SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

39088002450146

ANLEITUNG
ZU
WISSENSCHAFTLICHEN BEOBACHTUNGEN
AUF REISEN.

copying this.

Styngner
25.

ANLEITUNG

ZU

WISSENSCHAFTLICHEN BEOBACHTUNGEN AUF REISEN.

MIT BESONDERER RÜCKSICHT

AUF DIE BEDÜRFNISSE DER KAISERLICHEN MARINE

VERFASST VON

P. ASCHERSON, A. BASTIAN, W. FÖRSTER, K. FRIEDEL, G. FRITSCH,
A. GERSTÄCKER, A. GRIESEBACH, A. GÜNTHER, J. HANN, G. HARTLAUB,
R. HARTMANN, H. KIEPERT, W. KONER, E. VON MARTENS, A. MEITZEN,
K. MÖBIUS, G. NEUMAYER, A. OPPENHEIM, A. ORTH, C. A. F. PETERS,
F. VON RICHTHOFEN, G. SCHWEINFURTH, K. VON SEEBACH, H. STEIN-
THAL, F. TIETJEN, R. VIRCHOW, E. WEISS, H. WILD

UND

HERAUSGEGEBEN

VON

Georg Balthasar
DR. G. NEUMAYER,

HYDROGRAPH DER KAISERLICHEN ADMIRALITÄT.

MIT 56 HOLZSCHNITTEN UND 3 LITHOGR. TAFELN.

BERLIN,

VERLAG VON ROBERT OPPENHEIM.

1875.

Uebersetzungsrecht vorbehalten.

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.

Vorwort.

Als im März verflossenen Jahres eine Anzahl wissenschaftlicher Männer in Berlin zusammentrat, um zu berathen, wie die Herausgabe eines Werkes ermöglicht würde, dessen Bestimmung es sein sollte, den zahlreichen Reisenden und in fernen Ländern lebenden Angehörigen deutscher Nation eine einfache Anleitung zur Betheiligung an wissenschaftlichen Arbeiten auf den verschiedenen Gebieten der Naturforschung zu ertheilen, verhehlte man sich keineswegs, dass die Lösung dieser Aufgabe grosse Schwierigkeiten darbiete. Einerseits musste der wissenschaftliche Charakter des Werkes stets gewahrt bleiben, anderseits war Bedacht darauf zu nehmen, dass auch der nicht fachmännisch Ausgebildete daraus werthvolle Winke zu erhalten vermöchte, welche ihn befähigten, jede dargebotene Gelegenheit für die Beobachtung eines Phänomenes oder für eine wissenschaftliche Erhebung in einer solchen Weise auszunützen, dass die Resultate von wirklichem Werthe wären. In dieser, wie in so mancher anderen Hinsicht war zwar ein Vorbild für unsere „Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen“ in dem englischen „Manual of scientific enquiry“ vorhanden, welches nicht allein in britischen Kreisen, sondern auch bei deutschen Seeleuten und Reisenden grossen Anklang gefunden hat. Es erschien jedoch wünschenswerth, dass mit Rücksicht auf Zahl, Behandlung und Umfang der einzelnen darin aufzunehmenden Arbeiten den deutschen Verhältnissen und namentlich unserer einschlägigen Literatur Rechnung getragen werde, und so geschah es, dass manche Zweige der Forschung Berücksichtigung fanden, welche in dem englischen Werke fehlten, während wieder andere in dem deutschen Werke keine Stelle fanden, die dort berücksichtigt waren. Mit welchem Erfolge diese Sichtung der Materie durchgeführt wurde, wird die Zukunft lehren; einstweilen glauben wir, dass das deutsche Werk verglichen mit dem englischen Vorbilde wohl manche Mängel, aber auch

210643
4340 Reptiles

manche Vorzüge aufweisen wird. Wir sind uns bewusst, dass es nur allmählich und mit Hülfe derjenigen, welche es benützen, gelingen wird, die unleugbaren Wohlthaten, die ein solches Hülfsbuch der Wissenschaft und den Arbeitenden selbst zu bieten vermag, in immer vollerm Maasse zu verwirklichen.

Unser Buch dürfte gerade jetzt unter günstigen Umständen in die Oeffentlichkeit treten. Die ganze Richtung unserer Zeit, insbesondere die zahlreichen, von Deutschlands und Oesterreich-Ungarns Akademien und geographischen Gesellschaften ins Leben gerufenen Forschungsreisen, unter denen wir nur die wissenschaftlichen Unternehmungen im äquatorialen Afrika und die nun auf's Neue in Angriff genommene Lösung der geographischen Probleme innerhalb der Polarzonen namhaft machen wollen, rechtfertigen diese Annahme. Allein, was uns vor Allem in der Hoffnung ermuntert, dass unserer „Anleitung“ eine günstige Aufnahme und ein Erfolg zu Theil werde, ist der Umstand, dass in derselben den wissenschaftlichen Arbeiten der Marine soweit irgend möglich Rechnung getragen wurde, und dass sowohl in Deutschland, wie in Oesterreich-Ungarn nach dieser Richtung eine rege Thätigkeit herrscht. Wir erwarten daher mit einiger Zuversicht, dass der vaterländische Sinn, gepaart mit dem lebhaften Wunsche nach Kräften zur Förderung der Naturforschung auf allen Gebieten beizutragen, welche in erster Linie in den Mitarbeitern den Entschluss zur Herausgabe dieser systematischen Anleitung reiften, seinen Lohn darin finden wird, dass es den Expeditionen, den Reisenden und solchen, die in fernen noch wenig erforschten Ländern leben, gelingen wird, an der Hand derselben nützliche Beiträge für die Entwicklung menschlicher Erkenntniss zu liefern.

Ursprünglich war es beabsichtigt, die Herausgabe so zu beschleunigen, dass die Anleitung vor dem Abgange der Expeditionen zur Beobachtung des Vorüberganges der Venus vor der Sonnenscheibe erscheinen könnte. Leider ist es indessen trotz des grössten Eifers der meisten Mitarbeiter nicht gelungen, das Ganze rechtzeitig für die volle Benützung bei den gedachten Unternehmungen fertig zu stellen, indem es bei der Durchführung des Planes, ausser den schon berührten noch andere, hier nicht näher zu erörternde Schwierigkeiten zu beseitigen galt.

Schliesslich müssen wir mit besonderem Danke die geistige und materielle Förderung hervorheben, welche unser Unternehmen von Seiten der kaiserlichen Admiralität erfahren hat.

Berlin, den 9. December 1874.

I n h a l t.

	Seite
Ueber die Bestimmung der Abstände der Himmelskörper von der Erde und über die besondere Bedeutung, welche die Beobachtungen der Vorübergänge der Venus vor der Sonnenscheibe für diese astronomische Aufgabe haben, von Dr. W. Förster, Professor der Astronomie und Director der k. Sternwarte in Berlin	1
Geographische Ortsbestimmung, von Dr. F. Tietjen, Professor der Astronomie und Dirigent des astronomischen Seminars in Berlin	19
Topographische Beobachtung und Zeichnung (Flying survey, Levée à coup d'oeil), von Dr. H. Kiepert, Professor der Geographie und Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin	39
Anweisung zur Beobachtung allgemeiner Phänomene am Himmel mit freiem Auge oder mittelst solcher Instrumente, wie sie dem Reisenden zur Verfügung stehen, von Dr. E. Weiss, Professor der Astronomie und erster Adjunkt der kais. Sternwarte in Wien	49
Anweisung zur Anstellung von Beobachtungen über Ebbe und Fluth, von Professor C. A. F. Peters, Director der k. Sternwarte in Kiel	82
Anleitung zur Bestimmung der Elemente des Erdmagnetismus auf Reisen, von Dr. H. Wild, Professor und Director des physikalischen Centralobservatoriums zu St. Petersburg und Mitglied der kaiserl. Akademie der Wissenschaften daselbst	107
Meteorologie, von Dr. J. Hann in Wien	132
Politische Geographie und Statistik, von Dr. A. Meitzen, k. Geheimer Regierungsrath in Berlin	151
Heilkunde, von Dr. K. G. A. Friedel, Oberstabs- und Chefarzt des Ersten Preuss. Garde-Regiments zu Fuss	173
Allgemeine Rückblicke auf die Erforschungsgebiete der Continente und Erklärung der gebräuchlichsten Ausdrücke in der physikalischen Geographie, von Professor Dr. W. Koner, k. Bibliothekar in Berlin	206
Geologie, von F. Freiherr von Richthofen, Dr. phil. in Berlin	231
Erdbebenkunde, von Professor Dr. K. von Seebach in Göttingen	309
Pflanzengeographie, von Professor Dr. A. Grisebach in Göttingen	333
Die geographische Verbreitung der Seegräser, von Professor Dr. P. Ascherson in Berlin	359
Ueber Sammeln und Conserviren von Pflanzen höherer Ordnung (Phanerogamen), von Dr. G. Schweinfurth in Berlin	374
Das Sammeln von Reptilien und Fischen, von Dr. Albert Günther, Fellow of the Royal Society and Vice-President of the Zoological Society of London Assistant-Keeper des Zoologischen Departements des Britischen Museums . .	389

	Seite
Sammeln und Beobachten von Mollusken, von Dr. Eduard von Martens, k. Professor und Custos am zoologischen Museum in Berlin	403
Wirbellose Seethiere, von Dr. Karl Möbius, Professor der Zoologie und Director des zoologischen Museums in Kiel	418
Gliederthiere, von Professor Dr. A. Gerstaecker in Berlin	433
Vögel, von Dr. G. Hartlaub in Bremen	461
Die Säugethiere, von Professor Dr. R. Hartmann, Prosector am anatomischen Museum der k. Universität in Berlin	481
Ueber Sammlung und Aufbewahrung chemisch wichtiger Naturproducte, von Pro- fessor Dr. A. Oppenheim in Berlin	505
Allgemeine Begriffe der Ethnologie, von Professor Dr. A. Bastian, Custos am ethnologischen Museum in Berlin	516
Landwirthschaft, von Dr. Albert Orth, Professor der Landwirthschaft in Berlin	534
Linguistik, von Professor Dr. H. Steinthal in Berlin	551
Anthropologie und prähistorische Forschungen, von Professor Dr. R. Virchow, Director des Pathologischen Instituts, Mitglied der k. Akademie der Wissen- schaften in Berlin	571
Praktische Gesichtspunkte für die Verwendung zweier dem Reisenden wichtigen technischen Hilfsmittel: das Mikroskop und der photographische Apparat, von Professor Dr. G. Fritsch, am anatomischen Museum in Berlin	591
Hydrographie und Oceanographie, einschliesslich Winke über Höhenmessungen und magnetische Beobachtungen zur See, von Professor Dr. G. Neumayer, Hydrograph der kaiserl. Admiralität in Berlin	626
Anhang	686

K a r t e n .

- Skizze meines Weges am 1. Mai 1870 (letzte Hälfte, drei Stunden bis nach Jerusalem)
unterwegs entworfen von Dr. H. Kiepert.
- Karte zur Illustration hydrographischen Zeichnens von L. Friederichsen.
- Uebersichtskarte der Meeresströme und Trift von Dr. G. Neumayer.
-

Ueber die Bestimmung der Abstände der Himmelskörper von der Erde und
über die besondere Bedeutung, welche die Beobachtungen der Vorüber-
gänge der Venus vor der Sonnenscheibe für diese astronomische
Aufgabe haben.

Von

W. Förster.

Die folgenden Darlegungen werden sich von dem Inhalte und der Form der übrigen Beiträge, deren Gesammtheit die vorliegende Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen bildet, insofern unterscheiden, als die in der Ueberschrift genannte astronomische Aufgabe durch Reisen und Aufenthalt in fernen Erdgegenden auf keine andere Weise, als ganz systematisch unter fachmässiger Leitung nach sorgfältigster Vorbereitung und Ausrüstung gefördert werden kann, so dass es sich bei der vorliegenden Darstellung nicht um die Orientirung des Reisenden zum Zweck gelegentlicher unmittelbarer Betheiligung an der bezüglichen Forscher-Arbeit, sondern nur um eine Erneuerung des Verständnisses der wissenschaftlichen Ziele von Expeditionen obiger Art und um die entsprechende Erweckung oder Belebung grösstmöglicher Hilfsbereitschaft aller derjenigen, an welche sich das vorliegende Buch überhaupt wendet, für die Zwecke solcher Expeditionen handeln wird.

Die Expeditionen, welche zur Bestimmung der Entfernungen der Himmelskörper in ferne Gegenden der Erde ausgesandt werden, erhalten aber ein Recht, in diesem Buch an erster Stelle behandelt zu werden, sowohl dadurch, dass dieselben sich in der Vergangenheit höchst wesentliche Verdienste auch um die gesammte Erforschung der Erde erworben und so zur Förderung aller anderen wissenschaftlichen Aufgaben beigetragen haben, welche in vorliegender Anleitung behandelt werden, als auch im Besonderen dadurch, dass die für December 1874 bevorstehenden Expeditionen — zur Bestimmung genauerer irdischer Maassausdrücke für Dimensionen und Abstände innerhalb unseres Planetensystems mittelst Beobachtung des Vorüberganges der Venus vor der Sonnenscheibe — den unmittelbaren Anlass zur Herausgabe der vorliegenden Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen geboten haben.

Das wissenschaftliche Bedürfniss, Verhältnisse der Abstände der Himmelskörper von der Erde zu den Abständen verschiedener Punkte der Erde von einander oder allgemein zu den Dimensionen des Erdkörpers zu kennen, trat schon den ersten Astronomen entgegen, welche sich systematisch mit der Deutung und Vorausbestimmung der Bewegung des Mondes am Himmel beschäftigten, und zwar nachweisbar schon den babylonischen und den griechischen Astronomen. Nachdem schon in alter babylonischer Zeit die aufmerksame und stetige Beobachtung insbesondere der Mondfinsterniss-Erscheinungen zu der Vorstellung der Kugelgestalt der Erde geführt hatte, konnte es trotz der Täuschung des unmittelbaren Augenscheins, welcher jedem Beobachter eine centrale Stellung innerhalb des Firmaments vorspiegelt, keine näher liegende Folgerung geben, als dass das Centrum der Welt nicht irgend ein Punkt der Erdoberfläche, sondern eben der Mittelpunkt der Erdkugel selbst sei. — Durch diesen Punkt musste auch die Drehachse der Alles umfassenden Himmelskugel, welche täglich alle Gestirne um die Erde herumzuführen schien, durch diesen Punkt die Drehachse jeder einzelnen der gedachten Sphären gehen, welche die 7 Wandelsterne Mond, Sonne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn innerhalb der Fixsternsphäre tragen und bewegen sollten, durch diesen Punkt endlich musste man sich auch alle die verschiedenen Ebenen, in denen sich die Umläufe dieser Wandelsterne zu vollziehen schienen, gelegt denken.

In Folge dessen mussten vom Erdmittelpunkte aus alle diese Bewegungen in ihren einfachsten, am leichtesten durch Mess- und Rechenkunst zu be-masternden Formen erscheinen. Dagegen mussten von der Erdoberfläche aus gesehen die Bewegungen wenigstens aller derjenigen Himmelskörper, welche der Erde so nahe waren, dass die excentrische Lage der Beobachtungsstationen auf der Erdoberfläche von ihnen aus unter messbaren Winkeln wahrgenommen werden konnte, nothwendig gewisse von diesen Winkelgrössen abhängende Abweichungen von jener einfachsten, unmittelbar nur von dem unzugänglichen Centrum der Erde aus wahrzunehmenden Form der Erscheinungen zeigen.

Mit Sicherheit messbar waren nun den babylonischen und den griechischen Astronomen Winkel von etwa einem Drittheil des Grades.

Erwägt man zwar, dass der Winkel, unter welchem uns der Durchmesser der Sonne und der des Vollmondes durchschnittlich erscheint, etwas mehr als einen halben Grad beträgt, und dass ein gutes unbewaffnetes Auge Doppelsterne deutlich getrennt sieht, deren Winkelabstand an der Himmelskugel nur etwa 2 Minuten oder ein Dreissigstel des Grades beträgt, so scheinen selbst für die ältesten Astronomen obige Annahmen zu weit gegriffen zu sein. Es ist jedoch zu bedenken, dass es sich bei der Erkennung von Abweichungen und scheinbaren Unregelmässigkeiten gewissen Winkelbetrages in den Bewegungen der Himmelskörper nicht bloss um die Schärfe des Sehens, sondern auch um die Vergleichung und Festhaltung verschiedener Visirrichtungen an den Messinstrumenten, also um den Sicherheitsgrad der jedesmaligen Orientirung und der geometrischen Einrichtung der Instrumente, sowie um die Genauigkeit der Zeitmessung handelt.

Nimmt man also nach den zahlreichen uns vorliegenden Zeugnissen von dem Entwicklungszustande der astronomischen Messkunst in babylonischen und in griechischen Zeiten obigen Zahlenwerth für die damalige Grenze sicherer Messbarkeit von Oertern und Ortsveränderungen an der Himmelskugel an, so folgt daraus, dass ein Himmelskörper, bei welchem damals die excentrische Lage einer Beobachtungsstation auf der Erdoberfläche oder der Ab-

stand derselben von dem Mittelpunkt der Erde und »der Welt« in Besonderheiten seiner Winkelbewegung an der scheinbaren Himmelskugel sicher erkennbar werden wollte, höchstens so weit von der Erde entfernt sein durfte, dass von ihm aus der Halbmesser der Erdkugel unter einem Winkel von einem Drittel-Grad erschien, d. h. um höchstens 172 Erdhalbmesser.

Innerhalb dieses Abstandes von der Erde befindet sich von den mit unbewaffnetem Auge sichtbaren Himmelskörpern allein der Mond, dessen mittlere Entfernung vom Centrum der Erde bekanntlich nahezu 60 Erdhalbmesser beträgt. Vom Monde aus gesehen muss hiernach der Halbmesser der Erdkugel unter einem Winkel erscheinen, dessen mittlerer Werth nahezu 57 Minuten beträgt. Um eben denselben Winkel muss natürlich von einem Punkte der Erdoberfläche, an welchem eine vom Monde nach der Erde gedachte Gesichtslinie diese Oberfläche eben berührt, ohne sie zu schneiden, also von einem Punkte, in welchem der Mond sich gerade im Horizonte befindet, die Richtung nach dem Monde hin oder der Ort desselben an der Himmelskugel verschoben erscheinen gegen den Ort, an welchem der Mond im selbigen Zeitpunkte von dem Mittelpunkte der Erde erscheinen würde. Man nennt bekanntlich derartige Richtungsunterschiede der Gesichtslinien, wie sie eintreten, wenn auf ein und dasselbe Objekt von verschiedenen Standpunkten aus visirt wird, und dasselbe hiernach zwischen anderen entfernteren Objekten, auf deren scheinbare Lage dieselbe Verschiedenheit der Standpunkte keinen merklichen oder einen geringeren Einfluss hat, verschiedene Stellen einzunehmen scheint, Parallaxen oder parallaktische Ortsveränderungen des Objectes (nach einem griechischen Worte, dessen Sinn ungefähr den Vorgang der Verschiebung der Gesichtslinien ausdrückt.) Hiernach heisst der oben definirte Winkel, unter welchem vom Monde aus der Halbmesser der Erdkugel erscheint, oder die entsprechende Verschiebung, welche der Ort des Mondes am Himmel im Horizonte eines Beobachtungsortes gegen eine vom Erdmittelpunkt aus gleichzeitig nach dem Monde gerichtete Gesichtslinie und den entsprechenden Ort am Himmel erfährt, die Horizontal-Parallaxe des Mondes.

Innerhalb der einzelnen wissenschaftlichen Disciplinen gewährt es grosse Erleichterungen, derartige knappe technische Ausdrücke anzuwenden; den ausserhalb der Fachwissenschaft Stehenden erschweren dieselben oftmals das Verständniss der einfachsten Dinge. Die Parallaxen haben schon manchem Nichtastronomen Kopfzerbrechen bereitet, während man schon bei jeder Bewegung des Kopfes, oder bei abwechselndem Schliessen der Augen, überhaupt bei jeder Ortsveränderung des wahrnehmenden Sinnesorganes parallaktische Wirkungen in der gegenseitigen Lage der umgebenden Gegenstände erkennen kann.

Eine Eisenbahnfahrt lässt bekanntlich die Abstufung der Entfernungen der Gegenstände, an denen man vorüberreilt, deutlich an der verschiedenen Geschwindigkeit ihrer parallaktischen Verschiebungen bemerken, in denen sich die Abbilder derjenigen Winkelbewegungen darstellen, unter welchen von dem Ort der einzelnen Gegenstände aus, von den näheren schneller, von den entfernteren langsamer, die Bewegung des Eisenbahnzuges selbst erscheint.

Jede Dreiecks-Messung, bei welcher man an den beiden Endpunkten einer Standlinie die beiden Winkel, welche die Richtungen nach einem entfernten Gegenstand mit der Richtung der Standlinie bilden, aufnimmt, um dadurch die Entfernung dieses Gegenstandes im Verhältniss zur Länge der Standlinie zu bestimmen, wobei der dritte Winkel des Dreiecks oder der

Winkel an dem entfernten Gegenstande gleich dem Unterschiede der beiden an den Endpunkten der Standlinie aufgenommenen Richtungen, d. h. gleich ihrer Abweichung vom Parallelismus ist, lässt sich auch als eine Bestimmung des Parallaxen-Winkels, unter welchem die Standlinie an dem entfernten Objekt erscheint, bezeichnen.

Die Erkenntniss der zutreffenden Aehnlichkeit aller dieser bekannten Wahrnehmungen oder geläufigen Messungen mit den parallaktischen Erscheinungen und Aufgaben in der Astronomie und das Bewusstwerden parallaktischer Wirkungen überhaupt wird hauptsächlich dadurch verhüllt, dass man bei den sich scheinbar in überall gleicher Entfernung auf der Himmelskugel projicirenden Erscheinungen der Himmelsräume zur direkten Bestimmung der Verschiedenheiten der Entfernungen kein anderes Mittel, als die bewusste und exakte Messung der parallaktischen Erscheinungen besitzt. Auf der Erde dagegen wird bei Beurtheilung der Verschiedenheit der Entfernungen meistens unbewusst verfahren, indem man dabei in erster Stelle, wenn auch nur bei den nicht zu entfernten Gegenständen, diejenigen parallaktischen Wirkungen gelten lässt, welche schon durch die Verbindung der Wahrnehmungen der beiden Augen unbewusst hervorgebracht werden, und deren Wesen (das sogenannte stereoskopische Sehen) man erst bei abwechselndem Schliessen der Augen, in einer durch diese Veränderung des Visirpunktes bewirkten parallaktischen Verschiebung der näheren Gegenstände gegen die entfernteren deutlich bemerkt, und indem man ausser diesem unbewussten Verfahren der Entfernungsschätzung auch noch in dem Grade der konvergirenden Visir-Stellung der beiden Augen-Achsen, sowie endlich in dem Grade der Deutlichkeit, der Färbung und der scheinbaren Grösse der ihren wirklichen Formen, Farben und Dimensionen nach meist bekannten Gegenstände hinreichende Mittel zu einer fast instinktiv werdenden Schätzung ihrer Entfernungen hat.

Es wird daher in der Regel Niemandem, der auf der Eisenbahn fährt, einfallen, sich durch die grössere oder geringere Schnelle des parallaktischen Vorübereilens der Gegenstände ein Urtheil über ihre Entfernungen zu bilden, da Jedermann hierfür ungefähre Anhaltspunkte schon in Fülle hat, wogegen es einem in exakten Messungen Bewanderten wohl einfallen könnte, mit einer Secundenuhr in der Hand auf Grund der Geschwindigkeit, die der betreffende Zug nach dem Fahrplan durchschnittlich hat, bei entfernteren Gegenständen das Maass ihrer — durch eine gewisse auf der nahezu geradlinigen Bahn zurückgelegte Strecke bedingten — parallaktischen Winkelbewegung am Horizonte zu schätzen und dadurch beiläufige Entfernungsbestimmungen zu machen, die den astronomischen ganz ähnlich sind.

Die Wirkung der Horizontal-Parallaxe lässt den Mond stets weiter entfernt vom Scheitelpunkt eines Beobachtungsortes auf der Erdoberfläche erscheinen, als er vom Erdmittelpunkt aus gesehen werden würde, und zwar hat diese Wirkung, wie leicht ersichtlich, im Horizonte ihr Maximum, während sie, wenn der Mond im Scheitelpunkt eines Ortes steht, verschwindet, weil dann der Beobachtungsort und der Erdmittelpunkt vom Monde aus gesehen in derselben Richtung liegen, was nur wegen der Ellipsoid-Gestalt der Erde nicht völlig genau zutrifft.

Die Horizontal-Parallaxe verzögert nach dem Obigen relativ den Aufgang und verfrüht ebenso den Untergang des Mondes. Diese Wirkungen konnten indessen von den alten Astronomen nicht bemerkt werden, weil ihre Mittel der Zeitmessung noch nicht entwickelt genug waren. Auch wirkt die Brechung, welche die Lichtstrahlen beim Untergang aus dem Welt-

raum in die nach der Erdoberfläche hin immer dichter werdenden Schichten der Erdatmosphäre erfahren, jenem Einfluss gerade in der Nähe des Horizontes so stark entgegen, dass dort nur die kleinere Hälfte der Parallaxen-Wirkung übrig bleibt.

Dagegen konnten die alten Astronomen bei den Mondfinsternissen die parallaktische Wirkung der excentrischen Lage des auf der Erdoberfläche befindlichen Beobachtungsortes bemerken und zwar folgendermaassen: Die Achse des Schattenkegels der Erde, in welchem der Mond verfinstert erscheint, ist eine durch den Sonnenmittelpunkt und durch den Erdmittelpunkt gehende gerade Linie. Der Mittelpunkt des Kreises, in welchem der Schattenkegel die scheinbare Himmelskugel schneidet, muss also, vom Erdmittelpunkt aus gesehen, der Sonne genau gegenüber liegen. Die Umriss dieses Kreises lassen sich nun wenigstens theilweise auf der in den Schatten eintretenden Vollmondscheibe so deutlich erkennen, dass man schon daraus die Lage des Mittelpunktes dieses Kreises gegen den Mittelpunkt der bekanntlich in dem Schattenraum niemals ganz verschwindenden Mondscheibe gut bestimmen kann. Diese von der Erdoberfläche aus bestimmte Lage der Mitte des vom Monde durchlaufenen Schnittes der Schattenfläche an der Himmelskugel wird nun von dem genauen Gegenpunkt des gleichzeitigen Sonnenortes am Himmel gerade um den Parallaxen-Winkel verschieden sein, unter welchem der Abstand des Beobachtungsortes vom Erdmittelpunkte zur Zeit der Beobachtung vom Monde aus erscheint.

Aus diesem Winkel an der Spitze des Dreieks, welches einerseits durch den Mittelpunkt des Schattenschnittes, andererseits durch den Beobachtungsort und den Erdmittelpunkt als Endpunkte der Standlinie oder Basis bestimmt wird, kann mit Hinzunahme desjenigen Winkels, welchen am Beobachtungsort selbst die Richtung zum Mittelpunkt des Schattenschnittes mit der Richtung von dem Erdmittelpunkte nach dem Beobachtungsort macht, das Verhältniss der Entfernung des Mondes vom Erdmittelpunkt zum Halbmesser der Erde abgeleitet werden.

Der eben erwähnte zweite Winkel aber wird, wenn man die kleine Abweichung der Erdgestalt von der Kugelform vernachlässigt, einfach durch den derzeitigen Winkel-Abstand des Scheitelpunktes des Beobachtungsortes vom Mittelpunkt des kreisförmigen Schattenschnittes gefunden.

Schwierigkeiten musste den Alten hierbei nur die Bestimmung des genauen Gegenpunktes zur Sonne bieten. Wurden indessen unter den zahlreichen Mondfinsternissen, welche mit allen charakteristischen Umständen Jahrhunderte oder vielleicht Jahrtausende hindurch in Babylon aufgezeichnet worden waren, solche ausgewählt, bei denen der Mond um die Mitte der Verfinsterung sich in der Mittagsebene des Ortes befand, so ergab sich hierfür die Lage des Gegenpunktes zur Sonne leicht unter Benutzung der am vorhergehenden und am folgenden Mittag mit der Schattensäule bestimmten Mittagshöhe der Sonne, natürlich unter der Voraussetzung, dass die Sonne selbst durch die excentrische Lage des Beobachtungsortes keine oder wenigstens eine viel kleinere Parallaxe erfuhr, als der Mond, mit andern Worten, dass sie viel entfernter sei, als der Mond. — Dass der letztere überhaupt näher sei, als die Sonne, ergaben ja schon die Sonnenfinsternisse, in welchen er nachweisbar vor die Sonne trat, während er zugleich, nach seinem scheinbaren Durchmesser zu schliessen, bei diesen Phänomenen nicht wesentlich näher an der Erde war als sonst.

Dass aber die Entfernung der Sonne sogar um Vieles grösser, also ihre Parallaxe um vieles kleiner sei, als die des Mondes, ergab der bei den Mond-

finsternissen bestimmbare Halbmesser des Schattenkegelschnittes selbst. Derselbe erschien nahezu unter demselben Winkel, unter welchem vom Monde aus nach den vorläufigen Resultaten des oben erörterten Verfahrens der Halbmesser der die Schattenumrisse erzeugenden Erdkugel selbst gesehen wurde. Es erfolgte also bis zum Monde hin keinesfalls eine starke Divergenz des Schattenkegels, sondern die Wände desselben verliefen, wie es nur bei einer verhältnissmässig sehr entfernten Lichtquelle möglich ist, fast parallel.

Aus der Vergleichung der Winkelgrösse des Halbmessers des vom Monde passirten Schattenkegelschnittes mit dem Parallaxen-Winkel, unter welchem am Monde der Halbmesser der Erde erschien, suchte später Ptolemäus um 140 n. Chr. das Verhältniss der Entfernung der Sonne zur Entfernung des Mondes von der Erde wirklich zahlenmässig zu bestimmen.

Ein anderes Verfahren zur Lösung letzterer Aufgabe hatte aber schon vierhundert Jahre vor ihm Aristarch von Samos eingeschlagen, indem er den Winkelabstand des Mondes von der Sonne in einem der Zeitpunkte maass, in welchen die Mondscheibe genau zur Hälfte erleuchtet erscheint, in welchen also in dem Dreieck: Sonne, Erde, Mond, der Winkel an letzterem sehr nahe ein rechter ist. Da alsdann in diesem Dreieck zwei Winkel bekannt waren, konnte auch der Parallaxen-Winkel, unter welchem von der Sonne aus der Abstand des Mondes von der Erde erschien, und konnten überhaupt die Verhältnisse der Seitenlängen zu einander berechnet werden. Aristarch fand hieraus, dass die Sonne etwa 19 mal weiter entfernt sei, als der Mond, was später Ptolemäus nach der oben erwähnten Methode nahezu bestätigte. Bekanntlich beträgt aber jenes Vielfache in Wirklichkeit nicht 19, sondern etwa 400. Die Winkelgrössen, um die es sich hiernach handelte, waren eben zu klein, um von den Alten mit Sicherheit gemessen zu werden. —

Zu systematischen Messungen hatten übrigens die vorher erwähnten Möglichkeiten, das Verhältniss des Abstandes des Mondes zu den Dimensionen der Erde aus den Beobachtungen der Mondfinsternisse abzuleiten, nicht geführt: sie hatten ebenfalls nur dazu gedient, eine ungefähre Vorstellung von diesem Verhältnisse zu geben. Diese Vorstellung wurde erst in der griechischen Zeit deutlicher und wissenschaftlicher, nachdem man auch von den Dimensionen des Erdkörpers selbst im Verhältniss zu den irdischen Maassen durch die Gradmessung des Eratosthenes eine wissenschaftliche Kenntniss erlangt hatte. Das Verfahren, welches endlich Ptolemäus einschlug, um eine möglichst exakte Bestimmung der Mond-Parallaxe zu erlangen, gehört im Princip schon ganz zu dem System von parallaktischen Methoden, welche gegenwärtig zur Bestimmung der Entfernungen der Himmelskörper von der Erde angewandt werden, nachdem man durch die genauere Kenntniss der Gestalt und der Dimensionen der Erde und durch die sicheren Bestimmungen, welche man von der Lage der Beobachtungsorte auf der Erdoberfläche zu einander und zu den Polen und festen Meridianen der Erde machen kann, in den Stand gesetzt ist, statt des Halbmessers der Erde jeden beliebigen Abstand auf der Erde als Standlinie für die parallaktische Dreiecksmessung zu benutzen.

Die Methoden zur trigonometrischen oder parallaktischen Bestimmung der Entfernungen der Himmelskörper in Maassen der Erde zerfallen mit Ausschluss der oben erörterten, auf die Beschattungs- und Beleuchtungs-Erscheinungen begründeten, welche wegen des Mangels an Bestimmtheit und Regelmässigkeit jener Licht- und Schattengrenzen keine für die gegenwärtigen

Anforderungen hinreichende Genauigkeit mehr bieten, hauptsächlich in zwei Gruppen:

1) Messungen der scheinbaren Ortsveränderungen am Himmelsgewölbe, welche das Objekt, dessen Entfernung zu bestimmen ist, erfährt durch diejenigen Ortsveränderungen des Beobachters selbst, welche von der Drehung der Erde hervorgebracht werden, somit nach Richtung und Grösse leicht bestimmbar und in den Maassen des Erdkörpers ausdrückbar sind.

2) Messungen der Abstände der verschiedenen Oerter am Himmelsgewölbe, an welchen das Objekt, dessen Entfernung zu ermitteln ist, in einem und demselben Zeitpunkte von verschiedenen Beobachtungsstationen aus, deren gegenseitige Lage nach Richtung und Abstand bestimmbar und in den Maassen des Erdkörpers ausdrückbar ist, gesehen wird.

Beide Methoden fliessen bei Bestimmungen von Entfernungen auf der Erde selbst, zumal bei relativ ruhenden Objekten, in eine zusammen, denn es ist bei einer solchen irdischen Dreiecksmessung im Allgemeinen gleichgültig, ob die Winkel an den beiden Endpunkten der Stand- oder Grundlinie gleichzeitig von zwei verschiedenen Beobachtern oder nach einander von demselben Beobachter gemessen werden.

Bei ausserirdischen Entfernungsbestimmungen indessen sind obige Unterscheidungen erheblich, da man es bei ihnen stets mit relativ bewegten Objekten und mit mehreren Arten von Bewegungen des Standortes, z. B. ausser mit der täglichen Drehung auch noch mit der jährlichen Bewegung der Erde zu thun hat, wobei natürlich eine nahe Gleichzeitigkeit der Beobachtungen an zwei möglichst weit von einander abstehenden Stationen grosse Vorzüge bietet, während andererseits die Schwierigkeiten der sicheren Erzielung möglichst gleichartiger korrespondirender Messungen verschiedener von einander weit entfernter Beobachter in vielen Fällen für die Benützung der Drehung der Erde zum bequemsten, billigsten und schnellsten Transport eines und desselben Beobachters von einem Ende einer grossen irdischen Standlinie zum andern den Ausschlag gegeben haben.

Letztere Methode hat danach in der That bis zum Ende des 17. Jahrhunderts fast ausschliessliche Anwendung gefunden. Sie ist auch dem Princip nach die einzige, welche bei der Erweiterung der parallaktischen Probleme über die irdischen Standlinien hinaus, nämlich bei den ersten Ausmessungen der Planeten-Bahnen und der Fixstern-Entfernungen durch die parallaktischen Wirkungen unserer Bewegung um die Sonne (jährliche Parallaxe), sowie bei der ferneren Ausmessung der Fixstern-Räume durch die parallaktischen Wirkungen der Bewegung des ganzen Sonnensystems (Säkulär-Parallaxe) zur Anwendung kommt, weil uns ausserhalb der Erde die korrespondirenden Beobachter noch gänzlich fehlen.

In einer eigenthümlichen Form wurde diese Methode zuerst von Ptolemäus zur Bestimmung der Entfernung des Mondes angewandt.

Korrespondirende astronomische Beobachtungen an entfernten Punkten der Erde, wie wir sie jetzt in gewöhnlichen Fällen durch das Zusammenwirken der Astronomen aller Erdtheile verhältnissmässig leicht erlangen, wie sie sogar regelmässig einen Theil des Arbeitsplanes gewisser nördlichen und südlichen Sternwarten bilden, vermochten die Astronomen Alexandrias eben noch nicht zu beschaffen. Dafür aber hatte Alexandria gerade mit Bezug auf die durch den Erdmittelpunkt gehende Ebene der Mondbahn eine besonders günstige Lage.

In den Zeiten nämlich, in welchen diese Bahnebene ihre stärkste Neigung gegen die Ebene des Erdäquators hatte, lag Alexandria bei einer be-

stimmten Phase der Erddrehung sehr nahe in der Ebene der Mondbahn, während es in der gerade entgegengesetzten Phase der Erddrehung einen senkrechten Abstand von der Mondbahnebene hatte, welcher nahezu $\frac{9}{10}$ des Erdhalbmessers betrug. Gelang es, den Mond in diesen beiden entgegengesetzten Drehungsphasen der Erde auch in den entsprechenden einander entgegengesetzten Stellen seiner Bahn zu beobachten, so fand bei der einen Beobachtung, bei welcher der Mond dem Scheitelpunkt von Alexandria sehr nahe kam, fast gar keine parallaktische Wirkung statt, während bei der anderen Beobachtung der Mond in Alexandria um nahezu $\frac{9}{10}$ desjenigen Winkels, unter welchem alsdann von ihm aus der Erdhalbmesser gesehen werden musste, vom Nordpol des Himmels entfernter erschien, als vom Erdmittelpunkte aus. In Bezug auf letzteren, sowie überhaupt von jedem Punkte der Ebene des Erdäquators aus gesehen fand eine völlige Symmetrie der beiden äussersten Mondstellungen nördlich und südlich vom Himmelsäquator statt; von Alexandria aus war dagegen beim Durchgange durch die Mittags-ebene der äusserste südliche Abstand des Mondes vom Himmelsäquator um $\frac{9}{10}$ der Horizontal-Parallaxe grösser, als der grösste nördliche Abstand vom Himmelsäquator.

Hiernach bestimmte Ptolemäus aus seinen Messungen für Vollmonds- und Neumondszeiten die Entfernung des Mondes zu 59 Erdhalbmessern. (Leider wurde der Gewinn, den diese ziemlich genaue Bestimmung der Astronomie brachte, durch gewisse Fehler der Mondstheorie des Ptolemäus vermindert, welche die Annahme einer viel grösseren Veränderlichkeit dieser Entfernung enthielten, als nach den verhältnissmässig kleinen Veränderungen der scheinbaren Grösse des Mondes zulässig erscheinen durfte.)

In dem ganzen oben dargelegten Verfahren bei der Parallaxen-Bestimmung des Mondes wird übrigens gar nichts dadurch geändert, dass Ptolemäus selbst keine Drehung der Erde, also auch keine Bewegung des Beobachtungsortes annahm, sondern die Drehung nur der Himmelskugel und dem gesammten von ihr umfassten Himmelsraume zuschrieb.

Letztere Drehung um das Centrum der Erde musste für einen ruhenden, aber excentrisch gelegenen Beobachtungsort dieselben Erscheinungen hervorbringen, wie bei ruhender Himmelskugel die Bewegung des Beobachtungsortes durch die Drehung der Erde.

Nach obiger Messungsmethode würde man auch die Parallaxe der Sonne an jedem ausserhalb des Erdäquators gelegenen Punkte der Erdoberfläche, z. B. mit völliger Analogie zu obigem Verfahren von einem Punkte der Wendekreise aus, durch die Unsymmetrie ihrer grössten nördlichen und südlichen Abweichung vom Himmelsäquator auf Grund der notorischen Symmetrie der für den Erdmittelpunkt und die Ebene des Erdäquators überhaupt geltenden Phänomene derselben Art bestimmen können; doch würde dieses Verfahren aus vielen Gründen nicht zweckmässig sein, zumal da sich sogar nach demselben Princip günstigere Bedingungen für die Lösung derselben Aufgabe erreichen lassen.

Aehnliches gilt von entsprechenden Parallaxen-Bestimmungen solcher Objekte, die, von gewissen Gegenden der Erdoberfläche aus gesehen, nicht untergehen, sondern in entgegengesetzten Phasen der Erddrehung, also von den beiden Endpunkten des Durchmessers eines Parallelkreises aus gesehen, eine grösste und eine kleinste Höhe über dem Horizonte erreichen.

Eine andere und folgenreichere Anwendung der Drehung der Erde zur Parallaxen-Bestimmung machte gegen Ende des 15. Jahrhunderts Regiomontan (Johannes Müller aus Königsberg, Franken) zu Nürnberg.

Er maass die Veränderungen, welche die Oerter eines Kometen an der Himmelskugel erfuhren, wenn er sie womöglich innerhalb desselben Tages sowohl in der Nähe des westlichen als des östlichen Horizontes, also von den möglichst weit von einander entfernten, äussersten östlichen und westlichen Standpunkten, die man durch die Drehung der Erde erreichen konnte, bestimmte. Hierbei musste er natürlich die in der Zwischenzeit erfolgte Winkelbewegung am Himmel, welche der Komet — sowohl durch seine eigene Bewegung im Himmelsraume, als auch durch die parallaktische Wirkung der gleichzeitigen Bewegung der Erde in ihrer Bahn um die Sonne — erfuhr, in Rechnung bringen.

Dafür gab es aber eine hinreichende genäherte Bestimmung, wenn man den Kometen ausser in entgegengesetzten westlichen und östlichen Drehungsphasen der Erde hinreichend oft zu aufeinanderfolgenden Malen auch in einer und derselben Drehungsphase der Erde beobachtete und daraus die Oerter desselben am Himmel für die dazwischen liegenden Zeitpunkte der in entgegengesetzten Drehungsphasen stattfindenden Standorte des Beobachters einschaltete. Aus der Vergleichung der eingeschalteten mit den wirklich beobachteten Oertern des Kometen ergab sich alsdann die parallaktische Wirkung der in Theilen des Erdhalbmessers auszudrückenden Ortsveränderung, welche der Beobachter selbst durch die Drehung der Erde erfahren hatte, und daraus das Verhältniss der Entfernung des Kometen zum Erdhalbmesser.

Nach dieser in der Folge auch von Tycho v. Brahe angewandten Methode des Regiomontan, nur in etwas verfeinerter Anordnung mit Hülfe der eben erfundenen Pendeluhr, sollte auch in den Jahren 1672 und 73 von einer besonderen — auch mit Rücksicht auf die grösseren Dimensionen, welche die Parallellkreise in der Nähe des Aequators haben, also auf die grösseren dort durch die Drehung der Erde herzustellen Standlinien — nach Cayenne entsandten französischen Expedition die Entfernung des Planeten Mars in einer seiner Erdnähen bestimmt werden, um daraus in einer unten näher zu erörternden Weise auch die Dimensionen der Bahnen der übrigen Planeten und die der Erdbahn selbst und damit die Sonnen-Parallaxe abzuleiten.

Nachdem in dieser Bestimmung der Sonnen-Parallaxe und einigen ähnlichen Versuchen, die ihr bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts folgten, die Methode der Benutzung der Drehung der Erde zur Hervorbringung parallaktischer Wirkungen eine Art von Gipfelpunkt erreicht hatte — man hat sie erst viel später u. A. im Jahre 1862 bei einer ähnlichen Ausnutzung einer besonderen Erdnähe des Planeten Mars wieder aufgenommen — trat die zweite Methode (pag. 7) von der Mitte des 18. Jahrhunderts ab in den Vordergrund.

Man richtete alsbald, insbesondere zur genauesten Bestimmung der Entfernung des Mondes, eine korrespondirende Beobachtungsstation am Vorgebirge der guten Hoffnung ein und beobachtete sodann möglichst gleichzeitig, d. h. lange Zeiträume hindurch, so oft der Himmel wolkenfrei war, den Abstand des Mondes von den Himmelspolen beim Durchgange durch die Mittagsebene erst in Berlin, dann in Paris, Greenwich und am Vorgebirge der guten Hoffnung.

Diese bis in die neueste Zeit hinein fortgeführten, seit nunmehr etwa 40 Jahren durch Errichtung einer festen Sternwarte an dem genannten Vorgebirge unterstützten Messungen, bei welchen die z. B. zwischen der Sternwarte zu Greenwich und der Sternwarte am Kap gezogene Grundlinie des

Dreiecks, dessen Spitze der Mond bildete, nahezu das Anderthalbfache des Erdhalbmessers betragen hat, haben uns allmählig das Verhältniss der Entfernungen des Mondes von der Erde und überhaupt der Dimensionen seiner Bahn um die Erde zu jener Standlinie auf der Erde, sowie die Gesetze der periodischen Veränderungen seiner Entfernung mit einer Genauigkeit kennen gelehrt, welche gegenwärtig Nichts zu wünschen übrig lässt; denn der noch mögliche unbekannte Fehler der jetzigen Bestimmung dieses Verhältnisses wird höchst wahrscheinlich $\frac{1}{10000}$ des angenommenen Zahlenwerthes nicht übersteigen, und wir sind zur Zeit kaum im Stande, das Verhältniss der bei dieser Messung benutzten irdischen Standlinie zu dem Halbmesser des Erdäquators mit einer grösseren Genauigkeit als auf $\frac{1}{10000}$ seines Werthes anzugeben, während zugleich in der Bestimmung des Verhältnisses des Halbmessers des Erdäquators zur Toise oder zum Meter (d. h. zu der aus der Toise abgeleiteten Bestimmung des letzteren) ebenfalls noch Unsicherheiten von nahezu demselben Verhältnissbetrage obwalten.

Das System „Erde und Mond“ ist also gegenwärtig von den Maassstäben menschlichen Ursprunges aufwärts bis zu den Dimensionen der Mondbahn mit einer zwar beschränkten, aber nahezu gleichartigen Genauigkeit ausgemessen und gewissermassen in ein zusammenhängendes Ganze dergestalt verwandelt, dass man zur Ausmessung noch grösserer Entfernungen z. B. der Sonne unter Umständen eine Standlinie von der Erde bis zum Monde ebenso sicher anwenden könnte, wie eine auf der Erde selbst gemessene. —

Eine solche vergrösserte Standlinie könnten wir zur Bestimmung der Parallaxe der Sonne und der Planeten sehr wohl brauchen; denn da z. B. die Sonne etwa 400 mal weiter von uns absteht, als der Mond, so würde eine Standlinie von der Erde bis zum Monde, obwohl sie etwa 60 mal länger als der Halbmesser der Erde und etwa 40 mal länger ist als die Standlinie vom Kap der guten Hoffnung nach Greenwich, dennoch bei der Ausmessung der Sonnenentfernung vergleichsweise erst den zehnten Theil der Genauigkeit bieten, welche die letztere Standlinie bei der Ausmessung der Mondentfernung zu erreichen gestattet hat.

Es wird nämlich einleuchtend sein, dass gewisse, bei derartigen trigonometrischen Winkelmessungen unvermeidliche Fehler, während sie in ihrem absolutem Betrage von der Grösse der Standlinie selbst im Allgemeinen nur in geringem Maasse abhängig sein können, die Bestimmung der Parallaxe oder des Winkels, unter welchem die Standlinie an dem entfernten Objekt erscheint, mit um so stärkerem Verhältnissbetrage verfälschen, je kleiner dieser Winkel, also je kleiner das Verhältniss der Standlinie zur Entfernung des Objectes ist. Ein Fehler von einer Sekunde in der Bestimmung des Unterschiedes der beiden, von den Endpunkten der Standlinie nach dem Objecte aufgenommenen Richtungen verfälscht, wenn dieser Unterschied oder die Parallaxe, wie beim Monde, etwa 3400 Sekunden beträgt, die Bestimmung der bezüglichen Entfernung nur um $\frac{1}{3400}$ ihres Werthes, während derselbe Fehler eine Parallaxe von nahe 9 Sekunden, wie die der Sonne, um $\frac{1}{9}$ ihres Werthes unrichtig machen würde.

In der That besitzen wir ein Mittel, um die Entfernung des Mondes von der Erde gewissermassen als Standlinie für die Bemessung der Sonnenentfernung zu benutzen. Wir können zwar keinen korrespondirenden Beobachter nach dem Monde senden, aber die sowohl im Sinne der Richtung als der Intensität stattfindende Verschiedenheit der Wirkungen, welche Erde und Mond gemäss ihrer Entfernung von einander und ihrer jedesmaligen relativen Lage zur Sonne von der Anziehungskraft der letzteren erfahren, bringt in

der Bewegung des Mondes um die Erde ausser einigen sehr bedeutenden Ungleichheiten, aus deren auf der Erde zu beobachtenden Winkelwerthen das Entfernungsverhältniss der Sonne und des Mondes herausfällt, eine Anomalie geringeren Betrages, die sogenannte parallaktische Ungleichheit, hervor, aus welcher wir direkt das Verhältniss der mittleren Entfernung der Sonne zur mittleren Entfernung des Mondes von der Erde und somit nach dem Obigen auch das Verhältniss der Entfernung der Sonne zu den Dimensionen des Erdkörpers ableiten können, sobald wir durch anhaltende genaue Beobachtungen der Mondbewegung den Betrag jener Ungleichheit selbst hinreichend genau festgestellt haben.

Leider ist die theoretische Ergründung und die sichere Messung der Bewegungen des Mondes durch manche Schwierigkeiten, unter Andern auch durch die Unsicherheit über seine wahre Gestalt, von der er uns stets nur eine Seite zukehrt, und über die Lage seines Schwerpunktes, so verwickelt, dass wir zunächst mehr danach streben müssen, die parallaktische Ungleichheit der Mondbewegung durch eine anderweitige Messung der Sonnen-Parallaxe berechenbar zu machen, als die letztere aus der Messung der Mondbewegungen abzuleiten.

Da es uns also versagt ist, zur Messung der Sonnenparallaxe eine in irdischen Maassen gleichartig ausgedrückte Standlinie über die Dimensionen der Erde hinaus zu gewinnen, müssen wir Mittel und Wege suchen, die rein irdische Messung der Sonnen-Parallaxe, — deren verhältnissmässige Genauigkeit nach dem Obigen unter Anwendung derselben Methode, wie bei der Mond-Parallaxe nahezu 400 mal geringer sein muss, als bei letzterer, — dadurch zu sichern, dass wir einerseits die trigonometrische Winkelmessung noch mehr verschärfen, andererseits anstatt die Messung der Sonnen-Entfernung direkt auszuführen, uns auf die Messung der Entfernungen solcher Himmelskörper verlegen, die in grössere Erdnähe als die Sonne gelangen können, und deren Entfernungen zugleich zur Sonnen-Entfernung in numerischen Verhältnissen stehen, welche uns mit bedeutender Genauigkeit bereits anderweitig bekannt sind.

Bekanntlich wird die letztere Bedingung durch das dritte Kepler'sche Gesetz mit grosser Annäherung erfüllt, welches die Umlaufzeiten der Planeten zu ihren Entfernungen von der Sonne in eine feste Beziehung setzt und dadurch die Verhältnisse aller Entfernungen im Planeten-System unter einander mit grosser Schärfe aus Zeitmessungen zu bestimmen gestattet.

Bevor wir auf eine nähere Darlegung der hierauf zu begründenden Maassregeln zur Bestimmung der Sonnen-Parallaxe eingehen, dürfte es an der Zeit sein, einige häufig auftretende Fragen zu beantworten, welche den folgenden subtileren Erörterungen über die bestmögliche Lösung unserer Aufgabe vielleicht entgentreten könnten:

Ist es denn, so hört man oft fragen, wirklich so wichtig, die Verhältnisse der Entfernungen der Sonne und der Planeten von uns zu den Dimensionen des Erdkörpers, überhaupt zu den irdischen Maassen sehr genau zu bestimmen? Genügt es nicht für unsere wissenschaftliche Neugierde, eine ungefähre Idee davon zu haben, wie viel Millionen Meilen oder Kilometer der eine und der andere Himmelskörper von uns entfernt ist.

Eine verhältnissmässig sehr genaue Entfernungsbestimmung des Mondes, so sagt man, mag noch wünschenswerth sein; eben weil er uns so nahe ist und deshalb so starke parallaktische Verschiebungen am Himmel erfährt, und weil er überhaupt mannigfach mit seinen Einflüssen in das irdische Leben hineinzutreten und zu uns zu gehören scheint, aber wozu eine so grosse

Mühe auf die äusserst genaue Entfernungsbestimmung der andern Himmelskörper verwenden?

Diesen Fragen kann man zunächst ganz allgemein entgegen, dass es ein bewährtes Princip der wissenschaftlichen Forschung ist, in der Genauigkeit ihrer Maassbestimmungen nirgends eine willkürliche Grenze zu machen, Nichts in ungenauer Bestimmung liegen zu lassen, was einer genaueren Bestimmung zugänglich ist, und überall in möglichst gleichartiger Weise an die Grenze des zur Zeit Erreichbaren zu dringen.

Bei der Befolgung dieses Principis kann die Wissenschaft ökonomisch verfahren, d. h. Eines nach dem Andern, das schwer Zugängliche nach dem leichter Erreichbaren vornehmen, aber sie wird niemals irgend ein Erkenntnissgebiet, auf welchem sie das Thatsächliche noch genauer und vollständiger zu ermitteln vermag, nach altklugen menschlichen Gesichtspunkten ganz unbebaut liegen lassen; denn sie weiss zur Genüge, welche Hülfe sie schon bisher zur Lösung ihrer Probleme und gerade der sogenannten „eminenter praktischen“ aus der strengen und folgerichtigen Erforschung von sogenannten Subtilitäten gezogen hat.

Aber die genauestmögliche Bestimmung der Entfernung der Sonne und der Planeten in irdischen Maassen ist für die ganze Astronomie und somit für alle Aufgaben des Lebens, denen diese ihre Hülfe widmet, sogar ein höchst dringliches und eminent „praktisches“ Problem.

Die Unsicherheit, welche auf diesem Gebiete noch obwaltet, ist zunächst und zwar in Folge der Schwierigkeiten, welche oben bereits erörtert wurden, viel grösser als man gemeinlich glaubt. Die bisherige Annahme über das Verhältniss der Entfernung der Sonne zu dem Halbmesser des Erdäquators ist nämlich möglicherweise um $\frac{1}{30}$ ihres Zahlenwerthes zu klein.

Specieller gefasst besteht aber die grosse Bedeutung einer genauen Kenntniss des Verhältnisses der Abstände und Dimensionen im planetarischen Raum zu den Abständen und Dimensionen im irdischen und Mondbahnraum hauptsächlich in folgenden beiden Erfordernissen.

1) Die merklich verschiedenen Oerter an der Himmelskugel, an denen die Sonne, die Planeten und die Kometen unter den fast unermesslich entfernten Fixsternen nicht nur von verschiedenen Punkten der Erdoberfläche, sondern auch von den verschiedenen Punkten aus gesehen werden, welche die Erde in ihrer monatlichen Bewegung um den gemeinsamen Schwerpunkt des Systems Erde-Mond einnehmen kann [dieser Schwerpunkt steht bekanntlich um etwa $\frac{3}{4}$ des Halbmessers des Erdäquators vom Erdmittelpunkt ab], können hinreichend sicher nur dadurch mit einander vergleichbar gemacht werden, dass man die Abstände jener Himmelskörper mit entsprechender Genauigkeit in denselben Maassen bestimmt, in denen uns die Dimensionen der Erde und der Mondbahn bekannt sind. Es ist somit schon das blosse Zusammenwirken der Astronomen der verschiedenen Erdtheile, welches eine immer genauere Bestimmung jener Maassverhältnisse fordert. So lange diese Verhältnisse noch nicht bis auf eine Fehlergrenze von etwa $\frac{1}{1000}$ ihrer Werthe ermittelt worden sind, bleibt jede Vergleichung und Verbindung z. B. der von den Sternwarten der südlichen und der nördlichen Halbkugel gemachten Beobachtungen der Sonne, der Planeten und der Kometen mit Unsicherheiten behaftet, welche die theoretische Bearbeitung dieser Beobachtungen in Betracht der hierbei zur Zeit erreichbaren anderweitigen Genauigkeit erheblich beeinträchtigen, sowie überhaupt die Verwerthung eines zweckmässigen Zusammenwirkens aller Astronomen der Erde auf dem Gebiete dieser Messungen erschweren.

2) Die Ausdrücke von solchen Kräften und Geschwindigkeiten, welche entweder in Maasseinheiten der Erde oder in Maasseinheiten des planetarischen Raumes ermittelt worden sind, können ihren absoluten Beträgen nach miteinander nicht hinreichend strenge verglichen werden, und es können die auf der Erde ermittelten Wirkungen nicht in den Himmelsraum, die in letzterem ermittelten Wirkungen nicht auf die Erde mit genügender Sicherheit übertragen werden, wenn das Verhältniss der Dimensionen der Erde und der Mondbahn zu den Dimensionen der Planetenbahnen nicht mit grösstmöglicher Genauigkeit bekannt ist. Es wird z. B. die Anziehungskraft der Erde sehr genau mittelst des schwingenden Pendels in Pendellängen, überhaupt in irdischen Maassen ausgedrückt gefunden; aus dem so bestimmten Maasse dieser Kraft können aber die sehr merklichen Einwirkungen, welche dieselbe Kraft, kombinirt mit der u. A. aus Ebbe- und Flutherscheinungen zu bestimmenden Anziehungskraft des Mondes, auch auf die Bewegungen der Sonne, der Planeten und der Kometen äussert, nur mit einer verhältnissmässigen Unsicherheit gefunden werden, deren Maass nahezu den dreifachen Werth der Fehlerquote beträgt, die noch in der Bestimmung des Verhältnisses der Entfernungen dieser Himmelskörper zu irdischen Maassen und Dimensionen verblieben ist. Ebenso wird die Anziehungskraft der Sonne durch die Messung der Umlaufszeit der Erde um die Sonne mit grosser Genauigkeit gefunden, aber ausgedrückt in einer Maasseinheit, welche der halben grossen Axe der von der Erde um die Sonne beschriebenen Ellipse nahezu entspricht. Die Wirkung dieser Anziehungskraft auf das System Erde-Mond in Hervorbringung sogenannter Ungleichheiten oder Störungen kann aber nur dann zuverlässig genug ermittelt werden, wenn man das Verhältniss der Halbaxe der Erdbahn zu den Dimensionen des Systems Erde-Mond hinreichend genau bestimmt hat, und zwar beträgt auch hier wieder die relative Unsicherheit der Uebertragung der Anziehungswirkung aus dem einen Maasssystem in das andere das Dreifache der relativen Unsicherheit unser Kenntniss der Verhältnisse der Maasseinheiten beider Systeme. Auch die Vergleichung der himmlischen und irdischen Bestimmung der Geschwindigkeiten des Lichtes bedarf einer genaueren Festsetzung der in Rede stehenden Maassverhältnisse.

Die unter No. 2 soeben aufgeführten Ermittlungen, welche zur Zeit noch einer möglichst genauen trigonometrischen Bestimmung des Verhältnisses der irdischen Maasseinheit zu den himmlischen Entfernungsmaassen bedürfen, werden voraussichtlich dereinst zu den genauesten Bestimmungen dieser Maassverhältnisse, ähnlich wie das dritte Kepler'sche Gesetz für die Entfernungsverhältnisse innerhalb des Planetensystems, ihrerseits entscheidende Beiträge liefern, aber erst nachdem durch mehrhundertjährige genaue Beobachtung der Wirkungen aller jener Kräfte ein möglichst vollständiges Prüfungsmaterial dafür geschaffen sein wird.

Zur Erfüllung aller jener wichtigen und in gewissem Sinne für die Erkenntniss aller Bewegungen, Kräfte und Gesetze in unserm Planetensystem fundamentalen Forderungen bietet uns nun das bereits erwähnte dritte Kepler'sche Gesetz ausserordentliche Erleichterungen, indem es zwischen den Dimensionen der Erdbahn und den Dimensionen aller Planeten- und Kometenbahnen, also auch zwischen beliebigen Abständen der Planeten und Kometen von der Erde und voneinander Verhältnisse aufstellt, die sich für die Planeten aus ihren Umlaufzeiten um die Sonne und für diejenigen Kometen, welche keine für uns messbare Umlaufszeit haben, aus den Winkelgeschwindigkeiten ihrer Bewegung am Himmel mit grosser Strenge ermitteln lassen.

Insbesondere für die Planeten bietet der Ausdruck jenes von Kepler gefundenen Gesetzes, wonach sich die halben grossen Axen der von den einzelnen Planeten um die Sonne beschriebenen elliptischen Bahnen zu einander verhalten, wie die Kubikwurzeln aus den Quadraten der Umlaufszeiten, den grossen Vorzug dar, dass dasselbe vermöge der fortwährenden Wiederholung der Umläufe und der dadurch im Verlaufe der Zeiten ermöglichten beliebigen Genauigkeit der Kenntniss der einzelnen Umlaufszeiten die Dimensionen der Bahnen mit einer Sicherheit zu bestimmen gestattet, welche durch keinerlei trigonometrische Winkelmessung unter Anwendung derselben Messungsmittel, mit denen die Wiederkehr der Planeten an denselben Ort des Himmels jedesmal bestimmt wird, erlangt werden kann. Gilt auch jenes von Kepler gefundene Verhältniss nicht mit absoluter Strenge, sondern nur mit einer Annäherung, welche aus der die Masse aller andern Körper unsers Systems weit überwiegenden relativen Grösse der Sonnenmasse hervorgeht, so lassen sich doch durch die successive Einfügung der Einwirkungen der allmählig immer genauer bekannt werdenden Massen aller Planeten jene Beziehungen zwischen Umlaufszeiten und Bahndimensionen mit einer so grossen Schärfe ermitteln, dass die Verhältnisse der Entfernungen der verschiedenen Planeten von der Sonne und ihrer Abstände von einander schon gegenwärtig mit einer Genauigkeit bekannt sind, welche die Genauigkeit aller trigonometrischen Messungen von Entfernungsverhältnissen selbst auf der Erde weit hinter sich lässt. Wir sind somit auch noch mit viel grösserer Sicherheit als wir auf der Erde aus den trigonometrischen Messungen von den Endpunkten einer hinreichend grossen Standlinie das Verhältniss der Entfernung eines Himmelskörpers zu den Dimensionen der Erde zu bestimmen im Stande sind, in der Lage, aus dem Resultate einer solchen einzelnen Messung des Abstandes irgend eines Planeten von der Erde das Gesamtverhältniss zwischen den Entfernungsmaassen des ganzen Planetensystems und den Dimensionen des Erdkörpers zu bestimmen. Natürlich werden wir in Folge der oben erörterten Genauigkeitsverhältnisse hierzu die trigonometrischen oder parallaktischen Bestimmungen des Abstandes desjenigen Planeten, der der Erde am nächsten kommen kann, nämlich der Venus, und zwar zur Zeit ihrer grössten Erdnähe wählen. Die kürzestmögliche Entfernung der Venus von der Erde beträgt etwa 26 Hundertel oder etwas mehr als $\frac{1}{4}$ der mittleren Entfernung der Sonne von der Erde. Der Winkel, unter welchem zur Zeit dieser kürzesten Entfernung von der Venus aus der Halbmesser des Aequators erscheint, wird etwa $33\frac{1}{2}$ Sekunden und die entsprechende parallaktische Verschiebung, welche der Ort der Venus am Himmel für die Standlinie von Greenwich zum Kap der guten Hoffnung erfährt, wird somit nahezu 50 Sekunden betragen, so dass, wenn es gelänge, den Unterschied der Richtungen von Greenwich und von der Kapstadt nach der Venus zur Zeit ihrer grössten Erdnähe mit der Genauigkeit von einem Zehntel der Sekunde zu bestimmen, das Verhältniss des Abstandes der Venus zu den irdischen Maasseinheiten etwa bis auf $\frac{1}{500}$ genau ermittelt sein würde. Natürlich würden hierdurch, da das Verhältniss des beobachteten kürzesten Abstandes der Venus von der Erde zu allen andern Dimensionen des Planetensystems bis auf verschwindend kleine Fehler richtig bestimmt ist, auch die Sonnenentfernung und alle übrigen Entfernungen im Planetensystem mit derselben verhältnissmässigen Genauigkeit bestimmt sein. Leider ist die Venus zur Zeit dieses kürzesten Abstandes von der Erde nur sehr selten für die Erde sichtbar, weil sie um diese Zeit an denjenigen Stellen ihrer Bahn sich befindet, welche zwischen der Sonne und der Erdbahn liegen, so dass sie im Allgemeinen bei dem Durchgange durch diese Erdnähe in Folge

der diffusen Erleuchtung der atmosphärischen Luft durch die Sonnenstrahlen und in Folge des Umstandes, dass sie der Erde in diesen Zeiten höchstens eine sehr schmale Sichel ihrer von der Sonne beleuchteten Hälfte zuwendet, total unsichtbar bleibt. Nur in denjenigen Fällen, in denen der Planet sich zur Zeit der Erdnähe nicht über oder unter der Sonne, sondern gerade in der Nähe der Durchschnittslinie seiner Bahnebene mit der Erdbahnebene befindet, und hierbei eine der von der Erde zu irgend welchen Punkten der leuchtenden Sonnenscheibe gezogenen Gesichtslinien passirt, wird die Venus, während sie alsdann uns nur die von der Sonne gar nicht beleuchtete Fläche zuwendet, als dunkle Scheibe vor den entsprechenden Stellen der Sonnenscheibe sichtbar. Diese Vorübergänge finden in derartiger Folge statt, dass immer zwei in 8 Jahren aufeinanderfolgen, von denen der eine nördlich, der andre südlich von dem Mittelpunkt der Sonnenscheibe vor sich geht, und dass diese zusammengehörigen Phänomenpaare sich alsdann in abwechselnden Intervallen von $113\frac{1}{2}$ und $129\frac{1}{2}$ Jahren wiederholen, z. B. in folgender Reihe von Epochen:

December	1631
December	1639
Juni	1761
Juni	1769
December	1874
December	1882
Juni	2004
Juni	2012.

Diese Seltenheit des wichtigen Phänomens scheint dasselbe eines grossen Theiles seiner Vorzüge für die Lösung der in Rede stehenden Aufgabe zu berauben; denn es ist eine wichtige Lehre der Messwissenschaften, dass durch die öftere Wiederholung einer und derselben Messung zu verschiedenen Zeitpunkten bedeutende Verstärkungen der Sicherheit der Endresultate gewonnen werden, indem durch solche unabhängige Wiederholungen die Wahrscheinlichkeit vermehrt wird, dass unter den unvermeidlichen Einflüssen der zahlreichen sogenannten zufälligen Fehler einander entgegenwirkende auftreten. — Hier- nach würden wir vorziehen müssen, Venus nicht blos in ihrer grössten Erdnähe, sondern auch in solchen Punkten ihrer Bahn zu beobachten, in welchen sie uns immer noch erheblich näher ist, als irgend ein anderer Planet, in welchen sie aber zugleich einfachere und in öfterer Wiederkehr zu erfüllende Bedingungen der Sichtbarkeit darbietet. In solchen Punkten der Venusbahn jedoch, in welchen der Planet hinreichend weit von der Sonne absteht, um selbst für geringe optische Hilfsmittel und selbst neben zahlreichen lichtschwächeren Fixsternen sichtbar zu sein, ist die Entfernung der Venus von der Erde nicht kleiner als drei Zehntel der Halbaxe der Erdbahn, während die kleinste Erdnähe, in welche der Planet Mars zu wiederholten Malen während eines Jahrhunderts gelangen kann, 38 Hundertel derselben Maasseinheit beträgt. Immer noch würde also die Beobachtung der Venus in denjenigen Punkten ihrer Bahn, in welchen sie uns näher ist als irgend ein anderer Planet und in welchen sie doch alljährlich bequem gesehen und ihrer Lage nach mit benachbarten Fixsternen verglichen werden kann, das günstigste Hilfsmittel zur Lösung unsrer Aufgabe bilden, wenn nicht der Uebelstand hinzuträte, dass in solchen Fällen Venus sich immer ziemlich nahe dem Horizonte befindet, und dass somit von der unregelmässigen Wärmemischung unsrer atmosphärischen Luft die Messungen stärkere Beeinträchtigungen erfahren, als für die geforderte Genauigkeit dieser Bestimmungen

wünschenswerth ist. Immerhin würden sich in grösseren Höhen bei Tage ausgeführte Messungen der Lage der Venus zu helleren Fixsternen, angestellt an sehr weit voneinander entfernten Punkten der Erdoberfläche, in den uns nächsten Theilen ihrer Bahn vorthellhaft verwenden lassen, umso mehr als dann die gleichzeitige Sichtbarkeit der Venus und benachbarter Fixsterne, welche letzteren von der Verschiedenheit der Standorte auf der Erdoberfläche wegen ihrer enormen Entfernung keinerlei parallaktische Einwirkungen mehr erfahren, uns die absolute parallaktische Einwirkung der Verschiedenheit der Standorte auf den scheinbaren Ort der Venus erkennbar machen würde, während zur Zeit der Vorübergänge der Venus vor der Sonnenscheibe ihr relativer Ort innerhalb der letzteren, von verschiedenen Standorten aus gesehen, nicht um die absolute parallaktische Wirkung, sondern nur um die Differenz der parallaktischen Wirkung auf den Planeten und auf der Sonne verschoben erscheinen wird.

Dem ungeachtet ist der Vorzug, den die sogenannten Durchgänge der Venus für die Bestimmung des Verhältnisses der irdischen und der himmlischen Entfernungsmaasse gewähren, ein ganz ausserordentlicher und so wenig durch Beobachtungen in irgend einer andern Stellung der Venus oder eines andern Planeten zu ersetzen, dass die Astronomen verpflichtet sind, bei der säkularen Wiederkehr dieser Phänomene das Aeusserste an ihre möglichst vollständige und sorgfältige Ausnutzung zu setzen. Zwar werden die Oerter der Venus gegen Mittelpunkt und Ränder der hellen Sonnenscheibe, von zwei Punkten der Erdoberfläche aus gesehen, deren Abstand gleich dem Halbmesser des Erdäquators ist, höchstens um 24—25 Sekunden verschieden erscheinen können, während die entsprechenden Ortsverschiedenheiten der Venus gegen benachbarte Fixsterne in andern noch hinreichend günstigen Punkten ihrer Bahn, in denen sie öfter gesehen werden kann, bis 30 Sekunden und die des Mars gegen benachbarte Fixsterne in seiner grössten Erdnähe auch noch etwa 25 Sekunden betragen werden. Aber jener geringere Winkelbetrag der relativen parallaktischen Verschiebung der Venus innerhalb der hellen Sonnenscheibe wird dafür durch korrespondirende Messungen von möglichst weit voneinander abstehenden Standorten auf der Erdoberfläche mit viel grösserer Sicherheit bestimmbar sein, als irgend eine andere Winkelmessung solcher parallaktischer Wirkungen zu erreichen gestattet. Gerade bei korrespondirenden Messungen, die möglichst gleichzeitig an weit entlegenen Punkten der Erdoberfläche angestellt werden müssen, bietet es die grössten Schwierigkeiten, die Messungsinstrumente und ihre Handhabung so völlig gleich zu machen, dass nicht zu den parallaktischen Verschiedenheiten, welche durch die Verschiedenheit der Standorte entstehen, noch höchst merkliche Verschiedenheiten hinzutreten, welche nur aus den Besonderheiten der Ausführung der Messungen hervorgehen und natürlich die Zuverlässigkeit der parallaktischen Ermittlungen höchst wesentlich trüben. Schon der erste Astronom, welcher auf die Vorzüglichkeit der Venusdurchgänge für die Bestimmung der Sonnenentfernung aufmerksam machte, Edmund Halley, hob hervor, dass durch die blossе Beobachtung der Zeitpunkte, in welchen die dunkle Venusscheibe sich mit der hellen Sonnenscheibe berühre, mit einer Genauigkeit, die nur von der Schärfe des bestbewaffneten Sehens, aber von keinem andern Messinstrument und auch von kleinen Fehlern in den Angaben der zeitmessenden Instrumente nur in verhältnissmässig geringem Grade abhängig sei, Winkelmessungen an den entlegenen Beobachtungsorten gewonnen werden könnten, deren Genauigkeit durch keinerlei noch so feine Messungen mit eingetheilten Kreisen oder mit

Mikrometerschrauben erreicht werden könne. Halley entgingen hierbei allerdings, ebenso wie den meisten Astronomen, welche im vorigen Jahrhundert die Durchgänge der Venus beobachteten, in einer durch die damalige Jugend der feineren optischen Technik erklärlichen Weise, die Bedeutung gewisser Eigenthümlichkeiten der Fernröhre, durch welche in den Zeitpunkten der Berührung der dunklen Venusscheibe mit der hellen Sonnenscheibe merkbliche Beobachtungsfehler hervorgerufen werden können. In der That sind die Verschiedenheiten der Leistungen der damaligen unvollkommenen Fernröhre in Verbindung mit der Unsicherheit der Bestimmungen der Lage einzelner damals gewählter wichtiger Stationen auf der Erdoberfläche die Ursache geworden, dass die Beobachtungen des vorigen Jahrhunderts, wie es scheint, nur zu einer ziemlich rohen Bestimmung der Sonnenparallaxe geführt haben. Mit der schärferen Kritik, mit welcher die gegenwärtige Beobachtungskunst auch die Leistungen der besten Fernröhre untersucht, werden bei dem bevorstehenden Phänomen dieser Art Fehler des oben erörterten Charakters auf ein verschwindend kleines Maass eingeschränkt werden, und zwar dadurch, dass alle Fernröhre, die an korrespondirenden Stationen zur Beobachtung der Berührungen von Venus und Sonnenscheibe dienen sollen, vorher sorgfältig miteinander verglichen werden, indem durch besondere Apparate der Vorübergang einer dunklen Scheibe vor einer hellen Scheibe in möglichst denselben Verhältnissen, wie sie bei dem Venusdurchgang selbst eintreten werden, künstlich dargestellt, und die absoluten und relativen Fehler, welche die einzelnen Fernröhre bei dieser Nachahmung des Phänomens zeigen, scharf genug ermittelt werden, um später bei der wirklichen Beobachtung in Rechnung gebracht werden zu können. Uebrigens wird es bei den bevorstehenden Venusdurchgängen voraussichtlich auch gelingen, gewisse mikrometrische Messungsmittel, die sogenannten Heliometer, welche gerade auf Phänomene solcher Art in sehr günstiger Weise anwendbar sind, nach den sorgfältigsten vorherigen Vergleichungen mit Vortheil anzuwenden.

Endlich aber bietet die Besonderheit der Venusdurchgänge, nämlich die Projektion des Planeten auf die hellste natürliche Lichtquelle, welche in den kleinsten Zeittheilen schon photographische Wirkungen ausübt, die günstigst denkbaren Verhältnisse für die Anwendung der Photographie zu völlig objektiven, von Beobachtungsfehlern und Fehlern der optischen Apparate fast vollständig zu befreienden Festlegungen der Verschiedenheiten, in welcher sich das Durchgangsphänomen von den entlegensten Punkten der Erdoberfläche aus darstellen wird. Nimmt man nämlich an einer hinreichenden Zahl von Stationen während der 4 bis 5 Stunden betragenden Dauer des Phänomens etwa 100 bis 150 einzelne photographische Platten auf, so kann die mit völlig gleichartigen Messungsmitteln nachher in Ruhe auszuführende Messung der nach Beobachtungszeit und Beobachtungsort verschiedenen Lage der Venus innerhalb der Sonnenscheibe zu einer Bestimmung der Venusparallaxe und somit der gesammten darauf zu begründenden Maassverhältnisse führen, welche bei sorgfältiger kritischer Untersuchung und Feststellung des wahrscheinlichsten Werthes, unabhängig von jeder Erregung des Augenblicks und jeder Verschiedenheit des Geschickes und der Umsicht der Beobachter vielleicht nicht ihres Gleichen haben kann.

Es wird z. B. Venus, von den südlichsten für die Beobachtungen tauglichen Stationen, den Kerguelen- oder den Macdonaldsinseln aus gesehen, zur Zeit ihres kürzesten Abstandes von dem Mittelpunkt der Sonnenscheibe etwa 41 Sekunden nördlicher erscheinen, als von den am weitesten nördlich gelegenen noch hinreichend tauglichen Beobachtungsstationen. Gelingt es

nun durch das Zusammenwirken der Beobachtungen der Berührungszeiten von Venusscheibe und Sonnenscheibe, mit mikrometrischen Messungen und mit Vergleichen der von den verschiedenen Stationen aus aufgenommenen Photographieen, diesen auf 41 Sekunden hypothetisch berechneten Abstand so genau zu bestimmen, dass der noch mögliche unbekannte Fehler des Endresultates aller Beobachtungen 3 bis 4 Hundertel der Bogensekunde nicht übersteigt, dann ist das Verhältniss der Entfernung der Venus von der Erde zu der irdischen Maasseinheit, welche der Bestimmung der Abstände der einzelnen Stationen von einander zu Grunde gelegt wird, etwa bis auf $\frac{1}{1000}$ seines Werthes bekannt und hierdurch beiläufig für das nächste Jahrhundert die Grenze erreicht, welche für eine erschöpfende Erledigung zahlreicher andrer Aufgaben in der nächsten Zeit dringendst gefordert wird.

Das oben unter No. 2 (pag. 7) aufgeführte Verfahren der Parallaxen-Bestimmung durch Benutzung der Drehung der Erde zum Transport eines und desselben Beobachters und Instrumentes von einem Ende einer trigonometrischen Standlinie zum andern ist bei einem Phänomen, wie das vorliegende, nicht mit Vortheil anwendbar, weil die beschränkte Zeitdauer des Durchganges die Grösse der während desselben zurückzulegenden Ortsveränderung des Beobachters einschränkt. Indessen werden die auf jeder einzelnen Beobachtungs-Station durch die Ortsveränderung des Beobachters mit der Drehung der Erde eintretenden scheinbaren Bewegungen der Venus auf der Sonnenscheibe ebenfalls mit in Rechnung gezogen werden müssen und auch ihrerseits Beiträge zur Lösung der Aufgabe liefern.

Der nächst bevorstehende Durchgang der Venus, dessen Mitte auf 17 Uhr astronomische mittlere Zeit Greenwich des 8. December 1874, also für die im Meridian von Greenwich gelegenen Beobachtungsorter auf Morgens 5 Uhr des bürgerlichen 9. December berechnet ist, wird hauptsächlich auf der südlichen Halbkugel mit Ausschluss von Süd-Amerika, auf der nördlichen Halbkugel zwischen den Meridianen von Mittel-Afrika und der Sandwichinseln bis in die Regionen des mittleren Sibiriens hin sichtbar sein. In Folgendem geben wir eine kleine Tafel der örtlichen Eintritts- und Austrittszeiten des Planeten am Sonnen-Rande für eine Anzahl der wichtigeren Punkte, an welchen das Phänomen sichtbar ist:

	Anfang.	Sonnen- Aufgang.	Ende.	Sonnen- Untergang.
Kap der guten Hoffnung	vor Sonnen-Aufgang	4 h. 44 m.	7 h. 40 m. V.	—
Alexandria	"	6 „ 48 „	8 „ 36 „ „	—
Tiflis	"	7 „ 17 „	9 „ 36 „ „	—
Astrachan	"	7 „ 33 „	9 „ 49 „ „	—
Orenburg	"	7 „ 56 „	10 „ 17 „ „	—
Ispahan	"	6 „ 55 „	10 „ 2 „ „	—
Irkutsk	8 h. 41 m. V.	—	1 „ 32 „ N.	—
Peking	9 „ 30 „ „	—	2 „ 19 „ „	—
Nangasaki	10 „ 23 „ „	—	3 „ 11 „ „	—
Honolulu	3 „ 5 „ N.	—	nach Sonn.-Untg. 5 h. 18 m.	—
Auckland (Neuseeland)	1 „ 24 „ „	—	5 „ 57 „ N.	—
Melbourne	11 „ 28 „ V.	—	4 „ 0 „ „	—
Kerguelen-Insel	6 „ 32 „ „	—	10 „ 59 „ V.	—
Madras	7 „ 12 „ „	—	11 „ 54 „ „	—
Mauritius	5 „ 38 „ „	—	10 „ 10 „ „	—

Geographische Ortsbestimmung.

Von

F. Tietjen.

Einleitung.

1) Jeder, der sich mit geographischer Ortsbestimmung beschäftigt, ist wohl hinreichend mit der mathematischen Geographie vertraut, um die hauptsächlichsten astronomischen Ausdrücke zu verstehen, die hier vorkommen. Ausserdem ist für ihn erforderlich, dass er stets Ephemeriden zur Hand habe, und wir schlagen das Nautische Jahrbuch von Bremiker als besonders für diesen Zweck geeignet vor; man findet in der Einleitung, in den Erklärungen und Aufgaben dieser Ephemeriden auch Alles, was zum Verständniss unseres Aufsatzes nothwendig ist. Aus diesen Gründen beschränken wir uns hier auf folgende einleitende Bemerkungen:

Die geographische Lage eines Ortes ist bestimmt durch seine Länge und Breite. Die Länge pflegt man ostwärts von einem bestimmten, dem ersten, Meridian aus bis 360^0 herumzuzählen, doch zählt man sie auch östlich und westlich von demselben an jeder Seite bis 180^0 . Die gebräuchlichsten Annahmen für den ersten Meridian oder den Anfangspunkt der Längenzählung sind: 1) der durch die Sternwarte zu Paris gelegte Meridian, 2) der durch einen Punkt in der Nähe der Insel Ferro gelegte Meridian, der genau 20^0 westlich von der Pariser Sternwarte liegt, 3) der durch die Sternwarte zu Greenwich bei London gelegte, der $2^0 20' 2''$ westlich von der Pariser Sternwarte liegt. Letztere Zählungsweise ist für Seefahrer die allgemeinste geworden.

In Bezug auf Wochentag und Datum sei bemerkt, dass Seefahrer bei jedesmaligem Ueberschreiten 180^0 Greenwicher Länge einen Wochentag und ein Datum überschlagen, wenn sie von Osten nach Westen, und zwei Tage hinter einander denselben Wochentag und dasselbe Datum setzen, wenn sie von Westen nach Osten fahren. Bei den Völkern, die zwischen 100^0 und 190^0 (Greenw. östl. Länge) wohnen, und die den Gebrauch der Wochentage und des Datums der christlichen Rechnung eingeführt haben, hängt die Art und Weise dieser Zählung davon ab, ob ihnen dieselbe von Westen her, oder von Osten her überbracht wurde. Die Grenzlinie geht von Norden durch die Behringsstrasse und darauf zwischen Kamtschatka und den Aleutischen Inseln, östlich von Japan durch die Formosastrasse, Balabakstrasse,

südlich von den Philippinen unmittelbar östlich von den Salomoninseln und Hebriden durch die Freundschaftsinseln, östlich von Chatham und wendet sich darauf direkt nach Süden. Westlich von dieser Linie wird ein Tag mehr gezählt als östlich davon.

2) Da die Erde ein an den Polen abgeplattetes Rotationsellipsoid ist, so bildet die Richtung der Lothlinie einen kleinen Winkel mit der Richtung des Radius oder der Richtung nach dem Erdmittelpunkt, so dass der Winkel, welchen erstere mit der Ebene des Aequators bildet, grösser ist als der Winkel, welchen der Radius mit dieser Ebene bildet. Ersterer Winkel heisst die geographische, letzterer die geocentrische Breite. Die geographische Breite ist gleich dem Winkel zwischen Zenith und Aequator, oder auch: sie ist gleich der Polhöhe.

3) Da die Umdrehung der Erde gleichförmig und von Westen nach Osten erfolgt, so wird ein Stern dadurch nach und nach mit gleichförmiger Geschwindigkeit durch alle westlich gelegenen Meridiane geführt und nach 24 Stunden den ganzen Umkreis von 360° vollendet haben. Ist die Zeitdifferenz, in der er durch die Meridiane zweier Orte geht, h Stunden, so ist die Längendifferenz offenbar $\frac{h}{24} \cdot 360^{\circ}$ und zwar wird er am frühesten durch

den Meridian des östlich gelegenen Ortes gegangen sein. Dies gilt offenbar auch noch für jeden anderen Himmelskörper, der in Bezug auf die Sterne eine eigene Bewegung hat, wenn nur die Uhr, nach welcher die Zeit gemessen wird, einen solchen Gang besitzt, dass zwischen zwei aufeinander folgenden obern Culminationen dieses Gestirnes genau 24 Stunden verfliessen und ihr Gang in der Zwischenzeit nur genau der Bewegungsänderung des Gestirnes entspricht.

Statt die Längendifferenz in Graden anzugeben, ist es meistens bequemer, sie in Zeit auszudrücken, so dass also einer Stunde 15° , einer Zeitminute 15 Bogenminuten und einer Zeitsekunde 15 Bogensekunden entsprechen.

Uhren.

4) Um grössere Zeiträume in kleinere einzutheilen, bedient man sich entweder der Pendeluhrn oder der Federuhrn. Bei jenen ist das treibende Element die Schwerkraft, die bei jeder einzelnen Schwingung gleich wirkt, so dass die Zeitdauer einer Schwingung grösstentheils nur von der Länge des Pendels abhängig ist. Diese Länge ändert sich aber mit der Temperatur und zwar so, dass der tägliche Gang eines Sekundenpendels für einen Grad Reaumur um nahe $0^{\circ},4$ abweicht, wenn die Pendelstange aus Eisen, und um $0^{\circ},8$, wenn sie aus Messing ist. Zur Beseitigung dieses Einflusses dient die Compensation.

Für Reisezwecke sind nur Federuhrn — Taschenuhrn und Chronometer — anwendbar, da hier das in Verbindung mit der Feder als Regulator dienende kleine Rad — Unruhe, Balancier — bei jeder Lage der Uhr seine Schwingungen vollführen kann. Durch Reibung und Luftwiderstand geht bei jeder Schwingung Kraft verloren; diese muss auf geeignete Weise wieder ersetzt werden. Bei den Pendeluhrn geschieht es meistens durch ein Gewicht, bei Taschenuhrn und Chronometern aber durch eine Feder, welche durch das Aufziehen gespannt wird. Da diese Spannung unmittelbar nach dem Aufziehen bedeutend stärker wirkt, als wenn die Uhr bald abgelaufen ist, so lässt man

die Feder nicht direkt auf die Räder wirken, sondern zunächst vermöge einer Kette auf die sogenannte Schnecke, welche dann erst die Bewegung der übrigen Theile hervorzubringen strebt. Durch das Aufziehen windet sich die Kette spiralförmig um die sich verjüngende Schnecke, so dass der Hebelarm, mittelst dessen die Schnecke auf das Getriebe wirkt, anfangs nach dem Aufziehen bedeutend kleiner ist, als längere Zeit nach demselben. Die Form der Schnecke muss nun so sein, dass dieser Hebelarm der Federspannung stets entspricht. Die Schnecke ist zuweilen auch wohl durch eine besondere Construction der Triebfeder oder durch eine besondere Einrichtung der Hemmung (Echappement) ersetzt.

Die zunehmende Wärme wirkt auf eine Federuhr in doppelter Weise: Erstens vergrößert sich die Unruhe und vermehrt dadurch die zu ihrer Bewegung erforderliche Kraft und zweitens vermindert sie die Spannkraft der Feder. Eine Temperaturänderung von 1° kann eine tägliche Gangänderung von 10 bis 20 Sekunden hervorbringen. Eine Compensation lässt sich nur für eine Temperaturdifferenz von etwa 20° erreichen; oft erstreckt sie sich auf noch engere Grenzen. Ueber diese Grenzen hinaus nimmt der Einfluss der Temperatur auf den Gang sehr rasch zu; es ist daher unerlässlich, die Temperatur der Uhr stets innerhalb dieser Grenzen zu erhalten, die deshalb von vornherein, je nach der Bestimmung der Uhr, so eingerichtet werden müssen, dass ein Ueberschreiten nicht nothwendig wird.

Ferner hat man noch Sorge zu tragen, dass die Uhr stets möglichst in derselben Lage bleibt, in der sie regulirt ist, weil für eine geänderte Lage ein veränderter Druck der Spirale und der Zapfen und hierdurch ein veränderter Gang eintreten würde. So sind die grösseren Chronometer (Box-Chronom.) nur für die horizontale Lage corrigirt; durch geeignete Aufhängung ist dafür zu sorgen, dass sie stets in dieser Lage verharren. Bei der Regulirung von Taschenuhren und Taschenchronometern ist zwar in der Regel auf verschiedene Lagen Rücksicht genommen, will man aber einen gleichförmigen Gang erzielen, so ist es sehr rathsam, sie stets in derselben Lage zu lassen, sie z. B. nicht horizontal hinzulegen, wenn sie beim Tragen vertical in der Tasche hängen. Jede Erschütterung wirkt störend auf den Gang, ein rasches Drehen in der Ebene der schwingenden Unruhe kann sie selbst sofort zum Stehen bringen. Für langsamer schwingende Unruhen (Halbsekundenuhren) sind die Erschütterungen viel gefährlicher als für rasch schwingende; daher sind für den Transport auf Reisen gute Taschenuhren viel geeigneter, als grössere Chronometer, während letztere wieder beim längeren Aufenthalt an festen Orten die geeignetsten Zeitmesser sind. Gute Chronometer an festen Orten gehen täglich innerhalb einer halben Sekunde genau, während der Fehler einer guten Taschenuhr täglich 2 bis 3 Sekunden und beim Transport noch bedeutend mehr betragen kann. Endlich ist noch darauf zu achten, dass man keinen starken Magneten in unmittelbare Nähe der Uhr bringt, weil dadurch sofort ein höchst unregelmässiger Gang derselben eintritt. Dass es rathsam ist, die Uhr stets zu derselben Zeit aufzuziehen, dürfte aus dem über die Schnecke Gesagten genugsam hervorgehen.

Von einer guten Uhr muss vor Allem verlangt werden, dass sie einen gleichförmigen Gang habe, auf die Grösse desselben kommt es nicht an. Ist derselbe nicht gar zu gross, so corrigire man den Gang nicht, sondern ziehe ihn mit in Rechnung. Durch die Correction verändert sich in der Regel auch die Compensation.

Beim Einkaufe einer Uhr ist noch besonders darauf zu achten, dass

Minuten- und Sekundenzeiger mit der zugehörigen Theilung des Zifferblattes stimmen, dass sie also nicht excentrisch zu derselben angebracht sind. Bei kurzem Sekundenzeiger kann die excentrische Stellung desselben äusserst leicht zu Irrthümern in der Ablesung der Zeit Anlass geben.

Will man zwei Chronometer mit einander vergleichen, die einen bedeutenden Gangunterschied haben, z. B. eine Uhr, die nach mittlerer Zeit geht, mit einer, die nach Sternzeit geht, so warte man den Moment ab, wo zwei Schläge genau mit einander coincidiren, da das Ohr für die Coincidenz zweier Töne sehr empfindlich ist. Man erhält so die Differenz beider Uhren für diesen Moment bis auf ein- bis zweihundertel Sekunden genau. Die Vergleichung zweier Uhren mit nahe gleichem Gange führt man daher auch am sichersten mit Hülfe einer dritten von starkem Gangunterschiede aus.

Bei astronomischen Beobachtungen sehe man vor Allem darauf, dass die Uhr bequem placirt ist, um sowohl ihre Schläge deutlich zu hören, als auch, um die Zeit mit möglichst geringem Zeitverlust ablesen zu können. Auf Reisen, wo man in der Regel Uhren anwendet, die entweder 2 Schläge in einer oder 5 Schläge in 2 Sekunden machen, verfährt man am besten auf folgende Weise. Kurz vor Eintritt des zu beobachtenden Moments merkt man sich die Sekunde und zählt alle Schläge, bis der Eintritt erfolgt ist, sehe dann aber wieder nach der Uhr, um sich zu vergewissern, dass man sich nicht verzählt hat. Aus den bis zum Eintritt gezählten Schlägen wird man leicht die Zeit desselben ableiten. Häufig lässt sich die Zeit des Eintritts eines Moments (z. B. einer Sternbedeckung) im Voraus nicht genau angeben, um kurz vorher mit dem Zählen beginnen zu können, in diesem Falle fange man erst mit dem Eintritt an zu zählen und entnehme erst darauf die Zeit von der Uhr. Sind mehrere Momente in so kurzer Zeit hinter einander zu beobachten, dass man zwischen denselben nicht Zeit genug hat, um nach der Uhr zu sehen, so zähle man alle Schläge von Anfang bis Ende, notire aber diejenigen für jeden Eintritt, ohne nach dem Schreiben hinzusehen, wobei man das Auge unverwandt vor dem Fernrohr hält und dabei weiter zählt. Eine kurze Uebung wird hinreichen, dies fertig zu bringen. Unter allen Umständen ist es gut, zwei Uhren zur Verfügung zu haben, von denen die eine nur als Beobachtungsuhr benutzt und vor und nach der Beobachtung mit der andern verglichen wird.

Sextant und Prismenkreis.

5) Der Spiegelsextant besteht aus einem eingetheilten Kreissector, dessen Centrum zugleich der Drehpunkt einer Alhidade ist, welche an dem Ende, wo sie die Theilung des Sectors berührt, einen Nonius oder Vernier trägt. Sie kann an dem Sector festgeklammert werden und enthält hier eine Schraube für feinere Fortbewegung oder Einstellung. Nahe im Drehpunkt der Alhidade und auf derselben befestigt, befindet sich ein senkrechter Spiegel. Seitwärts, fest mit dem Sector verbunden, sitzt ein Fernrohr, diesem gegenüber in unverrückbarer Lage ein zweiter fester Spiegel, gleichfalls senkrecht zur Bewegungsebene der Alhidade. Das Objectiv des Fernrohrs trifft aber nur etwa zur Hälfte diesen zweiten Spiegel, mit der anderen Hälfte kann man über denselben hinweg einen Gegenstand direkt sehen. Dreht man nun die Alhidade so, dass ein zweiter Gegenstand von dem ersten Spiegel nach dem zweiten und von diesem nach dem Objectiv des Fernrohrs reflectirt wird, so dass sein durch das Fernrohr gesehenes Bild den direkt gesehenen Gegenstand deckt, so ist nach den Reflexionsgesetzen der Winkel, welchen beide

Gegenstände mit einander bilden, doppelt so gross als der, welchen die Ebenen beider Spiegel mit einander einschliessen. Die Eintheilung des Sectors ist daher gleich so ausgeführt, dass die Zahlen das Doppelte des Drehungswinkels der Alhidade oder des Neigungswinkels beider Spiegel gegeneinander angeben, vorausgesetzt, dass die Alhidade Null zeigt, wenn beide Spiegel einander parallel stehen.

6) Ein Beobachter darf sich nie auf die Vollkommenheit seines Instrumentes verlassen; er soll dasselbe stets sorgfältig untersuchen und unter Controle halten. Folgende Bedingungen müssen bei einem Sextanten erfüllt sein:

1. Beide Spiegel sollen senkrecht zur Ebene des Instrumentes stehen.

a) Sieht man an dem grossen mit der Alhidade fest verbundenen Spiegel vorbei nach dem Ende des Gradbogens, wo sich der Anfang der Theilung befindet, und ist zugleich die Alhidade so gestellt, dass man zu gleicher Zeit Theile des anderen Endes des Gradbogens reflectirt sieht, so ist bei diesem Spiegel die verlangte Bedingung nahe erfüllt, wenn der direkt mit dem reflectirt gesehenen Bogen in einer Ebene liegt und mit demselben keine gebrochene Linie bildet. b) Um die Stellung des anderen kleinen Spiegels zu prüfen, stelle man den Index nahe auf Null und bringe das durch das Fernrohr direkt gesehene Bild mit dem zugleich reflectirt gesehenen Bilde eines sehr entfernten Gegenstandes, am besten eines Sternes, möglichst zur Deckung. Erfolgt diese vollständig, so steht auch der kleine Spiegel senkrecht.

2. Die optische Axe des Fernrohres soll mit der Ebene des Instrumentes parallel, also senkrecht zu den Spiegelflächen stehen. Man wähle zwei um einen grossen Winkel von einander entfernte Gegenstände und bringe das Bild des einen mit dem direkt gesehenen andern zur Deckung an einem der beiden Parallelfäden, die man vorher parallel zur Sextantenebene gestellt hat. Bewegt man darauf den Sextanten, bis die Bilder auf den andern Parallelfäden fallen, und ist die Deckung dann noch vollständig, so ist die optische Axe, die mitten durch die Parallelfäden geht, richtig gestellt.

3. Der Index- oder Collimationsfehler besteht in der Abweichung der Alhidade vom Nullpunkt des Limbus, wenn das direkt und das reflectirt gesehene Bild eines sehr weit entfernten Gegenstandes sich decken. Macht man für diese Deckung die Ablesung, so erhält man den Indexfehler unmittelbar. Befindet sich der Nullpunkt der Alhidade bei dieser Stellung zwischen dem Nullpunkt der Theilung des Limbus und der Mitte desselben, so hat man den Indexfehler negativ zu nehmen, d. h. ihn von der jedesmaligen Ablesung für einen gemessenen Winkel zu subtrahiren. Im entgegengesetzten Falle hat man ihn zu addiren. Durch Drehung des kleinen Spiegels lässt sich der Indexfehler wohl genau auf Null bringen, doch empfiehlt es sich, ihn wohl möglichst klein zu halten, ihn aber dann mit in Rechnung zu ziehen. Bei jeder grösseren Beobachtungsreihe ist eine Bestimmung nothwendig.

4. Die beiden Flächen des grossen Spiegels sollen einander parallel sein. Um die prismatische Gestalt der farbigen Gläser unschädlich zu machen, wende man dieselben auch bei der Bestimmung des Indexfehlers an. Die prismatische Gestalt des kleinen Spiegels ist ohne Einfluss, weil sie nur einen constanten Fehler hervorbringt, der auch im Indexfehler enthalten ist.

5. Die Fehler, welche von der Excentricität herrühren, sollten bei jedem Sextanten, ehe er in Gebrauch genommen wird, geprüft werden. Ist A die Ablesung für einen Winkel zwischen zwei Objecten, so erfordert diese Ablesung eine Correction von der Form

$$\triangle A = \sin \frac{1}{4} A \{a \sin \frac{1}{4} A + b \cos \frac{1}{4} A\}$$

wo a und b zwei Constante sind, die man dadurch bestimmt, dass mindestens zwei anderweitig bekannte Winkel mit dem Sextanten gemessen werden. Sobald man a und b kennt, kann man für diese Correction eine Tafel berechnen, in die man zugleich die Correction für andere Fehler aufnehmen kann.

6. Bei Winkelmessungen nicht weit entfernter Gegenstände kommt noch die Parallaxe des Instrumentes in Betracht. Der Scheitelpunkt des gemessenen Winkels liegt nämlich nicht im Drehpunkte der Alhidade, sondern er liegt im Durchschnittspunkt zweier Richtungen, von denen die eine durch die optische Axe nach dem direkt visirten Gegenstande, die andere nach dem andern Objecte durch den grossen Spiegel geht. Ist daher l das Loth vom grossen Spiegel auf die optische Axe, d die Entfernung des direkt gesehenen Gegenstandes, so ist der gemessene Winkel um die Correction w zu vergrössern, die sich aus $\sin w = \frac{l}{d}$ ergibt.

Das was über den Sextanten gesagt ist, gilt auch von den Reflexionskreisen, die sich nur dadurch von den Sextanten unterscheiden, dass statt des als Limbus dienenden Kreissectors ein ganzer Vollkreis angewandt ist. Bei den Prismenkreisen ist noch der kleine Spiegel durch ein Prisma mit totaler Reflexion ersetzt, wodurch die Bilder an Helligkeit und Klarheit gewinnen. Die Vollkreise haben vor dem Sextanten ausser grösserer Stabilität hauptsächlich den Vortheil, dass der Excentricitätsfehler durch Ablesen zweier um 180° von einander abstehender Nonien aufgehoben wird.

7) Um mit diesen Reflexionsinstrumenten die Höhe eines Gegenstandes über dem Horizonte zu messen, kann man auf See den wirklichen Horizont (die Kimm) benutzen; auf dem Lande dagegen bedarf es eines künstlichen Horizontes. Hierzu wendet man in der Regel eine mit Quecksilber gefüllte eiserne Schale an, und beobachtet den Winkel zwischen dem Object und dessen von der horizontalen Oberfläche des Quecksilbers reflectirtem Bilde. Auf diese Weise erhält man die doppelte Höhe. Um die Oberfläche des Quecksilbers zu reinigen, wendet man entweder eine Stahlplatte oder auch ein Papier an, mit welchem der Schmutz nach der Seite gestrichen wird. Es empfiehlt sich, das Quecksilber mit etwas Zinn zu versetzen, weil es sich dann leichter reinigen lässt und weil dann auch die Erschütterungen nicht so sehr auf dasselbe wirken. Beim Füllen des Horizontes giesst man das Quecksilber am besten durch eine Düte aus zusammengefaltetem Schreibpapier, die an der Spitze ein kleines Loch hat. Um es vor Wind zu schützen, muss man irgend einen Schutz an der Windseite aufstellen; häufig wendet man ein aus planparallelen Platten bestehendes Dach an.

Azimutal- und Höheninstrument

(Theodolit und Universalinstrument).

8) Diese Instrumente besitzen doppelte Kreise, von denen der eine zum Messen horizontaler Winkel — Azimute —, der andere zum Messen von Höhenwinkeln — Zenitdistanzen — dient. Die Messung eines Winkels erfordert successive Einstellung beider Gegenstände; das Instrument verlangt daher für die Zeit der Messung eine absolut feste Aufstellung. Die Ablesung an den Kreisen geschieht entweder durch Nonien, wie bei den Sextanten, oder auch durch Mikroskope. Letztere besitzen in der Gegend des Oculars einen Kasten,

in welchem ein Fadenkreuz oder zwei parallele Fäden vermittelt einer an einer eingetheilten Trommel befestigten Mikrometerschraube beweglich sind. Um die ganzen Umdrehungen der Schraube zu zählen, erblickt man an der Seite des Gesichtsfeldes Auszahnungen oder Löcher, deren Abstand einer oder zwei ganzen Umdrehungen der Schraube entspricht. Nahe der Mitte des Gesichtsfeldes ist eine grössere Auszahnung oder ein anderes Merkmal, das dazu dient, den Nullpunkt anzugeben, auf welchen man die Ablesungen der Schraube bezieht. Die Trommel ist nun so auf der Schraube zu befestigen, dass ihre Ablesung Null giebt, wenn die beweglichen Fäden auf das als Nullpunkt dienende Merkmal gestellt werden. Bewegt man von dieser Stellung aus die Fäden auf den nächst kleineren Theilstrich des unter dem Mikroskop befindlichen Kreises, so erhält man durch Ablesung an der Trommel den Abstand dieses Theilstriches vom Nullpunkt des Mikroskops in Theilen der Schraube. Um die Ablesung des Kreises in Bezug auf den Nullpunkt zu erhalten, hat man den gemessenen Abstand in Bogen zu verwandeln und zur Ablesung für den nächst kleineren Theilstrich zu addiren. Der Werth eines Schraubentheils wird dadurch erhalten, dass man den Abstand zweier Theilstriche misst. Um unabhängig von einer Veränderung oder einer fehlerhaften Bestimmung dieses Werthes zu werden, ist es dringend zu empfehlen, bei jeder Messung stets die beiden benachbarten Theilstriche einzustellen und beide Ablesungen zu notiren. Die Eintheilung der Trommel ist fast stets so eingerichtet, dass sie direkt nahe Minuten und Sekunden angiebt. Kleine Abweichungen von den auf der Trommel bezeichneten Werthen lassen sich wohl durch geeignete Verstellung der Mikroskope corrigiren, doch ist es nicht rathsam, diese etwas mühsamen Correctionen für kleine Abweichungen vorzunehmen.

Es ist genau darauf zu achten, dass stets der Theilstrich des Kreises und die Fäden des Mikroskops zu gleicher Zeit deutlich erscheinen. Ist dies nicht der Fall, so verschiebe man zuerst das Ocular, bis der Faden deutlich wird, nähert oder entfernt darauf das ganze Mikroskop, bis auch der Theilstrich möglichst deutlich erscheint. Dies beurtheilt man am besten dadurch, dass sich der Theilstrich durch seitliche Bewegung des Auges nicht verschieben, keine Parallaxe zeigen darf.

9) Vor der Messung ist das Instrument mit Hülfe der Libelle oder des Niveaus horizontal zu stellen. Das Niveau wird auf die horizontale Axe aufgesetzt und an den Fusschrauben so lange corrigirt, bis die Blase bei horizontaler Drehung des Instrumentes sich nicht mehr ändert. Um die Axe bei unveränderter Stellung des Horizontalkreises zu nivelliren, werden beide Blasenenden des aufgesetzten Niveaus abgelesen und aus beiden Ablesungen das arithmetische Mittel genommen, wodurch die Ablesung für die Mitte der Blase erhalten wird. Um die Ungleichheit in den Längen der Niveaufüsse zu eliminiren, setze man das Niveau um und nehme wieder das Mittel aus den Ablesungen für beide Blasenenden. Ist das Niveau von der Mitte aus getheilt, so bestimme man das Zeichen so, dass man die Ablesung nach dem Höhenkreise hin positiv nimmt; ist aber die Libelle ganz durchgetheilt, so nehme man die Ablesungen für diejenige Stellung des Niveaus als positiv an, bei welcher sich die grössere Zahl am Kreisende befindet.

Nimmt man mit Rücksicht auf diese Zeichen das arithmetische Mittel aus den Mitteln beider Ablesungen, so erhält man die Neigung der Axe in Niveautheilen ausgedrückt, und zwar liegt das Kreisende höher, wenn das Mittel positiv ist.

Ausser diesem Aufsatzniveau befindet sich am Höhenkreise fest mit den

Nonienarmen oder den Mikroskopträgern verbunden ein zweites Niveau, das aber gegen den Höhenkreis verstellbar ist. Bei Höhenmessungen ist die Blase desselben vor der Kreisablesung stets in die Mitte oder auf gleiche Theilstriche zu bringen, oder, was vorzuziehen, stets mit abzulesen und die Stellung derselben bei der Reduction mit zu berücksichtigen, so dass die Kreisablesungen stets auf dieselbe Stellung der Blase des Höhenniveaus bezogen werden. Ist der Werth eines Niveautheils nicht bekannt, so kann man ihn am Höhenkreise selbst bestimmen. Ebenso lässt sich der Theil des Aufsatzniveaus am Höhenkreise ermitteln, wenn man dasselbe am Höhenniveau oder am Höhenkreise so befestigen kann, dass ihre Axe der Ebene dieses Kreises parallel ist. Auch eingetheilte Fusschrauben sind zu einer solchen Bestimmung geeignet. Wünschenswerth ist es, dass diese Bestimmung für verschiedene Strecken der Libelle gemacht wird, um zu sehen, ob die Krümmung der letzteren allenthalben gleich ist. Durch Correctionsschrauben lässt sich erreichen, dass die Blase der Aufsatzlibelle nahe in der Mitte ist, wenn sie auf einer horizontalen Axe steht und dass die Axe ihres Rohres parallel zu dieser horizontalen Axe ist. Letzteres ist der Fall, wenn die Blase bei einer seitlichen Neigung des Niveaus sich nicht bewegt. — Eine mit Aether gefüllte Libelle ist die empfindlichste, doch, da der Aether schon bei 36° verdampft, so ist es sehr rathsam, in heissen Gegenden Weingeistlibellen oder die etwas empfindlicheren Benzinlibellen anzuwenden. Sobald als die Messungen mit einem Universalinstrument auf Genauigkeit Anspruch machen sollen, ist eine sorgfältige Anwendung der Libellen erforderlich. Bei Reisen hat man daher auf eine gute Erhaltung derselben besonders zu achten und sich mit Reservelibellen zu versehen. Gegen strahlende Wärme, besonders aber gegen direkte Sonnenstrahlen sind die Libellen sowohl als auch das ganze Instrument sorgfältig zu schützen.

10) Um den Nullpunkt des Höhenkreises, d. h. diejenige Kreisablesung zu finden, bei der das Fernrohr bei richtigem Stande des Instrumentes genau nach dem Zenith gerichtet ist, stelle man erst das ganze Instrument horizontal und bringe die Blase der Höhenlibelle nahe in die Mitte. Hierauf richte man das Fernrohr auf einen weit entfernten Gegenstand, lese den Höhenkreis und die Höhenlibelle ab und reducire erstere Ablesung auf den Nullpunkt der Libelle. Diese reducirte Ablesung sei A . Dreht man jetzt das ganze Instrument genau um 180° , so ist das Fernrohr offenbar auf einen Punkt gerichtet, der mit dem beobachteten Gegenstand gleiche Höhe und gleichen Zenithabstand hat. Bewegt man daher das Fernrohr durch das Zenith auf den Gegenstand, so muss es offenbar die doppelte Zenithdistanz beschreiben. Ist die reducirte Ablesung für diese Lage A_1 , so erhält man die Zenithdistanz Z und den Nullpunkt N aus

$$\begin{aligned} Z &= \pm \frac{1}{2} (A_1 - A) \\ N &= \frac{1}{2} (A + A_1). \end{aligned}$$

Um hierauf die Zenithdistanz z , eines anderen Gegenstandes, der die Ablesung a ergiebt, zu erhalten, hat man

$$z_1 = \pm (a - N).$$

Bei Höhenmessungen hat man sich fortwährend der Unveränderlichkeit des Nullpunktes zu versichern. Entweder beobachtet man dasselbe Object stets in beiden Lagen, oder man wählt einen entfernt stehenden Gegenstand, dessen Zenithdistanz man wiederholt bestimmt.

11) Terrestrische Winkel. Mit dem Theodolith erhält man unmittelbar den auf den Horizont reducirten Winkel, nicht so mit dem Sextanten.

Hat man mit diesem einen schiefen Winkel A zwischen zwei Objecten gemessen, deren Zenithdistanzen resp. z und z_1 sind, so erhält man hier den auf den Horizont reducirten Winkel A_0 aus

$$\cos A_0 = \frac{\cos A - \cos z \cos z_1}{\sin z \sin z_1}$$

oder aus

$$\sin 2\frac{1}{2} A_0 = \frac{\sin \frac{1}{2} (A - z + z_1) \sin \frac{1}{2} (A - z_1 + z)}{\sin z \sin z_1}$$

12) Ephemeriden. Jeder Reisende, der astronomische Bestimmungen zu machen gedenkt, hat sich mit Ephemeriden zu versehen. Dieselben gelten in der Regel nur für ein Jahr, doch pflegen sie 2 bis 3 Jahre im Voraus herausgegeben zu werden. Zu Ortsbestimmungen sind die nautischen Ephemeriden empfehlenswerther als die rein astronomischen, welche mehr für Sternwarten berechnet sind. Von jenen eignet sich besonders das Nautische Jahrbuch von Bremiker für den Reisenden und es wird daher im Folgenden vorausgesetzt, dass dieses zur Hand ist. Die Einleitung dieses Jahrbuches giebt eine kurze Beschreibung der Himmelskugel und der Kreise, welche man sich auf ihr und der Erde gezogen denkt, sowie die Erklärung des Unterschiedes zwischen mittlerer und wahrer Zeit und Sternzeit. Hierauf folgt die Erklärung der Ephemeriden und Tafeln des Jahrbuchs und darauf werden verschiedene nautische Aufgaben gelöst. Schliesslich folgen die Tafeln und Ephemeriden selbst. Es wäre wohl überflüssig, hier die dort gegebenen Auseinandersetzungen zu wiederholen, es wird daher nur durch N. J. darauf verwiesen werden. Hier sei nur noch bemerkt, dass die dort gegebenen Zeitangaben sich stets auf die mittlere Greenw. Zeit beziehen; will man daher aus dem N. J. Oerter für eine andere Ortszeit entnehmen, so hat man diese zunächst mit der Längendifferenz auf die Greenw. Zeit zu reduciren.

13) Interpolation. Da man fast nie in dem Momente beobachten wird, für welchen die in den Ephemeriden gegebenen Daten gelten, so muss man die für die Reduction nothwendigen Daten mit Hülfe der Interpolation auf die Beobachtungszeit reduciren. Entsprechen drei auf einander folgende Ephemeridenörter z. B. Mondsdistanzen a , a_1 und a_2 den Zeiten t , t_1 , t_2 , wobei gleiche Zeitintervalle, also $t_1 - t = t_2 - t_1$, vorausgesetzt werden, und will man die Mondsdistanz A zur Zeit T kennen, wo T zwischen t_1 und t_2 liegt,

so setze man $\frac{T - t_1}{t_2 - t_1} = x$ und hat dann, wenn d und d_1 die Differenzen

$$d = a_1 - a; \quad d_1 = a_2 - a_1$$

sind:

$$A = \frac{d_1 + d}{2} x + \frac{d_1 - d}{2} x^2$$

Ist umgekehrt A gegeben und sucht man T , so hat man zunächst

$$x = \frac{A}{\frac{1}{2}(d_1 + d)} - \frac{d_1 - d}{d_1 + d} x^2$$

eine Gleichung, die sich leicht durch successive Näherung auflöst. Darauf wird

$$T = t_1 + x(t_2 - t).$$

(Siehe N. J. pag. XIII. und pag. XXVI.)

Zeit- und Breitenbestimmungen aus Höhenmessungen.

14) Correction der gemessenen Höhen. Die Art der Höhenmessung sowie die Anbringung der instrumentalen Correctionen ist oben (§§ 5—10) erörtert; es bleiben noch folgende Correctionen zu berücksichtigen.

a) Die Refraction vergrößert die Höhe eines Sternes. Sie ändert sich nicht nur mit der Höhe, sondern auch mit der Temperatur und dem Barometerstande, so dass ihre strenge Berücksichtigung Tafeln verlangt (N. J. pag. XXVI). Bezeichnet h' die gemessene, h die wahre Höhe und r die Refraction, so ist $h = h' - r$. Genähert ist für h grösser als 20° :

$$r = 57'',7 \cotg. h'.$$

b) die Parallaxe ist die Reduction der von einem Punkte der Erdoberfläche gemessenen Höhe auf den Erdmittelpunkt (S. N. J. XXVIII bis XXXIII, wo sich auch die Correctionen für Durchmesser von Sonne und Mond wegen Refraction und Parallaxe finden).

c) Haben die Planeten eine messbare Scheibe und ist nur der eine Rand beobachtet, so muss die Beobachtung, nachdem sie von Parallaxe und Refraction befreit ist, mit dem Halbmesser auf dem Mittelpunkt des Gestirns reducirt werden.

Bei Beobachtungen auf See ist noch die Depression des Meereshorizontes oder die Kimmtiefe zu berücksichtigen (N. J. Tafel X).

15) Der Ort eines Gestirnes ist bekannt, wenn die Sternzeit seines Durchgangs durch den Meridian (seine gerade Aufsteigung oder seine Rectascension) und seine Entfernung vom Aequator (seine Abweichung oder Declination) gegeben ist. Den Stundenwinkel oder den Winkel, welchen der durch das Gestirn und beide Pole gelegte grösste Kreis (Stundenkreis) mit dem Meridian bildet, erhält man aus

$$\text{Stundenwinkel} = \text{Sternzeit} - \text{Gerade Aufsteigung}.$$

Hier sollen stets folgende Bezeichnungen angewendet werden:

α Gerade Aufsteigung oder Rectascension,

δ Abweichung oder Declination,

h wahre Höhe, bezogen auf den Erdmittelpunkt,

z Zenithdistanz $= 90^\circ - h$,

A Azimut oder der auf den Horizont reducirte Winkel zwischen dem Südpunkte und einem Objecte, A wird gezählt vom Südpunkte durch West, Nord und Ost von 0° bis 360° ,

t Stundenwinkel,

θ Sternzeit der Beobachtung,

φ Breite oder Polhöhe des Ortes.

16) Aus dem sphärischen Dreiecke: Stern, Zenith, Pol ergibt sich:

$$\sin h = \cos z = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos t. \quad 1)$$

Betrachtet man den Sternort (α, δ) als gegeben und h ebenfalls durch Beobachtung bekannt, so erhält diese Gleichung noch die beiden Unbekannten φ und $t = \theta - \alpha$. Aus zwei solcher von einander unabhängigen Gleichungen, also aus zwei Beobachtungen, die in bekannter Zwischenzeit angestellt sind, werden sich daher sowohl Zeit als Breite bestimmen lassen. Bei allen Beobachtungen hat man aber vorzugsweise darauf zu achten, dass die etwaigen Fehler möglichst geringen Einfluss haben und dass, wenn man mehrere Grössen aus mehreren Beobachtungen ermitteln will, diese so anzuordnen sind, dass die gesuchten Grössen mit möglichster Sicherheit daraus hervor-

gehen. Nimmt man an, dass die Grössen h , q und t der Gleichung (1) mit kleinen Fehlern dh , dq und dt behaftet sind, so lehrt die Differentialrechnung, dass zwischen denselben die Relation

$$dh + \cos A dq + \cos q \sin A dt = 0$$

stattfindet. Nach obiger Regel folgt hieraus sofort, dass man zur Bestimmung von q oder der Breite des Ortes Gestirne in der Nähe der Azimute 0° und 180° , und zur Bestimmung des Stundenwinkels oder der sich hieraus ergebenden Zeit Gestirne in der Nähe von 90° oder 270° Azimut beobachten soll. Denn im ersten Falle wirkt ein Zeitfehler wenig auf den Werth von q , im zweiten Falle ein Breitenfehler wenig auf die Bestimmung der Zeit ein. Ferner ersieht man hieraus, dass Zeit sowohl als Breite in den günstigsten Fällen mindestens um den vollen Betrag des Höhenfehlers fehlerhaft werden. Sterne, die durch das Zenith gehen, eignen sich in der Nähe des Meridians wohl zur Zeit- aber nicht zur Breitenbestimmung. Wegen der Unsicherheit der Refraction soll man nicht zu nahe am Horizonte beobachten. Um sowohl von dieser Unsicherheit als auch noch von andern Fehlern frei zu werden, ist es sehr rathsam, zwei um nahe 180° Azimut von einander entfernte Gestirne zu beobachten. Bei dem Universalinstrument wird man noch von der fehlerhaften Bestimmung des Nullpunktes unabhängig, wenn in beiden Kreislagen gemessen wird.

Zeitbestimmung.

17) Correspondirende Höhen. Hat man denselben Stern östlich und westlich in gleicher Höhe beobachtet, so entspricht das Mittel aus den beiden Beobachtungszeiten seinem Durchgange durch den Meridian, für welchen die Sternzeit des Ortes gleich der geraden Aufsteigung des Sternes ist. Ist die Sonne das beobachtete Object, so ist zunächst auf die Aenderung ihrer Declination Rücksicht zu nehmen. Vergrössert sich diese von der ersten bis zur zweiten Beobachtung um $d\delta$, so vergrössert sich der Stundenwinkel um

$$dt = \left(\frac{\tan q}{\sin t} - \frac{\tan \delta}{\tan t} \right) d\delta \quad (2)$$

wo dt in wahrer Zeit ausgedrückt ist. Beachtet man nun, dass der Stundenwinkel der Sonne gleich der wahren Zeit ist, so erhält man, wenn U_1 und U_2 die Beobachtungszeiten in mittlerer Zeit ausgedrückt, U_0 die Uhrzeit des wahren Mittags und t den Stundenwinkel, der mit dem δ der ersten Beobachtungszeit berechnet ist, bezeichnen

$$\begin{aligned} U_1 &= U_0 - t \\ U_2 &= U_0 + t + dt \end{aligned}$$

also

$$U_0 = \frac{1}{2}(U_1 + U_2) - \frac{1}{2}dt$$

Die Grösse $\frac{1}{2}(U_1 + U_2)$ wird der unverbesserte Mittag, $\frac{1}{2}dt$ die Mittagsverbesserung genannt. Es genügt dt in mittlerer Zeit anzunehmen und mit dem δ zu berechnen, das für den Mittag gilt. Im N. J. ist die stündliche Veränderung von δ angegeben, um $d\delta$ zu erhalten, hat man diese also mit der Zeit zwischen beiden Beobachtungen in Stunden ausgedrückt zu multipliren. Ist U die Zeit des wahren Mittags entweder in mittlerer Zeit oder in Sternzeit ausgedrückt, je nach der Zeit, in welcher U_0 gegeben ist, so folgt stets als Uhr correction

$$\Delta U = U - U_0.$$

Geht z. B. die Uhr mittlere Zeit, so wird, wenn die Zeitgleichung für den mittleren Mittag gegeben ist, die wahre Zeit des mittleren Mittags:

$$U = 24^h - \text{Zeitgl. und darauf } \Delta U_m = U - U_0$$

geht sie dagegen Sternzeit, so drücke man zunächst die Zeitgleichung in Sternzeit aus und setze $U_s = \text{Sternzeit im mittleren Mittage} - \text{Zeitgleichung}$, es ist dann wieder

$$\Delta U_s = U_s - U_0.$$

18) Beobachtung einer einzelnen Höhe. Der Stundenwinkel t wird erhalten aus

$$\cos t = \frac{\cos z - \sin \varphi \sin \delta}{\cos \varphi \cos \delta}$$

oder aus

$$\sin \frac{1}{2} t = \sqrt{\frac{\sin \frac{1}{2} (z - (\varphi - \delta)) \cdot \sin \frac{1}{2} (z + \varphi - \delta)}{\cos \varphi \cos \delta}}$$

Bei Sternbeobachtungen ist dann die Sternzeit der Beobachtung

$$\theta = \alpha + t$$

wobei der östliche Stundenwinkel negativ zu nehmen ist. Ist die Sonne beobachtet, so rechne man t auf dieselbe Weise, wo dann aber der Stundenwinkel gleich der wahren Zeit der Beobachtung ist. Hat man δ für eine andre Zeit den Ephemeriden entnommen, so dass der wahre Werth um $d\delta$ grösser ist, so ist an t noch eine Correction nach § 17, 2 anzubringen.

Es ist sehr rathsam, wenigstens zwei verschiedene Sterne zu beobachten und zwar solche, die sich nahe in gleicher Höhe und in symmetrischer Lage zum Meridian befinden, weil das Mittel aus den Resultaten von verschiedenen Fehlern befreit ist.

19) Obwohl auf Reisen die Höhenbeobachtungen stets vorzuziehen sind, weil man die Instrumentalfehler so leicht berücksichtigen kann und man von der Zeit der Beobachtung nicht so sehr abhängig ist, so lässt sich das Universalinstrument doch auch als Durchgangsinstrument benutzen. Könnte man das Instrument so aufstellen, dass bei festgeklebten Horizontalkreis die optische Axe des Fernrohrs sich genau in der Meridianebeane bewege, so würde die Beobachtung eines Sterns an einem in der optischen Axe befindlichen Faden sofort die Sternzeit der Beobachtung (= Gerade Aufsteigung) ergeben. Da aber die Aufstellung des Instrumentes nie fehlerfrei sein wird, so sei i die Neigung der Umdrehungsaxe des Instruments, positiv genommen, wenn das westliche Ende höher ist; k das Azimut eines südlichen Punktes der in der optischen Axe des Fernrohrs liegt und zwar positiv genommen, wenn er sich östlich vom Südpunkte befindet; endlich sei c der Collimationsfehler oder die Abweichung des Mittelfadens von der optischen Axe. Ist c positiv, d. h. tritt der Stern zu früh an den Mittelfaden, so ist in der obern Culmination an die beobachtete Durchgangszeit folgende Correction anzubringen:

$$+ i \frac{\cos (\varphi - \delta)}{\cos \delta} + k \frac{\sin (\varphi - \delta)}{\cos \delta} + c \sec \delta$$

In der andern Lage des Instruments ist c dann negativ zu nehmen. Für untere Culmination hat man für erstere Lage die Correction

$$+ i \frac{\cos(\varphi + \delta)}{\cos \delta} + k \frac{\sin(\varphi + \delta)}{\cos \delta} - c \sec \delta$$

Sei U die so corrigirte Uhrzeit, so ist die Uhr correction gegen Sternzeit $\Delta U = \alpha - U$. Die Neigung i wird durch das Niveau ermittelt; um k , c und ΔU zu erhalten, sind mindestens 3 Beobachtungen erforderlich, wozu man am besten einen Aequatorial- und zwei Polsterne, letztere bei gleichen Culminationen in verschiedenen Lagen des Instruments, und bei oberer und unterer Culmination in gleicher Lage beobachtet.

Sind mehrere Fäden eingezogen und braucht ein Stern im Aequator f^s Zeitsekunden, um von einem Faden zum andern zu kommen, so gebraucht ein anderer Stern, dessen Decl. δ ist, dazu die Zeit f_1^s , die sich aus $\sin 15 f_1^s = \sin 15 f^s \cdot \sec \delta$ ergibt. Für kein sehr grosses δ genügt $f_1^s = f^s \cdot \sec \delta$. In der Regel bezieht man alle Durchgänge auf den Mittelfaden.

20) Ist man längere Zeit an demselben Orte, so kann man den Gang der Uhr auch dadurch bestimmen, dass man das Verschwinden eines Sternes hinter denselben nicht zu niedrigen terrestrischen Gegenstand beobachtet. Damit das Auge an verschiedenen Abenden stets dieselbe Position einnimmt, befestige man ein Diopter oder, weit besser, ein Fernrohr an der Stelle, wo man beobachtet.

Die Zeit des Auf- und Unterganges eines Gestirns ist wegen der Refraction zu unsicher, um gute Resultate liefern zu können.

Breitenbestimmung.

21) Hier sind die Beobachtungen so anzuordnen, dass ein Zeitfehler nicht zu grossen Einfluss auf das Resultat gewinnt, es sind also die Gestirne so zu wählen, dass ihre Höhe sich mit der Zeit nur wenig ändert. Dies ist bei allen Sternen, mit Ausnahme der Zenithsterne, in der Nähe des Meridians der Fall, bei Polsternen aber in allen Stundenwinkeln.

Hat man die Zenithdistanz Z genau im Meridian gemessen, so ist für

$$\begin{array}{l} \text{Obere Culm. } Z = \quad \pm (\varphi - \delta) \text{ also } \varphi = \delta \pm Z \\ \text{Untere } \quad \quad Z = 180 \mp (\varphi + \delta) \quad \quad \varphi = \pm (180 - Z) - \delta \end{array}$$

wobei südliche Breiten und südliche Declinationen negativ zu nehmen sind. Bei der unteren Culmination gilt das obere Zeichen für nördliche Breiten und Declination, das untere für südliche. In der oberen Culmination wird man in Bezug auf das Zeichen nicht zweifelhaft sein können, da man stets eine genäherte Kenntniss der Breite haben wird (N. J. pag. XLII).

22) Bezeichnet z irgend eine andere Zenithdistanz in der Nähe des Meridians, t der zugehörige Stundenwinkel, und setzt man $Z = z - \zeta$, so erhält man ζ am bequemsten durch indirecte Auflösung der Gleichung

$$\sin \frac{1}{2} \zeta = \frac{\cos \varphi \cos \delta}{\sin(z - \frac{1}{2} \zeta)} \sin \frac{1}{2} t \quad (3)$$

Ändert sich die Declination des Gestirns, von welchem Circummeridian-Zenithdistanzen beobachtet sind, so nehme man für alle Reductionen diejenige Declination, welche bei der Culmination stattfindet, und rechne den Stundenwinkel nicht von der Zeit T des Meridiandurchgangs ab, sondern von der Zeit T der grössten Höhe. Bezeichnet μ die Declinationsänderung in Bogensecunden während 48 Stunden, so erhält man $T - T_1$ in Zeitsekunden ausgedrückt durch

$$T_1 - T = \frac{\mu}{188.5} (\tan \varphi - \tan \delta)$$

Bei Polsternen kann man selbst in grösseren Stundenwinkeln obige Formel (3) anwenden, da hier $\cos \delta$ klein ist. Sonst setze man

$$\begin{aligned} \sin \delta &= n \sin N \\ \cos \delta \cos t &= n \cos N \end{aligned}$$

und erhält dann

$$\cos(N - \varphi) = \frac{\cos z}{n} \quad \left. \vphantom{\cos(N - \varphi)} \right\} (4)$$

wo man über das Zeichen von $N - \varphi$ anderweitig entscheiden muss.

23) Aus zwei verschiedenen Beobachtungen desselben Sterns oder zwei verschiedener Sterne werden sich sowohl Zeit als Breite bestimmen lassen. Man wähle die Beobachtungen aber so, dass die eine günstig für die Zeitbestimmung, die andere günstig für die Breitenbestimmung ist. Hat man für letztere die Culmination beobachtet, so erhält man die Breite frei von dem Zeitfehler, mit dieser Breite folgt dann aus der andern Beobachtung die Zeit.

Sind zwei verschiedene Höhen h und h_1 desselben Sterns in den Stundenwinkeln t und t_1 beobachtet, so kann man φ und die Zeit aus der successiven Auflösung der beiden Gleichungen

$$\begin{aligned} \sin \frac{1}{2}(t_1 + t) &= \frac{\cos z_1 - \cos z}{2 \cos \varphi \cos \delta \sin \frac{1}{2}(t_1 - t)} \\ \cos(\varphi - \delta) &= \cos z - 2 \sin^2 \frac{1}{2} t \cos \varphi \cos \delta \end{aligned}$$

ableiten, wo rechts zunächst ein genäherter Werth von φ einzusehen ist. $t_1 - t$ ist aus dem Uhr gange bekannt.

Ist $h = h_1$, hat man also correspondirende Höhen beobachtet, so erhält man zunächst die Uhr correction nach § 17 und darauf φ nach § 22, 4.

Ändert sich die Declination, so hat man t und t_1 nach § 17 zu corrigiren.

24) Breitenbestimmungen aus Durchgängen am Passageninstrument lassen sich mit Vortheil nur im Ost-Westkreise, im ersten Vertical, anstellen. Die Aufstellung des Instruments muss eine sehr feste sein, so dass sie für längere Zeit ungeändert bleibt. Die Neigung der Axe ist mit grösster Genauigkeit zu ermitteln. Es ist mindestens der Durchgang eines Sterns im Osten und eines Sterns im Westen zu beobachten, wobei man Kreis Nord, Stern Ost mit Kreis Süd, Stern West oder Kreis Süd, Stern Ost mit Kreis Nord, Stern West verbindet. Damit die Fehler sich aufheben, müssen die Declinationen beider Sterne nahe einander gleich sein, am besten beobachtet man denselben Stern Ost und West. Hier wird der östliche Stundenwinkel t nahe gleich dem westlichen t_1 — eine nahe Berichtigung des Instruments vorausgesetzt — und man hat, wenn nach obiger Anordnung beobachtet ist,

$$\sin(\varphi - \delta) = \sin \varphi \cos \delta (\sin^2 \frac{1}{2} t + \sin^2 \frac{1}{2} t_1) + \left(\frac{i + i_1}{2} \right) \cos z$$

wo i die Neigung vor, i_1 die nach der Culmination bezeichnet und positiv genommen ist, wenn der Stern zu früh an den Faden tritt.

Längenbestimmung.

25) Da es sich hier darum handelt, den Zeitunterschied zweier Orte zu ermitteln, so bieten sich für die Längenbestimmung drei verschiedene Wege dar. Erstens kann man die Zeit direkt mittelst Uhren und Chronometer übertragen. Zweitens können an beiden Orten gleichzeitige Phänomene (Pulversignale, elektrische Signale, Mondfinsternisse, Verfinsterungen der Jupitertrabanten) beobachtet werden, wodurch man unmittelbar die Differenz der Ortszeiten erhält. Drittens endlich können Mondbeobachtungen zur Längenbestimmung verwandt werden. Da nämlich der Mond uns so nahe ist, so verändert sich sein auf den Erdmittelpunkt reducirter Abstand von einem anderen Himmelskörper oder einer Ebene in Folge seiner Eigenbewegung, deren Lage für jede Zeit bekannt ist, schnell genug, um die Zeit eines bestimmten Abstandes mit Sicherheit angeben zu können. Kennt man daher die Zeit eines Abstandes (sei es Berührung, wie bei Sonnenfinsternissen und Bedeckungen, oder eine grössere Entfernung, wie bei Mondstänzen, oder endlich der Abstand von Ebenen, deren Aenderung mit der Zeit bekannt ist, wie bei Meridiandurchgängen und Zenithdistanzen) für eine bestimmte Ortszeit (z. B. Greenwich) im Voraus, und beobachtet diese Distanz an einem andern Orte, so giebt die Differenz der beobachteten Ortszeit mit der vorausgerechneten Greenwich. Zeit wieder die Länge, hier in Bezug auf Greenwich, an. Es ist nur zu bemerken, dass die Distanzen auf denselben festen Punkt (Erdmittelpunkt) bezogen werden müssen.

26) Was zunächst die Zeitübertragung betrifft, so ist wegen der Behandlung der Uhren auf § 4 zu verweisen. Auf der Reise kann man sich aber nie auf den Gang einer Uhr verlassen, es müssen daher stets mehrere Uhren in Anwendung kommen.

Die zweite Art bedarf hier ebenfalls kaum einer Erörterung, da die Verfinsterungen in den Ephemeriden zum Voraus berechnet sind. Wegen der unsichern Schattengrenzen giebt diese Methode aber keine zuverlässigen Resultate, die Mondfinsternisse noch weniger, als die Verfinsterungen der Jupitertrabanten, zu deren Beobachtung man überdies noch ein gutes Fernrohr haben muss. Die Verschiedenheit der Beobachter und der Fernröhre hebt man theilweise auf, wenn Eintritt und Austritt des Schattens beobachtet wird. Auch dadurch kann der Beobachter seinen und seines Instrumentes constanten Fehler theilweise bestimmen, dass er an einem bekannten Orte Verfinsterungen beobachtet und das Resultat mit anderweitig bekanntem Resultate vergleicht. — Von den Signalen fallen die electrischen auf Reisen fort, die andern dienen nur für kurze Entfernungen.

27) Sonnenfinsternisse und Sternbedeckungen gewähren die zuverlässigsten Resultate, sie finden jedoch nur selten statt. Für denselben Ort beträgt die Anzahl der Sternbedeckungen in einem Jahre:

für Sterne incl. 4ter Grösse: im Mittel 6, selten mehr als 9,

„ „ „ 5ter „ „ „ 20, „ „ „ 27.

Die Vorausberechnung der Sonnenfinsternisse findet sich in allen Ephemeriden, wenn auch nur mit Angabe der Grenzen der Sichtbarkeit, die der Sternbedeckungen findet sich jedoch nicht im N. J., wohl aber im englischen Nautical Almanac, im Berliner astron. Jahrbuch etc. Obwohl letzteres einige Daten mehr zur Vorausberechnung giebt, als der Naut. Alm., so ist doch dieser dem Reisenden mehr zu empfehlen, weil darin zugleich die Grenzen

der Sichtbarkeit dieser Bedeckungen angegeben sind und weil er ausserdem alles auf den Mond Bezügliche in grosser Ausführlichkeit enthält. Die Wichtigkeit der Sternbedeckungen wegen, mag hier eine genäherte Vorausberechnung nach dem astron. Jahrbuche (nach Bessel) folgen. Seien

α und δ die gerade Aufsteigung und Abweichung des Sterns.

A und D die des Mondes, wenn er mit dem Stern in geoc. Conjunction ist, so dass $A = \alpha$.

T diese Conjunctionszeit in mittlerer Zeit.

ΔA und ΔD die Aenderungen von A und D in einer Stunde mittlerer Zeit.

π die Aequatorial-Horizontalparallaxe des Mondes.

φ die wahre und φ_1 die geocentrische Breite des Ortes.

ϱ der Radiusvector.

l die Längendifferenz zwischen dem Orte der Bedeckung und dem, für welchen T gegeben ist, östlich positiv.

θ die der Conjunctionszeit T entsprechende Sternzeit des Ortes.

$$\log k = 9,4354; \quad \log \lambda = 9,41916$$

$$e = \varrho \cos \varphi, \quad \xi = \varrho \sin \varphi_1.$$

Sei e die Excentricität des elliptischen Meridians ($\log e = 8,912205$; $\log (1 - e^2) = 9,9970916$) und $\sin B = e \sin \varphi$, so werden e und s erhalten aus

$$c = \cos \varphi \sec B; \quad s = (1 - e^2) \sin \varphi \sec B.$$

Man berechne ferner

$$q = \frac{D - \delta}{\pi}; \quad p' = \frac{\Delta A \cdot \cos D}{\pi}; \quad q' = \frac{\Delta D}{\pi}$$

$$\mu = c \sin (\theta - d); \quad v = s \cos \delta - c \sin \delta \cos (\theta - \alpha)$$

$$\mu' = \lambda c \cos (\theta - d); \quad v' = \lambda c \sin \delta \sin (\theta - \alpha)$$

$$m \sin M = -u; \quad n \sin N = p' - u'$$

$$m \cos M = q - v; \quad n \cos N = q' - v'$$

(m und n stets positiv)

$$\tau = -\frac{m}{n} \cos (M - N)$$

$$T_0 = T + l + \tau; \quad \cos \psi = \frac{m \sin (M - N)}{k} \quad (\psi \text{ stets kleiner als } 180^\circ)$$

Für den Eintritt T_1 und den Austritt T_2 ergibt sich dann in mittlerer Ortszeit:

$$T_1 = T_0 - \frac{k}{n} \sin \psi; \quad T_2 = T_0 + \frac{k}{n} \sin \psi.$$

Diese Zeiten werden aber noch einer Correction bedürfen, weil das τ noch fehlerhaft ist. Um diese Correction zu finden, setze man

$$p_0 = \tau p', \quad q_0 = q + \tau q'; \quad \theta_0 = \theta + \tau + \varepsilon;$$

wo ε die Reduction des mittleren Zeitintervalls τ auf Sternzeit bedeutet. Wird nun in obigen Formeln allenthalben q_0 statt q , θ_0 statt θ gesetzt und ausserdem, wenn hiermit μ_0 , v_0 , μ'_0 , v'_0 gefunden wird:

$$m_0 \sin M_0 = p_0 - u_0; \quad n_0 \sin N_0 = p' - u'_0$$

$$m_0 \cos M_0 = q_0 - v_0; \quad n_0 \cos N_0 = q' - v'_0$$

$$\Delta \tau = -\frac{m_0}{n_0} \cos (M_0 - N_0)$$

$$\cos \psi_0 = \frac{m_0 \sin (M_0 - N_0)}{k}$$

so werden

$$T_1 = T_0 + \Delta \tau - \frac{k}{n_0} \sin \psi_0; \quad T_2 = T_0 + \Delta \tau + \frac{k}{n_0} \sin \psi_0$$

schon genähertere Werthe sein, die meistens genügen.

Die Positionswinkel für Ein- und Austritt, welche vom Mittelpunkt des Mondes aus von der Richtung nach dem Nordpole und über Ost, Süd, West bis 360° wachsend gezählt werden, ergeben sich einfach aus

$$Q_1 = N_0 - 90^\circ + \psi_0; \quad Q_2 = N_0 - 90^\circ - \psi_0.$$

Die Grösse τ wird meistens genau genug aus

$$\tau = \frac{c \sin (\theta - \alpha)}{0,5646 - \lambda c \cos (\theta - \alpha)}$$

erhalten. Die Einheit, in welcher τ und $\Delta \tau$ erhalten werden, ist die Stunde mittlerer Zeit. Vorstehende Formeln, die nur 4stellig berechnet zu werden brauchen, werden die Zeit des Eintritts und Austritts bis auf etwa 1^m genau geben, hierauf verlasse man sich aber nicht vollständig (wegen Unsicherheit in der angenommenen Länge etc.), sondern richte das Fernrohr längere Zeit vorher auf den Stern. Zur Beobachtung ist ein Fernrohr mit starker Vergrösserung zu empfehlen, weil das Mondlicht sich dadurch auf eine grössere Scheibe vertheilt, das Licht des Sterns aber fast ungeschwächt bleibt. Am hellen Mondrande kann man mit einem Fernrohr von 6 Centimeteröffnung und 60facher Vergrösserung schwerlich noch Sterne 4ter Grösse beobachten, während man am dunkeln Rande bei schmaler Mondsichel noch recht gut Sterne 6ter Grösse sieht. Die Beobachtung am dunkeln Rande ist überhaupt weit vorzuziehen, besonders bei dem Wiedererscheinen.

28) Eines der besten Mittel für die Längenbestimmung sind die Mond-distanzen. Die Reduction derselben sowie die dazu nothwendigen Hülfsmittel enthält das N. J., weshalb hier nur Folgendes erwähnt werden mag. Die Mond-distanzen sind offenbar dann am günstigsten, wenn dieselben sich am raschesten ändern. In Folge der elliptischen Mondbahn und aus einigen andern Ursachen kann die tägliche Aenderung zwischen 8 und 16 Grad schwanken, ein Beobachtungsfehler von $10''$ in der Distanz bringt je nachdem einen Längenfehler von $7\frac{1}{2}$ und $3\frac{3}{4}$ Bogenminuten hervor. Beobachtungen bei niedern Höhen sind wegen der Unsicherheit der Refraction zu vermeiden. Zuweilen wird es rathsam sein, den hellern Mond etwas abzublenden, während am Tage, wenn Distanzen zwischen Mond und Sonne gemessen werden, letztere stark abgeblendet werden muss. Der Fehler, der dabei durch eine etwaige prismatische Gestalt der Blendgläser hervorgebracht werden kann, muss aber bekannt sein, oder durch Drehung der Gläser um 180° eliminirt werden.

29) Mondhöhen lassen sich besonders in niedern Breiten, wo die tägliche Bewegungsrichtung nahe mit dem Verticalkreise zusammenfällt, für Längenbestimmung verwenden. Die Höhen müssen in dem Stundenwinkel genommen werden, in welchem die Eigenbewegung den grössten Einfluss auf die Aenderung desselben hat. Wächst die Declination des Mondes stark, so müssen bei höhern nördlichen Breiten die Höhen im östlichen, nimmt sie stark ab,

so müssen die Höhen im westlichen Stundenwinkel genommen werden. In höhern südlichen Breiten sind die Höhen dagegen im erstern Falle im Westen, im zweiten im Osten zu beobachten. Zur Eliminirung der Fehler ist erforderlich, dass stets Sternhöhen, die den Mondhöhen nahe gleich sind, zugleich mit gemessen werden, oder wenn Stern und Mond nahe gleiche Höhen haben, so beobachte man zuerst die eine Höhe und warte bis das andere Object dieselbe Höhe erreicht. Man hat dann nur die beiden Zeiten zu notiren; zur Sicherheit, dass sich das Instrument nicht verstellt hat, ist jedoch auch jedesmalige Ablesung zu empfehlen. Bei Ableitung der Länge aus Mondhöhen reducire man diese zunächst auf den Erdmittelpunkt, leite also die wahren Höhen ab. Mit einer genäherten Länge und der Beobachtungszeit nehme man α und δ für den Mond aus den Ephemeriden, berechne mit der Orts-Sternzeit T der Beobachtung und α den Stundenwinkel $t = T - \alpha$ und dann die Höhe h_0 nach § 16. Diese sollte mit der beobachteten Höhe h stimmen, wenn die Länge richtig angenommen, wenn also α und δ mit richtiger Zeit entnommen wäre. Hat aber die Länge einen Fehler von Δl Zeitsekunden und ändern sich α und δ in 10^m um $\Delta \alpha$ und $\Delta \delta$ Bogensekunden, woraus eine Höhenänderung Δh folgen mag, so ist

$$\Delta l = \frac{h - h_0}{\Delta h} 600$$

Δh erhält man am bequemsten aus

$$\begin{aligned} m \sin M &= \cos \varphi \cos t & \cos h \sin p &= \cos \varphi \sin t \\ m \cos M &= \sin \varphi & \cos h \cos p &= m \cos (\delta + M) \end{aligned}$$

(p für östl. Stundenwinkel negativ)

$$\Delta h = \cos p \cdot \Delta \delta + \cos \delta \sin p \cdot \Delta \alpha.$$

30) Ausser Mondhöhen kann man mit dem Passageninstrument noch Meridiandurchgänge beobachten. Für die so bestimmte gerade Aufsteigung des Mondes sucht man aus der Ephemeride die Greenw. Zeit, welcher dieselbe entspricht und die Differenz zwischen dieser Zeit und der Beobachtungszeit giebt wieder die Länge.

Um an demselben Tage mehrere Mondbeobachtungen zu erhalten, kann man diese in verschiedenen Azimuten vornehmen, doch beobachte man mindestens einen Stern in demselben Azimut. Da das Azimut nach § 16 aber nicht nahe 90^0 oder 270^0 sein darf, so eignet sich diese Methode nicht in kleinen Breiten.

Bestimmung des Azimuts.

31) Das Azimut A eines Gestirns oder der Winkel am Zenith zwischen dem Meridian und dem Verticalkreise dieses Gestirns, wird nach dem N. J. pag. L erhalten. Ist der Stundenwinkel t bekannt, so ist noch

$$\sin z \sin A = \cos \delta \sin t$$

$$\sin z \cos A = \sin \varphi \cos \delta \cos t - \cos \varphi \sin \delta.$$

Um das Azimut a eines terrestrischen Gegenstandes mit einem Reflexionsinstrumente zu bestimmen, beobachte man die Distanz desselben von einem Gestirn und reducire den gemessenen Winkel nach § 11 auf den Horizont. Dieser reducirte Winkel ist die Differenz der Azimute des Gegenstandes und des Gestirns. Das Azimut des letztern, sowie die für die Reduction nothwendige Zenithdistanz erhält man durch Rechnung, wenn die Zeit und also auch der Stundenwinkel bekannt ist. Sonst beobachte man die Zenith-

distanz gleich mit und zwar beobachte man alternirend Zenithdistanz und Winkel mit dem Gegenstande, damit Alles auf denselben Zeitmoment reducirt werden kann. Kleine Zenithdistanzen müssen ausgeschlossen werden. Befinden beide Objecte sich im Horizonte, so erhält man die Azimutdifferenz unmittelbar.

32) Um das Azimut einer Richtung mit dem Universalinstrument zu bestimmen, hat man zunächst diejenige Ablesung des Horizontalkreises zu ermitteln, welche der Richtung des Fernrohrs nach dem Südpunkte entspricht. Wird dann diese Ablesung von der für eine andere Richtung subtrahirt (vorausgesetzt dass der Kreis in der Richtung von Süd durch West etc. getheilt ist), so hat man das Azimut der letztern Richtung. Ist die Zeit genau bekannt, so beobachte man irgend einen Stern in grössern Zenithdistanzen, lese den Horizontalkreis ab und subtrahire von dieser Ablesung das für die Beobachtungszeit berechnete Azimut. Ist die Zeit weniger genau bekannt, so kann man einen dem Pole nahen Stern in allen Stundenwinkeln oder einen andern zwischen Zenith und Pol culminirenden Stern zur Zeit der grössten Digression beobachten. Besser aber verbindet man mit der Ablesung des Horizontalkreises zugleich die des Vertikalkreises, wo man aber Sterne wählen muss, deren Zenithdistanz sich bedeutend rascher ändert als das Azimut, also wieder Sterne, die sich nahe in grösster Digression befinden. Beobachtet man rasch hintereinander in beiden Lagen des Instruments, so erhält man eine Zenithdistanz z und eine Ablesung für das Azimut, die man als für das Mittel der Beobachtungszeit gültig betrachten darf. Wird mit z das Azimut berechnet und das Resultat von der Ablesung subtrahirt, so erhält man wieder den Südpunkt. Wegen der Umlegung des Instruments kann man diesen als frei vom Collimationsfehler betrachten, er ist aber noch für die Neigung i der horizontalen Axe zu corrigiren. Denkt man sich diese Axe bis zum Horizonte verlängert, so wird das eine Ende einen Punkt des Horizontes treffen, dessen Azimut um 90° grösser ist, als das beobachtete. Liegt dieses Axende zu hoch, so betrachte man die durch das Niveau ermittelte Neigung i als positiv. An das durch Rechnung gefundene Azimut ist dann die Correction $+ i \cotg z$, an den eben gefundenen Südpunkt also $\div i \cotg z$ anzubringen.

Behandlung und Verpackung der Instrumente beim Transport.

33) Die Vorsichtsmassregeln, die bei der Behandlung der Uhren und den andern astronomischen Instrumenten angewendet werden müssen, sind grösstentheils schon früher (§ 4 u. f.) erwähnt, so dass hier nur noch Folgendes anzuführen bleibt. — Die Uhren und Chronometer führe man auf Reisen stets bei sich und überlasse sie nicht fremden, ungeschickten Händen. Boxchronometer verpacke man in einem gut gepolsterten Kasten ohne cardanische Aufhängung, die nur auf See zu empfehlen ist. Beim Transport stelle man die Unruhe mittelst eines dazwischen geschobenen Papierstreifens fest und verwende das Chronometer nur dann zur Zeitübertragung, wenn der Transport ohne Stösse und Erschütterungen ausgeführt werden kann. Darauf zu achten, dass kein Staub hineindringen kann, ist selbstverständlich.

Die übrigen astronomischen Instrumente werden zunächst in einem Kasten so verpackt, dass alle Theile vollständig fest liegen, wobei jedoch für keinen Theil irgend welche Zwängung oder Spannung entstehen darf. Die

ganze Verpackung muss möglichst einfach und in kurzer Zeit auszuführen sein. Grössere Kasten sind mit Handhaben zu versehen, um sie auf kurze Strecken möglichst bequem zu transportiren. Bei längerem Transporte ist dieser erste Kasten in eine zweite grössere Kiste einzuschliessen, und zwar so, dass an den Seiten ein Zwischenraum bleibt, der mit einem elastischen Polster aus Heu, Stroh etc. ausgefüllt wird. Findet ein längerer Transport zur See statt, wo die feuchte salzige Luft die Oxydation der Metalltheile so sehr begünstigt, so ist es empfehlenswerth, die zweite Kiste mit Zinkblech zu belegen und dieses luftdicht zu verlöthen. Alle Metalltheile mit Ausnahme der Axen und Schrauben sollen lackirt sein, die nicht lackirten Theile sind während des Transports und überhaupt während der Zeit, wo das Instrument nicht benutzt wird, mit einer Schichte von Oel oder Fett, am besten mit Rindertalg zu bedecken, um den Luftzutritt abzuhalten. Selbst wenn ein Instrument fortwährend benutzt wird, so sind diese Theile dennoch von Zeit zu Zeit einzuschmieren und darauf mit einem reinen Lappen wieder zu reinigen, es bleibt eine hinreichend dicke Fettschicht zurück, um die Oxydation zu verhindern.

Anmerkung. Zum Gebrauche auf Reisen sind folgende Werke, enthaltend astronomische und andere Tafeln, ganz besonders zu empfehlen: die nautischen Tafeln von Ligowski und Domke, die astronomischen Tafeln von Peters und die Tafeln zu geogr. Ortsbestimmungen von Albrecht. Für die logarithmischen Rechnungen genügen fünfstellige Tafeln, wie jene von Bremiker, Lalande oder August.

Topographische Beobachtung und Zeichnung.

(Flying survey, Levée à coup d'oeil.)

Von

H. Kiepert.

Unumgängliche Vorbedingung jeder geographischen Erkenntniss, so wie jeder darauf zu gründenden naturwissenschaftlichen Folgerung ist sichere Orientirung in den Ortslagen, wie sie nur durch richtige, wenigstens annähernd richtige Verzeichnung der beobachteten Positionen und Naturformen im Kartenbilde gewonnen werden kann: alle andern Thatsachen, deren Beobachtung den speciellen Zweck einer Reise bilden mag, erhalten ihren vollen Werth erst durch die Möglichkeit der Nachweisung ihres localen Vorkommens auf Grund der Karte. Die Nothwendigkeit einer beständigen Aufmerksamkeit auf jene Elemente bei Reisen in weniger genau erforschten Gegenden kann nicht dringend genug eingeschärft werden, weil sie selbst von wohlunterrichteten und eifrigen Reisenden stellenweise noch in letzter Zeit nicht genügend beachtet wurde, vielmehr Dinge als bekannt vorausgesetzt worden sind, denen in der That noch die völlig sichere Grundlage fehlte.*)

Die regelmässige Beobachtung und Aufzeichnung aller topischen Objecte sollte daher spätestens mit der Betretung desjenigen Bodens beginnen, von dem noch keine aus wirklicher Aufnahme hervorgegangenen Specialkarten vorhanden sind; sie wird aber auch, wo eine solche oder auch nur eine Recognoscirung der vom Reisenden befolgten Route durch einen früheren, in Terrinaufnahmen geübten Reisenden vorhanden ist, nicht überflüssig sein, indem sie eine treffliche Vorübung, eine Controle der Brauchbarkeit der

---

*) Selbst ein so geübter und wohl vorbereiteter Reisender, wie H. Barth z. B., hat auf seiner letzten, speciell zum Zwecke topographischer Berichtigungen durch Theile der europäischen Türkei im Herbst 1865 gemachten Reise die Details der ersten Tagereise in's Binnenland — vom Hafen Antivari bis zur Stadt Scutari in Albanien — zu notiren unterlassen, in der Voraussetzung, dass die in der österreichischen Küstenkarte in Zusammenhang mit einer Recognoscirung stromaufwärts niedergelegte Position von Scutari richtig, überhaupt das ganze stark frequentirte Wegstück hinreichend bekannt sei; beides erwies sich später als irrige Voraussetzung, die Ortsbestimmung sogar in der Breite erheblich irrig (also sicher nicht auf astronomischem Wege gewonnen), so dass eine sorgfältige Notirung jenes Wegestückes nach Richtungen und Distanzen eine wesentliche Sicherung selbst des Ausgangspunktes der ganzen weiteren Route ergeben haben würde.

neuen Beobachtungen zu eigner Befriedigung, wie zur Sicherung des Urtheils eines etwaigen andern Bearbeiters der Beobachtungen gewährt.

Es bedarf zu solchen Beobachtungen nicht einmal absolut der Kunst des Zeichnens, so erwünschte Hülfe dieselbe auch gewährt, sondern nur einer mit leichter Mühe und in kurzer Zeit zu erwerbenden Uebung im Gebrauche der Instrumente, am besten unter Leitung eines Sachverständigen. Auch bei grösseren wissenschaftlichen Expeditionen, denen ein Topograph von Fach beigegeben ist, kann in vielen Fällen (z. B. Erkrankung des betreffenden Mitgliedes, absichtliche stellenweise Trennung der Reisewege u. dgl.) die Aushilfe eines ein anderes Fach vertretenden Collegen sehr erwünscht, ja nothwendig sein. Solchen nun, die sich einer ähnlichen Arbeit bisher nicht unterzogen haben, wird es nicht überflüssig sein, folgende durch Erfahrung erprobte Regeln dringend zu empfehlen:

1) Aufzeichnung unterwegs. Die ursprünglichen mit Bleistift, oft nur im Sattel gemachten, daher meist schwer lesbaren und nur dem Schreiber verständlichen Notizen, auch nachdem sie mundirt sind, aufzubewahren, um eventuelle Lücken und Mängel der Copie unter Umständen später noch ergänzen zu können. Statt eines Notizbuches, dessen bei fortgesetztem Gebrauch immerhin möglicher Verlust*) leicht einen unersetzlichen Schaden herbeiführt, hat Verfasser vorgezogen, einzelne durch Numerirung und Dairung in ihrer Folge gesicherte Blätter starken Cartonpapiers zu verwenden, weil der Verlust eines einzelnen Blattes, wenn im Laufe oder spätestens am Ende des Tages bemerkt, leichter noch aus frischer Erinnerung im wesentlichsten wieder ersetzt werden kann.

2) Reinschrift; bei erster Gelegenheit, also gewöhnlich im Laufe des Tages zweimal, hinreichend ausführlich und deutlich, um schlimmstenfalls auch anderen, als dem Schreiber, verständlich zu sein, jedenfalls mit Dinte. Thatfachen (besonders Namen und Ziffern), die etwa in der ersten Aufzeichnung bereits undeutlich geworden und schon nicht mehr aus frischer Erinnerung mit völliger Sicherheit ergänzt werden können, sind ausdrücklich als zweifelhaft zu bezeichnen, behufs Lösung der Frage durch spätere Nachfolger.

3) Sicherung der Nomenclatur, wenn sie Sprachen angehört, die dem Reisenden noch nicht geläufig sind, durch vielfaches Befragen mehrerer Zeugen und besonders, soweit es sich um Schriftsprachen handelt, mittelst Aufzeichnung in nationaler Schrift durch kundige Einheimische; wo diese Schrift (z. B. die arabische) wesentlich nur das Consonantengerippe, aber dieses in einer dem europäischen Ohre schwer fassbaren Schärfe giebt, ist auf die Auffassung der nicht geschriebenen Vocale durch das Gehör desto grössere Sorgfalt zu wenden. In der Transcription der fremden Laute stets nur eines der an den abweichenden orthographischen Gebrauch verschiedener europäischer Sprachen sich anschliessenden Systeme, gleichviel welches, anzuwenden.

4) Entfernungsbestimmungen. Für den zurückgelegten Weg ist direkte genaue Messung selbstverständlich unanwendbar, Schrittzählung — (direkte oder mittelst des unbequemen, kostspieligen, leicht zerbrechlichen Hodometers oder Pedometers, welches am menschlichen oder thierischen Knie

---

*) Barth erlitt einen solchen in der Dunkelheit einer Bergersteigung vor Sonnen-
aufgang an einem schon mit den Aufzeichnungen von drei Wochen gefüllten Büchelchen,
wodurch seine ganze Reise von 1865 in der Mitte, gerade in einer durchaus neue For-
schungsfelder eröffnenden Partie aufs störendste unterbrochen wurde.

angebracht wird), — nur ausnahmsweise, zunächst bei beschränkteren Planaufnahmen anwendbar, auch sonst kaum von einem der Mühe entsprechenden Nutzen; am allgemeinsten anwendbar ist das Zeitmaass, also die Uhr, nur mit den erforderlichen Correctionen der unausbleiblichen Abweichungen von dem normalen Maasse: also jedesmalige Notirung der durch Beschaffenheit des Weges, Temperatur der Tageszeit, Ermüdung der Reitthiere oder andere zufällige Umstände bedingten Beschleunigung oder Verlangsamung der Gangart, während der durchschnittliche Gangwerth des einzelnen Reitthieres zweckmässig gelegentlich durch direkte Abmessung einer kurzen Strecke nach Zeit- und Schrittmaass festgestellt werden kann.*) Bei Notirung des zurückgelegten Zeitmaasses verlasse man sich nie auf sein Gedächtniss, zeichne also nicht die Zeitdifferenz zwischen zwei Punkten der Route auf, sondern stets die absolute von der Uhr angegebene Zeit, natürlich mit sorgfältiger Notirung der nicht auf den Weg, sondern durch zufälligen Aufenthalt verbrauchten Zeit; durch dieses Verfahren werden Ergänzungen etwaiger Lücken und Berichtigungen von Fehlern der Aufzeichnung bis zu einem gewissen Grade sehr erleichtert.

5) Schätzungen der Entfernung von nicht direkt berührten und vom Wege aus mitunter nur an einzelnen Stellen sichtbaren Punkten können allerdings erst nach längerer Uebung einen einigermaassen befriedigenden Grad von Zuverlässigkeit erlangen, gewähren aber vielfach das einzige Mittel zu einer, wenn auch nur approximativen Fixirung mancher wichtigen Ortslage auf der Karte, so dass sie unter keinen Umständen unterlassen werden sollten. Die wünschenswerthe Uebung lässt sich, ehe sie auf dem eigentlichen Arbeitsfelde erprobt wird, zweckmässig auf Reisen in Landschaften erwerben, von welchen genaue Karten existiren, durch welche der Beobachter über den Grad der Genauigkeit seiner wiederholten Schätzungsversuche sich selbst controlliren kann.

6) Richtungen sichtbarer Gegenstände in Beziehung zur Route in rohester empirischer Weise nach dem Augenmaasse anzugeben, genügt nur da, wo selbe der Natur des Gegenstandes entsprechend überhaupt nicht zu fixiren sind und häufig wechseln (z. B. Lauf von Flüssen oder Thälern) — aber wenigstens in Beziehung auf die betreffende Seite des Weges, ob rechts oder links, sollte man zuverlässige Angaben von einem nur halbwegs aufmerksamen Reisenden um so mehr erwarten, je unentbehrlicher solche (z. B. für die Einsicht in den Zusammenhang des hydrographischen Netzes die Direktion jedes vom Wege geschnittenen Flusslaufes) für die Kartenconstruction sind und je grössere, mitunter unheilbare Verwirrung in dieser Beziehung irrige Angaben verschulden. Gleichwohl zeigt die Erfahrung, dass selbst sonst geübte Beobachter gerade jene einfachsten Beziehungen, so wie die der entsprechenden Himmelsgegenden (am leichtesten Ost und West, viel seltener begreiflicherweise Nord und Süd) häufig genug verwechseln: ein Wink, die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt zu verdoppeln und womöglich durch eine, wenn noch so roh gezeichnete Skizze, welche gerade solchen Umkehrungen der Richtung nicht unterworfen ist, der Wegebeschreibung zu Hülfe zu kommen.

Je wichtiger zur Ableitung aller anderweitigen und ferner liegenden

---

*) Es ist auch zweckmässig, durch mehrfache Versuche das Verhältniss des Zeitaufwandes in verschiedenen Gangarten für ein und dasselbe Thier zu ermitteln, um bei gelegentlich nicht ganz zu vermeidender Benutzung einer schnelleren Gangart den Maassstab zur Ermittlung der Wegelänge nicht einzubüssen.

Localbestimmungen die möglichst genaue Fixirung der Route als Grundlinie ist, um so nothwendiger ist es, nicht blos den allgemeinen Verlauf derselben, sondern jeden Wechsel der Richtung im Detail, auf schwierigen Gebirgswegen mitunter von Minute zu Minute zu notiren, doch kann dies mit Verzicht auf jede extreme Genauigkeit mittelst eines Taschencompasses geschehen, indem selbst ein aus der Unvollkommenheit des Instrumentes, der Schwierigkeit jedesmaligen völlig ruhigen Einspiels der Nadel (zumal bei der Beobachtung vom Sattel aus) und der anfänglichen Ungeübtheit des Beobachters entspringender Beobachtungsfehler von 5^0 auf die Detailconstruction der Zeichnung mit Rücksicht auf den Reductionsmaassstab keinen irgend erheblichen Einfluss ausübt.*)

Ein ähnlicher oder noch geringerer Grad von Annäherung an die exacte Direction reicht aus, wo es sich um Notirung von Gegenständen (Ortschaften, Bergspitzen, Flussbiegungen u. dgl.) handelt, welche dem Wege so nahe liegen, dass sie überhaupt innerhalb des Gesichtsfeldes einen grösseren Platz einnehmen, so dass eigentlich der Horizontalbogen, den ihre Endpunkte einschliessen, zu notiren wäre, in den meisten Fällen aber die Beobachtung ihrer ungefähren Mitte genügen wird. Man lasse die Nadel auf die in der Boussole als wirklicher Nord und Süd bezeichneten Punkte einspielen, und lasse sich durch den sogenannten magnetischen Nord, welchen die in Deutschland fabrikmässig verfertigten Compassee mit einer willkürlichen, nur für einzelne Linien auf der Erde (im Durchschnitt für das mittlere Deutschland) zutreffenden Annahme der Declination von 18^0 oder 20^0 westlich vom Nordpunkt anzeigen, nicht irre machen; man erhält auf diese Art natürlich Winkel, welche die Gesichtsobjecte mit dem nach Ort und Zeit veränderlichen magnetischen Meridian bilden, die also bei der Kartenconstruction der Berichtigung unterworfen werden müssen. Für diese gewährt in der Nähe der Küsten die durch die nautischen Aufnahmen von Zeit zu Zeit wiederholte und auf den Seekarten mit Datum der Beobachtung angegebene Bestimmung der Declination (auf den englischen Seekarten Variation genannt) ausreichende Hülfe. Bei Reisen, welche sich tiefer in das Innere eines Continents erstrecken, ist es dagegen nöthig, von Zeit zu Zeit an geeigneten Plätzen längeren ruhigen Aufenthaltes durch wiederholte Vergleichung der Richtung der Nadel mit einer ermittelten Mittagslinie**) den Betrag der magnetischen Abweichung festzustellen.

Hierzu ist natürlich ein durch Grösse und Einrichtung einen höheren Grad von Genauigkeit der Beobachtung gewährendes Instrument erforderlich: man bedient sich entweder einer Stativ-Boussole mit Dioptern, oder noch leichter des sog. Katerschen Compasses, eines Instrumentes, welches keine Aufstellung erfordert, sondern frei in der Hand gehalten mittelst Dioptern auf dem die Magnetonadel enthaltenden beweglichen Cylinders die direkte Ablesung des Winkels mit der magnetischen Nordlinie, und zwar bei einiger Uebung in ruhiger Haltung des Instruments bis auf halbe Grade genau gestattet.

Eine solche grössere Boussole ist es rathsam, zu Messungen an allen Ruhepunkten des Weges zu benutzen, wo sich eine weitere Aussicht über

---

*) Man versäume nie, nach gemachter Beobachtung durch die Arretirungs-Vorrichtung die Nadel wieder zum Stillstehen zu bringen, weil dieselbe durch das Hin- und Herschwanke während des Transports, resp. in der Tasche, an Empfindlichkeit verlieren würde.

**) Vgl. den Abschnitt „Geographische Ortsbestimmungen“ über Azimut S. 37.

den zurückgelegten*) oder bevorstehenden Weg oder überhaupt auf eine grössere Menge von Objecten eröffnet. Um sich gegen Irrungen in der Aufzeichnung von Ziffern und Himmelsgegenden möglichst zu sichern, ist an solchen Aussichtspunkten nichts zweckmässiger, als die Notirung der Directionen nicht blos mit Namen oder in Ermangelung der zuverlässigen Kunde des Namens, symbolischen Bezeichnungen, sondern auf einer, wenn auch noch so rohen, also selbst von des Zeichnens nur wenig kundigen Personen ausführbaren Profilskizze des zu überschauenden Abschnittes oder unter Umständen des ganzen Horizontes. Können solche Profilanichten durch einen geübten Zeichner oder durch Photographie hergestellt werden, dann um so besser für das Ergebniss der Kartenconstruction; nur vergesse man nicht die Hinzufügung der durch die Magnetnadel angegebenen Directionen der Hauptobjecte, welche bei Anwendung der Photographie, insofern dieselbe die Detailmaasse an sich richtig wiedergiebt, auf sehr wenige, ungefähr den Endpunkten der einzelnen Profilstücke entsprechende beschränkt werden können.

Statt der Boussole kann für feine Winkelmessungen, zümal solche, welche einen ganzen Horizont begreifen, mit noch grösserer Zuverlässigkeit ein Spiegelinstrument, wie der ungemein portative Douglas'sche Reflector angewendet werden, nur dass dasselbe natürlich nicht absolute Richtungen, mit Beziehung auf die Himmelsgegenden ergiebt, sondern die Winkel, welche die nach den einzelnen Schobjecten gezogenen Linien untereinander am Beobachtungsplatze bilden. Das Instrument besteht bekanntlich aus einem Kreisbogen von 60 oder mehr Graden mit einem festen und einem verschiebbaren Radius, welcher von dem durch die Dioptern und eine auf dem Kreisbogen stehende, unten mit Spiegel bedeckte, oben durchsichtige Glasplatte fixirten Objecte so weit geführt werden muss, bis ein zweites zu messendes Object, dessen Bild durch den zweiten grösseren Spiegel zurückgeworfen wird, in jenem halben Spiegelchen das Bild des erstern Objectes direkt berührt. Sicherheitswegen ist sodann die Stellung des beweglichen Radius durch die Schraube am Kreisbogen zu fixiren (bei einiger Uebung und Vorsicht ist selbst dies unnöthig), und kann sodann an dem auf Grade und mittelst des Nonius auf Zehntelgrade eingetheilten Bogen, der dem gesuchten Centrumswinkel entsprechende Peripheriewinkel beim Nullpunkt der beweglichen Scala direkt abgelesen werden. Die Construction des Instruments bedingt, dass bei der Berührung der beiden Objecte das links befindliche im unbelegten Glase, das rechts befindliche im Spiegel darunter erscheint, dass also, wenn man von jenem ausgeht, das Instrument von links nach rechts bewegt wird, es ist aber eben so gut ausführbar und in vielen Fällen (zumal für den ungeübten Beobachter, weil das Spiegelbild weniger deutlich ist, als das direkte) sehr viel leichter, in umgekehrter Richtung zu verfahren, also zunächst bei geschlossenem Instrumente durch die Diopter den Gegenstand rechts in's Auge zu fassen und ihn im Spiegel festzuhalten, während man das Instrument langsam nach links bewegt, bis im freien Glase das erste, nach links gelegene Object erreicht ist. Ferner ist es überhaupt nicht nöthig, und

*) Das von manchen Reisenden unbegreiflicherweise vernachlässigte Rückwärtsvisiren kann nicht dringend genug empfohlen werden, da es durch Bekanntschaft mit den sichtbaren und bereits in der Nähe gesehenen Objecten eine grössere Sicherheit gewährt, als die vorwärts gerichteten Beobachtungen nach noch neuen Objecten, für welche mitunter sonst landeskundige Personen irrthümliche Namen angeben und dadurch Verwirrung in den zu verarbeitenden Materialien bewirken.

bei unter einander ähnlichen und daher einer möglichen Verwechslung unterworfenen Gegenständen nicht einmal zweckmässig, die Winkel einer längeren Reihe von Objecten einzeln zu messen (also von a nach b , b nach c , c nach d , d nach e , e nach f), sondern, vorausgesetzt dass f ein auffallender, leicht erkennbarer Gegenstand sei, besser die Bogenstücke af , bf , cf , df , ef ; man theile seinen Horizont in mehrere durch hervortretende Objecte begrenzte Abschnitte (das Instrument gestattet ein Maximum von 120°), messe diese im Ganzen, dann innerhalb derselben die einzelnen Winkel, und überzeuge sich sofort durch Addition der einzelnen Beträge, dass kein Fehler im Ablesen und Notiren stattgefunden habe. Man beachte ferner, dass die Richtigkeit der Messung von der horizontalen Haltung des Instruments abhängt, dass es daher unmöglich ist, einen im Gesichtsfelde höher erscheinenden Gegenstand im Spiegelbilde unterhalb der Visirungslinie eines niedriger erscheinenden zu bringen; man wird also zweckmässig die zur Haupteintheilung des Horizonts geeigneten Objecte unter den tiefer gelegenen zu wählen haben. — Eine direkte Verbindung der mittelst des Reflectors gemessenen Richtungen mit den wirklichen Himmelsgegenden (also mit der wahren, nicht magnetischen Nordlinie) ermöglicht sich unter günstigen Umständen an Stellen, welche in der Richtung der auf- oder untergehenden Sonne einen ganz freien oder dem wirklichen nahezu entsprechenden Horizont gewähren, indem man im Moment der Berührung des Sonnendurchmessers mit dem Horizonte die Distanz zwischen dem linken oder rechten Sonnenrande und einem der gemessenen oder zu messenden Objecte bestimmt; der linke Sonnenrand wird sich hierzu besser eignen, da er dann im Spiegel, jedenfalls deutlich genug, erblickt wird, während andernfalls das Spiegelbild eines dunklen Objectes mit der direkten Visirung des rechten Sonnenrandes in Berührung gebracht, durch denselben für das Auge allzuleicht unkenntlich gemacht wird. Hauptsache ist bei diesem Verfahren natürlich richtige Aufzeichnung des Datums (sollte eigentlich keiner Erinnerung bedürfen und ist doch mitunter bei wichtigen Beobachtungen versäumt worden), und wenigstens approximative Kenntniss der astronomischen Breite, aus welchen beiden Momenten die absolute Stellung der Sonne im Augenblick der Beobachtung, und somit die wahre Orientirung zu berechnen ist.

Durch das bisher angegebene Verfahren werden immer nur die geometrischen Grundlagen der Kartenzeichnung: Positionen und Routenlinien, gewonnen: es erübrigt noch die Ausfüllung der Räume zu einem vollständigen Bilde durch Eintragung der von der Route aus sichtbaren Formen der Erdoberfläche und des Wassers. Das einzige, was der des Zeichnens absolut Unkundige in dieser Beziehung leisten kann: blosse Beschreibung mit Worten, kostet bei einiger Ausführlichkeit und Anschaulichkeit unverhältnissmässig viel Zeitaufwand, kann mithin meist nicht überall an Ort und Stelle, sondern oft erst bei einem Ruhepunkte aus noch frischer Erinnerung aufgezeichnet werden und ersetzt doch nicht entfernt selbst die flüchtigst hingeworfene, im Angesichte der betreffenden Objecte aufgefasste Zeichenskizze.*) Wenn bei Gewinnung des Materials zur Kartenzeichnung aus Reiseberichten des

---

*) Mangel an charakteristischer Detaillirung der Terrainformen ist daher ein sehr begreiflicher Fehler an manchen Karten, die gleichwohl durch die Genauigkeit der darin zuerst niedergelegten Positionen sich auszeichneten, z. B. derjenigen, welche Verfasser dieses zweimal (1840 und 1852) nach den Reisetagebüchern und sehr zahlreichen und genauen, aber durch keinerlei Skizze unterstützten Messungen der bekannten amerikanischen Palaestinaforscher Robinson und Smith ausgearbeitet hat.

vorigen, und selbst der ersten Decennien des laufenden Jahrhunderts der Geograph sich regelmässig mit solchen, oft sehr unbestimmten Beschreibungen begnügen, ja oft selbst Angabe der Marschdirection, zuweilen sogar genaue Distanzen entbehren musste, also selbstverständlich nur sehr unvollkommene Karten liefern konnte, so sind eben gegenwärtig, entsprechend dem auf diesem Felde bethätigten Wetteifer tüchtiger, auch nicht militärischer Arbeitskräfte, die Ansprüche an Genauigkeit und Schärfe des Ausdrucks derart gestiegen, dass sie nur durch Zeichnungen, die an Ort und Stelle aufgenommen, ein einigermaassen treues Abbild der Naturformen gewähren, befriedigt werden können. Ohne das topographische Zeichnen, wenigstens in seinen Anfangsgründen, schulmässig erlernt zu haben, wird es der Reisende kaum zu der gewünschten Fertigkeit im naturgetreuen Croquieren bringen: in jüngern Jahren ist deshalb jedenfalls die längere Ausübung dieser Kunst als vorbereitendes Studium für Reisen zu empfehlen. Aber auch wer ohne dasselbe planmässig getrieben zu haben, nur eine sichere Hand hat und den Bleistift zu führen versteht, wird mit einiger Uebung, wozu kleinere Reisen im Vaterlande leicht Gelegenheit bieten, wenigstens dahin gelangen, das für die Kartenzeichnung nothwendigste mit einiger Sicherheit symbolisch auszu-drücken, wobei ihm die folgenden Winke nützlich werden können — denn eine eigentliche vollständige Anleitung kann nicht füglich mit Worten, sondern besser durch einen Sachverständigen mittelst mündlichen Unterrichts und thatsächlichen Beispiels gegeben werden.

Man verzichte auf jeden Versuch, ein den wirklichen Distanzen der sichtbaren Objecte entsprechendes verkleinertes Bild sofort aufzuzeichnen oder man mache einen solchen Versuch, wo die Gelegenheit einer panoramatischen Uebersicht von höherem Standpunkte aus ihn zu empfehlen scheint, doch nur selbständig neben der Routenzeichnung, nicht in Verbindung damit: die Erfahrung wird sehr bald zeigen, dass viele anfangs zu nahe geschätzte und innerhalb des nächsten Gesichtsfeldes verzeichnete Objecte weit über den Rand des Blattes, auf welchem man zugleich die den Standpunkt umgebenden Details skizzirt, hinausgerückt werden müssen. Man lasse bei einer solchen panoramatischen Skizze nicht im Unklaren, von welchem Punkte der Zeichnung aus die angedeuteten Positionen entfernterer Objecte also erscheinen, und füge die gemessenen Direktionen sogleich bei.

Man versuche ebensowenig die traditionelle Stellung der sog. Himmels-legenden (also, nach europäischem Gebrauch, Norden oben) in der ersten Skizze beizubehalten: da die wirklich gemessenen Richtungen beigeschrieben werden, ist für das Skizzenblatt die Orientirung völlig indifferent. Man zeichne also in der Richtung, wie man sich auf dem eingeschlagenen Wege bewegt, d. h. vom untern Blattrande an, wo man den Zeitpunkt des Aufbruchs notirt hat, vor sich hin, möglichst in der Mitte des Blattes, soweit nicht Biegungen der Wegerichtung eine Veränderung der Linie bedingen. Auf ein gewisses Stück voraus lässt sich meistens der bevorstehende Weg übersehen und danach die Zeichnung einrichten; man hat natürlich diese Direction mittelst des Compasses beobachtet und notirt und versäumt nicht, am letzten Punkte des Weges, von wo der Ausgangspunkt noch sichtbar ist, zurückzuvisiren und dieses, natürlich sichrere Ergebniss neben dem ersten Richtungswinkel zu notiren. Bei jeder kleinsten Wegbiegung von Minute zu Minute den Compass zu befragen, würde man bald überdrüssig bekommen und als Zeitverderb erachten, wohl aber kann man dieselben durch die Zeichnung der Wegelinie bemerklich machen: nur vermeide man, die Biegungen, die dem Auge in der betreffenden Verkürzung der Horizontallinie stets viel

stärker erscheinen, als sie wirklich sind, allzustark auszudrücken. Allgemeine Visirungen längerer Wegstrecken mit Ausschluss der Krümmungen, wo sie ausführbar sind, werden das nöthige Correctiv dazu liefern. Auch dient oft der wechselnde Ausblick in der jedesmaligen wechselnden Wegrichtung auf schon früher sichtbar gewesene und daher mit dem Compass gemessene entfernte Objecte (z. B. Bergspitzen) als Norm für die Verzeichnung. Bei jeder Biegung, welche die gerade Wegelinie unterbricht, sowie bei jedem sonst am Wege verzeichneten Object notirt man natürlich die absolute Zeit; wo ein Aufenthalt, selbst ein sehr geringfügiger, entsteht, Zeit der Ankunft und des Weitermarsches; diese Art von Controle der Details der Route ist durchaus nöthig und nicht oder doch nur, wo es sich um Minima handelt, zu ersetzen durch den Maassstab der Routenzeichnung selbst, welchen man, wenn auch im allgemeinen den wirklichen Distanzen entsprechend, doch keineswegs überall genau festhalten kann, sondern häufig bei wachsendem Detail stark zu erweitern genöthigt ist. Ferner vergesse man nicht, von Zeit zu Zeit den Blick rückwärts längs des zurückgelegten Weges zu richten, und wo die Ansicht eine Abweichung von der soeben verzeichneten Form zu bedingen scheint, dieselbe gleichfalls (am besten, da Correcturversuche oft zur Undeutlichkeit führen, selbständig neben dem schon entworfenen) aufzuzeichnen. Wenn eine unvorhergesehene und weiterdauernde Veränderung der Wegerichtung vor Anfüllung des Blattes die Zeichnung der Route an den Seitenrand führt und darüber hinaus führen würde, biege man nicht willkürlich die angenommene normale Direktion um, — welches, auch wenn die neue Richtung selbstverständlich nach der Compassdirektion beigeschrieben wird, einen störenden Einfluss auf die richtige Stellung der zur Seite der Route liegenden Objecte üben und dadurch später Missverständnisse, resp. Fehler in der definitiven Verzeichnung bewirken würde, sondern gehe sogleich auf ein neues Blatt über; ebenso thue man, sobald man in der bisherigen Verzeichnung einen Irrthum entdeckt, unter thunlichster Berichtigung des falsch gezeichneten auf dem neuen Blatte. In jedem Falle, auch wo das neue Blatt nach vollständiger Anfüllung des vorangehenden begonnen wird, bezeichne man deutlich, d. h. mit Zeitdatum, den auf beiden Blättern identischen Punkt der Route.

Folgt der Weg zeitweise einem fliessenden Wasser und ist dasselbe nicht, wie in absolut flacher Gegend häufig, durch Bäume u. dgl. ganz verdeckt, so wird es nicht schwierig sein, die Biegungen des Wasserlaufes nach dem Augenmaasse, höchstens bei grösseren Abweichungen mit Zuhülfenahme des Compasses (indem z. B. ein an einer entfernteren Ausbiegung liegendes Object: Haus, Felsen, auffallender Baum oder dgl. von zwei oder mehreren Punkten der Route aus visirt wird) auf dem Papiere zu entwerfen. Auch bei kleineren, vom Wege aus ganz zu übersehenden Landseen wird es lohnen, diejenige Dimension, welche sich nicht aus der Wegelinie ergibt (also z. B. die Breite, im Fall der Weg der einen Langseite des Sees folgt) durch mehrfache Visirung irgend eines an der Gegenseite befindlichen auffallenden Objectes genauer, als durch blosser Schätzung zu ermitteln. Wasserläufe hingegen, welche der Weg schneidet, sind in flacheren Gegenden selten (mitunter durch die daran wachsenden Bäume) auf weitere Strecken in ihrer Direktion — die dann durch den Compass festzustellen ist — zu übersehen; man begnügt sich also dann mit der Andeutung der localen Schneidung und der durch einen Pfeil angedeuteten Richtung des Wassers, wofern dieselbe sonst zweifelhaft bleiben konnte. Ob wirklich fliessendes Wasser in der Thalrinne vorgefunden oder nur das periodische Vorhandensein eines solchen voraussetzen, wie in heissen und trocknen Ländern die Regel ist, wird

man in jedem einzelnen Falle zu bemerken nicht vergessen, sowie bei der Durchschreitung eines Wasserlaufes eine, wenn auch nur approximative Notiz über Breite und Tiefe desselben erwünscht ist.

Die Auffassung und Wiedergabe des speciell sogenannten Terrains, d. h. der Formen der Erdoberfläche in Anhöhen und Thälern, sanften oder steileren Abhängen und schroffen felsigen Abstürzen, isolirten oder zusammengehörten Gipfeln, Spitzen, Rücken u. s. w. — also der wesentlichste und für den Ungeübten schwierigste Theil der Kartenzeichnung — entzieht sich begreiflicherweise am meisten dem Versuche blosser schriftlicher Belehrung: einige Fertigkeit darin kann vielmehr durch gute Beispiele, namentlich aber durch fortgesetzte Uebung in zeichnender Reproduction des gesehenen erworben werden. Die grösste Schwierigkeit macht dem Anfänger die Nothwendigkeit der Uebersetzung der nur im Profil und zwar einem während der Route beständig wechselnden Profil sichtbarer Verticalform in die vom Verstande zu combinirende Horizontalform: die für das Auge stattfindende allmähliche Verschiebung der Objecte, der Unterschied, den dieselben Objecte im Profile hinwärts oder rückwärts gesehen dem Auge bieten, nöthigt häufig zur Modification und Correctur (zweckmässiger zur nochmaligen veränderten Aufzeichnung) der beim ersten Anblick für richtig gehaltenen Formen. Eine wichtige Hülfe für die definitive Reinzeichnung gewähren dabei möglichst oft an passenden Standpunkten wiederholte, nur in den einfachsten Contouren gehaltene, aber nur in den Formen und dem Verhältniss der Höhe zur Länge treue Profilskizzen, wie sie sich in wenigen Minuten herstellen lassen. (Die Notirung des genauen Standpunktes, ev. Zeitpunktes, innerhalb der Route natürlich nie zu vergessen.) Es macht sich bei solchen öfteren Wiederholungen der Verzeichnung ein und derselben Objecte (vorausgesetzt, dass, wie mehrentheils der Fall sein wird, keine Specialnamen für dieselben bekannt sind) zur Vermeidung von Missverständnissen die Nothwendigkeit einer bestimmten Bezeichnung, am besten durch willkürliche Buchstaben geltend (also z. B. Bergspitze *a*, Felsen *b*, Steilabfall *c*, Passeinschnitt *d* u. dgl.), die man ebenso auch bei der Notirung der Compassvisirungen anwenden wird. Hinsichtlich der speciellen Bezeichnung der Formen wird sich der im Zeichnen noch weniger geübte durch Beifügung kurzer descriptiver Notizen zu helfen wissen (z. B. spitz, rund, flach, steil, felsig u. dgl.), auch Angabe der Gesteinsart liefert, insofern z. B. Sandstein- oder Kalkfelsen, granitische oder basaltische Erhebungen überall dieselben typischen Formen reproduciren, ein schätzbares Hilfsmittel für charakteristische Ausführung der Reinzeichnung. Eine wesentliche Hülfe zu genauerer Terrainzeichnung bieten endlich relative Höhenbestimmungen, sowohl in unmittelbarem Bereich der Route (also z. B. Tiefe eines zu durchschneidenden Thales verglichen mit den plateauartigen Thälerrändern, Höhe eines Bergpasses oder Gipfels über den nächstgelegenen Thälern), wofür das so leicht zu handhabende und zu transportirende Aneroidbarometer ausreichende Genauigkeit gewährt, als auch für die seitwärts der Route bleibenden Höhen, für welche nur approximative Schätzungen möglich sind, die jedoch immer an Ort und Stelle ausgeführt, zumal nach einiger durch aufmerksame Vergleichung der Barometermessungen erworbener Uebung, immer viel werthvoller sind, als die blossere spätere Erinnerung und als der unbestimmte Spielraum der gezeichneten Skizze, die daher nie unterlassen werden sollten.

Was die Croquirung während der Route selbst betrifft, so bleibt natürlich Ausführung in irgendwie schraffirter Manier ausser Frage: erforderlich ist nur Bezeichnung der Lage und des Zusammenhanges der Terraingestal-

tungen durch Horizontalcontouren von einem, den wirklichen Formen entsprechenden stärkeren oder leichteren Ausdruck. Geeigneter als der zum Aufzeichnen von Linien, Namen und Zahlen zu benutzende, also der Deutlichkeit und Dauer der Züge wegen in ziemlichem Härtegrad (Faber No. 4 besser als 3) zu wählende Bleistift, ist zu jenem Zwecke der farbige Kreidestift, indem er auf festem Papier mühelos genügende Leichtigkeit und Stärke des Tones hergibt und durch die Farbe (für die erste Skizze gleichviel welche) Verwechslung der Terraincurven mit anderen Linien ausschliesst. Der Schwierigkeit gleichzeitiger Führung zweier Stifte ist leicht abzuhelfen, freilich kann man sie nicht beide in der ohnehin vielfach anders beschäftigten rechten Hand, auch nicht bequem und ohne häufigeren Verlusten ausgesetzt zu sein, in der Tasche führen. Verfasser hat es bequem gefunden, nur kurze Bleistift- und Kreidestift-Enden auf dem Pferde zu gebrauchen, welche mittelst eines um das eingekerbte untere Ende gebundenen Fadens an einem Westenknopf befestigt frei herabhängen (längere Stifte würden auf diese Weise begreiflich sehr stören und leicht verloren gehen), so dass man beide in jedem Augenblick im Handgriff hat.

Je weniger nun während der Route selbst ein die entsprechenden Entfernungen und Richtungen auch nur annähernd festhaltendes Aufzeichnen möglich ist, desto nöthiger ist es, die Herstellung einer die ersten rohen Skizzen schon in geordneter und berichtigter Form zusammenfassenden Zeichnung nicht länger als unumgänglich nöthig, also bis zur nächsten Mittags- oder Abendrast, zu verschieben und mit noch frischer Erinnerung des gesehenen vorzunehmen. Die nothwendigsten Instrumente zum Auftragen der Distanzen und Winkel sind dann zur Hand; statt des Zirkels dient ebenso gut ein auf einem Streifen festen Cartonpapiers aufgetragener Maassstab, statt des metallenen Transporteurs ein halbkreisförmiger Ausschnitt von Cartonpapier mit Gradeintheilung. Allerdings ist es bei dieser Arbeit noch nicht möglich, aber auch nicht erforderlich, sofort alle gemachten Messungen zu verwerthen; die auf entferntere Punkte gerichteten Winkelmessungen, welche in ihrem Zusammenhange unter Umständen die werthvollste Grundlage der Construction bilden können, werden gewöhnlich erst bei der schliesslichen Ausarbeitung zur Verwendung kommen. Nur erachte man die zunächst in Verarbeitung genommenen Details der Messungen durch diese vorläufige Construction nicht für überflüssig gemacht, sondern trage Zeitmaasse und Compassrichtungen (resp. mit dem Reflector gemessene Winkel) auch in die Reinschrift ein, und zwar zweckmässiger Weise mit leicht zu unterscheidender farbiger Bezeichnung, also z. B. Wege, Wasserläufe, Ortszeichen, Distanzziffern mit schwarzer, Richtungen mit den zugehörigen Ziffern mit rother Tinte. In dieser Gestalt wird die Skizze, falls der Autor sich die eigenhändige Ausarbeitung der Kartenzeichnung nicht zutraut, auch einer andern Person verständlich und verwendbar sein.

Um die Bleistift- und Kreidestiftzeichnungen (namentlich auch Profilskizzen) gegen Verwischen beim Transport zu schützen, kann man sie zweckmässig mittelst eines Tuschpinsels mit Kaffee überstreichen, indem der darin aufgelöste Zucker als Fixierungsmittel wirkt.

Um das hier gesagte einigermaassen, soweit es ohne mündliche Erläuterung und sachliche Demonstration möglich ist, zu veranschaulichen, füge ich die Copie eines Skizzenblattes aus meiner palästinensischen Reise von 1870 bei.

Skizze
(letzte I
unterme

Anweisung zur Beobachtung allgemeiner Phänomene am Himmel mit freiem Auge oder mittelst solcher Instrumente, wie sie dem Reisenden zur Verfügung stehen.

Von

E. Weiss.

Es giebt in der Astronomie eine Reihe von Erscheinungen, zu deren erfolgreicher Beobachtung weder kostbare, schwer zu behandelnde Instrumente, noch tiefe mathematische und astronomische Kenntnisse, sondern nur ein gesundes, scharfes Auge und ein gewisses Beobachtungstalent erforderlich sind. Und gerade in dieser Gattung von Beobachtungen kann ein Reisender der Wissenschaft viele und wichtige Dienste leisten, besonders dann, wenn ihn seine Reise in Gegenden führt, welche ein Astronom von Fach nicht so leicht Gelegenheit hat zu betreten, in denen aber das eine oder andere Phänomen in besonderer Einfachheit oder Schönheit auftritt.

Ein allgemeines Erforderniss für alle diesbezüglichen Beobachtungen ist eine übersichtliche Kenntniss der vorzüglichsten Sternbilder und ihrer Hauptsterne. Diese Kenntniss ist übrigens leichter zu erwerben als man gewöhnlich glaubt, wenn man die schon bekannten Sterne mit einzelnen anderen zu verschiedenen geformten Drei- oder Vierecken verbindet und sodann versucht, diese Figuren auf einer nicht mit allzuviel Detail überladenen Himmelskarte wiederzufinden. (Methode der Alignements.) Hat man auf diese Art die helleren Sterne kennen gelernt, so führt öfterer Gebrauch das Erkennen der schwächeren von selbst herbei, da man stets schon bekannte in der Nähe findet, gegen welche man die Lage jener leicht im Gedächtnisse behalten kann.

Ferner ist es wichtig, das Auge vor öfterem, raschem Lichtwechsel möglichst zu schützen, wenn man seine Empfindlichkeit für schwache Lichtindrücke oder geringe Lichtabstufungen nicht vorzeitig abstumpfen will. Man gewöhne sich daher, seine Wahrnehmungen im Dunklen aufzuschreiben, wobei man das Ineinanderschreiben dadurch verhindern kann, dass man das Blatt Papier nach jeder Zeile umbiegt. Noch besser ist es, das Papier in einen Rahmen von Pappendeckel zu legen, dessen Deckel bis auf einzelne Streifen ausgeschnitten ist, welche die Linien markiren, zwischen die man zu schreiben hat. Sobald jedoch das Auge ermüdet ist oder durch helles Licht geblendet wurde, soll man es vor dem Beginne einer neuen Beobachtung eine Zeit lang ruhen lassen (indem man, wenigstens durch einige Minuten, im Dunklen verweilt), bis es seine Empfindlichkeit wieder gewonnen

hat. Ebenso soll während der Beobachtung kein fremdes Licht störend einwirken: denn man kann auch dann, wenn das Auge nicht unmittelbar von dem fremden Lichteindrücke getroffen wird, in der Regel keine zuverlässigen Beobachtungen anstellen. Man vermeide es daher, zwischen hell erleuchteten Häusern, oder geblendet von dem Glanze der Strassenlaternen zu beobachten, und versäume, wenn es einmal geschehen, ja nie, dies anzumerken. Ueberhaupt kann die sorgfältige Notirung aller, eine Beobachtung beeinträchtigenden Umstände nicht genug empfohlen werden, damit man später unsicheren Beobachtungen nicht mehr Zutrauen schenke, als sie verdienen.

Endlich sei noch erwähnt, dass, so schätzbar auch eine jede sorgfältige und detaillirte Beschreibung eines einzelnen besonders ausgezeichneten Auftretens irgend eines Phänomenes ist, doch im Allgemeinen eine längere Zeit hindurch fortgesetzte, consequente Beobachtungsreihe desselben einen bei weitem grösseren Werth besitzt.

Ehe wir nach diesen einleitenden Worten zur Besprechung der wichtigeren hierher gehörigen Erscheinungen übergehen, sei noch die Bemerkung vorausgeschickt, dass der Kreis von Beobachtungen, deren Ausführung dem Reisenden eine lohnende Ernte verspricht, sich allmählig verengt. So sind uns beispielsweise manche Kometen früherer Jahrhunderte, welche nur auf der südlichen Halbkugel sichtbar waren, blos durch Berichte von Reisenden bekannt geworden: ebenso blieb die Beschreibung des spanischen Seefahrers Ulloa von der Sonnenfinsterniss am 24. Juni 1778 lange Zeit hindurch eine der wichtigsten Quellen unserer Kenntniss der Lichterscheinungen, welche sich um die total verfinsterte Sonne zeigen. Allein heutzutage, wo auf der südlichen Halbkugel bereits mehrere Sternwarten thätig sind, wird ein Reisender wohl nicht so leicht in die Lage kommen, einen Kometen zu beobachten, der nicht auch auf diesen Sternwarten, und zwar mit besseren Hilfsmitteln als ihm zu Gebote stehen, beobachtet würde. Nicht minder hat die Erleichterung des Verkehrs mit fernen Welttheilen zur Folge, dass jetzt zur Beobachtung jedes wichtigeren, selten sich ereignenden Phänomenes wohl-ausgerüstete Expeditionen an alle jene Punkte gesendet werden, welche für dessen Sichtbarkeit besonders günstig liegen. Es werden daher Fälle, wo ein Reisender in diesen und ähnlichen Beobachtungen etwas Erspriessliches leisten kann, nur noch ganz ausnahmsweise vorkommen, und es sind überdies die Beobachtungen, deren Anstellung ihm bei solchen Gelegenheiten empfohlen werden könnte, je nach den Hilfsmitteln, die ihm zu Gebote stehen, so verschieden, dass wir es für's Beste halten, derartige Phänomene hier nicht weiter zu berücksichtigen.

Zodiakallicht.

Unter dem Namen Zodiakal- oder Thierkreislicht versteht man gewöhnlich jenen mattleuchtenden, der Milchstrasse ähnlichen Lichtschimmer, der beim Schlusse der Abenddämmerung am westlichen, und kurz vor dem Einbrechen der Morgendämmerung am östlichen Himmel in Gestalt einer Pyramide sichtbar wird, die mit der Basis auf dem Horizonte ruht und sich nahezu längs der Ekliptik fortzieht.

Das Zodiakallicht besteht also dem Anscheine nach aus einer elliptischen Lichtwolke, deren Längsachse beinahe in die Ekliptik fällt, und in deren Mittelpunkt die Sonne sich befindet. Dies ist jedoch nicht das ganze Phänomen, sondern nur sein sichtbarster und am leichtesten zu beobachtender Theil. Unter günstigen Umständen zeigt sich nämlich in der Ekliptik noch

ein anderer Lichtstreifen von ähnlicher Gestalt, aber viel geringeren scheinbaren Dimensionen und viel blässerem Lichte, dessen hellste Partie dem Sonnenorte gerade gegenüberliegt. Ein geübtes und scharfes Auge bemerkt aber überdies zuweilen noch eine äusserst zarte Lichtbrücke, welche den letztgenannten, von Brorsen mit dem Namen Gegenschein belegten Lichtschimmer mit dem Hauptscheine verbindet. Das Zodiakallicht bildet daher in seiner Gesamtheit eine grosse Lichtzone, welche sich über den ganzen Thierkreis ausdehnt, und zwei Intensitätsmaxima besitzt, von denen das eine mit dem Orte der Sonne zusammenfällt, und das andere, viel weniger ausgeprägte, demselben diametral gegenüberliegt, während die beiden Minima ungefähr 130° von der Sonne abstehen dürften.

Das Zodiakallicht im engeren Sinne des Wortes (d. h. jene Lichtpyramiden, welche des Abends im Westen und des Morgens im Osten schief am Horizonte aufsteigen) ist wenigstens in unseren Breiten nicht zu allen Jahreszeiten gleich gut sichtbar, da es vermöge seines Verlaufes längs der Ekliptik zu Zeiten so tief am Himmel zu liegen kommt, dass es sich in den Dünsten des Horizontes sehr leicht der Wahrnehmung entzieht. Dies ist namentlich in den Sommermonaten der Fall, wo überdies auch die langen Dämmerungen seine Sichtbarkeit bedeutend erschweren. Eher schon kann man das Zodiakallicht im Winter erblicken, und zwar sowohl den östlich als auch den westlich von der Sonne gelegenen Lichtkegel: den ersteren des Abends im Schützen und Steinbock, und den letzteren des Morgens im Skorpion. Am besten jedoch ist das Zodiakallicht am Abendhimmel im Februar und März sichtbar, wo Ekliptik und Horizont sich unter einem Winkel von 60° und mehr Graden durchschneiden, und nebstbei die kurzen Abenddämmerungen seiner Sichtbarkeit sehr zu Statten kommen. In diesen Monaten steigt es als eine nach links geneigte Lichtpyramide steil am Horizonte empor, durchzieht das Band der Fische, den Kopf des Walfisches und den Widder, und reicht mit der äussersten Spitze ungefähr bis zu den Hyaden und Plejaden. Dabei übertrifft das Licht desselben bei reiner durchsichtiger Luft in seinem dichtesten Theile zuweilen die hellsten Parteen der Milchstrasse an Glanz, und ist sogar mitunter im Stande, einen schwachen Reflex auf der Oberfläche eines ruhigen Wassers zu erzeugen. Des Morgens macht die Ekliptik um diese Jahreszeit nur einen Winkel von etwa 20° mit dem Horizonte, weshalb die westliche Pyramide des Zodiakallichtes am Morgenhimmel nur sehr schwer oder gar nicht sichtbar wird. Im Oktober hingegen ist gerade diese im Löwen und Krebs sehr bemerkbar und erstreckt sich bis in die Zwillinge, während jetzt umgekehrt die östliche Pyramide des Abends so niedrig am Horizonte sich hinzieht, dass sie kaum zu Gesichte kommt.

In den mittleren Breiten der südlichen Halbkugel verhält sich die Sache sehr ähnlich, nur dass hier das Zodiakallicht am besten des Abends im Oktober, des Morgens im Februar und März und gleichzeitig am Morgen- und Abendhimmel während unseres Sommers gesehen wird. In den Tropenländern hingegen, wo die Ekliptik den Horizont stets unter einem sehr beträchtlichen Winkel durchschneidet, und wo die kurzen Dämmerungen und die im Allgemeinen weit grössere Durchsichtigkeit der Luft die Sichtbarkeit der dem Horizonte nahen, hellsten Parteen des Zodiakallichtes sehr begünstigen, zeigt es sich das ganze Jahr hindurch in seiner vollen Pracht, und kann bei einiger Aufmerksamkeit zu jeder Zeit, sowohl am Abend- als auch am Morgenhimmel aufgefunden werden.

Die Ausdehnung der Pyramide des Thierkreislichtes längs der Ekliptik

und ihre Breite längs des Horizontes ist schwierig anzugeben, da ihre Säume nicht scharf begrenzt sind, sondern allmählig in den dunklen Hintergrund übergehen. Bei der Basis tritt überdies noch der Umstand hinzu, dass sie in der Regel nicht ganz bis zum Horizonte verfolgt werden kann, sondern sich bereits einige Grade darüber in den dichten Dunstschichten unserer Atmosphäre verliert. Es ist daher sehr begreiflich, dass die Dimensionen des Zodiakallichtes, je nach seiner mehr oder minder günstigen Lage gegen den Horizont, der geringeren oder grösseren Durchsichtigkeit der Luft und der Schärfe des beobachtenden Auges sehr verschieden geschätzt werden, ohne dass man, wie es schon mehrfach geschehen ist, daraus allein auf Veränderungen im Lichte selbst zu schliessen berechtigt wäre. Die Breite der Basis variiert zwischen 10° und 30° , während die meistentheils etwas abgerundete Spitze zur Zeit ihrer besten Sichtbarkeit im Durchschnittes 50° bis 70° , zuweilen aber auch noch viel weiter, von der Sonne absteht.

Das Zodiakallicht lässt das Licht der Sterne, wie es scheint, ohne merkliche Brechung, und nach J. F. Schmidt, wenigstens in seinen hoch über dem Horizonte liegenden Theilen, auch ohne merkliche Schwächung hindurchgehen, indem darin die Sterne 6. Grösse noch ohne Mühe erkannt werden können. Tiefer im helleren Glanze, näher an der Basis des Zodiakallichtes wird es allerdings schwierig, die kleinen Sterne zu sehen, wobei aber die ohnehin starke Extinction des Lichtes in Höhen von weniger als 15° bis 20° zu berücksichtigen ist. Sind die hellen Planeten Jupiter und Venus dem Zodiakallichte nahe, so überglänzen sie seine matten Säume derart, dass sie eine genaue Beobachtung derselben zuweilen wochenlang unmöglich machen. Dass dies vom Monde in noch weit höherem Grade gelte, versteht sich von selbst: übrigens entzieht er, so lange er über dem Horizonte steht, das Zodiakallicht ganz unseren Blicken, sobald sein Alter vier Tage überschreitet.

Das Zodiakallicht zeigt nach den Untersuchungen von Liais keine Polarisation. Seine Farbe ist gewöhnlich gelblich, wurde aber schon in allen Nuancen von milchweiss und weissgrau über gelb bis röthlich gesehen. Doch scheinen diese Verschiedenheiten ebenso wie die öfters erwähnten Pulsationen und Zuckungen im Innern der Lichtkegel lediglich durch Zustände unserer Atmosphäre bedingt zu sein.

In neuerer Zeit wurde das Zodiakallicht mehrmals spektralanalytisch untersucht, und dabei das merkwürdige Resultat festgestellt, dass sein Spektrum aus einer hellen grünen mit der intensivsten Nordlichtlinie (Wellenlänge 5571) vollkommen coincidirenden Lichtlinie, und aus einem schwachen continuirlichen Spektrum besteht, welches nach der rothen Seite hin, kurz vor der eben genannten hellen Linie, scharf abgeschnitten ist.

Der zweite Haupttheil des Phänomenes, der sogenannte Gegenschein, ist am leichtesten im März, April und Anfang Mai wahrzunehmen, wo sein Centrum in den Sternbildern des Löwen und der Jungfrau sich befindet. Schwieriger schon wird seine Beobachtung zur Zeit des Herbstäquinoktiums während der Monate September und Oktober, wo er die Sternbilder des Wassermannes und der Fische durchwandert. In den anderen Monaten ist er theils wegen seiner tiefen Stellung, theils wegen seiner Lage in den Verästelungen der Milchstrasse kaum mit Sicherheit aufzufinden. Doch kann man im Ganzen genommen den Gegenschein auch in unseren Breiten als eine nicht ungewöhnliche Erscheinung betrachten, obwohl die Sichtbarkeit, und namentlich die scheinbare Ausdehnung desselben seiner Lichtschwäche wegen von den atmosphärischen Zuständen noch in weit höherem Maasse afficirt

wird, als dies bei den früher besprochenen Hauptpyramiden des Zodiakallichtes der Fall ist. Allein zur Erkenntniß der Lichtbrücke, welche den Gegensein mit den Hauptpyramiden des Zodiakallichtes verbindet, gehört in unserer Breiten (und wahrscheinlich ebenso auch in den gleichen Breiten der südlichen Halbkugel) ein vorzügliches Auge und eine ungewöhnliche Reinheit der Luft. Hingegen muss die Lichtbrücke in den Tropenländern wenigstens an gewissen Orten immerhin eine ziemlich auffällige Erscheinung sein, indem z. B. Jones vom Zodiakallichte, wie es sich auf dem Hochplateau von Quito zeigt, folgende Schilderung entwirft:

„I see here every night and all through the night, a luminous arch, from east to west, quite across the sky. This arch, 20° wide, is visible at all hours, when the sky is clear, but is brightest and most striking, when the ecliptic is vertical, at which times it looks almost like another Milky Way. It is very evidently the Zodiacal Light. This luminous arch, I know, is not a new discovery, for Baron Humboldt saw it in the seas of Mexico, and Professor Brorsen has noticed it more fully in Germany. I also had glimpses of it in my late cruise in the Eastern seas. Here however, it is developed with a remarkable degree of distinctness....“

Das Zodiakallicht wird sonderbarerweise von den Schriftstellern des Alterthums nirgends erwähnt, oder mindestens nirgends so bestimmt beschrieben, dass der betreffende Passus nicht ebensogut auf andere leuchtende Meteore, beispielsweise Nordlichtstrahlen etc. bezogen werden könnte. Auch im Mittelalter scheint es wenig beachtet oder nur für eine Phase der Dämmerung gehalten worden zu sein, da wir erst im Jahre 1661 in der Britannia Baconica von Childrey auf eine unzweifelhafte Beschreibung desselben als einer regelmässigen Erscheinung stossen. Von da an wurde es einige Dezennien hindurch vielfach beobachtet, besonders seitdem Cassini es im Jahre 1683 für eine Atmosphäre der Sonne erklärt hatte. Allein das Interesse am Studium desselben erkaltete sehr bald wieder. Denn von der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts an finden wir durch eine lange Reihe von Jahren in den astronomischen und meteorologischen Jahrbüchern, sowie in den Tagebüchern von Reisenden nur noch vereinzelt, zum Theile allerdings sehr werthvolle Notizen über das Zodiakallicht, aber keine einzige durch längere Zeit systematisch fortgesetzte Beobachtungsreihe desselben. Erst um die Mitte der vierziger Jahre nahmen sich einzelne Männer, namentlich J. F. Schmidt, E. Heis und Th. Brorsen der so lange vernachlässigten Erscheinung lebhaft wieder an, und gaben dadurch einen neuen Impuls zur genaueren Erforschung derselben. Eine besondere Beachtung verdienen auch die Beobachtungen, welche der amerikanische Schiffskaplan G. Jones in den Jahren 1853 bis 1855 auf einer Reise um die Welt mit einer nicht genug anzuerkennenden Ausdauer zum Theile unter sehr günstigen Umständen ausgeführt hat. Er selbst glaubt aus ihnen die folgenden Resultate ableiten zu können:

1) Dass die Hauptmasse des Zodiakallichtes auf der nördlichen oder südlichen Seite der Ekliptik liegt, je nachdem der Beobachter sich nördlich oder südlich von derselben befindet, mit anderen Worten, dass das Zodiakallicht zugleich mit dem Beobachter nach Norden und Süden wandert.

2) Dass (in Folge der Erdrotation) im Verlaufe der Nacht eine sehr merkliche seitliche Verschiebung des Lichtkegels eintritt.

3) Dass nicht nur die Sonne, sondern unter günstigen Umständen auch der Mond ein Zodiakallicht hervorbringen kann.

Es ist hier nicht der Ort, diese Sätze einer eingehenden Kritik zu

unterziehen, und zwar um so weniger, als die Beobachtungen von Jones noch einer eigentlichen Bearbeitung harren. Nur so viel sei erwähnt, dass er bei seinen Schlussfolgerungen kaum genug Gewicht auf manche Umstände legt, welche den Charakter des Phänomenes nicht unbeträchtlich modificiren können. So findet man beispielsweise in seinen Diagrammen das unter Nr. 1 angegebene Gesetz darin ausgesprochen, dass der Lichtkegel nicht symmetrisch, sondern an einer Seite scheinbar zusammengepresst ist, zugleich aber auch, dass in der Regel jene Seite, die zusammengepresste ist, welche mit dem Horizonte den spitzen Winkel einschliesst, also jene, deren Sichtbarkeit durch die Dünste des Horizontes am meisten beeinträchtigt wird. Es drängt sich dadurch unwillkürlich die Frage auf, ob die ganze Erscheinung nicht etwa blos eine optische Täuschung sei, ähnlich der in unseren Gegenden schon so häufig bemerkten, dass bei der am Abendhimmel sichtbaren Lichtpyramide der südliche (linke) Rand schärfer begrenzt erscheint als der nördliche. Dies rührt nämlich einfach daher, dass der nördliche Rand sich mehr mit den letzten Spuren der Dämmerung vermischt als der südliche, und sich deshalb weniger deutlich vom Hintergrunde abhebt. Nicht minder sind die 14 Fälle, die Jones als Mond-Zodiakallicht anführt, schwerlich genügend, eine so wichtige Frage endgültig zu entscheiden, insbesondere da die nöthigen Angaben fehlen, um die Rolle zu beurtheilen, welche die Mondämmerung und die westliche Hauptpyramide des Zodiakallichtes bei diesen Beobachtungen gespielt haben. Es wäre daher sehr zu wünschen, dass eine grössere Beobachtungsreihe speziell zu dem Zwecke unternommen würde, die Folgerungen, welche Jones aus seinen Beobachtungen gezogen hat, mit möglichster Berücksichtigung aller hierbei in Betracht kommenden Momente zu verificiren, eventuell zu rectificiren, da dieselben für die Theorie dieses räthselhaften Phänomenes von der weittragendsten Bedeutung sind.

Die Natur und das Wesen des Zodiakallichtes sind uns noch völlig dunkel. Cassini hielt es für eine weit ausgedehnte, stark abgeplattete Sonnenatmosphäre, weil er gefunden zu haben glaubte, dass die Ebene desselben mit der Ebene des Sonnenäquators zusammenfalle, was jedoch nach den neueren gründlichen Untersuchungen von Schmidt und anderen noch keineswegs als erwiesen anzusehen ist. Mairan bildete diese Hypothese in einer etwas phantastischen Weise weiter aus, um sie auch zur Erklärung der Polarlichter und anderer Phänomene benutzen zu können. Doch verliess man dieselbe nach und nach immer mehr, als Laplace am Anfange unseres Jahrhunderts sehr gewichtige theoretische Bedenken dagegen geltend machte, und kehrte ziemlich allgemein zu der Hypothese von Fatio de Duillier, einem Zeitgenossen Cassini's, zurück, nach der das Zodiakallicht der Widerschein einer zahllosen Menge minutiöser Körperchen ist, welche die inneren Räume unseres Planetensystemes bevölkern, und die Sonne nahezu in der Ebene ihres Aequators umgeben sollen. Was dieser Hypothese bis vor Kurzem einen besonderen Anhang verschaffte, war der Umstand, dass man meinte, mittelst derselben das Zodiakallicht in eine sehr enge Verbindung mit dem widerstehenden Mittel und den periodischen Sternschnuppenschwärmen bringen zu können: allein sie ist schwerlich im Stande, von allen Eigenthümlichkeiten des Phänomenes, namentlich vom Gegenscheine, genügend Rechenschaft zu geben. Es hat daher Jones in der neueren Zeit das Zodiakallicht für einen Nebelring erklärt, der die Erde innerhalb der Mondbahn umschwebt: eine Ansicht, die, nebenbei bemerkt, fast gleichzeitig auch Heis ausgesprochen hat. Indess lassen sich auch dagegen sehr gewichtige Bedenken erheben. Uebrigens ist unsere Kenntniss vom Zodiakallichte im Ganzen noch so

mangelhaft, dass uns vor Allem noch zahlreiche, nach einem zweckmässigen Plane angestellte Beobachtungen noth thun, ehe wir mit begründeter Aussicht auf Erfolg an die Aufstellung neuer Hypothesen über die Beschaffenheit desselben schreiten können.

Zunächst wird es sich jedenfalls stets darum handeln, die Gestalt und Lage des Zodiakallichtes im Momente der Beobachtung zu ermitteln. Dies geschieht, falls der Beobachter mit dem gestirnten Himmel vertraut ist, wohl am einfachsten dadurch, dass er die Grenzen des Zodiakallichtes in eine gute Sternkarte einzeichnet, oder sich die Sterne notirt, welche die Ränder desselben berühren, oder zwischen denen sie durchgehen. Auf einem schwankenden Schiffe ist diese Beobachtungsmethode auch die einzig anwendbare; auf dem festen Lande hingegen wird es sich vorzüglich dann, wenn der Beobachter mit den Gestirnen des Himmels nicht besonders vertraut ist, empfehlen, die Grenzlinien mit Hülfe von eigens hierfür construirten kleinen Theodoliten zu beobachten, die statt des Fernrohres eine einfache Visirvorrichtung tragen, und deren Kreise der leichten Ablesbarkeit wegen nur von Grad zu Grad getheilt sind. *) Diese Beobachtungsart fordert fast gar keine Vorübung und nimmt auch weniger Zeit in Anspruch, als das Einzeichnen in Karten: ferner ist bei ihr das Auge nicht in gleichem Maasse dem Wechsel von Licht und Dunkel ausgesetzt, und es können auch kleinere Sterne, welche in den Karten nicht eingezeichnet sind, zur Fixirung der Grenzen benutzt werden: endlich ist bei ihr die Gefahr einer Verwechslung der Sterne, welcher beim Einzeichnen in Karten minder geübte Personen in hohem Maasse ausgesetzt sind, eine sehr geringe. Allerdings muss die Ortszeit der Beobachtung ziemlich genau angegeben werden, damit die Azimute und Höhen mit genügender Genauigkeit in die entsprechenden Aequator-coordinaten verwandelt werden können, und es ist überhaupt diese Verwandlung eine nicht ganz unbeträchtliche Arbeit, welche bei der anderen Methode wegfällt. Indess wird dieser Umstand in den meisten Fällen gegenüber den eben erwähnten nicht geringen Vortheilen dieser Beobachtungsmethode um so weniger in Betracht kommen können, als der Reisende wohl selten in der Lage sein dürfte, seine Beobachtungen an Ort und Stelle zu reduciren, sondern dieselben in der Regel unreducirt in die Heimath mitbringen wird, wo ihm vielfache Hülfsmittel zu deren Bearbeitung zu Gebote stehen.

Die Orientirung eines solchen Instrumentchens, welches, um überall mit Leichtigkeit verwendbar zu sein, so eingerichtet werden muss, dass es sich ähnlich wie ein Nivellirinstrument oder das Zeichenbrett eines Messtisches auf einen hölzernen Dreifuss aufstecken lässt, ist sehr einfach. Denn sobald der Azimutalkreis horizontal gestellt ist, ergiebt jede Einstellung eines bekannten Sternes, der nicht gerade nahe am Zenithe steht, durch eine leichte Rechnung den Indexfehler beider Kreise. Am besten eignet sich zu diesem Zwecke auf der nördlichen Halbkugel der Polarstern, da sein Azimut stets sehr nahe 180^0 beträgt, und in Folge dessen das Instrument stets sehr nahe richtig orientirt ist, wenn man den Index des Azimutalkreises auf 180^0 ein-

*) Solche Instrumentchen, welche schon seit vielen Jahren an der Wiener Sternwarte mit sehr gutem Erfolge zur Bestimmung der Anfangs- und Endpunkte von Meteorbahnen verwendet und deshalb Meteoroskope genannt werden, können mit Vortheil zur Beobachtung aller jener Erscheinungen benutzt werden, bei denen Lichtschwäche, verwaschene Umrisse oder andere Ursachen eine genauere Pointirung nicht zulassen. Solche Erscheinungen sind ausser dem Zodiakallichte beispielsweise noch: Sternschnuppen, Polarlichter, die Halbmesser der verschiedenen Arten von Sonnen- und Mondhöfen etc.

stellt, hierauf das Instrument um seine Hülse dreht, bis das Diopterlineal auf den Polarstern hinweist, und dann festklemmt. Man wird ferner gut thun, im Verlaufe einer längeren Beobachtungsreihe den Polarstern oder einen anderen bekannten Stern ein paar mal einzustellen, und die Angaben der Kreise nebst der Beobachtungszeit zu notiren: theils um sich von der Unveränderlichkeit der Aufstellung zu überzeugen, theils um den Indexfehler aus dem Mittel mehrerer Beobachtungen mit grösserer Sicherheit zu erhalten.

Möge man indessen die Beobachtungen nach dieser oder jener Methode ausführen, immer müssen mancherlei Vorsichtsmaassregeln angewendet werden, um eine gute Beobachtung des Zodiakallichtes zu erhalten. Vor allem muss der Beobachter vor jeder neuen Pointirung oder Einzeichnung das Auge wieder an die Dunkelheit gewöhnen (am besten dadurch, dass er es eine Zeitlang schliesst, oder gegen eine dunkle Stelle des Himmels oder der Erde richtet), damit es fähig werde, auch die schwächeren unmerklich in den dunklen Himmelsgrund sich verlierenden Parteen des verwaschenen Lichtschimmers aufzufassen. Ferner unterlasse man die Beobachtung, wenn Venus oder Jupiter den Säumen des Lichtes nahe stehen, oder diese mit der Milchstrasse zusammenfallen, weil man in diesen Fällen wenigstens für die eine Grenzlinie nur illusorische Daten erhalten würde. Ebenso unterlasse man die Beobachtung lieber ganz, wenn das Auge, wie im Innern grösserer Städte, durch den Reflex von fremdartigem Lichte geblendet wird, oder die Luft nicht ganz rein ist, weil man unter diesen Umständen vom feineren Detail des Phänomenes ohnehin nichts wahrnimmt. Uebrigens sollten die atmosphärischen Verhältnisse etc., unter denen die Beobachtung ausgeführt wurde, stets sehr sorgfältig angegeben werden, da diese auf den Charakter der ganzen Erscheinung einen enormen Einfluss auszuüben vermögen. Endlich sei noch bemerkt, dass das Zodiakallicht selbst unter den Tropen das Licht der Dämmerung nicht verträgt, indem es auch dort erst am Schlusse der Abenddämmerung sichtbar wird und kurz nach dem Beginne der Morgendämmerung verschwindet. Dies verdient deshalb besonders hervorgehoben zu werden, weil die meisten Angaben über das Fehlen des Zodiakallichtes ohne Zweifel nur daher rühren, dass es des Abends zu früh oder des Morgens zu spät aufgesucht wurde.

Be findet sich der Beobachter in geringen Breiten, d. h. in Gegenden, welche sich vorzugsweise für die Beobachtung des Zodiakallichtes eignen, so richte er sein Augenmerk vorzüglich auf den Gegenschein und die bei uns so schwer sichtbare Lichtbrücke, und beachte ausser dem Verlaufe der Lichtzone namentlich auch deren Helligkeitsverhältnisse, um die Lage der Lichtminima festzustellen, über die wir noch sehr im Ungewissen sind. Es ist allerdings sehr schwierig oder eigentlich unmöglich, die einzelnen Helligkeitsstufen genau von einander abzugrenzen, weil die Lichtintensität sich nicht sprunghaft, sondern sehr allmählig ändert. Allein bei einiger Uebung wird man doch auch darin eine gewisse Sicherheit erlangen, weil sich in der Milchstrasse ein vortreffliches Vergleichungsobjekt darbietet. Denn nicht nur hat sie in ihrem milden Schimmer die grösste Aehnlichkeit mit dem Zodiakallichte, sondern an verschiedenen Stellen auch sehr verschiedene Helligkeit, so dass man leicht solche Stellen herausfinden wird, welche sich mit den einzelnen Parteen unseres Phänomenes gleich hell zeigen. Man wähle aber solche Gegenden der Milchstrasse aus, die mit den zu untersuchenden Punkten des Zodiakallichtes, vorzüglich wenn dieselben nahe am Horizonte liegen, beiläufig die gleiche Höhe haben, um dadurch die atmosphärischen Einflüsse so viel wie möglich zu eliminiren.

Um in die Helligkeitsangaben eine gewisse Gleichmässigkeit zu bringen und sie leichter unter einander vergleichbar zu machen, wird es gut sein, sich anzugewöhnen, die verschiedenen Helligkeitsstufen durch Zahlen zu bezeichnen, und beim Eintragen durch verschieden starke Schraffirungen zu unterscheiden, so wie dies Heis in seinem neuen Atlas bei der Milchstrasse gethan hat. Sehr erwünscht wäre es, sich bezüglich der Zahl und Abgrenzung der Abstufungen möglichst nahe an Heis anzuschliessen, weil er die von ihm gewählten Unterabtheilungen nach vielfacher, langjähriger Erfahrung als die zweckmässigsten erprobt hat.

Während der Beobachtungen wird der Beobachter wohl öfter Gelegenheit haben, die vielfach erwähnten Lichtzuckungen, rasche Expansionen und Contractionen des Zodiakallichtes u. dgl. m. zu bemerken. In solchen Fällen richte er seine Aufmerksamkeit durch längere Zeit auf benachbarte Theile der Milchstrasse: zeigt auch diese Schwankungen in ihren Grenzen, so sind selbstverständlich die ähnlichen Schwankungen des Zodiakallichtes ebenfalls nur optischer Natur, und durch leichte, vom Winde hin und her getriebene Nebel verursacht, die sich auch bei sonst reinem Himmel zuweilen in den höheren Regionen unserer Atmosphäre bilden.

Ausserdem bietet es noch ein Interesse dar, die Farbe des Zodiakallichtes zu ermitteln, und namentlich nachzusehen, ob alle Theile desselben, die Hauptpyramiden, der Gegenschein und die Lichtbrücke, gleich gefärbt sind oder nicht. Von Wichtigkeit wäre ferner eine wiederholte spektralanalytische Untersuchung des Zodiakallichtes: doch wird ein Reisender kaum in der Lage sein, eine solche mit Erfolg durchführen zu können. Leichter hingegen dürften ihn Untersuchungen über die Polarisation des Zodiakallichtes gelingen, da nach Liais die einfachsten Polariskope: Nicholsches Prisma und Turmalinplatte für derartige Zwecke auch die empfindlichsten sind. Dreht man nämlich eines dieser Polariskope, nachdem man es auf die zu untersuchende Stelle des Himmels gerichtet hat, vor dem Auge, und fixirt man dabei die kleinsten, im Gesichtsfelde eben noch sichtbaren Sterne, so werden sich diese während der Drehung mit verschiedener Intensität vom Hintergrunde abzuheben scheinen, sobald dessen Licht polarisirt ist, weil sich in diesem Falle dessen Helligkeit bei der Drehung des Polariskopes ändert. Ist jedoch das Licht des Hintergrundes nicht polarisirt, so afficirt die Drehung des Polariskopes seine Helligkeit nicht, und in Folge dessen eben so wenig die scheinbare Lichtstärke der Sterne.

Sternschnuppen.

Zu den Phänomenen, durch deren Beobachtung Reisende der Astronomie erspriessliche Dienste leisten können, gehören in erster Linie auch die Sternschnuppen oder Feuermeteore, welche in der jüngsten Zeit durch die Entdeckung ihres innigen Zusammenhanges mit den Kometen eine ungeahnte Bedeutung in der Wissenschaft erlangt haben.

Die scheinbare Grösse der Sternschnuppen ist bekanntlich sehr verschieden; von den kleinsten eben noch sichtbaren findet man durch jede Grössenabstufung heller werdende, bis sie nicht nur die schönsten Gestirne des Firmamentes Jupiter und Venus an Leuchtkraft übertreffen, sondern sogar bisweilen einen Glanz entwickeln, vor dem die Sterne erbleichen, und die Nacht taghell gelichtet wird. Doch pflegt man in der Regel nur die kleineren Erscheinungen dieser Art Sternschnuppen oder Meteore zu nennen und nach Sterngrössen von der 6. bis zur 1. zu ordnen, während man die

helleren Sternschnuppen, von Jupiter oder Venusgrösse angefangen mit dem Namen Feuerkugeln oder Boliden ausgezeichnet, weil sie bisweilen deutlich eine kugel- oder birnförmige Gestalt erkennen lassen, und manchmal sogar an Grösse dem Vollmonde gleichen sollen.

Die Bahn der Sternschnuppen stellt sich in der Regel als ein grösster Kreis am Himmel dar, was darauf hindeutet, dass das von uns gesehene Bahnstück von einer geraden Linie nicht merklich abweicht. Indessen besitzen die Bahnen öfter eine ziemlich auffällige, zuweilen sogar starke Krümmung; ebenso kommen wellen- oder schlangenförmige Curven nicht gar zu selten vor: endlich ist eine Bahn hin und wieder zum Theil geradlinig, zum Theil gekrümmt. Alle diese und ähnliche Variationen sind leicht erklärlich, wenn man bedenkt, dass die Sternschnuppen sich in unserer Atmosphäre, also in einem widerstehenden Mittel bewegen, und wenn man die an und für sich sehr wahrscheinliche Annahme macht, dass sie nicht immer genau sphärische Körper seien: denn dann müssen sie bei ihrer Bewegung in unserem Luftkreise unter Umständen alle jene sonderbaren Curven beschreiben, welche uns beim Bumerang, den Projektilen gezogener Geschosse etc. etc. auffallen.

Die Zeit, in welcher die Meteore den sichtbaren Theil ihrer Bahn durchfliegen, beträgt meistens blos Bruchtheile einer Sekunde, und übersteigt 3 bis 4 Sekunden schon sehr selten. Indess bleibt nach dem Erlöschen des eigentlichen Meteor, namentlich wenn es zu den helleren gehörte, in vielen Fällen am Himmel noch eine feurige Spur in Gestalt eines Schweifes zurück, der im Allgemeinen wohl bereits wenige Sekunden nach dem Meteore verschwindet, hin und wieder aber auch 1 bis 2 Minuten, ja sogar Viertel- bis Halbe-Stunden lang sichtbar bleibt, und dann oft merkwürdige, mit überraschenden Formänderungen verbundene Bewegungen ausführt, bei denen sonderbarerweise einzelne seiner Partien zeitweilig wieder heller aufleuchten.

Während ihres Laufes ändern die Sternschnuppen meistentheils ihre Helligkeit nicht und verschwinden wieder ebenso plötzlich als sie erschienen waren. Nur grössere Meteore, insbesondere die Feuerkugeln ersten Ranges, scheinen manchmal unter Funksprühen zu verlöschen oder zu zerplatzen, worauf man dann bisweilen einzelne matter leuchtende Stücke der Erde zu fallen sieht und einige Minuten nachher ein mehr oder minder starkes, ja sogar betäubendes Getöse vernimmt. Solche „detonirende“ Meteore sind es auch, welche gelegentlich zu den so interessanten Meteoritenfällen Veranlassung geben.

Die plötzliche Lichtentwicklung der Meteore rührt, den Forschungen der Neuzeit zu Folge daher, dass ihre kosmische Geschwindigkeit beim Eindringen in unseren Luftkreis durch den Widerstand desselben unglaublich rasch vernichtet, oder richtiger gesagt in andere Formen der Bewegung, als da sind: Wärme, Licht, Elektrizität etc. etc. umgesetzt wird. Ferner lehrt die Theorie, dass der grösste Geschwindigkeitsverlust (und in Folge dessen die intensivste Licht und Wärmeentwicklung) gleich nach dem Eindringen des Meteor in die Atmosphäre in Luftschichten von ausserordentlicher Dünne stattfindet, und dass die Geschwindigkeit (und damit die Ursache der Licht- und Wärmeentwicklung) bei Meteorkörpern von geringen Dimensionen bereits in den höchsten Schichten unserer Atmosphäre auf einen kleinen Bruchtheil der ursprünglichen reducirt wird. Mit diesen Ergebnissen der Theorie steht unsere Erfahrung in vollem Einklange, denn die Berechnung correspondirender Beobachtungen hat ergeben, dass die Meteore gewöhnlich in Höhen von 10 bis 20 deutschen Meilen, oder in noch grösseren aufleuchten (also in Luftschichten die noch zu dünn sind, um merkbare Dämme-

rungerscheinungen hervorzurufen) und dass sie bereits in Höhen von 5 bis 10 Meilen schon wieder erlöschen. Damit stimmt auch, dass man Sternschnuppen, einige sehr seltene Fälle ausgenommen, die überdies bestritten werden können, noch nie unter die Wolkendecke oder gar bis auf die Erde hat herabfallen sehen. Ueberhaupt scheint die Materie der Sternschnuppen stets in unserem Luftkreise zerstäubt oder verflüchtigt zu werden, da das, was man gewöhnlich als Sternschnuppenreste ansieht, nur gallertartige, grösstentheils organische Massen sind, welche in den ersten Stadien der Fäulniss eine schwache Phosphorescenz zeigen und sich dadurch in der Dunkelheit bemerklich machen.

Die mittlere Häufigkeit der Meteore steigt im Laufe einer Nacht, vom Abend bis Morgen nach und nach ungefähr auf das Dreifache, indem zahlreichen jahrelang fortgesetzten Zählungen zufolge ein Beobachter im Durchschnitte am Abend stündlich nur 4 bis 5, um Mitternacht schon 8 bis 10, gegen Morgen aber 14 bis 18 Sternschnuppen erblickt. Diese tägliche Variation in der Häufigkeit der Sternschnuppen, welche wegen ihrer unleugbaren Beziehung zur Ortszeit des Beobachters die Anhänger der kosmischen Theorie dieser Gebilde lange Zeit hindurch in nicht geringe Verlegenheit setzte, ist lediglich eine Folge der Combination der eigenen Bewegung der Meteore mit der Bewegung der Erde in ihrer Bahn. Eine gleiche Bewandniss hat es auch mit der jährlichen Variation in der Frequenz der Meteore, nach welcher auf der nördlichen Halbkugel in der zweiten Hälfte des Jahres (Juli — December) weit mehr Sternschnuppen sichtbar werden, als in der ersten (Jänner — Juni), während umgekehrt auf der südlichen Halbkugel die Sternschnuppen gerade in unserem Winterhalbjahre häufiger vorkommen.

Die eben angegebenen Zahlen sind jedoch nur als Mittelwerthe zu betrachten. Als man dem Sternschnuppenphänomene mehr Aufmerksamkeit zu schenken begann, machte man gar bald die Entdeckung, dass sich einzelne Nächte alljährlich durch eine weit grössere Fülle von Meteoren auszeichnen, und dass dabei die Sternschnuppen den Himmel nicht regellos in allen Richtungen durchkreuzen, sondern der Mehrzahl nach Bahnen beschreiben, die nach rückwärts verlängert auf einen bestimmten Punkt des Himmels, den Radiationspunkt hinzielen, dessen Lage weder im Laufe der Nacht, noch von einem Jahre aufs andere sich ändert. Man bemerkte auch, dass in diesen Nächten die Meteore bezüglich ihrer Farbe, Grösse und Dauer, sowie bezüglich der Schweifbildungen, kurz, bezüglich ihres ganzen Habitus einander sehr ähnlich seien. Alles dies weist unverkennbar darauf hin, dass die in solchen Nächten sichtbaren Meteore zu tausenden vereint, dieselbe Richtung im Weltraume verfolgen, und gemeinsam die Sonne in einer Bahn umkreisen, welche an einem bestimmten Punkte die Erdbahn durchschneidet, und dass die Erde bei jedem Durchgange durch diesen Punkt dem Strome einen Theil seiner Glieder entreisst. Man nannte daher die, diesen periodisch wiederkehrenden Sternschnuppenströmen angehörigen Meteore periodische oder systematische, zum Unterschiede von den anderen Sternschnuppen, welche man als sporadische bezeichnete. Neuere Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass in jeder Nacht sich mehrere Radiationscentra nachweisen lassen, zwischen welche sich die einzelnen Meteore ziemlich gleichmässig theilen, in Folge dessen für den ersten Anblick regellos am Himmel herumzufliegen scheinen. Es gehören daher so gut wie alle Sternschnuppen bestimmten Meteorströmen an, welche aber im allgemeinen viel dünner bevölkert sind als die früher erwähnten sogenannten periodischen, die schon einige Male zu wahren Sternschnuppenregen Veranlassung gegeben haben. Die bekanntesten

Beispiele hierfür sind die Nacht vom 11. auf 12. November 1799, wo Humboldt und Bonpland an der mexikanischen Küste durch mehrere Stunden viele tausende von Sternschnuppen und kleinen Feuerkugeln den Himmel durchfurchen sahen; ferner die Nacht vom 12. auf 13. November 1833, in der nach Olmsted und Palmer zu Newhaven die Sternschnuppen stundenlang wie Schneeflocken herabfielen, endlich aus der jüngsten Zeit die Morgenstunden der Nacht vom 13. auf 14. November 1866 und die Abendstunden des 27. November 1872.

Die reicheren Sternschnuppenströme, deren Radiationspunkt nördlich vom Aequator liegt, deren Meteore also auf der nördlichen Halbkugel gut sichtbar sind, dürften wohl schon so ziemlich alle bekannt sein: sie fallen auf die nachstehenden Epochen:

- 1) Januar 2. und 3. Hauptradiant im Hercules ($\alpha = 238^\circ \delta = +45^\circ$).
- 2) April 12. und 13. Hauptradiant im Hercules ($\alpha = 273^\circ \delta = +25^\circ$).
- 3) April 18—23. Reicher Schauer mit vielen Radiationscentren. Einer der Hauptradianen liegt: ($\alpha = 267^\circ \delta = +35^\circ$).
- 4) Juli 26—29. Reicher Schauer mit vielen Radianen, von denen keiner besonders präponderirt.
- 5) August 9—14. Sehr reicher Strom, bekannt unter dem Namen Laurentiusstrom mit vielen Radianen. Einer der Hauptradianen liegt im Perseus ($\alpha = 43^\circ \delta = +57^\circ$). Von Mitte Juli bis Mitte August ist überhaupt ein sehr beträchtliches Anschwellen des Sternschnuppenphänomenes bemerkbar.
- 6) Oktober 19—25. zeigte manche Jahre ziemlich reiche Fälle. Die Hauptradianen liegen im Orion ($\alpha = 75^\circ \delta = 25^\circ$) und den Zwillingen ($\alpha = 95^\circ \delta = +15^\circ$ und $\alpha = 112^\circ \delta = +30^\circ$).
- 7) November 13—14. Der bekannte Novemberschwarm der Leoniden ($\alpha = 148^\circ \delta = +24^\circ$).
- 8) November 27—29. Diffuse Radiation in der Andromeda.
- 9) December 6—13. Einer der Hauptradianen liegt in den Zwillingen ($\alpha = 105^\circ \delta = +30^\circ$).

Ueber die reicheren Sternschnuppenströme mit südlichen Radiationspunkten wissen wir nur sehr wenig, da ausser den mehrjährigen durch Heis bearbeiteten Meteorbeobachtungen Neumayer's noch keine grössere Beobachtungsreihe von Sternschnuppen aus der südlichen Halbkugel vorliegt. In diesen Beobachtungen spricht sich ein Anschwellen des Sternschnuppenphänomenes zu folgenden Zeiten aus:

- 1*) Jänner 28 bis Februar 2.
- 2*) März 12—15.
- 3*) Mai Mitte des Monates.
- 4*) Juni Anfang des Monates.
- 5*) Juli 28 bis August 2. Scheint die Epoche der Maximalfrequenz der Meteore in der südlichen Halbkugel zu sein.
- 6*) August 5—7.
- 7*) December 18—25.

Manche dieser Epochen sind auch aus gelegentlichen Notizen in den Tagebüchern von Reisenden als Zeiten grösserer Meteorfrequenz zu erkennen. So macht beispielsweise J. C. Ross im Berichte über seine Südpolarexpedition die folgende, auf die Epoche 5* hinweisende Bemerkung: „1840 July 28—29 . . . meteors in great numbers were seen darting about in all directions . . .“. Endlich sei noch erwähnt, dass die beiden sternschnuppen-

reichsten Perioden der nördlichen Halbkugel (August 9—14 und November 13—14) auf der südlichen an Meteoren besonders arm sein sollen.

Die Ausführung von Meteorbeobachtungen an allen mondfreien Nächten im Laufe des ganzen Jahres ist insbesondere in jenen Gegenden sehr erwünscht, in denen der grösste Theil des südlichen Himmels sichtbar ist, den wir bezüglich des Meteorphänomenes noch sehr wenig kennen. Besonders lohnend gestalten sich indess die Meteorbeobachtungen während der Epochen einer grösseren Meteorfülle, weil man in diesen schon binnen Kurzem ein hinreichendes Material zusammenbringt, um die vorkommenden Radiationspunkte einigermaßen sicher ermitteln zu können. In der Ermittlung derselben besteht aber eine der Hauptaufgaben der Sternschnuppenkunde, seitdem man weiss, dass die Sternschnuppen Auflösungsprodukte von Kometen sind, und so wie diese, der grossen Mehrzahl nach, in parabolischen Bahnen einhergehen. Denn nun kann man aus dem Radiationspunkte allein nicht nur die relative Geschwindigkeit, mit der die Meteore des betreffenden Stromes auf die Erde herabstürzen, und die Bahnelemente desselben berechnen, sondern auch durch Vergleichung dieser Elemente mit den Elementen der bisher erschienenen Kometen, zuweilen auch jenen Kometen herausfinden, dessen allmählicher Zerstörung der Meteorstrom sein Entstehen verdankt. Beispiele solcher Identificirungen liefern uns die oben unter den Nummern 3, 5, 7 und 8 angeführten Sternschnuppenströme, die der Hauptsache nach nichts anderes sind als Bruchstücke der Kometen: 1861 I, 1862 III, 1866 I und des Biela'schen Kometen.

Um Sternschnuppenbeobachtungen zu weiteren Untersuchungen möglichst verwendbar zu machen, muss der Beobachter vor Allem die Bahnen der einzelnen Meteore möglichst genau zu bestimmen trachten. Diess geschieht am einfachsten durch Einzeichnen derselben in eine Sternkarte, oder durch Einstellen ihrer Anfangs- und Endpunkte an Meteoroskopen, wie es bereits bei der Besprechung des Zodiakallichtes näher erörtert wurde. Uebrigens wird man auch beim Einzeichnen der Meteorbahnen in Sternkarten in der Regel blos den Anfangs- und Endpunkt genau eintragen, und diese beiden Punkte durch einen grössten Kreis verbinden (wobei man aber nie vergessen darf, den Sinn der Bewegung, etwa durch eine Pfeilspitze, ersichtlich zu machen), da die Bahn nur in seltenen Fällen merkbar von einem solchen abweicht.

Sollte der Beobachter so glücklich sein, einen reichen Sternschnuppenfall zu erblicken, so wird er bald die Gegend des Himmels erkennen, aus welcher die meisten Meteore auszustrahlen scheinen. Auf diese Gegend richte er dann sein Hauptaugenmerk und beachte besonders die Meteore mit ganz kurzen Bahnen und die nahezu oder ganz stationären. Denn die Bahnen dieser Meteore sind nur wegen ihrer Nähe am Radiationspunkte perspektivisch so stark verkürzt, und bieten daher das beste und sicherste Mittel zu seiner genauen Bestimmung dar. Dasselbe Verfahren sollte übrigens der Beobachter auch in einer gewöhnlichen Sternschnuppennacht befolgen, wenn er zu bemerken glaubt, dass mehrere der gesehenen Bahnen auf einen bestimmten Punkt des Himmels als ihren Radiationspunkt hinzielen. Bei sehr reichen Sternschnuppenfüllen will man auch manchmal bemerkt haben, dass in der Gegend des Radiationspunktes ein matter nordlichtartiger Schimmer sich zeigte. Auf dieses Phänomen sei vorkommenden Falles der Beobachter besonders aufmerksam.

Ausser den Bahnen der Sternschnuppen beachte man auch die Farbe und Helligkeit derselben, die letztere, indem man die Sternschnuppen mit den Sternen der verschiedenen Grössen, und die helleren mit Jupiter und

Venus vergleicht. Ebenso notire man es, wenn eine Sternschnuppe anomale Bewegungen zeigte oder während ihres Laufes ihren Glanz änderte. Hinterliess sie einen Schweif, so bemerke man, ob und wie lange derselbe nach ihrem Verschwinden noch sichtbar blieb, ob er sich gegen die Sterne bewegte, seine Form veränderte etc. etc. Bleibt ein Sternschnuppenschweif dem freien Auge so lange sichtbar, dass der Beobachter ein kleines lichtstarkes Fernrohr mit grossem Gesichtsfelde (etwa einen Kometensucher oder ein Binocle) darauf richten kann, so sollte er nie versäumen, diess zu thun, um die höchst interessanten Veränderungen, welche in den Schweifesten vorgehen, genauer verfolgen eventuell skizziren zu können.

Bei Beobachtungen wie den eben besprochenen kann das Anlegen zweckmässiger Register zum Eintragen derselben nicht genug empfohlen werden: es wird dadurch die Uebersicht wesentlich erleichtert und viel Zeit und Mühe erspart. Ein solches Register könnte etwa folgendermassen eingerichtet werden:

Athen ($\lambda = 0^h 41^m 21^s$ östl. v. Berl., $\varphi = + 37^\circ 58' 3$). J. F. Schmidt.

No.	1863	Mittlere Ortszeit.	Grösse.	Farbe.	Dauer des		Anfangspunkt		Endpunkt	
					Meteores.	Schweif.	α	δ	α	δ
1	Septbr. 8	12 ^h 10 ^m 5	—	—	—	—	1 ⁰	+15 ^{0.5}	349 ⁰	+20 ^{0.7}
2	" 8	12 40	4.5 +	—	4 ^s	—	105	+67	347	—10
3	" 8	12 49	4*	—	—	—	31.5	+25	24.5	+27.5
4	Octbr. 10	15 43	1.2 *	roth	3 ^s	(20 ^m)	70	—25	93	—30
5	" 11	7 31	3.4	roth	—	—	0	+ 6.5	347.5	+ 4
6	" 18	16 39	3*	—	—	3 ^s	69	—19	56	—23
7	Novbr. 13	13 32	2 *	grün	—	(5 ^m) 30 ^s	144	+25.5	139	+28.5
8	" 13	13 38	♀ *	roth	1½ ^s	(5 ^m) 70 ^s	163	+56	181	+72.5

No. 2. Diese ungewöhnliche Sternschnuppe beschrieb in 4^s folgende Bahn: (105⁰ + 67⁰), (60⁰ + 66.05), (35⁰ + 57⁰), (15⁰ + 36⁰), (1.05 + 14), (347⁰ — 10⁰).

Dieses Schema, welches der Hauptsache nach von J. F. Schmidt, einem der thätigsten Sternschnuppenbeobachter, herrührt, umfasst in seinen 10 Abtheilungen alles, was sich für gewöhnlich an einem Meteore beobachten lässt. Sollte ausserdem noch etwas beachtenswerthes bemerkt werden, so kann diess leicht in Form einer Note (wie hier zu No. 2) am Schlusse hinzugefügt werden. Die einzelnen Columnen bedürfen wegen der ganz detaillirten Ueberschriften wohl keiner weiteren Erläuterung. Nur in betreff der eingeführten Bezeichnungen sei bemerkt, dass ein der Grösse beigesetzter Asterisk oder ein angehängtes Kreuz andeutet, es habe das Meteor zu den geschweiften resp. jenen mit anomaler Bewegung gehört, und dass in der Columnne: Dauer des Schweifes von den mitgetheilten Zahlen die nicht eingeklammerte die Zeit angiebt, während welcher der Schweif dem freien Auge, die eingeklammerte hingegen jene, während welcher er in einem Fernrohr sichtbar blieb. So will z. B. bei No. 7 die Doppelangabe (5^m) 30^s besagen, der Schweif erschien dem blossen Auge nur durch 30^s; aber am Kometensucher liess er sich 5 Minuten lang erkennen.

Gestirnter Himmel.

Auf der nördlichen Halbkugel wird der gestirnte Himmel seit einigen Decennien so sorgfältig überwacht, dass auf ihm wohl nicht so leicht ein beachtenswerthes Phänomen der Wahrnehmung entslüpfen kann. Der in unseren Breiten sichtbare Theil desselben dürfte daher dem Reisenden im Allgemeinen kein besonders lohnendes Feld für seine Thätigkeit bieten: hingegen versprechen ihm die bei uns nicht sichtbaren Regionen des Himmels eine um so reichere Ausbeute, namentlich in folgenden Richtungen:

a) Die Milchstrasse.

Von dem Verlaufe der Milchstrasse hat uns wohl bereits vor längerer Zeit J. Herschel eine einigermaßen ausführliche Beschreibung gegeben: allein mit der bildlichen Darstellung derselben waren wir bis vor Kurzem noch sehr übel daran. Fast alle Himmelskarten zeichnen die Milchstrasse als einen continuirlichen Zug mit regelmässigen und zierlichen Contouren, und deuten keine Unterschiede der Helligkeit in ihr an, obwohl ein einziger Blick auf dieselbe sofort erkennen lässt, dass sie viel eher einer Ansammlung von verschiedenen dichten, unregelmässig aneinander gereihten Lichtwolken, als einem fortlaufenden Lichtgürtel gleicht. Diesem Uebelstande hat für den bei uns sichtbaren Theil des Himmelsgewölbes erst im vorigen Jahre der schöne Himmelsatlas von E. Heis abgeholfen, welcher die erste auf langjährige mühevolle Beobachtungen gegründete naturgemässe Darstellung der Milchstrasse enthält. Für ihren Zug durch die südlichen Sternbilder hat allerdings J. Herschel während seines Aufenthaltes am Cap eine ähnliche Arbeit ausgeführt und in seinem Capwerke veröffentlicht: allein in der dortigen Abbildung ist die Hauptaxe der Milchstrasse in eine gerade Linie auseinandergezogen, und es ist desshalb nicht ganz leicht, sich eine Vorstellung von ihrem Verlaufe am Himmel zu bilden. Ferner dürfte die Abbildung von Herschel kaum genug Anhaltspunkte liefern, um seine Helligkeitsscala und die von Heis hinreichend scharf auf einander reduciren zu können. Und doch wäre eine solche Reduction sehr erwünscht, weil uns vorerst noch immer die Mittel zur Herstellung einer einheitlich bearbeiteten Karte des Verlaufes der ganzen Milchstrasse fehlen.

Es könnte sich daher ein Liebhaber astronomischer Beschäftigung ein bedeutendes Verdienst erwerben, wenn er bei einem längeren Aufenthalte in den Tropen oder auf der südlichen Halbkugel den bei uns unsichtbaren Theil der Milchstrasse möglichst conform mit Heis bearbeiten würde. Zu diesem Zwecke wären zunächst die Umrisse der Milchstrasse durch die Sterne, an denen sie vorüberzieht, mit thunlichster Genauigkeit festzusetzen und hierzu nicht blos die helleren Sterne, sondern überhaupt alle mit freiem Auge sichtbaren zu verwenden, besonders an jenen Stellen, wo die Ränder bedeutende Krümmungen machen, wo sich Unterbrechungen und Theilungen zeigen, oder wo Ausläufer vorhanden sind.

Dann wäre die verschiedene Helligkeit der einzelnen Stellen zu ermitteln. Dies kann mit Sicherheit nur durch vergleichende Beobachtungen geschehen, wobei aber, insbesondere dann, wenn man in geringen Höhen operirt, wegen der raschen Zunahme der Lichtabsorption in der Nähe des Horizontes darauf geachtet werden muss, nur Stellen mit einander zu vergleichen, die nahezu dieselbe Höhe haben. Diese Vergleichen müssen

häufig wiederholt werden, um die Mangelhaftigkeit der einzelnen Beobachtungen zu paralysiren und die Einflüsse der Atmosphäre zu eliminiren. Dabei wäre es gut, nicht immer dieselben Stellen mit einander zu vergleichen, sondern die Vergleichen sich gleichsam kreuzen zu lassen.

Bei diesen Vergleichen muss sich der Beobachter genau so wie für Schätzungen von Sterngrössen eine bestimmte Scala bilden, und die einzelnen Helligkeitsabstufungen, die er annimmt, auch in seiner Zeichnung, am einfachsten wohl durch verschiedene Sorten von Schraffirung kenntlich machen. Den obigen Auseinandersetzungen zufolge wäre es nun am zweckmässigsten, sich hierbei ganz an Heis anzuschliessen. Diess macht sich von selbst, wenn der Beobachter damit beginnt, die noch unbekannten Partien der Milchstrasse mit solchen zu vergleichen, die in Heis' Atlas vorkommen, und erst, nachdem er sich dadurch Vergleichungspunkte in hinreichender Zahl geschaffen, neue Partien mit vorhin unbekannten zusammenhält. Dass so delicate Untersuchungen nur bei ganz dunkler Nacht und vollkommen klarer und durchsichtiger Luft anzustellen sind, um auch den feinsten Schimmer nicht zu übersehen, bedarf wohl kaum der Erwähnung.

Kann ein Beobachter nicht so viel Zeit darauf verwenden, als zu einem derartigen Unternehmen erforderlich ist, so wäre schon sehr viel damit geleistet, wenn er durch ein sorgfältiges Vergleichen der schönen Zeichnung von Herschel mit dem Himmel und Gegenden der Milchstrasse, die Heis' Atlas enthält, eine grössere Reihe von Partien namhaft machen würde, die sich gegenseitig an Helligkeit gleichen. Doch ist der oben vorgeschlagene, freilich viel mühsamere und zeitraubendere Arbeitsmodus deshalb vorzuziehen, weil er den Beobachter vor einer etwaigen Beeinflussung seines eigenen Urtheils vollständig schützt. Diess schliesst natürlich nicht aus, dass der Beobachter seine Skizze, sobald er sie zu einem gewissen Abschluss gebracht, mit Herschel's Zeichnungen, und in zweifelhaften Fällen beide mit dem Himmel vergleicht: es wäre diess im Gegentheil von hohem Werthe.

b) Die Grössen und Farben der Sterne.

Die genaue Ermittlung der relativen Helligkeit, oder wie man gewöhnlich sagt, des Grössenverhältnisses zweier Sterne wird durch eine Reihe von störenden Einflüssen ausserordentlich erschwert. Dahin gehören: die verschiedene Farbe der Sterne, die ungleiche Durchsichtigkeit der Atmosphäre in verschiedenen Höhen und Azimuten, die verschiedene Erleuchtung des Himmelsgrundes durch Dämmerung, Mondschein, Zodiakallicht, Milchstrasse, ja selbst durch nahestehende helle Planeten und Sterne u. s. f. Es ist daher auch die Ansicht ziemlich allgemein verbreitet, dass die Bestimmung der relativen Helligkeit der Gestirne mit freiem Auge entweder unausführbar sei, oder höchstens ein ganz rohes Resultat liefern könne. Allein abgesehen davon, dass die meisten der oben genannten störenden Einflüsse durch Anwendung von Instrumenten nur zum Theil oder gar nicht eliminirt werden können, lehrt die Erfahrung, dass dieselben keineswegs so nachtheilig einwirken, als man auf den ersten Blick meinen sollte, und dass man bei einiger Uebung und Anwendung der nöthigen Vorsicht durch mehrfaches Wiederholen der Helligkeitsschätzungen unter verschiedenen äusseren Umständen recht genaue Resultate erlangen kann.

Für die Ausführung von Helligkeitsbeobachtungen dürfte sich am meisten die von J. Herschel vorgeschlagene Methode der Sequenzen empfehlen, welche darin besteht, dass man durch allmälige Vergleichung einer grösseren

Anzahl zu gleicher Zeit sichtbarer Sterne die Reihenfolge ihrer Helligkeit festsetzt. Zu diesem Zwecke sucht man durch eine cursorische Betrachtung des Himmels eine Reihe von Sternen aus, deren Glanz stufenweise, aber sehr merklich abnimmt, und schreibt sie vertical untereinander, jedoch so, dass zwischen den einzelnen Sternen leere Räume übrig bleiben. Hierauf verkleinert man die Helligkeitsintervalle zwischen den einzelnen Gliedern des so gebildeten Skelettes durch successives Einschieben frischer Sterne so lange, bis die Helligkeitsabstufungen der einzelnen auf einander folgenden Sterne so gering werden, dass man zwischen dieselben mit Sicherheit keine weiteren Sterne mehr einschalten kann.

Die Art und Weise, wie man eine grössere Anzahl beobachteter Sequenzen am zweckmässigsten zu verbinden habe, um alle darin vorkommenden Sterne, von den hellsten angefangen bis herab zu den schwächsten in eine einzige ununterbrochene Kette aneinanderzureihen, ist in J. Herschel's Kapwerk sehr umständlich erörtert. Doch würde eine genauere Auseinandersetzung des dort angegebenen Rechnungsmechanismus, der im Grunde auf ein wiederholtes Ziehen von ausgleichenden Kurven hinausläuft, sehr weit führen und wäre hier auch kaum am Platze, da ein Reisender wohl nicht so leicht die immerhin ziemlich weiltäufige und zeitraubende Berechnung seiner beobachteten Sequenzen vor der Rückkehr in die Heimath ausführen dürfte.

Die Helligkeit der Sterne 1. Grösse und die der meisten 2. Grösse ist bereits so stark, dass das Auge geringe Helligkeitsabstufungen zwischen ihnen schon nicht mehr sicher erkennt. Diesem Uebelstande kann man wohl am besten dadurch begegnen, dass man die Sterne durch schwache Rauchbrillen betrachtet, und damit ihren Glanz derart mildert, dass die Helligkeitsnuancen deutlicher hervortreten. Man hat auch mehrfach vorgeschlagen, die relative Helligkeit der grösseren Sterne durch die Reihenfolge festzustellen, in der sie nach Sonnenuntergang sichtbar werden oder in der Morgendämmerung verschwinden. Doch ist diese Methode, falls man die Stellung der zu vergleichenden Sterne nicht sehr genau kennt, vielen Fehlerquellen unterworfen. Denn trifft das Auge zufällig auf eine Stelle des Himmels, an der ein eben sichtbar gewordener Stern steht, so wird man diesen schon erblicken, während man einen anderen eben so hellen beim Herumsuchen noch übersieht. In gleicher Weise wird man Sterne, die in bekannten Konfigurationen mit helleren stehen, viel eher gewahr werden, als andere gleich helle, die vereinzelt am Himmel vorkommen. Hingegen leistet hier der Mondschein zuweilen treffliche Dienste, doch muss man darauf achten, nur Sterne mit einander zu vergleichen, die nahezu dieselbe Entfernung vom Monde besitzen, damit der Hintergrund für beide ziemlich gleich erhellt sei. Bei Helligkeitsvergleichen zwischen schwächeren Sternen wirken aber Mondschein und Dämmerung entschieden schädlich, weil sie die schwächeren Sterne nur mit Anstrengung erkennen lassen, und man sie deshalb gegen die helleren, ohne Mühe erkennbaren in der Regel zu schwach schützt. Man wird daher gut thun, Vergleichen zwischen schwächeren Sternen nur an mondfreien Nächten und nach Schluss oder vor Beginn der Dämmerung auszuführen. Ebenso wird es gut sein, bei der Vergleichung der Sterne 6. Grösse, oder richtiger gesagt, jener Sterne, welche für den Beobachter an der Grenze der Sichtbarkeit stehen, ein Opernglas zu benutzen, da das Auge diese Sterne nicht mehr distinct genug sieht, um eine sichere Vergleichung ihres Glanzes anzustellen. Endlich ist jede Vergleichung so vorzunehmen, dass man nicht beide Sterne zu gleicher Zeit, sondern immer abwechselnd den einen und den anderen fixirt, bis man ein sicheres Urtheil sich gebildet.

Denn will man beide Sterne zugleich betrachten, so läuft man Gefahr, den rechtsstehenden Stern mehr mit dem rechten, den linksstehenden mehr mit dem linken Auge wahrzunehmen, und daher einen constanten Fehler zu begehen, wenn beide Augen ungleiche Lichtempfänglichkeit besitzen, was gar nicht so selten vorzukommen scheint. Ferner ist es eine bekannte Erfahrung, dass ein Stern, wenn man ihn scharf fixirt, nicht so hell erscheint, als wenn sein Licht von der Seite in's Auge fällt. Man muss daher, um sich auch vor allen aus dieser Quelle entspringenden Täuschungen zu schützen, den oben genapnten Beobachtungsmodus anwenden.

Da bisher keine Karte des südlichen Sternenhimmels vorhanden ist, in der auch nur der grösste Theil der mit freiem Auge sichtbaren Sterne richtig eingezeichnet wäre, wird ein Beobachter, der Helligkeitsschätzungen zwischen schwächeren Sternen vornehmen will, gut thun, sich zuerst aus einer Sternkarte (nach einem ihm bequem scheinenden Maassstabe) eine grössere, durch mehrere auffällige Sterne begrenzte Partie des Himmels mit den darin angegebenen Sternen herauszuzeichnen, hierauf in diese Partie alle ihm ausserdem noch sichtbaren Sterne mittelst Alignementen so gut als möglich einzutragen und erst dann an die Bildung von Sequenzen zu schreiten. Dabei erreicht er noch den Vortheil, schliesslich durch Zusammenschieben der einzelnen Polygone ein getreues Bild des Himmels zu gewinnen.

In einem Anhange ist der Abhandlung ein Verzeichniss aller jener, südlich vom Aequator liegenden Sterne 1. bis 4. Grösse beigelegt, die Herschel beobachtet hat, geordnet nach der Reihenfolge der Helligkeit, welche er ihnen zuweist. In dieses Verzeichniss wurden auch noch ein Paar (im Ganzen 9) Sterne von geringer nördlicher Deklination aufgenommen, um auffällige Konstellationen nicht zu zerreißen. Dieselben sind durch ein in Klammern beigelegtes (N) kenntlich gemacht. Den 3 Sternen: Sirius, Canopus und α Centauri ist keine Grösse beigelegt worden, weil sie die übrigen Sterne 1. Grösse so sehr an Glanz übertreffen, dass sie dieser Grössenklasse eigentlich nicht mehr beigelegt werden können: die anderen Bezeichnungen sind die jetzt allgemein üblichen, nach denen beispielsweise: 2.3 und 3.2 resp. Sterne von schwach 2. und hell 3. Grösse vorstellen.

Es wurde schon am Eingange dieses Abschnittes erwähnt, dass das verschiedenfarbige Licht der Sterne nicht auf alle Augen den gleichen Eindruck mache: namentlich scheinen manche Augen gegen das rothe Licht besonders unempfindlich zu sein. Schon deshalb ist eine Angabe der Färbung der einzelnen Sterne sehr erwünscht; sie wird dies aber um so mehr, als es nicht unwahrscheinlich ist, dass manche Sterne mit der Zeit ihre Farbe verändern. Dies scheint beispielsweise seit den Zeiten der Griechen und Römer bei Sirius und erst in unseren Tagen bei Arcturus eingetreten zu sein, welche beiden Sterne früher den rothen beigelegt wurden. Ueberhaupt ist der Sternhimmel keineswegs in dem Maasse ein Bild ewiger Ruhe und Unveränderlichkeit, wie die Alten sich ihn vorzustellen pflegten: auch an ihm ist alles in allerdings langsamer, aber nichts desto weniger stetiger Bewegung und Veränderung begriffen. Denn abgesehen von den sogleich zu besprechenden veränderlichen Sternen scheinen auch manche der übrigen säkularen Aenderungen ihrer Helligkeit unterworfen zu sein, und schon aus diesem Grunde allein ist es unsere Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass kommende Geschlechter sicherere und brauchbarere Daten zur Vergleichung vorfinden, als wir leider! von unseren Vorfahren überkommen haben.

c) Veränderliche Sterne.

Die Thatsache, dass einzelne Gestirne und darunter auch einige der hellsten des Himmels innerhalb verhältnissmässig kurzer Perioden regelmässige Veränderungen ihres Glanzes aufweisen, scheint den Alten vollständig unbekannt geblieben zu sein. Aber selbst als Phocylides Holwarda im Jahre 1638 in der Brust des Walfisches, an derselben Stelle, an der bereits im Jahre 1596 David Fabricius einen Stern gesehen und durch mehrere Monate bis zu seinem Verschwinden beobachtet hatte, wieder einen Stern auffand, der zuerst an Helligkeit zunahm, und hierauf abermals bis zum Unsichtbarwerden abnahm, erregte merkwürdigerweise diese auffallende Erscheinung fast gar kein Aufsehen. Sie wurde im Gegentheile von den Zeitgenossen nur sehr unvollständig beobachtet, und erst im Jahre 1660 von Hevel die Bemerkung gemacht, dass der Lichtwechsel des fraglichen Sternes, dem er den heute noch gebräuchlichen Namen Mira Ceti beilegte, innerhalb einer Periode von etwa 11 Monaten ziemlich regelmässig verlaufe. Ja es kannte nicht einmal die Entdeckung mehrerer neuer veränderlicher Sterne diese Apathie, indem erst gegen das Ende des verflossenen Jahrhunderts etwas mehr Interesse für dieselben erwachte, und namentlich J. Goodrike und E. Pigott nicht nur die bereits bekannten Variablen sorgfältig beobachteten und die Dauer ihres Lichtwechsels genauer bestimmten, sondern auch die Anzahl derselben bedeutend vermehrten. Von nun an wurde zwar eine Zeitlang diesen räthselhaften Sternen von verschiedenen Astronomen ab und zu etwas mehr Aufmerksamkeit zugewendet, aber im zweiten Decennium unseres Jahrhunderts erkaltete der Eifer wieder gänzlich, und es geriethen die Veränderlichen nochmals auf viele Jahre fast vollständig in Vergessenheit. Erst um das Jahr 1840 trat eine erfreuliche Wendung zum Besseren ein, und es entfaltete sich seither unter der Führung von Argelander hauptsächlich unter den deutschen und englischen Astronomen eine so lebhafte Thätigkeit auf diesem Gebiete, dass wir jetzt wohl schon an 150 veränderliche Sterne kennen, und auch bereits von einem grossen Theile derselben die Dauer und den Umfang des Lichtwechsels angeben können.

Die bekanntesten, in unseren Breiten sichtbaren* veränderlichen Sterne, deren Helligkeit im Maximum die 5. Grösse übersteigt, sind die folgenden:

Name	Max. mg.	Min. mg.	Dauer d. Periode
α Cassiopejae	2.2	2.8	irregulär
σ (Mira) Ceti	1.7...4	0	331. ^T 336
ρ Persei	3.4	4.0	irregulär
β Persei (Algol)	2.3	4.0	2.867
λ Tauri	3.4	4.3	3.953
ϵ Aurigae	3.5	4.5	irregulär
δ Orionis	2.2	2.7	ebenso
α Orionis	1	1.4	ebenso
ζ Geminorum	3.7	4.5	10.158
α Hydrae	2.3	2.7	sehr irregulär
$\mathcal{R}$ Hydrae	4.5	0	447.85
δ Librae	4.9	6.0	6. ^T 983
g Herculis	4.9	6.2	irregulär
α Herculis	3.1	3.9	ebenso
$\mathcal{R}$ Scuti	4.7...5.7	0	ebenso

Name	Max. mg.	Min. mg.	Dauer d. Periode
β Lyrae	3.5	4.5	12.908
R Lyrae	4.3	4.6	46....
χ Cygni	4	0	406....
η Aquilae	3.5	4.7	7.176
μ Cephei	4	5	irregulär
δ Cephei	3.7	4.9	5.366
β Pegasi	2.2	2.7	irregulär

Die Grössenangaben sind hierbei so zu verstehen, dass man sich das Intervall zwischen je zwei Grössen in 10 Theile getheilt denkt, und 0 Unsichtbarkeit mit freiem Auge bedeutet.

Auf dem bei uns nicht sichtbaren Theile des Himmels ist bisher wohl nur η Argus mit Sicherheit als veränderlich erkannt worden. Dieser merkwürdige rothe Stern überstrahlte im Jahre 1843 eine Zeitlang alle anderen Sterne bis auf Sirius an Glanz, und ist jetzt nach und nach fast unsichtbar geworden, während gleichzeitig auch in dem grossen ihn umgebenden Nebel bedeutende Veränderungen eingetreten sein sollen. Der Veränderlichkeit verdächtig sind nach J. Herschel: α und β Hydrae, α und γ Pavonis, β Leporis und nach Moesta auch μ Doradus (jetzt wahrscheinlich mit freiem Auge nicht sichtbar.

Bei den veränderlichen Sternen schreitet die Ab- und Zunahme des Lichtes selten gleichmässig fort: es kommen im Gegentheile bei den meisten sogenannte sekundäre Maxima und Minima, d. h. Rücksprünge, bald blos in der Zu-, bald blos in der Abnahme des Lichtes, bald in beiden vor. Ausserdem ist die Dauer der einzelnen Perioden keineswegs konstant, sondern oft sehr bedeutenden Schwankungen unterworfen, und nimmt sogar bei mehreren Sternen durch grössere Zeiträume an Länge regelmässig ab oder zu. Endlich erreichen manche Sterne nicht in jedem Maximum dieselbe Helligkeit, und sinken nicht in jedem Minimum zu derselben Lichtschwäche herab. Doch kommen die meisten Veränderlichen darin überein, dass ihr Licht geschwinder zu- als abnimmt, und dass die kleinste Lichtphase länger dauert als die grösste. Die Ursache dieses eigenthümlichen Verhaltens, so wie die der Veränderlichkeit überhaupt, ist uns noch unbekannt. Am plausibelsten ist aber die Annahme, dass die veränderlichen Sterne gleich unserer Sonne eine Rotation um ihre Axe haben, und an einer ihrer Seiten mit grossen dunklen Flecken besetzt sind: mit andern Worten, dass sich diese Sterne bereits in einem weit vorgeschrittenen Stadium der Abkühlung befinden. Auch diese Annahme ist wohl nicht im Stande, alle bisher beobachteten Erscheinungen auf eine ungezwungene Weise zu erklären: doch spricht für sie unter Anderem noch der Umstand, dass bei Weitem die meisten Veränderlichen wenigstens in einzelnen Phasen ihres Lichtwechsels eine rothe Farbe, zuweilen sogar eine sehr intensive zeigen.

Den veränderlichen Sternen jedenfalls sehr nahe verwandt, vielleicht nur eine Abart derselben sind die „neuen“ und „wieder verschwundenen“ Sterne, deren in den Chroniken des Alterthums öfter Erwähnung geschieht. Das berühmteste Beispiel solcher Sterne lieferte bis vor Kurzem der Tychonische Stern, der Anfang November 1572 plötzlich in einer ziemlich sternarmen Gegend der Cassiopeja aufleuchtete, und nachdem er eine Zeitlang in der Helligkeit der Venus glänzt hatte, allmählig wieder verschwand. Ein allerdings minder auffallendes Seitenstück hierzu bietet aus unseren Tagen ein

Stern in der Krone dar, welcher früher mehrfach als ein Stern 8. bis 9. Grösse beobachtet worden war, im Mai 1866 aber plötzlich zu einem Stern 2. Grösse emporschnellte, um bereits nach einigen Wochen wieder auf seine frühere Grösse herabzusinken.

Die Ausführung der im früheren Abschnitte besprochenen Helligkeitsbeobachtungen nach der Methode der Sequenzen würde auch auf eine einfache Weise zur Auffindung der Variablen des südlichen Sternenhimmels führen. Denn diese Sterne werden an verschiedenen Abenden verschiedene Stellungen in den Sequenzen einnehmen, und sich dadurch besonders dann als Veränderliche charakterisiren, wenn sich in den Verschiebungen eine gewisse Gesetzmässigkeit bekundet. Ist jedoch die Variabilität eines Sternes erkannt worden, so bleibt noch die Dauer der Periode, sowie die Amplitude und die Art des Verlaufes seines Lichtwechsels zu erforschen. Dies kann nur durch ein anhaltendes Vergleichen mit mehreren anderen Sternen geschehen, die ihm in den einzelnen Phasen des Lichtwechsels an Helligkeit nahezu gleichen, und womöglich so auszuwählen sind, dass ein Theil derselben heller, der andere schwächer als der Veränderliche ist. Hierbei schätzt man Helligkeitsdifferenzen gewöhnlich nach Stufen, indem man sich den Helligkeitsunterschied, um den im Mittel zwei aufeinanderfolgende Grössenklassen absteigen, in mehrere gleiche Theile getheilt denkt, und jeden derselben als Stufe bezeichnet. Es lässt sich nun allerdings nicht leugnen, dass in dem Begriffe der Stufe eine gewisse Willkürlichkeit liegt, indem jeder Beobachter sich seine eigene Skala bilden muss, und namentlich die Anzahl der Stufen, die er zwischen zwei Grössenklassen mit Sicherheit einschalten kann, von der grösseren oder geringeren Fähigkeit abhängen wird, schwache Lichtunterschiede aufzufassen. Im Allgemeinen hat man aber gefunden, dass ein normales Auge bei einiger Uebung das Intervall zwischen zwei Grössenklassen noch ziemlich sicher in 10 Theile theilen kann, so dass im Mittel eine Stufe etwa $\frac{1}{10}$ einer Grössenklasse beträgt. Uebrigens wird man unter dieser Annahme eigentlich immer nur 5 Stufen zu schätzen haben, nämlich 5 nach aufwärts und 5 nach abwärts.

Dämmerung.

Mit der Besprechung der Dämmerung eröffnen wir die Besprechung einer Gruppe von Erscheinungen, welche durch unsere Atmosphäre bedingt werden, und daher mehr in das Gebiet der Meteorologie und Physik, als in das der Astronomie gehören, deren Erforschung aber bisher fast ausschliesslich den Astronomen zugefallen ist, weil diese einerseits gewöhnlich die geeignetsten Mittel zu einer zweckmässigen Beobachtung dieser Phänomene besitzen, und weil andererseits ein Theil derselben, wie die Dämmerung und Refraktion, die astronomischen Beobachtungen unmittelbar beeinflusst. Allein gerade diese Zwitterstellung ist vielleicht eine der Hauptursachen, warum diese Phänomene noch in vielfacher Beziehung ziemlich mangelhaft bekannt sind, da der Astronom, deren Erforschung nicht als seine Hauptaufgabe betrachten kann, und sie daher nur nach jener Richtung studirt, die für ihn das meiste Interesse darbietet. Uebrigens wollen auch wir diesen Standpunkt hier festhalten, und diese Phänomene nur insoweit erörtern, als sie für die Astronomie von Wichtigkeit sind.

Der Verlauf der Dämmerung gestaltet sich in verschiedenen Zonen sehr verschieden, und ist in unseren Breiten im Allgemeinen der folgende. Gleich nach Sonnenuntergang zeigt sich am östlichen Horizonte ein schmutzig

blaues, von einem matten rothen Saume eingefasstes Segment, welches desto höher emporsteigt, je tiefer die Sonne sinkt, wobei aber die anfänglich ziemlich scharfe Begrenzung desselben immer verwaschener und der rothe Saum immer matter wird. Dieses unter dem Namen Gegendämmerung bekannte Segment ist nichts anderes als der Schatten, den der Erdkörper auf die Atmosphäre wirft, während der rothe Saum von zerstreuten Sonnenstrahlen herrührt, die in den Schattenraum gebrochen werden.

Sobald die Gegendämmerung das Zenith überschreitet, ändert sich die Erscheinung insofern, als jetzt beim weiteren Vorrücken des Erdschattens der früher ganz erhellte westliche Himmel von dem dunklen Bogen nach und nach immer mehr eingeengt wird, und dadurch die Gestalt eines lichten Segmentes annimmt, das zuweilen von einem matten weisslichen Rande umgeben erscheint, und Dämmerungsbogen oder Dämmerungsschein genannt wird. So wie der höchste Punkt dieses Bogens unter den Horizont sinkt, ist jede Spur der Dämmerung verschwunden und volle Nacht eingetreten. Man bezeichnet daher diesen Moment als den Schluss der astronomischen Dämmerung zum Unterschiede von der bürgerlichen Dämmerung, welche bereits dann ihr Ende erreicht, wenn man die meisten Arbeiten im Freien aus Lichtmangel einstellen muss.

Das Verschwinden des Dämmerungsbogens lässt sich in unseren Breiten nur sehr selten einigermaassen genau beobachten. Allein in geringeren Breiten, namentlich aber zwischen den Wendekreisen, lässt sich der Untergang desselben in der Regel auf wenige Minuten genau angeben, sobald man durch einige Uebung die Schwierigkeiten überwunden hat, welche sich anfänglich der Auffassung dieses Momentes entgegenstellen. Uebrigens sind in den Aequatorialgegenden alle Phasen der Dämmerung schärfer ausgeprägt, daher auch präziser zu beobachten als bei uns, und es bietet dort überhaupt die ganze Erscheinung ein viel prächtigeres Schauspiel dar, weil während derselben in buntem Wechsel, rasch nach einander die verschiedenartigsten Färbungen auftreten. So stellt sich nach Liai's die Dämmerung unter dem Aequator folgendermaassen dar. Fast unmittelbar nach dem Untergange der Sonne zeigt sich im Osten eine rosenrothe Färbung, unterhalb welcher bald darauf ein dunkles, häufig grünlich gefärbtes Segment zum Vorschein kommt. Die rosenrothe Färbung breitet sich rasch gegen Norden und Süden aus, und wird etwa 11 Minuten, nachdem sie im Osten aufgetreten, auch bereits im Westen bemerkbar. Um diese Zeit ist überhaupt der ganze Himmel rosenroth gefärbt, mit Ausnahme des Horizontes im Osten, wo ein dunkles graublaues, und im Westen, wo ein weisses Segment auf demselben aufliegt. Die rothe Färbung im Osten wird nun immer schwächer und verschwindet 8 Minuten später vollständig, während sich im Westen um das weisse Segment ein lebhaft roth gefärbter Saum bildet, von dem das Azurblau des darüber befindlichen Himmels sich in einem Glanze und einer Tinte abhebt, die unmöglich beschrieben werden können. Dieses Segment senkt sich nach und nach gegen den Horizont herab, färbt sich dabei intensiv roth oder roth-orange, und geht unter, wenn die Sonne eine Tiefe von $11^{\circ}7'$ erreicht hat.

Wenn der eben besprochene Bogen gerade im Untergange begriffen ist, tritt fast gleichzeitig am ganzen Himmel neuerdings ein rosenrothes Licht auf. Nur das Zenith bleibt fortwährend blau oder vielmehr tief dunkelblau, da die Helligkeit bereits sehr gering ist. So wie die Sonne noch tiefer hinabsteigt, verschwindet auch diese zweite Röthung zunächst im Osten und zieht sich dann langsam gegen Nord und Süd zurück, so dass sie schliesslich

am westlichen Himmel wieder zu einem gedrückten Segmente mit einem weisslichen Bogen im Innern zusammenschrumpft. Endlich geht auch dieses Segment, das bei seiner Annäherung an den Horizont sich immer mehr röthet, unter, wenn die Sonne $18^{\circ}3'$ unter den Horizont gesunken ist, und schliesst damit die Dämmerung.

Vor Kurzem hat H. Burkhardt-Jetzler noch auf eine andere merkwürdige Erscheinung aufmerksam gemacht, welche er für ein Analogon unseres Alpenglühens hält. Sie tritt an der östlichen Küste Südamerikas in besonderer Pracht auf und besteht darin, dass, wenn schon Dunkelheit herrscht, und Sterne bis zur 3. Grösse mit unbewaffnetem Auge erkannt werden können, das Tageslicht plötzlich wieder aufleuchtet, und der ganze Westhimmel ein helles Licht ausstrahlt, als ob ihn eine unsichtbare Sonne auf's Neue beleuchte. Diese Erscheinung, welche mit dem oben erwähnten zweiten Auftreten des rosenrothen Lichtes am Himmel zusammenhängen dürfte, zeigt sich jedoch nur bei sehr reiner Atmosphäre, nach starkem Thaufalle, nach Regen und Gewittern, in deren Folge sich die Luft abkühlt und der Wasserdünste entledigt.

Die bürgerliche Dämmerung wird so unbestimmt definirt, dass sich über ihr Ende nichts Näheres angeben lässt, als dass es eintritt, wenn die Sonne beiläufig 6° bis 7° unter dem Horizonte steht. Das Ende der astronomischen Dämmerung ist als Moment des Unterganges des Dämmerungsbogens allerdings besser charakterisirt, allein es fehlten bis vor Kurzem neuere Beobachtungen darüber, so dass man noch immer auf die zum Theile sehr vagen Bestimmungen früherer Jahrhunderte rekurriren musste, und die Tiefe der Sonne beim Ende der astronomischen Dämmerung gewöhnlich zu 18° rundweg annahm. Erst in der neuesten Zeit hat J. F. Schmidt eine sehr umfassende, hierauf bezügliche Beobachtungsreihe ausgeführt, aus welcher hervorgeht, dass dieser Werth wenigstens für Südeuropa nicht unbedeutend verkleinert werden muss, und dass sogar an ein und demselben Orte die Tiefe der Sonne beim Aufhören der Dämmerung mit den Jahreszeiten variirt, indem sie beispielsweise zu Athen im Sommer nur $15^{\circ}3'$, im Winter aber $17^{\circ}2'$ beträgt. Es lässt sich daher um so mehr bezweifeln, dass das Ende der Dämmerung an allen Orten der Erde bei demselben Sonnenstande eintritt: es weisen im Gegentheile mancherlei Umstände darauf hin, dass die Tiefe der Sonne am Schlusse der Dämmerung in niedrigen Breiten geringer sei, als in höheren. Uebrigens will man auch mehrfach die Bemerkung gemacht haben, dass die Morgendämmerung kürzer dauere als die Abenddämmerung: doch ist darüber noch nichts Näheres bekannt.

Die Dauer der Dämmerung hängt in erster Linie von der Schnelligkeit ab, mit welcher die Sonne unter den Horizont sinkt, ist daher zwischen den Tropen viel kürzer als in höheren Breiten. Allein auch an ein und demselben Orte ist ihre Dauer in verschiedenen Jahreszeiten sehr verschieden, und namentlich zur Zeit der Aequinoctien bedeutend kürzer als zur Zeit der Solstitien, weil in jenen die Sonne viel rascher unter den Horizont hinabsteigt als in diesen.

Aus dem Obigem ergiebt sich von selbst, dass die Ermittlung der Dauer der astronomischen Dämmerung in verschiedenen Gegenden der Erde besonders wünschenswerth wäre. Zu diesem Zwecke kann man in geringen Breiten den Untergang des Dämmerungsbogens unmittelbar beobachten: in höheren Breiten hingegen, wo diese Beobachtung nur sehr selten gelingen würde, ist es zweckmässiger, die Höhe und azimutale Ausdehnung des Dämmerungsbogens, so lange er noch gut zu erkennen ist, mehrmals nach einander zu

beobachten, und aus diesen Daten durch eine einfache Proportion die Zeit seines vollständigen Verschwindens zu berechnen. Doch darf man sich bei diesen Beobachtungen durch das Zodiakallicht nicht täuschen lassen, dessen Basis sich mit dem Dämmerungsbogen vermischt, und sehr leicht mit demselben verwechselt werden kann, wie denn überhaupt das Zodiakallicht der Genauigkeit dieser Beobachtungen am meisten Abbruch thut.

Die Höhe des Dämmerungsbogens kann man durch die Vergleichung der Höhe seines Scheitels mit den Höhen bekannter Sterne und seine azimutale Ausdehnung durch solche Sterne ermitteln, welche senkrecht über seinen Enden sich befinden. Viel einfacher und bequemer gestaltet sich jedoch die Sache, wenn man ein Meteoroskop zur Hand hat, weil man an einem solchen die gewünschten Grössen unmittelbar einstellen und ablesen kann. Scheut man hierbei die geringe Mehrarbeit nicht, nebst den Azimuten des Endpunktes des Bogens, noch das Azimut seines Scheitels zu notiren, so gewinnt man zugleich auch das nöthige Material zur Entscheidung der interessanten Frage, ob die Mitte des Dämmerungsbogens immer genau senkrecht über der Sonne steht, oder ob Unregelmässigkeiten in den oberen Luftschichten auch merkbare Unregelmässigkeiten in seiner Lage nach sich ziehen. Uebrigens wären alle diese Beobachtungen um so verdienstlicher, wenn sie im Hinblick auf die vermuthete ungleiche Dauer der Abend- und Morgendämmerungen nicht nur am Abendhimmel, sondern auch möglichst häufig am Morgenhimmel angestellt würden.

Neben diesen Beobachtungen versäume man es aber nicht, auch die verschiedenen Färbungen, welche die Dämmerung begleiten, zu beachten, namentlich dann, wenn darin eine besondere Lebhaftigkeit oder Pracht sich zeigt (ungewöhnlich starke Abend- und Morgenröthen). Ebenso sollten Beobachter innerhalb der Wendekreise ein besonderes Augenmerk auf die Eingangs erwähnte Nachdämmerung richten, und Alles, was sie darüber sammeln können, sorgfältig notiren, da diese bisher so wenig gekannte Erscheinung für die Theorie des Dämmerungsphänomens von der höchsten Tragweite ist.

Im Jahre 1858 machte Liai die interessante Bemerkung, dass bereits einige Zeit vor dem Beginne der Morgendämmerung am östlichen Himmel polarisirtes Licht vorhanden sei, dessen Polarisationsebene durch den Sonnenort hindurchgeht. Dies polarisirte Licht steigt allmählig höher, erreicht das Zenith beiläufig beim Beginne der Dämmerung und schreitet dann langsam gegen Westen vor. Daraus ergiebt sich, dass die Sonne schon beim Anfange der Dämmerung Schichten unserer Atmosphäre direkt beleuchtet, die sich im Zenithe des Beobachtungsortes befinden, oder mit anderen Worten, dass die Höhe der Atmosphäre weit bedeutender sei, als die eigentlichen Dämmerungsercheinungen sie ergeben — eine Thatsache, die man übrigens aus anderen Phänomenen längst erschlossen hat. Indess ist die Entdeckung von Liai deshalb wichtig, weil sie ein sehr bequemes Mittel an die Hand giebt, wenigstens eine untere Grenze für die Höhe jener Luftschichten zu ermitteln, welche das Licht noch zu reflektiren vermögen, wenn auch nur noch in so geringem Grade, dass das Auge die dadurch hervorgebrachte Erhellung nicht mehr wahrzunehmen vermag. Bedenkt man nämlich, dass in der Nähe des Zenithes die Grenze des polarisirten Lichtes mit gleicher Geschwindigkeit fortschreiten muss, wie die Grenze des Erdschattens, so ersieht man sofort, dass aus der Zeit, welche das polarisirte Licht braucht, um eine gewisse Winkelgrösse im Zenithe zu passiren, die Höhe der Atmosphäre berechnet werden kann. So beobachtete Liai im Jahre 1858, dass zu St. Domingos (Bai von Rio Janeiro) das polarisirte Licht in 9 Min. 40 Sek. von 20° östlich

bis 20^0 westlich vom Zenithe fortrückt. Da nun unter einer Breite von 23^0 der Erdschatten 3,45 Meilen in einer Minute oder 33,4 Meilen in 9 M. 40 S. durchläuft, so folgt daraus für die Distanz, in welcher diese Grösse unter einem Winkel von 40^0 erscheint, d. h. für die Höhe der Atmosphäre, 45,8 Meilen. Diese Beobachtungen, welche Liais mit einem Nichol'schen Prisma oder einer Turmalinplatte in der Art anstellte, wie es beim Zodiakallichte näher angegeben ist, scheinen eigenthümlicher Weise trotz ihrer Einfachheit und hohen Wichtigkeit seither nie mehr ausgeführt worden zu sein: es wäre daher eine Wiederholung derselben sehr erwünscht.

Mit den Dämmerungsbeobachtungen können sehr leicht auch Beobachtungen über das früheste und späteste Erscheinen der Mondsichel am Abend- und Morgenhimmel verbunden werden. Diese Beobachtungen haben heute allerdings nicht mehr die Bedeutung, welche sie in früheren Zeiten hatten: allein sie besitzen immerhin einiges Interesse, weil einzelne Wahrnehmungen die Zeiten der ersten und letzten Sichtbarkeit des Mondes seiner Konjunktion mit der Sonne viel näher zu rücken scheinen, als man gewöhnlich annimmt. Hingegen hätten Beobachtungen heliakischer Auf- und Untergänge auch heute noch einen praktischen Werth, namentlich wenn sie längere Zeit hindurch an den Kulturstätten des Alterthumes systematisch fortgeführt würden, da eine genaue Kenntniss des heliakischen Auf- und Unterganges einiger der hellsten Sterne das Verständniss und die Interpretation gar mancher Stelle in den alten Klassikern wesentlich fördern würde. Ebenso wäre eine genauere Prüfung der seit dem Anfange unseres Jahrhunderts mehrfach geäusserten Meinung, dass die Intensität des Erdlichtes im Monde davon abhängig sei, ob das Licht von der oceanischen oder vorwiegend kontinentalen Seite der Erde reflektirt wird, nicht ohne Wichtigkeit, und könnte ein schätzbares Material für manche photometrische Untersuchung liefern.

Refraktion.

Von den mannichfachen Erscheinungen, welche die Refraktion des Lichtes darbietet, wollen wir uns jenen Theil herausfassen, welcher als astronomische Refraktion bezeichnet wird und die sogenannte terrestrische Refraktion ganz bei Seite lassen. Was nun die astronomische Refraktion betrifft, so ist ihre Konstante, oder was auf dasselbe hinauskommt, ihre Grösse im Horizonte, noch keineswegs so genau bekannt, als man in der Regel annehmen dürfte, noch weniger Sicheres aber wissen wir über das Gesetz, nach welchem sich die Horizontalrefraktion mit Temperatur und Luftdruck ändert, und über den Betrag, auf welchen sich diese Aenderungen belaufen können. Selbstverständlich ist hier nur von den Mittelwerthen aller dieser Grössen die Rede, von denen einzelne Beobachtungen stets bedeutende Abweichungen zeigen werden, da die vielfachen Störungen in den untersten, das Licht am meisten brechenden Luftschichten auch vielfach Unregelmässigkeiten der Refraktion in der Nähe des Horizontes nach sich ziehen müssen.

Man kann nun einem Reisenden allerdings nicht zumuthen, eigentliche Refraktionsbeobachtungen anzustellen, allein trotzdem möge es erlaubt sein, hier darauf hinzuweisen, dass gerade die zahlreichen Expeditionen, welche sich zur Beobachtung des Venusdurchganges nach klimatologisch so verschiedenen Gegenden der Erde begeben werden, eine Gelegenheit darbieten, wie sie so leicht nicht wiederkehren wird, über verschiedene, die Refraktion betreffende Fragen nähere Aufschlüsse zu erhalten. Es wäre dazu nur erforderlich, an möglichst vielen dieser Stationen eine Reihe von Gestirnen aus

beträchtlichen Höhen bis zu ihrem Untergange, oder von ihrem Aufgange bis in beträchtliche Höhen zu verfolgen und diese Beobachtungen längere Zeit hindurch fortzuführen. Dabei würde es sich empfehlen, manchmal auch die ganze Kurve zu beobachten, die ein Stern von seinem Aufgange bis zu seiner Meridianpassage, oder von dieser bis zu seinem Untergange beschreibt und hierzu womöglich solche Sterne auszuwählen, welche einige Stunden nach Sonnenuntergang aufgehen oder einige Stunden vor Sonnenaufgang untergehen, weil in diesem Falle die Beobachtungen gerade jenen Zeitraum umfassen würden, in dem im Allgemeinen die grösste Regelmässigkeit in der Anordnung der atmosphärischen Schichten herrscht. Ein besonderes Interesse würden übrigens Refraktionsbeobachtungen von höher gelegenen Stationen besitzen, an denen man die Gestirne bis unter den wahren Horizont verfolgen und dadurch auch etwas Näheres über die noch so gut wie unbekannten Refractionen in Zenithdistanzen über 90° erfahren könnte.

Indess kann auch ein Reisender ohne genauere Instrumente schöne Beiträge zur Kenntniss der Refraktion liefern, wenn er auf einer weiten Ebene, oder noch besser am Meeresstrande die Auf- und Untergangsmomente der Sonnen- und Mondränder, oder die Untergänge der helleren Planeten und Fixsterne beobachtet: die letzteren mit Hülfe eines kleinen Fernrohrs, um sie bis an den Horizont sehen zu können. Dabei darf er aber nicht vergessen, die Höhe seines Auges anzugeben (wegen der Depression des Horizontes) und den Stand der meteorologischen Instrumente sorgfältig zu notiren. Ferner soll er nicht versäumen, unregelmässige Refraktionserscheinungen, wie z. B. eigenthümliche Deformationen der Sonnen- und Mondscheibe während des Auf- oder Unterganges, und namentlich die Fälle von lateralen Refractionen in ihren Einzelheiten genauer zu beschreiben.

Wenn auch nicht in einem unmittelbaren Zusammenhange mit, so doch in einer gewissen Beziehung zur Refraktion steht das Funkeln oder Scintilliren der Sterne. Man versteht darunter bekanntlich die raschen, gewöhnlich mit Farbenänderungen verbundenen Fluktuationen im Glanze und in der scheinbaren Grösse, welche die Sterne im Allgemeinen, besonders auffällig aber in der Nähe des Horizontes zeigen.

Arago hält das Funkeln für ein einfaches Interferenzphänomen; Montigny hingegen glaubt, dass es weit eher auf Dispersion und Refraktion des Lichtes in der Atmosphäre zurückgeführt werden müsse: eine Ansicht, welche die Untersuchungen von Donati und Respighi zu bestätigen scheinen. Indess ist das Phänomen des Funkelns zweifelsohne ein so complicirtes, dass nur zahlreiche und sorgfältige Beobachtungen die nöthigen Daten zur Aufstellung einer sicheren Theorie desselben liefern, und zur Erkenntniss der Relationen führen können, in welchen es mit den Zuständen in unserer Atmosphäre steht.

Für das unbewaffnete Auge ist das Funkeln bei den Sternen erster Grösse sehr auffällig; bedeutend geringer schon bei denen zweiter Grösse, und wird bei den schwächeren allmähig ganz unmerklich. Doch wechselt die Lichtstärke der Sterne, bis zu denen das Funkeln bemerkt werden kann, Tag für Tag, je nachdem dasselbe im Ganzen genommen stärker oder schwächer ist.

In unseren Gegenden ist in Nächten, in denen die Sterne stark funkeln, das Funkeln selbst im Zenithe noch sehr merkbar, und nur in Nächten, in denen es schwach ist, zeigen Sterne im Zenithe und in der Nähe desselben keine Spur davon. Allein auf hohen Bergen, ferner in den Aequatorialgegenden und auch in Ländern grosser Trockenheit sollen die Sterne in einem bedeutend schwächeren Maasse und blos in der Nähe des Horizontes

funkeln. Doch können wir darüber noch nichts Näheres angeben, da diese Resultate nur aus vereinzeltten Wahrnehmungen verschiedener Reisenden gezogen sind. Es wäre daher sehr zu wünschen, dass bald grössere systematisch angestellte Beobachtungsreihen aus verschiedenen Gegenden der Erde vorliegen würden, über das Verhalten des Funkelns bei grosser Hitze und Trockenheit (Wüsten- und Steppengegenden), intensiver Kälte (Polargegenden) während der monatelangen Nacht und Ostsibirien in heiteren Winternächten) oder hohem Dampfgehalte der Luft etc.

Von den Planeten nimmt man gewöhnlich an, dass sie gar nicht oder höchstens sehr schwach funkeln: doch gilt diess nur für Jupiter und Saturn, denn an Mars, Venus und namentlich Merkur zeigt sich diese Erscheinung oft in sehr hohem Grade. Uebrigens sollen auch zwischen den einzelnen Sternen individuelle Unterschiede im Scintilliren vorkommen, und insbesondere die rothen Sterne schwächer funkeln als die weissen: indess bedarf es zur Feststellung dieser und ähnlicher Verhältnisse noch zahlreicher Beobachtungen.

Nach den Erfahrungen von Ch. Dufour, welcher sich mit derartigen Beobachtungen vielfach beschäftigt hat, ist es das Zweckmässigste, das Funkeln der Sterne ohne jegliches Instrument, blos mit dem freien Auge zu beobachten und die Stärke desselben durch eine Zahl zu bezeichnen, ebenso wie man in der Meteorologie den Grad der Bewölkung oder die Stärke des Windes durch Zahlen ausdrückt. Dufour glaubt, dass man bei einiger Uebung sehr wohl 10 Grade in der Stärke des Scintillirens unterscheiden könne, und bezeichnet demgemäss mit 0 ein ganz unmerkliches, mit 10 das stärkste Funkeln, das vorkommt und dadurch charakterisirt ist, dass die Sterne zu hüpfen, bedeutende Farbenänderungen zu erleiden und manchmal sogar ganz zu verschwinden scheinen. Ein solches Funkeln findet nur hart am Horizonte statt und gehört auch dort noch zu den seltenen Vorkommnissen.

Ueber die Abgrenzung der einzelnen Zwischenstufen lässt sich nichts Näheres angeben: sie muss dem eigenen Ermessen jedes Beobachters anheimgestellt werden. Es wird daher auch stets eine gewisse Unsicherheit bei der Vergleichung der Resultate verschiedener Beobachter zurückbleiben; indess ist trotzdem diese Art der Aufzeichnung bei Weitem jener vorzuziehen, nach welcher der Grad des Scintillirens blos durch die noch weit elastischeren Ausdrücke stark, schwach, unmerklich u. dgl. angegeben wird.

Von Nebenumständen, welche wohl zu beachten sind, sei erwähnt, dass Dämmerung und Nähe von Wolken das Funkeln fast immer verstärkt, und dass Mondschein die Güte der Beobachtungen sehr beeinträchtigt. Sind daher Beobachtungen unter solchen Verhältnissen angestellt worden, so sollte dies stets bemerkt werden.

Dem Funkeln der Sterne in gewisser Beziehung ähnlich ist das sogenannte Sternschwanken, welches in eigenthümlichen Ortsveränderungen der Sterne besteht, die sich auf mannigfache Weise manifestiren. Die Sterne scheinen entweder Kreise oder Ellipsen, deren Durchmesser zuweilen bis auf mehrere Grade steigen, zu beschreiben — oder mehr fortschreitend von links nach rechts, oder von oben nach unten sich fortzubewegen, an dem äussersten Punkte eine Zeitlang zu verweilen und dann dem Anfangspunkte wieder zuzueilen — oder endlich unregelmässig geschlängelte Linien nach verschiedenen Richtungen zurückzulegen, jedoch immer so, dass sie zum Ausgangspunkte wieder zurückkehren.

Nach den Untersuchungen von Schweizer ist in den meisten Fällen diese Erscheinung rein subjektiver Natur und steht mit der Ermüdung des

Auges beim längeren scharfen Fixiren eines Gegenstandes in innigem Zusammenhange. Denn nicht nur konnten er und mehrere Mitbeobachter die Erscheinung des Sternschwankens stets dadurch hervorrufen, dass sie einen Stern längere Zeit hindurch unverwandt anblickten, sondern es war diese Erscheinung überdiess in ein und demselben Momente für einen jeden Beobachter eine andere (indem z. B. der eine den Stern steigen, der andere ihn fallen, ein dritter ihn einen Kreis beschreiben, ein vierter ihn stille stehen sah etc.) und konnte auch jeden Augenblick durch ein rasches Blinzeln mit den Augenlidern unterbrochen werden. Indess ist es doch immerhin noch fraglich, ob alle bisherigen Wahrnehmungen des Sternschwankens sich auf analoge Weise erklären lassen. Es wäre daher sehr erwünscht, bei einem etwaigen Auftreten dieser Erscheinung durch das oben angegebene Mittel sich zu überzeugen, ob das Phänomen ein subjektives ist oder nicht, und im letzteren Falle die Einzelheiten desselben genau anzugeben.

Schliesslich seien dem Reisenden noch Beobachtungen über die Absorption des Lichtes in der Atmosphäre, vorzüglich in der Nähe des Horizontes empfohlen. Diese Beobachtungen sind insofern wichtig, als sie uns die relative Durchsichtigkeit der Luft in verschiedenen Gegenden der Erde kennen lehren, und können am einfachsten durch Vergleichung der Helligkeit der grösseren Sterne bei tiefem Stande mit Sternen in der Nähe des Zenithes angestellt werden. Die hierbei anzuwendenden Methoden sind bereits in einem früheren Abschnitte (Helligkeit und Farbe der Fixsterne) näher auseinander gesetzt worden.

Polarlichter.

Das letzte Phänomen, auf dessen Beobachtung wir Reisende aufmerksam machen wollen, sind die Polarlichter, welche man bekanntlich je nach der Hemisphäre, in der sie sichtbar sind, als Nord- oder Südlichter bezeichnet. Von diesen sind begreiflicher Weise die Nordlichter am häufigsten und sorgfältigsten beobachtet worden; doch ist uns auch über die ersten Stadien und die allmälige Ausbildung eines Nordlichtes nur so viel bekannt, dass der nördliche Horizont kurz vor dem Auftreten eines solchen gewöhnlich ein schmutziges, dunstartiges Aussehen gewinnt und dass die schmutzig gefärbte Partie des Himmels nach und nach die Gestalt eines dunkeln Bogens annimmt, der sich in unsern Breiten meist nur bis zu einer Höhe von 5° bis 10° erhebt und von einem auf der obern Seite verwaschenen Lichtsaume begrenzt wird. Das dunkle Segment ist übrigens keine Wolkenbank, da die Sterne ohne bedeutende Lichtschwächung durch dasselbe hindurchschimmern. In hohen nördlichen Breiten scheint während dieses Entwicklungs-Stadiums öfters der ganze Himmel von einem rauchartigen Nebel erfüllt, und noch näher gegen den Pol hin sieht man das dunkle Segment am südlichen Horizonte aufruhren.

In der weiteren Ausbildung zeigen namentlich intensivere Polarlichter eine so grosse Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, dass eine auch nur halbwegs erschöpfende Beschreibung derselben den Rahmen dieser Zeilen weit übersteigen würde. Die auffälligsten und am öftesten wiederkehrenden Phänomene bezeichnet man als: Lichtbogen, Strahlenschiessen, Gewölk, Büschel, Flammen u. dgl. Dabei ist die ganze Erscheinung in steter Bewegung begriffen und zwar theils in tremulirender, theils in undulirender, theils in mehr oder minder rasch fortschreitender. Nur ein Gebilde, die Krone, welche übrigens in mittleren Breiten selten und blos bei vollständig ausgebildeten

Polarlichtern sich zeigt, nimmt an der allgemeinen Bewegung nicht Theil: bis zu ihr hinan schiessen die Strahlen und Flammen von allen Seiten, aber nie über sie hinaus, und nie wird sie von den Strahlenbogen bedeckt, wenn diese auch nördlich und südlich von ihr in der heftigsten Bewegung sind.

Die Krone hat für die Polarlicht-Strahlen dieselbe Bedeutung, wie der Radiationspunkt für eine Gruppe zusammengehöriger Sternschnuppen: sie ist nämlich jener Punkt, nach welchem der Perspektive gemäss die unter sich parallelen Polarlicht-Strahlen zu convergiren scheinen, und lehrt uns, dass diese Strahlen im Allgemeinen der Inklinationsnadel parallel angeordnet sind, da ihr Centrum dem magnetischen Zenithe stets sehr nahe liegt. Damit stimmt auch die beim Ueberwintern von arktischen Expeditionen häufig beobachtete Thatsache, dass mit der Annäherung an die magnetischen Pole die Richtung der Sichtbarkeit der Polarlichter immer unregelmässiger wird und nach der Ueberschreitung der magnetischen Pole sich geradezu umkehrt. Die Krone beweist ferner am augenfälligsten, dass die Polarlichter zu den tellurischen Erscheinungen gehören, da ihre Lage in Bezug auf den Horizont im Laufe der Nacht ungeändert bleibt, zum Zeichen, dass das ganze Phänomen an der täglichen Rotation der Erde theilnimmt. Uebrigens will man auch mehrfach einen Zusammenhang des Nordlichtes mit gewissen Wolkenformen, ja sogar eine Art gegenseitigen Vertretens von Polarbanden und Nordlicht beobachtet haben. Doch ist eine solche innige Wechselwirkung schwer zu begreifen, da der Polarlichtprozess, wenigstens in mittleren Breiten, stets in den höchsten Regionen unserer Atmosphäre vor sich geht. Nur in den Polargegenden soll die Lichtentwicklung ausnahmsweise in die tieferen Schichten der Atmosphäre und sogar ganz nahe an die Erdoberfläche herabsteigen: indessen ist bei den meisten hierfür angeführten Beobachtungen die Möglichkeit einer optischen Täuschung nicht ausgeschlossen.

Schwache Polarlichter zeigen meist eine weisse oder blassgelbe Farbe. Gestaltet sich jedoch die Erscheinung zu einer glänzenden, dann weist der Himmel gleichzeitig eine grosse Varietät von Farbentönen auf. Einige Partien desselben sind weiss mit einem Anflug von grün, andere blass — oder strohgelb, während noch andere eine röthliche, selbst blutrothe Färbung annehmen. Zugleich wechseln diese Farben beständig ihre Lage und Intensität. Ebenso kommt es sehr häufig vor, dass ein Polarlicht nicht blos in einzelnen Theilen, sondern allmählig ganz verblasst und fast vollständig verschwindet, plötzlich aber in seinem vollen oder selbst in verstärktem Glanze wieder aufleuchtet. Ein derartiges Schauspiel kann sich bei starken Erscheinungen sogar 3 bis 4 mal in einer Nacht wiederholen.

Das Spektrum des Nordlichtes besteht in seiner vollsten Entwicklung aus 7 hellen Linien, von denen eine im Roth, eine andere im Blau und 5 im Grün sich befinden. Die ganze letztere Gruppe, namentlich aber die hellste Linie derselben, ist am leichtesten sichtbar, schwieriger schon die rothe Linie und am seltensten die blaue.

Die Dauer der Polarlichter ist sehr verschieden. Manchmal währen sie blos 1 oder 2 Stunden, manchmal die ganze Nacht, und erscheinen hin und wieder an zwei aufeinander folgenden Nächten unter Umständen, welche annehmen lassen, dass der Lichtprozess ununterbrochen fortgedauert und lediglich das Dazwischentreten des Tages seine Sichtbarkeit gehindert habe. In der That hat man auch in der neuesten Zeit, wo man derartige Vorkommnisse aufmerksamer verfolgt, schon mehrfach Erscheinungen wahrgenommen, die ganz den Charakter eines Polarlichtes, wie es sich am Tage zeigen müsste, trugen.

Die Polarlichter erscheinen am häufigsten in höheren Breiten, und sind zwischen den Wendekreisen so gut wie unbekannt. Doch kennen wir das Gesetz ihrer Vertheilung nur für die Nordlichter etwas genauer. Für diese zieht die Linie der Maximalfrequenz nördlich von Nischney-Kolymsk und nahe an der Barrow-Spitze vorbei über den Bärensee, durch den nördlichen Theil der Hudsonsbai, über Labrador, südlich vom Kap Farewell zwischen Schottland und Island durch und wendet sich gegen das Nordkap, von wo sie bis zu ihrem Anschlusse an unseren Ausgangspunkt nicht weiter verfolgt werden kann. Dies- und jenseits dieser Linie werden die Lichtentwicklungen desto seltener, einförmiger und weniger prächtig, je weiter man sich von ihr entfernt. Ueber die Lage der analogen Linie für die Südlichter wissen wir noch nichts Näheres.

Polarlichter werden oft gleichzeitig über einen grossen Theil der Erde gesehen. So wurden beispielsweise die Nordlichter vom 28. August und 2. September 1859 in ganz Europa und in Amerika vom 20. Breitengrade bis zu unbekannten nördlichen Gegenden beobachtet, während das Sichtbarkeitsgebiet der grossen Nordlichter vom 25. October 1870 und 4. Februar 1871, welche namentlich in Mitteleuropa einen ungewöhnlichen Glanz entfalteten, kaum minder ausgedehnt war. Dazu kommt noch, dass jedes grosse Südlicht, von dem wir bisher Kenntniss erhielten, auch von einem grossen Nordlichte begleitet war. Es dürfte daher die Behauptung nicht ungerechtfertigt erscheinen, dass intensive Polarlichter stets gleichzeitig an beiden magnetischen Polen der Erde auftreten.

Obwohl Nordlichter zu allen Stunden der Nacht erscheinen, tritt ein Maximum der Frequenz derselben doch für die meisten Orte der Erde einige Stunden vor Mitternacht ein, wobei indessen mit zunehmender Breite, namentlich in den Meridianen von Amerika, eine Verspätung statt hat. Für die südliche Halbkugel fehlen bis jetzt noch die nöthigen Beobachtungen zur Konstatirung einer ähnlichen täglichen Periode in der Frequenz der Südlichter. Hingegen lässt sich eine jährliche Periode, nach welcher zur Zeit der Aequinoctien eine grössere Zahl solcher Phänomene auftritt, als zur Zeit der Solstitien, auch in den Verzeichnissen der Südlichter trotz ihrer grossen Unvollständigkeit nicht verkennen. Ausser dieser täglichen und jährlichen Periode lässt sich aber in der Häufigkeit der Polarlichter noch eine längere Hauptperiode von etwa 55 Jahren nachweisen, welche mit der gleichlangen Hauptperiode der Sonnenflecken in inniger Beziehung steht und so wie diese in 5 sekundäre Perioden von nahezu 11 Jahren zerfällt.

Bei der Eingangs erwähnten grossen Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, welche Polarlichter darbieten, ist es schwer, alles das detaillirter anzugeben, dessen Beobachtung wünschenswerth wäre: es ist daher das Beste, wenn ein Beobachter alles sorgfältig notirt, was ihm dessen werth scheint. Insbesondere aber sollte er den Verlauf der Bildung eines Polarlichtes von den ersten Anfängen an recht genau verfolgen, und sobald das dunkle Segment sich zu zeigen beginnt, namentlich das Augenmerk darauf richten, ob es sich auf einmal mit dem Lichtsaume umgiebt, oder ob dieser an einzelnen Stellen früher auftritt als an anderen. Dieselben Beobachtungen sind auch beim Verschwinden des Polarlichtes auszuführen. Ferner ist die Lage, Ausdehnung, Bewegung etc. der Lichtbogen möglichst genau zu beobachten, und sobald es bis zur Ausbildung einer Krone kommt, auch die Lage dieser. Die letztgenannten Beobachtungen haben desshalb ein besonderes Interesse, weil man in der neueren Zeit Methoden aufgefunden hat, aus der Amplitude und Höhe der Lichtbogen, sowie aus der Lage der Krone, allein, ohne Hin-

zuziehung anderer korrespondirender Beobachtungen, die Höhe des Herdes der Strahlenbildung über der Erdoberfläche wenigstens näherungsweise zu berechnen.

Die Feststellung der Lage und Ausdehnung der Lichtbogen kann durch Einzeichnen ihres unteren, meist schärfer begrenzten Randes in Sternkarten geschehen. Doch wird man sich auch gerade hier eines Meteoroskopes mit besonderem Vortheile bedienen können, da man an einem solchen die zur Höhenbestimmung nöthigen Daten: Amplitude des Bogens am Horizonte und grösste Elevation über demselben, unmittelbar ablesen kann. Etwas ähnliches gilt auch von der Krone, weil diese, wie bereits erwähnt wurde, an der täglichen Bewegung theilnimmt, daher ihre Lage in Bezug auf das Koordinatensystem der Höhen und Azimute nicht ändert.

Die Position der Krone wird in der Regel mit bedeutender Genauigkeit angegeben werden können, da die Polarlichtstrahlen nicht allzurasch vorübergehende, sondern oft minutenlang fast an derselben Stelle des Himmels feststehende Erscheinungen sind. Man kann daher den Anfangs- und Endpunkt und damit die Richtung einzelner verschieden gerichteter Polarlichtstrahlen mit einer namhaften Genauigkeit ermitteln und daraus den Konvergenzpunkt ebenso sicher herleiten. Diese Art der Feststellung des Centrums der Krone ist dem direkten Einstellen auf dasselbe deshalb vorzuziehen, weil es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Strahlen an einer Seite öfter näher an den eigentlichen Schneidungspunkt herantreten, als an der andern und dadurch dessen Lage in der Krone excentrisch wird.

Hat sich die Erscheinung des Polarlichtes bis gegen den Morgen hin erstreckt, so sollte der Beobachter nicht versäumen, sich unter Tags öfter nach Phänomenen umzusehen, welche als Fortsetzung des Lichtprocesses gedeutet werden könnten; ebenso sollte er es nicht unterlassen, alle Erscheinungen sorgfältig zu registriren, die über den vermutheten Zusammenhang zwischen Polarlichtgewölk und Cirruswolken einiges Licht verbreiten könnten. Zu weiteren Untersuchungen über die wechselseitigen Beziehungen zwischen den Polarlichtern, magnetischen Störungen und Witterungsverhältnissen wird ein Reisender wohl selten genug Gelegenheit haben, da ein solches Unternehmen vor Allem einen längeren Aufenthalt an ein und demselben Orte erheischt. Wir wollen daher hier nicht näher darauf eingehen, und zum Schlusse nur noch beifügen, dass selbst das blossе Registriren des Auftretens eines Polarlichtes, ohne jede weitere Beobachtung desselben, namentlich auf der südlichen Halbkugel Werth hat, da es zu Untersuchungen über die Korrespondenz zwischen Nord- und Südlichtern verwendet werden kann.

Anhang I.

Verzeichniss der Fixsterne bis zur 4. Grösse, südlich vom Aequator, die von J. Herschel nach der Methode der Sequenzen beobachtet wurden, geordnet nach ihrer Helligkeit.

Um natürliche Konstellationen nicht allzu sehr zu zerreißen, sind auch einige Sterne mit geringen nördlichen Deklinationen hinzugefügt, aber durch ein beigesetztes (N) kenntlich gemacht.

Name.	Grösse.	Name.	Grösse.	Name.	Grösse.
Sirius	—	γ Corvi	3	ζ Hydræ (N)	3.4
Canopus	—	κ Scorpii	3	γ Hydræ	3.4
α Centauri	—	η Centauri	3	β Trianguli austr.	3.4
β Orionis	1	κ Argus	3	σ Scorpii	3.4
α Eridani	1	β_1 Corvi	3	τ Argus	3.4
β Centauri	1	β Scorpii	3	θ Aquilæ	3.4
α Crucis	1.2	ζ Centauri	3	γ Trianguli austr.	4.3
α Scorpii	1.2	π Argus	3	ι Scorpii	4.3
α Virginis	1.2	δ Centauri	3	ν Argus	4.3
α Piscis austr.	1.2	α Leporis	3	λ Aquilæ	4.3
β Crucis	2.1	δ Ophiuchi	3	δ Crucis	4.3
α Gruis	2.1	ζ Sagittarii	3	γ Sagittarii	4.3
γ Crucis	2.1	η Ophiuchi	3	η Serpentis	4.3
ε Canis maj.	2	β Libræ	3	ν Hydræ	4.3
λ Scorpii	2	γ Virginis	3	χ (κ) Centauri	4.3
ε Orionis	2	μ Argus	3	ν Velorum	4.3
β Argus	2	δ Sagittarii	3	δ Aquarii	4.3
ζ Orionis	2	α Libræ	3	δ Aquilæ (N)	4.3
γ Argus	2	β Lupi	3	β Columbæ	4.3
ε Argus	2.3	α Columbæ	3	ζ Canis maj.	4.3
α Trianguli austr.	2.3	β Aquarii	3.4	γ Gruis	4.3
ε Sagittarii	2.3	α Aquarii	3.4	α Indi	4.3
θ Scorpii	2.3	λ Sagittarii	3.4	β Muscæ	4.3
α Hydræ	2.3	ι Centauri	3.4	μ^1 Scorpii	4.3
δ Canis maj.	2.3	ζ Ophiuchi	3.4	λ Centauri	4.3
α Pavonis (Var?)	2.3	δ Corvi	3.4	γ Tubi	4.3
β Gruis	2.3	δ Capricorni	3.4	γ Hydri	4.3
σ Sagittarii	2.3	β Eridani	3.4	ω Argus	4.3
δ Argus	2.3	θ Argus	3.4	ε Hydræ (N)	4.3
β Ceti	2.3	β Hydri (Var?)	3.4	θ Eridani	4.3
λ Argus	2.3	ε Corvi	3.4	ν Argus	4.3
θ Centauri	3.2	β Aræ	3.4	ξ Argus	4.3
β Canis maj.	3.2	α Toucani	3.4	σ^2 Canis maj.	4.3
κ Orionis	3.2	g Argus	3.4	π Hydræ	4.2
δ Orionis (Var.)	3.2	π Scorpii	3.4	β Tubi	4.3
γ Centauri	3.2	β Leporis (Var?)	3.4	τ Sagittarii	4.3
ε Scorpii	3.2	γ Lupi	3.4	ε Aquarii	4.3
ζ Argus	3.2	ν Scorpii	3.4	α Pictoris	4.3
α Phœnicis	3.2	ι Orionis	3.4	φ Sagittarii	4.3
ι Argus	3.2	α Aræ	3.4	α Circini	4.3
α Lupi	3.2	π Sagittarii	3.4	γ Ophiuchi (N)	4.3
α Ceti (N)	3.2	β Capricorni	3.4	σ Argus	4.3
ε Centauri	3.2	α Muscæ	3.4	α Doradus	4.3
η Canis maj.	3	α Hydri (Var?)	3.4	β Phœnicis	4.3
δ Scorpii	3	τ Scorpii	3.4	η Scorpii	4.3

Name.	Grösse.	Name.	Grösse.	Name.	Grösse.
γ Carinæ	4.3	μ Leporis	4	ϵ Gruis	4
γ Aræ	4.3	c Puppis	4	γ Scorpil	4
ξ^2 Sagittarii	4.3			ζ Leporis	4
ζ Aquarii	4.3	α Reticuli	4	μ Serpentis	4
δ Crateris	4	σ Canis maj.	4	o Argus	4
		η Orionis	4	β Toucani	4
ϵ Leporis	4	μ Centauri	4	γ Leporis	4
γ Capricorni	4	α^2 Capricorni	4	δ Pavonis	4
γ Phœnicis	4			ϵ Lupi	4
γ Aquarii	4	γ Eridani	4	ϵ Ophiuchi	4
ζ Virginis (N)	4	δ Lupi	4	ν Scorpil	4
γ Piscium (N)	4	ν Centauri	4	ϕ Eridani	4
δ Virginis (N)	4	β Pavonis	4	α Piscium (N)	4
p Carinæ	4	ϵ Gruis	4	γ Pavonis (Var?)	4

Anhang II.

Literaturangabe.

- Dr. E. Heis. Neuer Himmelsatlas. Köln 1872.
 J. J. v. Littrow. Atlas des gestirnten Himmels. Stuttgart 1866.
 Dr. Fr. Argelander. Neue Uranometrie. Berlin 1843.
- Fr. Argelander. Aufforderung an Freunde der Astronomie etc. Schumachers astron. Jahrbuch 1844.
- J. F. Schmidt. Das Zodiakallicht. Uebersicht der seitherigen Forschungen, nebst neuen Beobachtungen etc. Braunschweig 1856. Eine wichtige Ergänzung hierzu desselben Verfassers Aufsatz: Ueber den sog. Gegenschein des Zodiakallichtes. Astr. Nach. B. 72 p. 337.
- G. Jones. Observations of the Zodiacal Light from April 2 1853 to April 22 1855. U. S. Japan Expedition. Vol. III. Washington 1856.
- J. V. Schiaparelli. Entwurf einer astronomischen Theorie der Sternschnuppen. Deutsch herausgegeben von G. v. Boguslawski. Stettin 1871.
- M. Delaunay. Notice sur la constitution de l'Univers. Météores, Etoiles filantes. Annuaire du Bureau des Longitudes pour l'an 1870.
- Verzeichnisse von Radiationspunkten: Monthly Not. Roy. Ast. Soc. XXXII 345 (Greg); Publications de l'Observ. d'Athènes II, 1 (J. F. Schmidt); Astr. Nach. LXIX 157 (Heis).
- J. W. Herschel. Results of astronomical Observations at the Cape of Good Hope. London 1847.
- E. Schönfeld. Katalog von veränderlichen Sternen, mit Einschluss der neuen Sterne. Mannheimer Verein f. Naturkunde XXXII.
- J. F. Schmidt. Ueber die Dämmerung. Astr. Nach. B. 63 p. 97.
- E. Liais. Sur la hauteur de l'atmosphère déduite d'observations faites dans la Zone intertropicale etc. Compt. rend. B. 48 p. 109.
- H. Burkhart-Jetzler. Die Abendlichter an der östlichen Küste Süd-Amerikas. Pogg. Annalen. Bd. 145 p. 196, 337.
- Ch. Dufour. Instructions pour l'Observation de la scintillation des étoiles. Bull. de la Société Vaudoise des sciences, natur. No. 47. Lausanne 1860.
- G. Schweizer. Ueber das Sternschwanken. Moskau 1858.
- E. Loomis. The aurora borealis, or Polar Light. Its Phenomena and Laws. Smiths. Rep. 1865 p. 208. Ein sehr vollständiger Auszug daraus in desselben Verfassers: Treatise on Meteorology. New-York, 1868.
- H. Fritz. Das Polarlicht. Vierteljahrsh. d. naturforschenden Ges. in Zürich. 17. Jahrg. p. 338.
- L. A. Forssmann. Des relations de l'aurore boréale et des perturbations magnétiques avec les phénomènes météorologiques. Nova acta Regiæ Soc. Scient. Upsal. Seriei tertie VIII Fasc. II.

Anweisung zur Anstellung von Beobachtungen über Ebbe und Fluth und die Gezeitströmungen.

Von

C. A. F. Peters.

1. Die Benennungen Fluth und Ebbe bezeichnen die Erscheinungen des Steigens und Sinkens der Gewässer, insofern sie ursprünglich durch kosmische Einflüsse bewirkt werden. Fluth ist die Periode des Steigens, Ebbe diejenige des Sinkens. Beide Erscheinungen haben auch den gemeinschaftlichen Namen Gezeiten. Die höchsten im Laufe eines Tages eintretenden Wasserstände werden Hochwasser, die niedrigsten Niedrigwasser genannt. Die Himmelskörper, deren Anziehungen diese periodischen Phänomene hervorbringen, sind der Mond und die Sonne. Die Wirkungen der beiden Körper können hier getrennt in Betracht gezogen werden, indem die Höhenänderung der Wasserfläche, welche durch eins dieser Gestirne hervorgebracht wird, sich, dem bei Weitem wesentlichsten Theile nach, mit der durch das andere Gestirn hervorbrachten so verbindet, als wenn beide unabhängig von einander ihren Einfluss üben. Wenn die durch den Mond und die Sonne hervorbrachten Hochwasser zusammenfallen, so ist es Springfluth. Alsdann ist das Hochwasser am höchsten und das Niedrigwasser am niedrigsten. Fällt dagegen das von dem Gestirne, welches die grösste Einwirkung hat, ausgehende Hochwasser mit dem Niedrigwasser der Anziehung des andern Gestirns zusammen, so ist es Nippfluth oder Taubefluth. Bei diesen Gezeiten ist das Hochwasser am niedrigsten und das Niedrigwasser am höchsten. Betrachten wir nun zuvörderst die Einwirkung des Mondes. Ein Wassertheilchen, für welches der Mond sich im Zenith befindet, wird von ihm stärker angezogen, als der Mittelpunkt der Erde. Der Ueberschuss dieser beiden Kräfte und die Schwerkraft wirken daher auf das Wassertheilchen nach entgegengesetzten Richtungen. Einen halben Tag später ist das Wassertheilchen mit dem Monde in Opposition, und dieser zieht es alsdann schwächer an, wie den Mittelpunkt der Erde, so dass, wenn der angezogene Punkt sich unter dem Aequator befindet, der Unterschied beider Kräfte und die Schwerkraft wieder in entgegengesetzter Richtung wirken. Für Wassertheilchen, deren Vertikalen nicht mit den Richtungen zum Monde zusammenfallen, ist der Theil der Mondanziehung,

welcher längs einer Vertikale wirkt, sowohl von der Entfernung des Mondes von dem angezogenen Punkte, als auch von der Abweichung der Richtung der Mondanziehung von der Vertikale abhängig. In Folge dieser Verschiedenheit der Anziehungskräfte und der Ungleichheit ihrer Richtungen nimmt die Oberfläche des Wassers eine andere Gestalt an, als wenn die Anziehung des Mondes nicht vorhanden wäre, und diese Gestalt ändert sich wieder in Folge der Rotation der Erde, die an sich auch von Einfluss ist und die successive andere Punkte der Erdoberfläche in die Scheitellinie zum Monde bringt. Die hieraus hervorgehenden Phänomene der Ebbe und Fluth lassen sich in aller Strenge nicht theoretisch bestimmen, denn sie hängen nicht allein von den Anziehungen des Mondes und der Sonne und von der Rotation der Erde ab, sondern auch von der Ausdehnung der Continente und Inseln, der Configuration der Küsten, der Unregelmässigkeit des Meeresbodens, den Strömungen und der Richtung und Stärke der Winde. Es ist unmöglich, alle diese störenden Einflüsse der Rechnung zu unterwerfen. Man kann indess allgemeine Gesetze der Bewegung der Gewässer entwickeln, in welchen mehrere unbekannte Grössen vorkommen, die ihren Werth von einem Orte zum andern ändern, und die für jeden einzelnen Ort durch geeignete Beobachtungen sich ermitteln lassen.

2. Newton gab zuerst die wahren Ursachen der Erscheinungen von Ebbe und Fluth an, indem er sie auf sein Gesetz der allgemeinen Schwere bezog. Um die Erscheinungen in ihren Hauptzügen zu erklären, ging er von den Annahmen aus, dass das Meer die ganze Erde bedecke, dieselbe Dichtigkeit habe wie die Erde, und dass es in jedem Augenblicke die Gestalt annähme, bei welcher es, unter der Einwirkung von Mond und Sonne im Gleichgewicht sich befindet. Unter diesen Annahmen lieferte er den Nachweis, dass Fluthen von täglicher und halbtäglicher Periode entstehen, und dass die Höhen des Wassers zu den verschiedenen Gezeiten, sowie auch die Zeitintervalle zwischen ihrem Eintreffen und der vorangegangenen Culminationszeit des Mondes sich mit der Veränderung in der Stellung des Mondes gegen die Sonne verändern müssen. Auch konnte er nachweisen, in wie fern die Entfernungen des Mondes und der Sonne von der Erde, die Declinationen dieser Gestirne und die Polhöhe des Orts von Einfluss auf die Flutherscheinungen sind. Nach dieser Theorie müsste das grösste Hochwasser zu den Zeiten des Neu- und Vollmondes eintreffen. Allein schon zu Newton's Zeiten war es bekannt, dass die höchsten Fluthen an den europäischen Küsten zum Theil um $1\frac{1}{2}$ Tage nach den Syzygien eintreffen. Diese Verspätung, sowie auch den Umstand, dass die zu Plymouth und Bristol beobachteten Unterschiede zwischen den beiden im Laufe eines Tages eintretenden Höhen des Hochwassers viel geringer waren, als nach der aufgestellten Theorie, erklärte Newton aus der Oscillationsbewegung des Meeres, die noch einige Zeit fort dauere, wenn auch die Einwirkung der Gestirne aufhörte. Er machte ausserdem darauf aufmerksam, dass wenn Fluthwellen durch verschiedene Meerengen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten nach einem Hafen gelangen, auch dadurch mancherlei Veränderungen in den Flutherscheinungen entstehen können. Er zeigte, dass durch solches Zusammentreffen zweier Wellen die Flutherscheinungen von halbtäglicher Periode ganz verschwinden können, und nur diejenigen von täglicher Periode nachbleiben.

Da Newton die Theorie der Flutherscheinungen unter der Annahme entworfen hatte, dass die ganze Erde mit Wasser bedeckt sei, so gab er noch eine allgemein gehaltene Darstellung, wie die Flutherscheinungen auch

noch von der Grösse der Meere, der Configuration der Continente und der Lage des Orts gegen die Küsten abhängig sind.

3. In Folge einer von der Akademie der Wissenschaften in Paris im Jahre 1738 gestellten Preisaufgabe wurde das Problem der Flutherscheinungen, ein halbes Jahrhundert nach Newton's erstem Entwurf, von Daniel Bernoulli, Leonhard Euler und Mac Laurin aufs Neue behandelt. Diese erweiterten die Newton'sche Theorie, und insbesondere bestimmte Bernoulli durch allgemeine und elegante Formeln alle Umstände, wie sie aus der Newton'schen Theorie hervorgehen. Diese grossen Geometer hatten jedoch sämmtlich ihren Untersuchungen die bereits erwähnte Hypothese zu Grunde gelegt, dass das Meer in jedem Augenblick die Form annimmt, bei welcher es unter der Einwirkung des anziehenden Gestirns im Gleichgewicht sein würde.

4. Laplace entwickelte zuerst die Theorie der Bewegungen der Gewässer, welche die Erde bedecken, unter Berücksichtigung der Bewegungen der anziehenden Gestirne und der Rotationsbewegung der Erde. Aus dieser Theorie konnte er, wenn auch noch die Form des Meeresbodens und andere Localverhältnisse in Betracht gezogen wurden, den geringen Betrag der Fluthen von täglicher Periode in den europäischen Gewässern erklären. Er untersuchte auch nach seiner Theorie, welchen Einfluss die Oscillationsbewegungen des Meeres, wenn dieselben noch nach dem Aufhören der Einwirkungen der Sonne und des Mondes fort dauern würden, auf die Zeiten des Eintreffens der höchsten Hochwasser haben könne, und fand, dass ohne Hinzutreten von Nebeneinwirkungen die höchsten Hochwasser um die Zeiten des Neu- und Vollmondes, und die niedrigsten Hochwasser um die Zeiten der Quadraturen eintreffen müssen, so dass also die Verspätungen dieser Gezeiten nach den Mondphasen nicht der Ursache zugeschrieben werden können, welche Newton angegeben hat. Er hielt diese Verspätungen für Folgen der auf der Erde vorkommenden Localverhältnisse. Young und Airy haben später nachgewiesen, dass sie sich durch Reibung erklären lassen.

5. Aus den theoretischen Untersuchungen von Laplace geht hervor, dass hauptsächlich vier verschiedene periodische Höhenänderungen des Wassers in Betracht kommen. Jede derselben besteht aus zwei Theilen, von denen der eine aus der Anziehung des Mondes, der andere aus der Anziehung der Sonne hervorgeht. Der wesentlichste Theil der Anziehungskraft eines jeden der genannten Himmelskörper, in so weit sie für die Fluthbewegungen in Betracht kommt, ist der Masse des anziehenden Körpers direct und dem Kubus seiner Entfernung von dem angezogenen Wassertheilchen umgekehrt proportional. Je grösser die Ausdehnung eines Meeres ist, um so grösser ist die Verschiedenheit in der Stärke und den Richtungen der Anziehungskraft des Gestirns, und um so merklicher werden die Erscheinungen der Fluth und Ebbe sein. Im Allgemeinen sind in der Mitte grosser Wasserflächen die Fluthbewegungen am kleinsten. An den Küsten können durch locale Verhältnisse die Höhenunterschiede beträchtlich grösser werden. Insbesondere steigen in einer Meerenge und einer Meeresbucht die Fluthhöhen oftmals zu einer ausserordentlichen Höhe, theils in Folge der Verengung des Kanals, durch welchen sich das Wasser bewegt, theils auch durch das Zurückfliessen des Wassers von der gegenüberliegenden Küste.

6. Von den erwähnten vier verschiedenen periodischen Höhenänderungen des Wassers sind die der ersten Gattung von einer langen Periode, die für die Einwirkung des Mondes einen halben Monat und für diejenige der Sonne ein halbes Jahr umfasst. Diese Höhenänderungen sind unabhängig von der

Rotation der Erde und hängen nur von den Bewegungen der anziehenden Körper in ihren Bahnen ab. Die grösste durch diese Gattung hervorgebrachte Höhenänderung des Wassers beträgt an den Küsten meistens nur wenige Zolle.

7. Die Oscillationen der zweiten Gattung haben eine Periode von nahezu einem Tage. Sie sind dem Sinus der doppelten Declination des anziehenden Gestirns und dem Cosinus des Unterschiedes zwischen dem Stundenwinkel und einem für den Beobachtungsort unveränderlichen Winkel proportional. Die Höhenänderungen dieser Gattung verschwinden also zu den Zeiten der Aequinoctien und wenn die Declination des Mondes $= 0$ ist, und sie erreichen ihre grössten positiven und negativen Werthe zu den Zeiten der Solstitien und der grössten Declinationen des Mondes. Der grösste Betrag für die Höhe des Wassers beträgt an den Küsten von Europa selten mehr als 2 Decimeter.

8. Die Oscillationen der dritten Gattung haben eine Periode von nahezu einem halben Tage. Sie sind dem Quadrate des Cosinus des anziehenden Gestirns und dem Cosinus der doppelten Differenz zwischen dem Stundenwinkel und einem für den Beobachtungsort constanten Winkel proportional.

9. Die Glieder der vierten Gattung sind der vierten Potenz der Entfernung des Mondes von der Erde umgekehrt proportional. Eins derselben hat eine Periode von nahezu 8 Stunden. Ihr grösster Betrag erreicht an allen Orten, für welche derselbe mit Sicherheit hat bestimmt werden können, nur wenige Zolle. Die entsprechenden von der Anziehung der Sonne abhängigen Glieder sind so klein, dass sie nicht in Betracht kommen.

10. Es sei für die Sonne: M die Masse dividirt durch den Kubus der mittleren Entfernung der Erde von der Sonne, δ die Declination, Θ der Stundenwinkel, r die Entfernung von der Erde, ρ die mittlere Entfernung von der Erde. Für den Mond seien die entsprechenden Grössen mit einem Accent bezeichnet, dann sind die hauptsächlichsten Glieder, welche nach Laplace's Theorie, die Höhe h der Oberfläche des Wassers über einem gegen die Erdoberfläche als invariabel anzusehenden Punkt ausdrücken:

$$\begin{aligned}
 h = & A + B \left[\frac{\rho^3}{r^3} (1 - 3 \sin \delta^2) + \frac{M' \mu'}{M} \cdot \frac{\rho'^3}{r'^3} (1 - 3 \sin \delta'^2) \right] \\
 & + C \left[\frac{\rho^3}{r^3} \sin \delta \cos \delta \cos (\Theta - \gamma) + \frac{M' \mu'}{M} \cdot \frac{\rho'^3}{r'^3} \sin \delta' \cos \delta' \cos (\Theta' - \gamma') \right] \\
 & + D \left[\frac{\rho^3}{r^3} \cos \delta^2 \cos (2\Theta - 2\lambda) + \frac{M' \mu'}{M} \cdot \frac{\rho'^3}{r'^3} \cos \delta'^2 \cos (2\Theta' - 2\lambda') \right] \\
 & + E \frac{\rho'^4}{r'^4} \cos \delta'^3 \cos (3\Theta' - 3\lambda') + F \frac{\rho'^4}{r'^4} \sin \delta' \cos \delta'^2 \cos (2\Theta' - 2\lambda').
 \end{aligned}$$

Dieses ist die genäherte Form des Ausdrucks für die Höhe der Wasserfläche, wenn die Beobachtungsstation im offenen Meere belegen ist. Für Stationen, an welchen eine regelmässige Strömung des Wassers stattfindet, wie in den Flüssen, sind noch Glieder hinzuzufügen, welche unter dem Cosinus-Zeichen die vier-, sechsfachen etc. Werthe von Θ und Θ' enthalten. Die geraden Vielfachen dieser Winkel können nur zur Anwendung kommen, wenn der Verlauf der Flutherscheinungen von der oberen Culmination des Mondes zu der unteren, bei im Uebrigen gleichen Umständen, derselbe ist, wie von der unteren Culmination zu der oberen. An einigen Orten, wie zu

Bassadore im persischen Meerbusen, finden sich Ungleichheiten in den Zeiten und Höhen der Hochwasser, die sich nicht durch Oscillationen von täglicher Periode neben solchen von halbtäglicher Periode erklären lassen. In diesen Fällen sind in dem Ausdrücke für h noch Glieder zu berücksichtigen, welche die 3fachen oder höheren ungeraden Vielfachen von Θ und Θ' unter den Cosinus-Zeichen enthalten. Ein Theil dieser Glieder würde sich mit dem in E multiplicirten vereinigen.

11. In dem für h gegebenen Ausdruck ist die Grösse A , die mittlere Höhe des Wassers, von der Höhe des Nullpunktes des Pegels abhängig, an welchem die Wasserhöhen gemessen werden. Die Werthe der Grössen $B, C, D, E, F, \gamma, \gamma', \lambda, \lambda', \kappa', \nu', \mu'$ sind für jeden Beobachtungsort aus geeigneten Beobachtungen abzuleiten. μ' bezeichnet hier einen Factor, mit welchem die Einwirkung des Mondes, der Local-Verhältnisse wegen, zu multipliciren ist. Wenn die Wasserhöhe für irgend eine Zeit t nach der Formel (§ 10) zu bestimmen ist, so sind die Deklinationen und Stundenwinkel der Gestirne nicht für diejenigen Oerter dieser Gestirne zu nehmen, welche zur Zeit t stattfinden, sondern für solche, die in dem mit C multiplicirten Ausdruck für eine Zeit $t - T_1$ und in dem mit D multiplicirten für eine Zeit $t - T_2$, in beiden Ausdrücken für eine frühere Zeit, als t gelten. Die Werthe der Grössen T_1 und T_2 sind gleichfalls durch Beobachtungen zu ermitteln. Unter Berücksichtigung der Verzögerungen T_1 und T_2 der Fluthwellen wird es in den meisten Fällen gestattet sein, $\gamma = \gamma'$ und $\lambda = \lambda'$ zu setzen. Die Werthe von $B, C, D, E, F, T_1, T_2, \gamma, \lambda$ ändern sich von einem Orte der Erdoberfläche zum andern. Für jeden Ort sind diese Grössen jedoch, soweit die Einwirkungen von Sonne und Mond in Betracht kommen, konstant.

12. Laplace hat die Formel für h noch in eine Form gebracht, in welcher anstatt der Declinationen und der in den Ausdrücken für die Stundenwinkel enthaltenen Rectascensionen von Sonne und Mond, nur die mittleren Entfernungen dieser Gestirne von der Erde, die mittleren Rectascensionen derselben unter Berücksichtigung der Ungleichheiten der Bewegungen und die für diese Substitutionen erforderlichen Bahnelemente vorkommen. Auf diese Weise kann man für die Höhe h des Wassers einen Ausdruck erhalten, der ausser der Constante der mittleren Höhe nur solche Glieder enthält, in welchen die Sinusse und Cosinusse von Vielfachen verschiedener der Zeit proportionaler Winkel constante Coefficienten haben. Die periodischen Glieder können dann sämmtlich in solche von der Form $R \cos (mt - \varepsilon)$ gebracht werden, worin R und ε für denselben Ort unveränderliche oder doch nur sehr langsam sich verändernde Werthe haben. Die Grösse R eines solchen periodischen Gliedes wird dessen Amplitude und die Grösse ε die Epoche desselben genannt. Der Ausdruck für h ist in dieser Form weniger übersichtlich, als in der § 10 gegebenen, hat aber den Vorzug, dass man die wahrscheinlichsten Werthe der Constanten, welche für den allgemeinen Ausdruck von h zu bestimmen sind, aus einer grossen Anzahl von Beobachtungen, bei Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate, durch eine viel einfachere Rechnung erhalten kann, als wenn die vorhin gegebene Form zu Grunde gelegt wird.

13. Die in B multiplicirten, von den Declinationen der Gestirne abhängigen Glieder werden die halbjährlichen Sonnen-Declinations-Ungleichheiten und die halbmonatlichen Mond-Declinations-Ungleichheiten genannt. Um den von der Sonne abhängigen Theil von dem Theile, der von dem Monde abhängt mit Sicherheit trennen und frei von meteorologischen und anderen periodischen Local-Einwirkungen erhalten zu können,

ist es erforderlich, dass die Beobachtungen, welche auch zur Bestimmung der in *C*, *D*, *E* und *F* multiplicirten Glieder dienen, ein ganzes Jahr hindurch fortgesetzt werden.

14. In dem Gliede, welches die Höhe der Gezeit von täglicher Periode darstellt, lässt sich der von der Sonne abhängige Theil nur dann von dem Theile, der aus der Anziehung des Mondes hervorgeht, mit Sicherheit trennen, wenn die Beobachtungsreihe zum wenigsten einen solchen Zeitraum umfasst, dass Messungen, welche zu den Zeiten eines Aequinoctiums und eines Solstitiums angestellt sind, darin vorkommen. Es sind dann aus den Beobachtungen vier Grössen zu bestimmen: der Coefficient *C*, das Intervall T_1 zwischen der Zeit der Beobachtung und dem vorhergehenden Zeitmoment, für welches die Oerter des Mondes und der Sonne zu nehmen sind, γ (wenn man $\gamma' = \gamma$ setzt) und μ' .

Die Oscillationen von täglicher Periode würden, nach Laplace's Untersuchungen, Null sein, wenn das Wasser die ganze Erdoberfläche bedeckte und überall dieselbe Tiefe hätte. Der in der Wirklichkeit vorkommende Betrag hängt demnach nur von der Ausdehnung und Form der Continente und Inseln und von den Ungleichheiten des Meeresbodens ab. Es lässt sich dagegen keine Form des Meeresbodens angeben, welche die Oscillationen von halbtäglicher Periode für die ganze Erde könnte zum Verschwinden bringen.

15. Die Grössen, welche man für die Gleichung der Gezeithöhen der dritten Gattung, oder von halbtäglicher Periode, aus Beobachtungen abzuleiten hat, sind folgende: das Intervall T_2 zwischen der Zeit der Beobachtung und des vorangehenden Zeitmoments, für welches die Oerter des Mondes und der Sonne zu nehmen sind, und die Werthe der Grössen *D*, λ und μ' (wenn $\lambda = \lambda'$ genommen wird); im Ganzen also für jeden Beobachtungsort vier Grössen.

16. Um die mittlere Höhe des Wassers, die Grösse *A* (§ 10) frei von den meteorologischen Einwirkungen, deren Periode ein Jahr beträgt, zu erhalten, ist es nöthig, dass die Fluthbeobachtungen ein oder mehrere volle Jahre umfassen. Auf solche Weise wird auch die Sonnen-Gezeit von halbjährlicher Periode, die Grösse $B \cdot \frac{Q^3}{\gamma^3} (1 - 3 \sin \delta^2)$ (§ 10) für die Bestimmung von *A* eliminirt.

17. Wenn für die Flutherscheinungen nur die kosmischen Einwirkungen berücksichtigt werden, so ist die in der Formel für *h* mit μ' bezeichnete Grösse = 1. Laplace hat zuerst Untersuchungen darüber angestellt, ob die Werthe für μ' von der Einheit verschieden sein können. Er benutzte dazu anfänglich die zu Brest im Laufe von sechs Jahren, von 1711 bis 1716, jeden Tag angestellten Fluthbeobachtungen. Aus der Vergleichung der Fluthhöhen zu den Zeiten der Aequinoctial-Syzygien mit denen der Solstitial-

Syzygien folgte: $\frac{M' \mu'}{M} = 2,89841$, und indem er die Hypothese aufstellte,

dass $\mu' - 1$ und $\lambda' - \lambda$ dem Unterschiede der Bewegungen von Sonne und Mond in Rectascension proportional seien, erhielt er $\mu' = 1,10637$. Aus den Beobachtungen der Fluthhöhen zu den Zeiten der Quadraturen wurde gefunden $\mu' = 1,1061$, sehr nahe mit dem vorhergehenden Werthe übereinstimmend. Laplace bemerkte zu diesem Resultate, die Schnelligkeit der Bewegung des Mondes in seiner Bahn scheine zu Brest die Wirkung des Mondes, das Meerwasser zu heben, um nahezu den zehnten Theil zu vergrössern, wie es die Zeit der Springfluth um einen und einen halben Tag

verzögere, fügte jedoch hinzu, dieses schwierig zu bestimmende Element könne nur aus einer noch grösseren Anzahl von Beobachtungen mit Sicherheit ermittelt werden. Eine Vergleichung der Beobachtungen des Hochwassers, welche in dem genannten Zeitraume zu Brest in der Nähe der Zeiten angestellt worden, wenn der Mond in der Erdnähe und der Erdferne gewesen, gab in der That noch keine Bestätigung der soeben mitgetheilten Werthe für μ' , vielmehr folgte aus diesen Beobachtungen $\mu = 1 - 0,03425$. Die Abweichung von der Einheit ist also hier unmerklich und in entgegengesetztem Sinne, wie bei den vorhergehenden Werthen.

Später fand Bouvard, auf Laplace's Veranlassung, aus Fluthbeobachtungen, welche in den Jahren 1807 bis 1822 gleichfalls in Brest angestellt sind,

$$\frac{M'}{M} = 2,35333, \mu' = 1,25291, \frac{M'\mu'}{M} = 2,9485, \frac{M}{M'\mu'} = 0,34.$$

18. Für die meisten Orte, an welchen Fluthbeobachtungen angestellt worden sind, haben sich für das Verhältniss der Wirkungen der Sonne und des Mondes Werthe ergeben, welche von denjenigen, die Bouvard für Brest gefunden hat, nicht erheblich abweichen. Aus Beobachtungen, welche mit grosser Sorgfalt in der Zeit vom 22. Juni bis zum 22. August 1842 an 21 verschiedenen Punkten der Küsten von Irland angestellt worden sind, hat

Airy für die Grösse $\frac{M}{M'\mu'}$ Werthe gefunden, welche zwischen 0,33 und 0,48 liegen. An einzelnen Orten gelten für dieses Verhältniss jedoch Werthe, die von den genannten erheblich abweichen. In O Taiti ist, nach Beobachtungen, welche Kapitain Belcher im Jahre 1840 angestellt hat, die Sonnenfluth nahezu eben so hoch wie die Mondfluth, also $\frac{M'\mu'}{M}$ nahe = 1, und

für Courtown an der Irländischen Küste hat Airy die Grösse $\frac{M'\mu'}{M}$ noch kleiner als Eins gefunden.

19. Das Zeitintervall T_2 von der Syzygie bis zur Springfluth der Gezeiten von halbtäglicher Periode beträgt nach der verschiedenen Lage der Häfen einen bis drei Tage. Dieses Zeitintervall wird die Verzögerung oder auch das Alter der Gezeit genannt. Letztere Benennung beruht auf der Voraussetzung, dass Neu- und Vollmond die höchsten Hochwasser hervorbringen.

Man ersieht aus der Formel für h , dass sowohl in Folge der Ungleichheiten von täglicher, als auch derjenigen von halbtäglicher Periode die Höhen von Hoch- und Niedrigwasser von den Phasen des Mondes abhängig sind. Betrachtet man nur die halbtäglichen Ungleichheiten, so ist die Höhe am grössten, wenn die Cosinusse der in C multiplicirten Glieder = 1 sind, also wenn $\Theta - \lambda = 0$ oder $= 180^\circ$ und $\Theta' - \lambda'$ auch $= 0$ oder $= 180^\circ$ ist. Alsdann ist die Summe jener Glieder

$$= C \left(\frac{\varrho^3}{r^3} \cos \delta^2 + \frac{M'\mu'}{M} \cdot \frac{\varrho'^3}{r'^3} \cos \delta'^2 \right).$$

Das tiefste Niedrigwasser tritt etwa sechs Stunden früher oder später ein, wenn $\Theta - \lambda$ und $\Theta' - \lambda'$ die Werthe 90° oder 270° haben. Die Höhe des Hochwassers ist am kleinsten, wenn der Cosinus, der den grössten Coefficienten hat, $= 1$, und der andere Cosinus $= -1$ ist. Im Allgemeinen ist, wie erwähnt, die Einwirkung des Mondes grösser als die der Sonne, also

$\frac{M' \mu'}{M} > 1$; alsdann ist also das niedrigste Hochwasser, wenn $\Theta' - \lambda' = 0$ oder $= 180^\circ$, und $\Theta - \lambda = 90^\circ$ oder $= 270^\circ$ ist. Die Nippfluth tritt also zu einer Tageszeit ein, die nahezu um sechs Stunden von der Zeit der Springfluth verschieden ist. In den sehr seltenen Fällen, wo $\frac{M' \mu'}{M} < 1$ ist, findet das niedrigste Hochwasser statt, wenn $\cos 2(\Theta - \lambda) = 1$ und $\cos 2(\Theta' - \lambda') = -1$, also zu derselben Tageszeit wie die Springfluth. In beiden Fällen ist das Niedrigwasser am höchsten, und zwar etwa sechs Stunden vor und nach der Nippfluth.

Bei Berücksichtigung der Ungleichheiten von halbtäglicher Periode wird die Höhe des Hochwassers, von der Springfluth an, mit jedem folgenden Tage kleiner, bis zur Nippfluth; von dieser an wächst sie wieder bis zur nächstfolgenden Springfluth. Diese Veränderungen des Hochwassers und die entsprechenden des Niedrigwassers werden, weil sie eine Periode von nahezu einem halben Monat haben, zuweilen die halbmonatlichen Ungleichheiten des Hoch- und Niedrigwassers genannt.

20. Meistens sind die Fluthhöhen von halbtäglicher Periode die beträchtlichsten. Indess können die Localverhältnisse, welche an einigen Orten eine ausserordentlich grosse Höhe dieser Fluthen verursachen, an anderen Orten dieselben beinahe zum Verschwinden bringen. Dieses ist, wie Newton schon hervorgehoben hat, insbesondere dann der Fall, wenn an einem Orte zwei Fluthwellen, von verschiedenen Richtungen kommend, zusammentreffen, und das Hochwasser der einen Welle mit dem Niedrigwasser der anderen zusammenfällt. Die an einigen Orten von der Tageszeit abhängige Richtung und Stärke des Windes können auch einen so bedeutenden Einfluss auf das Steigen und Fallen des Wassers haben, dass dagegen die kosmischen Einflüsse als unerheblich erscheinen. Aus diesen und auch aus anderen Ursachen, die von der Tiefe und Form des Meeresbodens und Localverhältnissen abhängen, sind an einigen Orten die Fluthen von täglicher Periode beträchtlich im Verhältniss zu denen von halbtäglicher Periode, wie zu Bombay, Kurachee, auf der Cat-Insel im Meerbusen von Mexico, zu Fort Point in der San Francisco Bay in Californien.

21. Laplace suchte die Werthe der Grössen E , F , α' (§ 10) aus den Fluthbeobachtungen abzuleiten, welche in den Jahren 1807 bis 1822 in Brest angestellt sind. Um die Grössen E und α' zu bestimmen, bildete er die Summe der Höhen der Morgen-Hochwasser über die der Abend-Hochwasser für die Tage der Aequinoctial-Neumonde, -Vollmonde, der ersten und letzten Viertel des Mondes und für drei auf diese Mondphasen folgenden Tage. Aus der Vergleichung dieser vier Summen ergab sich $E = -0,117$ Meter. Laplace hält jedoch diese Bestimmung, ungeachtet der grossen Anzahl der benutzten Beobachtungen, noch für sehr unsicher.

Für die Ermittlung der Grösse F verglich er die Höhen der Hochwasser über die der Niedrigwasser, welche zu den Zeiten der Solstitial-Syzygien bei nördlicher Declination des Mondes angestellt sind, mit solchen, bei denen die Declination südlich war. Dieselbe Rechnung führte er auch bezüglich der Aequinoctial-Quadraturen aus. Aus den Solstitial-Syzygien folgte $F = -0,076$ Meter, aus den Aequinoctial-Quadraturen F gleichfalls $= -0,076$ Meter. Die Uebereinstimmung dieser beiden Werthe liess es Laplace, ungeachtet des kleinen Betrages, nicht zweifelhaft erscheinen, dass die Einwirkung des Mondes auf den Ocean bei südlichen Declinationen grösser ist als bei nördlichen.

Thomson und Roberts haben später noch Werthe von E aus Fluthbeobachtungen abgeleitet, welche in verschiedenen anderen Häfen angestellt sind. Es wurde E gefunden für Ramsgate = 0,04, für Liverpool = 0,09, für Bombay = 0,08, für Kurrachee = 0,10, für Fort Point = 0,00 engl. Fuss.

22. Wenn die Werthe der in der Formel für h (§ 10) enthaltenen Constanten ermittelt sind, so lassen sich nach derselben auch die Zeiten bestimmen, wenn Hoch- und Niedrigwasser eintreffen. Nennt man die wahre Sonnenzeit des Hochwassers = t , die scheinbare Bewegung der Sonne in der Einheit von t , = n , die Rectascension der Sonne = ψ , die des Mondes = ψ' , und behält man im Uebrigen die Bezeichnungen von § 10 bei, so erhält man für die europäischen Gewässer, in welchen vorzugsweise nur die Ungleichheiten von halbtäglicher Periode in Betracht kommen, die Zeit des Hochwassers durch die Formel:

$$\operatorname{tg} 2(n t + \psi - \psi' - \lambda) = \operatorname{tg} 2x = \frac{-\frac{\varrho^3}{r^3} \cos \delta^2 \sin 2(\psi' - \psi)}{\frac{M' \mu'}{M} \cdot \frac{\varrho'^3}{r'^3} \cos \delta'^2 + \frac{\varrho^3}{r^3} \cos \delta^2 \cos 2(\psi' - \psi)}$$

Man kann auch setzen $\frac{\varrho}{r} = \frac{R}{16' 2''}$, $\frac{\varrho'}{r'} = \frac{R'}{15' 34''}$, wenn R und R' die scheinbaren Halbmesser der Sonne und des Mondes bezeichnen. Nennt man noch, um abzukürzen,

$$\frac{M}{M' \mu'} \cdot \left(\frac{15' 34''}{16' 2''} \right)^3 \cdot \frac{R^3 \cos \delta^2}{R'^3 \cos \delta'^2} = k,$$

so wird

$$\operatorname{tg} 2x = \frac{-k \sin 2(\psi' - \psi)}{1 + k \cos 2(\psi' - \psi)}.$$

Die Werthe von δ , δ' und $\psi' - \psi$ gehören einer Zeit an, die um den Betrag T_2 der Verspätung der Fluthen dem Zeitpunkte, für welchen gerechnet wird, vorausgeht. Die Grösse λ (in Zeit ausgedrückt), die Zeit des Hochwassers, welches um das Intervall T_2 auf die Syzygie folgt, wird von Laplace die Fundamentalzeit des Hafens genannt. Die damit nicht zu verwechselnde Hafenzeit ist die Zeit des Hochwassers zu den Zeiten der Syzygien. Das Zeitintervall, um welches das Hochwasser auf die Culmination des Mondes folgt, nennt Whewell das Mondfluth-Intervall, und den mittleren, durchschnittlichen Betrag der letzteren Grösse das mittlere Mondfluth-Intervall oder die mittlere Hafenzeit. Bezeichnet man diese mittlere Hafenzeit mit L , den Unterschied der mittleren scheinbaren Bewegungen des Mondes und der Sonne, in der Einheit von T_2 , mit m' , die wahre Zeit der Culmination des Mondes mit c , so ist genähert:

$$\begin{aligned} L &= \lambda - T_2 m', \\ t &= c + L + x. \end{aligned}$$

Um ein Beispiel zu der Formel für x zu geben, sei $\varrho = r$, $\varrho' = r'$, $\delta = \delta'$, $\frac{M' \mu'}{M} = 2,64$, die Verspätung der Fluthen, $T_2 = 1\frac{1}{4}$ Tag, die mittlere Hafenzeit $L = 2^h 11^m$, die Culminationszeit des Mondes = $4^h 3^m$, so hat man in der Formel für x , $\psi' - \psi$ für eine Zeit zu nehmen, die um $1\frac{1}{4}$ Tag früher ist als $4^h 3^m$. Nun ändert sich der Unterschied der Rectas-

censionen von Sonne und Mond, oder die Grösse $\psi' - \psi$, in 24 Stunden um $50^m,5$, also in $1\frac{1}{4}$ Tag um nahezu $1^h 3^m$; es ist daher für $\psi' - \psi$ der Werth 3^h oder 45^0 zu nehmen. Damit erhält man aus der Formel für $\operatorname{tg} 2x$, $x = -41^m$, und $L + x$, oder das Mondfluth-Intervall $= 1^h 30^m$, dieses zu $4^h 3^m$ der Culminationszeit des Mondes addirt, giebt $5^h 33^m$ für die Zeit des Hochwassers. Diese Rechnung ist jedoch nur eine erste Annäherung. Für eine genauere Ermittlung müsste der Werth von $\psi' - \psi$ nicht, wie es hier geschehen ist, für die Culminationszeit des Mondes, sondern für die Zeit des Hochwassers genommen werden.

Die Zeit t des Hochwassers lässt sich auch aus folgenden Formeln berechnen:

$$\operatorname{tg} y = \frac{1 - k}{1 + k} \quad \operatorname{tg} (\psi' - \psi) = \frac{k' - 1}{k' + 1} \quad \operatorname{tg} (\psi' - \psi),$$

$$t = \frac{1}{2} [y \text{ (in Zeit)} + c + L + \lambda], \text{ wenn } k' = \frac{1}{k}.$$

Diese sind jedoch nur dann bequem, wenn man die Weidenbach'sche Tafel zur Hand hat, aus welcher man für $\log k'$ direkt $\log \frac{k' + 1}{k' - 1}$ entnehmen kann.

Wenn man es nicht vorzieht, die Vorausberechnung der Flutherscheinungen nach den mittleren Oertern des Mondes und der Sonne zu führen, so lässt sich die Berechnung von x nach der vorhin gegebenen Formel noch sehr vereinfachen durch Hülftafeln, die jedoch für jeden Werth von $\frac{M'\mu'}{M}$ besonders zu entwerfen sind.

Für Häfen, in welchen die Oscillationen des Meeres von täglicher Periode einen merklichen Betrag haben, sind auch diese bei den Bestimmungen der Zeiten von Hoch- und Niedrigwasser zu berücksichtigen.

23. Zu Brest und auch in einigen anderen Häfen sind viele Jahre hindurch, zum Theil zu wiederholten Malen, an jedem Tage alle Zeiten des Hoch- und Niedrigwassers und die zu diesen Zeiten stattgefundenen Höhen des Wassers beobachtet worden. Aus solchen Beobachtungsreihen, vornehmlich wenn sie die ganze Dauer eines Umlaufs der Mondbahn-Knoten umfassen, lassen sich alle in der Formel für die Höhe des Wassers enthaltenen unbekannten Grössen mit Sicherheit bestimmen. Beobachtungen der Hochwasser allein, wie man sie in England früher auf einigen Stationen angestellt hat, führen zu einer weniger sicheren Bestimmung dieser Grössen schon deshalb, weil die durch Winde entstehenden Störungen, wenn diese nicht eine tägliche Periode haben, die Höhen der benachbarten Hoch- und Niedrigwasser nahezu in gleicher Weise beeinflussen, so dass die Unterschiede zwischen diesen Höhen viel weniger dadurch verändert werden, als die Höhen der Hochwasser allein.

24. Wenn die Beobachtungen nur zu den Zeiten des Hoch- und Niedrigwassers angestellt werden, so ist es erforderlich, von 15 bis 30 Minuten vor dem Eintreten der Gezeit bis 15 oder 30 Minuten nachher die Höhen etwa von 5 zu 5 oder von 10 zu 10 Minuten zu beobachten. Man erhält aus diesen Beobachtungen die Zeit des Eintretens der Gezeit viel sicherer, als wenn man einfach nur den Augenblick des höchsten oder des niedrigsten Wassers abwarten wollte. Wenn es beabsichtigt wird, aus den

Beobachtungen das Maximum oder Minimum der Höhe durch Rechnung zu bestimmen, so ist es für die Vereinfachung der letzteren vortheilhaft, von 8 zu 8 oder von 4 zu 4 Minuten zu beobachten. Indem man alsdann die 1., 2., . . . Differenzen gebildet hat, interpolirt man so lange in die Mitte, bis man die Zeitintervalle von Minute zu Minute und daneben die entsprechenden Höhen erhält. Hieraus ergibt sich das gesuchte Zeitmoment ohne weitere Rechnung, da man es wohl nie genauer als bis auf eine Minute erhalten wird. Bei starken Wellenbewegungen können die Höhenänderungen so unregelmässig werden, dass es für die Ermittlung der Zeiten und Höhen der Maxima und Minima besser ist, ein graphisches Verfahren anzuwenden. Man trägt alsdann längs einer geraden Linie und nach einem angemessenen Maassstabe die Zeiten als Abscissen und die entsprechenden Wasserhöhen senkrecht dagegen als Ordinaten auf. Darauf bildet man eine Curve, welche, die Ungleichmässigkeiten der Höhen ausgleichend, sich den Endpunkten der Ordinaten, dem Augenmaasse nach, am besten anschliesst. Aus solcher Curve wird man die Zeiten und Höhen der grössten oder kleinsten Wasserstände oftmals insofern genauer, als durch das vorhin angegebene Rechnungsverfahren erhalten, weil durch die Curve die aus den Wellenbewegungen hervorgehenden Fehler der Messungen etwas ausgeglichen werden. Für die Entwerfung solcher Curven ist liniirtes Papier sehr bequem, welches in zwei auf einander senkrechten Richtungen mit Linien überzogen ist, deren Durchschnitte Quadrate bilden, von denen die kleinsten Seiten etwa einen Millimeter betragen.

25. Bevor das soeben erörterte Beobachtungsverfahren, welches darin besteht, dass nur die Zeiten und Höhen von Hoch- und Niedrigwasser observirt werden, zur Anwendung gebracht wird, ist es erforderlich, zu Anfange der Beobachtungsreihe an einem Orte, wo früher noch keine Fluthbeobachtungen angestellt sind, die Messungen den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch alle viertel- oder halbe Stunde anzustellen. Zeigt sich alsdann, dass das Steigen und Fallen des Wassers von den gewöhnlichen Gesetzen stark abweichend ist, so kann es nothwendig werden, das soeben angegebene Beobachtungsverfahren aufzugeben und dafür ein den Umständen mehr entsprechendes zu wählen.

26. Das Beobachtungsverfahren, die Messungen der Wasserhöhen zu den Zeiten von Hoch- und Niedrigwasser anzustellen, gewährt, wenn die Beobachtungen so lange fortgesetzt werden, als für eine sichere Anwendung dieses Verfahrens erforderlich ist, den Vortheil, dass es die für praktische Zwecke wichtigsten Elemente der Flutherscheinungen, die Zeiten und Höhen des Hoch- und Niedrigwassers, durch beinahe directe Beobachtungen ergibt. Die Entwicklung einer allgemeinen Formel für die Wasserhöhen wird jedoch viel einfacher und man geht auch sicherer, dass kein Glied der Formel unberücksichtigt bleibt, dessen Periode aus meteorologischen oder anderen Ursachen von den Gesetzen abweicht, welche bei europäischen Fluthen vorkommen, wenn die Wasserhöhen, nach dem Vorschlage von William Thomson (Report of the thirty-eight Meeting of the British Association. 1868) in gleichen Zeitintervallen, etwa von Stunde zu Stunde, Tag und Nacht hindurch beobachtet werden. Solche von Stunde zu Stunde ausgeführte Messungen reichen noch aus, wenn die Beobachtungen auch nur ein Jahr hindurch angestellt werden. Umfassen die Beobachtungen jedoch nur den Zeitraum von wenigen Monaten, so ist es nöthig, in so kleinen Zeitintervallen zu observiren, dass sich für jeden Tag eine Fluthcurve entwerfen lässt.

27. Für die Fluthbeobachtungen, welche im Jahre 1842 während zweier

Monate an verschiedenen Punkten der Küste von Irland angestellt sind, wurden die Beobachtungen in folgender Weise von Airy angeordnet:

Auf jeder Station waren zwei Beobachter. Einer derselben beobachtete, von 5 zu 5 Minuten, von einem Hochwasser zum nächstfolgenden Hochwasser, oder von einem Niedrigwasser zum nächstfolgenden Niedrigwasser. Dieses Intervall wurde so ausgewählt, dass es auf eine möglichst bequeme Tageszeit fiel. Hatte also ein Beobachter die Observationen am Morgen bei Hochwasser angefangen, wenn sowohl dieses als auch das am Abend darauf folgende auf eine bequem gelegene Tageszeit fiel, so wurden die Beobachtungen in gleicher Weise so lange fortgesetzt, bis in Folge der mit jedem Tage später eintretenden Gezeiten die Abendbeobachtung auf eine so späte Zeit fiel, dass sie beschwerlich wurde. Alsdann begann der Beobachter die Observationen 6 Stunden früher mit der Beobachtung des Niedrigwassers und beobachtete bis zum nächstfolgenden Niedrigwasser. Später wurde es wieder nöthig, wenn das Abend-Niedrigwasser sehr spät eintrat, aufs neue mit der Beobachtung des Hochwassers zu beginnen und so folgte immer nach wenigen Tagen ein Wechsel in der Anordnung der Beobachtungen.

Die Beobachtungen begannen etwa eine halbe Stunde vor dem Eintreten des ersten Hoch- oder Niedrigwassers und wurden fortgesetzt bis eine halbe Stunde nach der Gezeit, mit welcher die Reihe geschlossen wurde. Auf solche Weise wurden von den vier Hauptphasen der Flutherscheinungen, welche im Laufe eines Tages eintreten, drei durch eine vollständige Reihe von Beobachtungen mit einander verbunden. Die vierte, von den drei erwähnten getrennte Phase, welche während der Nacht eintrat, wurde von dem zweiten Beobachter observirt. Dieser beobachtete etwa eine Stunde hindurch, so dass die Hauptphase nahezu in die Mitte seiner Beobachtungen fiel. Dieses von Airy angeordnete System gewährt den Vortheil, dass es alle Phänomene der Fluthen angiebt, und dass es für jeden Tag eine vollständige Beobachtung der halbtägigen Fluth liefert. Es hat auch überall, wo es angewandt worden ist, vortreffliche Resultate gegeben. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass das ununterbrochene Beobachten während der Dauer von zwölf Stunden abspannend und ermüdend für den Beobachter ist. Um Zeit und Kräfte zu sparen, wird es daher immer vorzuziehen sein, selbstregistrirende Fluthmesser aufzustellen. Diese haben auch noch den Vorzug, dass man den ganzen Verlauf der Flutherscheinungen während 24 Stunden ohne irgend eine Unterbrechung erhält.

28. Für die Beobachtungen der Wasserstände im Hamburger Hafen wird ein selbstregistrirender Fluthmesser angewandt, der im Jahre 1861 nach dem Entwurfe des Ingenieurs F. H. Reitz von dem Mechaniker Reitz in Hamburg ausgeführt ist. Dieser Fluthenmesser, der sich als sehr brauchbar bewährt hat, ist seinen wesentlichsten Theilen nach in folgender Weise construirt und aufgestellt:

Nahe am Ufer der Elbe ist ein kleines Gebäude errichtet von etwa 14 Fuss Länge und 12 Fuss Breite. Der Fussboden desselben ist mit der angrenzenden Strasse, welche auch bei dem höchsten Wasserstande der Elbe nicht überschwemmt wird, nahezu von gleicher Höhe. Von dem Fussboden erstreckt sich lothrecht nach unten ein runder gemauerter Schacht von 3 Fuss innerem Durchmesser bis auf einige Fuss unter den niedrigsten Wasserstand. Unten ist von dem Schachte aus seitlich ein eisernes Rohr bis zur tiefen Stromrinne der Elbe geführt, welches bei seiner Mündung in dem Flusse gleichfalls unter dem niedrigsten Wasserstande sich befindet. Die obere Fläche in dem Schachte correspondirt daher immer mit der oberen Wasser-

fläche der Elbe. Auf dem Wasser im Schachte befindet sich ein Schwimmer, der mit der oberen Fläche des Wassers sich frei auf- und niederbewegen kann. Dieser Schwimmer besteht aus einem cylindrischen Gefäss von $\frac{1}{16}$ Zoll dickem Eisenblech. Es hat eine Höhe von 9 Zoll und einen Durchmesser von $2\frac{3}{4}$ Fuss. Boden und Deckel sind etwas nach aussen gewölbt. Im Boden ist eine mit Sand gefüllte Blechbüchse befestigt und im Deckel ist eine $\frac{1}{4}$ Zoll im Durchmesser haltende Oeffnung mit Deckel, um Luftspannungen im Innern des Gefässes zu verhüten. Ueber der Mitte des Deckels ist eine auch mit dem Boden des Schwimmers in Verbindung stehende Oese befestigt. Von dieser geht nach oben ein versilberter Kupferdraht von einem Millimeter Dicke, der um den äusseren Rand eines verticalen Rades geführt und mit dem Ende daran befestigt ist. Das aus Messing gefertigte und 0,43 Meter im Durchmesser haltende Rad kann sich um eine in festen Lagern ruhende horizontale Achse drehen. Sinkt der Schwimmer, so dreht sich der Umfang des Rades um eben so viel, wie der Schwimmer sich bewegt; steigt der Schwimmer dagegen, so bewegt sich das Rad durch ein Gewicht, welches auf den Umfang eines mit dem ersten Rade concentrischen kleineren Rades wirkt, in einer entgegengesetzten Richtung. Auf der horizontalen Achse dieser beiden Räder befindet sich ein Trieb, dessen Durchmesser $\frac{1}{8}$ von dem Durchmesser des ersten Rades hält. Der Trieb greift in den gezahnten Rand einer lothrechten Stange, die also durch die Drehung des Triebes auf- und niederbewegt werden kann. An der Seite der Stange befindet sich ein horizontal gerichteter, mit einer Diamantspitze versehener Schreibstift. Die Spitze des Schreibstiftes wird durch einen mit einem kleinen Gewichte beschwerten Hebel gegen die äussere Fläche eines Cylinders gedrückt, der sich durch die Einwirkung eines Uhrwerks um seine vertikale Achse drehen kann. Der Cylinder ist von hornisirtem Kautschuk anfertigt und hat einen Durchmesser von $1\frac{1}{2}$ Fuss, eine Höhe von 3 Fuss. Er wird für den Gebrauch mit einem geschwärzten Bogen von Kreide- oder Tapeten-Papier überzogen, auf welchem die Diamantspitze des Schreibstiftes scharf begrenzte und sehr deutlich zu erkennende weisse Striche zeichnet. Der Cylinder dreht sich, durch die Einwirkung des seitlich davon befindlichen Uhrwerks, mit einer gleichförmigen Geschwindigkeit in 12 Stunden einmal um seine Achse. Eine der Endflächen des Cylinders ist in 24 gleiche Theile getheilt, so dass also ein Theil 30 Minuten Zeit entspricht. Der Schreibstift giebt, nach der erwähnten Construction des Getriebes, welches ihn auf- und niederbewegt, die Höhenänderungen des Wassers in dem 8. Theile des wirklichen Betrages an. Für besonders hohe Fluthen wird ein zweiter Schreibstift benutzt. Das Uhrwerk, welches den Cylinder bewegt, ist mit einem Compensationspendel, welches aus Holz und Blei zusammengesetzt ist, versehen. Selbstverständlich muss das Häuschen, worin der Apparat aufgestellt ist, so eingerichtet sein, dass das Wasser in dem Schachte desselben im Winter gegen Gefrieren geschützt werden kann.

Der Bogen, worauf die Fluthcurven registriert werden, bleibt gewöhnlich 14 Tage auf dem Cylinder, bevor er abgenommen und durch einen neuen ersetzt wird.

Der Chronometer-Fabrikant Knoblich und die Mechaniker Dennert & Pape in Hamburg liefern selbstregistrirende Fluthmesser zum Preise von 200 bis 300 Thalern. In diesem Preise sind jedoch die Kosten für das Aufstellungsgebäude und den Schacht, der übrigens durch ein eisernes Rohr ersetzt werden kann, nicht mit einbegriffen.

29. Wenn es nicht ausführbar ist, einen selbstregistrirenden Pegel aufzustellen, so würde das Beobachten an einer im offenen Meere befestigten lothrechten Scale, wegen der Wellenbewegung, oftmals unausführbar sein. Die nichtregistrirenden Pegel sind daher meistens in folgender Weise konstruirt worden:

In dem Wasser wird ein oben offenes Rohr solide aufgestellt, so dass es sich in der Höhe nicht verändern kann. Dieses Rohr muss eine solche Länge haben, dass es sowohl nach oben über das höchste Wasser, als nach unten unter das niedrigste Wasser hinausgeht, oder es werden auch, wenn es zweckmässiger erscheint, zwei Rohre angebracht, eins für Hochwasser, das andere für Niedrigwasser. Wenn dieses Rohr unten zu ist und nur seitwärts ein oder mehrere kleine Oeffnungen hat, so werden die äusseren Wellenbewegungen nur geringen Einfluss auf die obere Fläche des Wassers im Rohre haben, und es lassen sich daher die Höhenänderungen des Wassers mittelst der innern Oberfläche viel sicherer beobachten, als an der äusseren. Auf dem Wasser im Rohre liegt ein Schwimmer, welcher eine aufrecht gerichtete Stange trägt, oder es wird an dessen oberer Fläche ein Draht befestigt, welcher oben über eine Rolle geht, und nach aussen durch ein Gewicht gespannt ist. An dem Theil der Stange, oder der Schnur, welcher sich über dem oberen Theile des Rohrs befindet, muss ein Index angebracht sein, welcher an einer vertikal befestigten Skala die Höhe des Wassers anzeigt.

30. Herr Thomson giebt (Report of the thirty-eight Meeting of the British Association, p. 492) folgende Einrichtung für einen nicht registrirenden Pegel an:

Ein metallenes Rohr von 2 bis 3 Zoll Durchmesser ist vertikal zu befestigen, so dass es durch das untere Ende mit der See in Verbindung steht. Ein metallener Maassstock, der in Centimeter, oder in Hundertheile eines Fusses eingetheilt ist, wird von dem Beobachter in der Mitte des Rohrs herabgelassen, bis der Stab die Oberfläche des Wassers berührt. Mittelst eines am oberen Ende des Rohrs angebrachten Index liest man alsdann die Wasserhöhe ab. Um den Maassstock sind einige Ringe anzubringen, welche galvanische Ströme nicht leiten und die sich mit dem Maassstocke leicht im Rohre auf und nieder bewegen lassen. Diese Ringe dienen dazu den Massstock so zu führen, dass er sich sehr nahe in der Mitte des Rohrs befindet. Der Beobachter erkennt die Berührung des Massstocks mit dem Wasser, durch Hülfe eines galvanischen Stroms, der gebildet wird durch ein einzelnes galvanisches Element, ein Galvanoskop oder ein galvanisches Lätewerk, den metallenen Massstock, die Flüssigkeit und das metallene Rohr. Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass dieser complicirte Apparat die Wasserhöhen mit grösserer Genauigkeit giebt als der vorhin beschriebene, wenn derselbe gut construirt ist. Die grössten Unregelmässigkeiten in den Höhenmessungen sind eine Folge der Wellenbewegungen, und diese sind von der Construction des Messapparats unabhängig.

31. Wenn der Pegel, gleichviel, ob ein registrirender oder ein nicht registrirender, nur für die Dauer eines kurzen Zeitraums errichtet wird, so ist es noch erforderlich, in seiner Nähe eine Marke auf einem Steinpfeiler oder Steinblock, von dem sich annehmen lässt, dass er für lange Zeit seinen Stand unverändert behalten wird, zu verzeichnen, und den Höhenunterschied zwischen dieser Marke und dem Wasserstande, welcher dem Nullpunkte des Pegels entspricht, durch ein Nivellement zu bestimmen. Dasselbe ist auch nöthig, wenn man Gründe hat, anzunehmen, dass der Pegel nicht ganz solide

befestigt ist. In letzterem Falle ist die Nivellirung von Zeit zu Zeit zu wiederholen.

32. Wird der Pegel am Ufer eines Meeres aufgestellt, so können an einigen Orten die Fluthbeobachtungen zuweilen durch Stürme unsicher und selbst unausführbar werden. Es kann sich daher empfehlen, den Fluthmesser, wo es ausführbar ist, nicht direct am Meeresufer, sondern etwas entfernt davon in einem Kanale aufzustellen. Nur muss der Kanal so beschaffen sein, dass er zu den Zeiten der Beobachtungen nicht mit Eis bedeckt wird. Wenn der Pegel in einem Kanale aufgestellt ist, so wird man den Unterschied zwischen den Wasserhöhen in seiner Nähe und am Meere, bei günstigen atmosphärischen Zuständen, zu wiederholten Malen, durch Nivellirungen und Fluthbeobachtungen ermitteln.

33. Damit die Beobachtungen auch in Bezug auf die Zeiten eine den Höhenangaben entsprechende Sicherheit erlangen, ist es erforderlich, dass die Fehler der Uhrcorrectionen für die Beobachtungszeiten ein Zehnthel einer Minute nicht übersteigen. Wenn nicht bereits zu andern Zwecken in der Nähe des Fluthmessers eine Sternwarte sich befindet, von welcher die Zeit mittelst eines Chronometers übertragen werden kann, so ist es erforderlich, Zeitbestimmungen entweder mittelst eines Sextanten oder eines Spiegelkreises, oder auch mittelst eines kleinen Passageinstruments zu bestimmen. Das letztere Instrument giebt am Festlande durch ein einfacheres Beobachtungsverfahren die Uhrcorrectionen mit einer grösseren Genauigkeit, wie ein Reflexionsinstrument. Eine Anleitung über den Gebrauch eines transportablen Passage-Instruments zu Zeitbestimmungen findet sich im 3. Bande der Zeitschrift für populäre Mittheilungen aus dem Gebiete der Astronomie.

34. Ein selbstregistrirender Pegel giebt nur die den Zeiten entsprechenden Höhen des Wassers an. Ausser diesen Registrirungen sind jedoch noch andere Beobachtungen auszuführen, die mit den Gezeiten in Verbindung stehen. Zu diesen Beobachtungen gehört die Ermittlung der Zeiten, wann die Strömung des Wassers ihre Richtung verändert. Diese Zeiten des Stromwechsels fallen im Allgemeinen nicht mit den Zeiten von Hoch- und Niedrigwasser zusammen und dürfen daher mit letzteren nicht verwechselt werden. Die Fluthwellen schreiten zuweilen in einer der Gezeitströmung gerade entgegengesetzten Richtung weiter. An manchen Orten dauert die Fluthströmung noch Stundenlang nach der Zeit des Hochwassers fort. Eben so fliesst die Ebbe-Strömung oftmals noch einige Zeit nach dem Niedrigwasser. Die Zeit des Stromwechsels ist zum Theil auch verschieden in verschiedenen Entfernungen vom Ufer, während die Zeit für Hoch- und Niedrigwasser für diese Punkte dieselbe ist. Ausserdem haben die Strömungen von Fluth- und Ebbe nicht immer nur zwei entgegengesetzte Richtungen, sondern sie ändern oftmals die Richtungen theils in der Folge von Osten durch Süden nach Westen, theils in umgekehrter Ordnung. Es sind daher neben den Höhenänderungen der Wasseroberfläche auch die Zeiten der Stromwechsel und die Richtungen, in welchen die Strömungen sich verändern, zu beobachten. Es ist vorzugsweise von Wichtigkeit, solche Beobachtungen längs der Ausdehnung einer Meeresstrasse oder an den Mündungen grosser Flüsse auszuführen.

35. Kapitain Beechey hat die Strömungen, welche in dem Irländischen Kanale, in dem Kanale von Dover und in der Nordsee vorkommen, einer sehr gründlichen Untersuchung unterzogen. Die Beobachtungen, welche in dem Irländischen Kanale angestellt sind, führten zu dem merkwürdigen, für die Schifffahrt äusserst wichtigen Resultate, dass die Stromwechsel auf der

ganzen Länge des Kanals nahezu gleichzeitig stattfinden, obgleich die Zeiten von Hoch- und Niedrigwasser für die verschiedenen Punkte zum Theil um mehrere Stunden verschieden sind. Der Strom fließt etwa sechs Stunden in jeder der beiden entgegengesetzten Richtungen, und überall trifft die Zeit des Stromwechsels sehr nahe mit denjenigen Zeiten von Hoch- und Niedrigwasser zusammen, welche zu Fleetwood statt finden. In Folge des Zusammentreffens der von Norden und Süden eindringenden Fluthwellen zeigen sich an einigen Stellen des Irländischen Kanals besonders bemerkenswerthe Eigenthümlichkeiten in den Gezeit- und Strom-Erscheinungen. An zwei Stellen fließen die abwechselnden Ströme mit beträchtlicher Geschwindigkeit, ohne dass das Wasser daselbst steigt oder fällt, und an andern Stellen steigt das Wasser bis auf 16 und 20 Fuss, ohne dass eine horizontale Bewegung des Wassers an seiner Oberfläche zu bemerken ist. In dem Kanale von Dover sind zum Theil andere, nicht weniger merkwürdige Erscheinungen gefunden worden.

36. Die von Kapitain Beechey untersuchten Beobachtungen der Strom-Phänomene sind von Schiffen aus bewerkstelligt worden. Ein solches Schiff wurde successive an vielen Stellen des zu untersuchenden Kanals zwölf Stunden und länger vor Anker gelegt. Die Entfernung einer Station von der nächsten betrug in der Mitte des Kanals zum Theil nur 15 Seemeilen, in kleinen Buchten, an einigen Stellen, nur 2 Meilen. Die Richtung des Stroms wurde jede halbe Stunde beobachtet. Die Strom-Geschwindigkeit wurde sowohl durch ein gewöhnliches forttreibendes Log, als auch durch ein umlaufendes Log, welches Fusse registrirte, gemessen. Um zu erfahren, ob die Geschwindigkeit an der Oberfläche des Wassers von der weiter in der Tiefe stattfindenden verschieden sei, wurden zwei umlaufende Logge benutzt, eins 2 Fuss, das andere 12 Fuss unter der Oberfläche des Wassers. Es wurden die Zeiten des Beginns und des Aufhörens eines Stroms beobachtet, woraus sich die Dauer des stille stehenden Wassers und die mittlere Zeit des Stromwechsels ergab. Alle diese Zeiten wurden auf denselben Meridian bezogen und mit den Zeiten des Hochwassers in einem benachbarten Hafen (im Kanale von Dover mit dem Hochwasser an der Küste von Dover) verglichen.

37. In Betreff der Bewegungen der Fluthwellen ist unsere Kenntniss, ungeachtet der grossen Verdienste, welche Whewell sich um diesen Gegenstand erworben hat, noch sehr mangelhaft, und es ist daher im hohen Grade wünschenswerth, dass auch in dieser Beziehung noch an recht vielen Orten Beobachtungen angestellt werden. Vornehmlich wird zu ermitteln sein, in wie weit sich Linien des gleichzeitigen Hochwassers angeben lassen, und nach welchen Gesetzen sich die Fluthzeiten mit der Lage des Orts in solchen Meeresstrecken verändern, für welche sich die genannten Linien nicht construiren lassen.

Lubbock hat auf einer Weltkarte, welche einer Abhandlung von ihm in den Philosophical Transactions von 1831 beigelegt ist, für viele Küstenplätze die Zeiten des Hochwassers bei Neu- und Vollmond, sowohl in Greenwicher Zeit, als auch in Ortszeit angegeben. Whewell machte den Verlauf der Fluthoscillationen, auf einer den Phil. Trans. von 1833 beigelegten Karte noch übersichtlicher, indem er Curven angab, längs welchen das Hochwasser bei Neu- und Vollmond zu denselben, auf den Greenwicher Meridian bezogenen, Zeiten statt findet. Diese Curven nennt Whewell Cotidal Lines, von andern werden sie auch Isorachien genannt. In den Phil. Trans. für 1836 hat Whewell für Europa und die Britischen Inseln neue Karten der Isorachien

mitgetheilt, für welche zahlreiche spätere Beobachtungen benutzt worden sind und welche sich auch noch darin von den früheren unterscheiden, dass für die Bestimmungen der Zeiten der Hochwasser, statt der Hafenzeiten, die mittleren Mondfluth-Intervalle benutzt worden sind. Whewell bemerkt in Bezug hierauf, dass das letztere Intervall für die Küsten von England um $\frac{1}{2}$ Stunde kleiner ist als die Hafenzeit, und dass also die Isorachie für $1\frac{1}{2}$ Uhr der neuen Karte derjenigen für 2 Uhr der früheren entspricht. Es darf übrigens nicht unerwähnt bleiben, dass Whewell auf seinen Karten insbesondere auf der früheren von 1833, wie es auch von ihm selbst später hervorgehoben ist, die Linien gleichzeitigen Hochwassers zum Theil hypothetisch über weite Strecken grosser Meere gebildet hat, für welche keine Fluthbeobachtungen vorhanden waren, und für welche sich zum Theil wohl überhaupt keine solche Linien werden construiren lassen. Indess für Wasserflächen von kleinerem Umfange und für solche, welche sich längs den Küsten erstrecken, geben Whewell's Karten eine sehr anschauliche Darstellung von dem Verlaufe einer der wichtigsten Erscheinungen der Fluthoscillationen.

38. Whewell giebt das Fortschreiten der Fluthwellen, so weit er es nach seinen Untersuchungen hat bestimmen können, in folgender Weise an:

Die Fluthwelle, welche die Gezeiten an die Küsten von Europa bringt, kommt aus dem Atlantischen Oceane, und erreicht die Westküste von Spanien und Portugal ungefähr zwei Stunden nach der Culmination des Mondes (in Greenwich), die Westküste von Frankreich nach etwa drei Stunden, die Westküste von Island und Land's-End nach etwa vier Stunden. Die Fluthwelle bewegt sich darauf längs der Südküste von England und der Nordküste von Frankreich nach der Strasse von Dover, welche sie etwa elf Stunden nach der Mond-Culmination erreicht. Sie bewegt sich ausserdem auch längs der Westküste von Irland und Schottland und erreicht die Orkney-Inseln etwa neun Stunden nach der Mond-Culmination. Von dort gelangt sie in die Nordsee und bewegt sich längs der Ostküste von Grossbritannien, erreicht um etwa zwölf Stunden nach der Mond-Culmination Peterhead und zwölf Stunden Später Harwich. Hier trifft sie mit einer Fluthwelle zusammen, welche gleichfalls aus dem Atlantischen Ocean kommend durch die Strasse von Dover zwölf Stunden früher nach Harwich gelangt. Die Gezeiten in der Nordsee werden durch Verbindungen dieser beiden Wellen hervorgebracht, woraus complicirte Gesetze der Flutherscheinungen hervorgehen, wie auch in dem Irländischen Kanale. Die Fluthwelle, welche die Gezeiten nach der Ostküste von Amerika bringt, scheint die südlicheren Theile etwa 7 Stunden, die nördlicheren Theile der Vereinigten Staaten etwa 11 Stunden nach der Mond-Culmination zu erreichen. Bemerkenswerth ist es, dass die Europäische Fluthwelle sich anfänglich in einer Richtung bewegt, welche der scheinbaren Bewegung des Mondes entgegengesetzt ist, nämlich von Westen nach Osten. Im stillen Oceane findet sich dieselbe Erscheinung. An der Westküste von Südamerika, in der Nähe von Cap Horn, bewegen sich die Gezeiten gleichfalls von Westen nach Osten. Sie fallen mit der Mond-Culmination zusammen bei Chiloe und erreichen $4\frac{1}{2}$ Stunden später Kap Horn. In den westlichen Theilen des stillen Oceans bewegt sich die Fluthwelle westlich, wie aus ihrer Bewegung längs den Küsten von Neu-Seeland und Australien, die mit Sicherheit ermittelt ist, hervorgeht. Sie erreicht Neu Seeland um etwa 6 Uhr und Australien um etwa 10 Uhr nach der Culmination des Mondes in Greenwich.

In dem mittleren Theile des stillen Oceans sind die Gezeiten von geringer Höhe und stark abweichend von dem Gesetze der halbtäglichen Un-

gleichheiten und es ist daher schwieriger, die dortigen zu den Ufern gehörigen Gezeiten in Verbindung zu bringen, als diejenigen des Atlantischen Oceans.

Die äusseren Regionen des stillen Oceans, die durch grosse Inseln unterbrochen sind, so wie auch der Indische Ocean, haben Gezeiten, für welche die Gesetze des Fortschreitens sehr complicirt zu sein scheinen und bis jetzt noch nicht entwickelt sind. Es scheint, dass sich diese Gesetze nicht durch Isorachien darstellen lassen, diese Curven vielmehr nur für Gegenden in der Nähe der Küsten zur Anwendung kommen können.

39. Für die Ermittlung der Gesetze des Fortschreitens der Fluthwellen längst einer oder mehrerer Küsten ist es, nach Whewell's Vorschlag, vortheilhaft, wenn gleichzeitige Beobachtungen an verschiedenen Orten angestellt werden. Auf solche Weise wird man die Geschwindigkeit des Fortschreitens mit beträchtlicher Sicherheit erhalten, wenn die Beobachtungen auch nur wenige Tage oder eine Woche hindurch fortgesetzt werden. Zu dem Ende sind die Beobachtungsstationen, je nach den Umständen, 10 bis 20 Seemeilen von einander entfernt zu wählen, und auf jeder Station sind die zu verschiedenen Tageszeiten eintretenden Momente des Hochwassers zu beobachten. Um die Bewegung der Fluthwellen weiter zu verfolgen, werden die Beobachter, wenn sie die Observationen an einer Reihe von Stationen absolvirt haben, dieselben an neuen Stationen, welche sich den ersteren anreihen, wiederholen, und so das Fortschreiten der Fluthwellen für eine grössere Strecke ermitteln. Diese Bestimmungen werden noch an Sicherheit gewinnen, wenn eine Normalstation ausgewählt wird, an welcher die Beobachtungen während der ganzen Dauer der verschiedenen Beobachtungsreihen angestellt werden, so dass die Beobachtungen einer jeden andern Station mit den an der Normalstation ausgeführten, verglichen werden können.

40. Um eine Uebersicht zu bekommen, welchen Einfluss, neben den Anziehungskräften von Sonne und Mond, auch noch störende Einwirkungen auf die Höhenänderungen der Wasseroberfläche haben, ist es erforderlich, dass mehrere Male am Tage auch noch die Richtung und Stärke des Windes und die Höhe des Barometerstandes beobachtet werden. Dass Stürme, besonders wenn sie in einen sich verengenden Meeresbusen eindringen, einen grossen Einfluss auf die Neigung der mittleren Wasserfläche und auf die Höhen und Zeiten von Hoch- und Niedrigwasser haben, ist bekannt; doch kann es von Interesse sein zu ermitteln, in welcher Weise die Stärke und Richtung des Windes, sowohl die gleichzeitigen, als auch spätere Erscheinungen der Gezeiten beeinflussen.

Dass die Höhen der Gezeiten von der Stärke des Luftdrucks beeinflusst werden, haben Daussy, Whewell, Bunt und Airy aus Untersuchungen von Fluthbeobachtungen nachgewiesen. Wenn das Barometer fällt, so steigt die Höhe der Meeresoberfläche, und zwar an einigen Orten um einen Betrag, der 12 bis 14 mal so gross ist, wie die Höhenänderung des Barometers.

Für die allgemeine Theorie der Bewegungen der Fluthwellen ist es auch noch förderlich, die Natur der Modification zu untersuchen, welche die Fluthwelle erleidet, wenn sie sich längs einem Flusse bewegt.

41. Welches Rechnungsverfahren anzuwenden ist, um aus den beobachteten Wasserständen eine allgemeine Formel für die Höhe des Wassers zu entwickeln, darüber werden sich allgemein gültige Vorschriften nicht angeben lassen, weil es dabei sehr in Betracht kommt, welche Zeitmomente für die Anstellung der Beobachtungen ausgewählt worden sind. Wenn mittelst eines registrirenden Pegels, oder in gleichen Zeitintervallen beobachtet worden ist,

so ist das von Thomson (Report of the 38. Meeting of the British Association) angegebene Verfahren sehr zu empfehlen. Er geht von derjenigen von Laplace angegebenen Formel für die Wasserhöhe ($= h$) aus, welche ausser einem constanten Gliede A_0 mehrere Reihen periodischer Glieder in der Form:

$$\begin{aligned} & A_1 \cos nt + B_1 \sin nt \\ & + A_2 \cos 2nt + B_2 \sin 2nt \\ & + A_3 \cos 3nt + B_3 \sin 3nt \end{aligned}$$

enthält. Hierin sind $A_1, A_2, A_3, \dots B_1, B_2, B_3, \dots$ Grössen, welche für denselben Beobachtungsort constante Werthe haben, t ist die Zeit, welche von einer angenommenen Epoche beginnt, und $n, 2n, 3n, \dots$ sind die der Zeiteinheit korrespondirenden Winkelgeschwindigkeiten.

42. Thomson wandte die Formel zuerst auf Fluthbeobachtungen an, welche in dem Hafen von Ramsgate, im Jahre 1864, an einem selbstregistrirenden Pegel angestellt worden sind. Es wurden für die Berechnung nur diejenigen Angaben des Fluthmessers benutzt, welche Januar 1, 0^h mittlere Zeit beginnend, von Stunde zu Stunde registriert sind. Für die Winkelgeschwindigkeiten wurden demnach die Bewegungen in einer Stunde mittlerer Zeit angenommen. Unter Anwendung folgender Bezeichnungen:

Winkelgeschwindigkeit der Rotation der Erde	= γ
" " der mittleren Bewegung des Mondes um die Erde	= σ
" " der mittleren Bewegung der Erde um die Sonne	= η
" " des Fortschreitens des Mond-Perigäum	= $\tilde{\omega}$

bestimmte er bei der ersten Berechnung nur diejenigen periodischen Glieder, in welchen n die Werthe $\gamma - \eta, \gamma, \gamma - \frac{1}{2}\sigma - \frac{1}{2}\tilde{\omega}, \gamma - \sigma, \gamma - \frac{3}{2}\sigma + \frac{1}{2}\tilde{\omega}, \gamma - 2\sigma$ hat. Für die Bewegung des Mondes wurden demnach nur die wesentlichsten, von der elliptischen Form seiner Bahn abhängigen, Glieder berücksichtigt.

Die den vorhergehenden Werthen von n entsprechenden Reihen in der Formel für h bezeichnet Thomson mit S, K, L, M, N und O . Für jede dieser Reihen berechnete er die Werthe der dazu gehörigen Constanten $A_1, A_2, A_3, \dots$ bis $A_8, B_1, B_2, B_3, \dots$ bis B_8 , aus 24 aus den Beobachtungen abgeleiteten Mittelwerthen von h . Wäre die Rechnung bis A_{11}, B_{11}, A_{12} fortgeführt worden, so würde eine vollständige Darstellung der benutzten Mittelwerthe erlangt sein, allein Thomson hielt mit Recht die letzten Werthe von A und B für zu unsicher, um auf ihre Entwicklung Zeit zu verwenden. Später liess Roberts von den Coefficienten $A_1, A_2, A_3, \dots A_8; B_1, B_2, B_3, \dots B_8$ auch noch diejenigen unberücksichtigt, die der Theorie nach, $= 0$ sein sollten, und deren Betrag sich ausserdem sehr klein herausstellte.

Für die Entwicklung der Constanten in den Reihen S und M wurden die stündlichen Höhen benutzt, welche während der Dauer von 369 Tagen und 3 Stunden registriert sind. Dieser etwas mehr als ein Jahr umfassende Zeitraum wurde gewählt, weil er sehr nahe 25 volle Perioden der Spring- und Nippfluthen umfasst, und daher die Mittelwerthe der Höhen, welche für einen bestimmten Werth des Stundenwinkels von S gelten, am wenigsten von den zu M gehörigen Werthen beeinflusst werden, und umgekehrt. Diese Mittelwerthe wurden in folgender Weise gebildet. Für die S Gezeiten schreiten die Winkel $(\gamma - \eta)t$, von 0 beginnend, für jede Stunde mittlerer Zeit um genau 15° fort. Es wurden daher aus allen Ablesungen 24 Mittelwerthe gebildet,

welche für $0^h, 1^h, 2^h, 3^h, \dots 23^h$ der S Stunden gelten. Für die M Gezeiten hätten zu den von 15 zu 15 Graden fortschreitenden Werthen von $(\gamma - \sigma) t$ die entsprechenden mittleren Zeiten bestimmt und für diese die dazu gehörigen Wasserhöhen aus den registrirten Curven genommen werden sollen. Statt dieser genaueren Höhenwerthe, wurden bei der ersten Annäherung diejenigen Werthe genommen, welche ihnen in der Reihe der für $0^h, 1^h, 2^h, 3^h, \dots$ mittlere Zeit geltenden Höhen der Zeit nach am nächsten liegen. Auf ähnliche Weise wurden für jede der Reihen $K, L, N, O, 24$ Mittelwerthe gebildet. Aus den 24 Mittelwerthen einer jeden Gruppe liessen sich die Werthe von $A_1, A_2, A_3, \dots A_8; B_1, B_2, B_3, \dots B_8$ durch Rechnung so bestimmen, dass die nach der erhaltenen Formel für $nt = 15^0$ $nt = 30^0, \dots$ berechneten Werthe den beobachteten so nahe wie möglich sich anschliessen. Diese Rechnung ist sehr einfach, weil die für jede Gruppe in Rechnung genommenen Winkelwerthe Punkten entsprechen, die gleichförmig auf dem Umfange eines Kreises vertheilt sind. Bei dieser ersten Annäherung wurde angenommen, dass in den benutzten Mittelwerthen für eine jede der S, K, L, M, N, O Gezeiten der Einfluss der anderen Gezeiten, wegen der grossen Anzahl ihrer Perioden nahezu eliminirt sei. Nachdem die Werthe der ersten Annäherung ermittelt worden, wurde eine zweite Annäherung ausgeführt, indem die zuerst gefundenen Werthe benutzt wurden, um für jede einzelne Gezeit K, S, L, M, N, O den Einfluss der übrigen auf die zu verwendenden Mittelwerthe in Rechnung zu bringen. Auch wurden mit Hülfe der ersten Approximation die Verbesserungen bestimmt, welche deshalb an die für K, L, M, N, O benutzten einzelnen Höhen noch anzubringen waren, weil diese, wie erwähnt, nicht genau zu den Zeiten gehören, für welche sie in Rechnung gebracht worden sind. Nachdem die Reihen für S, K, L, M, N, O entwickelt waren, bestimmte Roberts später noch die Glieder, welche von der Evection und Variation der Mondbahn abhängen, ferner die halbmonatliche Mond-Gezeit, die halbjährliche Sonnen-Gezeit und einige andere Glieder von kleinem Betrage. Schliesslich brachte Roberts je zwei zusammengehörige Glieder $A \cos nt + B \sin nt$ in die für die Anwendung bequemere Form $R \cos (nt - \varepsilon)$, worin $R \cos \varepsilon = A$ und $R \sin \varepsilon = B$. Für diejenigen Coefficienten A und B , welche der Theorie nach $= 0$ sein sollten, wie A_1, B_1, A_3, B_3 in L und N ; A_2, B_2 in O etc. ergab die Rechnung in der That auch nur sehr kleine Werthe.

Die Berechnung der Werthe der verschiedenen A und B lässt sich zum Theil noch vereinfachen, wenn die Relationen zwischen diesen Grössen und den Grössen $B, C, D, \dots \gamma, \gamma', \lambda, \lambda', \dots$ des § 10 berücksichtigt werden.

Roberts wandte dasselbe Verfahren, welches er auf Thomson's Veranlassung, für die Berechnung der zu Ramsgate angestellten Beobachtungen benutzt hatte, später mit sehr günstigem Erfolge auch auf Fluthbeobachtungen an, welche bei Liverpool, zu Fort Point in der San Francisco Bay und zu Kurrachee angestellt worden sind.

43. Die Verspätung der Springfluth oder das Alter der Gezeit, ergibt sich aus Roberts Formel, wenn die Differenz zwischen den Epochen der halbtäglichen mittleren Sonnen- und Mond-Gezeit (zwischen den ε_2 der Reihen S und M) durch den doppelten Unterschied zwischen den mittleren täglichen Bewegungen des Mondes und der Sonne, oder zwischen $24 (\gamma - \iota)$ und $24 (\gamma - \sigma)$ dividirt wird. Für Ramsgate ist $\varepsilon_2 (S) = 32^0, 70$, $\varepsilon_2 (M) = 339^0, 43'$; ausserdem ist $24 (\gamma - \iota) = 360^0$, $24 (\gamma - \sigma) = 347^0, 809$, $24 [(\gamma - \iota) - (\gamma - \sigma)] = 12^0, 191$. Demnach ist die Verspätung der Springfluth für Ramsgate

$$= \frac{32^{\circ}70' - 339^{\circ}43'}{2 \cdot 12^{\circ}191} = \frac{53^{\circ}27'}{24,382} = 2^{\text{d}}185' \\ = 2^{\text{d}}4^{\text{h}}24^{\text{m}}.$$

44. Wenn die Beobachtungen an einem selbstregistrirenden Pegel nur wenige Monate hindurch angestellt sind, so wird es sich empfehlen aus den Höhen und Zeiten von Hoch- und Niedrigwasser genäherte Werthe für die Amplituden und Epochen der periodischen Glieder für die halbtägliche Sonnen- und die halbtägliche Mondfluth, so wie für die täglichen Fluthen abzuleiten, und unter Benutzung dieser Werthe die ferneren Approximationen nach Thomson's Methode auszuführen. Es wird jedoch erforderlich sein, aus den registrierten Curven die Höhen für kleinere Intervalle, als von Stunde zu Stunde, etwa von 15 zu 15 Minuten, zu nehmen.

45. Es ist sowohl in wissenschaftlicher Beziehung als auch für mancherlei praktische Zwecke von grosser Wichtigkeit, dass noch an recht vielen Orten, an denen es bisher nicht geschehen ist, Fluthbeobachtungen angestellt werden. Aus zahlreichen derartigen Beobachtungen wird sich ermitteln lassen, nach welchen Gesetzen sich die Verspätung der Fluth mit der Lage des Orts auf der Erdoberfläche verändert, auf welche Weise sich die Fluthwellen über die Oberflächen der Meere bewegen, und welche Fluthen an jedem Orte die vorherrschenden sind. In Folge solcher Ermittlungen wird es ausführbar werden, für viele Orte die verschiedenen Flutherscheinungen im Voraus zu bestimmen, so weit nicht Localverhältnisse sie beeinflussen, die nach unbekannten Gesetzen wirken.

Die aus den Fluthbeobachtungen abzuleitenden mittleren Meereshöhen finden ihre Anwendung in der Geodäsie und in geologischen Untersuchungen. Die Marken, auf welche an den verschiedenen Beobachtungsstationen die Wasserhöhen bezogen werden, sind durch Nivellements, so weit es ausführbar ist, mit einander zu verbinden. Insbesondere ist dieses längs solchen Meeresstrecken erforderlich, die sich, abgesehen von den Fluthoscillationen, nicht im Zustande des Gleichgewichts befinden. In Europa tritt, durch Verschiedenheiten im specifischen Gewichte der Wassermassen, eine merkliche Abweichung vom Gleichgewichts-Zustande durch die Verbindung der Ostsee mit der Nordsee ein. Es ist daher zu wünschen, dass an diesen beiden Meeren und den dieselben verbindenden Strassen noch mehr Beobachtungsstationen als bisher zur Bestimmung der mittleren Meereshöhen an den verschiedenen Punkten angelegt werden.

Von Wichtigkeit ist es gleichfalls, dass an einzelnen Orten die Fluthbeobachtungen von Zeit zu Zeit wiederholt werden, um zu erfahren, ob und wie sich die mittlere Höhe der Wasseroberfläche, so wie auch die Amplituden und Epochen der verschiedenen Gezeiten mit der Zeit verändern.

Wenn die Fluthbeobachtungen an einem Orte während eines ganzen Jahres oder mehrere Jahre hindurch angestellt worden sind, so ist auch aus den Beobachtungen zu ermitteln, ob die mittlere Wasserhöhe ausser der Einwirkung durch die halbjährliche Ungleichheit der Sonnenfluth, deren Betrag, wie bereits bemerkt worden, nur gering ist, auch noch in Folge vom Schmelzen des Schnees und Eises, von Regengüssen oder der mehr oder weniger starken Verdunstung des Wassers sich im Laufe eines Jahres um eine angebare Grösse verändert.

Literatur.

- Strabo, geographia. Lib. III.
 C. Plinii Secundi historia mundi. Lib. II. Cap. 97.
 Plutarchus de placitis philosophorum. Lib. III. Cap. 17.
 F. Delphinus, de fluxu et refluxu maris disputatio. 1559.
 T. Alseforo, del flusso e reflusso del mare. 1561.
 Joh. Kepler, Astronomia nova seu physica coelestis. Introductio.
 — Epitome astronomiae p. 555.
 — de astronomia lunari.
 G. Galilaei, dialogi de systemate mundi. Dial. 4.
 R. Descartes, de fluxu et refluxu maris (principia philosophiae. Lib. IV. Art. 49 — 56).
 Ricciolus de motu maris, qui Aestus dicitur (Almagestum novum. II.).
 Gassendi opera II, p. 27.
 Hermanni, Landgravii Hassiae quaestio de fluxu et refluxu Oceani resoluta a Joh. Placentino. 1659.
 Isaacus Vossius de motu marium et ventorum. 1663.
 M. Meier de maris aestu. 1664.
 F. Baconus de fluxu et refluxu maris. 1665.
 Fabri dialogi physici, in quibus de motu terrae disputator, marini aestus nova causa proponitur. 1665.
 J. Wallis hypothesis about the flux and reflux of the sea. Phil. Trans. 1666.
 — Observations astronomiques et physiques faites en l'isle de Cayenne par Reiher. Chap. X. Art. II. 1679.
 — de aestu maris hypothesis nova. 1699.
 F. Nitzschius de triplici maris motu. 1667.
 Flamsteed a correct Tide Table to every day in the year 1683. Phil. Trans. vol. XIII.
 Isaac Newton, philosophiae naturalis principia mathematica. Lib. I, prop. 66. lib. III, prop. 24, 36, 37.
 J. de Vries an Luna sit causa aestus marini. 1689.
 J. C. Sturmius de fluxu et refluxu maris. 1696.
 E. Halley the true theory of the tides, extracted from Newton's principia. Phil. Trans. 1697.
 G. A. Stubnerus de Lunae viribus, imprimis in Oceanum. 1700.
 H. Ludolff de fluxu et refluxu maris. 1702.
 Cassini II., sur les observations du flux et du reflux. Mémoires de l'Académie des sciences de Paris. 1710, 1713, 1714, 1720.
 — du flux et du reflux de la mer. Mém. de l'Acad. des sciences de Paris. 1712, 1713.
 A. Gärtner, Planisphaerium hydrographicum, oder Scheiben-Instrument, die Ebbe und Fluth zu erforschen. 1722.
 Fr. Buchstrom, nova aestus marini theoria. 1734.
 Klingenstierna de fluxu et refluxu maris. 1740.
 Leonhard Euler, inquisitio physica in causam fluxus et refluxus maris. 1740. (Recueil des pieces qui ont remporté le prix depuis 1720 jusqu'en 1772. Tome IV.)
 — de statu aequilibræ maris a viribus solis et lunae sollicitati. Acta Acad. imp. Petrop. I. 1780.
 Daniel Bernoulli, Traité sur le flux et reflux de la mer. 1740. (Rec. d. p. cour. de Paris. IV.)
 Mac Laurin de causa physica fluxus et refluxus maris. 1740. (Rec. d. p. cour. de Paris. IV.)
 A. Cavallery, dissertation sur la cause physique du flux et reflux de la mer. 1740. (Rec. d. p. cour. de Paris. IV.)
 Simpson, Mathematical dissertations. 1743, p. 39.
 D'Alembert, réflexions sur la cause générale des vents. 1746.
 — Encyclopédie. Art. flux.
 Boscovich, de aestu maris. 1746.
 E. Napitis de maris aestu. 1749.
 Brancas, explication du flux et du reflux dans leurs véritables circonstances. 1749.
 Hellant, Ebbe und Fluth bei Wärdhus. 1753. (Kongl. Svenska Vetenskaps Akad. Handlingar.)
 Liedbeck de fluxu et refluxu maris. 1753.

- Wargentin, Geschichte der Ebbe und Fluth. 1753, 1754. (K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.)
- Pezenas observations des différentes hauteurs de l'eau dans la mer dans le port de Marseille. Mémoires de mathématiques et de physiques, rédigés à l'observatoire de Marseille. 1755.
- L. Ximenes de maris aestu. 1755.
- J. D. Titius vestigia fluxus et refluxus in mari Baltico. 1760.
- Toaldo novae tabulae barometri aestusque maris. 1763.
- G. Stapert de aestu maris. 1765.
- Lalande, sur le flux et le reflux. Mém. de l'Acad. de Paris. 1772.
- Traité du flux et du reflux de la mer, d'après la théorie et les observations. Astronomie Tome IV. 1781.
- sur les marées de l'équinoxe de printemps. Mém. de l'Acad. de Paris. 1789.
- J. Strange and J. Toaldo, Letters on the Tides in the Adriatic. Phil. Trans. 1777.
- De Fourcroy, observations sur les marées aux côtes de Flandre. (Mém. prés. à l'Acad. de Paris. T. VIII.)
- Verhandelingen van het Bataviaach genootschap der Konsten en Wetenschappen. Vol. II.
- S. J. van de Wynpersse de aestu marino. 1780.
- P. Frisii cosmographiae liber tertius, de figura et motu maris et atmosphaerae. 1785.
- Chiminello sulle Maree. Saggi sciens. e litterarj dell' Acad. di Padova. 1789.
- Vincent, observations sur les marées. (Journal des savans. 1789.)
- P. S. Laplace, sur le mouvement des fluides qui recouvrent la terre sont attirés par le soleil et la lune. Mém. de l'Acad. de Paris. 1775.
- Mémoire sur le flux et le reflux de la mer. Mém. de l'Acad. de Paris. 1790.
- Traité de mécanique céleste. Tome II, livre 4; Tome V, livre 13.
- Exposition du système du monde. Chap. XI.
- Sur les plus grandes marées de l'an 9. Connaissance des temps. 1801.
- Sur le flux et le reflux. Mém. de l'Acad. de Paris. 1818.
- Von Löwenörn, über Ebbe und Fluth an den Dänischen und Norwegischen Küsten. 1797. Allgem. geograph. Eph. 3.
- M. Alopaeus dissertatio physica causam aestus marini, a Hube allatam, examinans. 1800.
- Krusenstern observations et réflexions sur les marées dans le port de Nangasaki en 1805. Mém. de l'Acad. imp. de St. Pétersbourg. 1810.
- Th. Young on Tides. 1807. A course of Lectures on natural Philosophy and the mechanical arts.
- A. F. Kniberg de fluxu et refluxu maris. 1808.
- E. Knorr, disquisitiones de aestu maris. 1830.
- J. W. Lubbock, Account of the Traité sur le flux et reflux de la mer of D. Bernoulli, and a treatise on the attraction of ellipsoids. 1830.
- On the Tides in the Port of London. Phil. Trans. 1831, 1832, 1836.
- Report on the Tides. Reports of the British Association. 1832.
- On the Tides. Phil. Trans. 1832, 1833, 1834, 1837.
- Discussion of the Tide observations made at Liverpool. Phil. Trans. 1835, 1836.
- Discussion of observations of Tides. Rep. of the Br. Ass. 1836.
- Account of the discussions of observations of the Tides. Rep. of the Br. Ass. 1837.
- Elementary treatise on Tides. 1839.
- W. Whewell, Essay towards a First Approximation to a Map of Cotidal Lines. Phil. Trans. 1833.
- on the Empirical Laws of the Tides in the Port of London; with some Reflexions on the Theory. Phil. Trans. 1834.
- on the Results of Tide Observations made in June 1834 at the Coast Guard Stations in Great Britain and Ireland. Phil. Trans. 1835.
- Researches on the Tides. —. Fourth Series. On the Empirical Laws of the Tides in the Port of Liverpool. Phil. Trans. 1836.
- Researches on the Tides. —. Fifth Series. On the Solar Inequality and on the Diurnal Inequality of the Tides at Liverpool. Phil. Trans. 1836.
- Researches on the Tides. —. Sixth Series. On the Results of an extensive system of Tide Observations made on the coasts of Europe and America in June 1835. Phil. Trans. 1836.
- Researches on the Tides. —. Seventh Series. On the Diurnal Inequality of the Height of the Tide, especially at Plymouth and at Singapore; and on the Mean Level of the Sea. Phil. Trans. 1837.

- W. Whewell, *Researches on the Tides*. — Eight Series. On the Progress of the Diurnal Inequality along the coasts of Europe. Phil. Trans. 1837.
- *Researches on the Tides*. — Ninth Series. On the Determination of the Laws of the Tides from short Series of Observations. Phil. Trans. 1838.
- *Researches on the Tides*. — Tenth Series. On the Laws of Low Water at the Port of Plymouth, and on the Permanency of Mean Water. Phil. Trans. 1839.
- *Researches on the Tides*. — Eleventh Series. On certain Tide Observations made in the Indian Seas. Phil. Trans. 1839.
- Additional Note to the Eleventh Series of *Researches on the Tides*. Phil. Trans. 1840.
- *Researches on the Tides*. — Twelfth Series. On the Laws of the Rise and Fall of the Sea's Surface during each Tide. Phil. Trans. 1840.
- *Researches on the Tides*. — Thirteenth Series. On the Tide of the Pacific, and on the diurnal Inequality. Phil. Trans. 1848.
- *Researches on the Tides*. — Fourteenth Series. On the Results of continued Tide Observations at several places on the British Coasts. Phil. Trans. 1850.
- *Discussions of Tides*. Rep. of the British Assoc. 1838.
- Description of a new Tide-Gauge, constructed by T. G. Bunt, and erected on the eastern bank of the river Avon, in front of the Hotwell House, Bristol. Phil. Trans. 1838.
- On our ignorance of the Tides. Rep. of the British Ass. 1851.
- Tides, with Appendix by R. Main. *A Manual of scientific Enquiry*. 4th Ed. 1871, Article III.
- G. B. Airy, *Tides and Waves*. *Encyclopaedia metropolitana*.
- on the Laws of the Rise and Fall of the Tide in the River Thames. Phil. Trans. 1842.
- on the Laws of the Tides on the Coasts of Ireland, as inferred from an extensive series of observations made in connection with the Ordnance survey of Ireland. Phil. Trans. 1845.
- Daussy, *Mémoire sur les marées des côtes de France*. Conn. des Temps. 1834.
- D. Mackie, *Tides of Dundee and Glasgow*. Rep. of the Br. Ass. 1837.
- F. W. Bessel, über Fluth und Ebbe. *Schumacher's Jahrbuch für 1838 und in Bessel's popul. Vorlesungen*.
- Hewett, on the tide of the north sea. Rep. of the British Ass. 1841.
- F. H. Gernar, *Fluth und Ebbe*. Nach den Englischen Beobachtungen. *Lüdde's Zeitschr. für vergl. Erdkunde*. Band I. 1842.
- H. Hübbe, einige Wasserstandsbeobachtungen im Fluthgebiete des Elbstroms. 1842.
- E. Becher, *Tide Observations made at Tahiti*. Phil. Trans. 1843.
- Ch. Delaunay, *Mémoire sur la théorie des marées*. 1844. *Liouville Journal de mathématiques*. 9.
- Hagen, über Fluthbeobachtungen an der Preussischen Ostsee-Küste. *Wasserbaukunst* III, 1.
- Talysin, *Untersuchungen über die Fluth und Ebbe im Weissen Meere*. 1848 und 1852. *Bullet. de l'Acad. imp. de St. Pétersbourg*.
- C. H. Davis, on the geological action of the tidal and other currents of the ocean. 1849.
- F. W. Beechy, *Report of Observations made upon the Tides in the Irish Sea, and upon the great similarity of Tidal Phenomena of the Irish and English Channels, and the importance of extending the Experiments round the Land's End and up the English Channel*. Phil. Trans. 1851.
- *Report of further Observations upon the Tidal Streams of the North Sea and English Channel, with Remarks upon the Laws by which those Streams appear to be governed*. Phil. Trans. 1851.
- A. D. Bache, additional notes of a discussion of tidal observations, made at Cat Island, Louisiana. 1852.
- preliminary determination of cotidal-lines on the atlantic coast of the United States from the Coast-Survey tidal observations. Report of the Superintendent of the Coast-Survey. 1854.
- on the tides of the Western Coast of the United States.
- C. van der Stern, *Fluthbeobachtungen am Helder*. *Verhandlingen van het Kon. Institut van Ingenieurs*. 1852, 1853.
- James Clark on the Effect of the Pressure of the Atmosphere on the Mean Level of the Ocean. Phil. Trans. 1854.
- S. Haughton, on the Solar and Lunar Diurnal Tides on the Coast of Ireland. Trans. of the R. Irish Acad. 1854.

- S. Haughton, on the Tides of the Arctic Seas. Part. I, II, III. Phil. Trans. 1863, 1866.
- W. Ferrel, The problem of the Tides with regard of oscillations of the second Kind. 1856. Gould Astronomical Journal, No. 94.
- Paschen, über die Wahrnehmbarkeit von Ebbe und Fluth in der Ostsee. 1856.
- A. Erman, über Ebbe und Fluth an den Ochotzker und Kamtschatischen Küsten des Grossen Oceans.
- Graham, a lunar tidal wave in the Lake Michigan. 1860.
- Fitzroy, Notice of Tidal Observations. Rep. of the Br. Ass. 1861.
- Report of the Committee appointed in 1861 to report on a Peculiarity of the Tide Observations at the Port of Hull. Rep. of the Br. Ass. 1862.
- Report on Tidal Observations made on the Humber and Rivers Trent and Ouse, 1864. Rep. of the Br. Ass. 1864.
- T. Carrick on Tides. Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester. Vol. II of 3 Series. 1864.
- Hagen, die preussische Ostsee-Küste in Betreff der Frage, ob dieselbe eine Hebung oder Senkung bemerken lässt. 1866.
- Berghaus, phys. Atlas p. 122.
- Instruction zur Behandlung der selbstregistrirenden Fluthmesser. Herausgegeben von der Adria-Commission der k. Akad. d. Wissensch. zu Wien.
- H. W. Dove, der Kreislauf des Wassers auf der Oberfläche der Erde. 1866.
- Ueber die Gestalt der Fluchtlinien an den amerikanischen und europäischen Küsten. Zeitschr. für allgem. Erdkunde, Bd. 6.
- T. G. Bunt, Discussion of Tidal Observations at Bristol. Phil. Trans. 1867.
- W. Parkes, on the Tides of Bombay and Kurrachee. Phil. Trans. 1868.
- Reports of the Committee for the purpose of promoting the Extension, Improvement and Harmonic Analysis of Tidal Observations, drawn up by Sir W. Thomson. Rep. of the British Association. 1868, 1870, 1871.
- John Burdwood, Directions for reducing Tidal Observations.
- The Tide Tables for the English and Irish Ports; also the Times and Heights of High Water at Full and Change, for the Principal Places of the Globe. Published annually by J. D. Potter.
- H. Lentz, von der Fluth und Ebbe des Meeres. 1873.
- J. Kayser, Physik des Meeres. 1873.
- F. H. Reitz, Wasserstandszeiger für die mittlere Höhe. 1873.
- H. Schmick, das Fluthphänomen und sein Zusammenhang mit den säkularen Schwankungen des Seespiegels. 1874.
- W. J. Jordan, the Ocean: its Tides and their causes. 1873.

Anleitung zur Bestimmung der Elemente des Erdmagnetismus auf Reisen.

Von

H. Wild.

Einleitung.

G. B. Airy beschliesst sein im Jahre 1870 veröffentlichtes Werk „Ueber den Magnetismus“¹⁾ mit den Worten: „Im Ganzen müssen wir unsere Meinung dahin aussprechen, dass die allgemeine Ursache des Erdmagnetismus immer noch eines der Geheimnisse der kosmischen Physik bleibt.“ Obschon seither mehrere neue Versuche von Theorien des Erdmagnetismus gemacht worden sind, so bezeichnet Vorstehendes doch auch jetzt noch den Zustand unserer Erkenntniss des Wesens dieser Erscheinung. Der Grund hiervon liegt offenbar nicht allein in einem verminderten Geschick unserer Zeit zur Deduction, sondern mindestens ebenso sehr darin, dass unsere Erfahrungen über den Erdmagnetismus in seiner räumlichen und zeitlichen Gestaltung eben immer noch ungenügend sind. Die hauptsächlich noch zu sammelnden Erfahrungen sind zweierlei Art, nämlich continuirliche und möglichst genaue Beobachtungen der Veränderungen der erdmagnetischen Kraft, besonders durch selbstregistrirende Instrumente, an wenigen Punkten der Erdoberfläche zur Erforschung ihres Zusammenhanges mit andern irdischen und kosmischen Erscheinungen und sodann Beobachtungen der Elemente des Erdmagnetismus, wenn auch nur vereinzelt, an vielen Orten und insbesondere an solchen, wo bis dahin keine oder nur einmalige Messungen dieser Art angestellt worden sind. Das Letztere ist die Aufgabe der magnetischen Beobachtungen auf Reisen.

Die magnetischen Beobachtungen auf Reisen, die wir hier allein zu besprechen haben, bieten unstreitig manche Schwierigkeiten dar, welchen die bezüglichen Messungen auf ständigen Observatorien nicht oder viel weniger unterliegen. Bei der Auswahl der Instrumente kann nicht allein die Rücksicht auf die höchste Leistungsfähigkeit entscheiden, sondern es muss auch die Möglichkeit eines sichern und nicht zu unbequemen Transports, häufig auch noch die einfachere Behandlung und raschere Beobachtung in's Auge gefasst werden. Dass die Beobachtungen auf Reisen meistens entweder ganz im Freien oder nur in mangelhaft vor den Unbilden der Witterung schützenden Zelten angestellt werden müssen, dass man dabei häufig durch äussere Umstände in der Wahl der günstigsten Zeiten beschränkt

ist, dass störende Einflüsse hier schwieriger ganz zu beseitigen oder wenigstens aus den Endresultaten zu eliminiren sind, dies und andere Hindernisse mehr ermüden oft die Geduld des Reisenden und nehmen, wenn anders gute Resultate erzielt werden sollen, seine Aufmerksamkeit in einem viel höhern Maasse in Anspruch, als gewöhnlich vermuthet wird.

Eine gedrängte Anleitung zur Anstellung magnetischer Messungen erscheint daher ganz besonders für Beobachtungen auf Reisen als Bedürfniss. Sie hat der Natur der Sache nach in zwei Theile zu zerfallen, nämlich einen ersten allgemeinen Theil, in welchem dem Reisenden kurz die allgemeinen Principien dieser Messungen und die bereits vorliegenden bekannten That-sachen über den Erdmagnetismus, insofern sie auf seine Beobachtungen influiren können, in's Gedächtniss zurückgerufen werden und sodann einen zweiten speciellern Theil, der die Instruction für den Gebrauch der Reiseinstrumente enthält.²⁾ Wir werden hier nur die magnetischen Beobachtungen auf dem Lande betrachten, da diejenigen zur See wegen des Eisengehalts und der Bewegungen der Schiffe besondere Vorsichtsmassregeln und Hilfsapparate erfordern und daher besser im nautischen Theil dieses Werkes zur Behandlung kommen.

St. Petersburg, 1. Februar 1874.

I. Allgemeines über die Bestimmung und die Eigenschaften der erdmagnetischen Kraft.

1. Die magnetische Kraft der Erde ist an irgend einem Orte als vollständig bestimmt zu betrachten, wenn ihre Richtung und Grösse daselbst gegeben ist. Die Richtung der erdmagnetischen Kraft pflegt man auf zwei, für jeden Ort genau bestimmbare feste Ebenen, nämlich den astronomischen Meridian und die Horizontalebene, zu beziehen und heisst Declination jenen Winkel, welchen eine Verticalebene durch die Richtung der erdmagnetischen Kraft, der sogen. magnetische Meridian, mit dem astronomischen Meridian einschliesst, und Inclination den Neigungswinkel der Kraft gegen die Horizontalebene. Die magnetische Kraft der Erde an irgend einem Orte wird also auch durch die drei Elemente: Declination, Inclination und Intensität bestimmt. Statt durch diese drei Elemente hat man auch wohl die erdmagnetische Kraft durch ihre drei Componenten nach drei aufeinander senkrecht stehenden Richtungen, nämlich der Verticalen, der Nord-Süd-Richtung und der Ost-West-Richtung in der Horizontalebene definirt. Die Beziehung zwischen diesen beiderlei Bestimmungs-Elementen ergibt sich leicht.

Heissen wir K die ganze Intensität des Erdmagnetismus
 V die verticale Componente derselben
 H die ganze horizontale Componente der erstern
 X die Nord-Süd-Componente der letztern
 Y die Ost-West- " " " "
 i die Inclination
 d die Declination

so hat man die Relationen:

$$\begin{aligned} V &= K \sin i, & H &= K \cos i, \\ X &= K \cos i \cos d, & Y &= K \cos i \sin d. \end{aligned}$$

Da indessen die drei Componenten V , X und Y eine mehr theoretische als praktische Bedeutung haben, so werden wir uns hier an die drei erstern Elemente halten.

2. Die Declination wird bestimmt, indem man den Horizontal-Winkel zwischen dem astronomischen Meridian des Orts und der magnetischen Axe einer, um eine verticale Axe drehbaren, Magnetnadel misst. Sie wird in Graden, Minuten und Secunden (oder auch Zehntel- und Hundertel-Minuten) ausgedrückt und als östliche oder westliche Declination unterschieden, je nachdem das Nordende (das nach Norden weisende Ende) der Magnetnadel nach Osten oder Westen vom astronomischen Meridian abweicht. Selten wird die westliche Declination auch als die positive, und die östliche als negative bezeichnet.

3. Die Inclination erhält man durch Ausmessung des Vertical-Winkels zwischen der Horizontalebene und der magnetischen Axe einer Magnetnadel, die um eine, auf dem magnetischen Meridian senkrecht stehende Horizontalaxe drehbar ist. Sie wird wie die Declination in Graden, Minuten und Secunden (oder Zehntel- und Hundertel-Minuten) ausgedrückt und als nördliche oder südliche Inclination unterschieden, je nachdem das Nordende der Magnetnadel sich unter die Horizontale senkt oder über dieselbe erhebt. Die erstere wird auch wohl positive und die letztere negative Inclination genannt.

4. Die Intensität lässt sich ihrem ganzen Betrage nach direct nur unsicher ermitteln, während die Bestimmung ihrer horizontalen Componente einer grossen Genauigkeit fähig ist. Man zieht es daher durchweg vor, die letztere Grösse unmittelbar zu bestimmen und dann aus ihr und der bekannten Inclination die ganze Intensität nach der Formel: $K = \frac{H}{\cos i}$ zu berechnen.

Die absolute Bestimmung der horizontalen Componente der erdmagnetischen Kraft oder kurzweg der Horizontalintensität des Erdmagnetismus erheischt zweierlei Messungen: erstlich die Beobachtung der Schwingungsdauer einer horizontalen Magnetnadel um eine verticale Axe und zweitens die Beobachtung der Ablenkung aus dem magnetischen Meridian, welche diese Nadel in fixer Lage aus gewisser Entfernung bei einer zweiten um eine verticale Axe drehbaren Magnetnadel bewirkt. Sie setzt überdies die Kenntniss resp. Abmessung der letztern Entfernung sowie des Trägheitsmomentes oder der Dimensionen und der Masse des Schwingungsmagneten voraus.

Der numerische Ausdruck der aus diesen Beobachtungsdaten zu berechnenden Horizontalintensität hängt von den Einheiten ab, welche man für die Zeit, die Länge und die Masse bei obigen Messungen gewählt hat. Man erhält die Horizontalintensität ausgedrückt in absoluten Gauss'schen oder metrischen Einheiten, wenn wir alle Längen nach Millimetern, die Massen nach Milligrammen und die Zeiten nach Secunden der mittlern Sonnenzeit messen. Neben diesen Einheiten werden nur noch die der „Royal Society“ oder die englischen gebraucht, wobei als Längeneinheit der englische Fuss, als Masseneinheit die Masse eines Grains und als Zeiteinheit wieder die Secunde der mittlern Sonnenzeit gelten. Intensitätswerthe, welche in den letztern Einheiten ausgedrückt sind, hat man zur Reduction auf die Gauss'schen Einheiten mit dem Factor: 0,46108 zu multipliciren.

5. Isogone, isokline und isodyname Linien. Wenn man die Elemente der erdmagnetischen Kraft in fremden Gegenden zu bestimmen hat, so ist es nützlich, sich an der Hand der bereits vorhandenen Daten eine Vorstellung von dem ungefähren Betrag derselben zu machen. Dazu können am besten die magnetischen Karten benutzt werden. Man hat nämlich auf Karten diejenigen Orte, welchen jeweiligen gleiche Declination resp. Inclination zukamen, durch Linien verbunden und die Linien gleicher Declination: isogone, diejenigen gleicher Inclination: isokline, endlich die gleicher Intensität: isodyname Linien genannt.

Unter diesen magnetischen Karten erwähnen wir nur die neuesten und vollständigsten, nämlich die von Sir E. Sabine für die südliche Hemisphäre (Philos. Transactions 1868) und für die nördliche Hemisphäre (Philos. Transactions 1872) beide alle 3 obigen Elemente umfassend und für die Epoche 1840—45 geltend und die noch umfassenderen, nicht willkürlich, sondern an der Hand der Gauss'schen Theorie entworfenen in dem Atlas des Erdmagnetismus von Gauss und W. Weber. Die letzteren gelten für die Epoche 1830 und die Intensitätskarten unterscheiden sich von denen Sabine's noch dadurch, dass sie nach einer willkürlichen Einheit entworfen sind, wonach die ganze Intensität in London 1872 ist, also die den Tafeln zu entnehmenden Werthe mit 0,0034941 zur Verwandlung in das absolute metrische Maass multiplicirt werden müssen, während Sabine's Karten unmittelbar absolute Werthe der Intensität in englischem Maasse geben. Der Gauss'sche Atlas enthält auch besondere Karten für die Horizontalintensität.

Aus den Gauss'schen Karten folgt, dass auf der Erdoberfläche die ganze Intensität zwischen den beiden Extrem-Werthen 7,898 als Max. und 2,828 als Min. nach metrischem Maasse, die Horizontalintensität aber zwischen 3,733 als Max. und 0 als Min. nach demselben Maasse schwankt, während die Declination alle Werthe von 0° bis $\pm 180^\circ$ und die Inclination von 0° bis $\pm 90^\circ$ annimmt. Diese Karten ergeben auch, dass im mittleren Europa eine Längendifferenz von 1 Bogen-Minute = 4 Zeitsekunden = 1,3 Kilometer eine Declinationsänderung von ungefähr $\frac{1}{2}$ Minute und eine Breitendifferenz von 1 Bogen-Minute = 1,9 Kilometer eine Aenderung der Inclination um 1 Minute und der Horizontalintensität um 0,0008 absoluten metrischen Maasses zur Folge hat. Hiernach lässt sich je nach der Genauigkeit, welche man seinen Messungen zu geben wünscht, die nothwendige Sicherheit in der Fixirung des Beobachtungsortes bemessen. Da überdies gewisse Local-Einflüsse jeweiligen vorhanden sein können, so ist es zur spätern Wiederauffindung genau desselben Beobachtungspunktes zu empfehlen, nach dem Vorgange von Lamont in seinen magnetischen Ortsbestimmungen³⁾ ausser der Länge und Breite des Beobachtungsortes auch noch einen kleinen Situationsplan desselben beizufügen.

Die Vergleichung dieser beiderlei Karten, von denen also die einen auf ungefähr $12\frac{1}{2}$ Jahre spätere Beobachtungen sich stützen, als die andern, zeigt nicht unerhebliche Differenzen zwischen beiden und weist damit auf eine Erscheinung hin, welche die Schwierigkeiten magnetischer Beobachtungen bedeutend erhöht, es ist dies die Veränderlichkeit des Erdmagnetismus mit der Zeit. Dieselbe manifestirt sich in dreierlei Weise, nämlich als sogen. Säcularvariation, als tägliche Variation und als Störung.

6. Säcularvariation. Es zeigt sich entsprechend der vorstehenden Bemerkung, dass die Elemente der erdmagnetischen Kraft an ein und demselben Orte auch in ihren jährlichen Mittelwerthen eine langsame continuirliche Veränderung mit der Zeit erleiden, die zu verschiedenen Zeiten am

gleichen Orte in verschiedenem Sinne erfolgt, für verschiedene Orte einen verschiedenen Betrag und vielfach auch einen entgegengesetzten Sinn hat. Im mittlern Europa ändern sich z. B. in Folge dieser sogen. Säcularvariation die magnetischen Elemente zur Zeit in der Art, dass per Jahr

die mittlere westliche Declination um ungefähr	6 Min.
abnimmt;	
die mittlere nördliche Inclination „ „	2 „
abnimmt;	
die mittlere Horizontal-Intensität „ „	0,002 G. E.
zunimmt.	
die mittlere Ganze-Intensität „ „	0,0005 G. E.
zunimmt.	

Dieser Säcular-Variation halber ist es also bei vereinzeltten magnetischen Beobachtungen durchaus nothwendig, das Datum, für welches die Messung gilt, dem erhaltenen Werthe beizufügen.

7. Tägliche Variation. Des Weitern zeigen alle drei Elemente des Erdmagnetismus eine im Laufe von 24 Stunden periodisch wiederkehrende Veränderung, welche man die tägliche Variation genannt hat.

Die westliche Declination — für die südliche Halbkugel die östliche — hat im Jahresmittel ihren geringsten täglichen Werth ungefähr um 8^h Vm., nimmt dann rasch bis zum Maximum um 1 $\frac{1}{2}$ bis 2^h Nm. zu und kehrt darauf langsam im Laufe des Nachmittags und langsamer während der Nacht zu jenem ursprünglichen Werth zurück. Durch das Mittel geht die Nadel zwischen 10 und 11^h Vm. und 8 und 9^h Nm. Der Unterschied zwischen Max. und Min. beträgt in mittlern Breiten 7—8 Minuten.

Die Inclination zeigt im Jahresmittel ihren grössten täglichen Werth ungefähr um 11^h Vm. nimmt dann im Laufe des Nachmittags langsam bis ungefähr um 10^h Nm. ab, um darauf zuerst langsam, später — etwa von 5^h Vm. an — rascher zum Maximum um 11^h Vm. zurückzukehren. Der Mittelwerth wird um 7^h Vm. und 3 $\frac{1}{2}$ ^h Nm. passirt. Die Differenz zwischen Max. und Min. beträgt nur 2—3 Minuten.

Die Horizontal-Intensität endlich schliesst sich in ihrem täglichen Gange fast ganz der Inclination an, d. h. sie erreicht ihren kleinsten Werth ungefähr um 11^h Vm., den grössten ungefähr um 9^h Nm. und zeigt während der Nacht eine verhältnissmässig kleine Veränderung. Durch den Mittelwerth geht sie ungefähr um 7^h Vm. und etwas nach 3^h Nm. und die Differenz zwischen Max. und Min. erreicht durchschnittlich 0,003 absoluten Gauss'schen Maasses.

Für alle 3 Elemente ist die Amplitude der Variation in höhern Breiten grösser als in niedrigen, im Sommer der betreffenden Halbkugel grösser — ungefähr doppelt so gross — als im Winter, endlich in einem regelmässigen Cyklus von 10—11 Jahren zu- und abnehmend. Diese Veränderung der Amplitude ist auch von Aenderungen im Charakter der Bewegung begleitet, die indessen verhältnissmässig viel unbedeutender sind.

Diese tägliche Variation erheischt demnach, dass wir dem Datum der Messung auch noch die Tageszeit derselben genau beifügen, um das Beobachtungsergebniss später vom Einfluss der täglichen Variation möglichst befreien resp. auf das Tagesmittel reduciren zu können. Zur Zeit der raschesten Aenderung der Declination beträgt z. B. dieselbe 0,05 Bogen-Minuten in der Zeitminute und es wäre demgemäss die Zeit bis auf 2 Minuten genau anzugeben, wenn wir bei der Bestimmung der Declination eine Genauigkeit von 0.1 Bogen-Minute anstreben. — Zur Reduction des einen oder andern,

zu irgend einer Tagesstunde bestimmten magnetischen Elements auf das betreffende Tagesmittel kann man sich, analog wie dies bei der Temperatur geschieht, des bekannten täglichen Ganges des fraglichen Elements für eine benachbarte Normalstation bedienen. Ist eine solche nicht in der Nähe, so kann man entweder zu den Zeiten beobachten, wo das Medium des betreffenden Elements einzutreten pflegt oder auch, wie dies bei der Beobachtung der meteorologischen Phänomene gewöhnlich geschieht, zu solchen Terminen die Messungen anstellen, für welche das arithmetische Mittel sich nur wenig vom wahren Tagesmittel entfernt. Als solche Stunden-Combinationen sind zu empfehlen

für die Declination: 8^h Vm., 2^h und 8 oder 9^h Nm.,

für die Inclination: 7^h und 11^h Vm. und 10^h Nm. und

für die Horizontalintensität 7^h und 11^h Vm. und 9^h Nm. *)

8. Störungen. Den erwähnten regelmässigen täglichen Gang zeigen die drei Elemente der erdmagnetischen Kraft aber bloss im Durchschnitt ganzer Monate und an wenigen einzelnen Tagen; derselbe ist vielmehr im Allgemeinen ein sehr unregelmässiger, so dass die wirklichen Werthe oft in rascher Folge und um bedeutende Beträge von diesem normalen Gange nach der einen und andern Seite abweichen. Diese Abweichungen vom normalen Gange, welche selbst in mittlern Breiten bei der Declination $\pm 1^0$, bei der Inclination $\pm 10'$, und bei der Horizontalintensität $\pm 0,03$ Gauss'sche Einheiten betragen können, werden als magnetische Störungen und die bedeutendern auch wohl als magnetische Ungewitter oder Stürme bezeichnet.

Die Störungen machen sich durchweg bei allen 3 Elementen zugleich geltend, während aber diejenigen der Inclination und Horizontal-Intensität eine gewisse unverkennbare Uebereinstimmung zeigen, scheinen diejenigen der Declination in ihrem Verlauf ganz unabhängig von jenen zu sein.

Eine an einem Orte beobachtete Störung scheint sich stets auf die ganze Erdoberfläche auszudehnen, manifestirt sich aber an verschiedenen Orten in verschiedener Weise. Der Betrag der Störung ist unter höhern Breiten viel bedeutender als unter niedrigern; verschwindet wenigstens für die Declination am Aequator fast ganz und wird für diese auf der südlichen Halbkugel entgegengesetzt. Für Orte derselben geogr. Länge ist die Form der Störung eine ganz ähnliche und wird nur in höhern Breiten eine entschieden abweichende. Betrachten wir dagegen Orte gleicher Breite, aber verschiedener Länge, so zeigen um 180^0 auseinanderliegende Punkte zu gleicher Zeit entgegengesetzte Störungsschwankungen und von der Stelle stärkster Störung nimmt deren Betrag nach beiden Seiten hin ab und ist beiderseits in 90^0 Abstand zu gleicher Zeit nahezu Null.

Die Häufigkeit der magnetischen Störungen geht Hand in Hand mit der Häufigkeit der Sonnenflecken und der Nordlichter, zeigt also wie diese eine ungefähr 11jährige Periode.

Die Störungen beeinträchtigen unter allen zeitlichen Veränderungen der magnetischen Elemente ihres hohen Betrages und ihrer Unregelmässigkeit halber am meisten die Sicherheit der magnetischen Messungen. Zu Zeiten eigentlicher magnetischer Ungewitter, welche leicht an einer beständigen Unruhe und an plötzlichen Bewegungen der Declinationsnadel zu erkennen sind, ist es gerathen, die Beobachtungen, aus welchen mittlere Werthe der mag-

*) Die von Kreil entdeckten periodischen Veränderungen der magnetischen Elemente nach Mondzeit, sowie die von Hornstein für die Rotationszeit der Sonne nachgewiesenen haben als sehr klein mehr nur eine theoretische Bedeutung und können daher hier ganz ausser Acht gelassen werden.

netischen Elemente abgeleitet werden sollen, ganz auszusetzen. Finden dagegen nur geringere Störungen statt, so sind aus Messungen während derselben doch noch brauchbare Resultate herzuleiten, wenn man sich genau die Zeiten der einzelnen Beobachtungen notirt und wenn in der Nähe ein Observatorium sich befindet, wo in kurzen Intervallen magnetische Variationsinstrumente abgelesen werden oder noch besser eine continuirliche Selbstregistrirung solcher erfolgt. Da nämlich an nahe liegenden Orten eine fast mathematische Uebereinstimmung im Gange der Störungen erfolgt, so kann man nachträglich vermittelst der gleichzeitigen Aufzeichnungen der letztern die erhaltenen Beobachtungsresultate auf wahre Mittel reduciren. Für den Fall grösserer Entfernung (d. h. etwa über 5° in Breite und 10° in Länge) des Beobachtungsortes von einem ständigen magnetischen Observatorium kann man zwar die Veränderung des Störungsbetrags mit der Länge und Breite bei der Reduction einigermaassen in Rechnung bringen, doch erscheint es im Allgemeinen sicherer, an jedem Orte mehrere Messungen zu verschiedener Zeit anzustellen, um dann später diejenigen von ihnen, die nach der Angabe graphischer Instrumente mit Störungen zusammenfielen, ganz zu streichen oder wenigstens bei der Ableitung der Mittelwerthe mit geringerem Gewichte in Rechnung zu bringen.

II. Beschreibung und Gebrauch der magnetischen Reiseinstrumente.

Dem Zweck dieses Werkes entsprechend, das namentlich als Anleitung für Reisende in noch wenig erforschte, also auch von den Culturcentren entfernte Gegenden bestimmt ist, haben wir uns bei der Auswahl der hier zu beschreibenden Instrumente für die Bestimmung der drei Elemente des Erdmagnetismus besonders von zwei an dieselben zu stellenden Anforderungen leiten lassen; erstlich sollen sie alle Elemente nicht bloss relativ, sondern absolut zu messen gestatten, da man sich auf längeren Reisen nicht auf die unveränderte Erhaltung gewisser Grössen, welche die erste Methode voraussetzt, verlassen kann; zweitens müssen sie selbst auf die Gefahr hin, eine etwas geringere Genauigkeit der Messung damit erzielen zu können, compendiös und dauerhaft sein, sowie rasche und einfache Beobachtungen gestatten. Durch die erste Forderung wurde der magnetische Reisetheodolith von Lamont⁴⁾ trotz der guten Resultate, welche er selbst damit bei seinen magnetischen Ortsbestimmungen in Deutschland, Frankreich und Spanien erzielt hat, von unserer Betrachtung ausgeschlossen, da derselbe für die Declination und Inclination und theilweise auch die Intensität nur relative Bestimmungen erlaubt, ebenso auch das compensirte Magnetometer von W. Weber (beschrieben von Kohlrausch⁵⁾, da dasselbe eine absolute Bestimmung zwar nicht ausschliesst, wohl aber sehr erschwert; den zweiten Bedingungen entsprechend, glaubte ich hier auch von dem vollständigern magnetischen Theodolithen sowohl in der Gestalt, wie sie ihm Lamont gegeben hat⁶⁾, als auch in der in England üblichen von Lloyd⁷⁾ und ebenso in denjenigen Formen, die ich angegeben habe⁸⁾, absehen zu müssen. Gelegentlich werde ich indessen einige Andeutungen über den abweichenden Gebrauch auch dieser letztern Instrumente nicht unterlassen.

1. Verification der Instrumente. Da selbst die aus den renomirtesten Werkstätten hervorgegangenen magnetischen Instrumente nicht

immer den an sie zu stellenden constructiven Anforderungen genügen, so müssen dieselben behufs Erzielung guter Resultate vor dem Gebrauche durchaus einer sorgfältigen Verification unterworfen werden. Diese Verification erfordert aber vielfach Hülfsinstrumente und Vorrichtungen, wie sie auf Reisen gewöhnlich nicht zur Disposition zu sein pflegen; es ist daher nothwendig, dass dieselbe vor Antritt der Reise erfolge. Wenn in der Nähe des Ausgangspunktes der Reise keine meteorologisch-magnetische Centralanstalt vorhanden ist, wo der Reisende zu dieser Verification die nöthigen Hülfsmittel und Anleitung findet, so wird er sich diese doch von irgend einem physikalischen Institute verschaffen können. Ich werde daher der Kürze halber in Folgendem nur die Bedingungen angeben, denen das bezügliche Instrument zu genügen hat und deren Erfüllung durch die Verification zu constatiren ist, dagegen auf Erörterungen über die Verificationsmethoden selbst nicht eingehen. Nach jeder längeren Reise sollte, wo möglich an demselben Orte wie vorher, eine neue Verification aller Theile der Instrumente erfolgen, um sich von der unveränderten Erhaltung derselben zu überzeugen.

Eine erste und allgemeine Bedingung für alle magnetischen Instrumente ist, dass alle Theile derselben, mit Ausnahme der Magnete selbst, durchaus eisenfrei oder unmagnetisch seien.

2. Aufstellung der Instrumente. Da ein passender Stand für die Aufstellung der magnetischen Instrumente nur an den wenigsten Orten unmittelbar zu finden ist, so ist es im Allgemeinen nöthig, ein Gestell mit 3 Füßen auf die Reise mitzunehmen. Damit dasselbe beim Transport weniger Raum einnehme, wird es zum Auseinandernehmen oder besser zum Zusammenklappen eingerichtet. Die obere, die Füße verbindende Platte besteht gewöhnlich aus Messing und ist mit 3 radialen Rinnen zur Aufnahme der Stellschraubspitzen der Instrumente versehen. Etwa in der halben Höhe werden die 3 Stativfüße durch ein Brett oder durch einzuhakende Stangen verbunden, auf welche man ein zusammenzuklappendes Brett legen kann. Dieses Brett dient als Tisch für Hülfapparate, wie Libelle, Putzleder u. dergl. Das Stativ mit allen zugehörigen Theilen muss ebenfalls ganz unmagnetisch sein.

Zur Anstellung der Beobachtungen wird das Stativ an einem frei gelegenen Orte, möglichst fern von allen Gebäuden und andern Gegenständen, die Eisen enthalten, so aufgestellt, dass seine obere Platte nach dem Augenmaasse ungefähr horizontal steht. Dass der Beobachter selbst alle eisernen Gegenstände, wie Schlüssel, Messer u. dergl., die er gewöhnlich bei sich trägt, abzulegen und in einige Entfernung zu bringen hat, versteht sich wohl von selbst; es erscheint aber nicht überflüssig, darauf aufmerksam zu machen, dass häufig auch Theile der Kleidungsstücke, wie z. B. Knöpfe und Schnallen, etwas magnetisch sind und wegen der Nähe des Beobachters störend auf die Magnete der Instrumente einwirken können. Eine genaue Prüfung der letztern ist daher ebenfalls geboten.

3. Bestimmung der Inclination. Das zur absoluten Bestimmung der Inclination dienende Instrument, das sogenannte Inclinatorium, besteht aus einem horizontalen getheilten Kreis mit 3 Stellschrauben. Auf der Alhidade dieses Kreises ist ein verticaler getheilter Kreis mit umgebendem Gehäuse aus Messing und Glas und einem Träger für die Horizontalaxe der Inclinationsnadel befestigt, und auf ihr selbst oder oben auf dem Gehäuse befindet sich eine Libelle. Ausserdem gehören zu jedem Inclinatorium zwei oder mehrere Inclinationsnadeln, zwei, der Grösse dieser Nadel angepasste

kräftige Magnetstäbe und ein sogenannter Streichtrog, in welchen man die Inclinationsnadel fest hineinlegen kann, wenn sie zur Umkehrung der Pole mit den Magnetstäben gestrichen werden soll. Ein Haarpinsel und ein Stück sämisches Leder zum Entfernen des Staubes sind unentbehrlich; ein kleiner Taschencompass ist als Beigabe erwünscht.

Der Horizontalkreis bei den Inclinatorien ist durchweg so getheilt, dass man mit dem Vernier noch 1 Minute ablesen kann; die Ziffern gehen von 0 bis 350. Der Verticalkreis ist entweder in gleicher Weise, oder nur je in den verschiedenen Quadranten von 0 bis 90, beziffert, wobei dann die Null-Linie annähernd horizontal liegt. Die Ablesung der Nadel-Stellung an ihm geschieht entweder in der Art, dass man direct beobachtet, welchem Theilstrich die Spitze der Nadel gegenübersteht — in diesem Fall muss die Nadel sehr spitz sein, dem innern, getheilten Rande des Kreises sehr nahe kommen und der Kreis entweder in $\frac{1}{3}^0$ oder $\frac{1}{6}^0$ direct eingetheilt sein, so dass man unter Zuhülfnahme einer Lupe leicht und sicher die Zehntel, also 2' oder 1' schätzen kann — oder an der Alhidade des Kreises, deren Verniers dann mindestens noch 1' ablesen lassen, sitzen zwei kleine Mikroskope mit Fadenkreuzen, welche letztere auf die Nadelspitzen oder feine Striche an den Nadelenden eingestellt werden. Die letztere Ablesungsmethode besitzt den Vorzug, dass der getheilte Kreis nicht so nahe an die Nadel herantreten muss, und so Störungen durch dazwischen kommende Staubtheilchen, oder durch schwach magnetische Eigenschaften des erstern viel weniger zu befürchten sind, als bei der ersten Methode.

Die Nadeln tragen auf einer ihrer Seitenflächen zwischen der Mitte und dem einen Ende eine Marke, am besten eine Ziffer zu ihrer Unterscheidung und zur Bezeichnung ihrer Seiten und Enden, sie sollen ferner recht dünne, kreisrunde und zum Hochglanz polirte Stahlzapfen haben, auf deren gute Erhaltung besondere Sorgfalt zu verwenden ist. Die Lager, auf welche sie im Gehäuse zu liegen kommen, bestehen meistens aus ebenfalls zum Hochglanz polirten, ganz schwach abgerundeten Achat-schneiden.

Nachdem das Instrument überhaupt und namentlich im Innern des Gehäuses die Lager für die Nadelaxe und der innere Rand des getheilten Kreises sorgfältig von Staub befreit worden sind, wird dasselbe auf den Dreifuss gestellt und in gewöhnlicher Weise nivellirt.

Alsdann müssen folgende Bedingungen erfüllt sein. Die Ebene des verticalen getheilten Kreises muss genau vertical sein; die Kanten der Achat-schneiden sollen in ein und dieselbe Horizontalebene fallen und so hoch sein, dass wenn die Zapfen der Nadel auf ihnen ruhen, die Axen der letztern genau in das Centrum des getheilten Kreises fallen; endlich müssen die Einschnitte in der Arretirungsvorrichtung, in welche sich die Nadelzapfen beim Arretiren einlegen, so justirt sein, dass die Nadelaxe nach dem Lösen der Arretirung jeweilen genau senkrecht zur Ebene des getheilten Kreises und in dessen Centrum sich befindet.

Nach erfolgter Nivellirung ist nun die Ebene des Verticalkreises zuerst in den magnetischen Meridian zu bringen. Zu dem Ende wird eine der Nadeln, nachdem ihre Zapfen mit dem Leder oder besser durch Einstechen in ein Stück Hollundermark gereinigt worden sind, so in den Apparat auf die Lager gelegt, dass die markirte Seite dem Beobachter zugewendet ist, die Arretirung sanft gelöst und das Gehäuse — das jeweilen nur für das Einlegen oder Herausnehmen der Nadel auf kurze Zeit geöffnet wird — so gedreht, bis der Nordpol der Nadel auf 90^0 der Theilung weist und dabei die Kreistheilung nach Norden gewendet ist. Der Horizontalkreis wird jetzt geklemmt, die Nadel durch die Arretirung nochmals gehoben und sanft heruntergelassen und darauf die Mikrometerschraube am Horizontalkreise, wenn nöthig, gedreht, bis der Nordpol der Nadel genau auf 90^0 einsteht. Die Ablesung des Verniers am Horizontalkreise bei dieser Stellung sei a_1 . Nunmehr drehen wir vermittelst der Mikrometerschraube den Horizontalkreis weiter, bis auch der Südpol der Nadel genau auf 90^0 weist. und wiederholen dies, wenn nöthig, nachdem wir wieder die Arretirung gehoben und gesenkt haben. Die neue Ablesung am Horizontalkreise sei a_2 . Die Klemme am

Horizontalkreise wird jetzt gelöst, das Gehäuse um 180^0 gedreht, so dass die getheilte Seite des Verticalkreises nach Süden gewendet ist, und wie vorhin zuerst das untere, dann das obere Ende der Nadel auf die Theilstriche 90 des letztern eingestellt. Die zwei entsprechenden Ablesungen am Horizontalkreise seien a_3 und a_4 ; alsdann ist die Ablesung am Horizontalkreise, bei welcher die Ebene des Verticalkreises senkrecht auf dem magnetischen Meridian steht, hinlänglich genau gegeben durch:

$$a = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4}{4},$$

und man hat, um den Verticalkreis in den magnetischen Meridian zu bringen, nur den Vernier am Horizontalkreise auf:

$$a \pm 90^0$$

einzustellen.

Da für diese Einstellung auf den Meridian eine Genauigkeit von $\pm \frac{1}{2}^0$ vollkommen genügt, so braucht man nur einen Vernier dabei zu beobachten.

Die Nadel wird jetzt aus dem Gehäuse herausgenommen, in den Streichtrog gelegt, die Stellung ihrer Pole mit dem Compass untersucht und darauf die letzteren durch Streichen mit dem grossen Magneten vertauscht, so dass das Ende, welches vorher ein Nordpol war, jetzt zu einem Südpol wird.

Es habe sich z. B. bei der Untersuchung der Nadel mit dem Compass das bezeichnete Ende als Südpol erwiesen, so werden die beiden Streichmagnete zur Umkehr der Pole so in der Nähe des Centrums der Nadel in beinahe verticaler Stellung aufgesetzt, dass der Südpol des einen Magneten auf das bezeichnete Ende, der Nordpol des andern auf das freie Ende der Nadel zu liegen kommt, und darauf streicht man mit jedem Magnet über die betreffende Nadelhälfte bis zum Ende hin, hebt die Stäbe auf, setzt sie wieder in gleicher Weise in der Mitte an und wiederholt so das Streichen eine bestimmte Zahl von Malen, etwa 10 Male. Sodann kehrt man die Nadel um ihre Längsaxe um 180^0 um, so dass jetzt die bezeichnete Seite nach unten gekehrt ist, wenn sie vorher oben war, und streicht sie in genau gleicher Weise wieder 10 Male. Damit bei diesem Streichen die Nadel keinen Schaden leidet, müssen die Streichmagnete etwas abgerundete Ränder haben, ferner muss die Nadel festgehalten und zugleich ihre Axe gegen Anstossen der Magnete geschützt werden. Es geschieht das Letztere in der Regel durch einen kleinen Bügel, der über die Mitte der Nadel gelegt wird und sie an den Streichtrog schwach anklammt.

Nach erfolgter Ummagnetisirung der Nadel — es sei dabei das bezeichnete Ende zu einem Nordpol geworden — werden die Zapfen wieder gereinigt, die Nadel in das Gehäuse so eingelegt, dass die bezeichnete Seite nach Osten gerichtet ist und der Verticalkreis so in den magnetischen Meridian gebracht, dass seine getheilte Seite nach Ost gewendet ist. Man versetzt darauf die Nadel nach Lösung der Arretirung durch einen Hilfsmagneten in Schwingungen und beobachtet 2 Male nach einander vermittelst des Chronometers die Anfangs- und Endzeit von etwa 10 Schwingungen derselben.

Ist so die Schwingungsdauer der Nadel bestimmt, so wird sie mit demselben Hilfsmagnet beruhigt und zwei Mal ihre Gleichgewichtslage an beiden Enden abgelesen, nachdem man jedesmal vorher die Arretirung gehoben und langsam wieder gesenkt hatte. Das Mittel der vier Ablesungen am Kreise für die beiden Nadelenden und die beiden Einstellungen sei i'_1 , so gilt also diese Grösse für bezeichnetes Nadelende als Nordpol, bezeichnete Nadelfläche nach Ost und Kreistheilung nach Ost gewendet.

Eine gleiche Beobachtung wird gemacht, nachdem man den Verticalkreis genau um 180^0 umgedreht hat. Das Mittel aus den vier neuen Ablesungen

am Kreise: i'_2 gilt dann für bezeichnetes Nadelende als Nordpol, bezeichnete Nadelfläche nach West und Kreistheilung nach West.

Nunmehr wird die Nadel auf ihren Lagern umgelegt — wozu vollkommenere Instrumente eine besondere mechanische Vorrichtung besitzen, sonst muss dies von der Hand geschehen — und die Beobachtung ihrer Gleichgewichtslage bei dieser Stellung wiederholt. Das Mittel der 4 Ablesungen am Kreise: i'_3 bezieht sich dann offenbar auf bezeichnetes Nadelende als Nordpol, bezeichnete Nadelfläche nach Ost, Kreistheilung nach West gewendet.

Endlich drehen wir bei unveränderter relativer Lage der Nadel den Vertikalkreis wieder genau um 180° und beobachten die neue Stellung derselben. Das Mittel der 4 Kreisablesungen: i'_4 bezieht sich auf bezeichnetes Nadelende als Nordpol, bezeichnete Nadelfläche nach West, Kreistheilung nach Ost gewendet.

Das Mittel i' der vier so erhaltenen Grössen oder:

$$i' = \frac{i'_1 + i'_2 + i'_3 + i'_4}{4}$$

gilt also für das bezeichnete Ende der Nadel als Nordpol.

Die Nadel wird jetzt entsprechend wie oben und insbesondere durch dieselbe Strichzahl ummagnetisirt, so dass ihr bezeichnetes Ende ein Südpol wird, die Schwingungsdauer neu bestimmt — die nahezu gleich sein soll — und darauf die Gleichgewichtslage der Nadel in denselben vier Hauptstellungen wie oben bestimmt. Heissen wir die entsprechenden vier Beobachtungsergebnisse: $i''_1, i''_2, i''_3, i''_4$, so bezieht sich also das Mittel aus ihnen:

$$i'' = \frac{i''_1 + i''_2 + i''_3 + i''_4}{4}$$

auf das bezeichnete Ende der Nadel als Südpol.

Die wahre Inclination i ist dann gegeben durch:

$$i = \frac{i' + i''}{2}.$$

Es gilt dieselbe für das Mittel aus den Zeiten, zu welchen man die einzelnen Messungen gemacht hat.

Dieses Resultat ist nur dann mit genügender Annäherung richtig, wenn die Schwingungsdauer der Magnetnadel bei den beiden verschiedenen Pollagen nahezu dieselbe gewesen ist, wenn ferner der Schwerpunkt derselben sehr nahe in die Drehungsaxe fällt, was daran zu erkennen ist, dass die Werthe i'_1, i'_2 etc. und i''_1, i''_2 etc. nur wenig von einander abweichen und wenn endlich die Zapfen der Nadel sehr nahe kreisrund sind. Um den letztern, schwer zu bestimmenden Fehler unschädlicher zu machen, und überhaupt allfällige Veränderungen der Nadel besser erkennen zu können, thut man gut, stets eine entsprechende Beobachtungsreihe auch noch mit der zweiten Nadel anzustellen. Ist die Differenz der mit beiden Nadeln gewonnenen Resultate nicht grösser als bei den Verificationsuntersuchungen, so kann man wohl annehmen, dass beide Nadeln unverändert geblieben sind, also noch gute Resultate geben.

4. Bestimmung der Declination. Das einfachste zur absoluten Bestimmung der Declination benutzbare Instrument ist der Azimutal-compass oder die Declinationsbusssole. Er besteht aus einer dosenförmigen Messingbüchse mit Glasdeckel, in deren Innerm ein horizontaler getheilter Kreis und eine Magnetnadel sich befinden. Die letztere ruht vermittelst eines Achathütchens auf einer Stahlspitze im Centrum des Kreises und bewegt sich bei der Drehung um diese Verticalaxe mit ihren spitzen

Enden entweder hart vor dem getheilten Rande des Horizontalkreises oder über der Theilung auf der Bodenplatte der Büchse, in welchem Falle aber die letztere zur Vermeidung der Parallaxe bei der Ablesung spiegelnd sein muss. Aussen an zwei diametral gegenüberstehenden Punkten des Büchsenrandes sind um horizontale Axen drehbare Diopter angebracht. Das eine besteht aus einer feinen Oeffnung oder vertikalen Spalte in einer Messingplatte mit vorzuschiebendem Sonnenglas, das andere aus einem länglichen, rechteckigen Messingrahmen mit in seiner Mitte der Länge nach ausgespanntem, schwarzen Verticalfaden und einem dahinterstehenden kleinen, ebenfalls für sich um eine horizontale Axe drehbaren Planspiegel. Die Anwendung dieses einfachen Compasses setzt voraus, dass die obere Platte des Stativs eine der Dose desselben entsprechende Vertiefung im Centrum habe, so dass man den Compass in dieselbe stellen und auch leicht darin umdrehen kann. Zur Beobachtung wird der Compass auf das Stativ gebracht und mit Hülfe eines auf die Glasdeckplatte der Büchse aufgesetzten Niveaus durch Verstellung der Beine des Stativs horizontal gemacht.

Wenn der Glasdeckel des Compasses horizontal gemacht ist, so sollen auch der Boden desselben und der getheilten Kreise, so wie die Axen der Diopter genau horizontal, die Visirlinien der letztern aber genau vertikal sein. Behufs sicherer Ablesung ist es gut, wenn die Magnetnadel in horizontalem Sinne ganz schmal und nur in verticalem Sinne verbreitert ist; das Achathütchen aber muss auf jeden Fall herauszunehmen und von der entgegengesetzten Seite wieder in die Oeffnung hineinzustecken sein, damit die Nadel um ihre Längsaxe um 180° gedreht und in dieser Stellung wieder auf die Spitze gelegt werden kann. Die Nadel muss sich auf der Spitze sehr leicht drehen und daher zur Schonung der letztern eine Arretirung angebracht sein, mit der die Nadel von ihr beim Nichtgebrauche des Instruments stets abgehoben wird.

In neuerer Zeit versteht man die Compasse zur Erhöhung der Genauigkeit auch mit 3 Füßen und Nivellirschrauben, so dass sie wie das Inclinatorium auf ein gewöhnliches Stativ gesetzt und nivellirt werden können. Eine Verbesserung besteht ferner auch darin, dass man die Kreistheilung aussen auf dem obern Rand der Büchse anbringt und die Diopter an der um das Centrum derselben drehbaren Alhidade befestigt; im Innern der Büchse befindet sich dann nur die Magnetnadel ohne Theilung, deren Stellung entweder unmittelbar mit dem Augendiopter oder mit Hülfe eines hinter denselben angebrachten rechtwinkligen Ocular-Prismas beobachtet wird. Die Kreistheilung kann hier leicht bis zu $\frac{1}{4}^\circ$ gehen, so dass vermittelt einer Lupe die Indexstellung bis auf $1'$ genau geschätzt werden kann.

Von dieser zuletzt angegebenen Form des Azimutalcompasses unterscheidet sich der magnetische Theodolith im Wesentlichen nur dadurch, dass statt der Diopter als Absehvorrichtung ein excentrisches Fernrohr angebracht ist, dass der Magnet an einem feinen ungedrehten Seidenfaden als Drehungsaxe aufgehängt wird und derselbe zur Beobachtung seiner Stellung mit dem Fernrohr entweder einen Collimator in sich trägt oder mit einem Spiegel versehen ist, wobei dann Objectiv und Fadenkreuz des erstern den Collimator repräsentiren. Die Genauigkeit der Ablesung am Horizontalkreise geht hier gewöhnlich bis $10''$.

Nach erfolgter Nivellirung des Compasses stellt man die Visirlinie der Diopter durch Drehung desselben auf die sogenannte Mire, d. h. auf irgend einen entfernten festen Gegenstand ein, der eine scharfe Marke darbietet, z. B. auf eine Thurmspitze, auf das Fensterkreuz eines Hauses, auf die Mitte eines Baumstamms etc. und liest nach Lösung der Arretirung und Beruhigung der Magnetnadel die Stellung der letztern am getheilten Kreise ab; darauf wird die Nadel herausgenommen, das Achathütchen umgesetzt, die Nadel nach dieser Drehung um 180° wieder eingelegt und unter steter Hinrichtung der Visirlinie nach der Mire, der neue Nadelstand am Kreise abgelesen, die Ablesung sei im erstern Fall β_1 , im zweiten β_2 . Nunmehr dreht man den Compass so lange, bis der Faden des Diopters beim Visiren nach der Magnetnadel hin dieselbe in ihrer ganzen Länge deckt resp. halbirt, und liest den jetzigen Nadelstand am Kreise ab. Heissen wir diese Ablesung c

— dieselbe soll eigentlich gleich Null sein — so ist der Winkel zwischen der Richtung nach der Mire hin und der magnetischen Axe des Magneten resp. dem magnetischen Meridian des Beobachtungsortes gegeben durch:

$$b = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} - c,$$

und wenn a das Azimut der Mire bezeichnet, so ist die gesuchte Declination d der erdmagnetischen Kraft:

$$d = b - a.$$

Hier repräsentirt ein positives Vorzeichen von d eine westliche Declination, d. h. ein Abweichen des Nordpols der Nadel nach Westen vom Nordpunkte des astronomischen Meridians aus, wenn wir das Azimut a der Mire vom Nordpunkte aus positiv nach Osten, und ebenso den Winkel b zwischen der Mire und dem Nordpol der Nadel von der Mire aus positiv nach links zählen.

Ist das Azimut der Mire bereits bekannt, so ist damit eine Declinationsbestimmung vollendet und es gilt der erhaltene Werth für das Mittel der bei den Ablesungen der einzelnen Nadelstände notirten Zeiten. Man thut gut, mehrere solche Beobachtungsreihen nach einander anzustellen, um den störenden Einfluss der Reibung des Achathütchens an der Spitze besser zu eliminiren.

Wenn dagegen das Azimut a der Mire nicht gegeben ist oder gar kein als solche geeigneter Gegenstand vorhanden ist, so kann das Azimut der Mire in folgender Weise durch die Beobachtung der Sonne bestimmt oder die Stellung des Magneten direct auf diese bezogen werden.*) Man richtet vor oder nach den vorigen Messungen die Visirlinie des Compasses gegen die Sonne, schiebt das Sonnenglas vor und bestimmt nach den Schlägen des in der Nähe, etwa unten auf dem Stativ, stehenden Chronometers die Zeit des Antritts des ersten und darauf die des zweiten Sonnenrandes an den Verticalfaden des Diopters — bei hohem Sonnenstande wird zu dem Ende der Spiegel hinter demselben zu Hülfe genommen. Gleich hernach liest man den Stand γ_1 der Magnetnadel am Kreise ab und darauf den Stand der letztern β_1 , wenn das Visir auf die Mire eingestellt ist. Heissen wir das Mittel aus den für den Fadenantritt des ersten und zweiten Sonnenrandes beobachteten Uhrzeiten U , so findet man zunächst das Azimut a' der Sonne, vom Nordpunkt aus positiv nach Osten gezählt, nach der Formel:

$$\tan g a' = \frac{\sin t}{\cos \varphi \tan g \delta - \sin \varphi \cos t},$$

wo φ die geographische Breite des Beobachtungsortes, δ die Declination der Sonne zur Zeit der Beobachtung — die mit Berücksichtigung der Längendifferenz l mit Greenwich und der stündlichen Aenderung der Declination $\Delta \delta$ dem „Nautical almanac“ zu entnehmen ist —, endlich t den östlichen Stundenwinkel der Sonne repräsentiren. Der letztere aber ist gegeben durch:

$$t = 360^\circ - 15 (U + u - z),$$

wo u die Uhr correction und z die Zeitgleichung darstellen und zu den am Vormittage am Chronometer unmittelbar abgelesenen Uhrzeiten jeweils noch 12 Stunden hinzuaddirt worden sind. Da nun der Horizontalwinkel zwischen der Sonne und der Mire: r nach den Messungen am Compass gegeben ist durch:

*) Vergleiche auch „Geogr. Ortsbestimmungen“ pag. 36.

$$\nu = \gamma_1 - \beta_1,$$

so findet man schliesslich für das gesuchte Azimut der Mire:

$$a = a' - \nu,$$

wo der Winkel ν mit einem positiven Vorzeichen zu nehmen ist, wenn die Sonne vom Beobachter aus betrachtet rechts von der Mire steht.

Ist keine Mire da, so muss noch eine zweite Beobachtung eines Sonnendurchgangs am Diopterfaden erfolgen, nachdem die Nadel um 180° umgelegt worden ist. Das Azimut der Sonne im letztern Falle sei gleich a'' gefunden und dabei als Nadelstand am Kreise γ_2 abgelesen worden; alsdann ist wie oben die Declination d gegeben durch:

$$d = b - a$$

wo aber jetzt:

$$b = \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{2} - c \text{ und } a = \frac{a' + a''}{2}$$

sind und der mittlere Winkel b zwischen der Sonne und dem Nordpol der Nadel von der Sonne aus positiv nach Links zu zählen ist. — Die günstigsten Tageszeiten zur Bestimmung des Azimuts a sind 6^h Vm. und 6^h Nm.; nach 10^h Vm. und vor 2^h Nm. aber sollte eine solche nicht erfolgen.

Die Ablesung c am Kreise, welche der Visirlinie der Diopter entspricht, kann selbstverständlich ein für alle Male oder wenigstens für längere Zeit als Mittel mehrerer bezüglicher Beobachtungen bestimmt werden; ebenso auch

der Winkel $\frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$ oder $\frac{\gamma_1 - \gamma_2}{2}$ d. h. der Winkel zwischen der magnetischen Axe der Nadel und der bezeichneten Linie oder geometrischen Axe derselben. In Folge dessen lassen sich die einzelnen Declinationsbestimmungen sehr abkürzen.

Bei Anwendung des oben beschriebenen verbesserten Azimutal-Compasses wird die Alhidade mit den Dioptern auf die Mire resp. Sonne eingestellt, die Stellung der Indices am Kreise abgelesen und darauf der Diopterfaden durch Drehung der Alhidade auf die Magnetnadel projectirt oder dann das Diopter mit Hülfe des Prismas auf die nähere Nadelspitze eingestellt, der Kreis wieder abgelesen und das Letztere nach Umlegung der Nadel um 180° wiederholt. Hierbei kann durch die Benutzung des Prismas leicht ein Fehler entstehen, nämlich dann, wenn die Einfallsebene bei demselben nicht genau vertical ist. Das Vorhandensein und die Grösse dieses Fehlers kann entweder, die Lage des Prismas als constant vorausgesetzt, ein für alle Male durch Vergleich der Angaben des Compasses mit denen eines andern fehlerfreien Declinatoriums oder auch, wenn schon etwas weniger genau, durch eine gleichzeitige Einstellung der Alhidade nach der ersten Methode der Projection des Diopterfadens auf die Magnetnadel bestimmt werden. — Die Declinationsbestimmung mit dem magnetischen Theodolithen schliesst sich ganz an das Verfahren beim letztern Compass an; es muss nur noch jeweilen vor der Beobachtung die Torsion des Aufhängefadens vollständig dadurch aufgehoben werden, dass man statt des Magneten einen gleichschweren unmagnetischen Körper eine Zeit lang daran aufhängt. Da gerade auf Reisen, wo das Instrument verschiedenen Temperaturen und Feuchtigkeitszuständen der Luft ausgesetzt ist, die Torsion des Seidenfadens eine sehr veränderliche Grösse ist, so muss diese Operation vor jeder Messung vorgenommen werden, wenn man nicht Fehler riskiren will, die grösser sind als diejenigen beim Azimutal-Compass. Nach Fritsche ist nämlich der wahrscheinliche Fehler einer einzelnen Deklinationsbestimmung mit einem guten Azimutal-Compass nur $\pm 0,09^\circ$.

5. Bestimmung der Horizontalintensität. Die absolute Bestimmung der Horizontal-Componente H der erdmagnetischen Kraft setzt, wie wir schon sub I. 4. kurz angedeutet haben, zwei gesonderte Messungen und dem entsprechend auch zwei besondere Apparate dazu voraus.

Der erste Apparat dient zu den Schwingungsbeobachtungen und besteht aus einem hölzernen oder gläsernen Kasten mit Glasdeckel und drei Füßen mit Stellschrauben. In der Mitte des abnehmbaren Glasdeckels ist ein verticales Messing- oder Glasrohr eingesetzt, das an seinem obern Ende die, in der Höhe etwas verstellbare Befestigungsöse für den Seidenfaden, sowie einen kleinen Torsionskreis, besitzt. Am untern Ende des Seidenfadens ist ein Haken mit Schlitz befestigt, an welchen man den Schwingungsmagneten anhängen kann. Ein durch diesen Schlitz des Hakens und entsprechende Oeffnungen in der Röhrenwand durchgesteckter Stift verhindert eine Torsion des Fadens im unbelasteten Zustande. Auf dem Boden des Kastens befindet sich eine einfache Kreistheilung auf Papier — ganze Grade —, ein kleines Thermometer — ganze Grade — und eine kleine, von aussen zu hebende Platte zur Beruhigung des Magneten.

Der letztere hat eine Länge von höchstens 60 Millimeter und seine Messingfassung ist noch mit einer kreisförmigen horizontalen Platte versehen, auf welche zur Bestimmung des Trägheitsmoments ein genau gearbeiteter Messingring concentrisch mit der Drehungsaxe aufgelegt werden kann. Zur Aufhebung der Torsion des Fadens wird an Stelle des Magnets ein gleich schwerer Messingkörper an ihn gehängt, auf den man ebenfalls den Messingring auflegen kann.

Mit dem zweiten Apparat sind die Ablenkungsbeobachtungen auszuführen. Es kann dazu der Azimutalcompass, besonders in der oben erwähnten verbesserten Form, die wir hier allein näher betrachten werden, dienen. Zu dem Ende muss sich auf der Alhidade desselben eine Messingschiene genau senkrecht zur Visirlinie der Diopter befestigen lassen, und auf der Schiene muss sich in verschiedenen genau zu messenden Entfernungen vom Centrum der Büchse der Schwingungsmagnet so aufsetzen lassen, dass seine magnetische Axe gegen dieses Centrum gerichtet ist und sich in derselben Horizontalebene mit der Magnetnadel in der Büchse befindet. Statt der Declinationsnadel wird eine kleinere Magnetnadel — höchstens halb so lang als der Schwingungs- oder Ablenkungsmagnet — in die Büchse gebracht, welche Nadel behufs Beobachtung ihrer Stellung mit dem Prisma durch angesetzte Messingspitzen verlängert ist. An der Messingschiene befindet sich auch ein Halter zur Aufstellung eines einfachen Thermometers.

Beim Azimutalcompass der ersten Art kann die Querschienen einfach an der Büchse befestigt werden. Beim magnetischen Theodolithen sind sowohl der Schwingungsapparat als der Ablenkungsapparat im Wesentlichen dieselben, nur hängt da auch der kleinere abzulenkende Magnet an einem umgedrehten Seidenfaden.

Beobachtung der Schwingungsdauer. Der Schwingungsapparat wird auf das Stativ gestellt, die Torsion des Aufhängefadens aufgehoben, der Magnet in den Kasten gehängt und mit den Fusschrauben der letztere so justirt, dass das Magnetcentrum mit dem Centrum des getheilten Kreises zusammenfällt. Der getheilte Kreis im Kasten wird so gerichtet, dass sein Nullpunkt genau unter den Nordpol des Magneten in seiner natürlichen Gleichgewichtslage fällt. Bei dieser Ruhelage soll die Längsaxe (eigentlich die magnetische Axe) des Magneten überdies genau horizontal sein, was stets durch ein um das eine Ende geschlungenes und zu verschiebendes Drähtchen erreicht werden kann.

Nach dieser Berichtigung des Instruments wird nun der Magnet vermittelst eines Hilfsmagneten um ungefähr 8^0 von seiner Gleichgewichtslage abgelenkt und zunächst die Dauer von 10 Doppelschwingungen desselben um

diese Gleichgewichtslage nach Entfernen des Hilfsmagneten mit dem Chronometer gemessen. Hieraus berechnet man sofort einen ersten angenäherten Werth der Schwingungsdauer des Magnets und damit die ungefähre Dauer von 5, 10 und 100 einfachen Schwingungen des Magnets. Dies setzt uns in den Stand, zum Voraus mit einer Genauigkeit von 1—2^s den Eintritt der 5, 10, 15 etc. sowie der 100, 105, 110, 115 etc. Schwingung anzugeben, wenn wir zu der berechneten Dauer von 5, 10, 100 etc. Schwingungen die Zeit der Oten Schwingung hinzuaddiren. Nachdem daher der Magnet stärker als vorher, etwa bis 10 oder 12^o, aus seiner Gleichgewichtslage abgelenkt worden ist, hat man nur die schon annähernd bekannten Zeit jedes 5ten Durchgangs durch die Gleichgewichtslage nach dem Chronometer genauer zu notiren und zwar etwa von der Oten bis zur 45ten Schwingung und dann wieder von der 100ten bis zur 145ten Schwingung. Die Differenzen der ersten und entsprechenden letzten Zahlen geben dann 10 Werthe der Dauer von je 100 Schwingungen des Magneten, die abwechselnd je den geraden und ungeraden einfachen Schwingungen entsprechen und deren Mittel daher von einer allfälligen Veränderung des magnetischen Meridians in der Zwischenzeit unabhängig ist. Summiren wir diese 10 Werthe und dividiren die Summe durch 1000, so werden wir einen sehr genauen mittlern Werth der einzelnen Schwingungsdauer erhalten. Am Anfang und Ende dieser Schwingungsbeobachtungen werden ausserdem noch die Temperaturen im Kasten t' und t'' und die Amplituden der Schwingungen α' und α'' notirt, und zum Schlusse ist jeweilen noch der Einfluss der Torsionskraft des Aufhängefadens zu bestimmen. Zu dem Ende wird der Magnet beruhigt und seine Gleichgewichtslagen am getheilten Kreise abgelesen, nachdem man den Faden durch eine Drehung des Torsionskreises am obern Ende einmal um 360^o nach Links und darauf um ebenso viel nach Rechts gedreht hat. Die halbe Differenz der abgelesenen Stellungen des Magneten am getheilten Kreise im Schwingungskasten sei Δ Grade.

Diese Beobachtungen geben für den unbelasteten Magneten 4 Grössen nämlich:

die mittlere Schwingungsdauer $\quad \quad \quad = T$ Chronometer-Second.

bei der mittleren Amplitude $\frac{\alpha' + \alpha''}{2} \quad \quad \quad = \alpha$ Bogen-Grade

bei der mittleren Magnet-Temp. $\frac{t' + t''}{2} \quad \quad \quad = t$ Centes-Grade.

und pro 360^o Torsion eine Ablenkung $\quad \quad \quad = \Delta$ Bogen-Grade.

Ablenkungsbeobachtungen. Der Azimutalcompass mit der Ablenkungsschiene, dem Thermometer und dem kleinern Magneten wird auf das Stativ gebracht und nivellirt. In einer bestimmten Entfernung legt man sodann den Schwingungsmagneten auf die Schiene in der oben angegebenen Stellung und dreht dieselbe mit der Alhidade so lange, bis die Spitze des kleinen Magnets in der Büchse bei der Beobachtung durch das Prisma mit der Visirlinie coincidirt. Nachdem man nun die Stellung der Alhidade am Kreise abgelesen hat, dreht man den ablenkenden Schwingungsmagneten um seine Mitte um 180^o um, so dass sein Nordpol jetzt nach West weist, wenn er vorher nach Ost gekehrt war. Der Magnet in der Büchse wird in Folge dessen nach der andern Seite abgelenkt und man dreht nun die Schiene mit Alhidade nach dieser Seite hin, bis auch wieder die Diopterlinie und der kleine Magnet coincidiren. Die halbe Differenz der jetzigen Ablesung am Kreise und der frühern repräsentirt den Ablenkungswinkel u' der kleinen

Nadel aus dem magnetischen Meridian, wenn der Ablenkungsmagnet auf einer Senkrechten zu ihr durch ihr Centrum in einer Entfernung E nach Osten zu sich befindet. Wir erhalten analog einen zweiten, von diesem wenig verschiedenen Ablenkungswinkel u'' , indem wir den Ablenkungsmagnet in dieselbe Entfernung E vom kleinen Magnet westlich davon auf die Schiene legen und in beiden Positionen (Nordpol nach Ost und nach West) dieselben Einstellungen wie oben machen. Lesen wir ausserdem noch die Temperaturen τ' und τ'' des Ablenkungsmagneten zu Anfang und Ende dieser Ablenkungsbeobachtungen an dem auf der Schiene aufgestellten Thermometer ab, so geben uns dieselben 3 weitere Grössen, nämlich:

den mittlern Ablenkungswinkel $\frac{u' + u''}{2} = v$ in Graden und Minuten

für die mittlere Temperatur des Abl.-Magn. $\frac{\tau' + \tau''}{2} = \tau$ in Centes-Graden

für die Entfernung der Magnetmittelpunkte $= E$ in Millimetern.

Die Entfernungen E sind bei der ersten Verification des Instrumentes für gewisse Marken auf der Schiene ein für alle Male nach wahren Millimetern ausgemessen und die Schiene soll so construirt sein, dass eine Veränderung dieser Grössen mit der Zeit nicht zu befürchten ist.

Heissen wir das magnetische Moment des Schwingungs- resp. Ablenkungsmagneten bei 0° : M_0 und μ seinen Temperaturcoefficienten für 1°C. , so dass $M_0 (1 - \mu t)$ das magnetische Moment bei t° repräsentirt, ferner N_0 das Trägheitsmoment dieses Magneten bei 0° und e den linearen Ausdehnungskoeffizienten des Stahls für 1°C. , also $N_0 (1 + 2et)$ das Trägheitsmoment bei $t^\circ \text{C.}$, endlich s den täglichen Gang des benutzten Chronometers in Secunden (bei dadurch beschleunigtem Zurückgehen des Chronometers als positiv aufgefasst), so ergibt sich aus den bei den Schwingungsbeobachtungen erhaltenen 4 Daten für die Horizontalkomponente H der erdmagnetischen Kraft der Ausdruck:

$$1) H. M_0 = \frac{\pi^2. N_0 (1 + 2et)}{T^2 (1 + 0,00002315.s - 0,00003808.\alpha^2 + 0,002778.A) (1 - \mu t)}$$

und aus den 3 bei den Ablenkungsbeobachtungen gewonnenen Grössen:

$$2) \frac{H}{M_0} = \frac{2 (1 - \mu.\tau)}{E_0^3 (1 + 3m\tau) \sin v} \left[1 + \frac{x}{E_0^2} + \frac{y}{E_0^4} + \dots \right],$$

wo E_0 die wahre Länge bei 0° des Stücks der Ablenkungsschiene zwischen den beiden Magnetmittelpunkten — oder eigentlich die halbe Entfernung der Auflegungspunkte des Ablenkungsmagneten bei der östlichen und westlichen Lage desselben auf der Schiene — und m den linearen Ausdehnungskoeffizienten des Messings, aus welchem die Schiene angefertigt ist, darstellen, endlich x und y zwei nicht genau bekannte, von den Dimensionen und der Vertheilung des Magnetismus in den beiden Magneten abhängige konstante Grössen repräsentiren.

Damit auf jeden Fall das schwer genau zu bestimmende Glied $\frac{y}{E^4}$ als klein vernachlässigt werden darf, müssen in Betreff des Verhältnisses der Länge der Magnete zur Entfernung E derselben gewisse Bedingungen erfüllt sein. Will man sich z. B. in der Bestimmung der Horizontalintensität H mit einer Genauigkeit von $\pm 0,001$ (Gauss'sche Einheiten) begnügen — es dürfte schwer halten, durch gewöhnliche Beobachtungen auf Reisen eine grössere

Sicherheit zu erzielen —, so darf, wenn die Länge des grössern Magneten 60 mm und die des kleinern 30 mm beträgt, der Ablenkungswinkel v nicht kleiner als 40° und die Entfernung E der beiden Magnete nicht kleiner als 200 mm sein.

Unter der Voraussetzung, dass diese Bedingungen erfüllt seien, enthalten also die obigen 2 Gleichungen ausser H nur noch die Unbekannten:

$$M_0, e, m, \mu, N_0 \text{ und } x.$$

Was zunächst die Ausdehnungskoeffizienten e und m betrifft, so genügt es vollkommen, dafür die gewöhnlichen für Stahl und Messing geltenden Werthe zu setzen; nämlich:

$$e = 0,0000124 \quad m = 0,0000180.$$

Der Temperaturcoefficient und das Trägheitsmoment des Schwingungsmagneten, sowie die Grösse x können bei sorgfältiger Behandlung des Apparats für längere Zeit als konstant betrachtet werden; für kürzere Zeit kann dies auch vom magnetischen Moment M_0 des Schwingungsmagneten gelten, wenn derselbe inzwischen keinen starken Erschütterungen oder bedeutenden Temperaturvariationen ausgesetzt war und sich bereits im Zustand der Permanenz befindet.

Unter diesen Beschränkungen können hie und da auf Reisen zur Abkürzung der Messungen entweder bloss Schwingungsbeobachtungen oder nur Ablenkungsbeobachtungen gemacht werden.

Es seien z. B. an zwei benachbarten Orten die Schwingungsdauern T_1 und T_2 bei den Temperaturen t_1 und t_2 beobachtet worden und im Uebrigen s , α und λ dieselben geblieben, so ist nach 1) das Verhältniss der Horizontalintensitäten an beiden nach der Formel:

$$3) \quad \frac{H_1}{H_2} = \frac{T_2}{T_1} [1 + (2e + \mu)(t_1 - t_2)]$$

zu berechnen. Hat man dagegen an beiden Orten bloss die Ablenkungen v_1 und v_2 bei derselben Entfernung E_0 der beiden Magnete und bei den resp. Temperaturen τ_1 und τ_2 beobachtet, so ergibt sich für dasselbe Intensitätsverhältniss aus 2) die Formel:

$$4) \quad \frac{H_1}{H_2} = \frac{\sin v_2}{\sin v_1} [1 - (3m + \mu)(\tau_1 - \tau_2)]$$

Hiernach kann also, wenn der absolute Werth der Horizontalintensität für den einen Ort gegeben ist, auch derjenige für den andern Ort aus bloss einer Beobachtung bestimmt werden.

Da aber, wie schon bemerkt, die Constanz des magnetischen Moments M_0 nur eine sehr beschränkte ist, so sind im Allgemeinen stets sowohl Ablenkungs- als Schwingungsbeobachtungen an denselben Orte anzustellen, aus denen zusammen dann die absolute Horizontalintensität nach der Formel:

$$5) \quad H = \sqrt{\frac{2 \pi^2 N_0 (1 + 2 e t)}{\sin v \cdot T^2 k E_0^3 (1 + 3 m \tau)}} \left[1 - \mu (t - \tau) \right] \left(1 + \frac{x}{E_0^2} \right) = \sqrt{X}$$

zu berechnen ist, wo wir abkürzend:

$$1 + 0,00002315 \cdot s - 0,00003808 \cdot a^2 + 0,002778 \cdot \lambda = k$$

gesetzt haben. An dem so berechneten Werthe von H ist strenggenommen noch eine, von der Induction des Erdmagnetismus auf den Schwin-

gungsmagneten herstammende Correction anzubringen, welche in runder Zahl: $-\frac{H^2}{4000}$ beträgt.

Der wahre Werth der Horizontalintensität des Erdmagnetismus ist somit:

$$6) H = \sqrt{X} - \frac{X}{4000},$$

wo allerdings das zweite in Gleichung 5) nicht berücksichtigte Glied in der Regel sehr klein ist.

Wegen der täglichen Variation von H ist es zur Elimination dieses Einflusses auf das Messungsergebnis rathlich, je vor und nach der Ablenkungsbeobachtung eine Schwingungsbeobachtung zu machen. Alsdann repräsentiren in obigem Ausdruck T das Mittel aus den beiden Schwingungsdauern und t das Mittel aus den beiden Temperaturen vor und nach der Ablenkungsbeobachtung.

Die allein noch unbekannten Grössen in der Gleichung 5, nämlich N_0 , μ und x können, wie schon oben erwähnt, längere Zeit jeweiligen als constant betrachtet werden und brauchen daher durchaus nicht jedesmal neu bestimmt zu werden. Auf längern Reisen ist es indessen gut, sich von Zeit zu Zeit von ihrer unveränderten Erhaltung überzeugen zu können und es muss daher ein gutes Reiseinstrument auch hierzu die Möglichkeit darbieten.

Bestimmung des Trägheitsmomentes N_0 des Schwingungsmagneten. Nachdem in der oben angegebenen Weise die Schwingungsdauer T des unbelasteten Magneten bei der mittlern Amplitude α , der Temperatur t und der Torsionsgrösse A gemessen worden, wird der erwähnte Messingring auf den Magneten aufgelegt und in ganz derselben Art die neue Schwingungsdauer T_1 bei einer mittlern Amplitude α_1 , einer Temperatur t_1 beobachtet und ebenso auch wie oben die neue Torsionsgrösse A_1 bestimmt. Heissen wir das Trägheitsmoment des Messingringes bei 0° : R_0 , so ist es bei t_1° : $R_0 (1 + 2 m t_1)$ und es berechnet sich dann das Trägheitsmoment des Magneten nach der Formel:

$$7) N_0 = R_0 \frac{T^2 (1 - 2 e t + 2 m t_1)}{T_1^2 [1 - 0,00003808 (\alpha_1^2 - \alpha^2) + 0,002778 (A_1 - A) - \mu (t_1 - t)] - T^2}$$

wo e und m die schon oben angegebenen Werthe haben und ferner:

$$8) R_0 = \frac{G}{8} (D_0^2 + d_0^2)$$

ist. Hier bedeuten G_0 das Gewicht des Ringes in Milligrammen, D_0 und d_0 seine äussern und innern Durchmesser in Millimetern bei 0_0 . Bei sorgfältiger Behandlung und Aufbewahrung des Messingringes bleibt sein Trägheitsmoment R_0 erfahrungsgemäss während vieler Jahre auch auf längeren Reisen hinlänglich konstant.

Das Trägheitsmoment N_0 des Schwingungsmagneten mit seiner Fassung bleibt so lange konstant als sein Gesamtgewicht, die Dimensionen und Lagerungsverhältnisse seiner einzelnen Theile sich nicht merklich verändert haben. Will man also eine öftere Bestimmung von N_0 vermeiden, so müssen äussere mechanische und chemische Einflüsse, welche solche Veränderungen bewirken können, möglichst fern gehalten werden.

Da N_0 eine Fundamentalgrösse repräsentirt, welche von wesentlichem Einfluss auf das Resultat ist, so ist es rathlich, ihren Werth nicht bloss aus

zwei einzelnen Beobachtungen, wie oben angegeben wurde, abzuleiten, sondern das Mittel aus vielen derartigen Bestimmungen zu nehmen, wobei jeweilen eine Schwingungsbeobachtung bei belastetem Magneten von zwei solchen bei unbelastetem eingeschlossen sein sollte.

Bestimmung des Temperaturcoefficienten μ des Schwingungsmagneten. Man misst rasch nacheinander die Schwingungsdauern T_1 und T_2 des Magneten bei zwei möglichst verschiedenen Temperaturen t_1 und t_2 — etwa durch Abkühlen und Erwärmen des Beobachtungsraumes —; dann findet man die Grösse μ aus der Formel:

$$9) \quad \mu = \frac{2 \cdot (T_1^2 - T_2^2)}{(t_1 - t_2)(T_1^2 + T_2^2)} - 2e.$$

Auch diese Grösse hält sich längere Zeit constant.

Bestimmung der Grösse x . In der oben auseinandergesetzten Art und Weise werden nacheinander Ablenkungsbeobachtungen bei zwei verschiedenen Entfernungen E_1 und E_2 der Magnete von einander angestellt. Sind die beobachteten Ablenkungswinkel resp. v_1 und v_2 und die bezüglichlichen Temperaturen τ_1 und τ_2 , so ist x nach der Formel:

$$10) \quad x = - \frac{E_1^3 \sin v_1 - E_2^3 \sin v_2}{E_1^2 \sin v_1 - E_2^2 \sin v_2} \frac{[1 - (\mu + 3m)(\tau_1 - \tau_2)]}{[1 - (\mu + 3m)(\tau_1 - \tau_2)]}$$

zu berechnen. Zur Erlangung eines genauen Werthes von x ist es nicht gleichgültig, in welchem Verhältniss die beiden Entfernungen E_1 und E_2 zu einander stehen; am besten ist es, wenn $E_2 = 1,32 \cdot E_1$ gewählt wird. Es ist auch hier räthlich, zur Erzielung einer grössern Sicherheit für x abwechselnd mehrere Beobachtungen in der einen und in der andern Entfernung zu machen und je eine Messung bei einer Entfernung mit dem Mittel der beiden benachbarten bei der andern zu combiniren.

Ueberhaupt thut man gut zur Elimination des störenden Einflusses der Variationen des Erdmagnetismus auf das Resultat bei diesen letztern Bestimmungen immer eine Messung bei einem Zustand des Magneten von zwei solchen beim andern einschliessen zu lassen.

Genauigkeit der Messungen. Es ist für die Praxis von Wichtigkeit, dass der Beobachter sich von vorne herein klar bewusst sei, in welcher Weise die einzelnen Beobachtungsgrössen auf das Endresultat einwirken oder mit andern Worten wie genau die einzelnen Grössen bestimmt werden müssen, um im Endresultat eine gewisse Sicherheit zu erhalten. Für gewöhnliche Reisebeobachtungen dürfte, wie schon oben bemerkt, in der Bestimmung der Horizontalintensität H eine Genauigkeit von kaum mehr als: $\pm 0,001$ absoluten Gauss'schen Maasses erzielt werden können. Soll das Endresultat diese Genauigkeit haben, so sind die zulässigen Fehler bei den üblichen Dimensionen und Einrichtungen der Apparate für:

N_0 (ganzer Werth circa $24,10^5$)	± 3000
v (ganzer Werth nicht $< 40^\circ$)	$\pm 1'$
T (ganzer Werth circa 4^s)	$\pm 0,002$
E_0 (ganzer Werth nicht $< 200 \text{ mm}$)	$\pm 0,02 \text{ mm}$
s (täglicher Gang der Uhr)	$\pm 50^s$
a (mittlere Schwingungsamplitude)	$\pm 8^\circ$
A (für 360° Drehung des Fadens)	$\pm 0,4$

Schemata für die Beobachtungen. Für die vollständigen, häufig zu wiederholenden Beobachtungen ist sowohl zur Zeitersparniss als zur Vermeidung von Unvollständigkeiten durch Vergesslichkeit die Entwerfung von Beobachtungsformularen sehr zu empfehlen. Wir theilen schliesslich Muster solcher Schemata für die verschiedenen normalen Beobachtungen mit.

Ueber die geeignetesten Zeitpunkte zur Bestimmung der 3 Elemente haben wir im ersten Abschnitt das Nähere mitgetheilt.

Literatur.

- ¹⁾ G. B. Airy, A treatise on Magnetism. London, Macmillan & Co. 1870; deutsch von Fr. Tietjen. Berlin, Oppenheim 1874.
- ²⁾ Anleitungen zur Anstellung magnetischer Beobachtungen:
J. Lamont, Handbuch des Erdmagnetismus. Berlin, Veit & Co. 1849.
J. B. Riddell, Magnetical Instructions for the use of portable instruments. London, Clowes & Sons. 1844.
E. Sabine, Manual of Terrestrial Magnetism (Extracted from the Admiralty Manual of Scientific Enquiry, Third Edition 1859).
- ³⁾ J. Lamont, Magnetische Ortsbestimmungen in Bayern und Deutschland. I. und II. Theil nebst Karten-Atlas. München 1854 und 1856.
—, Magnetische Untersuchungen in Nord-Deutschland, Belgien, Holland und Dänemark. München 1859.
—, Untersuchungen über die Richtung und Stärke des Erdmagnetismus im südwestlichen Europa. München 1858.
C. Kreil, magnetische und geographische Ortsbestimmungen im südöstlichen Europa. Wien 1862.
G. Neumayer, Results of the Magnetic Survey of the Colony of Victoria 1858—64. Mannheim, Schneider 1869.
- ⁴⁾ J. Lamont, Resultate des magnetischen Observatoriums in München für 1843—45. München 1846.
- ⁵⁾ F. Kohlrausch, Das Weber'sche compensirte Magnetometer zur Bestimmung der erdmagnetischen Intensität. Pogg. Ann. Bd. 142.
- ⁶⁾ J. Lamont, Resultate des magnet. Observatoriums etc.
- ⁷⁾ H. Lloyd, Theodolite Magnetometer. Proceedings of the R. Irish Academy. Vol. II. p. 608 und Vol. VII. p. 8.
- ⁸⁾ H. Wild, Bestimmung der Elemente des Erdmagnetismus auf einer Reise von St. Petersburg nach Tiflis. Wild, Repertorium für Meteorologie. Bd. I. S. 253.
—, Ueber ein neues magnetisches Universal-Instrument. *ibid.* Bd. III. No. 2.
- ⁹⁾ H. Fritsche, Ueber die magnetische Declination Pekings. *ibid.* Bd. II. S. 182.

Inclination.

Beobachter: .....
 Ort: .....
 Datum u. Zeit: .....
 Instrument: .....
 Nadel: .....
 Magnet. Meridian: .....

Marke:					
Schwingungen.		h. m. s.		h. m. s.	
Anfang der Schwingung.					
Ende der Schwingung.					
Dauer v.		Schwing.			
Schwingungsdauer:					
Kreis.	Marke.	1. Einstellung.	2. Einstellung.	Mittel.	
O.	O.				
W.	W.				
W.	O.				
O.	W.				

Summe:

Mittel $i' =$

Marke:					
Schwingungen.		h. m. s.		h. m. s.	
Anfang der Schwingung.					
Ende der Schwingung.					
Dauer v.		Schwing.			
Schwingungsdauer:					
Kreis.	Marke.	1. Einstellung.	2. Einstellung.	Mittel.	
O.	O.				
W.	W.				
W.	O.				
O.	W.				

Summe:

Mittel $i'' =$

$$\text{Inclination } i = \frac{i' + i''}{2} =$$

Declination.

Beobachter: .....

Ort: .....

Datum u. Zeit: .....

Instrument: .....

Beobachtung.

Lage des Visirs und des Magneten.	Ablesung am		Zeit.
	Index I.	Index II.	
Mire			
Marke oben			
Marke unten			
Marke unten			
Marke oben			
Mire			

Berechnung.

Marke des Magneten.	Winkel zwischen dem Magneten, Nordpol und Mire.		Mittel <i>C</i> (+ links v. d. Mire.)
	Index I.	Index II.	
oben			
unten			
unten			
oben			
Mittel			

Azimut der Mire vom Nordpunkt: $a =$ Declination: $d = C - a =$

Intensität.

Beobachter: .....
 Ort: .....
 Datum u. Zeit: .....
 Instrument: .....
 Chronometer: .....
 Correction des Chronom.: .....
 Tägl. Gang des Chronom. s: .....
 (+ Zurückgehen gegen mittl. Ortszeit.)

A. Schwingungsdauer.

Anfangs-Temperatur.			Anfangsamplitude der Schw.		
$t_1' =$	Celsius.		$\alpha_1' =$	Grade.	
No. der Schw.	h.	m. s.	No. der Schw.	h.	m. s. Dauer von 100 Schw.
0			100		
10			110		
20			120		
30			130		
40			140		
T_1' :			Summe:		
No. der Schw.	h.	m. s.	No. der Schw.	h.	m. s. Dauer von 100 Schw.
5			105		
15			115		
25			125		
35			135		
45			145		
T_1'' :			Summe:		
End-Temperatur			End-Amplit. der Schw.		
$t_1'' =$	Cels.		$\alpha_1'' =$	Grade	
Mittel-Temperatur: $t_1 = \frac{t_1' + t_1''}{2} =$			Celsius.		
Mittel-Amplitude: $\alpha_1 = \frac{\alpha_1' + \alpha_1''}{2} =$			Grade.		
Mittel-Schw.-Dauer: $T_1 = \frac{T_1' + T_1''}{2} =$			Sec.		

B. Ablenkungsbeobachtungen.

Entfernung des Magneten: E_0 bei $0^\circ =$

Millim.

Anfangs-Temp. $\tau' =$

Lage d. Magn.		Ablesungen am Kreis.		Differenz für Vernier.
Seite nach	N.Pol. nach	Index I. 0	Index II. 0	
Ost.	Ost.			I.
	West.			II.
West.	Ost.			I.
	West.			II.

End-Temperatur

Mittel

$\tau' =$

$M =$

Mittel-Temperatur: $\tau = \frac{\tau' + \tau''}{2} =$

Celsius.

Mittl. Ablenkungswinkel $v = \frac{M}{2} =$

0

C. Schwingungsdauer.

Anfangs-Temp.

Anfangs-Ampl. der Schw.

$t_2' =$

Cels.

$\alpha_2' =$

Grade.

No. der Schw.	h. m. s.	No. der Schw.	h. m. s.	Dauer von 100 Schw.
0		100		
10		110		
20		120		
30		130		
40		140		

$T_2' =$

Summe:

No. der Schw.	h. m. s.	No. der Schw.	h. m. s.	Dauer von 100 Schw.
5		105		
15		115		
25		125		
35		135		
45		145		

$T_2'' =$

Summe:

End-Temperatur

End-Amplit. der Schw.

$t_2'' =$

Cels.

$\alpha_2'' =$

Grade.

Mittel-Temperatur $t_2 = \frac{t_2' + t_2''}{2} =$ Celsius.

Mittel-Amplitude $\alpha_2 = \frac{\alpha_2' + \alpha_2''}{2} =$ Grade.

Mittel-Schw.-Dauer $T_2 = \frac{T_2' + T_2''}{2} =$ Sec.

D. Bestimmung der Torsion.

Torsionskreis.	Ablesung am Theilkreise.		Differenz für Ende.
	Ende I.	Ende II.	
+ 360			I.
— 360			II.

Mittel: $D =$

Torsionswinkel: $\Delta = \frac{D}{2} =$ Grade.

Meteorologie.

Von

J. Hann.

Der Reisende kann dieser Disciplin nach drei Richtungen hin förderlich sein: 1) durch eigene Beobachtungen mit, oder selbst ohne Instrumente, 2) durch Anregung zu Beobachtungen, 3) durch Sammeln schon vorhandener aber wenig bekannter meteorologischer Aufzeichnungen.

Es ist hier am Platz, eine Ansicht darüber auszusprechen, in wie weit vereinzelte meteorologische Beobachtungen eines Reisenden für die Wissenschaft werthvoll sind. Man muss hier unterscheiden, zwischen Beobachtungen zur See und Beobachtungen auf dem Lande. Ueber den Oceanen erleiden die meteorologischen Erscheinungen fast keine örtlichen Modificationen und jede einzelne Beobachtung trägt deshalb einen, man möchte sagen, generalisirten Charakter. Beobachtungen während verschiedener Reisen lassen sich darum auch leicht an einander anschliessen und es bedarf einer geringeren Zahl derselben, um gute Mittelwerthe zu erlangen. Darum sind sorgfältige Beobachtungen auf Schiffen jederzeit erwünscht.

Anders ist es auf Ueberlandreisen. Die örtlich vereinzeltten wenn auch regelmässigen Aufzeichnungen der Temperatur, des Luftdruckes, der Feuchtigkeit, Winde etc. lassen sich nur wenig verwerthen, und der einzelne Reisende, der seine Aufmerksamkeit auch zugleich vielen anderen Dingen zuzuwenden hat, thut in den meisten Fällen am besten, sich durch derartige meteorologische Beobachtungen nicht überflüssig zu ermüden und für seine andern Beobachtungen abzustumpfen. Etwas anderes ist es bei Expeditionen, wo die einzelnen naturwissenschaftlichen Disciplinen auch durch einzelne Personen vertreten sind. Auf der Reise selbst rathen wir daher dem Reisenden, nur jene Beobachtungen anzustellen, die für die Hypsometrie des durchzogenen Landes wichtig sind, also an jedem Halteplatz oder sonst noch an interessanten Punkten, den Luftdruck und zugleich die Lufttemperatur abzulesen, ohne sich dabei an gewisse fixe Stunden zu binden. Daneben mögen nur auffallende meteorologische Erscheinungen aufgezeichnet werden. Die im Nachfolgenden als wünschenswerth aufgeführten regelmässigen meteorologischen Beobachtungen zu fixen Terminen empfehlen wir für einen längeren Aufenthalt an einem und demselben Orte.

I. Anleitung zu vollständigen meteorologischen Beobachtungen.

Der Zweck dieser Anleitung kann nicht darin bestehen, über die Theorie und den Gebrauch der wichtigsten meteorologischen Instrumente ins Einzelne gehende Instructionen zu geben, dazu würde der hier gebotene Raum nicht ausreichen, und zudem existiren schon leicht zugängliche treffliche Publicationen über diesen Gegenstand (s. den bibliographischen Anhang). Unsere Hauptaufgabe muss sein, die Aufmerksamkeit des Reisenden auf jene Punkte hinzulenken, welche auf Reisen die meiste Förderung unserer Disciplin versprechen. Wir wollen nach den wichtigsten der einzelnen meteorologischen Elemente vorgehen und stets zuerst das Wesentlichste über die zu empfehlenden Instrumente und Beobachtungsmethoden zusammenstellen.

1. Temperatur. (a) Lufttemperatur. Die Thermometer sind bewährten mechanischen Werkstätten (siehe darüber am Schlusse dieses Abschnittes) zu entnehmen und vor wie nach der Reise an einem der meteorologischen Centralinstitute einer Vergleichung mit einem Normalthermometer zu unterziehen. Während einer längeren Reise ist es zu empfehlen, wenn sich hierzu eine Gelegenheit bietet, die Thermometer in thauenden schon wässerigen Schnee (oder Hagel, Eis, aber diese sollen immer möglichst rein von erdigen oder gar salzigen Beimengungen sein) zu geben, und wenn kein Sinken des Quecksilberfadens mehr zu bemerken, den Stand desselben zugleich mit der Nummer des Thermometers im Beobachtungsjournal anzumerken. Durch Stösse und Erschütterungen auf dem Transport trennt sich zuweilen ein Theil des Quecksilberfadens, der, wenn noch in der Röhre, durch vorsichtiges schwaches Erwärmen sich wieder vereinigen lässt; zuweilen jedoch kommt auch etwas Quecksilber in den obersten meist etwas blasenartig erweiterten Theil der Thermometerröhre. Wenn man auf diesen Umstand nicht sorgfältig Acht hat, bekommt man leicht zu niedrige fehlerhafte Temperaturen. Durch vorsichtiges wiederholtes Stossen des Thermometergefässes gegen eine weiche Unterlage oder schwaches Erwärmen desselben, welches eben genügt, den Quecksilberfaden in die obere Endigung der Röhre und zur Wiedervereinigung mit dem dort befindlichen Quecksilbertropfen zu bringen, und nun folgende langsame Abkühlung gelingt es auch dann alles Quecksilber ungetheilt in die Röhre zurückzubringen. Zur Bestimmung der höchsten und tiefsten Temperatur im Laufe des Tages dienen die Maximum- und Minimum-Thermometer, deren es verschiedene Systeme giebt. Das vielfach angewendete Rutherford'sche empfiehlt sich nicht für Reisen, weil es sehr leicht in Unordnung kommt. Gegenwärtig dürften Casella's Maximum- und Minimum-Thermometer nach Philipp's und das Hermann und Pfister'sche registrirende Metallthermometer für Reisende am meisten zu empfehlen sein. Wenn man diese Instrumente benützt, ist es nöthig öfter und bei verschiedenen Temperaturen zugleich mit der Ablesung des gewöhnlichen Thermometers eine Ablesung des Standes (des Quecksilber- oder Alkoholfadens, bei den Metallthermometern des mittlern Stiffes) dieser Registrirthermometer zu verbinden und etwaige Abweichungen an einer besonderen Stelle des meteorologischen Registers anzumerken.

Sehr wichtig ist die Aufstellung der Thermometer. Dieselbe soll so erfolgen, dass die Thermometer gegen den Regen und gegen die directen Sonnenstrahlen sowohl, als auch gegen die von Wänden, nacktem Boden etc. reflectirte und strahlende Wärme geschützt sind, und dabei zugleich die Luft einen möglichst freien Zutritt zu denselben hat. Man schliesst zu diesem Zwecke auf den festen Stationen die Thermometer in weisse Blechkästchen mit jalousienartig durchbrochenen Wänden ein und bringt sie (auf der nördlichen

Hemisphäre) auf der Nordseite von Gebäuden wenigstens $\frac{1}{2}$ Meter von der Wand, oder ganz im Freien mindestens 4 Fuss über einem rasenbedeckten Boden an. Hat man wie im Sommer hoher Breiten keinen allzeit schattigen Ort zur Verfügung, so schliesst man die Thermometer in zwei solche Gehäuse ein (äusseres von Holz, inneres von Blech) mit luftigem Zwischenraum. Eine ähnliche Beschirmung dürfte auch auf Schiffen sich empfehlen. Auf Landreisen wird es in der Regel schwer fallen voluminöse Thermometerbeschirmungen mit sich zu führen, obgleich die kleinen Blechschirme für ein Thermometer, wie sie an den secundären Stationen in Oesterreich im Gebrauche sind, mit innen festgeklebtem Thermometer, zugleich zum Transport derselben sich eignen möchten. In den meisten Fällen muss es dem Reisenden überlassen bleiben einen schattigen luftigen Ort aufzufinden, wo das Thermometer möglichst richtige Lufttemperatur angeben kann. Störende Einflüsse sind bei den Aufzeichnungen kurz zu vermerken. In baumlosen Ebenen, Wüsten, dann auf Berggipfeln etc. ist es oft beinahe unmöglich, eine Schattentemperatur anzugeben; die Temperatur unter Zelten und Schirmen (welche die Wärmestrahlung des Bodens oft geradezu concentriren) entfernt sich meist sehr weit von der Lufttemperatur. In solchen Fällen ist jedenfalls ein zuerst von Arago im Jahre 1830 empfohlenes Verfahren anzurathen, welches darin besteht, ein kleineres, auf der Röhre getheiltes an einer Schnur befestigtes Thermometer im Kreise herumschwingen, bis dessen Stand stationär geworden ist. Man erhält dadurch selbst im vollen Sonnenschein ziemlich richtige Lufttemperaturen (Thermomètre fronde, von Baudin in Paris für 10 Francs zu beziehen). Diese Methode zur Bestimmung der Lufttemperatur wird überall dort zu empfehlen sein, wo sich eine schattige, von Wärmestrahlung freie Aufstellung der Thermometer nicht bewerkstelligen lässt.

Beobachtungszeiten. Es ist wichtig, dass die Temperaturen mehrmals im Laufe des Tages abgelesen werden und zwar zu Terminen, welche gestatten, ein Mittel aus allen Ablesungen zu nehmen, welches einem wahren aus 24stündigen Aufzeichnungen entnommenen Mittel möglichst nahe kommt. Als solche Termine empfehlen sich:

6 ^h VM.	2 ^h	und	10 ^h NM.		9 ^h VM.	9 ^h Abend	Maximum	und	Minimum
7 ^h	"	2 ^h (od. 1 ^h)	u. 9 ^h	"	10 ^h	"	10 ^h	"	"

oder mit Rücksicht auf die wünschenswerthen gleichzeitigen Barometerablesungen, besonders in niedrigen Breiten: 9^h oder 10^h VM., 3^h oder 4^h NM., 9^h oder 10^h Abend in Verbindung mit der Angabe der täglichen Minima (mit Hilfe eines Registrirthermometers). Eine einmal gewählte Stundencombination ist, so lange es die Umstände gestatten, beizubehalten. Aenderungen in den Beobachtungszeiten, sowie verfrühte oder verspätete Ablesungen der Instrumente, sind in den Beobachtungstabellen kenntlich zu machen.

Beobachtungen über die Wärmeabnahme mit der Höhe in heissen trockenen Continental-Klimaten wären sehr erwünscht. Die zu diesem Zwecke etablirten Beobachtungsstationen müssten in möglichst geringer horizontaler Entfernung von einander liegen und eine Höhendifferenz von mindestens 2—300 Metern besitzen. Die Beobachtungen an solchen derart gewählten Punkten sollten zu gleichen Stunden und bei möglichst gleicher Aufstellung der Thermometer geschehen; letztere selbst müssen vorher unter einander verglichen werden. Schon eine einmonatliche Reihe solcher Beobachtungen wäre von Werth.

Der tägliche Gang der Temperatur ist noch unbekannt für Orte

unter niedrigen Breiten jenseits des 30. Breitengrades und fern von den Meeresküsten, besonders in trockenen Klimaten. Um den täglichen Gang der Wärme kennen zu lernen, wären zum mindesten Beobachtungen in Intervallen von 2 Stunden von 6^h Morgens bis 12^h Nachts erforderlich, noch wünschenswerther ist natürlich die Fortsetzung der Beobachtungen auch in den Nachtstunden. Sogenannte stündliche Terminbeobachtungen einmal (am 21.) in jedem Monat, wie sie in älteren englischen Instructionen vorgeschrieben, genügen nicht, oder führen erst nach einer längeren Reihe von Jahren zum gewünschten Ziele. Solche Beobachtungen müssen sich über den ganzen Monat oder doch einem grösseren Theil desselben erstrecken. Stündliche Beobachtungen bloß während der Tagesstunden anzustellen, lohnt nicht die Mühe.

Lenz hat aus seinen eigenen und den Beobachtungen von Schrenck gefunden, dass auf offenem Meere innerhalb der Tropenzone das Wärmemaximum schon vor Mittag (um 11 $\frac{1}{2}$ bis 11 $\frac{3}{4}$) eintritt. *) Diese Erscheinung verdient aufs Neue geprüft und untersucht zu werden.

Auch die Bestimmung des Eintrittes des täglichen Wärmemaximums auf hohen freien Berggipfeln, und die tägliche Wärmeschwankung daselbst, verglichen mit gleichzeitigen Beobachtungen an einem Orte am Fuss des Berges muss empfohlen werden. Es genügen für's erste mehrtägige derartige Beobachtungen während heiteren ruhigen Sommerwetters. Von allgemeineren Beobachtungen über Wärmeverhältnisse eines Ortes führen wir an: Angabe des Eintretens des ersten und letzten Frostes im Winter, der Frosttage überhaupt, über die Dauer einer geschlossenen Eisdecke auf Flüssen, Seen, Meerbusen, sowie deren Anfang; Angabe des ersten und letzten Reifes etc.

(b) Insolation und Radiation. Zur Bestimmung der Intensität der Sonnenstrahlung in absolutem Maasse hat bisher nur ein Instrument mehrfache Anwendung gefunden; es ist dies das Pyrheliometer von Pouillet. **)

Zum Zwecke der Bestimmung der Sonnenstrahlung wird das aus dünnem Silberblech bestehende Gefäß mit Wasser ganz gefüllt, die Vorderseite mit Russ geschwärzt und das Instrument so aufgestellt, dass man es leicht dem vollen Sonnenschein aussetzen kann. Sobald es die Lufttemperatur angenommen, stellt man zuerst die berusste Fläche so auf, dass sie nicht von der Sonne beschienen wird aber ihre Wärme frei gegen den Himmel ausstrahlen kann. Dies geschieht durch etwa 5 Minuten, man liest hierauf die Temperaturänderung (wir bezeichnen sie mit Δt) ab, und setzt nun die berusste Fläche den senkrecht auf sie einfallenden Sonnenstrahlen aus, was man dadurch bewirkt, dass man den Schatten des Gefäßes in die Mitte der unten angebrachten Scheibe bringt. Nachdem man die Insolation durch 5 Minuten hat einwirken lassen, liest man die Temperaturerhöhung (ΔT) ab, und setzt nun wieder die berusste Fläche durch 5 Minuten der freien Strahlung gegen den Himmel aus, die nun erfolgende Aenderung heisse $\Delta t'$. Während das Instrument der Sonnenstrahlung ausgesetzt war, hat demungeachtet auch eine Wärmeausstrahlung stattgefunden und der wahrscheinliche Werth derselben wird durch $\frac{\Delta t + \Delta t'}{2}$ gemessen. Die Wirkung der Sonnenstrahlung allein

*) Bulletin der Petersburger Akademie. I. B. 1860.

**) Für Reisende statt des gewöhnlichen Stativs oder neben demselben mit einer Baumschraube zu versehen.

wird daher sein $\Delta T = \left(\frac{\Delta t + \Delta t'}{2} \right)$, wobei Δt und $\Delta t'$ negativ zu nehmen sind, wenn, wie dies meist der Fall sein wird, die Temperatur des von der Sonne abgewendeten Instrumentes sinkt. Diese Beobachtungen werden mehrmals wiederholt und stets die Zeit der Beobachtung mit angegeben, weil diese dazu dienen kann, Beobachtungen zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten auf dieselbe Sonnenhöhe zu reduciren und dadurch vergleichbar zu machen. Das Beobachtungsschema wäre also z. B.

Zeit		Temp. des Instruments 15°.6 C.		
9 ^h	0 ^m	{ Schatten	14.8	$\Delta t = - 0.8$
	5 ^m			
9 ^h	5 ^m	{ Sonne	18.2	$\Delta T = + 3.4$
	10 ^m			
9 ^h	10 ^m	{ Schatten	17.6	$\Delta t' = - 0.6$
	15 ^m			

u. s. w. Isolation = $3^{\circ}.4 + 0^{\circ}.7 = 4^{\circ}.1$ in 5 Minuten, somit $0^{\circ}.82$ in 1 Minute. Kennt man das Gewicht des Wassers im Gefässe = p , das Gewicht des Gefässes selbst = p' , das Gewicht des Quecksilbers im Thermometer p'' und deren specifische Wärmen: 1, σ' , σ'' , so hat man in Wärmeeinheiten: $\Delta T (p + p' \sigma' + p'' \sigma'')$ bezogen auf die Oberfläche des Gefässes. Die Grösse in den Klammern ist constant für dasselbe Instrument und braucht nur ein für alle mal bestimmt zu werden.

Beobachtungen mit diesem Instrument sind bisher nur in Europa von Pouillet in Paris, Althaus in Bonn, Quetelet in Brüssel, Forbes in der Schweiz gemacht, oder wenigstens bisher veröffentlicht worden. Es wäre sehr zu wünschen, dass sie in hohen Breiten im Winter wie im Sommer, ferner in der Nähe des Aequators in sehr feuchten, wie in sehr trockenen Klimaten, besonders auch in grossen Höhen (z. B. auf den Hochebenen von Tibet oder von Südamerika, im Winter auf hohen Berggipfeln unserer Alpen wie anderer Gebirge) wiederholt würden.

Das Pyrheliometer eignet sich zu einzelnen Bestimmungen der Sonnenstrahlung, weniger zu fortgesetzten regelmässigen Beobachtungen, die z. B. ganze Jahrgänge umfassen. Zu solchen Beobachtungen über Insolation an festen Stationen empfehlen sich am meisten die englischen Insolationsthermometer mit geschwärzter Kugel im Vacuum. Das Instrument wird horizontal auf Stützen in einiger Höhe über einer Rasendecke angebracht, und die Angabe des Maximum-Index in demselben täglich notirt; nach jeder Ablesung muss natürlich der Stift wieder auf das Ende des Quecksilberfadens zurückgebracht werden.

Auch Beobachtungen mit diesem Instrument sind sehr wünschenswerth an den oben näher bezeichneten Oertlichkeiten und Zeiten.

Die Wärmeausstrahlung in heiteren Nächten ist ein wichtiger klimatischer Factor und es sind daher Beobachtungen über dieselbe zu empfehlen. Zur Bestimmung derselben dient ein Minimumthermometer, das frei, unbeschützt, auf kleinen Stützen horizontal auf einen kurzen Rasen gelegt wird. Die Differenz zwischen der Angabe des nächtlichen Minimums an diesem Thermometer und der Angabe des unter dem Thermometerschirme befindlichen Minimumthermometers, welches die Lufttemperatur anzeigt, entspricht dem Betrage der nächtlichen Wärmeausstrahlung über dem Grasboden. An pflanzenleeren Orten kann man auf ähnliche Weise die Erkaltung des Bodens selbst

bestimmen. Ist der Boden mit Schnee bedeckt, so legt man ein Minimumthermometer unmittelbar auf den Schnee.

In trockenen Wüstenklimaten soll die nächtliche Erhaltung der Erdoberfläche unter die Lufttemperatur (beobachtet in circa 2 Meter Höhe über dem Boden) sehr bedeutend sein. Es liegen aber wenige Messungen derselben vor. Länger fortgesetzte Beobachtungen hierüber wären daher sehr erwünscht.

(c) Bodentemperatur. Regelmässige, in verschiedenen Tiefen angestellte, Beobachtungen über die Bodentemperatur können nur von Hauptobservatorien gefordert werden. Auf Reisen und an vorübergehend etablirten Beobachtungsstationen können jedoch Beobachtungen gemacht werden über die Temperatur der Bodenoberfläche. Die kräftige Erwärmung besonders dunkler Bodenarten über die Lufttemperatur ist ein nicht unwichtiges Element, z. B. für die Pflanzengeographie. Im hohen Norden sowohl, wie auf grossen Berghöhen macht sich die Vegetation dadurch in gewisser Hinsicht von der Luftwärme unabhängig. Die Beobachtung der Temperatur der Bodenoberfläche kann dadurch geschehen, dass man ein Maximumthermometer in eine kleine Vertiefung des Bodens legt und es 1—2 Centimeter hoch mit der umgebenden Erde bedeckt.

An Oertlichkeiten, die fernab liegen von meteorologischen Beobachtungsstationen und für welche wenig Aussicht vorhanden ist, dass in nächster Zeit solche errichtet werden mögen, sollten Bestimmungen der Bodentemperatur in grösserer Tiefe vorgenommen werden, um wenigstens zu einer genäherten Kenntniss der mittleren Jahreswärme der betreffenden Gegend zu gelangen. In jener Tiefe, in welcher die jährliche Schwankung der Wärme, wie sie an der Oberfläche statthat, aufhört, ist die Temperatur sehr nahe gleich der mittleren Lufttemperatur an der Oberfläche. Von diesem Niveau constanter Temperatur nimmt aber in noch grösseren Tiefen die Temperatur wieder zu, ungefähr im Verhältniss von 1° C. auf 90—100'.

Jene Tiefe, in welcher die jährliche Variation der Temperatur unmerklich wird, hängt erstlich ab von der Grösse der jährlichen Wärmeschwankung an der Bodenoberfläche und zweitens von der Wärmeleitungsfähigkeit des Bodens. Von sekundärer Bedeutung sind auch die in den Boden eindringenden meteorischen Wassermengen. Mittlere Verhältnisse in letzteren zwei Beziehungen vorausgesetzt, kann man für die gemässigte Zone der nördlichen Hemisphäre annehmen, dass in einer Tiefe von 15 Meter die jährliche Variation schon bis auf 0.1° C. vermindert ist. Die Bestimmung der Temperatur in dieser Tiefe genügt schon vollkommen für einen genäherten Werth der mittleren Jahreswärme. In polaren continentalen Klimaten (wo jedoch solche Bestimmungen auf manche Schwierigkeiten stossen dürften) müsste man die Beobachtungen in einer grösseren Tiefe anstellen; unter niedrigeren Breiten findet man die constante Temperatur schon näher an der Oberfläche. Uebrigens haben selbst die Beobachtungen zu Trevandrum, 8° nördl. Br., bei einer jährl. Wärmeschwankung der Lufttemperatur von circa 2.8° C. noch in 3.6 Meter Tiefe eine Variation der Wärme von 0.8 C. gegeben, wahrscheinlich unter dem Einfluss der starken Regen. Eine Verminderung auf 0.1° wäre erst in 9—10 Meter Tiefe zu erwarten. Boussingault begnügte sich auf den Andes der Aequatorialregion Südamerikas allerdings mit einer Tiefe von 0.3 Meter zur Bestimmung der mittleren Bodenwärme*). Die grosse

*) Nimmt man das Mittel aus den Beobachtungen zu Edinburg, Upsala, Brüssel, Paris, Strassburg, Madrid, Peking (welche für den Coefficienten B in der bekannten Formel $\lg p = A - Bp$ allerdings ziemlich variirende Werthe liefern), so findet man

Anzahl seiner Bestimmungen mag die noch übrig bleibenden Fehler eliminirt haben.

Um nun die Bodentemperatur zu bestimmen, bohre man an einer freien horizontalen Bodenstelle, welche kein Zusickern von Quellwasser besorgen lässt, ein Loch bis zur nöthigen Tiefe, versenke in dieses ein unempfindlich gemachtes Thermometer, fülle die Bodenöffnung nicht zu locker wieder mit Erde aus und Sorge dafür, dass das Regenwasser und oberflächlich zufließendes Wasser nicht eindringen kann. Je länger man die Thermometer in den Boden lassen kann, desto besser ist es. Hat man hierzu die Mittel, so ist sehr zu empfehlen, dieses Verfahren an mehreren Stellen in verschiedenen Bodenarten gleichzeitig anzuwenden. Die Thermometer kann man für den Gebrauch ad hoc durch dichte Umhüllung des Thermometergefäßes mit schlecht leitenden Substanzen (Wachs, Harz, Wolle, Hanf etc.) möglichst unempfindlich machen; besser jedoch ist es schon derart vorbereitete Thermometer mit sich zu führen. Am meisten dürfte sich empfehlen, das Thermometergefäß in eine zweite dicke Glashülle einzuschmelzen, so dass eine Luftschicht zwischen beiden bleibt. Das ganze Thermometer wird zum Schutz gegen Zerbrechen in eine Metallkapsel eingeschlossen, ähnlich wie die englischen Tiefseethermometer.

Wenn auch der einzelne Reisende selten in der Lage sein wird, Erdbohrer kleinerer Sorte, wie sie zu obigem Zwecke nöthig sind, mitzunehmen, so ist dies doch wissenschaftlichen Expeditionen sehr zu empfehlen. Nur auf diesem Wege wird es möglich sein, von zahlreichen, wenig besuchten und unbewohnten Erdstellen Mitteltemperaturen zu erlangen. Besonders dürften Expeditionen in höhere südliche Breiten keine Gelegenheit versäumen, durch sorgfältige Bestimmung der Bodentemperatur in Tiefen von 12—15 Meter uns in den Besitz zahlreicher genäherter Jahresmittel der Luftwärme jener interessanten Zone zu setzen. Die Bestimmung der Temperatur von tiefen Brunnen sowie von Quellen lässt viel weniger verlässlich auf die mittlere Lufttemperatur schliessen, ist aber aus anderen Rücksichten nicht ganz bei Seite zu lassen. Ebenso mag die Temperatur des Flusswassers bestimmt werden. Auch hierzu bedient man sich am besten unempfindlich gemachter Thermometer (z. B. Janssen's Pinselthermometer, thermomètre plongeur de Janssen, von Baudin in Paris), die man genügend lange im Wasser versenkt lässt. Ueber die Bestimmung der Meerestemperatur verweisen wir auf den Abschnitt über Hydrographie.

(2) Luftdruck. Zur Bestimmung des Luftdruckes empfehlen sich für den Reisenden zu Lande Heberbarometer von kleinerem Kaliber (wie sie z. B. Kappeller in Wien liefert), zur See Gefäßbarometer nach dem System von Kew.

Die Barometer sollen vor der Abreise an einem Hauptobservatorium verglichen worden sein, und es ist sehr wünschenswerth, dass eine sorgfältige Vergleichung an allen Observatorien wiederholt wird, an denen der Reisende

---

eine mittlere Leitungsfähigkeit des Bodens vorausgesetzt, die Tiefe p (in Metern), in welcher die jährliche Variation der Wärme auf 0.1° C. herabgesunken ist, durch die Gleichung

$$p = \frac{\lg a + 1}{0.1554};$$

a bezeichnet die Wärmeschwankung an der Oberfläche (in Celsius-Graden) und müsste eigentlich bekannt sein. Aber auch die Einführung eines beiläufigen Werthes nach Analogieschlüssen führt wenigstens zu einem genäherten Werth der Tiefe p , in welche man die Thermometer zu versenken hat.

vorüber kommt. Es sollen zu diesem Zwecke etwa 10 gleichzeitige Beobachtungen an dem Reiseinstrument und dem Instrument des Observatoriums von demselben Beobachter vorgenommen und die Temperatur der attachirten Thermometer mit angegeben werden. Die Ablesungen der Barometer und Thermometer werden im Original (ohne Reduction verschiedener Maasse) in die Tagebücher eingetragen.

Die Ablesung geschieht immer in der Art, dass der untere Rand des Nonius auf die Quecksilberkuppe eingestellt wird, so dass er den Meniskus tangirt. Zu diesem Zwecke wird der Noniusrand von oben herab mit dem Meniskus zur optischen Berührung gebracht. Das Auge muss dabei genau in der Höhe des Meniskus sich befinden, was man dann erreicht hat, wenn der hintere untere Rand des Nonius mit dem vorderen in derselben Ebene erscheint, sich also beide zu decken beginnen. Bei dem Heberbarometer muss die Einstellung auf dieselbe Weise auch am kürzeren Schenkel erfolgen, und die Ablesungen an beiden Schenkeln werden in das Beobachtungsjournal eingetragen. Das attachirte Thermometer wird am besten vor der Ablesung des Barometers beobachtet, weil während einer längeren Manipulation an demselben die Temperatur des Thermometers rascher steigt, als die des Quecksilbers im Barometer. Man vermeide, dass die Sonne während oder kurz vor der Beobachtung das Barometer bescheint, ebenso die Nähe eines geheizten Ofens.

Während der Reise überzeugt man sich von der Unversehrtheit des Vacuums im Barometer durch (nicht zu schnelles) Neigen desselben, so dass das Quecksilber an das obere geschlossene Ende der Röhre anschlägt. Ist der Ton hell, metallisch klingend, so ist das Barometer luftleer, ist er dumpf und matt, so ist wahrscheinlich Luft eingedrungen, selbst wenn man noch keine Luftblase bemerkt. Schiffsbarometer mit verengten Röhren geben aber nie einen starken hellen Ton.

Der Transport des Barometers erfolgt immer in der Art, dass man dasselbe neigt, bis das Quecksilber das Vacuum erfüllt hat und es dann ganz umkehrt. Die gewöhnliche Stellung des Instruments wie beim Ablesen, ist die gefährlichste für den Transport in Bezug auf das Eindringen von Luft in das Vacuum.

Die Beobachtungszeiten für den Luftdruck sollen im Allgemeinen dieselben sein, wie für die Temperatur. Das Tagesmittel erhält man in niedrigen Breiten, wo die tägliche Oscillation schon beträchtlich ist (unter 30° circa 1.6 Mm., unter dem Aequator 2.5) aus zwei Beobachtungen zur Zeit des Hauptmaximums, zwischen 9 und 10^h VM., und des Hauptminimums um 3—4^h NM., oder einer Beobachtung um Mittag.

Liegt die Beobachtungsstation in der Nähe der Küste, so ist es wünschenswerth, dass die Höhe des Barometers über dem mittleren Niveau des Meeres mit möglichster Genauigkeit ermittelt werde.

Beobachtungen über den täglichen Gang des Luftdruckes sind besonders unter niedrigen Breiten und auf den Continenten noch immer wünschenswerth. Ch. S. Claire Deville will z. B. gefunden haben, dass die tägliche Schwankung des Barometers an der Westküste (auf der pacifischen Seite) des tropischen Amerika mehr als doppelt so gross sei, als auf der östlichen atlantischen Küste. Neuere Beobachtungen im Innern Südamerikas haben sehr grosse tägliche Amplituden ergeben.

Um wenigstens die Hauptmaxima und Minima des täglichen Ganges kennen zu lernen, sind Beobachtungen mindestens in zweistündigen Intervallen von 5 oder 6^h Morgens bis 10 oder 11^h Abends erforderlich, welche wo möglich

einen Monat hindurch fortgesetzt werden. Bei längerem Aufenthalt empfiehlt es sich, wenn man nicht Musse und Gelegenheit findet, diese Beobachtungen continuirlich fortzusetzen, dieselben wenigstens durch längere Zeit um die Periode der Solstitien und Aequinoctien vorzunehmen.

Wünschenswerth sind ferner Beobachtungen und Angaben über das Verhalten des Barometers vor, während und nach Gewittern, heftigen Regengüssen, während auffallender charakteristischer Winde u. s. w. Wenn sich auch derartige Beziehungen zum Theil später numerisch sogar genauer ableiten lassen, ist es dennoch zu empfehlen, an Ort und Stelle den Erscheinungen besondere Aufmerksamkeit zu widmen und was als charakteristisch auffällt zu notiren. Es wird hierdurch einer allseitigen Verwerthung des numerischen Beobachtungsmaterials ungemein Vorschub geleistet.

(3) Luftfeuchtigkeit. Die zwei Methoden zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit, die für Reisende wohl allein in Betracht kommen können, sind die Bestimmung des Thaupunktes und die Beobachtung des Temperaturunterschiedes eines trockenen und eines befeuchteten Thermometers. Ein Hygrometer der ersten Gattung ist das Daniell'sche, sowohl in der ursprünglichen als in der von Regnault verbesserten Form. Auch das Regnault'sche Thaupunkthygrometer mit Aspirator ist schon auf ziemlich compendiöse Form gebracht worden. An Daniells und Regnaults Hygrometer beobachtet man mit möglichster Genauigkeit die Temperatur in dem, Aether enthaltenden, Gefäss im Momente, in dem es sich aussen mit Thau beschlägt. Der Thaupunkt ist jener Temperaturgrad, bei welchem die in der Luft enthaltenen Wasserdämpfe das Maximum ihrer Spannkraft erreichen würden. Die Grösse des entsprechenden Dunstdruckes e kann darum aus jeder Tabelle, welche die Maximal-Spannkraft des Wasserdampfes für jede Temperatur enthält, entnommen werden. Hat man zugleich die Lufttemperatur abgelesen, und entnimmt aus derselben Tabelle die dieser letzteren Temperatur entsprechende grösste Spannkraft des Dampfes ε , welche also bei gänzlicher Sättigung der Luft mit Wasserdampf beobachtet worden wäre, so nennt man das Verhältniss $\frac{e}{\varepsilon}$ die relative Feuchtigkeit. — In die

Beobachtungstabellen sind mindestens die beobachtete Temperatur des Thaupunktes und die gleichzeitige Lufttemperatur einzutragen. Die Bestimmung der Luftfeuchtigkeit mit dem Regnault'schen Hygrometer erfordert jedesmal einen eigenen Versuch, ferner macht der nicht unbedeutende Verbrauch von Aether die Beobachtungen ziemlich kostspielig. Nur wenige Reisende werden sich darum entschliessen, ein Regnault'sches Hygrometer mit Aspirator mit sich zu führen und regelmässig zu beobachten. Wissenschaftlichen Expeditionen sind aber wenigstens zeitweilige vergleichende Beobachtungen an diesem Instrument dringend zu empfehlen.

Bequemer und einfacher, aber weniger fehlerfrei, ist die Feuchtigkeitsbestimmung mit dem August'schen Psychrometer, d. i. die Beobachtung der Temperatur an einem befeuchteten und an einem trockenen Thermometer. Diese beiden Thermometer sollen unter gleichen Umständen übereinstimmende Angaben liefern und zum Zwecke der Feuchtigkeitsbestimmung neben einander angebracht sein. Man beziehe die Psychrometer nur von bewährten Werkstätten, und lasse beide Thermometer vor dem Gebrauch einer sorgfältigen Vergleichung unterziehen. Zerbricht eines der Thermometer, so ersetze man es nicht durch ein beliebiges anderes, sondern überzeuge sich vorher, ob das neue Thermometer mit dem alten wenigstens bei einigen verschiedenen Temperaturgraden übereinstimmt; beobachtet man Differenzen, so sollen die-

selben im Beobachtungsjournale vermerkt werden. Die Vergleichenngen werden in einer grösseren Menge Wasser vorgenommen, welches beständig gemischt wird, und in welches beide Thermometer bis zur selben Tiefe eingetaucht sind. Die Beobachtungsfehler und jene Fehler, die aus der nie gleichmässigen Temperatur des Wassers hervorgehen, macht man unschädlich durch Wiederholung der Beobachtung bei nahezu gleichen Temperaturen.

Die Kugel des „nassen Thermometers“ wird mit dünnem Baumwollzeug, Mousselin, überzogen und einige Zeit vor der Beobachtung befeuchtet. Man achte sorgfältig darauf, nicht früher die Temperatur abzulesen, bis die Abkühlung oder Erwärmung durch das aufgetropfte Wasser keinen Einfluss mehr haben kann. Wenn die Hülle durch Staub und Schmutz verunreinigt worden, muss sie durch eine neue ersetzt werden.

Die Beobachtung an dem Psychrometer erfolge an einem, vor Sonnenstrahlung und Wärmereflexen geschützten, freien Orte, nicht in Zimmern, Zelten, zwischen Fenstern u. s. w.; im Allgemeinen unter denselben Verhältnissen, die für die Bestimmung der Lufttemperatur schon empfohlen worden sind. Die Luft um die Thermometer soll nicht stagniren und völlig ruhig sein, sondern es soll ein mässiger Luftwechsel stattfinden.

In das Beobachtungsjournal trage man die Ablesung am trockenen wie am nassen Thermometer ein. Zur Bestimmung des Dunstdruckes und der relativen Feuchtigkeit aus diesen Ablesungen existiren Tabellen, welche beide Werthe ohne jede weitere Rechnung entnehmen lassen (siehe den bibliographischen Anhang). Die Richtigkeit der auf diesem Wege erhaltenen Feuchtigkeitsbestimmungen hängt vornämlich ab von der genauen Uebereinstimmung der beiden Thermometer und einer günstigen Aufstellung derselben, vorzüglich aber auch von einem mässigen Luftwechsel. Um den Gefrierpunkt herum werden die Bestimmungen unsicher, ebenso bei hohen Wärme- und Kältegraden. Die Formel, nach welcher aus der Psychrometerdifferenz Dunstdruck und Feuchtigkeit abgeleitet werden, ist nur für die im mittlern Europa vorkommenden Temperatur- und Feuchtigkeitsgrade geprüft, nicht so für hohe Temperaturen und grosse Trockenheit. Es ist daher sehr wünschenswerth, dass auf Expeditionen in solchen Ländern, wo grosse Trockenheitsgrade vorkommen, öftere gleichzeitige Beobachtungen mit dem Psychrometer und mit Regnaults Hygrometer ausgeführt werden, besonders während hoher Trockenheit der Luft, sei es bei niedriger oder hoher Wärme. Selbst kurze aber sorgfältig durchgeführte Reihen solcher Beobachtungen würden für die Wissenschaft sehr werthvoll sein.

Beobachtungen an Haarhygrometern haben nur dann einen Werth, wenn sie sehr häufig durch Vergleichenngen mit dem Psychrometer oder dem Regnaultschen Hygrometer controllirt werden. Im Allgemeinen sind sie nicht zu empfehlen.

Will man den mittlern Feuchtigkeitsgehalt der Luft kennen lernen, so genügt es nicht bloß einmal am Tage, oder gar zu unregelmässigen Zeiten, zu beobachten. Die Beobachtungen erfolgen am besten täglich mehrmals zugleich mit jenen der Lufttemperatur.

Es mangeln bis jetzt noch sorgfältige längere Beobachtungsreihen über den Feuchtigkeitsgehalt der Luft auf Berggipfeln, und so auch über die im Winter in den höhern Schichten der Atmosphäre eintretende relativ grosse Trockenheit. Wir besitzen ferner überhaupt wenige zuverlässige Beobachtungen über die Feuchtigkeit in dem Innern der Festländer. Der Zusammenhang zwischen Aenderungen der Feuchtigkeit mit der Windrichtung verdient Beachtung. Selbst über dem Meere kann die Luft ziemlich trocken

sein. Lenz hat an den Beobachtungen von Schrenck gezeigt, dass an der Westküste von Südamerika, speciell von Peru, die relative Feuchtigkeit sehr vermindert ist. Zwischen $10-1^{\circ}$ Südbreite geben die Beobachtungen von Schrenck in einiger Entfernung von der Küste zwischen 96 und 109° Länge eine relative Feuchtigkeit von nur $23-36\%$, erst in 123° Länge stieg dieselbe wieder auf die normale Höhe von 78% . (Bull. der Petersburger Akad. IV. 1861.) Diese Verminderung der Feuchtigkeit wird wahrscheinlich durch den Passat hervorgebracht, der hier über den hohen Kamm der Anden herabkommt und dadurch ausgetrocknet wird. Eine wiederholte Prüfung dieser Erscheinung ist wünschenswerth.

(4) Bewölkung. Der Grad der Trübung des Himmels durch condensirten Wasserdampf ist ein nicht unwichtiges klimatisches Element. Darum soll der Bewölkungszustand des Himmels zugleich mit den Ablesungen der meteorologischen Instrumente angegeben werden. Die Bezeichnungen heiter, wolzig, trüb, genügen nicht, man gebe vielmehr an, ein wie grosser Theil des ganzen sichtbaren Himmels von den Wolken eingenommen wird. Nach der jetzt allgemein üblichen Bewölkungsscala bezeichnet man mit 0 ganz heitern, mit 10 vollständig bedeckten Himmel, gleichgültig welcher Art die Wolkendecke ist; die Grade 1, 2, 3 etc. entsprechen einen bis zu 1, 2, 3 etc. Zehnthellen bedeckten Firmament. Diese Schätzung mag anfänglich schwierig und nicht scharf genug ausführbar scheinen, indess übt sich mit der Zeit der Blick, und da die einzelnen Schätzungen ebenso oft etwas zu gross als zu klein ausfallen werden, können die mittleren Resultate dennoch eine völlig befriedigende Genauigkeit erlangen. Besondere Angaben über bemerkenswerthe Erscheinungen am Wolkenhimmel sind wünschenswerth. Nebel, die auf dem Boden aufliegende Wolke, von welcher der Beobachter selbst umgeben ist, soll immer speciell angemerkt werden, am besten durch ein bestimmtes Zeichen. Bei jeder Beobachtung auch die Wolkenformen anzugeben, mag nur jener Beobachter thun, der den Wolkenformen ein specielles Studium widmet. Die mechanische Ausführung solcher Beobachtungen ist bei der nach jeder Terminologie grossen Unbestimmtheit der Wolkenformen nicht empfehlenswerth. Zur Entscheidung einiger Fragen über die zeitliche und örtliche Vertheilung der beiden am schärfsten charakterisirten Wolkenformen, des Cumulus (als Product des Courant ascendant) und des Cirrus, bei uns in Europa die typische Wolkenform des feuchten SW- und W-Windes, (schon vor deren Eintreten an der Erdoberfläche sie ankündend) empfiehlt es sich zumeist diese beiden Formen regelmässig zu beobachten, um z. B. folgende Fragen beantworten zu können: Giebt es eine Polargrenze des Cumulus selbst im Sommer, giebt es eine Aequatorialgrenze des eigentlichen Cirrus? — nicht des cirrusartigen (meist unbeweglichen) Wolkenschleiers, in welchem sich schliesslich die Cumulostratuslager der Gewittersheerde auflösen. Am entscheidendsten sind darum die Beobachtungen am frühen Morgen. Welche Bewegungsrichtung zeigen die langgestreckten Cirrusfäden, ziehen sie überall auf der nördlichen Hemisphären fast nur aus SW und WSW, auch auf der Ostseite von Amerika und in Ostasien; auf der südlichen Hemisphäre ebenso stetig aus NW?

Bestehen irgendwo längere Zeit oder regelmässig zwei übereinander wehende Luftströmungen, eine untere und eine obere, von verschiedenen Richtungen, angezeigt durch den Zug der Wolken, so verdient eine solche Erscheinung beobachtet und bemerkt zu werden. Eigenthümliche Trübungen des Himmels, etwa ähnlich unserem Höhenrauch, ferner durch Staub u. s. w.

verdienen Beachtung, besonders wenn sie periodisch auftreten oder mit gewissen Witterungserscheinungen in regelmässigen Zusammenhänge zu stehen scheinen.

(5) Niederschläge. Die Niederschläge des Wasserdampfes aus der Atmosphäre treten auf in der Form von Thau, Reif (gefrorenen Thau), Glatteis, Rauchfrost oder Haarfrost, Schnee, Regen, Hagel. Jede dieser Formen ist als solche in dem meteorol. Journal zu bezeichnen, am einfachsten durch bestimmte Symbole. Regelmässiger starker Thaufall (leider giebt es kein einfaches Mittel die Quantität dieser Niederschläge zu messen), sowie ein Aufhören des Thaufalls zu bestimmten Jahreszeiten, ferner das Datum des letzten Reifes im Frühjahr und des ersten im Herbste, Glatteis, als bezeichnendes Phänomen einer rasch wechselnden sehr veränderlichen Winterwitterung, sind charakteristische Erscheinungen für gewisse Klimagebiete. Wünschenswerth sind Angaben über die Dauer der Schneedecke, und deren mittleren Tiefe, die aus öfteren Messungen an verschiedenen Stellen, welche keine besonderen Schnee-Anhäufungen und Entblössungen zeigen, erhalten wird. Bis zu welchen Breiten kommt Schneefall in niedrigen Lagen zu beiden Seiten des Aequators vor? Beiträge zur nähern Bestimmung einer Aequatorialgrenze des Schneefalls und einer winterlichen Schneedecke sind wünschenswerth.

Beim Hagelfall verdient Beachtung: Grösse und Form der Schlossen, die Zeit des Falles, die Erstreckung des Hagelwetters, die Richtung des Zuges desselben, sowie die vorausgehenden und begleitenden Erscheinungen. Giebt es Oertlichkeiten, welche besonders häufig und regelmässig von Hagelschlag betroffen werden, und welche sind deren besondere natürliche Verhältnisse? Wie verhält es sich mit der Häufigkeit des Hagelfalls auf offenen Meere. Vom Hagel, grössere Körner mit eisiger Umhüllung, sind aber zu unterscheiden die Graupeln, kleinere Körner aus zusammengebackenen Schneeflocken, kleinen Schneebällen ähnlich sehend, denen die glatte eisige Rinde fehlt.

Die als Schnee, Graupeln, Hagel oder Regen fallenden Niederschläge werden ihrer Intensität nach gemessen durch den Regenschesser. Casella in London liefert auch speciell für Reisende bequeme Formen derselben. Die Regenmenge wird angegeben durch die Höhe der Wasserschichte, mit welcher der gefallene Regen, oder der geschmolzene Schnee (Graupel, Hagel) den Boden bedecken würden, wenn nichts verdunsten oder abfliessen könnte.

Die Maassröhren geben meist unmittelbar diese Höhe. Hat man den Regenschesser nicht von einer bekannten Firma bezogen, oder sich denselben selbst construirt, so soll die Grösse der Oberfläche des den Regen aufsammlenden Gefässes, und dessen Form, so wie die Methode der Messung speciell angegeben werden. Der Regenschesser ist auf dem flachen Erdboden aufzustellen, so dass der Regen von allen Seiten, auch wenn er vom Winde getrieben in schiefer Richtung niederfällt, frei in das Sammelgefäss gelangen kann. Es ist zu rathen, die Höhe des Niederschlags jedesmal nach Aufhören des Regens gleich zu messen.

Die Zahl der Monatstage, an welchen ein messbarer Niederschlag überhaupt, gleichgültig von welcher Form, stattgefunden hat, gelten als Tage mit Niederschlag, überdies kann daneben besonders die Zahl der Tage, an welchen Schnee oder Hagel gefallen ist, angegeben werden.

Wenn sich an gewissen Oertlichkeiten besondere Unterschiede des Regensfalls auf kleine Entfernungen hin bemerklich machen, sowie wenn die eine Seite

eines Gebirgszuges reichlichen Regen, die andere gleichzeitig Trockenheit hat, so verdient dies eine Mittheilung mit Angabe der speciellern Verhältnisse.

Meist mit Niederschlägen zugleich treten die elektrischen Entladungserscheinungen auf, die wenn der Blitz mit hörbarem Donner verbunden ist, als Gewitter, wenn nur Blitze oder Blitzschein wahrgenommen wird, als Wetterleuchten zu bezeichnen sind. Natürlich ist dies nur eine Unterscheidung zum Zwecke unmittelbarer Vergleichbarkeit aller meteorologischen Tagebücher; ein aufmerksamer Beobachter kann bei diesen noch wenig aufklärten Erscheinungen durch Mittheilung interessanter Detailbeobachtungen der Theorie vielleicht manchen werthvollen Fingerzeig geben. Besondere Beachtung verdienen die räthselhaften sogenannten Kugelblitze, Blitze in Form von Feuerbällen, die sich auffallend langsam bewegen sollen. Doch ist hier auch die Gefahr einer Täuschung z. B. durch Nachbilder u. s. w. sehr gross und darum strenge Selbstkritik und nackte Darstellung des Sachverhalts zu empfehlen.

Bei den Gewittern ist ebenfalls Angabe der Zeit des Auftretens, Dauer, Richtung und aller bemerkenswerther Umstände wünschenswerth. Um die Häufigkeit der Gewitter an verschiedenen Orten vergleichen zu können, ist die Angabe der Zahl der Tage mit Gewittern am meisten zu empfehlen. Die Häufigkeit der Gewitter auf offenem Meere soll viel geringer sein, als über einer benachbarten, wenn auch flachen Küste.

Das ruhige Ausströmen der Elektrizität mit Lichterscheinung aus Mastspitzen, Kirchthürmen Bäumen u. s. w. (Eliasfeuer), Blitze ohne Donner im oder nahe dem Zenith, Blitzschläge, die besondere, merkwürdige Wirkungen hinterlassen haben, starke elektrische Spannung der Luft, die sich zuweilen durch knisternde Funken an geriebenen Wollstoffen u. s. w. unmittelbar zu erkennen giebt, diese und noch manche andere bemerkenswerthe elektrische Erscheinungen verdienen ebenfalls einen Platz in den meteorologischen Aufzeichnungen.

(6) Winde. Die Winde sind nach ihrer Richtung und Stärke zu notiren. Letztere kann gemessen oder nur geschätzt werden. Zur Messung der momentanen Windstärke zur Zeit der Beobachtung kann man sich am besten eines Anemometers nach Robinson kleinerer Gattung (wie sie z. B. Mechaniker Kraft in Wien liefert) bedienen, vorausgesetzt, dass der Beobachtungsort so frei liegt, dass man annehmen darf, die richtige Windgeschwindigkeit zu erhalten. Man bestimmt mittelst des am Apparate angebrachten Zählerwerkes die Zahl der Umdrehungen für etwa 5 Minuten. Daraus ergiebt sich auch deren Zahl für eine Secunde. Nach Robinson ist die Windgeschwindigkeit dreimal grösser als die Geschwindigkeit, mit der sich die Mittelpunkte der Halbkugeln bewegen. Bei Einer Umdrehung legen dieselben den Umfang u des von ihnen beschriebenen Kreises zurück, die Windgeschwindigkeit in der Zeiteinheit ist daher gleich $3\pi u$, wenn n die Anzahl der Umdrehungen. Der Abstand der Mittelpunkte zweier gegenüber stehender Halbkugeln oder der Durchmesser d des Kreises lässt sich leicht messen, und man findet dann $u = \pi d$, wo $\pi = 3.14159$. Die Grösse $3\pi d$ ist eine Constante für ein bestimmtes Instrument, hat man sie einmal berechnet, so braucht man nur die Zahl der Umdrehungen n in der Zeiteinheit mit diesem constanten Factor zu multipliciren um die Windgeschwindigkeit zu erhalten.

Bei Schätzung der Windstärke bedient man sich auf dem Lande am besten der 10theiligen Scala, nach welcher 1 einen eben spürbaren leichten Windzug, 10 einen Orkan bedeutet. Die Abstufungen 2, 3, 4 entsprechen

mässigen; 5, 6, 7 starken; 8, 9 stürmischen Winden. Zur See ist die 12theilige Beaufort'sche Scala üblich, die Bedeutung der einzelnen Stufen ist:

- 1 leichter Wind, eben fühlbar
- 2 leichte Brise, 1—2 Knoten
- 3 „ „ 2—4 „
- 4 mässige „ 4—6 „
- 5 frische Brise mit welchem ein Schiff eben die Oberbrahmsegel noch führen kann
- 6 stürmische Brise (einfach gereefte Marssegel)
- 7 mässige Windstösse (doppelt gereefte Marssegel)
- 8 lebhaftige Windstösse (dreifach gereefte Marssegel)
- 9 heftige Windstösse (dicht gereefte Marssegel)
- 10 stürmische Windstösse (dicht gereefte Grosssegel)
- 11 Sturm (Sturm-stapsegel)
- 12 Orkan (dem kein Segel Widerstand leisten kann).

Für meteorologische Zwecke entspricht es vollständig die Windrichtung nach 16 Punkten der Windrose anzugeben, ja es genügen schon die 8 Hauptrichtungen. Wenn die Bezeichnung der Himmelsgegenden nach den Compass orientirt sein sollte, so muss dies ausdrücklich bemerkt werden.

Auf Reisen zur See in die Aequatorialgegenden verdient besondere Beachtung der Eintritt in die Passatregion sowie der Austritt aus derselben, ebenso Beobachtungen über die Breite der Zone mit schwachen und veränderlichen Winden zwischen den beiden Passatgürteln. Auf den Continenten ist die Abgrenzung der Passatregionen noch viel weniger bekannt, als auf den Oceanen, sie ist auch viel unregelmässiger und deshalb schwieriger zu bestimmen. Wenn Reisende nicht selbst durch längeren Aufenthalt innerhalb oder an der Grenze der Passatregionen Gelegenheit haben, regelmässige Beobachtungen über die Winde anzustellen, so können zuweilen auch Erkundigungen bei den Eingebornen über die Zeit der constanten Winde und die Richtung der letzteren förderlich sein. Ebenso sollten Erkundigungen eingezogen werden, aus welcher Himmelsgegend die Regen kommen, ferner über die durchschnittliche Dauer der Regenzeit und die Regelmässigkeit, mit welcher sie eintritt. Da die Eingebornen mit ihren Ernten und in manchen Einrichtungen ihres öffentlichen und häuslichen Lebens von diesen meteorologischen Verhältnissen abhängig sind, so dürfte es nicht so schwierig sein, brauchbare Mittheilungen darüber zu erlangen.

Zur Bestimmung der constanten Windrichtungen in den höhern Regionen empfiehlt Mühry die Rauchsäulen der hohen Vulkane, die Richtung nach welcher sie ziehen, regelmässig zu beobachten.

In den gemässigten und höheren Breiten verdient das Dove'sche Drehungsgesetz des Windes weitere Aufmerksamkeit. Dove hat zuerst festgestellt, dass in der überwiegenden Zahl der Fälle die Winde in den ekotropischen Breiten so mit einander abwechseln, dass ihre Aufeinanderfolge im Sinne des täglichen Laufes der Sonne geschieht, also auf unserer Hemisphäre die Windfahne von N über O nach S, SW, W, NW zurück nach Nord sich dreht, auf der südlichen Halbkugel hingegen von N über W nach S und über O zurück nach N. Oder: auf der nördlichen Hemisphäre dreht sich die Windfahne wie der Zeiger einer Uhr, auf der südlichen im entgegengesetzten Sinne. Mit dieser Drehung des Windes stehen die Aenderungen des Luftdruckes der Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung, der Häufigkeit des Regens im engen Zusammenhange. Die Nordwinde, und zwar NO in Europa und an der Westseite von Amerika, NW an der Ostseite von Amerika und Asien, bringen den höchsten Luftdruck, die tiefste Temperatur,

grösste Aufhellung des Himmels und geringste relative Feuchtigkeit, der SW (Europa, westl. Amerika) und SO (östl. Asien und Amerika) den tiefsten Luftdruck, die höchste Wärme, grösste Trübung und Feuchtigkeit.*) Der Uebergang von dem einen zu dem andern Extrem erfolgt auf regelmässige Weise, bei Ost sinkt das Barometer und steigt die Temperatur, bei W steigt das Barometer und sinkt die Temperatur. Auf der südlichen Hemisphäre liegen die Pole der Windrose bei SO und NW.

Diese Veränderungen sind noch weniger bekannt aus dem Innern von Asien und von Amerika, ebenso von der Ostseite dieser Continente, wie von der Ostseite von Süd-Amerika. Beobachtungen daselbst über das Gesetz der Winddrehung und die sie begleitenden Witterungserscheinungen sind darum wünschenswerth.

Ueber Winde von besonders hoher Temperatur und Trockenheit sind specielle Beobachtungen zu empfehlen. Die heissen trockenen Winde zerfallen in zwei Klassen:

1. Wüstenwinde, d. h. Winde die aus pflanzenleeren stark erhitzten Ebenen kommen, und darum heiss und trocken und meist staubführend sind, wie der Chamsin in Aegypten, der Samum in Mesopotamien, der Solano in Spanien, der trockene Scirocco auf Sizilien und in Unteritalien, der Harmattan in Senegambien, Leste auf Madeira, die Nordwinde in Victoria und Süd-Australien u. s. w.

2. Heisse trockene Gebirgswinde, in den Alpen Föhn genannt. Diese kommen trocken und heiss von dem Kamm der Gebirge herab, selbst wenn dieser schneebedeckt und vergletschert ist. Die Temperatur ist am höchsten in den Thälern, die dem Kamm des Gebirges am nächsten liegen, sie wird niedriger gegen das Flachland hinaus. Auch die Höhen des Gebirges selbst sind minder auffallend warm, und noch mehr gilt dies von den jenseitigen Hängen, des Gebirges, welche meist zugleich starke Regen haben. Diese Winde treten stets stürmisch auf. Wir kennen noch nicht genau alle Umstände, durch welche die Föhnerscheinungen erzeugt werden. Durch Erfahrungen, wo überall in Gebirgsländern derartige heisse trockene Winde, die vom Kamm des Gebirges herabwehen, sich finden, könnte ihre Theorie weiter ausgebildet werden. Die Trockenheit sollte mit dem Hygrometer gemessen und wenn irgend möglich Erkundigungen über die gleichzeitige Witterung an den jenseitigen Gebirgshängen eingezogen werden.

Wenn durch Stürme Staubmassen herbeigeführt werden, die deutlich auf eine ferne Ursprungsstätte hinweisen, oder der Regen und besonders der Schnee durch Beimengungen gefärbt erscheint, ist es wünschenswerth, nicht zu geringe Proben davon aufzusammeln und mit Etiketten versehen aufzubewahren. Zeigt der frisch gefallene Schnee fremde Beimengungen, so soll sogleich, am besten noch während des Schneefalls, eine grössere Menge desselben in vorher möglichst gereinigten Gefässen aufgesammelt, geschmolzen und das Wasser durch reines Filtrirpapier geseiht werden. Die auf dem Filter bleibenden Rückstände sind bei gewöhnlicher Temperatur auf dem Filter selbst vor Staub geschützt zu trocknen und aufzubewahren.

Von Wirbelwinden, welche Wasser oder Staub aufheben, sog. Tromben, besonders wenn sie in grösserer Heftigkeit mit zerstörenden Wirkungen

---

*) Im Sommer liegen diese Pole der Windrose jedoch für die Temperatur bei NW (Min.) und SO (Max.) in Europa, bei NO (Min.) und SW (Max.) im östlichen Amerika und Asien.

auftreten, sind möglichst sorgfältige Beschreibungen des Verlaufes der Erscheinung selbst und der vorhergehenden und nachfolgenden Witterung zu geben, besonders über Drehungsrichtung, vorausgehende Windstille, hohe Temperatur, begleitenden Hagelfall u. s. w.

Von Interesse ist ferner eine ausgesprochene tägliche Periode der Winde an irgend einem Orte, besonders wenn sie einen deutlichen Einfluss auf den Gang der übrigen meteorologischen Elemente hat. Auf die Wichtigkeit der Feststellung einer bestimmten jährlichen Periodicität der Windrichtung und der damit zusammenhängenden periodischen Witterungserscheinungen haben wir schon früher aufmerksam gemacht. Sie kann aber auch ausserhalb der Tropenzone angetroffen werden.

Von besonderem theoretischen wie praktischen Interesse sind die Beobachtungen bei Stürmen. Während derselben sollten die meteorologischen Beobachtungen in kleineren Intervallen angestellt werden, speziell über die Aenderungen des Luftdruckes und die Aenderung der Windrichtung; ferner über das Aussehen des Himmels, die Bewegung der höhern Wolken, ob sie mit der Richtung des unten herrschenden Windes übereinstimmt oder nicht. Bei längerem Aufenthalt an einer Station können über folgende wichtige Punkte Erfahrungen gesammelt werden: Aus welcher Richtung kommen die meisten Stürme, welche Winde, welche Witterungserscheinungen gehen ihnen voraus, welche folgen ihnen; springt der Wind während oder nach dem Sturme in die frühere Richtung zurück oder durchläuft er die Windrose und in welcher Richtung? Können Nachrichten gesammelt und Erkundigungen eingezogen werden über die Zeit des Eintretens, die Richtung u. s. w. des Sturmes an anderen Orten, so ist dies nicht zu verabsäumen, da hierdurch werthvolle Daten geliefert werden. Man möge die Mühe nicht scheuen, aus Localblättern, an Küstenplätzen von einlaufenden Schiffen, alle auf Stürme bezüglichen Angaben zu sammeln. Werden solche Sammlungen consequent fortgesetzt, so bilden sie für die Theorie der Stürme ein sehr werthvolles Material und kommen in Hafenplätzen nicht minder unmittelbar der Praxis zu Gute, vorzüglich in meteorologisch noch weniger bekannten Ländern. Solche Beobachtungen und Sammlungen sind auch dann verwerthbar, wenn keine Instrumente zur Verfügung stehen, wenn nur sorgfältige Angaben über Windrichtung, geschätzte Stärke des Windes und begleitende Witterungserscheinungen beigebracht werden können.

Beobachtungen ohne Instrumente. Es ist schon aus den vorhergehenden ersichtlich, welche meteorologischen Erscheinungen auch ohne Instrumente mit Nutzen beobachtet und aufgezeichnet werden können. Möge sich niemand von der Anstellung derartiger Beobachtungen abschrecken lassen durch den Gedanken, nicht etwas vollständiges liefern zu können. Regelmässig fortgesetzte Beobachtungen über ersten und letzten Frost und Reif, über die Tage mit Niederschlägen (Regen und Schnee), Gewitter, Hagel, über die Häufigkeit der 8 Windrichtungen zu gewissen fixen Stunden des Tages, über Stürme, Grad der Bewölkung des Himmels u. s. w. sind sehr werthvoll für die Klimatologie, besonders in wenig bekannten Ländern.

II. Anregung zu meteorologischen Beobachtungen.

Der Reisende, der selten im Stande sein wird, eine mindestens einjährige Beobachtungsreihe an einem Orte durchzuführen, wird oft in anderer Weise

diesem Mangel abzuhelpen im Stande sein. Ueber alle Erdtheile zerstreut, selbst auf den entlegensten Inseln der Südsee, leben Europäer und besonders Deutsche. Darunter finden sich sicherlich eine nicht geringe Zahl von intelligenten Männern, welche Interesse für die Wissenschaft haben und nicht wenige mögen darunter sein, deren Beschäftigung und Lebensweise für Beobachtungen an einem und demselben Orte gerade sehr passend ist. In der gesellschaftlichen Isolirung und der daraus hervorgehenden geistigen Monotonie, welche das Leben an solchen exponirten Punkten mit sich bringt, dürfte vielen die Gelegenheit sehr erwünscht kommen durch regelmässige Beobachtungen sich zugleich der Wissenschaft nützlich zu erweisen, mit dem civilisirten Leben neue Verbindungen anzuknüpfen und sich dabei zugleich geistig zu beschäftigen. Stets wird die Wissenschaft dankbar nennen einen Newcroff, jenen einfachen Kaufmann zu Jakutsk, der aus eigenem Interesse ein Vierteljahrhundert hindurch an einer in thermischer Beziehung höchst interessanten Erdstelle meteorologische Aufzeichnungen machte, oder einen Tobiesen, dem wir die ersten Wintertemperaturen aus dem europäischen Eismeere verdanken, und andere mehr. Vielleicht lässt sich mancher unserer fernen Landsleute aneifern, auf ähnliche Weise seinem Namen eine Unsterblichkeit zu sichern.

Wollen wir unser meteorologisches Beobachtungsnetz über die ganze Erde ausdehnen, so sind wir nothgedrungen auf die Beihülfe solcher freiwilliger, selbst interessirter Beobachter angewiesen. Der Reisende hat die Gelegenheit in fremden Ländern mancherlei Leute kennen zu lernen und es wird sein nicht geringes Verdienst sein, die zu Beobachtungen geeigneten Persönlichkeiten ausfindig zu machen und sie dafür zu interessiren. Ist dies gelungen, so ist fürs erste eine Anleitung zu den meteorologischen Beobachtungen nöthig, und es wäre wünschenswerth, dass zugleich Instrumente an solche freiwillige Beobachter abgelassen werden könnten. Wenn letzteres nicht möglich ist, so mögen vorläufig jene Beobachtungen begonnen werden, zu denen es keiner Instrumente bedarf, und es muss auf Mittel gesonnen werden, wie letztere beschafft werden können.

Der in Wien im September 1873 versammelte internationale Congress der Meteorologen hat auch die Unterstützung meteorologischer Beobachtungen an entlegenen Orten beschlossen und diese und ähnliche Angelegenheiten an ein permanentes Comité übertragen, das aus den Herren: Dir. Buys Ballot in Utrecht, als Präsident, Dir. C. Bruhns in Leipzig, Prof. Cantoni in Pavia, Dir. C. Jelinek in Wien, Prof. Mohn in Christiania, Dir. Robert H. Scott in London und Dir. H. Wild in Petersburg besteht.

An eines der Mitglieder dieses Comité's können derartige Anzeigen und Wünsche, sowie auch schon vorhandene, zur Veröffentlichung bestimmte meteorologische Tagebücher eingesandt werden.

III. Sammeln schon vorhandenen Beobachtungsmateriales.

Der Reisende dürfte zuweilen Gelegenheit haben, von meteorologischen Beobachtungen zu hören, welche von einem Freunde der Wissenschaft vielleicht schon seit längerer Zeit angestellt werden. Sind dieselben nicht schon irgendwo publicirt und ist keine bestimmte Absicht vorhanden, die Resultate in einem Fachblatte zu veröffentlichen, so ist dringend zu wünschen, mit dem Beobachter ein Uebereinkommen zu treffen in Betreff der Ueberlassung des Beobachtungsjournals oder der Resultate (letztere aber möglichst detaillirt,

z. B. für Temperatur, Barometer, Feuchtigkeit, die Monatsmittel der einzelnen Beobachtungsstunden für die einzelnen Jahre; die einzelnen Monatsextreme, die Häufigkeit der Winde ebenfalls für die einzelnen Monate und wenigstens für 8 Richtungen etc. siehe oben bei den einzelnen meteorologischen Elementen), sei es im Original oder in Abschrift.

Es existiren ferner viele derartige von Freunden der Meteorologie mit Sorgfalt an interessanten Orten angestellte Beobachtungen, welche den Fachmännern nicht bekannt werden und darum für die Fortbildung der Disciplin auch nicht verworthen werden können. Von manchen dieser Beobachtungen werden die Resultate in wenig bekannten Localblättern publicirt, und ihr Schicksal ist dasselbe. Es lohnt sich darum sehr wohl der Mühe, in fremden Ländern derartige Publicationen möglichst vollständig zu sammeln, oder die betreffenden Daten zu copiren.

Immer sind aber die sorgfältigsten Nachforschungen wünschenswerth, über den Ort, an dem die Beobachtungen angestellt worden sind, sowie über die verwendeten Instrumente. Wenn möglich, sollen letztere mit den eigenen Instrumenten des Reisenden einer genauen Vergleichung unterzogen werden. Zum mindesten lässt sich vielleicht der Werth des Nullpunkts des benutzten Thermometers und vielleicht noch eines oder des andern Scalentheils an demselben feststellen. Man möge sich die Mühe nicht verdriessen lassen, sich über alle diese Punkte ausführliche Aufzeichnungen zu machen; ohne solche können die besten Beobachtungsreihen oft keine Verwerthung finden. Wir haben schon früher bemerkt, dass, falls der Reisende nicht selbst Gelegenheit hat, derartige Sammlungen bald zu publiciren, es am gerathensten erscheint, sie mit den nöthigen Bemerkungen versehen an das ständige Comité des internationalen Meteorologencongresses einzusenden.

Anhang.

A. Mechanische Werkstätten, welche empfehlenswerthe meteorologische Instrumente liefern:

1. Berlin: Aktien-Gesellschaft zur Fabrikation meteorologischer Instrumente und Glas-Präcisions-Apparate (vormals J. G. Greiner jun. und Ch. Geissler) Markgrafenstrasse 87.
2. London: L. Casella, Meteorol. Optical Surveying and Scientific Instrument Makers to the Admiralty 147 Holborn bars London E. C.
— Negretti und Zambra Holborn Viaduct, 45 Cornhill, oder Krystall Pallast Sydenham.
3. Paris: Baudin, Instruments de Physique et de Météorologie. 330 Rue Saint Jacques.
4. Wien: L. J. Kapeller, Wieden, Hauptstrasse Nr. 2 und C. Kraft u. Sohn für Anemometer, Wiedner Hauptstrasse 60, Kärnthnerstrasse 34.

B. Meteorologische Tafeln und Lehrbücher zur Einführung in die Meteorologie:

Jelinek: Anleitung zur Anstellung meteorologischer Beobachtungen und Sammlung von Hülftafeln. Wien, in Commission bei Braumüller.

Guyot: Tables, Meteorological and Physical. Washington. Smithsonian Institution. *)

L. F. Kämtz: Meteorologische Tafeln herausgegeben von A. v. Oettingen. Dorpat.

C. Jelinek: Psychrometertafeln für das hunderttheilige Thermometer. Wien 1871.

*) Es ist dies die reichhaltigste Sammlung meteorologischer Tabellen, die überhaupt existirt.

- L. F. Kämtz: Vorlesungen über Meteorologie. Halle 1840.
E. E. Schmid: Lehrbuch der Meteorologie. Leipzig 1860.
E. Lommel: Wind und Wetter. Populäre Meteorologie. München 1873.
Th. Reye: Die Wirbelstürme, Tornados und Wettersäulen. Hannover 1872.
W. Dove: Das Gesetz der Stürme. IV. Auflage. Berlin 1873.
J. Müller: Lehrbuch der kosmischen Physik. III. Aufl. Braunschweig 1872.
A. Buchan: Handy Book of Meteorology. III. Ed. Edinburgh 1874.
A. Buchan: Introductory text book of Meteorology. Edinburgh 1871.
J. Herschel: Meteorology. Second. Ed. Edinburgh 1860.
Marié Davy: Les mouvements de l'atmosphère et de la terre. Paris 1866.
Flamarion: l'Atmosphère. Paris 1871.
-

Politische Geographie und Statistik.

Von

A. Meitzen.

Unter politischer Geographie und Statistik wird der Erkenntnisskreis verstanden, den wir über die politische und wirthschaftliche Cultur und Culturfähigkeit eines Landes zu erlangen wünschen.

Wir fragen dabei nach Bodengestalt und Beschaffenheit, nach Pflanzen- und Thierwelt, nach Anbau, Besiedelung und Bevölkerung, nach Landwirthschaft und Viehzucht, Kunstübung und Gewerbe, nach Handel und Verkehr, Land- und Wasserstrassen, nach Staatswesen und Geistesbildung. Die Gegenstände sind dieselben, die mancherlei Wissenschaften unter mancherlei Gesichtspunkten betrachten. Die politische Geographie aber verfolgt bei ihrer Art der Auffassung die Absicht, Natur und Menschen nach den Zügen zu beschreiben, welche ein Bild der politischen und wirthschaftlichen Zustände und der Mittel sie auf höhere Stufe zu heben, gewähren; die Statistik will in demselben Sinne die einzelnen Elemente des Naturlebens nach Zahl und Maass in ihrer räumlichen und zeitlichen Vertheilung feststellen und Vergleiche mit den ähnlichen Erscheinungen anderer Orte und Zeiten möglich machen.

Wenn man sich über die Einzelheiten Rechenschaft giebt, aus denen sich ein solches Bild des Kulturzustandes und der Culturfähigkeit zusammensetzen muss, um die nöthigen Ansprüche einigermaassen ausgiebig zu befriedigen, so entdeckt man sofort, dass die Mannigfaltigkeit und Massenhaftigkeit ganz überwältigend sind.

Sobald es sich darum handelt, nicht einzelne Beobachtungen und Notizen zu sammeln, sondern auf die oben gestellten Fragen eine begründete und erschöpfende, die Menge der Erscheinungen genau und zutreffend feststellende und übersichtlich zusammenfassende Antwort zu geben, werden Ermittlungen nothwendig, welche nur durch eine organisirte Vereinigung zahlreicher Arbeitskräfte ausgeführt werden können.

Niemand kann ohne mannigfache Veranstaltungen, die im wesentlichen nur die Staatsgewalt zu veranlassen vermag, die topographischen Grundlagen für den Flächeninhalt des Landes mit seinen Gebietsabtheilungen und für die Lage der Berge, Flüsse und Orte gewinnen, oder Volks- und Vieh-

zählungen vornehmen, Geburten, Trauungen, Todesfälle notiren, die Culturflächen an Acker, Wiese, Weide, Wald feststellen, oder Einfuhr und Ausfuhr der verschiedenen Waarengattungen an den verschiedenen Grenzen ermitteln, öffentliche Einnahmen und Ausgaben kennen u. dgl. mehr. Auch genügt für die meisten Fragen eine einmalige Antwort, oder die Angabe über die Zahlen eines Jahres nicht. In zahlreichen Fällen ist fortlaufende Beobachtung des eintretenden Wechsels nothwendig oder erwünscht; man will wissen, was sich zum Besseren, was zum Schlechteren verändert.

Für alles Dieses handelt es sich zunächst um hinreichend sichere Feststellung der einzelnen Thatsache, wo immer sie auftritt. Diese Beobachtung und Aufzeichnung fordert der Staat, der dabei verschiedene Zwecke seiner Verwaltung verfolgt, in der Regel von seinen örtlich vorhandenen Beamten oder anderen dazu bestimmten Organen. Die grosse Masse der verzeichneten Einzelheiten aber muss dann gesichtet, nach bestimmten Gesichtspunkten unterschieden und summiert, und endlich so übersichtlich zusammengestellt werden, dass daraus der geforderte Kreis von Antworten in Haupt- und Verhältnisszahlen entnommen werden kann.

Dies ist Sache der sogenannten amtlichen Statistik, welche in allen Kulturstaaten als ein nothwendiger Zweig der Verwaltung betrachtet und geübt wird. Selbst verhältnissmässig noch sehr weit zurückgebliebene und rohe Staaten pflegen in neuerer Zeit für solche Ermittlungen und Zusammenstellungen und für die Veröffentlichung dieser Nachrichten Sorge zu tragen. Sie legitimiren sich damit gewissermaassen als in die Reihe derjenigen Staaten eingetreten, welche ihren Bevölkerungen solche immerhin schwierig zu organisirende Erhebungen und Angaben zumuthen können. Wenn die Grundlagen auch vielfach mangelhaft und unsicher sind, sehen diese Staaten doch in der möglichst vollständigen und glatten Herstellung ein nicht ungeschicktes Mittel, politisch und finanziell ihren Credit zu erhöhen.

Der Reisende wird daher, so weit er noch von leidlich kultivirten Verhältnissen umgeben ist, fast überall solche Hilfsmittel erwarten können. Er wird häufig überrascht sein, welche glänzend ausgestatteten Tabellenwerke, Kartirungen und Beschreibungen er vorfindet; und er darf sich dieselben niemals entgehen lassen.

Aber es ist nicht so einfach, allorts von ihrer Existenz zu erfahren, und sie zu beschaffen. In der Regel wissen nicht sehr Viele um dieselben; Buchhändler nur ausnahmsweise, weil diese amtlichen Schriften nicht in den Buchhandel kommen; eher gelehrte Gesellschaften, denen sie mit Vorliebe und bis in die entferntesten Gegenden zugesandt werden. Am besten aber sind sie bei den höheren Beamten der Centralverwaltungen und bei den mit der Bearbeitung beauftragten statistischen Bureaus und ähnlichen Behörden zu erfragen.

Diese Nachfrage aber ist jedem Reisenden sehr zu empfehlen, denn ohne jede Ausbeute wird sie selten sein. Jedenfalls aber bildet sie einen vorzüglichen Anknüpfungspunkt, der den Nachfragenden auf die natürlichste Weise in Beziehung mit den in der Verwaltung des Staates hervorragendsten, mit Land und Leuten besonders gut bekannten Persönlichkeiten bringt, und ihm gewiss einen freundlichen, entgegenkommenden Empfang und vielerlei belehrende Andeutungen bietet. Nur ist dabei die alte Regel zu befolgen, sich stets an den höchststehenden Beamten zu wenden. Dieser erkennt darin nicht bloss die Höflichkeit, sondern auch, dass der Fremde sich des Werthes seiner Anfrage bewusst ist. Der Chef der Behörden vermag die Fragen

in der Regel hinreichend zu beurtheilen und hat wenig Mühe davon, die unteren Beamten zu den etwa nöthigen Diensten anzuweisen.

Neben der Beschaffung ist aber auch das Verständniss und die Handhabung solcher geographisch-statistischen Arbeiten schwerer, als es auf den ersten Blick erscheinen kann. Es gehört einige Bekanntschaft mit solchen Werken und eine gewisse Uebung dazu, um sich in ihren Zahlenreihen und kurzen Ausdrücken nicht zu irren, ganz abgesehen davon, dass es sehr viel Kritik erfordert, das Wahrscheinliche von dem Verdächtigen zu unterscheiden.

Der Reisende wird gewiss gut thun, vorher zu Hause, wo er mit Leichtigkeit volle Belehrung finden kann, auch wenn dort die statistischen Arbeiten der Staaten, die sein Reiseziel sind, nicht zu erlangen sein sollten, doch die ähnlichen Werke seiner Heimath auf Inhalt und Gebrauch näher anzusehen.

Er findet da bei jeder höheren Behörde zahlreiche Tabellen, Staatshandbücher, Jahrbücher und periodische Schriften über die oben gedachten verschiedenen statistischen Gegenstände. Alle diese Veröffentlichungen werden durch die übereinstimmende Natur der Dinge in den verschiedenen Staaten ziemlich ähnlich gestaltet.

Je mehr er sich mit Zweck und Anordnung solcher Aufstellungen bekannt gemacht hat, desto leichter wird es ihm werden, ähnliche Arbeiten im fremden Lande auszunützen, und er wird um so rascher Einsicht in dieselben gewinnen und durch persönliche Rücksprache Grundlagen für die richtige Würdigung erreichen. Solche Hinweisungen werden um so nothwendiger, je unbekannter und unentwickelter die thatsächlichen Verhältnisse des bereisten Staates sind. Bei statistischen Werken in weniger bekannten Sprachen wird der Reisende gut thun, zu wichtigeren und schwerer verständlichen Angaben die ihm mündlich mitgetheilten Uebersetzungen und Erläuterungen alsbald zu notiren, um dadurch für sich und Andere Aufschlüsse zu sichern, die fern vom Lande häufig durch keinerlei Hilfsmittel zu erreichen sind. Selbst sehr vollständige Lexika lassen für die statistische Terminologie meist sehr erhebliche Zweifel und Lücken.

Die statistischen Werke, die der Reisende im fernen Lande sammelt, wird er voraussichtlich nicht weiter mit sich führen wollen, sondern nach Hause senden. Gewiss aber wird sich ein Tag reichlich lohnen, den er vorher zu einer genaueren Durchsicht und zur Entnahme übersichtlicher Auszüge der wichtigsten Zahlen und sonstiger Angaben verwendet. Mit solcher Vorbereitung ausgerüstet wird er auch in sehr kleinen und verborgenen Orten einen Gemeindevorsteher, einen Beamten, einen Priester, einen Landwirth, überhaupt gewiss irgend Jemand finden, mit dem er über die ermittelten Verhältnisse, über die Art der Erhebung, über deren Richtigkeit und über die Ursachen der Ergebnisse, oder die Folgerungen daraus, sprechen kann, und den er durch die erworbene Landeskunde leichter für allerhand interessante Mittheilungen aufzuschliessen vermag.

Dass aber der Reisende überall durch solche von langer Hand vorbereitete, sachkundig geordnete, genügend verständliche geographisch-statistische Werke seine Bestrebungen erleichtert sehe, kann nicht als Voraussetzung gelten. Immer muss er vorbereitet sein, auch ohne jedes Hilfsmittel seinen Tag zu Beobachtungen zu verwerthen. Auch bleibt es sehr fruchtbar, nur von der eigenen Anschauung ausgehend, Schlüsse auf das Allgemeineren zu versuchen, und deren Richtigkeit an den bekannt gewordenen statistischen Daten zu prüfen.

Für den vorliegenden Zweck, bei dem vorwiegend Reisen in wenig oder gar nicht kultivirte Gegenden in's Auge zu fassen sind, empfiehlt sich deshalb anzunehmen, dass der Anhalt literarischer Nachweisungen fehlt, dass es dem Reisenden vielmehr obliegt, sich im Wesentlichen auf eigene Beobachtungen und Erkundigungen hin die nöthigsten Grundlagen zu verschaffen, um die beregten Fragen, wenn auch keineswegs genau, doch annähernd richtig oder wenigstens so zu beantworten, dass er die wissenschaftliche Forschung, der er dienen will, nicht irre leitet, und Andere auf seinen Angaben weiter fortzubauen vermögen.

Wir wollen uns also den Reisenden zu Ross oder Kameel im wechselnd kaum bewohnten Lande denken und ihn bitten, uns die Fragen, wie sie uns als Nationalökonom und Statistiker am Herzen liegen, nach Möglichkeit zu beantworten.

Dabei möchten wir ihm aber in Erinnerung erhalten, dass seine Antworten uns, die wir der Anschauung fern sind und deren Ergänzung nicht hoffen können, so weit es erreichbar, zweifelfreie mit dem vollen Inhalt der Wirklichkeit erfüllte Belehrung gewähren sollen und wollen. Er, der selbst als Fremder mit fremden Augen sieht, beabsichtigt Anderen neue Vorstellungen zu geben oder alte zu berichtigen. Diesen Zweck, dessen muss er sich bewusst bleiben, vermag eine aus der Gesammtheit der Eindrücke gewonnene Ueberzeugung oder ein souverain ausgesprochenes Urtheil nicht zu erfüllen. Vielmehr müssen wir wünschen, dass er verstehe, die einzelnen Elemente, die sein Urtheil vor ihm selbst begründen, auch uns gegenüber auszudrücken und kurz und plastisch zusammenzufassen. Wer Reisebeschreibungen oder unseren Altmeister Ritter mit Aufmerksamkeit liest, wird leicht erkennen, durch welche Züge die Darstellung ihn ungezwungen aus dem Nebel der Möglichkeiten in klar beleuchtete, fast wie die Heimath erkennbare Gegenden führt. Die Sache ist einfach zu wissen, aber schwer zu üben. Der Erfolg liegt wesentlich in der richtigen Angabe der bestimmenden Gründe, statt der, wenn auch noch so wohl durchdachten Abstraction des subjectiven Endurtheils. Wir wollen nicht glauben, sondern schauen. Der Reisende möge uns genau sagen, was er sieht, wir werden selbst ahnen, was daraus folgt.

Unser Fragen ist freilich leichter, als sein Antworten. Was wir auf dem Gebiete der politischen Geographie und Statistik an Beobachtungen wünschen, davon ist schon das Bemerkenswertheste allein von unendlicher Mannichfaltigkeit. Wir wollen versuchen, das Wichtigste unter einige Hauptgesichtspunkte zusammenzufassen.

1. Bodengestalt und Bodenbeschaffenheit.

Wo sind wir? Wie verläuft der Boden unter unseren Füßen? Wie sieht die nächste Nähe, wie die Ferne, wie der Horizont aus?

Was wir für unseren Vorstellungskreis davon bedürfen, lässt sich eher an Beispielen andeuten, als durch allgemeine Regeln feststellen.

In der Oberflächengestaltung der Erde giebt es nächst dem Meere Nichts über die ganze Welt gleichartigeres, immer ähnlich wiederkehrendes, als den Boden der Strombetten und ihrer Auen: Sie sind die Schöpfung des Wassers und gewissermaassen das in Thon und Sand zurückgelassene Abbild der überall gleichen Thätigkeit desselben.

Will uns der Reisende orientiren, so führe er uns vom Meere aufwärts, das strömende Wasser entlang, an dem mehr oder weniger trocknen Fluss-

bette, gebe uns Breite, Tiefe, Schnelligkeit, Farbe des Wassers an, zeichne uns, so weit das Auge reicht, den geraden oder gewundenen Lauf, die Breite der flachen Auen, die Zeichen der Hochwasserüberschwemmungen oder der genügend gesicherten Lagen der Thalebene. Dann sage er, ob die höheren Ufer in sanften Böschungen, als Abbruchstellen alter Schlangenwindungen ansteigen, durch deren immer wiederholte mäandrische Verschlingungen der Strom sich in den lockeren Boden eingeschnitten, oder ob er zwischen Hügelvorsprüngen sich durchdrängt, ob Felsen ihm ab und zu den Weg verlegen, ob ihn in grösserer Weite Bergabhänge begleiten, sanft abfallend in flachen Neigungen, Terrassen und Schuttsenkungen, oder steil in Fels oder Erdwänden oder in mannichfachen mehr rundlichen oder mehr zackigen Formen, wie sie das Gestein des Gebirges annimmt.

Vom Stromufer ausgehend, aufwärts und abwärts schauend, zunächst über das Flussthäl, dann längs der auf beiden Seiten coulissenartig hintereinander gelagerten flacheren oder höheren Thalabhänge, erreicht die Schilderung überall leicht und mit wenig Worten eine feste Linie, einen sicheren Grundbau für das Verständniss der landschaftlichen Situation. Vom Flussthäl steigt, wie der Weg, so der Blick allmählig zu den Höhen auf, ermisst die Zugänglichkeit, unterscheidet die weitere Verwicklung der Vorthäler bis zu den höchsten Gipfeln der Wasserscheiden und Pässe.

Aber nicht immer verfolgt der Weg das Stromthal, in wilden Gegenden geht der willkommenere Reisezug meist über Hochplateaus und breite Rücken ohne Gewässer und Einschnitte. Nothwendigkeit oder besondere Absicht zwingt, seitab über Abhänge und Vorhöhen zu hohen Lagen und mächtigen Gebirgsmassen anzusteigen, und Pässe oder Uebergänge in mehr oder weniger entfernte andere Flussthäler zu überwäligen. Aehnlich vermag auch die Beschreibung am deutlichsten vom Thale aufsteigend die rechts und links liegenden Gebirgsstöcke in ihren charakteristischen Formen zu erfassen, und an die feste, für die Kartirung besonders wichtige Hauptlinie des Weges die Gruppen von Höhen anzuschliessen, zwischen denen die Reise sich durch Gebirge zu Gipfeln, Pässen oder Plateaus erhebt und Rückblicke und umfassendere Aussichten gestattet. Für die Beschreibung wird ebenso wie für das eigene Auge die Schwierigkeit, in das richtige Verständniss einer Gegend von einem hohen Aussichtspunkte aus einzudringen, wesentlich durch die bereits erworbene genauere Bekanntschaft mit dem Charakter der Einsenkungen erleichtert.

Von welchen Grundsätzen immer aber der Reisende bei seiner Darstellung ausgehe, ein scharf aufgefasstes Bild der Oberflächengestaltung kann in keiner Reiseschilderung entbehrt werden, es ist die wichtigste Grundlage für die Richtigkeit aller weiteren Vorstellungen von Land und Leuten.

2. Pflanzen- und Thierwelt.

Der Botaniker, der Zoologe mag die Merkwürdigkeit der einzelnen Pflanzen- oder Thiererscheinung aufsuchen. Der Statistiker und Volkswirth fragt anders auf diesen Gebieten.

Für ihn treten die Beziehungen der Flora und Fauna zur Cultur in den Vordergrund.

Interessant ist, welche Pflanzen die Bodenoberfläche beherrschen; wichtiger noch, dass, wie weit und in welcher Gestalt eine Pflanzendecke überhaupt besteht.

Wald dicht oder licht, Gestrüpp, Schilf, Gras, Heide, Moos, oder der

dürre, harte oder fliegende Boden? Diese Frage geht allen vor und wird erst näher illustriert durch das mehr oder weniger fremdartige Bild, das die einzelnen theilgenommenen Pflanzengattungen und ihre Zusammenstellung bieten.

Wie vertheilen sich alle diese Vegetationsformen? in welchen Mischungen, in welchen Lagen stehen sie gegeneinander?

Für die Culturfähigkeit des Landes gilt es, die mehr oder weniger bekannten Besonderheiten des botanischen Charakters durch Prüfung einiger Eigenthümlichkeiten zu ergänzen, auf die sich nicht immer, selbst bei bekannten Gattungen, schliessen lässt.

Wie wurzelt der herrschende Waldbaum und wie tief? wie klammert er sich an? welche Zerstörung fordert sein Stand im Untergrundsgestein? Bedarf er viel oder wenig, stetige oder periodische Feuchtigkeit? Füllen Wurzeln, Unterholz, Schlingpflanzen die Räume zwischen den Stämmen? Was lässt sich von den Gestrüpppflanzen, von den auftretenden Grasarten aussagen? Welche Höhe lockerer Bodendecke fordern sie?

Welche Geschichte durchläuft die herrschende Vegetation im Jahr?

Die Culturfähigkeit des Bodens hängt weniger von seiner Zusammensetzung oder von seinem geologischen Charakter ab, als von seinen physikalischen Eigenschaften. Wie rein und wie tief er zerkleinert ist, ob lockerer Sand oder mehr oder weniger bindender Thon oder Mergel darin vorherrscht. Ob das Wasser darin leicht versinkt, ob es mässig gebunden bleibt, oder ob es bis zur Versumpfung zurückgehalten wird. Ob die Oberlagen porös und durchlüftet, oder verschlossen, verschlämmt oder hart sind. Ob der Boden sich heiss, kühl oder kalt hält. Für alles dies giebt die Pflanzendecke zu unseren Füßen Zeugniß, und spricht dies Zeugniß gleichmässig auf weite Entfernungen hin aus. Die Brauchbarkeit zum Anbau ist durch diese Unterscheidungen mehr oder weniger bedingt.

Dies gilt von der Nutzbarkeit des Bodens.

Anderes lässt sich über die Nutzbarkeit der einzelnen Pflanzengattung erfragen. Wie ist der Baumwuchs, wie das Holz, wie die Früchte? Bieten sie besondere Vorzüge oder büßen sie nach Klima, Boden oder anderen Einflüssen ihre Vorzüge ein? Entspricht die vorhandene Art der Verwendbarkeit der Gattung?

Wie weit reicht die Ernährungsfähigkeit der wilden Vegetation für Menschen, für Hausthiere? In welchen Jahreszeiten ist sie reichlich, in welchen spärlich oder gar nicht vorhanden?

Wie steht es mit der Zugänglichkeit? Welche Schwierigkeit bietet die Flora dem Vorschreiten der Menschen, der Reit- und Lastthiere, der Wagen? Wie viel Zeit und Arbeit fordert durchschnittlich eine bestimmte Wegelänge? Wie wechseln diese Hindernisse mit der Jahreszeit? —

Auch die Thierwelt kann ausser unter dem streng zoologischen Gesichtspunkte unter manchem mehr kulturwissenschaftlichem und wirtschaftlichem betrachtet werden.

Wie die Pflanze, und vielfach durch die Pflanze, hängt auch das Thier von dem Boden ab, der für seine Bedürfnisse geeignet ist, und erläutert die Eigenthümlichkeiten der Natur, in der es lebt. Es ist ein Gewinn, diesen Zusammenhang durch die Beobachtung zu erweisen.

Wichtig sind die Erleichterungen, welche die wilden Thiere dem Leben bieten: die Möglichkeit der Ernährung mittelst der Jagd durch Fleisch, wie durch sonstigen Jagdgewinn. Wie viel Menschen leben davon auf einem gewissen Terrain? Werden sie im weiteren Verlauf davon leben können? Welche Bedingungen bestehen dafür?

Was lässt sich von Fischen und Wasserthieren sagen?

Wichtiger noch sind wohl die Gefahren. Raubthiere lassen sich tödten, ja ausrotten; aber die Myriaden der kleinen Fauna, wie steht es mit ihnen? Was aus deren wechselvollem Dasein betrifft die Menschen, was das Vieh, was die Culturpflanzen? Von welchen Bedingungen scheinen die einzelnen Plagen abzuhängen? Wirken sie einander entgegen oder steigern sie sich? In welchen Jahreszeiten herrschen sie? Welche Gegenmittel sind in bekannter Anwendung?

3. Anbau, Besiedelung, Bevölkerung.

Der Culturfähigkeit steht die erreichte Culturentwicklung gegenüber. Es frägt sich, wie ist das Land angebaut, bewohnt, bevölkert?

Nur ausnahmsweise zeigt die Geschichte Völker, welche aus sich selbst heraus von Stufe zu Stufe höhere und gleichmässig verbreitete Cultur errungen haben, vielmehr hat sich zu allen Zeiten, von den ältesten bis auf die neuesten, die Erscheinung wiederholt, dass unter wilden und halbwilden Völkerstämmen von fremden Zuwanderern vereinzelte Culturstätten als Colonien höherer, übermächtiger und fremdartiger Bildung begründet werden, die längere oder kürzere Zeiträume ohne innere, wahrhaft organische Verbindung mit dem Volke bestehen, in dessen Territorium sie Fuss gefasst haben; die, auch wenn sie dieses Volk ihrer Herrschaft mehr oder weniger unterwerfen, doch die Fremdartigkeit ihres Ursprungs und die Eigenartigkeit ihrer Lebensbedingungen nicht verläugnen. Solche Coloniestädte, Handelsemporien, glänzend emporgeblühte Hauptorte inmitten weit unentwickelter Landgebiete empfangen gewöhnlich den Reisenden. Von ihnen aus setzt er seinen Fuss in's innere Land. Sie sind für ihn vom höchsten Interesse, und Jeder, der später dasselbe Ziel verfolgt, wird vorschien, genau sowohl über die Oertlichkeit wie über die Hülfsmittel, die sie bietet, orientirt zu sein. Gleichwohl ist es gut, wenn der Reisende sich bewusst bleibt, dass eine solche Stadt nicht anders denn als Fremdling im Lande zu betrachten ist. Sie will in ihrem geschichtlichen und merkantilen Entwicklungsgange aufgefasst, und in ihren daraus folgenden Besonderheiten als eine eigene der Erklärung bedürftige Erscheinung dargestellt sein. In ihrem innern Wesen und Treiben ist sie in der Regel wegen der Ausgleichung, die die Weltverbindungen schaffen, leicht verständlich. Niemand wird zweifeln, was er über einen solchen Punkt zu berichten hat. Hundertfältig besitzen wir die Beispiele, wie eine derartige Stadt nach ihrer Lage, ihren Bauten, ihren Kommunikationsmitteln, ihrem Handel und Wohlstand, ihrer Gesellschaft und ihrem Volkstreiben dem Leser anschaulich und befriedigend vor Augen geführt werden kann.

Gewiss bietet eine solche Culturstätte auch schon ausserordentlich viele Gelegenheit, nähere Kenntniss vom Innern des Landes zu erlangen, oder doch dafür Vorbereitungen zu treffen; und die Quellen, wie solche Kenntniss erlangt worden ist, oder erlangt werden kann, können nicht ausführlich und deutlich genug dargestellt und bezeichnet werden. Wohl aber ist auch dabei die Mahnung zu beachten, dass die Beobachtung an solchen Orten keine ungehörte ist. Mischung aller Art, von den äusserlichen Rassen- und Körper-eigenschaften, von Charakter und Temperament bis zu den verschiedenen Richtungen der Gedankenwelt, der Anschauungen und Wünsche, wird zur unabweisbaren Voraussetzung, welche so lange gelten muss, als nicht durch sorgfältige Prüfung die gegenheilige Annahme gerechtfertigt erscheinen darf. Es ist wohl gut, wenn der Reisende sich bewusst bleibt, dass grade hier

die schwierigsten Probleme ihm begegnen, und dass richtige Beobachtung an solchen Orten am allermeisten den kritischen Apparat fordert, der erst als die Summe aller Reiseerfahrungen am Ende, nicht am Anfang, der Forschungsreise als erworben betrachtet werden kann.

Das nächste Ziel, die Hauptfrage für die Reisenden wird, soweit es sich um die Kultur des Landes handelt, immer der Zustand der eigentlichen Masse des Volkes, die Verhältnisse des Territoriums der mehr oder weniger ausgedehnten Landgebiete sein, über die die eigenartige Bevölkerung dieser Gebiete ausgebreitet ist.

Die Menschen aber, die Volksgruppen, unter denen er sich bewegt, bleiben dem Reisenden auch hier lange ein ungelöstes Räthsel; er muss sich zunächst an ihre Werke halten.

Wenn der Blick über die weiten Flächen oder an den Gebirgslehnen hinstreift, so sucht er fast unbewusst nach den Spuren der Arbeit. Was hat der Mensch hier gethan? Wie hat er die gegebenen Mittel zu nützen gewusst? Wo hat Hacke oder Pflug Ackerfurchen gezogen? Wo ist der Forst gelichtet, wo stehen geordnet gepflanzte Bäume, wo lassen sich gepflegte Grasflächen bemerken?

Auch bei fremdartiger Gestaltung findet das Auge, von der Nähe ausgehend, diese Unterscheidungen leicht in seinem Gesichtskreise auf; und es ist keine zu grosse Forderung, dass sich der Beobachter darüber Rechenschaft gebe, in welchem Verhältniss alles dies Culturland den Flächenausdehnungen nach zu dem wilden Walde oder zu der Oede, zu Fels, Heide und Sumpf steht. Was er aber selbst sieht, möge er sagen. Was ihm Andre an Schilderung dazu ergänzen, thut er gut, davon zu unterscheiden.

Aehnlich lassen sich bei dieser Betrachtungsart die Wohnstätten überblicken. Wir erinnern uns der anziehenden Schilderungen Schweinfurts, wie er in den Landstrichen der verschiedenen, dem Nil anwohnenden Völkerschaften die Hütten zählt und danach die Köpfe schätzt. Es giebt eine vortreffliche Anschauung zu hören, welche überschlägliche Zahl von Wohnstätten sich im Verlaufe der Tagereise im Gesichtskreise gezeigt, wie sie gruppiert gewesen, welche Form und Grösse die Hütten gehabt, ob sie einzeln gestanden, allen Bedürfnissen unter einem Dach genügend, oder ob die Baulichkeiten verschieden für verschiedene Zwecke, und ob und wie sie für einen Haushalt zu Gehöften vereinigt zu werden pflegen.

Auch sehr ausgedehnte Ansiedelungen, grosse Lager, stadtähnliche Zusammenhäufungen lassen hinreichend sichere Schätzungen zu. Wo die Uebersicht mangelt, vermag ein Abschreiten der Hauptausdehnungen, abschnittsweises Zählen und verhältnissmässiges Berechnen immerhin ausreichenden Anhalt zu gewähren.

Stets wird willkommen sein, zu erfahren, welche Bauart die einzelnen Gebäude haben, und welche Stellung gegeneinander, wie viel Raum den einzelnen Wohnstätten, wie viel den umgebenden Höfen, Hausplätzen, Strassen gewährt ist, auf welche ungefähre Fläche sich die ganze Ansiedelung ausdehnt, und ob dies nach einem ersichtlichen Plane geschieht. Ebenso wird interessiren, ob dieser Plan auch bei anderen Ortschaften mehr oder weniger sicher wiederkehrt, und wie weit ein solcher mit Stammeseigenthümlichkeiten, Sitten oder Bedürfnissen zusammenhängt.

Diese Beobachtungen führen am natürlichsten und sichersten dazu, auch ein begründetes Urtheil über die Bevölkerung selbst zu gewinnen.

Die Volkszahl entscheidet wesentlich über den Entwicklungsgang der

Cultur, je näher sich die Menschen berühren, desto mehr sind sie aufgefördert, ihre humanen Eigenschaften zu entfalten.

Gewiss wird der Reisende nie versäumen, nach der Zahl der Männer, der Familien, oder der Köpfe des Volkes im Lande zu fragen; auch ist bekannt, wie geläufig den Wilden und Halbwilden Angaben über die Zahl der Krieger sind, die ein Stamm ins Feld stellen kann.

Aber die Prüfung des Anbaus und der Bewohnung bietet Gegenproben, welche diese Angaben controliren, und zugleich auf die lohnendste und überzeugendste Weise in das Wesen der Zustände einführen.

Jeder Anbau bedeutet eine Summe von Arbeit, die innerhalb gewisser Zeitperioden gethan worden sein muss, die in der Regel auch ihrem Zwecke nach sich periodisch wiederholt, und diese Summe der Arbeit setzt eine Summe von Menschenkräften voraus.

Was eine Menschenhand an einem Tage schaffen kann, auch nur in der gewöhnlichsten landwirthschaftlichen Arbeit, ist unter Verhältnissen sehr verschieden. Grosse Flächen im Zusammenhang bewirthschaftet, ersparen stets Zeit und Kräfte und beweisen unmittelbar die Regelmässigkeit der Durchführung. Die Kleinwirthschaft kann mit rastloser Sorgfalt verknüpft sein; sie kann aber auch in der Gewohnheit und Neigung wurzeln, nur das für des Lebens Nothdurft Unentbehrlichste dem Boden abzugewinnen, und anderen Richtungen der Beschäftigung oder allein der träumerischen Trägheit nur die nöthigste Zeit für die Landarbeit zu entziehen.

Nirgends aber ist schwer zu erfragen, wie viel Menschen durch wie viel Zeit nach Sitte des Orts zu einer gewissen Culturarbeit erforderlich geachtet werden? wie viel Arbeiter das im Jahre Wiederkehrende auf einer gewissen Fläche herzustellen pflegen? wie viele Betheiligte die Ernte auf gewissen mit Brodfrüchten, Obst, Palmen oder anderen Culturpflanzen bestandenen Flächen besorgen?

Dies sind Fragen, welche, auch wenn Kundigere nicht zur Hand sind, für Diener, Fuhrknechte und Träger zu den verständlichsten gehören, und auf die auch durch unbehülfliche Dolmetscher hinreichende Auskunft zu erlangen ist, wenn man nicht blos eines Zeugen Rede hört, sondern mit Aufmerksamkeit die Angaben Mehrerer vergleicht.

Ebenso wird meist zu erfragen sein, woher und wie weit diese Arbeiter herkommen, und für wie viele die in gewöhnlichen Jahren gewonnene Ernte zur Nahrung hinreicht.

Lässt sich damit ein ungefährer Anschlag vereinigen, in welchem Verhältnisse solche Culturflächen bis in gewisse Entfernungen vorgefunden werden, auf wie viele Quadratmeilen innerhalb des Gesichtsfeldes oder über dasselbe hinaus dies Verhältniss gelten kann, so leuchtet ein, dass daraus sowohl von der Zahl als von der Beschäftigungs- und Lebensweise der Bevölkerung des betreffenden Landstriches ein anschauliches Bild gewonnen werden kann.

Ein ähnliches Hülfsmittel, die Bevölkerungszahl zu schätzen und zugleich tiefer ihre Eigenthümlichkeiten zu erfassen, ergiebt die Bewohnung des Landes.

Es ist nicht schwer zu beobachten und zu erfragen, wie viele Personen durchschnittlich als Bewohner auf eine Hütte, ein Haus oder ein Gehöft zu rechnen sind. Daraus ergiebt sich, verbunden mit der beobachteten Zahl der Wohnungen ein entsprechender Ueberschlag der Bevölkerungsdichtigkeit.

Es ist aber bei der Beobachtung der Bewohner eines Hauses überall da gestattet, etwas weiter zu gehen, wo man es nicht mit aussergewöhn-

lichen Verhältnissen, die Krieg, Wanderungs-, Wirthschafts- oder Handelszwecke herbeiführen können, sondern mit dauernden landesüblichen Zuständen, mit der gewöhnlichen Lebensweise des Stammes zu thun hat.

In welcher Weise setzt sich die Bewohnerschaft eines Hauses zusammen? Werden viele Kinder, viele alte Leute bemerkt? Ist nur Einer Hausherr oder Mehrere? Lebt er mit einer Frau oder mit mehreren? Ist die eine eine legitime bevorzugte Ehefrau? Wie ist das Verhältniss der Kinder? Wie erben sie in Betreff der Herrschaft, der Vorrechte, des Vermögens in der Familie, im Stamm oder Staat? Gelten etwa die Schwesterkinder mehr als die eigenen, hat der älteste oder der jüngste Sohn mehr Anrechte?

Wie ist die Lage der alten Leute; wird ihnen Achtung und Hülfe bewiesen? Haben alte Frauen eine bevorzugte Stellung oder alte Männer, oder werden beide als Last behandelt?

Macht sich ein Unterschied in der Familiengestaltung nach verschiedenen Klassen oder Stämmen, nach Priester-, Krieger-, Herrschergeschlechtern bemerklich? Welche Vorstellungen und Anschauungen äussern sich über alle diese Verhältnisse bei den darüber Befragten?

Bleiben Geschwister, nachgeborene Söhne und Töchter oder sonstige Anverwandten im Familienhaushalte, ist es überhaupt üblich, ohne eigenen Haushalt eine Familie zu begründen? Bestehen genossenschaftliche Haushaltungen einer grösseren oder geringeren Anzahl von Verwandten, und wie werden sie geleitet? Oder lebt jeder Familienvater selbstständig und gesondert mit dem engeren Kreise von Frau und Kindern? Hält er Sklaven, abhängiges oder bezahltes Gesinde? Ist alles dies bei verschiedenen Klassen in bestimmter Weise verschieden?

Ehe-, Geburts-, Mannbarkeits-, Begräbniss-Ceremonien zu schildern, hat an sich Reiz genug, als dass die Veranlassung dazu unbenutzt gelassen werden sollte. Vielleicht zu wenig aber wird der aus den Lebensbeziehungen, Anschauungen und Bedürfnissen herfliessende Sinn beachtet, der sich in ihnen ausspricht. Dabei ist es rathsam, weniger die mystische Bedeutung, auch wenn sie von den Betheiligten behauptet wird, in den Vordergrund der Betrachtung treten zu lassen, als vielmehr das Zeugniß, welches in diesen Veranstaltungen von geschichtlichen Ueberlieferungen, oder von dem Charakter des Stammes, von seiner Sittlichkeit, seiner Art, dem Genuss und der Freude sich hinzugeben, oder von der oft streng erprobten Selbstüberwindung, Härte und rauhen Tugend zu erkennen ist.

4. Landwirthschaft und Viehzucht.

Schon der erste Versuch in die Anbau- und Bevölkerungsverhältnisse der ihn umgebenden Landstriche einzudringen, wird dem Reisenden das hohe Interesse nahe legen, welches eine speciellere Kunde der Landwirthschaft in fremdem Lande mit Recht in Anspruch nimmt.

Die Bewirthschaftung des Landes muss schon eine ziemlich hohe Entwicklung erreicht haben, ehe die einzelne ländliche Ansiedelung den eigenthümlichen Charakter eines Heimwesens verliert, das mit einer gewissen Selbstgenügsamkeit aus eigenen Kräften für den grössten Theil seiner Bedürfnisse selbst zu sorgen vermag. Auf den unteren Stufen der Cultur vereinigt die ansässig gewordene Familie materiell und ideell die Züge eines Mikrokosmos des Staates. An einen gewissen Fleck Landes gebunden, von

dem sie durch mehr oder weniger andauernde Arbeiten ihren täglichen Lebensbedarf gewinnt, trachtet sie nach aussen mehr nach Abgrenzung der Rechte und Sicherung vor Eingriffen, als nach Verkehr und unruhigem Wechsel. Nicht allein die Nahrung, sondern auch Kleidung, Werkzeuge und Genussgegenstände sucht sie in der Regel, sei es auch mit sehr einfachen Mitteln, doch selbst mit eigenen Kräften herzustellen, denn sie kann auf Lieferung von aussen nicht immer mit Sicherheit rechnen, und besitzt nur ausnahmsweise die Möglichkeit, sie durch Austausch oder Kauf zu gewinnen. So lange die Landwirthschaft nicht das Wesen der Grosswirthschaft annimmt, sind ihre Erträge in der Regel nur ein mässiger, eben nur den Unterhalt deckender Ersatz für die aufgewendete Arbeitskraft. Nicht deshalb, weil nicht an vielen Stellen Boden und Klima für wenig Arbeit reichliche Früchte zu gewähren vermöchten, sondern weil auf niederen Culturstufen der Arbeiter meist vorzieht, sich nur den nothwendigsten Anstrengungen zu unterziehen, und deshalb erst die organisirte Herrschaft über die Arbeitskräfte, die sich in der Grosswirthschaft ausspricht, erhebliche Ueberschüsse zu erzeugen vermag. Die gewöhnliche kleine bäuerliche Landwirthschaft bekommt ihrer Natur nach überall einen gewissen abgeschlossenen und stabilen Charakter, mit einem der Oertlichkeit angemessenen gleichbleibenden Kreislaufe der jährlichen Beschäftigungen und Ereignisse. Da nun mit Boden und Klima auch die am nutzbarsten anzubauenden Culturpflanzen und am zweckmässigsten zu haltenden Viehbestände kaum durch ein Jahrtausend dem Wechsel unterliegen, die Hilfsmittel einer Gegend und ihre einfachste und zweckentsprechendste Anwendung vielmehr leicht erkannt und ohne besondere Cultureinflüsse unverändert festgehalten zu werden pflegen, so ist unzweifelhaft, dass die genaue Erforschung einer landesüblichen Landwirthschaft eine Quelle der reichsten und merkwürdigsten Aufschlüsse sein muss.

Eine Fülle von Fragen drängt sich auf. Welche Pflanzen werden angebaut? Warum nicht andere, in der Gegend wohl bekannte, anscheinend ertragreichere? Welche Arbeitskräfte, welche Hilfsmittel erfordert der Anbau? Welche Zeiten halten Aussaat, Pflanzung, Blüthe, Frucht, Ernte inne? Wie stimmen diese Zeiten mit den Hauptperioden des jährlichen Ganges des Klimas? Welche Bodenarten werden benutzt, welche Bedingungen der Lage aufgesucht? Wie steht es mit der Bewässerung, mit dem Wasserabzug, mit der Düngung? Welche Gefahren werden befürchtet, welcher Schutz wird versucht? Wie hoch ist der Ertrag der Ernte, die man hofft, schwankt er sehr, oder ist er sicher? Wie stellt sich ihm gegenüber der tägliche oder jährliche Bedarf der nothwendigen Arbeitskräfte? Welches Quantum einer gewissen Frucht kann als dasjenige bezeichnet werden, welches den täglichen Nahrungsbedarf eines Menschen oder einer Familie ausmacht, oder ihm gleichgestellt werden kann? Ist es möglich, dafür einen Geldwerth anzugeben?

Welche Hausthiere werden gehalten? Wie werden sie ernährt? Welche Sorge wird auf sie gewendet? Wie ist ihr Lebenslauf, ihre Aufzucht, ihre Verwendung? In welchem Verhältniss werden sie gegenüber dem Werthe einer täglichen Nahrungsportion eines Menschen beim Tausche angeschlagen? Ist ein Geldpreis bekannt? Findet mit ihnen verbreiteter Handel statt?

Welche Ackerwerkzeuge sind in Uebung? Wie sind sie construirt, aus welchen Theilen, aus welchem Material bestehen sie? Welche Anstrengungen oder Kunstfertigkeiten erfordert ihre Herstellung, und welche ihre Handhabung? Wie viel leistet ein Arbeiter damit in einer gewissen Zeit?

Wie ist die häusliche Einrichtung beschaffen? Welchen Plan, welche Zusammenstellung, welches Baumaterial zeigt Haus und Gehöft? Wie werden die einzelnen Räume ausgestattet und benutzt? Welche Besonderheiten haben Heerd, Kochgeschirr, Lagerstätte, Aufbewahrung von Werth und Schmuck? Welche Vortheile, welche Nachtheile bietet die Wohnweise? Wie hängt sie mit dem Organismus der Wirthschaftsführung zusammen?

Wie viel Grund und Boden gehört üblicherweise zur Wirthschaft? Wie ist er belegen und wie eingetheilt? Welche Abgrenzung besteht gegenüber den Nachbarn? Ist Jeder selbstständiger Eigenthümer an seinem Grundstücke, oder nur vorübergehender Pächter oder Nutzniesser? Wie ist die Vererbung? Bestehen gemeinschaftliche, genossenschaftliche oder auf Familienband begründete Rechte am Boden? Sind solche Anrechte oder die Nutzungsarten an Acker, Wiese, Wald verschieden? Sind gemeinsame Weide, gemeinsame Holzrechte nach Bedarf oder nach bestimmten Antheilen in Uebung? Besteht eine Gemeinde mit wechselndem Besitz, mit periodischen Vertheilungen oder Verlosungen der Grundstücke? Gelten anerkannte agrarische Gebräuche oder Gesetze, und wer wacht über deren Aufrechthaltung?

Jede scharfe Antwort auf diese Fragen dient nicht allein dazu, das Bild der vorgefundenen Zustände in dankenswerther Weise zu zeichnen, sie bildet zugleich einen culturhistorischen Anhaltspunkt, dessen Wichtigkeit der Reisende, auch bei gewissen Vorstudien auf diesem Gebiete, nicht vollständig zu ermessen vermag.

Man kann sagen, dass aus diesem Kreise selbst die unscheinbarsten Kleinigkeiten und Trümmer der Aufbewahrung werth sind. Denn es handelt sich hier nicht um einen vorübergehenden Moment, oder um ein einzeltes Stammesdasein, sondern hier sind die feinen Fäden angeknüpft, welche, wenn auch noch kaum erkennbar, doch ohne Zweifel in die Urgeschichte des Menschengeschlechts zurückleiten und, von den verschiedensten Seiten zusammenlaufend, uns die Hoffnung auf eine immer klarere Erkenntniss der Vorzeit verbürgen. Nicht, dass wir davon so leicht ein Spiegelbild wiederzufinden vermöchten, aber für die Erklärung einzelner Züge bieten sich Erinnerungen, die bei anderen Völkern längst verklungen sind, Uebereinstimmung in unnöthigen Bedürfnissen, in Hilfsmitteln und in Ideen; altüberlieferte Bezeichnungen, sprachliche Anklänge, bei denen grade in der ursprünglichen Landwirthschaft alle Gegenstände nach Natur und Zweck besonders anschaulich und wahrscheinlich zu identificiren sind. Hier rechtfertigen sich leicht Schlüsse auf gemeinsame Quellen, oder es ergeben sich Ausblicke auf Ideen, Schöpfungen und Erfindungen, die übereinstimmend aus dem Wesen jeder menschlichen Gemeinschaft erwachsen.

Dieses Forschungsgebiet also dem Reisenden ganz besonders zu empfehlen, ist gewiss aller Grund vorhanden, und es wird ihm zugleich eines der leichtesten und zugänglichsten sein. Es bietet sich überall dar. Jeder weiss davon zu erzählen. Es bedarf nur des offenen Auges. Alles ist gegenständlich, selbst ohne genügenden Dolmetsch werden die Bezeichnungen verständlich. Dabei genügen wenige Beispiele, und diese sind, wo überhaupt Landbau betrieben wird, aller Orten zu finden.

5. Kunst und Gewerbe.

Schon auf fast noch thierischer Stufe drückt dem Menschen das Bedürfniss die Werkzeuge in die Hand und lehrt ihn, die äusseren Dinge sich zu Hilfsmitteln des Daseins zu gestalten. Waffen, Jagdgeräth, Nahrungsbereitung,

Wohnung, Kleidung, alles dies beginnt in einfacher ursprünglichster Gestalt, die der Zufall bietet, die bereite Aneignung wiederholt und die erfinderische Phantasie ausbildet.

Grösser, als wir es von unserem überschwänglichen Reichthume aus würdigen, ist die Mannigfaltigkeit der Gebrauchsgegenstände selbst bei sehr wenig entwickelter Cultur und augenscheinlicher Armseligkeit. Schon welche Art des Hausraths, der Werkzeuge, des Schmuckes, für welche Zwecke und für welche Personen in überwiegender Zahl und Ausbildung vorhanden, welche andern Arten und Richtungen vernachlässigt sind oder unbekannt scheinen, ist nicht ohne Interesse. Aber auch an besonderen Eigenthümlichkeiten wird keine Beobachtung ohne Ausbeute bleiben.

Es wird für den Reisenden keine lange Bekanntschaft mit einem Volksstamme dazu gehören, um an den Dingen des täglichen Gebrauches das Charakteristische in Gedanken und technischer Behandlung einerseits und in Zweck und Anwendungsweise andererseits aufzufinden.

Auch wird es immer sehr dankenswerth sein, wenn er Beispiele aller Art sammelt, und uns zum lehrreichen Beleg seiner Notizen in thunlichst ausgewählten Exemplaren unmittelbar vor Augen stellt.

Aber man darf sich nur solcher oft schwer errungener Sendungen von Waffen und Geräthen oder mancher Schaustellungen in Museen erinnern, um sich zu sagen, dass durch diese äusserliche Aufsammlung doch nur selten ein genügend bestimmtes, in vielen Fällen vielmehr ein sehr zweifelvolles und gewiss nicht selten sehr irrthümliches Bid erweckt wird.

In der That bedarf es auch hier scharfer Auffassung und sorgfältiger Unterscheidung.

In verschiedenem Sinne ist es nothwendig, nach der Quelle dieser Dinge zu forschen und jedes in sein richtiges Licht zu stellen.

Zunächst müssen wir wissen, dass der Gegenstand dem Volke, dessen Cultur er erläutern soll, auch wirklich angehört. Entweder die Sache, oder der Verfertiger kann importirt sein. Und so lange beide noch nicht mit Leben und Bedürfnissen verwachsen sind, hat der Besitz dieser Gegenstände nicht nothwendig andere Bedeutung, als die der Neugierde oder des Geschmacks am Ungewöhnlichen.

Aber auch der Werth der heimischen oder heimisch gewordenen Gegenstände ist für die Culturbetrachtung sehr verschieden.

Die meisten dieser Dinge sind allgemein menschlich und werden mit mehr oder weniger durch die Umstände bedingten Veränderungen von Geschlecht zu Geschlecht von sehr alten Zeiten her überliefert. Viele aber wanderten auch von Volk zu Volk, sei es, indem sie selbst der Oertlichkeit angepasst, mit dieser aus einer Hand in die andere gingen, sei es, indem sie der Begleiter der weiten Züge blieben, die gewisse Stämme nach und nach unruhvoll über weite Strecken des Erdrunds führten. Vielleicht lässt sich noch hier und da eine Erinnerung, ein Anklang an Namen, oder ein Rest früherer, zu anderem Gebrauch bestimmter Form erkennen. Auch hier kann das Kleine und Nebensächliche von kaum geahnter Wichtigkeit sein.

Einer der interessantesten Gesichtspunkte für die Betrachtung aller dieser Gegenstände, welche zum Gebrauch und zum Schmuck des täglichen Lebens dienen, ist die Frage, wie weit sie als Liebhaberei, als die freie Schöpfung der Phantasie entstehen, oder wie weit sie Ergebniss der auf Lohn oder Erwerb gerichteten, dem fremden Zwecke dienenden, nachahmenden Arbeit sind: also die Unterscheidung zwischen Kunst und Gewerbe.

Es ist ein eigenthümlicher Zug der menschlichen Natur, der sich immer

wieder unter den verschiedensten Verhältnissen geltend macht, dass sie für ideale Ziele ganz ungewöhnlicher Leistungen fähig ist. Was der Drang des Bedürfnisses, der Zwang der Arbeit oder der Wunsch des Erwerbes niemals erreicht, schafft der freudige Genuss, einem innerlich vorschwebenden Bilde von Schönheit oder Erhabenheit Ausdruck zu geben. Die Kunst ist nicht jünger, als das Gewerbe. Die freie Zwecklosigkeit des Daseins ist ihre Wiege, und die eigene Befriedigung giebt ihr die Spannkraft, aber die Befähigung von Andern verstanden und mitgeföhlt, als eine beglückende Verschwendung anerkannt und als Schmuck und Reichthum erstrebt zu werden, ist ihr Wesen.

Die Leistung, das Kunstwerk selbst, kann freilich in argem Missverhältniss zu der innewohnenden Idee stehen, und es kann andererseits die blosserwerbsmässige Nachahmung Gegenstände erzeugen, welche nur der genaue Sachkenner auf Originale zurückzuführen weiss.

Der Unterschied aber, ob man es mit einem Gegenstande ideeller Neigung, der nur die Entwicklung subjectiver Idee und Fertigkeit beweist, aber keinen allgemeinen Rückschluss erlaubt, oder ob man es mit einer handwerksmässigen Uebung zu thun hat, ist ein sehr wesentlicher. Letztere wird zunächst von der zweckmässigen Befriedigung des Bedürfnisses bestimmt, sie sucht diesem Bedürfnisse zunächst am einfachsten und mit den geringsten Opfern zu genügen, und je weiter sie darüber hinaus zum Schmuck, zur Nachahmung künstlerischer Verschönerung übergeht, desto mehr müssen ebenso die Mittel eines gewissen Ueberflusses oder Wohlstandes, als andererseits Neigung und Wohlgefallen an Aufwendungen für Reiz und Zierde vorhanden sein, und es muss sich darin auch eine mehr oder weniger bestimmt ausgeprägte Geschmacksrichtung erkennen lassen.

Man kann also von einer für den Culturzustand des beobachteten Volkes charakteristischen höheren oder niederen Stufe des Kunstgewerbes sprechen; und es ist bei jedem Gegenstande, den uns der Reisende beschreibt oder übermittelt, durchaus wesentlich, dass er sich über die Stellung ausspricht, die derselbe der herrschenden Stufe des Kunstgewerbes gegenüber einnimmt.

Ist man nicht bereits durch anderweit gewonnene Kenntniss belehrt, so bleibt der einzelne Gegenstand bei aller Klarheit seines Zweckes, ein ungelöstes Räthsel. Man muss wissen, ob er das vereinzelte Product eines auf sich selbst gestellten Künstlers, oder ob er das Ergebniss allgemein verbreiteter Routine ist, ob ihn nur der übermächtige Häuptling oder der heilig geachtete Priester als seltene, angestaunte Auszeichnung besitzt, oder ob ihn die Reichen, die Wohlhabenden oder selbst die Armen beschaffen. Auch ob einfachere oder noch werthvollere Gegenstände desselben Zweckes angefertigt und mehr oder weniger verbreitet besessen werden.

Ferner gehört hierher die Beantwortung der Frage, ob die Anfertigung in den Händen Einzelner, oder bestimmter Handwerkerclassen, Gesellschaften oder Familien liegt, ob damit Kasten- oder Ausschlussrechte verknüpft sind, oder endlich, ob viele oder die Mehrzahl der Männer oder Frauen des Volkes ähnliche Gegenstände für ihren Bedarf anfertigen oder anzufertigen vermögen.

Es bedarf keiner Hinweisung, dass hierdurch erst die Bestimmung eines Geldwerthes, oder der für den Gegenstand einzutauschenden Menge landesüblicher Nahrungsmittel, ihre Bedeutung erlangt. Vermag der Reisende zugleich eine Auskunft darüber zu erlangen, wie viel Zeit die Anfertigung des Gegenstandes und der Gewinn seines Materiales in Anspruch nimmt, dann kann er sich auf wenige solcher Gegenstände beschränken und gleichwohl,

wahrscheinlich ohne besondere Mühe, mit grosser Schärfe bleibende Anhaltspunkte für die Culturstufe sowohl als für die wirthschaftliche Entwicklung seiner Wirthe festlegen. —

Daneben erscheint indess die Beantwortung gewisser Fragen über besondere Gebiete der Technik von culturhistorischem und sonst allgemeinerem wissenschaftlichem Interesse.

Dahin gehört zunächst die Frage, ob und wie weit bei dem Volksstamme, den der Reisende beobachtet, noch Steinwerkzeuge in Gebrauch sind, und wie sie hergestellt und angewendet werden?

Unbestritten bilden die Steinwerkzeuge die ältesten Spuren des Menschengeschlechtes, und mit Recht ermisst man noch gegenwärtig nach ihrem ausschliesslichen, überwiegenden oder mehr und mehr verschwindenden Gebrauche die grössere oder geringere Annäherung des bestehenden an den ursprünglichen Zustand. Es sind überdies bezüglich der Anfertigung und des Gebrauches dieser Steinwerkzeuge viele Umstände noch unaufgeklärt. In diesen Verfahrungsweisen liegt aber gewissermaassen das einzige beweisfähige Document, welches wir uns über jene ältesten Zustände verschaffen können; es muss deshalb jeder Beitrag zu einer richtigen Vorstellung über dieselben höchst willkommen sein.

In ähnlichem Sinne fragen wir nach dem Verfahren der Metallbereitung. Die Anwendung der Metalle ist unbezweifelt jünger, als die der Steine. Man glaubt an das Auftreten von Metallgegenständen eine Art Chronologie der Gegenstände, wie der Fundstätten knüpfen zu können. Man legt dabei wesentlich auf die grössere oder geringere Leichtigkeit Gewicht, mit welcher die verschiedenen Metalle in einfacher Weise aus den Erzen gewonnen werden können. Aber das Vorkommen von Erzen und die Möglichkeit, sie ohne grosse Vorbereitungen zu gewinnen, sind in den verschiedenen Gegenden der Erde vielfach abweichend. Die rohen Methoden der Behandlung, durch welche die Darstellung des Metalles gelingen kann, sind keineswegs in erschöpfender Weise bekannt. Die cultivirten Völker haben schon viel zu lange den Zustand verlassen, in welchem es weder auf Zeit, noch auf Arbeitskraft, noch auf Menge und Werth, Reinheit, Härte u. dergl., sondern lediglich auf die schliessliche Herstellung des Metalles ankommt. Die rohen Verfahren älterer Zeit sind deshalb längst in Vergessenheit gekommen; Versuche, die man jetzt anstellt, um die Möglichkeit einfacher Gewinnung nachzuweisen, haben nicht die Sicherheit für sich, dass sie früher bereits bekannt waren. Es ist also von grossem Interesse, eigenthümliche Weisen der Metalledarstellung irgendwo thatsächlich in Ausübung zu finden, welche einen Aufschluss über die ersten Versuche auf diesem Gebiete zu geben vermögen. Dabei ist es von erheblichem Werthe, sowohl die Erze, als die Zwischenproducte und das endlich gewonnene Metall der wissenschaftlichen Untersuchung in Proben darbiehen zu können.

Unter verwandte Gesichtspunkte fällt die Bereitung von Thongefässen sammt ihren Ornamenten und der Art, wie dieselben hervorgebracht sind, da nächst den Steinen die irdenen Urnen zu den ältesten und doch in bekannte Perioden herab reichenden Resten der Vorzeit gehören.

Auch Glas und Glasflüsse, die verschiedenen Gewebe mit ihren besonderen Mustern und der dazu gebrauchte Webstuhl, ebenso die Benutzung von Färbstoffen gestatten mancherlei culturgeschichtliche Beziehungen.

Die Eigenthümlichkeiten der Ornamentik in Zeichnung oder Färbung sind mit Recht Gegenstand aufmerksamer Vergleichung, denn sie bilden gewissermaassen eine Art Zeichenschrift, welche die Verwandtschaft des

Geschmackes bekundet und häufig naheliegende Gründe an die Hand giebt, bestimmte Ueberlieferung und damit die gegenseitigen Beziehungen entfernter Gegenden zu vermuthen.

Für die Technik der Gegenwart kann besonders die Benutzung von Hölzern und Spinnstoffen, sowie namentlich die Bereitung von Färbmitteln von Bedeutung sein. Letztere werden vielfach aus Pflanzensäften in mehr oder weniger geheim gehaltener Weise gewonnen, und es sind auf diesem Gebiete noch Entdeckungen von durchgreifender Wichtigkeit möglich.

6. Handel, Verkehrsstrassen, Schifffahrt.

Seit lange rechtfertigt der Weltverkehr, dass, wenn wir vom Handel auch des entferntesten oder abgelegensten Landstrichs der Erde sprechen, wir dabei zunächst an den der Europäer oder der europäisch civilisirten Nationen denken. Die Handelsbeziehungen unserer Culturmittelpunkte umspinnen in der That die ganze Welt, dringen mit rastloser Energie und unwiderstehlicher Gewalt selbst über die abgeschlossenen und feindseligsten Grenzen und erstrecken sich in völlig unbekannte Gegenden, die nie ein europäischer Fuss betrat. Von Häfen und anderen zugänglichen Punkten aus weiss unser Kaufmann dem vermittelnden Händler sehr bald Geschmack und Neigung seiner Abnehmer abzulauschen und dieselben bis in dunkle Fernen seinem rastlosen Streben nach Gewinn unterthan zu machen, das zugleich die Propaganda der Civilisation ist.

Alle handeltreibende Nationen veröffentlichen Handelsberichte und Handelsnachweise. Es giebt kaum einen grossen Seehafen, auch in entfernten Ländern, in welchem nicht Specialberichte über den Verkehr zu erlangen sind, sei es besondere, die von kaufmännischen Corporationen, einzelnen Personen oder von den Consuln der vertretenen Staaten ausgehen, sei es durch eigene Zeitungen oder durch die Correspondenzen der Weltblätter. Der Reisende darf sich diese Auskunft selbstverständlich nicht entgehen lassen; er wird daraus mannigfache Belehrung schöpfen und weitere Fragen daran knüpfen können.

Aber er mag sich über die Bedeutung dieser Angaben nicht täuschen. Wenige Stunden Studium, in denen er versucht, sich aus ihnen ein klares Bild von dem wahren Stande der Handelsbeziehungen zu machen, werden ihn belehren, wie viel zu demselben fehlt. Nicht dass die Nachrichten absichtlich täuschten, aber unsere Kenntniss bleibt in den Vorhallen. Theils setzen die Mittheilungen Verhältnisse als selbstverständlich voraus, von denen uns jede Anschauung fehlt; wir vermögen die Bedeutung der einen oder anderen Notiz nicht zu würdigen, theils können die Berichterstatter selbst nur Bruchstücke geben, vieles Wichtige bleibt verborgen.

Der Reisende wird stets Gelegenheit haben, schon am Ausgangspunkte eines solchen Handels die dankenswerthesten Erläuterungen zu sammeln, wie viel mehr, wenn er, in das Innere vordringend, dessen Gang und Verzweigungen und alle Eigenthümlichkeiten des Geschäftes beim Uebergang aus den europäischen in die einheimischen Hände kennen lernt.

Schon Leben und Verkehr der Factoreien ist uns fremd. Sie bilden bereits die zweite, den Eigenthümlichkeiten des Landes mehr angepasste Etappenlinie. Von ihnen aus aber beginnt doch erst der wirkliche Vertrieb mit allen seinen Besonderheiten. Auf noch weiterer Station, an der letzten Grenze der Cultur, wo der europäische Kaufmann schon nicht mehr der Uebermächtige ist, sondern wo er nur durch kluge und sorgsame Benützung

aller wechselnden Umstände Stand halten kann, da nehmen die Handelsverhältnisse endlich den fremdartigen, abenteuernden Charakter an, der unser ganzes Interesse zu erregen geeignet ist; und hier liegen zugleich die Schlüssel zu manchem Unerklärlichen, zu den scheinbar offenkundigen Widersprüchen, zum Fehlschlagen der lange überlegten und vorbereiteten Versuche, zum Gelingen des Unwahrscheinlichsten. Kurz hier ist der Boden der praktischen, erfinderischen und unerschrockenen That. Jede Belehrung über denselben wird nicht blos dem Laien, der nach den Wegen sucht, auf denen die Cultur sich ausbreitet, sondern auch dem Kaufmanne, der nicht leicht eine Notiz übersieht, die seinem Geschäfte dient, in hohem Grade willkommen sein.

Es handelt sich dabei allerdings nicht blos um die allgemeine Bezeichnung der gehandelten Gegenstände, auch wenn sie uns anscheinend ganz bekannt sind, sondern um ihre genaue Beschreibung, wo möglich um Proben. Denn der Geschmack hängt an kaum glaublichen Kleinigkeiten. Auch der Gebrauch fordert oft Besonderheiten, die für uns und in der Ferne durchaus unbedeutend und gleichgültig erscheinen. In den Formen von Haupt- und Nebendingen, in Grössenverhältnissen, Material, Farbe, Glanz, Musterung, machen kaum erfindbare Umstände fast wie ein neckischer Zauber einen Gegenstand im Handel dem anderen überlegen.

Aber dies ist nur die eine Seite des Verkehrs.

In jedem Lande giebt es noch ein weiteres Feld, das allerdings dem europäischen Kaufmanne weniger wichtig ist, für den ethnologischen Forscher aber reichere Ausbeute verspricht, weil es nicht an Bekanntes und Jüngst-entstandenes anknüpft.

Es ist dies der Austausch heimischer oder von anderen, unserer Cultur nicht angehörigen Völkern verfertigter Gegenstände und die Art, wie derselbe vermittelt wird.

Selten vermögen wir uns auch nur ein annähernd sicheres Bild von diesem Verkehre zu machen, und doch bewegt er das tägliche Leben viel intensiver, als der grosse Welthandel, und umfasst die einfachsten und nothwendigsten landesüblichen Gegenstände, die durch Jahrhunderte und Jahrtausende ihre ursprünglichen Formen und Gebrauchsweisen beibehalten, und auch ihre Bezugsquellen, Handelsstrassen und Verbreitungsmittel in der Regel nur durch den unüberwindlichen Widerstand mächtiger Ereignisse ändern. Seien sie nun mehr Naturproducte oder mehr Kunsterzeugnisse, sie haben die Vermuthung für sich, dass sie in ihren innern Eigenthümlichkeiten, in ihrer Verwendung wie in ihrer Benennung, Ueberlieferungen enthalten, die für den Culturhistoriker von unerwarteter Bedeutung werden können.

Deshalb ist die scharf, in charakteristischen Zügen gezeichnete Skizze, wie ein fremder Volksstamm seinen Bedarf an den vielerlei Kleinigkeiten des Tages beschafft, wie sie aussehen und wie sie heissen, wie sie mehr oder weniger beliebt sind und gegeneinander im Werth stehen, nicht weniger anziehend, als die bunten Genrebilder des wirren Marktlebens, durch welche uns unsere wandernden Maler mit sicherer Wahl mitten hinein in das pulsirende Leben der unbekannten geheimnissvollen Fremde versetzen.

Hier kommen dann für den einzelnen Gegenstand alle die Fragen wieder in Betracht, die in Betreff der mehr oder weniger merkwürdigen Eigenthümlichkeiten der Erzeugnisse der Kunstfertigkeit aufzuwerfen sind. —

Der Verkehr hängt indess nicht allein an den Gegenständen selbst, sondern auch an der Möglichkeit oder grösseren Leichtigkeit, dieselben an Ort und Stelle zu schaffen. Die Transportmittel sind so sehr Hauptbedingung für

die gesammte Gestaltung des Handelsverkehrs, dass eine möglichst richtige Anschauung von denselben weder dem Kaufmanne, noch dem Forscher mangeln darf. Für den Reisenden selbst aber haben sie offenbar das un-mittelbarste und vielseitigste Interesse.

Es wäre völlig überflüssig, einen Reisenden auf die Bedeutung hinzuweisen, die jede Notiz über eine Handelsstrasse, sei es Land- oder Wasserweg, und über die auf derselben gebräuchlichen oder anwendbaren Transportmittel hat. Da giebt es offenbar nichts Unwichtiges.

Die Erkundigungen über die Strassenzüge sind gewissermaassen die ersten Visirlinien, die der Reisende über das Gebiet seiner Forschungen auslegt, um zunächst feste Punkte darin zu gewinnen.

Strassenkunde ist die Grundlage aller Geographie. Aus Itinerarien ist die Weltkarte entstanden, und noch heute füllen die Strassenlinien zuerst das Kartenbild unbekannter Gegenden.

Die hintereinanderfolgenden Stationen und ihre Entfernung in Stunden oder Tagemärschen, die Lagen einer gegen die andere nach den Himmelsgegenden, die Wendungen, die der Weg nimmt, bilden das constructive Gerippe. Der Charakter des Landes, Ebene, Hügel, Berge, Pässe, Uebergänge, die Bodenbeschaffenheit, Steine, Sand, Steppe, Wald, Sumpf, ebenso die Flüsse, die passirt werden, die Richtung ihres Laufes und ihr Wasserreichtum zu gewissen Zeiten, die Grenzen der Gebiete der Herrscher und der Stämme geben die äussere Gestalt und Form. Den vollen lebendigen Inhalt aber gewährt erst, wie Land und Leute genauer aussehen, mit wem man es zu thun hat, mit welcher Cultur, mit welchen Sitten, wie die Wohnplätze beschaffen sind, wie man vorwärts kommt, mit welchen Hülfsmitteln, unter welchem Aufwande und was sich Aehnliches erfahren lässt.

Alles dies zu erfragen, wird der Reisende nicht versäumen, auch wenn er nicht gedenkt, selbst des Weges zu gehen; ja man muss wünschen, um so weniger, je weniger er hoffen kann, die eigene Anschauung an die Stelle dieses durch Hörensagen gewonnenen Spiegelbildes zu setzen.

7. Staatswesen und Geistesbildung.

Nächster Beweis der erreichten Cultur, der Bildung und der Geistes- und Charakterentwicklung eines Volkes ist sein Staatsleben.

Der Reisende darf uns und sich selbst über die wesentlichen Züge desselben nicht im Unklaren lassen.

Allerdings aber ist dafür die hergebrachte äussere Schematisirung der Staatsformen, sei es nun autokratische oder beschränkte Monarchie, aristokratische, oligarchische oder demokratische Republik, Theokratie, Patriarchal-, Patrimonial-, Rechtsstaat, oder wie man unterscheiden will, nicht ohne Bedenken zu verwenden, weil dadurch Voraussetzungen einer systematischen Organisation erweckt werden, von denen die Wirklichkeit in weitem Maasse abweichen kann. Auch die staatsrechtlichen Theorien, welche in Europa seit einem Jahrhundert die Kämpfe constitutioneller Principien gegen die autokratische, oder man kann sagen bureaukratische, Monarchie unterstützt haben, sind in ihren Gegensätzen zwischen dem Staate einerseits und dem Einzelnen, der Familie und der Gesellschaft andererseits, welche gewissermaassen als Existenzen ausserhalb des Staates behandelt werden, ein keinesweges sehr klarer und glücklicher Anhalt für die Auffassung der wirklichen Zustände der Völker auf den verschiedenen Stufen ihrer staatlichen Entwicklung.

Eine einfache und natürliche Anschauung von fremdartigem Staatswesen und Staatsleben wird leichter gewonnen, wenn man sich nach wie vor an den Grundgedanken hält, den uns Aristoteles in seinem *ζῶον πολιτικόν* bietet.

Mit dem ersten erwachenden Bewusstsein, dass zur befriedigenden Durchführung des gemeinsamen Lebens Beschränkung der Gewalt und Opfer der Neigungen und Wünsche im Interesse des Anderen nothwendig und durch die Rückwirkung auf das eigene Wohl gefordert seien, beginnt der Staat. Ohne dieses Element steht auch das Familiendasein auf thierischer Stufe. Wohl mag die Familie Wiege und Schule des Staates sein, und der Staat kann zunächst auf eine durch gesicherte Vereinzelung selbstständige und souveraine Familie beschränkt bleiben, aber unter der Herrschaft menschlichen Bewusstseins giebt es weder eine Familie, noch eine Gesellschaft, welche nicht innerhalb des Staates beständen. Eine Horde, ein freier Stamm ist ein Staat. So lange die Theile der Gemeinschaft nicht die Kraft haben, sich freiwillig oder durch Empörung loszulösen und ein anderes Staatswesen zu bilden, ist auch die abnormste Lage, in die sich ein Einzelner oder eine Gesellschaft Vieler den übrigen Staatsbürgern oder der Staatsleitung gegenüber versetzt, gleichwohl nur durch den Schutz und die Ausübung eines Kreises von Rechten und Pflichten haltbar, denen sich Niemand im Staate entziehen kann, und die, wenn ein Staatsganzes zerreist, sofort in jedem Theile, als Sonderstaat, wieder aufleben.

Einfach aufgefasst, handelt es sich also für jedes Staatswesen im Innern nur um den Gegensatz derer, die ihren Willen in der Gestaltung des Staatslebens zur Geltung bringen, und derer, die von diesem Willen geleitet werden. Dies ist nicht nothwendig identisch mit dem Gegensatz des Herrschenden und der Beherrschten, oder der Regierenden und der Regierten. Denn die Bedingungen, von denen das Staatsleben abhängt, können sich so mischen, dass die nach der einen Richtung Leitenden nach verschiedenen anderen Richtungen die Geleiteten sind. Es ist meist nur Sache feiner Beobachtung zu ermitteln, wie dabei die Gewalten mehr oder weniger in gewissen Händen vereinigt, und von welchem Willen sie so beeinflusst werden, dass er als der bestimmende erkannt werden muss. Die Darstellung muss nothwendig auf das wahre Verhältniss zwischen der formalen Verfassung und dem in der praktischen Ausübung ausgesprochenen Wesen mit Schärfe eingehen. Letzteres zu kennen ist das Wichtigste.

Aehnlich grenzt nach Aussen die Staaten die Erstreckung ihrer souveränen Selbstbestimmung ab. Nicht durch die Kräfte, sie zu vertheidigen, besteht dieselbe, sondern thatsächlich, so lange sie nicht wirklich beeinträchtigt wird. Aber auch hier sind nach formalem Staatsrecht Fictionen der Unabhängigkeit, wie der Abhängigkeit möglich; und für die Beobachtung fremder Staatsverhältnisse ist es mindestens ebenso wichtig zu wissen, wie weit der Druck der Lage ein Staatswesen bestimmt, sich mehr oder weniger dauernd dem Einflusse des andern zu unterwerfen, als wie weit dieses Vassallenthum einen formalen Rechtsausdruck gewonnen hat.

Hat man also auch bei dem rohesten und wildesten Volksstamme die Grundzüge eines Staatswesens aufzusuchen, so wird es sich empfehlen, von dem Minimum der Anforderungen für ein solches ausgehend, sich zu vergegenwärtigen, wie es sich äussert, und auf welche Stufe es sich erhoben hat.

Die Reihe der Fragen ist überreich:

Wie weit ist die Wohlfahrt des Einzelnen geschützt, und zwar beides der Absicht und der Macht nach? Wie steht es mit der persönlichen

Sicherheit vor Gewaltthat, vor Unterjochung und Zwang, vor Beleidigung? Wie in Betreff des Eigenthums, des Hausfriedens, der Feldfrüchte, des Viehes, wie in Betreff der gemeinsamen Berechtigungen an Acker, Wiese, Wald? Wie sind Verträge, Kauf und Tausch, wie Schuldforderungen und Bürgschaften gesichert? Bestehen besondere kaufmännische Rechte? Wie behandelt man den Ueberschuldeten, Zahlungsunfähig gewordenen?

Was gilt von Familienrechten, von Ehe, von Kindern, Vormundschaften, Erbschaften? Besteht Sklaverei oder Hörigkeit, Gesinde, vertragsmässige Lohnarbeit, und unter welchen Berechtigungen?

Giebt es besondere Rechte für den Adel, für die Priester, für die Fürsten und ihre Familienglieder?

Wie weit darf man für alle diese Rechtskreise von feststehenden Normen sprechen? Wechseln dieselben nach Meinung oder Belieben des Königs oder des von diesem, oder vom Volke, oder von den Priestern anerkannten oder eingesetzten Richters oder Beamten? Wird den geltenden Normen durch Festsetzungen oder Beschlüsse mehr oder weniger Stetigkeit und Ansehen verliehen? Wie kommen diese zu Stande? Wie weit gelten Sitte und Ueberlieferung. Wie weit wirken religiöse Vorstellungen? Sind Rechtsprüchwörter bekannt? Giebt es geschriebene Gesetze, gilt ein Religionsbuch zugleich als Gesetzbuch?

Uebt man Straf- und Civilgericht mit einer gewissen feierlichen Förmlichkeit? Wer ist dabei betheiligt? Wie wird Anklage oder Klage gestellt, wie der Beweis erzielt? Wie werden Zeugen, Urkunden, Schwüre benutzt? Ist Berufung von einem Richter an den anderen möglich? Entscheidet schliesslich der König, die Volksversammlung, der Priester, die Gottheit, das Orakel? Sind die Strafen leicht oder grausam, einfach oder abgestuft und verwickelt? Fällt der Schwache der Willkür, dem Eigennutz, dem Betrug der Gegenpartei oder des Richters leicht zum Opfer? Wie werden die Strafen vollzogen, wer führt die Processurtheile aus?

Macht sich in den einzelnen Orten oder Bezirken, oder vom Mittelpunkt des Staates aus eine polizeiliche Aufsicht und Fürsorge geltend? Wer übt sie aus? Worauf bezieht sie sich? Werden Wege oder Brücken, Landungsplätze, Wasserleitungen gebaut und im Stand gehalten? Giebt es eine Fürsorge durch Nacht- oder Feuerwachen, Strassenreinhaltung, Handels- und Marktaufsicht? Besteht ein Benachrichtigungs-, ein Boten- oder Postwesen?

Wie ist das Militär organisirt? Giebt es stehende Truppen? Gehört Jeder zum Aufgebot? Welche Waffen bestehen als Kriegswaffen? Muss sie Jeder selbst beschaffen? Wer ist Ober-, wer Unterbefehlshaber? Sorgt man für Vorbildung? Besteht Sinn für kriegerische Tapferkeit, Unterordnung und Ausdauer in Beschwerden? Sind Befestigungen der Grenzen oder einzelner Punkte bekannt? Wie sind sie beschaffen?

Wie werden die öffentlichen Bedürfnisse bestritten? Schalten die Machthaber nach Belieben? Steht dafür das Eigenthum oder die Leistungskraft jedes Einzelnen zur Verfügung, oder besteht eine organisirte Vertheilung der Lasten? Werden Abgaben erhoben? Worauf haften sie? Wie ist die Festsetzung, wie die Einziehung, sind bestimmte Gegenstände oder bestimmte Personen besteuert? Giebt es Grenz-, Wege-, Fluss-, Hafenzölle? Besteht eine Rechnungslegung, eine Verantwortung? Wer erfährt davon?

Sind Schulen eingerichtet? Bestehen sie nur für Priester oder durch Priester? Worauf erstreckt sich der Unterricht? Knüpfen sich Vorzüge oder Berechtigungen an eine gewisse Vorbildung?

Welche Religionsvorstellungen herrschen? Ist eine Priesterschaft aus-

gebildet, oder stehen sich verschiedene gegenüber? Stehen sie mit auswärtigen Priesterschaften in Verbindung oder in Unterordnung. Sind die Priester zahlreich, mächtig, reich, oder arm und verkommen? In welchem Verhältniss steht ihre Bildung zu der anderer Volksklassen?

Was lässt sich von der äusseren Politik sagen? Wer bestimmt dieselbe? Wer entscheidet über Krieg und Frieden? Besteht Neigung zu kriegerischen Unternehmungen, werden dieselben durch Raubsucht, Hass, Sitte, Fanatismus oder durch Noth hervorgerufen?

Lassen sich die geschichtlichen Hergänge, die Ereignisse in Staat und Politik in die Vergangenheit zurückverfolgen? Welcher Art sind die Ueberlieferungen? Giebt es Denkmäler, Inschriften, Heldenlieder, Schriften? Was wird berichtet?

Es kann nicht daran gedacht werden, die Folge der wichtigsten und interessantesten Fragen irgend zu erschöpfen. Ebenso wenig wird der Reisende im Stande sein, auch nur die Mehrzahl der eben gestellten zu beantworten. Aber schon der Versuch, Auskunft darüber zu finden, wird ihn in den Besitz einer Fülle von Bemerkungen und eigenthümlichen Thatsachen setzen, die um so mehr Interesse erregen müssen, je mehr der Beobachter vermag, dabei die Stufe intellectueller und moralischer Bildung derer klar zu stellen, in deren Händen die Leitung der verschiedenen Richtungen des erforschten staatlichen Organismus liegt.

Es steht dabei auf der einen Seite in Frage, in welchem Umfange diese Kreise des Volkes an den Kenntnissen Theil nehmen, welche in unserer Zeit ein Gemeingut aller Gebildeten sind. In diesen Kenntnissen liegt das Mittel, die geistige Cultur zu bereichern, die Seelen dem Verständnisse des Allgemeinen zu öffnen und sie der Herrschaft von Vorurtheilen zu entreissen.

Auf der anderen Seite handelt es sich um den überwiegenden Charakter, die Denkweise und die Thatkraft der massgebenden Persönlichkeiten oder Genossenschaften.

Wie das Seelenleben des einzelnen Menschen wird auch das eines Volkes bestimmt durch die ursprünglich mehr oder weniger gesunde, mehr oder weniger glückliche Naturanlage des Körpers und des Geistes und durch die stärkere oder schwächere Entwicklung, die diese Anlage in der Erziehung und durch die eigene Willenskraft und Thätigkeit erhalten. Gute und leichte Ernährung, sinnige Schulung, frohe und erhebende Eindrücke, Hoffnungen und frische Thaten, oder der Einfluss der Kärghlichkeit, Unkenntniss, Dumpfheit und scheuen Einschränkung entwickeln verschiedene Menschen und verschiedene Völker. Die Mannigfaltigkeit ist aber keine geringere, als die Möglichkeit aller der Combinationen, in denen alle diese Elemente auf einander treffen können.

Der Reisende mag uns sagen, wie weit ihn seine Eindrücke bestimmen, nicht blos einzelne gute oder glänzende neben mehr oder weniger nachtheiligen Eigenschaften anzunehmen, sondern wie weit er zur Freude des Menschenfreundes bestimmte Züge jener Harmonie des Empfindens, des Wollens und Könnens anzuerkennen vermag, welche dem frohen Genuss des Daseins offen, doch stets bereit ist, ihn mit Hingebung der Pflicht zu opfern, welche tief erregbar von dem Grossartigen, Erhabenen und Geheimnissvollen, sich doch nicht über die Grenzen vernünftiger Erwägung und Beurtheilung fortreissen lässt, welche selbstbewusst und selbstvertrauend, doch nicht überhebend und in Selbsttäuschung eingewiegt, deren Charakter edel, zuverlässig, streng gegen sich selbst, gerecht und milde gegen andere ist; mit einem Worte, wie weit er seine Gastfreunde der wahren Humanität genähert findet.

Mit dieser Forschung wird er sich ein Denkmal setzen auf dem Gebiete einer der berechtigsten und noch viel zu wenig ausgebeuteten Hilfsdisciplinen der Geschichte, für welche mitzuwirken der Reisende in der Unmittelbarkeit der charakteristischen Eindrücke und in der Unbefangenheit seiner wechselnden Vergleichen ganz besonders berufen ist. Diese Wissenschaft, für die wir ihn interessiren und gewinnen wollen, ist die Völkerpsychologie. Sie sucht gewissermaassen die Seele, die sich in der politischen Geographie und Statistik verkörpert.

Heilkunde.

Von

Dr. Friedel.

Dem Arzte und dem Naturforscher, dem wissenschaftlich gebildeten Laien bieten sich auf Reisen so zahlreiche Gelegenheiten zur Beachtung und Untersuchung einschlägiger Fragen, dass es schwierig sein dürfte, auf dem diesem Capitel hier nothwendigerweise zugemessenen geringen Raume Alles zu besprechen, was des Beobachtens, Untersuchens, Sammelns etc. werth ist. Selbstverständlich sind die Gelegenheiten je nach der Art der Reisen sehr verschiedene und müssen natürlich hier moderne Vergnügungs- und Geschäftsreisen ganz ausser Betracht bleiben, die höchstens zur subjectiven persönlichen Instruction des Betreffenden ein Scherflein beitragen, dem allgemeinen ärztlichen Wissen aber selten Nutzen bringen können, selbst wenn sie als Feuilletonartikel während oder nach der Badesaison in irgend einer Zeitschrift erscheinen, aufgeputzt mit ästhetischer oder popularisirender Schönrederei. Nur worauf der Arzt, der als Reisebegleiter einer Person oder einer Expedition zahlreicherer Personen, oder wenn er selbständig für sich zu wissenschaftlichen Zwecken reist, zu achten habe, soll hier zunächst so kurz und doch so vielseitig als möglich erörtert werden. Dann aber sollen diese Zeilen auch dem Missionar, der in fernen weniger bekannten Regionen stationirt ist, dem Handelsagenten, dem Jagdliebhaber, dem naturwissenschaftlichen Sammler, dem Consularbeamten u. A. eine Anleitung sein, was und wie sie beobachten und erforschen sollen. Namentlich könnten unsere deutschen Missionare hierin sich nach dem Beispiele ihrer englischen und amerikanischen Amtsbrüder richten und durch Begründung von Missionshospitälern nicht nur der Menschheit, sondern auch der Wissenschaft enormen Nutzen stiften. Dazu gehört aber unter anderen Dingen auch, dass sie regelmässige Berichte in unseren Fachjournalen über ihre medicinischen Beobachtungen veröffentlichen. Leider haben unsere Missionsanstalten solches Streben noch gar wenig unterstützt. Ich habe auf meinen Reisen nur einen deutschen Missionar kennen gelernt, der darin etwas leistete, und der stand im Dienst einer englischen Colonialregierung als Inspector der Eingeborenen-schulen. Viele andere dagegen habe ich leider auch angetroffen, die die einfachsten Feldfrüchte der Eingeborenen, zu denen sie als Aufklärer gesandt

worden waren, nicht dem Namen nach kannten. Von solchen Leuten wird freilich für uns nicht viel zu erwarten sein!

Vor allen Dingen halte sich der Beobachter und Forscher auch hier das „multum, non multa“ vor Augen. Eine einzige gut durchgeführte Beobachtungsreihe über eine einzelne Streitfrage oder über ein noch nicht in sicheren Zahlengrößen dargestelltes Untersuchungsobject ist fruchtbringender als eine noch so ausführliche allgemeine Darstellung medicinischer Reiseerlebnisse. Wo letztere durch die Verhältnisse erforderlich ist, z. B. im militärischen oder maritimen Dienst, kann sie ja nur durch erstere Rücksicht gewinnen. Seitdem aber die Flotten und andere Expeditionsunternehmungen der civilisirten Welt alle Winkel der Erde mehr oder minder durchsucht haben, sind wir schon im Besitz so zahlreicher allgemein gehaltener Berichte über die medicinischen Erlebnisse auf denselben, dass dergleichen Mittheilungen für die Wissenschaft in genere wenig Werth beanspruchen und eigentlich nur der Statistik zu Gute kommen können.

Arbeitsheilung ist daher auch hier als der leitende Grundsatz zu betrachten und ein Jeder lege sich vor Antritt einer solchen Reise die Frage vor, in welchem Fache er nach Wunsch, Neigung und Befähigung zu arbeiten sich am meisten qualificirt fühle. Berufen zu solchen Unternehmungen sind vor Allen die Aerzte der Marine, sowohl der Kriegsmarine wie der postalischen Verkehrslinien. An bequemerer Gelegenheit zur Untersuchung physiologischer, pathologischer, pharmacologischer, auch chirurgischer und therapeutischer Fragen kommt ihnen kaum je ein Hospitalarzt, unter den günstigsten Verhältnissen stehend, gleich. Theils lange Monate und Jahre, theils immer sich wiederholende kürzere Zeiträume, ein gleichförmiges lebendes Beobachtungsmaterial, gleichbleibende oder doch stets ihrer unmittelbarsten Beobachtungscontrole unterworfenen äussere Einflüsse liegen ihnen zur Einsicht vor. Namentlich steht den Aerzten der Kriegsschiffe ein beneidenswerthes Menschenmaterial von durchgängig normaler physiologischer Qualität zu Gebote. Und dies führt uns gleich zu dem ersten Abschnitte unseres Themas, den in die Physiologie gehörenden Untersuchungen.

Prof. Hirsch spricht in seinem berühmten Handbuche der historisch geographischen Pathologie, Band I, p. 41 Anm. schon im Jahre 1858 die wohlbegründete Meinung aus, „die wissenschaftliche Begründung einer geographischen Physiologie, eines der Hauptdesiderate für die Bearbeitung der geographischen Pathologie, ist auch noch nicht einmal in den Anfängen versucht worden“, und dies zwar gelegentlich der Erwähnung der als „hypothetische Voraussetzung“ bezeichneten erhöhten Venosität des Blutes in den Tropen, gesteigerter Arteriellität in der kalten Zone, vermindertem Muskeltonus dort und vermehrtem hier etc. Wenn nun auch seitdem einzelne Untersuchungsergebnisse der physiologischen Verhaltens unseres Organismus unter den verschiedenen klimatischen Einwirkungen bekannt geworden sind, so ist doch das noch viel zu wenig, um als befriedigend für die Wissenschaft betrachtet zu werden. Fast jedes Capitel der Physiologie ist hier noch lückenhaft und bedarf der Ergänzung. Gehen wir daher dieselben für unseren Zweck hier einzeln durch.

Das ergiebigste Feld für die Untersuchung bildet zunächst die Physiologie des Stoffwechsels und hier bietet dem Marinearzt sich die günstigste Gelegenheit. Es ist nicht nöthig, eine grosse Anzahl von Individuen auf einmal einer fortgesetzten Untersuchung zu unterwerfen, wohl aber wünschenswerth, möglichst viele Kategorien von Individuen auszusuchen. Zu diesem Zwecke sind: 1) verschiedene Altersstufen, 2) verschiedene Beschäf-

tigungs-(Arbeits-)Classen, 3) materiell verschieden situirte Classen (Gemeine, Unteroffiziere, Cadetten, Offiziere etc.) zu unterscheiden. Die Zahl der Individuen in jeder Kategorie braucht 5 kaum zu überschreiten. Ueber jedes Object muss ein förmliches Ausgabe- und Einnahmejournal quoad Stoffwechsel angelegt werden. Hauptuntersuchungsinstrument ist eine Schönmann'sche Patentdecimalwaage, die bei 150 K. Tragkraft noch 1 Grm. Ausschlag giebt (von Kuhtz u. Co. in Brandenburg a/H. für 90 R.-M. zu beziehen vid. dessen Katalog, Brandenburg a/H. 1873). Die Voruntersuchung jedes Individuums muss die durchschnittliche materielle Constitution und do. Stoffwechsel unter den gewohnten heimischen Verhältnissen feststellen. Die Einflüsse der Jahreszeit, Witterung, Kleidung und Arbeit sind dabei genau zu berücksichtigen; auch der Aufenthaltsort (Logis etc. an Bord, z. B. Last, Zwischendeck, Batterie, Cajüten etc.) würde hier als Eintheilungsprincip (wie analog bei den obigen grösseren Kategorien) dienen müssen. Wie lange die Voruntersuchung dauern soll, muss der Ueberlegung des Beobachters und dem Zweck, den er in specie verfolgt, überlassen bleiben. Beiläufig will ich nur u. a. z. B. darauf hinweisen, dass von manchen Reisenden, namentlich Seelenten, dem Monde und seinen Phasen eine Einwirkung mysteriöser Natur auf die Organismen zugeschrieben wird. Wer hierüber exactere Beobachtungen machen wollte, müsste also zunächst während einer ganzen Mondphase auch Voruntersuchungen anstellen.

Gegenstand der Stoffwechseluntersuchung unter den Einflüssen der verschiedensten Klimate und Zonen ist dann zunächst natürlich das Blut und seine Zusammensetzung. Wie verhält sich unter veränderten klimatischen etc. Einflüssen seine Reaction, sein specifisches Gewicht, seine Mischung in Bezug auf feste und flüssige, feuerfeste und verbrennliche Bestandtheile? Wie die rothen Blutkörperchen nach Gestalt, nach Farbe, chemischen Bestandtheilen, Quantität, im Vergleich zu den weissen? Letztere wiederum, zeigen sie Abweichungen in Bezug auf Grösse, Beweglichkeit, Zahl, Uebergangsformen? Die Blutflüssigkeit selbst ist auf ihre Gerinnungsfähigkeit, Menge im Verhältniss zur Placenta sanguinis nach der Gerinnung, das Serum auf sein eigenes specifisches Gewicht, chemische Zusammensetzung (Wassergehalt, Eiweisskörper, Amidsubstanzen, Zucker, Fette, Riechstoffe, Farbstoffe, Salze, Gase etc.) zu untersuchen. Gelegenheit zu diesen Untersuchungen müssen traumatische Blutverluste oder Venäsectionen aus Veranlassungen, wie etwa Commotionen wichtiger Organe bei ganz gesunden Individuen, geben. Auch ist Rücksicht zu nehmen auf Racenunterschiede, wo sich am Lande dazu gerade eine Gelegenheit bietet.

Wichtig sind vor Allem die Blutgase. Die Frage nach der grösseren oder geringeren Venosität oder Arteriellität, je nach den Klimaten, kann nur durch Untersuchung dieser Umstände entschieden werden. Vom Θ weiss man, dass es im Mittel 15,78 % in Volum beim arteriellen Blut ausmacht, während der Gehalt des venösen daran sehr schwankend ist. Ist es absorbirt oder chemisch gebunden in grösserer oder geringerer Menge vorhanden? Ist es als Ozon vorwiegend vorhanden? Die theils fest, theils absorbirt vorhandene ΘO_2 , im arteriellen Blut zu 30, im venösen zu 35 Volumproc. durchschnittlich, ist zu untersuchen, ebenso der Gehalt an N und NH_3 .

Die Blutarten selbst sind nach Farbe, Gasgehalt, Dichroismus, Zusammensetzung und Ursprung (Pfortader, Leber, Milz etc.) und unter Berücksichtigung aller tellurischen und siderischen Einflüsse zu prüfen. Auch ist jede Gelegenheit, die Blutmenge zu bestimmen, zu benutzen. Endlich ist zu studiren der Einfluss der Klimate auf die Blutbewegung, d. h. also auf

die Herzbewegung, die Bewegung in den Gefäßen, die Spannung im Arteriensystem, die Pulsweite, Frequenz etc. Der Sphygmograph (Preis bei Windler in Berlin, Dorotheastr. 3: 40 Thlr.) wird hier eine Menge interessanter Vorgänge aufdecken. Pathologische Fragen werden sich hieran knüpfen lassen. Die Gelegenheit, in aller Ruhe Beobachtungen zu machen über den Einfluss heftiger und langdauernder Körperanstrengungen auf das Herz, ist dem Marinearzte geboten wie keinem Andern. Die Untersuchungsobjecte sind nach den verschiedenen Exercitien (Segel-, Geschütz-, Boots-Exercitien etc.) sofort und wiederholt mit dem Sphygmographen und anderweitig zu untersuchen. Wo die Umstände es gestatten oder erfordern, sind auch die anatomischen Verhältnisse des Herzens und seiner Abschnitte durch die physikalische Exploration festzustellen. Die Resultate der Beobachtungen sind in tabellarische Form zu bringen. Schemata zu solchen Tabellen lassen sich bei der Fülle der Fragen, die hier in Betracht kommen können, gar nicht aufstellen. Ich will nur ohngefähr den Gang einer einzelnen solchen Untersuchungsreihe skizziren und annehmen, es sollte z. B. festgestellt werden, welchen Einfluss der Aufenthalt in den Tropen, und zwar theils nur auf der See, im Passat oder in den Calmen, theils wieder längerer Aufenthalt im Hafen, auf die Qualitäten des Pulses ausübte. Zu diesem Zwecke würden bei und gleich nach der Indienstellung eines Schiffes 12 vollkräftige normale Individuen, und zwar 4 Jungen, 4 Matrosen, 4 Heizer ausgesucht werden müssen und deren normales Durchschnittsverhalten in Bezug auf Gewicht, mittlere Temperatur, Athem- und Pulsfrequenz, Pulscurven etc. während der ersten 14 Tage festgestellt werden. Die meteorologischen Verhältnisse müssten gleichzeitig notirt werden. Sobald alles Hierzugehörige festgestellt ist, hört die Beobachtung der Individuen auf, während die der äusseren Einflüsse fortgesetzt wird. Sobald ein längerer Aufenthalt unter den zu schätzenden Agentien beginnt und stattgefunden hat, fängt die Beobachtung der betreffenden Individuen in derselben Weise wie vorher wieder an und wird in entsprechender Weise so lange fortgesetzt, bis sich ein mess- oder wägbares Resultat ergibt. Der Beobachter wird dann sich dafür entscheiden müssen, ob und wie oft, resp. in welchen Perioden die Beobachtungen zu wiederholen sind. Eine solche einzige lange fortgesetzte und mehrfach von demselben, resp. anderen Beobachtern angestellte Untersuchung wird z. B. schon viel dazu beitragen, die Redensarten von dem gesunkenen Tonus, der herabgesetzten Vitalität, der verminderten Energie der Functionen u. dgl. m., die man in den meisten Handbüchern über Tropenkrankheiten und Tropenhygienien immer wieder von Neuem vorgekaut findet, zu illustriren und auf ihr wahres und richtiges Maass zu reduciren. Wird gleichzeitig die Ernährungsweise berücksichtigt, so wird auch zur Lösung der Frage, wie die Diät beim Betreten der Tropen modificirt werden soll, ein Beitrag geliefert werden, sofern der Arterientonus als ein Maassstab für den Kräfte- und Ernährungszustand des Organismus dienen kann.

Es wird nicht genügen, die Blutmasse als fertiges, in sich abgeschlossenes Constituens des Organismus zu studiren. Auch die Ausgaben aus demselben, die Absonderungen sind zu prüfen, wo sich dazu Gelegenheit bietet, namentlich sind die Racenverschiedenheiten hier zu beachten. Die Parenchymäfte und Parenchyme der Organe verschiedener Racen sind wahrscheinlich different, z. B. sind wahrscheinlich die Knochen der afrikanischen Race anders constituirt als die der weissen, malaischen etc. Man vergleiche also die Constitution des Knochengewebes, des Knorpels, des Bindegewebes, der Muskeln, des Hirns etc., die Gelenkhöhlen- und Schleimbeutelflüssigkeit.

Noch ergiebiger wird die Beobachtung der dem Verdauungscanal angehörigen Absonderungen sein, des Schleimes, Speichels (Einwirkung verschiedener nationaler Masticatorien: Tabak, Betel, Coca, Pituri in Neuseeland etc. auf denselben), Magensaftes, Galle, Pancreatischen- und Darmsaftes. Unglücksfälle und Untersuchungen an Schlachthieren an Bord, die gleichen klimatischen Einflüssen wie die Menschen ausgesetzt gewesen, werden hierzu die Gelegenheit bieten müssen. —

Sehr umfassende und variirende Beobachtungen wird die Urinsecretion erfordern und zahlreichen Untersuchern Gelegenheit zur Arbeit bieten. Waren die bisher erwähnten Punkte wegen der dazu erforderlichen Gelegenheiten, wegen des Zeitaufwandes u. a. m. mehr geeignet den Aerzten der Kriegsmarine zur Untersuchung vorgelegt zu werden, so können sich hier namentlich die Aerzte der Postdampfer etc. betheiligen und an sich selbst wie an ihren Untergebenen (Wärtern, Gehülfen etc.) Beobachtungen machen. Die dazu erforderlichen Apparate, Maasscylinder, Araeometer, Pipetten und Büretten, Reagentien, Titrirflüssigkeiten etc. sind so compendiös, so wenig kostspielig, so weit verbreitet in allen grösseren Städten, dass die Anschaffung nur wenig Mühe kostet. Das Feld selbst ist in dieser Weise fast noch gar nicht bearbeitet, denn wir wissen noch nichts Genaueres darüber, welchen Veränderungen die Urinsecretion nach Menge und Zusammensetzung beim Wechsel der Klimate und anderer äusserer, kosmischer Einflüsse unterworfen ist. Ein Arzt, der 4 bis 6 Mal im Jahre aus unseren norddeutschen Häfen nach Westindien, Brasilien u. a. m. hin- und zurückreist, kann hier in Bezug auf die Harnsecretion vielerlei untersuchen. Ein gehörig eingerichtetes und genau geführtes Journal, für jedes Individuum eins, ist vor Allem dazu erforderlich. Es enthalte Notizen über Alter, Grösse, Beschäftigung an Bord, Rubriken für Körpergewicht, Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck, Diät, tägliche Flüssigkeitseinnahme, Körpertemperatur, dann für Urinmenge, spec. Gewicht, Farbe, Reaction, feste Rückstände, organische und unorganische Rückstände, Gehalt an Harnstoff, Harnsäure, anorganische Salze und deren Säuren etc. etc., für abnorme Bestandtheile (Zucker, Albumen, Fett, Indican). Man wird gut thun, nicht alle hier möglichen Fragen auf einmal zu beantworten zu versuchen, weil die Zeit dazu selten ausreichen wird. Man begnüge sich vielmehr damit, jedesmal nur eine kleinere Anzahl Dinge zu erforschen, zunächst z. B. nur die einfacheren Fragen nach Menge, spec. Gewicht und Reaction, beim zweiten Male organische und unorganische Rückstände u. s. w. festzustellen. Bedenkt man dabei ferner, dass die chemische Zusammensetzung des Harnes weiterhin ein sehr genaues Bild des Stoffwechsels im Organismus giebt, so werden sich daran eine ganze Reihe anderer Fragen anknüpfen lassen, z. B. welche Stoffe, und in welchem Verhältniss, zeichnen den Harn des schnell in die Tropen gelangenden Nordländers vor seinem bisherigen aus, bei gleichbleibender Diät, bei ungewohnter, tropischer Diät, bei gleichbleibender oder wechselnder Muskelarbeit? Welche Rückschlüsse gestattet das Resultat der Untersuchung auf die Vorgänge im Organismus bei solch schnellem Klimawechsel und wie lassen sich die etwaigen Nachtheile vermeiden oder paralysiren durch diätetische Maassregeln? Sind Lebensalter, geographische Abstammung (ob Nord- oder Südländer?), Racen, Nationalität u. A. hierbei von Einfluss? Bietet die Urinbeschaffenheit Anhalt, auf die Blutconstitution in den Tropen Schlüsse zu machen, oder, wo Blutuntersuchungen möglich, welche Beziehungen finden zwischen Blut und Urin im gegebenen Falle statt?

Die gesammten Beziehungen der Harnabsonderung zu den verschiedenen

äusseren Einflüssen sind so wichtiger Art, dass bekanntlich der italienische Physiologe und Arzt Mantegazza, um dieselben zu studiren, im Jahre 1862 nach Buenos Ayres reiste und dabei zweimal die Tropen und die gemässigte Zone beider Hemisphären passirte. Früher schon hatten Davy auf Barbadoes, Reynaud (auf der fr. Corvette la Chevrette) 1826, dann Eydoux und Souleyet auf der berühmten Fahrt der „Bonite“ einschlägige Beobachtungen gemacht, wenigstens über die Körpertemperatur beim Wechsel der Zonen. Mantegazza's Beobachtungen ergaben in Kurzem etwa Folgendes: Die Temperatur des Körpers und des Harns steigt und fällt mit der der Luft, so dass schneller Wechsel die Temperatur des Harns um mehr als 3° C. verändern kann. Die Harntemperatur nimmt schneller ab beim Uebergang aus den Tropen in die kälteren Zonen als umgekehrt. Bei Gesunden ist die subjective Wahrnehmung der Temperatur von entsprechenden objectiv nachweisbaren Veränderungen der Körpertemperatur begleitet: Exposition des Körpers an die Sonne vermehrt die Harntemperatur, desgleichen Genuss alkoholischer Getränke, Muskelthätigkeit u. s. w. Man findet Mantegazza's Arbeit im Jahrgang 1863 der *Presse médic. belge*. Noch andere sehr unterrichtende Untersuchungen in diesem Gebiete hat Lawson vor Mantegazza in der *British and foreign medical Review* von 1861 Oct. mitgetheilt. Er stellte dieselben 1859 in Jamaica an gesunden europäischen Soldaten an, die in Newcastlle fast 4000' über dem Meeresspiegel stationirt waren, und auch an Anderen.*) Man ersieht aus diesen Beispielen, dass hier schon Manches gearbeitet ist, Manches aber noch unerledigt ist und bedenke, dass eine öfters wiederholte Untersuchung jeder solchen Frage in der Physiologie nothwendig ist, um das allgemein Gültige aufzufinden.

Die anderen Ausscheidungen aus dem Blute erfordern ebenfalls vergleichende Untersuchungen. Ueber die Schweisssecretion und deren Varianten existirt wenig Zuverlässiges; die unmerkliche Wasserverdunstung durch die Haut hat Weyrich bearbeitet. Nach Analogie dieser Arbeit (Leipzig bei Engelmann, 1862) würde die letztere unter den verschiedenen Klimaten folgendermaassen zu beobachten sein: Ein cylindrisches Glasgefäss von bestimmtem kubischen Inhalt, in welches ein Condensationshygrometer eingefügt ist, wird mit seinem freien abgeschliffenen Rande auf die Haut aufgesetzt und wird alsdann nach einer bestimmten Zeit (W. nimmt 3 Minuten an) der Thaupunkt im Inneren des Gefässes ermittelt. Ein Vergleich des gefundenen Werthes mit dem Thaupunkte der Luft ergiebt das Maass für die Wasserverdunstung der Haut. W. setzt den Apparat auf die *Regio subclavicularis* an. Er fand folgende Resultate: Die Perspiration steht unter dem Einfluss des Nervensystems; Erregung steigert, Depression verringert sie. Nahrungsaufnahme, namentlich Stimulantien, Muskelthätigkeit, psychische Erregung steigern, Ruhe des Körpers und der Psyche, Schlaf, deprimirende Affecte, Enthaltung von Speise und Trank setzen sie herab. Reizung der äusseren Nervenfasern (Frottiren, Kneipen etc.) steigert, Kälte vermindert sie. Bei Abschliessung atmosphärischer etc. Einflüsse (Zimmeraufenthalt) sind die Schwankungen sehr gering, doch finden sonst solche Schwankungen unablässig statt; sie fällt und steigt z. B. mit der Pulsfrequenz u. s. w. Wie verhält sich ferner die Arterienspannung, das specifische Gewicht des Blutes, des Muskeltonus zur Schweissmenge? Wie die Körpertemperatur? Und bis

*) Auszüglich zu finden in Schmidt's Jahrb. Band 120 und 125; überhaupt sind in diesem Sammelwerke die referirenden Artikel über den Harn etc. von Huppert für den Untersucher dieser Punkte unentbehrlich.

zu welchen Grenzen der äusseren Temperatur ist die Schweisssecretion als Regulator für die Körpertemperatur zu betrachten? Welche Schweissmenge kann noch zu den erträglichen, welche zu den krankmachenden Einflüssen gezählt werden? Welche chemische Qualitäten besitzt der Schweiss in den verschiedenen Klimaten, und wie verhält er sich in ätiologischer Beziehung bei Entstehung gewisser Hautkrankheiten in den Tropen?

Auch der zweite Bestandtheil der Hautabsonderung, das Hauttalg, verdient eine Berücksichtigung, namentlich in ethnologischer Hinsicht. Noch viel mehr ist dies lohnend bei der Milchabsonderung, deren Verschiedenheiten nach Klima und Race wenig bekannt ist. Ein grosses Hinderniss der Verbreitung der europäischen Race unter wärmeren Zonen ist ja bekanntlich eben die Schwierigkeit, den Neugeborenen der Europäer passende Milch zu verschaffen. Die Frauenmilch scheint ebenso wie die Kuhmilch klimatischen Abänderungen zu unterliegen und dass die Neonati eingeborene Ammen erhalten können, ist wohl nur ein seltener Glücksfall. Hier liegt also dem Arzt ein anderes unbeachtetes Feld offen, auf welchem er, da auch die Einführung der condensirten Milch zu diesem Zwecke nicht überall zulässig sein dürfte, neue Thatsachen ergründen könnte. Die hier angedeutete Einführung der condensirten Milch oder anderer Surrogate als diätetisches Mittel in den Tropen ist bisher wohl nicht ausgedehnt versucht und verdient Berücksichtigung.

Die Aufnahme von Stoffen in das Blut hängt von so vielen äusseren Agentien ab, dass auch hier mancherlei vergleichende Untersuchungen stattfinden können. Die „Trägheit der Assimilation in den Tropen“ ist eine eben so landläufige Redensart wie die von der erhöhten Venosität. Hier wird Wägung und gelegentliche chemische Prüfung am Orte sein, um die Frage z. B. zu beantworten, ob in der That in den Tropen die Darmdejecte denn nur um ein Erhebliches weniger von den Ingestis differiren als in den nördlichen Breiten u. A. m. Die Speichelwirkung, die Chymusbereitung, die Qualität des Chylus, die Wirkung des Pancreatischen Saftes, der Galle, die Reaction des Darminhaltes sind, wo sich Gelegenheit dazu bietet, unter anderen Zonen zu studiren. Schon die oft wiederholten Prüfungen der Reaction des Darminhaltes würden mancherlei Schlüsse gestatten. Ueberhaupt ist die Controle der Verdauungsvorgänge durchaus wichtig und geeignet, auch für die Hygiene der Ernährung in verschiedenen Klimaten neue Gesichtspunkte zu gewinnen. Die Gewichtsveränderungen des Körpers, bei verschiedener, natürlich genau zu detaillirender Ernährung notirt, werden dazu beitragen, ein Urtheil zu gewinnen, welcher Kost Einwanderer in die Tropen sich am besten unterziehen u. dgl. mehr. In den arctischen Zonen werden sich nicht minder wichtige Untersuchungen in dieser Beziehung anstellen lassen. Unter Controle der anderen Ausgaben (Harn, Schweiss, CO^2 etc.) werden sich die besten Surrogate für gewisse, in den betreffenden Zonen schwer erreichbare, dem Einwanderer aber fast unentbehrliche Genuss- und Nahrungsmittel (Alkoholica, Fette, N-haltige Alkaloidmittel, Amylacea, Saccharina etc.) ergeben. Der Einfluss körperlicher Uebungen auf diese Vorgänge ist zu controliren und ein Maass daraus abzuleiten für die Exercitien und sonstigen Körperanstrengungen einer Schiffsmannschaft, Truppe, Expeditionsmannschaft etc. Gewisse Kategorien der Besatzungen grosser Schiffe, namentlich der Dampfer, die an Bord schon dem Laienauge auffällig erscheinen durch ihr blasses Gesichtscolorit, die Kategorien der Heizer, Lastmänner, Botteliere, Köche, kurz der Functionäre, die die grösste Zeit ihres Schiffslebens in geschlossenen, dunklen Räumen zubringen, sind wiederum als ein gesondertes

Beobachtungssubstrat mit anderen Kategorien zu vergleichen. Ein näheres Eingehen auf eine einzelne dieser Fragen wird übrigens dem Forscher, der mit warmem Interesse an die Sache herantritt, eine solche Mannichfaltigkeit der Themen entwickeln, dass zahlreiche Forscher sich daran betheiligen können.

Die Physiologie der Respiration wird in klimatischer Beziehung weniger in der Ebene als in der senkrecht zu ihr stehenden Dimension ihre Untersuchungen erfordern. Vorübergehende Beobachtungen, augenblickliche Einwirkungen beim Aufsteigen mit Luftballons etc. betreffend, sind hier sattem vorhanden. Hier ist die Wirkung des Höhenklimas während längerer Perioden gemeint, und vornehmlich in Bezug auf die Respirationsorgane, dann aber auch auf Ernährung, Harnabsonderung, Schweissbildung etc. zu studiren. Die Grösse und Qualität des Gaswechsels bei der Respiration ist allerdings auch in der Ebene unter allen existirenden tellurischen und siderischen Einflüssen noch nicht erkannt genug und demgemäss zu studiren. Die dazu erforderlichen Apparate sind nicht so kostspielig und complicirt, dass sie schwer zu beschaffen wären. Es genügen dazu die von Pexin bei seiner 1864 angestellten Untersuchung über den Einfluss des Alkohols auf die Ernährung (Schm. Jahrb. Vol. 126 p. 266) benutzten einfachen Apparate zur Bestimmung der CO^2 und natürlich, wie zu allen feineren Untersuchungen solcher Art, eine chemische Wage, feine Thermometer für Körperwärmemessung. Barometer besserer Art, die eventuell erforderlich sind, werden Reisenden, denen zu solchen Untersuchungen Gelegenheit sich bietet, so wie so zu Gebote stehen. Zur Bestimmung der vitalen Capacität der Lungen, die nach den Racen z. B. noch gar nicht untersucht sind, ist allerdings ein Spirometer erforderlich. Ein sehr bequemes portatives Spirometer, von Galante in Paris construiert und 1867 daselbst in der Weltausstellung producirt, besteht in einer dünnen Kautschukblase, deren Luftkubus an einer graduirten vertikalen Stange gemessen werden kann. Ob das Instrument seine Probe fernerhin bestanden hat, ist mir nicht bekannt geworden.

Endlich sind die Wirkungen solcher gemischten Gase, die in der Natur hie und da frei der Erde etc. entströmen, aufmerksam zu studiren. Es sei hier nur z. B. an die Höhle von Monsummano erinnert.

Zum Studium des Gesamtstoffwechsels des Blutes in geographisch-physiologischer Beziehung wird nur derjenige befähigt sein, der durch zahlreiche Einzelbeobachtungen der vorher angeführten Punkte und langjährige Residenz an einem Orte zur Lösung dieser schwierigsten Frage der Chemie des Blutes sich qualificirt. Es würde vergebliche Arbeit sein, dies unter anderen Verhältnissen als den hier hervorgehobenen zu untersuchen.

Ebenso steht es um das Studium des Gesamtstoffwechsels des Organismus unter den erwähnten Verhältnissen. Hier müssen zunächst erst die größeren Versuche mit Wägen und Messen vorgenommen und nebenbei die Nahrungsmittel der verschiedenen Zonen berücksichtigt und analysirt werden. Zu letzterem Zwecke thut daher zunächst ein Sammeln und Conserviren dieser Gegenstände Noth und die Begründung einer Abtheilung für die vergleichende Bromatologie in einem ethnographischen Museum.

Hier berührt sich die Physiologie mit der Hygiene und mit der Ethnologie, und wer in letzterer Wissenschaft arbeitet ohne gerade Physiolog, Botaniker oder Arzt zu sein, kann also durch einschlägiges Sammeln auch anderen Disciplinen nützlich sein. Man achte hier aber nichts zu gering und sammle nicht zu kleine Proben und suche auch die quantitativen Verhältnisse, die zum Unterhalt der Individuen durchschnittlich von diesem oder jenem

Object täglich erforderlich sind, zu erfahren. Wo periodische Abstinenz, Fasten, Geophagie u. dergl. vorkommt, eruiere man den Einfluss derselben durch zuverlässige Untersuchungsmittel, Wägen u. s. w.

Dem Consum gegenüber beachte man ferner die Leistungen des Organismus, die ja in den Formen der Wärme, der Elektricität und der Bewegung auftreten. Die Thermographie der verschiedenen Racen, vom angedeuteten Gesichtspunkte aus aufgefasst, ist noch nicht bearbeitet und verdient daher, selbst wenn a priori vielleicht ein irrelevantes Resultat vermuthet werden dürfte, dennoch in Angriff genommen zu werden. Man weiss z. B. wie colossale Mengen Brennstoffe der Polarländer verzehrt und wie geringe Nahrung der Wüstenbewohner Afrikas geniesst. Wie steht es hier mit der Balance der thierischen Wärme? Welche Nahrungsmengen sind absolut erforderlich zum Unterhalt des Lebens hier und dort? Welche Wärmegrenzen sind dem Menschen gezogen und wie hat er seine Ernährung danach einzurichten. Man giebt als höchste Grenze der Eigentemperatur, die der Mensch ertragen kann, 42,6 C. an, und doch geben Berichte manchmal höhere Aussentemperaturen als erlebt an. Welche Vorgänge im Organismus ermöglichen dann die Weiterexistenz desselben?

Die elektrischen Vorgänge in Muskeln und Nerven in den verschiedenen Zonen und Höhen sind wohl zu subtiler und schwieriger Natur, um sie schon jetzt von diesem Gesichtspunkte aus zu studiren. Eher lässt sich die Arbeitskraft des Muskels hiernach untersuchen. Man wendet dazu entweder ein Dynamometer an und prüft Druck-, Zug-, Stoss- oder Hebekraft gewisser Muskelgruppen, je nach den Einflüssen der Temperatur, Luftdruck (Höhe über der See) Feuchtigkeit, Ernährung, Per- und Transpiration u. s. w. oder man prüft auch nach der Methode von Weber, indem man den betreffenden Körper solange mit Gewichten (Sand- oder Schrotbeuteln) belastet, bis das Erheben der Fersen vom Boden durch die Action der Wadenmuskeln unmöglich geworden ist. Die absolute Kraft der letzteren ist = dem Moment der Last (d. h. Körper + Gewicht) durch die Länge des Hebelarmes der Wadenmuskeln dividirt (Näheres in den Handbüchern der Physiologie).

Diese Untersuchungen über die Muskelkraft werden den Aerzten von Kriegsschiffen ganz besonderes Interesse gewähren und der Hygiene der Mannschaften, in Bezug auf nothwendige und erlaubte Arbeitsleistungen unter den Tropen u. s. w. von grossem Nutzen sein. Die Flimmerbewegung, die der contractilen Zellen u. s. w. sind ebenfalls noch zu studiren.

Was demnächst noch aus dem Capitel der Nervenphysiologie zu untersuchen ist, lässt sich vor der Hand schwerlich näher bestimmen. Dass das Nervensystem von äusseren Einflüssen des Klimas, der Höhe über dem Meere u. s. w. stark beeinflusst wird, dass die Energie der Leistungen darunter entweder leidet oder dass sie erhöht wird, wissen wir Alle. Es fragt sich nur um die Methode, wie man diesen Einfluss messbar darstellen kann und wir werden uns demgemäss wohl zunächst auf die Untersuchung der Functionen der Sinnesorgane beschränken müssen, auch hier zunächst nur ganz einfache elementare Vorgänge berücksichtigen können. Nur die Physiologie des Auges wird ein ergiebigeres Feld darbieten, namentlich für den Marinearzt. Die systematische Untersuchung des Sehvermögens bei allen Individuen und allen Kategorien der Besatzung des Schiffes vor, während und nach einer längeren Reise wird ein dankbares Unternehmen sein und über manche Monotonie des Seelebens hinfort helfen. Ich habe früher dazu schon einmal eine Anregung gegeben und zwar zunächst nur in der Absicht, das Sehvermögen einer gewissen Classe von Seeleuten nach allen Richtungen hin, auf

Sehschärfe, Accomodation, dioptrische Qualität, Fern- und Nahepunkt u. s. w. geprüft, zu ermitteln und danach das absolut von Seediens-Candidaten zu fordernde Maass von Sehvermögen festzustellen. Eine solche Untersuchung muss aber vielfach, tausendfach wiederholt werden, nicht nur in diesem Interesse, sondern auch in anderer Beziehung, ebenso unter dem stetig gleichen intertropicalen Tageszeitenwechsel wie unter den langen Tages- oder Nachtmomonaten der Pole. Vollständige Brillenkasten, Optometer u. s. w. sollten daher für solche Zwecke der sonstigen Ausrüstung eines Schiffsarztes mit ophthalmologischen Instrumenten gelegentlich hinzugefügt werden.

Die Endorgane des Olfactorius, Acusticus, Glossopharyngeus werden weniger interessante Untersuchungen gestatten, eher noch wird vielleicht die Tastempfindung in ihren verschiedenen Abstufungen als Wärme-, Druck-, Schmerz- u. s. w. Wahrnehmung sich einer Inquisition unterwerfen lassen, wobei ich nur darauf hinweisen will, dass z. B. das Schmerzgefühl nach Racen sehr variabel erscheint.

Dass mit diesen Andeutungen nicht die gesammten Aufgaben aus der geographischen oder ethnographischen Physiologie erschöpft sind, wird Jeder einsehen, ebenso aber bereitwillig zugeben, dass sich dieselben nicht erschöpfend ohne Weiteres a priori stellen lassen. Wer sich aber mehr und mehr in die Lösung einiger derselben vertieft haben wird, wird aus sich selbst heraus mehr und mehr die Vielfältigkeit derselben erkennen und immer neue Gesichtspunkte ausfindig machen, von welchen diese oder jene Frage aufs Neue einer Untersuchung und Beantwortung unterworfen werden kann.

Die bisher betrachteten physiologischen Gebiete konnten grossentheils auch von Nichtärzten bearbeitet werden, sofern sie nur in den dazu unerlässlichen propädeutischen Fächern der Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Physiologie, Anatomie u. s. w. bewandert sind. Das Gebiet der eigentlichen ärztlichen Wissenschaft, die Pathologie, pathologische Anatomie, Aetiologie, Therapie u. s. w. wird auf Reisen nutzbringend grösstentheils nur von wirklichen Aerzten angebaut werden können und das auch nur bei gehöriger literarischer Vorbereitung auf das vorgesteckte Ziel. Wer daher eine einzelne Krankheit studiren oder das gesammte pathologische Bild einer bestimmten Region auffassen will, säume nicht, bei Zeiten seine Vorstudien zu beginnen. Nutzbringend wird auch die Bekanntschaft mit den Vorgängen sein, die in den letzten Jahren auf den internationalen medicinischen Congressen und auf den alljährlichen Wanderversammlungen der Naturforscher und Aerzte sich abgespielt haben. Ich füge daher sogleich hier z. B. die Fragen ein, welche auf dem 1867 zu Paris abgehaltenen internationalen medicinischen Congress vorgelegen haben:

1. Die pathologische Anatomie und Physiologie des Tuberkels, die Häufigkeit der Tuberkulose in verschiedenen Klimaten und ihr Verhältniss zur Sterblichkeit im Allgemeinen. Der erste Theil der Frage kommt hier nicht in Betracht, während es bezüglich des zweiten Theiles darauf ankommt, zu untersuchen, welche Verhältnisse in den verschiedenen Zonen und Ländern für die Entstehung der Krankheit von vorwiegendem Einfluss sind. Berücksichtigt müssen werden Alter, Geschlecht, klimatische Eigenthümlichkeiten, Racen, sociale Gewohnheiten, Nahrungsmittel, Profession, frühere Krankheiten, Complicationen. Die Erscheinungen, unter welchen die Krankheit in verschiedenen Gegenden aufzutreten pflegt und der Einfluss von Complicationen auf den Verlauf der Tuberkulose selbst und umgekehrt der Einfluss der Tuberkulose selbst auf andre Krankheiten

sind genauer zu untersuchen. Eine strenge Prüfung der statistischen Unterlagen, die zur Beantwortung der Frage benutzt worden sind, ist erforderlich.

Die seit dieser Zeit in der Erkenntniss der vorliegenden Frage gemachten Fortschritte werden allerdings die Fragestellung in mancher Beziehung abändern. Man wird manche Frage präziser stellen müssen. Tuberculose und Phthisis werden streng zu trennen und ein Hauptaugenmerk wird darauf zu richten sein, welche vorausgegangenen Organ-Erkrankungen die Tuberkulose in genere und in specie herbeiführen. Die Häufigkeit des Auftretens von Tuberkulose bei nicht nach Habitus und Constitution dazu disponirten Individuen in den Tropen ist bisher noch unerklärt und ebenso der Grund der Gefährlichkeit des Tropenaufenthaltes für prädisponirte oder schon in dem ersten Stadium einer Lungenphthise befindliche Individuen. Hat sie ihren Grund in der diätetischen Lebensweise der Tropen, in der veränderten, mangelhaft assimilirten Nahrung? Was antwortet mit Bezug hierauf die, nach oben angeführten Grundzügen bearbeitete physiologische Beobachtung der gesunden Individuen?

Gehen etwa in den Tropen entzündliche Vorgänge in den Parenchymen der Organe nicht in eine hinlängliche, erwünschte Resolution über, fehlen die nothwendigen kritischen Ausscheidungen, bleiben Reste zurück, die käsige Umwandlung erfahren? Ist namentlich die Pneumonie in den Tropen etwa schleichend-insidiöser Natur, und aus welchen Gründen ist sie das? Hängt etwa die tropische Furunkulose, die sie oft begleitende Lymphdrüsenentzündung, die Dysenterie der Tropen und die damit einhergehende Schwellung der Mesenterialdrüsen mit der Tuberkulose causal zusammen? Eine Menge von Fragen kommt, wie der Leser sieht, hier vielleicht in Betracht.

2. Die Affectionen des Gesamtorganismus, welche nach chirurgischen Operationen den Tod herbeiführen. Hierher sind zu rechnen die Zufälle, welche weder mit Ausdehnung oder Beschaffenheit des operativen Eingriffes, noch mit Vernachlässigung irgend einer Vorsichtsmaassregel in Verbindung gebracht werden könne, z. B. diffuse Phlegmone, Brand, Rothlauf, Lymphangitis, Phlebitis, Pyaemie, Septicämie, Tetanus. Die Entstehungsursachen aller dieser Wund- und Hospitalkrankheiten ist, obschon unsere neuere Zeit (die „Bakterienfrohe“, wie sie Cohnheim nennt), mancherlei Aufschlüsse darüber bieten zu wollen scheint, noch nicht aufgeklärt, und die Erfahrung lehrt, dass dieselben nicht überall gleich stark und gleich häufig auftreten. Hier heilen die schwersten ausgedehntesten Verletzungen stets per primam, dort keine einzige, jede Acne- oder Furunkelbeule kann lethal endigen. Es ist daher zu untersuchen, ob die Sterblichkeit nach traumatischen oder chirurgischen Eingriffen, je nach Race und Klima verschieden ist (z. B. in China, Algier u. s. w., wo die enormsten, vom Priesterfanatismus ersonnenen Verletzungen spontan heilen) und ob die Allgemeinerkrankungen, welche dieselben bedingen, gleich heftig und gleichartig überall auftreten, ob den Methoden der Nachbehandlung, den localen Unterkunftsverhältnissen, Hospitaleinrichtungen u. s. w. ein Einfluss zuzuschreiben ist.

3. Die dritte Frage des Congresses, 1873 in Wien wieder behandelt, betreffend Beschränkung der Verbreitung venerischer Krankheiten, ist füglich hier nicht in dieser Weise mehr zu stellen. Jedoch wird das Studium der Syphilis überall unternommen und gefördert werden können, ausgenommen natürlich an solchen Punkten der Erde, wo sie angeblich bisher fehlt. Diese Gegenden, z. B. also der Archipel der St. Johanna-Inseln (Moolsamodo Hauptort), Port-Victoria auf den Seychellen u. A., die etwa noch frei von Syphilis sind, erfordern aber erst recht eine aufmerksame Beobachtung und

ebenso die Centren der grossen Continente mit ihrem mühseligen und spärlichen Fremdenverkehr. Ebenso verdient Berücksichtigung die Therapie der Eingeborenen und namentlich die Frage, ob nicht hier und da, und unter welchen Umständen, genuine constitutionelle Syphilis spontan heilt. Die Höhenklimate, die Wüstenregionen, gewisse insulare Lagen sind zu beachten. Um den Antimercurialisten erfolgreich entgegenzutreten zu können, würde es äusserst wichtig sein, Erfahrungen darüber zu sammeln, ob mercurielle Behandlung an solchen Orten überhaupt bekannt, möglich und erreichbar ist, und welche Formen der Syphilis auf solchen, dem Mercur gar nicht bisher zugänglichen Territorien vorkommen. Die zahlreichen, auf kleine Territorien localisirten Leiden, welche noch immer grösstentheils als Syphilis-Varianten oder -Bastarde bezeichnet werden, sind genau zu studiren und namentlich dazu Impfversuche vorzunehmen. Die mikroskopische Untersuchung der Secrete von derartigen Geschwürskrankheiten ist bisher noch grösstentheils verabsäumt worden. Die Secrete sind möglichst frisch zu untersuchen oder durch Glycerin (resp. carbolisirtes Gl.) conservirt in Lymphröhrchen von gelbem Glase mitzunehmen und später mit Musse zu prüfen. Wo man Gelegenheit hat, extirpire man ganze solche Hautstellen, unter Hülfe des Lister'schen Carbollösungserstäubers, um die Heilung des chirurgischen Eingriffes zu befördern und beobachte den Verlauf der Heilung. Ebenso sind verdächtige Geschwülste solcher Natur, Drüsenpackete u. s. w. zu enucleiren und alle solche Präparate, in Chromsäure, Chlorzink u. s. w. conservirt, unter Beifügung gehöriger Etiquetten, nach Haus zu nehmen und an kompetenter Stelle weiter zur pathologisch-anatomischen Untersuchung abzuliefern. Zu den Varietäten der Syphilis sind zu rechnen 1) die Radesyge Norwegens und Schwedens, 2) das jütische Syphiloid im nördlichen Jütland, 3) Morbus ditmarsicus in Holstein, 4) die Sibbens in Schottland, 5) das liv- und curländische Syphiloid, 6) die Falcadina, der Seerljevo (Margaritizza, Grobnicker Krankheit) da Mal di Breno auf der dalmatinisch-illyrischen Küste, 7) die Frenga Serbiens, 8) Spirocolon oder Orchida Griechenlands, 9) das canadische Syphiloid, auch Mal de la Bay de St. Paul, Ottawa-Krankheit u. s. w. genannt.

4. Einfluss der in den verschiedenen Ländern üblichen Nahrungsweise auf die Entstehung gewisser Krankheiten.

Diese Frage schliesst sich wieder eng an die schon oben von mir besprochene physiologische Untersuchung und an die noch später zu erörternden hygienischen Beobachtungen an. Das Congresscomité fügt hinzu: Mit Ausschluss der Getränke und der direct unzureichenden Nahrungsweise, richte sich die Aufmerksamkeit auf die Wirkung des ausschliesslichen oder vorwiegenden Genusses bestimmter und des Verbrauches geradezu schädlicher Nahrungsmittel. In ersterer Hinsicht sind die physiologischen Bedingungen zu erforschen, welche den zufälligen, resp. epidemischen Leiden zu Grunde liegen, die bei ausschliesslichem Genuss vegetabilischer oder animalischer Nahrungsmittel oder vorwiegendem Gebrauche bestimmter Speisen eintreten, unter Berücksichtigung der Wirkung der verschiedenen Zubereitung derselben. Direct giftige Stoffe, die etwa zufällig zur Verwendung kommen, sind natürlich nicht zu berücksichtigen (wohl aber doch solche die z. B. wie Trichinen u. s. w. deletär wirken) und vielmehr nur die spontane (oder abichtlich herbeigeführte, von specifisch nationaler Natur) Verderbniss der qu. Nahrungsmittel ihrem Wesen und ihren Entstehungsursachen nach zu erforschen und die Krankheiten zu schildern, welche der Genuss solcher Speisen beim Menschen hervorzurufen im Stande ist.

Die Zahl der Krankheiten, welche derartigen Einflüssen ihre Entstehung verdanken, ist bekanntlich durch die Fortschritte der medicinischen Erkenntniss neuerer Zeit eine immer grössere geworden (Raphanie, Pellagra u. A.), aber es bleiben noch genug übrig, bei denen ein solcher Verdacht vorliegt, z. B. beim Aussatz. Die Ausschliessung der Getränke durch die Erläuterung des Comités, möchte nicht so unbedingt anzuerkennen sein. Es handelt sich erstlich hierbei ja nicht nur um die Genese von Krankheiten, sondern auch um die Ausschliessung solcher aus gewissen Zonen und Territorien und man würde wohl nicht gut nationale Getränke, wie z. B. Kumys hier unbeachtet lassen dürfen; zweitens aber sind wieder andre Getränke, wie Pulque, Chica u. A. nicht so ohne Bedeutung, so wenig wie bei uns zu Lande die Weine, Biere und Branntweine, für die Genese acuter resp. chronischer Leiden. Abgesehen vom Alkoholismus, kommen doch Arthritis, Urolithiasis, Hämorrhoids u. A. dabei in Betracht.

5. Der Einfluss des Klimas, der Race und der Lebensweise auf die Menstruation in verschiedenen Ländern.

Mehrere Reihen von Frauen, welche derselben Race angehören und in demselben Lande wohnen, aber unter verschiedenen socialen Verhältnissen leben, sind miteinander zu vergleichen. Am meisten zu empfehlen ist die Bildung von drei Kategorien, Frauen der wohlhabenden Stände, Arbeiterinnen und Frauen der ärmeren Classe in den Städten, Frauen der ländlichen Bevölkerung. Bei den Völkern europäischen Stammes werden sich, wegen der seit Jahrhunderten stattgehabten Vermischung der Stände, diese Reihen schwer bilden lassen, desto besser bei den Völkern mit Kastenwesen. Farbe der Augen und Haare sollte dabei berücksichtigt werden. Der Einfluss des Klimas in der qu. Richtung lässt sich nur durch Vergleichung mehrerer Reihen von Frauen derselben Race finden, welche unter nahezu gleichen äusseren Verhältnissen unter verschiedenen Klimaten leben, während dort, wo die Vergleichung streng geschiedener Racen ausführbar ist, zugleich auch die Frauen mit gemischtem Blut berücksichtigt werden müssen. Es wird auch nöthig sein, den Einfluss der qu. Verhältnisse auf die Unregelmässigkeiten der Menstruation zu erforschen.

Sehr geeignete Orte für diese Beobachtungen werden die grossen Handelsemporien des Ostens sein, z. B. Singapore, Calcutta, Hongkong, Batavia, Melbourne u. A., wo zahlreiche Nationalitäten unter gleichen Verhältnissen theils schon längere Zeit angesiedelt leben, theils in immer neuen Völkerströmen zuziehen. Die Beobachtungen sollten in Form von Tabellen niedergelegt werden, welche enthalten: Alter, Lebensverhältnisse, Beschäftigung, Zeit des Eintritts der ersten Menstruation, Dauer des blutigen Ausflusses, Verheirathung oder Ehelosigkeit, Zahl der Kinder und Fehlgeburten, Zeitpunkt der Menopause. Zu den Angaben über die klimatischen Qualitäten des Beobachtungsortes gehört auch die der Höhe über der See.

6. Die Acclimatisirung der europäischen Racen in heissen Ländern. Es handelt sich nicht um einzelne Individuen oder eine grössere Anzahl derselben, da die Erfahrung bewiesen hat, dass die Nachkommenschaft derselben häufig dem Klima erliege. Zur völligen Acclimatisation einer Race ist erforderlich, dass sich dieselbe stets durch sich selbst, ohne Vermischung mit der eingeborenen Race und ohne Zuzug aus dem Mutterlande, erhalten könne, dabei im Stande sei, ihre Existenz durch eigenhändigen Erwerb oder Bodencultur sich zu verschaffen. Wo solche Arbeit durch Natives oder andre, Sklaven- oder Kulibevölkerung verrichtet wird, da ist die Acclimatisation von keiner Dauer. Doch auch solche Beobachtungen müssen mit in

Betracht gezogen werden. Die Zunahme der europäischen Race an einem solchen Platze ist an und für sich kein Beweis für ihre gelungene Acclimatisirung. Selbst bei Vergleichung der Geburts- und Sterblichkeitsverhältnisse, sonst dem bestmöglichen Verfahren zur Beurtheilung der Frage, muss die neueingewanderte Bevölkerung von der in der Colonie selbst geborenen geschieden werden, da erstere bei ihrer Ankunft grösstentheils das gefährliche Alter der Kindheit schon hinter sich haben. — Was in dem Abschnitt über die physiologischen Beobachtungen früher schon erwähnt worden ist, findet natürlich hier seine volle Anwendung. Ich füge hier nur noch hinzu, dass nach meiner Ansicht, bei gehöriger Observanz aller Cautelen, die die hygienischen Erfahrungen schon jetzt allermeist innezuhalten erlauben, die Acclimatisirung der Europäer fast überall möglich ist, sofern nur der Nervus rerum, d. h. Geldmittel, reichlich zu Gebote stehen. Alle Schwierigkeit liegt an den Bodenverhältnissen, nicht am Längen- und Breitengrade eines Ortes, und an dem langsamen, aber systematisch-sicheren Vorschieben der Culturarbeiten. Wer eine Brücke über einen Fluss bauen will, muss vom sichern Ufer anfangen, und wer Sümpfe austrocknen oder Wälder ausroden will, darf sich nicht mitten in dieselben hineinwagen. Die Altmeister der europäischen Colonisationsexpeditionen, die Portugiesen und Spanier, haben nur durch zähe Geduld und systematische Arbeit, ohne von Hygiene einen Begriff zu haben, ihre wahrhaft grandiosen Colonialbauten zu Stande gebracht und fast allen Klimaten mit Erfolg getrotzt.

Die 7. Frage des Congress-Comités „die Entozoen und Entophyten des Menschen“, würde heut zu Tage richtiger lauten müssen: Die Parasiten des menschlichen Körpers und die durch sie bedingten Krankheiten. Der Umfang dieses Capitels ist ein so grosser, dass kaum noch eine contagiöse, miasmatische, verimpfbare oder mittheilbare, en- oder epidemische Krankheit existirt, welche nicht Anspruch hätte, hier mit in den Kreis der Beobachtung gezogen zu werden. Noch brennt ja allerdings der Kampf der Meinungen heiss. Aber wie in jeder Frage, welche im Gebiete der Pathologie eine gänzliche Umwälzung herbeiführen musste, die conservativen und die fortschrittlichen Kämpfer sich arg befehdeten, bis die Meinungen sich abklärten und eine positive Neuerrungenschaft allseitig anerkannt wurde, so auch hier. Die Jünger überholen ihre Meister mit der Zeit, wie es z. B. in der Cellularphysiologie erging mit der Feststellung der Thatsache, dass es Zellen giebt, ohne die bis dahin für unumgänglich nothwendig erachtete Zellmembran, und wer früher über die Botaniker die Achseln zuckte, wenn sie bei zahlreichen pathologischen Vorgängen niedere Parasiten als Ursache beschuldigten, der ist heut nicht mehr so unglaublich, seitdem der leider so früh verstorbene Mediciner Obermeier die Spirochaete im Recurrens-Blute aufgefunden hat. Ich glaube, dass die Zeit doch noch kommen wird, zu welcher Mancher den Pionieren auf diesem Gebiete, Hallier und seinen Schülern, ein Unrecht abbitten wird. Und eben aus diesem Grunde sollte jeder Beobachter unter allen Zonen seine Hauptaufmerksamkeit auf solche Krankheiten richten, die möglicherweise von der Existenz derartiger Parasiten am oder im Körper abhängig sein können. Die dazu erforderlichen Instrumente sind jedem Arzte heut geläufig und bekannt; es sind zunächst: ein gutes Mikroskop mit ausreichender Vergrösserung, wenigstens bis 1200 lin. und dabei hellem und klarem Bilde, feuchte Kammern, grosser Vorrath an Objectgläsern und namentlich Deckgläschen. Letztere brauchen gar nicht regulär zugeschnitten zu sein, im Gegentheil sind unregelmässige grössere Bruchsplitter aller Art von dieser Glassorte oft willkommener als jene, weil sie eventuell für die

eigenthümlich configurirten Objecte besser passen und Veränderungen an denselben, die durch Wachsthum der etwaigen parasitären Gebilde entstehen, mehr Raum gewähren. Für Schiffsärzte, die an Bord fast immer nur von oben einfallendes Licht beim Mikroskop benutzen können, ist ein Mikroskop mit umlegbarem Fuss und seitlicher Drehung wohl absolut erforderlich. Die Objecte selbst sind natürlich zunächst vom Beobachter möglichst frisch zu untersuchen, demnächst aber in conservirenden Flüssigkeiten, oder wo erforderlich, in Lymphröhrchen aufzubewahren. Letztere sind immer zuzuschmelzen, da Verlacken derselben nicht genug schützt. Wer Culturversuche unmittelbar anstellen will, muss dazu seine Isolir-Cultur-Apparate, über deren Construction er Halliers Schriften befrage, falls er auf einem Schiffe arbeitet, an möglichst trockenem und sonnigem, luftigen Platze aufbewahren und aufstellen, denn bekanntlich fängt an Bord alles Organische sehr bald an von Schimmelbildungen zu leiden und leider stört ja das allgegenwärtige *Penicillium glaucum* bekanntlich so viele Mikroculturen. Wer dazu keine Zeit und Gelegenheit hat, suche die zur späteren Cultur resp. Untersuchung bestimmten, mit der qu. Flüssigkeit gefüllten Lymphröhrchen vor zu hohen Hitzegraden dadurch zu schützen, dass er sie in gewöhnlichen irdenen Blumentöpfen, die mit rein gewaschenem und ausgeglühtem Sande gefüllt sind und in einer flachen Schüssel mit Wasser stehen, vergräbt, die Töpfe auf Schlengerbrettern dem Luftzuge und dem Lichte möglichst constant aussetzt und durch ein eingesetztes Thermometer oft die Temperatur controllirt: Temperaturen, die anhaltend über $20-22^{\circ}\text{C}$. stehen, vernichten meistens die Lebensfähigkeit solcher protozoischer Gebilde. (Gleiche Vorrichtung ist für den Transport von Vaccine-Röhrchen in tropische Gegenden die beste Methode). Das Verpacken in den untersten Schiffsräumen ist gänzlich zu widerrathen, da hier höhere Temperaturen vorkommen können. Die Conservirung solider Objecte in Chromsäure u. s. w. ist schon erwähnt.

Wer selbständig solche Untersuchungen anstellen will, muss aber nicht nur ein sicherer Mikroskopiker, sondern auch Botaniker und Zoolog genug sein, um nicht Enttäuschungen oder positiven Täuschungen ausgesetzt zu sein. Das Studium der Mycologie u. s. w. ist aber leider noch so wenig von Aerzten bisher cultivirt, dass es unerlässlich sein dürfte, für diesen Zweck, dass der Beobachter sich durch propädeutische Studien an bekannten Schizomyceten u. dergl. dazu vorbereite. Wer das nicht kann, der wage sich nicht daran, unbekanntes Gebiet zu erforschen, denn er setzt sich der Gefahr aus, bekannte Dinge für Neue zu halten, gleichgültige für bedeutungsvolle auszugeben. Fleissiges Sammeln zum Zweck der Untersuchung durch Sachverständige in der Heimath ist hier das Erforderniss.

Wenn auf den nun folgenden Seiten eine Aufzählung der Krankheitsformen folgt, auf welche von dem hier entwickelten Gesichtspunkte die Aufmerksamkeit der Beobachter hingelenkt werden soll, so soll damit nicht etwa Aerzten eine Anleitung gegeben werden (denn von ihnen muss vorausgesetzt werden, dass sie ihre Aufmerksamkeit der Aetiologie der Krankheiten so wie so immer zuwenden), sondern den Botanikern, Zoologen, Ethnologen, Physikern, Astronomen u. A. die oft weit mehr und längere Zeit hindurch Gelegenheit haben, auf ihren Reisen und Excursionen derartige Beobachtungen zu machen, und wohl, wie leider von einem Arzte hier eingestanden werden muss, mehr Verständniss für die terrestrischen oder siderischen Qualitäten eines Ortes haben, als die jüngeren Generationen der Mediciner, bei denen ja eben leider die naturwissenschaftlichen Studien immer mehr in Abnahme kommen.

Sprechen wir zunächst von den acuten Infectiouskrankheiten, so sind es vor Allen die Malaria-Krankheiten, die hier in Betracht kommen. Sie sind die Hauptfeinde, nach Ansicht Vieler sogar die einzigen Feinde der Acclimatisationsunternehmungen der europäischen Race. Ihre Unabhängigkeit vom Boden und von dem Einfluss der Jahreszeiten auf denselben ist allbekannt und bedarf keiner besonderen Untersuchungen. Es handelt sich hier hauptsächlich um folgende Fragen: 1) Wie weit erstreckt sich der Einfluss der Malariaquellen auf ihre Umgebung, zunächst am Lande, dann wie weit hinaus auf die See, Lagunen, Flussdeltas, Haffs, breiten Ströme? 2) Sind die Landnebel der Malariaküsten Träger des Infectiousstoffes? 3) Welche Bodenerhebung schützt am jeweiligen Orte und welche locale Eigenthümlichkeiten lassen sich an hochgelegenen, aber dennoch malariösen Orten wahrnehmen? 4) Welche Windrichtungen sind an Fieberorten die gefährlichen? 5) Welche Wohnungsaccomodationen schützen dagegen*)? 6) Ist das Trinkwasser, das Flusswasser u. s. w. von Einfluss auf die Genese? 7) Sind gewisse Gesteinsarten des Bodens (Granit, Gneis u. s. w.) von Bedeutung? 8) Wo existiren absolut malariafreie Orte und wie ist ihre geologische, hydrologische, botanische Beschaffenheit? 9) Was ergiebt die Untersuchung der verdächtigen Luft? Man benutze dazu Glasplatten, die mit reinem Glycerin bestrichen sind und stelle sie an den verdächtigen Localitäten auf oder man aspirire die qu. Luft vermittelt einer Saugpumpe durch eine grosse Anzahl von Glasröhren, die mit Bäuschchen von Schiessbaumwolle verstopft sind und löse diese dann in Aether. Die erhaltene Collodiumlösung fülle man in Glasbüretten mit Glashahn und untersuche dann das in denselben am Boden angesammelte Sediment, welches sich tropfenweis auf ein Objectglas vermittelt des Hahnes abzapfen lässt, mikroskopisch. Diese Methode, Sedimente aus verdächtigen Flüssigkeiten zu untersuchen, ist die bequemste und sicherste und dem Umherfischen mit einem Glasstabe in einem weiten Gefässe gewiss vorzuziehen. Ich bediene mich derselben seit Jahren, und bin damit im Stande, die kleinsten wie die grössten Mengen von Sedimenten durchzusehen. Die erhaltenen Präparate conservire man oder nehme Zeichnungen davon, um sie mit denen von anderen Localitäten vergleichen zu können. Dass man die Collodiumlösung möglichst verdünnt, nachdem sie in einem grösseren Gefässe sedimentirt hat und decantirt worden ist, ist selbstverständlich. Ueberhaupt muss man dafür sorgen, dass solche Sedimente mit möglichst wenig Fluidum in die Büretten hineinkommen. 10) Die Formen der Malariafieber sind zu beachten, namentlich ist eine genauere Untersuchung der remittirenden und der biliösen remittirenden Form nothwendig mit exacten Temperaturmessungen, uroskopischen Untersuchungen u. s. w. 11) Von Wichtigkeit sind ferner Blutuntersuchungen, namentlich bei den perniciosen Formen. Sind wirklich hämobiotische Parasiten bei der Malaria im Spiel, so müssen sie sich bei diesen Formen zunächst im Blute finden. Es ist daher während des Anfalles sowohl als längere Zeit nach demselben Blut zu entziehen und mikroskopisch zu untersuchen. 12) Welche Immunität geniessen die Eingeborenen und wie weit erstreckt sich dieselbe; worauf beruht sie? Welche andre Momente (Erdarbeiten, Sprengungen, Tunnelbauten, Erdbeben) begünstigen das Auftreten von Malaria? 13) Welche Bodenculturen schützen dagegen, was ist namentlich von der z. B. von Ali Cohen so

---

*) Z. B. in den Schlafzimmern in den Tropen statt der Fensterjalousien u. s. w. Rahmen mit doppelten Metallgaze-Scheiben, zwischen denen Watteschichten, comprimirt, eingelegt sind?

warm empfohlenen Sonnenblumencultur zu halten? 14) Welche sicheren diagnostischen Kennzeichen existiren zwischen biliöser Remittens und Gelbfieber und andererseits Typhus icterodes? 15) Ueberall ist vermitteltst genauer Tagebuchnotizen anamnestisch die Incubationsdauer festzustellen. Oft wird nur auf diesem Wege die Frage: ob Gelbfieber oder biliöses Remittens? zu entscheiden sein. Icterische Fieber, die später als 7—11 Tage nach Communication mit einer verdächtigen Localität u. s. w. auftreten, sind nach meiner Ansicht wohl kaum je Gelbfieber. 16) Welche Prophylaxe ist innegehalten worden und wie hat sie sich bewährt? 17) Welche andern Krankheitsformen treten mit der Malariaaffection zugleich auf, welche verschwinden? 18) In tödtlich ablaufenden Fällen suche man Milz, Theile der Leber, des Hirnes, die Mesenterialdrüsen, Nieren zur späteren Untersuchung zu conserviren.

Ganz analoge Fragen liegen beim Gelbfieber zur Erledigung vor. Neuerdings hat bekanntlich eine Autorität wie Pettenkofer demselben die Contagiosität absprechen wollen und es nur als „verschleppbar“ bezeichnet. Diesem Ausspruche gegenüber halte ich es für die Pflicht jedes Arztes, dem Gelegenheit wird, Gelbfieber zu beobachten, namentlich jedes Schiffsarztes, die Frage aufs Neue sorgfältigst zu studiren. Kein Anderer ist so dazu berufen, wie ein solcher. Er kann alle Umstände genau controlliren; unter seinen Augen entwickelt sich der Vorgang, unter seiner Behandlung befinden sich die Kranken. Jede erdenkliche Mühe ist von ihm daher anzuwenden, die Gifträger zu ermitteln und die Umstände klar zu legen, welche ein Aufgehen der giftigen Saat oder das Erlöschen derselben bedingen konnten. In vielen Fällen, so namentlich auf Kriegsschiffen, wird wegen der sofort zu ergreifenden Gegenmaassregeln (Verlassen des Hafens und Aufsuchen nördlicherer Breiten) eine genauere Forschung sehr erschwert werden. Wer aber von solchen Umständen unabhängig eine Gelbfieber-epidemie beobachten kann, dem stehen noch viele Fragen zur Lösung offen. Vor allen Dingen ist die Aetiologie noch ganz und gar mythisch. Wir wissen, dass bis vor nicht langer Zeit Gelbfieber nur die atlantischen Continente und Inseln infestirt hat, dass es mit der Verbreitung der Klipper, Dampfer und Eisenbahnen über den amerikanischen Continent hinweggeschleppt ist, dass es die früher so salubren brasilianischen Häfen heimgesucht hat. Ueber den indischen nach Osten und über den grossen Ocean nach Westen ist es noch nicht gedrunken und warum das nicht? Wenn es von hämobiösischen Parasiten abhängig ist, welcher Art sind dann dieselben und wo existiren sie, analog der Malaria, ausserhalb des menschlichen Organismus? Welche derartige Gebilde zeichnen denn die Heimath des Gelbfiebers, die westafrikanischen Dschungeln, vor anderen tropischen Dschungeln aus? Welche fehlen in Vorder- und Hinter-Indien, den Sunda-Inseln, den chinesischen Küsten, Madagascar u. s. w.? Wird ein zweiter Obermeier im Gelbfieberblute die hier supponirten Gebilde entdecken? Ich erinnere daran, dass nach glaubwürdigen Untersuchungen, beim Biss durch Giftschlangen, hämobiötische Neubildungen in unzähligen Mengen die Blutmasse zerstören und zu hämorrhagischen Ergüssen durch die Schleimhäute, sowie ins subcutane Zellgewebe Veranlassung geben. Rührt die Blutdissolution bei Gelbfieber nicht etwa von analogen Vorgängen her? Man hat (vergl. meine „Krankheiten in der Marine“ pag. 221) frisch gefälltes, mit der Rinde versehenes Holz und die darauf wachsenden üppigen parasitären Pflanzen als Ursache beschuldigt. Die Erwägung, dass die Quelle des ersten autochthonen Gelbfieberfalles doch einmal ausserhalb des menschlichen Organismus zu

suchen ist, lässt die Annahme zu, dass z. B. also auf der westafrikanischen Küste immer von Neuem eine solche Genese stattfinden kann. Ist man sicher dass solche Fieber nicht zu den bilböös-remittirenden gehören, so muss sich doch das Agens einmal erforschen lassen, welches die Gelbfieber-Erkrankung erzeugte. Wenn ferner, im Pettenkoferschen Sinne, Gelbfieber nicht contagiös, sondern nur verschleppbar ist, warum fallen ihm so viele Aerzte und Krankenpfleger auf gut und sauber gehaltenen Kriegsschiffen zum Opfer? Wo liegt hier der Boden, das Mistbeet, um mich so auszudrücken, auf welchem der Infectionsstoff, einmal ausgesäet, neu aufkeimt und seine Keime weiter ausstreut? Welche Desinfectionsmaassregeln verhüteten eventuell dieses Aufgehen der Saat oder waren sie unwirksam? Schützte nur das schon erwähnte Aufsuchen höherer, kälterer Breiten dagegen? Die Therapie anlangend, so ist wohl anerkannt, dass Chinin, gegen die beiden andern biliösen Fieberformen der Tropen so wirksam, hier nichts hilft. Wie steht es aber mit anderen antizymotischen Mitteln, den Präparaten der Carbolsäure (z. B. carbolsaures Chinin,) den Hyposulfiten? Sind etwa directe Injectionen in die Venen, von Ammoniak, welches gegen Schlangenbiss so warm empfohlen wird, von Hyposulfiten etc. nicht wirksam? Ist die schwere Erkrankung der Magenschleimhaut nicht etwa die alleinige Ursache, wesshalb Chinin und dessen Salze, als nicht resorbirbar, unwirksam sind? Wer über Eis und Eismaschinen gebieten kann, sollte ausserdem die Abkühlung des Körpers durch grosse Eismassen, in Beuteln oder in Eiscataplasmen (dicker Mehlteig mit Eisbrocken darin) nicht unversucht lassen. Es bedenke ferner jeder Beobachter, dass unseren heimischen Forschern noch keine Gelegenheit geboten gewesen ist, anatomisch-pathologische Untersuchungen einzelner Organe von Gelbfieberkranken zu machen. Wer daher Gelegenheit zu Obductionen hat, bringe Probestücke aller Organe gut conservirt in Chromsäure oder Chlorzink etc. mit nach Haus und schicke sie an die pathologischen Institute unserer Universitäten!

In Bezug auf Cholera wird an dieser Stelle kaum etwas Anderes erwartet werden können, als was vor Kurzem erst die Reichscommission zur Erforschung der Ursachen der Cholera im August 1873 schon Allen Beobachtern ans Herz gelegt hat. Der einheitliche Untersuchungsplan stützt sich auf folgende Momente die übrigens bei jeder epidemischen Krankheit beobachtet werden könnten:

1. Jeder einzelne Krankheitsfall ist als Gegenstand besonderer Anzeige bei den Behörden isolirt zu registriren in ein Schema, enthaltend: Ort, Wohnung (Strasse, Hausnummer, Stockwerk, Zahl der Hausbewohner, ob am Beobachtungsort oder anderswo erkrankt (zugereist, wann und woher?) Name, Geschlecht, Alter, Stand oder Gewerbe des Erkrankten, Tag der Erkrankung, Tag des Todes. Bei Kindern unter 14 Jahren Stand oder Gewerbe der Eltern, bei ausserhalb ihrer Wohnung Arbeitenden auch der betr. Aufenthaltsort, Werkstatt, Fabrik, Bergwerk etc. wo sie arbeiten. Unter Bemerkungen sind Andeutungen über Wohnung, Aborte, Trinkwasser, Verkehrrverhältnisse, Gewerbsanlagen im Hause etc. zu machen. Analoge Fragen sind zu beantworten betreffs der Militärpersonen und zwar nach Ort, Truppentheil, Unterabtheilung desselben, (Caserne, Bürgerquartier, Strasse, Hausnummer, Stockwerk, Stubennummer, Zahl der Bewohner), ob der Kranke zugereist, wann und woher, Namen, Alter, Dienstzeit, Charge, Civilberuf, Tag der Erkrankung und des Todes, Bemerkungen (ob im Arrest, auf Posten erkrankt, Art der Strafe bei Arrestaten, bereits abgesessene Zeit, Beschaffenheit der Wohnung, Aborte etc. wie oben).
2. Bei Erforschung der Krankheitsträger und Verbreiter kommen in Betracht: der Mensch selbst, der krank oder gesund aus inficirten Gegenden kommt, Verkehr desselben mit den Inficirten; Leichen und mit denselben stattgehabte Manipulationen; Auswurfstoffe der Kranken, auch der an abortiven Formen Leidenden; Gegenstände an denen das Gift haften kann: Thiere und Thiertheile, Wäsche, Kleider, etc. Transportmittel, Trinkwasser, (Untersuchung desselben vor, während und nach Auftreten der Krankheit und Ausdehnung des Gebrauchs desselben auf dem heim-

gesuchten Terrain, Einfluss der Absperrung des qu. Wassers auf das Erlöschen der Krankheit in dem Terrain; Verunreinigung des Nutzwassers mit Choleraejecten, z. B. durch Waschanstalten; Abzugscanäle und deren Zusammenhang mit den infectirten Localitäten, Aborte und deren Beschaffenheit, Communication derselben mit einander oder Isolirung und Zusammenhang dieser Verhältnisse mit den Erkrankungen; Art der Entleerung der Aborte und wohin? ob in offene Gruben, Canäle, Bäche, oder verscharrt? Wasserläufe als solche und als Verkehrsstrassen, als Träger von Stoffen (Stroh, Holz etc.) an denen der Krankheitsstoff haftet; endlich die Luft selbst, in der Nähe der Kranken wenigstens. Es ist ferner 3. zu berücksichtigen: individuelle Empfänglichkeit und zwar im Individuum selbst als auch in seiner nächsten Umgebung, also Constitution, früherer Gesundheitszustand, etwa überstandene Cholera, Schwangerschaft, Wochenbett, Lebensweise, Nahrung, Mangel oder Uebermass derselben, unverdauliche oder laxirende Speisen, Gemüthsstimmung, Wohnung, Luftkubus, Kleidung, Reinlichkeit. Auch die Erforschung der Incubationszeit gehört hierher. 4. Die Erforschung der sub 2 und 3 angedeuteten Momente ist besonders detaillirt zu führen bei Gefängnissen, Correctionshäusern, Hospitalen, Irrenhäusern, Versorgungs- und Lehr-Anstalten etc. kurzum bei Zusammenleben vieler Menschen unter gleichen äusseren Verhältnissen. Garnisonen, Bergwerksdistrikte, Schiffe und Flösse werden als Territorial-Bezirke, in denen die Krankheit besonders genau beobachtet werden kann, zu bezeichnen sein. 5. Die Coincidenz epidemischer Verbreitung der Cholera mit gewissen constanten atmosphärischen und tellurischen Vorgängen, namentlich in Indien, erfordert dass endlich folgende Gesichtspunkte näher bezeichnet werden müssen a) von tellurischen: geognostische Formation, ob Urgebirgs-, Keuper-, Kalk-Formation, ob Diluvial- oder Alluvial-Boden. Physikalische Beschaffenheit, ob Kies, Sand, Lehm, Fels, leicht-, schwer-, oder undurchlässig? Festes Gestein ist nicht immer undurchlässig, es kann dabei sehr porös sein. Die Angabe der Bodenverhältnisse beziehe sich auf die Schichten von der Oberfläche bis zur ersten Wasserundurchlässigen Schicht mit Angabe der Maasse, Gestalt und Gefällsverhältnisse der Oberfläche, ob relativ hohe oder niedrige Localität, auf oder am Fusse eines Abhanges, an einem Steilrande, ob auf einer Schneide zwischen zwei Mulden oder in einer Mulde gelegen? Inhalt des Bodens an Wasser und organischen Stoffen mit besonderer Rücksicht auf die Abfälle des menschlichen Haushaltes. b. Von atmosphärischen: Temperatur der Luft und des Bodens, Regenmenge, Verdunstungsmenge, Grundwasserstände (sämmtliche Angaben nach den Monatsmitteln der Beobachtungen), Pegelstände grösserer und kleinerer Flüsse nach täglichen Aufzeichnungen.

Diese Aufzeichnungen sind nur werthvoll, wenn sie Jahre hindurch stattgefunden haben und nicht bloss an Cholera-Orten sondern auch an cholerafreien oder auffallend verschont gebliebenen Orten. Missionsanstalten mögen davon Notiz nehmen! 6. Endlich Abwehr der Cholera, wo und wodurch sie stattgefunden?

Die Aufmerksamkeit der Beobachter wende sich ausserdem noch auf die verschiedenen Formen der Krankheit, die tetanische, cyanotische, trockne, sudatorische etc. Die Pseudocholera-Formen der Malariafieber sind wohl zu unterscheiden! Die Therapie wird Bereicherungen durch Import vom Auslande her kaum zu erwarten haben und man vertraue daher nicht allzusehr den Empfehlungen von Specificis der Eingeborenen.

Von den typhösen Fiebern ist die geographische Verbreitung, die Form des Auftretens, namentlich der eventuellen exanthematischen Erscheinungen bei denselben, die Aetiologie, die Blutbeschaffenheit zu studiren. Von vielen Gegenden her fehlen noch ganz und gar die Obductionsergebnisse, namentlich vom Typhus syncopalis. Vom Recurrens ist das Vorbild zu den mikroskopischen Studien der Blutveränderung herzunehmen. Das biliöse Typhoid mit seiner Differential-Diagnose von den schon erwähnten beiden anderen icterischen Fiebern, ist einer sehr genauen Forschung bedürftig. Das Mittelmeerfieber (mediterranean fever), bald für eine Typhusform, bald für eine Varietät der Influenza erklärt, ist fast noch ganz unbekannt nach allen Richtungen hin. Ebenso steht es mit dem sogenannten „Australfieber“ und anderen mit grosser Prostration und Benommenheit verbundenen fieberhaften Krankheiten des südamerikanischen Continents, Neuseelands, Austra-

liens, Neu-Guinea's, Südafrika's etc. die noch ihrer Bearbeiter warten und eine bedeutende Ausbeute liefern dürften. Auch hier werden die Missionen dieser Regionen als Pioniere der ärztlichen Wissenschaft Europa's aufzutreten müssen.

Beulenpest, indische, sibirische Pest sind heut zu Tage den Forschern wohl nur in ihrer Heimath noch zugänglich, versprechen aber nach jeder Richtung hin die ergiebigste Ausbeute und sollten auch hierbei unsere pathologischen Institute vor Allem von den Reisenden (nach Anleitung der beim Gelbfieber gegebenen Andeutungen) nicht vergessen werden.

Von den exanthematischen Fiebern sind besonders Erysipel und Schweissfriesel vom neueren aetiologischen Standpunkte aus zu untersuchen, namentlich das gleichzeitige Auftreten von Cholera und Schweissfriesel zu beachten. Vom Scharlach und von den Morbillen interessieren die Erscheinungen derselben bei den farbigen Racen, ihre Einschleppung u. s. w. Diphtheritis und ihre Coincidenz mit Scharlach in bisher selten heimgesuchten oder ganz verschonten Territorien ist noch überall eingehender Beobachtungen bedürftig. Ueber Blattern wird kaum viel Neues noch beigebracht werden können, wenigstens von Reisenden. Dengue wird den Schiffsärzten, die die Tropen besuchen, nicht entgehen dürfen, wenn es das Glück will, dass sie eine solche Epidemie gerade vorfinden. Die räthselhaften Ursachen der Influenza, wenn sie plötzlich 1000 Meilen vom Lande Schiffsbesatzungen überfällt, erwarten von diesen Reisenden ebenfalls scharfe Beobachtungen der atmosphärischen Verhältnisse womöglich unter Zuhülfenahme des Mikroskopes, falls die Winde etwa Staub etc. (analog dem Passatstaube) mit sich führen. Auch das Heufieber und seine Analogie*) gehören hierher.

Was über den Aussatz (*Lepra arabum*) zu beobachten ist, hat Virchow schon vor längerer Zeit in einem Fragenschema mitgetheilt und muss, um diesen Zeilen nicht eine zu grosse Ausdehnung zu geben, daher hier auf dasselbe verwiesen werden. Ich kann die Ansicht aber hier nicht unterdrücken, dass auch der Aussatz und alle seine Formen so wesentlich den Charakter einer parasitären Krankheit, ähnlich wie Pellagra u. A., trägt und daran also die Aufforderungen knüpfen, die Genese desselben aus dem Genuss gewisser verdorbener Nahrungsmittel aus der Fischclasse scharf im Auge zu behalten und darauf hin die Untersuchung zu richten. Auch die Contagiosität, event. Verimpfbarkeit, die Mittheilbarkeit auf irgend einem noch dunklen Wege, ist noch nicht zweifellos zurückgewiesen. So herrscht in Bangkok die Ansicht, dass der Urin der Kranken das Vehikel des Contagiums sei!

Als pathologische Raritäten sind zur Beobachtung ferner zu empfehlen: 1. die Fromboesie, auch Pians oder Yaws genannt, jene eigenartige höchst contagiose, von Fiebererscheinungen eingeleitete Hautkrankheit der Tropen beider Hemisphären, namentlich Westafrikas, fast nur Schwarze und Farbige, sehr selten Weisse behaltend. Ist von Neuem sorgfältigen mikroskopischen Untersuchungen zu unterwerfen. 2. Dieser ähnlich aber nur auf irländische Districte beschränkt und lange nicht mehr besprochen, der Warzen-Scharbock, Button scurvy der Engländer, vielleicht eine übertragene Zoonose. 3. Die Veruga Perus, eine Krankheit, bei deren Beschreibung man unwill-

---

*) Ein mir wohlbekannter höherer Diplomat wird z. B. jedesmal vom Heufieber ergriffen, wenn er mit Pferden zu thun hat, reitet oder fährt, oder in einen Pferde-stall tritt, während er andre Stallungen ungefährdet betreten kann.

kürlich an die schwersten Fälle von Trichinose denken muss, wenn nicht die plötzlich auftretenden, bis hühnereigrossen Warzengeschwülste der Haut dem Leiden einen noch ganz anderen Charakter gäben. Ursache soll das Wasser gewisser Quellen sein, oder wohl vielmehr das, was im Wasser suspendirt, mit demselben zugleich verschluckt wurde. Die Untersuchung des Wassers ist bisher, auch durch v. Tschudi, noch nicht vorgenommen worden. 4. Die Kriebelkrankheit (Ergotismus, Raphanie) als eine allbekanntere heimische Krankheit, giebt das Prototyp ab für 3 Krankheitsformen, die höchst wahrscheinlich, auch schon theilweise anerkanntermaassen, auf analogen Vergiftungen des Organismus durch Staub- und Brandpilze gewisser Getreidearten beruhen, für die Acrodynie, bisher nur in Frankreich und seit 1860 nicht wieder beobachtet und wohl auf Genuss schlechten Brotes zurückzuführen (erkrankter Weizen?), dann für das Pellagra (auch Mal rosso, Mal del Sole, cattivo male, mal de la Rosa span.), in Spanien, in Nord- und Mittel-Italien, Dalmatien etc. auch in Süd-Frankreich und in der Wallachei von kranken Mais herrührend*) und für die in einzelnen Reisländern (Hinter-Indien, Ceylon, Sunda-Inseln, China) beobachteten gangränösen Affectionen der Füsse, die von Verdauungsbeschwerden, heftigen Gelenkschmerzen, Fieber, Brennen und Prickeln der Hände und Füsse etc. eingeleitet werden und durch leichte Hautreize zum Ausbruch kommen können, von den Engländern „Burning of the feet“, genannt. All diese Leiden dürften reiche mikroskopische Ausbeute vom parasitologischen Standpunkte aus gewähren, oder doch etwas anderes Plausibles bringen lassen. Hierher gehört vielleicht auch das noch räthselhafte, in Cadix, Xerez u. s. w. epidemisch 1867 aufgetretene Trancazo-Leiden, ein mit gastrischen und catarrhalischen Symptomen complicirtes fieberhaftes Exanthem, bald als maserartig, bald als frieselartig bezeichnet.

Weit verbreitet über grosse Strecken der Erde zeigt sich die Kropfkrankheit und der Cretinismus, erstere bald sporadisch, bald endemisch und erlöschend ohne bekannte Ursache, bald epidemisch und doch nirgends an überall gleiche locale Bedingungen, soweit wenigstens bisher bekannt, geknüpft. Lange und umfangreiche Beobachtungen, wie sie nur auf Missionsstationen möglich sind, dazu erforderlich sein, um mehr Material zum Abschluss der Fragen, die hier vorliegen, herbei zu bringen. Der Cretinismus, so häufig Begleiter des Kropfes, dürfte gerade den Missionaren Veranlassung geben, diese Krankheiten ihrer besonderen Beachtung theilhaftig werden zu lassen.**)

Die Zuckerharnruhr ist nach geographischer und ethnographischer Verbreitung noch gar wenig studirt. Ob dies daran liegt, dass so mancher Arzt d'ultramare sie noch nicht beachtet oder die Reaction auf Zucker nicht anzustellen vermocht hat — wer vermag es zu sagen? Dass klimatische Einflüsse, dass rein vegetabilische Nahrung sie erzeugen, ist nicht anzunehmen. Woran liegt es, dass ihrer in so vielen ärztlichen Topographien gar nicht gedacht wird?

*) Hierher sind vielleicht auch noch zu rechnen: die Columbische Maiskrankheit (vom Peladero, dem Mutterkorn des Mais), von Roulins in Columbia, der Cak, von Brocchi in Sennaar 1816–17 und der „Namy“ von Tytler in Benkulen auf Sumatra beobachtet.

**) Die nepalesische Ohrgeschwulst, vielleicht die Veranlassung der bekannten Darstellung der Buddha-Statuen mit den langen birnenförmigen Aurikeln, wird gleicher Beachtung zu empfehlen sein; sie soll gleichzeitig mit Kropf vorkommen, was aber bestritten wird.

Die Abwesenheit der Arthritis (Gicht) auf vielen Gebieten ist noch mancher Aufklärung bedürftig. Die geographisch-physiologischen Studien über Harn- und Schweiss-Ausscheidung, über den Einfluss der Nahrungsmittel, namentlich der animalischen und der Alkoholica auf den Chemismus der Säfte, sind wohl unerlässliche Vorstufen zur Lösung dieser Frage. Dasselbe dürfte erforderlich sein bei einer Untersuchung über die rheumatischen Affectionen, deren fast allgemeine Verbreitung über alle Zonen der Erde vielen Beobachtern Arbeitsmaterial liefern wird. Ich kann dabei Nichts Besseres thun als die Worte Hirsch's hier anführen, mit denen er das Capitel über Rheumatismus schliesst: „Es ist eine Hauptaufgabe späterer medicinisch-topographischer Forschung, das Verhältniss des acuten Gelenkrheumatismus nach allen Seiten hin einer sorglichen Prüfung zu unterwerfen, um die Beantwortung der Frage zu ermöglichen, ob, vom Standpunkte der geographischen Pathologie, die in Frage stehende Krankheitsform überhaupt dem sogen. rheumatischen Krankheitsprocesse zugezählt werden darf, oder ob es sich hier nicht, was mir sehr wahrscheinlich ist, um eine specifische, acute Infectiouskrankheit handelt, welche etwa ähnliche Beziehungen zu dem Rheumatismus, wie die Influenza zum Catarrhe hat.“

Gleicher Aufklärungen ist die den Tropen oder vielmehr gewissen tropischen Bezirken eigenthümliche Krankheitsform Beriberi. Ihre Abhängigkeit von Witterung und Klima scheint allerdings erwiesen zu sein, doch bleibt ihre eigene locale Verbreitung, die Vorliebe für farbige Racen und für das männliche Geschlecht, ihr Auftreten bei Individuen, die schon längere Zeit am betr. Orte sich aufhalten, und nicht so sehr bei neuen Ankömmlingen, ganz unerklärt. Ueberhaupt bedarf diese Krankheit einer erneuerten klinischen Bearbeitung nach modernen Gesichtspunkten. Die Untersuchung mittelst der elektrischen Agentien, die microscopische Beobachtung der Musculatur, die Thermographie der Affection u. A. fehlen noch.

Von den Organkrankheiten beanspruchen demnächst eine ziemlich beträchtliche Reihe die Aufmerksamkeit des Reisenden. Die Erkrankungen der Respirationsorgane wird derselbe überall vorfinden und für die Pathologie namentlich daraus Gewinn ziehen, dass er die Thermographie der acuten und subacuten Formen, vor Allem in den Tropen, studirt, worauf schon oben unter der Besprechung der Tuberkulose hingewiesen wurde. Diejenigen Gegenden, welche sich einer besonderen Immunität von diesen Leiden erfreuen, sind besonderer Rücksicht würdig. Die socialen Verhältnisse, namentlich gewerbliche, üben auf ihre Entstehung bekanntlich grossen Einfluss und wir kennen schon eine ganze Reihe von Gewerben, die durch den mit ihrer Ausübung verbundenen Staub-Inhalations-Process ihre Angehörigen höchlichst gefährden. Eine Erweiterung dieser Kenntniss, auch etwa in der negativen Richtung resp. mit Rücksicht auf solche Gewerbe, die eine Immunität verleihen oder einen curativen Einfluss hier und dort ausüben, ist im Interesse der öffentlichen Hygiene wünschenswerth. Der Einfluss klimatischer Veränderungen, der See-Reisen, der Veränderungen der Höhenlage ist zu studiren.

Besondere Beachtung erfordern die folgenden seltenen Formen von Erkrankungen dieser Organe: 1. Die Nacra oder Naukhra Ostindiens jene eigenthümliche heftige Entzündung der Nasenhöhle und ihrer Adnexa, fast nur Farbige befallend. 2. Die von Ansiedelung von Insecten-Larven in den Nasenhöhlen herrührende „Peenash-Krankheit“ Ostindiens, Cayennes und wahrscheinlich auch anderer Tropenländer. 3. Die besonderen Formen von Pneumonien, die als typhöse Pneumonie in Europa sowohl als auch in

Tropenländern (Jamaica, Peru) und Nordamerika oft epidemisch beobachtet worden sind, dann auch die sog. Malaria-Pneumonie.

Die neueren Ansichten über Keuchhusten, Diphtheritis und Croup, namentlich über den parasitären Character der beiden ersteren, werden den Beobachtern Veranlassung geben, dieselben auch in anderen Regionen in dieser Hinsicht zu prüfen.

Die Krankheiten des Verdauungssystemes werden den die Tropen besuchenden Reisenden und Aerzten die nächste Veranlassung zu Beobachtungen geben. Die ersten Aeusserungen des inneren Menschen gegen die Einflüsse des Tropenklimas sind die verminderte Esslust und die verzögerte Verdauung. Dass die physiologischen Grundlagen dieser Erscheinungen noch aufzuklären sind, bedarf wohl kaum noch des Hinweises. Viele z. B. Fonsagrives, schreiben die Trägheit der Magen-Darm-Functionen der vermehrten Säfteströmung nach der Haut und der verminderten Durchfeuchtung und dadurch beschränkten Schleimabsonderung des Alimentationscanals zu und gewiss nicht ohne Recht. Es würde sich nun nur darum handeln, von einer Reihe von Personen hierüber feste Data zu erhalten, ihre Darmfunctionen zu protocolliren, desgl. ihre Körpergewichte etc. und dann ihre etwaigen durch die physiologischen Vorgänge vorbereiteten Erkrankungen zu studiren, eine Aufgabe für den Arzt eines kleineren oder grösseren Kriegsschiffes z. B. die Arbeitsmaterial für längere Zeit darbietet. Man wird dadurch Anhalt gewinnen können über die Genese der Dysenterie, ob dieselbe mehr oder minder den Fäcalstauungen im Dickdarm zuzuschreiben oder ob sie einem, an diesem oder jenem Orte acquirirten Infections-Medio aufzubürden ist. Dies sei nur als ein Beispiel hier angeführt. Die grosse Zahl der das Verdauungssystem heimsuchenden Leiden kann hier nicht der Reihe nach durchgesprochen werden. Es muss nur gleich demnächst darauf hingewiesen werden, dass der einheitliche Zusammenhang des ganzen Darmrohres vom Lippensaume an bis zum Constrictor ani eine Wanderung der schädlichen Uebertragungen von Anfang desselben bis zum Ende sehr begünstigt und dass Schädlichkeitsfinger, wie sie den Augen durch die Lider und den Respirationswerkzeugen durch die ihnen vorgelagerten Schutzorgane verliehen sind, hier nicht anders als etwa durch das Geschmacksorgan repräsentirt sind. Krankheiten des Mundes und Schlundes, parasitäre Ansiedelungen auf diesen, die bisher als noxen sui generis galten, sind vielleicht oft nur Vorläufer der Leiden tieferer Particlen. Die Stomatitis vesicularis intertropica ist z. B. vielleicht ein solches schleichendes, oft gar nicht beachtetes Leiden, welches den tropischen insidiösen Durchfällen vorausgeht. Genaue und durch pathologisch-anatomische Präparate unterstützte Mittheilungen aus allen Weltgegenden sind erwünscht über Noma (den Wasserkrebs der Wangen), ebenso über die Parotitis epidemica, den Mumps. Die Zahnkrankheiten der verschiedenen Nationen bieten nicht minder Interessantes: Die Ursachen der Immunität so vieler Racen von Zahnleiden sind aufzusuchen und zu prüfen. Die Untersuchung der der Zahncaries zu Grunde liegenden Pilz-Wucherung ist allerorts, wo es angeht, aufzunehmen, eventuell die nöthige Anzahl von extrahirten Krankheitsobjecten, in Glycerin etc. verwahrt, mitzubringen. Die Krankheiten des Magens sind im Zusammenhange mit der üblichen nationalen Diät zu betrachten und die Exemption davon mit gleicher Berücksichtigung zu notiren. Die chronischen Gastrosen, namentlich ihre Beziehung zu der erst in den letzten Jahren näher gewürdigten Ectasie des Magens, sind bei ihrem ohne Zweifel nationalen Sitten zuzuschreibenden häufigen Vorkommen, und trotz desselben, noch immer sehr interessante Beobachtungsobjecte. Wir haben

z. B. von der Beschaffenheit eines nordischen Magens, der ja bekanntlich colossale Fettmassen aufnehmen können soll, noch keine Vorstellung. Eine volumetrische Aichung solcher Mägen ist noch nicht bekannt und ebenso wenig alle die näheren Umstände, welche die Verdauung z. B. einer Menge von 20 u. m. Pfunden Butter im Darmcanale eines Tschuktschen oder Tungusen begleiten. Wie erhält sich das Blut derselben während und nach der Verdauung, wie die Temperatur, wie die Gallensecretion, die Nieren-thätigkeit u. s. w.? Welchen gastrischen Affectionen sind solche Nationen unterworfen? Kommen Carcinom und perforirende Geschwüre bei ihnen vor? Und dagegen: welches Volumen hat der Magen eines Wüstensohnes, eines Andesbewohners? Welche Magenleiden finden sich bei ihnen?

Von den Krankheiten des Darmes interessirt vor allen den Reisenden die Dysenterie und ihre Aetiologie, worauf schon hingewiesen worden ist. Was man auch darüber anführen möge, so bleibt es, bis andere Thatsachen darüber mitgetheilt werden sollten, doch feststehend, dass auf einem segelnden Seeschiff, selbst unter den ungünstigsten Witterungseinflüssen und den schlechtesten Verhältnissen in der Trinkwasserversorgung, Dysenterie nicht auftritt, es sei denn von Hause aus inficirtes Trinkwasser mitgenommen worden oder die Accomodation für die Defécation so mangelhaft, dass daraus Schädlichkeiten entstehen. Erst wenn Schiffe mit dem Lande communicirt, von dort Wasser zum Trinken bezogen oder wenn ihre Mannschaften Flusswasser aus den Aestuarien grosser Ströme genossen haben, tritt Durchfall und bald darauf Dysenterie auf. Temperaturwechsel allein erzeugt keine Dysenterie. Dass auch bei Ausschliessung des Genusses von Wasser, also bei grosser Trockniss und Dürre Dysenterie auftritt, ist kein Grund dagegen. Denn der eingesogene und verschluckte Staub, der auch mit Obst und anderen Früchten verschluckt werden kann, kann ebenso infectiös wirken, wie der Staub in den trocknen, heissen Sommern in Malaria-Gegenden Intermittenten hervorrufen kann. Der Beobachter richte also sein Augenmerk hauptsächlich auf die Beschaffenheit der Erdoberfläche und der Wasserläufe, auf die Landcultur, die Düngungsmethode, die Berieselung, die Feld- und Gartenfrüchte und die Art ihrer Zu- und Vorbereitung zum Genusse, des Kochens, Schälens etc. Länder, deren Boden in reicher und langanhaltender Düngungskultur gehalten wird, sind die bevorzugten Heimstätten der Dysenterie, deren, nebenbei gesagt, überall gleichartiger Charakter und Verlauf auch ausserdem allwärts auf gleichartige Aetiologie hinwies. Auch die Therapie des Leidens verlangt neuere Mittheilungen namentlich über die Nützlichkeit der localen Behandlung des Dickdarms durch massenhafte Irrigationen von Wasser oder arzneilichen Mischungen, wie sie durch Mosler u. A. neuerlichst vorgeschlagen und auch angewendet worden sind.

Nähere Auskunft verlangen noch von Leiden des Darmkanals der in den Tropen häufige Prolapsus ani mit seinen begleitenden Ulcerationen, Gangrän etc., unter dem Namen Bicho, Maculo u. A. bekannt und namentlich den Negern eigenthümlich. Ferner die endemische Colik, Colica intertropica seu sicca und deren Vorkommen auch ausserhalb der Tropen, wobei namentlich die etwa vorhandene Möglichkeit einer chronischen Bleivergiftung genau zu beachten ist. Demnächst, obschon am besten studirt von allen Erkrankungen dieser Organe, verdienen die Entozoen des Darmes stets neue Beachtung des Reisenden, da hier, wie z. B. die Forschungen Bilharz's ergeben haben, ganz sicher noch an vielen Orten der Erde neue Entdeckungen zu erwarten sind. Ihre Wanderungen in und ausserhalb des Menschenleibes wie des ihrer anderen Wirthe werden immer wieder neue Aufschlüsse

geben.*) Von den Adnexen des Darmes ist es bekanntlich die Leber, die zahlreichen, durch Klima, geographische Lage des Ortes, Diät etc. bedingten Leiden ausgesetzt ist. In den Tropen häufig entzündlichen und abscedirenden Erkrankungen unterworfen, bleibt sie dort fast ganz immun gegen Neubildungen (Carcinom etc.), während sie in den nördischen Gegenden anderen Veränderungen unterliegt. Diese Thatsachen wollen erläutert, untersucht, festgestellt werden. Die Nachbarin der Leber, die Milz, theilt vielfach die Geschicke derselben und verlangt daher gleiche Beachtung. In den subtropischen und tropischen Zonen kommt Noma und Rhachitis in Verbindung mit Milztumoren vor und ist das Verhältniss dieser Erscheinungen zu einander noch der Aufklärung bedürftig.

Die Krankheiten der Circulationsorgane sind nach ihrer geographischen Verbreitung noch wenig studirt und bedürfen überall der Aufmerksamkeit der Forscher. Die Affectionen des Herzens, entzündliche wie organische, ihr Vorkommen in Verbindung mit chronischen Lungenleiden, mit chronischem Alkoholismus, mit Chlorose, Geophagie, unter Zeiten grosser geistiger Aufregungen (Revolutionen, Erderschütterungen, Handelskrisen etc.), die Complicationen mit Scorbut, die Fettentartungen, das welke Herz, die Hypertrophie ohne Klappenfehler bei Bergvölkern, Arbeitern, Seeleuten, die schwierige Pericardo-Mediastinitis mit dem sogenannten paradoxen Pulse, die Bildungsanomalieen, sind allerwärts zu studiren. Von den Gefässkrankheiten sind die Aneurismen aller Art (sie sollen in der Negerrace, bei den Indiern, Egyptern fehlen), die Hämorrhoidal- und Varicenkrankheit bisher die einzigen, welche, und dies nur spärlich, beachtet worden sind.

Von den Krankheiten des uropoëtischen Systems ist eine reichere Ausbeute zu erwarten. Schon die oben besprochene physiologische Untersuchung dieser Organe und ihrer Functionen lässt dies erwarten. Hirsch bemerkt hierher gehörig, dass die Acclimatisationsatrophie der Nieren bei den aus nördlicheren nach tropischen Zonen übergesiedelten Individuen „leider die Aufmerksamkeit der Beobachter in sehr geringem Grade beschäftigt hat“. Bright'sche Nierenkrankheit, an vielen Orten aller Zonen beobachtet, fehlt auf gewissen Territorien fast ganz, z. B. auf Inseln, wie auf Neuseeland und der Fäeroergruppe; ist selten in gewissen malariareichen Gegenden Niederbengalens und Brasiliens. Mittheilungen über gleiche Immunität anderer Gegenden sind daher erwünscht. Doch auch die übrigen pathischen Processe der Nieren sind nicht zu vernachlässigen, z. B. die amyloide Degeneration, die Hydronephrose, die wandernde Niere. Von den parasitären Erkrankungen kennt man die endemische Hämaturie von Mauritius, Isle de Bourbon und namentlich Brasilien. Ein Analogon bietet die Chylurie, welche nach neueren Mittheilungen von Lewis in Calcutta durch die Gegenwart eines Hämatozoon bedingt sein soll. Man soll nach diesem fast in jeder aus den Fingern entnommenen Blutprobe die filariaähnlichen Nematoden auf-

---

*) Als ein Beispiel nur Folgendes, wenn es auch nicht vom menschlichen Leibe, sondern nur von einem Hunde sich handelt: 1860 herrschte eine Epizootie unter den Hunden in Singkawang, Montrade u. s. w. auf Borneo. Die holländischen Aerzte fanden bei Obductionen die rechte Herzhälfte der Thiere voll von Nematoden, die 8 bis 10 Zoll rh. lang und einige Linien dick waren und bis in die Vena cava und pulmonalis hineinreichten. Aehnliche fanden sich im Dünndarm. Dieser Befund hatte indess nichts mit der Grundkrankheit der Thiere zu thun, die vielmehr eine Cerebrospinal-Meningitis mit Lähmungen war. Er ist aber so sonderbar, dass er auf's Neue aufgesucht und erforscht zu werden verdient, denn die Natur der Hämatozoen ist nicht bekannt geworden.

finden. Beide Formen der Harnstörung sind daher dringend zum Studium des Reisenden zu empfehlen, wie nicht minder die Distomenerkrankung der Blase, welche bisher fast nur aus Egypten bekannt geworden ist, wahrscheinlich aber auch anderswo aufgefunden werden wird. Die Urolithiasis endlich, sowie andere, durch chemische Veränderungen des Harn (Oxalurie, Indigo-harn, harnsaure Diathese etc.) charakterisirten Leiden sind zu berücksichtigen. Erstere ist zwar reichlich unter allen Zonen verbreitet und studirt worden, aber die Exemption mancher Racen ist noch weiter zu erforschen und aufzuklären.

Die Krankheiten der weiblichen Genitalorgane (und ihrer Adnexa, der Brustdrüsen) meist von socialen Missständen, verkehrten und schlechten Gewohnheiten, Excessen etc. abhängig, sind Begleiter des geringeren wie grösseren Civilisationszustandes und werden daher dem Reisenden bald mehr, bald weniger auffällig werden. Der Einfluss des Wochenbettes, die Art und Weise der Abhaltung desselben bei den verschiedenen Nationen und Racen wird daher seine Aufmerksamkeit in Thätigkeit setzen müssen. Die Mittheilungen über die Krebsaffectionen des Uterus und der Brustdrüse, die Ovarialtumoren, gewähren bisher in vielen Beziehungen nur dürftiges und wenig brauchbares Material. Sie sind daher aller Orten von Neuem zu studiren. Die Puerperalprocesse endlich, ihr theils diphteritischer, theils septämischer ev. pyämischer Charakter und die neuere ätiologische Auffassung derselben sind von letzterem Gesichtspunkte aus gleichfalls einer Revision mit Mikroskop, Impfung, Mikroculturen etc. zu unterziehen. Diese neuere Auffassung, welche, vielleicht mit Recht, eine einheitliche genetische Entstehung vieler solcher Processe, wie Wunddiphtherie, Wundröse, Rose der Neugeborenen, Hospitalbrand, Septämie etc. befürwortet, wird den Forschern reichliche Anregung zu vergleichenden Studien über diese Processe geben.

Von den Krankheiten der männlichen Genitalorgane beanspruchen die Hydrocelen, die Neubildungen der Hoden u. a. erneute Untersuchungen nach ihrer geographischen Verbreitung, ebenso die verschiedenen Formen der Unterleibsbrüche.

Das Heer der Hautkrankheiten wird sich überall der ersten und immer wiederholten Aufmerksamkeit der Reisenden zu erfreuen haben, da es ihnen zunächst in die Augen fallen muss und verhältnissmässig wenig diagnostische Schwierigkeiten bietet, schon deshalb, weil selbst für die grössten Raritäten endemischer Art unter denselben der betreffende Patient meist den ortsüblichen oder nationalen Namen seines Leidens kennen wird. Und gerade diese eigenen nationalen Affectionen sind die der Beachtung und Aufklärung bedürftigsten Objecte der Forschung. Um einen kleinen Fingerzeig für den Beobachter zu liefern, folge daher hier ein kleines Verzeichniss solcher Leiden nebst ihrer Heimath nach Hirsch. Es gehören hierher:

- a) in Persien die Nabot el leyl, die Nachtpflanze, auch Ihr, eine Art von Nesselsucht von zweifelhafter Ursache, ob von Insectenstichen oder Nahrungs- etc. Einflüssen?
- in Assam die Daudkrankheit, ein schuppiges Exanthem, besonders zur Regenzeit auftretend, anfänglich papulös und heftig juckend,
- in Brasilien die „Curúba“, eine chronische Psoriasis bei den Indianern und auch bei Thieren,
- auf Polynesischen Inseln die Gune, ein Schuppenepanthem mit ringförmigem excentrischem Wachsthum und centralen Nachschüben;
- b) in Vorderasien (Syrien, Mesopotamien, Persien etc.): die Beule von Aleppo, eine Lupusform, die auch als Beule von Sindh, Cambay, Delhi in Ostindien aufgefunden worden ist,

- auf Polynesischen Inseln unter dem Namen Tona, Bua, Pupa ein ähnliches lupöses Leiden,
 in der Barberei, Algier die Beule von Biscara, wohl identisch mit der von Aleppo.
 Die Veranlassung aller dieser lupösen Leiden ist ganz dunkel. Man hat sie im Trinkwasser gesucht — ob mit Recht, müssen neuere Forschungen lehren.
- c) in Egypten eine Prurigokrankheit der Neger, auf den Seychellen eine ähnliche bei europäischen Einwanderern, die besonderer Eigenthümlichkeiten des Sitzes etc. wegen fernere Forschungen erfordern;
- d) auf den Peruanischen Hochebenen die „Chunu“, auch in anderen Gebirgsgegenden bekannt, vielleicht eine eczematöse Affection,
 in Egypten die Nilflechte, Boutons du Nil, und in gleicher Region der Intertrigo scrotalis navium, beide dem Einflusse des Nil- resp. Seewassers (des rothen Meeres) zugeschrieben,
 in Illinois die Illinois Itch (Krätze), ebenfalls ein Eczem, nicht ansteckend, im Winter vorherrschend und seit 1824 nicht weiter erwähnt;
- e) auf den Fidschi-Inseln die Dthoke, der Fidschiausschlag, wahrscheinlich syphilitischer Natur,
 in Westindien (vom Verf. auf Sr. M. S. Gefion fast epidemisch beobachtet) eine äusserst schmerzhaft, acneartige, auch in Furunkel übergehende Entzündung der Haut über den Patellen, vielleicht durch Corallensandsplitter beim Scheuern der Schiffsdecks bei den Matrosen entstehend; auch anderwärts in den Tropen beobachtet;
- f) auf den Molukken die Cascadee (Huitklei) eine Art von Ichthyosis, angeblich mit dem Aussatz in einem localen Exclusionsverhältniss stehend,
 in Mexico, Brasilien, Columbien, Cayenne das Mal de los pintos, auch Pinta, Quiricua, Tinna genannt,
 auf der Cordillarenkette, besonders in Neu-Granada die Carate,
 in Surinam die Lota, auch auf den Antillen, in Brasilien, Peru und Chili vorkommend,
 alle 3 Formen fast nur Farbige befallend, rein localer Natur, nicht contagiös, nicht mit Aussatz oder Syphilis zusammenhängend und zum Genus des Chloasma gehörend, möglicherweise von einem Epiphyt bedingt und daher dringend für neue Untersuchungen zu empfehlen,
 überall in den Tropen die Pachydermie,
 im Süden Chinas die Chylorrhoea scroti, wie ich sie nennen will, eine mit erschöpfenden chylusartigen Ergüssen verbundenen Pachydermie des Scrotums. Präparate sind sehr erwünscht;
- g) in Peru die Uta, endemisches (lupöses oder parasitäres?) Scrotalleiden, stets tödtlich?
- h) an den Küsten des rothen Meeres das Yemen- auch Adengeschwür, übrigens überall in den Tropen verbreitet und dem Nosocomialbrande sehr-ähnlich, aber wohl nicht identisch. Wird sich wohl neueren Mikroskopikern gegenüber als ein parasitäres Leiden entpuppen,
 auf den Antillen, in Cayenne, in Indien die „Crabbe“, bei Negern, Indianern und Hindus die geschwürigen Zerklüftungen der Fusssohlen;
- i) in den Tropen weit verbreitet der „Ringworm“ der Engländer, eine Herpes circinatus-Form, von Trichophyton tonsurans herrührend,
 in Ostindien (Madura, Bellary, Madras, Pundjab, Pondichery etc.) der von Hirsch so benannte „Madurafuss“, von den Eingeborenen Goutlon Mahdi, Pericae, Anaycae, Kirinaghra u. s. w. genannt, ein exquisit-parasitäres Leiden, in Gestalt von Geschwülsten im subcutanen Bindegewebe eines Fusses, niemals beider, auftretend, und zwar an der Fusssohle etc., selten an der Hand, die schnell wachsen und dann exulceriren und den Fuss gänzlich zerstören können. Ein Pilz aus den Gruppen der Myxomyceten ist die Ursache. Beobachtungen und Präparate sind äusserst erwünscht;
- j) endlich die epizoischen Parasiten ihre Entstehung verdankenden Leiden von der Natur der Scabies, die Filarialeiden, die sonstigen von Ansiedelungen anderer Würmer, Insecten, Milben herrührenden Affectionen wollen erneute Untersuchungen der Forscher auf sich ziehen.

Von den Krankheiten der Knochen und Muskeln sind pathologisch-geographische Angaben sehr spärlich bekannt, mit etwaiger Ausnahme derjenigen über die Rachitis, welche indess auch nicht beträchtliche zu nennen sind. Ueber Osteomalacie, progressive Muskelatrophie, lipomatöse Muskel-

degeneration, Osteomyelitis und Periostitis, Caries und Necrose, Sclerose, Fragilitas Ossium (auch die senile). Die zahlreichen Neubildungen an den Knochen, die Gelenkerkrankungen (Arthritis deformans eingerechnet), die erst neuerdings bekannt gewordene Zehenkrankheit der Neger, Ainhum genannt, gehört ebenfalls hierher, die Deformitäten derselben, die Krankheiten der Wirbelsäule, die myopathischen Gelenkleiden, die Hygrome u. A. fehlen von den meisten aussereuropäischen Gegenden her Nachrichten. Es scheint überhaupt, als würde in der medicinischen Geographie den chirurgischen Erkrankungen wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die Aufmerksamkeit der reisenden Aerzte sollte sich also mehr diesem Felde zuwenden, als bisher geschehen ist.

Die Krankheiten des Nervensystems sind gleich stiefmütterlich von den berufenen Reisenden und Forschern behandelt worden. Hirsch bezeichnet dies Gebiet als ein solches, „auf welchem wir uns nicht nur von allen auch nur einigermaassen brauchbaren Vorarbeiten verlassen sehen, sondern auf welchem auch die äusserst mangelhaften und zum Theil wenig verlässlichen Angaben der Berichterstatter die Forschung auf die engen Grenzen der Erlangung einzelner Gesichtspunkte beschränken.“ Das Gebiet der Nervenleiden ist aber ein so ausserordentlich ergiebiges, dass es reichlich Stoff zu Beobachtungen der Reisenden bietet. Abgesehen von den Seelenstörungen, den Logoneurosen, deren vergleichende ethnische Darstellung noch mangelt, während eine vergleichende Völkerpsychologie als Grundlage dafür immer mehr angebaut wird, sind die anderen Gruppen der Hyperästhesien, Anästhesien, Krämpfe und Lähmungen etc. und die acuten Krankheiten der Centralorgane noch wenig ethnographisch behandelt worden. Von manchen derselben (Hysterie, Epilepsie, Chorea, Apoplexie u. a.) wird behauptet, dass sie in diesen oder jenen Regionen gar nicht vorkommen, während bei anderen (Paralysis agitans, Tetanus traumat. und neonat., Hydrocephalus acutus u. a.) ein endemisches resp. epidemisches Auftreten bekannt ist. Diese Punkte sind daher sorgfältig zu beachten und zu untersuchen. Die verschiedenen Formen der Myelitiden, der Spinalmeningitis, die progressive graue Degeneration (Tabes dorsualis) entbehren fast jeder Bearbeitung in geographisch-ethnologischer Beziehung. In dies Capitel gehören auch Untersuchungen über die Hypnosie der Neger.

Die Pharmacologie und Toxicologie endlich erwarten von den reisenden Forschern, namentlich den Botanikern und Zoologen, immer neue Aufschlüsse und neue Thatsachen. Die Erforschung des Inneren grosser Continente und Inseln, die noch von rohen und uncivilisirten Eingeborenen bewohnt sind, hat diesen Zweigen der Wissenschaft schon reiche Ausbeute gewährt. Ich erinnere nur an die Anthelmintica, an Calabar, Eucalyptus, das Tootgift Neuseelands, die vielen nationalen Narcotica u. A. Die Nachforschungen nach Antitypiceis sind nicht minder zu erneuern. Auch die animalischen Gifte und die durch sie erzeugten Leiden (Anthrax, Malliosis, Lyssa etc.) sind überall zu beachten. Die neueren Untersuchungen über Schlangenbiss-erkrankungen, wonach aus zelligen Gebilden des Inhaltes des Giftsackes, sobald sie in den Kreislauf des Warmblüters gelangen, zahllose Abkömmlinge entstehen und den Zerstörungsprocess des Blutes bedingen sollen, sind womöglich experimentell zu untersuchen. Zu empfehlen ist es, dass die betreffenden Thiere oder doch ihre Köpfe, womöglich in Paraffin eingeschmolzen, conservirt mitgebracht werden. Paraffin conservirt solche Objecte so vorzüglich, dass fast jede Zerstörung des feineren organischen Baues ausgeschlossen wird. Die Anwendung ist der Art, dass das betreffende Object

möglichst frisch zunächst in ein Bad von flüssigem Paraffin von 120° C. für einige Secunden eingetaucht, dann schnell abgekühlt und mit dem noch daran haftenden Reste von Paraffin in ein Glas oder eine Blechbüchse eingesenkt wird, in welchem sich eben in flüssigen Zustand übergegangenes (bei $45-50^{\circ}$ C.) Paraffin befindet. Sobald das Object hierin so lange verblieben ist, dass anhängende Luftblasen abgestreift sind, wird das Gefäss wieder schnell abgekühlt und das Object verbleibt nun bis zur näheren Untersuchung in diesem Einschlusse, gegen alle Fäulniss- und Schimmelprocesse geschützt. Hieran schliesse ich noch 2 Vorschriften zur Conservirung gröberer und feinerer anatomischer Präparate:

I. Van Vetter's Verfahren, anatomische Präparate in natürlicher Farbe und Geschmeidigkeit zu erhalten. 7 Theile Glycerin, 1 Theil natürlicher brauner Zucker und $\frac{1}{2}$ Theil Salpeter werden gemischt. In diese Mischung, in der ein leichter Bodensatz sich bildet, legt man die schon fertig präparirten oder noch zu präparirenden Theile und lässt sie nach ihrer Grösse verschieden lange darin, z. B. eine Hand 8 Tage. Herausgenommen sind die Theile steif, werden aber, an einem trockenen und warmen Orte aufgehängt, ganz weich und geschmeidig. Wenn sie lange genug gehangen haben, um alles überschüssige Glycerin abdunsten zu lassen, firnisst man das Präparat und wiederholt dies, wenn sich irgend wo Schimmelbildung zeigt. Trocken und warm aufbewahrt, bleiben sie weich, behalten ihre natürliche Farbe und können Jahre lang aufbewahrt werden. Welchen Vortheil das Verfahren für chirurgische Präparate namentlich hat (Madurafuss, Ainhumfuss!!) ist leicht ersichtlich.

II. Farront's Gummiglycerinmischungen für histologische etc. Präparate. Es sind 2 Mischungen, eine flüssig bleibende und eine erstarrende. Die erste wird folgendermaassen bereitet: 3 Gran Acid. arsenicos. in 2 Unz. Aq. dest. gekocht und kalt durch Papier filtrirt. Gleiche Gewichtstheile dieser Lösung, von reinem Glycerin und reinem Gummi arab. gemischt und ohne Anwendung von Hitze zur Lösung gebracht, wozu wohl 14 Tage nöthig sind. Schütteln ist zu vermeiden, um Luftbeimengung zu verhüten. Trübe, flockige Lösung ist durch Filtriren durch ein gut ausgespültes Colaturtuch zu reinigen.

Die zweite Lösung besteht aus gut ausgelesenem reinem arabischem Gummi und destillirtem Wasser, ca. 2 Gew.-Theile, 1 Gew.-Theil Glycerin. Beide wie oben angegeben gemischt und zur langsamen Lösung gebracht. In die verkorkte Flasche thut man dann noch einige Stückchen Campher und wartet, bis eine möglichst gleichmässige Vertheilung eingetreten ist. Dies Gummiglycerin erhärtet nach einigen Tagen in dünnen Lagen vollständig zu einem Firniss. Tinctions- und Injectionspräparate (mit gelbem Anilin und Carmin) halten sich darin vollkommen. Rosanilintinctionen dagegen verschwinden nach einiger Zeit.

Bei weitem die meisten medicinischen Beobachtungen müssen entweder selbst statistisch bearbeitet sein oder doch so angelegt werden, dass sie einer solchen Bearbeitung späterhin fähig sind. Nun wird es allerdings so manchem Reisenden gar nicht möglich sein, statistische Erhebungen zu machen, oder er wird wegen zu geringen Beobachtungsmaterials nicht geneigt sein, dasselbe statistisch zu verwerthen. Wer sich im ersteren Falle befindet, der kann trotzdem der medicinisch-statistischen Forschung noch immer grosse Dienste leisten. Angenommen ein Missionar, ein Consul, ein Maler, ein Jagdfreund etc. befinde sich auf spärlich erforschtem Gebiet oder in einer Region, deren geistiger Verkehr nach aussen hin sich in ganz anderen Rich-

tungen oder erst in ganz geringem Maasse ausgebildet, beziehentlich entwickelt habe, auf welchem zwar Einrichtungen für Gesundheits- und Krankenpflege existirten, z. B. Missionshospitäler oder dergl., so wird er der übrigen medicinischen Welt immerhin einen dankenswerthen Dienst erweisen, wenn er die von solchen Instituten gemeiniglich nur zum Gebrauch für ihre Gönner und Erhalter bestimmten und gedruckten Circulare, Jahresrapporte etc. sammelt und Sachverständigen zur Benutzung überliefert. Dieselben dringen eben zu selten über ihre Ursprungsstätten hinaus und bieten doch sehr viel Interessantes. Wer selbst beobachten will und statistische Bausteine herantragen möchte, der muss natürlich zunächst auch selbst Arzt resp. mit genügenden ärztlichen Kenntnissen ausgerüstet sein. Die brauchbarsten Notizen werden von diesen Beobachtern aber nicht in Form grosser vielspaltiger Tabellen, sondern in Form der Zählkarten geliefert werden müssen. Was eine Zählkarte für solchen Zweck ausser dem vollständigen Nationale des Individuums enthalten sollte, dafür bieten sich, soweit es im Grossen und Ganzen die Infections-(zymotischen) Krankheiten angeht, oben schon unter den der Cholera gewidmeten Zeilen genügende Anhaltspunkte. Wer in der Lage ist, lange Zeit an einem Orte die ärztliche Kunst auszuüben, wird diese Zählkarten sich mit Bequemlichkeit dort selber anfertigen lassen können und dieselben auch noch als kurze Krankenjournalen benutzen können. Jedoch wird er mit dieser Arbeit besser so lange warten, bis er sich über die Gesichtspunkte, von welchen aus die Zählkarten einzurichten sind, durch hinlängliche Bekanntschaft mit den localen Eigenthümlichkeiten und Sitten etc. orientirt hat. Wer mit der bestimmten Absicht, irgend eine Krankheit an Ort und Stelle zu studiren, auf die Reise geht, der wird sich allerdings schon zu Hause gehörig darauf vorbereiten und event. Zählkarten vorher anlegen. Wer in die Lage kommen sollte, in amtlicher Stellung von der Gesundheits- resp. Krankheitsstatistik ganzer politischer oder ethnologischer Bezirke Notiz nehmen zu müssen (etwa als Communal- oder Colonial-, Provinzial- etc. Gesundheitsbeamter), der wird sich am besten an die Beschlüsse und Vorschläge halten, welche die statistischen Congresse der letzten Jahrzehnte für die Medicinalstatistik aufgestellt haben. Beachtenswerth sind daher z. B. die Vorschläge, welche der Registrar-General Dr. Farr in grossen Zügen gegeben hat: 1) Der Gesundheitszustand der Nationen und Districte ist je besonders darzustellen. Die Sterblichkeit ist in pro mill's über Reihen von Jahren zu bestimmen. 2) Mortalität, Durchschnittslebensdauer, Todesursachen sind für die ganze Bevölkerung, für die gesunden und ungesunden Districte und für die grossen Städte besonders nachzuweisen. 3) Die Zahl der an den hauptsächlichsten Krankheiten Leidenden, sowie derjenigen Leiden, welche zu den gewöhnlichen Beschäftigungen unfähig machen, ist zu ermitteln. 4) Die Hospitalstatistik sollte folgende Data erkennen lassen: a) Krankenbestand am 1. Tage jedes Jahres; b) Zahl der im Jahre aufgenommenen Kranken nebst Angabe des Ortes, woher sie eingeliefert. Stand, Alter, Familie etc. möglichst genau; c) Zahl der Geheilten, Gebesserten, als unheilbar oder auf Verlangen oder aus anderen Gründen Entlassenen, sowie der Verstorbenen; d) mittlere Dauer jedes einzelnen Krankheitsfalles nach Tagen, sowie die Kosten für jeden Kranken; Tag des Beginnes der Krankheit und der Aufnahme in das Hospital; e) Häufigkeit, Behandlungsdauer und Lethalität der einzelnen Krankheiten nach Alter und Geschlecht; f) Zahl und Resultate der Behandlung einzelner Krankheiten nach Alter und Geschlecht und je nach der Behandlungsweise; g) Verhältniss der Heilungen für jedes Alter, Geschlecht und jede Krankheit; h) Angabe der im Kranken-

hause selbst erworbenen Krankheiten, sowohl bei den Patienten als dem Heil-, Pflege- etc. Personal, sowie der Verlegungen von Patienten von einer Station auf eine andere (von einer inneren auf eine äussere und umgekehrt); i) Angabe der noch disponiblen Betten, sowie der zu gelegentlichen Evacuationen lange belegter Säle disponiblen Räume, und wie oft und wie lange solche Evacuationen im Jahre stattfanden, sowie der danach beobachteten Heilresultate. 5) Die Krankenpflegevereine zu gegenseitiger Unterstützung, die Gewerksassen etc. als ein vorzügliches, von genauen Grundlagen ausgehendes Substrat, sind der statistischen Untersuchung besonders zu empfehlen. 6) Grösse, Gewicht, Muskelkraft, Arbeitskraft, Athemgrösse als Gradmesser der Gesundheit sind von grösseren Gruppen der Bevölkerung nach bestimmten Altersklassen in regelmässigen Intervallen zu prüfen. 7) Ferner ist zu erforschen, welchen Einfluss auf die Gesundheit Boden, Klima, Luft, Dichtigkeit der Wohnstätten und der Einwohner, Nahrung, geistige und körperliche Thätigkeit, Höhenlage, Art der Häuserconstruction, Latrinen u. A. ausüben. 8) Der Einfluss, welchen die Beschäftigung und die Gewerbe etc. auf eine Bevölkerung ausüben, ist zu untersuchen. Die Gewerbekrankheiten nehmen in neuerer Zeit immer mehr das Interesse der Wissenschaft wie des Staates in Anspruch. Bezügliche statistische Aufnahmen sind daher namentlich für die Gewinnung klarer ätiologischer Anschauungen und der darauf zu begründenden etwaigen staatlichen Beihilfen sehr erwünscht. 9) In grösseren Städten sind wöchentliche, in anderen Districten monatliche oder vierteljährliche Nachweise über den Personenstand und die Todesursachen, nach den Altersklassen (von 5 zu 5 Jahren nach Farr) geordnet, anzulegen und mit populär-hygienischen Erläuterungen versehen zu veröffentlichen.

Diese Vorschläge sind gewiss recht wohlgemeint und verdienen auch alle Berücksichtigung, sind aber bisher meist nur in Europa befolgt worden, und auch hier nur selten genügend in Bezug auf das weibliche Geschlecht. Die medicinisch-hygienische Statistik des Geschlechtes der Mütter der Menschheit ist von ihren Söhnen in der That arg vernachlässigt worden. Wer diesem Zweig der Statistik zur Blüthe verhelfen will, der muss mit den Säuglingsbewahranstalten anfangen und mit den Vereinen zur Hebung der Erwerbsfähigkeit des weiblichen Geschlechtes zusammen arbeiten. Darin wird es noch Vieles zu erforschen und zu entdecken geben.

Schliesslich noch einige Hindeutungen und Anleitungen für solche statistischen Untersuchungen nach den vom internationalen statistischen Congress 1863 adoptirten Principien. Zum Messen des Gesundheits- und Krankenzustandes einer Bevölkerung muss die Statistik die einzelnen Individuen durch alle Stadien ihres Lebens bis zum Tode begleiten. Zur Abkürzung beschränke sich dies auf die Hauptlebensabschnitte und als solche sind zu bezeichnen: 1) Geburt und Säuglingsalter bis zum vollendeten 1. Lebensjahre; 2) von da ab bis zum Eintritt der Schulpflicht, also zum vollendeten 6. Lebensjahre, das zarte Kindesalter; 3) die Periode des sogenannten schulpflichtigen Lebensalters, bis zum vollendeten 14. Jahre; 4) Periode der Pubertät oder des körperlichen Reifens und Vorbereitung zum selbstständigen Erwerbe, 14—20. Lebensjahr; 5) Zwischenperiode und auch nur für einen Theil der männlichen Bevölkerung: das militärpflichtige Alter; 6) Periode der Arbeit, des Erwerbes und der Begründung des eigenen Hauswesens und der Familie, vom 20. bis 60. Jahre; 7) Periode der Invalidität, durchschnittlich vom 60. Lebensjahre ab bis zum Tode; 8) endlich der Tod selbst. Für jede der genannten Lebensperioden mögen die denselben adaptirten öffentlichen und privaten Anstalten regelmässige, möglichst

genaue und vollständige Beobachtungen übernehmen und solche veröffentlichen. Die Schulen sollten alljährlich Nachweise über die Erkrankungen und Todesfälle ihrer Schüler, eine Situationsskizze ihrer Schulräume nebst Beschreibung nach Lage, Grösse, Ventilation, Heizung, Erleuchtung etc. einreichen und derselben Zahlenangaben über Lehrer, Schüler, tägliche Unterrichtsstunden, Turnstunden, andere körperliche Erholungs- und Uebungsstunden, Ferien etc. hinzufügen. Viel werthvolle Angaben könnten die Lebensversicherungsanstalten machen und würde es möglich sein, dass die Aerzte aller gebildeten Nationen sich dazu entschliessen, für jeden ihrer Patienten ein nach einem übereinstimmend adoptirten Schema angelegtes Gesundheits- und Krankheitsbüchelchen anzulegen (etwa wie der Militärpass oder das Soldbuch des deutschen Soldaten), und dass sie dort hinein alle den Gesundheitszustand ihres Patienten betreffenden Beobachtungen kurz und bündig eintrügen, die Therapie nur durch Eintragung der Haupt- und Kernmittel ihrer Recipes andeuteten, so würden sie sich selber, ihren Kranken und der Wissenschaft einen grossen Dienst erweisen. Wie der Soldat durch solches Büchelchen einer anderen Behörde überwiesen wird, so überweise der erste Arzt der Kindheit seinen jungen Clienten damit z. B. dem Arzte der Erziehungsanstalt, diese dem aushebenden Militärarzte u. s. f. jedes Lebensalters ärztlicher Patron dem des nachfolgenden ein möglichst medicinisch genau beleumundetes Individuum und der Arzt, der den Todtenschein für dasselbe endlich ausstellt, nimmt das Curriculum vitae medicum an sich und bearbeitet aus der Gesamtheit derselben eine gewiss interessante und genaue Statistik. Dem ähnliche Einrichtungen bestehen jetzt ihre Probe in der Armee, und es hängt vielleicht nur von einem demnächstigen internationalen statistischen Congresse ab, dies System auch weiterhin in der Civilbevölkerung nutzbar zu machen.

Besondere Hinweise für Forschungen auf dem Gebiet der Hygiene zu geben enthalte ich mich, da sie hinlänglich unter dem schon Gegebenen enthalten sind.

Literatur.

- Für die physiologischen Abschnitte im Allgemeinen die Handbücher von Ranke, Herrmann, Valentin, Funke, Hoppe-Seyler.
- Für den Sphygmographen: Marey, Journ. d. l. Physiol. 1860 p. 241., Mach, Duchek: Wiener Zeitschrift 1862, auch Bayer's Bericht, Schmidt's Jahrb. Vol. 142. p. 90 u. 281.
- Ueber Wärme: Weickart, Archiv d. Heilk. 1863. Walther, Virch. Arch. 1862. Renzi, Gaz. hebdom. 1865. Ogle, St. Georges Hosp. Rep. 1866. Schm. Jahrb. Vol. 138.
- Ueber Höheneinfluss: Glaisher, Lancet, Nov. 1862.
- Ueber Harn: Die Artikel von Huppert in Schmidt's Jahrb. Vol. 120, 1., 2. u. 3. Heft, Vol. 125, 1., 2. u. 3. Heft, Vol. 126.
- Alcohol und die Ernährung: Perrin, Gaz. hebdom. 1864.
- Zur medicinischen Zahlenlehre: Marx, Göttingen 1863: Beurtheilung d. Werthes u. d. Bedeutung d. m. Z.
- Zur Blutlehre: Huppert, Bericht in Schm. Jahrb. Vol. 122, Heft 1 u. 2.
- Nationale Genussmittel: Frömmüller, Prag. Viertelj.-S. 1863 über Coca, Cath.
- Gewichtsbestimmungen vom menschl. Cadaver: Bischoff: Zeitschr. f. rat. Medic. 1863 (auch für vergleichende Ethnologie).
- Zur Verdauung und Assimilation: Huppert, Bericht in Schm. Jahrb. Vol. 123.
- Muskelkraft: Henke, Zeitschr. f. rat. Medic. 1865. Huppert, Bericht in Schm. Jahrb. 1867 Vol. 135.
- Schlangengift: Halford, brit. med. Journ. 1867, auch Schm. Jahrb. Vol. 139 p. 27.

Ruhe und Arbeit: Verhältniss d. Ausscheidung dabei; Parkes, Proceed. of Royal Society; Auszug in Schm. Jahrb. Vol. 137, p. 5.

Für die pathologischen Beobachtungen ist unerlässlich „Hirsch, Handbuch d. historisch-geographischen Pathologie“*). Für statistische Beobachtungen: Oesterlen, Handbuch der medicinischen Statistik. Mühry's Schriften: „Die geographischen Verhältnisse der Krankheiten“ (1856) und „Klimatologische Untersuchungen“ sind wegen ihrer reichhaltigen Bibliographie in Auszügen zu empfehlen, sonst aber nicht ohne Vorsicht zu benutzen. Für Hygiene sind das Werk von Oesterlen: „Handbuch der Hygiene“, Kirchner's „Militär-Hygiene“, Roth und Lex gleichartiges Werk zu nennen. Für die Schiffsärzte will ich schliesslich meine Schrift: „Die Krankheiten in der Marine, geographisch und statistisch dargestellt etc. Berlin 1866“ in Erinnerung bringen.

---

*) Für vorstehenden Artikel vielfach benutzt.

Allgemeine Rückblicke auf die Erforschungsgebiete der Continente und Erklärung der gebräuchlichsten Ausdrücke in der physikalischen Geographie.

Von

W. Koner.

Es kann nicht in unserer Absicht liegen, in den beschränkten Rahmen, welcher uns zur Erörterung geographischer Fragen zugemessen ist, ein Bild dessen, was man von der Erde weiss, hineinzuzwängen. Was man von unserm Globus kennt, bis zu welchen Punkten des Innern unserer Continente und der die Pole umgebenden Meere und starren Eisregionen menschlicher Forschungsgeist bis jetzt vorgedrungen ist, darüber giebt jedes geographische Lehr- und Handbuch, welches den Entdeckungen der Neuzeit und somit den Fortschritten geographischen Wissens Rechnung trägt, genügende Auskunft, und jeder Reisende, der mit Nutzen reisen will, der die ihn umgebende Aussenwelt richtig zu erfassen bestrebt ist, wird sich vor dem Beginn seiner Reise mit dem Studium eines solchen Buches zu befassen, ja vielleicht das eine oder andere als Vademecum mit sich zu führen, und besonders sich mit der geographischen Literatur desjenigen Landes, nach welchem er seine Schritte zu lenken gedenkt, vertraut zu machen haben. Ebenso wenig liegt es in unserer Absicht, die Blicke auf alle jene Gebiete zu lenken, welche bis jetzt noch der geographischen und naturwissenschaftlichen Durchforschung harren. Und dennoch wäre es interessant, ein so zu sagen negatives Bild unsers geographischen Wissens, ein kartographisches Bild derjenigen Theile unseres Globus, welche bis jetzt noch als *terrae incognitae* oder als ungenügend durchforschte Gebiete sich erweisen, etwa derartig herzustellen, dass das noch Unbekannte oder mangelhaft Erforschte durch einen weissen, respective hellgelben, das Bekannte mit einem dunklen Farbenton bedeckt würde. Erkennen würden wir aus einem solchen Bilde, welche Fortschritte die geographische Wissenschaft seit jenen Zeiten, wo der Gesichtskreis der Völker der alten Welt nicht über die vom Okeanos umströmte Erdscheibe hinausreichte, bis zu Erkenntniss der Kugelgestalt unsers Erdballes, bis zur Entdeckung neuer Continente, bis zur richtigen Darstellung der Vertheilung des Festen und Flüssigen auf unserm Globus gemacht hat. Gleichzeitig würde aber ein solches Bild uns lehren, welche Zeit unermüdllichen Strebens und Forschens dazu gehört hat, welche Summe geistiger Kräfte dazu erforderlich gewesen ist, um die Kenntniss unsers Erdballes bis

zu dem Standpunkte zu fördern, auf welchem wir bis jetzt angelangt sind, und welche gewaltige Aufgabe noch der Zukunft überlassen bleibt, um das Gesamtbild unsers Erdkörpers genügend herzustellen.

Blicken wir zunächst auf Asien, die Wiege des Menschengeschlechts. Welche gewaltigen Länderstrecken harren in diesem nächst Europa reichstgegliederten Continente noch der Durchforschung. Von den Ufern des Euphrat und Tigris bis zu den Gestaden des Mittelmeeres, wo zahllose Ruinen alter Culturstätten ein redendes Zeugniß von dem einstmals blühenden Zustande dieser Gegenden geben, in Kleinasien, in Syrien, selbst in dem von Tausenden durchpilgerten heiligen Lande, überall eröffnet sich hier, verhältnissmässig so nah der eignen Heimath, dem Reisenden, der abseits von den so oft betretenen Verkehrsstrassen in noch wenig bekannte Gegenden seine Schritte lenkt, ein überraschend reiches Feld für seine Thätigkeit. Fest verschlossen liegt die arabische Halbinsel vor uns, wo der von den heiligen Stätten des Islam aus genährte Fanatismus dem Ungläubigen den Eintritt nur auf einigen Küstenstrichen gestattet hat, wo noch Keiner den das Innere bedeckenden geheimnissvollen Schleier zu lüften gewagt hat. Mesopotamien ist erst in neuester Zeit, wo englische und französische, durch reiche Mittel geförderte Ausgrabungen die Wunder seiner alten Bauwerke wiederum ans Tageslicht gezogen haben und durch ein bis dahin ungeahntes inschriftliches Material die Urgeschichte dieses Landes reconstruirt werden konnte, zum Schauplatz der Forschung geworden. Und ostwärts, wo das iranische Gebirgsland beginnt, bis zu dem von wilden Stämmen bewohnten Afghanistan und Balutschistan liegen, mit Ausnahme der an das Caspische Meer grenzenden Provinzen und der Umgebungen der Hauptstädte des persischen Reiches, die erforschten Punkte nur oasenartig zwischen den weiten Strecken der noch völlig unbekannten oder nur ungenügend durchforschten Gebiete. Anders auf der vorderindischen Halbinsel, auf deren Küsten europäische Cultur festen Fuss gefasst und dem Lauf der Flussthäler folgend auf die Hochländer ihre Wanderung begonnen hat, wo Eisenbahn- und Telegraphenlinien bereits die fernsten Punkte mit einander verbunden haben und genaue Landesvermessungen und Aufnahmen von der Südspitze der Halbinsel bis zu der Grenzmauer des Himalaja das Land mehr und mehr bekannt werden lassen. Welche ethnographischen Probleme sind hier aber noch unter dem bunten Gemisch von Völkerracen, welche das Innere von Dekan, die Thäler des Ganges und Indus, die Abhänge des Himalaja bewohnen, zu lösen, welche grosse Aufgaben treten hier, trotz der grossen Vorarbeiten der Engländer, dem Geographen und Ethnographen entgegen! Und um wie viel schwieriger wird die Lösung dieser ethnographischen Aufgaben in dem noch so wenig bekannten Hinterindien. Langsam beginnt hier von den Küsten her, wo Engländer und Franzosen an den Mündungen der mächtigen Stromstrassen festen Fuss gefasst haben, die Erkundigung längs dieser Ströme von Süden nach Norden, von der bekannten Küste nach dem noch völlig unbekannten Innern hinaufzusteigen. Aber die epochemachenden Leistungen kühner Reisenden beider Nationen, welche zur Erkundigung von Handelswegen nach China's südlichen Provinzen die gefahrvolle Reise unternahmen, vermochten sich bis jetzt nicht über den schmalen Streifen der von ihnen durchwanderten Gebiete auszudehnen; mehr als drei Viertel der siamesisch-anamitischen Halbinsel, ebenso wie Malacca, mit Ausnahme der wenigen von den Engländern besetzten Punkte, müssen noch als völlig unbekanntes Gebiet betrachtet werden. Um vieles bedeutendere Erfolge hat aber die geographische Wissenschaft in der Neuzeit in China errungen, seitdem der diesem Reiche auf-

gedrungene Verkehr mit dem Auslande und innere politische Kämpfe die Abgeschlossenheit China's unhaltbar gemacht haben. Im Dienste des Handels und der Industrie hat die Forschung sich über die tractatmässig geöffneten Handelsplätze hinausgewagt, der Hinblick auf den eigenen Vortheil beginnt das Misstrauen der Bewohner gegen die Fremden zu besiegen, und trotz aller Reactionsversuche wird es mehr und mehr gelingen, der friedlichen Forschung von Osten her Eingang zu verschaffen. Anders im Norden und Westen China's, wo Russlands kriegerisches Vorgehen bereits die alten Reichsgrenzen durchbrochen hat, oder zu durchbrechen droht und mit der Eroberung neuer Provinzen auch der wissenschaftlichen Forschung neue Provinzen zu schaffen beginnt. Als Pfadfinder eilten die Geographen den Armeen voran, die Geographie bahnte den Heeren den Weg in die noch unbekannten Gegenden Turän's, und nachdem die in Despotismus und religiösem Fanatismus versumpften Chanate der Uebermacht der russischen Waffen erlegen waren, konnten der Geograph und Naturforscher auf dem neu gewonnenen Terrain unter sicherem Schutze ihre Thätigkeit in ausgedehnterem Maasse beginnen. Mehr und mehr hat seitdem die bis dahin nur der Hypothese unterworfenene Configuration Centralasiens eine gesicherte Grundlage erhalten, aber noch vieler Decennien bedarf es, noch vieler blutigen Kämpfe, um die fast 30 Breitengrade umfassende Forschungszone ostwärts bis zur chinesischen Mauer und südwärts bis zum Anschluss an die englischen Vermessungsarbeiten in Indien auszudehnen. — Ueber Japan ist mit dem Augenblick, wo es aus seiner Abgeschlossenheit herausgetreten ist, eine neue Aera für die wissenschaftliche Forschung hereingebrochen. Handel und Industrie haben ihr Augenmerk auf die Hebung der noch verborgenen Naturschätze gerichtet und dem Geographen und Naturforscher ein neues Feld eröffnet. Auf den Inseln des indischen Archipels endlich beschränkt sich die wissenschaftliche Forschung mit wenigen Ausnahmen nur auf die den Holländern unterworfenen Gebietstheile, während das Innere der grossen Inseln, wie Sumatra, Borneo, Celebes, noch weite Strecken gänzlich unbekannter Gegenden birgt, viele kleineren Inseln und Inselgruppen aber nur in ihren äusseren Contouren bekannt geworden sind.

Afrika, der in neuerer Zeit von der Forschung so vielfach umfreite Continent, beginnt mehr und mehr den mysteriösen Charakter, welcher seit Jahrtausenden sein Inneres verhüllte, zu verlieren. Colonien europäischer Nationen haben hier sich weiter Küstenstriche bemächtigt, Factorien sind an den Mündungen der Flüsse und an sonst geeigneten Küstenpunkten, wo Aussicht auf Handelsverbindungen mit dem Inneren sich eröffneten, entstanden, und die Staaten des Islams und viele Negerreiche, welche von der Küste die Scheingrenzen ihres Gebietes bis weit in das Innere ausdehnen, beginnen, die einen der Civilisation gehorchend, die andern der Waffengewalt der Europäer weichend, der friedlichen Forschung weniger feindlich entgegenzutreten; die Unterbindung der Lebensader des Sklavenhandels wird den Eingebornen mehr und mehr auf den friedlichen Verkehr mit dem Weissen hinweisen. Werfen wir aber einen Blick auf die Karte, auf der die von den Europäern und den islamitischen Reichen besetzten Küstenlinien farbig angedeutet sind, so finden wir fast überall ihre Grenzen nach dem Innern zu, weil meistens unbekannt, offen gelassen: in der Nordhälfte, wo Sahel, Sahara und die libysche Wüste die ungewisse Südgrenze bilden, auf der Südhälfte, wo ein im ersten Stadium der Entdeckung sich befindendes mächtiges Plateau mit seinen Seeregionen von der östlichen Abfallsstufe zum indischen Ocean bis zur Westterrasse an den Gestaden des atlantischen Oceans sich

ausbreitet. Und zwischen jenen beiden Plateaus des Nordens und Südens erblicken wir jene von O. nach W. diesen Continent durchschneidende Depression, die stark bevölkerten Sudanstaaten. Wohl sehen wir auf diese Centren seit uralten Zeiten die Karavanenstrassen gerichtet, wohl lehrt uns die Geschichte der Entdeckungen, wie es einzelnen kühnen Reisenden gelungen ist, sich den Weg zu diesen dem vorigen Jahrhundert noch völlig unbekannten Ländergebieten zu erzwingen und die Lücke unsers geographischen Wissens durch die Entdeckung und Erforschung derselben auszufüllen. Mehr und mehr haben sich die bisher weissgelassenen Flächen auf den Karten Afrika's mit Namen von Völkerschaften, von bewohnten Orten, von Bergen und Wasserläufen belebt, die grossen Probleme der noch räthselhaften Fluss- und Wasserscheiden rücken durch den rastlosen Eifer der Forscher ihrer Lösung näher und näher, aber die endgültige Lösung dieser wichtigen Fragen liegt noch in weiter Ferne. Der Tod eines Reisenden, der Verlust seiner schriftlichen Aufzeichnungen zerstört oft auf Jahre hinaus die für die Wissenschaft erhofften Erfolge, die Unmöglichkeit, auf dem eingeschlagenen Wege weiter vordringen zu können, schreckt nur zu häufig von nachfolgenden Versuchen in derselben Richtung zurück. Und dennoch müssen wir hier, wo ein Massenvordringen europäischer Civilisation ein nur sehr langsame ist, wo an vielen Punkten ein solches vielleicht nie stattfinden wird, auf die Einzelforschung unsere ganze Hoffnung setzen. Gerade in diesem Erdtheil, wo die Handelsbeziehungen weniger als in Asien und Amerika die Eröffnung der Binnenländer nothwendig machen, wo nutzbare Wasserstrassen weniger als in anderen Continenten das Innere mit der Küste verbinden und die Anlage geregelter grosser Verkehrsstrassen nach europäischen Begriffen durch die Natur des Landes meistens auf unüberwindliche Hindernisse stösst, hat die Begeisterung für die Forschung die grössten Triumphe gefeiert, sie hat die Gefahren, welche Klima und feindliche Begegnung mit den durch den Sklavenhandel demoralisirten Völkerschaften dem Reisenden entgegensetzen, siegreich überwunden und etwa zwei Drittheile dieses Continentes der Geographie, aber auch diese nur in grossen Umrissen eröffnet, während geographische, sowie naturwissenschaftliche Specialuntersuchungen erst hier und da begonnen haben.

In Amerika, wo durch den Contact mit der europäischen Civilisation die Eingebornen mehr und mehr der Vernichtung anheimgefallen sind und durch Staatenbildungen der germanischen und romanischen Race in wenigen Jahrhunderten dieser Continent eine vollständig veränderte ethnographische Physiognomie gewonnen hat, wo in vielleicht nicht allzuferner Zeit, in Nordamerika wenigstens, die Reste der Urbevölkerung nur noch durch wenige Individuen vertreten sein werden, sind eben durch das unaufhaltsame Vordringen der Europäer die Vorbedingungen zu einer geographischen Forschung mehr als anderswo zur Geltung gekommen. Krystallinisch setzen sich in Nordamerika an die noch vor einem Jahrhundert auf wenige Districte beschränkten Staaten der anglogermanischen Race neue an; immer weiter in die unbekannten Wildnisse des Far West dringen die Pioniere der Civilisation, ihren Pfaden folgen Schaaren von Ansiedlern, welche die alte Welt hinübergesandt hat; die Anlage neuer Ansiedlungen, die Vereinigung derselben zu grösseren Verbänden bedingt ihre staatliche Consolidirung und ihren Anschluss an die grosse Vereinigung der alten Freistaaten. So fluthete die unaufhaltsame Woge der Einwanderung von Ocean zu Ocean, so führte diese Massenbewegung innerhalb eines Zeitraumes von 70 Jahren zur Entdeckung und Erforschung eines Erdgürtels von etwa 50 Breiten-

graden, eine Erscheinung, wie eine ähnliche sich in der Geschichte nicht wiederholt hat. Doch wie grosse Strecken dieses mächtigen Erdgürtels harren noch der Durchforschung! Immer neue zu Ansiedlungen geeignete Gegenden werden aufgesucht und entdeckt, neue Hülfquellen dem Boden entlockt, die bis dahin ungeahnte Schönheit einer grossartigen Gebirgswelt mit ihren Naturwundern zugänglich gemacht, und durch Anlage mächtiger Eisenbahnnetze auch die fernsten Punkte der geographischen Forschung und gleichzeitig dem Verkehr erschlossen. Gleiche Bedingungen walten im Britischen Nordamerika; auch hier erheischt die Einwanderung eine Erweiterung des Forschungsgebietes nach W. zu, über welches wir bis vor kurzer Zeit nur spärliche Kunde aus dem Munde der Trapper besassen, die jene Gegenden auf ihren Jagdzügen zu durchstreifen pflegten. In Mexico, in den centralamerikanischen Staaten und in Südamerika hingegen, wo eine romanische Bevölkerung schon vor Jahrhunderten staatenbildend auftrat, haben die Indolenz dieser Race sowie die klimatischen Verhältnisse das Entdeckungswerk bisher nur wenig gefördert. Hier verbleibt der Forschung ein noch endloses Terrain; sie beginnt die grossen Wasseradern, das weit in das Land hineingreifende Stromnetz bis zu seinen Quellen hinaufzusteigen, sie sucht im Interesse des Handels und Verkehrs nach geeigneten Uebergangspunkten über die hohen Grenzwälle, welche die beiden Oceane von einander trennen, nach der Möglichkeit von Verbindungen der von jenen Gebirgen nach Osten und Westen herabströmenden Gewässer, sie dringt ein in die Urwälder, sie bahnt sich den Weg zu den unter dicht wuchernder Vegetation verborgenen Ruinenstätten, den grossartigen Zeugen uralten Culturlebens, sie entdeckt in den noch von keiner Axt berührten Urwäldern neue Schätze der Fauna und Flora, sie eröffnet von Neuem die Metalladern, deren Reichthum einst die Habsucht der Conquistadoren reizte, kurz, dem Geographen, Naturforscher und Archaeologen eröffnet sich hier auf unendlich weiten Strecken ein noch gänzlich unberührtes Feld für eine erfolgreiche Thätigkeit.

In Australien, dem jüngsten der entdeckten Continente, hat sich mit einer nur den nordamerikanischen Verhältnissen vergleichbaren Schnelligkeit eine Staatenbildung vollzogen. Je weiter hier der Küstensaum sich mit Colonien bedeckt, je weiter diese sich binnenwärts auszudehnen beginnen, um so mehr der Angriffspunkte auf das noch unbekannte Innere, um so enger zieht sich der Kreis des Erforschten um das noch unerforschte Centrum. Nicht die wasserlosen Einöden mit all' ihren Schrecknissen, nicht die Kunde von missglückten Versuchen in das Innere einzudringen, schrecken den Forscher zurück; die erwiesene Möglichkeit einer Durchschneidung des Continents hat stets zu neuer Thätigkeit angespornt. Auch hier ist das Forschungsgebiet innerhalb der bereits cultivirten Districte ein noch unendlich grosses, ja es erweitert sich von Jahr zu Jahr mehr, seitdem man die mineralischen Bodenschätze kennen gelernt hat. Selbst die negativen Resultate vieler Reisen, vereitelte Hoffnungen auf Auffindung neuer Besiedelungspunkte, neuer Weideplätze, neuer Verbindungsstrassen der besiedelten Küsten mit einander haben dem geographischen Wissen stets neue Bereicherung gebracht.

Werfen wir schliesslich noch einen Blick auf die Nordpolargegenden. Hier, wo starre Eisbarrieren nur unter besonders günstigen Verhältnissen ein Vordringen gestatten, hat die wissenschaftliche Forschung ein reiches Arbeitsfeld gefunden. Jeder Schritt vorwärts in dem heute erschlossenen, morgen und vielleicht für lange Zeit verschlossenen Gebiet ist mit seinen Erfolgen oder seinen negativen Resultaten genau in den Annalen der Geographie verzeichnet, und so wird es endlich gelingen, aus der Summe der

Erfahrungen der Lösung der sich noch kreuzenden Hypothesen über die Configuration eines polaren Festlandes, über ein eisfreies Meer im hohen Norden, über die Strömungsverhältnisse, über die Möglichkeit einer Wasser-Verbindung im Norden der grossen Continente unsers Globus näher zu treten.

Selbst unser eigener Erdtheil, der am gründlichsten durchforschte, in dem von zahllosen Centren der Wissenschaft aus die Lichtstrahlen nach und nach die verborgensten Punkte zu erhellen beginnen, bleibt noch viel zu thun übrig. Hier, wo innerhalb einer civilisirten Welt das Natur- und Völkerleben in weniger fremdartigen Erscheinungen dem Reisenden entgegentritt, mag derjenige, der mit Nutzen in fremden Erdtheilen beobachten will, seine Vorstudien beginnen, hier mag er lernen, wie von Forschern selbst die scheinbar unbedeutendsten Seiten des Naturlebens zum Nutzen der Wissenschaft ausgebeutet werden, hier, wo fast jede Stadt geistige Anregung zu freier Forschung bietet, mag jeder in der ihm zusagenden Sphäre beobachten und sammeln lernen.

Wir haben in diesem kurzen Umriss auf die grosse Aufgabe aufmerksam gemacht, welche die geographische Forschung noch zu erfüllen hat. Die Ausdehnung des negativen Bildes der Kenntniss unsers Globus, das noch der Ausfüllung harrt, ist riesengross, und jeder Reisende, der in sich das Bedürfniss trägt, schon Erforschtes mit Nutzen zu beobachten und in noch nicht erforschten Gebieten selbstforschend aufzutreten, mag sein Theil dazu beitragen, nutzbare Bausteine zu sammeln zu dem grossen Bau, zu dessen Vollendung der Mensch berufen ist. — Wie auf meteorologischem, hydrographischem und naturwissenschaftlichem Gebiete nutzbringend zu beobachten und zu sammeln ist, dazu bieten die betreffenden Abschnitte dieses Buches eine genügende Handhabe. Uns bleibt nur noch die Aufgabe, dem Reisenden eine kurze Anleitung zur richtigen Benennung der physikalischen Erscheinungen in der Bildung unsers Festlandes, soweit dieselben nicht schon in Abschnitten über Geologie und Hydrographie behandelt sind, zu geben, wobei wir uns aber gegen jeden Vorwurf eines Mangels an Vollständigkeit von vorn herein wahren wollen. Es sollen eben hier nur die allgemein bekannten Erscheinungen, wie sie jedem Reisenden entgegengetreten, in compendiöser Form in Erinnerung gebracht werden.

Nähert man sich dem Lande von der Seeseite her, so wird zunächst die Beschaffenheit der Küste oder des Gestades unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Ersterer Name bezeichnet die Grenze des Landes von der Seeseite her, letzterer die Grenze der See in Bezug auf das Land (Nordküste Afrika's; Südgestade des Mittelmeeres); beide Ausdrücke werden aber häufig verwechselt. Zunächst hat nun der Reisende auf die Contouren der Küste seine Aufmerksamkeit zu richten, ob dieselben in sanft eingeschnittenen Biegungen, oder ob sie ausgezackt und starkkantig sich dem Auge darstellen, und welche die Ursachen sind, durch welche die Gestaltung dieser Contoure bedingt wird. Die Flachküste, als eine gleichmässige Fortsetzung der Tiefebene unter der Meeresfläche gedacht, wird sich meistens als ein der Ueberfluthung durch die Wellen ausgesetzter Strand mit geringem Böschungswinkel darstellen. Den Einwirkungen von Ebbe und Fluth unterworfen, werden durch die Gewalt des Wassers Sand- und Schlammmassen, Muschelreste und Seegewächse auf denselben geschleudert. Von den Wellen ausgeworfenes Steingeröll, vermisch mit schwererem Sandtheilen und Muschelschalen, bezeichnet, als ein oft meilenweit den Küstencontouren folgender Uferwall, die Grenzen des Strandes landeinwärts. Wird der Uferwall durch engere Verbindung des denselben bildenden losen Materials zu einem compacten

Conglomerat, so bezeichnet man denselben als „Riffstein“ oder „Uferbreccie“; Vermischung mit Eisenoxyd kann ihn in feste Felsbildung umwandeln (an der Küste Calabriens, bei Messina, auf Elba, auf mehreren westindischen Inseln). Sind die Uferwälle vom Festlande durch einen Streifen flachen Wassers getrennt, so heissen sie vorgeschobene Uferwälle (am meisten ausgebildet an der Ostküste Nordamerika's von Long Island bis Florida, namentlich in der Nähe des Cap Hatteras). — Je nach dem grösseren Steilabfall des Meeresbodens kann dieser Wall in grösserer oder geringerer Entfernung die Ufer einsäumen, bald in gerader Linie hinlaufend, bald an den Ausgängen flacher Buchten sich aufthürmend und diese allmählig in abgeschlossene Binnenbecken, Haffe oder Lagunen umwandelnd, sei es, dass diese Binnenbecken gänzlich abgeschlossen sind, oder durch eine oder mehrere Wasserrinnen mit dem Meere in Verbindung stehen. Einen solchen nicht geschlossenen, weit in die See hinausragenden und eine breite Bucht umschliessenden Uferwall bildet die Halbinsel Hela; fast geschlossen und nur durch eine schmale Durchfahrt mit dem Meere in Verbindung stehend sind das Frische und das Curische Haff, bei denen der abschliessende Wall als Nehrung bezeichnet wird. Aehnliche Erscheinungen bieten die Lagunen von Venedig, die Étangs im Departement des Hérault u. a. m. Selbst wo Flussmündungen die Uferwälle durchbrechen, setzen sich dieselben unterseeisch als Sandbänke oder Barren fort.

Mit der Flachküste eng verbunden tritt in den meisten Fällen die Dünenbildung auf: aus dem Flugsande des Strandes durch die von der See her wehenden Winde zusammengewehrte Hügelreihen, in mehreren Reihen hintereinander sich erhebend und je weiter landeinwärts, um so höher ansteigend, hier durch Thäler von einander getrennt, dort nur von unbedeutenden Einsenkungen unterbrochen und gegen das Meer hin meistentheils steiler abfallend als binnenwärts. Durch den Wind entstanden und seinen Einwirkungen fortdauernd ausgesetzt, ist, abgesehen von den Auswaschungen, welche durch den Anprall der vom Sturm gepeitschten Wogen entstehen, die Gestalt der Dünen eine veränderliche. Gewähren nun dieselben auch den dahinterliegenden angebauten Gegenden einen gewissen Schutz gegen die Ueberschwemmungen des Meeres, so wird doch in vielen Fällen ihre Wanderung landeinwärts für die fruchtbaren Landstriche verderbenbringend, eine Erscheinung, die sich mehr oder minder bei allen Dünen zeigt (an der preussischen Ostseeküste, in Frankreich zwischen den Mündungen der Gironde und des Adour, in den Landes im südwestlichen Frankreich). Durch Anlage einer die Bewegung des Flugsandes hemmenden Vegetation hat man mit mehr oder minder glücklichem Erfolge es versucht, den Wanderungen der Dünen ein Ziel zu setzen. Häufig finden sich da, wo Dünenreihen das Durchbrechen der Gewässer verhindern, hinter denselben Sümpfe und stagnierende Wasserbecken, während das Fehlen von Dünen oder eine zu geringe Höhe derselben an flachen Küsten oft eine Versumpfung des Ufers erzeugt. Durchschnittlich variirt die Höhe der Dünen zwischen 10 und 60 Fuss; sie erreichen aber in einigen Fällen eine bei weitem grössere Höhe. So trennt eine 160 Meilen lange Dünenkette von 370—550 Fuss Höhe die Sahara vom Ocean zwischen Cap Bojador und Cap Verde; Hollands Küsten, welche im Mittel 2 Fuss unter dem gewöhnlichen Meeresniveau liegen, sind von 40—50 Fuss, an einzelnen Stellen bis 185 Fuss hohen, durchschnittlich eine Stunde breiten und mit Sandrohr bepflanzten Dünenreihen geschützt, von denen die äusserste, aus losem Sande bestehend, die niedrigste, die mittlere die breiteste und höchste, die innerste die älteste ist. Da wo hier natürliche

Dünen fehlen, hat die Kunst Deiche bis zur Höhe von 45 Fuss aufgeworfen.

Von der Natur geschaffene gute Häfen, in denen Schiffe von grösserem Tiefgang und vor den Winden geschützt zu ankern vermögen, finden sich bei Flachküsten fast nirgends. Hafenanlagen an solchen Küsten, selbst da, wo Flussmündungen eine grössere Tiefe bieten, erheischen mithin die Erbauung einer oder zweier tief in das Meer hinausreichenden Molen, durch welche der aus der Meerestiefe aufgewühlte oder von den Flüssen hinausgeführte Sand seitwärts bewegt wird, sowie stetige Ausbaggerungen innerhalb derselben. Derartige Hafenanlagen zeigen die Häfen an der Ostseeküste, an Frankreichs Küsten, bei Port Said an der nördlichen Mündung des Suez-Canals, an der Sulina-Mündung der Donau u. s. w.

Als Gegensatz zur niedrigen, sanft zum Meere sich abdachenden Flachküste tritt uns die Steilküste entgegen, wo der Rand eines Plateaus, die unterste Stufe eines Gebirges oder einzelne Felspartien jäh zur Küste abfallen. Die Höhe der Fluth, die Richtung, Schnelligkeit und Gewalt der Fluthwelle, die Richtung der Stürme sind mächtige Factoren für die Contouren der Steilküste. Maassgebend ist bei diesen äusseren Einwirkungen auf das Gestein der Küste, dass Gneiss, Granit, Syenit und Basalt grösseren Widerstand zu leisten vermögen als Sandstein- und Kalksteinformationen; horizontal geschichtete Felswände einen grösseren, als schiefliegende Schichtungen. Je grösser die Zahl der Vorgebirge und Buchten, um so reicher die Zahl der Angriffspunkte durch die Wogen, und um so grösser die Möglichkeit einer Zerstörung durch dieselben, während gradlinige Strecken weniger derselben ausgesetzt sind. Wird nun der Küstensaum von einer labyrinthischen Anhäufung von Felstrümmern gebildet, sei es, dass dieselben als Reste der durch die Luft zersetzten, oder in Folge von Erosionen durch die Meereswogen herabgestürzten Massen der Steilküste sich darstellen, oder dass sie als Theile des seawärts sich fortsetzenden Fusses des Gebirges mit ihren Spitzen als Felskegel oder Klippeninseln über der Meeresfläche emporragen oder als blinde, dem Auge nicht sichtbare Klippen unter dem Meeresniveau liegen, so wird man eine solche Küste als Klippenküste bezeichnen.

Bei Steilküsten pflegen mehr oder minder weit in die See hinausragende Felsenvorsprünge und Felsencaps grössere oder kleinere Buchten und Baien zu umschliessen, die, sobald der Meeresboden von Klippen frei ist, sich in vielen Fällen trefflich zu Hafenanlagen eignen, einmal durch die zumeist grössere Tiefe des Seebodens in der Nähe des Ufers, dann durch den Schutz, den die die Bucht umschliessenden hohen Ufer gegen gewisse Windrichtungen gewähren. Klippenküsten hingegen bieten, wenn auch oft in den innersten Theilen ihrer Buchten gute, aber wegen der Gewundenheit und geringen Breite des durch die vorliegenden Klippen und Felseneilande führenden Fahrwassers für den Verkehr nur in wenigen Fällen practicable Häfen.

Wir sprachen von der Bildung der Klippenküste als durch Zersetzung der Felsenmassen entstanden. Da, wo nun eine Zersetzung des weichen Gesteins durch atmosphärische Einflüsse derartig vor sich gegangen ist, dass das Meer durch tief in die Steilküste hineinreichende Einschnitte sich einen schmalen Zugang und Weg bis in das Plateau des Landes gebahnt hat, tritt uns die Fjordbildung entgegen. Ein Gewirr von Inseln und Klippen deckt den Eingang der Fjorde (in Schweden Skären, Schären genannt), die meistens senkrecht auf die Küstenlinie, mitunter jedoch auch schräg auf

dieselbe, bald in gerader Linie, bald in Krümmungen zwischen hohen Steilwänden in längerer oder kürzerer Ausdehnung in das Land einschneiden. Hier und da zweigen sich Nebenarme von dem Hauptfjord ab. Die innerhalb seiner Mündung liegenden Klippen und Inseln können verschiedene Einfahrten bilden, welche, da die Fjorde gleichfalls der Ebbe und Fluth unterworfen sind, je nach der Jahreszeit und der Fluth als Eingänge zu diesen Meereseinschnitten benutzt werden können. In Skandinavien, Schottland, Irland, Island, in den Nordpolarländern, an der Ost- und Westküste Nordamerika's, in Südamerika auf der Westküste von Chiloë bis zum Cap Horn etc., überall wo das ganze Jahr hindurch die stärksten atmosphärischen Niederschläge sich bilden, tritt die Fjorbildung auf.

Im Gegensatz zu den zerstreut liegenden Klippen oder Schären bezeichnet man die kammartig zusammenhängenden Klippen oder Felsbänke, mögen dieselben sich unter dem Wasser hinziehen oder in geringer Höhe den Wasserspiegel überragen, mit dem Namen Riff. Dieselben sind häufig von grossen Dimensionen und begleiten die Küste mancher Länder in grösserem oder geringerem Abstände (z. B. das durch 8 Breitengrade an der Küste Brasiliens von Cabo Frio bis Cap do Calcanhar sich hinziehende Sandstein-Riff). Klippen wie Riffe werden deshalb, weil der Schifffahrt am gefährlichsten, auf guten Seekarten überall verzeichnet sein müssen, und hat jeder Schiffer die Pflicht, die Lage neuentdeckter mit genauer Breiten- und Längenbestimmung in die Karten eintragen zu lassen.

Zu diesen Riffen gehören auch die Korallenbänke. Sie sind an die heissen Zonen gebunden und treten zwischen den 30° N. Br. und 25° S. Br. und zwar vorzugsweise im Stillen und Indischen Ocean, im Rothen Meere und in den westindischen Meeren auf. Stark bewegtes Wasser begünstigt ihre Entwicklung, die in einer Meerestiefe von höchstens 40 Meter zu beginnen vermag und 1—2 Meter unter dem tiefsten Stande der Ebbe aufhört. Ueberall da, wo Korallenriffe auf einem tiefer gelegenen Meeresboden ruhen, scheint, weil eben die Korallenthier in grösserer Tiefe nicht zu leben vermögen, eine allmähige Senkung des Meeresbodens stattgefunden zu haben, während neue Riffe sich auf den unbelebten aufgebaut haben. Hingegen wird da, wo Korallenriffe oft bis zu mehreren hundert Fuss über die Meeresfläche aufsteigen, diese Erscheinung auf eine Hebung des Seebodens deuten. Durch Ansiedelung von Seethieren, durch ihre Verkalkung und durch Schlamm-massen steigt das Riff allmähig über die Fluthlinie empor, auf dessen Oberfläche nun durch Wind, Wellen und Vögel dorthin getragene Samenkörner ein vorzugsweise aus Kokospalmen, Pandanus und Pisang bestehendes Vegetationsleben sich entwickelt. Viele solcher Korallenriffe lagern häufig hart an der Küste von Inseln oder sind von denselben durch breite Canäle getrennt; andere umschliessen in weiten Kreisen mehrere Inseln oder Inselgruppen. Diese Art der Korallenbänke werden mit den Namen Strand-, Küsten- oder Ufer-Riffe bezeichnet. Alle aber zeigen mehr oder minder breite Einsenkungen, namentlich gegenüber den Punkten, wo auf dem Lande Flussmündungen sich finden. — Andere Riffe begleiten die Küsten des Festlandes oder langgestreckter Inseln (Neu-Caledonien) als Barrierenriffe. Ein solches gegen 300 Meilen langes Barrierenriff zieht sich von der Torresstrasse längs der Nordküste Neuholands hin. — Schliessen die Riffe in ovaler oder kreisrunder Gestalt ein Seebecken (Lagune) dergestalt ein, dass die eingeschlossene Wasserfläche nur durch einen oder mehrere Einschnitte mit dem ausserhalb des Ringes liegenden Meere in Verbindung steht, so heisst ein solches Riff Atoll (Atoll von Ebon, White Sunday in der Gruppe

der niedrigen Inseln etc.). Erhebt sich innerhalb einer solchen Lagune eine Insel, so erhält das Riff den Namen Dammriff. Wohl zu beachten ist, dass innerhalb der Lagune das Wasser völlig ruhig, in den zwischen den anderen genannten Riffen und dem Lande gelegenen Canälen nur verhältnissmässig wenig bewegt ist, während die seewärts liegenden Abfälle der Riffe stets von einer wilden Brandung umtost sind.

Als in gleicher Weise für die Schifffahrt gefährlich verdienen die Untiefen oder Sandbänke der Erwähnung.

Als Product zweier sich begegnenden und in ihrem Bestreben, die auf dem Meeresboden oder im Flussgrunde fortgestossenen Sand- und Schlamm-massen sich hemmenden Strömungen entstehen Sandbänke sowohl im offenen Meere, als auch vorzugsweise häufig an Küsten, Flussmündungen und innerhalb breiter fliessender Gewässer. Häufig unter dem Meeresspiegel liegend (wie z. B. wie oben bemerkt, als unterseeische Fortsetzungen der Uferwälle), an anderen Stellen das Meeresniveau entweder zu Ebbezeit oder fortdauernd überragend, aber je nach der Stärke der einen oder der andern Strömung von variirender Gestalt und desshalb für die Schifffahrt um so gefährbringender, treten dieselben, ebenso wie die Riffe, hier als submarine Wälle von grosser Längenausdehnung (Agulhasbank an der Südspitze Afrika's bis zu Algoa-Bai), dort als von schmalen Einsenkungen unterbrochene und auch diese oft nur zur Fluthzeit als passirbare Durchfahrten zu benutzende Reihen-Bänke auf. Leuchtfeuer, Feuerbecken, Tonnen müssen hier das oft variable Fahrwasser bezeichnen. Häufig erscheinen solche Sandbänke oder Barren an den Mündungen grosser Flüsse, wo sie durch die Ablagerung der von denselben in das Meer hineingeführten Schlamm-massen entstehen. Sind Einschnitte in derselben vorhanden und werden dieselben durch künstliche Aus-tiefung offen gehalten, so wird die Barre auch für grössere Schiffe passirbar sein; andere Barren, welche geschlossen sind, können nur zur Fluthzeit, und dann auch häufig nur von kleineren Fahrzeugen überwunden werden (z. B. Donaumündungen, die Mündungen der meisten Flüsse Afrika's sind von solchen Barren gesperrt). Sandbänke lagern aber auch in Strombetten, hier meistens in langgestreckter, in ihren Contouren den Ufern parallel laufender Form, oder vor der Mündung von Nebenflüssen in den Hauptstrom.

Endlich machen wir auf eine nur auf die Tropengestade beschränkte Küstenbildung aufmerksam. In den Tropen (Louisiana, Florida, Westindien, am Rothen Meer, Koralleninseln des Stillen Oceans) umgeben nämlich an vielen Punkten innerhalb der Fluthmarken die zur Gattung der Rhizophoren (Rhizophora Mangle, Mangrove-Waldungen) und Avicennien gehörige Bäume in schmalen Gürtel den Meeressaum. Zwischen ihren mächtigen, aus dem Uferschlamm hervorragenden hohen Luftwurzeln und den hervorsprossenden Wurzelschösslingen werden die von der Fluth angespülten Tange, Muscheln und Krebschalen, sowie Sand zurückgehalten. Durch die Verwesung des lederartigen Laubes bildet sich, beschattet von dichtem Laubwerke, eine schwarze Humusschicht, von stagnirenden Pfützen und Sümpfen unterbrochen. Hierdurch verbreitert sich allmählig das Küstenland, das Meer wird zurückgedrängt und die Küstenlinie verändert.

Der Reisende hat deshalb auf die Küstenbildung ein aufmerksames Auge zu richten, sich nicht allein mit dem Charakter derselben an den Punkte seiner Landung vertraut zu machen, sondern von erhöhtem Standpunkte eine Umschau über grössere Strecken derselben zu halten, sich an unbekannten Küsten damit vertraut zu machen, an welchen Punkten sich dieselbe zu Landungspunkten und Hafenplätzen eignet, ob die Küste bewohnbar oder

bewohnt ist, wie weit Ansiedelungen und Culturen sich bis zum Strande erstrecken, ob die Ufer bewaldet, ob steril sind. Die Küstencontouren sind vom Schiffe aus in Umrissen zu zeichnen, einzelne, namentlich charakteristische Parteen der Steilküste, von einem Punkte derselben aus. Endlich wird der Reisende sich darüber Rechenschaft zu geben haben, welchen Einfluss die Küstengestalt auf die Gesittung und den Verkehr der Bewohner des Landes ausübt.

Gehen wir von der Betrachtung der Uferländer zu der der Relief-formen des Landes selbst über. Hier begegnen wir den Ausdrücken Tiefland, Tiefebene, Hochland, Hochebene. Absolute Ebenen oder fast absolute kommen, wie wir später zeigen werden, nur in wenigen Fällen vor; überall werden wellige Anschwellungen des Bodens, Hügel und Hügelreihen, Einsenkungen und Thalmulden, von Wasserläufen gebildet, dieselben unterbrechen. Als charakteristisches Merkmal für das Tiefland oder die Tiefebene gilt, dass dieselbe in ihrer absoluten mittleren Höhe (d. h. bei einer gleichmässig gedachten Vertheilung ihrer höchsten und niedrigsten Punkte über den ganzen Flächenraum und in ihrer Erhebung nach dem Meeresspiegel berechnet) im Ganzen wenig mit der Höhe des Meeresspiegels differiren darf; ein allmähliges Ansteigen der Fläche landeinwärts zu, einer grösseren Höhe, selbst die Lage derselben mitunter unter dem Meeresspiegel, ändert nichts in der Bezeichnung (Norddeutsche, Lombardische Ebene, Ungarn, ein umschlossenes Binnentiefland; unter dem Niveau des Meeres liegend: Holland, die Gebiete am Caspischen Meere). Selbst Ebenen, welche vom Meeresstrande aus sich zu bedeutender Höhe allmählig erheben, wie die des Amazonenstromes, behaupten ihre Bezeichnung als Tiefebene.

Ursprünglich vom Ocean oder Binnenmeer bedeckt zeigen viele Tiefebene, in denen atmosphärische Niederschläge fehlen oder nur selten erscheinen, einen einförmigen oder vegetationslosen Charakter oder bieten da, wo Mangel an Gefäll die Gewässer sparsam rinne oder stagniren lässt, das Bild weit ausgedehnter Sumpf- und Moorflächen. Bei geneigten Flächen, in denen durch Wasserläufe hingegen eine fruchtbare Humusschicht das Land bedeckt und atmosphärische Niederschläge die Fruchtbarkeit erhöhen, wo Wald- und Wiesengründe entstanden sind, hat Menschenkraft die Bodenkraft zu benutzen verstanden und durch Anlage von Culturen den einförmigen Charakter der Tiefebene verwischt; solche Tiefebene sind zu Centren des Culturlebens der Völker geworden. Je nach ihrer geognostischen Bodenbeschaffenheit und der sie bedeckenden Vegetation haben wir für die Tiefländer besondere Bezeichnungen. Ueberall da, wo die einst vom Meere bedeckte, gegenwärtig aber gehobene Tiefebene ihren ursprünglich sterilen Charakter in der Art bewahrt hat, das der sandige Boden auf endlosen Strecken mit einer Vegetation von Haidekräutern und Gestrüpp bedeckt, wo die Ebene kaum von kleinen Erhebungen unterbrochen wird und der Horizont gleichsam endlos in die Ferne gerückt ist, wendet man die Benennung Haideland an. Fast überall fehlen in ihm Wasserläufe und wo Wasseransammlungen sich finden, werden, weil jeder Abfluss fehlt, moorartige Pfützen sich bilden (Landes in Frankreich, Lüneburger Haide). Sind durch Wassergewalt in Einsenkungen der Haidefläche, namentlich wo Wasserläufe dieselbe durchschneiden, der Sand weggeschwemmt und die darunter lagernden Lehm- und Mergelschichten blossgelegt, so werden solche Striche sich als culturfähig erweisen, während die eigentliche Haidefläche mit ihrem nackten Sande nur in den seltensten Fällen sich zum Anbau eignet und nur durch mühsamen Anbau von Kiefernwaldungen nutzbar gemacht werden kann.

Sind in Tiefländern von Sumpfflächen erfüllte Bodenmulden oder morastige Fluss- und Stromniederungen vorherrschend, so wird man dieselben als Moor-, Bruch-, oder Sumpfland zu bezeichnen haben. Sie unterscheiden sich in solche, deren Oberfläche vorherrschend Lehm, Mergel, Sand oder Kies, in solche, wo die Diluvialdecke von grossen Torfmooren und in solche, welche von einer starken, fruchtbaren Humusschicht bedeckt sind. Letztere Form wird Marschland genannt. Gebildet ist die Marsch durch das feine Material, welches die Flüsse aus dem Innern zur Meeresküste führen und das dort zu Inseln und Schlamm- oder Schlickbänken angehäuft wird. Durch Deichanlagen wird die Marsch vor den Meereswogen gesichert und zur Bebauung benutzt. Sie ist vollkommen flach, ist bedeckt mit fruchtbaren Aeckern und Wiesen, von Canälen durchschnitten, ohne Wald und ohne Sand- und Haideboden (Marschen der untern Eider, Elbe, Weser, Ems). Treten die erwähnten Schlickabsätze nur zur Ebbezeit über der Meeresfläche hervor, sind mithin dieselben noch nicht durch Deiche in Marschen umgewandelt, so wird eine derartige Bildung Watte genannt (Westküste von Schleswig). Dem Marschlande entgegen steht die Geest (Gast), Geestland. Dasselbe besteht grossentheils aus diluvialem Sande, ist hoch, uneben und minder fruchtbar als die Marsch, hat Quellen, Bäche und Ströme, ist nur stellenweise bebaut und bildet z. B. im Westen der untern Elbe, an der untern Weser und in Westphalen das Becken der Moore und Haiden.

Moor- und Sumpflandschaften, wie sie namentlich der Nordwesten Deutschlands bietet, sucht man in verschiedener Weise der Cultur zugänglich zu machen: einmal durch die seit dem 17. Jahrhundert in jenen Gegenden eingeführte Methode des Moorbrennens (Anzünden des durch flache Gräben einigermassen entwässerten und an seiner Oberfläche gelockerten Bodens im Frühjahr; in Folge dessen der Moorrauch oder Höhenrauch, von üblem Einfluss auf die klimatischen Verhältnisse durch seine die Atmosphäre austrocknenden und demgemäss den Pflanzenwuchs hindern den Eigenschaften), dann in neuerer Zeit mit besserem Erfolge für die Cultivirung der Moore durch Anlage von Fehncolonien (Canäle, die von einem schiffbaren Fluss aus theils zur Entwässerung, theils zur Verschiffung des gewonnenen Torfes durch die Moorlandschaften geführt werden, und wo nach Absteckung der Torflager Culturen an ihre Stelle treten).

Einen ähnlichen Charakter tragen die ausgedehnten Ebenen des nördlichen Russlands und Sibiriens, Tundra genannt. Während der langen in diesen Regionen herrschenden Winterzeit unter Schneemassen begraben, bedeckt sich hier, sobald während der kurzen Sommerzeit der Schnee geschmolzen ist, der Boden an seinen niedrigen Stellen inselartig mit einer aus Torfmoosen und anderen Pflanzen bestehenden Vegetation, während die Rennthierflechte und andere weisslich schimmernden Flechten die übrige Fläche wie mit einem Leichentuche überziehen, den dort nomadisirenden Stämmen mit ihren Heerden einen kümmerlichen Lebensunterhalt gewährend.

Gleichfalls charakteristisch durch die Gleichmässigkeit und Einförmigkeit ihrer Pflanzendecke sowie durch ihre von keiner Erhöhung und Eintiefung unterbrochene Ebenheit des Bodens stellt sich die Puszta des ungarischen Tieflandes dar: weit ausgedehnte mit üppigen Gräsern bestandene Ebenen, ursprünglich ein altes Seebecken, dessen Boden durch die jährlich wiederkehrenden Ueberschwemmungen der sie bewässernden Flüsse eine ausserordentliche Fruchtbarkeit erhält.

Den Begriff einer ausgedehnten Ebene, die allerdings je nach ihren Vegetationsverhältnissen einen verschiedenen Charakter zeigt, bedingt auch das ur-

sprünglich russische Wort *Steppe*, eine Benennung, welche gegenwärtig nicht bloss auf die weiten grasbedeckten Ebenen Südrusslands, sondern auch für analoge Bodenbildungen in anderen Ländern ihre Anwendung gefunden hat. Da, wo in Südrussland eine dicke Humusschicht von schwarzer Erde die endlosen Ebenen bedeckt, breitet sich ein weites baumloses Gras- und Kräutermeer, nur unterbrochen von den auf dem fetten Boden zu üppigster Pracht sich entfaltenden Getreidefeldern, über sie aus; Spuren, dass diese Tiefebene einstmals Seeboden gewesen sind, fehlen hier. Südlich aber von diesem Gebiete der „schwarzen Erde (Tschonosjom)“, wo der Boden sich als früherer Meeresgrund erweist, entbehrt die Steppe im Sommer ihr grünes Pflanzenkleid, welches nur im Frühjahr den dort weidenden Heerden Nahrung in reichster Fülle zu gewähren vermag. Griesebach in seinem Werke, „die Vegetation der Erde“, theilt die Steppen nach ihrer charakteristischen Vegetation in Gras-, Sand- und Salzsteppen. Die Grassteppe, in erweitertem Sinne aufgefasst, umfasst überhaupt die Strecken, wo der Boden seinen Salzgehalt verloren und die Vegetation so viel Humus abgelagert hat, dass die Feuchtigkeit nach dem Schmelzen des Schnees oder nach erfolgten Niederschlägen nicht sogleich wieder den Erdschichten an der Oberfläche entzogen wird, so dass, auch wenn Gestrüpp sie bedeckt, doch auch zartere Gewächse zur Weide geboten sind. In den Grassteppen bedeckt da, wo Gramineen vorherrschen, der Rasen niemals vollständig den Boden; nur stellenweise wachsen Gräser, während das übrige Land nur im Frühling mit zarten Kräutern bekleidet ist, die durch die sommerliche Hitze versengt werden.

Die Sandsteppe, die den Humus fast ganz entbehrt und die Feuchtigkeit zum Grundwasser abfliessen lässt, geht in die Wüstenbildungen über, die bald von beweglichen Dünen bedeckt, bald von feiner gekörnter Erdkrume entblösst ist, indem die Oberfläche aus dem nackten Felsen selbst oder aus Gerölle gebildet wird. In ihr verschwinden die Gramineen fast gänzlich, und Stauden und Kräuter sind den Strauchformen untergeordnet; wo die Feuchtigkeit nicht ausreicht, letztere zu ernähren, wird die Sandsteppe zur unbewohnbaren Wüste. Die Salzsteppe endlich, welche Natriumverbindungen in grösserer oder geringerer Menge dem Boden beigemischt enthält, und deren Feuchtigkeit, von dem Thongehalt der Erdkrume abhängig, nur durch Verdunstung verloren geht, oder in anderen Fällen sich längere Zeit erhalten kann, wird, wenn sie sich über grössere Räume ausgedehnt, gleichfalls zur Wüste, weil ihr Wasser nicht trinkbar ist und ihre Vegetation zur Weide nicht dienen kann. Grassteppen und die besseren Theile der Sandsteppen sind mithin allein zur Ernährung der Heerden der nomadisirenden Stämme geeignet. Sandsteppen nehmen zum grossen Theile das westliche Becken der caspischen Niederung ein, während Salzsteppen in weiter Ausdehnung sich zwischen Wolga und Ural hinziehen. Sandsteppen, wie die der caspischen Senkung, umgeben auch den Balkasch See in Sibirien, dort unter dem Namen von Hungersteppen bekannt.

Wir erwähnten des Ueberganges der Steppe zur Wüste. Als charakteristisches Merkmal für letztere sind das Fehlen atmosphärischer Niederschläge, oder, wo diese als Gewitterregen eintreten, rasch vorübergehend, und in Folge dessen der gänzliche Mangel eines Vegetationslebens oder dieses nur auf Distelgewächse und stachelige Mimosen beschränkt. Den Boden bildet nackter Fels oder ein mit Rollkieseln überschütteter grobkörniger, aus Verwitterung des Felsboden entstandener Sand; in anderen Theilen feiner Sand, der von den über die Wüste streichenden Winden leicht emporge-

wirbelt sich als Wanderdünen in bestimmter Richtung fortbewegt. Nur wo Hügelreihen aus gröberen Sandtheilen sich aufbauen, vermögen sie den Winden Widerstand zu leisten. Luftspiegelungen sowie Reif und Eisbildungen während der Nächte gehören wegen der durch nichts gehinderten nächtlichen Ausstrahlung des durch die Hitze des Tages erwärmten Bodens nicht zu den Seltenheiten.

Da wo unterirdische Wasser in der Wüste auftreten, bilden sich Wadis und Oasen, erstere in Form von Thalbildungen, in denen die Quelläden tiefer im Boden liegen und in Folge dessen nur mit dürrtlicher Vegetation versehen sind, letztere, gleichfalls als Thalbildungen anzusehen, in denen die unterirdischen Wasser in grosser Menge bis zur Oberfläche steigen und inmitten des Sandmeeres grüne fruchtbare Inseln schaffen. Je nach der Stärke der Quellen oder ihrer Zahl sind die Oasen von grösserem oder kleinerem Umfang. Dattelpalmen vorzugsweise sowie andere fruchtbare Bäume, Mais, Weizen und Gerste gedeihen auf ihnen trefflich und sind im Stande, je nach der Grösse der Oase, den auf ihnen angesiedelten Bewohnern, oft ganzen Stämmen, mit ihren Heerden hinreichende Nahrung zu spenden. Um die Zahl der Oasen zu vermehren, haben die Franzosen in neuester Zeit mit glücklichem Erfolge in der Provinz Constantine durch Anlage artesischer Brunnen neue Oasen zu schaffen versucht. Brunnen (arabisch Bir), häufig freilich mit brakischem Wasser, und Oasen bestimmen die Richtung der die Wüste durchwandernden Karavanan; die Karavananstrassen in der Wüste haben daher seit den ältesten Zeiten so ziemlich ihre Richtung beibehalten, und werden nur durch räuberische Ueberfälle der Wüstenstämme, mitunter auch durch das Versiegen eines Brunnens die Karavanan zeitweise zur Veränderung ihrer Wegerichtung gezwungen. Die Abstände der Oasen und Wüstenbrunnen von einander sind sehr ungleich, selten jedoch auf den grösseren Karavananstrassen weiter als 3—5 Tage. Der Wüstengürtel der Continente der alten Welt beginnt am Westgestade des atlantischen Oceans mit der Sabel (arabisch eine mit feinem Sande bedeckte Fläche), zieht sich ostwärts als Sahara (Sahar, arabisch = Wüste, bedeckt mit grobem Kies und Steinen und Oasen enthaltend) und libysche Wüste, nur unterbrochen durch das Nilthal, bis zum Rothen Meere, bedeckt das Innere der arabischen Halbinsel und das iranische Plateau und endet in der Wüste Gobi in der chinesischen Mongolei. Bei allen diesen Wüsten finden sich die oben angedeuteten charakteristischen Merkmale des Bodens, sowie der meteorologischen Erscheinungen.

Wie auf der östlichen Halbkugel erscheinen auch auf der westlichen Steppen, Tundren und Wüsten, hier als Prairien, Savannen, Pampas, Llanos und Disiertos bekannt. Die Prairien und Savannen Nordamerika's gleichen, abgesehen von den durch die Klimate bedingten Verschiedenheiten, den Puszten Ungarns und den Grassteppen Südrusslands. Sie stellen sich dem Auge als wellenförmige, mit einer üppigen Grasvegetation bedeckte Flächen dar, aus denen nur hier und da einzelne Bäume oder kleinere Baumgruppen hervorragen. Wie in Europa beginnt auch in Amerika die unaufhaltsam gegen Westen vordringende Cultur den Prärien mehr und mehr Ackerland abzugewinnen, das oft inselartig sich weit in die Grassteppe hineinzieht. Die Grassteppen Südamerika's, die Llanos Columbiens und die Pampas der La Plata-Staaten, in denen der Ackerbau erst noch unbedeutende Fortschritte gemacht hat, erscheinen im Gegensatz zu den nordamerikanischen, als vollkommene Ebenen, in denen jede Bodenerhebung fehlt. Nur zerstörte Schichten von Sandstein oder Kalkstein (Bancos) mit wagerechter Oberfläche,

nur wenige Fuss über dem Boden sich erhebend und oft stundenlang sich fortsetzend, sowie gewölbte, nur wenig ansteigende Erhöhungen (Mesa), hier häufig die Wasserscheide der Gewässer bildend, unterbrechen die gleichförmigen Niveauverhältnisse dieser Ebenen. Nach der Regenzeit mit üppigen Gräsern und Halbgräsern bedeckt, verdorrt mit dem Beginn der Hitze die Vegetation der unabsehbaren Weideflächen; die durch die Regen angeschwollenen Wasserläufe, welche die Gegend meilenweit überschwemmen, versiegen, die Wasserflächen verwandeln sich in Sümpfe, der Boden zerreisst durch die Gluth der Sonnenstrahlen, und der Sturmwind jagt die in Asche verwandelte Vegetation in dichten Wolken über die verbrannte Ebene. — Doch auch wirkliche Wüsten, denen Afrika's und Asien's vergleichbar, hat Amerika aufzuweisen: im Norden, westlich von dem grossen Salzsee und in der Colorado-Wüste theils ohne jeglichen Wasserlauf, ohne jede Spur von Vegetation, mit hartem Felsboden, mit weiten Salzflächen, theils mit armseligem, über den Boden hinkriechendem Gestrüpp bedeckt oder von einzelnen aus dem Thon- und Felsboden hervorstarrenden riesigen Cactus belebt. Im Süden aber erinnern am meisten an die Wüsten der alten Welt die Disiertos, die sich terrassenförmig zwischen dem Stillen Ocean und den Anden im südlichen Peru und im Norden Chile's ausbreiten. Das australische Tiefland endlich zeigt neben wellenförmigem Weideland, welches sich jedoch weniger mit den Prärien Amerika's als mit den Haide-Steppen vergleichen lässt, weite nur von einzelnen Felspartien unterbrochene endlose Ebenen von sandig-thonigem Boden, fast gänzlich ohne Quellen und nur selten von atmosphärischen Niederschlägen bewässert, welche dann auf kurze Zeit die tiefer liegenden Theile in wassergefüllte Mulden verwandeln und ebenso rasch wieder verdunsten, einen salzhaltigen Schlamm zurücklassend, welcher den Boden mit einer harten Salzkruste überzieht. Steppe und Wüste liegen hier neben einander, letztere aber den grösseren Theil des Innern des Continents bedeckend.

Der Tiefebene gegenüber stehen das Tafelland, die Hochebene oder das Plateau, das Hochland. Die Hochebene bedingt die Erhebung einer Ebene zu einer grösseren mittleren Höhe über den Meeresspiegel, als dies bei dem Tieflande stattfindet. Sonderungen der Hochebene in solche ersten und zweiten Ranges je nach ihrer Erhebung von über oder unter 4000' sind willkürliche. Nur die Beziehung der Ebene zur continentalen Masse, der sie angehört, wird massgebend sein für die Bezeichnung derselben als Hoch- oder Tiefland, und Flächen, welche nach ihrer mittleren Erhebung in dem einen Lande als Hochebene gelten, würden in einem anderen Lande nur den Anspruch auf die Bezeichnung einer Tiefebene zu machen haben. Dieselben charakteristischen Merkmale der Bodengestaltung, auf welche wir bei der Tiefebene aufmerksam gemacht haben, wiederholen sich bei der Hochebene: bei beiden ist der Begriff der absoluten Ebene ausgeschlossen; muldenförmige Einsenkungen, Schluchten und Erhebungen wechseln mit Flachland, Weide- und Ackerland mit Morästen, sterilem Fels- und Sandboden und Wüstenbildungen. Bedingt wird aber die Hochebene durch das Vorhandensein eines Gebirges. Der Uebergang der Tiefebene zum Gebirge wird durch allmählig ansteigende Hügelketten oder Terrassen vermittelt, und werden diese vermittelnden Gliederungen als Stufen bezeichnet; eine Erhebung des Hochlandes aus der Tiefebene ohne ein solches Verbindungsglied findet nur selten statt.

Mit dem Ausdruck Gebirge bezeichnet man die Summe unter sich zusammenhängender und gegliederter Berge aus festem Gestein. Je deutlicher diese Gliederung auftritt, umso mehr wird sich der Name Gebirge für eine

solche Erhebung rechtfertigen lassen, während bei einer geringer scharfen Abgrenzung der Gliederung, bei dem Fehlen tiefer Thaleinsenkungen, eher die Bezeichnung Bergland anzuwenden sein wird. Da wo der Berg oder das Gebirge aus der Ebene aufsteigt, beginnt der Fuss; derselbe wird aus allmählig ansteigenden höheren Vorbergen mit Thaleinschnitten gebildet; selten steht der Berg unvermittelt in der Ebene (Pic von Tenerifa, Stromboli, Olymp bei Brussa in Kleinasien). In den seltensten Fällen hat der Fuss eines Gebirges oder Berges überall ein und dieselbe Meereshöhe. Der Reisende hat daher bei der Schätzung der Höhe eines Berges genau die Höhe seines Standpunktes, von welchem aus die Schätzung vorgenommen wird, anzugeben. Bestimmte Höhenangaben lassen sich nur durch Besteigung mit Hilfe von Instrumenten ermitteln.

Gewöhnlich ist bei den Gebirgen die Längendimension vorherrschend. Es wird sich eine Linie bestimmen lassen, in deren Richtung die grössten Erhebungen liegen, und bezeichnet man dieselbe als Gebirgsrücken oder Kamm; er bildet die Wasserscheide der zu ihren beiden Seiten herabfliessenden Gewässer. Die Kammlinie, weil sie die Vorberge bedeutend überragt, wird von der Ebene aus betrachtet mit dem Auge am weitesten sich verfolgen lassen, während ein weiteres Ueberblicken derselben von einem höheren Punkte innerhalb der Kammlinie selbst in den meisten Fällen durch vorliegende, die Fernsicht verdeckende Berge unmöglich wird. Der Reisende mag deshalb die Contouren der Kammlinie von der Ebene aus sich wohl einprägen, dieselbe zu zeichnen versuchen und wird dabei vorzugsweise auf die charakteristischen Merkmale derselben, z. B. bei vulkanischen Gebirgsketten, bei Juraformationen u. s. w. seine Aufmerksamkeit zu richten haben. Auf Reisen durch wenig erforschte oder noch völlig unbekannte Gegenden mag er stets die den Horizont begrenzenden Gebirgscontouren, besonders da, wo Zeit und Verhältnisse eine nähere Untersuchung der Bergketten nicht gestatten, zu skizziren versuchen. Die Skizzirung des Gebirges aus weiter Ferne gestattet freilich nur in seltenen Fällen ein näheres Eingehen auf die Beschaffenheit des dem Beschauer zugekehrten Abfalles, welcher sich meistentheils, je nach dem Stande der Sonne oder der Reinheit der Atmosphäre, als eine blaue oder graue Fläche, in der nur einzelne heller beleuchtete Punkte sich markiren, darstellen wird. Auch wird die eigentliche Beschaffenheit des Kammes, ob derselbe schmal und scharf (Grat, Gräte), ob er breit ist, ob weite Flächen auf demselben sich hinziehen, der Kamm also die charakteristische Gestalt der Hochebene annimmt, vom Fuss aus nicht erkennbar sein. Alle diese Bestimmungen müssen der Autopsie bei der Wanderung durch das Gebirge selbst überlassen bleiben.

Beim Aufstieg haben wir den zwischen dem Fuss und der Spitze des Berges oder der oberen Kante des Gebirges liegenden Theilen, dem Abfall oder der Abdachung, eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken; ihre verschiedenartige Neigung ist für die Physiognomie des Gebirges von höchster Wichtigkeit. Ein symmetrisch gleicher Abfall nach beiden Seiten hin findet sich nur höchst selten; stets ist der Abfall auf der einen Seite hin steiler, als auf der entgegengesetzten. Bei grossen von N. nach S. streichenden Gebirgen liegt der Steilabhang gegen W. (Anden, Skandinavische Gebirge), bei den von O. nach W. streichenden auf der Südseite (Pyrenäen, Erzgebirge, Riesengebirge), doch giebt es auch Ausnahmen von dieser Regel (Vogesen, Sevensen, Küstengebirge Venezuela's).

Besonders wichtig für die Erkenntniss des Gebirgsreliefs ist seine Gliederung. Gewöhnlich sendet der Hauptgebirgsrücken, ähnlich den vom Rück-

grat ausgehenden Rippen, nach beiden Seiten rechtwinklig auf die Hauptachse treffende Seitenarme, was als Quergliederung bezeichnet wird. Mitunter ist die Gliederung eine parallele (Anden Südamerika's), in der das Gebirge aus parallel nebeneinander laufenden Ketten besteht oder diese sich unter einem spitzen Winkel berühren. Endlich zeigt sich auch mitunter eine divergirende Gliederung, wo die Hauptkette sich an ihrem Ende in mehrere in verschiedenen Richtungen streichende Gebirgszüge theilt. Alle Punkte nun, von denen bei Quergliederungen Seitenarme auslaufen oder wo bei Parallelketten diese sich vereinigen, um später wieder ihre ursprüngliche Richtung zu verfolgen, bilden meistentheils höhere Gipfel und werden Gebirgsknoten oder Stöcke genannt.

Alle grossen Erhebungen des Gebirges, mögen sie aus der Kammlinie hervortreten oder als isolirte Gebirgsstöcke neben der Hauptmasse der Gebirgskette auftreten, nennen wir Gipfel. Ihre Gestalt ist von der geologischen Beschaffenheit der Gebirgsart, aus welcher sie bestehen, abhängig, sie geben dem Gebirge den eigentlich charakteristischen Typus. Gerundete Formen in Abhängen und Gipfeln zeigt, weil leichter verwitternd, das aus Sandstein aufgebaute Gebirge, zackige, schroffe Gipfel, das aus Granit, Porphyr und Gneis bestehende, da diese Formationen dem Einfluss der zerstörenden Elemente kräftigeren Widerstand leisten. Diese allgemeinen Annahmen finden jedoch auch ihre Ausnahmen, indem ein und dieselbe Gebirgsart in verschiedenen Erhebungen oft einen verschiedenen Charakter annimmt. — Für die verschiedenen Formen der Gipfel hat sich bei den Gebirgsbewohnern, namentlich bei denen der Hochgebirge, eine reiche Nomenclatur entwickelt, während der Bewohner des Flachlandes sich mit allgemeinen Bezeichnungen für die Gestalt der ihm zunächstliegenden Höhen begnügt. Nach ihren vielfachen volksthümlichen Bezeichnungen aber die Berge bestimmt classificiren zu wollen, ist unmöglich, und mag der Reisende an den landesüblichen Bezeichnungen festhalten. Abgesehen von der so schwankenden Scheidung zwischen Hügel und Berg (letztere Benennung wird ja von dem Flachländer für jede grössere Erhebung des Bodens angewendet) pflegt man für alle sanft ansteigenden Rücken oder gerundete Gipfel den Namen Berg anzuwenden (Inselberg, Winterberg, Feldberg) oder Kopf, Kuppe, Kulm, Kolm, Buel, Bühel (Schneekopf, Riesenkoppe, Knüllköpfchen, Wasserkuppe, Rauhe Kulm, Rigi-Kulm, Brandberger Kolm, Hirschbühl, Brennbüchel); für sanft abfallende grasige Bergrücken, doch auch für den Berg selbst, Leite, Lehne, Leiste (Eisenleite, Madonna ai Lait beim St. Gotthard); bei Bergen, bei denen Felspartien zu Tage treten oder bei einzeln stehenden grossen Felsmassen den Namen Stein, Fels (Drachenfels, Königstein), bei niedrigeren Bergen, namentlich mit freier Umschau, Höhe (Victorshöhe); oder es werden Gebirgszüge nach ihrer Waldbekleidung als Waldgebirge bezeichnet (Böhmerwald, Steigerwald). In den Alpen finden wir zerrissene kegelförmige oder nadelförmige Spitzen, hier oft als Hörner, Hörnli oder Nadeln (französisch dents und aiguilles) bezeichnet, oder einzelne spitz ansteigende oder in zugespitzten Massen sich erhebende Felsformationen, für welche häufig die Namen Stock, Kofel, Kar, Ker in Anwendung kommen (Schreckhorn, Uri Rothstock, Aiguille de Balme, Dent de Jaman, Ankogel, Gartnerkofel, Fuscherkarkopf); die abgestumpften Kegel erloschener Vulcane werden im südlichen Frankreich Puy (Puy de Dôme) genannt; Tucs oder Trucs heissen in den Pyrenäen Gipfel von bedeutenden Höhen, Tugue, Truque, Tusse Berge von weniger steilem Gehänge; Berge, deren Spitzen durch thurmartige Gipfel gekrönt sind, heissen in der Ostschweiz Piz (Piz Bernina,

Pizzo d'Uccello), in den Pyrenäen Pine oder Boun u. s. w., u. s. w. Berge, welche abgestumpften Kegeln gleichen und oben in eine Fläche enden, nennt man Tafelberge (Meissner bei Cassel, Tafelberg bei Capstadt); es gehören auch in diese Kategorie die in Abyssinien unter dem Namen Amba vorkommenden Erhebungen, welche sich als steil in die Thalgründe abfallende theils isolirt dastehende, theils mehrere unter einander durch schmale Grate und Joche verbundene Felsmassen darstellen, mit weiten culturfähigen Flächen auf ihren Plateaus. — Alle vom Hauptgebirgsrücken ausgehenden Nebenarme werden als Jöcher bezeichnet; sie trennen die Thäler von einander, und wird man da, wo zwei Hauptthäler von einander durch sie getrennt werden, von einem Hauptjoch, da wo sie Nebenthäler von einander scheiden, von einem Seitenjoch zu sprechen haben. Die Enden dieser Seitenjöcher senken sich allmählig zur Ebene herab und bilden die Ausläufer des Gebirges.

Die Entstehungsgeschichte der Thäler und Schluchten gehört der Geologie an; wir werden uns hier mithin nur auf die Bezeichnungen für die verschiedenen Thalbildungen zu beschränken haben. Zunächst haben wir Längen- und Querthäler von einander zu unterscheiden. Erstere folgen dem Gebirge in der Richtung seines Hauptzuges und scheiden zwei Erhebungen in ihrer ganzen Längenausdehnung von einander, während das Querthal eine Spaltung ist, welche durch das Zerreißen des Gebirges während seiner Hebung entstanden ist, und das in seiner mittleren Richtung etwa senkrecht auf den Hauptgebirgszug gerichtet ist. Die Gehänge, d. h. die zu beiden Seiten der Thalsole (des niedrigsten Theiles der Thaleinsenkung) hinlaufenden Bergabhänge des Querthales werden, weil sie den Querdurchschnitt des Gebirges bilden, die Schichtungen mehr zur Anschauung bringen, als dies bei Längenthälern der Fall ist; Querthäler sind meistens eng, haben eine schmale Thalsole und bieten der Vegetation und den menschlichen Ansiedlungen meistens einen geringeren Raum als die breiteren Längenthäler. Die Einwirkungen der Niederschläge, sowie die Erosionen oder Auswaschungen durch das in den meisten Thalsohlen fließende Wasser bedingen zum grossen Theile die Gestalt der Thäler; hinzu tritt als anderer Factor die geologische Beschaffenheit des Gebirges, der Widerstand, den die eine oder die andere Felsart den Erosionen durch das Wasser entgegensetzt. Hier werden die Thäler, durch parallele Thalwände eingeschlossen, bald in gerader, bald in gewundener Richtung laufen; dort entfernen sich die Thalwände von einander (Thalweitungen), um sich später wieder zu nähern (Thalengen oder auch bei längerer Ausdehnung Thalschlünde genannt), und es entsteht da, wo solche Thalweitungen mit Thalengen abwechseln, eine Reihe von Becken, die durch diese Einschnürungen der Thalwände abgegränzt werden. Diese oft von senkrechten Felsen eingeschlossenen Thalengen, durch welche das Wasser mit wilder Gewalt sich seinen Weg bahnt, heissen Klusen oder Klausen und zeigen sich in vielen Gebirgen Europa's, am grossartigsten aber jedenfalls in den unzugänglichen Thalengen der Colorado im Westen Nordamerikas, dort Cañones genannt. Häufig wird die Neigung eines Thales sich in Form von Stufen, Thalstufen, darstellen, über welche das Wasser als Wasserfall herabstürzt, oder es wird durch einen von dem einen Thalgehänge zu den gegenüberliegenden sich hinziehenden Damm (Thalriegel, Thaldamm) das Wasser oberhalb desselben seeartig aufgestaut und stürzt mit furchtbarer Gewalt durch tief ausgewaschene Spaltungen in die tiefer gelegene Thalsole hinab (solche Spalten heissen in Tyrol Klamm, Seisenberger Klamm). Fast jedes Hauptthal,

d. h. jedes vom Rücken des Gebirges bis zum Fuss sich hinziehende Thal, hat seine Nebenthäler; letztere sind meistens steiler als das Hauptthal und nehmen wiederum kleinere Seitenthäler (oft als Runsen und Tobel bezeichnet) auf. — Kammeinschnitte oder Scharten endlich, theils entstanden durch Risse in den aufgerichteten Schichten, theils durch Einstürze oder Erosionen, hier als schmale von senkrecht oder steil aufsteigenden Gebirgsmassen begrenzt, dort als weite Thore zwischen zwei entgegengesetzten Gehängen des Gebirges sich darstellend und durch die Kunst häufig zu Fusspfaden oder bequemen Fahrstrassen erweitert, heissen Pässe (Furken, fourches, ports, puertos, pasos), ihr höchster Punkt Passhöhe, auch Scheideck. Sie bilden die Verbindungs- und Verkehrsadern zwischen den Thälern und Landschaft diesseits und jenseits, sie spielen in der Landesvertheidigung, weil allein für grössere Truppenkörper passirbar, die wichtigste Rolle und sind deshalb häufig befestigt. Die vorhandenen, meistentheils schon seit alten Zeiten practicablen Passübergänge in gutem Stande zu halten, bequeme Strassen zu ihnen hinaufzuführen, ihre Ränder durch Schutzbauten gegen Erd- und Felsrutsche und da, wo sie sich bis zu bedeutenden Höhen erheben, durch Schutzdächer gegen Lawinen zu sichern, wird daher die Aufgabe jeder wohlgeordneten Regierung sein. Der vermehrte Länderverkehr in unseren Tagen hat aber da, wo Eisenbahnen hüben und drüben am Fusse von Berg- und Gebirgrücken enden, statt der mühsamen Uebersteigung des Gebirges auf seiner Passhöhe in der Anlage von Tunnel ein Mittel zu einer directen Verbindung der entgegengesetzten Gehänge gefunden.

Ebenso veränderlich, wie die Anwendung der Bezeichnung von Berg und Hügel, sind auch bei fliessenden Gewässern die Benennungen Strom und Fluss. Weder die grössere oder geringere Wassermenge, noch die Schnelligkeit und Länge des Laufes, noch der Umstand, dass ein Wasserlauf in den Ocean mündet oder als Nebenfluss eines Hauptflusses auftritt, gestatten eine prägnante Scheidung in der Benennung. Selbst der für die kleinsten Wasserläufe gebräuchliche Ausdruck von Bach wird in vielen Fällen, namentlich bei Gebirgsgewässern, mit der Bezeichnung von Fluss confundirt. Der Reisende mag deshalb bei der Bezeichnung von fliessenden Gewässern sich den althergebrachten, wenn auch nicht immer ganz präzisen Benennungen anschliessen, da eine Reform des landesüblichen Sprachgebrauches mancherlei Missverständnisse herbeiführen würde. Wichtiger für unsere Zwecke ist die Erörterung allgemein feststehender hydrographischer Begriffe. Als Strom- oder Flussgebiet bezeichnen wir die von der Gesamtheit der zu ein und demselben Stromsystem gehörenden grossen und kleinen Wasserläufe eingenommene Fläche. Je nach der Ausdehnung der Gesamtheit dieser Wasserläufe wird das Stromgebiet einen grösseren oder kleineren Flächenraum einnehmen, dessen Gestalt durch eine Linie bezeichnet wird, welche die Quellenpunkte der Wasserläufe mit einander verbindet. Da fliessende Gewässer, selbst die unbedeutendsten, eine schiefe Ebene bedingen, muss die Gesamtheit der zu einem Stromsystem gehörenden Quellen, die wir als Quellbezirk bezeichnen, höher liegen als derjenige Theil, in dem sie sich vereinigen. Das Stromsystem wird sich deshalb muldenförmig darstellen, und die tiefste Linie des Thalweges die Vereinigung sämmtlicher Gewässer bilden. Hier liegt die Hauptwasserader, der Hauptfluss; alle in ihn mündenden Wasserläufe sind als Neben- oder Zuflüsse zu bezeichnen. Gewöhnlich verliert der Nebenfluss mit seiner Mündung seinen ursprünglichen Namen, besonders wenn sein Lauf rechtwinklig auf den Hauptfluss gerichtet ist, während dem Hauptfluss selbst von der seiner Mündung am entferntesten liegen-

den Quelle an bis zu seiner Mündung ein und derselbe Namen beigelegt zu werden pflegt. Fraglich freilich bleibt es in solchen Fällen, wo zwei gleich wasserreiche Flüsse sich zu einem Strombette vereinigen, welcher von beiden auf die Bezeichnung eines Hauptflusses Anspruch zu machen hat. In einigen Fällen wird die Grösse des Flussgebietes, die Breite, die Wassermenge, die Färbung des Wassers, das frühere oder spätere Anschwellen desselben in Bezug auf den Unterlauf des Hauptstromes etc. maassgebend sein können; in den meisten Fällen aber wird auch hier althergebrachte, volksthümliche Ueberlieferung für die Namengebung bestimmend bleiben. Aber auch ein und derselbe Fluss wird häufig auf verschiedenen Abschnitten, vorzugsweise in aussereuropäischen Ländern, von den Völkern, durch deren Gebiet derselbe fliesst, mit verschiedenen Namen belegt, während die Geographie gewöhnlich den an seiner Mündung gebräuchlichen Namen für den Gesamtlflusslauf adoptirt hat. Ebenso wird der Gesamtname des Flusses bei den anwohnenden Völkern oft ein verschiedener sein. Ueberall, wo nur der Unterlauf eines Flusses bekannt ist (z. B. in Afrika und Australien) ist nach Durchforschung seines Mittel- und Oberlaufes, selbst bei verschiedener Bezeichnung desselben durch die Eingeborenen, der für den Unterlauf von den Europäern bereits gebräuchliche Name als Gesamtbenennung des Hauptflusses anzuwenden. Eine europäische Namentaufe von Flüssen und anderen Localitäten ist überhaupt nur da zulässig, wo (z. B. in Australien) einheimische Namen für dieselben nicht existiren oder wo die von den Eingeborenen so häufig für Wasserläufe angewandte Bezeichnung „Wasser“ eine genauere Unterscheidung derselben durch eine neue Namengebung nothwendig macht.

Bei jedem vollständig ausgebildeten Flusssystem werden sich drei Abschnitte unterscheiden lassen: der Ober-, Mittel- und Unterlauf. Scharf gesondert treten die unterscheidenden Merkmale jedoch nicht überall auf. Für weniger entwickelte Flusssysteme, namentlich bei solchen Flüssen, welche über Steilabfälle des Gebirges dem nahen Meere zueilen, oder die, auf niedrigen Höhenzügen entspringend, mit geringem Gefälle durch das Flachland strömen, wird jene dreifache Scheidung überhaupt nicht anwendbar sein. Wo aber im Gebirge Quellen und Giessbäche, eingeengt durch steile Felswände, meist über nacktes Gestein ihren Weg in die Tiefe bahnen, wo Schluchten und Spalten den Abfluss der atmosphärischen Niederschläge begünstigen und der Zusammenfluss dieser Gewässer zu einem grösseren, gemeinsamen Lauf noch innerhalb der Gebirgsabhänge stattfindet, da ist der Oberlauf des Flusses zu suchen. Mit seinem Eintritt in das niedrigere Hügelland, wo die Berge mehr und mehr von seinen Ufern sich entfernen und die Gewässer ihr Bett frei auszuarbeiten vermögen, das Gefälle geringer wird und die eigentliche Entwicklung des Stromgebiets durch von rechts und links herkommende Zuflüsse stattfindet, liegt der Mittellauf. In Folge seines verminderten Gefälles wird der Fluss während seines Mittellaufes einen weniger geradlinigen Lauf nehmen, vielmehr in maeandrischen Krümmungen (Serpentinen) je nach dem Widerstande, der sich der Fortbewegung des Wassers entgegenstellt, dahinfließen. Bei diesen Krümmungen wird, sobald dieselben nicht durch Steilabfälle des Ufers aus festem Gestein bedingt werden, der Fluss durch Abspülung des Materials von der Stelle, wo er auf Widerstand trifft und zur Krümmung seines Laufes genöthigt ist, durch Ablagerung desselben auf einer weiter unterhalb gelegenen Stelle im Lauf der Zeiten eine Veränderung seines Bettes bewirken. An die Stelle des alten Laufes treten Sandbänke, Inseln, Werder und Auen, und die Kunst weiss durch Stromreguli-

rungen, durch Anlage von Canälen, welche die Krümmungen abschneiden, sowie durch Uferbauten dem Fluss sein bestimmtes Bett anzuweisen und dadurch die Benutzung der Flüsse auch in ihrem Mittellauf für den Verkehr zu erleichtern. Häufig treten aber auch im Mittellauf Unterbrechungen durch Verengungen des Flussbettes in Gestalt von Stromschnellen und Wasserfällen auf, welche menschliche Macht vergeblich zu beseitigen sucht.

Mit dem Aufhören der Thalbildung, mit dem Eintritt des Flusses in das Tiefland, wo sein Niveau nur wenig höher als das des Meeres liegt, beginnt sein Unterlauf. Fast uferlos und in seiner Geschwindigkeit sehr verlangsamt, verliert er, je näher der Mündung, an Tiefe und breitet sich bei Hochwasser seeartig über seine niedrigen Ufer aus. Während er noch in seinem Mittellauf Kiesel und Geröll fortzubewegen vermochte, verliert er, je näher der Mündung, an Tragkraft; er ist nur noch im Stande, Sand und feinen Schlamm mit sich zu führen, den er da, wo er noch hinlängliche Kraft besitzt, in das Meer hinausführt und vor seinem Mündungsgebiet als eine halbmondförmige, nach der Seeseite convex gebogene Barre, sei es in Gestalt einer vom Meere bedeckten Sandbank oder einer hervorragenden Düne, ablagert. Häufig versperrt die Barre derartig die Flussmündung, dass Schiffe nur bei Hochwasser dieselbe passiren können, oder hindert jeglichen Verkehr auf dem Flusse mit der See. Durch Eindeichungen des Flussufers an der Mündung versucht man dem Flusse eine verstärkte Strömung zu geben, um die Barre zu durchbrechen, oder, was am wirksamsten erscheint, durch weit in das Meer hinausgeworfene Steindämme oder Molen. Das Finden des richtigen Mittels zur dauernden Beseitigung der Barre ist mithin eine Lebensfrage für den Aussenverkehr der Bewohner eines Stromgebietes. Die Barre ist ein Product der Gegenströmung des Flusswassers und der Meereswogen; jenes wird durch die Meeresfluth in seiner Bewegung gehemmt; der vom Fluss mitgeführte Schlamm sinkt, und während das Süßwasser seinen Weg unter dem herandringenden Salzwasser fortsetzt, werden vom Fluss die Schlamm Massen nach auswärts weiter zurückgeworfen, wo sie vermischt mit dem Sande des Meeres zur Barre anwachsen. Sie wechselt ihre Gestalt, je nachdem die Kraft der Strömung von der einen oder anderen Seite die überwiegende ist.

Mit der Barrenbildung eng verknüpft ist die der Delta's. Dieselbe findet an der Ausmündung grösserer Ströme in das Meer da statt, wo bei wenig geneigtem Meeresgrunde Uferwälle oder Barren die Mündungen derartig schützen, dass, ohne den Einwirkungen von Ebbe und Fluth unterworfen zu sein, der Fluss seine Sedimente ungehindert abzulagern vermag. Bei einem solchen Prozesse werden zunächst Lagunen entstehen, welche durch fortgesetzte Niederschläge entweder ganz oder theilweise ausgefüllt werden. Allmählig steigt der also neu gebildete Boden über die Oberfläche empor, seine Ränder erhöhen sich mehr und mehr, und der Widerstand, welchen der Hauptfluss an der Neubildung findet, nöthigt ihn, seine Gewässer in Arme zu zertheilen, welche, unter sich häufig durch kleine Wasserläufe in Verbindung stehend, das Anschwemmungsgebiet inselartig umschliessen. Seichte Seen, als Ueberreste der Lagunen, pflegen sich in solchem Anschwemmungsgebiet zahlreich vorzufinden. Der Punkt, von dem aus die Theilung des Flusses beginnt, heisst Gabelungsstelle oder die Spitze des Delta's, während das ihr gegenüberliegende Meeres- oder Seeufer (Deltabildungen zeigen sich sowohl am Meere wie an den Mündungen vom Hochgebirge kommender Flüsse in Gebirgsseen) als Basis bezeichnet wird.

Ist bei Flussmündungen, vor welchen Uferwälle gelagert sind, die Ein-

wirkung von Ebbe und Fluth auf den Flusslauf weniger bemerkbar, so tritt hingegen bei dem Fehlen von Uferwällen die Erscheinung auf, dass die Fluthwelle, dem Lauf des Flusswassers entgegenströmend, oft weit in den Fluss eindringt, das Wasser desselben mithin zurückstaut. Mit dem Eintritt der Ebbe findet nun ein Zurückströmen des angestauten Flusswassers mit erhöhtem Gefälle nach der Mündung zu statt. Schlamm- und Sandmassen, welche die Fluthzeit abgesetzt hat, werden mit grosser Gewalt in das offene Meer hinausgetragen, wo sie auf dem Grunde oder auch längs der benachbarten Küste sich ablagern. Diese Erscheinung wird als Aestuarium (früher fälschlich negatives Delta genannt) bezeichnet.

Das Gefälle (Fall des Wassers im Verhältniss zu einer bestimmten Strecke, z. B. 3 ‰, d. h. 3' auf einer Strecke von 100') bildet den Hauptfactor der mechanischen Thätigkeit der fliessenden Gewässer. Von dem Ursprung nach der Mündung zu mehr und mehr abnehmend, im Oberlauf und theilweise auch im Mittellauf bei allen grösseren Flüssen, deren Quellen im Hochgebirge liegen, um so stärker, bedingt das Gefälle mit seiner zerstörenden Kraft die Fortbewegung der durch die Unterwühlung durch das Wasser gelösten Stein-, Sand-, Kies- und Schlammmassen. Das starke Gefälle der von den Gebirgen herabströmenden Gewässer reisst Felsblöcke aus ihrer ursprünglichen Lage, es glättet und zerkleinert die Felsen, und die Gesteinsbruchstücke werden durch andauerndes Rollen und Aneinanderreiben zu Geschieben, welche im Flussbett fortgeschoben oder, weit über die Ufer hinausgeschleudert, die Grenzen der Wasserfluth bezeichnen und da, wo tiefe Schluchten in breite Thäler ausmünden, oft mächtige Schuttkegel bilden. Je weiter die Geschiebe fortgeführt werden, um so kleiner werden sie; dieselben werden bei längeren Flussläufen nach und nach in Sand und Schlamm, namentlich aber als schwebende Theilchen (Silt, Flusstrübe) zur Mündung des Flusses fortbewegt. Eine geringere Neigung des Flussbettes bedingt eine geringere Transportfähigkeit; hier werden Ablagerungen das Bett der Ströme erhöhen, der Strom wird über seine Ufer treten und dieselben mit Detritus bedecken, wenn nicht durch künstliche Dämme die Ufer in demselben Verhältniss erhöht werden, in welchem das Bett des Stromes sich erhöht.

Hingegen vertieft sich das Flussbett durch Erosion oder Auswaschung. Sie entsteht da, wo durch Verwitterung durch die Luft eine Zersetzung des Gesteins vorangegangen ist und die also mürbe gewordenen und zerfressenen Gesteinstheile durch fliessende Gewässer in Bewegung gesetzt werden. Je geringer die Widerstandsfähigkeit des Gesteins, um so rascher geht dieser Process vor sich. Rückwärts von dem Punkte aus, an welchem das Gewässer in die Ebene fällt, schreitet die Austiefung seiner Mulde fort (daher das langsame Zurückweichen des Niagara-falles), und je grösser die Kraft des Wassers, um so grösser die Geschwindigkeit der Auswaschung des Bettes in seiner Tiefe. Ein merkwürdiges Beispiel einer solchen Erosion bietet die Elbe. In der Urzeit lag ihr Bett in gleicher Höhe mit dem gegenwärtigen Plateau der sächsischen Schweiz und stürzte etwa in der Gegend von Pirna in das Flachland herab. Durch allmälige Unterwühlung des Gesteins rückte der Wasserfall stromaufwärts, grub sich tief in das Sandsteinplateau bis zur jetzigen Tiefe des Flussbettes ein. Noch prägnanter sind die schon oben erwähnten Cañones des Colorado in Arizona: auf 60 Meilen Länge ausgewaschene senkrechte Schluchten von 1000 bis 2000 Meter Höhe, von denen sich ein weit verbreitetes System gleich tiefer Schluchten abzweigt.

Bei den Erosionen haben sich durch Ablagerung des ursprünglichen

Alluvialbodens an beiden Flussufern häufig zonenartige Geröllablagerungen gebildet, welche als Uferterrassen bezeichnet werden und wo die ursprünglich steilen Abhänge durch nachstürzendes weiches Material in sanft ansteigende Böschungen umgewandelt worden sind (Thal von Aosta, Oberwallis). Ein Bild fortgesetzter Erosionsthätigkeit bieten vorzüglich die Wasserfälle und Stromschnellen, welche namentlich im Oberlauf der vom Hochgebirge kommenden Flussläufe, bei noch nicht vollständig entwickeltem Flusssystem aber auch im Mittellauf auftreten. Die über höhere oder niedrigere Stufen oder in starker Neigung des Strombettes herabstürzenden Wassermassen zerstören je nach der Härte des Gesteins in längerer oder kürzerer Zeit die durchbrochenen Schichten; sie suchen alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen und das Gefälle auszugleichen. Wo die Widerstandskraft des Gesteins eine grössere ist, fällt das Wasser als mächtige Katarakte oder als kleinere Cascaden in die Tiefe, hier und da noch in ihrer Mitte eine dem Angriffe Widerstand leistende Felsmasse umtosend, während an tiefer gelegenen Punkten, wo Steilufer das Flussbett einengen, theils verborgene, theils aus dem Wasser hervorragende Felsenklippen oder quer den Fluss durchsetzende Felsbänke Stromschnellen, Strudel oder Wirbel erzeugen.

Dem ausgebildeten Stromsystem, bei welchem die Entwicklung der drei oben angedeuteten Stufen des Flussbettes nachweisbar ist, steht gegenüber das unentwickelte Stromsystem. Zu letzterem zählen die Küstenflüsse, bei denen entweder wegen ihres geringen Gefälles oder wegen ihres jähen Absturzes von den nahe gelegenen Gebirgen herab die mechanische Thätigkeit des Wassers eine Ausgleichung des Bettes noch nicht bewirkt hat. Ferner rechnet man hierhin die Steppenflüsse, welche, obgleich häufig von grosser Längenausdehnung, sich in abgesonderte Wasserbecken ergiessen oder in ausgedehnten Sumpfreigionen von dem Erdreich aufgesogen werden, wobei der Ueberschuss des zugeführten Wassers durch Verdunstung entweicht.

Auch der Beobachtung der nicht fliessenden Gewässer, welche wir mit den allgemeinen Namen „Seen“ und „Sümpfe“ bezeichnen, wird der Reisende sich nicht verschliessen dürfen. Die Verbindung der Seen mit fliessenden Gewässern, die Bildung ihrer Ufer, ihre Grösse, Tiefe, Temperatur an der Oberfläche und in verschiedenen Tiefen, ihre Farbe, ihre chemische Analyse, ob dieselben süsses Wasser, ob sie Salz-, alkalisches oder kalkhaltiges Wasser enthalten, die Niveauverhältnisse, die periodischen Schwankungen des Wasserspiegels, die klimatischen Einflüsse, welche derselbe auf die umliegenden Gegenden ausübt, endlich die Scenerie werden die besondere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Jedes rings vom Lande eingeschlossene Wasserbecken wird bei grösseren Dimensionen als See, bei kleineren und den kleinsten Dimensionen als Teich (dieser Ausdruck auch oft für künstliche Wasseransammlungen gebraucht), Lache, Weiher, Pfuhl bezeichnet. Die Bezeichnung Binnen- oder Landsee schliesst aber keineswegs die Verbindung des Seebeckens mit einem Flusssystem aus, sei es dass ein fliessendes Gewässer seinen Abfluss in ein Seebecken hat, sei es dass letzteres einen Abfluss in andere fliessende Gewässer oder zum Meere hat. Nur pflegt man Seen, welche einem Flusssystem angehören, als Flussseen zu bezeichnen und diese dann den Binnenseen im engeren Sinne des Wortes, d. h. den Wasseransammlungen ohne Zu- und Abfluss, gegenüber zu stellen. Seen werden von Quellen, welche sich an ihren Rändern oder in ihrem Grunde befinden, durch Schneeschmelzen, sowie durch Flüsse gespeist; es werden sich in letzterem Falle häufig die schon oben bei den Flussmündungen in das Meer ge-

dachten Erscheinungen der Bildungen von Bänken und Delta's wiederholen (Delta der Rhone bei ihrem Einfluss in den Genfer See). Seeabflüsse sind entstanden, sobald ein quer durch das Thal sich hinziehender Damm aus losem Gestein dem Drucke der Wassermassen nachgegeben hat, ferner durch Erosionen oder dadurch, dass Erdbeben gewaltsam diesen Damm zerissen haben. In Seen mit Zu- und Abflüssen wird eine Strömung wahrnehmbar sein, welche je nach ihrer Richtung eine grössere Austiefung des Seebodens bedingt. Ab- und Zuflüsse können an den entgegengesetzten Enden eines Sees stattfinden (Genfer See), oder es kann der Zufluss an dem einen Ende, der Abfluss an der einen Seite oder umgekehrt (Comer-See), oder beide auf den gegenüberliegenden Seiten (Baikal-See), oder beide nahe an einander auf derselben Seite liegen (Ladoga-See). Auch giebt es Seen mit unterirdischem Abfluss, vorzugsweise in Kalksteingebirgen, in denen Höhlenbildungen vorherrschend sind. Zu dieser Kategorie gehören auch, weil gleichfalls fast ausschliesslich in kluftigen Kalksteingebirgen auftretend, die intermittirenden Seen: Wasserbecken, in denen das Wasser zu Zeiten in unterirdische Höhlen und Abzugscanäle zurückweicht, zu anderen Zeiten, namentlich bei nassem, stürmigem Wetter, aus jenen Höhlen mit Gewalt wieder hervorbricht und von Neuem das Seebecken füllt (Zirknitzer See); eine regelmässige Periodicität dieser Erscheinung findet aber nicht statt. Aehnliche langgezogene Höhlen im Kalkgebirge, welche z. B. die Ueberschüsse des Winterwassers und theilweise auch des Sommerwassers des Kopais-See aufschlürfen, werden in Griechenland allgemein als Katawothren bezeichnet.

Während nun bei diesen intermittirenden Seen vermöge ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit das Niveau ein veränderliches ist, bleibt im Allgemeinen das Niveau der Seen dasselbe, wenn nicht eine Verstopfung des Abflusses oder eine momentane Versiegung des Zuflusses eintritt. Auch können durch Temperaturwechsel bedingte Veränderungen des atmosphärischen Druckes eine unregelmässig eintretende und nur kurze Zeit dauernde Hebung des Seespiegels herbeiführen, ein Phänomen, welches beim Genfer See unter dem Namen „Seiches“ bekannt ist und mehrfach bei anderen Seen, wenn auch nicht in gleicher Stärke, sich zeigt.

Nach der Lage der Seen werden wir Niederungs-, Strand-, Thal-, Gebirgs-, Alpen-, Steppen- und Wüsten-, Krater- oder Trichterseen zu scheiden haben. Je nach der Beschaffenheit des Seewassers, welches theils von der seiner Zuflüsse, theils von der seines Beckens bedingt wird, lassen sich Süsswasser- und Salzseen unterscheiden. Die Mehrzahl der Seen, namentlich die Flussseen, gehören, weil sie ziemlich reines Wasser enthalten, in die erstere Kategorie. Andere enthalten jedoch mehr oder minder starke Auflösungen von Kochsalz; diese werden wir als Salzseen zu bezeichnen haben. Sie treten besonders häufig in der nordwestlichen Hälfte Asiens vom Caspischen Meere bis in die Hochebene der Mongolei auf, doch auch in anderen Erdtheilen (Salzsee in Utah). Hierher gehören auch diejenigen Wasserbecken, welche kohlen-saures und schwefel-saures Natron enthalten und unter dem Namen Natronseen bekannt sind. Salz- und Natronseen gehören fast ausschliesslich nach ihrer Lage zu den Steppen- und Wüstenseen.

Durch eine stetige Niveauabnahme eines Seebeckens wird sich dasselbe zunächst an seinen Rändern und dann mehr und mehr der Mitte nähernd in ein Sumpfbecken verwandeln, und umgekehrt können Sumpfniederungen, namentlich in Folge der Schneeschmelze und der atmosphärischen Niederschläge, temporär den Charakter von ausgedehnten, seeartigen Wasserflächen

annehmen, eine Erscheinung, welche fast bei allen Sumpfniederungen, besonders in den Tropengegenden, auftritt. Wie bei den Seen werden wir auch bei den Sümpfen, je nach ihrer Lage, Niederungs-, Gebirgs-, Steppen-, Wüsten-, Küsten- und Deltasümpfe zu scheiden haben. Die reiche Nomenclatur, welche in verschiedenen Gegenden auf Sumpfniederungen angewandt wird, bezeichnet jedoch nur in wenigen Fällen charakteristische Formen derselben (Bruch, Moor, Luch, Marsch, Fenn, Moos, Ried, letztere beide in Baiern gebräuchlich, Tundra, Swamps und theilweise auch die Creeks sind zum grössten Theil Localnamen und unterscheiden sich je nach der Zone, der sie angehören, hauptsächlich durch ihre eigenthümliche Vegetation, durch die grössere oder geringere Menge des stagnirenden Wassers, durch den Grad ihrer Unwegsamkeit und demgemäss durch den Anblick, den sie dem Beschauer gewähren).

Geologie.

Von

F. Frhr. v. Richthofen.

Je weiter die Kenntniss des vielgestaltigen, gemeinhin als „Physikalische Geographie“ bezeichneten Forschungsgebietes fortschreitet, desto klarer stellt es sich heraus, dass unter den Fundamentalwissenschaften, welche es ihr möglich machen, den Gründen der Erscheinungen, mit denen sie sich beschäftigt, nachzuforschen, die Geologie die wichtigste Stelle einnimmt; so wichtig in der That, dass man keinen Theil der Landoberfläche der Erde verstehen kann, ohne wenigstens einigermaassen einen Einblick in seine geologische Beschaffenheit und die Vorgänge, welche gestaltend wirkten, gewonnen zu haben. Wohl kann man nach den Höhenverhältnissen die Form und Vertheilung von Gebirgen und Hochebenen, Thälern und Niederungen, Halbinseln und Inselgruppen, Meeresküsten und Flussbecken kennen lernen, und ihre Bedeutung für die Verbreitung meteorologischer Vorgänge, oder der Pflanzen und Thiere feststellen. Aber ebenso wie wir in der organischen Natur ein Verständniss der Morphologie nur auf Grundlage anatomischer, histologischer und embryologischer Forschung gewinnen können, so lässt sich eine tiefere Erkenntniss der einzelnen Elemente der Gestalt der Oberfläche der Erde nur dann erreichen, wenn wir uns mit ihrem allgemeinen inneren Bau, der Art und Anordnungsweise der einzelnen Bestandtheile und ihrer Entwicklungsgeschichte im Verhältniss zum Erdganzen, sowie mit jenen Vorgängen fortdauernder Veränderungen bekannt gemacht haben, welche ihr Analogon in den physiologischen Processen der organischen Welt haben. Will daher der Reisende für das tiefere Verständniss der Länder, welche er erforscht, beitragen, so muss er seine Thätigkeit einigermaassen der Geologie zuwenden. Allerdings nur einem gewissen Theil derselben; denn es gibt andere Gebiete dieser umfangreichen Wissenschaft, welche dem geographischen Gebiet fern liegen, und welche nur der Geolog von Fach auf Reisen berücksichtigen wird. Auf diese soll im Folgenden nur in geringem Grade eingegangen werden.

Beispiele der Elementar-Untersuchung. — Um uns zunächst in ganz allgemeiner Weise der hier in Betracht kommenden Aufgaben klar zu werden, setzen wir den einfachen Fall, den sich jeder nach Vorbildern in seiner

Heimath oder ihm sonst bekannten Ländern vergegenwärtigen kann: ein Reisender, mit geringer Vorbildung in der Geologie, aber bestrebt, die ihm gebotene Gelegenheit nach seinen Kräften zur Vermehrung der Kenntniss auf diesem Gebiet zu benutzen, lange auf einem Gebirgspass an, und sehe vor sich ein Thal ausgebreitet durch das sich ein Fluss schlängelt, jenseits dessen ein anderer Hügelzug mit einzelnen höheren Gipfeln in der Ferne ansteige. Sein Weg führe ihn quer über das Thal hinweg, und an dem jenseitigen Gehänge allmählig hinan nach dem Kamm. Gebirge und Thal, wenn auch ihrer Existenz nach bekannt, seien doch in ihrem inneren Bau noch unerforscht. Was kann er thun, um sein Bestreben auszuführen und Beobachtungen mitzubringen, die einen wirklichen Einblick in die geologischen Verhältnisse gewähren, oder die Geologie nach anderen Richtungen hin zu fördern geeignet sind? Die meisten schrecken vor der Schwierigkeit der Aufgabe zurück, oder nehmen im besten Falle einige planlos aufgelesene Gesteinsstücke mit, deren Fundorte sie später vielleicht noch annähernd anzugeben wissen, und erwarten von dem Geologen, dass er daraus den Bau des durchreisten Landes construiren. Diese Methode ist unzureichend, und die ganze auf das Sammeln und Fortschaffen der Gesteinsstücke verwendete Mühe vergeblich.

Nehmen wir an, der Reisende bestimme die Lage des Passes astronomisch, um ihn als einen der Stützpunkte für die topographische Karte der bereisten Gegend, welche er unzweifelhaft anfertigt, zu benutzen. Zunächst wird er da die Namen des Passes, des Gebirges, in dem er liegt, des Flusses im Thalgrunde, der daran liegenden Ortschaften und des jenseitigen Höhenzuges zu erfragen suchen, sowie auch diejenigen der in der Ferne sichtbaren hohen Gipfel, deren Richtung er mit dem Compass bestimmt. Sodann schlägt er, nach den später anzugebenden Regeln, ein Handstück des Gesteins, das am Pass ansteht, und nimmt es mit, entweder zum Beleg seiner Beobachtungen und zu eigenem späteren Studium, oder um es nach der Rückkehr einem Fachmann vorzulegen. An und für sich hat das einzelne Stück keinen Werth. Es erhält ihn zum Theil dadurch, dass der Ort, von wo es stammt, sich auf der Karte genau bestimmen lässt. Doch hat es auch dann noch eine untergeordnete Bedeutung; denn es lässt sich nicht ersehen, ob das Gestein örtlich beschränkt vorkommt oder ein ganzes Gebirge zusammensetzt, noch auch, von welchem Alter es ist, und wie es sich zur Structur der ganzen Gegend verhält. Um eine Grundlage für die Beantwortung dieser Fragen zu schaffen, wird die Beobachtung bei dem Abstieg nach dem Thal ohne Unterlass fortgesetzt. Vielleicht bildet die Gebirgsart, sei sie Granit oder Kalkstein, oder von anderer Art, den ganzen Abhang, und dann genügt die einfache Constatirung dieser Thatsache im Tagebuch. Vielleicht macht sie bald anderen Gesteinen Platz, indem z. B. Schieferthon und Kalkstein auf Granit folgen, oder unter einer Basaltdecke, in der der Pass sich befindet, Glimmerschiefer zu Tage tritt. In solchem Fall wird unser Reisender auch von diesen Gesteinen Handstücke schlagen, und auf der Karte die Stellen bezeichnen von denen sie herrühren, sowie im Tagebuch und auf Zetteln, die den Gesteinsstücken beigelegt werden, ihre Reihenfolge genau notiren. Ebenso wird er bei dem jenseitigen Anstieg verfahren. Vielleicht ist er so glücklich, in einer Schicht einige Versteinerungen zu finden. Mit dem Werth, den sie für den Geologen haben, vertraut, wird er sie besonders sorgfältig sammeln, und genau feststellen, aus welchem Theil seiner Reihenfolge von Gesteinen sie stammen.

So wird die Art und das Nebeneinander der Gesteine in mehr oder

minder vollkommener Weise ergründet werden. Aber die Beobachtungen müssen sich nothwendigerweise auch auf das Uebereinander erstrecken, damit man erkenne, in welcher Weise die einzelnen gesammelten Gesteine an dem Aufbau der beiden Gebirgszüge theilnehmen, und wie sie sich zunächst dem Wege des Reisenden weiter verbreiten. Wie viel er von diesen Verhältnissen feststellen kann, wird sich zum Theil nach der Gunst der Umstände richten. Ein Schnitt quer durch das Gebirge, wie ihn zuweilen die in engen Querspalten gelegenen Theile von Flussbetten bieten, würde am geeignetsten sein, sie zu erschliessen. Dem zunächst an Werth kommt ein Einschnitt in die Oberfläche von der Kammhöhe nach dem Fuss des Abhanges. Die gegenseitigen Begrenzungsflächen der einzelnen Gesteine sind hier zu jeder Seite entblöst und geben sich in ihren Durchschnittslinien mit den Wänden der Schluchten zu erkennen, besonders wenn diese zu grosser Tiefe ausgewaschen sind. Verlängert man die Flächen nach dem Innern des Berges, so erhält man ein Bild des Gebirgsbaues, welches wenigstens annähernd richtig sein kann.

Angenommen, der Weg von unserem Pass nach dem Thal führe in einer tiefen Schlucht hinab, so wird es sich hier zeigen, in welcher Weise entweder die Schichten eines und desselben Gesteins, oder die geschichteten und ungeschichteten Massen verschiedener Gesteine gegen einander angeordnet sind. Hat man es mit Sandstein, Schieferen oder Kalkstein zu thun, so lagern die Schichten selten horizontal, sondern sind unter einem gewissen Winkel, oder auch unter verschiedenen Winkeln geneigt, und zwar ist meistens die Neigung entweder in das Innere des Gebirges oder von ihm hinweg gerichtet. Um das Verhältniss zu einem klaren und kurzen Zahlenausdruck zu bringen, bestimmt man mit dem Compass die Richtungen des Streichens und des Fallens — d. h. 1) die Himmelsrichtung einer auf der Schichtungsfläche gedachten Horizontallinie, und 2) diejenige, nach welcher die Fläche geneigt ist, sowie den Winkel, welchen die Neigung mit der Horizontalebene bildet. Bei einiger Erfahrung wird es auch gelingen, anzugeben, wie viel Zehner oder Hunderte oder Tausende von Metern die Mächtigkeit — d. h. die Dicke in einer zu den Schichtebenen rechtwinkligen Richtung — einer durch gleiches oder ähnliches Gestein ausgezeichneten Reihenfolge beträgt. Da nun in der Regel ein und dasselbe Gestein mit wenig wechselnder Mächtigkeit weithin fortsetzt, so lässt sich, wenn die Streichrichtung bekannt ist, auch der Bau der beiderseits an die Schlucht angrenzenden Theile des Gebirges im Allgemeinen übersehen. Treten in einem der Gesteine Kohlen oder Erze auf, so muss auch die Art, in der diese vorkommen, genau untersucht werden.

So wird der fortdauernd beobachtende Reisende ohne viel Mühe, und mit desto weniger je mehr seine Erfahrung wächst, eine Reihe von That-sachen sammeln, aus deren Vereinigung sich ein, wenn auch noch unvollkommenes Bild von dem Gesteinsaufbau, d. i. von dem geologischen Bau der beiden das Thal einschliessenden Gebirge machen lassen wird. Er kann es vervollständigen, indem er mit besonderer Sorgfalt die äusseren Formen des Gebirges auf seiner Karte niederlegt, die Lage der Hauptgipfel, die Richtung der Kämme und Abfälle, der Nebenhöhen und Wasserläufe, die Neigungswinkel der Gehänge in verschiedenen Höhen, die Richtung des Hauptthales, so weit es sichtbar ist, die Breite, Form und Beschaffenheit des Flussbettes, die Geschwindigkeit des Stromes, die Ausdehnung der Alluvien zu seinen Seiten, ihre Abgrenzung entweder durch eine ebene Terrasse oder unmittelbar durch die Gebirgsgehänge, untersucht; und das Verständniss wird

erleichtert werden, wenn möglichst viele Höhenbestimmungen gemacht werden. Wie diese hier in flüchtigen Umrissen angedeuteten Beobachtungen ausgeführt werden, worauf besonders das Augenmerk zu richten ist, und welche anderweitige Gesichtspunkte dabei noch festzuhalten sind, dies ist der Zweck unserer Auseinandersetzung.

Aehnlich wie in dem bisher angenommenen Fall der aufmerksame Beobachter, auch ohne bedeutende Vorkenntnisse, mitten im Lande ein Bild von den geologischen Verhältnissen zu liefern im Stande ist, das dem Fachgelehrten verständlich ist und von ihm zu weiteren Schlüssen benutzt werden kann, so vermag er dies auch bei dem Landen auf einer Insel oder an einer fernen Küste zu thun, mit dem Unterschied, dass hier die Aufgabe eine ungleich leichtere ist. Zunächst bietet sich ausgiebige Gelegenheit zum Sammeln, da Raum und Gewicht bei einer Reise zu Schiff keine Beschränkung auferlegen. Die topographische Küstenaufnahme ist vorhanden und kann mit geringer Mühe nach dem Innern hin vervollständigt werden. Es ist in diesem Fall stets das Beste, zunächst sich von einem hohen Aussichtspunkt eine Uebersicht der Gegend zu verschaffen, dann die Details derselben eingehend zu studiren, und schliesslich noch einmal das Ganze zu überblicken.

Allgemeine Aufgaben. — Es lassen sich aus den angeführten Beispielen im Umriss die Aufgaben übersehen, welche sich der geologischen Forschung in einer gar nicht oder unvollkommen bekannten Gegend bieten. Sie bestehen im Sammeln, Beobachten und Aufzeichnen, und diese drei Beschäftigungen müssen fortdauernd Hand in Hand gehen. Am wichtigsten ist die Beobachtung, aber nur wenn sie durch die beiden anderen Arten der Thätigkeit controllirt und in ihrer Ursprünglichkeit zu Papier gebracht wird. Die Gesichtspunkte, welche sich ihr bieten, sind, wenn wir die im vorigen Abschnitt dieses Buches abgehandelten Oberflächenformen ausser Acht lassen, die folgenden: 1) der Charakter und die Arten der Gesteine und Formationen, welche das Land zusammensetzen; — 2) die Art, in welcher dieselben einerseits von unten nach oben, und andererseits in Beziehung auf die Zeitalter ihrer Entstehung aufeinander folgen; — 3) die Stellung welche sie in der Geschichte der Erde einnehmen, d. h. ihre Einreihung in die nach ihrer chronologischen Folge bestimmten Formationsreihen anderer Länder; — 4) die Art, in welcher sie sich zu Gebirgen aufbauen oder die Zwischenräume zwischen ihnen ausfüllen; — 5) die Art, in welcher diese Gebirge gegenseitig angeordnet sind und Länder oder Inselreihen zusammensetzen; — 6) die Veränderungen, welche an deren Oberfläche durch Verwitterung, Erosion, Wirkung des Eises, Ablagerung von Zerstörungsproducten, vulcanische Thätigkeit, Hebung oder Senkung, Ebbe und Fluth und andere Agentien nachweislich stattgefunden haben und noch stattfinden; — 7) die technische Verwerthbarkeit einzelner Gesteine und das Auftreten nutzbarer Mineralstoffe in ihnen.

Erforderliche Vorkenntnisse. — Die vorstehenden Aufgaben wird der Einzelne, je nach dem Grad seiner Vorkenntnisse und praktischen Erfahrung, sowie nach dem Maass der ihm gebotenen oder von ihm aufgesuchten Gelegenheiten, in mehr oder minder vollständiger Weise zu lösen vermögen. Keiner sollte vor den scheinbaren Schwierigkeiten zurückschrecken; denn in wenigen anderen Wissenschaften setzen elementare Beobachtungen so wenige und so leicht zu erwerbende Vorkenntnisse voraus, als in der Geologie. Jeder, der guten Willen hat, kann durch verständiges und planmässiges Sammeln von Gesteinsstücken Fragmente zur geologischen Kenntniss liefern; und wer mit offenen Augen reist, kann eine Menge werthvoller Beobachtungen

nach den unter 2, 4, 5, 6, 7 (vor. S.) angeführten Gesichtspunkten, sowie Material zur Lösung der in 1 und 3 enthaltenen Fragen mitbringen. Je vollkommener die Vorbildung, desto höher können natürlich die Leistungen sein, und desto grösseren Werth wird jede einzelne Beobachtung haben. Absolut erforderlich ist die Kenntniss der verbreitetsten Gesteine und der gebräuchlichsten geologischen Ausdrücke. Die letzteren kann sich jeder durch das aufmerksame Lesen populär geschriebener Bücher aneignen. Die Gesteine aber und die richtige Anwendung ihrer Namen lassen sich nur nach Schautstücken in Sammlungen einprägen, wenn man sie unter kundiger Anleitung gründlich besichtigt und studirt. Eine bessere Vorbereitung für Reisen ist es, eine eigne Sammlung anzulegen, die sich auf das Wichtigste beschränkt, und an deren Hand man die betreffenden, allgemein verständlichen Werke mit Sorgfalt liest. Wer sich des ABC in der Geologie unkundig erweist, indem er beispielsweise (wie dies häufig geschieht) einen Sandstein oder Trachyt, weil sie körnig sind, als Granit beschreibt, oder einen versteinierungsführenden Kalk als Muschelkalk bezeichnet, oder jede kesselförmige Vertiefung einen Krater nennt, der kann höchstens durch Sammeln etwas leisten, aber seine aufgezeichneten Beobachtungen werden als verlorene Mühe betrachtet werden. Wie wichtige Beiträge für die grossen geologischen Fragen ein Zoolog oder Botaniker, der sich nebenher geologische Kenntnisse angeeignet hat, leisten kann, das zeigen die Muster-Reisewerke von Charles Darwin, Hooker und Alfred Russell Wallace. Das Studium des Reisewerks des erstgenannten insbesondere ist jedem Reisenden anzuempfehlen.

Die Leichtigkeit, mit der man sich eine Menge des Wissenswürdigen in der Geologie aneignen kann, führt zu einer gefährlichen Klippe, an welcher viele scheitern. Sie besteht in der Versuchung, welche die Geologie zu weitgehenden theoretischen Schlussfolgerungen bietet. Der Laie ist zu denselben am meisten geneigt, und kaum minder sind es diejenigen, welche entweder ausschliesslich im Felde oder ausschliesslich im Studirzimmer (besonders am Tisch des chemischen Laboratoriums) gearbeitet haben. Die Vorsicht wächst mit der Kenntniss und Erfahrung, und die Schlussfolgerungen von höheren Gesichtspunkten aus sollten denen überlassen bleiben, welche neben einer ausgedehnten Uebung im Felde die Fähigkeit zu gründlichem geologischem Arbeiten im Studirzimmer erlangt haben. Je reiner sich die Beobachtung von der Theorie hält, desto werthvoller ist sie. Dies kann nicht genug beherzigt werden.

Ich will nun im Folgenden auf die Mittel eingehen, wie die geologischen Aufgaben bei Forschungsreisen zu lösen sind, und mit der Ausrüstung als der nothwendigen Vorbedingung beginnen. Es soll dabei nur selten über das hinausgegangen werden, was der Anfänger zu leisten vermag. Der gebildete Geolog kennt seine Aufgabe besser als sie hier dargestellt werden könnte.

Ausrüstung.

Hammer, Compass und Aneroid sind das Handwerkszeug, ohne welches geologische Arbeit nicht ausgeführt werden kann. Nächst einem Notizbuch ist ausser ihnen nicht viel nothwendig.

Der Hammer muss besonders für den Zweck gearbeitet sein. Von seiner Beschaffenheit hängt viel ab. Mit einem schlechten hat man doppelte Arbeit, erhält unvollkommene Handstücke und unterlässt oft das Sammeln; er nutzt sich leicht ab, wird dann beinahe unbrauchbar, und man hat viel Verdross. Der dazu verwendete Stahl muss die grösste Härte besitzen, welche sich ohne zu

grosse damit verbundene Sprödigkeit erreichen lässt. Seiner Herstellung sind nur einzelne, besonders geschickte Stahlschmiede fähig, und gute Hämmer sind eine Seltenheit. Von nicht geringer Wichtigkeit ist die Form des Hammers, und in dieser Hinsicht gehen die Ansichten weit auseinander. Es giebt eine Berliner, Wiener, schweizerische, italienische, englische, indische, californische etc. Form, und jede Schule hält die ihr eigenthümliche für die beste. Nachdem ich mich periodisch verschiedener Hämmer bedient habe, bin ich bei dem von Prof. Whitney bei den geologischen Aufnahmsarbeiten in Californien eingeführten stehen geblieben, da er den wirksamsten Schlag und die genaueste Arbeit gestattet. Als Regeln haben zu gelten: ein Ende ist scharf, das andere stumpf; die Schneide des Keilendes ist dem Stiel parallel; das stumpfe Ende ist parallelopipedisch (nicht abgestutzt-pyramidal, wie in den meisten Fällen); die Endfläche desselben (also auch der Querschnitt des Hammers am stumpfen Ende) ist ein Rechteck, dessen längere Seiten dem Stiel parallel sind; als das günstigste Grössenverhältniss fand ich 1 Zoll und $1\frac{1}{8}$ Zoll für die vier Seiten des Rechtecks, und $4\frac{1}{4}$ Zoll für die ganze Länge des Hammers; das Centrum des Loches für den Stiel muss mit dem Schwerpunkt zusammenfallen, und das Loch muss oben weiter sein als unten, damit, wenn das obere Ende des Stiels verkeilt ist (mit hölzernem, oder mit Widerhaken versehenem eisernen Keil), der Hammer bei dem Gebrauch nicht herausfliege; der Stiel muss 15 bis 16 Zoll lang, vom zähesten und härtesten Holz gearbeitet (z. B. amerikanischem Hickory-Holz), und am Ende so abgerundet sein, dass er zu sicherem Schlag bequem in der Hand ruht. Es ist gut, einige Reservestiele und Keile mit sich zu führen. Man trägt den Hammer entweder in einem ledernen Futteral, das an einem Leibriemen auf der linken Seite des Körpers angebracht ist, oder an der Seite der ledernen Umhängetasche.

Der Compass sollte so eingerichtet sein, dass er zu verschiedenen Zwecken dient, und in Anbetracht seiner Wichtigkeit von vorzüglichster Construction sein. Erst bei mindestens $2\frac{1}{2}$ zölligem Durchmesser des Theilungskreises kann die wünschenswerthe Genauigkeit der Gradtheilung und Ablesung erreicht werden. Uhrförmige Instrumente sind nur ein unvollkommener Nothbehelf. Das runde Gehäuse sollte auf einer quadratischen Messingplatte so befestigt sein, dass die *N-S*-Linie einer Seite parallel ist, und das ganze Instrument in einem genau gearbeiteten Holzkasten liegen, so dass bei dem Aufklappen desselben eine 6 Zoll lange Seite der *N-S*-Linie parallel ist. Man hat dann nur diese Seite derjenigen Linie parallel zu halten, deren Abweichung von dem magnetischen Meridian bestimmt werden soll, und kann das Resultat unmittelbar mit grosser Schärfe an der Stellung der Nadel ablesen. Die letztere sollte stets stabförmig, und der Kreis in 360 Grade getheilt sein. Doch ist auch eine Theilung jedes Quadranten in 90 Grad, wobei die Nullpunkte mit den Polen zusammenfallen, praktisch. Früher theilte man den geologischen Compass in die bergmännisch gebräuchlichen 24 oder zweimal 12 „Stunden“ ein; dies ist heute zum Theil noch gebräuchlich, muss aber als ganz ungenügend bezeichnet werden, da die Ablesungen auf einen Grad genau geschehen müssen.

Die angegebene Methode der Ablesung ist besonders bei Streichrichtungen anstehender Schichtgesteine oder eines Ganges anzuwenden. Sie ist ungenügend, wo die Richtungslinie von dem Standpunkt des Beobachters nach einem entfernteren Gegenstand, z. B. dem Gipfel eines Berges, bestimmt werden soll. Dazu muss an dem Compass eine Azimutvorrichtung angebracht sein. Ein einfaches Visir zum Aufklappen, bestehend in einem senkrecht stehenden, mit einem Schlitz versehenen Stäbchen am Südende, und einem ebenso gestellten, mit einem Faden, am Nordende der Gradeintheilung, ist vollkommen zweckentsprechend.

In England wendet man häufig den sogenannten prismatischen Compass an. Die Nadel trägt ein rundes Kartenblatt mit Gradeintheilung, und letztere wird, vergrössert, durch ein Prisma abgelesen. Da jedoch die Ablesung nur durch letzteres geschehen kann und die Nadel mit ihrer Belastung sehr langsam schwingt, so sind diese Instrumente nur dann brauchbar, wenn man den Compass fest und in einer für diese Art des Ablesens bequemen Lage aufstellen kann; und da dies sehr häufig nicht möglich ist, so beeinträchtigt man leicht die Genauigkeit, welche die Methode zu erhöhen bestimmt ist.

An jedem geologischen Compass befindet sich ein Klinometer, um den Winkel zu bestimmen, den eine geneigte Linie oder Fläche mit dem Horizont bildet. Die Genauigkeit der Bestimmung wird um so grösser sein, je länger die gerade Linie des Instrumentes ist, welche man in die zu bestimmende Neigung

zu bringen vermag. Fällt der Nullpunkt des Klinometers mit dem *W*- oder *O*-Punkt des Compasses zusammen, so kann man die sechszöllige Seite des geöffneten Kästchens zum Anlegen auf einer geneigten Schichtfläche benutzen und sehr befriedigende Resultate erhalten. Will man aber die Neigung einer im Profil gesehenen sanften Böschung, oder der Gehänge eines vulcanischen Kegels messen, so hält man die untere Langseite des Kastens so, dass sie mit der Profillinie zusammenfällt, und wird, wenn man das Mittel aus zwei oder drei Ablesungen nimmt, das Resultat bis auf einen halben Grad genau bekommen können.

Das nächst wichtigste Instrument ist das Aneroid, um, ausser jenen Höhenbestimmungen, die für das Relief der Gegend wichtig sind, auch fort-dauernd kleine Höhendifferenzen zu beobachten, und dadurch die Mächtigkeit von Schichtengruppen, die Erhebung einer Schotterterrasse über die Thalsohle, oder alter Küstenränder über dem Meere, die Tiefe von Schluchten, die Höhe bis zu welcher Gletscher oder Lavaströme herabreichen, das Gefälle von Gebirgsbächen, und vieles Andere, das sich der Beobachtung ohne Unterlass bietet, sogleich zu bestimmen. Den besten Dienst thut ein kleines Instrument in Gestalt einer Uhr, das man an einer um den Hals geschlungenen Schnur, in einer etwas höher als die Uhr angebrachten Westentasche trägt. Dort ist es Störungen am wenigsten ausgesetzt und bewahrt am gleichmässigsten die Temperatur; zugleich auch hat man es stets bequem zur Hand. Der Reisende sollte aber niemals ohne zwei andere controllirende Aneroide sein. Der Gang eines jeden muss auf das genaueste bekannt und in Tabellen niedergelegt sein. Erfährt ein Instrument einen Stoss, wie es bei längeren Reisen unvermeidlich vorkommt, so vergleicht man es sofort mit dem anderen und notirt, falls es seinen Gang verändert hat, die von nun an bis auf weiteres constant bleibende Abweichung. Da man zuweilen bei zwei Aneroiden eine grössere Differenz im beiderseitigen Stand beobachtet als sie vorher hatten, ohne die Veranlassung zu kennen, und ohne daher zu wissen, welches von beiden seinen Gang geändert hat, so ist ein drittes Instrument erforderlich, dessen Vergleichung sofort zeigt, wo und wie gross der Fehler ist. Sind auch Unfälle dieser Art bei sorgfältiger Behandlung selten, so sind sie doch nicht zu vermeiden (z. B. bei einem Fall, dem Umstürzen des Wagens, dem Abwerfen des Gepäcks durch Lastthiere u. s. w.). Ein einziges Aneroid ist deshalb gänzlich werthlos. Die Mitnahme eines zweiten bietet einige Garantie, aber nur wenn ihrer drei sind, kann man die Fehler ganz eliminiren. — Die Reserve-Aneroide packt man mitten in Wäsche hinein, wo sie recht gut geschützt sind. — Am besten ist es natürlich, ein Quecksilberbarometer zur Vergleichung bei der Hand zu haben. Bei langen geologischen Landreisen ausserhalb Europa ist jedoch ein solches Instrument oft schwierig zu transportiren; man muss stets auf seinen Verlust gefasst sein, und daher selbst dann noch die Dreizahl der Aneroide beibehalten. —

Die Stationsbarometer, welche jeder Reisende besitzt, aber entweder an Bord oder auf der Hauptstation zurücklässt, um periodisch die anderen Instrumente mit ihm zu vergleichen, lasse ich hier ausser Acht, da sie nicht zur eigentlich geologischen Ausrüstung gehören.

Der Gebrauch des Aneroids wird wesentlich vervollständigt durch ein Horizontglas, eine ungefähr einen Fuss lange Röhre, an deren einem Ende sich ein kleines rundes Visir befindet, während am anderen in der Mitte der Oeffnung ein Faden gespannt ist. Durch eine prismatische Vorrichtung sieht man, wenn das Instrument genau horizontal steht, und der Faden ebenso gerichtet ist, eine in einer kleinen Libelle befindliche Luftblase, sobald sie in der Mitte steht, von einem zweiten am Prisma angebrachten Faden durchschnitten. Der erste Faden bezeichnet daher den Horizont. Beobachtet man nun von einem Punkt, dessen Höhe das Aneroid anzeigt, den Horizont ringsum, so lassen sich manche geologisch interessante Niveauverhältnisse sofort bestimmen. Bei einem mehrgipfeligen Gebirge z. B. kann man, wenn man einen Gipfel bestiegen hat, die Höhe der andern annähernd durch Schätzung bestimmen, wenn man beobachtet, wo die Horizontlinie sie schneidet.

Thermometer führt selbstverständlich der Reisende in Mehrzahl mit sich. Ausser der Temperatur von Quellen, insbesondere Thermen, sollte man damit diejenigen des Wassers in sehr tiefen Brunnen fleissig bestimmen, da sie sich der mittleren Temperatur des Ortes hinreichend nähert um diese annähernd festzustellen.

Der Geolog braucht nothwendig eine aus starkem Leder fest genähte Tasche, die an einem über die Schulter geschlungenen Riemen an der Seite

getragen, und nicht gleich andern Sachen den Trägern oder Führern übergeben wird. Er findet sich von diesen sehr häufig isolirt, und muss Fundstücke von Gesteinen wenigstens eine Weile selbst zu transportiren bereit sein, ausserdem aber die Instrumente, ein Skizzenbuch und Notizbuch stets zur Hand haben. Auch darf es nie an einer Quantität weichen Packpapiers fehlen, um vorkommenden Falls eine Menge von Steinen hineinzuwickeln. Hinsichtlich der Form der Notizbücher hat jeder seine Liebhaberei; doch sollte der Geolog ein möglichst einfaches Buch stets in der Rocktasche bei sich tragen, um es jederzeit zu rohen Aufzeichnungen und flüchtigen Bemerkungen zur Hand zu haben *).

Aus dem vermittelt der angegebenen einfachen Utensilien gesammelten Material von Gesteinsproben, sowie von vorläufig aufgezeichneten Beobachtungen, wird am Abend jedes Tages das Tagebuch mit Gewissenhaftigkeit und Ausführlichkeit mittelst Feder und Tinte geschrieben; zugleich werden die geologischen Skizzen mit mehr Sorgfalt ausgeführt. Das Tagebuch sollte in Gross-Octav- oder Quartformat sein. Bei Einzeichnungen wird es Jedem zu statten kommen, farbige Stifte mit sich zu führen, um sie für geologische Unterscheidungen sofort anzuwenden. Auch ein Farbenkasten ist erforderlich, um die Verbreitung einzelner Formationen gleich auf der Karte aufzutragen.

Dies ist Alles was der Geolog nothwendig braucht. Je nach Bedürfniss wird mancher noch mehr mit sich führen. Wer darauf ausgeht, an Orten, von denen das Vorkommen von Versteinerungen bekannt ist, grössere Sammlungen anzulegen, der wird eine Keilhaue, einen schweren Hammer, einige Meissel und andere Instrumente mitnehmen. Wer beabsichtigt, an Ort und Stelle Untersuchungen von Mineralien und Erzen auszuführen, der belastet sich vielleicht mit einem Löthrohrapparat, Mikroskop und Reagenzkasten, wird aber davon wenig Gebrauch machen können, wenn er nicht an einzelnen Orten einen längeren Aufenthalt nimmt. Will einer geologische Karten anfertigen und muss er dazu auch die topographische Grundlage selbst construiren, so hat er Alles mitzunehmen was dazu gehört.

Ein nicht unwichtiger Theil der allgemeinen Ausrüstung, der aber nach den Bedürfnissen der einzelnen sehr verschieden sein wird, betrifft Karten und Bücher. Von Karten sollte der Reisende, der nur einigermaassen geologisch zu beobachten gedenkt, das beste mitnehmen was von dem betreffenden Lande existirt, und fortwährend bei sich führen, um Einzeichnungen zu machen und sich über den weiteren Verlauf der Flüsse und Gebirge, welche er sieht, zu orientiren. Wo es keine giebt, vermisst sie der Geolog mehr als ein anderer Reisender, und wo sie existiren, da sind sie ihm mehr als diesem unentbehrlich. Die Bücher theilen sich in zwei Klassen. Denn einerseits besitzt der Reisende eine Bibliothek, die er an Bord oder an Orten, wo er sich länger aufhält, mit Musse studirt. Hier wird der Laie seine geologischen Lehrbücher, der Geolog von Fach seine specielleren Nachschlagewerke haben. Auf Reisen im Innern eines Landes aber sollte

*) Den kleinen, höchst unbedeutend erscheinenden, und doch sehr beherzigenswerthen Wink möchte ich hinzufügen, dass der Geologe stets einen guten langen Bleistift an einer Schnur befestigt um den Hals trage, weit genug herabhängend, um ihn mit Bequemlichkeit zu gebrauchen. Fortdauerndes Notiren ist das Wesen genauer geologischer Aufnahmen, und vielfache Erfahrung hat mir gezeigt, dass man mehr als doppelt soviel notirt, wenn man den Bleistift bei der Hand hat. Ist die Mühe, ihn anderswo hervorzuholen noch so gering, so ist dies doch hinreichend, um oft einen Aufschub und dadurch eine Vernachlässigung der Notiz zu veranlassen. Ein einziges Wort, kaum leserlich in das Rohbuch geschrieben, ist häufig hinreichend, um am Abend im Tagebuch zu einer längern Beschreibung ausgesponnen zu werden, deren Abwesenheit man später sehr empfinden würde.

man sich möglichst beschränken. Existiren bereits Abhandlungen über die Geologie desselben, so sollte man sie mit sich führen, denn sie regen ausserordentlich an. Ausserdem aber genügt ein kurzes Compendium, in dem man zeitweise sein Gedächtniss auffrischen kann. Zum Studium ist in der Regel keine Zeit; und der Laie mühe sich nicht damit ab, unterwegs nach Beschreibungen Gebirgsarten kennen lernen oder bestimmen zu wollen. Da würde er sicher auf Irrwege gerathen. Wer vorher die gewöhnlichen Gebirgsarten nicht zu unterscheiden weiss, der kann es unter solchen Verhältnissen aus dem besten Buch nicht lernen, und handelt weit richtiger, keine Namen anzuwenden.

Als das beste Compendium, das in gedrängter Kürze einen reichen und wohlgeordneten Inhalt hat, mit der vollsten Reife geologischer Durchbildung geschrieben ist und viele neue fruchtbringende Ideen birgt, aber auch grade deshalb die vorhergegangene Lectüre anderer Bücher voraussetzt, ist F. v. Hochstetter's Geologie, in dem vortrefflichen Werk: Allgemeine Erdkunde (ein Leitfaden der astronomischen Geographie, Meteorologie, Geologie und Biologie) von Hann, Hochstetter und Pokorny (Prag 1872), das zugleich das Wichtigste aus anderen Wissenschaften in ähnlicher Kürze zusammengedrängt enthält, zu empfehlen. Es ist jedem Reisenden zu rathen, dieses Buch mit sich zu führen. Bei den folgenden Betrachtungen ist dies vorausgesetzt, und ich habe mich daher betreffs der Erläuterung geologischer Ausdrücke und der zahlreichen instructiven Abbildungen, welche hier, da sie kaum besser gegeben werden können, weggelassen sind, mehrfach (unter der Form: „Hochst. S...“) auf jenes Werk bezogen. — Wer etwas Ausführlicheres wünscht, dem ist ausserdem das nach einiger Vorbildung leichtverständliche, durch Klarheit und Kürze des Ausdrucks sich rühmlichst auszeichnende Werk „Elemente der Geologie“ von Hermann Credner (Leipzig, 1872) bestens anzuempfehlen.

Es erübrigt noch ein einleitendes Wort über die Methode geologischer Reisen. Der Geolog reist unter allen Umständen am besten allein, oder höchstens (natürlich abgesehen von der einheimischen Dienerschaft) mit einem Begleiter, welcher nicht einem bestimmten Zweig der Wissenschaft nachgeht, sondern vielmehr dazu da ist, specielle Aufsicht über Leute und Gepäck zu führen, gelegentlich den Packzug auf einem von dem des Reisenden abweichenden Weg zu führen, die Küche mit Wildpret versorgt zu halten, die Neugier der Eingebornen zu befriedigen, während der Reisende seine Arbeiten ausführt, u. s. w. und sich für geologische Hilfsarbeiten, wie das Sammeln von Versteinerungen, das Schlagen von Formastücken u. s. w. anleiten lässt. Jeder Reisende welcher selbstständigen Zielen nachgeht, sei er Botaniker, oder Entomolog, oder Ethnograph, oder Kaufmann, hindert den Geologen und wird von ihm gehindert, da jeder andere Bedingungen für die Orte, an denen ihm ein Aufenthalt wünschenswerth erscheint, bedarf. Selbst ein geistig ebenbürtiger, dem Willen des Reisenden sich unterordnender Gesellschafter ist kaum anzurathen, da man dann nicht die nöthige Zeit auf Ausarbeitungen zu verwenden im Stande ist. Der Geolog aber hat beim Reisen nicht einen Augenblick Zeit, müssig zu sein. — Diese Vorschriften gelten für den Fachmann in rigorosester Weise, und haben allerdings weit weniger Anwendung für den, welcher Geologie als Nebenbeschäftigung treibt. Doch gilt für alle reisenden Naturforscher die Empfehlung, allein oder in sehr kleinen Gesellschaften zu reisen. Botaniker und Zoolog kommen gut zusammen aus, da das Verbleiben an Standquartieren in der freien Natur für sie wichtiger ist als das stete Vorwärtswegen. Auch der Ethnograph und der Statistiker mögen zusammengehen, da Beide ihr Material an bevölkerten Ortschaften finden. Mit dem Geologen kann derjenige am besten reisen, welcher geographische Ortsbestimmungen macht und topographische Karten verfertigt, also der eigentliche Forschungs-

reisende. Daher auch kann dieser am besten geologische Studien mit den seinigen vereinigen. Je vielseitiger grösse Expeditionen mit zahlreichem Personal sind, desto ungünstiger gestaltet sich das Verhältniss der aufgewendeten Mittel zu dem zu erwartenden Erfolg. Man hindert sich gegenseitig, man hält einander auf und reisst einander fort. Viel Zeit wird vergeudet, und sehr selten hat ein Mitglied Gelegenheit, seine Kräfte zur vollen Geltung zu bringen. Solche Expeditionen werden in Hindernissen geboren und wachsen in ihnen fort; nur wenige sind mit grossem Erfolg gekrönt gewesen.

Der Geolog muss, wo immer er mitten in einem Beobachtungsgebiet ist, möglichst viel zu Fuss gehen. Unter den Beförderungsmitteln ist der Gebrauch des Wagens wenig zu empfehlen, da man dadurch an die Fahrstrassen gebunden ist, welche das geologisch interessante Terrain gewöhnlich vermeiden. Tragstühle sind nur dem anzurathen, welcher das Bedürfniss hat sie öfters zu verlassen. Am zweckmässigsten ist das Reisen zu Pferde oder Maulthier, da man damit am wenigsten an bequeme Wege gebunden ist, und ein Mittel zu Seitenausflügen stets zur Hand hat. Stromfahrten sind unbefriedigend, da man vom Boot zu wenig Aussicht hat und nur den Gebirgsbau entlang einer Linie kennen lernt. Bei der Fahrt stromaufwärts kann man viel zu Fuss gehen, aber stromabwärts eilt man im Fluge an den interessantesten Stellen vorbei, und gerade in Felsengen, wo die Aufschlüsse am reichsten sind, hat man selten Gelegenheit, an den für die Beobachtung zweckmässigsten Orten anzulegen. Ist man an ihnen vorbei, so ist die Gelegenheit sie zu sehen unwiederbringlich verloren.

Sammeln geologischer Gegenstände.

Die Gegenstände, welche gesammelt werden sollten, lassen sich vom praktischen Gesichtspunkte eintheilen in: Gesteine, Erden, Versteinerungen und Mineralien.

Die Sammlung von Gesteinen oder Gebirgsarten ist die wichtigste, um einen allgemeinen Ueberblick des Baues der betreffenden Gegend möglich zu machen. Die Art ihrer Anlegung richtet sich ganz nach dem Grad der geologischen Ausbildung, welche der Reisende besitzt. Als das Vollkommenste kann man eine Reihenfolge guter Handstücke von regelrechtem Format betrachten, die ein namhafter Geolog nach eigener Auswahl selbst geschlagen hat, und die ihm dann als Grundlage einer Ausarbeitung dienen, in welcher er das, was in der Sammlung fehlt, durch deutliche Beschreibungen ergänzt. Unter regelrechtem Format versteht man Stücke von ungefähr 4 Zoll Länge, 3 Zoll Breite und $\frac{1}{2}$ Zoll Dicke; gute Handstücke müssen allseitig einen frisch geschlagenen Bruch haben. Wer Specialuntersuchungen eines kleinen Gebietes ausführt, bemühe sich, auch in Bezug auf äussere Ausstattung das Vollendetste zu leisten und jede Beobachtung durch Musterstücke zu belegen. Von dem reisenden Geologen jedoch ist nicht zu verlangen, dass er dieses Ziel in einer auch nur annähernd vollkommenen Weise erreiche; und so sehr es anzuerkennen ist, wenn er dort, wo er Zeit dazu hat, auch einige Mühe auf äusseres Ansehen verwendet, so würde es doch ganz fehlerhaft sein, zu sehr darauf zu achten, und manche Stücke deshalb nicht mitzunehmen, weil sie den genannten Anforderungen nicht entsprechen. Eine kleine vorspringende Ecke, die man gelegentlich von einem Fels abgeschlagen und mitgenommen hat, ist nachher oft mehr werth als ein Dutzend mühsam in die regelrechte Form gebrachter Stücke. Der Dilettant, vorausgesetzt, dass er geologische Untersuchungen zu einer Haupt-

beschäftigung auf seiner Reise wählt, ist in der eigenthümlichen Lage, dass er mehr sammeln muss als der Geologe von Fach, deshalb, weil er die Nomenclatur und Beschreibung nicht so beherrscht wie dieser, und seine Angaben erst durch Belegstücke Zuverlässigkeit erlangen. Um sich nicht zu sehr zu belasten, sollte er, beispielsweise bei dem Uebergang über ein Gebirge, mit Sorgfalt kleine, frisch gebrochene Scheiben oder Würfel der einzelnen Gesteine sammeln, denen er begegnet, sie sofort numeriren und in Papier wickeln, und entsprechende Nummern mit Bemerkungen über die Art des Auftretens an Ort und Stelle in das Rohbuch eintragen. Damit ist aber nicht gesagt, dass er, wie es viele thun, hin und wieder ein beliebiges Stück Stein von der Strasse aufheben und nach Hause bringen solle, das würde nur nutzlosen Ballast ergeben. Sondern jedes Bruchstück muss von anstehendem Gestein sein, vom Fels selbst losgeschlagen; der Reisende muss wissen, weshalb er es mitgenommen hat, und es muss durchaus wenigstens Eine frische Bruchfläche haben. Neben dieser kleinen, unter allen Umständen leicht zu transportirenden Sammlung, welche den Weg des Reisenden illustriert, sollte er dann eine zweite von guten Handstücken anlegen, zu der er den längeren Aufenthalt an interessanten und geographisch gut bestimmten Localitäten ebenso wie eine kurze gelegentliche Rast am Wege benutzt*).

Was die Erden betrifft, so empfiehlt es sich zunächst, die Anschwemmungen von Flüssen zu sammeln. Die Dammerde ist durch Cultur verändert; man thut daher besser, die Proben von Steilabbrüchen an Flussufern wenigstens 2 Fuss unter der Oberfläche zu entnehmen. Dasselbe sollte man dort thun, wo der Boden von tiefen Schluchten durchfurcht ist. Ausserdem sollte man alle technisch verwendeten Erden, Töpferthone, Porzellanthone, Pfeifenthone und die aus ihnen gewonnenen Producte sammeln. Ferner die Polirschiefer, überhaupt kieselige Erden, und die Absätze aus heissen Quellen, die dann zum Theil auf Infusorien zu untersuchen sind. Bei Porzellanthonen kommt es darauf an, die verschiedenen angewendeten Arten von Material vollständig zu haben. In vulcanischen Gegenden ist Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Tuffe und die Schlammabsätze zu verwenden. Wer in den Tropen reist, der sollte nicht versäumen, den Laterit**) recht gründlich zu studiren, und Proben desselben von verschiedenen Orten mitzunehmen. — Zur Aufbewahrung von Erden empfehlen sich die Büchsen von verzinnem Eisenblech, in welchen man stets einen Theil der Provisionen mit sich führt. Bei solchen Erden, die eine Structur haben, wie der Löss, sollte man solide Stücke von der Gestalt der Büchse schneiden und sie, in ihrer natürlichen Lage, hineinthun.

Wenn die Gesteinssammlung für den allgemeinen Ueberblick besonders wichtig ist, so ist es diejenige von Versteinerungen zur genauen Bestimmung der Formationen. Kein Reisender sollte unterlassen, auf sie ein ganz besonderes Augenmerk zu richten. Selbst wenn er gar keine Gesteine sammelt, darf er keine Gelegenheit vorübergehen lassen, um Fossilien in möglichster Reichhaltigkeit mitzubringen. Denn wenn man das Glück hat, eine

*) Ich habe mich selbst, bei meinen Reisen in China, fortdauernd dieser zwei neben einander hergehenden Methoden bedient. Denn wenn man zum Beispiel mit Maulthieren über ein Gebirge reist, so hat man keine Zeit zum Stehenbleiben, sondern muss rastlos vorwärts gehen. Das Mitnehmen eines kleinen Belegstückes erscheint oft im Augenblick selbst als überflüssig. Hat man es jedoch gesichert, so bewahrt man es wie Gold, und manches unscheinbare Fragment bewährt sich später als das wichtigste Material zur Vergleichung. Keines aber ist nutzlos gesammelt.

**) S. in einem späteren Abschnitt.

noch unerforschte Gegend zu betreten, so bleibt sie, wenn sie nicht vielleicht aus vulcanischen Gesteinen oder Schwemmland besteht, ganz unverständlich, so lange man nicht im Stande ist, durch die Bestimmung des geologischen Alters einzelner Formationen Licht über das Ganze zu verbreiten. Wer diese erste Aufgabe löst, dem wird der Dank des Fachmannes die darauf gewendete Mühe reichlich lohnen. Das Auffinden von Versteinerungen erfordert allerdings Uebung, und es lassen sich nicht leicht bestimmte Regeln angeben. Ich will nur einige wenige Fälle erwähnen:

Alle mit krystallinischen Schiefern wechsellagernden Gesteine sind im Allgemeinen als versteinierungslos zu betrachten. Gelingt es, darin etwas zu finden, so wird der Werth um so grösser sein. — Reiner Kalkstein ist gewöhnlich arm an deutlichen Versteinerungen, und sind sie vorhanden, so ist es schwer sie zu sammeln. Sie sind aber stets wichtig und in hervorragendem Grade zu beachten. Insbesondere kommen in reinen Kalksteinen Brachiopoden, Cephalopoden, Crinoideen, Korallen und Foraminiferen vor. Vor Allem sind solche Steinbrüche zu berücksichtigen, in denen Kalkstein zum Brennen gewonnen wird. Die Abänderungen, welche man dazu verwendet, sind häufig voll Versteinerungen, welche, sonst schwer zu erhalten, durch die Steinbruchsarbeit blossgelegt werden. Wird der Kalkstein bituminös oder mergelig, oder geht er in Mergelschiefer oder in thonige Schiefer mit Kalkknauern über, so wird man in der Regel einige, und zuweilen eine reiche Ausbeute haben. Dies gilt auch für den Fall, dass Kalkstein und Schiefer wechsellagern. — In reinen Quarzsandsteinen oder dickbankigen rothen thonigen Sandsteinen wird man meist vergebens nach Versteinerungen suchen. Werden sie aber mit dem Thongehalt dünnschichtig, mit glimmerigen Absonderungsflächen, so stellen sich häufig Reste von Zweischalern und Pflanzen ein. Weit günstiger ist der Uebergang in thonig sandige Schiefer und reine Schieferthone einerseits, und Kalksandsteine andererseits. — Wo Kohlenflöze vorkommen, da giebt es fast immer etwas zu sammeln; gewöhnlich sind es Abdrücke von Pflanzen in den begleitenden Kohlenschiefern, bei deren Sammlung besondere Vorsicht in der Conservirung nothwendig ist. Oft auch kommen thierische Versteinerungen in den Schichten über oder unter der Kohle vor. Hier ist das Sammeln besonders wichtig, um festzustellen, welchem Alter die Kohle angehört. — Tuffschichten, seien sie untermeerisch oder in Süswasser abgelagert, der Tertiärperiode angehörig oder von höherem Alter, enthalten fast stets stellenweise grössere Anhäufungen von Versteinerungen.

Man kann von Versteinerungen niemals zu viel sammeln. Wo sie in Masse vorkommen, sollte man die am besten erhaltenen Stücke aussuchen, wo es nur wenige giebt, die unvollkommenen Exemplare nicht verachten; denn ein kleines Bruchstück kann oft einen Anhalt von grösserem Werth geben, als von einem anderen Ort eine Sammlung der besten Exemplare.

Mineralien hat der Reisende, welcher nicht Fachmann ist, selten Gelegenheit zu sammeln. Die unscheinbaren, welche zuweilen grossen Werth haben würden, fallen ihm nicht auf, und berücksichtigt er die schön krystallisirten, so kann es ihm leicht geschehen, dass er sich aus Unkenntniss mit Sachen von geringem Werth beschwert. Allerdings giebt es Ausnahmen. Besonders werden schön krystallisirte Erze, die man in Bergwerksgegenden zuweilen bekommt, in der Regel geschätzt werden. Nutzbare Mineralien, als Kohle, Eisenerze, Graphit u. s. w. sind natürlich stets mit Aufmerksamkeit zu sammeln.

Einzelne speciellere Winke zum Sammeln werden sich im Weiteren

ergeben. Es erübrigt an dieser Stelle noch auf die fernere Behandlung hinzuweisen. Und da ist vor Allem zu bemerken, dass ein Gesteinsstück vollkommen werthlos ist, wenn man den Ort, von dem es stammt, nicht ganz genau kennt, bei Versteinerungen aber mindestens die Gegend ihres Ursprungs angegeben sein muss, und jedes genauere Detail erwünscht ist. Die Versteinerungen verschiedener Schichtencomplexe oder verschiedener Theile desselben Complexes müssen sorgfältig auseinander gehalten werden. Zu jedem Stück, sowie man es in Papier wickelt, sollte sofort, wenn es möglich ist, die Localität, oder wenn diese schwer definirbar ist, Stunde und Tag des Sammelns, oder wenigstens eine die Reihenfolge an dem betreffenden Tage bezeichnende Nummer geschrieben werden. Kommt man Abends in das Quartier oder Lager, so wird zu jedem Gesteinsstück ein Zettel geschrieben, auf dem man oben das Land oder die Provinz, darunter die Richtung und Entfernung des Fundortes von einem auf der Karte verzeichneten Ort, und dann das Detail der Localität selbst angibt. Jede weitere Bemerkung ist später von Nutzen. Unten wird das Datum vermerkt, an dem das Stück gesammelt wurde, damit man sofort das Tagebuch um Information nachschlagen kann, und endlich der Namenszug des Sammlers; also z. B.:

Da sich der Zettel zerreibt, wenn er auf den Stein zu liegen kommt, so wird er in das erste zum Einwickeln des Gesteins verwendete Blatt Papier eingeschlagen. Drei halbe Bogen weichen Papiers sind bei einem gewöhnlichen Handstück zum Verpacken hinreichend. Die so eingewickelten Gesteinsstücke müssen nun so untergebracht werden, dass sie fest liegen*). Bei Expeditionen, bei welchen Mehrere betheiligt sind, ist es wünschenswerth, die Proben zu nummern und in Registern fortlaufend einzutragen. Der Einzelne braucht sich dieser Mühe nicht zu unterziehen.

Sollte es dem Reisenden einmal geschehen, dass er die hier angegebenen Regeln vernachlässigt und bei einigen Stücken nicht mehr genau den Fundort weiss, so sollte er sie, mit Ausnahme der Versteinerungen, ohne Weiteres wegwerfen, da sie nutzlos sind.

Beobachtungen über Gebirgsbau.

Von grösserer Wichtigkeit als das Sammeln greifbarer Gegenstände ist das Sammeln geologischer Beobachtungen und das sorgfältige Niederlegen derselben im Tagebuch. Die Gesichtspunkte, welche dabei leitend sind, wurden auf S. 234 auseinandergesetzt. Sie lassen sich, nach Ausschluss der

Java.

Residentie: Preanger Regentschaften.

Bandong 3 M. NNW.

Südabhang des Vulcans Tankuban Prah. — 1 Stunde von Lembang, am Weg nach dem Gipfel. Bildet das untere Ende eines Lavastromes.

1. 6. 1874.

M. N.

*) Die Gesteine sind nun zum Versenden bereit. Sind deren genug vorhanden, so werden sie in eine Kiste gepackt, in welcher unten eine dünne Lage von Heu ist. Die einzelnen Packchen werden dann, wie beim Packen von Büchern, in Reihen aufrecht nebeneinander gestellt und fest eingezwängt. Je fester sie liegen, desto besser werden sie die Erschütterungen überstehen, denen sie weiterhin unterworfen sind. Zartere Gegenstände werden mit Baumwolle belegt, ehe sie in Papier gewickelt werden, und separat in Schachteln und Kistchen gepackt.

Oberflächenformen, in den zwei grossen Abschnitten: Gebirgsbau und Geologische Vorgänge, zusammenfassen. Der Gebirgsbau ergibt sich aus der sorgfältigen Beobachtung der geologischen Aufschlüsse.

Geologische Aufschlüsse. — Einen geologischen Aufschluss giebt jede Stelle, an der man das an der Zusammensetzung einer Gegend theilnehmende Gestein beobachten kann, und er ist um so vollständiger, in je grösserer Entwicklung in horizontalem oder verticalem Sinn das Gestein blossgelegt ist oder sich durch Schlussfolgerungen feststellen lässt. Die Oberfläche des Bodens, wo sie nicht aus dicker Ackerkrume besteht, ein Graben, ein Steinbruch, die Seiten eines Flussbettes, die Runsen und Tobel in Gebirgen, jeder anstehende Fels, und jedes an die Oberfläche kommende weichere Schichtgestein, geben mehr oder weniger vollkommene Aufschlüsse. Der Reisende, welcher sie bei dem Betreten einer fernen Gegend verfolgt, findet dort Sandsteine, Kalksteine, verschiedene Arten von Schiefern, Granit, Sand, Alluvialabsätze u. s. w. in ähnlicher Ausbildung, wie er sie in anderen Ländern gesehen hat. Aber ihre Anordnung ist überall verschieden, und erst wenn man diese mit Klarheit erkannt hat, kann man daran gehen, Vergleichen mit anderen Gegenden auszuführen. Das erste Ziel der Untersuchung ist die Erkenntniss der Art und Weise, wie die einzelnen Gesteine im Alter auf einander folgen. Die darauf bezüglichen Schlussfolgerungen bauen sich nach und nach aus Einzelbeobachtungen auf, deren jede Licht in das Chaos bringt, in welchem uns anfangs die vielen verschiedenen Gesteine und Erden entgegengetreten. Das zweite Ziel, dessen Erreichung gleichzeitig angestrebt und herbeigeführt wird, ist die Erkenntniss der Art, in welcher die Gesteine zu Gebirgen zusammengefügt sind, oder Einsenkungen ausfüllen. Es giebt Gegenden, wo eine grosse Gleichförmigkeit über weite Strecken herrscht. Aber keine ist von so geringem Interesse, um nicht Stoff zu Beobachtungen zu bieten. Sehr häufig hängt die Erlangung von Aufschlüssen von dem Willen des Reisenden und der Geschicklichkeit in der Wahl seiner Wege ab; denn anstatt das zufällige Begegnen solcher Stellen, welche zur Beobachtung geeignet sind, abzuwarten, muss er dieselben aufsuchen und seine Pläne demgemäss einrichten. Dazu gehört vor Allem, dass er sich nicht an die Thäler halte, noch auch, mehr als nothwendig ist, der Richtung der Gebirge parallel reise, sondern möglichst oft quer über dieselben hinweggehe, oder vom Thal aus Ausflüge nach den Kämmen unternehme. Bekommt man mehrere Querschnitte desselben Gebirges, so ergänzt einer den anderen, und man wird sich bald ein annähernd richtiges Bild von dem Gesamtbau desselben machen, während die innere Structur ganz verborgen bleibt, wenn man die Gesteine von seinem Fuss noch so genau kennt, der Rest aber unbekannt ist. Die Mühe und Kosten der angegebenen Art der Bereisung sind viel bedeutender, als wenn man auf bequemen Strassen in den Thälern herumfährt; aber man wird reichlich belohnt, nicht nur durch die geologischen Aufschlüsse, sondern auch durch den Genuss, welcher in Gebirgstouren liegt, den Ueberblick des Landes, den man von den Höhen erhält und der zur Kartenzeichnung wichtiges Material giebt, die Bereicherung der Kenntniss der hypsometrischen Verhältnisse der Gegend, und die Gelegenheit zum botanischen und zoologischen Sammeln. Ein Reisender, der die Gebirge nicht besucht, mag wohl die Leute kennen lernen, aber mit der Natur des Landes bleibt er unbekannt. Je mehr dies beherzigt worden ist, desto mehr haben berühmt gewordene Landreisen zur Bereicherung der naturwissenschaftlichen Kenntnisse beigetragen. Aber auch wo die Gelegenheit dazu nicht vorhanden und man auf grosse Ebenen angewiesen ist, fehlt es nicht an Beobachtungs-

material. Die Resultate häufen sich langsamer, aber um so weiter sind die Gesichtspunkte, von denen aus man dieselben nach Beendigung einer Reise überblickt. So geringen Werth man oft im Augenblick auf Beobachtungen in solchen Gegenden zu legen geneigt ist, sollte man doch auch in ihnen niemals ermüdet stille stehen. Jede Lücke macht sich bei der Rückkehr in empfindlicher Weise bemerkbar.

Ein sehr brauchbares Feld für geologische Beobachtung bieten alle Werke von Menschenhand, in denen Steine angewandt werden. In einer Gebirgsgegend könnte man aus dem Material womit die Mauern und Häuser in Dörfern und Städten gebaut sind eine fragmentarische geologische Karte construiren; denn wo die Verkehrsmittel unvollkommen sind, verwendet man zu diesen einfachen Bauwerken meist nur Material aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Oft führt ihre Beobachtung zur unerwarteten Entdeckung einer Formation, die man vorher nicht anstehend sah, z. B. von Basalt; oder man findet an ihnen das Wiederauftreten eines längst bekannten Gebildes, z. B. eines oolithischen Kalksteins, dessen genaue Einreihung als Formationsglied man genau kennen gelernt hat. Zu monumentalen Bauten wird das Gestein oft weiter herbeigeführt, und indem man die Lage des Steinbruches, welcher es liefert, erforscht, erweitert sich die Kenntniss von der Verbreitung der betreffenden Formation. Auch die Gerölle in Bächen müssen untersucht werden, da sie manchen Fingerzeig für den Bau des Gebirges geben, aus dem sie stammen. Grosse Vorsicht ist an solchen Orten nothwendig wo Schiffe anlegen. Begierig, einen Wink über das was er zu erwarten hat zu erhalten, untersucht der Geolog beim ersten Landen sofort die zu Uferbauten verwendeten oder lose umherliegenden Gesteine. Sie zeigen oft eine auffallende Musterkarte, und bei näherer Untersuchung ergiebt es sich, dass sie Schiffsballast sind, welcher aus verschiedenen Gegenden hergebracht wurde. Selbst der Schluss, dass Ballast, der eben ausgeladen wird, eine Andeutung der Formationen an dem Ausgangspunkt des Schiffes geben könnte, ist falsch; denn dort nahm man vielleicht solchen ein, welcher schon mehrere Male seinen Ablagerungsort wechselte.

Eine kurze Betrachtung des Materials, woraus die Erdoberfläche besteht, wird zeigen, welche Klassen von Gesteinen sich der Beobachtung des Reisenden unterziehen. Wir werden dann auf die bei jeder einzelnen sich darbietenden Gesichtspunkte eingehen.

Allgemeine Zusammensetzung der festen Erdoberfläche. — Die Grundzüge der Systematik der Gesteine, welche in dem Aufbau des der Beobachtung zugänglichen Theiles der Erdrinde vertreten sind, hängt eng mit den Grundzügen der Entwicklungsgeschichte der letzteren zusammen, wie sie sich auf inductivem Wege ergeben hat. Die Entstehung einer festen Rinde auf dem heissflüssigen Erdkörper durch Ausstrahlung der Wärme, bei gleichzeitiger Condensirung hoch überhitzten Wassers auf ihrer Oberfläche, bezeichnet, soweit die Forschung in das Chaos der Urgeschichte einzudringen vermocht hat, den Anfang der Gesteinsbildung. Von dieser ersten Oberfläche aus wuchs die Rinde nach aussen durch Aufwärtsdringen heissflüssiger Massen aus der Tiefe und durch Absatz von Zerstörungsprodukten aus dem Wasser, während sie nach innen, in weit stärkerem Maasse, durch Erstarrung zunahm. Hier war der Sitz des Vulcanismus, der, als die Rinde dünn war, wenig Widerstand zu überwinden hatte, sich sehr häufig äusserte und die der Erstarrungsoberfläche zunächst gelegenen Theile des Innern durch Spalten nach aussen brachte, später aber, als durch fortschreitende Erstarrung die Widerstände allmählig wuchsen, sich mehr und mehr selten

und paroxysmatischer äusserte, während zugleich die nach der Oberfläche gelangenden Massen aus grösserer Tiefe stammten und, da die Zusammensetzung der Erde von der Oberfläche gegen das Innere sich nach mathematischen Gesetzen ändert, von anderer Beschaffenheit waren als die früheren. Der sich zu gleicher Zeit allmählig verdickende äussere Theil der Rinde setzte sich demnach aus zweierlei Producten zusammen: 1. den in heissflüssigem Zustand aus der Tiefe heraufgedrungenen, stets mit überhitztem Wasser vermengten Massen, welche krystallinisch erstarrten und die Eruptivgesteine abgaben, deren wichtigste Eigenschaft darin besteht, dass ein in ihrer chemischen Zusammensetzung waltendes mathematisches Gesetz sie zu einem Ganzen verbindet; 2. den Sedimentgesteinen, welche sich im Wasser absetzten, und anfangs aus der Zerstörung der Gebilde der Erstarrungsrinde und der Eruptivgesteine, später aus derjenigen der letzteren und der älteren Sedimente hervorgingen. Sie haben eine regellose, von zufälligen Umständen abhängige chemische Zusammensetzung, und sind in Form horizontaler oder wenig geneigter Lagen oder Schichten (normal) abgelagert, während die Eruptivgesteine in von unten nach oben (abnorm) gerichteten Spalten aufstiegen und erst an der Oberfläche durch Ueberströmen sich ausbreiten konnten; unter besonderen Umständen veranlassten sie bei der Ankunft an dieser paroxysmatische und explosive Erscheinungen, und verursachten dadurch die Entstehung von Vulkanen. — Da die Sedimentgesteine die Entwicklung von der Erstarrungsoberfläche nach oben darstellen, die Eruptivgesteine aber ein Abbild derjenigen von der Erstarrungsoberfläche nach unten geben, so haben beide in ihr einen gemeinsamen Berührungspunkt, und müssen dort aus demselben Material bestehen. Granit, welcher jetzt allgemein als die Unterlage aller Sedimentgebilde angesehen wird, und Urgneiss, welcher das tiefste derselben bildet, sind daher eng verwandt und oft identisch. Sie bilden die Ausgangspunkte der Systematik der Gesteinslehre, welche sich nach diesen Grundanschauungen leicht übersehen lässt. Es ist dabei stets festzuhalten, dass es bei den Gesteinen keine scharf getrennten Gattungen und Arten giebt, sondern, wie Granit und Gneiss in einander übergehen, so auch jedes Gestein überhaupt durch Aenderung der Structur oder der Zusammensetzung gewissen anderen Gesteinen durch Uebergänge verbunden ist. Dies erschwert die präcise Anwendung der Nomenclatur.

- A. Die *Sedimentgesteine* lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten einteilen. Für die rein praktischen Zwecke des Reisenden giebt es im Wesentlichen zwei grosse Reihen, die primitiven und die secundären Sedimentgesteine. In der ersten walten die krystallinischen Schiefer weitaus vor, in der anderen die nur verhärteten Sandsteine, Schieferthone und Kalksteine. Die ersten reichen, im Alter, von den Anfängen der Sedimentbildung bis zu den unbestimmten Anfängen des organischen Lebens auf der Erde, die anderen umfassen die lange Periode, aus welcher das organische Leben seine Spuren in zahllosen deutlichen Resten hinterlassen hat. Die späteren Gesteine der ersten und die älteren Gesteine der zweiten Reihe sind durch Uebergänge mit einander verbunden, welche Werner, der zuerst diese heute nur aus Zweckmässigkeitsgründen noch anwendbare Eintheilung aufstellte, zur Unterscheidung einer dritten Reihe, der Uebergangsgesteine, veranlasste. Man gewinnt aber dabei nichts, weil auch ihre Grenzen nach oben und unten undefinirbar sind. Die praktische Brauchbarkeit der Eintheilung beruht darauf, dass sie einen wesentlichen Factor in der geographischen Verbreitung der Gebirgsarten abgiebt, indem grosse Gebiete oder Theile desselben Gebirges

nur aus den Gesteinen der einen oder der andern Reihe aufgebaut sind, und die Aufmerksamkeit des Beobachters in jedem der beiden Fälle in etwas verschiedener Weise in Anspruch genommen ist. — Von theoretischem Gesichtspunkt aus sind dann noch die metamorphischen Gesteine zu unterscheiden, welche unter gewissen wenig bekannten und stets örtlich beschränkten Umständen durch Umänderung aus Secundärgesteinen entstanden sind. Sie gleichen den primitiven krystallinischen Schiefen, und in der Betrachtung der Gesteine nach äussern Merkmalen lassen sie sich von diesen nicht trennen. — Wir unterscheiden somit

1. die krystallinischen Schiefer, und zwar zunächst soweit sie die primitiven Sedimentgesteine oder das Grundgebirge umfassen. Ihre Entstehungsart ist nicht sicher erwiesen und lässt sich nur aus Wahrscheinlichkeitsgründen ableiten. Je nach den Lehrbüchern, in denen der Reisende seine Vorstudien macht, wird er verschiedene Ansichten vertreten finden. Neuere Untersuchungen scheinen indess eine so gleichmässige Entwicklung dieser Gesteine über die ganze Erdrinde darzuthun, dass man annehmen muss, sie seien ursprünglich so gebildet wie wir sie heute finden, d. h. von Anfang in krystallinischem Zustand abgelagert. Sie stellen vielleicht zum kleinen Theil das Oberste der Erstarrungsrinde des Planeten dar, welche sich im Verein mit hoch überhitztem Wasser bildete, während sie wohl zum weit überwiegenden Theil aus dem überhitzten und sich allmählig abkühlenden Ocean der Urzeiten niedergeschlagen wurden, und sich demgemäss in ihrer Natur mit dem fortschreitenden Alter der Erde änderten, indem zu dem Absatz aus rein chemischer Lösung nach und nach der Niederschlag mechanisch suspendirter Theile kam, so dass hierdurch die lange Reihe von Uebergangsstufen (besonders in den Schlammabsätzen, welche zu den Thonglimmerschiefen erhärteten) entstand, welche die krystallinischen Schiefer mit den Gesteinen der nächsten Ordnung verbindet. Man nennt die Formationen, welchen die ganze Gesteinsreihe angehört, azoisch, weil ein reich entwickeltes organisches Leben in wohl erhaltenen Resten darin noch nicht nachgewiesen worden ist, wenn es auch im letzten Theil der Periode mit grosser Wahrscheinlichkeit schon existirte. Die grosse Aehnlichkeit in der Ausbildung, welche die metamorphischen krystallinischen Schiefer mit den primitiven haben, deutet darauf hin, dass die Vorgänge, welche ihre Bildung veranlassten, viel Analogie mit denjenigen hatten, unter denen der Niederschlag von jenen stattfand. — Gneiss, Glimmerschiefer, Hornblendeschiefer, Chloritschiefer, Thonglimmerschiefer und Thonschiefer sind die wichtigsten krystallinischen Schiefergesteine, welche der Reisende kennen muss. Zwischengelagert sind körniger Kalkstein oder Marmor, Quarzit, und in den oberen Theilen eine Reihe von Schiefen, welche sich durch grüne Farben auszeichnen und für praktische Zwecke als Grüne Schiefer bezeichnet werden können.

2. die Secundären Sedimentgesteine, oder das Flözgebirge. Alle Formationen von der Cambrischen an sind im wesentlichen aus Schichten aufgebaut, welche durch die Ablagerung mechanisch in Wasser suspendirter Theile oder chemisch gelöster Stoffe gebildet wurden, und von einem ursprünglich weichen oder losen Zustand meist zu festem Gestein erhärteten. Alle Schieferthone, Sandsteine und Conglomerate, und wahrscheinlich die meisten Kalksteine, haben diese Entstehung. Nur der durch Korallen aufgebaute Riffkalk und einige chemische Se-

dimente waren schon ursprünglich grösstentheils fest. Hierher gehören auch alle jetzt noch weichen oder losen Ablagerungen aus Meerwasser und Süsswasser. So wenig zahlreich die Namen sind, unter denen sich die in den secundären Sedimenten vertretenen Gesteinsarten zusammenfassen lassen, bilden sie doch den allermannichfaltigsten Aufbau, theils wegen der endlosen Nüancirung im äusseren Charakter, welche ihnen eigenthümlich ist, und theils wegen der nicht minder vielgestaltigen Art in welcher sie miteinander wechseln. Den einzigen Anhalt zu einer wissenschaftlichen und durchgreifenden Gliederung liefert das historische Moment, welches die eingeschlossenen organischen Reste abgeben. Darauf stützt sich die Eintheilung in Formationen, mit deren Aufeinanderfolge von der Cambrischen und Silurischen bis zur Tertiär-Formation und den Gebilden des Diluviums und Alluviums jeder Reisende vertraut sein sollte. Es ist nicht schwer sich ihre Grundzüge anzueignen und mit den vorwaltenden paläontologischen Merkmalen bekannt zu werden, auf welche sich die Eintheilung stützt.

- B. Die *Eruptivgesteine*. Das wesentliche äussere Merkmal an diesen Gesteinen ist ihr Mangel an Schichtung, verbunden mit einem krystallinischen Gefüge und einer Zusammensetzung aus mehreren Mineralspecies. Ihre Entstehungsweise, welche derjenigen der heutigen Lavaströme analog war, und die Gesetzmässigkeit in ihrer chemischen Zusammensetzung wurden schon erwähnt. Um einzelne Gesteine mit Namen benennen zu können, sollte der Reisende sich zunächst mit den Begriffen der granitischen, porphyrischen und trachytischen Textur durch Studium in Sammlungen bekannt machen. Bei granitischer Textur sind alle zusammensetzenden Mineralien zu einem gleichmässig körnigen Gemenge auskrystallisirt; bei porphyrischer umschliesst eine feinkrystallinische dichte Grundmasse grössere Krystalle eines Minerals oder mehrerer; bei trachytischer waltet ebenfalls eine feinkrystallinische Grundmasse, aber sie ist stark porös und meistens rau; einzelne Mineralien sind meist in grösseren Krystallen eingeschlossen, fehlen aber auch häufig. Aus der ersten Gruppe sollte man Granit, Syenit und die deutlicheren Varietäten von Diorit kennen lernen; aus der zweiten den Quarzporphyr und Porphyrit. Dem Laien wird man gern gestatten, sich des obsoleten Namens „Grünstein“ für die schwer erkennbaren dunkel gefärbten und meist etwas grünlichen Gesteine aus den zwei Gruppen zu bedienen; nur wäre es gut, den porphyrischen Charakter zu erwähnen, wo er vorhanden ist. Die vulcanischen Gesteine, bei denen allein das trachytische Gefüge vorkommt, sollen später erwähnt werden.

- C. Als eine dritte Klasse kann man die *subaërisch gebildeten Gesteine* betrachten, welche auf dem trockenen Land unter der Atmosphäre entstanden sind. Zu ihnen gehören im Wesentlichen der vulcanische Schutt, welcher die Kegel der Vulcane bildet, der Löss, und einzelne Zersetzungsproducte.

Die sedimentären und die Eruptivgesteine setzen den sichtbaren Theil der Erdrinde zusammen; die Gesteine der dritten Klasse spielen nur örtlich eine Rolle, und sind auf die äusserste Oberfläche beschränkt. Ich gehe nun auf die Beobachtungen ein, welche bei den Gesteinen jeder einzelnen Classe von den Reisenden anzustellen sind, sei es dass sie Gebirge selbstständig zusammensetzen, oder nur Theile von combinirten Gebirgen bilden. Die vulcanischen Gesteine, welche sich an dem Grundbau derselben weniger betheiligen, aber doch in der Zusammensetzung der Oberfläche

eine bedeutende Rolle spielen, sollen besonders betrachtet werden. Von subaërischen Gebilden finden einige ihre Besprechung in demselben Capitel über vulcanische Gegenden, der Löss in dem über Steppen und Wüsten, die Zersetzungsproducte in dem Abschnitt über die geologischen Vorgänge.

Secundäre Sedimentgesteine (Flözgebirge).

Den nur verhärteten aber nicht metamorphosirten Sedimentgesteinen hat der Reisende am häufigsten zu bezeugen Gelegenheit, da sie an dem Aufbau fast aller Gebirge den hervorragenden Antheil nehmen und manches allein zusammensetzen. Es ist, wie erwähnt, die Hauptaufgabe geologischer Forschung in einer neuen Gegend, die Grundlagen zur Feststellung des Altersverhältnisses derselben zu suchen: die Sedimentgesteine zu gliedern. Dem Anfänger erscheint sie sehr schwierig, aber gerade hier macht Uebung den Meister. Die einfache Angabe, dass in einer Gegend Kalkstein, oder Sandstein, oder Schiefer vorkommt, ist, wenn auch nicht werthlos, doch durchaus ungenügend. Man hat stets nach dreierlei Gesichtspunkten genau vorzugehen. Sie sind:

1. Angabe des Gesteinscharakters. Bei Sandsteinen: Farbe, Grad der Festigkeit, Grösse des Korns; ist es ein reiner Quarzsandstein, oder ist er thonig oder kalkig? wie dick sind die einzelnen Schichten? sind die einzelnen Schichtungsflächen eben, oder wellig, oder zeigen sie Spuren des Wellenschlages? sind sie glimmerig? kommen kohlige Pflanzenspuren oder schilfartige Reste vor? Hinsichtlich der Festigkeit kann jeder nach eigenen Bezeichnungen eine Scala von losem Sand bis zum harten Quarzit einführen. — Bei Conglomeraten: Grösse der Rollstücke; sind sie scheibenförmig oder eiförmig, in die Länge gezogen oder in allen Dimensionen gleich? Woraus bestehen die Rollstücke, aus einer Gesteinsart oder aus mehreren, und welches sind diese? Lassen sie sich in der Nachbarschaft anstehend finden? dies ist ein wichtiger Punkt, da das Conglomerat jünger ist als die eingeschlossenen Gesteine, und aus dem Fehlen gewisser Gesteine unter den Einschlüssen es sich oft schliessen lässt, dass es älterer Entstehung ist als diese. Wie ist das bindende Cement? sandig, kieselig, thonig, kalkig, oder aus dem zerkleinerten Material benachbarter Eruptivgesteine bestehend (tuffartig)? welches ist seine Farbe? Auch die Festigkeit des Conglomerats, und die Mächtigkeit seiner Schichten sind anzugeben. — Bei Schieferthonen sind ebenfalls Farbe, Korn, sandige oder kalkige Beschaffenheit, Vertheilung von Glimmerblättchen auf den Schichtungsflächen zu beobachten; ferner die mehr oder weniger vollkommene und ebenflächliche Schieferung. Die Thonschiefer unterscheiden sich durch dichteres Korn, festere Beschaffenheit, vollkommenere Schieferung (Dachschiefer, Tafelschiefer), seidenglänzendes Ansehen, Vorkommen von Einschlüssen, häufigere Durchsetzung durch Quarzschnüre, und zerfallen oft in Griffel oder Stengel in Folge einer durch Druck entstandenen zweiten (transversalen) Schieferung. — Bei Kalksteinen: Farbe, Bruch, Härte, krystallinische oder dichte Textur. Bei den dichten Kalksteinen, welche für die Formationsbestimmung wichtiger sind, kommt dann weiter in Betracht: Ist das Gestein geschichtet? in dünne Lagen oder dicke Bänke? sind die Schichtflächen eben, oder wellig, oder ineinandergezackt? liegt zwischen den Schichten schieferige Substanz? Ist der Kalkstein thonig, kieselig, dolomitisch oder bituminös? hat er homogene Textur oder ist er oolitisch, oder erdig (Kreide)? enthält er Einschlüsse von Feuerstein oder Hornstein, und wie sind diese vertheilt? Ist der Kalkstein von

weissen Kalkspathadern durchsetzt? führt er Erze? ist er zellig? neigt er zur Höhlenbildung? — Aehnlich sind die Fragen, die man bei anderen, nicht so häufig vorkommenden Schichtgesteinen zu stellen hat, und von denen einige, wie die vulcanischen Tuffe, noch behandelt werden sollen. — Wenn man ein in grosser Mächtigkeit auftretendes Gestein in dieser Weise beobachtet und sich seine Eigenthümlichkeiten eingeprägt hat, ist es gut, die Aufmerksamkeit auf die Oberflächenformen zu richten, welche demselben eigenthümlich sind. Gewisse Kalksteine und Sandsteine zeichnen sich in dieser Beziehung so aus, dass man ihre Verbreitung häufig von weitem erkennen kann. Doch gehört grosse Uebung dazu um mit Vertrauen zu Werke gehen zu können. Der Reisende, welcher im Landschaftszeichnen Fertigkeit besitzt, sollte sich die getreue Wiedergabe des den einzelnen Gesteinen eigenthümlichen landschaftlichen Elementes anlegen sein lassen.

2. **Schichtenverband.** Die Angabe der äusseren Eigenschaften ist zur Charakterisirung nicht hinreichend. Denn ganz gleichartige oder ähnliche Schichtgesteine treten in verschiedenen Formationen auf, und man kommt auf Fehlschlüsse, wenn man aus der Aehnlichkeit auf Identität schliesst. So bezeichnet die Zeit, als man alle in den Alpen auftretenden Kalksteine mit dem Namen „Alpenkalk“ belegte und sie nicht weiter zu gliedern verstand, einen ganz unreifen Standpunkt, bei welchem die Alpengeologie ein dunkles Feld blieb. Klarheit kam erst hinein, als man anfang, einzelne Kalksteine von einander zu unterscheiden. Dies aber kann der Beobachter in einem neuen Land von vorn herein thun. Das Mittel dazu ist, nicht bloss einzelne Schichtgesteine zu unterscheiden, sondern bestrebt zu sein, gleich Schichtensysteme aufzufinden, und diese als Elemente zur Vergleichung zu verwenden. Ein Schichtensystem ist ein Verband gleichmässig gelagerter Schichtgesteine verschiedener Art. Wenn zum Beispiel ein durch Hornsteinführung ausgezeichnete Kalkstein, dessen Hangendes und Liegendes (d. i. das darunter und das darüber lagernde) nicht bekannt sind, eine Schiefereinlagerung von 100 Fuss Mächtigkeit und bestimmtem Charakter enthält, so bildet die Reihenfolge von unten nach oben: Kalkstein, Schiefer, Kalkstein, ein einfaches Schichtensystem. An diesem Verband wird man den Kalkstein wie den Schiefer mit Sicherheit wiedererkennen, wenn man ihnen in nicht zu grosser Entfernung von dem ersten Ort begegnet, und sie von anderen Kalksteinen und anderen Schiefen zu unterscheiden vermögen.

Je complicirter ein Schichtensystem. desto schwieriger wird die Aufgabe es zu entwirren, aber auch desto wichtiger. Es sind dabei stets die folgenden einfachen Regeln im Auge zu behalten: 1. Wo Schicht auf Schicht in längerer Reihenfolge übereinanderlagern, seien sie horizontal oder geneigt, da ist die tiefere (mit seltenen Ausnahmen) älter als die darüberliegende; 2. alle Schichten sind ursprünglich in Ebenen abgelagert, welche von der Horizontale gar nicht oder wenig abweichen, und konnten in eine stärker geneigte Lage erst durch spätere Störung gebracht werden; 3. wenn horizontale oder schwach einfallende Schichten stark geneigten angelagert sind, so ist die Aufrichtung der letzteren zwischen den Ablagerungsperioden beider geschehen. An der Hand dieser Grundsätze sollte der Reisende (und dies kann auch dem geübteren nicht genug anempfohlen werden) bei dem Betreten einer neuen Gegend den ersten sich anbietenden oder absichtlich aufgesuchten deutlichen und reichhaltigen Schichtenaufschluss auf das sorgfältigste, mit dem Notizbuch in der Hand, studiren. Ausser an Flüssen, welche Schichtgebirge quer durchsetzen, und in tief eingerissenen Querschluchten, bieten sich Gelegenheiten, wo immer man einen Theil eines

Gebirges aus Schichten aufgebaut sieht, welche durch das leisten- oder mauerartige Vortreten gewisser Schichtglieder eine ungleichmässige Zusammensetzung schon von weitem erkennen lassen. Die unterste Reihe gleichartiger Schichten, z. B. die eines braunen thonigen Sandsteins, bezeichne man mit einem beliebigen Buchstaben des Alphabets (z. B. *G*), notire ihre Mächtigkeit (z. B. 60 Meter) und Gesteinsbeschaffenheit, und bestimme ihr Streichen und Fallen. Nun geht man aufwärts in das Hangende und fährt in der Bezeichnung der nächsten Schichten nach der Reihe des Alphabets fort. Ob ein Complex gleichartiger Schichten aus einer 200 Meter mächtigen Folge von Kalkstein oder einer nur 6 Zoll dicken Schiefereinlagerung bestehe, Alles wird aufgezeichnet, und mit kurzen aber prägnanten Gesteinsbeschreibungen begleitet. Mit einer in dieser Weise schriftlich niedergelegten Schichtenfolge hat man schon gleich im Anfang einen Schlüssel gewonnen, den man so oft anwendet, als man einer einzelnen, oder einer kleinen Reihenfolge der am ersten Platz gesehenen Schichtengruppen begegnet. Je nachdem sich am nächsten Ort andere Glieder nach oben oder unten anreihen, fährt man mit dem Alphabet nach vorwärts oder nach rückwärts fort; und nach kurzer Zeit wird man jedes bereits gesehene Gestein nicht nur sofort wiedererkennen, sondern auch gleich wissen, welches Glied in der Reihe es bildet, und welche andern man zunächst darüber oder darunter zu erwarten hat. Zugleich werden sich in der Reihenfolge allmählig Aenderungen einstellen, die gleich beschrieben werden müssen. Kommt man aber, vielleicht nachdem man ein Thal überschritten hat, zu einer Schichtfolge, die mit der früheren keine Aehnlichkeit hat, und also einer jüngeren oder älteren Formation angehört, so suche man so bald als möglich sich auch für diese in der schon beschriebenen Weise einen Schlüssel zu verschaffen. So wird man auch die zweite Reihe zu verfolgen und an ihren untergeordnetsten Gliedern wieder zu erkennen vermögen, und an einem dritten Ort entdecken, ob sie über oder unter der ersten lagert, das heisst, ob sie jünger oder älter als diese ist. In ähnlicher Weise fahre man weiter fort. Dabei ist es gut, von vornherein Benennungen für sehr ausgezeichnete Schichtengruppen (z. B. eine solche, in welcher gewisse rothe Schieferthone oder grünliche Sandsteine bei allem sonstigen Wechsel stets wiederkehren), oder besonders mächtige und charakteristische Formationsglieder (z. B. einen Kalkstein von einer gewissen Mächtigkeit, der sich vor andern Kalksteinen durch bituminöse Beschaffenheit auszeichnet), nur für den Gebrauch im eigenen Tagebuch, einzuführen, und zwar am besten nach Localitäten; also z. B. der schwarze Kalk (*m*) vom Ort A, der rothe Schiefer (*h*) vom Berg L u. s. f. So wird nach und nach eine kleine Geologie der Gegend erwachsen, mit einer ausschliesslich für sie geltenden Terminologie.

Nicht immer bieten sich so günstige Verhältnisse, dass man vollständige Schichtenreihen gleich auffinden und verzeichnen kann. Dann muss man fragmentarische Beobachtungen sammeln, aus denen sich nach und nach das Vollendetere entwickelt. Diess lässt sich am besten an einem Beispiel zeigen. Aus einem Thalboden kommt man häufig zu einem einzeln aufragenden Hügel oder einem kleinen Hügelzug, der aus einer einzigen Gesteinsart besteht. Es sind besonders die härteren, welche bei der allgemeinen Erosion in dieser Weise zurückgelassen werden, zum Beispiel die verhärteten reinen Quarzsandsteine oder Quarzite. Man bestimmt das Streichen und Fallen der Schichten dieses Gesteins. Daraus zeigt sich, wo die tiefsten derselben zu suchen sind; und an der betreffenden Stelle wird es wahrscheinlich gelingen, das Liegende des Quarzits, z. B. schwarze Thon-

schiefer, zu finden. Der Quarzit habe eine Mächtigkeit von 2000 Fuss. Es kommt nun darauf an, sein Hangendes, das heisst, die ihn überlagernden Schichten, zu kennen. Das gelingt vielleicht nicht gleich; aber indem man das Problem im Auge behält, kommt man doch schliesslich wohl an eine Stelle, wo man es lösen kann. Vielleicht zeigt es sich, dass dem Quarzit nichts regelmässig aufgelagert, sondern ein anderes Schichtensystem in solcher Weise angelagert ist, dass es sich deutlich als jünger erweist, so dass man schliessen muss, es habe sich in einer Periode, als der Quarzit bereits ein Riff bildete, abgelagert. Nun wird man beim Weiterreisen die erste Schichtenfolge vom Quarzit und Schiefer abwärts zu verfolgen, und die jüngere nach allen Dimensionen zu erforschen haben.

Der Laie sollte, wie es der Fachmann thut, alle Beobachtungen über Schichtung sogleich graphisch darstellen. Wenige Linien drücken das Verhältniss besser aus als eine lange Beschreibung. Die gebräuchliche Art der Darstellung besteht in der genauen Einzeichnung der Einfallslinien auf einer senkrechten Ebene, die man sich rechtwinklig zur Streichrichtung der Schichten gelegt denkt. Durch ihre vollständige Zusammenstellung entlang eines Abhanges, oder über einen Gebirgszug hinweg, erhält man das „geologische Profil“, das, wenn mit Sorgfalt gezeichnet, den Bau eines Gebirges am klarsten zum Ausdruck bringt.

Nichts hütet mehr vor falschen Schlüssen über den Gebirgsbau und fördert mehr die richtige Vorstellung von demselben, als die sorgfältige und unablässige Aufzeichnung solcher Schichtenprofile mit genauer Angabe von Streichen und Fallen. Wo die Erinnerung selbst nur weniger Stunden unvollkommene und lückenhafte Ergänzungen macht, da ergiebt die graphische Darstellung von selbst das Richtige, und bei der Rückkehr von einer Reise ist nichts geeignet, das Gedächtniss in wirksamerer Weise zu unterstützen. Darum aber sind auch Schichtenprofile, die nicht mit vollkommener Exactheit gezeichnet sind, ganz besonders im Stande, irre zu führen. — Wer Beobachtung, Sammlung von Handstücken und Einzeichnung fortdauernd verbindet, der wird bald von selbst alle jene Verhältnisse entdecken, welche er in Büchern als Lagerungsformen und Schichtenstörungen beschrieben findet. Wo Schichten wellig aufgebogen sind, da ist die Streichrichtung der Falten, und die beiderseitige Neigung zu notiren. Dieser Gegenstand soll in dem Abschnitt über Gebirgsbau noch ausführlicher behandelt werden.

3. Geologisches Alter. — Die stratigraphischen Beobachtungen geben über das relative Altersverhältniss der in einer abgegrenzten Gegend vorkommenden Schichtgesteine Aufschluss. Aber die Resultate erhalten ihren wahren Werth erst dann, wenn es auf Grundlage von Versteinerungen gelingt, einerseits die Stellung der einzelnen aufgefundenen Schichtensysteme in der Geschichte der Erde festzustellen, andererseits an ihrer Hand die Richtigkeit der aus den stratigraphischen Untersuchungen gezogenen Schlüsse zu prüfen und zu controlliren. Mit niemals nachlassender Sorgfalt sollte man nach ihnen suchen und jeden Anhalt, der sich in den Pflastersteinen einer Stadt, an den Pfeilern einer Brücke, in dem Baumaterial von Häusern, Mauern und Tempeln, oder in Kunstproducten bietet, benutzen, um nach dem Herstattungsort darin gesehener Versteinerungen zu fragen und dann den Fundort aufzusuchen. Bei der Begehung von Gebirgen sind die S. 242 angegebenen Regeln zu befolgen. Wer Uebung hat und mit Eifer sucht, der wird gewiss in irgend einer Schicht Versteinerungen finden. Der Platz derselben in der ganzen Reihe der in der Gegend auftretenden Schichtgebilde sollte nach den vorhergehenden Beobachtungen bekannt sein. Auf

den Zetteln, welche den Fundort der Versteinerungen angeben, ist die Schicht genau, mit Verweisung auf das Tagebuch, zu bezeichnen. Findet man dann noch Versteinerungen in andern Schichten höher hinauf oder tiefer hinab in der Reihe, so wird sich dadurch auch das Alter aller dazwischenliegenden Schichten mit einiger Sicherheit interpoliren, oder der Betrag der in den Ablagerungen vorhandenen Lücken festsetzen lassen. In Anbetracht der Wichtigkeit der Altersbestimmung muss man aus einer Schicht, von welcher man noch keine Fossilien besitzt, auch das Unbedeutendste und Unvollkommenste sammeln.

Krystallinische Schiefer (Grundgebirge und metamorphische Gesteine).

Diese Gesteine treten so selbstständig auf, setzen so ausgedehnte Länderstrecken für sich allein zusammen, und tragen so viel Veranlassung eines besonderen landschaftlichen Charakters bei, dass sie besonders behandelt werden müssen. Sie bilden häufig die Unterlage der so eben behandelten Flözgebirge und können daher diesen gegenüber als Grundgebirge bezeichnet werden. Die Beobachtung in solchen Gebieten ist schwierig und setzt Uebung voraus. Schon die Constatirung der Anwesenheit und Verbreitung von krystallinischen Schiefen entlang dem Reiseweg ist ein beachtenswerthes Resultat. Der Reisende sollte auch angeben, welche besonderen Gesteine allein herrschen oder vorwalten, dieselben durch gut gewählte Belegstücke zur Darstellung bringen, und möglichst oft die Richtungen des Streichens und Fallens festsetzen. Insbesondere ist auf die Züge von krystallinischem Kalk oder Quarzit zu achten, welche zwischen Gneiss oder Glimmerschiefer liegen, ferner auf das Vorwalten von Glimmer oder Hornblende neben den anderen Bestandtheilen, auf die Beimengung von Granaten und das Auftreten von Gängen, seien dieselben Granit, Pegmatit (oder Schriftgranit, mit oder ohne Turmalin), oder Quarz.

Der geübte Geolog findet weit mehr Fragen zu lösen. Zunächst wird er sich bemühen zu entscheiden (und dies ist meist sehr schwer), ob die krystallinischen Schiefer jener grossen Abtheilung derselben angehören, welche als die primitiven bezeichnet werden, oder ob sie von jüngerem Alter und durch Umwandlung aus Schichtgesteinen von silurischem, devonischem, carbonischem, triassischem oder noch jüngerem Alter entstanden sind. Den primitiven Gesteinen gehören sie unzweifelhaft an, wenn auf den Köpfen der steil gestellten Schichten die cambrischen oder untersten silurischen Gesteine horizontal oder in geringer Neigung aufliegen. Es ist dann die Hauptaufgabe, in ähnlicher Weise wie bei den secundären Schichtgesteinen das relative Altersverhältniss festzustellen. Daraus wird sich ergeben, ob, wie man Grund hat anzunehmen, eine in ihren allgemeinen Zügen analoge Reihenfolge sich in verschiedenen Gegenden der Erde wiederholt, ob die ältesten sichtbaren Gebilde überall Gneisse von ausserordentlich grosser Mächtigkeit sind, darauf eine Reihe von Gesteinen folgt, unter denen Glimmerschiefer vorwaltet, und als drittes Glied Chioritschiefer mit Hornblendeschiefer, Serpentin und Talkschiefer auftreten, welche mit einer Reihe undefinirbarer grüner Schiefer verbunden sind; ob dann nach oben hin Thonglimmerschiefer, und endlich Thonschiefer mit Quarziten und zuweilen unveränderten rothen Sandsteinen und Conglomeraten auftreten, welche älter sind als die Silurische Formation und das bilden was man in Europa die Cambrische Formation nennt und in Amerika wahrscheinlich den obersten Theil der Huronischen Formation begreift. — Sind die krystallinischen Schiefer nicht

primitiv, sondern durch Metamorphismus entstanden, so kommt es vor Allem auf die Altersbestimmung an, die sich nur in seltenen Fällen ausführen lässt, ferner auf die Art des Verbandes mit Eruptivgesteinen, und die Ausdehnung der metamorphischen Einwirkung. Man kann auch versuchen, den Charakter der besonderen Schichten, welche verändert worden sind, festzustellen, doch setzt dies die geübteste und genaueste Beobachtung voraus.

Die krystallinischen Schiefer, die primitiven wie die metamorphischen, bilden oft die Mittelzone in zusammengesetzten Kettengebirgen, z. B. die Central-Alpen, die höchsten Kämme des Himalaya, des Kwen-lun, der Anden und vieler andrer Gebirge, sowie den grössten Theil der skandinavischen Halbinsel. Auch bilden sie ausgebreitetes Hügelland, wie in Canada. In letzterem Fall ist die Oberfläche gewöhnlich sanft wellig und von schroff eingeschnittenen Thälern unterbrochen, im ersteren walten zackige Gräte und schroffe Kämme vor. Die Schichten sind meist steil geneigt, und bewahren häufig über weite Strecken ein gleiches Streichen und Fallen. In diesem Fall ragen Theile von ihnen als kurz abgesetzte wilde Höhenzüge auf, während im Fortstreichen oft dieselben Schichten tief hinab zersetzt und weich geworden sind und culturfähiges Land bilden.

Granit.

Der Granit ist ein Gestein, dem der Reisende stets mit besonderem Vergnügen begegnet. Denn er ist leicht erkennbar, gewährt dadurch einen vollkommen sicheren Boden, schmückt die Landschaften mit einigen ihrer schönsten Formen und ist immer eins der wichtigsten Elemente im Gebirgsbau. Daher auch sollte man der Art seines Vorkommens in verschiedenen Ländern grosse Aufmerksamkeit zuwenden. Für den Anfänger genügt es auch hier, die Anwesenheit und Verbreitung des Gesteins festzustellen und auf der Karte niederzulegen; er sollte ferner angeben, ob der Granit die höchsten Kämme zusammensetzt oder sie, in geringerer Höhe an den Gebirgsabhängen, in Zonen oder einzelnen Stöcken begleitet, ob er von Klüften durchsetzt ist, wie diese gerichtet sind und sich gegenseitig durchschneiden, ob die Segmente durch Verwitterung in grosse runde Blöcke aufgelöst werden, welche in phantastischen Haufwerken übereinander liegen, oder die Abhänge hinunterrollen, um unten ein wildes Felsgewürfel zu bilden; ob er flachrunde Kuppen bildet, die schalig abgesondert sind; ob Steilwände in ihm niedersetzen; ob seine Oberfläche von kesselförmigen Vertiefungen mit senkrechten Wänden unterbrochen ist; oder ob er sich ohne irgend eine dieser Eigenthümlichkeiten über breite niedere Landschaften ausdehnt.

Man kann drei verschiedene Weisen unterscheiden, in denen der Granit auftritt: 1) in Verbindung mit Gneiss, so dass beide Gesteine unmerklich in einander übergehen. Die Glimmerblättchen, welche im Granit regellos zerstreut sind, nehmen eine parallele Lagerung an, und durch zunehmende Vollkommenheit der Parallelstructur entsteht wirklicher Gneiss. Die Uebergänge wechseln häufig mehrere Male an demselben Berg. Man kann diesen Granit als den primitiven bezeichnen, da sich niemals ältere Gesteine finden, und er ist vielleicht als Erstarrungsrinde anzusehen. — 2) Als Unterlage der Sedimentformationen jeglicher Art, die in einer Gegend auftreten; aber ohne mit Gneiss verbunden zu sein. Dann muss er einfach als von hohem Alter angesehen werden; genauer lässt sich dieses nicht feststellen. — 3) In die Lagerung der Sedimentformationen in abnormer Weise eingreifend. Er bildet dann zuweilen mächtige und nach allen Richtungen gleich ausgebreitete Massen (Stöcke) zwischen ihnen, oder setzt ganze Zonen zusammen,

oder ist über andere Gesteine ausgebreitet (dies ist ein seltener Fall und besonders genau zu beobachten), oder bildet breite Ausfüllungen zwischen getrennten Schollen des zerborstenen Sedimentgebirges. In allen diesen Fällen dringt er in Gängen in das letztere ein, manchmal nur auf einzelnen grossen Spalten, dann häufiger, und zuweilen das ganze Gestein in einem Netzwerk von Schnüren und Adern durchziehend. Wo sich die dritte Art des Auftretens findet, ist der Granit stets jünger als die von ihm durchsetzten Gesteine, und wenn man sorgfältig beobachtet welches Alter die höchsten noch von ihm afficirten Schichtgesteine haben, kann man das Alter des Granits mit mehr oder weniger Genauigkeit feststellen.

Wer mit dem Charakter des Granits wohl vertraut ist, wird in den meisten Fällen festsetzen können, welche Art des Auftretens er vor sich hat. Häufig finden sich in einer Gegend verschiedene Granite von verschiedenem Auftreten und verschiedenem Alter. Sie sind dann gewöhnlich auch im Aeussern von einander verschieden. Man sollte sie getrennt beobachten und Proben von allen sammeln. Auch durchsetzt eine Granitvarietät eine andere in Gängen, und dann müssen beide Gesteine untersucht werden. Bei dem häufigen Zusammenvorkommen von Granit und Gneiss ist wohl zu unterscheiden, ob sie (wie oben unter 1) in einander übergehen, oder ob der Granit den Gneiss in Gängen durchsetzt. Während man im ersten Fall die ältesten Gebilde vor sich hat, tritt der zweite bei primitivem wie bei metamorphischem Gneiss ein, der ein verhältnissmässig jugendliches Alter haben kann.

Ist der Granit jüngerer Entstehung, so sollte man nie unterlassen, die Veränderungen zu beobachten, welche er im Contact mit den durchsetzten Sedimentgesteinen hervorgebracht hat, und wie sie sich in der Verwandlung des dichten in körnigen Kalkstein mit gleichzeitiger Ausscheidung schön krystallisirter Mineralien, der Umänderung thoniger in glimmerige Schichten, erdiger in krystallinische Textur u. s. w. äussert. Es ist dabei auf den verschiedenen Grad der Metamorphose, je nachdem nur einzelne grössere Gänge oder zahlreiches kleines Geäder von Granit auftreten, zu achten. Auch sollte man die Quarzgänge beachten, welche die durch Granit verursachten metamorphischen Prozesse in grosser Anzahl zu begleiten pflegen und oft erzhaltig sind. In Californien sind sie die Hauptquelle des Goldes. Sie helfen oft wesentlich, das Alter des Granits zu bestimmen.

Aeltere Eruptivgesteine.

Nach Abzug der jugendlichen vulcanischen Gesteine, welche ihre eignen Verbreitungsgebiete haben und selbst dort, wo sie in älteren Gebirgen auftreten, individualisirte, schmarotzerhafte Massen bilden, die man leicht von dem Gesamtbau getrennt überblicken kann, und des Granits, bleiben noch eine grosse Anzahl wichtiger und häufig vorkommender Gesteine übrig, welche eine lange Kette zwischen den Endgliedern Granit und Lava bilden und durch analoges geologisches Auftreten wie durch analoge Entstehungsweise in der S. 248 angedeuteten Art untereinander verbunden sind. Diese Eruptivgesteine haben eine sehr allgemeine Verbreitung, und fehlen nur selten in Gebirgen welche aus gestörten Schichtmassen von Sedimentgesteinen bestehen.

Für ihre Beobachtung gelten im Allgemeinen die Regeln, welche für den Granit aufgestellt sind, und bei den Fragen 1, 2, 4 betreffs der vulcanischen Gesteine betrachtet werden sollen, aber nicht für alle gleichartig. Man theilt die Eruptivgesteine in kieselsäurereiche oder saure, und in kieselsäurearme oder basische. Zu den ersten gehören Granit, Syenit, Quarzporphyr und Porphyrit, zu den letzteren der Diorit, die dunklen Porphyre (Melaphyr und

Augitporphyr) und die verschiedenen Grünsteine. Die sauren Gesteine nähern sich in ihren grossen Ausbruchsmassen, wie sie besonders dem Quarzporphyr und Porphyrit eigenthümlich sind, dem Granit; die basischen trifft man vorwiegend in Gängen, welche die Sedimentgesteine durchsetzen, sich oft vielfach verzweigen, und entweder blind endigen, oder auf der Oberfläche in Kuppen, Decken und Lagern endigen, die zuweilen wieder von andern Sedimentgesteinen bedeckt sind. Diese Formen trifft man auch bei sauren Gesteinen, aber seltener ahmen die basischen die grossen Ausbruchsmassen der letzteren nach.

Die Anwesenheit, Lagerungsform und Verbreitung gewisser Eruptivgesteine nachgewiesen zu haben, ist an sich von Interesse. Doch wird dasselbe erhöht, wenn man in jeder einzelnen Gegend das Alter und die Aufeinanderfolge der einzelnen Gesteinsarten festsetzen kann. Ersteres bestimmt man aus dem Alter der durchsetzten Schichten, welche älter sind, und der überlagernden Gesteine, welche jünger sind als das Eruptivgestein. Die Aufeinanderfolge ergibt sich aus den gegenseitigen gangartigen Durchsetzungen verschiedener Eruptivgesteine, sowie aus den Fragmenten welche einzelne derselben umschliessen, indem im ersteren Fall das durchsetzte Gestein, im zweiten dasjenige von dem die Einschlüsse stammen, das ältere sein muss. Bei den Conglomeraten ist zu beachten, ob die Einschlüsse eckig oder gerundet sind, ob die ganze Gesteinsmasse sich structurlos hoch aufthürmt, oder in dicken Bänken, oder in dünneren Schichten abgelagert ist. Im letzteren Fall sind sie unter Wasser abgesetzt, und meist wird es sich dann ergeben, dass auch die Gesteinsausbrüche unter Wasser stattfanden. Mit den Conglomeraten wechseln alsdann Sedimente, in denen die Bruchstücke des Eruptivgesteins sandartig klein sind, und andere in denen sie erdig werden und nicht mehr erkennbar sind. In Südtirol sind z. B. die Ausbrüche des Augitporphyrs mit solchen Tuffablagerungen in grosser Mächtigkeit verbunden. Sie umschliessen Reste von Thieren und Pflanzen, welche sie hinsichtlich des Alters einem bestimmten Niveau der Triasformation zuweisen. So auch wird man überall, wo derartige submarine Ablagerungen den Ausbrüchen verbunden gewesen sind, nach Versteinerungen zu suchen haben, aus denen sich unmittelbar das Alter des Eruptivgesteins ergibt.

Gebirgsbau.

Die meisten Gebirge sind nicht einfach zusammengesetzt, sondern bestehen aus einem Wechsel von Gesteinen aus den verschiedenen im Vorhergehenden näher betrachteten Classen. Es ist die Aufgabe des Beobachters, die Gesammtarchitektur kennen zu lernen. Dazu muss er die Art, in welcher die einzelnen Formationen und Gesteine nebeneinander und übereinander angeordnet sind, mit Klarheit erkennen, und die Grundzüge des Gebirgsbaues aus der Vielheit der Erscheinungen entwickeln.

Tafelländer. — Diese bieten in der Regel den einfachsten Fall. Sie entstehen besonders dort, wo ein mächtiges System horizontaler Schichten sich mit dem ganzen betreffenden Theil eines Continentes ohne örtlich vermehrte oder verminderte Störung aus dem Meer gehoben hat und von andern Schichten nachher nicht mehr bedeckt worden ist. Nach der Hebung haben sich die Gewässer durch Erosion tief in die Schichten eingegraben und das Tafelland in einzelne Theile zerschnitten. An den Seiten der Schluchten kann man den Aufbau studiren, und häufig wird man in dem untern Theil derselben die Beschaffenheit des Bodens kennen lernen, welcher die Unterlage für die Schichtenanhäufung bildete. Manche Tafelländer sind

noch in dem Stadium, wo ein System von Furchen sehr tief eingeschnitten ist (z. B. dasjenige des Colorado-Flusses). Fortschreitende Erosion bringt zweierlei Wirkungen hervor. Sind die tieferen Schichten weich und leicht zerstörbar, die oberen hingegen hart, so werden die Furchen sehr breit und haben einen ebenen Boden, während die Abfälle ausserordentlich steil sind. Zuletzt bleiben nur noch einzelne, oft sehr grosse und weit von einander getrennte Tafeln oder Schollen als Fragmente übrig. Wenn aber umgekehrt die unteren Schichten härter sind, als die oberen, so ist die Hauptwirkung der Erosion in den oberen Theilen, und von ihnen aus fallen die Gehänge in Terrassen nach den in der Tiefe engen Schluchten ab. Zuletzt bewahren nur noch einzelne Rücken die ursprüngliche Höhe. Von ihnen aus erkennt man noch, wie einst eine ebene Fläche sie verband. Gewöhnlich sind solche aus Sedimenten aufgebaute Tafelländer die Ausfüllung ehemaliger weiter Meeresbuchten. Dann erheben sich an den Rändern die früheren Küstengebirge, welche älterer Entstehung sind. Reste von organischem Leben sind in den Schichten besonders diesen alten Gestaden entlang eingeschlossen, ein Gesichtspunkt, der häufig betreffs des Vorkommens von Kohlenflözen nicht unwichtig ist. — Eine zweite Art von Tafelländern sind diejenigen, welche durch die deckenartige Ausbreitung eines Eruptivgesteins gebildet werden. Dieselben nehmen oft grosse Flächen ein. Auch sie füllen, wie die Schichten im vorigen Fall, die Unebenheiten der Unterlage aus, und man kann dieselben, wenn das Tafelland von Wasserläufen durchschnitten ist, häufig blossgelegt sehen. Eine Decke folgt über der anderen; nur höhere Gebirge ragen noch darüber hervor. Basalt und Dolerit bilden die grössten Tafelländer dieser Art; kleinere bestehen zuweilen aus Quarzporphyr oder Diabas. Granit übertrifft den Basalt noch an Ausdehnung, aber seine Oberfläche ist gewöhnlich durch grosse blasenartige Auftreibungen uneben.

Häufig auch hat der Reisende Gelegenheit, von einem Höhenpunkt aus ein Meer von anderen Höhen zu überblicken, welche sämmtlich in ungefähr gleicher Höhe liegen, obgleich sie aus verschiedenen, oft stark geneigten Schichten bestehen. Man trifft sie besonders im krystallinischen Schiefergebirge. Es drängt sich die Ueberzeugung auf, dass sie die Fragmente eines früher eben und zusammenhängend gewesenen Landes sind. Die Gründe solcher Erscheinungen sind noch wenig klar.

Tafelländer haben oft nach einer Seite einen steilen Abbruch, mit dem sie gegen eine angrenzende Ebene oder das Meer endigen. Diese Stellen sollten besonders genau untersucht werden. Bei denen, welche von Eruptivgesteinen gebildet werden, kann die Auswaschung der Unterlage durch Meeresbrandung oder einen Fluss die Erklärung geben. Bei solchen aber, welche aus horizontal gelagerten Schichtgesteinen bestehen, wird man häufig eine plötzliche Umbiegung oder eine Zusammenfaltung der Schichten entlang einer schmalen Grenzzone wahrnehmen, von der aus sie unter die Ebene oder das Meer hinabfallen. Man hat es dann wahrscheinlich mit einem Bruchrande zu thun, an welchem ein Senkungsfeld und ein Hebungsfeld aneinander grenzen.

Lange Abdachungen. — Der Uebergang von der Ebene zum Gebirge wird häufig durch eine sehr allmälige Abdachung vermittelt, welche viele Meilen breit sein kann. Oft besteht sie aus dem losen Schwemmland der Flüsse oder den jüngst gehobenen Ablagerungen eines seichten Meeres. Dieser Fall wird später in dem Abschnitt über die Sedimentbildung der Jetztzeit betrachtet werden. Oefter aber sind sie, analog den Tafelländern der ersten

Art, dadurch gebildet, dass Schichtgesteine, welche in ihrer Lagerung wenig oder keine Störung erfahren haben, allmählig über die Meeresfläche erhoben worden sind. In wenigen Fällen (wie im nördlichen Russland) gehören solche Sedimentgebilde den ältesten Formationen an; gewöhnlich aber sind sie jugendlicher Entstehung. Da die höheren, den Gebirgen zunächst liegenden Theile schon gehoben waren, als die tieferen sich noch unter Wasser befanden und von jugendlichen Schwemmbildungen bedeckt wurden, so findet man dort häufig ein fast ebenes oder sanftwelliges Land von tertiären Schichten, denen gegen die Küsten hin allmählig jüngere Ablagerungen folgen. Im Innern der Continente (wie in Ungarn) ist auch das Meer längst zurückgewichen, und die tieferen Theile werden dann von Süswasserbildungen eingenommen. Ist der Neigungswinkel der Abdachungen sehr gering, so haben sich die Gewässer nur flache Canäle ausgeschnitten und die Gestalt der Oberfläche wenig verändert. Je grösser die Böschung, desto tiefer sind jene eingegraben, desto mehr das früher ebenflächige Land in sanfte Hügel aufgelöst, welche eine erste Vorstufe gegen das Gebirge bilden. Im ersten Fall kann man den Schichtenbau nur durch Brunnengrabungen oder Bohrlöcher kennen lernen, im zweiten durch unmittelbare Beobachtung. Die Aufschlüsse sind oft sparsam. Man sollte daher keinen ununtersucht lassen. Es bietet sich in ihnen besonders häufig Gelegenheit, die versteinungsreichen Schichten des Tertiärgebirges kennen zu lernen.

Die Ränder der südlichen Hälfte des Afrikanischen Continentes bieten das grossartigste Feld für die Untersuchung der Art in welcher Tafelländer abfallen, sowie derjenigen, in welcher eine aus verhältnissmässig jüngeren Gebilden bestehende Vorlage den Abfall von der Küstenebene und dem Meere trennt.

Vereinzelte Hügel. — Aus Ebenen, langen Abdachungen und Tafelländern erheben sich oft inselförmig vereinzelte Hügel. Entweder sind sie vulcanischen Ursprungs, und dann mit den Gebilden über die sie ansteigen gleichzeitiger Entstehung, oder ihnen im Alter nachstehend; oder sie sind aufragende Theile unterirdischer Gebirge. Dies ist der häufigere Fall. Sie erfordern dann dieselbe Aufmerksamkeit wie Inseln im Ocean, und sollten, als die isolirten Punkte, an denen man Aufschlüsse über oft wichtige Verhältnisse erlangen kann, stets sorgfältig untersucht werden. Die isolirte Gypsinsel von Sperenberg, welche zur Bohrung von 4000 Fuss in solidem Steinsalz Veranlassung gab, sollte geeignet sein, einen Wink über die praktische Bedeutung des Studiums solcher Inseln zu geben. Von ähnlicher Wichtigkeit würde das vereinzelte Auftauchen von Steinkohlenformation in einer Ebene, in welche vom Gebirgsrande aus die Schichten derselben hinabtauchen, sein. In anderen Fällen giebt sich ein grösseres Hauptgebirge durch Inseln unzweideutig zu erkennen. Häufiger stellen sie die letzten Ausläufer von Gebirgen oder Seitenrücken derselben dar. Auch kommt es vor, dass in geringer Entfernung von einem Gebirgsrand, besonders wo man es mit einem Bruchrand zu thun hat, einzelne hochgewölbte Kuppen von Eruptivgesteinen aufsteigen, vorzüglich von solchen welche unter den weiten Begriff der „Grünsteine“ fallen.

Einfache Gebirge. — Es giebt Gebirgszüge, welche aus den Gesteinen einer einzigen der bisher behandelten Classen zusammengesetzt sind, indem sie entweder aus krystallinischen Schiefern, oder aus Schichtgesteinen, oder aus Eruptivgesteinen bestehen. Sie sind selten und im Allgemeinen von geringer Bedeutung. Für sie gelten die in Beziehung auf jede einzelne

Classe angegebenen Regeln. Von ungleich grösserer Wichtigkeit sind die vulcanischen Gebirge, welche grossentheils hierher gehören und im nächsten Abschnitt betrachtet werden sollen.

Combinirte Gebirge. — Bei Weitem die Mehrzahl der Gebirge sind aus Gesteinen der verschiedensten Art aufgebaut. Sie sind als durch unendlich lange Zeiträume fortgesetzte, periodisch beschleunigte oder verzögerte Faltungen langer Reihen über einander abgesetzter Sedimentformationen anzusehen, welche an solchen Stellen stattfanden, wo zugleich günstige Bedingungen für das Hervorbrechen von Eruptivgesteinen gegeben waren. Je älter die Formationen, desto länger hatten sie an dem Faltungsprocess theilzunehmen, und desto grösser ist daher in der Regel die Störung, die sie erlitten haben. Den normalsten Bau haben die grösseren Kettengebirge. Meist herrschen bei ihnen in einer Axenzone, welche zugleich die Zone höchster Erhebung zu sein pflegt, krystallinische Schiefer und Granit, und es schliessen sich daran beiderseits die Schichten einzelner Formationen aus der Reihe von der Cambrischen und Silurischen aufwärts bis zur Tertiären. Sie bilden Nebenketten, welche oft dem Centralzug parallel gerichtet sind. Zu solchen normal gebauten Gebirgen, deren Emporhebung bis in die jüngste Zeit gedauert hat, gehören die Alpen und der Himalaya. Nicht alle combinirten Gebirge sind so regelmässig construiert. Es giebt solche, wo die krystallinische Zone nur auf einer Seite von parallelen Nebenzonen von Schichtgebirgen begleitet wird, während auf der andern Seite eine Ebene angrenzt, oder wo die Schichtgebirge in elliptischen Kreisen einen krystallinischen Kern umgeben, und noch andere, wo die Schichtgebilde einer krystallinischen Kette aufsitzen und sie überragen. Man kann sagen, dass jedes Gebirge seine eigene Art der Anordnung und seinen eigenen Bau hat. Der Reisende wird sich schnell überzeugen, ob er es mit einem combinirten Gebirge zu thun hat. Je nach der Gesteinsclasse, welche er bei der Bereisung desselben in einzelnen Theilen antrifft, kann er die früher gegebenen Regeln anwenden, um dann noch die Art und Weise zu untersuchen, wie diese Theile zum Gebirgsganzen zusammengefügt sind. Es sind dabei im Wesentlichen die folgenden Fragen zu beantworten: Ist das Gebirge langgestreckt (wie die Alpen), oder kurz abgesetzt (wie der Harz)? Besteht es aus einer oder aus mehreren Ketten? Sind diese einander vollkommen parallel? Stimmt die Abtheilung der geologisch verschiedenen Zonen mit der Anordnung der Formen überein? Bilden die krystallinischen Gesteine eine oder mehrere Zonen? Ist, wenn nur eine vorhanden ist, dieselbe in der Mitte oder am Rande? Nehmen Granite daran einen hervorragenden Antheil? Kommen dieselben (wie bei den Südalpen) auch noch ausserhalb der krystallinischen Zone in stockförmigen Massen vor? Fallen die krystallinischen Schiefer von einer Axenlinie aus nach beiden Seiten ab? oder sind sie sämmtlich nur nach einer Richtung geneigt? stehen sie senkrecht? oder fallen sie einer Axenlinie von beiden Seiten zu (Fächerstructur)? Ist in letzterem Fall die Neigung gleichmässig? oder biegen sich die Schichten von einer in der Tiefe herrschenden steilen Neigung in den oberen Theilen so um, dass sie hier unter geringerem Winkel der Axe zufallen? Wie sind die Sedimentformationen angeordnet? Ist eine gewisse Reihe derselben zu einer Gruppe verbunden, die eine Zone für sich bildet (wie z. B. die Trias-Lias-Zone in den Nordalpen)? Schliessen sich daran andere Zonen, die aus ähnlichen Gruppen bestehen (wie z. B. die Jura-Kreide-Eocän-Zone in den westlichen Nordalpen)? Wie ist das beiderseitige Fallen der der Streichrichtung parallelen Schichtenaufbiegungen? Ist es gleichmässig, oder nach einer Seite steiler als

nach der anderen? (In den Nordalpen sind geringe Fallwinkel auf der der Centralkette zugewendeten, steile auf der abgewendeten Seite.) Wie verhalten sich in jeder Zone die Eruptivgesteine? Wie endet das Gebirge in seiner Streichrichtung? Geht es in andere Gebirge über, oder versenkt es sich in eine Ebene? Wie sind die dem Streichen parallel gerichteten Abfälle? Sind sie plötzlich und steil, oder dacht sich das Gebirge allmählig in Hügelreihen ab? Sind die einzelnen Zonen durch Längsthäler geschieden, oder kommen nur Querthäler vor? Zur Beantwortung der meisten dieser Fragen gehört etwas Uebung; aber wer die Gabe eines klaren Ueberblicks hat, wird sie bald in den unter seine Beobachtung kommenden Fällen zu lösen verstehen, sowie er auch die Fragen selbst zu modificiren wissen wird, wenn eine Anordnung in deutliche Zonen nicht vorhanden ist.

Wer im Stande ist, das Alter der Formationen sogleich annähernd zu bestimmen, der sollte auch seinen Blick auf die Unterschiede zwischen denjenigen Gebirgen, wo das Auftreten tertiärer Schichtgebilde in den höheren Theilen ein bis in die jüngeren geologischen Perioden fortgesetztes Ansteigen der ganzen Gebirgsmasse erweist, und denjenigen, an deren Aufbau nur die ältesten Formationen theilnehmen, richten. Die ersteren (Himalaya, Felsengebirge) wachsen wahrscheinlich noch heute fort, während die letzteren schon in frühen Perioden vollendet waren und seitdem als Ruinen allein der zerstörenden Gewalt des Wassers ausgesetzt waren (Skandinavisches Gebirge, Harz, Kwenlun und die meisten Gebirge von China, Appallachische Ketten).

Gebirgsländer. — Ein Gebirgsland wird von vielen Gebirgen mit oder ohne eingeschlossene Thalweitungen oder Ebenen zusammengesetzt. Ein Gesamtüberblick seiner Configuration und Anordnung lässt sich nur durch die vorangegangene Untersuchung des allgemeinen Baues der einzelnen Gebirge gewinnen. Hierbei wird es vor Allem klar, wie wichtig es ist, die Streichrichtungen der Ketten und Abfälle und der einzelnen Formationen zu bestimmen. Mit ihrer Hülfe zeichnet sich oft in einem anscheinend chaotischen Gebirgsland die Anordnung mit überraschender Klarheit. Dort z. B., wo hervorragende Kämme nicht existiren, sondern gleichmässiges Mittelgebirge sich ausbreitet, in welchem die Flüsse einen gewundenen Lauf nehmen, zeigen Aussichten von Höhepunkten ebenso wie topographische Karten oft ein scheinbar gesetzloses Gewirr von Erhebungen und Vertiefungen. Legt man aber die geologischen Beobachtungen auf der Karte nieder, so erkennt man mit Staunen die einfachen Linien, in denen die Formationen durch das Land ziehen, und wie sich ihnen die Gebirgsabfälle, die einzelnen Theile der Flussläufe und Thaleinsenkungen nach bestimmten, vorher aber ungeahnten Gesetzen unterordnen. Der einfachste, aber trotzdem nicht immer am leichtesten zu beurtheilende Fall ist der, dass ein ausgedehntes Gebirgsland nur aus einander parallelen Ketten besteht, die durch parallele Thäler getrennt sind. Verwickelter wird das Verhältniss, wenn in parallelen Furchen dieser Art jüngere Formationen liegen, die auch durch Zusammenfaltung und Aufrichtung an dem gebirgigen Charakter theilnehmen. — Häufiger als solcher über weite Strecken sich ausdehnender Parallelismus ist der Fall, dass Gebirge von verschiedenen Streichrichtungen gegeneinander laufen und sich entweder kreuzen oder verbinden. Wie sind die Verhältnisse an den Kreuzungs- oder Schaarungspunkten? Zeigt sich das Vorherrschen und Durchgreifen einer der beiden Richtungen, und welcher? Ist dort besonders hoch erhabenes Land? Der interessanteste Punkt dieser Art, welcher noch einer Untersuchung wartet, ist dort, wo der Kwenlun (Sreichen $O\ 12^{\circ}\ S$) und der Himalaya (Sreichen $SO - NW$) gegen Westen zusammenlaufen. —

Wie ist das Land zwischen auseinander laufenden Gebirgszügen beschaffen? Schliessen sie ein Tafelland ein? — Diese Fragen können nur einen allgemeinen Anhalt für diejenigen geben, die sich dem Reisenden in jeder Gegend in besonderer Weise bieten und in weiterer Fassung auf die Configuration der Continente ausgedehnt werden können.

Bruchlinien und Gebirgsverwerfungen. — Dieser für die Gestaltung des inneren Baues der Continente wie für ihre Umrisslinien fruchtbare und wichtige Gegenstand wird noch wenig beachtet. Der Reisende hat Gelegenheit, Thatsachen darüber aus verschiedenen Gegenden der Erde zu sammeln. Die einfachen Schichtenverwerfungen, wie man ihnen in Flözgebirgen fortdauernd begegnet, sind leicht zu verstehen, wenn man sich den Begriff aus der Darstellung in einem Lehrbuch (s. Hochst. S. 113) angeeignet hat. Der einfachste Fall der ungleich grossartigeren Erscheinung der Gebirgsverwerfungen findet sich in Kettengebirgen deren einzelne Theile in regelmässigen Zonen angeordnet sind. Da kommt es häufig vor, dass die Zonen ihre Anordnung nicht einer einfachen Ueberlagerung und Schichtenbiegung, sondern Verwerfungen, welche parallel der Streichrichtung des Gebirges sind, verdanken. Man erkennt dies, wenn von zwei gegenüberliegenden Seiten eines Längsthales der Bau der einen sich nicht aus dem der anderen ableiten lässt, sondern plötzlich eine ganze Zone weit älterer oder viel jüngerer Formationen auftritt, als man zu erwarten hat. Ein dem Streichen paralleler Steilabfall eines Gebirges besteht zuweilen aus dichtgedrängten derartigen Längsverwerfungen. — In ähnlicher Weise finden sich Querverwerfungen, wo entlang einer quer gegen ein Gebirge gerichteten Linie plötzlich alle Höhenrücken und Falten ein Ende erreichen, um daneben in weit tieferem Niveau (zuweilen um mehrere tausend Fuss tiefer), und manchmal noch überdies seitlich verschoben, wieder aufzutreten (Verwerfung der nördlichen Kalkalpen am Bodensee).

Bruchlinien unterscheiden sich von den Gebirgsverwerfungen dadurch, dass ihnen entlang ein Gebirge vollkommen abgebrochen ist und gar nicht oder erst in grösserer Entfernung wieder erscheint. Man muss sie auch als Verwerfungsspalten betrachten, denen entlang aber eine weit bedeutendere verticale Verschiebung als im ersten Fall stattgefunden hat, so dass der versenkte Theil des Gebirges unter der angrenzenden Oberfläche, sei sie eine Alluvialebene, oder Meer, oder Tertiärgebirge, verborgen ist. Auch hier müssen Längsbrüche und Querbrüche unterschieden werden. Längsbrüche sind dem Streichen der Gebirge parallel gerichtet. Sie finden statt, wenn eine Zone eines Gebirges plötzlich von grösserer Höhe steil abfällt und kein weiteres demselben Gebirge angehöriges Glied darauf folgt. Zuweilen sieht man wellig aufgebogene Schichten auf einmal umbiegen und senkrecht hinabstürzen, um ein ganzes Gebirge abzuschliessen (z. B. am unteren Yang-tse-kiang). Dass ähnliche Fälle bei Tafelländern vorkommen, wurde schon erwähnt. — Querbrüche kommen dort vor, wo ein ganzes Gebirge in der Streichrichtung plötzlich endet, und zwar oft in solchen Theilen, wo die Rücken vollkommen entwickelt sind (Bruchlinie der Alpen bei Wien, des Kwen-lun in Honan, der Westkarpathen bei Eperies). Es schliesst sich dann unmittelbar Ebene oder niederes Hügelland an, oder es steigen vulcanische Gesteine aus der Bruchlinie auf.

Dies sind Erscheinungen, welche die Aufmerksamkeit des Reisenden auf sich ziehen sollten. Da sie eine nicht unbedeutende planetarische Rolle spielen, so sollten die Fälle mit Sorgfalt gesammelt und die Streichrichtungen der Brüche festgestellt werden.

Hierher gehört auch das schwierigere Phänomen der vulcanischen Einbruchskessel. Es giebt grosse Gebirge, welche mitten in ihrem Verlauf eine durch Bruchlinien begrenzte Lücke von mehreren Meilen Durchmesser haben, und wo an der Stelle des vollkommen verschwundenen Gebirgsthales vulcanische Gesteine abgelagert sind, über die sich thätige Vulcane erheben. Die Vermehrung der wenigen in dieser Beziehung bekannten Thatfachen würde wesentlich zur Erkenntniss des Vulcanismus beitragen.

Vulcane und vulcanische Gesteine.

Ein Vulcan ist ein Berg, welcher durch successive Ausbrüche heissflüssigen, aus der Tiefe heraufgedrungenen Gesteinsmaterials aufgebaut ist, das sich um eine senkrechte Axe, die periodisch ihre Lage gewechselt haben kann, kegelförmig anhäufte, sei es, dass dasselbe in Gestalt von Lavaströmen ruhig über die Abhänge hinabfloss, oder, durch Explosionen in Fragmente zertrümmert, als Schlacken und Rapilli ausgeschleudert und über die Kegelfläche zerstreut, oder, gleichzeitig durch die plötzliche Verwandlung des im Innern des Gesteins enthaltenen überhitzten Wassers in Dampf schwammartig aufgebläht, in Bimstein und feine Asche verwandelt wurde. Man unterscheidet thätige Vulcane, bei welchen noch periodisch Ausbrüche stattfinden, und erloschene Vulcane, bei welchen sie in historischer Zeit sich nicht ereignet haben. Man betritt mit ihnen gewissermaassen ein Stück des nach aussen gekehrten Erdinnern, und da sich auch die unterirdischen Kräfte nirgends deutlicher manifestiren als an thätigen Vulcanen, so nehmen diese das Interesse des Forschungsreisenden in besonderem Maasse in Anspruch. Auch der Laie findet sich zu ihrer specielleren Untersuchung hingezogen, und findet vielfache Gelegenheit zur Sammlung werthvoller Beobachtungen.

Gewöhnlich finden sich eine geringe Zahl thätiger Vulcane unter einer grösseren Zahl anderer zerstreut, welche nicht mehr thätig sind, aber durch eine den ersteren analoge Zusammensetzung und Structur den Beweis liefern, dass sie in analoger Weise aufgebaut wurden. Bei einigen von ihnen strömen noch Dämpfe oder Quellen kochenden Wassers hervor; bei anderen geben nur noch Thermen von geringeren Temperaturgraden Zeugniss von der unterirdischen Wärmequelle. In anderen Gegenden ist die Ausbruchsthätigkeit gänzlich erloschen; da geben von ihrer früheren Heftigkeit nur noch die Reihen von oft schon halb zerstörten Kegeln beredte Kunde.

In früherer Zeit richtete man die Aufmerksamkeit ausschliesslich auf die thätigen Vulcane und legte deren Verbreitung auf der Erde auf Karten nieder. Dies ist ein veralteter und sehr unvollkommener Standpunkt, da wir dadurch nur ein ganz lückenhaftes Bild von der Verbreitung derjenigen Gesteine erhalten, welche in Charakter und Ursprungsart dem Material, welches die Vulcane aufbaut, analog sind. Gewisse Erscheinungen ehemaliger vulcanischer Thätigkeit, wie sie im grossartigsten Maassstab aus der Permischen und Trias-Periode (z. B. im Fassathal in Südtirol) vorliegen, sind nur dem Auge des geübten Geologen erkennbar und kommen hier nicht in Betracht. Die betreffenden Gesteine sind von mächtigen Schichtmassen bedeckt und ihre Anordnung ist nicht leicht zu enträthseln. In der Tertiärperiode begann auf der ganzen Erdoberfläche, nach langen Zeiten verhältnissmässiger Ruhe, eine neue Phase der Eruptionsthätigkeit. Sie steigerte sich in jeder einzelnen von ihr betroffenen Gegend zu einem Höhepunkte, von dem aus sie sich allmählig abschwächte. Unsere heutigen thätigen Vulcane sind ihre letzten geringen Nachwehen. Da sie ein Hauptmoment für die Beobachtung

bieten, indem sie allein den vollgültigen Beweis für die Entstehung einer grossen Reihe von Gesteinen durch Ausbruchsthätigkeit geben, so bezeichnet man alle in unmittelbarem Zusammenhang mit ihnen stehenden Eruptionsgesteine, d. h. alle welche seit dem Anfang der Tertiärperiode an die Erdoberfläche gelangt sind, als vulcanische Gesteine.

Eine zweite Art der Anhäufung vulcanischer Gesteine besteht darin, dass ganze Gebirge mit bedeutender Längenerstreckung aus ihnen aufgebaut sind. Bei ihnen gruppirt sich Alles um eine horizontale Längsaxe; es finden sich keine Kratere als Ausgangspunkte der Thätigkeit. Wohl aber sind häufig ihren Rücken und Flanken vulcanische Kegel mit Verticalaxen, Krateren und radialer Anordnung des Materials aufgesetzt, oder ihr Fuss ist von Reihen derselben begleitet. Sie sind von Vulcanen verschieden, indem sie das Gepräge eines ruhigen Ausflusses von heissflüssigem Material aus Längspalten tragen, während der Vulcan wesentlich convulsivischer Thätigkeit seinen Ursprung verdankt. Im Gegensatz zu thätigen und erloschenen Vulcanen bezeichnen wir jene kurzweg als vulcanische Gebirge. Die Beobachtung muss nothwendig auf sie ausgedehnt werden. Sie lässt sich unter folgenden Gesichtspunkten zusammenfassen:

1. **Wie ist das Material beschaffen?** besteht es aus einer einzigen Gesteinsart, oder sind deren mehrere vorhanden? — Das Material, woraus die Vulcane bestehen, zerfällt nach seinen augenfälligsten Eigenschaften in zwei grosse Abtheilungen: 1) homogene Gesteine, welche durch Festwerden einer heissflüssigen Masse entstanden sind; 2) Trümmergesteine, welche aus der Zertrümmerung der ersten zur Zeit des Ausbruchs hervorgegangen sind. Zwischen beiden stehen 3) solche homogene Massen, welche Trümmer umschliessen und mit ihnen Breccien bilden.

Die homogenen Gesteine sind am normalsten ausgebildet, wenn sie ein krystallinisches Gefüge haben, und man kann dann die Gesteinsart feststellen der sie angehören. Häufig sind sie unvollkommen ausgebildet, oder haben durch störende Einflüsse ein besonderes Gepräge erhalten. Diejenigen von glasartiger Textur nennt man, ohne Rücksicht auf die Gesteinsart, Obsidian; schaumige Aufblähung giebt den Bimsstein, eine concentrisch-lamellare Aufblähung gewisser Arten (nur Rhyolith) den Perlstein. Ebenso scheint Basalt eine im Wesentlichen mikrokrySTALLINISCHE Ausbildungsform der kieselsäureärmsten Arten zu sein, und zwar die häufigste Form, in welcher dieselben auftreten. Das Vorkommen solcher Modificationen der Textur zu beobachten ist stets von Interesse. Aber wichtiger ist die Feststellung der Gesteinsart, welche nach der mineralischen Zusammensetzung, in Verbindung mit gewissen Texturunterschieden, bestimmt wird. Die hauptsächlichsten Arten lassen sich leicht kennen lernen, und keiner sollte es versäumen, vor Antritt einer grösseren Reise sich mit denselben vertraut zu machen. Im Allgemeinen unterscheidet man auch hier die kieselsäurereichen oder sauren und die kieselsäurearmen oder basischen Gesteine; zu ersteren gehören Rhyolith und Trachyt, zu letzteren Andesit und Dolerit, welcher, nebst einigen unwesentlichen verwandten Gesteinen, häufig als Basalt ausgebildet ist. Die erste Gruppe besteht im Wesentlichen aus hellen, die zweite aus dunklen Gesteinen.

Der Rhyolith ist stets von den hellsten Farben, und hat entweder ein stark poröses Gefüge oder ein geflossenes, an die verschiedenen Arten von Glasflüssen erinnerndes Ansehen. Zuweilen ist er zu einem Bimsstein aufgebläht, der sich durch lange Fasern und Seidenglanz auszeichnet. Glasartiges Gefüge (Obsidian) ist häufig, und in manchen Abänderungen wechsell papierdünne Lamellen von diesen und anderen Arten der Textur. Perlsteintextur ist ihm ganz allein

eigen. Die Erkennung der Mineralien, welche er enthält: Quarz, glasiger Feldspath (Sanidin und Oligoklas), Glimmer und Hornblende, kann man sich ohne Schwierigkeit aneignen. — Der Trachyt ist häufig dem Rhyolith ähnlich; seine Farben sind zum Theil eben so hell, aber Mittelstufen walten vor. Er enthält keinen Quarz, aber die anderen angeführten Mineralien, und in den häufigsten Abänderungen ist Oligoklas als einziger Feldspath vorhanden. Auch er ist fast stets porös, oft zu Bimsstein aufgebläht, welcher etwas weniger langfaserig ist als der aus Rhyolith gebildete, und besitzt oft eine Absonderung in feine Lamellen. — Der Andesit ist das verbreitetste unter allen vulcanischen Gesteinen, aber, was die Erkennbarkeit mit blossen Auge betrifft, schwer zu definiren. Bei Weitem vorherrschend ist schwärzlich graue Farbe. Wenn er erkennbare Krystalle enthält, so sind es sehr kleine eines Feldspaths, Nadeln oder Säulen von Hornblende, und vereinzelte Krystalle von Augit. Er ist zuweilen zu Bimsstein aufgebläht, der von grünlicher oder grauer Farbe und rundbläsig ist. Auch bildet er Obsidian. — Der Dolerit ist in seiner weitverbreiteten mikrokrySTALLINISCHEN Modification, dem Basalt, zu wohl bekannt, um dessen Beschreibung nothwendig zu machen; das Vorkommen von Olivin ist besonders charakteristisch für diesen. Die krystallinischen Modificationen bieten dem Ungeübten Schwierigkeit, da charakteristische Mineralien in grösseren Krystallen gewöhnlich nicht ausgeschieden sind. Doch gewöhnt man sich bald an das einförmig lichtgraue, an der Oberfläche oft rothbraune, poröse Mineralgemenge. Dazu kommt ein hohes specifisches Gewicht, und besonders charakteristisch ist das häufige Auftreten rundlicher Höhlungen, welche leer oder mit fremden Mineralien erfüllt und den anderen Gesteinen nicht eigenthümlich sind.

Wer eine gründliche Vorbildung in der Geologie nicht besitzt, thut wohl, sich nur die Typen dieser vier Gesteinsarten einzuprägen, da die anderen unwesentlich sind. Nur eine ist noch von hoher Wichtigkeit: der Propylit oder Grünsteintrachyt, welcher von allen anderen vulcanischen Gesteinen wesentlich verschieden ist und sich überdies dadurch auszeichnet, dass er die meisten grossen Silbererzgänge der Welt führt. Seine Beobachtung bietet Schwierigkeiten und sollte dem Fachgeologen überlassen bleiben.

Zunächst den grossen festen Massen der homogenen Gesteine, welche als Lavaströme, als einzeln aufragende Kuppen und als ganze Gebirgszüge auftreten, sind die Trümmergesteine zu untersuchen, welche aus jenen entstanden sind und in welchen sich daher deren Artenreihe wiederholt. Es kommen hier zunächst diejenigen in Betracht, welche als lose Auswürflinge aus Kratern die Flanken der Vulcane zusammensetzen. Die herkömmlichen, den Grössenverhältnissen entnommenen Ausdrücke: vulcanische Blöcke (mehrere Fuss Durchmesser, aussen verschlackt, innen fest), vulcanische Bomben, Rapilli, vulcanischer Sand, vulcanische Asche, lernt jeder bei dem ersten Anblick auf der Lagerstätte richtig anwenden. Sie ordnen sich in der Regel nach der Grösse von dem Kraterrand nach dem Fuss des Kegels; nur die feinste Asche, und insbesondere der Bimssteinsand, breiten sich weit darüber hinaus aus. Diese Materialien bilden Schichten, welche allseitig vom Kegel abfallen, und sind häufig von radial eingeschnittenen Wasserrillen durchschnitten. Sie werden leicht cämentirt. An den Trümmern erloschener Vulcane kann man sie in tiefen Durchschnitten beobachten und die Natur jener daran erkennen. Aus der Untersuchung der festeren Stücke lässt sich die Art des Gesteins festsetzen, das in einer gewissen Epoche vom Vulcan ausgeworfen wurde.

Eine zweite Form, in welcher Trümmergesteine erscheinen, sind die Schlammströme, welche durch das Zusammenströmen von Auswürflingen in Folge der die Eruptionen zuweilen begleitenden wolkenbruchartigen Regengüsse entstehen. Man erkennt sie an dem gänzlichen Mangel der Schichtung oder der lagenartigen Vertheilung der einzelnen Trümmer nach ihrer Grösse, an der Menge scharfeckiger Einschlüsse von der verschiedensten Grösse, welche in dem aschenartig zerkleinerten Material, das die Grundmasse bildet, unregelmässig zerstreut sind, ferner an dem Umstand, dass sie die

tiefere Theile ihrer Unterlage ausfüllen und oft eine bedeutende Längenerstreckung bei geringer Breite haben. Sie sind ein wichtiges Element in vulcanischen Gebirgen, und wer sie kennen gelernt hat findet sie auch als Begleiter von Ausbrüchen alter Eruptivgesteine. Man verwendet sie wegen ihrer Lockerheit und Leichtigkeit, die sie trotz fester Cementation auszeichnet, gern zu Baumaterial. Die dritte Form des Auftretens sind die Tuffgesteine, die sich von den vorigen durch Schichtung auszeichnen. Es sind Ablagerungen von Auswürflingen und sonstigen zur Eruptionszeit zerstörtem Ausbruchsmaterial unter Wasser. Die einzelnen Bestandtheile sind darin nach der Grösse in Schichten geordnet. Schlamm und Tuff variiren je nach der Art des Gesteins aus dem sie entstanden sind.

Die zwischen beiden Abtheilungen stehenden Gesteine bestehen in homogener Masse, welche eckige Bruchstücke von Gesteinen umschliesst. Die Trümmer sind entweder 1) gleichartig mit dem einschliessenden Gestein, oder sie bestehen 2) aus vulcanischem Gestein anderer Art, oder 3) aus ganz fremdartigem Gestein.

Gesteine der ersten Art sind am grossartigsten in Andesitgebirgen entwickelt, und sie bilden zuweilen das Hauptmaterial ausgedehnter Rücken. Sie entstehen wahrscheinlich, indem die zu einer Kruste erstarrte Schale einer im ruhigen Zustand befindlichen heissflüssigen Masse durch neues Andrängen der letzteren zerberstet und die Trümmer in den hervorbrechenden Strom eingeschlossen werden. — Gesteine der zweiten Art sind bei vulcanischen Ausbruchsmassen häufig. Ihr Studium ist wichtig, weil das eingeschlossene Bruchstück älter ist als die umschliessende Masse. — Die Gesteine der dritten Art sind von allgemeinerem Interesse und zeichnen sich zuweilen durch das Vorkommen schöner Mineralien aus. Man nimmt zu ihrer Erklärung an, dass die vulcanische Masse bei ihrem Aufwärtsdrängen Bruchstücke des Nebengesteins losriss.

2. Ist, wenn mehrere Gesteinsarten vorhanden sind, eine bestimmte Altersfolge zu erkennen, in der sie an die Erdoberfläche gelangten? — Für diese wichtige Frage, betreffs derer sichere Beobachtungen aus sehr wenigen Gegenden vorliegen, kann der nur einigermaassen der Gesteine kundige und im Beobachten geübte Reisende werthvolle Beiträge liefern. Das Altersverhältniss lässt sich erkennen 1. in der Ueberlagerung einer Gesteinsart durch eine andere, z. B. der Abhänge eines Andesitgebirges durch Ströme von Rhyolith, oder einer trachytischen Masse durch eine Basaltdecke, wobei das überliegende Gestein das jüngere ist; 2. durch Gänge, in welchen ein Gestein durch das andere aufsteigt, indem das letztere fest gewesen sein muss, als die Gangmasse in zähflüssigem Zustand hindurchgepresst wurde; 3. durch Einschlüsse von Bruchstücken einer Gesteinsart in homogener Masse einer anderen, wobei die Bruchstücke älter sind; 4. in der gegenseitigen Ueberlagerung verschieden gefärbter Tuffgesteine, welche sich gleichzeitig mit den Ausbrüchen unter Wasser ablagerten. Wenn z. B. weisser Tuff von langfaserigem Bimsstein, welcher aus Rhyolithsubstanz gebildet wird, auf dunklen Tuffschichten von Andesitsubstanz liegt, so ist ersteres Gestein jünger als das letztere.

Einige Worte über das Wesen der Ausbruchsthätigkeit der vulcanischen Gesteine werden die hohe Bedeutung dieses zu wenig berücksichtigten Gesichtspunktes darlegen. Wenn ein Vulcan durch Mangel an Zufuhr von flüssigem Gestein aus der Tiefe in eine Periode der Ruhe getreten ist, so schreitet die Erstarrung von der Oberfläche nach der Tiefe fort. Beginnt (wahrscheinlich durch Volumenvermehrung in Folge der Zunahme der Quantität des überhitzten Wassers) ein neues Andrängen der flüssigen Massen, so finden sie einen Widerstand, der endlich durch mit Erdbeben verbundene Aufspaltung überwunden wird. Entweder folgt convulsivische Auswurfsthätigkeit, die mit der Entwicklung ungeheurer Dampfmassen verbunden ist, und ein neuer Schuttkegel wird aufgeworfen, oder das überschüssige Material quillt in Gestalt eines Lavastromes ruhig

empor. — Wendet man dies auf die Thatsache der Eröffnung einer allgemeinen Ausbruchsthätigkeit über die Erdoberfläche zu Anfang der Tertiärperiode, nach langen Zeiten verhältnissmässiger Ruhe, an, so hat das grossartige Phänomen seinen Grund offenbar in dem Umstand, dass eine fortdauernd langsam anwachsende Spannkraft in dem Innern der Erde hoch genug gediehen war, um den Widerstand des Gewichtes und der Cohäsion der darüber befindlichen Theile der festen Erdrinde zu überwinden. Aufspaltungen stellten den Gleichgewichtszustand her. Durch seitliche verzweigte Spalten und Risse erhielt Wasser Zugang zu solchen Tiefen, wo eine hohe Temperatur herrscht, und indem es mit den glühenden, in festem oder zähem Zustand befindlichen Gesteinsmassen in Verbindung trat, führte es dieselben nach bekannten Erfahrungen in flüssigen Zustand über und vergrösserte ihr Volumen. Die flüssige, mit überhitztem Wasser geschwängerte Masse stieg in Folge dessen allmählig in der Spalte auf und quoll über ihren oberen Rand, wo sie sich ausbreitete und erkaltete. Wie alle solche Erscheinungen einen periodischen Charakter haben, so erfolgten nach Intervallen der Ruhe neue Ueberflüssungen, und indem sich Lage auf Lage aufthürmte, wurde über der Spalte ein ganz aus Tiefengestein zusammengesetztes Gebirge aufgebaut, wie es die langen Andesitücken zeigen. In manchen Fällen hat der Process damit sein Ende erreicht; wahrscheinlich dadurch, dass der Wasserzugang nach der Tiefe verstopft wurde und eine weitere Volumenvergrösserung nicht stattfand. In anderen dauerte er fort, nahm aber periodisch einen anderen Charakter an, theils dadurch, dass längere Pausen der Ruhe eintraten, das Gestein im Canal in Folge dessen erkaltete, ein starker Widerstand geschaffen wurde, dann das Wasser wieder Zugang zu irgend einem Theile der Spalte fand, die frühern Processe sich wiederholten und die Wiedereröffnung der Thätigkeit mit einer heftigen Katastrophe geschah, wobei dann häufig seitliche Spalten gebildet wurden. So entstand ein neuer Herd der Ausbruchsthätigkeit, welcher, wenn er der Oberfläche nahe genug gelegen war, dass die Dampfkraft zur Wirkung kommen konnte, zu solchen explosiven Erscheinungen, wie wir sie heute sehen, Veranlassung gab. Es wurden dann über den Schlünden Kegel aufgehäuft, theils aus Schlacken und Asche, welche durch die Dampfkraft ausgeschleudert wurden, theils aus Lavaströmen bestehend, welche das in Folge einer Volumenvergrösserung ruhig ausquellende Material darstellen. Da nun die Zusammensetzung der Erde sich von der Oberfläche gegen den Mittelpunkt hin nach bestimmten, allgemein giltigen Gesetzen ändern muss, und da zu Anfang der Tertiärperiode die Erstarrung allenthalben bis zu einer nahezu gleichen Tiefe vorgedrungen sein musste, wo Material von einer bestimmten Zusammensetzung herrschte, so sollte man nicht nur die Eröffnung der Ausbruchsthätigkeit mit einem überall ungefähr gleichartigen Material, sondern auch die Fortentwicklung der Thätigkeit nach allenthalben nahezu gleichen Gesetzen erwarten. Dieselbe wird sich aber hauptsächlich in der relativen Aufeinanderfolge bestimmter Gesteinsarten zu erkennen geben. Gelingt es, in dieser Beziehung eine Gleichmässigkeit zu erweisen, so ist damit ein grosses kosmisches Gesetz gefunden, welches eine Basis für weittragende Schlüsse giebt. Hierauf nun zielen die Beobachtungen über das relative Alter der vulcanischen Gesteine in jeder einzelnen Gegend, welche ein Forschungsreisender berührt.

Zur Lösung der angedeuteten Frage kann nur derjenige einen werthvollen Beitrag liefern, welcher sich längere Zeit in einer vulcanischen Gegend aufhält. Zunächst muss er sich daran gewöhnen, die Massenausbrüche, deren Ursprung in Vorgängen, welche in grosser Tiefe stattfanden, zu suchen ist, von den vulcanischen zu unterscheiden, welche örtlich beschränkt sind, ihren Sitz in geringer Tiefe haben, weit mehr Zufälligkeiten unterworfen sind und die letzte Phase der Ausbruchsthätigkeit bezeichnen. In den grossen Massenanhäufungen zeigt sich ein merkwürdiges Gesetz, das bisher in mehreren Gegenden (Ungarn, Siebenbürgen, Nordamerika, Mexico, Japan) nachgewiesen worden ist, zum Beweis seiner allgemeinen Gültigkeit aber noch der Bestätigung aus vielen anderen Theilen der Erdoberfläche bedarf. Dieses Gesetz der Aufeinanderfolge der vulcanischen Gesteine besteht darin, dass der den alten Grünsteinen im Ansehen fast genau gleichende Propylit die Ausbruchsthätigkeit eröffnete, dann Andesit folgte, in welchem dieselbe culminirte, darauf Trachyte und endlich Rhyolithe an die Reihe kamen. Diese

Gesteine sind örtlich an einander gebunden. Den Schluss bildeten die Dolerit-Basalt-Gesteine, welche in ihrer Verbreitung grossentheils von jenen unabhängig sind und die Masseneruptionen beschlossen. Auch bei thätigen und erloschenen Vulkanen lässt dasselbe Gesetz sich erkennen, erleidet aber wegen der vielen zufälligen Umstände welche in's Spiel kommen manche Ausnahme.

3. Wie äussern sich gegenwärtig die Kräfte, welche das Aufsteigen des Gesteins bewirken? — Wo es in einem vulcanischen Gebiet Stellen giebt, an denen die Aeusserung des Vulcanismus noch fort dauert, sollte der Reisende zuerst seine Aufmerksamkeit den thätigen Vulkanen, dann den Solfataren und anderen Schauplätzen gegenwärtiger Thätigkeit zuwenden, da er durch ein genaues Studium der jetzigen Vorgänge und ihrer Wirkungen den Schlüssel zum Verständniss des Aufbaues vulcanischer Gebiete im Allgemeinen erhält. *) Bei einem vulcanischen Ausbruch sind zu beachten: die vorbereitenden Vorgänge, und zwar Erderschütterungen, ihr Centrum, ihre Ausdehnung, die Art ihrer Fortbewegung; meteorologische Verhältnisse; die genaue Gestalt des Vulcans und seines Kraters, und etwaige bereits geschehene Veränderungen derselben; Sitz und Art der Gas- und Dampf-Exhalationen; Schmelzen des Schnees; Versiegen von Quellen und Brunnen u. s. w. Steigern sich diese gewöhnlichen Vorläufer der Ausbrüche allmählig, oder beginnen die letzteren plötzlich? Wie manifestirt sich der erste Ausbruch? Ein Maass für die Stärke der Explosion wird sich in dem Grad der Veränderung der Gestalt des Kraters, in der Höhe bis zu welcher die Trümmer im Verhältniss zu ihrer Grösse geschleudert werden, in der Entfernung vom Centrum in welcher Fragmente von gewisser Grösse noch niederfallen, ergeben. Es sind dann die Häufigkeit und Stärke der folgenden Explosionen, die Entfernung bis zu welcher die feine Asche getragen wird, die weiteren Veränderungen des Kraters, die Bildung seitlicher Spalten, durch welche Dampf entweicht, zu beobachten. Die Trümmer, welche niederfallen, sind zu untersuchen; sind diejenigen des ersten Ausbruchs gleichartig mit denen der späteren Explosionen? Die Bestimmung entweichender Gase, womöglich durch Reagenzien an Ort und Stelle, wird zur Entscheidung der Frage beitragen, ob das von Bunsen aufgestellte Gesetz, dass Fluor und Chlor das intensivste Stadium der Ausbruchsthätigkeit, schwefelige Gase einen späteren abgeschwächten Zustand, und Kohlensäure das Absterben der vulcanischen Thätigkeit bezeichnen, überall anwendbar ist. — Bei Lavaströmen ist der Ursprungsort, die Art der Oeffnung des ersten Canals, der Querschnitt des Stromes, der Grad der Geschwindigkeit, mit welcher er unter verschiedenen Neigungswinkeln hinabfliesst, vor Allem aber die Natur der von der Oberfläche der Lava aufsteigenden Dämpfe und Gase, der Grad der fortschreitenden Abkühlung und Erstarrung, und endlich die Art des daraus sich ergebenden Gesteins zu untersuchen. Welche Mineralien sind schon vor dem Festwerden der Lava in Krystallen vorhanden gewesen? Man erkennt sie oft daran, dass sie bei dem Fortschieben der Masse zerrissen worden und zerborsten sind. — Ein glücklicher Umstand könnte einen intelligenten

*) Eine Musterdarstellung solcher Vorgänge, sowie der Structur eines vulcanischen Gebietes überhaupt, welche durch klare, anschauliche Form auch dem Anfänger verständlich ist und ihm einen Fingerzeig für die Methoden der Beobachtung giebt, enthält F. v. Hochstetter's „Neu-Seeland“ (Stuttgart bei Cotta, 1863), ein Buch, welches überhaupt demjenigen, welcher sich auf Forschungsreisen begeben will, auf das wärmste anzupfehlen ist.

Reisenden zum Zeugen der Bildung eines jener Schmarotzervulcane machen, welche nicht selten den Flanken eines grösseren Vulcans aufsitzen. Sie wiederholen im Kleinen dessen Structur und Thätigkeit; und wie dieser in glühenden Massen grösserer Tiefen wurzelt, so muss ihr Ursprung auf glühende Lavamassen im Innern des Vulcans selbst zurückgeführt werden. Mit ihrem Aufschüttungskegel, ihrem Krater und dem zuweilen vorhandenen Lavastrom geben sie ein Miniaturbild eines Vulcans, und ebenso müsste man bei ihnen die Geschichte der Bildung eines Vulcans der einfachsten Art in Miniatur studiren können.

Tritt nach einer Periode der Thätigkeit der Vulcan in den Ruhestand zurück, so sollte mit Sorgfalt das Zurücksinken des Kraters und seiner Umgebungen beobachtet werden. Es tritt dann durch Abkühlung eine Volumenverminderung der unterirdischen heissflüssigen Lavamassen ein. Hochstetter nimmt an, dass sich dann im Innern des Berges ein leerer Raum, der Lavaraum, bilde, welcher vor einer neuen Eruptionsperiode zuerst durch die empordrängende Lava wieder ausgefüllt werde. Nun beobachtet man in alten Schuttkegeln Einbrüche, zuweilen von ausserordentlichem Umfang, aus deren Mitte dann ein neuer Schuttkegel aufgestiegen ist, und in kleinem Maassstab hat sich dieses Phänomen am Vesuv und andern thätigen Vulcanen in historischer Zeit manifestirt. Sollte einmal eine Untersuchung ergeben, dass ein solcher Einbruch von gewaltigen Dimensionen plötzlich geschieht, so würde damit das Vorhandensein eines solchen „Lavaraums“ erwiesen sein.

Eine andere wichtige Frage betrifft jene langsamen Athemzüge des Vulcans, welche sich in dem periodischen Wechsel der Hebung und Senkung seines ganzen Gerüstes manifestiren. Es liegen Beobachtungen vor, welche zu beweisen scheinen, dass ein Vulcan während der Periode, in der sich die Ausbruchsthätigkeit allmählig vorbereitet, in langsamer Hebung begriffen ist, dann aber, während und nach der Periode der Ausbrüche, sich wieder langsam senkt. Sie sind noch zu mangelhaft, um dies als ein Gesetz auszusprechen, und jede einschlägige Beobachtung ist daher von Wichtigkeit. Sie lassen sich, nach den später anzugebenden Methoden, besonders dann anstellen, wenn ein Vulcan am Meere gelegen ist. Doch ist auch bei solchen, die weiter von der Küste abliegen, die Beobachtung nicht ausgeschlossen. Dort würden sich insbesondere aus der Zunahme oder Abnahme im Gefälle benachbarter Flüsse ziemlich sichere Schlussfolgerungen auf Aenderungen des Niveau's ergeben.

Die meisten der bisher in diesem Abschnitt angeführten Beobachtungen setzen eine lange zu Gebote stehende Zeit, oder ein häufigeres Zurückkehren an denselben Ort voraus. Sie sind besonders solchen anzuempfehlen, welche, wie die Residenten auf Java, Sumatra, Manila, oder einiger Orte in Central-Amerika, in der Nähe thätiger Vulcane leben. Der Reisende kann den eignen Aufenthalt in gewissem Grade durch das Einziehen von Erkundigungen ersetzen, und sollte bei keinem Vulcan unterlassen, so viele Thatsachen als möglich über die Geschichte seiner Ausbrüche festzustellen.

Die Beobachtungen an Solfataren fallen mehr in das Gebiet des Reisenden, sind aber wegen ihrer complicirten Natur noch kaum von Fachmännern genügend ausgebeutet worden. Eine Solfatara ist eine Stelle, wo Wasserdämpfe mit Gasen, insbesondere Schwefelwasserstoff und schwefeliger Säure, vermischt aus der Erde strömen. Kratere im Zustand periodischer Ruhe haben diese Art der Thätigkeit; ausserdem findet man Solfataren in Kesseln und Spalten, sowie an den Abhängen vulcanischer Gebirge und ihrer

Umgebungen. Sie sind als Stellen zu betrachten, wo unterirdische erhitzte Massen, zu welchen Wasser Zugang hat, in beständiger Communication mit der Oberfläche stehen. Mit grosser Gewalt strömt Dampf und kochendes Wasser hervor. Die Gesteine werden stark zersetzt; es bilden sich Ansammlungen von Schlamm, der selbst ein brodelnder Pfuhl wird. Darin setzt sich häufig Schwefel ab. Solfataren liegen meist in nachgiebigem Gestein, besonders Trümmergestein, Conglomeraten mit eckigen Bruchstücken, zuweilen auch in nicht vulcanischem Gestein. Die Zersetzung bringt weisse, giftig gelbe und braune Farben hervor und erzeugt zuweilen Alunitfels. Der Besuch solcher Stellen ist dem Reisenden sehr zu empfehlen, da ihre Beobachtung ihm ein Verständniss für eine Classe vulcanischer Vorgänge und für eine Art von Zersetzungsprocessen giebt, deren Wirkung er sehr häufig wiederfinden wird, besonders bei erloschenen Vulcanen, und in noch grösserem Maassstabe in vulcanischen Gebirgen.

Bei heissen Quellen ist der Temperaturgrad, das Gestein, aus welchem das Wasser entspringt, die Quantität des entströmenden Wassers, das Vorhandensein oder Fehlen von Schwefelwasserstoffgeruch, sowie von Absätzen am Rand oder am Boden (Kieselerde, kohlenaurer Kalk, Eisenoxydhydrat u. s. w.) zu beobachten, und die Absätze zur Untersuchung auf mikroskopisches Leben zu sammeln. Auch sollten bezüglich der Lage der Quellen möglichst viele Notizen gegeben werden, insbesondere, ob vulcanische Gesteine in der Nähe sind. Man findet z. B. dort wo steile Abbrüche von Granitgebirgen durch Reihen von Basaltausbrüchen begleitet sind, fast stets heisse Quellen.

Bei intermittirenden Springquellen, denen man nach dem isländischen Prototyp den Namen Geysir giebt, sind neben diesen Gesichtspunkten noch die Intervalle der regelmässig pulsirenden Thätigkeit zu bestimmen. Das angeführte Werk von Hochstetter über Neu-Seeland giebt hierfür alle erforderlichen Fingerzeige.

4. In welcher Weise wurde das Gesteinsmaterial auf der Erdoberfläche ausgebreitet und abgelagert? — Die eingehende Untersuchung eines einzigen Vulcans wird den Reisenden in Stand setzen, die vielen hinsichtlich dieser Frage sich darbietenden Gesichtspunkte selbst zu finden, und diejenigen, welche in Lehrbüchern beschrieben sind, zu verstehen. Zunächst ist die Ausbreitung und Ablagerung eine zweifache, je nachdem sie auf dem Festlande oder unter Wasser geschah. Auf die Ausbreitung der homogenen Massen ist dies von geringem Einfluss; aber die Ablagerung der Trümmergesteine wird dadurch wesentlich beeinflusst.

Die homogenen Gesteine treten bei Vulcanen als Lavaströme auf, welche von der Verticalaxe aus radienförmig nach aussen gerichtet sind, wiewol sie durch die Bodenformen häufig abgelenkt werden. Bei vulcanischen Gebirgen, wo ihre Lagerungsformen schwieriger zu beobachten sind, ordnen sich die Ergüsse im Allgemeinen in Zonen parallel zur Längsaxe des Gebirges an; die jüngeren Gesteine bilden Gänge in den älteren, und breiten sich häufig über diesen aus. Der Flüssigkeitsgrad ist besonders bestimmend auf die Architektonik. Die als Nevadite bezeichneten granitisch-körnigen Abänderungen des Rhyoliths tragen die Spuren äusserster Zähflüssigkeit in ihren hochgewölbten, noch am Ende hoch und steil abfallenden Strömen, während umgekehrt die Basalte stets den besonders dünnflüssigen Zustand bekunden, in welchem sie an die Erdoberfläche gelangten. Sie breiten sich von den Ausbruchsspalten fast horizontal aus, und füllen zuweilen sehr grosse Becken aus, in welchen Schicht auf Schicht gelagert ist. Es entstehen dadurch die bereits auf S. 257 beschriebenen Tafelländer.

Man kann die Structur eines vulcanischen Gebirges am besten in Spaltenhöhlen erkennen, welche dasselbe quer durchziehen, während diejenige einer basaltischen Ablagerung sich in jeder Schlucht erkennen lässt, welche auf die Unterlagen niedersetzt. Man sollte solche Gelegenheiten nie versäumen, um die Aufeinanderfolge der einzelnen Gesteinsarten genau zu studiren. — Einige Gesteine bilden auch hoch-glockenförmige oder domförmige isolirte Kuppen, wie die Propylite; andere ragen in spitzen Kegeln auf, wie es nicht selten bei Trachyten der Fall ist. Einige Geologen bezeichnen solche Formen, ohne Rücksicht auf die Analogie mit vulcanischen Gebirgen, als homogene Vulcane, andere betrachten sie als den stehen gebliebenen massiven Kern zerstörter Vulcane, indem sie annehmen, dass der umhüllende Schuttkegel zerstört wurde. Ausgedehnte Beobachtung wird die Richtigkeit der letzteren Ansicht prüfen; besonders ist zu untersuchen, ob bei solchen isolirten Kegeln oder Domen Spuren von Lavaströmen sichtbar sind.

Bei allen Arten der Lagerung besitzen die homogenen Gesteine gewisse Formen der Absonderung, welche sie durch Contraction bei dem Festwerden annehmen. Sie sollten stets angegeben werden. Sie ist plattenförmig (gewöhnlich von $\frac{1}{4}$ bis 5 Zoll Dicke), lamellar (von $\frac{1}{4}$ Zoll abwärts bis zu Papierdicke, welche sich besonders bei Rhyolithen und Trachyten findet), prismatisch und säulenförmig (resp. in unregelmässiger und regelmässiger Weise senkrecht zur Oberfläche zerklüftet). Ausserdem sind Platten und Säulen zuweilen kugelig abgesondert. Die senkrechten Zerklüftungsformen, welche am häufigsten und vollkommensten bei Basalt vorkommen, sind ein wichtiges geographisches Moment, indem sie es den Gewässern leicht möglich machen, tiefe Schluchten einzugraben, welche sich nach oben erweitern. Am grossartigsten sind dieselben, wo horizontale Basaltdecken in grosser Mächtigkeit übereinander gelagert sind. Es entstehen breite terrassenförmige Abhänge, indem der Stirnrand jeder Decke gegen den der darunterliegenden zurücktritt und fast senkrecht abgebrochen ist. Es werden dadurch einzelne basaltische Plateau's vor einander abgesondert.

Die Trümmerschichten sind bei Landvulcanen kegelförmig um den Krater gelagert, da sie aus der Luft niederfielen. Indem aber der Neigungswinkel der Ablagerung mit der Feinheit des Kornes abnimmt, bildet sich im Profil eine Curve, welche am Gipfel in der Regel mit Winkeln von 28 bis 30° beginnt und, wenn Raum zur seitlichen Ausbreitung gegeben war, bis zu dem geringen Betrag von 2° und 1° gegen den Fuss hin übergeht. Es ist wünschenswerth, dass die Gestalt der Curven bei recht vielen Vulcanen, deren Gesteinsnatur bekannt ist, festgelegt werde, damit man sehen könne, ob sie sich mit der Art des Gesteins ändert. Bei untermeerischen Vulcanen sind die Trümmer ebenfalls in Schichten angeordnet, welche einen äusserst flachen Kegel darstellen, gemeinhin aber als horizontal angenommen werden. Das grösste Material häuft sich der Auswurfstelle zunächst an; je feiner es ist, desto länger bleibt es suspendirt, um sich zum Theil in besondern Schichten auf das Grobe zu legen, zum Theil aber weit fortgetragen zu werden. Es wäre von Interesse, bei gehobenen und trocken gelegten Ablagerungen dieser Art ebenfalls die Curvengestalt nachzuweisen und das Maximum der Neigungen festzustellen. An Durchschnitten lässt sich der Wechsel solcher Tuffschichten (s. S. 265) genau beobachten. Sie sind stets auf Versteinerungen zu untersuchen, aus denen es sich ergibt, ob sie im Meer oder im Süsswasser abgesetzt wurden. Im letzteren Fall bieten sie oft besonderes Interesse, indem sich jede Ausbruchperiode kennzeichnet. Von den grössten Conglomeraten, die zu unterst liegen, findet eine allmälige Abstufung nach

dem Hangenden bis zu den feinerdigsten Tuffen statt, und häufig endigt die Ablagerungsreihe mit Polirschiefer, der eine durch lange dauerndes mikroskopisches Leben charakterisirte Periode der Ruhe bezeichnet. In unmittelbarer Auflagerung folgen dann wieder die grössten Conglomerate, welche dem Anfang einer neuen Ausbruchperiode entsprechen; und so folgen nicht selten eine Reihe von Ablagerungen, welche eine deutliche Geschichte des Vulcanismus der Gegend erzählen. Wo dünnflüssige Basalte ausgebrochen sind, lagern wohl auch Decken dieses Gesteins zwischen Infusorienschichten. Diese Untersuchungen erstrecken sich auch auf die grossen vulcanischen Gebirge, die zuweilen voll von kleinen, mit Tuffen, Kieselgerölle (Kieselgerölle, Polirschiefer, Halbböden aller Art, verkieseltes Holz etc.), und Braunkohlenflözen erfüllten ehemaligen Süsswasserbecken sind, und in den feineren Tuffen die Ueberreste der Flora aus der Zeit der Ablagerungen bergen.

Untersuchung eines einzelnen Vulcans. Wenden wir die vielfachen bisher erörterten allgemeinen Gesichtspunkte auf den speciellen Fall eines Vulcans an. Es kommen in Betracht: die Unterlage, das Gerüst und der dem Gipfel eingesenkte Krater. Die Unterlage kann ein vulcanisches Gebirge sein, und dann ist der Vulcan entweder dem Kamm oder den Flanken desselben aufgesetzt (z. B. Rhyolithvulcane auf Andesitgebirge). Oder vulcanische Tuffe (z. B. Basaltvulcane auf Bimssteintuffen). Oder ein Vulcan selbst; dann ist entweder derjenige von späterer Entstehung als ein Schmarotzer auf dem älteren, oder der ganze Bau als ein combinirter Vulcan zu betrachten, je nach der Rolle, welche der später entstandene spielt. Oder älteres Gebirge irgend welcher Formation. In allen bisher untersuchten Fällen scheint es, dass die Bildung eines Vulcans keinen merklichen Einfluss auf die Schichtenneigung der Unterlage bewirkt hat. — Der Vulkankegel selbst besteht äusserlich im einfachsten Fall aus Lagen von Schutt, die wie concentrische Schalen übereinander liegen. Sie sind in der Mittelaxe von dem in dem Krater endenden Zuführungscanal durchbohrt, und der Kern besteht aus fester Lava, die in Gängen in die Schalen eingreift und zwischen einzelnen derselben, sowie auf der Oberfläche der äussersten, sich stellenweise stromartig hinabzieht. Sie bildet ein Gerüst, welches den Bau zusammenhält. Zuweilen ist der obere Theil des Schuttkegels eingestürzt, und ein zweiter Kegel mit Krater, dessen Axe mit der ersten nicht zusammenfällt, auf einem Theil des ursprünglichen Kegels aufgeworfen. Bei einzelnen sind mehrere Kegel mit ebenso vielen Kratern zu einem ganzen Bau vereinigt. Dies sind combinirte Vulcane. — Schon bei der Annäherung an einen Vulcan bestimmt der Beobachter die Profilinien des Berges durch Zeichnung mit der Camera oder durch das Klinometer. Beim Anstieg wird das Material in der unter 1) angegebenen Weise untersucht. Auf dem Gipfel ist der Bau von Kraterwand und Kraterwänden, sowie die Thätigkeit im Kraterboden zu beobachten, die Weite und Tiefe des Kessels festzusetzen, und eine Skizze zu entwerfen, welche einen Grundplan der Lage der Nebenkratere zum Hauptkrater, der Wände eingestürzter alter Kratere u. s. w., mit Notirung der Höhenunterschiede, giebt. Wo möglich sollte die Kartenskizze über den ganzen Vulcan, allseitig bis über seinen Fuss hinaus, ausgeführt und darauf auch alle sichtbaren Lavaströme verzeichnet werden. Man wird finden, dass, während einzelne Kegel ihrer Unterlage unvermittelt aufsitzen, andere, und darunter die grössten, zuweilen in weitem Umkreis von einem ringförmigen, nach innen gerichteten Steilabbruch umgeben sind, der aus den verschiedensten Gesteinen (vulcanisches Tuffland, krystallinische Schiefer, Flözgebirge) bestehen kann, welche in ihrer Lagerung in gar keiner Beziehung zur Ge-

stalt des Bruchrandes stehen. Hierher gehören die auf S. 262 erwähnten Gebirgseinbrüche. Man wird nach diesem Gesichtspunkt, wenn darüber mehr Thatsachen vorliegen, vielleicht aufgesetzte und eingesenkte Vulcane unterscheiden können.

5. Zeigen die Vulcane, wenn deren mehrere vorhanden sind, ein bestimmtes Gesetz in ihrer gegenseitigen Gruppierung oder in ihrer Lage zu vulcanischen Gebirgen? — Thätige und erloschene Vulcane müssen hierbei in Betracht gezogen werden. Die Frage lässt sich zwar am besten durch die Construction einer genauen Karte beantworten, doch reichen Compass und Auge oft hin, um die Anordnung mehrerer Kegel in einer geraden Linie zu zeigen. Zuweilen findet sich noch eine secundäre Anordnung in Linien, welche rechtwinklig zur ersten gerichtet sind. Doch kommen auch Gruppen vor, in welchen diese linearen Anordnungen nicht gelten. Nicht selten begleiten Vulcanreihen die Rücken vulcanischer Gebirge in gewissem Abstand, und besonders häufen sie sich an deren Enden.

6. Wie verhalten sich ganze vulcanische Gebiete zu ihren Umgebungen?

— Es ist von hoher Wichtigkeit, die vulcanischen Gebiete in ihrer Gesamtheit auf Karten niederzulegen, um ihr Verhältniss zu den nicht vulcanischen Gegenden zu constatiren. Wo Studien der Art vorliegen, findet man, dass die vulcanischen Gebirge, einschliesslich der erloschenen und thätigen Vulcane, Gebirgszügen parallel sind, welche aus älteren Formationen bestehen (Vihorlat-Gutin Zug in den ungarischen Karpathen), oder dass sie die Querverwerfung eines Gebirgszuges bezeichnen (Eperies-Kaschauer Zug in Ungarn), oder den Raum einnehmen, in welchem ein ganzes Gebirge (Sierra Nevada in Californien am Lassen's Peak und Mount Shasta) einen Einbruch erlitten hat. Manchmal beschränken sich die Vulcane auf eine Bucht, die von Gebirgen umschlossen wird; auch werden ihre geraden Züge durch Gebirge abgelenkt. Von den planetarischen Gesetzen der Verbreitung der Vulcane und der grossen Anhäufungen vulcanischer Gesteine seien hier nur einige Thatsachen, welche dem Reisenden eine gewisse allgemeine Orientirung zu geben vermögen, erwähnt: 1) dass sie sich besonders dort häufen, wo Continente mit ihren Spitzen gegeneinander gerichtet und entweder bereits verbunden sind, oder einer Verbindung durch Hebung entgegengehen (Central-Amerika, Alaska-Kamtschatka, Ostindische Inseln und Australien, Türkische Halbinsel und Kleinasien); 2) dass sie die Bruchränder der Continente begleiten (Westabfall der Anden und Cordilleren; Kette von Manila über Formosa, Liu-kiu, Japan, Kurilen); 3) dass sie sich an die Nähe der gegenwärtigen Meeresküsten oder derjenigen der Tertiärperiode halten; 4) dass, als Ausnahme von dieser Regel, eine grosse Verbreitung auf einigen Plateau's stattfindet, welche seit langen Perioden einen Wasserabfluss nach dem Meere nicht gehabt haben (Plateau zwischen Sierra Nevada und Felsengebirge).

Steppen und Wüsten (Lössbildung).

Wenn der Reisende die weite Steppe betritt, so wird er das Feld geologischer Forschung beendet glauben. Doch bieten sich gerade hier Fragen von grosser Tragweite. Man muss von geologischem Gesichtspunkt zwei Arten von Steppen unterscheiden, die auch der Geograph und der Botaniker als verschieden anerkennen werden, nämlich die mit Abfluss versehenen Steppen (wie die Haiden Norddeutschlands, die Puszten Ungarns, die Tundren oder Moossteppen von Nordrussland und Sibirien, die Grassteppen von Südrussland, die Prärien von Nordamerika, die Pampas von Südamerika)

und die abflusslosen oder Salzsteppen. Insgemein unterscheidet man sie nicht, weil beiden der Charakter weiter Verebnung, allgemeiner Oede und Einförmigkeit, und des Vorwaltens von Graswuchs, fast zum gänzlichen Ausschluss von Baumvegetation, gemeinsam ist. Der grosse geologische Unterschied, welcher sich in allen ökonomischen Verhältnissen, wie in denen der Bevölkerung und Vegetation widerspiegelt, besteht darin, dass in denjenigen Steppen, deren Gewässer nach dem Meere abfliessen, die Salze, welche der Boden ursprünglich enthalten haben mag, die Zersetzungsproducte, sowie die mechanisch vom Wasser losgelöst oder von den Gebirgen der Umgebungen abgespülten Bestandtheile, ebenfalls ihren Abzug dorthin haben, während die abflusslose Steppe in einzelne Becken getheilt ist, deren jedes den Zufluss eines bestimmten Gebietes in sich aufnimmt, und die löslichen wie die mechanisch fortgeführten Zersetzungsproducte in dem Bereich des Beckens selbst bleiben. Salzsteppen kann man sie nennen, weil in Folge dieser Zurückhaltung der Boden stets mit Salzen imprägnirt ist; überdies hat fast jedes Becken in seiner Mitte einen See von concentrirter Salzlösung, aus dem das Wasser verdunstet. Durch die Ablagerung der unlösbaren Zersetzungsproducte an Ort und Stelle wird der Boden der einzelnen Salzsteppenbecken auf Kosten der durch die allmälige Abtragung verlierenden Umgebung erhöht. Zu den Gegenden der Salzsteppen gehören: das Land zwischen der Sierra Nevada und dem Felsengebirge in Nordamerika, ein Theil von Mexico, die Wüste Atacama in Südamerika, das Innere von Australien, das ganze Hochland von Centralasien, soweit nicht die Abführung der Gewässer nach dem Meere stattfindet, grosse Theile von Persien, Arabien und dem nördlichen Afrika — Gegenden welche in den Bereich vieler der Reisenden, für welche diese Bemerkungen bestimmt sind, kommen werden. Die Gegend des Kaspischen Meeres, Aral- und Balkhash-sees, sowie Theile der Sahara, bilden Uebergangsstufen, da sie vom Ocean abgetrennt wurden, und die Umgebungen ihren Salzgehalt grossentheils der Verdunstung des Meerwassers zu verdanken haben. Während die Steppen der ersten Art im Ganzen eben oder leicht ansteigend sind und Theile von Niederungen bilden, finden sich in den Gebieten der Salzsteppen grosse Höhendifferenzen, und sie sind im Wesentlichen als Hochländer zu betrachten. In dem centralasiatischen Gebiet z. B. sind die Höhenunterschiede grösser als in Europa, wenn auch in jedem einzelnen Becken die Oberflächenformen sanft, die Neigungen gering sind.

Zur Beobachtung empfehlen sich folgende Jedem verständliche Punkte. Die Oberflächengestalt der Ausfüllung ist bei einigen Becken festzustellen, die Differenz der Meereshöhe an den Seiten und in der Mitte, und die Winkel der Böschung in verschiedenen Theilen zu bestimmen. Die Aenderung im Salzgehalt von den Rändern nach der Mitte hin sollte wenigstens bei einem ausgezeichneten Becken untersucht und die efflorescirenden Salze häufiger gesammelt werden. Welches sind die Begrenzungen des Beckens? sind es hohe Gebirge oder sanft gerundete Rücken? Wie ist der Neigungswinkel derselben an der Stelle, wo die Oberfläche der Beckenausfüllung an die Abhänge ansetzt? auf welche Tiefe des Kessels und (daher) welche Mächtigkeit der Ausfüllung darf man schliessen? Wie gross ist der jährliche Niederschlag auf der Fläche eines Beckens? Wie sammelt sich derselbe aus den begrenzenden Gebirgen, wenn deren vorhanden sind? Entströmt er ihnen in starken Flüssen? und wie lagern dieselben, wenn sie vorhanden sind, ihre Sedimente bei dem Austritt aus jenen ab? Geben die Flüsse beim Austritt zu künstlicher Berieselung Anlass? versiegen sie später, oder erreichen sie das

centrale Seebecken? Fliessen sie in mehreren seichten Armen, oder in einem scharf begrenzten Canal? Geht man auf das Gebirge hinauf, so wird man oft jenseits der Wasserscheide kleine abgeschlossene Becken in hoher Lage finden, und an dem Kamm werden andere Becken beginnen, welche sich zwischen ihm und den nächsten Kämmen ausbreiten.

Die wichtigste Frage für den Geologen ist aber: Woraus besteht die Ausfüllung der Salzsteppenbecken? Offenbar sind es nur in der Mitte wahre Sedimente; der Rest besteht in subaërischen Gebilden, wobei das Herabspülen der Zersetzungsproducte von benachbarten Gehängen durch das Regenwasser, ihre Ausbreitung über die Fläche der Steppe und ihr Zurückhalten durch die Grasvegetation eine wichtige Rolle spielen. Einen Aufschluss kann man in der Steppe selbst nie erwarten, da die Neigungen zu gering sind, als dass die Flüsse in den Boden einschneiden könnten. Man muss sie dort suchen, wo veränderte Bedingungen eine tiefe Erosion möglich gemacht haben, z. B. wo durch Aenderung der klimatischen Verhältnisse einige an den Grenzen eines Salzsteppengebietes gelegene Becken mit Wasser angefüllt wurden, dieses sich einen Ausweg grub, und nach und nach Flüsse entstanden, welche mehrere der alten Becken durchströmen. Ich habe nachzuweisen gesucht, dass im nördlichen China weite Gegenden im Charakter der Oberfläche mit dem der Salzsteppen, wie sie in der Mongolei noch existiren, übereinstimmen, aber von nach dem Meere strömenden Flüssen tief durchschnitten sind. Dort besteht die ganze Ausfüllung der Becken aus Löss, der über 1000 Fuss Mächtigkeit erreicht, und, wenn die erste Annahme richtig ist, gebildet wurde, als ein regenarmes Continentalklima herrschte. Nur an den Rändern nimmt Gebirgsschutt an der Ausfüllung Theil, und im Centrum jedes Beckens tritt insofern eine Aenderung ein, als dort die Gebilde geschichtet sind, das Wasser schwer durchlassen und von Salz am stärksten imprägnirt sind, als Zeugniss der einstigen Anwesenheit eines Salzsees. Wahrscheinlich bestehen die Ausfüllungen sämtlicher Salzsteppenbecken von Centralasien aus demselben Löss. Aehnliche Gebilde wie der Löss von China finden sich, wie es scheint, um ganz Centralasien herum, in Tibet, am oberen Indus, am Tiën-shan und in anderen Gegenden, sind aber bisher der Beobachtung entgangen. Die Untersuchung dieses Verhältnisses wäre sehr erwünscht. Der Löss ist vom Lehm dadurch unterschieden, dass er mit Structur begabt ist, indem seine sehr poröse Masse von feinen incrustirten verticalen Röhrchen durchzogen ist, welche die frühere Lage von Graswurzelfasern bezeichnen. Er ist ungeschichtet, zerklüftet vertical, saugt Wasser auf, und enthält zahlreiche Gehäuse von Landschnecken, sowie Knochen diluvialer Säugethiere. Beides sollte der Reisende sammeln. Das Wasser ist in tiefen Schluchten eingeschnitten, deren Wände in senkrecht abstürzenden Terrassen nach oben auseinandertreten. — Es wäre von grossem Interesse, einerseits zu untersuchen, in wie weit der Löss auch in anderen Gegenden auf trockenem Land gebildet wurde, und andererseits, wie in anderen Salzsteppen-Gegenden die Ausfüllungen der Becken beschaffen sind. Sind vielleicht die „Mauvaises Terres“ von Nebraska, Dakota und anderen westlichen Territorien der Vereinigten Staaten, mit ihrer überreichen Säugethierfauna und den tief ausgewaschenen Schluchten, subaërische, dem Löss entsprechende Bildungen?

Besondere Aufmerksamkeit sollte den Stürmen, welche in solchen Gegenden häufig sind, gewidmet werden. Dieselben führen grosse Staubmassen weit mit sich fort, welche zur Erhöhung des Bodens beitragen, indem der niederfallende Staub von der Grasvegetation festgehalten wird. Wo der Wind in gänzlich regenlosen und vegetationslosen Gebieten die feinen Lehmtheilchen

in Staubwolken entführt, bleibt Sand übrig. Dies ist ein feiner Flugsand. Die Shamo-Wüste in Centralasien ist wahrscheinlich zum Theil in dieser Weise gebildet. Durch das Vorherrschen einer bestimmten Windrichtung wandert der Flugsand nach einer Himmelsgegend allmählig fort, und es bleiben die grösseren Fragmente zurück; die weichen unter ihnen werden durch den fliegenden Sand zerrieben, die härteren glatt abgeschliffen. So werden Steinwüsten entstehen, die mit runden glatten Kieseln von Quarz und Chaledon bedeckt sind, wie sie ebenfalls in Centralasien vorkommen. Derartige Vorgänge sollten wegen ihrer Wichtigkeit für die Oekonomie der Natur und die Bedingungen der Völkerexistenz mit Sorgfalt beobachtet werden, da die häufige Annahme, dass die Wüsten alter Meeresboden seien und dies ihre Natur erkläre, gänzlich ungenügend ist.

Wüsten können wahrscheinlich verschiedenen Ursprung haben. Wo Sandsteingebirge abgeholzt sind, sieht man oft Theile ihrer Oberfläche, selbst in klimatisch begünstigten Ländern, in Sand aufgelöst, welcher wandert, sich über fruchtbaren Boden ausbreitet und die Ausdehnung der wüsten Strecke vermehrt. Tritt regenloses Klima ein, so können wahrscheinlich ganze Tafelländer von Sandstein in ähnlicher Weise umgewandelt werden; wo aber die Lagerung wellig ist, werden Kalksteine in Riffen und Zügen stehen bleiben, während der Sandstein aufgelöst wird. Auch hier wird der Wind eine Säi-gerung ausführen, und den feinen Sand nach gewissen Richtungen fortführen, während die Gerölle, welche in den Conglomeraten eingeschlossen waren, zurückbleiben. Dies dürfte auf die Entstehungsweise mancher Wüsten, besonders im Innern von Afrika, anwendbar sein.

Oasen können natürlichen und künstlichen Ursprungs sein, und haben in beiden Fällen geologisches Interesse. Welchen Umständen verdankt die natürliche Oase ihre Existenz? Ist sie durch diejenigen Gesteine, deren Oberfläche Wüstencharakter hat, in solche eingesenkt, welche fruchtbaren Boden tragen und vermöge einer das Wasser nicht durchlassenden Unterlage im Feuchtigkeitszustand erhalten werden? Wie kommt es, dass sie nicht mit Flugsand überführt worden ist? Hat es früher in der Nähe noch andere Oasen gegeben, welche im Lauf der Zeit verschüttet wurden? — Künstliche Oasen sind dort angelegt, wo salzhaltiger Boden ausgelaugt und bewässert werden konnte, wie an solchen Stellen der Steppen des Hochlandes von Centralasien, wo Gebirgsbäche auf sie münden, z. B. am Südfuss des Tiënshan. Welchen Einfluss hat die Anlage von Berieselungsoasen auf die Geographie der Gegend ausgeübt? Hat sie durch die Vergrösserung der Verdunstungsfläche die Verkleinerung des Sees, dem das Wasser zuströmt, zur Folge gehabt?*)

Nutzbare Mineralien.

Kohlenlager. — Wo Kohle bergmännisch nicht gewonnen wird, kann nur ein glücklicher Zufall auf ihre Entdeckung führen. Denn selbst wenn man mit Hilfe von Versteinerungen das Vorhandensein der Steinkohlenformation nachweist, und sie in einer solchen Weise entwickelt findet, wie sie in anderen Ländern die günstigste für die Führung von Kohle ist, kann man

*) Dieses Problem bietet sich beispielsweise bei dem Lob-nor, welcher in historischer Zeit weit grösser als jetzt gewesen zu sein scheint. Verdankt der Aralsee, wie Marthe vermuthet, seine Verkleinerung der ausgedehnten Berieselung von Khiwa? und ist vielleicht demselben Umstand die Austrocknung des nach dem Kaspischen Meer gerichteten Arnes des Amu zuzuschreiben?

doch einerseits nicht mit Sicherheit auf deren Vorkommen rechnen, und andererseits selten hinreichende Aufschlüsse erhalten, um darüber etwas festzustellen. In vielen Ländern haben die Eingeborenen die Eigenschaften der Steinkohle kennen gelernt, und beuten sie so weit aus als ihre einfachen Mittel es erlauben. Gelingt es, die Orte auszukundschaften wo dies geschieht, so geben sie passende Anhaltspunkte für den einzuschlagenden Reise-
weg; denn man darf an ihnen stets allgemein werthvolle geologische Aufschlüsse erwarten, für die es sonst oft schwer ist, einen Fingerzeig zu erhalten.

Kommt man an einen Ort wo Bergbau getrieben wird, so hat man zuerst den Charakter der Kohle, des Flözes welches sie führt, und der einschliessenden Schichten zu untersuchen. Ist die Kohle von schwarzer oder schwarzbrauner Farbe? oder giebt sie, wenn sie schwarz ist, beim Zerreiben ein braunes Pulver? ist sie fest oder zerfallend, spröde oder mild, mit dem Messer schwierig oder leicht zu ritzen? hat sie einen muschligen, splittrigen oder erdigen Bruch? ist sie in Lagen abgetheilt (schiefrig) oder homogen, oder spiegelklüftig? enthält sie Verunreinigungen (erdige oder schiefrige Bestandtheile, Schwefelkies, dünne Blättchen von Dolomit), oder ist sie frei davon? Brennt sie ohne Flamme und Rauch, oder auch nur mit einer schwach bläulichen, nicht leuchtenden Flamme (in beiden Fällen Anthracit), oder mit schwacher gelber und wenig russender Flamme (magere Kohle), oder mit langer stark russender Flamme (fette Kohle)? Geschieht beim Verbrennen ein Aufkochen und Zusammenbacken der Stücke (kokende oder backende Kohle), oder verbrennen sie ohne merkliche Aenderung und ohne sich zu vereinigen (Schmiedekohle)? Hinterlässt sie viel oder wenig Asche? ist diese im erstern Fall fein und leicht, oder bleibt sie in Stücken (Klinker)? Brennt die Kohle leicht bei offener Luft, oder bedarf sie eines starken Zuges? Wird am Orte selbst Koks bereitet, und wie geschieht dies? wie sind die Oefen construirt, in denen die Eingeborenen die Kohle verbrennen? — Den Charakter des Flözes kann man nur durch Befahren der Grube wirklich kennen lernen. Dies ist oft nicht ausführbar, und man ist auf Ausfragen angewiesen. Die Angaben über die Mächtigkeit lassen sich controlliren, indem man die Länge der Grubenhölzer, welche als Stützen dienen sollen, misst. Es fragt sich dann, ob die Kohle durch die ganze Mächtigkeit gleich ist, oder in den hangenden oder liegenden Theilen einen anderen Charakter annimmt. Es ist ferner zu erforschen, ob mehrere Flöze übereinander aufgeschlossen, und durch wie viel Zwischenmittel sie von einander getrennt sind. Man erhält darüber meist unbefriedigende Auskunft, da die angewendeten einfachen Methoden gewöhnlich nur den Abbau eines Flözes durch eine Grube erlauben. Wenn die Flöze unter einem Winkel gegen die Oberfläche geneigt sind, so wird in der Regel eine Reihe von Gruben ein Flöz bezeichnen. Findet sich dann in gewissem Abstand eine andere, parallele Reihe von Gruben, so wird man aus dem Studium der Schichten ermitteln können, ob sie ein zweites Flöz, und ob fernere Reihen von Gruben noch andere Flöze bezeichnen, oder ob man es mit Verwerfungen zu thun hat. In Gebirgsgegenden kann man die Flöze oft an Gehängen in Schichtendurchschnitten sehen. Sie sind dort so verändert, dass man den Charakter der Kohle und die Mächtigkeit nicht erkennen kann; aber die Frage der Mehrheit der Flöze und ihrer Abstände lässt sich alsdann lösen. — Das Studium der einschliessenden Schichten ist wichtig, theils weil man nur dadurch die Formation bestimmen kann, der die Kohle angehört, theils weil man dadurch in den Stand gesetzt wird, festzusetzen, ob andere Flöze, die man in derselben Gegend findet, mit dem ersten in gleicher

Lagerung, oder von ihm hinsichtlich der Stellung in der Schichtenreihe verschieden sind. Fast immer sind Steinkohlenflöze von dunklen Schieferthonen begleitet, entweder nur im Liegenden, oder im Liegenden und Hangenden, während die einzelnen Flöze mit ihren zugehörigen Schiefern durch Schichten von Sandstein und Conglomeraten von einander getrennt sind, und das oberste häufig noch durch sehr mächtige Folgen rother Sandsteine überlagert wird. Die Schiefer führen fast stets Pflanzenabdrücke, diejenigen des Liegenden hauptsächlich die Wurzelstöcke, diejenigen im Hangenden die Stengel und Blätter. Wenn Flöze geringe Mächtigkeit haben, werden zur Erleichterung des Abbaues Theile der oberen Schiefer, seltener Theile der unteren mit gefördert und auf Halden gestürzt. Hier hat man sorgfältig nach Pflanzenresten mit deutlich erhaltener Blattnervatur zu suchen, aus denen das Alter der Formation bestimmt werden kann. Es giebt auch Kohlenflöze, welche zwischen Schichten von Kalkstein lagern; doch auch sie sind fast ausnahmslos von Schiefern begleitet. Der Kalkstein wird an der Grenze der Schiefer gewöhnlich mergelig und umschliesst Meeresconchylien, welche eine noch sicherere Altersbestimmung als die Pflanzen erlauben. Besonders werthvoll ist die letztere, wenn die Versteinerungen aus Schichten stammen, die zwischen den Flözen liegen. Bei wirklicher Steinkohlenformation findet man gewöhnlich als Liegendes sehr mächtige, gebirgsbildende Kalksteine (den Bergkalk), welchen dann die langen Reihen von Sandsteinen und Schiefern oft in vielen tausend Fuss Mächtigkeit folgen. Es ist dann festzusetzen, ob die Kohlenflöze sich in verschiedenen Niveaus dieser Schichtfolge wiederholen, und wie sie in jedem einzelnen Niveau beschaffen sind.

Mit der Beantwortung dieser Fragen verbindet man die Untersuchung des Grubenfeldes, sei es dass dasselbe einen Theil eines Gebirgsabhanges bilde und ein zwischen anderen Formationen eingeschlossenes, in seiner Lagerung viel gestörtes Fragment einer früher ausgedehnteren Formation darstelle, oder in ebenem Lande weit und regelmässig ausgebreitet sei, oder in anderer Weise auftrete. Mit Compass, Bleistift und Papier verfolgt man die Lagerung bis zu den Grenzen gegen ältere Formationen, wenn sich diese feststellen lassen, und verfertigt eine Skizze von dem gesehenen Theil des Grubenfeldes, sowie Entwürfe der Lagerungsverhältnisse, mit genauer Zeichnung aller Streichrichtungen und Fallwinkel. Der einfachste Fall ist gegeben, wenn kohlenführende Schichten ungestört in einer von älteren Gesteinen im Halbkreis begrenzten Bucht gelagert sind. Besonders findet man tertiäre Braunkohle, sowie überhaupt jüngere Kohle, häufig unter solchen Verhältnissen. Zuweilen sind es nur kleine Becken, zuweilen sind sie von ausserordentlicher Grösse (wie das gegen 4500 deutsche Quadratmeilen umfassende Steinkohlenbecken der Provinz Sz'-tshwan in China). Durch Auseinandertreten der beiden Flügel entstehen Uebergänge dieser Buchteinlagerungen in solche Kohlenfelder, deren Schichten einem Gebirge vorliegen und demselben angelagert sind, und endlich in solche, welche eine ganze Mulde zwischen zwei Gebirgen ausfüllen. Grössere Schwierigkeit bietet sich der Untersuchung, wenn durch nachträgliche Störungen die kohlenführenden Schichtensysteme Hebungen und Faltungen erfahren haben, von Eruptivgesteinen durchbrochen und zum Theil durch Erosion fortgeführt sind. Die Kohlschichten werden dann zu Nebenzonen von Kettengebirgen aufgebogen, oder bilden welliges Land zwischen zwei Gebirgen, oder sind hier und da in einem, zwischen anderen Schichtgesteinen eingeklemmten und hoch aufgerichteten Fragment einer alten Buchteinlagerung mitten in Gebirgen anzutreffen. Solche Umstände sind von der grössten Wichtigkeit für die Be-

stimmung des ökonomischen Werthes des Kohlenfeldes. Wissenschaftliche Ausbeute erhält man oft am reichsten von solchen, welche nur einen untergeordneten praktischen Werth haben; es sollte daher keines seiner geringen Bedeutung wegen übersehen werden.

Der ökonomische Werth eines Kohlenfeldes hängt ausser von der Lagerung und der Beschaffenheit der Kohle auch von der geographischen Lage ab. Es ist von Interesse zu wissen, wie weit das Product gegenwärtig verführt wird und wie weit es bei Verbesserung der Verkehrsmittel verführt werden könnte. Die Entfernung nach einem Hafenplatz oder einem schiffbaren Fluss sollte stets erfragt und die Gelegenheit zur Anlage vollkommenerer Beförderungsmethoden erforscht werden. Auch sind Angaben über die beim Bergbau angewendeten Methoden, die Mittel zur Förderung und Wasserhebung, den Betrag der täglichen Förderung, die Kosten derselben, die Höhe des Tagelohns, die Preise der Materialien stets erwünscht; sie müssen sofort in das Notizbuch eingetragen werden.

Erzlagerstätten. — Der Reisende sollte nie unterlassen, zu erfragen, woher das Eisen, Kupfer, Blei, Zinn, Silber, Gold, das die Eingeborenen anwenden, bezogen wird. Nur nach oft wiederholter Nachfrage kann er einigermaassen sicheren Aufschluss bekommen. Ergiebt sich daraus, dass er Gelegenheit hat eine Erzlagerstätte zu besuchen, so sollte er sie nicht versäumen. — Eisenerze sind besonders wichtig, wenn sie in einer kohlenführenden Formation auftreten. Sie halten sich dann gewöhnlich an schiefrigthonige Einlagerungen, denen sie in kleineren oder grösseren Resten inneliegen; seltener bilden sie fortlaufende Lager. *Thoneisenstein* und *Brauneisenstein* walten unter solchen Verhältnissen vor. Es ist dann die Art der Vertheilung, die relative Menge des Erzes und seine Qualität zu untersuchen. Belegstücke sollten sowol von den besten Sorten als von den an Masse vorwaltenden gesammelt werden. *Magneteisenstein* und *Rotheisenstein* bilden Lagerstätten von grossartigem Umfang vorwaltend in krystallinischen Schiefern. Es sind bei ihnen die folgenden Punkte zu berücksichtigen: Welches sind die begleitenden Gesteine? (es ist besonders auf Hornblendeschiefer, Chloritschiefer, krystallinischen Kalkstein und Serpentin zu achten). Finden sich massive Erze in regelmässigen Zwischenlagern (Mächtigkeit, Anzahl, Fallen und Streichen, Art der trennenden Mittel), oder in mächtigen, linsenförmigen oder stockförmigen Massen (Ausdehnung derselben)? Wie verhält sich deren längste Axe zum Streichen und Fallen der Schichten? Sind die Nebengesteine von Erzen imprägnirt (Fallbänder)? Welche Mineralien finden sich als Verunreinigungen in den Erzkörpern? *Eisenkies* tritt in sehr ausgedehnten Zwischenlagern und Reihen ungeheurer Linsen in Thonschiefern und Glimmerschiefern auf. Er wird zur Darstellung von Eisen nicht verwendet, ist aber in dieser Art des Auftretens in neuerer Zeit durch den gewöhnlich vorhandenen geringen Gehalt an Kupfer zu einem wichtigen Erz für die Gewinnung dieses Metalls geworden (besonders in Spanien). *Spatheisenstein* tritt, gleich den genannten Erzen, in grossen Einlagerungen in den älteren Formationen auf. Auch der *Raseneisenstein*, welcher sich unter dem Einfluss der Vegetation an sumpfigen Stellen bildet, ist von Bedeutung geworden, seitdem Schweinfurth gezeigt hat, welche Wichtigkeit für die Darstellung eines vortrefflichen Eisens er in Centralafrika hat.

Die anderen Metalle kommen, mit Ausnahme einiger nicht unwichtiger Kupfererzlagerstätten, vorwaltend auf Erzgängen vor, d. h. in Spalten, welche verschiedene Gesteine durchsetzen und auf dem Wege chemischen Niederschlags, insbesondere durch Sublimation von unten und durch aufsteigende Thermalgewässer, ausgefüllt worden sind. Ihre Bildung hängt in der Regel mit Vorgängen zusammen, welche das Aufsteigen von Eruptivgesteinen durch andere Spalten zur Folge hatten. Das Studium der letzteren in Erzdistricten

wird dadurch besonders wichtig; denn allgemeine Schlüsse lassen sich erst aus der Ansammlung zahlreicher Thatsachen ziehen. Da die jüngsten Schichtgebilde auch nur von den jüngsten Eruptivgesteinen, die älteren aber von allen Eruptivgesteinen durchbrochen werden konnten, so ist es wahrscheinlich daraus zu erklären, dass je älter eine Formation, desto grösser in der Regel ihr Reichthum an Erzgängen und die Mannichfaltigkeit derselben ist. Bei dem einzelnen Erzgang ist zu untersuchen: das Streichen und Fallen, die Mächtigkeit in verschiedenen Theilen, ferner die Grenze gegen das Nebengestein; das Gangmittel kann scharf gegen dasselbe sich abgrenzen, und ist dann gewöhnlich durch eine dünne, lettige Lage (Besteg) davon getrennt, oder es kann (und dies ist oft am Hangenden der Fall) allmählig in dasselbe übergehen, indem zahlreiche Bruchstücke des Nebengesteins dem Gangmittel inne-liegen, und das letztere in zersetzte Massen von jenem eingreift, oder sich in kleinen Gängen und Schnüren hinein verzweigt. Dann ist das Gangmittel zu untersuchen, ob es Quarz, Kalkspath, Eisenspath, Flussspath, Schwerspath, oder nur Erz ist, ferner die Erzvertheilung: sind die Erze eingesprengt, oder in abwechselnden, den Seitenwänden parallelen Lagen angeordnet? und wie ist die Aufeinanderfolge? Finden sich hohle, mit Drusen bekleidete Räume, und wie folgen in diesen die Mineralien auf einander? Selten ist ein Gang in seiner ganzen Ausdehnung in gleicher Weise von Erzen erfüllt; sondern wenn man einen horizontalen Querschnitt durch den Gang legt, wechseln in gewissen Entfernungen erzarme und erzreiche Mittel. Es hat sich an vielen Gängen gezeigt, dass die reichen Mittel einzelne Erzkörper darstellen, welche in schiefer Richtung nach der Tiefe ziehen. Der Abbau wird darüber Aufschluss geben. Ebenso hat sich oft gezeigt, dass die Erzführung aufhört, wenn der Gang in ein anderes Gestein übersetzt; auch darüber sind Thatsachen zu sammeln.

Wo mehrere Gänge vorhanden sind, ist festzustellen, ob sie sämmtlich einander parallel sind, oder einzelne, verschieden streichende Systeme paralleler Gänge darstellen; ob sich die Gänge kreuzen und an den Kreuzungsstellen Anreicherung des durchsetzenden Ganges stattfindet, oder ob sich zuweilen zwei Gänge mit einander vereinigen (scharen) und ob dies auf die Erzführung von Einfluss ist; ob sie sich in Gangmittel und Art der Erze von einander unterscheiden. Aus dem Studium der Eruptivgesteine der Umgebungen wird sich ergeben, ob die Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass verschiedene derselben mit verschieden gerichteten Mineralgängen in Verbindung stehen.

Gold findet sich vorwaltend auf Quarzgängen, welche in Formationen jeden Alters, am meisten aber in den primitiven und metamorphisch krystallinischen Schiefern auftreten. Es ist meist an Eisenkies gebunden, und kommt vielfach mit Erzen von Kupfer, Blei, Silber etc. zusammen vor. — Silbererze haben vielfaches Vorkommen, meist in Verbindung mit vielen anderen Erzen. Die Hauptmasse des Silbers wird jedoch aus Gängen gewonnen, die in Propylit oder Grünsteintrachyt aufsetzen, dem Eruptivgestein welches die Ausbruchsthätigkeit der Periode der vulcanischen Gesteine eröffnete (S. 266); sie stehen anscheinend in genetischer Verbindung mit Ausbrüchen von Rhyolith oder Trachyt. Es wäre von hohem Interesse, zu erfahren, inwieweit die Silbererzgänge von Mexico und Peru dieser Art des Vorkommens angehören. Gänge im Propylit sind oft sehr mächtig und enthalten ausserordentlich grosse Erzkörper. Silbererzgänge in Kalkstein sind meist unregelmässig, indem sie mit dem reichsten Erz erfüllte Weitungen enthalten, die durch schmale Schnüre verbunden sind. Regelmässige aber weniger wichtige Silbererzgänge finden sich in allen älteren Formationen. — Vielfach wird Silber aus Bleierzen gewonnen, besonders wo diese auf Gängen vorkommen. Bleierzgänge sind allenthalben häufig, aber nur eine verhältnissmässig geringe Zahl von ihnen ist abbauwürdig. An vielen Orten finden sich in Kalksteinen verschiedener Formationen Putzen und Nester von Bleiglanz, und stellenweise wachsen diese zur Ausfüllung grosser Hohlräume an;

sie sind dann unregelmässig durch das Gestein vertheilt und durch Schnüre verbunden. Gewöhnlich ist der Bleiglanz mit Zinkblende und anderen Schwefelmetallen vergesellschaftet. — Kupfer erreicht seine grösste technische Bedeutung im Kupferkies, der gewöhnlich mit Eisenkies verbunden ist und in sehr grossen Massen auftritt. Das Vorkommen ist ähnlich den Lagermassen des Eisenkieses. Kupfererzgänge sind ebenfalls ausserordentlich häufig und zuweilen sehr wichtig, stehen aber im ganzen an Bedeutung hinter jenen grossartigen Anhäufungen zurück. — Zinnerz tritt in der Regel in sogenannten Stockwerken auf. Das Gestein (gewöhnlich Granit, in Japan Sandstein) ist entlang gewisser Richtungen von kleinen Schnüren durchschwärmt, welche Zinnerz mit anderen Mineralien führen. — Quecksilbererze (Zinnober) haben die unregelmässigste Vertheilung. Das Gestein, in dem sie aufsetzen, ist gewöhnlich von kleineren Gängen und Gangtrümmern durchzogen, zwischen denen sich hier und da eine grössere Anhäufung des Minerals findet.

Die Orte an welchen Erzbergbau, insbesondere auf Gängen, betrieben wird, sollten stets auch im Hinblick auf das Vorkommen gut krystallisirter oder seltener Mineralien untersucht werden, da dieselben sich hier am meisten finden und in grösster Menge an die Oberfläche gefördert werden. Doch kann man auf diesem Gebiet ohne Spezialkenntnisse nicht mit Erfolg sammeln.

Ein Gesichtspunkt verdient eingehendere Beachtung. Aus vielfachen Untersuchungen scheint es hervorzugehen, dass diejenigen Gegenden, wo vulcanische Gesteine zum Ausbruch gelangten, von jeher der Sitz eruptiver Thätigkeit gewesen sind, indem jenen porphyrische und granitische Gesteine vorangingen. Nach dem eben gesagten ist die Bildung von Erzgängen an das Auftreten von Eruptivgesteinen gebunden. Nun giebt es Gegenden, in denen die mit dem Ausbruch der vulcanischen Gesteine verbundenen Vorgänge anscheinend nicht vermocht haben, Erzgänge hervorzubringen, und solche Gegenden besitzen überhaupt wenig oder keine Erzgänge, indem auch die früheren Eruptivgesteine ihre Bildung nicht veranlasst haben. Dagegen giebt es andere Länder, wo der Vulcanismus der Tertiärzeit ausserordentlich reiche Erzgänge hervorgerufen hat. In solchen Ländern ist auch die Ausbruchsthätigkeit früherer und frühester Zeiten mit der Entstehung bedeutender Erzlagerstätten in Verbindung gewesen. Ob dies ein allgemein geltendes Gesetz ist, muss weitere Beobachtung entscheiden. Die Bildungszeit der einzelnen Erzgänge festzusetzen ist die dazu nothwendig zu lösende Aufgabe. Das Gesetz bezieht sich nicht in derselben Form auf solche Gegenden, wo vulcanische Gesteine nicht auftreten.

Noch ist des Vorkommens von Erzen in Schwemmbildungen zu erwähnen, dem der Reisende häufiger begegnen wird. Am verbreitetsten sind die *goldführenden Schwemmgebilde*. Sie sind eigentlich überall vorhanden, besonders wo Flüsse aus krystallinischem Schiefergebirge kommen. Meist sind sie so arm, dass sie nicht ausgebeutet werden. Wo man sie bearbeitet, hat oft die Thatsache der Gewinnung von Gold zu der Vermuthung geführt, dass das betreffende Land reich an diesem Metall sein müsse. Doch wird sich der sorgfältige Reisende überzeugen, dass der Gewinn in der grossen Mehrzahl der Fälle geringer ist als der Tagelohn in der betreffenden Gegend. Durch Anwendung der Kraft schnell strömenden Wassers an Stelle der menschlichen Arbeit sucht man die Kosten zu verringern. Es ist daher bei der Untersuchung von goldführenden Ablagerungen darauf zu achten, ob die Einführung einer solchen Kraft möglich sei, und wenn dies der Fall ist, ob die Kosten und Schwierigkeiten im Verhältniss zu dem Reichthum der Ablagerung stehen. Wer Übung hat, kann aus der Menge des Goldes das in je einer Pfanne von bestimmtem Inhalt aus dem

von verschiedenen Stellen entnommenen Boden ausgewaschen wird, den Goldgehalt der Ablagerung mit annähernder Richtigkeit in Zahlen ausdrücken. Den Schwankungen derselben muss dabei Rechnung getragen werden. Die grösste Concentration des Schwemmgoldes ist am Grunde von Flussbetten, besonders von verlassenenen, zu suchen, wo dieselben mit starkem Gefälle quer gegen das Streichen harter Schichtgesteine gerichtet sind und eine Wirbelbewegung im Wasser stattgefunden hat. — *Zinnführendes Schwemmland* kommt in einzelnen Gegenden vor. Der Zinnstein findet sich darin in runden Körnern von verschiedener Grösse. Die Auffindung neuer Lagerstätten von Schwemmozinn, welche gewöhnlich auch zur Entdeckung des Ursprungsortes führt, wäre von bedeutendem praktischen und theoretischen Interesse. — *Eisenführendes Schwemmland* ist so weit verbreitet als das Schwemmland selbst. Doch ist das Eisenerz (Magnet Eisenstein und Rotheisenstein) selten so concentrirt, dass es technisch abbauwürdig ist. Der Gegenstand verdient mehr Berücksichtigung als er bisher erfahren hat.

Bei allen Erzvorkommnissen sollte der Reisende die Methoden des Abbaues und der Zugutemachung genau beobachten, Kosten und Preise zu ermitteln suchen und Proben der Hüttenproducte in ihren verschiedenen Stadien sammeln.

Andere Mineralien. — Ausser Kohle und Erzen giebt es noch eine Reihe anderer nutzbarer Mineralien, deren Fundstellen der Reisende untersuchen sollte. Insbesondere die *Töpferthone* und *Porzellanthone*, welche verschiedenen Formationen angehören, oder in verschiedener Weise aus anderen Gesteinen entstanden sind; die zur Glasur verwendeten Erden; die zum Schleifen und Poliren benutzten Stoffe, von Kieselschiefern, Schieferthonen und feinkörnigen Sandsteinen bis zum Trüpel und Smirgel. Was immer von Mineralstoffen in der Industrie eines Landes und im täglichen Leben verwendet wird, das sollte nach Fundort und Vorkommen bekannt sein. Hierher gehören auch die *Edelsteine* und *Schmucksteine*. So wäre es z. B. von hervorragendem Interesse, die Fundstellen der Nephritvarietäten, welche von den Völkern von Ostasien unter dem Namen Yü (in Europa Jade genannt) verwendet werden, und deren einer bei Khoten, der andere in Oberbirma gelegen ist, zu untersuchen. Wo Edelsteine im Schwemmland gewonnen werden, sollte man versuchen, das Gestein, aus dem sie stammen, aufzufinden. Dem *Graphit* wird gewöhnlich aus technischen Rücksichten eine Aufmerksamkeit geschenkt, deren er fast in allen Fällen nur von theoretischem Gesichtspunkt werth ist. Sein Vorkommen ist stets von Interesse und sollte im Tagebuch genau beschrieben werden; doch thut der Reisende wohl, sich mit den im Handelswerthe sehr verschiedenen (die besten haben den tausendfachen Preis der geringsten) Arten dieses Minerals bekannt zu machen, um nicht den fortdauernd wiederkehrenden Illusionen betreffs vermeintlich aufzufundener Schätze zu verfallen. Der Graphit ist meist ausserordentlich unrein und bildet mehr oder weniger mächtige schiefrige Einlagerungen in Gneiss, körnigem Kalk und Glimmerschiefer, kommt aber auch in wenig metamorphosirten Schichten vor. — Der *Schwefel* findet sich besonders als Absatz von Solfataren, mit zersetztem Gestein vermenget, aber auch in festen Krusten ausgeschieden. — Das *Petroleum* oder *Erdöl* kommt an der Oberfläche zum Theil in Quellen und Tümpeln vor, auf denen es eine schwärzliche Schicht bildet, oder im Schlamm der Schlammvulcane, zum Theil als Imprägnation von Schiefern, Sandsteinen und Kalksteinen. Wo es sehr verbreitet ist, lässt sich zuweilen auf ein massenhafteres Vorkommen in grösseren Tiefen schliessen. — *Asphalt* findet sich ebenfalls theils als Imprägnation poröser Gesteine,

theils in grösseren Lagern. — Zum Bauen und besonders zur Ornamentik von Gebäuden verwendete Gesteine sollten endlich auch Berücksichtigung finden.

Geologische Karten.

Die in den vorhergehenden Abschnitten auseinandergesetzten Beobachtungen müssen, soweit es thunlich ist, sofort durch Zeichnungen und Schichtenprofile dargestellt (S. 252) und auf Karten niedergelegt werden. Im Anfang fällt die Einzeichnung schwer, da man nicht weiss, was man auf den Karten zur Anschauung bringen soll; die ersten Versuche sind roh und unbefriedigend. Aber wer sich dadurch nicht abschrecken lässt und energisch fortfährt, der wird bald das angenehme Gefühl steigender Sicherheit und Uebung haben. Sind topographische Karten des betreffenden Gebietes vorhanden, so ist die Aufgabe verhältnissmässig leicht, und je genauer dieselben sind, desto gründlicher kann man selbst bei Uebersichtsaufnahmen verfahren. Man hüte sich aber, während der Reise nur die Formationen entlang dem Wege anzugeben, um die Grenzen zwischen ihnen später auszuziehen, sondern man thue dies sofort, an Ort und Stelle. Der Verlauf der Linien muss eingetragen werden, so weit als die Aussicht gestattet, es mit annähernder Richtigkeit zu thun, und man lasse sich durch die Unmöglichkeit, die letztere absolut zu erreichen, nicht abschrecken. Denn an Ort und Stelle hat man die grössten Chancen, die Linien mit möglichst wenigen Irrungen anzugeben; je länger man wartet, desto mehr schwindet die Klarheit der Erinnerung; und wer die Grenzen erst nach der Rückkehr von einer Reise auszieht, der wird theoretisch verfahren und sich von der Wirklichkeit weit entfernen. In einem Thal giebt man zunächst die Grenzen der Ebene an, welche das Alluvium umfasst, dann sondert man die höher ansteigende Stufe aus, welche vielleicht aus einer Diluvialterasse besteht. Am Weg nach den Höhen erkennt man, ob sie bis an den Steilabhang des Gebirges reicht, oder noch von ihm durch andere Gebilde getrennt ist. Besteht der Steilabhang aus Quarzporphyr oder Kalkstein, so verfolgt man seine untere Grenze genau und trägt sie auf der Karte ein. Dann folgen auf den Porphyr beispielsweise Schichten von rothem Sandstein, oder auf den Kalkstein solche von Schiefer. Der gute Beobachter erkennt sofort den Unterschied im Oberflächencharakter, den sie veranlassen, und zeichnet die Grenze soweit sein Auge das Verhältniss übersehen kann. So wird man bald eine leicht zu verfolgende, bald eine ungemein schwierige Grenzlinie erreichen; aber jede muss angegeben werden. Zugleich werden mit eingezeichneten Abkürzungen die Formationen angegeben, welche man ausscheidet. Nach wenigen Tagen wird die bereiste Strecke gemalt. Auf die Wahl der Farben kommt es bei den an Ort und Stelle gemachten Skizzen nicht an. Nur bezeichnet jede Farbe eine Gesteinsart oder eine Schichtengruppe, welche man glaubt als ein Formationsglied ausscheiden zu dürfen; und man muss nicht versäumen, an der Seite der Karte sofort einen Pinselstrich mit jeder Farbe zu machen und anzugeben, was mit ihr gemeint ist, vielleicht mit Hinweis auf Seite oder Tag im Tagebuch, wo die Formation beschrieben ist. Für jede Ausscheidung, wenn sie wiederkehrt, wird dieselbe Farbe wieder angewendet. Bald wird der Reisende Vergnügen daran finden, mit einem Blick die durchreisten Formationen zu übersehen. Geht man über ein Kettengebirge, so werden die Farbenstreifen häufig einen unvollkommenen Parallelismus haben. Kehrt man später auf einem andern Weg über dasselbe Gebirge zurück, so wird man wahrschein-

lich einer annähernd gleichen Reihe derselben Formationen in umgekehrter Folge begegnen. Die Verbindung der Grenzlinien an beiden Orten wird ein richtiges, wenn auch nicht genaues Bild der Vertheilung der Formationen in einer grösseren Strecke geben und dadurch grosse Befriedigung gewähren. Es fehlt nun noch die Einzeichnung des Streichens und Fallens, welche für das Verständniss der Karte unentbehrlich ist. Die Methode wird als bekannt vorausgesetzt (s. Hochst. S. 112 und S. 119). Ausserdem kann man durch besondere willkürliche Zeichen die Lage von Steinbrüchen, von Bergbauen, von Fundorten von Versteinerungen u. s. w. angeben.

Wo topographische Karten nicht existiren, hat sie der Reisende selbst anzufertigen. Die Methode solcher Aufnahmen ist von Herrn Kiepert in einem andern Theil dieses Buchs beschrieben. Bei geologischen Einzeichnungen kommt es darauf an, den Maasstab so zu wählen, dass er für die Angaben von Details ausreiche, ohne zu gross zu sein. Ich habe mich auf Reisen in China, wo ich durch Jahre fortdauernd auf eigne Aufnahmen angewiesen war, des Maasstabs von 6 nautischen Meilen auf einen Zoll bedient, und denselben in allen Breiten durchgeführt. Er hat sich als praktisch bewährt. Vor dem Aufbruch zu einer Reise bedeckt man eine Anzahl von Bogen Zeichnenpapier (z. B. 16 bei 20 Zoll) mit quadratischen Netzen, deren Linien je 1 Zoll Abstand haben. 10 Zoll sind ein Breitengrad. Die Längengrade werden nach dem unter der betreffenden geographischen Breite herrschenden Verhältniss eingetragen. Jeden Abend zeichnet man den durchlaufenen Weg gleich auf diese Blätter, oder, besser, erst in ein Skizzenbuch, oder auf besondere Bogen, von denen er später übertragen wird. Dabei wird nicht nur topographisch sondern auch geologisch alles angegeben was man von dem Wege aus überblicken kann.

In beiden Fällen, ob eine Karte vorliege oder erst construiert werden müsse, sollte der Reisende bestrebt sein, Uebung im Schätzen von Berg Höhen zu erlangen, und wenn er sie besitzt, sollte er die relativen Höhen aller Hügel und Berge zu beiden Seiten seines Weges fortdauernd nach Schätzung notiren. Dies trägt wesentlich dazu bei, dem Beschauer der Karte ihr Verständniss zu ermöglichen. Entlang dem Wege werden natürlich barometrische Messungen ausgeführt, welche es gestatten, auch die absolute Höhe der umgebenden Gebirge annähernd zu bestimmen. Um Uebung zu erlangen, sollte man sich daran gewöhnen, jede Anhöhe, ehe man sie besteigt, zu schätzen und dann die Richtigkeit der Schätzung durch das Aneroid zu controliren. Auf diese Weise erlangt man bald Fertigkeit, wenn man auch stets der Begehung erheblicher Irrthümer ausgesetzt bleibt. Es ist aber weit befriedigender, auf einer Routenkarte die Höhe der Gipfel in einem Bergzug beispielsweise zu 6000 Fuss, mit einer möglichen Irrung von 1000 Fuss zu viel oder zu wenig, angegeben zu sehen, als deshalb, weil der Verfasser aus übermässiger Gewissenhaftigkeit nur das genau bekannte angebracht hat, in der Vermuthung über die Höhe des aufgezeichneten Gebirges von 1000 bis 10,000 Fuss schwanken zu müssen. Unter allen Umständen sollten geschätzte Höhen durch eine andere Schriftart als die berechneten eingetragen werden.

Beobachtungen über geologische Vorgänge.

Die Vorgänge der Jetztzeit erklären die Wirkung von Vorgängen der Vergangenheit, und sollten daher ohne Unterlass beobachtet werden. Die auf den Vulkanismus bezüglichen sind schon, so weit sie sich dem Reisenden darbieten, behandelt worden. Die wichtigsten der noch zu betrachtenden sind die, welche sich auf die Wirkung des Wassers und des Eises beziehen. Ausserdem giebt es noch einige andere Classen von Vorgängen, welche sich,

wie der Contactmetamorphismus, nur an ihren vollendeten Aeusserungen erkennen lassen. Es ist hier nicht der Raum um auf diesen umfassenden Gegenstand, bei dem auch das Capitel der Paragenesis der Mineralien würde behandelt werden müssen, einzugehen; auch sind die betreffenden Beobachtungen für den nicht gründlich geologisch ausgebildeten Reisenden schwierig.

Zerstörende Thätigkeit des Wassers.

Wirkungen des atmosphärischen Wassers; Verwitterung. — Alle Gesteine, die festesten wie die lockersten, unterliegen, wo sie den atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt sind, einer Veränderung, welche sich mehr oder weniger weit in das Innere erstreckt und, wiewol langsam vor sich gehend, doch durch ihr andauerndes Wirken überaus grosse Umgestaltungen der Erdoberfläche hervorbringt. Den wesentlichsten Antheil hat das Regenwasser, welches mit Bestandtheilen der Luft, insbesondere Sauerstoff, Stickstoff und Kohlensäure, dann auch mit organischen Substanzen beladen in die Gesteine eindringt und ihre Zersetzung vermittelt. Die hierbei stattfindenden hydrochemischen Processe, welche in Reduction und Oxydation, Auflösung und Wiederabsatz von Bestandtheilen, Eintreten des Wassers in die chemische Zusammensetzung von Mineralien, Bildung von Carbonaten, und überhaupt in der Umsetzung chemischer Verbindungen bestehen, genauer zu verfolgen, ist nicht die Aufgabe des Reisenden, wiewol er sich mit den Gesetzen, welche bei so allgemeinen und täglich unter seine Augen kommenden Vorgängen herrschen, bekannt machen sollte. Nur die äusseren Manifestationen derselben fallen seiner Beobachtung zu.

Fast alle Gesteine erhalten durch atmosphärische Einflüsse eine Verwitterungsrinde. Zuweilen ist sie eine dünne scharf abgesetzte Kruste, zuweilen eine dickere, allmählig in das frische Gestein übergehende, und in anderen Fällen zeigt sich eine schalige Auflockerung, wobei die äusserste Schale am stärksten, jede nachfolgende weniger verwittert ist. Diese Erscheinungen finden sich besonders bei festen Gesteinen, darunter bei fast sämmtlichen Eruptivgesteinen. Da sie stets von Klüften durchsetzt sind und das Wasser in dieselben eindringt, so findet dieselbe oder eine sehr ähnliche Art der Zersetzung wie an der Oberfläche auch an den Kluftwänden statt. Wo, wie häufig beim Granit, zwei oder drei Systeme von Kluftflächen einander so durchsetzen, dass dadurch eine Auflösung des Gesteins in kubische oder polyëdrische Blöcke stattfindet, und zugleich die Verwitterung in Schalen fortschreitet, liegen unzersetzte Kerne in dem durch die Zersetzung entstehenden Gruss oder Thon, und indem der Regen die weiche Substanz fortspült, bleiben jene als gerundete Blöcke übrig. Es entstehen dann Haufwerke von lose übereinanderliegenden Gesteinsblöcken, welche die abenteuerlichsten Formen annehmen, dort aber, wo sie den Halt verlieren, an den Abhängen hinabrollen und in die Betten reissender Gebirgsströme getragen werden.

Es ist in solchen Fällen die Farbe, Dicke und Beschaffenheit der Verwitterungsrinde zu beobachten. In anderen Fällen, z. B. bei krystallinischen Schieferen, wo sie nicht Gebirgsfirsten sondern flachwelliges Land zusammensetzen, greift die Verwitterung hunderte von Fussen tief ein. Das Gestein wird aufgelockert, einige Bestandtheile werden ausgelaugt, die Structur und das Ansehen verändert, und es entsteht ein weicher Boden, welcher zuweilen ausschliesslich die Oberfläche einer Landstrecke bildet und auf den Charakter der Vegetation und die Art der Landwirthschaft von grösstem Einfluss ist. Man kann überhaupt den Boden in zwei grosse Classen eintheilen, in

solchen der aus der Zersetzung entstehenden Gesteins, und in solchen welcher aus der Ablagerung der Zersetzungsproducte hervorgegangen ist. Hier haben wir es mit dem ersten zu thun. Er giebt, wenn er auch das frische Gestein noch so sehr verhüllt, doch meist dem aufmerksamen Beobachter zu erkennen, woraus das letztere besteht. Grus und Grand der verschiedensten Arten, Töpferthon, Porzellanthon u. s. w. finden sich häufig auf solchen ursprünglichen Lagerstätten, und man sollte wo möglich bestimmen, woraus sie entstanden sind. Bei Erzgängen bringt die Verwitterung der der Oberfläche zunächst gelegenen Theile den rostig gefärbten sogenannten eisernen Hut hervor.

Wind und Regen. — Dem Wind als geologischem Agens ist bisher seine Rolle kaum zuerkannt worden. Der Reisende hat vielfach Gelegenheit ihm seine gebührende Stellung zu sichern. Ich verweise hier auf das in Beziehung auf die Salzsteppen und Wüsten und Bildung des Löss gesagte (S. 272—75). Man begegnet auf solchem Boden, welcher das Wasser einsaugt, vielfach tiefen Einschnitten, welche durch Wind entstanden sind, z. B. Hohlwegen, welche in einer ebenen Fläche über hundert Fuss tief eingesenkt sind und in welche die Wagen an einem Ende hinabfahren, während sie an dem anderen nach dem Niveau der Ebene hinauffahren. Ebenso sieht man altes Gemäuer mit seinem Fundament freistehen, ja dasselbe unterminirt, an Stellen wo fließendes Wasser keinen Zutritt gehabt hat. In beiden Fällen war der Wind die fortführende Kraft; er wirkt am meisten wo der Boden, wie z. B. durch die Wagenräder, zerrieben wird, am wenigsten wo Vegetation eine schützende Decke bildet. Was die Wiederablagerung betrifft, so sollte man bei Staubstürmen die Quantität des auf einer abgemessenen Fläche niedergefallenen Staubes nach dem Gewicht bestimmen. Dies wäre besonders werthvoll auf See, wo man mit Sicherheit weit von der Ursprungsstelle des Staubes entfernt ist. Schiffe, die bei Taku liegen, haben z. B. dafür Gelegenheit. Es würde sich zeigen, dass der in einem Jahrhundert niederfallende und von der Grasvegetation festgehaltene Staub eine nicht zu vernachlässigende Grösse beträgt. Ferner sollte man die Wanderung des Sandes beobachten*), besonders wo sie dauernd nach bestimmten Richtungen stattfindet und aus der Geschichte sich die Ueberführung eines fruchtbaren Landstriches durch Sand ohne Zuthun von Wasser nachweisen lässt.

Hierher gehört auch die Bildung von Gebirgslehm, welcher auf Flächen und Abhängen lagert und nicht durch Wasser abgesetzt ist. Die Art seiner Entstehung ist noch nicht hinreichend untersucht. Wahrscheinlich spielt, neben dem Vorwalten örtlicher Zersetzungsproducte, das spülende Regenwasser, welches über die Gehänge rieselt ehe es sich zu Bächen gestaltet, die Hauptrolle, während auch der Wind einen Beitrag liefert. Besonderen Aufschluss über die durch rein atmosphärische Einflüsse entstehenden Gebilde kann man aus genauen Untersuchungen über solche Schuttmassen erwarten, welche menschliche Werke, z. B. die alten Bauten in den Ländern am Mittelmeer, in Mesopotamien und Indien an solchen Stellen bedecken, wo eine Ablagerung durch Wasser nicht stattgefunden hat.

Lateritbildung. — Unter den durch Einwirkung der Atmosphärien entstandenen Gebilden nimmt der Laterit eine der hervorragendsten Stellen

---

*) Nach Schweinfurth soll in den Umgebungen der Oase Chargeh der vom Winde gepeitschte Sand in die felsigen Flächen scharfgeschnittene Furchen eingraben, welche die vorherrschende Richtung seiner Wanderung angeben. Ist Aehnliches anderwärts zu beobachten?

ein. Er hat seinen Namen von der ihm eigenthümlichen Farbe rothgebrannter Ziegelsteine (later) erhalten, und zwar zuerst in Ostindien, wo er den Erdboden weithin bedeckt. Der Reisende, welcher Ceylon berührt, hat in dem intensiv rothen feinen Staub der Landstrassen Gelegenheit, seine unangenehme Bekanntschaft zu machen. Er findet sich ebenso über Hinterindien und Birma ausgebreitet und scheint den Boden grosser Landstriche in Brasilien zu bilden. Sein eigenthümlichstes Merkmal besteht in seiner Beschränkung auf tropische Gegenden. Obgleich die Ansichten über seine Entstehungsart noch von einander abweichen, scheint es doch aus Untersuchungen in verschiedenen Ländern hervorzugehen, dass der Laterit auf tiefgreifenden Zersetzungs Vorgängen beruht, und dass die mannichfaltigsten Gesteine, wahrscheinlich dadurch, dass sie Jahrtausende hindurch tropischen Regengüssen, vielleicht mit Beeinflussung durch üppige Vegetation, ausgesetzt gewesen sind, in Laterit umgewandelt werden können. Seine Structur und seine zufälligen Bestandtheile ändern sich daher auch je nach dem Gestein, auf dem er lagert und aus dem er entstanden ist. Doch erkennt man ihn, zunächst der Farbe, stets leicht an dem ihm eigenthümlichen zelligen Gefüge, welches aus einem festen Maschenwerk mit rundlichen Ausfüllungen von thoniger Substanz besteht. Er geht in Gneiss, Granit, Thonschiefer, Schieferthon und thonigen Sandstein über, je nachdem er auf dem einen oder andern dieser Gesteine lagert, indem sich Zwischenstufen von dem unzersetzten Gestein bis in den vollkommensten zelligen Laterit zeigen. In Brasilien, wo der Laterit aus krystallinischen Schiefern hervorgegangen zu sein scheint, soll er eine Menge fester, unersetzter eckiger Blöcke, besonders von Quarz, umschliessen, welche bei der Erosion zurückbleiben, und deren Anhäufung zu der Ansicht von Gletscherwirkungen in jenem Lande Veranlassung gegeben haben mag. Die nähere Untersuchung dieses Gegenstandes wäre von grossem Interesse. — Im mittleren und südlichen China finden sich Massen von Laterit, welche von Zersetzungsproducten und Anschwemmungen der Neuzeit bedeckt werden. Es scheint, dass der erste ein früheres tropisches Klima andeutet. Kommt Aehnliches in anderen Ländern vor? Aus Afrika fehlen noch Angaben über das Auftreten von Laterit. Hat er dort eine grosse Verbreitung? Ist er dort auf die feuchten Gegenden beschränkt? Sind vielleicht die ausgedehnten Lager von theils reinerem, theils sehr unreinem Raseneisenstein, welche sich über grosse Landstriche ausdehnen, eine dem Laterit vergleichbare Bildung, durch grösseren Eisengehalt modificirt?

Zwei andere Probleme hängen hiermit eng zusammen. Verdankt der rothe Passatstaub dem Laterit der Tropen seinen Ursprung, wie der gelbe Staub, den der von Centralasien kommende Wind führt, dem Löss? Das zweite betrifft die Ablagerungen von abgeschwemmter Lateritmasse. Bilden dieselben rothe thonige Sandsteine? Dies würde vielleicht auf die noch unklare Entstehungsweise der mächtigen rothen Sandsteine Licht werfen, welche in älteren Formationen als Sedimente der Aestuarien und des seichten Meeresstrandes so häufig auftreten und wenigstens zum Theil Perioden einer üppigen tropischen Vegetation bezeichnen.

Der Laterit sollte auch auf das Vorkommen von Infusorien untersucht werden.

Quellwasser. — Das Regenwasser nimmt theils einen unterirdischen und theils einen überirdischen Lauf. Im ersteren Fall kommt der bei weitem überwiegende Theil in Gestalt von Quellen wieder zum Vorschein. Insofern die Quellen durch Aufnahme von Bestandtheilen während ihres unterirdischen

Laufes geologische Agentien sind, hat der Reisende wenig Gelegenheit sie zu beobachten, im Allgemeinen nicht viel mehr als so weit die Bestandtheile dem Auge oder dem Geschmack erkennbar sind. Die Häufigkeit und Wassermenge der Quellen; das Gestein aus dem sie hervorkommen; die Kraft mit der dies zuweilen geschieht; der Wechsel in der Fähigkeit der einzelnen Gesteine, das Wasser durchzulassen, worin die Quellen meist ihren Ursprung haben; die Temperatur; der Gehalt an Kohlensäure oder Schwefelwasserstoff; das Entstehen von Absätzen von Kalktuff, Eisenocker oder Kiesel Erde — sollten stets beobachtet werden. Auch sollte man nicht unterlassen, am Fuss von Gebirgen die Tiefe der Brunnen zu untersuchen, ihre Temperatur zu bestimmen, und ganz allgemein anzugeben, ob die Brunnen einer gewissen Gegend, oder diejenigen von einer gewissen Tiefe, sich entweder durch ähnliche Temperatur, Härte oder Weichheit des Wassers, einen alkalischen oder salzigen Geschmack auszeichnen, und ob diejenigen verschiedener Tiefen von einander verschieden sind.

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Vorkommen von Salzsoole zu schenken. Kommt sie in Quellen hervor, oder wird sie in Brunnen erbohrt? in welcher Tiefe erreicht man sie durch diese? In welchem Gestein setzen die Bohrlöcher an, und wie ist das Liegende derselben nach sonstigen Aufschlüssen beschaffen? Wie lagert die ganze Formation in welcher die Soole vorkommt? Füllt sie ein Becken aus? sind es sandige und thonige Schichten? Kommt Gyps vor? und in welcher Weise? Lassen die Verhältnisse darauf schliessen, dass das Salz aus einem abgeschlossenen Meerwasserbecken niedergeschlagen wurde? Ist das gewonnene Salz rein?

Höhlenbildung durch Auslaugung ist eine der Wirkungen des unterirdisch fliessenden Wassers. Sie findet am meisten in solchen Gesteinen statt, welche zugleich leicht löslich und von grosser Festigkeit sind, wie vor allem Kalkstein. Gypsmassen sinken durch Auslaugung gewöhnlich in sich selbst zusammen. Sobald sich das Wasser unterirdische Wege durch Auflösung gebahnt hat, vergrössert es dieselben durch Erosion. Es entstehen dann Einstürze, welche kesselförmige Vertiefungen auf der Oberfläche verursachen und zur Bildung der Karrenfelder des Kalksteins Veranlassung geben. Ist das Maass der Auslaugung und der dadurch verursachten Wirkungen auf die Gestalt der Oberfläche in tropischen Gegenden grösser als in kälteren Klimaten? Man könnte dies aus dem Umstand schliessen, dass dort die Quellabsätze weit bedeutender sind.

Erosion durch fliessendes Wasser. — Die erste Wirkung des niedergefallenen Regenwassers auf allen geneigten Flächen ist das Spülen, welches eine so grosse Rolle bei der Lössbildung in den Becken der Salzsteppen spielt. Es werden dadurch lose Bestandtheile von höheren Theilen nach niederen geführt und über Flächen ausgebreitet; werden sie von der Vegetation festgehalten, so tragen sie zur Erhöhung des Bodens bei. Bald sammelt sich das Wasser in Rinnsalen, und damit beginnt die Erosion. Sie vereinigen sich mehr und mehr zu kräftigeren Wasserläufen, und schliesslich zu Flüssen. Die Producte der Zersetzung und die losgerissenen Bestandtheile, besonders der weichen Gesteine, werden dabei mit fortgeführt. Das transportirte Material besteht in (1) Felsblöcken, welche theils bei der den Klüften folgenden Zersetzung (S. 284) übrig geblieben sind, theils durch Abbrechen unterwaschener Felsmassen, Abrutschungen und andere Prozesse in die Wasserläufe gelangen, theils auch den Eruptivconglomeraten entstammen; (2) Schotter, welcher sich theils nur in der Grösse der ursprünglich in das fliessende Wasser gelangten Stücke von den Felsblöcken unter-

scheidet, theils durch Zertrümmerung und Abreibung beim Transport aus ihnen entstanden ist, und endlich noch weit häufiger als die Felsblöcke seinen Ursprung in der Zerstörung von Conglomeraten aller Art hat; (3) Kies, der wesentlich durch noch weitere Zerkleinerung und Abreibung entsteht, oder aus groben Sandsteinen stammt, in welche er auf ähnliche Weise gekommen ist, daher er auch vorwiegend aus den härtesten Gesteinen, besonders aus Quarz, besteht; (4) Sand, dessen Ursprung noch verschiedenartiger ist, indem bei ihm auch die Zersetzung quarzhaltiger Gesteine, wie Granit und krystallinische Schiefer, eine wesentliche Rolle spielt; (5) feinerdigen oder thonigen Bestandtheilen, dem Resultat der Verwitterung, der Abreibung, und der mechanischen Zerstörung thoniger Gesteine; (6) chemisch gelösten Stoffen. — Die Thalbildung durch Erosion (s. Hochst. S. 160 ff.), auf welche der Raum nicht erlaubt ausführlich einzugehen, bietet sich dem Reisenden zur fortdauernden Beobachtung. Die gewöhnlichen Aufgaben (Art der Erosion in einzelnen Gesteinen, im Schwemmland, Ausnagen an den convexen, Ablagern von Schutt an den concaven Seiten der Biegungen, allmähliche Aenderung der Stromwindungen, Wirkung der Cascaden u. s. w.) lassen sich aus jedem Lehrbuch ableiten. Hier sollen nur noch einige Fälle besonders angedeutet werden. Am eclatantesten ist der Vorgang dort, wo das Wasser sich tiefe Canäle senkrecht eingeschnitten hat, wie dies besonders häufig in Tafelländern der Fall ist, ferner in ausgefüllten Seebecken, wo der hindurchströmende Fluss den Riegel, welcher früher das Becken abschloss, allmählich durchnagt hat und tief unter dem Niveau des alten Seebodens fließt, und ganz besonders wo ähnliche Veränderungen in mit Löss erfüllten Salzsteppenbecken stattgefunden haben. Bei weiterer Fortführung der Ausfüllung entstehen Thalweitungen. Die Geschichte der Erosion ergiebt sich oft mit Klarheit in Querschluchten, welche in einem Kettengebirge vom Kamm nach dem Fuss gerichtet sind. Wenn sie, wie am californischen Abhang der Sierra Nevada, mehrere tausend Füss tief eingeschnitten sind, sieht man oft an jeder Seite Abstufungen, auf welchen Reste von Fluss-schotter liegen; sie bezeichnen das Niveau, in welchem das Flussbett in einzelnen früheren Perioden gewesen ist.

Besondere Beachtung verdienen jene häufigen Stellen, wo ein Gebirgszug von einem Fluss quer durchbrochen wird. Gewöhnlich ist man mit dem Schluss, dass der Fluss eine Querzerspaltung des Gebirges benutzt und dieselbe ausgeweitet habe, schnell zur Hand. Auch ist dies unzweifelhaft häufig der Ursprung der Querdurchsetzung. Das Problem bietet sich besonders in der so sehr häufigen Erscheinung, dass grosse Gebirge nicht Wasserscheiden von grossen Flüssen sind, sondern dass diese auf einer Seite desselben entspringen, es dann durchbrechen und ihren Lauf auf der andern Seite fortsetzen, und dass sogar, wie z. B. im Himalaya und der Tatra, die Hauptwasserscheide quer gegen die Hauptkette gerichtet ist.

Das Problem ist schwer zu lösen, wo das Verhältniss so vollständig entwickelt ist. Der Reisende hat Gelegenheit es in seinen ersten Stadien zu beobachten, wo ein Gebirgskamm ein abflussloses Salzsteppenland von einer Gegend, welche Abfluss nach dem Meere hat, trennt und einzelne Theile der Salzsteppen bereits in den Bereich des Abflusses gezogen sind. Solche Fälle sind wahrscheinlich um das ganze centralasiatische Hochland herum vorhanden und mögen auch in Afrika vorkommen. Ich beobachtete sie vielfach am Südrand der Mongolei, wo die meisten Flüsse in Steppenboden entspringen und noch als kleine Bäche Gebirgsketten durchnagen. Manche sind nur bis wenig unterhalb der Kammhöhe gediehen, andere schon so weit vorgeschritten, dass das Verhältniss, wenn auch in kleinem Maasstab, an diejenigen des Himalaya und der Tatra erinnert. Dort kann die Bildung der Querfurchen nur der Erosion zugeschrieben werden.

Durch je längere Perioden die Erosion gewirkt hat, desto mehr werden die Flussbetten nivellirt, desto weiter die Thalgebiete auf Kosten der Berggebiete (s. Hochst. S. 160) gegen das Innere der Gebirge, nach den Wasserscheiden hin vorgeschritten sein — vorausgesetzt, dass nicht partielle Hebungen des betreffenden Gebirgslandes die Wirkung neutralisirt haben. Diese streben, das Gefälle, wo die Erosion es mühsam ausgeebnet hat, wieder steiler zu machen. Sind daher, wie im südöstlichen China, sämmtliche in einem weit ausgedehnten Gebirgsland gelegene Flüsse der Schifffahrt zugänglich, so ist dies ein Beweis, dass nicht nur die Erosion durch unendliche Zeiträume gewirkt hat, sondern auch, dass partielle Hebungen lange nicht stattgefunden haben.

Die Beziehungen der Erosion zu den Uferterrassen sollen bei den Fragen über die Wiederablagerung des Materials betrachtet werden.

Eis und Gletscher. — In Höhen und hohen Breiten, wo wegen niedriger Temperatur die chemische Zersetzung langsam vorschreitet, tritt das Eis als compensirender Factor auf und befördert die mechanische Zerstörung, Abbröckelung, Zertrümmerung und Zerreibung von Gesteinen, und dadurch die Abtragung von Gebirgen, in mächtiger Weise. Durch das nächtliche Gefrieren des Wassers in den Klüften wird das festeste Gestein aufgelockert; es lösen sich scharfkantige, unzersetzte Fragmente los und schaffen die Formen der wilden Gräte und Bergfirten, wie sie die Hochalpen charakterisiren. Die Fragmente gelangen entweder sogleich in strömende Gewässer, oder auf die Eisströme oder Gletscher, welche sie in Seitenmoränen, Mittelmoränen und Gufferlinien nach tieferen Theilen der Thäler tragen, und dort wo sie ihr Ende erreichen, in Endmoränen vor sich herschieben. Wer Gletscher zum Gegenstand der Beobachtung machen will, sollte die besten Werke darüber studirt haben, um mit den Vorgängen bei der Verwandlung des Schnees in Firneis, und dieses in Gletschereis, sowie mit den Gesetzen der Bewegung der Gletscher vertraut zu werden. Doch sind alle Nachrichten aus weniger bekannten begletscherten Gebirgen von Interesse. Wie gross ist die Menge des jährlichen Schneefalls? Wie weit erstrecken sich die Firnfelder? Zu welcher Meereshöhe steigen die Gletscher hinab? Wie gross ist das periodische Vorrücken und Zurückziehen des Endes? Lässt es sich nachweisen, ob in historischer Zeit das Eis tiefer hinabreichte als gegenwärtig, oder ob es in grösserer Höhe endigte? Sind Endmoränen, welche durch den jährlich sich wiederholenden Vorgang entstehen, dass die auf der Eisfläche transportirten Gesteinsblöcke bei dem Abschmelzen des unteren Endes liegen bleiben und bei dem Vorrücken vorgeschoben werden, in mehrfacher Anzahl unterhalb des Gletscherendes vorhanden? Wie gross ist die Neigung des Eisstromes in verschiedenen Theilen? wie gross seine Dicke am untersten Ende? Die Dimensionen in Länge und Breite, die Verhältnisse zu den Wänden des Gletschercanals, das Zusammenströmen verschiedener Gletscher, sollten auf Kartenskizzen dargestellt werden.

Der Frage nach der früheren Verbreitung von Gletschern sollte die Aufmerksamkeit des Beobachters in Gebirgsländern und in hohen Breiten stets zugekehrt sein, da sich daraus Schlüsse auf die ehemaligen Verhältnisse des Klima's, besonders in Beziehung auf Temperatur und Quantität des Niederschlags, ableiten lassen. Eisströme hinterlassen auf hartem Gestein unverkennbare Spuren durch das Schleifen desselben mittelst derjenigen Fragmente, welche (als sog. Grundmoräne) auf den Boden des Gletschers gelangen. In noch weit höherem Grade als die vom strömenden Wasser mitgeführten festen Massen vermögen sie, unter dem Druck des darüber

befindlichen Eises sich hinschiebend, Canäle auszuhöhlen. Alle schärferen Vorsprünge werden zunächst abgewetzt, und es bilden sich im festesten Granit ganz glatte Wände. Darauf haben die Gesteinsblöcke beim Fortschieben scharfe Furchen eingegraben, welche die Richtung der Bewegung zu erkennen geben. Sie sind aber auch selbst gefurcht. Wo man daher geschliffene und zugleich nach einer gewissen Richtung geritzte Felswände sieht, da hat man es mit dem Canal eines ehemaligen Eisstromes zu thun; und wo sich in einem Haufwerk von Gesteinsfragmenten viele der Blöcke geritzt zeigen, ist dasselbe als die Endmoräne eines ehemaligen Gletschers zu betrachten. Man findet beide Erscheinungen in Gebirgen wo jetzt keine Gletscher existiren (z. B. im grossartigsten Maasstabe in der Sierra Nevada in Californien, welche früher ganz vergletschert war).

Die reichste Gelegenheit zur Beobachtung sowohl der physikalischen Eigenschaften als der geologischen Wirkungen grosser Eismassen bietet sich in hohen Breiten.

Fjordbildung. — Dass die Fjords eine Wirkung der Erosion sind, kann keinem Zweifel unterliegen, doch ist es unentschieden, welche dabei die Hauptagentien gewesen sind. Seltsam ist die Beschränkung der Fjordbildung auf hohe Breiten (z. B. Skandinavien, Grönland, Alaska und Columbia, Feuerland und Patagonien). Wer dort reist, wird der Wissenschaft einen Dienst erweisen, wenn er sich eingehend mit dem Phänomen beschäftigt. Wo so ungeheure Eisanhäufungen gewesen sind, wie in diesen Ländern, ist es wahrscheinlich, dass dieselben beim Fortschieben die Unterlage noch mehr aushöhlen mussten, als Wasser es unter den günstigsten Verhältnissen zu thun vermag. In ausserordentlichem Grad würde eine langsame Vermehrung des Gefälles, wie sie dann geschieht, wenn die Axe eines Gebirges (z. B. Skandinaviens) in bedeutenderem Maasse als sein Fuss in langsamer Hebung begriffen ist, die Erosionskraft vermehren, da in bereits vorgezeichneten und gebahnten Canälen die Eisströme sich mit grösserer Geschwindigkeit abwärts bewegen würden. Darauf hinzielende Beobachtungen wären sehr erwünscht.

Brandung. — Die Brandung des Meeres an seinen Küsten, welche mit der Ebbe und Fluth das Niveau ihrer intensivsten Wirkung täglich einige Male wechselt, wirkt langsam zerstörend auf die Gesteine welche die Küste zusammensetzen, und in verschiedenem Grade je nach der Härte derselben. Am stärksten ist die Wirkung dort, wo weichere Schichten im Niveau der Brandung liegen und von härteren Gesteinen überlagert werden. Dann werden die letzteren unterminirt und stürzen nach. Die herabgefallenen Felsblöcke werden gegeneinander bewegt, zerkleinert und abgerieben, bis sie in sandiger und erdiger Form hinweggespült werden. Besonders sind die Küstenplattformen oder Küstenterrassen (s. Hochst. S. 184) zu berücksichtigen, welche in halber Fluthhöhe liegen, und über welche die Brandung in langer schäumender Linie hinstiebt. Selbst aufgerichtete harte Kalksteinschichten werden in dieser Weise von einer glatten Fläche abgeschnitten. Diese Beobachtungen, sowie alle welche die Wirkung der Brandung betreffen, sind besonders nützlich, wo es sich darum handelt, frühere Küstenlinien, welche höher als die gegenwärtigen liegen, zu verfolgen. — Bringt geringe Brandung Wirkungen derselben Art wie stärkere hervor? Wie entstehen die steilen Klippen, welche zuweilen geschlossene Meeresbuchten ohne Brandung umgeben? Hat hier der Wellenschlag einen ähnlichen (wiewohl langsameren) Einfluss wie jene auf die Unterminirung der Ufergesteine?

Bildung der Seebecken.

Vertiefungen im Erdboden, welche mit Wasser erfüllt werden und Seen bilden, können ihre Entstehung verschiedenen Ursachen verdanken. In der Mehrzahl der Fälle ist das Problem schwer zu lösen; wo man dies versucht hat, herrschen gewöhnlich widersprechende Ansichten, und um eine Systematik der Seebecken nach bestimmten Gesichtspunkten durchführen zu können, bedarf es noch der Aufsammlung vielfacher Untersuchungen, wie sie ein Reisender besonders im Stande ist auszuführen. In allen Fällen ist ein Seebecken ein Resultat geologischer Vorgänge, und in den meisten sind solche Kräfte thätig gewesen, welche auf die ganze Umgebung gestaltend wirkten. Schlüsse auf die Entstehungsart eines Beckens müssen sich daher auf die genaue Untersuchung der Umgebungen gründen. Im Folgenden sollen nur einige Fälle zusammengestellt werden, welche geeignet sein dürften, dem Reisenden Gesichtspunkte für die Beobachtung in jedem speciellen Fall und vielleicht auch für eine geologische Eintheilung der Seen zu bieten.

Erosion durch Wasser. — Man nimmt an, dass viele Seen, z. B. diejenigen welche den Alpen im Norden vorliegen, durch Auswaschung vermittelt Wassers entstanden sind. Es ist zu untersuchen, ob Wasser eine solche Wirkung in grossem Maassstab ausüben kann, was an sich sehr unwahrscheinlich ist, da es wohl seitlich abschwemmen und ein Strombett erweitern kann, Erosionen nach der Tiefe aber, d. h. nach einer Tiefe welche diejenige des Ausflusscanals übersteigt, durch die Kraft des einfachen Stromes nur in sehr geringem Maass, in höherem Grade aber nur durch starken Fall, Wirbelbewegung oder rückläufige Ströme hervorzubringen vermag. Wirkungen dieser Art sind häufig zu beobachten, z. B. wo ein Strom in Felsengen sich an festen Wänden bricht, oder in seinem Bett ein hartes Gestein auf ein weiches folgt, aber sie ist stets räumlich beschränkt*). Wahrscheinlich wird daher dieses Agens bei der Bildung der Seebecken nur in sehr geringem Maass in Anspruch zu nehmen sein.

Erosion durch Eis. — Eisströme bewegen sich im Allgemeinen nach den Gesetzen des fliessenden Wassers. Auch in ihnen entsteht daher wahrscheinlich eine langsame rotirende Bewegung, wenn das Eis durch ein seitliches Hinderniss in der Richtung der Bewegung abgelenkt wird. Solche Wirbel würden viel grössere Dimensionen annehmen können als diejenigen in Wasserströmen, und durch das Gewicht des Eises die stärkste erodirende Wirkung ausüben. Der Gegenstand sollte besonders in den Gebirgen untersucht werden, welche in der Eiszeit von Gletschern bedeckt waren und jetzt frei davon sind**), insbesondere in Lappland und Norwegen. Es ist ange-

*) Solche Stellen finden sich besonders auch oberhalb der Stromschnellen der Flüsse, wo die Ablagerungen, wahrscheinlich durch rückläufige Tiefenströme, stets wieder weggenommen werden und eine Ausfüllung daher nie stattfindet. Dies sind jedoch räumlich beschränkte Erscheinungen; noch mehr ist dies der Fall mit den sogenannten Riesentöpfen, brunnenartigen Vertiefungen, welche entstehen, wenn fallendes Wasser Gesteinsmassen an ein und derselben Stelle fortdauernd in wirbelnder Bewegung erhält und als Material zum Ausdrehen benutzt. Sie sind am häufigsten in Gletschergegenden.

**) Auf der Sierra Nevada in Californien finden sich Stellen, wo ein Gletscher, der in dem Bereich weicherer Gesteine ein breites Bett einnahm, unterhalb derselben durch ein enges, aus hartem Gestein, z. B. Granit, gebildetes Thor gezwängt wurde, dessen Wände noch jetzt bis auf den Boden in der Richtung der Bewegung geschliffen und tief geritzt sind. Dann findet man zuweilen oberhalb der Engpforte einen See, dessen Becken hinsichtlich der Lage ganz mit den häufigen Stellen, wo in der angegebenen Weise Tiefwasserbecken in Flüssen gebildet werden, übereinstimmt. Sie sind oft vollkommen kreisrund, wie herausgedreht. Hierher gehören vielleicht die „Meeraugen“ der hohen Tatra.

nommen worden, dass Eis auch durch blosses Fortschieben auf der Unterlage Becken von grosser Tiefe aushöhlen könne, und dass z. B. die Alpenseen schon vor der Eiszeit existirten, bei deren Eintritt ganz mit Ablagerungen ausgefüllt waren, durch das Eis aber von neuem ausgehöhlt wurden; Dagegen ist erwidert worden, dass Gletscher an manchen Stellen, wo sie das Gebirge verliessen, auf weichem Schichtgebirge fortgeschoben wurden, ohne bedeutende Aenderungen in der Gestalt der Unterlage hervorzubringen. Diese Frage wird man gewiss in hohen Breiten, durch Beobachtung einer Anzahl von Stellen die erst kürzlich von Eis verlassen wurden, erledigen können.

Gebirgsfaltung. — Die Seebecken in den inneren Theilen der Alpen sind von Herrn Desor orographische Seen genannt werden; er unterscheidet nach der Lage im Verhältniss zu den Ketten des Schichtgebirges: 1) Comben-Seen, die in isoklinen Einsenkungen (d. h. wo die Schichten, aus denen die Seiten des Beckens aufgebaut sind, sämmtlich nach einer Richtung fallen, 2) Mulden-Seen, die in synklinen Einsenkungen (d. h. mit von beiden Seiten gegeneinander einfallenden Schichten) und 3) Clusen-Seen, welche in den quer gegen das Streichen der Schichten gerichteten, stets schroffen Einsenkungen der Querthäler liegen. Die Seen der beiden ersten Kategorien nehmen Längsthäler ein. Desor nimmt an, dass die Seen zuerst durch eine Faltung zur Zeit der Erhebung des Gebirges gebildet, dann während der Eiszeit von Eis erfüllt und dadurch von Sedimenten frei gehalten, dann durch klimatische Aenderung eisfrei wurden, und in das Stadium allmäliger Sedimentausfüllung gelangten, in dem sie sich gegenwärtig befinden. Dagegen ist von Lyell als wahrscheinlicher hingestellt worden, dass die Faltung der Schichten, welche die Bildung der Seebecken zur Folge hatte, erst während der Eiszeit geschah, indem die dadurch entstandenen Ungleichheiten in den Einsenkungen durch ihre Eisdecke von der Ausfüllung mit Sedimenten bewahrt blieben, der Gebirgsschutt vielmehr darüber hinweg getragen wurde. Der Reisende wird gut thun, sich der Eintheilung von Desor für die Seen in Kettengebirgen, welche man wol am besten als Faltungsseen bezeichnet, zu bedienen. Er sollte es sich angelegen sein lassen, zu bestimmen, in wie weit Eis eine Rolle in dem betreffenden Gebirge gespielt hat. Wenn man sieht, in welchem Maasse kleine Gebirgsseen gegen Norden zunehmen, und wie sie dort am häufigsten sind wo die Begletscherung am stärksten war, dagegen südlich vom 40sten Breitengrad äusserst selten werden, so muss man das Eis als einen wesentlichen Factor betrachten. Denn die Kräfte, welche Seebecken bilden, wirken allenthalben gleich. Aber wo das Eis fehlt, hält die Ausfüllung nahezu Schritt mit der Vertiefung der Becken. Es ist hauptsächlich zu untersuchen, wie die Rollen der Erosion durch rotirendes Eis und der Gebirgsfaltung unter Eisbedeckung sich vertheilen, und ob nicht beide zusammenwirkten.

Senkung. — Ähnlich wie bei der Gebirgsfaltung kleine Unterschiede in dem Betrag der gegenseitigen Verschiebung der einzelnen Theile, oder der Niveauveränderung benachbarter Gebiete, die in den Längs- und Querthälern der Gebirge gelegenen Seebecken hervorbringen, so können grössere Becken in flachen oder hügeligen Gegenden entstehen, wenn bei der langsamen Niveauveränderung grösserer Strecken der obere Theil eines Flussgebietes sich im Verhältniss zum unteren senkt, oder der letztere im Verhältniss zum ersteren in Hebung begriffen ist. Das Wasser wird dann aufgestaut und füllt grosse flache Becken. Auch hier würde Eis, wenn es die Fläche bedeckte, die Wirkung haben, dass bei langer Dauer dieses Vor-

ganges die Becken an Tiefe zunehmen, während, wo dies nicht der Fall wäre, die ununterbrochen einströmenden Sedimente das Becken seicht erhalten würden. — Der Fall ist besonders dann evident, wenn sich am Fuss eines Gebirges statt eines Schuttkegels, der dort am höchsten sein sollte (s. Ablagerung in Ebenen S. 296), Seen ausbreiten. Viele Plateauseen dürften denselben Ursprung haben. Ein noch fortschreitendes Sinken wird sich dadurch zu erkennen geben, dass ein solcher See in Armen in die Betten der Zuflüsse seines oberen Theils eingreift.

Abtrennung von Meeresarmen. — Durch Hebung des Meeresbodens an den Rändern der Continente sondern sich Becken ab. Ist der Niederschlag hinreichend sie erfüllt zu halten und einen Ausfluss zu gestatten, so werden sie ausgesüsst; ist er geringer als die Verdunstung, so findet kein Abfluss statt: das Becken verkleinert sich. Dem Caspischen Meer und dem Aralsee wird diese Entstehungsart zugeschrieben. Das Studium der Fauna wird in solchen Fällen den sichersten Anhalt bieten und absolute Beweise gestatten.

Continentalte Gliederung. Wo die von Gebirgen gebildeten grossen continentalen Becken eine Verbindung mit dem Meer durch Abfluss der sich ansammelnden atmosphärischen Gewässer nicht haben, bleiben die letzteren an allen tiefern Stellen stehen. Es bilden sich jene Seen, die in dem Abschnitt über Steppen und Wüsten betrachtet wurden. Bringt nachher klimatische Aenderung einen Abfluss hervor, so erfolgt die Aussüssung des Wassers und allmähig die Verwandlung des Seebeckens in ein Lössbecken.

Abdämmung. Wird quer gegen ein Flussbett ein künstlicher oder natürlicher Damm aufgeworfen, so entsteht ein See. In Gebirgsthälern üben Abrutschungen diese Wirkung sehr häufig aus. Die Endmoränen von Gletschern stauen das Wasser oft zu bedeutenden Seen auf, auch noch, wie im Fall des Garda-Sees, an Stellen wo ein Fluss aus dem Gebirge austritt. In Ebenen findet eine Abdämmung durch Aufschüttung kaum statt; aber in den Mündungsgebieten der Flüsse verursachen Sanddünen die Abtrennung seeartiger Ausbreitungen, welche durch ihre Brackwasserfaunen einen wichtigen Anhalt für das Verständniss mancher Bildungen der Vorzeit geben.

Explosion. Es scheint, dass man unter dem Namen „Maare“ Seebecken von zwei verschiedenen Entstehungsarten vereinigt. Man bezeichnet damit trichterförmige Becken, welche den vulcanischen Gegenden eigenthümlich sind und bald in vulcanischem Tuffland, bald in Gesteinen anderer Art eingesenkt sind. In der Eifel, aus der der Name stammt, ist dasselbe Material, aus dem die Wände bestehen, in zerkleinertem Zustand in Form eines in der Mitte durchbohrten, sehr flachen Kegels um die Oeffnung angehäuft. Man nimmt eine Entstehung durch einmalige Explosion an; solche Stellen sind gleichsam Kratere, die in einem Stadium geringer Entwicklung stehen geblieben sind. Sie finden sich in vulcanischen Gegenden anderer Länder zusammen mit anderen ähnlich gestalteten Becken, welche auch als Maare bezeichnet werden, aber keinen aufgeworfenen Ring haben, sondern oft in horizontalen Tuffschichten unmittelbar eingesenkt sind. Diese gehören zur nächsten Kategorie.

Einbruchseen erfüllen solche Becken welche durch Einbrechen einzelner Stellen der Erdoberfläche gebildet werden. Hierher gehören insbesondere die Einbruchskessel in vulcanischen Gegenden. Es giebt deren sehr grosse, wo die Ufer den Ringwall darstellen, aus dessen Mitte ein Vulcan sich über die Wasserfläche erhebt (Vulcan de Taal auf Manila).

Ferner die oft nicht unbedeutenden Seen, welche Kratere erloschener Vulcane ausfüllen (der Hakone-See in Japan bietet ein schönes Beispiel), und wahrscheinlich die Maare der zweiten angeführten Art, welche durch das Fehlen eines Schuttkegels auf eine Entstehung durch Einbruch hindeuten. — Es dürften noch viele, mannichfach gestaltete und in verschiedenen Gesteinen auftretende Seebecken vulcanischer Gegenden in Folge der Erkaltung und Zusammenziehung unterirdischer erhitzter Massen und des dadurch bewirkten Nachstürzens des darüber befindlichen Gesteins entstanden sein; denn gerade solche Gegenden sind auch in den Tropen reich an grossen und tiefen Seen, deren Entstehung durch keine der sonst bei der Bildung von Seebecken thätigen Kräfte erklärt werden kann. — Eine andere Art von Einbruchseen sind diejenigen, welche durch Auslaugung von Gestein, z. B. von Gyps- oder Steinsalzmassen, oder von Kalkstein, entstanden sind.

Es würden hiernach von einfachen Formen zu unterscheiden sein: Erosionsseen, 3 Arten von Faltungsseen, ferner Senkungsseen, abgetrennte Meeresarme, Seen der continentalen Gliederung, 3 Arten von Abdämmungsseen (durch Erdfälle, durch Moränen und durch Sanddünen), Explosionsseen, 4 Formen vulcanischer Einbruchseen (Ringwallseen mit einem Vulcan in der Mitte, Kraterseen, Maare, und solche, die durch Einbruch grösserer Strecken in vulcanischen Gegenden entstehen), und Einbruchseen durch Auslaugung. Bei so vielfachen möglichen Ursachen, zu denen gewiss noch andere kommen, ist die genaueste Untersuchung erforderlich, um die Agentien zu bestimmen, die in jedem Fall thätig waren. Dazu kommt, dass wahrscheinlich in vielen Fällen eine Combination verschiedener der hier angegebenen Ursachen der Bildung von Seebecken zu Grunde gelegen hat.

Wiederaufbauende Thätigkeit des Wassers. — 1. Ablagerung der mechanisch suspendirten Stoffe.

Alles was das Wasser durch seine zerstörende Kraft von dem Gebirge, dem Flachland und den Küsten entführt: die Gesteinblöcke, der Schotter, der Kies, der Sand, die erdigen Theile und die chemisch gelösten Stoffe, wird durch das Wasser, zum Theil im Verein mit Wind, sowie mit chemischer und organischer Thätigkeit, wieder abgelagert. Bei den mechanisch suspendirten Massen findet eine Sichtung nach Grösse und specifischem Gewicht, je nach der Tragfähigkeit des strömenden Wassers statt. Die grössten Blöcke und die specifisch schwersten Substanzen (wie das Gold) bleiben, mit Ausnahme des besonders zu betrachtenden Transportes durch Eis, der Ursprungsstelle am nächsten liegen. Je feiner die Vertheilung und je geringer das specifische Gewicht, desto weiter ist die Fortführung; und desto grösser die Vermischung der Zerstörungsproducte der verschiedensten Gesteine, und am weitesten verbreiten sich die chemisch gelösten Stoffe.

Ablagerung durch spülendes Wasser. — Zum Theil sind die hierher gehörigen grossartigen Wirkungen, an solchen Stellen wo sanftes Gefäll die Vereinigung des über eine Fläche fliessenden Wassers zu einzelnen Rinnalen beschränkt, bereits dargestellt worden (S. 274 u. 286). Die Vorgänge des Spülens sind sehr allgemeiner Art, ihre Aeusserungen aber, je nach der Menge des spülenden Wassers, der Neigung der Gehänge, der Art des Gesteins und der Pflanzendecke verschieden, und die sorgfältige Beobachtung der gegenwärtigen Resultate und ihre Vergleichung mit denen der Vorzeit gestattet Schlüsse auf klimatische Aenderungen. Das über die Gebirgsgehänge fluthende Regenwasser lagert die mitgenommenen, durch die Zersetzungs-

vorgänge lose gewordenen oder sonst locker angehäuften Bestandtheile dort wieder ab, wo eine Verminderung der Neigung oder andere Umstände der Fortbewegung ein Hinderniss bieten. Gebirgsschutt bildet grosse Anhäufungen am Fuss von Gehängen, und feinere Bestandtheile breiten sich über grössere Flächen aus. Die Wirkungen dieser Art sind am stärksten wo in regenreichen Gebirgsgegenden der Wald vernichtet ist. — Der unregelmässigen Ablagerung der Materialien durch das spülende, folgt nun die regelmässigere durch das in bestimmte Canäle geleitete Wasser.

Gebirgsbäche mit steilem Gefäll. — Ist das Gefäll schäumender Wildbäche nahezu gleichmässig, so werden sämmtliche Materialien, einschliesslich der grössten Felsblöcke, hindurchtransportirt. Sie finden hier und da einen Rastplatz, werden aber bei Hochwasser wieder mit fortgerissen. Bildet sich im Strome eine Barriere, z. B. durch eine Bergabrutschung, so staut sich das Wasser auf, das Material bleibt liegen, häuft sich an und erfüllt den gebildeten Kessel bis zu der Höhe, welche der Tiefe entspricht, zu welcher das Wasser im Stande gewesen ist, den Riegel zu durchnagen. Nach und nach gräbt sich der Strom tiefer in die Sedimente ein, bis er in seinem früheren Niveau angekommen ist. Zu beiden Seiten aber bleibt die Thalausfüllung stehen und bildet eine, oft hoch über dem Gewässer gelegene Terrasse. An solchen Stellen findet man häufig die Gebirgsdörfer der engen Querthäler.

Mündung steiler Gebirgsbäche in Thalweitungen. — Wo der Wildbach in ein breiteres Thal, z. B. ein Längsthal mündet, lässt er die grossen Blöcke liegen, da seine nun vertheilte Kraft zu ihrem weitem Transport nicht hinreicht. Es bildet sich ein Schuttkegel, der sich im Halbkreis um die Mündung lagert, und auf welchem der Bach seinen Lauf oft ändert. Die Neigungswinkel solcher Anhäufungen sollten gemessen werden. Kleine und feine Bestandtheile vermengen sich mit dem Schutt, werden aber zum bei weitem grösseren Theil weiter hinab geführt, nach dem das Thal durchströmenden Fluss. Wo ein Wildbach unmittelbar in diesen mündet, da nimmt der Fluss die grossen Gerölle mit so weit er kann, und rollt sie weiter ab. — Zuweilen durchbricht ein Wildbach seinen eignen Schuttkegel, indem er einen Canal in ihn gräbt. Dann bilden sich lange Mauern von zuweilen fest cümentirtem Gebirgsschutt, die man leicht mit Moränen verwechseln kann; sie sollten mit Vorsicht untersucht werden. Sind sie Moränen, so enthalten sie stets geschliffene und geritzte Blöcke.

Seeablagerungen. — Das fliessende Wasser entledigt sich, wenn es einen See betritt, der mechanisch vertheilten Stoffe, und verlässt ihn klar. Die Ablagerung der grössten Bestandtheile geschieht nach Art derjenigen welche bei einem Schuttkegel stattfindet, nur, wegen der Tragkraft des Wassers, unter einem geringeren Winkel. In noch weit weniger geeigneten Schichten werden die feineren Bestandtheile am Grunde des Sees niedergeschlagen. Durch die Begegnung und Vereinigung der den verschiedenen Zuflüssen angehörigen Schuttkegel wird der See allmählig ausgefüllt und bildet schliesslich einen Thalboden, in dem nur noch das Flussbett eingegraben ist. Es kommt nicht selten vor, dass der Fluss sich allmählig ein tieferes Bett ausnagt und die Seeausfüllung durchschneidet. Man sollte an solchen Stellen nicht vorübergehen, ohne genau die Art, in welcher die Ausfüllungsmassen des Seebeckens niedergeschlagen sind, zu beachten; insbesondere die von der Einmündung des Flusses nach dem Ausfluss des Sees allmählig vorschreitende geneigte Ablagerung des gröberen Materials, und dessen Wechsel mit feineren Schichten, welcher die Reihenfolge grösserer und geringerer Wasserführung

des Flusses bezeichnet. Es wäre von Interesse, die Ablagerungsform in solchen Becken, die, wie viele Schweizer Seen, eine im Verhältniss zur Ausdehnung sehr beträchtliche Tiefe haben und hauptsächlich Gebirgsschutt zugeführt bekommen, mit der Art zu vergleichen, in welcher die Ablagerung in solchen Seen stattfand, die während der allmäligen Vertiefung fortdauernd mit Sedimenten versehen wurden.

Ablagerung in Thalweitungen. — So lange die Flüsse noch zwischen Bergen fliessen, werden sie von ihnen mit frisch von den Felsen entnommenem Ablagerungsmaterial gespeist. Daher ist hier die eigentliche Region des groben Schotter, von dem nur wenig die Nähe des Gebirges verlässt. Die grösseren Thalweitungen im Gebirge selbst, welche wohl in der Mehrzahl der Fälle von Parallelketten eingeschlossen werden, sind daher grossentheils mit grobem Geröll ausgefüllt. Wenn am untern Ende die Hügel von beiden Seiten zusammentreten, um das Thal abzuschliessen, so hat man es mit einem alten Seebecken zu thun. Treten sie auseinander, so dass das Thal sich gegen die dem Gebirge vorliegende Ebene erweitert, so stellt es nur eine Bucht derselben dar und nimmt an ihrem Charakter theil. Man wird bei den meisten Flüssen, welche ihren Lauf in Kettengebirgen haben, und noch mehr bei denen, welche in einem aus Parallelketten aufgebauten Gebirgsland von einer Thalmulde nach der anderen ihren Weg nehmen, finden, dass ihr Lauf aus einer Reihe durch Erosionscanäle verbundener Seebecken besteht, welche entweder noch zum Theil durch Wasser oder ganz von Ablagerungen ausgefüllt sind. Dasselbe gilt überhaupt überall wo Faltung stattgefunden hat, besonders wenn die Störungen einer jugendlichen Periode angehören. Anders ist es in Tafelländern, deren oberste Schichten eine Störung nicht erlitten haben. Sind diese weich und die tieferen hart (s. S. 257), so kommen in den darin eingesenkten Flusssystemen Thalweitungen selten vor, und entstehen wesentlich an der Confluenz von Flüssen durch die örtlich vermehrte Erosion. Im umgekehrten Fall, wenn oft das ganze Gebiet aus Thalweitungen zwischen Fragmenten der Tafelgebirge besteht, wird man irrthümlich auf ausgefüllte Seebecken zu schliessen geneigt sein, wo man es nur mit horizontalen Abwaschungen und einer leichten Ueberführung des Gesteins durch Schwemmgebilde zu thun hat. — Die Seebeckenthäler zeigen in eminentem Grad die Bildung der sogenannten Schotterterrassen, welche durch Tieferlegung des ganzen Flussbettes oder seines unteren Theiles entstehen. Sie begrenzen einen breiten, durch die veränderlichen Windungen des Flusses ausgenagten Stromweg, in welchem derselbe die Alluvien abgelagert hat, zwischen denen er sich hinschlängelt. Es ist in diesen Fällen die Höhe der Terrasse im oberen und im unteren Theil des Thales, ihre Zusammensetzung, die Anwesenheit einer oder mehrerer Terrassen, und die Verschiedenheit ihrer Culturfähigkeit zu untersuchen, indem häufig der Ertrag der Felder auf den Alluvionen weit bedeutender ist als auf den Terrassen, oder auch die natürliche Vegetation einen ganz anderen Charakter annimmt.

Ablagerung in Ebenen. Wo der Fluss aus der letzten Gebirgsecke oder, wie es häufiger der Fall ist, aus allmähig sich öffnendem Hügelland heraustritt, um seinen Lauf auf einer sanft geneigten, gemeinhin als Ebene bezeichneten Fläche fortzusetzen, wird gewöhnlich das Gefäll gering und gleichmässig. Ist der Boden der Fläche das Product des Flusses, so kann man ihn wie einen Schuttkegel des letzteren betrachten, über welchen der Fluss verschiedene Canäle einschlagen kann. Eine kleine Differenz im Gefäll bewirkt, dass entweder der Fluss nur in einem Canal zur selben Zeit fliesst, denselben aber in einzelnen langen Perioden wechselt, oder dass er

vor dem Punkt, wo ein See oder das Meer seinen Bewegungen ein Hinderniss entgegensetzen, in mehreren Canälen gleichzeitig fliesst und ein Delta bildet. Der Schotter erreicht bald das Ende seiner Ablagerung; auch der Kies wird nicht weit geführt. Sand und Schlamm aber bleiben im Flusswasser suspendirt. Ist der Lauf kurz, so geht noch viel Sand direct nach dem Meer; ist er lang, so bleibt der Sand grösstentheils im Flussbett, wo er Bänke bildet, welche ihre Lage und Form ändern und allmählig abwärts nach dem Mündungsgebiet gelangen. Der am feinsten suspendirte Schlamm wird zum Theil mit dem Sand gemengt, zum Theil geht er direct nach der Mündung. Tritt der Fluss bei dem jährlich wiederkehrenden Hochwasser über seine Ufer, so setzt sich der Sand in seiner Nähe ab; der Rest des Ueberschwemmungsgebietes wird mit schlammigem Sediment überführt, und auch aufgelöste Stoffe bleiben zurück. Es bieten sich hier dem Beobachter mancherlei Fragen. Wie sind die Sedimente beschaffen? (Proben zu sammeln) und wie ist ihre ökonomische Bedeutung? Wie weit reicht das Ueberschwemmungsgebiet gegen das Meer (das Küstengebiet wird von Flüssen nicht überschwemmt), gegen das Gebirge und in andern Richtungen? Ist das Wasser dabei stehend, so hat man darin ein natürliches Nivellement. Lassen sich alte verlassene Flussläufe durch vorhandene Canäle, Versandungszonen, alte Dämme oder historische Ueberlieferungen nachweisen?

Ablagerung an Flussmündungen. — Wo Flüsse in das Meer münden, kommen alle jene Ablagerungen in Betracht, welche sich durch die Combination der Wirkung des Stromes mit derjenigen von Ebbe und Fluth, oder, wo diese fehlen, des stillstehenden Wassers bilden. Indem die Gezeiten durch die zweierlei Bewegungen eine Saigerung veranlassen, gelangen im Allgemeinen, je weiter an der Mündung abwärts, mehr und mehr die feineren Sedimente zum unmittelbaren Absatz aus dem Wasser, während zugleich dadurch, dass der Ebbestrom ausser dem eingedrungenen Fluthwasser auch das Flusswasser begreift, mithin stärker ist als der Fluthstrom, die im Strombett gebildeten Bänke und Inseln von Sand allmählig abwärts wandern. Das Endresultat im Meer ist daher wahrscheinlich eine Vermischung von Thon und Sand, oder ihr Wechsel in sehr dünnen Lagen. Die Geschichte der Inseln in Strommündungen und der Ansiedelungen auf denselben, die weit schneller vor sich gehenden Aenderungen in der Vertheilung der unter Wasser bleibenden Bänke und der fahrbaren Canäle, die Versandung alter Canäle und die Bildung neuer, die Form der Barre welche sich vor der Flussmündung halbkreisförmig im Meer bildet, die zuweilen in Gestalt langer Zungen von Sand dem Fluss sich anlagernden und ihn seitlich ablenkenden Halbinseln und Dünen*), die Art der Absätze jenseits der Barren am Meeresgrund — sind sämtlich Gegenstände von theoretischem und praktischem Interesse. Hinsichtlich der Bewegung des Wassers sind in jedem Fluss zwei Punkte festzusetzen: Derjenige Punkt, bis zu welchem die Fluth als Strom aufdringt, (er bezeichnet oft die Lage wichtiger Handelsplätze), und der höchste Punkt im Fluss, wo noch ein Steigen des Wassers bei dem Eindringen der Fluth stattfindet.

Küstenablagerungen. — Während diejenigen Flüsse, deren Unterlauf durch ebenes Land führt, nur die feinsten Sedimente und chemisch gelösten Stoffe nach dem Meere bringen, kommen demselben an Steilküsten alle

*) Diese Erscheinungen, welche sich besonders dort finden wo Fluth und Brandung heftig wirken, sind nicht mit den Nehrungen der von einem ganz ruhigen Meer bespülten Ostseeküste zu verwechseln, welche sich durch Zusammensetzung aus Diluvialschichten als Ueberreste von losgetrennten Theilen des angrenzenden Festlandes documentiren sollen.

Formen von Zerstörungsproducten zu, welche auch die Gebirgswässer erhalten. In beiden Fällen dacht sich von der Küste aus ein Schuttkegel ab, dessen Form von der Tiefe des Meeres und der Steilheit der Böschung, von der Grösse der sich ablagernden Bestandtheile, von Unebenheiten der Unterlage (Inseln und Klippen) und von Strömungen abhängt, und in welcher die Feinheit des Korns mit der Entfernung von der Küste zunimmt. Die Tiefenparallelen sollten mit Sorgfalt gezogen, und das Verhältniss ihrer Gestalt zu derjenigen der Küste beobachtet werden. Inseln können mit dem Festland oder untereinander durch sanfte untermeerische Mulden verbunden, oder durch tiefe Canäle getrennt sein (beides ist z. B. bei den ostindischen Inseln der Fall, und wie folgenreiche Schlüsse sich daraus ziehen lassen, hat A. R. Wallace gezeigt). Häufig findet sich, dass der Schuttkegel plötzlich durch einen Steilabfall abgeschnitten ist, wie im Westen der Britischen Inseln. Die Ursache davon liegt wahrscheinlich in Strömungen, welche die über die Abbruchlinie hinausgelangenden Theilchen aufnehmen und in andere Regionen führen.

Es ist noch nicht untersucht, wie weit dort, wo keine Strömungen stattfinden, die Küstenablagerungen gegen die Tiefsee hin fortsetzen. Ist auch die Entfernung wahrscheinlich sehr gross, und mögen auch Strömungen noch viel weiter hinaus Absätze verursachen, so glaubt man doch im Allgemeinen annehmen zu dürfen, dass in den centralen Theilen der grossen Meere klastische Ablagerungen nicht stattfinden.

2. Ausscheidung der gelösten Stoffe.

Nachdem alle mechanisch suspendirten Materialien abgelagert sind, bleibt dem Wasser von den Stoffen, welche es den Gebirgen entführt hat, nichts übrig als die chemisch gelösten Substanzen. Sie finden verschiedene Verwendung. 1) Ein Theil wird schon durch Ueberspülung oder, im Unterlauf der Flüsse, durch Ueberschwemmungen dem Boden mitgetheilt, um von der Vegetation aufgenommen zu werden und später in veränderter Form nach den Flüssen zurückzukehren. 2) Ein anderer dringt mit den Sickerwässern in den Boden, und bewirkt dort chemische Umsetzungen und krystallinische Absätze (in Drusen, in den Blasen des Mandelsteins, auf Klüften und Spalten). 3) Noch ein anderer Theil findet eine besondere Verwendung in den Steppenbecken, indem durch die ununterbrochene Zufuhr die Lösung concentrirter wird, bis sich, wenn sie übersättigt ist, die Salze krystallinisch ausscheiden. 4) Der bei weitem grösste Theil wird dem Meere zugeführt. Das Wasser in diesem wird aber nicht concentrirter, da eine fortdauernde Ausscheidung von Stoffen einen gleichbleibenden Salzgehalt bewahrt. Die Ausscheidung ist theils krystallinisch und theils geschieht sie durch zoogene Bildungen, von denen zwei, die Korallenriffe und der Tiefseeschlamm, besonders in Betracht gezogen werden müssen. Die zu 1 und 2 gehörenden Prozesse sollen hier nicht näher erörtert werden.

Ausscheidungen aus Steppenseen. — Den Salzausbildungen der Steppen, den Salzkrusten welche die austrocknenden Seen umgeben, und den Salzmassen, welche zurückbleiben wenn das Wasser ganz verdunstet ist, hat man bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Da die gelösten Stoffe derselben Quelle (den zersetzten Gesteinen) entstammen, von der sie nach dem Meere gelangen, so sollten sie auch, mit kleinen, von der Art des vorherrschenden Gesteins der Umgebung abhängigen Unterschieden, jenen des Meeres ähnlich sein. Dennoch wird aus einigen ausgetrockneten Becken solcher Art kohlensaures Kali, aus anderen kohlensaures Natron, und noch aus anderen Steinsalz gewonnen. Nur eine grosse Reihe systematisch gesammelter Proben-

reihen, aus verschiedenen Becken, und ihre chemische Analyse werden, im Zusammenhang mit der Beobachtung der örtlichen Verhältnisse, über die Ursachen solcher Verschiedenheiten Licht zu verbreiten vermögen. Besonders wäre es von Interesse, festzusetzen, ob grosse Steinsalzlager in Becken entstehen können, die nie einen Zusammenhang mit dem Meere gehabt haben.

Ausscheidungen aus abgetrennten Meeresbecken; Bildung der Steinsalzlager. — Wenn eine Meeresbucht durch Hebung oder andere Ursachen zu einem Binnenmeer isolirt wird und die Verdunstung den Wasserzufluss übersteigt, so trocknet es aus, und die Salze schlagen sich krystallinisch nieder. Man nimmt an, dass die in verschiedenen Sedimentformationen eingeschlossenen grossen Steinsalzstöcke in dieser Weise entstanden sind, seitdem man beobachtet hat, dass sie aus den verschiedenen im Meere gelösten Substanzen zusammengesetzt sind, und dass diese nach dem Grad ihrer Löslichkeit angeordnet sind, so, dass Gyps und Anhydrit, welche am schwersten löslich sind, im Allgemeinen zu unterst liegen, dann das im Löslichkeitsgrad zunächst stehende Steinsalz folgt, und die am meisten löslichen Salze (wie schwefelsaures Kali, schwefelsaure Magnesia, Chlorkalium, Chlormagnesium und Chlorcalcium), welche zu den Mineralien Polyhalit, Kieserit, Carnallit und anderen zusammentreten, oben auf gelagert sind. Es wäre von Interesse, in den verschiedenen Salzwasserbecken der Aralokaspischen Senkung, in denjenigen Becken der Sahara welche Ueberreste einer vormaligen Meeresbedeckung sind, und wo immer Salzseen nachweisbar diese Entstehung haben, die Salzbildung an ihrem Grunde und die gegenwärtige Zusammensetzung der Mutterlauge kennen zu lernen. Auch die ausserhalb des Salzkörpers in den Becken niedergeschlagenen Sedimente sollten untersucht werden, um sie mit denen zu vergleichen, welche die Salzkörper einzuschliessen pflegen.

Eine wichtige Frage ist es, ob chemische Sedimente auch auf dem Boden des Meeres selbst sich niederschlagen. Insbesondere betrifft dies Gyps und Steinsalz. Der Beweis des theoretisch wahrscheinlichen Vorgangs kann nur durch Tiefseeproben geliefert werden.

Korallenriffe. — Die Art des Wachsens der Korallenriffe, eigentlich der Zoologie angehörig, ist zuerst durch Charles Darwin zu einem hervorragenden Gegenstand geologischer Forschung erhoben worden. Die Korallen tragen wesentlich bei, das Lösungsverhältniss einzelner Substanzen im Meereswasser im Gleichgewicht zu erhalten, indem sie dieselben in ihren kalkigen Absonderungen fortdauernd zur Ausscheidung bringen und feste Massen aus den von den Gebirgen durch Zersetzung entführten Substanzen aufbauen. Zugleich gestatten sie weittragende Schlüsse auf Vorgänge der Gegenwart und früherer Zeitalter der Erdgeschichte. Denn da die Thiere der riffbauenden Arten von Korallen nur bis zu einer bestimmten Wassertiefe, welche 200 Fuss wenig übersteigt, leben können, die Riffe aber von der Meeresfläche oft viele tausend Fuss hinabreichen, so bekundet sich in dem Aufbau derselben eine allmälige Senkung des Meeresbodens, wobei die Korallen durch Weiterbauen nach der Höhe sich stets in einem bestimmten Niveau im Verhältniss zur Meeresfläche erhielten. Die lebenden Korallenriffe sind auf die tropischen und einen Theil der subtropischen Meere beschränkt. Wer diese bereist, sollte jenen seine Aufmerksamkeit zuwenden, und wer dies mit Erfolg thun will, die darauf bezüglichen Werke von Darwin und Dana als unentbehrliche Anleitungsbücher mit sich führen. Man wird leicht finden, ob man es mit Küstenriffen, Dammriffen oder Lagunenriffen (s. Hochst. S. 204), zu thun hat. Die Arten der Korallen sollten sorgsam studirt und

gesammelt, und die Rolle untersucht werden, welche jeder einzelnen, betreffs ihres Antheils am Riffbau und der Formen welche sie hervorbringt, zukommt*). Nicht minder genau sollte die artenreiche Fauna der auf den Korallen weidenden Schalthiere, Echinodermen, Würmer, Krebse, sowie der darauf wachsenden Schwämme untersucht werden, da man dadurch ein Verständniss für die mit den Riffen der Vorzeit zusammen vorkommenden Faunen gewinnen würde. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem sogenannten Korallensand geschenkt werden, welcher eine Zusammenhäufung kleiner Fragmente der Schalen von Thieren aus allen vorgenannten Klassen ist. Die Brandung wirft die Gehäuse der abgestorbenen Thiere Millionen Male heftig durcheinander und zerschlägt sie an dem rauhen Geäst der Korallenstöcke, bricht dabei Theile von diesen ab, und zerschellt auch sie, bis endlich die Trümmernmassen auf der Leeseite der Riffe, in den Zwischenräumen zwischen den Korallenstöcken, oder an weiter ab gelegenen Stellen des Meeresgrundes zur Ruhe kommen. Der Unterschied des Charakters der Riffe auf der Seite an welcher die Brandung anschlägt, und auf der entgegengesetzten, an der Grenze des ruhigen Wassers, sollte besonders beachtet, und ebenso an der Oberfläche wie mit dem Senkblei in der Tiefe untersucht werden. Bei Küstenriffen und Dammriffen ist auch der Antheil zu beobachten, den der Korallensand an den Küstengebilden nimmt; denn der grösste Theil desselben wird vom Riff hinweggespült, und der Raum zwischen Riff und Land sollte in der Tiefe ganz und gar damit ausgefüllt sein, wie auch das Innere der ringförmigen Atolle daraus besteht. Wie fällt das Riff nach der inneren Seite ab? steil, oder allmählig, oder in Terrassen? Kann die Ueberführung eines Theiles des lebenden Riffs mit einer durch eine besonders grosse Fluth herangeschwemmten Schicht von Korallensand die daselbst bauenden Korallen tödten und das Wachsthum unterbrechen? Kann man dadurch das innere Abfallen in Terrassen, wie es zuweilen beobachtet worden ist, erklären? Umschliesst der Korallensand an der Leeseite auch die unzerbrochenen Gehäuse von Schnecken und anderen Thieren? Siedeln sich auf ihnen auch noch Korallenstöcke an?

---

*) Darwin giebt selbst folgende Regeln: „Der wichtigste Gegenstand bei Untersuchung von Korallenriffen besteht darin, bis zu welcher Tiefe der Meeresboden ausserhalb des Riffes mit einem zusammenhängenden Lager lebender Korallen bedeckt ist. Man kann dies durch wiederholte Sondirungen mit einem schweren und sehr breiten glockenförmigen Senkblei thun, das unten mit einer Lage von Talg versehen ist. Es wird kleine Theile der Korallen abbrechen, oder genaue Eindrücke von ihnen erhalten, und man kann daraus ersehen, wo die Bedeckung des Seegrundes mit Sand beginnt. Diese Tiefengrenze sollte in verschiedenen Meeren, unter verschiedenen Breiten und unter verschiedenen Lagen festgestellt werden. Um die Korallen selbst zu sammeln, sollten Ketten und Haken angewendet werden. Man hat Grund zu vermuthen, dass verschiedene Arten von Korallen in verschiedenen Zonen und Tiefen leben, und man sollte daher bei dem Sammeln sorgfältig die Tiefe, von der jedes Stück stammt und in der die betreffende Art am häufigsten ist, notiren, ebenso, ob das Stück von dem ruhigen Wasser einer Lagune oder eines geschützten Canals oder von der ausgesetzten Aussenseite des Riffes kam. Die kleinen Riffe innerhalb der Lagune gewisser Atolle im Indischen Ocean kommen alle an die Oberfläche, während in anderen Atollen jedes Riff um mehrere Faden unterhalb der Oberfläche bleibt. Es wäre von Interesse, festzusetzen, ob die Korallen in beiden Fällen denselben Arten angehören, und wenn dies der Fall sein sollte, von welchem möglichen Umstand dieser eigenthümliche Unterschied im Betrag ihres Aufwärtswachsens abhängig gewesen sein mag. — Alle Thatssachen, welche über das Maass des Wachsthums der Korallen unter günstigen Umständen Aufschluss geben können, sind von Werth. Die Eingeborenen einzelner Koralleninseln könnten vielleicht darüber Auskunft geben, z. B. zu welcher Zeit ein seitdem von Korallen zugebauter Canal zum Zweck der Durchfahrt mit grossen Canoes ausgefurcht worden ist.

Auf der Windseite ist der Rand des Riffes, die Art wie die Korallen über ihn hinaus zu bauen streben, die Böschung des Abfalls, die Tiefe zu der das Riff hinabreicht, die Beschaffenheit des angrenzenden Seebodens, und die Entfernung, bis zu welcher die abgebrochenen Fragmente des Riffes auf dem Seegrund vertheilt werden, zu untersuchen. Wie ist z. B. der Boden zwischen zwei nahe zusammenliegenden Atolls beschaffen?

Von Wichtigkeit für die Geologie ist besonders die Untersuchung abgestorbener Korallenriffe, welche durch Hebung des Bodens entweder partiell über das Meer hervorragten, oder mit ihrer Unterlage trocken gelegt sind. Man wird sie nicht immer gleich erkennen, da sie sich von anderen Kalkriffen nicht wesentlich unterscheiden. Wo immer in tropischen Meeren eine Hebung in jüngster Zeit stattgefunden hat, sollte man in den Küstengebieten nach ihnen suchen, und hat man eine gefunden, welche den unzweifelhaften Beweis für die angegebene Art der Entstehung giebt, so wird es nicht schwer halten, noch andere aufzufinden. Es ist zunächst die Form zu beobachten. Ein Atoll wird sich als allseitig steiles Riff mit einer flach trichterförmigen Vertiefung auf der Höhe erweisen. Ein Dammriff wird der Meeresseite einen langgedehnten, mehrfach unterbrochenen Steilabfall zukehren, nach der Landseite aber allmählig abfallen, während ein Fransenriff (oder Küstenriff) nach der Seite der Gebirge hin ansteigen und gegen das Meer hin entweder plötzlich oder allmählig endigen, vielleicht auch bis unter dasselbe, nach solchen Stellen wo die Thiere noch fortbauen, sich erstrecken sollte. Am wichtigsten sind die beiden ersten Arten von Riffen, da sie mächtige Kalksteinmassen liefern und einen Anhalt zur Erklärung der Entstehung mancher mächtiger Kalksteinmassen in der Vorzeit geben können. Mit der grössten Sorgfalt sollte nun das Riff in allen Theilen beobachtet werden. Ist die Oberfläche eben oder senkt sie sich nach gewissen Richtungen? Finden sich auf ihr Anhäufungen, welche früher, wie bei den Laguneninseln, über das Meer aufragten? Ist die Fläche glatt oder mit Höckern besetzt? Ist in diesen noch Korallenstructur deutlich zu erkennen? Sie geht häufig verloren. Der Korallensand zwischen den Höckern ist fest cämentirt und lässt durch seine etwas dunklere Färbung die weissbleibende Masse der Korallenstöcke in ihren Umrissen deutlich erkennen. Wie ist der äussere Abfall des Riffes? Wahrscheinlich wird man ihn steil, vielleicht überhängend, zerfressen und höhlenreich finden, indem dort der Korallensand sich nicht ablagern konnte, oder, was davon vorhanden war, bei der Hebung des Riffes, durch die Brandung, welche nach und nach an alle Theile des Abfalls von der Höhe bis zur Tiefe anschlug, herausgeholt wurde und letzterer nur das Gebäude der unregelmässig aufeinander gesetzten und sich oft nur an einzelnen Stellen berührenden einzelnen Korallenstöcke darstellt. Jedes Riff ist von tiefen Spalten durchsetzt, welche bis auf den Boden reichen und ihren Ursprung in den Mündungen von Bächen hatten, die vom Lande herabkamen und die Ansiedlung von Korallen hinderten; nachher aber, als das Land sich tiefer senkte, blieben die Spalten bestehen, weil die Brandung hindurchschlug. Dort wird man daher ähnliche Formen wie an der Front finden. Auf der Landseite bieten sich der Beobachtung die mächtigen Ablagerungen von ehemaligem Korallensand dar, welche vollkommen geschichtet sind.

Alle bisherigen Beobachtungen an gehobenen Riffen haben gezeigt, dass die ganze Masse derselben in einen unvollkommen krystallinischen Zustand übergeführt wird und Schichtung annimmt. Der cämentirte Korallensand wird ein etwas lockerer, poröser, bräunlich gefärbter, der eigentliche Körper ein fester geschichteter Kalkstein von weisslicher Färbung, der sich zuweilen von

den Kalksteinen der älteren Formationen nicht unterscheiden lässt. Da man in der Regel lebende Korallen und jüngst gehobene, wenig über der Fluthhöhe befindliche Korallenbänke in der Nähe der gehobenen Riffe findet, so hat man Gelegenheit, die ganze Reihe von Uebergangsstufen von der frischen Koralle bis zu geschichtetem Kalkstein, in welchem nur noch hier und da die Form einer Koralle erkennbar ist, zu verfolgen und zu sammeln.

Es würde eine dankbare Aufgabe sein, bei einem gehobenen Damm- oder Wallriff die zwischen demselben und dem ansteigenden Bergland (dem früheren Festland) gelegenen Sedimente genau zu untersuchen, am besten in Erosionsschluchten. Diese Zwischenräume sind bei hohen Riffen sehr gross, da das Riff mauernartig aufwächst, das Land aber eine allmälige Abdachung hat. Es muss darin eine Vermischung der vom Land herbeigeführten klastischen Sedimente mit Korallensand stattfinden; und ist die Ablagerung stark genug, um mit der vielleicht sehr langsamen Senkung insoweit Schritt zu halten, dass die Wassertiefe noch die Ansiedlung von Korallenstöcken gestattet, so werden diese sporadisch aufwachsen, und ihre Entwicklung periodisch durch vermehrten Süsswasserandrang oder schlammige Niederschläge unterbrochen werden. Man darf daher erwarten, dass an solchen Stellen hin und wieder ein Verhältniss eintreten wird, welches abwechselnde Lagen von Schlamm und Kalk mit eingestreuten Korallenstöcken zeigen wird. Dies würde gewisse Gebilde der Vorzeit, die z. B. in der silurischen Formation vorkommen, befriedigend erklären. Man würde aber auch dadurch demonstrieren, wie verschieden die Gebilde sein können, welche sich gleichzeitig aus demselben Meere nebeneinander ablagern. Ein ähnlicher Fall würde sich bieten, wenn es gelänge, ein gehobenes Dammriff aufzufinden, das einer vulcanischen Insel vorliegt oder sie umzieht, und dessen Entstehung mit der Periode der vulcanischen Thätigkeit zusammenfiel. Wo sich eine solche Gelegenheit bietet, sollte sie der Reisende nicht unbenutzt lassen, um das Ineinandergreifen der riffbauenden und der vulcanischen Thätigkeit zu studiren. Könnte man einen in jugendlicher Zeit in der Nachbarschaft von Korallenriffen abgelagerten Wechsel von Tuffschichten, Korallensandschichten, Lavaströmen und einzelnen Korallenstöcken oder Korallenbänken beobachten, so würde ein streitiges Problem der Geologie von Südtirol, das anderwärts manches Analogon hat, endgültig gelöst sein.

Tiefseeschlamm. — Den Untersuchungen der Neuzeit ist die Kenntniss eines reichen organischen Lebens in den grössten Meerestiefen, das meist aus mikroskopischen, theils Kieselsäure und theils kohlensauren Kalk absondernden Thieren besteht, zu verdanken; es scheint den Schlüssel für die Entstehungsweise der über weite Länderstrecken gleichmässig ausgebreiteten Kalksteinschichten zu geben, und liefert den Beweis, dass sich z. B. gleichzeitig mit Korallenriffen und dicht neben ihnen Kalksteine ablagern können, welche sowohl von ihnen als von den Korallensand- und gemischten Sedimenten abweichen. Der Gesichtskreis geologischer Vorgänge hat sich dadurch ausserordentlich erweitert. Doch giebt es gegenwärtig noch manche schwierige Fragen, es würde aber zu weit führen diese hier auseinanderzusetzen. Der Reisende kann zu ihrer Lösung vorläufig nichts beitragen als: Sammeln recht zahlreicher und ausgiebiger Tiefseeproben.

Ablagerung durch Eis (Drift).

Ausser derjenigen Form der Ablagerung, welche ein Gletscher ausübt, indem er die auf seinem eigenen Rücken abwärts getragenen Schuttmassen

als Endmoräne vor sich herschiebt, oder beim Abschmelzen als erratische oder Wanderblöcke liegen lässt, wirkt das Eis ablagernd durch die in hohen Breiten in das Meer hinabtauchenden Gletscher, indem abgetrennte Theile derselben als Eisberge grosse Gesteinsmassen mit sich führen und beim Abschmelzen auf den Meeresgrund fallen lassen. Es kommen bei der Beobachtung dieser Erscheinungen verschiedene Gesichtspunkte in Betracht, und zwar: 1) der Herstattungsort der Gesteine. Die vom Eis entweder nur auf dem Festland oder durch das Meer transportirten Blöcke sind gewöhnlich nicht gerollt und finden sich als Fremdlinge in Gegenden, in deren geologischen Bau sie nicht passen. Lässt sich der Herstattungsort ausfindig machen, so erkennt man daraus den Weg des Gletschers oder die Richtung der Strömung, welche den Eisberg transportirt hat. — 2) Die horizontale Grenze der Vertheilung. Bei Gletschern lässt sich daraus erkennen, wie weit sie aus dem Innern des Gebirges in das Flachland hinaus sich verbreiteten, bei Eisbergen, die Küsten des Meeres in welchem der Transport stattfand, oder, wo das Meer offen war, die Grenze, bis zu welcher das Eis in der Richtung des wärmeren Klimas gelangen konnte. Die Grenzen der Driftablagerungen sind in Europa und in Theilen von Nordamerika gut bekannt, weniger genau im nördlichen Asien, und in Südamerika ist die Kenntniss von ihnen noch ganz ungenügend. — 3) Die verticale Verbreitung. Bei ehemaligen Gletschern lässt sich, theils an Stellen, wo sie einen in der Ebene gelegenen Berg einhüllten, oder sich gegen einen quer zur Bewegung gerichteten Hügel aufstauten, oder ein grosses Thal anfüllten, an den beim Abschmelzen liegen gebliebenen Blöcken die Höhe erkennen, bis zu welcher sie reichten. (Sie beträgt oft mehrere tausend Fuss.) Aber weit wichtiger ist dieser Gesichtspunkt bei der durch schwimmende Eisberge hervorgebrachten Drift, da ihre verticale Verbreitung zeigt, bis zu welcher Tiefe die jetzigen Continente zur Eiszeit in das Meer versenkt waren. — 4) Wirkungen des Drifteises. Die scheuernde Wirkung der mit Steinblöcken erfüllten Eisberge der Diluvialmeere giebt sich an Bergen zu erkennen, welche Untiefen in letzteren bildeten, oder an den Gehängen, gegen welche die Eisberge, in ähnlicher Weise wie jetzt an die flachen Böschungen der Newfoundland-Insel, getrieben wurden, und an denen sie sich mit Ebbe und Fluth abwärts und aufwärts bewegten, während auch die Brandung ein Oscilliren in geringeren Grenzen verursachte. Alle solche Erscheinungen, das Furchen der Berggipfel, das Scheuern der Gehänge, das verworrene Aufstauen von Thon oder Lehm u. s. w. sind ebenso zu beobachten, wie die gegenwärtigen Bewegungen gestrandeter Eisberge, und die Beschaffenheit des feineren und gröberen Materials, welches sie enthalten. — 5) Zusammensetzung der Drift. Ist die Ablagerung, welche die erratischen Blöcke führt, geschichtet oder ungeschichtet? oder wechseln geschichtete und ungeschichtete Massen? Sind die Blöcke, soweit sie nicht lose auf der Oberfläche zerstreut sind, an sandige oder thonige Ablagerungen gebunden? oder finden sie sich in beiden? Nehmen sie vielleicht je nach dem Charakter der Schicht eine andere Gestalt an? Kommen gerollte Stücke neben eckigen vor?*) Sind beide Formen von einander getrennt, und vielleicht die eine mehr an Sand, die andere an Thon gebunden? Wechseln mit den Driftschichten

*) Darwin macht darauf aufmerksam, dass das Packeis die von Wasser gerollten Geschiebe der Küsten und Flussmündungen einschliessen sollte, und rath, bei der Untersuchung der Einschlüsse das Packeis vom Gletschereis zu trennen. Beide würden, wenn die Vermuthung richtig ist, verschiedenartig geformtes Material zur Ablagerung bringen.

andere, in denen von Eis transportirte Blöcke nicht vorkommen? Oder lässt es sich schliessen, dass zwei Perioden der Driftablagerung durch eine Periode der Trockenlegung des betreffenden Landes durch Hebung aus dem Meere unterbrochen waren? — 6) Organische Reste in der Drift. Wenn schon die vorigen Fragen Aufschluss über die Geschichte der Eiszeit in jeder einzelnen Gegend zu geben bestimmt sind, so wird dieselbe sich noch viel klarer aus den organischen Resten, wenn sie vorkommen, entwickeln lassen, und es sollte auf sie die grösste Aufmerksamkeit verwendet werden. Es ist in neuerer Zeit ein besonders wichtiges Problem geworden, festzustellen, ob es auf der nördlichen Hemisphäre eine oder mehrere Eiszeiten gegeben hat, die durch Perioden des Vorrückens der Wärme nach dem Norden unterbrochen waren; ob die Eisperioden auf der südlichen Erdhälfte mit denen auf der nördlichen gleichzeitig waren oder, wie es wahrscheinlicher ist, alternirten; ob mit der Wärme zwischen der vorletzten und letzten Eiszeit des Nordens organische Wesen wärmerer Zonen, und unter ihnen der Mensch, nach Europa vordrangen, um dann während der letzten Eiszeit wieder zu verschwinden und nach ihr abermals vorzurücken; ob mit den Kälteperioden eine grössere Versenkung des Landes unter das Meer verbunden war als mit den Wärmeperioden. Diese und verwandte Fragen lassen sich nur durch die subtilsten Untersuchungen lösen, zu denen sich dem Reisenden nur in seltenen Fällen, wie bei einem längeren Aufenthalt in Patagonien oder Canada, oder anderen Ländern hoher Breiten, Gelegenheit bietet.

Ablagerungen in Höhlen.

Der ruhige Aufenthalt, welchen Höhlen den grösseren Säugethieren und dem Menschen in seinen frühen Entwicklungsstadien gewährten, giebt den Absätzen in ihnen eine besondere Wichtigkeit für das Studium des gleichzeitigen Bestehens gewisser Thierarten und des Menschen mit ihnen, aber nur wenn sie mit so viel Sorgfalt untersucht werden wie es z. B. neuerdings in England geschieht. Der eigentliche Reisende hat dazu keine Gelegenheit; aber sie dürfte sich zuweilen dem bieten, welcher längere Zeit in der Nähe von Höhlen wohnt, und es wäre von hohem Werth, zu den vielen jetzt in Europa erhaltenen wichtigen Resultaten solche aus anderen Erdtheilen hinzuzufügen. Die Ablagerungen in Höhlen bestehen im Wesentlichen aus Kies, Lehm und Stalagmit. Incrustationen des letzteren konnten sich nur in Zeiten der Ruhe bilden, während Kies darauf deutet, dass ein Fluss die Höhle durchströmte, wie es jetzt noch so häufig der Fall ist. Der Lehm zeigt ruhigeren Absatz an, ist aber vielleicht auch von aussen zugeführt worden. Die Thierreste sind zum Theil abgerollt und dann mit Sicherheit von aussen zugeführt, zum Theil deuten sie darauf, dass die Thiere an Ort und Stelle starben und incrustirt wurden. Producte menschlicher Kunst dürften stets als am Ursprungsort befindlich angenommen werden können. Mit grosser Vorsicht muss man die in einer bestimmten Lage, z. B. oberhalb oder unterhalb einer gewissen Stalagmitdecke befindlichen Reste sammeln, und wohl darauf achten, dass sie nicht mit anderen vermenget werden. Die Bestimmung der aufgefundenen Reste sollte nur den höchsten Autoritäten überlassen werden. Nur dann wird es möglich sein, festzusetzen, ob successiv verschiedene Faunen lebten und klimatische Aenderungen andeuten, und ob der Mensch mit gewissen Thieren, deren geologisches Alter von anderwärts bekannt ist, zusammen lebte; vielleicht auch, ob verschiedene Rassen nach einander in einer Gegend auftraten. In allen Gegenden, welche der Ursitz.

vieler Völker gewesen sind, versprechen derartige Untersuchungen grossen Erfolg.*)

Hebung und Senkung.

Seitdem es bekannt ist, dass keine der bisher genau untersuchten Küsten stationär bleibt, sondern jede durch die langsam aber stetig fortschreitende Aenderung, welche das Niveau des Landes im Verhältniss zu dem des Meeres erleidet, auf eine gegenwärtig stattfindende Hebung oder Senkung des Bodens schliessen lässt, sind die darauf bezüglichen Erscheinungen unter diejenigen gekommen, welchen der Reisende in hervorragendem Maasse seine Aufmerksamkeit zuzuwenden hat. Der Seefahrer, dessen Beobachtungsgebiet auf die Nähe der Küsten beschränkt ist, insbesondere derjenige welcher mit Küstenaufnahmen beschäftigt ist, hat reiche Gelegenheit zu derartigen Untersuchungen. Im Innern des Landes, je weiter man sich von der Küste entfernt, wachsen die Schwierigkeiten. Die Bezeichnungen „Hebung“ und „Senkung“ sind dabei nur relativ, im Verhältniss zu der scheinbar stationären Meeresfläche, aufzufassen; es kann, wo es sich um empirische Beobachtung handelt, nicht darauf ankommen, ob nicht beide Erscheinungen zum grösseren Theil auf allgemeine Senkung zurückzuführen sind, oder ob das Zurückziehen des Meeres von einem oder dem anderen Pol und seine Concentration nach dem entgegengesetzten hin auch eine Rolle spielt.

Die Hebung einer Küstengegend während der jüngstvergangenen Perioden ist am leichtesten festzusetzen. Denn wo immer das Land tiefer als jetzt in das Meer versenkt war, wird man in dem früheren Niveau der Brandung mehr oder weniger deutlich die Spuren aller Arten von zerstörender, und unterhalb derselben diejenigen der wiederaufbauenden Thätigkeit des Meeres finden. Klippige, durch einen ebenen Küstenstreif vom Meer getrennte Abfälle werden in der Regel auf Hebung deuten. Man hat dann die Felswände mit solchen zu vergleichen, an welche Brandung anschlägt. Noch sicherere Schlüsse erlaubt das Vorkommen der von Bohrmuscheln herührenden Löcher in festem Gestein, besonders wenn die Schalen noch darin sitzen, oder das Anheften von Austern, Balanen und anderen die Brandung liebenden Thieren. Wo man sie findet, sollte man die Spuren nach der Höhe so weit als möglich verfolgen, und besonders darauf achten, ob sie in horizontalen Streifen angeordnet sind. Findet man, besonders in klippigen mit Schwemmland angefüllten Buchten, alte Haken zum Befestigen von Schiffen angebracht, so rückt die Periode der Hebung mit Bestimmtheit in die Zeit des Menschen herab. Die Anwesenheit von Uferbauten, Ankern, im Sande vergrabenen Fahrzeugen u. s. w. sind ebenso directe Beweise für eine Hebung in jüngster Zeit. Einen anderen Anhalt geben die Uferwälle, welche das Meer aus Gesteinsblöcken, Kies, Sand, Muscheln und Tang zusammenspült und, indem es sie bei Hochfluth über den Bereich der gewöhnlichen Brandung bringt, der weiteren Zerstörung und Fortschaffung gegen die Tiefe entzieht. Man findet sie zuweilen auf sanft ansteigendem Boden in parallelen Reihen

*) Ein Gegenstand, welcher würdig wäre als besonderer Zielpunkt einer Reise zu dienen, wären die Höhlen von Yunnan, welche die erstaunlichen Mengen in chinesischen Apotheken verkäuflicher fossiler Zähne (bekannt als Drachenzähne) liefern. Ein längerer Aufenthalt daselbst würde sich ohne Schwierigkeit bewerkstelligen lassen, und nirgends sind so zahlreiche auf den besonderen Gegenstand eingübte Arbeiter zur Hand. — Neuere Gesichtspunkte vom höchsten Interesse würde die Untersuchung von Höhlen auf oceanischen Inseln bieten, da sich vielleicht Rückschlüsse auf ihre frühere Verbindung mit einem bestimmten Continent ergeben würden.

entlang der Küste angeordnet, manchmal bis weit in das Innere der Thäler hinauf. Grosse Vorsicht ist dort nothwendig, wo man Küstenebenen mit Resten derselben Schalthiere, welche jetzt im angrenzenden Meere leben, bedeckt sieht. Denn die Bewohner führen dieselben als Dünger auf die Felder, und von den Gehäusen der Muscheln und Schnecken, welche ihnen zur Nahrung dienen, bilden sich oft unglaublich grosse Ansammlungen. In jedem Fall kann daher erst das Vorkommen unterhalb der Ackerkrume maassgebend sein. Andere Anzeichen von Hebung sind: das Aufragen von Klippen, die früher vom Wasser bedeckt waren; das Seichterwerden des Meeresgrundes an Stellen wo keine bedeutende Ablagerung von Material stattfindet, wie man dies an vielen ehemals guten und jetzt nicht mehr brauchbaren Häfen beobachtet; die Ueberlieferung, dass eine Stadt, die früher am Meer gelegen war und durch Handel und Schifffahrt blühte, jetzt weit landeinwärts, vom Meere entfernt liegt und ihre Bedeutung für den Handel verloren hat; die Erzählungen der Strandbewohner, dass auf demselben Grund, wo sie jetzt ihre Felder und Wiesen bewirthschaften, ihre Väter in Booten gefahren sind und gefischt haben. Durch sorgfältige Ansammlung solcher historischer Daten sollte man versuchen, den Betrag der Hebung in einer bestimmten Zeitperiode, z. B. im Lauf eines Jahrhunderts, festzustellen. — In tropischen und subtropischen Gegenden geben trocken gelegte Korallenriffe den aller sichersten und leichtesten Anhalt. Jeder ansitzende Korallenstock über dem Bereich der Fluth ist Beweis der geschehenen Hebung, und an Riffen kann man oft erkennen, dass sie Hunderte von Fussen betragen hat. Besonders aber geben sie einen Anhalt zur Beobachtung des Wechsels von Hebung und Senkung, indem das Riff selbst Senkung bekundet, seine Trockenlegung Hebung erweist, und andere Vorgänge vielleicht darauf hindeuten, dass jetzt wieder eine Senkung der Küste stattfindet.

Die absoluten Beweise für die Senkung einer Küstengegend zu finden ist weit schwieriger, da in diesem Fall das Meer die Spuren seiner eigenen Thätigkeit verhüllt. Das Tieferwerden des Meeresgrundes in felsigen Buchten, das historisch nachgewiesene Vordringen desselben in das Land, das Verschlingen ganzer Städte und Dörfer und Ueberfluthen blühender Landstriche durch das Meer, an Stellen wo die Brandung allein eine solche Wirkung nicht auszuüben vermag, das Versinken von Wäldern, und andere derartige Erscheinungen, sind directe Beweise der Senkung. Nicht minder findet man sie bei Ausgrabungen welche bis unter das Meeresniveau hinabreichen. Bei der Anlage von Brunnen z. B. erschliesst man im Schwemmland Ueberreste menschlicher Kunst in Töpferarbeiten, Steingeräthschaften, Wohnhäusern, sowie Anzeichen ehemaliger Wälder und Torfmoore. Ausser diesen von glücklichen Zufällen abhängigen Beweisen kann der Beobachter noch andere auf dem Wege indirecter Schlussfolgerung ableiten. So z. B. liegen an der südlichen Hälfte der Küste von China, welche dort felsig und gebirgig ist, allen Flussmündungen Schlammبانke vor, welche genau im Niveau der Fluth stehen, und aus denen die Felsberge unvermittelt ansteigen. Wenn die geringste Hebung stattfände, so würden dieselben in Küstenebenen verwandelt, und selbst bei vollkommenem Stillstand zum Theil trocken gelegt werden. Nur wenn Senkung stattfindet, ist es denkbar, dass durch Absatz von neuem Material jede Schlammbank genau im Niveau der Fluth erhalten wird. Der Beweis, welchen die Erscheinung für eine fortdauernde Senkung der Küste giebt, wird durch die Resultate der Brunnengrabungen in dem weiter landeinwärts gelegenen Schwemmland der Flüsse bestätigt. Umgekehrt sind im nördlichen China die ausgedehnten submarinen Sediment-Ablagerungen an

den Mündungen der grossen Flüsse zu einer weiten, den Gebirgen vorliegenden Ebene verwandelt worden, und noch jetzt schreitet die Hebung fort, die dies veranlasste. Aehnliche Argumente werden sich gewiss in vielen anderen Ländern finden lassen.

Der Nachweis oscillirender Bewegungen in Küstenländern, wie ihn zuerst Lyell für den Tempel von Puzzuoli gab, verlangt genauere und scharfsinnigere Beobachtung. Es wurde bereits (S. 268) auf das Phänomen in vulcanischen Ländern hingewiesen. Korallenriffe werden hier einen gewichtigen Anhalt geben. Am leichtesten ist die Thatsache einer früheren Versenkung und darauf erfolgten Hebung zu constatiren. Wenn z. B. ein im Niveau des Meeres oder über demselben befindliches Torflager, oder die sicheren Ueberreste menschlicher Existenz von einer mehrere hundert Fuss mächtigen jugendlichen Schichtenablagerung bedeckt sind, so ist dies ein sicherer Beweis, dass das ehemalige Festland mindestens um diesen Betrag unter die Oberfläche des Meeres versenkt wurde und sich wieder gehoben hat.

Wo ein Hebungsfeld und ein Senkungsfeld sich berühren, wird Stillstand herrschen, und wahrscheinlich können stationäre Zonen von langem Bestand sein. Man muss dies z. B. annehmen, wo eine der auf S. 290 beschriebenen Küstenplattformen eine grosse horizontale Ausdehnung hat. Denn die Abwaschung geschieht nur im Niveau der mittleren Brandung. Ist die Plattform gegen das offene Meer geneigt, so deutet dies eine Senkung an.

Die Hebung oder Senkung des Bodens im Innern der Continente wird sich durch genaue Nivellirungen, die in längeren Zeiträumen wiederholt werden, nachweisen lassen. Weit mehr kommt es hier darauf an, die örtlichen Verschiedenheiten im Betrag der verticalen Bewegung festzusetzen, und dafür giebt es auch mehr und directere Anhaltspunkte. Es ist von besonderem Interesse, zu erweisen, ob Gebirge noch jetzt in Hebung begriffen sind, und ob, wie es in ihrer Vorzeit der Fall war, die axialen Theile sich in stärkerem Maass heben als die Flanken. Wo Gebirge in der Nähe einer Küste liegen, lässt sich dies zuweilen durch das Ansteigen alter Küstenwille gegen das Innere der Thäler nachweisen. Doch kann man auch zu Schlussfolgerungen durch die Beobachtung der Veränderungen im Gefäll der vom Gebirge herabströmenden Gewässer gelangen.*) Wird eine Seite eines Parallelthales stärker gehoben als die andere, so wird der dasselbe durchströmende Fluss allmählig nach der weniger gehobenen Seite hin wandern, oder, wenn er es vermag, sein Bett seitlich überschreiten und einen anderen Lauf nehmen. Wird der obere Theil eines Stromlaufes stärker gehoben als der untere, so wird das Gefäll vermehrt, der Fluss schneidet tiefer ein, es bilden sich hohe Uferbänke. Wo diese nicht von einer alten Seeaussfüllung herrühren, sondern in einer, von zwei Gebirgsarmen eingeschlossenen aber nach vorn weit geöffneten Bucht vorkommen und grössere Höhe erreichen,

*) So ist z. B. an der Sierra Nevada in Californien, welche jetzt von dem nur wenige Fuss über dem Meeresniveau liegenden Schwemmland zu Kammhöhen von 6 bis 10000 Fuss ansteigt, deutlich wahrzunehmen, dass sie früher ein Hügelland war, in welchem an der Westseite, in Thälern, welche dem jetzigen Kamm des Gebirges parallel gerichtet waren, grosse Flüsse strömten. Ihre Betten mit der ganzen Schotterablagerung sind wohl erhalten und die Hauptlagerstätten des Californischen Goldes geblieben. Als dann die Axe des Gebirges allmählig höher anstieg, trat das Wasser aus den Strömen an deren Westseite über und floss seitlich hinab, erst an einer, dann nach und nach an mehr Stellen. Endlich bildete sich ein System von Querschluften aus, welche die Betten der früheren Parallelströme rechtwinklig durchschneiden und dem Goldgräber zugänglich machen. Allerdings bietet sich selten Gelegenheit, eine derartige Erscheinung mit solcher Sicherheit zu beobachten wie in dem erwähnten Fall.

wird man deshalb auf eine Hebung ihres oberen Theiles schliessen müssen. Wo solche Terrassen sich (wie z. B. westlich von Yedo) von einer Höhe von mehr als 100 Fuss abstufen, wird man eine lang andauernde und beträchtliche Hebung anzunehmen haben. Senkt sich hingegen der obere Theil eines Flusslaufes gegen den unteren, so wird der bei der Seebildung (S. 292) erwähnte Fall eintreten, dass das Wasser aufgestaut wird. Das Land am Fuss des Gebirges wird leicht Ueberschwemmungen ausgesetzt sein, sumpfigen Charakter annehmen und je nach der Menge disponibler Sedimente ebenso gleichmässig erhöht werden als es sich senkt, oder mit flachen Seen bedeckt werden. Wo immer das Schwemmland mit horizontaler Oberfläche und unvermittelt an den Fuss eines Gebirges heranreicht, kann man annehmen, dass seine Ablagerung Senkung bekundet, und es bleibt dann nur zu beobachten, ob nicht das ganze Land nachher noch gehoben worden ist.

Es konnten hier nur einige allgemeine Winke für die Beobachtungen über Hebung und Senkung gegeben werden. Der Gegenstand gehört zu den anziehendsten und wichtigsten, die sich der Reisende, auch ohne geologische Vorbildung, als Ziel seiner Arbeiten setzen kann. Durch diese langsamen aber stetigen Vorgänge wurden erst in den jüngsten Zeiten der Erdgeschichte die wichtigsten Stätten der menschlichen Cultur über den Ocean gehoben, und wahrscheinlich gleichbegünstigte Landstriche unter ihn versenkt, Continente mit einander verbunden oder in Inseln aufgelöst (ostindischer Archipel), oder vielleicht auch ganz vom Meer überfluthet (Lemuria); es wurden klimatische Aenderungen hervorgerufen, weit über den Kreis des gehobenen oder versenkten Landstriches hinaus, Meeresströmungen abgeleitet, die Verbreitung organischer Wesen in bestimmte Richtungen geführt, das Aussterben einzelner Geschlechter, die Variation anderer verursacht.

In nahem Zusammenhang mit den säcularen Hebungen und Senkungen stehen diejenigen Bewegungen der Erdkruste, welche zu der Emporhebung und Zusammenfaltung von Gebirgen und überhaupt den schnellen Uebergängen in den Unebenheiten des Erdbodens Veranlassung gegeben haben. In welcher Art die diesen zu Grunde liegenden Kräfte wirken, darüber sind Aufschlüsse nur durch die genaueste Beobachtung der Erscheinungen der Erdbeben zu erwarten, welche den Gegenstand des nächsten Abschnittes bilden.

Erdbebenkunde.

Von

K. von Seebach.

I. Einleitendes.

Praktische Bedeutung. Die Erdbeben stellen das grossartigste und verheerendste Phänomen dar, welches unser Planet kennt. Tausende und abertausende von Menschen sind häufig genug in wenigen Secunden durch ein Erdbeben getödtet worden. So soll beispielsweise nach den am meisten verbreiteten Angaben das Erdbeben von Lissabon am 1. November 1855 60,000 Menschenleben gefordert haben. Das Erdbeben von Calabrien im Jahre 1783 tödtete über 30,000, das von Riobomba am 4. Februar 1797 über 30,000, und dasjenige, welches am 16. August 1868 Equador erschütterte, gegen 30,000.

Ueberall und zu allen Zeiten. Erdbeben haben in allen Zeitabschnitten, in allen Jahrhunderten, in allen Jahres- und Tageszeiten stattgefunden (Mallet. Report. Brit. assoc. adv. sc. for 1850 p. 25 No. 2). Wenn man Nachricht von dem täglichen Zustande der gesammten Erdoberfläche haben könnte, würde man sich wahrscheinlich davon überzeugen, dass fast immerdar an irgend einem Punkte diese Oberfläche erbebt (Humboldt Kosmos I p. 218).

Sie sind in allen Theilen der Erdoberfläche auf dem Festlande, wie auf dem Oceane beobachtet worden. Sie finden sich in Gegenden von der allerverschiedensten geologischen Zusammensetzung und Struktur: in dem vulcanreichen tropischen Amerika wie in dem vulcanfreien Skandinavien, in den Felsengebirgen der Alpen, wie in dem Schwemmland der norddeutschen Tiefebene.

Auf jeder Reise, in welche Gegenden sie auch gerichtet sein möge, liegt daher die Möglichkeit und oftmals die Wahrscheinlichkeit vor, mit diesem merkwürdigen Phänomen bekannt zu werden.

Nachrichten über frühere Erdbeben. Aber auch wenn der Reisende nicht selbst ein Erdbeben erlebt, so empfiehlt es sich doch immer, in den Archiven, libros de cabildo, in den Kirchenbüchern und Familienchroniken früheren Erdbeben nachzuforschen, um durch neue, zuvor ungedruckte Nachweise die bereits vorliegenden und mit so erstaunlichem Fleisse zusammengestellten Erdbebenchroniken (K. E. A. v. Hoff, Geschichte d.

natürl. Veränderungen der Erdoberfläche, Bd. IV u. V, 1840 u. 41, reicht bis 1805 und von 1821 bis 32; British Association earthquake-catalogue by R. Mallet 1851 u. 1854, reicht bis 1843; für die Zeit seit 1843 nach Ländern geordnet die bewundernswerth sorgsam Zusammenstellungen A. Perrey's in verschiedenen Sammelchriften) zu bestätigen und zu ergänzen.

Kritik der Quellen. Selbstverständlich wird man aber bei der Benutzung von Nachrichten über Erdbeben, mögen dieselben aus älteren Zeiten überliefert sein oder von Zeitgenossen mündlich oder schriftlich mitgetheilt werden, stets die grösste Vorsicht und strengste Kritik anwenden müssen. „Es liegt in der Natur der Sache, dass die Beobachtungen über ein so überraschend eintretendes Phänomen nicht alle von gleichem Werthe und gleicher Glaubwürdigkeit sein können, da sich sehr leicht Täuschungen und vorgefasste Meinungen einmischen, abgesehen von ganz absichtslos ungenauen Mittheilungen, welche ebenso unterlaufen und deren Quelle bald in leichtfertiger Auffassung und bald in der mangelhaften Darstellung liegen kann. Die Materialien können daher nur mit besonderer Kritik benutzt werden, und es ist auf alle diejenigen Angaben keine Rücksicht zu nehmen, welche irgend den Charakter der Unrichtigkeit, des Irrthums und der Unwahrscheinlichkeit an sich tragen. Die Probe der Wahrscheinlichkeit ist allerdings nicht immer ganz leicht; sie ergiebt sich aber noch oft aus der Vergleichung mit den Umständen, welche an vielen benachbarten Oertlichkeiten beobachtet worden sind“ (Nöggerath, D. Erdbeben v. 29. Juli 1846 p. 2).

II. Thatsächliches.

Diagnose. Erdbeben nennt man jede vorübergehende Bewegung des Erdbodens, deren Ursache eine natürliche und unter der Erdoberfläche gelegene ist.

Form. Diese Bewegung kann bald nur ein kurzes Erzittern sein, welches den in Gebäuden befindlichen Personen den nämlichen Eindruck zurücklässt wie bei dem raschen Vorüberfahren eines stark beladenen Wagens oder bei dem heftigen Zuschlagen einer schweren Thüre oder auch bei dem Fallenlassen eines sehr grossen Gewichtes im Keller oder auf dem Boden: Tassen und Teller klirren gegen einander, Klingeln läuten, Bilder pendeln, kleine Gegenstände werden verschoben, Pendeluhrn bleiben stehen etc. Bald ist die Bewegung eine bedeutendere, die Bäume, Thürme und Häuser sichtbar hin- und herschwanken macht, Essenköpfe herabstürzt, in Mauern kleine Spalten öffnet, Gegenstände von geringerem Gewichte umstürzt und fortgeschleudert. Bei noch stärkerer Bewegung stürzen dann die Thürme und andere höhere Baulichkeiten ein; die Mauern von Gebäuden bersten weit auf und stürzen ein, und auch schwere Gegenstände werden umgestürzt und fortgeschleudert. Endlich kann das Erdbeben jene furchtbare Intensität erreichen, durch welche der feste Erdboden bewegt wird wie ein wild erregtes Meer, ganze Städte werden in wenigen Secunden in Trümmerhaufen verwandelt, mächtige Erdspalten öffnen und schliessen sich, weit genug, um ganze Häuser mit ihren Einwohnern — nur in seltensten Fällen unbeschädigt und lebendig — zu begraben.

Die Bewegung eines Erdbebens kann sich von dem Festland aus auch auf alle Wasserflächen und in das Meer hinaus erstrecken und ungewöhnliche Wellen erzeugen, die in diesem schon über tausende von Meilen ver-

breitet beobachtet worden sind. Endlich können Erdbeben auch direct den Boden des Oceans erschüttern und durch die Uebertragung dieser Bewegung auf die überlagernde Wassersäule wahre Seebeben verursachen. (Vgl. unten S. 327.)

Ausdehnung. Der von einem Erdbeben bewegte Theil der Erdoberfläche kann bald nur einen sehr geringen Raum einnehmen, bald tausende von Quadratmeilen erreichen, und soll bei dem Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755 sogar $\frac{1}{3}$ der ganzen Erdoberfläche 700,000 geographische Quadratmeilen betragen haben. Die Form des erschütterten Gebietes lässt sich in den meisten Fällen mit einem Kreise oder einer Ellipse vergleichen, seltener stellt dieselbe einen lang gezogenen schmalen Gürtel dar. Jedoch kommen nicht nur bedeutende Unregelmässigkeiten in dem Verlaufe der Grenze des erschütterten Gebietes vor, sondern es finden sich auch innerhalb des erschütterten Gebietes einzelne Punkte, welche nicht bewegt worden sind. Die Bewegung pflegt an der Grenze des Verbreitungsbezirkes am geringsten zu sein und wächst von da ab nach dem Innern zu. Doch kommen auch hierbei die mannichfachsten Unregelmässigkeiten vor.

Modalität. Die Bodenbewegung besteht, wie schon der Name Erdbeben andeutet, stets aus einer Reihe in rascher Aufeinanderfolge sich wiederholender Erschütterungen, die in weitaus den meisten Fällen unmittelbar als ein wellenförmiges Hin- und Her- und Auf- und Abschwanken erkannt werden können. Weit seltener erscheint dieselbe glücklicher Weise als eine stossende oder endlich gar als eine schussartig schleudernde. Nur bei ganz unbedeutenden Erschütterungen erscheint die wellenförmige Bewegung als ein gleichmässiges Erzittern, in der Regel zeichnen sich dagegen in derselben eine oder mehrere stärkere Schwankungen aus, die dann meist als einzelne Erdstösse bezeichnet werden.

Die Richtung der Bodenbewegung ist eine wesentlich geradlinige. Auch die Thatsachen, aus welchen man früher auf eine wirbelnde oder drehende Bewegung („moto vorticoso“, „oscillation tournante“) geschlossen hatte, müssen auf eine geradlinige Erschütterung zurückgeführt werden und lassen sich sehr einfach und naturgemäss aus einer solchen ableiten. (Siehe unten S. 325.)

Schallphänomen. Viele Erdbeben werden von einem besonderen Schallphänomen begleitet, welches am gewöhnlichsten mit einem entfernten Donnern oder auch wohl mit dem rasselnden Dröhnen verglichen wird, welches ein rasch über das Pflaster fahrender, schwer beladener Wagen erzeugt. Dieses Schallphänomen wird oftmals direct als ein unterirdisches erkannt. Im Freien befindliche Personen geben dasselbe dagegen auch wohl als ein aus der Luft kommendes starkes Brausen an. Das Schallphänomen kann gleichzeitig mit der Bodenbewegung eintreten oder derselben kurz vorausgehen oder ihr nachfolgen, oder alles dreies zugleich. Die Stärke des Schallphänomens entspricht nicht der Stärke, mit welcher die Bodenbewegung empfunden wird, und es sind daher ebensowohl starke Erdbeben ohne jedes Schallphänomen, als auch starkes unterirdisches Donnern ohne jede Bodenerschütterung beobachtet worden (Xuanaxuato, Anfang 1784, A. v. Humboldt Kosmos IV S. 226).

Spaltenbildung, Erdschlipfe, dauernde Niveauveränderungen. Erdbeben erzeugen zuweilen Spalten in der festen Erdkruste. Die Mehrzahl derselben ist bisher in lockerem Materiale beobachtet worden längs steiler Flusseinschnitte etc., verbunden mit Erdschlipfen. Bei ihrem Aufbersten entströmen denselben mächtige Staubwolken, Sand, Wasser oder breiiger

Schlamm, wie die berühmte brennbare Moya bei dem Erdbeben von Riobamba am 4. Februar 1797, welche in kegelförmigen Hügeln über den Spalten emporquoll und weiterfliessend Häuser begrub und zerstörte (vgl. A. v. Humboldt, z. B. Kosmos Bd. V S. 33 u. f.). Auch Dampf soll ihnen entströmen. Wenn hingegen auch Rauch- und Feuerexhalationen berichtet werden, so bedürfen diese doch noch sehr der Bestätigung. Wahrscheinlich beruhen sie nur auf irrigen Wahrnehmungen und übertriebenen Angaben.

Weit seltener als diese im Grossen und Ganzen doch immer linearen und in gleicher Richtung verlaufenden Spalten sind die radial stehenden, die dann zu den kreisförmig eingesenkten Trichtern mit kurzen Radialspalten in den Rändern hinüberführen (Calabria 1783). Es sind offenbar nur durch das Erdbeben veranlasste Erdfälle über unterirdischen Hohlräumen und Spalten.

Die Längsspalten lassen oftmals deutlich erkennen, dass ihre Bildung zugleich Verwerfung erzeugte, das heisst also: dass von den beiden ursprünglich in einem Niveau gelegenen Rändern durch das Erdbeben der eine oder beide in ein anderes Niveau bewegt worden sind. Dies führt hinüber zu den Fällen, in denen durch Erdbeben grössere Niveauperänderungen veranlasst worden sind, wie in Cutch am 16. Juni 1819 und in Chile 1822 etc. Sie werden natürlich am ehesten an den Ufern des Meeres, von Seen und grossen Flüssen bemerklich werden.

Auch in den Fällen, in denen an der Erdoberfläche noch keine Spaltenbildung zu erkennen ist, lassen doch zuweilen noch die veränderten Quellläufe: das Versiechen mancher Brunnen, während andere reichlicher fliessen, die verschiebende, vorhandene Spalten bald erweiternde, bald verengernde und wohl auch neu bildende Kraft des Erdbebens erkennen. Die Temperatur von Thermen wird durch Erdbeben bisweilen vorübergehend oder auch wohl dauernd alterirt. Durch entstandene Spalten und Erdschlipfe werden dann weiter auch wohl Aufstauungen von Flüssen und ganz veränderte Flussläufe veranlasst. Ueber die Wirkung der Erdbeben im Meere, d. i. also über die sogenannten Seebeben siehe unten S. 327.

Angenommener Zusammenhang mit Zuständen der Atmosphäre. Eine Einwirkung oder doch wenigstens ein Zusammenhang der Erdbeben mit dem Zustand der Atmosphäre gehört zu den weit verbreiteten und tief eingewurzelten Annahmen, hat sich aber nichts desto weniger wissenschaftlich bis jetzt noch nicht nachweisen oder begründen lassen. Der regelmässige Gang des Barometers in den Tropen wird durch Erdbeben nicht gestört und auch in unseren Breiten sind dieselben bei allen Barometerständen und ebensowohl beim Steigen wie beim Fallen derselben beobachtet worden. Die noch immer auf manchen gewöhnlichen Barometern gegenüber von 27 Zoll angebrachte Angabe „Erdbeben“ ist daher eine absolut falsche und unsinnige. Ebensowenig hat sich nachweisen lassen, dass Erdbeben eine drückende Schwüle vorausgehe, oder dass dieselben von heftigen Windstössen begleitet werden. Die gelegentlich während Erdbeben beobachteten Störungen des Erdmagnetismus, der atmosphärischen Elektricität (Gewitter etc.) und andere meteorologische Phänomene müssen nach dem heutigen Stande unserer Kenntniss ebenfalls nur auf eine ganz zufällige Gleichzeitigkeit zurückgeführt werden.

Merkwürdig hartnäckig haftet im tropischen Amerika und auch anderen-orts noch der Glaube, dass Regen und besonders der Eintritt der Regenzeit in innigem Zusammenhange mit dem Erscheinen von Erdbeben stehe, und man wird die gewöhnliche Annahme, dass kurz nach Eintritt der Regenzeit

auch Erdbeben folgen, wenigstens in vulcanischen Gegenden wohl nicht so ohne Weiteres als eine ungereimte a priori verurtheilen dürfen.

Es führt dies hinüber zur Frage nach der Häufigkeit und Periodicität der Erdbeben.

Häufigkeit, Periodicität. Ein Erdbeben kann bald ganz isolirt und durch sehr lange Zwischenzeiten von allen anderen getrennt auftreten, bald wird ein stärkeres von schwächeren Stößen begleitet, bald können sich dieselben, meist eng begrenzt, zu wahren Erdbebenschwärmen häufen, wie z. B. jüngst die Hunderte von Erschütterungen bei Gross-Gerau (wesentlich vom 30. October 1869 bis Februar 1870. S. Nöggerath: Verh. d. nat.-hist. Ver. f. Rheinl. u. Westf. 1870 S. 54 u. ff.). Dabei ist es kaum zulässig, anzunehmen, dass vulcanreiche Gegenden häufiger von Erdbeben heimgesucht werden als vulcanfreie. Schon Humboldt bemerkt ausdrücklich, dass er die hier der Kürze wegen als Erdbebenschwärme bezeichneten Erschütterungen nur fern von allen Vulkanen kenne. Auch sonst sind zahlreiche „habituelle Stossgebiete“ bekanntlich in vulcanfreien Regionen nachgewiesen.

Umgekehrt ist der ursachliche Zusammenhang zahlloser Erdbeben mit näheren vulcanischen Erscheinungen über jeden Zweifel sichergestellt.

Die Periodicität der Erdbeben ist einmal auf Jahreszeiten und das andere Mal auf Mondphasen bezogen worden. Ihre Erforschung setzt natürlich ausgedehnte Sammlungen voraus, wie sie v. Hoff, Merian, Volger, Mallet und A. Perrey angelegt haben. Es erscheint danach, als ob die Erdbeben im Winter und Herbste häufiger sind als im Frühjahr und Sommer. Nach A. Perrey sind Erdbeben häufiger zur Zeit der Syzygien, als zu der der Quadraturen, häufiger beim Perigäum als beim Apogäum des Mondes und an jedem Orte häufiger, wenn der Mond im Meridian steht.

Von diesen Erfahrungen bis zu der neuerdings von R. Falb wieder mit Eifer verfochtenen Theorie, nach welcher die Erdbeben nur als eine Fluthbewegung des gluthflüssigen Erdkerns aufzufassen sind, ist nur noch ein Schritt.

Offenbar ergeben aber alle derartigen Untersuchungen, auch wenn sie auf die fleissigsten Sammlungen sich stützen, doch immer nur unvollkommene Inductionen und der Versuch R. Falb's, ein grosses Erdbeben für Perú vorauszusagen, ist daher — wie bekannt — auch kläglich fehlgeschlagen und hat die Bewohner Limas nur in eine vergebliche Furcht und Aufregung versetzt.

Einwirkung auf Thiere. Dass endlich Erdbeben wie auf den Menschen, dessen Erdbebenfurcht mit der Zahl der erlebten Erschütterungen zu wachsen pflegt, auch auf Thiere einen furchtbaren Eindruck hervorbringen, ist nicht zu verwundern. Directe Beobachtungen haben gelehrt, dass die Wasserbewohner und die landbewohnenden Wirbelthiere gleichmässig durch dieselben erschreckt werden.

Von hohem Interesse ist aber die unbestreitbare Thatsache, die vielleicht noch zu wichtigen praktischen Folgen führen kann, dass manche Thiere schon vor dem Eintritt der von den Menschen empfundenen Erschütterungen in Aufregung gerathen, wie kaum zu bezweifeln ist, in Folge vorausgehender, unserer Wahrnehmung sich entziehender, schwacher Beben. Als solche werden erwähnt: Hunde, Schweine, Pferde und Maulthiere, Ziegen, Hühner, Krokodile, „Fische“.

III. Theoretisches.

Die soeben übersichtlich zusammengestellten Fundamentalerschütterungen von Erdbeben lassen sich übereinstimmend durch eine, erst in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts bestimmt formulierte Hypothese erklären, nach welcher ein Erdbeben nur der die Erdoberfläche erreichende Theil der Schwingungen ist, welche durch irgend einen bezw. mehrere Stöße irgendwo im Innern unserer Erde erzeugt und durch das elastische Medium der festen Erdkruste nach allen Richtungen fortgepflanzt werden.

Longitudinale Wellen. Die Bewegungen eines Erdbebens sind demnach ebenso wie die Schwingungen, welche den Schall erzeugen und von denen die Erdbeben so oft begleitet werden, longitudinale Wellen. Es ist dies eine Art der Bewegung, die man wohl mit derjenigen verglichen hat, welche in einer langen Reihe dicht hintereinander stehender Billardkugeln entsteht, wenn man auf die letzte derselben in der Richtung der Reihe einen kurzen Stoss ausübt. Jede Billardkugel stösst auf ihren Vordermann und setzt diesen in Bewegung, dann prallt sie von diesem ab, bewegt sich rückwärts und kehrt in ihre Ruhelage zurück. Im elastischen Körper tritt diese Rückkehr zur Ruhe, d. i. in die Gleichgewichtslage erst ein, nachdem jedes einzelne Theilchen wiederholt hin- und hergeschwungen. Wenn in elastischen Massen ein beliebiges kleines Partikelchen durch einen Stoss oder sonst irgendwie aus seiner Gleichgewichtslage entfernt wird, so führt es eine hin- und hergehende Schwingung aus, und indem es hierdurch auch seinen Nachbar aus der Gleichgewichtslage bringt, geräth auch dieser in eine Schwingung. Dadurch wird nun wiederum dessen Nachbar genöthigt, eine Schwingung auszuführen und so fort. Die aus solchen einzelnen Schwingungen bestehende Bewegung nennt man eine Wellenbewegung, und es sind die Wellen longitudinale, wenn, ähnlich wie bei dem eben gebrauchten Vergleich mit den Billardkugeln, die Richtung, in welcher die einzelnen Punkte schwingen, die nämliche ist, in welcher sich die Bewegung fortpflanzt. Wird nun innerhalb einer gleichartigen Masse irgend ein Punkt in Schwingung versetzt, so entsteht eine Bewegung, welche sich von dem Punkte des ersten Anstosses als dem Centrum nach allen Richtungen hin fortpflanzt. Bei dieser Fortpflanzung ist nun wohl zu unterscheiden die Geschwindigkeit, mit welcher die Bewegung fortschreitet, und die Abnahme der Intensität bei dieser Verbreitung.

Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Die Geschwindigkeit der Fortpflanzung in einer gleichartigen Masse ist unabhängig von der Stärke des ersten Anstosses und der Geschwindigkeit der einzelnen Schwingungen. Sie wird vielmehr allein bestimmt durch die Elasticität und die Dichtigkeit der gleichartigen Masse, welche in Bewegung versetzt wird. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit (c) ist der Quadratwurzel der Elasticität der gleichartigen Masse (e) direct, derjenigen der Dichte (d) umgekehrt proportional

$$c = \sqrt{\frac{e}{d}}.$$

Störungen. Bestände die Erde daher aus einer gleichartigen Masse, so müssten auch alle Erdbeben gleiche Fortpflanzungsgeschwindigkeiten haben. Dies ist aber nicht der Fall. Die Erde besteht aus verschiedenartigen Massen. Aber auch eine indirecte Berechnung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit nach der eben angeführten Formel aus der im Cabinet zu bestimmenden Dichte und Elasticität der erschütterten Masse ist

unzulässig, da diese Methode vollkommene Elasticität des erschütterten Mediums voraussetzt. Diese aber besteht nicht. Denn, wie bekannt, werden alle Gesteine, aus denen unsere feste Erdkruste sich aufbaut, von zahllosen Spalten, Fugen und Klüften durchzogen, durch welche nothwendig eine Verzögerung der Geschwindigkeit bewirkt wird. In der That hat R. Mallet durch directe, im Grossen und Freien ausgeführte Versuche die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Stosswellen gefunden in:

feuchtem Sand	251,5 m.
zerklüftetem Granit	398 "
festerem Granit	507,5 "
starkgefaltetem Schiefer	331,5 "

in der Sekunde.

Diese Werthe bleiben ausserordentlich weit zurück hinter denen, die man nach einer theoretischen Berechnung, z. B. aus dem an einem Granitwürfel angestellten Versuche erwarten sollte; keiner derselben erreicht auch nur annähernd die Geschwindigkeit, mit welcher sich der Schall im Wasser fortpflanzt (1437 m. in der Sekunde), sondern sie stehen vielmehr noch näher der geringen Geschwindigkeit, mit welcher der Schall von der Luft fortpflanzt wird (bei 0° 337 Meter in der Sekunde). Dabei fand Mallet gleichzeitig, dass in Folge dieses Mangels vollkommener Elasticität die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in diesem Falle auch nicht völlig unabhängig von der Intensität des ersten Anstosses ist. Denn er fand in den quarzitäen Schiefen von Holyhead die Geschwindigkeit in der Sekunde bei einer Pulverladung von im Mittel

30,75 Ctr. = 331,5 m. (Mittel aus 4 Beobachtungen),

91,00 Ctr. = 412,0 m. (Mittel aus 2 Beobachtungen).

Hieraus ergibt sich unmittelbar, dass die Fortpflanzungsgeschwindigkeit sich nicht indirect theoretisch berechnen lässt, sondern in jedem einzelnen Falle direct zu ermitteln ist.

Fortpflanzung der Intensität. Die Gewalt aber, mit der ein Erdstoss empfunden wird, die Verheerungen, die er verursacht, sind nicht abhängig von der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellenbewegung, sondern von der Intensität des ersten Anstosses und den Gesetzen, nach denen diese sich fortpflanzt, oder was dasselbe ist, von der Maximalgeschwindigkeit des zuerst schwingenden Partikelchens und von dem Gesetze, nach dem diese mit der Entfernung vom Punkte des ersten Anstosses abnehmen muss. In einem vollkommen elastischen Körper soll diese Intensität und Maximalgeschwindigkeit des schwingenden kleinsten Theilchens abnehmen nach dem Quadrate der Entfernung von dem Punkte des ersten Anstosses.

Störungen. Da nun aber, wie schon oben erwähnt, die feste Erdkruste kein vollkommen elastisches Mittel ist, sondern vielmehr von zahlreichen Spalten in seiner Continuität unterbrochen wird, so muss hierdurch ein Verlust an lebendiger Kraft und somit auch eine raschere Abnahme in der Geschwindigkeit der schwingenden Theilchen eintreten.

Dagegen ist für die Fortpflanzung der Intensität (und für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit) der Wellenbewegung wohl zu berücksichtigen, dass die in der Physik geltenden Gesetze für die Fortpflanzung longitudinaler Wellen sich nur auf einen ersten Anstoss beziehen, welcher die Elasticitätsgrenze der bewegten gleichartigen Masse nicht übersteigt. Bei den Stössen aber, welche Erdbeben erzeugen, wird diese vielfach überschritten und wie die oft gebildeten Spalten lehren, die Festigkeit des bewegten Mittels überwunden. Ein so gewaltiger erster Anstoss wird der rascheren Dämpfung der

Intensität entgegenwirken und sie wiederum mehr oder minder zu vernichten vermögen.

Die zu lösende Aufgabe. Die genaue Ermittlung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit eines Erdbebens und des Maasses, nach welchem seine Stärke abnimmt, setzen aber nothwendig die Kenntniss des Ortes voraus, von welchem der erste Anstoss ausging. Die Feststellung dieses Ortes und besonders die Tiefe desselben unter der Erdoberfläche ist aber wenigstens vom geologischen Standpunkte aus bei Weitem die wichtigste Aufgabe bei der Untersuchung eines Erdbebens und eins der wichtigsten Probleme der dynamischen Geologie schlechthin.

Methoden zur Lösung der Aufgabe. Zur Feststellung desselben hat schon Hopkins*) eine Methode in Vorschlag gebracht, die aber, da sie allzu feine Beobachtungen voraussetzt, bis heutigen Tages noch nicht praktisch durchgeführt worden ist und auch wohl nicht so leicht werden wird.

Fig. 1.

Es sind bisher nur zwei Methoden in Vorschlag gebracht und praktisch durchgeführt worden. Zu ihrem leichteren Verständniss wird der nebenstehende Holzschnitt beitragen. Derselbe stellt das Stück eines Querschnittes der Erde durch seinen grössten Kreis dar. Der Querschnitt durch die Erd-

oberfläche erscheint, da diese für ein Erdbeben von geringeren Dimensionen als ebene Fläche angesehen werden kann, als eine gerade Horizontallinie. O sei der Ursprungsort oder das Centrum (Heerd, Focus) eines Erdstosses, YOA ist das Stück eines Erdradius, der durch O gelegt ist. Derselbe heisse die Erdbebenaxe. A ist der Punkt, in welchem die Erdbebenaxe die Erdoberfläche schneidet und der somit senkrecht über O liegt. Er heisst der Oberflächenmittelpunkt oder das Epicentrum. $OA = h$ ist daher die Tiefe des Centrums unter der Erdoberfläche. $M_1 M_2 M_3$ etc. seien von dem Erdbeben betroffene Orte auf der Erdoberfläche. Ihre Abstände von $O = OM_1, OM_2, OM_3$ etc. heissen ihre Centralabstände, ihre Abstände von $A = AM_1, AM_2, AM_3$ etc. ihre Axialabstände. Die Centralabstände OM_1, OM_2, OM_3 etc. sind die Radien (r_1, r_2, r_3 etc.), in denen die Wellenbewegung sich fortpflanzt und die einzelnen Theilchen schwingen, welche M_1, M_2, M_3 etc. erschüttern. Die Winkel AM_1O, AM_2O, AM_3O etc., unter welchen die Radien r_1, r_2, r_3 etc. den Horizont schneiden, sind die Emersionswinkel der Wellenbewegung für M_1, M_2, M_3 etc. Die Curve, welche die Orte gleichzeitiger Erschütterung verbindet, heisst Homoseiste, die Curve annähernd gleich starker Erschütterung aber Isoseiste.

R. Mallet's Verfahren. Die erste Methode ist nun die von R. Mallet in seinem bahnbrechenden Werke „The great Neapolitan earthquake of 1857 (London 1862, Chapman and Hall) begründete und durchgeführte Methode,

*) Report of the meeting of the British association for the advancement of science 1847 p. 83.

die sich auf die durch Erdbeben in Gebäuden erzeugten Spalten und auf umgestürzte oder fortgeschleuderte Gegenstände stützt.

Es liegt ihr die mit der Wahrheit nicht übereinstimmende, aber durch keine andere allgemeine Voraussetzung zu ersetzende Annahme zu Grunde, dass die Erde eine gleichartige Masse sei.

Spalten in Gebäuden. Wenden wir uns zunächst der Spaltenbildung zu. Nehmen wir der Einfachheit wegen den in Fig. 2 skizzirten Fall (subnormal Mallet), dass

Fig. 2.

zwei Seiten eines Gebäudes parallel r liegen, der Erdstoss also in der Richtung dieser Seiten das Gebäude trifft, jedoch nicht in der horizontalen, sondern mit einem gewissen Emersionswinkel. Es seien die parallel stehenden Seiten längere, die queren kürzere. In dem Momente, in welchem die Wellenbewegung das Gebäude erreicht, führen die kleinsten Theilchen erst eine Schwingung in der Richtung des Pfeils aus, dadurch wird, so zu sagen, der dem Stosse zugewendeten Quermauer der Boden unter den Füßen weggezogen, sie erhält durch ihre Trägheit einen Anstoss nach aussen, der Richtung des Erdstosses entgegen einzustürzen, und wenn der Stoss stark genug bezw. die Geschwindigkeit der schwingenden Theilchen gross genug ist die Festigkeit der Mauern zu überwinden, so entsteht rechtwinklig auf der Richtung des Stosses in den beiden Längsmauern die Hauptspalte $\alpha\beta$, zu der bei noch bedeutenderer Stärke auch die beiden anliegenden, ebenfalls skizzirten secundären Spalten hinzutreten können. Gleichzeitig hiernit ist die der Wellenbewegung abgewendete Querwand nur gegen die beiden Längswände gedrückt worden. Aber unmittelbar darauf beginnt die zweite Hemiphase der Bewegung, und die Theilchen schwingen der Richtung des Pfeils entgegen. Jetzt erhält die abgelegene Querwand durch ihre Trägheit ebenfalls den Anstoss nach aussen und diesmal mit der Richtung der Wellenbewegung einzustürzen, und es bildet sich die Spalte $\gamma\delta$. Ist der Stoss noch stärker, so mögen die abgerissenen Querstücke wohl auch ganz einstürzen und nur zwei Längsstücke von der Form des schraffirten Mauertheils stehen bleiben. Doch sollen dann meist auch diese mit einstürzen. Kann man daher in einem geeigneten Gebäude derartige Spalten erkennen, so braucht man nur auf der durch die zusammengehörigen Spaltenpaare gelegten Ebene das nach dem Erdinneren gerichtete Loth zu construiren, um sofort das Azimut der Wellenbewegung und den Emersionswinkel zu erhalten, unter welchen dieselbe den betreffenden Ort getroffen hat.

Der (normale Mallet) Fall, in welchem die Wellenbewegung ein Gebäude in horizontaler Richtung trifft, kann theoretisch offenbar nie vorkommen. Nach Mallet wirken aber alle Stosswellen, die einen Emersionswinkel von 10° oder weniger haben, wie horizontale. Die Spalten sind dann senkrecht, und auf der dem Stosse zugewandten Seite pflegt sich eine stärkere Wirkung (z. B. breiteres Aufreissen) erkennen zu lassen.

Bietet ein Gebäude statt der schmalen Seiten längere dar, so werden diese beide dem Stosse entgegen convex in der Mitte ausgebauscht, von oben nach unten entstehen Spalten und der mittlere und obere Theil kann ganz herausstürzen.

Trifft die Stosswelle ein Gebäude über Eck (abnormal und subabnormal Mallet), so entstehen die Hauptspalten, wie in Fig. 3 skizzirt, paarweise an

Fig. 3.

den zu- und abgewandten Ecken, zu denen noch andere ebenfalls angedeutete secundäre hinzutreten können. Der mit Trigonometrie einigermaßen Vertraute wird auch hier keine Schwierigkeit finden, die Richtung der Stosswelle zu berechnen.

Umgestürzte und fortgeschleuderte Gegenstände. Aus einem umgestürzten Körper lässt sich zunächst das Azimut bestimmen, in welchem die Wellenbewegung den umgestürzten Körper traf, indem dieser

natürlich in der verticalen Ebene jener und, da er nur durch seine Trägheit umgestürzt wird, der Richtung derselben entgegen liegen muss.

Hat der umgestürzte Körper eine einfache und regelmässige Gestalt, so kann dann weiter auch die horizontale Componente der einzelnen Schwingungen und somit der Stosskraft selbst bestimmt werden. Denn wenn wir nennen:

V die horizontale Geschwindigkeit,

M die Masse des Körpers,

a Abstand des Schwerpunktes des Körpers von der Axe, um welche der Körper gestürzt wird,

φ der Winkel, welchen die den Schwerpunkt mit dieser Axe verbindende Linie mit der verticalen macht,

g die beschleunigende Kraft der Schwere und

$M(k^2 + a^2)$ das Trägheitsmoment des Körpers in Bezug auf die Axe, so gilt als allgemein:

$$V^2 = \frac{2g}{a} \cdot \frac{(k^2 + a^2) (1 - \cos \varphi)}{\cos^2 \varphi}.$$

Es ist dann im einzelnen Falle je nach der Form des umgestürzten Körpers $k^2 + a^2$ noch besonders zu bestimmen. Ist der Körper ein solider Cylinder von der Höhe a und vom Durchmesser β , so ist

$$k^2 + a^2 = \frac{15\beta^2 + 16a^2}{18};$$

ist er dagegen ein massiver Pfeiler von der Höhe a und von einer quadratischen Basis, deren Seiten β seien, so gilt:

$$k^2 + a^2 = \frac{a^2 + \beta^2}{3}.$$

Um endlich V auf absolutes Maass zurückzuführen, ist es noch erforderlich, stets M zu bestimmen.

Ist auf diese Weise das Azimut der Wellenbewegung und die horizontale Geschwindigkeit des Stosses ermittelt, so genügt eine freiliegende, fortgeschleuderte Kugel, um auch den Emersionswinkel ε zu bestimmen. Ist:

b der verticale Abstand der Kugel in ihrer ursprünglichen Lage über dem horizontalen Boden,

a der horizontale Abstand der Kugel nach dem Stosse von der Verticale b , wiederum

V die horizontale Componente der Geschwindigkeit des geworfenen Körpers und

g die beschleunigende Kraft der Schwere,

so gilt

$$\tan \varepsilon = \frac{b}{a} - \frac{ag}{2V^2}.$$

Bestimmung von Epicentrum und Centrum. Sind nun durch Spalten in Gebäuden oder durch Umsturz und Fortschleudern von Körpern an zwei oder mehreren Orten das Azimut der Wellenbewegung und deren Emersionswinkel bestimmt, so braucht man offenbar nur diese Azimute in eine Karte in Mercators Projection einzutragen, um in ihrem Schnittpunkte den Oberflächenmittelpunkt oder das Epicentrum zu erhalten. Danach ist selbstverständlich auch der Axialabstand der verschiedenen erschütterten Orte bekannt und da gilt

$$h = a \tan \varepsilon,$$

wobei, wie oben, h die Tiefe des Centrums, a den betreffenden Axialabstand, ε den Emersionswinkel bezeichnet, so ist auch die Lage des Centrums oder Erdbebenherdes bestimmt.

Von Interesse ist ausserdem noch das folgende von R. Mallet zuerst erkannte allgemeine Resultat. Die Stärke der Erschütterung wird auf der Erdoberfläche zwar im Epicentrum am intensivsten sein, aber die Gebäude werden hier nur in die Höhe gestossen werden und dann wenig oder unbeschädigt wieder zurücksinken. Da nur die horizontale Componente einstürzend wirkt, so müssen die stärksten Verheerungen sich auch da vorfinden, wo diese ein Maximum ist. Unter der Annahme, dass die Intensität wirklich nach dem Quadrate der Entfernung abnimmt, ist dies in einem Kreise der Fall, für welchen das Verhältniss besteht: Axialabstand zur Heerdtiefe, zum Centralabstand $= 1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$.

Seismometer. Um sich beim Eintreten eines Erdbebens von allen Zufälligkeiten frei zu machen und stets genaue Beobachtungen zu erlangen, hat man eigene Apparate: Erdbebenmesser, Seismometer, Seismographen erdacht, welche bestimmt sind, die Eigenthümlichkeiten derselben zu nachträglicher Benutzung zu fixiren. Die verschiedenartigsten Principien und Constructionen sind in Anwendung gekommen, von den einfachsten Vorkehrungen, wie sie jeder Reisende sich leicht selbst ausdenken wird, bis zu complicirten, selbstregistrirenden Apparaten, die nur auf grossen Observatorien aufgestellt werden können (vgl. Mallet Rep. Brit. Assoc. adv. sc. 1858 und Adm. manual of sc. inquiry).

Eines der zweckmässigsten Seismometer ist das nachfolgende, zuerst von Mallet vorgeschlagene, welches überall leicht und billig herzustellen ist und doch alle Elemente liefert, welche für die wissenschaftliche Erforschung eines

Erdbebens zunächst wünschenswerth sind. Dasselbe besteht aus einer oder zweckmässiger aus zwei rechtwinklig auf einander stehenden Reihen kleiner Cylinder. Die Säulchen sind von Marmor, Gusseisen, Holz, Thon oder ähnlichem Material; sie sind von gleicher (beliebiger, etwa 30 Cm.) Höhe, aber von abnehmenden Durchmessern (Höhe zu Durchmesser etwa 3:1, 4:1 u. s. w. bis 9:1) und daher von abnehmender Stabilität. Diese zwei Säulenreihen werden auf 2 im Boden befestigten horizontalen, ebenen und rechtwinklig zu einander liegenden Platten oder Bohlen aufgestellt, die etwa so breit sind, wie der Durchmesser der breitesten Säule und so lang, dass zwischen je 2 Säulchen ein etwas grösserer Zwischenraum bleibt als ihre Höhe. Um diesen einfachen Apparat herum wird bis zur Höhe der Bohlen oder Platten etwa 5 Cm. hoch trockener Sand aufgefüllt. Wenn jetzt durch einen Erdstoss ein oder mehr Säulchen umgestossen werden, so wird zunächst ihre Lage in dem Sand, der ein Rollen verhindert, das genaue Azimut des Stosses ergeben, und man kann ferner aus den theilweise umgestürzten und theilweise stehen gebliebenen Säulchen auch die horizontale Geschwindigkeit des Stosses berechnen.

Fügt man noch eine fest im Boden stehende Säule hinzu, auf deren oberer ebener Fläche eine Kugel frei aufliegt, so ergiebt bei der bereits bekannten horizontalen Geschwindigkeit das Wegschleudern derselben auch den Emersionswinkel.

Genaue Wägung und Messung der Kugel und der Säulen nach Höhe und Durchmesser, Messung der ursprünglichen Höhe und des späteren Abstands der Lage der Kugel und genaue Ermittlung des Azimuts mittelst des Compasses sind hierbei natürlich erforderlich.

Neue nur auf exacte Zeitbestimmungen gegründete Methode. Da R. Mallet's Methode sich in der Regel und ohne Seismometer nur bei Erdbeben wird anwenden lassen, welche beträchtlichere Verheerungen angestiftet haben, da ihre Anwendung, so weit sie sich nicht auf Seismometer stützt, immer eine complicirte bleiben wird, die Reisen an Ort und Stelle und die sorgsamste Berücksichtigung aller der zahlreichen Fehlerquellen, mit denen sie behaftet ist, voraussetzt: so hat Schreiber dieses besonders für Erdbeben von schwächerer Wirkung eine andere einfachere Methode in Vorschlag gebracht. (K. v. Seebach, Das mitteldeutsche Erdbeben vom 6. März 1872. Leipzig, H. Hässel 1873).

Auch ihr liegt die mit der Wahrheit nicht übereinstimmende, aber durch keine andere allgemeine Voraussetzung zu ersetzende Annahme zu Grunde, dass die Erde eine gleichartige Masse sei.

Uebrigens stützt sie sich nur auf genaue Beobachtungen der Zeiten, in denen die Stosselle an den verschiedenen Orten beobachtet worden ist. Je genauer und zahlreicher diese sind, um so schärfer und sicherer werden natürlich auch die gefundenen Resultate sein. Um die verschiedenen Zeiten, aus denen Beobachtungen vorliegen, vergleichen zu können, ist es selbstverständlich erforderlich, dieselben aus örtlicher Zeit auf eine beliebig zu wählende gemeinsame Zeit zu reduciren.

Bestimmung des Epicentrums oder des Oberflächenmittelpunktes. Zunächst soll aus den so reducirten Zeiten das Epicentrum gefunden werden. Die Aufgabe ist sehr einfach gelöst, wenn drei oder mehrere Orte gleiche, oder zwei oder mehrere Paare unter einander gleiche Beobachtungszeiten ergeben. Man braucht dann nur auf einer Karte von geeigneter Projection (Kegelprojection mit weit abstehender Kegelspitze) die Orte gleichzeitiger Erschütterung durch Grade zu verbinden, diese zu hal-

biren und auf dem Halbirungspunkte Lothe zu errichten, um in dem Schnittpunkte dieser Lothe das Epicentrum zu finden.

Liegen keine Paare gleicher Zeiten vor, so wird man je nach Lage der Angaben andere Methoden versuchen müssen (vgl. z. B. Mallet, Report of the meeting of the British association for the advancement of science 1858, p. 95). Sind keine einfachen rationellen Methoden mehr anwendbar, so wird man immer noch am kürzesten mit Probiren zum Ziele kommen, indem man aus der Gesammtheit aller Beobachtungen eine erste rohe Annäherung an den Oberflächenmittelpunkt versucht. Von dem so gewählten Punkte zieht man Radien nach einigen besonders zuverlässigen Beobachtungsorten und bestimmt aus ihnen die (constant gedachte) Oberflächengeschwindigkeit. Diese ergibt sich höchst wahrscheinlich auf den verschiedenen Radien verschieden. Man nimmt nunmehr das Mittel der gefundenen Oberflächengeschwindigkeiten und sucht nun rückwärts ein neues Epicentrum, von dem aus man dann wieder ähnlich verfahren kann, bis endlich der Oberflächenmittelpunkt mit der wünschenswerthen Genauigkeit gefunden ist.

Bestimmung des Erdbebenheerdes oder Centrums. Darauf ist die Tiefe des Erdbebenheerdes oder Centrums unter der Erdoberfläche zu suchen. Diese Aufgabe ist früher (a. o. a. O.) allgemein gelöst worden. Hier dürfte es genügen, allein den einfacheren Fall zu entwickeln, in welchem bei einem Erdbeben von nur geringerer Verbreitung die Erdoberfläche wiederum als ebene Fläche angenommen werden kann. Nach der Tiefe, die wir bei dem heutigen Stande unserer Kenntnisse für die Tiefe der Erdbebenheerde annehmen müssen, wird dies bis zu einem Axialabstand von etwa 200 Seemeilen zulässig bleiben.

Es stelle der nebenstehende Holzschnitt, wie oben, einen Querschnitt nach einem grössten Kreise der Erde dar, welcher durch den Erdbebenheerd O gelegt worden ist. A ist alsdann das Epicentrum und h die zu findende Tiefe.

M_1, M_2, M_3 etc. sind beliebige Orte der Erdoberfläche, welche in $t_1,$

t_2, t_3 etc. Zeit von dem Erdbeben erschüttert worden sind. Der Einfachheit und Uebersichtlichkeit wegen sind die Abstände $t_1 t_2$ und $t_2 t_3$ etc. immer gleich angenommen worden. r_1, r_2, r_3 etc. sind die Centralabstände von M_1, M_2, M_3 etc. Nun gilt aber ganz allgemein

$$r = ct;$$

das heisst r ist gleich der (in der Theorie constanten) Fortpflanzungsgeschwindigkeit c mal Zeit t . Nun ist:

$$r^2 = h^2 + a^2$$

$$c^2 t^2 = h^2 + a^2$$

$$\frac{c^2 t^2}{h^2} - \frac{a^2}{h^2} = 1.$$

Fig. 4.

Dies ist die Formel der Hyperbel; die Oberflächengeschwindigkeit folgt also den Gesetzen der Hyperbel.

Dass dies der Fall sein müsse, erhellt auch schon aus der folgenden einfachen Betrachtung. Hat die Stosswelle in der Zeit t_0 die Oberfläche, das ist also das Epicentrum, A erreicht und in t_1 Zeit M_1 , so hat die Stosswelle auf der Erdoberfläche in der zwischenliegenden Zeit die Strecke AM_1 zurückgelegt, also scheinbar eine weit grössere Geschwindigkeit besessen, als die wahre Geschwindigkeit $r_a r_1$. Während ebenso auf der Erdoberfläche die Strecke von M_1 bis M_2 durchheilt wird, beträgt der Weg der gleichzeitigen wahren Geschwindigkeit nur den Abstand von r_1 bis r_2 ; auch hier ist die Oberflächengeschwindigkeit grösser als die wahre, aber die Differenz beider ist geringer als bei AM_1 und $r_a r_1$. Vergleicht man dann weiter ab von A die Oberflächengeschwindigkeit mit der wahren, so sieht man sofort, dass jene sich dieser immer mehr nähert, sich also immer mehr ebenfalls einer Constanten nähert, ohne sie jedoch wirklich erreichen zu können. Die Oberflächengeschwindigkeit nähert sich also der wahren asymptotisch und es ist die wahre Fortpflanzungsgeschwindigkeit die Asymptote zu der Hyperbel der Oberflächengeschwindigkeit. Nun fällt aber offenbar die Queraxe der Hyperbel zusammen mit der Erdbebenaxe, und da mit dem Oberflächenmittelpunkt oder Epicentrum uns diese gegeben ist, so ist auch jene bekannt. Construirt man daher nunmehr ein quadratisches Netz, dessen Abschnitte auf der Abscissenaxe Meilen darstellen, auf der Coordinatenaxe aber Minuten, die man mit einigen Minuten früher als die früheste beobachtete Zeit des Erdbebens zu zählen anfängt, und trägt nun die verschiedenen erschütterten Orte nach ihrem Axialabstand von der Ordinatenaxe und nach der Zeit ein, in welcher sie erschüttert worden sind, so müssen dieselben auf einer Hyperbel liegen.

Die weiter von der Erdbebenaxe und somit auch von der Ordinatenaxe abstehenden Orte stellen nun einen so wenig gekrümmten Theil der Hyperbel dar, dass man diesen in der Praxis als gerade und somit als Asymptote selbst ansehen kann. Diese ergiebt aber unmittelbar die wahre Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellenbewegung nach Meilen in der Minute. Zieht man nunmehr diese Asymptote wirklich aus, so ergiebt ihr Schnittpunkt mit der Ordinatenaxe unmittelbar den Zeitpunkt des ersten Anstosses im Erdbebenherde selbst. Ist nunmehr der Scheitel der Hyperbel gegeben, so ist auch die Zeit bekannt, welche die Stosswelle bedurfte, um sich vom Centrum bis zum Oberflächenmittelpunkte oder Epicentrum fortzupflanzen, und da wir auch ihre Geschwindigkeit kennen, so ist offenbar auch der Weg vom Centrum bis zum Epicentrum und somit auch die Tiefe des Erdbebenherdes gefunden.

Der Scheitel der Hyperbel kann im einfachsten Falle direct gegeben sein durch eine aus dem Oberflächenmittelpunkte herstammende Zeitbeobachtung. In weitaus den meisten Fällen wird man denselben aber erst construiren müssen. Man bedarf hierzu nur noch eine gute Zeitbestimmung eines Ortes von möglichst geringem Axialabstand. Man braucht alsdann nur die andere Asymptote zu ziehen und die Lage dieses Ortes symmetrisch auf der anderen Seite der Ordinatenaxe aufzutragen. Legt man nun durch diesen Punkt einen Strahlenbüschel, so hat man nur den Abstand, in welchem diese Strahlen die nächste Asymptote schneiden, vor der anderen Asymptote auf dem gleichen Strahle abzutragen, um durch diese Punkte die gesuchte Hyperbel vorgezeichnet zu erhalten. So findet man auch sicher und rasch den

Scheitelpunkt und kann, wenn mehrere geeignete Zeitbestimmungen vorliegen, zugleich deren Uebereinstimmung oder Güte prüfen.

Fig. 5.

Der vorstehende Holzschnitt möge dies an einem concreten Falle erläutern. Er bezieht sich auf das Rheinische Erdbeben vom 29. Juli 1846 (S. Noeggerath's gleichnamige Schrift. Bonn 1847). Die wahre Fortpflanzungsgeschwindigkeit beträgt hier 18,4 Seemeilen in der Minute. Der Moment des ersten Anstosses ergibt sich zu 24,12 Minuten, der der Erschütterung des Epicentrums zu 25,26 Minuten, die Tiefe des Erdbebenheerdes oder Centrums betrug somit 20,9 Seemeilen.

Die Anwendung dieses einfachen Verfahrens auf das Erdbeben vom 6. März 1872 hat es mindestens sehr wahrscheinlich gemacht, dass durch die Annahme einer nach allen Radien des Centrums gleichartigen Fortpflanzungsgeschwindigkeit kein bemerkbarer Fehler entsteht. Wenn aber die wahre Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Innern der Erde auf einem Radius grössere Aenderungen erleidet, so müssen sich diese bei sehr zahlreicher und guter Zeitbestimmung gerade auch nach dieser Methode durch Aenderung der Richtung der Asymptote zu erkennen geben.

Ein bei Erdbeben geringerer Wirkung wohl eher zu verschmerzender Mangel dieser Methode ist, dass dieselbe keine unmittelbare Bestimmung der Maximalgeschwindigkeit der schwingenden Partikelchen zulässt.

Für das Mitteldeutsche Erdbeben vom 6. März 1872 wurden nach diesem Verfahren gefunden: die Tiefe des Centrums zu 9,6 Seemeilen und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit zu 24 Seemeilen in der Minute.

Intensität. Es ist hervorzuheben, dass, wie schon oben nach den Mallet'schen Beobachtungen zu Holyhead vorausgesagt wurde, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit bei den verschiedenen Erdbeben eine verschiedene ist.

Wie oben erwähnt, würde im vollständig elastischen Mittel die Intensität nach dem Quadrat der Entfernung vom Centrum abnehmen; in Folge der in der Erde zahlreich vorhandenen Spalten muss jedoch einerseits ein weit rascherer Kraftverlust eintreten, während andererseits bei einer so hohen Intensität, wie die der Erdbeben, welche die Elasticitätsgrenze der erschütterten Massen überschreitet, wieder eine langsamere Abnahme der Stärke erfolgen wird. Wie sich diese beiden entgegenwirkenden Einflüsse

genauer zu einander verhalten, würde sich nur durch (heute noch fehlende) zahlreiche und gute Beobachtungen über die Maximalgeschwindigkeit der schwingenden Partikelchen in verschiedenen Centralabständen ermitteln lassen. Einstweilen muss man für weitere Betrachtungen annehmen, dass sie sich ausgleichen und die Intensität somit wirklich nach dem Quadrat des Centralabstandes abnimmt. Die Stärke, in welcher ein Erdstoss an einem bestimmten Orte wahrgenommen wird, m , ist daher gleich der Intensität des ersten Anstosses i dividirt durch das Quadrat des Centralabstandes r

$$m = \frac{i}{r^2}$$

$$i = mr^2$$

Da nun anzunehmen ist, dass die Stärke der Erschütterung, welche bei dem grössten beobachteten Centralabstand bei verschiedenen Erdbeben dennoch durch einfache Sinneswahrnehmung erkannt werden konnte, wenigstens eine annähernd gleiche Grösse ist, so wird für diese Fälle m eine constante. Setzt man diese gleich 1 und bezeichnet den grössten beobachtbaren Centralabstand mit r_z , so gilt für jedes Erdbeben:

$$i = r_z^2$$

womit daher ein relatives Maass gefunden worden ist, um die wahren Intensitäten verschiedener Erdbeben mit einander zu vergleichen. Da demnach betragen:

Die wahre Intensität	Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit
In Mitteleuropa 1872	3305 24 Seemeilen
Am Rhein 1846	1577 20,9 „

so ergibt sich, dass auch in diesen beiden Fällen die Fortpflanzungsgeschwindigkeit mit der Intensität wuchs. Es ist zu hoffen, dass sich für dies Verhältniss dereinst noch ein bestimmtes Gesetz wird nachweisen lassen.

Aus der Gleichung $i = r_z^2 = a_z^2 + h^2$ ergibt sich ferner sofort, dass bei allen Erdbeben von nur geringer Ausdehnung, die doch grosse Verheerungen angestiftet haben (Melfi 1857 etc.) dies nicht die Folge eines sehr grossen ersten Anstosses ist, sondern nur diejenige einer geringen Tiefe h .

Seismometer. Da für die erfolgreiche Durchführung dieser Methode möglichst genaue Zeitbestimmungen erforderlich sind, so ist entweder verbunden mit dem oben beschriebenen Seismometer Mallets oder auch für sich allein ein anderes Seismometer zur Erlangung solcher vorgeschlagen worden. Eine gut gehende, womöglich auch Secunden zeigende Uhr wird aufgezogen und auf 0 Zeit gestellt. Ihr Pendel wird darauf aus der Gleichgewichtslage entfernt und in dieser dadurch festgehalten, dass ein Haken an einem nur um ein geringes den anderen an Gewicht übertreffenden Arm eines Hebels in das Steigrad eingreift. Am anderen leichteren Hebelarm hängt an einem schlaffen Faden ein Gewicht, welches auf einer kleinen Säule von geringer Stabilität ruht. Ein Erdstoss stürzt dann die Säule um, das Gewicht fällt, löst den schwereren Hebelarm aus und die Uhr beginnt zu gehen. Durch nachträgliche Vergleichung ihrer Zeit mit der astronomisch oder telegraphisch genau festgestellten mittleren Zeit des nämlichen oder eines anderen Ortes wird dann der genaue Zeitpunkt gefunden, in welchem das Erdbeben den betreffenden Ort erschüttert hat. Muss diese Vorkehrung für Gegenden, die nur selten bewegt werden, für zweckmässiger gelten, so empfiehlt sich dagegen für häufiger erschütterte Länder das um-

gekehrte Verfahren, wie es Gümbel (Ausland 1873 Nr. 48) vorgeschlagen. Danach ist die Uhr dauernd im Gange, das Gewicht der Hebelarme wird entgegengesetzt vertheilt und das Gewicht hängt an dem der Uhr zugewandten Arm. Die Uhr wird alsdann durch den Erdstoss und das fallende Gewicht arretirt. Diess Verfahren setzt aber natürlich weit zuverlässigere Uhren voraus, deren Gang sehr oft kontrollirt wird.

Die vermeintliche kreiselnde Bewegung. Nach allem bisher Gesagten muss sich die Stosswelle wesentlich geradlinig fortpflanzen. Dem scheint aber entgegenzustehen, dass in vielen, ja wohl in den meisten Erdbeben Fälle beobachtet worden sind, in denen Gegenstände nicht geradlinig fortbewegt worden sind, sondern um eine senkrechte Axe gedreht wurden. Man hatte hieraus auf eine drehende, kreiselnde Bewegung (*moto verticoso*) schliessen wollen. R. Mallet hat aber schon 1846 (*Transact. of the Royal Irish academy* vol. 21 p. 52) in überzeugendster Weise dargethan, dass in Wahrheit keine solche drehende Bewegung stattfindet. Die beobachteten Drehungen müssen vielmehr ebenfalls durch eine geradlinige Bewegung erklärt werden. Ein einfaches Beispiel wird dies sofort klar stellen. Es liege ein Steinwürfel auf Mauerwerk auf und er sei in der Nähe seiner einen Ecke von einer senkrechten in der unter liegenden Basis befestigten Eisenspitze ganz oder theilweise durchbohrt. Wenn dieser nühmehr nahezu horizontal, normal auf eine Seite von einer Stosswelle getroffen wird, so wirkt dieser in dem Schwerpunkte oder in dem Mittelpunkt des Würfels und es wird der ganze Block durch seine Trägheit dem Stosse entgegen bewegt. Da derselbe aber ausserhalb des Lothes seines Schwerpunktes durch die eiserne Spitze an einem Punkte festgehalten wird, so muss sich der Block um diese senkrechte Axe wie um eine Angel drehen. Statt des eisernen Stachels kann dann auch eine geringere Hervorragung das Gleiche bewirken und es wird eine derartige Drehung selbst dann schon eintreten müssen, wenn bei der Bewegung eines Körpers auf einer Unterlage derselbe an einer ausserhalb des Lothes seines Schwerpunktes gelegenen Stelle seiner Basis eine besonders starke Reibung erleidet. Körper werden also durch die geradlinige Wellenbewegung verdreht, wenn ihr Schwerpunkt und ihr Haftpunkt nicht in einer Senkrechten liegen.

Einfluss der Form des Erdbebenherdes. Bei den ganzen bisherigen Betrachtungen ist das Centrum der Erdbeben stets stillschweigend als ein Punkt oder doch eine Region von geringen Dimensionen angenommen worden, so dass die Projection derselben auf der Erdoberfläche, der Oberflächenmittelpunkt, ein kleiner arrondirter Distrikt ist und die Homoseisten und Iseisten als kreisförmige Curven sich darstellen. Zahlreiche derartige centrale Erdbeben sind nachgewiesen worden.

Nach allen geologischen Erfahrungen ist jedoch anzunehmen, dass der Erdbebenherd, was auch immer die Ursache des Erdbebens sein möge, plattenförmig sein werde in oder neben Spalten. Geht der erste Anstoss von einer solchen Spalte aus, so wird, wie R. Mallet 1862 gezeigt hat, die Intensität in der Richtung normal auf die Wände der Spalten weniger rasch abnehmen, als in der Richtung der Spalten. Unter diesen Umständen können aber natürlich die isoseistischen Zonen nicht mehr kreisförmig bleiben, sondern werden, wenn die Spalte senkrecht steht, zu Ellipsen ausgezogen, deren kleinerer Durchmesser der Länge nach durch die Spalte hindurchgeht, während ihr grösserer Durchmesser normal zur Richtung der Spalte stehen wird. Steht die Spalte nicht senkrecht, sondern fällt sie geneigt ins Erdinnere, so müssen die Iseisten eiförmig erscheinen. Der

grössere Theil der Eiform muss neben und über der Spalte liegen, der kleinere neben und unter derselben und es kann schliesslich der Fall eintreten, der bei dem mitteldeutschen Erdbeben vom 6. März 1872 nachgewiesen wurde, in dem ein Maximalgebiet der Erschütterung, eine pleistoseistische Fläche nur auf der einen Seite der Spalte (über ihr) vorhanden ist, während der auf der anderen Seite (neben und unter ihr) erschütterte Theil der Erdoberfläche nur wenig bewegt wird. Wäre die Spalte endlich horizontal, z. B. ein flaches Schichtengewölbe, so ist eine nur wenig ausgedehnte aber starke Erschütterung zu erwarten. Aus dem oben Gesagten ergiebt sich ferner unmittelbar, dass der Schwerpunkt eines erschütterten Gebietes keineswegs mit dem Epicentrum zusammenzufallen braucht und dass es daher unzulässig bleibt, jenen ohne Weiteres als Oberflächenmittelpunkt anzunehmen.

Besitzt eine derartige Spalte von nahezu senkrechter Stellung aber eine bedeutendere Längerstreckung, so wird sich der Einfluss der Form des Erdbebenherdes auch auf die Homoseisten erstrecken müssen. In diesem Falle werden die Homoseisten entgegengesetzt zu den Isoseisten in der Richtung der Spalte gestreckt erscheinen müssen. Alle Orte, welche längs der Spalte gleichweit von ihr abstehen, werden gleichzeitig erschüttet. Die Homoseisten laufen daher der Spalte parallel und sind nur an deren Ende halbkreisförmig gestaltet. Erdbeben, bei denen man diese Art der Fortpflanzung im grossen Maasstabe beobachtet haben will (4. Januar 1843 Ohio-Mississippi nach Rogers Sillim. Amer. Journ. vol. 45) hat Naumann transversale genannt. Ihre Existenz in der Form, wie sie Rogers annahm, wird indessen von Noeggerath wohl mit Recht noch bezweifelt.

Einfluss der Form und Beschaffenheit der festen Erdkruste. Andere Erdbeben, welche sich nicht in kreisförmiger oder elliptischer Form, sondern nur in schmalen Zonen verbreitet haben, hat man unzweckmässig longitudinale nennen wollen. Sie werden nicht durch die Form des Erdbebenherdes beeinflusst, sondern entstehen nur durch die eigenthümliche Zusammensetzung und Form der erschütterten Region, welche die Bewegung nur nach zwei gegenüberliegenden Richtungen weit fortpflanzt, sonst aber nicht.

Der Einfluss, welchen die verschiedenartige Form und Beschaffenheit der festen Erdkruste auf die Verbreitungsweise eines Erdstosses überhaupt und besonders seiner Stärke ausübt, ist noch wenig aufgeklärt. Wohl von jedem Erdbeben liegen Berichte vor, welche beweisen, dass mitten in dem allgemeinen Schütterungsgebiete, ja oftmals neben stark bewegten Orten andere vollkommen verschont geblieben sind. Nicht selten ist an einem und demselben Orte ein Erdstoss über der Erde bemerkt worden, den man unterirdisch nicht wahrnahm, oder auch umgekehrt. Andere Orte, die für längere Zeit vollkommen erdbebenfrei waren, gehen bei einem späteren Erdstosse dieses Vorrechts verlustig. Alle diese Erscheinungen müssen dadurch erklärt werden, dass die verschonten Orte in einem localen Erdbenschatten liegen. Durch welche bestimmte Verhältnisse dieser aber erzeugt wurde, hat man nur in einzelnen einfachen Fällen mit einiger Wahrscheinlichkeit dazuthun vermocht. Dreierlei Ursachen sind hier besonders zu berücksichtigen:

1) Der geologische Bau des erschütterten Gebietes. Besteht ein erschüttertes Gebiet in seiner ganzen Ausdehnung nur aus einem massigen Gesteine ohne grössere Spalten und Verwerfungen, so muss sich natürlich in einem solchen die Bewegung am regelmässigsten fortpflanzen. Besteht das erschütterte Gebiet aus geschichteten Gesteinen, so findet parallel der

Schichtung eine bessere Leitung statt als quer (Mallet) und nach Jeitteles selbst eine bessere als in massigen Gesteinen. Breite mit lockerem Material ausgefüllte Spalten sollen die Bewegung vollkommen verschlucken.

2) Das Relief der Erdoberfläche. Die hohe Bedeutung der Gestaltung der Erdoberfläche für die Verbreitung der Erdbeben ist in vielen Fällen direct bewiesen worden. Oftmals haben Erdbeben grössere Gebirgsketten nicht zu überschreiten vermocht. So sind an der Westküste Südamerikas sogenannte longitudinale Erdbeben entstanden, weil in diesen Fällen die Anden die Fortpflanzung nach Osten hemmten und abschnitten. Auch die Einwirkung, welche man grösseren Flussthälern auf die Richtung der Erdbeben zugeschrieben hat, wird von anderen auf die ihren Lauf vorzeichnenden, benachbarten Bergketten zurückgeführt. Dass in anderen Fällen Erdbeben hohe Gebirgsketten überschritten haben, wie z. B. das Erdbeben von Lahore 1832 nach Burnes den Hindu-Kusch und anderer neuerdings auch die Anden, kann den Einfluss der Gebirgszüge auf die Verbreitung von Erdstössen offenbar nicht entkräften. Ortschaften, die auf isolirten steilen Anhöhen liegen, werden besonders stark erschüttert; beobachtete Ausnahmen sind wohl durch die unter 1 und 3 aufgeführten Einwirkungen zu erklären. Bei Bergketten von geringer Höhe werden die auf der abgewendeten Flanke liegenden Orte mehr leiden, als die dem Epicentrum zugelegenen. Hingegen bleibt bei tief eingeschnittenen Thälern die entferntere Thalseite oft völlig verschont.

Bei dem neapolitanischen Erdbeben von 1857 hat Mallet sogar nachgewiesen, dass ein Theil der Wellenbewegung durch einen Gebirgszug zurückgeworfen wurde, wie ein Lichtstrahl von einem Spiegel.

3) Die verschiedene Natur und Beschaffenheit der Gesteine, welche die Oberfläche selbst und die unmittelbar unter ihr gelegenen Regionen bilden. Eine wenig mächtige Decke von lockerem Material, Schotter, Sand, wird für einen gefährlichen Untergrund gehalten, während eine sehr mächtige Bedeckung durch solche Massen die Wellenbewegung ganz oder theilweise absorbiren und dadurch schützend wirken soll. Freilich sind auch Fälle bekannt geworden, die auf das gerade Gegentheil deuten und Orte auf festem, anstehenden Gestein sicherer erscheinen lassen, als benachbarte andere, die auf lockerem Schwemmland stehen.

Unsere Kenntniss von dem Einfluss der erschütterten Massen auf die Fortpflanzung der Bewegung sind eben noch viel zu gering, als dass sich aus ihnen sichere Gesetze ableiten liessen. Jeder Lichtstrahl, den die genaue Beobachtung eines einfachen Falles nach dieser Richtung in das Dunkel wirft, muss als ein dankenswerther Fortschritt begrüsst werden.

Seebeben. Ein besonders interessantes Phänomen ist der Uebergang eines Erdbebens vom Festland auf den Ocean, oder auch die Entstehung eines solchen unter der Meeresbedeckung. (F. v. Hochstetter, Sitzungsber. d. K. Acad. d. Wissensch. zu Wien, II. Abth. 1868 und 1869; sowie in Peterm. Mittheil. 1869 p. 222 u. Karte 12). In diesem Falle entsteht zunächst auch in dem Meere eine Stosswelle; indem diese aber das hydrostatische Gleichgewicht stört, werden Wellen erzeugt, die, wie andere Wasserwellen beschaffen, auch den Gesetzen folgen, welche die Fortpflanzungsweise dieser bestimmen.

Die Stosswellen selbst sind in Schiffen oftmals als ein scharfer, kurzer Stoss etwa so, als ob das Schiff auf den Grund gerathen wäre, wahrgenommen worden, nicht selten verbunden mit einem Schallphänomen und zuweilen bei (wenigstens anscheinend) völlig ruhig bleibender See.

Liegt das Epicentrum nicht unter dem Meere, sondern auf dem festen Lande, so steigt zuerst in seiner Nachbarschaft das Niveau; die See fluthet. Mallet und F. v. Hochstetter fassen diese Welle nach Russel's Theorie als forcirte positive Welle erster Ordnung (wave of translation) auf. Gleich darauf ebbt die See, um darauf (z. B. in 20 Minuten) als eine furchtbare Fluthwelle zurückzukehren, weit über die Marken der höchsten Springfluth hinaus über die Küste hereinzubrechen und alles zu verwüsten. Nochmals zieht sich dann das Meer zurück, um in wechselnden Schwankungen noch ein- oder mehrmals, wenn auch nur mit geringerer Gewalt, wiederzukehren. Es sind diese Wellen, die über die grössten Seeflächen hin mit grösster Geschwindigkeit fortgepflanzt werden. Als am 23. December 1854 ein Erdbeben Simoda in Japan zerstörte, wurden fünf mächtige Wogen erzeugt, deren Wirkungen man $12\frac{1}{2}$ Stunde später in einem Abstand von etwa 4800 Seemeilen in den Fluthmessern an der Californischen Küste noch zu erkennen vermochte. Von dem Erdbeben, welches am 13. August 1868 den District von Arica verwüstete, hat F. v. Hochstetter gezeigt, dass die entstandenen Fluthwellen sich über den ganzen südlichen Theil der Südsee verbreitet haben und nach rund $19\frac{1}{4}$ Stunde Neuseeland (Abstand ca. 6100 Seemeilen) und nach rund $22\frac{1}{2}$ Stunde die Ostküste von Australien (ca. 7400 Seemeilen abstehend) erreichten. Die Erdbebenfluthwelle hat sich daher, wie F. v. Hochstetter hervorhebt, mit derselben Geschwindigkeit fortgepflanzt, wie die lunare Fluthwelle und ist daher wie diese nach Russel eine freie Uebertragungswelle gewesen.

Die grossen Erdbebenfluthwellen sind nach Hochstetter negative Wellen gewesen, aber obschon nur 2 Beobachtungen dies direct erkennen lassen, so müsse ihnen doch eine positive Uebertragungswelle vorausgegangen sein, die in der Richtung des Stosses durch das dichtere Aufeinanderrücken aller verticalen Wasserdurchschnitte habe entstehen müssen.

Besonders berufen für das häufige Vorkommen submariner Erdbeben oder Seebeben ist die Region mitten im atlantischen Ocean 7° N. bis $3^{\circ} 30'$ S. Br. und $15^{\circ} 50'$ bis $29^{\circ} 30'$ W. L. v. Greenw. (Vgl. Mercantile Marine Magaz. 1869 Jan. u. Petermann. Mittheil. 1869 p. 96). Wiederholt sind daselbst Seebeben irrig bald für eine gestreifte Untiefe, bald für die Vorboten einer vulkanischen Inselgeburt gehalten worden.

IV. Für die praktische Ausführung.

Aus dem bisher Gesagten dürfte hinreichend hervorgehen, welche Beobachtungen für die rationelle Erforschung eines Erdbebens von Wichtigkeit sind. Vielleicht ist aber eine kurze Recapitulation derselben, bei der sich gelegentlich noch einige Vorsichtsmaassregeln für die Ausführung der Beobachtungen ergeben werden, nicht unzweckmässig. Sofortige, detaillirte Aufzeichnung aller Beobachtungen wird dabei als selbstverständlich vorausgesetzt.

Zeit. Bei jedem Erdbeben muss eine möglichst sorgfältige Bestimmung der Zeit, in welcher dasselbe empfunden wurde, die erste Aufgabe sein, da sie die einzige Beobachtung ist, die nachträglich völlig unmöglich ist. Bei einer kleineren Erschütterung wird man die Zeit natürlich unmittelbar und daher genauer finden können, als bei einem heftigen Stosse, bei welchem die Sorge um das Leben eine wenigstens um einige Secunden verspätete Beobachtung, deren Fehler dann geschätzt werden muss, in der Regel

verursachen wird. Selbstverständlicherwise, wenn auch leider nur allzu oft ausser Acht gelassen, verliert die an der gezogenen Taschenuhr gemachte Zeitbeobachtung ihren ganzen Werth, wenn man versäumt, die Uhrzeit durch chronometrische oder telegraphische Vergleichung oder durch eine astronomische Zeitbestimmung auf eine bestimmte Zeit bezw. auf mittlere örtliche Zeit zu reduciren. Man scheue nicht die Mühe, sondern erinnere sich, dass schon wenige gute Zeitbestimmungen genügen, um alle interessanteren Verhältnisse eines Erdbebens klar zu legen.

Dauer. Ebenfalls sofort ist die Zeitdauer der Erschütterung zu schätzen. Wer des Schätzens kleiner Zeiträume ungewöhnt ist, überschätzt dieselben gemeiniglich. Bei heftigen Stössen vergrössert der Schrecken die Secunden zu Minuten und wohl noch mehr. Vergleichung mit den Wahrnehmungen Anderer empfiehlt sich hier noch besonders, verlangt aber auch wieder Vorsicht und Kritik. Der Ort der Beobachtung ist kurz anzugeben: ob auf ebener Erde, oder in einem hohen Gebäude, ob auf einer steilen Anhöhe oder im Thale u. s. w.

Form. Weit leichter und schärfer pflegt man die Form eines Erdbebens, auch wenn es von verheerender Stärke war, zu erfassen. Wenn die Erschütterung keine regelmässige zitternde Undulation war, ist darauf zu achten, in welchem Theile der ganzen Zeitdauer der bezw. die Anschwellungen bezw. Stösse lagen und deren Stärke gegen einander abzuwägen.

Schallphänomen. Es ist darauf zu achten, ob das Erdbeben von einem eigenthümlichen Geräusch begleitet war oder nicht? War dies, wenn vorhanden, einfach oder mehrfach? Welcher Art erschien es und wo schien es herzukommen? Ging es der Erschütterung voraus, folgte es nach, oder war es gleichzeitig? Wo ist es beobachtet worden und ist man sicher, nicht die durch die Erschütterung in dickem Mauerwerk u. s. w. erst erzeugten krachenden Zerreiassungen u. s. w. für ein begleitendes Getöse gehalten zu haben? In Holzhäusern pflegt das Knarren und Aechzen unverkennbar zu sein und erleichtert daher die Ermittlung der Wahrheit.

Richtung. Wenngleich sich der Oberflächenmittelpunkt, das Epicentrum schon aus guten Zeitbestimmungen ermitteln lässt, so wird diese Aufgabe doch nicht nur wesentlich vereinfacht, sondern es ist für die Frage von der Grösse der Ablenkung, welche die Stosswelle erfahren mag, unentbehrlich, die Richtung, in welcher dieselbe einen Ort trifft, auch direct zu bestimmen. Zunächst ist stets zu bedenken, dass es die Trägheit der Körper ist, welche diese (und daher auch dem Stosse entgegen) bewegt. In allen nicht völlig klaren Fällen erhält man daher nur die Himmelsrichtung der Bewegung, aber nicht das woher und wohin, und selbst diese wird man bei einer einfachen unmittelbaren Empfindung nur in Ausnahmefällen hinreichend genau erkennen können. Genügende Genauigkeit liefern dagegen meist schon die Pendelschwingungen eines freihängenden Körpers von nicht zu ungeeigneter Form und Aufhängung. Man messe so bald nach der Erschütterung als möglich mit dem Compass die Richtung der Ebene der Schwingungen und deren Amplitude. Man messe, wäge und beschreibe möglichst genau den schwingenden Körper. Wenn beobachtet, ist natürlich auch die Richtung des ersten Ausschlags von Wichtigkeit. Mit Erfolg bedient sich der reisende Naturforscher auch für diese Beobachtungen seines in Compassaufhängung aufgestellten oder freihängenden Barometers an dessen unterem Ende eine kleine Hülse zur Befestigung eines kurzen Bleistifts angebracht ist. Unter dem Bleistift liegt ein dessen Spitze in der Ruhelage berührender Bogen weissen Papiers auf anderen nicht fest gefalteten Papierbogen,

deren Rücken je in einem rechten Winkel mit dem nächsten unter bzw. über ihm liegenden gelegt sind. Man erhält hierdurch eine ausreichend und gleichmässig gegen die Bleistiftspitze federnde Unterlage, auf welche dann bei einer erfolgten Erschütterung der Bleistift die Richtung und die Amplitude verzeichnet. Durch Ausgleichung der meist elliptisch gezeichneten Schwingungen auf eine mittlere gerade, durch künstlich herbeigeführte Controllversuche und andere Vorsichtsmaassregeln dürfte ein ausreichender Grad der Genauigkeit zu erreichen sein. Aber auch wenn das Barometer nicht bewegt worden ist, wird die Anbringung jener einfachen Vorkehrung, durch welche dasselbe als ein einfaches Seismometer benutzbar wird, sich oftmals lohnen, da nicht nur während Vulcanausbrüchen oft genug von Anderen schwächere Erschütterungen behauptet werden, deren Nichtigkeit der improvisirte Apparat sofort nachweist, sondern auch in oft erschütterten Ländern die von Fall zu Fall sich steigende nervöse Reizbarkeit gegen Erdstösse unter Umständen den Beobachter selbst irre führen kann.

Weniger genaue Resultate ergiebt naturgemäss die Beobachtung der Schwankungen von Flüssigkeiten in runden Becken und Schalen, da sich hierbei die Richtung, in welcher die Flüssigkeit am höchsten emporgeschlagen, immer nur annähernd bestimmen lässt.

Umgestürzte und fortgeschleuderte Körper. Bei jedem Erdbeben versäume man nicht, sofort nach solchen nachzuforschen. Sie werden kaum jemals fehlen. Man überzeuge sich genau, ob dieselben nicht nach ihrem Falle noch seitlich gerollt sind und messe dann vor allem mit dem Compass die genaue Richtung, in welcher dieselben umgestürzt bzw. geworfen wurden. Bei sehr einfacher Form messe und wäge man den Körper; ist derselbe geschleudert worden, so ist alsdann (wie oben angeführt) auch die verticale Höhe seines ursprünglichen Standorts über der Horizontalebene seines Auffalles und der horizontale Abstand dieses letzteren von jener Verticalen zu messen.

Seismometer. Allen, die aber nicht nur vorübergehend, sondern für längere Zeiten oder dauernd in einer oft erschütterten Gegend wohnen, den Herrn Consuln, Kaufleuten und Aerzten, die in solchen Gegenden wohnend, das schreckenerregende Phänomen mit Interesse zu beobachten pflegen, kann gar nicht warm genug die Aufstellung des einfachen oben (S. 324) beschriebenen Seismometers anempfohlen werden. Da man zu den (allerdings genau auszuarbeitenden) Säulchen und der Kugel sehr zweckmässig völlig trockenes und möglichst schweres Holz verwenden kann, so ist derselbe gewiss überall leicht und mit geradezu verschwindendem Kostenaufwande herzustellen. Derselbe bedarf kaum einer weiteren Beaufsichtigung. Seine Benutzung ist eine so einfache und bequeme, dass sie Niemandem Schwierigkeiten bereiten kann. Für seine Aufstellung sind leichte Hütten und Holzhäuser geeigneter, als schwer fundirte steinerne Gebäude, welche die Richtung schwächerer Stösse leicht ablenken können.

Spalten in Häusern (Mallet). Zunächst wird man schon die Gebäude, deren durch Erdbeben erzeugte Spalten man zur wissenschaftlichen Untersuchung verwenden will, mit Vorsicht auszuwählen haben. Isolirte oder doch fast isolirte Gebäude, die nicht zu sehr beschädigt worden, sind am geeignetsten und es werden die Resultate um so einfacher zu finden und um so genauer sein, je gleichmässiger das gesammte Material ist, aus welchem die Mauern des Gebäudes bestehen und je weniger die Mauern von zahlreicheren oder grösseren Lücken (Fenster, Thüren) unterbrochen werden. Einstöckige Gebäude (z. B. Kirchen) sind mehrstöckigen vorzuziehen. In

südlichen Gegenden und unter den Tropen wird es nicht schwer fallen, Häuser zu finden, die allen diesen Anforderungen genügen. Die zweckmässige Auswahl der Gebäude und Spalten muss eben dem Tact des Beobachters überlassen bleiben. Besonders gut ist nach Mallet bei dem von unten und übereck ein Gebäude treffenden Stosse, der an der abgelegenen Ecke oben abgesonderte Theil des Gemäuers, der oftmals ganz herausstürzt, zur Ermittlung der Stossrichtung geeignet. (Vgl. Holzschnitt S. 318.)

Bei der Aufzeichnung des Beobachteten wird man nicht umständlich genug sein können. Man messe mit der Diopterboussole genau das Azimut der gespaltenen Mauer, man messe den Abstand von dem oberen Anfang der Spalte bis zu den oberen Wandecken und ebenso das untere Ende von der unteren Wandecke, oder messe, falls die Spalte den Boden nicht erreicht, die anderweitigen Dimensionen, welche geeignet sind, die Lage und Richtung der Spalte in der Mauer festzustellen. Man gebe Länge und Weite der Spalten an. Man versäume nicht, Skizzen der beschädigten Gebäude zu zeichnen, um den Verlauf der Spalten sowohl, als die übrigen Verhältnisse zu fixiren. Notizen über die Bauart und Natur des Mauerwerks, etwaige Querwände, Stützen und Träger sind nicht zu vergessen. Die Mühe wird reichlich dadurch belohnt, dass schon zwei gute Beobachtungen an verschiedenen Orten genügen können, um die interessantesten Verhältnisse eines Erdbebens zu entwickeln.

Spaltenbildung. Sind durch ein Erdbeben Spalten gebildet worden, so ist zunächst von Interesse, ob diese nur im lockeren Boden oder im Felsen selbst sich vorfinden, ferner ob sie unabhängig vom Relief der Erdoberfläche sind, oder ob sie nur längs den Abhängen von Thälern und Flussläufen sich finden. Sind dieselben leer oder ausgefüllt und womit? Drang bei ihrem Aufreissen Sand, Staub oder was sonst aus ihnen hervor. Ihre Richtung, Länge, Tiefe und Breite ist zu bestimmen. Es ist zu ermitteln, ob die eine Seite der Spalte gegen die andere ihr Niveau verändert hat, oder ob die Spaltenbildung gar zu wirklichen Erdschlipfen geführt hat. Wenn keine äusseren Spalten entstanden, achte man doch auf die etwaige Veränderung von Quellen, in ihrer Wassermenge und Temperatur.

Dauernde Niveauveränderungen. Der sichere Nachweis dauernder Hebung oder Senkung eines Landstrichs, veranlasst durch ein Erdbeben, wie sie in der Regel nur längs der Seeküsten unmittelbar erkennbar sein werden, würde von besonderem Interesse sein.

Zusammenhang mit Vulcanen. Bei jedem Erdbeben, welches in der Nachbarschaft activer Vulcane eintritt, wird man sorgfältigst darauf zu achten haben, ob mit demselben irgend welche Veränderungen in dem Zustande dieser verbunden sind.

Vorausgegangener klimatischer Excess. Wo Messungen und längere Beobachtungsreihen vorliegen, empfiehlt es sich, zu prüfen, ob die einem Erdbeben vorausgegangene Zeit, etwa ein Jahr, excessive Abweichungen von dem normalen mittleren Klima, besonders in Bezug auf die Regenmenge erkennen lässt.

Regenzeit. Es wäre wünschenswerth, aus häufiger bewegten Tropengenden mit scharf begrenzten Regenzeiten, von verschiedenen Plätzen sorgsame über eine möglichst lange Reihe von Jahren sich hinziehende Aufzeichnungen aller am Orte empfundenen Erdstösse nebst gleichzeitigen Angaben über den alljährlichen Anfang (und Ende) der Regenzeit zu erhalten.

Thiere. Jede Beobachtung von Thieren, welche durch ein ungewöhn-

liches Benehmen, verrathen, dass sie das Erdbeben eher als die Menschen wahrnehmen, ist von Interesse. Es ist anzugeben, was für Thiere dies waren, welcher Art ihr Benehmen war, und so genau wie möglich, wie lange vor den von Menschen empfundenen Erschütterungen das letztere begann.

Beobachtungen an verschiedenen Plätzen. So wichtig oftmals auch eine isolirte Beobachtung über ein Erdbeben werden kann, so wird dieselbe doch offenbar in weit aus den meisten Fällen ihre wahre Bedeutung erst durch die Verknüpfung mit anderen und besonders mit gleichartigen Beobachtungen an anderen Plätzen erlangen. Gerade die wichtigste Untersuchung, die Frage nach der Lage und Tiefe des Erdbebenheerdes setzt ja stets die entsprechenden Beobachtungen an zwei oder sogar mehreren verschiedenen Plätzen voraus. Man wird daher stets bemüht sein müssen, alle gewonnenen Erfahrungen zu vervielfältigen und über einen möglichst grossen Theil des ganzen Erschütterungsgebietes auszudehnen.

Verbreitung. Dies Bestreben wird dann selbstverständlich auch sofort zu Erfahrungen über die Verbreitungsgrenzen und die Verbreitungsart führen. Die graphische Darstellung, die Einzeichnung in die Karte tritt dann in ihre Bedeutung. Für das Fixiren der Homoseisten, für die nach annähernd gleichstarken Wirkungen zu construirenden Iseisten ist sie natürlich unentbehrlich.

Schluss. Niemals aber versäume man, eine sichere und genaue Beobachtung über ein Erdbeben aufzuzeichnen und mitzutheilen, mag sie momentan auch noch so gering und unbedeutend erscheinen. Kann doch eine jede, gerade auf einem bisher so dürftig bebauten Felde, wie die Erdbebenkunde, neue Gesichtspunkte eröffnen und der Anfangspunkt werden für wichtige neue Forschungen *).

*) Zum Schluss möge es gestattet sein, an alle diejenigen, welche zwar Beobachtungen über Erdbeben angestellt oder gesammelt haben, dieselben aber nicht selbst zu bearbeiten und zu berechnen wünschen, die gehorsamste Bitte zu richten, dieselben zu diesem Zwecke dem Schreiber dieses gütigst zuschicken zu wollen.

Adresse: Dr. K. v. Seebach, Professor der Geologie zu Göttingen (Preussen).

Nachtrag.

Erst während der letzten Revision obiger Notizen erschien die verdienstvolle Schrift: A. v. Lasaulx, das Erdbeben von Herzogenrath, Bonn, M. Cohen u. Sohn 1874. In derselben wird für genaue Zeitbestimmungen ein neues sinnreiches Seismometer, als „Seismochronograph“, vorgeschlagen, das für häufig controllirte und sehr genau gehende Uhren den Vorzug zu verdienen scheint. Dasselbe ist an jeder Pendeluhr (Regulator etc.) anzubringen. Zu sehr mässigem Preise kann es von Herrn Mechaniker Eschbaum in Bonn bezogen werden, wobei entweder die Tiefe des umschliessenden Gehäuses oder die Länge des frei schwingenden Pendels der Uhr, an welcher es angebracht werden soll, anzugeben ist.

Pflanzengeographie.

Von

A. Grisebach.

Dem wissenschaftlichen Reisenden pflegt sich im Bereich pflanzengeographischer Thatsachen zuerst die Frage aufzudrängen, ob er durch seine botanischen Studien zu den Beobachtungen hinlänglich vorbereitet sei. Allein seine Vorbereitung hat auf den Werth seiner Leistungen einen weniger bedeutenden Einfluss, als in anderen Gebieten der Naturwissenschaft. Es ist wichtiger, dass ihm die natürliche Begabung zu Gebote steht, den landschaftlichen Charakter eines Landes aufzufassen und durch die Vergleichung mit heimathlichen oder aus frühern Reisen geschöpften Natureindrücken in der Mannigfaltigkeit der Einzelheiten das Eigenthümliche zu erkennen, als dass ihm der Besitz einer umfassenden Pflanzenkenntniss von entscheidendem Vortheil sein könnte. Denn auch der Botaniker von Fach, der sich diesen Vorzug erworben hat, ist auf Reisen in fremden Ländern nicht im Stande, seine Beobachtungen auf eine sichere Kenntniss der Pflanzennatur zu gründen, von der doch jedes brauchbare Ergebniss bedingt ist. Es bleibt ihm nichts übrig, als diejenigen Pflanzen einzusammeln, über deren geographische Verbreitung er Nachrichten zu geben denkt: erst nach seiner Rückkehr findet er Gelegenheit, die genaue Untersuchung der Arten, welche eine Vergleichung in grossen Museen voraussetzt, nachfolgen zu lassen. Diese Arbeit aber kann ebensowohl von anderen vorgenommen werden, als vom Reisenden selbst. Wer also ohne specielle botanische Kenntniss nur das für die Feststellung pflanzengeographischer Thatsachen Geeignete zu sammeln versteht, kann sich später der Hülfe von Botanikern bedienen und hierdurch den Mangel eigener Vorstudien ersetzen.

Es giebt jedoch eine Reihe von Aufgaben, welche nur diejenigen Reisenden zu lösen im Stande sind, denen eine genügende botanische Vorbildung zu Gebote steht. Nur sie vermögen durch ihre Sammlungen eine vollständige oder doch die grosse Mehrzahl der Arten umfassende Kenntniss der vegetabilischen Erzeugnisse eines Landes vorzubereiten. Hierzu ist zunächst die ohne langjährige Uebung und eigene systematische Arbeiten nicht zu erwerbende Fähigkeit erforderlich, verwandte Arten zu unterscheiden und die Eigenthümlichkeiten ihres Baues mit Leichtigkeit aufzufassen. Wie viel

in dieser Beziehung von angeborenem Talent und erworbener Geschicklichkeit abhängt, geht schon daraus hervor, dass selbst in den am meisten durchforschten Gegenden Europas für gewisse Gattungen die Fragen über den Variationskreis der Arten oder die durch hybride Befruchtung entstandenen Individuen nicht erschöpft sind und die Einsicht in die unveränderlichen Normen der Gestaltung, also die Kenntniss der Flora erst allmählig fortschreitet. Sodann sind aber auch zugleich die Erfolge botanischer Reisen von der Dauer des Aufenthalts an zweckmässig gewählten Oertlichkeiten bedingt. Bei einer raschen Bewegung durch unerforschte Gebiete bleiben die Sammlungen in demselben Verhältniss unvollständig. Da in der Regel nur solche Arten sicher erkannt werden können, die mit Blüthe und Frucht gesammelt wurden, und da auch anderweitige Beobachtungen über die jährlichen Entwicklungsphasen gerade in geographischer Hinsicht von hohem Werthe sind, so ist hierüber maassgebend, was Spruce nach seinen vieljährigen, so erfolgreichen Forschungen am Amazonas ausgesprochen hat. Weil daselbst jeder Monat des Jahres neue Blüthen hervorbringe, bemerkt er, und weil die Vegetation von den Quellen des Stroms bis zur Mündung mehrfach wechselt, so sei mindestens ein einjähriger, an verschiedenen Punkten des Thalweges wiederholter Aufenthalt unerlässlich, um einen gewissen Grad der Vollständigkeit der Sammlungen zu verbürgen. Endlich giebt es noch eine andere Classe von Beobachtungen, welche nur der bereits mit hinlänglicher Artenkenntniss ausgerüstete Botaniker und auch dieser nur dann unternehmen kann, wenn er sich Jahre lang an demselben Orte ansässig gemacht hat. Dazu gehört namentlich die Feststellung des Einflusses, den die Beschaffenheit der Erdkrume und die geognostische Unterlage auf das Vorkommen bestimmter Pflanzen äussert. Denn sie erfordert nicht bloss den Nachweis, dass sie auf gewissen Bodenarten auftreten, sondern auch dass sie auf anderen Substraten fehlen, was meist nur durch langjährige Vergleichen und in Verbindung mit Bodenanalysen zu ermitteln ist. Ebenso bedürfen auch die Untersuchungen über die natürlichen Wanderungen der Pflanzen, wodurch sie auf neue Standorte übergehen und die Vegetation eines Landes allmählig verändern können, wegen ihrer Langsamkeit oder auch, weil sie selten in die Erscheinung treten, einer unausgesetzten Aufmerksamkeit, wie sie in grösserem Umfange nur an dem Wohnorte eines Botanikers aufzuwenden ist.

Solche topographische Beobachtungen sind demnach von den Aufgaben der Reisenden auszuschliessen oder können doch nur gelegentlich in Betracht kommen. Ebenso wenig aber sollen sich die folgenden Anweisungen auf diejenigen Arbeiten beziehen, die dem Botaniker von Fach obliegen, mögen sie nun auf den Reisen selbst oder später in den Museen ausgeführt werden. Denn diese fallen wesentlich mit dem zusammen, was der die Aufgaben wissenschaftlicher Reisenden im Bereiche der systematischen Botanik behandelnde Abschnitt dieses Buches zu erörtern hat. Indem ich also demgemäss den Umfang des hier Mitzutheilenden einschränke, stelle ich mich auf den Standpunkt eines Reisenden, der, ohne durch botanische Fachstudien vorbereitet zu sein, ein Land betritt, dessen Vegetation ihm fremdartig gegenübersteht. Das Charakteristische wird er aufzufassen vermögen, wenn er, von der Bekanntschaft mit den heimischen Vegetationsformen ausgehend, diese durch vergleichende Anschauungen in botanischen Gärten erweitert hat. Auch muss er in den Handgriffen geübt sein, um Sammlungen getrockneter Pflanzen in der Weise anlegen zu können, dass die Arten in der Folge systematisch festgestellt werden können. Da solche Herbarien, wie

wir sehen werden, einen beschränkten Umfang haben, wird ihre Herstellung indessen nur wenig Zeit und Geschicklichkeit beanspruchen.

Die Vegetation ist der unmittelbarste Ausdruck der geographischen Stellung eines Landes und dadurch zugleich von dessen klimatischer Eigenthümlichkeit. Von jedem Reisenden muss daher gefordert werden, dass er eine anschauliche Darstellung von der vegetativen Bekleidung des Bodens entwerfe, durch welche innerhalb der durch das Relief bestimmten Grenzlinien des Landschaftsbildes die Physiognomie der Natur in ihrem ursprünglichen Zustande fast allein bedingt wird. Diese Charakteristik kann durch Zeichnungen und Photographieen gewinnen, aber nicht ersetzt werden. Denn auch die gelungensten Landschaftsbilder aus fernen Erdtheilen, wie wir deren von Kittlitz, Rugendas und Andere besitzen, sind wegen ihres verkleinerten Maassstabes ungeeignet, die Pflanzen hinreichend kenntlich zu machen, welche der Vegetation das örtliche Gepräge verleihen. Es bedarf um die vergleichende Geographie zu fördern, der systematischen Bezeichnung solcher Gewächse, und zu diesem Zwecke einer angemessenen Auswahl nach ihrer physiognomischen Bedeutung, der Aufbewahrung derselben zu späterer Untersuchung.

Der Reisende wird sich leicht überzeugen, dass die Physiognomie der Landschaft zunächst von der Gestaltung der Vegetationsorgane abhängt, welche den Pflanzen zur Ernährung dienen, dass hingegen ihre Blüten und Früchte, von denen ihre Fortpflanzung ausgeht, in dieser Beziehung von untergeordneter Bedeutung sind. Viele Sträucher Australiens und des Caplandes stimmen in ihrem Wuchs und in der Belaubung so sehr überein, dass man sie im Landschaftsbilde und selbst in den Treibhäusern erst dann unterscheidet, wenn sie in Blüthe treten, und doch gehören sie nach ihrer systematischen Stellung, da das Pflanzensystem auf den Bau der Fortpflanzungsorgane gegründet ist, zu den verschiedensten Familien. Der Sammler der für die Landschaft charakteristischen Gewächse muss zwar blühende und Frucht tragende Exemplare auswählen, weil nur diese zur systematischen Feststellung der Arten geeignet sind, aber er bedarf einer nach den Vegetationsorganen gegliederten Bezeichnungsweise der physiognomisch verbundenen Formen, um eine anschauliche Darstellung des landschaftlichen Charakters geben zu können. Diesem Bedürfniss entspricht Humboldt's System der Vegetationsformen, welches, in gleichem Sinne weiter ausgebildet, zugleich noch einen andern Gesichtspunkt darbietet, der für den Fortschritt der Pflanzengeographie noch wichtiger ist, als die blosse Beschreibung der bereisten Landschaften.

Die Vegetationsformen sind nämlich in weit höherem Maasse, als die von den Fortpflanzungsorganen abgeleiteten, systematischen Gliederungen des Pflanzenreichs, ein Maassstab für die klimatischen Abstufungen, von denen die geographische Anordnung der Gewächse bedingt wird. Die Familie der Gräser reicht so weit, wie das Pflanzenleben auf gelockertem Erdreich überhaupt, aber die Savannengräser tropischer Klimate zeigen eine andere Bildungsweise der Vegetationsorgane, als die Wiesengräser höherer Breitengrade. Die Pflanzengeographie hat nicht bloss die Aufgabe einer botanischen Erdbeschreibung, sondern sie hat das höhere Ziel, den Ursachen nachzuforschen, durch welche die heutige Anordnung der Gewächse bestimmt worden ist. Der geologische Theil dieser Untersuchungen, der die Entstehung der Arten, sowie den Ausgangspunkt und die Richtung der Pflanzenwanderungen zum Gegenstande hat, steht mit den systematischen Forschungen der Botaniker im engsten Zusammenhang und entzieht sich in gleichem Maasse

dem Berufe des wissenschaftlichen Reisenden. Die Vergleichung hingegen der Vegetation eines Landes mit den klimatischen Factoren, von denen ihre Entwicklungsphasen bedingt werden, ist ein Gebiet, welches seiner Thätigkeit sich öffnet und wodurch ausserdem sein Blick geschärft wird, die natürlichen Hilfsquellen der Länder richtiger aufzufassen. Als werthvoll sind besonders die Beobachtungen zu bezeichnen, wo dem Reisenden zuerst eine neue Vegetationsform begegnete, weil aus diesen geographischen Grenzlinien sich häufig bestimmte, klimatische Grenzwerte ableiten lassen, an welche das eben noch mögliche Fortkommen jener Form gebunden ist.

Das System der Vegetationsformen ist so einfach und übersichtlich, dass, um sich darin zu orientiren und Verwechslungen vorzubeugen, eingehendere botanische Studien nicht erforderlich sind. Wenn in der nachfolgenden Zusammenstellung desselben einige allgemeinere klimatische Momente berücksichtigt werden, so ist hierüber zu bemerken, dass damit nichts weiter beabsichtigt ist, als einen ersten Anhaltspunkt zu geben, wo die einzelnen Vegetationsformen zu erwarten sind. Nirgends mehr, als in der organischen Natur, haben alle Bemühungen, den Begriffen und Wechselbeziehungen eine systematische Form zu geben, nur einen typischen Werth, so dass, um gewisse Thatsachen logisch zu ordnen, den Ausnahmen und Uebergängen kein Platz eingeräumt wird.

Vegetationsformen, die in kalten Klimaten die Physiognomie der Landschaft bestimmen.

Erdlichenen. Zellenpflanzen von nicht grüner Färbung und ohne Belaubung.

Laubmoose. Zellenpflanzen mit grünen Blättern.

Vegetationsformen, die in höheren Breiten und auf höheren Gebirgen der Nordhemisphäre vorkommen, wo die Vegetationsperiode nicht durch Dürre, aber durch Kälte des Winters unterbrochen wird, zum Theil im antarktischen Amerika wiederkehrend.

I. Bäume mit verzweigter Krone.

Nadelhölzer. Blätter nadelförmig, starr, immergrün.

Cypressenform. Zweige mit anliegenden, immergrünen Blättern von sehr geringer Grösse bedeckt.

Buchenform. Blätter breit, ungetheilt, biegsam: Belaubung periodisch.

Lindenform. Blätter abgerundet, mit mehreren Hauptadern, die vom Grunde in die Fläche eintreten.

Eschenform. Blätter einmal gefiedert.

II. Sträucher (vom Boden aus verzweigte Holzpflanzen).

Rhamnusform. Blätter biegsam. Belaubung periodisch.

Krummholzform. Blätter nadelförmig, starr, immergrün (der Erikenform an der Höhengrenze der Wälder in gewissen Gebirgen entsprechend, Zweige niedergedrückt.)

III. Gräser.

Wiesengräser. Rasen aus biegsamen Blättern.

Rohrgräser. Halm hochwüchsig, mit entfernt stehenden Blättern.

Vegetationsformen, die über den grössten Theil der Erde verbreitet sind (ubiquitäre Formen).

I. Auf Sumpfboden.

Cyperaceenform. Grashalm ohne Knoten.

II. An fliessendem Wasser.

Weidenform. Sträucher und Bäume mit schmalen, biegsamen, ungetheilten Blättern: Belaubung periodisch.

III. Sträucher und Stauden, die gegen excessive Temperaturgrade oder gegen Dürre durch ihre Organisation geschützt sind.

Erikenform. Sträucher mit nadelförmigen, starren, immergrünen Blättern.

Myrtenform. Sträucher mit glänzend grünen, starren, immergrünen Blättern unter Zollgrösse.

Oleanderform. Sträucher mit glänzend grünen, starren, immergrünen Blättern über Zollgrösse.

Dornsträucher. Sträucher, deren Belaubung durch Bildung von Dornen in der Entwicklung gehemmt wird.

Chenopodeenform. Sträucher und Kräuter mit saftigen Blättern, die eines Vorraths von alkalischen Salzen im Boden bedürfen. (Halophyten.)

Stauden und Halbsträucher. Kräuter, die durch einen Wurzelstock perenniren und die Halbsträucher genannt werden, wenn der Stengel zugleich am Grunde verholzt.

IV. Gräser.

Annuelle Gräser. Gräser ohne Rasenbildende Verzweigung. (Mittelmeergebiet, Californien.)

Vegetationsformen, welche der kurzen Vegetationsperiode des Steppenklima's entsprechen.

Tamariskenform. Sträucher mit anliegenden Blättern von sehr geringer Grösse.

Zwiebelgewächse. Kräuter, die durch unterirdische Zwiebeln oder Knollen perenniren: Stengel mit einer Laubrosette am Boden.

Stoppengräser. Grasrasen aus starren Blättern.

Vegetationsformen, welche die subtropischen und tropischen Zonen bewohnen und gegen die Dürre der trockenen Jahreszeiten durch ihre Organisation geschützt sind.

I. Holzgewächse.

Sykomorenform. Bäume mit verzweigter Krone und starren, ungetheilten Blättern: Belaubung periodisch.

Mimosenform. Bäume mit verzweigter Krone oder Sträucher, deren Blätter doppelt gefiedert und die Blattflächen klein sind.

Oschurform. Sträucher mit starren, immergrünen, glanzlosen, blaugrünen Blättern (der Proteaceenform in Sudan und Ostindien entsprechend).

Sodadaform. Sträucher mit starren, ungetheilten Blättern: Belaubung periodisch. (Sudan.)

Spartiumform. Sträucher ohne Laub, oder Blattbildung wenigstens unterdrückt.

Zwergpalmenform. Holzgewächse ohne Verzweigung: Laubrosette von getheilten Blättern auf verkürztem oder unterdrücktem Stamm. (Cycadeenform.)

II. Succulente Gewächse.

Agavenform. Saftreiche Laubrosette am Boden. (Agaveen in Amerika, Aloe in Afrika).

Cactusform. Blattlose Saftgewächse. (Cacteen in Amerika, fleischige Euphorbien in Afrika.)

III. Schlinggewächse.

Cucurbitaceenform. Schlinggewächse ohne Holzstamm (der Convolvulusform entsprechend).

IV. Schmarotzer.

Loranthusform. Parasitische Sträucher mit starrer Belaubung.

V. Kräuter.

Gnaphaliumform. Kräuter mit Wollbekleidung.

Immortellenform. Kräuter mit allmählig austrocknenden Blumen.

VI. Gräser.

Savanengräser. Rasen von hohem Wuchs.

Vegetationsformen, welche der gleichmässigen Tropenwärme und starker Niederschläge bedürfen, daher gegen die Aequatorialzone an Bedeutung zunehmen, aber zum Theil die subtropischen Breitengrade erreichen.

I. Unabhängig von der Feuchtigkeit der Luft.

Palmen. Bäume ohne verzweigte Krone: Stamm durch eine Laubrosette von einmal getheilten Blättern gekrönt.

Pisangform. Bäume ohne verzweigte Krone: Stamm durch eine Laubrosette von ungetheilten, breiten Blättern gekrönt, deren Adern parallel verlaufen.

Clavijaform. Bäume ohne verzweigte Krone: Stamm durch eine Laubrosette von ungetheilten, breiten Blättern gekrönt, deren Adern netzförmig verbunden sind.

Pandanusform. Bäume ohne verzweigte Krone: Stamm durch eine Laubrosette von ungetheilten schmalen Schilfblättern gekrönt. (Liliceenbäume.)

Lorbeerform. Bäume mit verzweigter Krone: Blätter ungetheilt, breit, glänzend grün, starr, immergrün.

Olivenform. Bäume mit verzweigter Krone: Blätter ungetheilt, schmal, starr, immergrün.

Bombaceenform. Bäume mit verzweigter Krone: Blätter abgerundet, mit mehreren Hauptadern, die von der Spitze des Blattstiels in die Fläche eintreten (der Lindenform entsprechend, aber Stamm angeschwollen und mit am Grunde vorspringenden Holztafeln).

Tamarindenform. Bäume mit verzweigter Krone: Blätter einmal gefiedert (der Eschenform entsprechend, aber immergrün).

Banyanform. Bäume mit verzweigten und gegenseitig verbundenen Kronen, die durch Luftwurzeln gestützt werden.

Bambusenform. Bäume ohne abgesetzte Krone, mit seitlichen Büscheln von Grasblättern auf kurzen Zweigen an den Seiten des Stammes.

Lianen. Holzige Schlinggewächse mit netzaderigen Blättern.

Rotangform (Palmlianen.) Holzige Schlinggewächse mit Palmenblättern. (Monsungebiet.)

Convolvulusform. Schlinggewächse ohne Holztamm.

Bromelienform. Kräuter mit einer Laubrosette von Schilfblättern am Grunde des blühenden Stengels. (Amerika.)

II. Neben tropischen Niederschlägen einer feuchten Atmosphäre bedürftig.

Farnbäume. Bäume ohne verzweigte Krone: Stamm durch eine Laubrosette von mehrfach getheilten Blättern gekrönt.

Farnkräuter. Laub aus dem unterirdischen Stamm: Blätter mit frei im Gewebe endenden Adern.

Atmosphärische Orchideen. Gewächse, bei denen kein Organ in den Boden oder in eine Mutterpflanze eingesenkt ist.

Scitamineenform. Kräuter mit einer Laubrosette oder zweizeiliger Belaubung: Blätter ungetheilt, breit, mit parallelen Adern.

Aroideenform. Kräuter mit einer Laubrosette aus gestielten, pfeil- oder herzförmigen, oder getheilten Blättern.

III. Tropische Küstenbäume im Bereich von Ebbe und Futh.

Mangroveform. Bäume mit verzweigten und gegenseitig verbundenen Kronen, die durch neue, aus den Zweigen hervorkeimende Individuen gestützt werden.

Vegetationsformen Australiens (zum Theil auch des Caplandes), wo dürre Jahreszeiten von unregelmässiger Dauer eintreten.

Xanthorrhoeenform. Bäume ohne verzweigte Krone: Stamm durch eine Rosette von ungetheilten, schmalen, saftarmen Grasblättern gekrönt. (Australien, besonders im Südwesten des Continents.)

Eukalyptusform. Bäume mit verzweigter Krone und nicht periodischer Belaubung: Blätter starr, ungetheilt, glanzlos blaugrün, schief oder vertical gestellt. (Australien.)

Proteaceenform. Sträucher (oder Bäume) mit starren, immergrünen, glanzlosen, blaugrünen Blättern. (Australien und Capland, aber hier fast nur auf der südwestlichen Küstenterasse.)

Casuarinenform. Bäume mit verzweigter Krone von nackten Zweigen ohne Blätter. (Australien und gewisse Inseln des indischen und stillen Meeres).

Es erhellt aus dieser Uebersicht, dass dadurch keineswegs der Kreis von Bildungen erschöpft wird, durch welche die Ernährung den verschiedenen, äusseren Lebensbedingungen angepasst ist. So fehlen die einjährigen Kräuter, die den Winter nur in der Form des Samens überstehen, die Wurzelparasiten, die Humuspflanzen, die Pilze. Dies erklärt sich daraus, dass nur solche Vegetationsformen aufgenommen sind, welche zur geographischen Charakteristik verschiedener Länder und Klimate dienen können. Nur diese eignen sich, durch ihre Verbreitung die feinen und in vielfacher Richtung sich äussernden Beziehungen aufzuklären, welche zwischen der Organisation der Pflanzen und den klimatischen Einflüssen bestehen, die ihre Wanderungen beschränken. Solchen Verhältnissen nachzuforschen, ist eine anziehende Aufgabe für jeden Reisenden, der auf die in grossen Massen auftretenden oder in ihrer Gestaltung eigenthümlichen Gewächse seine Aufmerksamkeit richtet und sich zu diesem Zwecke mit dem System der Vegetationsformen vertraut gemacht hat. Der geographische Gesichtspunkt, der demselben zu Grunde liegt und wodurch es ungeachtet der unzähligen Uebergänge zwischen den einzelnen Formen allein gerechtfertigt wird, spricht sich

gleich Anfangs darin aus, dass die Moose und Lichenen zwar überall auf der Erde ihr Gedeihen finden, aber nur in den arktischen Ländern zu den Tundren sich verbinden, deren wenige Bestandtheile dadurch die Bedeutung einer besondern Vegetationsform erhalten. Unter den ubiquitären Formen haben aus gleichem Grunde nur solche Gewächse Aufnahme gefunden, bei denen die Abhängigkeit von bestimmten, örtlichen Bedingungen deutlich hervortritt. So stehen unter ihnen die Dornsträucher in einer augenscheinlichen Beziehung zur Trockenheit der Luft: denn obgleich sich dies keineswegs in jedem einzelnen Falle nachweisen lässt, weil dieselbe Einrichtung in der Organisation verschiedenartigen Zwecken dienstbar sein kann, so sind es doch die dürrn Klimate, wo die dornigen Gewächse eine unvergleichlich viel grössere Mannichfaltigkeit erreichen. Ebenso fehlt es zwar nirgends an einjährigen Gräsern, aber nur in zwei Floren der subtropischen Zone treten sie, so weit dies bis jetzt nachgewiesen ist, als massenhafte Bekleidungen des Bodens auf, wodurch der Zusammenhang zwischen der in diesen Breiten rasch eintretenden, feuchten Frühlingswärme mit ihrer kurzen Vegetationsperiode angedeutet wird. Wer nicht als Botaniker reist und nicht darauf ausgeht, botanische Sammlungen von möglichst grossem Umfange zusammenzubringen, muss sich von dem zerstreuen Uebermaass der topographischen Einzelheiten abwenden und seinen Blick für die allgemeineren Thatsachen der Pflanzengeographie zu schärfen suchen.

In dem System der Vegetationsformen sind auch die Wasserpflanzen übergegangen, weil das Studium ihrer geographischen Anordnung ebenfalls den botanischen Sammlern grossentheils überlassen bleiben muss. Höchstens sind Tiefenmessungen über das Vorkommen der am Boden des Meeres befestigten Algen eine Jedem zugängliche Beschäftigung, die um so wünschenswerther sein würde, als wir darüber erst wenige, sporadische Beobachtungen besitzen. Die Gewächse des süssen Wassers tragen wenig zur Charakteristik der Länder bei, wo sie vorkommen. Da die Temperatursphäre des Wassers geringer ist, als die der Luft, und da die Wasserpflanzen leichter durch Strömungen und durch Thiere verbreitet werden, so sind sie geographisch weit weniger abgeschlossen, als die Landpflanzen. Aus einer genaueren Kenntniss ihrer verticalen Verbreitung im Meere und in Landseen aber wird wahrscheinlich ein Gewinn für die Lösung der physiologischen Frage erwachsen, in wie weit die Vegetation verschiedener Algenformen von dem Lichteinflusse bedingt sei.

Die Auffassung der Vegetationsformen würde zu einer nur sehr unvollständigen und einseitigen Darstellung führen, wenn der Reisende nicht in gleichem Maasse auch ihre Anordnung berücksichtigte. Zu diesem Zweck muss er von dem Begriff der Vegetationsformationen ausgehen. Hierunter werden die botanischen Gliederungen der Erdoberfläche verstanden, sofern sie den Charakter der Landschaft bestimmen. Gleichmässig reichen sie durch grosse klimatische Gebiete, in der baltischen Ebene als Haiden, Wälder und Wiesen in stetem Wechsel wiederkehrend, oder, wie die Tundren der arktischen Zone, unermessliche Flächen mit einem einförmigen Teppich überkleidend. Die Bedingungen ihres Wechsels bestehen, so weit die klimatischen Einflüsse dieselben bleiben, in der Beschaffenheit und Bewässerung des Bodens, in der Mischung und Form der Nahrungsstoffe, welche dieser den Pflanzen darbietet. Aendern sich diese Verhältnisse im Laufe der Zeit, so kann auch auf demselben Boden ein Wechsel der Vegetationsformation eintreten. Rasch und in grossem Maassstabe können solche Aenderungen nur durch die Cultur herbeigeführt werden, im natürlichen Lauf der Dinge

werden sie höchstens einen säcularen Wechsel bewirken, wie derselbe in den Wäldern Dänemarks von Steenstrup nachgewiesen wurde. Je mehr die Natur sich selbst überlassen blieb, desto deutlicher sind daher die Formationen in ihrer gesetzmässigen Anordnung ausgeprägt und geben jeder Landschaft den Reiz eigenthümlicher Gestaltung.

Die Vegetationsformationen nach ihrem Gesamtleben aufzufassen, ihre durch Bildungsweise und Geselligkeit der Individuen hervorragenden Bestandtheile anzugeben und den physischen Bedingungen ihres Vorkommens nachzuforschen, ist eine Aufgabe des wissenschaftlichen Reisenden, die nur durch eine vergleichende Methode nach bestimmten Gesichtspunkten gelöst werden kann. Vor Allem hat er sich auch hier zu hüten, topographischen Einzelheiten einen zu grossen Werth beizulegen, da das Charakteristische eben in der Massenwirkung liegt. Wie die grossen Gebirgsketten eine ganz andere geographische Bedeutung haben, als die unregelmässig verschlungenen Hügelland, so verdienen nur solche Vegetationsformationen eine besondere Beachtung, die über weite Erdstriche ausgebreitet sind und dadurch Aufschluss darüber geben, was diese an organisirender Kraft leisten können. Die Natur spricht zu uns in grossen Zügen, aber sie zeichnet neben ihren wesentlichen Gebilden zugleich eine Mosaik von unzähligen Ornamenten, die fehlen könnten, ohne vermisst zu werden, und die der Reisende ohnedies nie würde erschöpfen können. Er muss wie der Künstler verfahren und den Charakter der Landschaft in seiner Darstellung zu idealisiren verstehen. Gerade die Schilderungen der Vegetationsformationen in Mitteleuropa leiden oft aus einem hier keineswegs zulässigen Streben nach Vollständigkeit an dem Mangel angemessener Gruppierung der Thatsachen und an dem Uebermaass von Einzelheiten, denen keine geographische Bedeutung zukommt. Sie scheiden ausserdem viel zu wenig aus, was die Natur erst unter dem Einfluss des Menschen geworden ist, wenn neben den Erzeugnissen des Waldes und der Wiesen auch die Pflanzen aufgezählt werden, die sich an Wegen oder auf Aeckern angesiedelt haben. In dem ursprünglichen Landschaftsbilde und in den Formationen, die es zusammensetzen, macht man sich da am sichersten heimisch, wo man in den Einöden der Steppen, der Wälder und Gebirge umherwandert, die von der Cultur unberührt blieben. Hier pflegen sie auch schärfer umgrenzt zu sein, die Bedingungen ihres Bestehens lassen sich leichter erkennen und weit seltener sind die Mittelstufen und Uebergänge, die oft nur die Folge einer beschleunigten Aenderung in der Beschaffenheit des Bodens sind.

In den von der Cultur weniger umgestalteten Ländern treten die Vegetationsformationen dem unbefangenen Blicke so bestimmt und selbständig gegenüber, dass ihre Unterscheidung hier den Bewohnern am geläufigsten ist und in deren Sprachen einen reicheren Ausdruck gefunden hat. Besonders zeigt sich dies bei den Colonisationen durch die Portugiesen, Spanier und Engländer, welche als die historischen Pioniere in Amerika, Südasien und Australien diese Bezeichnungen theils von den Eingeborenen entlehnt, theils selbst gebildet haben. Für die vergleichende Darstellung ist es von Wichtigkeit, die Bedeutung solcher, wenn auch nur in einzelnen Ländern, üblich gewordener Ausdrücke zu kennen; sie lassen sich wissenschaftlich verwerthen, wenn die entsprechenden Bezeichnungen zusammengefasst, auf die gleichartigen Erscheinungen anderer Floren übertragen und den Begriffen angereicht werden, die wegen ihrer Allgemeinheit in jeder Sprache sich wiederfinden. Hiezu ist die nachfolgende Uebersicht der bedeutendsten Vegetationsformationen bestimmt, in welcher zugleich diejenigen Charakterzüge

angedeutet sind, die in der Darstellung besonders berücksichtigt zu werden verdienen.

Wälder. Die wichtigsten Unterschiede ergeben sich aus der Geselligkeit der Baumarten, der Zusammensetzung aus einer einzigen oder mehrerer Baumformen, der Höhe des Wuchses der einzelnen Bestandtheile, der Beleuchtung der Zwischenräume oder in geschlossenen Beständen des Bodens und des Unterholzes, endlich der Verbindung der Bäume mit anderweitigen Vegetationsformen, mit denen sie zusammenzuleben bestimmt sind. Der einfache Baumschlag, die Folge der Geselligkeit einer einzelnen Art von Bäumen, ist die gewöhnlichste Erscheinung in der nördlichen, gemässigten Zone, die tropischen Wälder sind fast immer aus den verschiedensten Bäumen und Vegetationsformen gemischt. Die letzteren zerfallen in die feuchteren Bestände, wo die Mischung der Formen unter allen Formationen der Erde den höchsten Grad erreicht, und in die lichtereren Savanenwälder, deren periodische Bewässerung ihre Vegetationsperiode an ein kürzeres Zeitmaass bindet. Die immergrüne oder periodische Belaubung der Wälder ist in beiden Zonen an bestimmte Baumformen geknüpft, aber die erstere, in den höheren Breiten auf die Nadelhölzer eingeschränkt, wird in den feuchten Tropenwäldern zur herrschenden Erscheinung und behauptet sich in gleicher Weise auch jenseits des südlichen Wendekreises, wo die jährliche Temperaturvariation geringer ist, als in dem gemässigten Klima unserer Hemisphäre. Die Nebenbestandtheile des Waldes, das aus Sträuchern und Zwergbäumen bestehende Unterholz, Stauden und andere Schattengewächse, Schlingpflanzen, Epiphyten, die unter den Tropen vom Boden auf die Stämme hinaufkriechen oder parasitisch durch sie ernährt werden, alle diese mannichfaltigen Gebilde sind nach Vorkommen und Anordnung von dem Lichteinflusse bedingt. Sie können ganz fehlen, wenn die unteren Räume durch die Dichtigkeit der Baumkronen in Dunkel gehüllt sind; sie vereinfachen sich in den gemässigten Zonen in demselben Maasse, als die sich verschränkenden Blätter des Laubdachs ein durchscheinendes, aber gleichmässiges Licht in die Tiefe gelangen lassen, und sie erreichen die höchste Fülle in der Richtung zum Aequator, je mehr die durchbrochene Bildung der Baumgipfel den Eintritt greller Lichtreflexe zulässt und diese mit dem tiefen Schatten undurchsichtiger Organe sich berühren.

Wälder einfachen Baumschlags, die nach der Vegetationsform der Bäume unterschieden werden.

Nadelwälder, z. B. *Pine barrens* in den nordamerikanischen Südstaaten: *Pinus australis*; *Pinares* in spanischen Colonialländern; *Pinheiros* in Brasilien: *Araucaria brasiliensis*.

Laubwälder, z. B. *Postoakland* in Texas: Eichenwälder.

Tjemorowälder der Sundainseln: *Casuarina montana*.

Gemischte Wälder.

In Ostindien. *Jungle*: allgemeine Bezeichnung.

In Sudan. *Waldgalerieen*: Uferwaldlinien an den die Savanen durchströmenden Flüssen.

In Australien. *Brushwood* an feuchten Standorten der Creeks; *Cedrelawald* (*Cedar country*) in Queensland: mit Aufnahme indischer Formen.

In Brasilien.

Matovirgem: feuchte Urwälder; am Amazonas *Eta*, wenn sie ausserhalb, *Igapo*, wenn sie innerhalb des Ueberschwemmungsgebietes liegen (letzterer den *Pantanal*s in *Mattogrosso* entsprechend).

Capoes: Waldinseln, d. h. von offener Landschaft umschlossene Waldungen, deren Bestandtheile nach aussen an Grösse abnehmen, in Zwergbäume und in Gesträuche übergehen.

Capoires: Waldbildungen aus neuen Bestandtheilen, die an gelichtet gewesenen Orten innerhalb des Urwaldes entstehen.

Catingas: Savanenwälder mit grösstentheils periodischer Belaubung (den Chumicales auf dem Isthmus von Panama entsprechend).

Waldsavenen in Australien (Grasland der Colonisten), die diesem Continent eigenthümliche Formation, wo die mit einzelnen Bäumen der fast schattenlosen Eukalyptusform besetzten Weidelandschaften eine Mittelstufe zwischen den Wäldern und Savanen darstellen.

Gebüschformationen. Mit Sträuchern bedeckte Landschaftsgliederungen sind für das subtropische Klima besonders charakteristisch und haben in deren Bereich die mannichfachsten Bezeichnungen erhalten. Oberhalb der Baumgrenze in den Gebirgen entsprechen sie einer kürzeren Vegetationsperiode, als das Baumleben sie erfordert. Im Steppenklimate stehen sie unter ähnlichen klimatischen Bedingungen, aber auch in den offenen Landschaften höherer Breiten dehnen sie sich da über weite Räume aus, wo der Boden oder das Klima den Wald zurückdrängt. Grosse Verschiedenheiten zeigen die Gebüschformationen in der Höhe des Wuchses, der immergrünen oder periodischen Belaubung und in den Vegetationsformen, die sie zusammensetzen. Die Nebenbestandtheile treten weit mehr zurück, als in den Wäldern, weil die Sträucher gewöhnlich dem Boden eine dichte Bekleidung geben: in einzelnen Fällen nehmen sie auch Bäume auf, die sich einzeln oder gruppenweise aus dem Gesträuch erheben. Auch eine Mischung verschiedener Vegetationsformen ist in den Gebüschformationen eine viel seltenere Erscheinung, als in den Wäldern. Denn wie wohl sie ebenfalls bald aus einer einzigen, gesellig wachsenden Art bestehen, bald aus vielen verschiedenen Sträuchern zusammengesetzt sind, so ist doch im letzteren Falle die Bildungsweise der Vegetationsorgane einförmiger, als bei den Bäumen.

Haiden: mit niedrigen Sträuchern der Erikenform (*Calluna*) bewachsene Flächen in der baltischen Ebene; die westlichen Hochmoore desselben sind mit einer ähnlichen Formation bekleidet.

Brüche: Moräste im nordöstlichen Deutschland und Russland, die mit Birken- oder Erlengebüschen bewachsen sind.

Eichengebüsche: Eichengesträuche mit periodischer Belaubung, besonders in Ungarn und Rumelien.

Saliceten: Weidengebüsche an Flussufern.

Maquis: immergrüne, aus den Oleander-, Myrten- und Erikenformen bestehende oder aus denselben gemischte Gebüsch. Den corsicannischen Maquis entsprechen: die Garrigues in Südfrankreich, die Formation des Montebaxo in Spanien, die Macchie in Italien, die Xerovuni in Griechenland, die Bosjes am Kap, die Ambavilles auf den Maskavenen, die Carrascos in Brasilien.

Ginstergebüsch: Sträucher der Spartiumform und ähnliche Gebilde.

Tragantgebüsch: niedrige, dornige Sträucher von *Tragacantha* (Arten von *Astragalus*) im Orient.

Espinales: Dornsträucher in Chile. Diesen entsprechen die Chaparals in Texas.

Karroofelder: niedriges Gestrüpp aus holzigen Synanthereen am Cap, namentlich dem geselligen Rhinocerosbusch (*Elytropappus*).

Scrub: eigenthümliche Gesträuchformation Australiens, von undurchdringlich verwachsenen Sträuchern der Proteaceen- und Erikenform gebildet, aus denen hier und da auch wohl Bäume hervorragten.

Brigalow-Scrub: allgemeine Bezeichnung.

Callitris-Scrub (Pine forest): Scrub mit Bäumen von Callitris.

Bottle-tree-Scrub: Scrub mit Bäumen der Bombaceenform (Brachychiton).

Mezquites: Mimoseengesträuche in Texas.

Chanarsteppe: mit Holzgewächsen bekleidete Abschnitte der Pampas, die grossentheils mit niedrigem Gebüsch bewachsen gegen den Wendekreis auch Bäume und lichte Gehölze aufnehmen (Buschwälder).

Wiesen und Matten. Die Formation der Wiesen setzt ein zusammenhängendes Wurzelgeflecht von Rasen bildenden Gräsern voraus, welche den Boden mit einer dichten Vegetationsdecke bekleiden, aber sie nimmt auch als Nebenbestandtheil blühende Stauden auf, deren unterirdische Organe ebenfalls jenes Geflecht durchwachsen. Wenn dagegen die Stauden den Graswuchs zurückdrängen, entstehen jene Matten, die als Weideland oft gleichen Werth haben und in manchen Ländern, wie im Mittelmeergebiet, die Wiesen fast überall zu ersetzen pflegen. So sind auch in den europäischen Hochgebirgen die alpinen Matten für die Region oberhalb der Baumgrenze bezeichnend, für die Waldregion die Bergwiesen. Eigentliche Wiesen, in denen die Gramineen vorherrschen, fordern eine stetige Erneuerung des Wasserzuflusses während ihrer Vegetationsperiode; Halbgräser (Cyperaceen) treten an ihre Stelle auf sumpfigem Boden, wo das Grundwasser in Ruhe bleibt und dann leichter bis zur Oberfläche ansteigt. Auch diese Formationen sind, wie die übrigen, nach der Art der Bewässerung und unter klimatischen Einflüssen unter sich und mit der Steppenvegetation durch Uebergänge verbunden.

Wiesen begleiten in den höheren Breiten der Nordhemisphäre das fliessende Wasser, vom Quellgebiet der Gebirge und Wälder (Waldwiesen) bis zu den Küsten des Meeres. Auf den Alluvionen des See-strandes und der grossen Ströme werden sie Marschen, im arktischen Sibirien Laidie's genannt.

Matten.

Tomillares in Spanien: Matten des Mittelmeergebiets, aus Stauden und Halbsträuchern bestehend.

Alpenmatten: Matten der alpinen Regionen in den Hochgebirgen; sie heissen in der spanischen Sierra Nevada Borreguiles.

Wiesenmoore: mit Cyperaceen bewachsene Sümpfe und schwimmende Inseln (im deutschen Sprachgebrauch nicht immer von den Brüchen unterschieden). Eine besondere, durch das Wollgras bezeichnete Bildung in den höheren Breiten ist die Eriophorenformation.

Parklandschaften entstehen aus der Verbindung von Wiesen mit Baumgruppen und Waldinseln. Solche Grasfluren mit hohen Stauden, wo durch die Aufnahme von Bäumen die Physiognomie der Landschaft der künstlichen Gruppierung des englischen Parks ähnlich wird, sind für die Floren des Amurgebiets, sowie von Kamtschatka und von Californien charakteristisch.

Rohrdickichte. Mit geselligen Rohrgräsern sind oft auf weiten Strecken die Ufer an den Mündungen der Ströme und ihre Deltabildungen

dicht bewachsen. In niederen Breiten gehen die Rohrgräser durch die Holzbildung ihres Stammes allmählig in die Baumform der Bambusen über, welche die Bambusenwäldungen bildet und im östlichen Asien weit in die gemässigte Zone hinaufreicht. Dieser Formation entsprechen auch die Cane-breaks in den südlichen Staaten Nordamerikas (aus *Arundinaria* bestehend).

Savannen. Jenseits des nördlichen Wendekreises erstrecken sich durch die Tropenzone und in südlichere Breiten die Savannen, mit Stauden gemischte Grasfluren, die eine geringe Temperaturvariation und ein schärferer Gegensatz nasser und trockener Jahreszeiten hervorruft. Von den Steppen der gemässigten Zonen unterscheiden sie sich durch den im Allgemeinen höheren Wuchs der Savanengräser, welche die Bekleidung des offenen Bodens bilden, weit bestimmter aber durch die Aufnahme von Bäumen, die entweder zerstreut unter den Gräsern wachsen oder die Savannenwälder und Waldgalerien bilden.

Savannen. Sie heissen Pens in Jamaika, Llanos in Venezuela, Campos in Brasilien.

In Brasilien werden unterschieden:

Taboleiro coberto: Grasflur mit zerstreutem oder vereinzelt Baumwuchs.

Campo aberto: Grasflur mit zerstreuten Liliaceenbäumen.

Campo serrado: Grasflur mit zerstreuten Gebüsch (den Carrascos).

Campo vero: reine Grasflur. Dieser entsprechen die Älängfelder auf den Sundainseln.

Bay of Biscayland in Australien: Grasflur mit niedrigem und seltenem Baumwuchs.

Steppen. Sie sind eine Wirkung des Steppenklimas, wo durch die Dauer regenloser Jahreszeiten oder auch des Winters die Entwicklung der Vegetation auf wenige Frühlingsmonate eingeschränkt wird und nur bei gewissen, durch ihre Organisation geschützten Formen sich über ein längeres Zeitmaass ausdehnen kann. Sofern die Bewässerung des Bodens von den atmosphärischen Niederschlägen abhängt, ist daher der Ackerbau ausgeschlossen, und die Bewohner werden, um Viehzucht oder Jagd zu betreiben, zum Nomadeleben genöthigt. Diese physischen Bedingungen treten am reinsten im Innern der beiden Continente der Nordhemisphäre ein, wo ein strenger Winter auf den regenlosen Sommer folgt. Die Steppen in der südlichen gemässigten Zone stehen vermöge ihrer gleichmässigeren Temperatur den Savannen näher, von denen sie weniger durch ihr Klima, als durch ihre Vegetationsformen abweichen: sie sind für die Viehzucht geeigneter und gewähren auch einer sesshaften Bevölkerung hinreichende Hilfsquellen, zu bestehen. Die Vegetationsformationen sind in den Steppen durch die Beschaffenheit der Erdkrumen am deutlichsten geschieden. Die Grassteppe ist von den Steppengräsern nur unvollständig bewachsen, die Zwischenräume ihrer Rasen werden auch von anderen Gewächsen nicht vollständig ausgefüllt und schon durch diese Stellen nackten Erdreichs entsteht ein ganz anderes Landschaftsbild, als die Formationen der Wiesen und Matten gewähren. Wenn der Steppenboden Natriumverbindungen enthält, erzeugt derselbe die Formation der Salzsteppe, wo die saftreichen Blätter der Halophyten eine längere Vegetationsperiode gestatten. Durch die Strauchformen der Chenopodeen und durch ihr dichteres Wachsthum bildet die Salzsteppe den Uebergang zu den mit Gebüsch bewachsenen Abschnitten des Steppenklimas, die oben erwähnt wurden. Zur Sandsteppe endlich wird die Grassteppe dadurch, dass die sandigen Erdkrumen das Wasser in die Tiefe entlassen: nun löst

sich die Vegetation zu vereinzelter Individuen auf und, indem das nackte Erdreich sich weiter ausbreitet, verliert der Boden als Weidegrund völlig seinen Werth.

Grassteppen: die in den Steppen nutzbaren Weidelandschaften. In Australien werden sie als Desert oder als offene Niederungen (open downs) bezeichnet, aber hier wohl kaum von den Sandsteppen unterschieden. Potrerros sind in Chile die eingehägte Weidegründe, in Südbrasilien werden darunter von Wald umschlossene Pampas verstanden.

Salzsteppen. Dazu gehört auch die persische Salzwüste. In den Pampas werden sie Salinas genannt.

Wüsten. Der Begriff der Wüsten beruht auf ihrer Unbewohnbarkeit, die wiederum die Folge einer Vegetation ist, die entweder keinen Nahrungswerth hat oder zu spärlich ist, um die Viehzucht zu unterhalten. Das Erstere ist der Fall in den Polarwüsten (den Tundren), das Letztere in den Wüsten der regenlosen Gebiete, die nur da belebt sind, wo die Vegetation durch die Quellen der Oasen oder durch von auswärts eintretende Flüsse bewässert wird. Von den Sandsteppen unterscheiden sich diese weniger durch ihre Vegetation, als dadurch, dass hier auch die periodischen Niederschläge fehlen, die jenen zukommen. Die Polarwüsten im Norden von Asien und Amerika sind eine Wirkung des unterirdischen Eises, durch dessen Aufschmelzen im Sommer die Temperatur der Bodenfeuchtigkeit gehindert wird, sich so weit zu heben, dass zur Weide geeignete Pflanzen bestehen könnten: indessen fehlen doch wenigstens der Lichenentundra die spärlichen Nährstoffe nicht, mit denen das Rennthier sich begnügt.

Tundren: Formation der Erdlichenen (Lichenentundra) und der Laubmoose (Moostundra, Polytrichumtundra).

Regenlose Wüsten in der tropischen und subtropischen Zone. In der Sahara unterscheidet man:

Areg: Wüste mit Sanddünen.

Hammada: steinige Wüste.

Wadi's: wasserlose Thalbildungen.

Oasen: Palmenwald in Folge unterirdischer Wasserzuflüsse.

Reisen in gebirgigen Gegenden und Hochländern geben den Anlass, sich mit dem Studium der Regionen zu beschäftigen, worunter die klimatischen Abstufungen der Vegetation nach Höhengrenzen verstanden werden. Die physischen Bedingungen, welche die verticale Anordnung der Pflanzen beeinflussen, sind weit leichter und sicherer zu erkennen, als die verwickelte Frage über die Beziehungen zwischen Klima und Vegetation auf ebenen Bodenflächen gelöst werden kann. Die Abnahme der Wärme mit dem Niveau ist das die Regionen scheidende Moment, und diese tritt so rasch ein, dass auf dem engen Raume geneigter Abhänge die vergleichenden Beobachtungen in wenigen Stunden zum Abschluss gelangen. Dazu kommt, dass die Pflanzen in ihrem Kampf um den Besitz des Bodens hier leicht zu den so nahe gerückten Niveaugrenzen vorrücken, jenseits derer sie nicht mehr bestehen können. In den Ebenen dagegen vertheilt sich die allmälige Abstufung der klimatischen Werthe auf weite Länderstrecken, und an den Linien, wo eine bestimmte Pflanzenart beginnt oder aufhört, ist es schwierig zu ermitteln, ob sie wirklich die Grenze ihrer klimatischen Sphäre erreicht hat, oder, wie es weit häufiger der Fall ist, noch weiter im Laufe der Zeit sich ausbreiten und andere Gewächse verdrängen könnte.

Uebrigens bieten die Regionen im verkleinerten Maassstabe verticaler Anordnung dem Beobachter ganz denselben Kreis von Erscheinungen, wie die Vegetationsformen und Formationen der Ebene. In den meisten Gebirgen ordnen sich diese nach der Höhe des Wuchses: je mehr man nach aufwärts der Schneelinie sich nähert, desto kleiner wird der Maassstab der Vegetationsorgane, weil mit ihrer Grösse der Anspruch an die Dauer der Entwicklungsperiode zunimmt und diese mit der geringeren Erwärmung sich verkürzt. Das Niveau der Baumgrenze gehört daher, ebenso wie das der Linie des ewigen Schnees, zu den bedeutendsten und auffallendsten Wendepunkten in dem Charakter der Gebirgslandschaft. Schon aus der Ferne von den Ebenen aus in langen Horizontallinien erkennbar, aber im Einzelnen je nach der örtlichen Erwärmung und andern Einflüssen vielfach verschoben, fordern diese Werthe auf, aus vervielfältigten Höhenmessungen ihr mittleres Niveau zu bestimmen und mit der verticalen Abnahme der Wärme zu vergleichen. Zwischen der Baumgrenze und Schneelinie liegt die alpine Region, in welcher wiederum Sträucher und höhere Stauden die Räume zu bekleiden pflegen und weiter aufwärts die Gewächse an Grösse abnehmen. An den bewaldeten Abhängen der Gebirge lassen sich ebenfalls in der Regel bestimmte Regionen nach den herrschenden Vegetationsformen unterscheiden, in der nördlichen, gemässigten Zone eine obere Region der Nadelhölzer, eine untere von Laubwäldern. Unter den Tropen sind die Regionen in gewissen Hochländern mit solcher Bestimmtheit geschieden und als Ausdruck der verticalen Wärmeabnahme erkannt worden, dass sie von den Einwohnern eine besondere Bezeichnung erhalten haben. Beispiele davon dienen zur Erläuterung des Humboldt'schen Satzes, dass in der tropischen Zone die Pflanzen in verticalem Sinne ähnlich geordnet sind, wie sie auf den Tiefebene der ganzen Hemisphäre in der Richtung vom Aequator zum Pol nach einander in die Erscheinung treten.

Regionen in Abessinien.

Kola (0'—5500'): Thäler mit tropischen Vegetationsformen.

Woina-Deka (5500'—7500'): Coniferen und Weinban.

Deka (7500'—12000'): Erikenregion.

Regionen in Mexiko.

Tjerra caliente (0'—3000'): heisse Region mit überwiegend tropischen Familien.

Tjerra templada (3000'—6000'): Region immergrüner, mit tropischen Formen gemischter Eichenwälder.

Tjerra fria (6000'—12300'): Region der Eichen- und Nadelholzwälder bis zur Baumgrenze.

Regionen in Peru.

Montaña (950'—4700'): tropische Region am Ostabhang der östlichen Kordillere.

Sierra (3750'—10200'): gemässigte Region der westlichen und des Westabhanges des östlichen Kordillere.

Ceja (4700'—7500'): Cinchonregion am Ostabhang der östlichen Kordillere.

Puna (10200'—13100'): alpine Region der Hochebene zwischen beiden Kordilleren.

Aus der Vergleichung solcher landesüblichen Landschaftsbezeichnungen ergibt sich schon, dass die Eintheilung der Gebirge in Regionen bis zu einem gewissen Grade willkürlich ist. Zum Zweck vergleichender Darstellung

erscheint es am passendsten, von der Stufenfolge der herrschenden Vegetationsformen auszugehen und den dadurch bestimmten Regionen andere Gliederungen unterzuordnend, die für einzelne Gebirge bezeichnend sind, aber keine allgemeine Bedeutung haben. Nach diesem Grundsatz würden z. B. in Mexiko über der tropischen Region (0'—6000') die Regionen der reinen Eichenbestände (—7800'), der Nadelhölzer (—12300') und die alpine Region bis zur Schneelinie (12300—13900') zu unterscheiden sein. In der nördlichen Hemisphäre geht dann mit zunehmender Breite von diesen vier Hauptgliederungen eine nach der andern verloren, zuerst die tropische, im höhern Norden auch die Abstufung der Laub- und Nadelhölzer, bis zuletzt jenseits der arktischen Baumgrenze nur noch die alpine Region übrig bleibt.

Eine grössere Schwierigkeit für die Unterscheidung von Regionen entsteht dadurch, dass sie in gewissen Gebirgsländern, namentlich innerhalb der Tropen, nicht als abgesonderte Formationen von einander geschieden sind, sondern durch Uebergänge allmählig sich verwischen. Dies ist der Fall in den Waldregionen des indischen Monsungebiets, wo einzelne tropische Vegetationsformen bis zu bedeutenden Höhen im Gebirge ansteigen. Hier kann die zum Zweck der Darstellung doch nothwendige Eintheilung, wie es auch in den Grenzgebieten natürlicher Floren vorkommt, nicht von den herrschenden Vegetationsformationen, sondern muss aus der Stufenfolge klimatischer Werthe abgeleitet werden. Nichtsdestoweniger ist es auch hier die Aufgabe des Reisenden, die verticale Anordnung der Vegetation durch Höhenmessungen festzustellen. Denn jede einzelne Pflanzenart hat ihre klimatische Sphäre, ebenso sehr wie jede Vegetationsform. Das Niveau also, welches den physiognomisch bedeutenden Gewächsen eine Grenze setzt, kann im Einzelnen bestimmt werden. Hierbei ist anzurathen, die Messungen der oberen Niveaugrenzen nicht während des Ansteigens, sondern beim Herabsteigen vorzunehmen, weil es leichter zu beobachten ist, wann ein Gewächs zuerst dem Blicke begegnet, als wo es sich verliert.

Bei der Einsammlung der Pflanzen, welche dem Reisenden zur Grundlage der Darstellung des Vegetationscharakters einer Landschaft dienen sollen, ist die zweckmässige Auswahl das erste Erforderniss. Hierüber lassen sich weiter keine Regeln geben als dass es darauf ankommt, die vorkommenden Vegetationsformen nachzuweisen und diejenigen Arten in die Sammlung aufzunehmen, von denen die Eigenthümlichkeit der Vegetationsformationen und der Regionen bedingt wird. Gesellige Pflanzen, die, wie die *Calluna* der baltischen Ebene, oft fast ausschliesslich den Boden bekleiden, stehen in erster Linie; Bäume, die durch ihre Grösse, ihre Zweigbildung, ihre Belaubung oder Formen, die, wie die Succulenten, durch die Gestaltung der Organe sich auszeichnen, verdienen vor allen übrigen beachtet zu werden. Aber hier das Geeignete zu wählen, muss dem Geschick des Reisenden überlassen bleiben. Hier kann er sein persönliches Talent zur Geltung bringen, die Natur wie ein Kunstwerk aufzufassen und nachzuweisen, wie sie im Bereich des Zulässigen sich mässigt und wie unter theils harmonisch verbundenen theils widersprechenden Bedingungen überall bestimmte Lebensformen in die Erscheinung treten.

Die Herrichtung und Aufbewahrung der Sammlungen erfordert dieselbe Sorgfalt und Umsicht wie jedes grössere Herbarium, welches dem Systematiker zu seinen Untersuchungen genügen soll. Die Exemplare müssen so vollständig und in getrocknetem Zustande so gut erhalten sein, dass die Pflanzenart sicher erkannt werden kann. Bei variablen Arten ist auch auf die wichtigsten Abänderungen Rücksicht zu nehmen, nicht bloss wenn dieselben

an den neben einander wachsenden Individuen sich zeigen, sondern auch in den Fällen, wo sie Wirkungen eines besondern Standorts oder von geänderten klimatischen Einflüssen zu sein scheinen. Um Verwechslungen vorzubeugen, wird jedes Document mit einer Nummer versehen und in doppelten oder mehrfachen Exemplaren aufbewahrt, von denen später das einem Systematiker zur Untersuchung übergebene in dessen Händen bleibt. Den Nummern entsprechen sodann die schriftlichen Aufzeichnungen des Reisenden über das Vorkommen und die pflanzengeographische Bedeutung des Gewächses, so dass diese Notizen durch den systematischen Namen desselben leicht ergänzt werden können. Auch ist der Ordnung und Erhaltung der Exemplare wegen anzurathen, jedes einzelne Gewächs abgesondert zwischen halben Foliobogen von ungeleimtem Papier zu verpacken.

Die Orte, wo eine Untersuchung von botanischen Sammlungen aus jedem beliebigen Theile der Erde mit Erfolg vorgenommen werden kann, sind wenig zahlreich. Denn es können nur Städte in Betracht kommen, in deren Museen umfassende Herbarien aus den verschiedensten Florengebieten und in hinlänglicher Menge Original Exemplare vorhanden sind, die systematischen Schriften zu Grunde lagen. Nur da, wo solche Hilfsmittel zu Gebote stehen, wo eben aus diesem Grunde erst in unserm Jahrhundert die an Umfang und Genauigkeit hervorragenden Quellenwerke über exotische Gewächse grossentheils entstanden sind, findet sich zugleich der literarische Apparat mit seinen kostbaren Kupferwerken in einer zu Arbeiten dieser Art genügenden, aber auch unerlässlichen Vollständigkeit. Die Erfahrung hat nämlich gelehrt, dass selbst geübte, scharfsichtige Botaniker, wenn sie sich mit den encyclopädischen Werken über das Pflanzenreich behelfen müssen, oft nicht im Stande sind, in Sammlungen aus fremden Ländern neue oder schon beschriebene Arten sicher als solche zu erkennen. Hieraus aber entspringt ein grosser Nachtheil für die Pflanzengeographie, wie für die Systematik, indem das Eigenthümliche nicht unterschieden, das Gleichartige nicht verbunden wird. Dieser Zustand ist ohne Zweifel nur ein vorübergehender, der aber für die gegenwärtige Epoche noch maassgebend ist. Schon haben indessen die monographischen Bearbeitungen der meisten natürlichen Florengebiete begonnen, nach deren Vollendung ein grosser Theil der jetzt bestehenden Schwierigkeiten, die geographische Verbreitung bestimmter Pflanzenarten festzustellen, verschwinden wird. Im Bereich der europäischen Floren ist dieses Ziel schon seit langer Zeit erreicht, europäische Pflanzensammlungen lassen sich an jedem beliebigen Orte mit wenigen literarischen Hilfsmitteln untersuchen: hier steht dem Fortschritt der Erkenntniss nicht die Unvollkommenheit der bereits geleisteten wissenschaftlichen Arbeit, sondern die in der Natur der Organismen selbst liegende Schwierigkeit des Artbegriffs entgegen. Um Pflanzensammlungen aus den meisten aussereuropäischen Ländern so bearbeitet zu erhalten, wie es für die Zuverlässigkeit pflanzengeographischer Darstellungen erforderlich ist, können gegenwärtig nur folgende Orte namhaft gemacht werden, wo für diesen Zweck zureichende Mittel geboten sind: London, Paris, Genf, Berlin, Göttingen, München, Wien, Petersburg, Cambridge bei Boston. Die Reisenden werden in der Mehrzahl dieser Städte Systematiker finden, die solchen Arbeiten sich zu unterziehen geneigt sind; für gewisse Länder hätten einzelne Museen den Vorzug vor den übrigen, und so giebt es auch andere Orte, in deren Sammlungen bestimmte Floren ebenso reich oder noch reicher vertreten sind, z. B. der indische Archipel und Japan in Leiden, die Kapflora in Hamburg. Auch braucht nicht erinnert zu werden, dass die Monographen einzelner Pflanzenfamilien, die an diesen

und vielen andern Orten zerstreut leben, als Rathgeber und Mitarbeiter von den Reisenden vorzugsweise anzugehen sind.

Die Beobachtungen, die an den Fundorten der ausgewählten Pflanzen während der Reise aufgezeichnet werden müssen, beziehen sich nicht bloss auf ihre Physiognomie und ihr Zusammenleben, sondern vor Allem auf die physischen Bedingungen, von denen ihr Vorkommen bestimmt wird, auf den Boden, worin sie wurzeln und auf die klimatischen Einflüsse, die ihrem natürlichen Wohngebiet eine Grenze setzen. Bei den Angaben über die Bodenverhältnisse, von denen die Anordnung der Vegetationsformationen abhängig ist, kommt, abgesehen von den Halophyten, die mineralogische Beschaffenheit der Erdkrumen und das unterliegende geognostische Substrat weniger unmittelbar als dadurch in Betracht, dass die Stetigkeit und Menge des Wasserzufflusses zu den Wurzeln davon beeinflusst werden. Sodann ist von ihrer Verwitterung und dem Grade ihrer Löslichkeit, sowie von dem Humusgehalt des Bodens die Zufuhr der unorganischen Nährstoffe und damit die Fruchtbarkeit der Erdkrumen bedingt. Schon bei diesen Beobachtungen ist es klar, dass es nicht auf eine ausführliche Beschreibung der Bodenverhältnisse ankommt, sondern auf die Berücksichtigung ihrer Beziehungen zu den physiologischen Ernährungsbedürfnissen, die bei den verschiedenen Formen der Vegetation ungleicher Art sind. In noch weit höhern Maasse aber ist es erforderlich, bei der Untersuchung der klimatischen Bedingungen, denen sie unterworfen sind, deren physiologische Wirksamkeit zu Grunde zu legen und unter diesem Gesichtspunkte allein die mannigfachen klimatischen Werthe zu würdigen.

Der allgemeine Satz, dass die Vegetation unter dem Einflusse von Wärme, Licht und Feuchtigkeit stehe, erhält erst dadurch seine pflanzengeographische Bedeutung, dass jedes Gewächs in seiner Entwicklung an eine bestimmte Temperatursphäre gebunden ist, dass es nur beleuchtet seine Nährstoffe in organische Verbindungen verwandelt, die zum Wachsthum brauchbar sind, und dass es in seiner bildenden Thätigkeit still steht oder abstirbt, wenn die Strömung des Wassers von der Wurzel zu den Blättern gehemmt und unterbrochen wird. Früher meinte man den Wärmemaassstab für eine Pflanze schon gefunden zu haben, wenn man die mittlere Temperatur der Orte kannte, wo sie vorkommt. Aber die Vegetation ist nicht von Mittelwerthen, sondern von Extremen der Temperatur abhängig, die nicht überschritten werden dürfen; innerhalb dieser Grenzwerte beschleunigt oder verlangsamt sich ihre Entwicklung bei verschiedenen Wärmegraden. Ferner ist die Temperatursphäre jeder Pflanze veränderlich und nur für die einzelnen Entwicklungsphasen des Keimens, der Belaubung, des Blühens, der Frucht reife und der Ruhezeit des Samens eine Reihe von bestimmten Werthen. Sinkt die Wärme unter ein gewisses Maass, so braucht die Organisation noch nicht absterben, sondern geht in einen Stillstand ihrer Entwicklung, in den Winterschlaf, über, während dessen grössere Temperaturschwankungen ertragen werden, als in den übrigen Jahreszeiten. Endlich hat sich auch ergeben, dass das Pflanzenleben in den Perioden des Steigens und Sinkens der jährlichen Temperaturcurve sich verschieden verhalten kann, dass es nur im ersten Falle aus dem Winterschlaf geweckt wird, unter dem Einfluss nicht höherer, ja vielleicht noch niedrigerer Wärmegrade, als bei denen es in denselben eintrat oder in einer früheren Zeit darin verharrete.

So verwickelt sind demnach die Beziehungen der Temperatur zur Vegetation, dass sie in vollem Umfange zu untersuchen, dem Reisenden Gelegenheit und Musse fehlen würde: er hat daher seine Beobachtungen auf

ein engeres Gebiet einzuschränken. Dazu kommt, dass, um die pflanzengeographische Bedeutung des Wärmeklimas zu würdigen, die etwa vorhandenen meteorologischen Tagebücher in mancher Beziehung nicht ausreichend sind. Die Lufttemperatur, die, im beschatteten Raume gemessen, darin verzeichnet wird, ist nicht der alleinige Maassstab dafür, wann die Entwicklungsphasen eines Gewächses eintreten. Die Insolation, wodurch die Erwärmung der von der Sonne beleuchteten Pflanzen gesteigert wird, der Schutz gegen extreme Temperaturgrade, den sie andererseits in besonderen Einrichtungen ihrer Organisation oder während ihres Winterschlafs durch die Schneedecke des Bodens erfahren, finden in den meteorologischen Messungen keinen genügenden Ausdruck und doch ist es die Temperatur nicht ihrer Umgebung, sondern ihrer Gewebe, an deren Maass das Bestehen der Pflanzen geknüpft ist.

Auf dem eingeschränkten Standpunkte, den der Reisende bei seinen Untersuchungen über den Einfluss der Temperatur auf das Verkommen der Pflanzen einnehmen muss, ist das Studium der Vegetationslinien das wichtigste. Darunter werden durch klimatische Einwirkungen bestimmte Grenzlinien der Verbreitung von Pflanzenarten oder von Vegetationsformen verstanden. Eine nördliche Vegetationslinie ist beispielsweise ein Breitengrad, über welche hinaus eine bestimmte Pflanze nicht mehr vorkommen kann, weil sie das in dieser Richtung sich ändernde Klima nicht mehr erträgt. Hiermit ist die Frage gegeben, ob einer durch geographische Beobachtungen nachgewiesenen Pflanzengrenze wirklich eine klimatische Bedeutung zukomme. Dieses Problem ist nicht leicht zu lösen: in den meisten Fällen werden die Pflanzen durch andere Ursachen zurückgehalten, sich weiter auszubreiten, durch mechanische Hindernisse, durch das Meer, durch Gebirge oder durch Vegetationsformationen, die sie nicht zu verdrängen vermögen. Wenn eine Pflanze an den Grenzen ihres Wohngebiets verkümmert und in ihrer Entwicklung gehemmt erscheint, wenn Bäume daselbst in eine Zwerggestalt oder in Strauchformen übergehen, oder wenn Arten, die dem Reisenden bis dahin häufig begegneten, nun selten werden und nur noch an geschützten, klimatisch begünstigten Oertlichkeiten sporadisch auftreten, dann kann er sicher sein, eine wirkliche Vegetationslinie und nicht bloss eine veränderliche oder mechanische Grenze erkannt zu haben. Jede Beobachtung dieser Art ist von entschiedenem, sowohl pflanzengeographischem als botanischem Werth, weil dadurch nicht bloss die Einsicht in die Gesetze sich erweitert, die dem Zusammenhang zwischen Klima und Vegetation zu Grunde liegen, sondern auch zugleich die Natur des Gewächses und seiner Culturbedingungen erläutert wird.

In anderen Fällen verschwindet eine Pflanze, wo sie ihre geographische Grenze erreicht hat, gleichsam plötzlich und ohne dass Störungen ihrer Entwicklung und ihres Fortkommens zu bemerken sind. Auch solche Pflanzengrenzen können wirkliche Vegetationslinien sein, aber dürfen nur dann als solche gelten, wenn sie mit bestimmten klimatischen Linien zusammenfallen. Auch müsste streng genommen dabei nachgewiesen werden können, dass der klimatische Grenzwert, der hier überschritten wird, zur Entwicklung der Pflanzen und den Aeusserungen ihres Lebens in einer gewissen Beziehung steht. Ein Beispiel bietet die Nordwestgrenze der europäischen Weincultur, sie entspricht einer klimatischen Linie, die durch den Grenzwert von Monatsisothermen bestimmt wird, welchen die Reife der Trauben im Spätsommer noch eben ertragen kann.

Da das Pflanzenleben in den verschiedensten Beziehungen zum Wärmeklima steht und selbst in denjenigen Ländern, deren Klima durch vieljährige

meteorologische Messungen am genauesten erforscht ist, diese Hilfsmittel zur physiologischen Würdigung der Vegetationslinien nicht genügen, so wird der Reisende selten in der Lage sein, diesen Weg einschlagen zu können, und am wenigsten in der Ebene, wo die klimatischen, Aenderungen so allmählig einzutreten pflegen. Er muss auch in dieser Beziehung seine Thätigkeit auf einen engeren Kreis von Untersuchungen und namentlich auf solche Fälle einschränken, wo eigene Messungen möglich sind. Hierzu bieten die Regionen und die Niveaumessungen derselben in den Gebirgen ihm die angemessenste Aufgabe. Hier ist der Zusammenhang zwischen Klima und Vegetation am einfachsten und am sichersten nachzuweisen. Wenn der Schnee des Winters bis zum Fusse des Gebirges herabreicht und nun mit der steigenden Wärme allmählig nach aufwärts zurückweicht, bis zuletzt im Sommer auch die alpine Region der Vegetation frei gegeben wird, so verkürzt sich in demselben Verhältniss auch die Entwicklungsperiode nach der Stufenfolge der Niveaueabschnitte. Die abnehmende Grösse der Vegetationsorgane ist demnach die Folge der ungleichen Zeitdauer, deren sie zu ihrem Wachsthum bedürfen. Hieraus ergibt sich die Wichtigkeit der Beobachtungen über den Zeitpunkt, wann in den einzelnen Regionen die Vegetation erwacht und zu Ende geht. Denn jede Pflanzenart kann nur bis zu einem gewissen Grade ihre Entwicklungsperiode verkürzen oder verlängern; sie erwacht aus dem Winterschlaf erst nachdem der Schnee geschmolzen ist und die Wärme nun anfängt, sich über den Gefrierpunkt zu erheben, und ihr Leben kommt unter dem erneuerten Schneefalle im Herbste zum Stillstand. Die Temperatur des Zeitraums, der den jährlichen Kreislauf von Bildungen einschliesst, ist der Maassstab der Niveaugrenze, die es nicht überschreiten kann. Unter den Tropen und in den gemässigten Breiten der Südhemisphäre, wo der Unterschied der thermischen Jahreszeiten geringer ist oder aufhört und die jährlichen Verschiebungen der Schneelinie daher unbedeutend werden, vereinfacht sich die Frage insofern, als nur noch die Abnahme der Jahreswärme bei der Absonderung der Regionen in Betracht kommt und diese thermischen Factoren sich von dem Reisenden selbst leichter bestimmen lassen. Allein eben aus der unbestimmten Dauer der Entwicklungsperiode erklärt sich, dass hier die Vegetationsformen oft weniger deutlich nach dem Niveau geschieden sind, dass die Bäume zuweilen bis in die Nähe des ewigen Schnees im Gebirge emporsteigen.

In den nördlichen Continenten, wo die Kenntniss der Vegetationslinien zuerst begründet und am weitesten fortgeschritten ist, ergibt sich aus den bisherigen Untersuchungen, dass auch in den Tiefebene das Zeitmaass der Entwicklungsperiode, ebenso wie in den Gebirgen, das wichtigste klimatische Moment ist, die Wohngebiete der Pflanzen geographisch abzuschliessen. Wenn daher die Reisenden auch die Ermittlung der bestimmenden klimatischen Werthe spätern Forschungen und dem Fortschritt der Wissenschaft meist werden überlassen müssen, so hat doch jede ihrer Beobachtungen über den Zeitpunkt, zu welchem bestimmte Entwicklungsphasen bei den charakteristischen Landschaftspflanzen eintreten, einen bleibenden Werth. Sie haben, so oft sich die Gelegenheit darbietet, darauf zu achten, in welchen Monaten die Saftbewegung stockt und wann sie rege ist, um Knospen zu entfalten. Diese Hauptphasen der Vegetation lassen sich fast in allen Klimaten der Erde unterscheiden, sie sind für verschiedene Gewächse desselben Standorts nicht gleichartig, bei den periodisch belaubten Holzgewächsen erkennt man sie am leichtesten, indem ihre Belaubung der anhebenden Bewegung des Frühlingssafts innerhalb weniger Tage nachfolgt und die herbstliche Ent-

färbung der Blätter dem winterlichen Stillstand einige Zeit vorausgeht. Um vergleichende Untersuchungen über die Temperaturbedingungen vorzubereiten, von denen die Entwicklungsphasen abhängig sind, müssen die Wärmegrade, bei denen sie eintreten, sorgfältig aufgezeichnet werden.

Bei den Niveaubestimmungen der Regionen oder Vegetationslinien der Gebirge ist eine möglichst grosse Zahl von einzelnen Messungen wünschenswerth, um Durchschnittswerthe zu gewinnen. Wenn auch diese Höhenmessungen, vorausgesetzt dass gleichzeitige Beobachtungen an nahe gelegenen Orten in der Ebene zu Gebote stehen, mit dem Barometer am sichersten auszuführen sind, so ist doch schon die Bestimmung des Siedepunkts an den Grenzen der Regionen eine empfehlenswerthe Methode an hochgelegenen Standpunkten. Den grossen Schwankungen gegenüber, welche unter sehr verschiedenartigen Einwirkungen das Niveau der Regionen erfährt, ist eine Fehlergrenze von zwei Procent nicht bedeutend anzuschlagen.

Die Beziehungen der Feuchtigkeit zur Vegetation müssen ebenso, wie die der Wärme, auf physiologische Grundsätze zurückgeführt werden. Die Ergebnisse meteorologischer Messungen über den Wasserdampf der Atmosphäre und über die Regenmenge lassen sich nur selten zur Erläuterung pflanzengeographischer Erscheinungen benutzen. Aber je mehr der Umfang der Temperaturvariation nach den Jahreszeiten abnimmt, einen desto grösseren Einfluss auf die Grenzen der natürlichen Floren, auf die Vegetationslinien und auf gewisse Vegetationsformen gewinnt die jährliche Vertheilung und Beschaffenheit der atmosphärischen Niederschläge, insofern davon der Wasserzufluss zu den Wurzeln abhängt. Jede Pflanze fordert während ihrer Entwicklungsperiode eine stetig von den Wurzeln zu den Blättern aufsteigende Wasserströmung, bei verschiedenen Gewächsen ist diese von ungleicher Intensität. Stillstand der Functionen ist die Folge regenloser Jahreszeiten. In den meisten Ländern, wo die Temperaturvariation gering ist, giebt es Perioden, in denen die Niederschläge entweder ganz aufhören oder doch zur Thätigkeit der Pflanzen nicht genügen; in den continentalen Steppe und einigen subtropischen Gebieten tritt im Sommer durch Dürre und im Winter durch Kälte ein zwiefacher Stillstand der Entwicklung ein. Eine nach der Jahreszeit verschiedenartig bedingte Periodicität des Pflanzenlebens ist daher eine der allgemeinsten Erscheinungen, der die Reisenden stets ihre Aufmerksamkeit zu widmen haben.

Bei dem Wechsel feuchter und dürre Jahreszeiten ist es nicht hinreichend, die Zeit der Niederschläge und ihre Intensität zu bestimmen, sondern auch hier muss man zuerst die Zeitpunkte des Erwachens und Aufhörens der Entwicklung bei den verschiedenen Vegetationsformen feststellen. Auf dieser Grundlage kann erst ihr Verhältniss zu den meteorologischen Thatsachen weiter erforscht werden. Selten sind die dürrer Jahreszeiten durchaus regenfrei: in aufsteigenden Luftströmungen, welche eine ungewöhnliche, örtliche Erhitzung des Bodens veranlasst, können durch die Kälte in den höhern Schichten der Atmosphäre Gewitterwolken entstehen, aus denen Regengüsse herabfallen. Aber rasch vorübergehend, wenn auch wasserreich, sind sie nicht geeignet, den Boden so zu bewässern, dass dadurch eine stetige Saftbewegung eingeleitet und unterhalten wird. Die Vertheilung der Regentage ist daher für das Pflanzenleben ein bedeutenderes klimatisches Moment, als die Regenmenge, wie sie aus den meteorologischen Messungen abgeleitet wird. Eine andere Unsicherheit in der Anwendung derselben auf pflanzengeographische Beobachtungen beruht darauf, dass der stetige Wasserzufluss zu den Wurzeln in so hohem Grade von der Beschaffenheit des

Bodens beeinflusst wird, theils von dessen Neigung, indem nicht das oberflächlich abfliessende, sondern nur das in die Tiefe dringende Wasser den Pflanzen zu Gute kommt, theils von der ungleichen Fähigkeit der Erdkrumen, dasselbe zurückzuhalten. So muss man annehmen, dass die Theecultur der trockenen Hügel China's nur deshalb auch in dem feuchten Klima von Assam gedeiht, weil auch hier die starken Niederschläge an den Berggehängen der Himalayathäler mit Leichtigkeit herabfliessen, ohne die Wurzeln des Strauches mit Feuchtigkeit zu überladen. Bei den Untersuchungen über die verschiedene Art der Bewässerung ist endlich auch zu beachten, wie die Vegetationsformen je nach ihrer Organisation zu deren Mangel oder Ueberfluss sich in weit höherem Maasse ungleich verhalten, als im Grade ihrer Widerstandsfähigkeit gegen die Kälte. Je nachdem sie die Verdunstung zu beschränken im Stande sind, können sie im Wechsel feuchter und dürerer Jahreszeiten ihre Entwicklungsperiode entweder verlängern oder müssen ihre Thätigkeit auf ein kürzeres Zeitmaass einschränken. Und hiebei tritt auch, namentlich in tropischen Klimaten, der Dampfgehalt der atmosphärischen Luft in Wirksamkeit, durch dessen Maass die Verdunstung der Blätter verlangsamt oder befördert wird.

Was die verschiedene Beleuchtung der Pflanzen betrifft, so ist zunächst zu beachten, ob die einzelnen Arten im Schatten wachsen oder der Sonne ausgesetzt sind. Es ist zwar eine offene Frage, ob das diffuse Tageslicht, auf welches die ersteren beschränkt sind, die chemischen Umwandlungen der Nährstoffe in jedem Falle ebenso wirksam beeinflusst, wie die directen Sonnenstrahlen, allein durch die zugleich davon bedingten Unterschiede in der Erwärmung des Gewebes und in der Verdunstung der Säfte ist das Vorkommen der Pflanzen an verschiedenen Standorten schon erklärlich. Nur bei den Schattenpflanzen können die Messungen der Luftwärme mit dem Thermometer zum Maassstab ihrer geographischen Verbreitung dienen. Die Insolation, wodurch die unbeschatteten Gewächse erwärmt werden, ist eine Function der geographischen Breite, aber die Instrumente, sie zu messen, sind wenig brauchbar und wegen der ungleichen Bewölkung des Himmels in verschiedenen Klimaten würden sie ohnedies nicht ausreichen, die pflanzengeographische Bedeutung der directen Sonnenwärme zu erläutern. Wie sehr aber die Art der Beleuchtung auf die Anordnung der Bestandtheile in den Vegetationsformationen einwirkt, erhellt aus der Vergleichung der Wälder in verschiedenen Zonen. Bei der Schilderung des Landschaftscharakters dürfen daher auch diese Verhältnisse nicht vernachlässigt werden.

Eine besondere Aufmerksamkeit muss den Gewächsen gewidmet sein, die Gegenstände der Bodencultur und des Handels sind. Neue Hilfsquellen von nationalökonomischem Werth eröffnen sich, wo das Klima die Einführung ihres Anbaues gestattet, und wenn dieser in den Ländern, die sie bereits erzeugen, sich so weit ausgebreitet hat, als die Natur des Gewächses es zulässt, können ihre Vegetationslinien mit grösster Sicherheit erkannt werden. In den Vegetationslinien an den verschiedenen Grenzen ihres Culturgebiets aber ist zugleich ein umfassender Aufschluss über die physischen Bedingungen enthalten, denen sie unterworfen sind. Bei den meisten Gewächsen, die im Grossen gebaut werden, ist die Heimath unbekannt oder lässt sich doch nicht näher angeben. Es wäre indessen in vielfacher Beziehung von Wichtigkeit, die Orte bestimmter kennen zu lernen, von denen ihr Anbau ursprünglich ausgegangen ist. Dies wird dem reisenden Beobachter, der sie ohne Zuthun des Menschen wachsen sieht, dadurch möglich, dass die Be-

dingungen ihres Vorkommens und das Verhältniss der durch die Cultur entstandenen Spielarten zu der Stammart genau untersucht werden.

Es folgen nun noch einige Andeutungen über einzelne Probleme, welche der Aufmerksamkeit der Reisenden zu empfehlen sind, sowie über die Länder, deren Vegetationscharakter am wenigsten bekannt ist.

Arktische Flora. Wünschenswerth sind Untersuchungen über den Einfluss der Tageslänge auf die Entwicklung der Pflanzen, und zwar sowohl in Bezug auf die Dauer der Vegetationsperiode einzelner Arten, als auf das Verhältniss der aufgenommenen und abgegebenen Gase im Zeitraum der Beleuchtung und Dunkelheit. Das letztere Problem ist durch die Beobachtungen der schwedischen Naturforscher in Spitzbergen besonders wichtig geworden, nach denen die Vegetation der Algen auch während des arktischen Winters, also bei Entziehung des Lichtreizes, fortdauern soll. — Die bedeutendste Lücke in der Kenntniss der Verbreitung arktischer Pflanzen würde durch Sammlungen in Neu-Sibirien und Wrangels Land ausgefüllt werden.

Waldgebiet des östlichen Continents. Im östlichen Asien scheint die Amurflora durch allmälige Uebergänge in die des chinesisch-japanesischen Gebiets überzugehen. Die Vegetationslinien charakteristischer Vegetationsformen in der Mandschurei und im nördlichen China sind hier in ähnlicher Weise festzustellen, wie dies auf Sachalin geschehen ist. Dabei wäre besonders zu beachten, in wie weit die grössere Regelmässigkeit der Regenperioden China's auf die Lage solcher Vegetationslinien von Einfluss ist. Ein ähnliches Problem bezieht sich auf das gemischte Klima Kamtschatka's, indem zu untersuchen ist, wie weit kamtschadalische Arten von der Halbinsel in den Continent verbreitet sind. — Die Regionen des Ural bedürfen einer genaueren Feststellung; in Europa fehlt es an einer Untersuchung der Sumpfformationen Lithauens und Polens; die walachischen Karpaten, Rumänien überhaupt und Bulgarien, die Gebirgslandschaften Bosniens in ihrem Verhältniss zu den östlichen Alpen und das Balkansystem mit seinen Verzweigungen gehören zu den am wenigsten erforschten Gebieten.

Mittelmeergebiet. Auch hier ist die südosteuropäische Halbinsel am wenigsten bekannt, namentlich die Herzegowina und Albanien, grosse Theile von Macedonien, Thessalien und Thracien, wo theils die Gebirgsregionen, theils die Grenzen gegen das Steppengebiet näher festzustellen sind. In Spanien ist Estremadura weniger erforscht, als die übrigen Provinzen, die Vegetation des marokkanischen Atlas nur an einzelnen Stellen untersucht worden. — In Cyrenaica wäre die Wiederauffindung der Umbellifere, welche das *Silphium* der Alten lieferte, von grosser Wichtigkeit.

Steppengebiet. Die Grenze der Steppen mit periodischen Niederschlägen und der regenlosen Wüsten ist in Syrien, Arabien und von da bis Sind noch nicht genau bekannt. Innerhalb des Gebiets sind die Lücken unserer Kenntniss in Centralasien am fühlbarsten. In den Hochländern, die sich vom indischen Himalaya bis Turkestan erstrecken, sind nur die britischen Besitzungen und die Strasse, welche vom Changchemno nach Yarkand führt, botanisch erforscht worden. Auch von der Mongolei, vom Thianschan und der Gobi kennt man die Vegetation nur an vereinzeltten Punkten. — In dem östlichen, noch von keinem Reisenden betretenen Theile der centralasiatischen Hochsteppen, welche an die chinesische Provinz Szetschuan an-

grenzen, sind Prshewalski und David nur zu den äusseren Randgebirgen vorgedrungen.

Chinesisch-japanisches Gebiet. Vom Festlande ist die Vegetation nur von einigen Küstenpunkten näher bekannt geworden. Die Flora von Peking zeigt nur wenig Aehnlichkeit mit den südlichen Provinzen, die Feststellung der Palmengrenze im Innern ist hier die erste Grundlage weiterer Fortschritte. In Japan wäre die Untersuchung des Innern von Kiusiu besonders wünschenswerth, welches von der Cultur des Bodens nicht berührt zu sein scheint. — Zahlreiche Cultur und Handelspflanzen China's verdienen eine genauere Beachtung, theils in systematischer Beziehung, theils um aus ihrer Vegetationsperiode auf die klimatischen Bedingungen der dortigen Bodencultur zu schliessen, die in den verschiedenen Provinzen ungleich zu sein scheinen.

Indisches Monsungebiet. Die Formationen beider indischer Halbinseln bedürfen, wie die der meisten Tropenländer, eingehenderer Darstellungen, als sie die Literatur bis jetzt aufweist. Vom Himalaya sind die östlichen Gliederungen über Assam hinaus unbekannt, die malayische Flora ist wenig bearbeitet. — Im indischen Archipel gehört zu den wichtigsten Problemen, ob die Linie tiefen Seegrundes durch die Macassarstrasse zwischen Borneo und Celebes und im Norden zwischen den Molukken und Philippinen, im Süden zwischen Bali und Lombot auf die Verbreitung der Pflanzen einen bestimmten Einfluss geäussert hat, wie dies bei den Thieren der Fall ist. Dazu würde eine viel umfassendere Kenntniss der Flora des Archipels und namentlich von den beiden grössten Inseln, von Borneo und Neu-Guinea, gehören, als die auf wenige Küstenpunkte eingeschränkt gebliebene Untersuchung bis jetzt geleistet hat. Auch das Verhältniss des indischen Archipels und besonders von Neu-Guinea zur Flora des tropischen Australien bietet ein grosses, allgemeines Interesse dar und erfordert zu seiner Erläuterung eine genauere Kenntniss der durch die herrschenden Winde bestimmten Regenzeiten. — Die Sammlungen von den Philippinen und den pacifischen Archipelen der Carolinen und Marianen bis über die Gesellschaftsinseln hinaus sind ebenfalls unvollständig. Sie scheinen zwar sämmtlich zum Verbreitungsbezirk der indischen Flora zu gehören, aber es müsste untersucht werden, ob nicht auf diesen Inseln noch manche endemische Centren anzunehmen sind.

Sahara. Reisende, welche zu dem Erhebungssystem des Ahaggar vordringen, müssen ihr Augenmerk auf die Vergleichung der dortigen Vegetation mit der des Atlas richten. — Die in der algerischen Sahara beobachteten Wüstenpflanzen sind von denen der ägyptisch-arabischen Flora vielfach abweichend: Sammlungen aus Fezzan und aus der libyschen Sahara sind daher besonders wünschenswerth.

Sudan. Bei dem Fortschritt der geographischen Entdeckungen im aequatorialen Afrika möchte die wichtigste Aufgabe sein, nachzuweisen, unter welchen Meridianen der Uebergang von den Savanen des Nilgebiets zu der viel reichern Flora der feuchteren Wälder am Gaboon und Congo stattfindet und ob in den südlichen Breiten sich ein ähnliches Verhältniss zwischen Mozambique und Benguela geltend macht. — Die Verbindung der Gebirgsflora von Abessinien und vom Cameroon kann nur durch die zwischenliegenden Hochländer und durch die fortgesetzte Untersuchung der Schneeberge an der Zanzibarküste aufgeklärt werden. — Schilderungen der Formationen, wie sie Schweinfurth gegeben hat, fehlen fast für alle, ausserhalb des Nilgebiets gelegenen Landschaften des tropischen Afrika's.

Kalahari. Die Flora ist grösstentheils unbekannt, das geographische

Verhältniss zur Vegetation von Natal näher festzustellen. — Klimatische Nachweisungen über die Bedingungen, unter denen die Gnetacee *Welwitschia* vegetirt, sind wünschenswerth.

Kapland. Die Regionen in den Gebirgen von Kaffrarien und die Grenzen der Capflora gegen die von Natal sind festzustellen.

Australien. Die geographische Erforschung des australischen Continents hat mit der seiner Flora ziemlich gleichen Schritt gehalten und ist in gleicher Weise fortzuführen. Am wenigsten sind mit Ausnahme von Queensland die tropischen Breiten bekannt und die Vergleichung der gegenüberliegenden Küsten an der Torresstrasse, sowie das Verhältniss von Nordwestaustralien zu Timor besonders beachtenswerth.

Nordamerikanisches Waldgebiet. Im Norden fehlt es an Darstellungen der Formationen von Newfoundland und Labrador. Die Regionen in den Alleghanies und in einem grossen Theil der Rocky Mountains sind genauer festzustellen. In den südlichen Staaten und besonders in Florida bedürfen die Formationen einer vergleichenden Schilderung. An der Westküste sind die Regionen ebenfalls nach ihrer Gliederung und ihren Höhengrenzen zu bestimmen.

Prairiengebiet. Die natürlichen Vegetationsgrenzen gegen Mexico sind sehr unvollständig bekannt, ebenso auf der californischen Halbinsel gegen das Gebiet der californischen Flora. Die Regionen der Gebirge, soweit sie bewaldet sind, namentlich ihre Gliederung an beiden Abhängen der Sierra Nevada, würden von der pacifischen Eisenbahn ausgehend leicht festzustellen sein.

Kalifornien. Ueber die Formationen und Regionen sind wir noch wenig unterrichtet. Ueber die Verbreitungsweise einiger mit Chile gemeinsamer Arten wären Untersuchungen wünschenswerth, welche sich auf die Zugvögel und auf den Schiffsverkehr beziehen.

Mexico. Die Flora ist nur fragmentarisch bearbeitet, was in gleichem Maasse auch vom tropischen Südamerika gilt. Die Grenzen gegen die Flora des Isthmus von Panama sind nur unvollständig angedeutet, am wenigsten weiss man von Yucatan. Die Regionen der westlichen Cordillere sind mit denen der Ostküste und des innern Mexico's zu vergleichen. — Ueber manche Drogen und andere vegetabilische Handelsproducte aus Mexico und den übrigen Gebieten des tropischen Amerika's sind Nachweisungen des Ursprungs wünschenswerth.

Westindien. Eine umfassende Untersuchung der Bahama's würde für viele, allgemeinere Probleme der Pflanzengeographie von grossem Interesse sein. Auf den grossen Antillen sind nur in Jamaica die Formationen und Regionen genügend erläutert worden, auf den übrigen Inseln Westindiens ist, wie auf Cuba, die Systematik der einheimischen Pflanzen besser bekannt, als ihre Anordnung, von Haiti und Portorico sind auch die Sammlungen lückenhaft und grossentheils unbearbeitet.

Tropische Florengebiete Südamerika's. Die am wenigsten bekannten Landschaften sind: die Westküste von Panama bis zur Bai von Choco, sowie weiter hin bis Tumbaz, und in diesen Breiten auch die westliche Cordillern der Anden, südwärts vom Aequator die östliche Cordillere in ihrer Abdachung zum brasilianischen Tieflande, ein grosser Theil der Waldgebiete des Orinoko und der beiderseitigen Zuflüsse des Amazonas, die Verzweigungen der Anden nach Venezuela, die Gebirge an den Grenzen von Guiana und Brasilien, der grössere Theil der Serra do Mar, das Stromgebiet des Paraguay und weite Strecken im Innern von Peru und Bolivien.

Pampasgebiet. Die Grenzen der argentinischen zur brasilianischen Flora sind wenig genau festgestellt. Die Pampas und patagonischen Steppen bis zur Magellanstrasse und die afrikanische Kalahari sind überhaupt die am wenigsten bekannten Vegetationsgebiete der südlichen gemässigten Zone. Durch die Forschungen des Botanikers Lorentz in Tucuman, Catamarca und bis zum Wendekreise am östlichen Fusse der Anden werden einige der am meisten fühlbaren Lücken in der Kenntniss der dortigen Flora beseitigt werden.

Chile. Die Regionen der chilenischen Anden sind nur unter einzelnen Breitengraden untersucht worden: am wichtigsten wäre eine Erforschung derselben in Araucanien, weil hier die Schneelinie südwärts rasch in ein tiefes Niveau herabsinkt.

Oceanische Inseln. In der Reihe derjenigen Inseln, welche durch ihren Endemismus sich auszeichnen und von den Floren der Continente wenig entlehnt haben, sind Madagaskar und Neucaledonien noch immer am wenigsten bekannt: die Anordnung der Vegetation haben die Reisenden daselbst wenig beachtet und ihre Sammlungen sind nur unvollständig bearbeitet worden. — Von abgelegenen Inseln sind unerforscht und wären von besonderem Interesse: im atlantischen Meere Martin Vaz nebst Trinidad und Fernando Noronha; in der Südsee Masafuera, S. Felix und S. Ambrosius, Osterinsel, Pitcairn, Bounty und Antipodeninsel, Macquaries; im indischen Meere Keeling (Cocosinsel), Rodriguez, Amirantes und Comoros.

Die geographische Verbreitung der Seegräser.

Von

P. Ascherson.

Unter dem Ausdruck Seegräser sind hier diejenigen blüthentragenden Gewächse (Phanerogamen) verstanden, welche ihre Lebensvorrichtungen ganz oder doch grösstentheils untergetaucht im Meerwasser vollziehen und nur in diesem Medium vollziehen können. Obwohl zwei verschiedener, allerdings im Systeme sich nahe stehenden (monokotylen) Familien, den Potameen und Hydrocharitaceen angehörig, sind doch diese Gewächse ihren gemeinsamen Lebensbedingungen in so ähnlicher Weise angepasst, dass mehrfach Verwechselungen zwischen zu verschiedenen Familien gehörigen Arten vorgekommen sind. Die grosse Mehrzahl besitzt schmale, grasartige, ungestielt auf meist langen Scheiden stehende Blätter, wie unser bekanntes nordeuropäisches Matratzenseegras (*Zostera marina* L.), dem auch die meisten Seegräser durch ihren mit verlängerten Gliedern kriechenden Wurzelstock gleichen, vermöge dessen sie oft weite Strecken des Meeresbodens wiesenartig überziehen. Eine Ausnahme machen nur die Arten der Gattungen *Posidonia* und *Phyllospadix*; bei der *Posid. oceanica* Del. des Mittelmeeres erscheinen die massigen, rasenähnlichen Verzweigungen des Rhizoms besonders geeignet, die Pflanze auch auf steinigem Grunde festzuhalten. Von der grasähnlichen Blattbildung weichen nur *Cymodocea isoëtifolia* Aschs. und *C. manatorum* Aschs. durch ihre stielrunden binsenähnlichen, sowie die *Halophila*-Arten durch ihre breiten, rundlich eiförmigen oder länglichen, meist in einen Stiel verschmälerten Blätter ab. Ich habe diese Gewächse seit 1867 mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt und nicht nur die in den grösseren Sammlungen aufbewahrten Exemplare verglichen, sondern durch das freundliche Entgegenkommen zahlreicher Freunde und Gönner von den verschiedensten Punkten des Erdballs wichtige Beiträge erhalten. Dennoch bietet das mir bisher zugekommene Material sowohl in geographischer als in systematischer Hinsicht auch manche Lücken; da indess die Zahl der hierher gehörigen Gewächse eine verhältnissmässig beschränkte ist, so dürften dieselben in nicht zu langer Zeit, falls die Aufmerksamkeit der Seereisenden sich allgemeiner diesen unscheinbaren, aber für den Haushalt der Natur nicht unwichtigen Gewächsen zuwendet, ausgefüllt werden können. Ich bemerke übrigens,

dass das Präpariren dieser Gegenstände keine sonderliche Schwierigkeiten hat. Gestattet es die Gelegenheit nicht, sie wie andere Pflanzen zwischen Löschpapier zu pressen (wie alle Meergewächse trocknen sie wegen ihres Salzgehaltes etwas langsam), so sind auch an der Luft getrocknete Exemplare recht brauchbar. Blüthen und Früchte sind womöglich, mit einzelnen Blatt- und Stengelproben, in Weingeist aufzubewahren; namentlich ist es erwünscht, die Spitzen der kriechenden Stengel mit jungen Blättern auf diese Art zu conserviren.

Mit Ausnahme der arktischen (und vermuthlich antarktischen) Gewässer dürfte keine Erdgegend der Seegräser entbehren. Da sie meist nur in verhältnissmässig seichtem Meere, etwa bis zu einer Tiefe von 10 m. vorkommen*), so sind sie nur in der Nähe von Land zu erwarten, sie finden sich nicht nur an den Küsten der Continente und grossen Inseln, sondern selbst bei so kleinen oceanischen Inseln wie die Bermudas-Gruppe, von wo Dr. Rein Cymodocea manatorum mittheilte. Die meisten Arten ziehen, wie bemerkt, schlammigen und sandigen Grund vor; innerhalb der Tropen bietet Korallensand eine besonders günstige Unterlage; doch dürften vielleicht ausser der erwähnten *Posidonia oceanica* auch einige andere Arten Steingrund nicht verschmähen. Manche Arten treten mit Vorliebe in die brackischen Küstengewässer, Flussmündungen, Lagunen etc. ein, wo jedenfalls nicht der geringere Salzgehalt des Wassers, dessen Fehlen selbstverständlich keine Seegrasart trägt, sondern der Schutz vor Brandung und der schlammige Grund ihr Gedeihen begünstigen. An solchen Stellen, wie auch in seichten Meeresbuchten, werden die Seegrasbänke öfter zur Ebbezeit halb entblösst und sind dann besonders geeignet, das reiche Vorkommen dieser Gewächse, bei denen, wie bei anderen geselligen Pflanzengruppen die Anzahl der Individuen die geringe Zahl der Gattungen und Arten mehr als aufwiegt, zur Anschauung zu bringen, wie dies z. B. jeder Besucher Venedigs gesehen haben wird. Es ist bemerkenswerth, dass die Seegräser, selbst unter der heissen Tropensonne, an solchen Stellen stundenlange Entblössung ohne Schaden ertragen, wie dies z. B. Motley an der Küste von Borneo von *Enhalus acoroides* beobachtete; selbst in Meeren ohne merkliche Gezeiten sah ich die nämliche Erscheinung durch den unter dem Einfluss des Windes wechselnden Wasserstand bedingt, wie an den *Zostera nana* Rth. in der Kieler Bucht. Diese biologischen Beobachtungen wären namentlich für die exotischen Arten zu vervollständigenden.

Eine besondere Aufmerksamkeit verdient auch der Bestäubungsprocess, welcher bei der grossen Mehrzahl der hierher gehörigen Gewächse, nämlich bei allen Potameen, durch das ungewöhnliche Medium des Wassers vermittelt wird. Dem angepasst besitzt der Pollen nicht die gewöhnliche Kugelgestalt, sondern stellt langgestreckte, cylindrische Schläuche dar, die bei *Halophila* sogar, wie ein Confervenfaden, durch Querwände gegliedert sind; diese Schläuche werden von den meist fadenförmigen Griffelästen aufgefangen und steigen längs denselben in die Fruchtknotenhöhle hinab. Abweichend hiervon gestaltet sich die Bestäubung bei den marinen Hydrocharitaceen, wenigstens ist für *Enhalus* eine der verwandten Süsswassergattung *Vallisneria* vollkommen entsprechende Bestäubung festgestellt, die männlichen Blüthen reissen sich von ihren kurzgestielten Blüthenständen los und schwimmen an

*) *Posidonia oceanica* wurde von Lorenz im Quarnero noch in der fünften Tiefenregion (15–35 Faden, also ca. 30–50 m. tief) beobachtet. (Physik. Verhältnisse und Vertheil. der Organismen im Quarn. Golfe. Wien 1863, S. 249.)

der Oberfläche des Wassers, wo sie der auf ihren langen, spiralig gewundenen Stiele fluthenden weiblichen begegnen. Für *Thalassia* macht die Kugelgestalt des Pollens ebenfalls eine Bestäubung über oder an der Oberfläche des Wassers wahrscheinlich.

Ich will nun zunächst die Seegräser in systematischer Reihenfolge aufzählen und die mir über ihre Verbreitung bekannten Thatfachen anführen, alsdann die Seegrassfloren der einzelnen Abtheilungen des Weltmeers aufstellen und mit den daraus sich ergebenden pflanzengeographischen Folgerungen schliessen.

I. Hydrocharitaceae L. C. Rich.

1. *Enhalus* L. C. Rich.

1. *E. acoroides* (L. fil.) Steud. (Linnaea. Neue Folge I. Bd. S. 158 *)). Diese Pflanze charakterisirt sich durch ihren robusten Wuchs, die breiten Blätter, welche nach ihrer Zerstörung zwei lange, glänzend schwarze Fäden (die Gefässbündel der Randnerven) hinterlassen und besonders durch den eigenthümlichen Bau ihrer zweihäusigen Blüthen, deren sonderbares biologisches Verhalten oben angedeutet wurde. Die männlichen sind sehr klein und zahlreich, aus der einzelnen, ziemlich grossen weiblichen bildet sich eine wallnussgrosse, mit kammförmigen Schuppen besetzte Frucht, welche durch den spiralig sich wieder einrollenden Blüthenstiel, den der alte Rumpf naiv mit einem Schweineschwanz — varkenstaart — vergleicht, wieder unter Wasser gezogen wird. *Enhalus* findet sich im Indischen Ocean, und zwar besonders häufig im Indischen Archipel, wo ihre Grenzen nach Norden und Osten noch zu erforschen sind; die äussersten mir bekannten Punkte sind Cap York in Queensland und Labuan auf Borneo; ferner sah ich sie auch von Ceylon und aus dem Rothen Meere von Assab im Schchoslande und Djambo.

2. *Thalassia* Solander (König).

Diese Gattung unterscheidet sich von *Enhalus* durch die einblüthigen männlichen Blüthenstände, welche, wie die weiblichen, kurz gestielt sind; die Frucht zerreist, wenigstens bei *T. Hemprichii*, in zahlreiche schmale, sich sternförmig ausbreitende Klappen. Die beiden in der Tracht kaum zu unterscheidenden *Thalassia*-Arten haben kürzere und meist breitere Blätter als unsere *Zostera marina*, sind aber weit kleiner und zarter als *Enhalus*.

2. *T. testudinum* Solander (König). (Linnaea a. a. O. S. 159.) Ist bisher im tropischen Atlantischen Ocean und zwar nur im Antillenmeere beobachtet worden; der nördlichste mir bekannte Punkt ist Key West an der Südspitze von Florida; wie weit nach Süden sie vorkommt, bleibt festzustellen. Die reife Frucht dieser Art ist noch nicht bekannt.

3. *T. Hemprichii* (Ehrb.) Aschs. (Schizotheca *Hemprichii* Ehrb., Linnaea a. a. O. S. 159.) Findet sich im Indischen und Stillen Ocean innerhalb der Tropen. Im ersteren kennt man sie im Rothen Meere von Zanzibar, von den Küsten von Ceylon, im Indischen Archipel von Java, Borneo, Mindanao, im letzteren vom Lieu-Kieu-Archipel und von Neu-Caledonien.

*) An den citirten Stellen habe ich mich über die technisch-botanischen Merkmale resp. die Geschichte der betr. Arten ausführlicher verbreitet.

II. Potameae Juss. em.

3. Cymodocea König.

Diese Gattung zeigt eine unter den Seegräsern ungewöhnliche Mannichfaltigkeit im äusseren Ansehen der Arten, welche indess, soweit bisher bekannt, in den wesentlichen Gattungsmerkmalen übereinstimmen. Bei allen Arten sind die Blüten zweihäusig. Die männlichen bestehen aus zwei verhältnissmässig sehr grossen, der Länge nach mit einander verwachsenen Staubbeutel, die weiblichen aus zwei nebeneinander stehenden Fruchtknoten, deren jeder zwei bandförmige, verlängerte Griffeläste trägt. Die Merkmale im äusseren Ansehen, mit denen auch solche des inneren Baues Hand in Hand gehen, geben Veranlassung, diese Gattung in drei Untergattungen zu trennen, welche sich auch, wie wir später sehen werden, in geographischer Hinsicht fast wie die übrigen Gattungen verhalten.

a. Untergatt. Phycagrostis (Willd.).

Stengeltheile krautartig, weich, getrocknet einschrumpfend; Blüten einzeln, die männlichen lang gestielt, weit aus den Scheiden der sie umgebenden Laubblüthen hervorragend; die weiblichen dagegen von diesen Scheiden eingeschlossen, nur mit den Griffelästen hervorragend. Die Früchte sind daher im Boden vergraben und werden fast nie an's Ufer geworfen wie die Rhizome und Blätter.

4. *C. nodosa* (Ucria) Aschs. (Naturf. Freunde in Berlin, Febr. 1869; *C. aequorea* Kön., Linnæa a. a. O. S. 161). Diese zierliche Seegrasart steht in der Grösse etwa zwischen den beiden europäischen *Zostera*-Arten in der Mitte, von denen sie sich indess durch die gezähnelten Blätter, sowie die lange ausdauernden, stellenweise durch dichtstehende Blattnarben geringelte Rhizomverzweigungen leicht unterscheidet; frisch ist sie durch die schön purpurrothe Farbe der letzteren besonders gekennzeichnet. Ihr Verbreitungsgebiet umfasst hauptsächlich das Mittelländische Meer, an dessen Nord- und Südküste wie um die Inseln sie an geeigneten Stellen überall zu finden ist. Ob sie in das schwarze Meer eindringt, ist bisher nicht festgestellt; dagegen ist sie ausserhalb der Strasse von Gibraltar an der spanischen Küste bei Cadix, an den Ufern der Canarischen Inseln und an der Westküste Afrikas noch bei Joal in Senegambien beobachtet worden.

5. *C. rotundata* (Ehrb. u. Hempr.) Aschs. u. Schweinf. (Naturf. Freunde in Berlin, Dec. 1870). Der vorigen sehr ähnlich, aber robuster, die Blätter kürzer, breiter, mit zahlreicheren Nerven; die Blattscheiden sich in unregelmässigen Fetzen ablösend, während sie bei *C. nodosa* meist auf einmal abfallen; die bisher noch unbekannten Blüten dürften wohl noch schlagendere Unterschiede ergeben. Bisher nur im Rothen Meere an verschiedenen Punkten von Tor im Norden bis Assab im Süden beobachtet, ohne Zweifel aber im Indischen Ocean weiter verbreitet.

6. *C. serrulata* (R. Br.) Aschs. u. Magnus (Naturf. Freunde in Berlin, Dec. 1870). Diese sehr robuste und kräftige Pflanze hat noch breitere, kürzere Blätter als die vorige und unterscheidet sich besonders auffällig durch die Kürze der Blattscheiden; die männliche Blüthe und die jedenfalls ziemlich grosse Frucht sind noch unbekannt. Sie gehört dem Indischen und Stillen Ocean an; man kennt sie bis jetzt aus dem Rothen Meere (Kosser, Suakin), von den Küsten der Ostafrikanischen Inseln (Nossi-Beh), aus dem Bengalischen Meerbusen an der Küste Coromandel, aus der Strasse

von Singapore, von der Süd- und Ostküste Neuhollands und von Neu-Caledonien.

b. Untergatt. *Amphibolis* (Agardh).

Stengeltheile holzartig hart, die aufrechten Triebe gewöhnlich sehr verlängert und fast baumartig verzweigt, während bei *Phycagrostis* wie bei den meisten Seegräsern die Blattbüschel unmittelbar über der kriechenden Grundachse auf ganz kurzen Stengeltheilen stehen. Blätter flach, Blütenstand wie bei *Phycagrostis*.

7. *C. ciliata* (Forsk.) Ehrenb. *Linnaea* a. a. O. S. 762, *Naturf. Freunde* in Berlin, Dec. 1870. Der *C. serrulata* im Ansehen so ähnlich, dass ich sie früher selbst nicht unterschieden habe; ausser den harten verlängerten aufrechten Stengeltheilen unterscheidet sie sich von dieser auch dadurch, dass die Blattnarben bei ihr (wie bei den meisten Seegräsern) geschlossene Ringe bilden, während sie bei *C. serrulata* an einer Seite mehr oder weniger weit geöffnet sind. Die Blattzähne treten (wie auch bei *C. serrulata*) am stärksten unter allen bekannten Seegräsern hervor. Man kennt diese Art, deren männliche Blüten und Früchte noch unbekannt sind, nahezu aus demselben Gebiete wie *C. serrulata*, in deren Gesellschaft sie mitunter zu wachsen scheint; im Indischen Ocean ist sie im Rothen Meere sehr häufig, ebenso an der Ostküste von Afrika (Rowuma Bai, Mündung des Luabo) und im Ostafrikanischen Archipel (Mayotte, Nossi-Beh, Réunion); aus dem Stillen Ocean sah ich sie bisher nur von der tropischen Ostküste Neuhollands (Cap York, Port Denison).

8. *C. antarctica* (Labill.) Endl. (*Amphibolis antarctica* Aschs. u. Sond. *Linnaea* a. a. O. S. 164). Kleiner und zarter als die vorige, unter allen Seegräsern durch die an der Spitze halbmondförmig ausgeschnittenen, sonst ganzrandigen, kurzen und verhältnissmässig breiten Blätter ausgezeichnet. Die Keimpflanzen (deren erste Laubblätter an der Spitze abgerundet sind) sind am Grunde mit einem eigenthümlichen, kammförmig zerschlitzten Becher umgeben. Diese merkwürdige Art ist nur von der West-, Süd- und Ostküste Neuhollands, sowie von Tasmania bekannt; den Wendekreis scheint sie nach Norden nicht zu überschreiten.

c. Untergatt. *Phycoschoenus* Aschs.

Blätter stielrund, binsenähnlich; Blüten zahlreich auf eigenen Zweigen, von kleinen (Hoch-)Blättern umhüllt.

9. *C. manatorum* Aschs. (*Naturf. Freunde* in Berlin, Jun. u. Oct. 1868). Unter diesem Namen habe ich das vom alten Sloane in seiner klassischen Beschreibung Jamaika's schon sehr treffend gekennzeichnete Mannitsee-grass der neueren Systematik einverleibt. Die Blüten sind kleiner als bei *C. nodosa*, jedoch viel grösser als bei der folgenden Art; die Blätter sind lang und verhältnissmässig dünn. Man kennt diese Art, deren reife Früchte noch nicht vorliegen, aus dem Atlantischen Ocean auf der amerikanischen Seite, und zwar von den westindischen Inseln (Martinique, St. Thomas, Haiti, Cuba), von Key West an der Südspitze Florida's und von den Bermuda-Inseln.

10. *C. isoëtifolia* Aschs. (*Linnaea* a. a. O. S. 163). Blätter kürzer und verhältnissmässig dicker als bei der vorigen, beim Trocknen ihre graugrüne Farbe beibehaltend, während sie bei *C. manatorum*, wie bei den meisten Seegräsern, sich schwärzen. Diese Art bewohnt den Indischen und Stillen Ocean; ich sah sie aus dem Rothen Meere, wo sie häufig und tonangebend auftritt, von Nossi-Beh, von den Küsten von Ceylon und Vorderindien und von Neu-Caledonien und den Viti-Inseln.

4. *Halodule* Endl.

Diese der vorigen sehr nahe stehende Gattung gleicht im Aussehen deren Section *Phycagrostis*; indess unterscheiden sich die männlichen Blüten dadurch, dass die beiden Staubbeutel nicht genau nebeneinander stehen, sondern der eine etwas höher als der andere, die weiblichen dagegen dadurch, dass jeder Fruchtknoten nur einen Griffel trägt. Die schmalen Blätter, welche unserer *Zostera nana* gleichkommen, haben an der Spitze zwei oder drei stark hervortretende Zähne, sind aber sonst ganzrandig.

11. *H. Wrightii* Aschs. (Naturf. Freunde in Berlin, Juni u. Oct. 1868). Findet sich im tropischen Atlantischen Ocean und zwar im Antillen-Meere (St. Thomas, Haiti, Cuba, Key-West); ich glaube bisher auch eine von dem verstorbenen, hochverdienten Welwitsch an der Küste Nieder-Guineas bei Loanda und Ambriz nur unfruchtbar gesammelte Pflanze vorläufig rechnen zu dürfen.

12. *H. australis* Miq. (Linnaea a. a. O. S. 163). Staubbeutel viel kleiner als an der vorigen Art; weitere Beobachtungen müssen lehren, ob ein merkwürdiges an den bisher vorliegenden Exemplaren beobachtetes Verhältniss beider Geschlechter beständig ist; bei dieser Art ist nämlich die männliche Pflanze weit zarter und schwächer als die weibliche, während es bei *H. Wrightii* umgekehrt ist. Die Frucht der *H. australis* ist noch unbekannt. Sie findet sich im Indischen und Stillen Ocean, und zwar im Rothen Meere (tonangebend) an den Küsten der Ostafrikanischen Inseln (Madagascar, Nossi-Beh), Vorderindiens, des Indischen Archipels (Sumbaua, Flores), der Marianen, Viti-Inseln und Neu-Caledoniens.

5. *Zostera* L.

Der eigenthümliche Blütenstand macht, wenn vorhanden, die Arten dieser Gattung, der einzigen in unseren nordeuropäischen Meeren vertretenen, leicht kenntlich. Eine flachgedrückte Stengelspitze („Kolben“) trägt nur auf einer Seite die aus einem Staubbeutel (mit 2 getrennten Hälften) und einem daneben stehenden Fruchtknoten (mit 2 bandförmigen Griffelästen) bestehenden Blüten derart über einander, dass in den beiden senkrechten Zeilen Staubbeutel und Fruchtknoten meist regelmässig abwechseln. Dieser Kolben ist völlig in die Scheide des obersten Blattes (Hüllblatt) eingeschlossen, aus dessen Scheidenspalte nur die Narben hervorragen.

13. *Z. marina* L. (Linnaea a. a. O. S. 165). Unser allbekanntes Matrazenseegrass findet sich keineswegs, wie frühere Botaniker annahmen, in allen Meeren, ist vielmehr nahezu auf die nördliche gemässigte Zone beschränkt. Im Atlantischen Ocean findet es sich an der Ostküste von Nordamerika; ob es wirklich nach Süden bis West-Florida reicht also in den mexicanischen Golf eintritt, oder die dahin lautende Angabe Chapman's auf Verwechselung mit einer der westindischen Arten, z. B. *Thalassia testudinum*, welche nach dem Grafen Pourtalès auf Key West mit dem sonst unserer *Zostera* zukommenden Namen eel-grass bezeichnet wird, beruht, ist noch weiter festzustellen; nördlich reicht es bis Island und Westgrönland, wo sie indess den Polarkreis nicht zu erreichen scheint; an der Küste Ostgrönlands suchte es Dr. Pansch, der sich mit diesen Gewächsen mit besonderer Vorliebe beschäftigt hat, vergeblich; in den Europäischen Gewässern an der Nordküste des Mittelmeers (ich sah Exemplare von den Ufern Spaniens,

Frankreichs, Italiens (auch von Messina), Istriens, Dalmatiens, Griechenlands und Kleinsiens (Smyrna), auch von der Nord- und Südküste des Schwarzen Meeres, aber nicht von Syrien, Nordafrika, Sardinien und Corsica), ausserhalb der Strasse von Gibraltar an den Küsten der Iberischen Halbinsel, Frankreichs, der Britischen Inseln, in der Nord- und Ostsee überall, an der Westküste Norwegens bis zum Waranger Fjord und auch noch an der Murmanischen Küste in Knjäscha gubá, doch bemerkt Wahlenberg, dass diese Pflanze nach Norden abnehme und unfruchtbar bleibe. Doch ist es nach dem neuerdings festgestellten weiten Vordringen des Golfstromes nach Nordosten nicht unwahrscheinlich, dass das von Kapitän Johannessen an der Weissen Insel im Karischen Meere beobachtete „Seegras“*) wirklich *Zostera* ist. Ausserdem findet sich unsere *Zostera marina* noch im nördlichen Stillen Ocean an den Küsten der Mandschurei, Japans und der Aleuten (Unalauha).

14. *Z. nana* Rth. (Linnaea a. a. O. S. 166). Die zarteste und schmalblättrigste aller *Zostera*-Arten. Sie hat, soviel bisher bekannt, drei getrennte Verbreitungsbezirke: 1. Im nördlichen Atlantischen Ocean, wo ihre Verbreitung weiter nach Süden, aber nicht so weit nach Norden reicht als die der *Z. marina* L. Sie ist von der Amerikanischen Küste nicht bekannt, dagegen an den Canarischen Inseln, an allen Küsten des Mittelmeeres und seiner Inseln, des Schwarzen und Kaspischen Meeres, an den Küsten der Iberischen Halbinsel, Frankreichs, Irlands (Dublin) und Grossbritanniens (doch ist es zweifelhaft, ob diese Art die nördlichsten Küstenpunkte Schottlands erreicht; an der Westküste kennt man sie bisher nur bis zur Grafschaft Argyll und an der Ostküste bis Forfar), an der Niederländischen und Deutschen Nord- und Ostseeküste bis Heiligenhafen; von der Mecklenburgischen und Pommerischen Küste sah ich sie nicht, wohl aber ein Exemplar aus der Danziger Bucht. In den Dänischen Gewässern kennt man sie nördlich bis zum Limfjord, an der Küste der Skandinavischen Halbinsel, so viel mir bekannt, nur im Kattegat am Ufer von Bohuslän und Halland, aber nirgends in Norwegen. 2. Im nördlichen Stillen Ocean, bisher nur an der Japanischen Küste bei Kanagawa gesammelt. 3. In den Südafrikanischen Gewässern: Am Vorgebirge der Guten Hoffnung, in der Natal Bay und an der Insel Nossi-Beh (die Pflanze aus 2. u. 3. bisher nur unfruchtbar gesammelt, aber von der Europäischen durch kein Merkmal unterschieden).

15. *Z. Muelleri* Irmisch (Linnaea a. a. O. S. 168). Der vorigen sehr ähnlich, indess robuster, die Blätter an der Spitze breit ausgerundet (bei *Z. nana* nur mit einem kleinen Einschnitt). Beobachtet an der Süd- und Ostküste Neuhollands (nördlich bis Moreton Bay), sowie an der Küste Tasmaniens; hierher glaube ich vorläufig auch eine von dem verdienstvollen Prof. Philippi an der Küste Chile's bei Coquimbo nur unfruchtbar gesammelte *Zostera* rechnen zu dürfen.

16. *Z. tasmanica* G. v. Martens (Linnaea a. a. O. S. 168). Von den drei anderen Arten auffällig durch die Hüllblätter verschieden, deren Blattfläche viel breiter ist als die der übrigen Laubblätter und deren bauchige Scheiden der Pflanze ein sehr eigenthümliches Aussehen geben. Ich kenne sie bisher nur von Port Philipp an der Südküste Neuhollands.

---

*) Petermann's Mittheil. 1870, S. 199.

6. *Phyllospadix* W. J. Hooker.

Diese Gattung steht *Zostera* sehr nahe, von der sie sich nur durch den zweihäusigen Blütenstand, sowie durch die zu deutlichen Deckblättchen entwickelten Tragblätter der Blüten unterscheidet; letztere sind übrigens bei den drei letztgenannten *Zostera*-Arten normal, sowie mitunter auch bei *Z. marina* angedeutet. Die männlichen Blüten, sowie die reife Frucht unbekannt. Der Wurzelstock kriecht nicht weithin, wie bei den meisten Seegräsern, sondern trägt dichte Blattrasen; die Blätter sind denen der *Zostera marina* nicht unähnlich.

17. *P. Scouleri* Hook. (Linnaea a. a. O. S. 169). Nächst der *Zostera tasmanica* ist diese Art bisher auf dem beschränktesten Gebiete gefunden worden, nämlich an fünf Orten der Westküste Nordamerikas von etwa 50—34° n. Br., nämlich an der Küste von Vancouvers Island, an der Mündung des Oregon, unweit der ehemaligen Niederlassung Ross, bei Monterey und S. Barbara in Californien.

18. (?) *P. serrulatus* Rupr. (Linnaea a. a. O. S. 169). Diese zweifelhafte, nur in einigen unfruchtbaren Bruchstücken bekannte Art unterscheidet sich von *P. Scouleri* nur durch die gezähnelten Blätter. Sie wurde von zwei russischen Sammlern jedenfalls aus den das jetzige Territorium Alaska bespülenden Gewässern mitgebracht; indess steht nicht fest, ob von Sitka und Unalashka oder nur von einem dieser Punkte.

7. *Posidonia* König.

Zu dieser Gattung gehören die grössten und breitblättrigsten Seegräser mit dickem, kräftigen Wurzelstock, der wie bei *Phyllospadix* nicht weithin kriecht, sondern mit seinen kurzen Verzweigungen dichte Blattrasen bildet. Diese Verzweigungen sind unterwärts mit den borstenartigen Gefässbündelruthen der abgestorbenen Blätter bedeckt und erhalten dadurch das Ansehen einer Hasenpfote. Der langgestielte Blütenstand ist von laubartigen Deckblättern, die allerdings viel kürzer als die eigentlichen Laubblätter sind, umhüllt; die meist zwittrigen Blüten bestehen aus drei flachgedrückten Staubblättern, welche einen sehr grossen, von einer zerschlitzten Narbe gekrönten Fruchtknoten umgeben, der sich in eine Frucht von Ansehen und Farbe einer unreifen Olive verwandelt.

19. *P. oceanica* (L.) Del. (Linnaea a. a. O. S. 170). Diese Art ist im Mittelmeere allgemein verbreitet, wo sie, wie oben bemerkt wurde, in sehr beträchtliche Tiefen hinabsteigt. Aus dem Schwarzen Meere kenne ich sie nicht, doch dürfte sie an der West- und Südküste Kleinasiens, sowie an der Küste Syriens, woher ich sie auch nicht sah, schwerlich fehlen, da ich sie bei Alexandrien häufig antraf. Ausserhalb der Strasse von Gibraltar sind nach Süden weitere Standorte nicht bekannt, nach Norden findet sie sich indess an der Küste Portugals, der Nordküste Spaniens und noch im innersten Winkel der Bai von Biscaya, bei Biarritz. Ob sie von dort noch weiter nach Norden vorkommt, ist sehr zweifelhaft, da sie der ausgezeichnete Botaniker Durieu de Maisonneuve in Bordeaux, welcher diese Gewächse ebenfalls zum Gegenstande seiner Beobachtungen gemacht, nicht bemerkt hat.

20. *P. australis* J. D. Hook. (Linnaea a. a. O. S. 171, Naturf. Fr. in Berlin, Nov. 1869). Sehr ähnlich der vorigen, von der sie sich besonders durch lockerere, mehrblüthige Blütenstände unterscheidet. Sie bewohnt die Süd- und Ostküste Neuhollands (vermuthlich nur südlich vom Wendekreis) und die Ufer Tasmaniens.

8. *Halophila* Du Petit-Thonars.

Die Arten dieser für ein Seegrasgeschlecht ungewöhnlich formenreichen Gattung unterscheiden sich von allen übrigen Seegräsern auf den ersten Blick, wie bereits angedeutet, durch ihre nicht linealischen, grasartigen, sondern von lineal-länglich bis rundlich in Umriss abändernden, am Grunde mehr oder weniger stielartig verschmälerten, oft langgestielten, zarten, meist auch getrocknet hellgrünen Laubblätter, ausser denen bei manchen Arten auch durchsichtighäutige Schuppenblätter vorhanden sind. Alle Blätter sind paarweise genähert einem meist zarten, weit umherkriechenden Stengel angeheftet; öfter rücken auch mehrere dieser Blattpaare zusammen, wodurch eine scheinbar quirlige Anordnung der Blätter entsteht. Die einzeln stehenden, meist zweihäusigen Blüten sind von zwei scheidenartig zusammengerollten Schuppenblättern umhüllt; die männlichen sind mehr oder weniger lang gestielt und besitzen eine dreiblättrige Blütenhülle, und drei freie Staubbeutel; die weiblichen bestehen aus einem nackten von einen 2—5spaltigen Griffel gekrönten Fruchtknoten, welcher zahlreiche Samenknospen enthält, durch welches Merkmal sich *Halophila* von allen übrigen Potameen unterscheidet. Die dünnhäutige Frucht lässt die hartschaligen Samen durchschimmern.

21. *H. stipulacea* (Forssk.) Aschs. (Linnaea a. a. O. S. 172.) Laubblätter kurz gestielt, am Rande gezähelt; Schuppenblätter sehr gross und auffällig, worauf der vom Entdecker der Pflanze gegebene Name *Zostera stipulacea* hindeutet. Diese schöne, auffallende Art scheint dem Indischen Ocean eigenthümlich zu sein und zwar habe ich sie bisher nur aus dem Rothen Meere, wo sie häufig und tonangebend ist, und von den Ostafrikanischen Inseln Madagascar, Nossi-beh und Mauritius gesehen; Exemplare vom „Cap der guten Hoffnung“ oder „Cap Agulhas“, die ich in mehreren Herbarien sah, stammen alle aus derselben, mir verdächtigen Quelle, obwohl das Vorkommen immerhin möglich wäre. Dagegen hat sich die früher von mir auf fremde Autorität hin gemachte Angabe an der Küste von Ceylon als zur folgenden Art gehörig ergeben; es bleibt mithin durch andere Untersuchungen festzustellen ob sich diese Art wirklich auf die Ostafrikanischen Gewässer beschränkt. Die Frucht derselben kenne ich noch nicht. Die am Strande ausgeworfene, gebleichte Pflanze und höckerig-blasigen Blättern wurde von Delile als eigene Art *Zostera bullata* beschrieben.

22. *H. ovalis* (R. Br.) J. D. Hook. (Linnaea a. a. O. S. 173.) Zarter und meist kleinblättriger als die vorige; Laubblätter lang und dünn gestielt, länglich bis rundlich oval, ganzrandig, (durch welches Merkmal sich diese Art von den meisten anderen unterscheidet). Die verbreitetste Art der Gattung, scheint den ganzen Indischen Ocean und die Südsee zu bewohnen; ich sah Exemplare aus dem Rothen Meere, wo diese Art ebenso häufig als die vorige ist, aus dem Ostafrikanischen Archipel (Madagascar, Nossi-beh, Mauritius), aus dem Persischen Meerbusen, von den Küsten Vorder- und Hinterindiens, Ceylon's, Südchina's (Hongkong, Pratus Bank, südl. von Canton) der Philippiner (Negros) der Ler-Choo-Inseln, dem ostindischen Archipel (Celebes, Sumbawa, Flores, Timor), von der Süd- und Ostküste Neuholands (Adelaide, Paramatta, Brisbane), von Tasmanien, Neucaledonien, den Marianen, Viti, Samoainseln und Tongatabu.

23. *H. Baillonii* Aschs. ms. Diese Art gleicht im Aussehen der vorigen, von der sie sich indess durch die gezähnelten Laubblätter sofort unterscheidet. Sie scheint dem tropischen Atlantischen Ocean an der Amerika-

nischen Seite eigenthümlich. Ich sah sie von Martinique, Guadeloupe und St. Thomas, bisher indess nur mit weiblichen Blüthen.

24. *H. Beccarii* Aschs. (Giorn. bot. italiano 1871 p. 302.) Das kleinste und zarteste aller Seegräser, im Ansehen der dikotylen Uferpflanze *Linosella aquatica* L. nicht unähnlich. Sie unterscheidet sich von kleinen Formen der *H. ovalis*, mit der sie durch die ganzrandigen (lineal-länglichen) Laubblätter übereinstimmt, dadurch, dass diese spitz sind und der bei allen übrigen Arten vorhandenen Seitennerven entbehren; auch sind keine Schuppenblätter vorhanden. An seichten Uferstellen Borneo's an der Mündung des Flores Bintulu in Sarawak von dem verdienstvollen Reisenden Beccari entdeckt und mir bisher ausserdem nur von Arrakan mitgetheilt, aber gewiss in den indischen Gewässern weiter verbreitet.

25. *H. (?) spinulosa* (R. Br.) Aschs. ms. Ich glaube diese von Robert Brown entdeckte und nach sterilen Exemplaren zweifelhaft als *Caulinia? spinulosa* beschriebene Art vorläufig zu *Halophila* stellen zu müssen, mit der sie in der weiblichen Blüthe übereinstimmt; möglich, dass die mir noch unbekannte männliche Blüthe eine generische Trennung nothwendig machen wird, da die Tracht (trotz der Uebereinstimmung in der Nervatur der stark gezähnten Blätter) von den übrigen Arten sehr abweicht. Es sind nur längliche Laubblätter vorhanden, welche in zahlreichen Paaren nahe übereinander stehen; dieselben sitzen mit etwas verschmälertem Grunde, und verleihen der Pflanze eine grosse habituelle Aehnlichkeit mit unserer Süsswasserpflanze *Potamoeton densus* L. Ich kenne diese merkwürdige Art bisher nur von der Ost- und Nordküste des tropischen Neuholland (Moreton-Bay, Port-Denison, Albany-Insel) und von den Philippinen; muthmaasslich ist sie im Indischen Archipel und wohl auch von da weiter östlich und westlich verbreitet.

26. *H. (?) Engelmanni* Aschs. ms. Ich stelle auch diese, nur in einem sterilen Exemplar bekannte zweifelhafte Pflanze vorläufig zu dieser Gattung, mit der sie im Blattbau übereinstimmt. Die kurzgestielten Laubblätter (es sind nur solche vorhanden) sind länglich, zugespitzt, und stehen in vierzähligen Scheinquirlen, wodurch die Pflanze an manche *Najas*-Formen erinnert. Sie wurde an der Küste Florida's gesammelt und ist vermuthlich im Antillen-Meere weiter verbreitet.

Aus dieser Zusammenstellung der Thatsachen, die mir bisher über die geographische Verbreitung der Seegräser bekannt geworden, ergeben sich als diejenigen Gebiete, aus denen am wenigsten Nachrichten vorliegen und deren Erforschung von besonderem Interesse wäre, das östliche Polynesien, wo vermuthlich auch alle Indisch-Pacifischen Arten vorkommen, die Küsten von China (wichtig wegen der Abgrenzung der Indisch-Pacifischen und Nord-Pacifischen Arten, möglicherweise durch Sammlungen in den so oft besuchten Emporien Schang-hai und Tschifu festzustellen) die ganze Afrikanische Küste von der Strasse Bab-el Mandeb bis zu der von Gibraltar und die Küsten des Festlandes von ganz Amerika.

Ferner ergibt sich (man vergleiche die von mir in Petermann's Mittheilungen 1871, Tafel 13 veröffentlichte Karte, welcher bereits die meisten hier mitgetheilten Daten zu Grunde liegen), dass die grosse Mehrzahl der Arten entweder der Tropenzone oder einer der gemässigten Zonen fast ausschliesslich angehört; dass die Arten des Indischen Oceans im nördlichen Rothen Meere (und vermuthlich im Persischen Golf) den nördlichen Wende-

kreis um etwa 7 Grad überschreiten, ist bei dem anerkannt tropischen Charakter von Flora und Fauna dieser Meerbusen nur eine scheinbare Ausnahme; ähnlich verhält es sich vielleicht mit dem Vorkommen von *Cymodocea manatorum* bei den Bermudainseln und mit *Zostera marina*, die noch in dem durch den Golfstrom temperirten Theile des europäischen Eismeeress innerhalb der kalten Zone vorkommt. Nur *Cymodocea serrulata* und *Halophila ovalis* greifen aus der Tropenzone beträchtlich in die südliche gemässigte Zone hinüber. Ich will das Vorkommen in den nunmehr folgenden Seegras-Floren (früher habe ich, einen Ausdruck der Algologen adoptirend, dieselben als „phanerogame Nereis“ bezeichnet) durch die Buchstaben *c.* (heisse Zone) *t. a.* (südliche gemässigte Zone), *t. b.* (nördliche gemässigte Zone)* und *f. b.* (nördliche kalte Zone) andeuten, sowie die Küsten der Erdtheile, an welchen jede Art gefunden ist, durch deren Anfangsbuchstaben bezeichnen. Die übrigen pflanzengeographischen Bemerkungen lasse ich diesen Floren nachfolgen.

I. Seegras-Flora (phanerogame Nereis) des nördlichen Eismeeress.

1. *Zostera marina* L. *f. b.* Eur. As.?

II. Seegras-Flora des Atlantischen Oceans.

1. *Thalassia testudinum* Kön. *c.* Am.
2. *Cymodocea nodosa* Aschs. *t. b.* Eur. As. Afr.
3. — *manatorum* Aschs. *c.*, *t. b.* Am.
4. *Halodule Wrightii* Aschs. *c.* Am. Afr.?
5. *Zostera marina* L. *t. b.* Am. Eur. As.
6. — *nana* Rth. *t. b.*, *t. a.* Eur. As. Afr.
7. *Posidonia oceanica* Del. *t. b.* Eur. Afr.
8. *Halophila Baillonii* Aschs. *c.* Am.
9. — *Engelmanni* Aschs. *c.*? Am.

III. Seegras-Flora des Indischen Oceans.

1. *Enhalus acoroides* Steud. *c.* Afr. As.
2. *Thalassia Hemprichii* Aschs. *c.* Afr. As.
3. *Cymodocea rotundata* Aschs. u. Schweinf. *c.* Afr. As.
4. — *serrulata* Aschs. u. Magn. *c.*, *t. a.* Afr. As. Austr.
5. — *ciliata* Ehrb. *c.* Afr. As.
6. — *antarctica* Endl. *t. a.* Austr.
7. — *isoëtifolia* Aschs. *c.* Afr. As.
8. *Halodule australis* Miq. *c.* Afr. As.
9. *Zostera nana* Rth. *t. a.* Afr.
10. — *Muelleri* Irm. *t. a.* Austr.
11. — *tasmanica* v. Mart. *t. a.* Austr.
12. *Posidonia australis* J. D. Hook. *t. a.* Austr.
13. *Halophila ovalis* J. D. Hook. *c.*, *t. a.* Afr. As. Austr.
14. — *stipulacea* Aschs. *c.* Afr. As.
15. — *Beccarii* Aschs. *c.* As.
16. — *spinulosa* Aschs. *c.* Austr.

*) Von den oben erwähnten nördlichsten Einbuchtungen des Indischen Oceans, welche astronomisch betrachtet hierher gehören, wird im Folgenden abgesehen.

IV. Seegras-Flora des Stillen Oceans.

1. *Enhalus acoroides* Steud. *c.* As. Austr.
2. *Thalassia Hemprichii* Aschs. *c.* As. Austr.
3. *Cymodocea serrulata* Aschs. u. Magn. *c., t. a.* As. Austr.
4. — *ciliata* Ehrb. *c.* Austr.
5. — *antarctica* Endl. *t. a.* Austr.
6. — *isoëtifolia* Aschs. *c.* Austr.
7. *Halodule australis* Miq. *c.* Austr.
8. *Zostera marina* L. *t. b.* As. Am.
9. — *nana* Rth. *t. b.* As.
10. — *Muelleri* Irm. *t. a.* Austr. Am.?
11. *Phyllospadix Scouleri* W. J. Hoch. *t. b.* Am.
12. — *serrulatus* Rupr. *t. b.* Am.
13. *Posidonia australis* J. D. Hook. *t. a.* Austr.
14. *Halophila ovalis* J. D. Hook. *f. b., c., t. a.* As. Austr.
15. — *Beccarii* Aschs. *c.* As.
16. — *spinulosa* Aschs. *c.* As. Austr.

Numerische Zusammenstellung aller Seegräser.

Gattungen.	Im Nördl. Eismeer.	Im Atlant. Ocean.	Im Indisch. Ocean.	Im Stillen Ocean.	Im ganzen Weltmeer.
<i>Enhalus</i>	—	—	1	1	1
<i>Thalassia</i>	—	1	1	1	2
<i>Cymodocea</i>	—	—	—	—	—
Sect. <i>Phycagrostis</i> .	—	1	2	1	3
Sect. <i>Amphibolis</i> .	—	—	2	2	2
Sect. <i>Phycoschoenus</i>	—	1	1	1	2
<i>Halodule</i>	—	1	1	1	2
<i>Zostera</i>	1	2	3	3	4
<i>Phyllospadix</i> . . .	—	—	—	2	2
<i>Posidonia</i>	—	1	1	1	2
<i>Halophila</i>	—	2	4	3	6
Summe	1	9	16	16	26

Pflanzengeographische Bemerkungen.

Die Seegrasarten bewohnen in der Regel zusammenhängende Gebiete. Die beiden Verbreitungsbezirke der *Zostera marina* im nördlichen Atlantischen und nördlichen Stillen Ocean stehen möglicher Weise durch ein Vorkommen dieser Art längs der Nordküste Asiens in Verbindung; ein ähnlicher Zusammenhang längs der Nordküste Amerika's ist dagegen sehr zweifelhaft. Dagegen ist für *Zostera nana* allerdings ein Zusammenhang des Nord-Atlantischen und Nord-Pacifischen Bezirkes auf dem eben bezeichneten Wege sehr unwahrscheinlich, da diese Art nirgends jenseits des 60° N. B. beobachtet wurde. Auch ob dieselbe Art etwa längs der Westküste Afrika's an den Canarischen Inseln bis zum Cap verbreitet ist, müssen wir im Hinblick auf das oben constatirte Gesetz der vorwiegend tropischen oder vorwiegend temperirten Bezirke dahingestellt sein lassen.

Nur wenige Arten sind, soweit bisher bekannt, über die ganze Breite eines Oceans hinüber verbreitet, wenn dessen gegenüberliegende Küsten sich

nicht irgendwo auf geringere Entfernungen nahe kommen. Das einzige sicher constatirte Beispiel dieser Art dürfte das Vorkommen von *Zostera marina* an der Europäischen und Amerikanischen Küste des Atlantischen Oceans sein, da die Identität der *Halodule Wrightii* an der Afrikanischen und der *Zostera Muelleri* an der Amerikanischen Westküste immerhin beim Mangel der Blüthen noch zweifelhaft bleibt. Im oben erwähnten Falle haben wir wohl die Faer-Oer und Island als vermittelnde Zwischenstationen zu betrachten, obwohl die Zwischenräume zwischen ihnen und den Continenten immerhin sehr ansehnlich sind und durch tiefe Meeresgründe gebildet werden. Im Falle der vollständigen oder annähernden Continuität der Küsten sehen wir dagegen mehrere Arten unter gleichen klimatischen Bedingungen auf beträchtlich grössere Strecken sich ausdehnen, als die Breite des Atlantischen Oceans, und selbst noch weiter, als die des Stillen Oceans zwischen Neuseeland und Südamerika beträgt; letztere Küsten sind etwa 110 Längengrade von einander entfernt, während die Indisch-Pacifischen Arten *Thalassia Hemprichii*, *Cymodocea serrulata* und *isoëtifolia*, *Halodule australis* und *Halophila ovalis* von den Ostafrikanischen Gewässern mindestens bis Neucealedonien, einige bis zur Viti- und Tongagruppe verbreitet sind, also über 120—140 Längengrade. Verhältnissmässig beschränkt sind dagegen, soweit bisher bekannt, die Gebiete der Westindischen (*Thalassia testudinum*, *Cymodocea manatorum*, *Halophila Baillonii* und *Engelmanni*) Mittelmeer- (*Cymodocea nodosa*, *Posidonia oceanica*) und Südaustralischen Arten (*Cymodocea antarctica*, *Zostera tasmanica*, die allerdings kaum auf eine Localität beschränkt sein dürfte, *Posidonia australis*), ferner die der beiden Nord-Pacifischen *Phyllospadix*-formen. *Cymodocea rotundata* wird wohl so gut als die übrigen Arten des Rothen Meeres sich als weiter im Indischen Ocean verbreitet herausstellen. Im Gegensatz zu diesem Verhalten der Arten sind die Verbreitungsbezirke der Gattungen resp. der Untergattungen von *Cymodocea*, welche sich sowohl physiognomisch als geographisch wie Gattungen verhalten, vorwiegend getrennt. Eine Ausnahme macht, abgesehen von der monotypischen Gattung *Enhalus*, nur *Phyllospadix*, bei dem allerdings auch die spezifische Verschiedenheit der beiden Formen noch zweifelhaft ist.

Innerhalb der einzelnen Gattungen lässt sich die Mehrzahl der Arten in zwei Reihen paarweise gruppieren. Einmal bewohnen eine Anzahl von Arten-Paaren, welche durch verhältnissmässig geringfügige, öfter nur relative Merkmale sich unterscheiden, getrennte Bezirke. Solche sind:

<i>Thalassia testudinum</i>	<i>T. Hemprichii</i>
<i>Cymodocea (Phycagrostis) nodosa</i>	<i>C. (P.) rotundata</i>
— (<i>Phycoschoenus</i>) <i>manatorum</i>	— (<i>P.</i>) <i>isoëtifolia</i>
<i>Halodule Wrightii</i>	<i>H. australis</i>
<i>Zostera nana</i>	<i>Z. Muelleri</i>
<i>Posidonia oceanica</i>	<i>P. australis</i>

Dagegen bewohnt eine andere Reihe von Arten-Paaren, welche sich durch auffallende und beträchtlichere Merkmale unterscheiden, annähernd denselben Verbreitungsbezirk:

<i>Cymodocea (Phycagrostis) rotundata</i>	<i>P. serrulata</i>
<i>Zostera marina</i>	<i>Z. nana</i>
— <i>Muelleri</i>	<i>Z. tasmanica</i>
<i>Halophila stipulacea</i>	<i>H. ovalis</i>
— <i>Engelmanni</i>	<i>H. Baillonii</i>

Vielleicht dürften auch die Verbreitungsbezirke von *Cymodocea (Amphibolis) ciliata* und *C. (A.) antarctica* theilweise über einander greifen.

Eine merkwürdige Thatsache ist auch die fast vollständige Congruenz der Bezirke mehrerer zu verschiedenen Gattungen gehöriger Arten, wie der der oben erwähnten Westindischen, Mittelmeer- und Südaustralischen Artengruppen; bei vollständigeren Daten wird sich wohl von den meisten Indisch-Pacifischen Arten dasselbe sagen lassen.

Die somit über die jetzige Verbreitung der Seegräser festgestellten Thatsachen scheinen mir einige Rückschlüsse auf die Geschichte dieser merkwürdigen Gewächse zu gestatten. Die grösstentheils getrennten Bezirke der Gattungen machen es wahrscheinlich, dass dieselben bereits zu einer Zeit existirten, wo eine andere Vertheilung von Land und Wasser Verbreitungswege offen liess, welche gegenwärtig geschlossen sind, vielleicht auch andere klimatische Bedingungen Verbreitungen zulassen, welche jetzt nicht mehr möglich sind. Dagegen deuten die zusammenhängenden Gebiete der meisten Arten darauf hin, dass diese erst von einer Zeitepoche datiren, in der die Begrenzung der Meeresbecken, sowie die klimatischen Bedingungen annähernd die jetzigen waren; bei den Arten der ersten Reihe dürfen wir sogar in der Aufhebung der ursprünglichen Continuität ihrer Wohnbezirke die Ursache ihrer specifischen Differenzirung vermuthen. Die Gegenwart der *Zostera nana* im Kaspischen Meere macht die Vermuthung wahrscheinlich, dass der Zusammenhang desselben mit dem benachbarten, dieselbe Art besitzenden Schwarzen Meere noch in einer relativ neuen Zeit existirte.

Die Seltenheit des oben von *Zostera marina* erwähnten Falles der Verbreitung einer Art quer über weite Meeresstrecken erklärt sich ungezwungen aus der Schwierigkeit der Wanderung dieser an seichtes Wasser gebundenen Gewächse über die breiten Abgründe der Tiefe, da der Transport fast immer zu lange dauern würde, als dass losgerissene Pflanzen oder Samen, welche sicher zu früh keimen würden, falls sie an ein geeignetes Gegengestade geführt würden, ihre Lebensfähigkeit noch bewahrt haben könnten. In vielen Fällen dürfte auch die Richtung des Transports eine ungünstige sein; so würden etwa die Westindischen Arten, durch den Golfstrom an die Europäische Küste geführt, dort schwerlich die Bedingungen ihres Gedeihens vorfinden. Für die Richtigkeit dieser Anschauungsweise spricht wohl überwiegend die Thatsache, dass der anscheinend so leicht mögliche Fall der Verschleppung eines Seegrases durch die heutzutage überall verkehrende und so sehr beschleunigte Schifffahrt noch nie beobachtet wurde. Dagegen ist die Verbreitung einer Art längs continuirlicher oder nur durch schmale und seichte Wasserstrassen unterbrochener Küstenstrecken keiner Schwierigkeit unterworfen.

Das schlagendste Beispiel der Abhängigkeit der jetzigen Verbreitung der Seegräser von der gegenwärtigen Meeresbegrenzung ist wohl die Thatsache, dass die Seegrasfloren an beiden Seiten der, geologisch betrachteten, neuen Landenge von Suez so verschieden als möglich sind. Von den vier Arten des Mittelmeeres (*Cymodocea nodosa*, *Zostera marina* und *nana*, *Posidonia oceanica* ist nicht nur keine mit einer der neun Arten des Rothen Meeres (*Enhalus acoroides*, *Thalassia Hemprichii*, *Cymodocea rotundata*, *serrulata*, *ciliata*, *isoëtifolia*, *Halodule australis*, *Halophila stipulacea* und *ovalis*) identisch, sondern sie gehören mit Ausnahme von *Cymodocea* sect. *Phycagrostis* beiderseits durchaus verschiedenen systematischen Gruppen an. In dieser Gruppe scheint allerdings das Vorkommen der *Cymodocea rotundata* im Rothen Meere darauf hinzudeuten, dass die nahe verwandte *C. nodosa* des Mittelmeeres eine ältere, zu einer Zeit wo dasselbe noch nach Südosten geöffnet war, eingewanderte Bewohnerin dieses Beckens ist als die vielleicht

erst nach dem Durchbruch der Strasse von Gibraltar eingewanderten *Zostera*-Arten von denen sich *Z. marina* auch heute noch auf die Nordküste beschränkt. Diese *Cymodocea* und *Posidonia oceanica* haben sich dagegen vielleicht umgekehrt aus dem Mittelmeere an die Atlantischen Küsten und zwar bis heut nicht allzuweit von deren Oeffnung entfernt, verbreitet. Eine bemerkenswerthe Thatsache wäre es, -wenn beide wirklich im Schwarzen Meere fehlten. Auch für die *Posidonia* des Mittelmeeres deutet der Wohnsitz der noch heut existirenden Gattungsverwandten auf eine Einwanderung aus Südost, wobei die so paradoxe Uebereinstimmung einer Mittelmeer- mit einer Australischen Art an das von den Paläontologen erkannte Vorkommen Neuholländischer Typen in manchen Tertiärfloren Europa's erinnert.

Ueber Sammeln und Conserviren von Pflanzen höherer Ordnung. (Phanerogamen.)

Von

G. Schweinfurth.

A. Allgemeine Regeln bei der Auswahl einzusammelnder Pflanzenexemplare.

1. Beim Einsammeln von Pflanzen und Pflanzenproben hat der Reisende vor Allem auf die möglichste Vollständigkeit der an den Exemplaren erkennbaren Merkmale zu achten, insoweit sich darin die Eigenart einer Pflanze verräth.

2. Die wichtigsten Erkennungszeichen jeder Pflanzenart finden sich an den Theilen der Blüthe und des aus ihr hervorgegangenen Fruchtgebildes.

3. Vollständig sind Exemplare nur dann, — d. h. erschöpfend für den wissenschaftlichen Nutzen einer Sammlung, — wenn sie die Pflanze als Ganzes, oder wenn sie die charakteristischen Theile derselben darbieten, oder wenn sie zugleich die verschiedenen Entwicklungsstadien ein und derselben Art in einer Reihe von Formen vor die Augen führen. Ein einzelnes Exemplar einer Pflanzenart genügt daher nicht in allen Fällen.

4. In den Herbarien bezeichnet man mit dem Ausdruck Exemplar (specimen) nicht nur das einzelne Stück einer Pflanze, sondern eine Anzahl von Pflanzen oder Pflanzentheilen, die sich in Hinsicht auf die zur Schau getragenen Merkmale gegenseitig ergänzen.

5. Vollständige Exemplare sind daher nur solche, an welchen sich folgende Theile einer Pflanze erkennen lassen: Wurzel, Stamm oder Stengel, Rinde, Blätter, Blüthe und Frucht. Der Reisende wird, zumal an grösseren Gewächsformen (an Bäumen z. B.), nicht immer alle die genannten Theile zugleich antreffen, auch wieder einzelne derselben ihrer Natur nach von der Sammlung in Papierbögen ausschliessen müssen, in jedem Falle aber sei er bestrebt die angedeutete Vollständigkeit möglichst annähernd zu erreichen.

6. Einzelne abgerissene Blüthen oder Früchte, wenn ihnen nicht wenigstens ein beblättertes Aststück beigegeben ist, sind fast werthlos, dasselbe gilt für den umgekehrten Fall.

7. Die Blüthen müssen, um genau erkannt werden zu können, wohl ausgebildet und geöffnet sein; ebenso müssen die Früchte der Reife nahe stehen, wie sich das an der Entwicklung der Samenkerne am besten er-

kennen lässt. Damit sei nicht gesagt, dass der Reisende Blüten im Knospenszustande und unreife Früchte vom Einsammeln auszuschliessen habe; beide Zustände sind gleichfalls wichtig zur Erkennung der Eigenart einer Pflanze.

8. Bei baum- und strauchartigen Gewächsen achte der Sammler auf den Erwerb solcher Zweige, welche die ersten Anfänge der Blattentwicklung darthun; Blattknospen sind besonders bei Gewächsen mit periodisch eintretender Entlaubung nie zu vergessen.

9. Kleine Gewächse (Kräuter) welche eine Länge von 40 Centm. nicht überschreiten, werden ganz gesammelt, so dass sie alle unter 5. aufgeführten Theile aufweisen können. Längere Gewächse werden theils durch Umbiegen der Aeste oder Wurzeln, oder durch Zerschneiden der Pflanze in einzelne Stücke oder durch Abschneiden von Theilen, welche den unter 5. angedeuteten Bedingungen entsprechen, zur Mitnahme behufs Conservirung hergerichtet.

10. Die definitive Länge, zu welcher grössere Pflanzen auf die obige Art zuzustutzen sind, um in einem Herbarium untergebracht werden zu können, kann, je nach der Grösse zur Verfügung stehenden Papiers, zwischen 40 und 50 Centim. schwanken; die diesen Maassen entsprechende Breite ist 25 bis 35 Centim.

11. Von Insecten zerfressene, verdorrte oder in ihren Blüten- und Fruchtheilen verstümmelte Exemplare sind zu vermeiden und bessere aufzusuchen.

B. Präpariren der Pflanzen am Platze der Einsammlung.

12. Um Pflanzen auf Ausflügen unbeschädigt nach seinem Standquartiere bringen zu können, wo die weitere und sorgfältigere Präparation vorzunehmen ist, bedient sich der Reisende am zweckmässigsten einer Mappe, die er mit Papierbögen zur Aufnahme der Exemplare füllt.

13. In früheren Zeiten bediente man sich gewöhnlich der sogen. Botanisirbüchsen; diese aber erscheinen aus folgenden Gründen als mangelhaft oder mindestens doch für heisse Klimate als durchaus unzweckmässig:

1. mit Hilfe der Mappe können die Exemplare frisch in's Papier eingelegt werden, so dass sie, bevor sie noch welk und schlaff werden, die natürliche Stellung der Pflanzentheile in dem Maasse bewahren, als es bei der statthabenden Einzwängung in die Flächenausbreitung überhaupt möglich ist.
2. Einmal eingelegt brauchen die Exemplare nicht mehr aus dem Bogen entfernt zu werden, sondern sie bedürfen nur noch der Einfügung von Papierzwischenlagen zwischen den mit Pflanzen gefüllten Papierbögen der Mappe.
3. In der Mappe werden die Exemplare nicht gequetscht und verunstaltet durch gegenseitig ausgeübten Druck und durch die Stiche harter Theile gegen zarte. Die zarteren Blüten bleiben in der einmal empfangenen Einbettung zwischen Papier wohlgesichert. Auch das Zusammenfallen und Welken der Blätter wird vermieden, welches in der Büchse, sobald sie von der Sonne beschienen wird, namentlich in den Tropenländern unausbleiblich ist. Einmal welk gewordene oder zusammengeschrumpfte Pflanzentheile lassen sich nur mit grossem Zeitaufwande nachträglich wieder glätten, oft gelingt dieses durchaus nicht.
4. In der Mappe können weit grössere Quantitäten untergebracht werden als in der Büchse, da, sind sie erst einmal eingebettet, die Pflanzen mit Gewalt zusammengedrückt und geschnürt werden können, ohne zu leiden.

14. Nur für sehr fleischige, sogen. succulente oder cactusartige Gewächse, oder für Pflanzen mit knolligen und zwiebelartigen Wurzeltheilen, die einer sorgfältigen Zustutzung mit dem Messer oder einer Behandlung mit kochendem Wasser bedürfen, ist der Gebrauch einer Büchse empfehlenswerth. In den meisten Fällen wird es sich jedoch auch bei ihnen empfehlen die ange-deutete Zustutzung bereits am Einsammlungsplatze auszuführen, um auch solche Exemplare in der Mappe unterbringen zu können.

15. Dieser letzte Rath empfiehlt sich gerade deswegen der Beachtung des Reisenden, weil sehr viele Gewächse, deren Blätter, Stengel- und Wurzeltheile vermöge ihrer Textur von derartiger Dauerhaftigkeit sind, dass sie weder durch Sonnenbrand und Hitze noch durch Druck und gegenseitige Quetschung im Laufe vieler Stunden leiden, dennoch sehr zarte und hin-fällige Blüthen tragen können.

16. Die unter 14 erwähnten Gewächse, soweit sie nicht durch die unter 15 genannte Ausnahme betroffen werden, lassen sich indess noch besser als in Botanisirbüchsen, in offenen oder geschlossenen Körben fortschaffen. Gewaltsames Einzwängen in einen geschlossenen Raum ist bei der Brüchigkeit fleischiger Blatt- und Stengeltheile zu vermeiden. Derartige Gewächse müssen locker aufeinander gelegt in die Körbe gethan werden.

17. Eine Botanisirmappe ist von Aussen am besten mit starkem Leder zu überziehen und an den Rändern muss der Ueberzug extra gesäumt sein. Für die Auskleidung der Innenseite entspricht wasserdichter Koeper oder Wachstuch, um die von den Pflanzen ausgehende Feuchtigkeit vom Pappen-deckel der Mappe fernzuhalten, am meisten allen Zwecken. Zwei lange Riemen mit Schnallen genügen, die durch je vier Einschnitte der beiden Deckel zu ziehen sind, welche letztere sonst unter sich nicht verbunden sein dürfen. Diese Riemen lassen sich anziehen, um den Inhalt der Mappe fest zusammenzuschnüren.

18. Der Sammler wird wohl daran thun, die Mappe nicht zu sehr an-schwellen zu lassen, um sie beständig selbst unter dem Arme tragen zu können. Von Zeit zu Zeit kann er den Stoss bereits gefüllter Papierbogen in eine zweite Mappe thun, die sein Begleiter fortschafft.

19. Der Sammler scheue nie die Mühe bei jedem neuen Funde die Mappe zu öffnen, denn er muss stets darauf bedacht sein, dass die in den Händen getragenen Exemplare nicht welken, bevor sie eingelegt werden können. Das Welken erfolgt in heissen Ländern nach Verlauf weniger Mi-nuten, und hier bei vielen Pflanzen sogar unmittelbar nachdem man sie aus der Erde gerissen oder abgeschnitten hat.

20. Eine Botanisirmappe darf nur einzeln auf einander geschichtete Papierbögen, die vor Antritt der Excursion auszulegen sind, enthalten, um beim Einlegen jeden Zeitverlust zu vermeiden.

21. Das Einlegen der Pflanzen geschieht in der Weise, dass jeder Bogen für sich gefüllt wird, die Flächen zwischen den einzelnen Bögen aber unbenutzt bleiben, damit bei nachherigem Einfügen der Zwischenlagen die Pflanzen nicht aufgehoben und überhaupt nicht mehr berührt zu werden brauchen.

22. Jeder Bogen muss, falls er mit Exemplaren von geringer Grösse gefüllt wird, womöglich nur solche von ein und derselben Pflanzenart ent-halten.

23. Ist der Sammler nicht im Stande windgeschützte Stellen zum Ein-legen aufzusuchen, so muss er sich an stürmischen Tagen durch einen Be-

gleiter unterstützen lassen, welcher die Papierbögen ausbreitet, während er die Exemplare zurecht legt.

24. Beim Einlegen hat der Sammler die Blätter und Aeste mit den Händen so zurecht zu legen, dass sich die einzelnen Theile nicht aufeinander häufen und nicht zu viele Blätter übereinander zu liegen kommen. Ist letzteres nicht zu vermeiden, so muss durch Ausschneiden Platz geschaffen werden. Häufung der Masse erschwert das Trocknen und macht diesen Proceß sehr ungleich wirkend, so dass der grösste Theil des Exemplars bereits getrocknet sein kann, während an einzelnen Stellen Fäulniss und Schimmelbildung Platz greift.

25. Beim Einlegen der Exemplare ist auch auf möglichst gleiche Vertheilung der dicken Theile der Pflanzen zu achten, damit die Packete nicht auf einer Seite mehr anschwellen als auf der anderen. Die Basaltheile müssen daher bald nach oben, bald nach unten auf dem Papierbogen zu liegen kommen. Dasselbe gilt von dicken Blüten und Früchten. Legt man die Exemplare alle in derselben Richtung in's Papier, so häufen sich dieselben an einer Stelle und bilden einen Hügel im Packet, auch drücken und beschädigen sie sich alsdann leicht gegenseitig.

26. Zarte Blüten, besonders da, wo die Blumenblätter grosser Blüten auf derbe Theile der Pflanze, auf Blätter etc. zu liegen kommen, müssen mit feinem weichen Papier, am besten mit Seidenpapier eingeschlagen und in dieser Hülle belassen werden. Da wo Blüten von Zweigen und Stengeltheilen gekreuzt werden empfiehlt sich behufs Separirung die Unterschiebung eines Lappens von Fliesspapier.

27. Sind an den eingelegten Exemplaren nur wenige Blüten oder Früchte zu finden, oder bringt es die Natur der Pflanze mit sich, dass nur wenige Blüten an ihnen vorhanden sind, so muss der Sammler einzelne Blüten und Früchte noch abbrechen und diese in die stets vorrätzig mitzuführenden Papierkapseln gethan extra dem Exemplare beifügen.

28. Solche Papierkapseln müssen von starkem Schreibpapier in Vorrath und von verschiedener Grösse angefertigt werden. Sie müssen von viereckiger Gestalt und so geschnitten sein, dass die eine Hälfte über die andere an den auf und zuzuklappenden (einzufalzenden) Rändern übergreife.

29. In den Einlagebögen dürfen sich keine von der Pflanze herrührenden kleineren Theile frei umherliegend befinden, damit ein Herausfallen derselben nicht Statt haben kann. Ausser Blüten und Früchten, hat der Reisende hauptsächlich darauf zu achten, dass die aus den letzteren fallenden Samenkerne eigens in Papierkapseln gesteckt werden, desgleichen Rindenproben, Blatt- und Blütenknospen, abfallende Blätter und Stacheln, Wurzelquerschnitte und dergl.

30. Das Papier, in welches die Pflanzen gethan werden, braucht nicht von derselben Qualität zu sein, wie das zum Trocknen verwandte. Es empfiehlt sich zum Einlegen eine stärkere Sorte. Fliesspapier ist zu diesem Behufe nicht unbedingt erforderlich; man kann sich auch zur Einlage des Schreibpapiers, geleimter Druckpapiere und selbst der Zeitungen bedienen. In jedem Falle aber darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass das Papier, welches mit der Pflanze in unmittelbare Berührung gelangt, frei sei von Körnchen und Knötchen, welche auf zarten Blättern und Blüten hässliche Flecken zurücklassen, in Folge der partiellen Quetschung.

31. Für sehr starre, holzige und dornreiche Gewächse ist glattes geleimtes Papier von besonderer Stärke die geeignetste Sorte.

32. Sehr sperrig und spreizend verzweigte, starrästige Exemplare müssen mit Hülfe des Messers so zugestutzt werden, dass diejenigen Pflanzentheile, welche der horizontalen Ausbreitung am meisten widerstreben, ganz entfernt werden. Oft können die widerstrebenden Aeste gewaltsam auf die Seite gebogen werden, was sich durch Anschneiden ihrer Basis unterstützen lässt.

33. Widerstreben starre Gewächse der Einzwängung in die horizontale Flächenausdehnung bis zu dem Grade, dass sie beim Aufeinanderschichten der Einlagebögen mit ihren Dornen, Stacheln und Astspitzen diese durchlöchern und den Inhalt der benachbarten Bogen durch Druck und Stich beschädigen, so müssen sie, ehe man sie einlegt, zuvor gebändigt werden. Auch würde ohne vorhergegangene „Bändigung“ die Pflanzenmappe sehr schnell zu unförmiger Dicke anschwellen.

34. Das Bändigen geschieht am Besten mit Hülfe zweier starker Pappdeckel, zwischen welche man das widerspenstige Exemplar gewaltsam zusammendrückt. Zwei Holzplatten oder nöthigenfalls die Deckel der Mappe selbst, leisten gleichfalls diesen Dienst. Nachdem man das zu bändigende Exemplar zu ebener Erde zwischen die beiden Deckel gelegt, stampft man kräftig mit den Füßen darauf. Alsdann nimmt man sie heraus, ordnet noch an den zusammengedrückten Theilen und behandelt sie wie die anderen Exemplare. Manche Gewächse sind so voller Dornen und Stacheln, dass man sie nur mit grosser Vorsicht abzuschneiden und in den Händen zu halten vermag, ohne sich zu verletzen.

35. Bei dieser gewaltsamen Behandlung der Pflanzen wird es nicht zu vermeiden sein, dass viele ihrer Blüten, Früchte und Blätter abfallen. Diese müssen in die unter 28 beschriebenen Kapseln gethan werden. Auch kann der Sammler nach wiederholten Versuchen der Art solche Exemplare aussuchen, welche durch das Zusammendrücken zufällig am wenigsten gelitten haben.

36. Cactusartige Gewächse (Cacteen, Euphorbien, Stapelien u. dergl.) und solche deren Stengel unförmig dick sind, müssen durch Schnitte zu der Form zugestutzt werden, wie sie sich der horizontalen Ausbreitung in die Fläche am meisten anpassen. Die Stengel werden der Länge nach durchschnitten oder Längsschnitte durch die ganze Blüthe geführt, wobei darauf zu achten ist, dass die an den Segmenten haftenden Blüten, Stacheln, Dornen und Blätter nicht abfallen. Von anderen Stengeltheilen müssen unter Beobachtung derselben Vorschrift Querschnitte von scheibenartiger Gestalt hergestellt werden.

37. Besonders dicke Blütenköpfe (z. B. von Disteln) müssen halbirt, oder, wenn dieses nicht genügt, von beiden Seiten beschnitten werden, so dass sie nur noch eine den Längsschnitt darbietende Scheibe ausmachen.

38. In ähnlicher Weise stutzt man unförmig dicke Früchte zu, die an den einzulegenden Exemplaren haften. Man macht Längs- und Querdurchschnitte je nach der Lage der Früchte. Ganze Früchte müssen ausserdem noch mitgenommen werden und unter Angabe ihrer Zugehörigkeit (vgl. 52.) entweder auf feuchtem oder auf trockenem Wege conservirt werden.

39. Auch von sehr dicken, fleischigen oder lederartigen Blattgebilden, wie sie namentlich bei Liliengewächsen und Zwiebeln vorkommen, müssen scheibenförmige Querschnitte den Exemplaren beigelegt werden.

40. Rübenartige Wurzeln, Knollen und Zwiebeln, dicke Wurzelstöcke oder Rhizome, welche, wo nur immer thunlich, von den Pflanzenexemplaren

nicht zu trennen sind, müssen durch Längsschnitte, entweder halbirende oder scheibenartig von beiden Seiten geführte, flach gemacht werden.

41. In gleicher Weise sind dicke Theile an holzigen Aststücken abzuflachen

42. Der Sammler, welcher gerade in der Ueberwindung der unter 32 bis 41 angeführten Schwierigkeiten seine Freude findet, wird nicht verfehlen einen an Neuheiten überraschenden Reichthum zu erzielen; er wird Pflanzen erlangen, die in den vorhandenen Sammlungen bisher gar nicht, oder doch nur sehr mangelhaft vertreten waren, weil seine Vorgänger die Mühe scheuten, welche eine solche zeitraubende Präparation erheischt.

43. Es empfiehlt sich, um späteren Verwechslungen und Gedächtnissfehlern vorzubeugen, die auf einer Excursion zu sammelnden Exemplare sofort beim Einlegen mit den unter 51 und 52 näher zu bezeichnenden Zetteln zu versehen. Die Pflanzennamen der Eingeborenen, sowie Angabe über die Wachstumsverhältnisse der Pflanzen — (über die Höhe, ob Baum oder Strauch, ob schlingend oder kriechend u. s. w.) — müssen schon an Ort und Stelle niedergeschrieben werden.

C. Conserviren der Pflanzen auf trockenem Wege.

44. Das Trocknen der in den unter 21. beschriebenen Einlagen enthaltenen Pflanzen wird durch wiederholt erneuerte Zwischenlagen von Papier vollzogen, welche einmal trocken mit grosser Begierde die von den eingelegten Pflanzen ausgehende Feuchtigkeit aufsaugen müssen. Dieser Process wird durch Druck und Pressung beschleunigt.

45. Das hierzu Verwendung findende Papier darf kein geleimtes sein, wie es die Schreibpapiere und alle harten Packpapiere sind. Die für den botanischen Sammler unentbehrliche Sorte, gewöhnlich Fliesspapier genannt, muss von wolliger, lockerer und weicher Beschaffenheit sein. Taugliches Trockenpapier erkennt man in jedem Falle auf folgende Art. Man drückt einen nass gemachten Finger auf das zu untersuchende Papier. Hinterlässt derselbe einen deutlichen Fleck und wird das Papier an der angefeuchteten Stelle in demselben Momente weich und aufgelöst, so dass man es mit dem Finger durchstossen kann, so ist es brauchbar. Bleibt es fest und wird der Fleck nur undeutlich, so ist es unbrauchbar.

46. Bei der Auswahl des Papiers achte man darauf, dass die einzelnen Bögen eine gewisse Stärke (Dicke) besitzen, da zu feines, schwaches Fliesspapier, wie es namentlich die weissen Sorten zu sein pflegen, keine genügende Dauerhaftigkeit besitzen, um einer tagtäglichen Manipulation zu widerstehen. Die zur Verwendung kommenden Papiersorten müssen von möglichst gleichartigem Format sein. Da dies bei häufig wechselndem Einkaufsplatze schwer zu beobachten sein wird, so muss man zum Zuschneiden der Papiere seine Zuflucht nehmen.

47. Der Reisende wird in fernen Ländern hinsichtlich der Beschaffung des nöthigen Trockenpapiers nicht selten in grosse Verlegenheit gerathen, da die geeigneten Sorten in den Fabriken Europas mit jedem Jahre seltener werden. Die sogenannten Maschinenpapiere, weil fest gewalzt, und geglättet und minder hygroskopisch, eignen sich zu unserem Zwecke weniger als die sogenannten Handpapiere wie sie vor Jahren fast ausschliesslich als Packpapier Verwendung fanden. Zum Pflanzentrocknen besonders geeignete Sorten werden heutzutage nur noch in Belgien, am Rhein, in Oesterreich, Italien und Russland im grösseren Maassstabe fabricirt. Japanisches Pack-

papier übertrifft an Weichheit, Lockerheit und Imbibitionsfähigkeit alle europäischen Sorten. Es giebt auch sogen. Strohpagiere, welche leicht imbibiren.

48. Die einzelnen Zwischenlagen bestehen, wenn das Papier stark ist, wie Packpapier aus 4 bis 6 Bogen, wenn es schwach ist, wie Druckpapier, aus 8 bis 12 Bogen. Brauchbare Zwischenlagen müssen zusammengepresst mindestens eine Dicke von 3 bis 5 Millimeter darthun.

49. Die Bogen einer Zwischenlage müssen geheftet werden, damit beim Trocknen an offener Luft die einzelnen Blätter nicht vom Winde zerstreut werden und das Auflesen und Ordnen derselben keinen Zeitverlust zur Folge habe.

50. Die Anwendung der Zwischenlagen besteht darin, dass man die von der Excursion zum Standquartiere geschafften und nicht zu öffnenden Einlagen (unter 21.) mit diesen Zwischenlagen abwechseln lässt, so dass ein wohlgeschichteter Ballen entsteht, der bis zu 2 Fuss Höhe anwachsen darf. Eine regelmässige Schichtung muss beobachtet werden und darf kein Bogen über dem andern vorstehen.

51. Sobald der Sammler nach Hause zurückgekehrt ist und die mitgebrachten Pflanzeneinlagen zum Trocknen herrichtet, muss seine erste Sorge darauf gerichtet sein, eine sorgfältige Etiquettirung aller ihm als eigenartig erscheinenden Exemplare vorzunehmen. Blatt für Blatt durchmusternd hat er jeder eigenen Art einen Zettel beizufügen, welcher folgende Angaben enthalten muss: —

1. Datum der Einsammlung.
2. Angabe des Standorts:
  - a) Ortsangabe: das Land, District, Stadt; der Bach, Fluss oder Berg in der Nähe.
  - b) Standortsangabe und Bodenverhältnisse: Wald, Steppe, Sumpf, Ackerland, Flussufer, Sandfelder, Felsen etc.
  - c) Meereshöhe.
3. Angabe über Wachsthumsvverhältnisse, ob Kraut, Staude, Baum oder Strauch, ob schlingend oder kriechend; Wurzelbildung; bei Bäumen die Höhe in Metern approximativ, Gestalt und Aussehen von Laubkrone, Stamm und Rinde.
4. Name der Pflanze bei den Eingeborenen.
5. Etwaige Nutzanwendung der Pflanze und einzelner ihrer Theile bei den Eingeborenen.
6. Beschreibendes über solche Theile, die sich in Folge des Trocknens verändern oder aus den eingelegten Exemplaren nicht ersichtlich sind, z. B. die Farbe der Blüthen, Frucht, Rinde, Art des Duftes der Blüthen etc.

Je vollständiger diese Angaben sind, desto grösser wird der wissenschaftliche Werth und der Nutzen der Sammlung sein. Der Mangel solcher Angaben wird bei vielen, sonst vorzüglichen Sammlungen aufs schmerzlichste empfunden. Die unter 1., 2., 3. und 6. aufgeführten Angaben sind in jedem Falle mindestens durch eine kurze Notiz zu berücksichtigen.

52. Um zu erfahren wie gross die Anzahl der auf einer Reise gesammelten Exemplare oder wie gross die der Arten sei, kann der Reisende die Zettel mit fortlaufenden Nummern versehen, die er sich im Voraus auf die leeren Zettel geschrieben hat. Bei Unkenntniss des Artnamens hat diese Einrichtung für ihn den grossen Vortheil, dass er, wo er von dieser oder jener Art sprechen will, nur die betreffende Nummer seines Herbars zu citiren braucht.

Beispiel einer Pflanzenetiquette:

Nr. 2307 *Terminalia macroptera* Guill.

(= 1460, wo mit Frucht)

Bongo-Name: mit Nr. 1575 zusammen „Gurfa“ Blüten gelblich weiss, duftend. 30 Fuss hohe Bäume, mit hellgelbem weichem Holz, niederem Stamm und breiter Krone. Rinde schwärzlich, tiefrissig. Bildet geschlossene Wälder in sumpfigen Niederungen. Gegen 700 Meter am Teh im südlichen Bongo-lande. 2. Februar 1870.

53. Kommen in einen und denselben Bogen Exemplare verschiedener Arten zu liegen, so sind die dazu gehörigen Zettel an denselben zu befestigen, damit keine nachherige Verwechslung möglich ist. Zu dem Ende schiebt man einen vorspringenden Ast, oder die Wurzel durch einen spaltartig am unbeschriebenen Rande des Zettels geführten Schnitt, oder man befestigt den Zettel mit einer Stecknadel, oder man näht denselben am Stengel fest.

54. Die Pressung geschieht am Besten durch einen schweren Körper, durch einen Stein von circa 40 Kilogramm. Letzterer muss womöglich von plattenförmiger Gestalt sein; eine wirkliche Steinplatte macht das Unterlegen eines Brettes entbehrlich. Holzplatten und Bretter müssen in jedem Falle auf Reisen eigens zu diesem Zwecke mitgeführt werden.

55. Wendet man zu schwere Gewichte beim Pressen an, so werden die Pflanzen zerquetscht, besonders ist darauf zu achten dass die Stengelteile und die Früchte nicht völlig flach gedrückt werden, sodass sich auch an der getrockneten Pflanze immer noch die Form erkennen oder errathen lässt, welche dieselben im frischen Zustande auf dem Querschnitt zu erkennen gaben.

56. Die zu pressenden Papierballen lehnt man an eine Wand, an einen Pfahl etc., um das bei stattfindender Sackung der trocknenden Pflanzen unvermeidliche Umstürzen zu verhüten.

57. Will der Reisende Pflanzen während des Marsches trocknen, so schnürt er die Papierballen mit Riemen und Stricken fest zusammen. An den Rast- und Lagerplätzen muss er sie mit Steinen beschweren. Ist der Boden feucht, so legt er die mitgenommenen Bretter unter die Ballen. Steht Termitenfrass zu befürchten oder ist der Erdboden durchnässt, so hat er Pflöcke mit sich zu führen, die in den Boden getrieben der Brettunterlage als vier Füße dienen können.

58. Die in früherer Zeit üblichen Schraubenpressen, die (Buchbinderpressen) sind aus dem Grunde unzweckmässig, weil die Pflanzen durch dieselben momentan zu gewaltsam zusammengedrückt später aber nach erfolgter Sackung des Inhalts, nicht nachhaltig genug gepresst werden. Auch vermehrt dieser schwerfällige Apparat unnöthiger Weise das Gepäck der Reisenden.

59. Je schneller die Pflanzen getrocknet werden können, desto bessere Exemplare erzielt man für die Sammlung; je häufiger die imbibirten Zwischenlagen gegen trocken gewordene vertauscht werden, desto schneller trocknen die Pflanzen. In heissen Ländern muss während der ersten 2 bis 3 Tage ein zweimaliges Wechseln stattfinden. Ueberlässt man die Pflanzen in ihrer Einbettung zwischen Zwischenlagen sich selbst, so faulen und verschimmeln sie. Fäulniss und Schimmelbildung sind aber vor allen Dingen fernzuhalten; Pflanzenexemplare, die diese Uebelstände verrathen, werden zu jeder wissenschaftlichen Verwerthung untauglich sein.

60. Sein Hauptaugenmerk richte der Sammler auf die vollständige

Austrocknung der gebrauchten Zwischenlagen. Zu regenloser Zeit wird es genügen, dieselben auf der trocknen und nackten Erde auszubreiten, so dass sie von der Sonne ausgedörnt werden können. Ist der Boden feucht und grasbewachsen, so errichte man Gestelle, um die Zwischenlagen der vollen Wirkung der Sonnenstrahlen aussetzen zu können. Es empfiehlt sich auch die Zwischenlagen in solchem Falle an ausgespannten Stricken aufzuhängen. Wo grosse Oefen (bei Bäckern) zu Gebote stehen, Plattformen der Häuser und dergl., kann das Trocknen sehr beschleunigt werden.

61. Um die Zwischenlagen gegen den Wind zu schützen, legt man auf jede einzelne einen Stein, oder man legt Stangen der Länge nach über eine grössere Anzahl derselben.

62. Das Trocknen der Zwischenlagen einzeln am Feuer ist eine so mühsame Arbeit, dass sie fast unausführbar erscheint. An regnerischen Tagen oder in thautriefenden Nächten wird der Reisende auf eine Conservirung auf trockenem Wege zu verzichten und den feuchten Weg einzuschlagen haben. In feuchten Klimaten kann man ohne Einwirkung der Sonnenstrahlen keine absolut trockenen Zwischenlagen erzielen.

63. Um Pflanzen auch unter Verhältnissen trocknen zu können, welche ein Ausdörren der Zwischenlagen unmöglich machen, wie es in der Regenzeit heisser Tropenländer, wo die Regen oft Tage lang ohne Unterbrechung niederfallen, wie es an feuchten Küstenstrichen, auf Flussreisen etc. vorkommt, sind eigene Apparate erfunden worden, welche sich indess nicht hinreichend bewährt haben, da alle gewaltsam durch künstliches Ausdörren hergestellten Exemplare eine so brüchige, schrumpfe Beschaffenheit annehmen, oder in so unnatürlicher Weise gebräunt und geschwärzt werden, dass sie sich später weder gut aufbewahren noch mit Erfolg untersuchen lassen, in jedem Falle aber ein sehr entstelltes Aussehen zur Schau tragen. Dies gilt namentlich für diejenigen Exemplare, welche in durch Wasserdämpfen erhitzten Trockenkammern oder zwischen über Feuer gestellten Drahtgittern gedörnt oder vielmehr gebraten wurden. Bessere Resultate erzielt man mit Hülfe des von Professor Münter erfundenen Trockenofens, in welchem die zwischen Drahtgitter oder durchlöchernte Blechplatten gelegten Pakete mit Pflanzen einem durch Feuer ausgedörnten Luftstrome ausgesetzt werden.

64. Jeder Reisende wird gewisse Pflanzen einzusammeln Gelegenheit haben, welche zur definitiven Austrocknung einen unverhältnissmässig grossen Zeitraum erfordern. Hierzu gehören besonders hinsichtlich ihrer Wurzeltheile alle Zwiebelartigen Gewächse und die Erdorchideen, ferner trocknen alle Succulenten oder Fettpflanzen selbst bei beständigem Wechsel der Zwischenlagen oft in vielen Wochen nicht aus, so dass man auf Mittel sinnen muss, um das Trocknen derselben zu beschleunigen. Das einfachste Mittel besteht darin, dass man je nach Erforderniss die ganze Pflanze oder nur ihre Wurzeltheile in siedendes Wasser taucht.

65. Nach vollzogenem Abbrühen ist grosse Sorgfalt auf das Wechseln der Zwischenlagen zu legen, da die davon betroffenen Theile sehr leicht faulen und schimmeln. Dieses Wechseln muss bei Tage mindestens alle 6 Stunden erfolgen. Abgebrühte Exemplare dürfen nur ganz leicht gepresst werden, da sie sonst vollständig zerdrückt werden.

66. Zwiebelartige Pflanzentheile müssen unter allen Umständen, selbst nach vorgenommener Halbirung und bei Anwendung des Längsschnitts, abgebrüht werden, weil sie sonst entweder faulen oder schimmeln oder auswachsen und frisch zu treiben beginnen. Knollen von mehligter Beschaffen-

heit brauchen nur durchschnitten zu werden, schleimige Knollen müssen dagegen wie Zwiebeln behandelt werden. Oft erheischen auch die Blätter und Stengel der Abbrühung.

67. In manchen Fällen wendet man auch das Abbrühen da an, wo in Folge des Trockenprocesses ein Abfallen der Blätter etc. zu befürchten steht. Dies gilt besonders für die Conservirung der Exemplare von Feigenbäumen, deren Blätter und Früchte nur nach geschehenem Abbrühen im Zusammenhange bleiben.

68. Pflanzen, die voraussichtlich eine lange Zeit zum Austrocknen erfordern, müssen von den übrigen getrennt in eigenen Packeten untergebracht werden. Der Reisende wird sich der fortgesetzten Mühe des Umlegens durch Anwendung von Gittern entziehen können. Succulente Gewächse werden mit doppelten oder dreifachen Zwischenlagen versehen zwischen die Gitter geschnürt und diese der Sonne und dem Winde ausgesetzt (vor Thau zu bewahren) sich selbst bis zu ihrer völligen Austrocknung überlassen. Ein Abbrühen der für die Gitter bestimmten Pflanzen ist unzulässig.

69. Die zum Austrocknen der Pflanzen ohne Wechsel der Zwischenlagen dienenden Gitter bestehen aus einem Netzwerke von Draht, welches zwischen einem eisernen Rahmen von der Grösse des Papierformats ausgespannt ist. Auch hölzerne Gitter sind verwendbar, und der Reisende kann sich selbst leicht derartige Holzgitter verschaffen, indem er eine Anzahl dünner Holzstäbe (Rohr, gespaltene Palmzweige, Bambus u. dergl.) der Quere und der Länge nach über und unter den Packeten ausbreitet und die Stäbe da, wo sie vorragen, fest zusammenschnürt.

70. Die in den Gittern enthaltenen Pflanzenpackete können nur in dem Falle des Umlegens entbehren und sich selbst überlassen werden, wenn dieselben in zusammengepresstem Zustande keine grössere Dicke erreichen als etwa 5 bis 10 Centimeter. Bei sehr fleischigen Pflanzen darf man nur 5 bis 6 Einlagebogen und 10 bis 15 Zwischenlagen in ein und dasselbe Gitterpacket einschnüren.

D. Verpackung und Aufbewahrung getrockneter Pflanzen.

71. Erst nach gänzlich vollendetem Trocknungsprocesse dürfen die Einlagebögen mit den Pflanzen aus den Zwischenlagen genommen und sich selbst überlassen, zu einzelnen Packeten zusammengebunden werden.

72. Man erkennt den vollendeten Trocknungsprocess eines Exemplares an der völligen Starrheit aller seiner Theile. Wenn man ein trockenes Exemplar aufhebt, so müssen alle seine Theile in derselben Lage zu einander verharren, welche sie vorhin zwischen dem Papiere einnahmen.

73. Die Einlagen mit den trockenen Pflanzen werden ohne weiteres sorgfältigst auf einander geschichtet und zu Packeten vereinigt, welche man in Mappen von Pappdeckel schnürt.

74. Um das spätere Ordnen der Sammlung zu erleichtern, empfiehlt es sich, solche Einlagebogen, welche trocken gewordene Exemplare ein und derselben Art enthalten, in einem Umschlagbogen zu vereinigen, bevor das Packet formirt wird. Geschieht dies nicht, so muss ein jeder Bogen eine Abschrift des auf die betreffende Art bezüglichen Zettels enthalten.

75. Die zum Zuschnüren der Packete mit getrockneten Pflanzen dienenden Mappen muss der Reisende in entsprechender Menge vorrätig mit sich führen. Mittelstarke Pappdeckel, deren Format das zur Anwendung gelangte Papier um eines Fingers Breite nach allen Seiten überragen muss,

werden je mit 6 Einschnitten versehen, durch welche Bänder von Fingerbreite (leinene oder baumwollene Stränge) hindurchgezogen werden, die zum Zugschnüren dienen.

76. Die gefüllten Mappen dürfen an Höhe die Breite ihres Formats nicht überschreiten.

77. Gegen Insectenfrass kann man getrocknete Pflanzen nur durch Eintauchen in eine Lösung von Sublimat in Spiritus ($\frac{1}{30}$ vom Gewichte des letzteren) vollständig schützen. Alle anderen Mittel haben sich auf die Dauer als unbrauchbar erwiesen. Da das Sublimatisiren der Exemplare indess, der nochmaligen Trocknung halber, eine sehr zeitraubende Manipulation erfordert, so wird der Reisende nur selten Zeit und Musse finden, es vornehmen zu können. Er wird daher wohl daran thun, die Packete der Art zu emballiren, dass ein Eindringen der Insecten von aussen mindestens sehr erschwert werde.

78. Auch gegen den Einfluss der Feuchtigkeit müssen solche Packete sorgfältig geschützt werden. Ein sehr gutes Mittel dagegen, und zugleich sehr geeignet, Insecten abzuhalten, ist in dem Kautschuksafte gewisser Gewächse dargeboten, wie man sich denselben frisch in verschiedenen Tropenländern verschaffen kann. Mit diesem milchartigen Saft (von Feigenbäumen, von Asclepiaden und Sapotaceen) bestreicht man Papierbogen und hüllt in dieselben die zu schützenden Packete. In manchen Fällen wird auch geöltes Papier einen willkommenen Schutz gegen äussere Einflüsse gewähren.

79. Vor Termiten, Ameisen, Ratten und Mäusen schützt man die Pflanzenpackete durch Aufhängen hoch über dem Boden.

80. Zur Versendung packt man die Pflanzenpackete am besten in gut-schliessende Holzkisten. Befürchtet man Schaden durch Nässe auf dem Transport, so ist auch ein Einschluss in verlöthete Blechkisten oder Blecheinsätze in Holzkisten zu empfehlen. In keinem Falle aber darf das Verlöthen derselben vorgenommen werden, bevor man sich nicht vom absolut trockenen Zustande der Packete überzeugt hat. Halbfeuchte (durch atmosphärische Einflüsse) Packete bewirken im hermetisch geschlossenen Raume eine hässliche Schwärzung der Exemplare. Die Verpackung nimmt man an sonnenklaren Tagen vor, nachdem man die einzelnen Packete zuvor für einige Stunden der Sonne exponirt hat.

81. Eine einfache Umhüllung in Leinwand und andere weiche Stoffe reicht nicht aus, da die Packete nicht nur gegen Nässe, sondern auch gegen Druck und Quetschung zu hüten sind. Passirt die Sendung auf ihrem Wege nach Europa dürre Gegenden, Wüsten etc., so ist anzunehmen, dass die Exemplare unterwegs äusserst brüchig werden, so dass ein wiederholter, ungleichmässiger Druck den Pflanzen grossen Schaden zufügen kann.

82. Zoologische Sammlungen, überhaupt Gegenstände von animalischer Substanz dürfen in keinem Falle in die für die Pflanzenpackete bestimmten Kisten mit verpackt werden. Dagegen können Mineralien, Petrefacten, Holzproben (völlig trockene) und metallene Gegenstände gut zur Ausfüllung der leeren Räume verwandt werden. Letzteres empfiehlt sich auch vom Gesichtspunkte der Raum- und Gewichtersparniss aus, da allein mit trockenen Pflanzen gefüllte Kisten unverhältnissmässig leicht zu sein pflegen, ein Umstand, der bei Kameeltransporten und dergl., wo weniger für das Gewicht als für das Volumen einer Last gezahlt wird, besondere Berücksichtigung verdient.

E. Conserviren der Pflanzen auf feuchtem Wege.

83. Unter 62 und 63 ist auf die grossen Schwierigkeiten aufmerksam gemacht worden, denen der Reisende in manchen Gegenden beim Trocknen der Papiere und beim Aufbewahren der bereits getrockneten Pflanzen begegnen wird; zugleich wurde auf die Unzweckmässigkeit gewaltsamer Dörrprocesse bei Herstellung von Pflanzensammlungen in solchen Ländern hingewiesen. Um nun das Conserviren von Pflanzen unter allen Verhältnissen, selbst mitten im Regen, zu ermöglichen, habe ich die in folgenden Artikeln beschriebene Methode eronnen, die ich bereits mit grossem Erfolge zur Ausführung zu bringen vermochte und daher als etwas schon Bewährtes allen Reisenden empfehlen kann.

84. Alle pflanzlichen Gebilde, da sie in höherem Grade von Luft und wässrigen Säften erfüllt, als Thierkörper, sowohl durch unzählige Oeffnungen als auch durch das endo- und exosmotische Vermögen ihrer Zellmembranen mit dem sie umgebenden Medium in einen directen Austausch der Stoffe treten können, vornehmlich aber in Folge der in der Regel weit geringeren Massivität ihrer Theile, lassen sich weit leichter und schneller durch antiseptische Mittel (dampfförmige so gut wie flüssige) conserviren als thierische Körper irgend welcher Art.

85. Die wohlfeilsten und zuverlässigsten Conservationsflüssigkeiten sind Spiritus oder Carbolsäure, Glycerin, Sublimat und Kochsalz in wässriger oder alkoholischer Lösung. Die beiden letztgenannten Lösungen sind nur in gläsernen oder glasirt-thönernen Gefässen anwendbar.

86. In allen den genannten Flüssigkeiten werden Pflanzen sofort conservirt, sobald man sie hinein gethan. Ein nachfolgender Wechsel der angewandten Flüssigkeit, wie dies bei thierischen Körpern erforderlich ist, fällt weg.

87. Eine starke Kochsalzlösung in Wasser empfiehlt sich ihrer leichten Beschaffung halber besonders zur Conservirung von Früchten. Indess müssen dieselben darin völlig untergetaucht sein und untergetaucht erhalten werden, sie dürfen nicht einmal die Oberfläche berühren, da sonst an den der Luft exponirten Theilen unfehlbar Schimmelbildung Platz greift. Auf den sorgfältigsten Verschluss ist daher zu achten, damit während des Transports die Flüssigkeit sich nicht verringere.

88. Will man Gewächse durch Immersion conserviren, so genügt bei Anwendung von Spiritus eine verdünnte Lösung von ein- bis zweimal mehr Wasser als Spiritus.

89. Pflanzen, welche (mit der Bestimmung später am Bestimmungsorte getrocknet zu werden) durch eine Flüssigkeit conservirt werden sollen, kann man nicht durch einander in die Gefässe thun, sondern sie müssen mit ihrem Papier, wie sie als Einlagen (unter 21) frisch von der Excursion zum Standquartiere gebracht worden waren, und zu Bündeln vereinigt in den Gefässen untergebracht werden.

90. Die Etiquettirung der für die Conservirung auf feuchtem Wege bestimmten Pflanzen muss mittelst eines mittelweichen Bleistiftes von genügender Schwärze (Faber No. 2) vorgenommen werden, da mit Tinte geschriebene in den meisten Fällen unleserlich werden.

91. Die geeignetsten Gefässe zu diesem Zwecke sind vierkantige Blechbüchsen, welche oben offen und mit umgebogenen Rändern versehen sein müssen, um das Auflöthen eines Deckelblechs zu gestatten. Sie müssen in

ihrem Längs- und Breitendurchmesser das Format der Einlagen um eines Fingers Breite überragen.

92. Das passendste Metall zur Anfertigung dieser Büchsen ist starkes Zinkblech; minder zweckmässig erscheint Weissblech, da das Eisen desselben von den durch den Spiritus ausgezogenen Pflanzensäften beeinflusst, leicht eine schwärzliche Färbung der eingeschlossenen Pflanzen veranlassen kann.

93. Das Füllen der Büchsen mit den frischen Einlagen ist auf folgende Art vorzunehmen. Man formirt aus den Einlagen drei mehrmals über das Kreuz zusammengeschnürte Bündel ohne Pappendecken anzuwenden. Die drei Bündel müssen zusammen bei leichtem Zusammendrücken dem dargebotenen Raume ungefähr entsprechen. Alsdann stellt man zwei der Bündel so in die leere Büchse, dass sie zur Rechten und zur Linken an den Seitenwänden derselben lehnen. Nun treibt man das dritte Bündel keilartig zwischen die beiden ersten hinein, und die Büchse ist wohlgefüllt. Um das Hineingleiten des keilartigen Bündels zu erleichtern, umgibt man die Bündel mit einem (nicht unter die Umschnürung derselben zu bringenden) losen Umschlagebogen von glattem, starren und starken Packpapier (Carton- oder Actendeckelpapier).

94. Die Füllung mit Flüssigkeit kann erst nach vorausgegangenem Einschieben der Pflanzenbündel vorgenommen werden.

Da nun Gefässe von der unter 91 angedeuteten Grösse ein sehr bedeutendes Gewicht (20 bis 25 Kilo) erreichen würden, falls man sie ganz mit einer Conservationsflüssigkeit füllen wollte (20 bis 30 Liter), so empfiehlt es sich zur Erleichterung des Transports, die Conservirung nur durch Einwirkung des Spiritus in dunstförmiger Gestalt bewerkstelligen zu lassen.

96. Spiritus und in mindestens zwanzigmal stärkerem Grade, Carbonsäure leisten auch in dampfförmiger Gestalt denselben Dienst, als wenn die Pflanzen ganz in diese Flüssigkeiten eingetaucht worden wären. Wenn man Blüten und Blätter verschiedener Art (sowohl succulente wie zarte) in eine Flasche einschliesst, auf deren Grunde sich ein mit Spiritus oder Carbonsäure getränkter Schwamm befindet, so wird man noch nach Jahren an ihnen keine andere Veränderung wahrnehmen, als höchstens ein Ausbleichen der Mehrzahl ihrer Farben; dennoch waren sie an jeder unmittelbaren Berührung mit der conservirenden Flüssigkeit völlig gehindert.

97. Die mit pflanzengefüllten Papierbündeln versehenen Blechbüchsen brauchen daher nur zum kleinsten Theile mit Spiritus gefüllt zu sein, um jeder Fäulniss ihres Inhalts vorzubeugen. Es genügt, die eingeschlossene Papiermasse durch allmähliges Berieseln mit Spiritus zu durchtränken, was nur ein dem 6. Theil des Büchsenvolumens gleichkommendes Quantum erheischt.

98. Der Sammler darf nicht ausser Acht lassen, dass zu dem unter 97 beschriebenen Verfahren ein nicht zu verdünnender, möglichst hochgradiger Spiritus erforderlich ist. Carbonsäure, obgleich der mindestens zwanzigste Theil der erforderlichen Spiritusmenge ausreicht, dürfte sich aus Rücksicht auf den Kostenpunkt und die beim nachherigen Trocknen unvermeidlichen Exhalationen übelster Art für unseren Zweck minder empfehlen als Spiritus.

99. Das Zulöthen muss der Reisende entweder eigens erlernen oder er muss es durch Sachkundige bewerkstelligen lassen, da diese Arbeit mehr Uebung und Geschick erheischt, als man auf den ersten Blick zu vermeinen glaubt.

100. Der Reisende versehe sich mit einem Vorrathe der durch nichts zu ersetzenden Löthapparate.

1. Löthkolben grösserer Form.
2. Zinn in Stangen.
3. Salzsäure in möglichst kleine Fläschchen abgefüllt und mit vergypsten Stöpseln.

101. Die Verpackung der gefüllten Büchsen zum Transport geschieht in Holzkisten, in welche eine Anzahl der ersteren genau hineinpassen muss. Bei der grossen Brüchigkeit des Zinklechs ist wohl auf diesen Umstand zu achten. Weiche Papiere zwischen die einzelnen Büchsen (als Polster) gethan, werden zum Schutz derselben gegen Stoss und Schlag das Uebrige thun.

102. Sind die Blechbüchsen mit den in Spiritus conservirten Pflanzen an ihrem Bestimmungsorte angelangt, so werden die Bündel herausgezogen und die einzelnen Einlagebögen mit Pflanzen sorgfältig von einander abgehoben und wie frische zwischen Zwischenlagen getrocknet.

103. Mit Spiritus getränkte Exemplare von Pflanzen trocknen kaum schleuniger als frische; ein wiederholtes Wechseln der Zwischenlagen ist daher erforderlich.

104. Ich resumire in Kürze die Vorzüge und Nachtheile der hauptsächlich unter 89—103 erläuterten Methode der Pflanzenconservirung. Man wird sehen, wie sehr die ersteren die letztgenannten überwiegen.

Vorzüge:

1. Grosse Zeitersparniss für den Sammler. Der Reisende kann die Zeit, welche er sonst auf das Trocknen der Pflanzen verwendet, weit erspriesslicher für die Herstellung von Zeichnungen und Untersuchungen derselben an Ort und Stelle verwerthen.
2. Der Reisende kann ohne die unter 44—82 beschriebenen Manipulationen vorzunehmen, Pflanzen und Pflanzentheile jeder Art auf das leichteste conserviren.
3. Der Reisende kann zu jeder Zeit, auch wenn Regen tagelang anhalten sollte, die Pflanzen conserviren.
4. Der Reisende geniesst da, wo ihm kein genügender Raum zum Trocknen der Papiere geboten, wie beispielsweise auf den engen Fahrzeugen der Flüsse, oder auf Küstenfahrten in kleiner Barke, den Vortheil einer leichteren Manipulation und bedarf keines sehr grossen Papier-vorrathes.
5. Die einmal conservirten Pflanzen sind ein für alle Mal gegen Einflüsse von Feuchtigkeit und Nässe gegen Schimmelbildung, sowie gegen Insectenfrass und gegen Ratten und Mäuse sichergestellt.
6. Hat der Sammler in der Hast des Zusammenraffens die Pflanzen schlecht eingelegt, so steht nichts im Wege, um sie nachher in Europa von neuem auszubreiten und besser zurechtzulegen.
7. Brüchige Pflanzen oder solche, welche leicht in ihre Theile zerfallen, durch Abwerfen der Blätter, durch Abgliederung der Blüthen- und Fruchtheile, durch Aufspringen und Zerfall der Fruchtgebilde selbst, nehmen in Folge der Behandlung mit Spiritus ein weit festeres Gefüge an. Zugleich geben die Exemplare nach erfolgter Trocknung später eine weit grössere Geschmeidigkeit und Biegsamkeit aller Theile zu erkennen, als wenn sie auf gewöhnlichem Wege getrocknet worden wären.
8. Viele Pflanzen besitzen die Eigenthümlichkeit, nach erfolgtem Trocknungsprocesse schwarz zu werden; man nennt solche Arten „nigrescirende“. Durch die Einwirkung des Spiritus fällt dieser, die

spätere Untersuchung sehr erschwerende Uebelstand entweder gänzlich weg oder er tritt nur in weit beschränkterem Grade ein.

9. Für das spätere Studium der gesammelten Pflanzen erwächst der grosse Vortheil, dass man sich beim Oeffnen der Büchsen Proben von Blüthen und Früchten im safterfüllten Zustande herauszunehmen und in Glaskölbchen mit Spiritus aufzubewahren vermag, um diese Theile einer ebenso genauen Analyse unterziehen zu können, wie sie an der frischen Pflanze dargeboten erscheinen.
10. Das zur endgültigen Sicherung eines Herbars gegen Insectenfrass unerlässliche Sublimatisiren wird auf weit einfacherem Wege ermöglicht, da man nach Oeffnung der Blechbüchsen nur die erforderliche Lösung des Giftes auf die bereits durchnässten Pflanzen zu giessen braucht, bevor man sie definitiv trocknet.

Nachtheile:

1. Grösserer Kostenaufwand.
  2. Erschwerter Transport auf Landreisen.
  3. Stärkeres, wenigstens frühzeitigeres Ausbleichen der pflanzlichen Farbstoffe, das übrigens im Laufe der Jahre auch bei den bestgetrockneten Pflanzen unausbleiblich ist.
-

Das Sammeln von Reptilien und Fischen.

Von

A. Günther.

I. Reptilien.

Soweit es nur immer zulässig ist, sollen alle Arten von Reptilien in Spiritus aufbewahrt werden.

Stehen dem Sammler genügende Geldmittel zu Gebote, so wähle derselbe den besten und stärksten Weingeist der zu haben ist; derselbe kann dann auf der Reise mit Wasser oder schwächerem Spiritus verdünnt werden, bis er auf die gewünschte Stärke gebracht ist. Es ist oft schwierig während der Reise sich mit Spiritus zu versehen, und desshalb thut der Reisende wohl daran, eine genügende Quantität mitzunehmen, was ja bei Seereisen keine Schwierigkeit haben kann. Nächst reinem Weingeiste empfiehlt sich der grösseren Billigkeit halber Methylirter Spiritus; doch halten sich meiner Erfahrung gemäss, Exemplare lange nicht so gut in dieser Flüssigkeit; und man sollte ihn nie für die Conservation besonders schätzbarer Exemplare, oder solcher, die später genau anatomisch untersucht werden sollen, anwenden. Ist dem Sammler der Vorrath an Spiritus ausgegangen, so kann er Arac, Cognac, Rum oder irgendwelche weingeisthaltige Flüssigkeit, die gerade zu haben ist, anwenden, vorausgesetzt dass dieselben den nöthigen Spiritusgehalt besitzt. Im allgemeinen kann man sagen, dass Spiritus, der sich sofort, ohne vorhergehendes Erwärmen, durch eine daran gehaltene Flamme entzündet, zur Conservation von Thieren tauglich ist.

Es ist aber bei weitem besser, wenn sich der Sammler mit einem oder zwei jener einfachen Maasse, Hydrometer*) oder Alkoholometer, versieht, mit welchem Chemiker und Destillirer die Stärke des Spiritus messen, und wo-

---

*) In den folgenden Angaben über die Stärke des Spiritus habe ich mich der englischen Bezeichnungen bedient. Auf dem englischen Hydrometer bezeichnet 0 einen Spiritus (proof-spirit), dessen specifisches Gewicht 0,92 ist, und der nach Beck's Hydrometer 14,8°, nach Cartier's 22,5° und nach Baumé's 22° stark ist. Spiritus von 10° über 0 Stärke nach dem englischen Hydrometer, hat ein specifisches Gewicht von 0,912, und eine Stärke von 16,5° nach Beck, von 24° nach Cartier, und von 23,3° nach Baumé; während Spiritus von 10° unter 0, 13,1° nach Beck, 21° nach Cartier, und 20,7° nach Baumé stark wäre.

mit man ohne alle Mühe und mit Sicherheit bestimmen kann, ob der Spiritus noch tauglich ist. Der Spiritus, in welchem Exemplare für die Dauer der Reise verpackt werden, sollte 15° bis 20° über 0 stark sein.

Es ist gerathen, mit dem Spiritus irgend ein Brechen erregendes oder sonst Ekel verursachendes Mittel zu vermischen, um Unberufene zu verhindern, die Flüssigkeit für sich selbst zu verwenden.

Ferner wird der Reisende einen kleinen Destillirapparat höchst nützlich finden, da er mit Hilfe desselben seinen eigenen Vorrath von geschwächtem und verunreinigtem Spiritus, oder den schlechten Liqueur, der ihm als Rum verkauft wird, destilliren und bis zur gewünschten Stärke bringen, ja unter Umständen sich eine geringe Quantität Spiritus selbst bereiten kann.*) Natürlich wird der Reisende bei der Wahl und Zusammensetzung des Apparats darauf bedacht sein, Glas möglichst zu vermeiden, und dasselbe durch Metall zu ersetzen.

Von Gefässen erwähne ich zunächst diejenigen, welche der Reisende zu täglicher Verwendung nöthig hat. Höchst zweckmässig sind vierkantige Büchsen aus Zink, von 18 Zoll Höhe, 12 Zoll Breite und 6 Zoll Weite. Dieselben haben auf ihrer oberen Fläche eine runde Oeffnung von 4 Zoll im Durchmesser, welche durch einen starken Zinkdeckel von 5 Zoll Durchmesser verschlossen und durch ein Schraubengewinde in der Oeffnung festgehalten wird. Um den Verschluss zu sichern, wird ein Kautschukring unter dem Rande des Deckels befestigt. Jede dieser Zinkbüchsen steht in einem genau anschliessenden Holzkasten, dessen oberer Deckel mit Charnier und Riegel versehen ist, und der auf zwei Seiten einen Handgriff von Leder oder Flachs hat, um die Büchse bequem von einem Ort zum andern bringen zu können.**)

Solcher Büchsen bedarf der Reisende zwei bis vier, und er steckt darein alle diejenigen Exemplare, welche er Tag für Tag erhält, um sie darin vom Spiritus, der von Zeit zu Zeit erneuert wird, durchtränken zu lassen, und sie für einige Zeit unter stetiger Beobachtung zu haben, bis das Gefäss voll ist, oder die Objecte zur endlichen Verpackung tauglich sind. So praktisch und bequem diese Büchsen sind, so können sie natürlich auch durch einfachere Gefässe ersetzt werden, z. B. gewöhnliche irdene Töpfe, die durch Kork oder Kautschuk verschlossen sind. Die Bedingungen, welche für diese Gefässe nothwendig sind, wären nur die 1. dass sie geräumig sind, 2. dass sie eine weite Oeffnung haben, 3. dass sie so verschlossen werden können, dass der Spiritus nicht verdunstet, und dass man sie ohne Mühe jeden Augenblick öffnen kann.

Gefässe, in welchen die Gegenstände bleibend verpackt und auf die Heimreise geschickt werden, bestehen in Zinkkasten von verschiedener Grösse, welche in genau anschliessende Holzkisten gestellt werden. Es ist jedoch zu vermeiden, dass die Kisten nicht zu gross gemacht werden, da durch einen übermässigen Druck die Objecte selbst leiden, und sich mit der Zunahme des Gewichts die Gefahr für die Kiste selbst steigert. Eine solche Kiste mit in Spiritus conservirten Gegenständen sollte höchstens einen

*) Das zuerst von Sir Samuel Baker gemachte Experiment ist seitdem von andern Reisenden erfolgreich wiederholt worden.

**) Diese Büchsen sind nach dem Muster der Ammunitionsbüchsen der englischen Armee gemacht, und haben sich im Dienste des Britischen Museums als sehr praktisch bewährt.

Inhalt von 18 Kubikfuss haben, und was, dem Bedürfnisse der Exemplare gemäss, an Länge zugesetzt werden muss, ist in der Tiefe oder Breite der Kiste abzunehmen. Am zweckmässigsten, aber nicht für alle Fälle ausreichend, sind eine Reihe kleinerer Kisten von 2 Fuss Länge, $1\frac{1}{2}$ Fuss Breite und 1 Fuss Tiefe. Der Reisende kann nun diese Kisten fertig zusammengesetzt mit sich nehmen, und darin Gegenstände, welche während der Reise verbraucht werden, verpacken; oder er kann der Raumersparniss halber nur die Zinkplatten, welche zur passenden Grösse geschnitten sind, mitnehmen, um sie selbst an Ort und Stelle zusammenzufügen; er wird an keinem Orte Schwierigkeit finden, sich die nöthigen Holzkisten zu verschaffen. Unter allen Umständen muss er sich aber mit einem Löthapparat versehen, und sich mit dessen Gebrauch wohl vertraut machen. Auch eine Scheere zum Schneiden der Zinkplatten ist nützlich.

Holzfüsser eignen sich nicht gut (namentlich nicht in heissen Ländern) zum Transport von Spiritusexemplaren. Man sollte sich derselben nur im Nothfalle, oder zur Verpackung der grössten Exemplare, oder eingesalzener Gegenstände bedienen.

Sehr kleine oder leicht zu verletzende Exemplare sind nicht mit grösseren zusammenzupacken, sondern in kleinen Flaschen oder Töpfen besonders zu conserviren.

Conservierungsmethode. — Alle Reptilien, mit Ausnahme sehr grosser Schildkröten, Krokodile und Alligatoren (über 4' Länge), und Schlangen (über 10' Länge), eignen sich zur Conservation in Spiritus. — Man mache einen tiefen Einschnitt in die Magenegend, und einen zweiten in einiger Entfernung vor dem After, so dass eines Theils der die Fäulniss befördernde Inhalt des Magens und Mastdarms entleert wird, anderntheils der Spiritus schnell Eingang zu den Weichtheilen im Innern des Körpers findet. Die Exemplare werden nun in eine der oben beschriebenen Handbüchsen gebracht, um ihnen durch den Spiritus die wässerigen Bestandtheile zu entziehen. Nach wenigen Tagen (in heissen Klimaten schon nach 1 oder 2 Tagen bringt man solche Exemplare in die zweite Handbüchse mit stärkerem Spiritus, und lässt sie darin 8—14 Tage. Zeigt sich am Ende dieser Zeit, dass die Exemplare fest und wohl erhalten sind, so kann man sie in demselben Spiritus bis zur Zeit der finalen Verpackung belassen; sind sie aber weich, und fliesst aus ihnen ein durch Blut missfarbig gewordener Schleim ab, so müssen sie für kürzere oder längere Zeit in frischen und wenigstens 10⁰ starken Spiritus gebracht werden. Exemplare, welche deutliche Zeichen von Fäulniss tragen, werfe man weg, da durch solche der Inhalt der ganzen Kiste gefährdet ist, und dieser alsdann nur zu häufig zu Grunde geht. In gleicher Weise darf man nie Gegenstände, welche schon angefault sind, ehe sie in Weingeist kommen, zur Conservation annehmen; sie taugen höchstens noch zum Abbalgen, oder zum Skelett.

Der Spiritus, der bei diesem provisorischen Process verwendet wird, wird natürlich schwächer und schwächer. So lange er noch 15⁰ unter 0, oder in heissen Klimaten 10⁰ unter 0, ist, kann er immer noch zum ersten Stadium der Conservation verwendet werden. Fällt er aber unter diesen Grad, so kann ihn der Sammler, welcher nicht die Mittel hat, ihn zu destilliren, nur so weiter benützen, dass er ihn zunächst durch gepulverte Kohle filtrirt, und dann mit Zusatz von sehr starkem Weingeist wieder auf den nöthigen Stärkegrad bringt. Viele Reisende machen aber den Fehler, dass sie solchen Weingeist, den sie auf die angegebene Weise wiederholt verstärkt haben, zu oft und zu lange benützen. Die Flüssigkeit erhält in kurzer Zeit

so viele Fäulnisstoffe, dass dieselben nicht durch Zusatz des stärksten Spiritus überwunden werden können, und den Zersetzungsprocess bald den besterhaltenen Exemplaren mittheilen. Anwendung des Geruchsinnes, häufige Untersuchung der in Weingeist gelegten Exemplare, und einige Uebung werden dem Sammler bald seine gewonnenen Schätze sichern.

Hat der Sammler eine genügende Anzahl wohlconservirter Exemplare beisammen, so werden dieselben bald möglichst auf die Heimreise gesandt. Sie werden gesondert in alte Leinwandlappen gewickelt, und so dicht als möglich in die Zinkkiste verpackt. Es darf kein freier Raum oben oder auf den Seiten gelassen werden, damit der Inhalt der Kiste keinen Schaden durch das unvermeidliche Rütteln nehmen kann. Ist die Kiste voll, so wird der Deckel, in dessen einer Ecke ein etwa $\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser enthaltendes Loch angebracht ist, aufgelöthet. Durch das Loch füllt man nun die Kiste langsam mit 20° starkem Spiritus und trägt Sorge, dass womöglich alle Luft durch die Flüssigkeit ausgetrieben wird. Hat man sich hiervon überzeugt, so löthet man ein kleines viereckiges Stück Zink über das Loch. Um endlich sicher zu sein, dass der Verschluss vollständig gelungen ist, dreht man die Kiste um, und lässt sie über Nacht stehen, wobei es sich bald herausstellt, wenn ein Leck vorhanden ist.

Conservation sehr grosser Reptilien.

1. Schildkröten. — Eine gefangene grosse Schildkröte zum Zwecke der Conservation zu tödten, ist keine leichte Sache, da man die Weise, in der zum Essen bestimmte Schildkröten getödtet werden, nicht anwenden kann. Der Reisende wird sich also zunächst fragen, ob es nicht möglich ist, das Thier lebend nach Europa zu bringen, da es ohne Nahrung in einem Winkel des Schiffes 10—12 Monate leben kann. Ist dieses aber nicht thunlich, so dürfte es das Beste sein, mit einem langen Messer an der Wurzel des Halses gegen das Herz einzudringen, um dieses Organ selbst oder doch einige grosse Gefässe zu durchschneiden und das Thier durch Verblutung absterben zu lassen. Es ist nicht schwierig, sowohl das Skelett als die Haut zu bewahren; muss aber das eine oder das andere geopfert werden, so ist es wichtiger, das erstere zu erhalten. Zunächst hat man den Bauchschild abzuheben, indem man den schmalen Isthmus jeder Seite durchsägt, und dann mit dem Messer sorgsam die vorne und hinten anhaftende Haut ablöst. Man führt dann durch die Haut einen geraden Schnitt vom Kinn in der Mitte bis zum Ende der Brust, und nachdem die Haut nach rechts und links wegpräparirt worden ist, kann man alle Weichtheile, sowie den grössten Theil der Muskulatur von Hals, Extremitäten, Schulter- und Beckenknochen entfernen. Der Kopf ist der einzige Theil, der einige Mühe macht, da man an demselben möglichst wenige Weichtheile zu lassen hat, und hierbei die Haut oder der Knochen leicht verletzt werden. Soll ausser dem Schild und den Knochen auch die Haut erhalten werden, so muss man ihre ganze innere Seite, sowie die Knochentheile mit Arsenikseife bestreichen. Alle Theile werden nun in die Höhlung des Schildes zurückgebogen, und in dieser Lage getrocknet. Sind sie trocken, so bringt man den Bauchschild in seine natürliche Lage zurück, und hält ihn darin durch einige Windungen mit einer Schnur fest.

Diese Methode ist auch bei kleineren Schildkröten anwendbar, wenn der Reisende mit seinem Spiritusvorrath sehr sparsam zu Werke zu gehen hat.

2. Saurier. — Bei grossen Krokodilen und Alligatoren ist es nicht möglich, Haut und Skelett desselben Individuum zu conserviren. Beim Abbalgen hat man die Haut vom Kinn entlang der Mitte der untern Seite bis zum Schwanzende zu durchschneiden, und darauf Acht zu haben, dass der Schädel unverletzt bleibt, damit wenigstens dieser Theil gerettet ist, im Falle die Haut zu Grunde ginge. Für die Conservation der Haut ist eine wiederholte Einreibung (mit einer Bürste) einer starken Alaunlösung, der einige Gran Sublimat beigefügt sind, zu empfehlen. Vollständige Skelette grosser Krokodile und Alligatoren sind auffallenderweise ziemlich selten in Sammlungen, und deren Beschaffung ist äusserst wünschenswerth. Es ist hierbei viel besser, wenn der Sammler die Knochen in ihrem natürlichen Verbande belässt, und das Skelett nur von der Masse der Muskulatur befreit, und in mehrere leicht zu verpackende Stücke getrennt, nach Hause schickt, als wenn er die Maceration und vollständige Reinigung an Ort und Stelle unternimmt, da er auf letztere Weise sich nur der Gefahr aussetzt, einzelne Knochen zu verlieren. Der Sammler sollte aber zu jedem Skelett den äusseren Rücken- und Bauchpanzer des Exemplars zu bewahren suchen, da nur so die richtige Bestimmung des Species gesichert wird.

3. Schlangen — welche eine Länge von 10 Fuss überschreiten, können nicht in Spiritus aufbewahrt werden; ja Pythonen, welche bekanntlich einen verhältnissmässig grossen Körperrumfang haben, sind schon, ehe sie diese Grösse erreichen, für diese Präparationsmethode unpassend. Sie müssen abgehäutet werden, aber nicht in der Weise, wie es häufig geschieht, dass man nämlich nur hinter dem Kopfe einen kurzen Schnitt macht, und dann die Haut mit dem daran hängenden Kopfe über den Körper zurückstülpt, da so die Schuppen zu sehr verzerrt werden. Es ist viel besser, mit einer Scheere die ganze Mittellinie des Bauches und Schwanzes aufzuschlitzen, und die Haut nicht allein von vorne nach hinten, sondern auch von der Bauch- nach der Rückenseite vom Körper abzulösen. Eine solche Haut nimmt nicht sehr viel Raum ein, und wird, wenn andere Verhältnisse es erlauben, besser in Spiritus, als getrocknet conservirt. Der Kopf bedarf dann selbstverständlich ebenfalls keiner weitem Präparation.

Grosse Riesenschlangen werden so häufig lebend nach Europa gebracht, dass die meisten Museen sich mit guten Skeletten versehen können, und es sich desshalb nicht der Mühe lohnte, wenn ein Sammler sich ein solches Object während der Reise verschaffte. Anders würde es sich mit den grössern Seeschlangen (*Hydrophis*) verhalten, auf die ich weiter unten zurück kommen werde.

Wenig erforschte Reptilien-Faunen. — Um den Reisenden, der nicht Fachmann ist*), einen Begriff zu geben, in welchen Ländern das Sammeln von Reptilien besonders erfolgreich sich erweisen würde, ist es einfacher, diejenigen Gegenden zu bezeichnen, deren Reptilienfauna ziemlich gründlich durchforscht ist. Solche mehr oder weniger bekannte Theile sind nun Europa (mit Ausnahme von Griechenland und Sicilien), Nordamerika, Jamaica, Trinidad, die Küstenstriche von ganz Südamerika, Nordafrika, das Cap der guten Hoffnung, die Küstenstriche von West- und Ostafrika, das continentale Indien unter englischer Herrschaft oder Protektorat, Ceylon,

---

*) Die folgenden Bemerkungen (hier, wie im späteren Artikel über die Fische) sind überhaupt für Männer geschrieben, die Herpetologie und Ichthyologie nicht zum Specialstudium gemacht haben: da der Herpetologe und Ichthyologe so gut als ich, oder besser, weiss und was er an Ort und Stelle untersuchen und beobachten kann.

Java, die Nachbarschaft der europäischen Ansiedelungen in Borneo, die Philipinen, die Küstengegenden China's von Hongkong bis zum Breitegrade von Peking, der südliche Theil von Japan, der südöstliche Theil Australiens, Tasmanien und Neuseeland. Natürlich lassen sich noch manche interessante Entdeckungen in den genannten Gegenden machen, allein es gehört nicht unbedeutende Sachkenntniss dazu, dieselben zu erkennen. In allen übrigen Welttheilen mag der Reisende getrost alle ihm zustossenden Reptilien sammeln, da dieselben schon der Localität halber Werth haben. Ist er nicht im Stande, Seltenes und Werthvolles von den schon wohlbekannten Arten zu unterscheiden, so kann er nicht besser zu Werke gehen, als wenn er jede unterscheidbare Art nur in etwa 6 Exemplaren sammelt.

Zur Lösung wichtiger biologischer und geologischer Fragen ist es von grosser Bedeutung, die Fauna isolirter Inseln, sowie der einzelnen Inseln einer Gruppe genau zu erforschen. Der Reisende, dem sich eine solche Gelegenheit bietet, wird also sich Mühe geben, die Reptilien solcher Inseln auf's sorgfältigste zu sammeln, und dabei Sorge tragen, dass der Fundort aller Exemplare aufs genaueste bezeichnet ist.

Es ist bekannt, dass manche Reptilien, wie kleine Geckonen, und Schlangen (*Lycodon*, *Typhlops*) zufällig auf Schiffe gerathen, und durch dieselben in sehr entfernte Gegenden transportirt werden. Auch kleine Schildkröten werden oft in grösserer Anzahl durch Matrosen von einer Tropengegend in die andere gebracht. Es ist interessant, solche Fälle zu notiren, da sich auf diese Weise manche anomal erscheinende Vorkommnisse von Thieren in Ländern, wo man sie nicht erwartet, erklären lassen.

In Gebirgsgegenden muss man über die Höhe, in welcher die einzelnen Exemplare gefangen wurden, möglichst genaue Angaben sammeln, oder wenigstens bemerken, welcher Vegetationszone dieselben eigenthümlich sind.

In Bezug auf die einzelnen Ordnungen mag der Reisende noch besonders auf folgende Punkte sein Augenmerk richten:

Schildkröten: — Es ist, wie schon oben angeführt, äusserst wichtig, ausser dem Panzer noch soviel als möglich von dem Skelette zu conserviren, und ganz besonders den Schädel, von welchem Theile man in neuerer Zeit gefunden hat, dass er in der Classification und Artbestimmung dieser Thiere eine besondere Rolle spielt. Höchst interessant ist die Erwerbung der riesigen Landschildkröten, welche früher auf den Mascarenen in grosser Anzahl lebten und zum Theil schon jetzt ausgestorben sind. Sie sollen im wilden Zustande nur noch auf der Insel Aldabra vorkommen. Man bringe sie womöglich lebend nach Hause; und da sie häufig an Orten, die weit von ihrer eigentlichen Heimath entfernt sind, verkauft werden, so ziehe man möglichst genaue Erkundigungen über ihre Herkunft ein. In Mauritius, Bourbon, den Seyschellen und in Rodriguez sind sie ausgestorben, dagegen finden sich noch an gewissen Localitäten in diesen Inseln ihre Knochenüberreste in grosser Anzahl. Solche Ueberreste sind äusserst werthvoll, besonders wenn der Reisende ihre Ausgrabung selbst überwacht, und sich die Mühe giebt, die Knochen, welche zusammengefunden werden, und daher wahrscheinlich demselben Individuum angehören, durch angeschriebene Nummern zu kennzeichnen. Solche grosse Landschildkröten finden sich auch auf den Gallapagosinseln, und sehr alte und grosse Exemplare (bis über 4 Fuss Länge) werden alljährlich seltener. Sie sind — als ausgestopfte oder skelettirte Exemplare — sehr werthvoll. Die Schildkröten der verschiedenen Inseln des Gallapagos Archipels gehören verschiedenen Arten an; der Sammler würde sich also nicht damit begnügen, nur von einer Insel

sich Exemplare zu verschaffen, sondern eine Reihe junger und alter Individuen von jeder einzelnen Insel zu erhalten suchen, und die Schalen selbst so bezeichnen, dass jede Möglichkeit einer spätern Confusion der Localität ausgeschlossen ist.

Die Unterscheidung der grossen Flussschildkröten (*Trionyx*), welche sich in den Strömen des tropischen Asiens und Afrika's finden, ist in neuester Zeit in schwierige Verhältnisse gerathen: und die gegenwärtig herrschende Unsicherheit ist in keiner andern Weise zu entfernen, als dass man auf's neue alle Arten ohne Unterschied in grosser Anzahl sammelt. Es ist also dem Sammler zu empfehlen, so viel als möglich Exemplare von allen Altersstufen mit genauer Angabe der Localität, und immer mit dem Schädel, zu bekommen zu suchen. Es wäre dabei namentlich interessant, Exemplare, welche in copula gefunden wurden, zu erhalten.

Das Sammeln von Seeschildkröten scheint wenig Aussicht auf belohnende Resultate zu liefern. Ausserordentlich grosse Exemplare, und namentlich das Skelett der Lederschildkröte (*Sphargis*) sind in den Museen sehr gesucht. Ueber die Fortpflanzungsweise der letzteren Art, die über alle warmen und gemässigten Meere spärlich verbreitet zu sein scheint, weiss man noch sehr wenig; auch wäre es wichtig, in den Eischalen eingeschlossene Embryonen in verschiedenen Entwicklungsstadien zu erhalten *).

Saurier. — Ueber die Lebensweise und Fortpflanzungsart der Eidechsen weiss man verhältnissmässig noch sehr wenig, und wo der Reisende Gelegenheit hat, für längere Zeit eine oder die andere Art dieser Thiere zu beobachten, sollte er alles notiren, was ihm als eigenthümlich erscheint. Wie anziehend und belehrend solche Beobachtungen sein können, davon kann man sich überzeugen, wenn man Gosse's Beschreibung von *Anolis* in „A Naturalist's sojourn in Jamaica“ oder von *Amblyrhynchus* in Darwin's „Journal“ liest. Beobachtungen an lebenden Thieren gewinnen oft eine besondere Tragweite, wie z. B. erst kürzlich der Versuch gemacht wurde, durch die angeblich eigenthümliche hüpfende Locomotion der australischen Krageneidechse (*Chlamydosaurus*) gewisse Fussspuren mit den fossilen Dinosauriern in Zusammenhang zu bringen. Um von vielen Desideraten nur noch eines zu erwähnen, dürfte es sich wohl der Mühe verlohnen, die Amphisbänen lebend zu beobachten, da man von ihrer Lebensweise und Fortpflanzung so gut wie nichts weiss.

Von bekannten Sauriern mögen noch einige namentlich erwähnt werden, welche der Sammler in möglichst vielen Exemplaren zu bekommen suchen sollte, da sie von beinahe allen Museen gesucht sind: die Krokodile und Alligatoren der südamerikanischen Ströme (mit Ausnahme des gemeinen *Crocodilus americanus*), den Gavia Borneo's, die Krokodile und Gaviale des tropischen Australiens, die neuseeländische *Hatteria*, das mexicanische *Heloderma*, die grossen Eidechsen der Gallapagos-Inseln (*Trachycephalus* und *Oreocephalus*), die gehörnte Iguana von Hayti (*Metopoceros*).

Schlangen. — Es ist dringend zu empfehlen, die kleinen und in Farbe meist unscheinbaren Arten nicht zu vernachlässigen. Viele derselben leben perpetuirlich unter dem Boden oder sind nächtliche Thiere, deren man nur durch Aufwühlung des Bodens oder durch Suchen in verwitternden Stoffen habhaft werden kann. Sodann sollten die Seeschlangen, deren es eine grosse

*) Embryonen aller Art, welche in Eischalen eingeschlossen sind, werden im stärksten Spiritus aufbewahrt, nachdem man mehrere Löcher in die Eischale gestossen hat, und die vorhandene Flüssigkeit hat ablaufen lassen.

Anzahl von Arten und Abarten giebt, ein Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit sein. Mit Ausnahme der gemeinen *Platurus* und *Pelamys* kann der Sammler ohne Unterschied alle Exemplare annehmen, muss aber dabei ganz genau die Localität, resp. geographische Länge und Breite, sich verzeichnen, wo die Exemplare gefunden wurden. Einige Seeschlangen in den Meeren nördlich von Australien, erreichen eine nicht unbedeutende Grösse, und es ist wünschenswerth, dass der Reisende selbst die grössten in Weingeist conservirt; solche Exemplare bedürfen eine verhältnissmässig längere Durchtränkung mit starkem Spiritus und öfteren Wechsel desselben.

Viele Schlangen sind während des Lebens mit äusserst bunten Farben geziert, welche nach dem Tode verschwinden. Ist der Reisende ein Zeichner, so sollte er, wenn er Zeit hat, sich eine Skizze der Schlange machen, worin die Färbung während des Lebens soweit angedeutet ist, dass man mit ihrer Hülfe später eine vollständige Zeichnung der Art machen kann.

Batrachier. — Bekanntlich bietet diese Classe in Bezug auf Fortpflanzung und sexuelle Verhältnisse viele merkwürdige Erscheinungen. Hat der Reisende Gelegenheit, während der Fortpflanzungsperiode eine oder mehrere Arten zu beobachten, so mag er es möglich finden, von dem Mutterthiere Eier zu erhalten, deren Entwicklung zu beobachten, und die Larven in verschiedenen Entwicklungsstadien zu conserviren. Solche Larven, über deren richtige Artbestimmung dann kein Zweifel herrschen kann, sind für das Studium dieser Thiere werthvoll, während Larven, über deren Herkunft man nichts weiss, ganz werthlos sind. Es scheint auch, dass in tropischen Gegenden die Metamorphose, wie sie an den europäischen *Batrachiern* beobachtet wurde, in manchen Arten sehr modificirt ist, ja zum Theil noch vor dem Absetzen der Eier stattfindet; dass in kälteren Regionen dagegen die Entwicklung sehr retardirt ist; dass in wasserarmen Ländern die Eier in besonderen schützenden Hüllen vor dem Eintrocknen bewahrt, und so oft in Entfernung vom Wasser angetroffen werden. Alle derartige Verhältnisse sollten an Ort und Stelle untersucht werden. Von dem grossen Salamander *Japan's* kennt man die Larve nur aus rohen japanesischen Abbildungen; über seine Fortpflanzung sowie über die vieler sogenannter *Perennifranchier* weiss man noch nichts. Endlich bieten die *Coecilien* ein weites Feld für ähnliche Beobachtungen; die Jungen haben einen feinen äussern Kiemenfaden, und leben — wenigstens in den *Seyschellen* — für eine unbekannte Periode im Wasser.

Literarische Hülfsmittel. — Ist der Bezirk, den der Reisende besuchen will, bestimmt und irgendwie begrenzt, so wird sich der Reisende über die existirende Literatur leicht orientiren können. Der verstorbene so glückliche Reisende, *Andrew Smith*, sammelte die Abbildungen aller Thiere, welche von der durch ihn zu erforschenden *Capcolonie* bereits bekannt waren; und von den Abbildungen von Werken, welche ihm nicht zur freien Verfügung standen, machte er sich Copieen. In dieser Weise verschaffte er sich ein compendiöses Material, mit dem er sich auch in den Fächern, die er nicht speciell kannte, leicht orientiren konnte. Erstreckt sich dagegen die Reise eines Sammlers auf sehr verschiedene Welttheile, so dürften ihm die folgenden herpetologischen Werke von Nutzen sein:

Ein allgemeines Werk, das nun aber eben jetzt sehr antiquirt ist, dennoch aber die grösste Masse belehrenden Inhaltes darbietet, ist *Dumeril et Bibron, Erpétologie générale. Paris 1834 et seqq. 8. In 8 Bänden, mit verhältnissmässig wenigen Abbildungen.*

Specialwerk über die Schildkröten:

Gray, J. E., Catalogue of Shield Reptiles. Part. I. Lond. 1855. 4. Mit 42 Tafeln; und mit einem Supplement to the Catalogue. Lond. 1870. 4.

Specialwerk über Eidechsen:

Gray, J. E., Catalogue of Lizards. Lond. 1845. 16. Veraltet, aber doch noch das letzte Werk über diese Ordnung.

Specialwerke über Schlangen:

Schlegel, H., Essai sur la physiognomie des Serpens. Leide (ohne Datum). 8. Atlas in Fol. Ein seiner Zeit classisches, und für das Studium der Schlangen unentbehrliches Werk. Der Atlas enthält Abbildungen der Köpfe einer grossen Anzahl von Arten.

Günther, A., Catalogue of Colubrine Snakes. Lond. 1858. 16. Enthält nur die nicht-giftigen Landschlangen, und ist jetzt durch die Menge seither entdeckter Arten noch unvollständiger geworden.

Jan et Sordelli. Iconographie des Ophidiens. Milan 1860 et seqq. 4. Unvollendet und ohne Text. Die grosse Anzahl abgebildeter Arten wird dieses Werk dem Sammler besonders nützlich machen.

Specialwerke über Batrachier:

Gray, J. E., Catalogue of Batrachia gradientia. Lond. 1850. 16.

Günther, A., Catalogue of Batrachia salientia. Lond. 1858. 4.

Mit einer Anzahl Abbildungen vereinigt dürften sich dem Reisenden die billigen, compendiösen, eine grosse Anzahl geographischer Angaben enthaltende Cataloge des Britischen Museums am meisten empfehlen.

II. Fische.

Die Behandlung von Fischen, welche in Spiritus conservirt werden sollen, stimmt so sehr mit der von Reptilien überein, dass Anweisungen hierüber nur eine Wiederholung des in dem vorhergehenden Abschnitt Gesagten sein würde. Man benütze denselben Spiritus und dieselbe Art von Gefässen, halte aber womöglich während der Entwässerungsperiode Fische, Batrachier und Reptilien getrennt. Man hat im Auge zu behalten, dass Fische viel mehr Wasser enthalten, als Reptilien, und dass deshalb der angewandte Spiritus viel schneller geschwächt, und ein öfterer Wechsel desselben nothwendig ist. In grösseren (2 Fuss langen) und sehr fleischigen Fischen dringt der Spiritus nur sehr langsam in das Innere, und während die äusseren Theile im besten Erhaltungszustande erscheinen, sind die inneren Theile über und um die Wirbelsäule in Fäulniss. Man hat also bei diesen Exemplaren tiefe Einschnitte oder Stiche in grösserer Anzahl in die Musculatur des Rückens und Schwanzes zu machen (ausser den beiden früher erwähnten Bauchschnitten), um dem Spiritus Zutritt in die Muskeln zu verschaffen. Ferner habe ich wiederholt bemerkt, dass einzelne Fische sehr verschiedener Familien, welche aber das gemein haben, dass sie aus grösseren Tiefen herzustammen scheinen (gewisse Gadoiden, Trigloiden, Gobioiden etc.) ungewein schnell in Fäulniss zerfallen. In einer Sammlung von 50—60 Arten sind es oft die Exemplare von nur einer Art, welche sich in dieser eigenthümlichen Weise verhalten, und die alle ohne Ausnahme in Stücke zerfallen sind, während der Rest sich im besten Erhaltungszustand befindet. Bemerkt der Sammler eine solche rasche Auflösung in einer Art, so ist zu rathen, die Exemplare sofort in den stärksten Spiritus zu setzen, und dieselben für sich in einem besondern Gefässe aufzubewahren und zu versenden. Es ist um so gerathener, diese Mühe auf solche Exemplare zu verwenden, da sie meistens zu den interessantesten Funden gehören werden.

Man benütze keine Fische, welche ihre Schuppen verloren haben; solche, die, wie die häringartigen Fische, dieselben leicht verlieren, wickle man in ein Papier oder Stück Leinwand, ehe sie in Spiritus gesetzt werden.

Hie und da kommt es in heissen Klimaten vor, dass es dem Sammler nicht mit dem stärksten Spiritus gelingt, seine Exemplare vor Fäulniss zu beschützen, ohne dass er die Ursache auffindet, welche diese Wirkung herbeiführt. In diesen Fällen ist es gerathen, dem Spiritus etwas Arsenik oder Sublimat zuzusetzen; der Sammler sollte aber seinen Correspondenten von dieser Conservierungsmethode benachrichtigen.

In früheren Zeiten bewahrte man Fische aller Art, selbst die von geringer Grösse, getrocknet als plattgedrückte Häute, oder im ausgestopften Zustande auf. Da solche Exemplare nur die alleroberflächlichste Untersuchung zulassen, so haben alle besseren Museen diese Conservationsmethode aufgegeben, und sie sollte nur unter solchen Umständen angewandt werden, wo es, wie auf langen Landreisen und bei grosser Schwierigkeit des Transports, absolut unmöglich ist, Spiritus und Conservationsgefässe in genügender Menge mitzunehmen. Rathsam ist es dabei, wenn der Reisende vor dem Abhäuten des Fisches eine Skizze macht und dieselbe colorirt, im Falle die Art eine auffallende Färbung zeigen sollte. Ich mag bei dieser Gelegenheit erwähnen, dass es zwar höchst wichtig ist, eine Sammlung mit nach dem Leben colorirten Zeichnungen zu begleiten, dass auf der andern Seite aber Zeichnungen, deren Originalien nicht zu gleicher Zeit conservirt wurden, einen nur untergeordneten Werth besitzen.

Sehr grosse Fische können natürlich nur im getrockneten Zustande conservirt werden; und dem Sammler ist dringend zu empfehlen, die grössten Exemplare zu präpariren, die er sich verschaffen kann. Da dieses mit ziemlich grosser Mühe und vielen Kosten verbunden ist, so sieht man in den Museen verhältnissmässig sehr wenige Exemplare von beträchtlicher Grösse, und viele Arten kennen wir nur von kleinen, jugendlichen Individuen.

Soll von einem grossen beschuppten Fische die Haut conservirt werden, so führt man mit einer starken Scheere einen Schnitt vom vordersten Theil der Kehle, entlang der Mittellinie des Bauches, an der Basis der Afterflosse vorüber bis zur Schwanzflossenwurzel, und von hier aufwärts an der Basis der Schwanzflosse bis an deren Rückentheil. Die Haut wird nun auf der einen Seite des Fisches bis zur Mittellinie des Rückens wegpräparirt, und wenn man an die die Flossen stützenden Knochen angekommen ist, schneidet man dieselben durch, oder löst sie in den Gelenken ab, so dass alle Flossen an der Haut verbleiben. Die Ablösung der Haut von der andern Seite des Fisches ist dann leicht. Schwieriger ist die Präparation des Kopfes und der benachbarten Theile. Am besten trennt man die beiden Hälften des Schultergürtels in der Mittellinie der Kehle, drückt sie nach rechts und links auf die Seite, und schneidet dann den vordersten Theil der Wirbelsäule durch, so dass jetzt nur noch der Kopf und die Schulterknochen an der Haut hängen. Diese Theile müssen nun von innen heraus von allen Weichtheilen möglichst gesäubert werden; kleinere Knochen, wie die des Zungen- und Kiemenapparates entfernt man mit den Weichtheilen. Ist dieses geschehen, so reibt man die ganze Innenseite der Haut und der von Fleisch entblössten Stellen mit Arsenikseife, stopft in Höhlen und Zwischenräumen Baumwolle oder anderes weiches Material, und legt endlich zwischen die beiden Hautlappen eine dünne Lage desselben Materials, worauf das Exemplar getrocknet wird und zur Versendung fertig ist.

Grosse unbeschuppte Knochenfische, wie Siluroiden und Störe werden in derselben Weise abgebalgt; da aber ihre schuppenlose Haut in ein Bündel aufgerollt werden kann, so können sie in Spiritus verpackt werden, wobei sich der Reisende die Mühe des Reinigens des Kopfes ersparen kann.

Skelette grosser Knochenfische sind eben so werthvoll, wie ihre Haut. Im Allgemeinen werden sie ebenso behandelt, wie die Skelette grosser Saurier. Der Sammler hat dafür Sorge zu tragen, dass soviel von den äusseren Theilen erhalten bleibt, dass man die Art bestimmen kann, da es sonst meist unmöglich ist, mehr als das Genus zu bestimmen.

Es ist bekannt, dass einzelne Haifische eine Länge von 30 Fuss und einzelne Rochen eine Breite von 20 Fuss erreichen; ja einige ganz zuverlässliche Angaben gehen noch über diese Maasse hinaus. Es ist höchst wünschenswerth, von diesen Colossen Exemplare für Museen zu bekommen; und die Anschaffung derselben ist bedeutend durch den Umstand erleichtert, dass sich die Conservation in Salz für die Häute aller Haie und Rochen eignet. Der Abbalgungsprocess von Haien ist im Allgemeinen derselbe wie bei Knochenfischen. Bei Rochen führt man aber nicht blos einen Längsschnitt von der Schnautzenspitze bis an das Ende des fleischigen Theiles des Schwanzes, sondern auch einen Querschnitt über den breitesten Theil der Bauchseite. Auch andere Schnitte, die zur Entfernung von Weichtheilen nöthig sind, können ohne Schaden an der untern Seite des Fisches gemacht werden; doch ist es nicht nothwendig, sehr scrupulös hierbei zu Werke zu gehen. Die abgezogene Haut wird in ein Fass gebracht, das mit einer concentrirten Salzlösung, welcher man Alaun beigemischt hat, angefüllt wird; dabei wird man wohl thun, den Kopftheil, der am meisten Weichtheile an sich hat, am obern Ende des Fasses zu behalten, damit man ihn unter den Augen hat und nöthigenfalls die Flüssigkeit sofort erneuern kann. Ist die Flüssigkeit durch das der Haut entzogene Wasser und Blut sichtlich schwächer geworden, so erneut man sie in toto. Endlich nimmt man die Haut aus dem Fasse, breitet sie aus, lässt sie möglichst abtrocknen, bedeckt ihre ganze innere Fläche mit einer dünnen Schicht trockenen Salzes, rollt sie auf (diesmal den Kopf nach innen) und verpackt sie fest in einem Fasse, auf dessen Boden eine Salzlage ist, und indem man alle Zwischenräume mit Salz anfüllt. Das Fass selbst muss vollständig wasserdicht sein.

Bei allen Individuen, welche der Sammler auf diese Weise conservirt, müssen die verschiedenen Längenmaasse genau vom vollständigen Thiere genommen werden, um dem Ausstopfer später zur Wiederherstellung der richtigen Proportionen zu dienen.

Wenig erforschte Fisch-Faunen. — In der gründlichen Durchsichtung der Süssen Gewässer ist noch so wenig geschehen, dass man eigentlich nur die Flüsse Central-Europa's, den untern Nil, den untern und mittleren Ganges, und den untern Theil des Amazonenstroms als Gebiete bezeichnen kann, an denen Sammeln ohne Unterschied sich nicht belohnen würde*). Etwas besser verhält es sich mit den oceanischen Districten: besonderen Erfolg dürften die folgenden versprechen: der arktische Ocean, alle Küsten der südlich vom 38^o südlicher Breite gelegenen Länder und Inseln, das Cap der Guten Hoffnung, der Persische Golf, die Küsten von Australien (mit Ausnahme von Neu-Südwaies) und Neu-Guinea, die Insel-

*) Es ist hier zu erwähnen, dass keine Gelegenheit versäumt werden sollte, Gewässer, welche sich in Höhlen finden, genau zu untersuchen und zu erforschen, ob dieselben Fische (oder andere Thiere) beherbergen.

gruppen des Stillen Oceans, die Küsten des nordöstlichen Asiens vom 35° nördl. Breite, die westlichen Küsten von Nord- und Südamerika. Manche Entdeckungen und Beobachtungen werden sich in den nichtgenannten Meeresstrichen machen lassen; in den aufgezählten Districten ist aber verhältnissmässig noch so wenig geschehen, dass kein Sammler verfehlen kann, werthvolle neue, oder doch wenigstens in den Museen sehr seltene Arten nach Hause zu bringen.

An keine Art von Seefischen knüpft sich ein grösseres Interesse, als an die, welche beständig in der hohen See leben und nur selten sich den Küsten nähern (pelagische Fische), und an solche, welche für den Aufenthalt in grossen Tiefen organisirt sind, und nur zufällig an die Oberfläche kommen (Tiefsee-Fische). Was die letzteren betrifft, so weiss man schon seit einer Reihe von Jahren, dass in sehr bedeutenden Tiefen (von 1000 und mehr Faden) eine beträchtliche Mannigfaltigkeit von Fischen vorkommt und dass dieselben durch gewisse Eigenthümlichkeiten, die hier auseinanderzusetzen nicht der Platz ist, so charakterisirt sind, dass man sie sofort als Bewohner grosser Tiefen erkennen kann. Die Tiefen selbst, in denen diese Fische leben, genau numerisch zu bestimmen, ist mit den bisherigen Beobachtungen nicht möglich, und jeder Beitrag, der in dieser Richtung Aufschluss giebt, ist höchst willkommen. Der Fische selbst wird man nur selten habhaft; und die englischen und amerikanischen Deep sea-explorations der letzten Jahre haben in dieser Beziehung äusserst wenig geleistet, einmal, weil die dabei theilgenommenen Männer von der Existenz dieser Fauna keine Kenntniss gehabt zu haben scheinen, und dann, weil die Dredge sich nicht dazu eignet, die Fische zu fangen. Da alle Tiefsee-Fische gefräßige Raubfische sind, so dürften sich zwei Fangmethoden empfehlen. Die eine wird an der portugiesischen Küste und bei Madeira wirklich von den Fischern ausgeübt, welche sich einer starken, bis 800 Faden langen Schnur bedienen, an deren einem Ende ein Gewicht, und von da an in entsprechenden Zwischenräumen Angeln befestigt sind; kurz, eine Angelschnur, deren man sich auch beim Stockfischfang bedient. Eine zweite Methode, die man aber kaum in grösseren Tiefen, als 400 Faden, wird anwenden können, wäre die, dass man Körbe, die aus Rohr oder galvanisirtem Zink nach Art der Hummerkörbe construirt sind*), an geeigneten Orten versenkt, und sie nach 12 oder 24 Stunden untersucht.

Alle Tiefsee-Fische sind so zerbrechlich, dass ihre Conservation ganz besondere Aufmerksamkeit erfordert, und es verlohnt sich, dieselben in Leinwand eingewickelt für sich in einem Gefässe aufzubewahren.

Das Sammeln von pelagischen Fischen, welche an der Oberfläche leben, ist mit weniger Schwierigkeiten verbunden. Der Sammler sollte nie versäumen, das Schleppnetz zu gebrauchen, so oft es der Capitain und das Wetter erlauben; auf diese Weise erhält man die kleinen Arten, sowie die höchst interessanten Jugendzustände der grösseren: Fischchen, welche oft kaum eine Länge von 2—3 Linien haben. Viele dieser Fische kommen nur während der Nacht an die Oberfläche des Wassers. Grösserer Fische kann man sich natürlich nur mit der Angel oder der Harpune bemächtigen.

Gegenstände, die auf der hohen See treibend angetroffen werden, wie Holzstücke, Körbe, grössere und kleinere Massen von Flechten u. s. w. ver-

*) Diese Körbe sind domförmig, mit flachem Boden von 2—2½ Fuss Durchmesser, und mit einer oben in der Mitte angebrachten, einwärts gestülpten Oeffnung von 6 Zoll Durchmesser.

dienen die besondere Aufmerksamkeit des Sammlers, da sie meistens von Fischchen und Seethieren aller Art umschwärmt sind. Ganz besonders versprechen aber alle in einiger Entfernung vom Lande gelegenen Untiefen besonders reiche Ausbeute von Fischen aller Art, deren man sich hier mit der Angel sowohl als mit den oben erwähnten Fischkörben bemächtigen kann.

Für alle in der offenen See gefangenen Exemplare ist der Länge- und Breitengrad des Fundortes genau zu notiren.

Die Classe der Fische bietet eine so ausserordentliche Mannigfaltigkeit der Form und Lebensweise dar, und in Bezug auf letztere ist so wenig bekannt, dass es unmöglich ist, den Reisenden auf alle Verhältnisse aufmerksam zu machen, in denen er interessante Beobachtungen zu sammeln im Stande sein wird. Es wird jedoch nützlich sein, mit einigen allgemeinen Bemerkungen, welche sich auf diese Aufgabe des Sammlers beziehen, dieses Capitel zu schliessen.

Vor allem sind wichtig alle Angaben über Fische, welche einen bedeutenden Nahrungsartikel entweder schon bilden (frisch oder zur Exportation), oder einen solchen bilden können. Es verdienen also besondere Aufmerksamkeit die Störe, die Gadus-Arten, die Thyrsites und Chiodactylus der südlichen Meere, die Salmonoiden, die Clupeoiden und andere. So ist es bekannt, dass die Lachse, Sardellen, Anjovis etc. in sehr verschiedenen Welttheilen vorkommen, und dass es nur darauf ankömmt, ihr Vorkommen in genügender Menge zu constatiren, um neue wichtige Handelsquellen aufzuschliessen.

Auf der andern Seite ist es bekannt, dass das Fleisch vieler Seefische constant, oder zu gewissen Jahreszeiten oder an gewissen Localitäten giftige Eigenschaften besitzt: und es wären namentlich über die Ursache dieses eigenthümlichen Verhaltens, auch über die Natur des Giftes und seine Wirksamkeit auf andere Thiere Beobachtungen zu machen.

Andere Fische, deren Fleisch ganz unschädlich, ja schmackhaft ist, besitzen in den Stacheln des Kopfes, der Flossen oder des Schwanzes Giftorgane, und secerniren eine beträchtliche Menge von Gift in besondere Säcke; sie vergiften den Menschen durch Verwundung: es wäre höchst wünschenswerth, dieses Gift am frischen Fische zu untersuchen und damit zu experimentiren.

Alle Verhältnisse, welche sich auf das Geschlecht und die Fortpflanzung beziehen, sind von besonderem Interesse: so also alle Geschlechtsunterschiede, Hermaphroditismus, numerisches Verhältniss der Geschlechter (ob monogamisch oder polygamisch), Laichezeit und Wanderungen, Art der Absetzung des Laiches, Nestbau, Sorge für die Jungen u. s. w.

Wie in andern Classen des Thierreichs, so auch in den Fischen, treten einzelne Arten höchst selten auf, und zwar in einer Weise, dass man sich ihre Seltenheit nicht allein aus etwaiger localer geographischer Verbreitung erklären kann. Es ist wahrscheinlich, dass solche Arten im Aussterben begriffen sind: und jede Nachricht über die Lebensverhältnisse solcher Fische ist daher von ungemeinem Werthe.

Ferner ist es Thatsache, dass alle Fischarten, so lange sie ungestört einen District bewohnen, zu einer viel bedeutenderen Grösse heranwachsen, als später, wenn in Folge energischen Fanges kein Individuum mehr die äusserste Grenze des Wachstums erreichen kann. Das Sammeln grösster Individuen ist also schon aus diesem Grunde geboten; kann aber der Reisende dieselben nicht conserviren, so sollte er wenigstens die Längen- und Gewichtsmaasse notiren.

In heissen Gegenden, wo die Gewässer austrocknen, sind viele Fische auf temporäre Luftathmung angewiesen, oder reisen beträchtliche Strecken über Land, oder fallen, in eine Höhle oder selbstgemachte Kapsel eingeschlossen, in einen Zustand der Torpidität. Eigene, selbst angestellte Beobachtungen hierüber sind von ungleich höherem Werthe, als was der Reisende von den Eingeborenen hört. Auf der anderen Seite wäre es interessant, zu wissen, ob in der arctischen oder antarktischen Zone das Leben in von Eis eingeschlossenen Fischen sich erhalten kann, und wie lange.

Parasitische Fische giebt es in der heissen Zone sowohl unter den marinen, als unter den Süsswasser-Arten. Sie sollten, womöglich für längere Zeit, unter den Augen des Beobachters in einem Gefässe gehalten werden. Es ist bekannt, dass die Temperatur des Blutes der Thunfische um mehrere Grade wärmer, als die anderer Fische ist. Wahrscheinlich sind die Thunfische nicht die einzigen, welche warmes Blut besitzen; man sollte hierauf namentlich auch die Haifische, und überhaupt alle grossen See- und Flussfische untersuchen.

Viele pelagische Fische sind mit kleinen, glatten, perlmutterglänzenden oder weissen Körperchen besetzt, welche auf dem Körper rund und klein, am Kopfe (besonders am Auge) unregelmässig gestaltet und grösser sind. Ich habe die Hypothese (welche bisher nur auf eine von mir gemachte Beobachtung gestützt ist) aufgestellt, dass diese Körper Leuchtorgane sind, und diesen Thieren zur Beleuchtung ihrer Umgebung dienen. Da die Scopeliden, welche mit solchen Organen versehen sind, sehr häufige pelagische Fische sind, so kann ein aufmerksamer Reisender leicht diese höchst interessante Frage an frisch gefangenen lebenden Exemplaren lösen.

Was endlich die literarischen Hülfsmittel betrifft, so giebt es eine ziemliche Anzahl faunistischer Publicationen, die hier aufzuzählen zu weitläufig wäre, und welche der Reisende ohne Schwierigkeit in Erfahrung bringen kann. Als das neueste und vollständigste allgemeine Werk empfiehlt sich Günther, A., Catalogue of Fishes. Lond. 1859 et seq. 8. In 8 Bänden und ohne Abbildungen.

Kann der Reisende über genügenden Raum verfügen, so wird ihm das folgende grosse Werk von Nutzen sein.

Cuvier et Valenciennes. Histoire naturelle des poissons. Paris 1828 et seq. 8. In 22 Bänden und mit 650 Abbildungen. Dieses Werk behandelt nicht alle Fische, kann aber vervollständigt werden durch den 4. und 8. Band des erstgenannten Werks und durch

Müller u. Henle. Systematische Beschreibung der Plagiostomen. Berl. 1838. Fol.

Sammeln und Beobachten von Mollusken.

Von

Ed. v. Martens.

Das Sammeln der blossen Schalen von Schnecken und Muscheln erfordert so wenig Umstände und Mühe, dass es unter gewöhnlichen Verhältnissen von jedem Reisenden leicht nebenbei betrieben werden kann, wie denn auch schon sehr Viele, deren Reisen ganz anderen Zwecken gewidmet waren, die europäischen Conchyliensammlungen bereicherten und manche darunter ganz interessante Funde in diesem Gebiete gemacht haben, z. B. Cailliand beim Aufsuchen der alten Bauwerke am oberen Nil die eigenthümlichen austerähnlichen Süsswassermuscheln desselben (*Aetheria*) entdeckte. Dennoch ist die Kenntniss der geographischen Verbreitung der Molluskenarten, namentlich für die aussereuropäischen Länder, noch recht unvollkommen, und es ist daher jedem Reisenden, der andere Gegenden als die ganz gewöhnlichen, von Europäern vielbesuchten Hafenplätze wie Rio Janeiro, Singapore etc. betritt, an's Herz zu legen, das was er gelegentlich von Schnecken und Muscheln sieht, mitzunehmen, sie können dadurch der Wissenschaft mit leichter Mühe einen guten Dienst leisten, vorausgesetzt, dass sie die Fundorte genau notiren. Dieses ist als die erste Regel jedes Sammelns und Beobachtens voranzustellen, sowohl des beiläufigen, als des ernstlicheren, eingehenden, nie für eine Einzelheit sich auf das Gedächtniss zu verlassen, das ja ganz besonders auf Reisen durch die rasch sich folgenden neuen Eindrücke sehr in Anspruch genommen wird, sondern in jedem Falle alsbald ein Zettelchen mit Angabe des Fundortes, sei es auch nur mit Bleistift geschrieben, den gesammelten Stücken beizulegen und nie Stücke von verschiedenen Fundorten ungetrennt miteinander zu verpacken. So einfach und selbstverständlich diese Regel ist, so oft wird sie zum Nachtheil der Wissenschaft und auch des Sammlers vernachlässigt; ganz gewöhnliche Stücke können durch genaue Fundortsangabe ein wissenschaftliches Interesse erhalten, und die seltensten, ja ganz neue Arten verlieren, wenn der Fundort nicht angegeben werden kann, bedeutend an Werth. Dass man sich aber eben so sehr vor falschen Fundortsangaben, durch Verwechslung beim Ein- oder Auspacken u. s. w. zu hüten habe, versteht sich von selbst; solche falsche Angaben können für den Augenblick vielleicht Interesse

erwecken, als etwas Unerwartetes, Paradoxes, aber die Unrichtigkeit stellt sich doch früher oder später heraus und sie beeinträchtigen dann auch die Glaubwürdigkeit der richtigen Angaben desselben Sammlers. Der Reisende kommt sehr oft in den Fall, Conchylien in Kauf oder als Geschenk zu erhalten; diese Art der Acquisition ist auf den beigelegten Zetteln zu vermerken und die Stücke sorgfältig von denen getrennt zu halten, welche man in derselben Gegend selbst aufgenommen oder in noch frischem Zustande von Fischern u. dgl. erhalten hat; denn man kann keine Garantie für ihren Fundort übernehmen. In Singapore, Pointe de Galle, Amboina kann der Reisende leicht ganze Muschelsammlungen kaufen; selbst noch ehe er das Dampfschiff verlassen, bringen ihm Händler auf eigenen Booten dieselben entgegen; diese Conchylien eignen sich vortrefflich, um Bekannten in der Heimat ein hübsches Geschenk von der Reise mitzubringen, einen wissenschaftlichen Werth darf man aber nicht von denselben erwarten; es sind mit wenigen Ausnahmen gerade diejenigen Arten, welche seit zwei bis drei Jahrhunderten in den europäischen Sammlungen verbreitet sind, und sie sind auch nicht für die geographische Verbreitung zuverlässig, da sie selbst einen Handels- und Tauschartikel zwischen den eingeborenen Kaufleuten der genannten Orte bilden, je nach Ueberfluss oder Nachfrage. Anders ist es freilich mit einzelnen Stücken, die irgend ein dort wohnender Europäer oder intelligenter Eingeborener von einer bestimmten Reise nach einem anderen, weniger besuchten Orte mitgebracht hat; man kann dadurch öfters zu seltenen und interessanten Stücken gelangen, doch ist auch hier eine vorsichtige Beurtheilung der erhaltenen Angaben zu empfehlen.

Selbstthätiges eingehendes Sammeln und Beobachten kann überall, auch an den besuchtesten Hafenorten wie die beispielsweise oben genannten, noch interessante Resultate ergeben, es erfordert aber auch etwas Zeit und Anstrengung, Neigung und wenigstens einige Vorkenntnisse. Zweierlei ist dabei ganz allgemein zu empfehlen, erstens auf die kleinen Arten besonders zu achten, da diese unter sonst gleichen Umständen stets die weniger bekannten, von früheren Sammlern übersehenen oder vernachlässigten sind, und zweitens die lebenden Thiere, soweit sie aus der Schale sich vorstrecken, sofort zu zeichnen. Die Schale lässt sich leicht bewahren und noch später von Anderen genau beschreiben und zeichnen; die Formen der Weichtheile des lebenden kriechenden Thiers, der Fühler, des Fusses, der Athemröhre gehen mit seinem Tode mehr oder weniger verloren, sie sind von sehr zahlreichen in unseren Sammlungen recht häufigen Arten noch nicht bekannt, und für die systematische Einordnung derselben von Werth; eine Art ist doch eigentlich nur unvollständig bekannt, so lange sie nicht während ihres Lebens und in ihrer Bewegung beobachtet und diese Beobachtung bleibend aufbewahrt ist. Soviel zum Zeichnen der hauptsächlichsten Formen nöthig, erwirbt man sich bald und leicht bei etwas gutem Willen; kann man es künstlerisch und in Farben, um so besser, aber auch die einfache Bleistiftskizze hat ihren Werth und ist in den meisten Fällen lehrreicher als eine Beschreibung mit blossen Worten. Ueber das Nähere, wie man die Thiere zum Hervorstrecken bringen kann und auf welche Theile man besonders zu achten hat, siehe weiter unten.

Mühe und Zeitaufwand des Suchens und Sammelns kann man sich sehr erleichtern oder ganz ersparen durch Heranziehen der Eingeborenen, namentlich der Kinder derselben, denen man eine Kleinigkeit für jedes Stück oder für eine gewisse Anzahl derselben im Voraus verspricht. Diese kennen in der Regel die geeigneten Oertlichkeiten besser, lassen sich auch

durch Hitze, Regen oder Bodenschwierigkeiten weniger abhalten; man verliere nicht gleich die Geduld, wenn sie auch anfangs nur schlechtes Zeug bringen, mache ihnen aber sobald als möglich den Unterschied zwischen guten, d. h. lebend gesammelten, vollständigen, und schlechten, d. h. verbleichten, zerbrochenen u. s. w. Stücken klar, und wo man nicht allzukurze Zeit sich aufhält, setze man ihnen eine bestimmte Stunde fest, zu welcher allein man ihre Sachen annimmt, wenn es nicht ganz etwas aussergewöhnliches ist, sonst läuft man Gefahr, alle fünf Minuten wegen eines werthlosen Stückes gestört zu werden. Dieses Verfahren hat den Vortheil, dass man in kurzer Zeit und ohne besondere Mühe eine grössere Anzahl von Exemplaren erhält; in der Regel bringen sie so lange immer wieder dasselbe, bis man es nicht mehr annimmt. Der allen Conchyliologen bekannte „König der Sammler“ (H. Cuming) erhielt so einen grossen Theil seiner so zahlreichen Conchylien. Ausschliesslich angewandt, hat es allerdings den Nachtheil, dass man die Thiere nicht in ihrer natürlichen Umgebung, die oft so charakteristisch für sie ist, zu sehen bekommt und dass man auch nicht immer leicht bezeichnen kann, was die Leute suchen sollen; wiederholtes Vorzeigen von Abbildungen der gewünschten oder auch nur ähnlicher Arten ist hiefür zu empfehlen. Wo Zeit und Umstände es gestatten, ist das Richtigste, Selbstaufsuchen und Bringelassen zu verbinden.

Was nicht der Mühe werth sei, mitzunehmen, darüber lassen sich nicht leicht allgemeine Regeln geben. In wenig besuchten Gegenden oder wenn man eine möglichst vollständige Sammlung der in einem Bezirk vorkommenden Arten beabsichtigt, ist auch ein verbleichtes, selbst zerbrochenes Stück von Werth — so lange man kein besseres hat; nur zu oft geschieht es, dass man ein schlechtes Exemplar nicht mitnimmt, in der Zuversicht, bald ein besseres zu finden, und diese Zuversicht sich nicht bewährt. Aber wenn man die Wahl hat, nehme man nur frische, lebende oder den lebenden an Glanz und Farbe gleichende, unversehrte Stücke. Im Allgemeinen hat eine verbleichte, abgeriebene oder zerbrochene Conchylie, namentlich wenn die Mündung bei einer Schnecke, Wirbel und Schloss bei einer Muschel unkenntlich geworden, keinen Werth, insbesondere keinen Geldwerth. Kleinere Löcher an unwichtigeren Stellen benehmen nichts an wissenschaftlichem und nur etwas an pecuniärem Werth. Unausgewachsene Schalen, neben geringerer Grösse bei vollständiger Uebereinstimmung der schon vorhandenen Theile bei den Schnecken meist auch durch den dünnen geraden Rand der Mündung zu erkennen, mit den erwachsenen zu sammeln, ist von Interesse, nur nicht allzuvieler, da sie allein kein Tausch- oder Verkaufsobject bilden; wenn man im Zweifel ist, ob etwas unausgewachsen oder eine besondere Art sei, thut man gut es mitzunehmen; in den meisten Fällen wird sich die Frage auch später noch durch Kundige lösen lassen.

Wieviele Exemplare mitzunehmen, lässt sich nicht im Allgemeinen bestimmen, da es ganz von den einzelnen Arten abhängt; bei ganz kleinen, deren Gewicht und Volum praktisch nicht in die Wagschale fällt, soviel als möglich; bei grösseren ist, je ansehnlicher und schöner sie sind, desto mehr Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass sie in den europäischen Sammlungen schon zahlreich vertreten seien, also eine grössere Menge mitzunehmen, für die gewöhnlichen Zwecke des Reisenden sich nicht lohnt; handelt es sich aber um wenig besuchte Gegenden, namentlich nicht maritime, so nehme man immerhin mit, soviel die Umstände erlauben, 20—100.

Leere Conchylien erfordern keinen besonderen Schutz gegen Insecten, Feuchtigkeit oder Trockenheit; nur dem unmittelbaren Sonnenschein lasse

man sie nicht längere Zeit ausgesetzt, da sie dann leicht von der Lebhaftigkeit ihrer Farben verlieren, sehr dünne sogar Sprünge bekommen können. Beim Einpacken hat man nur gegenseitiges Reiben und Schütteln durch Ausfüllen aller Zwischenräume mit Baumwolle, Spreu oder dergl., bei zarteren oder stacheligen auch durch Einwickeln der einzelnen in Papier zu verhüten; sehr grosse und sehr kleine packt man nicht gern untereinander, sondern vielmehr die kleinen in eigenen Behältern ab; dieses ist bei dünnschaligen, daher leicht zerbrechlichen ganz nothwendig, man nimmt dazu kleine Schachteln jeder Art, Stücke eines Bambusrohrs, u. dgl.

Lebend oder doch frisch mit den Weichtheilen erhaltene Conchylien kann man auf verschiedene Weise behandeln. In gutem Spiritus erhalten sie sich soweit, dass man bei grösseren noch die gröbere Anatomie, bei allen, auch den kleinsten, wenigstens noch die wichtigeren Hartgebilde der Mundorgane, Zunge und Kiefer, studiren kann. Aber die Schalen leiden in Spiritus, meist verlieren sie mehr oder weniger Glanz und Farbe, so dass sie

nach längerer Aufbewahrung darin im Trocknen äusserst unansehnlich, matt und blass werden und deshalb in den Sammlungen trockener Conchylien nicht gerne gesehen sind. Es ist daher zu empfehlen, bei hinreichender Anzahl nur einen Theil und zwar nur solche Exemplare, die unzweifelhaft noch die Weichtheile enthalten, in Spiritus aufzubewahren, die anderen aber von Anfang an trocken, um die Schale gut zu erhalten. Wenn das Thier innerhalb seiner Schale langsam abstirbt und fault, so verliert die Mündung meist dadurch auch an Glanz und Farbe. Das einfachste Mittel, die Thiere schnell und sicher zu tödten, ist, sie in siedendem Wasser einigemal aufwallen zu lassen; nur Ueberschütten mit siedendem Wasser ist nicht so sicher, da es die in die Schale zurückgezogenen Thiere öfters erst etwas abgekühlt erreicht. Bei weitmündigen gewundenen Schalen lassen sich dann die Weichtheile in der Regel leicht mit einer Nadel, bei grösseren auch mit Pincette oder Messer herausziehen; man kann sich das Herausziehen dadurch erleichtern, dass man die Schnecken- schale langsam nach der entgegengesetzten

Richtung dreht. Bei engmündigen oder langgewundenen Schalen geht das Herausziehen nur unvollständig oder gar nicht; man thut dann wohl daran, die Mündung mit Baumwolle oder Papier dicht zu verstopfen, um sie und die Aussenseite der Schale vor den Fäulnisproducten im Innern zu schützen. Ausfressenlassen durch Ameisen oder Käferlarven mag in manchen Fällen gut sein; meist fehlt aber Zeit und Gelegenheit dazu; Fliegenmaden stellen sich leicht von selbst ein, machen aber diese Arbeit zu unvollständig und zu unreinlich. Wenn das Thier einen Deckel hat, ist derselbe nach dem Herausziehen vom fleischigen Fuss zu trennen, was meist schon durch Schieben mit dem Fingernagel geht, wo nicht, mit dem Messer, in die Mündung der Schale zu bringen und daselbst durch Baumwolle oder Papierpfropfen festzuhalten. Zweischalige Muscheln schliessen meist, so lange sie leben, fest zusammen; wenn sie aber matt werden oder todt sind, klaffen sie etwas. Bei gewaltsamem Aufreissen zerbricht man leicht den Rand. Man bringt daher nur eine Messerklinge flach in die Spalte und fährt damit hin und her, bis die Schliessmuskeln, meist zwei, einer vorn und einer hinten, durchschnitten sind; dann öffnet sich die Schale ohne Mühe weit und die übrigen Weichtheile lassen sich leicht mit Fingernagel oder Messerstiel loschieben, nur die Muskelansätze verlangen in der Regel Abschaben mit der Messerschneide. Das elastische Band, welches beide Muschelhälften zusammenhält, zieht sich beim Trocknen so zusammen, dass die Muschel weit offen steht und leicht bricht; man thut daher gut, sie gleich, so lange sie noch feucht ist, mit einem Faden fest zusammen zu binden und so trocknen zu lassen. Die losgelösten oder herausgezogenen Weichtheile der Muscheln und Schnecken mag man auch, wenn sie nicht zu sehr zerstückelt sind (bei Schnecken genügt der untere vordere Theil), statt sie wegzuworfen, in Spiritus aufzubewahren; es hat den Vortheil, dass sie weniger Raum einnehmen, namentlich auch in Flaschen mit engerem Hals gebracht werden können, als mit den Schalen; aber es ist dann nothwendig, sie und die Schalen so zu bezeichnen, dass man die Arten danach wieder zusammenfinden kann.

Wo Schnecken oder Muscheln den Eingeborenen als Speise dienen, hat der Sammler gute Gelegenheit, schöne grosse Exemplare in Mehrzahl ohne besondere Mühe auszulesen, und es ist auch an sich nicht ohne Interesse, zu wissen, welche Arten dadurch eine praktische Bedeutung in diesem oder jenem Lande haben; daher versäume man nicht, Fischmärkte und dergleichen Gelegenheiten zu besuchen und wenigstens einzelne Exemplare als Belegstücke von da mitzunehmen. Auch anderweitige Verwendungen, z. B. zu Werkzeugen oder als Schmuck, sind zu beachten und womöglich die betreffenden Exemplare zur sicheren Bestimmung der Art mitzunehmen; manche seltene dem Hinterlande angehörige Conchylien hat man bis jetzt nur oder hauptsächlich nur aus dem Schmucke der Eingeborenen zu erhalten Gelegenheit gehabt.

a) Land- und Süsswasser-Mollusken.

Landconchylien sind in unserer Zeit etwas mehr beliebt als Meerconchylien, und da sie auch durchschnittlich einen geringeren Verbreitungsbezirk haben, so bieten sie mehr Chance, neue Arten zu finden. Dagegen sind sie meist nicht so gesellig beisammen, als die weniger geschätzten Süsswasserschnecken, und daher in derselben Zeit nicht so viele Exemplare zusammenzubringen. Auf ebenem, angebautem Terrain ist nicht viel von ihnen zu erwarten; wer Landschnecken sammeln will, suche Waldränder oder Wald-

lichtungen, Schluchten und wo möglich Felsen auf. Unter abgefallenem Laub, an den Wurzeln der Bäume, an den Stämmen der Bäume unter Moos oder Schlingpflanzen, in den feuchtbleibenden Blattachseln monokotyledonischer Gewächse, an der Unterseite lose liegender Steine, in Spalten und einspringenden Ecken kann man lebende Exemplare finden, auch wenn beim ersten Ueberblick der ganze Platz unbelebt erscheint; öfters leiten Schleimspuren, den Weg, den sie früher zurückgelegt, bezeichnend, zu dem Verstecke der lebenden Schnecken, oder verrathen verbleichte leere Schalen die Nähe besserer Exemplare. Nur nach Regen oder in der Morgenfrische darf man erwarten, sie frei umherkriechen zu sehen. Es ist von Interesse, sich die Gesteinsart des Bodens, auf welchem man Schnecken findet, zu notiren, und ebenso wo möglich die Art der Bäume, an deren Stämmen und auch eventuell Kronenlaub man lebende Schnecken findet. Kalkstein bietet zahlreichere Exemplare und grössere, dickschaligere, heller gefärbte Formen; manche Arten scheinen nur auf Kalkstein vorzukommen; der Landschneckensammler sollte daher nie an Kalkfelsen ohne Aufenthalt vorübergehen. Besondere Instrumente zum Sammeln sind nicht nöthig, die Hand ist das vielseitigste Instrument; unter Umständen kann ein Taschenmesser zum Herausholen aus engen Spalten zu Hülfe genommen werden. Ein kleiner Handrechen zum Aufscharren des abgefallenen Laubes mag unter Umständen anwendbar sein und könnte sich dadurch empfehlen, dass er etwas mehr Sicherheit gegen etwaige Schlangen, Skorpione und Tausendfüsse gewährt, welche von der blossen Hand durch unabsichtliche Berührung im Laube oder Mulme zur Selbstvertheidigung gereizt werden könnten. Diese Gefahr aber, sowie die Anwendbarkeit jenes Instruments ist zu selten, als dass wir das Mitnehmen eines solchen Stückes für gewöhnliche Excursionen im Voraus empfehlen möchten. Zur ersten Aufbewahrung der gesammelten Schnecken dient jedes Gefäss, das sie einigermaassen vor Zerdrücktwerden sichert: Zündholzbüchsen, Pappschachteln, im Nothfall ein Stück Bambusrohr mit improvisirtem Stöpsel, und wo auch das nicht zu haben, kann man sie wenigstens in einen Zipfel des Taschentuches einknüpfen.

Es giebt verschiedene Methoden oder Kunstgriffe, um Landschnecken zu finden, welche alle unter Umständen sehr vortheilhaft, aber je nach Bodenbeschaffenheit u. dgl. auch oft gar nicht anwendbar sind. Eine sehr einfache ist z. B. alle lose liegenden Steine umzudrehen, da oft an der Unterseite derselben, von der Sonne geschützt, Schnecken (auch Käfer, Asseln u. dgl.) verborgen sitzen. Umständlicher, aber auch für kleine Schnecken oft sehr lohnend ist die von Insectensammlern vielgeübte Methode, abgefallenes Laub und sonstige Pflanzenreste handvollweise zusammenzuraffen und in einem eigens dazu mitgenommenen Sieb zu schütteln, so dass die kleinen Thiere, freilich mit viel Erde und Mulm, durch das Sieb in einen an dessen Unterseite befestigten Sack hindurchfallen und so mitgenommen werden können, um sie zu gelegener Zeit in Musse auszusuchen. Auch an Pflanzen, die zu ökonomischen Zwecken haufenweise gesammelt werden, kann ein achtsames Auge noch manche Schnecke finden; ich weiss von einem Falle, wo interessante Arten in der Krippe des Pferdestalles gefunden wurden; einige neue Arten sind sogar in Pfeffer- und Sesamsendungen unabsichtlich nach Europa gebracht worden.

Was die Beobachtung der lebenden Landschnecken betrifft, so hat man zunächst darauf zu achten, ob das Thier sich ganz in seine Schale zurückziehen kann oder nicht; manche Arten können es erst, wenn sie eine Zeitlang an einem trockenen Orte verwahrt gewesen und damit mehr Feuch-

tigkeit aus ihrem eigenen Körper verloren haben. Andere erscheinen auf den ersten Anblick schalenlos; bei näherer Untersuchung findet man aber eine kleine, von Weichtheilen (dem sogenannten Mantel) mehr oder weniger vollständig verhüllte Schale, und auch der Grad dieser Verhüllung kann bei demselben Individuum nach der Feuchtigkeit der umgebenden Luft wechseln. Solche Verhältnisse sind wo möglich durch Bleistiftskizzen gleich beim Finden festzustellen. Ferner achte man darauf, ob das Thier am vorderen Ende zwei oder vier (ein oder zwei Paar) Fühler trägt, ob diese Fühler ganz oder nicht ganz eingezogen (eingestülpt) werden können, ob die schwarzen Augenpunkte (*a*) an ihrer Spitze oder an ihrer Basis sitzen, ob Mantellappen (*b*) aus der Mündung der Schale hervortreten. Der hintere Theil des Körpers einer Schnecke kann dachförmig mit einem First (Kiel) versehen oder flach sein, sein Ende kann steil abfallen, mit einem Grübchen (grössere Schleimdrüsenöffnung *c*) und auch mit einem darüber vorragenden weichen Hörnchen versehen sein oder nicht, was für die systematische Stellung der Art von Wichtigkeit ist. Es kann auch einen dünnen oder stärkeren Deckel (*d*) tragen, der dann mit der Schale aufbewahrt werden muss. Bei schalenlosen Schnecken achte man ausserdem noch

darauf, wie weit der durch eine Furche umgrenzte Schild (Mantel) an der Oberseite sich über den Rücken erstreckt, und an welcher Stelle desselben, in seiner vorderen oder hinteren Hälfte (meist an der rechten Seite) das rundliche, willkürlich sich öffnende und schliessende Athemloch liegt.

In Betracht der Lebensweise ist z. B. darauf zu achten, ob die lebenden Schnecken nur am Boden oder auf dem Laub der Gesträuche, selbst Bäume, gefunden werden, ob sie einzelne Pflanzenarten bevorzugen, wie tief sie sich in der kalten oder trockenen Jahreszeit in den Boden vergraben, ob sie einen consistenten schalenähnlichen oder nur papierdünnen Winterdeckel sich bilden u. s. w. Einige Landschnecken sind fleischfressend und fressen ihre eigenen Kameraden aus; Beobachtungen hierüber an aussereuropäischen Arten sind sehr dankenswerth. Auch die Zahl und Grösse der Eier (taubeneigross bei einigen *Bulinus*), sowie die Jahreszeit, in der sie gelegt werden, ist von Interesse. Einige sind lebendiggebärend, so dass die Jungen schon mit Schalen im Leibe der Mutter gefunden werden.

Süsswasserschnecken und Süsswassermuscheln leben meist in grösserer Menge beisammen. Auch hier reicht in vielen Fällen die Hand zum Sammeln aus; Wasserpflanzen kann man mittelst eines Hakenstockes

heranziehen, um sie auf daran sitzende Schnecken zu untersuchen, oder auch mit einem Handnetz, ähnlich den Schmetterlingsnetzen, an langem Stiel das Wasserpflanzendickicht so durchstöbern, dass die abfallenden Schnecken in das Netz fallen. Süßwassermuscheln graben sich oft so in den Grund ein, dass sie dem Auge leicht entgehen; man bemerkt in diesem Falle nicht selten die seichten Furchen, die sie auf dem weichen Grunde gezogen haben und findet dann an deren Ende die eingegrabene Muschel, oder man fühlt ihren scharfen Rand beim Baden an der Fussohle.

Bei Beobachtung der lebenden Süßwasserschnecken kommt es hauptsächlich wieder auf Besitz oder Abwesenheit eines Deckels, Zahl und Form (fadenförmig oder abgeplattet) der Fühler und die Lage der Augen an deren Basis nach innen, oben oder aussen, an; auch ist es von Interesse zu wissen, ob die Thiere zeitweise an der Oberfläche des Wassers schwimmen und dann etwa ein Athemloch öffnen, um direct Luft aufzunehmen, vielleicht auch freiwillig einige Zoll über Wasser herauskriechen, oder ob sie stets am Grund unter Wasser bleiben, und ob sie etwa besondere federartige Organe (Kiemen) unter Wasser entfalten, wie es z. B. bei der Gattung *Valvata* der Fall ist. Auch auf Consistenz, Form und Bau des Deckels ist zu achten; er kann concentrisch geringelt (*Paludina*) oder spiralgewunden (*Melania*) sein, mit angelartigen Fortsätzen im Fleisch des Thiers haften (*Neritina*) u. s. w. Endlich ist die Form und Anordnung der Eier von Wichtigkeit, z. B. in wurstförmigen Laichen bei *Limnaea*, in flachen Häufchen bei *Planorbis*, während wiederum einige, wie die echten Paludinen, lebendig gebärend sind.

Bei den Muscheln ist die Form und Grösse der Fortsätze von Wichtigkeit, nach vorn und unten ein beilförmiger, cylindrischer oder auch pilzförmiger Fuss, nach hinten und oben zwei Röhren, lang oder kurz, zuweilen zu einfachen Oeffnungen verkürzt, getrennt oder mit einander verwachsen, am Rande gefranzt oder glatt; man sieht diese Fortsätze am besten, wenn man die Muschel aus ihrer natürlichen

Lage nimmt und in ein Gefäss mit Wasser und etwas Sand legt, wo alsdann das Thier nach vollständiger Beruhigung versuchen wird, sich von neuem einzugraben.

Es ist interessant, Gewässer von besonderem Mineralgehalt darauf zu untersuchen, ob und welche Schnecken oder Muscheln darin leben. Bei heissen Quellen ist zu untersuchen, bis zu welcher Nähe die Wasserschnecken herankommen und die Temperatur des Wassers an der Stelle, wo schon welche leben, neben derjenigen der Quellen selbst zu messen.

An Flussmündungen und in Strandseen pflegen ganz besondere Molluskenarten vorzukommen, welche theils einer eigenen Familie (*Auriculaceen*) angehören, theils mit andern Süßwasser- oder auch Meermollusken nächst verwandt sind; solche Oertlichkeiten verdienen daher besondere Aufmerksamkeit und es ist soweit möglich festzustellen, ob die betreffenden Arten nur in brackischem oder auch in rein süßem Wasser, ob noch im Bereiche der Fluth auf feuchten, periodisch von Wasser bedeckten Stellen leben. In den Tropenländern bilden die Mangle- (Mangrove-) dickichte reiche Fundplätze einer solchen Brackwasserfauna, in denen Land-, Süßwasser- und Meerthiere sich mannichfach begegnen, Litorinen gehen auf die Blätter der Bäume, Neritinen auf die Gesträucher hinauf und an den eintauchenden Zweigen hängen Austern; man beobachte möglichst sorgfältig,

welche Gattungen an solchen Stellen in nächster Nähe beisammen vorkommen und wie weit sich die einzelnen, sowohl horizontal als vertical, vom Wasser entfernen.

b) Meer-Mollusken.

Eine Anzahl von Mollusken wird durch ihren Aufenthalt in der Strand-region ohne weitere Umstände dem Beobachter zugänglich, namentlich wenn derselbe die Ebbezeit zu seinen Excursionen wählt. An flachem Sandstrande wird er freilich zunächst nur todte, vom Meer ausgeworfene, Schalen finden; diese sind in der Regel für Sammlungen wenig brauchbar, namentlich die von Einsiedlerkrebsen bewohnten sind meist nicht nur aussen, sondern auch an der Innenseite stark abgeschliffen; doch sind sie immerhin wenigstens noch zur Erkennung der Art brauchbar, und wer sich daher vornimmt, überhaupt die Conchylien-Fauna einer Küste möglichst vollständig zu sammeln, darf sie nicht ganz verachten. Unmittelbar nach unruhigem Wetter findet man oft bessere Conchylien, frisch, zuweilen noch lebend, aus etwas grösserer Tiefe von den Wellen ausgewühlt. Im Allgemeinen sind aber solche vom Strand aufgesammelte Schnecken und Muscheln nicht des Transportes werth. Eine Ausnahme machen die ganz kleinen Conchylien, die man öfters streifenweise mit andern kleinen Thierresten, namentlich Foraminiferen, mit feinem Sande dicht am Saume des Spiels der Wellen an geschützteren Stellen findet; von diesen ist immer eine Quantität mit dem Sande mitzunehmen, das Auslesen kann zu Hause besorgt werden und wird in der Regel manche gute Arten ergeben. Der umsichtige Beobachter wird aber auch am flachen Strande nicht immer ganz ohne lebende Ausbeute bleiben, ein cylindrisches Loch im Sande oder eine langgezogene Spur verräth ihm die Stelle, wo eine Muschel sich eingegraben hat, zuweilen sogar ein kleiner Wasserstrahl, den die durch den Tritt des Herannahenden zum raschen Einziehen bewegene Muschel ausstösst; öfters sind die Muscheln bis 1 Fuss tief oder noch tiefer eingegraben. Wenn man einen dünnen langen Gegenstand, z. B. einen Strohalm, Rohrstengel, Draht oder auch eine Degenklinge bei der Hand hat, kann man damit sondiren, dieser Gegenstand wird leicht, wenn er auf die Muschel trifft, von dieser durch Schliessen ihrer Schalen eingeklemmt, so dass sie daran festgehalten und unter Umständen herausgezogen werden kann. In der Regel wissen die Eingebornen, denen solche Muscheln zur Nahrung dienen, am besten Bescheid sie zu finden und zu fassen. Es ist von Interesse, die Tiefe in der sie stecken, und die Länge der fleischigen Röhren, die sie ausstrecken, zu notiren, wie auch ob sie zwei getrennte Röhren haben oder dieselben in ein Stück verwachsen sind.

Für schlammigen Boden gilt ungefähr dasselbe; nur befindet er sich in diesem Niveau meist in der Nähe von Flussmündungen, und es ist daher interessant, den Salzgehalt des Wassers zu prüfen, wenn auch zunächst nur durch Kosten, und wenn man dazu Gelegenheit hat, auf- oder abwärts die einzelnen Arten zu verfolgen und zu beobachten, welche früher, welche später aufhören und wo neue auftreten. (Vgl. oben die Bemerkungen über Brackwasserfauna.)

Mehr Gelegenheit zur Beobachtung lebender Meermollusken geben die Felsenküsten und wie vorhin das Ineinandergreifen der Süsswasser- und Meeresfauna, so ist hier das Grenzgebiet zwischen Land- und Meerthieren der Beachtung werth. Nicht nur unter den beweglichen Crustaceen, sondern auch unter den nur langsamer Ortsbewegung fähigen Schnecken giebt es

manche, welche obwohl eigentlich dem Meer angehörig, doch die gewöhnliche Fluthhöhe überschreiten und für die meiste Zeit nur auf das emporspritzende Wasser oder die feuchte Luft angewiesen sind. Ihnen kommen von der Landseite andere entgegen, welche obwohl ihrem Bau und ihrer Verwandtschaft nach zu den Landbewohnern gehörig, doch die Nähe des Meeres lieben und auch eine gelegentliche Ueberschüttung mit Meerwasser ertragen. In der Regel sind beide Kategorien leicht von einander zu unterscheiden, die Landthiere gehen nicht über die zusammenhängende Landvegetation hinab und die Meerthiere nicht bis zu dieser herauf. Aber es giebt doch auch Stellen, wo diese Regel nicht Stich hält, und für ganze Gattungen unter

den Conchylien (z. B. *Truncatella* o), sind in dieser Hinsicht noch nähere und zahlreichere Beobachtungen wünschenswerth. Ueber der Fluthlinie sind von Meer-schnecken namentlich Litorinen zu erwarten, unterhalb derselben nimmt die Zahl der Gattungen rasch zu, herauszuheben sind besonders die einfach müthenförmigen Schüsselschnecken (*Patella*) und die acht-

gliederigen Käferschnecken (*Chiton*); beide kleben ihrer ganzen Länge nach dicht an den Felsen oder Steinen und drücken sich um so fester an, je mehr man sie beunruhigt, so dass es oft nicht möglich ist sie ohne Verletzung abzunehmen; lässt man ihnen aber etwas Ruhe, so lüften sie die Schale wieder,

man kann dann rasch die Messerklinge zwischen dieselbe und die Unterlage bringen und sie so ablösen. Die Patellen haben rings in der Furche zwischen Mantel und Fuss eine Reihe Kiemenblättchen (*ad*), es giebt aber eine ähnliche, nach der Schale allein nicht unterscheidbare Gattung (*Tectura*, *Acmaea* oder *Patelloida*), welcher diese Blättchen fehlen; es ist daher gut, sofort die lebenden Thiere darauf anzusehen und womöglich einige Exemplare mit den Weichtheilen in *Spiritus* aufzubewahren. Die Käferschnecken rollen sich abgelöst ein und sterben so; man muss sie daher gleich pressen oder

auf eine flache Unterlage mit Faden festbinden und so trocknen lassen, um sie ausgedehnt zu erhalten. Wo sie häufig sind, wie namentlich in der südlichen gemässigten Zone, kann man nach sieben- oder sechsschaligen suchen, was als Ausnahme bei einzelnen Individuen vorkommt. Man findet sie meist in Spalten oder vorspringenden Felsstücken; solche Stellen sind überhaupt gute Fundgruben für allerlei Meerthiere, nur hat man oft Mühe sie aus engen Spalten hervorzuholen, wobei Messer und Finger zusammenarbeiten müssen.

Mit der gewöhnlichen Ebbegrenze pflegen ungefähr auch die Meerpflanzen, Tange (auf sandigen Strecken Seegras) zu beginnen und diese dienen meist zahlreichen Meerschnecken zum Aufenthalt, namentlich auch den schalenlosen zarten buntgefärbten Nudibranchien, die man lebend studiren muss, da sie in *Spiritus* sich zu sehr zusammenziehen. Zu ihnen kann man noch durch Waten und Baden gelangen. In den Tropengegenden treten statt der Tangwiesen häufig Korallenbänke ein, und diese bieten, wie für alle niederen Thiere, so auch für Conchylien, das reichste Beobachtungs- und Sammelfeld. Ausgerüstet mit einem Sack oder Korb, ein paar derben

Schuhen, besser noch Holzpantinen, zum Schutz gegen die spitzen Korallen, einem Hammer zum Zerschlagen der grösseren Blöcke und einem spitzigen Messer zum Herausholen aus engen Spalten, kann man hier Tag für Tag immer wieder Neues und Interessantes zu Gesicht und in die Hände bekommen, und man wird hier noch öfter, als wie an den Felsen und zwischen den Tangen sich überzeugen, dass gerade diejenigen Formen und Farben, die in den Sammlungen so auffällig und barock erscheinen, in nächster Harmonie mit der Umgebung stehen und mehr zum Verbergen des Thieres beitragen, als man erwartet. Hierfür Belege zu sammeln, indem man die Schalen unmittelbar mit den umgebenden Korallenstücken u. dergl. aufbewahrt, ist eine interessante Aufgabe. Freilich verschwindet die Harmonie der Farben beim Trocknen öfters sehr, indem die der Korallen, Tange u. s. w. sich dabei weit mehr ändern als die der Conchylienschalen. Auch die Färbung der Weichtheile an den lebenden Mollusken zu beobachten, ist von Interesse, bei manchen tropischen, z. B. den blassen braunfleckigen Eburna sind sie in auffallender Uebereinstimmung mit denen der Schale, bei andern gar nicht, z. B. den lebhaft rothen Tritonien und Fusus in düster braunen Schalen. Ueber die Ortsbewegung und überhaupt das Benehmen der Thiere verschiedener Gattungen lassen sich auf den Korallenriffen noch manche lehrreiche Beobachtungen machen; man weiss z. B., dass die schweren

Strombus und Pterocera nicht eigentlich kriechen, sondern sich durch Umkugeln vorwärtsbewegen, dass Conus und Terebellum, nach einer alten Angabe auch Mitra mittelst ihres vorstreckbaren Rüssels empfindlich verwunden. Viele Meer-
schnecken legen Eier, deren Hülsen im Wasser erstarren und eine eigenthümliche Form annehmen, wie Krüge, langgestielte Blumen, aneinander-

dergereichte Scheiben u. s. w. (Fig. 1—6); von manchen solcher Formen weiss man noch nicht, durch welche Schneckengattung sie hervorgebracht wurden und es ist daher nicht nur empfehlenswerth, solche Eihülsen, wenn man sie findet, mitzunehmen, sondern auch womöglich ausfindig zu machen, welcher Schnecke sie angehören, und den Hergang des Laichens zu beobachten.

Zu solchen und ähnlichen Beobachtungen, wie auch zum Zeichnen der lebenden Thiere, kann man dieselbe in Gefässen mit Meerwasser einige Zeit lebend zu erhalten suchen; man darf dabei nicht zuviel zusammenlassen und muss alle todte bald entfernen, da sie das Wasser leicht verderben; überhaupt muss das Wasser, wenn man nicht etwa grüne Meerpflanzen darin vegetiren lassen kann, mindestens jeden Tag, in der Hitze öfters gewechselt werden. Alle Thiere, die sich in eine Schale zurückziehen können, und auch schalenlose, die an den Wechsel von Fluth und Ebbe gewöhnt sind, halten sich länger nur im Feuchten, vor Verdunstung möglichst geschützt, als in sauerstoffarmem oder sonst verdorbenem Wasser; man setze sie daher nur in Wasser, gerade wenn man sie beobachten oder zeichnen will,

nicht allzulange vorher. Wenn sie sich sehr weit ausstrecken, ohne ernstlich herumzukriechen, ist das ein Zeichen, dass das Wasser nicht mehr gut für sie ist, und ebenso wenn sie augenscheinlich es zu verlassen streben.

Bei der beschaltten Meerschnecke ist hauptsächlich zu beobachten: die Gestalt des Kopfes und der Fühler, die Lage der Augen (*a*) an denselben, die

Länge der Athemröhre (*b*) und ob sie einen Rüssel hervorstrecken können, die Gestalt und Ausdehnung des meist scheibenförmigen Fusses (*d*), auf welchem sie kriechen, endlich ob ein Theil der Weichtheile um die Schale herumgeschlagen und diese dadurch theilweise oder auch ganz verdeckt wird; dieser Theil kann entweder der Fuss Scheibe (*d*) angehören oder besondere Lappen (*c*) bilden, die aus der Schalenöffnung hervorkommen und eine Fortsetzung des die Schale von innen auskleidenden sogenannten Mantels sind, so ist es z. B. bei den bekannten Porzellanschnecken (*Cypraea*). Endlich ist auch zu beobachten, in welcher Weise der Fuss sich zusammenfaltet, um in die Schale einzutreten, und ob ein Deckel an demselben vorhanden ist, oder nicht, eventuell ob derselbe die Schalenöffnung vollständig schliesst oder nicht. Bei den schalenlosen Meerschnecken ist namentlich die Lage und Form der Kiemen, ob sie baumförmig verzweigt, gefiedert oder einfach fadenförmig, in Reihen oder einem Kreishogen, auf dem Rücken, an einer oder an beiden Seiten angeordnet sind, zu beachten, auch die Lage der verschiedenen Körperöffnungen, soweit möglich, zu constatiren. Es giebt einige Meerschnecken, welche bei schnellem Zusammenziehen in Gefahr einen Theil ihres Fusses lostrennen und verlieren (*Harpa*); bei diesen ist es von Interesse zu beobachten, ob sie am Leben bleiben, wie bald sie wieder umherkriechen und ob ein Nachwachsen des verlorenen Theils zu bemerken ist, falls man sie lang genug am Leben erhalten kann. Manche Thiere geben einen färbenden Saft von sich, sei es ihre allgemeine Körperflüssigkeit, sei es die Absonderung einer eigenen Drüse, wie bei der Purpurschnecke (*Murex*); es ist immer von Interesse, das Factum für die einzelnen Arten zu constatiren und die Veränderungen, welche diese Farbe gewöhnlich bald an der Luft erleidet, zu verfolgen. Bei den Muscheln handelt es sich hauptsächlich um das Vorhandensein oder Fehlen zweier ausstreckbarer Röhren am hintern Ende, um die Gestalt des nach vorn und unten vorstreckbaren fleischigen Fusses, ob beilförmig, cylindrisch und dgl., endlich zu untersuchen, in welcher Ausdehnung die, die Innenseite oder Schale auskleidende, Haut von beiden Seiten in der Mittellinie, da wo die Schalenränder zusammentreffen, continuirlich sich fortsetzt oder auch gespalten ist.

Wer mit Mikroskop und Skalpell umzugehen weiss, hat in der Anatomie der Mollusken ein weites Feld vor sich, aus dem ich hier nur hervorheben will, dass von sehr vielen die Geschlechtsverhältnisse noch unbekannt und nur theoretisch nach dem Beispiel weniger Ordnungsrepräsentanten angenommen sind; es handelt sich zunächst darum, zu constatiren, ob in demselben Individuum Spermatozoen und Eier sich gleichzeitig finden, bei einigen vielleicht auch abwechselnd zu verschiedener Zeit sich ausbilden, und wo das nicht der Fall, sondern die Geschlechter wirklich auf verschiedene Individuen vertheilt sind, ob sich eine Verschiedenheit an den Schalen zwischen den Geschlechtern findet, ob z. B. wie man öfters annimmt, die Schalen der Weibchen dicker, aber zuweilen dafür auch kürzer sind. Bei einer Anzahl von Meerschnecken mit getrenntem Geschlecht lässt sich das Männchen äusserlich an den ihm eigenthümlichen Organ, das an der rechten Seite, meist in der Nähe der Fühler, vorgestreckt wird, erkennen; hier kann auch der Laie leicht, wenn er die lebenden Thiere vor sich hat, nach Verschiedenheiten an der Schale sich umsehen.

Besonderes Interesse bietet die Beobachtung lebender Cephalopoden (Tintenfische), ihres Farbenwechsels durch ausdehnbare Pigmentzellen, ihrer Ortsbewegung durch Auf-dem-Kopf-Gehen oder Rückwärtsschwimmen und ihrer Fortpflanzungsverhältnisse; auf Korallenriffen sind am ehesten Arten der Gattung Octopus zu erwarten, sie haben oft ihre eigenen Höhlen, in denen sie sich verbergen, verrathen aber ihr Dasein durch Häufchen leerer Muscheln, die sie ausgefressen haben; die Männchen erkennt man oft daran, dass einer ihrer acht sonst gleichen Arme in Anordnung und Grösse der Saugnäpfe von den andern sich unterscheidet. Es ist so manches Eigenthümliche über das Leben dieser Thiere uns von Alters her überliefert und theilweise erst in der Neuzeit bestätigt, dass sorgfältige Beobachtungen an verschiedenen Arten in verschiedenen Gegenden noch manchen wichtigen Zuwachs versprechen.

Bis jetzt haben wir vorzugsweise von denjenigen Mollusken gehandelt, die dem Forscher noch unmittelbar an ihrem Wohnort zugänglich werden. Es giebt nun noch zwei Kategorieen von solchen, die man nur durch eigene Apparate erreichen kann, die freischwimmenden Mollusken des offenen Meeres und die in grösserer Tiefe lebenden. Die ersten, welche man pelagische zu nennen pflegt, bieten während der Seereise oft eine angenehme Unterhaltung nicht nur für den Naturforscher, sondern auch für die Seeleute selbst, wenn sie so massenhaft erscheinen, dass sie sich leicht bemerklich machen, und es ist von Interesse, ihr Vorkommen nach Ort und Zeit genau zu notiren, um unsere Kenntnisse über deren geographische Verbreitung und periodische Erscheinung nach Jahres- und Tageszeit zu erweitern. Sie finden sich sowohl in den tropischen, als in den kalten Meeren, in letzteren haben sie als Nahrung der Walfische eine praktische Bedeutung und sind daher auch den Seelenten seit lange, theilweise unter sonderbaren Namen Walfischaas u. dgl. (*Cliona*, *Limacina*) bekannt. Sie erscheinen hauptsächlich bei ruhiger See, in Windstille an der Oberfläche, gewisse Arten, wie man sagt, nur zu gewissen Stunden des Morgens und Abends, wofür wiederholte Bestätigung wünschenswerth ist; am zahlreichsten findet man sie in Meerengen, durch welche eine Strömung geht, so sind z. B. die Meerengen von Messina und Gibraltar als Fundorte zahlreicher Arten bekannt. Um sie zu erlangen, hat man ein sackförmiges Netz mit kreisrundem eisernen Rahmen, wovon möglich von 2—3 Fuss Durchmesser, das Netz aus grobem Bindfaden und in seiner hintern (untern) Hälfte mit Gazestoff ausgefüllt, damit die kleinen

Thiere nicht durch die Maschen entkommen, während der Bindfaden die nöthige Festigkeit giebt; am Rahmen sind drei Oesen, woran drei Enden eines gemeinschaftlichen Taus befestigt sind; dieses Netz lässt man

vom Hintertheil des Schiffes aus nachschleppen mit so viel Tau, dass es die Oberfläche des Meeres durchschneidet; wenn es sich nicht selbst durch den Zug senkrecht stellt, hilft man durch Gewichte oder Schwimmer an einer der Oesen nach. Es ist

aber nur bei sehr mässiger Geschwindigkeit der Fahrt anwendbar; wenn das Schiff über drei Knoten macht, tritt Gefahr ein, es durch Reißen des Taus zu verlieren. Die Mollusken, welche man auf diese Weise neben zahlreichen Thieren anderer Classen erhält, gehören hauptsächlich den Ordnungen der Pteropoden und Heteropoden an. Auch hier ist es interessant, die Thiere eine Zeit lang lebend zu beobachten, ehe man sie in Spiritus aufbewahrt, ihre Bewegungen beim Schwimmen, namentlich beim Auf- und Absteigen im Wasser zu verfolgen und zu constatiren, welche Mittel sie zur Veränderung ihres specifischen Gewichtes anwenden; bei den beschalten wird Zurückziehen in die Schalen und wiederum möglichstes Ausbreiten das Hauptsächlichste sein. Die veilchenblaue *Janthina* ist durch einen eigenen blasigen Schwimmapparat ausgezeichnet, an dem sie zugleich ihre Eier trägt; es ist von Interesse zu beobachten, ob sie ihn freiwillig abstösst, wie sie sich ohne ihn behilft und wie sie ihn bildet; für letzteres müsste man sie längere Zeit am Leben zu erhalten suchen oder man könnte günstigenfalls aus verschiedenen Exemplaren die aufeinander folgenden Stadien combiniren. Besonderer Erwähnung verdienen noch einige Cephalopoden, zunächst die zwei lebenden mit gekammerter Schale, der durch seine Perlmutterchale ausgezeichnete grosse *Nautilus*, nur im indischen Ocean zu Hause, und das kleinere weisse Posthörnchen, *Spirula*, mit abstehenden Windungen, aber am lebenden Thier halbverhüllt, dessen Schale häufig in allen Sammlungen ist, während das vollständige Thier zu den grössten Seltenheiten gehört; bei beiden ist es von grossem Interesse, ihre Stellung und Bewegungen beim Schwimmen sowie beim Aufsteigen und Niedersinken zu beobachten, eventuell am lebenden Thier durch Anbohren der Schale die Zusammensetzung der Luft in den Kammern zu untersuchen und den Einfluss, den ihre Entleerung auf die Bewegungen des Thieres hat, zu erproben. Endlich giebt es noch riesenhafte Tintenfische, deren Reste, Schnäbel wie die von Pampageien, und schenkeldicke Armstücke, im Magen der Potwale (*Cachelots*) zuweilen gefunden werden, und die nur höchst selten an die Oberfläche des Meeres zu kommen scheinen; was von solchen zu erlangen, ist werthvoll. Sollte man ein solches Thier ganz bekommen, so ist es zunächst in seinen einzelnen Theilen auszumessen und in möglichst grossem Maassstab zu zeichnen, dann in Spiritus, oder doch in Salz aufzubewahren; ist das unmöglich und misslingt auch das Trocknen, so sind der Kopf, die Enden der Arme und der schwertförmige hornartige Knorpel im Rumpfe die wichtigsten Theile für die Aufbewahrung.

Was die Mollusken des Meeresgrundes betrifft, so ist unter günstigen Umständen und nur bei mässiger Tiefe Heraufholenlassen durch Taucher möglich und räthlich; in der Regel und bei jeder beträchtlicheren Tiefe ist das einzige Mittel das Schleppnetz (englisch dredge, französisch la drague, neuerdings zu „Schabe“ verdeutscht), über dessen Beschaffenheit, Handhabung

und Anwendung in dem folgenden die übrigen wirbellosen Thiere betreffenden Theile von Prof. Möbius das Nöthige angegeben werden wird, ebenso über die dadurch zu ermittelnde Tiefenvertheilung der Thiere. Es möge hier nur noch bemerkt werden, dass viele seltene und werthvolle Conchylien nur durch dieses Mittel zu erlangen sind, sowie dass es in den aussereuropäischen Meeren noch eine Fülle neuer Arten verspricht. Namentlich in Westindien, bei den kleinen Antillen Tortola, Guadeloupe und Barbados sind durch dasselbe grosse und schöne, durch ihre Aehnlichkeit mit fossilen Formen höchst interessante Conchylien (*Pholadomya*, *Pleurotomaria*), erlangt worden, aber nur in geringer Anzahl und daher immer noch sehr selten und werthvoll.

Pleurotomaria.

Als passendes Handbuch zum Studium der Mollusken ist dem Reisenden in erster Reihe zu empfehlen: S. P. Woodward's manual of the Mollusca, London bei J. Wheale 1851. 1856, mit 24 Tafeln und zahlreichen Holzschnitten, in dritter Auflage mit

Pholadomya.

Zusätzen von Ralph Tate 1868 (2 Thlr. 20 Sgr.), auch in französischer Uebersetzung von Humbert, Paris 1870. Es enthält in einem kleinen Octavband in gedrängter, angenehmer

Darstellung eine grosse Menge wichtiger und interessanter Capitel, namentlich auch über geographische Verbreitung und über das Schleppnetz, zugleich eine systematische Uebersicht und eine kurze Beschreibung der wichtigeren Gattungen und die nöthigsten Abbildungen. Umfassender angelegt und reicher an Stoff, aber auch an Umfang und theurer ist die Bearbeitung der Weichthiere in Prof. Bronn's „Classen und Ordnungen des Thierreichs“, fortgesetzt von Prof. Keferstein, Leipzig und Heidelberg bei Winter 1861—66; zwei starke Octavbände füllend, mit 137 Tafeln (22 Thlr.); es ist hauptsächlich denen zu empfehlen, welche sich mit dem Körperbau, der Anatomie und Physiologie dieser Thiere näher bekannt machen wollen. Chenu's manuel de conchyliologie, Paris 1860—62. 2 Bde. gr. 8. zeichnet sich durch die grosse Zahl der abgebildeten Arten bei mässigem Preise (16 $\frac{2}{3}$ Thlr. Ladenpreis antiquarisch billiger) aus und wird daher dem der möglichst viel gleich unterwegs zu bestimmen wünscht, willkommen sein. Zwei etwas ältere, aber immer noch sehr brauchbare Werke sind Johnston's Einleitung in die Conchyliologie, aus dem Englischen übersetzt mit Zusätzen von Bronn, Stuttgart 1854. 8. mit 166 Holzschnitten (4 $\frac{1}{2}$ Thlr.) und Philipp's Handbuch der Conchyliologie, Halle 1853. 8. (4 Thlr.); ersteres giebt das Allgemeine ausführlich und gründlich, namentlich über Lebensweise und Verwendung durch den Menschen ohne auf die einzelnen Gattungen einzugehen; Philipp's Hauptstärke ist umgekehrt die Beschreibung der Gattungen, aber leider ohne Abbildungen.

Wirbellose Seethiere.

Von

K. Möbius.

Krustenthiere, Crustacea.

Krustenthiere sind vom Strande bis in mehrere tausend Meter Tiefe verbreitet. Auf dem Strande wende man angespülte Seepflanzen um, damit die Strandflöhe hervorspringen. In feuchten Steinklüften suche man Strandasseln. An Steinen und Holzwerk sitzen bis zur höchsten Fluthlinie und selbst über diese hinauf Rankenfüssler in kleinen zeltförmigen Kalkgehäusen. Man löse sie mit einem Meissel oder Messer los. Von der hölzernen Unterlage trenne man sie womöglich mit einer dünnen Holzschicht ab, damit ihre Basis durchaus nicht verletzt werde. Wenn Schiffe gedockt werden, kann man am Kiele derselben oft reiche Ernten von Rankenfüsslern halten.

In Wasserlöchern, die bei Ebbe trocknen Fusses zu erreichen sind, kann man Taschenkrebse, Krabben und Flohkrebse sammeln, wo sie sich unter Steinen und Pflanzen verbergen.

Im flachen Wasser leben auf weichem Grunde Schwertschwänze (Molukkenkrebse) Krabben und Garnelen; in Höhlungen der Klippen Hummer, Langusten u. a. grosse Krebse. Manche grössere Krebse gehen auch ans Land, z. B. die Landkrabben.

Zum Fangen von Krustenthieren, die im freien Wasser oder auf tieferen, niemals trocken laufenden Gründen leben, wendet man Käscher, Schweb- und Schleppnetze und Siebe an. Diese und alle anderen Fanggeräthe sind in einem besonderen Abschnitte weiter unten beschrieben.

Einen Theil der Grundbestandtheile, die man mit dem Schleppnetz emporgeholt hat, bringe man sofort in Schüsseln und giesse etwas Seewasser darauf. Ebenso behandle man lebende und todte Seepflanzen, damit darin verborgene Krustenthiere an die Oberfläche kommen.

In den höheren Wasserschichten treten kleine Krustenthiere (Copepoden) oft in solchen Schaaren auf, dass sie das Wasser färben. Dann kann man sie schon fangen, indem man Wasser schöpft oder auf Deck pumpt; besser freilich mit Schwebenetzen, die man in verschiedenen Tiefen in das Meer hängt. Sind an der Oberfläche keine Krebschen, so schwimmen sie doch oft 2, 3 oder noch mehr Faden tief. Wo Schaaren von Fischen auftreten,

da sind häufig auch viele Copepoden, welchen die Fische folgen, um sie zu fressen. Man fange solche Fische, schlitze ihren Bauch auf und lege sie in starken Spiritus, damit ihr Darminhalt zur späteren Untersuchung gut erhalten bleibe. Nicht selten wirft die See bei stürmischem Wetter so viel kleine Krustenthierchen auf Deck, dass sie hier gesammelt werden können.

Im Schwebnetz fängt man mit Copepoden auch andere kleine Krebsarten, oft auch junge Entwicklungsformen der Taschenkrebse, Langusten und anderer grösserer Krebse, die ganz andere Formen haben, als die Alten. Alle diese Entwicklungsformen sind werthvoll, besonders wenn es gelingt, eine Reihe von Entwicklungsstufen bis zur völligen Ausbildung hinauf zu erlangen. Die oft prachtvoll gefärbten Langusten oder Stachelhummer der warmen Meere sind in der Jugend fast ganz durchsichtig und so dünn wie ein Blatt. Entwicklungsreihen solcher Arten sind sehr erwünscht.

Unter den Krustenthieren giebt es viele Schmarotzer. Solche suche man auf der Haut der Seekühe (*Halicore*, *Manatus*), Delphine, Walfische, Schildkröten, Seeschlangen, Fische, Nacktschnecken und Würmer; in den Schalen von Schnecken und Muscheln, auf Stachelhäutern, Polypen, Korallen und Schwämmen; in der Mundhöhle und auf den Kiemen von Fischen, auf den Kiemen und unter dem Hinterkörper (Schwanz) grösserer Krebse, in der Leibeshöhle von Tintenfischen und in den Körperhöhlen der Quallen.

Lassen sich die Schmarotzer nicht leicht ablösen, so bewahre man sie mit ihrem Wirthe zusammen auf oder schneide den Theil ab, an dem sie festhängen, damit sie unverletzt bleiben. Von vielen Schmarotzerkrebsen kennt man blos die Weibchen, welche in der Regel viel grösser sind als die Männchen. Oft klammern sich die Männchen neben der Geschlechtsöffnung der Weibchen fest. Beim Fangen und Aufbewahren der Weibchen sehe man daher zu, dass nichts von kleinen Anhängseln verloren gehe. Wenn solche bemerkt werden, empfehle ich den Schmarotzer mit seinen Anhängseln in ein besonderes Gläschen einzusetzen.

In süssen Gewässern: in Seen, Flüssen, Wassergräben suche man in Klüften, unter Steinen und Baumwurzeln nach Krustenthieren. Schmarotzerkrebse leben auch auf Süsswasserfischen.

Am besten conservirt werden die Krebse in starkem Spiritus. Will man mehrere hartschalige in einem Gefässe aufbewahren, so muss man jedes Stück in weiches Zeug (altes Flaggentuch) einwickeln oder einnähen. Will man grössere Krebse trocknen, so trenne man den Hinterkörper (den sogenannten Schwanz) von dem Vorderkörper ab und hole aus beiden alle Eingeweide heraus. Aehnlich verfähre man mit den Scheeren und dickeren Beinen. Nachdem die leeren Schalenstücke mit Süsswasser ausgespült und darauf mit arsenigsurem Natron ausgepinselt worden sind, werden sie an einem schattigen zugigen Platze gut getrocknet.

R. Owen empfiehlt, die trocknen Krebse mit einem Firniss zu überziehen, der auf folgende Weise bereitet wird.

100 Gramm Gummi arabicum und 6 Gramm Gummi Traganth löse in 1,5 Liter Wasser. Hierzu setze 100 Gr. Weingeist mit 20 Tropfen Thymianöl und 1,3 Gr. Quecksilberchlorid. Mische gut und lass abklären. Der klare Theil dient als Firniss, der Bodensatz als Kitt.

Marine Insecten und Spinnenthierchen.

Die Insecten und Spinnenthierchen sind im Meere schwach vertreten. Insectenlarven sind auf lebenden und abgestorbenen Scepflanzen zu

suchen. Käfer und Wasserwanzen fängt man mit Käschern, Schwebenetzen und Schleppnetzen in höheren Wasserschichten und auf geringen Tiefen.

Seespinnen (Pycnogoniden) leben am Grunde auf Seepflanzen, Seerosen und Spongien, die man mit Schleppnetzen fängt. Milben kommen in höheren und tieferen Regionen auf lebenden und todtten Pflanzen und auf anderen Thieren vor. Man findet sie, wenn man diese unter schwachen Vergrößerungen durchmustert.

Alle diese Thiere werden in Spiritus aufbewahrt; die ausgebildeten Insecten können auch auf Nadeln gespiesset und getrocknet werden.

Würmer, Vermes.

Würmer leben am Strande unter Steinen und angespülten Seepflanzen, welche nur bei Hochwasser nass werden, auf Sand- und Schlickbänken, welche bei Ebbe trocken liegen. Hier zeigen schnurförmige Kothhaufen und kleine Löcher ihre Lagerstätten an. Man hebe mit einem Spaten schnell den Boden auf und werfe ihn auseinander oder bringe ihn in ein Sieb, das man im Wasser auf- und niederbewegt, damit die feinen Bodensstoffe durchgehen, bis die Würmer frei liegen.

Würmer, welche auf lebenden und abgestorbenen Seepflanzen wohnen, werden am leichtesten entdeckt, wenn man eine Hand voll solcher Pflanzen in einer Schüssel mit Seewasser einige Stunden stehen lässt. Die meisten erscheinen dann an der Oberfläche.

Beliebte Wohnplätze von Würmern sind poröse Klippen und Steine; aus diesen holt man sie mit Meissel und Hammer. Auch auf Muscheln und Schneckenhäusern und auf hartschaligen Krebsen siedeln sich verschiedene Würmer mit ihren Kalk- und Sandröhren an oder sie verkriechen sich in Höhlungen alter Muschelschalen und Schneckenhäuser, in Spalten und Löcher des Pfahlwerks der Häfen oder in leere Röhren der Schiffbohrer. Auf lebenden Seesternen halten sich auch Würmer auf.

In dem weichen Meeresboden jeder Beschaffenheit kommen Würmer bis zu den größten untersuchten Tiefen vor (über 5000 Meter). Man holt Meeresboden mit Schleppnetzen herauf und siebt ihn durch. Röhren aus Sand, Mud, Muschelbrocken oder Foraminiferenschalen zeigen die Anwesenheit von Würmern an. Man breche sie vorsichtig entzwei um ihre Bewohner zu finden. Aufbewahrt werden nicht blos die Würmer, sondern auch ihre Röhren. Man nehme alle längeren Röhren mit und lege sie in Spiritus, damit sie später auf ihren Inhalt untersucht werden können.

Viele Würmer schwimmen als junge Thiere, manche auch im ausgebildeten Zustande in der oberflächenschicht des Meeres. Diese werden mit feinen Schwebenetzen oder Käschern gefangen, deren Inhalt in Glashäfen angesammelt und darauf genau betrachtet wird.

Verschiedene egelartige Würmer sitzen auf äusseren Theilen der Fische, Frösche, Molche und Schildkröten. Man hat sie auch in der Nasenhöhle und im Schlunde von Säugethieren und Vögeln und an den Kiemen von Muscheln gefunden.

Eingeweidewürmer suche man im Innern des Nahrungscanals anderer Thiere. Diesen schneide man mit einer Schere auf, spüle den Inhalt mit Wasser in ein Gefäss und verdünne ihn portions- und gradweise in einem anderen Gefässe immer weiter, um vorhandene Würmer sichtbar zu machen. Man sehe auch zu, ob Würmer an der innern Fläche des gereinigten Darms

festhängen. Solche löse man vorsichtig los, damit sie nicht zerreißen. Hängen sie sehr fest, so schneide man das Darmstück, woran sie sitzen, aus. Man durchsuche ferner auch die Leibeshöhle, die Leber, die Nasenhöhle, die Lunge, die Muskeln, das Zellgewebe unter der Haut, das Gehirn und selbst das Innere der Augen nach Würmern. Sie verrathen sich in diesen Organen zuweilen durch kleine abweichend gefärbte Punkte und Flecke oder blasige Erhöhungen und in dem Auge durch Trübungen.

Die Würmer des süßen Wassers verschafft man sich, indem man Schlamm und Pflanzen aus Gräben, Teichen, Seen und Flüssen in Glasgefäße bringt und durchmustert, nachdem sich das aufgequollene Wasser geklärt hat oder man lässt die weiche Grundmasse, die man durch Schleppnetze und Schrapper heraufgeholt hat, durch das Sieb gehen.

In feuchten Tropenwäldern kommen Blutegel auf Gebüsch und Bäumen vor. Gewisse Plattwürmer sind auf der feuchten Erde, Regenwürmer und verschiedene kleine Rundwürmer in dem Erdboden zu suchen.

Würmer, welche lebhaft prächtige Farben haben, sollten womöglich abgemalt werden, weil die meisten Farben in Spiritus vergehen. Kann man sie nicht malen, so beschreibe man ihre Färbung. Zur Conservirung der Würmer dient Weingeist. Würmer mit harten Röhren dürfen mit weichen Würmern nicht zusammen in ein Glas gesetzt werden. Zur Aufbewahrung einzelner Weichwürmer sind Röhrengläser sehr passend. Plattwürmer pflegen sich in Spiritus so stark zusammenzuziehen, dass ihre Lebensform ganz verloren geht. Um diese einigermaßen zu erhalten, legt man (nach Dr. H. Gräffe) den in Spiritus getödteten Plattwurm baldigst zwischen zwei Platten steifen Papiers, deren Ränder man durch Nadeln oder Zwirn aneinanderheftet.

Mantelthiere, Tunicata.

Es giebt schwimmende und festsitzende Mantelthiere. Zu den schwimmenden gehören die Salpen und Leuchtwalzen (Pyrosomen), welche beide zum Leuchten der warmen Meere beitragen. Sie werden mit Schwebnetzen gefangen. Die Salpen pflanzen sich abwechselnd durch Eier und durch ganze Ketten junger Thiere fort. Man bemühe sich von jeder Art, die man sammelt, beide Generationen zu erlangen, sowohl die eierbildende als auch die kettenerzeugende Form.

Festsitzende Mantelthiere leben von der Strandregion bis zu grossen Tiefen hinunter. Sie sitzen auf Pflanzen, Holzwerk, Steinen und andern Körpern, auf felsigen, steinigen, sandigen und muddigen Gründen. Manche bilden Thiercolonieen und erscheinen wie Sterne, Sterngruppen oder farbige Ueberzüge auf ihrer Unterlage. Es ist zweckmässig sie mit dieser zu conserviren, da sie beim Ablösen leicht verletzt werden.

Die Seescheiden (Ascidien) sind grössere Mantelthiere, welche meistens eine derbe Hülle haben, in der nicht selten kleine Muscheln sitzen. Man sucht die festsitzenden Mantelthiere bei Ebbe wie Krebse u. a. Seethiere in Wasserlachen oder fischt sie mit Schrapern und Schleppnetzen auf tieferen Gründen. Die Mudbewohner werden oft erst mit Hülfe des Siebes sichtbar.

Alle Mantelthiere enthalten sehr viel Wasser; man setze sie deshalb in unverdünnten Spiritus, und wenn man viele Exemplare in ein Gefäss gethan, so versäume man nicht, den stark gewässerten Spiritus bald durch neuen zu ersetzen, sonst faulen die Eingeweide und die gesammelten Thiere haben dann wenig oder gar keinen Werth mehr.

Stachelhäuter, Echinodermata.

Manche Seesterne und Seeigel kriechen auf dem Pfahlwerk der Häfen, auf Klippen, Steinen und Seepflanzen so nahe an die Oberfläche herauf, dass sie mit Käschern oder Schrapern vom Ufer oder von einem Boote aus gefangen werden können. Für tiefer lebende wendet man das Schleppnetz und den Quastenschlepper an. Die Beschreibung dieser Instrumente findet man in einem besonderen Abschnitte weiter hinten. Sie bringen Echinodermen empor, welche auf dem Meeresgrunde kriechen oder sich in die obere Schicht desselben eingraben, als herzförmige und scheibenförmige Seeigel, Schlangensterne mit dünnen schlangenartig biegsamen Armen und Seewalzen (die wie dicke Würmer aussehen oder gurkenförmig sind). Ausser diesen fängt man auch noch kleinere und grössere Haarsterne (Crinoideen), die dünne gefiederte Arme haben. Der Körper, von welchem diese Arme ausgehen, steht entweder mittels eines gegliederten Stieles auf einem Steine oder einem anderen Gegenstande fest oder er hat statt des Stieles Ranken, durch welche er sich willkürlich festhalten kann. Die gestielten Haarsterne bewahrt man mit dem Gegenstande auf, an welchem sie festgewachsen sind. Gut conservirt, haben sie als sehr seltene Thiere, grossen Werth.

Eine Gruppe von seesternartigen Echinodermen (die Medusenhäupter, Euryalae) ist mit einfachen oder verzweigten Armen ausgerüstet die sich wie Ranken um Polypenäste schlingen; daher werden die Medusenhäupter oft mit Polypenbäumen zugleich aus der Tiefe gehoben. Von diesen reisse man sie nicht ab, sondern conservire beide so viel als möglich zusammen. Man beachte, ob beide Thiere ähnliche oder verschiedene Farben haben und notire, wie sie aussahen.

Für viele Seewalzen sind Höhlungen in Klippen und Korallenriffen beliebte Wohnstätten. In den tropischen Meeren leben sie auch in dem Schlamme der Mangrovesümpfe. Man findet sie auch in dem sandigen Grunde der Flussmündungen.

Die Echinodermen werden am besten in starkem Weingeist aufbewahrt. Seewalzen pflegen ihre Eingeweide auszustossen, wenn sie gefangen werden. Sie rasch in Weingeist zu werfen, ist immer noch das beste Mittel, möglichst viele unzerstört zu erhalten. Seeigel haben in ihrem Schalenraum sehr viel Wasser, welches entfernt wird, ehe man sie in Weingeist setzt. Man steche mit einer dicken Nadel einige Löcher in die Haut, welche den Mund umgiebt und lege den Seeigel dann mit der Mundseite auf ein Sieb, damit das Wasser auslaufen kann. Will man sie mit allen Stacheln gut erhalten, so muss man jeden Seeigel einzeln mit weichem Kattun (altem Flaggentuch u. dergl.) umgeben, ehe man mehrere zusammen in ein Gefäss mit Weingeist bringt. Und dieses fülle man so vollständig aus, dass die Seeigel beim Transport nicht gegeneinander fahren können. Sollen sie trocken aufbewahrt werden, so trenne man die Mundhaut an ihrer Peripherie von der Schale ab und zieht das Gebiss, den Darm und die andern Eingeweide aus der Schale heraus. Von dem Gebiss schneidet man den Darm ab und legt es dann sammt der entleerten Schale einige Stunden in Süsswasser, darauf einige Stunden in starken Weingeist und endlich an einen schattigen und zugigen Platz zum Trocknen. Die Därme verdienen in Spiritus oder getrocknet aufbewahrt zu werden, da sie oft reichlich mit Foraminiferen und Diatomeen angefüllt sind.

Die getrockneten Seeigel werden sorgfältig verpackt, damit sie unbeschädigt bleiben. Das Gebiss wird mit Seidenpapier umwickelt und in den

Schalenraum gesteckt oder mit der Schale in eine Schachtel gelegt. Seeigel mit langen leicht zerbrechlichen Schalen schlage man in Seidenpapier und lege sie dann in einen Kasten, der mit Watte oder einem andern elastisch-weichem Stoffe ausgepolstert worden. Je vollkommener die Stacheln erhalten sind, je mehr Werth hat der Seeigel.

Soll eine grössere Zahl von Seesternen, Schlangensterne oder Haarsterne in einem Spiritusgefäss aufbewahrt werden, so lege man Scheiben von weichem Zeug oder Papier zwischen sie, damit sie sich nicht gegenseitig zerreiben. Um die Eingeweide grosser Seewalzen, Seeigel und Seesterne recht gut zu conserviren, treibe man durch eine Spritze Spiritus in ihre Leibeshöhle.

Ausser den Seeigeln kann man auch Seesterne, Schlangensterne und Haarsterne trocknen. Man lege sie kurze Zeit in Süsswasser, dann einige Stunden in Alkohol und darauf trockne man sie in Zugluft im Schatten.

Um die trocknen Echinodermen besser vor dem Verbleichen, von Fäulniss, Feuchtigkeit, Schmutz und Insectenfrass zu schützen, kann man sie mit demselben Firniss bestreichen, der bei den Crustaceen angeführt worden ist. Die einzelnen trocknen Echinodermen werden nicht unmittelbar in Watte gewickelt, sondern zunächst in Seidenpapier, weil die Wattenfasern später schwer ohne Stachelbrüche entfernt werden können.

Wenn prächtig gefärbte Echinodermen nicht nach dem Leben gemalt werden können, so mache man Notizen über ihre Farben.

Beim Einsammeln von Seewalzen sei man achtsam auf Fischchen (Fierasfer), die in ihrem Innern (in dem baumförmigen Athemorganen) wohnen. Auf Seeigeln trifft man zuweilen kleine Schnecken an (Stylifer), auf Seesternen kleine Krustenthiere. Solche Schmarotzer bringe man mit ihren Wirthen in eine Gefäss, sammle sie aber auch für sich allein und schreibe auf, woher man sie nahm.

Polypen- und Quallenthier, Coelenterata.

Die einfachen Weichpolypen, welche Seerosen oder Aktinien heissen, kommen vor bis an die Grenze des Hochwasserstandes; man kann sie daher bei Ebbe auf dem trockenliegenden Meeresboden aufsuchen. Besonders beliebte Wohnplätze derselben sind Vertiefungen, in denen etwas Wasser zurückgeblieben ist. Hier findet man oft auch zarte baumförmige Polypen, die von Nichtkennern leicht für farblose Pflanzen mit kleinen Früchten gehalten werden. Solche Polypen siedeln sich gern auch an dem Pfahlwerk der Häfen an. Man erhält sie leicht mit dem Schraper. Dieser ist weiter unten beschrieben.

Für Aktinien, Seefedern, Hornkorallen (mit biegsamen Zweigen) und Kalkkorallen grösserer Tiefen wirft man das Schleppnetz oder den Quastenschlepper aus. Ausgezeichnete Fundstätten für Korallen sind die Korallenriffe. Hier sammle man nicht nur die grösseren Arten, sondern achte auch auf die kleineren, welche nur aus einem Thier bestehen, oder aus einem Hauptthier mit Knospen.

Um die Korallen recht schön weiss zu erhalten, setzt man sie (nach Dr. Gräffe's Erfahrungen) zwei Tage in Süsswasser, am besten in fliessendes, damit der weiche Ueberzug abfällt. Diesen entfernt man durch wiederholtes Auf- und Niedertauchen und Schlagen auf das Wasser vollständig. Mangelt das Süsswasser, so lässt man die Korallenthier in der Luft absterben und reinigt die Kalkmasse dann in Seewasser. Zur Entfernung des Salzes ist

zuletzt wenigstens ein längeres Eintauchen in Süsswasser erforderlich. Dies kann jedoch auch später nach dem Trocknen noch nachgeholt werden. Trocknet man Korallen mit ihrem weichen Ueberzuge in der Luft, so werden sie bräunlich. Solche Stücke haben, wenn sie sonst nur wohl erhalten sind, auch wissenschaftlichen Werth.

Wenn man es möglich machen kann, so conservire man von jeder Korallenart auch kleine Exemplare oder Bruchstücke grösserer mit dem weichen Polypenüberzuge in starkem Spiritus (der mit etwas Chromsäure versetzt werden kann), damit später noch eine anatomische und mikroskopische Untersuchung der Korallenpolypen möglich ist. Wenn man mehrere Polypenzweige in ein Glas legt, so müssen sie durch weiche Umhüllungen vor gegenseitiger Reibung geschützt werden.

Wer Gelegenheit hat, ein Korallenriff genauer zu untersuchen, der notire die Lage, die Form, die Tiefe, den Untergrund, die Höhe unter der Oberfläche, die Wasserbewegung, die Temperatur und den Salzgehalt des Wassers. Ueber Korallenriffe findet man ausführliches in der Schrift: *Corals and Coral Islands* by James D. Dana, London 1872. (Mit Karten und vielen Abbildungen.)

Aktinien in einem ausgedehnten Zustande zu conserviren gelingt schwer. Wenn man sie fängt, ziehen sie sich zu schleimigen Klumpen zusammen. Um sie zur Entfaltung zu bringen, setze man sie in ein Gefäss mit Seewasser. Haben sie sich ausgedehnt, so tödte man sie durch allmäligen Zusatz von Süsswasser oder Weingeist. So gelingt es manchmal, sie im ausgedehnten Zustande todt zu erhalten. Sie werden in starkem Spiritus oder in Lösungen von doppeltchromsaurem Kali aufbewahrt. Notizen über ihre Lebensfarben, noch besser Farbenbilder sind erwünscht.

Alle zarten Weichpolypen, wie auch Seefedern und Seenieren werden in starkem Spiritus aufbewahrt.

Grössere Quallen und Schwimmpolypen (Siphonophoren) fängt man mit Siebschöpfern, kleinere mit Schwebenetzen. Diese Instrumente sind weiter hinten beschrieben. Die kleineren (bis 5 Cm. Durchmesser ungefähr), kann man in einer 5 bis 7procentigen Lösung von doppeltchromsaurem Kali aufbewahren. Sehr kleine, bis 2 Mm. grosse, lege man in ein Uhrglas mit wenig Seewasser und übergiesse sie dann (nach F. E. Schulze) mit einer 1procentigen Lösung von Osmiumsäure, um sie rasch zu tödten und alle zarten Weichtheile gut zu erhalten. Nach einigen Minuten schütte man sie in reines Wasser und übertrage sie aus diesem in Spiritus von wenigstens 60 Procent. In Ermangelung von Osmiumsäure conservire man auch die kleinen Quallen in starkem Spiritus oder in doppeltchromsaurem Kali. Grössere Quallen und Schwimmpolypen lassen sich dadurch conserviren, dass man sie lebend in unverdünnten Spiritus wirft, welchen man nach einigen Stunden abgiesst und durch neuen ersetzt. Dies wiederholt man drei bis viermal. Auf diese Weise zieht man alles Wasser aus ihrem Körper; sie werden zwar bedeutend kleiner und derber, behalten aber ihre Form. L. Martin empfiehlt, Alaunlösung mit dem Spiritus für Quallen zu mischen, um die Farbe derselben zu erhalten. Derartig behandelte Quallen werden am besten einzeln in einem Gefässe aufbewahrt, welches ganz mit Spiritus angefüllt ist. Bringt man mehrere in ein Gefäss, so müssen sie durch Scheiben von Zeug oder Papier getrennt werden. Dann schichte man aber das Gefäss ganz voll, damit die zarten Thiere nicht durch Schütteln zerstört werden.

In süssem Wasser und im Brackwasser kommen kleine Weich-

polypen an Pflanzen, Steinen und Holzwerk vor. Um sie zu gewinnen, bringe man Wasserpflanzen in Glashäfen mit Wasser; auch schrape man das Pfahlwerk, die Quaimauern, Steine und Felsen in Flüssen und Flussmündungen ab. Häfen in den Flussmündungen werden oft eine recht gute Ausbeute liefern. Die Süss- und Brackwasserpolyphen conservirt man ebenso wie die kleinen Quallen.

Moosthierchen, Bryozoa.

Diese Thiere bilden oft feine Ueberzüge auf Seepflanzen, Muscheln, Steinen und anderen Gegenständen. Manche sind blattartige Colonien, andere haben die Form von Bäumchen. Es giebt biegsame und harte kalkige Moosthiere. Man wird sie oft mit Polypen zusammen im Schleppnetz finden. Alle zarteren bewahre man mit ihrer Unterlage in gutem Spiritus auf. Nur die grösseren kalkigen Arten eignen sich zum Trocknen, nachdem sie vorher in Süsswasser gelegen. Von den getrockneten Arten conservire man stets kleine Exemplare oder Bruchstücke in starkem Spiritus. Bryozöen*) kommen auch im süssen Wasser auf Wasserpflanzen und anderen Unterlagen vor.

Schwämme, Spongiae.

Die Schwämme sind festsitzende Thiere, welche von Nichtkennern leicht für Pflanzen gehalten werden. Sie unterscheiden sich jedoch durch ihre mehr massigen Formen und durch ihre Farbe von den Seepflanzen; sie sind grau, weiss, bräunlich, gelb, roth, blau oder schwärzlich. Sie sitzen an Seepflanzen, an Klippen, auf Steinen, an Holzwerk, auf Muscheln, Schnecken und hartschaligen Krebsen. Manche siedeln sich sogar in den Kalkschalen der Muschel an und ragen aus den Höhlungen, die sie selbst darin verursachen, nur wenig über die Oberfläche der Muschelschale hervor.

Die flachwohnenden gewinnt man bei Ebbe wie Krebse, Würmer und andere Seethiere; die tiefer lebenden mit Schrapern und Schleppnetzen.

Man bewahrt sie am besten in starkem Spiritus auf. Verschiedene Arten darf man nur dann in ein Gefäss setzen, nachdem man jede besonders eingewickelt hat, damit die mikroskopischen Kalk- oder Kieselkörper der einen Art nicht in die andere gerathen.

Will man sie trocknen, so lege man sie vorher einige Stunden in Süsswasser.

Wurzelfüssler, Rhizopoda.

In dem Sande des Strandes kommen, besonders in wärmeren Gegenden, Schalen von Wurzelfüsslern vor, welche Foraminiferen heissen, weil Poren in der Schale sind. Um sie in dem Sande zu entdecken, bringe man eine Handvoll desselben auf eine dunkle Unterlage. Sie haben die verschiedensten Formen; sie ähneln Schneckenhäusern, Kugeln, Walzen, Scheiben, Sternen und anderen Dingen. Die meisten sind kaum einen oder einige Millimeter gross. Lebendig kriechen sie mittels Schleimfäden (Sarkodefäden), die aus

---

*) Die Bryozöen stehen ihres vollkommenen inneren Baues wegen den Würmern näher, als den Polypen und Quallen. In einer praktischen Anweisung zum Sammeln von Seethieren folgen sie am passendsten auf diese.

den Poren der Schale hervorkommen, am Meeresboden auf Pflanzen, Steinen, Polypen und anderen Thieren.

Wenn der Küstensand reich ist an Wurzelfüsslerschalen, so entfernt man durch Siebe die größeren Theile desselben, trocknet die feine Masse gut und bringt sie dann in Schachteln, Flaschen oder Büchsen.

Vom Meeresboden werden die Wurzelfüssler mit Schleppnetzen oder Schrapern heraufgeholt.

Will man sie lebend beobachten, so bringe man kleine Portionen der heraufgebrachten Masse in Schüsseln oder klare Glashäfen und giesse Seewasser darauf. Nach einiger Zeit werden vorhandene Wurzelfüssler an der Oberfläche des Schlammes oder an der Gefässwand erscheinen.

Will man sich die Schalen der Wurzelfüssler aus dem Schlamm verschaffen, so breite man diesen in flachen Gefässen oder auf Papier zum Trocknen aus. Die gut getrocknete Masse wirft man in ein Gefäss, das mit Süsswasser gefüllt ist. Die Schlammtheile sinken unter, aber die Schalen der Wurzelfüssler steigen an die Oberfläche, weil sich ihre Höhlungen beim Trocknen mit Luft anfüllen. Mit einem kleinen Mullnetz oder einem kleinen gestielten Sieb schöpft man sie ab, trocknet sie und bringt sie dann in Röhrengläser oder andere Gefässe. Ebenso kann man auch verfahren mit foraminiferenhaltigem Sande des Strandes.

Bei den Echinodermen habe ich schon mitgetheilt, dass ihre Därme nicht selten Foraminiferenschalen enthalten. Gleiches gilt auch von dem Darne schlammfressender Würmer.

Ausser den kalkschaligen kriechenden Wurzelfüsslern giebt es noch schwimmende, von denen viele Arten Skelete von Kieselsäure in ihrem weichen Körper tragen. Sie heissen Radiolarien. Man fängt sie mit Schwebnetzen wie die Copepoden und kleinen Quallen, bringt sie aus dem Seewasser entweder unmittelbar in starken Spiritus oder übergiesst sie vorher auf wenige Minuten mit $\frac{1}{3}$ procentiger Osmiumsäure.

Sehr kleine Wurzelfüssler sucht man mit Mikroskopen an Pflanzentheilen und Polypenzweigen oder zwischen Bodenbestandtheilen, wie man Infusorien und andere mikroskopische Thiere aufsucht.

Die Werkzeuge zum Fangen der wirbellosen Seethiere.

Das wichtigste Werkzeug zum Fangen wirbelloser Thiere, die am Meeresboden leben, ist das Schleppnetz. Es besteht aus einem rechteckigen Eisenrahmen, dessen längere Seiten für grössere Tiefen 1 Meter, die kürzeren 25 Cm. lang genommen werden können. Die Langseiten sind divergirende Schneiden von 5 Cm. Breite, die Kurzseiten bestehen aus Rundeisen von 2,5 bis 3 Cm. Durchmesser. Für geringere Tiefen kann der Netzrahmen etwas kleiner und leichter sein.

Fig. 1.

An der innern Seite der Schneiden ist eine Reihe Löcher, eines von dem anderen 1,5 Cm. weit entfernt. In diesen Löchern und an den seitlichen Rundeisen des Rahmens wird der Netzbeutel durch starkes Netzgarn oder durch

dünnen Kupferdraht befestigt. Der Beutel ist ungefähr $1\frac{1}{2}$ mal so lang wie breit. Er wird aus grobem Stramin (Canavas), einem zu Stickereien ge-

brauchten Baumwollengewebe, genäht. Fischernetze, selbst sehr engmaschige, sind dazu weniger passend, weil sie feinen Sand und Schlamm nicht halten. Ein solcher Straminbeutel ist ziemlich dauerhaft, wenn er nach dem Gebrauch immer gut ausgespült und getrocknet wird. Zum Schutz gegen steinigen Grund und gegen zu schwere Füllungen kann man ihn mit einem weitmaschigen dicht anschliessenden Beutel von starkem Netzgarn umgeben. An den runden Seitenstücken des Rahmens sitzen zwei bewegliche Schenkel, welche ungefähr $\frac{3}{4}$ so lang sind wie die Schneiden. Das Zugthau wird an einem Schenkel unmittelbar befestigt, mit dem anderen wird es durch eine kurze dünne Leine in Verbindung gesetzt. Bricht diese, wenn das Netz hinter einen schweren Stein geräth, so wird es sich in den meisten Fällen leichter aufziehen lassen, als wenn das Zugtau an beiden Schenkeln gleich festliegt. Die ungleiche Befestigung des Tauwerks an den eisernen Schenkeln des Netzrahmens kann auch so geschehen, wie Figur 2 darstellt.

Fig. 2.

Fig. 3.

Beim Schleppen auf geringen Tiefen lässt man ungefähr doppelt so viel Tau aus, als die Tiefe beträgt, damit das Netz in den Boden eingreifen kann. Wenn man grössere Tiefen befischt, so ist es zweckmässig, einige Faden vor dem Netz Gewichte von 25 bis zu 100 Pfund zu befestigen. Auf sehr grossen Tiefen kann man dadurch Tau sparen, dass man schwere Gewichte mehrere hundert Meter vor dem Netze anbindet. Diese Gewichte ziehen das Tau fast senkrecht nieder, und wenn das Schiff vorwärts geht, wird das Netz von dem Gewichte fortgezogen.

Auf geringen Tiefen fischt man von einem Boote aus, welches durch Ruder oder Segel langsam fortbewegt wird. Von grösseren Segel- oder Dampfschiffen aus kann nur gefischt werden, wenn sie in ganz langsamer Bewegung sind. Auf den Ost- und Nordsee-Expeditionen in den Jahren 1871 und 1872 warfen wir das Schleppnetz entweder vom Hintertheil oder von der Backbordseite hinter dem Radkasten in's Meer, während das Schiff (der Avisodampfer Pommerania) mit dem Winde trieb. Es schleppte gewöhnlich eine Viertelstunde am Grunde. Während dessen liess ein kundiger Mann seine Hand an dem Tau, um sofort zu fühlen, ob das Netz festgehalten werde. Bleibt das Netz in grossen Tiefen hängen, so fühlt man es nicht.

Capt. Boardsley, der Commandant der Blue Light, des Dampfers der nordamerikanischen Meeruntersuchungscommission hat (1873) eine zweckmässige Einrichtung angewendet, um Schleppnetzverlusten vorzubeugen (s. Fig. 3). Er liess das letzte Stück des ausgelassenen Netztaues *N* durch ein dünneres Tau *S* mit dem Bordrand verbinden. Bleibt das Schleppnetz am Grunde hängen, so reisst zunächst das Sicherheitstau *S*, und der Knall, mit dem dies geschieht, veranlasst sofort den Commandanten des Schiffes und die Mannschaft, welche das Netz bedient, zur Rettung desselben das Nöthige zu thun.

Hat man einen Schraubendampfer, so werfe man das Schleppnetz vom Vordertheile aus und gehe während des Schleppens langsam rückwärts, um sofort kräftig vorwärts laufen zu können, sobald das Netz am Grunde festgehalten wird.

Fig. 4.

Da das Aufholen des Schleppnetzes mit den Händen sehr anstrengend und zeitraubend ist, so wendeten wir auf der Pommerania dazu eine kleine Dampfwinde an, die von dem grossen Dampfkessel aus gespeist wurde. Sie brauchte z. B. nur 24 Minuten, um das gefüllte Netz im Skagerak aus 294 Faden Tiefe heraufzuholen.

Der Inhalt des aufgezogenen Netzes wird entweder mit einem Mal in ein flaches Fass entleert oder in kleineren Portionen herausgenommen und sorgfältig durchsucht. Besteht er aus Schlick, feinem

Fig. 5.

Sand, Muschelbrocken oder todtten zerfallenen Pflanzen, so muss man Siebe anwenden, um verborgene Thiere blosszulegen. Die käuflichen Haarsiebe sind dazu schon recht brauchbar; besser jedoch sind Siebe von feinem Messingdraht mit zwei Griffen (deren Form Fig. 4 zeigt), welche ein bequemes Auf- und Niedertauchen zum Durchspülen der feinen Grundmassen gestatten. Werden drei Siebe in einander gesetzt, von denen das unterste Oeffnungen von 1 Mm. Weite hat, das mittlere von 4 Mm. und das oberste von 8—10 Mm., so erhält man die Thiere nach 3 verschiedenen Grössen sortirt. Fischt man bei ruhigem Wetter von einem Boote aus, so können die Siebe im freien Wasser auf- und niedergetaucht werden. Die Siebe in horizontaler Haltung zu drehen, ist unzweckmässig, weil zarte Thiere dadurch geschuert werden. Auf Schiffen siebt man in flachen Fässern (Baljen).

Aus den Sieben nimmt man die kleineren Thiere mit Hornlöffeln, löffelförmig angeschnittenen Federposen, kleinen Haarpinseln oder mit Pincetten von Neusilber, Messing oder Horn, welche auf See den stählernen vorzuziehen sind.

Einen Theil der nicht gesiebten Bodenmasse bringt man in Schüsseln mit etwas Wasser, um kleinen Thieren Gelegenheit zu geben, aus derselben hervorzukriechen und sich im klaren Wasser zu zeigen.

Zum Fangen von Seesternen, Seeigeln, Korallen, kleinen Krustenthieren u. dgl. sind ausser den Schleppnetzen auch grosse Hanfquasten sehr

geeignet. Die nordamerikanischen Seeforscher brauchen einen Quastenschlepper von der Fig. 5 abgebildeten Form. An einer eisernen Stange von 1 M. Länge mit reifenförmigen Läufern von 20—25 Cm. Durchmesser hängen Ketten mit 3 bis 6 Reihen Hanfquasten. Die englischen Tiefseeforscher befestigten Hanfquasten an einer Querstange am Hinterende des Schleppnetzbeutels.

Zum Abkratzen des Pfahlwerks der Häfen, der Quaimauern, der Schiffskiele und der Klippen ist der Schrapper, das Fig. 6 abgebildete Instrument, recht zweckmässig. Es besteht aus einer Schneide von 20—25 Cm. Länge und einem Bogen von 15—18 Cm. Höhe. Schräg aufwärts von dem höchsten Punkte des Bogens läuft eine Hülse für eine Stange. Am Hinterende werden Löcher in die Schneide und den Bogen geschlagen, durch welche man einen Straminbeutel anheftet. Dieser Schrapper lässt sich auch anwenden, um Muscheln und Würmer auf flachen Gründen auszugraben.

Fig. 6.

Fig. 7.

Schwimmende Thiere werden mit Schwebnetzen, Fig. 7, gefangen. Diese bestehen aus einem Beutel von Mull, der an einem Ringe von starkem Messingdraht befestigt ist. Der Ring hat ungefähr 25 Cm. Durchmesser und der Beutel ist 35—40 Cm. lang. Von dem Ringe gehen gleichweit von einander drei Aufhängeleinen aus; wo diese zusammenlaufen, wird das Zugtau angesetzt. (Siehe auch Seite 416.)

Das Schwebnetz darf nur bei ganz langsamer Fahrt des Fahrzeuges ausgehängt werden, weil starker Wasserdruck sowohl das Netz als auch die gefangenen Thiere zerstört. Liegt das Fahrzeug vor Anker, so kann man das Schwebnetz aushängen, sobald das Wasser vorüberströmt. Hat man mehrere Schwebnetze, so hänge man sie an einem Tau, das durch ein Loth beschwert ist, in Abständen von mehreren Metern unter einander auf, um nicht bloss an der Oberfläche, sondern auch in tieferen Wasserschichten schwimmende Thiere zu fangen.

Wenn das Schwebnetz 5, 10 oder 15 Minuten im Wasser gewesen ist, zieht man es heraus. Eine Schüssel oder ein Glashafen mit Seewasser steht schon bereit. Der Netzbeutel wird umgestülpt und in diesem Wasser abgespült. Die kleinen gefangenen Thiere hebt man mit einer Glasröhre aus dem Wasser, deren obere Oeffnung man mit einem Finger geschlossen hält, bis das untere Ende über dem einzufangenden Thiere steht. Oeffnet man nun oben, so führt das Wasser sammt dem Thierchen hinein; schliesst man darauf die obere Oeffnung mit dem Finger wieder zu, so kann man den ganzen Inhalt der Röhre in ein kleines Gefäss (in ein Uhrglas z. B.) übertragen.

Schneller gewinnt man die kleinen Thiere, wenn man das Spülwasser der Schwebnetze durch einen kleinen Durchschlag von Mull oder sehr feinem Messingdrahtgewebe giesst, Fig. 8.

Ausser den aufzuhängenden Schwebnetzen wendet man zum Fangen kleiner schwimmender Thiere auch noch Käscher von Mull an. Sie unterscheiden sich von dem beschriebenen Schwebnetz nur dadurch, dass ihr Ring an einer Stange befestigt ist, mittels welcher das Netz vom Boot, vom Ufer oder von einer Brücke aus durch das Wasser gezogen werden kann.

Fig. 8.

Man fische mit Mullnetzen nicht blos bei Tage, sondern auch am Abend und bei Nacht, da viele Thiere gerade während der Dunkelheit aus der Tiefe in die Höhe steigen, besonders bei ruhigem und warmem Wetter.

Weil zarte Thiere schon durch den geringsten Druck gegen den Netzbeutel verletzt werden, so gebrauche man zum Einfangen von Thieren, die an der Oberfläche schwimmen, auch noch Glasgefässe und durchschlagartige Schöpfer von der Form des oben Fig. 8 abgebildeten Durchschlags. Sie bestehen aus einem Messingring von 10, 15 oder 20 Cm. Durchmesser mit Stielhülse und aus einem Boden von Messingdrahtgewebe. Solche Schöpfer sind sehr geeignet, Quallen, Schwimmpolypen, Tunicaten und andere zarte Thiere aus dem Wasser zu heben.

Während der Fahrt kann man kleine Thiere, die in der Oberflächenschicht schwimmen, dadurch fangen, dass man Wasser aufpumpt und in einen Mullbeutel fallen lässt, der in einem Eimer hängt.

Wo das Schiff vor Anker liegt, kann man Aalkörbe oder andere korbformige Fanggeräthe mit Köder auf den Grund senken, um darin grössere Krebse, Schnecken und Stachelhäuter zu fangen.

Beim Aufziehen des Ankers achte man auf das, was an der Kette und an dem Anker hängt. Auch fange man schwimmende Pflanzen, schwimmendes Holz u. dgl. ein, weil solche Dinge häufig von Thieren besetzt sind.

Um da, wo das Meerwasser ganz klar ist, einen Blick auf den Grund zu thun, kann man ein Geräth anwenden, dessen sich die griechischen Schwammfischer bedienen. Es ist ein Cylinder von Zinkblech, 45 Cm. lang und 30 Cm. weit, mit einem Glasboden. Man drückt die untere Hälfte desselben in das Wasser und blickt dann durch das Glas in die Tiefe. Auf diese Weise erhält man Bilder von dem Meeresboden, welche durch die Unruhe der Oberfläche nicht verzerrt werden.

Das Conserviren der wirbellosen Seethiere.

Gefässe.

Ehe die Seethiere zur Versendung verpackt werden, muss man sie durch Einlegen in Spiritus entwässern. Dies geschieht am bequemsten in Standgläsern mit weitem Halse und gut eingeschliffenem Glasstöpsel. Zwei cylindrische Standgefässe von 40 Cm. Höhe und 25 Cm. Durchmesser, zwei von 30 Cm. Höhe und 20 Cm. Durchmesser und 20 Gefässe von 20 Cm. Höhe bei 15 bis 4 Cm. herab reichen aus zur Entwässerung einer ziemlich grossen Menge gleichzeitig gefangener Thiere von verschiedenen Formen und Grössen. Um diese Gefässe sicher zu transportiren, lässt man Kisten für sie anfertigen, in welchen jedes Glas in durchlöchernten Brettern an seinem Platze festgehalten wird. Von den grossen Gläsern kommen nur 4 Stück in eine Kiste, von den kleineren mehr.

Die genügend entwässerten Thiere verpacke man in Blechkisten, über-

giesse sie mit 50—60procentigem Spiritus und löthe dann den Deckel luftdicht auf.

Für das Entwässern kleiner Thiere können Röhrengläser mit guten Korkstöpseln dienen, die man in Gestellen mit durchlöchernten Brettern aufstellt. Solche Röhrengläser sind auch sehr empfehlenswerth zur Versendung kleinerer zarter Thiere.

Man rüste sich daher mit einer grösseren Menge solcher Röhrengläser von drei verschiedenen Längen aus, von 10 Cm., 15 Cm. und 20 Cm. Länge. Die Durchmesser können dabei sehr verschieden sein, etwa von 1 bis 3 Cm. Damit der Kork recht fest schliesst, lässt man die Röhren unter der Oeffnung ein wenig verengen (Fig. 9). Die Dicke der Glaswand beträgt ungefähr 1 Mm. Ist eine grössere Zahl solcher Röhrengläser mit entwässerten Thieren gefüllt, so kann man sie mit einem weichen Stoffe umwickeln und dicht aneinander in einen Blechkasten legen, der zugelöthet wird, nachdem das Zeug mit starkem Spiritus getränkt worden ist. Die Etiketten werden mit Bleistift auf Papier geschrieben und in die Röhrengläser mit eingeschlossen. Will man Thiere in Standgläsern versenden, welche mit Glasstöpseln verschlossen sind, so überbinde man sie mit Schweinsblase, welche vorher in Wasser gelegen hat. Beim Trocknen klebt sie so dicht an, dass sie das Verdunsten des Spiritus verhindert.

Fig. 9.

Conservirungsflüssigkeiten.

Die brauchbarste Conservirungsflüssigkeit ist starker Weingeist. Man vermischt ihn nicht mit Wasser, weil alle Wasserthiere sehr viel Wasser enthalten. Setzt man mit einem Mal eine grössere Menge Seethiere in ein beschränktes Maass von Spiritus, so muss man wenigstens nach 12—24 Stunden den durch das Wasser der Thiere sehr gewässerten Weingeist durch neuen stärkeren ersetzen. Schwächer als 50 p. C. darf er nicht werden, wenn die Eingeweide der Thiere nicht verderben sollen. Zum Messen des Spiritus wendet man die käuflichen Alkoholometer an.

Aus grossen mit Thieren angefüllten Gefässen ziehe man den stark gewässerten Weingeist durch einen Heber von Glas, Blech oder Kautschuk ab, dessen einer Schenkel bis an den Boden des Gefässes reicht, weil gerade am Boden die wasserreichste, schwerste Flüssigkeitsschicht steht. Dringend empfehle ich allen Seethiersammlern, die baldige Entfernung des stark gewässerten Weingeistes und die Ersetzung desselben durch gut conservirenden Weingeist nicht zu versäumen, damit die Weichtheile ihrer Thiere für anatomische und histologische Untersuchungen tauglich bleiben. Sehr wasserreiche weiche Seethiere, wie z. B. Quallen, muss man mehrmals nach einander in neuen unverdünnten Spiritus setzen, wenn sie gut bleiben sollen.

L. Martin empfiehlt in seiner Praxis der Naturgeschichte (Weimar 1870) eine Auflösung von 1 Gewichtstheil Alaun in 30 Gewichtstheilen Wasser mit dem Weingeist zu mischen, damit sich die Farben der Wasserthiere besser erhalten, als in reinem Spiritus. Solcher Alaunspiritus darf jedoch nicht für Thiere mit Knochen oder Kalkschalen angewendet werden, weil er den Kalk auflöst; es sei denn, dass man blos die äusseren Formen und Farben möglichst gut erhalten will.

Kleine Quallen, schalenlose kleine Mollusken und kleine Würmer lassen sich für spätere mikroskopische Untersuchungen ihrer Gewebe auch recht gut in einer 5—7procentigen Lösung von doppelt chromsaurem Kali

conserviren. Man sehe nur zu, dass die Lösung nicht zu sehr durch das Wasser verdünnt wird, welches die eingesetzten Thiere abgeben, und verstärke sie wieder, wenn dies geschehen sein sollte.

Alle übrigen sonst noch zur Anwendung gekommenen Conservirungsflüssigkeiten haben weniger allgemeinen Werth.

In Goadby's Liqueur behalten wohl zarte kalkfreie Wasserthiere Jahre lang ihre Form; sie werden aber brüchig und zu mikroskopischen Untersuchungen taugen sie wenig oder gar nichts. Ich kann ihn deshalb nicht empfehlen. Man bereitet ihn aus 140 Gramm Seesalz, 70 Gr. Alaun und 0,3 Gr. Quecksilbersublimat, welche in 2,5 Kgr. Wasser gelöst und filtrirt werden.

Osmiumsäure, in 1procentiger und $\frac{1}{2}$ procentiger Lösung, kann man anwenden, um sehr kleine zarte Seethiere für mikroskopische Untersuchungen zu conserviren. Sie werden mit der Säurelösung, nachdem sie sich in einer kleinen Menge Wasser ausgedehnt haben, plötzlich übergossen, aber schon nach einigen Minuten in reines Wasser gelegt und bald darauf in Weingeist von ungefähr 60 Grad gebracht. (Vgl. oben S. 424, wo von der Conservirung der Quallen gesprochen wird.) Man hüte sich die schädlichen Dämpfe der Osmiumsäure einzuathmen.

Einige allgemeine Regeln.

Wo Thiere in grossen Schaaren auftreten, wo sie ungewöhnliche Färbungen des Wassers oder das Leuchten des Meeres verursachen, da untersuche man die Temperatur, die Strömung, den Salzgehalt und andere begleitende Erscheinungen.

Denke niemals: hier brauche ich kein Netz auszuwerfen, denn hier ist doch nichts zu fangen, sondern mache überall, wo sich Zeit und Gelegenheit dazu bietet, einen Versuch.

Verachte das Unscheinbare nicht; es kann ein sehr seltenes und sehr gesuchtes Thier sein.

Wirf nichts fort, ehe du nicht sicher überzeugt bist, dass es wirklich werthlos ist.

Wenn viele Exemplare einer Art leicht zu erlangen und gut zu conserviren sind, so nimm viele mit. Vielleicht ist es eine Art, die noch kein Museum besitzt.

Schiebe die schriftlichen Aufzeichnungen nicht auf, sondern mache sie während der Beobachtung oder doch sehr bald nachher.

Bringe an den Thieren oder an ihren Aufbewahrungsgefässen dauerhafte Zettel an, auf denen Ort und Zeit des Fanges vermerkt sind. Pergamentabfälle sind zu solchen Zetteln sehr geeignet. Wenn die Thiere keinen Ursprungszettel haben, so sind sie weniger werth.

Conservire und verpacke mit grosser Sorgfalt, damit die Arbeit des Sammelns nicht umsonst gewesen ist, wenn die Thiere zu Hause ankommen. Die trocknen schütze vor Feuchtigkeit und Insectenfrass; die in Weingeist conservirten vor Verwässerung und Verdunstung des Weingeistes und vor dem Bruch der Gefässe. Alle farbigen Thiere schütze vor Licht.

Die Fanggeräte bewahre nach dem Gebrauch rein und trocken auf.

Gliederthiere.

Von

A. Gerstaecker.

Man fasst unter diesem Namen diejenigen Thiere zusammen, welche gemeinhin als Insecten (Käfer, Schmetterlinge, Heuschrecken, Libellen, Bienen, Wespen, Fliegen u. A.), Spinnen, Skorpione, Krebs- und Krustenthiere, Asseln, Tausendfüsse (Skolopender) u. s. w. bezeichnet werden, und welche darin mit einander übereinstimmen, dass ihre bald nachgiebige, bald mehr oder weniger erhärtete und selbst bis zur Brüchigkeit starre Körperhaut (als äusseres oder Hautskelet bezeichnet) eine durch quer gegen die Längsachse gerichtete Einkerbungen hervorgerufene Gliederung wahrnehmen lässt, so dass der Körper äusserlich aus einer grösseren Anzahl in der Richtung von vorn nach hinten aufeinander folgender Ringe (Segmente) zu bestehen scheint. Diese Ringe können in sehr grosser (bis 100 und darüber), wie bei den Tausendfüsslern, oder in ungleich geringerer Anzahl (13 oder weniger), wie bei den meisten Insecten, vorhanden und ebenso oft an allen Theilen des Körpers von annähernd gleicher Form und Grösse, wie in beider Hinsicht sehr verschieden gestaltet sein. Im letzteren Fall verschmelzen sehr häufig je mehrere aufeinanderfolgende dieser Ringe zu mehr oder weniger deutlich geschiedenen, d. h. durch tiefere Einkerbungen von einander getrennten Körperabschnitten, von denen man z. B. bei jedem Insect den vordersten, welcher mit den Augen und Fühlhörnern versehen ist, den Kopf, den mittleren, welcher unterhalb die drei Beinpaare und oberhalb (in der Regel) die Flügel trägt, den Brustkasten (Thorax), den hintersten endlich, welcher die Gliederung am deutlichsten zur Schau trägt, den Hinterleib (Bauch) nennt. Bei den Spinnen werden durch Verschmelzung mehrerer solcher Körperringe nur zwei Hauptabschnitte: ein vorderer, mit Beinen versehener (Brustkasten) und ein hinterer, derselben entbehrender hergestellt; bei den Skorpionen dagegen lässt jeder dieser Abschnitte die ihn zusammensetzenden Körperringe noch deutlich erkennen, doch sind sie hier durch verschiedene Breite (Rumpf- und Schwanztheil) unterschieden. Bei einem Krebs (z. B. dem Flusskrebs) existiren zwei ähnliche Hauptabschnitte, an deren vorderem (Brustpanzer) die Einzelringe mit einander verschmolzen sind, während sie an dem hinteren (Krebsschwanz) getrennt geblieben sind.

Gliederthiere finden sich überall, so weit organisches Leben überhaupt reicht, und zwar sowohl der Arten- wie der Individuenzahl nach ungleich häufiger als irgend eine andere Abtheilung des Thierreiches vertreten; sie erstrecken sich durch alle Zonen hindurch bis zum äussersten Norden, in verticaler Richtung bis auf die höchsten Gipfel der Gebirge (in Europa bis über 9000', in den Tropen noch bei weitem höher) und bis in sehr beträchtliche Tiefen des Meeres (Krebsthiere). Auch unter den dem Festlande eigenthümlichen giebt es zahlreiche, welche stehendes und fliessendes Wasser bewohnen.

Die, wie es scheint, unerschöpfliche Zahl der theils ansehnlich grossen, theils bis zu mikroskopischer Kleinheit herabgehenden Gliederthiere — man kennt deren bereits gegenwärtig über 250,000 Arten, also mehr denn zehnmal so viel als Wirbelthiere — lässt es selbst für den praktischen Zweck des Sammelns wünschenswerth, ja zur Orientirung unentbehrlich erscheinen, dieselben nach bestimmten äusseren Körpermerkmalen in systematische Abtheilungen höheren und niederen Ranges (Classen, Ordnungen, Familien u. s. w.) zu zerlegen. Solcher hat man zunächst nach den natürlichen Verwandtschaften der Einzelformen vier, mit dem Namen der „Classen“ belegt, abgesondert:

Classe 1. Insecten (Insecta, Hexapoda). Körper mehr oder weniger deutlich dreitheilig, aus Kopf, Brustkasten (Thorax) und Hinterleib bestehend. Der Kopf mit zwei seitlichen Netzaugen (häufig auch mit drei kleinen Punkt- oder Scheitelaugen), zwei Fühlhörnern (von sehr verschiedener Gestalt und Grösse) und mit Fress- oder Saugwerkzeugen (als Mundtheile, Kiefer, Zunge, Saugrüssel u. s. w. bezeichnet) versehen. Am Brustkasten unterhalb stets drei Beinpaare, oberhalb ausserdem sehr allgemein zwei Flügelpaare (zuweilen beide, zuweilen das hintere fehlend; das vordere in vielen Fällen zu harten, hornigen Deckschilden: Flügeldecken, Elytra umgestaltet) beweglich eingelenkt. Am Hinterleib niemals Beinpaare, wohl aber häufig faden-, zangen- oder säbelförmige Anhängsel an der äussersten Spitze, besonders zum Ablegen der Eier (seitens der Weibchen) dienend. (Diese Charakteristik bezieht sich nur auf die ausgebildeten (d. h. fortpflanzungsfähigen) Insecten, während bei den Larven (Maden, Raupen) stets die Flügel fehlen, der Körper häufig nicht dreitheilig, sondern linear und gleichmässig geringelt erscheint, und die Beine ebensowohl ganz fehlen wie zu mehr als drei Paaren vorhanden sein können.)

Classe 2. Spinnenthier (Arachnoidea). Körper nur zweitheilig oder (Milben) selbst ungetheilt. Der vordere Abschnitt (Cephalothorax, d. h. dem Kopf plus Thorax der Insecten entsprechend) stets nur mit einfachen (Punkt-)Augen in verschiedener Zahl versehen, der Fühlhörner entbehrend. An seiner Unterseite sind ausser Kiefern und Tastern vier Beinpaare beweglich eingelenkt; Flügel, wie bei den folgenden zwei Classen, stets fehlend. Der hintere Abschnitt (Bauch, Abdomen) bald sackförmig, ungegliedert (Spinnen), bald gegliedert und dann zuweilen (Skorpione) schwanzförmig verlängert. — Ausser den allgemein als „Spinnen“ bekannten Gliederthieren gehören hierzu die Skorpione, die Geisselskorpione (Taranteln), die Schneiderspinnen („Schneider“), die Milben, Zecken u. A.

Classe 3. Krebs- oder Krustenthier (Crustacea). Körper entweder deutlich zweitheilig (wie beim Flusskrebs, Hummer u. A.) und dann

aus einem ungegliederten Brustpanzer (Cephalothorax) und einem darauf folgenden, gegliederten Schwanztheil (Postabdomen) zusammengesetzt, oder (wie bei den Kellerasseln) aus einem Kopftheil und meist dreizehn auf ihn folgenden, fast gleich langen Körperringen bestehend. In beiden Fällen an allen Körperabschnitten (resp. Körperringen) unterhalb Beine eingelenkt, diese jedoch im Bereich der vorderen Hälfte grösser (Wandelbeine) und von denjenigen der hinteren auch in der Form verschieden. Am Kopftheil oder dem ihm entsprechenden Vorderende des Brustpanzers zwei seitliche (zuweilen auf beweglichen Stielen sitzende) Netzaugen und zwei Paar Fühlhörner. — Die meisten (mit Ausnahme vieler Asseln) im Wasser lebend und daher mit Kiemen athmend. Es gehören zu dieser Classe ausser den eigentlichen Süsswasser- und Seekrebsen (Krabben, Taschenkrebse, Einsiedlerkrebse, Hummer, Langusten, Garneelen u. s. w.) die Flohkrebse, die Asseln; ausserdem aber zahlreiche, bis zu mikroskopischer Kleinheit herabgehende See- und Süsswasserthierchen, wie die Hüpferlinge (Cyclops), Wasserflöhe (Daphnia) u. A.

Classe 4. Tausendfüssler (Myriopoda). Körper lang gestreckt, linear, aus einem Kopf und zahlreichen (zu 16, 20 bis 80 und selbst über 150 vorhandenen) fast gleichartigen Körperringen bestehend, von denen jedes entweder ein oder zwei Beinpaare trägt. Am Kopf ein Paar Fühler und meist zwei zusammengesetzte Augen oder Gruppen von Punktaugen. — Sie leben sämmtlich auf dem Lande. Die bekanntesten Formen sind die flachgedrückten Scolopondren und die drehrunden (cylindrischen) Tausendfüsse (Julus).

1. Die Insecten.

An ihrem zweiten Körperabschnitt (Brustkasten, Thorax) lassen sich drei Segmente nachweisen, von denen bei aller Verschiedenheit in Form und Grösse das vorderste (Prothorax) stets nur das erste Beinpaar, das mittlere und hintere (Meso- und Metathorax) je ein Bein- und ein Flügelpaar tragen. Am Mesothorax sind die Vorder-, am Metathorax die Hinterflügel eingelenkt.

Man theilt die Insecten gegenwärtig allgemein in sieben Ordnungen, welche einerseits auf die Verschiedenheiten in der Mundbildung, andererseits auf die Art der Verwandlung (Metamorphose) begründet sind. In ersterer Beziehung ist es allgemein bekannt, dass es neben kauenden (beissenden) Insecten, wie Käfer, Heuschrecken u. s. w. auch saugende giebt, welche, wie z. B. die Schmetterlinge, Fliegen, Wanzen u. A. sich nur von flüssigen Substanzen (Blüthensaft, Blut) ernähren. Bei beiden Kategorieen finden sich zwar die zur Nahrungsaufnahme dienenden Mundwerkzeuge in gleicher Zahl (sechs) und in ähnlicher gegenseitiger Lage vor; sie sind aber, ihrer verschiedenen Function entsprechend, in ihrer Form sehr auffallend und selbst bis zur Unkenntlichkeit von einander verschieden. In Bezug auf die Entwicklung der Insecten verdient erwähnt zu werden, dass die Mehrzahl in einer Form aus dem Ei hervorgeht, welche von derjenigen des ausgebildeten (fortpflanzungsfähigen) Individuums total verschieden ist und zur Umwandlung in letzteres eines Durchgangsstadiums (Puppe) bedarf. Diese erste (Jugend-) Form wird als „Larve“ bezeichnet und ist Jedem von den Schmetterlingen, wo sie gewöhnlich Raupe genannt wird, hinreichend bekannt. Eine solche formell verschiedene Larve, welche sich nach Erlangung ihrer vollen Grösse verpuppt, besitzen nun ausser den Schmetterlingen auch die Käfer, Fliegen,

Bienen, Wespen u. A., welche man aus diesem Grunde als Insecten mit Verwandlung (Metamorphose), *Insecta metabola* zusammenfasst. Ihnen gegenüber stehen die ametabolen Insecten, bei welchen eine derartige Verwandlung insofern fehlt, als das Individuum aus dem Ei sogleich in einer dem erwachsenen ähnlichen oder fast übereinstimmenden Form hervorgeht, nur dass es noch der Flügel und der Fortpflanzungsorgane entbehrt. Zu dieser Abtheilung gehören alle Wanzen, Cicaden, Heuschrecken, Grillen, Schaben, Libellen und Verwandte.

Uebersicht der Insecten-Ordnungen.

A. Kauende Insecten.

a) Ohne Metamorphose (ametabole).

1. Ordnung. Geradflügler (*Orthoptera*). Sie sind in ihrer Körperform und in der Bildung ihrer Flügel sehr schwankend. Letztere sind entweder zu beiden Paaren dünnhäutig und durchsichtig (Libellen und Eintagsfliegen: *Ephemera*) oder es sind die vorderen in lederartige oder hornige Deckflügel umgewandelt, welche sich dann im Zustand der Ruhe den häutigen und faltbaren Hinterflügeln, so wie dem Hinterkörper auflegen (Heuschrecken, Grillen, Schaben). Ausserdem gehören dieser Ordnung aber auch verschiedene, zeitlebens ungeflügelte Formen, z. B. die Silberfischchen (*Lepisma*), Springschwänze (*Podura*) u. A. an.

b) Mit Metamorphose (metabole).

2. Ordnung. Netzflügler (*Neuroptera*). Vorder- und Hinterflügel dünnhäutig, meist mit einem dichten Adernetz durchzogen, die hinteren zuweilen grösser und dann faltbar. Erster Ring des Mittelleibes (*Prothorax*) frei beweglich. — Larven mit drei Beinpaaren, theils mit saugenden, theils mit bissenden Mundtheilen; die einen auf dem Lande, die anderen im Wasser lebend. — Es gehören hierher von allgemein bekannten Insecten: der Ameisenlöwe (*Myrmeleon*), die Florfliegen (*Chrysopa*), die Skorpionsfliegen (*Panorpa*) und die Köcherfliegen (*Phryganea*).

3. Ordnung. Käfer (*Coleoptera*). Anstatt der Vorderflügel sind harte, hornige Flügeldecken (*Elytra*) vorhanden, welche dem Hinterkörper fest aufliegen und ihn seitlich sogar umfassen; dieselben stossen in der Mittellinie meist unter einer geraden Naht zusammen, an welcher sie zuweilen selbst mit einander verwachsen sind. Nicht selten sind sie mehr oder weniger verkürzt und lassen dann einen Theil des Hinterkörpers frei hervortreten. Die Hinterflügel, welche hier die alleinigen Flugorgane sind, liegen im Zustand der Ruhe unter den Flügeldecken verborgen; wegen ihres grösseren Umfangs falten sie sich in doppelter Richtung, nach der Länge und Quere (gegenläufig) zusammen. Der erste Ring des Mittelleibes (*Prothorax*) an den folgenden frei beweglich und von grossem Umfang. — Larven mit drei, zuweilen verkümmerten Beinpaaren.

4. Ordnung. Hautflügler (*Hymenoptera*). Vorder- und Hinterflügel dünnhäutig, durchsichtig, von wenigen Adern durchzogen, die hinteren stets viel kürzer als die vorderen, an welche sie sich durch eine Reihe feiner Häkchen anheften können. Mundtheile zwar durchweg bissend, theilweise jedoch stark rüsselförmig verlängert (Bienen). Erster Ring des Mittelleibes (*Prothorax*) sehr kurz, ringförmig und in der Regel

mit dem zweiten oberhalb fest verwachsen. Hinterleib mit dem Mittel-leib häufiger durch einen dünnen Stiel verbunden (dann sehr frei beweglich) als mit breiter Basis ansitzend. — Larven der Mehrzahl nach madenförmig, ohne Beine; diejenigen der Blattwespen raupenförmig, mit neun bis elf Beinpaaren (Afterraupen). — Zu dieser Ordnung gehören Bienen, Wespen, Grab- und Wegewespen, Goldwespen, Schlupfwespen, Ameisen, Gall- und Blattwespen.

B. Saugende Insecten.

a) Mit Metamorphose (metabole).

5. Ordnung. Schmetterlinge (Lepidoptera). Vorder- und Hinterflügel häutig, dicht mit farbigen, schuppenförmigen Haargebilden bedeckt, die hinteren fast durchweg beträchtlich, kürzer, nicht selten aber breiter als die vorderen. Der Saugrüssel nach Art einer Uhrfeder spiralgig aufgerollt, seitlich von grossen, buschigen Tastern eingefasst. — Larven (Raupen) in der Regel mit acht, zuweilen (Spanner) nur mit fünf Beinpaaren versehen.

6. Ordnung. Zweiflügler (Diptera). Von den beiden Flügelpaaren nur das vordere ausgebildet, dieses dünnhäutig, durchsichtig; anstatt der Hinterflügel ein Paar kleiner, klöppelförmiger Organe (Schwinger, Halteres). Am Brustkasten alle drei Ringe fest mit einander verschmolzen. Saugrüssel gerade hervorstehend (nicht aufgerollt), faden-, dolchförmig oder in zwei schwammige Lippen endigend. — Larven madenförmig, beinlos. — Ausser den Fliegen können dieser Ordnung auch die Flöhe zugerechnet werden.

b) Ohne Metamorphose (ametabole).

7. Ordnung. Halbflügler (Hemiptera). Saugrüssel aus einer teleskopartig gegliederten Röhre, in welcher sich vier feine, hervorstreckbare Borsten finden, bestehend. Vorderflügel bald (Wanzen) zur Hälfte oder darüber verhornt (Hemelytra) und dann den Hinterflügeln und dem Körper flach aufliegend, bald (Cicaden u. A.) gleich den hinteren häutig oder lederartig und dann dem Körper schräg anliegend. — Zu dieser Ordnung gehören ausser Kraut-, Baum-, Mord- und Wasservwanzen auch die Singcicaden, die Zirpen, die Laternenträger, die Blatt- und Schildläuse; auch können ihr die eigentlichen (parasitischen) Läuse angeschlossen werden.

Geographische Verbreitung, Artenzahl.

Die für die Gliederthiere im Allgemeinen angegebene weite Verbreitung in horizontaler und verticaler Richtung gilt ganz besonders für die schon durch ihr Flugvermögen bevorzugten und zu einer Ortsveränderung befähigten Insecten. Sie reichen erfahrungsgemäss nach beiden Richtungen hin bis an die äussersten Grenzen der spärlichsten und unscheinbarsten Vegetation, ja sogar noch über dieselben hinaus. Dass sie sich gegen die Pole hin und bei bedeutender verticaler Erhebung auf eine verhältnissmässig geringe Anzahl von Arten beschränken, ist ebenso bekannt, als dass sie daselbst in um so grösseren Massen auftreten und dass ihre Erscheinungszeit sich oft nur auf einige Wochen, ja bei gewissen Arten selbst nur auf wenige Tage ausdehnt. Ihr grösserer Reichthum, ihre progressive Mannichfaltigkeit an Form, Grösse, Intensität der Färbung etc. wird einerseits durch die Zunahme der mittleren Jahrestemperatur, andererseits durch die Beschaffenheit des Terrains, seinen

Boden, Wasserreichthum, die Fülle seiner Vegetation u. s. w. bedingt. Schon für Europa, dessen bekannte Insectenarten sich auf 60 bis 65,000 belaufen, kann man als die Durchschnittszahl einer mässig begünstigten Localität etwa 20,000 Arten annehmen; die vorzugsweise begünstigten der Tropen (Westafrika, Ostindien, Sundainseln, Südamerika) sind aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens um die Hälfte reicher. Dass bei allen Sammlungen, welche nicht von einer und derselben Station herrühren, sondern auf einer in der Fortbewegung begriffenen Expedition veranstaltet werden, eine möglichst genaue Angabe des Fundorts nach Längs- und Breitengraden von Belang und daher erwünscht ist, bedarf kaum der Erwähnung. Von ebenso grossem Interesse ist aber auch die verticale Erhebung, besonders wenn sie beträchtlich und mit einer merklichen oder auffallenden Modification des Pflanzenbestandes verbunden ist. Gerade aus den Tropengegenden liegen hierüber nur sehr spärliche Nachrichten vor; in den wenigen Fällen, wo sie gegeben worden sind, lässt sich aber ein nicht minder auffallender Unterschied zwischen dem faunistischen Charakter der Ebene (Niederungen) und des Gebirgsterrains erkennen, als er in Europa seit langer Zeit bekannt und hervorgehoben worden ist.

Erscheinungszeit, Vorkommen, Aufenthaltsorte.

Mit der allmählichen Zunahme der mittleren Jahrestemperatur gewinnt die Erscheinungszeit der Insecten beträchtlich an Ausdehnung. Schon im mittleren Europa beschränkt sich ihr Verborgensein — denn von einem gänzlichen Fehlen kann überhaupt zu keiner Jahreszeit die Rede sein — nur auf zwei bis drei Monate, in besonders milden Wintern selbst nur auf Wochen. Zum Theil hängt dies von einer verhältnissmässig langen Lebensdauer des Individuums, zum Theil von dem Auftreten einer und derselben Art in mehreren Generationen, in noch weiterer Ausdehnung aber davon ab, dass die einzelnen Arten sich in ihrem Auftreten auf verschiedene Jahreszeiten vertheilen, dass mithin die eine von der anderen abgelöst wird. Es kann kaum zweifelhaft sein, dass in diesen Beziehungen die einzelnen Gegenden mehr oder weniger auffallende Verschiedenheiten zeigen werden, welche zu ermitteln der Nachforschung des betreffenden Sammlers überlassen bleiben muss; in jedem Fall hat er den Versuch zu machen, auch während der sogenannten „todten Saison“ diese Thiere in ihren Schlupfwinkeln aufzufinden. In den Tropengegenden beginnt bekanntlich mit dem Eintritt der Regenzeit das Wiedererwachen der vorher schlummernden Natur und mit ihm auch das regere Insectenleben, welches sich um diese Zeit zu immer grösserer Fülle entwickelt.

Wie zu allen Jahreszeiten, so giebt es auch zu allen Tageszeiten Insecten, d. h. es verlassen gewisse Arten zu den verschiedensten Stunden des Tages, des Abends und der Nacht ihre Schlupfwinkel, um ihren Flug anzutreten und mit diesem ihrer Nahrung und ihrer Fortpflanzung nachzugehen. Die grosse Mehrzahl wird allerdings durch das Tageslicht und die mit demselben verbundene höhere Temperatur zu einem regeren Treiben angelockt, daher in den gemässigten Zonen sonnenhelle, warme und windstille Tage und an diesen wieder die Mittagszeit eine reichere Ausbeute gewähren; indessen auch die Nachmittags- und Abendstunden, ja sogar die Dämmerung und die Nachtzeit haben ihre besonderen Arten, welche während dieser entweder vorwiegend oder sogar ausschliesslich in Thätigkeit versetzt werden. Ganz allgemein üben Witterungsverhältnisse, insbesondere grosse Hitze und

Trockenheit, auf der anderen Seite Feuchtigkeit, Gewitter u. s. w. auf das Erscheinen der Insecten einen bemerkbaren Einfluss. Ausnahmsweise heisse und schwüle Tage veranlassen selbst solche Arten, welche sonst Licht und Wärme lieben und durch diese zum Aufsuchen der Blüthen, des Baumsaftes, der Excremente oder anderer ihnen Nahrung gewährender Objecte angeregt werden, zur Ruhe, zum Aufsuchen schattiger und kühler Verstecke, welche sie gegen ihre sonstige Gewohnheit dann erst bei grösserer Kühlung, nach einem erfrischenden Regen u. s. w. verlassen. Bienen, Wespen, Tagfalter, Fliegen, die mit intensiven, besonders metallischen Farben geschmückten Käfer u. A. gehen besonders dem Sonnenlicht nach und tummeln sich gerade bei hoher Temperatur mit besonderer Vorliebe auf Blüthen, Gesträuch, an Bäumen, Kletterholz u. s. w. herum. Mit einem unscheinbaren, düsteren (dunkelbraunen oder schwärzlichen) Colorit ist in den meisten Fällen eine verborgene oder nächtliche Lebensweise verbunden; die Dungkäfer, die Abendfalter (Schwärmer, Sphingidae) beginnen ihren Flug meist erst in der Dämmerung, die Eintagsfliegen (Ephemera), die Mücken, Ameisen u. A. führen ihre gemeinsamen Tänze besonders am Abend aus, die Nachtfalter (Bombycidae, Noctuidae), die Leuchtkäfer (Lampyris) werden geradezu erst durch die Dunkelheit aus ihren Verstecken hervorgeholt.

Eine grosse Anzahl von Insecten zieht während der Tagesstunden schon durch ihren oft lebhaften und anhaltenden Flug von selbst die Aufmerksamkeit des Sammlers auf sich; daher ihnen nicht erst besonders nachgespürt zu werden braucht. Durchschnittlich sind solche Arten jedoch die häufigsten des jedesmaligen Terrains, daher auch meist schon von Anderen gesammelt, zur Genüge bekannt und in den Sammlungen vertreten. Die Menge der Individuen, die stete Wiederkehr derselben an den verschiedensten Orten des von ihm durchforschten Terrains, wird dem Sammler leicht die Ueberzeugung gewähren, dass es sich bei einer solchen Art nicht um etwas besonders Seltenes und Wünschenswerthes handelt. Seltener und daher werthvollere treten in der Regel entweder nur local oder sparsam, oft sogar nur in vereinzelten Individuen auf; immerhin kann es jedoch ein glücklicher Zufall mit sich bringen, dass man auch seltene oder selbst noch ganz unbekannte Arten in grosser Individuenzahl beisammen trifft, wie das z. B. bei Bockkäfern (*Cerambyx*) und Prachtkäfern (*Buprestis*), welche aus einem und demselben Baumstamme ausgeschlüpft sind, bei Schmetterlingen, deren Raupen gesellig leben, u. A. nicht selten vorkommt. Ist das Land, in welchem gesammelt wird, ein bis dahin überhaupt noch nicht betretenes und durchforschtes, so ist selbstverständlich jede Art, welche sich darbietet, von Interesse; die weniger verbreiteten und selteneren verdienen aber auch hier (für den Fall der Raumbeschränkung) den Vorzug.

Da es sich nun bei der naturgeschichtlichen Erforschung eines Landes oder eines engeren Gebietes nicht blos darum handelt, die sich unmittelbar der Beobachtung darbietenden Naturobjecte einzusammeln, in dem vorliegenden Fall also die häufigsten Insecten obenhin abzuschöpfen, so wird ein rationelles Sammeln darin zu bestehen haben, dass man für die einzelnen Arten die Bedingungen ihres Vorkommens zu ermitteln sucht. Die eine Art bewohnt sumpfiges, die andere trockenes Terrain, diese den Wald, jene mehr Lichtungen, Felder oder Gärten, je nachdem sie durch ihre Lebensweise auf Feuchtigkeit, Licht, Wärme, Schatten u. s. w. angewiesen ist. Besonders ist es aber die Nahrung und die Sorge für die Nachkommenschaft, welche einen Anhalt für das Auffinden der selteneren Arten gewährt. Findet man z. B., dass die Blüthen bestimmter Krautpflanzen, Sträucher und Bäume durch

ihren Geruch, ihren Blütenstaub u. s. w. eine besondere Anziehungskraft auf Insecten ausüben, wie es im Inlande z. B. von den Weidenkätzchen, von den Blüten des Crataegus, vieler Labiaten, Borragineen u. A. bekannt ist, so wird man solche Blüten immer wieder von Neuem aufzusuchen und zu beobachten haben und kann sicher sein, an denselben auf die Dauer eine reiche Ausbeute zu machen. Die seltneren Schmetterlinge, Fliegen, Bienen, Grabwespen gehen dem Nektar derselben mit ebenso grosser Vorliebe nach, wie viele auf Blüthennahrung angewiesene Käfer (Cetonien, Bockkäfer, Rüsselkäfer u. A.), die Antheren benagen. Eine ganz analoge Anziehungskraft und zwar fast auf dieselben oder nahe verwandte Insecten übt der ausfliessende Saft vieler Bäume aus; ein öfter wiederholter Besuch solcher wird gleichfalls immer wieder neue Individuen — ausser den genannten Käfergattungen auch die besonders geschätzten Hirschkäfer (Lucanus) — antreffen lassen, da dieselben durch den Geruch des Saftes aus ziemlich weiter Ferne herbeigelockt werden und solche Bäume daher zu ihrem Versammlungsort wählen. Ist es in diesen beiden Fällen die Nahrung, welche die betreffenden Insecten anzieht, so ist es in anderen die ihnen gebotene Gelegenheit, ihrer Nachkommenschaft ein Unterkommen zu sichern. Dies ist z. B. mit dem Dung, besonders der Hufthiere und des Menschen, der Fall, welcher ausser zahlreichen Käfern (Copris, Onthophagus, Hister) auch viele Fliegen, Schmetterlinge u. A. durch seinen Geruch anlockt, ihnen selbst zur Speise dient, von den meisten aufgesucht wird, um die Eier (seitens der Weibchen) in denselben abzusetzen; ferner mit den Cadavern der verschiedensten Wirbelthiere (Säugethiere, Vögel), welche zu demselben Zwecke von Aaskäfern (Necrophorus, Silpha, Staphylinen u. s. w.), verschiedenen Fliegen u. A. sehr bald ausgekundschaftet werden. Sind ferner in Waldungen Holzschläge angelegt worden, so lockt der aussickernde Saft der niedergelegten Stämme und der stehen gebliebenen Stümpfe viele Insecten gleichfalls zur Unterbringung ihrer Brut an. Ausserdem lassen sich aber auf die Stämme, nachdem sie getrocknet und aufgeklaffert worden sind, und zwar besonders, wenn sie von der Sonne beschienen werden, gerade die seltensten und gesuchtesten Insecten, als welche besonders die Prachtkäfer (Buprestis), die Bockkäfer (Cerambyx), manche Rüsselkäfer (Anthribus), die Raubfliegen (Asilus, Laphria), Holzwespen (Sirex), grosse Schlupfwespen (Pimpla, Ephialtes) u. A. zu nennen sind, mit besonderer Vorliebe nieder und sind daher hier öfters in grösserer Individuenzahl zu fangen. Da es gerade von den genannten Insectengattungen zahlreiche Arten giebt, welche zu verschiedenen Jahreszeiten auftreten, sich zum Theil also ablösen, so ist ein öfterer und auf längere Zeit ausgedehnter Besuch solcher Holzschläge anzuempfehlen. Ein Gleiches, wie von den niedergelegten Stämmen, gilt auch für das aus ihnen geschnittene und zu Blockhäusern, Zäunen u. s. w. verarbeitete Holz, welches begreiflicherweise und erfahrungsgemäss dieselbe Anziehungskraft auf die genannten Insecten ausübt.

Einer besonderen Beachtung sind ferner alle Baumstämme zu empfehlen, welche zum Theil ihrer Rinde beraubt sind oder bei welchen das Absterben bereits sich auf das blossgelegte Holz fortgepflanzt und in diesem Risse, Höhlungen u. s. w. zu Wege gebracht hat. In den meisten Fällen wird man an solchen beschädigten Stellen mehr oder weniger deutliche Eingriffe von Insecten, in Form von Ausnagungen, Bohrlöchern u. dgl. wahrnehmen, oder es stehen solche, falls sie noch fehlen, in naher Aussicht. Zuweilen gelingt es, von dem morschen Stamm die Rinde oder einzelne, bereits abgestorbene Theile des Holzes loszulösen und auf diese Art den Urheber

des Schadens entweder noch im Stadium der Larve oder schon des ausgebildeten Insectes (besonders Käfer) zu entdecken. Als solche sind besonders Hirschkäfer (*Lucanus*), Nashornkäfer (*Dynastes*, *Oryctes*), die Gattungen *Cetonia*, *Trichius*, *Euchirus* und *Passalus*, zahlreiche Bockkäfer (*Cerambyx*), Rüsselkäfer (*Curculio*), Borkenkäfer (*Bostrichus*), Bast- und Rindenkäfer (*Elater*, *Nititula*, *Platysoma*, *Colydium* u. A.), Prachtkäfer (*Buprestis*) u. s. w. zu erwähnen. Da auch diese Käfer sich aus dem Holze erst nach und nach entwickeln, zum Theil auch zu verschiedenen Tageszeiten — viele Bockkäfer z. B. nur gegen Abend aus ihren Verstecken in Bäume hervorkommen, so ist eine Ausbeutung der ganzen Einwohnerschaft nur durch öfter wiederholte Nachforschungen zu erreichen. — Endlich wäre von vegetabilischen Fundorten noch besonders der Pilze und Baumschwämme zu erwähnen, welche gleichfalls zahlreiche Insecten, besonders wieder Käfer (*Staphylinen*, *Dorcotoma*, *Mycetophagus*, *Orchesia*, *Scaphidium*, viele *Heteromeren* u. A.) in sich beherbergen und, um sich ihrer Einwohner mit grösserer Sicherheit zu bemächtigen, am besten in einem Sack ausgeschüttelt oder mitgenommen und bei der Rückkehr auseinandergebrochen oder zerschnitten werden.

Eine Eigenthümlichkeit vieler Insecten besteht darin, dass sie sich gern und selbst gewohnheitsmässig in die Gesellschaft anderer, besonders in grossen Colonieen oder Staaten lebender begeben. Als solche Staaten bildenden Insecten sind besonders die Termiten, die Ameisen, die Wespen und manche Bienen (Honigbienen, Hummeln) bekannt. Fast alle in solchen Bauten oder Nestern als Gäste lebenden Insecten, welche dem grösseren Theil nach den Käfern, sonst aber auch den Zweiflüglern, Hautflüglern und Netzflüglern (*Mantispa* in Wespennestern) angehören, sind ebenso interessant als bis jetzt selten und geschätzt. Vor allen sind als Gäste der Ameisen die merkwürdigen *Paussus*-arten, Käfer von 2–6 Lin. Länge, von meist kastanienbrauner Färbung, mit auffallend geformten, keulenförmigen Fühlhörnern, abgestutzten Flügeldecken und messerartig flachgedrückten Beinen, zu erwähnen. Neben ihnen die viel kleineren, aber sehr zierlich gestalteten *Pselaphiden*, *Claviger*, *Scydmaenus* und Verwandte, ebenso viele durch ihre kurzen Flügeldecken kenntlichen *Staphylinen*. Es lassen sich diese Käfer entweder durch Aussieben (siehe unten Sammeln) oder dadurch aus der Ameisencolonie mit leichter Mühe erhalten, dass man, besonders nach eingetretenem Regen, flache Steine oder Holzstücke (Bretter) in den Ameisenhaufen oberflächlich hinein-, resp. auf denselben legt und dieselben nach Verlauf mehrerer Stunden oder eines Tages wieder heraushebt. Es sitzen dann diese Käferchen, falls solche unter den Ameisen vorhanden sind, an der untern Seite der Steine oder Bretter. — Bei Eröffnung und Untersuchung von Termitenbauten ist gleichfalls auf dergleichen, bis jetzt noch wenig bekannte Gäste zu achten; bei Wespennestern würde es zu ihrem Auffinden einer Ausräucherung und Tödtung der (stechlustigen) Besitzer des Nestes bedürfen.

Von denjenigen Insecten, deren Thätigkeit erst mit einbrechender Nacht beginnt, welche sich dagegen den Tag über verborgen halten, können viele in ihren Schlupfwinkeln aufgesucht und in diesem bei Tage oft sogar in grösserer Anzahl und mit leichterer Mühe gesammelt werden. Ausser gewissen Geradflüglern, besonders Schaben (*Blatta*) und Gespenstheuschrecken (*Phasma*), Halbflüglern (Rindenwanzen) u. A. gehören hierher ganz besonders zahlreiche Käfer, unter welchen vor Allem die (meist nächtlichen) Raub- oder Laufkäfer (*Carabus*), viele *Staphylinen* und *Elateriden* zu nennen sind. Es verbergen sich dieselben gern unter Baumrinde, Moos, unter ab-

gefallenen Blättern, unter niederliegenden Baumstämmen, unter flachen, dem Erdboden weniger aufliegenden, als etwas in denselben eingesenkten Steinen u. s. w. Ebenso wenig versäume man Gräben und Erdlöcher, besonders solche, welche mit steil abfallenden Wänden versehen und auf ihrem Grunde mit abgefallenem Laube bedeckt sind, stets auf die während der Nacht hineingefallenen Insecten zu untersuchen. An Localitäten, welche sich für den Fang als günstig erwiesen haben, lohnt es sogar der Mühe, derartige Gräben und Gruben speciell behufs des Sammelns von Insecten anzulegen, auch flache Steine, Bretter u. s. w. in den Erdboden einzustampfen, um ihnen die Gelegenheit, sich unter dieselben zu flüchten, darzubieten. Die Untersuchung von abgefallenem Laube erweist sich besonders dann als lohnend, wenn dasselbe in der Nähe von stehendem oder fliessendem Wasser, dessen Ufer meist zugleich mit Anspüllicht bedeckt sind, angehäuft ist. Um die darin befindlichen Insecten leichter und in grösserer Menge zu erhalten, ist anzupfehlen, das Laub, resp. den Anspüllicht entweder auszusieben oder dasselbe unter das Wasser zu tauchen und auf diese Weise die Insassen herauszulocken.

In ungleich grösserer Individuen- und Artenzahl lassen sich jedoch die in ihrem Treiben auf die Nachtzeit angewiesenen Insecten durch eine eigens auf sie während der Dunkelheit gerichtete Jagd, den sogenannten Nachtfang erhalten. Erfahrungsgemäss bieten mondheile Nächte eine geringe, solche mit bewölktem Himmel und selbst regnerische dagegen eine ungleich reichere Ausbeute dar. In menschlichen Wohnungen bieten offene Schuppen, Gartenlauben, Veranden u. s. w., im Freien Hecken von Sträuchern, Wald- und Wiesenränder besonders günstige Fangplätze dar. Zur Anziehung der Insecten dienen Laternen, welche vor oder auf weissen Flächen, z. B. Segeltüchern, Tischdecken u. A. aufgehängt oder gestellt werden, ausserdem aber auch Blüthen, welche während der Nacht besonders intensiv riechen. Einen sehr ergiebigen Ersatz für letztere hat man in Obstschnitten (Bananen, Aepfeln u. s. w.), welche man an Schnüren bündelweise an günstigen Orten aufhängt und mit Aepfeläther begiesst, ausfindig gemacht. Durch Anwendung solcher Lockspeisen hat man in Europa sowohl wie in den Tropen die verschiedensten Insecten, besonders aber Nachtschmetterlinge, welche für grosse Seltenheiten galten, in überraschender Menge gefangen.

Die Erfahrung, dass zahlreiche Insecten theils behufs ihrer eigenen Ernährung, theils zur Unterbringung ihrer Nachkommenschaft bestimmte vegetabilische und animalische Substanzen constant aufsuchen und durch dieselben in grösserer Zahl angelockt werden, legt es dem Sammler nahe, derartige Anziehungspunkte überhaupt (auch bei Tage) künstlich herzustellen, d. h. die betreffenden Arten zu ködern. Es wird sich daher die Auslegung eigens geschossener Säugethiere und Vögel an passenden Orten, das Anschneiden oder Anbohren saftreicher Bäume, das Bestreichen fliessender Stämme mit zuckerhaltigen und aromatischen Substanzen, (Flüssigkeiten) u. s. w., kurz jedes Verfahren beim Sammeln empfehlen, welches die natürlichen Bedingungen nachzuahmen, resp. zu vermehren angethan ist. Als solches ist nach den Erfahrungen neuerer Reisender auch die Anhäufung menschlicher Excremente an passenden Localitäten und besonders ihre Vermischung mit Urin hervorzuheben. Die Anziehungskraft, welche diese Auswurfstoffe z. B. auf die Nachtfalter haben, wird als eine ganz eminente und mit der reichsten Ausbeute verbundene geschildert.

Sammelapparate und ihre Anwendung.

Dass es viele Insecten giebt, welche sich ebenso wohl mit dem Auge erspähen, wie mit der Hand leicht erreichen lassen, ist allgemein bekannt; für solche würde es also besonderer Fangapparate nicht bedürfen, wenn man sich auf das Einsammeln der sich gerade darbietenden Exemplare beschränkt. Indessen selbst für solche leisten Sammelapparate oft dadurch Nutzen, dass sie in verhältnissmässig kurzer Zeit und mit weniger Mühe grössere Mengen von Exemplaren zu beschaffen geeignet sind. Für alle sich durch Lebhaftigkeit und Schnelligkeit des Flugs auszeichnende, ferner für leicht verletzbar oder sich durch Beissen und Stechen gegen das Ergriffenwerden zur Wehre setzende Insecten sind dagegen zweckmässige Fangapparate unentbehrlich. Als solche sind besonders folgende hervorzuheben.

1. Ein Regenschirm von gewöhnlicher oder über diese hinausgehender Grösse, welcher mit haltbarem, leinenem oder baumwollenem Stoffe überzogen und auch innerhalb mit ähnlichem Zeuge, hier aber mit solchem von heller (weisser oder gelblicher) Farbe bespannt ist. Man benutzt denselben, um in ihn die auf Sträuchern und Bäumen sitzenden Insecten mittelst eines Stockes hineinzuklopfen.

2. Fangsäcke (Kötscher) von grobem, grauem Leinen oder Cannevas, deren offenes Ende um einen starken eisernen Reif befestigt ist. Ihre Länge muss etwa das Doppelte ihres Querdurchmessers betragen und ihr Boden bauchig abgerundet sein. Der $1\frac{1}{2}$ bis 2 Fuss im Durchmesser haltende Reif, welcher der bequemerem Verpackung halber in Form eines Halbkreises zusammenschlagbar sein kann, wird mittels einer Mutter auf die an dem Ende eines Stockes befindliche Schraube befestigt. Mit einem solchen Fang- oder Streifsack werden theils die an Gesträuch und Krautpflanzen sitzenden Insecten abgeschöpft, theils die im Wasser lebenden aus diesem herausgefischt.

3. Fangnetze. Ein gleich grosser und in gleicher Weise an einem Stocke zu befestigender eiserner Reif, welcher jedoch weniger stark als bei 2. zu sein braucht, trägt einen seinen Querdurchmesser um das Doppelte an Länge übertreffenden, unterhalb gleichfalls abgerundeten Beutel von dünnem, durchsichtigem Zeuge (Tüll, Musselin oder dgl.). Zum Fang schnell fliegender Insecten (Schmetterlinge, Zweiflügler, Hautflügler, Libellen u. s. w. dienend.

4. Fangscheeren (Klappen). Sie sind in der Hauptsache nach dem Modell einer Papierscheere gebaut, nur dass die beiden Arme aus starkem drehunden Eisendrahte (solcher ist der Haltbarkeit wegen mehr zu empfehlen als Messing) hergestellt und an ihrem Angelpunkt des festeren Schlusses wegen zu einer runden Drehscheibe erweitert sein müssen. Während ihr hinteres, ösenartig geschlossenes Ende zum Einlegen der Finger dient, schliesst sich an das entgegengesetzte ein quer viereckiger (nicht kreisrunder!) Rahmen von 5–6 Zoll Breite und 4–5 Zoll Länge an; beim Schluss der Scheere müssen sich diese (flach gehämmerten) Rahmen genau decken. Dieselben werden (von der Innenseite her!) mit einer doppelten Lage starken, grosslöcherigen Tülles straff überspannt, letzterer aber rings um den Rand der Rahmen noch mit festem leinenen Bande übernäht. Bei doppelter Gaze- oder Tülllage wird abgesehen von grösserer Haltbarkeit durch Uebereinanderschieben die Grösse der Maschen verringert, was den Vortheil gewährt, dass kleine Insecten sich weniger leicht durch die Oeffnungen des Ueberzuges hindurchzwängen können, nebenbei aber dem Durchziehen des Nadelknopfes — nachdem das gefangene Insect durch die beiden

Ueberzüge hindurchgespiest worden ist — keine Hindernisse entgegensetzt. (Durchaus verwerflich sind die von manchen Seiten — besonders zum Schmetterlingsfang — verwendeten Klappen, deren Ueberzug aus Metalldraht besteht, da durch diese der Körper aller zarteren Insecten sofort gequetscht, resp. gedrückt wird). Die Scheere oder Klappe dient demselben Zweck wie das Fangnetz und gewährt den Vortheil, dass das gefangene Insect zwischen den beiden Tülllagen sofort fixirt ist, also nicht, wie im Netze, herumflattern kann. Ihre erfolgreiche Anwendung erfordert jedoch der grösseren Annäherung an das zu fangende Individuum wegen einer ungleich grösseren Behutsamkeit und Uebung. Bei sehr schnell fliegenden Insecten wird daher der Fang mit dem Netz immerhin ein sicherer und ergiebiger sein, wie sich denn die Anwendung des letzteren bei solchen Insecten, welche ihrer grösseren Entfernung wegen mit der Scheere nicht zu erlangen sind, von selbst als nothwendig ergibt.

5. Siebe aus Eisendraht verfertigt, von verschiedener Lochgrösse. Dieselben können entweder den Boden eines kreisrunden Holzrahmens von etwa 1 Fuss Höhe und 2 Fuss Durchmesser oder auch denjenigen eines leinenen Sackes, dessen offene Seite um einen eisernen Ring (mit Handhabe) herumgenäht ist, bilden. Sie dienen zum Aussieben kleinerer Insecten aus abgefallenem Laub, aus Anspüllicht, aus Holzmulm, aus Ameisenhaufen u. s. w. Nachdem das Sieb mit diesen Substanzen, welche rasch zusammenge rafft werden müssen, angefüllt ist, wird es über untergelegtem Papier oder weissem Zeuge so lange kräftig hin und her geschüttelt, bis nichts mehr durch die Löcher hindurchfällt. Die durchgesiebten Insecten werden, soweit sie sich sofort bemerkbar machen, in Gläser eingesammelt; die zugleich mit ihnen durchgefallenen Erd- und Holztheilchen u. s. w. müssen jedoch in Säcke geschüttet und auf die kleineren, darin verborgenen Thiere noch einer speciellen nachträglichen Durchsicht unterzogen werden. Ebenso wird auch das aus dem Sieb wieder ausgeschüttete Laub einer nochmaligen Prüfung auf etwaige grössere, darin verborgene Insecten, welche die Löcher des Bodens nicht passiren konnten, zu unterwerfen sein.

6. Als Ersatz für den Regenschirm werden grosse Tücher von festem Leinen, Segeltuch oder dgl. zur Ausbreitung unter abzuklopfende grössere Bäume und Sträucher oft mit grösserem Erfolge in Anwendung gebracht werden können. In solchen Fällen würde auch der zum Abklopfen dienende Stock eine entsprechende Festigkeit und Länge zu erhalten haben und zum kräftigeren Schütteln der Aeste und Zweige mit einem Eisenhaken zu versehen sein.

7. Insectennadeln in sechs bis acht verschiedenen Stärken, von Haardünne bis zur Dicke einer gewöhnlichen Stecknadel und darüber; zum Aufspieszen des Fanges dienend (siehe unter Präparation). Ihrer schnelleren Handhabung wegen werden sie am besten auf ein im Knopfloche zu befestigendes Nadelkissen (nach ihrer Stärke geordnet) gesteckt.

8. Anatomische Pincetten, zum Ergreifen und Fixiren solcher Insecten, welche sich durch Beissen oder Stechen (Hymenopteren-Weibchen) wehren. Ferner Nadelzangen zum Befestigen der aufgespiesten Insecten in dem Korkboden der Fangschachteln. (Bei nicht hinreichender Befestigung reissen sich grössere und kräftigere Insecten nicht selten von ihrer Unterlage los und beschädigen dann die übrigen.)

9. Sammelschachteln und Sammelkasten. Zu ersteren können entweder gewöhnliche, zwei Zoll hohe Holzschachteln, welche dann jedoch mit starkem Papier zu bekleben sind, oder solche von Eisenblech, welche

sich durch grössere Haltbarkeit und den festen Schluss des Deckels empfehlen, verwendet werden. Für letztere ist weniger eine Herstellung aus Pappe als aus festem (besonders Eichen-) Holz anzurathen; der im Charnier bewegliche Deckel wird besser so eingerichtet, dass er nicht übergreift sondern sich dem Kasten nur fest auf- oder einlegt und durch einen in eine Oese eingreifenden Haken geschlossen wird. Am bequemsten werden solche etwa 2 Zoll hohe, 12 bis 15 Zoll lange und um einige Zoll schmalere Kasten mit einer Schnur oder Riemen über die Brust gehängt. Mehrere Kasten oder Schachteln von verschiedener Grösse sind beim Sammeln deshalb nöthig, um kleinere und grössere Insecten auf dieselben vertheilen, d. h. von einander getrennt aufbewahren zu können. Der Boden aller muss zur sicheren Fixirung des Fanges mit einer etwa 3 Lin. dicken Korkplatte ausgelegt sein. (Gepresster Torf, welcher hierzu vielfach verwendet wird, ist deshalb verwerflich, weil er nicht den nöthigen Halt bietet; dasselbe ist mit Hollundermark und Agavenmark der Fall, letzteres auch desshalb unvortheilhaft, weil es die Nadeln leicht rosten macht.)

10. Gläser und Blechbüchsen zum Einsammeln solcher Insecten, welche harte, hornige Vorderflügel haben (Käfer, Wanzen, manche Geradflügler) und daher nicht sofort auf Nadeln gespiesst zu werden brauchen. Die Gläser müssen möglichst dickwandig, annähernd cylindrisch und mit einer weiten, durch einen Kork verschliessbaren Oeffnung versehen sein (von der Form der sogenannten „Opodeldok-Gläser“); die Beschaffung verschiedener Grössen empfiehlt sich, um kleinere und grössere Insecten beim Sammeln von vorn herein sondern zu können. Um kleinere Insecten, besonders Käfer, bequemer und schneller in die Flaschen einzusammeln, führt man durch den durchbohrten Kork eine Federpose oder eine Glasröhre, deren unteres Ende in die Höhlung der Flasche hinein- und deren oberes über den Kork um $1\frac{1}{2}$ bis 2 Zoll hinausragt und hier mit einem besonderen Holz- oder Korkstöpsel zu verschliessen ist. Durch dieses Rohr lässt man, ohne den Hauptkork von der Flasche zu entfernen, die kleineren Insecten in das Innere der letzteren hineinpässiren. Da die in die Gläser gelangenden Insecten meist nicht an den glatten Wänden heraufzuklimmen oder sich wenigstens nicht an denselben festzuhalten im Stande sind, sich daher auf dem Boden ansammeln und sich hier gegenseitig leicht beschädigen, ist es zweckmässig, in das Innere der Gläser einen Knäuel von Papierstreifen, zwischen welche die Thiere sich vertheilen können, hineinzubringen; derselbe muss, sobald er beschmutzt oder feucht geworden ist, erneuert, das Glas selbst nach jedesmaligem Gebrauch gelüftet werden. An das in die Flasche hineinragende Ende des Korkes kann ein Stückchen Badeschwamm oder Wollenzeug zum Auftropfen betäubender Substanzen befestigt werden. — Blechbüchsen, welche sich durch grössere Haltbarkeit empfehlen, aber den Nachtheil haben, dass sie leicht Rost ansetzen, müssen mit einem abnehmbaren Deckel und einer besonderen halsförmigen Oeffnung, welche durch einen Kork verschlossen wird, versehen sein.

Tödtung, Präparation und Conservirung.

Wie bei den Thieren überhaupt, so hat auch bei den Insecten die Präparation sich als Ziel zu setzen, denselben nach ihrer Tödtung ein dem lebenden Thiere möglichst ähnliches Ansehen in Form, Färbung, Haltung u. s. w. zu verleihen, resp. zu bewahren. Leider ist dies mit den bisherigen Mitteln und selbst unter Anwendung der grössten Vorsicht nicht in allen Fällen

möglich. Einerseits giebt es Insecten von so zartem Bau, dass sie fast unmittelbar nach dem Tode ihre Gestalt verändern, d. h. durch Eintrocknen zusammenschrumpfen; andererseits auch solche, deren Färbung sich ebenso schnell verändert oder selbst fast verloren geht. Um so mehr muss es die Aufgabe des Sammlers sein, wenigstens in denjenigen Fällen, wo eine solche Veränderung von selbst nicht eintritt, dieselbe nicht durch unzweckmässige Behandlung zu veranlassen oder zu befördern. Letzteres kann aber ebenso wohl durch die Art der Tödtung wie durch eine auf Unkenntniss beruhende Art der Aufbewahrung bewirkt werden. Das in beiderlei Beziehung einzuschlagende Verfahren wird durch Beobachtung des lebenden Insektes, seines Aufenthalts (mit wenigen Ausnahmen) im Trockenen, seiner Zurückgezogenheit während des Regens, seiner bis zur Unkenntlichkeit und völligen Unbrauchbarkeit gesteigerten Veränderung durch anhaltend nasses Wetter u. s. w. gewissermaassen von selbst an die Hand gegeben. Da dieselben Veränderungen d. h. Verschlechterungen, welche an dem lebenden Insect die Nässe hervorruft, auch bei oder nach seiner Tödtung jede künstliche Befeuchtung zur Folge hat, so ist es als erste Regel hinzustellen, dass jedes zur Aufbewahrung in der Sammlung bestimmte Insect vor aller, auch der geringsten Feuchtigkeit bewahrt werde. Schon die Anwendung von Flüssigkeiten, wie Weingeist oder Schwefeläther, zur Tödtung der in ein Glas eingesammelten Insecten ist wenigstens in der Weise verwerflich, dass dergleichen Flüssigkeiten mit den Thieren selbst in Berührung gebracht, d. h. auf dieselben aufgetropft oder gar aufgegossen werden; denn selbst eine vorübergehende Benetzung bringt bei behaarten Insecten eine Verfälschung ihres Haarkleides, bei vielen intensiv (grün, gelb, roth) gefärbten oft eine Veränderung der Farbe hervor. Als ein ganz rohes Verfahren muss es aber bezeichnet werden, wenn Insecten der verschiedensten Gattungen ohne Unterschied zusammen im Weingeist oder Brantwein geworfen oder wohl gar in Gemeinschaft mit Schlangen, Eidechsen u. dgl. in einen und denselben Behälter gebracht werden. Da fast alle in dieser Weise be- und misshandelten Exemplare zu Nichts zu gebrauchen sind, sondern einfach fortgeworfen zu werden verdienen, so ist es bei dieser Art des Sammelns besser, sie von vorn herein leben zu lassen und sie nicht unnütz zu tödten. Selbst die im Wasser lebenden Insecten machen von dieser Regel keine Ausnahme, da sie während des Lebens vor der Benetzung durch eine fettige Absonderung ihrer Haut geschützt sind, nach eingetretenem Tode aber gleichfalls vom Weingeist angegriffen und verändert werden. Ausgenommen von dieser Regel sind einerseits Larven von Insecten, welche, da sie ihrerseits wieder durch trockene Aufbewahrung unbrauchbar werden, nur durch Alkohol conservirt werden können; andererseits gewisse (später zu erwähnende) Arten, bei welchen behufs anatomischer Untersuchung ein Einsetzen in Weingeist erforderlich ist. Allenfalls können auch, wenn eine Conservirung im getrockneten Zustand nicht thunlich ist, solche grössere Käfer in Weingeist aufbewahrt werden, welche entweder metallisch oder dunkel (schwärzlich, bräunlich) gefärbt und zugleich von glatter, d. h. unbehaarter Körperoberfläche sind (z. B. Nashornkäfer, Cetonien, Laufkäfer, Buprestiden); alle nicht metallisch, sondern in Mennigroth, Goldgelb, Spangrün u. s. w. gefärbten, mit Filz oder Behaarung bekleideten sind hiervon jedoch unter allen Umständen auszuschliessen.

Alle Insecten mit zarthäutigen Flügeln, wie Fliegen, Bienen, Wespen, Libellen, Eintagsfliegen, Schmetterlinge u. s. w. können überhaupt nur dadurch in brauchbarem Zustande erhalten werden, dass man dieselben unmittel-

bar nach dem Einfangen im Netz oder der Scheere (Klappe) auf eine Nadel spießt. Bei dem Gebrauch der Fangscheere wird dies in der Weise ausgeführt, dass man die Nadel durch den Thorax des zwischen den beiden mit Tüll überspannten Klappen eingeschlossenen Insectes in der Richtung von oben (Rücken) nach unten (Brustseite) hindurchstösst. Die Stärke der angewendeten Nadel wird sich dabei jedesmal nach der Grösse und Kraftäusserung des betreffenden Insectes zu richten haben, doch sind, um eingreifendere Verletzungen des durchstochenen Körpertheiles zu vermeiden, im Ganzen feinere Nadeln vorzuziehen. Eine Nadel, welche die Dicke einer gewöhnlichen Stecknadel hat, wird in ihrer Anwendung schon auf die grössten und kräftigsten der genannten Insectenformen zu beschränken sein. Die Nadel wird mit ihrer Spitze stets auf die Mitte des Thoraxrückens, der Längsrichtung nach dem Ansatz der Vorderflügel entsprechend, aufgesetzt und durch denselben in senkrechter Richtung durchgestossen, so dass sie an der Brustseite zwischen den Beinen des ersten und zweiten Paares hervortritt. Nachdem sie durch das Insect so weit hindurchgeführt ist, dass dieses oberhalb der Mitte ihrer Länge ($\frac{2}{3}$ derselben unter, $\frac{1}{3}$ darüber) zu sitzen kommt, öffnet man die Klappe mit der Vorsicht, dass man das eine Ende der Nadel mit den Fingern erfasst und letztere aus den Maschen des Ueberzuges löst. Bei Insecten mit nackten (d. h. unbeschuppten) Flügeln reicht es dann aus, sie vorläufig lebend auf den Korkboden der Schachtel in solcher gegenseitiger Entfernung zu fixiren, dass sie einander nicht mit den Kiefern oder Beinen verletzen können; bei den viel leichter verletzbaaren Schmetterlingen ist aber ein sofortiger Druck mit den Fingern auf die dem Ansatz der Beine entsprechende Seite des Brustkastens nöthig, um sie am Flügel Schlag zu hindern. Bei kräftigeren Schmetterlingen, welche durch einen solchen Druck in ihren Bewegungen nicht gelähmt werden, ist das sofortige Einführen einer mit Nicotin getränkten Nadel in die Brust und den Hinterleib anzurathen und sie so niedrig auf die Nadel zu stecken, dass sie mit den Beinen den Korkboden berühren. Eine weitere Betäubung, resp. Tödtung solcher in die Sammelschachtel gebrachten Insecten wird am besten durch Cyankalium oder eine Mischung von rectific. Alkohol und Schwefeläther bewirkt; von ersterem wird ein Stückchen von Erbsengrösse, in ein Leinenläppchen eingehüllt, auf den Boden der Schachtel befestigt, letztere auf ein gleichfalls dort befestigtes Schwämmchen aufgetropfelt, ohne jedoch mit dem Insect selbst in Berührung gebracht zu werden. Schmetterlinge, welche, wie die grösseren Schwärmer und Spinner, eine besondere Lebenszähigkeit besitzen, tödtet man nachträglich sicher dadurch, dass man eine von der Kehle her der Länge nach in den Leib eingeführte Nadel mit ihrem Knopfende in eine Flamme hält und glühend macht; die hierzu in Anwendung gebrachte Nadel muss möglichst lang sein, damit der Schmetterling sich nicht die Fühlhörner versengt.

Solche Insecten dagegen, welche, wie die Käfer, Schaben, Heuschrecken, Cicaden und Wanzen, verhornte oder pergamentartige Vorderflügel (Flügeldecken) besitzen und mit diesen die zusammengefalteten, häutigen Hinterflügel verdecken, sammelt man besser in Gläser ein, in welche man zuvor einen Knäuel von Papierstreifen, zwischen welche sie sich vertheilen können, gebracht hat. Um sie zu betäuben, was, wenn sie sich nicht gegenseitig verletzen sollen, möglichst bald geschehen muss, wendet man Kirschlorbeerblätter, Cyankalium oder ein Gemisch von Schwefeläther und rectificirten Alkohol (beides zu gleichen Theilen) an; letzteres wird auf ein am Kork des Glases befestigtes Schwämmchen aufgeträufelt. Da jedoch kräftigere

Insecten, besonders die Bockkäfer, Rüsselkäfer, Nashornkäfer, Cetonien, grosse Heuschrecken u. s. w. sich meist nachträglich von dieser Betäubung wieder erholen und vollständig aufleben, so muss eine Tödtung derselben bei der Rückkehr von der Jagd dadurch vorgenommen werden, dass man die sie enthaltenden Gläser einige Minuten in siedendes Wasser steckt oder sie über einer Flamme stark erhitzt.

Bevor die so gesammelten und getödteten Insecten in die zu ihrer Aufbewahrung und Versendung dienenden Behälter gebracht werden, ist vor Allem dafür Sorge zu tragen, dass sie gehörig austrocknen. Bei kleineren Insecten geschieht dies verhältnissmässig schnell und ohne weitere Manipulationen, welche auch bei grösseren Käfern, da diese durch ihre consistente Körperhaut vor Fäulniss genügend geschützt sind, meist nicht nöthig sind. Anders verhält es sich dagegen mit allen grösseren Heuschrecken, Libellen und dickleibigen Schmetterlingen, bei welchen die in Verwesung übergehenden Eingeweide des Hinterleibes nicht nur die äussere Haut dieses Körpertheiles, sondern oft sogar das ganze Insect mit in Fäulniss und Verjauchung versetzen und in Folge dessen fast stets eine Veränderung und selbst einen Verlust der natürlichen Färbung hervorrufen. Es ist daher bei den genannten Insecten, zur Vorsicht aber auch bei besonders grossen und dickleibigen Käfern gleich nach dem Tode die Hinterleibshöhle durch einen Längsschnitt mittels einer feinen anatomischen Scheere zu öffnen und ihrer Eingeweide zu entleeren. Ausser dem gewöhnlich mit Kothmassen angefüllten Darmcanal gilt dies auch von dem zuweilen sehr massigen Fettkörper und bei den weiblichen Individuen besonders von den Eierstöcken. Bei Käfern schneidet man am besten, indem man die Flügeldecken lüftet, die weiche Rückenhaut des Hinterleibes ein, bei Heuschrecken, Libellen und dickleibigen Schmetterlingen dagegen die Bauchhaut längs ihrer Mittellinie; durch Einbringung einer feinen anatomischen Pincette kann man sehr leicht mit einem oder einigen Griffen die leicht zerreisbaren Eingeweide durch die Schnittöffnung hervorziehen und mit der Scheere abtrennen. Da die Hinterleibshöhle meist noch längere Zeit nachher nässt, ist es zweckmässig einen Streifen Löschpapier einzubringen und diesen nach Bedarf zu erneuern, bis sich keine Feuchtigkeit mehr in denselben einsaugt. Selbst bei dieser Behandlung verändert sich an vielen Heuschrecken, Libellen u. A. die Körperfärbung immer noch merklich; es wird jedoch wenigstens durch Beseitigung der Fäulniss das Insect vor dem Zerfall geschützt und bietet dann auch für die leicht sich einstellenden zerstörenden Würmer eine geringere Anziehungskraft dar.

Nach völliger Austrocknung können die mit Flügeldecken versehenen (letzterwähnten) Insecten behufs ihrer Versendung gleichfalls auf Nadeln gespiessert werden; es muss dies jedoch in der Weise geschehen, dass die Nadel nicht durch den auf den Kopf folgenden Körperabschnitt (Prothorax), sondern durch die rechte Flügeldecke geführt wird. Der Einstich geschieht etwa am Ende des ersten Drittheils der Länge dieser Flügeldecke, näher der Mittellinie (Naht) als dem Aussenrande; maassgebend für die Stelle des Einstiches auf der Rückenseite ist der Ansatz des zweiten und dritten Beinpaares, zwischen welchen die senkrecht durchgeführte Nadel unterhalb wieder heraustreten muss. Sonst ist übrigens ein Spiessen dieser mit Flügeldecken versehenen Insecten, besonders der Käfer, zu ihrer Conservirung und Verpackung nicht unbedingt nöthig. Dieselben können, wenn es mit Vorsicht geschieht, ebensogut in Löschpapier eingewickelt werden, wobei zu beachten ist, dass alle grösseren Insecten einzeln, d. h. jedes für sich in eine fest zu-

gedrehte Düte zu bringen ist. Diese Papierdüten werden dann, lose auf einandergeschichtet, in einen Blechkasten gebracht, welcher mit etwas Campher zu versehen und darauf durch Zulöthen des Deckels fest zu verschliessen ist. Kleinere Käfer schichtet man zwischen Lagen von Löschpapier in kleinere, gleichfalls gut zu verschliessende Papp- oder Holzschachteln, so fest, dass sie, ohne gedrückt zu werden, sich nicht verschieben können. — Ein durchaus verwerfliches, wiewohl vielfach angewandtes Verfahren ist die Verpackung sowohl solcher hartflüglicher wie auch der übrigen Insecten zwischen Sägemehl, da dieses stets mit ihnen verklebt und alle feineren Theile, wie Fühlhörner, Haare, Borsten u. s. w. verdirbt oder abbrechen macht!

Um Raum zu ersparen, hat man das Einschlagen in Papier neuerdings auch vielfach für die Schmetterlinge in Anwendung gebracht und damit wenigstens für die dünnleibigen Tagfalter, welche nach dem Tode ihre Flügel über dem Rücken aneinander legen, verhältnissmässig günstige Resultate erzielt. Während dieses Verfahren für alle übrigen Schmetterlinge durchaus zu verwerfen ist, kann es — da sorgsam auf Nadeln gespiesste Exemplare stets sehr viel besser conservirt werden — für die Tagfalter wenigstens als Nothbehelf gelten. Es wird für diese in der Weise in Anwendung gebracht, dass man sich Papierstücke verschiedener Grösse von Quadratform schneidet, dieselben in der Diagonale zur Dreiecksform zusammenknüpft und, nachdem zwischen die beiden Blätter des Dreiecks ein einzelner, zuvor gut getrockneter Falter gelegt worden ist, die Ränder der beiden offen bleibenden Seiten zusammenfaltet. Die so hergestellten flachen Düten werden dann gleichfalls, lose auf einander geschichtet, in Blechkästen oder gut schliessenden Holzschachteln aufbewahrt.

Viele Mühe verursacht dem Insectensammler in den Tropen einerseits das Austrocknen, andererseits der Schutz der gesammelten Vorräthe vor zerstörenden Elementen, als welche besonders Schimmel, Ameisen, Termiten, Schaben, verschiedene Käferlarven (*Dermestes*, *Anthrenus*) u. A. zu nennen sind. Zerstörende Insecten, welche oft massenhaft in menschliche Behausungen eindringen, hält man am besten einerseits durch scharf riechende Substanzen, wie Campher, Rosmarin- und Cajeput-Oel, Naphthalin, Carbonsäure, welche man in die zur Austrocknung und Aufbewahrung dienenden Behälter bringt, ab; andererseits auch dadurch, dass man ihnen den Zugang zu denselben abschneidet, indem man etwa die Füße des Tisches, auf welchem die Vorräthe getrocknet werden, in Wasserbehälter stellt, ferner Deckel von feilöcheriger Draht- oder Garngaze über die Sammelschachteln stülpt. Um das Austrocknen zu beschleunigen und Schimmelbildung zu verhüten, möchte sich wohl am meisten empfehlen, in die mit frisch gesammelten Insecten gefüllten Behälter Chlorcalcium zu bringen, ausserdem diese Behälter einer möglichst starken Zugluft auszusetzen. Natürlich werden sich dergleichen Proceuren je nach den localen Verhältnissen zu richten haben und letztere den Sammler am besten auf die Wahl der anzuwendenden Mittel hinweisen.

Während die bisher genannten ausgebildeten, d. h. fortpflanzungsfähigen und meist mit Flügeln versehenen Insecten durchweg in getrocknetem Zustande aufzubewahren sind, verhält es sich mit ihren früheren Entwicklungsstadien, den Larven (Raupen) und Puppen gerade umgekehrt. Diese schrumpfen, wenn sie getrocknet werden, wegen der Zarthäutigkeit ihres Körpers nach dem Tode bis zur Unkenntlichkeit zusammen und müssen daher zu ihrer Erhaltung in Weingeist aufbewahrt werden. Viele, wie die lebhafter (grün, roth, gelb) gefärbten Schmetterlingsraupen, büssen dabei

zwar in der Regel ihr Colorit ein; doch wird dann wenigstens noch ihre Form erhalten. Bei ihrem Einsammeln ist auch darauf zu achten, dass der Weingeist, in welchem sie getödtet worden sind, weil er in der Regel durch sie verunreinigt und jauchig gemacht wird, nach Verlauf einiger Tage zu beseitigen und durch neuen zu ersetzen ist. Zur Tödtung ist stärkerer (etwa 80⁰/₀er), zur späteren Conservirung etwas schwächerer (von etwa 60⁰/₀) zu empfehlen. Dass solche Insectenlarven nicht zusammen mit Schlangen, Eidechsen, Fröschen oder dergl. in dieselben Behälter geworfen werden dürfen, kann als selbstverständlich gelten; aber auch das Zusammenwerfen sehr heterogener und zahlreicher Larven in ein und dasselbe Glas ist nicht anzurathen, einerseits weil die zarteren von den härteren und grösseren leicht beschädigt werden, andererseits weil dann eine Bezeichnung des Fundortes, der Futterpflanzen u. s. w. für die einzelnen Arten nicht möglich ist.

Beobachtungen und darauf bezügliche Notizen.

Wenngleich die Beschaffung wohl erhaltener Exemplare seltener und bis dahin unbekannter Arten das erste und hauptsächlichste Ziel des Sammlers in wenig durchforschten oder neu betretenen Gebieten der Erdoberfläche sein muss, so hat sich darauf seine Thätigkeit doch keineswegs zu beschränken, wenn sie einen wirklichen Gewinn für die Wissenschaft abwerfen soll. Farbenprächtige und grosse Schmetterlinge und Käfer dienen den Liebhabern als Augenweide, den naturhistorischen Museen vorwiegend als Schaustücke, an welche sich ein allgemeineres wissenschaftliches Interesse verhältnissmässig selten, oder nur dadurch knüpft, dass directe, ihre Lebensweise betreffende Beobachtungen vorliegen. Solche nach Möglichkeit und bei jeder sich darbietenden Gelegenheit anzustellen und darüber genaue Notizen niederzuschreiben, ist die ungleich höhere und die wissenschaftliche Kenntniss des Gegenstandes wahrhaft fördernde Aufgabe des Sammlers, welche er um so vollkommener lösen wird, wenn er seine Aufmerksamkeit auch den weniger ansehnlichen, in ihrer Lebensweise, Fortpflanzung, Entwicklung u. s. w. meist aber sehr viel merkwürdigeren Insecten aus den Abtheilungen der Zweiflügler, Aderflügler, Netzflügler u. A. zuwendet. Wenn dergleichen Beobachtungen selbst für einen grossen Theil der inländischen Insecten entweder noch ganz fehlen oder in ihrer Vollständigkeit noch viel zu wünschen übrig lassen, so ist damit schon von selbst der Hinweis gegeben, ein wie weites und vollständig brach liegendes Feld der Thätigkeit eines intelligenten Beobachters in den übrigen Erdtheilen und vor Allem innerhalb der so überreichen Tropengegenden eröffnet ist. Was aus diesen bekannt ist, beschränkt sich dem grösseren Theil nach nur auf die in todtten Exemplaren eingesandten Individuen, aus deren Vergleich sich der Kenner den Artbegriff erst zu construiren hat, sehr häufig aber über denselben in Zweifel bleibt; die Grenzen der Art bei auffallender Abänderung der Individuen, bei stärkerer oder totaler Form- und Färbungsdifferenz der beiden Geschlechter, ihre Beziehungen zu der umgebenden Natur (Pflanzen, anderen Thieren, Parasitismus u. s. w.), ihr Entwicklungsgang, Aufenthalt u. dergl. sind von der Mehrzahl zur Zeit noch unbekannt, deshalb aber natürlich um so wissenschaftlicher. Die Punkte, auf deren Erledigung sich die Aufmerksamkeit des Sammlers besonders zu richten hat, möchten hauptsächlich folgende sein:

1. Die Feststellung der Art nach den beiden Geschlechtern

(Männchen und Weibchen). Bei zahlreichen Insecten sind Männchen und Weibchen einander so ähnlich, dass die Unterschiede erst aufgesucht werden müssen, oder letztere den Uebereinstimmungen gegenüber so zurücktreten, dass die Zusammengehörigkeit auch ohne directe Beobachtung, lediglich durch Betrachtung des todtten Materials festgestellt werden kann. Von dieser Regel sind jedoch zahlreiche Ausnahmen vorhanden, in denen sich die Unterschiede der beiden Geschlechter allmähig bis zu totaler Verschiedenheit in Form, Structur, Färbung und Grösse steigern können. Beispiele davon bieten gewisse Gattungen und Familien in allen Insectenordnungen dar; unter den Orthopteren besonders die Raub- und Gespenstheuschrecken (Mantis, Phasma) in Grösse, Form und Färbung, die Schaben (Blatta) in Färbung und Form (Weibchen oft flügellos, wenn die Männchen geflügelt sind), die Libellen (in Färbung des Körpers und der Flügel); unter den Käfern die Blatthornkäfer (Cetonia, Goliathus, Copris, Onthophagus, Hirschkäfer: Lucanus), viele Bockkäfer (Cerambyx), Leuchtkäfer (Lampyris), Schmiede (Elater), bald in der Färbung, bald in der Form einzelner Körpertheile, wie Fühlhörner, Beine, hornartige Auswüchse auf Kopf und Prothorax, geweihartige Kiefer (Hirschkäfer, Bockkäfer), bald in der Grösse, dem Mangel resp. der Ausbildung von Flügeln u. s. w.; unter den Zweiflüglern die Bremsen (Tabanus) u. A. in der verschiedenen Grösse der Augen und der Körperfärbung, die Mücken und Schnacken (Culex, Tipula) in der Bildung der Fühlhörner, die Raubfliegen (Asilus) in der Bildung der Hinterleibsspitze, zuweilen auch in Rumpf- und Flügelfärbung. Bis zu völliger Verschiedenheit im ganzen Habitus sind aber diese Differenzen zwischen Mann und Weib besonders bei vielen Schmetterlingen und Aderflüglern ausgeartet, so dass in vielen Fällen ohne einen directen empirischen Nachweis der Zusammengehörigkeit die Artidentität absolut nicht zu ermitteln ist. Unter ersteren ist besonders die Gattung Papilio (Ritter, Equites Lin.), deren meiste Arten sich durch geschwänzte Hinterflügel kenntlich machen, zu erwähnen; Männchen und Weibchen sind hier oft wie Tag und Nacht verschieden gefärbt und zum Theil auch verschieden gestaltet, so dass beide sehr oft als besondere, weit von einander getrennte Arten beschrieben und abgebildet worden sind. Aehnliches gilt auch für andere Tagfalter aus den Gruppen der Nymphaliden (Schillerfalter und Verwandte) und Lycaeniden (Männchen mit hellblauen oder feuerrothen, Weibchen mit dunkelbraunen Flügeln), während bei den Nachtfaltern häufiger die Fühlhörner, die Körpergrösse, die Ausbildung der Flügel (Weibchen zuweilen flügellos) u. s. w. mehr oder weniger ausgeprägte Unterschiede zeigen. Unter den Aderflüglern (Hymenoptera) sind Männchen und Weibchen einer und derselben Bienenart (Xylocopa, Megilla, Megachile) sehr häufig ganz und gar verschieden gefärbt und gestaltet; bei denjenigen Arten, welche in grossen Colonien leben (Hummeln, Honigbienen) auch die ungeschlechtlichen Arbeiter von den fruchtbaren Weibchen in der Grösse auffallend (um das Doppelte und Dreifache) verschieden. Die beiden Geschlechter vieler Mordwespen (Meria, Thynnus, Mutilla) machen den Eindruck, als gehörten sie ganz verschiedenen Familien an, indem besonders bei den beiden letzten Gattungen die Weibchen flügellos und buntscheckig, die Männchen geflügelt und oft viel dunkler, einfarbiger sind.

In solchen Fällen ausgeprägter Geschlechtsdifferenz ist begreiflicher Weise die Feststellung der Zusammengehörigkeit nur auf Grund directer Beobachtung möglich. Eine solche kann auf zweierlei Weise bewirkt werden: 1) beim Sammeln durch den Fang verhängter, d. h. in der Begattung befindlicher Paare. 2) durch die Zucht aus Eiern oder aus Larven, von denen

erstere von einem und demselben Weibchen abgesetzt, letztere in Gemeinschaft gefunden und als übereinstimmend in Form, Färbung, Nahrung u. s. w. beobachtet worden sind. Der Fang copulirter Paare ist bei Schmetterlingen, Käfern, Wanzen, Zweiflüglern, Libellen, Heuschrecken u. A. nicht gerade selten, gehört dagegen bei den Aderflüglern (Bienen, Wespen, Grab- und Schlupfwespen) zu den Ausnahmefällen. Sowohl bei jenen wie ganz besonders bei letzteren ist eine die beobachtete Paarung betreffende Notiz (oder ein Aufstecken beider Individuen auf eine und dieselbe Nadel) natürlich von besonderem Belange; aber auch schon eine Andeutung, dass das constante gemeinsame Vorkommen einer männlichen und weiblichen Form die Vermuthung ihrer Zusammengehörigkeit nahe legt, ist, als Anhalt gewährend, wünschenswerth. Ueber die Züchtung zweierlei, in Form oder Färbung verschiedener Individuen aus gleichen Larven, welche besonders bei Schmetterlingen zu ermöglichen ist, wird selbstverständlich gleichfalls eine möglichst eingehende Notiz zu geben sein.

2. Die Feststellung der Art nach ihren verschiedenen Formen.

a) Diese Formen können entweder nur Abänderungen der beiden Geschlechter in Grösse, Gestalt und Färbung sein und als solche dann entweder gleichfalls durch die Zucht aus Eiern oder Larven oder durch ihr gemeinsames häufiges Vorkommen an einem und demselben Fundort, z. B. unter Baumrinde, in Dung, auf den Blüthen derselben Pflanze u. s. w. ermittelt werden. Bei der Zucht aus Larven sind von diesen sowohl wie von den Puppen einige Exemplare in Weingeist aufzubewahren und als den entwickelten Insecten angehörig zu bezetteln.

b) oder diese Formen können, wie bei Termiten, Ameisen, geselligen Bienen und Wespen, die nach Alter, Function u. s. w. verschieden gestalteten und verschieden grossen Mitglieder eines gemeinsamen Insectenstaates repräsentiren. Es finden sich also z. B. in einem Termitennest, welches unter oder über der Erdoberfläche, im Innern von Bäumen u. s. w. angelegt sein kann, zu allen Zeiten Larven, Arbeitertermiten, die durch einen grossen Kopf ausgezeichneten Soldaten und eine Königin (trächtiges Termitenweibchen von Fingerdicke und bis zwei Zoll Länge), sämmtlich ungeflügelt, aber in ihrem Aussehen auffallend von einander verschieden, zu anderen Zeiten ausserdem noch Nymphen (blass gefärbt, mit Flügelstummeln) und geflügelte Männchen und Weibchen (dunkler gefärbt und mit vier Flügeln versehen) vor. Alle diese gemeinsam lebenden Formen sind, da es auf die Kenntniss ihrer Zusammengehörigkeit besonders ankommt, in möglichst grosser Individuenzahl zu sammeln und, da es sich bei ihnen um anatomische Untersuchung handelt, in Weingeist aufzubewahren. Bei den Ameisen, welche meist gleichfalls in grossen, unter oder über dem Erdboden befindlichen Colonieen leben, kommt es hauptsächlich auf die Zusammengehörigkeit der geflügelten männlichen und weiblichen Individuen mit den flügellosen Arbeitern (zuweilen gleichfalls in mehreren, durch Grösse des Körpers, Dicke des Kopfes u. s. w. unterschiedenen Formen repräsentirt) an; während letztere nebst Larven, Puppen und einem oder mehreren grossen, dickbauchigen (flügellosen) Weibchen zu jeder Jahreszeit in der Colonie sind, gehen die geflügelten Individuen aus dieser nur zu einem bestimmten Termin hervor, um sich in der Luft zu begatten (Schwärmen). Beim Auffinden solcher im Schwärmen befindlichen Colonieen, ebenso bei denjenigen von Bienen- und Wespenstaaten ist gleichfalls ein Ein-

sammeln zahlreicher Individuen der verschiedenen Formen wünschenswerth; hier sind jedoch nur die weichen (fusslosen) Maden und Puppen in Weingeist aufzubewahren, die ausgebildeten Insecten dagegen auf Nadeln zu spießen. Unter den ameisenartigen Insecten ist besonders auf die in unterirdischen Colonieen lebenden Dorylusarten, deren Arbeiter augenlosen und ungeflügelten Ameisen gleichen, deren grosse Männchen dagegen mehr an eine blassbraun gefärbte Wespe (mit Flügeln, Augen und langem, cylindrischem Hinterleib) erinnern, aufmerksam zu machen. Die Männchen schwärmen zusammen mit zahlreichen Arbeitern (im tropischen Afrika und Asien) nicht selten aus einem und demselben Erdloche aus; um das bisher nicht sicher gekannte, vermuthlich aber gleichfalls augen- und flügellose Weibchen, welches wahrscheinlich den Männchen an Grösse gleichkommen, den Arbeitern dagegen mehr im Aussehen ähneln wird, aufzufinden, ist es nöthig, den unter dem Erdloche liegenden Grund aufzugraben und auf die Anwesenheit besonderer Höhlungen, Zellen oder dergl., in welchen die Weibchen sich aufhalten dürften, genau zu untersuchen. Auch diese Dorylus sind behufs anatomischer Untersuchungen nach allen ihren, in Gemeinschaft angetroffenen Formen in Weingeist aufzubewahren.

c) diese Formen können, auch ohne dass ein Staatenleben der Anlass ist, ferner dadurch in der Drei- oder Mehrzahl vorhanden sein, dass entweder zu einer und derselben weiblichen zwei verschiedene männliche oder zu einer und derselben männlichen zwei oder mehr verschiedene weibliche gehören. Derartige Fälle sind einerseits bei gewissen Libellen, andererseits bei verschiedenen Tagfaltern (Papilio, Heliconier) beobachtet worden, könnten sich indessen leicht auch noch auf andere Insecten ausdehnen. Zuweilen kommen die beiden Formen desselben Sexus an einer und derselben Localität vor; in anderen Fällen hat ein und dasselbe Männchen in verschiedenen Gegenden verschieden gestaltete und gefärbte Weibchen (z. B. Pap. Pammon Lin.). Zur Feststellung derartiger besonders interessanter Verhältnisse wird, z. B. bei Schmetterlingen, die Zucht aus den Larven, resp. Puppen den sichersten Anhalt gewähren; indessen auch eine Beachtung der in Copula gefangenen Paare wird zu ihrer Ermittlung beitragen.

3. Die Feststellung der Lebensbeziehungen zweier oder mehrerer Arten zu einander, besonders die Abhängigkeit der Existenz einer Art von einer anderen betreffend. Solche Beziehungen lassen sich vielfach schon durch aufmerksames Sammeln, durch den Nachweis eines häufigen oder constanten gemeinsamen Vorkommens zweier Arten erkennen, andere, zu denen der Parasitismus der einen Art auf Kosten einer anderen gehört, erst durch die Zucht des Wirths- oder Nährthieres feststellen. Der erste Fall betrifft z. B. das regelmässige Vorkommen bestimmter Gattungen und Arten von Käfern in den Colonieen gesellig lebender Insecten, wie Ameisen, Wespen, Termiten u. s. w. oder das Schmarotzen der einen Bienen-, Grabwespen-, Goldwespen- u. s. w. Art in den von anderen zur Auffütterung ihrer Brut angelegten Nestern oder Zellen, welches sich daran erkennen lässt, dass der Schmarotzer in die Wohnung des bauenden Insectes eintritt, sobald letzteres dieselbe verlassen hat, um neues Futter einzutragen. Ueber alle solche durch oft wiederholte und genaue Beobachtungen festgestellte Beziehungen sind Notizen ebenso erwünscht, wie über die aus Raupen und Puppen (bei Züchtung von Schmetterlingen) erhaltenen parasitischen Zweiflügler (Tachina, Ichneumon, Chalcis u. A.), welche dann am besten

mit derselben Nummer wie diejenige Art, aus welcher sie erzogen worden sind, versehen werden.

4. Die Feststellung der Lebensbeziehungen gewisser Insecten zu anderen Thieren, besonders Wirbelthieren. Zu diesen gehört zunächst die Gewohnheit oder Liebhaberei gewisser Insecten, die Schlupfwinkel, Nester u. s. w. höherer Thiere, besonders der Raub- und Nagethiere unter den Säugern, so wie zahlreicher Vögel aufzusuchen und in diesen zu verharren; daher man die Lager- und Brutstätten derselben stets auf solche Einmiether zu untersuchen hat. Eine ungleich nähere und daher auch viel allgemeiner verbreitete Beziehung ist der Parasitismus bestimmter Insecten an Wirbelthieren und zwar kann derselbe ebensowohl ein äusserlicher, nach Art der Flöhe, Läuse, Zecken u. s. w., wie ein innerer nach dem Vorbild der Eingeweidewürmer sein. Auf der Haut, zwischen dem Pelz der Säugethiere und den Federn der Vögel finden sich meist nur ausgebildete Insecten, im Innern der Körper- (Leder-) Haut, in der Nasen- und Rachenhöhle so wie im Darmcanal dagegen nur Larven. Besonders interessante äussere (Haut-) Parasiten haben alle Fledermäuse, z. B. die kleinen Spinnen ähnelnden, flügellosen Dipteren aus der Gattung *Nycteribia*, fast alle Vögel, (Lausfliegen, Federläuse), manche Hufthiere: Einhufer, Hirsche, Hohlhörner u. A. (gleichfalls Lausfliegen). Da dieselben meist sehr verborgen, in Einfaltungen der Haut, bei den Fledermäusen z. B. in den Achseln der Arme, tief zwischen dem Pelz, am Grunde der Federn (bei Vögeln) u. s. w. sitzen, so ist zum Auffinden derselben schon eine genauere Untersuchung des frisch geschossenen Thieres, welches sie bald nach seinem Ableben verlassen, nothwendig. Leichter machen sich beim Abziehen des Felles die im Innern der Lederhaut steckenden, oft sehr dicken und ansehnlich grossen parasitischen Larven dadurch kenntlich, dass sie beulenartige Anschwellungen hervorrufen. Sie kommen vor Allem bei Hufthieren (Hirschen, Hohlhörnern), zuweilen auch bei Nagethieren und Raubthieren vor, sitzen bald am Rücken, bald in der Bauchhaut und gehören den Dasselfliegen (*Oestrus*) an. Da sie sich nach Tödtung des Wirthsthieres nicht weiter entwickeln und sich also nicht züchten lassen, so sind sie mit Angabe des Namens ihres Trägers in Weingeist aufzubewahren; ebenso ähnliche Larven, welche man in der Nasen- und Rachenhöhle geschossener Hirsche und Antilopen (vielleicht auch Giraffe, *Rhinoceros*, *Tapir*, *Elephant*?), im Darmcanal der Einhufer (vielleicht auch *Zweihufer*?) antrifft. Gelingt es jedoch, solche bereits ausgewachsene Larven in dem Koth ihrer Wirthsthiere (*Zebra*, *Esel*, *Rhinoceros*, *Elephant*?) aufzufinden oder dieselben, nachdem sie aus der Nasen- und Rachenhöhle der Hirsche, Antilopen, Kameele, Schafe, Rinder u. s. w. durch Niesen entleert worden sind, zu erhalten, so ist der Versuch zu machen, aus ihnen das ausgebildete Insect zu erziehen. Man hat dazu die vollwüchsigen Larven (als Engerlinge der Hufthiere bezeichnet) nur einfach in ein Gefäss mit leicht angefeuchtetem, etwas backendem Sand zu legen, in welchen sie sich dann von selbst oberflächlich eingraben, um sich in demselben zu verpuppen; die Fliege geht aus ihnen nach verhältnissmässig kurzer Zeit (2 bis 4 Wochen) hervor. Da alle diese in Säugethieren parasitirenden Bies- oder Dasselfliegen grosse Seltenheiten und von zahlreichen tropischen Thieren überhaupt noch nicht bekannt sind, so ist denselben in allen Ländern eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen und besonders ihre Zucht aus Larven (unter genauer Angabe des Wirthsthieres) anzustreben. Das an Hufthieren so reiche Afrika verspricht davon eine besonders ergiebige Ausbeute.

5. Feststellung der Lebensbeziehungen der Insecten zu be-

stimmten Pflanzen. Sind Angaben darüber, auf welchen Pflanzen sich bestimmte Insectenarten constant oder mit besonderer Vorliebe aufhalten, überhaupt schon vielfach von Interesse, so ist die Kenntniss der ersteren um so erwünschter, wenn sie sich als die ausschliesslichen Nahrungspflanzen besonders der Larven (Raupeu u. s. w.) herausstellen und durch die Zucht der letzteren als solche um so sicherer festgestellt werden können. Ist dem Sammler der wissenschaftliche Name der betreffenden Pflanze nicht bekannt, so ist die Aufbewahrung eines eingelegten Blattzweiges, resp. Blütenstandes, mit Hinweis auf das sich davon ernährende Insect wünschenswerth. Ein besonderes Interesse gewähren, als bis jetzt noch sehr wenig bekannt, die von zahlreichen ausländischen Insecten hervorgerufenen Pflanzendeformationen, welche, im Allgemeinen als „Gallenbildungen“ bezeichnet, sich an den verschiedensten Theilen der Gewächse, wie Blüten, Blätter, Früchte, Stengel, Wurzel vorfinden und oft schon durch Grösse und abenteuerliche Gestalt auffallen. Ihr wissenschaftlicher Werth ist natürlich um so grösser, wenn das sie erzeugende Insect bekannt, wo möglich aus solchen Deformationen durch die Zucht erhalten worden ist. Das Einlegen und Pressen solcher mit Gallenbildungen versehener Pflanzen ist jedoch deshalb nicht zu empfehlen, weil dadurch die charakteristische Form der ersteren verloren geht; weiche, nachgiebige Deformationen sind daher in Weingeist aufzubewahren, resistente, wie z. B. holzige dagegen im trockenen Zustand einzusenden.

6. Ermittlung der bei manchen Insecten vorhandenen Instincte und Kunstfertigkeiten. Solche sind besonders bei vielen Arten der Hautflügler (Hymenoptera), ausserdem auch von den Termiten (unter den Orthopteren) so wie von Seiten gewisser Insectenlarven (Ameisenlöwe: *Myrmeleon* u. A.) bekannt, bedürfen aber zu ihrer näheren Kenntniss bei den ausländischen Formen noch weiterer und genauerer Beobachtungen. Besonders ist es die Anfertigung der von solchen Insecten zur Auffütterung ihrer Brut angelegten Bauten (Zellen, Waben, Nester), welche nähere Aufmerksamkeit verdient und für deren Kenntniss eine Aufbewahrung und Einsendung der oft sehr kunstvoll ausgeführten Bauten selbst erwünscht ist. Unter den Hymenopteren legen z. B. die Weibchen der Sand- und Grabwespen, der Mauerwespen, der einsam lebenden (solitären) Bienen entweder einzelne oder zu Gallerieen vereinigte Zellen von Lehm, Thon, Holzspänen, abgeschnittenen Blattstückchen an oder sie höhlen behufs Herstellung ihrer Gallerieen Aeste und Zweige von Bäumen und Sträuchern aus, benutzen dazu auch schon von vornherein hohle Stengel oder Schäfte von Rohr u. dgl. Die Grab- und Mauerwespen tragen in diese Zellen zur Nahrung für ihre Brut andere, von ihnen todtegebissene oder gelähmte Insecten, Raupeu, Spinnen u. s. w. ein, während die Bienen ihre Zellen mit Pollen von Blüten, mit Honig oder mit Beidem anfüllen. Bei den in Staaten, d. h. in einer Gemeinschaft zahlreicher Individuen lebenden Honigbienen (*Apis*, *Trigona*), Hummeln und Papier- oder Faltenwespen sind die Zellen meist zu Waben vereinigt, dabei aber, je nachdem in demselben fruchtbare Weibchen (Königinnen), Arbeiter oder Männchen aufgezogen werden, von verschiedener Form und Grösse. Da gerade von den ausländischen Honigbienen, deren Königinnen und Männchen das Nest nur ausnahmsweise (behufs der Begattung, Hochzeitsflug) verlassen, bis jetzt fast nur die herumfliegenden Arbeiterformen bekannt sind, so ist eine nähere, auf das Auffinden dieser Weibchen und Männchen gerichtete Beobachtung der Nester selbst, so wie die Aufbewahrung der verschieden grossen und geformten Zellen, aus welchen wo möglich die Insassen durch

Zucht zu gewinnen sind, besonders zu empfehlen. Vor Allem sind in dieser Beziehung die in Ostindien und auf den Sundainseln vorkommenden Honigbienen aus der Gattung *Apis*, welche nach ihren einzelnen Formen und nach ihren Bauten noch so gut wie unbekannt sind, genau zu untersuchen. — Bei dem Einsammeln der sehr mannigfaltig geformten, nicht selten durch ihre Grösse auffallenden Wespennester ist begreiflicher Weise eine Kenntniss ihrer Bewohner von besonderem Belang; es ist daher zum Mindesten von den sogenannten Arbeiterwespen eine Anzahl Exemplare (aufgespiesst) beizufügen. — Bei der Oeffnung und Untersuchung von Termitenbauten und zwar ebensowohl solcher, welche im Erdboden wie in Baumstämmen, Holzpfählen, Gebäuden u. s. w. angelegt sind, ist besonders auf das Auffinden der grossen und dickwandigen Königinzelle (oft von der Grösse eines Eies oder einer Faust) auszugehen; ausser dieser sind jedoch auch andere Theile des aus zahlreichen Gewölben, Kammern, Gängen u. s. w. bestehenden Baues, als für die Kenntniss seiner Anlage, von Interesse aufzubewahren.

7. Angaben über Erscheinungen, welche gewisse Insecten im Leben darbieten, welche dagegen mit dem Absterben verschwinden. Hierher gehören a) Arten, welche mit dem Tode ihre Färbung, ihren Metallglanz einbüssen, z. B. viele Heuschrecken, welche ihre im Leben intensiv rothe, blaue, gelbe und grüne Färbung mit einer fahlgelben oder braunen vertauschen, ferner die Schildkäfer (*Cassida*), welche oft in den herrlichsten Metallfarben (Gold, Silber, Bronze) strahlen, mit dem Tode aber knochengelb werden. In beiden Fällen sind Angaben über das Colorit während des Lebens erwünscht; bei den letzteren (*Cassida*) ist ausnahmsweise ein Aufbewahren in Weingeist oder Glycerin, welche den Metallglanz erhalten, anzurathen. b) Arten, welche an bestimmten Stellen des Körpers während des Lebens leuchten (*Lampyris*, *Pyrophorus* u. A.). Hier sind Notizen über den Ort, die Intensität und Färbung des Lichtes erwünscht. c) Arten, deren Augen im Leben intensiv, oft metallisch gefärbt, bunt gebändert u. s. w. erscheinen; gleichfalls mit Angaben zu versehen. d) Arten, welche im Leben andere Naturkörper (Pflanzentheile, Blüthen, andere Thiere, leblose Gegenstände, z. B. Excremente von Vögeln und Reptilien) nachahmen (*mimicry*) sind als solche zu bezeichnen und sind wo möglich die nachgeahmten Objecte beizufügen.

2. Die Spinnenthier (Arachnoidea).

Die Conservirung der Spinnen ist eine ungleich einfachere und leichtere als diejenige der Insecten. Da man bis jetzt keine Methode ausfindig gemacht hat, sie im getrockneten Zustande unter Erhaltung ihrer Form und Färbung aufzubewahren, so tödtet und conservirt man sie durchweg in Weingeist, durch welchen in allen Fällen ihre ursprüngliche Gestalt erhalten bleibt, während die Färbung sich allerdings nicht selten verändert. Es ist jedoch bei diesem Aufbewahren in Weingeist auch für diese Thiere darauf zu achten, dass erstens nicht zu verschiedenartige Formen in denselben Behälter geworfen werden, besonders nicht weichhäutige und kleine mit hartschaligen, grossen und stacheligen, zweitens aber der erste zur Tödtung verwendete Weingeist nach Verlauf einiger Tage, besonders wenn er sich stark gefärbt hat, beseitigt und durch neuen ersetzt wird.

Bei den Webespinnen, welche sich überall im Walde an Bäumen

und Sträuchern, ferner im Innern von Gebäuden u. s. w. vorfinden und meist schon durch ihre oft grossen Netze leicht in die Augen fallen, ist besonders das Ausfindigmachen der zu einer und derselben Art gehörigen Männchen und Weibchen, von denen erstere meist selten und viel kleiner, oft auch anders gefärbt und gestaltet (besonders durch die keulenförmig verdickten Taster kenntlich) sind, anzuempfehlen. Die mit der Hand schwer zu greifenden Springspinnen (*Salticus*, *Attus*), theils auf Blättern und Blüthen theils an Baumstämmen, Planken u. s. w. anzutreffen, sind am besten mittels des Schmetterlingsnetzes zu fangen. Desselben oder des Kätschers (Streifsackes) kann man sich auch zum Fang der sehr schnell laufenden, meist am Erdboden unter Steinen, abgefallenen Blättern u. dgl. lebenden Jagd- und Wolfsspinnen (*Lycosa*, *Tarantula*), deren Weibchen ihren Eiersack unter dem Bauche tragen, bedienen. Die innerhalb des Erdbodens in selbstverfertigten und oft mit einem Deckel verschliessbaren Röhren lebenden Fallenspinnen (*Oteniza*) verschafft man sich durch Ausgraben; ihre oft sehr grossen (2 bis 3 Zoll langen) nächsten Verwandten, die sogenannten Vogelspinnen (*Mygale*) finden sich theils in Baumlöchern, theils gleichfalls in Erdhöhlungen, welche sie besonders des Nachts, um auf Raub auszugehen, verlassen. Bei ihrem Fange ist einige Vorsicht zu beobachten, da sie einerseits mit ihren Kiefern heftig beißen, andererseits durch ihre leicht abbrechenden, starren Haare leicht eine Hautentzündung an den Händen veranlassen. Auch bei dem Einsammeln der Skorpione, welche sich am Erdboden unter Steinen, unter Laub, Baumrinde, in Felsspalten, nicht selten auch in menschlichen Wohnungen vorfinden, ist in Rücksicht auf den giftigen Stich, welchen sie mittels ihres Schwanzes auszuführen befähigt sind, die nöthige Vorsicht und stets ein Erfassen mit einer langarmigen Zange anzuempfehlen. Ihre Begattung ist zur Zeit noch völlig unbekannt, falls sie also zur Beobachtung gelangt, in ihren Einzelheiten festzustellen. Copulirte Paare sind in gleicher Weise als Desiderate zu bezeichnen, wie trüchtige oder ihre Jungen auf dem Rücken tragende Weibchen (letztere sind bei den Skorpionen und der verwandten Gattung *Phrynus* lebendig-gebärend); von häufig auftretenden Arten sind zahlreiche, an gleichen Orten beisammen gefundene Individuen verschiedener Alters- (Grössen-) Stufen einzusammeln und in einem und demselben Glase aufzubewahren.

Die sogenannten Schneiderspinnen (*Opilio*), in den Tropengegenden durch zahlreiche, sehr bizarre Formen vertreten, sind gleichfalls noch nicht genügend in ihren Geschlechtsunterschieden bekannt; copulirt gefundene Paare sind daher auch von ihnen stets erwünscht. Die mit sehr langen und dünnen (leicht abfallenden) Beinen versehenen Arten fängt man, um sie unverletzt zu erhalten, am Besten durch Ueberstülpen eines Glases.

3. Die Krebsthiere (Crustacea)

gehören der Mehrzahl dem Meere an und sind daher vorwiegend Gegenstand der pelagischen Fischerei. Von den auf dem Lande und im Süsswasser lebenden sind als besonders wünschenswerth folgende zu erwähnen:

1. Die eigentlichen, mit beweglichen Augenstielen versehenen Krebse (Zehnfüssler, *Decapoda*) haben von Süsswasserbewohnern sowohl Lang- (*Macrura*) wie Kurzschwänze (*Brachyura*) aufzuweisen. Die Langschwänze gehören fast durchweg der Gattung der Flusskrebse (*Astacus*) und einigen

von derselben abgeschiedenen Untergattungen (*Engaeus*, *Cambarus* u. A.), einzelne der Garneelengattung *Anchistia* an. Die meisten *Astacus*-arten sind Bewohner grösserer Ströme und der mit denselben in Verbindung stehenden Seen, andere von Gebirgsbächen; einzelne finden sich ferner in unterirdischen Höhlen (Mammuthshöhle in Kentucky) und sind dann blind, noch andere graben sich in der Nähe von Flüssen in den Sand ein (Australien). Alle diese ausländischen Flusskrebse sind, als in den Europäischen Sammlungen sehr dürftig vertreten, der Aufmerksamkeit des Sammlers unter allen Breiten besonders zu empfehlen und in grösserer Individuenzahl beider Geschlechter und verschiedener Altersstufen wünschenswerth. Da man deren bereits aus allen Erdtheilen und aus Nordamerika selbst eine sehr ansehnliche Artenzahl kennt, so ist mit gutem Grunde vorauszusetzen, dass sich bei näherer Nachforschung überall noch viele neue Arten werden auffinden lassen. — Dasselbe ist mit einigen, an den Ufern der Flüsse lebenden und sich oft weit im Innern des Landes vorfindenden Kurzschwänzen aus den Gattungen *Telphusa*, *Gecarcinus*, *Dilocarcinus* u. A., so wie mit gewissen, zwischen Lang- und Kurzschwänzen die Mitte haltenden Formen (*Aeglea*), von denen man einzelne gleichfalls in Gebirgswässern (Chile) gefunden hat, der Fall. Alle diese Krebse lassen sich nur in Weingeist, in welchem sie freilich ihre Färbung verlieren, aufbewahren.

2. Flohkrebse (*Amphipoda*), von den eigentlichen Krebsen durch sehr viel geringere Grösse, ungestielte Augen und den Mangel eines grossen, ungliederten Brustschildes unterschieden, finden sich gleichfalls überall in stehendem sowohl wie fliessendem Wasser, unter Steinen, Anspüllicht u. s. w. Viele derselben machen lebhaft Sprungbewegungen (*Talitrus*), andere (*Gammarus*) rutschen mittels der Seiten ihres seitlich zusammengedrückten Körpers auf ihrer Unterlage sehr gewandt herum. Aufbewahrung gleichfalls in Weingeist.

3. Wasserasseln (*Aselina*), durch flachgedrückten Körper von den vorigen unterschieden und daher mehr den Länd- oder Kellerasseln gleichend, mit den vorhergehenden an gleichen Orten, meist aber mehr an Wasserpflanzen angeklammert lebend.

4. Kiemenfüssler (*Branchiopoda*). Sie gehören zu den merkwürdigsten und interessantesten Süsswasserkrebsen und versprechen bei ihrer ansehnlichen Artenzahl gleichfalls noch eine reiche Ausbeute, besonders in den wärmeren Gegenden aller Erdtheile. Viele derselben (z. B. Wasserflöhe, *Daphnia*) gehen bis auf die geringe Grösse von nur 1 Millim. herab, andere dagegen erreichen eine Länge von zwei Zoll. Die grösseren sind durchweg mit zahlreichen (11 bis 60), sehr zarthäutigen und blattförmigen Beinen, welche sie beim Schwimmen in ununterbrochene Ruderbewegung versetzen, ausgestattet; manche (*Apus*) mit einem grossen unpaaren Rückenschild versehen, andere (*Limnadia*, *Estheria*) in eine zweiklappige Schaaale, welche ihnen das Ansehen kleiner Muscheln verleiht, eingeschlossen, noch andere (*Branchipus*, *Artemia*) ganz unbedeckt. Gewöhnlich finden sich diese Krebschen theils in stehenden Gewässern (Teichen, Gräben), theils in Regentümpeln, welche sich bei Anlass von Gewittern, während der Regenzeit (in den Tropen) u. s. w. vorübergehend gebildet haben, in grossen Massen, meist aber nur während eines beschränkten Zeitraumes vor. Ganz besonders sind auch die Salzseen, welche als der constante Aufenthaltsort gewisser, hierher gehöriger Arten nachgewiesen worden sind, auf dieselben zu untersuchen. Während die grösseren Arten sich dem unbewaffneten Auge

wenigstens dann leicht bemerkbar machen, wenn sie sich im Wasser herumtummeln — was jedoch, da sie sich zeitweise in den Schlamm eingraben, auch bei ihnen nicht durchweg der Fall ist — lassen sich die kleineren nur dadurch erlangen, dass man einen aus dünnem Zeuge verfertigten Streifsack durch das Wasser und zwar besonders über die in demselben befindlichen Pflanzen hinwegzieht, auf dessen Boden sie dann nach Abfluss des Wassers leicht zu bemerken sind. — Aufbewahrung durchweg in Weingeist.

5. Spaltfüssler (Copepoda) leben theils frei im Wasser mit den vorigen zusammen (solche sind durchweg sehr klein, nur einige Millimeter lang), theils als Parasiten auf dem Körper von Fischen, denen sie aus der Körperhaut, aus der Mundhöhle und aus den Kiemen Blut entziehen. Auch diese in grosser Artenzahl existirenden und die mannigfaltigsten, zum Theil abenteuerlichsten Formen zeigenden Krebschen sind sämmtlich von Interesse: daher alle zur Beobachtung kommenden Fische des Süsswassers sowohl wie des Meeres auf ihre Anwesenheit zu prüfen sind. Genaue Angabe über die Fischart, auf welcher sie leben und über die Körperstelle, an welcher sie aufgefunden worden, sind erwünscht. Finden sie sich an den Kiemen oder in die Haut, in die Kopfknochen u. s. w. der Fische eingebohrt, so wird am besten der betreffende Körpertheil mit den Parasiten, ohne dieselben abzulösen, in Weingeist gesetzt.

6. Landasseln (Oniscus, Porcellio, Armadillidium u. s. w.) finden sich überall unter Baumrinde, Steinen und in ähnlichen Verstecken; kugeln sich zum Theil zusammen. In Weingeist einzusammeln.

4. Die Tausendfüssler (Myriopoda).

Im Inlande von geringen Körperdimensionen, erreichen sie unter den Tropen nicht selten die ansehnliche Länge von acht Zoll und darüber. Als lichtscheue Thiere finden sie sich meist den Tag über in Verstecken, an der Erde unter Steinen und abgefallenem Laub, unter Composthaufen, Baumrinde u. s. w., kommen jedoch bei feuchter Witterung aus diesen hervor, um Bäume, Sträucher, Planken, Mauern u. dergl. zu erklimmen. Beim Einsammeln derselben ist zu beachten, dass die abgeflachten, an den einzelnen Leibesringen nur je ein Beinpaar tragenden Scolopendren sich mit ihren scharfen und eine ätzende Flüssigkeit ergiessenden Kiefern heftig zur Wehr setzen, daher mit einer Pincette zu fassen sind. (Die cylindrischen Julusarten sind unschädlich und können daher mit den Fingern ergriffen werden.) Nachdem man sie in Gläser eingesammelt hat, tödtet oder betäubt man sie durch Eintröpfeln von Aether mit Weingeist und erreicht dadurch, dass ihr langer Körper sich — was zur Aufbewahrung und Untersuchung nöthig ist — nicht zusammenrollt, sondern gestreckt bleibt. Um die Thiere in dieser Streckung zu erhalten und sie zugleich vor dem — bei ihnen leicht eintretenden — Zerfallen in einzelne Theile zu schützen, ist es zweckmässig, sie einzeln in cylindrische, ihrer Körperdicke entsprechende Gläser, welche mit Weingeist gefüllt werden, zu bringen. (Viele zusammen in ein Glas gebrachte Tausendfüssler werden durch den Weingeist leicht brüchig und zerfallen.) Werden zwei Individuen in Begattung angetroffen, wie es z. B. bei feuchter Witterung unter den Julusarten nicht selten vorkommt, so sind sie als Männchen und Weibchen derselben Art zu bezeichnen oder in einen und demselben Glase vereint aufzubewahren. Von

einigen, sehr langstreckigen und sich tief in die Erde eingrabenden Scolopendriden (*Geophilus*) ist ein phosphorescirendes Leuchten in der Dunkelheit behauptet worden; weitere Beobachtungen hierüber sind erwünscht. Als besonders geschätzte Gattungen sind die mit einem rüsselartig ausgezogenen Mund versehenen *Siphonophora*, die mit blattartig erweiterten Hinter- (Schlepp-) Beinen versehene Scolopendridengattung *Eucorybas*, so wie die zahlreichen, durch flügelartig erweiterte Körperringe und eine körnige Sculptur ihrer Rückenseite ausgezeichneten *Polydesmus*-Arten hervorzuheben.

Vögel.

Von

Dr. G. Hartlaub.

Journ. Anthropol. Syst. July 21 72 pag. 303 A. W. Franks:

„There is however a point of great importance which relates to the disposal of the collections when they are brought back. It has been too much the habit to consider such objects the property of the officers of the expedition; to be disposed of according to their wish. Should however such collection be made by a scientific expedition there should be clear directions that it should be placed at the disposal of the Government to be deposited in the national museum and the commander of the expedition should see that the main collection contains the best illustrations of the subject“...

Skelettiren eines Vogels *).

Die Herstellung eines Vogelskelett's kann auf Reisen immer nur eine rohe sein. Man verwendet zum Skelettiren natürlich nur Exemplare, die möglichst wenig durch den Schuss gelitten haben, namentlich gern gefangene Vögel. Balg und Skelett von einem und demselben Exemplare zu präpariren, ist unzweckmässig.

Die erste Arbeit ist die Entfernung von Haut, Eingeweiden und möglichst vielen Fleischtheilen, nachdem man das Geschlecht, den Mageninhalt u. s. w. untersucht hat. Dieses Abfleischen und Auswaiden muss womöglich bald nach dem Tode geschehen und ebenso sollte man, wenn dies ausführbar, das Rohskelett sogleich eine Zeitlang (in gemässigten Klimaten 1—2 Tage) in Wasser und zwar am besten in fliessendes senken, weil so am besten das Blut vollständig aus den Knochen entfernt wird. Dann nehme man die Augen mittelst eines löffelartigen Kratzers heraus, trenne den Kopf**) zum Theil oder ganz vom Halse und entferne das Gehirn durch Einschieben von Wollpfropfen und zuletzt durch Ausschwemmen mit Wasser. Die einzelnen Knochen in den Gelenken zusammenhaltenden Bänder und Sehnen lasse man unverehrt. Gerathen erscheint es, da die Etikette verloren gehen kann und die Art oft sehr schwer wieder zu bestimmen sein würde, auch um das Skelett vor Wind und Stoss zu sichern, die äussersten Schwingen und die Schwanzfedern stehen zu lassen. Man kann diese letzteren, wenn sie zu viel Raum einnehmen sollten, etwas beschneiden.

*) Nach Mittheilungen von Dr. Th. v. Heuglin und Dr. A. Pansch.

**) Rich. Owen empfiehlt den Kopf abzulösen und im Thorax zu verpacken: *Man. for Scient. Inquiry* 3 ed. p. 390.

Ist nun der Vogel ziemlich sauber abgefleischt, so lege man Hals und Kopf in die Bauchhöhle, knicke die Füße ganz ein (wie sie der Vogel in liegender Stellung zu tragen pflegt), binde mittelst eines um die Mitte des Körpers gewundenen Fadens oder Bandes Hals, Kopf und Füße in der betreffenden Lage fest und hänge dann das Skelett an einem luftigen, schattigen Orte zum Trocknen auf, nachdem man dasselbe zuvor mit einer Lösung von arsenisaurem Natron ein- oder zweimal bestrichen hat.

Bei grossen Vögeln kann man die Hinterseite des Kopfes und die Unterseite der Zehen mittelst eines Schnittes öffnen, um dadurch das Trocknen zu beschleunigen.

Ist das Skelett trocken, so binde man eine Etikette mit Datum, Fundort, Geschlechtbezeichnung und dem systematischen Namen an die Füße, signire nöthigenfalls auch den Schädel und verpacke das Skelett in Sägemehl oder Spreu oder umwickele dasselbe ordentlich mit Löschpapier. Das Ganze kann man dann noch mit einem Kreuzband von Hede (Werch) oder Bast umschnüren.

Man thut wohl, die Knochen jedes einzelnen Exemplars in eine besondere Schachtel zu verpacken.

Ganz kleine Vögel bewahre man in Spiritus auf, da das trockene Skelett sehr zerbrechlich wird.

Das äussere (Hand-) Gelenk des Flügels erfordert wegen der dort befindlichen kleinen Knochen beim Skelettiren Vorsicht; ebenso die Basis des Schädels zwischen den Unterkiefern. Am Unterschenkel ist das zuweilen sehr dünn auslaufende Wadenbein vor Verletzung zu bewahren; an der Brust der zuweilen sehr zarte Gabelknochen (furcula). Die zwischen ihm, dem Brustbein und den Schulterknochen befindlichen Häute und Bänder suche man zu erhalten.

Von besonderem Interesse ist die Conservirung einiger harten Theile, die nicht eigentlich zum Skelett gehören: des Zungenknochens, des Kehlkopfs und der Luftröhre sowie der Knochenringe des Auges. Der Zungenknochen sitzt am Grunde der Zunge und schlägt sich jederseits mit einem Ausläufer nach hinten und zuweilen hoch am Schädel hinauf. Man bewahrt diese Theile (für die Augenringe natürlich die ganzen Augapfel) in schwächerem Spiritus.

Ornithologie.

In aussereuropäischen Ländern auf dem Gebiete der Ornithologie sammeln und beobachten zu können, dazu ist die oft und sehnlich herbeigewünschte Gelegenheit uns versagt geblieben. Wenn wir dennoch, von der Wichtigkeit der Aufgabe durchdrungen, gern darauf eingegangen sind, die nachstehenden Winke und Anleitungen für Reisende zusammenzustellen, die etwa Gefallen finden sollten an Forschungen in dieser unserer Specialität, so haben wir dabei uns, besonders für die praktische Hälfte, die nöthige Information zum Theil bei Anderen suchen müssen. Es existirt nun eine Anzahl von Schriften, welche unser Thema mehr oder weniger vollständig behandeln und deren sich der weniger geübte oder selbst der ganz Unvorbereitete mit entschiedenem Vortheil bedienen könnte. Aber keine dieser Schriften erschöpft dasselbe in knapper übersichtlicher Gestalt und wir haben es daher vorgezogen, unserer Arbeit in erster Linie die Erfahrungen eines Mannes zu Grunde zu legen, der einen grossen Theil seines Lebens bald unter der heissen Sonne der Tropen, bald auf den eisigen Gefilden des hohen Nordens

als Naturforscher und zwar hauptsächlich als Ornitholog mit glänzendem Erfolge thätig gewesen ist und dessen Competenz in dieser Hinsicht ausser allem Zweifel steht. Es ist Dr. Th. v. Heuglin, dem wir uns für die freundschaftliche Bereitwilligkeit, mit welcher er unserem Anliegen in ausgiebigster Weise entsprochen hat, zu grösstem Dank verpflichtet fühlen. Praktisch und theoretisch vorbereitet wie wenige, und gestützt auf langjährige Uebung, durfte er seine Ansichten über Sammeln, Präpariren und Beobachten von Vögeln auf Reisen mit Fug und Recht als bewährte hinstellen und wir sind fest überzeugt, dass dieselben von jedem seiner Nachfolger unbedenklich adoptirt werden können.

I. Praktischer Theil.

Es ist dem wissenschaftlichen Reisenden, welcher, wenn auch nur nebenbei, die Absicht verfolgt, sein Unternehmen auch für die Ornithologie nutzbar zu machen, dringend anzuempfehlen, sich zu dem Zweck einigermaassen vorzubereiten. Und zwar vor Allem dadurch praktisch, dass er sich im Gebrauche von Schiesswaffen und namentlich des Jagdgewehrs einige Uebung zu verschaffen sucht und dass er an irgend einem geeigneten Institute einen gewissen Grad von Gewandtheit im Präpariren erwerbe, um nöthigenfalls Diener und Eingeborne in dieser Kunst unterweisen zu können. Theoretisch lässt sich kaum nur einigermaassen Werthvolles von einem Reisenden erwarten, dem es um die Ornithologie als Wissenschaft nicht wenigstens zu irgend einer Zeit einmal etwas ernsthafter zu thun gewesen ist. Ja, bei den Rathschlägen und Anweisungen, die hier mitgetheilt werden sollen, muss geradezu vorausgesetzt werden, dass der Reisende bei einiger Vorliebe für unser Fach auch als Beobachter kein völliger Neuling sei. Ist's doch mit dem kritiklosen Schiessen nicht gethan. Gerade auf die unscheinbarsten Formen ist häufig Rücksicht zu nehmen und gerade die Auswahl des Gesammelten bedingt in der Regel den Werth desselben.

Ausrüstung. „Bei der Ausrüstung kommt es darauf an, dass sie in jeder Beziehung ausreichend, sowie darauf, dass sie möglichst compendiös eingerichtet sei.“

Zur Ausrüstung rechnet Heuglin, wo es möglich ist, grössere Gepäckstücke mitzuführen, also bei Reisen zu Schiff oder zu Kameel, einen Feldtisch mit Feldstühlen und eine Präparirkiste, d. h. eine Kiste, welche alles zum Präpariren und Conserviren erforderliche Material, nicht nur für Vögel, sondern überhaupt für Thiere aller Art enthält und welche nebenbei als Tisch zum Arbeiten und zum Aufbewahren der noch nicht ganz trocknen Bälge dient. Ein solcher Präparirkasten (siehe nebenstehende Figur) hat ungefähr die Grösse und Form einer Packkiste, wie sie Kameele tragen. Er ist von starkem Tanennholz von

Präparirkiste mit herausgenommenem oberen Fach und aufgeschlagenem Deckel und Seitenwand.

12—14 Linien Dicke verfertigt und kann mit Eisenblech an den Kanten und Ecken beschlagen werden. Dieser Kasten ist $2\frac{1}{2}$ Fuss lang, $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch und 1 Fuss 3—4 Zoll tief.

Ist der flache Deckel geöffnet, so lässt sich ein Theil der vordern Wand (Klappe) von 5—6 Zoll Höhe horizontal herabschlagen und macht dann mit dem zweiten Boden der Kiste den Präparirtisch aus. Dieser obere Theil der Kiste enthält ein Fach zum Herausheben mit zweckmässiger Eintheilung in verschiedene Fächer, in welchen die Materialien zum Präpariren Platz finden, als Etuis für anatomische Bestecke mit Skalpellen, Pincetten, Scheeren und Kratzern, Nadel und Faden, Schleifsteine, Arseniklösung mit Pinseln, Salz und Alaun zum Gerben, Fließ- und Packpapier, Baumwolle und Werch, Sägespäähne, ein kleines Waschgefäss mit Schwamm, Nägel, Zangen, Eisen-drath, Stecknadeln, Hammer und Beil, Maassstab, Zirkel, Notizbücher, ornithol. Journal, Tinte und Federn, Bleistifte, Farben, kleine Gläser mit verdünntem Spiritus, Etiketten, Loupen, Bindfaden, Schachteln verschiedener Grösse u. s. w. Der untere Theil des Kastens enthält 2 Schubfächer, die sich nach der Vorderseite öffnen, das eine 4, das andere 8" hoch, zur Aufnahme der noch nicht gänzlich fertigen und trocknen Bälge. Beim Haltmachen der Karavane nimmt man diese Fächer zum Lüften heraus.

Fangapparate. Ein oder mehrere eingeborene Jäger werden, namentlich wenn sie mit dem Fang umzugehen wissen, den Wünschen des Reisenden sehr förderlich sein können. Nun sind allerdings grosse Fangapparate meist schwer transportabel, kleinere aber, Trappfallen (Tellereisen, Schwanenhäule), Schlaggärnchen und Stellnetze*) führt man ohne viele Umstände mit sich. Laufschnüren aus Rosshaar und Schnüren kann sich der mit den verschiedenen Fangapparaten vertraute Sammler überall selbst anfertigen.

Schiesswaffen. Das beste Mittel zur Erlangung von Vögeln wie von Säugethieren bleiben aber Schiesswaffen. „Hierzu wählte ich — schreibt v. Heuglin — die besten Doppelgewehre neuesten Systems, nämlich Lefauchaux oder Lankaster. Sie haben den Vortheil, dass sie seltener versagen, dass man schneller laden und feuern kann und dass in kürzester Frist jede momentan erforderliche Art von Schrotcaliber eingeführt werden kann. Für sehr zarte Vögel bedarf es des feinsten Vogeldunstes, für sehr grosse der Rehposten und selbst der Kugel.“

„Aber auch die Caliber der Gewehre müssen verschieden sein. Zum Einsammeln ganz kleiner Arten ist ein mit Messing ausgebüchstes Blasrohr mit Lehmkugeln, welche letztere in einer besonderen Form gepresst und dann getrocknet werden, sehr vortheilhaft. Für Vögel von der Grösse eines Sperlings bis zur Drossel schiesse man Schrote Nr. 10—12 mit halber Pulverladung aus einem Hinterladergewehr Caliber 24 oder 28. Für Vögel von Taubengrösse bis zum kleineren Raubvogel eignet sich Caliber 16 oder 14.“

„Bei Wasserjagd empfiehlt sich ein sogenanntes Entengewehr oder eine Doppelflinte Caliber 10 und von 3—3½ Fuss Lauflänge. Ist das Gewehr ein Vorderlader, so sind Schrotpatronen, die den Schuss zusammenhalten und weiter tragen, sehr vortheilhaft.“

„Bei Jagd auf Strausse, Trappen und andere sehr grosse Vögel bediene man sich eines gezogenen Gewehrs von mindestens 2 Fuss Lauflänge, welches eine sehr kleine Rundkugel, 36 bis 40 auf ein Pfund, schiesst.“

„Von Hinterladergewehren hat man nicht mehr als drei verschiedene Caliber der Cartouche mitzuführen. Um letztere möglichst zu sparen, sammle man die nicht geplatzen Hülsen, die sich mit neuen mit einer kleinen Kapsel

*) In Paraguay stellt man gewissen kleineren Papageien mit Garnen nach. Der Vogelsteller baut sich ein Hüttchen, spannt das Garn aus, setzt Lockvögel und erwartet dann ruhig seine Beute. Reugg. Reise in Parag. p. 218.

versehenen Zündstiften wieder laden lassen. Nur ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass bei Anschaffung der Patronen verhältnissmässig mehr Pfropfen gewählt werden. Eine Chevelotpatrone lässt sich oft 3—4mal benutzen. Endlich hatte ich eine Anzahl von metallenen Cartouchen bei mir, 12 Stück für jedes Caliber. Für eingeborene Diener und Jäger sind Hinterladergewehre wohl zweckmässiger.“

„Dann solide, grosse, metallene Pulverhörner und zu jedem Gewehr ein Paar Reservehahnen, Reserveschrauben und Federn, eine Anzahl Cylinder, Ladestöcke, Putzzeug und Schraubenschlüssel.“

„Das Schiesspulver, von dessen Güte viel abhängt, transportirt man am besten in hermetisch geschlossenen Büchsen von Blech oder Zink. Von Schrotten sind anzuschaffen alle Grössen vom feinsten Vogeldunst bis zu Rehposten. Auf 100 Pfund Pulver rechnet man durchschnittlich 400 bis 450 Pfund Blei.“

„Man versäume nie, den eingeborenen Jägern die grösste Sorgfalt in Reinhaltung der Gewehre, namentlich der Battereien und Läufe, einzuschärfen.“

„Jeder Jäger hat neben der wasserdichten Tasche für Munition 2 bis 3 Schrotbeutel, eine Kugeltasche, metallene Schachtel für Zündhütchen, Pfropfenzieher und Schraubenschlüssel bei sich zu führen. Dazu wo möglich noch einen sogenannten Rucksack von starkem Baumwoll- oder Segelzeug, oder eine Netztasche mit vielem Papier (am besten Zeitungspapier) zum Verpacken der erlegten Thiere und zum Laden (als Pfropfen).“

„Als Gehilfen zur Jagd, also zum Tragen des Erlegten, der Reservegewehre, Munition, Lebensmittel und gelegentlich zum Treiben oder Aufstöbern lassen sich Eingeborene leicht abrichten. Diese kennen auch in der Regel am besten den Aufenthaltsort des verschiedenen Wildes und sind häufig höchst geschult im Gebrauche von Pfeil und Bogen.“

„Hunde*) können von grossem Nutzen sein. Aber europäische Jagdhunde halten sich nicht in sehr heissen Gegenden. Man wird sich also erforderlichen Falles der eingeborenen Rasse zu bedienen haben, der freilich das feine Geruchsorgan unserer Vorstehhunde abgeht, die aber doch zum Apportiren sowie als Wächter verwendet werden kann.“

„Ein gutes portatives Fernrohr wird der Jäger oft schmerzlich vermissen.“

Soweit unser Gewährsmann Heuglin über diesen Theil der Ausrüstung. Herr James Edmund Harting, der bekannte treffliche Specialist über die Grallatoren, hat in seinem hübschen Büchlein: „Hints on Shore Shooting with a chapter on skinning and preserving birds“ (London 1871) allerlei auf unseren Gegenstand Bezügliches. „As to the guns, an ordinary 12 bore breechloader with 3 sizes of shot in the cartridges, will kill anything you are likely to come across“. Dabei handelt es sich allerdings zunächst nur um Strandvögel. Harting ist im Allgemeinen sehr für den Gebrauch kleiner Schrotten. „Depend upon it, Sir, small shot is the best.“ Mit Nr. 7 kann man in der Regel allein fertig werden. Dass die Patronentasche wasserdicht, sei unumgänglich nothwendig „for nothing is more annoying than to find after a shower, that the cartridges in your pocket have bulged with the wet and will not go into the gem.“

*) Ueber die Verwendung des Stellohundes zur Jagd von Rebhühnern und Bekassinen in Paraguay vergl. J. R. Rengger, Reise in Par. p. 213. Bei dieser Jagd werden oft Giftschlangen den Hunden gefährlich. Bei der dort so beliebten Wasserjagd auf dem Rio Paraguay sind gute Apportirhunde unentbehrlich. Rengger. l. c. p. 220.

„Recognosciren des Terrains. Der Reisende, der auf fremdem Terrain jagen und sammeln will, würde als seine erste Aufgabe zu betrachten haben, sich durch Excursionen nach allen Richtungen hin mit der Natur der Umgegend vertraut zu machen. Er muss die Flüsse, Seen, Sümpfe und Quellen derselben genau kennen, um zu wissen, wo die Thiere zur Tränke kommen. Günstige Plätze der Art verrathen sich nicht nur aus den Fährten, sondern durch die Umgebung selbst. Jede Form von Landschaft hat bekanntlich ihre eigenthümlichen Insassen aus dem Vogelreich. Im Buschwald sucht man Bienenfresser, Würger, kleine Sänger und die Raubvögel, welche sich von solchen nähren, in der Wüste Lerchen, Sandhühner, Trappen; in der Steppe und im Unterholz hausen vorzugsweise Läufer und Hühnervögel, im Hochwald Kucke, Spechte, Drosseln, Papageien, verschiedene Tauben, an angebauten Stellen Tauben, Hühner, Raben, körnerfressende Finken, auf den Sandbänken Strandläufer, in Brüchen Wasserhühner, auf Seen mit schilfreichem Ufer und überhängenden Bäumen Eisvögel, Pelikane, Enten, Gänse, Cormorane, Seeschwalben, Möven u. s. w.“

„Viele Vögel halten sich nicht nur an bestimmte Gebiete und Vegetationsgürtel auf verschiedenen Meereshöhen, sondern auch an das Vorkommen bestimmter Pflanzen und Thiere, die ihnen zur Nahrung dienen. In Afrika macht man z. B. besonders reiche Ausbeute an blühenden Akazien und Euphorbien, auf riesigen mit Früchten beladenen Feigenbäumen u. s. w.“

„Andere Anhaltspunkte gewähren die zum Theil von der Jahreszeit bedingten Stimmen der Wildniss, die sich von Beginn der Morgendämmerung bis zum Aufgang der Sonne und dann wieder zur kühleren Abendzeit vernehmen lassen, die aber während der heissen Stunden des Tages verstummen. Ein Besuch der Tränkplätze um jene Zeiten ist allemal lohnend.“

„Von manchen besonders scheuen Vögeln, als Falken, Adlern, Kranichen, Reihern erkundet man die Nachtstände, von anderen, als Gänsen, Enten, Pelikanen die Plätze, wo sie während der Dämmerung regelmässig einzufallen pflegen.“

„Zur Zeit des Fortpflanzungsgeschäfts belauscht man das Balzen, Schreien, Kämpfen und Singen der Männchen, das Hacken der Spechte, Kreischen der Kucke, Zermahlen von zarten Früchten, wie es die Papageien thun. Selbst die Loosung, Plätze, wo Hühner und Trappen gescharrt und sich im Sande gepudert haben, lassen auf die temporäre Anwesenheit derselben schliessen.“

„Manche Vögel schiesst man ferner auf ihren Wechsell nach dem Wasser. Auf solchen pflegen die Eingeborenen Laufsclingen und Prügelfallen zu legen, machen auch nöthigenfalls die Wechsel selbst durch Verflechten des Hochgrases und der Büsche, sowie durch Einstecken dornigen Gestrüpps gezwungen.“

„Ein gutes Hülfsmittel für die Jagd auf grosse Raubvögel, Kropfstörche u. dergl. ist das Legen von Köder, Futter und Gift. In der Nähe des Cadavers von irgend einem grösseren Säugethier lege sich der Schütze in den Hinterhalt. Oder man vergifte Fleisch und Eingeweide durch Strychnin oder Cyankalium. Zum Anlocken von kleinen Vögeln kann man sich eines Kauzes oder eines Lockvogels im Bauer bedienen. Viele Arten, als Kucke, Pirole, Tauben, Hühner, Spechte und selbst manche Raubvögel gehen genau auf den nachgeahmten Ruf ihrer Männchen oder Weibchen.“

„Der erlegte Vogel. Der erlegte Vogel ist gewöhnlich da und dort mit Blut befleckt, das aus Schusswunden oder dem Schnabel und den Nasenlöchern fliesst und nicht selten mit Fett, Schleim oder Mageninhalt gemischt

ist. Die Reinigung und Verpackung desselben erfordert Vorsicht und Sorgfalt. Man lässt den Vogel, wenn thunlich, einige Zeit horizontal an einem trocknen Orte im Fleische liegen, in sehr heissen und feuchten Gegenden, wo die Verwesung oft schon nach wenigen Stunden eintritt, aber natürlich nicht zu lange, reinigt die Blutflecke oberflächlich mit Fliesspapier, stopft mittelst des Fingers oder einer Pincette reichlich Fliesspapier oder Wolle in den Schlund und die Nasenlöcher und schliesst die Schusswunden durch einen kleinen spitzkugelförmigen Papierpfropf. Dann nimmt man feinen trocknen Sand (im Nothfall reine Asche oder Erde), streut die fetten und blutigen Stellen damit ein und entfernt dann die das Blut ansaugende Sandmasse, die man ergänzt, bis die Stelle ziemlich trocken ist, wonach man sie wiederholt mit feinem Sand leicht ein- und abreibt. Oft ist die Aftergegend von herausdringenden Excrementen zu säubern, manchmal auch der Kropf zu entleeren. Dann steckt man den Vogel in eine Papierdüte und diese horizontal gelegt in den Rucksack oder das Netz. Sind schon andere Vögel darin, so ist es gut, wenn die grösseren schwereren Stücke unten, die leichteren oben liegen.“

Abbalgen. Bevor man an das Abbalgen des erlegten Vogels geht, hat man denselben im Fleisch zu messen, d. h. seine Totallänge, die Flügelweite und den Abstand der zusammengelegten Flügel von der Schwanzspitze. Dann notire man die Farbe der Weichtheile: Schnabel, Schlund, Zunge, Wachshaut, Augenring, Iris, Füsse, Flügel und etwa vorhandene nackte Stellen. Später ist an dem herausgenommenen Körper der Inhalt des Magens, des Schlundes und der Eingeweide zu untersuchen und vor Allem das Geschlecht. Heuglin machte zu diesem Zweck einen Längsschnitt auf der linken Seite des Unterleibes, nahm Magen und Eingeweide heraus und suchte in der Kreuzgegend nach Hoden oder Eierstock; war die Gegend stark durch Schusswunden verletzt, nach dem Legecanal.

Man versäume nicht, die sich etwa vorfindenden Eingeweidewürmer, sowie die Federläuse (Mallophagen) zu sammeln.

*) Mit einem scharfen Scalpell (Fig. a, b, c) öffnet der Präparator beim Abbalgen die Haut durch einen Längsschnitt vom Brustbein bis gegen den After, nachdem zuvor die Bauchfedern sorgfältig bei Seite gestrichen worden sind. Die Bauchhöhle darf dabei nicht verletzt werden. In manchen Fällen erscheint ein Längsschnitt unter den Flügeln geeigneter und bei Scharben, Enten und ähnlichen Formen macht man denselben auf dem Rücken. Mittelst schwächeren oder stärkeren Drückens des Daumens oder Zeigefingers und der spatalförmigen Spitze des Handgriffs der Scalpelle. nöthigenfalls auch mit dem Messer, löst man nun die Haut in der Nähe des Schnittes um und um vom Körper ab und bestreut diesen sowie die Innenseite der Haut mit Sägespähnen oder dergl. Dann arbeitet man

*) E. Harting empfiehlt als erstes beim Abbalgen den humerus beiderseits zu brechen „the wings will then lie open and be out of the way“. Auch erinnert er daran, dass man vor dem Beginnen mit der Arbeit den Schnabel zusammenbinde, wobei das Wegrutschen des Fadens dadurch unmöglich gemacht wird, dass man ihn durch die Nasenlöcher zieht.

den Rumpf vorsichtig aus der Haut heraus und zwar so, dass die Schwanzgegend zuerst frei wird. Beim Durchschneiden des Afters sucht man das Entleeren von Unrath zu vermeiden. Ist man bis zur Schwanzwurzel gelangt, so trennt man diese durch einen Schnitt von der Wirbelsäule. Dann ist der hintere Theil des Rumpfes frei und die Haut kann hier umgestülpt werden, wie ein Handschuh. Man fährt fort sie immer weiter abzutrennen und gelangt dann zunächst zu den Schenkeln. Hier wird das Gelenk, welches den Oberschenkel mit dem Schienbein (tibia) verbindet, durchgeschnitten, so dass der Oberschenkel am Rumpfe bleibt. Bei den Schultern angelangt, löst man dort die Flügelknochen am oberen (hinteren) Gelenk des humerus aus. Jetzt liegt der ganze Rumpf blos in seiner Verbindung mit dem Halse, welchen man jetzt vorsichtig, sowie endlich auch den Kopf bis zur Schnabelwurzel abstreift. Beim Ueberziehen der Hals- und Kopfhaut über den Schädel bedarf das Auslösen der Haut im Gehörgang und das Durchschneiden der Bindehaut des Auges, sowie das Reinigen der Nippshaut besondere Vorsicht, damit die natürliche Oeffnung des Auges mit dem dasselbe umgebenden Augenlide nicht verletzt werde.

Während dieser Operation des Abstreifens wird von Zeit zu Zeit Sägemehl*) auf Haut und Rumpf gestreut.

Jetzt trennt man den Hals am ersten Wirbel oder am Hinterhauptsloch vom Schädel selbst, der in der Haut bleibt, löst die Zunge und das Zungenbein aus und reinigt den Schädel von Fett und Fleischtheilen. Dann hebt man mittelst eines kleinen löffelfartigen Kratzers (Fig. d) die Augen aus der Augenhöhle. Gelenke und Gelenkflächen werden mit Kratzern und Messern von Fleischtheilen befreit. Das Gehirn entfernt man durch Einführen von Werg mittelst einer Pincette oder eines starken Drahtes in die Hinterhauptsöffnung, die nöthigenfalls etwas zu erweitern ist.

Jetzt geht es an das Reinigen der Kopf- und Halshaut durch Reiben mit Sägespänen, die dann wieder abgestäubt werden. In die äussere Oeffnung des Auges in der Haut führt man ein Klümpchen Baumwolle ein, pinselt Hals- und Kopfhaut mit Arseniklösung ein, ebenso den Schädel und zwar diesen von innen und aussen. In jede Augenhöhle kommt ein fester Wollpfropf von der Grösse und Form des herausgenommenen Auges. In das Hinterhauptsloch wird, nachdem es theilweise mit Werg vollgestopft, noch ein Strang Werg von der Länge des Halses und Körpers fest eingerammt. Dieser Strang muss nahezu die Dicke des Halses haben.

Gut ist's, die Stellen an der äusseren Schädelfläche, wo Muskeln lagen, mit etwas Baumwolle zu unterlegen. Dann wendet der Präparator Kopf und Hals wieder sorgfältig um und sucht den hier und da zerdrückten Federn ihre ursprüngliche Lage wiederzugeben.

Bei manchen Vögeln (Geiern, Gänsen, Enten, Trappen, Flamingos, Spechten u. s. w.) ist jedoch der Hals so eng, dass es unmöglich wird, den Kopf durch die Halshaut herauszuziehen, d. h. Hals- und Kopfhaut umzuwenden. In diesem Fall streife man den Hals so weit von unten nach oben,

*) Englische Präparateure bedienen sich zu dem Zweck des sogenannten „plaster of Paris“ calcinirten Gypses in Pulverform „to absorb the moisture“.

als dies thunlich, durchschneidet die Halswirbel mit Luft- und Speiseröhre und öffnet durch einen äusserlichen Längsschnitt längs des Hinterkopfes und des oberen Theils des Nackens die Kopfhaut. Durch diese Oeffnung präparirt man den Schädel heraus, behandelt das Reinigen und Füllen wie oben und näht durch Kreuzstiche mit Nadel und Zwirn die betreffende Stelle wieder zu.

Jetzt sind nur noch die so weit als möglich aus der Haut herausziehenden Flügel- und Fussknochen zu reinigen. Bei grossen Vögeln ist das Umwenden des Flügels längs des Vorderarms (cubitus) oft kaum möglich, noch weniger das vollkommene Streifen der Handknochen. Um diese Stellen von Fleischtheilen vollständig befreien zu können, mache man auf der Innenseite des Flügels unter den bei Seite geschobenen Cubitaldeckfedern einen Schnitt längs und zwischen Ulna und Radius und setze diesen Schnitt bis zum äussersten Fingerglied fort, löse dann allseitig die Haut von den Flügelknochen, reinige letztere und vergifte Haut und Knochen. Die hier gemachte Oeffnung kann ebenfalls zugenäht werden. Meistens genügt es aber, sie mit etwas Wolle zu unterlegen und die Deckfedern wieder darüber zu breiten.

Von den Fussknochen bleiben also nur Tarsen und Tibia am Balg. Die Tibia streife man bis zum Fersengelenk und womöglich noch etwas darüber hinaus nach dem Tarsus zu, umwickele erstere mit Werg, so dass das abgenommene Fleisch durch letzteres ersetzt wird, vergifte die Haut und wende auch den Fuss wieder um. Bei Vögeln, deren Tarsen befiedert, oder wenn letztere und die Zehen sehr muskulös oder fleischig sind, ist es zweckmässig, die Sohle der Zehen durch einen Längsschnitt zu öffnen, um die Zehenglieder von ihren Muskeln zu reinigen. Um dies auch bei den Tarsen zu thun, öffnet man die Haut am Ballen, löst die Tarsenmuskeln heraus und spritzt Alaun oder arsen. Natron in die Oeffnung bis gegen das Fersengelenk hinauf. Ebenso conservirt man die Zehen und vergiftet dann auch die Aussen- seite derselben, nachdem das entfernte Fleisch durch etwas Baumwolle ersetzt ist. Zuletzt wird die Innenseite der Körperhaut, die Schwanzwurzel und die ihr nahe liegende Fettdrüse sorgfältig gereinigt und vergiftet, und schliesslich werden auch diese Theile umgewendet, d. h. die Innenseite der Haut wird wieder nach aussen gekehrt und das Gefieder etwas geglättet. Damit ist die Operation des Abbalgens vollendet.

Ist die Haut sehr mit Fettzellen erfüllt, so bestreiche man die Innenseite derselben anstatt mit einer einfachen Solution von arsensaurem Natron mit einer dünnen Lage von breiartig geschlemmter mit arsensaurem Natron vermischter Thonerde. Die Haut sehr fatter Schwimmvögel kann man mit etwas Alaun einstreuen, das je nach der Grösse des Vogels 6—12 Stunden darin bleiben mag, dann aber wieder mit Sägespähnen davon abgerieben werden muss.

Es ist rätlich, auch die Nasenlöcher, die Mundwinkel, die Wachshaut und die Augengegend zu vergiften.*)

Es ist gut, den frisch gestreiften Balg eines grösseren Vogels einige Zeit, etwa 6—12 Stunden, liegen zu lassen, ehe man ihm durch Nachstopfen mit geschnittenem Werg seine ursprüngliche Gestalt und Grösse wiederzugeben sucht. Dies geschieht, nachdem die Flügel und Flügelknochen ihre richtige Lage erhalten haben. Der im Hinterkopfe befestigte Wergstrang wird etwas angezogen, damit der Hals nicht zu gestreckt erscheine, und um

*) „Do not neglect to brush the legs and beak with a solution of corrosive sublimate.“ Ch. Darw. Journ. of a Natur. p. 600.

erstere herum füllt man den Körper nach und nach leicht aus, ohne die Haut zu sehr auszudehnen, jedoch auch nicht zu wenig, weil diese sich beim Trocknen etwas zusammenzieht. Auch die Ohr- und Kieferwinkelgegend ist oft mit Wolle etwas nachzustopfen, ebenso die Kehle, erstere durch die Augenöffnungen, letztere durch die Mundspalte. Es erfordert einige Uebung, allen Hauttheilen und Federn mittelst der Pincette wieder ihre alte Lage zu geben.

Stellen, welche während des Abziehens durch Fett oder Blut beschmutzt wurden, wasche man sofort sorgfältig aus, trockne die feuchtgewordenen Federn rasch durch mehrfach aufgedrücktes Fliesspapier und pudere dieselben dann mit trockenem Sande.

Beim Präpariren von Eulen fülle man nicht, wie sonst, die orbita mit Baumwolle, sondern nehme das ganze Auge heraus, öffne dasselbe von hinten, entleere und vergifte es und setze es alsdann gut mit Baumwolle ausgestopft wieder ein.

Skelettiren. Beim Skelettiren eines Vogels streife man einfach die Haut ab, nehme den Inhalt der Bauchhöhle heraus, entferne nur oberflächlich die Fleischtheile an den Knochen und der Wirbelsäule, nehme die Augen aus dem Schädel und entleere das Gehirn, wobei der Kopf am ersten Wirbel ganz oder theilweise vom Halse getrennt wird. Die Bedeckung der Tarsen und Zehen verbleibt, ebenso zur Schonung des Skeletts einige Schwingen und Schwanzfedern. Auch Zungenbein und Luftröhre können stehen bleiben. Jetzt trocknet man das Ganze etwas und vergiftet es, macht es dann schliesslich lufttrocken, etikettirt und verpackt es, selbstverständlich getrennt von den Bälgen.

Es lassen sich ganze Vögel, wie Alfred Newton von Herrn John Hancock mitgetheilt wurde und wie ersterer es als bewährt erprobte, dadurch conserviren, dass man einige Tropfen acid. pyrolignos. mittelst einer Röhre in ihren Schlund träufelt und dass man ihre Federn mit derselben Flüssigkeit saturirt. Nachdem sie etwa eine Stunde getrocknet, kann man sie einfach in Papier verpacken.

Das Conserviren ganzer Vögel in Weingeist ist, will man den Balg erhalten, nicht rathlich, da der Fettgehalt des Gefieders sammt einem Theil der Farben, des Metallglanzes u. s. w. verloren geht.

Das Material zum Präpariren*) besteht in Messern (Scalpellen) verschiedener Form und Grösse, in einigen Pincetten, guten Scheeren und in Kratzern zur Entfernung von Fett und Muskeln. (Ein Paar kleine feine Schleifsteine nicht zu vergessen.) Endlich in einem tüchtigen Vorrath an Papier, Wolle, Werg (Hede), Sägespännen, Stecknadeln, leichtem Holzwerk zu Kisten, Rohr zu Geflechten u. s. w.

Zurichten des Balges. Als Conservativmittel wendet man jetzt, wie schon erwähnt, anstatt der früher gebräuchlichen Arsenikseife eine einfache Lösung von arsensaurem Natron an. Ist die Haut sehr fett, so mischt man dieses mit einem Brei von feiner Thonerde, welche letztere alles Fett ansaugt und den Balg geschmeidig erhält.

Das Trocknen des Balges geschieht in einem trocknen luftigen Raum,

*) E. Harting nennt als die dazu nothwendigen Utensilien: ein scharfes Messer, ein Paar Vogelscheeren, etwas Baumwolle, calcinirten Gyps (plaster of Paris), Arsenikpaste mit der zu ihrer Anwendung erforderlichen Bürste, Nadeln, Faden und eine hölzerne Stopfnadel „with these few items you may skin and preserve anything in the world“.

aber ja nicht in der Sonne. Es darf dies nicht zu langsam, aber noch weniger zu rasch vorgenommen werden.

Ist das Zurichten des Balges in jeder Hinsicht gut gelungen,*) so trocknet er sich am schönsten, wenn er offen oder nur mit einem Stückchen Papier bedeckt auf einer weichen Unterlage (Papier, Wolle) und Rohrgeflecht dem Luftzug ausgesetzt wird. Im anderen Fall steckt man ihn, den Kopf voran, in eine Papierdüte von entsprechender Grösse.

In feuchten Gegenden und während der tropischen Regenzeit muss das Trocknen aber künstlich beschleunigt werden. Zu diesem Zweck legte Heuglin die Bälge auf ein Rohrgeflecht in der Nähe eines Ofens oder Kohlenfeuers oder auch wohl auf ganz trocknen erwärmten Sand.

Wenn der Balg genügend trocken ist, wird demselben die Etikette mit Bezeichnung der systematischen Benennung, des Geschlechts, der Farbe der Weichtheile, des Datums und der Localität angehängt und zwar am Fusse. Dann verpackt man ihn leicht in einem Bogen Papier, der durch Verkleben gut geschlossen wird. Die gesammelten Bälge bringt man schliesslich in Kisten oder Rohrgeflechten unter und sorgt dafür, dass sie nicht an feuchten Orten aufbewahrt und vor Insectenfrass geschützt werden. Ein Nachsehen und Umpacken von Zeit zu Zeit ist unerlässlich. Heuglin liess die Vogelkästen während der Bivouacs gewöhnlich an Baumäste aufhängen und mit einer Haut bedecken. In den Standquartieren kamen sie auf hängende Gestelle oder auf solche, deren Füsse in Gefässen mit Wasser gestellt wurden, um sie für Ameisen und Termiten unzugänglich zu machen.

Lebende Vögel werden dem Reisenden häufig zum Kauf angeboten. Viele Eingeborene verstehen sich auf den Vogelfang. Aber der Transport ist oft schwierig. Man kann sich zu dem Zweck kleiner selbstangefertigter Rohrkäfige (von Bambus, den Stielen von Palmblättern u. s. w.) bedienen.

Eingeweidewürmer und Federläuse bewahrt man in kleinen mit verdünntem Spiritus gefüllten Glaszylindern, die mit einem Papierstreifen beklebt sind, auf dem der Name des Vogels, dem sie angehörten, verzeichnet ist.

Sammeln im hohen Norden. Im hohen Norden ist das Sammeln von Vögeln insofern leichter, als man einen Vogel im Fleisch je nach der herrschenden Temperatur tage-, ja wochenlang liegen lassen kann, ehe man ihn abbalgt. Man hat ihn nur einen kühlen trocknen Raum anzuweisen. Das Trocknen der Bälge hat aber in einem leicht erwärmten und zugleich luftigen Raum stattzufinden. Heuglin construirte sich zu dem Zweck einen grossen viereckigen Rost von $1\frac{1}{2}$ bis 2 Zoll breiten Latten, welchen er an den vier Enden mittelst starker Schnüre in der Nähe des Ofens der Cajüte nahe an der Decke aufhing. Die Oberfläche dieses Rostes, auf dem die Bälge 3 bis 8 Tage liegen blieben, bedeckte er mit einer Lage Fliesspapier.

Eier und Nester. Ein sehr moderner und sehr beliebter Zweig ornithologischen Studiums bildet das wissenschaftliche Sammeln von Eiern. Die vortrefflichste Anleitung dazu findet sich in einem Schriftchen niedergelegt, welches auf Ansuchen der Smithsonian Institution zu Washington Professor A. Newton in Cambridge veröffentlicht hat. Wir entnehmen diesen „Suggestions“ das Folgende.

Die Hauptsache, auf die es dem Eiersammler ankommen muss, ist die gewissenhafteste Sorgfalt bei der Identificirung und Authentificirung

*) „It is better to send home a few things well preserved than a multitude in bad condition.“ Ch. Darw. Journ. of a Natur. p. 601.

der gesammelten Eier. Nur dadurch wird eine wissenschaftliche Verwerthung derselben möglich. Sauberkeit in der Behandlung und Zurichtung des Eies für die Sammlung ist natürlich höchst wünschenswerth, aber, wie gesagt, es ist nicht das Wichtigste.

Der einfachste und in der Regel genügendste Weg, die Vogelart, der das gefundene Gelege angehört, zu identificiren, ist die Erlangung der Alten oder eines derselben durch den Schuss oder durch Schlingen, Fallen, Sprenkel, Leimruthen oder dergl. Glückt das nicht, so führt die genaueste Feststellung der Situation und Beschaffenheit des Nestes, sowie der Umgebung oft zum Ziel. Werden die alten Vögel erlegt, so muss die Haut oder irgend ein anderer zu conservirender charakteristischer Theil mit einer Etiket-
 te ver-

sehen werden, die mit der späteren Inschrift auf den Eiern correspondirt. Der Umstand, dass ein Vogel in der Nähe eines gefundenen Nestes gesehen wird, hat in dieser Beziehung gar keine Bedeutung und kann nur zu leicht zu Irrthümern verleiten. Man erinnere sich z. B. der bekannten Thatsache, dass viele Cuculiden, die amerikanische Gattung *Molothrus*, die Eiderente u. s. w. sich gern der Nester fremder Vögel bedienen.

Die sicherste Methode Eier zu authenticiren, ist mit Tinte auf der Eischale selbst der Namen des Vogels zu schreiben, zudem aber die Localität, das Datum, Namen des Finders u. s. w., und zwar immer mit Bezugnahme auf das Journal oder Notizbuch des Sammlers. Auch ist zu notiren, ob die

alten Vögel sicher erkannt, ob sie erlegt, gefangen u. s. w. Will sich der reisende Sammler dabei symbolischer oder anderer Abkürzungen bedienen, so geschehe das nach einem System, welches für Personen daheim kein Geheimniss ist. Man bezeichne jedes Ei sofort provisorisch mit Bleistift, mache die Inschrift mit Tinte aber erst, nachdem es entleert ist.

Die Entleerung eines Eies geschieht am einfachsten mittelst einer Oeffnung, und zwar einer seitlichen (Fig. 18 u. 19). Diese Oeffnung, deren Grösse im Verhältniss zu der des Eies und zu dem Grade der Bebrütung stehen muss, wird mit dem Eibohrer gemacht (Fig. 1, 2, 3). Die Anwendung dieses wie aller übrigen noch zu nennenden Instrumente erfordert die äusserste Vorsicht. Stark bebrütete Eier kann man einige Tage liegen lassen, ehe

Fig. 6.

Fig. 13. Fig. 12.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 17.

1
2

Halbe Grösse.

Fig. 11.

man sie entleert. Wenn die Schale durchbohrt ist, entferne man die innere Haut derselben mit dem Federmesser. Dann führe man das dünne Ende eines Blaserohrs (Fig. 4 und 5) ein, nehme das dickere in den Mund und blase, anfangs sehr vorsichtig, durch. Wenn der Embryo schon ziemlich gross ist, lasse man einen Wasserstrahl mittelst einer Spritze (Fig. 8) eindringen, schüttele das Ei sanft und bediene sich dann abermals des Blaserohrs, bis unter dem wiederholten Gebrauche beider Instrumente und mit Hülfe von Scheeren (Fig. 9 und 10), Haaken (Fig. 11, 12 und 13), Messern (Fig. 14, 15 und 16) und eines Forceps (Fig. 17) der Inhalt vollständig entleert ist. Dann fülle man das Ei mit Wasser, schüttele es sanft, blase es

aus und wiederhole das so oft, bis es ganz rein ist. Dann lasse man es, die Oeffnung nach unten, liegen, bis es trocken ist, wobei die äussere Schale vor Nässe und vor der Einwirkung des Lichtes, namentlich des Sonnenscheins, sorgfältig zu bewahren ist. Den Inhalt sehr kleiner frischer Eier kann man

Fig. 20.

mittelst des Instrumentes Nr. 6 aussaugen. Die Inschrift ist auf der durchbohrten Seite zu machen und als geeignete Stelle für das Loch immer eine solche zu wählen, wo die wenigst charakteristische Zeichnung ist.

Diejenigen, die es dennoch vorziehen, das Ei mittelst zweier Oeffnungen zu entleeren, mögen diese auf einer und derselben Seite des Eies machen: nicht an den beiden Enden (Fig. 20).

Sehr stark bebrütete Eier lässt Newton zur Stärkung der Schale beim Durchbohren und Entleeren mit gummirten Papierstücken (Fig. 21), eines über dem anderen, bekleben und das Instrument durch die mittlere Oeffnung desselben einführen.

Fig. 21.

Die beste Methode, Eier auf längeren und beschwerlicheren Reisen zu verpacken, ist, dieselben jedes einzeln mit Werg oder Wolle zu umwickeln und dann diese Ballen dicht nebeneinander in einer starken guten Schachtel so zu placiren, dass keine Lagerveränderung derselben möglich ist. Jede andere Art der Verpackung ist unsicher.

Die besten Verbündeten des Eiersammlers sind die Anwohner der Gegend. Kleine Belohnungen werden dieselben leicht bestimmen, dem Reisenden bei seinen Bemühungen Nester oder Eier zu finden, behülflich zu sein. Derselbe bestehe indessen darauf, dass ihm das Nest in situ gezeigt werde. Es mag hier erwähnt werden, dass die Eier von Regenpfeifern und Strandläufern (Charadriadae und Scolopacidae) bei den Oologen aller Nationen die gesuchtesten sind. Sollte es erforderlich sein, zur Erlangung eines seltenen Nestes an einer schroffen Felswand eine Person am Tau herabzulassen, so muss dieses letztere unbedingt unter den Armen des Herabzulassenden befestigt werden.

Nester hat man nur einfach so zu verpacken, dass sie vor Druck und Beschädigung gesichert liegen.

Embryo's. Besonderer Beachtung sei hier noch das Sammeln und Conserviren (in Spiritus) von Embryo's in jedem Stadium der Entwicklung empfohlen, wobei natürlich die Identificirung und Authenticirung der Exemplare von höchster Wichtigkeit ist. Würde es doch später geradezu unmöglich sein, die einzelnen Stücke zu bestimmen. Bekanntlich ist es Agassiz, der auf diesen bis jetzt wenigst cultivirten Zweig zoologischen Wissens das grösste Gewicht legt und wiederholt der Belehrung gedenkt, die ihm gerade aus dem Studium von Vogelembryo's erwachsen. „Wie höchst interessant — schreibt er — müsste es sein, derartige Untersuchungen auch bei den tropischen Vögeln zu machen, von deren Embryo's wir so gut wie gar nichts wissen.“ Und es scheint in der That, dass der genaueren Kenntniss der Embryonen ein bedeutender Antheil an dem künftigen Fortschritt der Zoologie zu-erkannt werden muss.

II. Theoretischer Theil.

Wie praktisch, so wird der Reisende, welcher das Studium der Vögel von seinen Beobachtungen nicht ausschliessen will, sich auch theoretisch

bestmöglichst vorzubereiten haben. Er wird vor Allem wohlthun, sich mit der Ornithologie der von ihm zu bereisenden Gegenden einigermaassen vertraut zu machen. Er wird dann schärfer, kritischer, wir möchten sagen systematischer sehen und seine Aufzeichnungen werden dadurch nicht wenig an Werth und Bedeutung gewinnen. Ein gewisser Grad von ornithologischer Localbekanntschaft ist auch darum unentbehrlich, weil sie die Aufmerksamkeit des Reisenden einigermaassen controllirt. So z. B. muss derselbe die wenigst bekannten, die besonders interessanten und seltenen Formen seines Forschungsgebietes kennen, um gerade diesen erhöhte Beachtung schenken zu können.

Dem Naturforscher, der demnächst behufs der Beobachtung des Vorübergangs der Venus, die entlegene Station Kerguelensland betreten wird, sollte es nicht unbekannt sein, dass auf dieser Insel Chionis minor lebt, ein im hohen Grade interessanter Vogel, dessen Lebensweise noch wenig bekannt ist, der also vorzugsweise zu näherem Studium auffordert. Der Zoolog der afrikanischen Expedition würde sein Augenmerk unter Anderem der seltenen *Musophaga Rossae* zuzuwenden haben. Die Ufer der Magellanstrasse beherbergen eine der allerseltensten Grallatorenformen, *Pluvianellus sociabilis*. Nun wohl, die Wiedererlangung und nähere Beobachtung gerade dieser Art wäre im hohen Grade wünschenswerth. Der sammelnde Reisende, welcher nicht unvorbereitet das Gebiet von Cachapoyas in Peru besucht, würde Alles aufzubieten haben, den wundervollen *Colibri Loddigesia mirabilis* zu erlangen und womöglich selbst seiner ansichtig zu werden. Sehr zu bedauern wäre es, wenn ein Tukuman als Naturforscher bereisender Gelehrter nicht wüsste, dass in diesem Lande Chunga Burmeisteri einer der höchsten Preise seiner Bemühungen sein würde. Die merkwürdige Grallatorform *Prosobonia*, von welcher das einzige bekannte Exemplar die Leidener Sammlung ziert, fordert auf Tahiti oder Eimeo zu erneutem Nachsuchen auf. Auf der grossen Navigatorinsel Sawai würde in erster Linie *Didunculus*, die aberranteste aller Tauben, weiterer Nachforschung und Beobachtung bedürfen. Auf der benachbarten Vitigruppe gilt dies von einer der ausserordentlichsten und reizendsten Tauben, *Chrysoenas victor*, die auf Taviuni lebt u. s. w. u. s. w. Es gelingen freilich dergleichen sehr specielle Recherchen an Ort und Stelle dem reisenden Ornithologen keineswegs immer. So z. B. bemühte sich der bekannte englische Naturforscher Wallace auf Celebes eifrigst aber vergebens, *Macropogon Forsteni* wiederzuerlangen, während dies später dem Deutschen Dr. Bernhard Meyer über Erwarten glückte.

Es würde nun für den wissenschaftlichen Reisenden ornithologischen Erforschungen gegenüber eine wesentliche Hülfe und Erleichterung sein, wenn die Zahl der Vollständigkeit anstrebenden Localornithologien, d. h. solcher Bücher, die in zum Gebrauch unterwegs geeigneter knapper Form sämtliche zur Zeit bekannte Arten dieses oder jenes Landes gut und genügend vollständig beschreibt, grösser wäre als sie es ist. Also Bücher, wie das im Anhang näher bezeichnete Audubon's für Nordamerika, Burmeister's für Brasilien, Gould's und Reichenbach's für Australien, Hutton's für Neuseeland, Jerdon's für einen grossen Theil Indiens, Heuglin's für Nordostafrika, Layard's für Südafrika, Hartlaub's für Westafrika, Finsch und Hartlaub's für Ostafrika, Finsch und Hartlaub's für Centralpolynesien und wie höchstens noch zwei oder drei andere. Ist der reisende Forscher im Besitz eines solchen Buches, so wird die sofortige Bestimmung der gesammelten Arten als sehr wünschenswerth mindestens zu versuchen sein. Ist er es nicht, so wird, wie dies die Regel ist, die sichere Bestimmung der

Folgezeit anheimfallen müssen. Als gute ornithologische Vorbereitungsbücher allgemeineren Charakters empfehlen wir Lesson's Manuel d'Ornithologie und Swainson's Natural history and classification of Birds; beide dem Datum nach ältere Werke, die aber bis jetzt durch keine Publication der Neuzeit überboten und entbehrlich gemacht worden sind.

„Trust nothing to memory“ möchte Darwin jedem Sammler als Motto empfehlen. Das Gedächtniss wird ein unzuverlässiger Hüter, wenn jeder Augenblick neue Eindrücke bringt, wenn dem soeben erlangten interessanten Gegenstand ein anderer folgt, der vielleicht noch interessanter ist. Er führe Buch über das Datum der Schiffe, in welchen Kisten mit erbeuteten Reise Früchten von ihm nach Europa gesandt werden und er halte den Empfänger an dasselbe zu thun. Er versehe jedes Stück mit einer Nummer und trage es sogleich in den Katalog ein. Er muss, wenn später die Localität angezweifelt werden sollte, mit Darwin sagen können: „every specimen of mine was ticketed on the spot“.

Der reisende Sammler wird ferner aus demselben Grunde wohlthun, jederzeit ein kleines Schreibbuch mitzuführen, in welches mit Bleistift Notizen über Stimme, Bewegung, Stellung u. s. w. sofort eingetragen werden. Heuglin pflegte, wenn er Gelegenheit fand, einen Vogel etwas länger durch ein Fernrohr beobachten zu können, die Umrisse desselben mit ein Paar Linien zu notiren. „Hat man einen Vogel mit hervorragendem Federschmuck oder mit besonders bunten oder auffallend gefärbten Weichtheilen erlegt, so empfiehlt es sich, denselben im Fleisch zu zeichnen und die Zeichnung wenigstens stellenweise nach der Natur zu coloriren.“

Für den wissenschaftlichen Sammler, also denjenigen, welcher zugleich beobachten will, mögen hier aphoristisch einige der wichtigsten Anhaltspunkte als durch die Erfahrung constatirt mitgetheilt werden.

Ein eigentliches Wandern findet in tropischen Ländern nicht statt, wohl aber ein Streichen.

Der tropische Frühling fällt einige Monate vor dem Eintritt der Regenzeit.

In den Somaliländern z. B. dauert die Zeit der Regen und der Fruchtbarkeit, also zugleich die der Fortpflanzung bei den Vögeln, von Ende September bis Ende Februar. Auch in Brasilien ist dieser Zeitraum die Zeit des Brütens. Nach Euler fällt hier der Anfang schon in die zweite Hälfte des August.

Die Brützeit der Vögel tritt nach vollendeter Wanderung ein, und der Ort, wo sie brüten, ist ihre eigentliche Heimath.

Am Zambesi fällt nach Kirk die Paarungszeit der Vögel und das erste Wiedererscheinen der Vegetation im October zusammen.

In Damara hängt die Brützeit hauptsächlich, wenn nicht ganz und gar, vom Beginn der Regen ab. Die Hauptdauer derselben fällt in die Zeit vom November bis Mai (Anderson).

Auf Ceylon lässt sich nach Layard keine bestimmte Brutperiode angeben. Er habe Nester in jedem Monat des Jahres gefunden und zwar in ziemlich gleicher Frequenz. Die Temperatur sei dort freilich auch immer so ziemlich dieselbe.

Dabei darf indessen nicht übersehen werden, dass überhaupt geringere Regelmässigkeit ein Hauptcharakter in den Functionen der Thiere heisser Länder ist.

Die Mauser, also die Zeit der Erneuerung des Gefieders, erfolgt bei den Vögeln tropischer Länder gerade wie bei denen Europas, nach über-

standener Brutperiode, also im Herbst. Bei den Vögeln Damaras beginnt diese Periode mit der Wiederkehr der nassen Jahreszeit.

Je näher der Brutplatz eines Vogels dem Pole, desto später fallen der Zug und die Mauser.

Während dieser Zeit, wo es also mit nur geringen Unterbrechungen regnet, beobachtet man z. B. in Damara die grösste Menge und Verschiedenheit in der Classe der Vögel. Obgleich während der trocknen Zeit kaum mehr als Wüste, wird Damara und die Nachbarländer in der Regenzeit ein Paradies für die Vogelwelt.

Wo die Jahreszeiten selbst nicht wesentlich verschieden ausgeprägt sind, da kann auch von Jahreszeitenkleidern bei den Vögeln kaum die Rede sein. Dies erkannte z. B. Burmeister bei den Vögeln Brasiliens.

Für die Wasserjagd auf den grossen Strömen tropischer Länder ist der Winter die beste Jahreszeit, indem alsdann der Strom in seine Ufer zurückgetreten ist und viele Schwimm- und Stelzvögel schaarenweise herumziehen, die Niederungen des Ufers nach Nahrung absuchend. Man vergleiche Rengger's Schilderung der Wasserjagd auf dem Rio Paraguay.

Die günstigsten Tageszeiten zum Jagen und zum Beobachten sind in tropischen Ländern der frühe Morgen und der Abend. Man erlangt zahlreiche Formen am besten auf der Bürsche, „wenn man Abends oder Morgens langsam und so geräuschlos als möglich am Saume des Waldes hinreitet oder hinspaziert“.

Hinsichtlich des Beobachtens der Lebensweise der Vögel ist bereits im ersten Theile dieser Arbeit auf manches Wichtigere hingewiesen worden. Auch dabei lässt sich nur auf praktischem Wege Uebung und Sicherheit erlangen. Absolut nöthig bleibt es, dass der Beobachtende ein scharfes und wenigstens einigermaassen geübtes Auge habe. „Es ist mir — schreibt uns Henglin — schon öfters vorgekommen, dass ich Anderen, die sich einer scharfen Sehkraft rühmten, einen sich im Lager drückenden Hasen, festliegende Hühner und andere Vögel zeigte, ohne dass sie im Stande waren, das betreffende Thier zu unterscheiden, selbst wenn sie nur 10 Schritte weit davon entfernt standen. Nur einem geübten Jäger fallen manche Dinge auf, die auf Anwesenheit dieser oder jener Vogelart schliessen lassen, wie z. B. die Excremente namentlich unter Bäumen, wo gewisse Vögel ihre Nachträge halten oder wo sich Nester mit Jungen befinden; Fährten; Plätze, wo sich Hühner im Sande oder in trockner Erde gepudert haben, wo der Boden frisch aufgescharrt ist, wo an Blattpflanzen und nach Insecten oder Samen gepickt wurde; Spuren am Rande von Plätzen und Gewässern, auf Sandbänken, Lagerstätten; verdeckte Wechsel in Gras und Gebüsch u. s. w.

Beim Anstellen biologischer Beobachtungen würden also hauptsächlich zu berücksichtigen sein:

1. Die Verbreitung, horizontale wie verticale.
2. Der Stimmlaut in seinen Modificationen nach Geschlecht, Jahreszeit, Affecten; also namentlich auch der Lockton.
3. Die Art des Vorkommens und Zusammenlebens in ihrem Verhältniss zur Umgebung. Hier bleibt noch Vieles aufzuhellen. Welche Bedeutung ist z. B. jenen gelegentlichen Massenversammlungen von Vögeln zuzuschreiben, wie solche z. B. Armstrong am Nordufer der Magellansstrasse mit dem Fernrohr beobachtete, wo Myriaden von Wasservögeln überragt wurden von den hohen Gestalten zahlloser Strausse?

4. Die Wanderung und der Strich in ihrer Abhängigkeit vom Nahrungsbedürfniss und anderen Motiven. — Standvögel, Zugvögel, zufällige Gäste. — v. Middendorf stellt den Satz auf, die Unbeirrbarkeit der Vögel bei ihren Wanderungen zeige, dass sie sich der Lage des magnetischen Pols bewusst seien. Ist dies richtig? — A. Newton nennt die Frage von dem Wandern der Vögel „The mystery of ornithological mysteries“. — Besondere Beachtung verdient das gelegentliche massenhafte Erscheinen einer Vogelart in einer Gegend, wo dieselbe zuvor unbekannt war und von wo sie aus bis jetzt unbekannten Ursachen früher oder später wieder verschwindet. (Vergl. Gould *Introduct. B. of Austral.* p. 14.)
5. Die Mauser und die Umfärbung.
6. Die Nahrung. Der Mageninhalt ist bei jedem erlegten Vogel zu notiren. Wallace bemerkt, die Zahl der für die Vögel essbaren Früchte sei in den Tropengegenden nur klein. „There must be some other principle regulating the infinitely varied forms of animal life.“
7. Das Brutgeschäft, dessen Zeit, das Nest, die Eier u. s. w. Auch hier fehlt es nicht an interessanten Fragen, die der Lösung harren. Castelnau untersuchte auf seinen weiten Reisen im tropischen Amerika 3750 Individuen anatomisch und fand unter dieser Zahl nur 297 Weibchen. Er folgert daraus, es sei die tropische Hitze der Mutabilität des Typus günstig, aber die Vermehrung der Individuen sei meist geringer als in der gemässigten Zone. In Gujana und Brasilien ist die Zahl der Eier sehr gering. (Schomburgk, Euler, Burmeister u. s. w.) Hinsichtlich der Nester würde die Theorie, welche Wallace aufstellt, sowie deren Widerlegung durch den Herzog v. Argyle specielle Berücksichtigung verdienen.
8. Es würde von grossem Interesse sein, weitere Belege für die neuerlich von Wallace und Bates mit Vorliebe behandelte Theorie von „Mimicry“ in der Vogelwelt nachzuweisen. Es handelt sich dabei bekanntlich um jene seltsame Erscheinung, wo eine Thierart eine andere ihr systematisch oft sehr fernstehende äusserlich dergestalt imitirt, dass derselben durch diese Aehnlichkeit ein nachweisbarer Schutz oder Vortheil erwächst. Für den aufmerksamen Beobachter bleibt dann die Aufgabe zu ermitteln, welche der beiden Arten das Modell und welche die Copie ist.
9. Instincte.

Eine Hauptsache für den Beobachter aber zugleich von der schwierigsten seiner Aufgaben ist das rasche Auffassen und sichere Erkennen gewisser Eigenthümlichkeiten, wodurch sich eine Form von der anderen, ja eine Art von der anderen sofort unterscheiden lässt. „Fast jede Vogelart zeichnet sich durch gewisse, oft unbeschreibbare, aber ihr ganz ausschliesslich eigene Arten der Bewegung, sowohl im Gehen, Sitzen, Hüpfen, Klettern, Schlüpfen, als auch im Fluge aus. Ich habe immer gefunden, dass eine in ihrer äusseren Erscheinung wenig auffallende Art, wenn sie nur einmal eingesammelt wurde, viel leichter erlangt wird, weil der Beobachter sie dann sofort wieder erkennt und zwar gerade aus der oder jener Eigenthümlichkeit“ (Heuglin).

Auch beim Beobachten der Lebensweise der Vögel wird man die Hülfe der Eingeborenen nicht ganz entbehren, ja dieselbe häufig mit Vortheil verwenden können. Man lasse sich von ihnen die einheimischen Namen der Vögel sagen und suche Auskunft zu erlangen über gewisse zwar ohne Zweifel vorhandene, aber noch nicht erlangte Arten. Nicht selten knüpft sich bei

wilden Völkern an die Erscheinung eines Vogels abergläubige Deutung. Auf Neuseeland fangen die Ansiedler, wie Potts schreibt, mehr und mehr an, auf Flug und Gesang der Vögel zu achten, welchen sie wohl mit Recht eine prognosticirende Bedeutung für das Wetter beilegen.*)

Wir wünschen hier noch speciell aufmerksam zu machen auf eine Abhandlung A. Newton's, die den Titel führt: „On a method of registering Natural History Observations“ und welche ursprünglich in den Verhandlungen der „Norfolk and Norwich Naturalist's Society“ erschienen ist. Diese Methode soll dazu beitragen, die Arbeit, gemachte Beobachtungen auf irgend einem Felde der Zoologie zu registriren, weniger beschwerlich zu machen, und sie verdient schon dadurch die höchste Beachtung, weil sie das Resultat zehnjähriger Prüfung und Anwendung eines der ausgezeichnetsten Ornithologen unserer Zeit ist. „We wished to make the birds tell their own story for themselves, so that their appearance or disappearance, their abundance or scarcity should be shown plainly by the pages of our „Register“.

Ist es schliesslich dem wissenschaftlichen Reisenden in aussereuropäischen Ländern anzuempfehlen, nur zu beobachten ohne gleichzeitig zu sammeln? Gewiss wird das für die Wissenschaft vortheilhafter sein, als beides zu unterlassen. Aber rathen können wir dazu nicht. Ganz abgesehen von der grossen Bedeutung, welche gesammelte Exemplare als Belegstücke den angestellten Beobachtungen gegenüber haben können, möchten wir auf den Genuss aufmerksam machen, welchen die Untersuchung, ja der blosser Anblick der vor Jahren gesammelten und oft unter den erswerendsten Umständen präparirten Exemplare immer von neuem ausüben wird. Sie bilden gewissermaassen ein Tagebuch unserer Erlebnisse und werden nie aufhören, der Erinnerung des Sammlers die schöne genussreiche Zeit seiner Reisen wieder lebendig zu machen.

Literatur.

- P. L. Martin, Die Praxis der Naturgeschichte. 3 Th. Weimar 1869. Taxidermie, Präpariren und Sammeln auf Reisen; Ausstopfen u. s. w. Vergl. über dieses Buch: Caban. Journal für Ornith. 1869, p. 381.
 Adam's Manual of Natural History for travellers. London. (V. Voorst) 1854.
 T. M. Harting, Hints on Shore Shooting with a chapter on skinning and preserving birds. London 1871. 88 S.
 Directions for collecting, preserving and transporting specimens of Natural History. Prepared for the use of the Smithsonian Institution. Smiths. Instit. Washington 1852. 23 S.
 A. Newton, Suggestions for forming collections of Birds Eggs. Reprinted with additions from the circular of the Smithson. Institut. of Washington. London 1860. 15 S.
 — On a method of registering Natural History observations. 9 S. (Separatabdruck aus den Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalist's Society von 1870).
 R. P. Lesson, Manuel d'Ornithologie ou description des genres et des principales espèces d'oiseaux. 2 vol. Paris 1828.
 W. Swainson, On the Natural History and classification of Birds. 2 vol. London 1836.

Für Nordamerika:

- J. J. Audubon, A. Synopsis of the Birds of North America. 1 vol. 8. Edinb. 1839.
 Elliot Coues, Key to North-American Birds, etc. Salem 1872. 1 vol.

*) Cuvier sagt von den Vögeln: ihr rasches Durcheilen der verschiedenen Luftschichten und die lebhafte und andauernde Einwirkung dieses Elements auf sie, setzen sie in den Stand, die Veränderungen der Witterung zu anticipiren.

Für Brasilien:

- H. Burmeister, Systematische Uebersicht der Thiere Brasiliens u. s. w. Zweiter und dritter Theil: Vögel. Berlin 1856.

Für Australien:

- L. Reichenbach, Die vollständige Naturgeschichte der Vögel Neuhollands, nach Vergleichung von Exemplaren beschrieben u. s. w. 1 vol. 8. Dresden u. Leipzig 1850.

Für Neuseeland:

- Fr. Wollaston Hutton, Catalogue of the Birds of New-Zealand, with diagnoses of the species. 1 vol. 8. 85 S.

Für Polynesien:

- Finsch u. G. Hartlaub, Beitrag zur Fauna Centralpolynesiens. Ornithologie der O. Viti, Samoa- und Tonga-Inseln. 1 vol. 8. Halle 1867.

Für Ostindien:

- T. C. Jerdon, The Birds of India being a Natural History of all the birds known to inhabit Continental India etc. 3 vol. Calcutta 1862.

Für Nordostafrika:

- Th. v. Heuglin, Ornithologie Nordostafrikas. 8. Cassel 1870 u. s. w.

Für Ostafrika:

- O. Finsch und G. Hartlaub, Die Vögel Ostafrikas: 4. Band von Baron Cl. v. der Decken's Reisen in Ostafrika. Leipzig und Heidelberg 1870.

Für Westafrika:

- G. Hartlaub, System der Ornithologie Westafrikas. 1 vol. 8. Bremen 1857.

Für Südafrika:

- E. L. Layard, The Birds of South Afrika. 1 vol. 8. London 1867.
R. B. Sharpe, Layards Birds of South Africa a new edition thoroughly revised and augmented etc. London 1874.
-

Die Säugethiere.

Von

R. Hartmann.

Förderung der Naturgeschichte der Säugethiere bildet eine der dankbarsten Aufgaben für Bereiser fremder Länder.

Sogenannte brennende Fragen auf diesem Gebiete der Thierkunde werden natürlicherweise am sichersten durch Fachleute gelöst und reisende Mammalogen werden selbst immer am besten wissen, was sie in dieser Richtung zu leisten haben.

Indessen vermögen doch auch anderen Berufsklassen angehörende gebildete Reisende, denen die Erweiterung der wissenschaftlichen Erkenntniss überhaupt am Herzen liegt, sich um die Säugethierkunde verdient zu machen. Den Bestrebungen aller zur letzteren Kategorie gehörenden Leuten eine Anregung und ihnen selbst eine gedrängte Anweisung zum Einsammeln und Zurichten von Säugethieren und deren Resten zu geben, sollen die nachfolgenden Blätter hauptsächlich bestimmt sein.

Die Säugethiere in ihren mannigfaltigen, zuweilen gewaltige Grösse erreichenden Gestaltungen, nicht selten ausgezeichnet durch die Harmonie ihres Gesamtbaues, durch die Schönheit in den einzelnen Formen ihres Körpers, durch die Kraft, Gewandtheit und Anmuth in ihren Bewegungen, durch die Eigenthümlichkeiten ihrer Lebensweise, oftmals tief eingreifend in das menschliche Sein und zwar bald nützend, bald schadend, sind schon seit den ältesten Zeiten die Lieblinge unserer Weltwanderer gewesen. Jene stylvollen Malereien und Bildwerke der Assyrier, Aegypter, Inder, Perser, jene roheren der Mexikaner und Peruaner, führen uns interessante Säugethierformen nicht allein der von jenen Culturvölkern bewohnten, sondern auch der ihnen benachbarten, ja selbst der ferner von ihnen gelegenen Länder vor. Selbst aber die ganz rohen Zeichnungen des Indianers auf der Lederbekleidung seines Wigwam, auf der um seine Schultern hängenden Büffeldecke, diejenigen des Tibu und Buschmannes auf den Felsen ihrer Steppen zeigen uns u. A. Säugethiere, welche jene wilden Leute auf ihren Wanderungen wahrgenommen, gejagt, erlegt hatten. Wie wohl haben auch unsere Altvordern verstanden, charakteristische Umrissfiguren des Mammuth, des Bären, Rennthieres u. s. w. auf Knochen, Elfenbein oder weichem Gestein einzu-

graben. Welche schönen Nachrichten über die geographische Verbreitung und dass Leben verschiedener Säugethiere verdanken wir nicht schon einem Aristoteles, Diodor, Strabo, Plinius, Tacitus, Plutarch, Aelian u. s. w.

Während nun die Säugethiere hauptsächlich in ihrer Eigenschaft als Pelze, Fleisch, Hörner und andere wichtige Producte liefernde Geschöpfe seit Alters zu ihrer Jagd und Hegung anregten, fühlten sich auch schon ältere Reisende öfters dazu veranlasst, nach der Verbreitung, dem Bau, der Lebensweise und Verwendbarkeit jener Thierarten zu forschen, die Tempel, Museen und Privatsammlungen mit deren Resten zu schmücken. Leider aber kümmerte man sich von jeher weit mehr um die den Wald, die Steppe, die Wüste, die Fluss- und Seeufer, wie auch die Meere bewohnenden wilden Säugethiere, als um die treuen nützlichen Begleiter der Menschen, um die Hausthiere. Freilich erscheint es heroisch, dem bemähnten Könige der Wüste nachzugehen, dem wehrhaften Büffel, dem so leicht offensiven Rhinoceros aufzulauern, freilich erscheint es poetisch, den Hirsch des Waldes, die Antilope der Steppe aufzuspüren, aufregend, den Walfisch im Ocean, das Walross an den Eisschollen, anmuthig, das Aeffchen und Eichhörnchen im Baum, den Springhasen und die Viscacha im Mondscheine des südlichen Himmels zu beobachten. Wie prosaisch dagegen erscheint es, in Feld und Hütte das Pferd, das Rind, die Ziege, den Hund u. s. w. in den Bereich einer genaueren Beobachtung zu ziehen. Und doch sind gerade die Hausthiere so sehr enge mit dem Sein des Menschen verwachsen; sie bedingen so häufig die ganze Art seines Erdenwandels, seine staatliche, seine gewerbliche Existenz! Wie viele Naturvölker hängen nicht gänzlich von ihren Hausthieren ab! Welche wichtigen Probleme der gesammten Thierkunde lassen sich nicht an Hand der Hausthierkunde lösen! Alle die vielen unser Denken anregenden Fragen nach den verschiedenen Abstufungen der thierischen Intelligenz, nach der Entwicklungsfähigkeit der letzteren, nach der Zähmbarkeit und Angewöhnbarkeit ursprünglich wilder Thierformen, nach ihrer Nutzbarkeit und nach ihrer Variabilität, letztere namentlich unter Einwirkung der künstlichen Zuchtwahl, lassen sich an Pferd, Esel, Rind, Schaf, Ziege, Hund, Katze und Schwein mit Aussicht auf Erfolg behandeln.

Bisher hat die Mehrzahl unserer Reisenden die Hausthiere hauptsächlich aus folgenden Gründen vernachlässigt. Erstlich schmeichelte die Beschreibung einer simplen Hunde- oder Schweinerasse dieses oder jenes Volkes zu wenig der Eigenliebe des Reisenden, indem es ja dabei keine neue Gattung oder Art zu beschreiben, indem es dabei den Namen des Betreffenden nicht durch eine lateinische Benennung zu verherrlichen galt. Zweitens war die Beobachtung der Hausthiere, wie oben bereits angedeutet worden, den Reisenden überhaupt zu langweilig, zu uninteressant. Drittens waren diese sich der Wichtigkeit der Frage überhaupt nicht bewusst. Man hielt Alles für bekannt und schämte sich fast, von solchen anscheinend selbstverständlichen Dingen zu sprechen.

Einige hervorragende Reisende der Neuzeit, ein G. Schweinfurth, A. Reichenow, B. Klunzinger, J. Haast, J. Hildebrandt, haben es nicht verschmäht, aus Freundeshand einige auf die Erforschung der Hausthiere bezügliche Winke entgegenzunehmen und es haben solche Männer denn auch diesen Zweig der Naturgeschichte durch directe Beobachtung und durch Einsendung von Resten jener Thiere unsere Kenntniss nicht unwesentlich bereichert.

So lasst Euch denn erbitten, Ihr Reisenden, dem rauhhaarigen, fuchsähnlichen Köter der Tehnelches und Pescherähs, dem schmucken Maulthiere

der Abyssinier, dem edlen Rosse der Wüstenbeduinen, dem gravitatischen Budehrinde der Malgaschen, dem grobwilligen Schafe der Färingier u. s. w. von nun an mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als dies bisher im Allgemeinen geschehen war.

Reisende, welche die Säugethierkunde überhaupt fördern wollen, mögen zunächst folgende Punkte ins Auge fassen:

1. Von anderen Personen (z. B. von Ansiedlern, reisenden Händlern, Jägern, auch Eingebornen) herrührende Nachrichten über die in einem Lande vorkommenden Säugethiere sind sorgfältig zu sammeln. Es sind nicht nur lebende Säugethiere, in Bezug auf ihr Vorkommen, ihre Gestaltung, ihre Lebensweise u. s. w. direct zu beobachten, sondern es sind selbst einzelne Reste, Theile derselben zu beachten.

2. Sind Beschreibungen, Messungen, Zeichnungen der beobachteten Säugethiere anzufertigen, dieselben sind photographisch aufzunehmen oder abzuzeichnen, es sind kartographische Skizzen ihrer geographischen Verbreitung anzufertigen.

3. Säugethiere und deren Reste sind einzusammeln, es sind die nöthigsten Vorkehrungen für deren Aufbewahrung, Erhaltung und Versendung zu treffen, den gesammelten Specimina aber sind Etiketts beizufügen.

Im Nachfolgenden sollen die oben aufgestellten Punkte näher erörtert werden.

1. Ueber das Einsammeln von Nachrichten über die in einem Lande vorkommenden Säugethiere, sowie Beobachtung der Reste und Theile von solchen. Ueber das Beobachten lebender Säugethiere.

Gesetzt, es betritt ein Reisender irgend eine Hafen- oder auch eine gewissen Verkehr darbietende Binnenstadt. Er sieht da in Privathäusern und auf dem Markte von mehreren oder von einzelnen Verkäufern herumtragen, oder -führen: lebende — wilde Thiere*) wie Affen, Agutis, Igel, Stachelschweine, Hyänen, Löwen, Leoparden, Ichneumons, Antilopen, Ameisenbären, Schuppenthier, Faulthiere u. s. w. Er sieht auf den Fleischbänken zugerichtete Borstenferkel, Hasen, Hirsche, Rehe, Gazellen, Büffel, Zebras u. s. w. Oder er erschaut Felle von Affen, Leoparden, Jaguaren, Tigern, Tigerkatzen, Luchsen, Hyänen, Viverren, Schakalen, Antilopen, Stücke von Elephanten-, Flusspferd-, Rhinoceroshaut etc., oder er sieht Geräthe aus Büffelhorn, Elfenbein, Fell, aus Leder besonderer Art u. a. m. feilbieten. Natürlich kann Aehnliches auch im kleinsten Dorfe, auf dem einsamsten Weiler, im abgelegensten Beduinenzelte, im dürftigsten Wigwam begegnen. Einzelne

*) Beispiels halber erwähne ich hier, dass uns in der keineswegs von Thierhändlern besuchten Stadt Sennaar folgende lebende Thiere zu Spottpreisen angeboten wurden: 3 sogenannte grüne und 4 rothe Meerkatzen, 1 Pavian, 3 Igel, 2 Stachelschweine, 3 gefleckte Hyänen, 1 Gepard, 2 Löwen, 1 Gazelle, ferner in dem ganz entlegenen Helles Idris, am Berge Gale, im Lande der Funje: 6 grüne, 2 rothe Meerkatzen, 3 Paviane, 2 Stachelschweine, 4 Igel, 1 Klippschliefer, 1 junger Leopard, 1 Genettkatze, 3 junge Kuhantilopen, 1 Giraffe, 1 Strauss, 8 Bullocks Bienenfresser, 6 Mandelkrähen, 2 Steppenwarneidechsen, 10 Gehäuseschildkröten, 3 Chamäleons, 20 Agamen, 2 Schlangen u. s. w., u. s. w. In Khartum wurden angeboten: 1 weibliche Kudu-Antilope, 1 junges Flusspferd, 1 Zibethkatze, 2 rothe Meerkatzen, 2 Papageien. Wenn nun der Reisende in solchen Fällen, wie die hier notirten, nicht im Stande ist, die Thiere zu erwerben und lebend oder todt zu transportiren, so kann er doch immerhin an ihnen Studien der obenbezeichneten Art machen.

Bewohner können Bekleidungsgegenstände aus Fellen interessanter Thiere, sie können als Schmucksachen rohe oder bearbeitete Zähne, Klauen, Hörner, Knochen und Haare von Säugethieren tragen. Es sind in dieser Hinsicht besonders die Schamanen, Mediziner, Doctoren, Regenschauer, Zauberer und Propheten wilder Völker interessant, indem diese nämlich unter dem an ihnen herumhängenden, auf Ausbeutung von Seltsamkeiten und von Auffallendem berechneten Plunder zuweilen wichtige zoologische Funde beherbergen. Auch sind nach dieser Richtung hin die Ausschmückungen der Hütten, Gräber, Fetischhäuser, Tempel, Motivpfähle u. s. w. in nähere Betrachtung zu ziehen.

Derartige Gelegenheiten sollte kein Reisender ungenutzt vorübergehen lassen. Er sollte sich demnach erkundigen, ob z. B. etwa ein zu Markte gebrachtes Säugethier oder ob Reste eines solchen aus dem Lande selbst, in welchem sie eben zur Beobachtung gelangten, oder ob sie aus benachbarten Gegenden, ob gar aus ferneren herstammen, ob sie durch Handel oder ob sie auf andere Weise an den Ort ihrer Bestimmung gebracht sind u. s. w. An derartigen Erkundigungen lassen sich dann solche über die geographische Verbreitung, über einheimische oder fremde Benennung, über die Lebensweise, die Jagd, Züchtung, Verwendung u. s. w. der vorliegenden Thiere anknüpfen.

Jeder Reisende sollte ferner bemüht sein, Nachrichten über die Jagd- und Fangmethoden der Säugethiere, über die dazu dienenden Geräthe u. s. w. einzuziehen. Er kann sich dieserhalb an andere mit Land und Leuten vertraute Reisende, an umherziehende Händler, an eingeborne Krämer, Jäger, Beamte und Arbeiter wenden. In dieser Hinsicht sind z. B. die nordamerikanischen Trapper, Coureurs des bois, Voyageurs, die südamerikanischen Peones, Gauchos, Baqueiros, Formigueiros, Capitães do Matto, Caçadores, Canoeiros und Arrieros, die Empacadores in Angola und Benguela, die weitreisenden Djaalin und Pilgrime in Inner- und Ostafrika, die nubischen und südafrikanischen Elephantenjäger, die syrischen Beduinenjäger, die cingalesischen Beddahs, die Malayenjäger im Archipel, die Walfischfänger an den Stationsorten der Südsee, die Robbenschlager u. s. w. zu Rathe zu ziehen.

Natürlicherweise müssen die erwünschten Erkundigungen auch auf die Lebensweise und die Fortpflanzung, die Sitten und Gewohnheiten der wilden, auf die mögliche Zähmbarkeit und Domesticirbarkeit derselben, auf die Beschaffenheit, die Pflege und Zucht der in den menschlichen Hausstand bereits übergeführten Säugethiere sich erstrecken. Auch hierzu kann die Hülfe der oben erwähnten Bevölkerungselemente eines bereisten Landes in Anspruch genommen werden.

Die Genauigkeit und kritische Schärfe, mit welcher derartige Erkundigungen eingezogen werden, dürften übrigens stets gute Prüfsteine für die intellectuelle Befähigung und Glaubwürdigkeit der betreffenden Reisenden abgeben.

Eine wesentliche Aufgabe für den Reisenden, auch den nicht fachmännisch gebildeten, besteht in der Beobachtung der Säugethiere in freier Natur. Zieht Ihr durch eine afrikanische, mit hohem Grase und mit knorrigem Buschwerke bewachsene Steppe, seht Ihr daselbst näher oder ferner Antilopen oder Büffel grasen, so sucht dergleichen Thiere, so lange es Euch die augenblickliche Sachlage gestattet und falls Euch die Jagd auf jenes Gethier für den gegebenen Fall nicht ansteht, zu beobachten, sucht zu erkennen, wie sich die Thiere im Freien benehmen, wie sie stehen, gehen,

sich lagern, fressen u. s. w.)*) Nehmt dann bald das Notizbuch zur Hand, verlasst Euch in solchen Dingen nicht zu sehr auf Euer Gedächtniss. Könnt Ihr zeichnen, so ergreift geschwinde das Skizzenbuch und thut in selbigem Eure Arbeit.

In gleicher Weise verfährt, wenn etwa am Abhange der Himalaya-Berge Wildziegen in Euren Gesichtskreis eintreten, wenn auf polarer See Robben an den Eisschollen dahinklettern, wenn im Lianengewirr eines südamerikanischen Urwaldes der Spinnenäffchen behende Schaar umhergaukelt, wenn in der schlammigen Dichtung eines indischen Dschungel das schwerfällige Rhinoceros sich umhersieht, wenn im Schrecken der Estampede der Wisent über die Prairien rast oder wenn das Känguru in den Casuarinahainen spielt.

Bekanntlich führen viele Säugethiere eine theilweis oder ausschliesslich nächtliche Lebensweise. Es wird sich stets der Mühe verlohnen, auch zu solcher Zeit Beobachtungen anzustellen, zu welchen unter den Tropen wenigstens die herrlichen lauen Mondnächte einladen. Da wird man den zierlichen Bewegungen der Springhasen zuschauen, das Flusspferd auf seinen Weidegängen belauschen, dem Geheule der Schakale und Hyänen folgen, dem sonderbaren Schnalzconcerte der Klippdachse zuhören können.

Es ist wohl zu beachten, dass viele Säugethiere an bestimmten Tageszeiten zum Wasser ziehen, um daselbst ihren Durst zu löschen. Unter den Tropen geschieht dies durchschnittlich zwischen 5—8 Uhr früh und zwischen 5½—7 Uhr Abends. Manche Arten besuchen freilich auch Mittags, Nachts oder selbst regellos zu allen möglichen Tageszeiten die Tränke. In Afrika bieten alsdann die Flüsse, Seen, Sümpfe, Regenteiche, Lachen (Biürek, Fülät, Vleys, Marigots, Lagoas) die belebtesten Bilder, welche reisenden Künstlern oder doch wenigstens mit dem Zeichnen vertrauten Laien einen unerschöpflichen Stoff des Naturgenusses und eine Fülle von Motiven für das Skizzenbuch gewähren. Gerade an solchen Stellen vermögen der gute Wille und die Befähigung der beobachtenden Reisenden Probe abzulegen. Aehnliche Erscheinungen, wie die geschilderten in Afrika, sollen sich übrigens auch in anderen Gegenden, z. B. in den ungeheueren Stromgebieten des Amur, Orenoco, Amazonas, La Plata u. s. w. darbieten. Ich erinnere hierbei z. B. an eine interessante Schilderung von dem zur Tränke ziehen der Unze, des Tapirs, Nabelschweines u. a. Thiere am Rio Apuré, woselbst die erwähnten Geschöpfe sich thorartige Oeffnungen durch eine lebendige, dem Uferwalde parallellaufende Hecke von Sausobüschen brechen, durch welche sie am frühen Morgen und bei Sonnenuntergang an das Wasser zu gelangen suchen.

Manche Säugethiere pflegen zur Zeit der Tageshitze unter Bäumen, Wurzelwerk, in trocknen Wildbüschen, Kulen und Kesseln zu ruhen. Ist die Dichtung nicht zu beträchtlich, ist noch ein Blick in die Weite möglich, so kann der Beobachter auch dann gar manches interessante Geschöpf auf seine äussere Gestalt, Farbe, seine Art sich zu lagern, aufzustehen, auch seine Kopfhaltung u. s. w. prüfen, ferner iconographische oder selbst wohl photographische Darstellungen aufnehmen. Nie werde ich so manchen sengend-heissen Mittag in den Steppen oder lichterem Wäldern Südnubiens und Senar's vergessen, woselbst sich alsdann die grossen schmucken Dama-Leucoryx- und Addaxantilopen unter breitästigen Akazienbüschen und unter laubenartig gewachsenen Kapparideen oder Balanites in den malerischsten Gruppen lagerten.

*) Mit Absicht vermeide ich hier jede Bezugnahme auf sublimes Jägerlatein.

Bei Gelegenheit solcher biologischen Beobachtungen hat man natürlicherweise alle diejenigen Vorsichtsmaassregeln zu treffen, welche nothwendig sind, um das zu belauschende Thier nicht gar zu bald zu erschrecken, es nicht zu frühzeitig zur Flucht zu reizen u. s. w. Man wird dabei manchmal grosse Geduld zu üben haben. In nicht seltenen Fällen wird man daher lange Zeit still stehen oder liegen müssen, um ein scheues Thier ungestört ins Auge fassen zu können, andererseits wird man sich früher oder später veranlasst fühlen, das gerade ruhende Thier durch Rufen und Gesticuliren zu kräftigen Lebensäusserungen zu reizen, um damit auch seine Gangart, Kopfhaltung, Schwungkraft und sein sonstiges Benehmen kennen zu lernen.

Geringe Schwierigkeit macht im Allgemeinen die directe Beobachtung der Lebensweise der wirklichen Hausthiere, d. h. solcher in den Haushalt des Menschen völlig übergeführter Thiere, welche sich in diesem Lebenszustande fortpflanzen *). Denn die Hausthiere, einzelne böse Individuen abgerechnet, lassen sich doch meist leicht ankommen. Höchstens können solche Hausthiere, welche gleich den Rindern in den Cordilleras, den Rindern und Pferden auf den Estancias der Pampas, gleich den Yak's auf Thibet's Hochflächen, gleich den Pariahunden der orientalischen Städte u. s. w. in einem halbwildem Zustande leben, in welchem sie scheu und schwer nahbar sind, dem Forscher Mühe bereiten. Dann giebt es bei wilden und halbcivilisirten Völkern eine gute Anzahl von Thieren, namentlich Säugethieren im domesticirten Zustande, welche sich theils nachweislich in der Gefangenschaft nicht fortpflanzen, oder bei denen es theils noch nicht oder nicht sicher bekannt ist, ob sie sich in jedem Zustande fruchtbar paaren. So halten sich z. B. die Indianer Südamerika's, im Allgemeinen grosse Thierliebhaber, in ihren Niederlassungen Agutis, Pacas, Tapire, Bisam-schweine u. s. w., die sie im Walde einfangen und der Zählung unterwerfen. Desgleichen findet man bei den Schwarzen zuweilen Ichneumoniden, Wiesel, Genettkatzen, Zibethkatzen, Hyänen, Hyänenhunde, Füchse, Schakale, Geparden, Mähnenmouffons, Warzenschweine, Pinselohrschweine u. s. w. im domesticirten Zustande. Auf solche Thiere sollte der Reisende besonders achten, und über deren Zähmbarkeit, Eingewöhnbarkeit, über ihre etwaige Fortpflanzungsfähigkeit unter dem Einflusse der Domestication, über ihr Benehmen, ihre Abänderungen unter den verschiedenartigen Lebensbedingungen, wie sie der ursprünglich wilde und der spätere domesticirte Zustand darbieten, nicht allein Nachrichten einzusammeln suchen, sondern der Reisende sollte auch von jenen Dingen durch eigene Anschauung, durch eigene Untersuchung Kenntniss nehmen.

Bei Hausthieren kommen ferner noch einige Fragen in Betracht, welche ökonomischer Natur, von keinem gebildeten Reisenden vernachlässigt werden sollten. Dieselben beziehen sich nämlich auf die Pflege und Züchtung jener nützlichen Geschöpfe, namentlich unter den Naturvölkern. Erkundigungen und directe Beobachtungen, betreffend der Hausthiere Haltung und Wartung, ihre Ertragsfähigkeit an Fleisch, Milch, Käse, Haut, Wolle, Haar, Hörnern, Hufen u. s. w., die Zubereitungsmethode dieser Stoffe, die eigentliche Züchtung und die Fruchtbarkeit, die Arbeitsleistung der oben erwähnten Geschöpfe, bilden stets würdige Objecte für den strebsamen Rei-

*) Völlig genau präcisiren lässt sich dieser Begriff leider nicht, da unsere Untersuchungen über die Fortpflanzungsfähigkeit der Thiere in der Gefangenschaft noch nicht abgeschlossen sind, und da gewisse Bastarde, wie Maulesel und Maulthiere trotz ihrer mindestens beschränkten Fortpflanzungsfähigkeit dennoch zu den Hausthieren gerechnet werden müssen.

senden. Ein dieser Arbeit angefügter, auch die Hausthiere berücksichtigender Fragebogen wird noch die nöthigen Einzelheiten, zu deren Erforschung Schreiber Dieses anregen möchte, präcisiren.

NB. Unter Hausthieren verstehe ich hier:

- 1) Die Katze (*Felis domestica*).
- 2) Den Hund (*Canis familiaris*).
- 3) Das Pferd (*Equus caballus*) und den Esel (*E. asinus*) nebst deren Bastarden.
- 4) Das Hausschwein (*Sus scropha domestica*).
- 5) Das Rind (*Bos taurus*), zu welchem ich auch den Zebu (*Bos Zebu*) und den Yak (*Bos grunniens*)*) rechne.
- 6) Den Büffel (*Bos Bubalus*) nebst seinen Varietäten (*Bos Cerabau*, *B. Arni* u. s. w.)
- 7) Die Hausziege (*Capra domestica*).
- 8) Das Hausschaf (*Ovis aries*).
- 9) Das Trampelthier (*Camelus bactrianus*), und das Dromedar (*C. dromedarius*).
- 10) Das Lama, Llama, Llacma (*Auchenia Lama*), nebst Paco, Alpaca, Huanaco, Vicuña.
- 11) Das Rennthier (*Cervus tarandus*).
- 12) Das Frettchen (*Mustela furo*).
- 13) Das Kaninchen (*Lepus cuniculus*).
- 14) Das Meerschweinchen (*Cavia Cobaya*).

Zu den domesticirten Säugethieren rechne ich u. A. vorläufig noch das Ichneumon, den ägyptischen Hausmarder (*Mustela palmata*), die Zibethkatze (*Viverra civetta*), den Geparden (*Felis jubata*), die Chinchillas (*Eriomys lanigera*, *E. chinchilla*), das sogenannte Sennärschwein (*Sus sennariensis*), das Pinselohrschwein (*Potamochoerus penicillatus*), den Elephanten. Von vielen dieser Thiere kennt man die Fortpflanzungsfähigkeit in der Gefangenschaft noch nicht sicher und ist es sehr wohl möglich, dass dereinst genauere Forschungen das Verhältniss derselben den eigentlichen Hausthieren gegenüber wesentlich anders gestalten werden, als ich es selbst vorläufig noch zuzugeben mich in der Lage fühle.

2) Ueber Anfertigung von Beschreibungen, Messungen und bildlichen Darstellungen der Säugethiere.

Wenn ein Reisender ein von ihm auf irgend eine Weise genauer beobachtetes Säugethier beschreiben will (meine Anweisungen sollen auch hier wieder den Nichtzoologen gelten), so soll derselbe triviale, Jedermann zu Händen befindliche Vergleichen mit beliebigen typischen Formen, namentlich der Hausthierwelt, wie z. B. Schwein, Pferd, Kuh, Hund, möglichst vermeiden, weil dadurch nämlich abenteuerliche und unpassende Dinge zu Tage gefördert werden. Es soll damit nicht etwa gesagt werden, dass derartige Vergleiche, z. B. eines Tapir mit einem Schwein, einer Gazelle mit einem Reh nicht gelegentlich auch gewisse, im Charakter der Thiergruppe, welcher die verglichenen Formen angehören, begründete Eigenthümlichkeiten zu kennzeichnen vermöchte. Allein der nicht zoologisch gebildete Reisende lässt sich gar häufig dazu verleiten, solchen von ihm getroffenen Vergleichen eine apodiktische Bedeutung beizulegen und erachtet sich wohl

*) Den Ausdruck Yak-Büffel halte ich für durchaus verfehlt.

daheim im Eifer für die Sache verpflichtet, mit dem vollen Gewicht des Selbstbeobachters für die angebliche Richtigkeit seiner Angaben einzutreten. Daher denn die mancherlei abscheulichen, wohl durch kritiklose Scribenten eifrig nachgeschriebenen Berichte über das Vorkommen von Rehen und Hirschen in Centralafrika, von wühlenden Schweinen (Erdferkeln, Ameisenscharrern, *Orycteropus*) in demselben Erdtheile, von wilden Eseln, so man Danta heisse (Anta-Tapir) in Südamerika, von echten Pantheren (*Pumas*, *Felis concolor*) in den vereinigten Staaten, von wilden Ochsen (Antilopen) in den Wüsten der Mongolei und Berberei u. s. w.

Manche europäische Völker, welche sich (zur Kindschaftsperiode der Zoologie) seit geraumer Zeit in fremden Erdtheilen niedergelassen haben und deren erste Angehörige meist aus ungebildeten Leuten bestanden, haben die in den occupirten Ländern vorgefundenen Säugethiere bald einmal mit ihren heimischen Formen in Vergleichung gezogen und nach solchen benannt. Bald haben sie den ihnen fremd entgegentretenden Formen die Namen mehr oder minder ähnlicher gegeben, deren Kenntniss ihnen von Hause aus geläufiger war. So haben die Südamerika colonisirenden Spanier den Puma Leon, d. h. Löwe, den Jaguar Tigre, d. h. Tiger, es haben die Südafrika überziehenden Holländer das Hippopotamus Seekuh, die Oryxantilope Gemsbock, es haben die Engländer das australische Schnabelthier Wassermaulwurf genannt u. s. w. Durch eine derartige Nomenclatur sind von weniger gebildeten Reisenden manche Irrthümer in deren Berichte eingeführt worden. Es ist daher erwünscht, wenn nach dieser Seite hin mit möglichster Vorsicht verfahren wird und wenn man bei Ausarbeitung der Tagebücher u. s. w. lieber Fachmänner zu Rathe zieht.

Wilde Völker, welche häufig der Jagd obliegen, haben sich nicht selten eine gewisse Schärfe in der Naturbeobachtung angeeignet, haben z. B. an den von ihnen gejagten und erlegten Säugethiern gewisse Eigenthümlichkeiten der Färbung, der Formenbildung, der Lebensweise nach bald seltener, bald nach häufigerer Begegnung sich angemerkt und den Gegenständen ihrer Beobachtung auch unterscheidende Namen verliehen, welchen sie selbst die Bedeutung durchgreifender Merkmale denn auch beilegen, was sie fremden Reisenden gegenüber oftmals mit Hartnäckigkeit zu vertreten suchen. So z. B. unterscheiden die Denka-Stämme Innerafrika's mancherlei Farbenvarietäten der Antilope (*Damalis*) *senegalensis* als verschiedene Thiere, sie unterscheiden die kleineren Elenantilopen (*Boselaphus oreas*) von grossen, ausgewachsenen, jüngere Löwen von älteren u. s. w. In Vorderindien unterscheidet man am Elephanten die Form Muknah mit kleinen, abwärts gerichteten und die Form Quantelah mit langen, stark enger gebogenen Stosszähnen. In Russland wird der Muraweissiki oder Ameisenbär von Sterwetniki oder Aasbären unterschieden u. s. w. u. s. w. Es ist nur zu loben, wenn Reisende derlei von Landeseingeborenen getroffene Unterscheidungen auffassen und wiederzugeben suchen, noch lobenswerther ist es, wenn sie sich bemühen, Material an Bälgen, Skeletten, Zeichnungen von solchen durch ihre Gewährsleute für verschieden erklärten Thieren herbeizubringen. Verwerflich dagegen erscheint es, wenn der Dilettantismus sich solcher nur schwer zu entscheidender und zuerst ernstlich zu prüfender Gegenstände bemächtigt, nach jenen immerhin vagen Merkmalen generische oder spezifische Charaktere in die Wissenschaft einzuschmuggeln sucht, welche dann wieder herauszuwerfen, dem reellen Forscher viele, meist schlecht gedankte Arbeit kostet.

Für die Beschreibung eines Säugethieres möchte ich folgendes Schema vorschlagen:

1) Allgemeine Gestalt. Namentlich hier bleibt es natürlich der Beobachtungsgabe und dem Darstellungstalent des Einzelnen überlassen, das Richtige, Passende auszuwählen und wiederzugeben. Auf die Gestalt des Kopfes, der Schnauze, der Ohren, Hörner, Geweihe, der Extremitäten, der Zehen, Krallen, Klauen, Hufe, des Schwanzes, sollte stets besonders geachtet werden. Es ist danach zu sehen, ob am Kopfe, am Rumpfe oder an den Gliedern etwa Auswüchse, Höcker oder dergl. vorkommen und welcher Beschaffenheit, ob sie z. B. hart, weich, aufgerichtet, hängend, behaart, nackt, hornig u. dergl. seien.

2) Ungefähre Grösse im Vergleiche zu anderen Thieren, wenn so etwas ausführbar ist. Diese Angabe sollte übrigens nur dann gemacht werden, wenn directe Maassangaben unausführbar sind.

3) Farbe und Beschaffenheit des Haares und nackter Hautstellen. Da das Haar der Säugethiere sehr häufig eine gemischte (melirte) Färbung besitzt, so wird es gut sein, bei Beschreibung derselben einzeln ausgeraute Haare zu berücksichtigen und anzugeben, mit welchen Farben dieselben von unten bis oben, von der Wurzel bis zur Spitze, gezeichnet sind. Z. B.: „Haare unten weisslichgelb, in der Mitte einmal schwarzbraun geringelt, dann weiter nach oben hin ockergelb, an der Spitze wiederum schwarzbraun.“ Es muss übrigens darauf geachtet werden, dass an verschiedenen Körperstellen, namentlich bei hundeartigen Raubthieren, die Zeichnung der einzelnen Haare wesentlich wechselt. Endlich ist auch der Gesamteindruck zu berücksichtigen und so präcise wie möglich wiederzugeben, welchen das GesamtcOLORIT der melirten Stellen hervorruft. Die durch besondere Färbung hervorstechenden Fleckungen des Pelzes sind genau ins Auge zu fassen und zu beschreiben, auch ist auf die Intensität und verschiedenartige äussere Begrenzung derselben bei verschiedenen Individuen wohl zu achten. Hinsichtlich der Beschaffenheit des Haares ist zunächst darauf zu sehen, ob man es mit den längeren, dickeren und steiferen Grannen-, oder ob man es mit den kürzeren, dünneren und weicheren, mehr gekräuselten Wollhaaren zu thun habe. Oefters hat man steife, glatte, stachelspitzige, öfters auch steife, grobe, fast heuähnlich gebildete Haare (Faulthiere), anderemale wollartig gekräuselte, dicht verfilzte vor sich. Solche Stellen am Körper, welche mit Stachelhaaren bedeckt sind, z. B. am Rücken der Stachelmäuse (*Acomys*), sind besonders zu berücksichtigen. An nackten Hautstellen ist deren Haltung, Oberflächen-Zeichnung (z. B. beim javanischen *Rhinoceros*) und Färbung zu beachten. Finden sich Auswüchse am Kopf oder an anderen Körperstellen?

4) Farbe und Gestaltung der Hörner, Klauen, Krallen, Hufe. Gerade hier sind triviale Vergleiche sehr schlecht angebracht und ist daher eine kurze treue Beschreibung des Gesehenen ganz besonders empfehlenswerth. Bei Beschreibung der Hörner sind Bezeichnungen, wie: „halbmondförmig, leierförmig, sanft- oder stark-gebogen, spiral, wohl statthaft. Es ist darauf zu achten, ob die Hörner gänzlich oder stellenweise plattgedrückt, oder ob sie gänzlich oder stellenweise rund, ob sie stark- oder schwachgeringelt, glatt, spitz oder stumpf sind. Auch ist ihre Stellung am Kopfe in Betrachtung zu ziehen. Es ist jedesmal anzugeben, ob die Weibchen gehörnt sind oder nicht. Hinsichtlich der Klauen, Krallen und Hufe ist deren Gestalt (ob lang, kurz, spitz, stumpf, gerade, stark oder schwach gekrümmt, platt, dick) anzugeben, auch sind die Fusseindrücke oder Fährten zu berücksichtigen.

5) Ist überhaupt die Gestalt der Zehen und der Fusssohlen einer besonderen Berücksichtigung werth. Sind die Fusssohlen nackt oder behaart, sind sie mit weicher oder härterer, mit schwieliger oder borkiger Haut bedeckt? Wie ist die Farbe der letzteren?

6) Bei geweihten Thieren (hirschartigen Wiederkäuern — Cervina) muss nicht allein auf die allgemeine Gestalt und Stellung des Geweihs,*) sondern auch auf die Verästelung desselben, auf die Zahl und Gestalt der Enden, ferner auf die Beschaffenheit der Aussenflächen derselben (ob glatt, ob höckerig, knorrig) auf die Zeit der ersten Entwicklung, auf die Zeit des Eintritts und auf die Dauer des Geweihwechsels geachtet werden. Auf diese Punkte ist in der Beschreibung Rücksicht zu nehmen, zumal dadurch vielfache Aufklärung über die Altersverhältnisse der betreffenden Thiere gewonnen werden kann.

Messungen an lebenden oder frisch getödteten Thieren sind sehr wichtig. Erstere sind natürlicherweise nur an zahmen oder an Haussäugethieren, und auch hier nicht immer gut ausführbar. Denn auch ein ursprünglich wildes, später gezähmtes Thier oder irgend ein von Hause aus noch so geduldiges Hausthier mag sich zwar füttern, streicheln oder sonstwie lieb-kosen lassen, wird aber, sobald die methodische Vermessung der einzelnen Körpertheile beginnt, misstrauisch und störrisch werden können. Hier hängt daher jeder Erfolg von der Gunst des Zufalles, d. h. hauptsächlich von dem Temperamente des gerade zu messenden Thieres, ab. Verfasser hat in dieser Beziehung die merkwürdigsten Erfahrungen gemacht. So bissen übrigens höchst zutrauliche Hunde nach der Hand, welche das Bandmaass an das Endtheil ihres Rückens, an eine für sie allerdings sehr empfindliche Stelle anlegen wollte. Militärfromme Pferde schlugen ungestüm hinten aus, sobald ihr Bauch gemessen werden sollte. Eine weibliche, sehr sanfte Njellet-Antilope (*Ant. strepsiceros*) rannte mich mit ungestümen Kapriolen über den Haufen, als ich die absolute Länge ihres Kiels (Wamme) mit dem Stangen-zirkel messen wollte. Ein sonst sehr mactabeler Klippschliefer (*Hyrax*) fauchte heftig und biss wüthend um sich, als man ihm mit dem Messapparate zu nahe kam u. s. w. In solchen und ähnlichen Fällen ist es natürlich besser, die Messung gänzlich zu unterlassen, als dieselbe hastig und dabei ungenau zu vollführen oder als sich dabei noch womöglich Verletzungen durch das wüthende Thier auszusetzen. Es sei denn, dass irgend eine Vorrichtung gefunden werde, um das Thier für die Dauer der Messung fest-machen zu können.

An Säugethierkadavern ist die Messung möglichst bald nach eingetretenem Tode vorzunehmen, so lange noch die Glieder biegsam sind. Denn hat sich erst die Todtenstarre entwickelt, so bereitet diese, namentlich an den Extremitäten, manche Schwierigkeiten. Indessen lassen sich auch diese noch umgehen, wenn man sich an den steifgewordenen Theilen das Gesamtmaass z. B. eines Beines aus den einzelnen von Glied zu Glied genommenen Theilmaassen zusammenaddirt. Zur Ausführung der Messungen dienen a) ein Bandmaass, im Etuis aufrollbar, von mindestens 6 Meter**) Länge, auf starkem

---

*) Noch immer werden von nicht wissenschaftlich gebildeten Reisenden die soliden alle Jahr sich erneuernden Knochenbildungen der Geweihe mit den hohlen, auf knöchernen Auswüchsen des Schädels, den Hornzapfen, aufsitzenden persistirenden Hörnern verwechselt.

**) Ich setze die Anwendung des metrischen Systemes bei den Messungen als selbstverständlich voraus.

geöltem Körper genau graduirt. b) Ein etwa 3 Meter langer hölzerner oder metallener Massstab mit ineinander verschiebbaren Gliedern. c) Ein Tasterzirkel von Metall nach Art eines geburtshülflichen *Compas d'épaisseur*, mit besonders weiten Branchen versehen. d) Womöglich ein Stangen- oder Winkelzirkel, dessen obere vom graduirten Theile, dem festen Massstabe, im rechten Winkel abstehende Branche auch fest ist, während die untere frei auf- und niederbewegt und mittelst einer Schraube beliebig fixirt werden kann. Während man nun die freien Branchenden solcher Zirkel behufs Ausmessung von Skeleten mit Vortheil zuspitzen lässt, gebe man ihnen an den zur Messung lebender Thiere dienenden Zirkeln dagegen eine abgestumpfte Form; dies, um nämlich bei Anwendung des Instrumentes die Beibringung von Stichwunden, die Erzeugung von Kitzel u. s. w. möglichst vermeiden zu können. e) Einige Meter Schnur, Bindfaden, Spagat, am Besten Körperband oder schmale Lederriemen, auf welchen letzteren Materialien man gemessene Distanzen mit Bleistift oder Tinte markiren kann. Hat man nur Bindfaden zur Hand, so hilft man sich durch Einknotung der gewonnenen Masse. Diese unter e) aufgeführten Apparate sind zur Ausführung mancher Aushülfemessungen sehr brauchbar.

Prof. C. Bruch hat in einer sehr gediegenen Arbeit „Ueber Thiermessungen“*) Schemata veröffentlicht, nach welchen Messungen von Säugethieren ausgeführt werden können. Ich lasse hier mehreres Nützliche aus Bruch's Artikel abdrucken. Unser Verfasser sagt: „Wir beginnen die Operation mit der Ermittlung der Körperhöhe am Widerrist und am Kreuz, als der beiden hervorragendsten Punkte des Rumpfes, wobei zugleich durch eine Theilungsmessung an dem auf die Basis gefällten Loth die Länge der vorderen und hinteren Extremitäten und der einzelnen Abschnitte derselben gefunden wird. Darauf folgt die Bestimmung der Körperlänge vom vorderen Rand des Buges bis zum hinteren Rand des Sitzbeines mittelst einer Horizontalen, welche der Basis parallel ist und in deren Verlängerung beim Rinde auch die Nasenspitze fällt. Hieran reihen sich die verschiedenen Durchmesser des Kopfes, die Schwanzlänge und die Umfangsverhältnisse des Rumpfes, welche wir an zwei Stellen, nämlich hinter den vorderen und vor den hinteren Extremitäten, nehmen. Die Ausmessung untergeordneter Theile, der Ohren, Hörner, Hufe u. s. w. bildet den Schluss.“ Wir lassen hier den Abdruck der Tabelle I aus Bruch's Arbeit folgen, welche die Masse von 8 Individuen der Neckar-Simmenthaler Rinderrace enthält. Diese letztere zeichnet sich durch Körpergrösse vor anderen aus. Die Tabelle betrifft 3 männliche (Mas = m.) und 5 weibliche (Foemina = f.) Exemplare. Sie sind nach dem Lebensalter geordnet, um zugleich die Zunahme der Proportionen besser übersehen zu können.

Bruch fügt dieser Tabelle noch folgende, auch ein allgemeineres Interesse darbietende Betrachtungen an:

„Schon ein flüchtiger Blick auf die Zahlen der Tabelle ergibt, dass das Wachsthum vom ersten zum zweiten Lebensjahre nicht so beträchtlich ist, als vom zweiten zum dritten, mit welchem das Thier zwar nicht ausgewachsen ist, aber doch seine osteologischen Dimensionen ziemlich erreicht zu haben pflegt und zwar gilt dies sowohl von der Körperlänge, als von der Körperhöhe, welche letztere hauptsächlich durch die Länge der Extremitäten bedingt ist. Während jedoch die Zunahme der Körperlänge beinahe $\frac{1}{4}$ beträgt, nimmt die Höhe noch nicht um $\frac{1}{8}$ zu, wird also in einer früheren

*) Der zoologische Garten. Frankfurt a. M. Jahrgang 1865, S. 161 ff.

I. Tabelle.*)

Bezeichnung der Thiere Geschlecht Race u. s. w.	Alter	Länge des Kopfes von der Stirnleiste z. Nasenspitze		Breite zwischen den Augen	Breite an der Nase	Breite zwischen den Hörnern.	Entfernung der beiden Hornspitzen.	Länge	Hörner	Länge d. Halses v. d. Stirn- leiste bis zw. d. Schultern	Von da bis zu den Sitz- beinhöckern	Höhe vom Boden bis zum Ellenbogen	Von da bis zum Widerrist	Höhe der Hinterbeine bis zum Knie	Von da bis zum Kreuz	Länge des Schwanzes	Querdurchmesser des Buges	Querdurchmesser von Hüfte zu Hüfte	Umfang des Rumpfes	oben	Umfang der Beine	Horizontallänge von der Schwanzwurzel zur Stirne	Brust- Umfang	Besondere Bemerkungen
		Stärke						unten																
I. Ludwig, Rottscheck m.	3/4	0,39	0,153	0,093	0,18	0,405	0,21	0,222	0,523	1,2	0,69	0,557	0,69	0,6	0,63	0,18	0,36	1,96	0,18	0,168	1,84	1,62	mehr weiss	
II. Hans, Rottscheck m.	1 2/3	0,459	0,21	0,105	0,279	0,66	0,228	0,218	0,54	1,26	0,675	0,57	0,705	0,645	0,78	0,95	0,42	2,1	0,21	0,195	1,86	1,86		
III. Napoleon Rottscheck m.	2 1/2	0,51	0,22	0,10	0,22	0,71	0,25	0,228	0,678	1,335	0,75	0,705	0,795	0,705	1,089	0,33	0,546	2,46	0,24	0,234	2,4	2,16		
IV. Marie Rottscheck f.	1 1/3	0,453	0,21	0,105	0,24	0,555	0,168	0,195	0,714	1,23	0,675	0,6	0,75	0,645	0,74	0,21	0,441	2,22	0,66	0,231	1,866	1,8	Kalbin seit 5 M. trücht.	
V. Lisebeth Rottscheck f.	6	0,495	0,192	0,09	0,21	0,39	0,33	0,15	0,696	1,41	0,705	0,678	0,75	0,69	0,89	0,18	0,54	2,24	0,69	0,21	2,16	1,968	mehr weiss	
VI. Goldie Rottscheck f.	6 1/4	0,45	0,21	0,096	0,195	0,6	0,27	0,18	0,69	1,32	0,696	0,63	0,75	0,675	0,9	0,24	0,495	2,29	0,21	0,18	2,32	1,95	mehr roth- braun	
VII. Babet Rottscheck f.	7 1/2	0,54	0,228	0,102	0,222	0,6	0,33	0,18	0,75	1,515	0,774	0,75	0,795	0,765	1,05	0,3	0,6	2,7	0,24	0,18	2,4	2,19	mehr weiss	
VIII. Grethle Rottscheck f.	9	0,465	0,18	0,09	0,21	0,768	0,33	0,15	0,69	1,395	0,9	0,518	0,702	0,6	0,9	0,195	0,489	2,38	0,18	0,135	1,95	1,99		

*) Wir verdanken dieselbe der gütigen Verwendung des Verwaltungsratsmitgliedes, Herrn Dr. med. Stiebel in Frankfurt a. M.

**) Soll wohl 0,25 heissen, da die Genauigkeit der Messungen einen solchen Irrthum nicht annehmen lässt.

Periode erreicht oder, mit anderen Worten, das jüngere Thier ist hochbeiniger, als das alte. Die Zunahme der Körperlänge kommt vorwiegend auf Rechnung des Halses und Kopfes, auch der Schwanz wächst mehr als der Rumpf, welcher letztere mehr an Umfang zunimmt.“

„Die weiblichen Maasse bleiben im Ganzen nicht erheblich unter den männlichen und übertreffen sie sogar in mehreren Rubriken, wobei jedoch in Anschlag zu bringen ist, dass die ersteren der Mehrzahl nach von älteren Thieren sind, und dass das jüngste derselben, sowie das unter VII aufgeführte, sich durch eine ungewöhnliche Körpergrösse (Frühreife?) auszeichnen. Dagegen fällt an dem weiblichen Thiere VIII eine Abnahme der meisten Dimensionen auf, mit Ausnahme der Länge der Extremitäten und der Hörner, welche hier die grössten Maasse geben. Nicht zu verkennen ist eine sowohl absolut, als relativ grössere Länge des Halses und des Schwanzes bei den weiblichen Thieren; dagegen zeigt sich in den Umfangsverhältnissen nur am Bauche ein Uebergewicht zu ihren Gunsten, da der Umfang an Brust und Extremitäten entschieden auf Seiten der männlichen Thiere ist.“

„Unschwer lassen sich Schwankungen in den individuellen Proportionsverhältnissen herauslesen; so ist namentlich bei dem weiblichen Thiere unter VIII das Verhältniss der Extremitäten zum Rumpfe, welches die relative Körperhöhe desselben bedingt, ein ganz abweichendes, und zwar besonders an den hinteren Extremitäten. Ebenso abweichend sind die Kopfverhältnisse des II. Thieres, welche durch starke Dimensionen, besonders in der Breite, auffallen, wobei die geringere Stärke der Hörner einen Antheil hat. Am meisten variirt die Entfernung der Hornspitzen, die sich als verhältnissmässig unwesentlich erweist, wie denn überhaupt die Verhältnisse des Schädels in Dimensionen schwanken, welche strenge Specifiker nur ungern als individuelle bezeichnen würden.

Wir lassen auf nächster Seite noch eine andere Tabelle des verdienten Forschers folgen.

Wer irgend die Musse hat und die passende Gelegenheit findet möge die von Bruch aufgestellten, ausführlichen Schemata benutzen und deren einzelne Rubriken auszufüllen sich bemühen. Jemand, welcher in besagter günstiger Lage ist, copirt sich am Besten die citirte Tabelle auf Schreibebögen des gewöhnlichen Formates und trägt die erhaltenen Zahlwerthe in die Rubriken ein, womöglich mit Tinte oder doch mit weichen Bleistiften, da letztere von härterer Sorte erfahrungsgemäss eine zu matte, namentlich auf weicherem Conceptpapier zu leicht vergehende Schrift erzeugen.

Für solche Reisende, denen die Bruch'schen Tabellen zu ausführlich erscheinen und welche aus mancherlei Gründen ein einfacheres Messungsschema beanspruchen, diene die folgende von mir schon öfters angewendete Vorlage:

Schema: 1) Kopflänge von der Stirnleiste (d. h. der auch durch die Weichtheile durchfühlbaren knöchernen Hervorragung am Ende des Hinterhauptes) bis zur Nasenspitze.

- 2) Länge von der Stirnleiste bis zum hinteren Augenwinkel.
- 3) Länge vom vorderen Augenwinkel bis zur Nasenspitze.
- 4) Ohrenlänge aussen.
- 5) Grösste Ohrenbreite.
- 6) Hörner- oder Geweihlänge an der stärksten Krümmung gemessen.
- 7) Abstand der Hörner- oder Geweihspitzen voneinander.
- 8) Halslänge im Rücken gemessen.
- 9) Rückenlänge von der Halsbeuge bis zur Schwanzwurzel.
- 10) Schwanzlänge.

- 11) Höhe vom Widerrist bis zum Boden.
- 12) Höhe von der Kruppe bis zum Boden.
- 13) Bauchlänge zwischen den Insertionen der Vorder- und Hinterbeine gemessen.
- 14) Vorderbeinlänge von der Insertion bis zum Vorderknie.
- 15) Dieselbe vom Vorderknie bis zur Fusssohle.
- 16) Hinterbeinlänge von der Insertion bis zum Hinterknie.
- 17) Dieselbe vom Hinterknie bis zur Fusssohle.
- 18) Gesamtlänge des Thieres von der Schnautzenspitze bis zur Schwanzwurzel.

Jedermann wird sich nach diesen 18 Maassangaben mit Leichtigkeit die nöthigen Tabellen construiren können.

Zur Ausführung der Masse 2, 3 wird man mit Vorthail den Tasterzirkel, zur Ausführung der Masse 4, 5 und 7 den Stangenzirkel, zu derjenigen von 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 das Bandmaass benutzen. Für 14, 15, 16, 17 wende man dagegen den verschiebbaren Maassstab an. Fehlt es an einem Stangenzirkel, so benutze man für 4, 5, 7 den Tasterzirkel, mangelt es auch an diesem, so bediene man sich des festen Maassstabes und des Bandmaasses. Letztere beiden Apparate sollten freilich stets zur Hand sein.

Bei der grossen Verschiedenheit der Körpergestalt selbst unter Säugethieren einer Art, bedingt durch die Differenzen des Alters, Geschlechtes, Ernährungszustandes und durch die Variabilität, lassen sich durchschlagende Regeln, wo und wie man den Messapparat an den einzelnen Punkten des Körpers, z. B. an das Widerrist, an die Kruppe u. s. w. jedesmal anzusetzen habe, nicht gut geben und bleibt es hier der Uebung sowie dem Takte des Messenden überlassen, sich in den gegebenen Fällen zurechtzufinden. Dass solchergestalt die Messungen nicht immer absolute Genauigkeit beanspruchen können, liegt auf der Hand, indessen ist hier doch tröstlicherweise anzuführen, dass es bei solchen Messungen weniger auf die exacte Begründung und Wiedergebung der einzelnen Zahlenangabe, als vielmehr auf die Herstellung von Verhältnisszahlen zwischen den verschiedenen quantitativ möglichst auseinandergehenden individuellen Formen ankommt.

Wem es übrigens an Zeit und Gelegenheit gebricht, auch das zuletzt von mir aufgeführte, reducirte Messungsschema durchgehends zu berücksichtigen, möge wenigstens, um noch immer einigen Nutzen stiften zu können, die unter Nr. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 und 18 angegebenen Messungen vornehmen, oder sich schlimmstenfalls auch mit Nr. 1, 4, 6, 8, 9, 10 begnügen. Noch weniger zu geben, dürfte dann freilich kaum der Mühe verlohnen.

Endlich werde noch bemerkt, dass bei den bärenartigen mit ganzer Sohle auftretenden Säugethieren diese im Rücken und auf der Unterseite, dass bei Hufthieren der Längsdurchmesser des Hufes an der Sohlenfläche desselben gemessen werden müssen, und zwar am Sichersten mit dem Stangenzirkel.

Bildliche Darstellungen. Ueber die photographische Aufnahme von Thieren wird man das Nothwendigste in dem der photographischen Technik gewidmeten Abschnitte dieses Buches finden. Hier nur noch einige Winke für solche des Zeichnens kundige Reisende, welche als geschickte Dilettanten durch ihre Thätigkeit hinlänglichen Nutzen stiften können. Es zeigen dies u. A. die Originalskizzen eines Barnim, Harnier, Heuglin, Schweinfurth und des Verfassers dieser Zeilen, Skizzen, welche unter der Hand eines geübten Künstlers zu anerkannt brauchbaren, instructiven Abbildungen erwachsen sind. Die Aufmerksamkeit zeichnender Reisender sollte nur

nicht allein darauf gerichtet sein, beobachtete Säugethiere in ihrem Vivarium aufzunehmen und zwar dies unter Berücksichtigung der umgebenden Bodenbeschaffenheit, Vegetation u. s. w., sondern vielmehr hauptsächlich darauf, das todte Thier, wie es vor dem Zeichner liegt, namentlich aber die Physiognomie verschiedener Thiere, abzukonterfeien. Der Dilettant möge immerhin den Kopf — en face, von oben, en profil — eines gezähmten wilden Säugethieres oder eines Haussäugethieres nach dem Leben zu zeichnen versuchen. Besser freilich wird es immer für ihn sein, wenn er sich möglichst an die ruhig vor ihm bleibenden, eine constante Silhouette darbietenden und wichtige Einzelheiten in der Configuration der verschiedenen Theile erkennen lassenden todten Thiere hält.

Am einfachsten ist es, wenn man mit Bleistift und Estampe oder mit Schwarzkreide die Zeichnung grundirt, sodann aber mit Bleistift, mittelst der Feder oder des Pinsels, schwarze Touche, Sepia oder Neutraltinte benutzend, die tiefen Linien und die Schatten deutlicher hervorzubringen sucht. Eine combinirte Anwendung von Schwarz, Sepia, Neutraltinte oder auch von Winsor und Newton's Indelible Brown Ink kann ganz effectvolle Zeichnungen liefern. Benutzt man farbiges Papier, z. B. Windsor Paper, De Canson und dgl., so lassen sich die Lichter durch reines oder durch ein mittelst Gelb, Bräunlich und Grünlich abgetontes Weiss in höchst bestechender Weise hervorheben. Verfasser sah die Köpfe von Wölfen, Hyänen, Rehen u. s. w. recht trefflich auf dunkel grundirten Sorten des leider jetzt wieder aus der Mode gekommenen Papier pellé ausführen. Die hervorstechenden Grannenhaare konnten auf diesem Material durch Einkratzen in den Kalküberzug recht täuschend hervorgehoben werden.

Ergebnissreicher ist freilich die Nachahmung des vollen Colorites. Wer nicht in Oel malt, also nicht den höchsten Grad der Malerkunst auszuüben weiss, nehme wenigstens gute halbfeuchte oder feuchte Farben von Newman, Schoenfeld, Winsor und Newton u. A. Trockne Farben, wie die sonst vortrefflichen von Panier, Flatow, Chenal, Rogall u. s. w. sind leider zu empfindlich gegen Temperaturdifferenzen, zerspringen z. B. in der Hitze von selbst oder bei leichtem Insult und verkrümmeln sich dann in der unheilvollsten Weise. Ein geschickter Aquarellist wird rauhe Papiere, wie rauhes Bristol Paper, Royal Belge, gewisse ein starkes Grain zeigende venezianische und rheinische Ellen- oder Cartonpapiere, auch chemnitzer Holzpapiere, vorziehen. Verfasser erhält recht günstige Resultate, wenn er auf mässig rauhem Papiere die Hauptfarben des Thieres mittelst der Estampen von den besten französischen Pastellen aufsetzt und mit Honigfarbe, Bleistift oder farbiger Kreide die Schatten, Flecken u. s. w. nachträgt.

Auch die schon flüchtig erwähnte farbige Kreide, Oelkreide, Creta polycolor, p. p. in den verschiedenartigsten Nüancen zu haben, liefert namentlich in Verbindung mit dem Bleistift und der Estampe vorzügliche Bilder, so z. B. in der geschickten Hand eines Schweinfurth.

Auf die Zeichnung der Ohren, Ohrläppchen und Ohrleisten, der inneren Ohrhaare, der Schnauze, Nasenlöcher, Augen (Iris — ob runde, ob verengte Pupille —), der Hörner und Geweihe, der Füsse, Afterzehen, Hufe und der Pfoten und Hufeindrücke (Fährten) ist besondere Rücksicht zu nehmen.

3. Einsammlung und Conservirung von Säugethieren und deren Resten.

Der Reisende findet an den verschiedensten Punkten der Erde Gelegenheit, Säugethiere lebend, in mehr oder minder gezähmtem oder noch ganz

wildem ungebändigtem Zustande, sei es durch Tausch, Kauf oder als Geschenk zu erhalten. Ist es der betreffenden Person darum zu thun, dergleichen lebende Thiere in diesem Zustande nach der Heimath zu befördern, so hat er für passende Behältnisse zu sorgen, und womöglich so viel von der einheimischen, für das Thier sich eignenden Futtersubstanz mitzunehmen, als es die Umstände gestatten. Es ist wohl kaum nöthig, darauf hinzuweisen, mit welchen Schwierigkeiten im Allgemeinen der Transport lebender Säugethiere verbunden ist. Da nun bei den steigenden Bedürfnissen unserer Zeit, namentlich bei dem sich mehrenden Interesse unserer Zeitgenossen für zoologische und Acclimatisationsgärten, für öffentliche und Privatmenagerieen, der Handel mit lebenden Thieren in immer lebhafterer Weise etabliert und in immer regelmässigeren Bahnen gelenkt wird, so dürfen wir die eine so unendlich viel Routine verlangende Beschäftigung, wie das Erwerben und der Transport lebender Säugethiere, füglich der Hauptsache nach den Thierhändlern überlassen. Sollte sich dennoch einer oder der andere Reisende veranlasst fühlen, ein Exemplar aus unserer Thierordnung lebend zu transportiren, so muss er sich dabei auf die eigene Wissenschaft, das eigene Glück, sowie auf den Rath von Kennern und von erfahrenen Thierfreunden verlassen. Denn Regeln nach dieser Richtung hin zu geben, gehört nicht zu unserer Aufgabe, würde aber auch hier nicht einmal durchführbar sein, weil man alsdann alles über die Lebensweise der einzelnen Säugethiere Bekannte zusammenstellen müsste. *)

Für uns handelt es sich hauptsächlich um die Einsammlung, Aufbewahrung oder den Transport von todtten Säugethiern und deren Skeleten, Häuten, Hörnern u. s. w. Der Reisende wird hier und da frisch getödtete Thiere, Schädel, Skelete, Bälge und einzelne merkwürdige Theile derselben zum Tausch oder Kauf erhalten. Hier heisst es Acht geben, dass auch die Waare dem Preise entspreche. An den Schädeln ist nach meinen eigenen Erfahrungen nur zu häufig das Hinterhauptsbein zerstört, um nämlich das Gehirn bequemer herausbekommen zu können, häufig fehlen auch Zähne oder der ganze Unterkiefer. An den Skeleten fehlen einzelne Rippen und namentlich oft einzelne Zehenglieder. Die Bälge sind nicht selten durch Schuss- oder Speerwunden gräulich zerlöchert, an manchen Stellen sind sie gefault, abgehaart, angefressen u. s. w. Hörner finden sich besonders an ihrer Basis zernagt u. s. w.

Vielfach wird sich der Reisende in der Lage befinden, irgendwo eingeborene Jäger in seinen Dienst zu nehmen, diese auf die Jagd zu senden und von ihnen Säugethiere einsammeln, resp. präpariren zu lassen. Man findet in manchen Gegenden geschickte Leute dieser Art, Leute, wie ihrer S. 484 erwähnt wurden. Nur muss man dieselben daran gewöhnen, schonender zu verfahren, als sie im Allgemeinen zu thun pflegen; namentlich bei Entfernung des Gehirns aus der Schädelhöhle, das Hinterhaupt zu erhalten, die Zehen und Huf-(Nagel-) Glieder ordentlich aus der Haut zu lösen, die Nasengegend nicht zu verstümmeln und jene Vorkehrungen zu treffen, welche für die Erhaltung der Präparate wichtig, von mir unten noch näher erörtert werden sollen.

*) Vergl. die verschiedenen Jahrgänge der Zeitschrift: „Der zoologische Garten“, der *Bulletins de la Société d'Acclimatation de Paris*, der *Proceedings of the Zoological Society of London*, sowie die hauptsächlich auf Biologie Rücksicht nehmenden zoologischen Werke: H. O. Lenz: *Gemeinnützige Naturgeschichte* 4. Aufl., Bd. I, Gotha 1860, Wood: *Natural history*. Vol. I Mammals. Brehm: *Illustriertes Thierleben* Bd. I, II, Figuier: *les Mammifères*.

Eingeborene Stämme verstehen es nicht nur mittelst der Feuerwaffen, der Bogen, Speere, Harpunen, Schwerter, der Wurfeisen, Wurfhölzer, Keulen, Laços (Wurfschlingen), Bolas (Wurfkugeln) u. s. w. Säugethiere zu erlegen, sondern sie fangen dieselben auch in verschiedenartig construirten Fallen, in Netzen, mit Selbstgeschossen, Fallharpunen, Schlaghölzern, in Gruben und Gehegen (Mundéos, Hopos u. s. w.). Von solchen Vorrichtungen muss der Reisende möglichst Nutzen zu ziehen suchen.

Eine Fallharpune, wie sie sich zur Erlegung gewisser Dickhäuter, grösserer Antilopen u. s. w., namentlich aber der Flusspferde, eignen möchte, findet sich in Monteiro's und Gamitto's interessantem Werke: *O Muata Cazembe*, Lisboa 1854, Tab. X abgebildet, ist auch in Livingstone's *Missionary travels* und in Anderson's *Lake Ngami* beschrieben und bildlich wiedergegeben. Eine Harpune, deren Spitze vergiftet werden kann, wird am unteren Ende eines mittelst Steinen beschwerten Fallholzes befestigt. Letzteres wird nun durch eine Leine an einem Baumaste oder an einer künstlichen Stütze emporgezogen und wird die Leine zugleich horizontal über den Weg gespannt, den das zu erlegende Thier erfahrungsgemäss zu betreten pflegt. Berührt dasselbe aber die zu beiden Seiten seines Pfades an Baumstümpfen lose befestigte, horizontal laufende Leine, so löst sich dieselbe augenblicklich, das Fallholz schiesst niederwärts und fährt in den Rücken des Thieres, welches in Folge der Verwundung stirbt, dies namentlich schnell, wenn die Harpune vergiftet gewesen war.

Ein Selbstgeschoss von starker Wirkung beschreibt der schon von uns citirte Anderson, einer der bewährtesten afrikanischen Sportsmen, wie folgt: „Man nimmt zwei junge Bäume, deren untere Zweige man abgeschnitten hat, oder ein Paar starke Pfähle, die man fest in die Erde einschlägt, und befestigt an ihnen eine Büchse in fast horizontaler Lage, doch so, dass die Mündung des Laufes etwas aufwärts gerichtet ist. Ein Stück Holz von ungefähr sechs Zoll Länge, so zu sagen ein kleiner Hebebaum, wird so an den Büchsenschaft gebunden, dass er etwas vor- und rückwärts geschoben werden kann. Ein kurzer Bindfaden vereinigt den Drücker mit dem unteren Theile jenes Holzstückes. Am oberen Ende desselben bindet man eine längere Schnur an, die man durch einen der leeren Ladestockhülsen zieht, worauf man an das äusserste Ende der Schnur ein Stück Fleisch bindet, das auf der Mündung der Büchse liegt. Wenn dies soweit fertig ist, macht man eine Art Zaun um den Platz, der aus stacheligem Gebüsch besteht, und lässt nur einen Zugang frei, gerade vor der Mündung der Büchse. Von verschiedenen Seiten her legt man altes Fleisch oder etwas Aehnliches bis an die Falle heran. Wenn nun z. B. eine Hyäne das Fleischstück anbeisst, was nicht geschehen kann, ohne dass ihr Rachen gerade vor die Mündung des Flintenlaufes kommt und die Schnur berührt, geht der Schuss sogleich los, und man kann hundert gegen eins wetten, dass die Hirnschale nach allen Seiten hin zersplittert.“

Die Mundéos sind in Ostbrasilien gebräuchlich und werden dieselben namentlich von den Indianern geschickt angelegt. Man wählt zu ihrer Aufstellung gern die Nähe eines Flussufers im Walde. Hier errichtet man aus grünen Reisern einen langen Zaun, der auf das Ufer rechtwinklig gestellt wird und etwa 2½ bis 3 Fuss hoch sein muss. Alle 15 bis 20 Schritte wird in diesem Flechtzaun eine schmale Oeffnung gelassen, in welcher drei starke Stücke Holz mittelst verschiedener kleiner Hölzer schräg in einem Winkel aufgestellt werden. Das kleine Wildpret sucht einen Durchgang, wenn es, seiner Gewohnheit gemäss, längs des Flussufers hin und her wechselt,

es findet eine Oeffnung unter den Schlagbäumen und tritt auf die Stellung, welche ein kleiner aus Reisig geflochtener Boden ist, die schweren Hölzer schnellen los, schlagen herab und tödten das Thier. Solcher Mundéos macht man dreissig, vierzig und mehr in einer Linie und in ihnen fängt man täglich Wildpret. Prinz Max von Neuwied, welchem wir eine Beschreibung dieser Art primitiver Thierfallen verdanken, fing darin an einer Localität innerhalb fünf Wochen 181 Säugethiere (darunter 3 Tapire, 3 Rehe, 11 Nabelschweine, 2 Ameisenbären, 2 Fischottern, 9 Tigerkatzen u. s. w.) Jedenfalls dürften sich diese Mundéos für die brasilischen und sonstigen Flüsse der waldreichen Theile Südamerikas recht wohl eignen.

Der schon erwähnte Hopo wird von gewissen Bantu- (Kaffern, Bechuana-) Stämmen Südafrikas benutzt. Derselbe besteht nach Livingstone aus zwei Verhauen oder Hecken in Gestalt des Buchstabens V, welche in der Nähe des Winkels sehr hoch und dicht sind. Anstatt dass aber beide Hecken im Winkel zusammenstossen, sind sie so angelegt, dass sie eine schmale Gasse von etwa funfzig Armlängen bilden, an deren Ende eine Grube von 6 bis 8 Fuss Tiefe und 12 bis 15 Fuss Breite angebracht ist. Ueber die Ränder der Grube sind Baumstämme gelegt, besonders über den Rand zunächst der Stelle, wo die Thiere in das Loch hinunterspringen sollen, und auf der gegenüberliegenden Seite, über welche sie, wie man voraussetzt, versuchen werden zu entkommen, wenn sie hinuntergefallen sind. Die Stämme hängen so lose über den Rand, dass sie das Entkommen beinahe unmöglich machen. Das Ganze ist sorgfältig mit kurzen grünen Binsen bedeckt, wodurch die Vertiefung einer versteckten Fallgrube ähnlich wird. Da die Hecken gewöhnlich ungefähr eine englische Meile lang sind und an ihren Enden etwa ebensowenig auseinanderstehen, so kann ein Stamm, der um die Grube herum einen Kreis von drei bis vier Meilen bildet und nach und nach näher zusammenrückt, darauf rechnen, eine grosse Menge Wild einzuschliessen. Dieses wird dann unter Geschrei nach dem engen Theile des Hopo getrieben, die dort versteckten Männer schleudern ihre Wurfspere unter die bestürzten Rudel hinein, die erschreckten Thiere rennen immer weiter bis zu der Oeffnung, die sich am Ende der zusammenlaufenden Hecken befindet, und stürzen in die Grube, die sich bis zum Rande füllt.

Von letzterer Fangmethode sollte der Reisende im gegebenen Falle in einem Lande Nutzen zu ziehen suchen, welches sich durch so grossen Wildreichtum auszeichnet und woselbst der Wagenverkehr im Innern den Transport selbst grosser Thierreste erleichtert, wogegen dieser in den mehr nördlichen Gegenden des afrikanischen Festlandes erhebliche Schwierigkeiten findet.

Der Reisende wird sich nun auch häufig bewogen fühlen, die Jagd persönlich auszuüben. Es würde die Tendenz dieses Buches und den mir zugewiesenen Druckraum gänzlich überschreiten, wollte ich mich hier darauf einlassen, dem Leser Mittheilungen über moderne Jagdwaffen u. s. w. zu machen. Nur hinsichtlich zweckmässiger Jagdkleidung möchte ich hier ein paar kurze Bemerkungen einschalten. Schreiende Farben sind gänzlich zu vermeiden, vielmehr muss der Kleiderstoff ein möglichst mattfarbiger sein. Dagegen wird es sich vielfach empfehlen, ein rothes Schnupftuch oder Lappchen in der Tasche bei sich zu führen, um damit die Neugier des Wildes, z. B. mancher Antilopen u. s. w., zu reizen und sie so leichter zu Schusse zu bringen. Für tropische, an dornigem Buschwerke reiche Gegenden eignen sich vorzüglich Jacke und Hose von Leder, die erstere vorn mit mehreren kleineren und hinten auf dem Rücken mit einer grossen Tasche versehen.

Diese Rückentasche wird durch zwei seitliche Schlitzte zugänglich, die sich auf- und zuknöpfen lassen. *) Hier kann man Reservezeug für das Gewehr, Notizbuch, Käferflasche u. s. w. unterbringen, ohne doch dadurch in seinen Bewegungen gehemmt zu werden. Als Leibwäsche ist auch für die heissen Länder ein auf dem blossen Körper zu tragendes Wollhemde anzurathen. Die Beine sichere man durch starke Gamaschen oder besser noch durch leicht und gut gearbeitete Kniestiefel. Als Kopfbedeckung nehme man einen Filzhut, dessen breite Krämpen im Dickicht emporgeschlagen werden können. Auch sind die von den Engländern in Indien u. s. w. getragenen helmartigen leichten Filzhüte sehr praktisch. An einem starken Ledergurt werden die Patrontasche und ein gutes Jagdmesser befestigt. Sehr empfehlenswerth sind die in Solingen gefertigten, in metallbeschlagener Scheide steckenden Bowie-Messer, Machetes oder Façoes, welche zugleich als Hackemesser im Walde dienen können und überdies eine vortreffliche Vertheidigungswaffe abgeben.

Will man nun ein todtcs Säugethier abbalgen, so verfähre man in folgender Weise: Man lege den Cadaver auf den Rücken, mache mit einem starken Skalpell oder einem Küchenmesser mit convexer Schneide einen am (zur Linken des Präparators gelegenen) Kinn beginnenden, bis gegen den After hin reichenden medianen Längsschnitt und verbinde damit je vier an den Füssen beginnende, an der Innenseite der Beine verlaufende Querschnitte. Die Schwanzhaut wird an der Unterseite dieses Organes bis zur Spitze gespalten. Brustwarzen, die männliche Ruthe, der Hodensack, die weibliche Geschlechtsöffnung und die Afteröffnung sind zu schonen, resp. während des Aufschneidens der Bauchhaut durch Kreisschnitte zu umgehen. Beim Abziehen der Haut löse man die Fusswurzeln in ihren Gelenken, unter Durchschneidung der Sehnen und Bandapparate. An der Nase, an den Lippen und Augenlidern sei man (worauf u. A. auch Ph. R. Martin mit Recht aufmerksam macht) sehr vorsichtig, damit diese Organe nicht eingeschnitten werden. An der Ruthe, dem Hodensack und den Zitzen, resp. Eutern, schäle man die Weichtheile aus der sie bedeckenden Haut heraus. Die Ohren werden hart am Kopfe abgetrennt. Die Hörner und Geweihe lasse man an der Haut und säge dieselben an ihrer Basis ab. Scheide und Mastdarm werden hart an ihrer äusseren Mündung abgeschnitten. Fett muss nach Möglichkeit von der Fleischfläche der Haut gelöst werden, auch muss man sich hüten, zu viel Muskel, namentlich Hautmuskel und Sehnenhäute (Fascien) daran zu lassen.

Martin schlägt vor, die nur schwierig im Ganzen ablösbaren und zu transportirenden Häute sehr grosser Bestien, der Elephanten, Nashörner, Flusspferde u. s. w. in einzelnen Stücken abzuziehen. Man solle dabei die natürlichen Hautfalten benutzen, was namentlich beim indischen Rhinoceros leicht ausführbar sei. Jedenfalls dürfte dieser Vorschlag des hervorragenden Taxidermen wohl zu beherzigen sein.

Will man das Skelet eines Thieres zurichten, so hat man dasselbe auf der Reise nur im Groben zu entfleischen und dabei die Bänder möglichst zu schonen. Die Vorderbeine werden sammt den Schulterblättern abgelöst, die Hinterbeine werden, sind die Thiere nicht allzu gross, am besten in ihrem Zusammenhange mit dem Körper belassen. Nägel, Krallen, Hufe u. s. w., womöglich auch die Sohlenhaut, bleiben an den Zehen. Vom Schädel sind die Schläfen- und Kaumuskeln zu entfernen. Derselbe muss behufs der Ent-

*) Niemals wähle man glänzende Knöpfe von Perlmutter, Metall und dergl., weil man von den Wilden unaufhörlich darum angebettelt wird.

hirnung sorgfältig vom ersten Halswirbel gelöst werden. Man zerstört alsdann das Gehirn vom Hinterhauptloche mittelst eines starken, winkelförmig gebogenen Drathes oder mittelst eines Baumästchens, an welchem noch ein Zweig im Winkel absteht. Das Hirn wird damit in der Schädelhöhle selbst zerdrückt und extrahirt, es kann aber mittelst Wasser und Holzasche noch weiter herausgespült werden. Es empfiehlt sich die Skelete kleinerer Säugethiere in feuchtes Löschpapier einzuschlagen, das ganze Packet am gelinden Feuer oder in der Sonne zu trocknen und mit Bindfaden zu umschnüren. Grössere Thierknochen trocknet man ebenfalls an einem nicht zu intensiven Feuer oder in der Sonne. Durch Aufstreuen von über Feuer erwärmtem oder von der Sonne durchglühtem Sande, selbst von heisser Asche, kann man das Eintrocknen der Skelete befördern. Auch empfiehlt es sich, dergleichen Materialien in die Schädelhöhle einzustreuen. Die enthirnten Schädel von Thieren, die nicht zu lange und nicht zu dicke Hörner oder Geweihe haben, können in den Rippenkorb gesteckt werden, in welchem auch wohl die vorher in Beugstellung gebrachten Vorderbeine Platz finden. Füllt man nun noch die übrigbleibenden Zwischenräume innerhalb des Rippenkorbes mit Werg, Watte, Papier, Lappen, Heu, Pflanzenhaaren oder mit Laub aus, so lässt sich das Skelet sicherer transportiren. Hat man ein gehörntes oder geweihtes Thier abgebalgt und die betreffende Kopfbewehrung abgesägt, so bleibt der Schädel trotzdem immer noch brauchbar. Selbst der Rippenkorb, die Wirbelsäule, die Beckenknochen und die abgehäuteten oberen Knochen der Extremitäten solcher abgebalgten Thiere sollten nicht bei Seite geworfen, sondern erhalten werden.

Ist die nöthige Musse vorhanden, so kann man die vorher in Gefässen untergebrachten Skelete kleiner Säugethiere immerhin von Ameisen, Termiten, Speckkäfern und Schaben benagen lassen.

Behufs Conservirung der Häute und Rohskelete hat man die verschiedenartigsten Methoden und Mittel in Vorschlag gebracht. Anstatt nun den Leser hier mit einem Wust von Recepten u. dgl. zu ermüden und zu verwirren, will ich nur einige Dinge mittheilen, deren Zuverlässigkeit ich selbst erprobt habe.

Zunächst Becoeur's Arsenikseife. Man kocht weisse Seife 1 Pfd. in Wasser zu einem Brei und fügt erst $\frac{1}{2}$ Pfd. frisch gelöschten Kalk und dann 1 Pfd. gepulvertes Arsenik (arsenige Säure — *acidum arsenicosum*), endlich $\frac{1}{2}$ Pfd. Kampher hinzu. Man transportirt diese Masse in geschlossenen, äusserlich gut gesicherten, weithalsigen Gefässen von Glas, Thon, Steingut oder Porzellan und streicht sie mit hölzernen Spateln auf die damit zu conservirenden Präparate auf.

Besser als diese Arsenikseife ist das von Martin in Vorschlag gebrachte arsenigsaure Natron. Es kann dasselbe als „arsenigsaures Natron, *Natron arsenicosum*“ aus chemischen Fabriken und Droguerieen bezogen werden. Vor dem Gebrauch löst man es in kaltem Wasser auf. Kleine Säugethiere, welche man mit Haut und Haar trocknen will, können vorher in eine solche Lösung eingetaucht werden. Gut ist es, auch die Hörnerbasen an Schädeln, Bälgen oder an isolirt abgelösten Hörnern damit zu bestreichen, weil diese Theile grossen Zerstörungen durch Insectenfrass ausgesetzt sind. Ferner muss man solche Rohskelette, deren Zusammenhang erhalten bleiben soll, damit bestreichen. Man kann dazu eine beliebige Vogelfeder benutzen.

Martin empfiehlt statt der Arsenikseife arsenigsauren Thon. Zu

gesättigter Arseniklösung wird irgend ein trockner gepulverter Thon hinzugerührt, bis ein dünner Brei entsteht.

Ehe man nun Häute mit Arsenikpräparaten behandelt, legt man sie einen Tag oder länger in eine gesättigte Kochsalz- oder Alaunlösung und trocknet sie alsdann. Hat man nun hierzu keine Musse, so bestreue man die Häute wenigstens auf der Fleischseite mit Kochsalz oder Alaunpulver, sehe aber bald einmal nach, ob sich diese Stoffe nicht nach Aufsaugung von Wasser aus der Luft gelöst haben. Ist dies der Fall, so trockne man das Präparat an der Sonne oder am Feuer. Auch Carbolsäure, sowohl roh wie rectificirt, Benzin, Naphthalin, Kienöl und Petroleum sind gute Conservierungsmittel für Häute, Hörner u. s. w., müssen indessen zuweilen neu aufgestrichen werden. Naphthalin kann man trocken einstreuen.

Will man kleine Thiere behufs späterer anatomischer Untersuchung aufbewahren, so lege man dieselben in Spirituosa, nachdem man sie vorher von Blut, Excrementen, Erde u. s. w. sorgfältig gesäubert und nachdem man ihre Bauchhöhle durch einen medianen Längsschnitt geöffnet hat. Kann man die Thiere erst einige Tage in sehr starkem und später in schwächerem, mit Glycerin versetztem Alkohol aufbewahren, so gewinnt man gute, später namentlich für das Studium der Muskeln werthvolle Präparate. Uebrigens sei man mit der Wahl der Spirituosen nicht zu ängstlich und nehme, was das Land bietet, selbst die amerikanischen Branntweine, wie Cachaça, Agoa ardente de Canna, Pisco u. s. w. Hat man es übrigens mit anerkannt schwachen Branntweinen zu thun, so erneuere man dieselben möglichst oft und setze jedesmal etwas Arsenik oder arsenigsaures Natron, arsenigsauren Thon oder selbst Arsenikseife hinzu.

Spirituosen, womöglich mit den eben erwähnten Ingredienzien versetzt, sind auch das beste Aufbewahrungsmittel für Eingeweide, Darmcanal und Geschlechtswerkzeuge, welche aber erst sorgfältig von Blut und Auswurfstoffen gereinigt werden müssen, bevor man sie einlegt.

Fehlt es durchaus an Spirituosen oder sind die Präparate zu gross, um sie ganz feucht aufbewahren zu können, so suche man sie wenigstens einzupökeln, in Gläsern, Töpfen (womöglich gepichteten) Fässern u. s. w. Man nehme Kochsalz (Seesalz) und erneuere dasselbe öfters, ebenso wie sich bildende Lake, welche letztere leicht fault.

Wer die nöthige manuelle Fertigkeit im Herausnehmen von Gehirnen, Augäpfeln, Felsenbeinen, Nasenapparaten und Zungen besitzt, möge dieselben in das leicht käuflich zu erwerbende und im trocknen Zustande leicht zu transportirende in (zur Noth gewöhnlichem, sonst destillirtem) Wasser bis zum dunklen Weingelb gelöste, alle paar Wochen zu erneuernde doppelt chromsaure Kali — Kali bichromicum — einlegen. Chromsäure ist oft nur schwierig zu haben und zerfliesst beim Transporte sehr leicht.

Haar- und Wollproben lege man mit etwas fein gestossenem Pfeffer oder mit Insectenpulver in aussen etikettirte Hülsen von starkem Papier ein.

Man vergesse niemals einem Präparate ein mit Tinte oder halbweichem Bleistift auf starkem Papier geschriebenes, mit laufender Nummer versehenes Etikett beizufügen, auf welchem Fundort, Geschlecht, ungefähres oder wirkliches Alter, landesübliche Namen und — wenn es sich um Häute handelt, die nothwendigsten Maasse, wenn man es dagegen mit Skeleten, Schädeln, Hörnern oder Geweihen zu thun hat, Maasse, Aeusseres und Farbe des betreffenden Individuums kurz vermerkt werden.

Zum Transport dienen natürlich am sichersten mit verlöthetem Blecheinsatz versehene Kisten; muss man sich aber mit dürrtigerem Verpackungs-

materiale begnügen, so suche man doch die Kästen oder dgl. in nasse, steinhart eintrocknende Ochsenhäute oder wenigstens in Segeltuch, Matten u. s. w. einzuhüllen und vorher gestossenen Pfeffer, Kampher oder andere stark-riechende, trockene Substanzen aufzustreuen.

Anm. Zum Präpariren dienen anatomische Präparirbestecke, eine Blatt- und eine Stichsäge, eine Knochenzange, eine Rippenscheere, ein paar Küchenmesser in Holzheft, Nadeln und Zwirn.

Vergl. u. A.:

Boitard, Manuel du Naturaliste Préparateur, ou l'art d'empailler les animaux etc. Paris 1825. Deutsch bearbeitet von Th. Thon. Ilmenau 1827.

P. L. Martin, Die Praxis der Naturgeschichte. I. u. II. Theil. Weimar 1869.

J. F. Naumann, Taxidermie oder die Lehre Thiere aller Classen am einfachsten und zweckmässigsten für Naturaliensammlungen aufzubewahren und auszustopfen. 2. Aufl. Halle 1848.

Barboza du Bocage, Instruções praticas sobre o modo de colligir, preparar e remetter productos zoologicos para o Museu de Lisboa. Lisboa 1862.

Schilling, Hand- und Lehrbuch für angehende Naturforscher und Naturaliensammler. Weimar 1861. 3 Bände.

Swainson, Taxidermy with the Biography of Zoologist etc. London 1840.

Ueber Sammlung und Aufbewahrung chemisch wichtiger Naturproducte.

Von

A. Oppenheim.

Die Chemie hat erst in neuerer Zeit einen Theil ihrer Kenntnisse synthetisch, durch willkürliche Verbindung der Elemente, gewonnen. Ihre ursprüngliche Methode ist rein analytischer Natur. Sie war deshalb früher absolut und ist noch heute zum grossen Theil auf die Substanzen angewiesen, welche ihr von Mineralogen, von Botanikern, von Zoologen, von Solchen endlich, welche aus technischen Gründen Naturproducte sammeln, überliefert werden. Was ihrer Analyse unterworfen wird, was ihr entgeht, hängt noch heute vom Zufall ab. Aus dem unerschöpflichen Schatze der Natur sind ihr nur sparsam und ohne System einzelne Brocken in den Schooss geworfen — und wenn sie aus zufällig erlangten Kenntnissen zu einer Wissenschaft erblühen konnte, deren Reichthum und Zusammenhang hinter keiner anderen zurücksteht, wenn sie der Industrie grössere Dienste leisten konnte als irgend eine, so steigt damit unser Verlangen, dass die Quellen ihrer Entdeckungen dem Zufall entzogen werden.

Wie nach unbekannten Gestirnen der Himmel systematisch durchforscht wird, so müssen die drei Reiche der Natur einer strengen Prüfung auf chemisch wichtige Substanzen unterzogen werden.

Im Mineralreich und nur in diesem ist dies bereits der Fall. Jedes neue Mineral wird seit länger als einem Jahrhundert dem Chemiker zur Analyse unterbreitet und die Chemie der unorganischen Natur hat sich deshalb am frühesten und vollständigsten entwickelt. Eine Anweisung zum Sammeln chemisch wichtiger Mineralien erscheint deshalb nicht am Platz. Die mineralogischen Abschnitte dieses Buches geben darüber das Wissenswerthe.

Auch Luft und Wasser der verschiedensten Fundorte sind schon früh untersucht worden.

Von der Atmosphäre ergab sich bereits 1804 durch Biot und Gay-Lussac, welche mit Hülfe eines Ballons Luft in der Höhe von 6500 Meter sammelten, dass dieselbe in hohen und niederen Schichten wesentlich dieselbe Zusammensetzung habe. Nachdem durch Sammeln von Luft auf hohen Bergen dies Resultat wiederholt bestätigt worden ist, kann man dies Capitel als geschlossen

betrachten. In neuerer Zeit bildete die vom Meerwasser absorbirte Luft den Gegenstand mehrfacher Untersuchungen. Es handelt sich dabei um einen Apparat, der in bestimmter Tiefe leicht gefüllt und fest verschlossen werden kann. Ein solcher findet sich von O. Jacobsen in den Annalen der Chemie und Pharmacie Bd. 167 S. 13 beschrieben. Da hierbei die Luft unter höherem Drucke gesammelt wird, ist es wünschenswerth, dieselbe bald aus der Flasche zu entlassen und zu untersuchen, wozu sich an Bord des Schiffes leicht die nöthige Einrichtung treffen lässt. Die Variationen in der Zusammensetzung der vom Wasser absorbirten Luft sind, der angeführten in der Ostsee und Nordsee sorgfältig ausgeführten Arbeit nach, nur von localen und zufälligen Umständen abhängig, und Reisende auf anderen Meeren werden derartige Untersuchungen deshalb nur unter besonderen Umständen anstellen wollen, wofür ihnen dann die citirte Abhandlung die beste Anweisung liefert.

Um so häufiger handelt es sich darum, die aus Quellen, Geysern oder Fumarolen aufsteigenden Gase aufzufangen. Die hierfür erforderlichen Maassregeln sind von Bunsen in seinen „Gasometrischen Methoden“ (Braunschweig 1857) ausführlich beschrieben. Für gewöhnliche Fälle wird der folgende Auszug aus diesem classischen Werke genügen:

Man versehe sich mit Probirröhrn von 40—60 Cc. Inhalt, die vor der Glasbläserlampe nahe dem offenen Ende zur Weite eines dünnen Strohhalmes

ausgezogen sind und mittelst eines gut schliessenden Korkes oder eines Röhrenstückes von vulcanisirtem Kautschuk mit einem Trichter luftdicht verbunden werden können. Statt der Probirröhrchen lassen sich auch kleine langhalsige Arzneiflaschen benutzen, die ebenso zugerichtet werden. Man füllt den Apparat zunächst mit dem Wasser der Quelle an. Da dies nicht ohne Luftzutritt geschehen kann, wodurch die Zusammensetzung des im eingefüllten Quellwasser diffundirten Gases geändert werden würde, so taucht man den mit der Trichtermündung nach oben gekehrten Apparat unter den

Quellenspiegel ein und saugt mittelst einer bis auf den Boden des Probirröhrchens reichenden engen Röhre das bei der ersten Füllung mit Luft in Berührung gewesene Wasser so lange auf, bis man überzeugt sein kann, es durch anderes Wasser aus der Quelle ersetzt zu haben. Lässt man dann das Quellgas durch den Trichter in das so gefüllte Gefäss aufsteigen, so ist man vor jeder Verunreinigung desselben gesichert. Werden die aufsteigenden Blasen in dem Trichterhalse oder unter der Verengung zurückgehalten, so kann man sie leicht durch Klopfen des Trichterrandes gegen eine harte Unterlage zum Aufsteigen bringen. — Nachdem der Apparat in einer kleinen Schale aus der Quelle entfernt ist, schmilzt man das Gefäss an der ausgezogenen Stelle ab, was ohne Schwierigkeit mit der Löthrohrflamme geschehen kann, mittelst deren man zugleich die Feuchtigkeit an der abzuschmelzenden Stelle durch Erwärmen vorher entfernt. (S. Fig. nächste S.)

In Ermangelung dieser Vorrichtungen lassen sich zur Noth auch gewöhnliche Arzneiflaschen anwenden, die auf die eben beschriebene Weise gefüllt werden. Man entfernt den Trichter unter dem Niveau der Quelle und ersetzt ihn durch einen befeuchteten, gesunden, gut schliessenden Kork, der mit einer ebenfalls befeuchteten dünnen Kautschukplatte überzogen ist. Dabei wird der Verschluss unter dem Wasser so bewerkstelligt, dass keine Flüssigkeit über dem Kork zurückbleibt. Schneidet man den letzteren dicht über dem Halse des Gefässes ab und überzieht man ihn, nachdem er sorgfältig abgetrocknet ist, mit einer Schicht möglichst feinen Siegellacks, so ist keine Luftverunreinigung möglich, wenn nicht anders der Siegellacküberzug durch Erschütterungen oder raschen Temperaturwechsel Risse erhält. Die so gefüllten Gefässe sind sorgfältig in Watte oder Werg verpackt ihrem Bestimmungsort zuzuführen: wenn nicht, wie es wohl bei Untersuchung der Meerwassergase an Bord des Schiffes geschehen ist, die Untersuchung bald nach der Auffangung ausgeführt werden kann.

Um Gase aus Kraterseen und Kochquellen aufzufangen, ist es oft nöthig, den Apparat an einem längeren Stabe zu befestigen, um nicht von periodischen Dampferuptionen zu sehr belästigt zu werden. Sind die Quellen unzugänglich oder durch heftiges Sieden unnahbar, so wendet man einen mit einem Bleiring beschwerten Trichter an, von dessen Stiele ein mittelst vulcanisirten Kautschuks befestigtes Zinnrohr ausläuft, mit welchem ein Hahn und hinter demselben Sammelröhren durch Kautschuk verbunden sind.

Ist der Apparat in die Quelle gesenkt und durch Aussaugen der Luft bis zum Hahn mit Wasser gefüllt, so lässt man das aufzufangende Gas in dem Trichter so lange aufsteigen, bis es sich unter einer den Atmosphärendruck überwiegenden Pressung befindet. Man öffnet sodann den Hahn und lässt dasselbe durch die Sammelröhren so lange strömen, bis man überzeugt sein kann, dass alle atmosphärische Luft verdrängt ist. Die 40—60 Cc. fassenden Röhrchen, deren ausgezogene Enden an der zum Abschmelzen bestimmten Stelle etwas verdickt und verengt sind und deren man drei bis vier zugleich anwenden kann, sind durch Röhren von vulcanisirtem Kautschuk luftdicht mit einander verbunden. Sie werden nach vorgängiger Erwärmung an der ersten und letzten Kautschukverbindung durch einfaches Zusammenpressen mit den Fingern luftdicht verschlossen und endlich, sobald ihre Temperatur wieder soweit gesunken ist, dass der äussere Luftdruck den inneren ein wenig überwiegt, der Reihe nach abgeschmolzen. — Wo grosse Dampfmassen abwechselnd mit kochendem Wasser aus Oeffnungen hervorgeschleudert werden

und der umliegende heisse Schlamm Boden nur von einer dünnen erhärteten Thonkruste überlagert wird, wie auf den Solfatarenfeldern Islands, erheischt die Vorsicht, die Festigkeit des Grundes mit einer Stange zu prüfen und vor plötzlichen Dampfausbrüchen den Rückzug zu sichern. Bisweilen ist es dann vortheilhaft, an bequemer Stelle mittelst eines Stabes ein Loch in den heissen Fumarolenthon zu stossen, um sogleich einen Gas- und Dampfstrom künstlich

hervorzurufen. Enthalten solche Gase, wie gewöhnlich, Schwefelwasserstoff, Salzsäure oder schweflige Säure, welche von Zinn oder Blei zersetzt werden, so müssen die sonst am besten aus diesen Metallen bestehenden Ableitungsröhren durch Glasröhren ersetzt werden. Die Ableitungsröhren sind in ein Loch eingesenkt und der umgebende Thon daran festgestampft. Um das Gas vor der Aufsammlung von Dampfmassen zu befreien, leitet man es durch ein Glasgefäss mit doppelt durchbohrtem Kork, welches zum Theil mit kaltem Wasser gefüllt ist. Dieses condensirt den Dampf, während das mitgeführte Gas, sobald das Wasser damit gesättigt ist, seine Zusammensetzung unverändert beibehält und die Luft aus dem Gefäss und den Sammelröhren verdrängt.

Wenden wir uns der Untersuchung des Wassers zu, so wird auch hier zuvörderst das Gas zu beachten sein, welches häufig aus Quellen aufsteigt und auf die angegebene Weise gesammelt werden muss. Feste Quellabsätze, wie Eisenocker u. s. w. sind vom Boden der Quelle und ihrer Abflusscanäle aufzuheben und in gut verschlossenen Flaschen zu bewahren. Das Wasser selbst sammelt man, indem man passende Flaschen (Weinflaschen können hierzu wohl verwandt werden) möglichst tief unter dem Wasserspiegel füllt, wieder entleert und möglichst tief eingesenkt wieder füllt. Dieselben werden mit gut passenden weichen Korken verschlossen, die man zuvor mit dem Wasser der Quelle (des Flusses oder des Sees, oder des Meeres) befeuchtet und mit vorher erwärmtem, befeuchtetem Blattkautschuk überzogen hat. Der über den Flaschenhals hervorragende Theil des Korkes wird abgeschnitten, der Hals abgetrocknet, mit dem feinsten Siegellack versiegelt und die Flaschen werden mit Etiquetten bezeichnet. Wünschenswerth ist, von jedem Wasser für die Analyse 3—6 Literflaschen zu besitzen, die verpackt werden, wie es der Ort erlaubt, in Heu, Werg, Kleie oder auch in Sand, wo es an passenderen Schutzmitteln fehlt. Einige Bestandtheile mancher Quellwasser, namentlich Eisenoxydul, schweflige Säure und Schwefelwasserstoff verändern sich beim Aufbewahren und müssen deshalb sofort bestimmt werden. Hierzu sind Vorbereitungen nöthig, die der Reisende nur in vorhergesehenen Fällen treffen kann und für die wir ihn auf die Abhandlung von Bunsen: Anleitung zur Analyse von Aschen und Mineralwässern (Heidelberg, C. Winter 1874) verweisen. Aehnlich wie die Quellen von Wasser sind die von Erdöl (Petroleum) zu behandeln. Welche Wasser ein Interesse haben, muss dem Tact des Reisenden zu entscheiden überlassen

bleiben: geologische Betrachtungen, der Geschmack oder zufällige Nebenumstände werden ihn hierbei leiten.

Im Allgemeinen wird die chemische Untersuchung von Gasen und Wasser weniger der Chemie selbst nützen, als anderen Wissenschaften, welchen sie dient. Das Umgekehrte ist meistens und zwar im höchsten Grade der Fall bei den Producten der organischen Natur.

Hierbei wird das Thierreich seltener in Betracht kommen als die Pflanzenwelt. Denn so wichtig auch die Kenntnisse sind, welche der Chemiker dem ersteren verdankt, so zeigen die thierischen Stoffe, mit wenigen Ausnahmen, innerhalb grosser Thierclassen eine sehr ähnliche Zusammensetzung. Der Harn der pflanzenfressenden unterscheidet sich in gewissen Bestandtheilen von demjenigen der thierfressenden Säugethiere. Innerhalb einer jeden dieser Classen finden, soweit unsere heutigen Kenntnisse reichen, nur geringe qualitative Unterschiede statt. Die Excremente der Amphibien und Vögel (Guano) sind für den Chemiker der Ausgangspunkt sehr einflussreicher Arbeiten geworden, aber ihre Bestandtheile scheinen wesentlich identisch zu sein. Aehnlich verhält es sich mit der Galle, dem Blut, der Milch, den Fetten, der Gehirnsubstanz, den Geweben u. s. w., und wenn auch im Harn des Hundes, in der Galle des Schweines, in dem Fett der Hyäne u. s. w. besondere Stoffe aufgefunden worden sind, so sind doch unsere einheimischen Thiere in dieser Hinsicht noch zu unvollständig untersucht, um uns zu veranlassen, die exotische Fauna in dieser Beziehung in Anspruch zu nehmen. Ausserdem ist die Isolirung der angedeuteten Substanzen zu zeitraubend und die Conservirung der thierischen Säfte zu schwierig, um den Reisenden derartige Aufgaben zu stellen. Einzelne Insecten, wie die Cochenille (*coccus cacti*), die Canthariden, welche chemisch wichtige Substanzen enthalten, lassen sich unschwer transportiren, und neue ähnliche Fälle werden dem aufmerksamen Beobachter leicht erkennbar sein.

Ganz verschieden verhält sich in allen diesen Beziehungen die Pflanzenwelt. Innerhalb derselben Familie kommen hier die mannigfaltigsten Substanzen vor, ja dieselbe Pflanze liefert in verschiedenen Perioden ihrer Vegetation verschiedene chemische Producte. Ohne die Kenntnisse einer Reihe derselben würde der bei weitem umfangreichste Zweig unserer Wissenschaft, die organische Chemie, nicht existiren. Ohne die Kenntnisse der Pflanzensäuren, vieler ätherischen Oele, der Alkaloide u. s. w. wäre die Chemie auf dem beschränkten Standpunkte des dritten Viertels des vorigen Jahrhunderts stehen geblieben und der Aufschwung, welchen sie in der Neuzeit genommen, selbst im Keime unmöglich gewesen. Den wenigen Pflanzenproducten, welche der Zufall ihr darbot, hat die Chemie eine unendliche Reihe neuer Körper entlockt, aus ihnen vorzüglich ihr System von wunderbarer Grösse entfaltet.

Bedenken wir aber, wie gering verhältnissmässig die Anzahl der Pflanzen ist, denen sie ihr Rohmaterial verdankt, wie unermesslich das Gebiet, welches heute noch unerschlossen geblieben ist, wie reich gerade die bisher auf das unvollkommenste erschlossene Tropenwelt an Pflanzenproducten aller Art ist, so liegt hierin ein Ansporn, mit aller Energie diesen vernachlässigten Zweig der Erkenntniss zu pflegen. Der Reisende, vor Allen derjenige, welcher sich die Tropenwelt zum Ziel gewählt, kann keinem Wissenszweige grössere Dienste leisten als dem genannten.

Wer zu Völkern seine Schritte lenkt, die auf einer selbständigen, verhältnissmässig hohen Culturstufe stehen, nach Persien, Indien u. s. w., vor Allem nach Japan und China, wird ohne Zweifel daselbst für medi-

cinische und technische Zwecke Pflanzenstoffe benutzt finden, die in Europa noch unbekannt sind. Drogen und Farbstoffe sind seinem Sammel-fleisse dringend zu empfehlen, mit dem Bemerken, dass die chemische Untersuchung derselben meistens grössere Mengen erfordert, weil sie zuweilen sehr complicirter Natur sind und oft wesentliche Bestandtheile nur in sehr geringer Quantität enthalten. Je mehr er von interessanten Substanzen dieser Art erlangen kann, um so besser. Zuweilen wird ein Pfund oder weniger für die Untersuchung genügen; zuweilen wird das Zehnfache für dieselbe nicht ausreichen.

Häufiger jedoch wird die Pflicht an den Reisenden herantreten, selbst Pflanzen auf die in ihnen vorkommenden Substanzen einer vorläufigen Prüfung zu unterwerfen und diese, wenn auch im unreinen Zustande, aus ihnen zu gewinnen.

Für diesen Zweck wird es vortheilhaft sein, wenn er mit Kenntnissen in der Botanik solche in der Chemie vereinigt. Er wird dann keine Anleitung nöthig haben als diejenige, welche ihm sein Wissen und dem Zweck angeeignete Lehrbücher der organischen Chemie, etwa Husemann's Pflanzenstoffe (Berlin, Springer 1871) liefern. Er wird hiernach leicht die Auswahl der Gewächse treffen können, die noch nicht untersucht sind und die ihm am meisten Ausbeute versprechen. Eine derartige Vereinigung von Kenntnissen ist bei Reisenden jedoch selten, die mehr den beschreibenden Naturwissenschaften oder der Physik und Astronomie, als der Chemie ihre Studien zu widmen pflegen.

In der folgenden Anleitung soll darum auch nur auf die letztere Classe von Reisenden Rücksicht genommen werden. Wir wollen kurz die Processe schildern, welche uns Rohproducte aus Pflanzen zu erhalten erlauben, die in der Heimath von geübten Chemikern einer fachmässigen Untersuchung unterworfen werden können. Wir wollen auf die Reinigung der Rohproducte, die Isolirung bestimmter Substanzen daraus keine Rücksicht nehmen und nur solche Processe beschreiben, die sich mit Hülfe der einfachsten Apparate und der gewöhnlichsten Chemikalien, nämlich mit Wasser, Salzsäure und einem Alkali, Natron oder Kalkmilch ausführen lassen. Mit ihrer Hülfe wird der Experimentator in den meisten Fällen unansehnliche, stark gefärbte und syrupartige oder undeutlich krystallinische Extracte gewinnen, die aber wohlverschlossen aufbewahrt bei der Rückkehr in civilisirte Länder bei weiterer Reinigung deutlich charakterisirte chemische Individuen zu liefern vermögen.

Die nöthigen Apparate sind Abdampfschaalen aus Porcellan und Wasserbäder: das sind grosse Gefässe aus starkem Blech oder besser mässig dünnem Kupfer, deren Deckel Oeffnungen enthalten, um die Schalen darauf zu stellen und durch Dampf zu erhitzen, und passende Apparate, um diese Erhitzung vorzunehmen. Derartige Apparate sind in Handlungen chemisch-pharmaceutischer Utensilien vorrätbig. Soll, was wünschenswerth, im Grossen gearbeitet werden, so sind dazu kupferne oder auch verzinnte oder emaillirte eiserne Kessel und ein Apparat nöthig, der Dampf entwickelt, um durch ein geleiteten Dampf zu kochen und abzdunsten.

Für Destillationen endlich sind kupferne Destillirgefässe und Kühlvorrichtung anzuwenden.

Ein compendiöser, fast zu kleiner Apparat, welcher Dampfbad und Destillationsgefäss unter Anwendung gespannten Dampfes vereinigt, wird durch die Figur auf folgender Seite dargestellt.

In tropischen Gegenden Amerikas und Westindiens werden sich hier und da, z. B. in Zuckerplantagen oder auch in wenigen Apotheken grosser

Städte, einzelne derartige Einrichtungen finden. Im Urwalde findet man sie nicht und es ist deshalb wohl am Platz, auf das Dringendste dazu aufzufordern, dass der Chemie eine Hülfe zu Theil werde, welche die Physik, die Meteorologie und Astronomie lange gefunden haben. Die Anlage phytochemischer Stationen wird den Regierungen, gemeinnützigen Gesellschaften oder Privaten, welche dieselben in's Leben rufen wollen, ebenso reiche industrielle Quellen wie der Wissenschaft einen neuen Born von Thatsachen eröffnen. Sie werden neue Farbstoffe, neue Heilmittel u. s. w. kennen lehren und verhindern, dass werthlose Substanzen wie Condurango und Anacohuit-holz in Mengen eingeführt werden und therapeutische Hoffnungen erregen, um sich schliesslich als ebenso medicinisch unwirksam wie chemisch indifferent

zu erweisen. Sie werden endlich erreichen, dass die Botanik nicht eine isolirte Existenz führt, sondern den Reichthum der Pflanzenwelt der Chemie als einer treuen Verbündeten zum ersten Male voll und ganz zu Gebote stellt.

Wo derartige Anstalten anzulegen sind, hängt zunächst von persönlichen und zufälligen Verhältnissen ab. Wissenschaftlich gesinnte Colonisten, denen einige Musse zu Gebote steht, werden auf eigene Hand in diesem Gebiete viel nützen können. Die reiche Flora Brasiliens, Westindiens, der Molucken u. s. w. verspricht unendliche Ausbeute. Grosse Städte des Südens, wie Calcutta, die Capstadt, Cairo, Melbourne, Batavia, Rio de Janeiro, Cordova am Fusse der Cordillern, Mexico u. a., die alle oder fast alle botanische Gärten be-

sitzen, würden besondere Erleichterungen gewähren können. Aber selbst einsame Plätze, nicht zu weit vom Meer, und mitten in der ursprünglichen Vegetation der Tropen gelegen, würden zur Anlegung der Stationen wohl geeignet sein.

Die Einrichtungskosten einer Station würden die des Laboratoriums einer gut organisirten Apotheke nicht übersteigen, und bald würden ohne jeden Zweifel diese Anstalten ihre Kosten durch industrielle Erfolge mehr als decken können, ohne ihre wissenschaftliche Bestimmung aus dem Auge zu verlieren. Sie werden dann die Darstellung reiner Präparate zu betreiben vermögen und nicht nur die von Rohproducten, deren Darstellung hier zu gerörten übrig bleibt:

1. Darstellung ätherischer Oele. Die ätherischen Oele sind am reichlichsten in den Blüthen, Fruchtrinden, Samen und Blättern, sparsamer auch in den Rinden oder dem Holz vieler Pflanzen enthalten, sowie in Harzen, Balsamen und Camphern, welche aus ihrer Rinde freiwillig oder aus künstlich angebrachten Einschnitten ausfließen. Die meisten dieser Pflanzen geben sich dem Geruch sofort zu erkennen. Andere enthalten das ätherische Oel nicht fertig vorgebildet. Die Oele der Cruciferen, der Liliaceen, das Oel der bitteren Mandel und des Kirschlorbeers entstehen erst, wenn die Zellen der Gewächse durch Pressen zerstört werden, so dass ihre Flüssigkeiten sich mischen, wodurch Gährung und damit Bildung des flüchtigen Oels hervorgerufen wird. Bei anderen Gewächsen, die völlig geruchlos sind, z. B. beim Wegerich ruft man diese Gährung künstlich hervor, indem man die Pflanzen zerquetscht und mit Wasser an der Luft stehen lässt.

Die meisten ätherischen Oele erleiden an der Luft durch Oxydation eine Umwandlung, indem sie in Harze oder Säuren übergehen. Es kommt deshalb darauf an, auch aus solchen Pflanzenproducten, die sich wie Balsame oder Harze scheinbar unverändert aufbewahren lassen, im frischen Zustande die ätherischen Oele zu gewinnen, da sie nach längerer Aufbewahrung dieselben häufig nicht mehr zu liefern vermögen.

Man unterwirft zu diesem Zwecke die genannten Substanzen oder Pflanzentheile der Destillation mit Wasser, dessen Dampf die flüchtigen Oele fast sämmtlich fortreisst, trotz dessen ihr eigener Siedepunkt über dem des Wassers liegt. Am besten wendet man gespannten Dampf für diesen Zweck an. Eine gewöhnliche kupferne Destillirblase mit guter Kühlung, besser jedoch eine Destillirblase mit eingesenktem Dampfrohr, welches mit einem Dampfkessel zusammenhängt und gespannten Wasserdampf liefert, genügen für diesen Zweck. Man fügt hinreichend Wasser zu, um die feste Masse zu bedecken und destillirt den dritten Theil davon ab. Zum Auffangen des Destillats dient eine sogenannte Florentiner Flasche, von der die beistehende Abbildung eine verbesserte Form, reducirt auf den zehnten Theil der wirklichen Grösse, giebt. Im Nothfalle wird es leicht sein, aus Glasröhren und Flaschen eine ähnliche Einrichtung selbst herzustellen.

Da die ätherischen Oele meistens leichter als Wasser sind, so schwimmen sie obenauf und können durch das obere Rohr der Florentiner Flasche in ein passendes enghalsiges Gefäss abfließen, während aus dem unteren Rohr

das Wasser sich entfernt. Diejenigen Oele, welche schwerer sind als Wasser (wie Sassafrasöl, Nelkenöl, Bittermandel- und Zimmetöl) sammeln sich unten an und fließen durch das untere Rohr ab, während das Wasser den umgekehrten Weg nimmt. Wenn man bemerkt, dass die Oele fest werden (wie es z. B. Anisöl, Rosenöl u. a. thun, so lässt man das Wasser in der Florentiner Flasche gegen Ende der Destillation warm werden, um sie zu verflüssigen.

Aus sehr ölreichen Fruchtschalen wie Citronen u. s. w. kann man das Oel auch durch Pressen der frischen Schalen gewinnen. Man entfernt zu diesem Zweck vorher das weisse, innere wasserreiche Zellgewebe derselben und lässt das Gemenge von Oel und Wasser durch Stehen-lassen zur Trennung gelangen. Dieser Weg ist jedoch mit Verlust verbunden und wenig empfehlenswerth. Die flüchtigen Oele, von denen viele der Chemie die grössten Dienste geleistet haben, müssen in wohlverschlossenen Gefässen, die womöglich ganz gefüllt sind, aufbewahrt werden.

Aus manchen Blumen z. B. Jasmin, Veilchen, Heliotrop u. s. w. kann man auf den angegebenen Wegen keine ätherischen Oele gewinnen, weil dieselben entweder mit Wasserdämpfen nicht flüchtig sind oder durch dieselben zerstört werden. Der Parfumeur gewinnt ihre Wohlgerüche, indem er die Blumen auf Fett legt, welches das Parfum aufnimmt und Pomaden bildet. Die Chemie kann jedoch aus dieser Methode keinen Vortheil ziehen. Sie gewinnt, wenn auch nur spärliche Mengen von Oelen aus solchen Pflanzen, indem man dieselben mit Aether, Chloroform oder Schwefelkohlenstoff auszieht. Die letzteren Substanzen stehen ihrer Flüchtigkeit wegen in tropischen Klimaten jedoch schwer zu Gebote.

Balsame, Harze und Campher haben für die Chemie auch andere Interessen, als durch die flüchtigen Oele, welche sie durch Destillation zu liefern vermögen und sie sind der Aufmerksamkeit des Reisenden um so mehr zu empfehlen, als ihre Aufbewahrung eine leichte ist. Campher sind in wohlgeschlossenen Gefässen zu bewahren.

2. Auflösung von Pflanzentstoffen in Wasser, Säuren oder Alkalien. Um aus Pflanzentheilen die löslichen Bestandtheile zu gewinnen, bedient man sich der oben (S. 510—511) beschriebenen Apparate. Man zerkleinert die Pflanzentheile, namentlich Rinde, Wurzel, Keime und Früchte, weniger häufig Holz und Blätter und unterwirft dieselben Vorversuchen im kleinen Maassstabe, um zu erfahren, an welches Lösungsmittel dieselben ihre löslichen Bestandtheile abgeben. Man kocht einige Pfund der zerkleinerten Pflanzensubstanzen nach einander mit den oben angeführten Lösungsmitteln in Porzellanschalen, die auf dem Wasserbade erwärmt werden. Wasser pflegt ausser Pflanzenschleim und Gummi, die Zuckerarten und die mit Zucker verbundenen Substanzen (die sogenannte Glucoside) ferner viele Pflanzensäuren, manche Bitterstoffe, Farbstoffe und einige Alkaloide aufzulösen.

Manche Pflanzensäuren werden nur von alkalischen Flüssigkeiten gelöst: wozu man kohlensaures Natron oder häufiger einen dünnen Brei von Aetzkalk mit Wasser (sogenannte Kalkmilch) in kleinen Mengen dem Wasser zumengt, bis rothes Lakmuspapier von dem kochend bereiteten Auszuge schwach blau gefärbt wird.

Die meisten Alkaloide werden nur von Säuren aufgenommen und zu diesem Zwecke setzt man dem Wasser am besten kleine Mengen von Salzsäure zu, bis blaues Lakmuspapier von der Lösung bleibend schwach roth gefärbt wird.

Man wird bei Vorversuchen nach einander zuerst Wasser, dann sehr

verdünnte Salzsäure und schliesslich mit kohlensaurem Natron oder Kalkmilch versetztes Wasser anwenden, so zwar, dass man die mit dem einen Lösungsmittel erschöpfte Substanz, nach einander mit den beiden anderen behandelt.

Um die Lösung von dem Rückstand zu trennen, filtrirt man durch Beutel aus leinenem oder baumwollenem Stoff. Die Lösung, wenn sie eine wässrige ist, wird darauf geprüft, ob sie sauer oder alkalisch reagirt. In dem ersteren Fall färbt sie blaues Lakmuspapier roth, im anderen Fall färbt sie rothes Lakmuspapier blau. Ist sie sauer so fügt man so lange vorsichtig kohlensaures Natron oder Kalkmilch hinzu, bis sie mit Lakmuspapier keine Farbenreaction mehr zeigt. Ist sie alkalisch so fügt man so lange Salzsäure hinzu bis Lakmuspapier nicht mehr gefärbt wird.

Die so „neutralisirte“ oder von vornherein neutrale wässrige Lösung wird nun in einer Porzellanschale auf dem Wasserbade so lange erwärmt, bis durch Verdampfen alle Flüssigkeit verschwunden ist. Es wird dann in den meisten Fällen ein fester Rückstand bleiben. Ebenso verfährt man mit den durch Alkalien oder Salzsäure dargestellten Lösungen. Der Augenschein wird so bereits darauf führen, welche Methode für grössere Operationen anzuwenden ist: ob die Pflanzensubstanz an Wasser, an Säuren oder an Alkalien mehr abzugeben vermag, oder in welchem Falle der Extract ein besseres, etwa ein krystallinisches Ansehen gewinnt, und hiernach wird sich, so lange weiterer Anhalt fehlt, die Operation im Grossen richten. Für diese benutzt man die oben beschriebenen verzinnten Kupferkessel, die am besten durch einen Dampfstrom erhitzt werden.

Die im Grossen gewonnenen Lösungen werden im Wasserbade oder im Dampfstrom eingedampft; sofern sie mit Wasser bereitet waren, jedoch vorher neutralisirt. Der trockene Rückstand wird aus dem Abdampfgefäss entfernt und in wohlverschlossenen Gefässen bewahrt. Selbstverständlich müssen die Gefässe etikettirt und mit der Angabe versehen werden, aus welchen Pflanzen und Pflanzentheilen und durch welche Methode der Extract aus ihnen dargestellt worden ist.

Bemerkt man, dass der Extract zu gähren beginnt, so ist es gut, ein wenig Quecksilbersublimat (weniger als 1 p.C. an Gewicht genügt) zuzufügen um die Gährung zu unterbrechen. Auch etwas arsenige Säure oder Phenol genügt diesem Zweck. Das angewandte Mittel ist auf der Etiquette anzugeben.

Sehr saftreiche Früchte (wie die Citrone) liefern die in ihnen enthaltenen Säuren durch Auspressen des Saftes. Der Saft wird dann mit Kalkmilch neutralisirt und abgedampft. Passende Pressen eignen sich auch um aus Pflanzentheilen die mit Wasser befeuchtet sind Auszüge zu bereiten.

Manche Pflanzenstoffe werden von keinem der angeführten Lösungsmittel, wohl aber von Alkohol aufgenommen. Zur Extraction mit Alkohol bedient man sich besonderer Apparate die in Werken wie Mohr's Pharmaceutische Technik oder Duflos' Apothekerbuch beschrieben sind, Extractionspressen oder auch Flaschen mit Kühlvorrichtungen, welche verhindern, dass die Alkoholdämpfe entweichen. Wir umgehen ihre Beschreibung um so mehr, als sie verhältnissmässig seltener zur Anwendung kommen, und diese Anweisung zur Ausführung der einfachsten Operationen nicht weiter complicirt werden soll. Es darf nicht verschwiegen werden, dass die anempfohlenen Operationen z. B. das Auskochen mit Kalkmilch gewisse Körper, wie Flechtensäuren (z. B. Lecanorsäure) zersetzen. Das sind jedoch Ausnahmefälle, die nur in phytochemischen Stationen, an deren Spitze geübte Chemiker stehen, vermieden werden können.

Es würde vollkommen falsch sein, aus ihnen den Schluss ziehen zu wollen, dass es am Besten beim Alten bliebe, dass man besser thue die Pflanzentheile (Rinden, Früchte u. s. w.) direct einzuführen und erst in Europa der chemischen Untersuchung zu unterwerfen. Die Erfahrung hat eben gelehrt, dass auf diese Weise der Pflanzenchemie sehr wenig neue Quellen eröffnet werden. Es ist ferner bereits erwähnt, dass die Pflanzen durch Trocknen und Aufbewahren häufig ihre wesentlichsten Bestandtheile verlieren: so dass der bisher befolgte Weg nicht zum Ziel führen kann. Endlich ist bekannt, dass viele der praktisch wichtigen und theoretisch interessanten Pflanzensubstanzen nur in ganz minimalen Mengen in den Gewächsen vorkommen. Das Verlangen, desshalb die Pflanzen nach Europa zu verschiffen und erst hier auf das Vorkommen jener Stoffe zu prüfen, würde mit dem Vorschlage auf gleicher Stufe stehen, etwa den Sand californischer Flüsse in Schiffsladungen herüberzubringen um erst in Europa das Gold derselben zu gewinnen.

Reisende aber, welchen es gelingt mit den angegebenen, immerhin unvollkommenen, Mitteln die Pflanzenchemie um eine neue Substanz zu bereichern, werden damit nicht nur direct der Chemie, der Pflanzenphysiologie und vielleicht der Industrie einen Dienst leisten, sondern was viel wesentlicher ist, sie werden einen neuen Beweis dafür liefern, dass die Anlegung phytochemischer Stationen eine wissenschaftliche und industrielle Nothwendigkeit, eine Quelle von Wissen und Wohlstand ist, die nicht länger unbenutzt bleiben darf.

Allgemeine Begriffe der Ethnologie.

Von

A. Bastian.

Für ethnologische Forschungen bildet den Hauptgesichtspunkt die Abhängigkeit des Menschen von der ihn umgebenden Natur, so dass sie auch in denjenigen Richtungen, wo sie sich mit den anthropologischen berühren, den homo weniger nach seiner Stellung innerhalb des Systems (im Anschluss an das zoologische) betrachten, als vielmehr in der charakteristischen Färbung, die ihm seine geographische Provinz verleiht (während wieder das aus der Herrschaft dieser befreite Culturvolk nicht länger der Ethnologie, sondern der Geschichte, und also der historischen Behandlung, angehört).

Für den Ethnologen erscheint der Mensch in zwei Formen, einmal als Individuum und dann als Gesellschaftswesen, und zwar fällt diese Scheidung mit der in eine physische und psychische Hälfte zusammen, denn Alles zur psychischen Wesenheit Gehörige setzt als primären Zustand den der Geselligkeit voraus, innerhalb welcher sich dann erst die Geltung des Individuums bestimmt, während in physischer Hinsicht das Individuum als solches den nächsten Gegenstand der Untersuchungen bildet, und zwar einen durch die socialen Verhältnisse nur in geringem Grade modificirbaren.

Die Causalitäten, die sich in den Eigenthümlichkeiten der physischen Erscheinungsform manifestiren, fliessen aus dem Klima im weitesten Sinne (aus den wandelnden Umgebungsverhältnissen, zu denen dann in psychischer Hinsicht noch die Einflüsse seines historischen Horizontes hinzutreten) und für dieses geographische Klima lassen sich die *causae efficientes* seiner organischen (im Besonderen, seiner anthropologischen) Schöpfungen ungefähr unter folgenden Rubriken begreifen:

- 1) die mittlere Temperatur des Ortes;
- 2) die extremen Temperaturen der Jahreszeiten;
- 3) die Modificationen der Temperatur nach der Erhebung;
- 4) locale Beeinflussungen der Temperatur;
- 5) Wechsel der Jahreszeiten und Eintheilung derselben;
- 6) Feuchtigkeitsgrade;
- 7) Windrichtungen;
- 8) Elektricitätsverhältnisse der Luft;
- 9) unregelmässige Störungen der meteorologischen Processe und Naturkatastrophen;

- 10) maritime oder continentale Lage des Landes;
- 11) die Niveauverhältnisse;
- 12) Bodengestaltung;
- 13) Hydrographie und Orographie;
- 14) Geologie und Metallreichthum;
- 15) Flora, mit besonderer Berücksichtigung der Nutz- und Schmuckpflanzen;
- 16) Fauna, und die von derselben gelieferten Jagd- oder Hausthiere;
- 17) agricole Bodenkunde;
- 18) die Lagerung des Landes nach Länge und Breite.

Zu Nr. 1.

In einer durch hohe Temperatur beständig erwärmten und dadurch also zur Expansion grösserer Mengen von Wasserdampf befähigten Luft wird die Lunge mit jedem Athemzuge verhältnissmässig weniger reinen Sauerstoff aufnehmen, das venöse System also, bei geringerer Oxydation des Blutes, über das arterielle vorwalten und somit die (auch zur Reinigung von deletären Stoffen dienende) Gallenausscheidung in der Leber vermehrt werden (oft mit Ablagerung kohlenstoffhaltiger Pigmente im Hautnetz verbunden). In Folge hiervon werden in solche Gegenden versetzte Fremde zu Leberkrankheiten disponirt sein, während die in denselben Einheimischen, wenn nach kälteren versetzt, Lungenkrankheiten verfallen. So oft in kalten Gegenden ölige Nahrung reichlicher vorhanden ist, tritt Fettbildung auf, an Stellen der sonst (wie bei den Thieren) schützenden Behaarung. Die rothe Oxydation des Blutes durch den Sauerstoffreichthum in condensirter Luft lässt die Erhitzung des Körpers schon in der Ausdünstung der Polarländer spüren, während am Aequator der Körper seinen Refrigerationsapparat eingefügt trägt und die schwarze Haut sich kühl anfühlt.

Zu Nr. 2.

Die Differenzen der Jahreszeiten müssen sich verschieden geltend machen, je nachdem die grössere Dauer in den Sommer oder in den Winter fällt, und ob extreme Gegensätze bestehen. An den gleichmässigen Vertheilungslinien der temperirten Zonen werden in activer Muskelarbeit geübte Glieder hervortreten, während die Unthätigkeit polarer Nächte ähnliche Erschlaffung zur Folge hat, wie sie nach dem Aequator hin die, aus Mühelosigkeit des Unterhaltes, fliessende Apathie ergiebt.

Zu Nr. 3.

Wenn unter niederen Breiten bedeutende Elevation noch immer den Charakter der Bewohnbarkeit bewahrt, wird dort die mittlere Temperatur, die auf höheren Breiten der am Meeresniveau entspricht, von zunehmender Luftverdünnung begleitet sein, deren Effect sich besonders in Erweiterung der Athmungsorgane (und daraus folgender Adaption der übrigen Körperglieder) manifestiren muss.

Zu Nr. 4.

Auf niedrigen rauhen Hochebenen mag eine gebräunte und ausgedörrte Menschenart neben einer behäbig in geschützten Thälern situirten wohnen, in schattigen, mehr oder weniger feuchten, Wäldern eine von der an offene oder durch Ausrodung entwaldete Flächen, gewöhnten verschiedene.

Zu Nr. 5.

Der Umlauf der Jahreszeiten bedingt mit der Lebensweise auch manche Besonderheiten des davon abhängigen Körpers und in den Namen der Monate spiegelt sich oft das Bild der in ihnen wechselnden Natur, sowie der daraus folgenden Beschäftigungen und Beschaffung der Nahrung.

Zu Nr. 6.

Ein trockenes Wüstenklima ergibt einen straffen Körper und heissblütiges Temperament, wogegen mit Feuchtigkeit gesättigte Luft melancholisch deprimirend wirkt.

Zu Nr. 7.

Die im Jahre vorherrschenden Windrichtungen eines Ortes bedingen, wie manche Eigenthümlichkeiten in der Lebensweise und deren Effecte in der Körperconstitution, oft Schutzmaassregeln, die sich im Baustyl und seinen Schirmdächern wieder erkennen lassen.

Zu Nr. 8.

Das Capitel der Elektricitätsvertheilung in der Luft ist ein von der Meteorologie noch zu wenig durchforschtes, um weitere Folgerungen daraus ableiten zu können, doch ist es bereits evident, dass die elektrischen Spannungsverhältnisse nicht nur psychisch die Gemüthsstimmung influenciren, sondern auch die äusseren Hautbedeckungen (besonders der Haare), und vielleicht die in febrilen Attaquen afficirten oder mitleidenden Nervenparthien.

Zu Nr. 9.

Die Vertrautheit mit Stürmen, Gewittern, Ueberschwemmungen, Erdbeben und andern Naturrevolutionen manifestirt sich in den körperlichen Erscheinungen zum Theil, sowie in einigen Eigenthümlichkeiten der psychischen, und weiterhin in den Producten schöpferischer Geistesthätigkeit, dann aber auch in den Bautenverhältnissen, wie Pfahlbauten gegen Fluthen schützen, versteckte Anlage der Hütten gegen Orkane, leichtes Fachwerk derselben gegen die Folgen der Erderschütterungen, die Tadtla genannte Wohnungsform der Australier gegen Hagelwetter u. s. w.

Zu Nr. 10.

Abgesehen von den klimatischen Bedingungen hat die maritime oder continentale Lage den weitgreifendsten Einfluss auf den im Leben verfolgten Beruf und die dadurch wieder modificirte Erscheinungsform des Körpers. Im Gegensatz zu Afrika und Australien zeigt Europa die Folgen einer günstigen Küstenentwicklung, in deren buchtenreich gegliederten Ländern die immer neu in die Häfen einfallenden Reize des Fremdartigen die Entwicklungssphäre anregen, in höheren und höheren Spiralen emporzusteigen, ohne je ein stabiles Verharren in einschläfernder Stagnation zu gestatten. Im Gegensatz zu den die Ansiedler in schwer zugänglichen Schluchten mit Vielfachheit der Dialekte zersplitternden Bergländern, wirkt das Meer, nicht die Völker scheidend, sondern sie verbindend. Es bildet eine Barrière im Zustande der Uncultur, wo noch nicht der Baum zum Canoe gehöhlt, noch nicht das Floss erfunden, noch keine Schläuche zur Erleichterung des Schwimmens dienstbar sind. Sobald indess das Schiff die Wogen durchschneidet, werden die fernsten Küsten in nächste Nachbarschaft gerückt, wie auch die Wüste, wenn die Benutzung des Wüstenschiffes im Kameel gegeben ist, ihre Grenz-

länder zusammenrückt, und so durch Einströmungen aus Afrika's Nordrand, der nebst Aegypten und seinem Nilthal in geographischer Einigung mit Asien-Europa steht, einheimische Culturbestrebungen im Sudan hervorrief. Werden dann in Folge politischer Umwälzungen zersprengte Stämme in die Wüste geworfen, wo sie ihrer Heerden beraubt und ohne Möglichkeit des Ackerbaues auf das Umherstreifen von Oase zu Oase angewiesen sind, so mögen sie durch ihre Räubereien die Karawanenstrassen unterbrechen, wie, bei zeitweiser Schwächung der Küstenreiche, Piratereien den Handel. Als Regulatoren für den bestimmten Gang der Civilisation dienen dann oftmals auch die Meeresströmungen, wie auf dem Lande in weiten Längsrichtungen streichende Gebirgsöffnungen.

Zu Nr. 11.

Schroff abfallende Bergländer bieten Völkerscheidungen. Erheben sich dieselben indess unter den Tropen zu solchen Höhen, dass sie in verschiedenen Temperaturzonen, die nach den Breitegraden der warmen, gemäßigten und kalten entsprechen würden, bewohnbar bleiben, so bildet sich zwischen den unter verschiedenen Physiognomien ausgeprägten Terrassen ein reger Wechselverkehr, der zur Culturentwicklung führt, wie sich in den mexicanischen Hochlanden des nördlichen Amerika und den peruanischen im Süden zeigt. Meistens leiten dann die Sagen den mythischen Ursprung auf ein dominirendes Seebecken zurück, nach dessen Ufern sich von verschiedenen Richtungen her die Wanderungen der Völker lenkten, oder auf ein centrales Hochland, wie in Anahuak, Sumatra, Madagascar u. s. w.

Zu Nr. 12.

Während weite Ebenen die Nomaden (wenn beritten, leicht in Krieger-völker verwandelt) bald zum Hirten-, bald zum Jägerleben führen, überwiegt das letztere in den Wäldern, mit deren Ausrodung der Ackerbau seinen Ansatz finden wird.

Zu Nr. 13.

Die Wasserläufe sind von den dominirenden Bergketten des Ortes bestimmt, und nicht nur wird der an sie gebundene Mensch sich als Fischer oder Schiffer von dem Flusse abhängig, und zwar verschieden, zeigen, ob den Quellen, ob dem mittleren Durchbruch oder ob dem unteren Lauf in der Ebene anwohnend, sondern längs der Ströme, an Seen oder an der Meeresküste markiren sich zugleich die Centralpunkte der Geschichtsbewegung, die dann den streichenden Gebirgslinien in ihren Richtungen folgt. Wenn dieselben, wie in Europa-Asien, gleichsam von gemeinsamen Centren, ausstrahlen, eröffnen sich die natürlichen Geschichtswege, während der Küste parallele Grenzgebirge, wie in Afrika und Australien, von dem belebenden Elemente abschliessen, und oft auch den innern Verkehr durch die Cataracten unfahrbarer Flüsse hemmen. Der Durchbruchsweg eines Flusses wird oft der Angelpunkt der Entwicklung des Landes, wie in Indien der des Indus, oder wie sich im kleineren Maassstab, in Australien nur im Gebiete des Murray einiger Fortschritt im Leben der Wilden bekundete (ebenso wie im Norden, in Folge der Einwirkung gegenüberliegender Küsten, die als erste Treppenstufe zu andern Entwicklungsgraden weiter führten).

Zu Nr. 14.

Die geologische Bodengrundlage, für die Wassergewinnung sowohl, wie für den Anbau und die Verwendung der Baumaterialien von nächster Be-

deutung, ist auch nach ihrem Gehalte an Metallen und je nach der Leichtigkeit deren Verarbeitung für weitere Culturstufen maassgebend.

Zu Nr. 15.

Wenn die Pflanzenwelt vorwiegende Nahrung liefert, wird — je nachdem sie in Fülle, reife Früchte gewährt, ob sie zum mühsamen Suchen von Beeren und Wurzeln zwingt, oder ob sie sich durch Fleiss die Körnerfrucht abringen lässt — in ihrer Mitte eine verschiedene Menschenart weilen, in deren Kleidung und Schmuck dann gleichfalls die specifische Flora des Ortes hervortritt.

Zu Nr. 16.

Während der Jäger und der Hirte, jener von den wilden, dieser von den zahmen Thieren abhängig ist, begleiten die Hausthiere auch den Ackerbauer durch alle Stufengrade fernerer Cultur. Ehe noch die Waffen zur Bekämpfung der Thiere genühten, die dann (in birmanischen und peruianischen Sagen) als frühere Beherrscher der Menschen erscheinen, beschränkt sich die Jagd auf niedere Thiere, auf Reptilien, auf Nager, auf Insekten, die vielfach in der Speiselite tief stehender Stämme figuriren, wie die Mollusken, Austern und andere Muscheln, deren Schalen jetzt wieder den Faden abgeben, um in einstige Vorzeit zurückzuleiten. Die Herrschaft der wilden Thiere bekundet sich jetzt noch in mehreren Districten des vorderen oder hinteren Indiens, wo Zunahme der Würger mitunter die Verlegung der Ortschaften nöthig macht und der Herr des Waldes sklavische Verehrung empfängt, vielleicht auch sühnende Menschenopfer. Ersteht dann dem Volke in einem (in vielfachen Sagen und mit verschiedenen Namen gefeierten) Nimrod (Herales, Maui u. s. w.) ein Retter, so werden zunächst die unbehülflichen Thierkolosse vertilgt, die dann oft gänzlich in einer Localität verschwinden (wie in neuester Zeit noch der Dinormis in Neuseeland). Beginnt sich die Zahl der Jagdthiere zu vermindern, so mag zur Bewahrung und Fortzüchtung des Restes eine Zählung (und damit domesticirende Veränderung) eingeleitet werden, ähnlich wie in Neu-Guinea auf die anfangs zu Jedes Benutzung frei stehende Sagopalme Eigenthumsrechte geltend gemacht werden, wenn die Menge derselben in der Nähe des Dorfes abzunehmen anfängt.

Zu Nr. 17.

Ehe die Dreiheit der Honochenokeh oder ein Hiawatha die Kunst des Ackerbaues lehrt, ernährt sich der Wilde von den ausgegrabenen Wurzeln und Knollen, wie die Digger-Indianer Oregons oder die Stämme Australiens, sowie mit den Beeren des Waldes, wie sie (gleich Wandervögel und Zugfische) von der Jahreszeit geboten werden. Mit richtiger Ausnutzung des Landes vervollkommt sich der Ackerbau zur höchsten Verwerthung für die dicht gedrängte Bevölkerung der Städte, die gewöhnlich bereits aus dem ethnologischen Horizonte auf die Bühne der Geschichte hinausgetreten ist. Der Handel leitet dann durch Erweiterung des Verkehrs fernere Verknüpfungen ein und somit schöpferisch weiter zeugende Wechselwirkungen. Der erste Uebergang zum Ackerbau ergiebt sich meistens als ein erzwungener, wie in Südafrika bei verachteten Stämmen, die sich nur deshalb zu der beschwerlichen Arbeit bequemen, weil sie durch mächtigere ihrer Heerden beraubt waren. Wenn das sesshafte Volk durch die dem Boden entlockten Schätze und später eingeleiteten Handel und Verkehr einen schmuckvollen Culturstaat aufbaut, werden durch die Schätze desselben die an den Grenzen schweifenden Nomadenhorden herbeigelockt, um, sobald aus dem zunehmenden Luxus der

Keim zersetzender Fäulniss aufwuchert, die vermorschenden Stützen der Schutzwehren zu durchbrechen und das höher gebildete Ackerbauvolk in dienende Knechtschaft herabzudrücken, während sich die Throne (wie Asiens Geschichte zeigt) mit den Sprossen der Reiterstämme besetzen, die dann als abgeschlossener Adelsstand durch Verwandtschaftsheirathen ihr blaues Blut rein zu halten trachten, aber es damit nur in krankhafte Zerrüttungen überführen, so dass es bald wieder regenerirender Einträufelung aus der frischen Atmosphäre der Wüste bedarf. Aus Schlichtung der Eigenthumswistigkeiten zwischen Siegern und Besiegten bilden sich die Formen feudalen, allodialen oder anderen Besitzes.

Zu Nr. 18.

Die Längelagerung macht sich nur in Vergleichung des Gesamteffectes der beiden Hemisphären zu einander geltend, während sich die Unterschiede der Breitelagerungen in jeder der beiden wiederholen, und zwar im umgekehrten Sinne nördlich und südlich von der Linie. Die Feindlichkeit der polaren Natur nimmt die ganze Thätigkeit des dortigen Menschen in Anspruch, und weckt deshalb in ihm die Ausübung einer Menge kleiner Fertigkeiten und handwerksmässiger Geschicklichkeiten, lässt ihn aber nie zu der Ruhe des künstlerischen Weiterschaffens kommen. In der äquatorialen Zone schläft die allzu gütige Natur den Geist des Menschen ein, indem sie ihm überall den Tisch gedeckt hat, ihn durch Anerbieten der Brodfrucht des Backens seines täglichen Brodes überhebt und ihm selbst seine Geräthschaften oder Waffen auf den Bäumen wachsen lässt. In temperirtem Klima allein (ob durch die Breitenzone, ob durch die entsprechende Erhebung, und dann natürlich wieder in den Tropen, gegeben) ist das richtige Maass innegehalten, indem die Natur genügende Widerwärtigkeiten einschliesst, um im Menschen die Bekämpfung derselben anzuregen, ihm aber nach siegreichen Erfolgen periodisch stationäre Ruhepunkte gönnt, auf denen der jetzt einmal in Bewegung und Fluss gesetzte Bildungstrieb selbstständig weiter wächst, um die Blüthe der Civilisation hervorzutreiben.

Die primärsten Erzeugnisse des Menschen sind die Waffen für seinen Lebensunterhalt (in Nahrung und Kleidung), sowie zur Vertheidigung. In den kalten Ländern muss das Thier zur Ernährung, in den warmen, wo der Pflanzenwuchs die Ernährung gewährt, zur Vertheidigung getödtet werden. Bei dem schweren Holz des Südens ist die Keule (symbolisch in Hercules), bei dem leichten Holz des Nordens der Stein (symbolisch in Thor) die erste Waffe, anfangs eine geschleuderte, und dann mit ihrem Stiel verbunden zum Werfen oder Schlagen. Aus der gespitzten Keule entsteht der Dolch, der geschärfte Stein wird zum Messer (dann zum Schwert). Die Verlängerung des Stockes findet sich, bald einfach gespitzt, bald mit beweglicher Spitze (aus härterem Holz, Stein, Knochen, Metallen u. s. w.) als Lanze zum Stoss oder (im Wurfspieß) zum Wurf, auch als Harpune mit loslöslicher Spitze, die durch einen Riemen mit dem Schaft verbunden, das Verfolgen erleichtert, und auf der Wasserjagd eine Schwimmblase zugefügt erhält. Die Schleuder dient zum Werfen des Steines, der Bogen zum Schleudern des Wurf Pfeils, und entwickelt sich weiter zur Armbrust. Die Schilde werden zum Schutz verwandt, bald parirend (als Faustschild), bald nur die verletzlicheren Organe, bald (gegen vergiftete Pfeile) den ganzen Körper deckend. Das Blasrohr, das nur durch Vergiftung des leichten Pfeiles Wirksamkeit erhält, zeigt sich als Waffe dichtverschlungener Wälder, in denen der Bogen schwieriger zu handhaben ist. Der Lanze wird weitere Flugkraft durch das Wurf-

brett (von den Eskimo bis zu den Australiern) ertheilt oder durch die (dem Amentum ähnliche) Schlinge (wie bei den Neucaledoniern). Der Wurfwaſſe wird gern (wie beim Bumerang Australiens, oder in geringerem Grade bei ostafrikanischen Wurfmessern) eine, rückkehrende Bewegung ermöglichende, Form gegeben, um sie beim Fehlwurf nicht zu verlieren.

Die Wohnung besteht in warmen Ländern oft nur in einem Wetter- oder Sonnendach, in kalten zunächst in Höhlen, in nassen in Pfahlbauten (auch zum Schutz gegen wilde Thiere beibehalten) und schliesst sich (in Betreff des Materials, ob aus Holz, Ziegel, Stein u. s. w.) im Uebrigen an den Boden des Landes an, bis im geschichtlichen Fortschritt dem architektonischen Style folgend. Aus Bedürfnissen gegenseitiger Vertheidigung bilden sich die Wohnungsdörfer (der Dayak), lange Häuser und Casas grandes (die durch Wegnahme der Leiter den oberen Stock in eine Festung verwandeln). Aus besonderen Gebräuchen wachsen bestimmte Modificationen hervor, wie einstöckige Häuser in Hinterindien, wo die Heiligkeit des Kopfes ein Darüberhinschreiten verbietet, oder die Abtrennung des Kochhauses, wie in Polynesien u. s. w.

Die Hausgeräte wachsen vielfach auf den Bäumen, wie in den Calabassen und anderen Fruchtschalen, oder der Wilde lässt die Natur für sich arbeiten, sei es, dass er den gerillten Stein dem Aste einfügt, der zum Stiel auswachsen soll, sei es, dass er das junge Stämmchen in die auf den Fidjinseln gewöhnliche Form der Keule beugt, um es nach dem Fortwachsen mit der Wurzel auszugraben.

In der Kleidung hängt der Wilde von den Fabrikaten der Natur ab und er ersatzt sich der Benutzung des gebotenen Materials an, ohne selbstständig freie Verwendung derselben, wie bei den Culturvölkern. Blättermenschen werden in den Hügeln der Kolh, den oberen Nilländern oder sonst erwähnt, und vielfach findet sich Umhüllung mit Schilf, Rohr u. s. w. Schon früh tritt an Stelle des Rohstoffes die Verarbeitung der Fasern (des Palmbastes in Niederguinea), bald als Filz (in der Auti oder *Morus papyrifera* in Polynesien) und dann als Gewebe (einreihiges bei *Phormium tenax* in Neuseeland), auch in Ländern, wo (wie in Cambodja) die Sagen noch von Rindenkleidern sprechen, obwohl schon baumwollene oder leinene Gewänder habituell geworden sind. In kalten Gegenden wird die primäre Bekleidung von den Thieren hergenommen, und mit der Erwärmung vereinigen dann die Federn noch den Putz, wie im Süden.

Der Schmuck übt sich (wenn geringe Bekleidung) am Körper selbst, durch Anmalen, Färben des Haares, Ausreissen des Bartes, durch Tätowiren oder (seine Vorstufe) das Mankaverfahren, sowie im Feilen oder Entfernen der Zähne, Durchlöcherung der Lippen (auch mit Einfügung von Klötzen zur Erweiterung), der Nase, der Ohren, wobei zugleich Hauttaschen gebildet werden, während später die Kleidung dafür die Unterlage bietet. In den Substanzen, die zum Zierrath verfertigt werden, wird besonders die Seltenheit berücksichtigt, wodurch z. B. auf den Aleutischen Inseln das Holz kostbar (und zu Hüten verwendet) wird, im Innern der Continente die Seemuscheln u. s. w.; während mit Abschätzung des Geldwerth's das Metall wegen Ueberwiegen des specifischen Gewichtes, durchdringt.

Die Nahrung, in den Tropen durch die Früchte geboten, wird im Norden von den Thieren gefordert, und bleibt (neben der Jagd oder der, vielleicht nur die Milchproduction, statt des Fleisches, benutzenden Heerdenzucht) auf Wurzelsammeln in den gemässigten Zonen hingewiesen, ehe der Ackerbau die Nährpflanzen in die Cultur eingeführt hat. — Ichthyophagen

finden sich an der Küste, wo mit der Ebbe Seethiere stranden, oder an Flüssen und Seen, die Fische mit mehrzackigen Pfeilen zu speeren oder sie zu schießen, bis zum Erlernen des Fischfangs, den die Ostjaken auf ihren inspirirten Propheten (der anderswo das geheimnißvolle Netzstricken übt), zurückführen, wie man sonst den Bringer der Körnerfrucht (in Triptolemos), den Erfinder des Webstuhls (in Bochica) oder der Töpferscheibe (bei Aegyptern) feiert.

Früher wurden die Töpferwaaren mit der Hand oder in Formen gebildet, und bleibt ihre Herstellung von dem Vorkommen des geeigneten Materials im Boden abhängig, der dann oft ein geheiligter oder neutraler (auch für feindliche Stämme) wird, wie der des rothen Pfeifensteinfels den rauchenden Indianern. Für Landtransport dient der Mensch als Lastthier, wenn noch keine Hausthiere abgerichtet sind und bei den Wasserfahrzeugen hängt es von den Winden und Strömungen ab, ob die Form der Flösse bevorzugt wird, oder die der Canoe (auch doppelt verbunden oder durch Ausleger gestützt), sowie ob zur Fortbewegung durch Ruder Benutzung der Segel tritt.

Der Luxus schafft für Würzen die Parfüms, die berauschenden Getränke (in gegohrenen, und später auch destillirten Spirituosen) und den Narcotica (Opium) im Kauen (Betel, Kat, Coca u. s. w.) oder Rauchen, sei es des, auch geschnupften, oder (in Südamerika) im Dampfe eingeathmeten Tabaks, sei es (zu directer Betäubung) der Hanfarten (im Haschisch als Lemba u. s. w.).

Die Art und Weise des Kochens wird zum Theil bedingt von der Feuerbeständigkeit der Gefäße und der Fertigkeit in Herstellung derselben. Die Zubereitung der Speisen hängt vielfach mit den Enthaltungsgebräuchen zusammen und kann auf einen bestimmten Ort beschränkt sein oder, nach den Kastenvorschriften, jedem Einzelnen obliegen, wie auch die Zeiten des Essens Beachtung erhalten müssen, sowie ob das Mahl durch die Hände (vielleicht nur eine derselben nach den Reinigkeitsvorschriften) oder mittelst Werkzeugen, ob es gemeinsam oder in Isolirung eingenommen wird. Die Ausleerungen, deren Natur von der Speise abhängig bleibt, sind oft nach Ort und Zeit regulirt und beim Uriniren mögen traditionell vorgeschriebene Körperhaltungen anzunehmen sein.

Im Leben des Einzelnen stehen drei Momente hervor, der der Geburt, der der Pubertäts-Entwicklung (bald mit der Hochzeit, bald mit der Waffenweihe näher verknüpft) und der des Todes.

1. Bei der Geburt ist zu beachten:

Die Haltung der Mutter.

Die Lösung der Nabelschnur.

Die Reinigung des Neugeborenen, die Pflege und Besorgung desselben.

Die Namengebung.

Die Aufnahme in der Familie.

Die Säugungszeit.

Während der Kindheit verdient der Ausbruch der Milchzähne und die Reihenfolge derselben, das Gehenlernen, die ersten Sprechversuche die Aufmerksamkeit, sowie die Kinderspiele, die Redeweisen der Kinder, ihre Beschäftigungen u. s. w.

2. Die Ceremonieen bei der Pubertätsentwicklung, während welcher die Geschlechter getrennt gehalten werden oder umgekehrt die Freiheit ungehinderter Vermischung haben, betreffen bald den Einzelnen, bald werden sie von der ganzen Altersklasse gemeinsam abgehalten. In dieser Lebensperiode offenbart sich dann in der (auf Totems oder Wappen fortdauernden) Gestalt des

Schutzgeistes die fernerhin leitende Idee. Nach den in verschiedenem Umfang angestellten Prüfungen, mit denen sich Beschneidung der einen oder andern Art verbinden mag, tritt der Knabe als Jüngling auf, oder dieser in die Reihen der Männer über, und dann folgt im Anschluss die Ehestiftung durch Raub, Kauf, Verdingung oder gegenseitigen Vertrag. Darnach modificirt sich die Stellung von Mann und Frau gegeneinander, sowie durch polyandrische oder polygamische Gebräuche. Neben der Dauer der Schwangerschaft oder der während derselben auftretenden Zufälle, die sich physisch oder psychisch zu erkennen geben, ist die Verhältnisszahl der Söhne und Töchter in's Auge zu fassen.

3. Die Eheschliessung*) (oft mit vorhergehender Prostitution), der Raub der Braut, der Kauf derselben oder ihre Erwerbung durch Dienstleistungen des Mannes besonders bei gynäkokratischen Verhältnissen, die, wenn nicht aus der Geschichte erklärt, sich oft aus den physischen Verhältnissbeziehungen der Geschlechter zu einander ergeben, führt auf die Verwandtschaftsgrade (ob nähere geboten oder nur entferntere erlaubt sind) mit den daraus folgenden Bezeichnungen für dieselben, die Versklavung der Frau oder ihr Recht, die Stellung der Wittwe, — ob vom Bruder übernommen, ob von den Kindern gepflegt, oder ob den Verwandten, bis zur Lossprechung (wie in Oregon), dienend, — dann die Polygamie, bald als ein nur von dem Reichen bestreitbares Luxus-Institut (wie im Orient), bald als in Vermehrung der Arbeit Bereicherung gewährend, sonst auch Polyandrie, sowie die Ausdehnung der väterlichen Gewalt oder der des Oheims (während das Mutterrecht localer beschränkt bleibt). Aristokratische Classen, oder Eroberer, die ihr Blut von dem der unterworfenen Gemeinen (die Mische-miche-quipy der Natchez) unberührt zu halten wünschen, bevorzugen eine, oft bis zu Schwesterheirathen (in Peru, Persien und sonst eupatorischen Geschlechtern) getriebenen Inzucht, während die für Vermeidung der aus ihrer Weitertreibung folgenden Degeneration gebotene Kreuzung Heirathen unter gleichen Geschlechtsnamen (wie in China), unter gleichem Kobong oder Totem verbietet, und auch im Stamme selbst zu Zwei- oder Mehrtheilung führen mag, wie (in Australien) in Erming und Tem (in Ippai und Kumpo mit Ippata und Puta gegen Muri und Kupi mit Mata und Kapota), ähnlich (in Lydien) in Tuberis und Termeris, bei Choctaw, Cherokee u. s. w. Die den Verwandtschaften gegebenen Namen erklären ihren Wortsinn je in den Graden enger oder näher gedachter Verknüpfung.

4. Die Erbschaftsverhältnisse und daraus folgende Gemeinsamkeit oder Theilung des Besitzthums (mit Berücksichtigung der Primogenitur, der Minoritätsrechte, des Neffenrechtes u. s. w.) greift tief in gesellschaftliche Gestaltung ein.

5. Bei dem Tode erfordert Beachtung:

- ob derselbe von den Verwandten beschleunigt wird,
- ob der Verscheidende aus dem Hause entfernt oder in diesem eine Communication mit Aussen eröffnet wird,
- ob der Tod auf dem Bette erwünscht oder vermieden wird;
- die Leichenfeste und Todtenklagen;
- dann: die Aufbewahrung der Leiche (oder die Disposition über dieselbe durch Verbrennung, durch Aussetzen auf Gerüsten zum Frass durch Vögel, durch Hunde u. s. w., ihre Uebergabe an geheiligte Gewässer, die sie in das Todtenreich führen werden),

*) Die Rechtsverhältnisse bei den verschiedenen Völkern der Erde (Berlin 1870). S. 170.

etwaige Procedures zur Präservation durch Räucherung, Balsamirung, Umwicklung,
 die Beisetzung in oder ohne Sarg,
 die Befragung um die Todesursache (mit Hexenriecherei zur Bestrafung des Schuldigen, mit Blutrache oder deren Milderung in der Sühne des Wehrgeld's),
 die Form des Grabes (und der Grab-Beigaben),
 Reinigung der Knochen,
 Gemeinsamkeit einer Familiengruft (oft periodisch gefüllt, wie bei den Karen),
 Zurückhaltung von Reliquien.

Die Einzelheiten bedingen sich hier durch die Vorstellung über die Natur der Seele*) und das fernere Geschick derselben.

Diese eindrucksvollste Katastrophe im Leben des Mitmenschen, seine Vernichtung im Tode, baut aus grübelnden Sinnen eine dämonische Welt in der Erinnerung auf, die aus den Mysterien des allen Naturgegenständen anhaftenden Unbekannten, in räthselvoll den Geist durchziehenden Ahnungen, Anklänge an die abgeschiedenen Seelen herauslauscht und so den Makrokosmos wieder aus dem Mikrokosmos beseelt.

Da der Mensch nackt und blos in's Leben gesetzt ist, muss er sich die nothwendigen Vertheidigungsmittel, die die Natur den Thieren bereits mitgegeben hat, durch Kunst erst schaffen, in seinen Waffen, auf die, als erstes und nothwendigstes Mittel der Existenz alle zu Gebote stehende Fertigkeit in der Herstellung verwandt, und bald auch zierender Schmuck zugefügt wird. Gegen die Unbilden der Witterung schützt die Kleidung (aus Fell, Rinde und Gewebe) und dann in erweiterter Fassung, das Haus, das ob in kalten oder warmen, ob in regnichten oder trockenen Klimaten erbaut, einen verschiedenen Styl der Ausführung zeigen wird. Eine Verschönerung wird durch pflanzliche Anlagen gegeben, in bequemerlicher Erleichterung des häuslichen Lebens durch Dienstbarmachung des Nebenmenschen, in den verschiedenen Formen der Kriegssklaven, Kaufsklaven, Pfandsklaven u. s. w., je nachdem die Versklavung**) durch Vergewaltigung, durch gerichtliche Verurtheilung oder durch Schulden herbeigeführt ist.

Die Völker sind als Ausdruck ihrer geographischen Provinz zu betrachten, um zu verstehen, wie und warum sie das, was sie sind, geworden, wie sich unter den makrokosmischen Bedingungen der sie charakterisirende Typus entwickelt hat. Der Mensch, als Gesellschaftswesen, ist nicht nur von dem Milieu des physikalischen Klima's seiner (zunächst an die zoologische, wie diese an die festere botanische angeschlossenen) anthropologischen Peripherie in der jedesmaligen geographischen Provinz abhängig, sondern auch von den politischen Constellationen seines Landes, die (auf topographischen Configurationen basirend) den ethnologischen Horizont darstellen. Wie jedes Naturwesen hat sich der Mensch mit der Monde ambiante in's Gleichgewicht zu setzen, also zunächst mit der anthropologischen Provinz und unter Einleitung der geschichtlichen Bewegung auch mit der ethnologischen. Der Uebertritt von der anthropologischen Provinz in die ethnologische bezeichnet den Beginn einer freieren Culturentwicklung im Naturvolk. Cultur ist der

*) Der Mensch in der Geschichte (Leipzig 1860), Bd. II, S. 304.

**) Rechtsverhältnisse u. s. w. S. 186.

Ausdruck der frei schöpferischen Geistesthätigkeit, die sich von dem unmittelbaren Eindruck der Umgebung unabhängig zu machen gesucht hat. Auch bei dem Volke, das (noch auf den untersten Stufen) im vollen Banne der Natur liegt, ist bereits eine gewisse Kunstfertigkeit vorhanden, ohne welche der hülflos in's Leben gesetzte Mensch überhaupt nicht zu existiren vermag. Dieser von Natur eingepflanzte Trieb strebt dahin, sich mit der Umgebung in Ausgleichung zu setzen, und wird dieser Zweck je nach den Zonen verschieden erreicht werden, in den Polargegenden nur mit Aufbietung und Vervielfältigung aller Kräfte, in den Tropen so rasch, um nicht die gesammten Kräfte entfaltet zu haben, wogegen in dem gemässigten Gürtel (oder einem erst durch Erhebung gemässigten Klima) ein, befriedigenden Genuss gewährender, Sieg zu erkämpfen ist, der dann zu eigenen Eroberungen weiter führt. Ob, nachdem der Ausgleich mit der anthropologischen Provinz hergestellt ist, ein neuer Reiz zum historischen Weiterschaffen einfallen wird, bleibt von der geographischen Configuration des jedesmaligen Landes abhängig, besonders von seiner Orographie und Hydrographie, ob die Bergketten in dominirenden Reihen die Continente durchziehen, ihn in fest umschriebenen Theilganzen umgrenzend, und vor Allem, ob das Wasser, das belebende Element, in den (die Anwohner der Quellen und Mündung verbindenden) Flüssen sowie in dem, die Entfernungen annähernden, Meere Verkehrswege eröffnet. In den geistigen Schöpfungsproducten (aus Reaction gegen die Natur gezeugt, um die Feindlichkeiten unschädlich zu machen und ein Gleichgewicht mit der Umgebung herzustellen), sind die Wachstumsprocesse zu studiren durch vergleichende Uebersicht, einmal in Aufstellung der Grundformen unter den Naturvölkern und dann in Ausfolgung der Fortbildungsstufen unter den Culturvölkern, besonders auf den die meisten Comparationspunkte bietenden Feldern.

Aus den Beziehungen der Einwanderer und Eingeborenen zu einander treten Kastenscheidungen hervor, die sich gesellschaftlich gliedern, auch Besonderheiten der Verfassungsform bedingen, sei es der monarchischen (im Erbrecht oder bei Wahl des Fürsten), sei es eines bald demokratisch bald aristokratisch gefärbten Gemeinwesens republikanischer Natur. Das ursprüngliche Priesterkönigthum pflegt im Laufe geschichtlicher Bewegung (wie sich in Japan, bei Chibchas, in Meroe, in Cochin u. s. w. zeigt) in seine Hälften weltlicher und geistlicher Macht zu zerfallen, und neben dem König an der Spitze des Heeres oder dem Priester als Hort des Wissens (so lange der Glauben noch nicht für theologische Prärogative beansprucht ist) wird dann der Richter mit selbständigen Functionen eingesetzt, und entscheidet nach Satzungen, in denen der alte Brauch unter den Anordnungen eines (meist mythischen) Gesetzgebers feste Bestimmungen gefunden hat, obwohl sich noch immer im Gedächtniss Traditionen vererben, bei denen vorkommenden Falles Rath geholt werden mag. Die anfangs gemeinsamen Eigenthumsrechte an den Boden*) werden, wenn die Verminderung der nutzbaren Pflanzen oder die Vermehrung der sie ausnutzenden Bewohner, die Kostbarkeit des Gutes erhöht, unter Einzelnebesitz parcellirt.

In den untersten Verhältnissen der Wilden herrscht das Recht des Stärkeren, indem der Mann das schwächere Geschlecht und die jüngeren Kinder als Sklaven knechtet, bis der im Greisenalter geschwächte Vater vor der überlegenen Kraft des aufwachsenden Sohnes erliegt (wie bei brasilischen Stämmen). Es tritt dann der (in mongolischen Sagen markirte) Zeitpunkt

*) Rechtsverhältnisse u. s. w. S. 70,

ein, wo die von den Alten gesammelte Erfahrung als nützliche Weisheit geschätzt wird, und jetzt im Senatus, in der Rathversammlung, über die Angelegenheit des Stammes entscheidet, obwohl die Anführung im Kriege noch immer (wie bei den Araucanen und einst bei den Germanen) dem Tapfersten aus den Jüngern zufällt, und überhaupt die gereiften Männer in einer nach den Altersclassen abgestuften Gliederung der Kasten (wie bei den Kru, Krih u. s. w.) die der vollen oder schwerbewaffneten Krieger bilden. Hier ist nun vielfach das historische Beispiel bekannt, wo der siegreich heimkehrende Feldherr die Niederlegung seiner temporären Würde verweigert, und sich dann allmählig einen auf den Bruder oder auf den Neffen, und schliesslich auf den Sohn (den ältesten oder, bei Minoritätsrecht, den jüngsten) übergehende Erbfolge festsetzte. Wie weibliche Succession zur Anerkennung gelangt, ist ausser in Afrika (bei dem dortig geringeren Geschlechtsunterschied, wie andererseits bei amerikanischen Bardachen u. s. w.), wie auf anderen Territorien, in den malayischen u. s. w., zu ersehen durch die Aufnahme flüchtiger Fürsten in die Herrscherfamilien des Landes, wo dann der durch Heirath erworbenen Königstochter, als einheimischer Prinzessin, ein Vorrang über den Fremdling blieb (wie in Lykien).

Die Gesellschaft gliedert sich verwandtschaftlich*) in der Familie zum Geschlecht (der Gens) mit seiner Erweiterung zum Stamm (tribus) oder unter Aufnahme der Stammesangehörigen als fictitiver Verwandte zum Clan (mit patriarchalischer Geltung des Hauptes), worauf sich dann in grösserem Ganzen das Volk oder die Nation zusammenschliessen.

Für das Studium der vergleichenden Psychologie zeigen sich die mythologischen Vorstellungen am geeignetsten, da sie nicht, wie die rechtlichen, sich an praktische Verhältnisse anzuschliessen haben und nicht, wie die poetischen, von individueller Zuthat abhängen, sondern in voller Freiheit geschaffen, die gesammte Naturanschauung einschliessen, so lange Religion und Wissenschaft noch nicht getrennt sind. In der Religion beantwortet sich der noch nicht zu wissenschaftlicher Forschung gereifte Geist in gläubig verehrten und dichterisch ausgemalten Idealen die an die Gegenstände der Aussenwelt**) gestellten Fragen und verkörpert sie in mythologischen Gestaltungen. Von den Definitionen des Wortes Religion bleibt es abhängig, ob solche einem jeden Volke zuzuschreiben sei, aber überall auf der Erde finden sich Verknüpfungen mit dem Uebersinnlichen, die religiösen Charakter tragen. Die religiösen Ideen wachsen auf der sinnlichen Grundlage des täglichen Lebens hervor und sie kommen (der, den Leiden unterworfenen, Menschennatur gemäss) desshalb zunächst in den Krankenheilungen***) zur Geltung, dann überhaupt bei den Vorstellungen von der Seele, den Ceremonien bei der Geburt und bei dem Tod, bei der Pubertätsentwicklung, bei der Ehe, bei den abnormen Zuständen des Nervensystems (in Besessenheit, Extase, Seherthum) u. s. w. Die einzelnen Naturobjecte, Steine, Pflanzen, Thiere, Flüsse, Berge, Wind, Wasser, Feuer treten in einen sagenhaft mysteriösen Zusammenhang mit dem Menschen, der sich etwaiger Pflicht gegen sie durch die Gelübde zu entledigen sucht. Mythen bilden sich über die Himmelskörper, über Sonne, Mond und Sterne, die leicht mit den Gottheiten identificirt werden, welche als schöpferische an der Spitze des Alls stehen und bei denen dann auch im Erwachen höherer Ahnungen, der Mensch in der Weihe

*) Ethnologische Forschungen (Jena 1871) Bd. I, S. XXIII.

**) Beiträge zur Ethnologie (Berlin 1871) S. XL.

***) Ethnologische Forschungen (Jena 1873) Bd. II, S. 320.

der Mysterien Rettung sucht, während sich die Priester in den Formen der weissen und schwarzen Magie*) bekämpfen. In den mythologischen Anschauungen finden wir die geistige Verkörperung der Natur, den Reflex der Umgebung, innerhalb welcher der Stamm lebt. Andere Figuren erscheinen im heissen Afrika der Neger, andere dem Lappen oder Samojeden kalter Polarländer, andere in den Wäldern des südlichen, auf den Prairien des nördlichen Amerika, andere wieder in arabischen Wüsten, andere auf mongolischen Steppen, andere in den Bergthälern des Himalaya oder Kaukasus, andere auf den Oaseninseln des weiten Ocean. Von den mythologischen Schöpfungen beginnen die mit dem Cultus der herrschenden Religion im Lande verknüpften rascher in stereotype Formen zu verknöchern, als die im freien Volksleben aufspringenden, aber auch die letztern charakterisiren sich fest durch die psychologischen**) Gesetze der Bildung, und sind (als conventioneller Behandlung entbehrend) für Vergleichenungen noch geeigneter. Ein einheitlicher Kult wird meist unter politischer Einigung organisirt, aber eine einheitliche Religion knüpft sich an die Offenbarung eines Propheten, dem dann leicht die Autorität des Buchs in Niederschreibung der Ueberlieferungen folgt.

Den Grundzug des religiösen Cultus bildet das Gelübde, indem in der dem Menschen nicht eignenden Natur durch die Enthaltung von selbstgewählten Gegenständen die Erlaubniss zum Gebrauch der Uebrigen nachgesucht wird. Die dämonische Erfüllung aller Naturgegenstände im Fetischglauben erhält ihren Abschluss mit dem den Horizont umwölbenden Himmel, als unnahbarer Sitz der in Emanationen ausströmenden Gottheit.

Die Manen der Ahnen***) steigen als hülfreiche Schutzgeister herab oder sie erhalten, als Heroen vergöttert, in den für sie errichteten Capellen†) ihre Verehrung. Die Cultushandlungen liegen dem Priesterstande ob, der in vielfachen Weisen mit der unsichtbaren Welt des Jenseits communicirt und, in den Orakeln, Verkündigungen von dort zurückbringt. Die Inspirationen berühren sich (je nach der Auffassung weisser oder schwarzer Magie) mit den Phänomenen der Besessenheit,††) wo es wieder der Exorcisationen zur Austreibung bedarf. Dem Zauberer steht der Zaubermeister, den Hexen der Hexenmeister gegenüber, aber der in fremder Religion geweihte Priester verfolgt dann seinerseits wieder den Hexenmeister mitsammt den Hexen, wenn ihm die weltliche Macht ihren Arm leiht. In gegenseitiger Unterstützung wird geistliche Hülfe dem Staat gewährt, in der von den Fetischen gestellten Polizei oder in den Verordnungen des Tabu, durch die der blinde Glaube hilflos gebunden ist. Die richterlichen Functionen werden durch Eidesabnahme erleichtert oder lassen zweifelhafte Fälle durch Gottesgerichte entscheiden. Die Krankheiten können als Strafen gesandt werden, vom Priester sowohl, wie vom Guten oder Bösen, und je nach diesem Ursprung ändert sich die Kurmethode, die bald blutige Opfer, bald Sühnen verschiedenster Art, bald feiernde in Tänzen (wie in Mikronesien) zum Heilen verlangt. Die dem Menschen selbst geheimnissvolle Fähigkeit seines Geistes, die ihn zu neuen Erfindungen führt, wird auf die Befähigtensten einen zauberischen Schein, unter welchem göttliche oder doch dämonische Belehrung die mit dem Jenseits verkehrenden Priester begünstigt haben möchte, wenn sie die

*) Der Mensch in der Geschichte (Leipzig 1860) Bd. II, S. 242.

**) Das Beständige an den Menschenrassen (Berlin 1868) S. 71.

***) Beiträge zur vergleichenden Psychologie (Berlin 1868) S. 72.

†) Reisen in Siam (Jena 1867) S. 247.

††) Beiträge zur vergleichenden Psychologie S. 115.

magische Kunst der Feuerentzündung*) (gleich den Flamines) und dann die Pflichten der Feuerreinigung (durch periodische Erlöschungen, wie in Sibirien und Mexico) üben, wenn sie, gleich dem Inca, Brücken bauen oder kunstvolle Häuser, wie die priesterlichen Zimmerleute Tonga's. (römische Pontifices) oder wenn sie die geheimnissvolle Kunst des Schmiedes (wie einst in Arcadien) treiben, und als solcher bei arabischen und afrikanischen Stämmen Verehrung empfangen, die sich freilich wieder im Gegensatz zu einem anderen Glauben in ein durch Vermuthung böser Schwarzkünste hervorgerufene Verachtung (wie in Kunawar) verwandeln mag. Die nächste Folge ist erbliche Ueberlieferung der erlangten und geheimnissvoll bewahrten Kunstfertigkeit von Vater auf Sohn, wann sie sich gesellschaftlich in Kastenscheidungen oder anderswo in Zunftverbänden erhält. Die Priester gewinnen ihre an das Uebersinnliche hinausreichenden Kräfte durch geheimnissvolle Riten, aus denen sie als Wiedergeborne hervorgehen, und sie sind dann ihrerseits wieder befugt, Candidaten zu einem Cursus von Prüfungen zuzulassen, der ihre Aufnahme in heiligende Mysterien vorbereitet. — Solche in Amerika (im Meda) und in Polynisien religiöse Weißen verleihende Ceremonien gewinnen in Afrika die vehmgerichtliche Gewalt der Geheimbünde (unter einem im Waldesdunkel gefürchteten Gross-Purrah) im Semo, im Egbo-Orden u. s. w. Zur Bekämpfung des feindlich Bösen leiten die Diener des höchsten Wesens oder Grossen Geistes ihre Kraft auf specielle Belehnung zurück, wie in Guiana, oder auf Einflüsse, in denen sich niederfließende Emanationen mit dem Aufsteigen seelischer Deificationen durchdringen.

Unter den Jahresfesten,**) die sich mit der Zeitrechnung, wie diese mit der Sternkunde verknüpft, treten besonders die beim Aussäen und Ernten der Früchte bedeutsamen (in ihrer Verbindung mit phallischen Ceremonien, um die Zeugungskraft der Muttererde zu beleben oder mit Menschenopfern, um sie durch das im Blute liegende Leben zu erneuern) hervor, sowie bei Jäger-völkern die mit magischer Bindung der Thiere verknüpften Tänze, oder bei Hirtenvölkern, die beim Auszug und Rückkehr der Heerden.

Aus den mit Sagen durchzogenen Traditionen wächst (mit Entwicklung des Zeitbegriffs neben dem räumlichen Denken) die chronologische Scheidung des Geschichtslaufes empor. Der ungeschulte Geist übt noch nicht das Zählen, sondern fasst die Menge der Einzelheiten noch in ihrem räumlich gegebenen Nebeneinander auf. Die einfachste Zählmethode geht (wenn nicht bei der Zwei stehen bleibend) bis zur drei, wo dann die Vier das Viele bildet. Darauf folgt der Abschluss mit der Fünf (in der Hand) oder, beim Weiterzählen an den Zehen der beiden Füße, die Vergleichung der Zwanzig mit dem (ganzen) Menschen. Bei höheren Zahlen findet leicht eine Entlehnung von culturfähigeren Nachbarn statt. Die Sprache sucht zunächst Bezeichnungen für jede Einzelheit der sinnlich gebotenen Eindrücke und mehrt so mit geschärfter Beobachtung die Menge der Namen***) und die Masse der Charakterisirungen für Einzelbezeichnungen bis an die Grenze des Möglichen, wo dann das dem logischen Denken inhärirende Wachsthumsgesetz der Entwicklung in Generalisationen abgleicht, wie die unter den Vorstufen der Kerbeinschnitte, der Knoten, der Figurenmalerei gebildete Schrift durch die unübersehbar zunehmenden Reihen der Hieroglyphen durch die dafür benötigten Schlüssel schliesslich auf die Vereinfachung des Hilfsmittels in dem Alphabet geführt wird.

*) Der Mensch in der Geschichte (Leipzig 1860) Bd. II S. 331.

**) Geographische und Ethnologische Bilder (Jena 1873) S. 198.

***) Sprachvergleichende Studien (Leipzig 1868) S. XXII.

Aus den Gesprächen der Eingebornen tritt die logische Verknüpfung hervor, die in ihren Denkopoperationen herrscht und ursprünglich auch die syntaktische Form ihrer Reden geschaffen hat, obwohl sie bei später zunehmender Fülle des Ausdrucks auch dann noch als Mittel derselben verwendbar bleibt. Der in den Wurzeln der Gedankenschöpfung treibende Mechanismus ist aus den an dem geistigen (zunächst dem mythologischen) Horizont projecirten Gestaltungen, als Resultate jener, zu studiren.

Für die Zwecke ethnologischer Museen sind die Sammlungen besonders auf folgende Gegenstände zu richten:*)

1. Kleidungsstücke (von einheimischer Manufactur) besonders gemusterte, unter Beifügung des Rohstoffes, der Stadien der Verarbeitung, der dabei gebrauchten Werkzeuge, Beschreibung des Verfahrens, Verwendung und Art der Farbstoffe etc.
2. Schmuckgegenstände und die Materialien, aus denen sie gefertigt sind, oder wenn dieses, weil aus edlen Metallen oder Steinen, zu kostspielig, Abzeichnung der Ornamentirung, ebenso etwaiger Tätowirung, Durchlöcherung von Körpertheilen, Bemalung derselben; am Kopf, Nase, Ohren, Zähnen geübter Entstellungen.
3. Hausgeräthe aus Thon (ob gedreht, mit der Hand gefertigt oder in einem Geflecht) oder Holz, wenn leicht und transportabel, sonst Modelle dieser und der Häuser (aus Stein, Holz, Lehm, je nach der Natur des Landes geboten), oder Zeichnungen, um den architektonischen Styl wiederzugeben.
4. Das Bett (Matten, Decken, Nacken- und Kopfkissen etc.).
5. Waffen zum Kriegsgebrauch (defensiv und offensiv) und Schmuck- oder Etikette-Waffen.
6. Geräthe zur Jagd mit Beschreibung des Gebrauchs (Lanze, Wurfstock, Bogen, Pfeile etc.).
7. Geräthe zum Fischfang (Angeln, Netze, Reussen, Pfeile, Speere etc.).
8. Geräthe zum Ackerbau (Beschreibung der Gebräuche beim Feldbau, beim Säen, der Ernte etc.).
9. Die bei der Viehzucht gebrauchten Geräthe, Schuppen, Lhasso, Glocken etc. mit Geräthschaften zur Butter- und Käsebereitung.
10. Handwerkszeuge in Reihen.
11. Heilige Gegenstände, für den Cultus verwandt, Embleme und Symbole, Götzen, Götzenbilder, Fetische, Amulette, Talismane, Zeichen des Priesterranges, der Würden etc.
12. Musikinstrumente.
13. Figürliche Bilderzeichen zur Verzierung oder im Uebergang zur Schrift, wo sie sich immer angebracht finden, entweder mit dem sie tragenden Gegenstände oder abgeklatscht (durch gebürstetes Papier oder durch schwarzgefärbte Wachsbälle).
14. Aushülfen für Rechnungen, wo vorhanden, geschürzte Knoten, gekerbte Stäbe etc.

Solche Erwerbungen sind meist durch einfache Austauschobjecte europäischer Manufactur zu bewerkstelligen, die freilich, weil je nach dem herrschenden Geschmack verschiedentlich vorgezogen, dem entsprechend zu wählen sind.

*) S. Rathschläge der Anthropologischen Gesellschaft Berlin's (in der Rubrik Ethnologie).

Bei weiterem Verkehr mit den Eingeborenen lassen sich unter Anderem folgende Fragen stellen:

Welchen Namen giebt sich der Stamm selbst?

Was bedeutet derselbe in der eigenen Sprache?

Wie heisst er bei seinen Nachbarn?

In welcher Sprache verkehrt er mit denselben?

Wie ist die Verfassung (patriarchalisch, republikanisch, theokratisch, monarchisch etc.)?

Welche Rangunterschiede bestehen? (etwaige Kastenscheidungen).

Bilden die Handwerker eine besondere Classe (wandernd oder ansässig)?

Welche Verkehrsmittel gelten (Austauschartikel, Handelswege)?

Weitere Auskunft ist dann zu suchen:

Ueber Gebräuche bei Kriegs- und Friedensschluss (Gesandtschaftsrecht, Erwählung des Heerführers).

Ueber Gebräuche bei der Geburt (Haltung der Mutter, Lösung der Nabelschnur).

Ueber Gebräuche beim Wochenbett (Betheiligung des Mannes).

Ueber Gebräuche bei Namengebung (Säugungszeit, Durchbruch der Zähne etc.).

Ueber Gebräuche bei Eintritt der Pubertät (Zeit des Eintritts etc. Prüfungen, etwaiges Beschneiden, Excision etc.).

Ueber Gebräuche bei Eheschliessung (Kauf der Braut, Dienst des Bräutigams, Raub).

Ueber Gebräuche bei Krankheiten (Arzneimittel, priesterliche Beschwörungen).

Ueber Gebräuche beim Begräbniss, durchschnittliche Lebensdauer, hauptsächlichliche Todesursachen etc.

Ueber die Form der Gräber (etwaige Zubereitung der Leiche, Begraben, Verbrennen etc.).

Ueber das Familienleben (väterliche Gewalt etc.).

Ueber die socialen Verhältnisse (Sittlichkeit, Gastrecht etc.).

Ueber die Stellung der Frau (Verheirathung in oder ausserhalb des Stammes. Monogamie, Polygamie, Polyandrie).

Ueber das Ansehen der Alten.

Ueber die bestehenden Gesetze (und auf wen zurückgeführt?).

Ueber die herrschenden Sitten und Gebräuche.

Ueber das Erbwesen (weiblicher oder männlicher Linie).

Ueber die Form der Eidesablegung.

Ueber die Sklaverei und Schuldklaverei.

Ueber Gewicht und Maass.

Ueber die Zeichen des Eigenthums und Symbole der Besitzergreifung.

Ueber die Anlegung der Dörfer, Befestigungsweisen etc.

Ueber die Getränke (Fluss-, Brunnen-, Regenwasser, gekocht oder gemischt).

Ueber die Nahrung (Zubereitung derselben, Esszeiten etc.).

Ueber Art, Dauer und Wechsel der Moden.

Ueber das Beleuchtungsmaterial (Erneuerung, Methoden des Feuer-machens).

Ueber die Zeiten des Schlafes (zu Nachtstunden, Mittags etc.).

Ueber die Haltung von Hausthieren (Züchtung oder Abrichtung derselben, Entstellung der Hörner, Melken der Kühe, Scheeren der Schafe).

Ueber die verwendeten Narcotica (in Getränken, Speisen, Rauchen, Schnupfen, Kauen).

Ueber Spiele und Tänze (oder Volksfeste).

Ueber die Transportmittel zu Lande.

Ueber die Befahrungsweise der Binnen- und Küstengewässer.

Ueber die Beschaffung und Verarbeitung der Metalle.

Ueber die Werkzeuge und deren Verwendung beim Baumfällen oder bei Herrichtung des Stammes. Bei Darstellung der gebrauchten Geräthe und Schmucksachen sind, besonders unter den aus Stein, Muscheln oder Knochen, die Verfahrungsweisen möglichst genau zu beschreiben.

Bei Gelegenheit zu längeren Gesprächen können Vocabularien gesammelt werden, zunächst in den Bezeichnungen der Naturgegenstände, der Körpertheile, der Verwandtschaftsgrade, der Religionsbegriffe, dann der hauptsächlichsten Verba und Adjectiva, sowie kurzer Phrasen (um Verwendung der Präpositionen zu zeigen) in fragender, befehlender, erzählender Form. Dabei sind die Rangunterschiede zu beachten, in der Anrede und Bezeichnungsweise, sowie der Sprechweise der Kinder. Bei Wörterverzeichnissen ist es geeignet, dem bereits von Koelle in der *Polyglotta Africana* (Comparative Vocabulary London 1854) niedergelegten Schema zu folgen.

Wenn möglich, ist eine Schätzung der Bevölkerung zu gewinnen, der durchschnittlichen Kinderzahl, das Verhältniss der Geschlechter.

Bei Bezeichnung der Monate muss zugleich auf die meteorologischen Verhältnisse des jedesmaligen Klima Rücksicht genommen werden, bei der Bezeichnung der Sternbilder auf die daran geknüpften Mythen, namentlich auf die über die Sonne und den Mond erzählten, die bei Finsternissen und im Gewitter geläufigen, die Heilighaltung sogenannter Donnersteine u. s. w.

Erkundigung über vorhandene Traditionen und die Art ihrer Fortpflanzung sind mehr bei herbeigeführter Gelegenheit herauszuhören als herauszufragen, wie überhaupt die Fragen nie als leitende gestellt werden dürfen. Wiedergabe von Fabeln, Sprichwörtern, Volksliedern wird ursprünglichen Sinn und Fassung am besten bewahren, wenn scheinbar unabsichtlich belauscht.

Bei stattgehabter Kreuzung sind die daraus hervorgegangenen Mischungen im Gegensatze zu den ursprünglichen Stämmen zu charakterisiren.

Bei Darstellung des Religionssystems ist der Einfluss desselben auf die individuelle Moral, die gesellschaftlichen Beziehungen und das politische Leben, sowie der Einfluss der Priesterkaste auf die Individuen und den Staat zu beachten. Bei den verschiedenen Formen des Irrsinns (oder Idiotismus) ist der Zusammenhang mit religiöser Schwärmerei in Betracht zu ziehen.

Neben der Statur, Kopfbildung, Physiognomie, Verhältniss der Extremitäten zum Rumpf, Farbe, der sanft oder rauh anzufühlenden Haut an bedeckten Körpertheilen, der Augen, der (straffen, harten, weichen, lockigen, kräuselnden, welligen, buschigen) Haare, der Zahl und Abschleifung der Zähne, dem Verhältniss zwischen Brust und Bauch, der Stellung des Unterkiefers und des Kinns, ist die gewöhnlichst angenommene Körperstellung zu beachten: die Haltung der Arme, das Setzen der Füße beim Gehen, die im Schlafen bevorzugten Lagen u. s. w. Ferner die Schrittweise, die Art des Laufes, des Sprunges, des Schwimmens, der bei der Rede gebrauchten Gesten, der Figuren des Tanzes u. s. w. Zugleich muss dem Minenspiel Aufmerksamkeit geschenkt werden: welche Kopf-, Hals- oder Schulterbewegungen drücken Bejahung oder Verneinung aus, wie markirt sich Verachtung, Ueberraschung, Freude? welcher Art ist die durch Weinen oder

Lachen hervorgerufene Zügeverzerrung? welche Hand- oder Fingerbewegungen dienen zum Winken oder Abwehren? wie weit werden die Ohren bewegt, ist die Kopfhaut verschiebbar, durchdringt das Erröthen die Haut, sind beim Gruss die Hände betheiligt (im Druck), die Lippen (im Küssen), die Nase (im Reiben)? findet Athemeinziehung oder Bespeieung statt? ist ein specifischer Geruch bemerkbar? Wie schliesst der Mund?

Werden die Nägel kurz oder lang getragen (vielleicht in einer Scheide), werden sie (und wie oft) absichtlich beschnitten, und was geschieht mit den Abfällen? welche Werkzeuge dienen zum Abscheeren und Glätten der Haare, zum Kratzen des (oft oder unter bestimmten Verhältnissen mit den Händen nicht zu berührenden) Kopfes, zur Reinhaltung und zum Stöchern (auch Schleifen) der Zähne? sind Vorrichtungen im Gebrauch, den Auswurf des Speichels aufzunehmen und vielleicht zu verbergen? tritt die Muskulatur stark an den Kaumuskeln hervor? ist das Trinken mehr schlürfend oder schluckend, wird der Bart gepflegt oder ausgerupft, wie auch die Augenwimpern und die Haare an anderen Körpertheilen, zeigt sich Blinzeln der Augen in Folge des Sonnenlichtes oder Schneeglanzes (und finden sich Vorrichtungen zum Schutz in Gebrauch), kommt Nachtblindheit vor? bis zu welcher Entfernung scheinen Gegenstände erkannt zu werden? richten sich die Ohren beim Lauschen oder wird der Kopf gewendet, schnüffelt die Nase, welche Art von Gerüchen scheinen beliebt, wird das Süsse, Salzige, Herbe, Bittere oder Saure beim Geschmack bevorzugt, welche Farben werden für Zusammenstellungen gewählt, sind Blau und Grün unterschieden und mit welchen Bezeichnungen?

Welches ist (bei Reitervölkern) der Sitz zu Pferde, welche Aufzäumung, Sattlung und Leitung, auf welcher Seite wird aufgestiegen, welches ist die häufigste Gangart der Reitthiere, welche Laute dienen zum Antreiben oder Zurückhalten, welche zum Locken der Hunde, wie werden (von den Hirten) die Heerden getrieben und in der Zusammenhaltung bewacht, wie in der Vollständigkeit controlirt, ob nach Zahl oder nach Aussehen, wie wird nach den verschiedenen Jahreszeiten darüber disponirt, und wie ändert in diesen überhaupt die Lebensweise des Stammes? — Je nach der besonderen Reise ergeben sich dann die specielleren Instructionen.

Landwirthschaft.

Von

Albert Orth.

Die Kenntniss der natürlichen Grundlagen für organische Entwicklung auf der Erde ergiebt häufig den Grund für das an bestimmten Orten daran geknüpfte verschiedene Culturleben, nach Richtung, Mannichfaltigkeit, Zurückgebliebensein oder Fortschritt. Will man deshalb die geographische Verschiedenheit einer Gegend und die wirthschaftliche Entwicklungsfähigkeit derselben durch Bodencultur verstehen, so ist eine möglichst eingehende naturwissenschaftliche Orientirung über Luft und Klima, sowie über Boden und geologische Grundlage nicht zu entbehren. Und indem das animalische Leben die organische Arbeit der Pflanze zu seiner nothwendigen naturgesetzlichen Voraussetzung hat, so sind die genannten Factoren für viele Culturfragen, wie Population, Möglichkeit der Volksvermehrung und dergl., überhaupt entscheidend.

I. Die natürlichen Grundlagen der landwirthschaftlichen Cultur.

Die Sonne ist das grosse mächtige Agens, welches für die Erwärmung der Erdoberfläche, für die Vertheilung der wässerigen Niederschläge und die chemische Action auf der Erde von dem maassgebendsten Einfluss ist. Die Angabe der geographischen Breite macht es möglich, die Dauer und die Intensität der Sonnenwirkung in den verschiedenen Jahreszeiten während des Tages zu bestimmen, soweit es von dem Stande der Sonne zur Erdoberfläche im Weltraum bedingt wird. Im hohen Norden und Süden summiren sich die Sonnenwirkungen innerhalb gleicher Zeiträume mehr, wenn die Erdoberfläche tagelang davon beschienen wird.

Die Wirkung der Sonne auf die Erdoberfläche wird in hohem Grade modificirt durch die Art und Weise, wie die feuchten Niederschläge auftreten, und das trockene continentale Klima im Innern vieler grosser Ländermassen unterscheidet sich in dieser Hinsicht sehr von dem feuchten und regnerischen Klima an vielen Meeresküsten. Es ist deshalb erwünscht, wenn die Beobachtung neben der Zahl der jährlichen Regen- und Schneetage auch auf die

Zeit mit heiterem, halbheiterem, bedecktem und bewölktem Himmel, mit Nebel und dergl. gerichtet ist. Namentlich ist dies für alle die Gegenden bemerkenswerth, welche an der Grenze der organischen Production und der Cultur liegen und in welchen jeder Abzug von der durch den Stand bedingten jährlichen Sonnenwirkung sich in ungünstigster Weise bemerklich macht. Die Samenreife in Island und im nördlichen Norwegen, der Weinbau in Grossbritannien und Irland wird dadurch sehr nachtheilig beeinflusst, indem daselbst die dazu nöthige Wärme häufig oder regelmässig fehlt.

Die durchschnittlich gleiche Jahreswärme eines Ortes wird durch die Isotherme, resp. die bezügliche Curve auf der Erdoberfläche durch die zugehörigen Tagesbeobachtungen bestimmt. Für die Vegetation und die landwirthschaftliche Cultur im weitesten Sinne des Wortes ist die durchschnittliche Jahrestemperatur weniger maassgebend, als der Durchschnitt und die Extreme der Sommer- und Wintertemperatur (perennirende und zweijährige Gewächse), ferner die Temperatur in den einzelnen Monaten während der oft kurzen Vegetationsperiode.

Der Bruchtheil des Jahres, in welchem der grösste Theil der vegetativen Thätigkeit, der Aufnahme- und Assimilationsprocesse sich vollzieht, ist an verschiedenen Punkten der Erde von sehr abweichender Dauer und nicht auf dieselben Jahreszeiten beschränkt. In anderen Theilen der Jahresperiode kann es eine zu extreme Wärme oder eine zu grosse Kälte oder beides zu verschiedenen Jahreszeiten sein, wodurch die vegetative Thätigkeit mehr oder weniger begrenzt wird. Es ist erwünscht, über die Jahreszeit und die Dauer der eigentlichen Vegetationsperiode, eventuell verschiedener Vegetationszeiten innerhalb eines Jahres und die naturgesetzliche Begründung dieses Wechsels möglichst genaue und vollständige Angaben zu erhalten. Dadurch würde ein weiteres wissenschaftliches Material gewonnen zur Bestätigung resp. Widerlegung des von Boussingault aufgestellten Satzes, dass bei denselben Culturpflanzen das Product der Vegetationsperiode in die mittlere Jahrestemperatur an verschiedenen Orten der Erde eine annähernd constante Grösse sei.

Die Wärmeverhältnisse sind stets in einem gewissen Zusammenhange mit der Licht- und chemischen Wirkung der Sonne und den Feuchtigkeitsverhältnissen einer Gegend aufzufassen, namentlich mit den feuchten Niederschlägen in gewissen Jahreszeiten und Monaten. Damit in den Pflanzen die chemische Action organischer Bildung aus unorganischen Stoffen vor sich gehe, damit die Culturpflanzen überhaupt existiren und sich vollständig entwickeln können, ist das gleichzeitige Zusammenwirken der genannten Factoren und eine bestimmte Vertheilung in den einzelnen Jahresabschnitten nothwendig. Während die Natur in manchen Gegenden Feuchtigkeit im Ueberfluss, jedoch zu wenig Licht und Wärme darbietet, als dass sich die Vegetation und manche Culturpflanzen noch zu entwickeln vermögen (hohe Gebirge, viele Polardistricte), so wird in anderen Gegenden, in weit ausgedehnten Terrains, die überschüssige Licht- und Wärmeabgabe durch die Sonne nicht oder nicht genügend activ im Sinne organischer Bildung, weil die dazu nothwendige Feuchtigkeit dahin durch die Luft nicht verbreitet wird. Sowie die Natur der Vegetation überhaupt, so ist auch die Zahl der anzubauenden Culturpflanzen, in gleichem Masse die Höhe und Sicherheit der Ernten grossentheils bedingt durch den Eintritt und die Stärke des Regenfalls in bestimmten Jahreszeiten, wie durch die Höhe des Jahresregens überhaupt. Sogar die Höhe des Schneefalles und die Art und Weise, wie der Winter mit viel oder wenig Feuchtigkeit in ein trockenes Frühjahr und einen heissen Sommer übergeht, ist in den Gegenden des sogenannten continentalen Klimas auf die

Ernteerträge von Einfluss, wie man namentlich in der russischen Steppe deutlich erkannt hat. Das Verdichten von Feuchtigkeit in dem Thau während der Nacht und innerhalb der Bodenräume während des ganzen Tages, indem hier die Thaupunkttemperatur in verhältnissmässig geringer Tiefe vorhanden ist, vertritt im heissen Sommer vieler Gegenden die, wenn auch sparsame, Zufuhr des Wassers, welches eine der unentbehrlichsten Bedingungen für die Vegetation und die Cultur von Pflanzen auf der Erde ist, es wird auch je nach der Natur, Entfernung und Entwicklung dieser Pflanzen und der dadurch dem Boden gewährten Beschattung natürlich oder künstlich in verschiedenster Weise, mehr oder weniger günstig beeinflusst. Die Ermittlung der täglichen, monatlichen und jährlichen flüssigen Niederschläge und der relativen Feuchtigkeit der Luft in Beziehung zu dem Wechsel der Temperaturverhältnisse ist deshalb eines der nothwendigsten Desiderien, um die Vegetation und Culturfähigkeit eines Landes beurtheilen zu können, und die Anstellung eingehender und fortgesetzter meteorologischer Untersuchungen hat deshalb einen sehr hohen Werth.

Die Zusammensetzung der Luft aus verschiedenen permanenten Gasen hat einen so hohen Grad von Constanz und die Kenntniss der durch die Luft verbreiteten kleinsten Organismen ist noch so wenig entwickelt, dass allgemeinere Rathschläge für ein System von Untersuchungen darüber ausgeschlossen werden können, so wichtig als dieselben auch für die Kenntniss pathologischer Verhältnisse anzusehen sind.

Neben den in erster Linie für Vegetation und Pflanzencultur auf der Erde entscheidenden klimatischen Verhältnissen sind in zweiter Linie

die Boden- und geologischen Grundlagen

zu nennen. Ihr Werth für die Bodencultur wird durch die Natur des Klimas wesentlich bedingt und sowie sich die ungünstigen Wirkungen extremer Boden- und klimatischer Verhältnisse zu summiren vermögen, so können die Nachtheile geringer Bodenarten wenigstens bis zu einem gewissen Grade ausgeglichen werden durch ein günstiges Klima und umgekehrt werden die Vorzüge von guten Boden- und geologischen Verhältnissen bei ungünstiger atmosphärischer Beschaffenheit weniger wirksam sein können. Ein Sandboden im feuchten Irland oder im gemässigten Norddeutschland oder in der trockenen ungarischen oder russischen Steppe hat demnach einen ganz verschiedenen Werth für die Vegetation.

Die Feuchtigkeit, welche sich durch das Medium der Luft auf der Erde verbreitet, wird je nach der Neigung und Natur des Bodens, worauf der Niederschlag erfolgt, mehr oder weniger davon aufgenommen oder festgehalten. Die tiefer gelegenen und weniger geneigten Böden erhalten von denjenigen aus höherer und abschüssiger Lage einen Theil des darauf gefallenen Regens zugeführt, in geringerem Grade an dem Abhange von Hügeln und Bergen, in höherem Grade da, wo in der Tiefe von Gebirgszügen oder Ebenen das verdichtete Wasser in Form von Quellen, Bächen, Flüssen und dergl., als das Product eines grossen Condensationsgebietes, auftritt. Die von diesen Wasseranhäufungen berührten Thäler, Niederungen und Depressionen sind in extrem trockenen Klimaten nicht selten die einzigen Gebiete, welche durch den Wasserabfluss anderer und oft grosser Districte die nöthige Feuchtigkeit bekommen, ohne welche hier überhaupt keine Pflanzencultur möglich sein würde. Der Antheil des jährlich durch die grossen Wasserläufe abfliessenden Wassers in Beziehung zu dem Stromgebiete und dem ganzen in

demselben niedergeschlagenen Wasserquantum (das Supplement zu dem durch Verdunstung verloren gegangenen Wasser), die Ausdehnung der Niederungen und die Möglichkeit der Bewässerung des Bodens sind hier also sehr wichtige Factoren, welche durch Messungen festgestellt werden können. Es ist von besonderem Interesse, zu ermitteln, welche Hilfsmittel dieser Art für die Bodencultur in Anspruch genommen werden, ob der natürliche Regenfall ausreicht oder ob durch Bewässerung nachgeholfen werden muss, resp. in welcher Ausdehnung dies möglich ist, in welcher Weise, mit welchen Geräthen, technischen Hilfsmitteln und dergl.

Das Verhalten des Bodens zum Wasser und zur Wärme ist für den Bodenwerth von der allergrössten Bedeutung, namentlich dasjenige zum Wasser, indem dadurch auch die Temperatur indirect wesentlich bedingt wird. Der trockene Boden erwärmt sich in der Sonne übermässig, der feuchte und nasse dagegen wird kühl erhalten, weil die von der Sonne übertragene Wärme grossentheils in dem daraus verdunstenden Wasser latent und deshalb zur directen Temperaturerhöhung des Bodens nicht oder wenig wirksam wird.

Die sogenannte „wasserhaltende Kraft“ des Bodens, d. i. die Fähigkeit, einen grösseren oder geringeren Theil von Wasser aufzunehmen, ohne dass dieses direct abzulaufen vermag, ist zum Theil von der chemischen Natur der Bodenbestandtheile, zum Theil von dem Zertheilungsgrade und der Summe der dadurch bedingten capillaren Räume abhängig. In grobem Sand und Kies ist die Zahl der capillaren Räume und deshalb auch die wasserhaltende Kraft gering, im feinen Quarmehl, Kalkmehl und dergl. sind viel mehr capillare Räume und deshalb auch eine viel grössere wasserhaltende Kraft. Je mehr in einem Boden die grösseren Zwischenräume zwischen den Sandkörnern durch feinerdige Theile ausgefüllt sind, desto mehr Wasser vermag er capillar in sich aufzunehmen und der lehmige Sand, der sandige Lehm und Lehm verhalten sich deshalb in dieser Hinsicht viel günstiger. Thon und Humus vermögen nach ihrer chemischen Natur und gleichzeitigen feinen Zertheilung ausserordentlich viel Wasser festzuhalten, namentlich der Humus, bei welchem die wasserhaltende Kraft nicht selten das 6—8fache von der des reinen Sandes beträgt. Die Durchlässigkeit oder Undurchlässigkeit für Wasser, resp. die Durchlüftung, die Fähigkeit auszutrocknen und, wie angegeben, auch die Erwärmungsfähigkeit, die Art und Weise, wie ein Boden sein Volumen verändert und in der Sonne Risse und Spalten bekommt und dergl., stehen in bestimmten Beziehungen zu dem Bestande des Bodens und während Quarzsand und Quarmehl in feuchtem oder trockenem Zustande nahezu dasselbe Volumen haben, so wirkt ein hoher Gehalt von Thon und Humus auf Spaltenbildung beim Austrocknen und entsprechend vermehrte Durchlüftung, was gegenüber vielen an Quarmehl reichen Bodenarten besonders hervorgehoben werden muss, welche zuweilen bei verhältnissmässig wenig Thongehalt einen undurchlässigen, kalten und verschlossenen Untergrund abgeben. Für viele Fragen ist es nicht ohne Bedeutung, dass der genannte Boden nicht selten undurchlässiger ist als Thonboden, namentlich bei oberflächlicher Lagerung. Indem in den lehmigen und thonigen Bodenarten ein höherer Grad von Zertheilung vorhanden ist, so ist die Oberfläche der Bodentheilchen, an welche sich die feinsten Wurzeln anlegen und zwischen welchen sie sich verzweigen können zum Zwecke der Nahrungsaufnahme, eine ungleich grössere als in den Sandböden und wird auch dadurch die Pflanzenernährung beeinflusst, ganz abgesehen davon, dass die feinerdigen Theile der genannten Böden die grösste Absorption für mineralische Pflanzennährstoffe

besitzen und auch aus diesem Grunde je nach ihrem Ursprung eine ganz andere Bedeutung für die Fruchtbarkeit haben als Sand und Kies. Bekanntlich steht aber diese Absorption des Bodens für gelöste Mineralstoffe, resp. die geringe Löslichkeit der einen, die verhältnissmässig grosse Löslichkeit der andern in einer nahen und sehr interessanten Relation zum organischen Leben, zur Zusammensetzung sowohl der Pflanze als des Thiers und ähnlich auch des Menschen.

Die Feststellung des Bodencharakters, der geologischen Bildung und Grundlage giebt deshalb unter sonst günstigen Verhältnissen einen Anhalt für die Culturfähigkeit einer Gegend. Es ist dazu aber nicht hinreichend, nur die Natur und den Bestand des oberflächlichen Bodens zu bestimmen, sondern es ist ein genaues geologisches Profil in verticaler Richtung bis zu einiger Tiefe (wo möglich 1—2 Meter, wenn mehr, um so besser) zu geben. Der Untergrund regulirt die allgemeinen oder die innerhalb einer Vegetationsperiode hervortretenden nachtheiligen Eigenschaften der Oberkrume in der mannichfaltigsten Weise, wirkt je nach der Natur dieser verbessernd oder verschlechternd und ist für Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit von der allergrossten Bedeutung. Dazu kommt, dass die Culturpflanzen, auch das Getreide, viel tiefer wurzeln als man früher angenommen hat, und nicht selten aus dem Untergrunde die Feuchtigkeit, auch die Nährstoffe aufnehmen, welche ihnen in der Ackerkrume nicht geboten werden oder welche letztere zu Zeiten nicht aufnahmefähig sind.

Das geologische Profil soll die verschiedenen oberflächlichen und bestimmt charakterisirten Bodenschichten nach Beschaffenheit und Mächtigkeit bezeichnen, resp. die Natur und Mächtigkeit über dem Gestein, durch dessen Verwitterung der Boden entstanden ist, und den Bestand dieses Gesteines andeuten. Man trägt die Profile unter genauer Angabe des Ortes auf der Karte und unter Beifügung einer Nummer in ein besonderes Buch ein, indem man die verschiedenen Schichten unter einander schreibt (oder kurz durch die Anfangsbuchstaben andeutet) und vor jeder Schicht die Mächtigkeit nach Centimetern besonders bemerkt, etwa in folgender Weise:

14.

Alluvium des Rheins.

Ort und Gegend.

- 45 Cm. stark gebundener Thonboden (gepflügt 15 Cm.).
- 50 Cm. Kalkmergel (Rheinweiss).
- — Mittelkörniger kalkreicher Alluvialsand, in die Tiefe fortsetzend.
- 30 Cm. Hochwasserstand (senkrechter Abstand von der Oberfläche).
- 150 Cm. Niederwasserstand " " " " "

Oder:

183.

Muschelkalkformation.

Ort und Gegend.

- 30 Cm. schön gemengter kalkhaltiger Lehm Boden (gepflügt 20 Cm.).
- — Zerklüfteter, schwach geneigter, plattenförmiger Muschelkalk.

Oder:

270.

Diluvium.

Stassfurt. Provinz Sachsen.

- 50 Cm. Schwarzerde, humoser Lehm Boden (gepflügt 36 Cm.).
- 100 Cm. milder lössartiger Diluvialmergel.
- — Mittelkörniger Diluvialsand, in die Tiefe fortsetzend.

Auf Karten von grösserem Maassstabe, wie Katasterkarten, Grundsteuerkarten (1:3000, 1:5000) würden solche Profile mit abgekürzten Zeichen an den zugehörigen Stellen direct eingetragen werden können und das Bild von den natürlichen Bodenverhältnissen der betreffenden Gegend ein um so vollständigeres sein, je mehr solcher Profile genommen und eingetragen sind.

Ist es möglich, eine Notiz über den Wasserstand, Hochwasserstand und Niederwasserstand, Winterwasserstand und Sommerwasserstand, wenn auch annähernd, mit beizufügen, so ist dies sehr erwünscht und besonders wichtig bei Bodenangaben über den Untergrund der Ortschaften und Städte im Interesse der Gesundheitsstatistik und Bebauung. Genauere Angaben und Zahlen können hier nur durch ein System von fortgesetzten Beobachtungen gewonnen werden und würde auch eine Notiz über den Wechsel im Wasserniveau der Brunnen etc. von hohem Werthe sein. Werden die angegebenen Profile mit einer Niveaukarte mit möglichst vielen Horizontalcurven combinirt, so sind dadurch die einzelnen Schichten, resp. der Wasserstand im gegenseitigen Niveau bestimmt und ein solches vollständiges System wissenschaftlicher Ermittlungen ist besonders für die Kenntniss des Baugrundes grosser Städte nicht zu entbehren.

Die Gewinnung eines solchen reichen Materials ist naturgemäss nicht ohne Schwierigkeiten und man wird sich häufig auf einen Bruchtheil beschränken müssen. Unter allen Umständen aber ist es werthvoll, verschiedene Verticalprofile durch die oberflächlichen Bodenschichten bis zu grösserer Tiefe (Luzernewurzeln hat man bis 30 Fuss Tiefe verfolgt) zu gewinnen und die Mächtigkeit derselben zu bestimmen, dadurch allein kann ein motivirtes Urtheil über den Culturwerth des Bodens und seine geologische Constitution erzielt werden. Man kann hierfür alle natürlichen Abfälle, Wasserrisse, steile Uferländer, Steinbrüche, Lehm- und Sandgruben, die bei Häuser- und Brunnen-, Strassen- und Eisenbahnbauten entstehenden Profile in's Auge fassen und die dadurch zu gewinnende Orientirung vervollständigen durch Spaten und die sehr zu empfehlenden Erdbohrer, besonders die bis fast 1 Meter langen Handbohrer. Es ist in der Regel besser, weniger Profile, aber diese in einer gewissen Vollständigkeit und auf den verschiedenen typischen Bodengrundlagen, welche zu diesem Zwecke besonders zu untersuchen und auszuwählen sind, aufzunehmen, als den oberflächlichen Boden an einer grösseren Reihe von Punkten einseitig zu prüfen, ohne den tieferen Untergrund und seinen Bestand, die Trockenheit, resp. Feuchtigkeit desselben und den Wasserstand (Eis im Norden) dabei zu berücksichtigen. Es wird dadurch auch an wissenschaftlich verwerthbarem Material am meisten gewonnen.

Dasselbe bezieht sich auf die Aufnahme der Bodenarten und empfiehlt es sich, von den verschiedenen charakteristischen Schichten eines typischen Profils, resp. von dem darunter befindlichen verwittertem und unverwittertem Gestein Proben auszuwählen, unter Angabe der Bezeichnung, der Reihenfolge jeder Schicht und der Nummer des zugehörigen Profils. Man entnimmt von jeder Schicht, auch von der Ackerkrume, eine charakteristische Probe von 1,0 bis 2,0 Kilogramm, füllt dieselbe in einen entsprechenden leinenen oder baumwollenen Beutel und bemerkt die Bezeichnung gleichlautend auf 2 starken weissen Papierstreifen, wovon der eine zum Boden in den Beutel gethan, der andere beim Zubinden daran befestigt wird. Dadurch wird für alle Fälle eine Verwechselung vermieden. Besonders wichtige Bodenmaterialien werden eventuell in stärkeren Quantitäten von 5 bis 10 Kilogramm entnommen. Das durch oberflächliche Besichtigung erhaltene Urtheil kann dann

später durch genaue Bodenuntersuchungen controllirt werden, wie es für Preussen in der Geologischen Landesanstalt zu Berlin, einer Abtheilung des Königlichen Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, bereits in der Ausführung begriffen ist.

Für die oberflächliche Untersuchung ist eine gute Lupe mit nicht zu kleinem Gesichtsfeld sehr werthvoll, um die Körnung und den Sandgehalt genauer wahrnehmen zu können, und ist es zu empfehlen, neben dem feuchten auch den trockenen Zustand zu prüfen, wodurch sicherere und vergleichbarere Resultate gewonnen werden. Bei der alleinigen Beobachtung im feuchten Zustande wird das Auge sonst leicht getäuscht. Durch ein zusammengesetztes Mikroskop kann das Vorkommen von Quarzmehl, Kieselmehl, Organismenresten, Diatomeen und dergl. constatirt werden. Will man die gröberen Theile von den feinerdigen trennen, um beide gesondert zu prüfen, so braucht man den Boden nur eine halbe Stunde unter Umrühren mit Wasser zu kochen und nach wiederholtem Aufrühren und kurzem Stehen die feineren Theile von den gröberen Theilen abzugießen oder abzuhebern. Der Bestand eines Bodens, die Beziehungen zur eventuell vorkommenden Gesteinsunterlage (Verwitterungsboden, Anschwemmungsboden) können dadurch leicht nachgewiesen werden. Die Angabe, ob ein Boden einem bestimmten Gestein angehört, ist nicht genügend, durch diese Bezeichnung wird nur angedeutet, welcher Boden daraus hervorgehen konnte. Der Grad und die Tiefe der Verwitterung, die Beschaffenheit und Mächtigkeit des dadurch entstandenen Bodens muss hinzugefügt werden, wenn daraus über den Culturwerth etwas Bestimmtes hervorgehen soll. Es ist wünschenswerth, unter Berücksichtigung des letzteren Gesichtspunktes zu ermitteln, in welcher Weise und zu welchen Antheilen (Hectaren oder □ Kilometer) die einzelnen geologischen Formationen den Grund und Boden einer Gegend zusammensetzen. In welchem Verhältniss treten die älteren und jüngeren krystallinischen Gesteine auf, die geschichteten Thon- und Thonschiefergesteine, die Sandsteine und Kalksteine? Wie weit sind die jüngeren, meist noch nicht verhärteten Anschwemmungen des Diluviums und Alluviums vertreten, in welcher Ausdehnung, in welcher Gliederung und Beschaffenheit? Diese Fragen sind, abgesehen von der wissenschaftlichen Seite, auch für Culturzwecke von grosser Bedeutung. Neuere Untersuchungen ergeben namentlich deutlich, welche grosse Flächen auf der Erde von den jüngeren Bildungen des Diluviums eingenommen werden, und ist die Frage nach dem Vorhandensein oder Fehlen von Diluvialablagerungen (an manchen Stellen stehen sie zur sogenannten Eiszeit in bestimmter Beziehung) nach dem Vorkommen und der Beschaffenheit derselben von einiger Bedeutung. Ist doch das Leben der Menschen in geschichtlicher und vorgeschichtlicher Zeit vielfach an diese Formation geknüpft! Gehören doch viele der fruchtbarsten Bodenarten mancher Gegenden dem Diluvium an, namentlich die über grosse Bezirke vertheilte Schwarzerde!

Ebenso sind die lehmigen und thonigen Ablagerungsproducte der jetzigen Flussläufe an vielen Stellen die Hauptrepräsentanten der fruchtbaren Bodenarten oder des Culturbodens überhaupt, letzteres namentlich in extrem trockenen Klimaten, wo die Grundfeuchtigkeit und die Bewässerungsfähigkeit von besonderer Wichtigkeit ist. An manchen flachen Meeresküsten mit Ebbe und Fluth wird in der Seemarsch noch jetzt der fruchtbarste und an Nährstoffen reichste Boden gebildet, ebenso wie die gegenwärtigen vulcanischen Ascheneruptionen und derartigen Anschwemmungen die besten Bodengrundlagen zu geben vermögen. Die leichte Verwitterbarkeit der Silicate

bewirkt in letzteren, wie in vielen basaltischen Böden, einen hohen Nährstoffgehalt und eine günstige Mischung der Bodenbestandtheile.

Andererseits giebt es in den jüngeren geologischen Formationen auch sehr geringe unfruchtbare Districte, namentlich manche geringe Sandböden, zum Theil so rein abgelagert und so wenig durch feinerdige Theile und Thon gebunden, dass die feineren Sandkörner durch die eigene Schwere zu wenig festgehalten und durch den Wind in Bewegung gesetzt werden, nicht selten der Art, dass dadurch der Sand über breite Districte fortgeführt wird und die Versandung fortschreitet. Schon eine ganz geringe Beimischung von Lehm oder Thon sind hier von dem günstigsten Einfluss, sowie überhaupt die Zahl der capillaren Räume, die sog. wasserhaltende Kraft und die Bewurzelungsverhältnisse dadurch sehr viel günstiger werden. Man hat deshalb der bezüglichlichen Vermischung agronomisch und im Sinne der Landescultur ein viel grösseres Interesse zuzuwenden und weit geringere Unterschiede noch zu beachten, als es seitens der wissenschaftlichen Geologie meist geschehen ist. Bei den sogen. Verwitterungsböden ist neben dem Bestande des Gesteins der Zersetzungsgrad auf die Mischung der gröberen mit den feinerdigen Theilen und die Natur beider von dem grössten Einflusse, vorausgesetzt, dass überhaupt verwitterbare Gemengtheile vorhanden sind. Das Vorwiegen von nicht oder schwer verwitterbaren Mineralfragmenten, wie Quarz und Glimmer, giebt dem Boden mit Bezug auf chemische Zersetzung einen höheren Grad von Constanz, so dass weniger Pflanzennährstoffe aufgeschlossen werden, selbst wenn es an der für die Auflösungsprocesse im Boden nothwendigen Feuchtigkeit nicht fehlt. Die Feldspathe, namentlich Oligoklas und Labrador, ferner die kalk- und eisenhaltigen Silicate (Augit, Hornblende) verhalten sich in dieser Hinsicht je nach Vorkommen und Mischung viel günstiger.

Eine besondere Bedeutung nimmt der Gehalt an Calcium- und Magnesiumcarbonat (kohlensaure Kalkerde, kohlensaure Talkerde) sowie an Humus in Anspruch und wird dadurch die chemische Action im Boden sowie das physikalische Verhalten in nicht geringem Grade beeinflusst. Namentlich der Humus regulirt die extremen Eigenschaften der Sandböden und der Thonböden nach verschiedenen Seiten hin in günstiger Weise und sind deshalb die humosen Bodenarten für Culturzwecke besonders geschätzt. In sehr grosser Ausdehnung treten solche humose Bodenarten mit dunkler, in feuchtem Zustand schwarzer Färbung (Schwarzerde, Tschernosem) in einer Mächtigkeit von 0,5 bis 2 Meter in manchen Diluvialgebieten auf, so im mittleren Russland bis an das schwarze Meer, am Kaukasus, in Sibirien, in Galizien und Ungarn, in geringerer Ausdehnung in den preussischen Provinzen Sachsen, Schlesien und Posen. Man hat den meist unter 10 Proc. ausmachenden Humusgehalt als das Residuum stärkerer Vegetationsanhäufung aus der Uebergangszeit von der Diluvial- zur Alluvialperiode aufzufassen und würde es von Interesse sein, zu verfolgen, an welchen Stellen der Erde etwas Aehnliches zu beobachten ist. In vielen Gegenden liegt unterhalb der Schwarzerde Diluvialmergel, (auch Diluviallehm) z. Th. unter dem Diluvialmergel Diluvialsand (vergl. das erwähnte Profil von Stassfurt in der preussischen Provinz Sachsen). Verhältnisse, welche an den Rändern der Flusstäler, an Wasserrissen und andern steilen Abfällen meist leicht beobachtet werden können.

Schon ein geringer Gehalt an Humus und Calciumcarbonat in inniger Mischung mit den feinerdigen Theilen ist von Wichtigkeit, während andererseits ein zu grosser Antheil an diesen Gemengtheilen den Bodenwerth sehr

herabsetzen kann. Eine übermässige Anhäufung von Humus ist im Torfmoor vorhanden, er hat darin auch eine für die meisten Culturpflanzen weniger günstige Beschaffenheit und sowie das Vorkommen von Moordistricten pflanzengeographisch die grösste Beachtung verdient, so ist es in gleicher Weise betr. technischer und agronomischer Benutzung der Fall. Einen mittleren Gehalt von Humus findet man in manchen Niederungen und Sumpfdistricten, welche aber den hohen Gehalt an sehr fruchtbarem Bodenmaterial häufig erst durch entsprechende Entwässerung verwerthen lassen, wobei die nachfolgende Cultur auf die Gesundheit eines solchen Bodens für Ansiedlungszwecke selbst wieder günstig einwirkt.

Die Gemenge von fein vertheiltem Kalk mit Thon pflegt man im Allgemeinen als Mergel zu bezeichnen, je nach dem Vorwiegen des Thons oder Kalks als Thonmergel oder Kalkmergel, oder wenn Sand stark vertreten ist, als Sandmergel. Der Mergel ist in vielen geologischen Formationen vertreten und geht seine Bedeutung für den Boden auch daraus hervor, dass er häufig als ein wichtiges Meliorationsmaterial dem Boden künstlich beigemengt wird. Es würde von Interesse sein zu erfahren, ob und in welcher Ausdehnung solche Materialien Verwendung finden und welche Methoden dazu benutzt werden.

Aus dem Angedeuteten ergibt sich, dass bezüglich der Culturinteressen bei der Bodenfrage die gesammte Constitution der oberflächlichen geologischen Bildungen — der Culturboden ist nur das Product einer bestimmten geologischen Thätigkeit — in's Auge zu fassen ist, der Bestand aus gröberen und feineren Gemengtheilen, die Beschaffenheit beider und das Vorwiegen der einen oder andern nebst Angabe der Mächtigkeit. Es ist das quantitative Princip, was auch hier möglichst in den Vordergrund gestellt werden muss, dasselbe quantitative Princip, was bei den Flötlagerstätten des Bergbaues schon seit langer Zeit und naturgemäss Anwendung gefunden hat. Zugleich wird dadurch der wissenschaftlichen Geologie am meisten gedient. Es ist die möglichst genaue naturwissenschaftliche Kenntniss, nicht einseitig im Sinne der Nährstofffrage, sondern mit Bezug auf den Gesamtbestand und das gesammte Verhalten der oberflächlichen geologischen Bildungen, wodurch hier gleichzeitig der Geologie, der Pflanzengeographie und den praktischen Interessen des Lebens und der Landescultur genützt wird. Durch eine einseitige und oberflächliche Beurtheilung wird hier, wie überall, wenig gewonnen. Aus einer genauen Kenntniss des Bodens und seiner geologischen Grundlagen kann aber jeder Nutzen ziehen, welcher mit diesen Fragen zu thun hat, also vor allen Dingen der Landwirth.

II. Die landwirthschaftliche Cultur.

Die Natur der klimatischen Verhältnisse und der Bodengrundlagen ist wesentlich entscheidend für Pflanzenvegetation, thierische Entwicklung, das Leben und die Ansiedlung des Menschen, für welchen die vegetabilische Production direct oder dieselbe nach ihrem Umsatze in thierische Form für Ernährung und Bekleidung nicht entbehrt werden kann. Die dürren Kräuter der klimatisch trockenen Steppe setzen die Ueberführung in thierische Producte (abgesehen von der Arbeitsleistung durch Steppenthier) zur Verwendung für menschliche Zwecke voraus und die Karglichkeit der natürlichen Pflanzenproduction ist für manche Stellen derselben der entscheidende Grund für das seit Jahrtausenden übliche Nomadenleben, überall da, wo bestimmte einzelne Stellen das Material für die Ernährung der Heerden und

indirect also des Menschen nicht zu liefern vermögen. Bei günstigeren klimatischen und Bodenverhältnissen sind manche Steppengegenden für dauernde Ansiedelung und die eigentliche Cultur des Bodens wohl geeignet, während die ersteren genannten Districte, wie die turkmenische Steppe an der Ostseite des kaspischen Meeres, wegen extremer Trockenheit und Sommerwärme wahrscheinlich stets nur dem Nomadenleben eine Stätte zu bieten vermögen. Auch die Seltenheit der Süsswasserquellen setzt hier einer ausgedehnteren und dauernden Ansiedelung das grösste Hinderniss entgegen. Die Grösse des culturfähigen und des unculturfähigen Districts würde hier also nur durch eine sorgfältige und vorsichtige Erwägung zu ermitteln sein.

Der durch häufige Niederschläge beförderte reichliche Graswuchs auf vielen Bodenarten der höheren Gebirge, welche wegen des leichten Abschwemmens der Krume nur mit Gefahr der Pflugcultur unterworfen werden, ferner in vielen nassgründigen Thälern, in den feuchten Niederungen der Flüsse und an den Meeresküsten hat die natürliche und ausschliessliche Benutzung der Pflanzenproduction für Viehzucht an diesen Stellen nicht selten vorgeschrieben, ist sogar für die Entwicklungsrichtung der Viehracen daselbst, für manche anatomische Verhältnisse und besondere Eigenthümlichkeiten, namentlich reichliche Milchabsonderung, von besonderem Einflusse gewesen. Die schweizer und tyroler Alpen, die Niederungen an der unteren Weichsel, Elbe und Weser, an den deutschen und holländischen Nordseeküsten sind bekannte Beispiele hierfür. Es würde von Interesse sein, den bezüglichlichen geographischen Einfluss ähnlicher Gegenden an anderen Orten der Erde nach Uebereinstimmung oder Verschiedenheit zu erfahren.

Sowohl der üppige natürliche Pflanzenwuchs als der Wasserreichthum begünstigt in den genannten Gegenden die an bestimmte Stellen geknüpfte Ansiedlung und die Schwierigkeit in der Ueberwindung mancher Hindernisse, wodurch nicht selten Deichbauten, Dämme u. dergl. und eine ständige sorgsame Aufsicht und Instandhaltung erforderlich werden, schreibt die dazu nöthigen festen Wohnplätze sogar gebieterisch vor.

In dem Angegebenen liegt es auch begründet, dass nicht die Grösse der absoluten Fruchtbarkeit, wie von volkswirthschaftlicher Seite wohl behauptet ist, sondern die Leichtigkeit und Sicherheit der Production bei vielleicht absolut geringerer Fruchtbarkeit für die erste Ansiedlung und Bodencultur maassgebend gewesen sind. Für das, was wir in dieser Hinsicht für die hochcultivirten Länder aus der geschichtlichen Entwicklung und der Natur der Bodengrundlagen zu schliessen haben, sind gewiss in den weniger cultivirten Districten der Erde noch die vielfachsten Analogia vorhanden und würde es sich empfehlen, wenn Naturforscher und Statistiker auch diesem Gegenstande Aufmerksamkeit zuwenden wollten. Die genaue Kenntniss der Gegenwart wird auch auf diesem Gebiete — und ähnlich auf vielen andern — das beste und sicherste Material zum Verständniss geschichtlichen Wandens abgeben.

Die Frage nach dem Vorhandensein von absolutem Wald-, Wiesen- und Weideboden wird durch die Neigung und das Gefälle des Terrains, durch Grundnässe, Ueberschwemmungen und dergl. vielfach bestimmt, wenigstens so lange, als nicht der Mensch den natürlichen Gewalten künstlich Grenzen setzt, wodurch die fruchtbarsten Bodenarten für die Cultur gewonnen werden können. Namentlich die künstliche Entwässerung spielt in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle.

Für die Geschichte der Landwirthschaft und der Menschheit überhaupt ist die Kenntniss auch der rohesten Anfänge landwirthschaftlicher Cultur

von hohem Interesse und man sollte deshalb den einfachsten und ursprünglichsten Methoden des Ackerbaues nicht mindere Beachtung schenken als der schon mehr vervollkommenen Entwicklung desselben. Die Geschichte der Landwirthschaft beginnt schon sehr früh, schon in der Zeit, als noch keine Metalle in Gebrauch waren und die Pfahlbauten enthalten bereits die Reste verschiedener Getreidesorten, sogar von Feldunkräutern, ferner die Knochen verschiedener Hausthiere. Findet man in der Gegenwart in gewissen Erd-districten noch übereinstimmende Verhältnisse, resp. welches sind die vorhandenen Unterschiede? dies sind Fragen, welche den Culturhistoriker in hohem Grade interessiren, auch schon mehrfach zu verwerthen versucht sind.

Eine grosse Reihe anderer Fragen reiht sich an diese an.

Welches sind die Einnahmequellen aus Grund und Boden und welche haben einen anderen Ursprung? Sind jene oder letztere mehr vorwiegend? Wie weit bezieht sich dies auf die eigentlichen und direct verbrauchten Subsistenzmittel, wie weit wird der Tauschverkehr dabei in Anspruch genommen? Sind die Ansiedelungen mehr einzeln oder stehen die Wohnsitze in unmittelbarer Nachbarschaft? Existirt gemeinschaftlicher Besitz des Grund und Bodens, welcher periodisch vertheilt wird, oder ist privativer Besitz und selbständige Disposition des Einzelnen vorhanden? Welches ist die Art und Höhe der Abgaben, der Steuern, Naturallieferungen u. dergl., von wem werden sie auferlegt und erhoben? Welche Arten von Servituten und Berechtigungen existiren mit Bezug auf den Grund und Boden und den Besitz des Einzelnen? Wird beim Tauschverkehr bereits edles Metall oder welches andere Werthzeichen in Anwendung gebracht? Welches ist die Grösse der einzelnen landwirthschaftlich benutzten Parcellen, welches die Grösse des einzelnen Besitzes, event. des Gemeindebesitzes? Welches ist die Form der einzelnen Parcellen? Wie stellt sich das procentische Verhältniss von Ackerland, Wiese, Weide und Wald mit Bezug auf den Grund und Boden zu Gebäuden, Geräthen, Vieh u. dergl., welches ist die verhältnissmässige Zahl der darauf beschäftigten Menschen? Wie sind die verschiedenen Gebäude, wie die Geräthe beschaffen, wie zahlreich ist der Viehstapel und woraus ist er zusammengesetzt? Welche Viehracen sind überwiegend vertreten und am meisten nutzbar? Bearbeitet der einzelne Besitzer, resp. die betr. Familie ausschliesslich den eigenen Grund und Boden oder werden bereits Lohnarbeiter, resp. Sklavenarbeiter zu Hülfe genommen? Welches ist das Verhältniss der Lohnarbeiter resp. Sklavenarbeiter zu den Besitzenden, wie ist es entstanden und zu erklären? Existiren bestimmte Ordnungen (z. B. Dienstbotenordnungen) hinsichtlich der arbeitenden Classen oder welches ist die Observanz? Wie kann geschichtlich das Auftreten der Sklavenarbeit, welche man in den frühesten Culturperioden nicht selten findet, nachgewiesen werden? Welche Umwandlungsprocesse sind event. vorgekommen betreffend den Uebergang der Sklavenarbeit und der Frohndienste zur freien Arbeit? Welches ist die Art des Lohnaccords, welches die Ablohnungsweise, in Geld, Naturalien u. dergl., ist Zeitlohn oder auch Ablohnung nach Leistung (Accordlohn) vorhanden? Wie weit tritt Männerarbeit oder Frauenarbeit mehr in den Vordergrund, in welcher Weise wird die Kinderarbeit in Anspruch genommen?

Wird neben der Menschenarbeit auch thierische Arbeit benutzt, von welchen Viehgattungen und in welcher Ausdehnung? Beruht dies mehr in der Verwendung zum Lastentragen oder zum Zuge oder Beides? Wird neben der thierischen Zugkraft auch die Menschenkraft zum Ziehen von Spanngeräthen gebraucht? Welches ist bei den Thieren die Art der An-

spannung resp. Tragevorrichtung, welches sind die zugehörigen Geräthe, Transportwerkzeuge u. dergl.? Wie weit ist die Kunst für die Herstellung von Transportwegen schon in Anspruch genommen oder wie weit ist dies je nach dem vorhandenen Boden- und Steinmaterial nothwendig und möglich? Auf welche Entfernung müssen event. die landwirthschaftlichen Producte zu den Markorten transportirt werden? Oder in welchem Grade producirt die Bevölkerung dasjenige, was sie gebraucht, selbst?

Existirt ein gewisses Pachtverhältniss oder nicht, unter welchen Bedingungen, welchen Rechten und Pflichten des Pächters? Wird die Pachtquote in Bruchtheilen des Naturalertrags oder in bestimmt fixirten Naturalien oder in anderen Tauschmitteln abgegeben? Wie weit ist das sogenannte Halbpachtsystem verbreitet? Ist event. schon ein Pachtrecht vorhanden oder existiren dieserhalb bestimmte Observanzen?

Wie weit besteht überhaupt ein sogenanntes Agrarrecht, wie ist es entstanden, wie wird es weiter entwickelt?

Was nun speciell den landwirthschaftlichen Anbau der Culturpflanzen und die Thierzucht betrifft, so werden die wesentlichsten Gesichtspunkte für die Erforschung dieser Verhältnisse sich ebenfalls in einer Reihe von Fragen am einfachsten und präcisesten zusammenstellen lassen. Mit Bezug auf den

Pflanzenbau

würden folgende hervorgehoben werden müssen:

Welche verschiedenen Arten von Culturpflanzen werden angebaut, in welcher Ausdehnung und in welcher Folge? Welche kommen davon direct für menschliche Ernährung, welche als Futtermittel für das Vieh, welche für Handelszwecke und technische Verwendung in Betracht? Ist eine bestimmte Feldrotation der Culturgewächse vorhanden oder werden sie im Urwechsel einige Jahre angebaut und das Feld nachfolgend der natürlichen Benarbung überlassen, wenn Erschöpfung oder das Ueberhandnehmen der Feldunkräuter der Pflanzencultur eine Grenze setzt? Welches sind event. die verschiedenen und die gefährlichsten Feldunkräuter und welche Hilfsmittel werden zu ihrer Bekämpfung in Anwendung gebracht?

Werden in einem Jahre eine oder mehrere Culturpflanzen gebaut, in welche Jahreszeit fällt die Saat, die Hauptentwicklung und die Ernte?

Welche Methoden werden für die Bestellung benutzt, welche Geräthe und mit welcher Arbeitskraft? Ist neben dem Pflug oder Haken, dessen wirksamen Theil man im Wesentlichen als einen Keil zum Aufreissen und Wenden des Bodens aufzufassen hat, noch die Egge, die Schleife, die Walze u. s. w. im Gebrauch oder mit welchen Instrumenten begnügt sich der Ackerbau? Ist geschichtlich in dieser Hinsicht vielleicht ein Fortschritt zu verzeichnen oder fehlt es an jeder Entwicklung? Welches ist die Form des Pflugs, wie wird das Schaar befestigt, welche Materialien werden bei dem Instrument verwendet? Eine möglichst genaue Zeichnung resp. Photographie der wichtigsten Ackergeräthe würde in vielen Fällen erwünscht, in einzelnen sogar die Einsendung von Original Exemplaren von Interesse sein. Wie bei Culturpflanzen, Ackerunkräutern, Viehracen u. dergl. würden auch mit den Ackergeräthen event. geschichtliche Schlussfolgerungen mit Bezug auf Veränderung von Wohnsitzen und örtliche Bewegungen in Verbindung gebracht werden können.

In welcher Weise und Folge werden die verschiedenen Feldinstrumente in Anwendung gebracht, sowohl die Gespanngeräthe als die Handwerkzeuge,

und treten letztere oder jene mehr in den Vordergrund, mit welcher Sorgfalt geschieht die Bestellung, wie wird der Samen ausgesät, mit der Hand oder mit Geräthen, breitwürfig oder in Reihen, gedrillt oder gedibbelt (in fortlaufenden Reihen oder in regelmässigen Abständen innerhalb der Reihen), wie wird der Samen bedeckt, in welcher Tiefe, mit welchen Instrumenten?

Werden Düngermaterialien irgend welcher Art, namentlich die menschlichen und thierischen Excrete, benutzt und in welcher Weise werden sie event. dem Boden beigemischt? Wenn nicht, werden dieselben anderweit verworthen (zum Brennen etwa) oder überhaupt nicht genutzt? Wie kann dies im letzteren Falle begründet werden und in welcher Beziehung steht es zu den gesammten wirthschaftlichen Verhältnissen der Gegend? Ist event. im Falle des Nichtersatzes der Pflanzennährstoffe eine erhebliche Abnahme der Fruchtbarkeit eingetreten? Wie weit entspricht etwa, wenn man specieller auf die durch Liebig angeregten Fragen eingehen will, der Ersatz an Pflanzennährstoffen durch die Düngung der Entnahme durch die Ernten? Letztere Erörterung kann naturgemäss nur in cultivirten Districten und bei schon vorliegenden analytischen Zahlen stattfinden.

Welche Hülfsmittel werden ausserdem für die Förderung der Cultur in Anspruch genommen, findet namentlich Zwischenbearbeitung während der Vegetation, mit Hülfe der Hand oder mit Spanngeräthen statt, wird Bewässerung angewendet, in welcher Weise, Ausdehnung und Wiederholung, mit welchen Hebe- oder Transportvorrichtungen?

Welches sind die wichtigsten Pflanzenkrankheiten und thierischen Feinde, von welchen die Culturpflanzen zu leiden haben, treten dieselben mehr einzelt oder regelmässig auf und unter welchen Verhältnissen werden sie am meisten nachtheilig? Kann event. ein Fortschreiten in der verheerenden Wirkung der genannten Schädlichkeiten nach einer Richtung hin wahrgenommen werden und in welchem Grade ist dies der Fall? Aus Ohio in Nordamerika wird berichtet, dass daselbst ein Käfer (*Doryphora decemlineata* Say) an den Kartoffeln erheblichen Schaden thut und in allmähligem Fortschreiten nach Osten hin begriffen ist, so dass man annimmt, er werde gegen das Jahr 1880 an der Küste des atlantischen Oceans angekommen sein. Bei den vielen internationalen Beziehungen der Gegenwart, wodurch eine Uebertragung in ferne Gegenden und auch nach Europa leicht möglich wird, verdient eine solche Erscheinung die eingehendste Beachtung.

Da die den Pflanzen nachtheiligen thierischen Feinde, besonders manche Insecten und die zugehörigen Larven, sich der oberflächlichen Beobachtung leicht entziehen, überhaupt nicht selten verhältnissmässig klein sind, so werden sie oft nur durch ganz besondere Aufmerksamkeit wahrgenommen werden können. Es empfiehlt sich, dabei sowohl das Aeussere der Pflanze als die innern Theile, (namentlich bei kränkenden Gewächsen) sowohl die oberirdischen als die unterirdischen Organe, und da sich manche Thiere bei Tage verstecken, auch die Nachtzeit in's Auge zu fassen, auch, wenn möglich, eine hinreichende Anzahl von Exemplaren zu sammeln und zum Theil trocken, zum Theil in Spiritus aufzubewahren.

Die eigentlichen sogenannten Pflanzenkrankheiten beruhen grossentheils auf den Wucherungen von Pilzen, deren genauere Beschaffenheit bei ihrer mikroskopischen Kleinheit nur mit stark bewaffnetem Auge erkannt werden kann. Besonders die Rost- und Brandpilze treten häufig nachtheilig auf und sind auch verhältnissmässig leicht zu erkennen. Die Pilzwucherungen kommen sowohl an oberirdischen als an unterirdischen Organen, an der Oberfläche wie im Innern der Pflanze vor, zum Theil sind sie, wie beim Stein-

brand des Weizens (*Tilletia caries* und *Tilletia levis*) und dem Mutterkorn des Roggens (*Claviceps purpurea*), haupts. an bestimmte Stellen der Pflanzen geknüpft, zum Theil kommen sie gleichzeitig oder nach einander an verschiedenen Pflanzenorganen vor, wie es bei der durch *Peronospora infestans* hervorgerufenen Kartoffelkrankheit am Kraut und an den Knollen bekannt ist.

Ebenso wie ein Herbarium mit den eingelegten typischen Culturgewächsen, ferner Acker-, Wiese-, Weide- und Holzunkräutern für die verschiedenen Gegenden der Erde ein sehr werthvolles Material zur Vergleichung abgiebt, so ist es auch erwünscht, dass eine grössere Zahl von derartigen befallenen Pflanzen aufgenommen und entweder zu einem pathologischen Herbarium eingelegt oder, wie bei manchen wasserreichen Pflanzentheilen, in Spiritus gethan werde, um zu näherer Vergleichung der pflanzenpathologischen Verhältnisse und der zugehörigen Pilzspecies dienen zu können. Es ist, wie im Pflanzen- und Thierreich überhaupt, so namentlich auch bei diesen kleinsten Organismen von grossem Interesse; zu wissen, wie weit auf der Erdoberfläche Constanz oder Variabilität vorhanden ist, resp. die gegenwärtigen Grenzen in der Entwicklung des organischen Lebens festzustellen. Es ist von besonderem Werthe, zu erfahren, ob und wie weit äussere naturgesetzliche Verhältnisse hierauf von Einfluss sind.

Dies ist die wissenschaftliche Seite dieser Frage. Was in praxi die nachtheiligen Wirkungen der vegetabilischen und thierischen Feinde bei den Culturpflanzen betrifft, so ist es wünschenswerth, annähernd den Grad des Schadens festzustellen und zu constatiren, ob, mit welchen Hilfsmitteln und mit welchem Erfolge dagegen angekämpft wird. Betreff eingehenderen Studiums dieser Verhältnisse wird auf die bezüglichlichen im Anhang genannten Werke hingewiesen.

Es schliessen sich hieran die Fragen bezüglich der Ernte der landwirthschaftlichen Culturpflanzen, über den Zeitpunkt der Reife, die Erntemethode und die dazu angewendeten Geräthe, Handarbeit oder Maschinenarbeit, Dreschmethode, Aufbewahrung u. dergl. Es ist zuweilen bereits periculum in mora, wenn man dem Vorschreiten neuerer Culturmethoden gegenüber die ursprünglichen Verhältnisse feststellen will. Die Maschinenarbeit concurrirt bereits in manchen Gegenden der Erde mit der Handarbeit und der rohen Arbeitsverwendung und hat die Kenntniss dieser Verhältnisse und der Erntegeräthe häufig auch mit Bezug auf die Geschichte Interesse. Kann man die Stärke der Aussaat auf die Flächeneinheit und die Höhe des Erntertrags ermitteln, so ist dies von besonderem Werthe und liefert eine Illustration zu den üblichen Verkaufs- resp. Pachtpreisen des Grund und Bodens.

Eine weitere Beachtung verdient die verschiedene Verwendung der Producte des landwirthschaftlichen Pflanzenbaues für Ernährung oder für Bekleidung, für Bereitung von alkoholhaltigen Getränken, von Zucker, Stärke und dergl., sowie die dazu in Gebrauch befindlichen Methoden und Geräthe.

Die bez. Fragen über die

Viehhaltung

einer Gegend werden kürzer zusammengefasst werden können. Namentlich würden nachstehende zu erwähnen sein:

Welches sind die verschiedenen zum landwirthschaftlichen Betriebe gehörigen Viehgattungen, werden sie als „Hausthier“ oder mehr in wilder nomadenartiger Weise behandelt, in welchem Verhältniss werden sie als „Nutzvieh“ oder für Arbeitsleistung verwendet? Sind die Viehracen aus anderen

Gegenden eingewandert oder werden sie seit undenklichen Zeiten an Ort und Stelle fortgezüchtet und ist in dieser Hinsicht ein Fortschritt oder ein Gleichbleiben der Verhältnisse wahrzunehmen?

Welches sind die charakteristischen Eigenthümlichkeiten der einzelnen Viehracen nach Bau, Grösse, Farbe und Leistung? Wie verhält sich der Umfang des Rumpfes zu seiner Länge, wie die Entwicklung des Rumpfes zu Kopf, Hals und Beinen? Welche Beziehungen findet man zwischen Grösse und Eigenthümlichkeit der Racen und bestimmten örtlichen Verhältnissen, Niederung, Gebirgsgegend, Boden und geologischer Formation? Welches ist etwa das durchschnittliche lebende Gewicht? Es wird dasselbe allerdings häufig nur schwierig festzustellen sein. Wie ist die Beschaffenheit und Farbe der Haut und Behaarung, wie die Leistungsfähigkeit je nach den Thiergattungen zum Ziehen und Reiten, für Fleisch-, Fett-, Milch- und Wollproduction? Dieselben Thierracen zeigen hiernach die grössten Verschiedenheiten, zum Theil mehr oder weniger durch die geographischen Verhältnisse begründet, zum Theil durch die Kunst der Züchtung entwickelt oder modificirt und die Hausthiere bieten deshalb die interessantesten Beispiele für die Lehre von der Variabilität thierischer Organismen, ähnlich wie dies auch bei den Culturpflanzen in hohem Grade wahrgenommen werden kann. Die Beobachtungen und Versuche von Darwin und Nathusius beweisen, ein wie reiches und werthvolles wissenschaftliches Material sich auf diese Weise gewinnen lässt und die Verschiedenheit der Hausthierracen auf der Erde im Zustande der Wildheit und der Domestication verdient deshalb die grösste Aufmerksamkeit und das eingehendste Studium, ausser für den Landwirth, auch für den Zoologen, Physiologen und Geographen. Ausser den Weichtheilen ist es namentlich das Skelett und Knochengerüst, welches viele Vergleichungspunkte darbietet und die Beschaffung eines vollständigen Skeletts oder wenigstens eines Schädels ist deshalb in vielen Fällen sehr erwünscht. Kleinere Stücke der Haut (nebst Haaren) würden ausserdem in der Regel leicht beschafft und trocken oder in Spiritus aufbewahrt, bei Schaafen auch Wollproben (möglichst mit erhaltenem Stapel und in 3—6 Centimeter Durchmesser dicht über der Haut abgeschoren) von verschiedenen Körperstellen (Vorderrücken, Seite, Bauch, Keule, Schwanz, Hals) leicht entnommen und in Gläsern oder in dichtem Papierverschluss vor Motten geschützt versendet werden können. Die Vergleichung des Skeletts bei den verschiedenen Hausthieren hat auch historisch nicht selten Werth, zumal dann, wenn in einer Gegend prähistorische derartige Ueberreste gefunden werden und dazu in Beziehung gesetzt werden können.

Eine weitere bemerkenswerthe Frage ist, wie weit die Kunst der Thierzucht, Auswahl der Racen für bestimmte Zwecke, entsprechende Paarung, Aufzucht und Ernährung überhaupt entwickelt sind. Werden hier überhaupt schon bestimmte und bewusste Zwecke verfolgt oder kann von einer regelmässigen künstlichen Einwirkung überhaupt noch nicht die Rede sein?

Werden die Individuen zur Paarung einander bestimmt zugetheilt, sind besondere Einrichtungen zur Verwendung vorzüglicher männlicher und weiblicher Thiere und zum Ausschliessen des schlechteren Materials vorhanden (Körordnungen, Landgestütwesen und dergl.) oder lässt man die Natur, wie in grossen Heerden und in der Nomadenwirthschaft, den natürlichen Neigungen und den materiellen geographischen Verhältnissen entsprechend, freischaalen und walten? Leben die Thiere das ganze Jahr im Freien oder sind besondere Ställe vorhanden und in welchen Jahreszeiten werden sie darin untergebracht? Namentlich für die jungen Thiere ist der Aufenthalt

und die Bewegung im Freien gegenüber dem Leben in den Ställen von besonderer Bedeutung für die Entwicklung, nicht blos bei Arbeitsvieh.

Welches sind die Futterstoffe, womit die verschiedenen Viehgattungen im Sommer und im Winter, auf der Weide und im Stalle, in kalter und warmer, trockener und nasser Jahreszeit ernährt werden? Wie lange erhält das säugende junge Thier die volle Milch, nach welcher Zeit und auf welche Weise wird dasselbe abgesetzt und an anderes Futter gewöhnt? Wie weit wird auf eine kräftige rationelle Fütterung im ersten Lebensjahre, wovon die spätere Entwicklungsrichtung und Grösse in so hohem Grade bedingt wird, Werth gelegt? Werden überhaupt bei der Ernährung der Thiere die Futtermittel in bestimmtem Verhältnisse und nach bestimmten zu Grunde liegenden Anschauungen zugetheilt? Und in welcher Weise etwa für Jungvieh, Mast-, Milch-, Woll- und Arbeitsvieh? Welches ist der Marktpreis der einzelnen Futtermittel (wird in grösseren Städten zu ermitteln sein) und wie gross ist die tägliche Futterration?

Welches ist die tägliche oder jährliche Leistung oder Nutzung pro Stück der einzelnen Viehgattungen, nach Quantität der Producte, resp. nach Geldwerth? In welcher Lebenszeit ist die Hauptnutzungsperiode, auf welches Alter fallen in der Regel das erste oder die ersten Jungen, wie viel Junge können auf die Mutter durchschnittlich in verschiedenen Malen gerechnet werden, wann und nach welchen Rücksichten werden die Thiere ausgemerzt, zur Schlachtbank gebracht und dergl.? Welches ist eventuell der Milch- und Woll-, der Fleisch- und Fettertrag per Stück, wie verhält sich das Schlachtgewicht (4 Viertel incl. Nierenfett) zum lebenden Gewicht, in welchem Alter und in welchem Mastzustande werden die Thiere zur Schlachtbank gebracht? Welches ist der Preis von 1 Kilogramm Fleisch, Talg, Speck, Wolle, von 1 Liter Milch, von 1 Kilogramm Butter und Käse? Wie weit wird die Milch als solche oder nach der Verarbeitung zu Butter und Käse verkauft? Welche Preisbewegung ist überhaupt betr. die wichtigsten landwirthschaftlichen Producte für Ernährungs- und Bekleidungs Zwecke vorhanden und wie weit lässt sie sich historisch nachweisen? Werden die landwirthschaftlichen Erzeugnisse vom Landwirth direct verwerthet und in welcher Form event. in den Handel gebracht? Welches sind die technischen Gewerbe, welche mit dem landwirthschaftlichen Betriebe in Verbindung stehen und wie weit werden sie vom Landwirth selbst betrieben? Welches sind die Erträge aus derartigen technischen Gewerben und in welcher Beziehung stehen sie zu den übrigen landwirthschaftlichen Einnahmequellen? Welche Producte liefern sie etwa an den eigentlichen landwirthschaftlichen Betrieb zurück und in wie weit stellen sie sich dazu mehr oder weniger günstig?

Betreff der Thierzucht sind noch die Krankheiten der Hausthiere zu erwähnen, deren zum Theil internationale Verbreitung, unterstützt durch leichtere Transportwege, durch rascheren und häufigeren Verkehr in der neueren Zeit, analog wie bei menschlichen Krankheiten, mit gutem Grund die Aufmerksamkeit der Wissenschaft wie der Verwaltungsbehörden in Anspruch genommen hat. Es ist namentlich die Frage nach der spontanen selbständigen Entstehung einzelner sehr gemeinschädlicher Krankheiten resp. nach der durch Ansteckung bewirkten Verbreitung, welche in der neueren Zeit vielfache Beachtung gefunden, Krankheiten, welche, wie Rinderpest u. a. bei häufigem Vorkommen das Nationalvermögen erheblich zu schädigen vermögen, wie das grosse russische Reich alljährlich, Deutschland im Kriegsjahre 1870/71 empfindlich genug erfahren hat. Wird die Rinderpest, wie die Cholera, periodisch uns aus Asien zugeführt, überwintert sie

bei uns oder kann sie sogar spontan sich bei uns entwickeln? ist für die Wissenschaft dieser rapide und ungewohnt sich verbreitenden Krankheit und die Gesetzgebung eine gleich wichtige Frage und sie mag darauf hinweisen, wie man speciell auch im praktischen Interesse Werth darauf zu legen hat, die Pathologie des animalischen Lebens, nicht bloss die verheerend und epidemisch auftretenden Seuchen, über die ganze Erde kennen zu lernen. Ist es möglich, im naturwissenschaftlichen Sinne, analytisch oder synthetisch, mit allen nothwendigen Hilfsmitteln diesen Fragen näher zu treten, so ist dies am werthvollsten und bei den vielen internationalen Beziehungen haben die Staaten nicht selten Ursache, alle Mittel in Anwendung zu bringen, um den Heerd und eigentlichen Grund einzelner Krankheiten zu ermitteln. Besondere pathologische Stationen, an der richtigen Stelle angelegt, würden hierfür ihre besondere Bedeutung haben.

Aber auch schon die Statistik der Krankheiten nach Oertlichkeit, Entstehung, Verbreitung, Sterblichkeit u. dergl. in Beziehung zu den übrigen geographischen Verhältnissen ist von sehr grossem Werthe, nur würde es nothwendig sein, dass die Krankheiten als solche bestimmt erkannt sind.

Literatur.

- Humboldt, Kosmos. Erster Band. Stuttgart und Tübingen 1845.
 Berghaus, Physikalischer Handatlas. Gotha 1849—1851. Abth. I. II. III. V. VI.
 Dove, Meteorologische Untersuchungen. Berlin 1837.
 Lorenz-Rothe, Klimatologie. Wien 1874.
 Hagen, Wasserbaukunst. Erster Theil. Die Quellen. Erster Band. Berlin 1869.
 Bischof, Lehrb. der chemischen und physikalischen Geologie. 3 Bde. Bonn 1863—66.
 Girard, Grundlagen der Bodenkunde. Halle 1868.
 Fallou, Pedologie. Dresden 1862.
 Orth, Geognostische Durchforschung des schlesischen Schwemmlandes. Berlin 1872.
 Cotta, Deutschlands Boden. 2 Bände. Leipzig 1858.
 Grisebach, Die Vegetation der Erde. 2 Bände. Leipzig 1872.
 Liebig, Agriculturchemie. 2 Bände. Braunschweig 1865.
 Liebig, Chemische Briefe. Leipzig und Heidelberg 1865.
 Koppe, Unterricht im Ackerbau und in der Viehzucht. Berlin 1873.
 Boussingault, Economie rurale. 2 Bände. Paris 1849.
 Stephens, book of the farm. London.
 Hamm, Das Wesen und die Ziele der Landwirthschaft. Jena 1872.
 Sprengel, Meine Erfahrungen im Gebiete der allgemeinen und speciellen Pflanzen-Cultur. 3 Bde. Leipzig 1847—1852.
 Darwin, Variation of animals and plants under domestication. 2 Bde. London 1868.
 H. v. Nathusius, Vorträge über Viehzucht und Racenkenntniss. Berlin. Mehrere Theile.
 Settegast, Die Thierzucht. Breslau 1869.
 Kühn, Die Krankheiten der Culturgewächse. Berlin 1859.
 Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Berlin 1874.
 Taschenberg, Naturgeschichte der wirbellosen Thiere, die in Deutschland den Feld-, Wiesen- und Weide-Culturpflanzen schädlich werden. Mit 7 colorirten Tafeln. Leipzig 1865.
 Nördlinger, Die kleinen Feinde der Landwirthschaft. Stuttgart 1869.
 Haubner, Die innern und äussern Krankheiten der landwirthschaftlichen Säugethiere. Berlin 1873.

Linguistik.

Von

H. Steinthal.

Der Reisende vergesse niemals die Hauptregel, dass seine Aufgabe für die Reise nur ist: Material zu sammeln, das später in Musse von ihm selbst oder von Anderen wissenschaftlich bearbeitet werden soll. Er hat Thatsachen zu beobachten und darzustellen.

Dazu gehören offene Sinne und ein offener Geist, die allem Beachtenswerthen zugänglich sind und das Gegebene treu und scharf auffassen; und dann ist für eine deutliche und unverfälschte Mittheilung zu sorgen.

Die folgenden Bemerkungen sollen Winke geben, worauf man bei der Beobachtung von Sprachen, Sinn und Geist besonders zu richten hat, um reine und so sehr als möglich zuverlässige Thatsachen aufzunehmen. Es ist freilich unmöglich, dem Reisenden, der noch unbekannte Gebiete entdecken oder unvollkommen Bekanntes besser kennen lernen soll, zu sagen, was ihm begegnen werde; wir bieten ihm hier keinen Führer. Indessen, die Beobachtung wird um so schneller zu zuverlässigen Ergebnissen gelangen, je mehr man die verschiedenen Möglichkeiten, deren eine als Wirklichkeit eintreten wird, sich klar gemacht hat. Die Natur seiner Aufgabe soll der Reisende kennen, und gewisse Fragen, deren Beantwortung gewünscht wird, sollen ihm an's Herz gelegt werden. Auch mag er sich vor Missgriffen warnen lassen.

Der Reisende glaube nur nicht, dass er sich, ohne Sprachforscher zu sein, nicht um Erforschung von Sprachen kümmern könne. Abgesehen davon, dass jede Bildung auf Grammatik beruht, dass zumal unsere Gymnasialbildung einen wesentlich philologischen Zuschnitt trägt, ist für die Linguistik, wie sie heute liegt und nothwendig noch lange liegen wird, jeder Beitrag willkommen. Der Reisende fürchte namentlich nicht, dass er schon Bekanntes notire. Denn gesetzt, dass seine Notizen unsere Erkenntniss nicht erweitern, so ist es schon ein Gewinn, durch dieselben die früheren Angaben bestätigt zu finden. Noch weniger misstraue der Reisende seiner Fähigkeit, in der rechten Weise Sprachliches zu notiren, wenn er nur das Folgende beherzigen will.

Zur Lautlehre.

Zunächst ist die Sprache ein Object für das Ohr. Bekannt ist, wie jede fremde Sprache, die wir zum ersten Male hören, derartig an dem Ohre vorüberauscht, dass wir kaum ein Wort, ein Lautgebilde, zu erfassen vermögen; sie scheint uns schneller gesprochen als unsere Muttersprache. Das ist eine Täuschung, die Niemanden entmuthigen wird, die bald schwindet.

Reisende, welche aus solchen Gegenden Deutschlands stammen, in denen die sogenannten harten und weichen (stummen und tönenden) Laute nicht unterschieden werden (*b* und *p*, *d* und *t*, *g* und *k*, *j* und *ch* in *ich*, summen- des *s* und zischendes *ß*) haben in diesem Punkte Organe und Ohr besonders zu üben. Ein gutes Mittel, die weichen Buchstaben richtig sprechen zu lernen, ist es, vor denselben einen Nasal auszusprechen: Ende, Enge, Ense, Ambos. Es ist auch für solche Laute, die in unseren europäischen Sprachen nicht üblich sind, wichtig, sie gut aussprechen zu lernen; denn das Ohr nimmt die Laute um so leichter und sicherer in voller Richtigkeit auf, je mehr die eigenen Organe dieselben ebenfalls zu erzeugen befähigt und gewöhnt sind.

Deswegen ist es rathsam, sich in der Aussprache der Wörter der fremden Sprache zu üben und sogar die ganz eigenthümlichen Laute derselben erzeugen zu lernen.

Mit unserem deutschen Alphabet lassen sich selten sämmtliche Laute einer fremden Sprache schreiben. Der Reisende wird also wohlthun, wenn er sich das allgemeine linguistische Alphabet aneignet, das wir hier folgen lassen. Er schrecke vor der Menge der diakritischen Zeichen nicht zurück; er wird nur wenige davon brauchen; wir aber müssen für alle Sprachen sorgen.

Die Vocale.

a in dem Deutschen *hat, That.*

ē " " " *Bär, fett; frz. è.*

e " " " *Weh, frz. é.*

i " " " *wir, mit.*

o " " " *Mond, ohne.*

ō " " " *Sonne; frz. or; engl. what, naught.*

u " " " *gut, Kuss.*

ō " " " *Hörner; frz. peur, heurter.*

o " " " *König; frz. peu.*

ū " " " *Thür, dürr; frz. sûr, sur.*

ai " " " *Kaiser, Eisen.*

au " " " *Haut.*

au " " " *Häute, heute.*

ei im Deutschen nicht vorhanden; spanisch *reina.*

oi " " " " engl. *join.*

e bezeichnet den dumpfen Vocal der deutschen Vor- und besonders Endsilben, z. B. *begraben.* In manchen Sprachen können die Nasalen und Liquiden ohne bestimmten Vocal Silben bilden; in diesem Falle gebe man ihnen den kleinen Kreis statt eines Vocals: *ṛ, ṁ, ṛ, ḷ*, welche gleichbedeutend sind mit *en, em, er, el.* Letztere Schreibung mag zuweilen vorzuziehen sein, um etwa einen Accent darüber setzen zu können.

Die Consonanten.

A. Explosivae.

a. Fortes.

k in dem deutschen *Kopf*.
ḳ assibilirtes *k*, fast deutsches *kj*.

t in dem deutschen *Topf*.
ṭ die Zungenspitze wird aufwärts gebogen und mit der unteren Seite an den Gaumen gelegt.
t̥ der Rücken der Zunge legt sich in seiner ganzen Breite an den Gaumen, während die Spitze nach unten gebogen ist.

p wie in *Palme*.

b. Lenes.

g, ǵ, d, ḏ, ḑ, b die vorigen Laute weich (mit Intonation) gesprochen.

B. Fricativae.

a. Fortes.

h wie in dem deutschen *Hut*.
χ wie das deutsche *ch* in *Buch, ach*.
χ̣ " " " " " *ich*.
š wie das deutsche *sch*, frz. *ch*.
s wie in dem deutschen *das*, frz. *si*.
ṣ̌ ein *sch*, das sich in der Weise seiner Aussprache an *ṭ* anschliesst, wie *ṣ̌* ein solches, das enger zu *ḳ* gehört.
ṣ ein *s*, das sich in der Weise seiner Aussprache an *t̥* anschliesst.

θ das interdentale *s*, das gelispelte scharfe *th* der Engländer.

f wie im Deutschen.

b. Lenes.

γ das (intonirte) weiche *χ* von *ach*, wie das *g* provinziell in Deutschland oft gesprochen wird in *Wagen, sagen*.
y wie im Englischen, also wie deutsches *j*.
ž das weiche *š*, frz. *j*.
z das weiche summende *s*, das frz. *z*.
ð das weiche englische *th* in *the, thy*.
v wie im Französischen.
w wie im Englischen.

C. Liquidae.

r der reine Zungen-Zitter-Laut, wie er besonders in Ostpreussen und überhaupt von den Deutschen in den slavischen Ländern (Russland, Polen) gesprochen wird.
ṛ das gutturale oder sogenannte schnarrende *r*, welches durch das Gaumenzäpfchen gebildet wird, während die Zunge ruht. Bei *γ* dagegen liegt die Zunge am Gaumen, wie bei *χ* und *y*.
l wie im Deutschen.
ḷ das mouillirte *l* der romanischen Sprachen, frz. *mouillé*.
ṛ, ḷ analog den *ṭ, ḏ = r, l : ṭ, d*.

D. Nasales.

ṇ wie das deutsche *ng* in *eng* (*yüṇe* = junge, *yüṇgesel* = junggesell).
ṇ das mouillirte *n*, wie *gn* im frz. *régner*.
n und *ṇ* gehören zu *t* und *ṭ*.
m wie im Deutschen.

Eine ausführliche Darstellung dieses linguistischen Alphabets nebst dessen Anwendung auf den grössten Theil der bisher bekannten Sprachen giebt

Lepsius, das allgemeine linguistische Alphabet. Berlin 1855, und desselben, Standard Alphabet, second ed. London and Berlin 1863.

Jedes Volk hat in der Erzeugung der Laute seine Eigenthümlichkeit, und es ist weder nöthig noch möglich, dieselbe zu bezeichnen. Der Reisende merke sich nur dieselbe, sowohl überhaupt, als für besondere Laute, und zeichne an Ort und Stelle auf, nicht nur wie ein besonders eigenthümlicher Laut das Gehör berührt, sondern auch in welcher Weise er durch die Organe erzeugt wird. Zu letzterem wäre freilich die Kenntniss der Physiologie der Laute erforderlich. Die einschlägigen Arbeiten von Brücke, Merkel und Max Müller (in seinen „Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache“, zweite Reihe) sind hier zu empfehlen. Für die mehr praktischen Zwecke könnte es genügen, Folgendes zu beachten.

Es kann im Allgemeinen keine Schwierigkeit machen, Vocale und Consonanten, harte und weiche Consonanten, Explosive und Fricative (also z. B. *a* und *k*, *k* und *g*, *k* und *χ*) von einander zu unterscheiden. Auch ob *t* oder *ʈ* oder *ʈ̣* gesprochen wird, lässt sich leicht an der Zunge merken. Schwierigkeit machen nur die ganz im Hintergrunde des Mundes gesprochenen Laute, z. B. die Unterscheidung von *γ* und *ʀ*, Modificationen des *h* und des *k*. Der Reisende sehe zu, was er mit Sicherheit beobachten kann.

Ein anderer Punkt ist der Einfluss der Nase auf die Natur der Laute. Nämlich bei den harten wie bei den weichen Consonanten und auch bei den reinen Vocalen wird die Nasenhöhle von der Mundhöhle (durch das Gaumensegel) abgeschlossen. Der Athem oder die Stimme dringt folglich durch den Mund und gelangt gar nicht in die Nase; diese bleibt vielmehr ganz unberührt. Wird dagegen die Nasenhöhle von der Mundhöhle nicht abgeschlossen, so dringt die Stimme durch beide Höhlen, und beide tragen zur Gestaltung des Lautes bei. So entstehen, bei offener Mundhöhle, die nasalirten Vocale, die frz. *en*, *in*, *on*, *un*, bei geschlossener Mundhöhle die nasalen Consonanten *m*, *n* und *ñ*.

Die linguistische Schreibung der Nasalirung der Vocale geschieht durch das Zeichen *~* über dem Vocal, also *ã* (frz. *en*), *õ* (frz. *on*) u. s. w. Es besteht also ein wesentlicher Unterschied zwischen *ẽ* und dem deutschen Worte *eng*, welches linguistisch *eñ* geschrieben würde; zwischen *ã* und dem Schlusse des deutschen *bang* (linguistisch *bañ*). In den genannten deutschen Wörtern ist ein reiner Vocal, auf den ein nasaler Consonant folgt, und während letzterer gesprochen wird, ist die Mundhöhle (am Gaumen) ebensowohl wie bei *n* (am oberen Zahnfleisch) geschlossen. Das frz. *en*, *on* dagegen besteht lediglich aus einem Vocal, ohne von irgend einem Consonanten begleitet zu sein, und die Mundhöhle bleibt bei der Aussprache offen. Da der Vocal *a* so gesprochen wird, dass dabei die Zunge in der natürlichen Lage bleibt und sich dem Gaumen gar nicht nähert, die Silbe *ang* aber ein Anlegen der Zunge an den Gaumen erfordert, so giebt Toussaint-Langenscheidt ein ganz richtiges Mittel an, um zu prüfen, ob man den nasalirten Vocal *ã* richtig spreche: „Man nehme einen leichten länglichen Gegenstand, etwa einen Federhalter oder Bleistift, trete damit vor einen Spiegel, öffne den Mund weit, bringe den Stift so tief in den Mund hinein, als man es vertragen kann, und lasse ihn auf der Zunge ruhen. Nun spreche man *ã* forttönend aus; bewegt sich der Bleistift dabei auch nur im geringsten, so ist der Nasallaut falsch; bewegt er sich nicht, so ist er richtig.“

Zu Bedenklichkeiten können auch die mouillirten oder assibilirten Consonanten Veranlassung geben, indem sie zwar ursprünglich, und rein gesprochen, einfache Consonanten bilden, gar leicht aber einen unbestimmten Charakter

annehmen, und endlich sogar zu einer Consonantengruppe auseinandergehen. So schwankt *k* hinüber zu *t'* und geht auseinander in *kj* oder *tj*, wird sogar *tš*, wie *g'* zu *dž* wird. Dann mögen grammatische Verhältnisse entscheiden, ob man *k* oder *tš* schreiben solle.

Jede Sprache hat zwar ihre eigenthümliche Lautfärbung, die aber in dem Munde der einzelnen Personen besondere Schattirung annimmt. Wenn der Reisende Gelegenheit hat mit mehreren und vielen Personen eines Volkes zu verkehren, so wird er bald finden, was den Einzelnen und was der Gesamtheit angehört. Der Sprachwissenschaft kann zuweilen an der Färbung eines Lautes im Munde des ganzen Volkes viel liegen; und darum achte der Reisende darauf. Doch kann es genügen, solche Modification eines Lautes im Allgemeinen anzugeben; es bedarf für dieselbe nicht eines besonderen Schriftzeichens. Nur wenn sich herausstellt, dass ein Laut in bestimmten Wörtern so und in bestimmten anderen Wörtern anders gefärbt ist, würde es gut sein, dies irgendwie anzugeben. Zur Erleichterung für die Praxis des Schreibens kann es dienlich sein, für die Unterscheidung zweier einander nahe stehender Laute nur den seltneren von beiden mit einem diakritischen Zeichen zu versehen. Dadurch wird das linguistische Alphabet sehr vereinfacht. Hat z. B. eine Sprache nur den Vocal *e*, so kann man ihn kurzweg *e* schreiben und ein für allemal bemerken, dass *e* den Werth von *e* haben solle; besteht dagegen *e* neben *e* und wird bald dieses, bald jenes gesprochen, so ist zwar die Unterscheidung unerlässlich, aber es genügt, den seltneren Laut zu bezeichnen.

Nur in einer oder in wenigen Sprachgruppen vorkommende Laute, wie etwa die Schnalzlaute im südlichen Afrika, schreibe der Reisende entweder so wie Andere vor ihm diesen Laut in den verwandten Sprachen geschrieben haben, wenn ihm das bekannt ist, oder er erfinde für sich ein beliebiges Zeichen, etwa *l* oder *x*.

Die Länge der Vocale und ihre Kürze darf nicht unbeachtet bleiben. Man gebrauche die üblichen Zeichen, z. B. *ā*, *ǎ*, *ē*, *ě* u. s. w. Auch hier genügt es, das Seltene zu schreiben, also gewöhnlich nur die Länge.

Die accentuirte Silbe eines Wortes muss bei den mehrsilbigen Wörtern durchweg angedeutet werden; indessen auch nur, wenn sich ein einfaches Accentuationsgesetz nicht herausstellt, was man freilich im Anfang des Studiums einer Sprache nicht wissen kann. Bald aber wird es sich doch zeigen, ob etwa der Accent immer auf der ersten Silbe des Wortes ruht. So lange freilich nichts beobachtet ist, wodurch die Accentuirung entweder unnöthig oder wenigstens vereinfacht wird, muss der Accent jedes Wortes bezeichnet werden. Dies geschieht in üblicher Weise; also z. B. *á*, *ǎ*, *é*.

Unter Accent verstehen wir die grössere Energie oder Intensität, mit welcher ein Vocal gesprochen wird. Dieser wird durch den Accent zugleich auch lauter und höher. Es bleibt aber fraglich, ob dies zu allen Zeiten so war und bei allen Völkern so ist. In den einsilbigen Sprachen Hinterasiens kann von einem Silbenaccent nicht die Rede sein. Wenn aber dort zwei oder mehrere einsilbige Wörter sich zu einem zusammengesetzten Worte fügen, so erhält eins derselben den Accent. Dieser aber muss in jenen Sprachen blos in der Energie des Tones liegen, und davon die Höhe des Vocals ganz abgesondert sein. Denn dort bildet die Höhe oder Tiefe eines Vocals seine unveränderliche Qualität. So entstehen verschiedene Vocale, die sich nur durch die Höhe oder Tiefe unterscheiden, und zwar drei- oder vierfach, sechs- oder achtfach verschieden. Sie können nämlich auf einer bestimmten Höhe oder einer bestimmten Tiefe verharren, aber auch steigen oder fallen,

endlich auch steigen und fallen. Auch mag es wohl einen Unterschied ausmachen, ob das Steigen oder Fallen allmählich oder sprungweise geschieht.

Aehnliches ist auch in afrikanischen Sprachen bemerkt worden. Jedenfalls verdient die Frage, ob Accent und Höhe des Vocals ganz gesondert von einander auftreten, dem Reisenden an's Herz gelegt zu werden. Wir sind sogar gewöhnt, den Accent mit Höhe und Länge zu verbinden; wir sprechen *geben*, lat. *hōminem*, während man ehemals sprach *hōminem*, *gēben*. — Im Vai (einer mehrsilbigen Negersprache) will man beobachtet haben, dass der Accent keine feste Stelle im Worte habe, sondern je nach der Folge der Wörter im Satze bald diese, bald jene Silbe treffe, wie die rhythmische Arsis im Verse. Es gilt also jeder Satz als eine Silbenreihe, welche trochäisch und daktylisch gesprochen wird. Sollte nun dem Vai der feste Wortaccent fehlen? Schwierlich; er wird wohl nur anders, nämlich als Höhe der Vocale neben den tiefen Vocalen gesprochen.

Hiermit in Zusammenhang steht, dass im Vai auch die Quantität der Vocale nicht in jedem Worte fest ist, sondern ebenfalls rein euphonisch, rhythmisch bestimmt wird.

Der Reisende versuche, was sich durch Beobachtung als sicher gewinnen lässt.

Nicht nur bei den cultur- und schriftlosen Völkern, sondern auch bei den halbcultivirten Völkern mit Schrift zeichne der Reisende immer das Gesprochene und Gehörte auf; denn es bleibt fraglich, ob die einheimische Schrift überhaupt genau ist, besonders aber, ob nicht die Aussprache seit Festsetzung der Schrift sich schon geändert hat. Dies ist z. B. bei den Barmanen der Fall.

Zum Wortschatz.

Der Reisende sei zunächst unbekümmert um jede theoretische Frage, wie: in welche Classe gehört eine Sprache, in die flectirende oder die agglutinirende? Sind die Elemente, welche der Bezeichnung grammatischer Verhältnisse dienen, als Affixe oder selbständige Wörter anzusehen? u. s. w. Er setze in dieser Beziehung nichts voraus, suche nichts Bestimmtes, schreibe den Satz als eine Reihe von Silben, und lasse sich die kleinen Pausen oder Einschnitte, durch welche die Theile des Satzes gesondert werden, als Norm für die Wortabtheilung dienen. Werden also Wörter zusammengeschleift, so schreibe er sie auch als Einheiten. Kurz er verbinde und trenne, was der Mund verbindet oder trennt.

Der günstigste Fall ist der, wenn der Reisende einem Eingeborenen begegnet, der neben seiner Muttersprache, die wir eben kennen lernen wollen, auch noch eine andere genügend spricht, die dem Reisenden schon bekannt ist. Wir sind aber auch mit einem Dolmetscher zufrieden, der ausser seiner Muttersprache oder irgend einer, welche der Reisende ziemlich versteht, auch mehr oder weniger im Besitz derjenigen Sprache ist, die wir von ihm lernen wollen. Besonders erwünscht ist ein Dolmetscher, der schreiben kann. Ein solcher wird, da es dem Ohre bei Erlernung einer Sprache so schwer wird, das fliegende Wort zu erhaschen, bei der Niederschreibung der Wörter sehr nützlich sein. Den Reisenden in Afrika ist besonders anzurathen, sich einen der arabischen Schrift kundigen Dolmetscher zu verschaffen.

Vor allem wichtig ist es, die Sätze, die der Eingeborene gesprochen hat, sorgfältig mit der Uebersetzung niederzuschreiben. Man wird natürlich auch die Sätze, welche man zu reden praktische Veranlassung gefunden hat, in der Uebersetzung notiren, welche der Dolmetscher gemacht hat. Sicheres

Material liefert aber nur der Mund des Eingeborenen selbst. Wenn man auch zunächst nicht anders kann, als dem Dolmetscher Wörter und Sätze abzufragen, so ist doch die wesentliche Aufgabe, die Sprache den Eingeborenen abzulauschen. Es wird sich ja Veranlassung finden, was der Dolmetscher gesagt hat, an der Rede des Eingeborenen gewissermaassen zu controliren. Der Eingeborene wird wohl bald an den Reisenden dieselbe Frage richten, die dieser zuvor an jenen gerichtet hat.

Um sicher zu sein, dass man richtig aufgefasst habe, wiederhole man nach einiger Zeit die gelernten Wörter und Sätze sowohl demselben Eingeborenen gegenüber, von dem man sie gehört hat, als auch besonders vor einem anderen. Der Wechsel der Personen schützt davor, rein Individuelles und Zufälliges für wesentlich zu nehmen.

Man notire genau die Gegend, das Dorf, wo man seine Bemerkung macht, und den Stamm, zu welchem der Eingeborene gehört, mit dem man spricht, auch von welchem Stamme der Dolmetscher ist, von dem man die ersten Kenntnisse einer Sprache erlangt hat. Und dann beim Weiterreisen merke man darauf, wie sich die Redeweise ändert, wo sogar eine andere Sprache auftritt. Auch erkundige sich der Reisende, wie weit eine Sprache gesprochen wird. Dies ergibt Notizen zur Sprachgeographie.

Nur den unglücklichsten Völkern (und vielleicht auch diesen nicht) mag es an gewissen Poesien und prosaischen, aber feststehenden Erzählungen (Sagen, Fabeln, Märchen) fehlen; diese finden sich vielmehr überall, und sie zu erhalten, bleibt immer das Wichtigste. Doch ist dies nicht so leicht. Der Uncultivirte weiss nicht, dass er dergleichen besitzt, und dass wir daran Interesse haben, abgesehen davon, dass er nur erst, wenn er Zutrauen zu uns gewonnen und alle Scheu abgelegt hat, sich vollkommen mittheilt. Jene Poesien, die Anfänge einer Literatur, sind nämlich meist mit bestimmten Ereignissen im Leben verbunden, bei denen sie zur Anwendung kommen. Man lasse sich also erzählen, wie es bei Hochzeiten, Geburten, Begräbnissen, Festen aller Art hergeht: so wird man auch Freud- und Trauerlieder kennen lernen. Oder man frage, wie die Leute die Abende im Winter, Zusammenkünfte überhaupt verbringen; gewöhnlich wird dabei erzählt, und dies sind feste Erzählungen. Es mag sein, dass auch solche Erkundigungen nichts nützen; man suche vielmehr den Festlichkeiten, Ceremonien, Zusammenkünften selbst beizuwohnen.

Alles was man so gewinnt, schreibe man genau und mit möglich treuer Uebersetzung nieder. Auch sonst lasse man sich vom Eingeborenen erzählen, was er nur weiss, auch etwa seine Lebensgeschichte.

Mit Hülfe des Dolmetschers mag man nach einzelnen Wörtern, oder vielmehr Sachen fragen, was vielfältig belehrend werden kann. Wie die Sprache ganz im Leben erwachsen ist, so kann nicht nur die Sprache überhaupt bloss durch Sätze aus dem Verkehr oder durch zusammenhängende Literatur erkannt werden, sondern sogar der Wortschatz ist nur in Zusammenhang mit allen Sitten und Lebensgewohnheiten, Anschauungen und Begriffen des Volkes aufzunehmen. Dies gilt für jeden Wortkreis.

Handelt es sich um die Verwandtschaftsbeziehungen, so ist es das Sicherste, wenn es sich ausführen lässt, nach der Beziehung des Befragten zu anderen bestimmten Personen zu fragen; z. B. „A ist dein Vater, B deine Mutter, was ist nun X“, d. h. eine Person, deren Verwandtschaft man genau kennt oder erfragt. Man muss nämlich beachten, dass unsere Bezeichnungen wie Grossvater, Oheim, Bruder, Neffe u. s. w. nicht so bestimmt sind, wie in den uncultivirten Sprachen die Verwandtschaftsgrade meist bezeichnet werden;

sondern der ältere Bruder heisst anders als der jüngere; der Oheim heisst anders, je nachdem er Bruder des Vaters oder der Mutter ist und älter oder jünger als diese; der Neffe ist ein anderer, wenn er der Schwester Sohn, als wenn er des Bruders Sohn ist. Dies hängt mit der ganzen Organisation der Familie, namentlich auch mit dem Erbschaftsverhältniss in Zusammenhang. Bei vielen Völkern ist der Schwestersohn der erste Erbe.

Bei den Gliedern des Körpers lasse man den Eingeborenen die Glieder genau zeigen. Denn die Völker theilen den Körper nicht genau in dieselben Glieder. Wir fassen z. B. unter Arm den Ober- und Unterarm zusammen und schliessen die Hand aus, unter der wir zwar die Finger mit verstehen, denen wir jedoch eine eigene Benennung geben. Ferne Völker dagegen fassen wohl den Unterarm mit der Hand durch einen Namen zusammen, wie andererseits den Oberarm mit der Schulter. So wird überhaupt nicht selten getrennt was wir verbinden, bald umgekehrt, namentlich was die Theile des Gesichts betrifft. Und das mag gelegentlich mit Sitten zusammenhängen. Bei Völkern, welche die Nase mit Ringen durchbohren, mag das Nasenbein, bei anderen das Ohrläppchen eine einfache Benennung haben; oder die Ober- und Unterlippe mögen verschieden benannt sein. Wo das Haar in Zöpfen gebunden wird, mag der Haarzopf besonders benannt werden; wo aber das Haar in Büscheln wächst, da wird ein Haarbüschel seinen besonderen Namen haben.

So versuche man, die ganze Anatomie und Physiologie eines Volkes zu erfragen, also nicht nur die Theile und womöglich auch die inneren unsichtbaren, wie Magen, Herz, Lunge, Nieren, Ader, Gehirn u. s. w., sondern auch deren Function. Dabei aber hüte man sich, die Theile und besonders ihre Functionen selbst anzugeben; denn es ist eben fraglich, was ein Volk weiss. Augen und sehen kennt allerdings jedes Volk unfehlbar; so frage man zuerst: was thut man mit dem Auge? und dann, wenn das Herz genannt ist: wozu dient dieses? wozu die Lungen? das Gehirn? Auch frage man etwa: wo fühlt man Freude über einen Gewinn oder Schmerz über einen Verlust? Dabei verräth auch der Befragte wohl, ob und welche Vorstellung er von Seele oder Geist hat.

Als Hauptregel diene, dass man es so einrichte, dass der Eingeborene selbst uns das Wort und dessen Object oder Bedeutung gebe.

In diesem Zusammenhänge frage man auch nach den Wörtern für schlafen, wachen, träumen, und zugleich nach den Vorstellungen, die man vom Traume hat. Ferner schliessen sich hier die Krankheiten an; und man frage nicht blos, welche Krankheiten im Lande heimisch sind, und wie sie heissen, sondern auch wie man sich ihre Entstehung, ihr Wesen und ihre Heilung denkt.

Bei den Namen der Naturgegenstände frage man nach ihrem Wesen: welchen Gebrauch man von ihnen macht, und wie man sie sich vorstellt. Dies führt theils in die eigentliche Naturanschauung, theils in die Religion, den Glauben des Volkes. Auch hier nenne man nur die handgreiflichen Dinge; andere müssen vom Eingeborenen selbst erwähnt werden. Man frage nicht: wie heisst der Himmel, die Luft? Denn es ist fraglich, ob das Volk diese Dinge kennt. Dagegen wird es wiederum für Dinge, für welche wir nur einen allgemeinen Namen haben, mehrere besondere Benennungen besitzen. In einem Lande z. B., wo ein Brunnen von so grosser Wichtigkeit ist, kann es leicht kommen, dass dieser mehrere Namen hat, je nach gewissen Eigenschaften, etwa nach der Grösse oder nach der Weise der Anlage.

Die Stellung eines Volkes zur Natur liegt in seiner Beschäftigungsweise,

in seiner Arbeit und seinem Genuss; und davon hängt seine Schätzung der Dinge ab. Dies erfährt man, indem man sich in der angegebenen Weise nach den einzelnen Dingen erkundigt.

Was die Thiere betrifft, so macht es einen Unterschied, ob das Volk von Ackerbau, Viehzucht oder Jagd lebt. Es benennt diejenigen Thiere, an denen ihm in Folge seiner Lebensweise besonders liegt, auch mit besonderen Unterscheidungen, sei es nach Geschlecht, sei es nach Alter, Farbe u. s. w. So wird bald die Kuh, bald das Pferd mannigfach benannt, wie bei uns Ross, Mähre, Klepper, Gaul, Wallach, Füllen u. s. w. — Besonders bei den Thieren ist es wichtig, ausser dem Namen auch die Lebensweise, den vermeintlichen Charakter und den Nutzen, welchen man bei ihrem Leben und ihrem Tode von ihnen zieht, zu erfragen. Hieraus erklären sich dann mythische und religiöse Vorstellungen, Sagen, Fabeln und Sprichwörter, in denen Thiere so wichtige Rollen spielen.

Man frage nicht nur, wie eine Hütte, ein Haus, ein Zelt genannt wird, sondern frage auch nach den Namen der Theile derselben und merke sich die ganze Einrichtung derselben. — Dann die Namen der Geräthe und Waffen; wozu jedes dient, und die Stoffe, woraus sie gemacht sind. Ebenso die Kleider und auch der Zierrath und Schmuck des Leibes und sonstige Verzierung. Vielleicht äussert sich auch der Eingeborene darüber, was an dem Schmuck eigentlich gefällt: die Grösse oder die Farbe oder die Form — kurz man sehe zu, das Ideal des Eingeborenen kennen zu lernen, die Art seines Schönheitssinnes. Welche Frauen z. B. findet er am schönsten? welche Thiere? Dass ein Wort für *schön* existirt, kann nicht vorausgesetzt werden; man wähle daher zunächst Ausdrücke wie *vorziehen*, *gern haben*, und warte, ob sich der Eingeborene eines unserem „schön“ entsprechenden Ausdruckes bedienen wird.

Wenn der Reisende nach den Farben fragt, so geschehe es immer an farbigen Dingen, die man vor Augen hat. Man wird finden, dass viele Völker ausser weiss nur schwarz und roth benennen, und dass schwarz zugleich blau und grün, roth zugleich gelb bezeichnet. Nun überzeuge man sich, ob das Auge des Eingeborenen in der That die Farben, die er gleich benennt, auch gar nicht unterscheidet. Man lege ihm also ein schwarzes, blaues und grünes Ding zuerst nach einander und dann zugleich vor. — Man wird auch bemerken können, wie die Farben auf das Gemüth wirken. Besonders aber vergesse man nicht, darauf zu achten, ob nicht verschiedene Arten des Bunten besonders benannt werden: das Gefleckte, das Gesprenkelte, und vielleicht anders an der Kuh als am Pferde.

So ziehe man die Wörter aus dem gesammten Leben der Völker, aus ihrem Schauen, Phantasiren und Denken, aus ihrem Ernst und ihrem Scherz, aus ihrer Arbeit und ihrem Genuss und ihrem Spiel.

Bei den religiösen Vorstellungen sei man besonders vorsichtig. Man frage nach Festen und Ceremonien im Laufe des Jahres und bei verschiedenen Gelegenheiten des Lebens und lasse sich ihren Sinn, ihren Zweck erklären. Man frage direct nur nach dem Sichtbaren, und dieses möge Aufschlüsse über das Unsichtbare herbeiführen. — Zur Religion gehören auch die Priester, welche zugleich die Aerzte sind; in der That, sie sind die Zauberer. Medicin ist nichts als ein Zaubermittel.

Manches wird sich kaum abfragen lassen; der Reisende wird es unmittelbar im Leben aufsuchen müssen. Denn eben so wichtig, wie die oben erwähnte mündliche Literatur, sind die üblichen Sätze des Verkehrs, die

stehenden Redewendungen des Gesprächs. Wie begrüsst man einander? wie dankt man? wie schmeichelt, lobt, schilt, segnet, flucht man?

Eine Erforschung der Sprache, wie sie hier gewünscht wird, kann freilich nur von einem Reisenden unternommen werden, welcher dieser Aufgabe einige Zeit widmen kann. Wir dürfen aber wohl auch einen Naturforscher daran erinnern, dass ihm auf Reisen Tage und Wochen bleiben werden, die er für seine naturwissenschaftlichen Zwecke nicht verwerten kann, wie auf Fahrten zu Wasser und durch Wüsten. Für solche Zeiten verseehe er sich neben seinem Dolmetscher noch mit einem Eingeborenen, und schenke die Zeit, welche er seinen eigenen Zwecken nicht widmen kann, der Sprachwissenschaft.

Um ihm das Suchen und Ueberlegen so viel wie möglich zu ersparen, lassen wir noch ein Vocabular und Winke zur Satzbildung folgen. Gestatten ihm nun die Verhältnisse ein genaues Eingehen auf eine Sprache nicht, so müssen wir uns mit einem kurzen Verzeichniss von Wörtern und einigen ganz einfachen Sätzen begnügen. Für diesen Fall wähle man aus dem folgenden Vocabular diejenigen Worte, die wir gesperrt haben.

Himmel, Wolken; der Himmel ist klar, ist bedeckt. Luft, der Wind weht, Sturm, Wirbelwind. Die Sonne ist aufgegangen, untergegangen, brennt heiss. Mond, Neumond, es ist Mondfinsterniss, Sterne, Komet, Sternschnuppe. Nebel, er steigt, fällt. Regen (vielleicht verschieden benannt nach der Jahreszeit, oder der Heftigkeit), es regnet. Gewitter, Donner es donnert; Blitz, es blitzt; es kommt ein Gewitter, der Regen hört auf. Regenbogen. Thau, Schnee, Hagel, Reif, Eis schmilzt, thaut. Tag, bricht an, geht zu Ende; Nacht, sie kommt herein. Morgen, Mittag, Abend, Morgenroth, Abendröthe. Es ist finster, Finsterniss, dunkel, — heit, hell, Licht, Schatten. Jahr, Jahreszeit, Sommer (trockne Zeit), Winter (Regenzeit), — ist nun vorüber, Herbst (Erntezeit), Frühling (Saatzeit). Heute, gestern, vorgestern, morgen, übermorgen. Woche, Monat, Namen der Wochentage und der Monate. Die Weltgegenden. Es ist kalt, Kälte, Hitze.

Erde (Welt), ein Land (grosses Gebiet), Boden, Feld (Acker), Wiese, Wüste, Oase, Quelle, Brunnen, Wald, Busch. Berg, Gebirge, Hügel, Gipfel, Fels, Thal, Ebene, Meer, Insel, See (Teich), Strom, Bach, Welle. Der Fluss ist im Steigen, das Wasser tritt über die Ufer, steht hoch, niedrig, fällt; der Bach ist ausgetrocknet. Das Wasser ist heiss, kalt. Feuer, Flamme, Rauch steigt auf, Feuerkohle, Asche. Metall (die gewöhnlichen Metalle). Sand, Lehm, Stein (Edelsteine, Kiesel, Feuerstein), Staub, Schlamm, Salz, Seife.

Baum fällen, Strauch, Rohr abschneiden, Gras, der Baum treibt Blüthen, das Kraut schiesst auf, Getreide (dessen übliche Arten), Arten von Hülsenfrüchten, von Gemüsen. Zweig, Blatt, Laub, Rinde, Dorn, die Frucht reift, ist noch nicht reif, faul, Same, Wurzel, Kartoffel, Holz spalten, Stroh, Heu. Besondere Baumarten und ihre Früchte, wie Palme, Dattel, Kaffee, Pfeffer, Cacao, Cocosnuss. Beere, Kern, Schale, schälen, Hülse, Fleisch der Früchte, Gummi, Baumwolle, Indigo, Tabak, Oel, Zucker. Stock (zum Gehen).

Thier, Hund bellt, beisst, wedelt mit dem Schwanze, Katze miaut, Bulle, Kuh, Ochs kät wieder, Kalb, kalben. Stier brüllt, Rindvieh. Ziege mäckert, Ziegenbock, Schaf blökt, Mutterschaf, Widder, Hammel,

Antilope, Giraffe, Hirsch, Reh, Schwein grunzt, Pferd wiehert, Esel ist träge, Maulthier, Maulesel, Zebra, Kameel, Elefant, Rhinoceros, Hippopotamos, Löwe brüllt, Tiger, Leopard, Panther, Hyäne, Bär, Fuchs, Wolf, Rennthier, Eber, Hase, Ratte, Maus. Affe (dessen Arten). — Vogel singt, zwitschert, fliegt, Adler fliegt hoch, stürzt sich auf seine Beute. Geier, Eule, Papagei, Storch, Strauss, Huhn, Hahn kräht, Henne gackert, Rebhuhn, Perlhuhn, Gans, Ente, Küchlein. Henne hat ein Ei gelegt. Taube. — Schildkröte, Krokodil (Alligator), Eidexe, Frosch, Kröte, Schlange, kriecht (deren Arten). Fisch (Arten) schwimmt. Krebs. Skorpion. Spinne, Käfer, Ameise (Arten), Heuschrecke, Biene, Honig, Wachs, Stachel, Wespe, Fliege sticht, Mücke, Laus, Floh, Wanze, Schmetterling, Raupe, Wurm, Seide, Schnecke, Auster. — Männchen, Weibchen, Fleisch, Fett, Milch, Butter, Käse; Haar, Schwanz, Wolle, Fett, Horn, Huf (Klaue), Rüssel, Elfenbein. Flügel, Feder, Vogelschwanz, Schnabel, Ei, Nest, Lager, Höhle. Gräte, Flossen, Schuppen, Schale.

Mensch (Leute). Mann, Weib, Kind, Sohn, Tochter. Diese Frau hat sechs Kinder geboren; zeugen; wo bist du geboren? Ist dein Vater am Leben? Er ist todt. Er ist wohl. Knabe, Jüngling, kleines Mädchen, reife Jungfrau; Gatte, Gattin; Braut, Bräutigam; Junggeselle, Wittwe, Wittwer; sich verheirathen, ein Mann A hat die Jungfrau B geheirathet, sein Sohn hat meine Tochter zur Frau. Heirath, Hochzeit, er ist unverheirathet. Vater, Mutter, schwanger, saugen, säugen, Säugling. Bruder (älterer, jüngerer), Schwester (ältere, jüngere), Grossvater (von Vaters, von Mutter Seiten), Grossmutter; Vaters Bruder, Mutter Bruder (Oheim), Neffe (Brudersohn, Schwestersohn), Nichte; Enkel, Enkelin. Schwieger-Vater, -Mutter, -Sohn, -Tochter. Schwager, Schwägerin (meiner Frau Bruder, meiner Schwester Mann; meines Bruders Frau; nennt eine Frau ihren Schwager und ihre Schwägerin ebenso? also ihres Mannes Bruder, ihrer Schwester Mann, ihres Bruders Frau). — Greis, alte Frau, er ist alt, er altert, er bekommt graue Haare; er ist gestorben, todt, alt geworden, nicht alt geworden, noch jung. Waise. — Familie, Stamm, Volk.

Leib*) (Körper), Leichnam, Knochen, Skelett, Mark, Fleisch, Blut, Adern, Haut, Haar. Glied, Kopf, Schädel, Stirn (Vorderkopf, Hinterkopf), Gehirn; Gesicht; Auge, Brauen, Lid, Wimper, Augapfel, Pupille; der Hund spitzt die Ohren; Wange, Nase, Mund, Athem (ich athme), Lippe, Kinn, Zahn, Ober- und Unterkiefer, Zunge, Gaumen, Bart (Backen-, Schnurr-, Kinn-Bart), den Bart rasiren, das Haar schneiden. Hals, Nacken, Mähne, Kehle (Luft-, Speise-Röhre). Rücken, Höcker (des Kameels), Schulter, Arm (Ober-, Unter-), Ellenbogen, Hand, rechte, linke Hand, Faust, Finger, Daumen, die übrigen Finger, Nagel. Brustkasten, weibliche Brust, Bauch, Nabel. Lunge, Herz, Magen, Leber, Galle, Milz, Gedärm. Rippe, Weiche, Hüfte, Arsch, Glied, Hoden, entmannen, weibliche Scham, Gebärmutter, Euter, Zitze. Schenkel (Ober-, Unter-), Bein, Knie, Schienbein, Wade, Fuss, Ferse, Knöchel, Sohle, Zehe. — Nackt, barfuss, barhaupt. — Schweiss, Thräne, Rotz, Speichel, schwitzen, weinen, sich schnäuzen, speien, Milch, Koth, Urin, kacken, pissen, Wind lassen.

*) Bei den Theilen des Körpers ist es wichtig, sich zu überzeugen, ob sie bei Menschen und Thieren gleich benannt werden. Auch werden zuweilen Fleisch und Knochen anders benannt, je nachdem von denselben am lebenden Körper oder als animalischer Speise die Rede ist.

Rein, reinlich, schmutzig, sich waschen, Seife, Fett einreiben, Salbe, sich mit Farbe bestreichen, tätowiren, baden, sich abtrocknen. Mager, bleich, fett, abmagern, fett werden. — Leben, Gesundheit, Geburt, Name (man lasse sich Eigennamen aller Art angeben, auch von Localitäten, wo möglich mit der Bedeutung). Leichenbegängniß, Klagegesang.

Speise, Trank, essen, trinken, tranken, Hunger, mich hungert, durstet, satt, kauen, schlucken, verdauen. Mehl, Brot, Fleisch, Brühe (Suppe), Brei (die üblichen Speisen). Frühstück, Hauptmahlzeit, Abendbrot. Berauschesendes Getränk, betrunken, Tabak rauchen. Schmecken, Geschmack, süß, bitter, sauer, salzig. Fressen, nagen.

Kleidungsstück (für den Kopf, Fuss, Leib; Aermel); sich anziehen, Staatskleider anlegen, ausziehen; Kleider reinigen, waschen, trocknen, schmutzig, rein, nass; Schmuck, einzelne Gegenstände zum Schmuck, wie Ohrring, Armring u. s. w.

Haus, Hütte, Zelt aufschlagen, abbrechen, Zeltpflock, Küche (Heerd), Schlafstätte, Bett, Thür, Thorweg, Schlüssel (Riegel), Schloss, verschliessen, zumachen, öffnen; Fenster, Rauchloch, Treppe, oberes Geschoss, Dach; Wand, Balken, Thürpfosten, Zeltpflock; bauen, zimmern. — Matte flechten, Tisch, Stuhl, Bank; wer macht diese? womit? (Beil, Säge, Hobel, Hammer, Nagel), Topf, Rost, Teller, Kessel, Schüssel, Löffel, Messer, Schneide, Heft, schleifen, Gabel, sonstiges Küchengeräth, reinigen, Krug, Becher, Glas, Brunnen graben, — Hof, Stall, Garten, Früchte pflücken, Scheune; Korb, Schippe, Spaten, Hacke, Beil, Pflug, Sense, Hippe (sonstiges Ackergeräth), pflügen, graben, säen, gäten, ernten, Ernte, Korn schneiden, dreschen, mahlen, Landgut, Grab, Begräbnissplatz. Dorf, Stadt, Markt, Bezirk, Hauptstadt, Festung, Residenzstadt, Palast.

Stimme, sprechen, was sagst du? pfeifen, Laut, Wort, nennen, einen Sklaven rufen, wie heisst er? fragen, antworten, schweigen, wie nennt man dieses Ding? jauchzen, weinen, lachen, niesen, husten, blasen, gähnen, schnauben, lecken, beissen; plaudern, sich besprechen mit Jemand, um Rath fragen, Geheimnis anvertrauen, bitten. — Sehen, erblicken, finden, spähen, hören, lauschen, riechen, schmecken, tasten, fühlen.

Schlafen, schläfrig sein, schnarchen, träumen, sich niederlegen, aufwachen, aufstehn, wachen bei einem Kranken; ich bin wach.

Wohnen, leben, wachsen, sterben, tödten; gesund, kräftig, schwach, krank, gross, klein, nackt. Schmerz, Kopf, Leib-, Fieber, Ausschlag, Blattern, sonstige heimische Krankheiten, die Wunde schmerzt, heilt, es juckt mich, jemanden heilen, Narbe, Medicin, Gift, Brech-, Purgir-Mittel. Amulet. Er ist genesen. — Lahm, stumm, taub, blind, schwindlig, zittern.

Greifen; hart, weich; glatt, rauh; scharf, stumpf; rund, eckig; schwer, leicht, wiegen, wägen, Last. Eisen ist fest, Wasser fliesst. Trocken, nass, heiss, kalt. Laut, leise. Farbe, hell, dunkel, weiss, schwarz, einzelne Farben, bunt. Gestalt, schön, hässlich. Geräusch (Schall), Ton, Musik.

Machen, arbeiten, fertig; klug, dumm, geschickt, ungeschickt, fleissig, faul, Gewohnheit, Uebung, schnell, langsam, ermüdet, sich erholen, anstrengen.

Jagen, Jäger, Jagd, Pfeil, Bogen, Sehne, Köcher, Falle (sonstiges Jagdgeräth), fangen, — Heerden hüten, schlachten, kochen, das Wasser kocht, braten, rösten, backen, roh, gar. Feuer anschlagen, anzünden, anblasen, auslöschen, das Feuer lischt aus, brennt, Holz verbrennen, ich habe mich verbrannt, Rauch.

Schmieden, Hammer, Ambos, Zange, Haken, Kette, Eisen rostet, Nadel, Zwirn, Schere, nähen, stechen, spinnen, Seil, weben, Webebaum, mahlen, Mühle. Loch bohren.

Schiff, Boot, Kahn; Ruder, Steuer, Mast, Segel; Netz (Fischgeräthe).

Trommel, Trompete, Pfeife, Saiteninstrument.

Tanzen, singen, spielen; trommeln, blasen; erzählen, Geschichte, Fabel, plaudern.

Kaufen, verkaufen, Handel treiben, Gewerbe, verdienen, ehrlich, betrügen. Waare, Markt, Preis, Geld; theuer, billig; Lohn, Pfand, bezahlen; Verdienst, Verlust, schenken, borgen, miethen, leihen, tauschen; ich bin ihm schuldig, ich bekomme zum Geschenk, wiedergeben. Reich, arm, zählen.

Häuptling, König, Königin, deren Sohn; freier Mann, berathende Versammlung. Sklave, Sklavin. Befehlen, geborchen, gehorsam. Priester, Zauberer (Arzt), Arznei, Opfer, beten (Ceremonien beim Beten), fasten, schwören, Geister beschwören, fluchen, segnen, lesen, schreiben, abschreiben. Todtengräber, Klageweiber, Schmied, Hirt, Jäger, Fischer, Schiffer, Ackerbauer, Handwerker, Kaufmann. Wirth, Gast, Freund, Feind, Nachbar, Landsmann (Einheimischer), Fremder, Europäer. — Richter, Dieb, stehlen, Hure, Ehebruch, Ehe, Scheidung, er scheidet sich von seiner Frau (entlässt sie). Mord, Mörder, A hat B's Bruder gemordet; B rächt die Ermordung seines Bruders, rächt sich an dem Mörder seines Bruders, A büsst seinen Mord. Enthaupten, hängen, sich erhängen.

Krieg, Sieg, Gefangener, sie haben die Schlacht verloren. Alle haben die Flucht ergriffen (sind geflohen); zu Sklaven machen. Beute. Angreifen, sich vertheidigen, kämpfen, sich verstärken, verfolgen. — Schwert ziehen, einstecken, Griff, Klinge; den Speer werfen, Schild, den Pfeil abschiessen, den Pfeil mit Gift bestreichen, schießen, zielen, treffen, fehlen. Flinte, Pulver, Kugel. — Fahne (sonstige Werkzeuge zum Kriege, zur Vertheidigung wie zum Angriff, etwa bei Belagerungen). Friede. Gefahr, Glück.

Tapfer, feige, sich fürchten, gut und schlecht, von Personen und Sachen; angenehm, unangenehm; nützlich, unnütz; gerecht, ungerecht; Tugend, Laster, Sünde, sündigen, Schuld, das ist nicht meine Schuld, Gewissen, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Lüge, Lügner, Irrthum; Gesetz, Sitte; verboten, erlaubt; loben, tadeln, spotten, anklagen, strafen. Lieben, wählen, vorziehen, hassen; dankbar, Dank; habgierig, Neid, wohlthätig, verschwenden, sparsam, geizig. Grossmuth, grossmüthig, verzeihen.

Geben (ich gebe dir), nehmen, suchen, finden, empfangen, halten, festhalten, zurückhalten, zurückgeben, bringen, holen, verlieren, hergeben, verweigern; hinlegen, hinstellen; heben, etwas aufheben (aufnehmen), ablegen. Gehen, treten, stehen, sitzen, sich setzen, liegen, sich legen, laufen, knien, kriechen, springen, sich anlehnen, hängen, sinken, fallen, sich neigen, bücken. Kommen, weggehn, hereinkommen, hinausgehn, hineingehen, spazieren gehen, zurückkehren, wohnen (zu Hause sein). — Reise, Gepäck, Stab, Wagen, Peitsche, Zügel. Weg, Brücke. Reiten, fahren, übersetzen, absteigen, hinauf-, hinabsteigen; ausruhen, zurückbleiben, entgegengehn, begegnen, sich trennen, grüssen, Ceremonien beim Grüssen (etwa: Hand geben), Abschied nehmen; sich auf der Reise irren, den Weg zeigen (überhaupt etwas zeigen), führen, schicken, Bote. Er hat mich gut aufgenommen. An einem Orte verweilen. Du bist lange geblieben. — Schneiden, ein Stock bricht, den Stock zerbrechen, er ist zerbrochen; etwas zerreißen, es ist zerrissen, das Kleid ist abgetragen, der Krug ist gespalten, der Schlauch platzt. Werfen, setzen, legen, sitzen, liegen; binden, knüpfen,

Knoten, lösen; drehen, schlagen, drücken, ziehen, wegziehen, stossen, tragen, reiben, mengen, Speise mit dem Löffel umrühren; Wasser schöpfen, ein-, ausgiessen; retten aus der Gefahr, aus dem Wasser, verbrennen; bewachen, bewahren, verbergen, verschliessen, etwas in einem Behälter, bedecken, einen Topf zudecken, öffnen, einhüllen, auswickeln, offen, bloss. Anfangen, enden, aufhören zu singen, der Sommer ist vorüber, der Monat geht zu Ende. Voranschreiten, folgen, gehorchen, gehorsam, ungehorsam. Messen, theilen, wägen (besondere Maasse).

Weit, eng; breit, schmal, dick, dünn; hoch, niedrig, tief, flach; gross, klein; lang, kurz; entfernt, nahe; rechts, links; gerade, krumm; einfach, doppelt; viel, wenig; oft, selten; alt, neu; ganz, halb; voll, leer; stark, schwach; früh, spät. — Er übertrifft dich an Grösse (ist grösser als du), sie übertreffen euch an Zahl (sind zahlreicher als ihr); ich bin stärker als du. Er ist ausgezeichnet an Grösse, Schönheit.

Heiter, ernst, lustig, betrübt. Er betrauert seinen Vater, ich bedaure dich, glücklich, unglücklich, Glück, Unglück; geduldig, Geduld, überdrüssig; ich bin es zufrieden, ich bin dagegen; das gefällt mir, gefällt dir das Mädchen? ich habe dich gern. Nach deinem Belieben. Ich ziehe dieses vor, es ist besser als jenes. Ich freue mich, es freut mich. Ich habe genug. Warum bist du so traurig? was weinst du? Kummer, Sorge, helfen, Mitleid. Aerger, Freude, Zorn, zürnen, Scham.

Wünschen, wollen, nicht wollen, hoffen, nachdenken (überlegen), versuchen, prüfen; gib Acht; sich erinnern, vergessen; vermuthen, glauben, zweifeln. Lernen, verstehn, können, lehren, zeigen, wissen. Gestehn, läugnen.

Die Zahlen von eins bis hundert. Mandel. Schock. Zählen, rechnen. (Es ist darauf zu sehen, ob ein Volk im Zählen und Rechnen Uebung hat, und wie weit sein Zählen durchschnittlich reicht. Hat es Wörter für addiren, subtrahiren, multipliciren, dividiren?) Hälfte, Drittel, Viertel, u. s. w.

Die Ordinalia von 1—20. Der mittelste, der letzte. — Die Cardinalia von 1—10 mit „Mal“. Noch einmal. Wie oft? Wann? Früher, vor Alters, einst (eines Tages), neulich, zuerst, noch nicht, schon, immer, niemals, täglich; jetzt, heute, morgen; in diesem Jahre, im nächsten Jahre, im vorigen Jahre, vor zwei, vor drei Jahren, in zwei Jahren; in diesem Monat, im verflossenen nächsten Monat. Soeben, sogleich, künftig.

Welche Zeitrechnung hat ein Volk?

Wo? wohin? woher? hier, dort; her, hin; diesseits, jenseits. hier und da, bisweilen, überall.

Ich, du, er, sie (es?), wir (ich und du? ich und er?) ihr, sie (sie beide?); ich selbst u. s. w., ich wasche mich; er liebt mich; er giebt mir Brot. Sätze, in denen der Dativ und Accusativ der übrigen Fürwörter erscheint. Die Possessiva.

Dieser, jener (auch die Mehrheit). Jemand, einige, jeder, niemand, alle, alles, zusammen, allein, einander, nur er, ausgenommen er, sogar er. Wer? wessen, wem, wen. Was? was immer. Nichts. Wie viel? sehr, wie sehr? mehr. Wie? so, anders. Vielleicht, gewiss. Ja, nein.

Drinne, draussen, hinein, heraus, in, aus; vorn, vor, hinten, hinter, nach; neben, rechts, links, bei, an; herum, um; auf, über (Ruhe und Bewegung), unter, oben, unten, aufwärts, abwärts, zu, von (vom Berge herab, auf den Berg hinauf); hinweg; durch, hindurch, zwischen, entlang, vorbei; ausser; aus einander gehn; für; gegen (entgegen dem Winde, dem Strome),

gegenüber, ohne; wegen; mit; seit, während; statt. Hinterher, woraus. Weshalb, wozu? deshalb, dazu.

Zur Grammatik.

Schon das vorstehende Vocabular ist mit Sätzen untermischt. Der Reisende wird wohl thun, immer nur Sätze abzufragen, da nur in diesen die Wörter bestimmte Bedeutung haben. So gewinnt man Lexikalisches und Grammatisches zugleich. Eben darum ist die Sonderung der Wörter nach Redetheilen nur unvollständig vorgenommen. Man verfare nun so, dass man z. B. ein bekannt gewordenes Substantivum mit mehreren Verben nach einander als Subject und als Object zu einem kleinen Satze verbindet, und dann wieder eins der angegebenen Verben mit mehreren Substantiven zu Sätzen oder Satzverhältnissen gestaltet. Z. B. der Kopf sitzt auf dem Halse, ich wasche den Kopf, ich wasche die Füße, die Hände u. s. w. So ist allemal in einem Satze ein Glied schon bekannt, und ein neues tritt hinzu. Das erleichtert das Verständniss, die Analyse, ist aber auch nöthig, um zu erfahren, ob nicht z. B. das Waschen des Kopfes ganz anders bezeichnet wird, als das der Füße, wie in amerikanischen Sprachen der Fall scheint. Man erfährt dabei auch, ob verschiedene Weisen der Abwandlung der Verba bestehn. Auch werde dabei die Gelegenheit benutzt, das Verbum nach Personen u. s. w. abzuwandeln. Wenigstens ein Verbum muss vollständig durchconjugirt werden; besser aber ist es, die Conjugation vollständig an mehreren zu versuchen, etwa an *geben*, *reisen* und *liegen*. Die üblichsten Verba mögen in den meisten Sprachen Unregelmässigkeiten zeigen; darum kann ihre Conjugation allein nicht genügen.

Sobald ein Wort bekannt und in mehrfacher Verbindung gegeben ist, versuche man davon abgeleitete Bildungen, um zu sehen, wie abgeleitet wird, und ob von diesem Worte Ableitungen gebildet sind: *Reiter, Bettler, Führer, Schmied, Schlächter, Färber, Trommler, Tischler, Schäfer, Barbier. Er thut nur Gutes, nichts Böses, ist ein guter Mann.* Die Differenz von *Hunger, mich hungert, ich bin hungrig* wird den meisten Sprachen unbekannt sein; aber dies muss festgestellt werden. Dagegen *das Kleid ist rein, das Kleid reinigen* wird überall unterschieden sein. Man prüfe, ob die abgeleiteten Verba eben so conjugirt werden, wie die primitiven. Man frage also: *er blutete; das Blut floss aus der Nase. Der Richter entscheide; du richte uns. Trocken, trocknen.*

Unmittelbar fast mit dem Verbum sind die Pronomina verbunden. Sätze, welche alle Formen der Pronomina als Subjecte und Objecte darstellen, sind leicht zu bilden. In manchen Sprachen sind die Objectsformen der Pronomina dem Verbum als Affix angebildet, sodass *ich gebe es dir* nur eine Verbalform bildet. Dann versuche man durch andere Wendungen, ob eine selbstständige Form des pronominalen Objects besteht, etwa durch Hervorhebung des Gegensatzes: *ich gab dir alles, du gabst mir nichts; ich gab es nicht ihm, ich gab es dir.* Ueberhaupt mögen Gegensätze empfohlen sein, namentlich auch für qualitative Prädicate: *er ist nicht schlecht, er ist gut; es ist nicht schmutzig, es ist rein; er hat nicht gelogen, er hat wahr gesprochen.* Solche Gegensätze bestimmen den Sinn noch mehr, als die blosser Satzform, und man erfährt, wie die Negation beim Verbum und beim Adjectivum ausgedrückt wird. Auch bringe man die Sätze häufig in die Frageform: *was suchst du?*

Zu den Ableitungen lassen sich auch die Factitiva zählen, und man versäume nicht, sie festzustellen: *das Pferd trinkt, ich tränke das Pferd;*

saugen, säugen; fallen, füllen; hangen, hängen; sitzen, setzen; liegen, legen; es lischt aus, es auslöschen; das Haus ist offen; er hat die Thür geöffnet. Von dem Brote ist nichts übrig geblieben; wir haben nichts übrig gelassen. X erschrak; sein Bruder hatte ihn erschreckt.

Die eigenthümliche Form der reflexiven und unpersönlichen Verba findet sich nur in den höhern Sprachen; doch prüfe man, wie ausgedrückt wird: *mich friert, mich schwitzt, mir ist heiss, ich freue mich, du grüsst dich, er schämt sich, wir wunderten uns, besinnt euch, sie sehnen sich, widersetzen sich, wir wollen uns erst erholen; es geht mir gut; es regnet, es ist kalt. Die uneigentlichen Reflexiva dürfen nicht unbeachtet bleiben: er liebt sich selbst am meisten; sie drehen sich; er hat sich geschmückt. Ferner das Reciprocum: sie liebten einander, schlugen.*

Das Passivum ist ebenfalls selten durch eine Form ausgedrückt. Man frage also etwa in folgender Weise: *ich ergriff ihn; er ward ergriffen; ich fand auf dem Wege einen Menschen getödtet. X und Y haben sich gestritten; dabei ward X von Y verwundet; Y ging in den Wald und ward von einem Löwen zerrissen. Der Bogen ist ihm gestohlen worden. Wenn du folgst, wirst du von mir gelobt; wenn du ungehorsam bist, wirst du vom König gestraft. X ist von Räubern ermordet worden. Das ist gethan.*

Die Verba mit doppeltem Sinne, activem und intransitivem, lasse man sich in doppelten Sätzen geben: *eine Arbeit anfangen; der Sommer fängt an.*

Besonders wichtig sind die abstracten Verba, namentlich das Sein. Folgende Sätze werden von selbst andeuten, was gemeint ist: *X ist ein guter Mann. Dort kommt ein alter Bettler; dieser Mann ist gut, ist alt. Dieses Pferd ist nicht schön, ist sehr schön, ist hässlich. Sie waren schwach. Ich bin jung. Ich bin sein Vater. Er ist zu Hause. Wer bist du? wer ist jener? Woher (aus welchem Lande, welcher Stadt) bist du? Wer ist der Herr dieser Felder. Dies ist mein; dies ist dein; wo warst du gestern? Ich war drei Tage bei meinem Vater. Morgen wird schönes Wetter sein. — Hast du Geld? Ich habe kein Brot. Wieviel Kinder hast du? Du hast recht, unrecht. — Ich will essen. Du darfst spielen. Er kann singen; er kann nicht singen. Er soll kommen. Wir müssen abreisen. Wir wollen weiter (mit Negation).*

Diese abstracten Verba greifen in die Bezeichnung der temporalen und modalen Verhältnisse. Dabei vernachlässige man die Frageform nicht: *ich habe es gethan; ich werde dir das nicht schenken. Willst du mir das geben? Er will nicht mit mir gehen. Was soll ich dir geben für dieses Pferd? Gott möge richten. Lass ihn wachen. Er soll sterben. Alle Menschen müssen sterben. Lass uns gehen. Ich lasse mir ein Beil machen. Ich lasse das Messer schärfen. Gibt es hier Rindvieh? Hier giebt es keine Schafe und Ziegen. Gibt es hier keine Ziegen? Hier ist er. Wem gehört dieses Haus? Dies ist mein Pferd, dieses Pferd gehört mir. Dies ist werth gesehen zu werden; dies bedarf der Verbesserung (es ist nothwendig dies zu verbessern). Dies ist genug (reicht aus). Das Wasser wird zu Dampf, der Schnee zu Eis; das Eisen ist rostig geworden. Es wird spät. Ich brauche ein grosses Haus. Wozu brauchst du das Eisen?*

Beim Substantivum ist das Geschlecht zu beachten, nicht leicht das grammatische, aber das physiologische: *Löwe, Löwin; Hund, Hündin; Bulle, Kuh u. s. w.*

Beim Adjectivum bleibt die Congruenz meist unbezeichnet, doch nicht überall. — Auch die Comparison wird meist umschrieben: *du bist grösser, als ich (du übertriffst mich an Weisheit), er ist der grösste von allen, sie ist das schönste Mädchen, welcher Berg ist der höchste im ganzen Lande X? ich*

habe mehr Kühe als du, weniger; er ist etwas kleiner u. s. w. Man beachte aber überhaupt die Vergleichen: er ist schmutzig wie ein Schwein. Dort lag eine Schlange so dick wie ein Arm. Dein Haar ist wie Schafwolle. Das kostet nicht mehr als drei Thaler. Es ist weiter als vier Stunden, Tagereisen.

Man bilde Sätze mit sämmtlichen Präpositionen, die am Schlusse unseres Vocabulars verzeichnet sind, und zwar, wo dieser Unterschied eintritt, in der Bedeutung der Ruhe und der Bewegung, also: *darin, hinein* und *heraus* und *ausserhalb*. Besonders aber unterscheide man *auf* und *über*, *an* und *auf* und *neben* und *bei*; *zwischen* und *mitten von etwas*; *mit* in causalem und sociativem Sinn; *vor* bedeutet Ort, Zeit, Vorzug, Ursache.

Für die Zahlwörter ist noch eine wichtige Bemerkung zu machen: *Hast du Ziegen? ich will zehn Stück davon kaufen.* Solcher Zahl-Substantiva wie hier *Stück* haben wir mehr: *ein Kopf Kohl, ein Laib Brot, ein Gespann Ochsen.* Was wir aber doch immer nur in beschränktem Maasse thun, geschieht in manchen Sprachen durchweg, sodass immer zwischen Zahl und Gezähltes ein Zahl-Substantivum tritt, deren es im Chinesischen über hundert giebt. Sie theilen alle zählbaren Dinge in Classen; jede Classe hat eben ihr eigenes Zahl-Substantivum. Man füge also Dinge zur Zahl.

Der einfache nackte Satz, aus Subject und Verbum (mit Object) bestehend, fragend, bejahend und verneinend, ist das wichtigste Element der Rede. In dieser Form sammle man die Substantiva, Pronomina und Verba und die Abwandlungsformen derselben. Dann bilde man mit Adverbien, Präpositionen erweiterte Sätze: *Auf den Sturm folgt Regen; er fiel vom Pferde. Was bedürfen wir sonst zur Reise? Warum schläfst du am Tage? Schläfst du diese Nacht in deinem Hause (zu Hause)? Ist euer Dorf weit von hier. Bleibe bei mir, ich fürchte mich im Walde. Das Wasser fliesst reissend. Was giebt es Neues bei euch? Alles wohl, nur Gutes. Ich will dich allein sprechen. Der Blitz schlug in das Haus. Es regnet alle Tage. Gehe geradeaus. Viele Leute waren gekommen; die Leute kehrten alle zurück. Die Einwohner der Stadt arbeiten viel, schlafen wenig, schwatzen und lachen in einem fort. Ich hasse ihn sehr. Er wird sich sehr freuen. Jeder Mensch muss schlafen. Er liebt alle Menschen, alle Menschen lieben ihn. Ich habe diese Nacht nicht gut geschlafen wegen der Fliegen. Du bist zu weit rechts gegangen. Du hast zu viel gearbeitet. Er sagt nichts als Lügen. Er läuft sehr schnell. Er bat mich sehr. Du hast mich oft genug um Geld gebeten; hör' auf, es nützt nichts. Ich pflege schnell zu gehn. Hole mir Brot aus der Hütte. Gieb mir Wasser zu trinken. Gestatte mir zu bleiben. Ich befehle dir zu gehen. Er ging schweigend. Er sass weinend. Er fiel verwundet vom Pferde. Vom Pfeil getroffen sank er nieder. Ich freue mich, dich zu sehen.*

Endlich die Conjunctionen: *Er ist gross und stark. Bring trockenes Holz, Feuer anzumachen, und Wasser. Er kam und sagte, er kam und ging wieder fort. Er ist nicht nur dumm, sondern auch boshaft. — Wir sahen weder Menschen noch Thiere. Ist die Stadt fern oder nahe? Willst du Wasser oder Milch? Giebt es Städte auf diesem Wege oder nur Wald? Giebt es viele Fische in diesem Flusse oder giebt es keine? Brechen wir heute oder morgen auf? Geht die Strasse geradeaus, oder wendet sie sich rechts ab oder links? Theils fehlte die Zeit, theils fehlte die Lust. Ich war reich, aber hatte kein Glück. Er ist klein, aber stark. Er ist noch nicht hier, sondern auf der Reise. Entweder du gehst mit mir, oder du bleibst zu Hause.*

Ich glaubte, er sei reich; nun höre ich, dass er arm ist. Er wusste nicht, dass es sein Sohn ist. Frage diesen Mann, wie er heisst; er fragte mich, ob ich krank sei. — Als ich kam, ging er fort. Als mein Vater starb, war ich noch klein. Wir alle sind ermüdet, die Kameele sind ermüdet; lasst uns absteigen und die Hitze im Schatten des Waldes verbringen; und wenn die Sonne sich abwärts neigt, lasst uns weiter reiten. Wenn du brav bist, werde ich dir eine Perle geben. Wenn ich jung wäre, würde ich mit dir gehen; wenn ich jung gewesen wäre, wäre ich mit dir gegangen. Wenn du früh aufbrichst, kommst du in einem Tage hin. Wenn ich ginge, würdest du mich begleiten? wenn ich gegangen wäre, wärest du mit mir gegangen? Wenn du Bösewicht nicht schnell davon läufst, werfe ich dir einen Stein an den Kopf (Lauf, oder ich werfe dir einen Stein an den Kopf). Nachdem die Sonne sich abwärts geneigt hatte, brachen sie wieder auf. Da sich die Sonne abwärts neigt, so wollen wir aufbrechen. Während ich schlummerte, drang ein Dieb in das Haus. Seit ich verheirathet bin, wohne ich hier. Ich wohnte schon hier, ehe mein Vater starb. Es ist zu weit bis zur nächsten Stadt, als dass wir heute noch hinkommen könnten. Er kam früher, als ich ihn erwartete. Ich blieb regungslos sitzen, als wäre ich vom Blitz getroffen. Er lief, als wäre er von Feinden verfolgt.

Je länger du bleibst, desto lieber ist es mir. Je älter er wird, um so mehr wird er arbeiten. Zeige mir, damit ich sehe. Ich strafe ihn, damit er sich bessere. Er grüsste mich, indem er sich verbeugte. Obwohl ich ihn bat, wollte er doch nicht mit mir gehn.

Er stieg auf das Pferd, das ihm sein Freund schickte. Der König hörte das Wort, das einer seiner Diener sprach. Gieb mir eine Person, die den Weg kennt. Wir waren an den Ort gekommen, wo er getödtet war. Ist die Stadt, woher du kommst, gross oder klein? Ist die Stadt, wohin wir reisen wollen, nahe oder fern? Leben in dem Walde, durch den wir gehen müssen, wilde Thiere? Die Männer, deren Kinder dort spielten, liefen hin. Wer kam, den tödteten sie. Darum komme ich; du weisst, weswegen ich komme. Dies ist es, weshalb ich so böse bin.

Ihr sprecht nicht, wie sie sprechen. Wie viel Personen hier sind, so viel Schlüssel gieb mir. Wo ihr auch sein möget, streitet euch nicht. Wen ihr auch fraget, jeder wird dasselbe antworten.

Was hier der Darstellung wegen zerlegt ist, dringt vereinigt auf den Reisenden ein. Er notire nur immer das Gehörte und was der nothwendige Verkehr ihn zu sagen zwingt. Es wäre ja unmöglich, alle grammatischen Rücksichten zugleich im Auge zu haben. Stellt er aber absichtlich sprachliche Erkundigungen an, so mag er die Reihenfolge innehalten, die bei den vorstehenden Bemerkungen über Grammatik befolgt ist. Nach der Analogie der gegebenen bilde er aus dem vorstehenden Vocabular neue Sätze.

Sobald sich dem Reisenden Zeit darbietet, analysire er die gewonnenen Sätze und ziehe daraus die Vocabeln und die grammatischen Momente. Dies wird einerseits seine Fortschritte fördern, anderseits ihm zeigen, was zur Vollständigkeit oder zur Sicherstellung und Aufklärung gewisser Formen und Wendungen noch fehlt, auch nach welcher Richtung das Vocabular zu vervollständigen ist.

Ist in einem Satze etwas zweifelhaft oder unklar, so bilde er analoge Sätze so lange, bis sich eine Regel ergibt. Ja auch dieselben Sätze lasse man sich von demselben Eingebornen oder Dolmetscher zu andern Zeiten

oder von Andern geben, um zu sehen, ob sich neue synonyme Wörter und Wendungen ergeben.

Hat der Reisende zu wenig Zeit für eine Sprache, so suche er kurzweg ausser den gesperrten Vocabeln die im Vorstehenden sich befindlichen Sätze übersetzt zu erhalten. Auf Uebersetzungen aber etwa des Vater-unser oder eines Stückes der Evangelien oder einer europäischen Fabel lasse er sich nicht ein.

Wir lassen endlich noch die von Darwin gestellten pathognomischen Fragen hier folgen und empfehlen dem Reisenden die Beachtung derselben:

1. Wird das Erstaunen dadurch ausgedrückt, dass die Augen und der Mund weit geöffnet und die Augenbrauen in die Höhe gezogen werden?

2. Erregt die Scham ein Erröthen, wenn die Farbe der Haut ein Sichtbarwerden derselben gestattet? und besonders, wie weit erstreckt sich das Erröthen am Körper abwärts?

3. Wenn ein Mensch unwillig oder trotzig ist, runzelt er die Stirn, hält er seinen Körper und Kopf aufrecht, wirft er seine Schultern zurück und ballt er die Faust?

4. Wenn er über irgend einen Gegenstand tief nachdenkt oder ein Räthsel zu lösen versucht, runzelt er die Stirn oder die Haut unterhalb der untern Augenlider?

5. Sind im Zustande der Niedergeschlagenheit die Mundwinkel herabgezogen und die innern Enden der Augenbrauen durch den Muskel, welchen die Franzosen den „Gram-Muskel“ nennen, emporgehoben? Die Augenbrauen stehen in diesem Zustande unbedeutend schräg, ihr inneres Ende ist leicht angeschwollen, und die Stirn ist im mittleren Theile quer gefaltet, aber nicht quer über die ganze Breite, wie dann, wenn die Augenbrauen beim Erstaunen in die Höhe gezogen werden.

6. Wenn der Mensch in guter Laune ist, glänzen dann die Augen, ist die Haut rund um sie und unter ihnen etwas gerunzelt, und ist der Mund an den Winkeln ein wenig nach hinten gezogen?

7. Wenn ein Mensch einen andern verhöhnt oder beissig anfährt, wird dann der Winkel der Oberlippe über dem Hunds- oder Augenzahn auf der Seite erhoben, auf welcher der so angeredete Mensch sich befindet?

8. Ist der Ausdruck des Mürrisch- oder Obstinatseins wiederzuerkennen, welcher sich hauptsächlich darin zeigt, dass der Mund fest geschlossen ist, die Augenbrauen etwas herabgezogen und leicht gerunzelt sind?

9. Wird Verachtung durch ein leichtes Vorstrecken der Lippen, durch Emporheben der Nase, verbunden mit einer leichten Expiration ausgedrückt.

10. Wird Widerwille dadurch gezeigt, dass die Unterlippe nach abwärts gewendet, und die Oberlippe leicht erhoben wird in Verbindung mit einer plötzlichen Expiration, bald so wie ein beginnendes Erbrechen oder als wenn etwas aus dem Munde ausgespuckt würde?

11. Wird die äusserste Furcht allgemein in derselben Weise ausgedrückt, wie bei Europäern?

12. Wird das Lachen jemals so weit getrieben, dass es Thränen in die Augen bringt?

13. Wenn ein Mensch zu zeigen wünscht, dass er irgend etwas nicht verhindern kann, oder dass er selbst etwas nicht thun kann, zuckt er dann mit den Schultern, wendet er seine Ellenbogen nach innen, streckt er seine

Hände nach aussen und öffnet er dieselben, wobei noch die Augenbrauen erhoben werden?

14. Wenn Kinder mürrisch oder eigensinnig sind, lassen sie dann den Mund hängen oder strecken sie die Lippen vor?

15. Kann Schuld oder Schlaueit oder Eifersucht im Ausdrucke erkannt werden.

16. Wird bei der Bejahung der Kopf in senkrechter Richtung genickt und bei der Verneinung nach den Seiten geschüttelt?

Allgemeine Bemerkungen über den Ausdruck sind von verhältnissmässig geringem Werthe; und das Gedächtniss ist so trügerisch, dass ich ernstlich bitte, ihm nicht zu trauen. Eine bestimmt abgefasste Beschreibung des Ausdrucks unter irgend einer Seelenerregung oder einem bestimmten Zustande des Geistes, mit einer Angabe der Umstände, unter welchen jene eintreten, würden grossen Werth für mich haben.

Soweit Darwin. Hier werde nur hinzugefügt, dass die Interjectionen, deren wir noch nicht gedacht haben, mit allen onomatopoetischen Elementen sowohl der Sprachwissenschaft sehr werthvoll werden können, als sie sich eng an Darwins Fragen anschliessen.

Anthropologie und prähistorische Forschungen.

Von

Rudolf Virchow.

Anthropologie im weiteren Sinne des Wortes umfasst die ganze Lehre vom Menschen, sowohl in physischer, als in psychologischer Beziehung. Im engeren Sinne beschränkt man sie auf die Erforschung und Darstellung der physischen Eigenschaften des Menschen, so jedoch, dass eine Reihe von Eigenthümlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens, welche durch wirkliche Naturobjecte, wie Nahrungsmittel, Geräth, Waffen, Schmuck, Bauten ausgedrückt werden, mit in die Betrachtung einbezogen werden. Diess gilt namentlich für die prähistorische (vorgeschichtliche) Anthropologie. Allein die Grenzen zwischen prähistorischen und historischen Gegenständen sind überaus schwankend. Nicht nur zu derselben Zeit bestehen an dem einen Orte geschichtliche, an dem andern vorgeschichtliche Zustände, so dass z. B. das Innere Australiens noch der Vorgeschichte angehörte, als grosse Abschnitte seiner Küstenländer gut gekannt waren, dass man von der Existenz der neuen Welt noch nichts wusste, als die alte Welt schon seit Jahrtausenden der wirklichen Geschichte erschlossen war, — sondern es können auch geschichtliche und nicht geschichtliche Zeiten mit einander abwechseln, wie das Beispiel von Ostdeutschland zeigt, welches in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung dem römischen Handel geöffnet war und sich mit der Völkerwanderung wieder auf Jahrhunderte schloss. Die Wanderungen der Polynesier, wie die der Arier sind zum grössten Theil vorhistorisch; nichtsdestoweniger wird durch eine umsichtige Erforschung der Sprachen und Sagen der einzelnen Völker des fernen Ostens, in Verbindung mit einer Feststellung der physischen Verwandtschaftsverhältnisse, der Hausthiere, der Kriegs- und Hausgeräthe, allmählich eine Art von geschichtlichem Verständniss erschlossen, welches weit über die eigentliche oder geschriebene Geschichte Oceanians hinausreicht. Damit ist zugleich eine der Hauptrichtungen der modernen Anthropologie angedeutet, diejenige nämlich, welche es sich zur Aufgabe stellt, die Entwicklungsgeschichte der Menschheit zu ermitteln.

Allerdings hat auch diese Entwicklungsgeschichte einen doppelten Weg. Der eine verfolgt die Frage der physischen Entwicklung. Wie ist der Mensch entstanden? Wie haben sich die einzelnen Rassen und Stämme gebildet? Haben alle Menschen, gleichviel welcher Rasse oder welchen Stammes,

eine gemeinschaftliche Abstammung oder giebt es mehrere Urrassen? Entscheidet man sich für die Einheit des Menschengeschlechts, wo war sein Ursitz und wie gestalteten sich von da aus die auseinandergehenden Wanderungen und Verzweigungen der Geschlechter? Und wiederum, wenn „erste Menschen“ die Ahnen der ganzen Menschheit waren, stammten sie ihrerseits von anderen Geschöpfen ab, von denen sie sich allmählich durch eine fortschreitende Ausbildung ihrer Organisation entfernten?

Der andere Weg ist der der Culturgeschichte, deren Anfänge in die Archäologie und in die Paläontologie zurückführen. Ist die menschliche Organisation so eingerichtet, dass derselbe Gang der geistigen Entwicklung oder doch wenigstens ein ganz ähnlicher an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten aus einer inneren Nothwendigkeit gefunden wurde und dass, unabhängig von einander, verschiedene Völker dieselben Erzeugnisse der Arbeit hervorbrachten, dieselben Methoden der Technik entdeckten, dieselben Erfindungen machten? oder war es nur die Ueberlieferung von Mensch zu Mensch, von Stamm zu Stamm, welche die einmal gefundenen Kenntnisse übermittelte, und ohne welche ein grösserer Fortschritt überhaupt nicht geschehen ist? Nirgends ist die Entscheidung folgenreicher, weil jede Einseitigkeit und Voreiligkeit die grössten Trugschlüsse in Bezug auf die höchsten Fragen der Menschheit nach sich zieht.

Warum sollte nicht, was ein Mensch erfindet, von hundert anderen in gleicher Weise erfunden werden? Und warum sollte nicht, was einmal erfunden ist, auf dem Wege der Ueberlieferung sich im Laufe langer Zeiträume zu allen Menschen verbreiten können? Theoretisch ist das eine, wie das andere möglich; in Wirklichkeit handelt es sich aber darum, die Merkmale zu ermitteln, an welchen die spontane Erfindung und die bloss traditionelle Mittheilung erkannt und unterschieden werden können. Die Bearbeitung der Steine gehört sicherlich zu den frühesten Erfindungen des Menschen; aber berechtigt uns die grosse Uebereinstimmung in der Methode dieser Bearbeitung, welche bis in die ältesten Zeiten der Vorgeschichte zurückreicht, zu dem Schlusse, dass diese Bearbeitung von einem Menschen oder einem Stamme erfunden ist und schon in der Zeit des Mammuth den sämmtlichen, damals lebenden Stämmen mitgetheilt war?

In den verschiedensten Welttheilen haben sich gewisse Brennpunkte der Cultur gebildet, überall entzündet durch die Arbeit gewisser bevorzugter Volksstämme. So in Asien jene uralten Herde der Bildung in Indien, in China und Japan, in Assyrien und Phönicien, so in Aegypten, in Griechenland und Italien, in Mexiko und Peru. Von einigen derselben hat sich die Cultur nachweisbar in weiter Ueberlieferung zu einem grossen Kreise anderer Völker verbreitet: die westasiatischen Culturländer, Aegypten, endlich die südeuropäischen Gebiete gelten mit Recht als die Ursitze derjenigen Erkenntniss, welche endlich unter dem Zusammenwirken romanischer und germanischer Nationen die moderne Cultur geschaffen hat. In Hinterasien und Amerika dagegen schliesst sich die besondere Cultur auch der am meisten fortgeschrittenen Völker in engere Grenzen; sie bleibt gleichsam ein Geheimgut, welches vor jeder Berührung mit der Aussenwelt gehütet und dadurch selbst in jene starren Formen gebannt wird, welche der Auffassung des Occidents gänzlich fremdartig entgegenstehen.

Aber gleichviel, welches das spätere Geschick dieser Culturen war, anthropologisch betrachtet, bieten sie ein grösseres Interesse in ihren Anfängen, gleichsam in ihren Anlagen, als in ihrer weiteren Ausbildung. Wie entstanden sie? wo hatten sie ihre Wurzeln? Ueberall, auch in den ältesten

Culturländern, stossen wir bei genauerer Nachforschung auf noch ältere Bevölkerungen. Viele Culturvölker betrachteten sich als die ersten Bewohner ihres Landes, sie nannten sich Eingeborene (Aboriginer, Autochthonen), aber die anthropologische Forschung zeigt fast überall noch frühere Eingeborene. In Indien und Japan, in Assyrien und Aegypten, in Griechenland und Italien enthüllt uns der geöffnete Schooss der Erde die Ueberreste älterer Aboriginer, und diejenigen, deren späte Enkel sich diesen Namen beileigten, werden zu Einwanderern, welche die frühere Bevölkerung entweder verdrängten oder vernichteten, oder in sich aufnahmen und ein neues Mischvolk zeugten, dessen Elemente ganz verschiedene Herkunft haben.

Diese Elemente auseinander zu lösen, ist eine der Aufgaben der Anthropologie. Sie lässt sich natürlich nur local lösen. Denn die Anthropologie kann, wie die Paläontologie, die zeitliche Aufeinanderfolge der lebenden Geschlechter mit Sicherheit nur an bestimmten Oertlichkeiten feststellen, indem sie gleichsam Schicht um Schicht eine Einwanderung nach der anderen (falls überhaupt mehrere stattfanden) abschält, um endlich den Untergrund der Urbevölkerung bloss zu legen. Erst, wenn diess an einer Reihe einzelner Orte geschehen ist, beginnt die Combination der Localerfahrungen zu einem grösseren culturgeschichtlichen Bilde. Ohne eine genaue Vorkenntniss der Volksschichtungen ist es unmöglich zu erforschen, welche körperlichen und geistigen Eigenschaften jeder einzelne Stamm in die spätere Vereinigung oder Mischung eingebracht hat, unmöglich zu bestimmen, welches Verdienst jedes Volk um die Anhäufung der materiellen oder ideellen Reichthümer der schliesslichen Gemeinschaft sich erworben hat. Welcher Stamm hat zuerst den Stein polirt? welcher hat zuerst Feuer gemacht? welcher Metalle bearbeitet? welcher Hausthiere gezogen? welcher Getreide gebaut und nutzbare Bäume gepflanzt? welcher Staaten gegründet? welcher Schriftzeichen gebraucht?

Diese Fragen, welche sich leicht vervielfältigen lassen, sind vielleicht zu einseitig gestellt. Es mag sein, dass das Steinschleifen, das Feuermachen, die Metallbearbeitung, das Schreiben an mehreren Orten erfunden und ausgebildet worden sind, aber nichts berechtigt vorläufig zu der Annahme, dass diess an vielen Orten unabhängig geschehen sei. Die grossen Erfindungen sind sehr schwierige Dinge, und die Stämme, welche früh isolirt wurden, wie die Australier, haben ein sehr geringes Maass von Culturfortschritten aufzuweisen, obwohl die Noth, die grosse Lehrmeisterin, ihnen Jahr für Jahr sehr nahe tritt. Die Kenntniss der Naturvölker, von denen jetzt eines nach dem andern durch die Einwanderer erdrückt oder aufgezehrt wird, hat der modernen Anthropologie für die Erforschung der prähistorischen Urvölker die wichtigsten Hilfsmittel dargeboten. Gerade desshalb ist es eine der ernstesten Aufgaben unserer Zeit, die Eigenthümlichkeiten der noch vorhandenen Naturvölker so genau wie möglich festzustellen, alle noch vorhandenen Ueberreste ihrer Cultur sorgfältigst zu sammeln, und der Nachwelt, welche bald dieses Mittels der Untersuchung beraubt sein wird, eine Literatur zu hinterlassen, welche reicher und vollständiger, als es für uns die klassische Literatur gelöst hat, die Quellen für eine vergleichende Wissenschaft vom Menschen zu erhalten im Stande ist.

Was hier von den Naturvölkern gesagt ist, gilt in gewissem Sinne auch von den eigentlichen Culturvölkern, zunächst von denen mit höherer oder abgeschlossener Cultur. Die letzten derselben, Inder, Chinesen und Japanesen, werden täglich mehr den Einwirkungen der occidentalischen Cultur zugänglich; Kleidung und Sprache, Sitten und physische Erscheinung, die

Methoden der Kunst und des Handwerks, die Formen der Gesellschaft und des Staates verändern sich, und bald werden Bücher, Abbildungen, Knochen und Arbeitserzeugnisse auch in Bezug auf sie die alleinigen Mittel sein, die Besonderheit ihrer Entwicklung späteren Geschlechtern zu verdeutlichen.

Die modernen Culturvölker befinden sich ihrerseits in beständiger Umwälzung, wenn auch der Charakter der Reform im Allgemeinen dem Gange ihrer Entwicklung in höherem Maasse eigen ist. Die volksthümliche Ueberlieferung ist überall im Aussterben, die alten Sagen gerathen in Vergessenheit und in vielen Ländern Europa's finden sich nur noch wenige älteste Leute, welche als lebendige Zeugen einer fast verschollenen Anschauung übrig geblieben sind. Die freiere Bewegung der Massen bedingt immer neue Mischungen des Blutes und der Vorstellungen. Das fortschreitende Wachsthum der grossen Städte tödtet die Erinnerung an die bis dahin lebendige Vergangenheit. Die Provinzen bringen ihre Besonderheiten zum Opfer in dem nationalen Aufbau der Staaten, und auch die Staaten selbst werden mehr und mehr genöthigt, sich dem Allen gemeinsamen Gange der occidentalischen Cultur zu fügen. Das internationale Wesen entfaltet sich immer gewaltiger trotz aller Intensität der nationalen Bewegungen. So ist auch hier viel zu fixiren, was der grosse Strom der Geschichte schnell hinwegschwemmen dürfte; ja man kann dreist behaupten, dass Vieles unrettbar verloren sein würde, wenn die gegenwärtige Generation nicht wenigstens die Erinnerung daran sicher stellt.

Aus dem Mitgetheilten ergibt sich von selbst, wohin die Nachforschungen und Sammlungen der Reisenden zu richten sind. Einzelne Rathschläge sind hauptsächlich in zwei Richtungen zu ertheilen:

1) Prähistorische Aufgaben.

Die vorgeschichtliche Archäologie wird gegenwärtig überall in 3 grössere Perioden eingetheilt: die Steinzeit, die Bronzezeit und die Eisenzeit. Freilich fehlt an nicht wenigen Orten die Bronzezeit gänzlich, oder sie wird durch eine blosse Kupferzeit ersetzt. Man kann daher etwas allgemeiner eine vor-metallische und eine metallische Zeit unterscheiden, wobei sich für jede derselben je nach den Eigenthümlichkeiten des Ortes eine Reihe von Unterabtheilungen aufstellen lässt. So hat man die Steinzeit in eine ältere (paläolithische) und eine jüngere (neolithische) geschieden, je nachdem die Steingeräthe bloss geschlagen wurden und in dieser rohen Form zur Verwendung kamen, oder geschliffen (polirt) wurden. Aber das Beispiel mancher Polynesier, die noch heute kein Thongeräth besitzen, aber wohl polirtes Steingeräth, belehrt uns, dass jene Abtheilungen nur einen beschränkten Werth für das Verständniss des Gesamtbildungsstandes eines Volkes haben, denn es ist sicherlich ein sehr erheblicher Unterschied, ob ein Volk der älteren Steinzeit die Kunst der Topfbereitung kannte oder ob dieselbe noch einem Volke der jüngeren Steinzeit unbekannt geblieben ist. Es wird daher überall nöthig sein, sich nicht auf vereinzelte Merkmale zu beschränken. Namentlich ist überall auf das Sorgsamste zu beachten, welche Nahrung das Volk genoss, ob es z. B. nur wilde Thiere, Fische, Muscheln oder auch Hausthiere und welche benutzte. Alle Arten von Knochen, Geräthen, Muscheln und Schalen auf alten Wohn- und Rastplätzen sind daher sorgsam zu sammeln.

Im Allgemeinen wird anzunehmen sein, dass die Bildung der Erdoberfläche auch zur Zeit der ältesten Steinzeit schon der gegenwärtigen entsprach.

Nichtsdestoweniger wissen wir, dass manche geologische Vorgänge, namentlich vulkanische Ausbrüche, Torf- und Moorbildungen, Fluss- und Seeanschwemmungen Menschen mit ihren Wohnungen oder Geräthen überdeckt haben. Auch ist die Frage noch unentschieden, ob nicht schon in der Zeit der Tertiärformation der Mensch gelebt hat und ob nicht seine Knochen und seine Geräthe, namentlich steinerne, als wirkliche Bestandtheile in ältere sedimentäre Bodenschichten aufgenommen worden sind. Ueberall, wo sich ein Verdacht dieser Art ergibt, sind die einzelnen Schichten des Erdbodens in ihrer Reihenfolge genau aufzunehmen, ihre Mächtigkeit zu messen, Proben davon zu sammeln, vor Allem aber die eigentliche Fundstelle mit minutiöser Genauigkeit zu messen und zu beschreiben. Die Möglichkeit, dass durch Verschüttung oder Beerdigung erst später die gefundenen Gegenstände an eine solche Stelle gelangt sind, ist klar ins Auge zu fassen und alle darauf bezüglichen Merkmale sind niederzuschreiben.

Von entscheidender Wichtigkeit für diese ältesten Funde sind die gleichzeitigen Thiere, namentlich die ausgestorbenen Säugethiere und Vögel. Nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, in Amerika und in Neuseeland ist es nicht mehr zu bezweifeln, dass der Mensch noch mit solchen jetzt ausgestorbenen Thieren zusammen gelebt hat. Freilich waren nicht alle diese Thiere „vorweltliche“ oder „vorsündfluthliche“. Die grossen Vögel Neuseelands sind wahrscheinlich zu Grunde gegangen, wie, bis auf wenige, künstlich gehegte Exemplare, der Auerocke und das Elenthier Europa's, vernichtet durch späte Geschlechter von Menschen. Es ist ferner wohl zu unterscheiden, ob es sich um Thiere der Diluvial- oder Quaternärzeit oder um solche der Tertiärzeit handelt. In dieser Beziehung wäre es von höchster Bedeutung, den Spuren untergegangener und in älteren Erdschichten wenigstens in ihren Knochen erhaltener Geschlechter von Affen und Halbaffen nachzuspüren, wie sie in den letzten Jahrzehnten in immer häufigerer Folge in Europa (Frankreich, Griechenland) und Asien aufgefunden sind. Ganz besondere Aufmerksamkeit verdienen Madagascar, Ostindien und die Sunda-Inseln, welche noch heute zahlreiche Halbaffen und einige der höchststehenden (anthropoiden) Affen beherbergen. Möglicherweise könnte auch das Festland von Afrika für diese Seite der Forschung Material liefern. Mag man nun die Frage von der Menschen-Entstehung im Sinne der Descendenzlehre oder in dem der Schöpfungslehre auffassen, immer wird es seinen grossen Werth haben, wenn es gelingen sollte, neue, dem Menschen nahe stehende Affen oder Halbaffen, wenn auch nur geologisch, aufzufinden.

Die ältesten Wohnstätten des Menschen, welche man kennt, sind Höhlen, namentlich Höhlen der Kalkgebirge. Nicht nur in Europa (Westfalen, Nassau, Franken, Schwaben, Polen, Oesterreich, Belgien, England, Frankreich, Italien, Spanien), sondern auch in Brasilien, in Südafrika, auf den Philippinen u. s. f. kennt man diese Höhlenwohnungen. In der Mehrzahl derselben ist durch hindurchströmende Bäche oder eintretende Wässer und Seen die ursprüngliche Beschaffenheit des Bodens verändert; Sickerwasser hat nicht bloss die Wände mit Stalaktiten bekleidet, sondern auch den Boden mit harten Tropfsteinplatten bedeckt; von der Decke und den Wänden sind kleinere oder grössere Stücke des Felsens herabgestürzt oder es ist im Laufe von Jahrhunderten die verwitternde Oberfläche als ein feines Pulver herabgefallen und hat sich in zuweilen sehr mächtigen Schichten auf den Boden abgelagert. Diese Deckschichten müssen erst vorsichtig durchbrochen oder weggenommen werden, ehe man auf jenes Niveau gelangt, auf welchem die alten Troglodyten lebten. Hier erst, meist eingeschlossen von Sickermasse oder „Höhlenlehm“, und nur

mit grösster Vorsicht unversehrt daraus zu gewinnen, finden sich die Ueberreste der Vorzeit. Hier liegen namentlich die Knochen der verspeisten Thiere, des Wildes, des Geflügels, der Fische, meist gespalten oder wenigstens zerbrochen, auch wohl benagt, geschnitten oder gesägt. Auf die Jagdbeute, welche in den ältesten Höhlenwohnungen allein gefunden wird, folgen oft früh die Knochen von Hausthieren oder wenigstens von gezähmten und gewöhnlich eingeführten Thieren: der Jäger wird zum Hirten und dieser zum Viehzüchter. Die Fischerei, zuerst mehr auf die Schalthiere und die schwerer beweglichen Bewohner des Wassers gerichtet, erreicht bald auch die eigentlichen Fische, selbst die grösseren, welche nur mit künstlichem Geräth gefangen werden können. Höchst vereinzelt finden sich Reste vegetabilischer Nahrung. Dagegen hat man vielfach einzelne Menschenknochen aus diesen Schichten unter sehr verdächtigen Zeichen aufgehoben; wie noch bis auf unsere Tage die Fidji-Leute ihre kannibalischen Schmäuse in Berghöhlen gefeiert haben, so mögen wohl auch an anderen Orten vorgeschichtliche Kannibalen der Anthropophagie gefröhnt haben. Indess fehlt noch viel dazu, dieser Möglichkeit in unseren Vorstellungen von der Vorgeschichte des Menschengeschlechts eine solche Sicherheit und Ausdehnung zu gewähren, wie es Manche thun, denen die Menschenfresserei als ein nothwendiges Durchgangsstadium der menschlichen Cultur überhaupt erscheint. Nur zu oft hat man Menschenopfer, die gewiss zahlreich genug an vielen Orten vorgekommen sind, und Menschenfresserei mit einander verwechselt. Darum wird es sehr genauer Erhebungen über die Einzelheiten der Funde bedürfen, um zu entscheiden, in welche Gruppe der einzelne Fall zu stellen ist.

Dabei ist zugleich zu beachten, dass es auch in vorhistorischer, wie in historischer, Zeit Höhlen gegeben hat, welche zur Bestattung und Beisetzung der Todten gedient haben, ja sogar solche, in welchen einzelne Theile der Höhle oder Nebenkammern zur Leichenbestattung, die Haupthöhle als Wohn- oder Rastplatz gedient haben. In allen solchen Fällen sind nicht nur die menschlichen Knochen, namentlich die Schädel möglichst vorsichtig loszulösen und zu sammeln, sondern auch alle Zugaben zusammenzuhalten und die Lage, die Umgebungen und Bedeckungen der Knochen protokollarisch festzustellen.

Manche Höhlen haben nur wilden Thieren, manche sogar nur „vorweltlichen“ zum Aufenthalt oder als Zufluchtsstätten gedient. In anderen ist der Mensch diesen Thieren gefolgt, und während die tieferen Schichten des Höhlenlagers oder des Tropfsteins nur Thierknochen einschliessen, finden sich in höheren auch die Ueberreste des Menschen selbst oder seiner Thätigkeit. Ja, es lassen sich hier zuweilen mehrere Etagen unterscheiden, welche den verschiedenen Epochen der vorgeschichtlichen Zeit angehören, so z. B. dass tiefere Etagen mit den Spuren des Menschen die Reste des Mammuth, höhere die des Renthiers, noch höhere die der heutigen Hausthiere vereinigt zeigen. Hat man doch in Frankreich und der Schweiz unzweifelhafte Zeichnungen und Schnitzwerke des Menschen aus jener ältesten Zeit auf Mammuth-Elfenbein und Renthierknochen aufgefunden.

Die Werke der menschlichen Hand sind natürlich in allen Schichten von höchster Bedeutung, auch wenn sie die allerrohesten sind. Einzelne Stücke von Feuerstein, Obsidian, Kieselschiefer, wenn sie Merkmale willkürlicher Zuschlagung darbieten, sind wichtig, so klein und so roh sie übrigens auch sein mögen, und sie sollten stets aufbewahrt werden, um einer wiederholten Nachprüfung unterworfen werden zu können. Topfscherben, zumal verzierte, und wenn sie noch so geringfügig erscheinen, sind geeignet,

werthvolle Anhaltspunkte für die Vergleichung zu bilden. Knochen oder Geweihstücke, welche geschnitten, gesägt oder nur geklopft sind, oder welche durch irgend einen andern Umstand die Einwirkung des Menschen erkennen lassen, Muschelschalen und Thierzähne, welche durchbohrt oder zerschnitten sind, müssen stets als Gegenstände besonderer Aufmerksamkeit gelten.

Dass endlich die Höhlen selbst, das Gestein, in welchem sie liegen, ihre Gestalt und Grösse, ihre Höhenlage, ihre Zugänglichkeit von mehreren Seiten, namentlich von oben her, die Zahl und Höhe der in ihnen enthaltenen Absätze mit Originalproben aufgenommen werden müssen, darf wohl kaum erwähnt werden.

Nächst den Wohn- und Grabhöhlen kommen vorzugsweise in Betracht die im Freien gelegenen Wohnplätze der vorgeschichtlichen Menschen. Unter ihnen haben ganz besondere Aufmerksamkeit erregt die zuerst in Dänemark aufgefundenen Küchenabfallshaufen (Kjökkenmøddinger), welche besonders häufig in Küstengegenden vorkommen und ausser spärlichen Säugethierresten hauptsächlich Muschelschalen enthalten. Manchmal bilden dieselben förmliche Berge. Solche Muschelberge sind unter dem Namen der Casqueiros oder Sambaquis an der Küste von Brasilien, unter dem der Paraderos in Patagonien, mehrfach beschrieben; sie finden sich an der Küste von Chile, auf den Andamanen u. a. Bis jetzt sind nur wenige Schädel von Menschen aus ihnen bekannt und deren Lage und Fundverhältnisse wenig genau ermittelt. Eine weitere Aufmerksamkeit auf dieselben ist dringend geboten, da die sonstigen Einschlüsse es wahrscheinlich machen, dass diese Haufen und Berge aus sehr verschiedenen Zeiten stammen und sehr verschieden lange vergrössert worden sind.

Ein besonderes Verhältniss ist hier vielleicht am besten anzuschliessen: das Vorkommen menschlicher Arbeitsprodukte im Guano der peruanischen Inseln. Unter ihnen sind namentlich Statuetten in Holz, deren Bedeutung bis jetzt nicht ganz klar ist, zu erwähnen. Weder chronologisch, noch geologisch ist die Geschichte dieser Einschlüsse bis jetzt so genau verfolgt, als die Eigenthümlichkeit der Gegenstände es erfordert.

An anderen Orten findet man die Reste alter Wohn- und Rastplätze in der Erde. An einzelnen Orten Europa's, wie in Schussenried (Schwabens) und unter der Stadt Bordeaux, sind uralte Wohnplätze aufgedeckt worden, welche später von alluvialen oder selbst glacialen Bodenschichten überschüttet wurden. Die Wohnstätte des Urvolkes von Schussenried, welche der Renntierzeit angehört, hat eine um so grössere Bedeutung erlangt, weil hier sogar noch erhaltene und erkennbare Ueberreste borealer Pflanzen, namentlich Moose, als Zeugnisse des damals, am Schlusse der Eisperiode, ganz verschiedenen Klimas dieser Gegend entdeckt wurden. An zahlreichen anderen Orten findet man künstliche Erdhöhlen, Trichter oder Gruben, welche Kohlen, Thierknochen, Körner von Pflanzen, Topfscherben, Klumpen von gebranntem Lehm und andere Zeichen menschlicher Thätigkeit enthalten. Ob es sich hier um wirkliche Wohnungen, oder um blosse Herdstellen, Keller u. dgl. handelt, lässt sich nur durch eine umsichtige Blosslegung und Ermittlung aller Einzelheiten feststellen. So sind namentlich die Abdrücke pflanzlicher Theile in dem Lehm der früheren Wände geeignet, Aufschluss über etwaigen Ackerbau der Bewohner zu geben. Die erste Aufmerksamkeit auf diese Stellen wird gewöhnlich durch die schwarze, kohlige Färbung des Erdreichs an zufälligen Durchstichen oder der beackerten Oberfläche erregt. Endlich giebt es Steinhäuser, wie sie

noch heutigen Tages die Eskimo errichten, und andere Steinbauten, welche die längere Anwesenheit des Menschen an diesen Stellen anzeigen.

Auf der Grenze zwischen eigentlichen Wohn- und blossen Zufluchtsstätten stehen die Sumpfhörste. Hier finden sich auf natürlichen festeren Stellen, Halbinseln und Inseln, oder auf künstlich, zuweilen wallartig angelegten Erhöhungen Reste von Nahrung und Hausgeräth, auch wohl Waffenstücke, Feuerstellen, welche geeignet sind, Zeit und Art der Benutzung zu erläutern. Sumpfburgen, wie die italienischen Terramaren sie zum Theil darstellen, und wie sie auch in Frankreich, Deutschland u. s. w. vorkommen, verdienen eine besondere Berücksichtigung.

Wir können hier vielleicht am zweckmässigsten die Pfahlbauten anreihen. Als man sie zuerst durch die schweizer Entdeckungen würdigen lernte, legte man der Erfahrung, dass noch gegenwärtig viele Küsten- und Inselvölker des indischen und des stillen Oceans, ja selbst Binnenstämme Afrika's, regelmässig auf Pfählen ihre Wohnungen, nicht nur über dem Wasser, sondern hier und da auch auf dem Lande errichten, wenig Werth bei. Noch jetzt verbinden Manche mit dem Namen der Pfahlbauten regelmässig den Begriff urältester Wohnungen der Steinzeit, obwohl die weitergehende Forschung gelehrt hat, dass selbst in Europa noch bis in die historische Zeit hinein in sehr verschiedenen Ländern Pfahlbauten im Gebrauche waren. Es wird also überall mit grosser Kritik zu untersuchen sein, ob man es mit vorhistorischen oder mit späteren, ja vielleicht selbst mit ganz modernen Pfahlbauten zu thun hat, wie es denn selbstverständlich ist, dass zur Annahme eines Pfahlbaues nicht bloss der Nachweis von Pfählen, sondern auch der Nachweis einer Bewohnung desselben, also namentlich das Vorkommen von Resten menschlicher Thätigkeit im Grunde des See's oder Meeres zwischen den Pfählen nöthig ist. Meist lässt sich erst aus diesen Ueberresten ermitteln, welcher Zeit oder Culturperiode der Bau angehört hat.

Obwohl bis jetzt aus aussereuropäischen Ländern über vorhistorische Pfahlbauten wenig Sicheres vorliegt, so lässt sich doch mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuthen, dass an vielen Orten Spuren davon aufzufinden sein müssen, wenn erst Meere und Sümpfe, Fluss- und Seeufer genauer darauf untersucht und vorkommende Gelegenheiten von Entwässerungsanlagen, Hafen- und Strassenbauten, mehr benutzt werden. Wo alte Pfähle im Wasser bemerkt werden, da kann durch Dreggen mit dem Schleppnetz und Ausschaufeln des Seegrundes oder des Flussbettes der Versuch der Hebung versunkener Gegenstände gemacht werden. Zeigen sich Spuren wirklicher Pfahlbauten, so sind einzelne Pfähle ausziehen und die Art ihrer Bearbeitung, namentlich die Zuschärfung und Behauung (ob mit bloss steinernen oder mit metallischen Werkzeugen) zu prüfen, auch die Art des weiteren Aufbaues zu ergründen.

Vorgeschichtliche Befestigungen, namentlich Erd- und Steinwälle, hölzerne Umfriedigungen, sind auch ausserhalb Europa's, namentlich in Nord-America (mounds), sehr zahlreich aufgefunden worden. Sie fehlen auch in Süd-Africa und Polynisien nicht. Indess ist unsere Gesamtkenntniss solcher Anlagen noch sehr beschränkt. Gerade in den aussereuropäischen Culturländern sollte man sie in grösserer Zahl erwarten. Umfang, Form, Lage, etwaige Ausstattung mit Brunnen oder Cisternen, bei Steinwällen die Art des Aufbaues, die Anwendung von Mörtel, das Vorkommen von Feuerwirkungen, wie bei den europäischen Glasburgen und Schlackenwällen, sind genau zu verzeichnen. Auch das Vorkommen älterer

Ueberreste in dem Boden dieser Anlagen ist durch Nachgrabung zu ermitteln.

Sodann sind zu erwähnen vorgeschichtliche Arbeitsplätze. Hierhin gehören namentlich die alten Werkstätten des Steingeräthes, wie sie fast überall in Europa und neuerlich auch in Aegypten nachgewiesen sind, erkannt an zahlreichen Splittern des verarbeiteten Gesteins und an zerbrochenen Werkstücken, zuweilen auch an verlorenen, weiter ausgeführten Geräthen, an Scherben von alten Thongefässen, Kohlenheerden, Thierknochen u. s. f. In Belgien und England hat man sogar Schächte oder Brunnen gefunden, welche zur bergmännischen Gewinnung des Feuersteins in kreidehaltige Schichten niedergesenkt worden sind. Alte Mühlsteine, kleinere und grössere Schleifsteine, die sogenannten Kerne (*nuclei*, *noyaux*), d. h. Steine, von welchen durch regelmässige Absplitterung scharfe, schneidende oder stechende Bruchstücke gewonnen sind und welche daher durch zahlreiche, meist längliche Splitterungsflächen eine polygonale Gestalt angenommen haben, sind besonders charakteristisch. In Bezug auf die Metallbearbeitung sind alte Schlackenhaufen, Gussformen, Bruchstücke früherer Geräthe, Metallbarren, hier und da auch Spuren bergmännischer Gewinnung von Metall zu beachten. Töpferwerkstätten, alte Ziegeleien, Glasflüsse u. s. w. werden leicht erkannt werden können.

Vorgeschichtliche Opferplätze und Gerichtsstätten, namentlich solche, welche durch besondere Steinstellungen oder bearbeitete Steine, zumal Opferbecken mit Ausflussrinnen oder sonstigen Verzierungen ausgezeichnet sind, haben eine hervorragende Bedeutung. Ueberall ist hier auch der umliegende Boden zu durchgraben und nach Ueberresten zu forschen, welche die Zeit und die Art der Benutzung genauer erkennen lassen könnten. Auch für religiöse Uebungen sind offenbar an manchen Orten schon früh abgelegene Gebirgsschluchten oder Felshöhlen benutzt worden und man findet in denselben Menschen- und Thierknochen, Thon-, Stein- und Metallfiguren, allerlei mystische Geräthe. Plastische Nachbildungen, wie man sie in Puerto-Rico, Haiti, Mittelamerika, Sibirien u. s. w. aus Thon, Stein, Gold und Bronze gewonnen hat, bieten für die weitere Erforschung der mythologischen Vorstellungen die wichtigsten Anhaltspunkte.

Uebersaus zahlreich sind in allen Continenten Felsenzeichnungen aus vorgeschichtlicher Zeit. Meist an steilen Felswänden sind einfache Zeichen, wirkliche Figuren, Hieroglyphen eingeritzt. An manchen Orten, z. B. auf Haiti sind die Wände bewohnter oder sonst benutzter Felshöhlen, an anderen die inneren oder äusseren Flächen von Steinhäusern mit solchen Zeichnungen bedeckt. Hier ist eine möglichst genaue Abzeichnung oder ein Gypsabdruck oder sonst eine Abnahme in Stanniol u. s. w. zu veranstalten, auch die Stelle der Zeichnung recht genau zu bestimmen.

Die in Europa ergiebigste, in den meisten aussereuropäischen Ländern noch wenig ausgenutzte Quelle der vorhistorischen Kenntnisse sind die Gräber. Sie enthalten nicht nur Ueberreste der alten Menschen selbst, sondern auch zahlreiche Beigaben der allerverschiedensten Art. Wo Leichenbrand stattgefunden hat, da ist die Asche oder genauer der Ueberrest von calcinirten Knochen häufig in besonderen Gefässen, namentlich thönernen Urnen beigesetzt. In manchen Höhlen finden sich Baumstämme oder hölzerne Särge mit den Ueberresten der Entseelten. Die Gräber selbst sind sehr verschiedenartig, manchmal mit Erdhügeln bedeckt, andermal mit grossen Steinkreisen eingefasst oder mit Steinmänteln umgeben, andermal flach; manche liegen vereinzelt, andere in grösseren Gruppen oder Reihen bei

einander. Nicht wenige enthalten besondere Steinkammern, auch wohl mit längeren Zugängen (Ganggräber). Wo Leichenbestattung vorgenommen ist, da sind nicht selten mit dem Todten Sklaven oder Kriegsgefangene oder Familienangehörige, auch wohl Pferde und andere Haus- oder Opferthiere, Waffen, Schmucksachen und andere Geräthe mit beigesetzt worden. Die Stellung der Leichen ist gleichfalls sehr verschieden: viele liegen horizontal, bald den Kopf nach Westen, bald nach Osten gerichtet; andere sind in hockender oder fast stehender oder sitzender Stellung beigesetzt. Alle diese Verhältnisse müssen genau angegeben und sämtliche Gegenstände von einiger Bedeutung aus den geöffneten Gräbern gesammelt werden. Die Eröffnung der Gräber muss sehr vorsichtig, Schicht um Schicht, erfolgen, entweder so, dass von einer Seite her das Grab ausgeräumt wird, oder so, dass die ganze Oberfläche schichtweise abgetragen wird. Kommt man auf die Leichen oder auf Geräthe, so ist jede Uebereilung in der Herausbeförderung zu vermeiden. Die einzelnen Theile müssen in ihrer natürlichen Lage allmählich, am besten mit kleinen Spaten oder Messern oder Löffeln, von der umgebenden Erde isolirt und wenigstens für einige Zeit der Luft ausgesetzt werden, damit sie wieder trocken und hart werden. Sonst läuft man Gefahr, nichts ganz aus der Erde heraus zu befördern.

Eine besondere Erwähnung verdienen endlich die Mumien, wie wir sie vorzugsweise aus Nordafrika, von den Canarischen Inseln und aus Peru kennen. Hier ist es überall wünschenswerth, die ganzen Mumien mit ihrer Umhüllung nach Europa zu bringen, und nicht etwa bloss die Köpfe abzunehmen, sondern mindestens das ganze Skelet, am besten jedoch auch die noch vorhandenen Weichtheile, namentlich Haut und Haare zu erhalten. Die Art der Umgürtung mit Stricken oder Tüchern u. s. w. ist für die vergleichende Betrachtung von grosser Bedeutung, wie denn überhaupt auch in diesem Falle ein genauer Fundbericht und eine Sammlung aller sonstigen Beigaben empfohlen wird.

Die sogenannten megalithischen Monumente, umfangreiche, aus mächtigen Steinblöcken errichtete Bauten, sind entweder als Grabdenkmäler, oder als Culturplätze errichtet worden. Ihre Verbreitung, anfangs nur in England, Frankreich, Deutschland und Skandinavien genauer verfolgt, ist in neuerer Zeit weit über die Grenzen Europa's hinaus bekannt geworden. Nicht nur in Nordafrika, sondern auch in Asien, namentlich in den Gebirgsgegenden von Ostindien sind zahlreiche Monumente dieser Art aufgefunden und beschrieben worden. Indess ist es immer noch nicht gelungen, das gegenseitige Verhältniss derselben festzustellen und zu ermitteln, ob die Erbauer demselben Volksstamme angehörten oder ob aus unmittelbarer Conception an verschiedenen und weit auseinandergelegenen Orten dieselbe Intention mit ähnlichen Mitteln zur Ausführung gebracht ist. Nicht nur fehlen vielfach die Mittelglieder, sondern auch die Kenntniss der einzelnen Bauten ist nicht überall genau genug, um ein chronologisches und ethnologisches Urtheil zu fällen. Zum mindesten ist es an den vorderindischen Monumenten dargethan, dass sie bis in die geschichtliche Zeit hineinreichen.

Am meisten verwischen sich die Grenzen zwischen prähistorischer und historischer Forschung in dem Gebiete derjenigen alten Culturvölker, deren Sitze erst in späterer Zeit erschlossen worden sind und deren Literatur zum grössten Theile oder ganz und gar verloren gegangen ist. Dies ist namentlich in Amerika, am meisten in Mexico, Nicaragua, Peru der Fall. Hier finden sich die Ruinen grosser Städte, prachtvoller Tempel und Palläste, von denen erst durch weitgreifende naturwissenschaftliche

Forschungen ein genaueres Bild der Architektur und der Bevölkerung selbst gewonnen werden kann. Indess giebt es Analogien dazu an zahlreichen andern Orten, wenngleich in weit ärmlicheren Verhältnissen. In Europa selbst stossen wir auf alte Dorf- und Stadtanlagen, von denen keine Chronik, kein Dokument zu erzählen weiss. In manchen Fällen ist die prähistorische Forschung hier berufen, der eigentlichen Geschichte zu ihrem Rechte zu helfen, wie es erst neuerlich bei Felsina, Julin und Birkra der Fall war. Zum mindesten benutzt auch die historische Forschung dieselben, mehr naturwissenschaftlichen Methoden, wie es mit grösstem Glücke in Aegypten und Assyrien, in Griechenland und Etrurien der Fall gewesen ist. Indien und die Sundainseln bieten zahlreiche Beispiele für dieses Mischgebiet des Prähistorischen und Historischen dar.

Nicht überall wird es dem Reisenden möglich sein, die Fundstätten der prähistorischen Gegenstände selbst zu besuchen. Dafür befinden sich viele derartige Gegenstände im Besitz und zum Theil im Gebrauch (auch im religiösen) der Einwohner. Uralte Steingeräthe, fast überall als Donner- oder Blitzsteine bezeichnet, sind aus Japan, den Südsee- und Sundainseln, aus verschiedenen Ländern des asiatischen und afrikanischen Continentes, aus Westindien, Brasilien, Nordamerika, den Eskimoländern bekannt geworden. An manchen Orten ist es möglich, selbst in Hafenstädten, alte Töpfe, Götzenbilder, Waffen aus dem Innern zu erlangen, so namentlich an den nördlichen und westlichen Küsten Südamerikas. Wo derartige Gegenstände aus sicherer Hand zu erlangen sind, da ist zu ihrer Erwerbung für europäische Sammlungen dringend zu rathen, da es noch keineswegs erreicht ist, auch nur annähernd eine Uebersicht der Vertheilung solcher Gegenstände über die alten Völker herzustellen. Wo es nicht möglich ist, die Gegenstände selbst zu erwerben, da sind Photographien, Abbildungen oder Beschreibungen derselben zu beschaffen. Auch ist es dringend wünschenswerth, die Adressen der Besitzer und Sammler, wenn irgend möglich, mit Verzeichnissen ihrer Sammlungen zu erhalten.

Schliesslich ist noch darauf aufmerksam zu machen, dass bei Stein- und Metallgeräthen jedesmal die Aufmerksamkeit auf die natürlichen Fundstätten des entsprechenden Gesteins oder Metalls zu richten ist. Wo diese Fund- oder Lagerungsstätten nur in grösserer Entfernung von der Fundstelle des bearbeiteten Materials zu entdecken sind, da bieten solche Feststellungen zugleich die Gelegenheit, die vorgeschichtlichen Wege des Handels oder der Wanderung der Völker zu erschliessen.

2) Anthropologische Aufgaben.

Die physische Anthropologie der geschichtlichen Völker, welche hier allein in das Auge gefasst wird, hat so grosse Aufgaben, dass vor der Hand nur einzelne Seiten specieller verfolgt werden können. Die Thätigkeit des Reisenden hat sich hier nach zwei Richtungen zu entfalten, welche, wenn irgend möglich, gleichzeitig betreten werden müssen. Es handelt sich einerseits um Sammeln, andererseits um Beobachten.

In ersterer Beziehung kommen hauptsächlich in Betracht Knochen, Haare und Haut des Menschen. Unter den Knochen steht natürlich obenan der Schädel, der, wenn irgend möglich, nebst dem Unterkiefer gesammelt werden sollte, nächstdem das Becken und die Knochen der Extremitäten. Wo jedoch ein ganzes Skelet erworben werden kann, da ist dies im höchsten Maasse anzurathen. Leider ist bis jetzt eine so kleine Zahl guter Skelette

fremder Völkerstämme vorhanden, dass unsere Kenntniss derselben kaum nennenswerth ist. Derartige Erwerbungen sind in europäischen Colonien und geordneten Staaten am besten in Hospitälern und Gefangenenanstalten zu machen. Sonst sind sichere Gräberstätten aufzusuchen. Auch haben viele wilde Völkerschaften den Gebrauch, die Schädel ihrer Feinde als Trophäen zu sammeln, und manche sind nicht abgeneigt, sie später zum Gegenstande des Handels oder des Tausches zu machen. In manchen christianisirten Ländern finden sich auch Beinhäuser auf den Kirchhöfen, in noch heidnischen Schlachtfelder oder Opferplätze, von wo wenigstens Schädel erworben werden können.

Vor allen Dingen ist es aber nothwendig, dass die Reisenden Fundort und Herkunft der Schädel und Knochen so genau, wie möglich, feststellen. Ganz unbestimmte Gegenstände dieser Art haben einen sehr mässigen Werth. Ein einziger sicherer Schädel ist mehr werth, als ein Dutzend unsicherer. Die einzelnen Schädel und Knochen sind alsdann sofort genau zu bezeichnen, am besten durch eine direkt auf deren Oberfläche eingezeichnete Inschrift; sind mehrere Knochen von demselben Skelet vorhanden, so ist es gut, allen ausser der Inschrift dieselbe Zahl beizufügen. Indess ist ein einzelner Schädel oder ein einzelnes Skelet wenig geeignet, sichere Anhaltspunkte für die Erkenntniss der typischen Eigenthümlichkeit eines Stammes zu gewähren, da die individuellen Verhältnisse sich nicht sicher abschätzen und ausscheiden lassen. Es ist daher dringend zu empfehlen, alle Anstrengung darauf zu richten, mehrere Schädel, Knochen oder Skelette von demselben Stamme zu erhalten. Namentlich die männlichen und weiblichen Knochen sind oft so verschieden, dass man durch die Betrachtung nur eines Schädels leicht zu falschen Schlussfolgerungen kommt. Kinderschädel sind durchaus nicht zu verachten, wenngleich erst in zweiter Linie verwendbar.

Wo die Gebeine der Todten erst aus der Erde herausgenommen werden müssen, da ist die Isolirung derselben mit grösster Vorsicht zu veranstalten. Namentlich in feuchtem oder sehr cohärentem Erdreich müssen die Knochen mit einem Messer oder Löffel umgraben, und erst nach möglichst sorgfältiger Auslösung hervorgehoben werden. Auch ist es gut, sie vor der Herausnahme erst wieder trocknen und härten zu lassen. Lose Zähne sind für sich in Papier einzuwickeln und beizulegen. Die Entfernung der Erde aus dem Innern der Schädel kann zunächst unterbleiben; jedenfalls darf sie nicht eher versucht werden, als bis das Ganze trocken geworden ist. Lassen sich trotzdem die Knochen nicht ohne Verletzungen herausbefördern, so müssen alle, auch die kleinsten Bruchstücke sorgfältig gesammelt, bezeichnet und aufbewahrt werden.

Für den Transport sind die Knochen am besten in recht trocknes Stroh oder Baumwolle oder Bast oder Baumblätter einzulegen und sowohl vor der gegenseitigen Berührung, als vor zu naher Anlagerung an die Wände der Kiste zu schützen. Bei sehr gebrechlichen und kostbaren Stücken ist es nöthig, im Innern der Kiste Scheidewände anzubringen, so dass jeder einzelne Schädel in einer besondern Abtheilung des Innenraumes untergebracht wird.

Zuweilen ist es möglich, ganze, frisch abgeschnittene Köpfe zu erhalten. In diesem Fall wird zugleich Haut und Haar der Leiche der späteren Untersuchung erhalten, auch ein grösser Theil physiognomischer Eigenthümlichkeiten, so namentlich die Form der Nase und des Mundes, das Auge und Ohr, bewahrt. Wo es irgend geschehen kann, da ist es daher sehr zu empfehlen, solche Gelegenheiten nicht zu verabsäumen. Der Transport geschieht

am besten in einem verlötheten und mit Spiritus gefüllten Zinkgefäss. Jedoch ist es wünschenswerth, dass der Spiritus vor der Verlöthung mindestens ein Mal, noch besser ein paar Mal erneuert werde. Auch können conservirende Stoffe, z. B. Carbolsäure, Kampher, in kleineren Mengen zugefügt werden.

Bei der Sammlung von Haaren sind natürlich die Kopfhare vorzuziehen und von diesen eine ganze Haarlocke bis auf die Ansatzstelle abzutrennen. Männliche und weibliche Haare sind erforderlich. Jede einzelne Haarlocke wird mit einem Faden zusammengebunden, in ein besonderes Papier gewickelt und dieses mit den erforderlichen Notizen versehen. Bei solchen Völkern, wo besondere Haartrachten in Gebrauch sind, gelingt es zuweilen, die gesammte Frisur eines Individuums zu erwerben.

Was endlich die Haut angeht, so wird es möglich sein, von Todten in Hospitälern oder auf Schlachtfeldern, bei Hinrichtungen von Räubern einzelne Stücke zu erlangen, was namentlich bei gefärbten Rassen von grossem Interesse ist. Diese Stücke sind sofort in Spiritus zu thun und die Gefässe, genau signirt, hermetisch zu verschliessen. Auch können die Stücke eingesalzen transportirt werden. Immer ist anzugeben, von welchem Körpertheil sie genommen sind.

Ausser den genannten Theilen würde das Gehirn das grösste Interesse in Anspruch nehmen. Bis jetzt ist eine vergleichende Anatomie des Gehirns verschiedener Rassen nur in Bezug auf die schwarze und weisse Rasse in Angriff genommen, jedoch auch hier mit viel zu geringem Material. Allerdings dürfte die Gelegenheit zu solchen Sammlungen nur an Orten zu erreichen sein, wo gut eingerichtete, europäischen oder fremden Culturvölkern angehörige Krankenanstalten vorhanden sind. Indess darf dieser wichtige Gegenstand den Reisenden ganz besonders ans Herz gelegt werden. Dabei ist zu erinnern, dass das Gehirn aus dem Schädel herausgenommen und, mit Watte umhüllt, in Spiritus gelegt werden muss. In dem ungeöffneten Schädel erhält es sich gewöhnlich nicht, es sei denn, dass die Blutgefässe vor dem Einlegen mit Alkohol oder einer anderen conservirenden Flüssigkeit ausgespritzt worden sind.

Verhältnissmässig leicht zu erhalten sind abgeschnittene Hände oder Füsse, deren Bildung für die Geschichte der Rassen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung hat. Im Nothfalle können sie sogar getrocknet und ganz einfach verpackt werden; sonst sind sie in Salz einzulegen oder gleichfalls in Spiritus zu transportiren. Die Büchsen sind äusserlich genau zu bezeichnen.

Ausserdem ist ein Verzeichniss zu führen, in welchem das Nationale des Individuums (Name, Geschlecht, Alter, Beschäftigung, Geburtsort, Stamm), sowie der Name des Gebers oder wenigstens der Ort der Erwerbung eingetragen werden. In letzterer Beziehung ist zu erwähnen, dass an manchen Orten ein Handel mit derartigen Gegenständen getrieben und gewissenlos beliebige Inschriften und Ursprungsangaben ausgetheilt werden. Der Reisende hat daher grosse Kritik und zuweilen den äussersten Scharfsinn aufzuwenden, um sich und die Wissenschaft vor grossen Irrthümern sicher zu stellen.

Die andere, noch viel mannichfaltigere und daher kaum im Voraus genauer zu erörternde Aufgabe des Reisenden ist das Beobachten. Soweit es sich hier um physische Merkmale handelt, sind natürlich Körperbau, Schädel- und Gesichtsform, namentlich Gestalt der Nase, des Mundes, des Kinnes, der Ohren, Farbe der Haut, der Haare und der Augen, Bildung der Extremitäten die Hauptsache. Eine möglichst genaue Beschreibung des männlichen, weiblichen und kindlichen Körpers ist die allge-

meinste Forderung. Sind Photographien, colorirte Abbildungen oder auch nur einfache Zeichnungen, vielleicht nur lineare Profilskizzen herzustellen, so können sie die Beschreibung auf das Glücklichsste ergänzen. Natürlich ist dabei am Besten der nackte Körper zu wählen. Mindestens sollte die Farbe der Haut und der Augen durch einfache Auftragung der entsprechenden Farbe auf reines weisses Papier sofort fixirt werden. Von den Haaren sind, wie es schon vorher angegeben ist, Proben zu sammeln.

Sehr leicht lassen sich Contourzeichnungen der Hände und Füsse nehmen, wenn dieselben einfach auf einen Bogen Papier gestellt und mit einem Blei umgangen werden. Wirkliche Abgüsse aus Gyps von diesen Theilen, sowie vom Gesicht oder vom ganzen Kopf sind allerdings vorzuziehen, und es wäre zu wünschen, dass jede Expedition sich von Hause aus mit grösseren Mengen guten Gypses in wohlverpackten Kisten versähe. Von Zahnbau und Gaumen können Wachs- oder Schwefelabdrücke genommen werden, und bei der grossen Wichtigkeit gerade dieser Theile für den Typus der Rasse ist es wohl gerechtfertigt, den Wunsch auszudrücken, dass dies recht viel geschehe.

Auch in diesen Fällen ist ein vollständiges Nationale, wo irgend möglich, aufzunehmen. Dabei ist die Reinheit der Rasse vorzugsweise zu beachten. Nicht, als ob Mischrasen oder einzelne Mischlinge von der Betrachtung auszuschliessen wären, im Gegentheil, der Einfluss der Mischung auf die physische Entwicklung des Individuums ist ein Gegenstand von hohem Interesse. Aber an den meisten Orten ist man noch nicht so weit, die Elemente der Mischung genau zu kennen, und diese zu ermitteln, sollte daher überall die Hauptaufgabe sein. Natürlich sind die Bevölkerungen der Städte, namentlich der grossen, und der Küstenstriche die der Mischung am meisten verdächtigen. Das Gebirge, die entfernten Thäler, Wald, Busch und Haide, abgelegene Inseln sind das günstigste Terrain für die Erforschung der Eingebornen. Unter diesen sind es wieder die dunkeln Stämme, welche die grössere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, weil ihr Anspruch auf Aboriginalität der am meisten begründete ist.

In Europa und Amerika sind die dunkeln Stämme überaus spärlich vertreten: Lappland und Californien bieten fast die einzigen Beispiele dar. Afrika, Australien und Melanesien sind die eigentlichen Mutterländer der Schwarzen. Indess finden sich schwarze oder doch sehr dunkle Stämme auch weiter nördlich: Mikronesien, die Philippinen und Andamanen, Malakka, die Gebirge von Vorderindien, die Insel Jesso, wahrscheinlich auch die Grenzgebirge von China und Hinterindien bergen zahlreiche dunkelfarbige Völkerschaften, deren physische Beschaffenheit nur zum Theil und auch da nur unvollkommen bekannt ist. Gerade hier Aufklärung zu verschaffen, ist eine der dringlichsten Forderungen der Gegenwart. Die verwandtschaftlichen Beziehungen der verschiedenen Schwarzen unter einander, namentlich die der grösseren Gruppen (Neger, Australier, Papuas, Negritos u. s. w.), ist so wenig sicher gestellt, dass die allergrössten Widersprüche unter den besten Forschern darüber bestehen.

Zur Erledigung dieser Fragen sind, ausser den schon vorher berührten Sammlungen und Beobachtungen, wobei auch namentlich den künstlichen Verunstaltungen des Körpers (vgl. am Schlusse dieses Artikels) gebührende Aufmerksamkeit zu schenken ist, Messungen der Körperverhältnisse nothwendig. Von einer Erörterung der Messmethoden an Schädeln und Skeletten wird hier abgesehen, da es für den vorliegenden Zweck darauf weniger ankommt; für geübte Reisende, namentlich Aerzte, kann freilich darauf hingewiesen

werden, dass an vielen Orten des Auslandes anthropologische Schädel- und Knochensammlungen bestehen, welche gar nicht genauer oder doch nicht vollständig bekannt sind, und dass es überaus dankenswerth wäre, wenn jede solche Gelegenheit benutzt würde, um Verzeichnisse dieser Sammlungen und grössere Reihen von exacten Messungen*) zu veranstalten und mitzubringen. Für die Mehrzahl der Reisenden wird es genügen, Angaben über die Messungen an Lebenden zu machen, und auch diese nicht über diejenige Zahl hinaus auszudehnen, welche ohne zu grosse Anstrengung des Messenden und zugleich ohne zu grosse Anforderungen an die Geduld des zu messenden Individuums ausführbar ist.

Als mindeste Anforderung sind folgende Messungen zu bezeichnen:

- 1) Die aufrechte Höhe vom Scheitel bis zur Sohle.
- 2) Die grösste Länge des Schädels: vom Stirn-Nasenwulst (dicht über der Nasenwurzel) bis zum äussersten Vorsprunge des Hinterhauptes.
- 3) Die grösste Breite des Schädels (über den Ohren).
- 4) Die Höhe des Gesichts von der Nasenwurzel bis zum unteren Kinnrande.
- 5) Die obere Breite des Gesichts von dem unteren vorderen Rande des einen Wangenbeins bis zu demselben Punkte des andern.
- 6) Die untere Breite von einem Unterkieferwinkel zum andern.
- 7) Die Jochbreite: von der am meisten vorspringenden Stelle des einen Jochbogens (vor dem Ohre) bis zur entgegengesetzten.
- 8) Die Nasenhöhe: von der Nasenwurzel bis zum Ansatz der Nasenscheidewand an der Oberlippe.

Hat der Reisende mehr Zeit und günstige Gelegenheit, so sind folgende Maasse hinzuzufügen:

- 9) Höhe des Kopfes in aufrechter Stellung vom Scheitel bis zum Kinn.
- 10) Länge des Halses vom oberen Rande des Adamsapfels bis zum Handgriffe des Brustbeins.
- 11) Länge des Rumpfes vom oberen Rande des Brustbeins bis zur Schambeinfuge (oberer Rand).
- 12) Höhe des Nabels über der Fusssohle.
- 13) Entfernung der Schambeinfuge (oberer Rand) bis zur Fusssohle.

-
- 14) Aufrechte Höhe des Schädels vom äusseren Gehörgange bis zum Scheitel.
  - 15) Gerade Entfernung der beiden äussern Ohröffnungen von einander (am oberen Umfange der Oeffnungen).
  - 16) Obere Nasenbreite: von einem inneren Augenwinkel zum andern.
  - 17) Untere Nasenbreite: vom äusseren Ansatz des einen Nasenflügels zum andern.
  - 18) Länge des Nasenrückens von der Wurzel bis zur Spitze.
  - 19) Länge (Breite) des Mundes.

*) In diesen Fällen sind zuweilen auch Gypsabgüsse, Photographien, Zeichnungen u. s. w. zu erlangen und Tauschverbindungen mit Europa einzuleiten.

- 20) Entfernung der Mitte der Nasenwurzel von der äusseren Ohröffnung.
- 21) Entfernung des Ansatzes der Nasenscheidewand an der Oberlippe von demselben Punkte.
- 22) Entfernung der Mitte des vorderen Randes der Oberlippe von demselben Punkte.
- 23) Entfernung des Kinns (Mitte des untern Randes) von demselben Punkte.
- 24) Horizontaler Kopfumfang, gemessen über die am meisten hervorragende Stelle am Hinterhaupte und den tiefer liegenden Theil der Stirn (Glabella).
- 25) Kopfbogen, von einer äussern Gehöröffnung zur andern senkrecht über den Kopf gemessen.

-
- 26) Brustumfang dicht oberhalb der Brustwarzen.
  - 27) Abstand der Brustwarzen von einander.
  - 28) Schulterbreite, über den Rücken gemessen.
  - 29) Bauchumfang in der Höhe des Nabels.
  - 30) Beckenbreite, gemessen von der am meisten hervortretenden Stelle des einen Darmbeinkammes zur entsprechenden Stelle der entgegengesetzten Seite.

-
- 31) Länge des rechten Arms, gemessen von der Schulterhöhe bis zur Spitze des Mittelfingers an dem gerade ausgestreckten Arm.
  - 32) Länge des Oberarms, gemessen von der Schulterhöhe bis zum äussern Vorsprung (Condylus externus ossis humeri) des untern Endes des Oberarmbeines.
  - 33) Länge des Vorderarmes, gemessen von dem hintern Vorsprunge des Ellenbogens (Olecranon) bis zur Spitze des untern Vorsprunghes des Speichenbeines an der Handwurzel (Kleinfingerseite).
  - 34) Länge der Hand, gemessen bei gestreckter Stellung derselben über den Handrücken und zwar von dem Handgelenk bis zur Spitze des Mittelfingers.
  - 35) Länge des rechten Beines, gemessen vom oberen Umfange des grossen Rollhügels (Trochanter major) bis zur Fusssohle in aufrechter Stellung.
  - 36) Länge des Oberschenkels, gemessen von demselben Punkte bis zum äusseren Vorsprung des Oberschenkelbeines am Kniegelenk (Condylus externus ossis femoris).
  - 37) Länge des Unterschenkels von dem äussern Vorsprunge des rechten Schienbeines am Knie bis zum untern Umfange des äussern Knöchels (Malleolus externus).
  - 38) Länge des Fusses, von der Spitze der grossen Zehe bis zum hintersten Vorsprunge der Ferse.

In dieser zweiten Abtheilung sind die wichtigsten Maasse, auf welche daher vorzugsweise die Aufmerksamkeit zu richten ist, die unter 11, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 31—38 aufgeführt.

Als Messinstrumente dienen am besten ein mit Millimeter- und Centimeter-Eintheilung versehenes, aufrollbares Bandmaass von Stahl (Chesterman's Patent, Sheffield), ferner ein Tastercirkel (Compas d'épaisseur) mit articulirten Armen und scharfen Spitzen, gleichfalls aus Stahl, sodann zur Be-

stimmung der Kopfdurchmesser ein Schiebeinstrument oder Craniometer*). Zu den Höhenmaassen wird am besten ein Rekrutenmaassstab verwendet. Fehlt ein solcher, so können die einzelnen Höhen (Scheitel, Kinn, oberer Rand des Brustbeins, Nabel, Schambeinfuge) bei dem an eine Wand gestellten Individuum leicht durch Anlegen eines horizontal gestellten Lineals oder Brettchens auf die Wand fixirt und hier mit dem Bandmaasse gemessen werden.

Überall, wo bestimmte Knochen die Grundlage für die Messpunkte bilden, müssen die Instrumente recht stark gegen diese Knochen angedrückt werden. Geschieht diess nicht zu plötzlich, sondern unter langsam anwachsendem Drucke, so wird die an sich freilich unangenehme Empfindung eher ohne Widerstand ertragen. Ganz besonders wichtig ist ein starkes Andrücken bei dem Schiebeinstrument und dem Tasterzirkel.

Die Messung mit dem Bandmaasse ist bei folgenden Nummern anzuwenden:

18, 24, 25, 26, 28, 29, 31—38.

Die Messung mit dem Tasterzirkel passt für folgende Nummern:

4—8, 10, 15—17, 19—23, 27, 30.

Mit dem Schiebeinstrument sind zu bestimmen die Nummern:

2, 3, 9, 14.

Endlich das Rekrutenmaass passt für folgende Nummern:

1, (9—10), 11—13, (31—38).

Aus Länge (L) und Breite (B) des Schädels (Nr. 2 und 3) berechnet sich der sogenannte Schädelindex (Breitenindex oder Längenbreitenindex) nach der Gleichung

$$L : B = 100 : x.$$

In gleicher Weise, wenngleich weniger zuverlässig, berechnet sich der Höhenindex (x') aus Länge (L) und Höhe (H), also

$$x' = \frac{100 H}{L}.$$

Diejenigen Schädel, welche einen Breitenindex von mehr als 80 haben, nennt man kurze (Brachycephalen), diejenigen, welche weniger als 74 ergeben, lange (Dolichocephalen). Dazwischen liegen die Mittelformen (Meso- oder Orthocephalen).

In ähnlicher Weise bestimmen sich nach dem Höhenindex die hohen (Hypsicephalen) und die niedrigen (Chamaecephalen, auch wohl Platycephalen) Formen.

Durch diese Bestimmungen gewinnt der Anthropolog eine erste und allgemeinste Kenntniss in Bezug auf die Gruppe, in welche ein Stamm oder ein Individuum versetzt werden muss. Allein die individuellen Schwankungen in der Ausbildung der Weichtheile, namentlich dem Fettgehalt und der Muskelentwicklung sind so gross, dass den am Lebenden gewonnenen Maassen für den Knochenbau, auf welchen es vorzüglich ankommt, stets eine gewisse Unsicherheit anhaftet; nur durch die grösste Präcision des Messens kann dieselbe einigermassen gemindert werden. Der Reisende darf sich daher nicht bloss auf sein Geschick verlassen: Autodidakten sind nirgends

*) Der von dem Verfasser angegebene ist vorrätzig bei dem Instrumentenmacher Thamm, Berlin, Charitéstr. 4, NW.

unzuverlässiger, als in den messenden Zweigen der Wissenschaft. Jeder Reisende sollte sich bei einem Anatomen oder sonst sachverständigen Anthropologen einüben lassen; selbst die gewöhnlichen Kenntnisse des Arztes reichen nicht aus, um in jedem Augenblicke diese Art der Messungen richtig anzustellen oder gar zu lehren.

Indess auch gute und zuverlässige Zahlen genügen noch nicht, um ein volles Bild der Gestaltverhältnisse eines Menschen zu gewähren. Wollte man sie auch noch weit über das gegebene Schema vermehren, so würde doch immer noch etwas zu wünschen übrig bleiben, und es würde unmöglich sein, aus den Zahlen das Bild des betreffenden lebenden Menschen wiederherzustellen. Die besondere Gestalt der Nase, des Mundes und des Ohres, die Grösse und Form der Brust, der Geschlechtstheile, des Gesässes, der Ernährungszustand des Körpers, die Stellung der einzelnen Körpertheile zu einander, namentlich die der unteren Extremitäten und der Füsse, lässt sich durch Maasse annähernd wohl darstellen, aber nur mit dem grössten Zeitaufwande und der äussersten Vervielfältigung der Messpunkte. Ein einziges Wort sagt oft mehr und ist deutlicher, als ein Dutzend Zahlen, natürlich vorausgesetzt, dass es sich um Theile oder Verhältnisse handelt, welche leicht geschätzt werden können. Ganz besonders gilt dies auch von dem Gesichtsprofil und der Stellung der Lippen und des Oberkiefers, wonach die Eintheilung der Stämme in prognathe (mit vorgeschobenen Kiefern) und orthognathe (mit zurücktretenden Kiefern, beziehentlich Lippen) gewählt ist. Dieses wichtige Verhältniss lässt sich allerdings einigermaassen sicher in Zahlen ausdrücken, wenn man ausser den unter Nr. 20—23 aufgeführten Messungen noch einige Winkelmessungen ausführt. Unter dem Namen des Gesichtswinkels hat man nach und nach sehr verschiedene Winkel bezeichnet. Für die ethnischen Profilverhältnisse sind alle diejenigen Winkelmessungen verwerflich, welche sich nicht auf sichere anatomische Punkte beziehen. Als solche Punkte erscheinen am meisten geeignet die Nasenwurzel (n), die Ansatzstelle der Nasenscheidewand an der Oberlippe (s), und die äussere Ohröffnung (m); der zu messende Winkel wäre also $ns m$. Ausserdem hat es freilich ein grosses Interesse, auch noch den Winkel $n l m$ zu kennen, in welchem l die Mitte des am meisten hervorragenden Punktes in der Mitte der Oberlippe bezeichnet. Wichtig für diese Bestimmungen wären auch Angaben über Gestalt der Zahnreihen und des Gaumens, Grösse und Stellung der Zähne, besonders der Schneidezähne, Haltung und Grösse der Zunge.

Bestimmungen des Körpergewichtes sind von geringerer Bedeutung, jedoch, wo sie ohne Schwierigkeit auszuführen sind, nicht zu versäumen. Dagegen giebt es eine Reihe mehr physiologischer Merkmale, welche eine grössere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Dahin gehören Zählungen der Puls-, beziehungsweise Herzschläge und der Athemzüge (in der Minute), Messungen der Körpertemperatur mittelst eines Thermometers (in der Achsel), Bestimmungen der Körperkraft sowohl in Bezug auf Hub, als auf Druck mittelst Regnier's Dynamometer, Bestimmungen der Schärfe der Augen*), des Gehörs, des Tastsinnes. In Bezug auf eine Reihe physiognomischer Gesichtspunkte hat Herr Darwin ein Frageschema aufgestellt, welches in den von der Berliner anthropologischen Gesellschaft ausgearbeiteten „Rathschlägen für anthropolo-

*) Manche wilde Stämme haben nicht für jede Farbe eine Bezeichnung; hier wäre zu untersuchen, ob es ihnen nur an Uebung fehlt oder ob ein physischer Mangel vorhanden ist.

gische Untersuchungen auf Expeditionen der Marine“ (auch abgedruckt in der Zeitschrift für Ethnologie 1872, Bd. IV, S. 342) wiedergegeben ist.

Es wird sich daher empfehlen, wenn der Reisende über jeden Einzelfall, den er untersucht, ein besonderes Protokoll erhebt, oder denselben in einer vorher angelegten Liste in eine besondere Rubrik einträgt, und dabei ausser den oben aufgeführten Punkten folgende weitere Ermittlungen veranstaltet:

- 1) Nationalität, einschliesslich Geburtsort, Wohnort, Beschäftigung und Sprache. Für Mischlinge sind besondere Angaben hinzuzufügen über Vater und Mutter, beziehungsweise über Grosseltern u. s. w.
- 2) Geschlecht.
- 3) Alter.
- 4) Ernährungszustand des Körpers.
- 5) Schädelform (Schätzung der Verhältnisse von Länge, Breite und Höhe: ob mehr schmal oder mehr breit, mehr lang oder mehr kurz, mehr hoch oder mehr niedrig; sodann Bezeichnung der allgemeinen Gestalt: ob mehr eckig, mehr oval, mehr rund).
- 6) Kieferstellung (orthognath, prognath).
- 7) Muskelstärke (Hub und Druck).
- 8) Gewicht.
- 9) Zahl der Pulsschläge in der Minute.
- 10) Zahl der Athemzüge in der Minute.
- 11) Temperatur in der Achselhöhle.
- 12) Schärfe der Sinne:
  - a) Auge,
  - b) Ohr,
  - c) Haut.
- 13) Farbe a) der Haut,
b) der Lippen,
c) der Nägel.
- 14) Farbe und Beschaffenheit a) des Kopfhaares,
b) des Bartes.
- 15) Behaarung des übrigen Körpers.
- 16) Farbe a) der Regenbogenhaut des Auges,
b) der Bindehaut.
- 17) Form und Stellung des Auges.
- 18) Form des Gesichts.
- 19) Form der Nase.
- 20) Form des Mundes.
- 21) Form des Halses und Nackens.
- 22) Form der Brust (einschliesslich der „Brüste“).
- 23) Form des Bauches.
- 24) Form des Gesässes.
- 25) Form der Geschlechtstheile.
- 26) Form und Grösse der Hände.
- 27) Form und Grösse der Beine, besonders der Waden.
- 28) Form und Grösse der Füsse.

Es sind endlich in einer besonderen Rubrik die künstlichen Verunstaltungen, welche etwa gefunden werden, aufzuführen. Als solche erwähnen wir die verschiedenen Deformationen des Kopfes (Compression bei Kindern), der Ohren, Lippen und Nase (Einstecken und Einhängen fremder Körper, Eindrücken der Nasenwurzel bei Neugeborenen), der Zähne (Feilen, Färben, Ausbrechen), der Taille (Einschnüren), der äusseren Geschlechtstheile (Be-

schneiden, Vernähen), der Füße (Verkleinerung), der Haut (Tätowirung, Narben, Bemalen). Dabei sind die Art der angewandten Operation, die Zeit des Lebens, in welcher sie ausgeführt zu werden pflegt, die dabei gebräuchlichen Ceremonien und der etwa erkennbare Sinn der Handlung zu ermitteln.

Es ist zum Schlusse zu erwähnen, dass es wünschenswerth ist, dass jeder Beobachter Notizen darüber macht, welche Körpervverhältnisse seiner Meinung nach als mehr individuelle, welche als mehr typische und als Stammesmerkmale anzusehen sind. Auch die Kenntniss der bloss individuellen Verhältnisse ist von Bedeutung, da es darauf ankommt zu wissen, wie gross das Maass der innerhalb eines Stammes möglichen individuellen Schwankungen ist, und es wird die wissenschaftliche Analyse sehr erleichtern, wenn jeder Beobachter seine Eindrücke darüber aufzeichnet. Indess steht diese Aufgabe nicht im Vordergrunde der jetzigen anthropologischen Studien. Noch fehlt zu viel an unserer Kenntniss der generellen Formen, um schon die Untersuchung dem Einzelindividuum in hervorragendem Maasse zuzuwenden. Daher wird auch die Aufgabe der Reisenden vorzüglich dahin gerichtet sein müssen, die allgemeinen Züge in der körperlichen Erscheinung der einzelnen Stämme zu erkennen und die Merkmale festzustellen, an welchen sich einerseits die Zusammengehörigkeit der einzelnen Glieder eines Stammes im Gegensatze zu benachbarten Stämmen, andrerseits aber auch die Verwandtschaft verschiedener Stämme unter einander erkennen lässt.

Praktische Gesichtspunkte für die Verwendung zweier dem Reisenden wichtigen technischen Hilfsmittel: Das Mikroskop und der photographische Apparat.

Von

Gustav Fritsch.

Zu den bereits in vorhergehenden Capiteln besprochenen instrumentellen Hilfsmitteln des Reisenden kommen noch zwei Instrumente oder vielmehr zwei Gruppen von solchen, für deren Verwendung auf der Reise zu wissenschaftlichen Zwecken zum Theil andere Gesichtspunkte gelten als im etablirten Studirzimmer oder Atelier.

Unter heimathlichen Verhältnissen verknüpfen sich beide Gruppen in der mikroskopischen Photographie, und es ist daher wünschenswerth für den in solchen Studien thätigen Forscher, wenn er beide beherrscht. Auf der Reise kann die mikroskopische Photographie indessen keinen Platz finden wegen der localen Schwierigkeiten. Das Gebiet, welches zu bearbeiten dem Verfasser der ehrenvolle Auftrag ertheilt wurde, das er es als Ganzes zu studiren gewöhnt ist, zerfällt also für den Reisenden in zwei vollkommen getrennte Abtheilungen und soll daher im Nachstehenden auch so behandelt werden.

Die Anwendung des Mikroskopes.

Das Mikroskop, dieses unschätzbare Hilfsmittel unserer neueren naturwissenschaftlichen Forschungen, ist seinem inneren Wesen nach das Instrument des heimathlichen, friedlichen Studierzimmers, wo der Beobachter mit behaglicher Ruhe sich in die geheimnissvollen Tiefen des mikroskopischen Baues der Organismen versenken kann.

So gewiss dies richtig ist, wäre es doch unrecht, allzu streng an dem ausgesprochenen Grundsatz festzuhalten; vielmehr muss es unsere Aufgabe sein, das kostbare Material, welches die Fremde bietet, und dessen unveränderte Ueberführung nach der Heimath oft unter die Unmöglichkeiten gehört, nicht unbenutzt zu lassen. Wir müssen ankämpfen gegen die mit der Reise verbundenen Uebelstände, und die hemmenden Wirkungen in möglichst enge Grenzen zu bannen suchen. Eine gewisse Musse wird aber unter allen Umständen zu consequent fortgeführten mikroskopischen Beobachtungen erforderlich sein, aber auch der nur als Zugvogel weiterziehende wissenschaftliche Reisende wird der Vergrößerungsgläser im weiteren Sinne nicht wohl

entrathen können. Für ihn dürfte indessen die Lupe und das einfache Mikroskop durchschnittlich den grössten Nutzen schaffen; mit diesen Instrumenten wollen wir uns daher zunächst beschäftigen.

Die Lupe.

Die gewöhnliche Taschenlupe, bestehend aus zwei oder drei Linsen, etwa von 6-, 12- und 18facher Vergrösserung wird für den Reisenden ein treuer Begleiter sein müssen, da ein solches Instrument allein schon in vielen Fällen genügt, die Aufmerksamkeit auf Organismen zu richten, welche das unbewaffnete Auge übersieht. Das Beisichführen eines solchen, wegen seiner geringen Grösse und Kostspieligkeit ungemein bequemen Instrumentes, ist so allgemein als eine *Conditio sine qua non* für den reisenden Naturforscher anerkannt, dass es nicht nöthig erscheint, weiter darauf einzugehen, dagegen ist es vielleicht nicht ungeeignet, auf eine besondere, wenig gekannte Form derselben hinzuweisen. Für den Sammler, welcher mikroskopische Pflänzchen oder Thiere sucht, ist der geringe Focalabstand der gebräuchlichen Lupen ein Haupthinderniss; es gelingt ihm schwer, mit der Linse stets nahe genug an der abzusuchenden Fläche zu bleiben und dabei das nöthige Licht und eine erträgliche Körperhaltung zu bewahren. Diesen Uebelständen wird durch gewisse Vergrösserungssysteme nach dem Princip der Brücke'schen Lupen sehr wesentlich abgeholfen, und wenn dieselben auch nicht so portativ sind wie gewöhnliche Lupen (sie gleichen äusserlich etwa dem einzelnen Tubus eines kleineren Opernglases), so sind sie dem Sammler aus den angeführten Gründen doch zu empfehlen. Zeiss in Jena construirt solche mit 6facher Linearvergrösserung bei 8 Cm. Focalabstand, bei denen das Auge, die Höhe des Systemes Thiom gerechnet, also etwa 16 Cm. von der zu untersuchenden Fläche abbleibt. Man kann damit z. B. am Meeresstrande in kauender Stellung den Sand auf seinen Gehalt an Organismen controlliren, selbst wenn noch hier und da etwas Wasser darüber steht, und es mag gelingen, mit Schnelligkeit selbst grössere Strecken zu durchmustern.

Das Präparirmikroskop.

Dieses Instrument sollte gleichfalls dem reisenden Naturforscher als ein treuer Begleiter gelten, wenn es auch seinen Platz nicht in der Tasche, son-

dern im Koffer finden wird. Wie bei allen Reiseapparaten ist auch hier die compendiöse Form, eine der wesentlichsten Bedingungen für die Nutzbarkeit des Ganzen. Ich glaube nicht, dass darin eine Anordnung erdacht ist, welche die bestehend abgebildete an Bequemlichkeit und leichter Trans-

portirbarkeit bedeutend übertrifft.

Im zusammengelegten Zustande bildet der Apparat ein Parallelopipedum von 15 Cm. Länge, 12 Cm. Höhe und 10 Cm. Breite, in runden Zahlen

ausgedrückt, und lässt sich in diesem Zustande umstürzen, ohne dass sich etwas im Innern verrückt. Der Kasten klappt in zwei Hälften auseinander (*a, a* der Fig.), welche nun die Basis abgeben und der innere dreitheilig zusammengelegte Apparat, dessen mittlerer das eigentliche Stativ trägt (*c*), während die seitlichen die Auflager für die Hände bilden (*b, b*), lässt sich in gestreckter Stellung durch unterhalb angebrachte Metallhaken festlegen. Er bildet alsdann den Deckel für die Kastenhälften, in denen auch die Systeme, achromatische Triplets in bestimmten Höhlungen eingesetzt sind, und macht das Ganze zu einem hinreichend stabilen Körper, um sicher damit arbeiten zu können. Der Arm des Ringes, welcher die Triplets aufnehmen soll, wird erst mittelbar in senkrechter Richtung auf- und abbewegt, indem die Einstellschraube direct auf eine Metallhülse wirkt, in welcher der Arm des Trägers steckt. Man erhält so die Möglichkeit, wenn ein besonders grosser Abstand vom Objecttisch für das System erforderlich wird, einen solchen durch Herausziehen des Armes aus der Hülse zu erzielen (über 5 Cm.). Die weitere Einrichtung ist von den üblichen Formen des Apparates nicht wesentlich verschieden, es ist nur noch daran zu erinnern, dass bei dem vorliegenden Arrangement auch die Anwendung beliebiger anderer Systeme als der ursprünglich dazu bestimmten besonders leicht gemacht ist. Passt die gewählte Linse nicht in den Ring des Trägers, so genügt ein Griff, denselben aus seiner Hülse zu ziehen, um ihn darauf durch einen anderen passenden in der gleichen Weise zu ersetzen.

Seibert*), von dem das hier besprochene Präparirmikroskop gefertigt wird, giebt demselben gewöhnlich drei achromatische Triplets bei, deren er neun Nummern construirt, mit Vergrösserungen von 3–40; empfehlenswerth für die Arbeit sind aber nur die schwachen und mittleren, da bei den höheren Nummern der Focalabstand schon viel zu gering wird, um darunter bequem mit der Nadel etc. präpariren zu können. No. I (3 X lin. V.), III (5½ X) und V (10 X) sind für gewöhnlich ausreichend, und zwar ist anzurathen, die Systeme in der Weise fassen zu lassen, dass die convexe Fläche nach oben, die plane abwärts gerichtet ist; diese Stellung giebt nämlich das planste Bild bei einigermaassen entfernt gehaltenem Auge, umgekehrt gefasst geben die Linsen absolut etwas planere Bilder, verlangen aber, dass das Auge sich der obersten brechenden Fläche möglichst nähert und strengen daher erheblich mehr an. Durch Abschrauben des den Triplets aufgesetzten Diaphragma's kann man dem entfernteren Auge ein immer noch grosses Gesichtsfeld belassen.

Ist man stärkerer Vergrösserungen beim Präpariren benöthigt, so empfiehlt es sich, ein mit Recht berühmtes System in Anwendung zu bringen, welches Zeiss in Jena verfertigt und das in einem Objectiv aus drei achromatischen Linsen und zwei concaven Oculargläsern besteht. Ohne Ocular geben die Objectivlinsen, einzeln benutzt, Vergrösserungen von respective 30, 20, 15 linear, und zwar zeichnen sie sich in dieser Anwendung sowohl durch die Schärfe der Bilder, als auch durch den bedeutenden Focalabstand aus. Verbindet man die Linsen mit dem schwächeren Ocular unter Combinirung derselben, so erzielt man Vergrösserungen von 100, 60 und 40 lin., die Benutzung des beigegebenen stärkeren Oculars bringt dieselbe sogar bis auf 150, wobei der Abstand noch 9 Mm. beträgt. Die schwächeren Vergrösserungen zeigen eine viel beträchtlichere Zahl (bis 27 Mm.), so dass hier die

*) Optisches Institut von Seibert und Kraft, Wetzlar.

Möglichkeit vorliegt, an einem 100 X vergrösserten Object mit aller Behaglichkeit zu arbeiten.*)

Das Reise-Mikroskop.

Ist es schon unter heimathlichen Verhältnissen kaum von Vortheil, voluminöse Stative bei den mikroskopischen Untersuchungen in Anwendung zu bringen, so gilt dies natürlich noch mehr, wenn man sich unterwegs befindet. Die Optiker haben diesem Bedürfniss auch in verschiedener Weise Rechnung getragen, am weitesten in der Beschränkung des Raumes ist aber Nacet in Paris gegangen, welcher ein Mikroskop construirt hat, dessen messingenes Behältniss nur 90 Mm. Länge, bei 50 Mm. Breite hat, und im Innern den umgelegten Tubus, Objective und Spiegel enthält. Beim aufgestellten Instrument dient das Behältniss, welches einer etwas grossen Schnupftabaksdose nicht unähnlich sieht, als Objecttisch und Fuss des Statives. Die Vergrösserungen reichen so weit, wie bei einem gewöhnlichen Stativ, indem Nacet durch besondere Construction des Oculars den Nachtheil der geringeren Tubuslänge ausgeglichen hat.

So ingeniös und zierlich indessen auch diese Construction ist**), so wird man wohl nur in dem Falle Veranlassung haben, sie in Anwendung zu ziehen, dass die beabsichtigte Untersuchung es nothwendig macht, das Instrument in der Tasche bei sich zu tragen, um es unter Benutzung starker Vergrösserungen augenblicklich aufstellen zu können. Sind die Verhältnisse derartig, so wird sich das Nacet'sche Modell gewiss ausserordentlich empfehlen. Nach dem bereits oben Angedeuteten reicht zur blossen Orientirung, wie man sie in der That beim Sammeln sehr häufig an Ort und Stelle vorzunehmen hat, schon die Zeiss'sche Lupe mit 100- bis 150facher Vergrösserung aus, dazu hätte man also ein Taschenmikroskop keineswegs nöthig.

Handelt es sich um regelmässige, consequent fortgesetzte Untersuchungen, so wird man gewiss lieber ein Instrument benutzen, welches nicht ganz so winzig ist und der Arbeit mehr Spielraum gewährt. Es ist alsdann nur erforderlich, das Stativ den Anforderungen der Reise entsprechend leicht und zusammenlegbar zu machen, sowie die einzelnen Theile des Instrumentes möglichst sicher und eng neben einander angeordnet dem Kasten einzupassen, damit kein unnöthiger Raum verbraucht wird. Diese Aufgabe scheint mir wiederum von der Firma Seibert und Krafft am glücklichsten gelöst worden zu sein, deren Reisemikroskop nur einen Kasten von 22 Cm. Länge, 12,5 Cm. Breite und 9 Cm. Höhe einnimmt.***) Solches Instrument leistet, nach mehrjährigen Erfahrungen, Alles, was der Beobachter verlangen darf, es lässt sich sehr bequem auf dieselbe Tubuslänge bringen, welche die anderen Mikroskope der Firma zu haben pflegen, und ist ausserordentlich leicht und transportabel. In der gewöhnlichen Anordnung ist die Rohrlänge in der That etwa um 15 Mm. kürzer, doch kann man sehr bequem besonders beim Ocular I einen entsprechend langen Tubusabschnitt, den man im Kästchen des Mikroskopes mitführt, einschalten, um das Fehlende zu ergänzen. Der Durchmesser der Oculare ist geringer, die Objective sind genau dieselben, wie sie zu den anderen Mikroskopen benutzt werden. Zu der vom Verfasser gewählten An-

*) In besonderem Etui kostet das Linsensystem allein nur 10 Thlr.

**) Sie ist in Nacet's älteren Katalogen als „Microscope de poche“ unter Fig. 18 abgebildet und dabei genauer beschrieben.

***) Ein anderes Modell zeigt noch geringere Dimensionen, ist von mir aber nicht so erprobt worden.

ordnung finden sich die Objective, drei an der Zahl, in einem besonderen seitlichen Behältniss des Kastens von einem gut schliessenden mit Sammet gefütterten Deckel bedeckt. Gerade dieser Punkt verdient besondere Beachtung, weil auf der Reise ein Mahagonikasten gewöhnlicher Construction nicht genügend gegen Staub geschützt werden kann, um die Objective rein zu erhalten. Sollten werthvolle Systeme schon zu Haus nicht dem Staub im Kasten frei exponirt sein, wie es leider von den Optikern bei uns noch vielfach geschieht, so ist der staubdichte Verschluss bei längerem Umherschleppen auf der Reise ein ganz entschiedenes Bedürfniss, wenn man klare Bilder erhalten will.

Trotz der Beschränkung im Raum findet im Kasten des in Rede stehenden Mikroskopes noch ein Objectiv im Etui, sowie der kleine Zubehör in Gestalt von Objectträgern, Deckgläschen, Haarpinsel, Putzleder genügenden Platz.

Zubehör für mikroskopische Arbeiten.

Was die sonstige Ausrüstung an Apparaten anlangt, welche die mikroskopische Technik verlangt, so wäre es ein kühnes Unternehmen, hier im engen Raum weniger Zeilen erledigen zu wollen, worüber Andere dicke Bücher geschrieben haben. Es bleibt nur übrig, die Gesichtspunkte anzudeuten und ein oder den anderen praktischen Fingerzeig zu geben, welcher dem Reisenden nützlich sein könnte.

Reduction der Ausrüstung auf das Allernothwendigste wird auch hier in die erste Linie gestellt werden müssen. Ein sogenanntes mikroskopisches Besteck, wie ein solches in compendiöser Form mir vorliegt, enthaltend eine feine gerade und eine krumme Scheere, zwei kleine Pincetten, ein Doppelmesser, verschiedene Nadeln und ein Haarmesser bildet einen geeigneten Ausgangspunkt. Bei den Nadeln ist es wünschenswerth, sie nicht fest fassen zu lassen, sondern sie nach Art der Häkelnadeln der Damen nur mittelst einer kleinen Schraube im Heft zu befestigen, um sie bequem wechseln und ergänzen zu können. Einen genügenden Vorrath von scharfen und stumpfen Nadeln, feinen Häkchen etc. kann man leicht mit sich führen. Zwei hierher gehörige Instrumente, von denen ich grossen Nutzen habe, wurden hergestellt aus gestielten Zeichenfedern, deren Spitzen bis zu dem cylindrischen Theil der Feder abgebrochen sind; bei dem einen ist zwischen dem Holz des dünnen Stieles und dem Stahlfederstumpf eine starke Borste eingeklemmt, bei dem anderen die erste, nur 2 Cm. lange Schwungfeder von der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*), welche durch ihre bedeutende Elasticität und Festigkeit nützlich wird; die entgegengesetzten Enden der Stiele tragen feine Miniaturpinsel. Diese unscheinbaren Instrumente sind für das Hantieren und Reinigen zarter Objecte von sehr grossem Vortheil. Gegenstände, welche directe Berührung gar nicht vertragen wollen, nimmt man am besten aus der Flüssigkeit mittelst einer Pipette auf, die durch den luftdichten Ansatz einer etwa fingerlangen Kautschukröhre an eine entsprechend dicke, unten etwas spitz ausgezogene Glasröhre gebildet wird. Ein kleiner Löffel und dünnes Hornspatel sind ferner zum Transferiren zarter Objecte nöthig.

Ein paar Rasirmesser mit Streichriemen, ein gewöhnliches anatomisches Besteck, zwei Knochenzangen verschiedener Gestalt, einige gröbere Haarpinsel, Objectträger, darunter einige mit vertieftem Ausschnitt zur Beobachtung lebender Organismen, Deckgläser, einige leichte, ganz flache Glasschälchen (den Uhrgläsern wegen der geraden Bodenfläche vorzuziehen) vollenden so ziemlich den unbedingt erforderlichen allgemeinen Theil der instrumen-

tellen Ausrüstung. Sind specielle Arbeiten in Aussicht genommen, welche besondere Instrumente erheischen, so ist darauf natürlich im concreten Falle Bedacht zu nehmen.

Es kommen nun noch hinzu die Reagentien, deren man zu mikroskopischen Zwecken bereits eine sehr grosse Zahl verwendet, doch wird man sich auch hierbei sehr beschränken können, zumal man einen grossen Theil auch unterwegs mit Leichtigkeit bekommen kann. Das Wichtigste dürfte dabei sein, dass man sich bald ein bequemes und festes Behältniss construirt, worin die erforderlichen Flaschen in einzelnen Fächern stehen und nicht gegen einander stossen können, ein genau aufpassender Deckel muss die Glasstöpsel oder Korken niederhalten, um das Herausspringen derselben zu verhindern. Auch unter Anwendung solcher Vorsicht vermeide man es, die concentrirten Säuren gleich von Hause aus mitzuführen. Hat man keine Aussicht, das Erforderliche sich später zu verschaffen, packe man die Flaschen gesondert und schliesse das Behältniss dicht, da gerade diese Chemikalien sehr häufig auf der Reise zu den unangenehmsten Störungen Veranlassung geben.

Die Objectträger mit Ausschnitt stellt man am besten dar durch Aufkitten eines in der Mitte kreisförmig ausgeschnittenen Objectträgers auf einen anderen undurchbrochenen. Sehr vortheilhaft für länger andauernde Beobachtung von Organismen, deren Veränderungen man unter dem Mikroskop studiren will, ist die Verwendung eines kleinen Apparates, bestehend aus einem Stück mässig starken Spiegelglases, etwa von 12 Cm. Länge und 6 Cm. Breite, in der Mitte ebenfalls ausgeschnitten. Auf einer Seite wird ein 1,5 Cm. hoher Abschnitt einer Barometerröhre wasserdicht aufgeklittet und oben mit einem Deckel verschlossen. Durch eine kleine eingefeilte Lücke des Randes dieses Behältnisses führt man einige starke Baumwollenfäden, die in das Innere nach Art eines Dochtes hereinhängen, während ihr äusseres Ende im Bogen bis an den Deckglasrand des auf die Platte gelegten Präparates geführt wird. Die Fäden saugen aus dem mit Wasser etc. gefüllten Rohre stets Flüssigkeit, um den durch Verdunstung entstehenden Verlust unter dem Deckglas zu ergänzen.

Für den allgemeinen Gebrauch dürften folgende Reagentien die unentbehrlichsten sein: Essigsäure, kaustisches Kali und Natron in Lösungen bestimmter Concentration, um später verschiedene Verstimmungen bewirken zu können, Jod, Jodkaliumlösung, Glycerin, Terpentinöl, Kreosot, Alkohol, Chromsäure, Carmin, Ammoniak und Argentum nitricum. Sehr wünschenswerth für bestimmte Untersuchungen ist die leider ziemlich theure Ueberosmiumsäure und das Chlorgold. Wegen der grossen Flüchtigkeit und leichten Zersetzbarkeit der ersteren lasse man sich dieselben vom Lieferanten gleich in kleine genau abgewogene Quantitäten (vielleicht 0,1 Grm.) vertheilt in zugeschmolzenen Glasröhrchen herstellen, so dass man stets nur eine mässige Quantität der Lösung durch Leeren eines solchen Gläschens bereitet. Die Lösung muss dann in lichtdichter Flasche an einem kühlen Orte bewahrt werden, welche Aufbewahrung sich auch für die Chlorgoldlösung empfiehlt. Die zur Untersuchung frischer Gewebe nöthigen Flüssigkeiten: Jodserum, verdünntes Albumin, Humor aqueus etc. kann man sich leicht an Ort und Stelle verschaffen.

Ueber die Art und Weise der Anwendung und die verschiedenen Methoden, deren Zahl in neuerer Zeit ungeheuer angewachsen ist, muss wegen Mangel an Raum auf die speciellen Handbücher verwiesen werden. Am geeignetsten ist zu diesem Zweck wohl wegen der Uebersichtlichkeit und

gedrängten Kürze Exner's Leitfaden bei der mikroskopischen Untersuchung, nächst dem: Frey, das Mikroskop.

Zwei Capitel sind indessen noch eingehender zu behandeln, da sie den Reisenden näher berühren, diese sind: das Sammeln des Materials, sowie die Conservirung und Präparation desselben.

Sammeln des Materials.

Wenn auch durch die Kleinheit der Formen dem unbewaffneten Auge das Erkennen unmöglich wird, so lernt der Sammler doch sehr bald nach dem makroskopischen Ansehen zu unterscheiden, ob eine Localität reich an dem gesuchten Material ist oder nicht. Handelt es sich um mikroskopische Algen, um Diatomeen und verwandte Familien, so beachte man besonders schleimige Ueberzüge anderer Organismen im Wasser, sowie den leichten oberflächlichen Schlamm des Grundes, zumal wenn er durch besondere Färbung ausgezeichnet ist, wenigstens von der Bodenfarbe des Gewässers deutlich absticht. Die gesuchten Organismen bilden oft dichte Massen, sogenannte Rasen, an den angedeuteten Localitäten und lassen sich leicht in grösseren Mengen sammeln. Sind viel erdige Bestandtheile dabei, so erscheint der Schlamm schwer und setzt sich schneller ab als die Diatomeen; man kann daher am Orte selbst wäherisch verfahren und von dem gesammelten Schlamm den rapide zu Boden fallenden Theil entfernen und erst den langsameren Absatz aufbewahren.

Um schnell und sicher zu Werke gehen zu können, empfiehlt sich dabei die Benutzung eines Netzes an einem mehrere Fuss langen Stiel, welches in einem Doppelring von etwa zwei Decimetern Durchmesser sitzt. Die Grundlage bildet ein gewöhnliches flaches Filetnetz, am inneren Ring befestigt, auf welchem ein entsprechend grosses Stück feiner Gaze ausgebreitet und durch den genau auf den ersten passenden Ring über dem Filetnetz fixirt wird. Man findet mit dem so vorbereiteten Netz die Diatomeenrasen aus dem Gewässer heraus, lüftet den äusseren Ring und steckt die zusammengefaltete Gaze mit der gewonnenen Beute in eins der mitgeführten Gläser mit Wasser oder schwachem Spiritus erfüllt, um alsbald eine neue Gaze einzuspannen und damit in gleicher Weise zu verfahren. Die Organismen trennen sich, besonders wenn man grössere Gefässe zur Verfügung hat, meist sehr bald von der Gaze, was man durch leichtes Bewegen derselben befördern kann und nach einiger Zeit würde man den Stoff auch wieder zur erneuten Benutzung herausnehmen dürfen, falls eine solche wünschenswerth erscheint. Lässt sich die Masse des Materials nicht durch diesen Schöpfer gewinnen, so kann man die den organischen Ueberzug tragenden Pflanzen aus dem Wasser zusammenraffen und unter leichtem Pressen die herablaufende trübe Flüssigkeit auffangen.

Von grossem Vortheil sind auch gläserne Barometerröhren von verschiedener Länge je nach Bedürfniss, welche man mit dem auf die eine Oeffnung gehaltenen Finger in die Tiefe senkt bis zu den erstrebten Organismen, durch Lüften des Fingers dieselben in die Röhre steigen lässt und sie nach erneutem Aufpressen des Fingers heraushebt. Durch die beschriebenen Manipulationen erhält man ausser den mikroskopischen Pflänzchen auch Thiere aus sehr verschiedenen Classen. Die Reichhaltigkeit der Ausbeute wird hauptsächlich von der günstigen Wahl der Localität abhängen, wofür sich natürlich nur allgemeine Principien aufstellen lassen. So reich manche Orte an organischem Leben sind, so arm sind andere, ohne dass der Grund für

den auffallenden Unterschied sich leicht beibringen liesse. Bei einer Reihe von Sandproben in sehr verschiedenen tropischen Gegenden von demselben Forscher gesammelt, bestand der organische Gehalt einer gewissen Quantität Sand vielleicht aus einem halben Dutzend Foraminiferen, während eine darunter (Golf von Siam) wohl zur Hälfte aus Schalen solcher Thiere bestand. Man informire sich daher bald an Ort und Stelle, wenn das unbewaffnete Auge nicht ausreicht, mit der Lupe, ob der Fang lohnt und halte sich nicht zu lange an armen Localitäten auf. Makroskopisch erkennt das Auge im Lande auch kleinere Formen von Foraminiferen und ähnlichen Organismen an der häufigen Wiederkehr bestimmter regelmässiger Contouren zwischen den Sandkörnern bei besonderer Farbe und Transparenz der einzelnen Körperchen. Im Wasser erscheinen an herausgeschöpften Proben selbst noch Infusorien von einiger Grösse deutlich als bewegliche Pünktchen. Besonders lohnend pflegen bei süssem Wasser kleinere Tümpel zu sein, deren Niveau gerade ungewöhnlich niedrig ist, vorausgesetzt, dass die Fäulniss der Substanzen nicht überhand genommen hat; hierher gehören auch die kleinen Becken an Gebirgsbächen, bei Wasserfällen und ähnlichen Orten, welche häufig durch das Vorkommen interessanter Arten ausgezeichnet sind. Ueppiges Wachsthum makroskopischer Wasserpflanzen pflegt auch die Entwicklung der mikroskopischen zu begünstigen.

Zu beachten sind ferner die Ausmündungen von Flüssen mit dem durch das Hin- und Herfluthen des brakischen Wassers entstehenden eigenthümlichen Schlamm, Schlick genannt, welcher massenhafte Diatomaceen zu enthalten pflegt. Man revidire sorgfältig Gegenstände, die frei ins Wasser hinausragen wie Fluthzeichen, alte Pfähle von Uferbauten, Wracks von Schiffen, die noch halb vom Wasser bedeckt sind und Aehnliches, da sie sich gern mit einem dichten Ueberzug von organischem Leben bedecken, darunter häufig Bryozoen und Hydromedusen. Am Strande des Meeres selbst wird man durchschnittlich am glücklichsten sein, wo niedrige Klippen riffartig vorspringen, die von der Fluth überspült, zur Ebbezeit aber bloss liegen und nur in den Höhlungen noch Wasser enthalten. Doch verabsäume man auch nicht das Revidiren des sandigen Strandes, wo man lebende Foraminiferen erst im flachen Wasser zu finden pflegt.

Für viele Organismen, die anderenfalls sich gern der Beobachtung entziehen, wie Larven von Echiniden, lebende Polycystinen u. s. w. ist die günstige Gelegenheit zum Fang, wenn die Sonne recht warm auf das möglichst ruhige Meer für längere Zeit geschienen hat. Es sammeln sich alsdann die Organismen auf der Oberfläche und lassen sich bequem mit dem oben beschriebenen Schöpfnetz sammeln.

Doch der Göthesche Mephistopheles bemerkt sehr richtig, dass er sich nur die Flamme vorbehalten, während im Feuchten, Trocknen, Warmen, Kalten die organischen Keime lebten. In den trocknen Erden finden wir sie im fossilen Zustande, die bewegte Luft führt sie mit sich und lagert sie Hunderte von Meilen entfernt als farbigen Staub ab; sie überziehen den Firnenschnee und leben in den heissen Quellen. Es geht daraus hervor, dass der Reisende, welcher diese Studien cultiviren will, äusserst misstrauisch gegen jede auffallende Erscheinung in seiner Umgebung sein muss und sich durch die Ocularinspection mit bewaffnetem Auge darüber informirt, ob nicht der Grund derselben im Vorkommen mikroskopischer Organismen zu suchen sei. Aufmerksamkeit und praktischer Tact wird dabei stets mehr leisten, als alle Instructionen zu geben im Stande sind.

Präservirung und Präparation.

Die Untersuchung des mikroskopischen Materials an Ort und Stelle muss trotz der entgegenstehenden Schwierigkeit stets in erster Linie ins Auge gefasst werden. Dessenungeachtet wird der Reisende es sich gerade auch angelegen sein lassen, sowohl Proben seiner Präparate zu conserviren, um nach der Rückkehr auch Anderen die neuen Ergebnisse demonstrieren zu können, als auch Material, zu dessen genauer Untersuchung die Zeit gänzlich mangelt oder nur ungenügend vorhanden ist, so zu erhalten, dass die spätere Präparation noch Erfolg verspricht. Es handelt sich dabei also um das sogenannte Einlegen von Präparaten sowie um die Kenntniss der conservirenden Flüssigkeiten zur Aufbewahrung des Materials.

Conservirender Flüssigkeiten kennt man eine grosse Zahl, der Reisende dürfte sich indessen auf eine verhältnissmässig geringe zu beschränken haben. Natürlich muss die Zusammensetzung verschieden sein, je nach der Beschaffenheit der Objecte, da es darauf ankommt, dass die verändernde Einwirkung auf dieselben eine möglichst geringe ist.

Der sogenannte *Liquor conservativus* der Autoren, welcher hauptsächlich zur Aufbewahrung von zarten thierischen Körpern empfohlen wird, besteht aus Seesalz, Alaun und etwas Sublimat. Man thut gut, die Stärke der Lösungen je nach der Consistenz der Objecte zu variiren, für den allgemeinen Gebrauch empfiehlt sich etwa die folgende Mischung: Seesalz 64 Grm., Alaun 32 Grm. mit 0,12 Grm. Sublimat zu 1 Quart kochendem Wasser. Braucht man eine sehr adstringirende Mischung, so kann man die Menge des Seesalzes und des Alauns verdoppeln. Für Organismen, die viel kohlensauen Kalk besitzen, wie die Mollusken, lässt man den Alaun am besten ganz weg unter nochmaliger Verdoppelung der Quantität Salz. Durch diese Mischungen gelingt es, die äussere Form zarter Organismen oft sehr schön zu erhalten, doch verändern sie die Beschaffenheit der Gewebe ziemlich bedeutend. Für die feinere mikroskopische Untersuchung, wo solche erforderlich scheint, wähle man lieber andere Substanzen. Eine solche ist z. B. das Chlorzink, welches etwa in der Stärke von 1:24 Wasser eine Lösung giebt, deren leicht coagulirende Wirkung die thierischen Gewebe für die mikroskopische Untersuchung noch brauchbar erhält. Auch hier hat man im besonderen Fall die Stärke zu variiren, je nach der Beschaffenheit und Consistenz der Organe. Bei längerer Aufbewahrung in Chlorzinklösung tritt indessen allmählicher Zerfall der Gewebe ein, man controllire also die Einwirkung und gehe eventuell zu anderen Conservirungsflüssigkeiten über; durch Hineinwerfen eines Stückes Kampher erhält sich die Lösung reiner.

Die wichtigsten Flüssigkeiten zur Erhärtung und vorläufigen Aufbewahrung von zarten Geweben, die man mikroskopisch untersuchen will, sind der Alkohol, die Chromsäure und die Müllersche Lösung. Der erstere bringt die Theile leider zur starken Schrumpfung, wo diese Wirkung keine zu störende ist, lässt er sich mit Vortheil verwenden. Bei der Erhärtung in Chromsäure sowohl wie in Müllerscher Lösung*) schwanken die verwendbaren Stärken zwischen sehr verschiedenen Graden; je zarter ein Gewebe, um so vorsichtiger sei man mit der Anwendung der stärkeren Lö-

*) Müllersche Lösung mittlerer Stärke:

500,0	Grm.	Wasser,
50,0	„	Kali bichrom.
10	„	Natr. sulph.

sungen, da die Präparate sich sonst mit einer brüchigen Rinde umgeben, im Innern aber verderben. Die Erhärtung gelingt am besten mit einer Lösung, die nur gerade stark genug ist, die Maceration zu verhindern (z. B. $\frac{1}{8}$ % für Nervengewebe), nur muss man grosse Quantitäten Flüssigkeit im Verhältniss zur Masse des Organes verwenden, und sie, besonders zu Anfang, recht häufig erneuern (nach 12 Stunden, 24 Std., 48 Std. u. s. w.). Müllersche Flüssigkeit wirkt milder als Chromsäure und dringt leichter in die Tiefe, indessen imbibiren sich die Präparate nachher schwerer mit carminsaurem Ammoniak.

Essigsäures Ammoniak giebt für solche bessere Resultate. Zur weiteren Aufbewahrung hinreichend erhärteter Organe kann man mit Vortheil chromsaures Ammoniak verwenden, da sich in demselben nicht wie bei der Chromsäure so leicht Pilze bilden.

Auch Kreosotwasser (ein Theil gesättigte Kreosotlösung in Spiritus auf 20 Theile Wasser und dann filtrirt), arseniksaures Kali (1:200 bis 500 destillirtes Wasser), Sublimatlösung (1:200 bis 500 destillirtes Wasser) kommen als conservirende Flüssigkeiten nebst vielen anderen zur Verwendung, über die speciellen Vorschriften vergleiche man indessen die oben angeführten Handbücher.

Unter die Erhärtungsmittel ist auch die Ueberosmiumsäure zu rechnen, welche, mit organischen Substanzen in Verbindung gebracht, dieselben schnell verändert, indem sie sich zersetzt (dabei wird das Nervenmark besonders intensiv dunkelbraun gefärbt). Diese Energie der Einwirkung gewährt die Möglichkeit einer eigenthümlichen Verwendung: Gewisse zarte Thiere, wie Polypen, Bryozoen, Hydromedusen, welche die Neigung haben, sich stark zusammen zu ziehen, lassen sich daran verhindern, wenn man, nachdem in einem flachen Glasschälchen ihre Ausbreitung erfolgt ist, plötzlich eine Quantität Ueberosmiumsäure in Lösung ($\frac{1}{3}$ %) über sie ausleert. Nach stattgefundener Einwirkung bringt man sie dann in eine andere conservirende Flüssigkeit (Lösung von essigsäurem Kali wird für Osmiumpräparate empfohlen).

Botanische Objecte sind im Allgemeinen viel resistenter als die thierischen und lassen sich leichter conserviren. Ein grosser Theil bleibt der Untersuchung zugänglich, wenn die Gegenstände in schwachem Spiritus (1 Sp. rectific. zu 5 Wasser) aufbewahrt werden. Auch schwache Lösungen von Salz und Alaun (und 1:500) sowie Zusatz von kreosothaltigem Spiritus zu destillirtem Wasser (1:16) kommen mit Vortheil zur Anwendung. Der praktische Tact und aufmerksam angestellte Versuche müssen im besonderen Falle die Wahl der Mittel und der Methode leiten.

Die Präparation der Diatomaceen, seien sie frisch oder fossil, geschieht durch andauerndes Kochen mit rauchender Salpetersäure, durch welche die organischen Substanzen allmählig zerstört werden. Während des Kochens wirft man kleine Stückchen chloresäures Kali in die Flüssigkeit, wodurch allmählig unter heftigem Aufbrausen eine Klärung der Masse erfolgt.

Die Herstellung der Präparate geschieht bekanntlich hauptsächlich auf folgende Weisen: bei zarten Objecten zunächst ohne weitere Präparation, am häufigsten aber durch das Studium sehr feiner, in verschiedener Richtung geführter Schnitte, oder endlich durch Zerzupfen der Objecte, eventuell nach vorausgegangener Maceration. Hierbei möchte ich auf eine Methode aufmerksam machen, die sehr bequem ist, in ihren Einzelheiten aber nicht vollständig gekannt zu sein scheint. Um nämlich Objecte, deren Dicke die directe Untersuchung unter dem Mikroskop nicht gestattet, derselben zu-

gänglich zu machen, hat man schon früh daran gedacht, dieselben zu quetschen und dazu besondere complicirte Compressorien construirt.

Ich verwende nun anstatt solcher die gewöhnlichen messigen Klemmschrauben, wie sie die Chemiker zu Quetschen von Gummiröhren benutzen. Die Breite der queren Bügel ist hinreichend um viereckige Glasstücke von der Breite der englischen Objectträger zwischen sich aufzunehmen. Man bringt das Object nun zwischen zwei solche ungefähr quadratische Glasstücke und zieht die Schraube an, bis genügende Quetschung erreicht ist, um dann das Ganze in eine Schale mit Alkohol zu tauchen und in der Klemme erhärten zu lassen, indem man die Schraube allmählig noch weiter anzieht. Der Alkohol ist alsdann nicht im Stande, die Breitendurchmesser stark zu reduciren und man erhält nach genügender Erhärtung (etwa in 24 Stunden) beim Lüften der Glasplatten das Object als eine dünne Lamelle, welche sich zur Aufhellung als mikroskopisches Präparat eignet. So lassen sich besonders von Entozoen sehr instructive Bilder gewinnen.

Was die Anfertigung von mikroskopischen Schnitten anlangt, so ist dafür ein gutes Rasirmesser und eine sichere Hand für den Reisenden wohl eine genügende Ausrüstung; der mehr oder weniger complicirten Mikrotome, wird er, da es ihm weniger auf Eleganz der Präparate als auf genaues Studium des mikroskopischen Baues ankommen muss, wohl entziehen können. Um so mehr wird er aber, auf die Hand angewiesen, die Einbettungsmethoden in's Auge fassen müssen, wobei folgende Mittel in Anwendung zu kommen pflegen: Einklemmen zwischen Kork oder Hollundermark, Einschmelzen in Stearin, Paraffin, Wallrath oder Mischungen dieser, endlich Transparentseife und Gummischleim in Alkohol niedergeschlagen. Das Einklemmen zwischen Kork ist eine ziemlich rohe Methode, da ein nicht unbeträchtlicher Druck auf das Präparat ausgeübt wird, besser ist schon das Einschmelzen in Stearin oder Paraffin, welche Körper man je nach der Jahreszeit mit einander mischen kann, da Paraffin allein an heißen Sommertagen etwas zu weich wird. Die besten Dienste hat mir bei Präparaten, die Alkohol und Terpentin vertragen, das Wallrath geleistet, sowohl wegen des niedrigen Schmelzpunktes, der angenehmen Schnittfähigkeit und der leichten nachträglichen Entfernung des Einbettungsmaterials. Gut in Alkohol entwässerte Präparate lassen sich, oberflächlich abgetrocknet, in einem ungefähr kegelförmigen Stück Wallrath sehr leicht einbetten, indem man mittelst eines erhitzten Metallstäbchens eine dem Object entsprechende Höhlung von der abgestumpften Spitze des Kegels aus einschmilzt, das Object in der gewünschten Stellung hineinsenkt und durch weitere Behandlung mittelst des wiederholentlich erwärmten Stäbchens von den Seiten her soviel abgeschmolzenes Wallrath zuführt, bis das Object zum obersten Rande eng von demselben eingebettet wird. Es erstarrt fast sofort und die Schnitte lassen sich unmittelbar nachher unter Benetzung der Klinge und des Objectes mit verdünntem Glycerin ausführen. In Alkohol gebracht bröckeln die Wallrathreste leicht ab. Fester umschliesst dies Material das Object, wenn es vorher in Terpentin gelegen hat; eine zu starke Erhitzung des Präparates, welche stets sorgfältig zu vermeiden ist, darf man hier nicht so leicht befürchten, wie beim Stearin.

Die Transparentseife gewährt den Vortheil, dass die Lage des Objectes stets genau übersichtlich bleibt, ihr Nachtheil ist, dass sie stark wasserentziehend auf die Gewebe wirkt. Man wendet sie in der Weise an, dass fein geschnittene Stückchen mit etwas Alkohol im Wasserbade zum Schmelzen gebracht werden, und das Object wird alsdann in einem Papierkästchen mit

der geschmolzenen Masse umgossen, während man durch einen angebundenen Faden die Stellung regulirt. Die Seife erstarrt bei der Abkühlung sehr bald und giebt ein sehr schnittfähiges Material, besonders unter Benetzung mit verdünntem Glycerin.

Der zur Einbettung benutzte Gummischleim muss dickflüssiger sein als Honig, man giesst ihn unter sorgfältiger Vermeidung der Luftblasen in ein kleines Papierdütchen, versenkt das Object (alkoholfrei!), nachdem es bereits in dünnem Gummischleim gelegen hat, hinein, und hängt das Ganze in Alkohol. Nach 1 bis 2 Tagen ist der Gummi durch den Alkohol in eine schnittfähige Masse verwandelt worden. Gummi oder Leim mit Zusatz von sehr wenig Glycerin erhärtet auch zu einer solchen Masse und lässt sich bei sehr kleinen Objecten mit Vortheil verwenden, indem man ihn auf Glasfädelchen aufträgt und die Objecte hineinbringt.

Was die Zerzupfungsapparate anlangt, so kann man vieles ohne weitere Präparation in geeigneten Flüssigkeiten (Jodserum, Humor aqueus, verdünntem Eiweiss) zerzupfen; bei Objecten, wo die Trennung der Elemente auf diese Weise nicht genügend erfolgt, erleichtert die vorgängige Maceration derartige Arbeit. Als macerirende Flüssigkeiten lassen sich mit Vortheil mehrere derselben Lösungen benutzen, die auch zum Erhärten dienen. So wirken Chromsäurelösungen von sehr geringem Gehalt ($\frac{1}{20}\%$) bei geringer Flüssigkeitsmenge und beim Unterlassen des Wechsels derselben, ebenso sehr schwache Müllersche Lösung oder Ueberosmiumsäure. Die Organe behalten äusserlich etwa dieselbe Consistenz, wie im normalen Zustande, die einzelnen Elemente sind aber leicht erhärtet, während der Zusammenhang gelockert ist. Die Wirkung pflegt nach 1 bis 3 Tagen ihren Höhepunkt erreicht zu haben, doch bleiben die Präparate noch für 8 bis 14 Tage brauchbar.

Einlegen von Objecten.

Es bleibt nun noch übrig, einige Bemerkungen über das Einlegen von Objecten zu machen, was für den Reisenden wegen der Kostbarkeit seiner Zeit, welche nicht gestattet an Ort und Stelle die Untersuchung und Skizzirung der Präparate zu beendigen, besonders wichtig erscheint.

Von allen Methoden, Präparate zu conserviren, ist keine so einfach und handlich, wie das Einlegen in Canadabalsam, sie giebt sehr saubere und vorzüglich haltbare Bilder, die Nachtheile sind indessen auch keineswegs gering. Man benutze möglichst hellen, reinen Balsam, dessen Consistenz derartig ist, dass er beim Herausnehmen eines eingetauchten Glasstäbchens nicht Faden zieht, aber auch nicht willig tropft. Zu dicker Balsam lässt sich durch Chloroform oder Terpentinöl verdünnen; letzteres giebt einen sehr langsam trocknenden Balsam, während das flüchtigere Chloroform ihn schnell trocknend macht. Bedingung für das Präparat ist, dass es durch Einlegen in absoluten Alkohol durchaus wasserfrei gemacht sei, ist dies aber der Fall, so erscheint das meist beliebte Durchsichtigmachen des Präparates in Terpentin vor der Transferirung in den Canadabalsam nicht nur überflüssig, sondern sogar zweckwidrig. Der Terpentin vermehrt den Fehler des Balsams, die Präparate allzu durchsichtig zu machen und schneidet das Stadium des Durchscheinens für den Beobachter gänzlich ab, während dem er im Stande ist, manchen zweifelhaften Punkt der Organisation festzustellen. Wasserfreier Alkohol wird von dem Balsam vollständig verdrängt, welcher Process allerdings zuweilen Tage in Anspruch nimmt, es bleibt aber schliesslich ein sauberes Präparat zurück. Ausgenommen sind davon nur gewisse sehr undurchdringliche Gewebe (z. B. die Leibeswand der Nematoden), die aber auch

unter Anwendung von Terpentin keine vollständige Garantie gegen undurchsichtige Stellen bieten. Hat der Balsam die richtige Consistenz, so ist ein Erwärmen des Objectträgers unnöthig, man nimmt mit einem kleinen Spatel etwas Balsam aus dem Behältniss, breitet ihn auf dem Objectträger aus, das Präparat wird im Alkohol auf dem untergetauchten Deckglas arrangirt, mit demselben herausgehoben, und nachdem der anhaftende Alkohol schnell etwas beseitigt ist, auf den Balsam gebreitet. Zögert man zu lange mit der Bedeckung, so zieht das Präparat Wasser aus der Luft an und durchtränkt sich nachher schwer mit dem Balsam. Bleiben die Unebenheiten des Objectes noch genügend mit Alkohol erfüllt, so können sich darin keine Luftblasen fangen, alle anderen derartigen Blasen sind völlig gleichgültig, da sie von selbst unter dem Deckglas hervorwandern, und sogar dann durch Diffusion verschwinden, wenn sie sich in weiteren Zwischenräumen gefangen haben.

Trägt man den Balsam an den Rändern des Deckglases etwas reichlich auf, so ist unter gewöhnlichen Verhältnissen ein Verkitten überflüssig; sollte nach Einlegen relativ dicker Präparate der Balsam schliesslich etwas schwinden, so genügt es, ein wenig von diesem Material in die Lücke laufen zu lassen, bis der Rand des Deckgläschens sicher mit dem Objectträger verbunden ist. Den Hauptfehler des Balsam, die allzugrosse Transparenz der Präparate, mildert man sehr erheblich, indem man sie vorher mit Carmin und ähnlichen Mitteln färbt. Aus trocknen Objecten, die man in Balsam legen will, muss man die Luft durch längeres Einlegen in Terpentin vertreiben und sie alsdann in Balsam übertragen. Die Resistenz der mit Alkohol behandelten Objecte ist meist genügend, um ein Unterlegen von sogenannten Zellen zur Verhütung des Deckglasdruckes unnöthig zu machen; nur bei sehr zarten Präparaten ist es unerlässlich. Ueberflüssigen Balsam entfernt man zunächst mit dem Messer, das Reinigen des Deckglases vollzieht sich an nicht ganz frischen Präparaten sehr leicht durch ein mit Ammoniak befeuchtetes Lappchen.

Vertragen die Objecte den Alkohol oder Balsam nicht wegen ihrer zarten Beschaffenheit, oder hat man die grosse Durchsichtigkeit zu fürchten, so muss man andere Einschlussmittel nehmen. Unter diesen ist verdünntes Glycerin mit sehr wenig Essigsäure ein noch immer beliebtes Mittel, statt desselben dürfte es sich aber viel mehr empfehlen, die Glyceringallerte in Anwendung zu bringen, wie sie vom Präparator Möller in Wedel (Holstein) in den Handel gebracht wird. Dieser Körper bildet bei gewöhnlicher Temperatur eine solide Gallerte, geringe Erwärmung reicht aber aus, um eine Quantität dem Behältniss mittelst der Pipette entnehmen zu können, die auf den leicht erwärmten Objectträger gebracht wird. Man placirt das Object aus wässriger Flüssigkeit auf das Deckglas, haucht es an und deckt es sehr langsam und behutsam über die flüssige Gallerte. So irrelevant die Luftblasen beim Balsam sind, so gefährlich sind sie hier, da, einmal eingeschlossen, sie aus der bald erstarrenden Gallerte nicht mehr weichen. Alkoholhaltige Präparate tauche man erst in schwachen Spiritus, sonst scheiden sie sehr kleine Luftbläschen in ihrer ganzen Umgebung aus. Wenn die Gallerte nach einigen Minuten geronnen ist, so entfernt man das überflüssige bequem mit dem Messer oder einem angefeuchteten Pinsel und verkittet später den Rand des wohl getrockneten Deckgläschens.

Der ausserordentliche Vortheil der Gallerte vor den sonstigen Glycerinmischungen liegt in dem Umstand, dass das Erstarren der Masse ein Reinigen der Ränder sehr erleichtert, da kein Nachfliessen stattfindet; aus dem-

selben Grunde tritt der angewendete Kitt nicht unter das Deckgläschen, endlich ist die Einwirkung des Einschlussmittels auf das Präparat eine mildere als beim Glycerin und findet ziemlich bald ihr Ende.

Vertragen Präparate selbst nicht die Glycingallerte, so kann man den ebenfalls von Möller käuflich gelieferten sehr indifferenten Gummischleim benutzen, für dessen Anwendung keine besonderen Vorschriften nothwendig sind. Endlich wäre noch auf ein englisches Einschlussmittel aufmerksam zu machen (Deane's Compound), dessen Zusammensetzung so rationell erscheint, dass es sich wohl zu weiterer Anwendung empfiehlt und in der Präservirung vielleicht vor der Glycingallerte den Vorrang hat. Es besteht aus 32 Grm. Gelatine, welche in 160 Grm. Wasser erweicht wird; darauf setzt man ebenfalls 160 Grm. Honig zu, der vorher zur Siedehitze gebracht wurde, kocht die Mischung auf und setzt ihr, wenn sie etwas verkühlt ist, 16 Grm. Spiritus zu mit 6 Tropfen Kreosot. Das Ganze wird schliesslich durch feinen Flanell filtrirt, und bildet eine Gallerte, die unter geringer Erwärmung flüssig wird; auch hier ist eine Verkittung des Deckglasrandes erforderlich, die Anwendung im Allgemeinen wie bei der vorigen Masse.

Die Cemente, deren man sich zur Verkittung des Deckglasrandes bedient, sind sehr mannigfaltig, ein Asphaltlack von der richtigen Consistenz leistet indessen ziemlich Alles, was man verlangen kann. Die Grundfrage ist hierbei, hat man eine sogenannte Zelle in Anwendung gebracht, oder nicht. Abgesehen von gewissen, künstlichen Präparaten, die im Handel sind, sowie einer geringeren Anzahl sehr zarter Objecte oder mikroskopischer Thiere, die Druck durchaus nicht vertragen, wird man meist ohne eine solche Zelle auskommen. Andernfalls kann man Zellen, oder eigentlich die Umwallung der zu bildenden Zelle, aus allerhand Material darstellen. Man bekommt im Handel solche Ringe und kreisförmig ausgeschnittene Plättchen aus Glas, Messing u. s. w., die dann auf den Objectträger mit einem festen Kitt aufgesetzt werden. Oder man bildet auf dem Objectträger Ringe aus einem bald erhärtenden Lack, deren Oberfläche nach vollständiger Erhärtung ebengeschliffen wird. Bei der Benutzung bringt man die Conservirungsflüssigkeit und das Object in die Umwallung und schiebt das Deckgläschen vorsichtig von der Seite her über, um keine Luftblasen zu fangen. Der geringe Ueberschuss wird vorsichtig abgetrocknet und das am besten etwas kleinere Deckgläschen mit der darunter liegenden Zelle durch Kitt vereinigt. Bei einiger Vorsicht wird von diesem nicht leicht etwas unter das Deckglas in das Präparat laufen, wie es allerdings ohne Anwendung von Zellen leicht passiren kann.

Auch ohne Zelle lässt sich aber dieser Uebelstand vermeiden, wenn man in folgender Weise verfährt. Man nimmt einen ziemlich schnell trocknenden Lack, z. B. chloroformhaltigen Asphaltlack, und umzieht das Deckglas, nachdem die Ränder sorgfältig gereinigt sind, in der Entfernung von etwa einem Millimeter. Nachdem diese Einfassung zu trocknen begonnen hat, führt man allseitig brückenartig von der Asphaltmasse kleinere Mengen gegen den Deckgläschenrand und fixirt es so horizontal gegen den Objectträger. Erst wenn diese Brücken etwas übertrocknet sind, füllt man auch die Zwischenräume aus. Etwa überschüssiger Lack ist bei dieser Methode nicht im Stande, das Deckgläschen anzuziehen und sich durch die Capillarität auszubreiten. Bei gelatinirenden Einschlussmitteln ist diese Gefahr überhaupt nicht vorhanden.

Asphaltlack von der geeigneten Consistenz (er lässt sich durch Chloro-

form, Aether oder Terpentin, wovon letzteres ihn langsam trocknend macht) ist unter gewöhnlichen Verhältnissen ein ganz ausreichender Kitt für Deckglässchen, für den Liebhaber folgen hier zum Schluss noch einige der von den verschiedenen Autoren erwähnten Kitte, auf welche besonders von den Engländern Werth gelegt wird.

Hierher gehört „Goldsize“, „Electrical Cement“ und „Marine glue“ E., welche Präparate in England käuflich sind, ihre Zusammensetzung folgt unten; für den erstgenannten Kitt ist die Bereitung etwas umständlich.*)

Photographische Aufnahmen.

Es giebt heutigen Tages wohl Wenige, die nicht die grosse Bedeutung der photographischen Technik erkannt hätten, und gerade für den Reisenden wird dieselbe von der höchsten Wichtigkeit. Will er nicht lediglich für sich selbst sehen, sondern hofft er aus dem Geschehen für weitere Kreise einen bleibenden Nutzen, einen Fortschritt in der Erkenntniss zu schaffen, so ist es nothwendig, dass er, wo Beschreibung nicht ausreicht, Belege beibringt, welche als materieller Anhalt dem Unkundigen die directe Anschauung zu ersetzen vermögen und gleichzeitig als Correctiv für die subjective Auffassung des Reisenden dienen können. Solchen Anforderungen entsprechen aber photographischen Aufnahmen am allerbesten.

Es ist nicht zu verlangen, dass jeder Reisende auch zugleich ein grosser Künstler sein soll, und selbst verhältnissmässig gewandte Zeichner sehen wir Schiffbruch leiden, wo die Massenhaftigkeit neuer, fremdartiger Anschauungen beim Reisen in andern Ländern überwältigend auf sie einwirkt. Dazu kommt, dass die häufig spärlich zugemessene Musse dem Zeichner nicht gestattet, sein Werk alsbald zu beendigen, sondern er sich nicht selten mit flüchtigen Umrissen und Andeutungen begnügen muss, die Vollendung einer gelegeneren Zeit nach seiner Erinnerung vorbehaltend. So erscheint es nicht wunderbar, dass die Hand fast unwillkürlich wieder in die gewöhnten heimathlichen Formen zurückfällt, dass zahllose interessante Details verloren gehen, und andere durch das trügerische Gedächtniss vorgespiegelt, falsch vermerkt werden. Dem Allen hilft die Photographie in ausreichender Weise ab: sie vollendet das Bild an Ort und Stelle in kürzester Zeit, trägt alle dem Blick erkennbaren Details mit bewunderungswürdiger Schärfe ein, giebt einen genau kontrollirbaren Ausdruck der Verhältnisse und wenigstens gewisse Andeutungen über die Localtöne.

Immerhin wird der Mangel der Farbe überhaupt, sowie die verschiedenartige Einwirkung derselben nach ihrer aktinischen Wirkung ohne Beziehung zur relativen Helligkeit als der grösste, ich möchte sagen als der einzige gegen die Photographie zu erhebende Vorwurf betrachtet werden müssen. Es sei daher gleich hier bemerkt, dass es sich stets dringend empfehlen wird,

*) Goldsize: 25 Theile Leinsamenöl für drei Stunden mit einem Theil Bleioxyd roth. Bl., und $\frac{1}{2}$ Theil Umber gekocht. Zum abgegossenen Oel werden alsdann allmählig gleiche Theile von fein gepulvertem weissen Blei und gelbem Ocker zugesetzt, bis eine dickliche Flüssigkeit entsteht. Das Ganze wird alsdann nochmals aufgekocht.

Electrical cement: 5 Theile Colophonium mit einem Theil Wachs und einem Theil rothem Ocker. Durch Zusatz von 2 Theilen Canadabalsam haftet es noch fester am Glase.

Marine glue besteht aus Kautschuck und Schellack in Naphta gelöst unter Anwendung von höherer Temperatur. Es dient zum Aufkitten der Zellen und ähnlichen Zwecken.

alle wichtigen Localtöne, Hautfärbungen etc. durch directe Vergleichung an Ort und Stelle graphisch festzustellen und den Photographien als Ergänzung beizugeben.

Ein anderer Vorwurf gegen die Photographie richtet sich auf die Umständlichkeit der Technik und Schwierigkeit der Anwendung auf Reisen; dieser Vorwurf ist kaum von grosser Bedeutung und es wird ein Hauptzweck der vorliegenden Arbeit sein, zu zeigen, dass die ausserordentliche Biegsamkeit, welche die Photographie zeigt, es möglich macht, das Verfahren sich sehr wesentlich zu erleichtern, umständliche und mühsame Präparationen aber auf gelegene Zeiten zu verschieben.

Nachdem sich jetzt diese Kunst über den ganzen Erdball verbreitet hat, steht der Reisende auch nicht mehr so verlassen da, wie noch vor wenigen Jahren und wird immer in grösserer oder geringerer Entfernung Stationen erreichen können, wo ihm Hülfe geleistet werden kann. Freilich die grössten Verdienste wird der reisende Photograph sich erwerben, wenn es ihm gelingt, bis tief hinein in das Innere noch uncivilisirter Continente seine Kunst im Flor zu erhalten, und man darf dreist behaupten, dass auch dies selbst unter den schwierigsten Verhältnissen möglich ist.

Endlich sollen die hier aufzustellenden Principien den der Photographie unkundigen Reisenden auch davon in Kenntniss setzen, was für Anforderungen von wissenschaftlicher Seite an Photographien gestellt werden, um ihn zu befähigen, beim Erwerben von käuflichen Aufnahmen eine geeignete Auswahl zu treffen.

Anthropologische Aufnahmen.

Die Mangelhaftigkeit und Unzulänglichkeit der andern darstellenden Methoden ist wohl in keinem Gebiet so klar zu Tage getreten als in dem der Anthropologie, und man ist vollständig berechtigt die grösste Menge der Typen fremder Nationen bis auf einen kleinen, von gewandten Portraitzeichnern gelieferten Bruchtheil entweder als incorrect vollständig zu verwerfen, oder wenigstens mit dem grössten Misstrauen zu betrachten.

Ist es mitunter schon schwer genug ein widerwilliges, scheues Individuum für den kurzen Moment einer Augenblicksaufnahme zum Stillsitzen zu bewegen, so gilt dies natürlich noch viel mehr, wenn durch die Hand des Zeichners ein Portrait entworfen werden soll, wo geschickte Maler stundenlange Sitzungen verlangen. Für die Herstellung zuverlässiger Abbildungen fremder Völkerstämme zu allgemeiner Vergleichung ist die Anwendung der Photographie daher als unumgänglich nöthig zu bezeichnen.

Betrachten wir nun die Gesichtspunkte, welche bei solchen Zwecken leitend sein müssen, um Resultate zu liefern, die den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen und eine möglichst eingehende Vergleichung erlauben.

Die Methode wird eine andere sein, wenn man die Gesichtsbildung und die Körperformen speciell in's Auge fasst (physiognomische Aufnahmen) oder wenn man den allgemeinen Eindruck der Personen fixiren, sie in ihrer Lebensweise und Beschäftigung darstellen, ihre Kleidung Waffen und Geräthe abbilden will (ethnographische Aufnahmen).

Die erstere Kategorie von Bildern werden keinesfalls so malerisch und unterhaltend sein können als die der zweiten, aber für die Wissenschaft sind sie vom grössten Nutzen und müssen gerade hier in die erste Linie gestellt werden, weil nur die Photographie dieselben in genügender Weise zu be-

schaffen vermag, während für die andere Kategorie der Zeichner schon leichter zu genügen vermag.

a. Physiognomische Aufnahmen.

Die physiognomischen Aufnahmen zerfallen in Aufnahmen von ganzen Figuren und solchen, wo der Kopf die Hauptsache darstellt. Beide Gruppen von Abbildungen haben ihre Berechtigung, da es nicht wohl ausführbar ist die ganzen Figuren in solchem Maassstabe aufzunehmen, dass auch die feineren Einzelheiten in den Gesichtszügen genügend zur Geltung kämen.

Die Bildung des Kopfes, die Verhältnisse der einzelnen Theile des Gesichtes sind für die vergleichende Anthropologie von dem höchsten Interesse und zwar sollten solche Portraits nach folgenden Principien aufgenommen sein:

1. Man wähle bei der Aufnahme stets gerade Projectionen, d. h. man nehme jeden Kopf in möglichst genau gestellter Vorder- und Seitenansicht auf, bei natürlicher Haltung, während gleichzeitig auch die Camera horizontal gestellt und in solche Höhe über den Erdboden gebracht wird, dass die Verlängerung der optischen Axe des Objectivs ungefähr durch die Mitte des Kopfes geht. Das Neigen der Visirscheibe, wie es sonst zur Erreichung grösserer Schärfe in vorspringenden Parthieen des Bildes u. s. w. häufig Anwendung findet, ist für den vorliegenden Zweck unzulässig, da es die räumlichen Verhältnisse verändert.

Die geraden Projectionen sind zu wählen, weil man dadurch am meisten von uncontrollirbaren perspectivischen Verkürzungen befreit wird und gleich gelagerte Theile verschiedener Bilder in directe Vergleichung ziehen kann.

2. Die aufzunehmenden Körperteile seien möglichst entblösst. Da es bei solchen Aufnahmen auf die Körperformen selbst in erster

Linie ankommt, sind alle Zuthaten,

Schmuckgegenstände und Aehnliches, wenn es auch den malerischen

Effect erhöht, durchaus zu verwerfen, da sie die Klarheit und Messbarkeit der Verhältnisse beeinträchtigen.

Probetafel der Brustbilder.

3. Die Beleuchtung sei einfach und bestimmt, um die Umrisse recht deutlich hervortreten zu lassen. Zu diesem Zwecke wird es sich empfehlen, nicht, wie es gewöhnlich des malerischen Effectes wegen geschieht, den Hintergrund in einem Mittelton zu halten, welcher sich hell von den Schatten, dunkel von den Lichtern des Portraits absetzt, sondern einen weissen oder wenigstens recht hellen Hintergrund. Die Schattentöne werden alsdann so abgestimmt, dass die ausgebreiteten Lichtparthieen sich doch noch dunkel davon absetzen und nur die kleinen Glanzlichter weiss bleiben. Man erhält so ein Bild, dem zwar nicht die sanfte, angenehme Lichtwirkung eigen ist, wie man sie sonst von einer Photographie verlangt, das aber leicht messbare Umrisse zeigt und sich bequem durch irgend eine andere graphische Methode vervielfältigen lässt.

4. Die Aufnahmen müssen in bestimmter Grösse ausgeführt werden. Der zu wählende Maassstab sollte nicht geringer als $\frac{1}{8}$ der natürlichen Grösse sein, da sonst die einzelnen Theile des Gesichtes schwer messbar erscheinen: $\frac{1}{4}$ der natürlichen Grösse würde für den Reisephographen wohl nach der andern Seite hin als die äusserste Grenze zu bezeichnen sein, über die hinauszugehen aus technischen Gründen nicht räthlich erscheint. Der einmal angenommene Maassstab ist natürlich möglichst consequent in Anwendung zu bringen, um die Vergleichung zu erleichtern.

5. Es empfiehlt sich bei der Aufnahme zugleich eine Maass-eintheilung mit zu photographiren, die im gleichen Verhältniss erscheint wie das Modell. Dies Princip kommt bei der Aufnahme von ganzen Figuren in noch höherem Maasse zur Geltung, als wenn die Köpfe allein abgebildet werden, doch ist auch hierbei die Möglichkeit einer Verificirung des vorliegenden Maassstabes dringend wünschenswerth.

Trotz aller Vorsicht ereignet es sich wegen der erzwungenen Eile der Aufnahme, dass selbst ein gewandter Photograph den beabsichtigten Maassstab häufig nicht genau trifft und man würde daher aus den Abbildungen absolute Grössenverhältnisse nicht entnehmen können, wenn nicht durch Vergleichung der mit photographirten Eintheilung oder einer direct gemessenen Distanz in jedem einzelnen Falle die etwaige Abweichung festgestellt wird.

Am zweckmässigsten ist es in der Entfernung der mittleren frontalen Ebene, die man sich durch den Kopf gelegt denkt, (für welche auch der Focus des Objectivs her-

Probetafel der Brustbilder.

gerichtet wird) neben der Person ein Bandmaass oder einen eingetheilten Stab lothrecht aufzuhängen, so dass die Theilstriche dieselbe

Verkleinerung zeigen als die mittleren Partien des Kopfes und gleichzeitig scharf erscheinen. Will oder kann man ein solches Bandmaass nicht anbringen, so muss man statt dessen mit dem Tasterzirkel (Baudeloque's Comp. d'épais.) ein oder zwei im Bilde leicht kennbare Distanzen am Kopfe selbst messen, die der Hauptebene nahe liegen. Für das Enface wähle man z. B. die Entfernung der Jochbrücken, für das Profil diejenige vom Beginn des Haarwuchses bis zum Kinn oder von der Nasenwurzel bis zum Kinn.

Bei der Aufnahme von ganzen Figuren gelten ähnliche Principien wie bei den Portraitaufnahmen.

a. Auch hier ist es wünschenswerth, mehrere Ansichten desselben Körpers zu haben. Vorder- und Seitenansicht werden den meisten Anforderungen genügen, diejenige von hinten ist weniger unumgänglich nöthig. Erlauben es die Verhältnisse nicht, mehrere Aufnahmen von derselben Person zu machen, so ist die Vorderansicht zu bevorzugen.

Als Probe einer physiognomischen Aufnahme germanischer Race im Maassstabe von $\frac{1}{15}$ nat. Gr. (ganze Figur).

b. Der Körper sei möglichst entblösst, die Haltung gerade und aufrecht. Unsymmetrische Stellung der Gliedmaassen ist im Allgemeinen

Anleitung zu wissenschaftl. Beobachtungen auf Reisen.

zu verwerfen, da solche ausgedehnte Verschiebungen in den einzelnen Regionen des Körpers mit sich bringt. Als Ausnahme wäre das Auflegen einer Hand auf die Brust bei rechtwinklig gebeugtem Vorderarm, um die Verhältnisse der Finger klar darzustellen zu zeitweiser Anwendung zu empfehlen. Doch ist alsdann darauf zu achten, dass der Arm nicht angeklemt wird, die Brustwarzen sichtbar bleiben, und die Stellung der Schulter nicht alterirt wird. Ein Arm wenigstens muss in natürlich herunterhängender Haltung verbleiben.

c. Bestimmte Grösse ist hierbei noch wichtiger als bei Portraits, der Maassstab darf aber viel geringer sein; erforderlichen Falls kann man bis $\frac{1}{20}$ der natürlichen Grösse heruntergehen. Die Schwierigkeit durch directes Messen am Lebenden correcte Daten über die Verhältnisse der einzelnen Theile zu gewinnen, macht es ausserordentlich wünschenswerth, genau messbare Photographien der ganzen Körper zu haben, wo man im Stande ist, sich über die als Ausgangspunkte der Messungen zu benutzenden Stellen mit anderen Forschern zu verständigen.

Das Anbringen einer Maasseintheilung sollte hier keinesfalls unterbleiben und zwar wird sich auch hier das lothrechte Aufhängen eines beschwerten Bandmaasses oder eines eingetheilten Stabes in der Focalebene als das Zweckdienlichste herausstellen. Der lothrecht hängende Stab dürfte beim Arbeiten im Freien, wo der Luftzug das Bandmaass leicht bewegen könnte, vorzuziehen sein. Ist der Wind so stark, dass auch der Stab schwankt, so näherte man denselben dem Boden so weit, dass er ihn fast berührt und fixire das untere Ende durch seitlich gelegene schwere Körper.

Weniger empfiehlt es sich, den Personen einen eingetheilten Stab in die Hand zu geben, da er so nicht genau in die Focalebene zu stehen kommt, bei etwas geneigter Stellung die Eintheilung unrichtig zeigt und durch die haltende Hand leicht in Schwankungen versetzt wird. Auch das Aufnehmen der Figuren von einem in Quadratnetze bestimmter Grösse eingetheilten Hintergrund ist kaum zu empfehlen, weil es selbstverständlich unmöglich ist, den Hintergrund in dieselbe Focalebene mit der Figur zu bringen und man also durch die perspectivische Verkürzung Abweichungen erhält, welche je nach der Entfernung des Körpers von der Hand eine ganz verschiedene Grösse zeigen. Will man einen eingetheilten Hintergrund als Masstab benutzen, so ist dafür zu sorgen, dass die Hauptfocalebene (etwa vom Scheitelpunkt der Figur zu messen) von der Wand stets genau dieselbe Entfernung zeige, und die Quadrate entweder im Verhältniss zur Verkürzung grösser entworfen werden, oder die gefundenen Dimensionen des Körpers mit Rücksicht darauf nachträglich reducirt werden. Es bleibt alsdann immer noch der Uebelstand bestehen, dass die Theilstriche wegen ihrer nicht unbeträchtlichen Entfernung vom Focus nicht vollkommen scharf erscheinen, was bei schnell arbeitenden Objectiven nicht gänzlich zu beseitigen ist.

Wir kommen so zu der wichtigsten Frage bei allen photographischen Aufnahmen überhaupt nämlich: Welches Objectiv ist für die eine oder andere Arbeit zu benützen?

Eine richtige Würdigung der mit der Construction unvermeidlich zusammenhängenden Eigenthümlichkeiten der Objective führt mit Nothwendigkeit zu der Ueberzeugung, dass es unter der grossen Zahl von solchen Systemen keins giebt oder auch nur geben kann, welches allen Anforderungen in annähernd gleicher Weise gerecht würde, da die Anforderungen zum Theil im innern Widerspruch mit einander stehen. Will man daher befriedigende

Aufnahmen erzielen, so muss man von vornherein darauf verzichten, Alles mit demselben Objectiv ausführen zu wollen.

Auch die sogenannten Universalobjective, welche durch Veränderung der Linsencombination bald diesem bald jenem Zweck entsprechen sollen, haben bisher nur sehr annähernd die gehegten Erwartungen befriedigt. Da für bestimmte Combinationen auch bestimmte Linsenkrümmungen die vortheilhaftesten sein müssen, so kann eine Veränderung des einen Momentes ohne gleichzeitige Modification des andern kaum ohne Nachtheil auf die Gesamtwirkung bleiben.

Bei physiognomischen Aufnahmen (Portraits sowohl wie ganze Figuren), wo es sich darum handelt häufig wenig intelligente, zuweilen sogar widerwillige Individuen aufzunehmen, ist Kürze der Expositionszeit eine der wichtigsten Anforderungen an das Objectiv. Da die Expositionszeit abhängt von der Lichtstärke und daher im Verhältniss des Quadrates der Oeffnung und im umgekehrten Verhältniss des Quadrates der hintern Focusdistanz wächst, so leuchtet ein, dass für die in Rede stehenden Aufnahmen nur Objective von grosser Oeffnung bei relativ kurzem Focus verwendet werden sollten. Gleichzeitig muss man aber möglichste Schärfe der Zeichnung verlangen.

Diesen Anforderungen genügen am besten die schnell arbeitenden Double-objective der mittleren Nummern von etwa 8 Cm. Linsendurchmesser. Niedrigere Nummern müsste man schon übermässig anstrengen, wenn man den angeführten Maassstab der Aufnahmen erreichen wollte.

Die wegen der geringeren Expositionszeit erwünschte Kürze des Focus hat einen Uebelstand im Gefolge, welchen man nicht übersehen darf: je kürzer nämlich der Focus relativ ist, um so stärker macht sich im Bilde die perspectivische Verkürzung bemerklich, um so mehr entfernt es sich also von der geometrischen Zeichnung.

Dies ist bei dem vorliegenden Zweck unstreitig ein Uebelstand und es sind daher die Objective mit besonders kurzem Focus, die Kugelobjective, Pantoscope, Weitwinkelobjective für physiognomische Aufnahmen nicht zu empfehlen. Im Nothfalle wäre das Steinheilsche Aplanat zu verwenden, welches hinsichtlich der correcten Zeichnung die Doubleobjective weit übertrifft, aber erheblich langsamer arbeitet.

Der Mangel der Doubleobjective, welchen man nicht verkennen darf, liegt in der geringen Tiefe des Focus und der bedeutenden Wölbung der Bildfläche. Beides kommt aber bei der Aufnahme von einzelnen Personen nicht so unangenehm zur Geltung, sobald man auf die Schärfe des Hintergrundes verzichten kann. Man vermeide es also bei der Anwen-

dung solcher Objective grosse Tiefen des Bildes oder breit neben einander gestellte Gegenstände aufzunehmen.

Für alle Aufnahmen ist es erwünscht, das zur Verwendung gekommene Objectiv, die Brennweite desselben, die Erhebung der optischen Axe über den Fusspunkt des Stativs, sowie die Entfernung der ersten brechenden Fläche vom Gegenstande wenigstens annähernd zu kennen. Man versehe das Negativ (wie überhaupt alle) mit einer fest damit verbundenen Nummer z. B. durch Einkratzen in einer Ecke desselben mit dem Schreibdiamanten, und notire im Negativverzeichniss zu demselben die wichtigsten Daten über die Person.

Z. B.: Nr. 46 a (Enface) b (Profil).

1. Name.
2. Stamm.
3. Geschlecht.
4. Ungefährs Alter.
5. Farbe der Haut.
6. Beschaffenheit und Farbe der Haare.
7. Farbe der Regenbogenhaut.
8. Körpergrösse; sonstige gemessene Distanzen.*)
9. Besondere Bemerkungen.

b. Ethnologische Aufnahmen.

Während die stricten Normen, die erzwungene Einförmigkeit in der Darstellungsweise den besprochenen Arbeiten wenig anregende Momente verleihen, bleibt bei den ethnographischen Aufnahmen der künstlerischen Neigung des Photographen ein grösseres Feld. Gerade desshalb darf man darauf rechnen leichter Hundert solcher Aufnahmen zu erhalten als eine der anderen Art; man darf aber nicht vergessen, dass an wissenschaftlichem Werth die eine vielleicht alle Hundert aufwiegt.

Bei Reisen zu wissenschaftlichen Zwecken muss daher die physiognomische Darstellung in erster Linie geübt werden und der kleinere Theil der Musse wird, den ethnographischen Aufnahmen zu widmen sein. An sehr vielen Orten der Erde wird der Reisende im Stande sein, ethnographische Bilder in grosser Menge zu kaufen und solche Ankäufe in ausgedehntem Maasse sind dringend zu empfehlen. Man sei alsdann nicht zu rigorös hinsichtlich der Ausführung der Photographien, sondern nehme auch Copien von fehlerhaften Platten, sobald sie interessante Details in genügender Deutlichkeit zeigen. Häufig werden die unter schwierigen Verhältnissen hergestellten und desshalb nicht ganz fehlerfreien Platten die seltensten und bedeutendsten sein.

Ethnographische Aufnahmen müssen ihrem Charakter nach sehr verschieden sein und es lässt sich daher wenig Allgemeines darüber sagen. Es gehört in diese Kategorie jedes Bild, welches sich auf den Menschen selbst und seine Umgebung bezieht, soweit er sich dieselbe durch seine Thätigkeit gestaltet hat. Bei diesem so ausserordentlich reichen Gebiet werden wir uns bemühen müssen möglichst viele Einzelheiten in ein Bild zu vereinigen, so lange die Deutlichkeit nicht darunter leidet.

---

*) Es handelt sich hier nur um Distanzen, die zur Verification des Maassstabes gemessen wurden; hat man Musse, vollständig zu messen, so wird dafür auf das unter dem betreffenden Kapitel gegebene Schema verwiesen.

Ihrer Wichtigkeit nach dürften etwa folgende Punkte als leitende Principien in's Auge gefasst werden:

Man suche Aufnahmen zu erzielen, welche als Ergänzung für die physiognomischen dienen können. Da bei den letztern die Stellung eine vorgeschriebene ist, der Körper entblösst werden soll, so haben die ersteren die beliebte Haltung des Körpers sowie die Tracht der Personen darzustellen, wobei darauf zu achten ist, wie dieselbe etwa bei besonderen Gelegenheiten wechselt als festlicher Schmuck, bei religiösen Feierlichkeiten, als Kriegsrüstung (kriegerische Bemalung) u. s. w.

Nächst dem sind die Waffen und Geräthe von grossem Interesse entweder für sich in Gruppen aufgenommen oder in den Händen der Personen selbst, wobei dann womöglich zugleich die Art und Weise der Anwendung veranschaulicht werden kann. Der leichteren Verständlichkeit wegen dürften kurze dem Negativverzeichniss beigefügte Notizen sehr erwünscht sein.

Ferner sind Darstellungen der Wohnungen wichtig, und zwar sowohl der einzelnen, wobei man auch die innere Einrichtung thunlichst zu berücksichtigen hat, als auch die Gruppierung der Wohnungen zu Dörfern und Städten. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Gebiet die Opferstellen, Tempel, Grabmäler, Kirchhöfe und ähnliche mit dem Cultus zusammenhängende Oertlichkeiten.

Häufig wird es schon gleichzeitig mit diesen Aufnahmen möglich sein Bilder zu erhalten, welche Scenen des privaten und öffentlichen Lebens darstellen und die begreiflicher Weise ebenfalls von hohem Interesse sind. Im Allgemeinen wird man freilich sich als Regel hinstellen müssen, dass solche Scenen nur als Augenblicksbilder oder wenigstens mit sehr kurzer Exposition aufgenommen werden können. Da man bei abgekürzter Exposition mit verhältnissmässig grosser Oeffnung des Objectivs arbeiten muss, erhält man gleichzeitig wenig Tiefenzeichnung und es wäre daher sicher ein verfehltes Unternehmen z. B. eine lange Strasse mit einem wichtigen öffentlichen Gebäude im Hintergrund unter Berücksichtigung der näheren Menschengruppen als Augenblicksbild aufnehmen zu wollen.

Häufig schliesst sich die Cultur zum wesentlichsten Theile an die Wasserstrassen an und es sind in solchen Fällen also auch die Landungsplätze, Häfen, Schiffe, Boote und temporäre Wohnstätten des Menschen auf dem Wasser eingehend zu berücksichtigen.

Schliesslich betrachte man als Gegenstände ethnographischer Aufnahmen auch die übrigen Erzeugnisse der menschlichen Thätigkeit: die Culturen der Felder, die Producte der Industrie, und Objecte der Kunst, soweit sich dieselbe nicht schon mit den Geräthen verbunden zeigt.

Als modificirt durch die Thätigkeit des Menschen und in so fern auch für das Studium seiner Natur von Wichtigkeit sind die Hausthiere zu bezeichnen, welche er züchtet, und wir kommen so zu den zoologischen Aufnahmen überhaupt.

Zoologische Aufnahmen.

Unter allen Gebieten, welche sich die Photographie unterworfen hat, erweist sich wohl keines spröder und undankbarer als das Aufnehmen zoologischer Objecte, was um so mehr zu bedauern ist, als hier das Bedürfniss der correcten und genauen Zeichnung ein ebenso dringendes ist als bei den menschlichen Portraits. Unsere zoologischen Sammlungen würden den Namen von Leichenkammern nicht in dem hohen Grade verdienen, wenn photographische Vorbilder die häufig dem Zooplasten unerreichbare Naturan-

schauung suppedirten. Man vernachlässige daher das Gebiet trotz seiner relativen Undankbarkeit nicht ganz.

Grundbedingungen eines leidlichen Erfolges sind hierbei, da fast ausschliesslich Augenblicksbilder in Frage kommen: Möglichst lichtstarke, schnellarbeitende Objective, sehr empfindliche Präparate, und grosse Geduld von Seiten des Photographen.

Auf das Einhalten eines bestimmten Maassstabes wird man meist verzichten müssen, ebenso auf eine allgemeine Schärfe des Bildes, da mit voller Oeffnung des Objectivs gearbeitet wird.

Am günstigsten stellen sich die Verhältnisse für die Aufnahmen von Hausthieren, von denen man bei einiger Mühe wohl mit Sicherheit brauchbare Bilder zu erhalten vermag. Um den Erfolg möglichst zu begünstigen, photographire man das Thier so weit thunlich in der ihm vertrauten Umgebung; man schüchtere es weder ein, noch reize man es; nachdem Alles zur sofortigen Aufnahme vorbereitet und auch die Camera bereits auf den gewählten Punkt eingestellt ist, führe man das Thier vorsichtig in die durch eine herabhängende Schnur oder etwas Aehnliches markirte Ebene des vorderen Focus, fessele seine Aufmerksamkeit alsdann momentan durch einen angeschlagenen musikalischen Ton (z. B. eine Mundharmonika) oder einen vorgehaltenen Gegenstand und exponire. Je schneller diese Operationen auf einander folgen, je weniger also das Thier ermüdet oder irritirt wird, um so grössere Aussicht auf Erfolg wird man haben.

Kann man, ohne dasselbe zu stören, zur Markirung des Focus ein hängendes Bandmaass benutzen, so erhält man gleichzeitig die erwünschte Verification des gewählten Maassstabes; in anderen Fällen wird man den Thieren ein Bandmaass umhängen können. Bei der Wahl des Platzes und der Stellung achte man darauf, dass der Boden horizontal sei und das Thier mit dem vorderen Theil des Körpers eher etwas höher stehe wie hinten, da das umgekehrte Verhältniss die Figur sehr zu entstellen pflegt.

Bei vierfüssigen Thieren dürfte die Seitenansicht stets zu bevorzugen sein, da die Ansicht von vorn wegen der starken perspectivischen Verschiebung leicht einen unnatürlichen Eindruck macht. Handelt es sich um die Gestalt von einzelnen Körpertheilen, so wird man sie auf Kosten des Gesamteindrucks in den Vordergrund stellen müssen.

Aufnahmen von wilden Thieren unterliegen natürlich noch grösseren Schwierigkeiten; auch in der Gefangenschaft sind sie als Regel zu intractabel und scheu, um Gelegenheit zu guten Aufnahmen zu bieten, wie die in zoologischen Gärten gewonnenen Bilder wohl unzweifelhaft darthun. Man muss sich hier also mit unvollkommenen Resultaten begnügen lernen; wie viel man erreicht, hängt in erster Linie von der Ausdauer des Photographen und der Zeit ab, die er darauf verwendet, einen günstigen Augenblick zu erspähen.

Von Thieren in der Wildniss aufgenommen, liegen kaum nennenswerthe Proben vor, und doch sollte auch diese Aufgabe nicht ganz bei Seite gesetzt werden.

Die geringste Aussicht auf Erfolg bietet der Versuch solche Thiere in einiger Grösse zu photographiren, da die entsprechende Annäherung meistens unmöglich, unter allen Umständen schwierig ist; trotzdem kann man dies Ziel nicht als durchaus unerreichbar hinstellen, und es ist bereits mehrfach versucht worden*), auf solche Weise zu photographiren. Tiefer im Innern

*) Der kühne Afrikareisende und ausgezeichnete Jäger Chapman hat z. B. in dieser Richtung gearbeitet, freilich ohne nennenswerthe Erfolge, da er die photographische Technik nur unvollkommen beherrschte.

menschenarmer Continente pflegt das Wild zuweilen sehr vertraut zu sein, so dass man die nöthige Annäherung erreicht, oder man hat zufällig genügende Deckung, um selbst an scheues Wild heranzukommen.

Es handelt sich alsdann darum, schnell und unter möglichst geringer Bewegung die Aufnahme zu vollenden; die günstigsten Bedingungen dafür würden sich ergeben unter Benutzung der sogenannten Zelt-Camera (Vergl. weiter unten) eines Apparates, der, wie der Name sagt, das photographische Dunkelzelt mit dem optischen Theil zum Entwerfen des Bildes in ein Stück vereinigt enthält. Als optischen Theil würde es sich empfehlen eine ähnliche Einrichtung dabei zu benutzen wie die von Bertsch angegebene *Chambre automatique**), um für den Fall, dass die weitere Annäherung mit der Zelt-camera nicht gelingen könnte, die mit der Platte montirte Camera aus ihrer Stelle zu nehmen und mit ihr allein den Thieren nachzuschleichen. Freilich wird der Photograph auch so sehr häufig die anfangs ruhig weidenden Thiere im entscheidenden Augenblick verschwinden sehen, doch dürfte genügende Ausdauer solche fehlgeschlagene Hoffnungen überwinden.

Für eine andere keineswegs unwichtige Kategorie zoologischer Aufnahmen stellen sich die Aussichten auf Erfolg viel günstiger: nämlich alle diejenigen, wo man auf die Deutlichkeit der Details von vornherein verzichtet. In Localitäten, wo der Blick ungehindert grössere Flächen durchstreift, überschaut man zuweilen Hunderte von grösseren Thieren auf einmal und es wäre interessant Photographien solcher Jagdgründe als Documente des Reichthums der Fauna zu erhalten, auch wenn das Bild nicht mehr erkennen lässt als die Stückzahl und die Gattung des Wildes.

Von gleicher Bedeutung wären Aufnahmen von Küstenparthien und Uferklippen mit ihrem häufig massenhaft auftretenden thierischen Leben, Colonien von Vögeln in Bäumen, Ansammlungen solcher an Sümpfen und ähnliche besondere Zusammenhäufungen von Thieren, welche photographisch abzubilden keineswegs unmöglich ist.

Als ein sicherer Erfolg bleibt im Gebiete der Zoologie die Aufnahme von getödteten Thieren übrig, freilich ein trauriger Nothbehelf im Vergleich mit denjenigen lebender, aber doch von grossem Nutzen.

Bei geschossenem Wild, besonders wo es sich um grössere Thiere handelt, ist die Art und Weise, wie ein Stück zusammenbricht und verendet oft recht charakteristisch und wegen des gleichzeitig sich abbildenden Terrains von besonderem Interesse. Man wird in solchen Fällen also gut thun, die Verhältnisse nicht zu verändern, sondern Alles in natürlicher Lage zu belassen. Sind derartige Erwägungen nicht vorhanden, so kann man das Thier entweder einzeln in die geeignete Lage bringen oder mehrere zur Gruppe arrangiren. Handelt es sich um seltene, wenig bekannte Thiere, deren Habitus und Figur man fixiren will, um vielleicht später den Taxidermen als Anhalt zu dienen, wird man jedes Stück einzeln aufnehmen müssen. Die Hauptschwierigkeit dabei ist, dass die Glieder bald todtstarr sind, bald ihrer Schwerkraft folgend schlaff am Boden liegen, so dass die Photographie anstatt den Umriss der Figur zu zeigen ein wirres, wegen starker perspectivischer Verkürzung wenig übersichtliches Bild giebt. Diesen Uebelstand kann man nur dadurch mildern, dass man die Thiere entweder mit möglichster Erhaltung der normalen Lagerungsverhältnisse der Glieder aufhängt, oder sie auf eine geneigte Fläche legt, gegen welche man mit entsprechend

*) Vgl. Vogel: Photographie auf der Londoner Weltausstellung pag. 21.

gesenkter Camera arbeitet, um so wenigstens die perspectivische Verkürzung zu verringern.

Auch bei dem Arrangiren von Gruppen wird man die gleichen Auskünfte verwerthen müssen, wenn das Ganze sich nicht als ein wildes Chaos von Beinen, Flügeln und Köpfen zeigen soll. Gleichzeitig kann man anderweitige eigenthümliche Erzeugnisse des Landes mit zur Darstellung bringen, und so das Bild zu einem geschmackvollen Stilleben abrunden; am besten pflegen Gegenstände dem Pflanzenreich zugehörig, wie sonderbare Stämme, pittoreske Blätter, Früchte und Aehnliches dazu zu passen, welche auch für sich allein eine Würdigung des reisenden Photographen beanspruchen dürfen.

Für die letztbesprochene Kategorie zoologischer Aufnahmen sowie bei den gleich zu behandelnden botanischen ist es überall, wo die Verhältnisse dem Arbeiten mit nassen Platten grössere Schwierigkeiten entgegenstellen, gerathen, trockene Processe in Anwendung zu bringen, weil diese keine langen Vorbereitungen brauchen und schnell zur Stelle geschafft werden können.

Phytognostische Aufnahmen.

Es gab eine Zeit, wo man meinte, die Photographie eigne sich nicht für die Darstellung des Pflanzenreiches, da die vorherrschenden grünen Färbungen desselben auf die dafür ungeeignet jodirte Collodiumschicht keinen genügenden Eindruck hervorbrachten. Ganze Scenerieen mit üppigem Pflanzenwuchs, wie sie heutzutage bereits vorliegen, lassen erkennen, dass der Photograph bei richtiger Kenntniss der Technick mit Sicherheit bedeutende Erfolge darin erwarten darf.

Für Aufnahmen solcher Gegenstände ist die Hauptbedingung, dass man ein Collodium benützt, auf welches die grünen Farben noch eine möglichst starke aktinische Wirkung ausüben. Dies gilt bekanntlich von Bromhaltigen Collodien, und man wähle daher mit solchen Salzen gemischte Jodirungen, worüber im technischen Abschnitt das Nähere einzusehen ist.

Lichtstarke, schnellarbeitende Objective sind hier weniger nöthig, dagegen ist eine allgemeine Schärfe des Bildes eine berechtigte Anforderung. Es werden sich zu phytognostischen Aufnahmen gerade die Systeme am meisten eignen, die bei geeigneter Reduction der Oeffnung durch Blenden eine grosse Tiefe des Focus zeigen, wie die Triplets, das Steinheilsche Applanat, die Weitwinkellinse und das Pantoskop von Busch.

Die Schönheit einer pflanzlichen Scenerie und ihre wissenschaftliche Verwerthbarkeit beruht zum grossen Theil mit auf dem Umstande, dass auch der nahe Vordergrund, wo die einzelnen Objecte in kennbarer Grösse erscheinen, mit in das Bild hineingezogen wird; es wird sich daher empfehlen ein Objectiv zu benutzen, welches einen grossen Bildwinkel zeigt, bei correcter Zeichnung, wenn auch die Perspective gleichzeitig etwas übertrieben erscheint. Unter den genannten Objectiven erfüllt keines diese Anforderungen so vollständig als das Pantoskop von Busch, nächst dem dürften die Dallmeyersche und Steinheilsche Weitwinkellinse rangiren.

Geeignete Wahl der Beleuchtung und richtige Exposition sind hier noch mehr Grundbedingung eines befriedigenden Erfolges wie in den übrigen Gebieten der Photographie. Bei klarem Himmel wähle man die frühe Morgenstunde, wenn die Sonne noch tief steht, da die grellen Glanzlichter bei scharfer Beleuchtung auf den Pflanzen sehr leicht beschneit erscheinen. Vermindert wird dieser Uebelstand ausserdem durch reich-

liche Exposition und volle Entwicklung der Platte bei äusserst vorsichtiger Verstärkung. Man wird gut thun, bei nassen Platten die energisch wirkende Pyrogallussäure ganz zu vermeiden und nur mit Eisen und Silber etwas zu verstärken. Die mässige Verstärkung hat sich besonders der weniger erfahrene Photograph stets aufs Neue einzuprägen, da man sich leicht durch die bei reichlicher Verstärkung entstehende Brillanz der Negative bestechen lässt.

Der Hauptfeind des photographirenden Botanikers ist der Wind, da er alle leicht beweglichen Pflanzentheile auf der Platte zu verwischen droht. Wollte der Reisende zu solchen Aufnahmen nur vollkommen windstille Tage benutzen, so würde natürlich ein ausserordentlicher Zeitverlust eintreten, man muss daher mässig bewegte Luft mit in den Kauf nehmen.

Der üble Einfluss, der dabei noch vorhanden ist, lässt sich besonders dadurch vermindern, dass man nur die geeignetsten Momente zur Aufnahme verwendet und bei eintretender Bewegung der Objecte sofort die Exposition unterbricht. Man darf als Regel annehmen, dass pflanzliche Organismen, von leichtem Winde bewegt, nach Aufhören desselben sehr schnell in die Gleichgewichtslage zurückkehren; es schadet daher Nichts, wenn man unter vorsichtiger Schliessung des Objectivs die Schwankungen vorübergehen lässt, sollte man dadurch auch zu einer zehnmaligen Exposition kommen.

Natürlich setzt dies voraus, dass die sensibilisirte Platte so lange aushält als die Gesamtsumme der Expositionszeiten und Pausen beträgt; dafür geben aber die Trockenprocesse die grösste Aussicht auf Erfolg. Die Erfahrung lehrt, dass bei Trockenplatten selbst ohne Unterbrechung der Exposition feine Pflanzentheile durch stossweise wirkende Winde bewegt, während der Schwankungen nur einen unmerklichen Eindruck auf die Collodiumschicht machen und erst nach Rückkehr in die Gleichgewichtslage wieder zu wirken anfangen. Bei nassen Platten und kurzer Expositionszeit werden selbst geringe Bewegungen in den pflanzlichen Objecten wegen der sofortigen Einwirkung auf die Schicht relativ viel störender.

Im Uebrigen gelten bei botanischen Aufnahmen mittelst der Photographie die allgemeinen Grundsätze der Landschaftsaufnahmen und das Weitere muss dem speciellen Ermessen des Botanikers anheim gestellt werden.

Geognostische und geographische Aufnahmen.

Geognostische Photographieen sind wegen der schnellen und getreuen Wiedergabe von Bergconturen, Schichtungen, besonders Felsformationen ganz gewiss von hervorragender Bedeutung. Diese Kategorie schliesst sich indessen schon sehr eng an die wirklichen Terrainaufnahmen mittelst der Photographie an und braucht daher nicht wohl besonders behandelt zu werden, während das letzt erwähnte Gebiet in der That von so hoher Wichtigkeit ist, dass man es zu einer eigenen leider noch immer nicht genug gewürdigten Wissenschaft, der Photogrammetrie erhoben hat.

Die grössten Verdienste um die Ausbildung und Einführung dieses Verfahrens hat sich Meydenbauer erworben, welcher es bereits wiederholentlich mit bestem Erfolge in der Praxis angewendet hat. Dasselbe wird sich überall da, wo der Reisende sich schnell in den Besitz des Materials für eine Spezialkarte setzen will, dringend empfehlen, und verdient daher allseitig gekannt zu sein.

Die Photogrammetrie beruht auf dem Princip, dass eine von verschiedenen Standpunkten aus aufgenommene Gegend die einzelnen Punkte wegen der parallaktischen Verschiebung auf den einzelnen Aufnahmen an verschiedener Stelle zeigt, und man so durch die Uebertragung der Standpunkte in die Horizontalebene Richtungslinien entwerfen kann, deren Durchschnittspunkte die Lage des gesuchten Punktes wie auf dem Messtisch festlegen.

Alle von einem Standpunkt aus sichtbaren Gegenstände müssen sich abbilden auf einer Reihe von Aufnahmen, die den ganzen Horizont umfassen. Es genügt zu diesem Zwecke 6 Abschnitte zu photographiren, die sich um den Standpunkt als ein regelmässiges Sechseck anordnen und also ein Gesichtsfeld von 60° repräsentiren.

Das empfehlenswerthe Objectiv wegen des grossen Bildwinkels (von 100° , dessen mittlerer Theil allein zur Verwendung kommt), der sehr correcten Zeichnung und der grossen Bildtiefe ist auch hier das Pantoskop von Busch. Der letzterwähnte Vorzug erlaubt es, vom Einstellen des Bildes ganz abzusehen, nachdem das Objectiv einmal in entsprechendem Abstand an der Camera fixirt ist; es zeichnet alsdann alle Gegenstände von der hundertfachen Brennweite bis zum Horizont in gleich genügender Schärfe.*) Bringt man nun die Platte ebenfalls stets genau in dieselbe Entfernung vom Objectiv, so ist der Abstand des optischen Mittelpunktes in der Verlängerung der Axe bis zur Mitte der Platte stets der gleiche.

Der absolute Werth für diese Grösse lässt sich auf verschiedene Weise bestimmen. Richtet man die Camera auf einen senkrechten Gegenstand von messbarer Grösse und misst die directe Entfernung desselben auf dem Boden bis zu einem lothrecht unter der vorderen Fläche der Platte liegenden Punkte, so hat man in diesen beiden Grössen und der Bildgrösse des gemessenen Objectes die Momente, aus denen man den Abstand des optischen Mittelpunktes (in welchem sich die Strahlen schneiden) von der Platte berechnen kann.

Dieser Abstand bildet die Grundlage für alle weiteren Operationen und muss mit möglichster Genauigkeit durch wiederholte Messungen festgestellt werden.

Um ihn constant zu erhalten, bedient man sich zu den photogrammetrischen Aufnahmen einer stabilen Camera in Gestalt eines Trichters oder einer vierseitigen Pyramide von Messingblech, die an der sich verjüngenden Seite das Objectiv trägt, während an der andern die Platte (der Apparat ist für Trockenplatten bestimmt) eingesetzt wird, welcher durch sehr genau gearbeitete scharfkantige Auflage eine zur optischen Axe senkrechte Stellung angewiesen wird.

Der Punkt, wo diese Axe die Platte trifft, wird markirt durch ein dicht davor angebrachtes Fadenkreuz, das sich auf jeder Aufnahme mit abbildet. Durch das Aufsetzen der Camera auf ein Stativ, dessen oberer Theil einen mittelst Stellschrauben absolut horizontal zu adjustirenden Messingring als Träger einer drehbaren Messingscheibe besitzt, fällt der eine Faden genau mit in dem Horizont des Bildes zusammen, während der andere durch das Zenith geht. Die Messingscheibe, auf welche sich die Camera leicht befestigen lässt, wird durch federnde Rasten nach einer Drehung von je 60° von selbst arretirt.

*) Selbst in der zwanzigfachen Brennweite erhalten die Gegenstände beim Pantoskop schon ziemlich präcise Umrisse, doch wird es selten nothwendig sein das Objectiv so weit auszunutzen.

Die Arbeit mit dem so adjustirten Apparat geht in der Weise vor sich, dass die mit einer Platte versehene Camera aufgesetzt und die Aufnahme ausgeführt wird. Man wechselt alsdann die Platte, nach Abnehmen der Camera, in einem lichtdichten Sack und nimmt mit der um 60° gedrehten Camera die zweite Ansicht auf und so fort, bis der Horizont umkreist ist. Man hat alsdann sechs Platten, deren Bildpunkte sich in ihrer Lage zu einander feststellen und graphisch eintragen lassen. Construiert man sich nämlich zunächst ein regelmässiges Sechseck, in welchem die Entfernung des optischen Mittelpunktes von dem Durchschnittspunkt des Fadenkreuzes auf der Platte als Perpendikel auf die Sechseckseite erscheint (h der Figur); so entsprechen die Seiten den Horizont-Abschnitten, welche auf den Platten aufgenommen wurden. Die Richtungslinie für irgend einen in den Photographien erkennbaren Punkt wird erhalten, wenn man den Abstand desselben von der Verticalen auf der entsprechenden Sechseckseite vom Fusspunkt des Perpendikels aus abträgt und mit dem Sechseckmittelpunkt verbindet. Es sei z. B. in I der nebenstehenden Figur der erste Standpunkt, die Seiten des um denselben entworfenen Sechsecks, 1, 2, 3, 4, 5, 6 die an demselben gewonnenen Aufnahmen und es erscheine das Bild von II auf Platte b in a , so muss der Punkt II auf der Linie liegen, die von a aus durch I gezogen wird. Misst man die Entfernung von I und II als Standlinie und trägt die Grösse, auf den gewählten Maassstab der Karte reducirt, an der Linie ab, so erhält man die Lage des Standpunktes II. Erlauben die Umstände es nicht gerade diese Linie zu messen, so genügt es irgend eine Linie zu messen, deren Lage sich nach den beiden Endpunkten in den Aufnahmen feststellen lässt, um beim Entwerfen der Karte die Dimensionen auf einen bestimmten Maassstab reduciren zu können.

Bei den von II aus gewonnenen Aufnahmen erscheint das Bild von I ebenfalls auf einer der Platten, nehmen wir an, im Punkte a' auf 7. Da die Grösse von $a'b'$ als Abstand vom Verticalfaden, und die vom Perpendikel h die constante Focuslänge, bekannt sind, so ist damit auch die Lage des zweiten Sechsecks gegeben. Die Festlegung der einzelnen, in den Aufnahmen sichtbaren Punkte erfolgt nun dadurch, dass man in derselben Weise die Richtungslinien durch Standpunkt I und II zieht und den Durchschnittspunkt bezeichnet; so liegt ein Ort B , welcher auf Platte 1 den Abstand cb , Platte 12 den von ed zeigt, in der Karte, wie es die Figur andeutet. Man braucht nicht einmal die Richtungslinien wirklich zu ziehen, sondern da die Punkte stets auf den gegenüberliegenden Platten dieselbe Lage haben, so genügt es, auf diesen die Abstände einzutragen und mittelst zweier in den Standpunkten an Nadeln fixirter menschlicher Haare, die man anspannt, die Durchschnittspunkte der Richtungslinien aufzusuchen und zu markiren.

Auf solche Weise lassen sich in verhältnissmässig sehr kurzer Zeit eine grosse Reihe von Punkten mit vollkommener Genauigkeit festlegen, man kann diese Arbeit im Studirzimmer mit aller Musse ausführen und je nach Bedürfniss beliebig ausdehnen; es ist endlich nicht einmal nothwendig, dass der aufnehmende Photograph und der Zeichner der Karte dieselbe Person sei.

Zu diesen enormen Vortheilen der Photogrammetrie kommt noch ein

Fig. 3.

sehr wichtiger hinzu, man kann aus den Aufnahmen auch die Elevation eines Punktes bestimmen.

Errichtet man nämlich, nachdem der Abstand vom Verticalfaden, es sei bc auf Platte 1, markirt ist, in c einen Perpendikel, an welchem man den Abstand vom Horizontalfaden anträgt, zieht durch Standpunkt I die Linie fg , so bezeichnet die Länge eines in B , dem wahren Ort des Bildpunktes c errichteten Perpendikels, Bg , die Elevation oder Depression des Punktes B unter die Ebene des Horizontes.

Im Hinblick auf diese wichtigen Vorzüge der Photogrammetrie ist es in der That schwer zu verstehen, warum sie bisher von Geographen, Ingenieuren und Geologen fast durchgängig so auffallend vernachlässigt worden ist. Man kann nur annehmen, dass ein gewisser Eigensinn im Festhalten am Althergebrachten der ausgedehnteren Benutzung entgegen steht, und dass die Zeit nicht fern ist, wo diese Technik die volle Würdigung findet, welche sie verdient.*)

Reproductionen.

Unter Reproductionen im photographischen Sinne versteht man die Wiedergabe von irgend welchen bildlichen Darstellungen, sei es dass es sich dabei um wirkliche Bilder oder um Inschriften, figurliche Darstellungen auf Stein und Holz oder Aehnliches handelt. Bei solchen Arbeiten ist die Wahl eines geeigneten Objectivs und die richtige Beleuchtung die Hauptsache. Statt des Pantoskops, welches nur ein verhältnissmässig kleines Bild giebt, empfiehlt sich hier die Verwendung des Steinheil'schen Aplanates oder die Tripletlinsen (Dallmeyer), da diese ein grosses, scharfes Bild geben bei hinreichend correcter Zeichnung.

Hinsichtlich der Beleuchtung gilt als Hauptregel die Vermeidung von störenden Reflexen und gleichmässige Vertheilung des Lichtes. Man erreicht dies durch Absperren alles sehr seitlichen Lichtes und die Benutzung von Reflectoren; die letzteren sind auf der Reise schwer in einiger Grösse zu verschaffen, doch darf man deshalb dies Hilfsmittel nicht aus den Augen verlieren, ein weisser Carton, ein aufgehängtes weisses Tuch oder ein Spiegel von einiger Grösse leisten in dieser Beziehung oft gute Dienste.

Ist z. B. an einer beschatteten Inschrift ein Theil besonders dunkel, und man befürchtet, er möchte bei dem Entwickeln sehr gegen das Uebrige zurückbleiben, und sind die Verhältnisse derartig, dass man mittelst des Spiegels Sonnenlicht auf denselben reflectiren kann, so gelingt es durch geschicktes Hin- und Herführen des Spiegelreflexes auf den dunklen Partien diese gegen das Uebrige hinreichend herauszuheben.**)

Sind die Oertlichkeiten ganz dunkel und auch durch Reflex kein Licht hineinzubekommen, so ist man gezwungen, künstliches Licht zu verwenden. Dazu wurde vielfach die Magnesiumlampe empfohlen, doch hat dieselbe den grossen Uebelstand, dass die beim Verbrennen gebildete Magnesia als dichter

*) Der Mechanikus Fliege in Bonn liefert unter Meidenbauers Leitung zusammengestellte Apparate, auf welchen die Constante bereits durch genaue Beobachtungen festgestellt und die optische Axe sorgfältig auf den Durchschnittspunkt des Fadenkreuzes centrirt ist. Der Preis des Apparates mit Busch's Pantoskop No. 5 stellt sich auf ungefähr 200 Thlr.

**) So liess sich z. B. in den unterirdischen ägyptischen Kammern, wo das Licht nur durch ein Loch in der Decke einfiel, mit dem Spiegel manche Inschrift der Wände „herausleuchten“.

weisser Rauch die Luft erfüllt und in engen Räumen bald als dichter Nebel erscheint, der die weitere Exposition stört.

Bei Untersuchungen, die Aufnahmen dunkler Localitäten in erste Linie stellen, wird es nothwendig sein Einrichtungen zu treffen, um ein anderes künstliches Licht, Drummont'sches Kalklicht oder elektrisches Kohlenlicht zur Anwendung bringen zu können.

Photographische Technik und Schwierigkeiten derselben auf Reisen.

Ausserordentlich häufig ereignet es sich, dass Personen, welche daheim in ihren vier Pfählen die photographische Technik recht gut beherrschen, vollkommen rathlos sind, sobald sie sich veranlasst sehen, ausserhalb unter wechselnden Verhältnissen dieselbe in Anwendung zu bringen. Sehr oft werden die schönsten, vollständigsten Einrichtungen dem Photographen mitgegeben und doch erscheint kein Negativ als Errungenschaft: er hat an der ersten besten Klippe, die ihm auf der Reise aufstiess, Schiffbruch gelitten. Es wird daher wohl nicht überflüssig sein, die Hauptschwierigkeiten der „outdoor's Photography“, wie sie der Engländer nennt, und die Mittel zur Ueberwindung in's Auge zu fassen.

Die wichtigsten Punkte liegen hierbei in den Vorbereitungen, d. h. in der Auswahl und geeigneten Verpackung der Apparate und Chemikalien. Es würde den Raum der vorliegenden Arbeit übersteigen, im Einzelnen alle die einschlagenden Verhältnisse zu besprechen, vielmehr muss dafür auf ein geeignetes photographisches Handbuch verwiesen werden. Das praktischste dürfte in dieser Beziehung für diejenigen, welche der englischen Sprache mächtig sind, Hardwich, a Manual of Photographic Chemistry sein, für deutsche Leser das Photographicum, herausgegeben von Heinlein.

Der Umstand, dass die Engländer schon seit einer langen Reihe von Jahren eine grosse Zahl von reisenden Amateuren der Photographie besitzen, die leicht Gelegenheit fanden auch in anderen Klimaten zu arbeiten, hat dieser Nation hinsichtlich der Reiseerfahrungen und Reiseeinrichtungen einen unleugbaren Vortheil vor den anderen gewährt. Wir werden uns daher hauptsächlich in ihren Werkstätten für solche Dinge Rathsholen müssen.

Selbstverständlich ist stets darauf zu sehen, dass die Apparate in möglichst compendiöser Form zur Verwendung kommen und die einzelnen Theile sich so eng zusammenpacken lassen, als noch irgend zulässig erscheint. Alle leere Räume zwischen den Apparaten oder Ausfüllung solcher mit Holzstücken und ähnlichem werthlosen Material sind, wenn sie beträchtlichen Umfang haben, als Fehler des Arrangements zu bezeichnen. So unbestreitbar dieser Grundsatz ist, so schwer hält es, den deutschen Arbeiter zum strengen Festhalten daran zu bewegen. Man baue sich also die Stücke des Apparates unter Benutzung von leichten Zwischenwänden und Einsätzen von Holz in einem soliden, verschliessbaren, mit Haken versehenen Holzkasten so zusammen, dass auch beim Umstürzen des Kastens kein Theil locker werden oder hin- und hergleiten kann. Ueberall, wo man ein Bescheuern zarterer Partien fürchtet, werden Filzstreifen an der anstossenden Kastenwand festgeleimt.

Jeden Holzkasten setze man bei weiteren Reisen in einen anderen von Weissblech von solcher Grösse, dass er gerade hineingleitet. Der Deckel des Blechkastens, von gleicher Höhe wie der des Holzkastens, bewegt sich

in Charnieren und wird vorn durch zwei in Hülzen horizontal verschiebbare Riegel von starkem Draht fixirt. Zwei an den Seitenwänden befindliche blecherne Oehre zum Durchziehen von Riemen und ein einfacher, sich umlegender Griff am Deckel erleichtern das Tragen.**) Blech allein hält allen Angriffen des Klimas der Abnutzung der Reise genügend Stand und hält Unreinigkeiten, räuberische Insecten und Feuchtigkeit am besten von den Apparaten fern. Diese Blechkapseln über andere Kästen sind nicht zu verwechseln mit den Zinkeinsätzen, wie sie beim überseeischen Transport allgemein in Anwendung kommen. Sie gewähren auch den Vortheil, dass man in Fällen, wo die Apparate mit der Zeit ganz oder relativ werthlos geworden sind, z. B. auf der Rückreise, durch Herausnehmen der inneren Behälter Räume schafft, um naturwissenschaftliche Sammlungen und Aehnliches zu verpacken.

Man vertheile die Gegenstände, welche in ihrer Gesamtheit leicht beweglich bleiben sollen, wenn es angeht, so, dass kein Gepäckstück mehr als ungefähr 50 Pfd. wiegt, damit ein Träger es unter schwierigen Verhältnissen noch befördern kann.

Die Wahl der Objective muss sich nach den Zwecken, welche der Photograph verfolgt, sowie nach der Ausdehnung, die der photographischen Arbeit gegeben werden kann, richten und ergiebt sich im Wesentlichen schon aus dem oben Gesagten.

Ein schnell arbeitendes Doubleobjectiv von etwa 70 Mm. Durchmesser (z. B. Dallmeyer's**) Quick-acting Patent Portraiteur, No. B, Preis 12 Pfd. St.) wird für anthropologische Aufnahmen unentbehrlich sein, ebenso wie das Pantoskop von Busch***), No. 4 oder 5, welches auch sehr schöne Interieurs und Landschaften liefert, es für photogrammetrische Arbeiten ist. Kommen solche nicht in Frage, so sind das Steinheil'sche†) Aplanat und die neue Weitwinkellinse von demselben oder auch das ähnliche von Dallmeyer sehr handliche, leitungsfähige Objective.

Was die zu wählende Plattengrösse anlangt, so verlasse man sich lieber nicht darauf, sehr kleine Aufnahmen später vergrössern zu wollen, da man dabei selbstverständlich die kaum zu vermeidenden, den Reiseeinwirkungen zuzuschreibenden Unvollkommenheiten der Original-Negative mit vergrössert. Ausserdem verlieren die Bilder dabei stets einen erheblichen Theil der Halbtöne, worin gerade die Schönheit beruht. Unter gewöhnlichen Verhältnissen dürfte eine Plattengrösse von 20 Cm. bei 13 Cm. recht empfehlenswerth sein, da eine solche, wie die obigen Proben (pag. 609, 610) zeigen, bequem Vorder- und Seitenansicht derselben Person in $\frac{1}{3}$ nat. Gr. oder drei Ansichten einer ganzen Figur in $\frac{1}{15}$ nat. Gr. fasst, ausserdem aber auch für Gruppen und Landschaften ein geeignetes Format bietet.

Es ist nicht nur wegen der grossen Zeitersparniss, sondern auch um das Zusammengehörige auf derselben Platte zu haben, zunächst zu versuchen, beide Aufnahmen auf die beiden Hälften zu exponiren; gelingt eine der Auf-

*) Ein so verpackter photographischer Apparat, dem Verfasser angehörig, wurde in Südafrika auf felsigem Gebirgswege vom Packpferd abgeworfen, und da der Riemen sich nicht vollständig löste, für etwa 100 Schritt über die Felsen im Galopp geschleift, ohne dass dem Inhalt der geringste Schaden zugefügt wurde.

**) Die Adresse ist: J. H. Dallmeyer, 19 Bloomsbury Street London WC.

***) Die Adresse ist: Rathenower optische Industrie-Anstalt (vorm. Emil Busch) Rathenow, Preussen.

†) Die Adresse ist: C. A. Steinheil Söhne, Landwehrstrasse No. 15a München.

nahmen nicht, wird man freilich von dem Princip ausnahmsweise abgehen müssen.

Von den beiden Methoden mehrmalige Exposition auf dieselbe Platte zu ermöglichen: Verschiebung des Objectivs bei getheilter Camera oder Verschiebung der Cassette vor einem entsprechenden Ausschnitt der Camera. Beides hat seine Vortheile und Nachtheile; bei verschiebbarem Objectiv kann man dem hinteren Theil der Camera eine compendiösere Form geben, aber die Theilung macht Unbequemlichkeiten, zumal wenn dieselbe doppelt sein soll; Verschiebung der Cassette ergiebt die Möglichkeit, ohne Veränderung der Camera jede beliebige Theilung der Platte vornehmen zu können, aber die Führung der Cassette verlangt links und rechts mehr Raum. Trotzdem wird der letztere Plan sich im Ganzen mehr empfehlen.

Was die Wahl der Camera selbst anlangt, so wähle man jedenfalls eine compendiöse Form, auch wenn man dadurch genöthigt wird, kleine Unbequemlichkeiten beim Arbeiten mit in den Kauf zu nehmen. Solche Reise-camera's werden besonders von den Engländern sehr handlich und dabei doch solide gearbeitet; die deutschen Arbeiten kommen in diesem Gebiet ihnen noch nicht gleich.

Man unterscheidet wesentlich zwei Arten von derartigen Camera's: mit festem aus Holz gefertigtem Auszug und andere mit einem sogenannten Balge von verschiedenem Material versehen. Die letzteren sind die bei Weitem leichteren, transportableren, dagegen vertragen sie sehr schlecht die Einflüsse der Witterung und die Angriffe von verschiedenen Thieren, unter welchen die Schaben und Termiten der Tropen die gefürchtetsten sind. Balgcameras von Pappe, mit Papier- oder Zeugüberzug sollte man für Reisen in den Tropen nicht verwenden, dagegen dürfte ein sauber gearbeiteter Balg mit Ueberzug von Juchtenleder bei schonender Behandlung lange ausdauern, da die Termiten wenigstens sich nicht leicht an Juchtenleder vergreifen. Unter den Holzarten ist Tekholz weniger den Angriffen dieser Thiere ausgesetzt als Mahagoni, doch dürfte der Verschluss in den besprochenen Blechkästen das geeignetste Mittel zur Sicherung dagegen sein.

Gegen das Reissen und sich Werfen des Holzes helfen am besten Messingbänder an den Ecken und Kanten, wie sie von den Engländern sehr sauber angebracht werden *).

Für die beabsichtigte Verwendung des Pantoskops muss man wegen der sehr kurzen Brennweite darauf achten, dass die Camera auch hinreichend in der Länge reducirt werden kann. Die Localdistanz der äquivalenten Linse von No. 4 ist nur etwa 12 Cm., während No. 5 allerdings noch gegen 24 Cm. besitzt.

Dallmeyers oben erwähntes Double-Objectiv von 70 Mm. hat auch nur wenig über 15 Cm. Brennweite, von der letzten brechenden Fläche gerechnet 21½ nat. Grösse 20 Cm., und besitzt zur Einstellung Zahnrad und Trieb von ausgiebiger Länge, die Camera für die beiden letztgenannten Objective braucht daher gar keinen Auszug, sondern kann ganz fest gearbeitet sein, bei einer Tiefe des Innenraumes von ungefähr 15 Cm. Eine solche Camera wird sich vor allen andern durch Dauerhaftigkeit auszeichnen müssen,

*) Vergl. Vogel: Die Photographie auf der Londoner Weltausstellung p. 44. Eine auf diese Weise ausgestattete Stereoskopcamera von Dallmeyer mit Mahagoni-auszug, an welcher auch der Portraitkopf und ein kleines Triplet angesetzt werden konnte, diente dem Verfasser während dreijähriger Reise in Südafrika, ohne dass trotz mehrerer Unglücksfälle sich Mängel herausstellten.

ohne dabei, sobald das Frontstück umgekehrt eingesetzt wird, einen viel grösseren Raum einzunehmen, als die üblichen Formen zum Zusammenlegen für grösseren Focalabstand.

Trägt das zu der Camera bestimmte Frontstück einen kegelförmigen Ansatz von etwa 5 Cm. Höhe, auf dem das Portraitobjectiv oder das Pantoskop sich abwechselnd befestigen lässt, so erhält man einen für sehr viele Zwecke ausreichenden Apparat.

Da Pantoskop No. 5 ein erheblich grösseres Bild giebt, als 20 bei 14 Cm. (als Durchmesser des runden Feldes werden 62 Cm. gerechnet), so kann man, ausser solchen Platten, für Landschaften und Architecturen auch eine zweite Grösse, etwa 28 bei 22 Cm. benutzen, ohne dass deshalb die Camera für den Transport sehr viel unbequemer würde.

Zu den unerlässlichen Apparaten des reisenden Photographen gehört auch ein geeignetes Dunkelzelt. Je bequemer und praktischer ein solches eingerichtet ist, um so schneller und sicherer wird der Photograph einen günstigen, vielleicht nie wiederkehrenden Moment zur Arbeit benützen können, während ein umständlich aufzustellendes, unhandliches Zelt selbst bei grosser Energie des Reisenden unter gleichen Bedingungen häufig unausgepackt bleiben wird.

Von den mancherlei üblichen Formen empfiehlt sich kaum eines mehr als das von Rouch*) in England construirte, welches sich mit grosser Schnelligkeit in einen Kasten verpacken lässt, dessen beide Theile bei dem aufgestellten Boden und Rückwand bilden. In dem Kasten ist hinreichender Raum, um auch den während der Arbeit ausserhalb stehenden Wasserbehälter und die für einmaliges Arbeiten nöthigen Chemikalien, den Plattenkasten u. s. w. aufzunehmen. Getragen wird das aufgerichtete Zelt durch ein ebenfalls eng zusammen zu legendes leichtes aber sehr stabiles Stativ.

Fügt man in die Rückwand einer ähnlichen Construction eine Camera ein, so dass man ohne Verlassen des Zeltes die sensibilisirte Platte exponiren kann, so erhält man die Anordnung, welche gewöhnlich Zeltcamera genannt wird. Eine solche Einrichtung ist in sehr compendioser Form von Davis in England angegeben und von Dallmeyer ausgeführt worden. Ein derartiger Apparat, dessen Anwendung bei aller Einfachheit doch wiederum auch viele Nachtheile mit sich bringt, ist nur, wie oben bereits angedeutet (pag. 616) für Aufnahmen zu empfehlen, wo der für die Exposition günstige Moment flüchtig und unberechenbar ist, z. B. Aufnahmen von Thieren in der Wildniss. Jedenfalls sollte die Camera leicht aus ihrer Stellung zu nehmen und für sich allein zu benutzen sein, damit man nicht an das Mitschleppen des ganzen Apparates gebunden ist. Im Nothfalle könnte man jedes Dunkelzelt, welches, wie das oben citirte, eine feste Rückwand hat, mit einer entsprechenden Camera combiniren.

Es wäre nun für den photographirenden Anthropologen auf der Reise noch auf einen unentbehrlichen Apparat speciell hinzuweisen, welcher häufig übersehen wird, nämlich ein zerlegbarer Kopfhalter, der sich an jedem Stuhl mit durchbrochener Lehne befestigen lässt. Hat ein solcher auch nicht die Solidität der in den Ateliers gebräuchlichen eisernen, so ist er doch bei der Aufnahme von Rassenportraits von ausserordentlichem Nutzen.

Auf die anderen einzelnen Stücke einer photographischen Ausrüstung kann hier nicht näher eingegangen werden, dagegen dürfte es geeignet

*) Es ist abgebildet und beschrieben in Vogel: Die Photographie auf der Londoner Weltausstellung.

erscheinen, über die Wahl und Verpackung der Chemikalien noch Einiges zu sagen.

Abgesehen von den überall in ähnlicher Weise wirkenden Einflüssen des Transportes selbst, muss die richtige Würdigung der klimatischen Verhältnisse, also besonders der Temperatur und der Dunstsättigung der Luft in Betracht gezogen werden.

Die wichtigsten Regeln für die Verpackung der Chemikalien dürften folgende sein: Man trenne trockene und flüssige Drogen nach Möglichkeit. Die Flüssigkeiten bringe man in vierkantigen Flaschen unter, die etwa 1 Pfund halten, da das bedeutende Gewicht der grossen Gefässe das Zerschlagen beim Transport sehr befördert. Die Flaschen werden in hölzerne Einsätze zu je 12–24 gepasst, wo jede ihr besonderes Fach hat und durch schmale Filzstreifen vom directen Berühren der Wand abgehalten wird. Der Verschluss der einzelnen kann auf verschiedene Weise erfolgen, entweder man hat Flaschen mit engen Mündungen in die sehr sorgfältig ausgesuchte, sauber eingepasste Korken eingefügt, mit Blase zugebunden und dann gefirnisst werden; oder man benutzt solche mit eingeschlifftem Glasstöpsel (für concentrirte Säuren und caustische Alkalien nicht zu umgehen). Diese kann man sehr dicht und zweckmässig verschliessen, wenn man den Hals und Stöpsel mit einem Gemisch von Schwefel und sehr feinem Ziegelmehl, etwa 1 Theil zu 3 Theilen Schwefel, in geschmolzenem Zustande gemischt überzieht. Bei solchen Flüssigkeiten, welche Metall nicht angreifen, empfiehlt es sich, ein dünnes Staniolblättchen vorher auf dem Stöpsel festzudrücken, um das Entfernen des Kittes (was durch Klopfen auf den Stöpsel geschieht) zu erleichtern; man verhindert so, dass Partikelchen des Kittes ins Innere der Flasche beim Lüften des Stöpsels eindringen. Diese Methode dürfte sich durchschnittlich am meisten empfehlen. Beim Verschliessen mit thierischer Blase achte man darauf, die glatte (Schleimhautseite) der erweichten Membran auf das Glas zu bringen, da diese allein fest anschliesst. Durch Abschneiden und Wegschaben der äusseren Schichten um den Flaschenhals bleibt die Schleimhaut allein stehen und klebt so fest, dass bei der getrockneten Blase der zuschnürende Bindfaden ohne Schaden wieder entfernt werden kann. Bei Alkohol und Aether hat man die Vorsicht zu gebrauchen, die Flaschen nicht ganz voll zu füllen, da durch Ausdehnung des Inhaltes sonst leicht ein Springen des Glases stattfindet.

Die im selben Einsatz befindlichen Flaschen müssen alle von gleicher Höhe sein und werden gemeinsam mit einer Filzlage überdeckt und so mehrere Einsätze übereinander (vielleicht 3) in eine Kiste eingepasst.

Hydrographie und Oceanographie, einschliesslich Winke über Höhenmessungen und magnetische Beobachtungen zur See.

Von

G. Neumayer.

I. Einleitung.

Die Wissenschaft der Hydrographie hat in den letzten 20 Jahren mit Rücksicht auf den gewonnenen Umfang eine solche Umwandlung erlitten, dass es heute noch schwer ist die Grenzen derselben nach anderen, verwandten Wissenschaften hin genau zu bestimmen. Es hat dies aber in einem Werke, wie das gegenwärtige eine grosse Bedeutung, weil nur durch ein Abgrenzen Einheit in demselben und strenge Gliederung der Materie durchgeführt werden kann. Wenn man in früheren Jahren darunter vorzugsweise die Aufnahme und Mappirung einer Küste, einer Inselgruppe, die Feststellung und Beschreibung ihrer Eigenthümlichkeit hinsichtlich der Gezeiten und Gezeitenströmungen, der Wassertiefen und Bodenbeschaffenheit oder der charakteristischen Gestaltung der Höhenprofile verstand, so ist jetzt in den Rahmen der Hydrographie Alles hereinzuziehen, was sich auf die den Verkehr zur See beeinflussenden physikalischen Verhältnisse bezieht, für deren erfolgreiche Behandlung wieder eine Anzahl anderer Zweige des Wissens, die als Hilfswissenschaften zu gelten haben, in einem Werke wie die „Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen“ aufzunehmen sind. Dass ein solches Hereinziehen anderer Disciplinen mit der nöthigen Umsicht und mit einem Verständniss der Zwecke des Reisenden geschehe, wird die Brauchbarkeit dieser Arbeit über Hydrographie bedingen und hierin liegt die Schwierigkeit der Ausführung der gestellten Aufgabe. Da die „Anleitung“ mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse der kaiserlichen Marine herausgegeben wird, so ist einerseits erforderlich, dass gerade die Hydrographie eine umfassendere Behandlung erfahre, während andererseits die Spärlichkeit der deutschen Literatur auf diesem Gebiete es nothwendig erscheinen lässt, darnach zu streben, manche fühlbare Lücken auszufüllen. Was überdies die Bearbeitung des Gegenstandes erschwert, ist der Umstand, dass einige der zu den Hilfswissenschaften gehörigen Branchen besonderer, hier nicht näher zu erörternder Verhältnisse wegen in den Plan der Arbeit einzuschliessen waren, wodurch die Gleichartigkeit und Gleichmässigkeit der Behandlung des Stoffes vielfach gestört werden mussten.

Ein anderer Gesichtspunkt, welcher bei Bearbeitung des Gegenstandes berücksichtigt werden musste, ergibt sich aus der Stellung, welche hydrographische Studien für die Zwecke des Reisens einnehmen: die Navigation in ihren wichtigsten Zweigen beruht fast ausschliesslich auf derselben, das heisst, während wir in den meisten anderen, in diesem Werke behandelten Zweige die Zwecke der Reise zu beleuchten hatten, haben wir es hier mit einem wesentlichen Mittel für das Reisen zu thun, dessen Feststellung und Ausbildung allerdings auch wieder Zweck ist.

Diese Erklärungen sind nothwendig zum Verständnisse des Standpunktes, von welchem aus der Verfasser den ihm zugetheilten Gegenstand zu bearbeiten sich bestrebte. Es wollte ihm nicht einleuchten, dass es hierfür genügen würde, eine Reihe von Regeln zur Aufnahme und Skizzirung, eine Anzahl von technischen Ausdrücken und Bezeichnungen zu geben, die in einer jeden einfachen Instruction für Vermessungsarbeiten aufgenommen werden, wie sie fast alle seefahrenden Nationen besitzen; vielmehr glaubte er den Gesichtskreis etwas weiter nehmen zu sollen, so dass jeder gebildete Reisende daraus Nutzen zu ziehen vermöchte, während auch der Hydrograph von Fach in einer kurz gedrängten Darstellung auf Manches aufmerksam gemacht werden dürfte, was in den betreffenden Fachwerken, wo eine Detailbehandlung von Wesenheit ist, vielleicht weniger hervorzutreten vermag und desshalb leicht unbeachtet bleibt. Der vorliegende Abschnitt ist der Natur der Sache gemäss besonders für Reisen zur See berechnet und hier ist es, wo fast nach allen Richtungen der physikalischen Forschung hin, die in diesem Werke vertreten sind, Ergänzungen oder Erläuterungen für die Zwecke der Beobachtung zur See gegeben werden müssen, damit auch der Nichtseemann im Stande sei werthvolles Material zu sammeln, was in diesem Falle mit um so mehr Eifer betrieben werden dürfte, da die schon hervorgehobene Wechselwirkung zwischen Bereicherung der Wissenschaft und Verwerthung des Gewonnenen zum Besten der Navigation sofort einem jeden einleuchtet. Dass bei einem solchen Umfang des zu besprechenden Materials an eine gründliche, in das Detail eingehende Behandlung des Gegenstandes nicht gedacht werden darf, versteht sich wohl von selbst. Es handelt sich hier vielmehr darum, in allgemeinen Zügen die Aufgaben zu bezeichnen, die der Pflege des Reisenden empfohlen werden sollen, gewisse Fragen zu stellen und deren eingehendere Bearbeitung anzuregen und in gewissem Sinne einzuleiten. Wenn es dem Verfasser gelingen sollte diesen ausgesprochenen Zwecken gerecht zu werden, so wird er auch seiner Wissenschaft dadurch einen wesentlichen Vortheil geleistet haben, indem gerade im gegenwärtigen Augenblicke die Umbildung derselben, die Normirung des Arbeitsplanes für hydrographische Forschung, nach dem weiteren Begriffe, vor sich geht. Es beziehen sich diese Bemerkungen vorzugsweise auf jenen Theil dieser Forschungen, welcher die Statistik der Meteorologie den Zwecken des Seeverkehrs dienstbar zu machen den Beruf hat. Die maritime Meteorologie und die Ausführung von Reisen unter Benutzung der von der Natur gebotenen und frei zur Verfügung gestellten Kräfte können auch von dem Reisenden, der nicht in Verbindung mit einem grösseren Beobachtungssysteme steht, gefördert werden. Wie dies am zweckmässigsten zu geschehen habe, werden wir an der geeigneten Stelle im Verlaufe dieser Auseinandersetzungen des Näheren erörtern; einstweilen genügt es auf die Bedeutung der Sache und den Standpunkt, welchen ich einzunehmen mich bestreben werde, hingewiesen zu haben.

II. Hydrographisch-meteorologische Verhältnisse; Wirkung des Windes auf den Ocean.

Die gründliche Kenntniss der meteorologischen und klimatischen Factoren ist zum Verständniss der Hydrographie eines Meeres, einer Küste oder eines Litorale eine Nothwendigkeit. Daher ist der Reisende vorzugsweise darauf hinzuweisen, sich diese Kenntniss zu erwerben, und sind die hydrographischen Aufgaben, die verschiedenen Fragen, welche sich dem Beobachter darstellen, auch von diesem Standpunkte aus zu bearbeiten. Dies gilt sowohl von den Beobachtungen zum Vortheile der Navigation und auf offener See, sowie von den Erhebungen an einer Küste, in Buchten und in Strassen. Unter einer Beleuchtung dieser Art ergiebt sich die Erklärung hydrographischer Verhältnisse von selbst, während der Reisende, wollte er ohne dieses Hülfsmittel an die Untersuchungen schreiten, unfehlbar vielfach irregeleitet würde. Zunächst hat man darüber klar zu werden, in welchem Windsysteme das der Beobachtung und hydrographischen Bearbeitung zu unterwerfende Oceanische Areal liegt:

1. Liegt dasselbe im Systeme der alternirenden, vorzugsweise von Westen einsetzenden Winde?
2. Gehört dasselbe zum Gebiete der Monsune, d. h. der in der Jahresperiode April-October und November-März wehenden Winde?
3. Liegt es in dem Gebiete beständig wehender östlicher Winde, innerhalb der Passatregionen,
4. Im Gebiete des beständig wehenden Polarstromes,
5. Im Gebiete der Calmen und zwar welcher: jener zwischen den beiden Passatregionen oder jener an der Polargrenze der Passate in beiden Hemisphären?
6. Welcher Natur sind die auftretenden Stürme, zeigen dieselben innerhalb des Jahres eine Periode, eine drehende Bewegung (einen rotatorischen Charakter) oder haben sie mehr den Charakter der „Gales“?

Ogbleich in das Gebiet der Meteorologie gehörend, muss der Hydrograph den mit diesen Fragen verknüpften Untersuchungen gründliche Beachtung zuwenden und namentlich in einem jeden einzelnen Falle die Orientirung der Küste, die Lage derselben mit Rücksicht auf diese Phänomene in Erwägung ziehen.

Eine andere Frage ist: Verschieben sich die Grenzen eines bestimmten Gebietes und welchen Einfluss übt eine solche Verschiebung, wenn sie stattfindet, auf die allgemeinen Erscheinungen aus?

Findet in einem Gebiete rasches, plötzliches Umspringen des Windes statt und, wenn so, von welcher und nach welcher Richtung? Knüpft sich dieselbe an eine bestimmte Periode im Jahre, an eine bestimmte Tageszeit und welcher Art ist ihr Einfluss auf den Zustand des Meeres?

Man beachte besonders auch locale Stürme und ihren Charakter, ihre Richtung und ihren nothwendigen Einfluss auf hydrographische Verhältnisse. Solche Betrachtungen sind von besonderem Werthe für Küstengebiete; man erwäge dabei die Erstreckung der Küste und ihre Höhenprofile mit Bezug auf die aufgeführten Windsysteme. Die Ermittlung der vorherrschenden Windrichtung ist zum richtigen Beurtheilen der hydrographischen Verhältnisse von grosser Wichtigkeit. Einer der folgenden Abschnitte wird von der Wirkung des Windes auf den Ocean zu handeln haben, sofern

dadurch eine Verschiebung der Wassermassen nach Lee bedingt wird, hier soll zuerst Einiges über die Wirkungen des Windes in verticalem Sinne, d. h. von jenen Wirkungen gesagt werden, welche in der Wellenbewegung erkennbar sind. Fragen über die Tiefe, bis zu welcher diese Wirkung im Ocean wahrzunehmen ist, sind für die Ausbildung einer allgemeinen Theorie der Strömungen wesentlich.

Seegang, Dünung (Swell) Richtung derselben und Höhe, namentlich wenn dieselben, wie in manchen Gegenden (Westküste von Afrika), einen eigenthümlichen Charakter annehmen, verdienen eine ganz besondere Beachtung. Die Woge, die Welle, ihre Gestaltung und Höhe, ihre Richtung, Schnelligkeit der Fortpflanzung, die Dauer ihrer einzelnen Oscillationen müssen beobachtet werden; wie dies zu geschehen hat, lehren Specialwerke über Oceanographie. Welche Veränderungen bringen die bezeichneten Elemente in einzelnen Gegenden auf den Charakter der Wellenbewegung überhaupt hervor?

Folgen die Wogen rasch aufeinander; wie weit sind die Wellenköpfe (Rücken) von einander entfernt und sind die aufeinanderfolgenden von gleicher Höhe. oder zeigen sie Ungleichheiten und wie liegen solche in der allgemeinen Reihe vertheilt? Ist jede dritte, vierte u. s. w. höher oder niedriger?

Während diese Wogenerscheinungen und deren Elemente mehr den regelmässigen Verlauf bezeichnen, haben wir es auch mit anderen zu thun, die in gewissem Sinne als Störungen, als unregelmässig wirkende Momente zu bezeichnen sind.

Kreuzsee, kurze See, verworrene See. Scheinbar regellos über einander fallend, bilden sich, wo diese Art der Wellenbewegung sich zeigt, weisse Köpfe. Man beobachte, ob es sich hier in Wirklichkeit um eine regellose Erscheinung oder nicht etwa um eine Interferenz der Wellen handelt, wie sie durch einen, mit Wirbelstürmen verknüpften, raschen Wechsel der Windrichtung erklärbar wäre.

Kabbelung (ripples) wird durch die widerstreitende Wirkung zweier Ströme — etwa den durch den Wind erzeugten Oberflächenstrom und entgegenwirkende Gezeitenströmungen — erzeugt; es kann diese Bewegung stellenweise sehr heftig und der Aufwallung des kochenden Wassers sehr ähnlich werden. Ist damit jedesmal ein Geräusch verbunden und kann man, je nach den Entstehungsursachen, verschiedene Arten von Kabbelung unterscheiden? Hierfür sind besonders lehrreich Beobachtungen, die in Strassen und da ausgeführt sind, wo sich zwei Strassen (Meerengen) treffen

Während im offenen Oceane die Erscheinungen, welche im Vorhergehenden geschildert wurden, sich zeigen, erkennt man in der Wellenbewegung an Küsten die Folge von Hindernissen, die sich derselben entgegenstellen: die Brandung. Dieselbe ist an Flachküsten verschieden von jener an Steilküsten. Im ersteren Falle verursacht die Reibung des bewegten Wassers am Boden des Meeres eine Verzögerung in der Bewegung und ein Ueberstürzen der Wellenköpfe und daher die eigenthümliche Erscheinung der lang ausgehenden, übereinanderstürzenden und ein stetes Geräusch (Rauschen) verursachenden Wogenreihen. An Steilküsten prallt die ungebrochene Woge gegen das Felsengestade an und erhebt sich zur grössten Höhe (das Brechen der Wogen). Je nach der Art der Brandung bietet die See ein eigenes Aussehen, und es ist namentlich auch nach dem Boden des Meeres, ob Sandbänke, Korallengebilde u. s. w. denselben decken, die Farbe desselben verschieden.

Wichtiger als diese äusserliche Erscheinung ist für den Hydrographen

die Wirkung der Brandung auf die Küste, welche er aufzunehmen und zu beschreiben hat. Die zerstörende, verändernde Wirkung ist am stärksten über der mittleren Wasserlinie, und man erkennt aus derselben, ob durch das Hinwegführen (Hinwegspülen) von Erdreich Plateaus gebildet werden, wie dies zumeist an Leeküsten der Fall ist, während an Wetterküsten Erdreich angetrieben (angeschwemmt) wird. Zur Beurtheilung der Eigenschaften einer Küste mit Rücksicht auf die Anforderungen der Schifffahrt ist die genaue Beobachtung der bezeichneten Erscheinungen von Bedeutung.

Die Bildung von Terrassen (Plateaus) auf Steilküsten und von Nehrungen auf Flachküsten muss vom Hydrographen beobachtet werden, weil davon häufig die Tauglichkeit derselben für Ankergründe, Häfen u. s. w. abhängig ist.

An Küsten spielen überdies die Niederschlags- und Regenverhältnisse eine Rolle, und zwar mit Beziehung auf die Gestaltung des Gestades; dies gilt vorzugsweise von Flussmündungen. Hier fragt es sich: ist der niederfallende Regen gleichmässig über das Jahr vertheilt, oder fällt er in Perioden oder plötzlich und heftig, so dass dadurch Ueberschwemmungen verursacht werden. Im letzteren Falle ermittle man die Jahreszeit, in welcher solche eintreten.

Auch die Temperaturverhältnisse haben auf Küstenbildung einen bestimmenden Einfluss. Welcher Art sind dieselben? Namentlich bedarf das Eis, sowohl das Treibeis, wie solches, welches sich in Buchten, in Flussmündungen an einer Küste bildet, einer gründlichen Beachtung. Hierbei ist die Gestaltung der Küste in Erwägung zu ziehen, so wie die orographischen Verhältnisse im Allgemeinen. Welche Wirkung äussern die Gebirge im Litorale und zwar mit Rücksicht auf die allgemeine Küstenerstreckung und die herrschenden Winde? Wie weit sind die höchsten Höhen von dem Ufer entfernt; steigt das Land in Vorgebirgen plötzlich auf, oder erhebt es sich terrassenförmig nach Innen zu? Zeigt das Profil tiefe, schroffe oder flache und abgerundete Einschnitte? Oder bilden die Höhenzüge allenthalben einen Rücken (Grat) von gleicher oder nahezu gleicher Höhe? Vertonungen (siehe unten) sind von grossem Werthe, mit Rücksicht auf die Schilderung dieser Verhältnisse. Man beachte die Gesteinsart und besonders, ob die Küste vielfach Gebilde vulkanischer Natur zeigt.

Eine Gattung der Wellenbewegung muss hier noch erwähnt werden, obgleich dieselbe nicht im strengsten Sinne zu den hier darzulegenden klimatologisch-hydrographischen Verhältnissen gehört; es ist dies die auf offener See, in Buchten und an Küsten häufig sich der Beobachtung darbietende Erdbebenwelle, die für manche Gegenden (Süd-Amerika) eine grosse Bedeutung hat. Auf offener See kann sie sich entweder durch einen plötzlichen Stoss in der Nähe des Schiffsortes oder durch eine ausserordentlich hohe, durch sonst ein anderes Agens nicht motivirte und schnell verlaufende Welle zu erkennen geben; an Küsten ist es oft nur eine einzige, rasch sich nähernde und wieder verschwindende Welle, welche das Wasser zu einer grossen Höhe erheht und das Gestade zeitweise überschwemmt. Treten diese Erscheinungen auf, so notire man sofort Zeit, Ort, Maass und Charakter der Bewegung. Besonders werthvoll werden solche Aufzeichnungen, wenn mehrere Schiffe sich zur Zeit in kurzen Entfernungen von einander befinden; werden in solchen Fällen die Erscheinungen genau nach Zeitmaass und Richtung beschrieben, so können daraus über Fortpflanzung solcher Wellen, ihre Höhe und Schnelligkeit der Oscillation, und daraus wieder über die mittlere Tiefe des erschütterten Wassers Schlüsse gezogen werden. (Siehe Seebach p. 327.)

III. Meteorologische Beobachtungen in ihrer Anwendung auf den Weltverkehr zur See.

Die Bedeutung meteorologischer Beobachtungen zur richtigen Beurtheilung oceanographischer Verhältnisse, vorzüglich mit Rücksicht auf ihre praktische Verwerthung, ist durch die Erfolge der Navigation der Neuzeit zu wohl erwiesen, als dass es nothwendig erscheinen könnte, hier dieselbe des Weiteren zu erörtern. Da überdies die Meteorologie schon in einem besonderen Abschnitte (Hann, Meteorologie) behandelt wurde, so genügt es für unsere Zwecke einige Gesichtspunkte besonders hervorzuheben.

Die vorzüglichsten hierher gehörigen Fragen lassen sich in folgende zwei Punkte zusammenfassen:

1. Welches sind im gegenwärtigen Stadium der Entwicklung die wesentlichsten maritim-meteorologischen Fragen, welche zum Nutzen der praktischen Navigation bearbeitet werden sollten, und
2. Wie kann die meteorologische Wissenschaft für hydrographische Zwecke weiter entwickelt werden?

1. Die genaue Erforschung der verschiedenen Gebiete der Winde (Siehe pag. 628) und der Strömungen des Oceans (Siehe folgenden Abschnitt) zu Zwecken der Förderung der Seeschifffahrt muss allen jenen, welche in Verbindung mit einem wohlorganisirten Systeme maritimer Meteorologie wirken wollen, in erster Linie besonders anempfohlen werden. Allein auch der einzelne Reisende kann auf diesem Gebiete Werthvolles leisten, sei es durch selbstständige Beobachtung, sei es durch Sammeln von Material oder durch Anregung anderer. Man lenke seine Aufmerksamkeit zunächst auf die Veränderungen der Windrichtung innerhalb eines Gebietes und prüfe die Beziehungen dieser Aenderungen zu den Aenderungen der meteorologischen Elemente, zum Verhalten des Luftdruckes, der Temperatur und der Feuchtigkeit der Luft. Bestätigen sich in allen Fällen die darüber bereits aufgestellten Gesetze und, wenn nicht, wie sind die Ausnahmen zu charakterisiren? Für den Seefahrer sind diese Fragen von besonderem Werthe, weil er, im Falle er einen, für seine Reise günstigen Wind verloren hat, denselben wieder auffinden — weil er das für ihn wünschenswerthe Gebiet der Winde oder besonderer Luftströmungen an der Hand der meteorologischen Instrumente aufsuchen kann. Mit Rücksicht auf diesen Punkt ist es besonders wichtig, die Relationen zwischen Windrichtung und Luftdruck (Dove's Drehungsgesetz. Buys Ballot's Gesetz u. s. w.) zum Gegenstand der Untersuchungen, Beobachtung und beziehungsweise Prüfung zu machen. Wenn der regelmässige Verlauf der Windphänomene so in erster Linie zu beobachten ist, so ist andererseits die Natur der in einem Gebiete herrschenden Stürme oder der Böen — namentlich auch des plötzlichen Umspringens des Windes von einer Richtung in eine andere (oft die entgegengesetzte) für den Seemann von grosser Bedeutung und sollte deshalb keine Gelegenheit versäumt werden, darüber Beobachtungen zu machen oder auch nur zu sammeln. Wie ist in solchen Fällen das Verhalten des Barometers, in welchem Stadium der Windveränderung tritt ein Steigen oder ein Fallen des Barometers ein; haben Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse dazu eine Beziehung und welche? Vermag man da, wo es sich um die Beobachtung von Orkanen handelt, die Windgeschwindigkeiten in den einzelnen Stadien der Drehung der Windrichtung zu messen (mit Anemometern), so ist dies zur Entwicklung einer Theorie der Stürme dieser Art von grossem Werthe. Man beobachte auch in solchen

Fällen, wo orkanartige Stürme auftreten, die Bewegung der oberen Luftschichten, den Wolkenzug, und den Charakter der Wolken, und verfehle nicht auch von anderen Beobachtern, anderen Schiffen, Material über das Phänomen zu sammeln, wobei man übrigens mit Kritik verfahren und Alles angeben sollte, was sich auf die genaue Feststellung der meteorologischen Elemente bezieht, damit die gemachten Beobachtungen unter einander vergleichbar werden. Eine besondere Beachtung verdienen die Anzeichen eines herannahenden Sturmes und vernachlässige man hierbei die Feuchtigkeitsverhältnisse nicht. Sehr zu empfehlen ist zu diesem Zwecke das Studium der Werke von Piddington, Reid, Dove, Mohn und Reye; man richte womöglich sowohl Beobachtungen als darauf gegründete Untersuchungen nach den, in denselben niedergelegten Grundsätzen ein.

Ein anderer Zweig der praktischen Navigation hat in der jüngsten Zeit einen Aufschwung genommen und verdient daher eine besondere Beachtung; es ist dies die Sturmwarnung an den Küsten. Der Seefahrer hat vielfach Gelegenheit in anderen Welttheilen Erhebungen zu machen über die Organisation von Sturmwarnungssystemen, welche daselbst in Thätigkeit sind. Es handelt sich hierbei, wenn das System innerhalb der Regionen periodisch auftretender Orkane liegt — also eine Sturmwarnung einfacher und sicherer sein kann, vorzugsweise um die Mittel, welcher man sich zur Mittheilung an die Seeleute bedient; es ist dies wichtig für die Sicherheit der Navigation an einer Küste. An Küsten, welche in ektropischen Gebieten liegen, wo Sturmerscheinungen viel verwickelterer Natur sind, sollte der Reisende darauf Bedacht nehmen, Alles zu sammeln, was auf die Grundsätze, nach welchen Sturmwarnungen ausgeführt werden, einen Bezug hat. Werden nur einfache Mittheilungen über den Stand der meteorologischen Elemente gegeben oder auch wirkliche Warnungen hinzugefügt? Sind es nur Wahrscheinlichkeiten, welche mitgetheilt werden oder Vorhersagungen? Wie lange ist das System in Betrieb — nach welchen Grundsätzen ist es organisirt und, besteht eine Statistik über den Erfolg und welches sind die Resultate derselben?

2. Zur Weiterentwicklung der meteorologischen Wissenschaft mit hydrographischen Zielen ist eine Organisation der Arbeit unerlässlich. Der Einzelne kann bei dem heutigen Stande der Kenntniss nur wenig zur Förderung derselben beitragen, wenn er nicht nach einem festen Plane und in Verbindung mit einem meteorologischen Systeme arbeitet. Daher ist es dem Reisenden, der allein reist und den Wunsch hat meteorologische Beobachtungen auf See anstellen zu können, sehr anzurathen, dass er sich vor Antritt der Reise mit einem Institute für Maritime Meteorologie in Verbindung setze, nach seinen Instructionen arbeite und die Instrumente daselbst mit den normalen vergleiche. (Siehe Hann, Meteorologie). Es empfiehlt sich, dass er sich specielle Aufgaben zur Bearbeitung stellen lasse, die solche Gegenstände berühren, welche nur selten eine Berücksichtigung finden können; dahin gehören beispielsweise die Beobachtungen über Feuchtigkeit der Luft mittelst Hygrometer (ohne psychrometrische Beobachtungen auszuschliessen) — über Windstärke, über Ozongehalt und Elektricität u. s. w.

Meteorologische Beobachtungen, auf See und in Verbindung mit einem Systeme und nach gegebenen Instructionen ausgeführt, bedürfen hier keiner weiteren Erörterung, indem alles Nähere aus diesen Instructionen zu entnehmen ist und theilweise im Abschnitte über Meteorologie schon behandelt wurde. Das auf diese Weise Gegebene als bekannt voraussetzend, wird nur Gewicht darauf gelegt, dass die Beobachtungen an Bord an Instrumenten gemacht

werden müssen, die an ein und derselben Stelle erhalten werden; dies gilt sowohl mit Rücksicht auf Barometer als auf Thermometer und Psychrometer. Bei der Wahl der Aufstellungsorte hat man sich vielfach, unter Festhaltung der für dieselben geltenden allgemeinen Normen, nach gegebenen Verhältnissen zu richten und lassen sich dafür nur schwer Regeln aufstellen, die in allen Fällen Anwendung finden können. Die Thermometer sind in einem Jalousiekästchen und an einem Stative befestigt so aufzustellen, dass sie gegen Sonnenschein, Wind und Wetter geschützt werden können und wird für diesen Zweck das in der kais. Kriegsmarine gebräuchliche Stativ besonders empfohlen (C. Bamberg, Mechaniker in Berlin).

Indem die Aufstellung des Thermometers an einer festen Stelle an Bord eines bestimmten Schiffes als wesentlich zur Erlangung guter und vergleichbarer Resultate bezeichnet wird, wird Reisenden, die sich an Bord solcher Schiffe befinden, anempfohlen Versuche anzustellen, die darauf abzielen, den für die Thermometeraufstellung gewählten Ort mit anderen durch gleichzeitige Beobachtungen zu vergleichen. Hierbei kann man so verfahren, dass man der Reihe nach andere, je nach Segelstellung, Sonnenschein u. s. w. gewählten Punkte, die für die Zeit einer Beobachtung — Vergleichung — den Anforderungen einer guten Beobachtungsstelle entsprechen, mit der Normalstelle in Beziehung bringt; man bedient sich hierbei eines einfachen transportablen Jalousiekästchens.

Auch über Regenfall kann der einzelne Reisende auf See wichtige Beobachtungen anstellen und wesentliche Lücken in unserer Kenntniss dieses Elementes ausfüllen. Bei der Aufstellung der Regenmesser muss aber mit besonderer Sorgfalt verfahren werden, damit einestheils nicht von Raaen und Tauwerk Wasser in das Auffanggefäss fällt, andererseits nicht durch Segel u. s. w., durch einen zu starken Luftzug oder gar durch Ueberdeckung der Niederschlag davon abgehalten wird.

In dem V. Abschnitt werden wir über die Anwendung der meteorologischen Forschungen für die Zwecke der praktischen Navigation einige Anhaltspunkte geben.

IV. Strömungen und Temperaturvertheilung im Ocean.

Sowohl für die Zwecke der Seeschifffahrt, als auch für die verschiedenen Fragen der Oceanographie ist es von Bedeutung, von der Bewegung der Wassermassen im Ocean eine klare Vorstellung zu haben. Es ist bis heute schon Manches geschehen, was dazu dienen kann, einigermaassen bestimmte Ansichten in diesen Zweig des Wissens hineinzubringen; zum Mindesten muss das Errungene der Forschung Fingerzeige geben und es erschien aus diesem Grunde rathsam, diesem Werke eine Karte über die Strömungen im Oceane beizufügen, weil durch sie in anschaulicher Weise auf die für die Forschung wesentlichsten Punkte aufmerksam gemacht werden kann. Es handelt sich zunächst darum, dass der Beobachter die Erscheinung der Bewegung der Wassermassen dem Wesen nach zu unterscheiden lerne. Die Bewegung der Gewässer geht entweder in Strömen mit mehr oder weniger scharf ausgeprägten, oder in Triftcomplexen mit unbestimmten Gränzen vor sich. Ströme und Trift ziehen im Allgemeinen entweder in der Richtung der Breitenparallele oder in der Richtung der Meridiane, indem sie mit diesen Linien grössere oder kleinere Winkel bilden. Während die Ströme tief in die Wassermassen hineinreichen, nach neuen Untersuchungen jedoch nicht so tief, als man früher vermuthete, sind die Triftcomplexe meist nur an der Oberfläche bis zu einer gewissen, mässigen Tiefe bemerkbar.

Der Beobachter muss diese beiden Erscheinungen zu unterscheiden lernen, wenn er Material zusammenbringen will, das für die Construction der Strömungskarten von Werth sein soll, was in vielen Fällen nicht so einfacher Natur ist, daher denn die zum Theil unverständlichen Systeme von Strömungen, welche heute noch auf den Karten erscheinen. Häufig wird das, was nur Oberflächen-Trift ist, als Fortsetzung von Strömen grösserer Tiefe dargestellt, eine Täuschung, die in sofern zu entschuldigen ist, als sich beide als Bewegung des Wassers in demselben Sinne an der Oberfläche zu erkennen geben und eine Scheidung beider Phänomene nach der Tiefe, noch nicht möglich ist. Ein Hauptziel der Forschung muss daher auf diesen letzten Punkt gerichtet sein.

In vielen Fällen kann man über den Charakter der Bewegung des Wassers im horizontalen Sinne nicht im Unklaren sein. Wenn z. B. in dem Gebiete der Monsune im Indischen Ocean, oder der Chinasee die Stromrichtung sich mit dem Wechsel des Monsuns gleichfalls ändert, mit seiner Richtung übereinstimmend sich erhält, so kann man nicht in Zweifel sein, dass es sich hier nur um eine Oberflächenströmung und nicht um eine Circulations-Bewegung des Wassers handeln kann. Ein Gleiches gilt, wenn längs einer Küste, und bis auf eine beschränkte Entfernung von ihr, die Strömung an der Oberfläche durch Inland-Flüsse, die gemäss den Jahreszeiten eine grössere oder geringere Menge Wasser dem Oceane zuführen, bestimmt wird; in solchen Fällen handelt es sich meistens nur um ein Ueberdecken oder Verwischen der eigentlichen Strömung durch abfliessende Wassermassen des Binnenlandes. Man prüfe daher strengstens, und hierbei unterstützt die Feststellung der Tiefe, bis zu welcher die Winde eine Wirkung äusseren, in erster Linie die Forschung. Wenn immer sich dazu Gelegenheit darbietet, stelle man mit geeigneten Instrumenten die Tiefe der Trift fest. Hierfür sind besonders geeignet die Gebiete der westlichen Winde, welche beständig die Erde umkreisen und die Wassermassen nach Osten treiben. Andere Elemente der Unterscheidung der wirklichen Strömungen im Ocean sind Temperatur und Salzgehalt. Von besonderer Bedeutung ist die erstere, deshalb gebrauche man fleissig das Thermometer. Die Strömungskarte dieses Werkes wird dabei von Vorthail sein können, da sie mindestens in allgemeinen Zügen die factischen Verhältnisse darstellt und warme und kalte Strömungen unterscheidet. Allein grade mit Rücksicht auf diese Unterscheidung muss man sehr vorsichtig sein, indem der Begriff der hohen und niederen Temperatur in den meisten Fällen nur relativ zu verstehen ist. Ein Strom wird warm oder kalt genannt, wenn er wärmer oder kälter ist, als die ihn umgebenden Wassergebiete. Es kann z. B. die Bewegung der tropischen Gewässer von Osten nach Westen hin nicht als warmer Strom bezeichnet werden, weil das Wasser eine Temperatur von 25° bis 30° hat, dagegen erscheint der Guineastrom mit Recht als ein Strom warmen Wassers, da er stellenweise 8° oder 12° höhere Temperatur zeigt, als der Aequatorialstrom.

Die Winde vermögen die Eigenschaften des Wassers mit Rücksicht auf Temperatur und Salzgehalt von einem Gebiete durch ihre verwischende Wirkung auf ein anderes ganz oder theilweise zu übertragen. Z. B. wird sich der Oberflächentheil des Kurosiwo, der sich als Strom warmen Wassers charakterisirt, sobald er in das Gebiet der westlichen Winde eintritt, nach Osten hin ausbreiten, während der eigentliche Strom seinen nordöstlichen oder seinen nördlichen Curs fortsetzt, weshalb es nicht streng richtig sein würde, anzugeben, dass seine Gewässer vorzugsweise eine östliche Richtung annehmen. Aehnlich ver-

hält es sich mit dem Golfstrom des nordatlantischen Meeres. Was also vorzugsweise Noth thut, das ist die Feststellung der Mächtigkeit der Triftwirkung. Unter diesem Gesichtspunkte werden sich die Gränzen der Strömungen bald genauer gestalten.

Soweit die Erfahrung bis jetzt einen allgemeinen Grundsatz festzustellen gestattet, lässt sich derselbe in Folgendem zusammenfassen: Es ziehen die warmen Wassermassen der niederen Breiten an den Ostgestaden der Continente den Polargegenden zu, während die kälteren Wassermassen von den Polargegenden an den Westgestaden der Continente nach den Tropen fließen. Ob sich dieser Satz auch auf grössere Inseln anwenden lässt, wird von der Gestaltung des Bodens, worauf sie ruhen, abhängen. Wenn, wie dies mit Beziehung auf Tasmanien der Fall ist, eine flache Strasse (die Bassstrasse) eine Insel vom Festlande trennt, und selbst die Wassertiefen in der Nähe des letzteren, wie im Süden von Victoria, nur gering sind, so wird die Westküste dieser Insel mit Rücksicht auf die Temperatur des Meeres als ein Theil der Westküste des Festlandes erscheinen. Im Interesse des Verständnisses der Stromerscheinungen längs den Küsten der Continente ist daher eine Untersuchung der Tiefenverhältnisse, der Bodengestaltung geboten; erst durch die Resultate einer solchen wird man über die oft scheinbar widersprechenden Erscheinungen Klarheit erhalten können. Deshalb suche der Reisende, sollte er selbst die Beobachtungen nicht zu machen vermögen, Information zu sammeln, wo immer er sie bekommen kann. Er verfehle aus diesem Grunde nie, wenn er Erhebungen über Ströme und deren Temperatur an Küsten gemacht hat, auch Erhebungen über die erwähnten Punkte einzuziehen, wenn es ihm, wie dies meist der Fall sein wird, nicht möglich war, die Tiefenbeobachtungen selbst anzustellen. In den einzelnen Oceanen werden sich die im Wesentlichen hierauf Bezug habenden Fragen, wie folgt, gestalten.

Im Atlantischen Ocean.

Der Golfstrom. Man beobachte Ausdehnung, Stärke, Tiefe, Schnelligkeit, Temperatur, Salzgehalt und Farbe des Wassers, und zwar an verschiedenen Stellen von seinem Ursprung im Golf von Mexico bis in den hohen Norden, wo er triftartig wirkend, die Temperatur der kalten Region erhöht. Wie sind die Strömungs- und Temperaturverhältnisse in der Strasse von Florida und zwar vorzugsweise auch nach der Tiefe zu? Nach welchem Gesetze vertheilen sich die Streifen kalten Wassers im Golfstrom und welche Bewegung ist denselben eigen und wie weit gehen dieselben nach der Tiefe? Reichen sie etwa nur bis zur Tiefe, bis zu welcher die Oberflächenwirkung zu erkennen ist? Wie ändern sich die Gränzen dieser bewegten Wassermassen mit den Jahreszeiten? Sind diese Gränzen zu allen Zeiten gleich scharf zu erkennen und bis zu welchen Breiten?

Der Labrador- und Polarstrom. Ändert sich die Lage dieses Stromes gegenüber dem Golfstrom? Da, wo beide zusammentreffen, ist es von Wichtigkeit zu erfahren, wie sich die Massen beider lagern, in welcher Weise der kalte Strom unter dem warmen hindurchgeht und wie tief er sich forterstreckt?

Der Aequatorialstrom, oder, die Bewegung der Wassermassen innerhalb der Wendekreise von Osten nach Westen. Es fragt sich hier: Bewegt sich die Wassermasse ihrer ganzen Tiefe nach in der genannten Richtung, oder ist sie nur an der Oberfläche bis zu einer gewissen Tiefe in Bewegung? Im ersten Falle wird man mit Nothwendigkeit zur Rotation der

Erde als der einzigen Ursache hingeleitet, im letzteren handelt es sich nur um eine Trift, welche durch die nordöstlichen und südöstlichen Passate verursacht wird. Untersuchungen zur Entscheidung dieser Fragen gehören zu den wichtigsten, weil sie die Grundursachen der Bewegungen des Wassers des Oceans betreffen. Ferner fragt es sich, wie ist im Süden der Linie der Curs dieses Stromes — theilt er sich bei dem nordöstlichen Ende des südamerikanischen Continentes seiner Tiefe nach und welche Beziehung hat derselbe zu den Strömungen im Golf von Mexico? Alle diese Fragen können nur beantwortet werden durch Nachforschungen der Stromesrichtung und Stärke, auch in der Tiefe und unterhalb des Gebietes der Wirkung der Winde. Das Wasser der Aequatorialströmung muss im Osten von niedrigerer Temperatur sein, da es aus höheren Breiten längs des Afrikanischen Continentes herabfließt. Ist diese Bewegung von Norden nach Süden, von Oben nach Unten durchgehend oder wird durch einen Unterstrom der Ausgleich hergestellt?

Der Aequatorial-Gegenstrom. Den Aequator unter einem kleinen Winkel schneidend, erstreckt sich der Gegenstrom von den Antillen bis zum Guineaastrom im Gebiete des Aequatorialstromes. Das Wesen dieses Stromes ist noch wenig gekannt: hat derselbe Tiefe oder ist er nur an der Oberfläche wahrzunehmen? Ist er der bewegenden Ursache nach dasselbe, wie der Guineaastrom, der nur noch durch Wasser, welches längs der afrikanischen Küste hinzieht, verstärkt wird? Seine Temperatur ist mit jener der Umgebung, die er durchzieht, verglichen, höher — auch der Guineaastrom ist von höherer Temperatur, als die ihn einschliessenden Gewässer des südlichen Aequatorialstromes. Handelt es sich in dem Falle, wo der Guineaastrom in der Bucht von Benin oder bei Fernando Po an der Oberfläche verschwindet um einen Strom, der unter den von Süden kommenden, der afrikanischen Westküste folgenden kalten Strom herabsteigt, oder wohin nimmt er seinen Lauf? Sollte nicht etwa in diesem Zusammentreffen zweier bewegter Wassermassen der erste Grund der noch immer nicht erklärten hohen Küstendünung jener Gegenden (Calema) liegen?

Der Brasil-Strom, der südlich ziehende Arm des Aequatorialstromes. In enger Verbindung mit der Verfolgung des Zuges dieses Stromes ist die Frage über den sogenannten Verbindungsstrom zwischen Südamerika und Afrika. Welches ist die Richtung des Brasilstromes von der La Plata Mündung aus? Tritt er nicht vielmehr unter die Oberfläche vielfach vorher schon durch Triftströmungen im SO Passate verwischt? Theilt er sich bei den Malwinen oder hält er sich als alleiniger Canal warmen Wassers, wie er bis jetzt auf den Karten gezeichnet, zwischen jenen Inseln und dem Festlande? Ist es nicht unwahrscheinlich, dass derselbe sich nur von so geringer Wassertiefe erweisen sollte? Wohin wendet sich das wärmere Wasser, indem es höheren Breiten zuzieht und von dem kräftigeren Strome bei Cap Horn nach unten verschoben wird?

Der Cap Horn-strom und die Antarktische Trift. Da, wo dieser Strom östlich von den Malwinen (Falklands Inseln) mitten in den südatlantischen Ocean hinaustritt, durch Temperaturverminderung und durch Treibeis sich zu erkennen giebt, ist eine wichtige Stelle für die Forschung nach dem Wesen der Meeresströmungen. Ist dort wirklich, wie man vermuthen sollte, eine Uebereinanderlagerung wärmeren und kälteren Wassers zu finden? Wie verhält es sich mit der sogenannten Gegenströmung? Ist sie eine Wirkung der westlichen Winde, die nur die allgemeine Strömung verwischen, oder ist es ein Rücklauf nach Osten, der sich hier zu erkennen giebt? Welche Beziehung hat derselbe zu der so auffallenden, noch

immer der vollen Erklärung harrenden umbiegenden Strömung bei dem Cap der Guten Hoffnung?

Der Indische Ocean.

Die Warme Strömung durch die Mozambique-Strasse nach der Agulhas Bank und der an der Ostseite von Madagaskar nach Süden und sodann nach Südosten ziehende Strom einerseits, und die kalte Strömung an der Westküste Australiens andererseits, sind in Uebereinstimmung mit den herrschenden Ansichten erwiesen. Wo ist in diesem Meere die Strömung zu suchen, welche den Austausch der warmen und kalten Gewässer vermittelt — erkennen lässt? Wie verhält es sich mit der Umkehr des Capstromes nach Osten oder Südosten? Worin sind die Gründe für ein solches ausserordentliches Phänomen zu finden? Ist diese Umkehr nur eine oberflächliche oder erstreckt sie sich zu einer grösseren Tiefe? Geht eine warme Strömung in einzelnen Jahreszeiten an der Oberfläche an der Westküste Südafrika's zwischen ihr und dem kälteren Südstrom hinauf? Ueberall sind Temperatur- und Bodenverhältnisse hierfür entscheidend.

Maury nimmt einen grossen Strom warmen Wassers an, der, aus der Mitte des Indischen Oceans herauskommend, sich an Kerguelen vorüber nach Süden wendet. Sind für die Existenz eines solchen Anhaltspunkte vorhanden? Spricht nicht vielmehr Alles dafür, dass die von der Ostküste Afrika's abgelenkten warmen Gewässer in einem südöstlichen Laufe sich westlich jener Insel und bei M'Donald's Gruppe nach Süden ziehen? Tiefentemperaturen sind hier entscheidend, ebenso, wie die Richtung des Stromes, deren Feststellung vielfach durch die verwischende Wirkung der westlichen Winde gestört wird. Auch in diesem Meere ist in der südlichen Hemisphäre der Aequatorialstrom zu erkennen, ebenso auch der Aequatorial-Gegenstrom, und es sind die Fragen über Tiefe der Wasserbewegung und die Ermittlung der Temperatur von grosser Tragweite zur vollständigen Erklärung der Erscheinungen. Namentlich ist der Uebergang der kalten Strömung Westaustraliens in die Bewegung des Aequatorialstromes von Interesse.

Der nördliche Theil des Indischen Oceans, nach Norden hin von Ländern umschlossen, bietet für die Erforschung der Meeresströme ein grosses erfolgverheissendes Gebiet. An der Oberfläche sind es die in der Jahreszeit herrschenden Winde (Monsune), welche den Strom bestimmen. Die Malaba-Strömung und die Strömungen in der Arabischen See, in der Bai von Bengalen und weiter nach Osten zu im Chinesischen Meere geben dafür die besten Belege. Allein, wie verhält es sich mit den Tiefenströmungen daselbst, denn jene Windeinwirkung kann für die eigentlichen Strömungsverhältnisse nicht maassgebend sein. Die Arbeiten der Hydra erweisen, dass sich in den tropischen Gewässern des Indischen Ocean's am Meeresboden Wasser von so niedriger Temperatur findet, dass man annehmen muss, es sei dasselbe aus dem antarktischen Gebiete gekommen. Wie lagern sich die Hauptströmungen im Indischen Oceane? Ein Durchforschen desselben von Westen nach Osten in 30° südlicher Breite wird entscheidende Resultate für die Erklärung der Erscheinungen bringen.

Der Stille Ocean.

Der Stille Ocean ist für die Erforschung der Bewegungsgesetze der Wassermassen gemäss seiner Ausdehnung wohl das günstigste Gebiet.

Der Kurosiwo oder der Japanische Strom, der, wie der Golfstrom um die Südspitze Florida's herum sich nach dem Atlantischen Oceane wendet,

um Formosa durch den nördlich Stillen Ocean zieht, ist in erster Linie zu beachten. Welche Beziehungen finden wir mit dem Aequatorialströme auf der Nördlichen Hemisphäre? Die bei Gelegenheit des Atlantischen Oceans angeführten Fragen finden auch hier eine Anwendung und bedürfen keiner Aufzählung mehr. Der Kurosiwo geht der Behringstrasse zu, ein anderer Arm wendet sich mehr nach Osten, den Aleuten ein wärmeres Klima bereitend. Es sind auch hier die zwischen 35° und 50° herrschenden westlichen Winde, welche an der Oberfläche den Charakter der westlichen der östlichen Hälfte des Stillen Ocean's zuführen. Wie aber mag es in der Tiefe aussehen? Wo dringt der kalte Strom, der durch die Behringstrasse herabkommt, in das Aequatorialgebiet ein? Geht er auch in der Tiefe längs der amerikanischen Küste, wie es die Oberflächen Beobachtungen vermuthen lassen, nach Süden?

Welcher Art ist der auf allen Stromkarten mit Bestimmtheit hervortretende Wirbel Fleuriens des nördlich Stillen Ocean's? Ist er nur durch den Widerstreit ephemärer Winde in den Calmengebieten erzeugt? Solche Erscheinungen müssen, wenn nicht gründlich erforscht, bei einer vorschnellen Beurtheilung, verwirrend wirken.

Der Aequatorial-Gegenstrom ist ein warmer Strom, namentlich im Osten, da er dort mit den relativ kälteren Gewässern zusammentrifft, die in beiden Hemisphären einen Polarursprung bekunden; denn auch an der Westküste des südamerikanischen Continentes zieht ein kalter Strom herauf — anscheinend von mächtiger Tiefe; nach und nach nehmen seine Gewässer, indem sie erwärmt werden, eine westliche Bewegung im Aequatorial-Strome an und zwar in einer Entfernung von der Amerikanischen Küste, wie sie durch die Ueberwindung des Trägheitsmomentes der Wassermassen bedingt wird. Wie ist der Einfluss der Aequatorialströmung südlich und nördlich des Aequators, auf die Bewegung des Wassers bei den Carolinen, der Ostküste der Philippinen entlang, und den Strom der Australischen Küste? Der Monsun-Charakter der Winde zeigt sich auch in diesem Theile des Oceans vielfach als ein, die allgemeinen Erscheinungen modificirendes, Element; die Ströme in der Tiefe sind hier noch nirgends eingehend erforscht. Im südlich Stillen Ocean sind vielfach Zeichen der Bewegung der Wassermassen von den antarktischen Regionen nach Norden hin zu finden. Ist der von der Ostküste Australiens zurückgeworfene Strom, der in südöstlichem Zuge dem Süden zugeht, mächtig genug, eine Ausgleichung für die Bewegung der antarktischen kalten Gewässer zu bewirken und ist in ihm die einzige Ader des Austausches zu erblicken? Auch in diesen Gewässern ist es der beständig wehende westliche Luftstrom, der störend auf das klare Erkennen der Erscheinungen einwirkt.

Interessant ist das Gebiet zwischen Neuseeland und dem australischen Continente. Ist der nördliche Strom an der Westküste Neuseeland's eine Fortsetzung des sich nach den Karten im Wirbel bewegenden Küstenstromes Australien's, oder haben wir in ihm den an die Oberfläche heraauftretenden kälteren vom Süden kommenden Strom zu erkennen? Temperaturbeobachtungen, consequent und gewissenhaft ausgeführt, können dies allein entscheiden. Die Bodengestalt muss Vieles, was uns jetzt räthselhaft erscheint, erklären.

Dies sind in grossen Zügen und in einigen Beispielen die Fragen, welche den Forscher auf dem oceanischen Gebiete beschäftigen müssen, wenn er durch seine Beobachtungen die Einsicht in das Wesen der Meeresströmungen fördern will.

Die Untersuchung der Strömungsverhältnisse in Strassen und Meerengen

bilden ein lehrreiches Capitel für sich. Sind in den Strassen an der Oberfläche und unten verschiedene Strömungen wie es sich vermuthen lässt? Wechseln dieselben mit der Jahreszeit in der Richtung oder nur in ihrer Mächtigkeit? Wie ist die Vertheilung der Temperatur? Beispielsweise sei nur daran erinnert, welches Interesse sich an die Strömungen und Temperaturverhältnisse in der Behringsstrasse oder in der Baffins Bai zum Smithsund hinauf knüpft. Wie wichtig ist nicht das Studium der Strömungen in einem Inselgebiete, wie in Ostasien oder in den Antillen! Allein nur eingehende Lothung und Temperaturmessung hat hier nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft einen Werth. Ein Gleiches lässt sich von den Strömungen in mehr oder minder geschlossenen Meerestheilen anführen. Die Untersuchungen von Schrenck in dem Ochotskischen und Japanischen Meere zeigen, wie eine gründliche Untersuchung in beschränkten Gebieten die allgemeine Strömungstheorie zu fördern vermag. Man wird wohl daran thun bei der Darstellung von Meeresströmungen in Karten allen beeinflussenden Umständen mit Verständniss Rechnung zu tragen, namentlich sollte man die Strömungen an der Oberfläche und die tiefer gehenden unterscheiden, die Winde nicht als maassgebend bei der Circulation der Wassermassen, sondern als dieselbe nur beeinflussend, modificirend erscheinen lassen.

In gewissem Sinne unabhängig von den in Systemen zu behandelnden Strömungen des Oceans sind in einzelnen Gebieten die, wenn die Bezeichnungsgestalt ist, sporadischen Ströme, die noch nicht, oder überhaupt nicht, auf ein System zurückgeführt werden können. Die Stromkarten zeigen davon eine grosse Anzahl und zwar in allen Gegenden des Weltmeeres; existiren dieselben wirklich oder sind sie vereinzelt, vielleicht nur momentane Erscheinungen, oder etwa Beobachtungsfehlern zuzuschreiben? Man denke an die Gebiete im subtropischen Stillen Ocean, oder auch im gleichen Gebiete des Indischen Oceans.

Der einzelne Reisende kann in diesen Fragen, wenn er nicht einer besonders für solche Zwecke ausgesandten Expedition angehört, weniger durch directe Beobachtungen wirken, als vielmehr durch Sammlung von Material die Entwicklung fördern.

Die Treibproducte; das Eis und die Trift; die Seetange. In beiden Hemisphären ist das Treibeis ein interessantes Object der Forschung; die Bewegungen desselben sind noch nicht genügend erklärt, und werden es auch erst werden können, wenn man über die unteren Meeres-Strömungen unterrichtet ist, als gegenwärtig. Von diesem Gesichtspunkte aus ist die Treibeisgränze der südlichen Hemisphäre (siehe Karte) höchst lehrreich, weil sie Unregelmässigkeiten zeigt, die bei der grossen Ausdehnung des oceanischen Gebietes, wo also die Gestaltung der Continente keinen Einfluss üben kann, nur tiefer liegenden Strömungen zugeschrieben werden können. Welches ist der Grund, dass die Treibeis-Gränze bei Kerguelen, bei den Auckland's Inseln um mehr als 10 Breitengrade weiter nach Süden hin verschoben ist, als in anderen Gegenden des Circumpolar-Gebietes? Was ist der Grund der Bewegung der Eismassen in der jährlichen Periode? Spielt hierbei die wechselnde Mächtigkeit der Strömungen eine Rolle (nicht die Stärke, sondern die Tiefe)?

Die treibenden Tange (siehe Acherson) folgen in den Ansammlungs-Plätzen vorzugsweise den Strömungen. Es ist eine wichtige und lohnende Aufgabe für den Beobachter, die Gattungen und Arten derselben in jedem Falle festzustellen, indem daraus auf die Strömungsverhältnisse Schlüsse gezogen werden können; denn, weil die Tange tief in das Meer hinabhängen, werden sie nicht in allen Fällen von der Oberflächenströmung beeinflusst.

So soll beispielsweise der Meridian St. Paul-Amsterdam nach den Holländischen Untersuchungen die Tange des westlichen und östlichen Indischen Oceans scheiden. Verhält sich dies so und findet man auch anderwärts Analogien hierzu? Kann man in Wirklichkeit auch in anderen Meeren der Sargasso See des nordatlantischen Oceans ähnliche Erscheinungen feststellen? Wenn dies so ist, dann handelt es sich um die Gränzen solcher Gebiete und um die Feststellung der Tiefe, bis zu welcher die Tange in den Ocean hineinreichen.

Quallen und die Wale. Man beobachte im Interesse der Meeresströmungen die treibenden Quallen, notire das Vorkommen der Wale, wenn möglich die einzelnen Gattungen scheidend. (Siehe Zoologie von Hartmann.)

Das Meeresleuchten ist einem Studium vom Standpunkte der Meeresströmungen, mit welchem es in einem noch zu vermittelnden Zusammenhange steht, zu empfehlen. Hierbei ist es wichtig die verschiedenen Arten des Leuchtens der See zu unterscheiden. Die Classification von Peak, welche in Nachfolgendem gegeben wird, sollte für diesen Zweck angewendet werden, nicht als ob dieselbe erschöpfend wäre für die Bezeichnung des hundertfältig modificirten Schauspiels, sie ist vielmehr nur als ein Versuch, dasselbe einheitlich zu beobachten und zu classificiren, anzusehen.

Nach Peak unterscheidet man folgende Arten:

- 1) Leuchtend, oder sehr leuchtend (luminous, very luminous)
- 2) Wie Wetterschein (sheet-like)
- 3) In grossen Flecken (in large-spots)
- 4) Glänzendes Aufblitzen (bright flashes).
- 5) Herrliches Schauspiel (glorious display).

Es sind besonders alle begleitenden Umstände mit den Beobachtungen über Meeresleuchten aufzuführen: Wind und Feuchtigkeit, Wellenschlag und Strömung. Ferner ist zu beobachten, wenn immer dies schöne Phänomen wahrgenommen wird, ob es an bestimmte Localitäten gebunden ist. Hat der Reisende ein Mikroskop und einige Uebung im Beobachten solcher Dinge, so kann er sofort wichtige Untersuchungen an den lebenden Thiergestalten anstellen; sonst sammle er Proben leuchtenden Wassers für die spätere Untersuchung. (Siehe Fritsch über Mikroskopische Untersuchungen auf Reisen.)

Beobachtung über Durchsichtigkeit und Farbe des Wassers sind dem Reisenden gleichfalls zu empfehlen, und wird er auf die Nothwendigkeit des Studiums solcher Werke, die sich besonders mit dieser Frage beschäftigen, aufmerksam gemacht. (Siehe Lorenz, Golf von Quarnero, p. 84—93). Die Tiefe, bei welcher weisse, im Meere versinkende Gegenstände dem Auge unsichtbar werden, ist anzugeben. Ueber das Aussehen, die Farbe der See mache er seine Bemerkungen. Welche Umstände wirken auf dies Aussehen ein? Entscheidet hier nur der Reflex des Himmels oder wirken auch noch andere Umstände auf die Farbe des Wassers bedingend ein? Es handelt sich natürlich hier nur um Beobachtungen in tiefem Wasser; das Durchleuchten des Bodens, sein Einfluss auf die Erscheinung des Wassers sind Dinge so vielfältiger Natur, dass sie hier nicht besprochen werden können, und ein Hinweis darauf genügen muss, um den Beobachter auch in dieser Richtung zur Thätigkeit anzuspornen.

V. Passagen und Routen zur See.

Aus den drei vorhergehenden Abschnitten (II—IV) lassen sich die Regeln für die Verwerthung der Lehren der wissenschaftlichen Hydrographie

zur Förderung des Weltverkehrs ableiten. Es erscheint in diesem Falle der Seefahrer, welchem die Navigirung eines Schiffes anvertraut ist, einerseits als diese Lehren zu seinem Vortheile ausbeutend, während er andererseits, gleich anderen wissenschaftlichen Reisenden, die Aufgabe hat, die Wissenschaft zu bereichern. Diese Aufgabe besteht vorzugsweise in der Prüfung, Vervollständigung und Schaffung von Segelhandbüchern (sailing directories), von Wind- und Stromkarten. Reisen zur See sind in den meisten Fällen durch die zu verfolgenden Ziele und Zwecke hinsichtlich der einzuschlagenden Route gegeben; nur bei wissenschaftlichen Reisen (Expeditionen) sind hierfür die denselben gestellten Aufgaben allein maassgebend. Bei Reisen des Weltverkehrs, welche zumeist zwischen gegebenen Punkten der Erde (Abgangs- und Bestimmungsort) eingeschlossen sind, handelt es sich zunächst darum, den nach Gestaltung der Länder und Meere möglichen, geometrisch kürzesten Weg durch den Ocean niederzulegen, sodann aber um die weitere Frage, in welchem Maasse und in welcher Weise die physikalischen Verhältnisse der zu durchreisenden Gegenden ein Verlassen desselben nothwendig oder rathsam erscheinen lassen. Hierbei kommt in Betracht, ob es sich um die Reise eines Dampfers, eines Segelschiffes mit Auxiliär-Dampfkraft oder eines Schiffes handelt, das nur auf seine Segelkraft allein angewiesen ist. Ein gründliches Studium der bereits vorhandenen Segelhandbücher, Wind- und Stromkarten, wie sie von den verschiedenen Nationen, welche sich auf diesem Gebiete bereits ausgezeichnet haben, herausgegeben wurden, ist zur erfolgreichen Lösung dieses Theiles der Aufgabe unerlässlich. Hat sich der Seefahrer über die Wahl seiner Route im allgemeinen schlüssig gemacht, so handelt es sich in zweiter Linie um das Studium der Einzelheiten mit Rücksicht auf Phänomene längs dieser Route; durch ein solches allein vermag er auf Alles das aufmerksam zu werden, was zum Nutzen oder Nachtheil der Reise gereichen kann, während er andererseits eine Einsicht in das erhält, was mit Beziehung auf Wind und Wetter, auf Barometerstand, auf Strömungen, auf Fauna, auf Treibprodukte u. s. w. zu beobachten ist. Der wahrhaft gebildete Seefahrer darf gemäss der angeführten Gesichtspunkte das Specialstudium einer Route nicht vernachlässigen; allein auch der Nichtseefahrer, der einzelne Reisende, vermag bei einer gründlichen Vorbereitung rücksichtlich der zu befolgenden Route zur See zur Hebung der oceanischen Wissenschaft Erhebliches zu leisten und sollte daher eine solche Vorbereitung, wenn ihm auch nicht die Pflege der praktischen Navigation obliegt, niemals vernachlässigen.

Im Interesse der praktischen Navigation ist es anzurathen, dass der Schiffsführer sich eine Einsicht in die Beziehungen zwischen Barometerstand und Windrichtung in den zu durchreisenden Gebieten des Oceans verschaffe, damit er eventuell im Stande sei, im Falle sich die klimatisch-meteorologischen Verhältnisse gegen Erwarten ungünstig erweisen sollten, andere und für seine Reise günstigere Gebiete aufzusuchen. Es wird mit Rücksicht gerade auf diesen Punkt auf das Studium der Arbeiten Maury's, Buys-Ballot's und Toynbee's aufmerksam gemacht und die Prüfung der in denselben niedergelegten Resultate empfohlen.

Man sei ferner bei dem Studium einer Route darauf bedacht, dass man nicht ältere Werke dazu benutze, sondern stets die neuesten; dies gilt mit Beziehung auf Segelhandbücher und besonders auch auf Karten und Kartenwerke, welche letztere die statistischen Ergebnisse der maritimen Meteorologie darstellen. Es ist die Beachtung dieses Umstandes schon um desswillen wichtig, weil die neueren Werke der bezeichneten Art nicht nur, wie dies

in den ersten Zeiten der Pflege unserer Wissenschaft unvermeidlich war, die Resultate der Arbeiten eines Instituts (Centralstelle für maritime Meteorologie) wiedergeben, sondern vielmehr in vielen Fällen die Ergebnisse der Forschungen mehrerer solcher Institute zusammenfassen, was begreiflicher Weise den Werth derselben beträchtlich erhöhen muss. Auch der fernere Umstand, dass in neuerer Zeit das zur Verwerthung kommende, reichlichere Material für kleinere Areale gegeben wird, wodurch die Zuverlässigkeit der gebotenen statistischen Resultate noch mehr erhöht werden muss, verdient eine Beachtung.

Es wird hier noch auf die, von verschiedenen Autoritäten herausgegebenen Routen- und Passage-Tabellen, in welchen die mittlere Dauer von Reisen über die ganze Erde niedergelegt sind, aufmerksam gemacht (In den Veröffentlichungen des Board of Trade, Sailor's pocket book von Capt. Bedford, Tabellen über Schnittpunkte von Maury und anderen); jedoch wird nur solchen Werken dieser Art eine Bedeutung beigelegt, bei deren Herstellung nachgewiesener Maassen nur Reisen zur Verwendung gelangten, welche bereits nach den neueren Grundsätzen der Navigation ausgeführt worden waren.

In diesem Abschnitt über Routen und Passagen und den auszuführenden Beobachtungen gehört auch noch die weitere Aufgabe der beständigen Controle der bereits veröffentlichten und im Gebrauche befindlichen Listen und Karten von angeblichen Untiefen und Gefahren (Vigia). Oft existiren solche Untiefen nur in der Einbildung und es ist Pflicht eines jeden Seefahrers, namentlich aber solcher, welchen die Führung von Vermessungsfahrzeugen anvertraut ist, zur Aufklärung nach dieser Richtung und nach Kräften beizutragen. Eine Entfernung angezeigter Untiefen von den Karten kann aber nur auf Grund der eingehendsten und gründlichsten Untersuchungen als gerechtfertigt erscheinen. Genaue astronomische Bestimmungen sind für die Entscheidung hierüber in erster Linie erforderlich, dann aber hat man sich auch durch das Werfen des Lothes, beispielsweise bis zur Tiefe von 2000 Meter, von dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer angegebenen Klippe, Bank u. s. w. zu überzeugen. Man merke vorzugsweise auch auf die Farbe des Wassers, auf die Veränderungen, die in derselben vorgehen und versäume nie durch eine gewissenhafte Wache alle hierauf Bezug habenden Umstände notiren zu lassen.

Aus den wenigen im Vorhergehenden gegebenen Andeutungen ergeben sich die Regeln und Vorschriften, welche beim Entwerfen von Segelhandbüchern zu beachten sind, von selbst; auch erhellt aus dem Gesagten zur Genüge, in welcher Weise der Reisende zur See für die Erhöhung des Werthes des Materials für die Auslegung der Routen zu wirken vermag. Der Schiffsführer, besonders der Commandant eines Kriegsfahrzeuges, sollte es sich stets beim Antritt einer Reise zur Pflicht machen nach Kräften zur Förderung der angeführten Ziele zu wirken und sich vergegenwärtigen, dass diese Förderung zur Kürzung der Seewege und zur Erhöhung der Sicherheit derselben führen muss.

Für den Hydrographen von Fach, welchem die Abfassung von Segelhandbüchern anvertraut ist, handelt es sich bei Besprechung bestimmter Routen vorzugsweise darum, die physikalischen Verhältnisse längs derselben, die Veränderungen derselben nach Jahreszeit und Ort in klarer und allgemein verständlicher Sprache darzulegen, so dass seine Auseinandersetzungen dem Seefahrer bei der Wahl seiner Route, die sich ja stets auch in Etwas nach den Qualitäten des Schiffes, nach Gattung der Ladung u. s. w.

richten muss, von Nutzen sein können. Das Eingehen in Einzelheiten, die sich auf specielle Fälle beziehen, sind bei der Ausführung dieser wichtigen Aufgabe zu vermeiden.

Alle Verbesserungen und Erweiterungen von solchen Werken, die die Sicherung und Kürzung der Seewege zum Gegenstande haben, müssen an der Hand gründlicher meteorologischer und hydrographischer Forschung ausgeführt werden und muss bei der Motivirung solcher besonders eine präcise und unzweideutige Ausdrucksweise zur Pflicht gemacht werden.

VI. Ansegeln von Land.

Nach einer längeren Reise, während welcher vielleicht wenig Gelegenheit gegeben war, Chronometer zu controliren, ist Vorsicht beim Ansegeln des Landes vor Allem geboten. Diese Vorsicht muss sich namentlich darin zeigen, dass alle Einzelheiten, welche die Küste, die angesegelt werden soll, betreffen, studirt, eingepägt und beachtet werden. Man merke auf die Leitmarken, ihre gegenseitige Lage und die Peilungen. Besonders sei man unterrichtet, ob Leuchthürme an der Küste sich befinden und wenn dies der Fall, welcher Gattung das Licht, welches auf demselben gezeigt wird, und namentlich wie gross der Leuchtkreis derselben ist. In der neueren Zeit wurden vielfach Nebelsignale eingeführt; die Nebeltrompeten, die Sirenen sind beim Ansegeln einer Küste während Nebel von grosser Bedeutung — deshalb sei man über die Einrichtung derselben unterrichtet, ebenso wie über die Weite der Verbreitung und Stärke des Schalles unter verschiedenen atmosphärischen Verhältnissen.

Die Erhebungen einer Küste über dem Ocean, die Gestaltung und die Beschaffenheit des Bodens unter dem Wasser — die Wassertiefen — sind zu beachten, nach Vertonungen die erstern, nach beständigen Lothungen und Grundproben die letztern. Beim Herannahen an die Küste ist es ferner rathsam, dass man sich über die Strömungen klar wird, d. h. dass man weiss, wo und wie man dieselben zu erwarten hat. Besonders achte man auf die Gezeiten, so dass man stets im Stande ist, wenn an der Küste die nöthigen Constanten bereits gegeben sind, die Zeit des Hoch- oder Niedrigwassers anzugeben — es ist dies wichtig, einmal für die genaue Angabe der Wassertiefen, wenn das Wasser flacher wird, während es andererseits unter Umständen, wenn das Fahrzeug auf Grund gerathen sollte, zur Lebensfrage werden kann.

Temperatur des Wassers und Farbe desselben geben beim Herannahen an eine Küste oft durch Aenderung eine Warnung — und ist dies besonders wichtig, wenn es sich um eine unbekannte Küste handelt. Sobald man dieselbe ansichtig wird, so beginne man mit der Beobachtung derselben; man suche die besonders charakteristischen Punkte auf und messe mit dem Sextanten von einem bestimmten Anfangspunkte aus, den man genau zu kennzeichnen hat, die horizontalen Winkel und ebenso die Höhen, nehme Peilungen und stelle Deckpeilungen fest, während man Vertonungen aufnimmt, in welchen man unter anderm auch Färbung des Landes, z. B. weisse Kreidestellen u. s. w., die in nebeligem Wetter hindurchschimmern und Marken abgeben können, angeben kann. — Ist man innerhalb der Sichtweite von Baken, Bojen, Leuchtschiffen und Thürmen, die sich auf der Küste etwa befinden, so achte man auf deren Erscheinen, auf die Peilungen und ihre gegenseitige Lage und mache sich darüber Notizen. Mit der Gestalt der Erhebungen gebe man auch, wenigstens im Allgemeinen den

Charakter der Vegetation an: sind die Ufer bewaldet oder kahl, hat man in den Niederungen bei der Annäherung an das Gestade Haideland oder Marschen in Sicht?

Die atmosphärischen Verhältnisse sind beim Ansegeln von maassgebender Bedeutung; besonders gilt dies von dem Grade der Durchsichtigkeit der Luft. Oft sieht die Küste aus, als läge sie noch in weiter Ferne, während man schon nahe dabei ist. Man denke nur an die Westküste von Afrika, die während der trockenen Jahreszeit stets in einen Schleier gehüllt ist.

Auch auf die Thierwelt achte man: der Zug vieler Vögel, z. B. der Pelikane an der Südküste Australiens, zeigt die Nähe des Landes an, während im Meere treibende Quallen und andere Thiere sich häufen.

Man behalte immer im Auge, dass es sich für den Hydrographen entweder darum handelt, neue Anweisungen für das Ansegeln einer Küste zu entwerfen oder die bestehenden zu prüfen und zu verbessern, dann werden die Beschreibungen klar und von Nutzen sein können, während andererseits auch die Naturkunde bereichert werden wird. Allein nicht nur der Hydrograph von Fach, sondern auch der wissenschaftliche Reisende vermag werthvolles Material für das Verständniss und die Navigation einer Küste zu sammeln.

Den von der Küste abliegenden Untiefen, Sandbänken, Riffen und der Kennzeichnung ihrer Lage, sowie ihrer Erscheinung, wende man besondere Aufmerksamkeit zu. Hier handelt es sich besonders darum, die Peilungen, womöglich Leitpeilungen (Deckpeilungen) anzugeben, durch welche man solche Gefahren vermeidet. Man sei in deren Angabe ganz besonders präcise und so klar, dass ein Irrthum nicht wohl stattfinden kann. Sind solche schon in Segelanweisungen niedergelegt, so ist gerade in diesem Falle eine Prüfung sehr erwünscht, weil oft Veränderungen in Gestalt und Umfang solcher Untiefen vor sich gehen, deren Feststellung dem Seemann von Bedeutung ist. Auch wenn es sich nicht um eine Vermessung handelt, ist es erforderlich, dass man Peilungen mit aller Sorgfalt nehme und dabei den Curs des Schiffes angebe, damit man die nach dem Compass gegebenen Richtungen später genauestens zu reduciren vermag. (Siehe den Abschnitt über Aufnahme am Bord, p. 667).

Es wurde schon hervorgehoben, dass man sich alle Information über Gezeiten und Gezeitenströmung zu verschaffen beziehungsweise festzustellen habe, wenn man eine Küste besucht. Dies gilt in gleichem Maasse von jeder physikalischen Eigenthümlichkeit, wie der Variation des Compasses, dem Verhalten des letztern in der Nähe der Küste, wenn sie aus vulcanischem, in den meisten Fällen die Magnetnadel beeinflussendem Gesteine besteht — dann auch von dem Stande des Barometers und seinen Oscillationen. Die meteorologischen Elemente und besonders auch die Temperatur und der Feuchtigkeitsgrad sind für Strahlenbrechung und Durchsichtigkeit der Atmosphäre von Wichtigkeit und sollen desshalb bei der Aufzeichnung der aufgenommenen Erscheinung einer Küste nicht vergessen werden. Oft kann eins oder das andere der genannten Momente zur Erkennung oder zur Kennzeichnung einer Küste von Belang sein.

Die Eigenthümlichkeit der Brandung, der Bewegung des Wassers beim Herannahen oder dem Anschlagen an die Küste sollten beschrieben werden, weil sie, wie aus dem Früheren erhellt, Schlüsse auf die Gestaltung des Bodens gestatten. Je nach den Eigenthümlichkeiten der Wasserbewegung wird sich auch die geologische plastische Erscheinung des Gestades gestalten. Es ist wichtig, dass man in der Beschreibung desselben mit Rücksicht

darauf präcise und wissenschaftlicher wie bisher verfahren. Die Wirkung des Wellenschlages auf die Ufer erzeugt oft höchst charakteristische Formen. So werden sich bei Steilküsten durch das Wasser Küstenplattformen und Küstenterrassen bilden, wie diese z. B. an der Ostküste Australiens wahrzunehmen sind, während auf Flachküsten häufig Aestuarien oder Fluthbecken entstehen, deren Scheidewände gegen das offene Meer an der Ostseeküste Nehrungen genannt werden. In der Verzeichnung und Beschreibung solcher Bildungen unterstütze man sich durch Skizzen und wenn irgend möglich auch durch Pläne.

Erhebt sich hinter der Küste ein hohes Land, das oft viel früher in Sicht kommt als das wirkliche Gestade, so erwähne man dies — gebe auch den Charakter der Formen der Höhenzüge an: sind dieselben scharf oder abgerundet, tragen sie mehr das Gepräge eines Plateaus, indem ihre Conturen horizontal sich gegen den Himmel abheben? Beim Herannahen an die Küste sehe man zu, dass man über die Bildung des Landes zwischen ihr und dem dahinter liegenden Hochlande sich Aufschluss verschaffe und achte namentlich darauf, wann dies Gestade zuerst sichtbar wird. In diesem Falle sind Deckpeilungen als leitende Merkmale für die Ansegelung von grossem Werthe. Längs solcher Leitmarken vergesse man die Lothungen und die Grundproben nicht! — Mit diesen zugleich sind Temperaturbeobachtungen des Wassers — an der Oberfläche und in der Tiefe — wichtig, zumal wenn man Untiefen vermuthet.

Mündet ein Fluss an der Küste von einiger Bedeutung, so wird sich dies schon auf Meilen Entfernung durch Aenderung (Trübung) der Farben des Wassers zumeist auch durch Aenderung der Temperatur zu erkennen geben. Die Beobachtung des Stromes ist in solchem Falle festzustellen — aber immer mit genauer Angabe der Zeit, damit man die Phase der Gezeiten dabei in Betracht ziehen kann.

Fjorde und Buchten geben sich schon dem einigermaassen geübten Auge des Seemanns durch die Gestaltung des umliegenden Terrains zu erkennen, wenigstens wenn dasselbe von einiger Erhebung über dem Wasser ist; ihre Aufnahme, eventuell ihre Beschreibung ist, da es sich hierin um Häfen und Ankerplätze handeln kann, für die Schifffahrt von Interesse und sollte nicht versäumt werden, wenn die Gelegenheit dazu gegeben.

Wie dies in genauer Weise geschehen kann, wird später in Kürze erörtert werden.

Handelt es sich um die Ansegelung eines unbekannten Landes, so wird man sich mit Vorsicht der Küste zu nähern haben — vielleicht ist das Herannahen unmöglich — alsdann suche man sich mittelst Ferngläser zu versichern, ob an der Küste Wohnungen von Menschen vorhanden und welcher Art dieselben sind — ob sie einigermaassen höhere Bildungsstufe verrathen oder ob sie so primitiv sind, dass man mit einiger Gewissheit den Urzustand der Bevölkerung annehmen kann.

Aus der Lage der Hütten — Wohnungsplätze — aus der Richtung der Bäume kann man sich, geleitet von einer allgemeinen Kenntniss des Windsystems, in welchem eine Küste, eine Inselgruppe liegt — eine Vorstellung von der vorherrschenden Windrichtung bilden, die bei einiger Uebung nicht weit von der Wirklichkeit sein wird. Sollen Segelanweisungen für eine Bucht, eine Flussmündung geschrieben werden, so führe man solche Wahrnehmungen an und wenn es die genaue Kenntniss der Beschaffenheit des Fahrwassers gestattet, so kann man durch Anführen des Buges, auf

welchem man Ein- und Aussegeln soll, die Schifffahrt nach solchen Gegenden wesentlich unterstützen.

Ist die fragliche Küste von einem Culturvolke bewohnt, bei welchem man die Möglichkeit genauerer hydrographischer Erhebungen voraussetzen kann, so sammle man an betreffendem Material, was immer zu erlangen ist. Wie hierbei Kritik geübt werden soll, werden wir in einem spätern Abschnitte auseinandersetzen.

VII. Aufnahmen und Beobachtungen an Bord.

Die Aufnahmen an Bord tragen im Vergleiche zu jenen am Lande, von welchen wir im nächsten Abschnitte zu sprechen haben werden, einen flüchtigeren und weniger strengen Charakter, wie dies in der Natur der Sache, in dem ewig bewegten Elemente, auf dem sie ausgeführt werden, begründet liegt. Allein auch die an Bord eines Schiffes ausgeführten Beobachtungen und Messungen sind einer beträchtlichen Genauigkeit fähig, wenn dabei nur die erforderliche Umsicht und eine zweckentsprechende Anordnung der Beobachtungen in Anwendung kommen. Beide lassen sich nur durch Uebung und Erfahrung erwerben und können in einer Abhandlung von dem beschränkten Umfange der unseren nur in den Grundzügen gekennzeichnet werden.

Nachdem bereits in einem früheren Abschnitte von den Strömungsverhältnissen, von den Bezeichnungen, wie sie bei Strömen und den mit ihnen verwandten Bewegungen des Wassers vorkommen, die Rede war, folgen nun zunächst in weiterer Ausführung einige hydrographische Erklärungen und Bezeichnungen. Um das Verständniß derselben zu erleichtern und gleichzeitig die Darstellungsweise hydrographischer Aufnahmen in Karten zu erläutern, sind zwei Blätter hier beigegeben, wovon das eine, von Herrn L. Friederichsen in Hamburg ausgeführte als Vorlageblatt für hydrographische Darstellung dienen kann (siehe Karte zur Illustration Hydrographischen Zeichnens), während das andere einige, bei Vermessungen an Bord anzuwendende Bezeichnungen von Linien, Punkten, Winkeln u. s. w. enthält. Ueberdies wird auf das von der kaiserl. Admiralität herausgegebene Blatt hydrographischer Bezeichnungen, wie ähnliche von den hydrographischen Aemtern der meisten Nationen veröffentlicht wurden, zu welchem die vorigen, auf dem letztgenannten Blatte dieses Werkes gegebenen als Ergänzungen und Vervollständigungen dienen mögen, hingewiesen.

Unter den hydrographischen Bezeichnungen, welche bei Aufnahmen vielfach in Anwendung kommen, nehmen jene, die sich auf die Wasserstände beziehen, eine hervorragende Stelle ein und sollen dieselben desshalb hier des Näheren definirt werden, indem dabei auf den Artikel „Peters über Ebbe- und Fluthbeobachtungen“ verwiesen wird. Die auf S. 647 stehende Figur stellt eine Pegelvorrichtung vor, von welcher sogleich gesprochen werden wird; für jetzt interessiren uns zum Zwecke der genannten Erklärungen die in derselben angedeuteten Linien für den Wasserstand, welche in folgender Weise bezeichnet werden:

a bezeichnet den mittleren Wasserstand bei Hochwasser gewöhnlicher Springzeit,

b den mittleren Wasserstand bei Hochwasser gewöhnlicher Nippzeit,

c die halbe Gezeit oder den mittleren Wasserstand des Meeres bei Spring- und Nippzeit,

d den mittleren Wasserstand bei niedrigem Wasser gewöhnlicher Nippzeit,

e den mittleren Wasserstand bei niedrigem Wasser gewöhnlicher Springzeit.

Daraus ergibt sich, dass z. B. von e bis a die Springfluthhöhe, von d bis b die Nippfluthhöhe u. s. w. ist. Es wird zur vollkommenen Erklärung der verschiedenen hierher gehörigen Ausdrücke auf den Artikel über Ebbe- und Fluth-Beobachtungen von Peters (p. 82) verwiesen.

Für Vermessungen ist das Minimum der Niedrigwasserhöhe oder der mittlere niedrige Wasserstand bei gewöhnlicher Springzeit insofern von Bedeutung, als die Lothungen auf diesen Wasserstand reducirt werden, wenn das betreffende Gewässer den Gezeiten unterworfen ist. Erhebungen über dem Meere werden in solchem Falle auf Hochwasser bezogen, während Erhebungen, wie Lothungen auf den mittleren Wasserstand reduziert werden, wenn Gezeiten nicht vorhanden sind.

Zu Zwecken der Durchführung einer solchen Reduction bedarf es der Ablesung des Wasserstandes an einem Pegel, welcher so errichtet sein sollte, dass eine locale Beeinflussung der Wasserstände nicht stattfinden kann, d. h. es muss derselbe möglichst unter demselben Verhältnisse mit Rücksicht auf das Gezeitenphänomen sich befinden, wie das abzulothende Areal. Um diese Bedingung erfüllen zu können wird es in vielen Fällen nothwendig sein, den Pegel so weit vom Lande ab zu errichten, dass nur ein Ablesen mittelst eines Fernrohres oder auf einem Boote möglich ist.

Durch eine vorläufige Beobachtung hat man die ungefähre Lage der oben bezeichneten Wasserstände am Pegel zu ermitteln und den Nullpunkt

bei der definitiven Feststellung so zu legen, dass er noch unterhalb des niedrigsten Wassers der Aequinoctial-Springzeit zu liegen kommt.

Wenn es irgend möglich ist, so sollte man da, wo es sich um Vermessungen im Meere handelt, die mit Bezug auf das Gezeitenphänomen noch wenig untersucht wurden, zwei Pegel neben einander errichten; nach dem einen werden nur die höchsten und niedrigsten Wasserstände abgelesen und notirt, während der andere regelmässig und in kleineren Zeiträumen (von 10 zu 10 oder von 30 zu 30 Minuten) Tag und Nacht abgelesen wird. Die Resultate der Beobachtungen werden alsdann in besonderen Journalen mit allen begleitenden Umständen eingetragen (siehe Anhang Nr. 8).

In dem Artikel dieses Werkes über Ebbe- und Fluthbeobachtungen (p. 92 u. folg.) findet sich eine Anzahl verschiedener Fluthmesser aufgezählt und beschrieben. Dieselben sind aber sämmtlich für genauere Beobachtungen an festen Beobachtungsarten berechnet, und es wird daher im Nachfolgenden ein Pegel beschrieben, welcher sich für die Zwecke von Vermessungen (Reisezwecke) sehr wohl eignet. Derselbe hat die Construction, welche in den Vereinigten Staaten Amerika's bei Vermessungen angewendet wird, und bietet den Vortheil, dass der zur Ablesung bestimmte Index stets gleich hoch über dem Wasser sich befindet, was in Fällen, in welchen vom Boote aus abgelesen werden muss, von Wichtigkeit ist.

Die vorstehende Skizze genügt um ein Bild der Einrichtung zu geben. $A B$ ist das Standrohr, welches bei m, m', n und n' mit dem Meere in Verbindung steht; P ist ein durchbohrter Schwimmer, an welchem mittelst eines Hakens z das Tau oder die Kette befestigt ist. Die Kette geht über die Rolle f durch den Schwimmer (ohne denselben zu berühren) hindurch über die Rollen f' und r zu dem Index bei J , welcher an der Theilung op auf und ab sich bewegt und von der jeweiligen Wasserlinie gleich weit entfernt bleibt. Man kann den Pegel entweder aus Holz in einfachster oder auch aus Zinkblech in einer vollkommeneren Weise herstellen. Ueber Aufstellung ist es kaum nöthig zu dem, was über Pegelaufstellung bereits im Allgemeinen gesagt wurde, Weiteres hinzuzufügen, da sich dieselbe nach örtlichen Umständen richten muss.

Wie schon erwähnt, werden Lothungen in einem von Gezeiten beeinflussten Gebiete auf mittleren Niedrigwasserstand zur Springzeit reducirt. Man kann sich dieses Niveau's schon versichern, indem man das Mittel aus drei oder vier auf einander folgenden Niedrigwasser zur Springzeit nimmt. Ermittelt man den mittleren Wasserstand (halbe Gezeit), so ist die Differenz zwischen diesem und dem bezeichneten Reductions-Niveau festzustellen und damit die Niedrigwasser-Marke des Hafens, der Bucht u. s. w. unter die mittlere Wassermarke in einer klaren und haltbaren Weise auf einen unveränderlichen, Beschädigungen nicht ausgesetzten Felsen oder einer Mauer u. s. w. einzutragen. Mit dieser Grösse und der bekannten täglichen Höhe der Fluth können die zu irgend einer Tageszeit ausgeführten Lothungen reducirt und unter sich vergleichbar gemacht werden. Es ist hierfür nothwendig, dass die Uhrzeiten nach mittlerer Zeit und so genau als möglich bekannt sind (innerhalb 10 oder 15 Secunden).

Im „Manual of scientific enquiry“ wird in der 4. Ausg. p. 33 folgende Formel für die Reduction der Lothungen gegeben:

$R + r \cdot \cos \left(\frac{t}{D} \cdot 180^\circ \right)$, worin R die Niedrigwasser-Marke für die Karte, r die Fluthhöhe über dem mittleren Wasserstande an dem Beobachtungstage,

D die Dauer der betreffenden Gezeit, t die mittlere Zeit, verflossen seit des letzten Hochwassers, ist.

Diese und eine andere Reductionsmethode, welche mittelst der gewöhnlichen Curstafeln ausgeführt wird, geben immer nur Annäherungswerthe und sind Correctionen, welche aus gleichzeitigen Ablesungen an einem Pegel abgeleitet werden, denselben vorzuziehen. Uebereinstimmung der Uhren, die zu den Lothungen und zu den Pegelablesungen gebraucht werden, und normale Aufstellung des Pegels sind hierfür unerlässliche Bedingungen.

Es ist bei Ausführung von Gezeitenbeobachtungen rathsam die Zeiten des Hoch- und Niedrigwasser mit der Declination des Mondes zusammen zu notiren, damit man etwaige Unregelmässigkeiten im Verlaufe der Phänomene beachten kann, um darnach seine Methoden der Untersuchungen einzurichten.

Ausser diesen am Lande und mit fester Aufstellung ausgeführten Beobachtungen über Höhe und Zeit der Gezeiten sind auch die Beobachtungen über Strom, Stromrichtung und Stärke von einem verankerten Boote oder von Bord eines vor Anker liegenden Schiffes auszuführen. Von Interesse sind hierbei Ströme an der Oberfläche, sodann namentlich auch die Richtung des Stromes in der Tiefe, die Zeit des todtten Wassers und das Umschlagen des Stromes. In diesem Falle ist es auch wünschenswerth von Bord aus das Sinken und Steigen des Wassers durch Festlegen einer Leine mittelst eines Senkbleies auf dem Grunde zu messen. Man hat darauf zu achten, dass die Leine immer senkrecht auf und nieder gehalten wird. Vergleichen von so angestellten Messungen mit Pegelablesungen am Lande sind instructiv für die Beurtheilung der Zuverlässigkeit der Reduction auf einen Normalstand. In allen Fällen, wo Gezeitenbeobachtungen an Bord eines Schiffes gemacht werden, hat man besonders darauf zu achten, dass man in der That vom Boden aus die Messungen macht und dieselbe von der Auf- und Abbewegung des Schiffes nicht influirt wird. Dies ist unter anderem von Wichtigkeit, wenn die Beobachtungen im Eise angestellt werden.

Stromrichtungen werden für diese Zwecke am Vortheilhaftesten mittelst des Irminger'schen Stromindicators bestimmt. Die besten Arbeiten dieser Art sind von Beechey im Irischen und Englischen Kanal und in der Nordsee ausgeführt worden. (Siehe Literatur über Gezeiten, p. 105.)

Innerhalb des Gebietes der Gezeiten hat man es vorzugsweise zu thun mit:

Sandbänken, deren Umfang, Annäherung, Notizen über eventuelle Veränderlichkeit, über Lage zu den einzelnen Wasserständen nach den Gezeiten genauestens gegeben sein müssen. Fallen dieselben zeitweise trocken oder sind sie stets bedeckt? Hängen sie zungenförmig mit dem Festlande zusammen oder sind sie vollkommen getrennt, vielleicht parallel zur Küste laufend? Die Barre der Flüsse gehört hierher, ihre Ausdehnung und der Wasserstand nach den verschiedenen Phasen der Gezeiten. Ist die Barre überall gleich tief oder bietet sie Rinnen und Durchfahrten; verschiebt sie ihre Lage? Ist ein Flussdelta gebildet und wie sind dessen Verhältnisse zum Wasserstande und den Gezeiten?

Ist das Ufer steil abfallend, so wird man möglicherweise mit Felsen und Riffen zu thun haben. Es fragt sich in diesem Falle gleichfalls, ob solche, wenn sie vorhanden sind, im Wasserspiegel liegen und bei welchem Wasserstande, ob sie stets bedeckt sind, auch bei der niedrigsten Wassertiefe, oder ob sie zeitweise trocken fallen.

Sind dieselben mit dem Festlande und in Reihen zusammenhängend oder vollkommen detachirt und vielleicht gruppenweise herumliegend?

Wenn die Küste vulcanischer Natur ist, so ist es möglich, dass in den Riffen durch Hebungen und Senkungen, — durch vulcanische Ausbrüche, Veränderungen vorgehen. Man erkundige sich bei der Bevölkerung, wenn solche vorhanden, — ob man derartige Veränderungen wahrgenommen und ob darüber Traditionen bestehen.

Beim Ablothen der Riffe verfare man mit Genauigkeit und Umsicht, damit die anzufertigende Karte dem Seemann wirklich von Vortheil sein kann.

Ganz besondere Beachtung verdienen die Korallenriffe. Da dieselben zumeist steil vom Boden, auf dem sie ruhen, aufsteigen, so zeigt das Loth selten das Herannahen an dieselben an. Es ist daher in sofern grosse Vorsicht nothwendig, während andererseits die Korallenbänke oder Riffe nicht über die Oberfläche des Wassers hervorragen, sondern meistentheils nur bis zu dieser hinan. Hier ist es vorzugsweise die Prüfung ihrer Stellung, die uns beschäftigen sollte. Sind es Küsten- oder Fransenriffe, welche sich unmittelbar an das Festland oder die Inseln anschliessen? Bei diesen Riffen ist zu prüfen, welchen Einfluss die Mündung von Flüssen auf deren Wachsthum ausübt. (Siehe Richthofen p. 299.)

Die Damm- oder Wallriffe sind meistentheils durch breite Canäle vom Festland oder der Insel, mit deren Küste sie parallel ziehen, getrennt. Es sind zwischen diesen hindurch Durchfahrten, Passagen, die der mit der Aufnahme Beschäftigte aufzunehmen und in der Karte niederzulegen hat. Innerhalb derselben sind meistentheils gute Ankerplätze und wegen des stillen Wassers gute Häfen.

Als Typus der ganzen Classe von Wallriffen kann das Great Australian Barrier reef um das nordöstliche Australien angesehen werden; die Lagunen oder Atolls sind die in sich selbst schliessenden Riffe, die meistentheils nur ganz niedere Inseln bilden und deren Aufnahme und genaue Niederlage in den Karten mit manchen Schwierigkeiten verknüpft ist. Auch hier sind Passagen durch die Riffe zu suchen und niederzulegen.

Bei allen Koralleninseln ist es von Werth Proben des Gesteins, worauf dieselben sitzen und ebenso von den Korallen selbst zu erhalten. Ferner sollten genauestens ihre Beziehungen zu den Gezeiten bestimmt werden; hierbei tritt der früher erwähnte Fall ein, dass man den für die Reduction bestimmten Pegel in einiger Entfernung vom Ufer (ausserhalb der durch die Riffe gebildeten Dämme) errichten muss, um von localen Einflüssen frei zu werden. Man hat sich durch Sondirungen bei den verschiedenen Formen von Korallenbildung, von der Art und Weise ihrer Entstehung ein möglichst klares Bild zu machen, wodurch auch die Frage, ob mit deren Entstehung vulcanische Thätigkeit verknüpft ist, beleuchtet wird.

Die Wirkung der Brandung auf die Küste, welcher Art sie auch sein möge, muss Gegenstand der Beobachtung sein und ist es namentlich wesentlich, dass in der Beurtheilung der Erscheinungen die geologische Forschung mit eingreift und den hydrographischen Reisenden wird daher auch das Studium des Abschnittes über Geologie p. 290—307 d. Werkes anempfohlen.

Welcher Natur auch die Küstenbildung sei, stets muss die Aufnahme so ausgeführt werden, dass sich daraus die Conturen, die Gestaltung der Vorgebirge, der Einbuchtungen, das Zurücktreten der Küste, Küstenplateaus u. s. w. darstellen lassen.

Die Aufnahme und Klarlegung der Verhältnisse unter dem Wasserspiegel — die Darstellung des Bodens nach Höhen und Tiefen, sowie die Untersuchungen über seine Bestandtheile, seine Beschaffenheit bilden einen

wichtigen Theil der Aufgabe des mit Vermessungen beauftragten Seeoffiziers. Man stelle sich im Allgemeinen die Frage hierbei ähnlich, wie mit Beziehung auf die Erhebungen über dem Hochwasser, d. h. man bestrebe sich, die Bodengestaltung im Schichtencurven darzustellen. Auf diese Weise erhält man von derselben das klarste Bild. In der diesem Buche beigegebenen Karte hydrographischen Zeichnens finden wir die Tiefencurven in Metern eingetragen und es wären nur die einzelnen Schichten zu coloriren mit hellerem und dunklerem Tone, um auf den ersten Blick ein Bild über die Bodenverhältnisse zu geben. Um ein genügendes Material für das Entwerfen einer Karte nach diesem Principe zu erhalten, müssen die Lothungen ziemlich dicht auf einander folgend vorgenommen werden; es schliesst dies nicht aus, dass das Eintragen der Lothungen in die Karte beschränkt werde. Auch über die Anordnung der Lothungen, über die Weise, wie die aufeinanderfolgenden zu einander gelagert sein sollen, lässt sich allgemein nur wenig sagen, es richtet sich dies nach der Gestaltung des Bodens und den örtlichen Verhältnissen mit Beziehung auf Peilungsobjecte. Hat man beispielsweise eine Kuppe auf dem Meeresgrunde zu sondiren, so werden die einzelnen Lothungen am vortheilhaftesten sternförmig — von der Mitte derselben ausgehend — angeordnet. Hat man schon im Voraus über die allgemeine Gestaltung des Bodens eines Hafens, einer Bucht u. s. w. einige Anhalte, so thut man daher wohl daran, sich vorher einen Lothungsplan zu entwerfen, der, wenn er unter Berücksichtigung aller die Arbeit beeinflussenden Verhältnisse entworfen wurde, wesentlich die correcte Aufnahme erleichtert. Bei Neuaufnahmen ist es nicht möglich, in so systematischer Weise zu verfahren, man hilft sich alsdann dadurch, dass man, wenn die hauptsächlichsten Lothungen ausgeführt sind, je nach Bedürfniss Nachlothungen, Ausfüllungen im Detail vornimmt. Die letztern tragen mehr den Charakter von Revisionslothungen bei schon ausgeführten Vermessungen, indem man sich durch das besondere Interesse, welches sich an ein Gebiet knüpft, leiten lässt. Findet man z. B., dass sich Tiefe und Charakter der Bodengestaltung rasch ändern, so muss man die Lothungen vermehren; während man im entgegengesetzten Falle mit einer geringen Anzahl ausreicht.

Lothung in Flach-Wasser müssen für eine jede Vermessung Gegenstand besonderer Instructionen sein und kann um desswillen hier darauf nicht näher eingegangen werden. Wir verweisen mit Bezug darauf beispielsweise auf die „Instructions for nautical surveyors“ U. S. p. 47—50.

Sowohl hinsichtlich der Sicherheit der Navigation, als auch mit Rücksicht auf Haltbarkeit des Ankergrundes u. s. w. ist die Beschaffenheit des Meeresbodens an einer Küste, in Strassen, Buchten und Häfen ein wichtiger Leitstern für den Seemann. Es ist daher bei dem Anfertigen von Karten erforderlich, dass die Resultate der Untersuchungen in dieselben in klarer und leicht verständlicher Weise eingetragen werden. Die verschiedenen, jetzt noch gebräuchlichen Gattungen von Bodenarten und deren Bezeichnung sind zu bekannt, als dass sie hier des Näheren charakterisirt zu werden brauchten. Es lässt sich über diese Eintheilung nur soviel sagen, dass sie einer strengen Grundlage entbehrt und dass, würde eine solche geschaffen, der Navigation und auch der Wissenschaft ein wesentlicher Dienst geleistet werden würde.

Die Durchsichtigkeit (Diaphanität) des Meeres, das Durchscheinen des Meeresbodens unterstützt oft wesentlich die Ausführung dieses Theiles einer Aufnahme. Allein abgesehen davon, ist dieselbe zu notiren, da sie oft schon auf beträchtliche Entfernung dem anmerksamen Seemann Klippen und

Untiefen, die unter Wasser liegen, erkennen lässt. In Fällen, wo die Durchsichtigkeit des Meerwassers die Erkennung der Vegetation auf dem Meeresboden gestattet, kann man über dieselbe, sowie selbst über die Fauna in der Tiefe, Aufschlüsse erlangen, die ohne dieselben nicht zu erhalten wären.

Die Aufnahme der physischen Gestaltung einer Küste wäre nicht vollständig, wenn nicht in derselben auch den sich in das Meer ergießenden Flüssen, soweit sie der Ebbe und Fluth unterworfen, salzig sind, eine Beachtung zugewendet würde. Es wurde bereits von der Barre gesprochen und auf deren genaue Untersuchung und Aufnahme Gewicht gelegt — aber auch Breite und Tiefe der Flüsse, ihre Uferbildungen — das Inundationsgebiet, Geschwindigkeit des Wassers, Gefälle sind für den mit Vermessungen beauftragten Seeofficier Gegenstände von Interesse und sollten deshalb beachtet werden. In der richtigen Beleuchtung einer oder der andern der genannten hydrographischen Elemente liegt häufig der Schlüssel zur Erklärung von Gesundheitsverhältnissen in einem Litorale. Hier ist auch die Stelle um auf die Beobachtung jener merkwürdigen Wasseranschwellung in manchen Flussmündungen aufmerksam zu machen, welche unter dem Namen „Stürmer“ (Bore) bekannt ist. Wie ist da, wo diese Erscheinung, besonders zur Springzeit, auftritt, die Gestaltung der Mündung; sind Felsen, Bänke oder eine Barre vorhanden? Man notire Zeit, Höhe, Schnelligkeit u. s. w., wenn man Gelegenheit hat, dieselbe zu beobachten und achte namentlich auch auf die Lage und das Verhalten der Untiefen während der Erscheinung.

Oft staut sich durch heftige Regengüsse (namentlich in Gebieten, welche eine Regenzeit haben) das frische Wasser in Flüssen an und erhöht selbst die Tiefe des Wassers über einer Barre, wenn eine solche vorhanden ist. Auch hier hat man die Localitäten genauer zu beschreiben, die Veränderungen in der Wassertiefe und die Zeiten des Vorkommens anzugeben.

Ueber das Vorkommen des „Stürmer“ sowohl, wie über jenes der Wasserstauung sammle man Notizen von den Bewohnern der betreffenden Flussmündung, wenn immer dies möglich ist.

Geometrische Aufnahme. Es wurde schon bei der Besprechung der Regeln für das Ansegeln von Land darauf aufmerksam gemacht, wie eine jede Eigenthümlichkeit desselben zu notiren ist. Alles das dort Gesagte gilt auch für die Vermessung, das Aufnehmen eines Küstenstriches oder einer Inselgruppe: jede Felskuppe, jede eigenthümliche Zerklüftung des Terrains, jedes Vorgebirge und die gegenseitige Lagerung solcher Objecte müssen verzeichnet werden, damit man sie bei den Vermessungen gebrauchen könne. Je mehr Punkte man zu unterscheiden vermag, so dass man sie stets wieder erkennt, desto günstiger ist dies für die Operation, da es nicht immer, ja wohl nur in seltenen Fällen, bei der Aufnahme unvermessener Küsten möglich sein wird, die einzelnen Punkte derselben durch Signale zu kennzeichnen.

Bei der Durchführung einer Vermessung von Bord aus achte man stets auf die während der Fahrt erfolgende Veränderung der Gestaltung der Objecte, damit man im Stande ist, die einzelnen Punkte in verschiedenen Stellen der Basis, die man sich zur geometrischen Aufnahme zu wählen hat, zu identificiren. Mit Rücksicht auf diesen Punkt wird auf den Artikel Kiepert's über flüchtige Aufnahme verwiesen und die in demselben gegebenen Winke *mutatis mutandis* der Beachtung empfohlen. Wir fügen hier hinzu, indem auf die flüchtige Kartenskizze sowohl als wie auch auf die Skizze einer Aufnahme unter Land Seite 654 aufmerksam gemacht wird, dass man die einzelnen Linien, ob zu trigonometrischen Bestimmungen dienend, ob eine Curslinie darstellend,

in der in der letzten angedeuteten Weise unterscheiden sollte. Eine systematische Bezeichnung der Linien, Punkte u. s. w. ist bei Arbeiten dieser Art unerlässlich. Man markire besonders auch die astronomisch bestimmten Punkte und versäume nicht, sich jeden Abend über das Ausgeführte durch umfassende Notizen klar zu werden und Irrthümern vorzubeugen. Dem Gedächtnisse darf man durchaus nicht trauen.

Messen einer Basis. Diese Operation, ohne welche eine Aufnahme überhaupt nicht gedacht werden kann, ist in dem vorliegenden Falle mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Längs einer Küste, die aufgenommen werden soll, segelnd, wird es nur selten möglich sein, von Einer Basis oder Standlinie aus die Aufnahme auszuführen; es wird vielmehr in den meisten Fällen erforderlich werden, eine Anzahl längerer gemessener Distanzen auf eine Hauptbasis zu reduciren und die Messungen als von diesen Curs ausgehend zu behandeln, sie darauf zu beziehen. Bei solchen flüchtigen Aufnahmen ist man zur Erlangung einer Basis auf den gesegelten Curs und die zurückgelegte Distanz hingewiesen und es ist daher bei der Bestimmung beider die grösste Sorgfalt anzuwenden. Man achte genau, auf das Steuern und das Log und controlire die daraus abgeleiteten Positionen so häufig als möglich. Wenn die Curslinie (Basis) nahe in der Richtung des Meridians liegt, so übe man diese Controle durch sorgfältige Breitenbestimmungen; liegt sie in der Richtung eines Breitenparallels, so kann man durch genaues und mehrmaliges Messen von Meridiandistanzen, namentlich wenn eine grössere Anzahl von Chronometern dazu verwendet werden kann, die aus Steuern und Logge abgeleiteten Positionen controliren und eventuell corrigiren. Die zu solchen Zwecken verwendeten Apparate müssen häufig auf ihre Genauigkeit geprüft werden — vorzugsweise hat man aber darauf zu achten, dass der Compass, nach welchem der Curs und die Peilungen beobachtet werden, in seinen magnetischen Eigenschaften gekannt ist. Hat man auf der Curslinie, welche zur Basis für die Vermessungen dient, eine Stelle erreicht, die durch Deckpeilungen bestimmt werden kann, vielleicht auch durch gute astronomische Bestimmungen, so nehme man den Cyclus von Peilungen in der Weise vor, dass gut identificirte Objecte, welche die Configuration des Landes, seine Conturen bestimmen, anvisirt werden. Man schreibe Peilungen und mit dem Sextanten gemessene Winkel ein, markire die Deckpeilung, nehme eine Vertonung auf und messe Höhenwinkel. Wünschenswerth ist es auch, dass man an solchen Punkten die Distanz gut zu identificirender Objecte von einem Sonnenrande messe, um daraus das Azimut ableiten zu können (siehe Skizze und die Bezeichnungen der Linien, Punkte u. s. w.).

Handelt es sich um die Aufnahme einer längeren Küstenlinie, so reihen sich die einzelnen Curslinien und gemessenen Distanzen aneinander und man trage in dem Journale Sorge dafür, dass man dieselben in der Folge ohne Schwierigkeiten unter einander verbinden und aus den Aufnahmen, Peilungen, Vertonungen eine zusammenhängende Darstellung der Küstenlinie ableiten kann. Es lassen sich für die Wahl der Anhaltspunkte, für die Längen einzelner Strecken keine allgemeinen Regeln geben, indem dieselben von der Gestalt und den Höhenverhältnissen der Küste und von der Möglichkeit, dem Lande nahe zu kommen, allzusehr abhängig sind. Wichtig ist aber stets in erster Linie, dass man die zur Aufnahme gewählten Punkte auch in den verschiedenen Positionen zu identificiren vermag.

Bei den Vermessungen an Bord kommen vorzugsweise Reflexionsinstrumente und Compassee zur Anwendung. Zum Peilen und Steuern bedient man sich des Regelcompasses, dessen Deviation und sonstigen

Fehler (Prismafehler, Collimation der Rose) genauestens bestimmt sein müssen. Gleichzeitig mit der Peilung notire man den Curs, damit die Reduction später strenge durchgeführt werden kann. Es ist darauf zu achten, dass die Deviation des Regelcompasses, wenn er zu Vermessungszwecken benutzt werden soll, einige Grade nicht übersteige. Sollte man auf einem eisernen Schiffe, oder auf einem hölzernen Schiffe mit eisernen Deckbalken genauere Peilungen zu nehmen wünschen, so hat man mit den Peilungen auch den Krüngungsbetrag für Deviation einzutragen, damit man in der Folge auch die Correction für Krüngung an die Peilung anbringen kann. Uebrigens ist es nicht zu empfehlen, solche Schiffe zu Vermessungszwecken zu verwenden.

Deviationsbestimmungen sind so oft als möglich auszuführen, um die Reductionsformeln daraus ableiten zu können (siehe magnetische Beobachtungen p. 667).

Stromwirkung und Abtrift beobachte man gewissenhaft und bringe sie bei der Reduction einer Basis in Anwendung. Allen Anforderungen an die tüchtige Navigirung eines Schiffes müssen da, wo es sich um Vermessungszwecke handelt, noch in erhöhtem Maasse gestellt werden.

Dampfer, bei welchen man die Fahrt genauer reguliren kann, eignen sich unter strenger Beobachtung der dargelegten Grundzüge besonders zu Aufnahmen und Vermessungen.

Oft vermag man eine kürzere Basis, etwa zwischen einem Schiffe und einem Boote oder einem Punkte am Lande durch den Schall zu messen. Messungen dieser Art sind übrigens nur unter günstigen atmosphärischen Verhältnissen auszuführen und sollte die Luft namentlich sehr ruhig sein. Die Berücksichtigung von Windstärke und Richtung bei den Reductionen der Basis, wie dies in Vorschlag gebracht wird (siehe Laughton naut. surveying p. 48 u. 49) bietet keine wesentlichen Vortheile, wegen der Ungenauigkeit der Messungen der Windstärke und Richtung. Diese Bestimmungen bei günstigem Winde und bei Gegenwind auszuführen, um daraus den Einfluss des Windes auf die Schallgeschwindigkeit ableiten beziehungsweise eliminiren zu können, dürfte sich in der Praxis selten ausführen lassen.

Die Fortpflanzung des Schalles hängt von der Temperatur, der Feuchtigkeit und der Schwere der Luft ab und hat man daher diese Elemente bei der Messung einer Basis durch Schall zu berücksichtigen. Bei trockner Luft im Normalzustande hat man für die Schnelligkeit des Schalles in einer Secunde 332.25 Meter angenommen. Nennet man diese Grösse V_0 , während die gesuchte Geschwindigkeit mit V bezeichnet wird, so hat man:

$$V = V_0 \sqrt{\frac{760(1 + \gamma t)}{b - \epsilon e}}, \text{ wo } \epsilon \text{ und } \gamma \text{ Coefficienten für Dampfspannung}$$

und Temperatur sind. t und e sind die mit dem Thermometer und Psychrometer ermittelten Temperaturen in Celsiusgraden und Dampfspannung in Millimeter; b ist der Barometerstand in Millimeter. Die constanten Coefficienten sind: $\epsilon = 0.3779$ und $\gamma = 0.003665$.

Hat man V ermittelt, so wird diese Grösse nur mit dem Intervall in Secunden zwischen der Wahrnehmung gleichzeitiger abgegebener Licht- und Schallsignale multiplicirt, um die Entfernung der Stationen von einander, die Basislänge, zu erhalten.

Es wird sich auch häufig die Gelegenheit bieten, aus Schallbeobachtungen längs einer gut gemessenen Basis die Schallschnelligkeit zu bestimmen. Dies sollte, wie sich aus dem Obigen ergibt, unter Berücksichtigung aller beeinflussenden Umstände geschehen.

Hat man sich auf eine oder die andere Weise eine zuverlässige Basis für die Aufnahme abgeleitet, hat man in den einzelnen Punkten eine genügende Anzahl Winkel zwischen Objecten gemessen und Deckpeilungen verzeichnet, so vermag man eine Skizze der Aufnahme, Conturen und Vertonungen der Küste auszuführen, wobei man dafür Sorge zu tragen hat, dass das Vermessungsjournal über alle Punkte klaren und bestimmten Aufschluss enthält. Die Resultate der Vermessungsarbeiten eines Tages sollten am Abend im Allgemeinen nur und ohne Eingehen auf eine strengere Reduction geprüft und in's Klare gebracht werden, so dass man sich in der Folge und zu irgend einer Zeit Rechenschaft darüber zu geben vermag.

Höhenmessungen werden im Allgemeinen nach den Methoden und unter Benutzung derselben Formeln abgeleitet, die in dem nachfolgenden Abschnitte p. 676 dargelegt werden.

In den meisten Fällen handelt es sich in zweiter Linie um die Ausführung genauer Tiefenbestimmungen (Lothungen); hierbei sind entweder Deckpeilungen (auch mit dem Prismenkreuz in Buchten z. B.) und darauf gemessene Distanzintervalle oder das gleichzeitige Messen von Winkeln zwischen drei gut bestimmten oder bestimmbaren Objecten am Lande in Anwendung zu bringen. Bei der ersteren Methode ist das strenge Innehalten des Curses, das genaue Bestimmen des Azimutes desselben und das Messen der Fahrt von Bedeutung.

Wendet man die letzte Weise an, so hat man die zu bestimmenden Objecte vorthellhaft zu wählen, die gemessenen Winkel deutlich im Journale zu verzeichnen und namentlich darauf zu achten, dass diese Objecte nicht allzu beträchtlich von der horizontalen Ebene liegen, im entgegengesetzten Falle muss man eine Reduction auf den Horizont vornehmen und hierfür die erforderlichen Elemente ermitteln. (Siehe Abschnitt über Aufnahmen am Lande pag. 669.)

Für das Steuern nach Compassen in Booten oder für Peilungen muss man sich eines guten Fluidcompasses bedienen, der auch wohl mit einer Peilvorrichtung versehen sein kann. Gewöhnliche Compassee sind bei der heftigen Bewegung eines kleinen Fahrzeuges nicht zuverlässig. Es wird dies auch hier besonders hervorgehoben für Reisen auf Flüssen, welche, auch wenn kein Seegang wirkt, durch die Bewegung mittelst der Ruder, Unsicherheit beim Gebrauche gewöhnlicher Compassee unvermeidlich machen. Aufnahmen während solcher Flussfahrten sind ohnedies der häufigen Windungen des Curses und der Unsicherheit der Bestimmung der Schnelligkeit wegen mit Schwierigkeiten verknüpft, vornehmlich da, wo niedere bewaldete Ufer, Peilungen in die Ferne nicht zulassen. Genaues Achten auf den Compass und Bestimmen der Stromgeschwindigkeit durch directe Messungen können allein in solchen Verhältnissen einen Anhalt für den zurückgelegten Weg bieten, was auch für den Reisenden im Innern von Continenten für die Verzeichnung seiner Route von grosser Bedeutung ist; hat man dagegen Gelegenheit, Peilungen während der Fahrt nach bestimmten oder bestimmbaren Objecten zu nehmen, so versuche man, vom Boote aus, einen Flusslauf niederzulegen. Von den Beobachtungen, die vom Boote aus ausgeführt werden können, müssen noch die Bestimmungen des Stromes, nach Richtung und Stärke genannt werden. Dies gilt sowohl mit Bezug auf die Ströme auf offener See, als auch für die Gezeitenströmungen längs einer Küste in Flussmündungen, Buchten u. s. w. In solchen Arbeiten können gute Resultate nur erhalten werden bei (etwa vor dem Lothe) verankerten Booten. Vermessungsfahrzeuge müssen mit irgend einem guten und auf seine Coefficienten geprüften Appa-

rate für die Geschwindigkeitsmessung ausgestattet sein (Patent Log). Die Bestimmung des Stromes auf längeren Reisen aus den Unterschieden der astronomischen Beobachtung und der gegisteten Schiffsrechnung ist nur dann von wirklichem Werthe, wenn diese Beobachtungen sich auf kürzere Zeiträume während eines Tages beziehen, wenn auf Steuern und vornehmlich auf Deviation des Compasses und auf Fahrt strengstens geachtet wird. Für Messungen des Stromes in Tiefen bedient man sich mit Vortheil weit in den Ocean herabhängender Körper (Zinkblech-Quadrate, Bojen), deren Bewegungen an der Oberfläche beobachtet werden können, indem sie mit anderen schwimmenden Körpern oder mit dem beobachtenden Boote in Verbindung erhalten und beobachtet werden. (Zwei in Gestalt und Grösse gleiche Tönnchen, welche durch eine Trosse verbunden sind und wovon das eine beschwert ist und in die Tiefe sinkt.) In allen Fällen ist genaue Zeitmessung unerlässliche Bedingung. (Siehe über Gezeitenströmung und die Methoden der Messung von Beechey, Phil. Trans., Irminger's Strommessungen in der Nordsee u. s. w.)

Sowohl bei Lothungen, wie bei Strombeobachtungen ist es von Wichtigkeit, dass die Zeiten der Uhren der verschiedenen mitwirkenden Beobachter untereinander öfter und gewissenhaft verglichen werden. Nur dadurch lässt sich Gleichzeitigkeit der Beobachtungen feststellen, und es empfiehlt sich zu diesem Zwecke der Gebrauch verabredeter Zeitsignale, entweder mittelst eines Zeitballes an den Masten eines Schiffes, oder für grössere Entfernungen mittelst eines Taschenheliotropes u. s. w.

Das Eintragen in die Karte. In den meisten Fällen von Aufnahmen auf Reisen genügt es, eine möglichst genaue Skizze einer Route mit den umliegenden Objecten in klarer und verständlicher Form und unter Anwendung der üblichen Bezeichnungen zu geben. Das Entwerfen eines Kartennetzes ist selten geboten; es ist dies Sache der späteren Mappirung, die nicht mehr in den Umfang einer Reisetätigkeit gehört. Da es aber in nautischen Vermessungen vorkommen kann, dass es wünschenswerth ist, eine grössere aufgenommene Strecke, wenn auch nur provisorisch, in ein Kartennetz (in eine Arbeitskarte) einzutragen, so ist es hier zweckmässig, einige Tafeln in dem Anhang zu geben, welche sich auf die Dimensionen des Erdsphäroids beziehen. Tafel 7 enthält die Längen der Meridiangrade für die verschiedenen Breiten und die Längen der Grade der verschiedenen Breitenparallele, so wie auch das Verhältniss der Bogengrade der verschiedenen Breiten zu Aequatorgraden in Minuten des letzteren ausgedrückt. Die hierbei zu Grunde gelegten Dimensionen des Erdsphäroides sind folgende:

a = halbe grosse Axe 6377397.156 in Metern

b = „ kleine Axe 6356078.963 „ „

deren Log. beziehungsweise 6.8046435 und 6.8031893 sind.

Aus den Tafeln vermag man sich den Werth der Meridionalminute für die Breite (q), die als Grundlage der Projection in der Karte zu nehmen ist, herzuleiten, was auch mittelst der folgenden einfachen Formel geschehen kann:

$$\text{Länge des Breitengrades } g = \frac{a\pi(1 - \epsilon^2)}{180(1 - \epsilon^2 \sin^2 q)^{\frac{3}{2}}}$$

Die Länge des Breitenparalleles (h) ergibt sich aus folgender Gleichung:

$$h = \frac{a\pi \cos q}{180 \sqrt{1 - \epsilon^2 \sin^2 q}}$$

*) Danach kann man sich in der gnomonischen (Central-)Projection ein Karten-netz nach einem bestimmten anzunehmenden Maassstabe entwerfen. Handelt es sich um die Zusammensetzung der Karten nach Mercators Projection, so hat man in jedem Handbuche der Navigation Tafeln vergrösserter Breite (Meridionaltheile) angegeben und kann sonach ohne weitere Anleitung hierzu nach den Erklärungen der zwei Tafeln die Karte in einer bestimmten Ausdehnung und in einem bestimmten Maassstabe entworfen werden.***) Der Reisende thut übrigens wohl daran, sich vorher im Kartenentwerfen, im Zeichnen und unter Leitung eines erfahrenen Kartographen zu üben, ehe er überhaupt seine Reise antritt.

Magnetische Beobachtungen. Unter den Beobachtungen, welche an Bord und auf See ausgeführt werden, nehmen magnetische Bestimmungen einen hervorragenden Platz ein. Es kann hier nicht auf die Bestimmung der Deviation für die verschiedenen Gattungen von Schiffen eingegangen werden; solches gehört in die praktische Navigation. Es wird vielmehr an dieser Stelle nur beabsichtigt, die in dem Abschnitte über Bestimmung der magnetischen Elemente am Lande gegebenen Winke durch Erweiterung derselben für die Zwecke an Bord zu vervollständigen. Es ist hierbei ganz besonders auf den Unterschied zu achten zwischen den Beobachtungen an Land und an Bord, der darin besteht, dass man sich in ersterem Falle stets eine Position wählt, welche frei ist von localen Störungen und dass Beobachtungen, welche, nachträglich als durch eine solche beeinflusst erkannt, einfach verworfen werden, während im letzten Falle an die durch die Beobachtungen erhaltenen Resultate eine Correction angebracht werden muss, da ein vollkommenes Befreien von den Einflüssen störender Eisenmassen an Bord nicht möglich ist. Daher tritt zu der allgemeinen Feststellung der Methode der Beobachtung in unserem Falle noch eine zweite Aufgabe: Bestimmungen der an die Beobachtungen wegen störender Einflüsse anzubringenden Correctionen erforderlichen Coefficienten und Constanten, und wir haben sonach:

1. Instrumente und Methoden der Beobachtung an Bord.

2. Bestimmung der Coefficienten für die Correction der Beobachtungen.

Für Beobachtungen an Bord ist es in erster Linie von Bedeutung, den richtigen Ort für die Aufstellung der Instrumente zu wählen. Hierbei muss ganz besonders beachtet werden, dass der Aufstellungsort nicht während der Dauer einer Reise gewechselt werden muss, sondern dass vielmehr alle Beobachtungen auf diesen Ort bezogen werden sollten, weshalb auch zu erwägen ist, ob der Ort frei von Veränderungen gelassen werden kann. Die Aufstellung soll ferner so gewählt werden, dass die störenden Einflüsse ein Minimum werden, namentlich aber muss darauf geachtet werden

*) Wo $\varepsilon^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} \varphi$ die geogr. Breite und π die Ludolphische Zahl ist.

(Der Krümmungsradius ρ für die Breite φ ist:)

$$\rho = \frac{a(1 - \varepsilon^2)}{(1 - \varepsilon^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}}$$

Littrow's Chorogr. pag. 90.

$$\begin{aligned} \varepsilon &= 0.08169683 \\ \lg \varepsilon &= 8.9922052 - 10 \\ \lg \varepsilon^2 &= 17.8244104 - 20 \\ \varepsilon^2 &= 0.00667435 \end{aligned}$$

**) Siehe die Werke von Steinhauser, Laughton, Gretschel u. a.

dass Eisenmassen, welche im Dienste oder sonst bewegt werden müssen, so weit entfernt gehalten werden, dass sie die Beobachtungen nicht beeinflussen können. Sollte dies auch erreicht worden sein, ist es trotzdem gut, dass man während der Ausführung aller Reihen von magnetischen Beobachtungen stets solche beweglichen Eisenmassen, wie Kanonen, Reserveschrauben, Davits u. s. w. an ein und derselben Stelle, die man sich durch Marken zu bezeichnen hat, erhält. Die Höhe der Instrumente über Deck sei so gewählt, dass man von dem Punkte der Beobachtung frei über die Regelung und etwaige Deckhäuser hinwegsehen kann. Man sieht, dass in diesem Falle die Aufstellung der Instrumente eine Sache ist, die mit grosser Sorgfalt ausgeführt werden muss.

Ad 1. Zu den magnetischen Beobachtungen an Bord werden ausser den Compassen zu Bestimmungen der magnetischen Declination (Variation) auch noch Declinatorien benutzt, während Inclination und Intensität am vortheilhaftesten mit dem Apparate von Fox bestimmt werden. Das Deviations-Magnetometer dient gleichfalls zu Bestimmungen der Intensität und Inclination, ist aber speciell für die Bestimmungen der Coefficienten in eisernen Schiffen berechnet und wird hier daher nicht näher besprochen werden.

Der zu Bestimmungen der Declination verwendete Compass soll ein Normalinstrument sein, d. h. es müssen sich bei demselben alle Fehler genauestens bestimmen, in Rechnung bringen oder eliminiren lassen. Auf Eisenfreiheit des Gusses muss besondere Sorgfalt verwendet werden, während die Rose, deren Nummer stets den Beobachtungen hinzuzufügen ist, so beschaffen sein muss, dass man sie umlegen kann, um die Collimation der Nadel zu entfernen oder, wie es in den meisten Fällen zu geschehen pflegt, zu bestimmen und bei den einzelnen Lagen der Rose in Rechnung zu bringen. Der Prismenfehler des Peilapparates und Excentricität müssen gut bestimmt und womöglich corrigirt werden, auch prüfe man genauestens, ob das Deckelglas des Compasses nicht durch prismatische Gestalt die Ablesungen beeinflusst. Durch den äusseren Theilkreis ist man jeden Augenblick in der Lage, eine genaue Untersuchung des Instrumentes, die übrigens vor der Reise auszuführen ist, vorzunehmen.

Das Declinatorium ist gleichfalls für Schiffsgebrauch eingerichtet, indem es in einer cardanischen Aufhängung schwingt. Die Aufhängung der Nadel ist auch in diesem Falle auf Spitzen, die Einstellung mittelst Spiegel, und es kann die Nadel in beiden Lagen beobachtet werden. Beide Instrumente, Declinatorium und Normalcompass, werden genau mit Beziehung auf die Kiellinie orientirt, so dass man auch bei jeder Beobachtung mit denselben den Schiffscurs abzulesen vermag. Von Zeit zu Zeit sind die beiden Instrumente an Land und wenn irgend möglich auf einem Observatorium, in welchem die magnetische Declination bekannt ist, zu prüfen; der Beobachter sollte sich stets gegenwärtig halten, dass ohne einen solchen Vergleich die gewonnenen Resultate nur einen sehr bedingten Werth haben können. Im Uebrigen gelten auch hier für die Beobachtungen an Bord dieselben Regeln, wie sie für Landbeobachtungen aufgestellt wurden (Wild, Beobachtung der magnet. Elemente). Es wird nebst der Angabe der Zeit, auch noch der Schiffscurs und eine Schilderung der Umstände, unter welchen die Beobachtungen gemacht wurden, hinzugefügt.

Mit Beziehung auf die Bestimmung eines astronomischen Azimutes muss bei Beobachtungen, auf See ausgeführt, stets erwogen werden, dass sich die Collimation des Kreises wegen der Schiffsbewegung stets ändert, denn wie genau auch auf das Steuern geachtet werden mag, und es ist dies eine der wesentlichsten Bedingungen für eine gute Beobachtung, so ist es doch un-

möglich, die Richtung des Kieles und damit die Lage des Kreises innerhalb der zu erstrebenden Genauigkeit der Beobachtung, auch nur für eine sehr kurze Zeit, inne zu halten.

Bei dem Gebrauche des Compasses, wo die Peilungen der Sonne oder eines Gestirns stets gleichzeitig mit der Ablesung der Rose geschieht, hat diese Aenderung weniger zu bedeuten, bei dem Declinatorium, wie es in der kaiserlichen Marine für die Küstenvermessung im Gebrauche ist, dagegen wird die Aenderung der Lage des Kreises stets vor und nach einer magnetischen Einstellung controllirt, da ein gleichzeitiges Ablesen vom Gestirn oder von einem terrestrischen Objecte von bestimmtem Azimut nicht möglich ist. Zur Bestimmung des astronomischen Azimutes bedient man sich auf See am zweckmässigsten der Morgen- und Abendpeilungen der Sonne, oder auch Peilungen irgend eines hellen Gestirnes, dessen Höhe über den Horizont 10 Grade nicht übersteigt. Die Ermittlung der Zeit und die genaue Ableitung der geographischen Position sind hierbei wesentliche Erfordernisse, da ja magnetische Beobachtungen überhaupt ohne die letzteren nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft kaum einen Werth haben. Mit Rücksicht auf die Ausführung der einzelnen hierzu nöthigen Operationen wird auf die betreffenden Paragraphen der Aufsätze von Wild und Tietjen verwiesen, während andererseits jedes Handbuch der Navigation über dieselben Aufschluss giebt. Oft kann es sich ereignen, dass ein Schiff Tage und Wochen an einem Orte vor Anker liegt und die Ermittlung des Azimutes eines terrestrischen Objectes (Mire) sehr erwünscht erscheint, während der Zustand des Wetters solches auf astronomische Weise durchzuführen nicht gestattet. Wenn nun in einem solchen Falle die geographischen Coordinaten dreier Objecte gegeben sind, so kann man sich durch Peilungen nach denselben nach dem Pothenotischen Probleme die Position des Schiffes und daraus die Azimute der Objecte ableiten. Wird darauf eine einfache Ausgleichungsmethode angewendet, so kann man mit der grössten Schärfe und auch ohne zu grossen Zeitverlust die magnetische Declination aus allen drei Miren ermitteln.

Der Fox'sche Apparat. Es besteht derselbe aus einem cylindrischen Messinggehäuse, welches durch eine Stütze in verticaler Lage gehalten wird, und mit einer Alhidade, die sich auf einem horizontalen Kreise dreht, in Verbindung steht. Derselbe stellt sonach ein Inclinatorium dar, welches nur für die Zwecke an Bord eine besondere Construction erhalten hat, indem die Aufhängung der Nadel so eingerichtet ist, dass ein Herabgleiten und Verschieben der Axe derselben von den Lagern nicht stattfinden kann. Zu diesem Zwecke dient ein mit Rücksicht auf seine Entfernung von der verticalen Ebene des Instrumentes verschiebbarer Arm, welcher an seinen Vorderenden das Lager für die inneren Zapfen der Axe der Nadel trägt, während der andere in einem genau centrisch zum ersten, in der Mitte des Verticalkreises befindlichen Steinlager ruht. Diese Anordnung, welche gestattet, dass die Nadel ohne jede Schwierigkeit in die Lager gelegt und sodann genau adjustirt wird; für die Ablesung ihrer Enden ist es nothwendig, dass der Arm auf einer um die Mitte des festen Steinlagers drehbaren Scheibe angebracht wird, weil sonst in gewissen Lagen der Träger des Armes die freie Bewegung der Nadel hindern würde. Durch die Drehbarkeit derselben kann man dies für jede mögliche Lage verhindern, während andererseits dieselbe dazu dient, die Nadel mittelst des Trägers des Armes nach der einen oder der anderen Seite zu bringen. Es befindet sich an derselben Scheibe noch ein kleiner Bügel von einer solchen Grösse, dass er die Nadel aufzunehmen und

festzuhalten vermag. An der Rückseite des Apparates befinden sich in Verbindung mit der Scheibe zwei Knöpfe, vermittelt welcher dieselbe leicht gedreht werden kann. Dieselben sind gleichzeitig die Schraubenköpfe, mittelst welcher sowohl der Arm als auch der erwähnte Bügel zu der Verticalebene herangebracht oder von ihr entfernt werden kann.

Das Inclinationsgehäuse hat zwei getheilte Kreise, die genau centrisch mit der Axe der Nadel und deren Ebene senkrecht auf ihr stehen, wenn die Zapfen in den betreffenden Lagern, genau adjustirt, sich befinden.

Der eine dieser beiden getheilten Kreise liegt etwas weiter zurück als der andere, und es hat derselbe den Zweck, bei der Ablesung die Parallaxe zu vermeiden, indem er die der betreffenden Ablesung zunächst liegenden Theilstriche des vorderen und hinteren Kreises zur Coincidenz bringt. Eine geringe Uebung wird genügen, hierin alle erwünschte Sicherheit zu gewähren. An der Rückseite des verticalen Gehäuses befindet sich ein dritter getheilter Kreis, welcher mit den beiden übrigen genau centrisch (nicht in derselben Ebene) liegt und dessen Theilstriche mit jenen der ersten genau übereinstimmen. Darauf und um die Axe der Inclinationsnadel dreht sich eine Alhidade mit 2 Nonien und zwar unabhängig von der vorher erwähnten Scheibe, welche den Arm des Zapfenlagers trägt. Dieser letzte Kreis hat den Zweck, stets an der Rückseite die Ablesung der Nadel fixiren, um gemäss derselben die fest mit der Alhidade verbundene Ablenkungsvorrichtung einstellen zu können, als wenn dies mittelst der Theilstriche an der Vorderseite geschehen wäre. Die Ablenkungsvorrichtung enthält Schraubengewinde, in welche die Ablenkungsmagnete (Deflectoren) eingeschraubt werden können. Es ist einleuchtend, dass man mittelst dieser Vorrichtung auf irgend einen Winkel mit der Inclinationsnadel oder auf diese selbst, zu Zwecken der Ablenkung derselben, einstellen kann.

Der Apparat hat an seinen Kreisen keine feine Bewegung (Mikrometergetriebe), wohl aber in dem Dreifuss des Horizontalkreises Stellschrauben, zum Horizontalstellen mittelst zweier senkrecht aufeinander auf dem Limbus des Horizontalkreises befindlichen Libellen. Der Limbus ist bei den älteren Instrumenten dieser Art so eingetheilt, dass an den Enden eines Durchmessers 0 steht, während der darauf senkrechte an seinen Enden 90^0 angeschrieben hat, so dass also in jedem der Quadrate von 0 bis 90^0 gezählt wird. Die neuen Instrumente haben eine etwas andere Bezeichnung; jedoch ist dies unerheblich und genügt nur ein wenig Nachdenken, um sich sofort mit irgend einer der angewendeten Weisen vertraut zu machen.

Im Innern des Gehäuses ist ein Thermometer angebracht.

Noch muss erwähnt werden, dass an der Rückseite des Gehäuses und an der Alhidade festsitzend, sich ein kleines Fernrohr befindet, mit welchem sowohl horizontale, als auch verticale Winkel gemessen werden können, und welches, da es umlegbar ist, eine genaue Beobachtung unter Berücksichtigung aller beeinflussenden Umstände (siehe Tietjen Universalinst.) zulässt.

Ueber dem inneren festen Zapfenlager und an der Rückseite des Gehäuses befindet sich ein etwa 2 Centim. langer Dorn, der dazu dient, auf das Zapfenlager und dadurch auf die Nadel eine Erschütterung hervorzu bringen, indem an demselben während der Beobachtung (Ablesung) der Nadel mit einem gerippten Elfenbeinstücke rasch und leicht gerieben wird. Dadurch überwindet die Nadel leicht jede Reibung und stellt sich sicherer ein.

Die Nadeln, welche mit ganz besonderer Vorsicht zu behandeln, namentlich vor Rost und Stößen zu bewahren sind, haben im Ganzen die Form der Inclinationsnadeln, nur dass sie auch noch ein mit einer Rinne versehenes

Rad haben, über welches ein Seidenfaden mit Gewichten gehängt werden kann. Besondere Sorgfalt ist auf die Zapfen, welche sehr fein sind, zu verwenden; beim Einlegen und Festschrauben der Lager muss man sehr vorsichtig sein. Man fasse die Nadel bei dem beschriebenen Rädchen und lege zuerst die Zapfen in das äussere, bewegliche Lager ein und leite den andern, indem man den Arm zurückschraubt, in das andere Zapfenlager hinein.

Die Deflectoren sind in Messinghülsen eingelegte Magnetstäbe, welche keine weitere Beschreibung erfordern. Auf die an der äusseren Hülse angebrachten N.- und S.-Bezeichnungen muss bei dem Verpacken geachtet werden.

Der Tisch mit cardanischer Aufhängung, auf welche der Fox'sche Apparat gestellt wird, muss von besonders guter und tüchtiger Arbeit sein. Wenn das Instrument darauf gestellt und adjustirt ist, so hat man die Orientirung nach der Kiellinie des Schiffes vorzunehmen. Man wählt dieselbe am zweckmässigsten so, dass man sofort die Curse abzulesen vermag, ohne erst einer Rechnung zu bedürfen.

Auf einer längeren Reise lässt man das Instrument auf dem Stative, weil Adjustirung und Orientirung zu zeitraubend sein würden; um dies ohne Gefahr für das Instrument thun zu können, ist der Tisch mit einer Glasglocke und einem Messinggeflechte versehen, über welche man noch eine Presenningdecke legen kann, wenn das Instrument nicht gebraucht wird.

Aufstellung und Anordnung der Instrumente an Bord. Es wurde schon über die Wahl des Aufstellungsortes und die an denselben zu stellenden Anforderungen gesprochen, und es ist daher hier nur nöthig zu erklären, wie der Fox'sche Apparat und der Normalcompass (Regelcompass des Schiffes) aufgestellt werden sollten. Wenn wir von den zu bestimmenden Correctionen sprechen, werden wir auch über diesen Punkt, namentlich auch über den Positionscompass des Apparates zu sprechen haben. Es ist wünschenswerth, dass der Fox'sche Apparat in der Nähe des Regelcompasses aufgestellt werde, und zwar, für den Fall nur einer an Bord ist, Mitschiffs 1 oder $1\frac{1}{2}$ Meter von demselben entfernt und nahezu in derselben Höhe über Deck, so dass zur Noth die zu bestimmenden Correctionen für beide Instrumente gelten können, was nicht schwierig ist, wenn der Ort der Aufstellung günstig gewählt wurde.

Beobachtungen mit dem Fox'schen Apparate. 1. Um den magnetischen Meridian zu bestimmen, dreht man das Instrument so lange und zwar allmählig, bis endlich die Nadel vollkommen vertical zu stehen kommt, nachdem sie bei Anwendung von einiger Erschütterung an der Rückseite einige Schwankungen gemacht hat. Für diese Stellung der Nadel ist die Ebene der Theilung des Verticalkreises rechtwinklig zur Ebene des magnetischen Meridians. Allein es ist nothwendig, dass der Verticalkreis jedes Mal auch um 180° gedreht wird, in welcher Lage die Nadel alsdann abermals sich vertical stellt. Auf diese Weise wird die erste Beobachtung controllirt und, wenn nöthig, verbessert. Hat man den Punkt des Horizontalkreises, der in beiden Lagen der verticalen Stellung der Nadel entspricht, abgelesen, daraus den um 90° davon liegenden Meridian gefunden, und kennt man ferner den Punkt, wo der astronomische Meridian den Horizontalkreis durchschneidet, so kann man sofort die magnetische Declination (Variation) ableiten.

2. Um die magnetische Inclination zu beobachten, kann man sich der gewöhnlichen Methode bedienen, die auch in Wild's Aufsatz pag. 114 u. f. beschrieben ist; nur ist zu bemerken, dass die zur Beobachtung verwendeten

Nadeln nicht ummagnetisirt werden dürfen, weil sie auch zu Intensitätsbestimmungen verwendet werden. Man muss für diesen Fall mit derselben Nadel am Lande und an einem Orte Beobachtungen machen, an dem die Inclination auf das Genaueste bekannt ist und daher durch den Vergleich der Resultate, der Indexfehler der Nadel bestimmt werden kann. Anstatt dieser gewöhnlichen einfachen Methode der Beobachtung wendet man meistens auf See die Methode der Ablenkung an, d. h. es wird zuerst der Punkt des Verticalkreises bestimmt, welchen die ungestörte Nadel einnimmt, sonach ist dieser Punkt auch auf dem Kreise an der Rückseite bekannt. Alsdann stellt man die Alhidade des Verticalkreises so ein, dass der darauf eingeschraubte Deflector um 30^0 , 40^0 oder 50^0 von der Richtung der Inclinationsnadel absteht, und zwar geschieht dies zuerst auf der einen Seite jener Richtung, und sodann auch auf der anderen. Die beiden Lagen des Deflectors werden unterschieden, indem man gemäss der bei der Nadel bewirkten Ablenkung von einer Ablenkung „nach oder durch die Verticale“ und von einer solchen „ab oder von den Verticalen“ spricht. Diese Beobachtungen werden in der Kreislage gegen West und jene gegen Ost ausgeführt und zwar für beide Reihen mit denselben Winkeln. Hat man 30^0 angewendet, da der Kreis gegen West war, so hat man auch 30^0 , da er gegen Ost ist, anzuwenden u. s. w.

Die entsprechenden Ablenkungen der Nadel zu Mittelwerthen vereinigt, ergeben jedes Mal die Mittellage oder die verbesserte Inclination der Nadel. Da man eine beliebige Anzahl verschiedener Ablenkungswinkel anwenden kann, so kann man auch eine grosse Anzahl von Bestimmungen der Inclination erhalten, welche alle den Vortheil haben, dass sie in verschiedenen Lagen der Zapfen in den Lagern ausgeführt wurden.

Es wird hier ein für alle Male darauf aufmerksam gemacht, dass man beim Beobachten (Ablesen) der Nadel jedes Mal die Erschütterung durch Reiben anwendet und ferner, dass für ein und dieselbe Ablesung stets die Scheibe, welche den Arm des Zapfenlagers trägt, dreht und zwar in 4 verschiedenen Positionen, für welche die Ablesungen gemacht werden. Die verschiedenen Reihen werden zu Mittelwerthen combinirt und an das Gesamtmittel die in einem Observatorium ermittelte Indexcorrection angebracht, um endlich die Inclination zu erhalten, an welche alsdann die für locale Einflüsse berechnete Correction anzubringen ist. Auf See kann man häufig nur in einer Lage des Kreises die Inclination beobachten, hat man dies gethan, so darf man auf das Endresultat auch nur die für diese Kreislage an Bord ermittelte Indexcorrection anwenden, um den wirklichen Werth der Inclination zu erhalten. Einer näheren Ausführung bedarf die an und für sich höchst einfache Sache nicht.

3. Bestimmung der relativen Intensität des Erdmagnetismus. Mit Anwendung von constanten Gewichten. In dem von Dover in London verfertigten Apparate befindet sich ein Etui mit einer Anzahl von gut adjustirten kleinen Gewichtchen von 0.25 bis 2.0 Grains. Diese werden an einem feinen Seidenfaden, welcher mit kleinen Häkchen an beiden Enden versehen ist, so über das an der Nadel befindliche Rädchen gelegt, dass sie frei schweben. Man thut wohl daran, sich die einzelnen Gewichte, welche bei einer Beobachtung benutzt wurden, zu merken und immer wieder anzuwenden, so lange dies angeht.

Wenn das Instrument genau adjustirt ist, stellt man den verticalen Kreis in die Ebene des magnetischen Meridians und hängt zuerst das Gewicht (oder die Gewichte) welche man benutzen will, an das eine Ende des Fa-

dens, so wird die Nadel aus ihrer Gleichgewichtslage verdrängt werden. Indem man die angeführten Vorsichtsmaassregeln (Reiben und Aendern der Lager) beim Ablesen beachtet, erhält man auf diese Weise eine Ablesung u , und wenn man das Gewicht einhängt an das andere Ende, eine Ablesung u' . Man unterscheidet beide Ablenkungen gerade so, wie im Falle der Inclination, nämlich: „Nach oder durch die Verticale“ und „von der Verticalen weg“.

Die Mittellage der Nadel wird nun wieder $\frac{u + u'}{2}$ und der Ablenkungs-

winkel $\varphi = \frac{u - u'}{2}$. Man muss hierbei beachten, ob die Nadel in einem

Falle nicht die Horizontale, in dem anderen nicht die Verticale passirt hatte, damit man der Ablesung das richtige algebraische Zeichen geben kann.

Gestatten es die Umstände und Zeit, so kann man die Beobachtung mit derselben Nadel in der anderen Kreislage wiederholen; wenn der Kreis zuerst West war, so wird er nun Ost und umgekehrt. Ebenso kann man noch eine zweite Nadel für denselben Zweck benutzen.

Hat man am Lande, in einem Observatorium, welches nun als Basis für die Beobachtungen zur See dienen soll, den Ablenkungswinkel für ein bestimmtes Gewicht gemessen und es sei derselbe q_0 gewesen und die dazu gehörige Intensität J_0 , so ist, wenn φ und J die entsprechenden Werthe für

eine Station an Bord waren: $J = \frac{J_0 \sin q_0}{\sin \varphi} (1 + q(t - t_0))$; $J_0 \sin q_0$ ist eine

Constante, die so oft, als sich Gelegenheit dazu findet, bestimmt werden sollte; q ist ein Coefficient für Temperatur, welcher ergiebt, um wie viel sich das magnetische Moment der Nadel für jeden Grad der Temperatur mehr verändert und muss in einem Observatorium bestimmt werden, t ist die Temperatur zur Zeit der Beobachtung, t_0 ist die Temperatur der Station, auf welche mittelst des Coefficienten der durch die Beobachtung erhaltene Werth reducirt wurde.

Mit Anwendung von Deflectoren. Anstatt der Gewichte, welche auf See schwerer und seltener anzuwenden sind, gebraucht man in den meisten Fällen die Deflectoren. Dieselben werden in die an den Arm der Alhidade des hinteren Kreises befindlichen Gewinde eingeschraubt und zwar je nachdem, einer derselben, oder beide zugleich, in der Anordnung, wie sie sich aus einer Beachtung der auf den Deflectoren befindlichen Buchstaben (N und S) sofort ergiebt. Es wird nämlich zuerst die Neigung der Nadel beobachtet, sodann werden mittelst der Nonien des Kreises an der Rückseite die Arme so eingestellt, dass dieselben mit der Richtung der Neigungs-nadel coincidiren, und hat dies möglichst genau zu geschehen. Werden sodann die Deflectoren richtig aufgeschraubt, d. h., dass z. B. das mit N bezeichnete Ende derselben bei nördlicher Inclination am unteren Arme an der Kreisebene, am oberen Arme aber entfernt von dieser Ebene zu stehen kommt, so wird die Nadel aus ihrer Gleichgewichtslage gebracht, abgelenkt und zwar wieder entweder nach der Verticalen zu oder von derselben ab. Hat man zuerst eine Lage der Nadel im abgelenkten Zustande unter Berücksichtigung der Vorsichtsmaassregel (starke Erschütterung durch Reibung am Zapfen und indem man in 4 verschiedenen Lagen des Armes, in welchem das äussere Zapfenlager liegt, beobachtet) ermittelt, so bewegt man die Nadel alsdann mittelst des Armes und Drehens der Scheibe so weit, bis sie nach der anderen Seite abgelenkt wird — die Deflectoren bleiben aber unverrückt an ihrer Stelle — so erhält man aus den vier zu nehmenden Beobachtungen

eine Mittelbeobachtung für die abgelenkte Nadel auf der anderen Seite und wenn u und u' wieder die Ablesungen in den beiden Lagen sind, so ist der Ablenkungswinkel q in diesem Falle: $q = \frac{u - u'}{2}$, wobei man aber wieder auf die algebraischen Zeichen achten muss, die darnach bestimmt werden, ob in einem Falle die Ablenkung bis über die Horizontale, oder im anderen bis jenseits der Verticalen geht. Eine Beachtung der Theilung des Instrumentes wird hier vor jeglichem Irrthume bewahren.

Man lese auch an dem im Gehäuse befindlichen Thermometer die Temperatur am Anfange und am Ende einer Reihe ab, damit man die nöthige Correction für Veränderung des magnetischen Momentes durch die Temperatur bestimmen kann. Wenn der mit genau demselben Deflector (oder Deflectoren) an der Normalstation erhaltene Ablenkungswinkel q_0 und die erhaltene Intensität J_0 , die Temperatur t_0 und der ermittelte Temperatur-Coefficient q ist, dann hat man für J , die Intensität an der zu beobachtenden Station an Bord:

$$J = \frac{J_0 \sin q_0}{\sin q} (1 - q (t - t_0)).$$

Man sieht alsbald, dass auf See die Methode mit Deflectoren schon um deswillen in den meisten Fällen den Vorzug verdient, weil man beim Beobachten mit denselben, das Gehäuse nicht zu öffnen nöthig hat, während beim Beobachten mit Gewichten ein Manipuliren mit dem Seidenfaden an Deck, und wenn nur etwas Wind weht, seine Schwierigkeiten haben dürfte.

Es verhalten sich die an zwei verschiedenen Stationen ermittelten Intensitäten umgekehrt, wie die Sinusse der resp. Ablenkungswinkel mit denselben Deflectoren und direct, wie die, der in jedem Falle ausgeübten ablenkenden Kraft gleichen Gewichte (gleichwerthige Gewichte). Hiernach kann der Werth der Sinusse der Ablenkungswinkel erhalten mittelst Deflectoren, durch kleine Gewichte bestimmt werden, indem man die Deflectoren so stellt, dass sie mit der Inclinationsrichtung die Ablenkungswinkel, deren Werthe bestimmt werden sollen, bilden und nun mittelst der Gewichte die Nadel in die Inclinationsrichtung zurückzwingt (deshalb das Englische *coercing weight*). Die Gewichte, welche nothwendig sind, die Nadel gegen die ablenkende Kraft der Deflectoren zur Inclinationsrichtung zurückzubringen, stellen die Wirkung des Erdmagnetismus für die zu ermittelnden Winkel dar.

In den Special-Instructionen für magnetische Beobachtungen, ausgearbeitet vom Capt. Evans für die britische Marine, wird folgendes Verfahren für die Beobachtungen mit Deflectoren und gleichwerthigen (equivalent, coercing) Gewichten und für die Berechnung einer Tabelle der letzteren aus eingehenden Beobachtungen an Normalstationen mit beiden benützten Nadeln und für die verschiedenen Ablenkungswinkel empfohlen. Die Deflectoren werden der Reihe nach unter solchen Winkeln zur Neigungsrichtung gestellt, dass jeder darauf folgende Winkel ein Grad von dem vorhergehenden abweicht. Für jede dieser Lagen werden die gleichwerthigen Gewichte bestimmt. Die Beobachtungen sollten so angestellt werden, dass die Deflectoren nach einander, sowohl auf die eine, als auf die andere Seite der Nadel zu stehen kommen. Es kann dies bei irgend einer Lage der Nadel geschehen, allein die verticale Lage, wenn also die Ebene der Nadel senkrecht auf den magnetischen Meridian steht, ist für den vorliegenden Zweck am Geeignetesten.

Aus dem oben angeführten Satze ergiebt sich folgende Relation:

$J = \frac{w \sin \varphi_0}{w_0 \sin \varphi}$ wo φ_0 und w_0 die Ablenkungswinkel und gleichwerthigen Gewichte an der Normalstation und w , φ und J dieselben Werthe und Intensitäten an irgend einer anderen Station sind. Versteht man unter μ_0 und μ die absoluten Werthe der Kraft an der Normalstation und einer anderen auf See, so hat man ferner: $\mu = \frac{\mu_0 \sin \varphi_0}{W_0} \cdot W \operatorname{cosec} \cdot \varphi$.

Wenn ein Kraftverlust des Magnetismus der Nadel oder der Deflectoren eintritt, so ist einleuchtend, dass der Ablenkungswinkel kleiner wird, wenn die Deflectoren und grösser wenn die Gewichte allein gebraucht wurden; ferner, dass, wenn die erdmagnetische Kraft durch Ortsveränderung geringer wird, die Ablenkungswinkel nach beiden Beobachtungsweisen (Deflec. u. Gew.) grösser werden.

Es ist nicht immer möglich, an einem Observatorium eine Tabelle gleichwerthiger Gewichte, nach der beschriebenen Weise herzustellen. Für solche Fälle ist in den vorerwähnten Instructionen ein anderes Verfahren vorgeschlagen.

Man beobachtet an der Normalstation mit einem constanten Gewichte (W_0) den Ablenkungswinkel Φ_0 und den Ablenkungswinkel φ_0 für eine, nach einen nach der Neigungsrichtung der Nadel adjustirten Deflector. Man hat alsdann die folgende Relation, wenn W_0 das gleichwerthige Gewicht für die ablenkende Kraft der Deflectoren, beim Winkel φ_0 ist:

$$w_0 = W_0 \sin \cdot \varphi_0 \operatorname{cosec} \cdot \Phi_0.$$

Man wird nun öfter auf See Gelegenheit haben, Ablenkungen mit constanten Gewichten und Deflectoren zu beobachten, so dass man die Werthe w und φ auch für eine Reihe anderer Stationen erhalten kann. Ist die Intensität an der Normalstation J_0 und J jene durch die Methode mit constanten Gewichten bestimmten einer anderen Station, so hat man:

$$w = \frac{J}{J_0} (w_0 \operatorname{cosec} \varphi_0 \cdot \sin \varphi)$$

woraus sich für jede der in dieser Weise beobachteten Stationen ein Werth von w berechnen lässt.

Alle so erhaltenen Werthe von w kann man sodann mit den correspondirenden Werthen von φ zusammen graphisch darstellen, und zwar so, dass jene (die w) die Ordinaten und diese (die φ) die Abscissen sind. Verbindet man die Endpunkte der Ordinaten durch eine Curve, so stellt diese eine Interpolations-Curve dar, mittelst welcher für irgend einen Werth von φ das dazu gehörige w erhalten werden kann. Hat die Curve keinen regelmässigen Verlauf, so deutet dies auf einen Kraftverlust der Deflectoren hin (Magnet. Instructions by Capt. Evans).

Es sind die Schraubengänge, der für die Deflectoren bestimmten Arme so eingerichtet, dass auch die eine oder die andere der in dem Futterale, in welchem sie verpackt ist, angeschraubt und als Deflector benutzt werden kann.

Es wäre noch eine andere Methode der Beobachtung hier zu erwähnen, bei welcher die eine der Nadeln zu Ablenkungen benutzt wird, und zwar in der Weise, dass die ablenkende Nadel parallel (und nicht wie bisher angenommen senkrecht) zur Ebene der Inclinationsnadel liegt, allein in jüngster Zeit werden die Instrumente nicht mehr mit den hierzu nöthigen Einrichtungen versehen, so dass wir diese Methode hier übergehen können, indem wir uns

begnügen auf die betreffenden Stellen im *Manual of scientific inquiry* hinzuweisen (p. 112, Nr. 5).

Da man durch die verschiedenen Deflectoren und Gewichte eine grosse Anzahl von Combinationen hervorbringen kann, so erhält man mittelst des Fox'schen Apparates auch eine beträchtliche Anzahl von relativen Werthen der Intensität, woraus ein Mittelwerth abzuleiten ist. Mit Rücksicht auf die Lage des Verticalkreises, ob Kreis Ost oder Kreis West, ist zu bemerken, dass man in vielen Fällen auf See nur im Stande sein wird, entweder in der einen oder in der anderen zu beobachten. Man combinirt alsdann in den Rechnungen solche Beobachtungen nur mit den in der gleichen Lage gemachten der Normalstation; hieraus ergibt sich aber die Nothwendigkeit an der Normalstation beide Lagen erschöpfend zu beobachten, um die betreffenden Beobachtungen vorkommenden Falles zur Verfügung zu haben.

Ueber die Bestimmungsmethoden für die Temperatur-Coefficienten der Nadeln, wird hier nichts weiter erwähnt, weil in dem Aufsatze von Wild das Wesentlichste darüber enthalten und dann aber auch, weil solche Bestimmungen im Observatorium ausgeführt werden müssen, und den Reisenden daher nur die daraus gewonnenen Resultate interessiren können.

Es bleibt nun nur noch übrig, Einiges über die Bestimmung der Correctionen zu sagen, welche, wegen des Localeinflusses an Bord an die gewonnenen Resultate angebracht werden müssen. Hierbei muss eine gründliche Kenntniss der über die Deviationsbestimmung veröffentlichten Arbeiten vorausgesetzt werden. Wir verweisen daher im Wesentlichen hier auf die Werke von Evans, Schaub u. s. w., indem wir die Correctionen, die bei den einzelnen Elementen anzuwenden sind, aufzählen.

Es ist zu diesem Zwecke das Schiff so zu schwairen, dass man dasselbe für einige Zeit auf einen bestimmten Strich des Compasses erhalten kann, für die Dauer einer Beobachtungsreihe. Man wählt hierzu entweder nur die 8 Hauptstriche des Compasses, oder beobachte, wenn Umstände es gestatten, auf 16 Strichen N. NNW. NW u. s. w.

Auf den Tisch mit cardanischer Aufhängung, welcher den Fox'schen Apparat aufzunehmen bestimmt ist, stellt man zunächst einen Compass, den Positionscompass. Es werden sodann während des Schwairens des Schiffes die Deviationen für den in der Nähe stehenden Regelcompass und den Positionscompass bestimmt. Darauf wird der Fox'sche Apparat an seinen Platz gestellt und genau adjustirt und nach der Kiellinie orientirt. Aus dem Vergleiche der Deviation der beiden Compasses leitet man eine Tabelle ab, die den Beobachter in die Lage setzt, das Schiff auf den Strich mittelst des Regelcompasses zu bringen, welcher nach dem Positionscompass anliegen sollte, und es werden nun danach die Striche für den Positionscompass — den Fox'schen Apparat — angelegt und auf denselben die Beobachtungen ausgeführt, indem man das Schiff ein zweites Mal auf die gewünschte Anzahl Striche bringt. Die Reductionen der Beobachtungen werden nun nach folgenden Formeln ausgeführt:

Für die Correction der Declination müssen die Coefficienten A, B, C, D, E bestimmt werden. Die Reductionsformel ist, wenn $\text{tg } \alpha = \frac{C}{B}$:

$$\sin \delta = A + \sqrt{B^2 + C^2} \sin(\zeta' + \alpha) + D \sin 2\zeta' + E \cos 2\zeta'$$

(Siehe Admir. Man. p. 114. 3rd Edition.)

Für die Correction der Bestimmungen der Inclination und totalen Kraft mit Fox's Instrument müssen die Coefficienten B, D, c, d und A' ermittelt

werden. Die Bedeutung dieser Coefficienten ist aus den vorher angegebenen Arbeiten zur Genüge bekannt und nur die Coefficienten c , d und A' bedürfen einer Erklärung, die in folgenden Gleichungen gegeben wird:

$$c = \frac{g}{1+a}; \quad d = \frac{1+k}{1+a}; \quad A' = 1 + a = \lambda(1+D).$$

Zur Correction der Inclination, auf See beobachtet, können die variablen Coefficienten c und d aus den Abweichungen der Inclination von der normalen Richtung der Inclination mit Fox's Instrument für die verschiedenen Compassstriche berechnet werden. Die Formel hierfür ist:

$$c \cos \zeta + d \operatorname{tg} D = (1 - 2 \sin D) \times \sin \zeta \operatorname{cosec} \zeta' \operatorname{tg} \vartheta'.$$

Dieselbe gilt für alle Striche mit Ausnahme jener von Nord und Süd; für diese hat man die folgende Formel anzuwenden:

$$c \cos \zeta + d \operatorname{tg} \vartheta = (\cos \zeta + \sin B) \times \sec \zeta' \operatorname{tg} \vartheta'$$

ζ bedeutet, wie bekannt, das corrigirte magnetische Azimut des Schiffsvordertheiles vom magnetischen Nordpunkte aus gezählt, ϑ die Inclination mit Fox's Instrument am Lande beobachtet, ζ' und ϑ' dieselben Grössen für Fox's Instrument und Positionscompass an Bord beobachtet.

Man hat mit den auf diese Weise erhaltenen Werthen von c und d die Correctionstabellen für die Inclination und die verschiedenen Curse zu berechnen; die Formel hierfür ist:

$$\operatorname{tg} \vartheta' = \frac{c}{(1 - 2 \sin D)} \left(\cos \zeta + \frac{d}{c} \operatorname{tg} \vartheta \right) \times \sin \zeta' \operatorname{cosec} \zeta.$$

Diese Formel gilt für die Curse zwischen NO und SO oder zwischen NW und SW, oder, wenn sich das Schiff in der Nähe der Ost- und Westcourse befindet. Ferner ist:

$$\operatorname{tg} \vartheta' = c \frac{\cos \zeta + \frac{d}{c} \operatorname{tg} \vartheta}{\cos \zeta + \sin B} \operatorname{cosec} \zeta'$$

wenn das Schiff nahezu Nord oder Süd anliegt.

A' welches zur Reduction der Intensitätsbeobachtungen nothwendig ist, wie sie an Bord gemacht werden, wird aus Intensitätsbestimmungen an Bord mit Fox's Instrument und solchen mit demselben Instrumente am Lande gemacht, abgeleitet. Es werden dieselben mit dem aus anderen Beobachtungen bekannten absoluten Werthe der Totalkraft am Lande (μ_0) combinirt; μ ist dieselbe Grösse an Bord.

$$\frac{\mu}{A' \mu_0} \sin \vartheta' = c \cos \vartheta \cos \zeta + d \sin \vartheta.$$

Diese Reductionsformel gilt für grosse Werthe der Intensität; für kleine wendet man an:

$$\frac{\mu}{A' \mu_0} \cos \vartheta' \sin \zeta' = (1 - 2 \sin D) \cos \vartheta \sin \zeta$$

A' ist dieselbe Grösse wie:

$$\lambda(1+D) \text{ oder auch } (1+a). \quad (\text{Siehe oben.})$$

Diese Auseinandersetzungen sind den magnetischen Instructionen des Capt. Evans p. 11 und 12 entlehnt.

Zur Erlangung guter Resultate ist, wie dies bei allen Fällen, in welchen Instrumente zur Anwendung kommen, gesagt werden kann, ein zartes Behandeln der Instrumente von grosser Wichtigkeit. Ausserdem hat man die magnetischen Instrumente sorgfältig vor Rost und vor Berührung mit Eisen zu bewahren, weil durch beide die magnetischen Momente der Nadeln und der Deflectoren geändert werden. Man bewahre daher diese, sowie in der That alle an Bord gebrauchten Instrumente an einem trocknen Orte auf, an welchem sie auch überdies nicht unmässig durch die Bewegung des Schiffes hin und her bewegt werden können; vor Allem aber sehe man zu, dass sie, wo immer sie sich befinden, fest sind und nicht gegen die Wände oder andere Gegenstände gestossen werden können.

Das Bestreichen der Nadeln und Deflectoren mit Petroleum oder mit einer dünnen Schichte von Talg oder Oel, ist denselben zuträglich, allein es muss dies stets so geschehen, dass kein Uebermaass dieser Substanzen daran klebt; besonders aber hat man, wenn eine Beobachtung gemacht werden soll, die Fettschichte mittelst eines Lappens oder mittelst der Finger sorgfältig zu entfernen, damit das Gewicht derselben die Ablesung nicht beeinflusse.

Den Aufbewahrungsräumen für die Instrumente an Bord, der Behandlung, Conservirung derselben, muss daher eine ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, wenn man gute Resultate erhalten will.

VIII. Aufnahmen und Beobachtungen am Lande.

Wenn, was wir in den folgenden Auseinandersetzungen durchweg annehmen, Aufnahmen in einem Lande, einem Küstengebiete gemacht werden sollen, wo noch wenig oder Nichts für eine Vermessung geschehen ist, so hat man in erster Linie Sorge dafür zu tragen, dass ein hervorragender Punkt dieser Küste nach seiner geographischen Position aus der Schiffsrechnung annähernd abgeleitet und gleichsam als Normalpunkt für etwaige Aufnahmen angenommen werde. Gestatten es Zeit und Umstände, so bestimme man durch genaue Beobachtung am Lande die Lage dieses Punktes nach den im Abschnitte über geographische Ortsbestimmung dargelegten Methoden, deren Wahl durch die vorhandenen Mittel der Beobachtung bestimmt wird (siehe Tietjen). Handelt es sich um ein grösseres Küstengebiet, so kann der auf diese Weise bestimmte Punkt mit Rücksicht auf seine Länge als secundärer Meridian angesehen und die Bestimmungen aller andern Punkte des Gebietes auf ihn bezogen werden, so dass später sobald eine Reihe absoluter Längenbestimmungen für diesen secundären Meridian vorliegen, die Resultate der ganzen Aufnahme ohne Schwierigkeiten in das allgemeine System der geographischen Coordinaten irgend eines Ersten Meridians (Greenwich, z. B.) eingetragen werden kann. Sowohl zum Zwecke der ersten Längenbestimmung eines Punktes, als auch zur Ermittlung der Längendifferenzen zwischen ihm und andern Punkten, bieten die Zeitübertragung mittelst Chronometer noch immer das einfachste Mittel. Daraus folgt aber, dass diese Methode der Längenbestimmung sowohl mit Rücksicht auf Aufnahmen neuaufgefundener oder doch nicht vermessener Gebiete, als auch mit Beziehung auf die Bestimmung und Corrigirung der Lage von Punkten einer schon bekannten und theilweise vermessenen Küste für den Hydrographen, der keine Gelegenheit namentlich in letzterer Richtung für das Interesse der Schifffahrt zu wirken unbenutzt vorübergehen lassen sollte, eine grosse Bedeutung hat und daher hier etwas näher besprochen werden muss.

In dem Abschnitt „Geographische Ortsbestimmung“ wurde pag. 20 u. f. das Wesentlichste über Uhren und deren Behandlung gesagt. Es wird nur noch hinzugefügt, dass es für die Zwecke der Hydrographie unerlässlich ist, dass die zu den Vermessungen benutzten Chronometer vor ihrer Verwendung einer gründlichen Untersuchung in einem Observatorium unterworfen werden müssen, um die Gänge und die Temperatureinflüsse zu ermitteln, dass sie während einer Seereise eine wissenschaftliche Behandlung mit Rücksicht auf ihre Gänge erfahren und dass die Aufbewahrung an Bord eine zweckentsprechende, gegen allzu heftige Erschütterungen und raschen Temperaturwechsel geschützte sei. Jede einzelne dieser Bedingungen würde eine grössere Auseinandersetzung erfordern, als sie hier gegeben werden kann und es wird daher der Beobachter mit Rücksicht auf diese Punkte auf die darüber veröffentlichten speciellen Arbeiten verwiesen. *)

Wenn immer Gelegenheit gegeben ist, muss man an Land den Stand der Chronometer gegen Ortszeit feststellen und zwar, wo möglich, für mehrere Tage, so dass man einen Gang für die betreffende Periode zu erhalten im Stande ist. Hat man ein temporäres Observatorium für diese Zwecke errichtet, so beobachte man mit einem Chronometer und kann dann mittelst Zeitsignale (siehe vorherigen Abschnitt, pag. 657) die Zeit vom Lande nach Bord mittheilen. Oder man bringt in einer zuverlässigen Weise die Zeit frei von dem eventuellen Gange der zur Uebertragung benutzten Uhr durch vor- und nachherige Vergleichung an Bord. Es muss hier ausdrücklich hervorgehoben werden, dass unter keiner Bedingung die Chronometer, wenn sie einmal an Bord eines Schiffes sind, welches zu Vermessungszwecken (oder überhaupt) ausgeht, an Land oder an Deck gebracht werden dürfen. Nur im Falle der Errichtung eines Observatoriums kann man ein bestimmtes Chronometer für die Zwecke der Beobachtung an Land bringen. Für solche Zwecke wähle man ein kleines Taschen-Chronometer ohne Aufhängung in Ringen, das aber niemals in der Tasche getragen, sondern mit derselben Vorsicht als andere Chronometer behandelt werden sollte.

Ein jedes Schiff, welches Vermessungszwecke zu verfolgen hat, muss mindestens 3 gut für Temperatur compensirte, geprüfte Chronometer haben, die auch unter sich stets verglichen werden. Man thut wohl daran ein Normal-Chronometer darunter zu wählen und die Vergleichen mit Rücksicht auf dieses auszuführen, dessen Schlag klar und bestimmt und dessen Zifferblatt gut getheilt und ohne Excentricität ist. Man richte hiefür seine Aufmerksamkeit besonders auf solche Instrumente, die von tüchtigen Künstlern angefertigt, gut geprüft und richtig befunden wurden.

Die Bestimmung der „Meridian-Distanzen“, Längen-Differenzen, für grosse Reisen aus Chronometern, bietet mancherlei Schwierigkeiten dar, da sich die Gänge der einzelnen Instrumente ändern und nicht in allen Fällen klar hervortritt, wie und wovon sich diese Gänge als eine Function darstellen lassen. Die Temperatur ist jedenfalls ein maassgebendes Element hierbei und eine strenge Untersuchung mit Rücksicht darauf ist auch während der Reise sehr zu empfehlen, wesshalb die Ablesungen eines Thermographen, in der Nähe der Chronometer, stets gegeben werden sollen, um die Gänge mit Rücksicht darauf ableiten zu können.

Es ist von ganz besonderem Gewicht, dass ununterbrochen, wenn immer sich eine Gelegenheit dazu bietet, die Chronometerlänge an Bord durch

*) Shadwell, on the Management of Chronometers u. Börgen, Hydr. Mitth. Nr. 14, 15, 16. 1874.

Monddistanzen u. s. w. bestimmt und daraus die Chronometergänge abgeleitet werden, sowie auch aus Beobachtungen in der Nähe gut bestimmter Punkte an Land. Aus einer solchen Reihe vermag der Navigateur die Gänge unter strenger mathematischer Behandlung abzuleiten.

An einer aufzunehmenden Küste hat man übrigens, wie schon bemerkt, nicht die Meridian-Differenzen stets vom ersten Meridian abzuleiten — man thut im Gegentheil klug daran nur die Meridian-Differenzen auf kurze Entfernungen im Verlaufe einer Vermessung zu geben und einen auf diese Weise bestimmten Punkt sodann an eine bereits absolut bestimmte Länge von dem ersten Meridian anzuknüpfen.

Die Bestimmung der Längen-Differenz (Meridian-Distanz) für eine Küste durch Chronometer (Chronometertransporte) führt man am vortheilhaftesten so aus, dass man sie für 2 Punkte hin und zurück bestimmt; wenn sowohl vor- als nachher gute Gangbestimmungen gemacht werden, so lässt sich dadurch — wenn der Zeitintervall nicht allzu gross ist — ein grosser Grad von Genauigkeit erreichen.

Wenn M die Meridiandifferenz von A nach B ist, α der Gang eines Chronometers vor der Abreise von A , β nach der Ankunft in B , β' vor der Abreise von B und α' nach der Ankunft in A , so ist ferner, wenn n die Anzahl Tage von der ersten Beobachtung in A und der in B , während m die Anzahl Tage zwischen der zweiten Beobachtung in B und der zweiten in A ist, für die Ausreise:

$$M = \frac{m(\beta - \alpha) + n(\beta' - \alpha')}{m + n}$$

wenn m und n ganze Zahlen sind; hat man aber die Tage und Bruchtheile gegeben, so ist es bequemer, der Gleichung die Form zu geben:

$$M = \frac{m}{m + n} (\beta - \alpha) + \frac{n}{m + n} (\beta' - \alpha').$$

Wenn in der Station B nur eine Beobachtung gemacht werden konnte, dann ist $\beta = \beta'$ und wir haben für die Ausreise:

$$M = \alpha' - \beta - \frac{m}{m + n} \cdot (\alpha' - \alpha).$$

Für die Heimreise von B nach A hat man bei denselben Beobachtungen

$$M = - \frac{m(\beta - \alpha) + n(\beta' - \alpha')}{m + n}$$

und für eine Beobachtung in B :

$$M = \alpha' - \beta - \frac{m}{m + n} \cdot (\alpha' - \alpha).$$

Man sieht sofort, dass man es bei der Ableitung der Meridiandifferenz nur mit dem Gange während der Reise zu thun hat, während die Gänge an den Stationen A und B nicht zur Ableitung derselben gebraucht werden.

Hat man kurze Reisen auszuführen, so kann man die Intervalle m und n leicht gleich machen und es wird alsdann:

$$M = \frac{1}{2} [(\beta - \alpha) + (\beta' - \alpha')].$$

Nicht nur dass diese Methode der Bestimmungen von Meridiandifferenzen an ein und derselben Küste oder zwischen Küstenpunkten verschiedener

Ländercomplexe sehr zweckmässig ist, vielmehr ist dieselbe sehr wichtig gerade wenn es gilt, einen Punkt im Innern eines Landes oder zwei Punkte im Innern unter einander hinsichtlich ihrer Längendifferenz zu verbinden. Es wird hier gerade mit Rücksicht auf den Gebrauch von Taschenchronometern oder Uhren darauf aufmerksam gemacht, dass es wichtig ist, die Gangbeobachtung so kurz als möglich vor der Abfahrt und nach der Ankunft auszuführen.

Je kürzer die Dauer der Hin- und Zurückreise, desto grösser ist die Sicherheit.

Die Chronometerconstruction ist für eine horizontale Lage berechnet, der Taschenchronometer sollte daher stets, auch am Lande reisend, horizontal getragen werden; da dies mit mehrfachen Schwierigkeiten verknüpft ist, so ist die Frage berechtigt, ob es nicht zweckmässig ist, gute Ankeruhren für Landreisen, namentlich wenn dieselben nicht zu Fusse ausgeführt werden können, zu verwenden.

Um zur Aufnahme eines kleinen Gebietes längs einer Küste zurückzukehren, etwa einer Bucht eines Hafens, muss noch erwähnt werden, dass es wünschenswerth ist, geographisch gut bestimmte Punkte auch zu Ausgangspunkten weiterer Aufnahmen zu machen. Da es nur in wenigen Fällen möglich sein wird, solche Punkte unmittelbar zu einem Endpunkte einer zur Aufnahme dienenden Basis zu machen, so versäume man nicht, sie durch Messungen auf diese zu beziehen. Bei der Wahl einer Basis, Standlinie hat man besonders darauf zu achten, dass dieselbe durch möglichst ebenes Terrain geht, so dass ein Messen mit Stäben oder Messbändern keine zu grosse Schwierigkeiten bereitet; überdies muss man darauf Bedacht nehmen, dass man von den Endpunkten der Basis eine grosse Anzahl von wichtigen Punkten des zu vermessenden Terrains, deren Lage niederzulegen ist, überblicken kann. Die Länge der Basis richtet sich innerhalb gewisser Grenzen nach der zu erzielenden Genauigkeit und der für die Winkelmessungen verfügbaren Instrumente. Bei Vermessungen von Häfen, Buchten u. s. w. kommt es zunächst darauf an, dass die Winkel verhältnissmässig genau beobachtet werden, damit die relative Entfernung wiedergegeben werden könne; strebt man grössere Genauigkeit an, so muss die Messung der Basis mit aller Sorgfalt ausgeführt werden, und es wird sich in diesem Falle empfehlen, Holzstäbe (Bauernfeind'scher Construction) anzuwenden, die ein genaues Aneinanderlegen und ein Nivelliren gestatten; für minder genaue Messungen bedient man sich mit Vortheil der Stahlbandmaasse, der Lothleinen, eines oder des anderen der vielen Distanzmesser oder des Rochow'schen Mikrometers oder endlich auch des Schalles (siehe vorhergehenden Abschnitt). Hat man sich die hervorragenden Punkte markirt, sie der Reihe nach in einer oberflächlichen Skizze niedergelegt und mit Buchstaben bezeichnet, so beginnt man mit den Winkelmessungen von den Endpunkten der Basis, deren Azimut gleichfalls durch Sonnenbeobachtungen oder in irgend einer entsprechenden Weise bestimmt werden muss. Da es sich hier nicht darum handelt, eine Darlegung der Methoden der genauen Aufnahmen zu geben, sondern vielmehr nur um das Geben von Winkeln für Fälle, in welchen eine für die Aufnahmen gebotene Gelegenheit benutzt werden soll und eine grosse Genauigkeit nicht angestrebt werden kann, so können wir uns über diesen Gegenstand kurz fassen. Hat man zum Messen der Winkel einen Theodoliten, so ist wegen der Anwendung des Fernrohrs ein schärferes Einschneiden der Objecte und ein grösserer Umfang des zu vermessenden Gebietes möglich. In den meisten dem Seeofficier vorkommenden Fällen wird zur Ausführung der Winkelmessungen

nur ein guter Azimutcompass gebraucht werden können. Hat man einen Normalcompass, wie er nun in der kaiserlichen Marine eingeführt ist, so kann man damit sehr gute Resultate erzielen. Dieses Instrument ist mit einem Theilkreise und mit Nonien versehen, zum Messen von Winkeln auf eine Minute genau. Die Rose wird nur angewendet, um die magnetische Richtung der Basis zu ermitteln, sodann aber festgestellt. Vor dem Gebrauche muss das Instrument auf seine Fehler untersucht werden (siehe magnetische Beobachtungen pag. 120). Hat man die Winkelmessungen beendet, für welche man sich im Voraus nach trigonometrischen Grundsätzen einen Plan entworfen haben sollte, so kann man die Endpunkte der Basis durch Steine oder Blöcke, die nicht leicht zerstört werden können, markiren. Einer der beiden Endpunkte kann mit Vortheil, wenn er durch einen Stein bezeichnet würde, dazu dienen, die Ebbe- und Fluthbeobachtungen darauf zu beziehen. Zu diesem Zweck hat man den Nullpunkt des Pegels (siehe vorhergehenden Abschnitt) durch ein Nivellement auf den Fixstein zu beziehen. Bei der Wahl der Basis nehme man auch auf diesen Gesichtspunkt Rücksicht, was in den meisten Fällen keine Schwierigkeiten bereiten wird.

Ist man bei den Winkelmessungen auf den Sextanten oder den Spiegelkreis hingewiesen, so hat man auf die genaue centrische Lage des Instrumentes über dem Standpunkte zu achten und die gemessenen Winkel auf den Horizont zu reduciren, wenn die Objecte nicht in einer horizontalen Ebene liegen. Man muss zu diesem Zweck auch die Höhenwinkel entweder mit dem künstlichen Horizonte oder mittelst eines Mikrometerniveaus nehmen. Sind diese Höhen, h und h' , nur wenige Grade gross, und ist γ der zu reducirende Winkel, so ist die Reduction auf den Horizont (r) bekanntlich:

$$r = \frac{\sin^2\left(\frac{h+h'}{2}\right) \operatorname{tg} \frac{1}{2}\gamma - \sin^2\left(\frac{h-h'}{2}\right) \operatorname{cotg} \frac{1}{2}\gamma}{\cos h \cos h' \sin 1''}$$

In solchen Fällen, wo man eine grössere Anzahl von Winkeln zu reduciren hat, kann man sich Tabellen ableiten, in welchen einmal $(h \pm h')$ und dann $\frac{1}{2}\gamma$ die Argumente sind. Es wird die erste Tabelle die Grösse $10.000 \sin^2\left(\frac{h \pm h'}{2}\right)$ und die zweite die Grössen $\left(\frac{0.0001}{\sin 1''}\right) \operatorname{tg} \frac{1}{2}\gamma$ und $\left(\frac{0.0001}{\sin 1''}\right) \operatorname{cotg} \frac{1}{2}\gamma$ geben, wodurch die sonst umständliche Arbeit des Reducirens sehr vereinfacht wird. Die Allgemeine Formel ist bereits in Tietjen's Aufsatz p. 27 gegeben.

Sind ausserdem die Gegenstände, zwischen welchen die Winkel gemessen werden sollen, nahe bei dem Standpunkte, so hat man, ehe man die Reduction auf den Horizont ausführt, noch die Correction für Schiefenparallaxe an die Ablesungen anzubringen (siehe geogr. Ortsbestimmung pag. 24).

Wenn bei dem gebrauchten Sextanten die Entfernung des Drehungspunktes der Alhidade von der Fernrohraxe 0.075 Meter ist, so sind für folgende Entfernungen der Objecte die entsprechenden Correctionen für Schiefenparallaxe:

$$\begin{array}{ll} \text{für } 188.5 \text{ Meter} & = 68'' \\ \text{„ } 377.0 \text{ „} & = 34'' \\ \text{„ } 1885.0 \text{ „} & = 7'' \end{array}$$

Es lässt sich daraus ein Urtheil ableiten, für welche Entfernungen die Correctionen noch zu berücksichtigen sind oder vernachlässigt werden dürfen.

Zur Bestimmung des Azimuts terrestrischer Objecte hat man nach einer

der früher (pag. 36 und 119) auseinandergesetzten Methode zu verfahren, zu welchen wir hier nur die Bestimmung eines Azimuts mittelst des Sextanten hinzufügen möchten.

Man misst nämlich die Distanz des nahen oder entfernten Sonnenrandes (oder eines anderen Himmelskörpers) mit dem Objecte, dessen Azimut bestimmt werden soll. Kennt man die wahre Ortszeit der Beobachtung, die Höhe des terrestrischen Objectes über dem Horizonte, so leitet man das Azimut des Sonnenmittelpunktes, die Differenz im Azimut zwischen demselben und dem terrestrischen Gegenstande (Mire) und daraus das Azimut des letzteren ab.

Soll bei der Aufnahme eines Gebietes genauer verfahren werden, so hat man die Basis mit grösserer Schärfe zu messen und die gemessenen Winkel einer Ausgleichung zu unterwerfen. Wie dies zu geschehen habe, lehren die verschiedenen Werke über praktische Geometrie (Jordan's Taschenbuch). In solchen Fällen und wenn es sich um Aufnahmen einer grösseren Bucht und um Ausföhrung von Lothungen handelt, ist es von Vortheil, sich die betreffenden Gebiete durch ein Coordinatensystem darzustellen, in welchem die Hauptpunkte, welche wir durch Triangulation erhalten, eingetragen werden. Man kann sodann nach der im vorhergehenden Abschnitt angeführten Methode (pag. 660), eine beliebige Anzahl untergeordneter Punkte durch Rückwärtseinschneiden bestimmen und eintragen.

Es ist dies für die Zwecke der Lothungen von Wichtigkeit, wo es sich darum handelt, in jedem Augenblick die Stelle der Lothung durch gleichzeitiges Messen der beiden aneinanderliegenden Winkel zwischen drei gut bestimmten Objecten oder durch Messen der Distanzen auf der Linie der Deckpeilung zweier Objecte bestimmen zu können (siehe pag. 656).

Man versäume niemals während des Aufnehmens in das Vermessungsjournal alle erforderlichen Notizen über Lage der Punkte, über Verfahrungsweise u. s. w. zu machen und verlasse sich niemals auf das Gedächtniss, da sonst leicht mühevoll Arbeit durch Mangel richtiger oder durch das Anfügen unrichtiger Angaben nutzlos gemacht werden kann.

Höhenunterschiede. Wenn der Plan, die horizontale Projection eines Gebietes festgestellt und entworfen ist, so handelt es sich in zweiter Linie um die topographische Aufnahme, um die Erhebungen.

Es zerfällt dieser Theil in folgende einzelne Unterabtheilungen:

1. Nivellements und Conturenaufnahme an der Küste.
2. Trigonometrische Höhenmessungen.
3. Barometrische Höhenmessungen im Litorale und im Innern eines Continents reisend.

Für die Aufnahme nach Höhenverhältniss im Interesse der Hydrographie ist es nicht erforderlich, dieselbe weit von der Küste ab nach dem Innern auszuführen, es richtet sich die Entfernung jedoch nach dem Grade der Erhebungen. Je höher sich die Bergspitzen erheben, wie z. B. in dem äquatorialen Theil der Westküste Südamerikas, desto beträchtlicher sollte die Ausdehnung der Aufnahme nach innen sein. Das unmittelbare zur Küste gehörige Terrain ist topographisch aufzunehmen und zwar nach einem Nivellement, welches sich auch auf den Pegelstand, so wie er sich aus den Messungen ergibt, reduciren lässt. Zur Ausföhrung eines solchen bedarf es mindestens einer Ausrüstung mit Nivelliridiopter und einer Setzlibelle,*) die jedem Schiffe,

*) In Karl's Repertorium wird ein kleines Nivellirinstrument von Geppert, p. 294, Jahrg. 1874 beschrieben, welches hierfür zu empfehlen wäre.

welches Vermessungszwecke zu verfolgen hat, mitgegeben werden sollten. Die Höhenverhältnisse sollen ferner, wenn sie nur einigermaßen beträchtlich sind, in Horizontalcurven gegeben werden. Die Höschichten sind bei steil abfallenden Gestaden in Entfernungen von 20 zu 20 Meter und bei sanft ansteigendem Terrain von 10 zu 10 Meter und selbst in kürzeren Abständen aufzunehmen. In welcher Weise solche Aufnahmen gemacht werden, kann man in Bauernfeind's Elemente der Vermessungskunde, II. Auflage, pag. 628 u. f. oder in Jordan's Taschenbuch der praktischen Geometrie pag. 240 nachlesen.

Der Beobachter sollte sofort an Ort und Stelle sich den ungefähren Verlauf der Horizontalcurven nach dem Auge zeichnen, damit er später durch eine solche Skizze in der Ausarbeitung unterstützt werden kann.

Es sollte zugleich mit einer solchen Höhenaufnahme auch eine Charakteristik des Bodens gegeben und angedeutet werden, ob es sich um ein Sandufer, um Gestein, um Marschland u. s. w. handelt; ob das Gestade nackt oder buschig, abgebrochen oder zusammenhängend, trocken oder sumpfig ist, und es sind etwaige zur Landung von Truppen u. s. w. geeignete Plätze zu bezeichnen.

Trigonometrische Höhenmessungen. Von den unmittelbar an der Küste gelegenen Districten ist die Art der Erhebung des Terrains nach dem Innern zu und, wenn thunlich, auf trigonometrische Messung basirend, sind die Höhenverhältnisse festzustellen. Hier hängt der Grad der Schärfe der Messung zunächst noch wieder von den zur Verfügung stehenden Instrumenten ab. Mit Reflexionsinstrumenten und den durch deren Anwendung bedingten Methoden kann man eine Genauigkeit wie mit Universalinstrumenten nicht erwarten; allein mit Anwendung von Vorsicht und bei der richtigen Wahl der Basis, wofür möglicher Weise die für die übrigen trigonometrischen Aufnahmen benutzte, dienen kann, ist man immerhin in der Lage Resultate zu erzielen, die von den durch schärfere Methoden erlangten, nicht wesentlich abweichen, da ja doch die Refraction auf Messungen der Höhen auf trigonometrischem Wege, wenn nicht reciproke Beobachtungen, d. h. solche, die von der Station am Gestade hinauf zur Bergeshöhe und gleichzeitig von dieser herab zur Station gemacht werden, namentlich ihres stets sich mit den atmosphärischen Verhältnissen ändernden Charakters wegen, einen höchst störenden, die Genauigkeit sehr beeinträchtigenden Einfluss ausübt.

Es wird in vielen Fällen nicht möglich sein von der Uferbasis aus eine trigonometrische Höhenmessung auszuführen, oft sind die ersten Uferkämme der Gebirge und Plateaus zu gewinnen, um von dort aus die zu einer Höhenmessung nöthige Gelegenheit erlangen zu können. In solchen Fällen hat man die beiden Standlinien, sei es durch ein Nivellement oder durch trigonometrische Messung oder was in den meisten Fällen das günstigste und einfachste sein dürfte, durch barometrische Messungen hypsometrisch zu verbinden.

Die terrestrische Refraction. Schon an zwei verschiedenen Stellen dieses Werkes wurde der Refraction gedacht, aber der astronomischen zum Unterschiede von der, mit welcher wir es hier zu thun haben. (Siehe Tietjen pag. 28 und Weiss pag. 73.)

Der einzelne Reisende wird durch wirkliche Messungen nur wenig zur Erweiterung unserer Kenntniss über diesen, noch immer sehr der Begründung bedürftigen Punkt leisten können.

Gelegentliche Wahrnehmungen der Aenderungen in der Refraction bei feststehenden Instrumenten in Verbindung mit Feuchtigkeitsgehalt, Temperatur

und Schwere der Luft sind immerhin von Interesse, namentlich auch die Beobachtung der seitlichen Refraction unter verschiedenen Umständen. Eine Notirung solcher physikalischen Erscheinungen in den Tagebüchern sollten nicht versäumt werden.

Das Verhältniss des Refractionswinkels zu dem Winkel, welchen die Radien, die zu den beiden Punkten, deren Höhendifferenz bestimmt werden soll, gehören, am Mittelpunkt der Erde bilden, wird der Refractions-Coefficient genannt und es wird diese Grösse gewöhnlich mit k bezeichnet. Oft wird auch nur die halbe genannte Grösse mit k bezeichnet und Refractions-Coefficient genannt. Es ist wichtig, dass man auf diese oft Verwirrung bereitende Differenz achtet; wir geben k die obige Bedeutung. Diese Grösse ergibt sich aus der Triangulation grösserer Gebiete und die bis jetzt mit aller Sorgfalt ausgeführten Systeme haben Werthe ergeben, die für wenig über dem Meere gelegenen Gebiete zwischen $k = 0.12374$ und $k = 0.1760$ schwanken. Den Reisenden interessirt hierbei zunächst, dass sich auch ergeben zu haben scheint, dass der Coefficient mit der Höhe abnimmt; so fand man aus der Kaukasischen Triangulation für 100 Meter $k = 0.170$ und für 4000 Meter $k = 0.116$, Werthe, die mit den von Bauernfeind theoretisch abgeleiteten, 0.170 und 0.122, nahe übereinstimmen.

Der Reisende kann in den wenigsten Fällen in dem Maasse über seine Zeit verfügen, dass er seine Beobachtungen so einzutheilen vermöchte, wie sie ihm die günstigsten Resultate versprechen: er kann weder die Tageszeit, noch die brauchbarsten Feuchtigkeits- und andere Verhältnisse abpassen, und schon aus diesem Grunde ist es anzurathen, für den Refractions-Coefficient einen constanten Werth ($k = 0.1306$) anzunehmen, ein Verfahren, welches bei der grossen Unsicherheit des Elementes auch sonst mit Erfolg angewendet wird.

Wir werden hier nur auf die Höhenmessungen mit constantem Coefficienten Rücksicht nehmen, indem wir übrigens, wenn sich die Gelegenheit dafür bieten sollte, das Beobachten von gleichzeitigen und gegenseitigen Zenithdistanzen anempfehlen möchten. (Siehe Bauernfeind 2. Aufl. p. 603.)

Wenn d die Distanz zwischen 2 Orten der Erde, deren Höhenunterschiede hypsometrisch bestimmt werden soll, α die Höhe über dem Horizont in der einen Station (zumeist der niedrigeren), H und H' die Meereshöhe der beiden Stationen und ρ der Krümmungshalbmesser des Bogens des Schnittes, der durch die Station gehenden verticalen Ebene mit der Erdoberfläche, bedeutet, und $h = H' - H$, so haben wir

$$h = d \cdot \operatorname{tg} \alpha + \frac{d^2}{2\rho} - \frac{d^2 k}{2\rho} + \frac{H'^2}{2\rho} - \frac{H^2}{2\rho}$$

(Jordan, Taschenbuch der prakt. Geometrie, pag. 169), worin die beiden letzten Glieder stets sehr klein sind und für geringe Höhen über dem Meere vernachlässigt werden können*).

Die Entfernung d wird durch Triangulation abgeleitet, erfordert aber, da α stets nur klein sein wird, keine sehr grosse Genauigkeit. Wird α negativ, so liegt die einerseits zu bestimmende Station unterhalb der Beobachtungsstation; für Höhe des Instrumentes und Signale sind Correctionen

*) $\frac{d^2}{2\rho} - \frac{d^2 k}{2\rho} = \frac{1-k}{2\rho} d^2$, welcher Werth als Function von d in eine Tafel gebracht werden kann.

anzuwenden, um das Resultat mit Rücksicht auf die Höhendifferenzen am Erdboden zu erhalten.

Wenn man mit Reflexions-Instrumenten allein die Höhen zu messen hat, so hat man in den Endpunkten der Basis die schiefen Winkel zwischen dem zu bestimmenden Höhenpunkte und der Basis zu messen und in einem der Endpunkte den Höhenwinkel α mittelst künstlichem Horizonte und Sextanten oder einer Mikrometerlibelle. Man erhält daraus d durch einfache Rechnung.

Bei Reisen nach dem Innern von Continenten wird es sich bei trigonometrischen Bestimmungen der Höhen darum handeln zuerst die Höhe der Beobachtungsstation (H) über dem Meere zu ermitteln und dafür sind die barometrischen Höhenmessungen von besonderer Bedeutung.

Barometrische Höhenmessungen. Wir haben hier, je nach den Reisenden vorkommenden Fälle zu unterscheiden: entweder handelt es sich darum

- a) Von der Küste aufsteigend die Höhe eines Berges oder Bergrückens über dem Meere zu ermitteln oder
- b) Ein barometrisches Nivellement über ein Land, ein Gebiet auszudehnen, welches in Höhenschichten dargestellt werden soll. Oder endlich
- c) Im Innern eines Continentes reisend im Allgemeinen die Höhenverhältnisse über dem Meere festzustellen.

Jede dieser Aufgaben findet auf Reisen Anwendung, während in hydrographischen Arbeiten die unter a) genannte am häufigsten vorkommt, wesshalb sie denn auch zuerst behandelt werden soll; vorher jedoch einige allgemeine Gesichtspunkte.

Die zu barometrischen Höhenmessungen verwendeten Instrumente sind entweder Quecksilberbarometer, Aneroide oder Kochpunktinstrumente (Hypsometer). Ueber den Werth der einzelnen für die zu leistende Arbeit kann man nur so viel sagen, dass das Quecksilberinstrument, wenn in gutem Zustande erhalten, dasjenige ist, welches der genauesten Behandlung fähig ist und die zuverlässigsten Resultate zu erzielen vermag. Seiner Zerbrechlichkeit halber ist es in letzter Zeit durch das Aneroidbarometer etwas in den Hintergrund gedrängt worden; das letztere ist da, wo es auf, in kurzen Zeiträumen gemessene Höhendifferenzen ankommt, sehr gut zu gebrauchen. Seinem ganzen Wesen nach ist das Aneroid ein Interpolations Instrument und kann als solches und in steter Verbindung mit Quecksilberinstrumenten vortreffliche Dienste leisten. Ein Verlassen auf die Beständigkeit der Indexcorrection ein und desselben Instrumentes ist durchaus nicht zulässig. Diese Indexcorrection muss für verschiedene Temperaturen und für den Umfang des Luftdruckes, der bei den Messungen vorkommt, genau bestimmt werden. Ein Prüfen der Indexcorrection für einen bestimmten Luftdruck während der Reise, wo eine eingehende Untersuchung in den meisten Fällen nicht möglich ist, genügt, um sich aus der ursprünglichen Correction die für die Zeit geltende abzuleiten, da bei ein und demselben Instrumente, wenn die Veränderungen nicht allzu bedeutender Natur waren, dieselbe als Constante an die früher ermittelte Correction hinzugefügt werden kann. Die auf Correction der Aneroide abzielenden Untersuchungen sind nur für ein bestimmtes Instrument anwendbar; alle Versuche die Correction für diese Instrumente unter einem allgemeinen Gesichtspunkte zu betrachten, haben zwar dazu beigetragen, das Wesen derselben in mancher Beziehung aufzuklären, allein sie haben keineswegs die eingehende individuelle Untersuchung überflüssig oder auch nur entbehrlich gemacht.

Der Reisende benutze nur gut geprüfte und verglichene Instrumente.

Die Prüfung erstrecke sich auch bei Quecksilberbarometern auf verschiedene Luftdrucke. Das Hypsometer ist weniger dazu geeignet, feine Höhenunterschiede zu bestimmen, als vielmehr im Innern der Contiente reisend, den Luftdruck durch längere Reihen von Beobachtungen zu constatiren, um danach zu ersehen, ob sich erhebliche Veränderungen in den anderen, den Luftdruck unmittelbar messenden Instrumenten ergeben haben. Dies findet hier ganz besonders Anwendung auf Aneroide, welche niemals, wenn kein Quecksilberinstrument mitgenommen wurde, ohne Hypsometer auf längeren Reisen gebraucht werden sollte. Man kann leicht zwei oder drei Siedepunkthermometer mitführen und kann daher stets den Siedepunkt des reinen Wassers bestimmen und daraus den Luftdruck ableiten. Wenn man z. B. aus einer längeren Reihe von Bestimmungen des Siedepunktes, denselben zu 83°40 Celsius gefunden hat, so wird der entsprechende Luftdruck 406.48^{mm}. *) sein und wurden gleichzeitige Ablesungen des Aneroid's gemacht, so hat man aus einem Mittelwerthe die Correction des Instrumentes festzustellen und kann sich so vor größeren Irrthümern in der Indexcorrection schützen. Wie häufig geschieht es auf längeren Reisen, dass man ein Aneroidbarometer vor Anfang und am Ende derselben mit einem Quecksilberinstrumente vergleicht und glaubt damit allen Anforderungen genügt zu haben, bedenkt dabei aber nicht, dass sich im Verlaufe der Reise die Correction unzählige Male geändert haben kann! Es ist also jedem Reisenden, der ein Quecksilberinstrument nicht hat, zu empfehlen, mit dem Aneroid stets bei längeren Reisen ein Hypsometer anzuwenden. Um Veränderungen bei Quecksilberbarometern möglichst während der Reise zu vermeiden, schütze man sie vor Stößen und Erschütterungen. Trägt der Reisende das Barometer auf dem Rücken, so ist es sehr praktisch, dasselbe auch mit einem Riemen um den Leib festzuzschnallen, damit es am Körper festgehalten ist; die Erfahrung hat gelehrt, dass man unter solchen Verhältnissen, selbst in raschen Gangarten, ein Quecksilberinstrument zu Pferde transportiren kann. Sind Barometer im Wagen zu transportiren, so stelle man sie vertical, wenn möglich, und zwar mit dem unteren Ende auf eine mit Tuch überzogene Sofafeder, oder auf ein Gummipolster. Es ist wesentlich, dass, wo man sie auch aufhebt, man sie fest anschnallt, damit kein Hin- und Herschlagen stattfinden kann.

Bei der Beobachtung und der Aufstellung der Barometer und Thermometer gebrauche man alle nöthige Vorsicht. Es wird namentlich Nachdruck darauf gelegt, dass das Barometer sowohl, wie das Thermometer, welches zur Bestimmung der Temperatur der Luft abgelesen werden muss, im Schatten aufgehängt werden, und dass man bei Ersteren der verticalen Lage sich versichert halten muss. Ist nur eine beschränkte Anzahl von Ablesungen möglich, so thut man wohl daran, das Barometer erst, nachdem es einige Zeit in seinem Stative aufgehängt war, abzulesen.

Mit den Ablesungen des Barometers und Thermometers für Lufttemperatur notire man die genaue Zeit der Ablesung, beschreibe die Localität so genau als möglich, auch mit Beziehung auf die Erhebung des Instrumentes über dem Boden, gebe die Windrichtung und Stärke, Bewölkung, Zug der Wolken, und, wenn möglich, den Feuchtigkeitsgrad der Luft an. In den neuen Formeln (Bauernfeind und Jordan) wird die Spannkraft der Wasserdämpfe mit in Rechnung gebracht, ein Element, welches zu beobachten der Reisende nur ausnahmsweise sich in der Lage befinden dürfte. Konnte das

*) Siehe Tabelle Nr. 3. im Anhang.

Psychrometer beobachtet werden, so schreibe man die Resultate, zum Zwecke späterer Berechnung, in das Journal für Höhenbestimmungen ein; auch bemerke man, was aus einer grösseren Reihe, auch schon aus den Beobachtungen klar wird, ob das Barometer im Fallen oder im Steigen begriffen war.

Begreiflicher Weise ist es am Zweckmässigsten die Ablesungen zu solchen Stunden zu machen, an welchen der Luftdruck einen gewissen stationären Charakter hat, also um 9 Uhr des Morgens und Abends und um 3 Uhr in der Nacht und des Nachmittags. Allein auch hierin ist der Reisende zumeist durch andere Rücksichten gebunden und vermag auf Einhaltung dieser Regeln nur selten zu achten. Bei Stationen, an welchen die horizontale Entfernung nicht sehr gross ist und die barometrischen Ablesungen daher wohl mit demselben Barometer, das der Reihe nach erst in der unteren Station, dann in der oberen und nachher wieder in der unteren beobachtet wurde, muss man die obere und untere Beobachtung für eine und dieselbe Zeit interpoliren. Sollten strenge Anhaltspunkte für die Ausführung der Interpolation fehlen, so wird man möglicher Weise zu anderen Hilfsmitteln für die Vergleichbarkeit der Beobachtungen, als Anbringung einer Correction für täglichen Gang des Luftdruckes und der Temperatur, Veränderung des Luftdruckes an anderen, nicht allzuweit entfernten Orten u. s. w., greifen müssen.

Fehlerquellen können bei Höhenmessungen mit Barometern vorzugsweise darin liegen, dass man an der zu bestimmenden Station den Luftdruck nicht genau erhält, dann aber auch, dass der Luftdruck über dem Areal, auf welchem die Stationen liegen, nicht gleichmässig vertheilt ist, d. h. durch aufsteigende Luftströme durch ungleiche Erwärmung und bei grossen Strecken dadurch, dass die Stationen in verschiedenen Luftströmen zur Zeit der Beobachtung liegen, kann der Fall eintreten, dass in den beiden Stationen der Luftdruck mit Beziehung auf die betreffenden Normalen, dass die barometrische Abweichung, in beiden Stationen verschieden ist.

Was das Erste, die exacte Ermittlung des gerade herrschenden Luftdruckes, anbelangt, so hat man durch Bestimmung der Correction der zu verwendenden Instrumente durch Vergleichung derselben an beiden Stationen dafür Sorge zu tragen, dass man denselben oder die barometrische Differenz beider Stationen genau bestimmen kann.

Nach Bauernfeind ist der Dunstdruck bei den barometrischen Höhenmessungen in Betracht zu ziehen, und Rühlmann hat nach diesen Grundsätzen der Bauernfeind'schen Formel folgende Gestalt gegeben:

$$h = \overset{\text{met.}}{18400.2} \left(1.00157 + 0.003675 \frac{T+t}{2} \right) \times \left(1 + 0.378 \frac{\sigma'}{B} + \frac{\sigma''}{b} \right) \times \frac{2}{2} \\ (1 + 0.002623 \cos 2\varphi) \times \left(1 + \frac{2n+h}{6378150} \right) \log \frac{B}{b}$$

Wo T und t , σ' und σ'' , B und b die Temperaturen, Dampfspannungen und auf 0° reducirten Barometerstände an der unteren und oberen Station, h die Höhendifferenz in Meter, φ das Mittel der geographischen Breite und n die Höhe der unteren Station über dem Meere bedeutet. Hat man die Dampfspannungen beobachtet, so kann man nach folgender Gleichung, σ' und σ'' , rechnen:

$$\sigma = e - 0.0008 (t' - t'') b$$

und für Temperaturen unter Null:

$$\sigma = e - 0.000691 (t' - t'') b,$$

wo e das Maximum der Spannkraft (bei t'') bedeutet, t' und t'' beziehungsweise die Temperaturen der trockenen und der nassen Kugel.

Rühlmann hat nach diesen Formeln Tafeln berechnet und in seinem Werke „Barometrische Höhenmessungen und ihre Bedeutung für die Physik der Atmosphäre“ abgedruckt. Es befinden sich diese in dem Anhange zu diesem Werke theilweise wiedergegeben, und wird hier auf dieselben (Tabelle 4, 5 und 6) hingewiesen, indem hervorgehoben wird, dass dabei zunächst nur den Bedürfnissen des Reisenden Rechnung getragen werden soll.

Werden dagegen die Dunstdrucke an den beiden Stationen nicht wirklich beobachtet, so ist es vorzuziehen, anstatt einen Mittelwerth zu setzen, dieselben aus der Formel ganz wegzulassen.

Ausser obiger strengen Formel zur Ableitung der Höhen aus den Barometerständen kann man für Höhen unter 1000 Meter, und wenn es sich nur um einen Ueberschlag handelt, auch nach Babinet die folgende für Reisende bequeme Formel anwenden:

$$h = 16000 \frac{B - b}{B + b} \left(1 + 2 \frac{T + t}{1000} \right)$$

wo die einzelnen Buchstaben die gleiche Bedeutung wie oben haben. Hat man die Beobachtung ganz oder zum Theil mit Aneroidbarometern gemacht, so hat man diese nur auf die Ablesungen des Quecksilberbarometers, auf 0^0 C. reducirt, zu beziehen und die Rechnung wie gewöhnlich auszuführen.

Die Formel der Reduction der Ablesung eines Aneroidbarometers auf den auf 0^0 reducirten Barometerstand giebt Jordan in seinem Taschenbuch der praktischen Geometrie, pag. 209, wie folgt:

$$Q_0 = F + A + B(760 - F) + Ct,$$

wo A , B , C Coefficienten sind, die sich aus einer genauen, in einem Observatorium, vor und, wenn möglich, nach der Reise auszuführenden Untersuchung des Aneroids ergeben.

Q_0 ist der auf 0^0 reducirte Stand des Quecksilberbarometers, F die unreducirte Ablesung des Aneroid, t die Temperatur desselben. Die gründliche Prüfung des Aneroids vor dem Gebrauche auf seine Temperaturcoefficienten und bei verschiedenem atmosphärischen Drucke muss zur Bedingung der Zulässigkeit eines Aneroids zu Höhenbestimmungen gemacht werden, und sollten Reisende mangelhafte oder gar nicht untersuchte Instrumente zu ihren Beobachtungen nicht verwenden. Aber auch während der Reise sollte stets und in kurzen Zeitintervallen das Aneroid gewissenhaft mit dem Quecksilberbarometer unter voller Aufzeichnung aller Daten verglichen werden, da man alsdann später im Stande ist, eine Reductionstabelle für das Aneroid auch aus diesen Beobachtungen abzuleiten.

Es wurden im Beginne des Abschnittes der Höhenmessungen mittelst des Barometers drei verschiedene Fälle angenommen, die sich dem Reisenden zur Lösung darstellen können. Den ersten, wo man vom Meere aufsteigend eine Küstenstrecke in ihren Höhenverhältnissen feststellt und entweder eine feste Station an der Küste hat, welche gleichzeitige Aufzeichnungen der erforderlichen Daten liefert, oder, wenn man in kurzen Zeiträumen beobachtet, die Möglichkeit bietet, durch Interpolation die Beobachtungen auf ein und denselben Zeitpunkt zu reduciren, haben wir soeben in der allgemeinen Auseinandersetzung der Höhenmessungen behandelt. Der zweite Fall, die Aufnahme eines barometrischen Nivellements über ein Areal und längs gegebener Linien, erfordert eine systematische Anordnung der Beobachtungen. Die Ungleichheit der

Vertheilung des Luftdruckes tritt hier vor Allem störend auf, und um die davon herrührenden schädlichen Einwirkungen zu eliminiren, muss man darauf Bedacht nehmen, die Stationen, an welchen die Beobachtungen zur Reduction gemacht werden, mit Rücksicht auf das zu bearbeitende Gebiet möglichst gleichmässig zu vertheilen. Solche Stationen, die wir Fixpunkte nennen wollen, können entweder durch trigonometrische Nivellements bestimmt, oder es kann die Höhe derselben über dem Meere aus einer Reihe, vielleicht während Jahren fortgesetzter Barometeraufzeichnungen abgeleitet werden.

Meteorologische Stationen eignen sich daher zu solchen Zwecken sehr gut und es sollte der Reisende, welcher ein Nivellement in einem Gebiete aufzusuchen hat, sich sofort versichern, ob er solche Fixpunkte in genügender Zahl und so vertheilt findet, dass sie in verschiedenen Azimuten von der zu bestimmenden Station gelegen sind, weil unter solchen Verhältnissen eine grössere Wahrscheinlichkeit besteht, die Ungleichheit des Luftdruckes eliminiren zu können.

Die Ableitung der Höhe, selbst aus einer längeren Reihe von Beobachtungen, lässt sich nur selten mit vollkommener Schärfe ausführen, weil eben gewisse Eigenthümlichkeiten der Lage (die mittlere Windrichtung) einen Einfluss auf den mittleren Luftdruck äussern, der sich nicht vollständig entfernen lässt. Allein man nehme nur jede Gelegenheit wahr, die Instrumente der Stationen mit jenen, welche im Felde gebraucht werden sollen, zu vergleichen, damit man unter allen Umständen Instrumentenfehler unschädlich zu machen vermag.

Ehe man die Arbeit beginnt, ordnet man die Beobachtungen so an, dass man stets für die im Felde auszuführenden Ablesungen correspondirende auf den Stationen zu erlangen vermag. Werden die horizontalen Entfernungen sehr beträchtlich von solchen Fixpunkten, so thut man wohl daran, dazwischen hinein secundäre Punkte einzuschieben und an denselben registriren zu lassen. Uebrigens hat die Erfahrung gezeigt, dass bei einer correcten Anordnung der Stationen und unter günstigen atmosphärischen Verhältnissen selbst bei beträchtlichen Entfernungen (100—150 engl. Meilen) durch eine vergleichsweise kurze Beobachtungsreihe gute Resultate erzielt werden können.

Wenn man es bei der Feststellung der Reihe der Beobachtungen an den zu bestimmenden Punkten in seiner Macht hat frei zu wählen, so thut man wohl daran, hierbei so zu verfahren, dass man von Zeit zu Zeit eine Controlbeobachtung an einer schon bestimmten Stelle zu machen vermag*), oder dass man trigonometrisch oder durch Nivellement bestimmte Punkte (Strassen-, Eisenbahn-, Canalübergänge) auch barometrisch bestimmt. Ueber die Anordnung und Reihenfolge lässt sich im Allgemeinen sonst nichts feststellen, weil solche zu sehr von besonderen Umständen bedingt werden.

Auf wellenförmigem Gebiete werden zu Zwecken hypsometrischer Bestimmungen sich die Stationen häufen müssen, und namentlich sind solche Punkte besonders zu beachten, wo die in ihrer allgemeinen Richtung ziehende Curslinie des Reisenden einen Fluss, eine Strasse, einen Gebirgspass, eine Vegetationsgrenze, die Grenze einer geologischen Formation u. s. w. überschreitet. Genaue Feststellung der Localität ist natürlich durchweg nothwendig. Ist bereits eine Karte des Gebietes vorhanden, so lege man die abgemessenen Linien in derselben nieder und bemerke genau die Localität der Beobachtung (siehe Kiepert und Richthofen).

Es bleibt uns nun noch übrig, über den dritten allgemeinen Fall, wenn

*) etwa durch Ausführung einer Schleife.

im Innern eines Continentes Höhen barometrisch gemessen wurden, ohne dass man auf barometrische Angaben von Stationen rechnen durfte, zu behandeln und anzugeben, wie hierbei zu verfahren ist. Man hat häufig zur Berechnung der Höhen in diesem Falle, für die unteren Stationen, einen mittleren Luftdruck und eine mittlere Temperatur angenommen und daraus in Verbindung mit den auf der Reise gemachten Beobachtungen die Höhen über dem Meere abgeleitet. Nicht allein wird in solchen Fällen die Annahme gar häufig gemacht, dass der Luftdruck am Meere überall auf der Erde gleich ist, sondern es wird auch angenommen, dass die Schwankungen desselben während des Jahres und Tages vernachlässigt werden dürfen. Beide Annahmen sind, wie ein Jeder weiss, der sich mit dem Gegenstande beschäftigt hat, unrichtig. Die vorzüglichen Tafeln des Luftdruckes über die Erde von Alex. Buchan erweisen, wie gross die Unterschiede des mittleren Luftdruckes am Meere sind und zeigen, wie sich die Areale hohen und niedrigen Luftdruckes im Laufe des Jahres verschieben, so dass also ohne Rücksichtnahme darauf die Resultate der Rechnung unmöglich richtig werden können. Aber was das Schlimmste ist, es werden vielleicht ganz gute Beobachtungen durch diese Art der Rechnung nutzlos gemacht werden. Buchan zeigt in einer kleinen Arbeit: *Determination of heights, chiefly in the interior of continents from observations of atmospheric pressure**) die Irrthümer, welche begangen werden; und spricht seine Meinung über die Art und Weise der Reduction barometrischer Höhenmessungen aus.

Wir möchten Jene, welche mit Reduction solcher Beobachtungen zu thun haben, darauf aufmerksam gemacht haben, dass man nicht allein auf die Verschiedenheit des Luftdruckes an verschiedenen Gestaden Rücksicht zu nehmen hat, dass vielmehr auch eine Correction für Schwankung des Luftdruckes während des Jahres und für den Tag anzubringen ist. Andererseits geht aus jener Schrift aber auch hervor, dass man aus gewissenhaften Beobachtungen über Wind und Wetter oft schon auf die Nutzlosigkeit einer Bestimmung schliessen kann und daher besser dieselbe ganz verwirft, als dass man ein notorisch unrichtiges Resultat aufnimmt. Doch das sind Dinge, die den Rechner vorzugsweise interessiren, der Reisende muss nur instruiert werden, wie er seine Beobachtungen zu machen hat, damit sie werthvoll werden, und hierfür ertheilt Buchan in seiner Arbeit Regeln, die wir zum Schlusse der Beherzigung sehr empfehlen:

Barometrische Beobachtungen zu Zwecken von Höhenbestimmungen müssen folgende Einzelheiten enthalten:

1. Breite und Länge des Platzes.
2. Das Datum der Beobachtungen, worin das Jahr, der Monat, der Tag des Monates und die Stunden ganz genau angegeben sind.
3. Die Beobachtung selbst, wie sie gemacht wurde, ob mit einem Quecksilber- oder einem Aneroidbarometer. Wenn die Beobachtung mit einem Kochpunktapparate gemacht wurde, so muss der Temperaturgrad angegeben werden und nicht etwa das Aequivalent in Druck.
4. Die Temperatur der Luft im Schatten.
5. Den Zustand des Wetters zwei Tage vor und zwei Tage nach der Beobachtung; die Temperatur der Luft, den wahrscheinlichen Feuchtigkeitsgehalt, wie sich derselbe durch das Gefühl oder seine Einwirkung auf die umliegenden Gegenstände zu erkennen giebt, - die Bewölkung, der Regenfall, die Richtung, das Umlaufen und Ver-

*) Proceedings of R. Sc. Met. Society January 1869.

ändern und die Stärke des Windes, nebst irgend welchen auffallenden gleichzeitigen Erscheinungen.

Kann das Psychrometer beobachtet werden, so ist das von grossem Vortheile. Zu diesen wichtigen Winken möchten wir noch hinzufügen, dass der Reisende im Innern eines Continentes wohl daran thut, von Zeit zu Zeit einen längeren Aufenthalt an einer zum Lebensunterhalte geeigneten Stelle zu nehmen, um durch längere Reihen von Beobachtungen zuverlässige Resultate erhalten zu können. Er kann dann von einer solchen neuen Basis ausgehend mit grösserer Zuversicht seine mühevollen Arbeit fortführen, es können die Instrumente nachgesehen und gereinigt werden, wodurch die geringe Verzögerung reichlich aufgewogen wird.

Magnetische Beobachtungen. Ein eigenes Capitel über magnetische Beobachtungen von H. Wild enthält Alles, was mit Rücksicht auf Beobachtungen am Lande zu sagen ist; wir verweisen daher den Reisenden darauf, und heben nur hervor, dass bei der Wahl der magnetischen Station am Lande grosse Sorgfalt und namentlich Beachtung der geologischen Formation stattfinden muss. Wenn es irgend angänglich ist, so vermeide man vulcanische Gesteine auf das Sorgfältigste, sie vermögen die aus den Beobachtungen erhaltenen Werthe der magnetischen Elemente so zu beeinflussen, dass dieselben nutzlos werden. Es empfiehlt sich, vor einer jeden Beobachtung die Ermittlung des Einflusses des an der Station vorherrschenden Gesteines auf die Magnetnadel durch Annähern eines Fragmentes zu prüfen und in das Tagebuch eine Notiz über das Resultat dieser Untersuchung einzutragen. Der Reisende versäume das ja nicht, indem er einmal seine magnetischen Beobachtungen werthvoller machen kann und andererseits die Untersuchung über die Einwirkung geologischer Formationen an und für sich ein Interesse hat. Er wird die Erfahrung machen, dass bei Weitem eine grössere Anzahl Gesteine auf seine aufgehängten Magnete einen Einfluss üben, als man im Allgemeinen anzunehmen geneigt ist.

Bodenverhältnisse, Vegetation und Fauna. Es ist dem Hydrographen sehr häufig eine Gelegenheit gegeben, im Interesse der Flora, Fauna und der Bodenverhältnisse, ja der Culturfähigkeit des Landes Beobachtungen zu machen, oder doch solche zu veranlassen. Man bedenke namentlich, dass von der richtigen Beurtheilung eines Landes, eines Küstenstriches dem Navigateur eine Gelegenheit geboten wird, zur Wohlfahrt seiner Nation beizutragen, wie dies die Geschichte der Colonien, besonders jene der Holländer und Engländer, zur Genüge erweist. Den Berichten eines Cook, Flinders, King und anderer verdankt die Ausbreitung englischer Handelsbeziehungen und Colonisirung ausserordentlich viel. Solche Berichte verlangen eine beträchtliche Vielseitigkeit, namentlich auch nach der Richtung von Gebieten, die der hydrographische Beobachter allein nicht beherrschen kann, weshalb es denn geboten erscheint, ihm namentlich Aerzte und Gelehrte zur Seite zu geben, welche auch andere Gebiete der Naturforschung bearbeiten können. Schiffe, die zu Vermessungszwecken in ferne Gegenden ausgesandt werden, sollten stets in der Auswahl des Personals die Möglichkeit geben, auch Geologie, Zoologie und Botanik zu bereichern.

IX. Schlussbemerkungen.

In den vorhergehenden Abschnitten sind die vorzüglichsten Gesichtspunkte, welche bei hydrographischen Beobachtungen und Aufnahmen zu berücksichtigen sind, in allgemeinen Zügen hervorgehoben worden; dem

Studium von Specialwerken muss es überlassen bleiben, den Reisenden, der wissenschaftliche Ziele verfolgt, nach den einzelnen Richtungen hin weiter auszubilden. Dies gilt vorzugsweise auch von manchen Zweigen der Forschung, die mit dem hier behandelten verwandt sind und zur erfolgreichen Pflege besonderer, umfassender Ausbildung und Erfahrung bedürfen. Der Vollständigkeit der in diesem Werke behandelten wissenschaftlichen Gegenstände wegen, mögen zum Schlusse noch einzelne Aufgaben namhaft gemacht werden, deren Bearbeitung von Seiten tüchtiger Reisenden der Wissenschaft zum Vortheil reichen kann.

Unter Beobachtungen dieser Art nehmen die Bestimmungen der Länge des einfachen Secundenpendels einen hervorragenden Platz ein; während dieselben im vorigen Jahrhundert und zu Anfang dieses Jahrhunderts in den Instructionen einer jeden grösseren wissenschaftlichen Expedition nicht fehlen durften, waren sie in der Neuzeit, bis vor etwa 10 Jahren, fast gänzlich in Vergessenheit gerathen. Die Unsicherheit in den Bestimmungen der Figur der Erde und die Uebereinstimmung der aus Pendelbeobachtungen abgeleiteten Resultate haben zur Wiederaufnahme dieser wichtigen Forschungen Vieles beigetragen. Es können Beobachtungen mit einem leicht transportablen Reversionspendel mit Messapparat solchen Reisenden, die sich einige Zeit an ein und demselben Orte zu wissenschaftlichen Zwecken aufhalten, nur auf das Dringendste anempfohlen werden; während in Fällen, in welchen zur Durchführung vollständiger Beobachtungsreihen (absoluten Bestimmungen) Zeit oder Localität nicht geboten sind, invariable Pendel einfacher Construction zur Anwendung kommen können. Damit die Resultate zuverlässig werden, ist es erforderlich, dass die verwendeten Pendel an einem Orte, der genau mit Rücksicht auf die Länge des Secundenpendels bestimmt ist, geprüft und deren Coëfficienten festgestellt werden, und überdies, dass der Beobachter sich in einem Observatorium für Arbeiten dieser Art vorbereitet und eine Uebung erworben hat. Das Studium der Abhandlungen von Kater, Sabine, Bessel und Peters über Pendelbeobachtungen muss ihm besonders zur Pflicht gemacht werden.

Eine Gattung von Erscheinungen, für deren Beobachtung sich dem Reisenden in allen Klimaten der Erde vielfach Gelegenheit darbietet, sind die optischen Erscheinungen in der Atmosphäre. Indem wir an die Bemerkungen von Weiss über Dämmerung (p. 69 d. W.) anknüpfen, heben wir die Wichtigkeit der Beobachtungen anderer Phänomene, die zu dem Auf- und Untergange der Sonne und des Mondes eine Beziehung haben, hervor und empfehlen Reisenden sorgfältige Aufzeichnungen über Nachdämmerung oder Gegendämmerung, die sich als blaues Segment an dem von der Sonne abliegenden Theile des Horizonts zeigt, über das Glühen der Berge (Alpenglühen) und über Dämmerungsstrahlen. Eine Erscheinung, welche hierher gehört und von Listing auf dem Aetna beobachtet wurde, ist das Darstellen des Schattens eines Berges, hinter welchem die Sonne auf- oder untergeht, über dem von ihr abliegenden Theile des Horizonts. Aufzeichnungen über Luftspiegelung (Mirage) und Kimmung und die diese Erscheinungen begleitenden atmosphärischen Verhältnisse, sowie über Wolkenbildung (siehe Hann, p. 142 d. W.), Färbung und spectroscopisches Verhalten des Himmels u. s. w. sind nur von besonderem Werthe, wenn sie mit einem vollen Verständnisse der Sache gemacht werden. Ein Gleiches gilt von Beobachtungen und Messungen von Höfen um Mond und Sonne, von Lichtkränzen (indem man beide Gattungen der Erscheinungen genau zu unterscheiden hat), von Nebensonnen (Parhelien) und von Sonnen- und Mond-, Regen- oder

Nebelbogen. Der Reisende, welcher die Kenntniss dieser interessanten Gattung von Erscheinungen fördern will, wird wohl daran thun, sich durch ein Studium der einschlägigen Abhandlungen von Frauenhofer, Fresnel, Kämtz, Galle und Anderer dafür vorzubereiten.

Tiefseeforschungen und Tieflothungen nehmen in unseren Tagen eine so hervorragende Stellung unter jenen Forschungszweigen ein, die besonders der Entwicklung der Wissenschaft dienen, dass sie in einem Werke, wie das vorliegende, mindestens eine Erwähnung finden müssen. In einzelnen der vorhergehenden Artikel wurde schon der hierher gehörenden Forschungen gedacht; so wurde in der Arbeit von Möbius vom Schleppen, in diesem Abschnitte von Thermometer-, Aräometer- und Tiefenmessungen gesprochen. Da die zur erfolgreichen Pflege dieser Forschungszweige erforderlichen Apparate, die ganze Methode der Arbeit, mit Dampfkraft ausgerüstete Schiffe (sowohl zum Reguliren der Bewegung als zum Bedienen der Apparate) voraussetzen, welche einem Reisenden, wie wir uns denselben in diesem Werke gedacht haben, nicht zu Gebote stehen, so muss die einfache Erwähnung genügen. Besondere Instructionen und das Studium von Specialwerken, wie die Berichte über die Reise der Porcupine, der Hydra und die Arbeiten der Commission zur Erforschung der deutschen Meere müssen die Grundlage von Untersuchungen sein, welche unsere Erkenntniss nach dieser Richtung fördern sollen.

Zum Schlusse sei noch die Bedeutung hervorgehoben — und es gilt dies in gewissem Sinne auch für die in den übrigen Artikeln dieses Werkes behandelten Gegenstände — welche ein gewissenhaftes und von Verständniss geleitetes Sammeln wissenschaftlichen Materials für die Entwicklung der einzelnen Forschungszweige haben muss. Begreiflicher Weise bezieht sich diese Bemerkung besonders auf Reisen in Culturländern, in welchen bereits wissenschaftlich gearbeitet wird und sich dem Forscher auf den verschiedenen Gebieten Manches darbietet, was seine eignen Arbeiten zu vervollständigen und deren Werth zu erhöhen geeignet ist. Allein es muss hierbei ein besonderer Nachdruck darauf gelegt werden, dass das Sammeln wissenschaftlichen Materials nur einen Werth haben kann, wenn dabei eine gewissenhafte Kritik geübt wird, wenn die Autorität und die Mittel, wodurch die in Frage stehenden Resultate erzielt wurden, in einem jeden Falle festgestellt werden. Mangel an hierbei anzuwendender Umsicht kann die Werthlosigkeit gemachter Sammlungen und selbst, statt Förderung wissenschaftlicher Erkenntniss, Verwirrung zur Folge haben.

A n h a n g.

Literatur zur allgemeinen Ethnologie.

- Prichard, Researches into the physical history of man. London 1813 u. folg. Auflgn., übersetzt von Wagner (Naturgeschichte des Menschengeschlechts).
- Bory, de, St. Vincent, L'homme. Sec. ed. Paris 1827.
- Kant, Anthropologie. Königsberg 1798.
- Girtanner, Ueber das Kant'sche Princip der Naturgeschichte.
- Roon, v., Darstellung der allgemeinen Verhältnisse und Erscheinungen der Völkerkunde. Berlin 1840.
- Peschel, Völkerkunde. Leipzig 1874.
- Müller, F., Allgemeine Ethnographie. Wien 1871.
- Rougemont, Précis d'ethnographie. Neuchâtel 1835—1837.
- Diefenbach, Vorschule der Völkerkunde. Frankfurt a. M. 1864.
- Brace, The races of the old world. London 1863.
- Nott & Glidden, Indigenous Races of the Earth. Philadelphia 1857.
- Le Hon, L'homme fossile. Paris 1857.
- Lubbock, die Vorgeschichte des Menschen, übersetzt von Passow, Jena 1874, (mit einer Einleitung Virchow's).
- Perty, Grundzüge der Ethnographie. Leipzig und Heidelberg 1859.
- Kriegk, die Völkerstämme und ihre Zweige. Frankfurt a. M. 1858.
- Lüken, Einheit des Menschengeschlechts. Hannover 1845.
- Latham, Descriptive Ethnology. Vol. 1 u. 2. London 1859.
- Blumenbach, Decas collectionis suae craniorum diversarum gentium illustrata. Göttingen 1790.
- Ueber die natürliche Verschiedenheit des Menschengeschlechts. Leipzig 1798.
- Davis, Thesaurus-craniorum,
- Klemm, Allgemeine Culturgeschichte der Menschheit. 10 Bände. Leipzig 1843—1852.
- Tylor, Primitive Culture. London 1873. Uebersetzt von Spengel & Proske. Leipzig u. Heidelberg 1874.
- Waitz, Anthropologie der Naturvölker. Bd. 1—5. Leipzig 1859—74. (Fortgesetzt von Gerland),

Tab. 1.

Maximal-Spannung des Wasserdampfes (e_1) in der Atmosphäre
in Millimeter für Celsiusgrade der Temperatur.

Temperatur.	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8
0	m. m.	m. m.	m. m.	m. m.	m. m.
— 14.0	1.51	1.49	1.47	1.44	1.42
— 13.0	1.64	1.62	1.59	1.57	1.54
— 12.0	1.78	1.75	1.73	1.70	1.67
— 11.0	1.93	1.90	1.87	1.84	1.81
— 10.0	2.09	2.06	2.03	2.00	1.97
— 9.0	2.27	2.24	2.20	2.16	2.13
— 8.0	2.46	2.42	2.38	2.35	2.31
— 7.0	2.67	2.63	2.58	2.54	2.50
— 6.0	2.89	2.84	2.80	2.75	2.71
— 5.0	3.12	3.08	3.03	2.98	2.93
— 4.0	3.37	3.32	3.27	3.22	3.17
— 3.0	3.64	3.59	3.53	3.48	3.43
— 2.0	3.93	3.87	3.81	3.75	3.70
— 1.0	4.24	4.17	4.11	4.05	3.99
0.0	4.56	4.50	4.43	4.36	4.30
	4.56	4.63	4.70	4.76	4.83
1.0	4.90	4.97	5.05	5.12	5.19
2.0	5.27	5.34	5.42	5.50	5.57
3.0	5.65	5.73	5.81	5.90	5.98
4.0	6.06	6.15	6.24	6.32	6.41
5.0	6.50	6.59	6.68	6.78	6.87
6.0	6.97	7.07	7.16	7.26	7.36
7.0	7.46	7.57	7.67	7.77	7.88
8.0	7.99	8.10	8.21	8.32	8.43
9.0	8.55	8.67	8.78	8.90	9.02
10.0	9.15	9.27	9.39	9.52	9.64
11.0	9.77	9.90	10.03	10.17	10.30
12.0	10.44	10.58	10.72	10.86	11.00
13.0	11.15	11.29	11.44	11.59	11.74
14.0	11.90	12.05	12.21	12.37	12.53
15.0	12.69	12.85	13.02	13.19	13.76
16.0	13.53	13.70	13.88	14.05	14.23
17.0	14.42	14.60	14.78	14.97	15.16
18.0	15.35	15.55	15.74	15.94	16.14
19.0	16.35	16.55	16.76	16.97	17.18
20.0	17.39	17.61	17.83	18.05	18.27
21.0	18.50	18.73	18.96	19.19	19.43
22.0	19.66	19.91	20.15	20.70	20.65
23.0	20.90	21.15	21.41	21.67	21.93
24.0	22.20	22.46	22.74	23.01	23.29
25.0	23.57	23.85	24.13	24.42	24.71
26.0	25.01	25.30	25.60	25.91	26.22
27.0	26.53	26.84	27.15	27.47	27.80
28.0	28.12	28.46	28.78	29.13	29.47
29.0	29.81	29.15	30.50	30.86	31.21
30.0	31.58	31.94	32.31	32.68	33.05

Tab. 2.

- Abgekürzte Tabelle zur Reduction der in Millimeter ausgedrückten Barometerstände auf 0°.

Celsius.	$f(t)$	Celsius.	$f(t)$
— 10	+ 0.00162	+ 11	— 0.00177
— 9	+ 0.00146	+ 12	— 0.00193
— 8	+ 0.00129	+ 13	— 0.00209
— 7	+ 0.00113	+ 14	— 0.00225
— 6	+ 0.00097	+ 15	— 0.00241
— 5	+ 0.00081	+ 16	— 0.00257
— 4	+ 0.00065	+ 17	— 0.00274
— 3	+ 0.00049	+ 18	— 0.00290
— 2	+ 0.00032	+ 19	— 0.00306
— 1	+ 0.00016	+ 20	— 0.00322
0	0.00000	+ 21	— 0.00338
+ 1	— 0.00016	+ 22	— 0.00354
+ 2	— 0.00032	+ 23	— 0.00370
+ 3	— 0.00048	+ 24	— 0.00386
+ 4	— 0.00065	+ 25	— 0.00402
+ 5	— 0.00081	+ 26	— 0.00418
+ 6	— 0.00097	+ 27	— 0.00434
+ 7	— 0.00113	+ 28	— 0.00450
+ 8	— 0.00129	+ 29	— 0.00466
+ 9	— 0.00145	+ 30	— 0.00482
+ 10	— 0.00161		

Beispiel: Ablesung = 745.78^{mm} $t = 16.2^{\circ}$

$f(t) = -0.00260 \times 745.78 = -1.94^{\text{mm}}$.

auf 0° reducirter Barometerstand = $745.78^{\text{mm}} - 1.94^{\text{mm}} = 743.84^{\text{mm}}$.

Tab. 3.

Barometerstände für verschiedene Temperaturen des siedenden Wassers
(Regnault's Tafel, verbessert von Moritz.)

	· 0	· 1	· 2	· 3	· 4	· 5	· 6	· 7	· 8	· 9
Celsius	Millimeter.									
80	354.62	356.06	357.50	358.96	360.41	361.87	363.34	364.81	366.29	367.77
81	369.26	370.75	372.25	373.75	375.25	376.77	378.28	379.80	381.33	382.87
82	384.40	385.95	387.49	389.05	390.61	392.17	393.74	395.31	396.89	398.48
83	400.07	401.66	403.26	404.87	406.48	408.10	409.72	411.35	412.98	414.62
84	416.26	417.91	419.57	421.23	422.89	424.56	426.24	427.92	429.61	431.30
85	433.00	434.71	436.42	438.13	439.85	441.58	443.31	445.05	446.80	448.55
86	450.30	452.06	453.83	455.60	457.38	459.17	460.96	462.75	464.55	466.36
87	468.17	469.99	471.82	473.65	475.49	477.33	479.18	481.04	482.90	484.76
88	486.64	488.52	490.40	492.29	494.19	496.09	498.00	499.92	501.84	503.77
89	505.70	507.65	509.59	511.54	513.50	515.47	517.44	519.42	521.40	523.39
90	525.39	527.40	529.41	531.42	533.44	535.47	537.51	539.55	541.60	543.65
91	545.71	547.78	549.86	551.94	554.03	556.12	558.22	560.33	562.44	564.56
92	566.69	568.82	570.96	573.11	575.27	577.43	579.59	581.77	583.95	586.14
93	588.33	590.53	592.74	594.96	597.18	599.41	601.65	603.89	606.14	608.40
94	610.66	612.93	615.21	617.50	619.79	622.09	624.39	626.71	629.03	631.36
95	633.69	636.03	638.38	640.74	643.10	645.48	647.86	650.23	652.63	655.04
96	657.44	659.86	662.28	664.71	667.15	669.59	672.05	674.51	676.97	679.45
97	681.93	684.42	686.92	689.42	691.94	694.46	696.98	699.52	702.06	704.62
98	707.17	709.74	712.31	714.90	717.49	720.08	722.69	725.30	727.92	730.55
99	733.19	735.84	738.49	741.15	743.82	746.50	749.18	751.87	754.57	757.28
100	760.00	762.73	765.46	768.20	770.95	773.71	776.47	779.25	782.03	784.82

Tab. 4.

Tabelle zur Berechnung der Spannkraft des Wasserdampfes in der Atmosphäre aus Psychrometer-Beobachtungen.

$$-0.0008 (t' - t'') b = e_2$$

$$0.000691 (t' - t'') b = e_2$$

b.	$t' - t''$										Wenn das feuchte Thermometer mit Eis bedeckt ist $t' - t''$		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	1.	2.	3.
400	0.32	0.64	0.96	1.28	1.60	1.92	2.24	2.56	2.88	3.20	0.28	0.55	0.83
420	0.34	0.69	1.02	1.34	1.68	2.02	2.35	2.69	3.02	3.36	0.29	0.58	0.87
440	0.35	0.70	1.06	1.41	1.76	2.11	2.46	2.82	3.17	3.52	0.30	0.60	0.91
460	0.37	0.74	1.10	1.47	1.84	2.21	2.57	2.94	3.31	3.68	0.32	0.63	0.95
480	0.38	0.77	1.15	1.53	1.92	2.30	2.69	3.07	3.46	3.84	0.33	0.66	0.99
500	0.40	0.80	1.20	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20	3.60	4.00	0.35	0.69	1.04
520	0.42	0.84	1.25	1.66	2.08	2.50	2.93	3.33	3.74	4.16	0.36	0.72	1.08
540	0.43	0.87	1.30	1.73	2.16	2.59	3.05	3.46	3.89	4.32	0.37	0.75	1.12
560	0.45	0.90	1.34	1.79	2.23	2.69	3.14	3.58	4.03	4.48	0.39	0.77	1.16
580	0.46	0.93	1.39	1.86	2.32	2.78	3.25	3.71	4.18	4.64	0.40	0.80	1.20
600	0.48	0.96	1.44	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84	4.32	4.80	0.41	0.83	1.24
620	0.50	0.99	1.49	1.98	2.48	2.98	3.47	3.97	4.46	4.96	0.43	0.86	1.28
640	0.51	1.02	1.54	2.05	2.56	3.07	3.58	4.10	4.61	5.12	0.44	0.88	1.33
660	0.53	1.06	1.58	2.11	2.64	3.17	3.70	4.22	4.75	5.28	0.46	0.91	1.37
680	0.54	1.09	1.63	2.18	2.72	3.26	3.81	4.35	4.90	5.44	0.47	0.94	1.41
700	0.56	1.12	1.68	2.24	2.80	3.36	3.92	4.48	5.04	5.60	0.48	0.97	1.45
720	0.58	1.15	1.73	2.30	2.88	3.46	4.03	4.61	5.18	5.76	0.50	1.00	1.49
740	0.59	1.18	1.78	2.37	2.96	3.55	4.14	4.74	5.33	5.92	0.51	1.02	1.53
760	0.61	1.21	1.83	2.44	3.04	3.65	4.26	4.87	5.48	6.08	0.53	1.05	1.57
780	0.63	1.24	1.89	2.51	3.12	3.75	4.37	5.00	5.63	6.24	0.54	1.08	1.62

$\sigma = e_1 - e_2$, wobei e_1 aus Tabelle 1 genommen wird.

Tab. 5.

$$\log \left(1 + 0.378 \frac{\sigma'}{B} \right) \text{ und } \log \left(1 + 0.378 \frac{\sigma''}{b} \right)$$

b. mm.	σ mm.									
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
400	41	82	128	164	206	247	289	330	371	411
420	39	78	117	156	196	235	275	314	353	391
440	37	75	112	150	187	225	262	299	337	374
460	36	72	107	143	179	215	251	286	322	358
480	34	69	103	137	172	206	240	274	309	343
500	33	66	99	132	165	198	230	263	296	329
520	32	63	95	127	158	190	221	253	284	316
540	30	61	91	122	152	183	213	244	274	305
560	29	59	88	118	147	177	206	235	265	294
580	28	58	86	114	143	171	200	228	257	284
600	28	55	83	110	139	166	194	221	248	274
620	27	53	81	107	134	160	187	214	240	267
640	26	52	78	104	130	156	181	207	233	258
660	25	50	76	101	125	151	176	200	225	250
680	24	49	74	98	122	147	171	194	218	242
700	24	47	72	95	119	142	165	189	212	235
720	23	46	69	92	115	138	160	183	206	228
740	22	45	67	89	111	134	155	178	200	222
760	22	44	66	87	108	130	151	173	195	216
780	21	42	63	84	105	126	147	169	190	211

Hierbei kann man auch mit dem Mittel von $\frac{\sigma' + \sigma''}{2}$ und $\frac{B + b}{2}$ die Werthe ausrechnen.

Tab. 6.

Tabelle für $A = \log \left\{ 18400.2 \left(1.00157 + 0.003675 \frac{T + t}{2} \right) \right\}$

Argument: $T + t$.

	Diff.		Diff.		Diff.
— 25	4.24508	3	4.26788	31	4.28956
— 24	4.24591	4	4.26868	32	4.29032
— 23	4.24674	5	4.26947	33	4.29107
— 22	4.24758	6	4.27025	34	4.29182
— 21	4.24841	7	4.27104	35	4.29257
— 20	4.24924	8	4.27183	36	4.29332
— 19	4.25006	9	4.27262	37	4.29407
— 18	4.25089	10	4.27340	38	4.29482
— 17	4.25172	11	4.27418	39	4.29556
— 16	4.25254	12	4.27497	40	4.29631
— 15	4.25336	13	4.27576	41	4.29705
— 14	4.25418	14	4.27654	42	4.29779
— 13	4.25500	15	4.27731	43	4.29853
— 12	4.25581	16	4.27809	44	4.29927
— 11	4.25663	17	4.27886	45	4.30001
— 10	4.25744	18	4.27964	46	4.30075
— 9	4.25825	19	4.28041	47	4.30148
— 8	4.25906	20	4.28118	48	4.30221
— 7	4.25987	21	4.28195	49	4.30295
— 6	4.26068	22	4.28271	50	4.30368
— 5	4.26149	23	4.28348	51	4.30441
— 4	4.26229	24	4.28425	52	4.30514
— 3	4.26309	25	4.28501	53	4.30587
— 2	4.26390	26	4.28577	54	4.30659
— 1	4.26470	27	4.28653	55	4.30732
0	4.26550	28	4.28729	56	4.30804
1	4.26629	29	4.28805	57	4.30877
2	4.26709	30	4.28881	58	4.30949
3	4.26788	31	4.28956	59	4.31021
				60	4.31093

Beispiel: $B = 735.581^{\text{mm}}$ (18.6°) $b = 537.203^{\text{mm}}$ (9.8°)

$T = 19.1^{\circ}$; $t = 4.0^{\circ}$

Auf 0° red. Baromet. 733.31^{mm} $\log = 2.86529$
 536.39 $\log = 2.72940$

$19.1 + 2.0 = 23.1$

$u = 0.13589$

für 23.1 ist $\log u = 9.13319$
 $A = 4.28355$

$\log u = 9.13319$

$\log H = 3.41674$

$H = 2610.6$ Meter. Hierbei werden, da es sich nur um eine Annäherung handelt, die feinem Correctionen vernachlässigt.

Tab. 8.

den ten 18		D's Passage		h m P. M.		Ort. Breite. Länge. Var. des Comp	
D's Passage		h m A. M.		D's Passage		h m P. M.	
Mittlere Zeit.	Höhe.	Richtung des Stromes magnetisch.	ohne I- ligkeit d. Stroms.	Winde Richtung magnetisch. Stärke.		Wetter	Barom.
Obere Passage.							
h. m.	Meter		Knoten.				
1 30 A. M.							
1 0 "							
30 "							
2 0 "							
30 "							
3 0 "							
30 "							
4 0 "							
30 "							
5 0 "							
30 "							
6 0 "							
30 "							
7 0 "							
30 "							
8 0 "							
30 "							
9 0 "							
30 "							
10 0 "							
30 "							
11 0 "							
30 "							
12 0 "							
Weitere Beobachtungen.							
						h. m. Meter	
						0	
						10	
						20	
						30	
						40	
						50	
						0	
						Von	
						1/2 Stunde	
						vor bis	
						1/2 Stunde	
						nach H. W.	
h. m. Meter							
0							
10							
20							
30							
40							
50							
0							
Von							
1/2 Stunde							
vor bis							
1/2 Stunde							
nach N. W.							
Alter des Mondes.							
0 30 P. M.							
1 0 "							
30 "							
2 0 "							
30 "							
3 0 "							
30 "							
4 0 "							
30 "							
5 0 "							
30 "							
6 0 "							
30 "							
7 0 "							
30 "							
8 0 "							
30 "							
9 0 "							
30 "							
10 0 "							
30 "							
11 0 "							
30 "							
12 0 "							
Weitere Beobachtungen.							
						h. m. Meter	
						0	
						10	
						20	
						30	
						40	
						50	
						0	
						Von	
						1/2 Stunde	
						vor bis	
						1/2 Stunde	
						nach N. W.	
h. m. Meter							
0							
10							
20							
30							
40							
50							
0							
Von							
1/2 Stunde							
vor bis							
1/2 Stunde							
nach N. W.							

Resultate { Hoch-Wasser um h. m. A. M. P. M. Erhebung A. M.
 Niedrig-Wasser um " " " Senkung " "
 Fluthstrom hört auf um " " " Erhebung P. M.
 Ebbstrom " " " " " Senkung " "
 (Manual of scientific enquiry p. 51.)

Erklärung zur Kartenskizze.

Längere Abwesenheit und Krankheit hat mich zu meinem Bedauern gehindert, noch rechtzeitig vor dem Druck ein Missverständniss des Lithographen zu berichtigen, welcher das beiliegende Kärtchen in eine elegant abgemessene Form übersetzt hat, anstatt, wie es beabsichtigt wurde, nur ein Facsimile der flüchtig hingeworfenen Skizze zu geben, wie sie jeder auch ohne grössere Fertigkeit im Zeichnen leicht zu Papier bringen kann. Zur Vermeidung einer dritten Druckplatte sind in der Lithographie (was hinzuzufügen ebenfalls vergessen worden ist) die nach dem Text zweckmässiger Weise mit roth ausziehenden Linien nur durch Punktirung bezeichnet.

H. Kiepert.

Druckfehlerverzeichniss und Verbesserungen.

Es sind in diesem Verzeichnisse nur solche Druckfehler aufgenommen, welche sinnstörend wirken, während in Fällen, wo dies nicht der Fall, eine Aufzählung der Fehler für überflüssig gehalten wurde, da der Leser sofort dieselben entdecken und verbessern wird.

Seite	34	in der	18. Zeile	von oben	soll es heissen:	$c = q \cos \varphi$	anstatt	$e = q \cos \varphi$.
„	34	„	20.	„	„	„	„	: c und s anstatt e und s .
„	34	„	24. u. 25.	„	„	„	„	: $v = c \sin (\Theta - \alpha)$ anstatt
								$\mu = c \sin (\Theta - d)$.
„	34	„	3. Zeile	von unten	„	„	„	: u_0, v_0, u'_0, v'_0 anstatt μ_0, v_0, μ'_0, v'_0 .
„	88	„	9.	„	„	„	„	: der in D multiplicirt anstatt der in C multiplicirt.
„	88	„	6.	„	„	„	„	: $D \left(\frac{q^3}{r^3} \cos \delta^2 \dots \right)$ anstatt
								$C \left(\frac{q^3}{r^3} \cos \delta^2 \dots \right)$
„	124	„	26.	„	oben	„	„	: $\frac{H_1}{H_2} = \frac{T_2^2}{T_1^2} (\dots)$ anstatt
								$\frac{H_1}{H_2} = \frac{T_2}{T_1} (\dots)$
„	148	„	13.	„	„	„	„	: Neweroff anstatt Newcroff.
„	149	„	7.	„	unten	„	„	: 60, oder Kärthnerth. anstatt
								60, Kärthnerth.
„	180	„	17.	„	oben	„	„	: Perin anstatt Pexin.
„	184	„	24.	„	unten	„	„	: Krankheit, das Mal anstatt Krank-
								heit da: Mal.
„	188	„	4.	„	oben	„	„	: Abhängigkeit anst. Unabhängigkeit.
„	189	„	21.	„	unten	„	„	: inficirt anstatt infestirt.
„	190	„	3.	„	oben	„	„	: biliös anstatt tilbös.
„	192	„	25.	„	„	„	„	: Analoga anstatt Analogie.
„	192	„	8.	„	unten	„	„	: Framboesie anstatt Fromboesie.
„	192	„	5.	„	„	„	„	: befallend anstatt behaltend.
„	193	„	12.	„	„	„	„	: sind, werden dazu anst. sind, dazu.
„	197	„	19.	„	oben	„	„	: trophie anstatt traphie.
„	198	„	5.	„	unten	„	„	: Schuppenexanthem anst. Schuppen-
								epanthem.
„	200	„	2.	„	oben	„	„	: (auch die senile), die anstatt (auch
								die senile). Die.
„	201	„	18.	„	unten	„	„	: aa anstatt ca .
„	201	„	24.	„	„	„	„	: arab. werden gemischt anstatt arab.
								gemischt.
„	217	„	17.	„	oben	„	„	: (Gast, Geestland). Dieselbe anstatt
								(Gast), Geestland. Dasselbe.
„	219	„	21.	„	unten	„	„	: und als lybische anst. und lybische.
„	246	„	4.	„	oben	„	„	: Gesetze zu ändern scheint anstatt
								Gesetze ändert.
„	263	„	6.	„	unten	„	„	: gewöhnlich anstatt stets.
„	292	„	12.	„	oben	„	„	: worden anstatt werden.
„	294	„	7.	„	unten	„	„	: (S. 274 und 285) anst. (S. 274 und 286).

Seite 361	in der 20. Zeile	von unten	soll es heissen:	Schohoslande	anst.	Schschöslande.
362	17.	oben		Laubblätter	anstatt	Laubblüthen.
365	11.	unten		ausgerandet	anstatt	ausgerundet.
366	27.	oben		resten	anstatt	ruthen.
367	8.	unten		Pratas	anstatt	Pratus.
367	7.			Philippinen (Negros)	der Lieu-kieu	anstatt Philippinen (Negros) der Ler-Choo.
368	4.	oben		Limo	anstatt	Lino.
368	23.			Potamogeton	anstatt	Potamoeton.
370	19.	unten		Phyllospadix	anstatt	Phyllospalix.
482	4.			jene Thiere	nicht unwesentlich	anstatt jene Thiere unsere Kenntniss nicht unwesentlich.
482	1.			Tehaelches	antatt	Tehnelches.
483	2.	oben		Buckelrinde	anstatt	Budelrinde.
483	9.	unten		Hellet... Gule	anstatt	Helles... Gale.
484	25.			Vaqueiros... Formigueros	anstatt Baqueiros... Formigneiros.	
487	3.			vermöchten	anstatt	vermöchte.
488	13.			Daumtelah	anstatt	Quantelah.
490	17.			Triels	anstatt	Kiels.
490	16.			tractabeller	anstatt	mactabeller.
497	17.			Zwickauer	anstatt	Chemnitzzer.
573	4.			aber	anstatt	oder.
576	16.			Höhlenlehms	anstatt	Höhlenlagers.
587	18.			Hinter (H)	ist hinzuzusetzen: des Schädels (No. 2 u. 14).	
591	11.	oben	muss „es“	wegfallen.		
619	22.		soll es heissen:	1 statt 6.		
622	29.			leistungsfähige	anstatt	leitungs-fähige.
634	9.	unten		benachbarte Aequatorialstrom	anstatt Aequatorialstrom.	
638	8. u. 9.	oben		den Charakter der westlichen Hälfte	des stillen Oceans der östlichen zuführen.	
639	6.			Baffin's	anstatt	Baffinns.
640	13.			ermittelnden	anstatt	vermittelnden.
643	17.			denselben	anstatt	demselben.
644	2.	unten	fällt geologisch	weg.		
645	26.		soll es heissen:	Richtung	anstatt	Beobachtung.
653	13.	oben		von diesem Curse	anstatt von diesen Curs.	
655	15.			Alle	anstatt	Allen.
658	6.			der Tafeln	anstatt	der zwei Tafeln.
658	9.	unten		$\varepsilon^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$	φ anstatt	
660	10.			$\varepsilon^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} \varphi$.		
660	10.			diese Anordnung	gestattet	anstatt diese Anordnung, welche gestattet.
666	6.	oben	muss in der Formel ω_0 u. ω	anstatt W_0 u. W	gesetzt werden.	
666	17. u. 18.		soll es heissen:	für einen, nach der Neigungsrichtung	anstatt für eine, nach einen nach der Neigungsrichtung.	
672	31.			vorzugsweise	anstatt	verhältniss-mässig.
681	11.			aufzunehmen	anstatt	aufzusuchen.
683	17.	unten		in	anstatt	von.

ÜBERSICHTS-KARTE
DER
MEERESSTRÖME & TRIFT
VON
D. G. NEUMAYER.

Maassstab im Äquator 1 : 80000000

Erklärungen:

	Kalte Strömung		Mit Meeresspiegel veränderte Strömung
	Warme Strömung		Durch Wind & Dichte veränderte Strömung
	Temperatur		Äquatorialer Strömung
	Windgeschwindigkeit		Äquatorialer Strömung
	Strömung u. Strömung		Äquatorialer Strömung

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

39088002450146