NOMENCLATOR
AVIUM NEOTROPICALIUM

SIVE

AVIUM QUÆ IN REGIONE NEOTROPICA HUCUSQUE REPERTÆ SUNT
NOMINA SYSTEMATICE DISPOSITA ADJECTA SUA CUIQUE
SPECIEI PATRIA ACCEDUNT GENERUM ET
SPECIERUM NOVARUM DIAGNOSES.

AUCTORIBUS

PHILIPPO LUTLEY SCLATER A.M. PHIL. DOCT.

SOC. REG. LOND. SOCIO
SOC. ZOOL. LOND. SECRETARIO.

ET

OSBERTO SALVIN A.M.

SOC. REG. LOND. SOCIO.

LONDINI:

SUMPTIBUS AUCTORUM.

MDCCCLXXIII.

With best compliments
of
J. W. Selator,
Secretary to the
Zoological Society of London.
11, Hanover Square.

D.

NOMENCLATOR AVIUM NEOTROPICALIUM

SIVE

AVIUM QUÆ IN REGIONE NEOTROPICA HUCUSQUE REPERTÆ SUNT
NOMINA SYSTEMATICE DISPOSITA ADJECTA SUA CUIQUE
SPECIEI PATRIA ACCEDUNT GENERUM ET
SPECIERUM NOVARUM DIAGNOSES.

AUCTORIBUS

✓
PHILIPPO LUTLEY SCLATER A.M. PHIL. DOCT.

SOC. REG. LOND. SOCIO
SOC. ZOOL. LOND. SECRETARIO.

ET

OSBERTO SALVIN A.M.
SOC. REG. LOND. SOCIO.

LONDINI:

SUMPTIBUS AUCTORUM.

MDCCCLXXIII.

LONDON:

PRINTED BY J. W. ELLIOT, 8 & 9, WHITE HART STREET, CATHERINE STREET, STRAND.

MONITUM.

Avium omnium e regione Neotropica hucusque nobis obviarum nomina tenet Nomenclator noster, secundum systema quo in opere nondum edito, sed jam per multos annos elaborato, cujus titulus “ Index Avium Americanarum,” usi sumus.

Species asterisco notatae neque in Ornithotheca P. L. S. neque in Museo Salvino-Godmannico asservantur, sed in aliis locis nobis obviae sunt.

P. L. S. }
O. S. }

Londini, Prid. Calend. Decembris, A. S. MDCCCLXXIII.

EXPOSITIO ORDINUM CLASSIS AVIUM

(FERE SECUNDUM SCHEMA HUXLEYANUM)

IN HOC OPERE USITATORUM.

ADJECTO IN QUOQUE ORDINE SPECIERUM NUMERO.

SUBORDO I.—AVES CARINATÆ.

SERIES.	SERIES.	SERIES.	SERIES.
ÆGITHOGNATHINA.	DESMOGNATHINA.	SCHIZOGNATHINA.	DROMÆOGNATHINA.
1. PASSERES . 1976	4. COCCYGES . . 214	11. COLUMBÆ . 66	19. CRYPTURI . 36
2. CYPSELI . . 444	5. PSITTACI . . 142	12. GALLINÆ . . 90	
3. PICI . . . 116	6. STRIGES . . 37	13. OPISTHOCOMI 1	
	7. ACCIPITRES . 114	14. GRUES . . 57	
	8. STEGANOPODES 17	15. LIMICOLÆ . 73	
	9. HERODIONES . 44	16. GAVIÆ . . 53	
	10. ANSERES . . 64	17. PYGOPODES . 9	
		18. IMPENNES. . 9	

SUBORDO II.—AVES RATITÆ.

20. APTERYGES . . . 0

21. STRUTHIONES . . 3

////////////////////////////////////

N.B.—Summa specierum Avium Neotropicalium 3565.

I N D E X

ORDINUM ET FAMILIARUM SYSTEMATICUS.

Ordo I.—P A S S E R E S

Subordo I.—Oscines.

	Gen.	Sp.	Pag.
Sect. I.—OSCINES DENTIROSTRES.			
I. TURDIDÆ	12	77	1
II. CINCLIDÆ	1	4	3
III. SYLVIIDÆ	5	19	4
IV. PARIDÆ	3	4	4
V. CETHIIDÆ	2	3	5
VI. TROGLODYTIDÆ	13	70	5
VII. MOTACILLIDÆ	1	4	8
VIII. MNIOTILTIDÆ	18	99	8
IX. VIREONIDÆ	5	50	11
X. LANIIDÆ	1	1	13
XI. AMPELIDÆ	4	6	13
Sect. II.—OSCINES LATIROSTRES.			
XII. HIRUNDINIDÆ	6	28	14
Sect. III.—OSCINES TENUIROSTRES.			
XIII. CEREVIDÆ	11	55	15
Sect. IV.—OSCINES CONIROSTRES.			
XIV. TANAGRIDÆ	43	302	17
XV. FRINGILLIDÆ	56	206	27
Sect. V.—OSCINES CULTRIROSTRES.			
XVI. ICTERIDÆ	24	105	35
XVII. CORVIDÆ	5	36	39
XVIII. ALAUDIDÆ	1	1	40

Subordo II.—OLIGOMYODÆ.

	Gen.	Sp.	Pag.
XIX. OXYRHAMPHIDÆ	1	2	41
XX. TYRANNIDÆ	71	324	41
XXI. PIPRIDÆ	15	60	53
XXII. COTINGIDÆ	28	93	56
XXIII. PHYTOTOMIDÆ	1	3	60

Subordo III.—TRACHEOPHONÆ.

XXIV. DENDROCOLAPTIDÆ	43	217	61
XXV. FORMICARIDÆ	32	211	69
XXVI. PTEROPTOCHIDÆ	8	17	76

Ordo II.—MACROCHIRES.

I. TROCHILIDÆ	118	387	78
II. CYPSELIDÆ	5	21	94
III. CAPRIMULGIDÆ	11	41	95
IV. STEATORNITHIDÆ	1	1	97

Ordo III.—PICI.

I. PICIDÆ	15	117	98
---------------------	----	-----	----

Ordo IV.—COCCYGES.

Subordo I.—COCCYGES ANISODACTYLÆ.

I. MOMOTIDÆ	6	17	102
II. TODIDÆ	1	4	103
III. ALCEDINIDÆ	1	8	103

Subordo II.—COCCYGES HETERODACTYLÆ.

IV. TROGONIDÆ	5	30	103
-------------------------	---	----	-----

Subordo III.—COCCYGES ZYGODACTYLÆ.

V. GALBULIDÆ	6	19	104
VI. BUCCONIDÆ	5	43	105
VII. CUCULIDÆ	11	30	107
VIII. RHAMPHASTIDÆ	5	51	108
IX. CAPITONIÆ	2	12	110

Ordo V.—PSITTACI.

	Gen.	Sp.	Pag.
I. PSITTACIDÆ	13	141	111

Ordo VI.—STRIGES.

I. STRIGIDÆ	1	2	116
II. BUBONIDÆ	15	35	116

Ordo VII.—ACCIPITRES.

I. FALCONIDÆ	32	108	118
II. CATHARTIDÆ	3	5	123

Ordo VIII.—STEGANOPODES.

I. FREGATIDÆ	1	1	124
II. PHAETHONTIDÆ	1	2	124
III. PELECANIDÆ	2	6	124
IV. PHALACROCORACIDÆ	1	7	124
V. PLOTIDÆ	1	1	124

Ordo IX.—HERODIONES.

I. ARDEIDÆ	8	28	125
II. CICONIIDÆ	3	3	126
III. PLATALEIDÆ	7	9	126
IV. PHENICOPTERIDÆ	1	4	127

Ordo X.—ANSERES.

I. PALAMEDEIDÆ	2	3	128
II. ANATIDÆ	23	61	128

Ordo XI.—COLUMBÆ.

I. COLUMBIDÆ	13	66	132
------------------------	----	----	-----

Ordo XII.—GALLINÆ.

Subordo I.—GALLINÆ PERISTEROPODES.

I. CRACIDÆ	12	52	135
----------------------	----	----	-----

Subordo II.—GALLINÆ ALECTOROPODES.

II. MELEAGRIDÆ	1	2	137
III. TETRAONIDÆ	6	35	137

Ordo XIII.—OPISTHOCOMI.

	Gen.	Sp.	Pag.
I. OPISTHOCOMIDÆ	1	1	139

Ordo XIV.—GERANOMORPHÆ.

Subordo I.—FULICARIÆ.

I. RALLIDÆ	8	44	139
II. HELIORNITHIDÆ	1	1	140
III. ARAMIDÆ	1	2	141

Subordo II.—ALECTORIDES.

IV. EURYPYGIDÆ	1	2	141
V. CARIAMIDÆ	2	2	141
VI. PSOPHIIDÆ	1	6	141

Ordo XV.—LIMICOLÆ.

I. ŒDICNEMIDÆ	1	2	142
II. PARRIDÆ	1	4	142
III. CHARADRIIDÆ	11	19	142
IV. CHIONIDIDÆ	1	1	143
V. THINOCORIDÆ	2	6	144
VI. SCOLOPACIDÆ	20	40	144

Ordo XVI.—GAVIÆ.

I. LARIDÆ	11	33	147
II. PROCELLARIIDÆ	11	20	148

Ordo XVII.—PYGOPODES

I. PODICIPITIDÆ	5	9	150
---------------------------	---	---	-----

Ordo XVIII.—IMPENNES.

I. APTENODYTIDÆ	4	9	151
---------------------------	---	---	-----

Ordo XIX.—CRYPTURI.

I. TINAMIDÆ	9	39	152
-----------------------	---	----	-----

Ordo XXI.—STRUTHIONES.

I. RHEIDÆ	2	3	154
---------------------	---	---	-----

NOMENCLATOR AVIUM NEOTROPICALIUM.

Ordo I.—PASSERES.

Subordo I.—OSCINES.

Sect I.—OSCINES DENTIROSTRES.

Fam. I.—TURDIDÆ.

Genus I.—CATHARUS.

- 1 *melpomene* (Cab.) ex Mexico, Guatemala et Costarica.
- 2 *aurantiistrotris* (Hartl.) ex Venezuela.
- 3 *occidentalis*, Scl. ex Mexico.
- 4 *griseiceps*, Salv. ex Veragua.
- 5 *frantzii*, Cab. ex Guatemala et Costarica.
- 6 *gracilirostris*, Salv. ex Costarica.
- 7 *mexicanus*, Bp. ex Mex. Guat. Costarica et Veragua.
- 8 *fuscater* (Lafr.) ex Æquatoria, Veragua et Costarica.
- 9 *dryas* (Gould) ex Guatemala.
- 10 *maculatus*, Scl. ex Æquatoria et Columbia.

Genus II.—TURDUS.

- 1 *mustelinus*, Gm. ex Mexico, Guatemala et Cuba.
- 2 *pallasi*, Cab. ex Mexico et Guatemala.
- 3 *fuscescens*, Steph. ex Panama et Cuba.
- 4 *swainsoni*, Cab. ex Mex. Am. centr. Cuba et Am. mer. ad Peruv.
- 5 *jamaicensis*, Gm. ex Jamaica.
- 6 *phæopygus*, Cab. ex Guiana, Amaz. Ins. Trin. Columb. et Æquat.
- 7 *tristis*, Sw. ex Mexico, et Am. centr. ad Veraguam.
- 8 *crotopczus*, Licht. ex Bras. orient.
- 9 *leucomelas*, Vieill. ex Am. merid. cisandeanæ ferè universa.
- 10 *albiventris*, Spix, ex Columbia, Venezuela, Guiana et Brasilia.
- 11 *albicollis*, Vieill. ex Brasilia orient.
- 12 *gymnophthalmus*, Cab. ex Venezuela et Columbia.
- 13 *fumigatus*, Licht. ex Venezuela, Guiana, Amazonia et Brasilia.
- 14 *grayi*, Bp. ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 15 *obsoletus*, Lawr. ex Costarica, Veragua et Panama.

- 16 *luridus*, Bp. ex Columbia
- 17 *falklandicus*, Q. & G. ex Patagonia, Inss. Falkl. et Chilia.
- 18 *migratorius*, Linn. ex Mex. Guat. et Cuba.
- 19 *flavirostris*, Sw. ex Mex. occ.
- 20 *rufiventris*, Vieill. ex Brasilia merid. et rep. Argent.
- 21 *rufitorques*, Hartl. ex Guatemala
- 22 *euryzonus*, Du Bus, ex Columbia.
- 23 *pinicola*, Scl. ex Mexico.
- 24 *gigas*, Fraser, ex Columbia et Æquat.
- 25 *fuscater*, Lafr. et d'Orb. ex Bolivia et rep. Argent.
- 26 *chiguanco*, Lafr. et d'Orb. ex Æquat. Peruvia et Bolivia.
- 27 *plebeius*, Cab. ex Costarica.
- 28 *nigrescens*, Cab. ex Costarica et Veragua.
- 29 *serranus*, Tsch. ex Peruvia, Æquat. Columbia, Venez. Ins. Trin. et Tobago.
- 30 *infuscatus*, Lafr. ex Mex. et Guat.
- 31 *flavipes*, Vieill. ex Brasilia et Venezuela.
- 32 *olivater*, Lafr. ex Venezuela.

Genus III.—MIMOCICHLA.

- 1 *rubripes* (Temm.) ex Cuba.
- 2 *plumbea* (Linn.) ex Inss. Bahamensibus.
- 3 *ardesiaca* (Vieill.) ex Ins. Hayti.
- 4 *aurantia* (Gm.) ex Jamaica.

Genus IV.—MARGAROPS.

- 1 *herminieri* (Lafr.) ex Inss. St. Lucia et Martinique.
- 2 *fuscatus* (Vieill.) ex Inss. Hayti, Porto Rico, St. Thomas and St. Croix.
- *3 *densirostris*, (Vieill.) ex Inss. Martinique et Guadeloupe.
- 4 *montanus* (Vieill.) ex Inss. Martinique et St. Lucia.

Genus V.—RAMPHOCINCLUS.

- 1 *brachyurus* (Vieill.) ex Inss. Martinique et St. Lucia.

Genus VI.—CINCLOCERTHIA.

- 1 *ruficauda* (Gould) ex Inss. Guadeloupe et Nevis.
- 2 *macrorhyncha*, Scl. ex Ins. St. Lucia.
- 3 *gutturialis* (Lafr.) ex Ins. Martinique.

Genus VII.—GALEOSOPTES.

- 1 *carolinensis* (Linn.) ex Mex. Guat. Panama, Cuba, et Inss. Baham.

Genus VIII.—MELANOPTILA.

- 1 *glabrirostris*, Scl. ex Honduras.

Genus IX.—MELANOTIS.

- 1 *cærulescens*, Sw. ex Mexico.
- 2 *hypoleucus*, Hartl. ex Guatemala.

Genus X.—HARPORHYNCHUS.

- 1 *curvirostris*, Sw. ex Mexico.
- 2 *longirostris*, Lafr. ex Mexico.
- 3 *ocellatus*, Scl. ex Mexico occ.

Genus XI.—MIMUS.

- 1 *polyglottus* (Linn.) ex Mexico.
- 2 *orpheus* (Linn.) ex Antilibus.
- 3 *dorsalis* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.
- 4 *triurus*, Vieill. ex Bolivia, rep. Arg. et Patag. bor.
- 5 *lividus*, Licht. ex Brasil. orient.
- 6 *gilvus*, Vieill. ex Guiana, Venez. Columb. et Am. centr. ad Guatemalam.
- 7 *saturninus*, Licht. ex Brasil. orient.
- 8 *calandria* (Lafr. et d'Orb.) ex rep. Argent. et Brasil. merid.
- 9 *patachonicus* (Lafr. et d'Orb.) ex Patagonia et rep. Arg.
- 10 *thenca* (Mol.) ex Chilia.
- 11 *longicaudatus*, Tsch. ex Peruv. occ.
- 12 *hilli*, Baird, ex Jamaica.
- *13 *trifasciatus*, Gould, ex Inss. Galapagensibus.
- 14 *melanotis*, Gould, ex Inss. Galapagensibus.
- *15 *parvulus*, Gould, ex Inss. Galapagensibus.

Genus XII.—RHODINOCICHLA.

- 1 *rosea*, Less. ex Mex. occ. Costarica, Veragua, Panama, Columb. et Venez.

Fam. II.—CINCLIDÆ.

Genus I.—CINCLUS.

- 1 *mexicanus*, Sw. ex Mexico et Guatemala.
- 2 *ardesiaeus*, Salv. ex Costarica et Veragua.
- 3 *leuconotus*, Scl. ex Venez. Columb. et Æquat.
- 4 *leucocephalus*, Tsch. ex Peruvia.

Fam. III.—SYLVIIDÆ.

Genus I.—MYIADESTES.

- 1 *unicolor*, Sel. ex Mexico et Guatemala.
- 2 *obscurus*, Lafr. ex Mexico et Guatemala.
- 3 *melanops*, Salv. ex Costarica et Veragua.
- 4 *ralloides* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia, Peruv. Æquat. Columb. et Venez.
- 5 *elizabethæ* (Lemb.) ex ins. Cuba.
- 6 *solitarius*, Baird, ex Jamaica.
- 7 *genibarbis* (Sw.) ex ins. St. Lucia.
- *8 *leucotis* (Tsch.) ex Peruvia.

Genus II.—CICHLOPSIS.

- 1 *leucogonyx*, Cab. ex Brasilia.

Genus III.—SIALIA.

- 1 *wilsoni*, Sw. ex Mexico et Guatemala.
- 2 *mexicana*, Sw. ex Mexico.

Genus IV.—REGULUS.

- 1 *calendula* (Linn.) ex Mexico et Guatemala.
- 2 *satrapa*, Licht. ex Mexico.

Genus V.—POLIOPTILA.

- 1 *leucogastra* (Max.) ex Brasil.
- 2 *buffoni*, Sel. ex Cayenna.
- 3 *albiloris*, Salv. ex Guatemala.
- 4 *bilineata* (Bp.) ex Columb. Æquat. occ. Panama, Costarica et Guatemala.
- 5 *dumicola* (Vieill.) ex Paraguay, rep. Argentina et Bolivia.
- 6 *cærulea* (Linn.) ex Mexico et Guatemala.

Fam. IV.—PARIDÆ.

Genus I.—PSALTRIPARUS.

- 1 *melanotis* (Hartl.) ex Mexico et Guatemala.

Genus II.—PARUS.

- 1 *meridionalis*, Sel. ex Mexico.

Genus III.—LOPHOPHANES.

- 1 *atrieristatus*, Cassin, ex Mexico.
- 2 *wollweberi*, Bp. ex Mexico.

Fam. V.—CERTHIIDÆ.

Genus I.—CERTHIA.

- 1 *mexicana*, Reich. ex Mexico et Guatemala.

Genus II.—SITTA.

- 1 *carolinensis*, Lath. ex Mexico.
- 2 *pygmaea*, Vig. ex Mexico.

Fam. VI.—TROGLODYTIDÆ.

Genus I.—DONACOBIVS.

- 1 *atricapillus* (Linn.) ex Guiana, Columbia, Amazonia et Brasil.
- 2 *albo-vittatus* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.

Genus II.—CAMPYLORHYNCHUS.

- 1 *griseus* (Sw.) ex Venezuela, Columbia et Guiana.
- 2 *capistratus* (Less.) ex Mexico, Guatemala et Costarica.
- 3 *humilis*, ScL. ex Mexico.
- 4 *rufinucha* (Lafr.) ex Mexico.
- 5 *brunneicapillus* (Lafr.) ex Mexico.
- 6 *guttatus* (Gould) ex Yucatan.
- 7 *gularis*, ScL. ex Mexico.
- 8 *jocosus*, ScL. ex Mexico.
- 9 *zonatus* (Less.) ex Mexico, Guatemala et Costarica.
- 10 *zonatoides*, Lafr. ex Columbia.
- 11 *pallescens*, Lafr. ex Mexico.
- 12 *balteatus*, Baird, ex Æquat. et Peruvia.
- 13 *nuchalis*, Cab. ex Venezuela et ins. Trinit.
- 14 *pardus*, Bp. ex Columbia.
- 15 *variegatus* (Gm.) ex Brasilia.
- 16 *hypostictus* (Gould) ex Amaz. sup. et Columbia.
- 17 *unicolor* (Lafr.) ex Bolivia.
- 18 *albobrunneus* (Lawr.) ex Panama.

Genus III.—CINNICERTHIA.

- 1 *unirufa* (Lafr.) ex Columbia.
- 2 *unibrunnea* (Lafr.) ex Æquatoria.

Genus IV.—CATHERPES.

- 1 *mexicanus* (Sw.) ex Mexico.

Genus V.—SALPINGTES.

- 1 *obsoletus* (Say) ex Mex. et Guatemala.

Genus VI.—CYPHORINUS.

- 1 *musicus* (Bodd.) ex Guiana.
- 2 *lawrencii*, Scl. ex Panama et Costarica.
- 3 *phæocephalus*, Scl. ex Æquat. occ.
- 4 *modulator* (d'Orb.) ex Amazonia.
- *5 *thoracicus*, Tsch. ex Peruv. orient.

Genus VII.—MICROCERCULUS

- 1 *bambla* (Bodd.) ex Cayenna.
- 2 *philomela*, Salv. ex Vera-pace.
- 3 *albigularis*, Scl. ex Æquat. orient.
- 4 *luscini*, Salv. ex Veragua et Panama.
- 5 *marginatus*, Scl. ex Peruv. et Columbia.

Genus VIII.—HENICORHINA.

- 1 *leucosticta* (Cab.) ex Mex. Am. centr. Columbia et Æquat.
- 2 *leucophrys* (Tsch.) ex Guatem. Am. centr. Columbia et Peruvia.

Genus IX.—THRYOPHILUS.

- 1 *rufalbus* (Lafr.) ex Guatem. Am. centr. Columbia et Venezuela.
- 2 *sinaloa*, Baird, ex Mexico.
- 3 *modestus* (Cab.) ex Guatem. Costarica et Panama.
- 4 *leucotis* (Lafr.) ex Guiana, Venezuela, Columb. Amazonia et Panama.
- 5 *rufiventris*, Scl. ex Brasil. int.
- 6 *minor* (Pelz.) ex Brasil. int.
- 7 *longirostris* (Vieill.) ex Brasil.
- 8 *castaneus* (Lawr.) ex Panama et Costarica.

- 9 *nigricapillus* (Scl.) ex Æquat. occ.
- 10 *semibadius* (Salv.) ex Veragua.
- 11 *thoracicus* (Salv.) ex Costarica et Veragua.
- 12 *pleurostictus* (Scl.) ex Mex. Guatemala et Costarica.
- *13 *nisorius* (Scl.) ex Mexico.

Genus X.—THRYOTHORUS.

- 1 *coraya* (Gm.) ex Guiana et Amazonia.
- 2 *melanos*, Vieill. ex Bras. merid. orient.
- 3 *mystacalis*, Scl. ex Æquat. occ. et Columbia.
- 4 *euophrys*, Scl. ex Æquat. occ.
- 5 *atroglaris*, Salv. ex Costarica.
- 6 *fasciato-ventris*, Lafr. ex Columbia, Panama, Veragua et Costarica.
- 7 *maculipectus*, Lafr. ex Mexico, Guatemala et Columbia.
- 8 *rutilus*, Vieill. ex Venez. Columb. Panama et Veragua.
- 9 *felix*, Scl. ex Mexico.
- 10 *albinucha* (Cabot) ex Yucatan et Poten.
- 11 *bewicki* (Aud.) ex Mexico.
- 12 *martinicensis*, Scl. ex ins. Martinique.

Genus XI.—TROGLODYTES.

- 1 *ædon*, Vieill. ex Mexico.
- 2 *furvus* (Gm.) ex Am. centr. et merid.
- 3 *tessellatus*, Lafr. et d'Orb. ex Panama, Columb. Peruv. et Bolivia.
- 4 *solstitialis*, Scl. ex Columbia et Æquat.
- 5 *brunneicollis*, Scl. ex Mexico et Guat.

Genus XII.—UROPSILA GEN. NOV. I.

- 1 *leucogastra* (Gould) ex Mexico.

Genus XIII.—CISTOTHORUS.

- 1 *elegans* (Scl. et Salv.) ex Guatemala et Veragua.
- 2 *polyglottus* (Vieill.) ex Brasil. merid. et Paraguay.
- 3 *platensis* (Lath.) ex Chilia, Patagonia et Mendoza.

Fam. VII.—MOTACILLIDÆ.

Genus I.—ANTHUS.

- 1 *ludovicianus* (Gm.) ex Mexico et Guatemala.
- 2 *bogotensis*, Scl. ex Columbia, Venezuela, Peruv. et Boliv.
- 3 *rufus* (Gm.) ex Veragua et America merid.
- 4 *correndera* (Vieill.) ex Brasil. merid. rep. Argent. Chilia, Patag. et Inss. Falkland.

Fam. VIII.—MNIOTILTIDÆ.

Genus I.—SIURUS.

- 1 *auricapillus* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et Antilibus.
- 2 *noveboracensis* (Gm.) ex Mex. Am. centr. Antill. et Columbia.
- 3 *ludovicianus* (Aud.) ex Mex. Am. centr. et Antilibus.

Genus II.—MNIOTILTA.

- 1 *varia* (Linn.) ex Mex. Am. centr. Antill. et Columbia.

Genus III.—PARULA.

- 1 *americana* (Linn.) ex Mex. Guat. et Antill.
- 2 *pitiayumi* (Vieill.) ex Bras. Amaz. Venez. Columb. et Æquat.
- 3 *inornata*, Baird, ex Am. centr.
- 4 *superciliosa* (Hartl.) ex Mex. et Guat.
- 5 *gutturalis* (Cab.) ex Costarica et Chiriqui.

Genus IV.—PROTONOTARIA.

- 1 *citrea* (Bodd.) ex Am. centr. Columb. et Venezuela.

Genus V.—HELMINTHOPIAGA.

- 1 *pinus* (Linn.) ex Mex. et Guat.
- 2 *chrysoptera* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et Columbia.
- 3 *ruficapilla* (Wils.) ex Mex.
- 4 *colata* (Say) ex Mex.
- 5 *peregrina* (Wils.) ex Guat. et Am. centr.

Genus VI.—HELMINTHIERUS.

- 1 *vermivorus* (Gm.) ex Mex. Guat. Costarica, Verag. et Antill.

Genus VII.—PERISSOGLOSSA.

- 1 *tigrina* (Gm.) ex Antill.

Genus VIII.—DENDRÆCA.

- 1 *virens* (Gm.) ex Mex. et Am. centr. usque ad Chiriqui.
- 2 *torcensendi* (Nutt.) ex Mex. et Guat.
- 3 *occidentalis* (Townsend.) ex Mex. et Guat.
- 4 *chrysoparia*, Scl. et Salv. ex Guatemala.
- 5 *nigrescens* (Townsend.) ex Mex.
- 6 *canadensis* (Linn.) ex Antill. et Guat.
- 7 *coronata* (Linn.) ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 8 *auduboni* (Townsend.) ex Mex. et Guat.
- 9 *blackburniæ* (Gm.) ex Mex. et Am. centr. et merid. ad Æquat.
- 10 *castanea* (Wils.) ex Guat. et Am. centr. ad Panama.
- 11 *pennsylvanica* (Linn.) ex Guat. et Am. centr. ad Panama.
- 12 *cærulea* (Wils.) ex Am. centr. Columb. et Æquat.
- 13 *phæactra* (Gosse) ex Jamaica.
- 14 *striata* (Forst.) ex Guian. Amaz. Columb. et Chilia.
- 15 *æstiva* (Gm.) ex Antill. Mex. Am. centr. et merid. ad Æquat. et Guian.
- 16 *petechia* (Linn.) ex Antill.
- 17 *aureola* (Gould) ex Inss. Galapag.
- 18 *vicilloti* (Cass.) ex Am. centr. et Columb.
- 19 *olivacea* (Giraud) ex Mex et Guat.
- 20 *maculosa* (Gm.) ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 21 *palmarum* (Gm.) ex Antill.
- 22 *superciliaria* (Bodd.) ex Mex. Guat. et Antill.
- 23 *graciæ*, Baird, ex Honduras.
- 24 *adelaideæ*, Baird, ex Antill.
- 25 *discolor* (Vieill.) ex Antill.

Genus IX.—OPORORNIS.

- 1 *formosus* (Wils.) ex Guat. et Am. centr. ad Panama.

Genus X.—GEOTHLYPIS.

- 1 *trichas* (Linn.) ex Mex. et Am. centr. ad Chiriqui.
- 2 *melanops*, Baird ex Mex.
- 3 *speciosa*, Scl. ex Mex.
- 4 *semiflava*, Scl. ex Æquat.
- 5 *æquinoctialis* (Gm.) ex Guian. Venez. et Columb.

- 6 *chiriquensis*, Salv. ex Chiriqui.
- 7 *relata* (Vieill.) ex Brasilia.
- 8 *poliocephala*, Baird, ex Mex. et Am. centr. ad Costarica.
- 9 *philadelphia* (Wils.) ex Costarica, Panama et Columbia.
- 10 *macgillivrayi* (Aud.) ex Mex. et Am. centr. ad Chiriqui.

Genus XI.—MYIODIOCTES.

- 1 *mitratus* (Gm.) ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 2 *canadensis* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Columb.
- 3 *pusillus* (Wils.) ex Mex. et Am. centr. ad Verag.

Genus XII.—BASILEUTERUS.

- 1 *vermivorus* (Vieill.) ex Bras. Guian. Venez. et Columbia.
- 2 *hypoleucus*, Bp. ex Bras. or.
- 3 *bivittatus* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia, Peruv. Æquat. Verag. et Costarica.
- 4 *melanogenys*, Baird, ex Costarica et Chiriqui.
- 5 *culicivorus* (Licht.) ex Mex. Guat. et Costarica.
- 6 *belli* (Giraud) ex Mex. et Guatemala.
- 7 *rufifrons* (Sw.) ex Mexico.
- 8 *delattrii*, Bp. ex Guatemala.
- 9 *mesochrysus*, Scl. ex Columb. Verag. et Costarica.
- 10 *griseiceps*, Scl. et Salv. ex Venezuela.
- 11 *coronatus* (Tsch.) ex Columb. Æquat. et Peruvia.
- 12 *cinericollis*, Scl. ex Columbia.
- 13 *chrysogaster* (Tsch.) ex Peruv. et Æquat.
- 14 *stragulatus* (Licht.) ex Brasilia.
- 15 *leucoblepharus* (Vieill.) ex Brasilia.
- 16 *mesoleucus*, Scl. ex Guiana.
- 17 *uropygialis*, Scl. ex Panama.
- 18 *semicervinus*, Scl. ex Æquat. et Columb.
- 19 *leucopygius*, sp. nov. i. ex Costarica.
- 20 *nigricristatus* (Lafr.) ex Columb. et Æquat.
- 21 *flaveolus*, Baird, ex Brasilia.
- 22 *luteoviridis*, Bp. ex Columbia.

Genus XIII.—SETOPHAGA.

- 1 *ruticilla* (Linn.) ex Mex. Am. centr. Columb. Æquator. et Antill.
- 2 *pieta*, Sw. ex Mexico et Guatemala.
- 3 *miniata*, Sw. ex Mexico et Guatemala.
- 4 *verticalis*, Lafr. et d'Orb. ex Boliv. Peruv. Æquat. Columb. et Venezuela.

- 5 *aurantiaca*, Baird, ex Veragua et Costarica.
- 6 *brunneiceps*, Lafr. et d'Orb. ex Boliv.
- 7 *torquata*, Baird, ex Costarica et Veragua.
- 8 *rufecoronata*, Kaup, ex Æquat.
- 9 *albifrons*, Scl. et Salv. ex Venezuela.
- 10 *ornata*, Boiss. ex Columbia.
- 11 *flaveola*, Lafr. ex Æquatoria.
- 12 *laerymosa* (Bp.) ex Mexico et Guatemala.

Genus XIV.—ERGATICUS.

- 1 *ruber* (Sw.) ex Mexico.
- 2 *versicolor* (Salv.) ex Guatemala.

Genus XV.—CARDELLINA.

- 1 *rubrifrons* (Giraud) ex Mexico et Guatem.

Genus XVI.—GRANATELLUS.

- *1 *venustus*, Du Bus, ex Mexico occid.
- 2 *pelzelni*, Scl. ex Amazonia.
- 3 *sallæi*, Scl. ex Mex. et Guatemala.

Genus XVII.—TERETRISTIS.

- 1 *fernandina* (Lembeye) ex Cuba occ.
- 2 *fornsi*, Gundl. ex Cuba orient.

Genus XVIII.—ICTERIA.

- 1 *viridis* (Gm.) ex Mex. Guatem. et Costarica.

Fam. IX.—VIREONIDÆ.

Genus I.—VIREOSYLVA.

- 1 *calidris* (Linn.) ex Antill. Panama et Venez.
- 2 *olivacea* (Linn.) ex Am. centr. et merid.
- 3 *flavo-viridis*, Cass. ex Mex. et Am. centr. ad Panama.

- 4 *philadelphia*, Cass. ex Guat. Costarica et Veragua.
- 5 *gilva* (Vieill.) ex Mexico.
- 6 *josepha*, Scl. ex Æquat. Columb. Verag. et Costarica.
- 7 *flavifrons*, Vieill. ex Mex. et Am. centr.
- 8 *solitaria* (Wils.) ex Mex. et Guat.
- 9 *plumbea* (Coues) ex Mex.

Genus II.—VIREO.

- 1 *noveboracensis* (Gm.) ex Mex. et Guat.
- 2 *carmioli*, Baird, ex Costarica et Chiriqui.
- 3 *huttoni*, Cassin, ex Mexico.
- 4 *modestus*, Scl. ex Jamaica.
- 5 *latimeri*, Baird, ex Porto Rico.
- 6 *pallens*, Salv. ex Costarica et Nicaragua.
- 7 *ochraceus*, Salv. ex Guatemala.
- 8 *erassirostris* (Bryant) ex inss. Bahamens.
- 9 *gundlachi*, Lemb. ex Cuba.
- 10 *hypochryseus*, Scl. ex inss. "Tres Marias."

Genus III.—NEOCHLOE.

- 1 *brevipennis*, Scl. ex Mexico.

Genus IV.—HYLOPHILUS.

- 1 *pæcilotis* (Max.) ex Brasil. merid. or.
- 2 *thoracicus* (Max.) ex Brasil. merid. or. et Amazonia.
- 3 *pectoralis*, Scl. ex Brasil. Amaz. et Guiana.
- 4 *muscapinus*, sp. nov. ii. ex Guiana.
- 5 *decurtatus* (Bp.) ex Mex. et Am. centr.
- 6 *semibrunneus*, Lafr. ex Columbia.
- 7 *hypoxanthus*, Pelz. ex Venez. Trinit. et Amazonia.
- 8 *brunneiceps*, Scl. ex Amazonia et Guian.
- 9 *ferrugineifrons*, Scl. ex Columb. et Amaz.
- 10 *ochraceiceps*, Scl. ex Mex. Guat. Costarica et Verag.
- 11 *rubrifrons*, Scl. and Salv. ex Amaz. inf.
- 12 *flavipes*, Lafr. ex Columbia.
- 13 *viridiflavus*, Lawr. ex Panama.
- 14 *insularis*, Scl. ex ins. 'Tobago.'
- 15 *acuticauda*, Lawr. ex Venezuela.
- 16 *semicinereus*, Scl. & Salv. ex Amaz. inf.

Genus V.—LALETES.

- 1 *osburni*, Scl. ex Jamaica.

Genus VI.—VIREOLANIUS.

- 1 *melitophrys* (Du Bus) ex Mex. et Guatemala.
- 2 *pulchellus*, Scl. et Salv. ex Mex. et Am. centr.
- 3 *eximius*, Baird, ex Columbia.
- 4 *chlorogaster*, Bp. ex Amazonia.

Genus V.—CYCLORHIS.

- 1 *guianensis* (Gm.) ex Guiana et Brasil. merid. or.
- 2 *albiventris*, sp. nov. iii. ex Brasil. orient. (Bahia.)
- 3 *flavipectus*, Scl. ex Amazonia, Venezuela, Columb. et Costarica.
- 4 *flaviventris*, Lafr. ex Mex. et Guat.
- 5 *ochrocephala*, Tsch. ex Brasil. merid. or. (Rio.)
- 6 *viridis* (Vieill.) ex Paraguay et rep. Argent.
- 7 *wiedi*, Pelz. ex Brasil. merid.
- 8 *nigrirostris*, Lafr. ex Columb.
- 9 *virenticeps*, Scl. ex Æquator. occid.

Fam. X.—LANIIDÆ.

Genus I.—LANIUS.

- 1 *excubitoroides*, Sw. ex Mexico.

Fam. XI.—AMPELIDÆ.

Genus I.—DULUS.

- 1 *domineus* (Linn.) ex ins. Hayti.
- *2 *nuchalis*, Sw. ex Antilibus.

Genus II.—AMPELIS.

- 1 *cedrorum*, Vieill. ex Mex. et Guat.

Genus III.—PTILOGONYX.

- 1 *cinereus*, Sw. ex Mex. et Guatemala.
- 2 *caudatus*, Cab. ex Costarica.

Genus IV.—PHAINOPEPLA.

- 1 *nitens* (Sw.) ex Mexico.

Sect. II.—OSCINES LATIROSTRES.

Fam. XII.—HIRUNDINIDÆ.

Genus I.—PROGNE.

- 1 *purpurea* (Linn.) ex Amer. merid.
- 2 *chalybea* (Gm.) ex Am. centr. et merid.
- 3 *dominicensis* (Gm.) ex Antilibus.
- 4 *tapera* (Linn.) ex Amer. merid.

Genus II.—PETROCHELIDON.

- 1 *pyrrhonota* (Vieill.) ex Paraguay, Brasil. et Mexico.
- 2 *swainsoni*, Sel. ex Mexico et Am. centrali.
- 3 *fulva* (Vieill.) ex Antilibus.

Genus III.—HIRUNDO.

- 1 *erythrogastra*, Bodd. ex Am. centr. et merid.
- 2 *bicolor*, Vieill. ex Mex. Guat. et Cuba.
- 3 *thalassina*, Sw. ex Mex. et Guat.
- 4 *andecola*, Lafr. et d'Orb. ex Peruv.
- 5 *albilinca*, Lawr. ex Mex. et Am. centr.
- 6 *leucorrohoa*, Vieill. ex Peruv. Bras. merid. et rep. Argent.
- 7 *meyeni*, Cab. ex Chilia.
- 8 *albiventris*, Bodd. ex Guian. Amaz. Columb. Æquat. et Bras. merid.
- 9 *euchrysca*, Gosse, ex Jamaica.

Genus IV.—ATTICORA.

- 1 *fasciata* (Gm.) ex Guian. et Amazonia.
- 2 *melanoluca* (Max.) ex Brasilia Orient.
- 3 *pilcata*, Gould, ex Guatemala.
- 4 *cyanoleuca* (Vieill.) ex Am. centr. et merid.
- 5 *cinerea* (Gm.) ex Æquat.
- 6 *tibialis* (Cass.) ex Peruv. et Panama.

Genus V.—COTYLE.

- 1 *riparia* (L.) ex Am. centr. et merid. ad fl. Amaz.
- 2 *fucata* (Temm.) ex Bras. et rep. Argentina.

Genus VI.—STELGIDOPTERYX.

- 1 *serripennis* (Aud.) ex Mex. et Guat.
- 2 *fulvipennis* (Scl.) ex Mex. Guat. et Costarica.
- 3 *uropygialis* (Lawr.) ex Costarica, Panama et Æquat. occ.
- 4 *ruficollis* (Vicill.) ex Guian. et Bras.

Sect. III.—OSCINES TENUIROSTRES.

Fam. XIII.—CEREBIDÆ.

Genus I.—DIGLOSSA.

- 1 *baritula*, Wagl. ex Mex. et Guat.
- 2 *similis*, Lafr. ex Columb. et Venezuela.
- 3 *sittoides* (Lafr. et d'Orb.) ex Æquat. et Bolivia.
- 4 *albilateralis*, Lafr. ex Æquat. et Columb.
- 5 *plumbea*, Cab. ex Costarica et Chiriqui.
- 6 *aterrima*, Lafr. ex Æquat. et Columb.
- 7 *humeralis* (Fraser) ex Æquat. et Columb.
- 8 *lafresnayi* (Boiss.) ex Columb.
- 9 *major*, Cab. ex Guiana.
- 10 *carbonaria* (Lafr. et d'Orb.) ex Boliv.
- 11 *brunneiventris*, Des Muys, ex Peruvia.
- 12 *gloriosa*, Scl. et Salv. ex Venezuela.
- 13 *personata* (Fraser) ex Columb. et Æquat.
- 14 *indigotica*, Scl. ex Æquat.

Genus II.—DIGLOSSOPIS.

- 1 *caruleseens*, Scl. ex Venezuela, Columbia et Æquatoria.

Genus III.—OREOMANES.

- 1 *fraseri*, Sclat. ex Æquatoria.

Genus IV.—CONIROSTRUM.

- 1 *sitticolor*, Lafr. ex Columbia.
- 2 *rufum*, Lafr. ex Columbia.
- *3 *ferrugineiventre*, Scl. ex Bolivia.
- 4 *fraseri*, Scl. ex Æquat.
- 5 *cinereum* (Lafr. et d'Orb.) ex Peruv. et Bolivia.
- 6 *albifrons*, Lafr. ex Columbia.

Genus V.—HEMIDACNIS.

- 1 *albiventris*, Scl. ex Columb. et Amaz. sup.

Genus VI.—DACNIS.

- 1 *cayana* (Linn.) ex Brasil. Amazonia, Guian. Columb. et Chiriqui.
- 2 *ultramarina*, Lawr. ex Panama.
- 3 *cærebicolor*, Scl. ex Columb.
- 4 *nigripes*, Pelz. ex Brasil. merid. or.
- 5 *melanotis*, Strickl. ex Guian. et Columb.
- 6 *egregia*, Scl. ex Æquat. et Columb.
- 7 *flaviventris*, Lafr. et d'Orb. ex Amaz. sup.
- 8 *venusta*, Lawr. ex Panama et Costarica.
- 9 *puleherrima*, Scl. ex Columb.
- 10 *leucogenys*, Lafr. ex Columb.
- 11 *analis*, Lafr. et d'Orb. ex Amaz. sup. et Guiana.
- 12 *speciosa* (Max.) ex Brasil. merid. or.
- 13 *plumbea*, Lath. ex Brasil. Amaz. et Venezuela.

Genus VII.—CERTHIDEA.

- 1 *olivacea*, Gould, ex inss. Galapag.
- 2 *fusea*, Scl. et Salv. ex inss. Galapag.

Genus VIII.—CHLOROPHANES.

- 1 *atricapilla* (Vieill.) ex Cuba, Am. centr. et merid. usque ad Brasiliam.
- 2 *purpurascens*, sp. nov. iv. ex Venezuela.

Genus IX.—CEREBA.

- 1 *eyanea* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et merid. usque ad Brasiliam.
- 2 *cærulea* (Linn.) ex Guian. Venez. Columb. et Amaz.
- 3 *lucida*, Scl. et Salv. ex Am. centr.
- 4 *nitida*, Hartl. ex Columb. et Amaz. sup.

Genus X.—CERTHOLA.

- 1 *bahamensis* (Reich.) ex inss. Bahamens.
- 2 *flaveola* (Linn.) ex Jamaica.
- 3 *portoricensis*, Bryant, ex inss. Porto Rico et St. Thomas.
- 4 *bartolemica* (Sparm.) ex inss. St. Croix et St. Bartholemew.
- 5 *luteola*, Licht. ex Trinidad, Venezuela et Columbia.

- *6 *clusia*, Hartl. ex ins. Haiti.
- 7 *mexicana*, Sel. ex Mex. Am. centr. Columbia et Æquatoria.
- 8 *chloropyga*, Cab. ex Guiana, Amazonia et Brasil.
- 9 *dominicana*, Taylor, ex ins. Dominica.
- 10 *martinicana*, Reich. ex ins. Martinique.

Genus XI.—GLOSSIPTILA.

- 1 *ruficollis* (Gm.) ex Jamaica.

Sect. IV.—OSCINES CONIROSTRES.

Fam. XIV.—TANAGRIDÆ.

Genus I.—PROCNIAS.

- 1 *tersa*, Linn. ex Brasil. merid. or.
- 2 *occidentalis*, Sel. ex Guian. Amazon. Peruv. Æquator. et Columbia.

Genus II.—CHLOROPHONIA.

- 1 *viridis* (Vicill.) ex Brasil. merid. or.
- 2 *longipennis* (Du Bus) ex Columbia.
- 3 *frontalis*, Sel. ex Venezuela.
- 4 *flavirostris*, Sel. ex Æquatoria.
- 5 *pretrii* (Lafr.) ex Columbia.
- 6 *occipitalis* (Du Bus) ex Mex. et Guat.
- 7 *callophrys* (Cab.) ex Costarica.

Genus III.—EUPHONIA.

- 1 *musica* (Gm.) ex Haiti et Cuba.
- *2 *selateri*, Sund. ex Porto Rico.
- 3 *flarifrons* (Sparm.) ex inss. S. Barthol. et Martinique.
- 4 *elegantissima*, Bp. ex Mex. et Am. centr.
- 5 *nigricollis* (Vicill.) ex Amer. merid. usque ad Paraguay.
- 6 *chlorotica* (Linn.) ex Guiana et Amazonia.
- 7 *trinitatis*, Strickl. ex ins. Trinit. Venezuela et Columb. litt.
- 8 *affinis*, Less. ex Mex. et Guat.
- 9 *minuta*, Cab. ex Guian. Columb. Costarica et Guatemala.
- 10 *concinna*, Sel. ex Columbia.
- 11 *saturata* (Cab.) ex Guiana.
- 12 *gracilis* (Cab.) ex Costarica et Veragua.
- 13 *luteicapilla* (Cab.) ex Costarica et Veragua.
- 14 *xanthogastra*, Sund. ex Brasil. Æquat. Amazonia et Columbia.
- 15 *ruficeps*, Lafr. et d'Orb. ex Boliv. Amazonia et Venezuela.
- 16 *annæ*, Cass. ex Veragua et Costarica.

- 17 *fulvicerissa*, Scl. ex Columb. litt. et Panama.
- 18 *vittata*, Scl. ex Brasil.
- 19 *chalybea*, Mikan, ex Brasil.
- 20 *violacea* (Linn.) ex Guiana, Amazon. et Brasil.
- 21 *crassirostris*, Scl. ex Columb. Æquat. Venez. Panama et Costarica.
- 22 *hirundinacea*, Bp. ex Mexico, Guat. et Costarica.
- 23 *gnatho*, Cab. ex Costarica.
- 24 *melanura*, Scl. ex Columb. Amaz. et Guian.
- 25 *gouldi*, Scl. ex Mex. et Am. centr.
- 26 *chrysopasta*, Scl. & Salv. ex Amaz. sup. et Venezuela.
- 27 *chalcopasta*, sp. nov. v. ex Columbia.
- 28 *rufiventris* (Vieill.) ex Amaz. sup.
- 29 *cayana* (Linn.) ex Guian. et Amaz.
- 30 *pectoralis* (Lath.) ex Brasilia.
- 31 *jamaica* (Linn.) ex Jamaica.
- *32 *plumbca*, Du Bus, ex Amaz.

Genus IV.—TANAGRELLA.

- 1 *velia* (Linn.) ex Guiana.
- 2 *iridina* (Hartl.) ex Amaz. et Columbia.
- 3 *cyanomelæna* (Max.) ex Brasilia.
- 4 *calophrys*, Cab. ex Guian. et Amaz. sup.

Genus V.—CHLOROCHRYSA.

- 1 *calliparæa* (Tsch.) ex Peruv. Æquat. et Columb.
- 2 *phanicotis* (Bp.) ex Æquat.

Genus VI.—PIPRIDEA.

- 1 *melanonota* (Vieill.) ex Brasil. Amaz. et Venez.
- *2 *castaneiventris*, Scl. ex Bolivia.

Genus VII.—DIVA.

- 1 *vassori* (Boiss.) ex Columb. et Æquat.

Genus VIII.—CALLISTE.

- 1 *tatao* (Linn.) ex Guian. et Columb.
- 2 *yeni* (Lafr. et d'Orb.) ex Amaz. sup.
- 3 *fastuosa* (Less.) ex Brasil.
- 4 *tricolor* (Gm.) ex Brasil.

- 5 *festiva* (Shaw) ex Brasilia.
- 6 *cyaneiventris* (Vieill.) ex Brasilia.
- 7 *thoracica* (Temm.) ex Brasilia.
- 8 *schranksi* (Spix) ex Amaz. sup.
- 9 *florida*, Scl. & Salv. ex Costarica.
- 10 *punctata* (Linn.) ex Guiana.
- 11 *guttata* (Cab.) ex Guian. Venez. Columb. Æquat. et Costarica.
- 12 *xanthogastra*, Bp. ex Amaz. sup. et Columb.
- 13 *graminea* (Spix) ex Guiana.
- 14 *rufigularis* (Bp.) ex Æquat.
- 15 *aurulenta* (Lafr.) ex Columb. et Æquat.
- 16 *scilateri*, Lafr. ex Columbia.
- 17 *pulchra* (Tsch.) ex Æquat. orient. et Peruvia.
- 18 *arthusi* (Less.) ex Venezuela.
- 19 *icterocephala* (Bp.) ex Æquat. occ. Veragua et Costarica.
- 20 *vitriolina* (Cab.) ex Columb. et Æquat.
- 21 *cayana* (Linn.) ex Guian. Venezuel. et Columb.
- 22 *cyanolæma*, Bp. ex Amaz. sup.
- *23 *cucullata* (Sw.) ex Venezuela.
- 24 *flava* (Gm.) ex Brasilia.
- 25 *pretiosa* (Cab.) ex Bras. merid. et Paraguay.
- 26 *melanonota* (Sw.) ex Bras. merid.
- 27 *cyanoptera* (Sw.) ex Venezuela.
- 28 *gyrola*, Linn. ex Guiana.
- 29 *gyroloides* (Lafr. et d'Orb.) ex Amaz. Æquat. Columb. Panam. et Costarica.
- 30 *desmaresti*, Gray, ex Venezuela et ins. Trinit.
- 31 *lavinia*, Cass. ex Panama et Nicaragua.
- 32 *brasiliensis* (Linn.) ex Brasilia.
- 33 *albiventris*, Gray, ex Guiana.
- 34 *flaviventris* (Vieill.) ex Guiana.
- 35 *vieilloti*, Scl. ex Venezuela.
- 36 *boliviana*, Bp. ex Amaz. et Columb.
- *37 *atroærulea* (Tsch.) ex Peruv. et Bolivia.
- 38 *ruficervix*, Prév. ex Columb. et Æquat.
- 39 *cabanisi*, Scl. ex Guatemala occ.
- 40 *atricapilla* (Lafr.) ex Venezuela et Columbia.
- *41 *argentea* (Tsch.) ex Peruvia
- 42 *nigriviridis* (Lafr.) ex Venezuela, Columbia et Æquatoria.
- 43 *dowii*, Salv. ex Costarica.
- 44 *inornata*, Gould, ex Columbia et Panama.
- 45 *lurva*, Du Bus, ex America centrali.
- 46 *nigricincta*, Bp. ex Amazon. sup. et Columbia.
- 47 *cyaneicollis* (Lafr. et d'Orb.) ex Venez. Columb. Æquat. Peruv. et Bolivia.
- 48 *labradorides*, Boiss. ex Columbia.

- 49 *cyanotis*, Scl. ex Æquator. orient.
- 50 *rufigenis*, Scl. ex Venezuela.
- 51 *hartlaubi*, Scl. ex Columbia.
- 52 *parzudakii* (Lafr.) ex Columb.
- 53 *lunigera*, Scl. ex Æquator. occ.
- 54 *chrysotis*, Du Bus, ex Æquat. orient.
- 55 *xanthocephala* (Tsch.) ex Peruv. et Boliv.
- 56 *venusta*, Scl. ex Columb. et Æquatoria.

Genus IX.—IRIDORNIS.

- 1 *dubusia* (Bp.) ex Columbia.
- *2 *reinhardti*, Scl. ex Peruvia.
- 3 *analís* (Tsch.) ex Peruvia.
- 4 *porphyrocephala*, Scl. ex Æquat.

Genus X.—PÆCILOTHRAUPIS.

- 1 *lunulata* (Du Bus) ex Columb. et Æquat.
- *2 *igniventris* (Lafr. & d'Orb.) ex Bolivia.
- *3 *laerymosa* (Du Bus) ex Peruvia.
- 4 *palpebrosa* (Lafr.) ex Columbia.

Genus XI.—STEPHANOPHORUS.

- 1 *leucoccephalus* (Vieill.) ex Bras. et rep. Argent.

Genus XII.—BUTHRAUPIS.

- 1 *montana* (Lafr. & d'Orb.) ex Bolivia.
- 2 *cucullata* (Jard.) ex Columb. et Æquat.
- 3 *chloronota*, Scl. ex Æquat.
- 4 *eximia* (Boiss.) ex Columbia.
- 5 *arcei*, Scl. & Salv. ex Veragua.

Genus XIII.—COMPSOCOMA.

- 1 *victorini* (Lafr.) ex Columb.
- 2 *sumptuosa* (Less.) ex Venez. Æquat et Peruv.
- 3 *cyanoptera*, Cab. ex Æquat. occ.
- 4 *flavinucha*, (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.
- 5 *notabilis*, (Jard.) ex Æquat.

Genus XIV.—DUBUSIA.

- 1 *tæniata* (Boiss.) ex Columbia.
- 2 *selysia*, Bp. ex Æquatoria.

Genus XV.—TANAGRA.

- 1 *episcopus*, Linn. ex Guiana.
- 2 *celestis*, Spix, ex Columb. Amazon. Æquat. et Peruv.
- 3 *cana*, Sw. ex Mex. Am. centr. et merid. ad Brasil.
- 4 *cyanoptera*, Vieill. ex Brasil. merid. et rep. Arg.
- 5 *ornata*, Sparm. ex Brasil.
- 6 *palmarum* (Max.) ex Amer. merid. trop. et Costarica.
- 7 *abbas*, Licht. ex Mex. et Guatemala.
- 8 *olivina*, ScL. ex Brasil. int. Peruv. et Columbia.
- *9 *darwini*, Bp. ex Peruv. occ. et Æquator.
- 10 *striata* (Gm.) ex rep. Arg. Brasil. merid. et Bolivia.
- 11 *cyanocephala* (Lafr. et d'Orb.) ex Boliv. Peruv. Æquator. Columb et Venezuela.
- 12 *oliviceyanea*, Lafr. ex Columbia.

Genus XVI.—SPINDALIS.

- 1 *zena* (Linn.) ex ins. Bahamens.
- 2 *pretrii* (Less.) ex Cuba.
- *3 *multicolor* (Vieill.) ex Haiti.
- 4 *portoricensis*, Bryant, ex Portorico.
- 5 *nigricephala* (Jameson) ex Jamaica.

Genus XVII.—RAMPHOCELUS.

- 1 *brasilius* (Linn.) ex Brasilia.
- 2 *ephipialis*, ScL. ex Amaz. sup.
- 3 *nigrogularis* (Spix.) ex Amaz. sup.
- 4 *jacapa* (Linn.) ex Guiana, Venezuela, Columbia et Amazonia sup.
- 5 *atrosericeus*, Lafr. et d'Orb. ex Boliv.
- 6 *luciani*, Lafr. ex Peruv. orient.
- 7 *uropygialis*, Bp. ex Guatemala.
- 8 *dimidiatus*, Lafr. ex Columb. Panama et Veragua.
- 9 *passeriuii*, Bp. ex Guatem. et Am. centr. ad Chiriqui.
- 10 *flavimigerus* (Jard. et Selby) ex Columbia.
- 11 *icteronotus*, Bp. ex Columb. Æquator. et Veragua.

Genus XVIII.—PHILOGOTHAUPIS GEN. NOV. II.

- 1 *sanguinolenta* (Less.) ex Mex. Guat. Hond. et Costarica.

Genus XIX.—EUCHÆTES.

- 1 *coccineus*, Sel. ex Æquat. orient.

Genus XX.—PYRANGA.

- 1 *rubra* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et Columb.
- 2 *æstiva* (Gm.) ex Mex. Am. centr. Columb. et Æquat.
- 3 *saira* (Spix.) ex Bras. Boliv. Parag. et Guiana.
- 4 *hepatica*, Sw. ex Mex. et Guat.
- 5 *testacea*, Sel. & Salv. ex Columb. Venez. Verag. Costarica et Hond. Brit.
- 6 *ludoviciana* (Wils.) ex Mex. et Guat.
- 7 *rubriceps*, Gray, ex Columbia.
- 8 *erythrocephala* (Sw.) ex Mexico.
- 9 *erythromelena* (Licht.) ex Mexico et Am. centr. ad Verag.
- 10 *ardens* (Tsch.) ex Venez. Columb. et Peruv.
- 11 *bidentata*, Sw. ex Mex. et Am. centr. ad Verag.

Genus XXI.—ORTHOGONYS.

- 1 *viridis* (Spix.) ex Brasilia.
- *2 *cyaniaterus* (Vieill.) ex Guiana.

Genus XXII.—LAMPROTES.

- 1 *loricatus* (Licht.) ex Brasilia.
- 2 *albocristatus*, Lafr. ex Columbia.

Genus XXIII.—PHÆNICOTHTRAUPIS.

- 1 *rubica* (Vieill.) ex Brasil. merid. Paraguay et Boliv.
- 2 *rubra* (Vieill.) ex ins. Trinit.
- 3 *vinacea*, Lawr. ex Costarica et Veragua.
- 4 *rubicoides* (Lafr.) ex Mex. et Guatemala.
- 5 *fusceicauda*, Cab. ex Columb. rip. Panama et Costarica.
- 6 *gutturalis*, Sel. ex Columbia.
- 7 *carmioli*, Lawr. ex Costarica et Peruvia.

Genus XXIV.—LANIO.

- 1 *atricapillus* (Gm.) ex Guian. Amaz. et Columbia.
- 2 *versicolor* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia et Peruvia.
- 3 *aurantius*, Lafr. ex Mex. et Guatemala.
- 4 *leucothorax*, Salv. ex Costarica et Veragua.

Genus XXV.—EUCOMETIS.

- 1 *penicillata* (Spix.) ex Guian. et Amaz.
- 2 *albicollis* (Lafr. et d'Orb.) ex Bras. int. et Bolivia.
- 3 *eristata* (Du Bus) ex Columb. et Panama.
- 4 *spodocephala* (Bp.) ex Verag. Costarica, Nicarag. et Guat.
- 5 *cassini* (Lawr.) ex Panama et Verag.

Genus XXVI.—TRICHOTHAUPIS.

1. *quadricolor* (Vieill.) ex Brasil. merid. et Paraguay.

Genus XXVII.—CREURGOPS.

- *1 *verticalis*, Scl. ex Æquat. occ.

Genus XXVIII.—TACHYPHONUS.

- 1 *melaleucus* (Sparm.) ex Costarica et Am. merid. ad Paraguay.
- 2 *luctuosus*, Lafr. et d'Orb. ex Nicar. Columb. Venz. Æquat. Peruv. et Bolivia.
- 3 *phænicus*, Sw. ex Amazon. sup.
- 4 *xanthopygius*, Scl. ex Columb.
- 5 *eristatus* (Gm.) ex Brasil. Amazonia et Columbia.
- 6 *surinamus* (Linn.) ex Guiana, Amazonia et Columbia.
- 7 *rufiventris* (Spix) ex Amazonia sup.
- 8 *coronatus* (Vieill.) ex Brasil. merid. et Paraguay.
- 9 *delatirii*, Lafr. ex Æquat. occ. Columbia, Panama et Costarica.
- 10 *nitidissimus*, Salv. ex Veragua.
- 11 *chrysomelas*, Scl. & Salv. ex Veragua.

Genus XXIX.—CYPSNAGRA.

- 1 *ruficollis* (Licht.) ex Bras. merid. et Bolivia.

Genus XXX.—NEMOSIA.

- 1 *pilcata* (Bodd.) ex Brasil. Guiana et Amazonia.
- 2 *guira* (Linn.) ex Brasil. Guian. Columb. Peruv.
- 3 *flavicollis* (Vieill.) ex Brasil. et Guian.
- 4 *peruana* (Bp.) ex Amazonia sup.
- 5 *albigularis*, Scl. ex Columbia.
- 6 *ruficapilla* (Vieill.) ex Brasil. merid. or.
- 7 *ruficeps* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.

- 8 *fulvescens*, Strickl. ex Brasil. et Amazonia.
- 9 *sordida* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.
- 10 *ornata*, Scl. ex Æquat. occ.
- 11 *fulviceps* (Cab.) ex Venezuela.

Genus XXXI.—PYRRHOCOMA.

- 1 *ruficeps* (Strickl.) ex Brasil. merid. et Paraguay.

Genus XXXII.—CHLOROSPINGUS.

- 1 *ophthalmicus* (Du Bus ex Mex. et Guatem.
- 2 *albitemporalis* (Lafr.) ex Costarica, Columb. Peruv. Æquat. et Bolivia.
- 3 *flavipectus* (Lafr.) ex Columbia.
- 4 *canigularis* (Lafr.) ex Columbia.
- 5 *pileatus*, Salv. ex Costarica.
- 6 *punctulatus*, Scl. & Salv. ex Veragua.
- 7 *flavigularis*, Scl. ex Columb. Æquat. et Amaz. sup.
- 8 *hypophæus*, Scl. & Salv. ex Veragua.
- 9 *semifuscus*, sp. nov. vi. ex Æquat.
- 10 *atripileus* (Lafr.) ex Columb. et Æquat.
- *11 *melanotis*, Scl. ex Columbia.
- 12 *rubrirostris* (Lafr.) ex Columbia.
- 13 *superciliaris* (Lafr.) ex Columbia et Æquat.
- 14 *oleagineus*, Scl. ex Columbia.
- 15 *verticalis* (Lafr.) ex Columbia.
- 16 *lichtensteini*, Scl. ex Columbia.
- 17 *castaneicollis*, Scl. ex Peruvia orient.
- 18 *goeringi*, Scl. & Salv. ex Venezuela.

Genus XXXIII.—BUARREMON.

- *1 *torquatus* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.
- 2 *phæopleurus*, Scl. ex Venezuela.
- 3 *assimilis* (Boiss.) ex Columb. et Æquator.
- 4 *virenticeps*, Bp. ex Mexico.
- 5 *brunneinucha* (Lafr.) ex Mex. Am. centr. Columb. Venez. Æquat. Peruv. et Boliv.
- 6 *chrysopogon* (Bp.) ex Mex. Am. centr. et Columb.
- 7 *albinuchus* (Lafr. et d'Orb.) ex Mex. et Columb.
- 8 *capitalis* (Cab.) ex Costarica et Veragua.
- 9 *latinuchus*, Du Bus, ex Æquat. et Peruvia.
- 10 *rufinuchus* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.
- 11 *leucopterus* (Jard.) ex Æquat.
- 12 *pallidinuchus* (Boiss.) ex Columb. et Æquat.

- 13 *albifrenatus* (Boiss.) ex Columb.
- 14 *merida*, Scl. et Salv. ex Venezuela.
- 15 *schistaceus* (Boiss.) ex Columb. et Æquat.
- 16 *semirufus* (Boiss.) ex Venezuel. et Columb.
- *17 *fulviceps*, (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.
- 18 *tibialis* (Lawr.) ex Costarica.
- 19 *castaneiceps*, Scl. ex Æquat.
- 20 *crassirostris*, Cass. ex Costarica et Veragua.

Genus XXXIV — PHÆNICOPHILUS.

- 1 *palmarum* (Linn) ex Haiti.

Genus XXXV.—ARREMON.

- 1 *silens* (Bodd.) ex Guiana, Amazonia et Brasil.
- *2 *orbignii*, Scl. ex Bolivia.
- *3 *flavirostris*, Sw. ex Brasil. merid.
- *4 *devillii*, Bp. ex Brasil. int.
- 5 *spectabilis*, Scl. ex Æquat. et Columbia.
- 6 *aurantiistrostris*, Lafr. ex Mex. et Am. centrali ad Panama.
- 7 *semitorquatus*, Sw. ex Brasilia.
- 8 *axillaris*, Scl. ex Columbia.
- 9 *polionotus*, Bp. ex Bras. int.
- 10 *abeillæi*, Less. ex Æquat. occ.
- 11 *wuchereri*, sp. nov. vii. ex Brasilia orient.
- 12 *schlegeli*, Bp. ex Columb. rip. et Venezuela.

Genus XXXVI.—OREOTHRAPIS.

- *1 *arremonops*, Scl. ex Æquat. orient.

Genus XXXVII.—CISSOPIS.

- 1 *leveriana* (Gm.) ex Brasilia.
- 2 *media*, Scl. et Guian. et Amaz.
- 3 *minor*, Tsch. ex Bolivia, Peruv. et Columb.

Genus XXXVIII.—LAMPROSPIZA.

- 1 *melanoleuca* (Vieill.) ex Guiana.

Genus XXXIX.—PSITTOSPIZA

- 1 *riefferi* (Boiss.) ex Columb. et Æquat.
- *2 *elegans* (Tsch.) ex Peruvia.

Genus XL.—SALTATOR.

- 1 *atriceps*, Less. ex Mex. et Am. centr. ad Costarica.
- 2 *magnoides*, Lafr. ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 3 *magnus* (Gm.) ex Guian. Amazon. Columb. Peruv. Boliv. et Brasil.
- 4 *atripennis*, ScL. ex Æquat. et Columbia.
- 5 *similis*, Lafr. et d'Orb. ex Brasil. et rep. Arg.
- 6 *grandis*, Lafr. ex Mex. Guat. et Costarica.
- 7 *olivascens*, Cab. ex Venez. Columb. et Æquat.
- 8 *superciliaris* (Spix.) ex Amaz. Peruv. et Bolivia.
- 9 *cærulescens*, Vieill. ex Paraguay et Bolivia.
- 10 *maxillosus*, Cab. ex Bras. merid. et Uruguay.
- *11 *rufiventris*, Lafr. et d'Orb. ex Bolivia.
- 12 *aurantiivrostris*, Vieill. ex Paraguay et La Plata.
- 13 *latioclavius*, ScL. et Salv. ex Peruv. et Bolivia.
- 14 *orenocensis*, Lafr. ex Venezuela.
- 15 *albicollis*, Vieill. ex ins. Trinit. Venez. Panama, Verag. Columb. et Peruv. occ.
- 16 *guadaloupensis*, Lafr. ex ins. 'Guadaloupe.'
- 17 *atricollis*, Vieill. ex Bras. merid. orient.

Genus XLI.—DIUCOPIS.

- 1 *fasciata* (Licht.) ex Brasil. merid. or.
- *2 *speculigera*, Gould, ex Amazonia sup.

Genus XLII.—ORCHESTICUS.

- 1 *abeillei* (Less.) ex Bras. merid. orient.
- 2 *eupistratus*, Max. ex Bras. merid. orient.
- 3 *ater* (Gm.) ex Amer. merid. tropica fere universa.

Genus XLIII.—PITYLUS.

- 1 *grossus* (Linn.) ex Guian. Amaz. Columb. Æquat. et Am. centr. ad Nicarag.
- 2 *fuliginosus* (Daud.) ex Bras. merid. orient.
- 3 *erythromelas* (Gm.) ex Guiana.
- 4 *celæno* (Licht.) ex Mexico.
- 5 *viridis*, (Vieill.) ex Guiana.
- 6 *brasiliensis*, Cab. ex Bras. merid. orient.
- 7 *poliogaster*, Du Bus, ex Mex. et Am. centr. tota.
- 8 *humeralis*, Lawr. ex Columb. et Æquat.

Fam. XV.—FRINGILLIDÆ.

Genus I.—PNEUCTICUS.

- 1 *aureiventris* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia et Peruv.
- 2 *uropygialis*, ScL. et Salv. ex Columb. et Æquat.
- 3 *chrysogaster* (Less.) ex Venezuela et Æquat.
- 4 *tibialis*, Lawr. ex Costarica et Veragua.
- 5 *chrysopeplus* (Vigors) ex Mex. occid.

Genus II.—HEDYMELES.

- 1 *ludovicianus* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et Columb.
- 2 *melanocephalus* (Sw.) ex Mexico.

Genus III.—CARDINALIS.

- 1 *virginianus* (Linn.) ex Mex. et Hond Brit.
- 2 *phæniceus*, Gould. ex Venezuela.

Genus IV.—GUIRACA.

- 1 *cærulea* (Linn.) ex Mex. et Amer. centrali.
- 2 *cyanea* (Linn.) ex Brasil. Guian. et Venezuela.
- 3 *cyanoides* (Lafr.) ex Panama, Verag. et Costarica.
- 4 *conereta* (Du Bus) ex Mex. et Guatemala.
- 5 *parellina*, Bp. ex Mexico.
- 6 *glaucoærulea* (Lafr. et d'Orb.) ex Paraguay. rep. Argent. et Uruguay.

Genus V.—GEOSPIZA.

- *1 *magnirostris*, Gould, ex inss. Galapag.
- 2 *strenua*, Gould, ex inss. Galapag.
- 3 *fortis*, Gould, ex inss. Galapag.
- *4 *nebulosa*, Gould, ex inss. Galapag.
- 5 *fuliginosa*, Gould, ex inss. Galapag.
- 6 *dentirostris*, Gould, ex inss. Galapag.
- 7 *parvula*, Gould, ex inss. Galapag.

Genus VI.—LOXIGILLA.

- 1 *violacea* (Linn.) ex inss. Jamaica et Haiti.
- 2 *noctis* (Linn.) ex Antill. minor.
- 3 *anoxantha* (Gosse.) ex Jamaica.

Genus VII.—ORYZOBORUS.

- 1 *crassirostris* (Gm.) ex Guiana et Trinit. ins.
- 2 *maximiliani*, Cab. ex Brasil. merid. or.
- 3 *occidentalis*, Scl. ex Æquator. et Columbia.
- 4 *melas*, Scl. et Salv. ex Guiana, Amazonia, Brasil.
- 5 *torridus* (Gm.) ex Guiana, Amazonia, Brasil.
- 6 *funereus*, Scl. ex Mex. Am. centr. Columb. et Æquator.

Genus VIII.—MELOPYRRHA.

- 1 *nigra* (Linn.) ex Cuba.

Genus IX.—AMAUROSPIZA.

- 1 *concolor*, Cab. ex Costarica et Panama.
- 2 *unicolor* (Burm.) ex Brasilia.

Genus X.—SPERMOPHILA.

- 1 *minuta* (Linn.) ex Guian. Venez. Columb. et Panama.
- 3 *hypoxantha* (Cab.) ex Bras. merid. Paraguay, Uruguay et Bolivia.
- 3 *nigro-aurantia* (Bodd.) ex Bras. merid.
- 4 *pileata*, Scl. ex Bras. merid. et Uruguay.
- 5 *nigro-rufa* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia et Bras. int.
- 6 *torqueola*, Bp. ex Mexico occ.
- 7 *eastaneiventris* (Cab.) ex Guian. Columb. et Amaz.
- 8 *telaseo*, Less. ex Peruv. occ.
- 9 *albigularis*, Spix. ex Bras. merid. orient.
- 10 *collaria* (Linn.) ex Guian. Brasil. Paraguay et Bolivia.
- 11 *moreleti*, Bp. ex Mex. Guat. Honduras et Costarica.
- 12 *lineata* (Gm.) ex Guian. et Amaz. inf.
- 13 *ophthalmica*, Scl. ex Æquat. occ.
- 14 *cæruleseens*, Vieill. ex Bras. merid. Paraguay, Boliv. et rep. Argent.
- 15 *lineata* (Linn.) ex Guian. Venezuel. Bolivia Parag. et Bras.
- 16 *ocellata*, Scl. & Salv. ex Amaz. sup. et Venez.
- 17 *aurita*, Bp. ex Am. centr. et Columb.
- 18 *luctuosu*, Lafr. ex Columb. Æquat. et Peruv.
- 19 *gutturialis* (Licht.) ex Bras. merid. Amaz. Columb. Æquat. et Panama.
- 20 *corvina*, Scl. ex Mex. et Am. centr.
- 21 *bicolor*, Lafr. et d'Orb. ex Bolivia.
- 22 *hypoleuca* (Licht.) ex Bras. merid. orient.
- 23 *grisea* (Gm.) ex Guian. Venez. Columb. Panama et Veragua.
- 24 *plumbea* (Max.) ex Bras. Bolivia, Guian. et Columb.

Genus XI.—NEORHYNCHUS.

- 1 *nasesus*, Bp ex Peruvia. occ.

Genus XII.—CAMARHYNCHUS.

- *1 *erassirostris*, Gould, ex inss. Galapag.
- 2 *psittaeulus*, Gould, ex inss. Galapag.
- 3 *variegatus*, Scl. & Salv. ex inss. Galapag.
- 4 *habeli*, Scl. & Salv. ex inns. Galapag.
- 5 *prothemelas*, Scl. & Salv. ex inns. Galapag.

Genus XIII.—CACTORNIS.

- 1 *scandens*, Gould, ex inss. Galapag.
- 2 *assimilis*, Gould, ex inss. Galapag.
- 3 *abingdoni*, Scl. & Salv. ex inss. Galapag.
- 4 *pallida*, Scl. & Salv. ex inss. Galapag.

Genus XIV.—CATAMBLYRHYNCHUS.

- 1 *diadema*, Lafr. ex Columbia.

Genus XV.—VOLATINIA.

- 1 *jacarina* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Brasil.

Genus XVI.—PHONIPARA.

- 1 *bieolor* (Linn.) ex inss. Antill. Venezuel. et Columb.
- 2 *marehi*, Baird, ex Jamaica.
- 3 *pusilla*, Sw. ex Mex. Am. centr. et Columb.
- 4 *olivacea* (Gm.) ex Cuba, Jamaica, Haiti et Porto Rico.
- 5 *canora* (Gm.) ex Cuba.

Genus XVII.—CYANOSPIZA.

- 1 *cyanea* (Linn.) ex Mex. et Am. centr.
- 2 *versicolor* (Bp.) ex Mex. et Guatemala.
- 3 *eiris* (Linn.) ex Mex. et Am. centr.
- 4 *leclancheri* (Lafr.) ex Mex. occ.

Genus XVIII.—HAPLOSPIZA.

- 1 *unicolor*, Cab. ex Brasil.
- 2 *uniformis*, sp. nov. viii. ex Mexico.

Genus XIX.—PAROARIA.

- 1 *cueullata* (Lath.) ex Bolivia et rep. Argent.
- 2 *larvata* (Bodd.) ex Brasilia.
- 3 *gularis* (Linn.) ex Guian. et Amaz.
- 4 *cervicalis*, ScL. ex Bolivia.
- 5 *capitata* (Lafr. et d'Orb.) ex Paraguay et rep. Argent.
- 6 *nigrigenis* (Lafr.) ex Venezuela.

Genus XX.—CORYPHOSPINGUS.

- 1 *cristatus* (Gm.) ex Æquat. Peruv. Boliv. et Bras.
- 2 *pilcatus* (Max.) ex Venez. Columb. Peruv. Amazonia et Brasil.
- 3 *griseocristatus* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.
- 4 *cruentus* (Less.) ex Æquat. occ.

Genus XXI.—PORPHYROSPIZA GEN. NOV. III.

- 1 *cyancella* (Sparm.) ex Bras. int.

Genus XXII.—TIARIS.

- 1 *ornata* (Max.) ex Brasil.

Genus XXIII.—XENOSPINGUS.

- 1 *concolor* (Lafr. et d'Orb.) ex Peruvia.

Genus XXIV.—DONACOSPIZA.

- 1 *albifrons* (Vieill.) ex rep. Argent. et Brasil. merid.

Genus XXV.—POOSPIZA.

- 1 *thoracica* (Nordm.) ex Brasilia.
- 2 *nigrorufa* (Lafr. et d'Orb.) ex rep. Argent. et Bras.
- *3 *lateralis* (Nordm.) ex Brasilia.
- 4 *ornata* (Landb.) ex Mendoza.
- 5 *torquata* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia et Mendoza.
- 6 *bonapartii*, ScL. ex Peruv. occ.
- 7 *cinerea*, Bp. ex Brasilia.
- *8 *melanoleuca*, Vieill. ex rep. Arg. et Paraguay.
- 9 *bilincata* (Cass.) ex Mexico.
- 10 *cæsar*, ScL & Salv. ex Peruvia.

Genus XXVI.—SPODIORNIS.

- 1 *jardini*, Scl. ex Æquat.

Genus XXVII.—PHRYGILUS.

- 1 *gayi* (Eyd. et Gerv.) ex Chilia et Patagonia.
- 2 *aldunatii* (Gay) ex Chilia et Patagonia.
- 3 *atriceps* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia et Peruv.
- 4 *unicolor* (Lafr. et d'Orb.) ex Columb. Æquat. Peruv. Boliv. Chilia et rep. Argent.
- 5 *ocularis*, Scl. ex Æquator.
- 6 *plebeius*, Cab. ex Peruv. et rep. Argent.
- 7 *alandinus* (Kittl.) ex Chilia, Boliv. Peruv. et Æquat.
- 8 *fruticeti* (Kittl.) ex Chilia, rep. Arg. Boliv. et Peruv.
- 9 *melanoderus* (Quoy et Gaim.) ex inss. Falkl. et Patagonia.

Genus XXVIII.—GUBERNATRIX.

- 1 *cristatella* (Vieill.) ex Paraguay et rep. Arg.

Genus XXIX.—DIUCA.

- 1 *grisea* (Less.) ex Chilia.
- 2 *minor*, Bp. ex Patagonia.
- 3 *speculifera* (Lafr. et d'Orb.) ex Boliv. et Peruv.

Genus XXX.—CATAMENIA.

- 1 *anal* (Lafr. et d'Orb.) ex Boliv. et Peruv.
- 2 *analoides* (Lafr.) ex Æquator. et Columb.
- 3 *homochroa*, Scl. ex Æquator et Columb.
- 4 *inornata* (Lafr.) ex Bolivia.

Genus XXXI.—PASSERCULUS.

- 1 *savanna* (Wils.) ex Mex. et Guatem.

Genus XXXII.—POECETES.

- 1 *gramineus* (Gm.) ex Mexico.

Genus XXXIII.—ZONOTRICHIA.

- 1 *leucophrys* (Forst.) ex Mexico.
- 2 *mystacalis*, Hartl. ex Mexico.
- 3 *quinquistriata*, Scl. & Salv. ex Mexico.
- 4 *pileata* (Bodd.) ex Am. centr. et merid. universa.
- 5 *strigiceps*, Gould, ex Patagonia.

Genus XXXIV.—MELOSPIZA.

- 1 *heermanni*, Baird. ex Mexico.
- 2 *lincolni* (Aud.) ex Mex. et Guat.

Genus XXXV.—SPIZELLA.

- 1 *socialis* (Wils.) ex Mexico.
- 2 *pinetorum*, Salv. ex Guatemala.
- 3 *atroregularis*, Cab. ex Mexico.

Genus XXXVI.—JUNCO.

- 1 *cinereus*, Sw. ex Mexico.
- 2 *alticola*, Salv. ex Guatemala.

Genus XXXVII.—PEUCEA.

- 1 *botteri*, ScL. ex Mexico.
- 2 *cassini* (Woodh.) ex Mex. bor.
- 3 *boucardi*, ScL. ex Mexico.
- 4 *notosticta*, ScL. & Salv. ex Mexico.

Genus XXXVIII.—AMMODROMUS.

- 1 *petenicus*, Salv. ex Guatemala.

Genus XXXIX.—COTURNICULUS.

- 1 *passerinus* (Wils.) ex Mex. et Guatemala.
- 2 *tixierus* (Gosse) ex Jamaica.
- 3 *manimbe* (Licht.) ex Bras. et Guiana.
- 4 *peruanus*, Bp. ex Amaz. sup. Columb. Peruv. et Bolivia.

Genus XL.—SALTATRICULA.

- 1 *multicolor*, Burm. ex rep. Argent.

Genus XLI.—EMBERNAGRA.

- 1 *platensis* (Gm.) ex Bras. et rep. Argent.
- 2 *olivascens* (Lafr. et d'Orb.) ex Boliv. et Mendoza.
- 3 *chrysoma*, ScL. ex Æquat.
- 4 *conirostris*, Bp. ex Columb.
- 5 *striaticeps*, Lafr. ex Panama, Verag. et Costarica.

- 6 *chloronota*, Salv. ex Guatemala.
- 7 *rufivirgata*, Lawr. ex Mexico.
- 8 *superciliosa*, Salv. ex Costarica.
- 9 *chlorura*, Aud. ex Mexico.

Genus XLII.—EMBERIZOIDES.

- 1 *macrurus* (Gm.) ex Guiana, Venezuela, Amazonia et Columbia.
- 3 *sphenurus* (Vieill.) ex Brasil. Boliv. et Paraguay.
- 3 *melanotis*, Temm. ex Brasil. merid. orient.

Genus XLIII.—HEMOPHILA.

- 1 *rufescens*, Sw. ex Mexico et Guatemala.
- 2 *sumichrasti*, Lawr. ex Mex. occ.
- 3 *superciliosa*, Sw. ex Mexico.
- 4 *melanotis* (Lawr.) ex Mexico.
- 5 *ruficauda* (Bp.) ex Guatemala et Costarica.
- 6 *humeralis*, Cab. ex Mexico.

Genus XLIV.—PIPILO.

- 1 *maculatus* (Sw.) ex Mex. et Guat.
- 2 *macronyx* (Sw.) ex Mexico.
- 3 *fuscus* (Sw.) ex Mexico.
- 4 *rutilus* (Licht.) ex Mexico.

Genus XLV.—CHAMÆOSPIZA.

- 1 *torquata* (Du Bus) ex Mexico.

Genus XLVI.—PYRGISOMA.

- 1 *biarcuatum* (Prév.) ex Guatemala.
- 2 *cabanisi*, Sel. & Salv. ex Costarica.
- 3 *rubricatum* (Cab.) ex Mexico.
- 4 *kieneri*, Bp. ex Mexico.
- 5 *leucote* (Cab.) ex Costarica et Guatemala.

Genus XLVII.—ATLAPETES.

- 1 *pilatus*, Wagl. ex Mexico.

Genus XLVIII.—EUSPIZA.

- 1 *americana*, Gm. ex Mex. Am. centr. et Columb.

Genus XLIX.—CALAMOSPIZA.

- 1 *bicolor* (Towns.) ex Mexico.

Genus L.—CHONDESTES.

- 1 *grammaca* (Say) ex Mexico.

Genus LI.—PLECTROPHANES.

- 1 *melanomus*, Baird, ex Mexico.

Genus LII.—LOXIA.

- 1 *americana* (Wils.) ex Mexico.

Genus LIII.—CARPODACUS.

- 1 *cassini*, Baird, ex Mexico.
- 2 *hamorrhous* (Wagl.) ex Mexico.

Genus LIV.—COCCOTHTRAUSTES.

- 1 *vespertinus* (Cooper) ex Mexico.
- 3 *abeillæi* (Less.) ex Mex. et Guatemala.

Genus LV.—CHRY SOMITRIS.

- 1 *eucullata* (Sw.) ex Venezuela.
- 2 *mexicana* (Sw.) et Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 3 *columbiana* (Lafr.) ex Columbia.
- 4 *barbata* (Mol.) ex Æquat. Peruv. Boliv. Chilia, rep. Argent. et Patagonia.
- 5 *uropygialis*, Scl. ex Chilia.
- 6 *atrata* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia et Peruv.
- 7 *xanthogastra*, Du Bus, ex Boliv. Æquat. Columb. Venez. et Costarica.
- 8 *yarrelli*, Aud. ex Brasilia.
- 9 *spinescens*, Bp. ex Columbia.
- 10 *notata* (Du Bus) ex Mexico et Guatemala.
- 11 *atriceps*, Salv. ex Guatemala.
- 12 *pinus* (Wils.) ex Mexico.

Genus LVI.—SYCALIS.

- 1 *flaveola* (Linn.) ex Am. merid. a Columb. ad Bras. merid.
- 2 *pelzelni*, Scl. ex Bras. int. Paraguay et rep. Arg.

- 3 *columbiana*, Cab. ex Venez. Guian. et Amaz. inf.
- 4 *luteola* (Sparm.) ex Am. merid. usque ad remp. Argent.
- 5 *chrysops*, Scl. ex Mexico et Guatemala.
- 6 *lutea* (Lafr. et d'Orb.) ex Boliv. et Peruv.
- 7 *luteocephala* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.
- 8 *uropygialis* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.
- 9 *aureiventris*, Ph. et Landb. ex Chilia.

Sect. V.—OSCINES CULTRIROSTRES

Fam. XVI.—ICTERIDÆ.

Genus I.—CLYPEICTERUS.

- 1 *osorii*, Deville, ex Amaz. sup.

Genus II.—OCYALUS.

- 1 *latirostris* (Sw.) ex Amaz. sup.
- 2 *wagleri* (Gray & Mitch.) ex Mex. et Am. centr. ad Panama.

Genus III.—OSTINORS.

- *1 *bifasciatus* (Spix.) ex Amazon. inf.
- 2 *montezumæ* (Less.) ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- *3 *guatimozinus*, Bp. ex Columb. ripar.
- 4 *yuracarium* (Lafr. et d'Orb.) ex Boliv. Peruv. Amazon. et Columbia.
- 5 *eristatus* (Gm.) ex Veragua, Columb. Æquator. Amazonia, Guiana et Brasilia.
- 6 *viridis* (Bodd.) ex Guiana et Amazonia.
- 7 *atrovirens* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia Peruv. Amazon. et Columbia.
- 8 *angustifrons* (Spix.) ex Amazonia et Columbia.

Genus IV.—CASSICULUS.

- 1 *melanicterus* (Bp.) ex Mexico.

Genus V.—CASSICUS.

- 1 *persicus* (Linn.) ex Guian. et Amazon.
- 2 *flavirissus*, Scl. ex Æquat. Columb. rep. et Panama.
- 3 *hemorrhous* (Daud.) ex Brasil.

- 4 *affinis*, Sw. ex Guiana et Amazonia inf.
- 5 *uropygialis*, Lafr. ex Columbia.
- 6 *microrhynchus*, Sel. et Salv. ex Panama et Costarica.
- 7 *leucorhamphus* (Bp.) ex Æquat. et Columbia.
- 8 *albirostris* (Vieill.) ex Brasil.
- 9 *prevosti* (Less.) ex Mex. Am. centr. Columb. et Æquator.
- 10 *solitarius* (Vieill.) ex Paraguay, Boliv. et Brasil.

Genus VI.—ICTERUS.

- 1 *baltimore* (Linn.) ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 2 *abceillæi*, Less. ex Mexico.
- 3 *bullocki* (Sw.) ex Mexico.
- 4 *spurius* (Linn.) ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 5 *bonana* (Linn.) ex Antill. min.
- 6 *pyrrhopterus* (Vieill.) ex Paraguay, Boliv. Brasil. merid. et rep. Arg.
- 7 *chrysocephalus* (Linn.) ex Guiana, Amazon. et Columbia.
- 8 *cayanensis* (Linn.) ex Guiana.
- 9 *tibialis*, Sw. ex Brasil.
- 10 *hypomelas*, Bp. ex Cuba.
- 11 *dominicensis* (Linn.) ex Hayti.
- 12 *portoricensis*, Bryant, ex Porto Rico.
- 13 *laudabilis*, Sel. ex ins. S. Lucia.
- 14 *wagleri*, Sel. ex Mex. et Guatem.
- 15 *prosthemelas*, Strickl. ex Mex. Guatem. Honduras et Costarica.
- 16 *maculi-alatus*, Cassin, ex Guatem.
- 17 *auricapillus*, Cassin, ex Columb. et Venezuela.
- 18 *cucullatus*, Sw. ex Mex. et Guatem.
- 19 *parisorum*, Bp. ex Mexico.
- 20 *melanocephalus*, Wagl. ex Mexico.
- 21 *auduboni*, Giraud. ex Mexico.
- 22 *giraudi*, Cassin, ex Mex. Am. centr. et Columbia.
- 23 *mesomelas*, Wagl. ex Mex. Am. centr. et Columbia.
- 24 *xanthornus* (Linn.) ex Guiana, Venezuela et ins. Trinitatis
- 25 *vulgaris*, Daud. ex Guiana et Venezuela.
- 26 *jamacai* (Gm.) ex Brasil. merid. or.
- 27 *croconotus* (Wagl.) ex Guiana et Amazonia.
- 28 *gularis* (Wagl.) ex Mex. et Guatem.
- 29 *sclateri*, Cassin, ex Mex. et Guatem.
- 30 *pectoralis* (Wagl.) ex Mex. Guatem. et Costarica.
- 31 *pustulatus* (Wagl.) ex Mexico occ.
- 32 *graysoni*, Cassin, ex Mex. occ. et inss. "Tres Marias."
- 33 *leucopteryx* (Wagl.) ex Jamaica.

Genus VII.—DOLICHONYX.

- 1 *oryzivorus* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Boliviam et Paraguay.

Genus VIII.—MOLOTHRUS.

- 1 *pecoris* (Gm.) ex Mexico.
- 2 *æneus* (Wagl.) ex Mexico, Guatem. et Veragua.
- 3 *bonariensis* (Gm.) ex Brasil. Bolivia et Paraguay.
- 4 *atronitens*, Cab. ex Guiana, Venezuela.
- 5 *purpurascens*, Hahn, ex Peruv. occ.
- 6 *discolor* (Cassin) ex Venezuela et Columbia.
- 7 *rufo-axillaris*, Cass. ex rep. Argentina.
- 8 *badius* (Vieill.) ex rep. Arg. et Paraguay.

Genus IX.—AGELEUS.

- 1 *phæniceus* (Linn.) ex Mex. Guat. Hond. et Costarica.
- 2 *gubernator* (Wagl.) ex Mexico.
- 3 *humeralis* (Vig.) ex Cuba.
- 4 *chrysopterus* (Vieill.) ex Porto Rico.
- 5 *thilius* (Mol.) ex Chilia, rep. Argent. Bolivia et Peruv.
- 6 *eyanopus* (Vieill.) ex Bras. merid. et Paraguay.

Genus X.—XANTHOCEPHALUS.

- 1 *icterocephalus* (Bp.) ex Mexico.

Genus XI.—XANTHOSOMUS.

- 1 *frontalis* (Vieill.) ex Brasilia.
- 2 *ruficapillus* (Vieill.) ex rep. Argent.
- 3 *icterocephalus* (Linn.) ex Guian. Venez. et Columb.
- 4 *flavus* (Gm.) ex Bras. merid. Paraguay et rep. Argent.

Genus XII.—AMBLYRHAMPHUS.

- 1 *holosericeus* (Scop.) ex Boliv. et rep. Argent.

Genus XIII.—GYMNOMYSTAX.

- 1 *melanieterus* (Vieill.) ex Guian. et Amaz.

Genus XIV.—PEUDOLEISTES

- 1 *viridis* (Gm.) ex Brasilia.
- 2 *viroseus* (Vieill.) ex Bras. merid. et rep. Argent.

Genus XV.—LEISTES.

- 1 *guianensis* (Linn.) ex Guian. Amaz. Venez. Columb. et Veragua.
- 2 *erythrothorax*, Pelz. ex Amaz.
- 3 *superciliaris*, Bp. ex rep. Argent. Paraguay, Boliv. et Bras. int.

Genus XVI.—STURNELLA.

- 1 *militaris* (Linn.) ex Chilia, Patagonia, et inss. Falkl.
- 2 *bellicosa*, De Fil. ex Peruv. et Æquat.
- 3 *defilippii*, Bp. ex rep. Argent. et Urugay.
- 4 *ludovieiana* (Linn.) ex Mex. Am. centr. Cuba, Columb. et Venez.

Genus XVII.—CURÆUS.

- 1 *aterrimus* (Kittl.) ex Chilia.

Genus XVIII.—NESOPSAR.

- 1 *nigerrimus*, Scl. ex Jamaica

Genus XIX.—SCOLECOPHAGUS.

- 1 *eyunoecephalus* (Wagl.) ex Mexico.

Genus XX.—LAMPROPSAR.

- 1 *guianensis* (Cab.) ex Guiana et Venezuela.
- 2 *tanagrinus* (Spix.) ex Amazonia.
- 3 *warszewiezi*, Cab. ex Æquator. et Peruv.
- 4 *dives*, Cab. ex Mexico et Guatemala.

Genus XXI.—QUISCALUS.

- 1 *macrurus*, Sw. ex Guatemala.
- 2 *assimilis*, Scl. ex Veragua, Panama, et Columbia.
- 3 *tenuirostris*, Sw. ex Mexico.
- 4 *lugubris*, Sw. ex Guian. et ins. Trinit.
- 5 *fortirostris*, Lawrence, ex ins. Barbados.
- 6 *inflexirostris*, Sw. ex inss. S. Lucia et Martinique.
- 7 *brachypterus*, Cassin, ex Porto Rico.
- 8 *crassirostris*, Sw. ex Jamaica
- 9 *subalaris*, Boiss. ex Columb. et Venezuela.

Genus XXII.—HYPOPYRRHUS.

- 1 *pyrrhogaster* (De Tarr.) ex Columb.

Genus XXIII.—APHOBUS.

- 1 *chopi* (Vieill.) ex Bras. Paraguay et Bolivia.

Genus XXIV.—CASSIDIX.

- 1 *oryzivora* (Linn.) ex Bras. Guian. Amaz. Æquat. Columb. Am. centr. et Mexico.

Fam. XVII.—CORVIDÆ.

Genus I.—CYANOCITTA.

- 1 *coronata* (Sw.) ex Mex. et Guatemala.
 2 *diademata* (Bp.) ex Mexico.
 3 *macrolopha* (Baird) ex Mex. bor.
 4 *californica* (Vig.) ex Mex. occ.
 5 *sordida*, Sw. ex Mex.
 6 *unicolor*, Du Bus, ex Mex. et Guat.
 7 *nana*, Du Bus, ex Mexico.
 8 *pumilo*, Strickl. ex Guatemala.
 9 *ornata*, Less ex Mexico, Guatemala et Costarica.
 *10 *beecheyii* (Vig.) ex Mex. occid.
 11 *crassirostris*, Bp. ex Belize et Yucatan.
 12 *melanocyanea* (Hartl.) ex Guatemala.
 13 *viridicyanea* (Lafr. et d'Orb.) ex Boliv. et Peruv.
 *14 *jolyca*, Bp ex Peruv.
 15 *turcosa*, Bp. ex Æquator. et Columbia.
 16 *armillata*, Gray, ex Columb. et Venezuela.

Genus II.—CYANOCORAX.

- 1 *luxuosus* (Less.) ex Mex. Guatem. et Honduras.
 2 *cyaneocapillus* (Cab.) ex Venezuela et Columb.
 3 *incas* (Bodd.) ex Columb. Æquator. et Peruv.
 4 *cayanus* (Linn.) ex Guiana.
 5 *cyanopogon* (Max.) ex Brasil. merid. or.
 6 *pileatus* (Temm.) ex Paraguay, et Brasil. merid.
 7 *affinis*, Pelz ex Columbia, Panama et Veragua.
 8 *mystacalis* (Geoffr.) ex Peruvia et Æquat.
 9 *cyanoleucus* (Max.) ex Brasil. merid.

- 10 *azureus* (Temm.) ex Brasil. merid.
- 11 *violaceus*, Du Bus, ex Amazonia et Columbia.
- 12 *cyanomelas* (Vieill.) ex Paraguay et Brasil. merid.

Genus III.—CALOCITTA.

- 1 *formosa* (Sw.) ex Mex. Guat. Costarica.
- 2 *collei*, Vig. ex Mex. occ.

Genus IV.—PSILORHINUS.

- 1 *morio* (Wagl.) ex Mexico.
- 2 *mexicanus*, Rüpp. ex Guat. Honduras et Costarica.

Genus V.—CORVUS.

- 1 *corax*, Linn. ex Mexico et Guatemala.
- 2 *leucognaphalus*, Dand. ex Haiti et Portorico.
- 3 *ossifragus*, Wilson, ex Cuba.
- 4 *jamaicensis*, Gm. ex Jamaica.

Fam. XVIII.—ALAUDIDÆ.

Genus I.—EREMOPHILA.

- 1 *chrysolæma*, Wagl. ex Mexico et Columbia alta.

////////////////////////////////////

Subordo II.—OLIGOMYODÆ.

Fam. XIX.—OXYRHAMPHIDÆ.

Genus I.—OXYRHAMPHUS.

- 1 *flammiceps* (Temm.) ex Brasilia.
- 2 *frater*, Sel. et Salv. ex Veragua et Costarica.

Fam. XX.—TYRANNIDÆ.

Subfam. I.—CONOPOPHAGINÆ.

Genus I.—CONOPOPHAGA.

- 1 *aurita* (Gm.) ex Guiana.
- 2 *torrida*, Sel. ex Æquat. orient.
- 3 *peruviana*, Des Murs, ex Æquat. orient. et Amazonia.
- 4 *dorsalis*, Ménétr. ex Brasil.
- 5 *gutturalis*, Sel. ex Columbia.
- 6 *lineata* (Max.) ex Brasil.
- 7 *castaneiceps*, Sel. ex Peruvia et Columbia.
- 8 *ardesiaca*, Lafr. et d'Orb. ex Boliv. et Amazonia sup.
- 9 *melanogastra*, Ménétr. ex Brasil. int. et Amazonia.
- 10 *melanops* (Vieill.) ex Brasil. orient. Bahia.
- 11 *maximiliani*, Cab. ex Brasil. merid. Rio.

Genus II.—CORYTHOPIS.

- 1 *calcarata* (Max.) ex Brasil.
- 2 *anthoides* (Puch.) ex Guiana.

Subfam. II.—TÆNIOPTERINÆ.

Genus III.—AGRIORNIS.

- 1 *livida* (Kittl.) ex Chilia.
- 2 *pollens*, Sel. ex Æquatoria.
- 3 *maritima* (Lafr. et d'Orb.) ex Chilia.

- 4 *solitaria*, Sel. ex Æquatoria.
- 5 *insolens*, Sel. et Salv. ex Peruv. alta.

Genus IV.—MYIOTHERETES.

- 1 *rufiventris* (Vieill.) ex rep. Arg. et Patagonia.
- 2 *erythropigia*, Sel. ex Æquatoria.
- 3 *striaticollis*, Sel. ex Æquat. et Columbia.

Genus V.—TÆNIOPTERA.

- 1 *nengeta* (Linn.) ex Brasil. merid. rep. Arg. et Bolivia.
- 2 *coronata* (Vieill.) ex rep. Arg. et Paraguay.
- 3 *dominicana* (Vieill.) ex Bras. merid. et rep. Arg.
- 4 *velata*, Licht. ex Brasil. merid. et Boliv.
- 5 *irupero* (Vieill.) ex rep. Arg. Paraguay et Bolivia.
- 6 *pyrope* (Kittl.) ex Chilia et Patagonia.
- 7 *murina* (Lafr. et d'Orb.) ex Patagonia.
- 8 *rubetra*, Burm. ex rep. Arg. et Patagonia.

Genus VI.—OCHTHODIÆTA.

- 1 *fumigata* (Boiss.) ex Columb. alta.

Genus VII.—OCHTHÆCA.

- 1 *funicolor*, Sel. ex Columb. et Æquat.
- 2 *superciliosa*, Sel. et Salv. ex Venezuela alta.
- 3 *ænanthoides* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia alta.
- 4 *polionota*, Sel. et Salv. ex Peruv. alta.
- 5 *leucophrys* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia alta.
- 6 *albidinema* (Lafr.) ex Columbia.
- 7 *citrinifrons*, Sel. ex Æquat.
- *8 *rufispectoralis* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.
- 9 *lessoni*, Sel. ex Columbia.
- 10 *rufimarginata*, Lawr. ex Æquator. et Columbia.
- 11 *nigrita*, Sel. et Salv. ex Venezuela.
- 12 *cinnamomeiventris* (Lafr.) ex Columbia.
- 13 *diadema* (Hartl.) ex Columbia.
- 14 *gratiosa*, Sel. ex Æquator.
- 15 *setophagoides* (Bp.) ex Columb. et Æquatoria.
- 16 *stictoptera* (Sel.) ex Columb. et Æquatoria.
- 17 *murina*, Sel. ex Guiana.

Genus VIII.—SAYORNIS.

- 1 *pallida* (Sw.) ex Mexico.
- 2 *nigricans* (Sw.) ex Mexico.
- 3 *aquatica*, Sel. et Salv. ex Guatemala et Costarica.
- 4 *cineracea* (Lafr.) ex Venezuela, Columbia et Æquatoria.

Genus IX.—FLUVICOLA.

- 1 *pica* (Bodd.) ex Guiana.
- 2 *albiventris* (Spix.) ex Amazonia et Bolivia.
- 3 *climacura* (Vieill.) ex Brasil.
- 4 *atripennis*, Sel. ex Æquat. oce.

Genus X.—ARUNDINICOLA.

- 1 *leucocephala* (Linn.) ex Am. merid. trop. feré universa.

Genus XI.—ALECTORURUS.

- 1 *guira-yetapa* (Vieill.) ex Brasil. merid. et rep. Arg.
- 2 *tricolor* (Vicill.) ex Brasil. merid. et rep. Arg.

Genus XII.—CYBERNETES.

- 1 *yetapa* (Vieill.) ex Brasil.

Genus XIII.—SISOPYGIS.

- 1 *icterophrys* (Vieill.) ex Brasil. merid. et rep. Arg.

Genus XIV.—CNIPOLEGUS.

- 1 *comatus* (Licht.) ex Brasilia.
- 2 *nigerrimus* (Vieill.) ex Brasilia.
- 3 *aterrimus*, Kaup, ex Bolivia.
- 4 *anthracinus*, Heine, ex Mendoza.
- 5 *cyanirostris* (Vieill.) ex rep. Arg. et Brasil. merid.
- 6 *unicolor*, Kaup, ex Amaz. sup.
- 7 *hudsoni*, Sel. ex Patagonia.
- 8 *cinereus*, Sel. ex rep. Arg.
- 9 *pusillus*, sp. nov. ix. ex Amazonia.

Genus XV.—LICHENOPS

- 1 *perspicillatus* (Gm.) ex Brasil. et rep. Arg.

Genus XVI.—MUSCIPRA.

- 1 *vetula* (Licht.) ex Brasil. merid.

Genus XVII.—COPURUS.

- 1 *colonus* (Vieill.) ex Brasil. merid.
- 2 *fuscicapillus*, Sel. ex Columbia.
- 3 *leuconotus*, Lafr. ex Guiana, Columb. Æquat. et Am. centr. ad Costaricam.

Genus XVIII.—MACHETORNIS.

- 1 *rixosa* (Vieill.) ex Brasil. Amazonia et Venezuela.

Genus XIX.—MUSCISAXICOLA.

- 1 *albifrons*, Tsch. ex Peruvia.
- 2 *alpina*, Jard. ex Æquat. alta.
- 3 *nigrifrons*, Ph. et Landb. ex Chilia.
- 4 *cinerea*, Ph. et Landb. ex Chilia.
- 5 *macloviana* (Garn.) ex inss. Falkland.
- 6 *mentalis*, Lafr. et d'Orb. ex Chilia et Patagonia.
- 7 *flavinucha*, Lafr. ex Chilia.
- 8 *rubricapilla*, Ph. et Landb. ex Chilia et Peruvia.
- 9 *ruvifertex*, Lafr. et d'Orb. ex Chilia et Bolivia.
- 10 *maculirostris*, Lafr. et d'Orb. ex Patagonia, Chilia, Boliv. Peruv. et Æquator.
- 11 *fluviatilis*, Sel. et Salv. ex Peruv.

Genus XX.—CENTRITES.

- 1 *niger* (Bodd.) ex rep. Arg. et Patagonia.
- 2 *oreas*, Sel. et Salv. ex Bolivia.

Genus XXI.—MUSCIGRALLA.

- 1 *brevicauda*, Lafr. et d'Orb. ex Æquat. occ.

Subfam. III.—PLATYRHYNCHINÆ.

Genus XXII.—PLATYRHYNCHUS.

- 1 *rostratus* (Lath.) ex Brasil.
- 2 *flavicularis*, Sel. ex Columbia.
- 3 *mystaccus* (Vieill.) ex Brasil.
- 4 *albigularis*, Sel. ex Venezuela, Æquat. Veragua, et Costarica.

- 5 *cancerminus*, Sel. et Sa'v. ex Guatemala, et Mexico.
- 6 *coronatus*, Sel. ex Æquat. orient.
- 7 *superciliaris*, Lawr. ex Panama, Veragua et Costarica.

Genus XXIII.—TODIROSTRUM.

- 1 *cinereum* (Linn.) ex Am. centr. et merid. tropica.
- 2 *poliocephalum* (Max.) ex Brasil. merid. or.
- 3 *nigriceps*, Sel. ex Columbia.
- 4 *chrysoerotrachum*, Strickl. ex Amazonia.
- 5 *guttatum*, Pelz. ex Guiana int. et Columbia.
- *6 *calopterum*, Sel. ex Æquator. orient.
- 7 *picatum*, Sel. ex Æquator. orient.
- 8 *capitale*, Sel. ex Æquator. orient.
- 9 *ruficeps*, Sel. ex Columbia.
- 10 *schistaceiceps*, Sel. ex Mex. Am. centr. et Columbia.
- 11 *maculatum*, Desm. ex Guiana, Amaz. inf. et Venezuela.

Genus XXIV.—ONCOSTOMA.

- 1 *cinereigulare*, Sel. ex Mex. Guatemala et Veragua.
- 2 *olivaceum* (Lawr.) ex Panama.

Genus XXV.—EUSCARTHUS.

- 1 *nidipendulus* (Max.) ex Brasilia.
- 2 *zosterops*, Pelz. ex Brasil.
- 3 *fumifrons* (Hartl.) ex Brasil.
- 4 *gularis* (Tomm.) ex Brasil.
- 5 *granadensis* (Hartl.) ex Columbia.
- 6 *striatocollis* (Lafr.) ex Brasil.
- 7 *impiger*, Sel. et Salv. ex Columbia et Venezuela.
- 8 *margaritaceiventris* (Lafr. et d'Orb.) ex Brasil. int. et Bolivia.
- 9 *wuchereri*, sp. nov. x. ex Brasil.
- 10 *fulviceps*, Sel. ex Peruv. et Æquat. occ.
- 11 *squamieristatus* (Lafr.) ex Columbia, Veragua et Costarica.
- 12 *spicifer* (Lafr.) ex Amazonia sup.

Genus XXVI.—ORCHILUS.

- 1 *auricularis* (Vieill.) ex Brasil.
- 2 *caudatus* (Lafr. et d'Orb.) ex Boliv. Venezuela et Costarica.

Genus XXVII.—*COLOPTERUS*.

- 1 *pilaris* Cab. ex Columbia et Veragua.
- 2 *galeatus* (Bodd.) ex Guiana et Venezuela.

Genus XXVIII.—*HEMITRICCUS*.

- 1 *diops* (Temm.) ex Brasil.

Genus XXIX.—*PHYLLOSCARTES*.

- 1 *ventralis* (Temm.) ex Brasil. Columb. et Æquator.

Genus XXX.—*HAPALOCERCUS*.

- 1 *meloryphus* (Max.) et Brasilia.
- 2 *flaviventris*, Lafr. et d'Orb. ex rep. Arg. et Chilia.
- 3 *acutipennis*, Scl. et Salv. ex Columb. et Peruvia.

Genus XXXI.—*HABRURA*.

- *1 *minima* (Gould) ex Uruguaya.

Genus XXXII.—*POGONOTRICCUS*.

- 1 *eximius* (Temm.) ex Brasil.
- 2 *plumbeiceps* Lawr. ex Columbia.

Genus XXXIII.—*LEPTOTRICCUS*.

- 1 *sylviola*, Cab. ex Brasilia.
- 2 *supereiliaris*, Scl. et Salv. ex Veragua.

Genus XXXIV.—*STIGMATURA*.

- 1 *budytoides*, Lafr. et d'Orb. ex Amazonia sup. et Bolivia.
- 2 *flavo-einerea* (Burm.) ex rep. Argentina.

Genus XXXV.—SERPHOPHAGA.

- 1 *suberistata* (Vicill.) ex Brasil. merid. et rep. Arg.
- 2 *subflava*, sp. nov. xi. ex Para.
- 3 *cinerea* (Strickl.) ex Æquat. Columb. Veragua et Costarica.
- 4 *nigricans* (Vieill.) ex rep. Argent.
- 5 *parvirostris*, Gould, ex Chilia.
- 6 *ruficeps* (Lafr.) ex Columbia.
- 7 *pæcilocerca*, sp. nov. xii. ex Æquat. et Columbia.

Genus XXXVI.—ANÆRETES.

- 1 *parulus* (Kittl.) ex Chilia, rep. Argentina, et Æquat.
- 2 *albo-eristatus* (Vig.) ex Peruv. occ. et Bolivia.
- 3 *fernandezianus*, Philippi, ex ins. Juan Fernandez.
- 4 *agilis*, Scl. ex Columbia.

Genus XXXVII.—CYANOTIS.

- 1 *azarae* (Naum.) ex rep. Arg. Chilia et Peruv. occ.

Subfam. IV.—ELAINEINÆ.

Genus XXXVIII.—MIONECTES.

- 1 *striaticollis* (Lafr. et d'Orb.) ex Columb. Peruv. et Bolivia.
- 2 *olivaceus*, Lawr. ex Venezuela, Columb. Æquat. Panama et Costarica.
- 3 *oleagineus*, Cab. ex Mex. Am. centr. et merid. ad Brasil.
- 4 *rufiventris*, Cab. ex Brasilia.

Genus XXXIX.—LEPTOPOGON.

- 1 *amaurocephalus*, Cab. ex Brasil.
- 2 *peruvianus*, Scl. et Salv. ex Amazonia sup.
- 3 *pileatus*, Cab. ex Mex. et Am. centr.
- 4 *superciliaris*, Tsch. ex Peruv. Æquat. Columb. Veragua et Costarica.
- 5 *erythrops*, Scl. ex Columbia.
- 6 *pæilotis*, Scl. ex Columbia.

Genus XL.—CAPSIEMPTIS.

- 1 *flaveola* (Licht.) ex Brasil. Guiana et Chiriqui.

Genus XLI.—PHYLLOMYIAS.

- 1 *brevirostris*, Spix, ex Brasil.
- 2 *burmeisteri*, Cab. et Hein. ex Brasil.
- 3 *griscocapilla*, Scl. ex Brasil.
- 4 *semifusca*, Scl. ex Brasil. Guiana, Venez. et Columb.
- 5 *platyrhyncha*, sp. nov. xiii. ex Brasil. int.

Genus XLII.—ORNITHION.

- 1 *inermis*, Hartl. ex Guiana.
- 2 *pusillum* (Cab.) ex Æquat. occ. Venez. Guiana et Amazonia.
- 3 *incanescens* (Max.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Brasil.
- 4 *obsoletum* (Max.) ex Brasil.

Genus XLIII.—TYRANNULUS.

- 1 *clatus* (Lath.) ex Amaz. Guian. Columb. et Panama.
- 2 *semiflavus*, Scl. & Salv. ex Guatemala.
- 3 *brunnicapillus*, Lawr. ex Panama et Costarica.

Genus XLIV.—TYRANNISCUS.

- 1 *nigricapillus* (Lafr.) ex Columb. et Æquat.
- 2 *cinereiceps*, Scl. ex Columb. et Æquat.
- 3 *chrysops*, Scl. ex Columb. et Æquat.
- 4 *vilissimus*, Scl. ex Guatemala.
- 5 *improbis*, Scl. & Salv. ex Venez. et Columb.
- 6 *parvus*, Lawr. ex Panama, Verag. et Costarica.
- 7 *leucogonys*, Scl. & Salv. ex Columbia.
- 8 *gracilipes*, Scl. ex Peruv. orient. et Amaz. sup.
- 9 *griseiceps*, Scl. & Salv. ex Æquatoria.

Genus XLV.—ELAINEA.

- 1 *pagana* (Licht.) ex Mex. et Am. centr. ad Brasil.
- 2 *martinica* (Linn.) ex Antilibus min.
- 3 *albiceps* (Lafr. et d'Orb.) ex Amazon. Brasil. rep. Arg. Chilia et Peruv.
- 4 *gigas*, Scl. ex Æquat. orient.
- 5 *pallatangæ*, Scl. et Æquat. occ.
- 6 *fallax*, Scl. ex Jamaica.
- 7 *placens*, Scl. ex Mex. Am. centr. Columbia et Æquat. occ.
- 8 *subplacens*, Scl. ex Æquat. occ.
- 9 *cotta*, Gosse, ex Jamaica.
- 10 *elegans*, Pelz. ex Amazonia, Columb. et Guiana.
- 11 *caniceps*, Sw. ex Amazonia Columb. et Panama.

- 12 *ruficeps*, Pelz. ex Guiana int. et Amazonia.
- 13 *obscura* (Lafr. et d'Orb.) ex Brasil. et Boliv.
- 14 *mesoleuca*, Cab. et Hein. ex Brasil.
- 15 *frantzii*, Lawr. ex Costarica et Veragua.
- 16 *pudica*, Scl. ex Venezuela, Columbia et Am. centr.
- 17 *arenarum*, Salv. ex Costarica.
- 18 *affinis*, Burm. ex Brasil. int.

Genus XLVI.—EMPIDAGRA.

- 1 *suiriri* (Vioill.) ex rep. Argentina, Parag. et Bolivia.

Genus XLVII.—LEGATUS.

- 1 *albicollis* (Vieill.) ex Bras. Guian. Amaz. Columb. Panama Verag. et Costarica.
- 2 *variegatus*, Scl. ex Mexico Guatemala et Costarica.

Genus XLVIII.—SUBLEGATUS.

- 1 *glaber*, Scl. et Salv. ex Venezuela.
- 2 *murinus* (Spix.) ex Amazonia inf.

Genus XLIX.—MYIOZETETES.

- 1 *erythropterus* (Lafr.) ex Brasilia.
- 2 *rufipennis*, Lawr. ex Venezuela.
- 3 *cayennensis* (Linn.) ex Guian. Columb. Æquat. et Panama.
- 4 *similis* (Spix.) et Brasil. Peruvia, et Æquat.
- 5 *texensis* (Giraud) ex Mex. Am. centr. et Columb.
- 6 *granadensis*, Lawr. ex Honduras, Panama, Columb. et Peruv. occ.
- 7 *sulphureus* (Spix.) ex Amaz. sup. et Bras. int.
- 8 *luteiventris*, Scl. ex Æquat. orient. Amaz. sup. et Guiana.

Genus L.—RHYNCHOCYCLUS.

- 1 *olivaceus* (Temm.) ex Brasil.
- 2 *æquinoctialis*, Scl. ex Amazon. sup.
- 3 *brevirostris* (Cab.) ex Mex. et Am. centr.
- 4 *fulvipectus*, Scl. ex Æquat. occ.
- 5 *sulphurescens* (Spix.) ex Brasil. Amazon. Columb. et Panama.
- 6 *cinereiceps*, Scl. ex Mex. et Am. centr.
- 7 *viridiceps*, Scl. et Salv. ex Amazonia sup.
- 8 *megacephalus*, Sw. ex Brasil. et Amazonia.
- 9 *flaviventris* (Spix.) ex Brasil. Guiana et Columbia.
- 10 *ruficauda* (Spix.) et Guiana et Amazonia.

Genus LI.—CONOPIAS.

- 1 *trivirgata* (Max.) ex Brasil.
- 2 *inornata* (Lawr.) ex Venezuela et Trinit. ins.
- 3 *cinchoneti* (Tsch.) ex Peruv. et Columbia.

Genus LII.—PITANGUS.

- 1 *lictor* (Licht.) ex Brasil. Amazon. Columb. et Panama.
- 2 *parvus*, Pelz. ex Amazonia.
- 3 *derbianus*, Kaup, ex Mex. Am. centr. Columb. et Venezuela.
- 4 *sulphuratus* (Linn.) ex Guiana et Brasil. orient.
- 5 *bellicosus* (Vieill.) ex Brasil. merid. Boliv. et rep. Arg.
- 6 *caudifasciatus* (d'Orb.) ex Cuba et Jamaica.
- 7 *taylori*, Scl. ex Portorico.

Genus LIII.—SIRYSTES.

- 1 *sibilator* (Vieill.) ex Brasil.
- 2 *albogriseus*, Lawr. ex Panama, Columb. et Amazonia.

Genus LIV.—MYIODYNASTES.

- 1 *solitarius* (Vieill.) ex Brasil. merid. Boliv. et Paraguay.
- 2 *audax* (Gm.) ex Brasil. Guiana, Venez. Columb. Panama et Costarica.
- 3 *luteiventris*, Scl. ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.
- 4 *atrifrons*, Scl. ex Æquator. occ.
- 5 *hemichrysus* (Cab) ex Veragua et Costarica.
- 6 *chrysocephalus* (Tsch.) ex Columb. Æquator. et Peruvia.

Subfam. V.—TYRANNINÆ.

Genus LV.—MEGARHYNCHUS.

- 1 *pitangua* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Brasil.

Genus LVI.—MUSCIVORA.

- 1 *regia* (Gm.) ex Guiana et Amaz. inf.
- 2 *swainsoni*, Pelz. ex Brasil. or.
- 3 *castelnaudi* (Dev.) ex Amaz. sup.
- 4 *occidentalis*, Scl. ex Æquat. occ.
- 5 *mexicana*, Scl. et Mex. et Am. centr. ad Panama.

Genus LVII.—HIRUNDINEA.

- 1 *ferruginea* (Gm.) ex Guiana et Amaz. inf.
- 2 *sclateri*, Reinh. ex Peruv. or. et Columbia.
- 3 *bellicosa* (Vieill.) ex Brasil. int. et Paraguay.

Genus LVIII.—CNIPODECTES.

- 1 *subbrunneus* (Sel.) ex Æquator. occ. Amaz. et Panama.

Genus LVIX.—MYIOBIUS.

- 1 *barbatus* (Gm.) ex Veragua, Panama, Æquat. Guiana, et Brasil.
- 2 *sulphureipygius*, Sel. ex Mex. Am. centr. Columb. Æquat. et Amaz.
- 3 *cinnamomeus* (Lafr. et d'Orb.) ex Columb. Æquat. Peruv. et Boliv.
- 4 *virillotides* (Lafr.) ex Venezuela.
- 5 *erythrurus*, Cab. ex Peruv. Amaz. Columb. Panama et Costarica.
- 6 *ornatus* (Lafr.) ex Columbia.
- 7 *phænicurus*, Sel. ex Æquat. et Peruvia.
- 8 *flavicans*, Sel. ex Æquat. et Columb.
- 9 *pulcher*, Sel. ex Æquat.
- 10 *bellus*, Sel. ex Columb.
- 11 *rufescens*, Salv. ex Peruv. occ.
- 12 *nævus* (Bodd.) ex Veragua et Amer. merid. ad rep. Arg.
- 13 *capitalis*, Salvin, ex Costarica.

Genus LX.—PYROCEPHALUS.

- 1 *rubineus* (Bodd.) ex Am. merid. ferè universa.
- 2 *mexicanus*, Sel. ex Mex. et Guatemala.
- 3 *nanus*, Gould, ex inss. Galapag.

Genus LXI.—EMPIDOCANES.

- 1 *olivus* (Bodd.) ex Guiana, Venezuela et Tobago.
- 2 *fuscatus* (Max.) ex Brasil. et Amazonia.
- 3 *fringillaris*, Pelz. ex Brasil. merid.
- 4 *pæcilurus*, Sel. ex Columb. et Peruvia.

Genus LXII.—MITREPHORUS.

- 1 *phæocercus*, Sel. ex Mex. et Guatemala.
- 2 *aurantiventris*, Lawr. ex Costarica et Guatemala.

Genus LXIII.—EMPIDONAX.

- 1 *trailli* (Aud.) ex Mex. Am. centr. Columb. et Æquat.
- 2 *minimus* (Baird) ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 3 *griseipectus*, Lawr. ex Æquat. occ.
- 4 *acadicus* (Gin.) ex Mex. et Am. centr. ad Costarica.
- 5 *griseigularis*, Lawr. ex Panama et Æquat. occ.
- 6 *albigularis*, Scl. ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 7 *flaviventris* (Baird) ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 8 *bairdi*, Scl. ex Mexico et Guatemala.
- 9 *flavescens*, Lawr. ex Costarica et Veragua.
- 10 *obscurus* (Sw.) ex Mexico.
- 11 *atriceps*, Salvin, ex Veragua.
- 12 *fulvifrons* (Giraud) ex Mex. et Guatemala.

Genus LXIV.—CONTOPUS.

- 1 *borcalis* (Sw.) ex Mex. Guat. Veragua et Columbia.
- 2 *pertinax*, Cab. et Hein. ex Mex. et Guat.
- 3 *ardesiacus* (Lafr.) ex Columb. Venez. et Æquator.
- 4 *ochraceus*, Scl. et Salv. ex Costarica.
- 5 *lugubris*, Lawr. ex Costarica.
- 6 *virens* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et Columbia.
- 7 *richardsoni*, Sw. ex Mex. Am. centr. et Columbia.
- 8 *brachytarsus*, Scl. ex Mex. Am. centr. Columb. et Amazonia.
- 9 *pallidus* (Gosse) ex Jamaica.
- 10 *latirostris*, Verr. ex ins. S. Lucia.

Genus LXV.—MYIOCHANES.

- 1 *cinereus* (Spix.) ex Brasilia, Amazon. et Æquat.

Genus LXVI.—MYIARCHUS.

- 1 *validus*, Cab. ex Jamaica.
- 2 *crinitus* (Linn.) ex Guatemala.
- 3 *erythrocerus*, Scl. ex Antill. min. et Am. merid. ad Brasil.
- 4 *mexicanus* (Kaup) ex Mex. et Guat.
- 5 *cinerascens* (Lawr.) ex Mexico.
- 6 *tyrannulus* (Müll.) ex Veragua, Panama, et Am. merid. ad Brasil.
- 7 *phæocephalus*, Scl. ex Æquator. occ.
- 8 *laurencii* (Giraud) ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.
- 9 *nigriceps*, Scl. ex Panama, Æquat. Columb. et Amazonia.
- 10 *stolidus* (Gosse) ex Jamaica et Hayti.
- 11 *phæbe* (d'Orb.) ex Cuba et inss. Bahamens.
- 12 *antillarum*, Bryant, ex Porto Rico.

Genus LXVII.—BLACICUS.

- 1 *barbirostris* (Sw.) ex Jamaica.
- 2 *caribæus* (d'Orb.) ex Cuba.

Genus LXVIII.—EMPIDIAS.

- 1 *fuscus* (Gm.) ex Mexico.

Genus LXIX.—EMPIDONOMUS.

- 1 *varius* (Vieill.) ex Guiana et Brasil.

Genus LXX.—TYRANNUS.

- 1 *pipiri*, Vieill. ex Am. centr. et merid. ad Boliviam.
- 2 *griseus*, Vieill. ex Cuba, Jamaica, Portorico et Am. centr.
- 3 *rostratus*, Scl. ex Guiana, ins. Trinit. et Antill. min.
- 4 *magnirostris*, d'Orb. ex Cuba.
- 5 *melancholicus*, Vieill. ex Mex. Am. centr. et merid. ad remp. Arg.
- 6 *niveigularis*, Scl. ex Æquat. occ.
- 7 *albigularis*, Burm. ex Brasil. or.
- 8 *vociferans*, Sw. ex Mex. et Guatemala.
- 9 *verticalis*, Say, ex Guatemala.
- 10 *crassirostris*, Sw. ex Mex. et Guatemala.
- 11 *aurantio-atro-cristatus*, Lafr. et d'Orb. ex rep. Arg. Boliv. et Peruv. orient.

Genus LXXI.—MILVULUS.

- 1 *tyrannus* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad remp. Arg.
- 2 *forficatus* (Gm.) ex Mex. Guatemala et Costarica.

Fam. XXI.—PIPRIDÆ.

Genus I.—PIPRITES.

- 1 *pileatus* (Temm.) ex Brasil.
- 2 *chloris* (Temm.) ex Brasil.
- 3 *chlorion* (Cab.) ex Guiana, Amazonia et Columbia.
- 4 *griseiceps*, Salv. ex Costarica.

Genus II.—MASIUS.

- 1 *chrysopterus* (Lafr.) ex Columbia.
- 2 *coronulatus*, Scl. ex Æquatoria.

Genus III.—CHLOROPIPO.

- 1 *flavicapilla* (Scl.) ex Columbia.

Genus IV.—XENOPIPO.

- 1 *atronitens*, Cab. ex Guiana et Columbia.

Genus V.—PIPRA.

- 1 *flicauda* (Spix.) ex Amazonia.
- *2 *heterocerca*, Scl. ex Amazonia.
- 3 *aureola* (Linn.) ex Guiana et Venezuela.
- 4 *flavicollis*, Scl. ex Amazonia.
- 5 *fasciata*, Lafr. ex Amazonia, Peruv. Boliv. et Brasil. int.
- 6 *cornuta*, Spix. ex Amazonia sup.
- 7 *rubricapilla*, Temm. ex Brasil.
- 8 *chloromeros*, Tsch. ex Peruv. et Boliv.
- 9 *mentalis*, Scl. ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 10 *auricapilla*, Licht. ex Guiana, Columb. et Panama.
- 11 *leucocilla* (Linn.) ex Guiana, Amazon. Columb. Panama et Veragua.
- 12 *isidori*, Scl. ex Columbia.
- 13 *nattereri*, Scl. ex Amazonia.
- 14 *eyaneocapilla*, Hahn, ex Amazon. sup. Columb. Panama et Veragua.
- *15 *cæruleocapilla*, Tsch. ex Peruvia.
- 16 *vireseens*, Pelz. ex Amazonia.
- 17 *serena* (Linn.) ex Guiana.
- 18 *gutturalis*, Linn. ex Guiana.
- 19 *leucorrhœa*, Scl. ex Columb. Veragua et Costarica.

Genus VI.—NEOPIPO.

- 1 *cinnamomea* (Lawr.) ex Amazonia sup.

Genus VII.—MACHLEROPTERUS.

- 1 *regulus* (Hahn) ex Brasilia.
- 2 *striolatus* (Bp.) ex Columb. et Amaz.
- 3 *pyrocephalus*, Scl. ex Amaz. et Bras. int.
- 4 *deliciosus*, Scl. ex Æquatoria.

Genus VIII.—ILICURA

- 1 *militaris* (Shaw) ex Brasilia.

Genus IX.—CHIROXIPPIA.

- 1 *parcola* (Linn.) ex Brasilia, Guiana et Amaz.
- 2 *regina*, Scl. ex Amaz. sup.
- 3 *lanceolata* (Wagl.) ex Venez. Columb. Panama et Veragua.
- 4 *linearis*, Bp. ex Costarica, Nicaragua et Guatemala.
- 5 *caudata* (Shaw) ex Brasilia.

Genus X.—METOPIA.

- 1 *galeata* (Licht.) ex Brasilia.

Genus XI.—METOPOTIRIX.

- 1 *aurantiacus*, Scl. & Salv. ex Amaz. sup.

Genus XII.—CHIROMACHÆRIS.

- 1 *manacus* (Linn.) ex Guian. Venez. Columb. et Æquat.
- 2 *gutturosa* (Desm.) ex Brasilia.
- 3 *flavcola* (Cassin) ex Columbia.
- 4 *candæi* (Parz.) ex Mex. Guat. et Costarica.
- 5 *vitellina* (Gould) ex Panama.
- 6 *aurantiaca*, Salv. ex Chiriqui.

Genus XIII.—HETOROPELMA.

- 1 *turdinum* (Max.) ex Brasilia.
- 2 *wallacii*, Scl. & Salv. ex Amaz. inf.
- 3 *amazonum*, Scl. ex Amaz. sup. et Columb.
- 4 *stenorhynchum* Scl. & Salv. ex Venezuela.
- 5 *verœpaci*s, Scl. & Salv. ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 6 *virescens* (Max.) ex Brasilia.
- 7 *flavicapillum*, Scl. ex Brasilia.
- 8 *chrysocephalum*, Pelz. ex Bras. int. et Amaz.
- 9 *igniceps*, Scl. et Guiana.
- 10 *aurifrons* (Max.) ex Brasilia.

Genus XIV.—HETEROCERCUS.

- 1 *luteatus*, Strickl. ex Amaz. sup.
- 2 *flavivertex*, Pelz. ex Guiana int.

Genus XV.—SCHIFFORNIS.

- 1 *major*, Bp. ex Amaz. sup.
- 2 *rufa*, Pelz. ex Brasilia int.

Fam. XXII.—COTINGIDÆ.

Subfam. I.—TITYRINÆ.

Genus I.—TITYRA.

- 1 *cayana* (Linn.) ex Guiana Amazonia Venezuela et Columbia.
- 2 *brasiliensis*, Sw. ex Brasil.
- 3 *semifasciata* (Spix.) ex Amaz. sup. et Bolivia.
- 4 *personata*, Jard. et Selb. ex Mex. Am. centr. Columb. Æquat. et Venezuela.
- 5 *albitorques*, Dubus, ex Columb. Amaz. et Brasil. int.
- 6 *fraseri*, Kaup, ex Mex. et Am. centr. ad Veraguam.

Genus II.—HADROSTOMUS.

- 1 *atricapillus* (Vieill.) ex Brasil.
- 2 *niger* (Gm.) ex Jamaica.
- 3 *homochrous*, Sel. ex Æquat. occ. et Panama.
- 4 *aglaie*, Lafr. ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.
- 5 *minor* (Less.) ex Columb. et Guian.

Genus III.—PACHYHAMPIUS.

- 1 *viridis* (Vieill.) ex Brasil.
- 2 *surinamus* (Linn.) ex Guiana.
- 3 *cinereus* (Bodd.) ex Guiana, Venez. Columb. et Panama.
- 4 *spodiurus*, Sel. ex Æquator. occ.
- 5 *cinereiventris*, Sel. ex Guatem. Am. centr. Columb. et Venezuela.
- 6 *niger*, Spix, ex Guiana, Amazonia, Columbia et ins. Trinit.
- 7 *polychropterus* (Vieill.) ex Amazonia int. et Brasil.
- 8 *major* (Cab.) ex Mex. et Guatemala.
- 9 *albo-griscus*, Sel. ex Nicar. Panam. Columb. Æquator. et Venezuela.
- 10 *atricapillus* (Gm.) ex Guiana, Amazon. et Brasil.
- 11 *versicolor* (Hartl.) ex Columbia.

Subfam. II.—LIPAUGINÆ.

Genus IV.—LATHRIA.

- 1 *fusco-cinerea* (Lafr.) ex Columbia.
- 2 *plumbca* (Licht.) ex Brasil.
- 3 *cineracca* (Vieill.) ex Guiana et Amazonia.
- 4 *unirufa*, Sel. ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 5 *subalaris*, Sel. ex Amazon. sup.

Genus V.—AULIA.

- 1 *hypopyrrha* (Vieill.) ex Brasil.
- 2 *lateralis*, Gray et Mitch. ex Amazon. sup.
- 3 *rufescens*, Scl. ex Veragua et Panama.

Genus VI.—LIPATUGUS.

- 1 *simplex* (Licht.) ex Brasil. Guiana et Columb.
- 2 *immundus*, sp. nov. xiv. ex Guiana int.
- 3 *holerythrus*, Scl. et Salv. ex Guat. et Am. centr. ad Columb.

Genus VII.—PTILOCHLORIS.

- 1 *squamata* (Max.) ex Brasil.
- 2 *remigialis* (Lafr.) ex Brasil.

Subfam. III.—ATTILINÆ.

Genus VIII —ATTILA.

- 1 *brasiliensis*, Less. ex Brasil.
- 2 *selateri*, Lawr. ex Panama, Veragua et Costarica.
- 3 *cinereus* (Gm.) ex Brasil.
- 4 *spadicus* (Gm.) ex Guiana.
- 5 *citriniventris*, Scl. ex Amaz. sup.
- 6 *validus*, Pelz. ex Brasil. int.
- 7 *torridus*, Scl. ex Æquator. occ.
- 8 *thamnophiloides* (Spix) ex Guiana et Amaz. sup.

Genus IX.—CASIORNIS.

- 1 *rubra* (Vieill.) ex Brasil. int. et Paraguay.
- 2 *fusca*, sp. nov. xv. ex Bahia.

Subfam. IV.—RUPICOLINÆ.

Genus X.—RUPICOLA.

- 1 *crocea* (Vieill.) ex Guiana.
- 2 *peruviana* (Lath.) ex Amazon. sup. Columb. Peruv. et Boliv.
- 3 *sanguinolenta*, Gould, ex Æquator. occ.

Genus XI.—PHENICOCERCUS.

- 1 *carnifex* (Linn.) ex Guiana et Amaz. inf.
- 2 *nigricollis*, Sw. ex Amaz. sup.

Subfam. V.—COTINGINÆ.

Genus XII.—TIJUCA.

- 1 *nigra*, Less. ex Brasil.

Genus XIII.—PHIBALURA.

- 1 *flavirostris*, Vieill. ex Brasil.

Genus XIV.—PIPREOLA.

- 1 *riefferi*, Boiss. ex Columbia.
- 2 *melanolæma*, Scl. ex Venezuela, Æquator. et Peruv.
- 3 *aureipectus*, Lafr. ex Venezuela.
- 4 *chlorolepidota*, Sw. ex Æquatoria occ.
- *5 *slateri*, Corn. ex Æquator.
- 6 *jucunda*, Scl. ex Æquator.
- 7 *formosa*, Hartl. ex Venezuela.

Genus XV.—AMPELIO.

- 1 *cucullatus*, Sw. ex Brasil.
- 2 *melanocephalus*, Sw. ex Brasil.
- 3 *arcuatus*, Lafr. ex Columb. et Æquator.
- 4 *cinctus*, Tsch. ex Peruv. Æquator. et Columb.

Genus XVI.—CARPODECTES.

- 1 *nitidus*, Salvin, ex Costarica et Nicaragua.

Genus XVII.—HELIOCHERA.

- 1 *rubrocristata* (Lafr. et d'Orb.) ex Columb. Æquat. Peruv. et Bolivia.
- 2 *rufaxilla* (Tsch.) ex Peruv. orient. et Columbia.

Genus XVIII.—COTINGA.

- 1 *cærulea* (Vieill.) ex Guiana et Columbia.
- 2 *cineta* (Bodd.) ex Brasil. orient.

- 3 *amabilis*, Gould, ex Guatemala et Am. centr. ad Panama.
- 4 *cayana* (Linn.) ex Guiana, Amaz. et Columbia.
- 5 *maynana* (Linn.) ex Amazon. sup.
- 6 *porphyrolæma*, Scl. et Dev. ex Peruv. orient.

Genus XIX.—XIPHOLENA.

- 1 *pompadora* (Linn.) ex Guiana.
- 2 *atropurpurea* (Max.) ex Brasil.
- 3 *lamellipennis* (Laftr.) ex Amazon. inf.

Genus XX.—IODOPLEURA.

- 1 *pipra* (Less.) ex Brasil.
- 2 *isabellæ* (Parz.) ex Amazon. sup. et inf.
- 3 *laplaci*, Eyd. et Gerv. ex Guiana.

Genus XXI.—CALYPTURA.

- 1 *cristata* (Vieill.) ex Brasil.

Subfam. VI.—GYMNODERINÆ.

Genus XXII.—QUERULA.

- 1 *eruenta*, Bodd. ex Guian. Amaz. Columb. et Panama.

Genus XXIII.—HÆMATODERUS.

- 1 *militaris* (Lath.) ex Guiana.

Genus XXIV.—CHASMORHYNCHUS.

- 1 *niveus* (Bodd.) ex Guiana.
- 2 *tricarunculatus*, Verr. ex Costarica et Veragua.
- 3 *nudicollis* (Vieill.) ex Brasil.
- 4 *variegatus* (Gm.) ex Venezuela et Guiana int.

Genus XXV.—GYMNOCEPHALUS.

- 1 *calvus* (Gm.) ex Guiana.

Genus XXVI.—GYMNODERUS.

- 1 *fœtidus* (Linn.) ex Guiana et Amaz. sup.

Genus XXVII.—PYRODERUS.

- 1 *scutatus* (Shaw) ex Brasil.
- 2 *granadensis* (Lafr.) ex Columbia.
- 3 *orenocensis* (Lafr.) ex Venezuela.

Genus XXVIII.—CEPHALOPTERUS.

- 1 *ornatus*, Geoffr. ex Amazonia sup.
- 2 *penduliger*, Scl. ex Æquator. occ.
- 3 *glabricollis*, Gould, ex Veragua et Costarica.

Fam. XXIII.—PHYTOTOMIDÆ.

Genus I.—PHYTOTOMA.

- 1 *rara*, Mol. ex Chilia.
- 2 *rutila*, Vieill. ex rep. Arg.
- 3 *angustirostris*, Lafr. et d'Orb. ex Bolivia.

////////////////////////////////////

Subordo III.—TRACHEOPHONÆ.

Fam. XXIV.—DENDROCOLAPTIDÆ.

Subfam. I.—FURNARIINÆ.

Genus I.—GEOBATES.

- 1 *pæcilopterus* (Max.) ex Bras. merid.

Genus II.—GEOSITTA.

- 1 *cunicularia* (Vieill.) ex Chilia, Patag. et rep. Argent.
- 2 *crassirostris*, Sel. ex Peruv. occ.
- 3 *tenuirostris* (Lafr. et d'Orb.) ex Peruv. et Bolivia.
- 4 *isabellina* (Phil. et Landb.) ex Chilia.
- 5 *fasciata* (Phil. et Landb.) ex Chilia.
- 6 *peruviana*, Lafr. ex Peruv. occ.

Genus III.—FURNARIUS.

- 1 *leucopus*, Sw. ex Guian. et Amaz.
- 2 *agnatus* sp. nov. xvi. ex Columbia rip.
- 3 *assimilis*, Cab. et Hein. ex Bras. merid. orient.
- 4 *torridus*, Sel. & Salv. ex Amaz. sup.
- 5 *cinnamomeus* (Less.) ex Æquat. occ.
- 6 *minor*, Pelz. ex Amazonia.
- 7 *figulus* (Licht.) ex Bras. orient.
- 8 *rufus* (Gm.) ex rep. Argent.
- 9 *commersoni*, Pelz. ex Bras. merid. et Bolivia.

Genus IV.—CLIBANORNIS, GEN. NOV. IV.

- 1 *dendrocolaptoides* (Pelz.) ex Brasil. merid.

Genus V.—UPUCERTHIA.

- 1 *dametoria*, Geoffr. et d'Orb. ex Patagonia et Chilia.
- 2 *excelsior* (Sclat.) ex Æquatoria alta.
- 3 *ruficauda* (Meyen) ex Chilia et rep. Arg.
- 4 *luscina* (Burm.) ex rep. Arg.

Genus VI.—CINCLODES.

- 1 *nigrifumosus* (Lafr. et d'Orb.) ex Chilia, Bolivia et Peruv.
- 2 *patagonicus* (Gm.) ex Chilia et Patagonia.
- 3 *antarcticus* (Garn.) ex inss. Falkland.
- 4 *fuscus* (Vieill.) ex Patagonia, rep. Arg. Chilia, Boliv. Peruv. et Æquator.
- 5 *bifasciatus*, Scl. ex Boliv. et rep. Arg.

Genus VII.—HENICORNIS.

- 1 *melanura*, G. R. Gray, ex Patagonia.
- 2 *phænicura*, Gould, ex Patagonia.

Genus VIII.—LOCHMIAS.

- 1 *nematura* (Licht.) ex Brasil.
- 2 *sororia*, Scl. et Salv. ex Venezuela.

Subfam. II.—SCLERURINÆ.

Genus IX.—SCLERURUS.

- 1 *umbretta* (Licht.) ex Brasil.
- 2 *caudacutus* (Vieill.) ex Guiana, Amazonia et Columbia.
- 3 *mexicanus*, Scl. ex Mexico, Guatem. Veragua et Amazonia.
- 4 *guatemalensis*, Hartl. ex Guatemala.
- 6 *albigularis*, Sw. ex Venezuela.

Subfam. III.—SYNALLAXINÆ.

Genus X.—OXYURUS.

- 1 *spinicauda* (Gm.) ex Chilia.
- 2 *masafueræ* (Ph. et Landb.) ex ins. Masafuera

Genus XI.—SYLVIORTHORHYNCHUS.

- 1 *desmursi*, Gay, ex Chilia.

Genus XII. —PHLŒOCRYPTES.

- 1 *melanops* (Vieill.) ex rep. Arg. Chilia et Peruv. occ.

Genus XIII.—LEPTASTHENURA.

- 1 *ægithaloides* (Kittl.) ex Peruv. occ. Chilia, rep. Arg. et Patagonia.
 *2 *setaria* (Temmm.) ex Brasil. merid.
 *3 *striolata* (Pelz.) ex Brasil. int.
 4 *andicola*, Sclat. ex Æquator. alta.
 5 *fuliginiceps* (Lafr. et d'Orb.) ex rep. Arg.

Genus XIV.—SYNALLAXIS.

a. Synallaxes rectr. x.

- 1 *ruficapilla* (Vieill.) ex Brasilia.
 2 *frontalis*, Pelz. ex Am. merid. usq. ad remp. Arg.
 3 *mæsta*, Scl. ex Æquator et Columbia.
 4 *spixi*, Scl. ex Brasilia.
 5 *albescens*, Temmm. ex Am. merid. usq. ad remp. Arg.
 6 *hypospodia*, Scl. ex Brasil.
 7 *subpudica*, Scl. ex Columbia.
 8 *pudica*, Scl. ex Æquator. Columb. Panama et Veragua.
 9 *guianensis* (Gm.) ex Guiana, Columb. et Amaz. inf.
 10 *abilora*, Pelz. ex Brasil. int. et Boliv.
 11 *cinerascens*, Temmm. ex Brasilia.
 12 *propinqua*, Pelz. ex Amazonia.
 *13 *stictothorax*, Scl. ex Æquatoria.
 *14 *semicinerea*, Reich. ex Brasil.
 *15 *scutata*, Scl. ex Brasil.
 16 *cinnamomea* (Gm.) ex Brasil. Amazonia, Guiana et Columbia.
 17 *vulpina*, Pelz. ex Brasil. int. et Amazonia.
 18 *unirufa*, Lafr. ex Columbia.
 19 *castanea*, Scl. ex Venezuela.
 20 *kollari*, Pelz. ex Guiana int.
 21 *candæi*, Lafr. et d'Orb. ex Columb. litt.
 22 *læmosticta*, Scl. ex Columbia.
 23 *terrestris*, Jard. ex inss. Tobago et Trinit.
 24 *gularis*, Lafr. ex Columbia et Æquator.
 25 *fuliginosa*, Lafr. ex Columbia.
 *26 *palpebralis*, Cab. ex Peruvia.
 27 *erythrothorax*, Scl. ex Mex. et Am. centr.
 28 *torquata* (Max.) ex Brasilia merid.

- *29 *maximiliani*, d'Orb. ex Bolivia.
- 30 *phryganophila*, Vieill. ex Brasil. int. Boliv. et rep. Arg.
- 31 *rutilans*, Temm. ex Amazonia.

b. Synallaxes rectr. xii.

- 32 *pallida*, Max. ex Brasil.
- 33 *antisiensis*, Scl. ex Æquatoria.
- 34 *eurtata*, Scl. ex Columbia.
- 35 *erythrope*, Scl. ex Æquator. occ. et Costarica.
- 36 *rufigenis*, Lawr. ex Costarica.
- 37 *striaticollis*, Lafr. ex Columbia.
- *38 *hyposticta*, Pelz. ex Guiana int.
- 39 *suberistata*, Scl. ex Venezuela.
- *40 *ruticilla*, Cab. et Hein. ex Brasil. merid.
- 41 *striaticeps*, Lafr. et d'Orb. ex rep. Arg. et Patagonia.
- *42 *albieps* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.
- *43 *albicapilla*, Cab. ex Peruvia.
- 44 *humicola*, Kittl. ex Chilia et rep. Arg.
- 45 *orbignyi*, Reichenb. ex Boliv. et rep. Arg.
- 46 *arequipæ*, Scl. et Salv. ex Peruv. occ.
- 47 *modesta*, Eyton, ex rep. Arg. et Patagonia.
- *48 *humilis*, Cab. ex Peruvia occ.
- 49 *sordida*, Less. ex rep. Arg. et Patagonia.
- 50 *sulphurifera*, Burm. ex rep. Arg. et Patagonia.
- 51 *patagonica* (Lafr. et d'Orb.) ex Patagonia.
- 52 *anthoides*, King, ex Boliv. Chilia, rep. Arg. et Patagonia.
- 53 *wyatti*, Scl. ex Columbia.
- 54 *flammulata*, Jard. ex Æquator. alta et Columbia.
- 55 *maluroides*, d'Orb. ex rep. Arg.

Genus XV.—CORYPHISTERA.

- *1 *alaudina* (Burm.) ex rep. Arg.

Genus XVI.—ANUMBIUS.

- 1 *acuti-caudatus*, Less. ex Paraguay et rep. Arg.

Genus XVII.—LIMNORNIS.

- 1 *curvirostris*, Gould, ex rep. Arg. et Uruguay.

Genus XVIII.—PLACELLODOMUS.

- 1 *frontalis* (Licht.) ex Brasil Paraguay, rep. Arg. Bolivia. et Venezuela.
- 2 *striaticiceps* (Lafr. et d'Orb.) ex Boliv. et Peruv.
- 3 *striaticollis* (Lafr. et d'Orb.) ex rep. Arg. et Boliv.
- 4 *ruber* (Vieill.) ex rep. Arg. Paraguay et Boliv.

Genus XIX.—THRIPOPHAGA.

- 1 *erythrophthalma* (Max.) ex Brasil.
- 2 *striolata* (Licht.) ex Brasil.
- 3 *guttuligera*, Scl. ex Columbia.

Genus XX.—PSEUDOCOLAPTES.

- 1 *boissoneauti* (Lafr.) ex Columb. Æquat. et Peruv.

Genus XXI.—HOMORUS.

- 1 *cristatus* (Spix) ex Brasil.
- 2 *unirufus* (Lafr. et d'Orb.) ex Boliv.
- 3 *gutturalis* (Lafr. et d'Orb.) ex Boliv. et rep. Arg.

Subfam. IV.—PHILYDORINÆ.

Genus XXII.—THRIPADECTES.

- 1 *flammulatus* (Eyt.) ex Columbia.

Genus XXIII.—ANCISTROPS.

- 1 *lineaticeps*, Scl. ex Amazonia sup.

Genus XXIV.—AUTOMOLUS.

- 1 *ferruginolentus* (Max.) ex Brasil.
- 2 *rubiginosus*, Scl. ex Mex. et Guat.
- 3 *cervinigularis*, Scl. ex Mex. Guat. et Veragua.
- 4 *pallidigularis*, Lawr. ex Veragua et Panama.
- 5 *melanopezus*, Scl. ex Æquat. orient.
- 6 *ochrolemus*, Tsch. ex Amazonia.
- 7 *sulphurascens*, (Licht.) ex Amazonia.
- 8 *sclateri*, Pelz. ex Amazonia.
- 9 *subulatus* (Spix.) ex Amazonia.

Genus XXV.—PHILYDOR.

- 1 *rufus* (Vieill.) ex Brasilia.
- 2 *panerythrus*, Scl. ex Columbia.
- 3 *columbianus*, Cab. ex Venez. et Columb.
- 4 *erythropterus*, Scl. ex Columbia.
- 5 *pyrrhodes*, Cab. ex Amazonia.
- 6 *fuscipennis*, Salv. ex Veragua.
- 7 *erythronotus*, sp. nov. xvii. ex Columbia.
- 8 *superciliaris* (Licht.) ex Brasilia.
- 9 *consobrinus*, Scl. ex Columb.
- 10 *ruficaudatus* (Lafr. et d'Orb.) ex Columb. Æquat. Peruv. et Boliv.
- 11 *subfulvus*, Scl. ex Æquat.
- 12 *erythrocerus* (Pelz.) ex Guiana et Amaz.
- 13 *striaticollis*, Scl. ex Columbia.
- 14 *amaurotis* (Temm.) ex Brasilia.

Genus XXVI.—HELIOBLETUS.

- 1 *superciliosus* (Licht.) ex Brasilia.

Genus XXVII.—ANABATOIDES.

- 1 *fuscus* (Vieill.) ex Brasilia.

Genus XXVIII.—ANABAZENOPS.

- 1 *rufo-superciliatus* (Lafr.) ex Brasil.
- 2 *variegaticeps*, Scl. ex Mex. Guat. et Costarica.
- 3 *temporalis*, Scl. ex Columb. et Æquat. occ.
- 4 *subalaris*, Scl. ex Æquat. occ. Columbia. et Veragua.
- *5 *guttulatus*, Scl. ex Venezuela.

Genus XXIX.—XENOPS.

- 1 *rutilus*, Licht. ex Amer. merid. tropica et Am. centrali ad Costaricam.
- 2 *approximans*, Pelz. ex Amazonia.
- 3 *genibarbis*, Ill. ex Am. merid. trop. et centr. ad Mexico.

Subfam. V.—DENDROCOLAPTINÆ.

Genus XXX.—SITTASOMUS.

- 1 *erithacus* (Licht.) ex Brasilia.
- 2 *olivaceus* (Max.) ex Bras. Amaz. Æquat. ins. Tobago, Am. centr. et Mexico.
- 3 *stictolæmus*, Pelz. ex Amaz. sup.

Genus XXXI.—MARGARORNIS.

- 1 *squamigera* (Lafr. et d'Orb.) ex Boliv. Peruv. Æquat. et Columbia.
- 2 *brunnescens*, Scl. ex Columb. Verag. et Costarica.
- 3 *rubiginosa*, Lawr. ex Costarica et Veragua.
- 4 *stellata*, sp. nov. xviii. ex Æquat.

Genus XXXII.—GLYPHORHYNCHUS.

- 1 *cuneatus* (Licht.) ex Am. merid. trop. Am. centr. et Mexico.

Genus XXXIII.—PYGARRHICUS.

- 1 *albigularis* (King) ex Chilia.

Genus XXXIV.—DENDROCINCLA.

- 1 *anabatina*, Scl. ex Mexico, Guatemala et Panama.
- 2 *homochroa*, Scl. ex Mexico et Am. centr.
- 3 *rusticeps*, Scl. & Salv. ex Panama.
- 4 *merula* (Licht.) ex Guiana et Amazonia.
- 5 *meruloides* (Lafr.) ex Venezuela.
- 6 *fumigata* (Licht.) ex Brasilia.
- 7 *atirostris* (Lafr.) ex Boliv. Æquat. Columb. Panama, Verag. et Costarica.
- 8 *longicauda*, Pelz. ex Amazonia.
- 9 *tyrannina* (Lafr.) ex Columbia.
- 10 *turdina* (Licht.) ex Brasilia.

Genus XXXV.—DENDROCOLAPTES.

- 1 *picumnus* (Licht.) ex Brasilia.
- 2 *puncticollis*, Scl. & Salv. ex Guatemala et Costarica.
- 3 *validus* (Tsch.) ex Guiana, Peruv. et Columb.
- 4 *certhia* (Bodd.) ex Guiana et Amaz.
- 5 *radiolatus*, Scl. & Salv. ex Peruvia.
- 6 *santi-thomæ* (Lafr.) ex Am. centr.
- 7 *concolor*, Pelz. ex Amaz.

Genus XXXVI.—NASICA.

- 1 *longirostris* (Licht.) ex Guiana.

Genus XXXVII.—DRYMORNIS.

- 1 *bridgesi*, Eyton. ex rep. Argentina.

Genus XXXVIII.—XIPHOCOLAPTES.

- 1 *albicollis* (Vieill.) ex Brasilia.
- 2 *promeropirhynchus* (Less.) ex Columb. Æquat. Peruv. et Boliv.
- 3 *procerus*, Cab. et Hein. ex Venezuela.
- 4 *emigrans*, Scl. & Salv. ex Mex. et Guatemala.
- 5 *major* (Vieill.) ex Paraguay et Bolivia.

Genus XXXIX.—DENDREXETASTES.

- *1 *temmincki* (Lafr.) ex Guiana.
- 2 *perrotti* (Lafr.) ex Guiana.

Genus XL.—DENDRORNIS.

- 1 *guttata* (Licht.) ex Brasilia.
- 2 *guttatoides* (Lafr.) ex Guiana.
- 3 *rostripallens*, Des Murs, ex Amaz. et Columbia.
- 4 *eytoni*, Scl. ex Amaz. inf.
- 5 *eburneirostris* (Less.) ex Mexico et Guatemala.
- 6 *triangularis* (Lafr.) ex Columbia.
- 7 *erythropygia*, Scl. ex Mex. Am. centr. et Æquat. occ.
- 8 *pardalotus* (Vieill.) ex Guian. et Amaz. inf.
- 9 *lacrymosa*, Lawr. ex Panama et Am. centr. ad Nicarag.
- 10 *susurrans* (Jard.) ex Tobago, Venez. Panama et Am. centr.
- 11 *ocellata* (Spix.) ex Amaz. sup.
- 12 *elegans*, Pelz. ex Amaz. et Columbia.
- 13 *spixi* (Less.) ex Amaz. inf.
- 14 *multiguttata* (Lafr.) ex Guiana et Amaz.

Genus XLI.—DENDROPLEX.

- 1 *picus* (Gm.) ex Brasilia et Amaz.
- 2 *picirostris* (Lafr.) ex Venezuela et Columbia.

Genus XLII.—PICOLAPTES.

- 1 *squamatus* (Licht.) ex Brasilia.
- 2 *leucogaster* (Sw.) ex Mexico.
- 3 *falcinellus* (Cab.) ex Brasilia int.
- 4 *lacrymiger* (Des Mus.) ex Columb. Æquat. Peruv. et Bolivia.
- 5 *affinis* (Lafr.) ex Mex. Guat. Costarica et Verag.
- 6 *compressus* (Cab.) ex Mex. et Am. centr.
- 7 *albolineatus* (Lafr.) ex Columbia et Venez.

- 8 *puncticeps*, sp. nov. xix. ex Guiana.
- 9 *soulcyeti* (Des Murs.) ex Æquat. occ.
- 10 *tenuirostris* (Licht.) ex Brasilia.
- 11 *fuscicapillus*, Pelz. ex Brasilia int.
- 12 *layardi*, Sel. ex Para.
- 13 *angustirostris* (Vicill.) ex Paraguay et rep. Argentina.
- 14 *bivittatus* (Licht.) ex Brasilia.

Genus XLIII.—XIPHIORHYNCHUS.

- 1 *procurvus* (Temm.) ex Brasilia.
- 2 *trochilirostris* (Licht.) ex Am. merid. trop. ad Panama.
- 3 *pusillus*, Sel. ex Columbia et Veragua.
- 4 *pucherani*, Lafr. ex Columbia.

Fam. XXV.—FORMICARIIDÆ.

Subfam. I.—THAMNOPHILINÆ.

Genus I.—CYMBILANIUS.

- 1 *lincatus* (Vicill.) ex Guiana et Amazonia.

Genus II.—BATARA.

- 1 *cinerea* (Vicill.) ex Brasil. merid. or.

Genus III.—THAMNOPHILUS.

- 1 *leachi*, Such, ex Brasil. merid.
- 2 *severus*, Licht. ex Brasil. merid.
- 3 *undulatus*, Pelz. ex Amazonia.
- 4 *fuliginosus*, Gould, ex Guiana.
- 5 *guttatus*, Vicill. ex Brasil. merid.
- 6 *major*, Vicill. ex Paraguay, Brasil. Guiana et ins. Trinit.
- 7 *borbæ*, Pelz. ex ripis fl. Madeira.
- 8 *melanurus*, Gould, ex Amazonia sup. et Columbia.
- 9 *transandeanus*, Sel. ex Æquat. occ. Panama, Veragua et Costarica.
- 10 *melanocrissus*, Sel. ex Guatemala.
- 11 *leuconotus*, Spix, ex Amazonia sup.
- 12 *plumbeus*, Selater, ex Amazonia sup.
- 13 *cinereo-niger*, Pelz. ex Amazonia.
- 14 *stellaris*, Spix, ex Guiana et Amazonia.
- 15 *tristis*, sp. nov. xx. ex Guiana.
- 16 *simplex*, Sel. ex Para.
- 17 *immaculatus*, Lafr. ex Amaz. Columb. Verag. et Costarica.
- 18 *luctuosus*, Licht. ex Amaz. inf.

- 19 *teshudi*, Pelz. ex Amaz.
- 20 *æthiops*, Sel. ex Amaz. sup.
- 21 *punctatus*, Cab. ex Costarica et Veragua.
- 22 *nigriceps*, Sel. ex Columbia.
- 23 *bridgcsi*, Sel. ex Veragua et Costarica.
- 24 *nigrocincereus*, Sel. ex Amaz. inf.
- 25 *nævius* (Gm.) ex Guiana, Amaz. Columb. et Am. centr. ad Honduras.
- 26 *ambiguus*, Cab. & Hein. ex Bras. merid. orient.
- 27 *cinereinucha*, Pelz. ex Amazonia.
- 28 *amazonicus*, Sel. ex Guiana et Amazonia.
- 29 *cincriciceps*, Pelz. ex Guiana et Amaz.
- 30 *cærulescens*, Vieill. ex Bras. merid. orient.
- 31 *capitalis*, Sel. ex Amaz. sup.
- 32 *murinus*, Pelz. ex Guiana et Amazonia.
- 33 *atricapillus*, Gm. ex Guiana, Amazon. et ins. Trinitatis.
- *34 *cristatus*, Max. ex Brasil.
- 35 *leucauchen*, Sel. ex Amazonia et Columbia.
- *36 *albinuchalis*, Sel. ex Æquat. occ.
- 37 *melanonotus*, Sel. ex Columb. rip.
- 38 *aspersiventris*, Lafr. et d'Orb. ex Bolivia.
- 39 *doliatus* (Linn.) ex Guian. Amaz. Columb. et Am. centr. ad Mexico.
- 40 *capistratus*, Less. ex Bras. merid. orient.
- 41 *radiatus*, Vieill. ex Paraguay, Boliv. Peruv. Amaz. sup. Columb. Panama et Verag.
- 42 *albicans*, Lafr. ex Columbia.
- 43 *multistriatus*, Lafr. ex Columbia.
- 44 *tenuipunctatus*, Lafr. ex Columb. et Æquat.
- 45 *palliatu*s, Licht. ex Bras. merid. orient.
- 46 *torquatus*, Sw. ex Bras. merid. orient.
- 47 *argentinus*, Cab. ex rep. Arg.

Genus IV.—BIATAS.

- 1 *nigropectus* (Lafr.) ex Brasilia.

Genus V.—THAMNISTES.

- 1 *anabatinus*, Sel. & Salv. ex Am. centr.
- 2 *æquatorialis*, Sel. ex Æquat.

Genus VI.—PYGOTILA.

- 1 *maculipennis*, Sel. ex Amazonia.
- 2 *margaritata*, Sel. ex Amazonia.

Genus VII.—NEOCTANTES.

- 1 *niger* (Pelz.) ex Amazonia.

Genus VIII.—CLYTOCTANTES.

- 1 *alixii*, Elliot, ex Æquat. orient.

Genus IX.—DYSITHAMNUS.

- 1 *guttulatus* (Licht.) ex Brasil. et Boliv.
- 2 *mentalis* (Temmm.) ex Brasil. et Boliv.
- *3 *olivaceus* (Tsch.) ex Peruv. et Boliv.
- 4 *semicinereus*, Scl. ex Venez. Col. Æquat. et Am. centr. ad Mex.
- 5 *xanthopterus*, Burm. ex Brasil.
- 6 *leucostictus*, Scl. ex Æquat. orient.
- 7 *puncticeps*, Salv. ex Veragua.
- 8 *striaticeps*, Lawr. ex Costarica.
- 9 *schistaceus*, d'Orb. ex Boliv. et Peruv. or.
- 10 *ardesiacus*, Scl. et Salv. ex Æquat. orient.
- 11 *unicolor*, Scl. ex Æquat. et Col.
- 12 *plumbeus*, Max. et Brasil. et Amaz. inf.

Genus X.—THAMNOMANES.

- 1 *cæsius* (Licht.) ex Brasil.
- 2 *glaucus*, Cab. ex Guian. Amaz. et Æquat.

Subfam. II.—FORMICIVORINÆ.

Genus XI.—HERPSILOCHMUS.

- *1 *pileatus* (Licht.) ex Brasil et Boliv.
- 2 *pectoralis*, Scl. ex Bahia.
- 3 *atricapillus*, Pelz. ex Brasil. int.
- 4 *rufi-marginatus* (Temmm.) ex Brasil. et Venezuela.

Genus XII.—MYRMOTHERULA.

- 1 *pygmaea* (Gm.) ex Guian. Amaz. Boliv. et Columb.
- 2 *surinamensis* (Gm.) ex Guian. Col. Æquat. et Panama.
- 3 *multo-striata*, Scl. ex Amaz.
- 4 *guttata* (Vieill.) ex Cayenn.
- 5 *gularis* (Spix.) ex Brasil.
- 6 *fulviventris*, Lawr. ex Panama et Æquat.
- 7 *hæmatonota*, Scl. ex Amaz. sup.

- 8 *pyrrhonota*, sp. nov. xxi. ex Guiana.
- 9 *ornata*, Scl. ex Columb.
- 10 *erythrura*, Scl. ex Columb.
- 11 *erythronota*, Hartl. ex Brasil.
- 12 *hauxwelli*, Scl. ex Amaz. sup.
- 13 *axillaris* (Vieill.) ex Guian. et Columbia.
- 14 *melæna*, Scl. ex Columb. Amazon. Panama et Costarica.
- 15 *melanogastra* (Spix) ex Brasil.
- 16 *menetriesi*, d'Orb. ex Boliv. Peruv. Columb. et Am. centr. ad Guat.
- 17 *urosticta*, Scl. ex Brasil.
- 18 *brevicauda* (Sw.) ex Brasil.
- 19 *unicolor*, Menétr. ex Columb. et Brasil.
- 20 *assimilis*, Pelz. ex Amazonia.
- 21 *cincereiventris*, Scl. ex Guiana, Amaz. et Columb.

Genus XIII.—FORMICIVORA.

- 1 *grisea* (Bodd.) ex Guiana et Brasil.
- 2 *intermedia*, Cab. ex Trin. ins. Venez. et Columb.
- 3 *rufatra* (Lafr. et d'Orb.) ex Brasil. et Bolivia.
- 4 *strigilata* (Max.) ex Brasil.
- 5 *ferruginea* (Licht.) ex Brasil.
- 6 *strigilata* (Spix.) ex Brasil.
- 7 *caudata*, Scl. ex Columb.
- 8 *erythrocerca*, Scl. ex Brasil.
- *9 *malura*, Temm. ex Brasil.
- 10 *squamata*, Licht. ex Brasil.
- 11 *boucardi*, Scl. ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 12 *consobrina*, Scl. ex Æquat. occ.
- 13 *quixensis*, Corn. ex Æquat. occ. et Guiana.
- 14 *bicolor*, Pelz. ex Amaz. sup.

Genus XIV.—TERENURA.

- 1 *maculata* (Max.) ex Brasil.
- 2 *callinota*, Scl. ex Columb. et Veragua.
- 3 *caloptera*, Scl. ex Æquat. occ.

Genus XV.—PSILORHAMPHUS.

- 1 *guttatus* (Mén.) ex Brasil. int.

Genus XVI.—MICROBATES, GEN. NOV. V.

- 1 *torquatus*, sp. nov. xxii. ex Cayenn.

Genus XVII.—RAMPHOCÆNUS.

- 1 *melanurus*, Vieill. ex Brasil. Guiana et Venezuela.
- 2 *rufiventris*, Bp. ex Guatem. Am. centr. et Columb.
- 3 *semitorquatus*, Lawr. ex Veragua et Panama.
- *4 *cinereiventris*, Scl. ex Columb. int.

Genus XVIII.—CERCOMACRA.

- 1 *cæruleseens*, Vieill. ex Brasil. orient.
- 2 *cineraseens*, Scl. ex Guiana et Amazonia.
- 3 *napensis*, Scl. ex Guiana et Æquat. orient.
- 4 *tyrannina*, Scl. ex Am. centr. et merid. ad Amaz.
- 5 *approximans*, Pelz. ex Brasil. int.
- 6 *carbonaria*, sp. nov. xxiii. ex Amazonia.
- 7 *nigricans*, Scl. ex Columb. Panama et Æquat. occid.
- 8 *maculicaudis*, Scl. ex Trinit. ins. Panama et Columb.
- 9 *melanaria* (Ménétr.) ex Brasil. merid.

Genus XIX.—PYRIGLENA.

- 1 *leucoptera* (Vieill.) ex Brasil. orient.
- 2 *atra*, Sw. ex Brasil.
- 3 *picea*, Cab. ex Peruv. et Æquat.
- 3 *serva*, Scl. ex Æquat. et Amazonia.

Genus XX.—GYMNOCICHLA.

- 1 *nudiceps* (Cassin) ex Panama.
- 2 *chiroleuca*, Scl. et Salv. ex Honduras et Costarica.

Genus XXI.—PERCNOSTOLA.

- 1 *funeris* (Licht.) ex Guiana.
- 2 *minor*, Pelz. ex Guiana int.
- 3 *fortis*, Scl. et Salv. ex Amaz. sup.

Genus XXII.—HETEROCNEMIS.

- 1 *nævia* (Gm.) ex Guiana.
- 2 *simplex*, Scl. ex Guiana.
- 3 *argentata* (Des Murs) ex Amazon. sup.

Genus XXIII.—MYRMECIZA.

- 1 *cinnamomea* (Gm.) ex Guiana.
- 2 *ruficauda* (Max.) ex Brasil.
- 3 *squamosa*, Pelz. ex Brasil.
- 4 *loricata*, Licht. ex Brasil.
- 5 *longipes*, Sw. ex Guiana, Amaz. Venez. Columbia et Panama.
- 6 *atrothorax* (Bodd.) ex Guiana, Amaz. Boliv. et Brasil. int.
- 7 *ruficauda* (Pelz.) ex Guiana int.
- 8 *hemimelæna*, Scl. et Salv. ex Amazonia et Boliv.
- 9 *exsul*, Scl. ex Æquat. occ.
- 10 *immaculata*, Scl. et Salv. ex Panama.
- 11 *lemosticta*, Salv. ex Costarica et Veragua.

Genus XXIV.—HYPOCNEMIS.

- 1 *cantator* (Bodd.) ex Guiana et Amazonia.
- 2 *flavescens*, Scl. ex Guiana int.
- 3 *hypoxantha*, Scl. ex Amazonia.
- 4 *pacilonota*, Puch. ex Amaz. sup. et Columbia.
- 5 *myiotherina* (Spix.) ex Amaz. sup. et Columbia.
- 6 *leucophrys* (Tsch.) ex Guiana, Amaz. sup. et Columbia.
- 7 *lugubris*, Pelz. ex Amazonia.
- 8 *melanura*, Scl. et Salv. ex Amaz. sup.
- *9 *schistacea*, Scl. ex Amaz. sup.
- 10 *melanopogon*, ex Guiana et Amazonia.
- 11 *maculicauda*, Pelz. ex Brasil. int.
- 12 *hemileuca*, Scl. et Salv. ex Amaz. sup.
- 13 *navia* (Gm.) ex Guiana et Amaz. sup.
- 14 *theresæ* (Des Murs) ex Amaz. sup.
- 15 *navioides* (Lafr.) ex Æquat. occ. Panama et Costarica.

Subfam. III.—FORMICARIINÆ.

Genus XXV.—PITHYS.

- 1 *albifrons* (Gm.) ex Guiana et Columbia.
- 2 *rufigula* (Bodd.) ex Guiana.
- 3 *leucaspis*, Scl. ex Amaz. sup. et Columbia.
- 4 *bicolor*, Lawr. ex Panama, Costarica et Nicaragua.
- 5 *lunulata*, Scl. et Salv. ex Amaz. sup.

Genus XXVI.—RHOPOTERPE.

- 1 *torquata* (Bodd.) ex Guiana.

Genus XXVII.—PHLOGOPSIS.

- 1 *nigromaculata* (Lafr. & d'Orb.) ex Bolivia, Æquat. et Amaz. sup.
- 2 *macleaniani*, Lawr. ex Panama, Verag. Costarica et Nicarag.
- 3 *erythroptera*, Gould. ex Guiana int.
- *4 *trivittata*, Scl. ex Amaz. sup.

Genus XXVIII.—FORMICARIUS.

- 1 *cayennensis* (Bodd.) ex Guiana et Brasilia.
- 2 *nigrifrons*, Gould. ex Columbia et Peruv. orient.
- 3 *analis*, (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia, Æquat. Panama et Costarica.
- 4 *rufipectus*, Salv. ex Veragua.
- 5 *moniliger*, Scl. ex Mexico et Guatemala.
- 6 *hoffmanni* (Cab.) ex Guiana, Venez. Trinit. Panama et Costarica.

Genus XXIX.—PITTASOMA.

- 1 *michleri*, Cass. ex Panama et Veragua.

Genus XXX.—CHAMÆZA.

- 1 *brevicauda* (Vieill.) ex Brasilia.
- 2 *olivacca*, Tsch. ex Venez. Columb. et Peruvia.
- *3 *nobilis*, Gould, ex Amaz. sup.
- *4 *mollissima*, Scl. ex Columbia.

Genus XXXI.—GRALLARIA.

- 1 *varia* (Bodd.) ex Guiana et Venezuela.
- 2 *imperator* (Lafr.) ex Brasil.
- 3 *regulus* Scl. ex Æquator. oce.
- 4 *princeps*, Scl et Salv. ex Veragua.
- 5 *guatemalensis*, Prévost, ex Guatemala.
- 6 *mexicana*, Scl. ex Mexico merid.
- 7 *squamigera*, Prévost, ex Columb.
- 8 *nuchalis*, Scl. ex Æquator. oce.
- 9 *grisconucha*, Scl. et Salv. ex Venezuela.
- 10 *monticola*, Lafr. ex Columb.
- 11 *ruficapilla*, Lafr. ex Venez. Columb. et Æquator.
- 12 *hypoleuca*, Scl. ex Columbia.
- *13 *modesta*, Scl. ex Columbia.
- 14 *brevicauda* (Bodd.) ex Guiana, Amazonia et Æquat. or.
- 15 *macularia*, Temm. ex Guiana.

- *16 *ochroleuca* (Max.) ex Brasil.
- 17 *perspicillata*, Lawr. ex Panama, Veragua et Costarica.
- 18 *fulviventris*, Scl. ex Æquat. orient.
- 19 *dives*, Salv. ex Costarica et Nicaragua.
- 20 *rufula*, Lafr. ex Columb.

Genus XXXII.—GRALLARICULA.

- 1 *flavirostris*, Scl. ex Æquat. orient. Columbia, Costarica et Veragua.
- 2 *loricata*, Scl. ex Venezuela.
- *3 *ferrugineipectus*, Scl. ex Venezuela.
- 4 *nana* (Lafr.) ex Columbia.
- 5 *cucullata* (Scl.) ex Columbia.

Fam. XXVI.—PTEROPTOCHIDÆ.

Genus I.—SCYTALOPUS.

- 1 *indigoticus* (Max.) ex Brasil.
- 2 *griseicollis* (Lafr.) ex Columbia.
- 3 *magellanicus* (Lath.) ex Patag. et Chilia.
- 4 *fuscoides*, Lafr. ex Chilia.
- 5 *senilis*, Lafr. ex Columbia.
- 6 *analis*, Lafr. ex Æquator. et Columbia.

Genus II.—MERULAXIS.

- 1 *rhinolophus* (Max.) ex Brasil. int.

Genus III.—RHINOCRYPTA.

- 1 *lanceolata* (Geoffr. et d'Orb.) ex Patagonia et rep. Argentina.
- 2 *fusca*, sp. nov. xxiv. ex rep. Arg.

Genus IV.—LIOSCELES.

- 1 *thoracicus*, Scl. ex Brasil. int.

Genus V.—PTEROPTOCHUS.

- 1 *rubecula*, Kittl. ex Chilia.
- 2 *albicollis*, Kittl. ex Chilia.

Genus VI.—HYLACTES.

- 1 *tarnii*, King, ex Chilia merid.
- 2 *castaneus* (Ph. et Landb.) ex Chilia centr.
- 3 *megapodius* (Kittl.) ex Chilia centr. et bor.

Genus VII.—ACROPTERNIS.

- 1 *orthonyx* (Lafr.) ex Æquator. et Columb.

Genus VIII.—TRIPTORHINUS.

- 1 *paradozus*, (Kittl.) ex Chilia.

Ordo. II.—MACROCHIRES.

Fam. I.—TROCHILIDÆ.

Genus I.—GRYPUS.

- 1 *navius* (Dumont) ex Brasilia.

Genus II.—ANDRODON.

- 1 *æquatorialis*, Gould, ex Æquatoria.

Genus III.—EUTOXERES.

- 1 *aquila* (Bourc.) ex Æquator. Columb. Veragua et Costarica.
- 2 *condaminii* (Bourc.) ex Æquator. occ.

Genus IV.—GLAUCIS.

- 1 *hirsutus* (Gm.) ex Am. merid. cisand. a Panama ad Brasiliam.
- 2 *dohrni* (Bourc.) ex Brasilia.

Genus V.—PHAETHORNIS.

- 1 *superciliosus* (Linn.) ex Guian. Amazon. Æquator. et Columbia.
- 2 *longirostris* (Less. et Delattre) ex Mex. Am. centr. Columb. et Æquator occ.
- 3 *hispidus* (Gould) ex Amazonia sup.
- 4 *syrmatophorus*, Gould, ex Æquator. occ.
- 5 *curynome* (Less.) ex Brasilia.
- 6 *squalidus* (Temmin.) ex Brasil.
- 7 *anthophilus* (Bourc.) ex Columb. et Venezuela.
- 8 *augusti* (Bourc.) ex Venezuela et Columb.
- 9 *pretrii* (Less. et Delattre) ex Brasil.
- 10 *yaruqui* (Bourc.) ex Æquator.
- 11 *guyi* (Less.) ex Venezuela et ins. Trinit.
- 12 *emiliæ* (Bourc.) ex Columb. Veragua et Costarica.
- 13 *bourcierii* (Less.) ex Amazonia sup. et Guiana int.
- 14 *philippii* (Bourc.) ex Bolivia.

Genus VI.—PYGMORNIS.

- 1 *idalie* (Bourc.) ex Brasil. merid.
- 2 *longuemareus* (Less.) ex Guiana Venezuela et ins. Trinit.
- 3 *adolphi*, Gould, ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 4 *griseigularis* (Gould) ex Columbia.
- 5 *striigularis* (Gould) ex Columbia et Æquator.
- 6 *pygmæus* (Spix) ex Brasilia.
- 7 *nigricinctus* (Lawr.) ex Amazonia sup.
- 8 *episcopus*, Gould, ex Guiana.

Genus VII.—TIRENETES.

- 1 *leucurus* (Linn.) ex Guiana.
- 2 *cervinicauda*, Gould, ex Amazon. sup. Æquator. et Columbia.
- 3 *antonice* (Bourc. et Muls.) ex Guiana.
- 4 *ruckeri* (Bourc.) ex Costarica, Veragua et Æquator. occ.

Genus VIII.—DOLERISCA.

- 1 *fallax* (Bourc.) ex Venezuela.

Genus IX.—EUPETOMENA.

- 1 *macrura* (Gm.) ex Guiana, Amazon. et Brasil.

Genus X.—SPHENOPROCTUS.

- 1 *pampa* (Less.) ex Gnatemala.
- 2 *curvipennis* (Licht.) ex Mexico.

Genus XI.—CAMPYLOPTERUS.

- 1 *lazulus* (Vicill.) ex Venezuela, Columb. et Æquatoria.
- 2 *hemileucurus* (Licht.) ex Mexico et Am. centr. ad Veraguam.
- 3 *ensipennis* (Sw.) ex Venezuela et Tobago.
- 4 *villaricensii* (Bourc.) ex Æquator. orient.
- 5 *largipennis* (Bodd.) ex Guiana.
- 6 *æquatorialis*, Gould, ex Amazon. sup.
- 7 *obscurus*, Gould, ex Amazon. inf.
- 8 *rufus* (Less.) ex Guatemala.
- *9 *hyperythrus*, Cab. ex Guiana.

Genus XII.—*PHÆOCHROA*.

- 1 *curieri*, Del. et Boure. ex Venez. Columb. Panama et Costarica.
- 2 *roberti*, Salvin, ex Guatemala.

Genus XIII.—*APHANTOCHROA*.

- 1 *cirrochloris* (Vieill.) ex Brasil.
- 2 *gularis*, Gould, ex Amazon. sup.
- 3 *hyposticta*, Gould, ex Æquatoria.

Genus XIV.—*UROCHROA*.

- 1 *bougueri* (Boure.) ex Æquatoria.

Genus XV.—*STERNOCLYTA*.

- 1 *cyaneipectus* (Gould) ex Venezuela.

Genus XVI.—*EUGENES*.

- 1 *fulgens* (Sw.) ex Mex. et Guatemala.
- 2 *spectabilis* (Lawr.) ex Costarica.

Genus XVII.—*CÆLIGENA*.

- 1 *clemenciæ* (Less.) ex Mexico.

Genus XVIII.—*LAMPROLÆMA*.

- 1 *rhani* (Less.) ex Mex. et Guatemala.

Genus XIX.—*DELATTRIA*.

- 1 *henrici* (Less. et Del.) ex Mex. et Guatemala.
- 2 *viridipallens* (Boure. et Muls.) ex Guatemala.

Genus XX.—*OREOPYRA*.

- 1 *leucaspis* (Gould) ex Chiriquia.
- 2 *cinercicauda*, Lawr. ex Costarica.
- 3 *calolama*, Salvin, ex Costarica et Veragua.
- 4 *hemileuca*, Salvin, ex Costarica.

Genus XXI.—HELIOPEDICA.

- 1 *melanotis* (Sw.) ex Mex. et Guatemala.
- 2 *xanthusi*, Lawr. ex Mex. occ.

Genus XXII.—TOPAZA.

- 1 *pella* (Linn.) ex Guiana.
- *2 *pyra* (Gould) ex Guiana int.

Genus XXIII.—OREOTROCHILUS.

- 1 *chimborazo* (Boure.) ex Æquatoria.
- 2 *pichinehæ* (Boure. et Muls.) ex Æquatoria.
- 3 *estellæ* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.
- 4 *leucopleurus*, Gould, ex Chilia.
- *5 *melanogaster*, Gould, ex Peruvia.
- 6 *adelæ* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.

Genus XXIV.—LAMPORNIS

- 1 *violicauda* (Bodd.) ex Guiana, Brasil. Amazon. Venez. Columb. et Panama.
- 2 *prevosti* (Less.) ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.
- 3 *veraguensis*, Gould, ex Veragua.
- 4 *gramineus* (Gm.) ex Guiana et Venezuela.
- 5 *aurulentus* (Vieill.) ex Hayti, Portorico et ins. S Thomæ.
- 6 *viridis* (Vieill.) ex Portorico.
- 7 *mango* (Linn.) ex Jamaica.

Genus XXV.—EULAMPIS.

- 1 *jugularis* (Linn.) ex Antill. min.
- 2 *holosericeus* (Linn.) ex Antill. min.

Genus XXVI.—AVOCETTULA.

- 1 *recurvirostris*, Sw. ex Guiana.

Genus XXVII.—LAFRESNAYA.

- 1 *flavi-caudata* (Fraser) ex Columbia.
- 2 *gayi* (Boure.) ex Venezuela.

Genus XXVIII.—DORYPHORA.

- 1 *johannæ* (Bourc.) ex Columbia.
- 2 *ludovicæ* (Bourc.) ex Columbia.
- 3 *rectirostris*, Gould, ex Æquatoria.
- 4 *veraguensis*, Salvin, ex Veragua et Costarica.
- 5 *euphrosyne*, Mulsant, ex Columbia.

Genus XXIX.—CHALYBURA.

- 1 *buffoni* (Less.) ex Venezuela et Columbia.
- *2 *urochrysea*, Gould, ex Panama.
- 3 *cæruleiventris* (Reich.) ex Columbia.
- 4 *isauræ* (Gould) ex Veragua.
- 5 *melanorrhœa*, Salvin, ex Costarica et Veragua.

Genus XXX.—HELIODOXA.

- 1 *jaeula* (Gould) ex Columb. Veragua et Costarica.
- 2 *jamesoni* (Bourc.) ex Æquatoria.
- *3 *otero* (Tsch.) ex Peruv. et Bolivia.
- 4 *splendens* (Gould) ex Venezuela.
- 5 *leadbeateri* (Bourc.) ex Columbia.

Genus XXXI.—IOLEMA.

- 1 *schreibersi* (Bourc.) ex Æquator. or. et Amazon. sup.
- *2 *whitelyana*, Gould, ex Peruvia.

Genus XXXII.—PHLEOLEMA.

- 1 *rubinoides* (Bourc. et Muls.) ex Columb.
- 2 *æquatorialis*, Gould, ex Æquatoria.

Genus XXXIII.—EUGENIA.

- 1 *imperatrix*, Gould, ex Æquatoria.

Genus XXXIV.—AITHURUS.

- 1 *polytmus* (Linn.) ex Jamaica.

Genus XXXV.—THALURANIA.

- 1 *glaucopis* (Gm.) ex Brasilia.
- 2 *columbica* (Bourc. et Muls.) ex Columb. Veragua et Costarica.
- 3 *furcata* (Gm.) ex Guiana.
- 4 *furcatoides*, Gould, ex Amazonia inf.
- 5 *nigro-fasciata*, Gould, ex Amaz. sup.
- *6 *watertoni* (Bourc.) ex Guiana.
- *7 *refulgens*, Gould, ex Venez. et ins. Trinit.
- 8 *criphile* (Less.) ex Brasil. Amazon. et Æquator.
- *9 *hypochlora*, Gould, ex Æquatoria.
- 10 *wagleri* (Less.) ex Brasilia.

Genus XXXVI.—PANOPLITES.

- 1 *jardinii* (Bourc.) ex Æquatoria.
- 2 *flavescens* (Bourc.) ex Columbia et Æquatoria.
- 3 *matheusi* (Bourc.) ex Æquatoria orient.

Genus XXXVII.—FLORISUGA.

- 1 *mellivora* (Linn.) ex Guat. Am. centr. et Am. merid. ad. Amaz.
- 2 *fusca* (Vieill.) ex Brasilia.

Genus XXXVIII.—MICROCHERA.

- 1 *albo-coronata* (Lawr.) ex Veragua.
- 2 *parvirostris* (Lawr.) ex Costarica et Nicaragua.

Genus XXXIX.—LOPHORNIS.

- 1 *ornatus* (Gm.) ex Guiana, Venez. et ins. Trin.
- 2 *gouldi* (Less.) ex Amazonia.
- 3 *magnificus* (Vieill.) ex Brasilia.
- 4 *delattrii* (Less.) ex Veragua, Panama, Columb. Æquat. Peruv. et Boliv.
- 5 *stictolophus*, Salv. et Elliot, ex Columb. Venezuela et Æquat.
- 6 *adorabilis*, Salv. ex Chiriqui.
- 7 *helenæ* (Delattr.) ex Mex. Guat. et Costarica.

Genus XL.—POLEMISTRIA.

- 1 *chalybea* (Vieill.) ex Bras. merid.
- 2 *verreauxi* (Bourc.) ex Amaz. sup. et Columb.

Genus XLI.—DISCURA.

- 1 *longicauda* (Gm.) ex Brasilia.

Genus XLII.—GOULDIA.

- 1 *popelairii* (Du Bus) ex Columb. et Æquat.
- 2 *langsдорffi* (Vieill.) ex Brasilia et Amaz. sup.
- 3 *conversi* (Bourc.) ex Æquat. Columb. Verag. et Costarica.
- *4 *latitiæ* (Bourc.) ex Bolivia.

Genus XLIII.—TROCHILUS.

- 1 *colubris*, Linn. ex Mex. et Am. centr. ad Veraguam.
- 2 *alexandri*, Bourc. et Muls. ex Mexico.

Genus XLIV.—MELLISUGA.

- 1 *minima* (Linn.) ex Jamaica et Hayti.

Genus XLV.—CALYPTE.

- 1 *annæ* (Less.) ex Mexico.
- 2 *eastæ* (Bourc.) ex Mexico.
- 3 *helenæ* (Lembeye) ex Cuba.

Genus XLVI.—SELASPHORUS.

- 1 *rufus* (Gm.) ex Mexico.
- 2 *scintilla*, Gould, ex Costarica et Veragua.
- 3 *platyeereus* (Sw.) ex Mex. et Guat.
- 4 *floresii*, Gould, ex Mexico.
- 5 *flammula*, Salv. ex Costarica et Veragua.
- 6 *ardens*, Salv. ex Veragua.
- 7 *torridus*, Salv. ex Veragua.

Genus XLVII.—ATTIUS.

- 1 *heloisæ* (Less. et Delattr.) ex Mexico et Guatem.

Genus XLVIII.—STELLULA.

- 1 *caliope* (Gould) ex Mexico.

Genus XLIX.—CALOTHORAX.

- 1 *lucifer* (Sw.) ex Mexico.
- 2 *puleher*, Gould, ex Mexico.

Genus L.—ACESTRURA.

- 1 *mul santi* (Bourc.) ex Columb. Æquat. et Peruv
- 2 *heliodori* (Bourc.) ex Venezuela et Columbia.
- *3 *micrura* (Gould) ex Bolivia.

Genus LI.—CHÆTOCERCUS.

- 1 *jourdani* (Bourc.) ex ins. Trinitatis.
- 2 *rosæ* (Bourc. et Muls.) ex Venezuela.
- 3 *bombus*, Gould, ex Æquatoria.

Genus LII.—MYRTIS.

- 1 *fanny* (Less.) ex Peruvia et Æquator. occ.
- 2 *yarrelli* (Bourc.) ex Bolivia occ.

Genus LIII.—THAUMASTURA.

- 1 *cora* (Less.) ex Peruv. occ.

Genus LIV.—RHODOPIS.

- 1 *vesper* (Less.) ex Peruv. occ.
- *2 *atacamensis* (Leybold) ex Chilia bor.

Genus LV.—DORICHA.

- 1 *eliza* (Less.) ex Mexico.
- 2 *bryantæ*, Lawr. ex Costarica et Veragua
- 3 *evelynæ* (Bourc.) ex ins. Baham. "Nassau."
- 4 *lyrura*, Gould, ex ins. Baham. "Inagua."
- 5 *henicura* (Vieill.) ex Guatemala.

Genus LVI.—TILMATURA.

- 1 *duponti* (Less.) ex Guatemala.

Genus LVII.—CALLIPHLOX.

- 1 *amethystina* (Gm.) ex Brasil.
- 2 *mittelli* (Bourc.) ex Æquatoria.

Genus LVIII.—LODDIGESIA.

- 1 *mirabilis* (Bourc.) ex Peruvia.

Genus LIX.—STEGANURA.

- 1 *underwoodi* (Less.) ex Columb. et Venezuela.
- 2 *melananthera* (Jard.) ex Æquatoria.
- 3 *solstitialis*, Gould, ex Æquatoria.
- *4 *peruana*, Gould, ex Peruvia.
- *5 *addæ* (Bourc.) ex Bolivia.
- *6 *scissura* (Gould) ex Peruvia.

Genus LX.—LESBIA.

- 1 *nuna* (Less.) ex Peruvia.
- *2 *eucharis* (Bourc.) ex Columbia.
- 3 *amaryllis* (Bourc. et Muls.) ex Columb. et Æquatoria.
- 4 *gouldi* (Bourc.) ex Columbia.
- 5 *gracilis*, Gould, ex Æquatoria.
- *6 *ortoni*, Lawr. ex Æquat.

Genus LXI.—CYNANTHUS.

- 1 *cyanurus* (Steph.) ex Columbia, Venez. et Æquatoria.
- 2 *mocoa* (Delattre et Bourc.) ex Æquatoria.

Genus LXII.—SPARGANURA.

- 1 *sappho* (Less.) ex Bolivia et rep. Arg.
- 2 *phaon* (Gould) ex Bolivia.
- *3 *glyceria* (Bp.) ex Columbia.
- *4 *caroli* (Bourc.) ex Peruvia.

Genus LXIII.—PTEROPHANES.

- 1 *temmincki* (Boiss.) ex Columb. Æquator. et Peruv.

Genus LXIV.—AGLÆACTIS.

- 1 *cupreipennis* (Bourc. et Muls.) ex Columb. Æquator. et Peruv.
- 2 *caumatonota*, Gould, ex Peruvia.
- 3 *castelnaudi* (Bourc. et Muls.) ex Peruvia.
- 4 *pamela* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia.

Genus LXV.—OXYPOGON.

- 1 *guerini* (Boiss.) ex Columbia.
- 2 *lindeni* (Parz.) ex Venezuela.

Genus LXVI.—OREONYMPHA.

- 1 *nobilis*, Gould, ex Peruvia.

Genus LXVII.—RHAMPHOMICRON.

- 1 *heteropogon* (Boiss.) ex Columbia.
 2 *stanleyi* (Boure. et Muls.) ex Æquatoria.
 *3 *olivaceum*, Lawr. ex Bolivia.
 *4 *ruficeps* (Gould) ex Bolivia.
 5 *herrani* (Delattre et Boure.) ex Æquatoria et Columbia.
 6 *microrhynchum*, Boiss. ex Columbia.

Genus LXVIII.—UROSTICTE.

- 1 *benjamini* (Boure.) ex Æquatoria.
 *2 *ruferrissa*, Lawr. ex Æquatoria.

Genus LXIX.—METALLURA.

- *1 *eupreicauda* (Gould) ex Bolivia.
 *2 *eneicauda* (Gould) ex Bolivia.
 *3 *williami* (Boure. et Del.) ex Columbia.
 *4 *primolina*, Boure. ex Æquatoria.
 5 *tyrianthina* (Boure.) ex Venezuela, Columb. Æquator. et Peruvia.
 6 *smaragdinecollis* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia et Peruvia.

Genus LXX.—ADELOMYIA.

- *1 *inornata* (Gould) ex Bolivia.
 *2 *chlorospila*, Gould, ex Æquatoria.
 *3 *cervina*, Gould, ex Columbia.
 4 *melanogenys* (Fraser) ex Venez. Columb. Æquator. et Peruvia.

Genus LXXI.—AVOCETTINUS.

- 1 *eurypterus* (Boure.) ex Columbia.

Genus LXXII.—ANTHOCEPHALA.

- *1 *floricaps* (Gould) ex Columbia.

Genus LXXIII.—CHRYSOLEMPIS.

- 1 *moschitus* (Linn.) ex Brasil. Amaz. Columb. Venezuela et ins. Trinit.

Genus LXXIV.—ORTHORHYNCHUS.

- 1 *cristatus* (Linn.) ex inss. S. Vincent. et Barbados.
- 2 *exilis* (Gm.) ex Antill. min.

Genus LXXV.—CEPHALOLEPIS.

- 1 *delalandii* (Vieill.) ex Brasilia.
- *2 *loddigesii* (Gould) ex Brasilia.
- *3 *beskii*, Pelzeln, ex Brasilia.

Genus LXXVI.—CLAIS.

- 1 *gumeti* (Bourc. et Muls.) ex Venezuela et Columbia.

Genus LXXVII.—BAUCIS.

- 1 *abeillei* (Delattre et Less.) ex Mex. et Am. centr. ad Veraguam.

Genus LXXVIII.—HELIACTIN.

- 1 *cornuta* (Max.) ex Brasilia.

Genus LXXIX.—HELIOTHRIX.

- 1 *auritus* (Gm.) ex Amazonia et Guiana.
- 2 *auriculatus* (Nordm.) ex Brasilia.
- 3 *barroti* (Bourc.) ex Guat. Am. centr. Columb. et Æquat. occ.

Genus LXXX.—SCHISTES.

- 1 *geoffroyi* (Bourc. et Muls.) ex Columbia.
- 2 *personatus*, Gould, ex Æquatoria.

Genus LXXXI.—PHLOGOPHILUS.

- 1 *hemileucurus*, Gould, ex Æquator.

Genus LXXXII.—AUGASTES.

- 1 *superbus* (Vieill.) ex Brasilia.
- 2 *lunachellus* (Less.) ex Brasilia.

Genus LXXXIII.—PETASOPHORA.

- 1 *serrirostris* (Vieill.) ex Brasilia.
- 2 *anaïs* (Less.) ex Venez. Columb. Æquator, et Peruvia.
- 3 *thalassina* (Sw.) ex Mex. et Guatemala.
- 4 *cyanotis* (Bourc.) ex Costarica, Veragua, Columb. et Æquator.
- 5 *delphinæ* (Less.) ex Guat. Am. centr. Columb. Æquat. Peruv. et Venezuela.

Genus LXXXIV.—CHRYSOBRONCHIUS.

- 1 *virescens* (Dumont) ex ins. Trin. Venez. et Bras.
- 2 *viridissimus* (Vieill.) ex Guiana et Venez.
- 3 *leucorrhous*, Gould, ex Amaz. sup.

Genus LXXXV.—PATAGONA.

- 1 *gigas* (Vieill.) ex Æquat. Peruv. Bolivia et Chilia.

Genus LXXXVI.—DOCIMASTES

- 1 *ensifer* (Boiss.) ex Columb. et Æquat.

Genus LXXXVII.—HELIANTHEA.

- 1 *typica*, Bp. ex Columbia.
- *2 *isaacsoni* (Parz.) ex loc. ign.
- 3 *bonapartii* (Boiss.) ex Columbia.
- *4 *eos* (Gray & Mitch.) ex Venezuela.
- *5 *violifera* (Gould) ex Bolivia.
- 6 *osculans*, Gould, ex Peruvia.
- 7 *lutetiæ* (Delatt. et Boure.) ex Æquat.

Genus LXXXVIII.—HELIOTRYPHA.

- 1 *viola*, Gould, ex Æquat.
- 2 *parzudakii* (Longuem.) ex Columb. et Æquat.

Genus LXXXIX.—HELIANGELUS.

- 1 *clarissæ* (Longuem.) ex Columbia.
- 2 *micraster*, Gould, ex Æquator.
- 3 *strophianus*, Gould, ex Æquat.
- 4 *spenei* (Bourc.) ex Venezuela.
- *5 *amethysticollis* (Lafr. et d'Orb.) ex Peruvia.
- *6 *mavors* (Gray & Mitch.) ex Columbia.

Genus XC.—DIPHLOGÆNA.

- *1 *iris* (Gould) ex Bolivia.
- *2 *aurora* (Gould) ex Bolivia.
- *3 *hesperus*, Gould, ex Bolivia.

Genus XCI.—CLYTOLÆMA.

- 1 *rubinea* (Gm.) ex Brasilia.
- 2 *aurescens* (Gould) ex Amaz. et Æquat orient.

Genus XCII.—BOURCERIA

- 1 *torquata* (Boiss.) ex Columb.
- 2 *fulgidigula*, Gould, ex Æquat.
- *3 *traviesi*, Muls. et Verr, ex loc. ign.
- *4 *conradi* (Bourc.) ex Venezuela.
- 5 *inca*, Gould, ex Bolivia et Peruvia.

Genus XCIII.—LAMPROPYGIA.

- 1 *celigena* (Less.) ex Columbia.
- 2 *boliviana*, Gould, ex Bolivia et Venezuela.
- 3 *prunellii* (Bourc.) ex Columbia.
- 4 *wilsoni* (Delatt. et Bourc.) ex Æquat.

Genus XCIV.—HELIOMASTER.

- 1 *longirostris* (Vieill) ex Guian. Amaz. Venez. Columb. et Am. cent ad Costaricam.
- 2 *pallidiceps*, Gould, ex Mex. Guat. et Nicarag.
- *3 *albierissa*, Gould, ex Æquator.
- 4 *constanti* (Delattre) ex Guat. et Costarica.
- 5 *leocadiæ* (Bourc.) ex Mexico.

Genus XCV.—LEPIDOLARYNX.

- 1 *mesoleucus* (Temm.) ex Brasilia.

Genus XCVI.—CALLIPERIDIA.

- 1 *furcifer* (Shaw) ex Paraguay et Bras. int.

Genus XCVII.—EUSTEPHANUS.

- 1 *galeritus* (Mol.) ex Chilia et ins. Juan Fernandez.
- 2 *fernandensis* (King) ex ins. Juan Fernandez.
- *3 *leyboldi*, Gould, ex ins. Masafuera.

Genus XCVIII.—ERIOCNEMIS.

- 1 *eupreiventris* (Fras.) ex Columbia.
- 2 *luciani* (Bourc.) ex Æquat.
- 3 *mosquera* (Bourc. et Delatt.) ex Columbia.
- 4 *vestita* (Longuem.) ex Columb. et Venez.
- 5 *nigrivestis* (Bourc.) ex Æquat.
- 6 *smaragdinipectus*, Gould. ex Æquat.
- *7 *godini* (Bourc.) ex Æquat.
- *8 *d'orbignii* (Bourc.) ex Bolivia.
- *9 *derbiana* (Delattre et Bourc.) ex Columbia.
- 10 *alinæ* (Bourc.) ex Columbia.
- 11 *lugens*, Gould, ex Æquat.
- *12 *squamata*, Gould, ex Æquat.
- 13 *aureliæ* (Bourc.) ex Columb. et Æquat.
- *14 *dysclius*, Elliot, ex Æquat.

Genus XCIX.—CYANOMYIA.

- 1 *quadricolor* (Vieill.) ex Mexico.
- 2 *violiceps*, Gould, ex Mexico.
- 3 *viridifrons*, Elliot, ex Mexico.
- 4 *cyanocephala* (Less.) ex Mex. et Guatem.
- 5 *franeivæ* (Bourc.) ex Columbia.
- *6 *cyaneicollis*, Gould, ex Peruvia.

Genus C.—HEMISTILBON.

- *1 *ocai* (Gould) ex Mexico.

Genus CI.—LEUCIPPUS.

- 1 *ehionogaster* (Tsch.) ex Peruv. et Boliv.
- 2 *chloroereus*, Gould, ex Amazon. sup.

Genus CII.—THAUMATIAS.

- 1 *candidus* (Bourc. et Muls.) ex Mex. et Am. centr. ad Nicaraguam.
- 2 *niveipectus* (Cab. et Heine) ex Guian. Venez. et ins. Trinit.
- 3 *leucogaster* (Gm.) ex Brasilia et Guiana.
- 4 *viridiceps*, Gould, ex Æquatoria.
- 5 *milleri* (Bourc.) ex Columbia.
- *6 *nitidifrons*, Gould, ex loc. ign.
- 7 *brevirostris* (Less.) ex Brasilia.

- 8 *albiventris* (Less.) ex Brasilia.
- *9 *linnei*, Bp. ex Amaz. Guian. Venez. et ins. Trinit.
- 10 *fluvialis*, Gould, ex Amazon. sup.
- 11 *bartletti*, Gould, ex Amazon. sup.
- 12 *maculicauda*, Gould, ex Brasilia.
- 13 *chionurus*, Gould, ex Veragua et Costarica.
- 14 *eupreiceps*, Lawr. ex Costarica.
- 15 *nigriventris*, Lawr. ex Costarica et Veragua.

Genus CIII.—AMAZILIA.

- 1 *pristina*, Gould, ex Peruv. et Æquatoria occ.
- 2 *alticola*, Gould, ex Æquatoria.
- *3 *leucophaea*, Reich. ex Peruv.
- 4 *dumerilli* (Less.) ex Æquatoria.
- 5 *cinnamomea* (Less.) ex Guat. et Costarica.
- *6 *graysoni*, Lawr. ex inss. "Tres Marias."
- 7 *yucatanensis*, Cabot, ex Yucatan et Peten.
- 8 *cerviniventris*, Gould, ex Mexico.
- *9 *castaneiventris*, Gould, ex Columbia.
- 10 *riefferi* (Bourc.) ex Mex. Am. centr. Columb. et Æquatoria.
- 11 *beryllina* (Licht.) ex Mexico.
- 12 *devillii* (Bourc.) ex Guatemala.
- 13 *viridiventris* (Reichenb.) ex Columbia.
- 14 *cyanura*, Gould, ex Guatemala et Nicaragua.

Genus CIV.—SAUCEROTTIA.

- 1 *erythronota* (Less.) ex Columb. Venez. et ins. Trinit.
- 2 *eduardi* (Delattr. et Bourc.) ex Panama.
- 3 *niveiventris* (Gould) ex Veragua.
- 4 *typica*, Bp. ex Columbia.
- 5 *warszewiezi*, Cab. et Hein. ex Columb. litt.
- 6 *sophieæ* (Bourc.) ex Costarica.
- 7 *cyaneifrons* (Bourc.) ex Columbia.

Genus CV.—EUPHERUSA.

- 1 *eximia* (Delattre) ex Guatemala.
- 2 *egregia*, Scl. et Salv. ex Costarica et Veragua.
- *3 *poliocerca*, Elliot, ex Mexico.

Genus CVI.—CHRYSURONIA.

- 1 *ænone* (Less.) ex Venezuela et Columbia.
- 2 *josephincæ* (Bourc. et Muls.) ex Amazon. sup.
- *3 *humboldti* (Bourc. et Muls.) ex Æquatoria.
- 4 *elicicæ* (Bourc. et Muls.) ex Guatem. et Am. centr. ad Chiriqui
- 5 *chrysura* (Less.) ex Brasil. int. Paraguay et rep. Arg.

Genus CVII.—EUCEPHALA.

- 1 *grayi* (Delattre et Bourc.) ex Æquatoria.
- 2 *smaragdo-cærulea*, Gould, ex Brasilia.
- *3 *chlorocephala* (Bourc.) ex Æquatoria.
- *4 *cæruleo-lavata*, Gould, ex Brasilia.
- *5 *scapulata*, Gould, ex Guiana.
- 6 *hypocyanea*, Gould, ex Guian. int.
- 7 *cærulea* (Vieill.) ex Guiana, Amaz. Venez. et ins. Trinit.

Genus CVIII.—PANTERPE.

- 1 *insignis*, Cab. ex Costarica et Chiriqui.

Genus CIX.—JULIAMYIA.

- 1 *typica*, Bp. ex Columbia et Panama.
- 2 *felicianæ* (Less.) ex Æquatoria.

Genus CX.—CIRCE.

- 1 *latirostris* (Sw.) ex Mexico.
- *2 *doubledayi* (Bourc.) ex Mexico.
- *3 *magica* (Muls. et Verr.) ex Mexico.

Genus CXI.—PHLEOPTILA.

- 1 *sordida*, Gould, ex Mexico.

Genus CXII.—DAMOPHILA.

- 1 *amabilis* (Gould) ex Æquator. Columb. et Costarica.

Genus CXIII.—HYLOCHARIS.

- 1 *sapphirina* (Gm.) ex Brasil. et Amazonia.
- 2 *lactea* (Less.) ex Brasilia.
- 3 *cyanea* (Vieill.) ex Brasilia.

Genus CXIV.—SAPPHIRONIA.

- 1 *goudoti* (Boure.) ex Columbia.
- 2 *cæruleigularis* (Gould) ex Veragua.

Genus CXV.—SPORADINUS.

- *1 *elegans* (Aud. et Vieill.) ex ins. Hayti.
- 2 *ricordi* (d'Orb.) ex Cuba et ins. Bahamensi "Abajo."
- *3 *maugæi* (Vieill.) ex Portorico.

Genus CXVI.—CHLOROSTILBON.

- 1 *auriceps*, Gould, ex Mexico.
- 2 *caniveti* (Less.) ex Mexico.
- 3 *osberti*, Gould, ex Guat. et Am. centr. ad Costaricam.
- 4 *angustipennis* (Fraser) ex Columb. Æquator. Venez. Panama et Veragua.
- 5 *aureiventris* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia et rep. Arg.
- 6 *prasinus* (Less.) ex Brasilia.
- *7 *igneus*, Gould, ex Amazon. inf.
- 8 *atala* (Less.) ex Guiana et Amazonia.

Genus CXVII.—PANYCHLORA.

- 1 *alicæ* (Boure.) ex Venezuela et Columbia.
- 2 *poortmanni* (Boure.) ex Columbia.
- 3 *stenura*, Cab. et Hein. ex Venezuela.

Genus CXVIII.—SMARAGDOCHRYSID.

- 1 *iridescent*, Gould, ex Brasilia.

Fam. II.—CYPSELIDÆ.

Subfam. I.—CYPSELINÆ.

Genus I.—CYPSELUS.

- 1 *phænicobius* (Gosse) ex Jamaica et Cuba.
- 2 *squamatus*, Cassin, ex Guiana et Amazonia.
- 3 *andicola*, Lafr. et d'Orb. ex Bolivia et Peruvia.

Genus II.—PANYPTILA.

- 1 *cayanensis* (Gm.) ex Guiana.
- 2 *sancti-hieronymi*, Salvin, ex Guatemala.
- 3 *melanoleuca* (Baird) ex Mex. et Guatemala.

Subfam. II.—CHLETURINÆ.

Genus III.—HEMIPROCNE.

- 1 *zonaris* (Shaw) ex Am. centr. et merid. ad romp. Arg.
- 2 *biscutata* (Scl.) ex Brasil. merid. or.
- 3 *semicollaris* (de Sauss.) ex Mexico.

Genus IV.—CHLETURA.

- 1 *pelasgia* (Linn.) ex Mexico.
- 2 *rauxi* (Townsh.) ex Mexico.
- 3 *poliura* (Temm.) ex Guiana, Tobago et Amazon. sup.
- 4 *cinereicauda*, Cassin, ex Brasilia.
- 5 *cinereiventris*, Scl. ex Brasilia.
- 6 *selateri*, Pelzeln, ex Amazon. sup.
- 7 *spinicauda* (Temm.) ex Guiana.
- 8 *fumosa*, Salvin, ex Veragua et Columbia.
- 9 *rutila* (Vieill.) ex Mex. Am. centr. Columb. Æquat. et Venezuela.

Genus V.—CYPSELOIDES.

- 1 *senex* (Temm.) ex Brasilia.
- 2 *fumigatus* (Streubel) ex Brasil. et Peruv.
- 3 *niger* (Gm.) ex Jamaica.

Fam. III.—CAPRIMULGIDÆ.

Genus I.—NYCTIBIUS.

- 1 *grandis* (Gm.) ex Brasil. Amazonia, Venez. et Guiana.
- 2 *æthereus* (Max.) ex Brasil.
- *3 *longicaudatus* (Spix.) ex Amaz. sup.
- 4 *jamaicensis* (Gm.) ex Jamaica, Guatemala et Am. merid. trop.
- *5 *leucopterus* (Max.) ex Brasil.
- *6 *bracteatus*, Gould, ex Guiana.

Genus II.—PODAGER.

- 1 *nacunda* (Vieill.) ex Am. merid. trop.

Genus III.—LUROCALIS.

- 1 *semitorquatus* (Gm.) ex Guiana et Amazonia.
- 2 *nattereri* (Temm.) ex Brasil.

Genus IV.—CHORDEILES.

- 1 *virginianus*, Sw. ex Columb. et Brasil.
- 2 *minor*, Cab. ex Jamaica.
- 3 *texensis*, Lawr. ex Mexico et Guatem.
- 4 *acutipennis* (Bodd.) ex Am. merid. tropica.
- 5 *peruvianus* (Peale) ex Peruv. occ.
- 6 *pusillus*, Gould, ex Brasil.
- 7 *rupestris* (Spix.) ex Amazonia.

Genus V.—NYCTIPROGNE.

- 1 *leucopygia* (Spix.) ex Amazon. et Brasil.

Genus VI.—ANTROSTOMUS.

- 1 *carolinensis* (Gm.) ex Cuba, Jamaica et Guatemala.
- 2 *sericeo-caudatus*, Cassin, ex Am. merid.
- 3 *rufus* (Gm.) ex Am. merid. tropica.
- 4 *vociferus*, (Wils.) ex Mex. Guat. et Cuba.
- 5 *macromystax*, (Wagl.) ex Mexico.
- 6 *nuttalli*, (Aud.) ex Mex. bor.
- 7 *nigrescens*, Cab. ex Guian. Amaz. et Columb.
- 8 *parrulus* (Gould) ex Brasil. merid. et rep. Argent.
- 9 *maculicaudus* (Lawr.) ex Boliv. et Peruv.
- 10 *ocellatus* (Tsch.) ex Brasil. et Peruv. or.

Genus VII.—STENOPSIS.

- 1 *cayennensis* (Gm.) ex Guiana, Tobago, Martinica et Columb.
- 2 *ruficervix*, Scl. ex Columb. et Æquat.
- 3 *bifasciata* (Gould) ex Chilia.
- 4 *æquicaudata* (Peale) ex Peruv. occ.

Genus VIII.—HYDROPSALIS.

- 1 *schomburgki*, Sclater, ex Guiana.
- 2 *trifurcata*, Natt. ex Amazonia sup.
- 3 *torquata* (Gm.) ex Brasil. merid. orient.
- 4 *furcifera* (Vieill.) ex Brasil. int. Paraguay, Boliv. et rep. Arg.
- 5 *forcipata* (Nitzsch) ex Brsil, merid. or.
- 6 *lyra*, Bp. ex Columbia et Venezuela.
- 7 *segmentata*, Cassin, ex Columb. et Æquator.

Genus IX.—HELEOTHREPTUS.

- 1 *anomalus* (Gould) ex Brasil. int.

Genus X.—NYCTIDROMUS.

- 1 *albicollis* (Gm.) ex Am. centr. et merid. ad imam Brasil.

Genus XI.—SIPHONORHIS.

- 1 *americana* (Linn.) ex Jamaica.

Fam. IV.—STEATORNITHIDÆ.

Genus I.—STEATORNIS.

- 1 *caripensis*, Humb. ex Columbia, Venezuela et ins. Trinit.

////////////////////////////////////

Ordo. III.—PICI.

Fam. I.—PICIDÆ.

Subfam. I.—PICUMINÆ.

Genus I.—PICUMNUS.

- 1 *rufiventris*, Bp. ex Amazon. sup.
- *2 *cinnamomeus*, Wagl. ex Venez. et Columb. ittorali.
- 3 *olivaceus*, Lafr. ex Columb. et Am. centr. ad Honduras.
- 4 *castelnaudi*, Malh. ex Peruv. orient.
- 5 *leucogaster*, Pelz. ex Guian. int.
- 6 *minutus*, (Linn.) ex Brasil.
- 7 *buffoni*, Lafr. ex Guiana et Amazon. sup.
- 8 *aurifrons*, Pelz. ex Amazon. sup.
- 9 *cirrhatus*. Temm. ex Brasil.
- 10 *temmincki*, Lafr. ex Brasil.
- 11 *lepidotus*, Cab. et Hein. ex Guiana.
- 12 *squamulatus*, Lafr. ex Columb. et Venezuela.
- *13 *albo-squamatus*, Lafr. et d'Orb. ex Boliv.
- 14 *pygmæus* (Licht.) ex Brasil.

Subfam. II.—PICINÆ.

Genus II.—CAMPEPHILUS.

- 1 *imperialis*, Gould, ex Mex. occ. propè Mazatlan.
- 2 *magellanicus*, King, ex Patagonia.
- 3 *melanoleucus* (Gm.) ex Brasil. Amaz. Guiana et Columb.
- 4 *malherbii*, Gray, ex Columb. Panama et Veragua.
- 5 *guatemalensis*, Hartl. ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.
- 6 *sclateri*, Malh. ex Æquator. occ.
- 7 *pollens*, Bp. ex Columbia.
- 8 *boiei* (Wagl.) ex Bolivia et rep. Argent.
- 9 *rubricollis* (Gm.) ex Guiana.
- 10 *trachelopyrus* (Malh.) ex Amazonia sup. et inf.
- 11 *robustus* (Licht.) ex Brasilia et Paraguay.
- 12 *hamatogaster*, Tsch. ex Peruv. Columb. et Veragua.

Genus III.—*DRYOCORUS*.

- 1 *lineatus* (Linn.) ex Brasil. Amazon. et Æquator. occ.
- 2 *scapularis* (Vig.) ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.
- 3 *erythrops* (Val.) ex Brasil.
- *4 *galeatus* (Temm.) ex Brasil. merid.

Genus IV.—*PICUS*.

- 1 *jardini*, Malh. ex Mex. et Am. centr. ad Veraguam.
- 2 *scalaris*, Wagl. ex Mexico.
- 3 *stricklandi*, Malh. ex Mexico.
- 4 *mixtus*, Bodd. ex Brasil. merid. et rep. Arg.
- 5 *lignarius*, Mol. ex Chilia.
- 6 *cactorum*, Lafr. et d'Orb. ex Boliv. et rep. Arg.

Genus V.—*SPHYROPICUS*.

- 1 *varius* (Linn.) ex Mexico et Guatemala.

Genus VI.—*CHLOROXERPES*.

- 1 *oleagineus* (Licht.) ex Mexico.
- 2 *caboti* (Malh.) ex Guatemala, Costarica et Veragua.
- 3 *fumigatus* (Lafr. et d'Orb.) ex Boliv. Peruv. et Columbia.
- *4 *sanguinolentus*, Sc. ex Honduras.
- 5 *callonotus*, Waterh. ex Æquator, occ.
- 6 *sanguineus* (Licht.) ex Guiana.
- 7 *kirki* (Malh.) ex Venez. et ins. Trinit.
- 8 *cecilie* (Malh.) ex Columb. Æquat et Chiriqui.
- 9 *affinis* (Wagl.) ex Brasil. merid.
- 10 *sclysi* (Malh.) ex Brasilia.
- 11 *sedulus* (Cab. & Heine) ex Guiana.
- 12 *ruficeps* (Spix) ex Amazon. inf. et Brasil. int.
- 13 *hilaris* (Cab. et Hein.) ex Amaz. sup.
- 14 *tephrodops* (Wagl.) ex Guiana.
- 15 *tænionotus* (Reich.) ex Brasilia.
- 16 *olivinus* (Malh.) ex Brasilia int.
- 17 *malherbii*, Sc. ex Bolivia et Æquat.
- 18 *spilogaster* (Wagl.) ex Brasil. int.
- 19 *aurulentus* (Licht.) ex Brasil.
- 20 *simplex*, Salvin, ex Chiriquia.
- 21 *chrysochlorus* (Vieill.) ex Brasilia.
- 22 *capistratus* (Malh.) ex Guiana int et Amaz. sup.
- 23 *erythropis* (Vieill.) ex Brasil.
- 24 *flavicularis* (Bodd.) ex Guiana

- 25 *leucolæmus* (Malh.) ex Brasil. int.
- 26 *ceruginosus*, Scl. ex Mexico.
- 27 *yucatanensis* (Cabot) ex Guatemala.
- 28 *rubiginosus* (Sw.) ex Venezuela et Æquator.
- 29 *canipileus* (d'Orb.) ex Boliv. Peruv. Columb. et Veragua.

Genus VII.—XIPHIDIOPICUS

- 1 *percussus* (Temm.) ex Cuba.

Genus VIII.—CHRYSOPTILUS.

- 1 *punctigula* (Bodd.) ex Guiana et Columbia.
- 2 *speciosus* Scl. ex Amazon. sup.
- 3 *melanochlorus* (Gm.) ex Brasil. Guian. Venezuela et ins. Trinit.
- 4 *icteromelas* (Vieill.) ex Brasil. int.
- 5 *cristatus* (Vieill.) ex rep. Argentina.
- 6 *atricollis* (Malh.) ex Peruv. occ.

Genus IX.—MELANERPES

- 1 *portoricensis* (Daud.) ex ins. Porto Rico.
- 2 *rubrifrons* (Spix) ex Guiana.
- 3 *cruentatus* (Bodd.) ex Guiana et Amaz. sup.
- 4 *flavifrons* (Vieill.) ex Brasilia.
- 5 *chrysauchen*, Salv. ex Veragua.
- 6 *pulcher*, Scl. ex Columbia.
- 7 *formicivorus* (Sw.) ex Mex. Guat. Costarica et Chiriqui.
- 8 *flavigularis* (Malh.) ex Columbia.
- 9 *therminieri* (Less.) ex ins. Guadaloup.

Genus X.—LEUCONERPES.

- 1 *candidus* (Otto) ex Brasil. Boliv. et rep. Argent.

Genus XI.—CENTURUS.

- 1 *striatus* (Bodd.) ex ins. Hayti.
- 2 *radiolatus* (Wagl.) ex ins. Jamaica.
- 3 *albifrons* (Sw.) ex Mex. et Guatemala.
- 4 *aurifrons* (Wagl.) ex Mex. bor.
- 5 *tricolor* (Wagl.) ex Columb. Venezuela et Veragua.
- 6 *hoffmanni*, Cab. ex Costarica.
- 7 *hypopolius* (Wagl.) ex Mexico.

- 8 *elegans* (Sw.) ex Mexico.
- 9 *superciliaris* (Temm.) ex ins. Cuba.
- 10 *pucherani* (Malh.) ex Mex. Am. centr. et Æquat. occ.

Genus XII.—HYPOXANTHUS.

- 1 *rivolii* (Boiss.) ex Columb. Venezuela et Æquatoria

Genus XIII.—COLAPTES.

- 1 *mexicanus*, (Sw.) ex Mexico.
- 2 *mexicanoides*, Lafr. ex Guatemala.
- 3 *chrysocaulosus*, Gundl. ex Cuba.
- 4 *campestris* (Vieill.) ex Brasil. et Boliv. campis.
- 5 *agricola*, Malh. ex rep. Arg.
- 6 *pitiis* (Mol.) ex Chilia.
- 7 *rupicola* (Lafr. et d'Orb.) ex Bolivia et Peruvia.

Subfam. III.—CELEINÆ.

Genus XIV.—NESOCELEUS, GEN. NOV. VI.

- 1 *fernandinæ* (Vig.) ex ins. Cuba.

Genus XV.—CELEUS.

- *1 *torquatus* (Bodd.) ex Guiana.
- 2 *tinnunculus* (Wagl.) ex Brasilia.
- 3 *flavescens* (Gm.) ex Brasilia merid.
- 4 *ochraceus* (Spix) ex Brasil. bor. et Amazonia.
- 5 *lugubris* (Malh.) ex Brasil. int. et Bolivia.
- 6 *elegans* (Müll.) ex Guiana.
- 7 *reichenbachii* (Malh.) ex Venezuela et ins. Trinit.
- 8 *jumana* (Spix.) ex Guiana et Amaz. inf.
- 9 *flavus* (Müll.) ex Guian. Venez. et Amaz.
- 10 *citreopygius*, Sel. & Salv. ex Amaz. sup.
- 11 *castaneus* (Wagl.) ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.
- 12 *grammicus* (Malh.) ex Guiana et Amazon sup.
- 13 *rufus* (Bodd.) ex Guiana.
- 14 *multi-fasciatus* (Malh.) ex Amazonia.
- 15 *loricatus*, Reich. ex Æquator. occ. et Panama.

Ordo. IV.—COC CYGES.

Subordo. I.—COC CYGES ANISODACTYLÆ.

Fam. I.—MOMOTIDÆ.

Genus I.—MOMOTUS.

- 1 *brasiliensis*, Lath. ex Guiana et Amazon. sup.
- 2 *swainsoni*, ScL. ex Venezuela, ins. Trinit. et Tobago.
- 3 *subrufescens*, ScL. ex Columb. litt. et Panama.
- 4 *microstephanus*, ScL. ex Columb. et Æquat.
- 5 *nattereri*, ScL. ex Brasil. int. et Bolivia.
- 6 *æquatorialis*, Gould, ex Æquator. et Columbia.
- 7 *lessoni*, Less. ex Mex. et Am. centr. ad Veraguam.
- 8 *æruleiceps*, Gould, ex Mexico.
- 9 *mexicanus*, Sw. ex Mexico.
- 10 *castaneiceps*, Gould, ex Guatemala.

Genus II.—UROSPATHIA.

- 1 *martii*, Spix, ex Amazon. sup. Columb. Veragua et Costarica.

Genus III.—BARYPTHENGUS.

- 1 *ruficapillus* (Vieill.) ex Brasil. et Paraguay.

Genus IV.—HYLOMANES.

- 1 *momotula*, Licht. ex Mex. et Guatemala.
- 2 *gularis* (Lafr.) ex Guatemala.

Genus V.—PRIONIRHYNCHUS.

- 1 *platyrhynchus*, Leadb. ex Amazon. sup. Columb. Veragua et Costarica.
- 2 *earinatus*. (Du Bus) ex Guatemala, Honduras et Nicaragua.

Genus VI.—EUMOMOTA.

- 1 *superciliaris*. (Sw.) ex Honduras et Am. centr. ad Chiriqui.

Fam. II.—TODIDÆ.

Genus I.—TODUS.

- 1 *viridis*, Linn. ex Jamaica.
- 2 *dominicensis*, Lafr. ex ins. Hayti.
- 3 *hypochondriacus*, Bryant, ex Portorico.
- 4 *multicolor*, Gould, ex Cuba.

Fam. III.—ALCEDINIDÆ.

Genus I.—CERYLE.

- 1 *torquata* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad remp. Arg.
- 2 *stellata* (Meyen) ex Chilia et Patagonia.
- 3 *aleyon* (Linn.) ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 4 *amazona* (Lath.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad remp. Arg.
- 5 *eabanisi* (Tsch.) ex Mex. Am. centr. Æquat. et Peruv. occ.
- 6 *americana* (Gm.) ex Am. merid. a Columb. ad remp. Arg.
- 7 *inda* (Linn.) ex Nicaragua, Veragua et Am. merid. ad Brasil.
- 8 *superciliosa* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Amazon.

 Subordo. II.—COCCYGES HETERODACTYLÆ.

Fam. IV.—TROGONIDÆ.

Genus I.—PRIONOTELES.

- 1 *temnurus* (Temm.) ex Cuba.

Genus II.—TEMNOTROGON.

- 1 *rhodogaster* (Vieill.) ex ins. Haiti.

Genus III.—TROGON.

- 1 *mexicanus*, Sw. ex Mexico et Guatemala.
- 2 *ambiguus*, Gould, ex Mexico.
- 3 *elegans*, Gould, ex Mex. et Am. centr. ad Nicaraguam.

- 4 *puella*, Gould, ex Mex. et Am. centr. ad Veraguam.
- 5 *aurantiiventris*, Gould, ex Mex. et Am. centr. ad Veraguam.
- 6 *collaris*, Vieill. ex Brasil. Amaz. Guian. Venezuela, Columbia et Æquatoria.
- 7 *personatus*, Gould, ex Columb. Æquator et Peruvia.
- 8 *atricollis*, Vieill. ex Brasil. Amaz. Guian. Columb. et Am. centr. ad Nicaraguam.
- 9 *caligatus*, Gould, ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 10 *meridionalis*, Sw. ex Venezuela, Guiana et Amazon. sup.
- 11 *variegatus*, Spix, ex Brasil. Amazon. sup. et Peruvia.
- 12 *viridis*, Linn. ex Brasil. Guian. et Columbia.
- 13 *chionurus*, Scl. et Salv. ex Panama.
- 14 *bairdi*, Lawrence, ex Veragua et Costarica.
- 15 *aurantius*, Spix, ex Brasil.
- 16 *surucura*, Vieill. ex Brasil. merid. et Paraguaya.
- 17 *citreolus*, Gould, ex Mexico.
- 18 *melanocephalus*, Gould, ex Guat. et Am. centr. ad Costaricam.
- 19 *clathratus*, Salvin, ex Costarica et Veragua.
- 20 *melanurus*, Sw. ex Guian. et Amazon. sup.
- 21 *maerurus*, Gould, ex Columb. litt. et Panama.
- 22 *massena*, Gould, ex Mex. et Am. centr. ad Panama.

Genus IV.—EUTILLOTIS.

- *1 *neoxenus* (Gould) ex Mexico.

Genus V.—PHAROMACRUS.

- 1 *paradiscus* (Bp.) ex Guatem. Costarica et Veragua.
- 2 *antisianus* (d'Orb.) ex Boliv. Peruv. Æquator. et Columbia.
- 3 *fulgidus* (Gould) ex Columbia et Venezuela.
- 4 *auriceps* (Gould) ex Columb. et Æquator.
- 5 *pavoninus* (Spix) ex Amazon. sup.

Subordo III.—COCCYGES ZYGODACTYLÆ.

Fam. V.—GALBULIDÆ.

Genus I.—GALBULA.

- 1 *viridis*, Lath. ex Guiana et Amazon. inf.
- 2 *rufo-viridis*, Cab. ex Brasil. et Boliv.
- 3 *ruficauda*, Cuv. ex Guiana int. Venezuela, Trinit. ins. et Columbia.
- 4 *melanogenia*, Scl. ex Guatem. et Am. centr. ad Veraguam.

- 5 *tombacca*, Spix, ex Amaz. sup. et Columbia.
- 6 *albirostris*, Lath. ex Guiana et Amazon. sup.
- 7 *cyaneicollis*, Cassin, ex Amazon. inf.
- 8 *leucogastra*, Vieill. ex Guiana.
- 9 *chalcothorax*, Sel. ex Æquator. orient.

Genus II.—UROGALBA.

- 1 *paradisca* (Linn.) ex Guiana.
- 2 *amazonum*, Sel. ex Amazonia. inf.

Genus III.—BRACHYGALBA.

- 1 *inornata* (Sel.) ex Guiana, Amazonia et Columb.
- 2 *goeringi*, Sel. et Salv. ex Venezuela.
- 3 *albigularis* (Spix) ex Amazon. sup.
- 4 *melanosterna* (Sel.) ex Brasil int. et Bolivia.

Genus IV.—JACAMARALCYON.

- 1 *tridactyla* (Pall.) ex Brasilia.

Genus V.—JACAMEROPS.

- 1 *grandis* (Gm.) ex Guiana, Amazon. Columb. et Panama.
- *2 *isidori*, Dev. ex Amazon. sup.

Genus VI.—GALBALCYRHYNCHUS.

- 1 *leucotis*, Des Murs. ex Amazon. sup.

Fam. VI.—BUCCONIDÆ.

Genus I.—BUCCO.

- 1 *collaris*, Lath. ex Guiana et Amazonia sup.
- 2 *macrorhynchus* (Gm.) ex Guiana.
- 3 *dysoni*, Sel. ex Columb. Æquat. et Am. centr. ad Guatemalam.
- 4 *hyperrhynchus*, Bp. ex Amazonia.
- 5 *swainsoni*, Bp. ex Brasil.
- 6 *pectoralis*, Gray, ex Panama.
- 7 *ordi*, Cassin, ex Guiana int. et Venezuela.
- 8 *tectus* (Bodd.) ex Guiana.
- *9 *picatus*, Sel. ex Amaz. sup.

- 10 *sublectus*, Sel. ex Æquator. occ.
- 11 *tamatia* (Gm.) ex Guiana.
- 12 *pulmentum*, Bp. ex Amazon. sup.
- 13 *ruficollis*, Wagl. ex Columb. litt.
- 14 *bicinctus* (Gould) ex Venezuela et Trinit. ins.
- 15 *radiatus*, Selater, ex Columbia.
- 16 *striolatus*, Pelzeln, ex Brasil int.
- 17 *chacuru* (Vieill.) ex Brasil. merid. et Paraguaya.
- 18 *maculatus* (Gm.) ex Brasil.
- 19 *striatipectus*, Selater, ex Bolivia.
- *20 *lanccolatus*, Deville, ex Peruv. et Æquator. orient.
- 21 *macrodactylus* (Spix) ex Amazon. sup. et Columbia.

Genus II.—MALACOPTILA.

- 1 *fusca* (Gm.) ex Guiana, Amazon. sup. et Columbia.
- 2 *rufa* (Spix) ex Amazon. sup.
- 3 *castanea*, Verreaux, ex Æquatoria.
- *4 *fulvogularis*, Sel. ex Boliv. et Peruv.
- 5 *torquata* (Hahn) ex Brasilia.
- 6 *substriata*, Selat. ex Columbia.
- *7 *aspersa*, Selat. ex Venezuela.
- 8 *mystacalis*, Selat. ex Columbia.
- 9 *panamensis* (Lafr.) ex Costarica, Veragua, Panama et Æquator. occ.
- 10 *inornata*, Du Bus, ex Guatemala.

Genus III.—NONNULA.

- 1 *rubecula* (Spix) ex Amazonia inf.
- 2 *frontalis*, Selater, ex Columbia.
- 3 *ruficapilla* (Tsch.) ex Amazon. sup.

Genus IV.—MONASA.

- 1 *atra* (Bodd.) ex Guiana.
- 2 *flavirostris*, Strickl. ex Amaz. sup. et Columbia.
- 3 *morpheus* (Hahn) ex Brasilia.
- 4 *peruana*, Bp. ex Amazon. sup.
- 5 *grandior*, Sel. et Salv. ex. Costarica et Mosquitia.
- 6 *pallescens*, Cassin, ex Columb. bor.
- 7 *nigrifrons* (Spix) ex Amazon. sup.

Genus V.—CHELIDOPTERA.

- 1 *tenebrosa* (Pall.) ex Guiana, Amazon. et Columb.
- 2 *brasiliensis*, Selater, ex Brasilia.

Fam. VII.—CUCULIDÆ.

Subfam. I.—CROTOPHAGINÆ.

Genus I.—CROTOPHAGA.

- 1 *ani*, Linn. ex Am. merid. cisandeanæ, Antilibus et Veragua.
- 2 *sulcirostris*, Sw. ex Mex. Am. centr. et Am. merid. transandeanæ.
- 3 *major*, Linn. ex Guiana, Amazon. et Brasilia.

Genus II.—GUIRA.

- 1 *piririgua* (Vieill.) ex Brasilia et Paraguaya.

Subfam. II.—PHENICOPHAINÆ.

Genus III.—NEOMORPHUS.

- 1 *geoffroyi* (Temm.) ex Brasilia.
- 2 *salvini*, Scl. ex Nicaragua, Veragua et Columbia.
- 3 *pucherani*, Deville, ex Amazon. sup.
- 4 *rufipennis*, Gray, ex Guiana.

Subfam. III.—GEOCOCYGINÆ.

Genus IV.—GEOCOCCYX.

- 1 *mexicanus* (Gm.) ex Mexico.
- 2 *affinis* (Hartl.) ex Mex. et Guatemala.

Subfam. IV.—DIPLOPTERINÆ.

Genus V.—DROMOCOCCYX.

- 1 *phasianellus* (Spix) ex Brasil. Amaz. et Am. centr. ad Mex.
- 2 *paroninus*, Pelzeln, ex Guian. int. et Brasil. int.

Genus VI.—DIPLOPTERUS.

- 1 *novius* (Gm.) ex Brasil. Amazon. Columb. Æquator. et Am. centr. ad Mexico.

Subfam. V.—COCYZINÆ.

Genus VII.—SAUROTHERA.

- 1 *vetula* (Linn.) ex Jamaica.
- *2 *dominicensis*, Lafr. ex ins. Hayti.
- 3 *vieillotii*, Bp. ex Portorico.
- 4 *merlini*, d'Orb. ex Cuba.

Genus VIII.—HYETORNIS.

- 1 *pluvialis* (Gm.) ex Jamaica.

Genus IX.—PIAYA.

- 1 *cayana* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Brasil.
- 2 *melanogastra* (Vieill.) ex Guiana et Amazon. sup.
- 3 *minuta* (Vieill.) ex Guiana, Amazon. Columb. Æquator. occ. et Panama.

Genus X.—MOROCOCYX.

- 1 *erythropygia* (Less.) ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.

Genus XI.—COCYZUS.

- 1 *americanus* (Linn.) ex Antill. Mex. Am. centr. et Am. merid. ad remp. Argent.
- 2 *minor* (Gm.) ex Antill. Am. centr. ins. Trinit. Guiana et Amaz. inf.
- *3 *ferrugineus*, Gould, ex ins. Cocos.
- 4 *erythrophthalmus* (Wils.) ex Cuba, Mex. Am. centr. Columb. ins. Trin. et Am. sup.
- 5 *melanocoryphus*, Vieill. ex rep. Arg. Parag. Bras. Amaz. Peruv. et Guiana.
- 6 *landsbergi*, Bp. ex Columb. bor. et Venezuela.
- 7 *cinereus*, Vieill. ex rep. Argent. et Paraguay.
- 8 *pumilus*, Strickl. ex ins. Trin. Venez. et Columb.

Fam. VIII.—RHAMPHASTIDÆ.

Genus I.—RHAMPHASTOS.

- 1 *toco* (Gm.) ex Guiana, Amazon. et Brasilia.
- 2 *carinatus*, Sw. ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 3 *tocard*, Vieill. ex Peruvia, Æquator. Columb. et Panama.
- 4 *erythrorhynchus* (Gm.) ex Guiana et Amazon. inf.
- 5 *inea*, Gould, ex Bolivia et Peruvia.
- 6 *cuvieri*, Wagl. ex Amazonia sup.
- 7 *citrcolamus*, Gould, ex Columbia.
- 8 *osculans*, Gould, ex Guiana int. et Amazon. inf.
- 9 *culminatus*, Gould, ex Amazon sup.
- 10 *ariel*, Vig. ex Brasil.
- 11 *vitellinus*, Licht. ex Guian. Venezuela et ins. Trin.
- 12 *dicolorus* (Linn.) ex Brasilia.

Genus II.—PTEROGLOSSUS.

- 1 *aracari* (Linn.) ex Guiana.
- 2 *wiedi*, Sturm, ex Brasilia.

- 3 *pluricinctus*, Gould, ex Guiana int. et Columbia.
- 4 *pæcilsternus*, Gould, ex Æquator. et Columbia.
- 5 *castanotis*, Gould, ex Brasil. int. Amazon. inf. et Guiana int.
- 6 *frantzii*, Cab. ex Costarica et Veragua.
- 7 *torquatus* (Gm.) ex Mex. Am. centr. tota, Columb. et Venezuela litt.
- *8 *crythropygius*, Gould, ex Nicaragua.
- 9 *humboldti*, Wagler, ex Amazonia sup.
- 10 *inscriptus*, Wagler, ex Amazon. inf. et Brasil. int.
- 11 *viridis* (Linn.) ex Guiana.
- 12 *beauharnaisi*, Wagl. ex Amazon. sup.
- *13 *bitorquatus*, Vigors, ex Amazon. inf.
- *14 *sturmi*, Natt. ex ripis fl. Madeiræ.
- *15 *azaræ* (Vieill.) ex Guiana int.
- 16 *flavirostris*, Fraser, ex Amazon. sup. et inf. et Columbia.

Genus III.—SELENIDERA.

- 1 *maculirostris* (Licht.) ex Brasilia.
- 2 *gouldi* (Natt.) ex Amazon. inf.
- 3 *langsдорffi* (Wagl.) ex Amazon. sup.
- 4 *nattereri* (Gould) ex Guiana int.
- 5 *reinwardti* (Wagl.) ex Æquator. orient.
- 6 *spectabilis*, Cassin, ex Veragua.
- 7 *piperivora* (Linn.) ex Guiana.

Genus IV.—ANDIGENA.

- 1 *laminirostris*, Gould, ex Æquatoria. occ.
- 2 *hypoglaucus* (Gould) ex Æquator. et Peruvia.
- *3 *cucullatus* (Gould) ex Bolivia.
- 4 *nigrirostris* (Waterhouse) ex Columbia.
- 5 *spilorhynchus*, Gould, ex Æquator. occ. et Columb.
- 6 *bailloni* (Vieill.) ex Brasil.

Genus V.—AULACORHAMPHUS.

- 1 *sulcatus*, Sw. ex Venezuela.
- 2 *derbianus* (Gould) ex Æquator. Peruv. et Bolivia.
- 3 *hematopygius* (Gould) ex Æquator. et Columbia.
- 4 *cæruleicinctus* (d'Orb.) ex Peruv. et Bolivia.
- 5 *prasinus* (Gould) ex Mex. et Guatemala.
- *6 *wagleri* (Stum) ex Mexico.
- 7 *albivitta* (Boiss.) ex Venezuela et Columbia.

- *8 *atrogularis* (Sturm) ex Peruvia.
- 9 *cæruleigularis* (Gould) ex Veragua et Costarica.
- *10 *cyanolæmus*, Gould, ex Æquatoria.

Fam. IX.—CAPITONIDÆ.

Genus I.—CAPITO.

- 1 *niger* (Müll.) ex Guiana.
- 2 *auratus* (Dumont) ex Amazon. sup. Columb. et Æquatoria.
- *3 *quinticolor*, Elliot, ex Columbia.
- 4 *maculi-coronatus*, Lawr. ex Panama et Veragua.
- 5 *aurovirens* (Cuv.) ex Amazon. sup.
- 6 *bourcierii* (Lafr.) ex Æquator. Columb. Veragua et Costarica.
- 7 *glaucogularis*, Tsch. ex Peruvia.
- *8 *versicolor* (Müll.) ex Amaz. sup.
- 9 *richardsoni*, Gray, ex Columb. et Æquator.
- 10 *aurantiisollis*, Selater, ex Amazon. sup.

Genus II.—TETRAGONOPS.

- 1 *rhaphastinus*, Jardine, ex Æquatoria.
- 2 *frantzii*, Selater, ex Costarica.

////////////////////////////////////

Ordo V.—PSITTACI.

Fam. I.—PSITTACIDÆ.

Subfam. I.—ARINÆ.

Genus I.—ARA.

- *1 *hyacinthina* (Lath.) ex Brasil. int.
- *2 *glauca* (Vieill.) ex Paraguaya.
- *3 *spixi* (Wagl.) ex Brasilia.
- 4 *rubrigenis*, Lafr. ex Bolivia.
- 5 *militaris* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Boliviam.
- 6 *macao* (Linn.) ex Guatem. Am. centr. et merid. ad Boliviam.
- 7 *chloroptera*, Gray, ex Panama et Am. merid. ad Brasil.
- *8 *tricolor* (Bechst.) ex Cuba.
- 9 *ararauna* (Linn.) ex Guiana, Columb. Amazon. Brasil. Boliv. et Paraguay.
- *10 *caninde* (Wagl.) ex Paraguaya.
- 11 *severa* (Linn.) ex Brasil. Boliv. Amaz. Columb. et Panama.
- 12 *maracana* (Vieill.) ex Brasil. Paraguay et Peruv.
- 13 *auricollis* (Cassin) ex Brasil. int. et Bolivia.
- 14 *nobilis* (Linn.) ex Brasil.
- 15 *hahni* (Sonancé) ex Guian. Venezuela et Amazonia.

Genus II.—RHYNCHOPSITTA.

- 1 *pachyrhyncha* (Sw.) ex Mexico.

Genus III.—HENICOGNATHUS.

- 1 *leptorhynchus* (King) ex Chilia.

Genus IV.—CONURUS.

- 1 *patagonus* (Vieill.) ex Chilia, Patagonia et rep. Arg.
- 2 *icterotis* (Mass. et Souancé) ex Columbia.
- 3 *acuticandatus* (Vieill.) ex Paraguay et Bolivia.
- 4 *hæmorrhous* (Spix) ex Brasilia.
- *5 *luteus* (Bodd.) ex Amazonia inf.
- 6 *wagleri*, Gray, ex Venezuela et Columbia.

- 7 *mitratus*, Tsch. ex Peruvia et Bolivia.
- 8 *frontatus*, Cab. ex Peruvia.
- 9 *finsehi*, Salvin, ex Veragua.
- 10 *erythrogenys* (Less.) ex Æquator. occ.
- 11 *holochlorus*, Scl. ex Mexico et Guatemala.
- 12 *pavua* (Bodd.) ex Guiana et Brasilia.
- 13 *cuops* (Wagl.) ex Cuba.
- 14 *nanday* (Desm.) ex Paraguay et Bolivia.
- 15 *solstitialis* (Linn.) ex Guiana et Amazonia.
- 16 *jendaya* (Gm.) ex Brasil.
- 17 *weddelli* (Dewille) ex Brasil. int. Peruv. or. et Bolivia.
- 18 *aureus*, Gm. ex Brasilia, Amazon. et Guiana.
- 19 *petzi* (Wagl.) ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.
- 20 *ceruginosus* (Linn.) ex Venezuela et Guiana int.
- 21 *ocularis*, Scl. et Salv. ex Veragua et Panama.
- 22 *pertinax* (Linn.) ex Guiana.
- 23 *xanthogenius*, Bp. ex ins. St. Thomæ.
- 24 *cactorum* (Max.) ex Brasilia.
- 25 *nanus* (Vig.) ex Jamaica.
- 26 *aztec* (Souancé) ex Mex. Guatem. Hond. et Nicaragua.
- 27 *smaragdinus* (Gm.) ex Chilia.
- 28 *cruentatus* (Max.) ex Brasilia.
- 29 *vittatus*, Shaw, ex Brasil. merid.
- 30 *devillii*, Mass. et Souancé, ex Bolivia.
- *31 *roseifrons*, G. R. Gray, ex Amazon. sup.
- 32 *rhodocephalus*, Scl. et Salv. ex Venezuela alta.
- 33 *leucotis*, Licht. ex Brasil.
- 34 *cyanopterus* (Bodd.) ex Guiana et Amazonia inf.
- 35 *luciani*, Deville, ex Amazon. sup.
- *36 *perlatus* (Spix) ex Amazon. inf.
- 37 *molinæ*, Mass. et Souancé, ex Brasil. int.
- 38 *rhodogaster*, Scl. ex ripis fl. Madeira.
- 39 *hematotis* (Souancé) ex Venezuela.
- 40 *hoffmanni*, Cab. ex Costarica et Veragua.
- 41 *callipterus*, Mass. et Souancé, ex Columbia.
- 42 *melanurus*, Spix, ex Guiana int.
- 43 *souancæi*, Verr. ex Amazon. sup.
- 44 *rupicola*, Tsch. ex Peruvia.

Genus V.—*BOLBORHYNCHUS*.

- 1 *monachus* (Bodd.) ex Brasil. int. Paraguay et rep. Arg.
- *2 *luchsi*, Pelz. ex Bolivia.

- 3 *aymara*, d'Orb. ex Boliv. et rep. Arg. occ.
- 4 *rubrirostris*, Burm. ex rep. Arg. occ.
- 5 *aurifrons*, Less. ex Peruv. occ.
- 6 *orbignianus* (Bp.) ex Boliv. et Peruv.
- 7 *lineolatus* (Cassin) ex Mexico, Guatemala et Costarica.

Genus VI.—BROTOGERYS.

- 1 *tiriacula* (Bodd.) ex Brasil.
- 2 *xanthoptera* (Spix) ex Brasil. int. Boliv. et Amazon. sup.
- 3 *virescens* (Gm.) ex Amazon. inf.
- 4 *pyrrhoptera* (Lath.) ex Æquator. occ.
- 5 *tovi* (Gm.) ex Mex. Am. centr. tota et Columbia.
- 6 *jugularis*, Deville, ex Guian. int. et Amazon. sup.
- 7 *tuipara* (Gm.) ex Guiana. Venezuela et Amazon. inf.
- 8 *chrysosema*, Scl. ex ripis fl. Madeira.
- 9 *tui* (Gm.) ex Brasil.

Subfam. II.—PSITTACINÆ.

Genus VII.—CHRYSOTIS.

- 1 *festiva* (Linn.) ex Guiana, Venezuela et Amazonia.
- *2 *bodini*, Finsch, ex loc. ign.
- 3 *sallæi*, Scl. ex Hayti.
- 4 *vittata* (Bodd.) ex Portorico.
- 5 *collaria* (Linn.) ex Jamaica.
- 6 *leucocephala* (Linn.) ex Cuba.
- *7 *cyanopsis* (Vieill.) ex Antilibus.
- 8 *albifrons* (Sparm.) ex Mex. Guat. Honduras et Costarica.
- *9 *xantholora*, Gray, ex Honduras.
- 10 *pretrii* (Temm.) ex Brasil. merid.
- 11 *agilis* (Linn.) ex Jamaica.
- 12 *brasiliensis* (Linn.) ex Brasilia merid.
- 13 *vinacca* (Max.) ex Brasil.
- 14 *viridigenalis*, Cassin, ex Columb. et Æquatoria.
- 15 *finschi*, Scl. ex Mexico.
- 16 *diademata*, Spix, ex Guiana int. Columb. et Panama.
- 17 *autumnalis* (Linn.) ex Mex. Guat. et Honduras.
- 18 *dufresniana* (Kuhl.) ex Brasilia
- 19 *angusta* (Vigors) ex ins. Dominica.
- *20 *güldingi* (Vigors) ex ins. S. Vincentis.
- 21 *guatemalæ*, Scl. ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- *22 *nattereri*, Finsch., ex Brasil. int.
- 23 *farinosa*, Bodd. ex Brasil. Guian. et Amazonia.

- 24 *auripalliata* (Less.) ex Guat. Honduras et Costarica.
- 25 *amazonica* (Linn.) ex Brasil. Guian. Amazon. et Columbia.
- 26 *ochroptera* (Gm.) ex Venezuela.
- 27 *levaillanti*, Gray, ex Mexico.
- 28 *ochrocephala* (Gm.) ex Guiana, Amazon. Columbia et Chiriqui.
- 29 *astiva* (Lath.) ex Brasil. et Paraguaya.
- 30 *mercenaria* (Tsch.) ex Peruv. Æquator. et Columbia.
- 31 *xanthops* (Spix) ex Brasilia int.

Genus VIII.—TRICLARIA.

- 1 *cyanogastra* (Max.) ex Brasilia.

Genus IX.—DEROPTYUS.

- 1 *accipitrinus* (Linn.) ex Guiana et Amazon. inf.

Genus X.—PIONUS.

- 1 *menstruus* (Linn.) ex Brasil. Amazon. Guian. Venez. Columb. et Veragua.
- 2 *maximiliani* (Kuhl) ex Brasil. Paraguay et Bolivia.
- 3 *corallinus*, Bp. ex Æquatoria.
- 4 *sordidus* (Linn.) ex Venezuela
- 5 *seniloides* (Mass. et Souancé) ex Columb. et Æquatoria.
- *6 *tumultuosus*, Tsch. ex Peruv. or.
- 7 *senilis* (Spix) ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.
- 8 *chalcopterus* (Fraser) ex Columb. et Æquatoria.
- 9 *violaceus* (Bodd.) ex Guiana et Amaz. inf.

Genus XI.—CAICA.

- 1 *amazonina* (Des Murs) ex Columbia.
- 2 *pyrilia* (Bp.) ex Columbia.
- 3 *hæmatotis*, Scl. et Salv. ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 4 *barrabandi* (Kuhl) ex Guiana et Amazonia.
- *5 *vulturina* (Kuhl) ex Amazonia inf.
- 6 *histris* (Bodd.) ex Guiana et Amazonia.
- 7 *melanocephala* (Linn.) ex Guiana et Amazonia.
- 8 *leucogastra* (Kuhl) ex Amazonia inf.
- *9 *xanthomera*, Gray, ex Amazonia sup.

Genus XII.—UROCHROMA.

- 1 *stictoptera*, Scl. ex Columbia.
- 2 *sorda* (Kuhl) ex Brasilia.

- 3 *melanonota* (Kuhl) ex Brasilia.
- 4 *cingulata* (Scop.) ex Venezuela et ins. Trinitatis.
- 5 *purpurata* (Gm.) ex Guiana et Amazon. inf.
- 6 *hucti* (Temm.) ex Guiana et Amazon. sup.
- 7 *dilectissima*, Sel. et Salv. ex Venezuela.

Genus XIII.—PSITTACULA

- 1 *passerina* (Linn.) ex Brasil.
- 2 *cyanoptera* (Bodd.) ex Guiana et Venezuela.
- 3 *cyanopygia*, Souancé, ex Mexico.
- 4 *slateri*, Gray, ex Amazon. sup.
- 5 *conspicillata*, Lafr. ex Columbia.
- 6 *celestis* (Lesson) ex Æquator. occ.

Ordo VI.—STRIGES.

Fam. I.—STRIGIDÆ.

Genus I.—STRIX.

- 1 *flammea* (Linn.) ex reg. Neotr. universa.
- 2 *punctatissima*, Gould, ex ins. Galapagensibus.

Fam. II.—BUBONIDÆ.

Genus I.—OTUS.

- 1 *americanus* (Gm.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Brasil.
- 2 *brachyotus* (Forst.) ex reg. Neotr. universa.

Genus II.—NYCTALOPS.

- 1 *stygius* (Wagl.) ex Mex. Cuba et Am. merid. ad Brasil.

Genus III.—PSEUDOSCOPS.

- 1 *grammicus* (Gosse) ex Jamaica.

Genus IV.—SYRNIUM.

- 1 *fulvescens*, Scl. et Salv. ex Mexico et Guatemala.
- 2 *rufipes* (King) ex Patagonia.
- 3 *hylophilum* (Temm.) ex Brasilia, Guiana et Venezuela.

Genus V.—NYCTALE.

- 1 *acadica* (Gm.) ex Mexico.

Genus VI.—NYCTALITINUS.

- *1 *harrisi* (Cassin) ex Columbia.

Genus VII.—BUBO.

- 1 *virginianus* (Gm.) ex reg. Neotr. universa.

Genus VIII.—LOPHOSTRIX.

- 1 *cristata* (Daud.) ex Guiana et Amaz. inf.
- 2 *stricklandi*, Scl. et Salv. ex Guatem. Costarica et Veragua.

Genus IX.—SCORS.

- 1 *trichopsis*, Wagl. ex Mex. et Guatemala.
- 2 *flammeola*, Kaup, ex Mex. et Guatemala.
- 3 *barbarus*, Scl. et Salv. ex Guatemala.
- 4 *brasilianus* (Gm.) ex Guat. Am. centr. et merid. ad Brasil.
- 5 *nudipes* (Vieill.) ex Costarica, Veragua et Columbia.

Genus X.—PULSATRIX.

- 1 *torquata* (Daud.) ex Guat. et Am. centr. et merid. ad Brasil.

Genus XI.—CICCABA.

- 1 *huhula* (Daud.) ex Guiana, Amazon. et Brasil.
- 2 *nigro-lineata*, Scl. ex Mex. Guat. et Costarica.
- 3 *melanonota* (Tsch.) ex Brasil. et Peruv.
- 4 *albitarsa* (Scl.) ex Columbia.
- 5 *suinda* (Vieill.) ex Brasil. et Paraguaya.
- *6 *cayennensis* (Gm.) ex Guiana.
- *7 *polygrammica*, Gray, ex Brasilia.
- 8 *albigularis*, Cassin, ex Columb. et Æquator.
- 9 *virgata* (Cassin) ex Mex. Am. centr. et Venezuela.

Genus XII.—GYMNOGLAUX.

- 1 *nudipes* (Daud.) ex Portorico et ins. S. Crucis.
- *2 *lawrencii*, Scl. et Salv. ex Cuba.

Genus XIII.—PHOLEOPTYNX.

- 1 *cunicularia* (Mol.) ex reg. Neotr. universa.

Genus XIV.—GLAUCIDIUM.

- 1 *nanum* (King) ex Chilia.
- 2 *phalcnoides* (Daud.) ex reg. Neotr. universa.
- 3 *siju* (d'Orb.) ex Cuba.
- 4 *pumilum* (Temm.) ex Brasil.

Genus XV.—MICRATHENE.

- *1 *whitneyi* (Cooper) ex Mexico.

Ordo VII.—ACCIPITRES.

Fam. I.—FALCONIDÆ.

Subfam. I.—PANDIONINÆ.

Genus I.—PANDION.

- 1 *haliaëtus* (Linn.) ex reg. Neotr. univ.

Subfam. II.—CIRCINÆ.

Genus II.—CIRCUS.

- 1 *hudsonicus* (Linn.) ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 2 *cinerus*, Vieill. ex Peruv. Boliv. Chilia, rep. Arg. et Patagonia.
- 3 *macropterus*, Vieill. ex Am. merid. tota.

Subfam. III.—BUTEONINÆ.

Genus III.—ASTURINA.

- 1 *nitida* (Lath.) ex Panama et Am. merid. trop.
- 2 *plagiata* (Schl.) ex Mex. Guatem. et Costarica.
- 3 *magnirostris* (Gm.) ex Columb. Guiana, Æquator. et Amazonia.
- 4 *nattereri*, ScL. et Salv. ex Brasil. merid.
- 5 *ruficauda*, ScL. et Salv. ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 6 *pucherani*, ScL. et Salv. ex Boliv. Paraguay et rep. Arg.
- 7 *leucorrhoa* (Quoy et Gaim.) ex Columb. Venez. Amazon. et Brasilia.

Genus IV.—BUTEOLA.

- 1 *brachyura* (Vieill.) ex Guat. Am. centr. et merid. ad Brasil.

Genus V.—BUTEO.

- *1 *swainsoni*, Bp. ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.
- 2 *borealis* (Gm.) ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 3 *abbreviatus*, Cab. ex Mex. Am. centr. et Guiana.

- 4 *lineatus* (Gm.) ex Mex. et Am. centr.
- 5 *pennsylvanicus* (Wils.) ex Mex. Am. centr. Columb. Amazon. et Æquat.
- 6 *galapagensis*, (Gould) ex inss. Galapag.
- 7 *pterocles* (Temm.) ex Mex. et Am. centr. ad Brasil.
- 8 *erythronotus* (King) ex Boliv. rep. Arg. Chilia et Patagonia.
- 9 *poliosoma* (Quoy et Gaim.) ex inns. Falkland. Chilia et Patagonia.

Genus VI.—BUTEOGALLUS.

- 1 *cequinoctialis* (Gm.) ex Panama. et Am. merid. trop.
- 2 *nigricollis* (Lath.) ex Guat. Am. centr. et merid. ad Brasil.

Genus VII.—URUBITINGA.

- 1 *zonura* (Shaw) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Brasil.
- 2 *anthracina* (Nitzsch) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Amazon.
- 3 *uniceincta* (Temm.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad remp. Arg.
- 4 *meridionalis*, Lath. ex Panama et Am. merid. ad remp. Arg.

Genus VIII.—LEUCOPTERNIS.

- 1 *ghiesbreghti* (Du Bus) ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 2 *palliata* (Pelz.) ex Brasilia.
- 3 *scotoptera* (Max.) ex Brasilia.
- 4 *albicollis* (Lath.) ex Guian. Amaz. Venez. et ins. Trinit.
- 5 *melanops* (Lath.) ex Guiana et Amazonia.
- 6 *superciliaris* (Pelz.) ex Amazonia inf.
- 7 *semiplumbea* (Lawr.) ex Costarica et Panama.
- 8 *princeps*, Sclater, ex Costarica.
- 9 *schistacea* (Sund.) ex Amazonia et Columbia.
- 10 *plumbea*, Salv. ex Æquatoria.

Genus IX.—GERANOÆTUS.

- 1 *melanoleucus* (Vieill.) ex Columb. Peruv. Brasil. Chilia. rep. Arg. et Patagonia.

Genus X.—HARPYPHALLÆTUS.

- 1 *coronatus* (Vieill.) ex Brasil. merid. rep. Arg. et Patagonia.

Genus XI.—URUBITORNIS.

- 1 *solitaria* (Tsch.) ex Peruv. Columb. et Veragua.

Genus XII.—THRASAETUS.

- 1 *harpyia* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Brasil.

Genus XIII.—MORPHINUS.

- 1 *guianensis* (Daud.) ex Panama et Am. merid. ad Brasil.

Genus XIV.—SPIZAETUS.

- 1 *ornatus* (Daud.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Parguay.
- 2 *tyrannus* (Max.) ex Guat. Am. centr. et merid. ad Brasil.
- 3 *melanoleucus* (Vieill.) ex Guat. Am. centr. et merid. ad Brasil.
- 4 *isidori* (Des Murs) ex Columbia.

Subfam. IV.—ACCIPITRINÆ.

Genus XV.—ACCIPITER.

- 1 *pileatus* (Temm.) ex Brasilia.
- 2 *bicolor* (Vieill.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Amazoniam.
- 3 *coopcri* (Bp.) ex Mex et Am centr. ad Costaricam.
- *4 *gundlachi*, Lawr. ex Cuba.
- 5 *guttatus* (Vieill.) ex Boliv. et Paraguaya.
- 6 *chilensis*, Ph. et Landb. ex Chilia et Patagonia.
- *7 *pectoralis*, Bp. ex Brasil. et Amazonia.
- 8 *fuscus* (Gm.) ex Mex. et Am. centr. ad Veraguam.
- *9 *fringilloides* (Vig.) ex Cuba.
- 10 *erythroenemis*, ScL. ex Brasilia.
- 11 *ventralis*, ScL. ex Venezuela, Columbia et Æquatoria.
- 12 *chionogaster*, Kaup, ex Guatemala et Venezuela.
- 13 *tinus* (Lath.) ex Veragua, et Am. merid. ad Brasil.
- 14 *collaris*, ScL. ex Columbia.
- *15 *castanius*, Bp. ex Columbia litt.

Genus XVI.—MICRASTUR.

- 1 *semitorquatus* (Vieill.) ex Guat. Am. centr. et merid. ad Brasil.
- 2 *mirandollii* (Schl.) ex Amazon. sup.
- 3 *ruficollis* (Vieill.) ex Brasilia.
- 4 *zonothorax* (Cab.) ex Venezuela et Columbia.
- 5 *gilvicollis* (Vieill.) ex Guiana, Amazon. et Bolivia.
- 6 *leucauchen* (Temm.) ex Brasilia.
- 7 *guerilla*, Cassin, ex Mex. Am. centr. et Æquator. oce.

Genus XVII.—GERANOSPIZA.

- 1 *cærulescens* (Vieill.) ex Brasil. merid. et Paraguay.
- 2 *hemidactyla* (Temmin.) ex Guiana et Amazonia.
- 3 *nigra* (Du Bus) ex Mex. et Am. centr. ad Veraguam.

Subfam. V.—FALCONINÆ.

Genus XVIII.—FALCO.

- 1 *pergrinus* (Linn.) ex reg. Neotr. univ.
- 2 *mexicanus*, Schlegel, ex Mexico.
- 3 *deioleucus*, Temmin. ex Guatem. Am. centr. et merid. ad Brasil.

Genus XIX.—HYPOTRIORCHIS.

- 1 *columbarius* (Linn.) ex Antill. Mex. Am. centr. et Venezuela.
- 2 *femorialis* (Temmin.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad remp. Arg.
- 3 *rufigularis* (Daud.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad remp. Arg.

Genus XX.—TINNUNCULUS.

- 1 *sparverius* (Linn.) ex reg. Neotr. universa.
- 2 *leucophrys*, Ridgway, ex Cuba et Hayti.
- 3 *sparveroides* (Vigors) ex Cuba.

Subfam. VI.—MILVINÆ.

Genus XXI.—ELANOIDES.

- 1 *furcatus* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Brasil.

Genus XXII.—ELANUS.

- 1 *leucurus* (Vieill.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Chilian.

Genus XXIII.—GAMPSONYX.

- 1 *sicainsoni*, Vig. ex Am. merid. trop.

Genus XXIV.—ROSTRHAMUS.

- *1 *sociabilis* (Vieill.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad remp. Arg.
- *2 *leucopygus* (Spix) ex Brasil.
- *3 *teniurus*, Cab. ex Amazonia.

Genus XXV.—CYMINDIS.

- 1 *cayensis* (Gm.) ex Guat. Am. centr. et merid. ad Brasil.
- 2 *uncinatus* (Temmm.) ex Guat. Am. centr. et merid. ad Brasil.
- *3 *wilsoni* Cassin, ex Cuba.
- 4 *megarhynchus* (Des Murs) ex Amazon. sup.

Genus XXVI.—ICTINIA.

- 1 *plumbea* (Vieill.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Brasil.
- 2 *mississippiensis* (Wilson) ex Guatemala.

Genus XXVII.—HARPAGUS.

- 1 *diodon* (Temmm.) ex Brasilia.
- 2 *bidentatus* (Lath.) ex Guiana, Amazonia, Venezuela et Columbia.
- 3 *fasciatus*, Lawr. ex Guat. et Am. centr. ad Panama.

Genus XXVIII.—SPIZIAPTERYX.

- *1 *circumcinctus* (Kaup.) ex rep. Arg.

Subfam. VII.—HERPETOTHERINÆ.

Genus XXIX.—HERPETOTHERES.

- 1 *cachinnans*, Vieill. ex Guat. Am. centr. et Am. merid. ad Brasil.

Subfam. VIII.—POLYBORINÆ.

Genus XXX.—IBYCTER.

- 1 *americanus* (Bodd.) ex Guat. et Am. centr. ad Brasil.
- 2 *formosus* (Lath.) ex Brasilia.
- 3 *ater* (Vieill.) ex Columb. Guiana et Amazonia.

Genus XXXI.—MILVAGO.

- 1 *chimango* (Vieill.) ex rep. Arg. Chilia et Patagonia.
- 2 *chimachima* (Vieill.) ex Veragua et Am. merid. ad Brasil.
- 3 *australis* (Gm.) ex inss. Falkland.
- 4 *carunculatus* (Des Murs) ex Columb. et Æquatoria.
- 5 *megaloptyrus* (Meyen) ex Boliv. Peruv. et Chilia.
- *6 *albigularis* (Gould) ex Patagonia.

Genus XXXII.—POLYBORUS.

- 1 *tharus* (Mol.) ex Am. merid. ferè universa.
- 2 *auduboni*, Cassin, ex Mexico, Guatem. et Cuba.

Fam. II.—CATHARTIDÆ.

Genus I.—CATHARTES.

- 1 *aura* (Linn.) ex reg. Neotr. ferè universa.
- 2 *urubitinga*, Pelzeln, ex Guiana, Amazonia, et Brasil.
- 3 *atratus* (Bartr.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad remp. Arg.

Genus II.—GYPARCHUS.

- 1 *papa* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. trop.

Genus III.—SARCORHAMPHUS.

- 1 *gryphus* (Linn.) ex Andibus a Columbia ad Patagoniam.

////////////////////////////////////

Ordo VIII.—STEGANOPODES.

Fam. I.—FREGATIDÆ.

Genus I.—FREGATA.

- 1 *aquila* (Linn.) ex oris Americæ centr. et merid. inter-trop.

Fam. II.—PHAETHONTIDÆ.

Genus I.—PHAETHON.

- 1 *æthereus* (Linn.) ex oris Am. merid. inter-trop.
- 2 *flavirostris*, Brandt, ex oris Am. centr. et Antilibus.

Fam. III.—PELECANIDÆ.

Genus I.—PELECANUS.

- 1 *trachyrhynchus*, Lath. ex Mexico et Am. centr.
- 2 *fuscus* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et merid. Am.trop.
- *3 *molince*, Gray, ex oris Chiliæ et Peruviæ.

Genus II.—SULA.

- 1 *fiber* (Linn.) ex oris Am. intertropicæ.
- *2 *variegata*, Tsch, ex oris Peruv. Boliv. et Chiliæ.
- 3 *piscator* (Linn.) ex sinu Mexicano.

Fam. IV.—PHALACROCORACIDÆ.

Genus I.—PHALACROCORAX.

- 1 *brasilianus* (Gm.) ex Am. centr. et Am. merid. tota.
- 2 *mexicanus* (Brandt) ex Mex. Guat. et Cuba.
- 3 *floridanus* (Aud.) ex Cuba.
- 4 *gaimardi* (Garnot) ex Chilia.
- *5 *bougainvillii* (Less.) ex Peruv. et Chilia.
- 6 *earunculatus* (Gm.) ex fr. Magell. inss. Falkland. et Chilia.
- 7 *magellanicus* (Gm.) ex fr. Magell. inss. Falkland. et Chilia.

Fam. V.—PLOTIDÆ.

Genus I.—PLOTUS.

- 1 *anhinga*, Linn. ex Am. centr. et merid. intertropica.

Ordo. IX.—HERODIONES.

Fam. I.—ARDEIDÆ.

Genus I.—ARDEA.

- 1 *cocoi*, Linn. ex Am. merid. ferè universâ.
- 2 *herodias*, Linn. ex Mex. Am. centr. Antill. et Venezuela.
- 3 *occidentalis*, Aud. ex Cuba.
- 4 *egretta* (Gm.) ex reg. Neotr. ferè universâ.
- 5 *candidissima* (Gm.) ex reg. Neotr. ferè universâ.
- 6 *rufa* (Bodd.) ex Mex. Guat. et Cuba.
- 7 *ludoviciana*, Wilson, ex Mex. Guat. et Antill.
- *8 *leucogastra* (Bodd.) ex Guiana et Amazonia.
- 9 *cœrulea* (Linn.) ex Mex. Antill. et Am. centr. ad Panama.
- 10 *sibilatrix* (Temm.) ex Brasil. et rep. Arg.
- 11 *agami*, Linn. ex Guat. Am. centr. et Am. merid. trop.

Genus II.—BUTORIDES.

- 1 *virescens* (Linn.) ex Mex. et Am. centr.
- 2 *cyanurus* (Vieill.) ex Am. merid.
- 3 *plumbeus* (Sund.) ex inss. Galapag.

Genus III.—ARDETTA.

- 1 *exilis* (Gm.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Brasil.
- 2 *involueris* (Vieill.) ex rep. Arg. et Chilia.

Genus IV.—BOTAURUS.

- 1 *lentiginosus* (Mont.) ex Mex. Am. centr. et Guiana.
- 2 *pinnatus* (Wagl.) ex Nicaragua, et Am. merid. ad Brasil.

Genus V.—TIGRISOMA.

- 1 *brasiliense* (Linn.) ex Panama et Am. merid. univ.
- 2 *fasciatum* (Such) ex Brasilia.
- 3 *cabanisi*, Heine, ex Mex. Guat. et Honduras.

Genus VI.—ZEBRILUS.

- *1 *pumilus* (Bodd.) ex Guiana.

Genus VII.—NYCTICORAX.

- 1 *gardeni* (Gm.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Brasil.
- 2 *obscurus*, Bp. ex Peruv. alta, rep. Arg. Patagon. et inss. Falkl.
- 3 *violaceus* (Linn.) ex Am. centr. et merid. inter-trop.
- 4 *pauper*, Scl. et Salz. ex inss. Galapag.
- 5 *pileatus* (Bodd.) ex Am. merid. intertrop.

Genus VIII.—CANCROMA.

- 1 *cochlearia*, Linn. ex Am. centr. et merid. inter-trop.

Fam. II.—CICONIIDÆ.

Genus I.—MYCTERIA.

- 1 *americana* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad rep. Arg.

Genus II.—CICONIA.

- 1 *maguari* (Gm.) ex Am. merid.

Genus III.—TANTALUS.

- 1 *loculator*, Linn. ex Mex. et Am. centr. et merid. inter-trop.

Fam. III.—PLATALEIDÆ

Subfam. I.—IBIDINÆ.

Genus I.—IBIS.

- 1 *rubra* (Linn.) ex Am. centr. et merid. trop.
- 2 *alba* (Linn.) ex Am. centr. et merid. trop.

Genus II.—FALCINELLUS.

- 1 *agneus* (Gm.) ex reg. Neotr. universa.

Genus III.—THERISTICUS.

- 1 *melanopsis* (Gm.) ex Am. merid. ferè universa.

Genus IV.—HARPIPRION.

- 1 *cayennensis* (Gm.) ex Panama et Am. merid. ad Brasil.
 2 *cœrulescens* (Vieill.) ex Brasil. merid. et rep. Arg.

Genus V.—PIIMOSUS.

- 1 *infuscatus* (Licht.) ex Am. merid. a Columbia ad remp. Arg.

Genus VI.—CERCIBIS.

- 1 *oxycerca* (Spix) ex Columb. Amaz. Guiana et Brasil.

Subfam. II.—PLATALEINÆ.

Genus VII.—PLATALEA.

- 1 *ajaja* (Linn.) ex Am. centr. et merid. intertropica.

Fam. IV.—PHŒNICOPTERIDÆ.

Genus I.—PHŒNICOPTERUS.

- *1 *ruber* (Linn.) ex Mexico.
 2 *ignipalliatu*s (Geoffr. et d'Orb.) ex rep. Arg. et Chilia.
 *3 *glyphorhynchus*, Gray, ex inss. Galapag.
 *4 *andinus*, Philippi, ex Andibus Chilens.

Ordo. X.—ANSERES.

Fam. I.—PALAMEDEIDÆ.

Genus I.—PALAMEDEA.

- 1 *cornuta*, Linn. ex Guiana et Amazonia.

Genus II.—CHAUNA.

- 1 *chavaria* (Linn.) ex rep. Arg. Paraguay et Brasil. merid.
- 2 *derbiana*, Gray, ex Columbia litt.

Fam. II.—ANATIDÆ.

Genus I.—ANSER.

- 1 *hyperboreus*, Pall. ex Am. sept. et Antill.
- 2 *cærulescens*, Linn. ex Am. sept. et Antill.
- 3 *gambelli*, Hartl. ex Am. sept. et Antill.

Genus II.—BERNICLE.

- 1 *canadensis* (L.) ex Am. sept. et Antill.
- 2 *melanopectera*, Eyton. ex Peruv. Bolivia et Chilia.
- 3 *antarctica* (Gm.) ex Patagonia et ins. Falkl.

Genus III.—CHLOEPHAGA.

- 1 *magellanica* (Gm.) ex Chilia, Patag. et ins. Falkl.
- 2 *inornata* (King) ex Patagonia.
- 3 *poliocephala*, Scl. ex Chilia, Patag. et ins. Falkl.
- 4 *rubidiceps*, Scl. ex ins. Falkl.

Genus IV.—CHENALOPEX.

- 1 *jubata* (Spix) ex Amazonia.

Genus V.—CYGNUS.

- 1 *nigricollis* (Gm.) ex Bras. merid. rep. Argent. Chilia, Patag. et inss. Falkl.
- 2 *coscoroba*, Mol. ex rep. Argent. Chil. Patag. et inss. Falkl.

Genus VI.—DENDROCYGNA.

- 1 *fulva* (Gm.) ex Mex. Venez. Bras. merid. Parag. et rep. Argent.
- 2 *autumnalis* (Linn.) ex Mex. et Am. centr. tota.
- 3 *discolor*, sp. nov. xxv. ex Venez. Guian. et Bras. merid.
- 4 *arborea* (Linn.) ex Antill.
- 5 *viduata* (Linn.) ex Columb. Venez. Guian. Amaz. Brasil. et Parag.

Genus VII.—SARCIDIORNIS.

- 1 *melanonota* (Gm.) ex Paraguay et Guiana.

Genus VIII.—CAIRINA.

- 1 *moschata* (Linn.) ex Am. merid. trop. universa.

Genus IX.—ANAS.

- 1 *boschas*, Linn. ex Am. sept. Mex. et Antill.
- 2 *obscura*, Gm. ex Am. sept. et Antill.
- 3 *chalcoptera*, Kittl. ex Chilia et Patag.
- 4 *cristata*, Gm. ex Peruv. Boliv. Chil. Patag. et inss. Falkl.
- 5 *strepera*, Linn. ex Am. sept. et Antill.
- 6 *melanocephala*, Vieill. ex rep. Argent. et Chilia.

Genus X.—QUERQUEDULA.

- 1 *carolinensis* (Gm.) ex Am. sept. Mex. et Antill.
- 2 *discors* (Linn.) ex Am. sept. Mex. Am. centr. et Antill.
- 3 *cyanoptera* (Vieill.) ex inss. Falkl. Patag. Chil. rep. Argent. Columb. et Mex.
- 4 *torquata* (Vieill.) ex rep. Argent.
- 5 *brasiliensis* (Gm.) ex Boliv. Bras. merid. Parag. et rep. Argent.
- 6 *oxyptera* (Meyen) ex Peruv.
- 7 *flavirostris* (Vieill.) ex rep. Arg. Chil. Patag. et inss. Falk.
- 8 *andium*, sp. nov. xxvi, ex Æquatoria.
- 9 *versicolor* (Vieill.) ex rep. Argent. Chil. Patag. et inss. Falkl.
- 10 *puna* (Tsch.) ex Peruv. et Bolivia.

Genus XI.—DAFILA.

- 1 *acuta* (Linn.) ex Antill. Mex. Guat. et Costarica.
- 2 *spinicauda* (Vieill.) ex rep. Argent. Chil. Patag. et inss. Falkl.
- 3 *bahamensis* (Linn.) ex Bras. merid. rep. Argent. Chil. et inss. Falkl.

Genus XII.—MARECA.

- 1 *americana* (Gm.) ex Mex. Am. centr. et ins. Trinit.
- 2 *chiloensis* (King) ex rep. Argent. Chilia, Patag. et inss. Falkl.

Genus XIII.—SPATULA.

- 1 *elypeata* (Linn.) ex Antill. Mex. Am. centr. et ins. Trinit.
- 2 *platalea* (Vieill.) ex rep. Argent. Chilia. et inss. Falkl.

Genus XIV.—AIX.

- 1 *sponsa* (Linn.) ex Mex.

Genus XV.—METOPIANA.

- 1 *peposaca* (Vieill.) ex rep. Argent et Chilia.

Genus XVI.—FULIX.

- 1 *affinis* (Eyton) ex Mex. Guat. Costarica et Veragua.
- 2 *collaris* (Donov.) ex Mex et Guat.

Genus XVII.—ÆTHYIA.

- 1 *americana* (Eyton) ex Mex. et Antill.
- 2 *valisneria* (Wils.) ex Guat. et Antill.

Genus XVIII.—BUCEPHALA.

- 1 *americana* (Bp.) ex Antill. (raro).
- 2 *albeola* (Linn.) ex Antill. (raro) et Mex.

Genus XIX.—CEDEMIA.

- 1 *perspicillata* (Linn.) ex Antill. (raro).

Genus XX.—MICROPTERUS.

- 1 *cinereus* (Gm.) ex inss. Falkl. et Patagonia.

Genus XXI.—ERISMATURA.

- 1 *rubida* (Wils.) ex Jamaica, Mex. et Guatemala.
- 2 *ferruginea*, Eyton, ex Peruv. Chil. et rep. Argent.
- 3 *dominica* (Linn.) ex Antill. Mex. Venez. Guian. Amaz. Bras. et rep. Arg.

Genus XXII.—MERGANETTA.

- 1 *armata*, Gould, ex Chilia.
- 2 *turneri*, Scl. & Salv. ex Peruv. alta.
- 3 *leucogenys*, Tsch. ex Peruv. Æquat. et Columb.

Genus XXIII —MERGUS.

- 1 *cucullatus*, Linn. ex Antill. et Mex.
 - 2 *brasiliensis*, Vieill. ex Bras. merid.
-

Ordo XI.—COLUMBÆ.

Fam. I.—COLUMBIDÆ.

Genus I.—COLUMBA.

- 1 *leucocephala*, Linn. ex Antill. et Honduratia Brit.
- 2 *corensis*, Gm. ex Antillibus.
- 3 *caribæa*, Linn. ex Jamaica et Portorico.
- 4 *speciosa*, Gm. ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Brasiliam.
- *5 *gymnophthalma*, Temm. ex Brasilia int.
- 6 *picazuro*, Temm. ex Brasil. merid. Paraguay et rep. Arg.
- 7 *maculosa*, Temm. ex Peruv. Boliv. Parag. et rep. Arg.
- 8 *fasciata*, Say, ex Mex. et Guatemala.
- 9 *albilineata*, Gray, ex Æquat. Columb. Veragua et Costarica.
- 10 *araucana*, Lesson, ex Chilia.
- 11 *flavirostris*, Wagler, ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.
- 12 *rufina* (Temm.) ex Guat. Am. centr. et merid. ad Brasil.
- 13 *inornata*, Vigors, ex Jamaica et Hayti.
- 14 *plumbea*, Vieill. ex Brasil. Peruv. et Columbia.
- 15 *nigrirostris*, Scl. ex Mex. et Am. centr. ad Panama.
- 16 *subvinacea*, Lawrence, ex Costarica, Veragua, Columb. et Æquatoria.
- 17 *vinacea* (Temm.) ex Peruv. et Bolivia.

Genus II.—ZENAUDURA.

- 1 *carolinensis* (Linn.) ex Mex. et Am. centr. ad Veraguam.

Genus III.—ZENAIDA.

- 1 *amabilis*, Bp. ex Antillibus.
- *2 *martinicana*, Bp. ex Antill. min.
- 3 *maculata* (Vieill.) ex Brasil. rep. Arg. Chilia, Peruv. et Æquatoria.
- 4 *ruficauda*, Bp. ex Venezuela et Columbia.
- 5 *galapagensis*, Bp. ex inss. Galapag.

Genus IV.—METRIOPELIA.

- 1 *melanoptera* (Mol.) ex Am. merid. transand. ab Æquator. ad Chilian.
- 2 *aymara* (Knip et Prévost) ex Bolivia et Peruvia.

Genus V.—MELOPELIA.

- 1 *leucoptera* (Linn.) ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.
- *2 *meloda* (Tsch.) ex Chilia et Peruv. occ.

Genus VI.—SCARDAFELLA.

- 1 *squamosa* (Temm.) ex Brasilia.
- 2 *inca* (Less.) ex Mex. et Guatemala.

Genus VII.—COLUMBULA.

- 1 *picui* (Temm.) ex Brasil. Parag. rep. Arg. Chilia et Bolivia.
- 2 *campestris* (Spix) ex Brasil. int.

Genus VIII.—CHAMÆPELIA.

- 1 *passerina* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Brasil.
- 2 *griseola* (Spix) ex Brasil. Amazon. et Columb. ad Panama.
- 3 *talpacoti* (Temm.) ex Brasil. Paraguaya et Bolivia.
- 4 *rufipennis*, Bp. ex Venez. Columb. et Am. centr. ad Guatemalam.
- 5 *cruziana* (Knip et Prév.) ex Peruv. et Æquator. occ.

Genus IX.—GYMNOPELIA, GEN. NOV. VII.

- 1 *erythrothorax* (Meyen) ex Boliv. et Peruv. occ.

Genus X.—PERISTERA.

- 1 *cinerea* (Temm.) ex Guat. et Am. centr. et merid. ad Brasil.
- 2 *geoffroyi* (Temm.) ex Brasilia.
- 3 *mondetoura*, Bp. ex Peruvia, Venezuela, Costarica et Mexico.
- 4 *cyanopis*, Pelzeln, ex Brasil. int.

Genus XI.—LEPTOPTILA.

- *1 *jamaicensis* (Linn.) ex Jamaica.
- 2 *albifrons*, Bp. ex Mex et Guatemala.
- 3 *verreauxi*, Bp. ex Venez. Columb. Æquator. et Am. centr. ad Costaricam.
- 4 *ochroptera*, Pelz. ex Brasilia.
- 5 *chalcauchenia*, Sel. et Salv. ex rep. Arg.
- 6 *erythrothorax* (Temm.) ex Brasilia.
- 7 *rufaxilla* (Rich. et Bern.) ex Brasil. Amazon. Peruv. et Columb.
- 8 *plumbeiceps*, Sel. et Salv. ex Mex. et Guatemala.

- 9 *cerviniventris*, Sel. et Salv. ex Guatemala.
- 10 *cassini*, Lawr. ex Panama.
- 11 *rufinucla*, sp. nov. xxvii. ex Veragua.

Genus XII.—GEOTRYGON.

- 1 *cristata* (Temm.) ex Jamaica.
- *2 *mystacea* (Temm.) ex ins. S. Lucie.
- 3 *caniceps*, Cab. ex Cuba.
- 4 *chiriquensis*, Sclater, ex Veragua.
- 5 *linearis* (Knip et Prév.) ex Columb. et Venezuela.
- *6 *bourcier*, Bp. ex Æquatoria.
- 7 *frenata* (Tsch.) ex Peruvia.
- 8 *albifacies*, Sel. et Salv. ex Mex. et Guatemala.
- 9 *costaricensis*, Lawr. ex Costarica.
- 10 *sapphirina*, Bp. ex Æquatoria occ.
- 11 *montana* (Linn.) ex Mex. Antill. Am. centr. et Am. merid. ad Brasil.
- *12 *martinica* (Linn.) ex ins. Martinica.
- 13 *violacea* (Temm.) ex Brasilia.

Genus XIII.—STARNGENAS.

- 1 *eyanocephala* (Linn.) ex Cuba.

////////////////////////////////////

Ordo. XII.—GALLINÆ.

Subordo. I.—GALLINÆ PERISTEROPODES.

Fam. I.—CRACIDÆ.

Subfam. I.—CRACINÆ.

Genus I.—CRAX.

- 1 *gobicera*, Linn. ex Mexico et Am. centr. ad Panama.
- 2 *alector*, Linn. ex Guiana.
- 3 *slateri*, Gray, ex Paraguay et Brasil. int.
- 4 *globulosa*, Spix, ex Amaz. sup.
- 5 *daubentoni*, Gray, ex Venezuela.
- 6 *carunculata*, Temm. ex Bras. merid.
- 7 *alberti*, Fraser, ex Columbia.
- 8 *mikani*, Pelz. ex loc. ign.

Genus II.—NOTHOCRAX.

- 1 *urumutum*, Spix, ex Guiana et Amaz. sup.

Genus III.—PAUXI.

- 1 *galeata* (Lath.) ex Guiana et Venezuela.

Genus IV.—MITUA.

- 1 *tuberosa* (Spix) ex Guiana, Amaz. sup. et Peruvia.
- 2 *tomentosa* (Spix) ex Guiana.

Subfam. II.—PENELOPINÆ.

Genus V.—STEGNOLÆMA.

- 1 *montagnii* (Bp.) ex Columbia et Æquat.

Genus VI.—PENELOPE.

- 1 *purpurascens*, Wagl. ex Mexico et Guatemala.
- 2 *marail*, Gm. ex Guiana.
- 3 *greeyi*, Gray, ex Columbia.
- 4 *jacucaca*, Spix, ex Bras. orient.
- 5 *jacupeba*, Spix, ex Bras. merid.
- 6 *obscura*, Wagl. ex Paraguay.
- 7 *cristata* (Linn.) ex Guiana, Columb. Panama et Costarica.
- 8 *boliviana*, Reich. ex Amaz. sup.
- 9 *rufiventris*, Tsch. ex Bolivia et Peruvia.
- 10 *pilcata*, Wagl. ex Amazonia.
- 11 *ochrogaster*, Pelz. ex Bras. int.
- 12 *superciliaris*, Temm. ex Bras. orient.
- 13 *argyrotis* (Bp.) ex Columb. et Venez.

Genus VII.—PENELOPINA.

- 1 *nigra* (Fraser) ex Guatemala.

Genus VIII.—PIPILE.

- 1 *cumanensis* (Jacq.) ex Guiana, Venez. Columb. Peruv. et Amaz. sup.
- 2 *jacutinga* (Spix) ex Bras. orient.
- 3 *cujubi* (Pelz.) ex Amaz. inf.

Genus IX.—ABURRIA.

- 1 *carunculata*, Reich. ex Columbia.

Genus X.—CHAMÆPETES.

- 1 *goudoti* (Lesson) ex Columb. Æquat. et Peruv.
- 2 *unicolor*, Salv. ex Costarica et Veragua.

Genus XI.—ORTALIDA.

- 1 *motmot* (Linn.) ex Guiana.
- 2 *araucuan* (Spix) ex Amaz. inf.
- 3 *ruficeps*, Wagl. ex Brasilia.
- 4 *wagleri*, Gray, ex Mexico occ. sept.
- 5 *ruficauda*, Jard. ex ins. Tobago et Venezuela.
- 6 *canicollis*, Wagl. ex Paraguay.
- 7 *albiventris*, Wagl. ex Bras. orient.
- 8 *squamata*, Less. ex Bras. orient.
- 9 *caracco*, Wagl. ex Columb. et Amaz. sup.
- 10 *guttata* (Spix) ex Amaz. sup. Columb. Æquat. orient. Peruv. et Bolivia.

- 11 *superciliaris*, Gray, ex loc. ign.
- 12 *poliocephala*, Wagl. ex Mexico.
- 13 *vetula*, Wagl. ex Mex. et Guatemala.
- 14 *ruficrissa*, Sel. & Salv. ex Columbia.
- 15 *leucogastra*, Gould ex Guatemala occ. et Nicaragua.
- 16 *garrula* (Humb.) ex Columbia.
- 17 *cinereiceps*, Gray, ex Panama, Veragua et Costarica.
- 18 *erythroptera*, Sel. & Salv. ex Æquat. occ.

Subfam. III.—OREOPHASINÆ.

Genus XII.—OREOPHASIS.

- 1 *derbyanus*, Gray, ex Guatemala.

Subordo II.—GALLINÆ ALECTOROPODES.

Fam. II.—MELEAGRIDÆ.

- 1 *mexicana*, Gould, ex Mexico.
- 2 *ocellata*, Temm. ex Honduratia Brit. et Yucatan.

Fam. III.—TETRAONIDÆ.

Subfam. I.—ODONTOPHORINÆ.

Genus I.—ORTYX.

- 1 *cubensis*, Gould, ex Cuba.
- 2 *nigrogularis*, Gould, ex Hond. Brit. et Yucatan.
- 3 *leylandi*, Moore, ex Honduratia et Costarica.
- 4 *pectoralis*, Gould, ex Mexico.
- 5 *coyolcos* (Gm.) ex Mexico.

Genus II. CYRTONYX.

- 1 *massena* (Lesson) ex Mexico.
- *2 *sallæi*, Verreaux, ex Mexico.
- 3 *ocellatus*, Gould, ex Guatemala.

Genus III.—EUPSYCHORTYX.

- 1 *sonnini* (Temm.) ex Guiana et Venezuela.
- 2 *parvicristatus*, Gould, ex Columbia.
- 3 *leucotis*, Gould, ex Columbia.
- 4 *hypoleucus*, Gould, ex Guatemala.
- 5 *fasciatus*, Gould, ex Mexico.

Genus IV.—CALLIPEPLA.

- 1 *squamata*, Vigors, ex Mexico.
- 2 *elegans*, Lesson, ex Mexico.

Genus V.—DENDRORTYX.

- 1 *macrurus* (Jard. et Selby) ex Mexico.
- 2 *leucophrys* (Gould) ex Guat. et Costarica.
- 3 *barbatus*, Gould, ex Mexico.

Genus VI.—ODONTOPHORUS.

- 1 *guianensis* (Gm.) ex Guiana et Amazonia inf.
- 2 *pachyrhynchus*, Gould, ex Peruv. et Columb.
- 3 *marmoratus*, Gould, ex Columbia et Veragua.
- 4 *speciosus*, Tsch. ex Peruvia.
- 5 *dentatus*, Temm. ex Brasilia.
- 6 *columbianus*, Gould, ex Venezuela.
- 7 *stellatus*, Gould, ex Amazonia sup.
- 8 *guttatus*, Gould, ex Mex. et Am. centr. ad Veraguam.
- 9 *balliviani*, Gould, ex Bolivia et Peruvia.
- *10 *strophium*, Gould, ex Am. merid.
- 11 *leucolæmus*, Salvin, ex Costarica et Veragua.
- 12 *thoracicus*, Gambel, ex Mex. et Guatemala.
- *13 *erythrops*, Gould, ex Æquatoria.
- 14 *melanotis*, Salvin, ex Nicaragua, Costarica et Veragua.
- *15 *melanonotus*, Gould, ex Æquatoria.
- 16 *hyperythrus*, Gould, ex Columbia.
- 17 *hypospodius*, sp. nov. xxviii, ex Columbia.

////////////////////////////////////

Ordo XIII.—OPISTHOCOMI.

Fam. I.—OPISTHOCOMIDÆ.

Genus I.—OPISTHOCOMUS.

- 1 *cristatus* (Lath.) ex Guiana et Amazonia.

Ordo. XIV.—GERANOMORPHÆ.

Subordo I.—FULICARIÆ.

Fam. I.—RALLIDÆ.

Genus I.—RALLUS.

- 1 *maculatus*, Bodd. ex Guiana, Amaz. inf. Bras. Paraguay, Columb. et Cuba.
- 2 *elegans*, Aud. ex Mexico, et Cuba.
- 3 *longirostris*, Bodd. ex Bras. Guian. et Antill.
- 4 *virginianus*, Linn. ex Mexico, Guatemala et Æquat.
- 5 *antarcticus*, King, ex Chilia.
- 6 *semiplumbeus*, Scl. ex Columbia.
- 7 *rythyrhynchus*, Vieill. ex rep. Argent. Paraguay, Bras. merid. Peruv. et Chilia.
- 8 *nigricans*, Vieill. ex Bras. merid. et Paraguay.

Genus II.—ARAMIDES.

- 1 *cayennensis* (Gm.) ex Panama, Columb. ins. Trin. Guiana, Bras. merid. et Paraguay.
- 2 *albiventris*, Lawr. ex Mex. Guat. et Honduras.
- 3 *ypecaha* (Vieill.) ex Parag. rep. Argent. et Bras. merid.
- 4 *ruficollis* (Gm.) ex Guiana.
- 5 *saracura* (Spix) ex Paraguay, et Bras. merid.
- 6 *axillaris*, Lawr. ex Venez. Columb. Guian. et Hond. Brit.
- 7 *mangle* (Spix) ex Bras. merid. orient.

Genus III.—PORZANA.

- 1 *carolina* (Linn.) ex Mexico, Guat. Panam. Jamaica, Cuba, et ins. Trinit.
- 2 *albicollis* (Vieill.) ex Paraguay, Bras. merid. Guian. et Venezuela.
- 3 *cayennensis* (Gm.) ex Guiana, Amazonia, et Brasilia.
- 4 *leuraudi*, Scl. et Salv. ex Venezuela.
- 5 *rubra*, Scl. et Salv. ex Guatemala.

- 6 *concolor* (Gosse) ex Jamaica, Guatemala et Brasilia.
- *7 *castaneiceps*, Scl. & Salv. ex Æquat. orient.
- 8 *hauzwelli*, Scl. & Salv. ex Amaz. sup.
- 9 *melanophæa* (Vieill.) ex Bras. merid. Parag. Bolivia et Venezuela.
- 10 *albigularis* (Lawr.) ex Panama, Costarica et Mosquitia.
- 11 *leucopyrrha* (Vieill.) ex Parag. rep. Argent. et Bras. merid.
- 12 *flaviventris* (Bodd.) ex Guiana, Jamaica, Cuba, Venez. Bras. et Paraguay.
- 13 *jamaicensis* (Gm.) ex Jamaica, Cuba, Guatemala, Columb. Peruv. et Chilia.
- 14 *spilonota* (Gould) ex ins. Galapag.
- *15 *ndtata* (Gould) ex rep. Argent. et Patagonia.
- 16 *cinerea* (Vieill.) ex Guiana, Amaz. Peruv. et Trinit.
- 17 *erythrope*, Scl. ex Peruv. occ.

Genus IV.—THYRORHINA.

- 1 *schomburgki* (Cab.) ex Guiana et Venezuela.

Genus V.—PORPHYRIO.

- 1 *martinicus* (Linn.) ex Am. merid. trop. ferè universa.
- 1 *parvus* (Bodd.) ex Guiana, Amaz. et Brasil. int.

Genus VI.—PORPHYRIOPS.

- 1 *melanops* (Vieill.) ex rep. Arg. Chilia, Peruv. et Columbia.

Genus VII.—GALLINULA.

- 1 *galeata* (Licht.) ex Amer. merid. ferè univers.

Genus VIII.—FULICA.

- *1 *cornuta*, Bp. ex Bolivia.
- 2 *gigantea*, Eyd. et Soul. ex Peruv. alba.
- 3 *ardesiaca*, Tsch. ex Bolivia, Peruv et Æquat.
- 4 *armillata*, Vieill. ex Bras. merid. Parag. Patag. et Chilia.
- 5 *leucopygia*, (Hartl.) ex Uruguay, Patag. inss. Falk. et Chilia.
- 6 *leucoptera*, Vieill. ex rep. Argent, Uruguay et Bolivia.
- 7 *americana*, Gm. ex Mex. Am. centr. Cuba, Jamaica, et ins. Trinit.

Fam. II.—HELIORNITHIDÆ.

Genus I.—HELIORNIS.

- 1 *fulica* (Bodd.) ex Am. trop. centr. et merid ferè universa.

Subordo II.—ALECTORIDES.

Fam. III.—ARAMIDÆ.

Genus I.—ARAMUS.

- 1 *scolopaceus* (Gm.) ex Guiana, Amazon. et Brasil. int.
- 2 *giganteus* (Bp.) ex Cuba, Mex. et Am. centr. ad Costaricam.

Fam. IV.—EURYPYGIDÆ.

Genus I.—EURYPYGA.

- 1 *helias*, Pallas, ex Guiana, Amaz. et Bras. int.
- 2 *major*, Hartlaub. ex Am. centr. et Columbia.

Fam. V.—CARIAMIDÆ.

Genus I.—CARIAMA.

- 1 *cristata* (Linn.) ex Bras. merid. et rep. Argent.

Genus II.—CHUNGA.

- 1 *burmeisteri*, Hartlaub, ex rep. Argent. int.

Fam. VI.—PSOPHIIDÆ.

Genus I.—PSOPHIA.

- 1 *crepitans*, Linn. ex Guiana.
- *2 *napensis*, sp. nov. xxix. ex Æquator. orient.
- 3 *ochroptera*, Pelzeln, ex ripis fl. Nigri, Guianæ int.
- 4 *leucoptera*, Spix, ex Amazon. sup.
- *5 *viridis*, Spix, ex ripis fl. Madeira.
- *6 *obscura*, Pelzeln, ex Amazon. inf.

Ordo. XV.—LIMICOLÆ.

Fam. I.—ÆDICNEMIDÆ.

Genus I.—ÆDICNEMUS.

- 1 *bistriatus* (Wagl.) ex Mex. Am. centr. Columbia Venezuela et Guiana.
- 2 *superciliaris*, Tsch. ex Peruvia occ.

Fam. II.—PARRIDÆ.

Genus I.—PARRA.

- 1 *jaeana* (Linn.) ex Guiana, Amaz. Brasil. et Paraguaya.
- 2 *melanopygia*, Scl. ex Columb. et Veragua.
- 3 *hypomelana*, Gray, ex Columbia, Panama et Veragua.
- 4 *gymnostoma*, Wagl. ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.

Fam. III.—CHARADRIIDÆ.

Subfam. I.—CHARADRIINÆ.

Genus I.—HOPIOPTERUS.

- 1 *cayanus* (Lath.) ex Am. centr. et merid. ferè univ.

Genus II.—VANELIUS.

- 1 *cayennensis* (Gm.) ex Am. merid. ferè univ.
- 2 *resplendens* (Tsch.) ex Andibus Peruv. et Æquator.

Genus III.—SQUATAROLA.

- 1 *helvetica* (Linn.) ex reg. Neotr. ferè univ.

Genus IV.—CHARADRIUS.

- 1 *virginicus*, Borkh, ex reg. Neotr. univ.

Genus V.—EUDROMIAS.

- 1 *modesta* (Licht.) ex rep. Arg. Patag. et inss. Falkl.

Genus VI.—ÆGIALITIS.

- 1 *vocifera* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. transand. ad Peruv.
- 2 *falklandica* (Lath.) ex Uruguay, rep. Arg. Chilia, Patag. et inss. Falkl.
- 3 *wilsonia* (Ord.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Brasil.
- 4 *semipalmata* (Bp.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Brasil.
- 5 *collaris* (Vieill.) ex Am. merid. et Am. centr. ad Guatemalam.
- 6 *nivosa* (Cass.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. transand. ad Patagoniam.

Genus VII.—OREOPHILUS.

- 1 *ruficollis* (Wagl.) ex rep. Arg. Chilia et Patagonia.

Subfam. II.—STREPSILASINÆ.

Genus VIII.—STREPSILAS.

- 1 *interpretes* (Linn.) ex reg. Neotr. ferè univ.

Genus IX.—APIRIZA.

- 1 *virgata* (Gm.) ex Am. merid. transand.

Genus X.—PLUVIANELLUS.

- *1 *sociabilis*, Hombr. et Jacq. ex fr. Magellanico.

Subfam. III.—HÆMATOPODINÆ.

Genus XI.—HÆMATOPUS.

- 1 *palliatu*s (Temm.) ex reg. Neotr. ferè univ.
2. *leucopus* (Garnot) ex inss. Falkl.
- 3 *ater* (Vieill.) ex Chilia, Patag. et inss. Falkl.

Fam. IV.—CHIONIDIDÆ.

Genus I.—CHIONIS.

- 1 *alba* (Gm.) ex inss. Falkl. et. fr. Magell.

Fam. V.—THINOCORIDÆ.

Genus I.—ATTAGIS.

- 1 *gayi*, Geoffr. et Less. ex Chilia.
- *2 *latreillii*, Lesson, ex Bolivia.
- 3 *chimborazensis*, Schl. ex And. Æquator.
- 4 *malouina* (Bodd.) ex inss. Falkl. et fr. Magell.

Genus II.—THINOCORUS.

- 1 *rumicivorus*, Eschsch. ex Chilia et rep. Arg.
- 2 *orbignyianus*, Geoffr. et Less. ex Chilia et Peruv.

Fam. VI.—SCOLOPACIDÆ.

Subfam. I.—RECURVIROSTRINÆ.

Genus I.—RECURVIROSTRA.

- 1 *americana* (Gm.) ex Mex. et Guatemala.
- *2 *andina*, Ph. et Landb. ex Peruv. alta.

Genus II.—HIMANTOPUS.

- 1 *nigricollis* (Vieill.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Brasil.
- 2 *brasiliensis*, Brehm, ex Brasil. merid. rep. Arg. et Chilia.

Subfam. II.—PHALAROPODINÆ.

Genus III.—PHALAROPUS.

- 1 *wilsoni*, Sabine, ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Chilian.
- 2 *hyperboreus* (Linn.) ex Mex. et Guatemala.

Subfam. III.—SCOLOPACINÆ.

Genus IV.—GALLINAGO.

- 1 *wilsoni* (Temm.) ex Mex. Am. centr. Venezuela et Guiana.
- 2 *paraguaiæ* (Vieill.) ex Parag. rep. Arg. Chilia et Bolivia.
- 3 *frenata* (Max.) ex Guiana, Brasil. et Am. antare.
- 4 *nobilis*, Selater, ex Columbia et Æquatoria.

- *5 *undulata* (Bodd.) ex Guiana.
- 6 *gigantea* (Temm.) ex Brasil. merid.
- *7 *stricklandi*, Gray, ex Chilia et Patagonia.
- 8 *jamesoni* (Bp.) ex Æquat. alta.
- 9 *imperialis*, Scl. et Salv. ex Columb. alta.

Genus V.—RHYNCHÆA.

- 1 *semicollaris* (Vieill.) ex rep. Arg. Chilia et Patagonia.

Genus VI.—PIEGORNIS.

- 1 *mittelli* (Fraser) ex Chilia.

Genus VII.—MACRORHAMPHUS.

- 1 *griseus* (Gm.) ex Panama et Brasilia.
- 2 *scolopaceus* (Say) ex Mex. Guatemala et Costarica.

Genus VIII.—TRINGA.

- 1 *canutus*, Linn. ex oris Guianæ et Brasilæ.
- 2 *maculata* (Vieill.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Chiliam.
- 3 *bairdi*, Coues, ex reg. Neotr. univ.
- 4 *fuscicollis* (Vieill.) ex reg. Neotr. univ.
- 5 *minutilla* (Vieill.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Brasil.

Genus IX.—CALIDRIS.

- 1 *arenaria* (Linn.) ex reg. Neotr. ferè univ.

Genus X.—EREUNETES.

- 1 *petrificatus* (Ill.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Brasil.

Genus XI.—MICROPALAMA.

- 1 *himantopus* (Bp.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Chiliam.

Genus XII.—SYMPHEMIA.

- 1 *semipalmata* (Gm.) ex Mex. Guatem. et Brasil.

Genus XIII.—GAMBETTA.

- 1 *melanoleuca* (Gm.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Brasil. et Chiliam
- 2 *flavipes* (Gm.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Chil. et Brasil.

Genus XIV.—RHYACOPHILUS.

- 1 *solitarius* (Wilson) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Brasil.

Genus XV.—HETEROSCELUS.

- 1 *brevipes* (Vieill.) ex inss. Galapag.

Genus XVI.—TRINGOIDES.

- 1 *macularius* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Brasil.

Genus XVII.—ACTITURUS.

- 1 *bartramius* (Wils.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Brasil.

Genus XVIII.—TRYNGITES.

- 1 *rufescens* (Vieill.) ex Am. merid. ad Brasil.

Genus XIX —LIMOSA.

- 1 *hudsonica* (Lath.) ex reg. Neotr. univ.
2 *fedoa* (Linn.) ex Mex. et Guatem.

Genus XX.—NUMENIUS.

- 1 *longirostris* (Wils.) ex Mex. et Guatemala.
2 *hudsonicus* (Lath.) ex reg. Neotr. univ.
3 *borealis* (Forst.) ex Am. centr. et Am. merid. ad Brasil.

////////////////////////////////////

Ordo XVI.—GAVIÆ.

Fam. I.—LARIDÆ.

Subfam I.—RHYNCHOPINÆ.

Genus I.—RHYNCHOPS.

- 1 *nigra*, Linn. ex oris Am. centr. et merid. et fl. Amaz.

Subfam. II.—STERNINÆ.

Genus I.—ANOUS.

- 1 *stolidus*, Linn. ex oris Am. centr. et merid.
- 2 *tenuirostris* (Temmin.) ex Hond. Brit. et ins. Trinit.

Genus II.—NÆNIA.

- 1 *inca* (Less.) ex Peruv. et Chilia.

Genus III.—PHAETHUSA.

- 1 *magnirostris* (Licht.) ex Guian. Amaz. Bras. merid. Parag. et Peruv.

Genus IV.—STERNA.

- 1 *maxima*, Bodd. ex Antill. Am. centr. Guian. Bras. rep. Arg. et Peruv.
- 2 *galericulata*, Licht. ex Mex. Hond. ins. Trinit. Bras. et Peruv.
- 3 *cantiaca* (Gm.) ex Cuba, et Am. centr.
- 4 *forsteri*, Nutt. ex Guat. et Brasilia.
- 5 *trudeauii*, Aud. ex Bras. et Chil.
- 6 *cassini*, Scl. ex inss. Falkl. Bras. et Chilia.
- 7 *dougalli*, Mont. ex Antill. Guat. et ins. Trinit.
- 8 *superciliaris*, Vieill. ex Parag. rep. Arg. Bras. Amaz. et Columb.
- 9 *antillarum*, Less. ex Cuba, ins. Trinit. et Hond. Brit.
- 10 *exilis*, Tsch. ex Peruv. et Chilia.

Genus V.—GELOCHELIDON.

- 1 *anglica* (Mont.) ex Antill. Am. centr. et Brasilia.

Genus VI.—ONYCHOPRION.

- 1 *fuliginosus* (Gm.) ex Antill. Am. centr. et Chilia.
- 2 *panayensis* (Gm.) ex Antill. et Am. centr.

Genus VII.—HYDROCHELIDON.

- 1 *fissipes* (Linn.) ex Antill. Am. centr. et Chilia.

Subfam. III.—LARINÆ.

Genus VIII.—LARUS.

- 1 *modestus*, Tsch. ex oris Am. merid. oec.
- 2 *fuliginosus*, Gould. ex inss. Galapagensibus.
- 3 *heermanni*, Cass. ex Mex. et Guatemala.
- 4 *beleheri*, Vig. ex Peruvia et Patagonia.
- 5 *argentatus*, Brünn. ex Cuba.
- 6 *dominicanus*, Licht. ex Bras. rep. Arg. inss. Falkl. et Chilia.
- 7 *atricilla*, Linn. ex Antill. Am. centr. et Guiana.
- 8 *serranus*, Tsch. ex Peruvia, Boliv. et rep. Argent.
- 9 *franklini*, Sw. ex Mex. Guat. et Chilia.
- 10 *glaucodes*, Meyen, ex Chilia, Patag. et inss. Falkl.
- 11 *maculipennis*, Licht. ex rep. Argent.
- 12 *eirrhoecephalus*, Vieill. ex Brasil. et rep. Argent.

Genus IX.—LEUCOPHÆUS.

- 1 *scoresbii*, ex Chilia, Patag. et inss. Falkl.

Subfam. IV.—LESTRIDINÆ.

Genus X.—LESTRIS.

- 1 *antarcticus*, Less. ex Patag. et inss. Falkl.

Fam. II.—PROCELLARIIDÆ.

Subfam. I.—DIOMEDEINÆ.

Genus I.—DIOMEDEA.

- 1 *exulans* (Linn.) ex fretu. Magell. et oris Chiliæ et Peruviae.
- 2 *melanophrys* (Temm.) ex inss. Falkl. et oris Am. Antaret.

Subfam. II.—PROCELLARIINÆ.

Genus II.—PROCELLARIA.

- 1 *nereis* (Gould) ex inss. Falkland.
- 2 *oceanica*, Kuhl, ex oris Brasil.
- 3 *gracilis*, Elliot, ex oris Chiliæ.
- 4 *grallaria*, Vieill. ex oris Brasil.

Genus III.—MAJAJQUEUS.

- 1 *æquinoctialis* (Linn.) ex oris Brasil.

Genus IV.—NECTRIS.

- 1 *amaurosoma*, Coues, ex oris Chiliæ.

Genus V.—PUFFINUS.

- 1 *major*, Fabr. ex fr. Magell.
2 *kuhli*, Boié, ex oris Am. merid. occ.

Genus VI.—THALASSECA.

- 1 *glacialoides* (Smith) ex oris Am. merid. occ.
2 *antarctica* (Gm.) ex fr. Magellauico.

Genus VII.—OSSEIFRAGA.

- 1 *gigantea* (Gm.) ex inss. Falkland.

Genus VIII.—ÆSTRELATA.

- 1 *hæsitata* (Kuhl) ex Antilibus.
2 *fuliginosa* (Kuhl) ex oris Brasil.
3 *caribbaa* (Carte) ex Jamaica.

Genus IX.—DAPTION.

- 1 *capensis* (Linn.) ex oris Brasil. et Peruviae.

Genus X.—PRION.

- 1 *vittatus* (Gm.) ex oris Brasil.

Subfam. III.—HALODROMINÆ.

Genus XI.—HALODROMA.

- 1 *garnoti* (Less.) ex oris Peruv. et Chiliæ.
2 *berardi* (Q. et G.) ex inss. Falkl.

~~~~~

Ordo XVII.—PYGOPODES.

Fam. I.—PODICIPITIDÆ.

Subfam. I.—PODICIPINÆ.

Genus I.—ÆCHMOPHORUS.

- 1 *occidentalis* (Lawr.) ex Mexico.
- 2 *major* (Bodd.) ex Am merid. antaretica.

Genus II.—PODICEPS.

- 1 *californicus*, Heerm. ex Mex. et Guatem.
- 2 *caliparaeus*, Lesson, ex Boliv. Peruv. Chilia rep. Arg. Patag. et inss. Falk.
- 3 *rollandi*, Q. et G. ex Peruv. rep. Arg. Chil. et inss. Falkl.

Genus III.—TACHYBAPTUS.

- 1 *dominicus* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et merid. ad Parag.

Genus IV.—CENTROPELMA.

- 1 *micropterum* (Gould) ex lacu Titicaca, Boliv. altæ.

Subfam. II.—PODILYMBINÆ.

Genus V.—PODILYMBUS.

- 1 *podiceps* (Linn.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Brasil.
- 2 *antarcticus* (Less.) ex Chilia, And. Peruv. et Guatemala alta.

////////////////////////////////////

Ordo XVIII.—IMPENNES.

Fam. I.—APTENODYTIDÆ.

Genus I.—APTENODYTES.

- 1 *pennanti*, Gray, ex inss. Falklandicis.

Genus II.—PYGOSCELES.

- 1 *tæniatus* (Peale) ex inss. Falklandicis.

Genus III.—EUDYPTES.

- 1 *catarractes* (Forster) ex inss. Falkl.
- 2 *chrysocome* (Forst.) ex inss. Falkl.
- 3 *chrysolophus*, Brandt, ex inss. Falkl.
- 4 *diadematus*, Gould, ex inss. Falkl.

Genus IV.—SPIENISCUS.

- 1 *magellanicus* (Forst.) ex inss. Falkl. ex Patagonia.
- 2 *humboldti*, Meyen, ex Peruv.
- 3 *mendiculus*, Sund. ex inss. Galapagensibus.

////////////////////////////////////

Ordo XIX.—CRYPTURI.

Fam. I.—TINAMIDÆ.

Subfam I.—TINAMINÆ.

Genus I.—TINAMUS.

- 1 *solitarius* (Vieill.) ex Parag. et Brasilia.
- 2 *tao* (Temm.) ex Amaz. Guiana, Venez. et Columbia.
- 3 *ruficeps*, sp. nov. xxx. ex Æquator. occ. Panama et Veragua.
- 4 *robustus*, Scl. ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.
- 5 *major* (Gm.) ex Brasilia.
- 6 *suberistatus*, Cab. ex Guiana.
- 7 *guttatus*, Pelzeln, ex Amazon. sup.

Genus II.—NOTHOCERCUS.

- 1 *julius*, Bp. ex Columbia et Æquatoria.
- 2 *bonapartii* (Gray) ex Venezuela, Columb. et Costarica.
- 3 *nigricapillus*, Gray, ex loc. ign.

Genus III.—CRYPTURUS.

- 1 *cinereus* (Gm.) ex Guiana et Amazonia.
- 2 *obsoletus* (Temm.) ex Brasil. et Paraguaya.
- 3 *castaneus* (Scl.) ex Columbia.
- 4 *pileatus* (Bodd.) ex Mex. Am. centr. et Am. merid. ad Brasil.
- 5 *tataupa* (Temm.) ex Brasil. merid. et Paraguay.
- 6 *cerviniventris*, Scl. et Salv. ex Venezuela.
- 7 *parvirostris*, Wagl. ex Brasilia.
- 8 *strigulosus* (Temm.) ex Brasilia.
- 9 *erythropus* (Pelz.) ex Guiana int.
- 10 *boucardi*, Scl. ex Mex. et Am. centr. ad Costaricam.
- 11 *sallæi*, Bp. ex Mex. Am. centr. Columb. et Venezuela.
- 12 *noctivagus* (Max.) ex Brasilia.
- 13 *variegatus* (Gm.) ex Guiana et Amazon. inf.
- 14 *bartletti*, Scl. et Salv. ex Amazon. sup.
- *15 *radiatus*, Gray, ex Bolivia.
- 16 *undulatus* (Temm.) ex Brasil. et Amazon.

Genus IV. RHYNCHOTUS.

- 1 *rufescens* (Temm.) ex Brasil. merid. Parag. et rep. Arg.
- *2 *maculicollis*, Gray, ex Bolivia.

Genus V.—NOTHOPROCTA, GEN. NOV. VIII.

- 1 *perdicaria* (Kittl.) ex Chilia.
- *2 *ornata* (Gray) ex Bolivia.
- *3 *pentlandi* (Gray) ex Bolivia.
- 4 *curvirostris*, sp. nov. xxxi. ex Æquatoria.

Genus VI.—NOTHURA.

- 1 *maculosa* (Temm.) ex Brasil. merid. Parag. et rep. Arg.
- *2 *marmorata*, Gray, ex Bolivia.
- 3 *boraquira* (Spix) ex Brasil. Parag. et rep. Arg.
- 4 *media* (Spix) ex Brasil.

Genus VII.—TAXONISCUS.

- 1 *nanus* (Temm.) ex Brasil. et Paraguaya.

Subfam. II.—TINAMOTINÆ.

Genus VIII.—CALODROMAS, GEN. NOV. IX.

- 1 *elegans* (d'Orb. et Is. Geoffr.) ex rep. Argentina.

Genus IX.—TINAMOTIS.

- 1 *pentlandi*, Vigors, ex. Andibus Boliv. et Peruvie.

////////////////////////////////////

Ordo XXI.—STRUTHIONES.

Fam. I.—RHEIDÆ.

Genus I.—RHEA.

- 1 *americana*, Lath. ex Brasil int. rep. Arg. et Patagonia.
- 2 *macrorhyncha*, Sclater, ex Am. merid. loc. ign.

Genus II.—PTEROCNEMIS.

- 1 *darwini* (Gould) ex Patagonia.

////////////////////////////////////

APPENDIX,

CONTINENS DIAGNOSES GENERUM ET SPECIERUM, QUORUM NOMINIBUS
IN HOC OPERE PRO PRIMA VICE USI SUMUS.

I.—DIAGNOSES GENERUM NOVORUM.

I.—UROPSILA, gen. nov. p. 7 (ὤρος, *cauda* et ψιλός, *tenuis*).

Genus cauda exili, ferè sicut in *Henicorhino*, satis insignis, sed naribus, sicut in *Thryothoro*, membranâ obtectis.

Typus, U. LEUCOGASTRA, i.e. *Troglodytes leucogastra*, Gould, P.Z.S. 1836, p. 89 :
Cyphorinus pusillus, Selater, P.Z.S. 1859, p. 372, ex Mexico.

II.—PHILOGOTHRAUPIS, gen. nov. p. 21 (φλόγος, *flamma* et θραύπις, nom. propr.)

Differt a *Ramphocelo* mandibula ad basin non incrassata nec denudata, et sexibus inter se similibus.

Typus, P. SANGUINOLENTA, i.e. *Tanagra* (*Tachyphonus*) *sanguinolentus*, Less. ex America centr.

III.—PORPHYROSPIZA, gen. nov. p. 30 (πορφύρα, *purpur* et σίζα, *fringilla*).

A *Cyanospiza*, cujus coloribus gaudet, rostro graciliore, longiore, sicut in genere *Coryphospingo* formato, diversa, et huic generi magis approximanda.

Typus, P. CYANELLA i.e. *Cyanospiza cyanella*, Pelzeln, Orn. Bras. p. 227, ex Brasilia.

IV.—CLIBANORNIS gen. nov. p. 61 (κλίβανος, *furnus* et ὄρνις, *avis*).

Genus affine *Furnario*, sed cauda elongata rigida, et rostro longiore diversum : nares, sicut in *Furnario*, patulae.

Typus, C. DENDROCOLAPTOIDES, i.e. *Anabates dendrocolaptoides*, Temm. M. S. et Pelzeln, Sitz. Wien. Ak. xxxiv. p. 104, ex Brasilia.

V.—MICROBATES, gen. nov. p. 72 (μικρός, *parvus* et βατήρ, *qui incedit*).

Habitus generalis *Ramphocæni*; rostro paulo crassiore at ferè simili : sed cauda brevissima, alas haud superante, primo visu distinguenda.

Typus, M. TORQUATUS, sp. nov. quam vide infra.

VI.—NESOCELEUS, gen. nov. p. 101.

Genus propter nares omnino denudatas *Celeinis* adjungendum, quamvis habitu generali *Colapti* magis simile.

Typus, N. FERNANDINÆ, i.e. *Colaptes fernandinæ*, Vig. et auctt. ex Cuba.

VII.—GYMNOPELIA, gen. nov. p. 133.

Habitus *Chamaepelia*, sed orbitis nudis dignoscenda.

Typus, G. ERYTHROTHORAX, i.o. *Columba erythrothorax*, Meyen, Nov. Act. Acad. Leopold. Car. xvii., Suppl. p. 98, t. xvi.: *Columba anaïs*, Lesson.

VIII.—NOTHOPROCTA, gen. nov. p. 153 (*νόθος*, *spurius* et *πρωκτός*, pars posterior corporis).

Genus inter *Rhynchotum* et *Nothuram* medium, quoad scuta tarsi illi magis affine, sed digito postico brevi distinguendum.

Typus, N. PERDICARIA, i.o. *Crypturus perdicarius* Kittlitz, ex Chilia.

IX.—CALODROMAS (*καλός*, bonus et *δρομῖς*, cursor) eadem ac *Eudromia*, d'Orb. et Is. Geoffr. (nec *Eudromias*, Boié).

Typus, C. ELEGANS, i.o. *Eudromia elegans*, d'Orb. et Is. Geoffr. Mag. de Zool. 1832, Cl. ii. pl. 1, ex rep. Arg.

II.—DIAGNOSES SPECIERUM NOVARUM.

1. BASILEUTERUS LEUCOPYGIUS, sp. nov. p. 10.

Saturate fuscescenti-olivaceus, pileo alis et caudæ apice nigricantibus: alarum marginibus dorso concoloribus: subtus medialiter albus; pectore et hypochondriis olivaceo perfusis; ventre ochraceo induto: tectricibus caudæ supra et subtus eum hujus dimidio basali albis, ochraceo vix tinctis: rostro corneo, pedibus corylinis: long. tota 5.2, alæ 2.5, caudæ 2.0.

Hab. Costarica (*Carmiöl.*)

Mus. P.L.S. et S.-G.

Obs. Similis *B. semicervino* et *B. uropygiali*, sed uropygio albo et colore dorsi nigricantiore diversus.

2. HYLOPHILUS MUSCICAPINUS, sp. nov. p. 12.

Sylvia muscicapina, auct. ign. M.S

Olivaceo-viridis, pileo cinereo: loris et superciliis indistinctis rufescentibus: subtus albus, pectore ochraceo vix tincto: subalaribus hypochondriis et crisso pallide limonaceo-flavis: remigibus nigricantibus, extus dorso concoloribus: rectricibus totis olivaceis: rostro superiore corneo, inferiore albicante; long. tota 4.2, alæ 2.4, caudæ 1.9.

Hab. Cayenna, propé urbem S. Louis d'Oyapok.

Mus. P.L.S.

Obs. Affinis *H. decurtato*, sed superciliis rufescentibus et pectore ochraceo distinctus.

3. CYCLORHIS ALBIVENTRIS sp. nov. p. 13.

Cyclorhis wiedi (ex Bahia) Pelzeln, Orn. Bras. p. 138.

Flavicanti-olivaceus, pileo et capitis lateribus cinereis, superciliis pone oculum extensis rubris: subtus albus, pectore antico lateribus et subalaribus limonaceo-flavis: rostro corneo, mandibula inferiore ad basin nigra: pedibus plumbeis: long. tota 5.8, alæ 2.8, caudæ 2.2.

Hab. Brasiliæ reg. sylv. orient. propè Bahia (*Wucherer*).

Mus. P.L.S. et S.-G.

Obs. Species a *Cyclorhina wiedi* Pelzelni pileo cinereo diversa, et ad *C. guianensem* magis appropinquans, sed ab hac ventre albo disjungenda.

4. CHLOROPHANES PURPURASCENS, sp. nov. p. 16.

Supra et subtus purpureo-cœrulea, dorsi plumis nigris purpureo marginatis: fronte et oculorum ambitu nigris: alis caudaque nigris, purpureo augustè et indistinctè extus marginatis: rostro superiore nigro, inferiore flavo, pedibus fuscis: long. tota 4.9, alæ 2.8, caudæ 1.7.

Hab. Venezuela, propè urbem Caraccas.

Mus. P.L.S.

Obs. Formâ omninò *C. atricapillæ* similis, sed colore purpureo specie ut videtur verè diversa.

5. EUPHONIA CHALCOPASTA, sp. nov. p. 18.

Supra æneo-viridis, nucha cœrulescente tincta, fronte lætè flava: subtus flava, lateraliter æneo perfusa: alis caudaque nigris æneo-viridi limbatis: loris nigricantibus: tectricibus subalaribus et remigum marginibus interioribus albis: rostro obscurè corneo, pedibus corylinis: long. tota 3.6, alæ 2.1, caudæ 1.2.

Hab. Columbia int.

Mus. P.L.S.

Obs. Affinis *E. chrysopastæ*, sed fronte flava diversa.

6. CHLOROSPINGUS SEMIFUSCUS, sp. nov. p. 24.

Supra oleagineus: capite undique et corpore subtus murino-fuscis, ventre medio cinereo, crisso flavicanti-olivaceo: subalaribus et hypochondriis olivaceis: remigibus et rectricibus fuscis, extus dorso concoloribus: long. tota 5.5, alæ 3.1, caudæ 2.5.

Hab. Æquatoria occ. in vicin. urbis Quito.

Mus. Salvino-Godmannico.

Obs. Species rostro crassiusculo (ferè sicut in *C. ophthalmico*) et pileo unicolore fusco facilè dignoscenda.

7. ARREMON WUCHERERI, sp. nov. p. 25.

Suprà lætè olivaceus: cervice posticâ cinerea: pileo et capitis lateribus nigris: strigâ post-oculari alba: subtus albus, torque lato subgutturali nigro; lateribus cineracescentibus: rostro flavo, culmine nigro: pedibus pallidè corylinis: remigibus et rectricibus nigricanti-fuscis, tectricibus alarum et secundariis extus dorso concoloribus: carpo alari et subalaribus lætè flavis: long. tota 7.2, alæ 3.2, caudæ 2.8.

Hab. Brasil. merid. orient. in vicin. urbis Bahiæ (*Wucherer*.)

Mus. Salvino-Godmannico.

Obs. Sp. pileo nigro, sicut in *A. schlegeli*, sed striga post-oculari alba, et torque subgutturali lato insignis.

8. HAPLOSPIZA UNIFORMIS, sp. nov. p. 29.

Plumbescenti-cinerea unicolor: subtus vix dilutior: remigibus et rectricibus intus cineraceo-nigricantibus: rostro et pedibus pallidè corylinis: alis longiusculis, rem.

secund. tert. et quart. æqualibus et primum parum excedentibus : cauda quadrata : long. tota 5.0, alæ 3.0, caudæ 2.0.

Hab. Mex. meridionalis, propè Jalapa (*de Oca*).

Mus. Salvino-Godmannico.

Obs. Sp. *II. unicolori*, ex Brasilia, omninó similis, sed major, et rostro elongatiore, pedibus quoque fortioribus.

9. *CNIPOLEGUS PUSILLUS*, sp. nov. p. 43.

Cnipolegus unicolor, Schl. et Salv. P.Z.S. 1867, p. 577 (nec Kaup).

Nitenti-niger unicolor, remigibus et rectricibus intus fusco-nigris : remigibus tribus externis angustatis et acuminatis : rostro obscurè plumbeo, pedibus fuscis : long. tota 5.0, alæ 2.4, caudæ 2.0 : remige quinto longissimo.

Hab. Amazonia inf. (*Wallace*).

Mus. P.L.S.

Obs. *Cn. unicolor* (vorus), ex Amazonia superiore, crassitie majore et primariis externis non angustatis differt.

10. *EUSCARTHIMUS WUCHERERI*, sp. nov. p. 45.

Supra fuscescenti-cinereus, pileo obscuriore, uropygium versus in olivaceum vix trahens : loris albis : alis caudaque fusco-nigris, remigibus et rectricibus olivaceo angustè, illorum tectricibus et secundariis albido latius marginatis ; subtus sericeo-albus, pectoris lateribus cineraceo perfusis : campterio flavo, subalaribus albis : rostro corylino, pedibus clarè carneis : remigibus tertio quarto et quinto ferè æqualibus et longissimis : long. tota 4.0, alæ 2.0, caudæ 1.6.

Hab. Brasil. merid. orient. Bahia (*Wucherer*).

Mus. P. L. S.

Obs. Aff. *E. margaritaceiventri* (Lafr. et d'Orb.) et ejusdem formæ, sed dorso obscure cinereo distinguendus.

11. *SERPOPHAGA SUBFLAVA*, sp. nov. p. 47.

Olivacea, pileo fuscescente ; linea superciliari a fronte albicante : alis et caudâ fuscis, illarum tectricibus et secundariis et hujus rectricibus externis albido marginatis : subtus flava, lateraliter in olivaceum trahens ; subalaribus pallidè flavis : rostro et pedibus nigris : long. tota 4.4, alæ 1.8, caudæ rectr. med. 1.9 ext. 1.6.

Hab. In vicin. urbis Para (*Wallace*).

Mus. P.L.S.

Obs. Affinis, ut videtur, *S. suberistata*, sed corpore subtus flavo distinguenda.

12. *SERPOPHAGA PÆCilocerca*, sp. nov. p. 47.

Olivacea, pileo cinereo, uropygio flavicanti-albo : loris et superciliis indistinctis albis : alis extus nigris, tectricibus majoribus et minoribus albo late terminatis : secundariis albo latius primariis olivaceo angustè limbatis : subtus albus, gutture cinereo vix lavato : subalaribus pallidè limonaceis : caudâ cineraceo-fusca, rectricibus lateralibus omnibus in pogonio interiore pallide limonaceis ferè albis : rostro superiore corylino, inferiore albicante ; pedibus clarè corylinis : long. tota 4.0, alæ 2.1, caudæ 1.7 : remigibus tertio et quarto æqualibus et longissimis.

Hab. Æquatoria et Columbia alta: Puellaro ad alt. 8,000 ped. (*Fraser*).

Mus. P.L.S.

Obs. Sp. cauda variegata insignis, forsàn magis affinis *Ochthoeca setophagoidei* et *O. stictopteræ*, sed rostro potius serpophagino.

13. *PHYLLOMYIAS PLATYRHYNCHA*, sp. nov. p. 48.

Phyllomyias semifusca, Polz. Orn. Bras. p. 105 (nec Sel.)

Supra sordide fusca, alis caudaque obscurioribus, illarum marginibus externis albicantibus: subtus grisescenti-alba, ventre toto et subalaribus flavicante perfusis: alis longiusculis, remigibus tertio quarto et quinto ferè æqualibus: pileo suberistato: long. tota 4.7, alæ 2.7, caudæ 2.1.

Hab. Brasil. int. prov. Goiaz (*Natt.*)

Mus. P.L.S.

Obs. Proxima *P. semifusca*, sed rostro breviorè latiore, superciliis nullis et alis longioribus diversa.

14. *LIPAUGUS IMMUNDUS*, sp. nov. p. 57.

Supra ex cineraceo nigricans, alis caudaque nigris: tectricibus alarum et secundariis albedo extus anguste limbatis: rectricum externarum pogoniis externis cineracescentibus: subtus pallidè cineraceus, ventre medio flavicante, subalaribus et remigum marginibus internis pallidè cineraceo-albis: rostro corneo, pedibus nigris: remige tertio longissimo: long. tota 7.0, alæ 3.5, caudæ 3.3: planta, sicut in *L. simplice*, aspera. Jr. colore fuscescens et remigibus rectricibusque rufescente limbatis diversus.

Hab. Guiana Gallica, prov. Oyapock (*Verdey*).

Mus. P.L.S.

Obs. Species a *L. simplice* colore obscuriore et rostro minore et augustiore, ut videtur, vere diversa.

15. *CASIORNIS FUSCA*, sp. nov. p. 57.

Supra fusca, pileo et cauda tota rufis: alis nigris, harum tectricibus et primariorum marginibus externis rufis, secundariorum dorso proximorum marginibus magis cinnamomeis: subtus valdè dilutior, gutture albicante, ventre toto flavescens, subalaribus albis, remigum marginibus internis cinnamomeis: rostro plumbeo, ad basin flavicante: pedibus nigris: long. tota 5.3, alæ 3.0, caudæ 2.9.

Hab. Brasilia orient. in vicin. urbis Bahia.

Mus. P.L.S.

Obs. Sp. *C. rubra* omnino similis, sed crassitie minore et dorsi colore fusco diversa.

16. *FURNARIUS AGNATUS*, sp. nov. p. 61.

Suprà pallidè castaneus. alarum tectricibus minoribus et secundariis totis cum caudâ totâ dorso concoloribus: alarum tectricibus majoribus, primariorum sex externorum apicibus et reliquorum fascia transversa nigris: pileo superiore sordidè cinereo: superciliis et gutture albis: abdomine pallidè cinnamomeo, pectore et subalaribus magis rufescentibus: rostro et pedibus pallidè flavidis: long. tota 6.0, alæ 3.75, caudæ 2.1.

Hab. Columbia littoralis in vicin. urbis S. Martha (*Joad*).

Mus. P.L.S.

Obs. Sp. *F. leucopodi* maximè affinis, sed supra pallidior, et pileo grisescente, alis longioribus et abdomine rufescente diversa.

17. *PHILIDOR ERYTHRONOTUS*, sp. nov. p. 66.

Supra castaneus, pileo obscuriore, uropygio et cauda tota clarioribus: alis nigricantibus: superciliis elongatis et distinctis et corpore toto infrâ cum subalaribus clarè cervinis: rostro superiore corneo, inferiore flavido; pedibus sordidè olivaceis: long. tota 6.0, alæ 3.3, caudæ 2.8.

Hab. Columbia interior (Bogota).

Mus. P.L.S.

Obs. Assimilis *P. pyrrhodi*, sed dorso castaneo et pileo obscuriore diversus.

18. *MARGARORNIS STELLATA*, sp. nov. p. 67.

Supra saturate ferruginea unicolor, alis intus nigris, caudâ tota concolore: subtus dilutior et paulò magis flavicantior, guttis minutis albis, nigro-cinctis, præcipuè in pectore summo, medialiter ornatus: gula albâ: crisso ferrugineo: subalaribus pallidè fulvis nigricante subobsoleto transfasciatis: remigum marginibus internis cinnamomeis: rostro corneo, ad basin inferiùs albicante: pedibus corylinis: long. tota 5.8, alæ 3.5, caudæ 2.9: tarsi 0.9, rostri a rictu 0.7: rectricum scapis exsertis, denudatis, acutis.

Hab. Republ. Æquatoriana, prov. Quitensis.

Mus. Salvino-Godmannico.

Obs. Sp. colore saturatè ferrugineo satis distincta.

19. *PICOLAPTES PUNCTICEPS*, sp. nov. p. 69.

Supra saturatè brunneus; remigum extus parte apicali uropygio et caudâ tota ferrugineis: pileo et capitis lateribus punctis elongatis clarè corylinis, in dorso superiore elongatioribus, ornatis: subtus dilutior et magis cinerascens, strigis longitudinalibus angustis albis utrinque nigro limbatis: gula pallidè ochracea, immaculata; remigum marginibus interioribus brunneis, subalaribus cervinis: rostro corneo, mandibula inferiore flavicante; pedibus nigris: long. tota 7.0, alæ 3.5, caudæ 3.0.

Hab. Guiana int.

Mus. P.L.S.

Obs. Species statura parva, punctis capitis insignis, aliter cum *P. albo-lineato* ex Columbia ferè congruens.

20. *THAMNOPHILUS TRISTIS*, sp. nov. p. 69.

Supra obscurè cinereus; pileo alis et cauda nigris, plumarum marginibus cineracescentibus; campterio et tectricum alarum maculis apicalibus albis: subtus cinereus unicolor, subalaribus albicante mixtis; rostro breviusculo, crasso, nigro; pedibus corneis: long. tota 6.2, alæ 2.9, caudæ 2.4.

Hab. Guiana gall. Oyapok.

Mus. P.L.S.

Obs. Sp. crassitie et coloribus *Th. stellari* et *Th. simplici* proxima, ab hoc rostro majoro et alis nigris, ab illo cauda longiore et rostro magis compresso diversa.

21. *MYRMOTHERULA PYRRHONOTA*, sp. nov. p. 72.

Myrmotherula hæmatonota, Pelz. Orn. Bras. p. 81 (nec. Sclat.)

Supra brunnea, dorso toto castaneo; alarum tectricibus nigris albo terminatis: subtus cinerea, gula nigra maculis triangularibus albis ornata; ventre imo et hypochon-

driis fulvescentibus: rostro corneo; pedibus corylinis: long. tota 3.5, alæ 1.8, caudæ

1.2. *Fem.* maculis tectricum alarium et corpore subtus rufis diversa.

Hab. Guiana int. Rio Negro (*Natt.*): Oyapok (*Verdey*).

Mus. P.L.S.

Obs. Proxima *M. hamatonotæ*, ex Amazonia superiore, sed dorso toto castaneo diversa.

22. MICROBATES TORQUATUS, sp. nov. p. 72.

Supra murino-brunneus unicolor, alis candaque concoloribus: superciliis angustis elongatis et genis albis: spatio postoculari et strigâ rictali indistincta nigris: subtus albus, torque pectorali nigro: hypochondriis et crisso fulvoscentibus: rostro superiore schistaceo, hujus tomiis et mandibula inferiore albicantibus; podibus clarè corylinis: long. tota 3.5, alæ 2.0, caudæ 1.0, rostri a rictu 0.9, tarsi 0.95.

Hab. Cayenna, propè urbem "St. George d'Oyapock (*Verdey*)."

Mus. P.L.S.

23. CERCOMACRA CARBONARIA sp. nov. p. 73.

Cercomacra nigricans, Pelz. Orn. Bras. p. 85.

"*Formicivora carbonaria*, Natt. M.S." Pelzeln *l.s.c.*

Obscurè schistacea interscapulii maculâ celata alba: alis nigris, campterio tectricum alarium marginibus et secundariorum apicibus angustis albis: subtus medialiter nigra, lateraliter in schistaceum trahens; cauda nigra, rectricum omnium apicibus albis: subalaribus nigris, remigum marginibus internis albis: rostro nigro, tomiis pallidis: pedibus clarè fuscis: long. tota 5.8, alæ 2.7, caudæ rectr. med. 1.9, ext. 3.0. *Fem.* supra dilutior, subtus pallidè fulva: gula alba nigro maculata.

Hab. Guiana int., Rio Branco (*Natt.*)

Obs. A *C. nigricante* rostro magis compresso, alis longioribus et caudâ longiore diversa, coloribus autem huic valdè similis.

24. RHINOCRYPTA FUSCA, sp. nov. p. 76.

Suprà pallide murino-fusca, unicolor, alis omninò concoloribus: loris superciliis indistinctis et corpore subtus lactescenti-albis: cauda nigra, rectricibus duabus mediis et reliquarum marginibus dorso concoloribus: subalaribus et remigum marginibus internis colore cervino parùm tinctis: rostro et pedibus nigris: long. tota 6.2, alæ 3.2 caudæ 2.5, tarsi 1.1.

Hab. Rep. Argentina, in campis Mendozæ (*Weisshaupt*).

Mus. P.L.S.

Obs. *Rhinocryptæ* species secunda, colore unicolore prorsus notabilis.

25. DENDROCYGNA DISCOLOR, sp. nov. p. 129.

Dendrocygna autumnalis, auctt. ex America meridionali.

Sp. *D. autumnali* plerumquo similis et hujus forma meridionalis, sed dorso superiore cinereo, nequò interscapulio concoloro distinguenda.

Hab. Venezuela, Guiana et Brasilia.

Mus. Salvino-Godmannico.

26. *QUERQUEDULA ANDIUM*, sp. nov. p. 129.*Dafila*—?—Scl. P.Z.S. 1860, p. 83.

Capite undique nigro et albo frequentissime marmorata: dorso obscure cinereo, scapularibus æneo-nigris fusco circumcinctis: speculo alari æneo-nigro in secundariis dorso proximis nitidissime æneo-viridi, supra et subtus fascia pallide castanea marginato: abdomine albo cineraceo adumbrato; pectore maculis plumarum centralibus fusco-nigris: rostro nigro, pedibus carneis: long. tota 16.0, alæ 9.0, caudæ rigidiusculæ 3.5.

Hab. Æquatoria alta, inter Riobamba et Mocha (*Fraser*).*Mus.* Salvino-Godmannico.

Obs. Similis *Q. oxyptera*, et *Q. flavirostri*, sed notæo obscuriore, rostro nigro, et speculo alari æneo neque viridi distinguenda.

27. *LEPTOPTILA RUFINUCHA*, sp. nov. p. 134.

Supra terreno-brunnea nitore quodam æneo: alis et caudâ intus cineraceo-nigris, rectricibus tribus externis albo terminatis: pileo antico cano, postico cum nuchâ læte rufo: subtus cineraceo-lactea; gulâ albâ; ventre summo cervino tincto, imo et crisso albis: hypochondriis dorso concoloribus: subalaribus castaneis: remigum marginibus interioribus rufescentibus: rostro nigro: pedibus rubris: long. tota 8.2, alæ 5.5, caudæ 3.5.

Hab. Veragua (*Arce*).*Mus.* Salvino-Godmannico.

Obs. Proxima *L. cassini*, ex *Panama*, sed nuchâ rubra prorsus distinguenda.

28. *ODONTOPHORUS HYTOSPODIUS*, sp. nov. p. 138.

Supra brunneus, nigro marmoratus et in interscapulio et scapularibus maculatus: pileo obscure brunneo; fronte, superciliis, capitis lateribus et gutture cum cervice antica castaneis; abdomine obscure cinereo; rostro nigro, pedibus obscure olivaceis: long. tota 9.7, alæ 5.7, caudæ 2.2, tarsi 1.8.

Hab. Columbia int. prov. Antioquia (*Salmon*).*Mus.* Salvino-Godmannico.

Obs. Affinis *O. hyperythro*, sed abdomine cinereo nec rufo.

29. *PSOPHIA NAPENSIS*, sp. nov. p. 141.

Species affinis *Ps. crepitanti*, sed valdè major et cervice antica obscure purpurea nec viridi.

Hab. Æquatoria orientalis, in ripis fl. Napo. (*Verreaux*).*Mus.* Brit.30. *TINAMUS RUFICEPS*, sp. nov. p. 152.

Similis *T. robusto*, ex Mexico et Am. centr., et hujus forma meridionalis, sed pileo rufo et secundariorum pogoniis externis magis rufescentibus et nigro distinctius vermiculatis semper, ut videtur, distinguendus.

Hab. Æquatoria occident. (*Bourcier*): Panama (*Mc. Cleannan*): Chiriqui (*Arce*).*Mus.* Salvino-Godmannico.

31. NOTHOPROCTA CURVIROSTRIS sp. nov. p. 153.

Rhynchotis perdix, Sel. P.Z.S. 1860, p. 97 (err.)

Supra plumis medialiter nigris, utrinque linea alba limbatis et brunneo variegatis et transfasciatis: alus extùs læte brunneis nigro regulariter et frequenter transfasciatis: remigum pogoniis interioribus cineraceo-nigris: subtùs saturatè fulva, gula albicante, fulvo et nigro longitudinaliter lineolato; pectore fasciis albis et lineis nigris obsoletè variegato: crisso et tibiis pallidioribus et magis albicantibus: rostro longo incurvato nigro, mandibula inferiore ad basin aurantiaca: pedibus aurantiacis: long. tota 10.0, alæ 6.0, caudæ (falsæ) 1.10, tarsi 1.6.

Hab. Æquatoria alta, Calacali et Puellaro (*Fraser*).

Mus. Salvino-Godmannico et inst. Smithsonianæ.

Obs. Sp. a *N. perdicaria* abdomine fulvo et rostro elongato distincta.

////////////////////////////////////