ZOOLOGIÆ DANICÆ
PRODROMUS,
SEU
ANIMALIUM

DANIÆ ET NORVEGIÆ INDIGENARUM
CHARACTERES, NOMINA,
ET
SYNONYMA IMPRIMIS POPULARIUM.

AUCTORE

OTHONE FRIDERICO MÜLLER,

REGI DANIÆ A CONSILII STATUS, ACAD. SCIENT. N. CURIOS.
HOLMENS. ET BOICÆ, HAVNIENS. NORV. BEROLINENS. ALIA-
RUMQUE SOCIET. LITER. SODALI, ACAD. PARIS. CORRESP.

IMPENSIS AUCTORIS.

HAVNIÆ,
TYPIS HALLAGERIIS.

CID DCC LXXVI.

1776

"Addenda" added
following index, orig
not in this
volume.

Vide mira domi,
et perdius ac pernox scrutare; turpe enim est in patria
peregrinum agere.

287
M947
1776
C.2
3CNRB

148683

SERENISSIMO
PRINCIPI ET DOMINO
FRIDERICO,

DANORUM NORVAGORUM
HOLSATORUMQUE

AMORI ET DELICIIIS

D. D. D.

OTHO FRIDERICUS MÜLLER.

Decennium jam elabitur, ex quo
Patriæ trecentas stirpes nemini
majorum viſas vindicavi, FRATRI-
que TUO Auguſtiſſimo pia, qua
debui, mente obtuli. TE DUCE
exercitum nunc animalium nume-
roſiſſimum & mere indigenam fir-
miori talo producere audeo. TE
FAUTORE noviciorum ultra octin-
genta, quæ primus in lucem pro-
fero, innotescant, ac inter vetera-
norum turmas diſpoſita, ne tenera
& pavida in priſtinam caliginem

recidant, foveantur, a civibus in-
quirantur, in usum publicum glo-
riamque summi Numinis vertenda.
Sic fausti & jucundi erunt labores
exantlati, historiæ naturalis cogni-
tio, borealium regionum incolis præ-
primis necessaria promovebitur, no-
menque & exemplar DIVI PATRIS
in TE, quod faciunt, exosculabun-
tur populares, exteri.

HAVNIÆ, 31 Martii,
1776.

Mirandas proprietates & affectiones, quas nostra ætas in animalibus huc usque neglectis detexit, nemo ignorat; penitiorem eorundem cognitionem maximum generi humano usum aliquando præstaturum ne altero cæcutiens oculo quidem dubitat; confusis tamen speciebus, non possunt non confundi hostes & euergetæ, noxæ & emolumenta.

Scopus igitur & usus libelli quintuplicisque indicis cuique patebit. Rerum peritus characteres específicos & genericos non paucos de novo elaboratos, plures mere novos, facile intelliget.

Species asterisco * notatæ in scriptis perillustris Equitis a LINNE frustra quærentur, signo † impressæ a civibus, signo ‡ a me, detectæ indicantur. Nomina vernacula, quibus nulla littera majuscula antepōnitur Danis & Norvegis communia sunt, reliqua D. *Danos*, N. *Norvegos*, I. *Islandos*, L. *Lappones*, Gr. *Grænlandos* significant.

Ulteriores descriptiones & observationes, quæ in vivis institutæ inter manuscripta servantur, afferre, ratio libelli prohibet. Hæc & reliqua non levis argumenti, ipsi *variorum historiæ*, quam cum iconibus edendam molior, jungentur.

Qui rerum naturalium patriæ notitiam meræ curiositatis arguunt, suo damno ignorabunt, earundem exactam enumerationem non *historico naturali* & *physico* tantum, sed *politico*, *philologo*, *geographo*, *medico*, *theologo* melioris notæ, esse verum & inexhaustum promtuarium.

Sequentia animalia, quæ impressis jam primis libelli paginis, suppeditabat venerabilis OTHO FABRICIUS paucis abhinc annis e missione grælandica redux, huc adscribere, nominaque *grælandica* animalium ante acceptas literas impressorum in indice suis numeris subiungere (utraq; suis locis inferenda) e re visum est.

PHOCA *leonina* capite antice cristato. I. *Blandruselr.* Gr. *Neitserfoak.*

Ph. *fætida.* I. *Utselr.* Gr. *Neitsek, Neitfilek.* * †

Ph *grælandica.* I. *Vadeselr.* Gr. *Atak.* * †

Ph. *barbata.* I. *Gramselr.* Gr. *Urksuk.* * †

Vix Ph. *ursina*, cum auriculæ desunt.

BALÆNA *Boops* fistula duplici in rostro, dorso extremo protuberantia cornea. I. *Hrasu-Reyður.* Gr. *Keporkak.*

PHYSETER *Tursio* dorsi pinna altissima, apice dentium plano. Gr. *Pernak.*

Balænam *albicantem* KLEINII Physët. *Catod.* censet O. FABRICIUS.

FALCO *Islandus albus.* Gr. *Kirkföviarsukkakortok.*

F. *Islandus fuscus.* Gr. *Kirkföviarsukkernektok.*

LARUS *candidus* totus niveus, rostro pedibusque nigris. Gr. *Naiauarsuk.* * †

Pulli maculis nigris.

FRINGILLA *lapponica* capite nigro, corpore griseo nigroque superciliis albis; rectricibus extimis macula alba cuneiformi. Gr. *Narkfamiutak.*

PARUS

PARUS *bicolor* capite cristato antice nigro, corpore cinereo, subtus exalbido, rufescente. Gr. *Auingursak*?

RAJA *fullonica* dorso toto aculeato; aculeorum ordine simplici ad oculos, duplici in cauda. Gr. *Aglernak*, *Taralikisak*.

CYCLOPTERUS *Spinofus* subrotundus aculeis planis, abdomine laevi. Gr. *Nepidsarluk*.

Distinctam a C. *Lumpo* speciem vult O. FABRICIUS.

C. *Liparis* corpore nudo pinnis dorsalibus, anali, caudalique unitis. Gr. *Abapakitsok*, *Amerfulak*.

BLENNIUS *Lumpenus* corpore areolis dorsalibus fuscis? Gr. *Tejarnak*.

COTTUS *cataphractus* loricatus, rostro verrucis 2 bifidis; capite subtus cirroso. Gr. *Kauniornak*, *Kanniordluk*.

C. *quadricornis* verrucis capitis 4 osseis? Gr. *Pokudlek*.

PLEURONECTES oculis dextris corpore supra maculis brunneis. Gr. *Okorak*, *Kollevsak*. * †

Absque tuberculis capitis, spinaeque ad anum brevi, cæterum P. *Platessam* refert.

Eadem literæ me certiores fecerunt,

p. 8. *Tunnulik* esse Balænam *Physalum*.

p. 10. *Kirkfoviarsuk* & *Kekingout* esse nom. gener. Falconis, *Nektoralik* Vult. *Albicillam*, *Opik* strigem *nycteam*.

p. 21. *Akpalliarfik* Alcam *Alle*, *Paik* Mergum *Merganserem*, *Nerlek* Anatem *Berniclam*.

p. 34. *Orpingmiutak* *Fringillam domesticam*, *Kyllektok* *Motacillam* *Oenanthem*, *Naksarminiak* *Fringillam lapponicam*.

COMPENDIA AUCTORUM EXPLICATA.

- A. Havn.* Det Kiöbenhavnske Selskabs Skrifter, 9 og 10 Deel, med Kob. Kiöbenh. 1765 - 1770.
- A. Helv.* Acta Helvetica phys. math. anat. botanico medica. Basil. 1760. 4 vol.
- A. Nidr.* Det Trondhiemske og Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, 5 Deelee med Kobb.
- A. St.* Der Schwedischen Academie der Wissenschaften Abhandlungen, Leipz. 32 B.
- Aph. N.* Bomares Natur-Historie af H. von Aphelen, 8 Tomer.
- Afc. ic.* Icones rerum naturalium; fasciculi 3. Havniæ.
- Barth. Unic.* Th. Bartholinus de unicornu, Amst. 1678.
- Barth. A. Havn.* Th. Bartholini acta medica & philosophica Hafn. 1671 - 1676.
- Barth. b. a. C.* Bartholini hist. anatom. rariorum Centur. Havn. 1654.
- Berl. Besch.* Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft, 1 B. m. Kupf. Berlin 1775.
- Biblioth. f. n. Skr.* Bibliothek for nyttige Skrifter, Kiöbenh. 1772.
- Br. monogr.* Ederfuglens Beskrivelse ved Brünniche, Kiöbenh.
- Br. Orn.* Brünnichii Ornithologia borealis, Havn.
- Cr. Gr.* David Cranz Historie von Grænland; Barby und Leipz. 1770.
- D. F.* L. J. Debes natürliche und politische Historie der Inseln Færoë, Kopenh. 1757.
- Eg. Gr.* Des alten Grönlandes Naturell-Historie von Hans Egede, Kopenh. 1742.

- Fu. Fridr.* Fauna insectorum Fridrichsdalina, Havn. & Lipsiæ 1764.
- Frisch. inf.* J. L. Frisch Beschreibung von Insecten in Teutschland, Berlin 1730. 13 Th.
- *Geofr. inf.* Histoire des Insectes aux environs de Paris, 1762. 2 Tom.
- H. Fu. N.* Fauna Norvegica ved Christopher Hammer, Kiöbenh. 1775.
- Geer inf.* Memoires pour servir à l'histoire des insectes par Ch. de Geer, à Stockholm, 5 Tom.
- Isl. R.* Eg. Olaffens og B. Povellens Reise giennem Island, Soröe 1772. 2 Deele.
- Kritiske Journal.* Kiöbenhavns kritiske Journal, 1769.
- Linn. Syst.* Caroli a Linne Systema naturæ, Holm. 1766. edit. duodecima.
- Lærde Efterr.* 1769. Kiöbenhavns Efterretninger om lærde Sager, 1769.
- Lang. nat. V.* Lange om de naturlige Vande, Kiöbenh. 1756.
- L. L.* Knud Leems Beskrivelse over Finmarkens Lapper, m. Kaaber, Kiöbenh. 1767.
- Mart. Spitzb.* Friderich Martens Spitzbergische oder Grönlandische Reise-Beschreibung, Hamb. 1675.
- M. R.* Oligeri Jacobæi Museum regium.
- Naturf.* Der Naturforscher, Halle 1774. 1 - 7 Stück.
- N. A. N. C. vel A. C.* Nova acta physico-medica naturæ curiosorum, Norimb. 4 Tom.
- O. M.* Olearii Gottorffische Kunst-Kammer, Schleswig, 1666.
- P. Fl. æcon.* Pauli æconomiske Urte-Bog.

- P. N. N.* E. Pontoppidans Norske Naturhistorie, Kiöbenh.
P. D. Atl. Danske Atlas ved E. Pontoppidan, Tom. I.
 Kiöbenh. 1763.
- Pile-Larven.* Pile-Larven med dobbelt Hale &c. Kiöbenh.
 1772.
- Pr. inf. S.* Prodromus Insectologiæ Siællandicæ M. Thr.
 Brünniche, Havn. 1761.
- Regenf. C.* Choix de Coquillages par Regenfus à Copenh. 1758.
- Rösf. inf.* Insecten Belustigung von A. J. Röfel, Nürnberg.
 1746. 4 Th.
- R. N. H.* Norriges Kongers Historie af J. Ramus, Kiöbenh.
 1719.
- S. inf.* J. C. Schæfferi icones insectorum, Vol. I & II.
- Scop. inf. Carn.* J. A. Scopoli Entomologia Carniolica, Vindobon. 1763.
- Sp. R.* Speculum regale, Sorøe 1768.
- St. S.* Physisk og æconomisk Beskrivelse over Söndmör af
 H. Ström, med Kobber, Sorøe 1762.
- V.* Vermium terrestrium & fluviatilium historia, 2 vol.
 Havn. & Lips. 1773 & 1774.
- W. Fr.* Wilse Fridericiæ Beskrivelse.
- W. M.* Olai Wormii museum.
- Würmern.* Von Würmern des süßen und salzigen Wassers,
 m. Kupf. Kopenh. 1771.

A N I M A L I A.

CORDE		CLASSES:
	<i>Pilis:</i>	<i>MAMMALIA.</i> I.
biaurito	<i>Pennis:</i>	<i>AVES.</i> II.
	<i>Pulmonibus:</i>	<i>AMPHIBIA.</i> III.
uniaurito	<i>Branchiis:</i>	<i>PISCES.</i> IV.
	<i>Antennis:</i>	<i>INSECTA.</i> V.
inaurito	<i>Tentaculis pluribus vel nullis:</i>	<i>VERMES.</i> VI.

I. *M A M M A L I A.*

PEDIBUS	DENTIBUS	ORDINES:
	primoribus nullis:	<i>BRUTA.</i> 1.
unguiculatis,	primoribus incisoriiis 2:	<i>GLIRES.</i> 2.
	primoribus conicis 6, 2. Lanar. 1:	<i>FERÆ.</i> 3.
	primoribus supra & infra:	<i>BELLUÆ.</i> 4.
ungulatis,	primoribus supra nullis:	<i>PECORA.</i> 5.
muticis,	variis in variis:	<i>CETE.</i> 6.

II. *AVES.*

II. *A V E S.*

ROSTRO

ORD:

subincurvato: mandibula superiore pone apicem utrinque dilatata:	ACCIPITRES.	1.
cultrato, dorso convexo:	PICÆ.	2.
lævi, epidermide tecto, apice aucto:	ANSERES.	3.
subcylindrico, obtuso:	GRALLÆ.	4.
convexo, mandibula superiore fornicata supra inferiorem:	GALLINÆ.	5.
conico-acuminato:	PASSERES.	6.

III. *A M P H I B I A.*

ORD:

pedata:	REPTILIA.	1.
apoda:	SERPENTES.	2.
pinnata:	NANTES	3.

IV. *P I S C E S.*

PINNIS ventralibus

ORD:

nullis:	APODES.	1.
ante pinnas pectorales:	JUGULARES.	2.
subpinnis pectoralibus:	THORACICI.	3.
pone pinnas pectorales:	ABDOMINALES.	4.

V. *IN-*

V. *I N S E C T A.*

ORD:

ALIS	{ coriaceis ore ma-		
fupe-	xilloso:	COLEOPTERA.	1.
riori-	femicoriaceis; ore		
bus,	vel pectore ro-		
	strato:	HEMIPTERA.	2.
4.	squmularis; ore		
	proboscideo:	LEPIDOPTERA.	3.
omni-	membranaceis:		
bus	inermi:	NEUROPTERA.	4.
	ano		
	aculeato:	HYMENOPTERA.	5.
2.	Halteribus loco posti-		
	carum:	DIPTERA.	6.
o		APTERA.	7.

VI. *V E R M E S.*

Pellucida, polymorpha, partitione		ORD:
& evolutione in quamvis di-		
rectionem propagabilia:	INFUSORIA.	1.
Mollia, nuda, tentaculosa, herma-		
phrodita vel neutra:	MOLLUSCA.	2.
<i>Testa</i> tecta, tentaculata, herma-		
phrodita:	TESTACEA.	3.
Duriuscula, filiformia, annularia,		
partitione & evolutione in lon-		
gitudinem propagabilia:	HELMINTHICA.	4.
Composita, <i>crusta</i> condita, gem-		
mascentia:	CELLULANA.	5.

CHA-

CHARACTERES MAMMALIUM.

I. B R U T A.

GENERA.

Pag.

Dentes molares ex osse rugoso :

TRICHECHUS. 1

2. F E R Æ.

* *Dentes* primores 6, 6:

Superiores excavati.	URSUS.	3
Superiores intermedii lobati :	CANIS.	2
Inferiores æquales , lingua aculeata :	FELIS.	2
Inferiores conferti, duo alterni interiores :	MUSTELA.	2

* * *Dentes* primores, superiores 6:

Inferiores 8:	TALPA.	3
Inferiores 4:	PHOCA.	1

* * * *Dentes* primores, superiores 2:

Inferiores 4:	SOREX.	4
Inferiores 2:	ERINACEUS.	4

3. G L I R E S.

Dentes primores superiores.

Duplicati :	LEPUS.	4
Angulo recto excavati :	CASTOR.	4
Subulati :	MUS	4
Cuneati :	SCIURUS.	5
Quatuor æquales, omnes acuminati :	VESPERTILIO.	4

4. P E C O R A.

* *Cornua* solida.

Ramosa :	CERVUS.	5
----------	---------	---

* * *Cornua* tubulosa.

Erecta :	CAPRA.	6
Reclinata :	OVIS.	6
Antrorsum versa :	BOS.	6

5. BEL-

5. BELLUÆ.

GENERA: Pag.

Dentes primores.

Superiores 6:	EQUUS.	6
Superiores 4:	SUS.	6

6. CETÆ.

<i>Dentes in maxilla superiore 2 protensi:</i>	MONODON.	6
<i>Dentes in maxilla superiore cornei:</i>	BALÆNA.	6
<i>Dentes in maxilla tantum inferiore:</i>	PHYSETER.	7
<i>Dentes in maxilla utraque:</i>	DELPHINUS.	7

CHARACTERES AVIUM.

I. ACCIPITRES.

<i>Rostrum aduncum; caput denudatum:</i>	VULTUR.	9
<i>Rostrum aduncum, basi cera tectum:</i>	FALCO.	9
<i>Rostrum aduncum capistro reverso.</i>	STRIX.	10
<i>Rostrum rectiusculum emarginatum.</i>	LANIUS.	11

2. PICÆ.

* Pedibus ambulatoriis.

<i>Rostrum cultratum, apice incurvo.</i>	CORACIAS.	12
<i>Rostrum cultratum, capistro reverso.</i>	CORVUS.	11
<i>Rostrum incurvatum, acuminatum.</i>	CERTHIA.	13
<i>Rostrum incurvatum obtusiusculum.</i>	UPUPA.	13
<i>Rostrum rectum, apice cuneato.</i>	SITTA.	13

** Pedibus scanforiis.

<i>Rostrum angulatum; lingua lumbriciformis.</i>	PICUS.	12
<i>Rostrum læve; nares marginatæ.</i>	CUCULUS.	12
<i>Rostrum læve; lingua lumbriciformis.</i>	YUNX.	12

*** Pedibus gressoriis.

<i>Rostrum trigonum, rectum.</i>	ALCEDO.	13
----------------------------------	---------	----

3. A N S E R E S.

GENERA: Pag.

* Rostro denticulato.

<i>Rostrum</i> unguiculatum denticulis membranaceis.	ANAS.	13
<i>Rostrum</i> unguiculatum denticulis subulatis.	MERGUS.	16

** Rostro edentulo.

<i>Rostrum</i> rugis lateralibus transversis.	ALCA.	16
<i>Rostrum</i> naribus superincumbentibus subcylindricis.	PROCELLARIA.	17
<i>Rostrum</i> sub apice subtus gibbum.	LARUS.	20
<i>Rostrum</i> subulatum lateribus compressiusculum.	COLYMBUS.	18
<i>Rostrum</i> subulatum, apice compresso.	STERNA.	21

4. G R A L L Æ.

* Pedibus tetradactylis.

<i>Rostrum</i> depressum, spatulatum.	PLATALEA.	22
<i>Rostrum</i> arcuatum sacco gulari.	TANTALUS.	22
<i>Rostrum</i> rectum, acutiusculum.	ARDEA.	22
<i>Rostrum</i> subulato-attenuatum, depressum, recurvum.	RECURVIROSTRA.	27
<i>Rostrum</i> rectum, teretiusculum, capite longius.	SCOLOPAX.	22
<i>Rostrum</i> teretiusculum longitudine capitis; pollex vix insistens.	TRINGA.	24
<i>Rostri</i> basis fronte calva.	FULICA.	27
<i>Rostrum</i> subcarinatum; corpus compressiusculum.	RALLUS.	27

** Pedibus cursoriis tridactylis.

<i>Rostrum</i> compressiusculum apice cuneo.	HÆMATOPUS.	27
<i>Rostrum</i> teretiusculum, obrusum.	CHARADRIUS.	26
<i>Rostrum</i> subfornicatum; lingua emarginata.	OTIS.	27

5. G A L L I N Æ.

<i>Supercilia</i> nuda, papillosa.	TETRAO.	27
------------------------------------	---------	----

6. PAS.

6. P A S S E R E S.

GENERA: Pag.

* *Crassirostres*.

<i>Rostrum</i> conico-ovatum.	LOXIA.	30
<i>Rostrum</i> conico-acutum.	FRINGILLA.	31
<i>Rostrum</i> subconicum, mandibula inferiore latiore, coarctata.	EMBERIZA.	30

* * *Curvirostres* mandibula superiore apice incurvata.

<i>Rostrum</i> incurvum, depressum, ciliatum; nares tubulosæ.	CAPRIMULGUS.	34
<i>Rostrum</i> incurvum, depressum.	HIRUNDO.	33

* * * *Emarginati-rostres* mandib. super. pone apicem
emarginata.

<i>Rostrum</i> emarginatum, subulatum, basi compressum.	TURDUS.	28
<i>Rostrum</i> emarginatum, subulatum, basi depressum.	AMPELIS.	30

* * * * *Simplicirostres*. R. recto integro attenuato.

<i>Rostrum</i> subulatum; lingua truncata; ca- pistrum reversum.	PARUS.	34
<i>Rostrum</i> subulatum; lingua incisa; unguis posticus, modicus.	MOTACILLA.	32
<i>Rostrum</i> subulatum; lingua bifida; unguis posticus elongatus.	ALAUDA.	28
<i>Rostrum</i> subulatum apice depresso, mar- ginato.	STURNUS.	28
<i>Rostrum</i> subformicatum; nares gibbosæ membrana oblitterata.	COLUMBA.	28

CHARACTERES AMPHIBIORUM.

1. R E P T I L E S.

Corpus nudum, caudatum.	LACERTA.	36
Corpus nudum, ecaudatum.	RANA.	36

2. S E R P E N T E S.

Scuta abdominalia; <i>Squamæ</i> caudales.	COLUBER.	36
<i>Squamæ</i> abdominales, caudalesque.	ANGUIS.	36

3. N A N T E S.

GENERA; Pag.

* Spiracula composita sive plura.

<i>Spiracula</i> septem lateralia.	PETROMYZON.	37
<i>Spiracula</i> quinque subtus.	RAJA.	37
<i>Spiracula</i> quinque lateralia.	SQUALUS.	37
<i>Spiracula</i> solitaria quadripartita.	CHIMÆRA.	38

** Spiracula solitaria.

<i>Pinnæ</i> ventrales 2. Os denticulatum.	LOPHIUS.	38
<i>Pinnæ</i> ventr. 2. Os edentulum.	ACCIPENSER.	39
<i>Pinnæ</i> ventr. 2. in orbiculum digestæ.	CYCLOPTERUS.	39
<i>Pinnæ</i> ventr. 0. Os operculatum maxilla inferiore.	SYGNATHUS.	39

CHARACTERES PISCIIUM.

I. A P O D E S.

<i>Apertura</i> branchiarum ad latera thoracis.	MURÆNA.	40
<i>Cauda</i> subulata, aptera.	TRICHIURUS.	40
<i>Dentes</i> conici, divergentes.	ANARHICHAS.	40
<i>Caput</i> corpore angustius.	AMMODYTES.	40
<i>Corpus</i> ensiforme.	OPHIDIUM.	41
<i>Caput</i> laminis tectum <i>Pinnæ</i> ventr. filiformes.	REGALECUS.	40

2. J U G U L A R E S.

<i>Apertura</i> branchiarum ad nucham.		
<i>Opertula</i> clausa.	CALLIONYMUS.	41
<i>Anus</i> prope pectus.	TRACHINUS.	41
<i>Pinnæ</i> dorsales anique plures, pectorales attenuatæ.	GADUS.	41
<i>Pinnæ</i> ventrales didactylæ, muticæ.	BLENNIUS.	43

3. T H O R A C I C I.

<i>Capitis</i> dorsum planum transversim sulcatum.	ECHENEIS.	43
<i>Caput</i> antice truncato obtusum.	CORYPHÆNA.	43
<i>Pinnæ</i> ventrales coadunatæ in pinnam ovatam.	GOBIUS.	44
	<i>Caput</i>	

GENERA: Pag.

<i>Caput corpore latius.</i>	COTTUS.	44
<i>Labium superius membrana transversa fornicatum.</i>	ZEUS.	44
<i>Oculi ambo in altero capitis latere.</i>	PLEURONECTES.	44
<i>Dentes validi, incisores s. molares.</i>	SPARUS.	45
<i>Pinna dorsalis ramento post spinas notata.</i>	LABRUS.	45
<i>Opercula branchiarum ferrata.</i>	PERCA.	46
<i>Cauda lateribus carinata; spinæ dorsales distinctæ.</i>	GASTEROSTEUS.	47
<i>Cauda lateribus carinata; pinnulæ spu- riæ plures.</i>	SCOMBER.	47
<i>Squamæ etiam capitis laxæ.</i>	MULLUS.	47
<i>Digitæ distincti juxta pinnas pectorales.</i>	TRIGLA.	47

4. A B D O M I N A L E S.

<i>Corpus vix ad caudam angustatum.</i>	COBITIS.	47
<i>Radius primus pinnae dorsalis pectora- liumque dentatus.</i>	SILURUS.	48
<i>Pinna dorsalis postica adiposa.</i>	SALMO.	48
<i>Mandibula inferior, longior, punctata.</i>	ESOX.	49
<i>Abdomen carinatum, ferratum.</i>	CLUPEA.	49
<i>Membrana branchiostega triradiata.</i>	CYPRINUS.	50

CHARACTERES INSECTORUM.

I. COLEOPTERA.

* Antennis apice incrassatis.

<i>Antennæ fractæ, capitulo solido. Caput intra thoracem retractum.</i>		
<i>Elytra abbreviata.</i>	HISTER.	56
<i>Ant. fractæ, rostro insidentes, clava an- nulata.</i>	CURCULIO.	85
<i>Ant. fractæ, clava perfoliata. Caput por- rectum. Elytra abbreviata.</i>	SILPHA.	96
<i>Ant. fractæ, clavata, perfoliata. Pedes natatorii.</i>	HYDROPHILUS.	68
<i>Ant. fractæ, apice laterali pectinata. Pedes gressorii.</i>	LUCANUS.	52

<i>Antennæ</i> clava solida. <i>Caput</i> sub thorace retractum.	ANTHRENUS.	58
<i>Ant.</i> clava solida. <i>Caput</i> exsertum.	SCOLYTUS.	57
<i>Ant.</i> rostro infidentes, clava annulata.	RHINOMACER.	90
<i>Ant.</i> clava annulata. <i>Palpi</i> clava truncata.	COCCINELLA.	65
<i>Ant.</i> clava non nihil perfoliata. <i>Caput</i> retractedum. <i>Thorax</i> non marginatus.	CISTELA.	58
<i>Ant.</i> clava perfoliata. <i>Caput</i> inflexum. <i>Thorax</i> & <i>Elytra</i> marginata.	DERMESTES.	56
<i>Ant.</i> clava perfoliata. <i>Caput</i> porrectum.	ANTHRIBUS.	57
<i>Ant.</i> apice lamellatæ. <i>Scutellum</i> manifestum.	SCARABÆUS.	52
<i>Ant.</i> apice lamellatæ. <i>Scutellum</i> nullum. <i>Femora</i> intermedia remotissima.	COPRIS.	55
<i>Ant.</i> articulis clavæ compressis. <i>Thorax</i> cylindraceus.	ATTELABUS.	95
<i>Ant.</i> articulis clavæ elongatis. <i>Thorax</i> gibbus.	BYRRHUS.	57

*** Antennis sensim crescentibus.

<i>Ant.</i> ferratæ. <i>Caput</i> inflexum. <i>Lamina</i> ad basim abdominis.	MORDELLA.	84
<i>Ant.</i> taxiformes. <i>Thorax</i> convexus marginatus.	DIAPERIS.	74
<i>Ant.</i> moniliformes. <i>Thorax</i> planiusculus, marginatus.	CHRYSOMELA.	81
<i>Ant.</i> articulis truncatis. <i>Thorax</i> planiusculus, non marginatus.	ANASPIS.	58
<i>Ant.</i> articulis truncatis. <i>Thorax</i> peltatus. <i>Caput</i> tectum.	CASSIDA.	65
<i>Ant.</i> articulis emarginatis. <i>Thorax</i> clypeatus. <i>Caput</i> exsertum.	PELTIS.	63

*** Antennis medio crassis.

<i>Ant.</i> flexuosæ (nari fusiformes) <i>Elytra</i> pone dehiscencia. <i>Alæ</i> nullæ.	MELOE.	96
<i>Ant.</i> rigidæ, basi auriculatæ. <i>Oculi</i> quatuor.	GYRINUS.	68

**** An-

Characteres generum artificialium in non paucis elidunt species naturales, in nonnullis quoque merus sexus.

GENERA: Pag.

***** Antennis altero latere incisifis.

<i>Ant. ferratæ, breves. Caput dimidium intra thoracem.</i>	BUPRESTIS.	59
<i>Ant. ferratæ, intra oculos positæ. Caput deflexum.</i>	MELOLONTA.	57
<i>Ant. ferratæ sub capite prodeuntes. Pectus mucronatum.</i>	ELATER.	59
<i>Ant. ferrato-pectinatæ. Thorax inæqualis, non marginatus.</i>	PYROCHROA.	80
<i>Ant. pectinatæ. Thorax subrotundus, marginatus.</i>	PTILINUS.	81

***** Antennis sensim attenuatis.

<i>Ant. setaceæ. Thorax aculeatus.</i>	CERAMBYX.	91
<i>Ant. setaceæ. Caput inflexum. Cauda supra bicornis.</i>	BLATTA.	99
<i>Ant. setaceæ. Elytra coriaceo-membranacea. Cauda bifida.</i>	ACHETA.	100
<i>Ant. setaceæ. Elytra coriaceo-membranacea. Cauda feminis ensifera.</i>	LOCUSTA.	101
<i>Ant. setaceæ vel filiformes. Caput exsertum. Thorax marginatus. Lamellæ ad basin femorum posticorum.</i>	CARABUS.	75

***** Antennis undique æqualibus.

<i>Ant. filiformes inter oculos. Femora postica crassa.</i>	ALTICA.	84
<i>Ant. filif. inter oculos approximata. Thorax inæqualis, marginatus.</i>	GALERUCA.	83
<i>Ant. filif. inter oculos pendulæ. Thorax subrotundus, gibbus.</i>	BRUCHUS.	57
<i>Ant. filif. inter oculos distantes. Caput intra thoracem rotundatum, receptum.</i>	CRYPTOREPHALUS.	58
<i>Ant. filif. inter oculos distantes, pendulæ. Thorax planiusculus, marginatus.</i>	LUPERUS.	83
<i>Ant. filiformes. Pedes postici natatorii.</i>	DYTICUS.	69

<i>Antennæ ferratæ. Thorax depressus, dentatus.</i>	PRIONUS.	74
<i>Ant. filiformes. Thorax muticus.</i>	LEPTURA.	92
<i>Ant. filif. Thorax teretiusculus. Caput exsertum, oculi prominuli.</i>	CICINDELA.	79
<i>Ant. filif. infra oculos. Thorax postice angustior. Caput inclinatum.</i>	CANTHARIS.	80
<i>Ant. filif. supra oculos. Thorax lunatus. Caput tectum.</i>	LAMPYRIS.	63
<i>Ant. filiformes. Thorax marginatus. Caput detectum.</i>	THELEPHORUS.	61
<i>Ant. moniliformes. Thorax cylindricus. Caput deflexum. Oculi prominuli.</i>	CRIOCERIS.	85
<i>Ant. moniliformes. Thorax planus, marginatus.</i>	TENEBRIO.	74
<i>Ant. vibrantes. Elytra linearia. Alæ plumosæ. Cauda aculeata.</i>	THRIPS.	96
<i>Ant. filif. Elytra dimidiata. Alæ testæ. Cauda vesiculosa.</i>	STAPHYLINUS.	97
<i>Ant. filif. Elytra dimidiata. Alæ pene-testæ. Cauda forcipata.</i>	FORFICULA.	96
<i>Ant. filif. Elytra dimidiata. Alæ nudæ. Cauda mutica.</i>	NECYDALIS.	96
<i>Ant. triangulares. Elytra coriaceo membranacea.</i>	ACRIDIUM.	100

2. H E M I P T E R A.

* Ore rostrato.

<i>Antennæ thorace breviores. Pedes postici saltatorii.</i>	CICADA.	102
<i>Ant. thorace longiores. Pedes cursorii.</i>	CIMEX.	104
<i>Ant. cheliformes. Pedes ambulatorii.</i>	NEPA.	104
<i>Ant. brevissimæ. Pedes postici natatorii.</i>	NOTONECTA.	103
<i>Ant. setaceæ. Pedes ambulatorii. Abdomen bicornæ.</i>	APHIS.	109

** Pectore rostrato.

<i>Alæ quatuor. Pedes saltatorii.</i>	PSYLLA.	109
<i>Alæ duæ masculis. Abdomen setis conditis.</i>	CHERMES.	111
<i>Alæ duæ masculis. Abdomen postice setosum. Fœmina folliculi forma.</i>	COCCUS.	111

3. LEPIDOPTERA.

GENERA : Pag.

<i>Antennæ</i> clavatæ.	PAPILIO.	111
<i>Ant.</i> medio crassiores.	SPHINX.	116
<i>Ant.</i> sensim attenuatæ.	PHALÆNA.	117

4. NEUROPTERA.

* Antennis brevibus.

<i>Os</i> maxillosum. <i>Cauda</i> foliacea.	LIBELLULA.	139
<i>Os</i> edentulum. <i>Cauda</i> setosa.	EPHEMERA.	142
<i>Os</i> palposum. <i>Cauda</i> mutica.	MYRMELEON.	147

** Antennis elongatis.

<i>Os</i> palposum. <i>Alæ</i> deflexæ.	PHRYGANEÆ.	144
<i>Os</i> maxilla fissæ. <i>Alæ</i> subæquales.	HEMEROBIUS.	145
<i>Os</i> rostratum. <i>Cauda</i> chelata.	PANORPA.	147
<i>Os</i> maxilla simplici. <i>Alæ</i> inæquales.	RAPHIDIA.	147

5. HYMENOPTERA.

* Antennis filiformibus.

<i>Aculeus</i> reconditus, ferratus.	TENTHREDO.	148
<i>Aculeus</i> exsertus ferratus.	SIREX.	150
<i>Aculeus</i> exsertus vagina bivalvi.	ICHNEUMON.	151
<i>Aculeus</i> reconditus, punctorius. <i>Alæ</i> neutris nullæ.	MUTILLA.	166

** Antennis fractis.

<i>Aculeus</i> subexsertus. <i>Anus</i> dentatus.	CHRYISIS.	162
<i>Aculeus</i> reconditus, spiralis.	CYNIPS.	147
<i>Aculeus</i> reconditus. <i>Alæ</i> planæ.	SPHEX?	160
<i>Aculeus</i> reconditus. <i>Alæ</i> superiores plicatæ.	VESPA.	162
<i>Aculeus</i> reconditus, punctorius. <i>Os</i> rostro deflexo, bivalvi.	APIS.	163
<i>Squamula</i> thoraci & abdomini intermedia. <i>Alæ</i> neutris nullæ.	FORMICA.	166

6. DIPTERA.

GENERA: Pag.

a. Proboscidea.

* Seti-vel plumifera.

<i>Antenna</i> seta laterali.	MUSCA.	171
<i>Ant.</i> pluma laterali.	VOLUCELLA.	178
<i>Ant.</i> seta terminali.	NEMOTELUS.	179

* * Mutica.

<i>Ant.</i> clavata.	STRATIOMYS.	177
<i>Ant.</i> acuminata.	TABANUS.	179

b. Rostrata.

<i>Ant.</i> setacea; rostrum obtusum.	HIPPOBOSCA.	183
<i>Ant.</i> rostrum setaceum.	BOMBYLIUS.	182
<i>Ant.</i> subulata; rostrum porrectum.	ASILUS.	180
<i>Ant.</i> rostrum geniculatum.	CONOPS.	180
<i>Ant.</i> pectinata; rostrum nutans.	CULEX.	182
<i>Ant.</i> subulata; rostrum inflexum.	EMPIS.	182

c. Mutica.

<i>Ant.</i> e globulo setacea.	OESTRUS.	166
<i>Ant.</i> pectinata.	TIPULA.	167
<i>Ant.</i> perfoliata.	BIBIO.	171

7. APTERA.

a. Nuda.

* Pedibus sex.

<i>Os</i> rectum, aculeatum.	PEDICULUS.	184
<i>Os</i> inflexum, rostratum.	PULEX.	186
<i>Os</i> maxillosum.	TERMES.	184

* * Pedibus octo.

<i>Oculi</i> 2; <i>Antenna</i> setacea.	ACARUS.	186
<i>Oculi</i> 4; <i>Antenna</i> pediformes.	PHALANGIUM.	191
<i>Oculi</i> 2, 4, 6; <i>Antenna</i> nulla.	HYDRACHNA.	188
<i>Oculi</i> 8; <i>Antenna</i> maribus clavata.	ARANEA.	192

b. Squamata.

<i>Cauda</i> fetis exsertis.	LEPISMA.	183
<i>Cauda</i> fetis inflexis.	PODURA.	183

c. Crusta-

c. *Crustacea.*

GENERA: Pag.

<i>Peas</i> 8, <i>Antenna</i> nullæ.	POLYPHEMUS.	201
<i>Pedes</i> 8, <i>Antenna</i> 2 vel 4.	CYCLOPS.	200
<i>Pedes</i> 10 vel 14. <i>Antenna</i> 4 integræ.	SQUILLA.	197
<i>Pedes</i> 10, <i>Antenna</i> 2 integræ.	CANCER.	195
<i>Pedes</i> 14, <i>Antenna</i> fractæ.	ONISCUS.	197
<i>Pedes</i> plurimi simplices; corpus lineare, depressum.	SCOLOPENDRA.	201
<i>Pedes</i> plurimi duplicati; corpus cylindraceum.	JULUS.	201

d. *Testacea.*

* Univalvia.

<i>Pedes</i> 4, <i>Oculus</i> 1.	AMYMONE.	198
<i>Pedes</i> 4, 6, 8; <i>Oculi</i> 2.	BINOCULUS.	200
<i>Pedes</i> 6; <i>Oculus</i> nullus.	NAUPLIUS.	198

** Bivalvia.

<i>Antenna</i> capillaceæ superæ; <i>Pedes</i> 4; <i>Oculus</i> 1.	CYPRIS.	198
<i>Antenna</i> capillaceæ superæ; <i>Ped.</i> 8. <i>Oculi</i> 2.	LYNCEUS.	199
<i>Antenna</i> ramosæ; <i>Ped.</i> 8-12. <i>Oculus</i> 1.	DAPHNE.	199

CHARACTERES VERMIUM.

I. INFUSORIA.

* Organis externis nullis.

Punctiforme.	MONAS.	202
Sphæricum.	VOLVOX.	202
Cylindraceum.	ENCHELIS.	202
Teres, elongatum.	VIBRIO.	203
Teres, cavum.	BURSARIA.	206
Complanatum, orbiculare vel ovatum.	CYCLIDIUM.	204
Complanatum, oblongum.	PARAMÆCIUM.	205
Complanatum, sinuatum.	KOLPODA.	205
Complanatum, angulatum.	GONIUM.	205

** Orga-

* * Organis externis. GENERA : Pag.

Rotundato-caudatum.	CERCARIA.	206
Altera parte crinitum.	TRICHODA.	206
Nudum, apice ciliatum.	VORTICELLA.	209
Testa tectum, apice ciliatum.	BRACHIONUS.	212

2. H E L M I N T H I C A.

* Mutica.

Teres, æquale, filiforme.	GORDIUS.	212
Teres, postice attenuatum.	ASCARIS.	213
Teres, proboscide retractili.	ECHINORYNCHUS.	214
Antice & postice dilatabile.	HIRUDO.	219
Depressum, cateniforme.	TÆNIA.	219

* * Setosa.

Teres, <i>tentaculis</i> nullis.	LUMBRICUS.	215
Teres, <i>tentac.</i> setaceis.	NEREIS.	217
Teres, <i>tentac.</i> flexuosis.	AMPHITRITE.	216
Depressum, <i>tentac.</i> nullis.	NAIS.	219
Depressum, <i>tentac.</i> annulatis.	APHRODITA.	218

3. M O L L U S C A.

* Ore supero.

Læve, <i>cirris</i> nullis, <i>apertura</i> unica.	MAMMARIA.	224
Læve, <i>cirris</i> nullis, <i>aperturis</i> binis.	ASCIDIA.	224
Inane, <i>cirris</i> marginalibus.	HYDRA.	230
Rugosum, <i>cirris</i> excentricis.	ACTINIA.	230
Vaginatum, <i>cirris</i> verrucosis.	SEPIA.	232
Pedunculatum, capitulo mutico vel aristato.	PEDICELLARIA.	229

* * Ore antico.

Latiusculum æquale, plicatile.	PLANARIA.	221
Teres, <i>poris</i> duobus, altero laterali.	FASCIOLA.	223
Grossum, <i>tentaculis</i> ramosis.	HOLOTHURIA.	231
Nudum <i>brachiis</i> teretibus.	LERNÆA.	226

Vagina-

GENERA : Pag.		
Vaginaturn, <i>brachiis</i> dilatatis.	CLIO.	226
Supra convexum subtus planum, lobatum.	LOBARIA.	226
Depressum, <i>tentaculis</i> duobus.	DORIS.	229
Subtus carinatum <i>tent.</i> subulatis.	MYXINE.	227
Clypeatum, <i>tentaculis</i> quatuor.	LIMAX.	227

*** Ore infero.

Gelatinosum, laeve, subtus cavum.	MEDUSA.	233
Coriaceum, scabrum, subtus sul- catum.	ASTERIAS.	233
Costatum, costis ciliatis.	BEROE.	232
Gelatinosum, rugosum, brachiatum.	LUCERNARIA.	227

4. T E S T A C E A.

a. Univalvia.

* Testa pervia.

Crustacea, ano verticali, <i>tentaculis</i> simplicibus.	ECHINUS.	235
Crustacea, ano infero, <i>tentaculis</i> penicillatis.	SPATAGUS.	236
Calcarea, rudi, <i>tentaculis</i> nullis.	DENTALIUM.	236

** Testa patula.

<i>Apertura</i> effusa; <i>tentaculis</i> nullis.	AKERA.	242
<i>Apert.</i> profunda, <i>tentac.</i> binis.	ARGONAUTA.	238
<i>Apert.</i> repanda, <i>tentac.</i> binis seta- ceis colliculo extrinse- co oculatis.	BULLA.	242
<i>Apert.</i> oblonga, <i>tent.</i> binis trian- gularibus, angulo in- trinseco oculatis.	BUCCINUM.	243
<i>Apert.</i> ovata, <i>tent.</i> binis truncatis conspicuis, angulo in- trinseco oculatis.	CARYCHIUM.	242
<i>Apert.</i> subquadrata, <i>tent.</i> binis li- nearibus, apice oculatis.	VERTIGO.	241

Apert.

<i>Apertura</i> orbiculari, <i>tentaculis</i> binis setaceis, conspicuis, angulo extrinsecō oculatis.	TURBO.	242
<i>Apert.</i> lunari, <i>tentac.</i> quatuor linearibus, apice oculatis.	HELIX.	239
<i>Apert.</i> semilunari, <i>tent.</i> binis setaceis, angulo intrinsecō oculatis.	PLANORBIS.	238
<i>Apert.</i> totali, <i>tent.</i> binis truncatis, oculatis, angulo intrinsecō oculatis.	ANCYLUS.	237
<i>Apert.</i> totali, <i>tent.</i> binis setaceis occultis, angulo extrinsecō oculatis.	PATELLA.	237
<i>Apert.</i> repanda, <i>poris</i> pertusa.	HALIOTIS.	238

*** Testa operculata.

Libera, <i>apertura</i> canaliculata; <i>tentaculis</i> 2 linearibus, angulo extrinsecō oculatis.	TRITONIUM.	243
Libera, <i>apert.</i> subtetragona; <i>tent.</i> 2 setaceis, colliculo extrinsecō oculatis.	TROCHUS.	242
Libera, <i>apert.</i> lunari; <i>tent.</i> 2 setaceis, angulo extrinsecō oculatis.	NERITA.	244
Libera, <i>apert.</i> circinnata; <i>tent.</i> 2 setaceis, angulo postico oculatis.	VALVATA.	239
Adnata, <i>apert.</i> orbiculari; <i>tent.</i> pennatis.	SERPULA.	236

b. *Bivalvis*.

* Cardine dentata.

<i>Testa</i> altera extremitate hiantē; <i>Card.</i> dente crasso solitario.	MYA.	245
<i>Testa</i> utraque extremitate hiantē; <i>Card.</i> dente reflexo, sæpe gemino.	SOLEN.	245
<i>Siphone</i> duplici mutico; <i>Card.</i> dentibus utrinque tribus, alternis.	TELLINA.	246
<i>Siphone</i> duplici, cirrato pedeque falciformi; <i>Card.</i> dentibus mediis alternis, remotis penetrantibus.	CARDIUM.	248

Siphone

GENERA: Pag.

<i>Siphone</i> duplici, cirrato pedeque lami- næformi; <i>Card.</i> dentibus tribus approximatis, late- ralibus divergentibus.	VENUS.	246
<i>Card.</i> dente medio complicato, ad- jacente foveola.	MACTRA.	245
<i>Card.</i> dentibus duobus, laterali- que solitario.	DONAX.	246
<i>Card.</i> dentibus numerosis, alternis penetrantibus.	ARCA.	247
<i>Branchiis</i> cincinnatis; <i>Card.</i> dentibus alterius uncinatis, valvula superiore deorsum perforata.	TEREBRATULA.	249

* * Cardine edentulo.

<i>Branchiis</i> simplicibus; valvula inferiore perforata.	ANOMIA.	248
<i>Branchiis</i> simplicibus pede nullo; <i>Car- dinis</i> fossula cava.	OSTREA.	247
<i>Branchiis</i> cirratis pede juxta auriculam; <i>Card.</i> fossula ovata, bys- sum emittens.	PECTEN.	248
<i>Siphone</i> duplici brevi; fossula lineari, byssum emittens.	MYTILUS.	249

* Multivalvia.

<i>Valvula</i> dorsales; <i>Tentacula</i> nulla.	CHITON.	250
<i>Valvula</i> erectæ; <i>Tentacula</i> bipartita.	LEPAS.	250
<i>Valvula</i> ad cardinem minores.	PHOLAS.	251

5. C E L L U L A N A.

* Calcareæ.

Articulata, tenera.	CORALLINA.	253
Articulata, lapidea.	ISIS.	251
Tubulosa, aggregata vel solitaria.	TUPIPORA.	252
Foraminulosa.	CELLEPORA.	253
Lamelloso-stellata.	MADREPORA.	252
Pertusa poris.	MILLEPORA.	252

* * Sub.

*** Subcornea.

GENERA: Pag.

Tubulosa, <i>tentaculis</i> simplicibus.	FISTULARIA. 254
Tubulosa, <i>tent.</i> cristatis.	TUBULARIA. 254
Ramosa, nuda, <i>tent.</i> manifestis.	SERTULARIA. 255
Ramosa, incrustata, <i>tent.</i> inconspicuis.	GORGONIA. 253

*** Fungosa.

Officulum polypiferum.	PENNATULA. 255
Suberosa, polypis stellatis.	ALCYONIUM. 255
Stuposa, osculis hiantibus.	SPONGIA. 255
Osculis atomiferis.	CLAVARIA. 256

Elvelæ & Phalii species, *Sphæria* & *Trichia* mucidarum-
que pleræque huc forte referendæ, motum vero atomorum vere
spontaneum in iis nondum vidi.

1. M A M M A L I A.

I. B R U T A.

1. **T**RICHECHUS, *Rosmarus* dentibus laniariis superioribus exsertis. Norv. *Hav-Hest*, *Hval-Ros*, *Rosmar*. Isl. *Rost-Unger*. Lap. *Morfsk*. Grænl. *Auk*. Mus. reg. p. 15. WORM. Mus. 289. f. OLEAR. Mus. t. 23. f. 3. EGEDE Grænl. c. 6. CRANTZ Grænl. p. 165. STRÖM. Söndm. I. p. 157. PONTOP. *Norske Naturh.* 2, c. 4, p. 255. f. APH. *Naturh.* 6, p. 556. SPEC. reg. p. 178.

In exemplari Grænländico dentes molares inferioris utrinque quatuor, superius quinque.

2. **T.** *Manatus* dentibus laniariis inclusis. Sœe-Koe, *Hav-Nödd*. APH. 7, 487. *Havmand*, *Marmenil*, *Marmale*, *Marmærke*, *Hav-Strambe*, *Sirene*? BARTHOL. h. anat. Cent. 2. p. 188. Aët. nidr. 2, p. 268. EG. Gr. c. 6, p. 56. i. Sp. r. 166.

2. F E R Æ.

3. **PHOCA** *vitulina* capite lævi inauriculato. Dan. *Sal-Hund*. N. *Kob*, *Klapmüts*, *Svartside*. I. *Selv*. Gr. *Purfe*. EG. Gr. c. 6. f. CR. Gr. 163. Sp. r. 177. Isl. R. 652-656. APH. 7, 13. LEEM. Lapp. p. 212. Deb. Fær. 146.

Multa adhuc in Phocarum historia desiderantur;
Færoens. *Steen-Kob*, *Later-Kob*, Islandorum *Land-Nord-Ut-Aukur*. *Vade Fletti*. *Blandri*. *Opno-Gran-Selv*; Lapponum *Dævek*, *Jagee*, *Nuonisk*, *Dalia*, *Oaido*, *Fatnevindue*

vindne, Hauskar-Gubbo. Grœnlandorum Attarsoak, Attarsoit, Kassigiak, Noitsek, Neitfersoak, Uksuk, Atak, Ataitseak; varietates an species?

4. CANIS *familiaris* cauda recurvata. Hund. D. Rakke, Koter, Mynde, Støver, Pudel, Tieg. N. Bikkie, Bue-Hund, Kof-Vara, Garvore. I. Lubba, Dverg-Lund cauda truncata. Gr. Kemmek. APH. 3, 553.
Danus major & minor apud exteros, in patria rarissime, occurrunt.
5. C. *Lupus* cauda incurvata. D. Ulv. N. Graabeen, Varg. L. Kumpi, Stolpe, Saibek, Gaine, Olgobutzh. APH. 8, 284. Isl. R. 650.
6. C. *Vulpes* cauda recta, apice albo. Ræv, Eiter-Unge. L. Rup-jok, Raude, Zbiaepok, Vielgok. Gr. Terrianniak. APH. 6, 465. L. Lapp. 193. a, fulvus. b, ferrugineus. c, cruciatus. d, albus. e, ater. f, argentatus.
Gras-Tofur Islandorum an specie, uti affectione diversa?
7. C. *Lagopus* cauda recta, apice concolore. N. Field-Rak, Mel-Rak. L. Nial. a, albus. b, carulescens.
8. FELIS *Catus* cauda elongata, fusco annulata, corpore fasciis nigricantibus; dorsalibus longitudinalibus tribus; lateralibus spiralibus. Kat. APH. 4, 299.
9. F. *Lynx* cauda abbreviata, apice atra; auriculis apice barbatis. N. Los, Goup. L. Albos. PONT. N. N. 2, c. 1. §. 5. f. a, Ulv-Goupe. b, Ræv-Goupe. c, Føl-Goupe, d, Kat-Goupe.
10. MUSTELA *Lutra* plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio brevior. D. Odder. N. Otter, Slen-ter. L. Zbievres. a, Rød-Brun: Brem-Odder. b, Sort-Brun: Fiord-Odder. c, Kul-Sort: Ferjk-Vands.

Vands-Odder, *Vas-Otter*, *Søe-Otter*. STR. S.
155. L. L. 208. APH. 6, 7.

11. *M. Gulo* pedibus fissis, corpore rufo-fusco, medio dorfi nigro. N. *Ferf*, *Filfras*, *Ferv*. L. *Gieedk*. P. N. N. 2, c. 1. §. 11. f. APH. 4, 42. Act. nidros. 3. p. 143, t. 3, f. 5.
12. *M. Martes* pedibus fissis, corpore fulvo nigricante, gula pallida. *Maar*. N. *Aspe-Maar*, *Birke-Maar*, *Fyrre-Maar*. L. *Natte*. P. N. N. 2. c. 1. §. 12. f.
13. *M. Putorius* pedibus fissis, corpore flavo nigricante, ore auriculisque albis. D. *Ilder*. L. *Boanid*, *Boitta*, masc. *Goa-aige*; fæmin. *Gad-fe*. APH. 4, 70.
14. *M. Erminea* pedibus fissis, caudæ apice atro. D. *Læ-Kat*, *Væfel*. N. *Rös-Kat*, *Hermelin*. P. N. N. 2 c., §. 14. f. APH. 3, 406.
15. *M. nivalis* pedibus fissis, corpore albo, caudæ apice vix pilis nigris. N. *Snee-Muus*. L. *Seibbsb*.
16. URSUS *Arctos* cauda abrupta. N. *Biörn*, *Ilgiersdyr*, *Græs-Dyr*, *Myre-Biörn*. L. *Guouzbis*, mas: *Aenak*; fæmina: *Aeste*. W. M. 318. P. N. N. 2. c. 1. §. 7. f. L. Lap. c. 12. Aph. 1, 326.
Pro varia ætate *Mourtus*, *Græs Biörn*, *Heste-Biörn*.
- 16.b *U. albus*. Gr. *Nennok*. MART. Spitz. t. O, f. c. EG. Gr. c. 6. Sp. r. 186. in aqua & in terræque vivere dicitur.
17. *U. Meles* cauda concolore, corpore supra cinereo, subtus nigro; fascia longitudinali per oculos auresque nigra. *Grævling*. D. *Brok*. N. *Svinn-Sax*. APH. 1, 452. 3, 144.
18. TALPA *europæa* caudata pedibus pentadactylis. *Muld-varp*, N. *Vond*.

19. SOREX *Araneus* cauda mediocri, corpore subtus albido.
D. *Angel-Muus*. N. *Nebbe-Muus*, *Musefskiar*.
L. *Zibak*.
20. ERINACEUS *europæus* auriculis rotundatis, naribus cristatis. D. *Pind-Sviin*. N. *Bustivil*. APH. 6, 243.

3. GLIRES.

21. VESPERTILIO *murinus*, caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus. D. *Flaggermuus*, *Aftenbakke*. N. *Skind-Vinge*.
22. V. *auritus* caudatus, naso oreque simplici, auriculis duplicatis, capite majoribus. O. M. t. 15. f. 1. APH. 2. f. 412.
23. LEPUS *timidus* cauda abbreviata, auriculæ apice nigris. *Harc*. N. *Jase*. L. *Niaamel*. Gr. *Ukalek*, *Niger* & alius *corniculis duobus*: W. M. p. 321. M. R. t. 3, f. 6-8. *pedibus septem*: M. Reg. t. 9. f. 56. APH. 3, 309.
24. L. *Cuniculus* cauda abbreviata, auriculis nudatis. D. *Kanin*. APH. 4, 259. *cærulefcens*: D. A. 1, p. 606.
25. CASTOR *Fiber* cauda ovata, plana. N. *Bæver*. L. *Majeg*. W. M. 320. P. N. N. 2. c. 1. §. 15. f. L. L. 203. APH. 1, 161.
26. MUS *Lemmus* cauda abbreviata, pedibus pentadactylis, corpore fulvo nigro-vario. W. M. p. 325. fig. O. M. t. 12. f. 6. M. R. p. 6. N. *Leman*, *Leming*. L. *Godde-Sapan*. P. N. N. 2, c. 1. §. 20. f.
27. M. *terrestris* cauda mediocri subpilosa, palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis vellere brevioribus. *Mark-Muus*.

28. *M. Musculus* cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: pollice mutico. D. Lille-Muus. N. Huus-Muus. a, graa. b, fort.
29. *M. Sylvaticus* cauda mediocri, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore griseo, pilis nigris; abdomine albido. Skov-Muus.
30. *M. amphibius* cauda elongata pilosa, plantis palmatis. D. Vand-Rotte. N. Vasmuus, Vand/skier. APH. 6, 564.
31. *M. Rattus* cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, plantis pentadactylis. Rotte. APH. 6, 561.
32. *SCIURUS vulgaris* auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. D. Egern. N. Ikorn. L. Orre. a, rufus. b, ater. APH. 2, 171.
33. *Sc. Volans* hypochondriis prolaxis volitans; cauda rotundata. N. Flyve-Ekorn.

4. P E C O R A.

34. *CERVUS Alces* cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali. N. Elg, Elsdyr, Ellgur. M. R. t. 3. f. 3. OL. M. t. 9. f. 2. P. N. N. 2, p. 18. f. APH. 2, 206.
35. *C. Elaphus* cornibus ramosis, totis teretibus recurvatis. Hiort, Kronhiort, Adelhiort. N. Röd-Dyr; fæmina: Dyrkolle. APH. 3, 457.
36. *C. Tarandus* cornibus ramosis recurvatis teretibus; summitatibus palmatis. N. Ren, Rens-Dyr, Hreindyr, Graa-Dyr, Halsbuk. L. Godde. Gr. Tukto. O. M. t. 10, f. 3. L. Lap. c. 12. P. N. N. 2, p. 18. APH. 6, 492.

37. C. *Dama* cornibus ramosis recurvatis compressis: summitate palmata. D. *Dam - Hiort*, *Daa - Dyr*. APH. 2, 1.
38. C. *Capreolus* cornibus ramosis teretibus erectis; summitate bifida. *Raa*, *Raa-Dyr*, *Raa-Buk*. APH. 6, 457.
39. CAPRA *Hircus* cornibus carinatis arcuatis, gula barbata. *Gied*, *Buk*. APH. 1, 43; 3, 42.
40. OUIS *Aries* cornibus compressis lunatis. D. *Faar*, *Lam*, *Gimmer-Lam*. N. *Soud*, *Smale*, *Kaas*. APH. 2, 253. Cornu e latere dextro, M. R. t. 2, f. 4.
41. BOS *Taurus* cornibus teretibus extrorsum curvatis, palearibus laxis. *Nod*, *Höved*, *Oxe*, *Koe*, *Tyr*. APH. 6, 410.

5. BELLUÆ.

42. EQUUS *Caballus* cauda undique setosa. *Hest*; mas: *Hingst*, fœmina: *Hoppe*. APH. 3, 411.
43. SUS *Scrofa* dorso antice setoso, cauda pilosa. *Sviin*; mas: *Rone*, *Orne*; fœmina: *Soe*, *Purke*; pulli: *Griis*. S. aper; *Vild-Sviin*. APH. 7, 702.

6. CETE.

44. MONODON *Monoceros*. N. *Nar-Hval*, *Lighval*. I. *Naa-hval*. Gr. *Tauvar*, *Killelluak kernektok v. tugalik*. M. R. t. 2, f. 6. W. M. c. 14. fig. EG. Gr. c. 6. fig. APH. 3, 604. BARTH. unic. c. 15, f. 121. Sp. r. 130.
45. BALÆNA *Mysticetus* naribus flexuosis in medio capite; dorso impinni. N. *Hvalfsk*, *Sletbak*, *Grönlandsk Hval*. I. *Vatusbualr*. Gr. *Arbek*, *Arbavirksoak*. M. R. t. 6, f. 2. MART. Sp. t. Q. f. a, b. EG. Gr. c. 6. fig. CR. Gr. 141. APH. 3, 598. Sp. r. 134.

Old. Taberni
fau na Groenl.
n. 18.

n. 20.

n. 22.

Balaena Groenl. v. 8 p. VIII.

46. B. *Physalus* fistula duplici in medio capite; dorso extremo pinna adiposa. N. Rör-Hval, Finne-Fisk, Tue-Qval; Stor-Hval. Gr. Kepokak, Kepokarsoak. L. Reider. I. Hunfubakr. M. Sp. t. Q. f. c. EG. Gr. c. 6. fig. L. Lap. 298. APH. 3, 594. n. 21.
47. B. *Muscus* fistula duplici in fronte; maxilla inferiore multo latiore. ASCAN. ic. 26. 23.
48. B. *rostrata* minima rostro longissimo & acutissimo. N. Nebbe-Hval, Butskopf. I. Anderne-Fia, Fær-Døgling, Sandæta. EG. Gr. c. 6. P. N. N. 1, fig. Isl. R. 660. D. F. 157. * † n. 24.
49. B. *glacialis*. N. Sild-Qval, Lille-Hval, Nørd-Kaper. EG. Gr. c. 6. APH. 3, 594. * † 23.
50. B. *albicans*. I. Hrafn-Reyður, Hrefna, Huitingar. Gr. Killelluak. EG. Gr. c. 6. fig. CR. Gr. 150. KLEIN. pisc. miss. 2. p. 12. Isl. R. 660. APH. 3, 603. * † 32.
51. PHYSETER *Catodon* dorso impinni; fistula in rostro. N. Svine-Hval, Kaskelot, Pot-Fisk. Gr. Kigutilik. EG. Gr. c. 6. CR. Gr. 149. APH. 3, 606. } n. 25.
52. Ph. *macrocephalus* dorso impinni; fistula in cervice. N. Trolld-Hval, Huus-Hval, Sue-Hval, Buur-Hval, Bardhualir. APH. 3, 597. } n. 25.
53. Ph. *microps* dorso pinna longa; maxilla superiore longiore. N. Staur-Hyning, Kobbe-Herre. Gr. Tikagulik. STR. S. 299. n. 27.
54. DELPHINUS *Phocæna* corpore subconiformi, dorso lato; rostro subobtusulo. Tumber. N. Nise. Gr. Nisa. EG. Gr. c. 6. Act. nidr. 2, 258. t. 4. n. 29.
55. D. *Delphis* corpore oblongo, subtereti; rostro attenuato, acuto. D. Marjvin. N. Springer. I. Huyfen, Hofrung, Leipter. Sp. r. 121. 30.

Defunct. monodon parvus. 17de. 8. salt. 56. n. 19.
Physeter. Turpis - - - - - 26

n. 31. 56. *D. Orca* rostro fursum repando; dentibus latis ferratis.
D. Óre - Svin, *Tandtböye*. *N. Spek - Hugger*,
Hval-Hund, *Springer*. *I. Huyding*. *STR. S. I*,
 309. *APH. 7*, 553.

n. 28. 57. *D. Orca* dorfi pinna altissima; dentibus subconicis, parum
 incurvis. *N. Stour-Vangen*, *Vand-Hund*, *Staal-*
Fønning, *Wagn-Hualur*, *Sp. reg. 121*. *L. Fakan*.
I. Haa-Hyrningur. *Gr. Arlo*, *Arlorfoit*. *Act. nidr.*
4, 99. *L. Lap. 304*. (158.) * †

An eadem cum proxime præcedente? an *Phyl-*
microps? obstant dentes conici & in utra-
 que maxilla.

Röd - Kammen, *Hav - Ert*: *L. L. 215*. *Tan-*
nulik, *Sigokitsfok*; *Amarok*: *EG. Gr. conf.*
CR. Gr. cont. Svinbualur, *Skiold- Geyr-*
Bard-Huölum; *Fiskreki*, *Sildreki*, *Steipe-*
reidur, *Mioareidur*, *Hafurkytti*; *Detter*,
Spret-Fiskur, *Stöckull*, *Blödrabualur*; quæ-
 nam *Cetorum* species aut varietates? *conf.*
Spec. regale & notata clarissimi ERICHSEN,

II. A V E S.

I. A C C I P I T R E S.

58. VULTUR *Albicilla* cera pedibusque flavis, rectricibus albis: intermediis apice nigris. *Fiske-Örn.* BRÜNNICH. ornith. 12. L. Lap. 213.
59. FALCO *Chrysaëros* cera lutea, pedibus lanatis luteo-ferrugineis, corpore fusco ferrugineo vario, cauda nigra basi cinereo-undulata. N. *Land-Örn.*
60. F. *offifragus* cera lutea, pedibus semilanatis, corpore ferrugineo, rectricibus latere inferiore albis. D. *Gaase-Örn, Konge-Örn.* N. *Field-Örn.* BRÜNN. orn. 13.
61. F. *Milvus* cera flava, cauda forficata, corpore ferrugineo. capite albidior. *Glante.*
62. F. *gentilis* cera pedibusque flavis, corpore cinereo maculis fuscis, cauda fasciis quatuor nigricantibus. D. *Hönse-Höeg.*
63. F. *subbuteo* cera pedibusque flavis, dorso fusco, nucha alba, abdomine pallido maculis oblongis fuscis. D. *Lærke-Falk, Blaa-Falk.*
64. F. *Buteo* cera pedibusque luteis, corpore fusco, abdomine pallido maculis fuscis. D. *Örne-Falk.* N. *Skiör-Vinge.*
65. F. *Tinnunculus* cera pedibusque flavis dorso rufo punctis nigris, pectore striis fuscis, cauda rotundata. D. *Kirke-Falk, Spurv-Höeg.* APH. 3, 507.

66. F. *Haliaetus* cera pedibusque cæruleis, corpore supra fusco, subtus albo, capite albido. N. *Fiske-Giøe*, *Blaafot*, *Fiskejou*.
67. F. *Lanarius* cera lutea pedibus rostroque cæruleis, corpore subtus maculis nigris longitudinalibus. *Smirle*.
68. F. *apivorus* cera nigra pedibus seminudis flavis, capite cinereo, caudæ fascia cinerea apice albo. *Muse-Høeg*, *Muus-Vaage*. N. *Slag-Høeg*, *Spend-Høeg*, *Morads-Høeg*. A.P.H. 3, 508.
69. F. *æruginosus* cera virescente, corpore griseo; vertice, gula, axillis, pedibusque luteis. D. *Hönse-Høeg*, *Dverg-Glente*. N. *Hönse-Tyv*.
70. F. *palumbarius* cera nigra margine pedibusque flavis, corpore fusco, rectricibus fasciis pallidis, superciliis albis. D. *Slet-Falk*, *Graa-Falk*, *Hvid-Falk*, *Blaa-Fugl*, *Guulbek*. N. *Due-Falk*, *Stor-Høeg*.
71. F. *Nisus* cera viridi, pedibus flavis, abdomine albo griseo undulato, cauda fasciis nigricantibus. *Spurre-Høeg*.
72. F. *Pygargus* cera pedibusque flavis, corpore cinereo, abdomine pallido maculis oblongis rufis, oculorum orbita alba. P. D. A. t. 25.
73. F. *Islandus*. conf. BR. ornith. 7-9. Isl. R. 86. * †
74. F. *Norvegicus*. Act. nidr. 4, p. 417. t. 13. N. *Graa-Falk*. * †
Slag-Ørn, *Skiörvinge*, an var. F. *chrysaetos*. Act. nidr. 4. p. 420. L. Lap. 230. *Klexe*, L. L. 234. *Nektoralik*; *Kirksoviarfuk*, *Opik Grænl. quinam*?
75. STRIX *Bubo* capite auriculato, corpore rufo. D. *Steen-Ugle*. N. *Bierg-Ugle*, *Roper*; *Kat-Ugl-Hane*.
76. St. *Orus* capite auriculato pinnis senis. D. *Horn-Ugle*.

77. St. *Nyctea* capite lævi, corpore albido maculis lunatis distantibus fuscis. N. *Gys-Fugl*; *Lemans-Griis*; *Gys-Ugl*. L. *Faggelofko*. L. Lap. 238.
78. St. *Aluco* capite lævi corpore ferrugineo, iridibus atris, remigibus primoribus ferratis. D. *Nat-Ugle*.
79. St. *flammea* capite lævi corpore luteo punctis albis, subtus albido punctis nigricantibus. P. D. A. t. 25. f. 5.
80. St. *Ulula* capite lævi, corpore supra fusco-albo maculato, rectricibus fasciis linearibus albis. *Ugle*.
81. St. *funerea* capite lævi, corpore fusco, iridibus flavis. *Krak-Ugle*. P. D. A. t. 25.
82. St. *stridula* capite lævi, corpore ferrugineo, remige tertio longiore. D. *Nat-Ugle*.
83. St. *passerina* capite lævi, remigibus maculis albis quinque ordinum. N. *Kat-Ugle*.
84. LANIUS *excubitor* cauda cuneiformi lateribus alba, dorso cano, alis nigris macula alba. D. *Tornskade*, *Harpax*. N. *Klavert*.
85. L. *Collurio* cauda subcunei formi dorso griseo, rectricibus quatuor intermediis unicoloribus, rostro plumbeo. D. *Tornskade*. N. *Hantvark*.

2. P I C Æ.

86. CORVUS *Corax* ater, dorso atro-cærulefcente, cauda subrotundata. *Ravn*. AFH. 6, 484.
Variat nigro & albo varius.
87. C. *Corone* atro cærulefscens totus, cauda rotundata; rectricibus acutis. *Blaa-Raage*.
88. C. *Cornix* cinerascens, capite jugulo, alis caudaque nigris. D. *Kraje*. N. *Kraake*. variat albus. AFH. 4, 463.

89. *C. Monedula* fuscus, occipite incano, fronte alis caudaque nigris. D. *Allike*. N. *Kaa, Kæie, Ravn-Kaate*. APH. 4, 194.
90. *C. glandarius* rectricibus alarum cæruleis: lineis transversis albis nigrisque, corpore ferrugineo variegato. D. *Skov-Skade*. APH. 7, 309.
91. *C. Caryocatactes* fuscus alboque punctatus, alis caudaque nigris, rectricibus apice albis: intermediis apice detritis. D. *Nødde-Krige*. N. *Nöt-Kraake; Nøddekriger*. a, rufus. b, albo nigroque maculatus.
92. *C. Pica* albo nigroque varius, cauda cuneiformi. D. *Skade, Huus-Skade*. N. *Skiör, Skiære, Skate, Tunfugl*. variat albus. W. M. p. 293. APH. 7, 198.
93. *C. infauftus*. BR. orn. p. 10? *Giertruds-Fugl, Ulyks-Fugl*.
94. CORACIAS *garrula* cærulea, dorso rubro, remigibus nigris. D. *Elle-Krage*. N. *Blaa-Kraake*.
95. CUCULUS *canorus* cauda rotundatata nigricante albo-punctata. D. *Giög-Kukert, Kuk, Kuk-Manden*, N. *Gouk*. ST. S. I, p. 229. APH. 3, 82.
96. JYNX *Torquilla*. D. *Vendebals, Dreybals*. N. *Saogouk*.
97. PICUS *Martius* niger pileo coccineo. N. *Sort-Spæt, Sort Hakke-Spæt, Sort Træ-Kloppe, Træ-Pikke, Lie-Haft*.
98. *P. viridis* viridis vertice coccineo. *Grøn-Spæt, Guul-Spæt*. L. *Zbiaine*.
99. *P. major* albo nigroque varius, crisso occipiteque nigro. *Hakke-Spæt, Træ-Spæt, Træ-Klak*.
100. *P. medius* albo nigroque varius, crisso pileoque rubris. D. *Flag-Spæt, Flak-Spærre*. N. *Kraakspære*.

101. *P. minor* albo nigroque varius, vertice rubro crisso testaceo. N. *Lille Træ-Pikke*.
102. *SITTA Europæa* rectricibus nigris : lateralibus quatuor infra apicem albis. D. *Spat-Meiffè*. N. *Nat-Vakke, Egde, Eremit*. St. S. 247. APH. 5, 565.
103. *UPUPA Epops* cristata, variegata. D. *Herfugl*. N. *Ær-fugl*. APH. 3, 403.
104. *CERTHIA familiaris* grisea, subtus alba, remigibus fuscis decem; macula alba; rectricibus decem. D. *Træ-Pikke, Lichesten*.
105. *ALCEDO Ispida* brachyura, supra cyanea, subtus fulva, loribus rufis.
Capta in prædio Enderupholmiensi Cimbricæ.

3. A N S E R E S.

106. *ANAS Cygnus* rostro semicylindrico atro, cera flava, corpore albo. *Svane, Snabel-Svane*. APH. 7, 693.
Svane-Sang? conf. W. M. 299.
107. *A. Tadorna* rostro fimo, fronte compressa, capite nigrovirescente, corpore albo variegato. D. *Grav-Gaas, Brand-Gaas, Grav-Drage*. N. *Ring-Gaas, Urgaas, Fager-Gaas, Rød-Bælle*; Færoen. *Hav-Sommer*; I. *Avekong*. P. N. N. c. 3. §. 8. f. APH. 3, 9.
Fœmina absque crista variat remigibus, exceptis extimis, apice albis.
108. *A. Spectabilis* rostro basi gibbo compresso : carina pennacea nigra, capite canescente. N. *Søe-Orre, Hav-Orre*. Gr. *Kingalik*. L. Lap. 275.
109. *A. fusca* nigricans, palpebra inferiore speculoque alarum albis. N. *Svart-Orre, Svart-And, Sorte*. Bornholm. *Sværte*. Act. nidr. I. t. 5.

110. *A. nigra* rostro basi gibbo, corpore toto nigro. N. *Svart-And*, *Sort Dup-And*.
111. *A. Marila* nigra humeris cinereo-undulatis, abdomine speculoque alari albis. *Pol/k-Ædelmand*. STR. S. 230, *den sidste*. P. D. Atl. I. t. 26.
112. *A. Anser* rostro semicylindrico, corpore supra cinereo, subtus pallidior collo striato. a, *ferus*: *Klinger-Gaas*, *Graa-Gaas*. b, *domesticus*: *Gaas*. APH. 3, 3.
113. *A. Erythropus* cinerea, fronte alba. N. *Field-Gaas*, *Helsing-Gaas*, *Finmarke-Gaas*. Feroen. *Bram-Gaas*. L. Lap. 265.
114. *A. Bernicla* fusca capite collo pectoreque nigris, collari albo. D. *Ray-Gaas*, *Rad-Gaas*. N. *Raat-Gaas*, *Gaul*, *Gagl*. I. *Helsingen*. Str. S. I. p. 227, 2. APH. 3, 8. Isl. R. 64. t. 33.
115. *A. Hrota* grisea, capite colloque nigris. N. *Gaul*. Isl. *Hrota*, *Mar-Gias*, *Gagl*. Isl. R. 667. * †
116. *A. mollissima* rostro cylindrico, cera postice bifida rugosa. D. *Eddergaas*, *Ederfugl*. N. *Ærfugl*. L. *Likka*. Gr. *Mittek*. BRÜN. monogr. Hav. 1763, c. fig. ejusd. ornith. bor. p. 14. APH. 2, 105. L. Lap. 267.
117. *A. clypeata* rostri extremo dilatato - rotundato: ungue incurvo. *Krøp-And*, *Stok-And*, *Leffel-And*.
118. *A. strepera* speculo alarum rufo nigro albo. D. *Knarr-And*, *Knarr-Gaas*.
119. *A. Clangula* nigro alboque varia, capite tumido violaceo: sinu oris macula alba. D. *Hvin-And*, *Blanke-Kniv*, *Bruus-Kop*. N. *Ring-Óie*. Fœmina: capite castio-rufescente.

120. *A. Glaucion* corpore nigricante, pectore nebuloso, speculo alarum albo lineari. D. *Krek-Kop, Dykker.*
121. *A. Penelops* cauda acutiuscula, crisso nigro, capite brunneo, fronte alba, dorso cinereo undulato. D. *Brun-Nakke, Blas-And, Græs-And, Stierr-And.*
122. *A. acuta* cauda acuminata elongata subtus nigra, occipite utrinque linea alba, dorso cinereo undulato. D. *Vinter-And.*
123. *A. hiemalis* cauda cuneata: rectricibus intermediis longis, corpore albo, temporibus pectore dorso alisque nigris. D. *Gadisse, Klaesban, Ungle, Dykere, Angletaske, Troesförrer.* N. *Hav-Old, Hav-Æller, Ha-Ella, Ha-Old, Havelda.* I. *Haavella.* Gr. *Aglek.* Variet. BRÜN. ornith. p. 17. Isl. R. t. 36. W. M. 302. Aët. nidr. 5. p. 539. t. 8. f. 1.
124. *A. ferina* cinereo-undulata, capite brunneo, fascia pectorali, crisso uropygioque nigro. D. *Brun-Nakke.* N. *Rød-Nakke, Kiærns-And.*
125. *A. Querquedula* macula alarum viridi, linea alba supra oculos. *Krik-And, Saur-And, Ört.*
126. *A. Crecca* speculo alarum viridi, linea alba supra infraque oculos. D. *Krik-And, Arteling-And.* N. *Heste-Lort-And, Krek-Ænder, Saur-Ænder.* St. S. 1. 220, 3. BR. orn. 82, 83.
127. *A. bistrionica* fusca albo cæruleoque varia; auribus, temporibus linea gemina; collari fasciaque pectorali albis. *Grav-And, Straum-And, Brimdue.* Isl. R. 668. t. 34. St. S. 243.
In duabus maculam in sinu oris croceam, haud albam, vidi.
An. *minutam* hujus esse fœminam test. reverend. OTHO FABRITIUS,

128. A. *Boschas* rectricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro recto. N. *Blaa-Hals*, *Blaa-Nakke*, *Blaa-koll*, *Græs-And*, *Stok-And*. a, *Vild-And*. b, *Tam-And*.
129. A. *Fuligula* crista dependente, corpore nigro; abdomine speculoque alarum albis. N. *Trold-And*.
130. A. *Skoorra* supra fusca punctis confertis; tania alarum obliqua, maculaque utrinque ad basin rostri albis; hypochondriis ferrugineis. A. latirostra BR. 91? L. *Skaar*. L. Lap. 266. * †
131. A. cristata nigra, pedibus croceis; collo inferior, pectore & abdomine albis. Isl. R. 668. I. *Hrafn-Ónd*. * †
132. A. crista gemina flava, pectore ferrugineo. I. *Sef-Ónd*. Isl. R. 668. t. 38. * †
133. MERGUS *Merganser* crista longitudinali erectiuscula; pectore albedo immaculata, rectricibus cinereis; scapo nigricante. N. *Fisk-And*, *Mort-And*. I. *Skiör-And*, *Gul-Ónd*, *Geir-Fugl*. W. M. 300. conf. BRÜN. ornith. 92-95. APH. 7, 281.
134. M. *Serrator* crista dependente; pectore rufescente variegato, collari albo, rectricibus fuscis cinereo-variegatis. D. *Top-And*, *Skrække*. I. *Vatus-Ónd*. In synonymia hujus & præcedentis apud hist. naturalis scriptores mira confusio.
135. M. *Albellus* crista dependente; occipite nigro; corpore albo, dorso temporibusque nigris, alis variegatis. D. *Hvid-Side*. Isl. *Topp-Ónd*. Isl. R. 668. t. 37? conf. BRÜN. ornith. 97-99.
136. ALCA *Torda* rostri fulcis quatuor, linea utrinque alba a rostro ad oculos. N. *Klub-Alk*, *Klympe*. Isl. *Klumbenefia*. W. M. 363. STR. 219, 2. P. N. N. 2. c. 3. p. 107. f. APH. 1, 82. Isl. R. 1, 562-571.

137. *A. balbica* subtus tota a rostro ad caudam candida. Gr.
Akpa. CR. Gr. 112. P. D. Atl. I. t. 36.
138. *A. Pica* rostro laevi compresso; corpore toto subtus apicibusque remigum posticarum albis; pedibus rubris. N. *Spidsnabbet Alk.* A. unifulcata BRÜN.
orn. p. 25. STR. S. 219. 3.
139. *A. impennis* rostro compresso-ancipiti fulcato, macula ovata utrinque ante oculos. N. *Angle-Mager, Penquin, Brille-Fugl, Fiart.* Isl. *Geirfugl, Gøifugl.* STR. S. 221. W. M. p. 301. fig. OL. M. t. 13. f. 6. APH. I, 131. Isl. R. 896.
140. *A. arctica* rostro compresso-ancipiti fulcato, fulcis quatuor; oculorum orbita temporibusque albis; palpebra superiore mucronata. N. *Lunde, Söe-Papegøy, Pulli; Lund-Tæller.* I. *Præst.* Gr. *Killengak.* OL. M. t. 15. f. 5. W. M. 302. STR. S. 245. D. F. 131. Isl. R. 1, 559.
141. *A. deleta*; similis proxime præcedenti rostro unifulcato. I. *Drunnefia.* BR. orn. 104. * †
142. *A. Alle* rostro laevi conico; abdomine toto subtus, remigumque posticarum apicibus albis; pedibus nigris. N. *Peer-Drikker, Sören Jacob, Söe-Konge, Borre-Fiart, Boe-Fiær, Rottet, Peder-Dykker, Tys-Thomas, Trolsfugl, Ful-Kop.* STR. S. 256. Act. nidr. I, t. 6. APH. I, 410. Variat tota alba.
143. PROCELLARIA *pelagica* nigra, uropygio albo. N. *Sören Peder, St. Peders-Fugl, Uveirs-Fugl, Vestenvinds Are, Søndenvinds-Fugl.* APH. 7, 532.
144. *P. glacialis* albicans, dorso canescente. Act. nidr. I. P. 182. t. 1. P. N. N. 2. c. 3. §. 9. f. APH. 3, 362. N. *Hav-Hest, Storm-Fugl, Mallemuke.* Gr. *Kakugtanak.*

145. *P. Puffinus* corpore supra nigro, subtus albo, pedibus rufis. N. *Skraap, Liere, Skrabe*. STR. S. 243. *Filingen*. Isl. R. 2, 744. conf. STR. S. 1, 231.
146. *P. Pelecanus* Carbo cauda rotundata; corpore nigro, rostro edentulo, oecipite subcristato. D. *Aale-Krage*. N. *Skarv, Skrie-Skarv, Strand-Ravn*. Gr. *Okeitsøk*. CR. Gr. 111. L. Lap. 272. APH. 7, 252.
147. *P. Graculus* cauda rotundata; corpore nigro subtus fusco; rectricibus duodecim, rostro edentulo. N. *Fiske-ren, Sletbak, Smaa Skarv*. STR. 250, 3.
148. *P. Phalacrocorax*. N. *Blik-Skarv, Hvidlaaring*. BR. 122. *P. bimaculatus*. P. D. Atl. 621. Isl. R. 896. STR. 250, 1. vel sola varietas vel sexus diversus. * †
149. *P. Bassanus* cauda cuneiformi; corpore albo, rostro serrato, remigibusque primoribus nigris; facie caerulea. N. *Hav-Sule, Toffe-Fugl, Jan van Gent*. I. *Sula*. P. N. N. 2, c. 3. §. 9. f. APH. 3, 382. Isl. R. 670, 896. D. F. 127.
150. *P. cristatus*, crista suberecta; corpore atro immaculato; rectricibus duodecim. N. *Top-Skarv*. I. *Hraukur*. P. N. N. 2, 155. Aët. nidr. 3. p. 141. t. 3. f. 7, 8. Isl. R. 670. t. 39. * †
151. COLYMBUS *Gryllus* pedibus palmatis tridactylis; corpore atro; rectricibus alarum albis. Aët. nidr. 1, t. 4. mas. STR. 258. femina. N. *Teiste, Pullus: Silde-Perris*. I. *Orturs-Kofa*. L. *Zbialkes*. Gr. *Serbak*. BR. orn. 113-116. APH. 8, 48. Isl. R. 1, 557.
- Rostrum in duobus speciminibus nigrum.

152. *C. Troile* pedibus palmatis tridactylis; corpore nigro; pectore abdomineque niveo; remigibus secundariis apice albis. D. *Aalge*. N. *Lomvie*, *Lomgivic*, *Langvire*, *Lumbe*. L. *Doppan*. Gr. *Tuglok*. P. D. A. t. 26. Br. orn. 108-112. Aët. nidr. 3, 133. D. F. 133. RAM. N. H. 248.

2, Annulo oculorum & linea pone oculos albis.
I. *Langvigia*. Isl. R. 673, t. 21. b, oculis & capite immaculatis. I. *Langnesia*, *Stuttnefia*. Ibid. t. 22.

153. *C. Septentrionalis* pedibus palmatis, tetradaetylis; collo subtus macula scutiformi ferruginea. D. *Lomm*. N. *Loom*, *Lumme*. L. *Gakkor*, *Gakatte*. F. *Liomen*. P. N. N. 2. c. 4, 136. fig. D. F. 124. Aët. nidr. 1. t. 2. f. 2.

154. *C. arcticus* pedibus palmatis tetradaetylis; capite cano; collo subtus atrovioleaceo; fascia alba interrupta. N. *Hymber*, *Imber*, *Emmer*. Aët. nidr. 1. t. 2. f. 1. W. M. 304. t. Q. Q.

155. *C. glacialis* pedibus palmatis tetradaetylis; capite colloque nigro-violaceo, fascia gulæ cervicisque alba interrupta. N. *Hav-Hymber*. I. *Vas-Hymber*, *Halsbaandet-Lom*, *Brusen*, *Hymbrine*. Aët. nidr. 3, 125. W. M. 303. C. torquatus Br. orn. 134. Isl. R. 556. t. 40. D. Fær. 123.

156. *C. Immer* pedibus palmatis tetradaetylis; corpore supra nigricante albo undulato, subtus toto albo. N. *Hav-Immer*, *Lom-Imber*, *Ember-Gaas*, *Ommer*, *Morteferie*. Gr. *Efarokitsok*. Aët. nidr. 1. t. 3. STR. S. 236. B. orn. 129. P. N. N. 2. c. 4. §. 1. APH. 4, 73.

157. *C. cristatus* pedibus lobatis; capite rufo, collari nigro; remigibus secundariis albis. D. *Topped Hav-Skiar*, *Toppet og Halskravet Dykker*, *Top-*

Skero. I. *Sef-Önd*. Isl. R. 896. t. 38. STR.
250, 2. APH. 3, 381.

Captus Christianiæ 1774.

158. *C. auritus* pedibus lobatis; capite nigro, auribus cristato
ferrugineis. D. *Söe-Höne*. N. *Söe-Orre*, *Sav-Orre*.
I. *Flave-Flit*.

159. *C. stellatus* corpore supra nigricante maculis stellatis albis
innumeris, subtus albo. BR. orn. 130. D. *Hav-
Gasse*, *Söe-Hane*. Var. collo antice rufo, ibid.

160. LARUS *Rissa* albus dorso cano; rectricibus totis albis;
pedibus tridactylis. D. *Lille-Sölvet*, *Rötteren*.
N. *Ritfa*. I. *Skegla*, *Ritar*. Isl. R. 527. t. 23.
pullus t. 24.

161. *L. tridactylus* albicans, dorso canescente; rectricum ap-
cibus excepto extimo nigris, pedibus tridactylis.
N. *Krykie*. L. *Skierro*. Gr. *Tattarak*. Act.
nidr. 3, 119. STR. 241. APH. 4, 521.

162. *L. canus* albus, dorso cano. D. *Graa-Nakke*. N. *Sæing*,
Huid-Maase. L. *Gaiske*. Gr. *Karsaak*. conf. BR.
orn. 146, 147.

163. *L. marinus* albus, dorso nigro. D. *Svart-Bag*, *Blaa-
Maage*. N. *Hav-Maase*. L. *Gairo*. I. *Svart-
bakur*. Gr. *Naviarlurkfoak*. D. F. 125. Isl.
R. 338. t. 13. pullus t. 14. Huc ref. *L. varius*
BR. orn. 150. conf. L. Lap. 285.

164. *L. fuscus* albus dorso fusco. D. *Sild-Maage*. N. *Gul-
fötting*, *Eymor*. I. *Veyde-Bialla*. Pullus *Soc-
Unge*, *Skure*, *Granafur*.

L. canus, *marinus* & *fuscus*, an specie vere di-
stincti, hæsito.

166. *L. parasiticus* rectricibus duabus intermediis longissimis.
N. *Struntjager*, *Tya-jo*, *Jo-Tyv*, *Kive*, *Maase-
Fat*,

Fut, Maase-Skid, Truen, Levar-Jo, Spotte-Jo, Jo-Bonde, Tiufva, Kiufva. I. Kioe. L. Skajite, Haskel. Gr. Esungak, Meriarfairsok. Isl. R. 573. D. F. 126. APh. 4, 110. Act. nidr. 3, 103.

Mas describitur in Fauna Svecica, in Brown. jamaic. ac in Br. orn. 127; fœmina vero STR. Söndm. 239. & Br. orn. 128; uterque in Act. nidr. e Nidrosia, Islandia & Grœndia exemplaria teneo; fœmina neutiquam Skua Hoyerî, quod quidem voluit immortalis GUNNERUS, nec fœmina apud clariss. STRÖM a nidrosiensi diversâ; hic enim non pennas, sed rachides albas dicit.

167. *L. Cataractes* griseus, remigibus rectricibusque basi albis; cauda subæquali. N. *Skue, Kav-Örre. Skua Hoyerî, BARTH. Act. 1, p. 91. Br. orn. 125. STR. p. 238? APh. 4, 313. D. F. 126.*

168. *L. Cepphus.* Br. orn. 126. f. * †

169. *L. Glaucus* totus albus dorso & alis canis; remigibus apice albis. D. *Perlemange. L. Dalvek. Hyperboreus, L. L. 226, 283. Argentatus: Br. orn. 148, 149.*

Lari ætate pennarum colore magnopere variant.

170. *STERNA Hirundo* cauda forficata; rectricibus duabus extimis albo nigroque dimidiatis. D. *Tærne, Krop-Kirre. N. Hætting-Tærne, Sand-Tærne, Tende-Löber, Tenne, Tende, Sandtal, L. Zhierrek. I. Therne, Krija. Gr. Emerkotulak, L. Lap. 283. STR. 258. APh. 8, 56.*

171. *St. nigra* cauda subforficata, corpore cano; capite rostroque nigro; pedibus rubris. D. *Glitter, Sort Kirre. N. Söe-Svale, Sort Tærne.*

Lire, Skrabe. D. F. 129. Lire, Skraap. STR. S. 243. quanam? Sevörren. P. N. N. 2. c. 4. Kallin-gak. CR. Gr. 113. Akpalliarfuk, ibid. Ket-luzok, Pak, Nerlek quanam anserum species?

4. GRALLÆ.

172. PLATALEA *Leucorodia* corpore albo, gula nigra, occipite subcristato. D. Skuffel. N. Skovl-Neb, Bred-Neb. W. M. p. 310. Ol. M. t. 13. f. 4.
173. ARDEA *Grus* occipite nudo papilloso, pileo remigibusque nigris, corpore cinereo, testricibus intimis laceris. Tranø.
174. A. *Ciconia* alba orbitis nudis remigibusque nigris, rostro pedibus cuteque sanguineis. D. Stork. APH. 7, 618.
175. A. *nigra* orbitis nudis pectore abdomineque albo. D. Den forte Stork. W. M. p. 306.
176. A. *cinerea* occipite nigro lævi, dorso cærulescente; subtus albidæ, pectore maculis oblongis nigris. Fiske-Heyer, Skid-Heyre, Skred-Hegre. L. Guorga.
177. A. *stellaris* capite læviusculo, supra testacea maculis transversis; subtus pallidior maculis oblongis fuscis. D. Rör-Drum. W. M. 307. fig. APH. 3, 400.
178. TANTALUS *Falcinellus* facie nigra, pedibus cæruleis, alis caudaque violaceis, corpore castaneo. Rylle, Dom-Sneppe. P. D. Atl. t. 26. f. 4. APH. 6, 612.
179. SCOLOPAX *Arquata* rostro arcuato, pedibus cærulescentibus, alis nigris maculis niveis. D. Heel-Spove, Regn-Spaaer. N. Lang-Neeb, Spue. L. Gusgastak. W. M. 307. fig.
180. Sc. *Phaopus* rostro arcuato, pedibus cærulescentibus, maculis dorsalibus fuscis rhomboidalibus. D. Mellem-Spove. N. Gaaspou, smaa Spue, Spove. I. Spoe. P. N. N. 2. c. 4. p. 159. f.

181. *Sc. Rusticola* rostro recto basi rufescente, pedibus cinereis, femoribus tectis, fascia capitis nigra. D. Holz-Sneppe. N. Rutte, Blom-Rokke.
182. *Sc. Gallinago* rostro recto tuberculato, pedibus fuscis, frontis lineis fuscis quaternis. D. Steen Sneppe, Dobbelt Sneppe, Hoffe-Giög. N. Trolldrukke, Møkerougk, Myre-Hest, Myre-Bok, Myr-Sneppe, Myr-Snipe. I. Myr-Skitt. L. Makastak. conf. BR. 161, 162. L. L. 249.
183. *Sc. Gallinaria* rostro recto tuberculato, pedibus flavis; capite toto griseo. E Finmarkia præcedenti affinis. * †
184. *Sc. Gallinula* rostro recta tuberculato, pedibus virescentibus, loris fuscis, uropygio violaceo vario.
In agro Fridrichsdalensi cepi.
185. *Sc. Glottis* rostro recto basi inferiore rubro, corpore subtus niveo, pedibus virescentibus. N. Høst-Fugl. STR. S. 231.
186. *Sc. Calidris* rostro recto rubro, pedibus coccineis, remigibus secundariis albis. N. Laxe-Tite, Laxe-Titing. STR. 242.
187. *Sc. Tatanus* rostro subrecto, pedibus fuscis, superciliis, pectore abdomine uropygioque albis. D. Rødbreen. N. Qvikketield, Squapziöld, Strand-Kiöld, Stilk, Skrig-Kiöld, Soelskin-Stöd. I. Stelkur. L. Buvadak. STR. S. 248. APH. 6, 455.
188. *Sc. lapponica* rostro subrecurvato flavescente, pedibusque nigris, subtus tota rufa ferruginea. D. Kobber-Høne.
189. *Sc. minima*. D. Rør-Sneppe. BR. orn. 163. * †
190. *Sc. Fadrega* rostro recto lævi; pedibus plumbeis; remigibus linea obliqua uropygioque albo; rectricibus
macula

macula nigra. I. *Jadreka*. Isl. R. 896. t. 48. *†
Affinis Sc. limosa.

Vald-Sneppe, *Hunrrula*, HAM. FN. N. 183. an
Sc. rusticola.

191. *TRINGA pugnax* rostro pedibusque rubris, rectricibus
lateralibus immaculatis, facie papillis granulatis
carneis. D. *Staal-Sneppe*, *Bruuskop-Sneppe*. N.
Brus-Kop, *Bruus-Hane*.

E *Finnmarkia* tres mihi misit ejusdem provinciæ
præfectus D. HAGERUP, hinc sub ipso arcto
quoque habitant. Colore eximie imprimis
pennæ colli variant; hæ in *Linnei*
exempl. albæ, in *Marsigli* albæ apicibus
nigris; in meis totæ rufæ, immaculatæ, vel
rufæ & nigro-violaceæ promiscue, vel de-
nique nigræ & violaceæ strigis tenuissimis
transversis albis.

192. *T. Vanellus* pedibus rubris crista dependente, pectore
nigro. D. *Vibe*. N. *Kybits*. APH. 8. 399.

193. *T. interpres* pedibus rubris, corpore nigro albo ferrugi-
neoque vario, pectore abdomineque albo. D.
Veydetite. N. *Kutte-Rutte*. Act. nidr. 3. 574.

194. *T. striata* rostri basi pedibusque flavis, rectricibus albis
fusco fasciatis, remigibus plurimis albis. D. *Strand-*
Erle, *Rytteren*, *Fier-Kuro*, *Fide-Muus*. N. *Fiöre*,
Fiäre-Pist, *Strand-Elg*, *Fier-Plister*. L. *Gad-*
devierrusb. STR. S. 225. Act. nidr. 3. t. 6. p. 440.
BR. ORN. 182: *maritima*. APH. 2, 316.

195. *T. lobata* rostro subulato apice inflexo, pedibus pinnatis;
pectore albo undulato. N. *Smallebor*, *Nordvest-*
Fugl, *Lira*, *Fisk-Litta*. L. *Bieggush*. P. D.
Atl. t. 26?

196. *T. hyperborea* rostro subulato, apice inflexo, pedibus
pennatis, pectore cinereo, colli lateribus ferrugi-
neis. N. *Mög-Lits*. BR. ORN. 172: *fulicaria*.

197. *T. alpina* testaceo-fusca pectore nigricante, rectricibus cinereo-albidis, pedibus fuscescentibus. D. *Strand-Spurv.* BR. orn. 173.
198. *T. ocropus* rostri apice punctato, pedibus virescentibus, dorso fusco-viridi abdomine rectricibusque externis albis. D. *Horse-Giög.* N. *Skodde-Fugl,* *Jord-Geed, Mækkre-Gouk, Ros-Gouge.* STR. 257?
199. *T. Hypoleucos* rostro lævi pedibus lividis, corpore cinereo lituris nigris: subtus albo. Bornh. *Virlen.* N. *Lille Myrstikkel, Lille Becassin, Myr- eller Strand-Sneppe.*
200. *T. littorea* rostro lævi pedibusque cinereis remigibusque fuscis, rachi primæ nivea. D. *Strand-Bekkasin.* *Skoddefole, Ploug- eller Klov-Mand, Taage-Hest.* I. *Lakiadudra.* Isl. R. 890? L. Lap. 250. conf. BR. orn. 178.
201. *T. Squatarola* rostro nigro pedibus virescentibus, corpore griseo, subtus albido. D. *Fløyte-Titen, Dolken.*
202. *T. cinerea* dorso alisque cinereis, lituris nigris albisque undulatis, rectricibus cinereis marginibus albis. BR. orn. 179.
203. *T. ferruginea* subtus tota ferruginea, dorso e nigro, ferrugineo alboque vario, rectricibus intermediis apice subcaudato. I. *Randbrisingar, Randbryftingr.* Isl. R. 896. BR. orn. 180.
204. *T. variegata* supra fusca, luteo maculata, subtus cinerascens, abdomine albo, rectricibus nigricantibus, apice lituraque luteis. BR. orn. 181.
205. *T.* rostro brevi nigro, tota dilute cinerea. I. *Kieldu-Svin.* Isl. R. 342. * †
206. *T.* rostro lævi subtus alba supra cinereo- & nigro-variegata, tinctura in medio dorso violacea. N. *Fiare-Muus, I. Selningen.* Isl. R. 342, 677. * †

208. *T. nigro lutescens variegata*, pectore macula nigra, rectricibus intermediis longioribus. I. *Loar-Thrall*. Isl. R. 677, g. t. 41. * †

Odins-Hanen; Torfgrafar-Alpt, Suarsuk, quænam?

209. *CHARADRIUS Hiaticula* pectore nigro, fronte nigricante fasciata alba, vertice fusco, pedibus luteis. D. *Præste-Krave, Sand-Vrifter*. N. *Sstrand-Piper, Sstrand-Elg, Sand-Rønne, Sand-Muling, Sand-Sneppe*. I. *Sandloe*. L. *Pago*.

210. *Ch. Alexandrinus* fuscus, fronte collarique dorsali abdomineque albis, rectricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus nigris. N. *Strand-Spurv, Strandlo*. Act. nidr. 5. p. 153. t. 5. f. 1. Br. orn. p. 77.

Captus in prædio Endrupholm Jutlandiæ.

211. *Ch. Morinellus* pectore ferrugineo, fascia superciliarum pectorisque lineari alba, pedibus nigris. D. *Pomerants-Fugl, Citron-Fugl*. N. *Pebrloe, Bold-Tiæt*. L. *Laubol, Laf-Ul*. Act. nidr. 3, 571. L. Lap. 260.

212. *Ch. apricarius* abdomine nigro, corpore fusco albo luteoque punctato, pedibus cinereis. D. *Hieilo*. N. *Heyloe, Brøkfugl, Myreløe, Akerla*. I. *Lo*. L. *Bizbiutzh, Huet, Huit, Hutti, Huttich*. Isl. R. 677. f.

213. *Ch. pluvialis* corpore nigro viridique maculato, subtus albido, pedibus cinereis. D. *Brøkfugl*. N. *Høst-Loe, Field-Loe, Loetræl, Loe-Knægt*. Isl. R. 677. g. t. 41. L. Lap. 248.

Fisfmule. Qvikke - Tiæld. STR. S. 248. Tildra.
Isl. R. 677. d, quænam?

214. RECURVIROSTRA *Avocetta* albo nigroque varia. D.
Klyde, Lau-Fugl, Forkeert Regn-Spove.
215. HÆMATOPUS *Ostralegus*. D. Strand - Skade. N.
Kield, Strand-Skur, Ronekalv, Sagan, Tiaadur,
Glib, Tield. L. Sagan. STR. S. 259. APH. 4, 321.
Isl. R. 1, 577. L. Lap. 252.
216. FULICA *atra* fronte incarnata, armillis luteis, pedibus
pinnatis, corpore nigricante. Blis-Høne, Blas-
And, Vard-Høne, Rør-Høne, Bondeløber. Aët.
nidr. 3, 576. W. M. 306.
217. F. *chloropus* fronte fulva armillis rubris, pedibus sim-
plicibus, corpore nigricante. BR. orn. 191.
218. RALLUS *Crex* alis rufo-ferrugineis. D. Skov-Snarre.
N. Akerrixe, Ager-Høne.
219. R. *aquaticus* alis griseis fusco-maculatis, hypochondriis
albo-maculatis, rostro subtus fulvo. D. Vagtel-
Konge. N. Jord-Koene, Strand-Snarre, Strand-
Rixe, Vand-Rixe, Vand-Høne, Vand-Vagtel.
Aët. nidr. 2, 340. t. 12. APH. 7, 636; 8, 360.
220. OTIS *Tetrax* capite juguloque lævi. Trappe - Gaar.
APH. 8, 222.

5. GALLINÆ.

221. TETRAO *Urogallus* pedibus hirsutis, cauda rotundata,
axillis albis. N. Tiur, Tødder, Teer. fœmina :
Røy. Bastard-Tiur af Aarbanen og Røyen, Tiur-
Aarbane P. N. N. 2, p. 165.f. APH. 8, 104.
RAM. N. H. 251.
222. T. *Tetrix* pedibus hirsutis, cauda bifurcata remigibus
secundariis basin versus albis. D. Urbøne. N.
Aarfugl, Ærefugl, Orbane, Orbøne.

223. *T. Lagopus* pedibus lanatis, remigibus albis, rectricibus nigris, apice albis: intermediis albis. N. Rype, Field-Skov. Lic-Snee-Rype, Harefod. L. Rieusak, Giron. Gr. Akeirsek. P. N. N. 2. c. 4. p. 149. f. APH. 6, 613. L. Lap. 242. Isl. R. 677. i. Hieme albicat.
224. *T. Bonasia* pedibus hirsutis, rectricibus cinereis punctis nigris fascia nigra: exceptis intermediis duabus. N. Hierpe. APH. 4, 40.
225. *T. Perdrix* pedibus nudis calcaratis, macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo. D. Agerhöne. N. Raphöne.
226. *T. Coturnix* pedibus nudis, corpore griseo maculato, superciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea. Vagtel. APH. 8, 325.

6. PASSERES.

227. COLUMBA *Oenas caerulescens*, cervice viridi-nitente, dorso postico albo, fascia alarum apiceque caudæ nigricante. Kirke Due, Vild-Due, Skov-Due.
228. *C. Palumbus* rectricibus postice atris, remigibus primoribus margine exteriore albidis, collo utrinque albo. Ringel-Due, Skade.
229. ALAUDA *arvensis* rectricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis: intermediis interiore latere ferrugineis. Sang-Larke, Variat candida.
230. *A. pratensis* rectricibus extimis duabus extrorsum albis linea superciliarum alba. Eng-Larke.
231. *A. arborea* capite vitta annulari alba cincto. Skov-Larke, Heede-Larke, Lyng-Larke. APH. 5, 96.

232. *A. campestris* rectricibus fuscis: inferiori medietate, exceptis intermediis duabus, albis, gula pectoreque flavescente. D. *Mark-Lærke*.
233. *A. trivialis* rectricibus fuscis: extima dimidiato alba, secunda apice cuneiformi alba, linea alarum duplici albida. D. *Hauge-Hylde*, *Pibe-Lærke*.
234. *A. cristata* rectricibus nigris: extimis duabus margine exteriori albis, capite cristato. D. *Top-Lærke*, *Vei-Lærke*.

Thufu-Tytlinger; Egde R. N. H. quanam?

235. STURNUS *vulgaris* rostro flavescente, corpore variegato punctis albis. D. *Star*. N. *Star*. APH. 7, 563.
236. St. *Cinclus niger*, pectore albo. N. *Fosse-Kold*, *Elv-Konge*, *Strömstar*, *Qvern-Kold*, *Bække-Fugl*, L. *Kuoikgarbeek*. L. Lap. 261. STR.S. 248.
237. TURDUS *viscivorus* dorso fusco, collo maculis albis, rostro flavescente. D. *Dobbelt Kramsfugl*. N. *Biork-Trost*. APH. 4, 478.
238. T. *pilaris* rectricibus nigris: extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano. D. *Dobbelt Kramsfugl*, *Snarrer*. N. *Graa-Trost*, *Field-Trost*, *Nordenvinds-Pibe*, *Simmeren*.
239. T. *iliacus* alis subtus ferrugineis; superciliis albicantibus. N. *Nat-Vake*. L. *Veigezizatzh*. L. L. 259.
240. T. *musculus* remigibus basi interiore ferrugineis. D. *Vim-Drossel*. N. *Sang-Tale*. Maal-Trost. I. *Thröstr*, *Skogartbröstr*.
241. T. *Merula ater*, rostro palpebrisque fulvis. D. *Salsört*, N. *Sort-Trost*, *Sol-Sort*.

Rostrum revera emarginatum est, pullis primi anni nigrum.

242. *T. Torquatus* nigricans, torque albo, rostro flavescente. D. Ring - Drossel. N. Ring - Trost. L. Gialvalgo.

Blaa-Trost, GJÆLLEBØLS Høeland f. 271. Kaka-Trost paa Christiansøe quinam?

243. *AMPELIS Garrulus* occipite cristato, remigibus secundariis apice membranaceo colorato. N. Siden-Svands.

244. *LOXIA Curvirostra* rostro forficato. Kors-Næb, Kors-Fugl. APH. 4, 449.

245. *L. Coccothraustes* linea alarum alba, remigibus mediis apice rhombeis, rectricibus latere tenuiore baseos nigris.

In agro Fridrichsdalensi cepi.

246. *L. Enucleator* linea alarum duplici alba, rectricibus totis nigricantibus. D. Kirseber-Fugl. N. Norsk Papegoy, Nødde-Knekker, Kierne-Bider.

247. *L. Pyrrhula* artubus nigris rectricibus caudæ remigumque posticarum albis. Dompape. N. Domberre. Blod-Finke. APH. 2, 48. Variat nigra.

248. *L. Chloris* flavicanti virens, remigibus primoribus antice luteis, rectricibus lateralibus quatuor basi luteis. Svenske, Svensk Irrisk. APH. 7, 696.

249. *L. atra* corpore toto atro; macula alari alba. BR. orn. 244. * †

250. *EMBERIZA nivalis* remigibus albis; primoribus extrorsum nigris, rectricibus nigris; lateralibus tribus albis. D. Sneekok, Vinter-Fugl. N. Snee-Fugl, Fiat-

Fialster, Snee-Spurre, Snee-Titing, Soelskriger.
I. Sino-Tytingur, Soelskrikia, mas; Tytlings-
Blike. L. Alpe. Gr. Kopanoarsuk. STR. S. 252.
APH. 7, 403. Isl. R. 1, 582. L. Lap. 256.

251. *E. Miliaria* grisea subtus nigro-maculata, orbitis rufis.
D. Korn-Lærke. N. Knötter. STR. S. 240.
An Calandra Fn. Sv. 228?

252. *E. Citrinella* rectricibus nigricantibus: extimis duabus
 latere interiore macula acuta alba. *D. Gulspurv,*
Gulvesling. N. Skur. APH. 3, 218.

253. *E. Hortulana* remigibus nigris: primis tribus margine
 albidis, rectricibus nigris: lateralibus duabus
 extrorsum albis. *D. Hortulan.*

254. *E. Schanichus* capite nigro, corpore griseo nigroque, re-
 ctricibus extimis macula alba cuneiformi. *D.*
Rör-Spurv.

255. FRINGILLA *Calebs* artubus nigris, remigibus utrin-
 que albis tribus primis immaculatis, rectricibus
 duabus oblique albis. *Bog-Finke, Bo-Finke.*

Fœmina medio Januarii Sclopeto occisa fuit, hinc
 non omnes hieme in Italiam migrant.

256. *F. Montifringilla* alarum basi subtus flavissima. *Qva-*
ker, Bogfinkens Hoer-Unge, Akerlan. APH. 6, 441.

257. *F. Lulensis* fusca pectore humerisque rufis, alis nigris
 macula rufa.

258. *F. Carduelis* remigibus antrorsum luteis: extrema imma-
 culata, rectricibus duabus extimis medio, reli-
 quisque apice albis. *Strigltz, Stillitz. APH. 7, 609.*

259. *F. Spinus* remigibus medio luteis: primis quatuor imma-
 culatis, rectricibus basi flavis apice nigris. *D.*
Sisgen, Sifiken.

260. *F. flavirostris* fusca rostro flavicante. N. *Graa Irrisk*.
L. Lap. 256.
261. *F. cannabina* remigibus primoribus rectricibusque nigris
utroque margine albis. D. *Torn-Irrisk, Sidse-
Rønnike*.
262. *F. Linaria* remigibus rectricibusque fuscis margine ablo-
lete pallido, litura alarum albida. D. *Moirisk,
Graa-Sisken*. APH. 3, 124. L. Lap. 292.
263. *T. domestica* remigibus rectricibusque fuscis, corpore
griseo nigroque, fascia alarum alba solitaria. D.
Graa-Spurv. N. *Huus-Spurv, Huus-Kald*. Va-
riat tota nigra: BR. orn. 266. & alba: M. R.
p. 12. W. M. p. 310. APH. 7, 555.
264. *F. montana* remigibus rectricibusque fuscis, corpore gri-
seo nigroque, alarum fascia alba gemina. D.
Skov-Spurre. N. *Orkiær*. conf. BR. orn. 268.
265. MOTACILLA *Luscinia* rufo-cinerea, armillis cinereis,
D. *Nattergal*. APH. 5, 545.
266. *M. modularis* supra griseo-fusca, rectricibus alarum apice
albis, pectore cœrulescente-cinereo. D. *Graa-
Irrisk*.
267. *M. Curruca* supra fusca subtus albida, rectricibus fuscis:
extima margine tenuiore alba. D. *Gras-Smutte*.
268. *M. leucomela* nigra subtus, macula alarum lineaque trans-
versa pone rostrum albis. Act. nidr. 5. p. 543.
t. O. f. 2. * †
269. *M. Sylvia* supra cinerea subtus alba, rectrice prima lon-
gitudinaliter dimidiato alba, secunda apice alba.
In Siælandia.
270. *M. Hippolais* virescente-cinerea, subtus flavescens abdo-
mine albedo, artubus fuscis, superciliis albidis.
D. *Gras-Smutte*.

271. *M. Ficedula subfusca*, subtus alba, pectore cinereo maculato. D. *Spids-Lærke*. P. D. Atl. t. 25.
272. *M. alba* pectore nigro, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis. D. *Vipstiert*, *Havre-Fugl*, *Steen-Pikker*, *Rendesteens-Snager*. N. *Erle*, *Lin-Erle*, *Elle-Kongens Datter*. I. *Mari-Erle*. Isl. R. 1, 584. conf. BR. orn. 272.
273. *M. flava* pectore abdomineque flavo, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis. D. *Gulfpink*.
274. *M. Oenanthe* dorso cano fronte alba, oculorum fascia nigra. *Steendolp*, *Steen-Sqvette*, *Steen-Gylp*. I. *Steinde-Pill*. Isl. R. 1, 584.
275. *M. Rubetra* nigricans, superciliis albis, macula alarum alba, gula pectoreque flavescente.
276. *M. Rubecula* grisea, gula pectoreque ferrugineis. *Röd-Hals*, *Röd-Kielke*, *Röd-Finke*. APH. 6, 578.
277. *M. atricapilla* testacea, subtus cinerea, pileo obscuro. D. *Hav-Skade*, *Spikke*.
278. *M. Phænicurus* gula nigra, abdomine caudaque rufis, capite dorsoque cano. *Blod-Fugl*, *Blod-Stiert*, *Röd-Stiert*. P. D. Atl. t. 25. fœmina.
279. *M. Troglodytes* grisea, alis nigro cinereoque undulatis. D. *Thomas i Giærdet*, *Nelle-Konge*, *Tomme-Liden*, *Gierd-Smutte*. N. *Petermansmad*, *Muse-Broder*. APH. 8, 123.
280. *M. Regulus* remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio albis, vertice luteo. *Fugle-Konge*. Islandorum *Rindill*, *Musa-Broder*? Isl. R. 1, 585.
281. *M. Trochilus* cinereo virens, alis subtus rectricibus flavescentibus, superciliis luteis. D. *Spurre-Konge*, *Fager-Füs*. APH. 7, 560.

282. *PARUS cristatus* capite cristato, collari nigro, ventre albo. *Top-Meise*.
283. *P. major* capite nigro temporibus albis, nucha lutea. *D. Musvit. N. Talg-Oxe, Kiød-Meise. conf. STR. S. 240, 4. APH. 5, 263.*
284. *P. griseus*, vertice coccineo. E Grœnlandia mihi missus; *CR. GR. 104. an Audna-Tytlingr; Isl. R. 586?*
285. *P. caruleus* remigibus caruleiscentibus: primoribus marginē exteriorē albis, fronte alba, vertice caruleo. *Blaa-Meise. APH. 5, 266.*
286. *P. palustris* capite nigro, dorso cinereo, temporibus albis. *D. Cria-Meise, Lille Musvit. N. Tete, Hamp-Meis.*
287. *HIRUNDO rustica* rectricibus, exceptis duabus intermediis, macula alba notatis. *D. Forstu-Svale, Mark-Svale. N. Lade-Svale. APH. 7, 667.*
288. *H. urbica* rectricibus immaculatis, dorso nigro carulescente, tota subtus alba. *D. Bye-Svale, Tag-Skiægs-Svale, Hvid-Svale, Rive, Skorstens-Svale. N. Haas-Svale. APH. 7, 665.*
289. *H. riparia* cinerea, gula abdomineque albis. *D. Dig-Svale, Jord-Svale, Blina-Svale, Sol-Bakke. N. Sand-Rønne, Strand-Svale, Digfalu, Sand-Sulu.*
290. *H. Apus* nigricans, gula alba, digitis omnibus quatuor anticis. *D. Steen-Kirke-Søe-Muur-Svale. N. Ring-Svale, Svart-Sulu, Field-Sulu. APH. 7, 667.*
291. *CAPRIMULGUS europæus* narium tubis obsoletis. *D. Aften-Bakke, Nat-Ravn, Nat-Skade. N. Qual-knarren, Gedemalker. APH. 5, 539.*
Gaarbon, Flæg-Spetter. R. N. H. Narksarmiutak, Orpungmiutak, Kyffekrak Grœnlandorum quænam?

III. AMPHIBIA.

I. REPTILES.

292. RANA *Bufo* corpore ventricoso, verrucoso lurido fuscoque; capite obtuso, pustula pone oculos oblonga. *Padde, Tudse, Buske - Tudse. N. Groe.*
293. R. *Bufo* corpore subverrucoso griseo supra maculis virentibus; capite fimo pustula pone oculos sinuata. * +
294. R. *Rubeta* corpore verrucoso, ano obtuso subtus punctato. *D. Skrubtudse. Aph. 7, 314.*
295. R. *bombina* corpore verrucoso, poris pertuso; capite antice rotundato. *D. Peder-Oxes Frøe, Klokke-Frøe.*
296. R. *temporaria* corpore planiusculo, fusco-cinereo; lituris, capite acuminato: temporibus nigris. *D. Frøe, Boe. N. Lop-Frosk, Lapp.*
297. R. *esculenta* corpore supra viridi, dorfi medio depresso lineaque longitudinali lutea. *Kilde-Frøe.*
298. R. *arborea* corpore laevi; subtus punctis contiguis tuberculato, pedibus fissis, unguibus orbiculato-dilatatis. *Træ-Frøe, Løv-Frøe.*
- Rumpe-Tudse P! D. Atl. p. 658. vix aliud quam gyrinus, seu pullus ranæ.*

299. *LACERTA agilis* cauda verticillata longiuscula squamis acutis, collari subtus squamis constructo. D. *Für-Been*. a. tota cinerea absque maculis. b. supra maculis nigris punctis linearibus nigris inscriptis, subtus absque maculis. c. supra cinereofusca punctis albis nigrisque contiguis, subtus flavo-aurea punctis nigris.

Viridem quoque in sylva Friderichsdalenfi reperi.

300. *L. vulgaris* cauda tereti mediocri, pedibus unguiculatis, palmis tetradactylis, dorso linea duplici fusca. D. *Fürbeen*, *Ögle*, *Skov-Fürbeen*, *Snerris*. N. *Firfidle*, *Orle*.
301. *L. aquatica* cauda teretiuscula mediocri, pedibus muticis, palmis tetradactylis. D. *Vand-Ögle*, *Lille Vand-Fürbeen*, *Vand-Salamandren*. APH. 7, 42.
302. *L. palustris* cauda lanceolata mediocri, pedibus muticis, palmis tetradactylis. D. *Mose-Ögle*, *den store Vand-Fürbeen*.

2. SERPENTES.

303. *COLUBER Aspis* corpore rufo, macula capitis, lineaque dorfi ferrata ferruginea. N. *Gulklødning*. STR. S. 1, 192.
304. *C. Berus fulco* canescens, vitta dorsali atra, dentata repanda. D. *Hug-Orm*, *Hugge-Basse*.
305. *C. Natrix* corpore nigro, macula alba utrinque ad colum. D. *Snog*. N. *Bue-Orm*.
306. *ANGUIS fragilis* squamis abdominis caudaque CXXXV. D. *Saal-Orm*. N. *Hvid-Orm*, *Blind-Orm*, *Kobber-Slange*.

3. N A N T E S.

307. PETROMYZON *fluviatilis* pinna dorsali posteriori angulata. D. Negen-Oyen. N. Steen-Suc, Lamprette, Negen-Ogen. STR. S. 297.

307b P. *branchialis* pinna dorsali posteriore lineari; labio oris posteriore latere lobato. N. Vas-Igle.

308. RAJA *Batis* varia, dorso medio glabro, cauda unico aculeorum ordine. D. Koe - Hale. N. Plet-Rokken. Gr. Takkalikkisak.

In sinu Dröbachienfi; an *Nehskade* Tönsbergensium?

309. R. *clavata* aculeata, dentibus tuberculosis. D. Rokke. N. Söm-Rokke, Söm-Skatte. I. Gadde-Skar, Tinda-Bukia. APH. 6, 541.

310. R. *Pastinaca* corpore glabro, aculeo longo, antèrius serrato in cauda & dorso apterygio? D. Rokkel. Isl. R. 897. t. 49, 50.

311. SQUALUS *Acanthias* pinna anali nulla, dorsalibus spinosis, corpore teretiusculo. D. Haae, Haafisk. N. Pig-Haae. I. Haafur. STR. S. 280. Isl. R. 897.

312. Sq. *Spinax* pinna anali nulla, dorsalibus spinosis, naribus terminalibus. N. Sort-Hane, Hane-Torsk, Sort-Torsk, Söe-Rotte, Morten-Blanke. Act. nidr. 2, 313. t. 7, 8. APH. 3, 230.

313. Sq. *Centrina* pinna anali nulla, dorsalibus spinosis, corpore subtriangulari. N. Purk-Haae. STR. S. 296. P. N. N. 2. p. 184. f. 1 Haa-Kiæring, nisi obfaret pinna ani.

314. Sq. *Catulus* dorso ocellato mutico, pinnis ventralibus concretis, dorsalibus caudæ approximatis, capite

- punctato. N. *Haa-Gale*. Aët. nidr. 2. p. 235. t. 1, 2. STR. S. 283. APH. 3, 236.
315. Sq. *maximus* pinna dorsali anteriore majori. N. *Brugde, Ry-Brigde, Haa-Mær*. I. *Ryner, Brim, Haa-Kal*. Aët. nidr. 3, 33. t. 2. & 4, 14. Isl. R. 897. L. Lap. 306.
316. Sq. *Carcharias* dorso plano, dentibus ferratis. D. *Hav-Kal, Hai-Fisk*. N. *Haae-Skiærding, Haae-Kiæring, Haa-Kal*. L. *Akkalagge*. O. M. t. 24. f. 5. M. W. 271. STR. S. 284. EG. Gr. c. 6. CR. Gr. 137. Aët. nidr. 2, 330. t. 10, 11. APH. 3, 249. L. Lap. 308.
317. Sq. *Mustelus* dentibus obtusis. N. *Glat-Haae*. P. N. N. 2. p. 185. fig.
318. Sq. *glaucus* fossula triangulari in extremo dorso; foraminibus nullis ad oculos. N. *Haae-Brand*. Aët. nidr. 4, 1. t. 1. f. 1.
319. Sq. *Pristis* pinna ani nulla, rostro ensiformi osseo plano, utrinque dentato. N. *Sværd-Fisk, Sang-Fisk*. O. M. t. 25. f. 1. EG. Gr. c. 6. APH. 7, 697. *lisgalte*, STR. S. 289. *Gnul-Haae*, P. N. N. 184. fig. quinam?
320. CHIMÆRA *monstrosa* rostro subtus plicis pertusis. D. *Hav-Kat*. N. *Haae-Muus, Gul-Haae, Iis-Galte, Soe-Ræv, Spil-Stræng-Hyse, Sõe-Rotte, Sõe-Muus, Haa-Konge*. I. *Geirnyr*. A. nidr. 2, 270. t. 5, 6. APH. 3, 364. Asc. ic. t. 15.
321. LOPHIUS *piscatorius* depressus, capite rotundato. D. *Ulk, Bredflab*. N. *Steen-Ulke, Hav-Soe, Hav-Taske*. I. *Marbuntur*. O. M. t. 23. f. 4. W. M. 275. STR. S. 1, 271. APH. 7, 603. P. N. N. 2. c. 6. p. 246. f.

322. ACCIPENSER *Sturio* cirris quatuor, squamis dorsali-
bus undecim. D. Stör. N. Haae-Störle; fœmina:
I. Graa-Sleppa. D. Qvap-Soe. mas: I. Rödmage;
D. Steen-Bider. P.N.N. 285. fig. STR S. I, 286.
W. M. 273. fig. APH. 7, 625.
323. CYCLOPTERUS *Lumpus* corpore squamis offeis angu-
lato. D. Rogn-Kexe. I. Hrognkellse. W. M. 269.
STR. S. 302. P. D. Atl. t. 27. Isl. R. 688, 898.
324. SYNGNATHUS *Ophidion* pinnis caudæ, ani, pectora-
libusque nullis, corpore tereti.
325. S. *Typhle* pinnis caudæ ani pectoralibusque radiatis, cor-
pore sex-angulato. N. Liden Soe-Naal. STR.
S. 313, 4.
326. S. *Acus* pinnis caudæ ani pectoralibusque radiatis, cor-
pore septem angulato. D. Stork, Hav-Naal.
N. Kant-Naal. M. W. p. 266. f. M. reg.
t. 9. f. I. STR. S. 312, 3.
327. S. *Hippocampus* pinna caudæ quadrangulæ nulla, corpore
septem-angulato tuberculato. N. Soe Hest, Soe-
Bæver, Hav-Bæver, Heste-Orm. O. M. t. 26. f. 4.
P. N. N. 2. p. 82. f. APH. 3, 354.
328. S. *æquoreus* pinna caudæ radiata pectoralibus anique nul-
lis, corpore angulato. D. Snippe. STR. S. 312, 2.
- An *Testudo*, aut quodnam animal, cujus memi-
nit EGED. Grœnl. c. 6. p. 61.

IV. P I S C E S.

I. A P O D E S.

329. MURÆNA *Anguilla* maxilla inferiore longiore, corpore unicolore. *Aal.* I. *Biart-Aal.*

330. M. *Conger* rostro tentaculis duobus, linea laterali ex punctis albida.

In littore freti Oresundici 1769 reperi rarissimum piscem.

331. TRICHIURUS *Lepturus*. Isl. R. t. 43.

332. ANARHICHAS *Lupus*, non maculatus. *Søe - Ulv*, *Steenbid.* N. *Hav-Kat.* I. *Steinbitr.* Gr. *Kigurilik.* Isl. R. 653. M. R. t. 7. f. 2. O. M. t. 27. f. 2. Asc. ic. t. 25. APH. 7, 571.

Edulis ac nonnullis optimi saporis est; ipse *Echinis*, *Turbinibus*, *Asterisque* minoribus vescitur.

333. An. *minor* maculis nigris rotundis totus conspersus. Isl. *Hlyre*, *Stenbitrs-Broder.* Isl. R. 683. t. 42. * †

334. AMMODYTES *Tobianus*. D. *Sand-Grævling*, *Tobis.* N. *Sil*, *Sølv-Fisk*, *Sand-Sild.* I. *Tranufle.* APH. 7, 143.

335. REGALECUS *Glesne* cirris pectoralibus longissimis; pinnae dorsalis radiis prioribus solutis subspinosis. N. *Glesne.* Asc. ic. t. 11. * †

336. OPHIDIUM *imberbe* maxillis imberbibus, cauda obtusiuscula. STR. S. 315, 3.

2. JUGULARES.

337. CALLIONYMUS *Lyra* dorsalis prioris radiis longitudine corporis. N. *Floi-Fisk*, *Fiesing*, STR. S. 278.
Echinis, Asteriis & Squillis vescitur.
338. C. *Dracunculus* dorsalis prioris radiis corpore brevioribus. N. *Fiesing*.
339. TRACHINUS *Draco*. *Fiesing*, *Sverd-Fisk*, *Steen-Bikker*, *Muller*. N. *Petermand*, *Soe-Drage*. W. M. p. 268. f.
340. GADUS *Brosme* monopterygius cirratus lateribus maculis nonnullis transversis. Asc. ic. t. 17. * †
341. G. *Brosme* monopterygius ore cirroso, cauda ovali acuta. N. *Brosme*. STR. S. I, 272. t. I. f. 19. * †
G. *longus* major & minor Islandorum *Lange* & *Keila*. Isl. R. I, 358. an a precedentibus diversi?
342. G. *Merluccius* dipterygius imberbis maxilla inferiore longiore. N. *Lyfing*, *Kul-Mund*, *Kol-Fisk*. STR. S. 295. APH. 5, 187.
343. G. *Molva* dipterygius cirratus maxilla superiore longiore. P. N. N. 2. p. 212. f. *Lange*. a, *Skrob-Lange*; b, *Blanke-Lange*; c, *Flek-Lange*. STR. S. 293. APH. 5, 14.
344. G. *Lota* dipterygius, cirratus, maxillis æqualibus. D. *Qvabbe*, *Aale-Qvabbe*. N. *Lake*. Asc. ic. t. 28.

345. *G. Mustela* dipterygius cirratus cirris quinque, pinna dorsali priore exoleta. D. Kroll-*Qvabbe*, Moer-*Qvabbe*. N. Rödbrunne Tang-Brosme.
346. *G. dipterygius*, cirratus, maxilla inferiore longiore, pinnis analibus LXX. N. Byrke-Lange. STR. S. 275. Act. nidr. 3, 446. t. 8. APH. 1, 494. * †
347. *G. Æglefinus* tripterygius cirratus albicans, cauda biloba, maxilla superiore longiore. D. Kuller. N. Kollie, Hysé. I. Isé. Isl. R. 528. t. 26. APH. 4, 537.
348. *G. Callarias* tripterygius, cirratus, varius cauda integra, maxilla superiore longiore. Graa, guulagrig smaa Torfk. N. Kropung, Röd-Torfk, Tara-Torfk; an specie iidem? APH. 8, 138.
349. *G. Morrbua* tripterygius, cirratus, cauda subæquali, radio primo anali spinoso. N. Cabliau, Skrey, Sild-Torfk, Vaar-Torfk; an iidem specie? Asc. ic. t. 27. STR. S. 317.
350. *G. barbatus* tripterygius cirratus maxilla inferiore punctis utrinque septem. D. Smaa-Torfk. N. rödagrig Smaa-Torfk.
351. *G. minutus* tripterygius cirratus ano in medio corporis. N. Ufs-Skreppe.
352. *G. virens* tripterygius imberbis, dorso virescente, cauda bifurca. N. Sey, Graa-Sey; minor Mort, major Pale, smaa Sey; medius Sakke-Nod-Sey; maximus vero Ufs vocatur. I. Upsé. STR. S. 305. Isl. R. t. 25. tertia tamen dorsalis pinna in figura deest. Asc. ic. t. 23. APH. 7, 128.
353. *G. Pollachius* tripterygius imberbis maxilla inferiore longiore, linea laterali curva. N. Lyr, Lyssé. Asc. ic. t. 21 & 22.

354. *G. Merlangus tripterygius imberbis albus*, maxilla superiore longiore. D. *Hvidling*. N. *Blege, Vitting, Bleiker, Hvitling*.

355. *G. Carbonarius tripterygius imberbis* maxilla inferiore longiore, linea laterali recta. D. *Kollemisse, Kollemoder*.

Tang-Brosme. STR. S. 315, 4. *Torske-Konge, Va-Lange*. STR. S. 320. *Ovak Grœnl. quinam?*

356. *BLENNIUS Galerita* crista capitis transversa cutacea. N. *Sœ-Lop-Lærke; Spidshattet Butbuc*. Asc. ic. t. 19. STR. S. 322.

357. *B. Gunellus* pinna dorsali ocellis decem nigris. N. *Guulagtig Snør-Dolk*. I. *Skeria-Steinbitr; Spretsfsk*. Isl. R. 680. c. t. 10. f. 12, 13.

358. *B. viviparus* ore tentaculis duobus. D. *Aale-Qvabbe, Aale-Kone, Aale-Moder*. N. *Brun- og mørkplettet Tang-Brosme, Steen-Brosme*.

359. *B. raminus* pinnis ventralibus subsexfidis, cirro gulari. N. *Aale-Kuse, Aale-Qvabbe*.

360. *B. fuscus* ore cirrato, pinnis setaceis. STR. S. 322. * †

3. THORACICI.

361. *ECHENEIS Remora* cauda bifurca, striis capitis XVIII. I. *Styris-Fiskur*.

362. *CORYPHÆNA novacula* capite pinnisque cancellatis lineis cærulescentibus.

363. *C. rupestris* dorso dipterygio, radio primo pinnæ dorsalis primæ retro dentato. N. *Berg-Lax*. STR. S. 267. Act. nidr. 3, 50. t. 3. f. 1. APH. I, 301. * †

364. *GOBIUS niger* pinna dorsali secunda radiis quatuordecim. D. *Kurling*, *Smör-Buting*. N. Aat. STR. S. 266?
365. *G. Jozo* radiis dorsalibus eminentibus fetaceis. *Stöbfunnet Kobling*. STR. S. 323.
366. *G. Aphyia* fasciis etiam pinnarum fulcis. N. *Fiske-Aat*, *Brude-Kut*. STR. S. 266.
367. *COTTUS Scorpis* capite spinis pluribus, maxilla superiore paullo longiore. D. *Ulk*, *Veke*. N. *Kiöbenhavns Torfk*, *Fiske-Sympe*, *Vid-Kieft*, *Söe-Scorpion*, *Mar-Ulke*. M.W. 267. STR. S. 296. Act. nidr. 2. 345. t. 13, 14.
368. *C. Gobio laevis* capite spinis duabus. *Slesre*, *Steinbikker*, *Tursbull*.
369. *C. cirris* plurimis corpore octogono. I. *Brodamus*, *Sexræding*. Isl. R. 1, 589. * †
370. *ZEUS* cauda bifurca colore argenteo purpureoque splens. N. *Soluplettet Guld-Fisk*. STR. S. 323. t. 1. f. 20. *Z. Vomeri* affinis.
371. *PLEURONECTES Hippoglossus* oculis dextris, corpore toto glabro. N. *Helleflynder*, *Qveite*, *Sandskiebbe*, *Skrobbe-Flynder*. I. *Flydra*, *Heilop-Fisk*. Gr. *Netarnak*. minor *Qveite-Barn*; medius *Styrving* dicitur. STR. S. 300. Oculis sinistris variat.
372. *P. Cynoglossus* oculis dextris, corpore oblongo, glabro, dentibus obtusis, cauda subrotunda.
373. *P. Plateffa* oculis dextris corpore glabro, tuberculis sex capitis. D. *Röd-Spætte*, *Skuller*. N. *Hellebut*, *Söndmör*. Kong- *Vaar*. *Guld-Flönder*, *Slatter*. I. *Karkole*. APH. 2, 468. STR. S. 276.

374. *P. Flesus* oculis dextris linea laterali aspera, spinulis ad pinnas. D. *Butte*, *Sand/kreble*. N. *Skey*, *Sand/kraa*. I. *Kola*, *Lura*.

Oculis finiftris. P. D. Atl. I. t. 28.

375. *P. Limanda* oculis dextris, squamis ciliatis, spinulis ad radicem pinnarum dorsi anique dentibus obtusis. *Skrubbe*. APH. 2, 468.

Oculis finiftris cum dextrorfa in Dania & Norvegia haud infrequens.

376. *P. Solea* oculis dextris corpore aspero oblongo, maxilla superiore longiore. D. *Tunge*, *Hunde-Tunge*, *Tunge-Pledder*, *Hav-Ager-Høne*. N. *Tonge*.

377. *P. Linguatula* oculis dextris ano finiftro, dentibus acutis. D. *Tungens Hoer-Unge*, *Bak/skulla*. P. D. Atl. t. 27.

378. *P. Rhombus* oculis finiftris, corpore glabro. D. *Sletvar*. N. *Sand-Flynder*,

379. *P. maximus* oculis finiftris corpore aspero. D. *Pigvar*, *Tønne*, *Steenbut*. N. *Vrang-Flønder*. APH. 2, 468. *Marie-Flynder*, *Okotak*, *Kalleraglek*, quinam?

380. SPARUS *Erythrinus* cauda subintegra, corpore rubro. I. *Karfe*. Isl. R. 898. t. 29.

Blankesteen, STR. S. 270. an Sp. *Salpa*.

381. LABRUS *Suillus* pinna dorsali ramentacea, macula nigra supra caudam, spinis dorsilibus novem. STR. S. 267, 2.

382. *L. rupestris* pinna dorsi ramentacea, antice macula fusca. N. *Raatte*, *Berg-Neppe*, *Straud-Karudse*, *Hav-Karudse*, *Soe-Karudse*. STR. S. 291. P. N. N. 2, 226. APH. 7, 486.

383. *L. Turdus* oblongus viridis, iride aurea. STR. S. 266, 1.
384. *L. Rone* pinna dorsi ramentacea rubra, maculis lineisque viridibus. N. *Rone*. ASC. ic. t. 14. * †
385. *L. carneus* ruber maculis duabus nigris in basi postica pinnae, & tertia in extremo dorsi. N. *Suder-Naal*. ASC. ic. t. 13. * †
386. *L. exoletus* pinna dorsali ramentacea, corpore lineis caeruleis, pinna ani spinis quinque. N. *Blaa-Staal*, *Blaa-Gomme*, *Blaa-Stak*, *Seigumme*. APH. I, 351. ASC. ic. t. 12? *L. caeruleus*. STR. 267, 3.
387. *L. Berg-Galt* cauda rotundata, squamis margine, pinnis operculisque lineis flexuosis rufo-aureis. N. *Berg-Galt*, *Berg-Gylte*, *Söc-Aborre*. ASC. ic. t. 1. * †
- Hic boni & delicati saporis (odorem ingratum nullum sentii) cum proxime præced. tribus & *rupestri* in sinu Christianiensi circa *Haadöen* haud infrequens.
388. PERCA *fluvialis* pinnis dorsalibus distinctis, secunda radiis sedecim. *Ferfk-Vands-Aborre*.
389. *P. marina* pinnis dorsalibus unitis radiis quindecim spinosis, quatuordecim muticis, corpore lituris variegato. *Strand-Aborre*.
390. *P. Norvegica* corpore rubro. N. *Rödfisk*, *Ouger*, *Klokker*, *Röd-Pungen*. I. *Karve*. ASC. ic. t. 16. STR. S. 302. APH. 6, 576. * †
391. *P. Lucioperca* pinnis dorsalibus distinctis: secunda radiis viginti tribus. D. *Sandart*. N. *Giörs*. P. D. Atl. t. 28.
392. *P. Cernua* pinnis dorsalibus unitis radiis viginti septem, spinis quindecim, cauda bifida. D. *Horke*, *Farrike*, *Stribling*. N. *Kulbars*, *Abor uden Flos*. *Gip*, *Röd-Finning*, HAM. FN. N. p. 77. quænam?

393. *GASTEROSTEUS aculeatus* spinis dorsalibus tribus.
D. *Hunde-Steyle, Gund-Stikel, Hund-Stigel, Tind-Öret.* N. *Stikling, Hornfille, Lille Tind-Oure.*
W. M. 278. APH. 3, 585.
394. *G. spinachia* spinis dorsalibus quindecim. D. *Tang-Snarre, Erfskraber.* N. *Store Tind-Oure.*
395. *SCOMBER Scombrus* pinnulis quinque. *Makrel; minor Geier; medius Makrel* proprie, maximus *Stok-Aal* dicitur. STR. S. 295. APH. 5, 211.
396. *Sc. Thynnus* pinnulis utrinque octo. D. *Tanteie.* N. *Makrel-Störje.*
397. *Sc. Trachurus* pinnulis unitis, spina dorsali recumbente, linea laterali loricata. D. *Stökker.* N. *Pür.*
398. *Sc. pelagicus* pinnulis pinnaque dorsali coadunatis in unum. N. *Lax-Störje?* Act. nidr. 4. p. 92. t. 12. f. 1?
399. *MULLUS barbatus* cirris geminis, corpore rubro. D. *Mulle, Barbe.*
400. *TRIGLA Hirundo* digitis ternis linea laterali aculeata. D. *Söe-Hane, Knur-Hane.* N. *Riot, Oufkar-Riot, Knorr.* Gr. *Inguinifet?* M. W. p. 266. f. M. Reg. t. 7. f. 1. STR. S. 302. APH. 4, 386.

4. ABDOMINALES.

401. *COBITIS Barbatula* cirris sex, capite inermi compresso. D. *Smerling.* APH. 7, 392.
402. *C. Tania* cirris sex, spina suboculari. Slesv. *Smeerbutte, Steinbikker.* N. *Elve Steen-Bid. Elve-Ritze?*

48 PISCES. ABDOMINALES.

403. *SILURUS Glanis* pinna dorsali unica mutica, cirris sex.
D. Mall, Malle. W. M. 277. P. D. Atl. t. 27.
Piscis pisci præda, at siluro omnes.
404. *S. Asotus* pinna dorsali unica, cirris quatuor. N. Sœ-
Kat. P. N. N. 282. f?
405. *SALMO Salar* rostro ultra inferiorem maxillam promi-
nente. D. Hap-Lax. N. Hake-Lax. Læxing
Salmo junior. APH. 5, 70.
406. *S. Eriox* maculis cinereis caudæ extremo æquali. D.
Graa-Lax. N. Tart, Pinke.
407. *S. Trutta* ocellis nigris, iridibus brunneis, pinna pecto-
rali punctis sex. D. Lax-Ört, Maskrog-Ört.
N. Sœ-Börting, Aurride.
408. *S. Fario* maculis rubris maxilla inferiore sublongiore. D.
Forelle. N. Forel-Kræ, Elv-Kræ, Muld-Kræ,
Ör-Kioie. I. Lækia-Silungk, Hængr. STR. S. 292.
409. *S. lacustris* cauda bifurcà, maculis solum nigris, sulco
ventris longitudinali. D. Öret. N. Ört, Oure.
junior Gial-Fisk, Siil-Unge, Puur.
410. *S. alpinus* dorso nigro lateribus cæruleis, ventre fulvo.
N. Røie, Rør. I. Rödbirlingur, Vatuaasilungr.
Asc. ic. t. 18. Caro uti in præcedente variat
alba, flavicans & rubra; HAM. FN. N. 83. STR. S. 303.
411. *S. Eperlanus* capite diaphano, radiis pinnae ani septen-
decim. D. Smelt. N. Lodde; major Qvatte, Fern-
Lodde, Slomme; minor Rogn- Sild-Lodde, Ræke-
Lodde, Krökle. STR. S. 293. APH. 7, 391; 5, 121.
412. *S. Carpio* pede minor dentium ordinibus quinque palati.
N. Giedde-Rør, Flakke-Rør.
413. *S. Lavaretus* maxilla superiore longiore, radiis pinnae
dorsi quatuor-decim. D. Helt. N. Siik, Stor-
Siik. Asc. ic. t. 30. APH. 3, 402.

414. *S. Albula* maxillis edentulis, inferiore longiore. D. *Stint.* N. *Smaa-Fisk*, *Blege*, *Lake-Sild*, *Vemme*. Asc. ic. t. 29.
415. *S.* maxillis edentulis, inferiore longiore; ventre punctato. CL. STRÖM in sit. * †
416. *S. Thymallus* maxilla superiore longiore, p'inna dorsi radiis viginti tribus. D. *Spelt*, *Stalling*. N. *Harr*.
417. *S. Oxyrinchus*, maxilla superiore longiore conica. D. *Snibbel*, *Hvid-Fisk*.
418. *S. Silus*. N. *Hvas-Sil*. Asc. ic. 24.
- Trutta tota argentea Kleinii. I. *Sio-Reidur*. Isl. R. p. 66.
- Trutta longa fusca capite obtuso. I. *Brankod*. Isl. R. 596.
- Salmo lævis pinnis maximis, corpore subtereti, pallide fusco. I. *Reidur*, *Bleikia*. Isl. R. 595.
- Trutta ex albido testacea, maculis in dorso quadratis nigris. Isl. R. 596. Hæ Salmonum species an varietates penitus inquirendum.
- Giedde-Rör. STR. S. 304. an ab alpino diversus?
- Guld-Lax, Löve, Louve, Siik-Sild, Hesling, Röd-Skolt, Köie. HAM. FN. N. Lax-Broder, Giesning. Isl. R. quinam?
419. ESOX *Lucius* rostro depresso subæquali. Giedde. APH. 3, 44.
420. E. *Belone* rostro utraque maxilla subulato. D. *Horn-Fisk*. N. *Horn-Give*, *Nebbe-Sild*, *Horn-Igel*. I. *Gierne-Fur*. M. W. 265. f. APH. 3, 486.
421. CLUPEA *Harengus* immaculata, maxilla inferiore longiore. *Sild*, minor *Strömning*, major *Ovæle-Sild*, *Graabeen-Sild*. Asc. ic. t. 32. APH. 7, 146.

422. *C. Sprattus* pinna dorsali radiis XIII. D. *Hvas-Sild*,
N. *Smaa-Sild*, *Brisling*, *Blod-Sild*; *Chriftianie-
Anføjer*. I. *Kop-Sild*. APH. I, 449.
423. *C. Alofa* lateribus nigro-maculatis, rostro bifido. D.
Brisling, *Sildinger*, *Sardeller*.
424. *C. Encrasiolus* maxilla superiore longiore. D. *Bykling*,
Moderlöfe.
425. *C. villosa*, linea laterali prominula, hirta. I. *Lodua*.
Isl. R. I, 358. t. 28. * †
- *C. longa arenaria*. *Trane-Sild*. Isl. R. 549.
Sildunge. APH. 7, 162. *Lakke-Sild*, *Makrel-
Sild*, *quinam*?
426. CYPRINUS *Carpio* pinna ani radiis IX, cirris quatuor,
pinnæ dorsii radio secundo postice serrato. *Karpe*.
APH. 4, 282.
427. *C. Gobio* pinna ani radiis XI, cirris duobus. *Grundling*,
Gympel, *Sand-Hest*.
428. *C. Tinca* pinna ani radiis XXV. caudā integra, corpore
mucofo, cirris duobus. D. *Suder*, *Slie*. APH.
7, 644.
429. *C. Carassius* pinna ani radiis X, caudā integra, linea la-
terali recta. *Karudse*. APH. 4, 291.
430. *C. Phoxinus* pinna ani radiis VIII, macula fusca ad cau-
dam, corpore pellucido. D. *Elritze*, *Ellbute*.
N. *Elve-Ritze*.
431. *C. Aphyia* pinna ani radiis IX, iridibus rubris, corpore
pellucido. N. *Löie*, *Gorloie*, *Kime*, *Gorkime*, *Gor-
kytte*, *Krökle*? HAM. FN. N. p. 80. APH. 4, 348.
432. *C. Dobula* pinna ani dorsaliq. radiis X. D. *Hes-Sele*,
Hesling.
433. *C. Grislagine* pinna ani radiis V, pinnis albescentibus.
D. *Ström-Skalle*. N. *Wetterbug*. APH. 7, 637.

434. C. *Idharus* pinna ani radiis XII, pinnis ventralibus sanguineis. D. Emd. N. Röd-Fiærig. P. D. Atl. t. 28.
435. C. *Rutilus* pinna ani radiis XII, rubicunda. D. Rud-Skalle. N. Röd-Skalle, Fles-Røje.
436. C. *Idus* pinna ani radiis XIII, rubra.
437. C. *Erythrophthalmus* pinna ani radiis XV, pinnis rubris. D. Skalle, Röd-Skalle. N. Flab-Røie.
438. C. *Aspius* pinna ani radiis XVI, maxilla inferiore longiore, incurva. N. Blaa-Spol.
439. C. *Alburnus* pinna ani radiis XX. D. Skalle, Luier, Blikke. Slesv. Witink, Witke. N. Mort. APH. 7, 227.
440. C. *Wimpa* pinna ani radiis XXIV, rostro nasiformi. D. Fiire, Blikke.
441. C. *Brama* pinna ani radiis XXVII, pinnis fuscis. *Brasen*. APH. I, 439.
442. C. *Ballerus* pinna ani radiis XL. N. *Brasen*, Bunke.

Siren, *Planker*, *Aarbug*, *Löver*, *Blaaspurv*, HAM. FN. N. Giörs. APH. 3, 97. *Havaume*, *Klepaal*, *Knudde*, *Kurbasse*, *Munke*, *Rinte*, *Runte*, *Egby-Giedde*, *Odense-Karpe*, *Sand-Tide*, *Strand-Karuffe*. P. D. Atl. 655. *Ubekiendt Fisk*, liig en *Brasen*, EG. Gr. c. 6. *Anker-Trold*, *Horr*, *Krökler*, *Stiblinger*, *Lub*, *Siö-Kok*, *Tang-Sperling*; R. N. H. p. 239. *quinam*?

V. INSECTA.

I. COLEOPTERA.

443. LUCANUS *Cervus* niger thorace depresso; maxillis exsertis longis, apice bifurcis, latere dentatis. D. *Ege-Hiort, Flyve-Hiort, Bibel-Hiort, Træ-Hiort, Skrubbe.* APH. 2, 158.

444. L. *Dorcas* niger thorace convexo; maxillis exsertis brevibus apice simplici, latere bidentatis. L. *Cervus* β perillustris a LINNE.

Copula *Dorcadum* differensque a L. *Cervo* structura veram speciem demonstrat.

446. L. *Dama* ater, thorace depresso; maxillis exsertis brevibus, apice bifurcis. Atlas Daniæ I. t. L. *parallelopipedus*. Sesquipedale nomen expunxi.

✱ Capite cornuto:

447. SCARABÆUS *nasicornis* castaneus, thorace prominentia triplici; capitis cornu incurvato. D. *Nabe-Horner.* APH. 7, 241.

448. Sc. *cylindricus* thorace antice truncato, quinque dentato; capite antice cornu erecto; corpore cylindrico.

✱✱ Capite tuberculato;

Aphodius
449. Sc. *hemorrhoidalis* niger thorace inermi, capite tuberculo triplici; elytris punctato-striatis, postice pedibusque rufis.

450. *Sc. ater* niger, nitidus, capite tuberculo triplici, elytris *Aphodius*
friato-punctatis pedibusque piceis. GERR inf. 4.
 p. 270, 16? *

451. *Sc. Fossor* niger, thorace convexo; capite tuberculis tri- *Aphodius*
 bus; elytris friatis.

Variat thorace nitido & opaco, raro & confertim
 punctato, fossulaque antica retusa in majoribus.
 Magnitudinis quoque tanta est differentia, ut invite eundem diceres.

452. *Sc. erraticus* ater thorace subconvexo; capite tuberculo *Aphodius*
 unico; elytris friatis fuscis; futura nigra. S. inf.
 t. 26. f. 9?

453. *Sc. conspurcatus* niger, capite tuberculo triplici obsoleto; *Aphodius*
 elytris friatis lividis macula disci obscura; marginibus thoracis pedibusque pallidis. P. D.
 Atl. 1. t. 82.

454. *Sc. fimetarius* niger, thorace inermi; capite tuberculo *Aphodius*
 triplici; antennis elytrisque rubris.

455. *Sc. subarator* niger, thorace subconvexo; capite tuberculis tribus; elytris *Aphodius*
friatis punctatisque. * +

456. *Sc. distinctus* niger capite tuberculo triplici; elytris *Aphodius*
friatis lividis, nigro maculatis. * +

Variat thoracis margine laterali rufo, elytrorumque maculis coalitis vel distinctis, hinc puncta septem in singulo quorundam.

*** Capite mutico:

457. *Sc. Eremita* fusco-ater, thorace scutelloque fusco longitudinali; elytris complanatis, rugoso-punctatis.
 SCHÆFFER inf. t. 26. f. 1.

458. *Sc. stercorearius* ater, subtus violaceus; elytris *Aphodius*
fulcatis; capitis clypeo duplicato: vertice prominulo. D.
 Torbist, Skarn-Basse, Skarn-Böddel, N. Tordival,

Larva, *Muld-Oxe*. S. inf. t. 33. f. 9. APH.
7, 238.

Geotrupes

459. *Sc. vernalis* violaceus; elytris lævissimis; capitis clypeo duplicato; vertice prominulo. D. *Skalle-Basse*.

Variat thorace femoribusque anticis virentibus;
fœmina major, supra tota nigra.

460. *Sc. horricola* niger; capite thoraceque violaceo, piloso; elytris rufis. D. *Gaas-Flue, Gaase-Bilde*. S. inf. t. 23. f. 4? APH. 3, 13.

Frox

461. *Sc. sabulosus* niger, thorace inæquali; elytris rugosis: striis quatuor elevatis.

Cetonia

462. *Sc. auratus* supra viridis, subtus æneus; thorace postice utrinque appendiculato. D. *Spanfk-Flue*. N. *Guld-Basse*. S. inf. t. 26. f. 2, 3, 7. t. 50. f. 8. 9. Act. nidr. 4, 1.

463. *Sc. nobilis* viridi-æneus; elytris anoque albo punctatis. S. inf. t. 66. f. 5.

Melolontha

464. *Sc. Melolontha* abdominis incisuris lateralibus albis; cauda inflexa, acuta. D. *Oldenborre, Oldentorne*. APH. 6, 14. S. inf. t. 93. f. 1, 2. t. 102. f. 3, 4.

Variat thorace nigro & rufo; illa rursus thorace villoso & glabro, cauda rufa & nigra; hæc iterum apice rufo & nigro.

465. *Sc. Solstitialis* testaceus, thorace villoso; abdominis incisuris albis; cauda obtusa. S. inf. t. 93. f. 3.

Trichius

466. *Sc. fasciatus* niger tomentoso-flavus; elytris fasciatis. S. inf. t. 1. f. 4. Act. nidr. 4, 3. t. 16. f. 2. figura meis major.

467. *Sc. fulcatus* subater, elytris striatis; pedibus ferrugineis. GEOFF. inf. Sc. 29. *

468. *Sc. atro-rubens* rufo-piceus, nitidus, elytris striatis; tibiis anticis basin versus denticulatis. Act. nidr. 4, 2?

469. *Sc. rufipes* muticus, oblongus, piceus; antennis rufis; *Aphodius*
elytris striatis.
470. *Sc. tessellatus* niger, elytris lividis striatis nigro tessulatis; *Aphodius*
Sc. fimetarius β LIN. S. inf. t. 26. f. 8.
471. *Sc. variabilis* ater, elytris albo punctatis.
472. *Sc. squamulatus* niger, thorace inæquali: lineola duplici *Valgus*
abrupta; elytris abdomine brevioribus. *Sc. hemipterus* LIN.
473. *Sc. brunneus* testaceus, elytris striatis; thorace utrinque
puncto notato. ACT. nidr. 4, 4.
474. *Sc. quadrimaculatus* niger oblongus; elytris maculis *Aphodius*
duabus rubris.
475. *Sc. bipunctatus* niger muticus, thoracis angulo antico
rubro; elytris striatis flavis. * †
476. *Sc. gagates* niger, elytris striatis punctatisque. GEOFF. *Aphodius*
inf. *Sc.* 21. * *nigripes* G.
477. *Sc. tomentosus* piceus opacus, capite thoraceque nigro;
elytris striatis pubescentibus. An *Sc. hispidus*.
P. D. Atl. t. *
478. *Sc. lineatus* niger, muticus elytris striatis punctatisque:
lineolis lividis. * †
479. COPRIS *nuchicornis* niger thorace rotundato, utrinque *Onthophagus*
tuberculato; elytris obsolete fulvis, striatis &
maculatis. S. inf. t. 73. f. 2 - 5. t. 96. f. 1.
480. *C. lunaris* niger thorace antice truncato, medio tubercu- *Copris*
lato, utrinque cornuto: cornu acuto, vel luna-
to; elytris fulcatis. P. D. Atl. 1, 2. S. inf.
t. 63. f. 2, 3.
481. *C. subterraneus* thorace inermi glabro; capite tuberculis *Aphodius*
tribus; elytris striis crenatis. Species Scarabæi
perill. a LINNE.

482. *HISTER unicolor* ater elytris striatis. Act. nidr. 4, 5.
t. 16. f. 4.

483. *H. bimaculatus* ater, elytris striatis : macula media rubra.
S. inf. t. 3. f. 9.

484. *H. pygmaeus* ater punctulatus ; pedibus piceis.

485. *DERMESTES lardarius* niger, elytris antice cinereis ;
punctis atris. D. Klanner. S. inf. t. 42. f. 3.

Attagenus

486. *D. Pellio* niger, elytris punctis albis binis. S. inf.
t. 42. f. 4. variat elytris fuscis.

Corynetes

487. *D. violaceus* caeruleus, thorace villosus ; elytris striatis.

488. *D. typographus* fuscus, pilosus ; elytris striatis, postice
retusis. Act. nidr. 3, 383, 1.

489. *D. domesticus* niger thorace villosus elytris griseis margi-
ne nigris.

Anobium

490. *D. paniceus* ferrugineus oculis rufis.

491. *D. scanicus* fuscus, thorace testaceo.

492. *D. psyllius* ovatus niger, abdomine obtuso ; thorace ely-
trisque marginatis.

493. *D. glaber* ovatus niger, elytris apice pedibusque brunneis.

Sphaeridium

494. *D. scarabaeoides* ovatus, niger, glaber, elytris maculis
duabus rubris.

495. *D. murinus* ovato-oblongus, niger, tomentosus ; abdo-
mine piceo.

496. *D. pulicarius* niger, oblongus, elytris abdomine acuto
brevioribus.

497. *D. pedicularius* flavus, oblongus, elytris abdomine bre-
vioribus ; oculis nigris.

498. *D. ferrugineus* ferrugineus, semicylindricus ; elytris ab-
breviatis.

499. *D. Jesuita* oblongus niger, segmentis abdominis ciliis albis. * +
500. *D. vernalis* oblongus glaber, fuscus; antennis tarsisque flavis. * +
501. *D. salicinus* cylindraceus niger, pedibus brunneis. * +
502. ANTHRIBUS *glaber* ruber, elytris nigris, nitidis. * +
Huic character *Anthrubi* uti quoque primo clariss.
GEOFFROI convenit, minus ejus tertio.
503. SCOLYTUS *punctatus* niger, thorace fossulato; elytris lineis quatuor elevatis: intervallo punctorum duplici serie. GEOFF. inf. I. t. 5, f. 5?
504. BYRRHUS *pertinax* niger, elytris striato punctatis. *Anobium*
Ptinus LINN.
505. *B. fenestralis* castaneus, elytris punctato-striatis, oculis nigris. *Dermestes* LINN.
506. *B. rubiginosus* totus nigro-fuscus. B. 4. G. inf. I, 112.
507. BRUCHUS *imperialis* subovatus cinereus, elytris fuscis: macula futuræ alba, pinnata.
508. Br. *Furunculus* oblongus, testaceus, alatus; thorace trifulcato; elytris concoloribus, immaculatis. Mas sequentis? *Ptinus*
509. Br. *Fur.* ovatus testaceus, subapterus; thorace trifulcato; elytris rufis fasciis duabus albis. *Bog-Möll.*
Act. nigr. 3, 12. *APH.* I, 414. Variat elytris pilis hirtis punctisque quatuor albis.
Species Ptini in Systemate Linn. at ob articulos antennarum æquales haud æque exacte. *Ptinus*
510. MELOLONTHA *quadripunctata* nigra, elytris fulvis: punctis quatuor nigris. *Act. nigr.* 4, 10. t. 16. f. 6. *Chrysomela* LINN.

511. *M. bimaculata* nigra, villosa; elytris punctis duobus rubris. * +

512. ANASPIS *murina* oblonga, nigra; elytris pedibusque flavis. *Chrysom.* LINN.

513. CISTELA *Pilula* ovata nigra, subtomentosa. I. *Guldvorta.* Isl. R. 688, 1. S. inf. t. 95. f. 3.

514. *C. stoica* ovata, nigra, abdomine ferrugineo. * +

515. *C. nitens* ovata, oricalcica, abdomine pallido. * +
Cistela GEOFFROI, *Byrrhus* LINNÆI.

516. ANTHRENUS *Scrophularia* niger, squamulis albis, tibiis flavis. D. *Skial-Bassè.* AFH. 7, 255.

517. *A. Museorum* nebulosus, elytris striato-punctatis.
Anthrenus GEOFFROI, *Byrrhus* LINNÆI.

518. CRYPTOCEPHALUS *sericeus* cæruleo-viridis; antennis tarsisque nigris.

519. *Cr. parvulus* cæruleus antennarum basi maculaque oris pallida. GEOFF. inf. I, 8.

520. *Cr. quadriguttatus* niger, elytris striatis margine exteriori apiceque macula rubra.

521. *Cr. sexpunctatus* ater, thorace elytrisque rubris: maculis marginalibus nigris.

522. *Cr. nitens* subtus ater, supra cæruleus; antennarum basi maculaque oris pedibusque flavis.

523. *Cr. Coryli* thorace elytrisque testaceis; pedibus nigris.

524. *Cr. bipunctatus* thorace nigro, nitido; elytris rubris: punctis duobus nigris; antennis longis.

525. *Cr. obscurus* thorace pedibusque nigris.

Chrysomela species *Equitis* a LINNÆ.

526. BUPRESTIS *nitidula* thorace marginato, utrinque depresso; corpore nitidissimo.
527. B. *quadripunctata* atra, thorace punctis quatuor transversim impressis.
528. B. *minuta*? nigro-ænea, thorace subtrilobo; elytris fasciis undulatis, villosa-argenteis.
529. B. *viridis* æneo-virescens, elytris linearibus; corpore elongato. S. inf. t. 67. f. 9.
530. B. *varicornis* nigricans, villosus; thorace utrinque lobato; elytris acutis. * +
531. ELATER *cruciatus* niger, thorace abdomineque utrinque rubro; elytris fulvis: cruce nigra.
532. E. *sanguineus* niger, elytris rubris. S. inf. t. 11. f. 8, 9.
533. E. *ruficollis* niger, thorace rubro. S. inf. t. 31. f. 3.
534. E. *castaneus* niger, thorace villosa; elytris flavis, apice nigris. Aët. nigr. 4, 21. S. inf. t. 31. f. 2, 4. t. 11. f. 9.
535. E. *aterrimus* ater, thorace opaco; pedibus fuscis.
Variat antennis tarsisque rufis.
536. E. *niger* niger, nitidus, pubescens. *Alchoris nictus?*
Variat thorace undique pubescente, striis elytrorum subpunctatis, & unguibus rubris; hæc iterum pedibus fuscis, margine & apice abdominis rufis.
537. E. *pullus* niger nitidus, pubescens; elytris punctatis; pedibus brunneis. * +
538. E. *subfuscus* niger, elytris fuscis; abdomine rufo. Fn. Fridr. 169. * +
Variat totus pubescens, abdomine toto rubro.

539. *E. chrysomelinus* niger thorace rubro fulcato; elytris tarsisque flavis.

540. *E. badius* niger, elytris, antennis pedibusque castaneis. *
Fn. Fridr. 172. GEER inf. 4. t. 5. f. 19.

Variat corpore nitido, thorace subtus abdominisque apice & lateribus rufis; alia varietas thoracæ toto rufo, elytrorum futura nigra.

541. *E. pectinicornis* æneo-viridis; antennis nigris. Act. nidr. 5, 23. S. inf. t. 5. f. 36. t. 2. f. 5.

542. *E. balteatus* ater elytris antice denudatis, rubris. Act. nidr. 4, 22.

543. *E. livens* niger, thoracis glaberrimi margine antico rubro; elytris testaceis.

544. *E. sexmaculatus* niger, obscurus villo griseo; pedibus fuscis. Fn. Fridr. 171. * +

545. *E. lugubris* supra ater, opacus, subtus niger. * +

546. *E. obscurus* fuscus thorace elevato; elytris striato-punctatis; intervallis rugulosis. Act. nidr. 4, 24; t. 16. f. 10?

Variat corpore nigro & fusco, glabro vel pubescente, supra opaco vel subnitente; elytris castaneis, lividis, fuscis, vel nigris; antennis fuscis & rufis.

547. *E. reffellatus* villosus-murinus; antennis tarsisque rufis. S. inf. t. 4. f. 6, 7.

548. *E. marginatus* rufo-fuscus, pedibus elytrisque flavis: margine futuraque fuscis. Act. nidr. 3, 16.

Variat margine elytrorum minus fusco, thorace pubescente; & alius longior elytris immaculatis.

549. *E. æneus* cærulefcenti-æneus, thorace viridi; unguibus pedum rubris. Aët. nidr. 3, 18. t. 4. f. 6.

Pedes in mare nigri, in fœmina ferruginei sunt.

550. *E. Sialandicus* purpureo-æneus pilis griseis undique adpressis. Fn. Fridrichsd. 170. * +

551. *E. flavipes* rufus, pubescens, pedibus luteis. * +

552. *E. linearis* thorace nigro lateribus rufis; elytris testaceis linearibus.

553. *E. sputator* thorace fusco nitido; elytris testaceis; corpore nigro.

554. *E. minutus* thorace nigro nitido; elytris nigris, obscuris.

Spring-Basse, Smaller, Smelder nom. gen.

* Thorace depresso.

555. THELEPHORUS *sanguineus* niger, thorace utrinque; elytrisque totis rubris. S. inf. t. 24. f. 1. Lamp. L.

556. *Th. fuscus* niger, marginibus thoracis lateralibus, abdomineque rufis. Fn. Fridr. 143. S. inf. 16. f. 10.

557. *Th. nigricans* niger, thoracis marginibus, ore, antennis pedibusque luteis. Fn. Fridr. 144. S. inf. t. 16. f. 13.

558. *Th. obscurus* niger, marginibus thoracis abdominisque lateralibus rufis. S. inf. t. 16. f. 8. Aët. nidr. 3, 15. t. 6. f. 5.

559. *Th. opacus* niger, thorace, capite, pedibusque luteis. Fn. Fridr. 144. β. S. inf. t. 16. f. 9.

560. *Th. fasciatus* niger, elytris maculis quatuor rubris. S. inf. t. 189. f. 3.

561. *Th. biguttatus* niger, elytris apice; abdomine lateribus flavis. Aët. nidr. 4, 19.

562. *Th. testaceus* niger, elytris: thoracis margine laterali, pedibusque luteis. Act. nidr. 4, 20.
563. *Th. bidentatus* niger, thorace, abdomine tibiisque rubris. * +
564. *Th. rufus* totus rufus, epigastrio alisque nigris.
565. *Th. bimaculatus* rufus, elytris testaceis apice nigris. Geer inf. 4. p. 71.
566. *Th. lividus* testaceus, femoribus apice, tibiisque nigris. Act. nidr. 4, 19. t. 16. f. 9?
567. *Th. minimus* flavus, elytris nigricantibus apice sulphureis. Act. nidr. 3, 16.
568. *Th. æneus* viridi-æneus; elytris extrorsum rubris.
569. *Th. bipustulatus* viridi-æneus, elytris cæruleis apice rubris.

* * Thorace teretiufculo.

570. *Th. flavesceus* niger, elytris attenuatis testaceis; femoribus posticis clavatis, arcuatis. Necydalis LIN.
571. *Th. virescens* opacus, elytris subattenuatis.
572. *Th. cæruleus* virens, elytris cæruleis; antennis nigris.
573. *Th. sericeus* viridissimus; elytris attenuatis, divaricatis. * +
574. *Th. Cardiacæ* æneo-ater, thorace lateribus, elytris apice rubris.
575. *Th. arborescentium* viridi-æneus; ore apiceque elytrorum rubris. * +
576. *Th. plumbeus* nigro-æneus, pilosus; tibiis rufis. * GEOFR. inf. p. 179. Cicindela 17.
577. *Th. pullus* nigro-cæruleus, pilosus. Fn. Fridr. 156. * + Ramalia fagina perforat, ac in pulverem redigit.
578. *Th. parvulus* flavus, oculis fronteque nigris; elytris nigricantibus. Geer inf. 4. p. 72.

579. *Th. lignosus* niger, elytris pedibusque luteis, Fn. Friedrichsd. 155.
580. *Th. quadripunctatus* testaceus, fronte punctis quatuor; thorace macula nigris. * +
Thelephori Cantharidis LINN. species.
581. LAMPYRIS *noctiluca* nigro-fulca. D. St. Hans Orm, Glands-Flue. APH. 2, 450; 4, 112.
582. PELTIS *quadripunctata* nigra thoracis lateribus elytris-que flavis, maculis quatuor coleopterorum nigris,
583. *P. thoracica* nigra, clypeo rufo, emarginato; elytrorum linea extima elevatiori sinuata. S. inf. t. 75. f. 4. Act. nigr. 3, 384. t. 6. f. 1.
584. *P. obscura* nigra, clypeo truncato elytrorum lineis tribus elevatis, punctis inæqualibus.
585. *P. opaca* nigra supra murina, tomentosa; clypeo truncato; elytris lineis elevatis subternis; unguibus rubris. S. inf. t. 93. f. 6.
586. *P. scabra* nigra, fronte pube rufa; thorace antice emarginato, elytris-que tuberculis depressis nitidis, S. inf. t. 93. f. 4.
587. *P. atrata* nigra, clypeo antice rotundato, nitido; elytrorum lineis tribus abbreviatis: spatio interjecto rugoso.
588. *P. grossa* nigra, clypeo antice emarginato, postice lineari; elytris punctatis: lineis elevatis tribus. S. inf. t. 75. f. 3.
589. *P. sabulosa* nigra, supra cinerea; clypeo emarginato; elytris lineis tribus utrinque tuberculatis. Act. nigr. 3, 386.

590. *P. littoralis* atra, clypeo orbiculato, nitido; elytris abdomine brevioribus.
591. *P. bipustulata* nigra elytrorum punctis binis pedibusque rufis. Geer inf. 4. t. 6. f. 22, 23.
592. *P. cadaverina* nigra, thorace ferrugineo; elytris flavicantibus: puncto & maculis rivularibus nigris. * +
593. *P. contusa* nigra, clypeo tomentoso, antice & postice emarginato; elytris trilineatis pubescentibus. Fn. Fridr. 42. * +
594. *P. femorata* atra clypeo orbiculato nitido; femoribus posticis clavatis, denticulatis. * +
595. *P. undata* nigra, thorace punctato; elytris lineis tribus abbreviatis; spatio interjecto undulato. Fn. Friedrichsd. 37. * +
596. *P. dermestina* oblonga nigra, elytris testaceis: striis transversis flexuosis, nigris. * +
597. *P. villosa* nigricans, tomento subflavo; ore antennis pedibusque rufis. * +
598. *P. scutellata* nigricans, elytris pedibusque testaceis. * +
599. *P. truncatella* rufa, glabra, thorace emarginato; oculis nigris. * +
600. *P. ferruginea* rufa, clypeo emarginato elytrisque striatis nigro maculatis. S. inf. t. 40. f. 7.
601. *P. depressa* ferruginea capite nigro; elytris maculis pallide luteis.
602. *P. arborea* oblonga ferruginea, pilosa, punctata; elytris nigris basi flavicante. Affinis S. *succincta* LIN.
603. *P. lineata* subflava, thorace elytrisque lineis elevatis cinereis. * +
604. *P. aestiva* testacea subtomentosa; thorace emarginato; oculis nigris.

605. *P. padina* fulva, tomentosa; oculis nigris. * + *Epurata?*
606. *P. aquatica* viridi-ænea, thorace longitudinaliter rugoso; elytris punctatis striatis; pedibus flavis. Aët. nidr. 3, 387.
607. *P. seminulum* nitidissima, brunnea, elytris hemisphæricis. * +
Species *Silphæ Equitis* a LINNÆ.
608. CASSIDA *viridis* nigra, supra viridis; pedibus luteis. S. inf. t. 27. f. 5.
609. *C. nobilis* nigra, supra grisea, linea punctoque elytrorum oricalcico. S. inf. t. 96. f. 6.
610. *C. nebulosa* nigra, supra pallida, elytris striatis: punctis sparsis, nigris. Sch. inf. t. 27. f. 4.
611. *C. sanguinolenta* nigra, supra viridis; scutelli regione coccinea. * +
612. *C. rubiginosa* nigra, supra viridiis, tibus tarsisque luteis *
Skiold-Bille nom. gen.
613. COCCINELLA *minima*, tota atra. * +
614. *C. pusilla* thorace nigro; elytris flavescentibus, impunctatis. * +
615. *C. impunctata* nigra, supra pedibusque rubris; elytris puncto nullo.
* Punctis nigris.
616. *C. I-punctata* coleoptris flavescentibus: puncto communi nigro.
617. *C. II-punctata* nigra, thoracis lateribus albis; elytris flavis: punctis nigris duobus. S. inf. t. 9. f. 9. Aët. nidr. 4, 6.
618. *P. IV-punctata* nigra, thoracis lateribus albis; elytris rubris: punctis nigris quatuor.

619. *C. marginella* nigra, thorace luteo punctis quinque; elytris flavis margine luteo: punctis quatuor nigris. P. D. Atl. 1. t. 29. *C. 4-punctata*. *
620. *C. V-punctata* nigra, thoracis angulis anticis albis; elytris rubris: punctis nigris quinque. S. inf. t. 9. f. 8.
621. *C. hieroglyphica* coleoptris luteis; maculis duabus nigris longitudinalibus, sinuatis.
622. *C. VI-punctata* nigra thorace luteo punctis quinque; elytris fulvis: punctis sex nigris, in triangulum dispositis. * +
623. *C. VII-punctata* nigra, thorace angulis anticis albis; elytris rubris: punctis nigris septem. S. inf. t. 9. f. 7. Aët. nidr. 3, 388.
624. *C. VIII-punctata* nigra, thorace testaceo; elytris rubris: punctis nigris octo. Fn. Frid. 50. * +
625. *C. IX-punctata* nigra, elytris rubris: punctis nigris novem.
626. *C. X-punctata* nigra, thorace albo punctis septem; elytris rubris punctis nigris decem.
627. *C. XI-punctata* nigra, thoracis angulis anticis albis, elytris rubris: punctis nigris undecim. Aët. nidr. 3. t. 6. f. 2.
628. *C. XII-punctata* nigra, thorace flavo punctis quinque; elytris rubris: punctis nigris duodecim. Vix 12-punct. LINN.
629. *C. XIII-punctata* nigra, thorace luteo; macula media punctoque utrinque nigro; elytris rubris: punctis nigris tredecim. Aët. nidr. 4, 7.
630. *C. tessulara* lutea, thorace macula tetraloba, elytris quatuordecim tetragonis nigris, sæpe contiguis. S. inf. t. 62. f. 6. Cocc. 14-punct. LINN.

631. *C. XIV-punctata* nigra, thorace flavo punctis quinque; elytris rubris: punctis nigris quatuordecim. * +
632. *C. XIX-punctata* lutea, thorace punctis sex; elytris novemdecim nigris.
633. *C. XXII-punctata* lutea, thorace punctis quinque; elytris viginti duobus nigris.
634. *C. XXIII-punctata* nigra, thorace maculato, elytris rubris: punctis viginti tribus nigris.
635. *C. XXIV-punctata* nigra, thorace maculato elytris rubris: punctis viginti quatuor nigris.
636. *C. conglobata* coleoptris rubris: punctis nigris plurimis subcontiguus.
637. *C. conglomerata* coleoptris flavescentibus: punctis nigris plurimis contiguus.
638. *C. ocellata* nigra, thorace albo maculato; elytris flavis aut rubris: punctis nigris, annulatis.

Variat punctis omnibus nigris, quibusdam luteo-annulatis, & punctis macularibus flavis absque puncto medio.

*** Punctis albis.

639. *C. XIV-guttata*, rufa, thorace duobus; elytris punctis quatuordecim albis. S. inf. t. 9. f. 11.
640. *C. XVI-guttata* lutea, thorace punctis sex sulphureis; elytris punctis tredecim albis.
641. *C. oblongo-guttata* rufa, thorace ex albo-virente medio livido; elytris fulvis: lineis lutescentibus. S. inf. 3. f. 14.

*** Punctis rubris.

642. *C. II-pustulata* nigra, abdomine, elytrorumque maculis duabus sanguineis.

643. *C. IV-pustulata* nigra, abdomine elytrorumque maculis quatuor rubris.
644. *C. X-pustulata* nigra, maculis elytrorum decem pedibusque fulvis.
645. *C. XII-pustulata* coleoptris nigris punctis duodecim flavis; ultimo in singulo elytro hamato. P. D. Atl. 1. t. 29.
646. *C. XIV-pustulata* coleoptris nigris: punctis flavis quatuordecim.
647. *C. cinēta* nigra, elytrorum maculis quatuor summoque margine rubris. S. inf. t. 30. f. 16, 17. *
648. *C. fasciata* nigra, capite, abdomine elytrorumque serie transversali rubra. GEOFR. Coc. 26. *

*** * Punctis flavis.

649. *C. didyma* nigra, thorace utrinque, margine maculaque elytrorum, ac pedibus flavis. An *C. bimaculata*, P. D. Atl. 1. t. 29. ? * +
650. *C. pantherina* coleoptris nigris: punctis flavis octo.
Ager-Höne, Mari-Höne nom. gener.

651. *GYRINUS natator* niger, elytris striatis; pectore antroque rufis; pedibus luteis. *Vand-Loppe, Lille Vand-Torbist.* Act. nidr. 4, 27. t. 16. f. 13. APH. 7, 246.

652. *G. villosus* subtus luteus, supra cinereus, pubescens. * +

653. *HYDROPHILUS piceus* niger antennis fuscis. *Store Vand-Torbist.* S. inf. t. 33. f. 1, 2. APH. 7, 244. 8, 362. *WILSE Fridericiæ Beskr.* 186.

654. *H. caraboides* niger nitidus, antennarum caule luteo. S. inf. t. 33. f. 10.

655. *H. fuscipes* niger, elytris striatis : margine pedibusque lividis. Variat totus niger, palpis & tarsis fuscis.
656. *H. luridus* lividus, capite æneo ; thorace utrinque flavo ; elytris striatim punctatis ; maculis, abdomineque nigris. GEER inf. 4. t. 15. f. 1, 2.
657. *H. obscurus* lividus, abdomine nigro ; elytris nitidis confertim punctatis. GEOFR. inf. p. 184. DYT. 5. *
658. *H. pusillus* niger, elytris lævissimis ; antennis tarsisque fuscis. * †
659. *H. Pilula* ater supra nitidus dense punctatus. GEOFR. inf. p. 184. Hydroph. 3. *
660. *H?* *chrysomelinus* niger, thorace utrinque, pedibus, elytris striatis, lividis. *Chrysomela minuta* LIN.

Figura *Coccinella* est, at non tantum facie, sed revera *Dyticus* vel *Hydrophilus* est ; pedes enim natatorii & villosi ; tarsi quidem unguiculati sunt, at hoc pluribus *Hydrophilis* commune ; antennæ ne armato quidem oculo in mortuis apparent, hinc an huic vel sequenti generi substituendus sit, ambigo.

Species *Dytisci* perillustres a LINNE.

* Scutellati.

661. *DYTICUS latissimus* niger, marginibus luteis ; elytris dilatatis, glabris.
662. *D. amplissimus* niger, marginibus luteis ; elytris dilatatis, fulcatis. * †

Fœminam præcedentis, facile crederem, nisi obstaret auctoritas FRISCHII inf. 2. t. 7. f. 1, 2. qui historiam *latissimi* dedit, sexusque differentiam in sola magnitudine patellisque pedum primorum posuit, fulcorum omnino ignarus, cum tamen differentiam *latissimi* a *semistriato* in elytris hujus fœminæ fulcatis statuerit.

Cyprinos vulnerat ; vivumque *Hydrophilum piceum* dilacerare vidi.

663. *D. marginalis* flavicans ; supra nigro-virescens , marginibus thoracis omnibus elytrorumque extimis flavis. S. inf. t. 8. f. 8. Geer inf. 4, 391, 2. t. 16. f. 2.

Hujus individua patellis pedum primorum destituta & instructa invenio, hinc *D. semistriatus*, quod volunt auctores, vix foemina *marginalis* est.

664. *D. virens* flavicans ; supra obscure virens, margine thoracis elytrorumque extimo flavo. Geer inf. 4, 396, 3. *

A praecedenti tantulum differt, ROESEL tamen, qui ejus historiam & figuram inf. aquat 2. t. 2. dedit ; distinctam a *marginali* speciem pronunciat.

665. *D. semistriatus* flavicans ; supra niger, marginibus thoracis omnibus , elytrorumque extimo flavis : sulcis viginti dimidiatis. S. inf. t. 8. f. 7.

666. *D. semifulcatus* fuscus ; supra niger , margine thoracis elytrorumque extimo flavo ; sulcis viginti dimidiatis. Frisch. inf. 2. t. 7. f. 4.

Praecedenti nimis affinis est, ac in utroque tamen pedes primores absque patellis reperi.

667. *D. cinereus* nigricans, thoracis medio, margineque omni, elytrorumque extimo flavis. Aët. nidr. 4, 25. t. 16. f. 11. S. inf. t. 90. f. 7 ; t. 3. f. 3. *D. cinereus* & *fulcatus* LIN.

Immortalis ROESEL, qui *cinerei* & *fulcati* historiam inf. aquat. 1. t. 3. f. 6 & 7. dedit, & alii eos copula junctos viderunt, perillustres tamen à LINNE & clariss. GEOFFROI dubii specie differentes habent ; quotquot ego elytris glabris vidi, patellis instruebantur, quos

quos vero elytris fulcatis, absque patellis
visi sunt ; item denique ROESSELI judicium
magni ponderis componere videtur.

668. *D. transversalis* niger ; thorace utrinque fasciaque antica :
elytris margine, lineaque transversa baseos flava.
P. D. Atl. I. t. 29. *

669. *D. cinctus* niger margine extimo thoracis & elytrorum
flavo. * +

Individua simillima patellis instructa & destituta
cepi.

670. *D. bipunctatus* niger, pedibus punctisque duobus apice
elytrorum ferrugineis. Fn. Fridr. 194. * +

671. *D. lacustris* flavicans , margine thoracis fulvo ; elytris
punctis sparsis. * +

672. *D. bipustulatus* ater, antennis palpisque ferrugineis.

Variat pedibus totis piceis, punctisque binis fer-
rugineis in capite juxta thoracem ; hæc plu-
ribus communia sunt.

673. *D. piceus* niger, corpore subtus margineque thoracis ely-
trorumque ferrugineo. * +

674. *D. fætidus* ferrugineus, supra niger ; margine thoracis
elytrorumque extimo flavo. * +

675. *D. uliginosus* ater, antennis pedibus elytrorumque mar-
gine extimo ferrugineis.

Variat margine thoracis exteriori lutescente.

676. *D. Comma* flavicans, supra nigro-æneus, margine exte-
riore lineolaque elytrorum lutescente. * +

677. *D. quadripunctatus* ferrugineus, elytris nigris : fascia,
macula, punctisque quatuor albis. * +

Variat striis quatuor punctatis in singulo elytro,
piloque griseo e quovis puncto procum-
bente.

768. *D. biocellatus* rufus, elytris æneis in longitudinem albo maculatis. * +
769. *D. granularis* niger, elytris lineis quatuor flavis; pedibus rufis.
770. *D. bilineatus*, niger antennis tarsisque rufis. * +
771. *D. roridus* flavus, thorace macula media, elytris atomis nigris irroratus. * +
- Specimen cum patellis & aliud absque iisdem dedit Experientis. Askow.
772. *D. impressus* nigro-æneus nitidus; antennis, pedibus, punctisque duobus apice elytrorum ferrugineis. * +
773. *D. striatus* ater, elytris giluis, transversim striatis; margine flavo.
774. *D. palustris* niger lævissimus; elytris lituris duabus lateralibus albidis.

* * Exscutellati.

775. *D. maculatus* flavicans, capite thoraceque postice, striis maculisque elytrorum nigris.
776. *D. erythrocephalus* niger, capite pedibusque rufis.
- Variat margine elytrorum exteriori rufo, ac elytris pubescentibus.
777. *D. grossus* subglobosus rufus; oculis nigris. GEOFR. inf. 1. p. 191, 10. An *D. ferrugineus*, ovatus, minutus LIN.? variat elytris fuscis, nitidis, ac rufis, opacis.
778. *D. gilvus* flavicans, capite thoraceque virente; elytris obscuris lævibus. GEOFR. inf. 1, 191, 11.
779. *D. crassicornis* fulvus, antennis subclavatis; elytris fuscis. Geer inf. 4, 402, 10. *

Mares, ut opinor, antennis medio incrassatis, ac quasi fractis aut geniculatis; tibiis anticis clavatis, denteque introrsum notatis, femoribus apice nigris, dilatatis & excavatis, ac denique macula pectorali nigra intra oculum quemvis a foeminis discrepant; ultra viginti quatuor examini subjeci.

780. *D. punctatus* ovatus rufus, thoracis medio nigro; elytris fuscis: margine inferiore punctoque baseos flavis. * +
781. *D. Cimicioides* virens, elytris vitrescentibus: margine inferiore & maculis albis. * +
782. *D. rufipes* ovatus ater, pedibus antennarumque basi ferrugineis; elytris punctatis subpubescentibus. GEOFR. inf. DYT. 9?
783. *D. velox* ovatus rufus, elytris striis octo fuscis. * +
784. *D. parvulus* niger thorace antice flavo; elytris fulco abrupto; pedibus piceis. * +
785. *D. rufifrons* niger, thorace utrinque; elytris basi lateribusque flavis; capite pedibusque rufis. Aët. nidr. 4, 26. t. 16. f. 12.?
786. *D. pupctulatus* rufus, elytris luteis disco macula communi nigra, sinuata. * +
787. *D. Curculinus* flavicans, thorace punctato; elytris pallidis, nigro maculatis, striato-punctatis. GEOFR. inf. 1, 191, 12. *
788. *D. pusillus* ovatus niger, antennis basi pedibusque ferrugineis, elytris absque punctis. * +
- An *Brunnkluka*. Isl. R. 688. d?
789. *D. quadripustulatus* niger, elytris maculis quatuor flavis; pedibus rufis. * +

790. *D. lineatus* ater, supra flavicans; thorace postice; elytris striis maculisque nigris. * +

Vand-Kalv nom. gener.

791. DIAPERIS *Boleti* nigra, elytris fasciis duabus dentatis, maculaque apicis flavis. S. inf. t. 77. f. 6. *Chrysom.* LINN.

* Alati.

792. TENEBRIO *culinaris* oblongus, ferrugineus; elytris striatis. S. inf. t. 66. f. 1.

793. *T. Fossor* niger, antennis pedibusque rufis; tibiis anticis palmato-digitatis.

794. *T. molitor* ater, elytris punctis distantibus striatis.

795. *T. aestivus* niger, palpis pedibusque flavis. * +

796. *T. striatus* niger, abdomine subtus dense striato. * +

797. *T. culinaris* ferrugineus, elytris striatis.

798. *T. cursor* fuscus, thorace oblongo, tricarinato, rugoso, utrinque denticulato; elytris substriatis.

** Apteri.

799. *T. mortifagus* niger, elytris punctatis, apice mucronatis. S. inf. t. 37. f. 6. t. 60. f. 3.

800. *T. gibbus* niger lævis, thorace orbiculato, convexo, antice truncato.

801. *T. Caraboides* thorace ovali, marginato; coleoptris carinatis.

802. PRIONUS *coriarius* piceus, thorace utrinque tridentato. S. inf. t. 9. f. 1. *Cerambyx* LIN.

* Tho.

* Thorace quadrato : antice & postice subæquali.

803. *CARABUS coriaceus* ater, elytris rugosis. S. inf. t. 36.
f. 1. t. 141. f. 1. Act. nidr. 3, 20. P. D.
Atl. 1. t. 29.

804. *C. intricatus* violaceo-niger, elytris intricato-striatis punctatisque. P. D. Atl. 1. t. 29.

In System. LINN. deest.

805. *C. granulatus* niger, supra æneus, elytris convexe striatis : interiectis tuberculis elongatis, triplici serie. S. inf. t. 18. f. 6. t. 156. f. 4.

Variat basi antennarum & femoribus ferrugineis ; utraque iterum articulis tarforum anticorum dilatatis (an maris ?) spongiosis, ac elytris apice erosis.

806. *C. clathratus* niger, elytris sulcis tribus : punctis excavatis æneis.

807. *C. nitens* elytris porcatis : striis passim interruptis sulcisque scabriusculis inauratis.

808. *C. hortensis* niger, elytris dense striatis punctisque æneis excavatis : triplici serie. Act. nidr. 31, 21. t. 6. f. 7.

809. *C. nemoralis* niger, elytris æneis, rugosis : punctis cavis triplici serie. Fn. Fridr. 211. * +

Variat tarsis anticis spongiosis ; coloreque thoracis & elytrorum obsolete purpureo.

810. *C. violaceus* niger, thorace subviolaceo ; elytris læviusculis. Act. nidr. 4, 29. S. inf. t. 3. f. 1. t. 88. f. 1.

Variat margine thoracis & elytrorum e violaceo purpurascens, uti quoque tarsis anticis spongiosis.

811. *C. quadrimaculatus* luteus, thorace rufo ; elytris elongatis, testaceis : maculis quatuor albis. P. D. Atl. 1. t. 29.

812. *C. fenestratus* niger, elytris fuscis : maculis obliquis flavis, fenestratis. * +

813. *C. Crux minor* niger, glaber ; thorace, pedibus elytrorumque basi & apice luteo-rufis. S. inf. t. 18. f. 8.

814. *C. punctatus* niger, tibiis tarsisque piceis ; elytris punctis impressis : serie flexuosa. * +

815. *C. cupreus* niger, supra æneus, antennis basi rubris,

Variat punctis tribus in singulo elytro inter striam secundam & tertiam impressis ; alia varietas puncto unico in secunda stria.

816. *C. rufipes* niger, elytris æneis ; pedibus antennisque fulvis. * +

817. *C. virens* niger, supra æneo-viridis. L. inf. t. 18. f. 4. * /S

818. *C. piceus* ater, antennis pedibusque piceis.

819. *C. nigricans* ater, elytris ; antennis palpis pedibusque piceis. * +

820. *C. niger* ater, opacus ; palpis antennisque fulvis ; tibiis tarsisque ferrugineis. GEOFR. inf. I. p. 160. BUPR. 37. *

821. *C. lividus* niger, margine elytrorum lato, apiceque & pedibus fordide flavis.

822. *C. leucophthalmus* niger, thorace lineolis quatuor posticis excavatis. Act. nidr. 4, 28. S. inf. t. 18. f. 2.

Viginti quidem exemplaria examini subjeci, examinationem thoracis varietatem vel differentiam miratus ; in quibusdam enim medio $2\frac{3}{4}$, postice $2\frac{1}{2}$ lin. latus, in aliis medio $2\frac{1}{4}$, postice adeo coarctatus, ut latitudo $1\frac{1}{2}$ lin. non excedat, cætera tamen cum convenient, vix species arbitror.

823. *C. agilis* piceus, capite, thorace, elytrisque striatis, nigris. Act. nidr. 4, 32. * +

824. *C. varius* niger, elytris striatis; antennis basi rubris.
GEER inf. 4. p. 98, 15. *
825. *C. pubescens* niger, tomentosus; elytris striatis; antennis,
palpis, pedibusque fulvis. GEOFR. inf. 1. p. 160.
BUFR. 38. *
826. *C. ruficornis* niger, glaber, elytris striatis; antennis pal-
pis, pedibusque fulvis. GEOFR. 1. p. 147. B. 9. *
827. *C. caruleus* niger, elytris cyaneis; antennis, palpis, pe-
dibusque fulvis. * +
828. *C. similis* niger, thorace postice utrinque excavato; ely-
trorum striis subpunctatis. * +
829. *C. obscurus* niger, elytris pedibusque obscure testa-
ceis. * +
830. *C. fulvus* totus flavus, nitidus; elytris striatis. GEER
inf. 4. p. 96, 11? Dom. FOLTMAR reperit. *
831. *C. melanocephalus* ferrugineus, capite, elytris abdomine-
que nigris. Act. nigr. 3, 22.
832. *C. aestivus* flavus, capite ferrugineo; thorace elytrisque
nigris. * +
833. *C. minimus* thorace subnigro; pedibus antennis elytris-
que striatis, fuscis. Fn. Fridr. 212. * +

*** Thorace cordiformi; postice angustiore.

834. *C. cephalotes* niger laevis, thorace oblongo, postice coar- broscus
ctato. S. inf. t. 11. f. 1.
835. *C. inquisitor* viridis, elytris aeneis rugose striatis; punctis Calosoma
triplici serie; pedibus antennisque nigris.

Variat supra totus niger margine elytrorum viridi.

836. *C. meridianus* niger, elytrorum basi, futura, pedibusque
testaceis.

837. *C. flexilis* flavicans, capite nigro, elytris lividis. A&.
nidr. 4, 30. * †
838. *C. carulefcens* viridi-caruleus; antennis basi tibiisque
rufis. S. inf. t. 18. f. 3.
839. *C. XII-punctatus* æneus, capite thoraceque viridi; elytris
cupreis: punctis sex longitudinaliter impressis;
pedibus nigris.
840. *C. bimaculatus* niger; capite, thorace elytrisque viridi-
bus: macula baseos pedibusque fulvis. * †
841. *C. laevis* æneus, capite thoraceque viridi; elytris cupreis
absque punctis; pedibus piceis. * †
842. *C. VI-punctatus* niger, supra æneus, elytris punctis tri-
bus longitudinaliter impressis; pedibus piceis. * †
843. *C. cursor* niger, antennis pedibusque ferrugineis; elytris
striato-punctatis. GEOFR. inf. 1. p. 146. BUFR. 8. *
844. *C. ustulatus* niger elytris fuscis: maculis quatuor pedi-
busque flavis.
845. *C. marginatus* niger, elytris margine tibiisque testaceis.
P. D. Atl. 1. t. 29.
846. *C. dorsalis* flavus, elytris striatis, capite, thorace macu-
laque apicis elytrorum viridi. P. D. Atl. 1. t. 29.
BR. Inf. Sial. p. 29. *
847. *C. vernalis* niger, antennis, palpis pedibusque flavis;
elytris striato-punctatis. * †
848. *C. pullus* niger, elytris striatis; pedibus piceis. * †
849. *C. bimaculatus* nigro-caruleus; elytris flavis: macula
didyma, fusca. * †
850. *C. vaporariorum* nigricans; antennis, thorace, pedibus,
elytrisque antice ferrugineis.
851. *C. ater* niger, elytris striatis; unguibus subferrugi-
neis. * †

852. *C. spinipes* niger, elytris æneis; tibiis anticis medio incisif.

A Carabo spinipede clarif. SCOROL. diversus est, an etiam a Car. perillustris a LINNE? nomen hujus specificum pluribus convenit, nec ulla ulterior descriptio exstat.

853. *C. multi-punctatus* nigro-æneus, elytris punctis impressis inæqualibus.

854. *C. latus* niger pedibus antennisque rufis. Act. nidr. 3, 23.

855. *C. ferrugineus*, thorace glaberrimo.

856. *C. cyanocephalus* thorace pedibusque ferrugineis; elytris capiteque cyaneis.

857. *C. arorufus* ater, subtus rufus, elytris mollibus. Act. nidr. 4, 31. * †

*** Thorace triangulari: postice latiore.

858. *C. vulgaris* niger, supra nigro-æneus; antennis basi fulvis; tibiis piceis. I. *Jarn-Smidur*. Isl. R. 688. e. Act. nidr. 3, 24.

Amaras

Variat ater totus, antennis basi fulvis, pedibus piceis; hic iterum pedibus totis luteis.

859. *C. oricalcicus* pallide flavus, supra æneus. * †

*** Thorace orbiculato.

860. *C. seticornis* niger, elytris æneis striato-punctatis; antennis setiferis. GEOFF. inf. I, 147. BUFR. 10. *

Loricata
venea

861. *C. crux major* niger, pubescens, maculis elytrorum quatuor fulvis. S. inf. t. I. f. 13.

Skov-Tigger nom. gener. *Bobbe* APH. I, 407.

862. *CICINDELA campestris* viridis; elytris punctis decem albis.

863. *C. hybrida* supra fusco-viridis; elytris fascia undulata, lunulisque quatuor albis.

864. *C. riparia* æneo-fulca; elytris scarificatis.

Notiophilus
865. *C. Danica* nigra, supra fusco-ænea; elytrorum striis lateralibus remotis; dorso speculifero. Fn. Fridr.

178. *

Notiophilus palustris
866. *C. aquatica* nigra, nitida; supra fusco-ænea; elytrorum striis æqualiter distantibus; pedibus rufo-fuscis. Fn. Fridr. 177.

Huic descriptio Cicind. aquat. Fn. Svec. 752. convenit, præcedenti vero definitio Cicind. aquat. Syst. 14, adjecto scilicet novo caractere: capite striato; utraque satis distincta species.

Bembidium impressum
867. *C. punctata* nigra, supra subænea; elytris striatis: punctis impressis quatuor; pedibus flavo fuscis. Fn. Fridr. 179. *

868. *C. flavipes* obscure ænea; elytris subnebulosis; pedibus luteis.

869. CANTHARIS *vesicatoria* viridissima nitens; capite postice gibbo; antennis nigris. D. Span/k-Flue. S. inf. t. 47. f. 1. Aph. 7, 534. Meloe LINN.

870. *C. lutea* subtus atra, supra fulva; elytrorum apicibus nigris. Fn. Fridr. 157.

Notiophilus punctatus
871. *C. melanura* fulva; oculis antennis apicēque elytrorum nigris.

872. PYROCHROA *purpurata* nigra, capite, thorace, elytris saturate rufis. S. inf. t. 90. f. 4. Canth. L.

873. *P. ceramboides* nigra, thorace triangulari; elytris castaneis. Chrysom. LIN.

874. PTILINUS *cylindricus* niger, antennis, pedibus rufis; abdomine elytrisque fuscis. *Ptinus pectinicornis* LIN. *Ptilinus* I. GEOFR.
875. CHRYSOMELA *grossa* ovata, atra, subtus violacea; tarsis spongiosis, subtus fuscis. S. inf. t. 126. f. 1. *Temarcha*
876. Chr. *Göttingensis* ovata, violacea; tarsis ferrugineis.
877. Chr. *hemorrhoidalis* ovata, violacea, punctata; ano rubro.
878. Chr. *hemoptera* ovata, violacea; alis rubris.
879. Chr. *collaris* ovata, nigra; thorace lateribus luteo: puncto nigro; elytris æneis, nitidis. *Sina*
880. Chr. *similis* ovata, nigro-violacea; thorace lateribus, antennisque basi rubris. S. inf. t. 52. f. 11, 12? *Sina*
Forte sexu tantum a præcedente diversa.
881. Chr. *Staphylea* ovata, castanea, oculis nigris. Act. nidr. 4, 9.
882. Chr. *polita* ovata, viridis; elytris castaneis. S. inf. t. 65. f. 9.
883. Chr. *sanguinolenta* ovata nigra, elytris rugosis, margine sanguineis. S. inf. t. 21. f. 15.
Minor elytris violaceis glabris, punctis substriatis.
884. Chr. *marginalis* ovalis violacea, thorace lateribus; elytris margine luteis.
885. Chr. *Fridrichsdalensis* ovata nigra, supra sanguinea; thorace unica: elytris octo maculis nigris, vel immaculatis. Fn. Fridr. 74. S. inf. t. 194. f. 4. * *Gonioctenus*
886. Chr. *marginata* nigro-cærulea, elytris margine flavis. Buprestis marginata. Fn. Fridr. 182. Act. nidr. 3, 82.
887. Chr. *Armoracia* ovata, cærulea, nitida, subtus atra.
888. Chr. *vitellina* ovata, nigra, supra viridi-cærulea.

889. Chr. *oricalcia* nigra, supra *ænea*, elytris punctis striatis. * +

890. Chr. *affinis* ovata violacea, elytris punctato-striatis; ano rubro. * +

891. Chr. *ænea* ovata, viridis nitida, ano rubro.

Illustrata LINNE olim scripseram, Chryf. *æneam* cum C. *Alni* in copula deprehensam, minime cum C. *graminis*, quod mihi in Systemate minus bene imputat, ejus enim contrarium litteræ & schedula insectis oppositaclare probant; at ex nova insectorum & penitiori inspectione comperi, esse Chryf. *hæmorrhoidalem*, quam ob maximam similitudinem *alni* credidi; hinc vel *ænea*, *alni* & *hæmorr.* mutuo coeunt, vel ipse LINNEUS in copula *ænea* & *alni* hallucinatus est.

892. Chr. *graminis* ovata viridi-cærulea nitida; alis rubellis.
N. Guld-Smed.

893. Chr. *Betulae* ovata, violacea; elytris punctis cavis striatis.

+ 894. Chr. *Polygoni* ovata, viridi-cærulea; thorace, pedibus, anoque rufis. S. inf. 161. f. 4. t. 173. f. 4.

+ 895. Chr. *obtusæ* ovata violacea; thorace pedibusque rufis. * +
A præcedente forte sexu tantum differt.

896. Chr. *Cerasti* ovata livida, antennarum apicibus oculisque nigris.

897. Chr. *Padi* ovata, nigra, elytris apice lividis.

898. Chr. *thoracica* ovata violacea; thoracis margine laterali dilatato; elytris punctato-striatis. * +

899. Chr. *Populi* ovata cærulea; elytris rubris: summo apice nigris. S. inf. t. 21. f. 9.

900. Chr. *Phellandrii* oblonga, nigra; thorace utrinque: elytris lineis duabus luteis. Act. nidr. 4, 11.

901. Chr. *polita* ovata, thorace aurato, elytris rufis.

902. Chr. *marginella* oblongo-ovata, nigro-cærulea; thorace elytrisque margine luteis. Act. nidr. 3, 9.

903. Chr. *fulphurea*, oblonga flava, tota.

904. Chr. *bilineata* viridi-aurea; thorace antice excavato; elytrorum linea duplici cærulea. Act. nidr. 4, 8.
t. 16. f. 5. * †

905. Chr. *ferozina* ovata, nitida, rufa; oculis nigris; tibiis posticis arcuatis. * †

Guld-Bille nom. gen.

906. GALERUCA *Tanacetii* ovata, atra, punctata; elytris lineis quatuor elevatis. Act. nidr. 3, 389. *Admonica littoralis*

Varietatem facie Melois abdomine extra elytra protenso semel reperi.

907. G. *Nymphææ* nigra, thorace maculato: elytris margine pedibusque flavis.

908. G. *aquatica* nigra, thorace maculato: elytrorum margine futuraque lata, pedibusque flavis. * †

An varietas præcedentis? datur alia thorace flavo macula media nigra; elytris flavis angulo antico nigro; ano marginibusque segmentorum abdominis flavis.

909. G. *Caprææ* nigra, thorace punctato; elytris tibiisque flavis.

910. G. *veris* nigra, thorace cupreo; elytris viridibus; pedibus rufis. * †

Species *Chrysomela* LINN.

911. LUPERUS *Alui* violaceus, antennis pedibusque nigris.

912. L. *quadrinaculatus* flavus, elytris maculis quatuor, abdomineque nigris. P. D. Atl. 1. t. 29.

84 INSECTA. COLEOPT: MORD: ALTICA.

913. *L. æruginosus* pallidus, capite pectoreque nigris; elytris viridibus, politis. * +

914. *L. pallidus* flavescens, oculis nigris.

Species *Chrysomela* perillustis a LINNÆ.

915. MORDELLA *frontalis* atra, fronte antennarum basi, pedibusque anticis flavis.

916. *M. thoracica* nigra, capite thorace pedibusque flavis.

917. *M. aculeata* atra, ano spina terminato. *Ford-Loppe.*
APH. 4, 164. S. inf. t. 127. f. 7.

918. *M. flava* flava, elytrorum apicibus nigris.

919. ALTICA *bicolor* ovata, rufa; elytris viridi-cæruleis; femoribus posticis violaceis.

920. *A. chrysocephala* ovata nigra, ore pedibusque rufis; femoribus posticis, atro-cæruleis.

921. *A. oleracea* ovata, cærulea; antennis nigris. *Ford-Loppe.*
Wilf. Frideric. 185.

922. *A. nemorum* ovata, nigra; elytris linea media flava longitudinali; pedibus testaceis.

923. *A. pusilla* ovata, nigra; antennis pedibusque pallidis. * +

Variat antennis apice nigris.

924. *A. luteola* ovata lutea; oculis pectore antennarumque apice nigris. * + Variat tota lutea oculis nigris. BR. pr. inf. Sial. p. 27.

925. *A. flaveola* ovata nigra; thorace capiteque rufo; elytris antennis pedibusque luteis. * +

926. *A. latiuscula* nigro-fusca, tibiis tarsisque subluteis. * +

927. *A. Hyoscyami* ovata nigra, elytris punctato-striatis; antennis basi pedibusque rufis.

928. *A. quadriguttata* ovata, nigra; antennis, pedibus elytrorumque punctis quatuor luteis. GEOFR. inf. I. Alt. 15. P. D. Atl. I. t. 29. *

929. *A. Helxines viridi-ænea*, antennis pedibusque omnibus testaceis.

930. *A. exfoleta* livida, pedibus testaceis; abdomine capiteque fusco.

931. *A. rufipes* cærulea, obovata; capite, thorace, pedibus antennisque rufis. S. inf. t. 166. f. 5.
Species *Chrysomela* LINN.

932. CRIOCERIS XII. *punctata* rubra, elytris flavis: punctis nigris duodecim. S. inf. t. 4. f. 5.

933. *C. Asparagi* cærulea, thorace rubro; elytris margine rufo: maculis octo flavis. S. inf. t. 52. f. 9, 10.

934. *C. cyanella* cærulea, antennis nigris.

935. *C. merdigera* nigra, thorace utrinque impresso elytrisque rubris. S. inf. t. 4. f. 4.

936. *C. melanopoda* cærulea, thorace pedibusque rufis.

937. *C. hirta* nigra, thorace teretiusculo; elytris elongatis, flavis.

938. *C. elongata* nigra, elongata; thorace rubro. P. D. Atl. I. t. 29.

939. *C. flavipes* nigra, capite, thorace, pedibusque flavis.

940. C? *striata* atra, capite supra; elytris abdomineque apice albis. S. inf. t. 89. f. 6. GEOFR. inf. I. t. 5. f. 2. *

Huic character *Anthribi* haud convenit, potius, licet haud in omnibus, *Crioceris* vel *Cicindela*. Crioc. species generis *Chrysomela* in System. LINN.

* Crassi- & brevi-rostris: femoribus muticis.

941. CURCULIO *dentirostris* ovatus, niger; rostro apice quadridentato. * +

942. *C. tardus* nigricans, thorace elytrisque utrinque rufis :
macula apicis atra. * †
943. *C. murinus* ovatus nigricans ; elytris pallide maculatis.
Fn. Fridrichsd. 116. * †
944. *C. fasciatus* oblongus ater ; thorace utrinque ; elytris
fasciis duabus futuraque albis, tomentosis. * †
945. *C. rufipes* ovatus cinereus ; antennis pedibusque rufis.
946. *C. incanus* oblongus cinereus , hirtus.
947. *C. scaber* fuscus, setosus, antennis pedibusque rufis.
948. *C. nodosus* canescens , elytris nodulis minimis striatis.
Fn. Fridr. 118. * †
An Silakeppr. Isl. R. 688, 2.
949. *C. longicornis* nigricans, thorace hirtus ; elytris cinereis :
maculis flavicantibus ; pedibus antennisque ru-
fis. * †
950. *C. opacus* griseus absque striis & punctis.
951. *C. latirostris* griseus , antennis pedibusque rufescenti-
bus. * †
952. *C. maculosus* ovatus obscure flavicans ; elytris luteo-ma-
culatis. * †
953. *C. lineatus* oblongus aurato-griseus ; thorace terlineato ;
antennis rufescentibus. Act. nidr. 4, 14. S. inf.
t. 103. f. 8.
954. *C. ater* thorace punctato terque lineato ; tibiis antennis-
que rufis.
955. *C. carinatus* cervinus ovatus ; elytris lineis tribus ele-
vatis : futura postice carinata. * †
956. *C. striatus* elongatus cinereus ; thorace terlineato ; an-
tennis nigris. * †

Hos duos proximos experientis. Askow reperit.

957. *C. cloropus* niger, antennis tibiisque ferrugineis.
 958. *C. viridis* corpore viridi: supra obscuro, subtus flavidiore,
 959. *C. ruficornis* corpore atro; thorace bituberculato: antennis rubris.

960. *C. mollis* brevirostris, griseo auratus, nitens, femoribus muticis; elytris mollibus. Aët. nidr. 4, 12; t. 16. f. 6. * †

961. *C. fasciatus* brevirostris, griseo nitens; fasciis elytrorum undulatis ferrugineis. Aët. nidr. 4, 13.

*** Crassi & brevirostres; femoribus dentatis.

962. *C. Ligustici* niger, thorace murino; elytris maculis pallidis striatis. S. inf. t. 2. f. 12.

963. *C. Levistici* niger, elytris substriatis; oculis rufis. * †
 An variet. præcedentis?

964. *C. punctatus* ater, elytris subfulcatis, pallide punctatis; oculis rufis. * †

965. *C. Pyri* æneo-fuscus, pedibus antennisque rufis.

966. *C. argenteus* viride-auratus, antennis pedibusque rufis.

967. *C. tessulatus* murinus ovatus; elytris striatis: striarum intervallis alternatim nigro-maculatis. * †

968. *C. squamifer* oblongus, elytris griseo nigroque striatis. * †

969. *C. ovatus* niger, pedibus antennisque rufis.

970. *C. cervinus* oblongus, cinereus; antennis basi rufis.

*** Crassi- & longi-rostres femoribus muticis.

971. *C. paraplecticus* cylindricus, subcinereus; elytris mucronatis. S. inf. t. 44. f. 1. P. D. Atl. 1. t. 1.

972. *C. dorsalis* niger, pedibus elytrisque rubris; sutura nigra.

973. *C. albinus* niger tuberculatus ; thorace subtus ; elytris antice & postice albis.
974. *C. griseus* oblongus, cinereus, antennis rufis. * +
975. *C. nitidulus* oblongus nigro-violaceus ; thorace elytris-que nigro virentibus. * +
976. *C. granarius* oblongus, piceus ; thorace longitudine elytrorum. P.D.Atl. I. t. 29. D. Korn-Kra, Glander.
977. *C. Pruni* ater, thorace maculato, tibiis ferrugineis.
978. *C. arvensis* griseus, thorace terlineato ; elytris rufis obscure tessulatis. * +
979. *C. tuberculatus* niger, thorace rugoso ; elytris lineis tuberculisque muricatis. * +
980. *C. Polygoni* griseus, thorace terlineato ; elytris striis abruptis, nigris.
981. *C. Quercus* cinereus, elytris pallide flavis : fascia obliqua alba ; antennis pedibusque rufis.

*** Crassi- & longirostres : femoribus dentatis.

982. *C. germanus* ovatus ater, punctis testaceis maculatus. S. inf. t. 25. f. 2.
983. *C. Urticae* niger planiusculus, thorace utrinque dentato ; elytris striatis ; postice bipunctatis. * +
984. *C. Abietis* niger elytris piceis : punctis pilosis fulvis subfasciatis. S. inf. t. 25. f. 1.
985. *C. ovatus* corpore ovato, nigro, albo maculato.

***** Tenui- & longirostres : femoribus muticis.

986. *C. purpureus* ruber, oculis abdomineque nigris. Scor. inf. 36. *
987. *C. cyaneus* niger, elytris striatis, caeruleis.
988. *C. Lapatii* niger, thorace utrinque ; elytris gibbosis utrinque & postice albis.

989. *C. glaucinus* niger thorace utrinque linea pallida; tibiis rufis. * +
990. *C. Pini* piceus, thorace maculis; elytris fasciis duabus fulvis. S. inf. t. 25. f. 7.
991. *C. aterrimus* ater, elytris nitidis.
992. *C. Cerasi* ater, elytris opacis oblongis.
993. *C. acridulus* piceus, abdomine ovato.
994. *C. pericarpus* subglobosus, nebulosus; coleoptris macula cordata alba.
995. *C. Alliarie* violaceus totus.

***** Tenui & longi rostris: femoribus dentatis.

996. *C. nucum* ovatus gilvus, rostro longissimo. S. inf. t. 50. f. 4.
997. *C. scrophularie* subglobosus ater, thorace pallide villosus; elytrorum lineis elevatis, albo nigroque tessulatis.
998. *C. similis* subglobosus rufus, elytrorum lineis elevatis, albo nigroque tessulatis. GEOFF. inf. Curc. ⁴⁵4? * + P. bonus

An varietas præcedentis; hic multo minor, nec tamen diversus sexus, a larva enim in curculionem utrumque deduxi, hunc scilicet ultimo Julii, illum primo Maji mensis.

999. *C. quadrimaculatus* griseus, elytris nigris maculis quatuor albis; tibiis rufis.
1000. *C. violaceus* violaceus proboscide thoracis longitudine.
1001. *C. Rumicis* griseus nigro-nebulosus oblongus; antennis subfuscis.
1002. *C. Pomorum* corpore griseo, nebuloso.
1003. *C. Druparum* rostris rubro; elytris testaceis; obsolete fasciatis.
1004. *C. carbonarius* corpore nigro, oblongo; elytris striatis.

* * * * * Saltatorii : femoribus posticis crassiss.

1005. *C. subater* tomentosus elytris striatis ; antennis tarsisque flavis. * +

1006. *C. testaceus* pallide flavus, elytris striatis ; oculis abdomineque nigris. * +

1007. *C. rufus* rufus elytris striatis ; oculis abdomineque nigris. * +

1008. *C. setosus* rufus, oculis, pectore abdomineque basi nigris. * +

1009. *C. Fagi* corpore atro ; femoribus pallidis.

1010. *C. Foliorum* corpore femoribusque atris ; antennis pedibusque luteis. Fn. Fridr. 102. * +

Snude-Bille nom. gen. APH. 7, 424.

* Longirostres.

1011. RHINOMACER *frumentarius* sanguineus, elytris striato-punctatis. Korn-Orm, *Snude Bille*. Act. nidr. 3, 391. APH. 4, 431; 7, 426, 427. Curc. L.

1012. Rh. *Populi* supra viridis, subtus atro-cærulescens. Curc. L.

1013. Rh. *Campanula* niger ovatus ; elytris subfulcatis. Curc. L.

1014. Rh. *gibbus* niger, ovatus ; elytris violaceis, fulcatis. * +

1015. Rh. *similis* ater, elytris ovatis, punctato-striatis. * +

1016. Rh. *nemoralis* niger, elytris striato-punctatis ; oculis fuscis. * +

1017. Rh. *politus* niger, elytris cyaneis, striatis, nitidis. * +

1018. Rh. *flavipes* niger, ovatus ; femoribus flavo-rufis. Act. nidr. 4, 15. * +

Variat antennarum basi rufa.

* * Bre-

*** Brevirostres.

1019. Rh. *Coryli* niger, thorace elytrisque rubris: P. D. Atl. I. t. I. S. inf. t. 75. f. 8. *Attelabus* L.

1020. Rh. *Avellana* niger, thorace, elytris femoribusque rubris. *Att.* L. S. inf. t. 56. f. 5, 6.

Variat thorace, elytris femoribusque luteis.

1021. Rh. *Betula* totus niger. *Att.* L.

1022. Rh. *Alni* supra viridis, subtus æneus; antennis tarsisque nigris. *Curc. Betula* L. *Rhynchites Betulaeti* Fabr.

1023. Rh. *bispinus* cæruleus, thorace utrinque spinoso; antennis nigris. S. inf. t. 6. f. 4. *

1024. Rh. *unispinus* violaceus, thorace antrorsum spinoso; antennis nigris. Scop. inf. 78. * *Betula* Linn. *Rhynchites Betuleti*, var.

1025. Rh. *inermis* violaceus thorace mutico; puncto utrinque impresso; antennis nigris. S. inf. t. 56. f. 8. * † *Rhynchites*

Hi tres unius speciei forte varietates.

1026. CERAMBYX *Cerdo* ater, thorace rugoso; elytris unicoloribus. P. D. Atl. I. t. 29.

Nullum maris & fœminæ discrimen.

1027. C. *Textor* nigricans; elytris punctis elevatis; antennarum articulo infimo, clavato. S. inf. t. 10. f. 1.

1028. C. *fuliginator* niger, thorace subspinoso; elytris tomentosis, cinereis.

1029. C. *inquisitor* niger tomento testaceus; oculis tuberculatis; elytris fascia duplici fulva. S. inf. t. 2. f. 10. t. 8. f. 2, 3; t. 83. f. 3. Act. nidr. 3, 11.

1030. C. *cursor* elytris obtusis, rufis margine lineaque nigris, antennis mediocribus.

1031. *C. Lamed* thorace pubescente; elytris fastigiatis lividis; tania obscura longitudinali sinuata; antennis brevioribus.
1032. *C. Sutor* nigricans, elytris punctis excavatis, maculisque rubiginosis.
1033. *C. edilis* cinereus, thorace punctis quatuor luteis transversalibus. D. *Tömmermand.* Act. nidr. 4, 16; t. 16. f. 8. Wilse Frid. 186. S. inf. t. 14. f. 7. femina.
1034. *C. nebulosus* cinereus, elytris punctis fasciisque nigris.
1035. *C. hispidus* fusco alboque varius, thorace tuberculato; elytris postice præmorsis: supra punctis hispidis. S. inf. t. 14. f. 9.
1036. *C. fetifer* fusco alboque varius; thorace gibbo; elytris postice integris punctisque hispidis. S. inf. t. 176. f. 5. * +
- Nimis præcedentem refert, diversus tamen.
1037. *C. moschatus* elytris obtusis viridibus, nitentibus, femoribus muticis, antennis mediocribus.
1038. *C. sanguineus* niger, thorace elytrisque rubris.

Træ-Buk. nom. gen.

* Elytris apice truncatis.

1039. LEPTURA *aquatica* deaurata antennis nigris; femoribus posticis dentatis.

Aliam reperi copiose thorace elytrisque nigris; antennis pedibusque ferrugineis. An var. *aquatica*? S. inf. t. 103. f. 6.

1040. *L. arietis* nigra thorace globoso; elytris fasciis quatuor flavis: secunda antrorsum arcuata; pedibus rufis. Act. nidr. 3, 394. t. 6. f. 4. S. inf. t. 38. f. 7.

1041. *L. rustica* nigra, thorace globoso; elytris fuscis, lineis transversis tribus albis; antica arcuata puncto medio. S. inf. t. 2. f. 7.
1042. *L. mystica* nigra, thorace globoso; elytris antice rufis, postice cinereis, medio nigro lineis arcuatis albis.
1043. *L. cylindrica* nigro-cinerea, thorace cylindrico: linea flava; tibiis anticis femoribusque rufis. *Cerambl.* L.
1044. *L. linearis* nigra, thorace cylindrico, palpis pedibusque luteis. *Cer.* L.
1045. *L. scalaris* nigra thorace cylindrico; subtus, linea futurali dentata punctisque e flavo virentibus. *Cer.* L.
1046. *L. fasciata* nigra, thorace conico; elytris attenuatis: fasciis quatuor pedibusque flavis. S. inf. t. 39. f. 6. *
1047. *L. quadrifasciata* nigra, thorace conico; elytris attenuatis: fasciis quatuor flavis. S. inf. t. 59. f. 6.
1048. *L. attenuata* nigra, thorace conico; elytris fastigiatis, attenuatis: fasciis quatuor, pedibus abdomineque fulvis. S. inf. t. 65. f. 11.
1049. *L. detrita* nigra, thorace globoso: fasciis duabus, elytris fasciis quinque luteis; antennis pedibusque rufis. S. inf. t. 38. f. 9; t. 64. f. 3.
1050. *L. nigra atra*, thorace conico; elytris attenuatis; abdomine rufo. S. inf. t. 29. f. 7.
1051. *L. bifasciata* nigra, thorace conico; elytris attenuatis: antice, macula postica, abdominisque medio rubris. * +
1052. *L. sanguinolenta* nigra, thorace conico; elytris attenuatis, sanguineis. S. inf. t. 39. f. 9.
1053. *L. melanura* nigra, thorace conico; elytris attenuatis, rufo-fuscis; futura apiceque nigris. S. inf. t. 39. f. 4. Aët. nigr. 3, 13.

a, Thor. con. elytr. att. luteis, margine apiceque nigris; abdomine argenteo.

b, Thor. con. elytr. att. pedibusque luteis; margine futuraque nigris. An varietates?

1054. *L. testacea* nigra, thorace conico; elytris attenuatis, tibiis tarsisque luteis. S. inf. t. 39. f. 3. t. 85. f. 7.

1055. *L. verna* nigra, thorace cylindrico; tibiis anticis fulvis. S. inf. t. 55. f. 9. *

1056. *L. rubra* nigra, thorace, elytris tibiisque purpureis.

1057. *L. interrogationis* nigra, elytris lividis; fascia longitudinali, arcuata, maculisque quatuor nigris.

1058. *L. sexmaculata* nigra, coleoptris testaceis; maculis sex nigris margine connexis.

*** Elytris apice obtusis.

1059. *L. violacea* tota violacea, pubescens; thorace depresso; oculis fulcis. *Ceramb.* L.

1060. *L. variabilis* violacea, thorace depresso; abdomine pedibusque rufis. S. inf. t. 4. f. 12. *Cer.* L.

1061. *L. testacea* testaceo-fusca, thorace depresso; abdomine femoribusque nigris. S. inf. t. 64. f. 6. *Cer.* L.

1062. *L. Bajula* variabilis, nitida; thorace depresso, villoso; tuberculis duobus. S. inf. t. 64. f. 4, 5. *Cer.* L.

Colore, magnitudine, defectu macularum in elytris &c. magnopere variat.

1063. *L. arcuata* nigra, thorace globoso; elytris fasciis flavis; tribus recurvis; antennis pedibusque rufis. S. inf. t. 38. f. 6; t. 107. f. 2 & 3.

1064. *L. virginea* thorace globoso nigro; elytris violaceis; abdomine rufo. S. inf. t. 4. f. 13.

1065. *L. castanea* thorace subrotundo, corporeque nigro; elytris, antennis pedibusque ferrugineis. *Cer.* L.

1066. *L. villica* thorace cupreo, tuberculato; elytris nigris, punctis striatis; antennis abdomine pedibusque ferrugineis. Fn. Fridr. 133. *
1067. *L. viridis* thorace violaceo, tuberculato; elytris viridibus, punctis striatis; antennis nigris. Fn. Frid. 134. *
1068. *L. femica* thorace subrotundo; tuberculis subferrugineis, obsolete; elytris violaceis; antennis longiusculis. Cer. L.
1069. *L. undata* thorace subrotundo, tuberculato; elytris fasciis duabus undulatis; antennis submediocribus.
1070. *L. populnea* nigra, thorace cylindrico; lineis tribus; elytris punctis decem luteis. S. inf. t. 48. f. 5. Cer. L.
1071. *L. æruginea* nigra, thorace cylindraco; undique pilis five squamulis pallide-virentibus irrorata. *
An indigena?
1072. *L. lineata* nigra villosa, thorace cylindrico; linea longitudinali pallida. * +
1073. *L. bimaculata* rufa, thorace cylindrico; elytris punctatis: macula & striga, undulata, alba. S. inf. t. 158. f. 1. *
1074. *L. præusta* nigra, thorace cylindrico; elytris flavis, apice nigris; pedibus anticis luteis. S. inf. t. 52. f. 8.
1075. *L. cantbarina* rufo-fusca, thorace cylindrico; antennis corpore longioribus; oculis nigris. Cer. L.
1076. ATTELABUS *apiarius* cæruleus, elytris rubris: fasciis tribus nigris. S. inf. t. 48. f. 11.
1077. *A. formicarius* niger, thorace abdomine, elytrorumque basi rubra, dorso fasciis binis albis. S. inf. t. 186. f. 4.
1078. *A. mollis* flavicans, thorace fasciisque elytrorum duabus fuscis. S. inf. t. 60. f. 2.

1079. MELOE *Proscarabeus* atro-violaceus. S. inf. t. 3. f. 5.
APH. 6, 22. D. Olin-Biller.

Variat elytris rugofulis & absque rugis; capite
& thorace plus minus punctatis; thorace-
que postice marginato vel absque margine.

1080. M. *majalis* niger, segmentis abdominis dorso rubris.
P. D. Atl. 1. t. 29. S. inf. t. 3. f. 6.

1081. NECYDALIS *minor* elytris abbreviatis testaceis; apice
lineola alba; antennis longioribus. SCHAF. mo-
nogr. 1753. f. 6, 7.

1082. THRIPS *Physapus* atra, elytris albidis, conjunctis,
fastigiatis.

1083. Th. *fusca*, nigricans, elytris glaucis.

1084. Th. *obscura* flavescens, elytris pallidis; oculis abdomi-
nisque annulis nigris. * †

1085. Th. *minutissima* elytris corporeque glauco; oculis fuscis.

1086. SILPHA *Vespillo* atra, clypeo quadrato; elytris trun-
catis; fasciis binis rufis. S. inf. 1. t. 9. f. 4.

1087. S. *germanica* nigra, clypeo subrotundo, gibbo; ely-
tris truncatis, margine laterali obsolete ferrugi-
neis. P. D. Atl. 1. t. 29.

1088. FORFICULA *major* ferruginea, elytris testaceis; ma-
cula alarum alba. Öretvist. Act. nidr. 3, 30.
APH. 6, 88. S. inf. t. 144. f. 3, 4.

Forcipes ferruginei: in mare basi lata, plana, la-
tere interiori denticulis quatuor minoribus
& quinto majori versus curvaturam, apicem
versus teretes, arcuati, ipso apice conniven-
tes; in femina minores, breviores, stricti,
summo apice aliquantum curvati, absque
dentibus.

1089. F. *minor* elytris testaceis, immaculatis. S. inf. t. 41. f. 12, 13.

* Tho-

* Thorace æquali: postice & antice æquali latitudine.

1090. STAPHYLINUS *olens* ater, opacus, antennis decrefcentibus. Fn. Fridr. 228. VonWürm. n.48. GEOF. inf. 1. t. 7. f. 1. Biblioth. f. n. *Skrift*. 1772. p. 147.

1091. St. *hirtus* hirsutus niger; thorace abdomineque postice flavis.

1092. St. *erythropterus* niger, opacus; elytris pedibusque rufis. S. inf. t. 2. f. 2. Act. nidr. 3, 26. t. 4. f. 8.

1093. St. *Baleti* fuscus, capite nigro; elytris antennis pedibusque lividis.

1094. St. *fulcatus* niger, thorace fulcato; elytris fuscis; pedibus pallidis. St. *piceus* LIN.?

1095. St. *Cursor* niger, thorace depresso: litura duplici; elytris pedibusque flavis. * +

1096. St. *minor*, niger glaber, elytris pallide fuscis; pedibus luteis. * +

1097. St. *Agarici* luteus, capite nigro; abdomine rufo. * +

1098. St. *rufipes* niger, elytris thorace duplo-longioribus brunneis; pedibus flavis. Act. nidr. 3, 29.

Maris & fœminæ nulla differentia.

1099. St. *flavipes* niger, elytris antennis pedibusque ferrugineis. Act. nidr. 4, 34?

** Thorace postice latiore.

1100. St. *marginatus* niger, thoracis margine pedibusque flavis; elytris glaucis. Fn. Fridr. 230. Act. nidr. 4, 13. * +

1101. St. *latus* niger, elytrorum summo margine postico pedibusque flavis. * +

1102. St. *penetrans* niger, antennis, elytris pedibusque castaneis. * +

1103. *St. vernalis* fulvus, elytris antice abdomineque postice nigris, medio rufo. * + Facies *St. chrysomelini*.
1104. *St. lunulatus* flavus, capite, antennarum elytrorumque medio, abdominis postico nigris.
1105. *St. chrysomelinus* niger, thorace elytrisque fulvis; pedibus luteis. Aët. nidr. 3, 28.
1106. *St. glaber* niger, antennis, pedibus, elytrisque lævibus, rufo-fuscis. GEOFR. inf. I. St. 10. *
1107. *St. marginalis* niger, thoracis marginibus, elytris, pedibus apiceque abdominis flavis. * +
1108. *St. politus* niger, capite thoraceque nitidis, punctatis. Aët. nidr. 3, 27.
1109. *St. niger* totus niger, capite thoraceque nitido, non punctatis. En. Fridr. 229. * +
1110. *St. aneus* niger, capite thoraceque nitidis; elytris æneovirentibus. GEOFR. inf. I. St. 17. An pracedentis varietas?
1111. *St. subterraneus* niger, elytris macula oblonga, subferruginea.
1112. *St. fuscicornis* niger, capite thoraceque nitidis; elytris margine inferiore, antennisque lividis. * +
1113. *St. flavesens* ater pedibus rufis; elytrorum margine flavo.

*** Thorace postice angustiore.

1114. *St. balteatus* niger, pubescens fasciis cinereis. I. Först. Oxe, Farte-Stoud. Isl. R. 688. c. Biblioth. f. n. S. p. 148. Von Würm. n. 48. S. inf. t. 80. f. I. Aët. nidr. 3, 25. *St. maxillofus* LIN.
1115. *St. murinus* cinereo-nebulosus, pubescens; punctis nigris. S. inf. t. 4. f. II.

1116. *St. rufus* niger; antennis, thorace, abdomineque antice rufis; elytris basi pedibusque flavis. S. inf. t. 85. f. 3.
1117. *St. florens* niger; thorace convexo, punctulato; elytris pedibusque flavis. * +
1118. *St. fracti-cornis* linearis niger; antennis pedibusque fuscis; infimo antennarum articulo atro. * +
1119. *St. formicarius* linearis niger, infimo antennarum articulo atro. * +
- Variat rufus; a, capite abdomineque nigris. b, capite, thorace abdomineque nigris. c, capite, thorace, elytris abdomineque nigris.
1120. *St. lignorum* fuscus, elytris futura; abdomine pedibusque ferrugineis.
1121. *St. punctatus* atro-cæruleus femoribus testaceis. Aët. nidr. 4, 36. * +
1122. *St. striatus* ater, thorace punctato & striato. Aët. nidr. 4, 35. * +
- *** Thorace cylindraceo.
1123. *St. oculus* niger thorace cylindraceo elytrisque scabris. GEOFF. inf. St. 24. *
- Variat pedibus nigris, flavis & pallidis.
1124. *St. biguttatus* niger thorace cylindraceo, elytris puncto fulvo.
1125. *St. riparius* rufus, elytris cæruleis; capite, abdomine femorumque apice nigris. S. inf. t. 71. f. 3.
Rov-Bille, nom. gen. APH. 6, 571.
1126. *BLATTA orientalis* ferrugineo-fusca, elytris abbreviatis: fulco oblongo impresso. S. inf. t. 155. f. 7.
1127. *Bl. lapponica* flavescens, elytris nigro maculatis. P. D. Atl. I. t. 29. S. inf. t. 88. f. 3.

1128. *Bl. germanica* livida, corpore flavescente; thorace lineis duabus nigris parallelis. D. Möll. P. D. Atl. 1. t. 29. *Bl. Transfuga*.

1129. ACHETA *Gryllozalpa* thorace rotundato, alis caudatis elytro longioribus, pedibus anticis palmatis tomentosis. Ford-Krebs. S. inf. t. 37. f. 1.

1130. *A. domestica* thorace rotundato, alis caudatis elytro longioribus, pedibus simplicibus, corpore glauco. D. Faare-Kylling. N. Sirize. APH. 2, 279.

1131. ACRIDIUM *bipunctatum* thoracis scutello abdominis longitudine.

1132. *Acr. subulatum* thoracis scutello abdomine longiore. S. inf. t. 161. f. 2, 3.

Variat linea flavissima a fronte ad apicem scutelli, crustaque lineari loco elytri alæ adhærente. S. inf. t. 154. f. 9, 10.

1133. *Acr. viridulum* thorace cruciato, corpore supra viridi, elytrorum margine albido. S. inf. t. 141. f. 2, 3.

1134. *Acr. stridulum* thorace subcarinato, alis rubris extimo nigris, nebulosis. S. inf. t. 27. f. 10, 11.

1135. *Acr. danicum* thorace subcarinato, femoribus virescen-
tibus, tibiis posticis sanguineis. S. inf. t. 141. f. 4, 5.

1136. *Acr. grossum* femoribus sanguineis, elytris viresepti
subrufis, antennis cylindricis.

Variat femoribus posticis supra & infra rubris,
capite & thorace undique rubro maculatis.

1137. *Acr. pedestre* corpore livido incarnato, aptero.

1138. *Acr. cinereum* punctis fulcis undique maculatum thorace
subcarinato, alis albis. *

1139. *Acr. apricarium* thorace cruciato, antennis longitudine corporis.

1140. *Acr. rufum* thorace cruciato, corpore rufo, elytris griseis, antennis subclavatis acutis. S. inf. t. 136. f. 5, 6.

1141. *Acr. biguttulum?* thorace cruciato; elytris utrinque puncto albido, lineaque interrupta: femorumque posticorum longitudinali nigra.

Coloribus maxime variat ejusdem fere magnitudinis:

a. capite, thorace, femoribus posticis elytrisque superne viridibus. b. capite, thorace, femoribus posticis, elytris, abdomineque superne rubris. c. capite, thorace, femoribus posticis, elytrisque griseis. d. capite thorace, pedibus elytrisque superne pallide virentibus. e. capite, thorace, femoribusque superne viridibus; elytris abdomineque griseis; omnibus nigro-maculatis. f. capite, thoracisque lateribus nigro rubroque variegatis, vertice ac elytris viridibus. g. totum pallide flavescens, elytris griseis. S. inf. t. 190. f. 1. In pratis sub initium Augusti mensis.

1142. *LOCUSTA viridissima* thorace rotundato, alis viridibus immaculatis, antennis longissimis. S. inf. t. 139. f. 3 - 5. APH. 3, 128.

1143. *L. verrucivora* thorace subquadrato lævi, alis viridibus fusco maculatis, antennis longitudine corporis. S. inf. t. 62. f. 5.

1144. *L. viridis* thorace maculis: elytris linea dorsali ferrugineis; antennis longissimis. * †

D. Græs-Hoppe. N. Eng-Tiding; Lang-Trold.
nom. gen.

2. H E M I P T E R A.

1145. *CICADA coleoptrata* elytris totis coriaceis, alas tegentibus.
1146. *C. cornuta* thorace bicorni postice subulato longitudine abdominis; alis nudis. P. D. Atl. I. t. 29. S. inf. t. 96. f. 2.
1147. *C. bifasciata*, fusca fasciis alarum binis albis.
1148. *C. spumaria* fusca thorace immaculato; elytris totis coriaceis: fascia duplici, interrupta, albida. Spuma larvæ: D. *Giög-Spyt*, *Troid-Spyt*. N. *Lop-Spyt*.
1149. *C. quadri-maculata* nigricans, thorace bipunctato; elytris totis coriaceis: fascia duplici interrupta alba. Affinis *C. Spum.* at in plurimis diversa. * +
1150. *C. pallescens* elytris abbreviatis striatis fusco-maculatis; alis albis. * +
1151. *C. fusca* flavescent, elytris fuscis, nervosis; oculis nigris. * +
1152. *C. squalida* fusca elytris, nebulosis: nervis albidis. GEOFR. inf. I. Cic. 14. *
1153. *C. nervosa* fusca, alis hyalinis, fusco maculatis: nervis punctatis.
1154. *C. leucophthalma* nigra, oculis albis.
Globulos aqueos e postica parte in parabolam vibrare vidi.
1155. *C. leucocephala* nigra, capite albo.
1156. *C. lateralis* nigra, elytris latere albis.
1157. *C. striata* elytris albido nigroque ad angulum acutum futuræ dorsalis striatis.
1158. *C. Populi* subtus flavescent, fronte punctis duobus nigris.

1159. *C. flavicollis* fusca, capite thoraceque flavis.
1160. *C. flava* flava, unicolor.
1161. *C. vittata* flava: vitta nigra longitudinali duplici repanda.
1162. *C. aptera* aptera atra, elytris abbreviatis; tibiis antennisque pallidis.
1163. *C. pusilla* pallida, alis membranaceis albis: punctis raris nigris. Salto oculis percipitur. * +
1164. *C. leporina* alis deflexis exalbidis, antice anastomosibus pallidis supra lineolam nigricantem, ano lanato.
1165. *C. viridis* elytris viridibus, capite flavo punctis nigris.
1166. *C. flava* flava, compressa.
1167. *C. Ulmi* alis viridi-luteis: apicibus nigricantibus inauratis.
1168. *C. Rosæ* flava, alis albis apice membranaceis.
1169. *C. hyalina* luteo-alba, oculis cinereis. * +
1170. *C. arvensis* lutea, fronte abdomine subtus lateribusque nigris. Stemmata in his duobus nulla. * +
1171. *C. maculata* flavescens, alis hyalinis nervosis maculis subfulvis. * +
1172. *C. reticulata* lutea, scutello tripunctato, apice fusco; alis albis reticulatis. * +
1173. *C. glabra* fusca, thorace nigro; elytris politis fulvis. * +
C. amphibia clarif. BRUNNICH. P. D. Atl. 1. t. 29.
 antennis clavatis, pedibusque natatoriis
 singularis.
1174. NOTONECTA *glauca* elytris fulvis: margine punctato. S. inf. t. 33. f. 5, 6.
1175. *N. lutea*, elytris albidis: striga marginali nigra. * +

Nulla maris & fœminæ differentia. Elytra & Scutellum in *glauca* tomentosa, hinc nunquam madent, in *lurea* contra tomento destituta, madida ex aqua trahuntur.

1176. *N. striata* nigricans thorace elytrisque lineis transversis flavescens. S. inf. t. 97. f. 2.

1177. *N. marginata* elytris nigris: margine futuraque luteis. * +

1178. *N. minutissima* grisea thorace elytrisque maculis fuscis.

Plurimas vidi, omnes elytris & scutello instructas; alas videre minus contigit; cursu vehementissimo per aquas fertur, mihi semper prona, nunquam supina.

1179. *NEPA cinerea* thorace inæquali, corpore oblongo-ovato. S. inf. t. 33. f. 7-9.

1180. *N. Cimicioides* abdominis margine ferrato. S. inf. t. 33. f. 3. 4.

1181. *N. linearis* linearis manibus spina laterali pollicatis.

* Apteri.

1182. *CIMEX lectularius* apterus. D. *Vægge-Luus*, *Vægge-Tingest*. N. *Senge-Tæge*.

1183. *C. grylloides* apterus niger, elytris ovatis margine luteis abdomine brevioribus.

* * Scutello longitudine abdominis.

1184. *C. Maurus* scutellaris corpore griseo.

* * * Elytris fere totis coriaceis.

1185. *C. rugosus* coleoptratus elytris pallidis, corpore oblongo.

1186. *C. clavicornis* coleoptratus, elytris nervoso-carinatis reticulato-punctatis, antennis clavatis.

1187.

1187. *C. littoralis* coleoptratus, elytris fordidis albo punctatis, alis abbreviatis, corpore nigro.

1188. *C. oculus* coleoptratus niger, pedibus fulvis. * †

* 4 * Thorace spina utrinque armato.

1189. *C. bidens* ovatus griseus, thorace acute spinoso, antennis rufis.

1190. *C. rufipes* ovatus griseus, thorace obtuse spinoso, pedibus rubris.

1191. *C. marginatus* oblongo-ovatus griseus, thorace obtuse spinoso, antennis medio rubris.

1192. *C. hæmorrhoidalis* ovato-oblongus viridis; thorace acute spinoso; cruce fusca; antennis nigris.

1193. *C. ferrulatus* ovatus griseus thorace antice denticulato; articulo quarto antennarum annulo rubro. * †

* 5 * Thorace mutico.

1194. *C. griseus* ovatus griseus, abdominis lateribus albo nigroque variis, alis nebulosis, sterno porrecto.

1195. *C. interstinctus* ovatus griseus, abdominis lateribus rubro nigroque variis, alis albis, sterno porrecto.

1196. *C. baccarum* ovatus griseus abdominis margine nigro maculato. S. inf. t. 43. f. 3, 4; 15, 16.

1197. *C. roseus* ovatus fuscus, abdomine incarnato; pedibus pallidis femoribus puncto nigro. * †

1198. *C. caruleus* ovatus caruleus immaculatus.

1199. *C. oleraceus* ovatus caruleo-æneus, thorace lineola, scutelli apice elytris puncto albo rubrove.

1200. *C. biguttatus* ovatus niger margine undique albo, elytris puncto albo.

1201. *C. bicolor* ovatus niger, elytris nigro alboque variis, alis albis. S. inf. t. 41. f. 8, 9.
1202. *C. bifasciatus* ovatus, niger; elytris fasciis duabus luteis. Fn. Fridr. 274. * +
1203. *C. ornatus* rotundato-ovatus nigro rubroque varius, capite alisque nigris.
1204. *C. alatus* ovatus rufus, elytris alas mentientibus; antennis clavatis. * +
1205. *C. acuminatus* ovalis antice attenuatus cinereo exalbidus, antennis incarnatis.
1206. *C. juniperinus* subrotundus viridis margine undique scutelloque apice flavo. S. inf. t. 46. f. 1, 2, 3.
1207. *C. prasinus* subrotundus totus viridis, scutello concolore.

* 6 * Antennis apice setaceis.

1208. *C. personatus* rostro arcuato, antennis apice capillaceis, corpore oblongo, subvillosa, fusca. D. Flue-Tegen. P. D. Atl. 1. t. 29. Aph. 11.
1209. *C. annulatus* rostro arcuato, antennis apice capillaribus, corpore oblongo: subtus sanguineo maculato.
1210. *C. ater* antennis apice capillaribus, corpore oblongiuculo, atro.
1211. *C. gothicus* antennis apice capillaribus, corpore oblongo nigro, scutello elytrorumque apicibus coccineis. P. D. Atl. 1. t. 29.
1212. *C. cimbricus* antennis apice capillaribus; thorace elytrisque rubellis apice macula coccinea, nigra duplicique alba. Scop. carn. Cim. gothicus. *
1213. *C. trilineatus* niger, antennis apice capillaribus; thorace pedibusque cinereis; elytris fuscis; lineolis transversis tribus candidis. * +

* 7 * Oblongi.

1214. *C. pratensis* oblongus griseus, scutello macula cordata flava, elytris apice puncto fusco.
1215. *C. crassicornis* oblongus subgriseus rubro punctatus, antennis clavatis.
1216. *C. tripunctatus* oblongus griseus; elytrorum singulo punctis tribus nigris in longitudinem dispositis. * +
1217. *C. ferus* oblongus griseus, immaculatus.
1218. *C. laevigatus* oblongus exalbidus, lateribus albis.
1219. *C. Populi* oblongus albo fuscoque nebulosus.
1220. *C. dolabratus* oblongus, elytris ferrugineis latere albidis, antennis nigris, linea thoracis alba.
1221. *C. inauratus* fulvescens, thorace linea interrupta nigra; elytris duabus obliquis luteis. * +
1222. *C. Galla* oblongus, antennis pedibusque incarnatis; elytris fulvis, apice nigricante. Fn. Fridr. 275. * +
1223. *C. pabulinus* oblongiusculus flavescenti-viridis totus.
1224. *C. Kalmii* oblongus viridis, scutello macula cordata, flava; elytris maculis duabus nigris.
1225. *C. lanarius* oblongus, elytris rufis, punctatis: apice macula flava circuloque rubro; abdomine pedibusque luteo virentibus.
1226. *C. Hyoscyami* oblongus rubro nigroque varius, alis fuscis immaculatis. S. inf. t. 13. f. 11.
1227. *C. campestris* oblongiusculus viridis scutello macula cordata, elytris margine interiore macula ferruginea.
1228. *C. umbratilis* oblongus niger, elytris albo maculatis.
1229. *C. nemorum* niger, elytris alisque fusco alboque variis, pedibus testaceis.

1230. *C. Pini* oblongus ater, elytris fuscis macula rhombea nigra.
1231. *C. Rolandri* oblongus ater, hemelytris macula flava.
1232. *C. striatus* niger, elytris fulvo striatis, apice pedibusque rufis.
1233. *C. arenarius* oblongus niger; elytris cinereis antice nigris; alis postice albis.
1234. *C. birtus* oblongiusculus niger; elytris litura longitudinali pallida.
1235. *C. cantbarinus* oblongus niger, thorace unidentato: circulo albo; elytris cinereis maculis quatuor scutelloque luteis. * +
1236. *C. sylvestris* oblongus niger, alis elytrisque albo fuscoque variis, pedibus rufis.
1237. *C. mutabilis* oblongiusculus niger, alis inferioribus caeruleis, antennis pedibusque flavis.
1238. *C. sexmaculatus* ater, elytris maculis sex pedibusque flavis. * +
1239. *C. defes* oblongus niger, thorace lineis tribus: scutello margineque elytrorum flavis. * +
1240. *C. Coryli* oblongus niger, pedibus antennisque fetaeis flavis.
1241. *C. rubellus* sanguineus, elytris membranaceis albis; antennis pedibusque pallidis. * +
1242. *C. variegatus* luteus thorace punctis quatuor, elytrisque striis sex nigris. * +
1243. *C. cruentus* oblongus sanguineus, thorace linea transversa nigra; elytris apicem versus puncto albo. * +
1244. *C. Ulmi* oblongus supra rubiginosus, elytris striis sanguineis, alis postice albo fuscoque variis.

1245. *C. Abietis* oblongiusculus, maculato-fulvus, pedibus rufis, femoribus anticis crassioribus dentatis.

✱ 8 ✱ Lineares.

1246. *C. lacustris* linearis supra niger depressus, pedibus anticis brevissimis. D. *Stankelbeen-Tagen*. APH. 8, 12.

In animali nondum perfecto rudimenta alarum nigra sunt, strigæque quatuor longitudinales ex punctis luteis in abdomine subtus albo. Cum hac larva in superficie aquarum frequens vagatur alia huic simillima, at quadruplo minor abdomineque minori, cujus fere apice affixi sunt pedes postici, ut facile crederes, abdomen deesse. An differens sexus?

1247. *C. stagnorum* linearis niger, apterus; capite, elongato; elytris brevissimis. D. *Naale-Tagen*.

Singulare animali caput vel si mavis, collum elongatum, clavatum, medio oculis binis & apice duobus minimis instructum.

1248. *C. bortenfis* linearis viridis oculis fuscis; secundo antennarum articulo basi albo; tibiis pallidis. GEOFR. *limex probulinos dian* inf. Cim. 43. *

1249. PSYLLA *Alni* viridis, alis primoribus venis fulvis. GEOFR. inf. I. Psylla 2. APH. 6, 368.

1250. Pf. *Abietis* pallide flavescens, oculis fuscis, alis aqueis.

1251. Pf. *Fraxini* nigro luteoque variegata; alarum oris in apice fuscis.

1252. APHIS *Balsamitæ* nigra, abdomine viridi; oculis rubris.

1253. Aph. *Cirsii* fusca punctis elevatis.

1254. Aph. *Rumicis* atra opaca, antennis pedibusque albis.

1255. Aph. *Salicis* viridis punctis dorſi ſerie duplici albis.
 Juniores læte virides, adultiores obſcuriores, natu minimæ fulvæ ſunt; variat dorſo viridi maculis ſparſis inæqualibus albidis; mortuæ nigræ, globosæ, abſque punctis aut maculis.
1256. Aph. *Ceraſi* atra nitida, antennis pedibusque albis.
 Juniores caſtaneæ, adultiores aterrimæ ſunt. * †
1257. Aph. *Sambuci* nigrovireſcens, lineis interruptis albis.
 Lineæ & puncta alba facile delentur. St. S. I, 163.
1258. Aph. *Ribis* viridis, pellucida.
1259. Aph. *Urticæ*, alba lanata, poſtice truncata.
1260. Aph. *Paſtinacæ*.
1261. Aph. *Lychnidis*.
1262. Aph. *Padi*.
1263. Aph. *Rosæ*.
1264. Aph. *Nymphææ*.
1265. Aph. *Tiliæ*.
1266. Aph. *Brassicæ*.
1267. Aph. *Craccæ*.
1268. Aph. *Cardui*.
1269. Aph. *Tanacetii*.
1270. Aph. *Absinthii*.
1271. Aph. *Jacææ*.
1272. Aph. *Betulæ*.
1273. Aph. *Roboris*.
1274. Aph. *Fagi*.
1275. Aph. *Tremulæ*.
1276. Aph. *Salicis*.

1277. Aph. *Ulm.*

1278. Aph. *Attriplicis.*

Blad-Luus nom. gen. APH. I, 354.

1279. CHERMES *Pyri.*

1280. Ch. *Urticæ.*

1281. Ch. *Alni.*

1282. Chr. *Fagi.*

1283. Ch. *Salicis.*

1284. COCCUS *Coryli.*

1285. C. *Tilia.*

1286. C. *Salicis.*

1287. C. *polonicus* radices sceleranthi perennis. D. *Skarlagens*.
Kræk. P. Fl. æcon. 219. APH. I, 571.

1288. C. *pilosella.*

3. L E P I D O P T E R A.

✱ *Alis caudatis.*

1289. PAPILIO *Machaon* alis caudatis concoloribus flavis,
limbo fuscø lunulis flavis, angulo ani fulvo. S.
inf. t. 45. f. 1, 2. In insula *Haavæn* sinus Drø-
bachienfis Norvegiæ.

1290. P. *Rhamni* alis subcaudatis, flavis: singulis puncto fla-
vo: subtus ferrugineo. S. inf. t. 35. f. 1, 2, 3.

1291. P. *Betula* alis subcaudatis fuscis: primoribus macula
reniformi fulva, subtus luteis fascia fulva.

1292. P. *Quercus* alis subcaudatis supra cæruleis, subtus cine-
reis lineâ alba puncto ani gemino fulvo. S. inf.
t. 14. f. 1, 2.

1293.

1293. *P. Rubi* alis dentato-subcaudatis; supra fuscis, subtus viridibus. S. inf. t. 29. f. 5, 6.

*** Alis denticulatis.

1294. *P. Jo* alis angulato-dentatis fulvis nigro-maculatis; singulis subtus ocello cæruleo. S. inf. t. 94. f. 1, 2.
1295. *P. Antiopa* alis dentatis nigris limbo albido. D. *Morian*. S. inf. t. 70. f. 1, 2.
1296. *P. polychloras* alis dentatis fulvis nigro maculatis: primoribus supra punctis quatuor nigris. S. inf. t. 146. f. 1, 2.
1297. *P. urtica* alis dentatis fulvis nigro maculatis: primoribus supra punctis tribus nigris. S. inf. t. 142. f. 1, 2.
1298. *P. C album* alis dentatis fulvis nigro maculatis: posticis subtus C albo notatis.
1299. *P. Cardui* alis dentatis fulvis albo nigroque variegatis; posticis utrinque ocellis quatuor sæpius cæcis. D. *Smukke Frue*. S. inf. t. 97. f. 5, 6.
1300. *P. Atalanta* alis dentatis nigris albo maculatis: fascia communi purpurea, primoribus utrinque, posticis marginali. D. *Admiralen*. S. inf. t. 148. f. 1, 2.
1301. *P. Lucina* alis dentatis fuscis testaceo-maculatis, subtus fasciis duabus macularum albidarum.
1302. *P. Cinxia* alis dentatis fulvis nigro-maculatis; subtus fasciis tribus ex albido flavis. D. *Graven*.
1303. *P. Paphia* alis dentatis luteis nigro-maculatis: subtus lineis argenteis transversis. D. *Kaiserin*. S. inf. t. 97. f. 3, 4.
1304. *P. Euphrosyne* alis dentatis fulvis, nigro-maculatis: subtus maculis IX. argenteis. D. *Prinzen*.
1305. *P. Aglaia* alis dentatis flavis nigro-maculatis: subtus maculis XXI. argenteis. D. *Kongen*.

1306. *P. Adippe* alis dentatis luteis nigro-maculatis: subtus maculis XXIII. argenteis. S. inf. t. 143. f. 1, 2.
1307. *P. Larbonia* alis dentatis luteis nigro-maculatis: subtus maculis XXXVII. argenteis.
1308. *P. Niobe* alis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus maculis pallidis: punctis tribus argenteis ocellatis.
1309. *P. Malva* alis denticulatis divaricatis nigris, albo maculatis.

*** Alis integerrimis, rotundatis.

1310. *P. Apollo* alis integerrimis rotundatis albis: posticis ocellis supra quatuor, subtus sex basique rubris. S. inf. t. 36. f. 4.
1311. *P. Mnemosyne* alis integerrimis rotundatis albis nigro-nervosis: primoribus maculis duabus nigris marginalibus. S. inf. t. 34. f. 6, 7.
- In luco *Fortunen* prope Havniam vulgarem reperi Europæorum rarissimum.
1312. *P. Cratægi* alis integerrimis, rotundatis, albis: venis nigris. S. inf. t. 140. f. 2, 3.
1313. *P. Brassica* alis integerrimis, rotundatis albis: primoribus maculis duabus apicibusque nigris, major. S. inf. t. 40. f. 3, 4.
1314. *P. Rapæ* alis integerrimis rotundatis albis: primoribus maculis duabus apicibusque nigris, minor.
1315. *P. Napi* alis integerrimis rotundatis albis: subtus venis dilatato-virescentibus.
1316. *P. Sinapis* alis integerrimis rotundatis albis immaculatis: apicibus fuscescentibus. S. inf. t. 97. f. 8-11. t. 140. f. 4, 5.

Termini veri specierum & varietatum in Papil. candidis, eorumque affinibus nondum descriptis desiderantur.

1317. P. *Cardamines* alis integerrimis rotundatis albis: primoribus medio fulvis: posticis subtus viridinebulosis. S. inf. t. 91. f. 1, 2.
1318. P. *Hyperantus* alis rotundatis fuscis margine albo: subtus primoribus ocellis duobus vel tribus; posticis quatuor vel quinque. S. inf. t. 127. f. 1, 2.
- Hujus novem varietates reperi. *Ocellis subtus primorum II, posticorum V.* a. alis supra primoribus impunctatis, posticis punctis 2 ocellaribus. b. alis supra prim. punctis 2 ocellaribus, posticis ocellis 2. P. *Polimeda* Scop. Carn. 1. c. alis supra omnibus impunctatis. Fn. Fridr. 331. P. *Vidua*. *Ocellis subtus primorum III, posticorum V.* d. alis supra omnibus impunctatis. e. prim. supra punctis 2, posticis puncto 1. f. prim. supra punctis 2, posticis impunctatis. g. omnibus supra punctis 2. P. *Polimeda* Sc. Carn. 2. *Ocellis subtus primorum III, posticorum IV.* h. alis supra omnibus impunctatis. *Punctis subtus primorum II. cæcis, posticorum V. pupilla candida.* i. alis supra omnibus impunctatis. Fn. Fridr. 330. P. *Arete*.
1319. P. *Tullia* alis rotundatis flavis: subtus fascia undata alba, margineque posteriorum ocellis septem. Fn. Fridr. 332.* S. inf. t. 127. f. 4, 5.?
1320. P. *Mara* alis rotundatis fuscis: utrinque primoribus sesquiocello; posticis ocellis supra tribus.
1321. P. *Mægera* alis rotundatis luteis fusco-fasciatis: utrinque primoribus sesquiocello; posticis supra quin. S. inf. t. 148. f. 3, 4.
1322. P. *Ligea* alis rotundatis fuscis fascia rufa: utrinque primoribus ocellis quatuor, posticis tribus. Aët. nidr. 3, 31.

1323. *P. Semele* alis rotundatis fulvo nigroque nebulosis : primoribus utrinque ocellis duobus ; posticis supra unico.
1324. *P. Furrina* alis rotundatis fuscis primoribus ocello utrinque unico. *P. Janira* sexus alter.
1325. *P. Arion* alis rotundatis, supra fuscis disco cæruleo maculis atris ; subtus canis punctis ocellaribus.
1326. *P. Acrion* alis rotundatis : superioribus fulvis maculis atris, inferioribus fuscis margine maculato ; omnibus subtus canis punctis ocellaribus. *P. D. Atl.* t. 30. * †
1327. *P. Argus* alis rotundatis cæruleis : posticis subtus limbo ferrugineo : ocellis cæruleo-argenteis. *S. inf.* t. 29. f. 3, 4 ; t. 98. f. 4, 6. *P. Idas* fœmina est.
1328. *P. Argiolus* alis rotundatis, supra cæruleis margine nigris ; subtus cærulescentibus punctis nigris dispersis. *Act. nidr.* 3, 32.
1329. *P. Pamphilus* alis integerrimis flavis, subtus primoribus ocello : posticis cinereis fascia ocellisque quatuor oblitteratis.
1330. *P. Pbleas* alis integerrimis fulvis nigro-punctatis, subtus albo marginatis ; posticis canescentibus. *S. inf.* t. 143. f. 3, 4.
1331. *P. Virgaurea* alis integerrimis fulvis margine fusco, punctis atris sparsis. *Act. nidr.* 3, 33.
1332. *P. Comma* alis integerrimis divaricatis fulvis, punctis albis lineolaque nigra. Variat maculis obsoletis & splendide niveis.
1333. *P. flavus* alis integerrimis fulvis, utrinque immaculatis. *P. D. Atl.* 1. t. 30. * †
D. Sommer-Fagl. N. Mari-Höne, nom. gen.
APH. 7, 440. *Kaal-Orm, Guld-Orm, Knob-Orm* nom. larvæ.

1334. SPHINX *ocellata* alis repandis, posticis ocellatis. S. inf. t. 99. f. 5, 6.
1335. Sph. *Populi* alis dentatis reversis, posticis basi ferrugineis, anticis puncto albo. S. inf. t. 100. f. 5.
1336. Sph. *Convolvuli* alis integris, posticis nigro fasciatis margine postico albo punctatis; abdomine rubro cingulis atris. S. inf. t. 98. f. 1, 2.
1337. Sph. *Ligustri* alis integris, posticis incarnatis fasciis nigris; abdomine rubro cingulis nigris.
1338. Sph. *Elpenor* alis integris virescentibus; fasciis purpureis variis; posticis rubris, basi atris. S. inf. t. 96. f. 4, 5.
1339. Sph. *Porcellus* alis integris, margine rubris; posticis basi fuscis.
1340. Sph. *Euphorbia* alis integris, fuscis: vitta superioribus pallida, inferioribus rubra. S. inf. t. 99. f. 3, 4. APH. 5, 59.
1341. Sph. *apiformis* alis fenestratis abdomine flavo; incisuris atris; thorace nigro: maculis duabus flavis. S. inf. t. 111. f. 2, 3.
1342. Sph. *fusciformis* abdomine barbato nigro: fascia flavescente; alis fenestratis margine nigro-purpurascete.
1343. Sph. *culiciformis* alis hyalinis margine fasciaque nigris; abdomine barbato: cingulo fulvo.
1344. Sph. *Filipendula* alis superioribus cyaneis: punctis rubris; inferioribus rubris, immaculatis. S. inf. t. 16. f. 6, 7; t. 71. f. 1.
1345. Sph. *purpuralis* alis superioribus hyalinis nigricantibus: maculis tribus oblongis, rubris; inferioribus rubris immaculatis. P. D. Atl. t. 30. S. inf. t. 16. f. 4, 5. *

1346. Sph. *Statios* viridi-cærulea, alis inferioribus fuscis. S. inf. t. 1. f. 8. 9.

In copula reperi marem cærulefcentem, fœminam viridem; ova lutea sunt.

✱ 1 ✱ Attaci alis patulis.

1347. PHALÆNA A. *pavonia* elinguis, alis rotundatis, griseo-nebulosis subfasciatis: ocello nictitante, subfenebrato. D. *Paafugl-Øye*, *Paa-Øye*. S. inf. t. 89. f. 4, 5.

1348. Ph. A. *Tau* elinguis, alis testaceis: ocello subviolaceo, pupilla hastata alba. S. inf. t. 85. f. 4, 5, 6.

✱ 2 ✱ *Bombyces* alis incumbentibus, antennis pectinatis.

1349. Ph. B. *quercifolia* elinguis, alis semitectis, dentatis, ferrugineis, margine postico nigris. S. inf. t. 71. f. 4, 5.

1350. Ph. B. *Rubi* elinguis, alis cervinis immaculatis: strigis duabus albidis subtus nullis. S. inf. t. 178. f. 3, 4.

1351. Ph. B. *Pruni* elinguis, alis lacteis: strigis duabus fulvis punctoque albo. S. inf. t. 60. f. 6, 7.

1352. Ph. B. *potatoria* elinguis, alis flavis: striga fulva repandaque punctis duobus albis. S. inf. t. 67. f. 10, 11.

1353. Ph. B. *Quercus* elinguis, alis ferrugineis: fascia flava punctoque albo. S. inf. t. 87. f. 1, 2, 3.

1354. Ph. B. *lanestris* elinguis, alis ferrugineis: striga alba, superioribus puncto basique albis. S. inf. t. 38. f. 10, 11.

1355. Ph. B. *Vinula* elinguis albida, nigro-punctata, alis sub-reversis fusco venosis striatisque. D. *Hermelins-Phalæne*. N. *Löv-Aarne*: larva. Monogr. t. 1 & 2. *Pile-Larven med dobbelt Hale*. S. inf. t. 144. f. 1, 2.

1356. Ph. B. *Fagi* elinguis, alis rufo-cinereis: fasciis duabus linearibus luteis flexuosis.

1357. Ph. B. *bucephala* subelinguis alis subreversis cinereis : strigis duabus ferrugineis maculaque terminali magna flava. S. inf. t. 31. f. 10, 11.
1358. Ph. B. *Neustria* elinguis, alis fascia lesquialtera, sub-
tus unica.
1359. Ph. B. *Caja* elinguis, alis deflexis fuscis : rivulis albis ; inferioribus purpureis, nigro-punctatis. *Pile-*
Larven p. 13. S. inf. t. 29. f. 7. 8.
1360. Ph. B. *villica* elinguis, alis deflexis atris : maculis octo
albidis ; inferioribus flavis nigro-maculatis.
1361. Ph. B. *Plantaginis* elinguis, alis deflexis atris : rivulis
flavis ; inferioribus flavis maculis nigris. S. inf.
t. 92. f. 5, 6.
1362. Ph. B. *Monacha* elinguis alis deflexis ; superioribus al-
bis atro-undatis, abdominis incisuris sanguineis.
1363. Ph. B. *Chrysothæa* elinguis alis deflexis albidis ; abdo-
minis apice barbato, luteo.
1364. Ph. B. *Salicis* elinguis alis deflexis albis ; pedibus nigris
albo-annulatis. S. inf. t. 131. f. 1, 2.
1365. Ph. B. *anastomosis* elinguis, thorace ferruginato, alis
deflexis griseo-cinerascentibus : strigis tribus pal-
lidis subanastomosantibus.
1366. Ph. B. *curtula* elinguis, thorace ferrugineo, alis deflexis
glaucis : striga alba apicibus macula testacea.
1367. Ph. B. *pudibunda* elinguis cristata, alis cinerascentibus :
fasciis tribus fuscis linearibus undulatis.
1368. Ph. B. *fascelina* elinguis cristata cinerea, alis superiori-
bus antice fasciis duabus angustis fulvo-fuscis,
scutello bipunctato fulvo.
1369. Ph. B. *antiqua* elinguis, alis planiusculis : superioribus
ferrugineis lunula alba anguli postici, Femina
aptera est. Aët. nidr. 4, 37; t. 16. f. 14.

1370. Ph. B. *cæruleocephala* elinguis cristata, alis deflexis griseis: stigmatibus albidis coadunatis.
1371. Ph. B. *Ziczac* subelinguis, alis deflexis dorso dentatis apicibusque macula grisea subocellari; antennis lamellatis.
1372. Ph. B. *Coffus* elinguis, alis deflexis nebulosis, thorace postice fascia atra, antennis lamellatis. S. inf. t. 61. f. 1, 2.
1373. Ph. B. *L. nigrum* elinguis cristata; alis candido-pellucidis: primoribus littera l nigra. Fn. Fridr. 360. * †
1374. Ph. B. *gibbosa* cristata, alis griseis nigro punctatis, striga maculisque flavis: tergo tuberculis duobus. Fn. Fridr. 355. *
1375. Ph. B. *lubricipeda* spirilinguis, alis deflexis albidis: punctis nigris, abdomineque quinquesariam nigro-punctato. S. inf. t. 24. f. 8, 9; t. 114. f. 2, 3.
- Variat punctis sparsis; linea punctorum interrupta transversa, ac punctis binis: altero remotiore ægre conspicuo.
1376. Ph. B. *graminis* spirilinguis alis depressis griseis: linea trifurca punctoque albidis.
1377. Ph. B. *libatrix* spirilinguis cristata, alis incumbentibus dentato-erosis rufo-griseis: strigis obliquis tribus, postica pallida, punctisque duobus albis. Fn. Fridr. 377, 378. S. inf. t. 124. f. 1, 2.
1378. Ph. B. *camelina* spirilinguis cristata, alis deflexis denticulatis brunneis; omnibus denticulo dorsali.
1379. Ph. B. *Sannio* spirilinguis alis deflexis luteis: margine sanguineo, lunulaque fusca; inferioribus subtus immaculatis.

* 3 * *Noctuae*; alis incumbentibus, antennis fetaceis.

1380. Ph. N. *Humuli* elinguis fulva, antennis thorace brevioribus; maris alis niveis.
1381. Ph. N. *Hecta* subelinguis lutea, alis deflexis: superioribus fasciis duabus albidis obliquis punctato-interruptis.
1382. Ph. N. *fuliginosa* spirilinguis lævis, alis deflexis rufo-fuliginosis puncto gemino nigro: inferioribus rubro marginatis. S. inf. t. 57. f. 7, 8.
1383. Ph. N. *nivea* spirilinguis lævis, alis corporeque albis; antennis linguaque testaceis.
1384. Ph. N. *Jacobae* spirilinguis lævis, alis fuscis: linea punctisque duobus; inferioribus rubris nigro marginatis.
1385. Ph. N. *Glyphica* spirilinguis lævis, alis patulis fuscescentibus: maculis hieroglyphicis nigris; subtus fascia atra.
1386. Ph. N. *marginata* spirilinguis lævis, alis depressis dilute cinereis: superiorum margine exteriore flavo. Larva pilosa maculis viridibus & nigris. * †
1387. Ph. N. *pallens* spirilinguis lævis, alis deflexis, pallidis immaculatis: marginibus posticis subtus nigro punctatis.
1388. Ph. N. *rubricollis* spirilinguis lævis nigra, collari purpureo; abdomine flavo. S. inf. t. 59. f. 8, 9.
1389. Ph. N. *quadra* spirilinguis lævis, alis depressis luteis: superioribus punctis duobus atro-carulescentibus. S. inf. 29. t. 9, 10.
1390. Ph. N. *l album* elinguis? cristata, alis pallide luteis: superioribus nebulosis: disco linea nivea uncinata.

1391. Ph. N. *pustulata* elinguis : cristata, alis fulvis : maculis novem luteis. Fr. Frid. 408. * +
1392. Ph. N. *paſta* spirilinguis cristata alis griseſcentibus ; inferioribus rubris fasciis duabus nigris ; abdomine supra rubro. S. inf. t. 151. f. 1, 2.
1393. Ph. N. *pronuba* spirilinguis cristata, alis incumben-
tibus griseis : inferioribus luteis : fascia atra sub-
marginali. Act. nidr. 4, 38. S. inf. t. 196.
f. 1, 2.
1394. Ph. N. *Chryſitis* spirilinguis cristata, alis deflexis : su-
perioribus orichalceis fascia grisea. S. inf. t. 101.
f. 2, 3.
1395. Ph. N. *Gamma* spirilinguis cristata, alis deflexis : supe-
rioribus fuscis λ aureo inscriptis. S. inf. t. 84.
f. 5, 6.
1396. Ph. N. *interrogationis* spirilinguis cristata, alis deflexis :
superioribus fuscis cinereisque signo ? albo in-
scriptis.
1397. Ph. N. *Festuca* spirilinguis cristata, alis deflexis : supe-
rioribus flavo ferrugineoque variis : maculis tri-
bus argenteis.
1398. Ph. N. *mericulosa* spirilinguis cristata, alis erosis palli-
dis : superioribus basi incarnata intra triangu-
lum fuscum.
1399. Ph. N. *Absinthii* spirilinguis cristata, alis cinerascen-
tibus nigricante fasciatis punctatisque : inferiori-
bus albidis.
1400. Ph. N. *Pſi* spirilinguis cristata, alis deflexis canis : supe-
rioribus caracteribus ψ nigris.
1401. Ph. N. *Chi* spirilinguis cristata, alis deflexis canis : su-
perioribus $\propto$ nigro notatis.

1402. Ph. N. *Aceris* spirilinguis cristata, alis deflexis canis : superioribus lineolis undatis annuloque ovali nigris. S. inf. t. 66. f. 8, 9.
1403. Ph. N. *exclamationis* spirilinguis cristata, alis incumbentibus fuscis : lineola atra, maculaque cordata ; inferioribus albis. P. D. Atl. t. 30.
1404. Ph. N. *aprilina* spirilinguis cristata, alis deflexis : superioribus virentibus maculis variis atris, postice punctis trigonis. S. inf. t. 92. f. 3.
1405. Ph. N. *ludifica* spirilinguis cristata, alis deflexis : superioribus abdomineque flavo trifariam nigro punctato.
1406. Ph. N. *turca* spirilinguis cristata, alis cinereo-rufis : strigis duabus fuscis lunulaque alba. Act. nidr. 39. t. 16. f. 15 ?
1407. Ph. N. *variegata* spirilinguis cristata, alis deflexis canis, lineolis undulatis transversalibus confluentibus. Act. nidr. 3, 40. t. 16. f. 16. *
1408. Ph. N. *umbratica* spirilinguis cristata, alis lanceolatis canis, striatis, thoracis valvulis lunatis.
1409. Ph. N. *exfoleta* spirilinguis cristata, alis lanceolatis convolutis exfoletis dorso fuscescentibus, collari compresso.
1410. Ph. N. *Verbasci* spirilinguis cristata, alis deflexis obfoletis : marginibus lateralibus fuscis. S. inf. t. 24. f. 6, 7.
1411. Ph. N. *Comma* spirilinguis cristata, alis cinereis deflexis : lineola nigra adjacente tenuiori albæ.
1412. Ph. N. *gothica* spirilinguis cristata, alis deflexis : superioribus fuscescentibus : arcu nigro linea alba marginato.

1413. Ph. N. *C nigrum* spirilinguis cristata, alis depressis cinereis macula nigra extus obsoleta lineolaque apicis atra.
1414. Ph. N. *Brassicæ* spirilinguis cristata, alis depressis cinereo - nebulosis : unco nigro supra maculam priorem.
1415. Ph. N. *Rumicis* spirilinguis cristata, alis deflexis cinereis bimaculatis : litura marginis tenuioris alba.
1416. Ph. N. *oleracea* spirilinguis cristata, alis deflexis : superioribus ferrugineis lunula lutescente striga alba postice bidentata.
1417. Ph. N. *Pisi* spirilinguis cristata, alis deflexis ferrugineo-cinereis bimaculatis : striga postica pallida.
1418. Ph. N. *oculea* spirilinguis cristata, alis ferrugineo-griseis macula reniformi nivea : pupilla lunari lutea.
1419. Ph. N. *Atriplicis* spirilinguis cristata, alis deflexis : superioribus fusco-nebulosis : litura flava bifida.
1420. Ph. N. *triplicia* spirilinguis alis deflexis : superioribus arcu duplici contrario maculisque tribus glaucis intermediis.
1421. Ph. N. *Tragopogonis* spirilinguis cristata, alis superioribus fuscis : punctis nigris tribus approximatis ; inferioribus luteis.
1422. Ph. N. *typica* spirilinguis cristata, alis deflexis fuscescentibus : stigmatibus marginatis, strigis pallidis reticulatis.
1423. Ph. N. *flava* spirilinguis cristata, alis omnibus immaculatis, flavis. Fn. Fridr. 407. * S. inf. t. 101. f. 12.
1424. Ph. N. *pratensis* spirilinguis cristata, alis fuscescentibus, fasciis duabus fuscis : omnibus subtus flavis : macula media nigra. Fn. Fridr. 409. S. inf. t. 163. f. 4, 5 ? * †

124 INSECTA. LEPIDOPT: PHALÆNA.

1425. Ph. N. *secalis* spirilinguis cristata cinerea; thorace bipunctato; alis strigis maculisque tribus: subtus punctatis. Fn. Fridr. 410. * +
1426. Ph. N. *desolata* spirilinguis cristata, alis fascia media undulata alba, prioribus fasciis macula baseos flava; posticis griseis. Fn. Fridr. 411. *
1427. Ph. N. *Jutica* cristata, alis griseis, superioribus strigis serpentibus quatuor fuscis: omnibus margine postico maculatis. Fn. Fridr. 412. *
1428. Ph. N. *heteroclita* subcristata, capite erucæ, antennis nullis; alis albis lineis transversim undatis punctatisque, marginalibus nigris. Fn. Fridr. 413. * +
1429. Ph. N. *nocturna* spirilinguis cristata, alis denticulatis albidis, fascia lata (medio macula reniformi lutescente) maculisque duabus apicis nigris. * +
1430. Ph. N. *lunulata* spirilinguis cristata, alis murinis, superioribus strigis transversis dentatis, circulo lunulaque nigris. ROES. inf. 1. ph. 2. t. 44. S. inf. t. 28. f. 7, 8? *

* 4 * *Geometra*: alis horizontaliter patentibus.

1431. Ph. G. *lactearia* bipectinicornis, alis angulatis albis, immaculatis; antennis apice setaceis. Act. nidr. 4, 41.
1432. Ph. G. *vernaria* pectinicornis alis subangulatis virescens: strigis duabus albis repandis; antennis apice setaceis. Act. nidr. 4, 42. S. inf. t. 122. f. 5.
1433. Ph. G. *amataria* pectinicornis alis angulatis, omnibus pallidis pulverulentis: striga ferruginea recta fuscaque repanda.
1434. Ph. G. *falcataria* pectinicornis alis falcatis glaucis: antennis undis fasciaque griseis puncto fusco.

1435. Ph. G. *sambucaria* subleticornis, alis caudato-angulatis flavescentibus lineis duabus; posticis apicibus bipunctatis.
1436. Ph. G. *putataria* pectinicornis, alis angulatis, omnibus albis: strigis duabus candidis repandis.
1437. Ph. G. *punctaria* pectinicornis alis angulatis cinereo-grisefcentibus: striga ferruginea ordineque transverso punctorum atrorum.
1438. Ph. G. *lacertinaria* pectinicornis alis erosis lutescentibus postice saturatioribus; lineis duabus punctoque fuscis.
1439. Ph. G. *Alniaria* pectinicornis alis erosis flavis, fusco pulveratis: strigis duabus fuscis.
1440. Ph. G. *Prunaria* pectinicornis, alis subdentatis luteis fusco-pulverulentis: anticis lunula fusca.
1441. Ph. G. *pennaria* pectinicornis, alis rufescentibus: strigis duabus fuscis punctoque subterminali nigro centro albo.
1442. Ph. G. *elinguaria* pectinicornis alis flavis: anticis fascia lata lutea: medio puncto nigro.
1443. Ph. G. *atomaria* pectinicornis alis omnibus lutescentibus: fasciis atomisque fuscis.
1444. Ph. G. *fasciaria* pectinicornis, alis omnibus rufescentibus: fascia lata, ferruginea margine albo.
1445. Ph. G. *Betularia* pectinicornis, alis omnibus albis, subfasciatis atomisque nigris; thorace fascia atra.
1446. Ph. G. *pulveraria* pectinicornis, alis omnibus testaceo-pulverulentis: fascia lata ferruginea, subtus purpurascens-ferrugineis. Act. nidr. 4, 43.
1447. Ph. G. *Wavaria* pectinicornis, alis cinereis: anticis fasciis quatuor nigris abbreviatis inæqualibus. Fn. Fridr. 434. viduaria. S. inf. t. 58. f. 1.

1448. Ph. G. *purpuraria* pectinicornis alis luteis margine anticarumque fasciis duabus purpureis. S. inf. t. 173. f. 5, 6.
1449. Ph. G. *pusaria* pectinicornis, alis omnibus niveis : supra frigis tribus obsoletis. P. D. Atl. t. 30.
1450. Ph. G. *papilionaria* pectinicornis alis omnibus viridibus subrepandis : friga sesquialtera, pallida.
1451. Ph. G. *defoliaria* pectinicornis, alis subgriseis medio albis puncto lituraque postica nigris; femina aptera. Fn. Svec. 1238.
1452. Ph. G. *margaritaria* subpectiniformis, alis margaritaceis : fascia rivulari lutescente : extremitatibus fuscis. Fn. Sv. 1249.
1453. Ph. G. *quadrifasciaria* pectinicornis, alis griseis, fascia fusca undata puncto atro. Fn. Svec. 1253.
Hæ tres in Systemate LINN. omissæ sunt.
1454. Ph. G. *strigaria* pectinicornis, alis omnibus albis : strigis utrinque tribus obsoletis. Sc. Carn. 542. *
1455. Ph. G. *Matronaria* pectinicornis alis undatim fasciatis : anticis cinereis fuscisque, litura angulo apicis inferiori; posticis cinereis. Fn. Fridr. 433. *
S. inf. t. 12. f. 1, 2?
1456. Ph. G. *faginaria* subpectinicornis alis dentato-erosis, fulvis : anticis strigis duabus transversis fuscis; posticis unica. * +
1457. Ph. G. *Cbarophyllata* feticornis atra, alis erectis : anticis apice albis.
1458. Ph. G. *Grossulariata* feticornis, alis albidis maculis rotundatis, nigris : anticis strigis luteis. D. *Snare-Orm*: larva. S. inf. t. 67. f. 1, 2.
1459. Ph. G. *Crategata* feticornis alis flavissimis : anterioribus maculis costalibus tribus ferrugineis : media

dia subargentea. Act. nidr. 3, 34. S. inf. t. 163. f. 2, 3.

1460. Ph. G. *Chenopodiata* feticornis, alis anticis testaceis; fasciis tribus griseis puncto prominulo apicis lineola supra fusca.

1461. Ph. G. *comitata* feticornis alis anticis flavescenscentibus; fasciis tribus griseis puncto apicisque lineola utrinque fusca. S. inf. t. 51. f. 8, 9.

1462. Ph. G. *Cherophyllata* feticornis atra, alis erectis: anticis apice albis.

1463. Ph. G. *undulata* feticornis, alis omnibus supra strigis confertissimis transversis undulatis fuscis.

1464. Ph. G. *prunata* feticornis alis griseis: anticis fasciis duabus pallidis repandis; postica semiterminali.

1465. Ph. G. *triflata* feticornis, alis omnibus nigris albo subundatis: fasciis duabus albis undatis nigro punctatis.

1466. Ph. G. *Alchemillata* feticornis, alis canescentibus: anticis undatis: fascia nivea cinereo undata, lineolaque intra apicem. Act. nidr. 4, 45.

1467. Ph. G. *bilineata* feticornis alis omnibus luteis testaceo-undatis: fascia repanda margine fusco alboque. Act. nidr. 4, 44. S. inf. t. 12. f. 4?

1468. Ph. G. *aversata* feticornis alis pallidis: striga baseos fasciæque media punctoque fuscis.

1469. Ph. G? feticornis, spirilinguis, corniculis duobus recurvis basi cristatis; alis plano incumbenscentibus. N. Forvalde. Sr. S. 190, 9.

1470. Ph. G. *bastata* feticornis alis omnibus nigris albo maculatis, fasciis duabus albis immaculatis, bastato-dentatis.

1471. Ph. G. *marginata* feticornis, alis omnibus albis : margine exteriore limbo fusco interrupto.
1472. Ph. G. *ocellata* feticornis, alis albidis : anticis fasciis duabus fuscescentibus maculaque apicis ocellari didyma.
1473. Ph. G. *fluctuata* feticornis, alis cinerascenscentibus : anticis fasciis abbreviatis tribus fuscis. Act. nidr. 3, 35. S. inf. t. 123. f. 6.
1474. Ph. G. *incanata* feticornis alis omnibus canis postice striga alba repanda disco margineque nigro punctatis.
1475. Ph. G. *remutata* feticornis alis flavescentibus : strigis tribus fuscis, puncto margineque postico nigropunctato.
1476. Ph. G. *strigilata* feticornis alis cinereis, postice striga transversa recta pallida.
1477. Ph. G. *didymata* feticornis alis albidis obsolete cinereo bifasciatis : posteriori macula fusca biloba.
1478. Ph. G. *rectangulata* feticornis alis viridibus fusco-subfasciatis.
1479. Ph. G. *urticata* feticornis alis albis, fusco fasciato-maculatis, thorace anoque flavis. S. inf. t. 119. f. 1, 2.
1480. Ph. G. *Nymphæata* feticornis alis cinereis, omnibus conformiter albo maculatis, reticulatis.
1481. P. G. *Potamogata* feticornis alis cinereis albo maculatis : anterioribus obsoletius reticulatis. S. inf. t. 189. f. 4, 5.
1482. Ph. G. *Lemnata* feticornis alis albis : posticis fascia terminali nigra punctis : quatuor albis.
1483. Ph. G. *brumata* feticornis, alis griseo-fuscis, striga nigra, postice pallidioribus ; femina aptera.

1484. Ph. G. *alternata* feticornis, alis dentatis, fasciis albis nigricantibusque alternis: striga marginali duplici undulata. Fn. Frid. 452. * + S. inf. t. 126. f. 2.
1485. Ph. G. *teffulata* feticornis, alis omnibus margine tessulato, disco cinereo: subtus lutescentibus: strigis undulatis albidis. Fn. Fridr. 453. * +
1486. Ph. G. *strigata* feticornis alis viridibus strigis duabus albis margine tessulato. Fn. Fridr. 454. *
1487. Ph. G. *ustulata* feticornis alis glaucis: strigis tribus undatis, interruptis, albis, margine nigro tessulato. * +
1488. Ph. G. *pascuata* feticornis alis albis: supra strigis quinque sublutescentibus, subtus tribus nigricantibus punctoque disci nigro. * +
1489. Ph. G. *ochrata* feticornis alis albo-flavescentibus: anticis strigis undulatis 2—3, posticis puncto disci fusco. Scop. inf. 567. GEOFR. inf. 2. Ph. 87. *
1490. Ph. G. *flexuata* feticornis alis murinis: anticis lineis transversis tribus: media flexuosa; omnibus subtus strigis duabus punctoque disci obscuris. * +
1491. Ph. G. *duplicata* feticornis alis flavescentibus macula media ocellari didyma nigra; margine postico fusco. * + Strigæ duæ obscuræ, undulatæ in quibusdam.
1492. Ph. G. O *Miata* feticornis alis albidis strigis quatuor cinereis: secunda in figuras literarum O M curvata. * +
1493. Ph. G. *albata* feticornis, alis anticis luteo-fuscis basi apiceque ferrugineis; posticis cinereis striga duplici alba. * +
Græsfdrilde nom. Ph. geom. Island.

- * 5 * *Tortrices*: alis ad angulum acutum deflexis.
1494. Ph. Tor. *fasciana* alis fusco-cinerascentibus: fascia alba.
1495. Ph. Tor. *uncana* alis fuscis margine exteriori albedo, medio ramum recurvum album introrsum exferente.
1496. Ph. Tor. *Prasinana* alis superioribus viridibus: strigis duabus obliquis flavis, margine postico antennis pedibusque fulvis.
1497. Ph. Tor. *viridana* alis rhombeis: superioribus viridibus immaculatis.
1498. Ph. Tor. *clorana* alis rhombeis: superioribus viridibus margine albedo.
1499. Ph. Tor. *Oporana* alis superioribus ferrugineis griseo maculatis reticulatisque.
1500. Ph. Tor. *hamana* alis superioribus flavis puncto lituraeque postica hamata ferrugineis.
1501. Ph. Tor. *Xylosteana* alis superioribus testaceis: cruce communi ferruginea.
1502. Ph. Tor. *picearia* alis superioribus griseo nigroque variis: dorso ferrugineis.
1503. Ph. Tor. *Rosana* alis superioribus testaceo-reticulatis: fascia grisea obliqua.
1504. Ph. Tor. *fuscana* alis superioribus testaceo-fuscis immaculatis.

Nomen *fuscanae* ideam hujus Tortricis apprime exprimentis restituendum; tale enim iis, quæ ex appellativis illustrium quoque Naturæ consultorum desumuntur, næ obscurorum hominum præferendum. Character cujusvis animalis antiquior quovis hominis.

1505. Ph. Tor. *Avellana* alis superioribus testaceis: fasciis ferrugineis sesquitertiis.

1506. Ph. Tor. *arcuana* alis luteis : fasciis tribus arcuatis, macula nigra tripunctata, lineolisque duabus argenteis.
1507. Ph. Tor. *Lecbeana* alis superioribus luteis : characteribus I L, thoraceque argenteis. P. D. Atl. t. 30?
1508. Ph. Tor. *Forskälæana* alis superioribus flavis luteo-reticulatis : medio lituræ fuscescente.
1509. Ph. Tor. *Bergmanniana* alis superioribus luteis flavo punctatis : fasciis quatuor argenteis : tertia bifida.
1510. Ph. Tor. *Holmiana* alis superioribus luteo-ferrugineis : macula marginali trigona, argentea.
1511. Ph. Tor. *Rolandriana* alis superioribus pallide testaceis : strigis ferrugineis inferne antrorsum versis.
1512. Ph. Tor. *Wahlbomiana* alis superioribus cinereis : fasciis duabus fusco-nebulosis litura postica obsoleta, palpis obtusis.
1513. Ph. Tor. *Solandriana* alis superioribus pallidis : macula communi dorsali ferruginea.
1514. Ph. Tor. *Alstroemiana* alis albidis : superioribus macula medio laterali fusco-ferruginea.
1515. Ph. Tor. *Logiana* alis superioribus canis : atomis nigris sparsis : inferioribus exalbidis.
1516. Ph. Tor. *Modeeriana* alis superioribus flavescentibus : macula marginali posterius fusca.
1517. Ph. Tor. *Héracleana* elinguis recurvicornis, alis griseis puncto fusco, thorace flavo.
1518. Ph. Tor. *Miana* alis omnibus argenteis : superioribus limbo fusco : lineaque undulata argentea. Fn. Fridr. 472. * †
1519. Ph. Tor. *Koenigiana* alis omnibus griseis politis : inferioribus striga undulata. Fn. Fridr. 473. * †

1520. Ph. Tor. *albana* alis omnibus albis : inferioribus apicē fascia fusca. Fn. Fridr. 474. * +
1521. Ph. Tor. *Wulfeniana* alis nigricantibus : anticis punctis argenteis ; posticis litura utrinque nivea. Scor. inf. Carn. 590. *
1522. Ph. Tor. *Lambergiana* alis nigricantibus maculis obscuris plumbeis. Sc. Carn. 589. *
1523. Ph. Tor. *Viduana* alis albo-cinereis : fasciis obliquis maculaque marginali nigro punctata griseis. An *Rubiana* Sc. Carn. 585. *
1524. Ph. Tor. *Funerana* alis atris maculis albis : superioribus tribus , inferioribus duabus. Act. nidr. 4, 46. t. 16. f. 17.
1525. Ph. Tor. *miniana* alis superioribus miniatis : nodulo disci candido, triangulo marginali rufo. * +
1526. Ph. Tor. *circulana* alis fulvescentibus : macula dorsali communi ferruginea, striga alba cincta. * +
1527. Ph. Tor. *penniferana* alis sexpennibus cinereis : fasciis duabus punctisque marginalibus nigris. FRISCH. inf. 3. t. 10. *
1528. Ph. Tor. *aureana* alis omnibus utrinque fuscis, margineque postico latiusculo, aureo. * +
1529. Ph. Tor. *graminana* alis omnibus utrinque cinereo-fuscis : basi maculis, disco lineis, altera bifida, altera curvata, transversis, albis. * +

* 6 * *Pyrallides* : alis ad angulum obtusum deflexis.

1530. Ph. P. *farinalis* palpis recurvatis , alis politis fuscescentibus : strigis repandis albidis area interjecta glauca.
1531. Ph. P. *glaucinalis* palpis recurvatis, alis glabris glaucis : strigis duabus flavis arcuatis, remotissimis.

1532. Ph. P. *barbalis* palpis brevioribus, antennis pectinatis, femoribus anticis barba porrecta. P. D. Atl. t. 30.
1533. Ph. P. *tentacularis* palpis porrectis longitudine antennarum pectinatarum, alis omnibus cinerascens: strigis tribus obsoletis.
1534. Ph. P. *proboscidalis* palpis porrectis approximatis thorace longioribus, antennis pectinatis, alis griseis, strigis ferrugineis.
1535. Ph. P. *forficæ* alis glabris pallidis, strigis ferrugineis retrorsum obliquatis lituraque anterioris.
1536. Ph. P. *verticalis* alis glabris pallidis subfasciatis, subtus fusco undatis.
1537. Ph. P. *pinguinalis* palpis recurvatis elinguis, alis cinereis: margine crassiore nigro subfasciato.
1538. Ph. P. *purpuræ* alis fusco purpurascens, omnibus luteo maculatis.
1539. Ph. P. *duplaris* alis superioribus cinereo-nebulosis: medio punctis duobus atris parallelis.
1540. Ph. P. *verrucæ* palpis porrectis; alis albis lineis duabus nigris arcuatis; verrucis tribus. Fn. Fridr. 484. * +

* 7 * *Tineæ*: alis convolutis.

1541. Ph. Tin. *colonella* alis oblongis cinereis: punctis duobus atris ante strigam curvam, undulatam obsoletam.
1542. Ph. Tin. *Evonymella* alis superioribus albis: punctis 50 nigris; inferioribus fuscis.
1543. Ph. Tin. *Padella* alis superioribus lividis: punctis 20 nigris; inferioribus fuscis. S. inf. t. 145. f. 2, 3.
1544. Ph. Tin. *Pinetella* alis superioribus flavis: maculis duabus argenteis; anteriore oblonga, posteriore ovata.

134 INSECTA. LEPIDOPT: PHALÆNA.

1545. Ph. Tin. *pascuella* alis superioribus pallidis; linea maculisque duabus oblongis albissimis.
1546. Ph. Tin. *pratella* alis superioribus albidis: linea albissima postice ramosa; apice striis obliquis.
1547. Ph. Tin. *nemorella* alis albidis incurvatis: superioribus puncto nigro.
1548. Ph. Tin. *Cynosbatella* alis griseis antice albidis, thorace cristato.
1549. Ph. Tin. *culmella* alis superioribus albidis excavato-striatis punctis nigris 7 ciliisque nitentibus.
1550. Ph. Tin. *fanella* alis fuscis: maculis albissimis: anteriora falcata, posteriore reniformi.
1551. Ph. Tin. *vestianella* alis cinereis costa albis, apicibus ascendentibus plumosis; palpis recurvatis.
1552. Ph. Tin. *taperzella* alis nigris postice albidis, capite niveo.
1553. Ph. Tin. *pellionella* alis canis medio puncto nigro; capite subgriseo. Act. nigr. 4, 48.
1554. Ph. Tin. *vitella* alis cinereis: vitta dorsali communi nigra, margine postico atro-punctato.
1555. Ph. Tin. *Lappella* alis pallidis puncto nigro, apice ascendentibus.
1556. Ph. Tin. *granella* alis albo nigroque maculatis; capite albo.
1557. Ph. Tin. *arbutella* alis sanguineis: fasciis argenteis tenuissimis.
1558. Ph. Tin. *cinctella* alis nigris: superioribus fascia lineari argentea transversa. Act. nigr. 4, 53.
1559. Ph. Tin. *lutarella* alis corporeque luteis immaculatis.
1560. Ph. Tin. *tessella* alis nigris: fasciis duabus albis remotissimis tessellatis. Act. nigr. 4, 45.

1561. Ph. Tin. *bicoftella* alis lanceolatis cinereo-albidis costa longitudinali fusca margine niveo.
1562. Ph. Tin. *Xyloftella* alis cinereo-fuscis: vitta dorsali communi albo-flavescente abbreviata. Aët. nidr. 4, 50.
1563. Ph. Tin. *cinerella* alis fusco-cinereis immaculatis nitidulis; palpis corniformibus.
1564. Ph. Tin. *elongella* alis linearibus testaceis; antennis mediocribus.
1565. Ph. Tin. *punctella* alis superioribus linearibus testaceis punctis 4 fuscis.
1566. Ph. Tin. *leucotella* alis nigricantibus: fasciis 2, posteriore obsoletiore capiteque albis, palpis reflexis.
1567. Ph. Tin. *trigonella* alis fuscis: macula communi dorsali duplici alba trigona. Aët. nidr. 4, 51.
1568. Ph. Tin. *tertianella* alis cinereis: fasciis obscurioribus sesquitertiis.
1569. Ph. Tin. *fuscella* alis fusco-cinereis: superioribus punctis duobus anoque subtus macula nigris.
1570. Ph. Tin. *gemmella* alis nigro, albo, argenteoque nebulosis, capite albo.
1571. Ph. Tin. *bractella* alis nigris macula marginali, anticeque luteo-aureis.
1572. Ph. Tin. *porrectella* alis albicantibus; antennis porrectis, approximatis longitudine corporis; palpis recurvis.
1573. Ph. Tin. *argentella* tota argentea, antennis fusco annulatis.
1574. Ph. Tin. *pruniella* alis fulvis, capite dorso thoracis, lineaque marginis interioris superiorum longitudinali nivea, medio interrupta.

1575. Ph. Tin. *flapella* alis nigris, maculis tribus sulphureis.
P. D. Atl. t. 30.
1576. Ph. Tin. *Pomonella* alis nebulosis postice macula rubra aurea.
1577. Ph. Tin. *strobilella* alis fuscis argenteo-undatis; inferioribus fuscis, margine albo.
1578. Ph. Tin. *Turionella* alis griseo-albis, nitidulis, thorace luteo.
1579. Ph. Tin. *Cembrella* alis fuscis, atomis albis irroratis.
1580. Ph. Tin. *Resnella* alis fuscis; fasciis cinereo-argenteis.
1581. Ph. Tin. *capitella* alis nigris: maculis tribus flavescentibus, capite luteo.
1582. Ph. Tin. *pedella* alis superioribus linearibus luteis: fasciis 3 fuscis; pedibus posticis transverse extensis.
1583. Ph. Tin. *Calthella* atra alis superioribus totis aureis, capite ferrugineo.
1584. Ph. Tin. *Petiverella* alis subgriseis litura dorsali flava, apiceque punctis tribus nigris.
1585. Ph. Tin. *Swammerdamella* antennis longissimis; alis flavescentibus, pallidis, immaculatis. Aët. nigr. 3, 36.
1586. Ph. Tin. *Reaumurella* antennis longissimis, alis nigris extrorsum deauratis.
1587. Ph. Tin. *Degcerella* antennis longissimis, alis atris: fascia argentea.
- Variat antennis longitudine alarum nigris subpilosis apicem versus albis, glabris.
1588. Ph. Tin. *Moufferella* antennis brevibus albo annulatis; alis lividis: atomis oblongis fuscis.

1589. Ph. Tin. *Frischella* antennis mediocribus apice albis, alis fusco-auratis.
1590. Ph. Tin. *Goedartella* alis auratis : fasciis 2 argenteis ; priore antrorsum, posteriore retrosum arcuata.
1591. Ph. Tin. *Rbediella*, alis nigris apice fulvis : strigis interruptis argenteis.
1592. Ph. Tin. *Roesfella* alis nigro-auratis : punctis 9 argenteis convexis submarginalibus.
1593. Ph. Tin. *Harrisfella* alis aureo-argenteis apice obtuso ustulato, subocellato.
1594. Ph. Tin. *Fungiella* alis fuscis : maculis septem albis duplicatis : tertia fasciali ultimaque simplici.
1595. Ph. Tin. *angulella* alis cinereis lanceolatis : superioribus angulis duobus argenteis, lineolaque apicis nigra. * +
1596. Ph. Tin. *Hauberella* alis anticis ciliisque albis ; posticis utrinque, anticisque subtus, nigro-cinereis. * +
In memoriam reverendiss. æd. St. Petri antist. D. E. HAUBER, qui vitam in contemplatione operum divin., quam mihi & omnibus sedulo commendavit, consumpsit.
1597. Ph. Tin. *albella* alis totis albis ciliatis : oculis nigris. GEOFR. inf. Tin. 8. *
1598. Ph. Tin. *Goezella* alis fulvescentibus : superioribus striga longitudinali communi flava : linea marginis inferioris alba. * +
1599. Ph. Tin. *Lupulella* alis fulvescentibus : fascia marginis superioris incurvata, maculaque inferioris flavis. * +
1600. Ph. Tin. *Filicella* alis superioribus apice in acumen erectis, fuscis : linea dorsali communi medio divergente, antennis pedibusque albis. * +
1601. Ph. Tin. *Wiedemanella* alis fulvis, fasciis maculisque albis ; lineis punctisque cæruleo-argenteis. Fn. Fridr. 519. * +

1602. Ph. Tin. *obliquella* alis plumbeis : fasciis duabus obliquis albidis, margine infimo albo nigroque tessulato. Fn. Fridr. 520. * †
1603. Ph. Tin. *Mastingella* alis flavis linea maculisque niveis. Fn. Fridr. 421. *
1604. Ph. Tin. *Ludvigella* alis griseis : basi priorum macula magna margine extimo triangulari parva fusca. Fn. Fridr. 522. *
1605. Ph. Tin. *Hebenstreitella* alis subfuscis priorum maculis tribus obscuris umbraticis. Fn. Fridr. 523. *
1606. Ph. Tin. *auratella* alis auratis, antennis annulo argenteo. Aët. nidr. 4, 54. * †
- 1606,b. Ph. Tin. *irrorella* alis luteis : superioribus punctis nigris trifariis. I. *Meelfuga*.
1607. Ph. Tin. *ciliatella* alis linearibus : anticis atomis nigris, maculisque sparsis luteis : postici sterciliatis. * †
* 9 * *Alucita* : alis digitatis.
1608. Ph. Al. *monodactyla* alis patentibus linearibus indivisis.
1609. Ph. Al. *didactyla* alis patentibus fissis fuscis, strigis albis : anticis bifidis, posticis tripartitis. S.inst.93.f.7.
1610. Ph. Al. *tridactyla*? alis patentibus fissis, griseis : macula fusca, lineaque apicis transversa alba ; posticis tripartitis.
1611. Ph. Al. *tesserodactyla* alis patentibus fissis, cinereo nebulosis, posticis fuscis. P. D. Atl. t. 30?
1612. Ph. Al. *tetradactyla* alis patentibus fissis flavescensibus.
1613. Ph. Al. *pterodactyla* alis patentibus fissis, testaceis : puncto fusco. P. D. Atl. t. 30.
1614. Ph. Al. *pentadactyla* alis patentibus fissis quinque partitis niveis : digito quinto distincto.
1615. Ph. Al. *heterodactyla* alis patentibus fissis, nigris, maculis albis : anticis bifidis, posticis tripartitis. Fn. Fridr. 530. *

4. NEUROPTERA.

* Alis horizontalibus.

1616. *LIBELLULA IV-maculata* alis posticis basi omnibusque medio antico macula nigricante. $\frac{1}{2}$ N. Aet. N. C. T. 3, 123, 1.

Variat a. macula marginali umbrata; oculis fuscis sex-punctatis. b. macula marginali nebulosa; abdomine pellucido. c. macula marginali media, ocellata. d. macula marginali media, duplicata; abdomine æquali. e. macula marginali media duplicata & punctata: abdomine attenuato. S. inf. t. 9. f. 13.

1617. *L. flaveolata* alis albis basi luteis. N. A. N. C. 3, 124, 2.
a. alis albis basi maculaque marginali luteis. S. inf. t. 125. f. 1. b. alis albis basi maculaque marg. & media superiorum luteis. c. alis albis basi maculaque marg. & media omnium luteis. S. inf. t. 4. f. 1.

1618. *L. vulgata* alis albis, corpore fusco: cauda simpliciter.

1619. *L. rubicunda* alis tantum posticis basi nigricantibus. N. Aet. N. C. T. 3.. 124, 4.

a. macula marg. ferruginea. b. macula marg. atra.

1620. *L. depressa* alis omnibus basi nigricantibus: thorace lineis duabus flavis; abdomine depresso lanceolato lateribus flavescente. S. inf. t. 52. f. 1.

1621. *L. vulgarissima* thorace strigis octo flavicantibus. S. inf. t. 6. f. 5.

1622. *L. cancellata* alis basi immaculatis; abdomine, dorso, lateribusque interrupte luteis. Aet. C. c. 124, 7.

1623. *L. aenea* viridi inaurata, alis pallidis, pedibus nigris. S. inf. t. 182. f. 1.

1624. *L. forcipata* thorace nigro: characteribus variis flavescantibus. A. C. l. c. 10. S. inf. t. 160. f. 1; t. 186. f. 1.

S 2

1625.

$\frac{1}{2}$ N. Aet. N. C. betulae; N. Aet. Naturalis Curiosorum

1625. *L. IV-fasciata* thoracis lateribus lineis quatuor luteis.

A. C. l. c. 125, 9. D. *Fandens* Ride-Heft.

a. alis glaucescentibus, thoracis lineis quatuor flavis. Aët. nidr. 3, 38. t. 6. f. 9. *L. grandis* LINN. b. alis albidis, abdomine rufo-fusco; dorso baseos triangulo fulvo. c. alis totis albidis, abdomine rufo-fusco: dorso baseos sex lineis inæqualibus nigris. d. alis albidis; abdomine punctis, maculis, lineisque diversicoloribus variegato. e. alis flavescens; abdomine juxta basin attenuato. S. inf. t. 60. f. 1. f. alis flavescens; abdomine basi crasso. S. inf. t. 2. f. 4. Species, varietates, an sexus diversus?

1626. *L. cyanea* oculis caruleis; thorace lineis luteis; abdomine variegato. A. C. l. c. 127, 12. *

a. alis albidis; puncto marginali nigro; lineis sex thoracis sulphureis. S. inf. t. 6. f. 10. b. alis lacteis macula marg. fulva; fasciis octo thoracis sulphureis.

1627. *L. Havniensis* alis basi margineque superiori aureis; thoracis lateribus sexfasciatis; abdomine nigro, lineis punctisque sulphureis. A. C. l. c. 127, 13. S. inf. 167. f. 4. * +

1628. *L. pratenfis* alis hyalinis; thoracis lateribus fasciis virentibus octo, antice tribus fuscis. L. c. 128, 14. * +

1629. *L. fulva* alis basi fulvescentibus: macula marginali nigra; thorace abdomineque fulvo. L. c. 129, 20. * +

1630. *L. triedra* nigra maculis flavis; abdomine triangulari. L. c. 129, 19. * +

Variat alis omnibus, alis posticis, alis nullis basi flavis.

1631. *L. squamata* alis albidis puncto marginali lutescente; lineis thoracis quatuor caruleis. L. c. 130, 22. * +

1632. *L. sanguinea* alis hyalinis puncto marginali ferrugineo; dorso sanguineo. L. c. 128, 15. *

1633. *L. variegata* alis hyalinis puncto marginali ferrugineo ; abdomine flavo rubeoque variegato. L.c. 128, 16.*

1634. *L. rubra* alis posticis basi lata macula flavescente ; thorace abdomineque cylindrico rubro. L.c. 128, 17.
S. inf. t. 92. f. 1. * +

1635. *L. Fridrichsdalensis* alis prioribus linea : posticis macula baseos nigricante ; abdomine depresso cæruleo.

a. abdominis maculis lateralibus concoloribus , obsoletis b. abdominis maculis lateralibus flavis. S. inf. t. 106. f. 1.

Varietas b. mihi rarissima semel tantum obvia , a. vero vulgatissima.

1636. *L. Frumenti* alis albis puncto marginali nigricante ; abdomine subluteo : linea interrupta laterali nigra. A. C. l. c. 129, 18. S. inf. t. 137. f. 1.

1637. *L. parvula* nigra, maculis luteis ; abdomine subcylindrico. * +

Inter minores ; variat alis basi nigricantibus & immaculatis.

*** Alis erectis.

1638. *L. Virgo* alis erectis , coloratis. A. C. l. c. 130, 23.

a. alis luteo-fuscis, margine immaculatis ; corpore sericeo nitido. S. inf. t. 48. f. 2. b. alis subfuscis : puncto marginali albo ; corpore viridi cæruleo. Gr. *Tuktursak*. S. inf. t. 44. f. 6. c. alis inaurato fuscis : macula nigra ; corpore sericeo, nitido. S. inf. t. 48. f. 3.

1639. *L. Puella* alis erectis hyalinis. A. C. l. c. 130, 24.

a. alis puncto marginali fusco ; corpore sericeo. S. inf. t. 116. f. 1. b. alis p. marg. fusco ; corpore incarnato. S. inf. t. 48. f. 1. c. alis p. marg. nigro, corpore sericeo. S. inf. 116. f. 5. d. alis p. marg. nigro ; corpore cæruleo cinereoque alterno. S. inf. t. 120. f. 5. e. alis p. marg. albo ; corpore fusco nigroque alterno. f. alis p. marg. fusco ; corpore sericeo æneo ; maculis viridibus. S. inf.

t. 12. f. 9. g. alis p. marg. rufo; corpore plumbeo; maculis cæruleis. h. alis p. marg. albo; corpore sericeo, æneo, apice cæruleo. S. inf. t. 121. f. 4, 5.

D. Guld-Smed. N. *Orm-Styng.* nom. gen.

* Cauda trifeta.

1640. EPHEMERA *Danica* cauda trifeta, alis pallide aureis, maculatis. Fn. Fridr. 554. S. inf. t. 9. f. 5, 6. *

1641. Eph. *vulgata* cauda trifeta, alis nebuloso-maculatis.

1642. Eph. *marginata* cauda trifeta; alis hyalinis, linea versus apicem umbratica. S. inf. t. 42. f. 7.

Sub meridiem 21 Maji in copula offendi; *mas* differt a *fæmina* appendiculis caudæ quatuor, majoribus curvatis; tuberculis duobus, magnis, fuscis supra oculos, ac macula alarum marginali, oblonga, obscura. Hæc tubercula maribus (non tamen omnibus) propria, auctoribus stemmata perperam dicuntur, vera enim stemmata sive ocelli non supra, nec ante sed inter oculos maris æque ac fæminæ puncta tria, glabra nitida, in triangulum disposita.

1643. Eph. *plumosa* diptera cauda trifeta: setis corporis longitudine; alis albis: margine crassiore obscuro. * +

Mas & fæmina haud differunt; setæ ope lenticulæ utrinque plumosæ videntur.

1644. Eph. *minima* diptera cauda trifeta: setis corpore quintuplo longioribus; alis albis: margine crassiore obscuro. * +

Setæ subtilissimæ visum fere fugientes, paucis momentis, insecto acicula puncto, rigorem amittunt & crispantur.

* * Cauda bifeta.

1645. Eph. *sulphurea* flava, cauda bifeta; oculis nigris. * +

1646.

1646. Eph. *gemmata* cauda bifeta unciali; alis hyalinis, reticulatis, abdomine annulis luteis. Sc. carn. 684. GEOFR. inf. 2. Eph. 5. t. 13. f. 4.
1647. Eph. *diaphana* lepidota, fusca, cauda bifeta fetis immaculatis; abdominis medio albo, pellucido. *Bisculata* LINN. at omnes binos oculos habent.
Alæ posticæ nullæ; squamulæ vero duæ, subulatæ.
Variat tuberculis fusco-flavis & sulphureis.
1648. Eph. *culiciformis* lepidota livida, cauda bifeta: fetis albissimis, basi nigris; alis hyalinis.
1649. Eph. *luteola* lepidota lutea, cauda bifeta; alis, pedibus, fetisque albis. * +
1650. Eph. *rufula* diptera, fusca cauda bifeta: fetis annularis; abdominis medio albo: marginibus rufis. * +
Diaphanam refert, at alæ minores nullæ, nec squamulæ.
1651. Eph. *striata* diptera, albida lineolis rufis, cauda bifeta; alis costa marginali cinerea, lineolisque transversis albis.
1652. Eph. *annulata* diptera, cinerea maculis fuscis; cauda bifeta, alis duabus hyalinis; costa marginali sublutea. P. D. Atl. t. 30. *Diptera* LINN.
1653. Eph. *horaria* cauda bifeta, alis albis margine crassiore nigricantibus.

Pupæ Ephemerarum ante ultimam decorticacionem alis perfectis gaudent, perfecto insecto simillimæ; hanc observationem FRISCHUS olim fecerat, ROESLIUS vero Inf. aqu. 2. p. 58. non pro falsa habuit, sed in medio reliquit, ego, dum Berolini primo vere 1765 peregrinarem, eandem speciem magna copia alis flavidis evolare, exuviisque alatis alis albescentibus rursus prodire vidi, novitiumque insectum, quod ROES. fig. 5 & 6. t. 12. delineavit, veram Ephemeræ Berolinensis pupam censeo.

144 INSECT: NEUROPT: PHRYGANEA.

1654. PHRYGANEA *Phalenoides* nigra, alis albidis : maculis nigris sparsis.
1655. Phr. *nebulosa* nigra alis incumbentibus, subcinereo-nebulosis, caudæ setis truncatis. Act. nidr. 4, 56; t. 16. f. 19.
1656. Phr. *striata* nigra, alis testaceis nervoso-striatis.
1657. Phr. *grisea* alis superioribus nebulosis : macula marginali nigra.
1658. Phr. *grandis* alis cinereo testaceis : linea longitudinali interrupta nigra punctisque albis. S. inf. t. 180. f. 1, 2.
1659. Phr. *rhombica* alis flavescentibus deflexo-compressis : macula rhombea laterali, alba. Gr. *Sullernak*. Act. nidr. 4, 55. t. 16. f. 18. S. inf. t. 90. f. 6?
1660. Phr. *bimaculata* alis fuscis : macula laterali duplici flava.
1661. Phr. *nigra* alis cæruleo-atris ; antennis corpore duplo longioribus.
1662. Phr. *ciliaris* nigra, abdomine utrinque linea alba ; tibiis posticis pallidioribus ; antennis mediocribus. S. inf. t. 157. f. 5, 6.
1663. Phr. *longicornis* alis superioribus nebulosis ; antennis corpore triplo longioribus.
1664. Phr. *flosa* alis cylindrico-incumbentibus , flavescentibus ; antennis corpore triplo longioribus. S. inf. 196. f. 4, 5.
1665. Phr. *Weneri* cinerea alis posticis pallidioribus : margine interiori piloso, albedo.
1666. Phr. *bilineata* nigricans, alis superioribus utroque margine lineolis duabus transversis albidis.
1667. Phr. *fusca* fusca immaculata ; alis inferioribus hyalinis.

1668. Phr. *flava* alis flavo-reticulatis; antennis longitudine abdominis.
1669. Phr. *umbrosa* nigra, alis superioribus lutescenti-nubulosis.
1670. Phr. *minuta* nigra, palpis villosis, capite longioribus. S. inf. t. 171. f. 4 - 6.
1671. Phr. *pilosa* flavicans, alis omnibus ciliatis; posticis pallidis; antennis longissimis absque annulis. * +
1672. Phr. *variegata* alis subnigris maculis & punctis albidis; pedibus rufis. * +
1673. Phr. *nirida* alis deflexo-compressis pellucidis: posticarum medio linea longitudinali nigra. Fn. Fridr. 569. * +
1674. Phr. *occulta* alis deflexo-compressis flavescens nitis; posticis punctis duobus marginalibus. Fn. Fridr. 576. * +
1675. Ph. *lineata* alis cylindrico-incumbentibus, flavescens; superiorum medio linea longitudinali, nigra; antennis corpore longioribus. * +
1676. Ph. *unimaculata*, alis nigricantibus; margine superiori puncto flavo. * +
1677. Ph. *longicornis* alis flavescens; fasciis tribus nigris; antennis longissimis albis.
1678. Ph. *Tineoides* alis fusco-ferrugineis; antennis longissimis albis basin versus annulis fuscis. Sc. carn. 694. *
1679. Ph. *plumbea* pallida, thorace nigro, pedibus lutescentibus; antennis longissimis. * + facies Ph. *nigra*. Larva Phr. Danis Ugg dicitur. Aph. 8, 270.
1680. HEMEROBIUS *Perla* luteo-viridis, alis hyalinis: vasis viridibus.

- a. viridis glaber, linea a capite ad anum lutea.
 b. viridis pilosus supra ad medium abdominis usque nigro punctatus. c. viridis pilosus supra & subtus nigro maculatus. S. inf. 5. t. 7, 8. d. luteus, pilosus linea fusca utrinque a capite ad anum. S. inf. t. 9. f. 2, 3.
1681. *H. Chrysops* viridi nigroque varius; alis hyalinis maculis reticulatis.
1682. *H. albus*, cinereus, maculis obscuris; capite flavissimo; alis hyalinis: vasis albis.
1683. *H. flavicans* niger, thorace abdomineque flavis.
1684. *H. lutarius* niger alis albidis striatis, ovato-oblongis; extensis.
1685. *H. sexpunctatus* alis albis: maculis fuscis postice punctis sex distinctis: antennis fuscis.
1686. *H. cylindricus* niger, alis albis striatis, elongatis, convolutis; pedibus fuscis. * +
1687. *H. nemoralis* alis hyalinis æneis, venosis: superioribus nigro punctatis. Fn. Fridr. 577. * +
1688. *H. obscurus* niger alis utrinque ciliatis obscuris, venis nigris; pedibus subluteis. Fn. Fridr. 578. * +
1689. *H. parvulus* alis lacteis, non ciliatis; antennis albis corporis longitudine. Fn. Fridr. 579. * +
1690. *H. unipunctatus* niger, alis albis: superioribus macula unica nigra. Fn. Fridr. 580. * +
1691. *H. trifasciatus* luteus, alis albis: fasciis tribus punctisque nigricantibus. * +
- Variat macula nigerrima juxta angulum interio-
 rem bascos & exteriorem apicis alarum.
1692. *H. pusillus* luteus, oculis nigris; alis albis: postice striis ramosis. * +

1693. *H. longicornis* luteus maculis utrinque nigris; alis hyalinis, venis raris, margineque primorum extimo macula trigona. * +
1694. *H. gibbus* luteus, alis hyalinis immaculatis; dorso thoracis puncto triplici convexo, fusco. * +
1695. MYRMELEON *Formicarium* alis macula alba marginali postica. S. inf. t. 22. f. 1, 2.
1696. PANORPA *communis* alis æqualibus nigro fasciatis. D. *Skorpion-Stiert*. APH. 2, 459. S. inf. t. 88. f. 6, 7. Variat minor maculis nigris absque ulla fascia; Act. nidr. 3, 38; t. 6. f. 10.
1697. RAPHIDIA *ophiopsis* thorace cylindrico. S. inf. t. 95. f. 1.

5. H Y M E N O P T E R A.

1698. CYNIPS *Rosæ* nigra, abdomine ferrugineo postice nigro, pedibus ferrugineis. APH. 2, 458.
1699. C. *Perla* nigra, antennis longitudine corporis; alis nebulosis, pedibus flavescentibus. Fn. Fridr. 597. * +
1700. C. *Hieracii*. BARTH. Act. Havn. 1671. p. 122.
1701. C. *Fagi*.
1702. C. *Glechomæ* totus fuscus, thorace villoso.
1703. C. *Quercus baccarum* nigra basi antennarum pedibusque flavescentibus.
1704. C. *Quercus folii* nigra thorace lineato, pedibus griseis, femoribus subtus nigris.
1705. C. *Quercus petioli* nigra pedibus albidis, femoribus fuscis.
1706. C. *Quercus ramuli* pallidus abdomine, oculisque nigris.
1707. C. *Quercus gemmæ* nigro-æneus, pedibus fuscis.

1708. *C. viminalis* flava, thorace nigro.
1709. *C. Caprea* viridis, nitida, pedibus pallidis.
1710. *C. aurata* viridis, antennis clavatis rubris, pedibus luteis.
Fn. Fridr. 598. *
1711. *C. viridis* antennis clavatis femoribusque nigris; capite, thorace, abdomine aeneo viridibus; oculis rubris. Fn. Fridr. 594. * +
1712. *C. atra*, nigra, antennis corpore longioribus, alis hyalinis: primoribus macula triangulari, pedibusque fuscis. Fn. Fridr. 595. * +
1713. *C. Cardui* antennis longitudine corporis; abdomine subtus fusco, supra nigro: annulo tenui fusco.
Fn. Fridr. 596. * +
Galle-Hveps nom. gen. APH. 3, 31.
1713. TENTHREDO *femorata* antennis clavatis luteis, corpore atro; femoribus posterioribus maximis.
1714. *T. lutea* antennis clavatis luteis, abdominis segmentis plerisque flavis.
1715. *T. Amerina* antennis clavatis; corpore cinereo, ano rufo, labio albo.
- 1715,b. *T. vitellina* antennis clavatis, ore elabiato, abdomine rufo, dorso nigro, femoribus posticis dentatis.
N. Fylle-Kummer. STR. S. 169. t. I. f. 9-11.
1716. *T. rustica?* antennis subclavatis nigra; abdominis segmento I medio: 4, 5, 7, 8, 9. apice fascia albida; femoribus basi sulphureis. GEORR. inf. 2. t. 14. f. 5.h.
1717. *T. ustulata* nigra ant. subfiliformibus exarcticulatis, abdom. carulescente, tibiis pallidis. A. nldr. 3, 39.
1718. *T. Abietis* antennis septemnodis, corpore nigro; abdominis segmentis quatuor ferrugineis.
1719. *T. Padi* anten. septemn. atra femoribus tibiisque albis.
Variat. tibiis tarsisque basi albis.
1720. *T. Cerasi* anten. septemn. corpore nigro, pedibus scutelloque flavis. A. nldr. 4, 57.

1721. *T. Salicis* anten. septemn. flava, capite, thorace supra pedumque posticorum tarsis nigris.

1722. *T. mesomela* anten. septemn. flava, vertice capitis, thorace supra lineaque segmentorum abdominis transversali nigra. A. nigr. 3, 41.

1723. *T. notata* anten. septemn. flava, capite, thorace supra & subtrus macula nigra. * +

1724. *T. atra* anten. septemn. corpore atro, pedibus rubris.

1725. *T. viridis* anten. septemn. corpore viridi, abdomine supra fusco. S. inf. t. 7. f. 11. A. nigr. 4, 59.

1726. *T. ovata* anten. septemn. corpore atro, thorace supra rubro. A. nigr. 4, 64.

1727. *T. Alni* anten. septemn. corpore nigro, thorace capiteque rubris. S. inf. t. 110. f. 6, 7.

1728. *T. Rosa* anten. septemn. corpore flavo, costa alarum superiorum longitudinali nigra. A. nigr. 4, 60.

1729. *T. livida* anten. septemn. corpore atro, abdomine supra infraque livido. A. nigr. 4, 61; t. 16. f. 20.

1730. *T. Septentrionalis* anten. septemn. pedibus posticis compressis, dilatatis.

1731. *T. XII-punctata* anten. septemn. corpore atro: punctis duodecim albis.

1732. *T. ligata* anten. septemn. atra, abdomine rubro: basi & apice nigris. S. inf. t. 7. f. 5. A. nigr. 3, 40; t. 6. f. 11. *Tenthredo neglecta (Nl. 77.)*
Schiff. Monncl.

Variat tibiis tarsisque a, omnibus nigris. b, omnibus ferrugineis. c, primorum ferrugineis. *

1733. *T. pellucida* anten. septemn. apice albis nigra, abdomine pedibusque ferrugineis. * S. inf. t. 115. f. 4.

1734. *T. bipunctata* anten. septemn. nigra: apice, ore, punctisque basi abdominis utrinque duobus albis. * +

Variat femoribus tibiisque ferrugineis.

- Nematus melanocephalus* (Lep.)
Schiff. Romancé.
1735. *T. nigrata* anten. septemn. nigra; scutello punctis duobus convexis albidis. * + Variat a, pedibus nigris. b, femoribus apice, tibiis basi flavis.
- 1735, b. *T. scrophulariae* antennis septemnodiiis luteis, abdomine cingulis quinque flavis: primo remotiori.
1736. *T. ferruginea* anten. septemn. apice albis, rufa; capite, thorace flavo-maculato, femoribusque posticis atris. * S. inf. t. 191. f. 2, 3.
1737. *T. ferotina* anten. septemn. atra, pedibus ferrugineis: tibiis basi, antennis medio, scutelloque bipunctato albis. * A. nidr. 4, 62. Variat tibiis medio albis.
- 1737, b. *T. leucomelas* ant. septemn. atra, abdomine lateribus albo, subtus albo striato. A. nidr. 4, 63. *
1738. *T. cynosbati* antennis setaceis, corpore atro, pedibus ferrugineis: posticis albo nigroque annulatis.
1739. *T. hortorum* antennis setaceis flava; capite, pectore, abdominis basi maculaque alarum nigris. *
Variat a, pedibus nigris. b, femoribus basi, tibiis apice nigris. S. inf. t. 62. f. 8, 9.
1740. *T. flavipes* nigra hirsuta, thorace subaeneo; ore pedibusque flavis. * +
1741. *T. ambigua* antennis brevibus nodulosis flava, vertice capitis thoraceque supra nigris. * +
1742. *T. pusilla* nigra, capite pedibusque albo-pellucentibus. * +
1743. *T. flava* flava, macula alarum ferruginea.
1744. *T. intercus* nigra, pedibus flavis, antennis subclavatis.
1745. *T. rumicis*.
1746. *T. ulmi*.
1747. *T. caprea*.
1748. SIREX *Gigas* abdomine ferrugineo: segmentis 3, 4, 5, 6 nigris, thorace villoso. S. inf. t. 121. f. 6.

1749. *S. spectrum* abdomine atro, thorace villoso, litura ante alas lutea.

1750. *S. Juvenus* abdomine atro-cærulescente, thorace uni colore, villoso.

1751. *S. Camelus* abdomine atro, lateribus albo maculato; thorace lævi. P. D. Atl. t. 30.

1752. *S. Mariscus* abdomine testaceo: segmentis duobus ultimis nigris; thorace villoso. P. D. Atl. t. 30.

1753. *S. Nanus* ater pedibus ferrugineis: tibiis posticis fuscis annulo albo. * +

Facies in omnibus *S. Spectri*, sed multo minor; variat litura ante alas lutea, tibiis tarsisque posticis annulatis.

* I * Scutello maculato; Antennis fascia annulatis.

1754. ICHNEUMON *infractorius* scutello flavo, thorace maculato abdominis segmentis omnibus margine albis, pedibus ferrugineis.

1755. Ichn. *pisorius* scut. flavic. thor. mac. abdomine toto luteo. S. inf. t. 22. f. 8; t. 114. f. 1; t. 70. f. 6.

Variat abdomine ferrugineo. S. inf. t. 6. f. 12.

1756. Ichn. *nigratorius* scut. flavic. thor. mac. pedibus antice fuscis. * + *Ichn. saturatorius (Pz.) Schiff. nom.*

1757. Ichn. *jubilatorius* scut. flavo, thor. mac. abdominis primo secundoque segmento basi, pedibusque luteis. S. inf. t. 52. f. 5. * *Ichn. jubatorius (Pz.) Schiff. nom. ncl.*

1758. Ichn. *amatorius* scut. flavo, thor. mac. abdominis segmento primo ferrugineo: incisuris luteis. * + *Ichn. amatorius (Grav.) Schiff. nom.*

1759. Ichn. *inquisitorius* scut. flavo, thor. mac. segmentis abdominis quatuor anticis apice albis, pedibus luteis. * + *Ichn. porrectorius (Grav.) Schiff. nom. ncl.*

Ichn. leucomela 1760. *Ichn. albatarius* scut. flavic. thor. mac. corpore pedibusque albo maculatis. Aët. nidr. 4, 66. * †
(Schäff. nomencl.)

Ichn. varius 1761. *Ichn. variatorius* scut. albido th. mac. abdomine ferrugineo apice nigro; tibiis posticis annulo albido. P. D. A. Ichn. 5. * †
(Pontopp. (nec auct.))

Ichn. sugillatus 1762. *Ichn. moratorius* scut. flavic. thor. immac. pedibus fulvis. S. inf. t. 20. f. 8; t. 72. f. 4. *
(Grau.) Schäff. nomencl. (nec auct.)

Ichn. natatorius 1763. *Ichn. sugillatorius* scutello flavicante, thorace immaculato, abdomine atro: segmentis tribus utrinque puncto albo.
(Pz. 80.7) Schäff. nomencl.

Ichn. vadatorius 1764. *Ichn. sarcitorius* scut. flavic. thor. immac. abdominis segmento tertio posterius, secundoque ferrugineis, ultimis apice albis. Isl. R. 688.
(Pz. Fn. 76.10) Schäff. nomencl.

Ichn. raptorius 1765. *Ichn. raptorius* scut. flavic. thor. immac. abdominis segmento secundo tertioque luteis, reliquis apice albis. P. D. Atl. t. 30.
(Grau.) Schäff. nomencl.

1766. *Ichn. extensorius* scut. flavic. thor. immac. abdominis segmento secundo tertioque ferrugineis: ultimis apice albis. Aët. nidr. 3, 42. S. inf. t. 43. f. 1, 2; t. 61. f. 3, 4.

1767. *Ichn. saturatorius* scut. flavic. thor. immac. abdominis nigri segmento ultimo albido.

1768. *Ichn. molitorius* scut. albo, thor. immac. abdominis apice tibiis utrinque basi albis.

Ichn. computatorius 1769. *Ichn. computatorius* scut. flavic. thor. immac. abdominis apice albo, pedibus nigris. * †
(Grau.) Schäff. nomencl.

1770. *Ichn. laboratorius* scut. flavic. thor. immac. abdominis segmentis duobus anticis ferrugineis: incisuris albidis. S. inf. t. 74. f. 4.

Ichn. variabilis? 1771. *Ichn. punctorius* scut. flavic. thor. immac. abdomine toto pedibusque ferrugineis. * †
(Schmücke) Schäff. nomencl.

1772. Ichn. *purgatorius* scut. flavic. thor. immac. pedibus abdomineque ferrugineis: segmentis mediis basi nigris. * † *an Ichn. antennatorius?*
1773. Ichn. *IV. punctorius* scut. albo, thor. immac. basi abdominis segmentis duobus utrinque puncto albo. S. inf. t. 84. f. 9. * *Ichn. notatorius (Pl. t. 80. 7) Schff. Nomencl.*
1774. Ichn. *clavatorius* scut. albo, thor. immac. abdominis apice albo; femoribus tibiisque posticis clavatis. P. D. Atl. Ichn. 6. * † *Ichn. saturatorius (P.) Schff. Nomencl.*
- * 2 * Scutello maculato; Antennis immaculatis.
1775. Ichn. *culpatorius* scut. flavic. thor. mac. abdominis segmento secundo tertioque ferrugineis: reliquis nigris. *Luctatorius Ichn. nomencl.*
1776. Ichn. *luctatorius* scut. flavic. thor. mac. abdominis segmento secundo tertioque luteis. S. inf. t. 73. f. 9. *Ichn. nomencl.*
1777. Ichn. *volutatorius* scut. flavic. thor. variegato; abdominis segmentis omnibus dorso flavis. Act. nigr. 3. 43.
1778. Ichn. *maculatorius* scut. flavic. thor. mac. abdominis segmento secundo, quarto, sextoque luteo, octavo flavo-striato. Act. nigr. 4. 67. * † *Ichn. maculatus non auct.*
1779. Ichn. *vaginatorius?* scut. flavic. thor. mac. abdominis nigri segmentis omnibus margine flavis.
1780. Ichn. *lituratorius* scut. flavic. thor. mac. abdomine nigro: segmentis quatuor medio flavis, pedibus ferrugineis.
1781. Ichn. *deliratorius* scut. flavic. thor. mac. punctis utrinque tribus, abdomine toto atro, tibiis albis. S. inf. t. 20. f. 11.
1782. Ichn. *curvatorius* scut. flavic. thor. mac. abdominis incisuris albis: media interrupta; pedibus flavis. S. inf. t. 20. f. 9. * *Ichn. vaginatorius? Ichn. nomencl.*

- Ichn. fossorius* 1783. Ichn. *gladiatorius* scut. flavic. thor. mac. abdomine atro; pedibus lutescentibus: tarsis posticis nigris. * +
(F) Schaff. Nomencl.
1784. Ichn. *angulatorius* scut. flavic. thor. mac. abdominis incisuris pedibusque subferrugineis. * +
1785. Ichn. *praestolatorius* scut. flavic. thor. mac. rufo; abdomine subferrugineo: incisuris nigris. * +
1786. Ichn. *rubratorius* scut. flavic. thor. mac. pedibus subluteis; abdomine petiolato femoribusque posticis ferrugineis. * +
- Polyphincta* Grav. 1787. Ichn. *percontatorius* scut. ferrugineo, thor. mac. oreque flavo; ventre albedo; pedibus rubellis. * +
Pimpla percontat. Schaff. Nomencl.
- Ichneum. subse-* 1788. Ichn. *fossorius* scut. flavic. thor. immac. abdomine toto rufus; pedibus rufis.
icans Schaff. Nomencl.
- Ichn. vespertinus* 1789. Ichn. *glabratorius* scut. albicante, thor. immac. pedibus ferrugineis: tibiis posticis nigris annulo albo. * +
Schaff. Nomencl.
1790. Ichn. *fabricatorius* scut. albo, thor. immac. fronte, palpis basique tibiarum tarforumque scutello concoloribus. Variat major totus ater, solo scutello tibiisque albis. * +
1791. Ichn. *ferruginatorius* scut. albedo, thor. immac. abdomine ferrugineo segmentisque extimis nigris: apice albo. P. D. Atl. Ich. 8. * +
- * 3 * Scutello immaculato; Antennis fascia annulatis.
- Ich. comitator* 1792. Ichn. *auspex* ater totus, antennis fascia alba. A. nidr. 3, 44; t. 6. f. 12. I. *comitator* LINN.
- Mesosternus* 1793. Ichn. *vibex* niger, abdomine ferrugineo: apice nigro macula alba, alis hyalinis; antennis fasciatis. Aët. nidr. 4, 65. I. *incubitor* LINN.
transfugus
Cryptus id.
Schaff. Nomencl.
- Ichthnus* 1794. Ichn. *obex* niger, abdomine medio piceo; tibiis anticis clavatis. I. *relictator* LINN.
relictator
Exorides id.
Schaff. Nomencl.

156 INSECT: HYMENOPT: ICHNEUM:

* 4 * Scutello, antennisque immaculatis.

1809. Ichn. *manifestator* corpore atro, immaculato, abdomine sessili, cylindrico, pedibus rufis. Gr. *Kiktoriak*. Act. nidr. 3, 45. S. inf. t. 50. f. 5; t. 110. f. 3.

1810. Ichn. *compunctor* corpore atro immaculato, abdomine subpetiolato longo, pedibus rufis, palpis setaceis.

1811. Ichn. *delusor* corpore nigro, abdomine ferrugineo: basi apiceque nigro, femorum posteriorum patellis folis nigris.

1812. Ichn. *titillator* corpore nigro, abdomine ferrugineo, basi apiceque nigro, pedibus posticis nigris: plantis albis.

1813. Ichn. *extensor* corpore nigro immaculato, abdominis cylindrico, pedibus rufis, palpis setaceis.

1814. Ichn. *Turionella* niger, abdomine cylindrico, macula alarum fusca albæ inserta, tibiis posterioribus albo annulatis.

1815. Ichn. *moderator* niger, abdomine petiolato compresso, ore palpatu pedibusque pallidis; aculeo corpore subbreuiore.

1816. Ichn. *Resinella* niger pedibus flavis, abdomine subcylindrico sessili, antennis basi luteis.

1817. Ichn. *prærogator* niger pedibus flavis, abdomine oblongo, obtuso.

1818. Ichn. *gravidator* niger, abdominis primo segmento ferrugineo, abdomen dimidium obtegente.

an nov. spec.? 1819. Ichn. *cincturator* antennis pedibusque ferrugineis alis albis, fasciis duabus nigris.

Variat corpore atro & rufo. I. *Cinctus* LINN.

Hemiteles bicolor Schff. nom. — *Pezomachus fusc.*

Mesoleptus testaceus Grav. 1820. Ichn. *clavator* luteus, abdomine clavato; oculis nigris. * †

Tryphon testaceus

Schff. nom.

1821.

1821. Ichn. *acuminator* luteus, thorace maculis: abdomine acuminato incisuris segmentorum nigris. * + *Pimpla flavicans* (Pa. 109. 14) Schaff. nomencl.
- Huic anus muticus est; alium reperi ani aculeo nigro, secundoque abdominis segmento bipunctato; sexus forte diversus.
1822. Ichn. *certator* niger pedibus ferrugineis; tarsis posticorum fuscis. * + *Ichneumon. certator* Schaff. nomencl.
- Variat a, antennis totis nigris; b, antennis subtus fuscis, capite toto nigro. c. ore luteo. d, lineola lutea juxta marginem interiorem oculi.
1823. Ichn. *cavator* niger, pedibus fulvis; patellis nigris, extrorsum puncto albo excavatis. * + *Tryphon*
1824. Ichn. *integrator* niger fronte albida, pedibus luteis: posticorum tarsis antennisque subtus fuscis. * + *Tryphon integrator* Schaff. nom.
1825. Ichn. *ambulator* niger frontis linea duplici, palpisque luteis; femoribus tibiisque antice ferrugineis. * + *Ichn. cornutus* Schaff. nom.
1826. Ichn. *incrassator* niger, abdomine supra ferrugineo; infra pedibusque luteis; femoribus posticis nigris. * + *Ichn. incrassator* Schaff. nom.
1827. Ichn. *saltator* thorace pallide flavo, abdomine nigro; pedibus pallidis. * + *Ichn. saltator* nec. auct.
1828. Ichn. *variator* niger, fronte pedibusque flavis; femoribus posticis abdominisque medio ferrugineis. S. inf. t. 103. f. 4. * *Mesoleptus filicornis* Tryphon
1829. Ichn. *sperator* niger, abdominis medio pedibusque ferrugineis: posticorum tibiis femoribusque apice nigris. * + *filicornis* Schaff. nom. *Phygadeuon* Grav. *sperator* (Cryp. tus) Schaff. nom.
1830. Ichn. *annulator* niger, antennis subfuscis; pedibus ferrugineis: tibiis tarsisque posticorum nigris, albo annulatis. * + *Ichn. annulator* Schaff. nom.
1831. Ichn. *punctator* niger, abdomine subtus albido, bifariam punctato; pedibus subflavis. * + *Pimpla instigator* Schaff. nomencl. *Cryptus* id. Fabr. S. Pès.

Pimpla flavicans (Ps. 109. 14) Schaff. nomencl.

Phygadeuon 1832. Ichn. *palpator* niger, antennis basi, abdomine medio
pedibusque ferrugineis.

Cryptus variatorius
Graw.

Ichn. cessator 1833. Ichn. *cessator* ater, pedibus fulvis; tarsis posticorum
nigris, apice abdominis punctis duobus luteis. * +
Schaff. nomencl.

Ichn. cunctator 1834. Ichn. *cunctator* lividus, abdomine petiolato; alis me-
dio litura alba punctoque nigro. * +
Müll. - Fabr.

Tryphon styl- 1835. Ichn. *calcator* niger, antennis fuscis; pedibus ferru-
gineis. * +
gineis Schaff. nomencl.

Ichn. raptor 1836. Ichn. *raptor* lutescens, antennis fuscis; thorace abdo-
minisque petiolati marginibus nigris. * +
Schaff. nomencl.

Ichneum. annu- 1837. Ichn. *annulator* niger, pedibus flavis, femoribus tibiis-
lato (nec Fabr.)
que posticis annulo nigro. * +
Schaff. nomencl.

Pimpla turio- 1838. Ichn. *contemplator* niger, pedibus ferrugineis, tibiis
nellae Schaff. nomencl.
posticis annulo albo. * +

1839. Ichn. *nigrator* totus niger. * +

Ichn. bellator 1840. Ichn. *bellator* niger, abdomine petiolato, cylindrico:
Schaff. nomencl.
aculeo recurvato; pedibus ferrugineis. * +

Ichn. denticulator 1841. Ichn. *denticulator* niger, postico thoracis obsolete den-
Schaff. nomencl.
ticulato; pedibus, abdominis basi ferrugineis, api-
ce maculis duabus albis. * +

Tryphon atoma 1842. Ichn. *atomator* niger, abdomine flavicante ovato; an-
tennis pedibusque ferrugineis. * +
tor Schaff. nomencl.

Ichneum. specierum numerus ex vario sexus colo-
re olim diminuendus.

* 5 * Abdomine falcato.

Ophion 1843. Ichn. *luteus* luteus thorace striato, abdomine falcato.
A. nidr. 3, 47. S. inf. t. I. f. 10.

Ophion ramidus 1844. Ichn. *ramidulus* luteus abdomine falcato; apice nigro.
las Schaff. nomencl. (nec Graw.)

1845. Ichn. *glaucopterus* luteus, pectore nigro; abdomine falcato; ano nigro. S. inf. t. 82. f. 3. *Janiscus Grav.*
Ophion glaucopt.
Schaff. nomencl.
1846. Ichn. *circumflexus* niger, abdomine falcato, antico luteo; pedibus posticis nigro geniculatis, scutello flavo. *Anomalus Jur.*
circumflexus
Ophion circumf.
Schaff. nomencl.
1847. Ichn. *longipes* niger, abdomine subfalcato, medio rufo, pedibus luteis: femoribus posticorum apice nigris. * + *Campoplex Grav.*
longipes
Ophion longipes
Schaff. nomencl.
1848. Ichn. *sagittarius* niger, abdomine falcato, toto ferrugineo. *Inculcator* LINN. *Campoplex inculcator.*
Ophion inculcator
Schaff. nomencl.
1849. Ichn. *pugil* niger, abdomine falcato: segmentis secundo, tertio, quartoque rufis; pedibus tenuibus ferrugineis. A. nigr. 3, 46. *Pugillator* LINN. *Campoplex pugill.*
Ophion pugillator
(Pl. 106. 15.) Schaff.
nomencl.
1850. Ichn. *curvus* niger, abdomine falcato: apice macula subvirente; basi pedibusque ferrugineis, tarsis posticorum luteis. * + *Pygadenon Grav.*
Cryptus curvus
Schaff. nomencl.
1851. Ichn. *falcifer* niger abdomine falcato: segmentis secundo, tertio, quartoque rufis; tibiis posticis clavatis. *Jaculator* LINN. *Joenus jaculator*
(Fabr.) Schaff. nom.
1852. Ichn. *varius*, antennis nigris, thorace variegato; abdomine falcato, subtus flavo; pedibus rubellis. * + *an?*
Primpla flavicaus?
var.

* 6 * Minuti.

1853. Ichn. *Muscarum* auratus pedibus flavis saltatoriis.
1854. Ichn. *Bedeguaris* auratus thorace viridi, abdomine aureo.
1855. Ichn. *Puparum* auratus caeruleus, abdomine viridi nitido, pedibus pallidis.
1856. Ichn. *Larvarum* auratus viridis, abdomine nigro: macula dorsali purpurascens; pedibus flavis, antennis septemnodis.
1857. Ichn. *Ovulorum* niger, pedibus rufis, antennis filiformibus longis.

1858. Ichn. *globatus* niger, pedibus ferrugineis; puncto alarum nullo. A synonym. LINN. diversus.

1859. Ichn. *glomeratus* niger, pedibus flavis.

1860. Ichn. *pendulus* lutescens, antennis tarsisque fuscis; petiolo aculeoque abdominis nigris. * +

Larva e nervo folii *Quercus* sibi domicilium ovale fruit.

Pesomachus agilis

Cryptus agilis (Gr., F.) Schaff. nomen nect. Ichn. apterus P. D. Atl. t. 30. an larva?

1861. SPHEX *fabulosa* nigra hirta, abdominis petiolo biartoculato; segmento secundo tertioque ferrugineis.

1862. Sph. *figulus* atra, abdomine subpetiolato: marginibus segmentorum lucidis.

1863. Sph. *fispes* atra abdomine petiolato brevissimo, tibiis posticis clavatis denticulatis, rufis.

1864. Sph. *viatica* nigra pubescens, alis fuscis, abdomine antice ferrugineo: singulis atris.

1865. Sph. *fusca* atra laevis, abdominis segmentis tribus primis subferrugineis.

1866. Sph. *pestinipes* nigra, glabra, abdomine anteriore ferrugineo, pedibus primariis ciliatis.

1867. Sph. *variegata* nigra tota, alis albo maculatis.

1868. Sph. *cribraria* nigra, abdomine fasciis flavis, tibiis anticis clypeis concavis cribriformibus. S. inf. t. 177. f. 6, 7, 8.

a, fasciis duabus interruptis. b, fasciis sex inaequalibus: anticis quatuor interruptis. c, fasciis quinque subaequalibus: anticis tribus interruptis. *Naturf.* 7 St. 99. an varietatis, mares potius diversi?

1869. Sph. *arenaria* abdominis fasciis quatuor flavis: primo segmento duobus punctis flavis.

1870. Sph. *fossoria* thorace immaculato, ore argenteo; abdomine maculis utrinque quinque lutescentibus.
1871. Sph. *gibba* nigra, abdomine ferrugineo apice fusco; alis primoribus fuscis juxta apicem macula alba.
1872. Sph. *leucostoma* atra glabra, labio argenteo; palmis fuscis.
1873. Sph. *vaga* thorace bipunctato, abdominis fasciis tribus flavis: primis interruptis, tibiis flavis.
1874. Sph. *nobilis* atra scutello bipunctato; abdomine fasciis quinque flavis: tribus primis interruptis; pedibus ferrugineis. S. inf. t. 113. f. 8? *
1875. Sph. *arvensis* nigra, abdomine fasciis quatuor flavis: tertia interrupta.
- Cadavera Muscæ domesticæ, quibus fenestræ apri-
cæ Augusto & Septembri obrutæ sunt,
huic debentur.
1876. Sph. *rustica* nigra, scutello, labio, fasciisque abdominis duabus flavis: prima interrupta; pedibus luteis. * +
1877. Sph. *militaris* nigra, ore argenteo; abdomine fasciis tribus interruptis; apice tibiisque flavis. * +
1878. Sph. *Splendida* nigra, labio argenteo; abdomine fasciis quinque: secunda & tertia interruptis, tibiis tarsisque flavis. S. inf. t. 81. f. 2.
1879. Sph. *feroxima* atra, antennis albo annulatis; tibiis posticis clavatis ferrugineis. * +
1880. Sph. *trimarginata* atra, thorace antice lineola, abdomine fasciis tribus flavis; pedibus ferrugineis. * +
1881. Sph. *trifasciata* atra flavo-maculata; abdomine fasciis tribus punctisque duobus, pedibusque flavis. * +
- Fascia primi segmenti in nonnullis interrupta est.

162 INSECT: HYMENOPT: CHRYS: VESPA.

1882. Sph. *bifasciata* atra flavo-maculata, abdomine fasciis duabus interruptis, maculis quatuor, pedibusque flavis. * +
1883. Sph. *IV-maculata* nigra, thorace immaculato; abdominis secundo tertioque segmento utrinque macula flava. * +
1884. CHRYSIS *ignita* glabra, nitida, thorace viridi, abdomine aureo; apice quadridentato.
1885. Chr. *cyanea* glabra, nitens; thorace abdomineque caeruleo; apice tridentato.
1886. VESPA *Crabro* thorace nigro, antice rufo, immaculato; abdominis incisuris puncto nigro, duplici contiguo. *Gieding, Gede-Hams. S. inf. t. 53. f. 5; t. 136. f. 3.*
1887. *V. vulgaris* thorace utrinque lineola interrupta, scutello quadrimaculato, abdominis incisuris punctis nigris distinctis. *S. inf. t. 91. f. 5.* Variat scutello bimaculato.
1888. *V. rufa* thorace utrinque lineola, scutello bipunctato, abdomine flavo, antice ferrugineo.
1889. *V. parietum* nigra, thorace lineola baseos punctisque, abdomine fasciis quinque vel sex flavis: prima remotissima.
- Eadem cum *V. parietina* est; variat vero flavedine multiplici: *antennis* basi introrsum luteis, vel totis nigris; *ore* nigro vel flavo, vel linea transversa, vel lineis duabus obliquis punctisque flavis; *thorace* immaculato, vel punctis flavis diverse maculato; *scutello* linea, vel punctis duobus, vel utroque, vel neutro; *fasciis abdomen* subtus duabus, vel unica, vel nulla cingentibus; *tibis* & *tarsis* vel luteis, vel ferrugineis.

1890. *V. muraria* nigra, thorace maculis duabus ferrugineis; abdominis fasciis quatuor flavis: prima remotissima.
1891. *V. spinipes* nigra, abdomine fasciis quinque flavis, femoribus intermediis, denticulatis, labio flavo ^{*Odynurus spinipes* sp.} maculato.
1892. *V. coarctata* abdominis primo articulo infundibuliformi, secundo campanulato, maximo bipunctato.
1893. *V. ligata* nigra, ore femoribus, abdominisque tertio sextoque segmentis flavis: medio angulo nigro. ^{*Vespa ligata* (Will.) Schaff. nomencl.} Fn. Fridr. 642. Variat ore, scutello, tibiis, abdominisque fasciis quatuor flavis: tertia interrupta. Minor *Sph. arvensis*, quæ nitida, cum hæc punctis excavatis scabriuscula sit. * +
1894. *trifasciata* nigra, thorace lineola interrupta; abdomine fasciis tribus tibiisque flavis. * + Variat a, ore nigro. b, ore flavo. c, thorace quadripunctato. ^{*Gymmorrhilus bifasciatus* (Werm.) Schaff. nomencl.}
- Hveps, Gede-Hams* nom. gen. APH. 3, 50.
1895. APIS *longicornis* antennis filiformibus longitudine corporis hirsuti fulvique.
1896. Ap. *tumulorum* antennis filiformibus longitudine corporis nigri, pedibus maxillisque flavescens.
1897. Ap. *centuncularis* nigra, ventre lana fulva.
1898. Ap. *retusa* nigra subhirta, abdominis basi retusa; tibiis posticis extus lanatis.
1899. Ap. *rufa* fusca, abdomine rufescente, fronte alba.
1900. Ap. *truncorum* nigra glabra, fronte albida pubescente, abdomine segmentis margine albidis, subtus flavicante.
1901. Ap. *succincta* thorace flavescens subvillosa, abdomine nigro: cingulis quatuor flavis.

1902. *Ap. carulefcens* fusca subvillosa, abdomine carulefcente, incisurarum marginibus albicantibus.
1903. *Ap. florifomnis* nigra abdomine subcylindrico, incurvo, ano bidentato; tibiis posticis apice spinosis.
1904. *Ap. belvola* rufa villosa, oblonga, subtus albida. S. inf. t. 113. f. 2?
1905. *Ap. succincta* thorace flavescente subvillosa, abdomine nigro: cingulis quatuor albidis.
1906. *Ap. cunicularia* pubescens, thorace ferrugineo, abdomine nigricante, pedibus undique villosis. S. inf. t. 32. f. 5.
1907. *Ap. mellifica* pubescens, thorace subgriseo, abdomine fusco, tibiis posticis ciliatis: intus transverse striatis. APH. 1, 224. *Honning-Bie*; mas: *Vand-Bie*; neutr. *Arbeids-Bie*.
1908. *Ap. conica* fusca, abdomine conico acutissimo: segmentorum marginibus albis.
- 1908,b. *Ap. lagopoda* griseus pedibus anticis dilatato-ciliatis, tibiis posticis clavatis, ano emarginato. P. D. Atl. t. 30.
1909. *Ap. annulata* nigra, fronte annulis pedum nigris.
1910. *Ap. tranquilla* nigra, antennis subclavatis, apice ferrugineis; pedibus posticis pallidis. * +
1911. *Ap. obscura* nigra, fronte, thorace, pedibusque villos rubescente cinereis.
1912. *Ap. pratensis* pubescens nigra, fronte pilis nigris: thorace albidis hirsuto. GEOFR. inf. 2. Ap. 8. *
1913. *Ap. marginata* nigra fronte albida, abdominis nitidi segmentis anterioribus margine ferrugineis; tarsis luteis. * +
1914. *Ap. nitida* nigra, incisuris abdominis nitidi pedibusque luteo-cinereis. * +
1915. *Ap. splendida* nigra, abdominis incisuris aureis: segmento secundo utrinque macula ferruginea, ano fulvo.
- 1916.

Andrena
id. Schff. nom.
And. pilifera Schff. var.
Andrena

Aspacus fulvo-
Enctus Schff. nomencl. Entom.

1916. *Ap. atra* nigra, thorace tibiisque posticis pilis albidis, *Andrenus cinereus* (G. & G.)
 alis apice macula fusca. * + *off. nomencl.*
1917. *Ap. terrestris* hirsuta nigra thorace antice flavo ano albo.
Jord-Humle. I. Humangs-Fluga. Isl. R. 688, 4. c.
Ham. Fn. N. 591.
1918. *Ap. hortorum* hirsuta nigra, thorace abdomineque antice flavo, ano albo. Major & minor, FRISCH. *Bombus hortorum* (Fabr.) Schaff. nom.
 inf. 9. p. 25, 6. S. inf. t. 69. f. 7.
1919. *Ap. paludosa* hirsuta, nigra, thorace antice posticeque, *Bombus hortorum* Schaff. nom.
 abdomine antice flavis: ano albo. * + *Bomb. paludosa* G. & G. 7. t. 15 f.
- Hi tres nimis affines sunt.
1920. *Ap. pratorum* hirsuta nigra, thorace antice flavo, ano rubro. *Bombus pratorum* Schaff. nom.
1921. *Ap. lapidaria* hirsuta atra, ano fulvo tibiis posticis nigris. *Bombus lapidarius* Schaff. nomencl.
 S. inf. t. 69. f. 9. In declivitate sylvarum habitat species duplo minor, cæterum simillima.
1922. *Ap. ruderaria* hirsuta atra, ano tibiisque posticis subtus fulvis. * + Certo situ villositas abdominis albicat, quod non æque in *Ap. lapidaria*. *Bomb. hortorum* Schaff. nomencl.
1923. *Ap. citrina* hirsuta nigra, thorace antice, abdomine basi tribusque penultimis segmentis flavis. GEOFR.
 inf. 2. Ap. 23. *
1924. *Ap. Muscorum* hirsuta fulva, abdomine flavo. Eng-
 Humle. Ham. Fn. N. 593.
1925. *Ap. hypnorum* hirsuta fulva, abdominis fascia nigra, ano albo. Gr. *Egyptak*.
1926. *Ap. lucorum* hirsuta flava, ano albido.
1927. *Ap. acervorum* hirsuta atra.
1928. *Ap. subterranea* hirsuta atra, ano fusco.
1929. *Ap. Cardui* hirsuta nigra, ano albo. * + *Bomb. Soroensis* (Fabr.) Schaff. nom.

- Andrena albicans* (Klög.) Schff. nomencl.
1930. *Ap. albicans* hirsuta nigra thorace abdominisque apice fulvescente. * +
- Formica Herculeana* (Rinn.) Schff. nom. ligni, perla dato.
1931. *FORMICA herculeana* nigra abdomine ovato, femoribus ferrugineis. Hefte - Myre. ARH. 5, 492. P. D. Atl. t. 30.
1932. *F. rufa* ferruginea, capite supra : abdomine toto nigro. N. Klämmer-Migmaur.
1933. *F. fusca* cinereo-fusca, tibiis pallidis. N. Svart-Migmaur.
1934. *F. nigra* tota nigra nitida, tibiis cinerascens. D. Smaa-Myre. N. Smaa-Migmaur.
- Formica obsolata* (Rinn.) Schff. nomencl.
1935. *F. obsolata* supra nigra, subtus testaceo-rufa, abdomine subglobofo.
1936. *F. rubra* testacea oculis punctoque sub abdomine nigris. N. Eiter-Migmaur.
1937. *F. cespitum* abdominis petiolo binodi : priori subtus, thoraceque supra bidentato. Act. Havn. 10, 1. t. 1. f. 1, 2, 3.
1938. *MUTILLA Acarorum* glabra, rufa, capite abdomineque postico nigris.

6. D I P T E R A.

1939. *OESTRUS Bovis* alis maculatis ; thorace flavo, fascia fusca ; abdomine flavo, apice nigro. D. Koe-Brams. N. Buværre.
1940. *Oe. Tarandi* alis immaculatis ; thorace flavo, fascia nigra ; abdomine fulvo, apice flavo. N. Rens-Værre. Lap. Gurme.
1941. *Oe. nassalis* alis immaculatis ; thorace ferrugineo ; abdomine nigro, pilis flavis. L. Trompe.

1942. *Oc. Ovis* alis subpunctatis; abdomine albo nigroque
versicolore. D. *Faar-Brems*. N. *Eiter-Smau*.
APH. 2, 453.

Bræms, *Sting-Flue*, nom. gen. *Værre*, *Vaar-Orm*: larva. APH. 2, 460.

* Alis patentibus.

1943. TIPULA *pectinicornis* antennis pectinatis; alis macula
nigra; thorace flavescente. S. inf. t. 106. f. 5, 6.

1944. *T. rivosæ* alis hyalinis; rivulis fuscis maculaque nivea.
Gr. *Tuktursak*.

1945. *T. IV-maculata* alis fusco venosis; margine maculisque
quatuor fuscis; abdomine supra flavo.

1946. *T. crocata* nigra, alis fulvescentibus macula marginali
fusca, abdomine basi, cingulisque sex luteis.
S. inf. t. 15. f. 5.

1947. *T. oleracea* alis hyalinis: costa marginali fusca.

1948. *T. hortorum* alis hyalinis; maculis sparsis, albis, hya-
linis. An *T. maxima* Isl. R. 688, 5, a? S. inf.
t. 15. f. 3, 4, 9.

1949. *T. variegata* alis hyalinis; macula pallida, obsoleta;
corpore nigro luteoque variegato.

1950. *T. contaminata* alis nigro maculatis; corpore nigro.
A. nidr. 4, 70. S. inf. t. 196. f. 3.

1951. *T. lunata* alis cinerascens: lunula marginali, alba.

1952. *T. pratensis* alis subcinereis; vasis fuscis punctoque mar-
ginali obscuro; fronte fulva. S. inf. t. 15. f. 7.

1953. *T. terrestris* alis hyalinis: puncto marginali; abdomi-
nis dorso cinereo.

1954. *T. cornicina* alis hyalinis puncto marginali fusco; ab-
domine flavo; lineis tribus fuscis. A. nidr. 3,
48. t. 6. f. 13.

1955.

1955. *T. nigra* alis fuscis ; corpore atro. A. nidr. 3, 49.
1956. *T. atrata* alis glaucis : puncto marginali , corporeque atro ; abdominis segmento primo pedibusque rufis. I. Galdra - Fluga, Hexerie - Flue. Isl. R. 688, 5. a ?
1957. *T. albipes* atra , pedibus longissimis , apice albis. A. nidr. 4, 69.
1958. *T. bimaculata* alis hyalinis ; maculis duabus fuscis ; abdominis medio maculato-ferrugineo.
1959. *T. annulata* alis fusco-variegatis, femoribus annulo albo.
1960. *T. ocellaris* alis albidis ; maculis ocellaribus nigricantibus plurimis.
1961. *T. flavesceus* alis immaculatis ; corpore flavo ; dorso fusco. Isl. R. 1, 903. c ?
1962. *T. regelationis* alis hyalinis nitentibus ; corpore cinereo fusco.
1963. *T. replicata* alis hyalinis : margine tenuiore recurvato ; corpore fusco ; antennis simplicibus.
1964. *T. monoptera* nigra, pedibus palpisque pallidis.
1965. *T. arundineti* albida, antennis villosis ; oculis atris.
1966. *T. aurea* subfulva alis aureis : macula media & marginali subfusca. Fl. Fridrichsd. 690. * †
- * * Alis incumbentibus.
1967. *T. plumosa* thorace virescente ; alis hyalinis : puncto nigro. A. nidr. 4, 71. Isl. R. 684, 5. d. They - Fluga.
1968. *T. littoralis* virescens alis immaculatis ; pedibus anticis longissimis.
1969. *T. monilis* pedibus albidis, annulis novem nigris ; alis albo cinereoque variis.

1970. *T. macrocephala* virefcens, oculis thoracisque tergo nigris.
1971. *T. virens* viridis, alis albis puncto marginali nullo; tarsis pallidis. Vix a *T. plumosa* satis distincta.
1972. *T. putris* fusca, alarum basi cinerea.
1973. *T. notata* atra alis albis; abdomine lateribus antice macula alba.
1974. *T. palustris* atra, abdomine rufescente.
1975. *T. tremula* pedibus anticis longissimis motatoriis nigris, annulis albis.
1976. *T. florilega*, atra holosericea.
1977. *T. juniperina*, alis incumbentibus glaucis: margine tenuiore villoso.
1978. *T. pennicornis* antennis bipestinatis, corpore atro, halteribus albis. A. nidr. 4, 72.
1979. *T. punctata* cinerea, alis nigro maculatis punctatisque. Fn. Frid. 691. * +
1980. *T. diluta* nigra alarum maculis nigris octo; abdominis fasciis femoribusque flavis. Fn. Frid. 692. S. inf. t. 48. f. 7. * +
1981. *T. Spinata* nigra nitida; alis immaculatis; tibiis anticis spinatis. Fn. Frid. 693. * +
1982. *T. Iris* flava alis hyalinis puncto marginali duplici. Fn. Fr. 694. * +
1983. *T. veris* viridis alis albis; thorace tribus maculis lutescentibus. Fn. Fr. 695. * +
1984. *T. tenera* antennis plumosis; thorace luteo; abdomine virente. Fn. Fr. 696. * +
1985. *T. plicata* alis deflexis lacteis puncto nigro; abdomine plicato-papilloso; pedibus luteis. Fn. Fr. 697. * +
Vengdila-Fluga. Isl. R. 684, 5, 6?

1986. *T. velata* alis hyalinis margine subfusco ; thorace abdomineque cærulescente. Fn. Fr. 698. An variet. *T. oleraceæ* ?
1987. *T. flavicans* antennis moniliformibus ; alis macula nigra ; abdomine flavo ; articulis duobus nigris. Fn. Fr. 699. * +
1988. *T. riparia* flava antennis setiferis ; oculis viridibus ; alis lunula alba. Fn. Frid. 700. * +
1989. *T. tripunctata* lutea alis hyalinis : margine punctis tribus nigris ; capite oculisque nigricantibus. Fn. Fr. 701. * +
1990. *T. bilineata* nigra, alis lacteis costa marginali duplici punctoque medio nigro. Fn. Fr. 702. * +
1991. *T. atomata* alis fusco-punctatis ; corpore cinereo, pedibus flavis, geniculo nigro. Fn. Fr. 703. * +
1992. *T. lineata* alis immaculatis ; abdomine fasciis tribus longitudinalibus luteis ; punctis nigris. Fn. Fr. 704. * +
1993. *T. fenestralis* flava immaculata, oculis nigris. Fn. Fr. 705. * +
1994. *T. Typhæ* nigra, abdomine utrinque luteo. * +
1995. *T. nitida* nigra, antennis thorace triplo brevioribus ; pedibus luteis. * +
1996. *T. minuta* nigra, antennis plumosis ; alis albis. * +
1997. *T. umbratica* atra, alis albis : costa nigra ; segmento abdominis primo viridi ; pedibus flavis. * +
1998. *T. nigrata* atra, alis nigricantibus puncto marginali nigro ; abdomine supra fasciis tribus, subtus maculis quatuor fulvis. * +
1999. *T. tarda* cinerea, segmentorum apicibus pedibusque pallidis. * +

2000. *T. dilatata* atra, abdomine depresso apicem versus dilatato ; pedibus pallidis. * +

2001. *T. Augusti*, nigra, antennis plumosis ; abdomine antice virente postice fusco ; alis immaculatis pedibusque albis. * +

2002. *T. socialis* nigra, alis albis costa marginali pedibusque pallidis. * +

2003. *T. ciliata* alba, hirsuta ; alis immaculatis ; pedibus punctatis. * +

2004. *T. virginea* alba, immaculata ; thorace flavo. * +

D. Stankel-Been, Öre-Stikker. N. Myg-Hanke ;
nom. gen. APH. 7, 564 ; 5, 488.

2005. *BIBIO Marci* niger, glaber ; alis nigricantibus ; femoribus anticis introrsum fulcatis. APH. 2, 451.
S. inf. t. 15. f. 1, 2.

2006. *B. crassipes* niger, glaber ; alis margine nigricantibus ; femoribus anticis crassis, tibiis spina terminatis.
Tip. brevicornis LINN.

2007. *B. febrilis* ater, oblongus, hirtus ; alis albis margine exteriore nigris. S. inf. t. 104. f. 8, 9.

2008. *B. hortulanus* alis albis margine exteriore nigro ; thorace abdomineque rubro. S. inf. t. 104. f. 9, 10.

2009. *B. phalaenoides* alis deflexis cinereis ovato-lanceolatis ciliatis, immaculatis. N. Smik. A. nidr. 3, 50.

* Nudæ.

2010. *MUSCA Ribesii* nigra nudiuscula ; thorace immaculato ; abdomine cingulis quatuor flavis : primo interrupto. S. inf. t. 36. f. 11, 12.

2011. *M. Pyrastræ* nigra nudiuscula ; thorace immaculato ; abdomine bis tribus lunulis flavis recurvatis. I.
Randa-Fluga. S. inf. t. 36. f. 9, 10.

2012. *M. Mentbaftri* nigra nuda ; thorace maculato ; abdomine cingulis quatuor scutelloque flavis.
2013. *M. Scripta* nudiuscula, thorace lineis , scutello abdomineque lineari fasciis flavis. S. inf. t. 113. f. 1.
2014. *M. mellina* nuda thorace subæneo, fufcescente immaculato ; abdomine maculis octo lutescentibus. A. nidr. 4, 74. S. inf. t. 177. f. 2, 3.
Variat abdomine ovato, lateribus flavo.
2015. *M. pipiens* nigra, glabra ; abdomine utrinque albo maculato, femoribus posticis clavatis, dentatis. A. nidr. 4, 75.
2016. *M. segnis* glabra, thorace subæneo ; abdomine ferrugineo , apice nigro ; femoribus posticis clavatis. A. nidr. 4, 76.
2017. *M. femorata* glabra, atra, oblonga ; femoribus posticis clavatis, pedibusque anticis rubris.
2018. *M. polita* glabra ænea, capite viridi ; thorace abdomineque cæruleis ; halteribus nudis.
2019. *M. bicincta* nigra, antennis elongatis ; thorace punctis lateralibus ; abdomineque cingulis duobus flavis.
2020. *M. arcuata* nudiuscula, nigra , thorace lateralibus maculis, abdomineque cingulis quatuor flavis.
2021. *M. ichneumonea* thorace postice, pectore pedibusque ferrugineis ; abdomine elongato cylindrico. GEOFR. inf. 2. M. 82. A. nidr. 3, 53.
2022. *M?* *conopsoidea* antennis clavatis mucronatis basi coadunatis ; corpore atro, abdominis cingulis tribus flavis.
2023. *M. cupraria* glauca ænea , thorace viridi ; abdomine cupreo oblongo ; halteribus nudis.
In nostra halteres ciliati sunt.

2024. *M. polita* glabra ænea, capite viridi; thorace abdomi-
neque cæruleis; halteribus nudis.
2025. *M. parietina* cinerea, alis fuscis albo-punctatis macula-
tisq; fronte testacea. S. inf. t. 89. f. 8.
2026. *M. saltuum* flava, alis albis costa punctoque terminali
fuscis; occipite nigricante.
2027. *M. grossificationis* alis nigris, apice albis.
2028. *M. cynipsea* nigra, alis apice puncto nigro; abdominis
primo articulo obovato. A. nidr. 4, 79.
2029. *M. viduata* glabra, æneo-nigra, squamis halterum ci-
liatis. A. nidr. 3, 55.
2030. *M. Arnica* testacea, alis unguiculatis griseis, nigro ma-
culatis.
2031. *M. urtica* alis albis puncto terminali fasciisque tribus
fuscis distinctis.
2032. *M. Cerasi* alis albis: fasciis fuscis inæqualibus, posticis
exterioribus connexis.
2033. *M. Heraclii*, alis albis fasciis fuscis repandis, oculis vi-
ridibus. A. nidr. 4, 80.
2034. *M. Cardui* alis albis: linea geminata fusca; S literæ fi-
gura; oculis viridibus.
2035. *M. fasciata* nigra, glabra; alarum costa dimidia lu-
tescente; abdomine fasciis septem flavis. Fn.
Fridr. 757. * +
2036. *M. elongata* nigra, alis apice puncto nigro; abdomine
æneo, basi flavo; pedibus longis, luteis. Fn.
Fridr. 763. * +
2037. *M. annexa* glabra, abdomine elongato nigro, fasciis
duabus pedibusque luteis; posticis nigro annu-
latis. * + Femora posticorum vel clavata, vel
tibiæ arcuata sunt; an mera varietas?

Dolichopus

2038. *M. ciliata* glabra viridis; alis macula nigra & alba; cauda utrinque lamina triangulari, ciliata. * +
2039. *M. pulchella* nuda, lutea; thorace lineis tribus nigris; abdomine fasciis duabus obscuris; halteribus albis. * +
2040. *M. laternaria* glabra atra; abdomine maculis duabus luteis, diaphanis, totidemque fasciis cyaneis. * +
2041. *M. bipunctata* nuda nigra, antennis capite longioribus; abdomine fasciis quatuor lunatis pedibusque luteis; alis fulvis. GEOFR. inf. 2. M. 28. *
2042. *M. cyanea* glabra; abdomine nitido, violaceo: octo maculis cyaneis; pedibus subluteis. Fn. Fridr. 761. * +

* * Tomentosa.

2043. *M. pendula* tomentosa, thorace lineis quatuor; abdomine fasciis tribus interruptis, flavis. APH. I, 284. S. inf. t. 156. f. 1.
2044. *M. florea* tomentosa, thorace fasciis duabus inæqualibus, nigris; abdomine quatuor luteis, subabruptis.
2045. *M. nemorum* tomentosa, abdomine cingulisque tribus albis; segmento primo lateribus luteo. Act. nidr. 3, 52.
2046. *M. arbutorum* tomentosa, thorace griseo; abdomine subfulco; segmento primo secundoque latere ferrugineis. S. inf. t. 17. f. 5.
2047. *M. tenax* tomentosa, thorace griseo; abdomine subfulco, unicolore; tibiis posticis compresso-gibbis.
2048. *M. intricaria* tomentosa lutescens, abdominis apice albedo; gcnubus albis.
2049. *M. oestracea* tomentosa nigra, scutello albido; abdominis apice lutescente.

2050. *M. noctiluca* subtomentosa atra ; abdominis primo segmento, maculis duabus pellucidis.
2051. *M. punctata* tomentosa ; oculis viridibus , punctatis ; thorace quinque lineato, abdomineque nigro, obtuso. Fn. Fridr. 760. * †
2052. *M. transfuga* tomentosa nigra , abdomine cylindrico : lunulis bis tribus albidis, recurvis.
2053. *M. gibba* capite albo, luteo & viridi variegato ; corpore aureo. I. *Fagra-Fluga*. Isl. R. 1, 6885. * †
An St. Hottentotta, vel Vol. superbiens ?

*** Pilosæ.

2054. *M. fera* pilosa nigra , abdominis lateribus testaceis diaphanis.
2055. *M. rotundata* pilosa, thorace sublineato ; abdomine subrotundo, flavo : maculis longitudinalibus fuscis, confertis. A. nidr. 4, 78. t. 16. f. 21.
2056. *M. Larvarum* pilosa nigricans, scutelli apice subtestaceo; abdomine pallidius tessellato.
2057. *M. Radicum* pilosa, abdomine cinereo : linea dorsali, cingulisque quatuor nigris.
2058. *M. Cæmeteriorum* pilosa nigra, abdomine supra glabro.
2059. *M. flava* pilosa, flava; oculis viridissimis; alis hyalinis.
2060. *M. roralis* pilosa aterrima.
2061. *M. canicularis* pilosa nigricans , abdominis segmento secundo tertioque diaphano.
2062. *M. ferrata* pilosa fusca, alarum costa pilis brevissimis ferrata, abdomine pedibusque ferrugineis. A. nidr. 3, 54.
2063. *M. cellaris* pilosa nigra, alis nervosis ; oculis ferrugineis.

2064. *M. meteorica* pilosa nigra, abdomine subcinereo ; alis basi flavis ; oculis brunneis.
2065. *M. putris* subpilosa atra , alarum costa nigra ; oculis ferrugineis.
2066. *M. pubera* pilosa nigra, abdominis ultimo segmento incurvato : pube utrinque reflexa.
2067. *M. Petronella* pilosa glabra livida, fronte rubra ; cauda incurvata ; pedibus elongatis, testaceis.
2068. *M. unguolata* pilosa, glabra , æneo-viridis ; cauda uncinata ; pedibus elongatis lividis.
2069. *M. Scybalaria* pilosa, rufo-ferruginea, hirta ; alis puncto obscuriore. Gr. *Anariak*. S. inf. t. 54. f. 2.
2070. *M. umbrarum* pilosa, cinerea alis fuscis albo maculatis ; fronte nivea.
2071. *M. stercoraria* pilosa grisea, hirta ; alis puncto obscuro. D. *Sekret-Flue*. I. *Myke-Fluga*. Gr. *Anariak*. S. inf. t. 54. f. 4. APR. 7, 126.
2072. *M. vibrans* pilosa nigra , alis hyalinis , apice nigro ; capite rubro. S. inf. t. 58. f. 5.
2073. *M. germinationis* alis albis margine maculisque nigris.
2074. *M. placida* pilosa, thorace aureo ; abdomine flavo pellucido : linea dorsali nigra. Fn. Fridr. 758. * +
2075. *M. squamifera* pilosa viridis, abdomine acuminato, geniculato , squamis duabus terminalibus. Fn. Fridr. 759. * +
2076. *M. flavicans* pilosa, thorace subcinereo ; abdomine pedibusque flavis. Fn. Fr. 762. * +
2077. *M. aurata* pilosa nigra, fronte argentata ; alis basi auratis. Fn. Frid. 764. * +
2078. *M. astiva* pilosa , abdomine flavo : margine , apice , thorace pedibusque nigris. Fn. Fr. 766. * +
- 2079.

2079. *M. ambulans* pilosa cinerea, thorace, pedibus, punctisque segmentorum abdominis tribus nigris; alis e fusco fulgidis. * +
2080. *M. tuberculata* subpilosa rufa ferruginea; thorace antice utrinque tuberculo pallido; oculis fuscis. * +
Flue nom. plur. gen. & ord. APH. 2, 539.
2081. STRATIOMYS *chamæleon* fusca, thorace subhirsuto, ferrugineo, abdomine glabro, ovato, plano; lunulis sex luteis. S. inf. t. 59. f. 2, 3.
2082. *St. hydroleon* fusca, abdomine viridi: fascia longitudinali nigra. P. D. A. t. 30. S. inf. t. 14. f. 14.
2083. *St. microleon* nigra, abdomine strigis lateralibus albis. S. inf. t. 14. f. 11; t. 198. f. 4, 5.
2084. *St. plebeia* cinerea, hirta, abdominis incisuris margine albidis. Variet. GEOFR. inf. Strat. 2.
2085. *St. trilineata* viridis, thorace strigis tribus, abdomine fasciis quatuor nigris.
2086. *St. fenestralis* glabra, atra, abdomine supra rugoso, strigis albis, pedibus ferrugineis.
2087. *St. Morio* corpore hirta, atro; alis dimidiato nigris.
2088. *St. hottentotta* corpore hirta, lutescente, alis costa fuscis.
2089. *St? græca* viridis, thorace lineis tribus, abdominis dorso litera Θ nigris. P. D. A. t. 30. Pr. inf. S. 19. * †
 Antennæ clavatæ, singulares.

Stratiomys
trilineata F.

Muscæ species perillustres a LINNÆ.

* Tomen-

Genere MUSCÆ specierum copia laborante plura genera assumi, horum tamen una aut altera species, cum descriptiones olim factæ, characteribus novorum generum minus exacte adaptatæ fuerint, nec tempus nec temporis injuria novam cujuscunque collationem permiserit, vicino forte generi substituenda erit.

* Tomentosa.

2090. *VOLUCELLA bombylans* tomentosa nigra; abdomine hirsuto, postice rufo.

2091. *V. mystacea* tomentosa nigra; thorace abdominis apice alarumque basi fulvis. A. nidr. 3, 51.

Variat alis striga ferruginea.

2092. *V. lappona* subtomentosa nigra; abdomine fasciis tribus subinterruptis luteis; ano pedibusque fulvis. Gr. *Milleriak.* A. nidr. 4, 73. S. inf. t. 36. f. 7, 8.

2093. *V. superbiens* tomentosa, fronte thoraceque flavo, abdomine flavo-virente; alis fascia abrupta nigra. *+

*cheilosia
oestracea* Mey.

2094. *V. sonora* subtomentosa nigra ano fulvo; alis strigis duabus dentatis, fuscis. S. inf. t. 10. f. 6, 7. *

2095. *V. tricineta* tomentosa, nigra; abdomine cingulis tribus albis; alarum puncto marginali ferrugineo. S. inf. t. 197. f. 7, 8. *

** Pilosa.

2096. *V. pullata* pilosa, lutea; alis hyalinis maculis nigricantibus. Fn. Fridr. 765. * +

2097. *V. meridiana* pilosa, nigra; fronte aurata; alis basi luteis. A. nidr. 4, 77. S. inf. t. 17. f. 4; t. 108. f. 6, 7.

2098. *V. Caesar* pilosa viridi-nitens, pedibus nigris. Gr. *Nivniak.* S. inf. t. 54. f. 3.

2099. *V. cadaverina* pilosa æneo-nitens, thorace, caruleo; abdomine viridi.

2100. *V. mortuorum* pilosa, thorace nigro; abdomine viridi. Gr. *Nivniak.*

2101. *V. vomitoria* pilosa, thorace nigro; abdomine caruleo nitente. D. *Maddik-Flue*, *Spye-Flue*. I. *Madka-Fluga*. APH. 7, 545.

2102. *V. carnaria* pilosa nigra, thorace lineis pallidioribus ; abdomine nitidulo tessulato ; oculis rubris. S. inf. t. 40. f. 1, 2.

2103. *V. domestica* pilosa nigra, thorace lineis quinque obsoletis ; abdomine nitidulo, tessellato ; oculis fuscis. *Stue-Flue*. I. *My-Fiuga*. P. D. A. t. 30.

2104. *V. albifrons* pilosa nigra, fronte alba.

2105. *V. sepulchralis* pilosa nigra, abdomine atro, nitidulo, supra glaberrimo.

2106. *V. fimetaria* pilosa livens, glabrata, alis puncto obscuriore.

2107. *V. taciturna* pilosa, abdomine nigro cingulis duobus cinereis ; alis trinerviis fuscescentibus. * +

Musca Species Equitis a LINNE.

2108. NEMOTELUS *tringarius* thorace cinereo ; abdomine flavo trifariam nigro punctato ; pedibus costaque alarum marginali flava.

2109. *N. aureus* pilis fulvis tomentosus, abdomine nigro fasciis lanuginosis aureis. * +

2110. *N. sylvestris* lutescens subhirtus, alis fascia abrupta nigra. * +

2111. TABANUS *bovinus* oculis virescentibus ; abdominis dorso maculis albis trigonis longitudinalibus. S. inf. t. 131. f. 6.

2112. *T. Tarandinus* oculis viridibus abdominis segmentis margine luteis ; pedibus rufis. APH. I, 448.

2113. *T. rusticus* oculis flavo-virentibus ; corpore cinereo, pubescente. Variat dorso abdominis lineis 2 longit. nigris.

2114. *T. bromius* oculis fascia purpurascente; corpore cinerascete laviore. Vix a præced. dist.
2115. *T. tropicus* oculis fasciis ternis fuscis; abdominis lateribus ferrugineis. S. inf. t. 8. f. 4, 5.
2116. *T. pluvialis* oculis fasciis quaternis undatis; alis fusco punctatis.
2117. *T. cæcutiens* oculis nigro - punctatis; alis maculatis. *Blindling*. S. inf. t. 8. f. 1.
2118. *T. arcticus* oculis fasciis binis purpureis; thorace punctato; alis nigro reticulatis; costa nigerrima. Fn. Fridr. 771. * +
2119. *T. caculus* oculis punctis quatuor lineolaque purpureis; alarum margine exteriori maculisque duabus nigris. * +
D. Bræms. N. Klæg nom. gen.
2120. CONOPS *calcitrans* antennis subplumatis cinerea, glabra, ovata.
2121. *C. irritans* antennis setariis cinerea subpilosa, ovata.
2122. *C. ferruginea* antennis setariis ferruginea; abdomine cylindrico; fronte lutescente.
2123. *C. macrocephala* antennis clavatis mucronatis luteis, abdomine subcylindrico, glabro: segmentis quatuor margine flavescentibus. P. D. A. t. 30.
2124. C? *hexagona* antennis filatis; oculis fascia cærulea; abdomine nigro sexangulari, subtus luteo. Fn. Fridr. 781. * +
2125. ASILUS *crabroniformis* abdomine tomentoso antice segmentis tribus nigris, postice flavo inflexo.
2126. *A. gilvus* abdomine pubescente nigro, supra rufo.

2127. *A. gibbosus* hirsutus niger, abdomine postice albo.
S. inf. t. 8. f. 11.
2128. *A. ater* hirsutus totus niger, barba albida. S. inf.
t. 183. f. 6.
2129. *A. marginatus* niger abdominis incisuris fulvis; halteribus sulphureis.
2130. *A. germanicus* hirtus subcinereus; femoribus nigris, tibiis rubris; alis fuscis basi albis. P. D. A. t. 30.
S. inf. t. 48. f. 10.
2131. *A. forcipatus* hirsutus, subcinereus; halteribus flavis; alis hyalinis. Marem tibiis ferrugineis, scæminam nigris reperi.
2132. *A. Erax* hirsutus subcinereus; halteribus albidis; alis fusco-ferrugineis. * Huc referenda *Synonyma* a perill. LINNÆO *forcipato* substituta.
2133. *A. Tipuloides* cinereus nudus, thoracis lineis dorsalibus tribus nigris.
2134. *A. Oelandicus* ater nudus, alis nigris; femoribus halteribusque ferrugineis. P. D. A. t. 30. S. inf. t. 8. f. 14. Alium possideo thorace utrinque alisque albidis, halteribus luteis; an variet?
2135. *A. femoratus* nudus niger, pedibus luteis: posticis nigris femoribusque clavatis. * †
2136. *A. binctus* hirsutus niger cingulis abdominis albis, tibiis fulvis. S. inf. t. 8. f. 12. *
2137. *A. maculatus* alis trimaculatis, abdomine flavo; ultimo segmento maculisque nigris. Fn. Fridr. 787. * †
2138. *A. medius* hirsutus subcinereus, alis fuscis; pedibus nigris. Fn. Fridr. 788. * †

2139. *A. ignavus* alis immaculatis, abdomine flavo; tribus posticis segmentis nigris. Fn. Fridr. 789. * +
His quodam modo convenire videntur *Tabani*
A. nigr. 4, 81, 82, 83. t. 16. f. 22; quinam tamen sint, minus liquet.
2140. *EMPIS livida* antennis filatis livida; thorace lineis tribus nigris. S. inf. t. 192. f. 1.
2141. *E. flava* antennis filatis flava; linea dorsali abdominis nigra. Fn. Fridr. 778. S. inf. t. 147. f. 7, 8.*
2142. *E. cinerea* antennis filatis cinerascens, pedibus nigris. * +
2143. *E. borealis* antennis filatis nigra, alis subrotundis fusco-ferrugineis. Gr. *Unnuariak*.
2144. *CULEX pipiens* cinereus, abdomine annulis fuscis octo. *Myg, Lys-Myg. L. Zbiuoik. Gr. Epernak.*
2145. *C. flavescens* luteus, tomentosus; alis ciliatis nervis subluteis. Fn. Fridr. 776. +
C. ciliaris LINN. System. an. 1767.
2146. *C. bifurcatus* fuscus, rostro bifurco.
2147. *C. equinus* ater, abdomine fusco; fronte alba.
2148. *C. fasciatus* alis immaculatis; abdomine annulis 14 albis nigrisque alternis. Fn. Fridr. 775. * +
2149. *C. reptans* niger alis hyalinis; pedibus nigris annulo albo. N. Knor. L. *Mockere. Gr. Epernak.*
2150. *C. pulicaris* alis hyalinis; maculis tribus obscuris.
Myg nom. gen. Tip. Bib. & Cul. Aph. 5, 481.
2151. *BOMBYLIUS major* alis dimidiato-nigris. S. inf. t. 146. f. 9.
2152. *B. medius* alis fusco-punctatis; corpore flavescente, postice albo. S. inf. t. 79. f. 5?

2153. HIPPOBOSCA *equina* alis obtusis; thorace albo variegato; pedibus tetradactylis. *Hefte-Fine*. S. inf. t. 11. f. 5, 6.

2154. H. *avicularia* alis obtusis; thorace unicolore.

2155. H. *Hirudinis* alis subulatis; pedibus hexadactylis. S. inf. t. 53. f. 1, 2?

2156. H. *ovina* alis nullis. D. *Faare-Leye*. I. *Fær-Luus*. Isl. R. 324 & 688, 5. C.

7. A P T E R A.

2157. LEPISMA *Saccharina* squamosa, cauda triplici. D. *Sölv-Möl*.

2158. L. *terrestris* nuda cauda triplici.

2159. L. *polypada* scutata, cauda triplici.

2160. L. *minuta* flava, cauda bifida. * †

Variat absque setis caudalibus.

Tve-Skæg nom. gen. APH. 8, 267.

2161. PODURA *viridis*, subcylindrica flavo-viridis; oculis nigris. A. nidr. 3, 56.

2162. P. *atra* globosa fusca nitida, antennis longis: articulis plurimis.

2163. P. *plumbea* teres fusco-cærulea, nitida. Gr. *Irpsubkoma*.

2164. P. *nivalis* oblonga cinerea signaturis nigris. D. *Snee-Loppe*. APH. 7, 554.

2165. P. *aquatica* nigra. Gr. *Imabkoma*. LANGE nat. *Vande*, t. 1. f. 2 - 4.

2166. P. *arborea*, oblonga, nigra, pedibus furcaque albis.

2167. P. *finetaria* nivea; cauda obtusa mutica. A. nidr. 3, 57.

2168. P. *ambulaus*, alba, cauda bifida, extensa, obtusa. Gr. *Irpsubkoma*.

184 INSECT: APTERA. TERM: PEDIC:

2169. *P. moritans* elongata, rubra; cauda extensa; pedibus
antennisque hyalinis. * +
2170. *P. sylvatica* cylindrica, fusco-cinerea; cauda acuminata,
mutica. * +
2171. *P. nemoralis* oblonga, cinerea pedibus totis, annis-
que apice albis: cauda sulphurea. * +
2172. *P. aquatilis* cylindrica, flavicans, oculis, dorso, lateri-
busque abdominis nigris. * +
2173. *P. crystallina* candida, pellucida, tota. * +
2174. *P. longicornis* cylindrica, flavicans; annis corpore lon-
gioribus, pedibusque cinereis. * +
2175. *P. palustris* lutescens oculis lineaque dorfi media nigris;
furca alba. * +
2176. *P. tota* argenteo-aurata, lanugine supra cærulea, annis
recurvis. Isl. R. 1, 607. * +
2177. *P. obscure* cærulea, annis crassis, corpore cylin-
draceo versus posteriora crassiore. Isl. R. 1,
607. * +
*Vand-Loppe, Spring-Luus. I. Blaamor, Vers-
blaame, nom. gen.*
2178. TERMES *pulsatorium* abdomine oblongo, pallido, ma-
culato; ore rubro; oculis flavis. *Vegge-Smed,
Træ-Orm, Bog-Mid. APH. 8, 323.*
2179. *T. divinatorium* abdomine transversim sulcato; ore fusco;
oculis nigris. Minor *pulsatoria*. * +
2180. PEDICULUS *humanus*. Luus. Gr. Komak. APH. 5, 175.
2181. *P. pubis*. Flad-Luus, Tir-Höns. I. Naa-Luus.
2182. *P. canis familiaris*. Gr. Kemibkoma.
2183. *P. Suis*.
2184. *P. Cervi*.

2185. *P. Ovis*.
2186. *P. Bovis* abdomine lineis transversis octo ferrugineis.
2187. *P. Viruli* abdomine plumbeo.
2188. *P. Equi*. D. *Heste-Luus*.
2189. *P. Strigis*. P. D. A. t. 30. Gr. *Opibkoma*. * †
2190. *P. Corvi*. Gr. *Tullukabkoma*.
2191. *P. Anseris*.
2192. *P. Lari*. Gr. *Najabkoma*. * †
2193. *P. Bassani*. Gr. *Okaitsubkoma*. * †
2194. *P. Sternae*.
2195. *P. Ciconiae*.
2196. *P. Meleagridis*.
2197. *P. Caponis* abdominis margine nigro.
2198. *P. Gallinae* thorace capiteque utrinque mucronato.
2199. *P. Tetraonis*.
2200. *P. Lagopi*. Gr. *Akeiksubkoma*.
2201. *P. Tringae striatae*. Gr. *Sarguarsubkoma*. * †
2202. *P. Hiaticulae*. Gr. *Tukaguaiubkoma*.
2203. *P. ramalium* oblongus fuscus, femoribus anticis cra-
fis. * †
2204. *P. [Opilionis]* coccineus abdomine ovato; serie duplici
punctorum impressorum. * †
2205. *P. Alce arcticae* e cinereo caerulefcens. I. *Lunda-Luus*.
Isl. R. 1, 606. d. * †
2206. *P. Colymbi Grylle* capite fusco, abdomine glauco. I.
Kofu-Luus. Isl. R. 1, 606. e. * †

2207. *P. calcareus*, crustaceus albus, antennis pedibusque rufis. I. *Jard-Luus*. Isl. R. 688. g. t. 44. f. a - e. *

Hunc quoque reperi in sylva Fridrichsdalensi.

2208. *PULEX irritans* proboscide corpore brevior. *Loppe*. Gr. *Ukalibkoma*. APH. 5, 128.

2209. *ACARUS Reduvius* obovatus planus; macula baseos obovata. N. *Veite*, *Soufflaat*.

2210. *A. Ricinus* globofo-ovatus; macula baseos rotunda; antennis clavatis.

2211. *A. crassipes* pedibus secundariis crassissimis.

2212. *A. passerinus* femoribus tertiis crassissimis.

2213. *A. motatorius* pedibus primis longissimis, motatoriis. A. nidr. 4, 84.

2214. *A. Siro* lateribus sublobatis, pedibus quatuor posticis longissimis; femoribus capiteque ferrugineis; abdomine fetoso. *Klaa-Nak*, *Krid-Orm*, *Ring-Orm*, *Meel-Mid*, *Fnat-Orm*, *Ost-Mid*. Gr. *Okok*, *Killibinnua*. A. nidr. 3, 58. APH. 7, 196; 5, 369.

2215. *A. aquaticus* abdomine sanguineo depresso, tomentoso, postice obtuso. Gr. *Imabkoma*.

2216. *A. holosericeus* ruber abdomine cordiformi, tomentoso; pedibus primis longioribus. *Buste-Luus*, *Röd-Luus*. APH. 1, 486. A. nidr. 4, 8?

2217. *A. Muscorum* abdomine rufo; pedibus posticis longissimis filiformibus. Gr. *Merkubkoma*.

2218. *A. Coleopratorum* rufus, ano albicante. A. nidr. 3, 58. APH. 5, 370.

2219. *A. gymnopteronum* abdomine rubro; lateribus punctis binis coccineis. Gr. *Egytsabkoma*.

2220. *A. Fungorum* fusco-rufescens, abdomine subglobofo, glabro.
2221. *A. longicornis* abdomine oblongo, rubro; antennis apice bifetis. I. *Steina-Luus*.
2222. *A. littoralis* fusco-rufus, pedibus sanguineis. Gr. *Sir-subkoma*.
2223. *A. salicinus* ruber, linea dorsali duplici fusca, antice bifurca.
2224. *A. rupestris* fuscus linea dorsali bicolore.
2225. *A. Baccarum* abdomine distento, rubro: lateribus obscurioribus.
2226. *A. velutinus* ruber, abdomine depresso, tomentoso; palpis nullis. Conferatur acar. aquat. Fn. Fridr., 819. not.
2227. *A. spinipes* niger globosus; articulis pedum spinosis. * +
2228. *A. velox* ruber, abdomine oblongo; maculis nigris; pedibus luridis. * +
2229. *A. orbicularis*, brunneus. * +
2230. *A. cadaverum* albus ovatus; fetis raris, pedibus posticis brevissimis. I. *Fisk - Maur.* Isl. R. 1, 688; 6, 6. a. t. 44. f. * +
2231. *A. nemoralis* nigricans, maculis pedibusque coccineis. * +
2232. *A. quadrupes* subrotundus abdomine fusco, nitido pedibus quatuor anticis. * +
2233. *A. latens* ovatus, abdomine lutescente; pedibus albis: primoribus duplo longioribus. * +
2234. *A. lutescens*, abdomine plano; pedibus æqualibus, globulo terminatis. * +
2235. *A. fulcatus* ruber, abdomine ovato rugoso; pedibus mediis brevioribus. * +

2236. *A. Lichenum* fuscus, abdomine ovato; femoribus anticis clavatis. * †
2237. *A. forcipatus* lutescens, abdomine oblongo; antennis cheliferis albis. * †
2238. *A. aquarius* coccineus, abdomine globoso, nitido, festo. * †
2239. *A. Seminulum* subsphæricus, nitidissimus, fuscus. * †
2240. *A. cornifer* oblongus niger, linea dorſi pallida; pedibus roseis, posticorum femoribus clavatis. * †
2241. *A. Hydrachnoides* ruber, abdomine subgloboso, linea dorſali obscura. * †

Nullus dubitem, quin *Acar. exulcerans*, *lactis & dysenteriae* indigenae sint, huc adscribere tamen minus licet, cum nec ego nec ullus civium eos ad examen revocaverit; e Syſt. enim LINNEANO in Ham. Fn. N. verbotenus translati sunt.

æ. Oculis binis.

* Caudata:

2242. *HYDRACHNA globator* virescens globosa oculis rubris; cauda cylindrica, basi coarctata. * †
- Fœmina triplo major absque cauda; *Larve Efterr.* 1769. p. 20. *Kritisk Journ.* p. 20. an omnes caudatae mares sint, dies docebit.
2243. *H. tubulator* lutescens, globosa, disco maculato; cauda cylindrica, æquali. * †
2244. *H. buccinator* rubra, obovata, postice nigra; cauda cylindrica, basi coarctata, flava. * †
2245. *H. cuspidator* fusca, apice truncata, postice mucronata; cauda depressa bidentata. * †
2246. *H. pustulator* rubra pustulata; cauda depressa angulis obtusis. * †

2247.

2247. *H. albator* grisea, rotundata, disco albo; cauda depressa tridentata. * +
2248. *H. maculator* cinerea, rotundata, maculata, postice mucronata; cauda depressa, tridentata. * +
2249. *H. tricuspikator* rubra, dorso gibbere triplice; cauda depressa tridentata. * +
2250. *H. emarginator* rubra, dorso gibbo, cauda depressa emarginata. * +
2251. *H. sinuator* grisea, antice flavescens, postice tripunctato; cauda depressa, sinuata. * +
2252. *H. integrator* viridis, immaculata, cauda depressa integra. * +
2253. *H. papillator* purpurea, rotundata, papilla utrinque caudali; pedibus nigris. * +

✱✱ Furcatæ: dorso furca notatæ.

2254. *H. crassipes* alba, obovata, disco nigro, furca rufescente; ano papilloso, pedibus anticis crassis. * +
2255. *H. grossipes* alba, subquadrata, maculis tribus, fusca rufa; pedibus anticis crassis. * +
2256. *H. clavicornis* rufa, obovata, fusca flava; palpis clavatis; pedibus pallidis. * +
2257. *H. spinipes* flavo-virens, ovalis, octo-punctata, furca rufa; pedibus spinosis. * +
2258. *H. longicornis* alba, subquadrata, maculis quinque obscuris, furca rufa; palpis longis. * +
2259. *H. vernalis* virens, ovalis, disco saturato, furca rufa. * +
2260. *H. lunipes* alba, ovalis, maculata, furca candida; pedum posteriorum articulo quarto lunato. * +
2261. *H. trifurcalis* albida, ovalis, dorso fusco, furca triplicata argentea. * +

2262. *H. orbicularis* lutea, depressa, orbicularis, maculis disci nigris, furca rufa. * +

2263. *H. stellaris* cærulea, globosa, dorso cinereo, furca stellari. * +

2264. *H. ovalis* virens, ovata compressa supra planiuscula subtus carinata fusca lutea; palpis inferis. * +

*** Postice pilosa, nec priorum.

2265. *H. elliptica* cærulea rotundata, maculis punctisque fulvis.

2266. *H. orbiculata* violacea, depressa orbiculari, macula circuloque albis. * +

2267. *H. lugubris* subfusca, globosa strigis nigris; pedibus viridibus. * +

2268. *H. truncatella* grisea, oblonga, postice truncato, punctis lineolisque obscuris. * +

**** Glabra, nec priorum.

2269. *H. despiciens* rubra, rotundata, maculis pluribus: oculis inferis. * +

2270. *H. geographica* nigra, sphaerica, maculis quatuor punctisque coccineis. * +

2271. *H. impressa* miniata, globosa immaculata pedibus nigris.

2272. *H. extendens* rubra, rotundata; pedibus posticis strictis.

2273. *H. cruenta* rubra distenta pedibus æqualibus. * +

2274. *H. lunaris* rufa, ovalis, dorso macula lunata nigra. * +

2275. *H. liliacea* albida, obovata, disco lilio candido, macula utrinque nigra. * +

2276. *H. ovata* fusco-cinerea, obovata macula triangulari fulva; pedibus pallide nigris. * +

2277. *H. obscura* grisea, rotundata, maculis obscuris disco albo. A. nidr. 4, 86. *Acarus fluviatilis*. *

2278. *H. Torris* lutescens, ovalis, maculis lateralibus nigris :
media ignita ; tibiis posticis lamellatis. * +
2279. *H. strigata* luteo-virens oblonga antice depressa, strigis
duabus nigricantibus, apice coalitis. * +
2280. *H. nodata* rubra, antice truncata, utrinque maculata ;
pedibus posticis nodosis. * +
2281. *H. obsoleta* rufo-fusca, rotundata ; striga pone oculos
duplici obsoleta. * +
2282. *H. complanata* viridis, depressa antice emarginata, fascia
media alba. * +
2283. *H. Musculus* viridis, ovalis compressa, supra fulcata
subtus carinata ; palpis inferis. * +
2284. *H. latipes* lutescens, ovata, utrinque maculata ; articulo
pedum posticorum quarto dilatato. * +
2285. *H. versicolor* subquadrata, maculis albidis, cæruleis,
fuscisque. * +

β. Oculis quatuor.

2286. *H. calcarea* fusca, rotundata, medio candidissimo. * +
2287. *H. fuscata* rufo-fusca, ovata, disco obscuro, furca
rufescente. * +
2288. *H. strigata* lutea, ovalis, strigis flexuosis nigris. * +
2289. *H. maculata* rubra, ovalis, maculis dorfi nigris. * +

Variat diverso macularum numero, palpis bre-
vibus & longis.

γ. Oculis sex.

2290. *H. umbrata* rubra, rotundata, maculis pluribus. * +
2291. PHALANGIUM *grossipes* corpore minuto, cylindrico,
humeris tuberculato ; pedibus longissimis. Gr.
Nizok. STR. S. 208. t. I. f. 16.

2292.

2292. Ph. *Opilio* abdomine ovato fusco, subtus albo. Meyer.
2293. Ph. *Cancroides* abdomine obovato, depresso; chelis labibus; digitis pilosis.
2294. Ph. *Balenarum* abdomine dilatato, muricato; rostro subulato. Gr. *Arberubkoma*. STR. S. 209. t. f. 17.
2295. Ph. *pycnogonum*. Gr. *Niutok*. BR. inf. tab. I. f. 17. * †
2296. Ph. *mucronatum*, abdomine ovato, antice tricorni. An pullus *Opilionis*? * †
2297. Ph. *lugubre*, abdomine obovato nigro macula utrinque alba. * †
2298. Ph. supra nigricans, abdomine notato lineis sex transversis granulatis; pedibus omnibus longissimis. Isl. R. 1, 608. * †
2299. Ph. pallidum abdomine linea nigra utrinque dentata, lateribus rubris. Isl. R. 1, 608. * †
2300. ARANEA *Diadema* abdomine subglobofo rubro-fusco, cruce albo-punctata.
2301. A. *reticulata* abdomine globofo reticulato, supra purpurascens fusco-nebuloso.
2302. A. *cucurbitina* abdomine subglobofo flavo; punctis quibusdam nigris.
2303. A. *calycina* abdomine globofo, pallido-flavescente.
2304. A. *bipunctata* abdomine globofo atro; punctis duobus excavatis. I. *Dordingur-Fiskekarl*. Isl. R. 1, 609. e. A. nidr. 3, 60.
2305. A. *domestica* abdomine ovato, fusco; maculis nigris quinque subcontiguas: anterioribus majoribus.
2306. A. *trilineata* abdomine ovato, albido; lineis tribus longitudinalibus punctorum nigrificantium.

Thomisus oblongus
Ltr. Encycl. X. 627.
Long 4'''

2307. *A. riparia* abdomine ovato, nigro-æneo, ano subluteo, bicorni.
2308. *A. redimita* abdomine oblongo-ovato flavo: annulo ovali dorsali rubro. S. inf. t. 64. f. 8.
2309. *A. corollata* abdomine ovato, nigro; annulo dorsali ovali albedo.
2310. *A. fumigata* abdomine ovato, fusco: basi punctis duobus albis.
2311. *A. rufipes* abdomine fusco; pedibus rufis. A. nidr. 3, 61.
2312. *A. nocturna* abdomine nigro: punctis duobus albis, basique lunula alba. A. nidr. 3, 62.
2313. *A. extensa* abdomine longo argenteo-virescente; pedibus longitudinaliter extensis. A. nidr. 3, 63?
2314. *A. fimbriata* abdomine oblongo, nigro: linea utrinque laterali alba; pedibus fuscis.
2315. *A. sexpunctata* abdomine oblongo: punctorum excavatorum paribus tribus.
2316. *A. holosericea* abdomine ovato-oblongo holosericea: basi subtus punctis duobus flavis.
2317. *A. fenoculata* oculis tantum fenis.
2318. *A. scenica* saliens nigra, lineis semicircularibus tribus albis, transversis. Gr. *Niksoarsuk*. S. inf. t. 44. f. 11.
2319. *A. truncorum* saliens nigra, dorso punctis albis. Gr. *Niksoarsuk*.
2320. *A. aquatica* livida, abdomine ovato: linea transversa punctisque duobus excavatis.
2321. *A. saccata* abdomine ovato ferrugineo-fusco. I. *Huoda Kongullo*. Gr. *Ausiek*.
2322. *A. palustris* abdomine oblongo nebuloso: lineis lateralibus albis.

2323. *A. viatica* abdomine subrotundo, plano, obtuso; pedibus quatuor posticis brevissimis.
2324. *A. chelata* abdomine thoraceque nigro: linea dorsali alba; brachiis cheliformibus nigris. Fn. Fridr. 845. * +
2325. *A. brachiata*, abdomine oblongo, obscuro; thorace luteo; brachiis capitatis; pedibus anticis longis. Fn. Fridr. 846. * +
2326. *A. viridata* abdomine ovato, fusco; punctis albis duplici serie; thorace margine rubro; pedibus crassius virentibus. * +
2327. *A. viduata* nigra abdomine quadrangulari, supra signaturis, subtus maculis quatuor, albis. * +
2328. *A. pinnata* abdomine ovato, fusco: striga dentata duplici, alba & lutea, laterali. A. nidr. 4, 88. * +
2329. *A. fenestralis* macula abdominis nigra trigona: cingulo luteo. A. nidr. 4, 87. t. 16. f. 23. * +
2330. *A. maculata* atra, lineis duabus lateralibus, punctisque abdominis utrinque quatuor albis. A. nidr. 4, 89. * +
2331. *A. virginea* alba abdomine rhombeo; striga laterali punctisque raris coccineis. * +
2332. *A. cana*, pilosa, abdomine ovato: macula disci nigra. * +
2333. *A. amphibia* abdomine ovato, pectoreque argenteo, extra aquam cinereo. * +
- In aqua quasi mercurio vivo circumdata apparet; dorso abdominis puncta quatuor ægre visibilia.
2334. *A.* abdomine ovato sericeo albo & nigro elegantissime picto. I. *Fialla-Kongullo*. Isl. R. 1, 608. * +
2335. *A?* palustris minima nigra. Isl. R. 1, 609. f.

D. Edderkop. N. *Spindel*, *Kongle* nom. gen.

2336. *CANCER minutus* brachyurus, thorace laevi integerrimo subquadrato : margine acutiusculo, antennis brevissimis.
2337. *C. Menas* brachyurus thorace laeviusculo utrinque quinque dentato, carpis unidentatis, pedibus ciliatis : posticis subulatis. D. Krabbe. N. Garnar. *Carcinus*
2338. *C. Depurator* brachyurus, thorace laevi utrinque subquinquedentato, manibus apice compressis, pedibus posticis ovatis.
2339. *C. Pagurus* brachyurus, thorace utrinque obtuse novemplicato, manibus apice atris. D. Taske-Krebs. N. Taske-Krabbe. I. Marg-Færla. Gr. Arksegiaarsuk. *Cancer*
2340. *C. Araneus* brachyurus thorace hirsuto ovato, tuberculato, rostro bifido manibus ovatis. N. Fausé, Trolld-Krabbe. I. Marg-Færla.
2341. *C. birtellus* brachyurus thorace hirsuto utrinque quinquedentato, manibus extus muricatis. *Alumnus*
2342. *C. Maja* brachyurus thorace aculeato, manibus ventricosus spinosis : digitis penicillato - hirsutis. N. Trolld-Krabbe. Gr. Arksegiak. P. N. N. 2. c. 7. p. 276. f. *Lithodes*
2343. *C. Bernhardus* macrourus parasiticus, chelis cordatis muricatis; dextra majore. Bug-Hummer. I. Kofnuga-Krabbe, Konga-Krabbe. P. N. N. 2. c. 7. p. 271. f. APH. 2. 229. Isl. R. 859. t. 11. f. 1, 2. *Pagurus*
In It. Isl. minus bene Diogenes dicitur.
2344. *C. Gammarus* macrourus, thorace laevi, rostro lateribus dentato : basi supra dente duplici. Hummer. *Astacus*
APH. 3, 549.
2345. *C. Astacus* macrourus thorace laevi, rostro lateribus dentato : basi utrinque dente unico. Krebs. APH. 4, 489. *Astacus fluvialis*
F.

Palaemon
2346. *C. Squilla* macrourus, thorace laevi, rostro supra fer-
rato, subtus tridentato, manuum digitis æquali-
bus. Røge. I. Marthvare. Gr. Pekkitak. APH.
6, 505. Isl. R. t. 10. f. 8.

Galathea
2347. *C. strigosus* macrourus, thorace antrorsum rugoso spinis
ciliato, rostro acuto septem-dentato. Finmark.
Krana-Krabbe.

Cepharops
2348. *C. Norvegicus* macrourus thorace antrorsum aculeato,
manibus prismaticis: angulis spinosis. N. Siö-
Røke, Hummer-Konge, Bogstav-Hummer. Gr.
Naubarnak. P.N.N.2. c.7. p.286. f. APH.1,415.

Scyllarus
2349. *C. Arctos* macrourus, thorace antrorsum aculeato, fronte
diphylla, manibus subadactylis. Gr. Umiktak.

2350. *C. Mantis* macrourus articularis manibus adaetylis
compressis falcatis ferrato-dentatis.

Branchiopoda
2351. *C. stagnalis* macrourus articularis, manibus adaetylis,
pedibus patentibus, cauda cylindrica, bifida. Gr.
Teitsm Illærkei.

2352. *C. flexuosus* macrourus pedibus pectoris duplici serie,
abdominis membranis, quinque utrinque, bran-
chialibus. * †

2353. *C. gacialis* semicylindricus, corporis segmentis octo sub-
æqualibus. † LINN. Mant. 542.

2354. *C. macrourus* teretiufculus, corporis segmentis octo,
pedibus duobus chelatis. † LINN. Mant. 542.
bini hi Squillis potius annumerandi, ultimus *S.*
lobatae affinis videtur.

2355. *C. Medusarum* antennis brevissimis, corpore latiore.
Gr. Urksursak. STR. S. 1. p. 188. t. 1. f. 12, 13.

2356. *C. macrourus* thorace antrorsum aculeato, pedum pa-
ribus 10; cauda foliacea. I. Kampa-Lampa. Isl.
R. 899. * †

2357. *C. macrourus* articularis, manibus adactylis, femoribus posticis orbicularibus, spinis caudæ bifidis. Aët. *Oniscus stroemianus* Gmel., O. Fabr.
Havn. 9. p. 588. t. 8.
2358. *C. macrourus* articularis, dorso carinato serrato, spinis caudæ bifidis. A. Havn. 10. p. 5. t. 2. f. 1-8. *Oniscus arenarius* O. Fabr., Gmel.
Cancer STR. S. 1. p. 180, 4. Gr. *Arksegiansoak* *Asiacus Homari* F.
quinam?
Krabbe nom. gen. APH. 4, 451.
2359. *SQUILLA lobata* pallida pellucida, lobis intermediis quatuor, pedibus decem unguiculatis. Gr. *Napparsariak* vel *Illarak*. Canc. *linearis* vel *filiformis* perillustis a LINNÆ.
2360. *S. ventricosa* rubra depressa, pedibus quatuordecim setaceis secundo pari clavato. A. Helv. 4. t. 4. f. 8, 9, 10. * *Leptomenes* Latr.
2361. *ONISCUS Oestrum* abdomine foliis sex obtecto, cauda retusa. N. *Fiske-Biörn*, *Krekku*, *Ofska-Biörn*. W. M. p. 241. f. STR. S. t. 1. f. 2, 3. p. 165, 2. P. N. N. 2. c. 2. p. 81. f. *Berl. Besch.* 1. 306. f. 7. O. P.
2362. *O. volutator* antennis crassis abdominis longitudine.
O. bicaud. LINN. antennas vero pro cauda sumsit.
2364. *O. Tinea* ovatus viridis maculis nigris, cauda rotundata. * †
2365. *O. aquaticus* lanceolatus cauda rotundata, stylis bifurcis.
2366. *O. Pulex* compressus; pedibus quatuor anticis chelifor- *oniscus pulex* Pall. (non Lin.)
mibus. N. *Marflue*. I. *Marflo*. Gr. *Kinguk*. STR. S. 188. APH. 2, 399; 5, 235. Cancer LINN.
In littore maris & in ripis amnium & lacuum frequens.

2367. *O. oceanicus ovalis*, cauda bifida, stylis bifidis. Gr. *Sirkfabkoma*. STR. S. 202. t. 1. f. 14, 15.
2368. *O. Scopulorum luteus*, strigis fuscis. STR. S. 166, 3.
2369. *O. Afellus ovalis*, cauda obtusa, stylis simplicibus. D. *Benke-Bider*. N. *Skrukke-Trold*. I. *Lodpurka*. Gr. *Kerkfabkoma*. APH. 7, 318. S. inf. t. 14. f. 5, 6.
2370. *O. Armadillo niger* marginibus segmentorum albis, glaber, nitidus. S. inf. t. 14. f. 3, 4.
2371. *O. chelipes semicylindricus*; cauda bifolia obtusa.
2372. *O. tridentatus planiusculus*; cauda bifolia tridentata. *
2373. *O. marinus semicylindricus*, cauda ovato-oblonga, integra. LINN.
2374. *O. Pfora abdomine subtus nudo*, cauda semiovali acuta. *Berl. Besch.* 1. p. 292. t. 7. f. A, B. Gr. *Terkeingak*, *Saraulibkoma*. Act. Havn. 9. p. 594. t. 10?
- Oniscus fuscus Gmel.* 2376. *O. fuscus*, crusta carinata, macula in thorace alba. Isl. R. 1, 610.
2377. NAUPLIUS *bracteatus* testa orbiculari mutica. * +
2378. N. *saltatorius* testa ovata, postice bifeta. *
2379. AMYMONE *Satyra* antennis obtusis verticaliter extensis. *
2380. A. *Silena* antennis lateraliter extensis. * +
2381. A. *Fauna* antennis oblique extensis. * +
2382. CYPRIS *pubera* testa ovali tomentosa. Monoculus *conchaceus* LINN.
2383. C. *lavis* testa globosa-ovata, glabra. *
Animalc. M. conch. simile, Syst. LIN. 1059.

2384. *C. Vidua* testa globosa, fasciis tribus nigris. * +
 2385. *C. candida* testa subovata candidissima. * +
 2386. *C. detecta* testa reniformi pellucida. * +
 2387. *C. strigata* testa reniformi fusca, fasciis tribus albis. * +
 2388. *C. pilosa* testa ovata, fusca, ciliata. * +
 2389. *C. fasciata* testa elongata, fascia viridi. * +
 2390. *C. monacha* testa antice truncata, strigis nigris. * +
 2391. *C. ornata* testa ovata, antice sinuata, strigis viridibus. * +
 2392. LYNCEUS *sibericus* cauda inflexa, testa globosa. * +
 2393. *L. quadrangularis* cauda inflexa, testa subquadrangul-
 lari. * +
 2394. *L. longirostris* cauda inflexa, testa antice aculeata. * +
 2395. *L. trigonellus* cauda inflexa, ferrulata, testa antice gibba,
 mutica. * +
 2396. *L. lamellatus* cauda inflexa, laminata, testa ventricosa. * +
 2397. *L. macrourus* cauda erecta, testa elongata. * +
 2398. *L. brachyurus* cauda deflexa; testa globosa. * +

* Antennis dichotomis.

2399. DAPHNE *Vetula* cauda inflexa; testa mutica. SCHÄF.
ungeschwänzter Wasserf. t. 1. f. 9.
 2400. *D. Pulex* cauda inflexa; testa postice mucronata. Gr.
Taitfibkoma. Monoc. pulex auctorum, Aph.
8, 362.
 2401. *D. longispina* cauda inflexa; testa antice ferrulata, posti-
 ce aculeata. * +
 2402. *D. recti-rostris* cauda inflexa; testa antice ciliata; cor-
 niculis porrectis longis. * +

2403. *D. curvirostris* cauda inflexa; testa antice pilosa; corniculis pendulis. * +

2404. *D. mucronata* cauda inflexa; testa antice aculeata. * +

2405. *D. crystallina* cauda deflexa; testa mutica; corniculis porrectis brevibus. * +

*** Antennis trichotomis.

2406. *D. Setifera* cauda recta; testæ angulis anticis fasciculo setarum. * +

Vaud-Loppe, Een-Ôie nom. generis.

Apus cancriformis 2407. BINOCULUS *palustris* oculis superis, testa postice truncata, cauda bifeta. Monoculus *apus* LINN.
Bosc.

Calculus. 2408. *B. piscinus* oculis marginalibus, testa postice lunata, cauda subreflexa. N. *Fiske-Luus*. Gr. *Netarnabkoma*. STR. S. p. 167, 1, 2. t. 1. f. 4 - 6. Aët. Havn. 10. p. 23. t. 7. f. 1 - 7. Quam auctores posticam dixere, antica pars est.

*** Antennis binis.

2409. CYCLOPS *minutus* antennis linearibus, cauda bifeta. *

2410. *C. lacinulatus* antennis linearibus, cauda curva, bifurca. * +

2411. *C. ceruleus* antennis linearibus, cauda recta, bifurca. * +

2412. *C. claviger* antennis subclavatis rigidis; cauda bifida. * +

2413. *C. chelifer* antennis apice bifetis, pedibus secundi paris chelatis. * +

2414. *C. brevicornis* antennis (mari) unguiculatis, fetis caudæ binis longissimis. Aët. Havn. 9. p. 590. t. 9. * + præcedenti valde affinis.

2415. *C. Finmarchicus* antennis linearibus, cauda brevi bifida.
Act. Havn. 10. p. 175. t. e. f. 20-23. * †

* * Antennis quaternis.

2416. *C. quadricornis* antennis linearibus, cauda recta bifida.
Monoc. quadricornis LINN. *Langes nat. Vande*
t. 1. f. 2, 3, 4, 7.

2417. POLYPHEMUS *Oculus* remis duobus elongatis, dichotomis; cauda inflexa. * †

2418. SCOLOPENDRA *electrica* lutea, vel rufa filiformis,
antennis 14 articulis. *Wurm.* p. 151, 49.

2419. *Sc. forficata* rufo-fusca, lamellis dorsalibus alternis minoribus. *APH.* 7, 283, 4. *S. inf. t.* 46. f. 12.

2420. *Sc. Lagura ovalis*, cauda penicillata. *APH.* 7, 284.
Skol.-Orm, nom. generis.

2421. JULUS *terrestris* niger totus. *Wurm.* p. 179.

2422. *J. sabulosus* fuscus lineis binis dorsalibus ferrugineis.
APH. 7, 283, 1. *S. inf. t.* 88. f. 8.

2423. *J. complanatus* corpore planiusculo, antennis clavatis.
A. nidr. 4, 90. *Wurm.* p. 185, 9.

2424. *J. tuberculatus* fuscus punctis luteis. * †

2425. *J. candidus* albus punctis lateralibus fuscis. *Wurm.*
p. 131, 45. * †

Numerus pedum & segmentorum varians.

Tusind-Been nom. gen.

VI. VERMES.

I. INFUSORIA.

2426. *MONAS Termo*, gelatinosa. *Grändse - Monaden.*
Verm. I. * +
2427. *M. Lens*, hyalina. *Gned-Monaden.* V. 2. *
2428. *M. Mica*, circulo notata. *Glimmer-Monaden.* V. 3. * +
2429. *VOLVOX Globulus*, globosus postice subobscurus. *Kugle-Valteren.* V. 4. * +
2430. *V. Pilula* sphaericus, interaneis immobilibus virescentibus. *Pille-Valteren.* V. 5. * +
2431. *V. Conflictor*, sphaericus, subopacus, interaneis mobilibus. *Strid-Valteren.* V. 6. * +
2432. *V. Lunula* hemisphaericus moleculis similibus lunatis. *Mane-Valteren.* V. 7. * +
2433. *V. Sphaerula* sphaericus moleculis similibus rotundis. *Soel-Gran-Valteren.* V. 8. * +
2434. *V. Globator* sphaericus membranaceus. *Klode - Valse-
ren.* V. 9.

* Opacæ.

2435. *ENCHELIS viridis* subcylindrica, antice oblique truncata. *Grön-Trumleren.* V. 10. * +
2436. *E. Farcimen* cylindracea, curvata utrinque truncata. *Pölsé-Trumleren.* V. 11. * +

2437. *E. nebulosa*, ovato-cylindracea, interaneis manifestis.
Taage-Trumleren. V. 12. * +

*** Pelluentes.

2438. *E. Seminulum*, cylindracea, æqualis. Frøe-Trumleren.
V. 13. * +
2439. *E. Epistomium*, cylindrico-elongata, apice gracili sub-
globofo. Tap-Trumleren. V. 14. * +
2440. *E. Fusus*, cylindracea utraque extremitate angustiore
truncata. Teen-Trumleren. V. 15. * +
2441. *E. Ovulum*, cylindrico-ovata, hyalina. Æg-Trumleren.
V. 16. * +
2442. *E. Fritillus*, cylindrica, antice truncata. Tumling-Trum-
leren. V. 17. * +
2443. *E. Pupula* cylindrica, apice papillari. Popp-Trumleren.
V. 18. * +
2444. *E. Spathula*, cylindrica, striata apice hyalino spathulata.
Spadel-Trumleren. V. 19. * +
2445. *E. Pirum*, inverſe conica poſtice hyalina. Pere-Trum-
leren. V. 20. * +

*** Gelatinofi.

2446. VIBRIO *Lineola*, linearis obscurus. Streg-Strækkeren.
V. 21. * +
2447. V. *Bacillus*, linearis, æqualis, utrinque truncatus. Kiap-
Strækkeren. V. 22. *
2448. V. *Anguillula*, æqualis subrigidus. Aal-Strækkeren. V. 23.
Chaos LINN.
2449. V. *Serpentulus*, æqualis utrinque subacuminatus. Slange-
Strækkeren. V. 24. *
2450. V. *Vermiculus*, tortuosus, gelatinus. Medike-Strækkeren.
V. 25. * +

204 VERMES. INFUSOR: CYCLIDIUM.

2451. V. *Undula*, filiformis, flexuosus. *Bølge-Strækkeren*.
V. 26. * +

2452. V. *Intestinum*, gelatinosus, teres, antice angustatus.
Tårne-Strækkeren. V. 27. * +

*** Pellicentes.

2453. V. *Proteus*, ellipticus, collo longissimo, apice nodoso.
Proteus-Strækkeren. V. 28. *

2454. V. *Falx*, gibbosus, postice obtusus, collo falcato. *Lee-Strækkeren*. V. 29. * +

2455. V. *Anser*, ellipticus collo longo, tuberculo dorsali.
Gaase-Strækkeren. V. 30. * +

2456. V. *Cygnus* ventricosus collo adunco. *Svane-Strækkeren*.
V. 31. * +

2457. V. *Malleus* linearis basi globulo, apice linea transversa.
Hammer-Strækkeren. V. 32. * +

2458. V. *Utriculus* teres antice angustatus, truncatus, postice
ventricosus. *Flaske-Strækkeren*. V. 33. * +

2459. V. *Fasciola*, antice attenuatus, medio latiusculus, postice
acutus. *Igle-Strækkeren*. V. 34. * +

2460. V. *Colymbus*, crassus, postice acuminatus, collo subfal-
cato. *Lom-Strækkeren*. V. 35. * +

2461. CYCLIDIUM *Bulla*, orbiculare hyalinum. *Boble-Runderen*. V. 36. * +

2462. C. *Milium*, ellipticum crystallinum. *Hirse-Runderen*.
V. 37. * +

2463. C. *Glaucoma*, ovatum interaneis ægre conspicuis. *Blaa-Runderen*. V. 38. * +

2464. C. *radians*, ovatum, interaneis manifestis. *Straale-Runderen*. V. 39. *

2465. *C. rostratum*, ovale, antice mucronatum. *Suabel-Runderen*. V. 40. * +
2466. *C. Nucleus*, ovale, postice acuminatum. *Kierne-Runderen*. V. 41. *
2467. *C. Pediculus*, ovale, convexum subtus planum. *APH.* 6, 366. *Luse-Runderen*, *Polyp-Luus*. V. 42. *
2468. *PARAMÆCIUM Aurelia*, oblongum, antice in longitudinem plicatum. *Puppe-Aflangeren*. V. 43. *
2469. *P. Histrio*, ovato-oblongum, antice punctis mobilibus nigris. *Gögle-Aflangeren*. V. 44. * +
2470. *KOLPODA Lamella*, elongata, membranacea, antice curvata. *Kniv-Blad-Bugteren*. V. 45. * +
2471. *K. Rostrum*, oblonga antice uncinata. *Suabel-Bugteren*. V. 46. * +
2472. *K. Ren*, crassa medio sinuata. *Nyre-Bugteren*. V. 47. *
2473. *K. Cucullus*, ovata antice incisa. *Hatte - Bugteren*. V. 48. *
2474. *K. Meleagris*, mutabilis antice uncinata, postice complicata. *Kalkun-Bugteren*. V. 49. * +
2475. *GONIUM pectorale*, quadrangulare pellucidum moleculis sedecim sphaericis. *Bryft - Hörneren*. V. 50. * +
2476. *G. pulvinatum*, quadrangulare opacum pulvillis quatuor. *Hynde-Hörneren*. V. 51. * +
2477. *G. truncatum*, obtusangulum postice arcuatum. *Stump-Hörneren*. V. 52. * +
2478. *G. lunatum*, rectangulum, postice arcuatum. *Maane-Hörneren*. V. 53. * +

2479. BURSARIA *truncatella*, ventricosa, apice truncata.
Mosé-Pungen. V. 54. * +
2480. B. *Hirundinella*, excavata, mucronata. Strut-Pungen.
V. 55. * +

* Teretes.

2481. CERCARIA *Gyrinus*, rotundata, cauda acuminata.
Frö-Unge-Haleren. V. 56. Aph. *
2482. C. *Catellus*, tripartita, cauda bifeta. Killing-Haleren.
V. 57. * +
2483. C. *Podura*, cylindracea, postice acuminata, subfissa.
Loppe-Haleren. V. 58. * +
2484. C. *Lupus*, cylindrica, elongata, torosa; cauda spinis
duabus. Ulv-Haleren. V. 59. * +
2485. C. *Lemna*, mutabilis, cauda annulata. Ande-Mad-
Haleren. V. 60. * +

* * Depressæ.

2486. C. *Cyclidium* ovalis, postice subemarginata; cauda ex-
fertili. Rund-Haleren. V. 61. * +
2487. C. *Tenax* membranacea, antice crassiuscula, truncata,
cauda triplo brevior. Sei-Haleren. V. 62. * +
2488. C. *Pleuronectes* orbicularis, cauda unifeta. Flönder-
Haleren. V. 63. * +
2489. C. *Tripes* subtriangularis, brachiis deflexis. Tre-Fod-
Haleren. In aqua marina. * +

* Caudatæ.

2490. TRICHODA *Clava*, clavata fronte crinita; cauda re-
flexili. Kolle-Spilleren. V. 64. * +
2491. T. *Pupa*, cucullata, fronte crinita, cauda inflexa. Puppe-
Spilleren. V. 65. * +

2492. *T. Clavus*, antice rotundata, crinita; postice acuminata-caudata. *Söm-Spilleren*. V. 66. * +
2493. *T. Cuniculus*, oblonga, antice crinita, postice subacuminata. *Kanin-Spilleren*. V. 67. * +
2494. *T. Piscis*, oblonga, antice crinita, postice in caudam exquisitam attenuata. *Fiske-Spilleren*. V. 68. * +
2495. *T. Musculus*, ovalis, antice crinita, postice subtus caudata. *Muus-Spilleren*. V. 69. * +
2496. *T. Ludio*, cirrata, supra crinita, cauda sursum extensa. *Springer-Spilleren*. V. 70. * +
2497. *T. Delphinus* oblonga, antice crinita, postice c uda reflexa truncata. *Marfvin-Spilleren*. V. 71. * +

* * Ecaudatæ.

2498. *T. Sol* globularis, undique radiata. *Soel-Spilleren*. V. 72. *
2499. *T. Grandinella*, sphaerica, pellucida superne crinita. *Havl-Spilleren*. V. 73. * +
2500. *T. Cometa*, sphaerica antice crinita; globulo appendente. *Comet-Spilleren*. V. 74. * +
2501. *T. Granata*, sphaerica centro opaco, peripheria crinita. *Granat-Spilleren*. V. 75. * +
2502. *T. Bomba*, mutabilis antice pilis sparsis. *Bombe-Spilleren*. V. 76. * +
2503. *T. Acarus* piriformis antice subtus crinita, postice pedata. *Mide-Spilleren*. V. 77. * +
2504. *T. Camelus*, antice crinita crassiuscula medio utrinque emarginata. *Cameel-Spilleren*. V. 78. * +
2505. *T. Pellionella*, cylindracea antice crinita, postice setosa. *Pelz-Spilleren*. V. 79. * +
2506. *T. Pulex* ovata antice incisa; fronte & basi crinita. *Loppe-Spilleren*. V. 80. * +

2507. *T. Pullaster* ovata, antice sinuata, fronte cristata, basi crinita. *Hane-Spilleren*. V. 81. * +
2508. *T. Angulus* angulata, apice crinita. *Vinkel-Spilleren*. V. 82. * +
2509. *T. Trigona* convexa, antice ciliata, postice erosa. *Trekant-Spilleren*. V. 83. * +
2510. *T. Tinea* clavata, antice crinita, postice grossa. *Möll-Spilleren*. V. 84. * +
2511. *T. Charon* cymbiformis, fronte crinita. *Ferge-Spilleren*. V. † p. 83. * +
2512. *T. Cimex* supra convexa, subtus plana, crinita. *Vægge-Luus-Spilleren*. V. 85. * +
2513. *T. Orbis* orbicularis antice emarginata, crinita. *Brille-Spilleren*. V. 86. * +
2514. *T. Semiluna* semiorbicularis, antice subtus crinita. *Halv-Maane-Spilleren*. V. p. 85. * +
2515. *T. Lynceus* subquadrata, rostro adunco: ore crinito. *Los-Spilleren*. V. 87. * +
2516. *T. Urnula* urceolaris, antice crinita. *Urne-Spilleren*. V. 88. * +
2517. *T. Mytilus* subclavata utraque extremitate latiori hyalina ciliata. *Musling-Spillere*. V. 89. * +
2518. *T. Silurus*, oblonga, antice & postice crinita, dorso ciliato. *Egern-Spilleren*. V. 90. * +
2519. *T. Calvitium* latiuscula oblonga, antice corniculis micantibus. *Skald-Spilleren*. V. 91. * +
2520. *T. Lepus* ovata, apice crinito, basi setosa. *Hare-Spilleren*. V. 92. * +
2521. *T. Urinarium* ovata rostro brevissimo, crinito. *Urin-Glas-Spilleren*. V. 93. *

2522. T. *Cyclidium* ovata apice hiantē, basique crinita. *Rund-Spilleren*. V. 94. *
2523. T. *Cypris* obovata, versus postica superne sinuata, antice crinita. *Cypris-Spilleren*. V. 95. * +
2524. T. *Pubes* ovato-oblonga, gibba, antice depressa. *Duun-Spilleren*. V. 96. * +
2525. T. *Linter* ovato-oblonga, utraque extremitate prominula. *Baad Spilleren*. V. 97. * +
2526. T. *Sannio* incurvata, supra ciliata, infra truncata. *Gögle-Spilleren*. V. 95. * +
2527. T. *Uvula* planiuscula elongata æqualis, antice crinita. *Drövel-Spilleren*. V. 99. * +
2528. T. *Anas* elongata, apice colli subtus crinito. *Ande-Spilleren*. V. 100. * +
2529. T. *Patella* univalvis antice & postice setis inæqualibus porrectis. *Patelle-Spilleren*. V. 101. * +

* Absque cauda & pedunculo.

2530. VORTICELLA *nigra*, trochiformis nigra. *Sort-Snurreren*. V. 102. * +
2531. V. *viridis*, cylindræa, uniformis, viridis, opaca. *Grön-Snurreren*. V. 103. * +
2532. V. *polymorpha*, multiformis, viridis, opaca. *Proteus-Snurreren*. V. 104. * +
2533. V. *cincta*, trapeziformis, nigro-viridis, opaca. *Magnet-Snurreren*. V. 105. * +
2534. V. *cornuta*, inverse conica, viridis, opaca. *Horn-Snurreren*. V. 106. * +
2535. V. *limacina*, cylindrica, truncata; ciliis bigeminis. *Snegl-Snurreren*. V. 107. * +

210 VERMES. INFUSORIA. VORTICELLA.

2536. *V. truncatella*, cylindrica, truncata, ciliis confertis, *Beger-Snurreren*. V. 108. *
2537. *V. crateriformis*, subquadrata, *Kop-Snurreren*. V. 109. *
2538. *V. nasuta*, cylindracea, crateris medio mucrone prominente. *Näse-Snurreren*. V. 110. * +
2539. *V. canaliculata* dilatata, pellucida, latere inciso. *Rende-Snurreren*. V. 111. * +
2540. *V. cratagaria*, subglobosa, conferta. *Moorbar-Snurreren*. V. 112.

* * Caudatæ.

2541. *V. rotatoria* caudata, cylindracea, organo rotatorio duplici. *Hiul-Snurreren*. V. 113. *
2542. *V. vermicularis* caudata, cylindrica, annulata, proboscide exsertili. *Madike-Snurreren*. V. 114. *
2543. *V. Felis*, caudata, cylindracea, mutica, cauda spinis duabus longis. *Katte-Snurreren*. V. 115. * +
2544. *V. Catulus* caudata, cylindracea; apertura mutica, cauda reflexa. *Valp-Snurreren*. V. 116. *
2545. *V. senta* caudata, apertura spinosa, cauda apice fissâ. *Torne-Snurreren*. V. 117. * +
2546. *V. furcata* caudata, apertura mutica, cauda simpliciter bifida. *Fork-Snurreren*. V. 118. *
2547. *V. auriculata*, caudata, nuda: cauda bifida, parvula. *Öre-Snurreren*. V. 119. * +
2548. *V. stentorea*, caudata, tubæformis, limbo ciliato. *Trompet-Snurreren*. V. 120.
2549. *V. socialis* caudata, aggregata, clavata; disco obliquo. *Samqvem-Snurreren*. V. 121.
2550. *V. fosculosa* caudata, aggregata, oblongo-ovata; disco dilatato pellucido. *Blomster-Snurreren*. V. 122. * +

*** Pedunculatæ.

2551. *V. citrina* simplex multiformis; orificio contractili, pedunculo æquali. *Citron-Snurreren.* V. 123. * +
2552. *V. piriformis* simplex obovata; pedicello minimo retractili. *Pære-Snurreren.* V. 124. *
2553. *V. ringens* simplex obovata; pedunculo minimo, orificio contractili. *Gabe-Snurreren.* V. 125. * +
2554. *V. inclinans* simplex, deflexa, pedunculo brevi, capitulo retractili. *Pibe-Snurreren.* V. 126. * +
2555. *V. Globularia* simplex sphaerica, pedunculo retortili. *Kugle-Snurreren.* V. 127. *
2556. *V. lunaris* simplex hemisphaerica; pedunculo retortili. *Maane-Snurreren.* V. 128. * +
2557. *V. Convallaria* simplex campanulata; pedunculo retortili. *Lilien-Conval-Snurreren.* V. 129.
2558. *V. nebulifera*, simplex ovata, pedunculo reflexili. *Tange-Snurreren.* V. 130. * +
2559. *V. gemella* simplex sphaerica; capitulo gemino. *Tvilling-Snurreren.* V. 131. * +
2560. *V. nutans* simplex turbinata; pedunculo retortili. *Ludde-Snurreren.* V. 132. * +
2561. *V. annularis* simplex truncata, pedunculo apice retortili. *Ring-Snurreren.* V. 133. * +
2562. *V. fasciculata*, simplex viridis campanulata, margine reflexo; pedunculo retortili. *Buket-Snurreren.* V. 134. * +
2563. *V. acinosa*, simplex globosa, granis nigricantibus, pedunculo rigido. *Mespel-Snurreren.* V. 135.
2564. *V. Bellis* simplex hemisphaerica, margine contractili. *Soel-Blomst-Snurreren.* V. 136. * +

2565. *V. bians simplex citriformis*, pedunculo retortili. *Sprake-Snurreren*. V. 137. *
2566. *V. pyrraria composita inversa*, conica pedunculo ramoso. *Quare-Snurreren*. V. 138.
2567. *V. Anastatica composita oblonga*, oblique truncata; pedunculo squamoso rigido. *Skæl-Snurreren*. V. 139.
2568. *V. racemosa composita* pedunculo rigido, pedicellis ramosis longis. *Klase-Snurreren*. V. 140. *
2569. *V. polypina composita*, ovato-truncata, pedunculo reflexili ramosissimo. *Polyp-Snurreren*. V. p. 123.
2570. BRACHIONUS *Patella univalvis* testa apice bidentata, basi emarginata; cauda bifeta. *Fad-Hvirvleren*. V. 141. *
2571. *B. Urceolaris* testa apice multi dentata, basi mutica; cauda simplici. *Krukke-Hvirvleren*. V. 142.
2572. *B. cirratus bivalvis*, testa apice mutica, abbreviata, basi bicorni; cauda longa bifeta. *Lokke-Hvirvleren*. V. 143. *
2573. *B. Tripos bivalvis*, testa apice mutica, basi tricorni; cauda duplici. *Trefod-Hvirvleren*. V. 144. * +
2574. *B. uncinatus bivalvis*, testa apice mutica, rotundata; basi unidentata; cauda bifeta. *Krog-Hvirvleren*. V. 145. * +
- 2575. *B. mucronatus bivalvis*, testa apice & basi bidentata; cauda spina duplici. *Braad-Hvirvleren*. V. 146. * +

2. HELMINTHICA.

2576. GORDIUS *Seta*, filiformis, fuscus. V. 161. *Vand-Tarm, Sene-Orm, Fuger-Trold*. N. *Väs-Kalv, Vand-Heste-Taget*.

2577.

2577. *G. argillaceus* flavescens extremitatibus concoloribus.
Gr. Kumak.

2578. *G. marinus* filiformis, plano-spirali convolutus. *Qveise*.
Gr. Saraulibkuma. APH. 6, 436. Asc. ic. t. 7.
f. a, b, c.

Varietatem griseam cingulo albo ad antica, non
elevato, reperit rever. OTHO FABRICIUS hist.
naturalis industrius observator.

2579. *G. lacustris* plano spirali convolutus, utrinque attenuatus. Gr. Kakillifabkuma.

2580. *G. Filum*, filiformis, candidus. V. 162. *Den bvide*
Traad-Orm. * +

2581. *G. arenarius*, fulvus, obtusus. V. Helm. p. 33. *Den*
röd-gule Traad-Orm. * +

2582. *G. lacteus* albus, opacus. V. 163. *Melk-Traad-Or-*
men. * +

2583. *G. Inquilinus* albus, tentaculiformis. V. 164. *Föl-Traad-*
Ormen. * +

2584. *G. littoreus* filiformis albus rubro maculatus. *Den tær-*
nede Traad-Orm. * +

Tand-Orm, HAMM. FN. N. 772. larva est, mini-
me Gordius.

2585. ASCARIS *vermicularis* cauda setacea. V. 165. *Börne-*
Orm, *Smaa Spoel-Orm.* Gr. Koartak. APH. 7, 550.

2586. *A. Lumbricoides* apice trinodi. V. 166. *Menneske-*
Orm, *Skol-Orm*, *Spol-Orm.* Gr. Luubkuma.
APH. 6, 41.

2587. *A. rubra* postice acuminata. Gr. *Pullateriak.* V. Helm.
p. 36. *Würm.* 118. t. 3. f. 1-3. * *A. pela-*
gica, A&H. Havn. 10. p. 174. t. e. f. 18, 19.

Viva fusca est, vix Clypearum Rödant. O. FABRICIUS.

2589. *A. longissima*, fusca lineis quinque longitudinalibus flavescens. Aët. Havn. 10. p. 173. t. e, f. 17. * †

2590. *Asc. Neitsil* pallida intestino lacteo spirali. Gr. *Neitsil-kuma*. * †

In phoca *fœtida*, cujus vivæ cor his vermiculis fere consumtum semel vidit reverend. O. FABRICIUS, qui hanc & sequentes *Ascaridis* species in Grœnlandia detexit.

2591. *Asc. Urksuk* albida, glabra, antice rostro cylindrico quasi prolongata. Gr. *Urksukuma*. * †

2592. *Asc. Atak* postice furcata, antice curva, setæformis. Gr. *Atakuma*. * †

2593. *Asc. Raia* postice attenuata integra, antice setæformis subcurva. Gr. *Taralikisakuma*. * †

2594. *Asc. Pleuronectis* rostro attenuato, postice cingulo elevato, terminali. Gr. *Okotakuma*. * †

2595. *Asc. Gadi* utrinque pinna laterali, desinente ante anum prolongatum. Gr. *Okakuma*. * †

2596. *Asc. versipellis* rugosa, compressiuscula, subobtusa, antice subtus orificio lunari. Gr. *Okakuma*. * †

Colorem ex loco assumit; an Clypearum *Röd-aar*?

2597. *Asc. Alca* antice subtus rugis lateralibus, medietatem elevatam includentibus. Gr. *Akpakuma*. * †

Dragfæ, *Orm-Drag*, HAM. FN. N. 775. congeries larvarum, nulla *Ascaris* est.

2598. *ECHINORYNCHUS lacustris* transverse striatus, utrinque attenuatus; extremitate anteriore callosa. * †

2599. *Ech. Gadi* proboscide cylindrica, echinata. * †

2600. *Ech. candidus* proboscide cylindrica, basi annulata, apice echinata. * †

2601. *Ech. levis* proboscide echinata, pone apicem in sphæram
lævem dilatata. * †

Hæc intestinalia dissectionibus piscium ab acutissi-
mo observatore J. ZOEGA institutis accepta
refero.

* Terrestres.

2602. *LUMBRICUS terrestris* ruber octofariam aculeatus.
D. Regn-Orm, Maddik, Meed-Orm. N. Ford-
Mak, Agna-Mark. I. Aana-Madkar, Aamu-
madkr. APH. 6, 55. V. 157.

2603. *L. vermicularis* albus bifariam aculeatus, æqualis. V. 158.
Stub-Orm. * †

* * Fluviales.

2604. *L. variegatus* rufus maculatus, sexfariam aculeatus,
V. 159. Sump-Orm. *

2605. *L. rubifex* rufescens, bifariam aculeatus. β, rufescens,
feta antice utrinque porrecta. V. 160. Rör-Orm. *

* * * Marini.

2606. *L. lineatus* albus linea longitudinali rubra. V. Helm,
p. 29. Würm. p. 110. t. 3. f. 4, 5. * †

2607. *L. ciliatus* rufus, ciliis annulatus. V. Helm. p. 30.
Fryndse-Orm. * †

2608. *L. cirratus* cirris longis varie sparsis. Gr. Nyaurfelyk.
STR. S. p. 188. Würm. p. 193, 4. Aët. nidr.
4. t. 14. f. 7. Aët. Havn. 10. p. 26. t. 8. f. 1-4. * †

2609. *L. marinus* papillis dorsalibus geminatis fetigeris. D.
Pyr. N. Fiare-Mark, Sand-Mark. I. Breidu-
Madkr, Fieru-Madkur. APH. 6, 57; 7, 101.
Isl. R. 2, 748. t. 10. f. 8. *L. littoralis*.

2610. *L. armiger* ruber, lamellis ventris lanceolatis, geminis,
antice nullis. * †

2611.

216 VERMES. HELMINTH: AMPHITR:

2611. *L. fragilis* ruber, verrucis lateralibus fissis; setis fasciculatis. * +

2612. *L. inaequalis* papillis lateralibus simplicibus: setis solitariis. * +

2613. *L. tubicola* albus, macula segmentorum dorsali rubra. * +

2614. *L. arenarius* albidus, cingulo elevato antico pallidiore, interaneis rubris, bifariam ad ventrem aculeatus. * +

2615. *L. papillofus* violaceo-viridis, toto corpore papillis & 2 ordinibus fasciculis cirrorum aculeorumque simul instructus. Gr. *Imellualerak*. * +

2616. *L. minutus* rubicundus, cingulo elevato, pallido, fere medio; ventre bifariam aculeato. Gr. *Sirkfab Komangoa*. * +

Lumbr. in ventriculo piscium. Isl. R. 1, 611. quinam?

Gr. *Pullateriak* nom. gen.

2617. AMPHITRITE, *cirrata* cincinnis utrinque tribus. *Würm*. p. 188. t. 15. + *Nereis cirrosa* LINN.

2618. *A. pennacea* penicillis frontis quatuor; intermediis majoribus. * +

2619. *A. cornata* corniculis simplicibus horizontalibus. * +

2620. *A. cristata* corniculis ramosis binis. * +

2621. *A?* *plumosa* cirro longo utrinque, flabellis caput fetasque pediformes tegentibus. Gr. *Merkolualik*. * + *O. Fabricius*.

2622. *A. auricoma* cirris binis utrinque, antice flabellis duobus aureis, rigidis. Gr. *Imab Polia*. *Sabella granulata* LINN.

Congeneres e granis arenaceis, cochleis minutis, testarumque fragmentis tubulos sibi fragiles ædificant.

✱ Ore forcipato.

2623. NEREIS *noctiluca* orpore vix conspicuo. Gr. *Ignerolak*.
 2624. N. *diversicolor* subdepressa, pedibus acuminatis setiferis.
Würm. 104. t. 6. STR. S. I. p. 198, 2?
 2625. N. *Tubicola* subdepressa, pedibus subcirratis, globosis. * +
 2626. N. *armillaris* subdepressa pedibus conicis cirris lenticularibus. *Würm.* 150. t. 9. * +
 2627. N. *fimbriata* subdepressa pedibus cirratis lentigeris.
Würm. 144. t. 8. * +
 2628. N. *verrucosa* convexa, pedibus cirratis verrucosis.
 D. Söe-Skol-Orm. *Würm.* 140. t. 7. Aph. 7, 284.
 Isl. R. 900. D. Act. Havn. 10. p. 9. b. t. IV.
 Act. Havn. p. 169. t. c, f. 10. N. *pelagica* LINN.
 2629. N. *pinnata* convexa, pedibus cirratis pinnigeris. * +
 2630. N. *pennata* convexa, pedibus cirratis pennigeris. Act.
 nidr. 4. p. 51. t. 2. f. 7 - 12. At tubulus alienus est. N. *norvegica* LINN.
 2631. N. *pusilla* depressa, pedibus cirratis, filamentis articulatis. * +

✱✱ Ore proboscideo.

2632. N. *stellifera* depressa, lamellis pedum ellipticis. * +
 2633. N. *punctata* subdepressa, pedibus longissime cirratis. * +
 2634. N. *alba* subconvexa, fronte cornuta, pedibus muticis bifidis. * +
 2635. N. *maculata* convexa, lamellis pedum subcordatis.
Würm. 156. t. 10. †
 2636. N. *viridis* depressa, lamellis pedum lanceolatis. *Würm.*
 162. t. 11. †

2637. *N. prismatica* triquetra pedibus distantibus papilla simplici setigera, supra cirrata. * †
2638. *N. bifrons* pedibus papilla simplici setigera, supra cirrata, mediis simul remigeris. * †
2639. *N. seticornis* elongata, tentaculis binis longis, tenuibus, pallidis: striga grisea.
2640. *N. filicornis* tentaculis binis longis crassis albis: annulis nigricantibus. Gr. *Iglulualik*. * † Has tres in Grœnlandiæ sinibus reperit O. FABRICIUS.
Gr. *Sengiak* nom. gen.

2641. APHRODITA *aculeata*, ovalis hirsuta. Sœe. *Muus*, *Guld-Muus*. Act. Havn. BARTH. 3. p. 8. & 88. Act. nidr. 3. p. 59. Act. Havn. 3. t. 88. & 4. p. 95. t. 10. APH. 7, 498.

2642. *A. punctata*, oblonga, squamis punctatis, macula sublunata, lutea. I. *Skere*. *Wûrm*. 170. t. 13. A. nidr. 4, 94. Isl. R. 900. t. 10. f. 7. *A. squamata* LIN.

2643. *A. lepidota*, oblonga, fascia dorfi longitudinali sanguinea. *

2644. *A. cirrata*, postice acuminata pedibus cirratis. *Wûrm*. 180. t. 14. *A. imbricata* LINN.

2645. *A. violacea* oblonga violacea, squamis dorsalibus utrinque quindecim. A. nidr. 4, 93. * †

2646. *A. longa* alba, squamis concoloribus medio dorfi nudo, pedibus papilla simplici setigera, cirris lateralibus nullis. * † O. FABR.

Inter *A. punctatam* & *lepidotam* media.

Testas derelictas & lacunas faxorum &c. occupant Aphrod. species.

Gr. *Koperdlurfoak* nom. gen.

2647. NAIS *vermicularis* fetis lateralibus nullis; mento barbato. Orme-Naiden. V. 151. Würm. 4. f. 1-2. *

2648. N. *serpentina* fetis lateralibus nullis; collari triplici nigro. Slange-Naiden. V. 152. *

2649. N. *proboscidea* fetis lateralibus solitariis, proboscide longa. Tunge-Naiden. V. 153. N. *lacustris* LINN. Würm. 14. t. 1.

2650. N. *elinguis* fetis lateralibus solitariis; proboscide nulla. V. 154. Würm. 74. t. 2. *

2651. N. *digitata* fetis lateralibus solitariis; cauda laciniata. Finger-Naiden. V. 155. Würm. 90. t. 5. * †

2652. N. *barbata* fetis lateralibus fasciculatis; proboscide nulla. Skiage-Naiden. V. 156.

2653. N. *cæca* verrucis lateralibus fetosis, oculis nullis. I. Brödru-Skal. Isl. R. 899. t. 10. f. 6, 10. An N. *carulea* LINN.? In Sinu Christianiensi quoque reperitur.

2654. TÆNIA *vulgaris* osculis lateralibus geminis. Bændel-Orm. I. Kediamadkur. Isl. R. 900, L. in lacu reperta a T. *folio* diversissima.

2655. T. *Lucii* osculis lateralibus, extremitate tenuiore subquadrangula, terminata margine elevato, quatuor aculeorum paribus armato. * †

2656. T. *Scorpii* osculis lateralibus, ultimo tenuioris extremitatis articulo tetragono. * †

2657. T. *Solida* osculis sub margine articulorum; alterius extremitatis articulo acuto. * †

Has tres amiciss. ZOEGA in piscibus detexit.

2658. HIRUDO *medicinalis* elongata nigricans, supra lineis versicoloribus, subtus maculis flavis. Dokter-Iglen, Blod-Igle. V. 167. APH. I, 377.

2659. *H. Sanguisuga*, elongata, nigra, subtus cinereo-virens, maculis nigris. *Hefte-Igle*, *Blod-Igle*. V. 168.

2660. *H. lineata*, elongata, grisea, dorso lineis quatuor longitudinalibus nigris. *Linie-Iglen*. V. 169. * +

2661. *H. vulgaris* elongata, flavo-fusca, oculis octo serie lunata. *Almæen-Iglen*. V. 170. *H. octoculata* LINN.

a. flavescens lineis longitudinalibus, media nodosa, lateralibus punctis remotis sanguineis.

b. luteo-fusca, linea media nodosa, laterali nigricante, antice intus pinnata. c. fusca, supra punctis flavescens parvis sparsa. d. cinerea, supra punctis nigris sparsa. e. fusca, immaculata.

2662. *H. bioculata*, elongata, cinerea, oculis duobus. *Tve-Oye-Iglen*. V. 171. *H. stagnalis* LINN.

2663. *H. piscium*, elongata, flavicans, linea dorsali pinnata, alba. *Fisk-Iglen*. V. 172. *H. geometra* LINN.

Quæ in Cottis reperitur Gr. *Kaneisubkuma* eandem esse censet O. FABRICIUS.

2664. *H. tessulata* cinerea, margine tessulato, oculis octo : serie duplici longitudinali. *Tærning-Iglen*. * +

2665. *H. marginata*, dilatata fusca margine tessulato; oculis quatuor. *Kant-Iglen*. V. 174. * +

2666. *H. complanata*, dilatata cinerea, linea dorsali duplici tuberculata, margine ferrato. *Plat-Iglen*. V. 175.

2667. *H. hyalina*, dilatata pellucida, flava, margine integro. *Klar-Iglen*. V. 176. *H. heteroclita* LINN.

2668. *H. grossa*, dilatata flavicans, antice fissâ. * +

2669. *H. Hippoglossi*, dilatata albida, medio corporis oculo didymo, candido. * +

2670. *H?* corpore tereti ventricoso, extremitate oris coniformi; cauda magis protracta. *Isl. R.* 1,611. * +

3. MOLLUSCA.

* Oculis nullis.

2671. *PLANARIA stagnalis*, ovata, fusca, antice pallida.
Söe-Flad-Ormen. V. 178. *
2672. *Pl. nigra*, oblonga, nigra, antice truncata. *Sort-Flad-Ormen*. V. 179. * +
2673. *Pl. brunnea*, oblonga brunnea, linea longitudinali nigra.
Brun-Flad-Ormen. V. 180. * +
2674. *Pl. ciliata*, elongata depressa, ciliis cincta. *Fryndse-Flad-Ormen*. V. 181. * +
2675. *Pl. Gulo*, elongata, pellucida, antice truncata. *Slug-Flad-Ormen*. V. 182. * +
2676. *Pl. punctata*, elongata, teres, viridis. *Prikke-Flad-Ormen*. V. 183. * +
2677. *Pl. intestinalis linearis longa* Gr. *Kumak*.
2678. *Pl. flaccida*, elongata, brunnea, linea laterali transversisque albis. *Slappe-Flad-Orm*. V. Helm. p. 57. * +
2679. *Pl. rosea*, elongata, rubra. *Röde-Flad-Orm*. V. Helm. p. 58. * +
2680. *Pl. angulata*, elongata, rufo-fusca, antice angulis binis albis. *Vinkel-Flad-Ormen*. V. Helm. p. 58. * †
2681. *Pl. cornuta*, oblonga, tentaculo ab utroque capitis latere. * +
2682. *Pl. striata*, elongata fusca, subtilissime striata, antice angulo unico. * +
2683. *Pl. rubra*, oblonga depressa, pallide rubra. *Röde-Flad-Orm*. V. Helm. p. 59. * †
2684. *Pl. viridis* oblonga, supra convexa vividis, striis transversis albis. *Gronne-Flad-Orm*. V. Helm. p. 59. * †

* 2 * Oculo unico.

2685. Pl. *glauca* subelongata, cinerea, iride alba. *Graae-Flad-Orm.* V. 184. * +
2686. Pl. *lineata* elongata supra convexa cinerea linea longitudinali pallida. *Streg-Flad-Ormen.* V. Helm. p. 60. * +

* 3 * Oculis duobus.

2687. Pl. *lactea* depressa oblonga alba, antice truncata. *Melke-Flad-Ormen.* V. 185. * +
2688. Pl. *torva* depressa, oblonga, cinerea vel nigra, subtus albida iride alba. *Skelende-Flad-Orm.* V. 186. * +
2689. Pl. *tentaculata* depressa, oblonga, cinerea, antice tubulosa. *Horne-Flad-Ormen.* V. 187. * +
2690. Pl. *crenata* depressa ovato-oblonga, pallida, margine crenulato. *Kervede-Flad-Orm.* V. 188. * +
2691. Pl. *littoralis* depressa, grisea, punctis duobus nigris immerfis. *A. nidr.* 4, 92. * +
2692. Pl. *Helluo* ovata, teres, viridis. *Fraadse-Flad-Orm.* V. 189. * +
2693. Pl. *obscura* ovato-oblonga, utrinque obtusa, alba. *Mörke-Flad-Orm.* V. 190. * +
2694. Pl. *rostrata* oblonga, hyalina, extremitate elongata, oculis rubris. *Snabel-Flad-Ormen.* V. 191. * +
2695. Pl. *radiata* oblonga, rufa, dorso rosula candida. *Straale-Flad-Ormen.* V. 192. * +
2696. Pl. *strigata* oblonga pallida, lineis tribus longitudinalibus. *Stribe-Flad-Ormen.* V. 193. * +
2697. Pl. *grossa* cylindracea, alba, antice & postice acuminata: oculis nigris. *Tykke-Flad-Orm.* V. 194. * +

2698. Pl. *linearis* elongata, teretiuscula, pallide lutea. *Linie-Flad-Ormen*. V. 195. * †

2699. Pl. *terrestris linearis*, supra convexa, cinerea, subtus alba. *Ford-Flad-Ormen*. V. 196. * †

2700. Pl. *tetragona* lutea, lamellis rectangulis quatuor. *Firkanted-Flad-Orm*. V. 197. * †

2701. Pl. *capitata* oblonga cinerea, capite discreto. *Hoved-Flad-Ormen*. V. Helm. p. 70. * †

2702. Pl. *caudata* antice rotundata, postice in caudam attenuata. *Hale-Flad-Ormen*. V. Helm. p. 70. * †

✽ 4 ✽ Oculis quatuor.

2703. Pl. *Marmorosa* oblonga pallida. *Marmor-Flad-Ormen*. V. 198. * †

2704. Pl. *candida* elongata, albida. *Blanke Flad-Orm*. V. Helm. p. 71. * †

✽ 5 ✽ Oculis pluribus.

2705. Pl. *tremellaris* plana membranacea, lutea, margine finuato. *Slim-Flad-Ormen*. V. Helm. p. 72. * †
A. nidr. 4, 91?

2706. Pl. *punctata*, plana, membranacea, alba, superne atomis sparsis rufis. * †

Majores Planariæ Grœnl. *Pullateriak*, minores *Kekkurfabkuma* dicuntur.

2707. FASCIOLA *hepatica* depressa ovata, fusca, antice tubulo instructa. *Faare-Flynder, Ikte, Igle*. V. 177.

2708. F. *barbata* ore papillis fasciculato.

2709. F. *Scorpæ* elliptica, altera extremitate papilla minima, perforata, collo nullo. * †

2710. F. *Lucio-perca* ovato-oblonga, subventricosa, collo brevi: pori terminalis margine dilatato, lævi. * †

2711.

2711. F. *Percae cernuae* ovata, ventricosa, collo brevi: pori terminalis margine noduloso. * †

2712. F. *Æglefini* linearis, depressiuscula, altera extremitate perforata. * †

2713. F. *Lucii* lanceolata, depressa, marginibus acutis, cre-
natis; collo elongato, cylindrico. * †

2714. F. *Bramæ* oblonga, teres, basi attenuata obtusa, collo
subincurvo. * †

2715. F. *Blennii* linearis, plana, collo divergente, truncato;
apice perforato. * †

2716. F. *disticha* elongata, teres, poro laterali porrecto, ex-
cavato. * †

2717. F. *binodis* elongata teres, poro laterali papillari, cau-
data. * †

Nova n. hæc intestinalia communicavit celeberr.
J. ZOEGA.

2718. MAMMARIA *Mamilla* conico-ventricosa, alba. N.
act. N. Curios. vol. 4. * †

2719. M. ovata, albo & purpureo variegata. I. *Sattu Koppar*
i *Sæ*. I. R. 900. * †

2720. ASCIDIA *rustica*, scabra ferruginea, aperturis incar-
natis. I. *Sæ-Baxur*. Isl. R. 900. C. b? †

Junior hemisphærica, mammillæformis; adul-
tior, cylindrica.

2721. Asc. *quadridentata* lævis alba aperturis quadridentatis. †

2722. Asc. *echinata* hemisphærica hispida, osculis hiantibus
coccineis. Gr. *Nakkasursak*. †

Has tres in sinibus Islandiæ sedulus natura-
lium scrutator J. G. KOENIG prius repe-
rit, post eum O. FABRICIUS in Grœnlandia,
ego in Norvegia.

2723. *Asc. gelatina* compressa lævis alba, sacco pallido, orificiis punctis luteis cinctis. * +
2724. *Asc. Mentula* compressa pilosa, sacco rubro aperturarum altera laterali. - I. *Konupungur*. Isl. R. 900, C. a? *A. singularis* act. Havn. 10. p. 166. f. 1 - 6 hujus junior? *
2725. *Asc. crystallina* compressa, lævis, sacco albo, atomis coccineis sparso. * +
2726. *Asc. scabra* compressa scabriuscula, orificiis concoloribus, sacco rubro. * +
2727. *Asc. conchilega* compressa frustulis testarum vestita, interaneo albo in cæruleum transeunte. * +
2728. *Asc. aspersa* subcompressa, scabriuscula, sacco maculis rubris. * +
2729. *Asc. patula* teretiuscula, lutescens, scabra; sacco rufo, orificiis patulis, altero laterali, coccineis. * +
2730. *Asc. Prunum* ovata, lævis, hyalina; sacco albo; aperturarum altera laterali. * +
2731. *Asc. octodentata*, oblonga, birostris, lævis, albicans, aperturis hinc octo, illinc sex-dentatis. *A.* Havn. 10. p. 168. f. 7. β . f. 8, 9.
2732. *Asc. virginea* elongato-compressa, crystallina, lævis striis sparsis coccineis; sacco rubro. * +
2733. *Asc. intestinalis* elongata, lævis, alba, sacco in colum producto. *Sœe-Pung*. Act. nidr. 3. p. 81. t. 3. f. 3, 4. *APH.* 7, 509.
2734. *Asc. canina* elongata, teres, glabra, sacco rubro. * +
2735. *Asc. corrugata*, elongata, glabra, sacco cinereo tæniis albis. * +
2736. *Asc. venosa* elongata rubra, sacco concolore. * +
 Ramusculi sanguinei frequentes tegumentum gelatinosum hyalinum reddunt rubrum.

2737. Asc. *Parallelogramma* candida teres hyalina; sacculo reticulato lutescente, aperturarum altera laterali. * †
2738. Asc. *lepadiformis* hyalina, clavata, intestino flavo. * †
2739. Asc. *patelliformis*, alba disco rubro. * †
2740. Asc. *clavata* aperturarum utraque laterali, stipite filiformi. *Vorticella Bolteni* LINN.
2741. LOBARIA *quadriloba* cauda lobulata. Aët. Holm. Phil. lis. * †
2742. CLIO *retusa* vagina triquetra, ore horizontali. Gr. *Ataursak, Augursak*. MART. Spitzb. t. p. f. f.
2743. LERNÆA *Gadina* corpore tereti flexuoso, ore laterali inter cornua tria subramosa. *Tokn-Trold, Fiord-torskens Gielle-Orm*. L. *branchialis* LINN. STR. S. I. t. I. f. 18. APH. 8, 122.
2744. L. *Salmonea* corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duobus in orbiculum cartilagineum connatis. *Laxe-Luus*. APH. 5, 85.
2745. L. *Cyclopterina* corpore tereti flexuoso, orificio duplici in medio rostri desinentis cornubus tribus tripartitis. *Rogn-Kieksens Gielle-Orm*. * †
2746. L. *uncinata* corpore oblongo, rostro simplici curvo, ore terminali. *Stor-Torskens Gielle-Orm*. STR. S. I, 167. t. I. f. 7, 8. * †
2747. L. *Gobina* corpore rhomboidali, brachiis duobus anticis, totidemque posticis, nodosis, cornubus binis arietinis. *Sand-Ulkens Gielle-Orm*. * †
2748. L. *radiata* corpore quadrato depresso, brachiis utrinque tribus, cornubus quatuor rectis. *Berg-Laxens Gielle-Orm*. * †

2749. *L. nodosa* corpore quadrato tuberculato, brachiis brevissimis utrinque duobus. *Röd - Fiskeus - Guelle-Orm.* * †

Has quinque species in Grœnlandia reperit reverend. O. FABRICIUS.

2750. *L. cornuta* corpore oblongo, brachiis quatuor rectis, emarginatis; capite subovato. * †

2751. *L. pectoralis* capite orbiculato, hemisphærico; abdominis obcordati papilla terminali, truncata. * † *Caligus*
Binoc. *piscinum* refert.

Binas has celeb. ZOEGA reperit.

2752. *L.* corpore cylindraceo, brachiis quatuor globosis hispidis. STR. S. 1, 176. In intestinis Gadi virentis. * †

2753. *L. clavata* corpore cylindrico, subinnuato, orificio triplicato infra apicem rostri. * †

Affinis *L. uncinata*.

2754. LUCERNARIA *quadricornis* corpore elongato tortili, brachiis quatuor dichotomis, apice tentaculatis. In Fuco saccharino. * †

2755. MYXINE *glutinosa*. *Hvid-Aal, Piir-Aal, Slep-Mark, Ingeris - Pilt.* Gr. *Ivik.* STR. 287. Aët. nidr. 2. p. 250. t. 3. APH. 7, 380.

2756. LIMAX *lævis*, niger, glabriusculus. *Glat-Sneglen.* V. 199. * †

2757. *L. ater*, niger, rugosus. *Sort-Sneglen.* I. *Brekku-Snigill.* V. 200.

a. aterrimus, subtus pallidus. b. ater, carina dorsi pallide virente. c. niger, ora lutescente, subtus albus. d. fusco-castaneus, ora lutescent-

lutescente; subtus albus. e. obscure fuscus,
ora strigaeque utrinque lutescente.

2758. *L. albus*, albus. *Hvid-Sneglen*. V. 201. +

a. albus totus. b. albus margine flavo. c. albus, margine & cincipite aurantio. d. albus, tentaculis nigris.

2759. *L. cinereus*, cinereus maculatus & immaculatus. V. 202.*

a. cinereus immaculatus, clypeo nigro-cæruleo.
b. cinereus, clypeo maculis, abdomine fasciis longitudinalibus nigris. c. cinereus clypeo abdomineque maculis nigris. d. cinereus abdomine striis quinque albidis, infima abrupta. e. cinereus, abdomine rugis albis cinereisque, ac maculis nigris ordine duplici. f. cinereus, margine albo.

2760. *L. succineus* supra subrufus, subtus albus. *Rav-Sneglen*. V. 203. subrufus LINN.

2761. *L. agrestis* albidus, tentaculis nigris. *Ager-Sneglen*. V. 204.

a. albidus, dorso cinereo. b. albidus, atomis nigris, sparsis. c. albidus, capite nigro. d. albus, immaculatus. e. albus, clypeo flavescente.

2762. *L. cinctus* flavescens, clypeo abdomineque cingulo cinereo. *Giord-Sneglen*. V. 205. *

2763. *L. marginatus* cinereus, clypeo utrinque striga obscura; abdomine pallide cærulecente. *Bög-Sneglen*. V. 206. * +

2764. *L. reticulatus* fuscus, clypeo punctis, abdomine lineolis nigris. *Net-Sneglen*. V. 207. *

2765. *L. flavus*, flavus immaculatus. *Gul-Sneglen*. V. 208. * +

2766. *L. fuscus* rufescens, linea laterali dorsoque nigricante. *Bruun-Sneglen*. V. 209. * +

2767. *L. tenellus* virescens, capite tentaculisque nigris. *Spad-Sneglen*. V. 210. * +

2768.

2768. *DORIS fusca*, ovalis, lamella scabra, punctata. D.
bilamellata LINN.
2769. *D. obvelata*, alba, corpore elongato, lamella repanda,
supra punctata. * +
2770. *D. clavigera* ovalis, candida, pedicellis dorfi clavatis
croceis. * +
2771. *D. quadrilineata* oblonga, alba, lineis quatuor nigris,
auriculis sulphureis. * +
2772. *D. fasciculata*, oblonga, alba fasciculis marginalibus,
fuscis. * +
2773. *D. muricata*, ovalis supra undique verrucis luteis. * +
2774. *D. laevis*, ovalis, corpore supra planiusculo, laevi. Gr.
Netarunabkuma.
2775. *D. papillosa*, supra tecta papillis: linea dorsali laevi. Gr.
Kemiarfursak. LINN. *Doris bodoensis*
A. Havn. 10. f. 11-16.
2776. *D. arborefcens*, tentaculis ramosis, dorso gibbo fruti-
cante. Gr. *Kemiarfursak*. Act. Havn. 10. p. 14.
t. 5. f. 5. * +
2777. *D. frondosa* dorso plano; marginibus fruticulosis. N.
Soe-Blad, Krake. Act. nidr. 5. p. 153. t. 5. f. 2.
2778. *D. auriculata*, alba, fasciculis dorsalibus rubris, apice
albis. A. Havn. 10. p. 16. t. 5. f. 6. * +
2779. *D. lacinulata* oblonga, alba, lobis dorfi ampullaceis. * +
2780. PEDICELLARIA *Tridens* capite trilobo: lobis ovali-
bus aristatis; collo tereti. * +
2781. *P. triphylla* capite trilobo: lobis subquadrangularibus
muticis; collo tereti. * +
2782. *P. globifera* capite sphaerico, collo nullo. * +

* Fluviales.

2783. HYDRA *viridis* viridissima, cirris corpore brevioribus.
Grönne Polyp. V. 147. Aph. 6, 355.
2784. H. *grisea* aurantia, cirris corpore vix duplo longioribus.
Graa-Polyp. V. 148.
2785. H. *pallens*, pallida, cirris corporis longitudine. Blege-
Polyp. V. 149.

* * Marinae.

2786. H. *squamata* coccinea, capite mutabili undique cir-
rato. Berl. Beschäft. 1. t. * +
2787. H. *brevicornis* alba, capite cirris octo, corpore duplo
brevioribus. * +
2788. H. *minuticornis* alba, capite truncato, cirris decem cor-
pore decuplo brevioribus. * +
2789. H. *crateriformis* albo-cærulea cirris lanceolatis corporis
longitudine. * +
2790. H. *capitata* alba, pedunculo rugoso longo, cirris ca-
pitis longitudine. * +

Fiöl-Fætingr. Isl. R. 900. E nulla Hydrarum
LINNÆI est.

2791. ACTINIA *plumosa* tentaculis parvis, margine pe-
nicillis cirrata. Gr. Kettuperak. Act. nidr. 5,
425. t. 7.

Variat colore castaneo, luteo-fusco, luteo-virenti,
& albo; maxime pellucida & opaca; la-
cinia faucis quoque variant albæ, rufæ, au-
rantia. Actiniarum pulcherrima. Ex syno-
nymo Basteri Act. Senilis LIN. esset, Syno-
nymo autem Planci ejusdem *Judaica* erit.
Veras Actiniarum notas differentiales aucto-
res nondum assecuti sunt.

2792. *A. crassicornis* rubra, cirris fusiformibus. *Söe-Kuse*,
Söe-Nelde. Gr. *Airsibpa*. STR. 204. Aët.
 Stockh. 1767. t. 4. f. 4, 5.

Hæc ex Synonymo STROEM. *Senilis* LINN. effet,
 ex Synon. vero *BASTERI felina* erit.

2793. *A. equina* semiovalis, læviuscula. I. *Brimbutur*. Isl.
 R. 900.

2794. *A. coccinea* albo rubroque varia cirris cylindricis an-
 nulatis. * †

2795. *A. truncata* rufo-lutea, conica, glabra pellucida. * †

2796. *A. digitata* fulva punctis albis, cirris roseis. * †

2797. *A. rufa*, rugosa, foramine rosaceo, cirris pallidis. * †

2798. *A. candida*, rugosa, rima aperturæ undulata. * †

2799. *A. viduata* grisea, strigis longitud. cirisque albis. * †

2800. *A. hemisphærico-ovalis* glabra, bicornis. * † Isl. R. 900.

2801. A? *Volva* corpore cylindrico, superne plano appendi-
 cibus orificii sex. I. *Gigarpuffa*, *Hraunpuffa*.
 Isl. R. 900. * †

Söe-Kuse nom. gen.

2802. HOLOTHURIA *frondosa*, tentaculis frondosis corpore
 lævi. Aët. Stockh. 1767. t. 4. f. 1, 2. †

2803. *H. Phantapus* tentaculis ramosis, corpore postice atte-
 nuato subtus punctis scabris.

2804. *H. elegans* tentaculis viginti racemosis, corpore papil-
 lofo supra rubescente, subtus albo. *Söe-Mige*.
 STR. S. I, 205. Aët. Stockh. 1767. t. 4. f. 3.
 a Bohadschii Hydra diversa. LINN. *H. tremula*. †

2805. *H. denudata*? destituta crista caudaque. Gr. *Kanmar-*
sorfoak. O. FABR.

232 VERMES. MOLL: SEPIA. BEROE.

2806. *H. pentactes*, tentaculis denis, corpore quinquefariam verrucoso. Gr. *Innelualik*. †

2807. *H. priapus*, ore papillis carnosis, corpore striis annularibus; glandis longitudinalibus. I. *Takirfionak*. Isl. R. 900. t. 10; fig. 9. ex specimine mutilato. †

2808. *H. Penicillus*, tentaculis racemosis octo, corpore osseo pentagono. * †

2809. *H. Fusus* tentaculis denis, corpore fusiformi tomentoso. * †

2810. *H. squamata*, tentaculis octonis subramosis, corpore supra scabro, subtus molli. * †

2811. *H. inbarens*, tentaculis duodenis, corpore papilloso, sexfariam lineato. * † Affinis *H. Pentact*.

2812. *H. lagenam referens* tentaculis octonis fasciculatis. Gr. *Ummeraisuk*. O. FABR. * †

Sœe-Plomme vix *Holothuria*, *Ascidia* potius?

2813. *SEPIA Octopodia* corpore ecaudato, tentaculis pedunculatis nullis. N. *Suar*. APH. 1, 365. STR. S. 1. p. 204.

2814. *S. officinalis* corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. *Blek-Fisk*, *Blek-Sprutte*. N. *Halder*, *Kaule*, *Sœe-Mige*. OL. M. p. 47. f. P N. N. 2. c. 7. p. 288. f. *Ossa Sepiæ*: *Hval-Skial*. APH. 1, 365.

2815. *S. Loligo* corpore subcylindrico subulato, cauda ancipiti-rhombea. I. *Dile*. Gr. *Amikok*. OL. mus. t. 26. f. 2. STR. S. 1, 173.

Smakfskur, *Kol-Krabbe* Island. an *S. media* vel *Loligo*?

2816. *BEROE Infundibulum* ovatus, costis ciliatis novem. Gr. *Ikiparfursak*. MART. Spitzb. t. p, f, h. *Volvox Beroe* LIN.

2817. *B. Pileus globosus*, costis octo, cirrisque duobus ciliatis. Gr. *Ikpiarsursak*. MART. Spitzb. t. p. f. g. Volv. *bicaudatus* LINN.

Trivialia & synonyma Friderici MARTENS primi inventoris ab infrequentibus neglecta restitimus.

2818. *MEDUSA cruciata* orbicularis, cruce alba.
2819. *M. æquorea* orbicularis, planiuscula, margine inflexo, villoso, tentaculato.
2820. *M. aurita* orbicularis, subtus quatuor cavitatibus. *Hvid-Blank-Gople, Sõe-Nelde. I. Kiøbmands-Huer.*
2821. *M. capillata* orbicularis convexa, margine sedecies emarginato, subtus pilosa. *Rød-Gople.*
2822. *M. hemisphærica*, hemisphærica costis transversalibus quatuor, tentaculis marginalibus plurimis, margine integerrimo.
2823. *M. bimorpha* disco capitato, subtus cruce minuta foraminibus quinque cincta; margine ciliato. * †
2824. *M. digitale* hyalina, subtus centro pistillifero; margine ciliato. * † Binæ hæ O. FABR. debentur.
2825. *M. palliata* Bohadsch. t. XI. f. I. STR. S. I. p. 164. Thetys. * †
- Gople, Mandate, Manale, Sõe-Nelde. I. Marghytta, Skollabraake. Gr. Nuertlok* nom. generis.

Esca Balænarum Eg. Grœnl. c. 6. Medusa videtur, at quænam?

✱ Lunatæ.

2826. *ASTERIAS equestris* lunata granulosa, margine pulverinato, disco pulvilli glabro. P. N. N. 2. c. 7. p. 291. f.

234 VERMES. MOLLUSCA. ASTERIAS.

2827. *A. Pulvillus* lunata lubrica, margine integro, mutico. * †

2828. *A. militaris* lunata undique granulosa, margine pulvinato confimili. * †

*** Stellatæ.

2829. *A. phrygiana* stellata, ubique papillis subtus rosaceis obfita. Act. nidr. 4. p. 424. t. 14. f. 1, 2. STR. S. 1. p. 178, 2. An *A. reticulata* LINN.?

2830. *A. rubens* stellata laxa, radiis convexis, superne spinulis solitariis seriatis.
Colore nimis variat.

2831. *A. aranciaca* stellata disco lato, radiis subdepressis, fummo margine aculeato. Act. nidr. 4. p. 425. & 426. t. 14. f. 3-6.

2832. *A. papposa* stellata muricata serie marginali penicillata. P. N. N. 2. c. 7. p. 291. f. 1sl. R. 689.
Radiis 11, 12, 13 & 15 variat.

2833. *A. aspera* stellata aspera, serie marginali pectinata. *
Radiis 5, 8, 9, 10. variat. Huic *A. endeca* LIN.
Mant. p. 543. substitui debet.

2834. *A. perforata* stellata mutica dorso punctis pertusa. * †

2835. *A. minuta* stellata, margine pinnulis porrectis distantibus.

2836. *A. sanguinolenta* stellata supra sanguinea radiis apice albis. * †

*** Radiatæ.

2837. *A. rosea*, radiata, aspera, granulis reticulata, radiis teretibus. * †

2838. *A. glacialis* radiata, radiis pentagonis; angulis verrucoso-aculeatis.

2839.

2839. *A. pertusa* radiata, scabra, radiis teretibus, basi angustatis, gibbis. * +
2840. *A. Ophiura* radiata, disco squamoso, squamula angulorum ferrata.
Huc referenda *A.* radiis in morte dissilientibus.
Isl. R. 900. c.
2841. *A. aculeata* radiata, aculeis glabris latitudine radii brevioribus. Stupenda in hac colorum varietas.
2842. *A. ciliata* radiata, spinis asperis latitudine radii longioribus.
2843. *A. filiformis* radiata, disco squamoso, aculeis latitudine radii æqualibus. * +
2844. *A. Caput Medusæ*, radiata, radiis duplicatis dichotomis.
N. *Søe-Soel*, *Søe-Navle*. APH. 7, 519. STR. S. 1, 179, 6. P. N. N. 2, 288.
Aft. 4 & 5. STR. S. p. 179. juniores *A. ophiuræ* vel *aculeatæ*.
D. *Søe-Stjerne*, *Kors-Fisk*, *Kors-Trold*. Gr. *Nerpiksoak*, *Nerpiksout* nom. gen.

4. TESTACEA.

2845. ECHINUS *Sphæra*, subsphæricus ruber, spinis subcæruleis. N. *Krage-Bold*, *Igelkier*, *Bust-Divel*, *Julkier*; *Krake-Baller*, *Søe-Æble*. I. *Igul*. P. N. N. 2. c. 7. p. 275. f. APH. 4, 45. Vix *E. esculentus* auctorum.
2846. *E. Drobachiensis* hemisphæricus pallidus, spinis longis albis. * +
2847. *E. saxatilis* hemisphærico-depressus, vel orbicularis, spinis diversicoloribus. Gr. *Ekkurjak*.
2848. *E.* spinis obtusis. *Søe-Pind-Svin*. P. N. N. 2. c. 7. p. 278. f. STR. S. 175.

236 VERMES. TEST: SPAT: DENT: SERP:

2849. SPATAGUS *flavescens* ovatus, gibbus, ambulacris quaternis depressis. *Guld-Igel-Kier*. Ech. *spatagus* LINN.
2850. S. *purpureus* cordiformis, spinis majoribus raris albis. * +
2851. S. *pusillus* ovalis ambulacris quinis, ano remoto. * +
Föl-Trin, APH. 2, 485. nom. gen.
2852. DENTALIUM *Entalis* testa tereti subarcuata, continua, lævi. *Pibe-Stilker, Tand-Skiel*. APH. 8, 25.
2853. D. *arietinum* testa tereti arcuata, continua, lævi. * +
Oktuplo tenuior, magisque arcuata, quam *Entalis*.
2854. SERPULA *spirillum* testa regulari spirali orbiculata pellucida, anfractibus teretibus sensim minoribus. *Gr. Katungiak*.
2855. S. *spirorbis* testa regulari spirali orbiculata, anfractibus supra introrsum subcaniculatis, sensimque minoribus. N. *Ruur*.
2856. S. *triquetra* testa repente flexuosa, triquetra. Act. nidr. 4. p. 53. t. 2. f. 14. Act. Havn. 10. p. 17. STR. t. 6. f. 1-5. optime.
2857. S. *granulata* testa tereti spirali, glomerata, latere superiore sulcis tribus elevatis.
2858. S. *glomerata* testa tereti decussato-rugosa, glomerata. I. *Pii-Puskel*. Isl. R. 901. H. 1.
2859. S. *norvegica* lævis, teres, incurva, ore oblique truncato, basi anfractuosa, subobsoleta, adnata. Act. nidr. 4. p. 51. t. 2. f. 11, 12, 13. * *
2860. S. *porrecta* testa tereti e basi spirali flexuose ascendente. * +
Skips-Tennur & *Serpula* manus complicandas referens Isl. R. 901. quænam?

2861. ANCYLUS *lacustris*, testa membranacea, mucrone verticis subcentrali, \ apertura oblonga. *Söe-Skellet.* V. 385. Patella LINN.
2862. PATELLA *pellucida* testa integerrima, pellucida, radiis cæruleis. Aët. nidr. 4, 98. APH. 7, 194.
Variat radiis 4 -- 36 cæruleis.
2863. P. testa ovata compresso - gibba, alba, striata, vertice subrecurvo: fissura verticali antica. Gr. *Ajuaur-fak.* * †
2864. P. *Fissura* testa sulcato-reticulata, vertice recurvo, margine antice fursum fisso. Aët. nidr. 4, 100.
2865. P. *Fissurella* testa sulcata, vertice recurvo, antice perforato. * †
2866. P. *caca* testa integra punctis elevatis striata, vertice acuto, recto. * †
2867. P. *virginea* testa integerrima alba, radiis rubris. * †
2868. P. *tessulata*, testa integerrima albida, tessuris rubris. * †
2869. P. *fulva*, testa integerrima, aurantia; vertice mucronato submarginali. * †
2870. P. *anomala*, testa rudi, fusca, orbiculari, vertice submarginali. * †
2871. P. *testudinaria* testa integerrima, ovata, lævi, glaberrima. Aët. nidr. 4, 99.
2872. P. *testudinalis* testa integerrima, ovata, striata.
Albue-Skiæl, Top-Østers? P. N. N. 2. p. 262. f.
Fløe-Skiæl. Isl. R. 901. G. 2. APH. 1, 79.
2873. P. testa ovata, apice subspirali obtuso. Isl. R. 901.
vix P. *Neritoidea* LINN.?
2874. P. testa ovata, mucrone subacuto reflexo, margine leviter dentato. Isl. R. 901. G. 3.

238 VERM: TEST: HAL: ARGON: PLAN:

2875. *P. testa* ovato-conica, apice prope centrum obtuso. Gr. *Ajuaurfak*. Isl. R. 901. G. 2. t. II. f. II.

2876. HALIOTIS *tuberculata* testa subovata, dorso transversim rugoso, tuberculato.

2877. ARGONAUTA *Argo?* carina integra. Gr. *Tullukaurfak*.
Hofpes niger est; in mari Grænländico numerosissime. O. FABRICIUS.

* Testa depressa.

2878. PLANORBIS *Purpura*, testa opaca, supra umbilicata immaculata. *Purpur-Skiven*. V. 343. *Helix cornea* LINN.

2879. *P. carinatus*, testa pallida, pellucida, supra umbilicata, carina marginali media. *Kiöl-Skiven*. V. 344. *H. planorbis* LINN.

2880. *P. vortex*, testa flavo-fusca, subcarinata, supra concava, subtus plana. *Hvirvel-Skiven*. V. 345.

2881. *P. umbilicatus*, testa fusca, opaca, utrinque subumbilicata, carina marginali infera. *Navle-Skiven*. V. 346. *H. complanata* LINN.

2882. *P. Spirorbis* testa flavescens utrinque concava æquali; anfractibus teretibus. *Brikke-Skiven*. V. 347.

2883. *P. contortus*, testa fusca, supra plana, subtus umbilicata, apertura arcuata. *Tobaks-Rulle-Skiven*. V. 348.

2884. *P. nividus* testa polita, flavescens, supra convexa, umbilicata, subtus plana, perforata. *Glands-Skiven*. V. 349. *

2885. *P. albus* testa alba utrinque umbilicata, apertura dilatata. *Hvid-Skiven*. V. 350. *

2886. *P. imbricatus* testa alba umbilicata, carina dentata. *Tegel-Skiven*. V. 351. *Turbo nautilus* LINN.

2887.

2887. *P. similis* testa pellucida, supra umbilicata, punctis striata. *Ligedan - Skiven*. V. 352. *
 * * Testa conica.
2888. *P. Bulla* testa fragili, sinistrorsa, vertice obtuso, apertura ovata. *Boble-Perlen*. V. 353. *Bulla fontinalis* LINN.
2889. *P. turritus* testa nitida, vertice acuminato, apertura oblonga. *Taarn-Perlen*. V. 354. * +
2890. *P. gelatinus*, testa fragilissima, sinistrorsa, vertice depresso; apertura caudata. *Slim-Perlen*. * +
2891. VALVATA *cristata*, testa planiuscula umbilicata, apertura circinnata. *Plumas-Neriten*. V. 384.
 * Depressæ.
2892. HELIX *pellucida*, testa imperforata, depressiuscula, nitida, subvirescente anfractibus tribus. *Glas-Snekken*. V. 215. Act. nidr. 3, 65. t. 6. f. 15. *
2893. *H. crystallina* testa perforata, depressa, candida, nitida, diaphana. *Krystall-Snekken*. * +
2894. *H. cellaria* testa umbilicata, depressa, lutescente, nitida, subtus lactea; apertura larga. *Kielder-Snekken*. V. 230. *
2895. *H. rotundata* testa umbilicata, subdepressa, lineis transversis elevatis, maculisque ferrugineis. *Knap-Snekken*. V. 231. *
2896. *H. pulchella* testa umbilicata, subdepressa, alba, glabra, apertura circinnata; labro tereti, reflexo. *Hvid-Snekken*. V. 232. *
2897. *H. costata* testa subdepressa umbilicata, cinerea; spiris costatis; apertura circulari; labro albo reflexo. *Ribbeen-Snekken*. V. 233. * +

2898. *H. nitida* testa umbilicata subdepressa, fulvo-cornea, pellucida, substriata, apertura, larga. *Glis-Snekken*. V. 234. Act. nidr. 3, 66. t. 6. f. 16. *
2899. *H. Lapidida* testa umbilicata, carinata, depressa, maculata, apertura transversa, alba. *Lille Lampe-Snekke*. V. 240.
2900. *H. Haliotoides* testa imperforata depresso-planiusculâ striis undatis, apertura ovali dilatata usque ad apicem. Gr. *Akoperursak*.
- * * Globosæ.
2901. *H. Pomaria* testa imperforata, globosa, rufescente, fasciis obsoletis. *Vold-Snekken*. V. 243.
2902. *H. nemoralis* testa imperforata, globosa, labro fusco. *Skov-Snekken*. V. 246. Colore & fasciis magnopere variat. APh. 7, 408.
2903. *H. hortensis* testa imperforata, globosa, labro albo. V. 247. *
2904. *H. arbutorum*, testa imperforata, globosa, fusca, lineolis luteis, labro albo. *Krat-Snekken*. V. 248.
2905. *H. fulva* testa imperforata globosa, pellucida, fulva, labro albo. *Topas-Snekken*. V. 249. * +
2906. *H. sericea* testa perforata, subglobosa, subcarinata, utrinque convexa, tomentosa. *Silke-Snekken*. V. 258. * +
2907. *H. incarnata* testa perforata, subglobosa, subcarinata, cornea anfractibus sex, labro incarnato. *Nödde-Snekken*. V. 259. *
2908. *H. Fruticum* testa globosa, umbilicata, apertura elabiata. V. 267. Punctis, maculis & fasciis valde variat. *
2909. *H. hispida* testa subglobosa, umbilicata, hispidosa. *Börste-Snekke*. V. 268.

* * * Variæ

*** Variæ.

2910. *H. Trochulus* testa imperforata trochiformi, fusca, glabra; apertura edentula, labro nullo. *Trilde-Snekken*. V. 276. * +
2911. *H. aculeata* testa trochiformi umbilicata, utrinque convexa, fusca, costis aculeatis; labro albido. *Pig-Snekken*. V. 279. * +
2912. *H. succinea* testa oblonga, fulva, diaphana, anfractibus tribus, apertura ovata. *Rav-Snekken*. V. 296. *H. putris* LINN.
2913. *H. obscura* testa conica fusca, apertura edentula labro albo. *Bygkorns-Snekken*. V. 302. *
2914. *H. lubrica* testa conica fulva, nitida, pellucida, acuta; apertura edentula, labro rubente. *Glands-Snekken*. V. 303. * Isl. R. 901. p. 1019. D?
2915. *H. Muscorum* testa cylindracea, obtusa; apertura edentula, orbiculata, labro albo. *Bimpel-Snekken*. V. 304. A. nidr. 3, 69.
2916. *H? pella* testa imperforata, ovato-acuminata transverse striata, fusca fasciis flavis.
2917. *H. bidens* testa turrita fusca, glabra, sinistrorsa, apertura canaliculata. *Glatte Links - Snekke*. V. 315. A. nidr. 3, 67, 68. t. 6. f. 17. Turbo LINN.
2918. *H. perversa* testa turrita, fusca, striata, sinistrorsa, apertura canaliculata. *Krusede Links - Snekke*. V. 316. Turbo LINN.
- Terrestres Cochleæ Isl. R. 901. p. 1019. *Cylindrus* B. *Dohum*, C. *Turbines* E. & *nerita* F. quænam sint, inquirent autoptæ.
2919. VERTIGO *pufilla* testa cylindracea, sinistrorsa. *Sand-Korn-Snekken*. V. 320. * +

242 VERM: TEST: CAR: BUL: TROC: TURB:

2920. CARYCHIUM *minimum* testa subconica, dextrorsa;
apertura obscure denticulata. *Soel-Gran-Snekken*,
V. 321. * +
2921. AKERA *bullata* testa ovata pellucida, vertice truncato,
canaliculato. * +
2922. BULLA *velutina* testa ventricosa, tomento transversim
fulcata, vertice obtuso. * +
2923. B. *latens* testa repanda, glabra, vertice depresso, subla-
terali. Act. Havn. 10. p. 10. b. t. 5. f. 1-4 * +
Tethys.
2924. B. *plicatilis* testa ovali pellucida, vertice depresso, aper-
tura dilatata. * +
2925. TROCHUS *cinerarius* testa oblique umbilicata ovata,
anfractibus rotundatis.
2926. T. *Zizyphinus* testa imperforata conica livida, lævi, an-
fractibus marginatis. STR. S. I, 186. α.
2927. TURBO *fuscus* testa flava striis elevatis transversis. * +
2928. T. *obtusatus* testa subrotunda, lævi, flava.
Limax corniculis duobus postice in dorso.
2929. T. *crystallinus* testa turrita, anfractibus costatis, apertura
ovata. * +
2930. T? *ungulinus* testa turrita, anfractibus striis decem
exoletis.

Hanc testam hospitem singularissimum inhabitare
sæpius reperi, nec alium unquam inveni,
nihilominus, an sit legitimus domicilii
possessor, valde dubito. Proboscis lon-
gissima, tentaculorum limacis instar exser-
tilis, apice globoso, globo cirris pluri-
bus brevibus instructo. Corpus ventri-
cosum.

Fiauru-Kongar Isl. nom. gen.

2931. BUCCINUM *Auricula* testa ampullacea, cornea, mucrone acuto brevi; apertura amplissima. *Öre-Horner*. V. 322. *Helix* LINN.
2932. *B. glutinosum* testa ventricosa, diaphana, mucrone obtuso, apertura ampla. *Slim-Horner*. V. 323. * +
2933. *B. peregrum* testa cornea subconica, mucrone acuto, apertura ovata. *Vandrings-Horner*. V. 324. *
2934. *B. palustre* testa oblonga, acuminata, fusca; apertura ovata. *Lille Spids-Horn*. V. 326. *
2935. *B. stagnale* testa oblonga, subulata, ventricosa, apertura ovato-repanda. *Store Spids-Horn*. V. 327. *Helix stagnalis & fragilis* LINN.
2936. *B. glabrum*, testa cylindracea, acuminata, cornea; apertura ovata. *Glat-Horner*. V. 328. * +
2937. *B?* *aciculare*, testa turrita, lævi, nitida, apice fulvo; apertura elliptica. * +
2938. TRITONIUM *undatum*, testa oblonga, rudi, transversim striata, anfractibus curvato-multangulis. I. *Sof-Kongur*. Gr. *Sinzerut*. Isl. R. 901. t. 10. f. 1. *Buccinum* LINN.
2939. *T. antiquum* testa patulo-caudata oblonga, anfractibus octo teretibus. *Murex* LINN.
2940. *T. despectum* testa patulo-subcaudata, oblonga, anfractibus octo: lineis duabus elevatis. *Murex* LINN.
2941. *T. clathratum* testa oblonga caudata, plicis longitudinalibus submembranaceis fulcata. Aët. nidr. 4. p. 54. t. 11. f. 17-19. *Murex* LINN.
2942. *T. glaciale* testa lævi substriata ovato-oblonga, anfractu infimo subcarinato. *Buccinum* LINN.
2943. *T. cingulatum* cingulis tribus elevatis, supra infraque canaliculatis. *Buc.* LINN.

2944. *T. Lapillus* testa ovata acuta, striata, lævi, columella planiuscula. I. Bobbe. STR. S. I, 183. γ. APH. 8, 234. Bucc. LIN.
2945. *T. pes pelecani* testa labro tetradactylo palmato, digitis angulato, fauce lævi. STROMBUS LINN.
2946. *T? incrassatum* testa oblonga, transversim rugosa, longitudinaliter striata, labro intus denticulato, extus incrassato. Aët. nidr. 4, 96. f. 25. * †
2947. *T. truncatum* testa oblonga, longitudinaliter costata, cauda subreflexa, emarginato-truncata. Aët. nidr. 4, 97. t. 16. f. 26. * †
2948. *NERITA sphaerica* testa globosa, cornea, vertice obtuso. Kugle-Neriten. V. 356. * †
2949. *N. piscinalis* testa globosa, perforata, rufo-fusca. Dam-Neriten. V. 358. * †
2950. *N. jaculator* testa oblonga, cornea, vertice acuto. Bombe-Kasteren. V. 372.
2951. *N. contorta* testa turbinata, cinerea, perforata, vertice truncato. Snirkel-Neriten. V. 374. * †
2952. *N. fluviatilis* testa dilatata, convexa, albis maculis reticulata. Flod-Neriten. V. 381.
2953. *N. littoralis* testa lævi, vertice carioso, labiis edentulis. Gr. Suiterursak. STR. S. p. 185. α.
2954. *N. littorea* testa subovata, acuta, striata, margine columnari plano. N. Kukkelnur, Konge, Konung. I. Naa-Kongur, Breitu-Kongur, Kupunge. STR. APH. 7, 416. Turbo LINN.
2955. *N.* testa globoso-subacuta crassiore spiris 4, fulcis inter spiras profundissimis. Isl. R. 901. * †

2956. N. testa globosa, crassiore; spira submucronata, anfractibus tribus. Isl. R. 901. vix *Canrena*, uti auctor vult. Ibidem plures colore variantes.

Isl. nom. gen. *Meyiar-Pattar*.

2957. SOLEN *siliqua* testa lineari recta, cardine altero bidentato. N. *Lang-Skial*. STR. S. I, 201. γ. P. N. N. 2. p. 262. f.

2958. S. *Legumen* testa lineari ovali recta, cardinibus bidentatis: alterius bifido.

2959. MYA *truncata* testa ovata postice truncata, cardinis dente antrorsum porrecto, obtusissimo. *Sand-Skial*, *Sand - Mige*. I. *Redduskel*, *Smyrsling*. Gr. *Ufursak*. Isl. R. t. 11. f. 7.

2960. M. *arenaria* testa ovata postice rotundata, cardinis dente antrorsum porrecto, rotundato, denticuloque laterali. *Sand-Skial*. I. *Sand-Migur*, *Flingr*. Gr. *Ufursak*. APH. 5, 47.

2961. M. *margaritifera* testa ovali oblonga, apertura sinuata, natibus decorticatis. *Perle-Migen*, *Perle-Musling*, *Perle-Skial*. V. 396. P.N.N. 2.c.7. p. 265. f. *Berl. Besch*. I. p. 344.

2962. M. *arctica* testa striata: valvulis carinis duabus spinulosis sæpe obsoletis; cardine edentulo.

Eadem ac Solen *minutus* Linnæi & Chama *aculeata*. A. nidr. 4, 95. t. 16. f. 24.

2963. M. *nitida*, testa ovali alba, lævi, dente obtuso in utroque cardine. * †

2964. M. testa ovata membranacea, candida, margine ad proboscidem protracto reflexo. I. *Sog-Skel*. Isl. R. 901. t. XI. f. 10. * †

Isl. *Hollokur*, *Skraalaagr* nom. gen.

- 246 VERM: TEST: TELL: CARD: MACT: DON:
2965. *TELLINA rivalis* testa globosa, gibba, glabra, umbo-
ne obtuso. *Bæk-Tellinen*. V. 387. *T. cornea* LIN.
2966. *T. lacustris* testa rhombea, planiuscula, glabra, umbone
acuto. *Söe-Tellinen*. V. 398. Isl. R. p. 1019. A? * +
2967. *T. amnica* testa subcordiformi transversim sulcata, um-
bone obtuso. *Aae-Tellinen*. V. 389. * +
2968. *T. radiata* testa oblonga longitudinaliter subtilissime
substriata, nitida, futura anali canaliculata.
2969. *T. trifasciata* testa ovata læviuscula sanguineo-triradiata,
pube rugosa.
2970. *T. balzbica* testa subrotunda lævi, extus incarnata.
2971. *CARDIUM echinatum* testa subcordata, sulcis exaratis
linea ciliata, aculeis inflexis plurimis. Gr. *Kirk-
foaurfak*.
2972. *C. edule* testa antiquata, sulcis 26 obsolete recurvato-
imbricatis. N. *Bekkre-Skiel*. I. *Baarn-Skiel*.
2973. *MACTRA solida* testa opaca læviuscula subantiquata.
2974. *DONAX Trunculus* testa antice lævi, intus violacea,
marginibus crenatis.
2975. *VENUS Gallina* testa subcordata, radiata, striis trans-
versis obtusis, cardinis dente postico, minimo,
margine crenulato.
2976. *V. mercenaria* testa cordata solida transversim substriata
lævi, margine crenulato, intus violacea, ano ovato.
2977. *V. islandica*, testa cordata transversim striata rudi, nym-
phis hiantibus, ano nullo. N. *Rund-Skiel*, *Koe-
Skiel*. I. *Kufskiel*, *Krok-Fiskur*. Gr. *Epiksaumak*.
Isl. R. 901. t. 11. f. 8. STR. S. 1, 201, 9. edulis.
Hæ in HAM. FN. N. quatuor species trium diver-
forum generum, 890, 896, 897, 904 perperam
constituit.

2978. *V. exoleta* testa lentiformi transversim striata pallida, obsolete radiata, ano cordato.
2979. *V. testa ovata tenera, lævi. I. Kuldafskiel. Isl. R. 901. affinis V. island.*
2980. *V. testa ovata minus convexa, crassa. I. Gimbur, Gimmerfskiel. Isl. R. 901. Binæ hæ & Sog-Skiel: Isl. R. t. 11. f. 10. ulterius inquirentur.*
2981. *CHAMA trapezia* testa trapezia gibba, fulcis longitudinalibus crenulatis.
2982. *ARCA barbata* testa oblonga striis barbata, natibus incurvis approximatis, margine integerrimo clauso.
2983. *A. tortuosa* testa parallelipeda striata, valvulo oblique carinata, natibus recurvis, margine integerrimo, LIN. Syst. p. 1140.
2984. *A. nodulosa* testa oblonga nodulis striata, natibus incurvis remotis, margine integerrimo clauso. * † Clarif. STRÖM misit.
2985. *A. minuta* testa compressiuscula, extremitate remotiore attenuata, opposita rotundata, transversim striata, margine integro. Gr. *Imenningoak. * † O. FABR.*
2986. *OSTREA edulis* testa inæquali semiorbiculata membranis imbricatis undulatis, valvula altera plana integerrima. *Östers. AFH. 6, 99.*
2987. *O. striatula*, testa æquali orbiculari alba semicirculis concentricis. * † Clarif. STR. misit.
2988. *O. retusa*, testa æquali oblonga, alba glabra, striata; umbone a cardine remoto. * † *Krugge, P. D. A. 1, 661. quænam?*

2989. PECTEN *maximus* testa inæquivalvi, radiis rotundatis longitudinaliter striatis. N. Kiering-Öre. P. N. N. 2. c. 7. p. 262. f. Ostrea LINN.
2990. P. *Islandicus* testa orbiculari aurita, circulis purpureis, radiis 100. I. Hörpudiskur. Isl. R. 901. t. 10. f. 5. edulis. * †
Ostrea testa pectinata irregulari, rugosa. Isl. R. 901. C. 3. quænam?
2991. P. *triradiatus* testa subæquivalvi glabra, immaculata, striis minimis. * †
2992. P. *septemradiatus* testa subæquivalvi striata glabra, radiis convexis septem. * †
2993. P. *tigerinus* testa subæquivalvi striata glabra, rubra maculis albis. * †
2994. P. *striatus* testa subæquivalvi striata, maculata, marginem versus scabra. * †
2995. P. *fulcatus* testa subæquivalvi intus & extus sulcata rubra, hinc scabra illinc glabra. * †
2996. P. *20-sulcatus* testa æquivalvi intus & extus sulcata fulva, maculis raris rufis, interstitiis rugosis. Cl. STRÖM. misit. * †
2997. P. *opercularis* testa inæquivalvi radiis 20, subrotunda, decussatim striato-scabra, operculo convexiore. Færoenf. Ruiboe-Skiel. O. *opercularis* LINN.? Doctif. MOHR Færoensis dedit.
2998. ANOMIA *squamula* testa orbiculata, integerrima plana, margine altero gibba, lævi.
2999. A. *patelliformis* testa ovata convexa, subdiaphana striata, vertice postico recurvo, lævi.
3000. A. *retusa* testa obovata striata retusa: convalle longitudinali, nate perforata.

3001. *A. truncata*, testa suborbiculata obsolete striata, cardine truncato.

3003. *A. testa* subovata pellucida, supra striis transversis undulatis.

3004. *A. avenacea* testa piriformi versus cardines protracta, subcompressa. Isl. R. 901. * +

3005. *A. aculeata* testa subrotunda, aculeata, vertice lævi, postice recurvo. * +

Gluge-Skial, nom. gen.

3006. TEREBRATULA *Cranium* testa lævi ventricosa, transversim subtiliter striata.

Hæc *Terebratula* auctorum, an vero LINNÆI? valvulas enim nec bi-nec triplicatas invenio.

3007. *T. pubescens* testa tomentosa, subquingulari, longitudinaliter striata.

Anomia LINN. an ab *A. Cap. Serpentis* diversa?

Tomentum non omnes æqualiter vestit, Spongiamque parasiticam suspicor.

3008. *T. Nucleus* testa glabra; ovali, longitudinaliter sulcata. * +

Terebratuler nom gen. APH. 8, 58.

3009. MYTILUS *anatinus* testa ovali, antice compressa, natibus decorticatis. *Ande-Musling*. V. 393.

3010. *M. cygneus* testa ovata, antice convexa, natibus integris. *Swane-Musling*. V. 394.

3011. *M. rugosus* testa rhomboideo-ovali rugosa obtusa, antiquata.

3012. *M. barbatus* testa læviuscula ferruginea, extus apice barbata.

3013. *M. edulis* testa laeviuscula violacea, valvulis antice subcarinatis, postice retusis, natibus acuminatis. *Musling. N. Krake-Skiel, Blaa-Skiel. I. Kraklingur. Gr. Uilok, Killiortout. REGENF. C. t. 7. f. 8. t. 11. f. 53.*
3014. *M. modiolus* testa laevi margine anteriore carinato, natibus gibbis, cardine sublaterali. *Krage-Skiel.*
3014. *M. discors* testa ovali cornea subdiaphana antice longitudinaliter, postice transversaliter, striata. *Gr. Bibibiarfuk.*
3015. *M. Faba* testa ovali rufa striata, margine crenulato. *Gr. Bibibiarfuk. O. FABR. e Grœnlandia misit. * †*
3016. *M.* testa ovata, oblonga, planiuscula. *N. Óeskial, Torſke-Skiel, Aude. I. Ada, Óufskiell. Isl. R. 901. * †*
3017. CHITON *fascicularis* testa octovalvi, corpore ad valvulae utrinque fasciculato.
3018. *C. ruber* testa octovalvi arcuato-substriata, corpore rubro. *Gr. Terkeingak. Act. nidr. V. 364. t. 6. f. 14. Arn. 1, 524.*
3019. *C. albus* testa octovalvi laevi, valvula prima postice emarginata. *Act. nidr. 4. p. 54.*
3020. *C. cinereus* testa octovalvi ovata.
3021. *C. punctatus?* testa octovalvi laevi, carinata. *I. Thri-streudingur, nom. forte generis. Isl. R. 901.*
3022. LEPAS *Balanus* testa conica fulcata, fixa, operculis acuminatis. *Bierg-Rur. Gr. Karungiak.*
3023. *L. Balanoides* testa conica truncata, laevi fixa, operculis obtusis.
3024. *L. balanaris* testa subconica, lobis sex elevatis, rugosis, quadripartitis; operculo membranaceo, bidentato. *Gr. Keporkabkarungiarfoak. Isl. R. 901. B. b.*

3025. *L. Strömia* testa conico-convexa, ferrato-striata, operculo elevato. Act. Havn. 10. p. 6. t. 3. f. 1-9. * †
3026. *L. Tulipa* testa sub-cubica lævi, operculis acutis, transversim striatis. Söe-Tulip. 1. Hrudurkall. Isl. R. 901. B, a. t. 11. f. 13. Asc. ic. t. 10. * †
Hirsuties operculorum ex rudimentis *Sertulariarum*.
3028. *L. Scalpellum* testa compressa tredecimvalvi læviuscula, intestino squamoso insidente.
3029. *L. anatifera* testa compressa quinquevalvi lævi, intestino insidente. Stok-Ænder, Vand-Æller, Angle-Tascher. 1. Helsingianef. P. N. N. 2. §. 12. f. APH. 1, 133. STR. S. 1. p. 213. BARTH. H. an. cent. 6, 46. f. 2.
3030. *L. aurita* testa membranacea ventricosa tubo insidente, ore octovalvi dentato, tubulo gemino aurita.
Concha anatifera major BARTH. h. an. Cent. 6, 46. f. 2. quænam?
3031. PHOLAS *dactylus* testa oblonga, hinc reticulato-striata.
3032. *Ph. crispatus* testa ovali hinc obtusiore crispata striata, cardinis dente curvo. LINN.
3033. *Ph. candidus* testa oblonga, undique striis decussatis muricata. 1. Berg-Bue. Isl. R. 901. t. 11. f. 3-6.
3034. *Ph. Teredo* tubulo fragilissimo, cardinis dente acuto, N. Jægte-Skib-Pæl-Bolværk-Orm. 1. Tremadr. Gr. Kerksubkoma. APH. 8, 208. *Teredo navalis* LIN.

5. CELLULANA.

3035. *ISIS Hippuris* stirpe corallina, articulis striatis, geniculis attenuatis. 1. Marmenils Smide, Havmønds Arbeide. Gr. Sarpargausæt. Act. nidr. 4. p. 70. t. 4. f. 8.

3036. TUBIPORA *infundibuliformis* corallio turbinato infundibuliformi subprolifero. Act. nidr. 3, 70. * †
3037. MADREPORA *interstincta* composita stellis immerfis teretibus distantibus interstitio punctato. In Sinu Christianiensi.
3038. M. *damicornis* ramosa composita verrucosa, poris sparsis confertis immerfis margine solo crenatis? STR. S. I, 142. β. P. N. N. t. I. p. 258, 6.
3039. M. *muricata* ramosa composita subimbricata, stellis oblique truncatis, prominentibus, ascendentibus. Act. nidr. 4. p. 62.
3040. M. *prolifera* ramosa subdichotoma reticulato-coalescens, stellis latere proliferis terminalibus concavis. Act. nidr. 4. p. 38. t. 2. f. 1, 2. P. N. N. I. p. 258. p. 257, 3. f. A. STR. S. I. p. 144. C.
- ✓ 3041. M. *virginea*. Act. nidr. 4. p. 56. t. 8. f. 1-4. STR. S. I. p. 144. δ. P. N. N. I. t. 14. f. G. vix M. *virginea* LINNÆI & PALLAS.
- ✓ 3042. M. *ramea* caulescens pinnata undulato-friata, stellis terminalibus. LINN.
- ✓ 3043. MILLEPORA *truncata* caulescens dichotoma, erecta, ramis truncatis. STR. S. I. p. 142. δ. Act. Havn. 10. p. 258. t. g. f. 10.
- ✓ 3044. M. *lineata* caulescens dichotoma, teres, poris multiplicatis, seriatis. In Sinu Sognensi.
- ✓ 3045. M. *aspera* ramosa subcompressa muricata poris eminentibus hinc fissis. Act. nidr. 4. p. 64. t. 2. f. 20, 21, 22.
- ✓ 3046. M. *Lichenoides* caulescens decumbens bifarie dichotoma, ramis denticulatis binis porosis scabris. P. N. N. I. t. 14. f. D. E.
- ✓ 3047. M. *cellulosa* membranacea reticulata, umbilicata turbinato-undulata, hinc porosa pubescens. N.

- Hul-Fad*, *Søe-Trægt*, *Hul-Blad*, *Corall-Trægt*.
P. N. N. I. t. 14. f. F. STR. S. I. p. 142. a.
Aët. nidr. 4. p. 77. t. 3. f. I. d, f. & f. 3.
3048. *M. polymorpha* crustacea polymorpha solida, poris nullis. N. *Bierg-Ruur*, *Kalk-Ruur*, *Soe-Kul*, *Kalk-artig Bierg-Skorpe*. Aët. nidr. 4. p. 71. t. 15. f. 1, 2, 3. STR. S. I. p. 161.
3049. *CELLEPORA ramulosa* dichotomo-fasciculata, ramulis teretibus obtusis, tubis confertissimis, cylindricis. LIN.
3050. *C. pumicosa* corallio dichotomo subcompresso erectiusculo scabro. P. N. N. I. t. 14. f. β. STR. S. I. p. 142. γ. Aët. nidr. 4. p. 59. t. I. f. 6, 7.
3051. *FLUSTRA foliacea* foliacea ramosa: laciniis cuneiformibus rotundatis. LINN.
3052. *F. truncata* foliacea subdichotoma; laciniis linearibus truncatis. In Sinu *Kragerøensi*.
3053. *F. pilosa* foliacea varie ramosa; poris infimo dente setaceo.
3054. *F. membranacea* plano foliacea indivisa ferrata, hinc cellulis quadrangulis oblongis.
3055. *F. lineata* plano-foliacea indivisa adnata, hinc cellulis ovalibus.
Coral-Barke nom. gen. APH. I, 558.
3056. *CORALLINA officinalis* subbipinnata, articulis sub-turbinatis. *Coralline*. I. *Hvitt Turfa - Skag*. Aët. Havn. 10. t. e. f. 7. APH. I, 552.
3057. *C. cristata* filiformis dichotoma fastigiata, articulis teretiusculis divifurarum superiorum clavatis. Pall. Zooph. 425. Ellis t. 24. f. g, G. ad rupes *Grönholmene* Christiansandenses.
3058. *GORGONIA Flabellum* reticulata, ramis interne compressis, cortice flavo.

3059. *G. lepadifera* dichotoma floribus sparsis confertis reflexis campanulatis imbricatis. Act. nidr. 2. p. 321. t. 9. f. 1, 2. P. N. N. 1. p. 252. t. 13. f. 11. Aph. 3, 113.
3060. *G. verticillaris* pinnata, ramosa, ramulis alternis parallelis, floribus verticillatis incurvis. LINN.
3061. *G. Placomus* bifaria ramis flexuosis rarius anastomosantibus, floribus conicis eminentibus. Act. nidr. 3. p. 1. t. 1. f. 1 - 3. P. N. N. 1. p. 249. t. 11. f. 3. STR. S. 1. p. 145. n. 11, 1.
3062. *G. pinnata* compressiuscula pinnata, ramis compressis simplicissimis, cortice rubro poris oblongis. LIN. vix P. N. N. 1. p. 248. t. 11. f. 2?
3063. TUBULARIA *Penicillus* cristata, cirris pectinatis, pavoniis, tubulo curvato, laevi. Söe - Pensel; Aph. 3, 505. Nierenformige Amphitrite; Würm. p. 194. t. 16. *Sabella* LIN.
3064. *T. repens* cristata, cirris utrinque radiatis, vagina porrecta; tubulo opaco procumbente. D. Plumas-Dyret. Verm. 150.
3065. *T. stellaris* cristata, cirris pectinatis, tubulo fusco, annulato, erecto. D. Stierne-Dyret. Verm. Helm. p. 18. * +
3066. *T. Fabricia* stellata, cirris pinnatis 6 ordinibus os cingentibus. * +. O. FABR.
3067. FISTULARIA *ramosa* culmis ramosis, geniculis contortis. *Tubularia* LIN.
3068. *F. muscoides* culmis subdichotomis, totis annulofo-rugosis.
3069. *F. simplex* cirris octo linearibus; tubulo conico hyalino. D. Straale-Dyret. Verm. Helm. p. 19. * +
3070. *F. longicornis* cirris duobus setaceis tubulo decuplo longioribus. * +
3071. *F. multicornis* cirris ultra viginti centro candido, corpore tereti hyalino; tubulo mucido. * +

3072. SERTULARIA *abietina* denticulis suboppositis tubulosis, ovariis ovalibus, ramis pinnato-alternis. 1. *Kraka-Mare*.
3073. S. *halecina* denticulis alternis obsoletis, calycibus biarticulatis, ovariis ovalibus, caulibus coadunatis.
3074. PENNATULA *mirabilis* stirpe filiformi, rachi distiche pennata, pinnis lunatis remotis alternis.
3075. P. *phosphorea* stirpe carnosa, rachi scabra, pinnis imbricatis. *Soe-Fiar*. P. D. A. t. 30. f. 1, 2, 3. *APH*. 7, 481.
3076. P. *stellifera* simplex æqualis apicem versus polypis solitariis. * +
3077. ALCYONIUM *arboreum* stirpe arborea, ramis obtusis, poris pabularibus. N. *Grund-Ved, Hav-Gran*. *Act. nidr.* 4 p. 87. t. 11. f. 1-8. P. N. N. 1. p. 249. f. 1, 4.
3078. A. *digitatum* acaule oblongum, coriaceum rugosum.
3079. A. *manus diaboli* polymorphum, protuberantiis obtusis perforatis.
3080. A. *Cranium*, tuberiforme album, fetosum. *
N. *Soe-Bold, Soe-Iver*. P. N. N. 1. p. 252. t. 13. f. 10. *STR. S. 1.* p. 148, 7.
3081. A. *rubrum* crustaceum, molle, miniatum, punctis sparsis saturatioribus. * +
3082. A. *gelatinosum* cinerascens-hyalinum ramosum, ramis teretibus subacutis.
3083. A. *massa*, informe, fulvum, spongiosum, patulum; stellulis quinque radiatis; centro nigro. * +
3084. SPONGIA *Ventilabrum* flabelliformis, conformis, stuposa, venis lignosis reticulatis, obtectis poris favigineis. *Act. nidr.* 4. p. 74. t. 3. f. 1, 2. & t. 4. f. 3, 4. P. N. N. 1. p. 251. t. 13. f. 8. *STR. S. 1.* p. 146, 4.

256 VERMES. CELLULANA. CLAVARIA.

3085. *S. infundibuliformis* infundibuliformis turbinata, flexilis. Aët. nidr. 4. p. 78. t. 4. f. 5.
3086. *S. bacillaris* conformis caulescens erecta, ramis apressis porulosis. LINN.
3087. *S. officinalis* foraminulata, subramosa diformis tenax, tomentosa. N. Siö-Vor, Siö-Vante. STR. S. I. p. 128.
3088. *S. dichotoma* conformis dichotoma erecta, disticha bifaria cylindrica flexilis, tomentosa. P. N. N. I. p. 251. t. 12. f. 7. STR. S. I. p. 146, 3. Aët. nidr. 4. p. 79. t. 5. f. 1. & t. 6. f. 1.
3089. *S. fluviatilis* conformis erecta, fragilis, polymorpha.
3090. *S. coalita* ramosissima mollis tenera, flava, ramis compressiusculis. * ELLIS p. 95. t. 32. f. F?
3091. *S. Pocillum* cylindrica, pedicellata vertice pertuso. * +
3092. *S. plana*, expansa, crustacea, flabelliformis. * +
3093. *S. cruciata* alba pinnatifido-ramosa, compressa, ramis obtusis, villoso-muricatis. * +
3094. *S. ossiformis* alba subramosa, apice incrassato, lacunoso. * +
3095. *S. mucida*, alba crustacea in aculeos producta. * +
Söe-Svamp nom. gen. APH. I, 559.
3096. CLAVARIA *militaris* crocea, clava verrucosa. Fl. Dan. t. 657. Berl. Besch. I, 156. N.A.C. 4, 215. t. 7. f. 5.
3097. *C. ophioglossoides* nigra, clava compressa, obtusa.
Variat clava triquetra, acuminata; clavam etiam sphaericam reperi. Berl. Besch. I, 158.
3098. *C. serpentina*, viridis, clava oblonga. *
3099. *C. Spatbula* lutea, clava compressa dilatata, stipite rugoso. Fl. Dan. t. 658. * Berl. Besch. I, 163.
3100. *C. pistillaris* lutea clava tereti, vertice obtuso.
3101. *C. Flabellum* lutea, compressa, clava dilatata, laciniata. * +

Facilius mirari & commentari, quam vera dignoscere & definire.

NOMINA GENERUM.

A carus	186	Binoculus	200	Cistela	158
Acheta	100	Blatta	99	Clavaria	256
Accipenser	39	Blennius	43	Clio	226
Acridium	100	Bombylius	182	Clupéa	49
Actinia	230	Bos	6	Cobitis	47
Akera	242	Brachionus	212	Coccinella	65
Alauda	28	Bruchus	57	Coccus	111
Alca	16	Buccinum	243	Coluber	36
Alcedo	13	Bulla	242	Columba	28
Alcyonium	255	Buprestis	59	Colymbus	18
Altica	84	Bursaria	206	Conops	180
Amodytes	40	Byrrhus	57	Copris	55
Ampelis	30			Coracias	12
Amphitrite	216	C allionymus	41	Corallina	253
Amymone	198	Cancer	195	Coryphæa	43
Anarichas	40	Canis	2	Corvus	11
Anas	13	Cantharis	80	Cottus	44
Anaspis	58	Capra	6	Crioceris	85
Ancylus	237	Caprimulgus	34	Cryptocephalus	58
Anguis	36	Carabus	75	Cuculus	12
Anomia	248	Cardium	246	Culex	182
Anthrenus	58	Carychium	242	Curculio	85
Anthrribus	57	Cassida	65	Cyclidium	204
Aphis	109	Castor	4	Cyclops	200
Aphrodita	218	Cellepora	253	Cyclopterus	39
Apis	163	Cerambyx	91	Cynips	147
Aranea	192	Cercaria	206	Cyprinus	50
Arca	247	Certhia	13	Cypris	198
Ardea	22	Cervus	5		
Argonauta	238	Chama	247	D aphne	199
Ascaris	213	Charadrius	26	Delphinus	7
Ascidia	224	Chermes	111	Dentalium	236
Astilus	180	Chimæra	38	Dermeftes	56
Asterias	233	Chiton	250	Diaperis	74
Attelabus	95	Chrysis	162	Doris	229
		Chrysomela	81	Donax	246
B alæna	6	Cicada	102	Dyticus	69
Beroe	232	Cicindela	79	E cheneis	43
Bibio	171	Cimex	104	Echino-	

Echinorynchus	214	Ichneumon	151	Musca	171
Echinus	235	Isis	251	Mustela	2
Elater	59	Julus	201	Mutilla	166
Emberiza	30	Jynx	12	Mya	245
Empis	182	Kolpoda	205	Myrmeleon	147
Enchelis	202			Mytilus	249
Ephemera	142			Myxine	227
Equus	6	Labrus	45		
Erinaceus	4	Lacerta	36	Nais	219
Efox	49	Lampyrus	63	Nauplius	198
		Lanius	11	Necydalis	96
Falco	9	Larus	20	Nemotelus	179
Fasciola	223	Lepas	250	Nepa	104
Felis	2	Lepisma	183	Nereis	217
Fistularia	254	Leptura	92	Nerita	244
Flustra	253	Lepus	4	Notonecta	103
Forficula	96	Lernæa	226		
Formica	166	Libellula	139	Oestrus	166
Fringilla	31	Limax	223	Oniscus	197
Fulica	27	Lobaria	226	Ophidium	41
		Locusta	101	Ostrea	247
		Lophius	38	Otix	27
Gadus	41	Loxia	30	Ovis	6
Galeruca	83	Lucanus	52		
Gasterosteus	47	Lucernaria	227	Panorpa	147
Gobius	44	Lumbricus	215	Papilio	111
Gonium	205	Luperus	83	Paramæcium	205
Gordius	212	Lynceus	199	Parus	34
Gorgonia	253			Patella	237
Gyrinus	68	Madrepora	252	Pecten	248
		Mastra	246	Pedicellaria	229
		Mammaria	224	Pediculus	184
Haliotis	238	Medusa	233	Peltis	63
Helix	239	Meloe	96	Pennatula	255
Hemerobius	145	Melolontha	57	Perca	46
Hippobosca	183	Mergus	16	Petromyzon	37
Hirudo	219	Millepora	252	Phalana	117
Hirundo	34	Monas	202	Phalangium	191
Hister	56	Monodon	6	Phoca	1
Holothuria	231	Mordella	84	Pholas	251
Hydra	230	Motacilla	32	Phryganea	144
Hydrachna	188	Mullus	47	Phyleter	7
Hydrophilus	68	Murana	40	Picus	12
Hæmatopus	27	Mus	4	Planaria	221
				Planorbis	

Planorbis	238	Sertularia	255	Thrips	96
Platalea	22	Silpha	96	Tipula	167
Pleuronectes	44	Silurus	48	Trachinus	41
Podura	183	Sirex	150	Trichechus	1
Polyphemus	201	Sitta	13	Trichiurus	40
Prionus	74	Solen	245	Trichoda	206
Procellaria	17	Sorex	4	Trigla	47
Pfylla	109	Sparus	45	Tringa	24
Ptilinus	81	Spatagus	236	Tritonium	243
<i>Prinus</i>	57	Sphex	160	Trochus	242
Pulex	186	Sphinx	116	Tubipora	252
Pyrochroa	80	Spongia	255	Tubularia	254
		Squalus	37	Turbo	242
		Squilla	197	Turdus	29
R aia	37	Staphylinus	97	Tania	219
Rallus	27	Sterna	21		
Rana	35	Strix	10	U pupa	13
Raphidia	147	Sturnus	29	Urfus	3
Recurvirostra	27	Sus	6		
Regalecus	40	Sygnatus	39	V alvata	239
Rhinomacer	90			Venus	246
		T abanus	179	Vertigo	241
S abella	216	Talpa	3	Vespa	162
Salmo	48	Tantalus	22	Vespertilio	4
Scarabæus	52	Tellina	246	Vibrio	203
Sciurus	5	Tenebrio	74	Volvox	202
Scolopendra	201	Tenthredo	148	Volucella	178
Scolytus	57	Terebratula	249	Vorticella	209
Scomber	47	<i>Teredo</i>	215	Vultur	9
Scolopax	22	Termes	184		
Sepia	232	Tetrao	27	Z eus	44
Serpula	236	Thelephorus	61		

VERNACULA DANICA ET NORVEGICA.

A al	329	Berg-Neppe	382	Blom	16
Aale-Kone	358	Biart-Aal	329	- Rokke	181
Aale-Krage	146	Bibel-Hiort	443	Blomster-Dyret	p.
- Kuse	359	Bierg-Ugle	75	Boe	296
- Moder	358	- Ruur	3022	- Fiar	142
- Qvabe	344: 358	- Skorpe	3048	Bolvark-Orm	3034
Aalge	152	Bikkie	3048	Bobbe	p. 79
Aarbug	p. 51	Biork-Trorft	4	Bogfinke	247
Aar-Fugl	222	Birke-Maar	237	Bogfinkens Hoer-	
- Hane	221	Blaa-Falk	12	unge	256
Aat	364	- For	63	Bog-Mid	2178
Aborre	386: 387	- Fugl	66	- Møl	509
Abor uden Flos	392	- Gomme	70	Bogstavs-Hum-	
Adelhiort	35	- Hals	386	nier	2348
Admiralen	1300	- Kraake	128	Bold-Tiæt	211
Aflangeren	p. 205	- Koll	94	Bombekasteren	2950
Aftenbakke	21	- Maage	128	Bonde-Löber	216
Agna-Mark	2602	- Meisse	169	Borre-Fiært	142
Agerhöne	218: 225	- Nakke	285	Bram-Gaas	113
	p. 68	- Raage	128	Brand-Gaas	107
Akerlan	256	- Skiael	87	Brafen	441
Akerlo	212	- Spol	3013	Bred-Flab	312
Akerrixe	218	- Spurv	438	- Neb	172
Albuc-Skiael	2872	- Staal	451	Brem-Odder	10
Alk	138	- Stak	386	Brille-Fugl	139
Allike	89	- Troft	386	Brim-Due	127
Ande-Musling	3009	Blank-Gople	p. 30	Brifling	422: 1423
Angel-Muus	19	Blanke-Kniv	2820	Brok	17
Angle-Maage	139	- Lange	119	- Fugl	212
- Talke	123: 3029	- Steen	343	Brofne	341
Anker-Trold	p. 51	Blas-And	p. 45	Brude-Kat	366
Arbeids-Bie	1907	Blege	121: 216	Brugde	315
Aspe-Maar	12	Blek-Filk	354: 414	Brun-Nakke	121
Atteling-And	126	- Sprutte	2814	Bruus-Hane	191
Aude	3016	Blecker	2814	- Kop	119: 191
Auride	407	Blikke	354	- Sneppe	191
B akskulla	377	Blik-Skarv	439: 440	Bræms	p. 167: p. 180
Barbe	399	Blind-Orm	148	Bue-Hund	4
Becassin	199	Blint-Svale	306	Bue-Orm	305
Bekkere-Skiael	2972	Blis-Höne	289	Bugteren	p. 205
Benke-Bider	2369	Blod-Finke	216	Buk	39
Berg-Gaft	387	- Fugl	247	Bunke	442
- Gylte	387	- Igle	278	Buste-Luus	2216
- Lax	363	- Sild	2658	Bustvil	20
		- Stiert	422	Buur-Hval	52
			278	Bulke-Tudse	292
				Bust-	

Buft-Divel	2845	Elle-Krage	94	Fiske-Sympé	367
Bur-Hue	356	Ellgur	34	- Örn	58
Buts-Kopf	48	Ellbute	430	Fit-Smule	p. 26
Butte	374	Elritze	430	Fiæfing	337. 338
Buværre	1939	Elsdyr	34	Fiælftef	250
Bye-Svale	288	Elv-Konge	236	Fiære-Mark	2609
Bykling	424	- Kræ	408	- Muus	194. 197
Byrke-Lange	346	Elve-Ritze	402. 430	- Pift	194
Bække-Fugl	236	- Steenbid	402	Fiær-Kurv	194
Bændel-Orm	2654	Em	434	- Plifter	194
Bæver	25	Ember-Gaas	156	Fiærfing	339
Börne-Orm	2585	Emner	154	Fiært	194
		Eng-Lærke	230	Fiöre	194
C abliau	349	- Tiding	p. 101	Flab-Rofe	43
Christianie-An-		Eremit	102	Flad-Fiik	337
fiofer	422	Erle	272	- Luus	2181
Citron-Fugl	211	Eymor	164	- Ormen	p. 221
Coralline	3056			Flag-Spæt	100
Coral-Barke	p. 253			Flagger-Muus	21
Corall-Trægt	3047	F aar	40	Flakke-Rör	112
		Faare-Flynder	2707	Flek-Lange	24
D aadyr	37	Faar-Bræms	1942	Fles-Röje	435
Dam-Hiort	37	Faare-Kylling	1130	Flire	440
Digfulu	289	- Tæge	2156	Flöyte-Biten	201
Dig-Svale	289	Fager-Fiis	281	Flue	p. 177
Dobbelt Kramsfugl		- Gaas	107	Flyve-Ekorn	33
	237. 238	Farrike	392	- Hiort	443
Dobbelt Sneppe	182	Faufe	2340	Flæk-Spærre	100
Dolken	201	Ferik-Vands-A-		Fnat-Orm	2214
Dom-Herre	247	borre	388	Forelle	408
- Pape	247	Ferik-Vands-Od-		Forels-Krop	408
- Sneppe	178	der	10	Forftu-Svale	287
Dragfæ	p. 214	Fide-Muus	194	Foffe-Kold	236
Dreyhals	96	Field-Gaas	113	Fraader	1148
Due-Falk	70	- Loe	213	Frofk	296
Dverg-Glente	69	- Öm	56	Fryndfe-Orm	2607
Dykker	120. 123	- Rak	7	Frøe	296
Dögn-Flue	1653	- Troft	238	Ful-Kop	142
		Fiirbeen	299. 300	Fugle-Konge	280
E dder-Gaas	116	Filfras	11	Fyre-Maar	12
Edder-Fugl	116	Finmarke-Gaas	113	Föl-Goupe	9
Edder-Kop	p. 194	Finger-Trold	2576	- Trin	p. 236
Eendags-Kræk	1653	Finne-Fiik	46		
Egby-Giedde	p. 51	Fiord-Odder	10	G aarbon	p. 34
Egde	102	Fir-Fidfle	301	Gaas	112
Ege-Hiort	443	Fiik-And	133	Gaafte-Bilde	460
Egern	32	- Lita	145	- Öm	60
Eiter-Migmaur]	1936	Fiske-Gat	366	Gaas-Flue	460
- Smau	1942	- Biörn	2301	- Spue	180
- Unge	6	- Giöe	66	Gadiffe	123
Elg	34	- Heyer	176	Gagl	114
Elle-Kongens Dat-		- Jou	66	Gai-Fugl	139
ter	272	Filkeren	147	Galle-Hueps	p. 148

Garnat	2337	Grund-Ved	3077	Hare	23
Garvore	4	Græs-And	121. 126	Harefod	223
Gaul	114. 115	- Biörn	10	Harpax	84
Gede-Hams	1886	- Dyr	5	Harr	416
- Malker	291	- Hoppe	p. 101	Hartouk	85
Gei-Fugl	139	- Smutte	267. 270	Hauge-Hylde	233
Geir-Fugl	139	Græven	1302	Havaume	p. 51
Geier	395	Grævling	17	Hav-Æller	123
Giög-Hveps	p. 160	Grönlandsk Hval	45	- Agerhöne	376
Gied	39	Grön-Spæt	98	- Bæver	327
Giedde	419	Guld-Basse	462	- Gran	3077
Giede-Rör	p. 89. 412	- Bille	p. 83	Havelda	123
Gieding	1886	- Fiisk	370	Hav-Ert	p. 8
Gielle-Orm	p. 226	- Flönder	373	- Gasse	159
Gierd-Smutte	20	- Igel-Kiær	2849	- Hest	1
Giertruds-Fugl	93	- Lax	p. 49	- Hymber	155
Gimmer-Lam	40	- Orm	p. 115	- Inner	156
Giög	95	- Smed	p. 142	- Kal	316
Giög-Spyt	1148	Gulkladning	303	- Karudse	382
Giör-Löie	40. 431	Gulföting	164	- Kat	320. 321
Giörs	391	Gulspink	273	- Lommer	107
Glander	976	Gul-Spurv	252	- Maasse	163
Glat-Haa	17	Gul-Vesling	252	- Mand	2
Glesne	335	Gund-Stikel	393	- Naal	362
Glib	215	Guulagtig Torfk	348	- Nöd	2
Glitter	171	Guul-Bek	70	- Old	123
Gluge-Skiæl	3005	- Haa	320	- Orre	1081
Glænte	61	- Spæt	98	- Skade	277
Gople	p. 233	Gys-Fugl	77	- Strambe	2
Gor-Kime	431	- Ugl	77	- Soe	32
- Kytte	431	Gympel	427	- Sule	149
Gouk	95			- Talke	321
Goupe	9			Havre-Fugl	272
Graabeen	5	H aabrand	318	Heede-Lærke	231
Graabeens-Sild	421	Haafisk	311	Helle-But	273
Graa-Dyr	36	Haakal	316	Helle-Flynder	371
- Falk	70. 74	Haa-Kiæring	316. 313	Heltinge-Gaas	113
- Gaas	112	- Konge	820	Helt	412
- Irrisk	260	- Gæle	314	Herfugel	103
- Lax	406	- Mer	315	Hermelin	14
- Meisse	286	- Muus	320	Hermelins-Phalæ-	
- Nakke	162	- Skiærding	316	ne	135
- Sikken	262	- Storie	322	Heste-Luus	2188
- Spurv	263	Haæ	311	Hesling	p. 49. 432
- Torik	348	Haifisk	316	Hesfele	432
- Trost	238	Hakelax	405	Hest	42
Granafur	164	Hakke-Spæt	99	Heste-Biörn	16
Gray-And	127	Haleren	p. 206	- Flue	2153
- Drage	107	Halsbuk	36	- Myre	1931
- Gaas	107	Halskravet Dykker	157	- Lort-And	126
Griis	43	Hamp-Meis	286	- Orm	327
Groe	292	Hane-Torik	312	Hieiloe	212
Grundling	427	Hap-Lax	405	Hiel-Spove	179

Hierpe	224	Hyle	346	Kilde-Frøe	297
Hjörneren	p. 205	Hættings-Tærne	176	Kime	430
Hingst	42	Høe-Skrække	p. 103	Kimning-Öre	2959
Hiort	35	Hönse-Hög	62. 69	Kirke-Due	227
Holz-Sneppe	181	- Tyv	69	- Falk	65
Honning-Bie	1907	Höst-Loe	212	- Svale	290
Hoppe	42	Höved	41	Kirsebær-Fugl	246
Horke	312			Kiufva	166
Hornet	p. 243	Jan van Gent	149	Kive	166
Horn-Filk	420	Jase	23	Kiærns-And	142
- Give	420	Jern-Lodde	411	Kiöbenhavns-Torik	
- Igel	420	Jerp	11		367
- Sille	393	Igel-Kiær	2845	Kiöd-Meisse	283
- Ugle	76	Iglen	p. 220	Klaa-Nak	2214
Horr	151	Iisgalte	320	Klaes-Han	123
Horfe-Giög	198	Igle	2707	Klanner	485
Hörtulan	253	Ikorn	32	Klapmüts	3
Hrein-Dyr	36	Ikte	2707	Klavert	84
Hual	45	Ilder	13	Klep-Aal	p. 51
- Fisk	45	Ilgjars-Dyr	16	Klinger-Gaas	112
- Hund	56	Imber	154	Klokke-Frøe	295
- Roj	1	Ingeris-Pilt	2755	Klokker	396
Hug-Basse	304	Jo-Bonde	166	Kluk-Alk	136
Hug-Orm	304	Jo-Tyv	166	Klyde	2141
Huid-Aal	2755	Jord-Geed	198	Klympe	136
Huidling	119	Jord-Humle	717	Klæg	p. 180
Huid-Maase	162	Jord-Koene	219	Klæmmer-Migmaur	
- Side	13	Jord-Krebs	1129		1932
Huin-And	359	Jord-Mak	2602	Knarr-And	118
Huirvleren	p. 212	Jul-Kiær	2845	- Gaas	118
Hul-Blad	3047	Jægte-Orm	3034	Knob-Orm	p. 115
- Fad	3047	Jærv	11	Knor	400
Hummer	2344			Knot	2149
Hummer-Konge	2348	Kaa	89	Knudde	p. 51
Hund	4	Kaal-Orm	p. 115	Knur-Hane	400
- Stigel	393	Kaas	40	Knötter	251
Hunttrula	p. 24	Kaje	89	Kob	3
Hunde-Steile	293	Kaka-Trorft	p. 30. 40	Kobber-Höne	188
- Tunge	376	Kakelak	1126	Kobbe-Herre	53
Huus-Hual	52	Kalk-Ruur	3048	Kobber-Slange	306
- Kald	263	Kant-Naal	326	Koblinge	365
- Muus	28	Karpe	426	Koe	41
- Skade	92	Karudse	429	- Bræms	1939
- Spurv	263	Kaskelot	51	- Hale	308
Hvas-Sild	418. 422	Kat	8	- Skial	2977
Hvid-Falk	70	- Goupe	9	Kof-Væra	4
- Filk	417	- Ugle	83	Kol-Filk	342
- Laaring	148	- Ugle-Hane	75	Kolle-Misse	355
- Orm	306	Kav - Orre	167	- Mider	355
Hvilling	354	Keiferen	1303	Koll'e	347
Huyfen	55	Kield	215	Kongen	1365
Hymber	154	Kierne-Bider	246	Kong-Flynder	373
				Kong-	

Kong-Örn	66	Lang-Vire	152	Laxing	405
Korn-Kræ	97	Lapp	296	Löie	431
- Lærke	251	Later-Kob	p. 1	Löv-Aame	1355
Kors-Fiik	p. 235	Lau-Fugl	214	Löve	p. 49
- Fugl	244	Lax-Störrie	390	Löv-Fröe	298
- Næb	244	Laxe-Bite	186	Löver	p. 51
- Troid	p. 235	- Luus	2744		
Kraake	88	Lax-Titing	186	M aal-Trorft	240
Kraak-Spinte	100	- Örræd	407	Maar	12
Krabbe	2337. p. 177	Leffel-Haad	117	Maafæ-Fot	166
Krage-Bold	2845	Leming	26	- Skid	166
- Skial	3014	Lemæns-Græs	77	Maddik	2602
Kraake	2777	Levar-Jo	166	- Flue	2101
- Baller	2845	Licheften	104	Makrel	395
- Skial	3013	Lie-Hæft	97	- Sild	p. 50
Krak-Ugl	81	Liere	145	- Stör	396
Kraje	88	Lig-Hual	44	Mall	403
Krebs	2345	Lille Becassin	199	Malle	403
Krek-Kop	120	Lille Hual	49	- Mukke	444
Krekku	2361	Lille Mufvit	286	Manæte	p. 233
Krid-Orm	2214	Lille Muus	28	Mandate	p. 233
Krik-And	125. 126	Lille Myrstikkel	199	Mar-Flue	2366
Krina-Krabbe	2347	Lille Sølvet	160	Mari-Flönder	p. 45
Kron-Hiort	35	Lille Bindour	393	- Höne	p. 68. 115
Krop-And	117	Lille Træ-Pikke	101	Mar-Svin	55
- Kirre	170	Lin-Erle	272	Mark-Lærke	232
Kropung	348	Lire	p. 21	- Muus	27
Krugge	p. 247	Lita	195	- Svale	287
Krykkie	161	Lodde	411	Marmenit	2
Krökke	411. p. 51	Loe-Knægt	213	Marmæle	2
Kuk	95	Træl	213	Marmærke	2
- Manden	95	Lom	153	Maskrog-Öret	407
Kul-Bars	392	Longivie	152	Meed-Orm	2602
Kuller	347	Lom-Imber	156	Meel-Mid	2114
Kul-Mund	842	Lomvie	153	Meel-Rak	7
Kutte-Rutte	193	Loom	153	Mellem-Spove	180
Kutling	304	Lop	296	Migen	2804
Kurbasse	p. 51	- Lærke	356	Moder-Löfe	424
Kut-Unge	364	- Spyt	1148	Mo-Irrik	262
Köter	4	Los	9	Monaden	p. 202
Köik	p. 49	Louvre	p. 49	Morads-Hög	68
		Lub	p. 51	Morian	1295
L ade-Svale	287	Luier	1439	Mort	352
- Lake	344	Lumbe	152	- And	133
- Sild	414	Lumme	153	Morteferie	156
Lam	40	Lunde	140	Mortenblanke	312
Lampe	2899	Lund-Tæller	140	Mose-Ogle	302
Lamprette	307	Luus	2180	Mourtus	16
Land-Örn	59	Lyng-Lærke	23	Muld-Kræ	400
Lange	343	Lyr	353	- Oxe	450
Lang-Neb	179	Lyr-Myg	2144	- Varp	18
- Skial	2957	Lyfing	342	Mulle	399
- Troid	p. 101	Lyffe	353	Munke	p. 51
				Muur	

Muur-Svale	290	Olden-Borre	464	Pungen	p. 206
Musvit	283	Olje-Bille	1079	Purke	43
Muse-Broder	279	Orhane	222	Purk-Haa	313
Muse-Hög	68	Orhöne	222	Puur	309
Muse-Skiar	19	Orle	300	Pyr	2609
Muse-Vagge	68	Orm	p. 222	Pæl-Orm	3034
Musling	3013	- Drag	p. 214		
Myg	2144	- Sryng	p. 142	Qvabbe	344
Myg-Hank	p. 171	Orne	43	Qvaker	256
Mynde	4	Oska-Biörn	2361	Qvale-Sild	421
Myre-Biörn	16	Ost-Mid	2214	Qvatte	411
- Bok	182	Otter	10	Qveife	2578
- Hest	182	Ouger	390	Qveitte	371
- Loe	212	Ouikar-Riot	400	- Barn	371
Myr-Löve	1695	Oxe	41	Qvilkke-Tield	187
- Sneppe	182.199			Qvælnarren	291
- Snippe	182	Paa-Fugl-Öye	1347	Qværnkold	236
Mög-Lits	196	Paa-Öye	1347		
Naa-Hual	44	Padde	322	Raa	38
Naale-Tægen	p. 44	Pale	352	Raabuk	38
Naide	p. 219	Peder-Dykker	142	Raadyr	38
Nar-Hval	44	- Oxes-Frøe	295	Raatte	382
Natter-Gal	265	Peer-Drikker	142	Raatgaas	114
Nar-Ravn	291	Pehrloe	211	Rad-Gaas	114
- Skade	191	Penqvin	139	Rakke	4
- Ugle	48.82	Perle-Maagen	169	Raphöne	225
- Vakke	102.239	- Mige	2961	Ravn	86
Nebbe-Hval	48	- Musling	2961	Ravn-Kaate	89
- Muus	19	- Skiæl	2961	Raygaas	114
- Sild	420	Perlen	p. 222	Regn-Orm	p. 214
Neb-Ravn	447	Petermand	339	- Spaaer	179
- Skade	308	Petermands-Mad	279	Ren	36
Negen-Ögen	307	Pibe-Lærken	233	Regn-Orm	2602
Nelle-Konge	279	- Stiiker	2852	Rendsteensnager	272
Neride	p. 217	Pig-Haa	2852	Rensdyr	36
Nerite	28. p. 244	Pigvar	379	Rensværre	1940
Nife	54	Piir	397	Ringel-Due	228
Nod-Sey	352	- Aal	2755	Ring-Gaas	107
Norden-Vinds-Pibe	238	Pile-Larven	1335	- Orm	2214
		Pind-Svin	20	- Svale	290
Nord-Kaper	49	Pinke	400	- Öye	119
Nord-Vest-Fugl	195	Planker	p. 51	Rinte	p. 51
Norsk Papegoy	246	Plet-Rokken	308	Riot	400
Nöd	41	Ploug-Mand	200	Ritfa	160
Nödde-Knekker	246	Plumas-Dyret	3064	Rive-Svale	288
- Kraake	11	- Neriten	2890	Rogn-Kexe	323
- Krige	91	Polik Ädelmand	111	- Lodde	46
- Skriger	91	Polyp	p. 230	Rokke	309
		Pomerantz-Fugl	211	Rone	43. 384
		Pot-Fiik	51	- Kalv	215
Odder	10	Prinzen	1304	Rokkel	310
Odense-Karpe	p. 51	Præste-Krave	209	Roper	75
Olden-Torpe	464	Pudel	- 4	Rosmar	1

Rosgouge	198	Sand-Flynder	378	Skarv	146
Rotte	31	- Grævling	334	Skate	99
Rotter	148	- Hæft	427	Skey	374
Röd-Aat 2587,	2596	- Korn	2919	Skib-Orm	3034
Rödagtig Torik	350	- Mark	2609	Skid-Heyre	176
Röd-Been	187	- Muling	209	Skur	252
- Bielle	107	- Rønne	289	Skind-Vinge	21
- Dyr	35	- Sild	334	Skjold-Bille	p. 65
- Finke	276	- Skraa	377	Skiven	p. 238
- Fisk	390	- Skiæl	2960	Skiæl-Basse	516
- Flæng	434	- Skieppe	271	Skiære	92
- Gople	2021	- Skreppe	374	Skiör	92
- Hals	276	- Smige	2959	Skiör-Vinge	64
- Kamunen	p. 8	- Sneppe	209	Skodde-Fugl	198
- Kielke	276	- Sulu	289	Skode-Fole	200
- Luus	2216	- Tal	170	Skol-Orm 201,	2586
- Nakke	124	- Tide	p. 51	Skorpion-Stiert	1696
- Pungen	390	- Tærne	170	Skorsteens-Svale	268
- Skalle 435,	437	- Vrifter	209	Skov-Due	227
- Skolt	p. 49	Sang-Lærke	229	- Fiirbeen	300
- Spætte	373	- Thrøft	240	- Lærke	231
- Stiært	278	Sardeller	423	- Muus	29
- Torik	348	Saug-Fisk	319	- Skade	90
Röie	410	Sauer-And 125,	126	- Snarre	208
Rör	410	Sav-Orre	158	- Spurre	264
- Drum	177	Seigumme	386	- Tigger	p. 79
- Hual	46	Sene-Orm	2576	Skovl-Neb	172
- Höne	416	Senge-Tæge	1182	Skraap	145
- Orm	2605	Sey	325	Skrabe	145
- Spurre	254	Siden-Svands	243	Skræb-Tudse	294
- Sneppe	189	Sidse-Rönnike	261	Skred-Hegre	176
Rös-Kat	14	Siik	413	Skrey	349
Rötteren	160	Siil	334	Skræ-Skarv	146
Rudikalle	436	- Unge	409	Skrig-Kield	187
Ruiboë-Skiæl	2997	Sild	421	Skrobbe-Flynder	371
Rumpe-Tudse	p. 35	Silde-Perris	151	Skrob-Lange	343
Runderen	p. 204	Sildinger	423	Skrubbe	375. 443
Rund-Skiæl	2977	Sild-Lodde	411	Skrukke-Trold	2369
Runte	p. 51	- Maage	164	Skrække	134
Rutte	181	- Qval	49	Skue	167
Ruur	2855	- Torik	349	Skuffel-Neb	172
Rybrigde	315	- Unge	p. 50	Skuller	373
Rylle	178	Simmeren	238	Skum-Kræk	1148
Rype	223	Siren	p. 51	Skure	164
Rytteren	194	Sirene	2	Skæller	2861
Ræge	2346	Sirize	1130	Slag-Hög	68
Ræke-Lodde	411	Siiken, Sifiken	259	Slag-Örn	p. 10
Ræv	6	Siö-Kok	p. 51	Slenter	10
Ræv-Goupe	9	Skade	228. 92	Slefre	368
		Skalle	439	Slet-Bok	45. 1146
Saagouk	96	Skalla-Basse	459	- Falk	70
Sagan	215	Skarn-Basse	458	Slep-Mark	2755
Sandarr	391	- Böddel	458	Slie	428

Slomme	411	Sort-Spæt	97	Stiert-And	121
Slætter	375	- Stork	115	Stiglitz	258
Slæt-Var	378	- Torfk	312	Stilk	187
Smaa-Filk	414	- Trorft	241	Sting-Flue	p. 167
- Myre	1934	- Tærne	171	Stint	414
- Sey	352	Soud	40	Stok-Aal	345
- Sild	422	Spanik Flue	462	- And	128
- Skarv	147	Spek-Hugger	56	- Aender	3029
- Spol-Orm	2585	Spelt	416	Stork	174, 326
- Spue	180	Spend-Hög	68	Stor-Hual	46
- Torfk	348. 360	Spids-Lærke	271	Stor-Hög	70
Smale	40	Spil-Hyse	320	Store Tind-Oure	394
Smeerbutte	402	Spikke	277	Storm-Fugl	144
Smelder	p. 61	Spilleren	p. 206	Stour-Vangen	57
Smelt	411	Spindel	p. 194	St. Peders Fugl	143
Smerling	401	Spol-Orm	2586	Straale-Dyret	3069
Smik	2009	Spotte-Jo	166	Strand-Aborre	389
Smiile	67	Spove	180	- Bekiffin	200
Smukke Frue	1299	Spring-Basse	p. 61	- Egl	193, 209
Smalle-Bot	195	Springer	55. 56	- Erle	194
Smæller	p. 61	Spring-Luus	p. 184	- Karudse	382.
Smör-Butting	364	Spue	179		p. 51
Snabel-Svane	106	Spurre-Hög	71	- Kield	187
Snare-Orm	1458	- Konge	281	- Lo	210
Snarrer	238	Spurv-Hög	65	- Piber	209
Snee-Bok	250	Spye-Flue	2101	- Ravn	146
- Fugl	250	Spæt-Meifle	102	- Rixe	219
- Muus	17	Sqvap-Tield	187	- Skade	215
- Spurre	250	Staal-Orm	306	- Skur	215
- Titing	250	- Sneppe	191	- Snarre	219
Snegl	p. 227	- Tønning	57	- Sneppe	199
Snekke	p. 239	Stalling	146	- Spurv	197, 210
Snerris	300	Stankel-Been	p. 171	- Svale	289
Snibbel	417	Stankel-Been-Tæ-		Straum-And	127
Snippe	328	gen	46	Strunt-Jager	166
Snog	305	Star	235	Strækkeren	p. 203
Snude-Bille	p. 90	Staur-Hyning	53	Stræng-Hyse	320
Snee-Loppe	2164	Stein-Bikker	368, 402	Strömling	421
Snurreren	p. 209	Steen-Bid	332	Ström-Skalle	433
Snör-Dolk	357	Steen-Brofine	358	- Stær	236
Soe	43	- But	379	Stub-Orm	2603
Soel-Gran	2920	- Dolp	274	Stue-Flue	2103
- Skin-Stöd	187	- Gylp	274	Styving	371
- Skriger	250	- Kob	p. 1	Stær	235
Sog-Skiæl	p. 247	- Pikker	272, 339	Støb-Finnet-Kobling	
Solbakke	289	- Sneppe	182		365
Solfort	241	- Sqvette	274	Stökker	397
Sommerfugl	p. 115	- Svale	290	Stöv	322
Sort-Dup-And	110	- Sue	307	Stöver	4
Sorte	109	- Ulk	321	Suder	428
Sort-Hakke-Spæt	97	Stibling	392	- Naal	385
- Hane	312. 400	Stiblinger	p. 51	Sue-Hual	352
- Kirre	171	Stierne-Dyret	3065		

Svane	106	Søe-Skellet	2861	Tobis	334
- Musling	3016	- Stierne	p. 235	Tokn-Trold	2543
Suar	2813	- Svale	121. 290	Tommeliden	279
Svart-And	109. 110	- Træget	3047	Torn-Irriik	261
- Bæg	163	- Tulip	3026	- Skade	84. 85
- Migmaur	1933	- Vante	3087	Tonge	376
- Orre	109	- Ulv	332	Top-And	134
- Sulu	290	- Vor	3087	- Lærke	234
- Side	3	- Unge	164	- Meisse	282
Svenske	248	- Æble	2845	- Skarv	150
Svenik-Irriik	248	Sölv-Fiik	334	- Skjær	157
Sverd-Fiik	339	- plettet Guld-		- Östers	2872
Svin	43	Fiik	370	Torbift	458
Svine-Hual	51	Söm-Rokke	309	Tordivel	458
Svin-Sax	17	- Skatte	309	Torike-Konge	p. 43
Sump-Orm	2604	Sönd-Mörs-Flön-		- Skial	3016
Sværd-Fiik	319	der	373	Tosse-Fugl	149
Sværte	109	Sönden - Vinds-		Traad-Orm	p. 213
Sæing	162	Fugl	141	Trane	173
Sække-Sey	352	Sören Jacob	142	- Sild	p. 50
Sæl-Hund	3	- Peder	143	Trappe-Gaas	220
Søe-Aborre	387			Troc-Förer	123
- Blad	2777	Taae-Heft	200	Trold-And	129
- Bæver	327	Tag - Skiægs-		- Drukke	182
- Bold	3080	Svale	288	- Fugl	142
- Börting	407	Tale-Trorft	240	- Gvabbe	345
- Drage	339	Talg-Oxe	283	- Hual	52
- Fær	3075	Tam-And	128	- Krabbe	2340.
- Hane	158. 159	Tandt-Höye	56	- Spyt	2342
- Heft	324	Tand-Skial	2852	- Tand	1148
- Iver	3080	Tang-Brosme	345. p. 43	Træ-Frøe	298
- Kat	404	- Snarre	358. 394	- Hiort	443
- Karudse	382	- Sperling	p. 51	- Klak	99
- Koe	2	Tara-Torik	348	- Kloppe	97
- Konge	142	Tart	406	- Orm	2178
- Kul	3048	Tafke-Krabbe	2339	- Pikke	97. 104
- Kufe	2792	- Krebs	2339	- Spat	99
- Lærke	356	Teer	221	Truen	166
- Mige	2804	Teifte	151	Trunleren	p. 202
- Muus	320	Telline	p. 246	Tudse	292
- Naal	325	Tende	170	Tvelskiæg	p. 183
- Nelde	2702. 2820	- Löber	170	Tumler	54
- Orre	108. 158	Tenteie	396	Tun-Fugl	92
- Otter	10	Terebratuler	p. 249	Tunge	376
- Papegoy	110	Tete	286	Tungens Hoer-Un-	
- Penfel	3063	Thomas i Giærdet	279	ge	377
- Pind-Svin	2848	Tiaader	215	Tunge-Pledder	376
- Plomme	p. 232	Tield	215	Tursbul	368
- Pung	2733	Tiig	4	Tufind-Been	p. 201
- Ræke	2348	Tind-Oure	393. 394	Tve-Qval	46
- Ræv	320	Tinde-Öret	393	Tyr	41
- Rette	320. 312	Tirhöns	2181	Tys Thomas	42
- Scorpion	367	Tiufva	166	Tyv-Jo	166

Tömmnermand	1033	Vand-Kaly	p. 74	Vid-Kieft	367
Tönne	379	- Loppe	p. 184	Vild-Due	227
		- Rixe	219	- Sviin	43
Ufs	352	- Rotte	30	Vim-Droffel	240
Ugg	p. 145	- Skiær	30	Vinter-And	122
Ugle	80	- Skorpion	1161	- Fugl	250
Ufs-Skreppe	351		p. 201	Viperftiert	272
Ulk	321. 367	- Spindel	p. 190.	Virlen	199
Ulv-Goupe	9		191	Vitting	354
Ulyks-Fugl	33	- Tarm	2576	Vond	18
Ungle	123	- Torbift	653	Vægge-Luus	1182
Urgaar	107	- Vagtel	219	- Tingest	1182
Urhöne	222	- Ugle	301	Vælteren	p. 202
Uveirsfugl	143	- Höne	216		
		Varg	5	Ære-Fugl	222
Vaar-Flönder	373	Væfel	14	Ær-Fugl	103. 116
- Orm	p. 167	Vas-Igle	317		
- Torlk	349	- Kalv	2576	Öes-Skiæl	3016
Vagtel	226	- Muus	30	Ögle	300
- Konge	219	- Otter	10	Ömmer	156
Va-Lange	p. 43	Vrang-Flönder	379	Örkiöie	408
Vald-Sneppe	p. 24	Vegge-Smed	2178	Öre-Svin	56
Vand-Bie	1907	Vei-Lærke	334	- Stikker	p. 171
- Eller	3029	Veke	367	Öret	409
- Firbeen	361.	Vemme	414	Öretvivft	1088
	302	Vende-Hals	96	Ört	125
- Hefte - Ta-		Vestenvinds-Are	143	- Oure	409
get	2576	Vetterling	433	Örne-Falk	64
- Hund	57	Veydetite	193	Öfters	2986
- Höne	219	Vibe	192		

ISLANDICA.

A amumadkr	2602	G adde-Skar	309	J adrecka	190
Aanamadkar	2602	Gagl	115	Jardluus	2207
Ada	3061	Geirfugl	133. 139	Igul	2845
Andernesia	48	Geyr-Huölum	p. 8	Ise	347
Andua-Tytlingr	284	Gierne-Fur	420	Jätte-Stoud	1114
Avekong	107	Giernyt	320	Jatan-Oxe	1114
Aukur-Selr	p. 1	Giæfning	p. 49		
		Gigarpuffa	2801	K ampa-Lampa	2356
B aaru-Skiæl	2972	Gimbur	2980	Karfe	380
Bard-Huölum	p. 8	Gimmer-Skiæl	2980	Karkole	373
Berg-Bue	3033	Goi-Fugl	139	Karve	390
Biart-Aal	329	Gran-Selr	p. viii	Kediamadkur	2654
Blaamor	p. 184	Græs Fidrilde	p. 129	Keila	p. 41
Blandrufelr	p. viii.	Gul-Önd	133	Kieldufvin	205
Bleikia	p. 49			Kioe	166
Blödrahualur	p. 8	H aafur	311	Kiöbmands - Huer	
Bobbe	2944	Haahyrningur	57		2820
Brandkod	p. 49	Haakall	315	Klumbenefia	136
Breidumadkr	2954	Haavella	123	Kofnuga-Krabbe	2343
Breitukongur	2954	Hafur-Kytti	p. 8	Kofu-Luus	2206
Briefen	155	Hav-Mands Arbei-		Kola	374
Brim	315	de	3035	Kol-Krabbe	2815
Brimbutur	2793	Heilop-Fisk	371	Konga-Krabbe	2343
Brodomaa	369	Helsingen	114	Kop-Sild	422
Brunkluka	788	Helsingianef	3029	Konupungur	2724
		Heyre	333	Kræklingur	3013
		Hollokur	p. 245	Kriia	170
D etter	p. 8	Hrafn - Reydur	p. viii.	Krok-Fiskur	2977
Dite	2815			Kulda-Skiæl	2979
Dordingut-Fiske-		- Önd	131	Kupunge	2954
karl	2304	Hraunkur	150	Kufkiæl	2977
Drunnesia	141	Hraunpuffa	2801		
		Hrefna	50		
		Hrognakellse	323	L adpurka	2369
F agra-Fluga	2053	Hrota	115	Land-Selr	p. 1
Fialla-Kongul-		Hrudurkall	3026	Lange	p. 41
lo	234	Huitingar	50	Langnesia	152
Fiauru-Kongar	p. 242	Huitturfa-Skæg	3050	Langvigia	152
Filingr	145	Hunfubakr	46	Lax-Broder	p. 49
Fiskmaur	2230	Huodakongullo	2321	Leipter	55
Fiskreki	p. 8	Huölum	p. 8	Lo	212
Fiarumadkur	2609	Huýding	56	Loarthrætt	208
Flave-Fit	158	Huyfen	55	Lodna	425
Fletti-Selr	p. 1	Hymbrine	155	Lunda-Luus	2205
Flingur	2960	Hængr	408	Lura	374
Flydra	371	Höfrung	55	Lækiadudra	200
Færdögling	48	Hörpudikur	2990	Lækia-Silungk	408
Fær-Luus	2156				

M adka-Fluga	2101	Ryner	315	Steindepil	274
Margias	115	Rödbirlingur	410	Steinereidur	p. 8
Marg - Fætla	2340.	Röft-Unger	1	Stelkur	187
	2339			Styrifíkur	361
Marglytta	p. 233	S ala	149	Stöckull	p. 8
Marhuntur	321	Sandlo	209	Stutnefia	152
Mari-Erla	272	Sandæta	48	Svartbakur	163
Marmenils-Smide	3035	Sandmigur	2960	Svinhualus	132
Marthware	2346	Selmingen	206	Sæ-Baxur	2720
Martlo	2366	Selr	3	Sættu-Koppar	2719
Meyiar-Pattar	2956	Sexrændig	369		
Mioareidur	p. 8	Sexönd	158	T herne	170
Mufa-Broder	280	Sildreki	p. 8	Thröstr	240
My-Fluga	2103	Sino-Tytlingur	250	Thriftrendingur	3021
Myke-Fluga	2071	Sio-Reidur	p. 49	Tildra	p. 26
Myr-Skit	182	Skegla	160	Tinda-Bukia	309
		Skere	2642	Topp-Önd	135
N aa-Hual	44	Skeriafsteinbit	357	Tranufille	334
- Kongur	2954	Skiold-Smölum	p. 8	Tremadkr	3034
- Luus	2181	Skiorond	133		
Nord-Selr	p. 1	Skipstennur	p. 263	V ade-Selr	p. viii.
		Skogarthröftr	240	Vagn-Hualur	57
O ppo-Selr	p. 1	Skollahraake	p. 233	Vas-Hymber	156
Orturikofa	151	Smakfíkur	2815	Vatua-Silungr	410
		Smyrsling	2959	Vatur-Hualur	45
P ii-Pufkel	2858	Soelfkinkia	250	- Önd	134
Præft	140	Sof-Kongur	2938	Vets-Blaarne	p. 184
		Sog-Skæl	2964	Veyde-Bialia	164
R anda-Fluga	2011	Spoe	180		
Randbrilingar	203	Spret-Fiskur	361	U t-Selr	p. viii.
Randbrystingr	203	Skraalaagr	p. 245		
Redduskel	2959	Steinaluus	2221	Ö du-Skiæl	3016
Reidur	p. 49	Steinbitr	332		
Ritar	160	Steinbitrbruder	333		

L A P P O N I C A.

A este	16	Godde	36	Nuonisk	p. 1
Akkalagge	316	Godde-Sapan	26	Nette	12
Albos	9	Guouzhia	16		
Alpe	250	Gurme	1940	O aido	p. 1
Aenak	16	Gusgastak	179	Olgobutzh	5
				Otte	32
B ieggush		H askel	166		
Bizhiurtzh	212	Hauſkar-Gub-	p. 2	P ago	209
Boaaid	13	bo	212		
Boitta	13	Huet	212	R eidet	46
Buvadak	187	Huit	212	Rieufak	223
		Hutti	212		
		Huttich	212		
D alia	p. 1			S agan	215
Dalvek	169	J agees	p. 1	Saibek	5
Davok	p. 1	Jæggelolko	77	Seibbsh	15
Doppan	152			Skaar	130
Dverg-Lund	4	K umpi	5	Skajite	166
		Kuoikgarheek	236	Skietto	161
F akan	57			Stolpe	5
Fatnevindne	p. 1	L af-Ul	211	T rompe	1941
		Lauhol	211		
G adevierrush	194	Likka	116	V eigezizatzh	239
Gadfe	13	Lubba	4		
Gaine	5				
Gairo	163	M ajeg	25	Z hiaine	98
Gaitke	162	Mockere	2149	Zhierrek	170
Gakatte	153	Morik	1		10
Gakkor	153	Mækartak	182	Zhiuoik	2144
Gieedk	11			Zhiælkes	151
Gielavælgo	242	N ial	7	Zibok	19
Giron	223	Niaamel	23		
Goa-Aige	13				

GROENLANDICA.

A bapakitfok	p. ix.	Egistsfak	1925	Karfaak	162
Aglernak	p. ix.	Egistsfapkoma	2219	Katungiak	2854
Aitsibpa	2792	Epernak	2144.	Kartlutorpiarfuk	119
Ajuaurfak	2875	Epiksaumak	2977	Kastigiak	3
Akeikfibkoma	2200	Efarokitfok	156	Katungiak	3022
Akeikfik	223	Efungak	166	Kauid	223
Akoperurfak	2900			Kaumarforfoak	2805
Akpa	138	H ekiurlek	368	Kediamadkur	2654
Akpabkuma	2597	Hunartlik	409	Kekingoak	73
Akpalliarfuk	142			Kelleuak	51
Akpamak	136	I glulualik	2640	Kekkurfubkoma	p. 223
Amarok	5. p. 8	Ignorolak	2623	Kemunek	4
Amauligak	250	Ikpearfurfak	2816.	Kemiarfurfak	2776
Amerfulak	p. ix.		2817	Kemibkoma	2182
Amikok	2815	Imabkoma	2165.	Keporkak	p. viii. 46
Anarak	202	Imabpolia	2622	Kepokarsuk	46
Anariak	2069.	Immenningoak	2985	Keporkokkatungiar-	
Arbanikroak	45	Immerkatulak	170	foak	3024
Arbek	45	Ingmingoak	363	Kerkfubkoma	2369.
Arberabkoma	2294	Innellualerak	2615		3034
Ardluk	53	Innelualik	2806	Ketlutok	p. 21
Ardluarfuk	55	Inubkoma	2586	Ketruperak	2791
Arkigiak	2342	Irbfubkoma	2163.	Kierlutok	128
Arkfagiak	2342		2168	Kigutilik	332
Arkfegiarfoark	2368	Isarokitfok	139	Kigutilikfoak	52
Arlo	57	Ilfingak	166	Killeluak	50
Arlorfoit	57	Ivik	2755	Killeluak Kemek-	
Atabkuma	2592	Iviklarok	410	tok	44
Ataitfeak	p. 2	Ivirkloak	343	Killeluaktugalik	44
Atak	p. viii.			Killiartout	3013
Ataufak	2742	K ajordlek	212	Kingalik	108
Attakfoak	p. 2	Kajorovik	212	Kinguk	2366
Attarfoit	p. 2	Kakillifubkuma	2579	Kiktoriaak	1809
Auen	1	Kakillifak	393	Killibinnua	2241
Augurfak	2742	Kakordluk	144	Kinlangak	140
Auingurfak	p. ix.	Kakordlunak	145	Kirkfoviarfuk-Ka-	
Aumakfak	425	Kakugtanak	144	kortok	p. viii.
Ausiek	2321	Kalleraglek	372	Kirkfoviarfuk-Ker-	
		Kallingak	p. 21	nektok	p. viii.
B ibiarfuk	3014, 3015	Kaneifubkoma	p. 220	Kirkfoaurfak	2971
		Kapniok	367	Kiusaunak	357
		Kanniornak	p. ix.	Koartak	2585
E kalluak	419	Kanniordluk	p. ix.	Kollersak	p. ix.
Ekalluk	410	Kapifalik	421	Komak	2180
Ekallukak	412	Kapifalirkfoak	405	Koperdlurfoak	p. 218
Ekallurkfoak	316	Kappiz	11	Koparnaurfak	250
Ekkurfak	2847	Karkfauk	153	Kukilik	311

Kukfak	149	Nifa	54	Siuterurfak	2953
Kumak	2577	Nifarnak	56	Sullernak	1330.1495.
Kurkfaunak	357	Nuertlok	2825		1659
Kyffektak	274	Nyalikfak	133	Sullupaugak	380
		Nyaurselyk	2608		
M eriarfarfok	166	O gak	350	T aitfibkoma	2400
Merkolualik	2621	Okaitfubkoma	2193	Takirfionak	2807
Merkubkoma	2217	Okeitsfok	146	Tannulik	46
Milleriak	2092	Okabkuma	2596	Taralifikak	p. ix.
Mingak	663	Okok	2241	Taralifikubkoma	2593
Misakornak	347	Okotab	p. ix.	Taraulik	348
Mittelk	116	Okotabkuma	2594	Tattarok	161
		Opibkoma	2189	Tauvar	44
N aia	169	Opik	77	Tejarnak	p. ix.
Naiabkoma	2192	Orpingmiutak	263	Teitfum illerkei	2351
Naviardlurkfoak	163			Tekkirkfok	46
Najardlurk	163			Terkeingak	2374.
Naiavik	169				3018
Najavarfuk	p. viii.	P aik	133	Tepienniakkakaka	7
Nakkasurfak	2722	Pekkitak	2346	Tetarfoak	58
Naitsek	p. 2	Pernak	p. viii.	Tikagulik	48.53
Narkfamiutak	p. viii.	Pokudlek	p. ix.	Torraiarfuk	127
Naubarnak	2348	Putorut	334	Tudlik	155
Neitsfek	p. viii.	Pullateriak	2587.	Tuglok	152
Neitferfoak	p. viii.		p. 216. p. 223	Tukagvajok	209
Neitsfibkoma	2590			Tukagvajubkoma	2202
Neitsfilek	p. viii.	S aguarfubkoma	2202	Tukto	36
Nektoralik	58	Sarguarfuk	194	Tukturfak	1638.1944
Nennok	16.b.	Saraulibkoma	2374.	Tullugak	86
Nelloumirfortok	195		2578	Tulliukabkoma	2190
Nennamak	262	Saraulirkfoak	349	Tullukaursak	2877
Nepidsardluk	p. ix.	Sarpargaufat	3035		
Nepifa	323	Sauliurfak	424	U ilok	3013
Netarnark	371	Sengiak	p. 218	Ukalibkoma	2208
Netarnabkoma	2408.	Serbak	151	Ukalek	23
	2774	Sergiak	p. 218	Umiktrak	2349
Nerdlek	114	Sigokitfok	p. 8	Unneraisfuk	2812
Nerpirkfoak	p. 235	Siguktrok	182	Unnuariak	2143
Nerpiksout	p. 235	Sirkfabkomangoa	2616	Ufurfak	2959. 2960
Nikfoarfuk	2318.2319	Sirfubkoma	2222	Urkfuk	p. viii.
Nimeriak	329	Siuterut	2938	Urkurfak	2355
Niutok	2295	Siutiscortokanyma-		Ursfubkoma	2591
Niviuak	2098. 2100	lortok	793. 993		

ERRATA:

P. XXIII. CRYPTOREPHALUS, leg. CRYPTOCEPHALUS.

p. 38. IISGALTE &c. substit. sequenti 320.

p. 49. Trutta & Salmo Island. non Synonyma, sed seposita sunt.

p. 50. In nota del. LAKE-SILD.

n. 1346. STATIOS leg. STATICES.

n. 2233. LATEUS leg. LUTEUS.

"Addenda" in side back
cover

Inquirenda et Corrigenda.

Page. IX. 1. 28. domesticam, lege Linariam
(Fr. enim domestifica in Groenlandia non reperitur.)

Page. XII. addatur Sch. ichth. a Schonevelde
ichthyologia & nomenclatura
animalium, fluviatiliu, lacus-
trium in ducat. Slesvici & Holf-
atiae Hamb. 1624.

Page. XVIII. lin. 12, add. Roftrum cinctum
facie nuda. Pelecanus. 18.

Page. XXVI. Daphne leg. Daphnia.

Page XXXII. lin. 25. deleatur* & leg. c.
lin. 36. add. Reticulata.
Flustra. 253.

Page XXXII. lin. 2. leg. Fistulana. I, II.
Phalii leg. Phalli.

Page I. lin. 17. del. Klapmiits & add. Ph.
leoninae; ib. del. Svartside
& add. Ph. groenlandicae p.
VIII. Loco Puise, potius
Puirse, quod nomen genericum
est, leg. Kaffigiak.. Posthac
ex literis reverend. Oth.
Fabricii comperi, Atarfoek esse
Ph. groenlandicam adultae aet-
atis, Ataitfiak eandem unius
anni, & Atarfoit numerum plur-
alem ejusdem. In Crantzii hist.
Groenl. Phocae Groenl. pullus
unius anni pallide flavescens
vocatur Attarak, biennis & gri-
feus Attaitfiak, triennis &

variegatus Aglektok, quadrien-
nis & maculatus Milektok,
quinquennis clypeo nigro
Attarfoak. Ita quoque pul-
lus Ph. vitulinæ unius anni
dicitur Kaffigiutfiak, bien-
nis Kaffigiak, triennis Aku-
tlinak, quadriennis Akunnektok,
quadriennis Akunnektok, quin-
quennis Kaffigiarfoak.

P. 276

Pag. 2. 1. 13. add. Gr. Amarok? lin. 15.
Terienniak add. frequenti C.
Lagopo, C. Vulpes enim in
Groenlandia non reperitur.

Pag. 7. 1. 3. del. Kepokak, Kepokarpak &
leg. Tunnulik, Tekirfok. lin.
18. del. Kigutilik, quod fe-
quenti potius convenit, & leg.
Kelleluak. lin. 24. del. Tik-
agulik, quod potius Bal. ro-
trata.

Pag. 8. 1. 8. leg. Ardluk, in plurali Ard-
lurkfoit, quem Phys. micr.
putat O. Fabricius. l. 13. del
Tunnulik, quæ B. Phyfalus,
Sigokitfok (brevirostris) an
Phys. Turfio? Amarok, C. Lupus?
Historiæ Cetorum & Phocarum
tenebricolæ lucem aliquam af-
fulsisse ex mota quaestione de
significatu nominum popularium
haud parum lætor, hinc plurae
Schoneveldi ichthyologia pag.
27, qui intra 150 annorum
spatium ne ullum quidem in in-
quirendis patriæ piscibus aem-
ulum habuit, addere juvat: Nin
ting, Andhwal, Raffu-Hwal,

Skialtdwal, Gebehwal, Bard-
hwal (haec tria comestibilia
dicit) porro: Plette-Kap,
Haver-Kitte, Skeling, Hafneg-
iuve, Røftund?

Pag. 9. lin 5. add. Isl. Aurn; mas: Are. Alb-
icillam, Chrysaetum, Milvum &
Haliaetum meras aetatis varie-
tates putant Islandi.

Pag. 10. ad. F. Gyrfalco cera caerulea, pedi-
bus luteis, corpore fusco, fas-
ciis cinereis, caudae lateribus
albis.

Pag. 11. add. C. Frugilegus ater, fronte cin-
erascens, cauda subrotundata.
D. Raage. P.A.D. Isl. Smyril,
l. 24. ad. an variet. F. gen-
tilis? l. 25. ad. N. Korp. I.
30. ad. Isl. Norfkur, Ifakraka,
Faerey-Ikar..

P. 277

Pag. 12, ⁿ~~II~~. 100. N. add. Field-Skiöreu, p.
13. l. 5. del. Str. S. 247.

Pag. 13. l. 17. Svane-Sang? add. cantum qui-
dem totis diebus exercent,
strenuissime vero horis mat-
utinis & vespertinis ~~tum~~ sub-
lime volantes, tum aquae in-
natantes, & a partu vacantes;
cum avolant vel advolant, una
alteri respondet modulationes-
que recitat. Veterum illud,
quod cygnus sub mortem **dulcissi-**
me canat, intelligendum est de
continuis querelis, quas vel
pietate, dum nidus acceditur &
ova auferuntur; vel metu, dum
inevitabile mortis periculum
instat, vel denique dolo re

cogente & vocem extorquente,
cum lethale vulnus acceperint,
quae omnia plus vice simplici-
obfervavimus. Olayii & B.
Pauli manufer. conf. Bartholini
diff. de cygni anatom. & cantu.

Pag. 15. 1. 14. add. K. Angalagges.

Pag. 17. 1. 2. ad. Bornholm. Mule. Alcam
balthicam & Picam unius spec-
iei esse, fuspicator O. Fab-
ricus. 1. 10. ad Gr. lfarokit-
fok. 1. 16. leg. Killangak.. 1.
ult. leg. Kakordluk pro Kaku-
gtonak.

Page. 16. ad. Grafa-aund Islandorum quinam?
del n. 132. C. enim criftatus
157 est.

Pag. 18. 1. 3. ad. Isl. Skropa. n. 146. del.
P. & Pelecanus scrib. literis
capitalibus. Quod de P. Pbal-
acrocorace dixi, idem de Car-
bone & Graculo judicat O. Fa-
bricius. 1. 12. ad. Isl. Grä-
fkarpur, Hnuplungur, Gräbringur.
1. 29. ad. Borgek pullus I anni
L.L. 1. 31. ad. Isl. Peturskofa.

Pag. 19. ⁿ~~11~~. 155. add. Gr. Tuklik. n. 153.
ad. Gr. Karfank. 1. 16. ad. Isl.
Perrikräka?

P. 278

Pag. 20. post 159. ad. Haftyrdill, Haftvitill.
Isl. quænam? 1. 17. leg. Tat-
arak. ad. L. Ritsam & tridacty-
lum eundem dicit O. Fabricius.

- Pag. 21. 1. 34. Killangak eft Alca arctica,
Kardlortok, Anas Boschas. ad.
Skumur Isl. quænam?
- Pag. 23. 186. ad. Quikke-Tield & Str. 248.
Isl. Tilldra. n. 189. ad. en-
kelt Bekkafin.
- Pag. 24. 1 31. L ad. Nuorte-Lodde. p. 25.
n. 198. del. Skodde-Fugl,
Mækkre-Gouk Str. 257. & ad.
num. 200.
- Pag. 26. 1. 7. D. ad. Fit-Smule, ac del.
una cum Quikke-Tield Str. 248.
in 1. 31.
- Pag. 28. post n. 226. ad. Loa, Lava Isl.
quinam?
- Pag. 29. 1. 10. ad. Gratitlingr. del. Egde
R. N. H.
- Pag. 30. 249. ad. L. atram Pyrrhulam effe
femine cannabis nutritam in-
dicat. nobilif. Petersen, stren-
uus avium Christianfœnfium
obfervator.
- Pag. 31. 1. 2. leg. Snio-Tytlingur.
- Pag. 34. 1, 31. del. Flag-Spætter R.N.H.
quæ Picus medius eft, & re-
liqua in præf. explicata.
- Pag. 37. post. 307. ad. P. marinus ore in-
tus papillofo, pinna dorfali
posteriore a cauda diftincta.
N. Sœe-Negen-Ogen. 1. 9. del.
Gr. Takkalikirak.

Pag. 38. n. 315. del. Haa-maer & ad. n.
318.

Pag. 40. n. 331. add. Isl. Vaag-maer.

Pag. 41. l. 18. ad. majorem effe G. mol-
vam, minorem vero fuum Bro-
me cenfet clarif. Ström
in lit. 2 Jul. 1767.

Pag. 42. ad. G. lufcus tripterygius cir-
ratus radio ventralium
primo fetaceo. N. Smelte,
Noff.

P. 279

Pag. 43. l. 7. ad. Dverg-Fifob, Krumftert,
Leid-Fifob Slesvicenfium
quinam? Tang-Brosme Str. 315.
4. fubftit. fequenti B. Gu-
nello. l. 19. ad. an Ham-
burg & Chilonienf. Schonev.
ichth. p. 49 diverfi? Poe-
cilie, Meberhutte, Meer-
Gründel v. Beifkar l. c. p.
56. & Rafpe, Till p. 78.
Nafe, Zerte, Blicke, Blauwit
p. 64 quinam?

Pag. 44. 367. ad. Groenlandorum Yarangmio,
Kivake, Milekturfok, Karik-
fok an Cotti Scorpii meræ
varietates?

Pag. 45. l. 22. Blanke-steen St. S. 270.
fubftit. Salm. immacul.

Pag. 46. l. 25. ad. L.L. t. 99. p. 327: or-
dinarie absque omnibus maculis
& lituris.

Pag. 47. ult. lin. ad. Bagunteln, Goldeken
Ekernfördenfium?

Pag. 48. n. 410. ad. L. Raudo. n. 413. D.
Saebbel.

Pag. 49. ad. S. immaculatus corpore immaculato, pinna ani radiis duodecim.
N. Blanke-fteen. ib. 419. ad. L.
Haug, Golees.

Pag. 50. 1. 12. ad. Staf-Sild. Staf-Hering,
r/ Sping-Hering, Peltzer, Schon.
ichth. p. 39. quāenam? l. 30.
ad. Rape, l. c. p. 30. Dobheler,
Mufeyter p, 42. an diverfi &
quinam?

Pag. 51. ult. lin ad. Lapponum Zhiofzhia,
uu/ Ruoudegolmek, Damok, Vaalas,
Gmezghia; Groenl. Kaumortluk;
Kilonenfium Meer-Brafen, Mag-
untchen, unechte Karpen, Rapen,
Marenechen, Mufeken, Stöcker;
Ekrenfordenfiumfchwarzer und
weiffer Gob v. Küeling, quinam?

Pag. 104. Nepae ad. D. Vand-Skorpion nom. gen.

Pag. 109. Pfyllae ad. Species Chermis Linn.

P. 280

Pag. 121. ad. Ph. nupta spirilinguis crif-
tata alis cinerafcenribus:
inferioribus rubris: fafciis
nigris; abdomine cano, fubtus
albo. S. inf. t. 151, f. I, 2.
quod Synonym. deleatur in l. 5.

Pag. 127. 1469. ad. Faur-elde. v. Fedrilde.
Faun. Svec. 2294.

Pag. 140. 1625. ad. e & f. copula junctas
deprehendi.

Pag. 160. 1. 8. ad. D. Giögbueps nom. gen. p.
168. 1966. Fl. leg. Fn.

Pag. 187. 1. 5. leg. Sirksabkoma.

Pag. 191. 2288. H. ftrigata, leg. undulata.

Pag. 192. Str. S. 209. t. I. f. 17. fubsit.
2295. & ad. 2295 b. Ph. cor-
pore ovato, tuberculo thoracis
Spinoso. Aët. Havn. 9. p. 503.
t. 6.

Pag. 197. Arksegiarfoak augmentativum ex Ark-
regiak nom. Canceri gener.

Pag. 203. post 2445. ad. E. festinans cylin-
drica, oblongs, obtusa, antice
hyalina.* +

E. retrograda hyalina, antice
spice globulari. * + utra-
que in aqua marina. 2448.
add. anguillulae aceti, quas
eximie scrutatus est clarif.
Goetze in Naturforfcher,
glutinis farinosi, aquae
dulcis, & aquae marinae
specie differunt, licet
primo intuitu, eadem vid-
eantur.

Pag. 205. post. 2469. ad. P. Fasciola antice
in collum attenuatum, postice sub-
acutum. * + marinum.

Pag. 206. post. 2480. ad. B. Bulla membranacea
lateribus inflexis. * +

— — post 2488. ad. C. Orbis orbicularis
spinis binis caudalibus longis. * +
C. Luna orbicularis spinis ~~binis~~
binis caudalibus brevibus.* +

Pag. 207. post 2497 ad. T. Pocillum oblonga antice truncata, crinita; cauda articulata, bifeta. **

T. Rattus oblonga, carinata, antice pilis brevissimis, postice ~~postice~~ ~~time~~ feta longa simplicis, * +

T. S. striata, antice ciliata, extremitatibus in oppositum flexis. * +

T. Anas teres elongata, subtus crinita, dorso fetoso, cuspidate caudali duplici. * +

Pag. 209. post 2529. ad. T. Transfuga latiuscula antice crinita, postice fetosa, altero latere sinuata, altero mucronata. * + Zool. dan. T. IX, f. I.

T. barbata elongata, teres, subtus ab apice ad medium crinita * +

T. melitea oblonga, ciliata, collidilabilis apice globofo pilifero. * +

T. Inquilinus folliculo cylindrico hyalino, pedicello retortili * + Zool. dan. T. IX, f. 2.

T. Lyncaster subquadrata, rostro obtuso, disco pedicellis micantibus, Zool. dan. T. IX, f. 3.

Hae posteriores marinae sunt.

Pag. 212. post 2566 ad. V. cyathina fim-
plex, crateriformis, pedun-
culo retortili. Zool. d. T.
XXXV. f. I.

V. putrina, fimplex, apice
retractili, pedunculo
rigido. Zool. d. T.
XXXV. f. 2.

V. patellina, fimplex patin-
aeformis, pedunculo retor-
tili. Zool. d. T. XXXV. f.
3.

P. 282

Pag. 215. lin. 27. post Pyr. ad. merl.

Pag. 221. post 2632. ad. Pl. flexuosa elong-
ata, depressa, aequali, postice
truncata. * +

Pag. 223. 2706. Pl. punctata, leg. atomata.

Pag. 227. lin. 17. ad. Maffimiut nom. gen.
Großenl.

Pag. 232. l. 4. leg. Takirfiwnak. ad. aucto-
res caudam pro ore fuisse re-
fert O. Fabricius. l. 15. leg.
Unnerarfuk.

Pag. 233. l. 23. ad. Brende-Bovle, Sael-Spy,
Balaenas variis Squillis &
Argonauta 2877 veici tradit O.
Fabr.

Pag. 235. lin. 4. ad. Act. nidr. 4, 54. t. 15,
16. at figurae A. aculaetam
potius revocant. 2.f.

Pag. 234. 2868. ad. P. oblinga. I. R. t. 9. f.
II?

Pag. 254. Fistularia, leg Fistulana.

Pag. 258. l. 29. in tert. colum. ad. Pel-
ecanus 18.

Ad augendam hiftoriam naturalem
patriæ, cognitionemque eorum, quæ ante
pedes funt, fymbolam aliquam conferendi
popularibus occafionem præftitiffe, fpe-
rat atque confidit.

Havniæ, 18 Jan. 1776. Prodrumi Zool. Dan.
auctor.