1976 ✓

over

DESCRIPTIONES
ANIMALIUM

AVIUM, AMPHIBIORUM,
PISCIUM, INSECTORUM, VERMIUM;

QUÆ
IN ITINERE ORIENTALI
OBSERVAVIT

PETRUS FORSKÅL.

PROF. HAUN.

POST MORTEM AUCTORIS

EDIDIT

CARSTEN NIEBUHR.

ADJUNCTA EST

MATERIA MEDICA KAHIRINA

ATQUE

TABULA MARIS RUBRI GEOGRAPHICA.

HAUNIÆ, 1775.

EX OFFICINA MÖLLERI, AULÆ TYPOGRAPHI.
APUD HEINECK ET FABER.

PETRUS FORSKÅL

opere hoc posthumo

*Posteritati traditus, superstes erit —
aut laudatus, aut excusatus.*

RL
337
E3F73
1775
C.3
SCHHRB

S E R E N I S S I M O

AC

P O T E N T I S S I M O P R I N C I P I ,

D O M I N O

C H R I S T I A N O

S E P T I M O ,

D A N I Æ , N O R V E G I Æ , V A N D A L O R U M

G O T H O R U M Q U E R E G I , & c . & c .

DOMINO MEO CLEMENTISSIMO.

Serenissime ac Potentissime Rex,
Domine Clementissime!

Ab antiquissimis usque seculis Arabiæ Peninsula
advenis obscura & fere inaccessa, sibi se reser-
vavit; & Provincia, quam YEMEN vocant Incolæ, fa-
stoso Felicis titulo increbuit. Cæli solique bonitas na-
tiva hanc prærogativam non effinxit totam; sed divi-
tiæ & merces Mundi circumjacentis hanc Regionem,
opportune sitam magno Commerciorum fluxu transibant.
Postquam ad alia littora tantæ refluxerunt opes, no-
men tamen pristinae perduravit fortunæ,

Quo

Quo abstrusior adhuc latebat Arabia, eo vehementius optarunt Scientiarum cultores, ut plena illustraretur luce. Demissa hæc eorum vota audivit & gratissime excepit Gl. M. REX FRIDERICUS V. quem tot nominibus Literarum extollunt fasti, & Thullen hanc detegere ejusque patefacere portas constituit.

Factum hinc est, ut visa diu felix Arabia propius inspecta & secreti nube profligata, qualis sit appareat. Commoda & incommoda justa miscentur lance. Sub bono Principe quæcunque regio barbariem exuit & felix appellari meretur.

Quam sæpe illustres repeterent legationes Optimi Reges, si tanta officiorum observantia spem implerent Socii, qua b. m. Professor FORSKÅL demandatam sibi Historiam Naturalem Arabiæ investigavit! Qua usus est industria: quot coacervavit spolia Naturæ rarissima: quæ pertulit alacri animo mari terraque tædia, pericula, insultus, climatum injurias, vel ex eo constat, quod REGI & Scientiis vivere & occumbere non refugit.

Tot tantaque acta, ne fati & oblivionis injuria emolumento publico subducantur, cui inchoata & destinata fuerunt, magnanima caves, REX AUGUSTISSIME, cura. MAXIMI GENITORIS TUI generose incepta generose continuas. ILLE Forskålum vocavit, misit, sustinuit.

nuit. *Eum redivivum*, TU sistis, DOMINE CLEMENTISSIME, dum Msc. posthuma evulgata cupis, & gratissimum consensum regali munificentia exornas. TIBI, REX POTENTISSIME, debet Orbis Literatus hæc Viatoris TUI monumenta, quæ devotissima offerre manu sustineo.

Qui fructus tot e laboribus exspectari debent, jam quidem e longinquo sublucent; omnes vero designare adhuc non licet; tacito enim & moderato adproperant passu, tempore duce, experientia comite. Interea Scientiæ, illæ melioris Seculi filiæ, quoties usus in his Scriptis, vel iis monstrantibus detegunt, MAXIMORUM BENEFACTORUM memores, AUGUSTISSIMA NOMINA, qua possunt gratitudine celebrare, & venientibus annis perpetua memoria renovare non desinunt.

Devotissima fide manebo

Sacræ Regiæ Majestatis Tuæ

Subiectissimus servus
Carsten Niebuhr.

LECTORI BENEVOLO!

In lucem prodit publicam Opus diu & anxie expectatum b. m. *Professoris* FORSKÅLII, Expeditionis literatæ ad *Arabiam Felicem* Socii. Dignus censebatur ille, quem magnanimus DANIÆ REX FRIDERICUS V. in disitam mitteret terram, ut fundum Historiæ Naturalis exploraret. Spem de se conceptam non fefellit eximius Viator; sed ardore superavit, actis factisque probavit adeo indefesse, ut in ipso tandem muneris campo, & in conspectu Scientiæ Naturalis ceciderit. Jam vero, ex tot officiis vix aliquid ultra famam superesset, si idem naufragium Socios omnes una clade abstulisset; ast unus alterius cineres tumulando propria meditatus est fata, & Msc. residua sollicite convasabat; quæ, solus superstes ego Hauriam transmissi omnia.

Cl. *Forskålus* e primo Orientis limine inclauit Literis ad Eruditos primi ordinis missis, Seminibusque Plantarum per Hortos Europæ Botanicos distributis. Sed Descriptionum & Observationum sylvam ægre vidissent Curiosi. Fasciculi de manu in manum delapsi, inter varia impedimenta longasque moras fluctuabant.

Neque hoc sine causa. Cl. Auctor adversaria sua committere solebat schedulis sparsis minutimque dissectis; methodo ipsi quidem commoda, ut incrementos indies & interlabentes novas observationes posset suis locare stationibus velut folia in Herbario; quum compactum Volumen adfluentibus undique visis & auditis, suis tandem limitibus angustum & confusum se reddit. Verum
enim

enim vero, hæc distributio in tranquillo museo haud utilis, nullo consensu approbanda Viatori est, quem continua vexat sarcinarum agitatio & evolutio. Quam facile foliolum aufugit, quod ex memoria restituere nequit Auctor ipse; longe minus rei perditæ ignarus alter? Chartulæ ad ruinam jam scissæ & paratæ hæredem requirunt scientiarum avidissimum, cui grave non erit inter fragmina disjectæ materiæ serpere, ut solidum ex iis construat ædificium. Ipsa, sua mole sibi gravis sarcina foliis abundabat octo centum ultra millia; quorum aliquot e Possessoris manu dudum excidisse credibile est; interiisse posthuma non minus certum. Hæ lacunæ, quamvis reparandæ hodie non sunt, ad perpetuæ tamen oblivionis inania non pertinent, dum locis in natalibus eadem crescunt Plantæ, eadem vivunt Animalia.

Msc. horum salus illico me ex Oriente reducem tetigit. Quum vero accepi eorum tutelam commissam Viro in Scientia Naturali peritissimo, omnem sollicitudinem deposui. Anno tamen post annum labente, *Forskålum* nimis ad oblivionem recedere dolui, & fasciculos laciniarum vitio ab interitu se non bene tueri, justo sensu timore. Quamvis adhuc non constitit, quid quantumque novi lateret in tanta farragine, illam plurima tenere curiosa judicavi ego, qui *Forskål*i stupendam diligentiam toties miratus sum. Ægerrime tuli, si ex tantis laboribus & periculis nihil maneret, nisi opinio rei bene gestæ.

Ne igitur monumenta hæc in ancipiti diutius penderent, ipse experiri volui, quid mea valeret cura. Illustrissimum Comitem de BERNSTORFF adii supplex, ut Clementissimi REGIS assensum expeteret his Msc. evulgandis. AUGUSTISSIMUS DOMINUS nihil serius optans, quam Itineris hujus Orientalis spolia,
dum

DSI

dum mare enatarunt, ne in portu perirent, veniam gratissime concedebat. Utque pia nostra desideria toto fortunæ nisu promoverentur, iis auspiciatissimo adspiravit nutu SERENISSIMUS PRINCEPS HÆREDITARIUS FRIDERICUS, qui publicæ felicitatis incrementa recta & regia Scientiarum via quærit & auget.

Tanto gratiæ consensu erectus, non cunctanter fasciculos orphanos suscepi. Consilia Amicorum doctissimorum exploravi, quo ordine scripta hæc extricanda, quaque facie in lucem emittenda essent. Illi unanimi judicio suaserunt, Auctorem autographum magis placere quam emendatum, & Publico interesse veritatem non per interpretem, sed ex ipsius Observatoris ore audire. Quæ nova detexit *Forskælius* scire avet Orbis literatus; refugit quæcunque novus addit auctor, qui de speciebus absentibus æquum ferre iudicium non valet; ne quidem in exemplari mortuo vel exsiccato ea cernit signa, quæ primo effulserunt observatori. Sic agebant Amici, & nihil iustius dictum putavi; inque eandem habui sententiam istum, cui laboris tanti obtuli molem.

Tam pertinaciter in hac area actum est, ut Msc. Auctoris omnia vinculis soluta, foliis expedita, & membra divulsâ in ordinem redacta typisque expressa, appareant. Primitias eorum sistimus Historiam Animalium; Floræ mox in vestigio sequuntur. *Editoris* titulum in eo, nullo modo Historici Naturalis. Illius autem nominis jure fidem interpono, Descriptiones omni, qua fieri potest, candore evolutas esse. Interpolationes sub Auctoris tutela irreperunt nullæ, & homogeneam Systematis compagem, partes non foedant dispares. Tam bene cautum est, ne veritates in angusto habitantes sub immoderata brevitate laterent; vel si omnia Auctoris annotata effunderentur, simul inutilia exuberarent. Synonymorum

fatellitio & Lemmarum internodiis fastigiare librum nolimus: his incrementis vacuas reliquit paginas Auctor, qui in via & campo, non in museo & bibliotheca scripsit.

Stili & narrationis genius simplex, dilucidus & Scientiæ legibus obtemperans *Forskålum* ubique spirat & characterem exprimit mentis, cui infixum erat: *non temere credere*. Ignotum nemini est Orientalium ad Mythologiam & rectæ veritatis ænigmata proclive pectus. *Forskålus* frequentiore cum indigenis quam Europæis familiaritatem & convictum agens, semper aliquid hujus arcani hausit. Quam caste tamen & caute se muniit a credulitate, scripta probant, quæ rerum alienæ fidei duo vel tria vix præbent exempla. Fabularum compilationem prorsus non damnamus. Apprime necessaria est ad varietates Veritatis, & diversas fictionis larvas cognoscendas. Ipsa phantasmata imaginationis novitate ingenii ludentis vel errantis placent. Nulla fictio, quæ ex veritate enata non est; nulla sine aliqua veritatis linea.

In his foliis eruendis idem contigit, quod præci Orbis ruinas scrutantibus accidere solet, ut in quovis fossoris jactu pretiosas inveniant res, multo pulvere squalentes. Plures ex his Msc. profiluerunt animadversiones, quas primus promittere non potuit aspectus. Errores haud paucos cum ipso sequi Auctore; errores transcribendo subrepsisse fatemur ipsi; & monstratos agnoscemus. Mitiori illos stringit censura, quisquis noverit, veritatem in omni puncto tutam ex umbra mortalitatis prodire nunquam posse. Absint igitur lites eruditæ; argumentum tribunal, nobiscum quod agat, nihil habet. Innocentissimo animo Auctorem ab interitu vindicare volumus; nostrum non erat illustratum sistere. Hoc magnæ patientiæ & doctrinæ opus aliis reservatum esto.

Causam

Causam igitur *Forskälîi* defendendam non suscipimus, si præter modum *succinctus* videatur Lectoribus, qui descriptiones amant vocabulorum ambitu distentas, totasque characterum lamineas ad ultimam usque evolutas. Peccavit-ne in hoc compendio Auctor, ego non deciderim. Clare & graviter eum scripsisse existimo; an sufficienter, nescio. Quum rem denominatam congruentem primis & palmaribus cum signis cernit Lector, his acquiescit & reliquas minutias supersalit, aut non sine tædio continuat. Totum syrma notionum ad Physiologiam rei descriptæ ablegat. Si eo usque progrediendum erit, quo finis Descriptionis adæquata statuat, Systema nomenclaturæ in Anatomiam & Systema Divisibilitatis infinitæ resolvitur. Quid si *Descriptio Micrographica* adiciatur & in Mundum usque Dioptricum prolongetur?

Scientia Naturalis in eodem rerum statu constituta hodie est, ac Literarum erat cultura universa tempore vergentis Barbariei. Ingenia quippe heroica & ad altiores volatus destinata, in studio inani & pulverulento verborum consumpta evanuerunt. Auctores moderni, qui ex observando & denominando modum retinere nesciunt, sibi molestum imponunt onus, & acervum vocabulorum plus quam sterilem Lectoribus relinquunt. Quantus labor est Pinnarum radios, Alarum plumas, Serpentum scuta & squamas non una vice numerare & renumerare, nullus, nisi Scientiæ cultor genuinus scit, & simul cum *Forskälîo* amare ingeminat in opere tam tristi. Optat, ut Scientia Naturalis quam ocyssime exuat jugum hoc grammaticale, & characteres induat genuinos quidem; sed sensibus & rationi magis obvios & emetiendos.

Feliciorem viam iniisse Auctorem nostrum in distribuendis *Piscibus* ex *Dentium* situ, haud affirmaverim. *Lacertarum* Syste-

ma e Speciebus cognitis proprium in usum delineavit; quod vero facilem & scientificam ob formam adjicere debuimus. Non sine qualicunque sensu reluctantis animi est, dum ideam sequitur in Systemate Naturæ reformato datam, quæ Natantium aliquot genera ad Quadrupedia mittit; vel Piscium genera nonnulla sub *Amphibiorum* signo trahit. Gratum fuisset audire Auctorem Philosophum fusius differentem in rationes, quibus inductus totam hanc destruit Classẽ, debilissimo antiquæ denominationis fundamento insistentem; propriam vero provinciam rebellionis contumacia defendentem; unde non aliter fieri potest, quam quod reliquæ Classẽs Animalium species has, tanquam totidem transfugas accusant. Ipsa definitio Amphibii, quocunque demum artificio tornata, vix sensum Scientiæ Naturali congruum admittit.

Deficere *Forskålum* in copia *specierum* lubenter concedimus. Hunc monstrant defectum *Nomina vacua*, quibus nullæ adhærent descriptiones. Hæ lacunæ fidem Auctoris firmant, qui nihil, nisi observatione duce & iudice tradidit, & potius parce loqui, sed vere voluit, quam volumina Relationibus implere exoticis. Nomina sibi, non Lectoribus notavit, ut occasione ferente, quæstiones haberet, quas Incolis proponeret. Nos eundem Catalogum & Quæstiones *Forskålianas* Eruditis Europæ proponimus, ut in Scriptis Arabum responsa quærant. Nec inutilis est hæc Sylloge aliis Viatoribus, qui, dato nomine, in res ipsas inquirant; ignoti enim nulla est scientia. Incolæ rudes ipsi, terræ indolem ignorant, usque dum indiciis moniti & excitati vident & loquuntur. Denique, nescio quo nisu dubia & obscura potius investigamus, quam vulgaria & patula. Scientia quoque Naturalis suum habet studium Antiquitatum; dumque ex Oriente munera mittit integra, hieroglyphica & fragmina scripta interspargit.

Pari

Pari involvimus excusatione *defectum Animalium*, quorum notitiam ab Auctore exigere potest Zoologus. Benigna manu accipe Lector, præsentēs descriptiones magis minus-ve diffusas ultra 300; præter observationes in Conspectu Faunæ allatas. Totidem species novas vel emendatas adferat Tibi ex Oriente Viator unus & alter; & Zoologia numero civium certabit cum Botanica. Considerandum præterea est, Animalium notitiam non eadem facilitate comparari ac Plantarum, quæ vitam agunt sedentariam & cum vicibus anni fluentem. Dies & mensis Botanicum ad opportunam vocat herbationem: moram deinde tranquillus exspectat, dum vegetabilia e feminibus in horto satis excrescunt. Animalium historia regios poscit sumtus, & eorum captura Venatorem magis quam Scientiæ alumnum requirit. Volucres vigili & præpeti ala effugiunt: Amphibia latebras terræ agilitate lubrica subeunt; nec cujusvis manus est Plutonia hæc corpora tractare. Non omnia exsequi valet omnis. Ægyptus liberos negat campos excursionibus eruditis, & Arabiam festinanti transivimus pede. Venatoriis artibus & ambagibus nec locus neque tempus suffecit.

Entomologiæ studium Cl. Auctori olim in deliciis erat, & Oriens Collectionem Insectorum suppeditavit ingentem; schedulas vero hoc sub titulo militantes invenimus admodum paucas. Jam ex Ægypto & Suès Cl. *Forskålus* Hauniam misit rariora exotica totis manipulis. Pars residua terra marique conquistata in Arabia simul cum Vermibus, Amphibiis & Piscibus in Sp. V. asservatis, magna afflicta est ruina in tumultu, quo excepti fuimus *Mochkam* ingredientes.

Post mortem Socii Museum Viatorium ad *Bombayam* transtuli; inde versus *Tranquebariam* misi. Ex hoc portu enormi

errabat ambage *Cantonem* Chinæ; inde demum Hauniam appulit. Quis ergo salva & integra expectabit corpora mollioris texture, postquam turbulentam maris agitationem, & Climatū vicissitudines tam diversas subierunt? Quum Insectorum exuviae non facile collabuntur & exiguo corporis compendio asservari commode possunt; credibile est Auctorem has descriptiones, suas amoenitates, curis reservasse quietioris vitae. Attamen *Cancrorum* hic leguntur species variae: *Cerealium exustio*: *Gryllus migratorius* & *Cicada mannifica* indignantur.

Testaceorum species perquam paucae inhabitarent Mare Rubrum, si Catalogo hoc in opere dato crederentur enumeratae omnes. Cl. *Forskålus* copiosius illas collegit, quam scribendi diligentia assequi potuit; quae praeterea semper hic in saxeo & sterili arat fornice. Quum vero indelebiles persistunt literae hae Tethydos, iis relegendis otium cum voluptate consecrasset redux.

Coralliorum indicem iis arridere speramus, qui theoriae hujus natales novis incrementis extendere cupiunt. Hic, aut nusquam Museum est, ubi scientia haec abstrusa studenda erit, & cum Corallologia Maris Baltici comparanda. Diversam quoque Neptuni progeniem incumbens advolvit Oceanus.

Sicut vero omne punctum non tulisse *Forskålum* ajunt Censores; ita a parte contraria vitio illi vertunt *nimum specierum affluxum*, quas characteribus specificis non ubique suffulcit fixis. *Piscium* agmina e prima acie produnt Varietates nimis multas, & Species aliquot levius stabilitas. Tu vero, qui hanc moves querelam & otiosa manu haec volvis folia; *ex istis, utinam! undis, ubi hi natabant pisces, eos ipse petisses!* scires, quanti tibi constaret haec notitia. Tot novis speciebus obrui, eas comparare,

rare, ad normam Scientiæ oculata examinare subtilitate, procul a consilio librorum, inter tumultus itinerum, tempore & tempestate urgente; hoc conamen heroicum vocat quisquis sterilia & tristia descriptoris officia desudavit ipse. Cl. Auctor Piscium exuviis utili artificio detractis Herbarium compegit Ichthyologicum, quod curis subcivivis reservavit & integrato examini.

Ista laude defraudare *Forskålum* nullus debet veritatis æstimator candidus, eum re ipsa *Species novas* Animalium omnium fere Classium detexisse haud paucas, & tot characteribus delineasse, quot sufficiunt a congeneribus discernendi. Ornithologia lucem sceneratur egregiam ex parallelismo Temporum periodicorum *Avium migrantium*. Si quid in *Molluscarum* Generibus ambiguum appareat, perpendant Censores, Vermium cognitionem adhuc enatam vix esse, & neminem exigere a viatore experimentorum patientiam in Animalium Marinorum naturam, quæ aut rarissimo protrahuntur casu, aut semper occultantur elemento, quod totum latebra est.

Iusta si dividatur lance hæc lis, agnoscet Lector Auctorem Varietates non alio sub titulo exhibuisse, quam instar *differentiæ exstantioris* a Specie superiore. Jam necesse est, antequam excludantur, ut accurata censura eas conferat cum simulacris in Museis asservatis vel in tabulis Zoologicis expressis; usque dum novus viator easdem *Forskålîi* lucubrationes in locis natalibus renovat. Si enim dicam, quod res est, *Recensio Varietatum* sobria in Zoologia provinciali non solum admittenda, verum & urgenda est; nam illi adhuc multum restat ad dignitatem Systematis Naturæ. Designatis Varietatibus primariis, in iis deceptus non errat tiro; quum Species tam polymorphæ sæpe ludunt, ut exercitatum fal-

lant

lant oculum. Nec omnes Varietates cum die & loco mutantur. Avium genera marem & fœmellam magnitudine & coloribus separant. Insecta in eadem domo quasi ignota habitant, mares, fœmellæ, neutra; alatus ille, aptera hæc. Tanta diversitas ejusdem progeniei, nisi dudum observatione innotuisset, totidem describerentur species distinctissimæ.

In Archivo hoc rerum exoticarum omnia scitu necessaria putamus, tanto magis, quo angustiore compendio proponuntur. Nobis datum non est, ex prima hac statione indigitare, quorsum rivuli omnes se diffundant; quæ nobis levioris momenti apparent, in eodem nodo magnam veritatum seriem evolvit sagax acumen. Veritates indelebiles manent, cum annis crescunt & perpetua inventorum familia propagantur.

Nihil facilius esse potest, quam superflua transire. Gradum interea reprime Lector, & Scientiæ alumno sincero, erudito & erectæ mentis confide, qui Species dum viventes & integras contemplatur *notas* judicio & sensibus discernit, quibus singulis enuntiandis in promptu non habet verba. Si fata permisissent, Zoologiam Orientalem Cl. Auctor elaboratam & magna luce illustrantem varia dubia edidisset, quæ ille BOCHARTO superior, post acquisitam Linguarum Orientalium notitiam vivam, & Scientiæ Naturalis longinquam experientiam valuisset & præstitisset.

Sunt, quibus Cl. Auctor videtur nimis sollicitus in *vocabulis Arabicis* conquirendis; & hi, sine dubio literati minorum gentium, ceu quisquilias repudiant sonos istos non intellectos. Sed spatia hæc illi, quibus apparent obscura, prætereant; brevis est saltus. Istis Lectoribus non scripsit Auctor, neque transcripsimus nos. Sapienter eum fecisse ajunt vere Eruditi. Non enim Lin-
guarum

guarum cultura ita ad occasum spectat, quin magni adhuc viri humeros tantæ opponant ruinæ. Ipsa Lingua Arabica in Europa plane extincta non est, ubi tot in Bibliothecis servantur Msc. hoc idiomate eruditorum Orbis Orientalis vernaculo exarata, & sine interprete nequaquam intelligenda. Nomen rei naturalis Arabice enunciatur vana vox est, nisi Scientiæ modernæ nomenclatura determinetur; quod solus ille exsequitur, qui studia hæc tam diffita conjunxit. Quantum *thesaurus Linguae* ex tali verborum sylloge increfcit, facile perspicitur. Cl. *Forskålus* nomina Arabica Romanis literis expressa interdum sistit dissona ab iisdem vocibus Anglo, Germano vel Gallo Auctore scriptis; is enim Svecanæ linguæ dialecto affuetus, illius ductum sæpius secutus est. Similiter ad normam dialecti Ægyptiacæ ق exprimit instar Q; idem in Arabia instar G. In Ægypto enunciat ش ut Sj; in Arabia ut Sch.

Græca nomina eo minus displicebunt, quo familiarior Doctis hæc Lingua sonat in scriptis adhuc non barbaris, ARISTOTELIS, ÆLIANI & horum imitatorum PLINII, SOLINI aliorumque.

Delineationes Animalium, e Classe præcipue Vermium, haud paucas egregia pinxit manu industrius BAURENFEIND. Expectant illæ societatem *Iconum Plantarum*, ut simul in publicum prodeant. Brevis est mora, nec impedimenta retardant Lectorem, si verbis adumbratas habet descriptiones claras & sufficientes, ut hæc sunt *Forskålianæ*.

Maris Rubri littora sufficienter non designata fuerunt hucusque Geographiæ cultoribus; quumque plurima Voluminis hujus res his in undis agitur; luce viatoria Lectorem præire volumus, ut vestigia inspiceret Musei Auctoris Ichthyologici: littora Te-

staceorum feracia: tractus & fines scopulorum Coralliferorum: brevia Piscibus frequentata.

Materiam Medicam ampliorem non invenit Cl. *Forskålus*, quam ex Officina Pharmacopœe Græci Kahiræ collegit, Domino ipso præeunte. Si ad extendendam Scientiam Pharmaceuticam copiosa satis non est; ad illustrandam inservit. Locales natales variorum Simplicium innotescunt & pretia rerum, simul cum nomine scripto & loquente. Neque domi sine usu est, in explicandis Libris Arabum Medicis & Botanicis.

De cætero monendum est, Auctorem usum fuisse *Editione decima Systematis Naturæ* de LINNÉ; & nos, ne recentiorum annorum detecta & emendata illi adscriberemus, eodem filo ariadneo secutos fuisse.

Forskålus hæc opera Lectores nancisci æqui iudicii, optamus; sed & leviorum ingeniorum insurgentes prævidemus censuras. Necessarium ducimus hos monere pugiles, ne *Forskålum* nostrum temere accusent, si ab aliis Doctis, de LINNÉ præsertim, subinde dissentiat. Magnum est sæpe laudari a de LINNÉ; gratissimi animi indicium est, quum discipulus magistri & antesignani vestigia tam presse sequitur, ut hic noster. Scientiæ Practicæ quovis die falsa detegunt, dubia emendant, certa confirmant, veritatum incrementa augent. Quid hoc sibi velit, primæ magnitudinis ingenia sciunt, quæ ex fastigio eruditionis suæ spatia scientiarum in immensum extensa prospiciunt, quæ nec intellectus humanus, neque secula exhauriunt.

Cl. *Forskålus* viva emicuit juventute & nativo indolis vigore perseveravit. Fortunam meritis comitem habuit, quæ cineribus superstes mansit, & raro favore Msc. in profundo
remotæ

remotæ Terræ servavit. Quidquid in his modum & littora ex-
cedit, coerceat alius, si oneri est: quicquid deficit, suppleat
quicumque post *Forskålum* eadem promittere audet, quæ hic
conatu & factis præstitit post BELLONIUM, ALPINUM, HASSEL-
QUISTIUM. Si his meliora exhibere non vales, Lector, his
utere. Si quid illustrius noveris, imperti: *erudita & justa li-
tura pretium huic operi facit.*

C O N T E N T A.

CONSPECTUS Faunæ Orientalis.

QUADRUPEDIA, Ægyptiaca, Arabica.	-	pag. III.
AVES. Descriptæ, Nominatæ,	-	VI.
AMPHIBIA, Descripta, Nominata.	-	VIII.
PISCES. Descripti, Nominati, Pisces Melitenfes.	-	X.
INSECTA. Descripta, Nominata,	-	XX.
VERMES. Mollusca, Testacea, Zoophyta, Corallia.		
Conchylia nominata.	-	XXIV.

D E S C R I P T I O N E S.

AVES.	-	pag. I.
AVES MIGRATORIÆ.	-	7.
AMPHIBIA.	-	12.
PISCES.	-	22.
INSECTA.	-	77.
VERMES: MOLLUSCA.	-	99.
TESTACEA.	-	122.
ZOOPHYTA.	-	128.
CORALLIA.	-	131.
TESTACEA FOSSILIA.	-	139.
MATERIA MEDICA.	-	141.

DE-

DESCRIPTIONES
ANIMALIUM:

AVIUM:
AMPHIBIORUM:
PISCIMUM:
INSECTORUM:
VERMIUM:
TESTACEORUM:
LITOPHYTORUM.

QUE
IN ITINERE ORIENTALI
OBSERVAVIT

PETRUS FORSKÅL.

PROF. HAVN.

NOVA GENERA.

PISCIMUM.

SALARIA. (Gadus 3.)

SCARUS. (Scarus 11--18.)

SIGANUS. (Scarus 9. 10.)

ACANTHURUS. (Chætodon 88--91.)

MOLLUSCARUM.

SALPA.

PTEROTRACHEA.

PHYSSOPHORA.

FISTULARIA.

— *Mutæ natantes*

Squammigerum pecudes, & lata arbusta, feræque,

Et variæ volucres, —

Horum unum quodvis generatim —

Invenies — LUCRET.

FAUNÆ ORIENTALIS

CONSPECTUS.

QUADRUPEDIA.

(*Observata, non descripta.*)

α) ÆGYPTIACA.

1. SIMIA; CAUDATA. *Robâb* رباح clunibus nudis.

β) *Alia* e Nubia affertur; vocata *Nisnâs*. نسناس

2. VESPERTILIO. *Adfa*. عذسيبة

Arabes e desertis adferunt stercus Vespertil. quod frequenti usu medico adhibetur interne. Externe aceto mixtum tumoribus imponitur.

3. CANIS; a) FERUS. passim. *Kelb marre*.

Album græcum, ar. *Cbâra kalb rumi* خراكلب رومي e Græcia affertur; usitatum contra Scabiem interne sumtum dosi 3j vel ʒiij saccharo mixtum.

4. b) HYÆNA. *Dabbâ*. ضبع In desertis.

Cauda non annulata, immaculata. *Corpus* albidum, transverse fasciatum; pilis dorfi longioribus, rigidioribus. *Ungues* pedum 4 — 4. *Ungula* lobi 5. *Pedes* anteriores majores. Arabes carnem ad usus medicos adhibent.

5. c) VULPES. *Taaleb* ثعالب vel *Dorên*. درين

6. VIVERRA; a) ICHNEUMON. *Nems*.

7. b) ZIBETHA. *Qatt el barr*; قط البر id est: *Felis sylvestris*. Zibethum affertur e Nubia; vocatur *Zabad*. زبد *Moschus* dicitur *Misk*. مسكى

8. ERINACEUS. *Harbe* حريرة vel *Ganfud*.

9. RHINOCEROS. *Karn charit: قرن خرتيت Cornu rhinoc.*
E Nubia. Colore rubro, vel albo; sed cornua fulva optima & antivenenata creduntur, e quibus pocula fabricantur, pretio 5. Ducatorum.
10. MUS. a) DOMESTICUS: *Far.*
11. b) MUS JACULUS. *Djarhua.*
12. CAMELUS a) VULGARIS. *Djämnel.*
Animal natum ad tolerandos labores & incommoda orbis meridionalis. Os & gingivæ mira cartilagine inducæ, ne noceant spinæ plantarum deserti, quæ omnes fere armatæ sunt, quasque cætera animantia horrent; quarum vero heluo Camelus est.
13. b) DROMEDIARIUS. *Hadjîn.*
A Camelo non specie sed propagatione variat: corpore apto & gracili; imprimis capite, collo, pedibus. Cursu equo citior.
14. c) BACTRIANUS. *Bôcht.*
Gibbo dorfi duplice. Exoticus; & proceribus tantum inter animalia rariora reservatus.
15. CAPRA. a) GAZELLA. *Dabi ظبي vel Gbazell. غزال*
16. b) IBEX. *Bæden.*
Ex *Hedijas* affertur.
17. HIPPOPOTAMUS. *Abu unner. Damiata* apparuisse, ajunt.

ARABICA.

α) GENERIS CERTI.

18. BALÆNA. *Bættan. بطن* Ante tres annos una projecta in littora maris rubri, 40 uln. long. In urbe *Tôr*, in Monasterio Græco *Raizbu* vocato, ostendebant mihi *Ceston* (nostratibus sæpe *Gigantum Ossa*) e pisce residuam grandi, ad littora Suenfæ non ita pridem ejecto. Referunt Arabes *Scarum rivalatum*, (*Sigan*) nescio quam ob inimicitiam ingredi nares Balænæ, easque crebriter pungendo, animal occidere. Confirmant exemplo Balænæ in littore ad *Hateban* mortuæ, cujus nares infederat *Scarus*.
19. DELPHIS *Djiddæ* vocatur *Mas Darfil درفيل* vel *Gobâr; قمبر* Foemina *Aræa*; alibi vero *Abu falâne*. Gregatim 10. vel 15. mares foemellam persequuntur. Vicinat *Muricibus* tribulis.
20. LEPUS. *Aræab. عرنب* In montibus Yemen non obviæ.
21. URSUS. *Dubb. دب*

22. LEOPARDUS. *Nemr.* نممر In Arabia & Ægypto non infestus, nisi irritetur.
Ædes noctu ingreditur, feles caprans.
23. LUPUS. *Dib.* ديب

β) GENERIS INCERTI.

24. ARDJ. *عرج* *Canis hyana?* Cinereus, pilosus.
25. BAKAR UASCH. *Bos sylvestr.?*
26. DAREN. *Meles?* Cryptas terræ inhabitat.
27. MASHUR. *مسهر* colore nigro; $\frac{3}{2}$. ped. longus; capite grandi; morfu lethali.
28. KUNDI. *كندي* exiguus; a serpentibus captatur.
29. DJÆAR. *جاءر* Afino similis forma, statura, auribus. Caro edulis.
30. SCHENSAR. *شنصر* Feli similis, sed major: cuniculos terræ inhabitat; gallinas venatur nocturnus prædator; eundo strepitum edit.
31. ÆKSCH. *عكش* ejusdem formæ; gallorum sono clamitans; rapax.
32. DAKIR. *دكير* Bovis magnitudine; cornua nulla; nocte prædatur.
33. DOGHAR. *ذغر* *Vesperilio?* noctu volat; fructu *Coffea* vescitur, quem, nimis forte gulofus, vomitu reddit, unde incolis opinio, eum ano destitutum esse.
34. UABR. *وبر* feli similis, sine cauda; herbiphagus, monticola. Caro incolis edulis.

γ) NOMINE SOLO NOTA.

a) HATTAF.	f) OMM SÆLAMLAM.
b) SAGHMA.	g) NAAM. <i>نام</i> Ital. GANGA.
c) BAJJUD.	h) ÖEKASCH. <i>عكاش</i>
d) BOKSUL.	i) GHAFLA.
e) SJARAD.	k) SAHHA MRIR.
- l) TAHISCH *طيش* vel NEBASCH *نباش* animal fabulare: magnitudine hominis; corpore pilis albis, mollissimis: noctu sono ridente clamans. Sufflare valet ad longam distantiam, & spiritum denuo resorbendo simul attrahit corpora viva, imo & cadavera e sepulcris exfugit. Ortus animalis, non inferior his dotibus: quatuor enim confatur substantiis: diabolo; vento; fulgure; in quarta vero defecit memoria hominis hanc fabulam mihi narrantis.

AVES.

α) DESCRIPTÆ.

1. FALCO CINEREO-FERRUGINEUS. *Haddaj*.
2. MEROPS a) ÆGYPTIUS, viridis. *Chaddajr*.
3. b) APIASTER. *Schagbagha* vel *Schokak*. شقاق
4. CROTOPHAGA GRISEO-MACULATA. *Tullak* vel *Dymudj*.
5. ALCEDO SEMI-CÆRULEA.
6. ANAS a) ANSER. *Uas araki*.
7. b) GRISEA. *Scar chir*.
8. c) COLLARIBUS ALBIS. *Sau farai*.
9. d) BOSCHAS. *Kenâr*.
10. e) FUSCA, MACULA ALBA. *Gazzair*.
11. f) VIRIDI-RHOMBEA. *Sirfair*.
12. g) NIGRO-VIRIDI-RHOMBEA. *Balbul*.
13. h) FERINA, UNDULATA. *Batt*.
14. COLUMBA a) TURTUR; RUFESCENS.

Columbarum in Ægypto theriotrophia a Viatoribus descripta & delineata sunt. Copiose coluntur aves istæ. Præter aquam, pabulum illis non præbetur, quod in agris & campis inveniunt ipsæ. Fimus Columbinus ad saturandam terram Cucurbitaceis plantatam adhibetur; præterea enim Ægyptiaca terra humana non indiget ope ad vires & succos restaurandos.

15. b) INCARNATA. *Hamâm*.
16. TURDUS SELEUCIS; GRYLLI-VORA. Arab. *Samârmâr*. سمور
Aleppo quovis anno advenit mense Julio & Aug. Gryllorum examina sequens & perfequens. Procul auditur clamore *rr, rr*; unde forsitan nomen romanum adeptus est.
17. MOTACILLA SCHOENOBENUS, NIGRO-CINEREA. *Abuffaj*.

β) NOMINATÆ: (*Arabicae*.)

1. ACCIPITER. *Sanûa*. Gallina minor.
2. NOCTUA. *Muslem*. Defuncto homine, in vicinia clamat hæc avis nocturno tempore sono articulado *fat, fat*; quod Arab. idiomate est *transiit*.
3. CROTOPHAGA. *Kakab*. كقاب rostro ferrato. Vescitur serpentibus & Chamæleontibus.

4. UPŪPA

4. UPUPA EFOPS. Arab. *Hudbud*. Káhiræ *Hadbada*.

5. PROCELLARIA PELAGICA.

Nigra; dorso macula alba. In Mari Lusitanico obvia.

6. ONOCROTALUS. *Abdjurba*.

Avis ad littora Nili non infrequens. Postea quoque vagum inveni in Insula Maris rubri, ubi nidum struxit e sarmentis. Ova inerant quatuor, alba, fusco-nebulosa, ovi anserini magnitudine. Avolavit mater terrêfacta, neque redibat tempore duarum horarum. Mirum id mihi videbatur, & alienum a cura prolis in Septentrionali orbe, ubi avis puerpera semper clamans, rediens, circumvolitans. Onocrotalo eadem sine dubio memoria nidi, sed fervidum clima longiorem permittit absentiam.

7. LARUS a) *Bagan*. In Ægypto. Græc. Γλάρος. Alia species *Macellus*.

8. b) *L. Jan van gendr*. Arcticus: prope *Herlandiam*; albus; remigibus apice nigris. Prope *Caput B. spei* volat Larus ejusdem coloris; an idem cum hoc polari? (cfr. *Itinerar. Dn. OSBECK.*)

9. GRUS ALBA. *Kobnobi*. *قهنبي*

Pedibus & plumis subalaribus rubris; unde volans apparet totus ruber.

10. CHARADRIUS ÆGYPTIUS. Arab. *Abu magbâsil* vel *Qarqar*.

Quem hoc nomine descripsit *Hasselquist*, videtur potiori jure pertinere ad genus *Hamaropi*. Est denique, ut mihi videtur, differentia sexus, non speciei inter *Charadrium alexandrinum* & *ægyptium*.

11. TETRAO PERDIX. Turc. *Tjekik*: Ad *Tôr Schinjan*. Djiddæ *Hadjal*.

12. COLUMBA a) TURTUR. *Djâbleh*. *جذلب*

13. b) VULGARIS. *Hudjafa*.

14. c) ALIA major, ejusdem nominis; granivora.

15. PASSER DOMESTICUS. *Akbâr*.

16. ALAUDA ARVENSIS. *Kunbar* vel *Kombara*. Frequens ad littora Nili, etiam *Lo-hajæ* mensè Januar, ubi quoque *MOTACILLAM lusciniam* agnovi.

γ) OBSCURÆ. (*Arabicae*.)

a) RHASCH: rufescens; columbæ magnitudine; granivora.

b) ELBAS: *البلاس* cinerea; columba major; prædatrix.

c) RÆKA: prædatrix.

d) SIKÆD: flava; graniphaga; columba major.

e) MEHARRER; flava: turture minor. Holci feminibus victitat. Nidum ejus vocant incolæ *Mekfahb*.

f) ASFARET EMOSETTIN; nigra, parva; cerealía depascens.

g) GHOR-

- g) GHORNOK: alba: *Oestrus* pascitur in tergore boum nidificantibus.
 h) ABU RISCHE.
 i) ABU ÆMAL.
 k) DJOUN: جون canora; edulis.
 l) BYLBYE: rubens, turture major; ipsa sibi nomen dedit *hyllye* clamando.
 m) ACHJAL: *rectricibus* duabus perquam longis, apice lamina ovali. Hæ duæ pennæ venduntur in Yemen pretio $\frac{1}{2}$. Imperialis; illisque Monticolæ tiaras ornant festivis diebus. Ipsa avis inter rarissimas habetur. Prope Beit el fakih volantem vidi. Ipsa, quasi curam gereret Rectricum, ne in angusto lædantur nido, dum circumeat & se vertat; duabus illum patefecit portis, ut liber & rectus sit utrinque egressus.

AMPHIBIA.

α) DESCRIPTA.

1. TESTUDO TERRESTRIS, Zolbafæ زولبافه vel Buzi.
 2. LACERTA a) NILOTICA. Varan, serpentibus inimica. An Arabum Varar? ورر
 3. b) ÆGYPTIA. Dabb.
 4. c) OCELLATA; domestica. Seblie.
 5. d) GECKO; leprosa. Abu burs. ادوبرص
 6. COLUBER a) LEBETINUS; somniferus. Aspis? Kēphn.
 7. b) GUTTATUS; innocuus. Taaban.
 8. c) HAJE; حية Funestus, collo inflato. Nascher. ناشر
 9. d) DHARA; cupreo-cinereus.
 10. e) SCHOKARI; شقاري vittatus; inermis.
 11. f) BÆTAN; بثن maculatus; lethalis.
 12. g) HÖLLEIK; هليكي ruber; ardens.
 13. h) HANNASCH ASUÆD; حنش اسود niger; innocuus.
 14. RAJA a) TORPEDO. Raafsch. رعاش
 15. b) LYMMA; لى caruleo-maculata.
 16. c) SEPHEH; سفين α) pterouros, aculeis caudæ ferratis,
 β) Uarnak; ورنكي cauda apterygia.
 17. d) DJIDDENSIS; maxima. Rger. رقيط
 18. e) HALAVI; حلوي rhinobates.
 19. SQUALUS CARCHARIAS. Tersch. قرش
 α) MINOR, Alka vel Aas. عوس
 β) MAJOR, Zyfa. زفا

β) NOMI-

β) NOMINATA.

1. TESTUDO a) MARINA. In mari Syriaco.
 2. b) TRIUNGUIS. *Tirse*. In *Nilo* rarior.
Pedibus pinni-formibus; omnibus tri-unguiculatis; dorfi disco rugoso, orbiculato, limbo depresso, lavi; naribus in cylindro elevato & ultra caput prominente.
 3. LACERTA a) HARBAL. حرباية. In desertis KAHIRINIS.
Cauda imbricata, longa; pedibus 5-dactylis; brachiis ferie verrucarum.
 4. b) AGILIS. Orbana. عريانة vel Sobala. HADIE.
 5. c) CHAMELEON. Focbacha. Hadienfibus Makrif. مقريف. In scriptis Arabum sonat Herba. حربا.
 6. d) AERDAN. HADIE.
- SERPENTES; obscura; arabica.
7. a) HANNASCH ABER, i. e. *Serpens cinerea*. Collum expandens irata.
 8. b) AERAM. عرقم cinerea.
 9. c) BÄSCHASCH. *Cerastes cornutus*? An ejusdem speciei cum *Serpente DATAN cornuta*, quæ cuniculos agit in terra sicca & laxa? Si viator scrobem pede premit, *Dazan* lethaliter mordet.
 10. d) TIRRAL. e) ASRUD.
 - f) JABES EL AGFAR. g) MHARRAK.
 - h) SUÆRI. i) HOUAL.
 - k) SELL. l) ÖSFAN.
 - m) SULTAN EL HANNASCH, ruber. n) MOVAS.
 11. RAJA: a) TORPEDO? Μαστιγόπτερος. In *Archipelago*.
 12. b) OMM ES SCHERIT. أم البشريطة. Cauda tereti, maculata: Piscis simillimus Rajis Uarnak & Arnak.
 13. c) ARNAK. Lobaja.
Dentibus granulatis; corpore orbiculato, argenteo; cauda tereti, apterygia, spinis duabus.
 14. d) TAJARA. طيارة Djidda. HÖRRÆKA: Lobaja.
Cauda tereti; ventre niveo. Capta, vehementer pinnis verberat.
 15. e) SCHOUKIE. Djidda.
Aculeis remotiusculis. E pelle hujus Rajæ conficiuntur in urbe *Suaken* Vaginæ gladiatorum.
 16. f) MULA. ملاء pelagica. Djidda, rarior.
Cauda tereti, variegata: ventre niveo; aculeo caudæ admodum nocivo.
Nocturno tempore propius ad littora venit.

17. SQUALUS: a) MASSASA, *Djidda*; MAFREKA, *Lobaja*.
Dentibus nullis; pinnis pect. longis. A Charcharia diversus.
18. b) PRISTIS. ABU MINSCHAR, *أبو منشور Djidda*. SCHÆKRA, *Lobaja*.
19. c) KUMAL. Dentibus nullis; pinnis pect. brevibus; cirrhis oris quatuor.
20. d) KELB EL BAHR: i. e. *canis marinus*.
21. e) ZYGÆNA. Korna *قرنة* vel *Mokarran*. *Mascatenfis* vocatur *Abu kott*.

Rarus ad littora Arabia. Coenosum fundum amat; non coralliferum, vel pelagum. Homini infestus, Carcharia peior. Rajas devorat, Foemella grvida pullis 10. vel 12. Mascatenfes nautæ Carnem lubenter edunt; & aphrodisiacam putant. Ventriculo inverso hep- par injiciunt, quod cito solvitur in axungiam.

PISCES.

α) DESCRIPTI.

1. MURÆNA a) GUTTATA. *Sjæaka*.
2. b) CINEREA; fuspecta. *Sjæga*. *شافة*
3. GADUS vel novum genus SALARIA. *Σαλάρια*.
4. BLENNIUS GATTORUGINE; torvus. *Kofchar ed djin*. *كشرا الجن*
5. GOBIUS a) ANGUILLARIS; minimus.
6. b) NEBULOSUS, pinnæ d. radio prolongato. *Hout ed djinn*. *حوت الجن*
7. COTTUS a) MASSILIENSIS, ambiguus. Gall. *Rascasse*.
8. b) INSIDIATOR. *Rogad*. *راقد*
- SCARUS: novum genus. *Σκαῖρος*.
9. a) RIVULATUS: *Djezavi* vel *Sigian*. *سيجان* nov. genus: SIGANUS.
10. b) STELLATUS. *Ghæjbân*. *عيتان*
11. c) GALLUS; venenatus. *Dik el bâbr*.
12. d) PURPUREUS; psittacus marinus. *Durrat el bâbr*. *درة البحر*
13. e) GHOBBAN; lituratus. *Ghobban*.
14. f) NIGER. *Cbadri*.
15. g) FERRUGINEUS; ore viridi. *Abu meles*.
16. h) PSITTACUS; viridi-flavus. *Durrat el barr*. *درة البر*
17. i) HARID. Cauda basi squamosa. *Harid*. *حريت*
18. k) SORDIDUS; fusco-ferrugineus. *Biff*.
19. MULLUS a) AURIFLAMMA; vittis aureis. *Ambîr*. *عنبيير*
20. b) VITTATUS; quinque-fasciatus. *Abu dagn*. *أبودغن*
21. SPARUS

21. SPARUS a) NILOTICUS; recte *Labrus julis*.
 22. b) SARBA; argenteus. *Arid.* *Sparus sarba* *Fah*
 23. c) SPINIFER; quinque-filaris. *Naddjar. نجار* Constantinopoli Merdjan. " *spinifer* *Fah*
 24. d) BERDA; spinis basi bulbosis. *Abu basal vel Nezi. نزي* Lohaja. " *berda* *Fah*
 25. e) HAFARA; lineis flavis 14. *Haffära. حفارة* " *haffara* *Fah*
 26. LABRUS a) PERDICA; vittis dentatis. *Περίδιννα.*
 27. b) INERMIS; nigro-guttatus. *Gbaffek. عسق* *Chelio inermis* *Ru*
 28. c) RAMENTOSUS; ramentis longis.
 29. d) ÖYENA, labio prolabente. *Abu öyena vel Kuvér. كوير* Lohaja. *Diapterus oyana* *Ru*
 (β) *Gafa; قاصه* vittis rubris.
 30. e) SCINA; abdomine recto. *Σκίνα.*
 31. f) LAPINA; rubro-maculatus. *Λαπίνα.* *Crenulabrus pavo* *Ru*
 32. g) CHANUS; lineatus. *Χάνι.* *Crenulabrus ocellatus* *Ru*
 33. h) OCELLATUS; oculo coccineo. *Chelinus lunulatus* *R.*
 34. i) LUNULATUS; squamis fasciatis. *Abu djubbe vel Dik. ديك*
 (β) lineis radiantibus circa oculos.
 35. PERCA a) LOPHAR, pinnis V. adnatis. *Λοφάρ.*
 36. b) ROGAA; fubnigra. *Rogaa. رقع* *Epinephelus rogaa* *Ru*
 37. c) LUNARIA; P. C. macula lunata. *Biut er robbân.*
 38. d) TAUVINA; longa, rufo-guttata. *Tauvina. توينه*
 39. e) FASCIATA. An Perca?
 40. f) LOUTI; cauda bi-falcata. *Louti. لوتي* *Epinephelus fasciatus* *Ru*
 41. g) MINIATA; rubra; caruleo-guttata. *Zarbân. نربون* *Variola louti* *Ru*
 (β) *caruleo-ocellata. Baláb. باح* *Epinephelus minimatus* *Ru*
 (γ) *caruleo-guttata, major. Nadzil.* " *guttatus*
 42. h) SUMMANA; albo-guttata; fusca. *Summân.* *Epinephelus summiana* *Ru*
 (β) *fusco-guttata. Kassjara.* " *fusco-guttatus* *Ru*
 (γ) *sciama nilotica. Δάβραζ.*
 (δ) *areolata. Daba. صبع* *Epinephelus areolatus* *Ru*
 43. i) LINEATA, lineis nigris. *Djesauvi.* *Paramia lineata* *Ru*
 44. SCIÆNA a) HAMRUR; squamiceps. *Abu hamrûr.* *Puacanthus hamrur* *Ru*
 45. b) FULVIFLAMMA. *Abu noqta. ابو نقطه* *Lufjanus fulviflamme* *Ru*
 46. c) KASMIRA; quadrivittata. *Kasjmiri.* " *bengalensis* *Ru*
 47. d) BOHAR; dorso recto. *Bohar. بهار* " *bohar* *Ru*
 48. e) GIBBA; dorso gibbo. *Nagil. ناقل* " *gibba* *Ru*
 49. f) NIGRA. *Gatle. قتيه* " *nigra* *Ru*
 50. g) ARGENTI-MACULATA; dentibus fastigiatis. *Schâafen. شوفن* " *argentimaculatus* *Ru*
 51. h) RUBRA; fronte spinola. *Azâja. عطاية* *Holocentrum rubrum* *Ru*

52. SCIÆNA i) MURDJAN; labiis retusis. *Murdjân. مرجان*
 k) SAMMARA; albo-ocellata. *Farer. م'فامر.*
 l) SPINIFERA; capite spinoso. *Gabâja. قهايا*
 53. m) ABU SAMF. *ابوصنف*
 54. n) GHANAM. *غنم*
 55. o) JARBUA; fasciis circinatis. *Djarbua.*
 56. p) STRIDENS. *Korkor. قرقر*
 57. q) GATERINA; fusco-guttata. *Gaterîn. قطرين*
 58. $\betagaterina minor.
 59. $\gammamedia maxilla edentula. Schotaf. شطف
 60. $\deltaFATELA; فنتلة maxima.
 61. r) ARGENTEA; nigro-guttata. *Nagem. ناغم*
 62. s) NEBULOSA. *Schaur. شعور*
 63. $\betaviolaceo-fasciata. Abu hamrâr.
 64. t) MAHSENA; transversum fasciata. *Mohseni. محسني*
 65. u) HARAK; pinnis rubris. *Abu m'hârrak.*
 66. v) OBSOLETA; flavo-violaceo-lineata. *Ramak. رمك*
 67. $\betalamina maxillari. Dib.
 68. $\gammaSuli. Djard. Mork. Saka. Kerfir.
 69. w) GRANDOCULIS; cærulefcens. *Abu ajn. ابو عين*
 70. x) CINERASCENS. *Tâbmel. تجمل*
 71. y) SAFGHA; maxilla inferiore longiore.
 72. z) ARMATA; nucha spinifera. *Galemfifb.*
 73. SCOMBER a) LYSAN; spinis d. 7, distinctis. *Lysan.*
 74. b) SPECIOSUS; aureus, fasciis nigris alternis. *Rîm. ريم*
 75. c) FERDAU; quinque-fasciatus. *Ferdau.*
 76. $\betalinea laterali elata, carinata. Bajad.
 77. d) IGNOBILIS; argenteo-cærulefcens. *Kirb. قرب*
 78. e) FULVO-GUTTATUS. *Gezz. قز*
 79. f) S. NSUN; immaculatus. *Abu sanfun.*
 80. g) DJEDABA; cauda sine carinis. *Djedaba. جدبة*
 h) FALCATUS; pinna dorfi & ani falcata. *Högel. هغل*
 i) EQUULA; gibbo duplici. *Abu kurse. ابو كرسه*
 $\betaminimus. Mellier.
 k) RHOMBEUS. *Abu gurr. ابو قر*
 79. CHÆTODON a) ORBICULARIS; dorso ascendente. *Kanof.*
 b) FASCIATUS; flavus. *Tabak el kûs.*
 80.$$$$$$$$

81. CHÆTODON c) AURIGA; radio quinto filari. *Mokti*. مغطي
82. d) TEIRA; pinna dors. corpore duplo longiore. *Teyra*. طير
83. e) MESOLEUCOS; hinc albus, inde fuscus. *Hadjan*
84. f) ASFUR; fascia lunari. *Affur*. عصفور
β) *carulefcens*. *Haddaja*.
85. g) MACULOSUS; cinereo-cæruleus. *Arufa*. عروسة
86. h) SAXATILIS. *Gargur*. قنقوت
87. i) SORDIDUS; fusco-cinereus. *Abu defâf*. ابودفوف
88. k) UNICORNIS; fronte cornuta. *Abu garn*. ابوقرن
89. l) SOHAL; fossula vulneriformi. *Sobal*. سحل
90. m) NIGRO-FUSCUS. *Taga*. تنقع
β) *Gabbm*.
91. n) BIFASCIATUS. *Rabâgi*. رباقي
92. o) PICTUS; albidus, violaceo-lineatus.
93. p) *Abu asfur*.
β) *Fabûd*. فهد
γ) *Hanni*.
94. SILURUS a) DOCMAK; radio osseo. *Doqmâq*. دقماق
95. b) BAJAD; niloticus. بياض
96. c) CORNUTUS; rostro recurvo. *Gall*. Chardonneret.
97. SALMO α) dentex. *Roschâl*. رشال *Hydrocyon Parkachli* L.
β) niloticus. *Rai*. *Marston dentex* M. C.
98. ESOX α) MARGINATUS; abdomine marginato. *Gambarur*. قمبرور
β) *Far*. فار *Lohajæ*.
γ) *belone*. *Cherman*. خرمان *Constantinop*. *Græcis Belavida*. Turc. *Martencubelus*
Sargan baluk, i. e. *piscis cornutus*.
99. ARGENTINA a) GLOSSODONTA; lingua tuberculis ossis. *Bönuk*. بنكي
100. b) MACHNATA; ossiculo maxillæ infer. *Machnat*.
101. ATHERINA a) HEPSETUS. *Gefebgufch*. *Constantinopoli* vocatur *Græcis Aðegivæ*.
Turc. *Djumifj baluk*, i. e. *piscis argenteus*.
102. b) SIHAMA; thoracica. *Sibâmi*.
103. CYPRINUS a) BYNNI; niloticus. *Bynni*.
104. b) NILOTICUS. *Lebes*. لبيس
105. c) LEUCISCUS. *Abu grymbi*.
106. CLUPEA a) HAUMELA; polita. *Haumela*.
107. b) ENCRASICOLUS. *Balama*.
108. c) DORAB; dentex. *Lysu*. Dorab.

Chaetodon auriga Forsk.*Platan teira* Ag.*Chaetodon maculatus* P.*Holacanthus asfur* L." *maulorus* L." *maulorus* L.*Glyphidodon topaklis* L." *lucidus**Narus unicornis**Rhinobotides* L." *nigropus* L." *gahm**gravis bifasciatus**Chaetodon pictus**Bagrus doemel* L." *basad* L.*Hemirhamphus marginatus*" *far* Ag.Turc. *Martencubelus**Conorhynchus glossodon* L.*Elops taurus* L." *Sillago sihama* Ag.*Barbus bynni* L.*Lebes niloticus**Enchelyopus haumela* L.*Engraulis boelama* L.*Chirocentrus dorab* L.

- Mugil crenilabris* 109. MUGIL a) CRENILABIS. Arabi.
 β) Sebeli: integris labiis.
Mugil cephalotus U. γ) Öär: عور labiis ciliatis.
 δ) Tåde: طاد labio unicarinato.
Chanos salmonius 110. b) CHANOS; pinna D. unica. Auged, عنقن
 β) magnus. Xávos.
Mormyrus 111. MORMYRUS KANNUME; قنوم rostro prominente.
Balistes asotus 112. BALISTES VERRUCOSUS. Azzazi. عزازي
Ostracion turritus 113. OSTRACION TURRITUS; dorso gibbo. Djemel,
Ostracion fabaka 114. TETRAODON, LINEATUS. Fabaka.

β) NOMINATI.

(Smirnae & Constantinopoli; postea quoque in Arabia observati.)

1. MURÆNA a) anguilla. Αχέλι. Ar. Tajebari تعبان vel Hannasch.
 2. b) opbis. Χέλι. Lohaja Far. Djidda Uuz.
 3. URANOSCOPUS scaber. Turc. Kurba, Constantinop. Βαλσαρχος, Smirnae
 Βεσπος vel Λύχνος.
 4. TRACHINUS. Δρακόνια. Acutissime pungit.
 5. GADUS mediterraneus. Γάδια. Turc. Djelindsjik baluk. Pinna D. unica; nam
 prioris pinnae loco non sunt nisi ramenta tenuia in fulco depresso.
Gadum Σαλαγία, solent Græci infantibus offerre pro medicamine masticatorio,
 dum saliva nimis defluit.
 6. OPHIDION. Arab. Abu gudda.
 7. ECHENEIS neucrates. Djidda Keide قيدو vel Kaml el Kerfch; قملة الغرش
 id est; pediculus Squali Carebar, quia saepe adhæret tenaciter huic pisci.
 Lohaja Keda.
 8. GOBIUS a) paganellus. Γοβιός.
 9. b) ophya. Κοβιδία. Turc. Kaja baluk. Arab. Bukrusch. Constantino-
 poli observatus. Plerisque Rad. 15. pro 17. in P. D. secunda; &
 P. V. rufescentes fornicatæ.
 Duo inventi, quibus P. D. secunda rad. 17. Horum P. V. planæ &
 nigrescentes. Alter pinnas omnes fuscas habebat, nec fasciatis, præ-
 ter primam dorsii. Caput nigrum; quod communiter solet esse sub-
 tus album, maculis fuscis.
 10. SCORPÆNA porcus. Σκορπίνη. Turc. Scorpi baluk, (Baluk Turcico idio-
 mate piscem designat.)

11. PLEURONECTES a) *solea*. Γλόσσα. Turc. *Dil baluk*. Arab. *Samak must*, i. e. *Piscis Mosis*.
12. b) *papillofus*. Πίσσι. Turc. *Pissi baluk*.
Non facile papillofus; nam radii D. 65. pro 58. V. 6. 7.
pro 5. 6. A. 49. pro. 42.
13. SPARUS a) *salpa*. Σάλπα.
14. b) *mormyrus*. Μέρμυρ.
15. c) *pagrus*. Μερίτζαρι. Turc. *Merisan*, nomen Perficum. Venter a capite ad anum fere rectus; unde habitus Trigla.
16. d) *Μαυρόψαρο*: lineatus, ovalis; cauda bifida; vertice laevi; corpore albo, lineis flavicantibus interceptis in medio latere.
Radii D. $\frac{11}{14}$. P. 15. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{14}$. C. 17.
17. e) *annularis*. Σπείρος. Turc. *Smarid*. Arab. *Háros*. Corpus ovale.
Ad caudam non ocellus, sed macula nigra. P. V. flava.
18. f) *melanurus*. Μελανῆρα. Arab. *Kabli* vel *Schargâsch*.
19. g) *crenident*. Djidda *Rasan*. Sués *Bozeir* طيطي vel *Ersan*. *Crenidentus Farkalici* W
Opercula inermia. Fossula in dorso. Color argenteus, lineis longitudinalibus, obscuris. *Dentes* lati, una serie, trifidi. In utraque maxilla tuberculi hemisphaerici. *Linea lat.* dorso propior. Longitudo piscis spith.
Loca coenosa & corallifera inhabitat frequens. Hamo venatur.
20. h) *fargus*. Ασκάθαρος.
21. i) *mana*. Σερελα.
22. k) *cantharus*. Oblongus, vertice rugoso. Βέπια. Turc. *Vupa*. Arab. *Mâsi*. An idem cum *Sp. boope*? vel Γέπια. Smirnenfium?
23. l) *strongilus*. Στρώγγιλο. Turc. *Strongil*. Arab. *Gueghara*.
Oblongus, sub-lineatus, *fulco* elevato, longitudinali, laevi, in vertice. *Lineae* longitudinales, flavicantes, obsoletae. P. Pect. & V. *fulva*, margine interiore albo. P. C. & D. fusco-flava. Parvus, *Sardella* non major.
24. LABRUS a) *striatus*. Πετρόψαρον. Graecorum Literatis: Πέτρον.
25. b) *cinerea*. Arab. *Chaddajr*.
P. Pect. flavis; V. viridibus. P. A. C. & D. viridibus, maculis violaceis.
26. PERCA? Σελεβαρδο. Arab. *Ugar* vel *Guaza*; aliis *Örfusa*; an idem?
P. V. membrana coadunata. Opercula Br. ferrata.
β) *Alia minor*; forte varietas. Πεφδ.

27. SCOMBER a) *pelamis*. Παλαμίδα. Turc. *Palamit*. lineæ 4. nigra corporis laterales non manifestæ.
28. b) *scombrus*. Κολιός. Turc. *Kolios-balük*.
29. c) *trachurus*. Σταυρίδα. Turc. *Staurit-balük*.
Spina ante pinnam D. primam, testa cute tam tenera, ut sæpe prorumpat & videatur nuda.
30. d) *thyurus*? Arab. *Kanad*. In *Mari rubro*.
Pinnis spuriis superne & inferne 10; radiis P. D. primæ 16.
Longitudo 1. uln.
31. MULLUS *barbatus*. Βαλβήνι. Turc. *Tekir*.
Esca vulgaris & fastidita Constantinopoli; Romanis olim ichthyophaga & pretiosa luxuria.
32. TRIGLA *gurnardus*. Χελιδνόψαρο. Turc. *Kirlanidsj-balük*.
P. Pect. superne bruneis, fasciis undulatis, obscure cæruleis; margine apicis dilute cæruleo, subtus virescente.
33. SILURUS a) *mytus*. Arab. *Schilba*. شلبه
34. b) *anguillaris*. Arab. *Harmutib*.
35. c) *clarias*. Arab. *Schilân*. شيلان
36. d) Arab. *Boa vel Buja*. بوج Mocchæ.
P. Dorsii prima radiorum 5; posteriori cum pinna C. & A. in unam connexa. Cirrhi 8. Vittæ 3. laterales albidæ, longitudinales.
Corpus fuscum.
Rad. B. 8. D. $\frac{1}{2}$. P. $\frac{1}{12}$. V. 12.
37. ESOX *spyræna*. Arab. *Mughsil* vel *Agam*, vel *Gadd*. قد Squamis magnis; corpore long. 3. uln.
β) *Minor*, squamis parvis. Arab. *Djadd*.
38. MUGIL *cephalus*. Κεφαλος. Turc. *Keful-balük*. Arab. *Buri*. دوري Aliis *Muktschen*.
β) *minor*; an varietas? Κεφαλόπτελο. Arab. *Gabbasj*. tempora migrandi observat periodica.
39. EXOCOETUS a) *volitans*. Arab. *Djerâd el bâbr*, جراد البحر i. e. *Gryllus marinus*. Djidda *Gharâra*, Mocchæ *Sabari*.
Toto itinere navali vidimus hunc piscem subinde catervatim volantem. Habitat sine dubio in Mari rubro, inde tamen minime sequitur, eum fuisse Hebræorum *Selan*, & ad castra usque Israelitarum volitasse.
40. b) *non volitans*: alius eodem nomine arabico, & huic similis; sed macerrimus, meris quasi officulis constans.

41. CLUPEA a) *borengus*. Ἀγέγγα.
42. b) *alofa*. Σαρδέλλα vel Σαυριδιπόλαμῆ. Turc. *Sardella* - *balük*.
Arab. *Sagbhoga*. Macula nigra pone branchias; pinnæ D. & C. albidæ,
apice nigra.
43. c) Γῶνος.
44. d) *charact. borengi*; sed minor. Arab. *Sirm*. سرم 44. *Clupea tirm Tur*
Maxilla inferiore longiore; corpore tripollicari; macula aurea pone
oculos.
Rad. B. 8. D. 19. P. 16. V. 8. A. 17. C. 18.
45. e) *Schâleb* شالچ quod nomen parum differt a voce Slavon. *Sa-*
lâka.
Parva, digiti longitudine; argentea; utrinque vitta laterali fulva; dorso
cæruleo. Vivam non vidi; sed deglutitam a Scombro reperi.
46. BALISTES a) *aculeatus*; major: Arab. *Sebaaram*. شبرم
Quinque seriebus aculeorum in cauda. Piscis insipidus & foetidus.
47. b) *minor*, duplici ordine aculeorum; corpore lineis flavis, obliquis.
48. OSTRACION *cubicus*. Arab. *Abu fendûk* ابو صندوق
Sapidissimus. Solent piscatores ventrem refecare & carnem eximere.
49. TETRAODON a) *ocellatus*? Arab. *Drimme* vel *Karrat*.
Lineæ flavæ circa pinnas Pect. Corpus supra fuscum, maculis
cæruleo-albidis.
Fabula narrat: hunc piscem e Pharaonis cadavere gustasse; unde
tota progenies carnem insalubrem contraxit, noxiam homi-
nibus.
50. b) *bispinus*? Arab. *Edjlis* عجلس Lohajæ. Totus fuscus, areo-
lis contiguus, papillisque albis.
51. c) *Abu-Kobbla*. Arab. ابو كحلة
52. DIODON *bystris*. Arab. *Schokia* شوكية vel *Abu mechajar*. Maculatus; in ventre
duæ venæ venenatæ.
53. CENTRISCUS *scutatus*. Arab. *Farras el bâbr* vel *Kesab el bâbr*.
Est piscis abdominalis non thoracicus; nam Membr. Br. radiata juxta aperturam
branchialem, ut reliqui pisces ejusdem ordinis. *Fistularia* proximus est.
Rad. B. 4. D. 3. 10. P. 11. V. 6. A. 11. C. 9. Lobajæ.
54. SYNGNATHUS *pelagicus*. Arab. *Abu zummâra*. ابو زمارة
Corpus heptagonum; cauda trigona.
55. NAQUA; piscis maris rubri obscurus; (an *Sciæna* 48.?) Multum expetitus ob den-
tes duos majores; æstimatos pretio insigni. Utum nescio.
56. DAREDJ ET TIN. دارج الطين (obscurus) Est Hebræorum דארג

CATALOGUS PISCUM MELITENSIIUM.

A MEDICO DOCTISSIMO COMMUNICATUS.

DELPHINUS orca.	(Melit.) i Delfin.	BALISTES scolopax.	
delpbis.		CHATODON parv.	
RAJA alcatela.	il Hamiema.	vetula.	(Melit.) il Hogiusa.
surpedo.		ZEVA aper.	
pastinaca.		gallus.	i Serduk.
aquila.	il Hamiema.	faber.	l ^a Aurata.
basis.	il Raja.	COTTUS scorpius.	i Scorfiua.
mus marinus. (piscis novus.)		dracunculus.	
SQUALUS pristis.	il Sia.	TRIGLA milvus.	il Taira.
caulus.	il Ruffeta.	lucerna.	i Tigiega.
spinax.	il Chelp il Babar. est Arab. Kelb el babr. cfr. Syft Amphib. β. 20.	garnardus.	
		lyra.	il Triglia.
xygma.	il Marsel.	oculus.	
squarina.		MULLUS surmuletus.	
lamia.	il Gabdol.	SCORPENA.	i Cippullaxza.
centrina.		scorpius.	il Mazzun.
ACIPENSER sturio.		TRACHINUS draco.	il Majuro ta rocca.
buso.		PERCA lucioperca.	
PETROMYZON lampetra.		asper.	
mustela.	il Mustilla.	cernua.	i Cerna.
LOPHIUS piscatorius.		labrax.	
OSTRACION gibbosus.		SCIENA umbra.	
lagocephalus.		umbrina.	
bystrix.	il Rizza.	SEARUS auratus.	l ^a Aurada.
capite testudinac.		cantharus.	
mola.	il Kamar.	oryzrinus.	il Pagella.
GASTEROSTEUS aculeatus.		pagrus.	il Pagru.
pungitius.		dentex.	i Denticij.
spinachia.	l ^a Ispotta.	boops.	
		menas.	il Minnula.
			SEARUS

<i>SPARUS smaris.</i>		<i>OPHIDION gryllus.</i>	
<i>sparus.</i>	(Melit.) i Spargu.	<i>MURÆNA anguilla.</i>	(Melit.) il Sallura.
<i>melanurus.</i>		<i>myrus.</i>	
<i>salpa.</i>	i Scilpa.	<i>serpens marinus.</i>	il Serpe al bābar.
<i>LABRUS tardus vulg.</i>		<i>conger.</i>	l' Imfella.
<i>turdus virid. minor.</i>		<i>serpens maculatus.</i>	il Murina.
<i>pavo.</i>		<i>GADUS asellus varius.</i>	l' Asnelli.
<i>scarus cretic.</i>		<i>aglefinus.</i>	
<i>julis.</i>	il Harusa. Arab. Aru- sa, cfr. Cha- rod. 85.	<i>barbatus.</i>	
		<i>merluccius.</i>	
<i>fuchettus.</i>		<i>asellus virefcens.</i>	
<i>scarus varius.</i>	il Bricchese.	<i>asellus mollis.</i>	il Munckaro.
<i>MUGIL cephalus.</i>	il Caplar.	<i>ANARHICHAS lupus marinus.</i>	
<i>SCOMBER ibyunus.</i>	Iron.	<i>AMMODYTES robianus.</i>	
<i>scombrus.</i>		<i>CORYPHÆNA bippurus.</i>	i Lampuca.
<i>trachurus.</i>	Savrella.	<i>novacula.</i>	il Fanfru.
<i>amia.</i>		<i>pompilus.</i>	i Stellara.
<i>glaucus.</i>		<i>PLEURONECTES limanda.</i>	
<i>XIPHIAS gladius.</i>	il Pesci spar.	<i>bippoglossus.</i>	
<i>GOBIUS niger.</i>		<i>linguacula.</i>	il Linguada.
<i>paganellus.</i>		<i>rhombus.</i>	
<i>aphya.</i>		<i>psitta.</i>	
<i>jozo.</i>		<i>ECHENEIS remora.</i>	
<i>BIENNIUS alauda.</i>		<i>ESOX lucius.</i>	i Trigle.
<i>galerita.</i>		<i>bellone.</i>	
<i>gunellus.</i>		<i>acus.</i>	
<i>galea.</i>		<i>OSMERUS eperlanus.</i>	
<i>mustela.</i>		<i>saurus.</i>	
<i>pentadactylus.</i>		<i>CLUPEA alosa.</i>	
		<i>encrascolus.</i>	il Sardella.

INSECTA.

α) DESCRIPTA.

1. *SILPHA MULTISTRIATA*.2. *CHRYSOMELA VIRIDI - CÆRULEA*.3. *CICINDELA LITTOREA*; lunulis albis marginalibus.4. *CARABUS SERRATOR*, albo-maculatus.5. *TENEBRIO* a) *ARUNDINACEUS*; alatus.

Eadem frumenti perniciēs quæ huic Tenebrioni adscribitur Arabiæ
ruricolis nota est; meridionales vocant *Ökab*; عقيب *Lohaj.n*-
fes *Chormulij*. خرمة Ipsa vero Insecta mihi non innotuerunt.

6.

b) *ÆGYPTIUS*; planus.

7.

c) *LÆVIS*; nitens, marginatus.

8.

d) *HISPIDUS*; elytris tuberculatis.

9.

e) *VULGARIS*; thorace acuminato.

10.

f) *POLYCHRESTUS*; elytris mucronatis.

11.

g) *COTHURNATUS*; dorso furgente.

12.

h) *ALEXANDRINUS*; thorace spinoso.

13.

i) *SPINOSUS*; elytris ferratis.

14.

GRYLLUS a) *VIRIDIS*; macula flava.

15.

b) *GREGARIUS*; migratorius. *Djerâd*. جراد

16.

c) *MONSTROSUS*, abortivus.

17.

PHALÆNA PROFUGA; noctua.

18.

CYNIPS SYCOMORI, aptera. *Nanûs djummeiz*.

19.

VESPA QUADRIPUNCTATA; *Kâbirina*.

20.

FORMICA a) *SALOMONIS*.

21.

b) *EDAX*; omnivora.

22.

c) *MALIGNA*; unisquamosa. *Kâamûs*.

23.

d) *ANIMOSA*; rubra. *Kaas*.β) *DHARR*; binodis, rubra, parva, solitaria.γ) *INSULTANS*; nigra.

24.

TABANUS TESTACEUS. *Tajaq*.

25.

CULEX MOLESTUS.

26.

ARANEA a) *SECTOR*; abdomine 8-dentato. *Nama*. نامة

27.

b) *CITRICOLA*; abdomine bidentato.

28.

c) *RIVULATA*; albo-fusca.

29.

d) *INSIDIATRIX*; tela laqueata.

30.

e) *TRIFASCIATA*; lineis novem nigris.

31. SCOLOPENDRA ADHERENS; flava. *Omn arba u. arbaeju.* ام لربع وارديين

32. LARVA obscura: (forte e Classe Vermium.)

33. CANCER (a) SARATAN; cantho oculorum mucronato. *Sarasân.* سراطان

34. (b) CONVEXUS.

35. (c) MESSOR; chelis inermibus.

36. (d) PINNOTHERES; manibus incurvis.

37. (e) PELAGICUS *Abu djalambu.*

38. (f) ANTENNATUS; antennis thorace longioribus.

39. (g) CUBICUS; thorace sculeato.

40. (h) NIGER; thorace 5-tuberculato.

41. (i) SERRATUS; thorace 9-dentato.

42. (k) BIDENTATUS; thorace 2-dentato.

43. (l) TRIDENTATUS; thorace tridentato.

44. (m) LUNARIS; Rumphii.

45. (n) SEGNIS; fronte 4-dentata.

46. (o) INCANUS; hirsutus, senilis.

47. (p) PELLITUS; thorace 5-dentato.

48. (q) CORNUTUS. *Renaîse de la mer?*

49. (r) SULCATUS; sulcis anfractuosis; oculis pedicellatis.

49. * (s) VERRUCOSUS; pagurus; thorace 6-dentato. *Παγῦρος.*

Canceris, imprimis *Asaxos* delectantur Græci. Turcæ escam e Canceris vel cochleis paratam abominantur.

50. (t) SCÆVOLE; chelis muricatis.

51. (u) AMBIDEXTER; cauda aphylla. *Komikom.* خمخم

52. (x) LAGOPODES; pedibus hirsutis.

53. (y) TINCTOR; forcice violaceo.

54. (z) SQUILLA; glauca. *Bargur.*

(β) FASCIATA. *Önsul.*

55. (aa) SUBLUCANUS; niger & rubens.

(β) LUCIDUS; albo-lineatus.

56. (bb) CUSTOS; pellucidus.

57. (cc) ACANTHURUS; cauda scutis setosis.

58. (dd) KERATHURUS; cauda cornu unidentato.

59. (ee) SEDENTARIUS; pedibus utrinque 10; domifex.

60. (ff) FALCATUS; manibus falcatis, gibbis.

61. TERMES DESTRUCTOR; *fitale.* *Arda.* أرض

62. PANORPA HALTERATA; diptera, halteribus prælongis, clavatis.

β) INSECTA OBSERVATA.

In littoribus Imros: Tenedos: Natolia.

1. SCARABÆUS a) AURATUS. In Arabia Djeall. *variat: nigricans.*
2. b) VARIABILIS: elytris latere emarginatis.
3. c) VIRIDULUS. Μαμῆνι.
4. d) PILULARIUS.
5. COCCINELLA a) 7-PUNCTATA. Arab. Dûde قودة vel Kermes. قرمنز
6. b) 11-PUNCTATA.
7. c) 22-PUNCTATA; flava.
8. CHRYSOMELA a) GORDIGERA; thorace non variegato.
9. b) GRAMINIS; foemella rubra.
10. c) SERRATICORNIS; cylindrica, cinerea; antennis serrate-peñtinatis.
11. BUPRESTIS NIGRA.
12. TENEBRIO CÆRULEUS; apterus.
13. MELOE a) CICHORH. Μαεροπῆλι. Mas ruber; foemella flava. Frequens in floribus.
14. b) MAJALIS? Kâhira, Drarich. ذرارح Yemen, Zonvich.
Elytris tivelosis, virefcentibus, tuberculis planis, maculis dorsalibus obfcure-cupreis; fubtus ad fegmentorum futuras fafcis cupreis.
15. FORFICULA MAJOR. ψαλῆδα.
16. BLATTA a) ÆGYPTIACA. Surfur. مصر مصر Alexandria domestica.
17. b) ORIENTALIS. *ibid.* grandis; in ædibus obvia.
18. GRYLLUS a) VULGARIS. Απιδάλα vel Κεῖάλλαφας. Alis fubtus rubris.
Variatio: alis totis rubris.
19. b) FLAVUS.
20. c) CÆRULESCENS; circa Constantinop. Alis cæreleis.
21. d) TURRITUS. Ακρίδα vel Αμφάχα.
22. e) MANTIS. Ἀλογο Ἰῆς γῆς; i. e. equus terræ. Cinereus.
23. f) CRISTATUS? In defertis Kâbirinis. Arab. Djachdat. جندوت
Alis inferioribus viridi-cærelefcentibus, fafcia poftica fufca. Arabibus non efculentus; quamvis ita refert Hufelquift.
24. g) IBN ED DUBB. ابن الدب *ibid.*
25. h) CINEREUS; fafcis tribus nigris. *ibid.*
26. CIMEX a) BACCARUM; thorace fpinofo.
27. b) EQUESTRIIS.
28. c) APTERUS.

29. CIMEX d) LINEATUS.

30. e) GRISEUS; oblongus, dorso medio flavo.

31. f) ÆGYPTIUS; in omnibus plantis succulentis post messem residuis in agris Ægypti, cimici huic quasi destinatis ad pabulum.

Varietatem? inveni habitantem in *Nasolia*, alis albis; apice elytrorum membranaceo, atro.

32. CICADA MANNIFICA.

Obs. Dum Monasterium Græcorum *Raizbu* dictum, in regione celebri *Elim* adivē, retulit mihi Sacerdos *Mannam* decidere hyemali tempore simul cum pluvia, ejusdemque esse speciei cum *Manna* sacra Israelitis e cælo decidua. Addidit quoque fide monachali, rorem hanc nullibi, nisi supra tectum & aream Monasterii reperiri, & sæpius se illam vidisse atque gustasse. Hic mea substitit fides. Eruditi nostri, qui miracula levissimo scientiæ naturalis artificio expedire solent, & pluviam hanc manniferam e *Cicadarum* rostro excutiant, anxie causam eandem his in locis quærent, nudis, & fruticulis vix vestitis, ubi *Cicadas* majores nec ego, neque Socii itineris vidimus ulla. Quum locus Hortis *Palmiferis* abundat, causa roris hujus magis Naturæ congrua subluet. (Plura ad hanc rem spectantia vide in *Deser. Arabia Ednoris* p. 145. seq.)

33. NOTONECTA; a) GLAUCA. In fonte habitat Insula *Imros*.34. b) ALBA; elytris griseis, immaculatis. *Alexandria*.

35. PAPILIO Παπιάδω. a) CARDUI.

b) BRASSICARIA minor.

c) AMIRALIS.

36. APIS VIOLACEA. IMPOS.

Caracana Meccensis affert ex Arabia *Kâbiram Mel*; *Asāl nâbl* عسل النحل præstantissimum; album & fuscum. Sæpe in sylvis Arabiæ fluens vidi mel; quod vocant indigenæ *Noûb*.

Cera alba, Arab. *Schemma ahjad*. شمع أبيض Beduinis collecta adportatur æstate; *citrina* Arab. *Schemmâ a-far* شمع أسفر hyeme.

37. HEMEROBIUS FORMICALYNX; puncto marginali.

38. FORMICA a) NIGRA, enodis; squama unica inter thoracem & abdomen. *Muppiyya*.

39. b) BINODIS; nodis duobus inter abdomen & thoracem: præcedenti similis. Cuniculos agit subterraneos.

40. c) CHUSEJIF; nigra, gregaria. *Yemcu*.41. d) SCHARDJ; rubra, magna. *ibid.* Exitiose vastat fructum *Phoenicis* (*nacht fuleimani*).

42. GALLÆ a) QUERCINÆ. E Syria ad Ægyptum invehuntur optimæ.

b) TAMARICIS. ATI; *Budjm*: تجم succedaneæ priorum.

c) INDICÆ; *Afs*. عفن In Arabia ad apparatus medicaminis faciei. Ustulantur, pulverisantur & miscentur aqua, in qua Gummi dilutum. Istud, sic præparatum pigmentum nominatur *Ebadâb*. عباداب Sic faciem nigris lineis pingunt foemina Arabum, puellæ imprimis. *Qoll* قول (Stribium) e Gallia advectum transfertur per totam Ægyptum & Arabiam: hoc minerale ignitum; in pulverem minuitur, & oculo aspergitur; hinc palpebræ canthus niger evadit; & sic sibi placet venus polymorpha.

43. MUTELLA a) NIGRA. Σφαλλαχα.
Capite thoraceque rubris; abdomine nigro, fasciis albis.
44. b) BARBARA? punctis in fascias coadunatis.
45. MUSCA NIGRA; antennis setaceis; thorace maculis flavis; abdomine fasciis 2. flavis, interruptis.
46. HIPPOBOSCA EQUINA; in campis Imrinis frequens, licet nulla aderant pecora.
47. EMPIS? Arab. *Mun*. Ad regionem Niloticam saepe nubis instar vento propellitur, & magna viatorum molestia oculos torquet. Pungere nescit. Genus determinare non potui: *Aplatis nigra* formam habet.
48. CANCER MENAS Τζαγάνος. Turc. *Tsaganos*.
49. SCOLOPENDRA; segmentis planis, recurvatis, bruneis.
50. JULUS. Arab *Halban*.
51. ONISCUS ASELLUS. Arab *Omm ali*. ام على
52. SCORPIO. Cineres scorpionis usti, calefacti ligno vitis in vasculo clauso, & mox propinati dosi 2. vel 3. gran. laudantur ut diureticum eximium, in stranguria. (Auctore Arabe medico.)
53. PODURA CINEREA; magna.
Foveas inhabitat excavatas in arena littorea prope *Alexandriam*.

VERMES.

I. MOLLUSCA.

1. TEREDO a) ARENARIA; tubulo arenoso.
2. b) CONCHILEGA; tubulo conchylifero.
3. LIMAX a) MARINUS.
4. b) TERGIPES; papillis dorsalibus 12.
5. c) MINIMUS; pap. dorsal. 4. serierum.
6. NEREIS a) CAERULEA; pseudo-phosphora.
7. b) PELAGICA; rubra.
8. PRIAPUS a) GIGANTEUS. *Tabaker el babr*.
9. c) ALBUS; *tardus*.
10. c) RUBER; glandulis albis. *Garindsj el babr*.
11. d) VIRIDIS; tentaculis corpore longioribus. *Karrasa*.
12. e) POLYPUS; radians; filamentis oris retractilibus.
13. SCYLLEA GHOMFODENSIS; tentaculis primis brevibus.
14. HOLOTHURIA a) DENUDATA; radiis trifariam glandiferis.
15. b) SPIRANS; radiis nudis.

16. SEPIA OCTOPODIA. *Sebbed*: vel *Achtrabüt*. الخطبوط

MEDUSA. α) limbo non tentaculato.

17. a) TETRASTYLA; tubulis coadunatis.
18. b) OCTOSTYLA; sedecim appendicibus. *Homad*.
19. c) ANDROMEDA; ramosissima. *Kandil el bábr*.
20. d) CORONA; brachiis dentatis, ramis dentatis.
21. e) PERSEA; annulo viscerato.
22. f) CEPHEA; brachiis lanatis.

β) limbo tentaculato.

23. g) PROBOSCIDALIS; tentaculis 6.
24. h) NOCTILUCA; tentaculis 8; verrucosa.
25. i) MOLLICINA; plicis 12; tentac. 12.
26. k) PILEATA; campaniformis, globifera.
27. l) CRUCIATA; cruce rufescente.
28. m) ÆQUOREA; vulgaris, maxima.
29. n) BEROE. α) albens. β) densa. γ) rufescens.

SALPA. α) appendiculata.

30. a) MAXIMA; utrinque appendiculata.
 31. b) PINNATA; appendice pinnata.
 32. c) DEMOCRATICA; aculeis 8.
 33. d) MUCRONATA; mucrone interno; gemino.
- β) appendice nulla.
34. e) PUNCTATA; pone mucronata.
 35. f) CONFOEDERATA; dorso gibbo. *Societas juncta membrana*.
 36. g) FASCIATA; intestino filiformi.
 37. h) SIPHO; fronte tubulata, siphonizante.
 38. i) AFRICANA; trinucleata.
 39. k) SOLITARIA; ano laterali.
 40. l) POLYCRATICA. *Societas prolongata*.

41. PTEROTRACHEA a) CORONATA; ventre caudaque pinniferis.

42. b) HYALINA; pinna centrali.

43. c) PULMONATA; nucleo plumoso.

44. d) ACULEATA; pinna terminali.

45. PHYSSOPHORA a) HYDROSTATICA; vesicis lateralibus.

46. b) ROSACEA; vesica foliifera.

47. c) FILIFORMIS; brachiis lateralibus.

48. FISTULARIA a) VITTATA; tentaculis 12. *Zibb el bábr*. زيب البحر

49. b) RECIPROCANS; tentaculis ramosis. *Hannafch el bábr*. هانافش البحر

d

50. FISTU-

50. FISTULARIA c) MAXIMA; papillofa.

51. d) IMPATIENS; tentac. 20; cinerea. *)

II. TESTACEA.

a) Multivalvia.

52. CARDIUM AURICULA; hemicardium?

53. VENUS a) GLOBOSA. Belg. Pistolen doubler.

54. b) CORDATA. Qouqa. قوقع

55. MYA a) OVATA.

56. b) PICTORUM. Mabar.

57. SPONDYLUS FLIGATUS.

58. ARCA MULTISTRIATA.

59. OSTREA a) MACULOSA.

60. b) SUPERFICIALIS.

61. c) FORNICATA.

62. d) REGULA.

63. OSTREA

*) ECHINUS a) diadema. 'Axxwes. Spinis crassis compressis.

b) esculentus; aculeis violaceis vel olivaceis. Edulis coctus.

c) saxatilis; radiis obscure purpureis; ambulacris vix distinctis. Kor-rân. كرعان

d) lacunosus.

e) orbiculus. Rif el bâbr. ريف البحر

f) rosaceus.

ASTERIAS a) nodosa. Σταγὸς. Esculenta cocta.

b) aranciaca; Kof merjam. كف مرجم radiis 5-lanceolatis, supra planis, nudis; subtus spinosis.

c) levigata; radiis 5-lanceolatis; utrimque elevatis punctis scabris, supra convexiusculis.

GORDIUS vena medinensis. Duda. دودة

Non licuit mihi disquirere, annon vernis hic fit causa morbi ad Lobajam vulgaris, Erk عرق vocati: crura vulneribus corrosivis foedantur, e quibus se exferit tendo (rectius forsitan Gordius). Causam adscribit gens aquæ putei Naaman. Est illa non solum sale inquinata, verum & pluvia diu morante, stagnans & tette salita. Necessitas usum jubet. Extra-nei morbo Erk vehementius torquentur. (cfr. Editoris Descr. Arab. p. 133.)

HIRUDO sanguisuga. Alak علق In fluvio Aleppensi abundat, & inde ad Ægyptum defertur.

63. ANOMIA TRIDENTATA.

64. PINNA PICTA.

β) *Univalvia*.

65. NAUTILUS a) PERTUSUS.

66. b) ORBICULUS.

67. TROCHUS a) DENTATUS. Κοχλῖος. Nebel. دحل

68. b) NODOSUS.

69. c) TRISULCATUS. Rumphius in Mus. Amb. ad Tab. 30. fig. 2. refert Trochum hunc non reperiri, nisi ad littora Sagu vestita. Hujus arboris vestigia circa Lohajam vidi nulla; verum Trochum copiose disseminatum per campos procul a mari; omnes autem testas vetustate exefas. Hoc non unicum est testimonium decre-scentis columnæ aquæ marinæ; solum vero non sufficit; vehemens enim inundatio maris suos transfert incolæ sæpe ad fastigia montium adjacentium; cujus facti jam notissima sunt exempla.

70. TURBO a) NEBULOSUS.

71. b) DIVERGENS.

72. c) DECLIVIS.

73. HELIX a) DESERTORUM.

74. b) ARABICA. Harbar.

75. c) JANTINA. Σαλλιδάχο.

76. NERITA CORNEA. Lyseiq. لريق

77. SERPULA CINEREA.

III. A ZOOPHYTA.

78. GORGONIA a) CERATOPHYTA.

79. b) VERTICILLATA. Ærk el bir.

80. c) SPONGIOSA.

81. d) VERRUCOSA.

82. ALCYONIUM FUSCA. Φέσκα; edule.

83. SERTULARIA a) OBSCURA; rachi virescente.

84. b) SETACEA.

85. c) RIGIDA; articulis integris.

86. HYDRA a) SCYPHIFERA; tentaculis 10.

87. b) MULTICORNIS; tentac. 14. *)

d 2

IV. CO-

*) SERTULARIÆ archipelagi.

a) polyzon.

b) scruposa.

c) eburnea.

d) bidentata.

e) pinnata; non ramosa.

f) balecina.

g) geniculata.

h) alba.

Ellis. tab. XII.

i) avicularia; duabus seriebus capitum avicularum.

IV. CORALLIA.

a) MADREPORA.

1. MADREPORA SOLIDA; stellis contiguus.
2. FAVUS; stellis margine coadunatis.
3. CAVERNOSA; stellis margine lamella interjecta.
4. LABYRINTHIFORMIS; costis undulatis.
5. ASTROITES; stellis orbiculatis, pariete lamella.
6. MONIE; stellis infundibul. lamellis continuatis.
7. DÆDALEA; stellis hexagonis, parietibus unitis, dentatis.
8. MONASTERIATA; parietibus elatis, lanceolatis.
9. CONTIGNATIO; stellis radii linearibus, disci ovatis.
10. FUNGITES; lamellis denticulatis. *Gædab. قدح*
11. ORGANUM; lamellis undulatis, combinatis.
12. CORALLIUM RUBRUM. *Murdjan. مرجان*
13. CACTUS; ramis dichotomis; lateribus stellatis.
14. RUS; inæqualis, papillosa; stellis distantibus.
15. SERATIA; stellis distantibus, margine prominentis.
16. INCRUSTANS; inæqualis; stellis prominulis, intus lamellatis.
17. CHALCIDICUM; stellatum tubis cylindricis; intus & extus lamellatis.
18. CONCAMERATA; plana; stellis remotis, interstitiis lamellatis.
19. DIVERGENS; subglobosa; tubis radiantibus, exstantibus.
20. CORYMBOSA; stellis terminalibus, solitariis, lobatis.

b) MILLEPORA.

21. MILLEPORA DAMICORNIS; ramorum apicibus conicis.
22. ALCICORNIS; apicibus obtusissimis.
23. LINEATA; apicibus subulatis.
24. PALMA; muricata.
 - a) ramis flavescenscentibus.
 - β) ramis rufescenscentibus; poris lateralibus cylindricis.
25. EXÆSA; rami conglomeratis, fastigiatis. *M'gaviseb.*
26. DICHOTOM; reiformis; ramis teretibus, apice obtusis.
27. LICHENOIDES; expansa; ramis alternis, ciliato-dentatis.
28. CELLULATA; conglomerata, ramis compressis.
29. RETICULATA; expanso-finuosa, reticulata, porosissima.
30. CONGLOMERATA; ramis verrucis quincuncialibus. *)

c) LITHO-

*) *Corallia fruticosa* omnia Arab. communi nomine *Sjæab ennâr* شجيرة الناري.

a) *Madrepora acerabulum*; alba, digiti longit. Habitat in testis Concharum vacuis. *Constantinop.*

c) LITHOPHYTA CARNOSA.

31. LITHOPH. PULMONARIS; carnosâ.

32. AREOREA; ramosa.

33. FULVA; crustacea.

b) *turbinata*; interdum ramosa; stella concava.c) *astroites*; stellis cavis, interdum angulatis, interdum subrotundis.d) TUBIFORA *musica*. Djidda. Damm el Achberaj. دم الاخريينe) *Mæandrites*. Doumar meschazi. دوامر مشطبيf) *Millep. damicornis*. *Madrep. fascicularis* & *favosa*; in montibus calcareis *Melitenf.* fossiles.

Montes coralliferi ab urbe Tôr usque ad *Gbonfodam* ripas muniunt submarinas densissime; post hanc urbem versus meridiem, rariores evadunt, (an desinant plane, nescio), ita ut nautæ, quantumvis timidi & inexperti, jam securis navigent velis nocturno quoque tempore. In famosa disceptatione de loco vero transitus *Israelitarum*; iste nequaquam infra Tôr quaerendus; quum inde manifesta incipiant juga *Corallina*; quæ omnem e fundo maris ascensum obiecto vetant muro. Suænsia littora, a recedente mari ferius orta, nesciunt *Corallia*; fragmina reperiuntur rarius sparsa. (conf. *Editoris Descript. Arabiæ* p. 404)

In Nomenclatura systematica hujus ordinis, putaverim nomina trivialia aptissime mutuari e regno Botanico, imprimis e classe *Cryptogamorum* & *Lichenum* genere; quum forma aliquatenus convenit; & *Corallia* sunt *cryptogama* regni Animalis.

CONCHYLIA

OBSERVATA

PER LITTORA MARIS RUBRI:

SUÉS: — DJIDDÆ: MOCHHÆ.

Insulam GEORAB prope GHOMFODAM Conchyliorum feracissimam esse rarissimorum, mihi constitit, dum in descensu aliquot horarum ultra 30. species festinanti passu collegi.

SMIRNÆ & CONSTANTINOPOLI vulgaria obtinui; sed artem piscandi inspexi (vide *Diar. Constantinop.*); & nomina Græca didici, quæ auxi & confirmavi testimonio Græcorum *Sués* habitantium, qui mercatores sunt, nautæ, vel navium architecti. Miferimus locus; sterilitatem terræ supplet annona marina. Græci, rigidi observatores Esurialium feriarum, carne exfangui Conchyliorum & Sepiarum deliciose præparata, abstinentiæ sacræ tædia facile castigant. Veniam extendunt ad omnia genera horum animantium; modo sint mole apta & textura corporis laxa. Testacea parva & rigidiuscula rejiciunt. Non solum copia prostat Conchyliorum in Mari mediterraneo, Asiatico & Rubro; verum & species multæ mensæ apparatus & gulæ appetitum variant, satiant. Quisquis species coacervare, vel quod sapientius judicaverim, Testaceorum naturam studere cupit, huic societatem commendo piscatorum Græcorum, ubi securitatem & apertam invenit fidem.

α) MULTIVALVIA.

1. LEPAS; *balanus*. Ελαῖς τῆς θαλάσσης.
2. CHITON; parvus; testis affixus; in Mari Nigro.
3. PHOLAS; *dactylus*.
4. SOLEN; *strigilatus*. Σελήνα. Crudus (Constantinop.) edulis & cum Pilau mixtus; Smirnæ non nisi coctus. Solen hunc etiam in Norvegico mari piscatus sum.
5. TELLINA a) *donacina*; magna.
6. b) *virgata*; parva, alba.
7. c) *rostrata*; transverse striata.
8. d) *incarnata*; magna edulis. Καλόγνομη. Arab. *Biut bet ababr* vel *Qouqa*. Arabibus universale nomen Testaceorum bivalvium, terrestrium, & esculentorum.
9. CARDIUM a) *ferratum*; ovatum.

10. CARDIUM

10. CARDIUM b) *unedo*; parvum, angulatum; ventre prominulo.
 11. c) *fragile*; striatum transverse; tantum ad cardines laeve.
 12. d) *edule*. Βεβλίδα vel Ακίβαδα. Omnia hujus cognominis Testaceae, sunt Graecis esculenta vel cruda vel preparata. Turc. *Aki-vada*. Circa *Sués* rarum; & longe a littore projectum in campis.
 13. DONAX *biradiata*; margine integro, testa glabra, alba, radiis utrinque 2. purpureis; antice tota purpureo-ferruginea, undulatum striata, *Lobaja*.
 14. VENUS a) *prostrata*; rotunda, striis transversis, fulcatis.
 15. b) *cbiene*; magna.
 16. c) *pectinata*. Αχιβαδα. escul.
 17. d) *decussata*. escul.
 18. e) *dione*. Arab. *Omm eschlul*. *Djidda*.
 19. f) *casina*; natibus planiusculis, rugis transversis undulatis. esc.
 20. g) *lata*. esc.
 21. h) *literata*. Ποχιζο - Αχιβαδα.
 22. i) *gallina*. Ορεχλίνες.
 23. k) *verrucosa*. Κιδόνια.
 24. l) *varia*; transverse striata fulcis parvis, multis; antico latere subtruncata; margine integro; colore vario; oblonga, bipollicaris.
 25. m) *reticulata*. Ad *Tör*.
 26. n) *erycina*; gibba, nitida, radiata.
 27. o) *lupinus*; parva, rubens.
 28. p) *violascens*; ovalis, longitudinaliter striata; margine integro, labiis violaceis. Variat: colore albo-flavicante, vel violascente.
 29. SPONDYLUS *gaderopus*. Γαδερόποδα. Arab. *Rigl bomar*. Frequens *Sués*; esc. crudus.
 30. CHAMA a) *gigas*. Arab. *Doffr*. بصر esc. nigris rejectis intestinis.
 31. b) *lazarus*. Χοχλός. Arab. *Hafer bomar*. حافر حمار
 32. c) *gryphoides*? oblonga, duplici cingulo tuberculoso; natibus spiralibus.
 33. d) *calyculata*; oblonga, pollicaris, fulcis profundis.
 34. ARCA a) *foliata*; margine foliato; magna, saepe 4. poll.
 35. b) *noæ*. Καλογνώμα. Arab. *Omm eschlul*. أم الجلول passim *Sués*; esc. cruda; *Smirnæ* frixa.
 36. c) *barbata*.
 37. d) *toriuosa*. *Sués*, rarissima & inter projecta longe a mari.
 38. e) *antiquata*; magna, alba, multifulcata.
 39. f) *pectunculus*.

40. ARCA g) *glycymeris*. Μεθ' ἑραχὺ βάδδα. etc.
41. OSTREA a) *plica*; non decussata.
42. b) *sanguinea*; costis trifariam squamato - imbricatis; interstitiis angustis nudis
43. c) *ziczac*. Arab. *Tarak*; ذراق operculo plano.
44. d) *lima*.
45. e) *varia*. Χλένι vel Καλογρειοχλένι. etc.
46. f) *glabra*. Χλένι vel Κεχυνόχλένι. Variat colore cinereo vel fulvo.
47. MYTILUS a) *margaritiferus*. Arab. *Sridie*. سریدیه Στρίδια.
48. b) *exustus*; parvus, striatus. Μίδια. Turc. *Midi*. Arab. *Mi-die*. میده Sués frequentissimus; majores etc. crudi & cocti.
49. c) *barbasus*. Χαβασο.
50. d) *modiolus*. Βέλο αχὺ βάδδα. etc.
51. e) *birundo*. Arab. *Zenni*. زننه
52. PINNA a) *succata*; laevis, albescens, subtruncata.
53. b) *rudis*. Turc. *Pines*.
54. c) *muricata*. etc. Constantinop. etiam ab Europæis: cocta.
55. d) *rudis*. etc.
56. e) *nobilis*: Græcis tendo Pinnae delicatula esca. *Smirna* maxima copia; margaritiferæ, sed inutiles, rubicundæ. Nesciunt incolæ in usus vertere capillos Pinnae, hyalinos, tenerrimos, ductiles. In Museo splendidissimo *Dronningholmensi* vidi specimen talis texturæ. Constantinopoli Pinna profundum alti maris occupat; ubi erecta stat, apice deorsum spectante: piscator illam circulo ferreo extrahit, semper tamen testam frangit.

β) UNIVALVIA.

57. ARGONAUTA *argo*. Arab. *Ankarit*. عنقریط
58. CONUS a) *textile*.
59. b) *imperialis*; fasciis multis; cingulis obsoletis.
60. c) *dentatus*.
61. d) *stercus muscarum*; digitum latum longus; fasciis interruptis; figuris leoniformibus; aliisque fasciis punctatis, alternantibus.
62. CYPRÆA a) *mappa*.
63. b) *Arabica*.
64. c) *lynx*. Arab. *Mafkale*. ملفكالة
65. d) *tigris*. Arab. *Safad*. Venalis defertur Káhiram; ad læviganda textilia fericea & aurea.

66. BULLA *ampulla*. Σκλιβόπερα.
67. VOLUTA a) *caffra*; glabra, nitida velut oleo uncta, parva, flavicans; columella uniplicata; plica alba, striata.
68. b) *monilis*. Ex Infula Camāran affertur Káhiram, colligata in monilia & fasciculos pendulos (*festons*) pulcherrimos.
69. BUCCINUM a) *vibex*.
70. b) *arcularia*.
71. c) *pomum*.
72. d) *patulum*.
73. e) *præmorsum*. Imros in fonte.
74. f) *reticulatum*; apertura non dentata; perexiguum; non escul. Constantinop.
75. STROMBUS a) *lambis*. Arab. Kabdān. قبضان Rumph. mus. tab. 35. fig. H.
76. b) *canarium*; ventre coronato; dorso nodoso. Inter testacea projecta.
77. c) *gallus*. Στρεμπάκ. Arab. Srombak. سرنباق Frequens. Caro testis tanta adhæret tenacitate, ut nonnisi fortiter coquendo solvatur.
78. d) *epidromis*; spiris nodosis.
79. TURBO a) *terebra*; apertura subquadrata, lineis 4. transversis.
80. b) *chrysofomus*; albus, detritus. Βικί. Arab. Iuss musa. فص موسى rarior; esculent.
81. c) *argyrostomus*; operculo hinc globoso, inde plano; umbilico brevi.
82. TROCHUS a) *pharaonius*. Ad Gbobeibe lectus.
83. b) *punctatus*, parvus, frequens Sués. Pro medicina in Hemorrhoidibus, externe applicatus; quare copiose transfertur venalis quaquaversum. Morbus iste perquam vulgaris in Ægypto & in Yemen; Lohajæ quasi endemius.
84. c) *magus*. Κοχλῖος. Arab. Budjek. lapidus. Umbilicatus; anfractuum fasciis torulosis 4, infima & suprema majori; columella integra.
85. HELIX *terrestris*; ovata, rotunda; apertura subrotundo-cuneata; obscure-testacea; operculo tenui, convexo, albo. Patriam ejus ignoro; Massilia obtinui ab amico.
86. MUREX a) *fusus*; dentatus. Rarissimus in museis curiosorum; perquam frequens in Infula Ghorab; vacuæ domus occupatæ a Cancris refugis.
87. b) *tribulus*. Ἀγγαθὴ τῆς θαλάσσης. Djiddæ Ajāne. Piscatoribus Abu ouf. vel Kabur nabur, قابور نابور vel Karal chale. قبل خاله spinæ curvæ, interspersis brevioribus, prostratis.

88. MUREX c) *baufellum*.
 89. d) *rapa*.
 90. e) *rubecula*.
 91. f) *graculus*; *subturrus*.
 92. g) *Aluco*. Arab. *Madne*. مادن. *Columella* vix multiplicata. Adeo parvus; non escul.
 93. h) *granulatus*; huic similis; longe minor.
 94. i) *asper*. Στροφαίνα. Arab. *Bouq*. بوق. Amari saporis.
 95. k) *ramosus*. Ηροσφύρα. Arab. *Abu dinar*. ابودينار. grati saporis.
 96. l) *colus*. Arab. *Bouq*.
 97. m) *lignarius*. Αφάλλη της θαλάσσης. Arab. *Æju*. Amarus; tamen edulis.
 98. NERITA a) *cornea*.
 99. b) *peloronta*.
 100. c) *mammella*.
 101. d) *caurena*.
 102. e) *vitellus*. Alba, transversa, striata.
 103. PATELLA *neritea*; in Mari nigro testis adhærens frequentissima; rara in museis Curioforum.
 104. SERPULA a) *contortuplicata*; teres.
 105. b) *triquetra*.
 106. c) *spirorbis*.
 107. d) *glomerata*.
 108. e) *angulata*; in testis undulatum repens. Omnes hæ Serpula in Mari nigro.

DESCRIPTIONES
ANIMALIUM.

ANIMALIA.

AVES.

FALCO.

1. **F**ALCO *cera pedibusque flavis, supra cinereus, subtus ferrugineus; alis supra fuscis; cauda forficata, fusco-fasciata, longitudine corporis.*

DESCR. A rostri apice ad extremam caudam fere cubitalis. *Rostrum* & *cera* flava. *Capitis* plumæ lanceolatae, griseo-rufescentes, medio nigrae, setis ad ora distantibus. Plumæ *dorsales* & alarum *teñrices* superiores, cinereae: rachi fusca. *Remiges* fuscae: 5 primæ versus apicem angustatae, omnes latere inferiore griseae, fusco-fasciatae: versus apicem nigrae. Alæ *subtus* griseo-fuscae, fasciis obscurioribus: teñricibus ferrugineis, linea media nigra. Idem color plumarum sub corpore: intimæ ad cutem omnes albæ. *Cauda* longitudine corporis, & ultra apicem alæ complicata prominens. *Rectrices* 12. versus mediam sensim paulo minores: cinereae, fasciis fuscis. *Femora* & *di-*
midia fere *tibia* plumatae: reliqua *tibia* pars & *digiti* flavi. *Ungues* nigri: posticus & interior uterque æqualis & reliquis major.

Locus: In *Ægypto* frequens hieme. Arab. *Haddāj*.

Obs. An *Falco* (10) *Milvus*? sed nec totus ferrugineus, nec caput albidum. An *Falco* (11) *forficatus*? sed subtus non albidus, verum ferrugineus.

MEROPS.

2. MEROPS *ÆGYPTIUS*, *totus viridis, gula flava, linea ad latera capitis nigra, remigibus apice fuscis.* Arab. *Chaddæjr*.

DESCR. *Rostrum* nigrum, rectiusculum. *Lingua* apice non laciniata, sed bidentata. *Pedes* incarnati. *Cauda* æqualis: rectrices 12.

Locus: in *Ægypto*. Pulli venales prostant mense Junio.

3. MEROPS. Arab. *Schaghgha*. شقاق

Obs. Cum Mer. *Apiast*. Linn. exacte quadrat; at *rostrum* carinatum non est, sed convexum: nec *digiti* infimo articulo coadunati.

Locus: *Temen*, frequens in sylvis: insectis vescitur.

▲

CRO.

CROTOPHAGA.

4. CROTOPHAGA. Arab. in DJEBBAL *Tullæk*; in TEHAMA *Dymildj* vocatur.

DESCR. Generi Crotophagi certe accedere videtur; quamvis rostri labium inferius (non superius) transverse fulcatur. *Labia* decurva, capite duplo longiora, compressa, margine inæqualiter ferrata, vel potius sæpe emarginata. In labio superiore, macula ad basin longitudinalis alba: in inferiore, lineæ obliquæ, curvæ, albæ, elatiusculæ, ad basin, tres vel quatuor. *Lingua* perbrevis, hastato-subulata, integra. *Caput & collum* griseo-fuscum: abdomen album, (sed ex junioribus ea, quam descripsi): cætero; *color* griseus, albo-maculatus, vitta utrinque supra oculos alba. *Remiges* apice albæ, primores cineræ, secundariæ nigræ. *Rectrices* decem, longitudinæ totius corporis: æquales nigræ, apice albæ, intermediæ vero duæ totæ fuscæ, etiam apice. *Tibiæ* nigro-fuscæ, ad genua plumatæ; femoribus breviores. *Digit*i tertii vel extimi duo articuli connati cum primo articulo digiti medii: unde singularis structura. *Magnitudo* columbæ majoris; sed rostrum præter modum grande respectu corporis. Serpentina dicitur.

ALCEDO.

5. ALCEDO SEMICÆRULEA, *brachyurus, dorso postico, cauda medioque alarum cæruleis, humeris nigris, capite pectoreque cinereo, ventre ferrugineo.*

DESCR. Magnitudo Pici minoris; circiter spithamæ longitudine. *Rostrum* miniato-rubrum, rectum, pollice aliquanto longius. *Mandibula* superioris dorsum angulatum, margo imbricans, apice paulo longior inferiori mandibula; basi medio & angulis calva. *Nares* oblongæ, nudæ, horizontales. *Lingua* brevissima, semi-unguem æquans, cordata, undique integerrima, obtusa. *Caput & cervix* obscure-cinereascens. *Pectus* pallidum. *Venter* ferrugineus. *Pedes* miniato-rubri. *Digit*i 3 --- 1. extimi ad medium connati. *Ungues* fusci, basi rubentes, omnes compressi, præter anticum medium, introrsum marginatum. *Dorsum* antarius nigrum: posticum & uropygium sericeo-cæruleum. *Remiges* ad angulum posticum 20: omnes uno numero 23. *Tectrices* remigum superiores nigræ: inferiores ferruginæ: sed primarum tectrices ut & alicula succenturiata cæruleo-sericea. *Remiges primores* 10: basi extus sericeo-cæuleæ, intus nivæ, versus basin fusciores, apice omnes nigræ. *Secundariæ* fere totæ extus cæuleæ; introrsum & summo apice nigræ. *Cauda* brevis: non vidi nisi rectrices duas extimas cæuleas, margine inferiore nigro, & subtus totas nigras.

Locus. *Yemen.*

ANAS.

ANAS.

6. ANAS ANSER; Arab. *Uas araki*.

DESCR. *Rostrum* incarnato-albidum. *Abdomen* nigro-maculatum. *Cauda* subtus alba. *Pedes* flavi; membrana flava. *Rectrices* 10. fuscae, margine albidæ.

7. ANAS. Arab. *Scar chir*.

DESCR. Corpus colore griseo-maculato; abdomen & uropygium subtus albidum, maculis cinereis. *Rostrum* medio nigrum, lateribus & subtus flavum. *Pedes* cinereo-flavicantes, membrana natatoria fusca. *Alarum* rhombus nigricans; ante & pone albus.

8. ANAS. Arab. *Sáu Sârai*.

DESCR. *Rostrum* totum nigrum. *Collum* cinereum, semicirculis albis. *Abdomen* albidum, immaculatum: uropygium subtus nigrum. *Pedes* cinereo-flavi, membrana natatoria fusca.

Locus: *Alexandriæ*.

9. ANAS BOSCHAS. Arab. *Kenâr*. (una ex avibus migrat. 15. Batt.)

DESCR. *Rostrum* medio nigrum, lateribus pallide cæruleum. *Dorsum* fuscum, undulis albis. *Abdomen* albido-rufescens. *Digitorum Membrana* interior integra, plena; exterior emarginata. *Alarum* rhomboides fusco-viridis, ante albo-rufescens, pone niveus, supra niger, infra fuscus. *Rectrices* 16. acutæ, ferruginescentes.

10. ANAS Gattâir. Arab.

DESCR. *Rostrum* fuscum, subrugosum, subtus nigrum. *Dorsum* fuscum. *Caput* pectusque bruneum. Sub rostro plumule anticæ albæ, maculam parvam albam adornant. *Alæ* supra nigrae: subtus albæ, margine fuscae: inter abdomen & rectrices subtus bruno-cinereæ. *Ala* complicata *Maculam* monstrat bifidam, ortam ex remigibus 4---20. medio albis. *Cauda* brevis, paululum cuneata: rectrices 12. acutæ, supra fuscae, subtus pallidiores: rectrices albæ. *Abdomen* medio album. *Pedes* cæruleo-cinerei.

Locus: *Alexandriæ*.

11. ANAS. Arab. *Sirfâir*. *Rostrum* subtus flavo; rhomboide alarum oblique dimidiato, supra sericeo-viridi, subtus nigro, antice & postice albo.

DESCR. *Rostrum* superne plumbeum; margine laterali & subtus flavum. *Gula* albida. *Vertex* fuscus. *Dorsum* fuscum, margine plumarum albedo. *Pedes* grisei, membrana digitorum fusca. *Abdomen* & alæ sub-

tus albidæ; sub cauda maculæ fuscæ. *Alæ* supra fuscæ: rectrices secundariæ apice albæ: & quæ pone rhomboiden, margine anteriore albæ. *Cauda* brevis subcuneata; rectrices 16. fuscæ, margine albidæ, subtus pallide-fuscæ, acuminatæ.

12. ANAS. Arab. *Balbul*. *Rostro nigro, rhomboide alarum supra oblique viridi, infra oblique nigro.*

DESCR. Præcedenti similis; sed rostro diverso. Magnitudine minor est gallina. *Corpus* cinereum: supra albo-undulatum, subtus albidius. Ejusdem coloris est foemellæ *Caput*: maris vero bruneum, macula magna & longa viridi-rubente utrinque ad tempora. In *Collo* pone macula atro-cærulea, quæ maculas virides conjungit. Ad basin *rostri* subtus, macula nigra. *Alarum* rhomboides ante & pone albus. *Uropygium* maris atro-virescens, margine plumarum interiori testaceo. *Cauda* cuneata: rectrices 16. sed nullæ pennæ recurvæ. *Pedes* cinerei. *Iris* oculorum obscure brunea.

LOCUS. *Kâhira* vulgaris.

13. ANAS PERINA? Arab. *Batt*.

DESCR. *Rostrium* rectum, latiusculum, obtusissimum, supra plumbeum, macula magna circa nares, apice nigras: appendix cum ipso rostro terminata, impressa margine & obcuneata: *maxillæ* superioris margo subtus totus niger. *Maxilla* inferior plumbea, margine late-nigro: membrana media nigra. *Iris* coccinea; dum vivit animal. *Caput* & collum ferrugineum: *pectus* & vicina *dorsi* pars nigra: *abdomen* & media *dorsi* pars albido-cinerea, undulis plurimis transversis, fuscis, subtilibus: extremum *dorsum* magis fuscum & albo-punctatum. *Alæ* pallido-cinereæ totæ: primorum remiges apice fuscæ, ut & rectrices. *Cauda* perbrevis, utrinque cinerea, subcuneata, rectricibus 12. acuminatis. *Uropygium* nigrum & anus. *Pedes* cinereo-cæruleoscentes: genua nuda: membrana digitorum nigra, inter extimos digitos angulo obtuso emarginata. *Magnitudo* anatis domesticæ.

LOCUS: *Kâhira*.

COLUMBA.

14. COLUMBA TURTUR; *rectricibus fuscis: extimis apice & extrorsum, reliquis apice albis; intermediis exceptis.*

DESCR. *Rostrium* fuscum. *Collum* & caput cæruleo-rufescentia; ad latera colli utrinque tres lineæ obliquæ, nigrae, totidemque albæ alternatim. *Pectus* rufescens: *abdomen* album. *Dorsum* cinereo-rufescens, marginibus

nibus plumarum testaceis. *Tibiae* & *digiti* rubri. *Remiges* fuscae. *Rectrices* 12. fuscae: *extimae* apice & dimidio toto *exteriore* albæ: *proximae* 4. apice albæ: *intermediae* totæ fuscae.

Locus: Ad littora *Galliae* capta.

15. COLUMBA TESTACEO-INCARNATA: *gula maculata plumis nigris, apice bilobo-truncatis, ferrugineis.*

DESCR. *Rostrum* nigrum. *Caput* violaceo-incarnatum. *Oculorum* orbita nuda, cærulescens. *Gulae* plumæ cuneiformes, nigrae, apice divisæ in duos lobos lineares, divergentes, truncatos, totos fere incarnato-ferrugineos. *Dorsum* cinereum. *Pectus* violaceo-incarnatum. *Abdomen* albidum. *Femora* albida: *tibiae* & *digiti* incarnati: *ungues* nigri. *Remiges* utrinque fuscae; *extimae* margine *exteriore* leviter dealbatae. *Rectrices* remigum *primarum* fuscae: *secundariarum* *exteriorum* cærulescentes: *interiorum* testaceae, sub-maculatae. *Rectrices* 12. obtusae: *mediae* 5. æquales: *exteriore* parum decrescientes: duæ utrinque *extimae* basi cinereae, medio nigrae, reliqua tota parte albæ: duæ utrinque sequentes basi cinereae, medio nigrae, reliqua parte cinereae, extremo apice albidæ: quinta, utrinque a margine numeranda fusca, medio obsolete nigra: duæ denique *intermediae* totæ fuscae.

Locus. In *Ægypto* frequens ad ædes. Arab. *Jemam*. Ital. *Turterella*; quod nomen pluribus speciebus commune.

TURDUS.

16. TURDUS SELEUCIS; *rostro pedibusque flavicantibus; abdomine dorsoque incarnatis; cauda, alis femoribusque fuscis.*

DESCR. Magnitudo vix *Turdi* *pilaris*. *Maxilla* superior, longior inferiore & leviter utrinque emarginata: linguam non vidi. *Alae* dimidiam caudam attingunt. *Remiges* duæ *extimae* æquales: sequentes 7. gradatim minores & obtusiores: totæ supra fuscae; subtus pallidiores: pennæ *remiges* 10--14. margine apice obtuso, retuso, linea tenui alba notatae. Penna 15. margine *exteriore* parum albens: 16, longior, rotundata, tota fusca: reliquæ sensim decrescientes, donec discerni a reliquis plumis vix possint. *Alarum* margo exterior, basi albidus, nigro maculatus. *Cauda* longitudine pedum cum digito postico. *Rectrices* 12. æquales rotundatae, utrinque fuscae: *extimarum* margo exterior paulum pallescens.

Obs. *Smirna* residens *Consul* gentis *Suecicae* Dn. RYDELIUS hanc avem mihi obtulit exsiccatam; quam pullum, vel foemellam putavimus; marem enim adultum crista & colore rubro pulcherrime ornatum esse, aiebant; &

grate canorum. *Gryllos* exstirpare solet; hinc Turcis sacra fere est avis, quam occidere inviti ferunt.

MOTACILLA.

17. MOTACILLA SCHOENOBÆNUS Linn. *supra nigro cinereoque maculata; rectricibus, intermediis exceptis, basi albis.*

DESCR. Magnitudo passeris. *Rosrum* nigrum: basi duplo longius, quam latum. *Maxilla* superior apice subreflexo, vix emarginato; dorso obtuse-angulato; basi medio calvo. *Lingua* sagittata, excavata; basi & apice setis ciliata; apice fere bifido. *Nares* ovatae, antice acuminatae, perviae. *Mystaces* ab exortu narium ad basin mandibulae; setis tertia & quarta a basi longissimis. Caput maculatum: a naribus ad occiput fascia utrinque albida. *Gula* pallide ferruginea, sub maxilla inferiori alba. *Pectus* pallide-ferrugineum, seu albedo-testaceum. *Abdomen* album, flavescent. *Femora* plumata, albida. *Genua* superius plumata, subtus nuda, nigra. *Tibiae* femoribus paulo breviores, nudae, nigrae; *squamis* usque ad basin digitorum quatuor, suprema a genu usque ad basin fere; reliquae tres breves, infima transverse truncata, oblique reliquae. *Digiti* tres antici, articulis 4, 3, 2: nigri, exteriores connexi, laterales aequales, medius uno articulo abundat. *Digitus* posticus niger, lateralibus anticis paulo brevior, crassior. *Ungues* nigri, falcari, compressi; posticus maximus, digiti fere longitudine: intermedius anticus huic proximus, paulo latior, subtus utrinque marginatus. *Laterales* antici subaequales, exteriore paulo minore. *Remiges* 16, usque ad longissimam corpori proximam, numeratae: illi & corpori intermediae duae, acutiores: quae sequuntur tertiam a margine gradatim decrescunt; omnes fuscae, limbo exteriore albedo; secunda & tertia a margine, attenuatae seu oblique excisae versus apicem extrorsum ad rachin; reliquae integrae; quatuor extimae parum acutiores; caeterae obtusae, ad basin extrorsum testaceae. *Rectrices* 12, aequales, extimis parum brevioribus, subacuminatae; 5. utrinque exteriores albae rachi & ad apicem fuscae: extima harum toto margine exteriore albida; secunda dimidio inferiore alba; tertia & quarta margine exteriore ad basin usque fusca; quinta toto dimidio exteriore fusca; duae intermediae auctiores, totae fuscae. *Ani testrices* nixae.

Locus: Inter *Minozam* & *Hispaniam* excepta in navi.

AVES MIGRATORIÆ.

PER CONSTANTINOPOLIM.

I. HIEMALES.

1. ANAS FERA & ANSER (*Ois sauvage*) ad aquas dulces & paludes copiosæ. Veris initio abeunt.
2. TURDUS? Gall. a) *Grives*: b) *Scires* vel *Grives grosses*: c) *Tourdres*: an totidem species diversæ? Veniunt Septembri, abeunt vere ad Septentrionem.
3. TETRAO PERDIX (*Perdrix grise*): venit inter summa frigora Decemb. & Januar. interdum hic nidos ponit: sæpius ad Septentr. abit Martio.

II. VERNALES.

4. HIRUNDO? (*Martinez*) venit Aprili, nidificatura.
5. CORACIAS ORIOULUS (*Orioles*) venit Junio; manet ad Septembr.: redit ad regiones calidiores. Vescitur hic Uva, Ficu, Mori fructu.
6. LANIUS AMPELIS (*Aile rouge*); venit (ut fertur) septimo quovis anno Februarii mense.

III. AUTUMNALES.

7. UPUPA EPOPS (*Hupe*) simul cum CORACIA GARRULA (*Bleuret*) venit Augusto e septentrione; hieme incunte redit.
8. MILVUS FALCO (*Milan*) Septembri transit.
9. MEROPS APIASTER (*Sirene*) a medio Augusti ad finem Septembris.
10. TETRAO COTURNIX cum præcedente idem tempus veniendi & abeundi servat. Redeunt Aprili ex Ægypto (ut creditur); tumque vocantur *Cailles verdes*; quia campus eo tempore viret. Manent ad finem Maji. Deinde *Tartariam Crimeam* petunt: mare tranantes, secundo vento offerunt alam in altum sublatam; si credere fas?
11. COLUMBA OENAS (*Palombe* vel *Pigeons ramiers*) venit medio Septembri turmis innumeris, glandes quercuum depascens; diu non moratur, in Asiam forte transiens.
12. SCOLOPAX Septembri hæc transit loca *Syriam* petens: Febr. & Martio redit, iterumque Septentr. adit. (Gall. *Beccaf.*)

13. MOTACILLA (*Becquefigue*) Augusto venit, sicum maturam quærens, per Septembrim & Octobrem; qua consumpta domum redit. Cum hac Motacilla venit reditque alia species *Mouriere*: plures enim hujus generis esse dicebatur; inter quas *Fouette*, capite nigro.

Totum hunc catalogum migrantium avium exhibuit mihi Dn. BARTHELEMI, *Medicus Legationis Svecicæ*, Gallus natione, venandi artis peritissimus.

14. PASSERUM multæ variæque species autumno transvolant, quibusdam hyemantibus; sed & perplurimæ aliæ aves, non adhuc in tabulas ephemeridis Ornithologicæ redactæ.
15. ARDEA NYCTICORAX, Gr. Νυκτοκόραξ.
16. RECURVIROSTRA, *avojetta*, Gr. Νεγοπέλας.
17. LARUS rostro rubro, apice nigro, macula nigra temporali; dictus ALEPPO: *Dingla*; visa mihi ad *Dardanellos*, vernalis Febuario advolans, æstate non permanens.

AVES ALEXANDRIÆ.

I. PERMANENTES.

(Ex relatu & fide Venatoris Arabici nomine AUVAT.)

1. FALCO Milvus,	Arab. <i>Hæddāja</i> .
2. STRIX Noctua	— <i>Būma</i> .
3. AQUILA,	— <i>Nisr</i> . Hæbr. נִשְׂר
4. FALCO gentilis,	— <i>Schahîn</i> . Ital. <i>Lufuga</i> .
5. PELECANUS ONOCROT.	— <i>Baschda</i> . بَشْدَا
6. AVIS PARADISIACA	— <i>Affurt ildsjænna</i> , vel avis paradisi.
7. VESPERTILIO?	— <i>Abu Sjærra</i> .
8. VULTUR,	— <i>Sûkr</i> .
9. STURNUS,	— <i>Lehalrûr</i> .
10. ARDEA stellaris,	— <i>Ariel</i> .
11. GALLINA sylvestr.	— <i>Farcha</i> . Ital. <i>Boccafà</i> .
12. CAPRIMULGUS,	— <i>Mûkhhit râjan</i> . item <i>Abu num</i> .
13. PHASIANUS,	— <i>Hbâra</i> .
14. CORVUS corax bilobis,	— <i>Gorâb mûâhhi</i> .

15. COLUMBA, *حمام* *Hamám.* Gall. *Pigeon.*
 16. COL. incarnata, Arab. *Jemám.* Ital. *Turterella.*
 17. INCERTI GENERIS: a) *Boſchóka.* b) *Gatgát.* c) *Ráchama.*
 d) *Abu haovám.* e) *Abu ſarága.* f) *Mſjárdæn.*
 g) *Káruan.* h) *Raáfcha.* *عرش* i) *Ökáb.* *عقاب*
 k) *Omm uſſi.* l) *Chlíſch.* m) *Abu ſſæjæ.*
 n) *Nurír.* o) *Bellæ ſjúm.* p) *Meduás.*
 q) *Buſchruſch.* r) *Abu gerdán.* s) *Sælva.*
 t) *Abu gæúda.* u) *Dagnúſch.* v) *Ghattáís.*
 w) *Kettár.* x) *Gátta.* Ital. *Berteris.*
 y) *Abu abáb.* *ابوععب*
 z) *Aſrít lhájjat:* i. e. *Diabolus muralis.*

AQUÁTICÆ AVES: a) *Abu ſchuch.* b) *Abu ſarua.*

CICONIA a) *alba*, roſtro rubro. *Λεῖλεκος:* vel *Πελαγέγγος.*
 - - b) *cinerea.* *Γερανίος.* Ambæ *Smirnæ,*

II. MIGRATORIÆ.

α) MENSE ANTE INUNDATIONEM NILI VENIUNT:

Arſar: *Motacilla*, *Becqueſigue:* abit pluvia ingruente; i. e. initio Novembris.

β) CUM NILO ACCEDUNT:

1. *Gimri* *كمري* Ital. *Turterella:* ſpicilegia meſſis colligit; quibus peractis & conſumtis, abit.
2. *Suffair*, Ital. *Rinéo.* Abit initio Novembr. iſtante frigore: & quidem diurno tempore valedicere ſolet. Eſt *Coracias oriol.*
3. *Summán* (*Tetrao coturn.*) cum præcedente eadem tempora veniendi & abeundi obſervat; hæc vero nocte caſtra mutat. E *Káhira* advenit.
4. *Kurki:* vocatur & *Uas aráki:* vel *aigriæs.* Conſtantinopoli advenit Octobri: poſt 3 meſes redit; vel ad Indiam, ut perhibetur, tranſit. (*Kur*, *Kurka*, vel *Kuritza* nomen eſt *Ruſſo-Slavicum*, GALLINAM designans. *Uas* ſimilitudinem magnam habet cum *Gus* (*anſere*) Ruſſice; vel Polonica dialectu *Hus*; G. leniter enunciato).

5. *Uas*. Ital. *Occa*: Oðobri e *Russia* venit & cum Kurki paria stationis & valedicendi tempora observat.
6. *Kunbár* accedit medio Novemb. e *Turcia*: discedit initio messis *Ægyptiacæ*.
7. *Ommu trajbisch* Oðobri venit e *Turcia*; redeundi societatem init cum *Kunbar*.
8. *Sáu Sáraí* ساءو fine Oðob. adest e *Barbaria*: post 90 dies secedit ad regionem *Káhirinam*.
9. *Gordb Suggait* Oðobri advenit ex *Æthiopia* (*Sudán*): manet 3 menses, quamdiu dactyli & fabæ vigent: deinde domum petit. *Coracias*-ne *Cassra*? sed huic rectrices non acutæ sed obtusæ.
10. *Abu fásádi*: *Motacilla*: Oðobris initio venit e *Turcia*: messe incipiente redit.
11. *Hassún*: Frigore, i. e. Novembr. inchoante venit e *Natolia* & *Smirna*; abit calore incidente; 1 mens. ante messem. Gall. & Ital. *Calderine*.
12. *Durúri*, venit dum Dactyli maturuerunt, fine Oðobr. ex *Ægypto* superiore: his consumtis, post 3 mens. abit.
13. *Tfáhi* fine Oðob. venit ex *Archipelago* & *Rhodo*, ad uvas pascendas; quatuor septimanas ante messem lares repetit; ut calorem æstivum vitet.
14. *Smírri* etiam accedit pluviosa periodo, medio Nov. & post 3 menses ad *Archipelagum* redit.
15. **BATTA** universale nomen Avium ex Occidente & *Barbaria* medio Oðobr. advenientium; manent 40 vel 50 dies, usque dum Nilus subsedit: cum *Giroko* seu *Vento favonio* advolant, & peracta statione eandem repetunt regionem.
16. *Achdár*, ital. *Kanar*. *Anas boschas*, mas.
17. *Búæhh*, Gall. *Toudre*. 18. *Scharíf*. 19. *Hámri*. 20. *Báß*.
21. *Getthais*. 22. *Sjirfjæir*. 23. *Sirfæiræ*; (cum priore non confundenda) Gall. *Cercelle*: *Anas*, copiose circa littora *Maris rubri*.
24. *Kifjæ*. 25. *Farcha blis*: i. e. *Diaboli proles spuria*.

AVES LOHAJÆ.

I. PERMANENTES.

1. PHASIANUS *Louam* لوم in provincia Yemen sylvestris.
2. PHAS. meleagris *Hádjal* حجل
3. FALCO *Ságr* سقر
4. CORVUS *Ghoráb* غران cadaveribus vescitur.
5. ACCIPITER *Schahiz* شاهية *Hendiz* حندية *Hædæ* حدة
6. ALAUDA prat. *Gombarán.* قنبران *Abu gába.* ابو قوبع
7. PASSER *Samel.* شامل falacissimus.
8. VULTUR perenopt. *Rócham.* رخم albus: vescitur cadaveribus.
9. GLARUS *Gombarán el báhr.* فنبران البحر
10. GL: *Adjam.* عجام humano more ridendo clamat.
11. INCERTI GENERIS: a) *Schægag.* شغاغ (3) *Djoun.* جون
b) *Gumri.* قمري
c) *Abu saváddæ.* ابوسوان granivora.
d) *Chaddádj.* خداج piscibus vescitur.
e) *Hönkarán.* حنكران piscivora.
f) *Mfarrára*; crepitans ut horologium: filens vespere circa horam 9. (Tempore Mohamm. ášha dicto),
g) *Schædagha* viridis.
h) *Dællad* variegata.

II. MIGRATORIÆ.

a) HIEMALES.

- INCERTI GENERIS: 1. *Hamám ráadi.* حمام رعدى
2. *Hádjesf.* هجف æstivo tempore septentrionem edit: granis vescitur *Holci.*
3. *Kæruán.* كروان eodem cibo vescitur.
4. *Kota.* قط noctu volat.
5. *Derdja.* درجة

NOCTUA

b) VERNALES.

AQUILA

INCERT. GEN.

6. *Nisr*. نسر carne & cadaveribus viſitat.
7. *Choffafch* خفاش vel *Abu Chaffjæſch*.
8. *Djaradjæ* جراجية e *Gracia* advenit: putatur ejusdem generis cum *Salua*. Sed omnes ſequentes æſtivalis vocantur: *Djaradjæ*; ſimul quoque propriis diſtinguuntur cognominibus.
9. *Akhal*. اکحل 10. *Achraſch*. اخرش
11. *Kalabefi*. کلادري 12. *Jdagûbi*. يعقوبي
13. *Durrâdj*. دراج 14. *Soghâtt*. زغت
15. *Hâmme*. حمة 16. *Hâmâmat elhind*. حمامة الهند
17. *Tæjr el hind*. طير الهند tota deaurata; & his in regionibus imperiali pretio emitur: quantum nonne exteris curioſis conſtabit?
18. *Buraej* بورعي venit tempore uvæ maturæ; e qua ſibi vinum conficit in Vite viva: (ſi fabulam non ſapit narratio). Rostro ſcilicet uvas perforat, & vulnera pulvere obturat. Septem diebus elapſis redit & ex his acinis vinum fugit paratum, adeo avide, ut inebriata poſſit comprehendere.

AMPHIBIA.

TESTUDO.

1. TESTUDO TERRESTRIS. Arab. *Zolhafa*. زلحفة LOHAJE *Buzi* vel *Sukar*.

Obs. Eodem *Zolhafa* nomine venit quoque TESTUDO MARINA *Lattakia* & ad montem *Libanon* in mari habitans. Terreſtris longitudine unius pedis. *Mas* pectore ſubtus plano: *Foemella* concavo. Ovis illa gravida 30 vel 40 inæqualis voluminis, ovum columbinum æquantis. *Kâbira* non frequens vivit, *Aleppo* autem & ad *Libanon* copioſior. Ruſtici totis plauſtris ad fora vehunt, & duas treſve *Medûni* pretio vendunt. Græcis eſt Jejunii tempore grata, caſu conſcientiæ amphibio, hanc piſcem ſimulantibus, ne in carnis eſu peccent. Ca: ut unco avellunt: crudum ſanguinem (ruber eſt) avide bibunt: corpus lapide fractum inteſtinis purgant: carnem, hepar, & potiſſimum ova coquant. Delicati ſaporis eſca; medico quoque commendanda uſu in Colica &

& Febri lenta; præsertim crudus sanguis & ova. Hæc ficcata, & grani dosi mixta lacti nutriticis propinantur infantibus inquietis & querulis.

LACERTA.

2. LACERTA NILOTICA. *Hasselq.* p. 311. Arab. *Vāran*.

Obs. Cauda verticillata, longa. Squamæ caudæ obtuse-truncatæ, dorfi-acutius carinatæ. Femora sine verrucis. Tripedalis.

3. LACERTA ÆGYPTIA. *Hasselq.* p. 302. Ægyptiis *Dabb*.

Obs. Femora teretia sine verrucis. Cauda verticillata non longa. Squamæ patentes, subconicæ, mucronatæ. Corpus nudum, rugosum.

4. LACERTA OCELLATA. Cauda tereti, imbricata, brevi.

DESCR. Longitudo totius animalis spithamalis: crassities digiti. Corpus nitidissimum, squamosum, depressum: subrus album, imbricatum: supra griseo-virescens; ocellis subrotundis, radio fuscis, disco albo, rectangulo. Pedes teretes, brevès, sine verrucis. Digiti 5 --- 5.

Locus: In Ægypto ad ædes: pulchella. Arab. *Sehlie*.

5. LACERTA GECKO. Ægyptiis dicitur *Abubûrs* ابو برص i. e. pater lepræ, s. leprosus. *Aleppensis* *Bûrs*.

Obs. *Kâbiræ* frequens in ædibus, æstivo tempore parietes pervagans. Stridet fore ut Mustela. Hyeme non conspicua; sed in tectis latere fertur, & medio Martii mensis denuo prodire. Cauda separata a corpore vivo, per dimidium horæ signa vitæ motusque edit. Ajunt, Feles hanc Lacertam venari illaque vesci. Nominis origo inter Ægyptios lepida est: si enim salivam demittat in sal, mensæ usibus destinatum, lepram inducit homini, illud gustanti: quapropter salinum caute obtegunt, vel Allium adjiciunt, quod horret Lacerta. Nomen animalis ortum putant alii, a similitudine coloris Lepræ.

COLUBER.

6. COLUBER LEBETINUS *Linn*.

DESCR. Longitudo Corporis subcubitalis: Caudæ 4 pollicaris: versus collum angustior & sesquipollice crassus. Caput latum, depressum, subcordatum. Squamæ dorfi ovato-obtusæ, planæ, stria media elata, carinatæ. Dorsum deflexum (*en dos d'ane*). Color supernus griseus, ordinibus quatuor macularum transversalium, alternarum. In seriebus mediis ambis flavescunt maculæ: sed in lateribus fuscae vel nigrae. Subrus albidus, & densius nigro punctatus. Scuta abdominalia 152. Squamæ caudæ 43.

Obs. Morfus somnum infert, prorsus lethalem nec vincendum. Duos Lebetinos e Cypro mihi transmisit amicissimus Dn. PETR. SJÆLVI, *Interpres Legationis Gallicanæ*.

Gallicana Kâhira. Hæc Species non parva est; an igitur veterum *Aspis*? Sic enim hodie vocatur a literatis Cypri civibus; vulgus vero nominat *Kâphî*: (*Kufî*) i. e. Surdus.

7. COLUBER GUTTATUS: *scutis abdom. 230. squamis caud. 82.*

DESCR. Longitudo $2\frac{1}{8}$ cubitorum: crassities pollicis. *Caput* planiusculum, subcordatum: vertice squamis duabus pallidis, oblongis, maximis; adeo ut vel 12 squamas alias, una harum exæquet. *Color* superne griseus, maculis dorsalibus fuscis, ovalibus, magnis; lateralibus quadrato-emarginatis, parvis: subtus totus sericeo-albus nitidusque.

Locus: Ad *Kâhram* juxta agrum Trifolio consitum se undulatum composuit, & aggressores mortemque immotus sustinuit.

OBS. Innoxius est. An *Coluber Tyr.* Linn.? *Hasselquisti* descriptio errore forte non vacat. Arabes communi serpentum nomine vocant *Taabân*, *ثعبان*.

8. COLUBER HAJE. Arab. *Nascher*. *ناشر*

OBS. Quum iratus morsum intendit, collum erigit & expandit quantum potest in longum, unde valde attenuatur; mox inde inimicum petit uno impetu. Geficulatores Kâbirini frequenter illum circumferunt; exemptis dentibus nocivis: nihilominus artifices ipsi morsum evitant, quum collum dilatat. Veneni præsentissimi effectum repetito experimento in Columba vidi. Circumforaneus, me monente, veneni receptaculum pressit, quod pellucido-flavicante succo stillabat. Hujus modicam partem vulneri leviter inciso femori columbæ applicui. Illa principio nullum doloris indicium dedit; at intra horæ quadrantem in pectus delapsa, violentis convulsionibus capitis torquebatur, & postquam magnam aquæ copiam evomuit, illico mortua est. In dissecta nihil fere intumuisse visum est, præter intestina aliquantum distenta. Cætera omnia sana.

9. COLUBER DHARA Arab.

DESCR. Longitudo plus quam cubitalis; crassities vix digiti. *Caput* ovatum, obtusum. Verticis *Squamæ* ut in sequente; sed squama inter oculos media, lateralibus latior. *Color* superne cupreo-cinereus, squamarum marginibus albescens, immaculatus, subtus totus albus. *Cauda* corpore quintuplo brevior; sed forte mutilata. Hinc *Squamæ* caud. non plures 48. *Scuta* Abd. 235. Unum tantum mihi videre licuit.

Locus; *Yemen* passim. Innoxius.

10. COLUBER SCHOKARI. Arab. *شكارى*

DESCR. Longitudo sesquicubitalis; crassities digiti. *Color* supra fusco-cinereus, vitta utrinque duplici longitudinali alba. In majoribus in medio dorso (non autem juxta caput nec in cauda) *vitta* parva conflata guttis

tis albidis, solitariis ad basin squamarum intermediarum. *Vitta superior* alba cinerea dimidio superiore; prorsus vero alba dimidio inferiore. Ad marginem ejus superiorem est linea angusta, nigra, longitudinalis, continua: ad inferiorem, alia tenuior, interrupta. *Vitta inferior* altera tota nivea. Totum animal subtus pallide-cinereum vel albescens: versus gulam flavicans: punctis fuscis sparsis; in gula frequentioribus. *Caput* ovatum, obtusum. *Vertex* planatus squamis magnis: duabus ingentibus cuneatis pone oculos: 3 mediocribus inter oculos; media harum angustiore pone, longiore & incumbente. Ante laterales squamas interferitur squamula ocularis. Inde os inter & regionem oculorum, duo paria squamarum verticem tegunt: & par squamarum minorum ori propius adjacet. *Cauda* duplo fere brevior corpore. Numeravi in uno Sc. abd. 183. sq. caud. 144. in alio Sc. abd. 180. sq. caud. 114. sed cauda huic sine dubio mutilata.

Locus: *Temen* frequens in sylvis montosis. Fertur esse ovipara. Morsus non lethalis: ego certe non vidi dentes in ore majores, & veneniferos.

11. COLUBER BÉTÉN. Arab. بثن

DESCR. Totus maculatus albo nigroque. Longitudo pedalis: crassities fere bipollicaris. Ovipara. Morsus in instanti necat, corpore vulnerato intumescente.

12. COLUBER HÖLLEIK, Arab. هليك

OBS. Totus ruber: longitudo pedalis: ovipara. Non quidem lethaliter mordet; at tumor ardens insequitur; cui *Capparis antid.* Arabis *Oūd eddābi* pro medela est. Solet etiam hominem afflare, & locus halitu tactus prurit: sed frictus tela gossypina rubra sanatur. Habitat *Hādīe*.

13. COLUBER Arab. *Hānnasch asuād.* حنش اسود

OBS. Totus niger: cubitalis: crassitie digiti: ovipara. Morsus non metuendus, sed tumet vulnus aliquantum: solent ligatura prohibere veneni dilatationem: illudque exfugere, vel *Capparidis* usu retundere.

Perhibent, serpentem hanc Camelorum letus intrare & per medium corpus transire, alteroque latere egredi; cum certa Cameli morte. Incolæ locum vulneratum ferro ustulant candente; & hac arte servant pecus.

RAJA.

14. RAJA TORPEDO: *pinna dorsali adiposa, corpore nigro maculato, cirrhis oris sex.*

Malapterurus electricus Lac.

DESCR. Longitudo spithamalis: latitudo duorum pollicum cum semisse. *Corpus* levissimum, sine squamis. *Color* dorso & capite fuscus, maculis

culis nigris, ad caudam pluribus: latera albescencia, maculis circularibus, nigris, lentis magnitudine: abdomen album, immaculatum. *Dorsum* & caput depresso. *Os* in apice capitis, truncatum, rectum. *Dentes* numerosissimi, conferti, breves in utraque maxilla, setacei, nec emarginati: qua nota discedit a charactere generico Mormyri. *Tentacula* ad os sex, pollicaria: unum in utroque limbo labii superioris; & illis interjacent calli quatuor elevati. In labii inferioris margine tentacula quatuor: e quibus exteriora paulo longiora. *Oculi* inter os & aperturam branchialem medii, parvi, parum protuberantes, iride flava, pupilla nigra. *Apertura Branchialis* utrinque unica, linearis, obliqua, supra pinnas pectorales, semipollicaris. *Pectus* planum. *Anus* paulo post medium corpus. *Linea lateralis* recta, elatiuscula, in medio latere. *Pinna dorsi* subpollicaris, a cauda distans semipollice, tota adiposa, versus caudam elatior, pone rotundata, fusca, maculis paucis nigris. *P. Caudæ* fusca, maculis nigris, margine rotundato, rubro. *P. pectorales* obovatæ, rubræ, maculis paucis nigris, digitum transversum longæ, remotissimæ, spatio sesquipollicari distantes. *P. Ventrals*, prope anum, semipollicem remotæ, lanceolatæ, digitum transversum longæ, rubræ, non maculatæ. *P. ani* pollicaris, medio inter anum & caudam loco, pone rotundata, rubra, maculis nigris. *Radii* C. 9. V. 6. A. 12. C. 18. Omnes valde molles.

Locus: In *Nilo* inferiori rarius: mihi obveniebat in pago *Benha el dīsal* ad Nilum jacenti, Arab. piscem hunc vocant *Raāsch*. رعاش

- OBS.** 1. An cum *Mormyro*, genere potest sociari; vel inter *Torpedines* posteriores *Rondeletii* locum invenire: aut potius novum constituere genus? Certe determinatur *Torpedinis* CHARACTER GENERICUS: *Piscis branchiostegeus: apertura linearis, obliqua supra pinnas pectorales: corpore nudo: pinnis ventralibus, seu abdominalibus: dentibus numerosissimis, densis, subulatis.*
2. *Ægypti* coctum edunt sapidumque laudant. Notissima illis est ejus mira proprietas tremefaciendi, cauda mota leviter, dum caput ejus tangitur manu. Ipse aliquoties experimentum hoc subivi. Motus tremoris levissimus erat; adeo ut ex ejus vi & celeritate ineptum sit derivare doloris sensum. Nichil vero Electricitati magis convenit, quam hic ictus. In manum sublatus piscis, aqua recens extractus, fortiter percutit cauda: fortius si sub ventre tangatur, quam lateribus: & levius, si unum tantum attrectaveris latus. Mortuus mihi erat, unicus quem habui, ante vesperam; adeo ut explorare negatum fuerit, phosphoriset ne in tenebris; vel valeat electricam vim communicare ferro sericeis filis suspenso. In sola caudæ verberatione vis consistit: illam enim si tangis, aut illa apprehensa piscem sublevas, nullo te ferit ictu. Græcus *Káhira* hospitans, de pisce quodam Archipelagi narrabat, eodem modo percutiente manus attrectantes; sed planiorem nostro descripsit, & Indigenis nominatum *Mediázza*. Fabulam forte sapit, *Torpedinem* salitum, manu detentum, fortissime stimulantem esse.

15. RAJA LYMMA. Arab. *U*. Corpore ovali, testaceo, maculis cæruleis; cauda *Tæniura lymma* *M*
pinnata aculeo uno.

DESCR. Vix pedalis magnitudinis: maxima; caudam si excipias. Corpus ovatum, testaceo-flavum, læve, maculis inæqualibus, ovatis, cæruleis. Oculi dimidio ultra caput elati. Pinnæ pectorales, corporis latera formant, pone acuminatæ. Ventrals ovatæ, incipientes ubi pectorales subsistunt, & paululum ante illas. Cauda aliquanto longior corpore: dimidio anteriore depressiusculo: subtus alba, apterygia; supra testaceo-fusca, vittis longitudinalibus duabus cæruleis. In media cauda superne inseritur aculeus unus: vel duo? longi, lati, cute vestiti cærulefcente-fusca. Inde cauda compressiuscula, tota cærulefscens acuta, superne & inferne membrana vestita; inferiore autem multo latiore. Apex caudæ albescit, & totum corpus subtus. Aculei caudæ putantur venenati; ut in congeneribus. Dentes granulati.

Locus: Ad urbem Lohajam in Mari rubro.

16. RAJA SEPHEN; corpore suborbiculato; cauda duplo longiore subtus alata, supra *Hypselophus sephæ* *M*
aculeis duobus longis, utrinque ferratis.

DESCR. Figura corporis cum pinnis lateralibus, sed sine cauda spectati, suborbiculata; vel potius ab angulis extremis pinnarum pectoralium versus caudam, semicircularis; versus caput semi-rhombea. Cutis tota superne plena tuberculis, & eapropter scaber, si digito exploretur versus caput ducendo; at contra, non sentitur scabrities. Oculi protuberantes, elati, adeo ut inter eos quasi fovea. Foramina pone duplo grandiora illis, subverticalia, sub-rhomboidalia, obliqua. Tubercula tria magna, seu calli ossei, albi in medio dorso, longitudinali serie positi hemisphærici; medio illorum majore. Color superne cinereo-fuscus. Subtus tota planissima, lævissima, albo-rufescens; cauda quoque usque ad alam. Narium apertura fere longitudinalis. Nares maxima parte rectæ lobo coriaceo communi, labiiformi, cordato-truncato; ad latera cum ipso ore convenientes. Dentes graniformes, planissimi, in superiori maxilla quasi fornicem versus frontem formantes. Aperturæ branchiales utrinque 5. ad latera pectoris. Anus inter pinna ventrales. Pinnæ pectorales latissimæ, quadriformes, apice postico rotundato, pinna ventrali incumbente. P. ventrales multo minores, quadriformes, sub apice pectoralium inchoantes. In ista Raja, quam examinavi, erant juxta exortum caudæ appendiculatæ, pinna ventrales. Appendices isti, forte genitalia maris: conici, coriacei, a pinna liberi, apice postico pinna paulo breviores. Cauda corpore duplo longior, incipiens inter pinna ventrales, usque ad spinas depressa, superne tuberculata ut corpus

pus; post spinas teres, sensim attenuata; aculeorum. exiguorum serie longitudinali, superne. *Spinæ* in dorso caudæ binæ (solitarias quoque reperiri, narrarunt mihi incolæ) lineari-lanceolatae, longitudine distantiae inter oculos, cute obiectæ, una supra alteram; utrinque carina longitudinali media, elata, obtusa; lateribus utrinque ferrata, aculeis basin spinæ spectantibus. Apex earum in regione mediæ caudæ; sic ordinem inchoantur. Adeo venenatae dicuntur. *Ala* sub cauda incipit paulo ante basin spinarum, finitur $\frac{3}{4}$ parte caudæ: membranacea, nigra, versus medium latior, flexilis, dependens: tota longo-lanceolata.

Locus: *Djiddæ* in mari rubro. Arabis *Sæfæn*. سفين. Lohajæ *Syfen*, & *Sif* vocant illam grandioris ætatis; sæpe diametro 3. ulnar. & spinis caudæ pedalibus.

OBS. An *RAJA AQUILA* Linn.? Obstat, quod aculeus caudæ duplex & apex pinnarum lateralium rotundatus, non acutus, ut describitur in *Arted. Gen.* p. 72. neque nostra instruitur rostro.

Rhynchobatus djiddensis *Am* 16. b.) *RAJA*. Arab. *Uárnak*, ورنك similis descriptæ, sed tota maculata, spina una vel duplici in cauda, quæ apterygia.

17. *RAJA DJIDDENSIS*; caudæ pinna biloba; aculeorum ordine initio dorsi triplici, dein simplici; pinna dorsi prima supra pinnas ventrales.

DESCR. Longitudine duarum ulnarum vidi; latitudine $\frac{3}{4}$ uln. una cum pinnis pectoralibus. Color pallide-cinereus, pinnis dorsalibus & ani glaucioribus: maculis in dorso & ad apicem pectoralium albidis, ovatis: subtus albescens post anum vitris aliquot fuscis albisque inæqualibus. Caput trianguli æquitermi forma, valde depressum, obtusum, subtus planissimum. Cutis subaspera. Oculi verticales, magis a se invicem remoti, quam a latere capitis; iride alba, nigra margine. Ante oculos & intra est series aculeorum curva, continuata ad basin foraminum. Os subtus ad basin capitis: labia extus callosa dentibus hemisphærico-ovalibus, contiguïs, quincuncialibus. Nares paulo ante os obliquæ, subcurvæ, anteriori margine lobo medio, membranaceo, ovali, dependente, intus velut branchia alba fornicatæ. Foramina post oculos, semidiametro oculi ab iis distantia, transverse-ovalia, oculis aliquantum majora; pone duplici carina cutis, perpendiculari, molli. Ore aperto aquæ non impeditus fluxus patet per os & hæc foramina. Dorsum elatius, convexius ante pinnam dorsalem primam; dein sensim depressum. Cauda fere plana. Anus linearis, longus, inter basin pinnarum ventralium. Margo lateralis parum prominens linea elevata. Spiracula 5. utrinque, sub pinnis pect. ad latera pectoris operculis pone ut litera S prona, excisis. Pinna ani nulla. Radii vix numerandi; quum

quum pinnae totae quasi coriaceae. Subtus totus piscis planus, post anum parum convexus.

Pinnæ pect. a capitis basi dilatantur, ut margo qualiscunque corporis, figura trianguli obtusi, latioris quam altioris; pone a corpore separatae, ventralibus quadruplo majores, medium fere corpus attingentes; jacentes in eodem cum abdomine plano. *P. dorsales* duae, subtriangulares, altiores plus quam latae, antice declives, apice rotundatae superne, pone parum excisae; lobo inferiori multo minori, acutiore, subtus a corpore libero. Dorsalis *anterior* major incipit in medio corpore, ubi pectorales desinunt & ventrales ordiuntur: *posterior*, caudae propior quam dorsali priori. *P. ventrales* pariter ac pectorales sitae in margine corporis, sed quadruplo minores; ceterum ejusdem figurae, nisi quod lobus posticus a corpore liber, longior, exteriore margine parum excisus. *P. Caudae* fere convenit figura cum dorsali; pone excisa, lobo superiori altiore, longiore, angustiore.

Aculei paulo post foramina nuchae: nam simul cum pinnis pect. incipit in medio dorso series recta aculeorum continuata, prope ad primam pinnam dorsii. Parum post hanc seriem, incipit ab utroque ejus latere alius ordo aculeorum minorum, divergens, incurvus, desinens circa medium pinnarum pect. in medio interruptus. Ab his seriebus lateraliibus pari distantia abest versus pinnam pect. *callus* elatus, seu carinula, duorum triumve aculeorum. Ordo aculeorum unicus est in medio dorso inter pinnae dorsales, incipiens ubi desinit inferior lobus pinnae dorsalis primae: desinens ante dors. secundam; & pone illam nulli aculei.

Locus: *Djiddæ* in mari rubro. Perhibetur, illam alia non frequentare littora quam *Arabiae Hedys*: haud vero ad *Sués* vel *Móchham* videri; quod vix crediderim, quum mihi *Lohajæ* obveniebat. Arabis *Rget* رقت. *LOHAJÆ Bokhát.* بقط. Aliis *Ærób.* عراب. Edulis, sapidior Squalo: Jecoris idem usus. Pelagum magis frequentat.

18. RAJA HALAVI. Arab. حلوي

Rhinobatus halawi Rüpp.

DESCR. Caractere cum *Linn.* RHINOBAT. apprime convenit, qui tamen notis nimis generalibus se diffundit.

Præcedenti Djiddenfi adeo similis; ut sequentibus signis ab illa dividenda sit: congruit figura corporis, capitis, oculorum, narium, oris, foraminum ocularium & branchialium atque colore sub corpore. *Differrentia* est: a) *color* superne cinereus, flavescens: pinnae pallide-flavae. b) *Margo* prominens, evidens, integerrimus, incipiens eadem regione

cum pinna dorf. prima. c) *Corpus* superius scabrum tuberculis, qui versus medium dorsum elatiores atque ad anteriorem oculorum marginem, ubi aculeorum fere sistunt formam. d) *Aculei* dorsali serie fere unica eunt, incipiente post oculos, desinente ante pinnam dorf. primam: post illam aculei non, sed tubercula majora. Ab initio hujus seriei utrinque exstat callus lateralis, elatus, aculeis aliquot armatus. e) *Pinnæ pect.* non triangulares, sed extus rotundatæ, semicordatæ, & simul cum capite figuram cordatam ferentes. f) *P. ventr.* incipiunt ante apicem posticum pectoralium, semi-ovatæ: lateri interiori (in nostra & unica quam vidi) in singula pinna ventr. junctus erat *appendix* linearis, compressus, subcartilagineus, a pinnæ apice liber: superne sulco longitudinali ad latus exterius: juxta apicem utroque latere perforatus: pinna sesquialongior. Relatum mihi est, hos appendices in foemellis non adesse, sed genitalia marium esse; quod mirum mihi videtur, ignaro hujus structuræ in aliis Rajis. g) *P. dorsalis prima* post apicem appendicum sita, in $\frac{2}{3}$ parte corporis, triangularis, pone vix exisā, nequaquam biloba. h) *P. d. secunda* loco medio inter priorem & caudam; paulo major dorf. anteriore; ejusdem vero figuræ. i) *P. caudæ* illam ambit, tamen nonnisi ovata, obliquo margine pone, non bilobo.

Locus: *Djiddæ*.

Obs. *Ova Raja vulg.* nigra, vesicaria, utroque apice bicornia: Græcis *Phycæ dæsdæv*. In Febri intermittente pro medicina domestica adhibentur: carbonibus candentibus imposita, ægro, paroxysmo instante fumum obvelato capite ore naribusque hauriente. Geminato tentamine febrem cessare, affirmabant mihi Constantinopoli piscatores Græci.

SQUALUS.

19. SQUALUS CARCHARIAS. Arab. *Gerfch* vel *Kerfch*. قرش

Obs. *Djiddæ* duæ Species simillimæ; his tantum notis invicem distinguendæ.

Minor: dentibus microscopio inspectis, latere ferratis: *dorso* non admodum gibbo: *pinnis* omnibus apice nigris, quem colorem maturiore ætate amittere dicunt Arabes: *pinna dorf.* quadruplo minore anteriori & dimidio angustiore pone. Arab. *Alka* & *Æs*. *Major*: *pinnis dorf.* immaculatis, ani tantum & caudæ margine inferiori fusciscentibus: *pinna dorf. posteriore* subæquali priori & pone paulo latiore. *Lohajæ* parvus vocatur *Æs*: عوس maturus *Zyfa*. زفا. *Carchariæ* caro sapida; excepto *Fecore*; quod si nigri coloris, est piscis macer, si albi, est pinguis. Venditur nomine *Sife*; optimum medicamen Siphyliticis. *Masfafa*, ماسفا

SYSTEMA LACERTARUM.

1. MONODACTYLÆ.

43. *Syst. Nat.* ANGUINA.

2. TRIDACTYLÆ.

42. CHALCIDES. Ventre repens.

3. TETRADACTYLÆ.

25. VULGARIS, cauda tereti.

26. AQUATICA, cauda compressa, integra.

8. PALUSTRIS, cauda ensiformi, supra crenata.

20. SALAMANDRA, porosa.

41. LINEATA? lineis 4. flavis.

4. PENTADACTYLÆ.

5. ANOMALÆ.

19. CHAMELEON: digitis 2. & 3. coadunatis.

6. PALMATÆ.

1. CROCODILUS, triangulatus, plantis tetradact.

2. CAUDIVERBERA, cauda plana.

7. MUTICÆ: absque unguibus.

22. STINCUS, ped. marginatis.

21. GECKO, ped. subtus lamellatis.

11. MAURITANICA, cauda verricillata.

8. PLICATÆ, lateribus.

17. SEPS: futura reflexa.

36. TEQUIXIN: futura undulata.

9. CRISTATÆ.

27. BASILISCUS: dorso pinnato.

28. IGUANA: dorso & gula.

3. SUPERCILIOSA: dorso & supercil.

4. SCUTATA: dorso & occipite.

29. CALOTES: humeris & occipite.

30. AGAMA: collo & occipite.

31. UMBRA: nucha.

6. PRINCIPALIS: gula cristata integra.

33. MARMORATA, gula carina ferrata.

34. BULLARIS: gula vesicularis.

35. STRUMOSA, jugulo prominente.

10. LINEATÆ.

38. PUNCTATA: lineis 2.

16. ALGIRA: lin. 4.

41. LINEATA: lin. 4.

40. FASCIATA: lin. 5.

39. LEMNISCATA, lin. 8.

11. - - -

9. CORDYLUS: cauda dentibus dentatis, corpore lævi.

10. STELLIO: cauda dentibus dentatis, corpore muricato.

12. AZUREA: c. dent. mucronatis.

14. AMEIVA: cauda dent. lineari-bus: plica gulari.

15. AGILIS: cauda dent. lin. plica gul. monili.

7. BICARINATA: cauda bicarinata.

18. ANGULATA: cauda sexangulata.

23. 24. ORBICULATA: ventricosa.

37. AURATA, lateribus fuscis.

5. MONITOR, fasciis moniliformib.

13. TURCICA, verrucosa.

PISCES.

MURÆNA.

Calophis guttatus Agass.

1. MURÆNA GUTTATA: *glauca, guttis nigris; macula majori utrinque prope caput.*

DESCR. Nonnisi parvulam vidi. *Iris aurea.* Callus elatus inter oculos. *Labium superius brevius.* *Pinna dorfi & ani cum basi pinnae caudæ connexa.*

RAD. B. 6. D. $\frac{1}{3}$. P. 9? V. o. A. 36. C. 10.

DJIDDE. Arab. *Sjæaka.*

Longer cinereus Risso

Muraenesox cinereus Gmel.

2. MURÆNA TOTA CINEREA. Arab. *Sjæga* vel *Schæga* سفاح, nomen commune toti huic generi.

DESCR. *Membr. branch.* ossibus utrinque 20. evidentibus, & uno in medio. *Aperturæ* duæ pone branch. juxta pinnas pect. *Pectorales* lanceolatae, obtusæ: radiis fere 18. *Pinna dorfi* caudæ & ani in unam ambientem coalitæ. *Maxilla superior* longior, præter dentes maxillares, instructa intus osse longitudinali, dentibus validis, erectis, compressis, retrorsum longioribus & remotioribus; postici trilobi. *Linea lateralis* primum supra medium corpus, dein sensim infra medium. *Anus* ante medium corpus. *Color* totius cinereus: venter albidior: margo pinnas ambiens niger.

DJIDDE. An *Myrus* Linn.? Ab Artedio imperfecte describitur. Species an Varietates: *Alba: rubra: flava.* Frequens ad littora saxosa & brevita. Caput veneno suspectum habetur; quod semper avellitur, si piscis mensæ destinatur.

GADUS.

3. GADUS an BLENNIUS? An potius novus, nomine SALARIÆ: *dorso monopterygio, cirrhis nullis.*

Bleennius barilescus Cuv.

DESCR. Parvus, spithamalis. *Caput* valde declive: vertice carinatum. *Corpus* nebuloso-variegatum. *Pinna dorfi* a capite ad P. caudæ. *P. ani* ab ano ad P. caudæ. *Linea lat.* obsoleta; supra dimidium corporis. *Maxillæ* velut ciliatæ *dentibus*; utrinque *canino* majori, in inferiore maxilla longe majori. *Cauda* integra.

RADI B. 6. D. 36. P. 14. V. 2. A. 26. C. 13.

ALEXANDRIÆ & in Archipelago. Græcis hodiernis Σαλαρίαι. Σαλα-
κίδες. Alexandrinis Garmuth vel Garamit quo nomine Káhiri
Silurum anguillarem appellant.

BLENNIUS.

4. BLENNIUS GATTORUGINE: *dorsi pinna unica cum pinna caudæ connata; capite obtusissimo, cirrhis tribus supra utrumque oculum, & utrinque senis in postico vertice.* *Salaria fasciatus* G.

DESCR. Singularis prorsus faciei; lanceolatus. Caput leonis; antice perpendiculare, rotundatum. Labia latissima, obtusissima; inferius labium, brevius. Dentes in utraque maxilla unius seriei numerosissimi, filiformes, flexiles, conferti. Oculi parum remoti, admodum protuberantes, iride glauca, radiis 9. rubris. Latera capitis parallela, glauca, guttis cæruleis sparsis. Gula lituris transversis & media longitudinali cæruleis. Membr. branch. recta juncta. Vertex convexus; pone duplici fasciculo cirrhorum brevium seniorum, albidorum, fusco-fasciatorum. P. Dorsi a capite incipiens: pone membrana connexa cum ipsa basi pinnae caudæ. P. caudæ æqualis. In omnibus pinnis præter dorsalem radii membranam superant. P. ani, ab ano incipiens terminatur paulo ante caudæ apicem; radiis sensim decrescentibus. Color piscis glaucus; dorso anteriore nigro punctato. Anus ante medium corpus. Abdomen post anum albidum maculatum. Squamæ prorsus nullæ. Radii dorsales primi 12. membrana breviores & apice molli terminatis; sed sub apice rigidiores, pungentes. Cirrhi palmati nuclæ & superciliorum: & ante utrumque oculum cirrus brevis, bipartitus. Dorsum posterius cæruleo-guttatum.

RAD. B. 5. D. $\frac{12}{30}$. P. 14. V. 2. A. 19. C. 13. Admodum parvus; dimidium spirith. Ideo non capitur. Cuniculos in coeno inhabitat: unde matutino tempore solet egredi, in porta apricans. Simul cum illo eandem domum occupat Vermis Arab. dictus Abu kobkab أبو كوكاب capite variegato; etiam edulis, si decorticetur. Ille servi instar, domum verrit capite, dum Blennius otiosus sedet spectator.

Arab. Koschar eddjîn. كشرالجن i. e. Scizæna diaboli. Dactylis adhuc immaturis ludit.

GOBIUS.

5. GOBIUS. ANGUILLARIS: *cute mollissima, squamulis adnatis: pinnis dorsi primis, radiis 5; posterioribus eminentibus, filiformibus.*

Paragobius arabicus Ble.
DESCR.

DESCR. Longitudine digiti minimi, sed angustior multo: ajunt hanc ejus staturam esse adultam. Color fusco-virescens, maculis rubro-violaceis plurimis, sparsis, saepe in nebulas confluentibus: punctis caruleo-nitidis in capite & corpore. Squamæ minutæ; adnatæ tam arcte, ut cutis mollis ac nuda sentiatur. P. caudæ cuneata. P. omnes maculatæ. In p. dorsali prima, radii 5 posteriores filo rubro membranæ duplo longiores.

RAD. B. 4. D. 6. 14. P. 16. V. 12. A. 13. C. 17.

DJIDDÆ. Arab. idem nomen cum Blennio.

6. GOBIUS NEBULOSUS: *squamis asperis, fusco-nebulosis: pinnae dorsalis primæ radio secundo filo longo nigro.*

DESCR. Magnitudo tripollicaris: latitudo digiti. Color albidus, maculis fuscis in nebulas confluentibus in capite, dorso, lateribus: abdomen album, immaculatum. P. pectorales glaucæ; basi maculis obsoletis, fuscis. Ventrals fulcescentes. Dorsales & Caudæ hyalinæ, guttis plurimis, fuscis. P. ani hyalina, margine exteriore nigro. P. Caudæ rotundata. P. dorsalis primæ radius secundus terminatus filo nigro, setiformi, duplo longiori membrana pinnae. Oculorum iris alba; pupilla cærulescens. Squamæ sat magnæ, rhombeæ, rigidæ; cutem asperam reddentes.

RAD. B. 7. D. 6. 11. P. 18. V. 12. A. 11. C. 14.

DJIDDÆ. Arab. Hout eddjinn. حوت الجن

COTTUS.

7. COTTUS MASSILIENSIS, *capite polyacantho, pinnis dorsalibus coadunatis.*

OBS. Ambigua Species: an *Scorpena scropha*? Cottum Cataphractum Artedius describit pinnis dorf. coadunatis, Linn. vero liberis. Cottus Scorpius capite polyacantho, sed pinna dorsali posteriori mutica; & cum nostro non congruit. Si aliquando obveniret Cottus massiliensis pinnis dorf. separatis; character petendus, a primo radio pungente pinnae dorsalis posterioris.

Differentia ab Art. Cotto Scorpio: a) locus inter oculos non elatus, sed cavus, p. 86. b) Sp. 8. pinnae pectoralis officula non simplicia, sed quadam apice bifida; officula 2---6 a dorso. c) ib. pinnarum ventr. radii non 4; sed $\frac{7}{6}$ sunt; & primus non adeo arcte adhærens sequenti, ut pungere nequeat, sed remotus & acutus. d) ib. pinnae ani radii non 11 vel 12; sed $\frac{3}{5}$. e) ib. 9. pinnae dorf. non 2 sibi fere contiguæ; sed unica continua, quamvis medio paulo depressior. f) Pinna dorf. posterior mere mollibus radiis non constat; sed ubi altitudine membranæ alterius pinnae initium indigitatur, ibi radius pungens. g) Pinnae dorf. radii in nostro $\frac{12}{13}$. Spinosi a primo (a capite) ad tertium gradatim longiores; a 3 ad 11 inclus. gradatim minores: omnes hi membrana longiores. Ultimus, seu 12. radius spi-

spinofus antecedenti dimidio longior, vix superans membranam pinnae. Sequentium radiorum mollium septem longiores plus duplo membrana pinnae, bifidi; reliqui minores, toti connexi.

RAD. B. 6. P. 17. V. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{12}{2}$. A. $\frac{3}{2}$. C. 12. Gall. *Rasfasse*.

8. COTTUS ROGAD; INSIDIATOR.

Platycephalus insidiator Bl.

DESCR. *Corpus* adeo depressum, attenuatum versus caudam, superne griseum; punctis maculisque fuscis, subtus album. *P. C.* alba, macula media flava, bifida, maculisque duabus inaequalibus atris, linearibus obliquis. *Vertex* lineis elatis, acutis scaber. Ad capitis latera utrinque spina duplex. *P. Ventrals* post pectorales sitae: basis earum ad basin pectoralium intus extenditur.

OBS. In arenosis habitat, arenam ingrediens, ubi piscibus insidias struit. Homines aquam ingressi, pedibus eum proculcantes, latebris expellunt.

RAD. B. 8. D. $\frac{1}{1}$ $\frac{7}{7}$ $\frac{0}{13}$. P. 19. V. $\frac{1}{6}$. A. 14. C. 15. Long. ulnar. $1\frac{1}{2}$
Arab. *Râgede*. *Rogad* vel *Raked*, رقاد

SCARUS.

SCARUS novum genus antiquo nomine Σκάρος. CHARACTER

GENERICUS: *Dentium loco maxillae ipsae eminentes, margine dentato-crenatae, ossæ.*

9. SCARUS SIGANUS; RIVULATUS; *maxillis continuis, complanatis, margine serrato-denticulatis: denticulis approximatis, filiformibus; a medio labio paulatim decreascentibus.*

Thunnus ligane Gk.

DESCR. *Branch.* radiis 5. *Opercula* integerrima. *Spinæ* dorsales & ani in fossula recumbunt. *P. ventrals* radio primo & ultimo spinoso, fortiore. *P. ani* radii spinosi. *Squamæ* minutissimæ. *Ramenta* post spinas dorsales exilia ad apicem. Cærulescens, maculis nigris, rivulis flavis longitudinalibus. *Spina* ante pinnam D. *Cauda* bifida. *Radii Ventr.* primus & ultimus pungentes. Radios spinosos venenum ferre putant; quia locus vulneratus, inflammatur cum tumore & ardore; post aliquot horas cessante. Piscis edulis; sed nescio quam incallescendi vim ei adscribunt. Viætitat herbis, imprimis *Zostera*. Adipe carbonibus ignitis liquefacto, ungunt genua, gonagra laborantes. Piscis *Lo-hajæ* $\frac{1}{2}$. uln. longus; *Basæ* fere ulnæ.

RAD. B. 5. D. $\frac{13}{23}$. P. 15. V. $\frac{1-1}{14}$. A. $\frac{7}{16}$. C. 17.

Arab. *Djezavi*.

D

OBS.

Obs. Videtur genus proprium una cum sequente constituere; quum habitus prorsus proprius. Nomen *Sigani* defunctum ex Arab. *Sidjan*. vel *Sigian*. سجان

10. SCARUS STELLATUS; ovalis; fasciis annulis cæruleo-pallidis, subhexagonis, undique contiguis.

Leuthis stellatus Gthr

DESCR. Labia æqualia; superius non protractile. Nares utrinque duplices remotæ, parvæ, rotundæ, æquales. Oculi aliquantum remoti; iride flava. Vertex planiusculus, carinis 2 longitudinalibus, obtusis, antrorsum convergentibus. Opercula squamata, integerrima, pone striata. Dorsum & abdomen curva. P. pectorales obtusæ, flavicantes. Spinæ dorsales & ani recumbunt in fossula: sed ipsi margini fossulæ radii alternatim sunt inserti. Spinæ dorsales parvis ramentis pone ad apicem. Caudæ pinna biloba, lobis obtusis. P. dorsi & ani pone obtusa. P. ventralium radius primus & ultimus validiores, spinosi, æquales; radiis interioribus basi approximatis. Anus pinnis ventralibus reconditus, & ad limitem earum membranæ situs. Linea lat. non conspicua. Cauda apice latior. Spinæ ani subæquales, prima minor. Ante pinnam dorsi spina antrorsum versa, sub cute recondita. P. pect. flavæ; reliquæ nigrae. Dorsalis & ani pone flavæ. Interdum in P. Caudæ liture flavæ laterales. Color corporis nigricans, annulis hexagonis parvis, undique contiguis, ubique adspersis; interdum albidis maculis seu guttis hexagonis nigris vel flavicantibus. Squamæ rotundæ; parvulæ.

DJIDDE. Arab. *Ghazjthan*. غيثان

Rad. B. 5. D. $\frac{1}{24}$ P. 16. V. $\frac{1}{5}$ A. $\frac{7}{17}$ C. 17. Longit. $\frac{1}{2}$ uln. Inter Corallia parciore; herbis victitans. Corbe venatur, non hamo.

11. SCARUS GALLUS; obscure-viridis, capitis abdominisque lineis violaceis, pinna caudæ bifurca; medio flava. An *Labrus lunaris* Linn?

Julis lunaris C

DESCR. Dentes subulati contigui, unius seriei: medii majores, remoti. Labium superius protractile: inferius ei æquale, subtus utroque latere uniplicatum. Oculi remoti: iride viridi; rubri ad marginem pupillæ. Squamæ laxæ, striatæ, margine membranaceæ: singulæ fascia transversa, purpurea. P. pectorales ovatæ, obtusæ, cæruleæ, medio violaceæ. Ventrals cæruleæ: linea longitudinali purpurea inter radium secundum & tertium ab exteriori margine numerando: radius secundus longo filo terminatur. P. dorsi & ani lineares, basi violaceæ; margine exteriori cæruleo, extus viridi. P. caudæ bifurca, medio flava, versus latera violacea, margine cærulea. Linea lat. subramosa; a capite recta, dorso propinqua; sed versus finem pinnæ dorsi præceps; & dein recta pergens

gens per medium caudæ. *Color* obscure-viridis. In capite lineæ varix purpureo-violaceæ; in latere & vertice longitudinales, sub labio inferiore binæ transversæ. Abdominis vittæ longitudinales duæ, violaceæ, media viridi a capite ad pinnas Vent. deinde ad p. ani cærulea: per totum corpus lineæ transversæ violaceæ tot, quot series squamarum. Venenatissimum ferunt, vel leviter tactum.

LOHAJÆ. Arab. *Dik el bâhr* vel *Mogharred*.

RAD. B. 5. D. $\frac{8}{22}$. P. 14. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{14-15}$. C. 15.

12. SCARUS PURPUREUS; *obscure-viridis; vittis utrinque tribus purpureis: ventre cæruleo; pinnis dorfi & ani linea purpurea: caudæ medio truncata.* *Fili purpurea* *Kup*

DESCR. Pulcher: lanceolato-truncatus: affinis Mullis ob squamas laxas & lineam lateralem ramosam; magis convenit cum Labro. (34.) *Dentes* validi, conico subulati, unius seriei; duo medii in utraque maxilla multo fortiores; remoti. *Labia* obtusissima, æqualia: superius protractile. *Vertex* convexus, nudus, fuscus: ante oculos triangulo utrinque purpureo: in vertice ambo connati. *Opercula* nuda, integerrima, obscure-viridia: macula quadrata, purpurea, emittente ad oculum ramum unum & subtus ramos tres curvos, ejusdem coloris. *Margo* posticus operculi posterioris purpureus, qui vitta continuatur supra basin pinnae pect. *Vittæ laterales* purpureæ, tres rectæ: infima paulo post pinnam pectoralem abrupta angulo descendente: dein continua ad apicem caudæ; ac dentata. *Vitta media* latior in medio corpore, infra æqualis: supra ferrato-dentata. *Suprema* prope dorsum latissima, obscurior, utrinque dentata. *P. pectorales* virides, pone lunatæ: ad apicem macula magna lunari, marginali, nigra. *P. dorfi & ani* basi vix squamis sepra: versus basin vitta longitudinali purpurea, subrepanda: radiis spinosis, membrana brevioribus: pone valde ramentaceis, ramentis in suprema membrana hærentibus. Cæterum *P. dorfi* obscure-viridis & latera corporis: *P. ani* cærulea & gula atque abdomen. *P. ventrales* totæ cæruleæ: interjecta membrana brevi, ovata. *M. Branch.* sub ipsa basi capitis connexæ & operculi angulis latis, rotundatis, sub gula se imbricantibus, obtectæ. *P. Caudæ* viridis, maculis aliquot purpureis longitudinalibus in medio & ad utrumque latus, vitta longitudinali purpurea, juxta marginem: Medio truncata; vel si expanditur pinna, rotundata: utroque margine apex longior prominet; dorsalis vero longior & acutior ac magis curvatus inferiore. *Linea lat.* ramosa; supra dimidium corpus: primum recta & dorso parallela: dein ante finem *P. dorsalis* præceps; ac postea recta transiens per mediam caudam. *Squamæ* laxæ, latæ, rhombeæ, striatæ.

Oculi parvi, remoti: iride purpurea. *Nares* oblique supra oculos; transversæ, oblongæ: ante illas *foramen* rotundum, parvum, cum conulo carneo in medio, cirrhi instar.

DJIDDÆ. Arab. *Dhrrat el bâhr*. *درة البحر* i. e. *Pfittacus maris*.

RAD. B. 5. D. $\frac{8}{22}$. P. 15. V. $\frac{9}{8}$. A. $\frac{2}{14}$. C. 12. longit. $\frac{3}{4}$ uln. inter corallia frequens: lapidus.

13. SCARUS GHOBAN; *cauda æquali, maxillis albidis; lituris capitis & pinnarum margine exteriori viridi-caruleis.*

DESCR. *Maxillæ* Tetraodontis, crenulatæ, albidæ; caninis nullis. *Labia* margine flavescentia; basi viridi-carulea. *Lineolæ* capitis viridi-caruleæ, supra & infra oculos: pone oculos in medio una brevis: una transversa; alia ad marginem posticum operculi anterioris: trans verticem alia obscura. *P. pect.* obfusæ, hyalinæ, margine superiori basi tantum caruleæ. *P. reliquæ* violaceo-rubentes; margine exteriori viridi-caruleæ: p. dorsi & ani ad basin vitta longitudinali ejusdem coloris. *P. caudæ* truncata; pone virescens. Corporis color albidus: sed squamæ singulæ in medio fasciola una carulescente, transversa & alia ad basin fusca: striis denique fuscis, tenuibus, longitudinalibus: unde piscis facies maculosa. *Abdomen* dorso magis curvum. *Linea lat.* ramulosa, duplex: prima dorso propinqua, juxta caput ascendens; dein subrecta; demum, ubi finitur pinna dorsi, descendens. Altera incipit ante prioris finem, itque recta per mediam caudam.

RAD. B. 4. D. $\frac{9}{19}$. P. 14. V. $\frac{9}{8}$. A. $\frac{9}{12}$. C. 12.

DJIDDÆ. Arab. *Ghobban*.

14. SCARUS NIGER: *ovato-oblongus, nigro-fuscus: labiis rubris: maxillis lituris capitis pinnarumque, exceptis pectoralibus; margine exteriori viridi-caruleis*

DESCR. Scaro (12) multum similis. *Maxillæ* medio fissæ; submobiles, margine acutæ, crenatæ. In superiori *Labio* utrinque canini duo, patentes, albi: labium, margine late rubrum, dein fusco-virens: inferius tenui margine rubrum; postea fascia lata, obscure-viridis, quam sequitur alia obscure-rubra. *Gula* vitta longitudinali, obscure-viridi. Circa *Oculos* pone & versus inferiorem marginem operculi anterioris lineæ fusco-virescentes. *P. pect.* obscure-ferruginæ, basi fuscæ: reliquæ fusco-violaceæ, margine exteriori viridi-caruleæ, ut & postico. *Dorsum* & abdomen æqualiter incurvata. *Cauda* virescens, recte protensa:
pinna

pinna medio truncata: angulis dimidio longioribus, obtusiusculis, lanceolatis. *Linea lat.* ramulosa, duplex, prior dorso propior, sub fine pinnae dorſ. ascendens: altera, per mediam caudam recta.

RAD. B. 5. D. $\frac{9}{20}$. P. 14. V. $\frac{9}{8}$. A. $\frac{9}{12}$. C. 13. Arab. *Chadri*.

15. SCARUS FERRUGINEUS; corpore fusco-ferrugineo: maxillis margineque pinnarum exteriori viridibus: cauda aequali.

DESCR. Corpus ovato-oblongum; fusco-ferrugineum. *Maxillæ* medio bifidæ, margine tenues, crenulatæ; canino nullo submobiles: cæruleo-virides, nudæ. *Pinna pect.* colore corporis: ventrales & ani violascentes: dorſi & caudæ flavescentes. *P. caudæ* basi squamis longis, lanceolatis; complicata, truncata; expansa, rotundata. *Dorsum & Abdomen* æqualiter curvatum. *Cauda* recta protensa. *Linea lat.* duplex, ramosa: prior dorso propinqua a capite ad regionem finis pinnae dorſ. altera per medium corpus: incipiens ubi prior desinit. *Radii* simplices: pinnarum cartilagine tenui, intra membranam terminati.

RAD. B. 5. D. 20. P. 13. V. $\frac{9}{8}$. A. $\frac{9}{12}$. C. 13. Arab. *Abu meles*.

16. SCARUS PSITTACUS: virescens, lineis flavicantibus, pinnarum margine, vitta abdominali, caracteribusque capitis cæruleis.

DESCR. *Maxilla* utraque binis ossibus, in medio separatis, crenulatis: superior utrinque tribus dentibus, patentibus: inferior utroque latere uno. *Carulea* sunt: margo utriusque labii: linea a labio superiori sub oculum producta, curva: linea utrinque transversa in labio inferiore: linea media longitudinalis sub toto capite: linea longitudinalis ad marginem inferiorem operculi. *Opercula* laxè squamata, integerrima. *Pinnae* omnes purpureæ: pectorales tantum superiori margine: reliquæ margine cæuleæ. *Dorsum* abdomine rectius. *Cauda* surgens: pinna cæruleo maculata, medio truncata; utroque angulo marginali productiori. *Squamæ* strinatæ. *Lin. lat.* ramulosa, duplex: prima, rectiuscula, dorso propinqua, terminata sub fine pinnae dorſi: altera sub illa eodem loco incipit in medio corpore & recta incedit per mediam caudam. *P. Caudæ* basi utrinque tribus squamis ovatis, magnis. In pinna dorſi radii primi 9 simplices, sed non rigidi, nec pungentes. *Oculi* parvi, remoti.

RAD. B. 5. D. $\frac{9}{20}$. P. 13. V. $\frac{9}{8}$. A. 11. C. 12.

DJIDDÆ. Arab. *Durrat el barr. ديرة البحر* i. e. *Psittacus terræ*.

Pseudocarrus pyrrho.
Hathus Bli

17. SCARUS HARID: *cauda bifurca, media basi squamis septa.**Pseudoscarnus harid Me*

DESCR. *Maxillæ* eminentes, crenatæ, medio fissæ: crenis interdum in maxilla inferiore pone excrescentibus in dentes subulatos, duos, tenues, latos: in superiore labio utrinque caninum conicum. Labium superius longius. *Vertex* & gula nuda, latera capitis squamata: corporis squamæ magnæ, laxæ *Lin. lat.* ramulosa, recta, duplex: prima, a nucha ad basin pinnæ dorsi; dorso propinqua. Altera incipit in medio latere post anum, abit recta ad medium caudæ, ubi squamæ laxæ pinnam Caudæ sepiunt. *P. dorsi* & *ani* coriaceæ, violascentes. *P. Caudæ* violacea, lunata, medio truncata. *Abdomen* violascens, *P. pect.* flavascentes. *Cirrhii* nulli.

RAD. B. 4. D. $\frac{9}{20}$. P. 15. V. $\frac{9}{8}$. C. 11. A. 13. Arab. *Harid*. حريت18. SCARUS SORDIDUS, *maxillis rubentibus, corpore fusco ferrugineo, pinnis obscurioribus, cauda surgente pinna æquali.*

DESCR. *Maxillæ* Tetraodontis, medio fissæ, submobiles: labiis non testæ: margine tenues, crenatæ: canino nullo: albo rufescentes. *P. pect.* & *caudæ* flavascentes: ventrales violascentes: dorsi fuscae. *Lin. lat.* duæ, rectæ, ramulosæ: eunt eodem modo ut in Scaræ psittaco: (16.): *P. caudæ* complicata truncata; expansa, rotundata. *Corpus* angustum, oblongum, dorso recto, abdomine incurvo, cauda surgente. *Radii* pinnarum simplices, cartilagine tenaci, intra membranam terminati. In pinna dorsi, 9 simplices: in pect. primus: in p. ani tres.

RAD. B. - - D. $\frac{9}{20}$. P. 14. V. $\frac{9}{8}$. A. $\frac{9}{12}$. C. 12. Arab. *Biff*.

MULLUS.

19. MULLUS AURIFLAMMA: *cirrhis duobus albis, vitta utrinque fulva; dorso fusco æneo: caudæ pinna flava, immaculata.**Mullus**Pseudoscarnus auriflamma Me*

DESCR. *Dentes* exigui, numerosi, densi. Capitis latera lituris flavis. *P. dorsi* & *caud.* flavæ; reliquæ albescentes. *Vitta* longitudinalis lata, aurea supra medium corpus utrinque: & infra caudam velut duæ aliæ obsoletæ, flavæ. *Squamæ* margine membranaceæ; rivulis aliquot elatis. *Lin. lat.* ramulosa, dorso propior, continuata ad caudæ apicem: in cauda supra *Lin. lat.* macula parva nigra. De *cirrhis* ambigo: videbantur quasi detronsi in tribus, quos mihi attulerunt piscatores, quamvis illi asseverabant Mulli hanc formam esse constantem.

DJIDDE. Arab. *Ambir*. عنبيرRAD. B. 3. D. $\frac{7}{10}$. P. 17. V. 6. A. $\frac{2}{9}$. C. 15.

20. MULLUS VITTATUS: *cirrhis geminis: corporis vittis utrinque duabus fuscis, tribus flavis: pinna caudæ oblique fuscata.*

Murex vittatus C.

DESCR. *Corpus* lanceolatum, album. *Vittæ* longitudinales utrinque 2 fuscae supra lineam lateralem: in medio latere una fulva: inferius binæ sulphureæ. *Maxillarum* margo, confertim dentatus. Apparet quasi dentes hi parvi insiti essent in utraque maxilla ossibus binis, medio separatis; ut in Tetraodonte. *Cirrhii* sub ore 2, longitudine operculorum. *Linea lat.* ramulosa unica, fere recta; dorso propior. *Squamæ* tenuissime dentatæ; rivulis elevatis, obsoletis. *P. pectorales*, Vent. & Ani albidæ; dorsi & caudæ albæ, lineis nigris, obliquis.

DJIDDE. Arab. *Abu dagn.* ابو دقني i. e. *barbatus*. Florente Dauco sativo ludit.

RAD. B. 3. D. $\frac{7}{10}$.

SPARUS.

21. SPARUS NILOTICUS ab *Hasselquist* descriptus (it. Palæst. p. 341.) est *Labrus Julis*, Linn. ut character indicat; & nomen Gallicum *Girelle* (*Labro Juli* proprium). Neque piscis Niloticus est, Káhirinis & Nili accolis prorsus ignotus; & aquæ dulcis impatiens: raro casu oblatus *Hasselquistio* Káhiræ.

Spari Genus dentibus *incisoriis* longis, acutis, contiguis: *molaribus* mediocribus, graniformibus: *interioribus* intra incisores & molares numerosis, graniformibus, plurium serierum: *interioribus* & *posterioribus* sensim majoribus, totum palatum replentibus. *Opercula* squamata: anteriora angulo radiatim striata: posteriora pone ante membranam acuminata. *Fossula* dorsalis in plurimis.

22. SPARUS SARBA; ovato-oblongus, argenteus: vittis obsoletis plurimis: linea aurea utrinque juxta pinnas ventrales flavas: an *Salpa* Linn.?

Sparus sarba Temm.

DESCR. *Corpus* latum, ovatum: dorsum curvum, semicirculi instar: abdomen rectum. *Dentes* incisores conici, contigui: molares hemisphærici plurimi. *Vertex* nudus, politus, fuscus, convexiusculus. *P. dorsalis* & ani radii spinosi in fossula: reliqui basi utrinque membrana erecta, communi, libera. *Dorsalium* spinæ tertia & quarta utrinque decrescunt sensim. *Vittæ* corporis longitudinales, fuscescentes, obsoletæ; utrinque fere 17, quot series longitud. squamarum: & oriuntur ex striis convergentibus in medio squamarum. *Squamæ* latæ, integerrimæ. *P. dorsi* fusca, basi hyalina. *Cauda* recta, protensa; pinna bifida, glauco-fusca; parte inferiore flava. *P. ventrales* & ani flavæ. *Pect.* lanceo-

Chryseichthys sarba C.

lanceolatae, albidæ, ventralibus sesquialongiores. *L. lat.* dorso propior, sed minus curva, in cauda rectior, ultimo apice surgens. *Opercula* squamata integra.

DJIDDE. Arab. *Arid*: videtur idem esse cum Suénsium *Kofar*, كفر quod nomen non cuique Suénsium, longe minus piscatoribus DJIDDE notum. Vocatur quoque *Sarba*. Loca habitat coenosa, herbida & corallifera. Sapidus: hamo & rete capitur.

RAD. B. 6. D. $\frac{1}{2}$. P. 15. V. $\frac{1}{8}$. A. $\frac{3}{14}$. C. 17.

23. SPARUS SPINIFER; *spinis dorsalibus recumbentibus, mediis quinque filiformibus, longioribus.*

DESCR. Ovatus, compressus, sesquispithamalis, argenteo-rubens: dorso obscuriore & lineis corporis. *Caput* adeo declive *Labia* obtusissima; inferius brevius: superius protractile. *Dentes* incisores utriusque maxillæ 4, conici, remoti, exteriores majores: molares numerosi, concertii, hemisphærici. *Opercula* squamata, integerrima. *Oculi* remoti: iride pone & ante argentea: supra & subtus aurea. *Vertex* convexus, nudus, punctatus. *Dorsum* pone caput declive; & ab ore ad caudam, semicirculare. *Abdomen* a gula ad pinnam ani rectum. *Fossula* in pinna dorsi & ani pro recondendis radiis spinosis. In *P. dorsi* spinæ duæ primæ brevissimæ: sequentes quinque radii, basi ad tertiam partem compressi, & pone membrana alati & pallido-rubri: dein filiformes, rubri, inermes, ultra reliquos radios eminentes: cum recumbunt pertingentes ad basin primam pinnae dorsi; ordine breviores. Reliqui radii spinosi, inermes, mediocres, subæquales. *P. caudæ* excisa, pallida; margine postico rubra. *Spina* ani tertia apice longior secunda; quæ valida. *L. lat.* dorso propior, curva, nec tamen dorso parallela: in cauda rectior incedit juxta dimidium. *Squamæ* latæ, integerrimæ, striis obsoletis, convergentibus. *Interstitia* radiorum nonnisi in p. ani squamata. *Nares* utrinque duplices: posterior oblongo-lanceolata; exterior rotunda, remotior.

DJIDDE. Arab. *Naddjar*, نجار DAMIATÆ vocatur Qidjadj قجاج vel Didjadj el bâhr, loca inhabitat coenosa, profunda 20 sæpe orgyarum. Hamo capitur: æstimatur ob saporem gratum: rarissime ad littora venit.

RAD. B. 6. D. $\frac{2}{3}$. P. 16. V. $\frac{1}{8}$. A. $\frac{3}{12}$. C. 16.

24. SPARUS BERDA; *cinereo-albidus; squamis lateralibus singulis fascia media, transversa, fusca: spinis dorsalibus recumbentibus.*

DESCR.

Sparus berda Temm =
Chrysops berda Cuv.

DESCR. *Figura* corporis ovalis. *Dorsum* inter caput & pinnam valde gibbum; dein rectum sub parte spinosa pinnæ, demum declive ad caudam. *Abdomen* a capite ad P. A. rectum, dein valde surgens. *Color* cinereo-fuscus. *Squamæ* laterales singulæ fascia transversâ; media fusca. *Fasciæ* dorsales obsoletæ. *Venter* albus. *Pinnæ* omnes fuscæ; pectorales hyalinæ. *Squamæ* latæ, rotundatæ, integræ. *Dentes* incisores utriusque maxillæ quatuor longiores conico-subulati, propinqui; interdum ad utrumque latus aucti dente minore. *Molares* numerosi hemisphærici; posteriores, majores. *Labium sup.* longius, protractile. *Nares* utrinque simplices; prope oculum magnæ, lineares. Ante singulas Cirrhulus conicus. *Oculi* sine scuto: iride alba. *Vertex* nudus, convexus, declivis. *Opercula* squamata, integra, anteriora pone striata. *Spinæ D.* a quarta sensim decrecentes; versus basin alternatim latiores; ita ut, prima, basi sinistra latior sit: secunda, dextra: tertia, sinistra &c. *P. Pect.* lanceolatæ; pertingentes ad initium P. A. *Pinnæ V. D. & A.* pone rotundatæ. *P. C.* parum bifida, lobis obtusis. *Spinæ A.* prima brevis, secunda valida, crassior quam tertia & apice longior. Omnes, ut & dorsales in fossula recumbunt. *Pars inermis P. D. & A.* squamis erectis, supremis lanceolatis. *Cauda* basi latior. *L. later.* dorso propior, juxta caput a dorso deflexa; dein parallela: in cauda recta supra medium.

RAD. B. 6. D. $\frac{12}{3}$. P. 14. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{13}$. C. 16. Longit. $\frac{1}{2}$ uln.

Arab. *Abu Basal* ابو بصل i. e. *Cepa gaudens*: ita nominatus, sine dubio, ob spinas dorsales anteriores basi bulbosas. *Berda* quoque vocatur. *Mare rubrum* inhabitat, locis coenosis; præsertim ad Insulas littore vestitas arbore dicta *Schöura* (nobis *Sceura*: novum Genus); ejus foliis, (deciduis forte) vescitur. Frequens, sapidus: hamo capitur.

25. SPARUS HAFARA.

DESCR. *Facies* Mormyri. *Fasciæ* transversæ nullæ. *Dorsum* curvatum: abdomen rectum. *Cauda* bifida. *Corpus* oblongum; argentei coloris: lineis longitudinalibus obsoletis, fusco-flavescentibus, utrinque 14. *Dentes* incisores in utraque maxilla validi, remoti, obtusi; in faucibus tubercula hemisphærica multa.

Arab. *Haffara*. Frequens, sapidus; hamo & rete capitur; coenosa inhabitat.

RAD. D. $\frac{11}{24}$. P. 15. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{13}$. C. 18. Long. 1. spith.

Sparus haffara Temm.
Chrysichthys haffara G.

LABRUS.

26. LABRUS PERDICA; *cauda æquali; vertice glabro; dorso recto; vittis utrinque dentatis, albido-flavicantibus.*

DESCR. *Dentes* medii maximi. *Caput* dimidio superiore fuscum; inferiore, albo-rufescens. *Opercula* anteriora pone prorsus obrecta cute: *posteriora* inermia; exeuntia in angulum rotundatum, apice cæruleum. Ad basin pinnarum pectoralium *Macula* cærulea. *P. D. & A.* rubicundæ. *P. V.* totæ liberæ. *Radii* pungentes: Dorsales, flexiles. *L. later.* continua; superne ferrato-dentata. *Vitta* alba, dentata per medium latus: alia superior, obsoleta, dentata, obscure-testacea: sub illa, linea flava, lata. *Dorsum* rectum: abdomen curvatum.

Constantinop. Turc. *Keklik balık.* Græc. Πέδινα.

RAD. D. $\frac{8}{21}$. P. 14. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{15}$. C. 14.

27. LABRUS INERMIS; *radiis pinnarum spinosis nullis; corpore lineari, oblongo, virente; vitta laterali nigro-guttata.*

DESCR. *Corpus* valde longum & pedale; tamen nonnisi 2 poll. latum. *Color* viridis. Per medium latus series una longitudinalis guttarum nigrarum. Corporis color supra hanc vittam obscurus; in dorso fuscus. Infra illam, color pallidus, maculis albidis. In capite & gula guttæ & lituræ violacæ. *Squamæ* late ovatæ, integræ; circa caudam majores. *Labium* superius longius, protrahibile. *Dentes* unica serie, ex ipso margine maxillarum enati; versus medium labium sensim majores; duo medii in singula maxilla reliquis validiores & incurvi; cæteri recti. *Opercula* integra; anteriora nuda; posteriora squamata. *P.* omnes virescentes. *P. Pect.* ventralibus longiores, obtusæ. *V. obtusæ.* *P. D.* post basin pect. incipit; pergit linearis; definit non procul a pinna caudæ, quæ rotundata. *Radii spinosi* nulli in pinnis, sed simplices, & versus apicem molliores. Ramenta nulla. *L. later.* simplex, elata, continua; fere recta incipiens ad nucham; desinens in apice caudæ.

Mochhæ. Arab. *Ghassék.* غسك

28. LABRUS RAMENTOSUS; *fusco-virescens; ramentis spinarum dorsalium primarum, radio duplo longioribus.*

DESCR. *Corpus* lanceolatum. *Labia* æqualia; superius protrahibile. *Dentes* unius seriei; maxillæ velut innati; parvi, recti, attenuati, contigui. In medio utriusque maxillæ, extra hunc ordinem dentium, sunt *Incisores* 4, remoti, reliquis dentibus quadruplo majores, subulati, incurvi; ex-

timi

Chelio inermis Rich.

timi majores, curvati. *Nares*, parvæ, remotæ. *Oculi* iride superne & inferne fusca; lateribus flava. Pupilla atra, oblonga, annulo marginali miniato. *Opercula anteriora* pone recta, valde dentata; *posteriora* inermia; utraque squamata. *L. lateralis* elevata, continua, sursum ramulosa, dorso propinqua, parallela; sub fine p. D. præceps descendens; recta per mediam caudam transiens. *Squamæ* magnæ, integræ, rotundatæ; 9 ordinum a ventre ad p. dorsi. Fossula in dorso nulla. *Ramenta spinar.* dorf. longa, decrefcentia ordine a primo radio. In p. A. ramenta spinæ primæ & secundæ propendent, ita ut parte propendente æquent spinæ longitudinem. Spinæ tertiæ ramentum liberum non est; sed margini membranæ inhæret. *Color* totius fusco-virefcens: pinnae magis rubent, lituris violaceis. Sub oculis lituræ violacæ & in vertice.

MOCHLÆ. Rad. B. 5. D. $\frac{2}{11}$. P. 13. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{13}$. C. 12.

28. b) *Varietas* forte erat Piscis huic tota quidem structura simillimus, sed colore magis virente; ramentis spinarum brevibus, & radiis p. dorsi spinosis 10.

29. LABRUS ÖYENA; corpore argenteo; radiis dorsalibus 2--5 subinermibus. *Diapterus oyena* Rü.

DESCR. *Color* argenteus; pinnae glaucæ; angulus dorsalis anterior, margine niger. *Dentes* numerosi, brevissimi. *Labia* æqualia; superius admodum protrahibile; & sponte prolapsa. *Opercula* integra, anteriora squamulata. *Spina* dorf. prima & ani prima perbrevis. Sp. D. 2, longior reliquis, latior vix pungens. 3, 4, 5 sensim decrefcentes: reliquæ rigidiores, decrefcentes. *Spina* ani tertia longior quam secunda. *Ramenta* exilia post spinas dorf. P. C. bipartita, lobis lanceolatis. *L. later.* dorso propior ac fere parallela; in cauda supra medium, & recta. *Dorsum* incurvum: *Abdomen* rectum. Corpus totum oblongum. *Venter* planus. *Nares* ovatæ, simplices. *Cauda* surgens. P. D. & A. membrana erecta, utrinque septa. *Squamæ* latæ, rotundatæ margine; in medio striis elatis, convergentibus.

SUES & DJIDDÆ.

RAD. B. 6. D. $\frac{2}{19}$. P. 15. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{10}$. C. 16. Long. $\frac{5}{24}$ uln.

29. b) Huic maxime affinis alius *Vittis rubris*, interruptis Hic Ar. *Gafa*: قاصد prior Abu Öyena. Ambo arenam litoream non solum frequentant, verum & territæ, eam intrant, inque latus cubantes piscatorias artes eludunt; periculo remoto, iterum profiliunt.

30. LABRUS SCINA; cauda integra; corpore virescente, nebulis albis flavisque; fovea inter oculos impressa; Et ante foveam sulco impresso.

DESCR. Dentes medii maximi. Iris viridis. Caput & Venter subtus colore albo, rivulis flavis. Opercula anteriora pone truncata, ferrulata; posteriora ossè instructa, pone sinuato, inermi. Dorsum curvum. Abdomen a rostro ad anum rectum; quæ peculiaris nota est; a Generica discedens. L. later. in latere interrupta: in cauda continuata. P. Pectorales flavescences, immaculatæ; reliquæ, ut & dorsum, obscure virescentes, maculis cæruleis. Radii Dorsales pungentes, vix flexiles.

RAD. D. $\frac{18}{31}$ P. 14. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{15}$. C. 15.

CONSTANTINOPOLI. Turc. Kichla balık. Gr. Σκίνα.

31. LABRUS LAPINA; cauda integra; pinnis pectoralibus flavis; Ventralibus cæruleis; reliquis violaceis, maculis cæruleis.

DESCR. Corpus ovali-oblongum. Iris cærulea; pupilla nigra, annulo rubro. Rivulus cæruleus sub oculo versus rostrum. Capitis latera maculis rubris. Vertex fuscus, lævis. Lateralia flavo-virescentia; dorsum fuscum; abdomen albicans. Lineæ utrinque 3, singulæ duplici ordine macularum rubrarum: prima prope dorsum: 2 parallela Lineæ later. usque ad caudam; ubi hæc descendit ad lineam tertiam rubram, quæ transiit per medium latus. P. D & A. basi virides. Opercula br. anteriora pone truncata, ferrata; posteriora pone emarginata; ante marginem sine spinis. Ante nares Gibbus utrinque ovalis, obliquus: rostrum non reflexum. Caudæ apex fere circularis. Pulcher piscis.

RAD. D. $\frac{15}{27}$ P. 15. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{15}$. C. 15.

CONSTANTINOPOLI. Turc. Lapina. Gr. Λαπίνα. Arab. Hassun.

32. LABRUS CHANUS; cauda bifida; capite utrinque rivulis tribus cærulescentibus; quadrato cæruleo sub oculo.

DESCR. Color: dorsum fuscum: venter albidus. Sub oculo rectangulum cæruleum. Sub linea lat. dimidium superius fuscum, linea alba; dimidium inferius album, linea gemina, lata, rufescente, & alia inferiore, fordida. P. P. V. A. flavæ; D. & C. maculis rubris adspersæ. Maxilla inferior longior. Inter oculos duæ Lineæ impressæ, longitudinales, pone divergentes. Opercula branchiarum anteriora margine pone ferrata; posteriora pone tridentata, ante marginem. L. later. prope dorsum, sursum incurvata. Cauda leviter forficata.

RAD. D. $\frac{10}{25}$ P. 15. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{10}$. C. 17.

CONSTANTINOPOLI. Turc. Chani. Gr. Χάνι.

33. LABRUS OCELLATUS; *virescens; ocello coccineo pone utrumque oculum. Crenilabrus ocellatus* *Li*

DESCR. Color viridis; non lineatus. Rivuli cærulei per totum caput transeunt. Pone oculos in operculo branch. macula obscure-cærulea, oblonga, obliqua, cincta margine coccineo. Linea coccinea supra & infra hunc ocellum, qui auriculam mentitur. Opercula br. anteriora, pone truncata, ferrulata; infra integra; posteriora, pene inermia. Cauda post P. D. & A. linearis. Linea lat. a dorso distat $\frac{1}{3}$ piscis parte; sub fine P. D. descendit: dein per mediam caudam. Dorsum fusco-flavescens. Corpus sub-ovatum.

RAD. D. $\frac{14}{4}$. P. 11. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{14}$. C. 15. Smirnæ.

34. LABRUS LUNULATUS; *fusco-virescens, fasciis obscurioribus, squamis singulis fascia ferruginea, capite pectoreque rubro-guttato, lunula operculi pone fulva. Cheilinus lunulatus* *R.*

DESCR. Cum Scaro (12.) adeo congruus. Huic Oculi iride fusco-virenti. Nares non conspicuæ. Caput compressiusculum, fusco-viride, gurtis obscure-rubris. Opercula squamis laxis, singulis gutta rubra versus basin. In margine operculi posterioris in membrana, lunula fulva retrospiciens, utrinque obtusa, colore nigro cincta. M. branch. virens, pone juxta caput maculis duabus fulvis. P. D. & A. tota basi squamis erectis utrinque septæ. P. A. utrinque tribus squamis ovatis, maximis, liberis. P. pect. rotundatæ, flavæ: reliquæ virides; interstitiis radorum vel rubris vel rubro-maculatis. Dorsum parum curvum. Abdomen rectum. Inter p. ventr. membrana lanceolata, obtusa, pinna dimidio brevior. Squamæ latæ, integræ, striis excavatis, divergentibus, & versus basin linea transversa obscure-violacea. L. lat. prior incipit a lunula prope caput; terminatur sub fine p. dorsi; dorso parallela: altera, ante prioris finem incipit, tenditque recta per mediam caudam. Cauda rotunda. Spinæ ani gradatim longiores, crassiores.

34. b) Varietas sine lunula fulva: lineis circa oculos radiantibus, rubris, longis.

DJIDDE. Arab. Abu djubbe ابو جوببة! Aliis Samuat abu djubbe. Inter coral-
lia. Hamum non admorder, nisi Strombi carne obvolutum.

RAD. B. 5. D. $\frac{2}{26}$. P. 12. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{12}$. C. 13. Longit. $\frac{1}{2}$ uln.

OBS. Labri notæ generales cum Scaro sæpe contiguæ, noscuntur: DENTES maxil-
lares, validi, conico-subulati, contigui. Imisores mediocres, paulo interius
positi, quam vicinus caninus: qui utrinque unus; reliquis duplo major. Mo-
lares una serie post caninum, acuti, contigui, retrorsum decrecentes. Den-
tes

tes faucium tantum in maxilla superiori & utrinque brevis serie; parvi, conici, acuti, rigidi, incipientes pone incisorem utrinque; contigua ac maxillaribus parallela serie positi, utrinque quaterni. In inferiori maxilla nulli: nisi incisores ipsos numeres. *Pinna br.* radii 5. *Opercula* squamata, squamis laxis, latis. *Ramenta* evidentia post spinas dors. hærentia in margine membranæ. *Radii dors. & ani* spinosi; membrana breviores. *P. D. & A.* basi squamis erectis. *P. Caudæ* basi squamis ovatis, majoribus utrinque. *L. lat.* ramulosa duplex: aliis simplex, continua. Illa optima nota est, atque dors. abdominisque curvatura: ista enim signa facile in oculos incidunt; dum fastidiosi laboris est, incerti quoque eventus radios pinnarum minutissimos legere & relegere. Radii pungentes constantiores sunt & majoris usus in Systemate Piscium.

PERCA.

35. PERCA LOPHAR; argentea; dorso dipterygio; pinnis ventralibus adnatis.

DESCR. Magnitudo & facies Harengi. Dorsum & basis pinnarum pect. fusco virescentes. Inter oculos *sulci* elati, longitudinales; media maxima. *Opercula anter.* latere, non pone ferrata; posteriora prorsus integra. *Radii P. D.* anterioris flexiles, vix pungentes. *P. D.* altera & *P. A.* basi antice valde adiposæ. *Cauda* bifida; apicibus radiorum nigricantibus. *P. V.* non liberæ; sed membrana adfixæ carinæ abdominis, & sic quoque inter se uniuntur. Hinc ad Gobium non bene accedit; qui *P. V.* in unam liberam planam connatas habet.

Rad. D. 7, $\frac{1}{2}$? P. $\frac{1}{10}$? V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{1}{2}$? C. 17.

CONSTANTINOPOLI. Gr. Λοφάρι. Turc. Lofâr balûk.

36. PERCA ROGAA; nigro-rufescens; cauda æquali; pinnis nigris: branchio-
stega & capitis lobis obtectis, obscure-rubris.

DESCR. *Dentes* numerosissimi, setacei, introrsum mobiles. Sape duo fortiores *incisores* in antica parte conico-subulati, remoti. *Labia*, lata, obtusissima; inferius longius; superius protractile. *Nares* utrinque simplices, rotundæ, & ante singulam *Cirrhulus* conicus in cavitate. *Oculi* remotiusculi. Iris extrorsum nigra; dein flava; interius cærulea. *Opercula* obesa, squamata, integerrima: postica ante marginem membranæ tridentata. *Vertex* convexus, inter oculos declivis. *Scapulae* gibbæ ad initium dors. dorsum vero & abdomen recta: pone curva. *Ramenta* brevia post spinas dorsales. *P.* omnes obtusæ: caudæ, truncatæ: ventrales, rotundatæ: (quod rarum in hoc genere). *D. A. C.* pinnae basi carnosæ; interstitia radiorum squamata. *Cauda* surgens; apice latior. *L. lat.* vix notabilis: dorso propior: sub dorso curva: in cauda recta. *Spinæ* ani ordine longiores; media robustior. *Color* totus nigro-rufescens:

Epinephalus rogaa Cuv.

scens: caput maxima parte atque M. branch. & palatum rubro-obscura.
Habitat inter Corallia saxosa Mæandrites: frequens.

DJIDDÆ. Arab. *Rogâa*. رڤع

RAD. B. 7. D. $\frac{2}{28}$. P. 18. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{13}$. C. 14. Long. 3. spith.

37. PERCA LUNARIA; ferrugineo-nigra: pinnis pett. nigris, pone flavis: dor- *Epinephelus*
sali & caudæ pone hyalino-albis.

DESCR. Præcedenti perquam similis, præter colorem & indolem pinnarum;
quarum pett. ferrugineo-flavæ, basi oblique nigræ. Ventr. non pror-
sus rotundatæ, sed obverse triangulares, nigræ, vitta obscure-rubra
juxta marginem exteriorem. P. D. & A. pars inermis vitta rubra
prope exteriorem marginem: margo posticus pinnæ dorfi, albus. P.
C. pone lunula albo-hyalina: pinna truncata, & pone lunulam rufe-
scens. Putant piscatores eam provectiore ætate Lunulam deponere.

DJIDDÆ. Arab. *Bint er robbân*. LOHAJÆ: *Schâhi*. شوحى

RAD. B. 7. D. $\frac{2}{28}$. P. 18. V. dextr. $\frac{1}{5}$. sin. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{13}$. C. 14.

38. PERCA TAUVINA; lineari-oblonga, fusca; guttis ferrugineo-nigris in ca-
pite, & corpore: cauda rotundata.

DESCR. Solito oblongior versus caudam & attenuata versus caput. *Dentes*
maxillares parvi, subulati, unius seriei, remoti, subæquales, rigidi. *Ca-*
ninus in utraque maxilla utrinque unus validior versus medium labii.
Faucium intra maxillares numerosi, majores, feracei, introrsum mobi-
les: in medio labio lacunam versus majores, densiores. Dentes feracei,
breves, multi supra basin linguæ. *Labia* obtusa: inferius longius: su-
perius retusum, protrahibile. *Lacuna* vacua in superiori maxilla. *Nares*
utrinque duplices, remotæ, orbiculatæ: posteriores duplo majores.
Vertex squamatus, declivis, ut & gula; unde Caput cuneatum, ore in
medio obliquo. *Opercula* squamata: anteriora rotundata, pone denticulata,
vix sinuata versus angulum subtrus integerrima, membrana dependente.
Posteriora pone ante membranam trispinosa. *Pinnæ* colore & guttis
ferrugineo-nigris, parum virentibus: margine postico rotundato-albe-
scente. *Pett.* & *V.* fere pari longitudine. *Spina* A. secunda crassior,
longior; sed apice brevior tertia. *Dorsum* & *Abd.* modice curva.
Cauda surgens. *L. lat.* dorso propior & parallela; in caudæ initio
fracta & supra medium. *Guttæ* corporis magnæ, sparsæ, ferrugineo-
nigræ. *Squamæ* parvæ, denticulatæ.

DJIDDÆ.

DJIDDÆ. Arab. *Tauwina*, توينة inter corallia, rarior. Minus grati saporis.

RAD. B. 7. D. $\frac{11}{26}$. P. 17. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{12}$. C. 17. Long. $\frac{3}{4}$ uln.

39. PERCA FASCIATA: *rubra, fasciis transversis, latis, albidis, sub-quaternis.*

DESCR. Corpus sæpe ultra mensuram ulnæ excrescit. Color ruber, maculis fasciisque latis, pallidioribus. Caput magnum, tertiæ partis corporis. Labia rotundata, obtusa, æqualia. Dentes setaceo-subulati; in inferiori maxilla unius ordinis; in superiori multorum. In medio utriusque maxillæ bini Dentes conici, remoti, fortiores reliquis. Oculi magni, propinqui: iris rufo-virescens: pupilla nigra, ovata. Nares utrinque binæ: vel forte anterior cirrhus nariformis. Inter Oculos sulci duo longitudinales, pone juncti. Opercula anteriora obesa, squamis minimis, pone leviter dentata: posteriora pone in acumen deducta: ante quod, duæ Spinæ, superiore majore. P. Pect. breviter pedicellatæ; fossula pone sub basi Cauda integra. Sp. dors. rectifimæ, cum ramento brevi pone ad apicem. P. A. & D. pars inermis margine flavicans: pars armata pinnae D. ad apicem singulæ spinæ triangulo nigro. L. lat. dorso propior. Squamæ parvæ. R. pect. A & D. inermes, bifidi: Ventr. ramosi. P. pect. membrana fere connexæ. P. A. radius secundus spinosus, valde robustus.

In Mari rubro ad promontorium Mohammed hamo capta.

RAD. B. 7. D. $\frac{11}{28}$. P. 17. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{12}$. C. 17

Radiis branch. septem accedit ad genus Percæ: sed abit ramentis dorsalibus & operculis parum ferratis?

40. PERCA LOUTI; *oblongo-lanceolata: miniata: guttis pallide-violaceis: cauda bifalcata: pinnarum omnium margine postico flavo.*

DESCR. Color miniato-ruber, guttis violaceis sparxis. Abdomen pallidum, subtus immaculatum. Squamæ parvæ, striatæ, rotundatæ, integræ. Dentes setacei, flexiles, densi: quidam validiores, remoti, conico-subulati. Labia obtusa: inferius longius: superius protractile. Nares utrinque simplices, rotundæ: ante eas utrinque Cirrhus conicus in cavitate. Oculi iridē miniata. Opercula obesa, squamulata; anteriora integerrima; parum pone sinuata pro lobo & operculo posteriori: posteriora pone, supra membranam & ante ejus marginem trispinosa. Vertex nudus, convexus. L. lat. dorso propior, non parallela: surgens in medio dorso: inde descendens: in cauda subrecta: in apice parum

Epinephelus fasciatus Bl.

Varicla louti Bl.

parum recurva. Cauda surgens, linearis. P. D. A. & C. basi carnosæ; interstitiis radiorum squamatis; guttis pallide-violaceis confusæ; angulo postico acuminato, falcato. P. pett. ovatæ, rotundatæ: Vent. angulo falcato: utræque sine guttis violaceis. Omnes pinnae margine postico late flavo, in caudæ extremo flavedo terminata lunula. Sp. ani ordine majores & longiores.

DJIDDÆ. Arab. *Louti*. لوتي LOHAJÆ: *Schân*. nigrior Djiddensi. Inter corallia profunde habitat. Hamo vel rete capitur. Longit. 1. uln.

RAD. B. 7. D. $\frac{9}{24}$. P. 17. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{12}$. C. 15. Quia ramenta post spinas dors. nulla; Chætodontem hanc Percam dixerim & propter dentes: sed Branchiostega multiradiata. Præcedenti (39) similis.

41. PERCA MINIATA; coccineo-rubra, guttis cæruleis undique adspersa: cauda rotundata.

Epinephelus ruber
atun Klls

DESCR. Labia latissima, obtusa, cæruleo-guttata: inferius, longius: superius, protractile. Nares simplices, rotundæ, & ante singulam Cirrhus conicus in cavitate. Oculi iride extrorsum rubra: interius flava. Opercula obesa: anteriora integerrima; pone modice ferrata pro ingrediente callo posteriorum, quæ ante marginem membranæ trispinosa. Vertici ante oculos litera V. inscripta. L. lat. ut in præcedente. Dorsum & abdomen recta; pone curvata. Post Spinæ dors. ramenta brevissima, libera. Sp. ani secunda, apice tertiæ æqualis; sed validior & longior. P. omnes pone rotundatæ, præter Ventræles, quæ acutæ, margine antico cæruleæ, contiguæ. Basis P. D. A. C. carnosæ, squamata. Squamæ parvæ, striatæ, rotundatæ. Dentes setacci, flexiles: quibusdam caninis validis, conico-subulatis, in utraque maxilla binis.

DJIDDÆ. Arab. *Zarbûn*. زربون LOHAJÆ *Ataja*. عطاية vel *Bur-di*; بردى

RAD. B. 7. D. $\frac{9}{24}$. P. 17. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{12}$. C. 15. Longit. $\frac{1}{2}$ uln. Inter Corallia versatur. Fluctuat hæc inter Percam, & Chætodontem, cujus dentes gerit: a Labro spinam D. & radios Br. mutuatur.

41. b) Varietas: colore fusco: ocellis cæruleis: P. A. margine postico alba, & P. D. partis inermis margine superiore. Arab. *Balâh*: vel *Abu belâh*. ابو بلح

Epinephelus guttatus
tun Klls

41. c) Exstantior est varietas: *rubra, guttis caeruleis*. Arab. *Nadjil* vel *Nâgen*. Capta ad Promont. *Djymûm* ante *Jamboam*. Longit. 3. uln. frequens: sapida: hamo, non rete capitur. Vivit inter Corallia profunda: vescitur piscibus.

DESCR. In inferiori maxilla *Dentes* æquales: in superiori versus medium longiores & coacervati in duos fasciculos remotos. *Ocelli* vel guttæ caerulei, margine fusco: per totum corpus perspersi.

42. PERCA SUMMANA; *cauda rotundata: corpore cinereo-fusco, guttis albis undique adperso*.

Epinephelus summanus

DESCR. *Dentes* ut in prioribus: *Labia, Nares, Opercula* præcedentis. Sub Oculo utroque macula oblonga, obliqua, nigra. *P. omnes* fuscae, guttis albis. *Caput* fuscum, vix guttatum. *Oculi* iride fusca. Nec fossula, nec ramenta. *Cauda* brevis, parum surgens; supra macula nigra.

RAD. D. $\frac{11}{28}$. cæterum simillima (P. 40.) & (41.).

Arab. *Summân* vel *Symman*.

42. b) Ab hac parum diversa *Varietas: Fusco-GUTTATA*. Corpus caerule-scens *Dentes* multi, setacei. Macula nigra in dorso caudæ. Guttæ circulares fusco-ferrugineæ. Caput, maxillæ & M. Br. pariter guttatæ. *Oculi* remotiusculi. Vertex inter oculos planus, subcavus. Squamæ parvæ, vix dentatæ. Cauda altior.

Epinephelus fusco-guttatus Bl.

RAD. P. 18. C. 18.

Arab. Suesens. *Kassjara*. DJIDDE *Koschar*. An eadem cum Arab. *Kesjr* & Linn *Perca nilot*? Gr. $\Lambda\alpha\beta\gamma\alpha\zeta$: quæ certius *Sciæna* est; quia pinna dorfi prima tota in fossa reconditur: & radii Dorfi. 7? Cauda linearis, ascendens: pinna ani albida, apice fusca.

42. c) PERCA AREOLATA; *corpore cinereo, albido; guttis fusco-flavescentibus*.

Epinephelus areolatus Bl.

A superioribus varietate tantum diversa. Rad. D. $\frac{11}{29}$. P. 18. C. 14. Cauda expansa truncata: plicata, leviter exsecta. Pinnis caudæ, similis varietati (P. 41. c.); vertice & operculis similis (P. 40). Color albidus: guttæ in capite flavescentes, in pinnis fuscae; tam prope in pinnis, ut interstitiorum color ambulacra albida inter areolas fulcas repræsentet.

Arab. *Daba*. ذبابة DJIDDE.

43. PERCA LINEATA; *pinnis dorfi binis remotis: corpore argenteo, lineis nigris, longitudinalibus; macula caudæ aurea, medio nigra*.

Paramia lineata Bl.
Cheilodipterus arabicus W.

DESCR.

DESCR. *Corpus* oblongo-lanceolatum, truncatum. *Color* argenteo-nitens; lineis longitudinalibus per caput, dorsum & latera. Abdomen immaculatum. Lineæ hæ ab utroque latere 16 vel 17, interstitiis argenteis duplo angustioribus. *Iris* oculorum flava, nitens. In caudæ extremo macula magna viridi-aurea, medio nigra. *Dentes* longi, subulati, recti, remoti, in utraque maxilla tres ab utroque latere, medio majori. Duo validiores in medio maxillæ inferioris, a se invicem remoti. In imo palato dentes multi, parvi, setacei. *Lingua* plana; apice latiore, orbiculato; edentula. *Labia* æqualia: superius protractile. *Nares* utrinque duplices, longitudinales, ovales, æquales. *Opercula* squamata: anteriora valde obesa; nonnisi angulo postico & subtus ferrulata: posteriora integerrima, mucrone nullo. *Vertex* planus: inter oculos carina in cute obtusa, antice & postice bifurca: pone oculos carinæ ossæ tres. *Dorsum* subcurvum: abdomen rectum. *P. D.* prima ab altera remota, radiis gracilibus, subulatis. *Sec. & tert.* radius æquales, primo duplo longiores: reliqui ordine decrescientes. *P. D.* anterior fusca; reliquæ fusco-flavescentes. *P. D. & A.* triangulares. *Pect.* lanceolata. *Ventr.* subtriangulares: *P. Caudæ* leviter bifida, lobis acuminatis. *Spina* p. ani prima exigua: secunda sextuplo longior filiformis: sequens inermis, priori dimidio longior: reliqui ordine decrescientes. *L. Lat.* dorso propior, at non parallela. *Squamæ* laxæ, deciduæ: subtiliter denticulatæ, latæ: ordinibus longitudinalibus fere decem.

RAD. B. 7. D. $\frac{6}{8}$. $\frac{1}{11}$. P. 14. V. $\frac{1}{8}$. A. $\frac{2}{11}$. C. 17.

DJIDDÆ. Arab. *Djefauvi*.

Ad Percarum genus retuli; quamvis opercula anteriora parum serrata subtus; posteriora plane non. Dentes validi & pinna dorsi duplex sine fovea; pro Perca militant. Mulli faciem non habet, nec Lin. lat. ramulosa est.

OBSERV.

Characteres Generum *Spari*, *Labri*, *Scianæ*, *Perce*, *Mulli* dati in Syft. Nat. Linn. ad species sufficienter extricandas, haud sufficere; constitit mihi demum, postquam in ditissimo piscium exercitu ordinando, labores inveni & anxias descriptionum minutias defudavi. Nec tamen ipse adhuc conjectas schedulas in ordinem redegi; perpetua itinerum cura impeditus. Generalem ergo observationem inferendam putavi: Nullos certos characteres dari, nisi e *Dentibus* sumtos; qui pro animalium vario vitæ genere varii sunt; ut Quadrupedia e signo hocce perquam manifesto & constanti distribuuntur.

Opercula anteriora pone dentata in multis Labris æque ac in Percis. Spinas dorsales in foveam recondunt, non Scianæ solæ; sed multi Spari, Perce, forte & Labri. Ramenta post Spinas Dors. Percis multis sunt communia.

Squamis laxis adeo prope Mullo accedit Labrus; unde novum genus Scari desumfi. Labrorum Maris Medit. dentes non sufficienter inspexi.

Perca dentibus gaudet maxillaribus subulatis, propinquis: posterioribus sensim minoribus: interdum quidam dentes magni, conici, remoti. Intra dentes maxillares alii parvi, fetacei, numerosi. P. Branch, radii 5. 6. 7. vel 8. Opercula utraque squamata; anteriora pone, vel subtus dentata, quantumvis leviter: posteriora sæpe ante membranam pone spinosa. Quædam species radios spinosos dorsi & ani fossula recondunt. Nonnullis ramenta parva post spinas dorsales.

Perca dentibus LOUI. لوتى Dentes incisores nulli. Canini in superiori maxilla: interdum utrinque solitarius, validus, rigidus & pone illum series unica dentium rigidorum, acutorum, exilium. Minores fetacei, mobiles, numerosi, conferti, versus medium labii interiores majores: quoque post molares in maxilla superiori. In maxilla inferiori Incisores nulli: Canini utrinque duo, remotissimi, validi, subulati: dein Molares parvi, acuti, subulati, decrescetes, unius seriei. Dentes fetacei plurimi, conferti, mobiles usque ad caninum secundum: versus medium labii interioris majores. Lacuna in medio maxillarum parva, dentibus vacua. P. Branch. ossibus 7. Ramenta post spinas dorsales exigua. Fossula dorsalis nulla. Opercula squamata: anteriora subtiliter dentata: posteriora pone ante membranam trispinata, vel bispinosa.

Perca dentibus DABA. Dentes maxillares laterales, incurvi: superioris maxillæ majores quam palatini, seu interiores: inferioris vero maxillæ, minores palatinis. Incisores pauci, remoti, conici; multo crassiores reliquis. Palatini numerosi, fetiformes, incurvi, versus medium labii numerosiores: introrsum gradatim minores. In ipso labii medio nulli; ibi enim lacuna vacua. Scutum circa oculos nullum. Fossula nulla dorsalis. P. Branch. rad. 7. Opercula utraque squamata; anteriora pone dentata, posteriora integra: ante membranam bispinosa. Scutellum supra pinnas peçt. nullum.

Ut SCARUS innotescat systemate distinctiore; potest in tres subdivisiones ordinari. A) *Sc. Dentibus Sidjan*; maxillis continuis: denticulis approximatis, filiformibus. B) *Dentibus Abu ajubbe*: maxillis continuis, dentatis: denticulis subulatis, remotis. C) *Dentibus Harid*: maxillis crenatis, medio fissis. Subdividuntur 1) maxillis pallidis vel rubentibus. 2) maxillis virecentibus.

SCIÆNA.

Vastissimum hoc Genus, commode potest in subdivisiones ahire. SCIÆNÆ OMNES IN FOSSULA SPINAS DORSI RECONDUNT. 1) ABU HAMRUR: hujus characterem vide in descriptione. 2) HOBAR. a) OMNES HÆ SCIÆNÆ MACULA GAUDENT NIGRA SUB JUNCTURA PINNARUM DORS. b) IMMACULATÆ. 3) FARER. a) branch, radiis 7. b) radiis 8. 4) GHANAN. 5) DJABUB. Dentes maxillares unius seriei majores, remoti, a medio decrescetes: palatini, numerosi, fetacei, minores, etiam pone maxillares posticos; at copiosiores ad anticos: omnes tamen æquales. Opercula utraque squamata: anteriora subtus & pone dentata: posteriora integra, ante membranam unispinosa. Br. radiis 6. P. D. duæ, prioris radii omnes spinosi. Scutum peculiare osseum, pone

pone dentatum; supra pinnae pect. Squamæ denticulatæ. 6.) GATERIN,
operculis posterioribus inermibus. 7) SCHÖUR. 8) TAHMEL.

44. SCIÆNA HAMRUR; cupreo-rubra: pinnis obscurioribus; capite undique
squamato: ore subverticali: squamarum margine membranaceo.

Priacanthus
hamrur

DESCR. Caput & gula squamatum; Os fere verticale. Labium superius protractile. Dentes maxillares parvi, rigidi, subulati, æquales, remoti: serie in superioris maxillæ medio leviter descendente, & spatiolo vacuo dentibus: quod vero in maxilla inferiore est plenum. Dentes faucium unius seriei, paralleli maxillaribus superioris maxillæ. Canini majores nulli. Nares utrinque duplices: propinquæ, obliquæ: posteriores oblongæ: anteriores parvæ, ovatae. Opercula anteriora, pone & subtrus recta, ferrata, angulo acuto. Posteriora pone ante membranam acuminata. Oculi iride miniata; pupilla hyalina, nebula alba mixta. Vertex convexus, squamatus. Dorsum & Abdomen parum curva: corpus oblongum. Squamæ parvæ, cupreo-nitentes; margine membranaceæ, integræ. L. lat. juxta caput furgens: dein dorso parallela: sub fine pinnae D. descendens; in cauda recta, media. P. P. pallide rubræ, dimidio breviores ventralibus. Spinæ D. subflexiles. Spinæ ani ordine longiores. Cauda recta, protensa; apice latior, rotundata: pinna pone lunata. Interstitia radiorum in nullis pinnis squamata.

RAD. B. 6. D. $\frac{10}{24}$. P. 18. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{19}$. C. 16.

DJIDDE. Arab. *Abu hamrûr*. LOHAJË *Höförom*. حمر

45. SCIÆNA FULVIFLAMMA; pinnis dorsalis connexis; flavicans, macula laterali nigra: vittis longitudinalibus aureis.

Lutjanus ful-
flamma Blt.

DESCR. Color albicans, vittis quinque vel sex longitudinalibus aureis, vel fulvis; inter um obsoletis. Macula nigra, sub limite pinnarum dors. Dentes validi, remoti, conico-subulati: inferioris maxillæ laterales majores: superioris secundus, a medio utrinque major. Iris aurea. Nares binæ, ovatae; Opercula anteriora, ferrato-dentata; pone parum emarginata, pro ingrediente lobo posterioris operculi. Abdomen rectum. Dorsum rotundatum. L. lat. dorso propinqua parum curva; in cauda recta. Pinna flavæ; dorsalis anterior fusca. Radiorum interstitia in pinna caudæ squamata.

RAD. B. 7. D. $\frac{8}{15}$. P. 15. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{12}$. C. 15.

Arab. *Abu noqta*: ابو نقطه i. e. *macula insignitus*. Aliis *Hābar*
vel *Hober*. حبر

46. SCIÆNA KASMIRA; *flavescens*, *vittis utrinque cæruleis quatuor majoribus*.

DESCR. Hæc & (Sc. 47) *Conveniunt*: Labio inferiore brevior: dentibus conicis: sinu operculi anterioris in medio pone, & angulo dentato: operculo postico inermi: linea laterali squamis striata: numero radiorum pari. *Differunt*: Huic *Cauda* lunata. *Radius* spinosus p. A. secundus major tertio. *Oculi* parum remoti, *iride* flava. *Color*; *vertex* albus, *vittis parvis, obsoletis, cæruleis, utrinque septem*. *Latera* & *dorsum* *flavida*; *vittis utrinque 4, cæruleis, margine undulatis*. Vidi *Varietatem*: *macula utrinque fusca, magna, versus caudam inter vittas medias*.

RAD. B. 7. D. $\frac{10}{2}$. P. 16. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{12}$. C. 17.

Arab. *Kasjmiri*. Aliis *Tyrki*.

47. SCIÆNA BOHAR; *rubens, lineis nebulisve albidis*.

DESCR. *Corpus* oblongum. *Labium* inferius brevius. *Dentes* maxillæ superioris duo subulati extra maxillam inferiorem prominentes: intra hos, duo alii breviores: laterales una serie. In inferiori, medii remoti: laterales tres utrinque minores: ultra, unus major; ultimus triplo major. *Circhi* 2 breves, ante nares. *Opercula ant.* pone, angulo dentato: medio sinu; recipiente lobum osseum *Operculi post.* *Opercula post.* inermia. *L. lat.* dorso propior: squamis striatis. *Squamæ* corporis glabræ. *Spinæ* D. & A. in fossula. Vivo pisce *maculæ* 2 magnæ ad dorsum; moriente exoleseunt. *P. D. & A.* pone rotundatæ. *Cauda* bifida. *P. ani* radii spinosi gradatim majores. *P. D. & A.* pars inermis squamata. *P. V.* membrana cuti adnexa.

Arab. *Bohār* vel *Bhār*. بهارى. *Rad.* numerus ut in priori.

Genus mihi ambiguum videtur: opercula non adeo dentata, ut *Percæ*: ramenta non sunt Labri. *P. Dors.* procumbens *Sciænā* denotat.

48. SCIÆNA GIBBA; *rubens, albo-guttata, dorso gibbo*.

DESCR. A præcedente parum differt. *Dorsum* valde gibbum, unde corpus ovatum. *Membr. Br.* radiis 6. *P. D. & A.* pone angulum rectam formant. *Dentes* superiores medii contigui: *Canini* distant, & duplo majores reliquis. *Linæ* albæ nullæ; sed *squamæ* rubræ, apice albæ.

albæ. Cætera communia habent: figuram narium, cirrhos, lineam lat. operculorum, spinarum, caudæ, labiorum &c. indolem.

Arab. *Nagil*. *Nagil*. *نَاقِل* Aliis *Asmûdi*. *عَصَوْدِي*

49. *SCIÆNA NIGRA*; *tota nigra, ventre fusco-albescente.*

Lutjanus niger Ble.
" *maculor* Ble.

DESCR. Duobus prioribus adeo affinis; spina operculi post. ingrediente finum anterioris. *Dentes* maxillares, fixi, remoti, subulati, versus medium majores: nulli autem pone molares inferiores. Lacuna dentibus vacua in medio utriusque maxillæ. Faucium dentes numerosi, parvi, fixi, densi. *Palatum* album, glabrum; branchiis rubris in ore ramosis. *Labia* obrusa; superius protractile. *Nares* parvæ, utrinque duplices; posteriores majores, ovatæ. *Iris* introrsum alba: extrorsum nigra. *Vertex* convexus, nudus. *Opercula ant.* sub oculis squamata: pone recurva, dentata, sinu profundo. *Gula* parte recondita alba. *Lin. lat.* dorso propior & parallela. *Squamæ* integerrimæ. *Spina P. A.* secunda, triplo longior prima, sed brevior tertia. *P. D.* apparet quasi ex duabus connata: pone acuta. *P. C.* parum excisa. *P. pet.* apice falcata: ventralibus sesquialongiores: basi squamata. *Anus* post apicem ventralium. *Rad.* numerus ut in (Sc. 46.).

RAD. B 7. D. $\frac{10}{10}$. P. 16. V. $\frac{1}{8}$. A. $\frac{3}{12}$. C. 17.

DJIDDE. Arab. *Gatîe*. *قَتِيَّة*

Cum Sc. (45) & sequentibus easdem ingreditur notas *Varietas* genis & margine pinne A. rubentibus. Macula nigra lateralis, a Lin. lat. bifariam oblique fecatur. Arab. *Kesjmire*.

50. *SCIÆNA ARGENTIMACULATA*; Arab. *Schâsæn*. *شَاشَان*

Lutjanus argentimaculatus F.

RAD. B. 7. D. $\frac{10}{24}$. P. 17. V. $\frac{1}{8}$. A. $\frac{3}{12}$. C. 18.

DESCR. *Labium* inferius longius. *Dentes* inferiores laterales ordine majores retrorsum. Infra illos *Dentes* setacei, in utraque maxilla multi. *Litura* sub oculo versus os decurrens curva, cærulea. *Opercula* squamata: posteriora, angulum acutum pone formantia. *Spinæ Ani* longiores & majores gradatim. *Pinnæ* fusco-rufescentes: *D.* glaucæ; margine rufescentes. *Interstitia* radiorum squamosa. *Squamæ* in dorso nigricantes, margine & apice argenteæ; in abdomine rufescentes, margine pallidæ; unde color piscis exsurgit fuscus, argenteo-maculatus. Cæterum similis adeo (Sc. 47.).

Fatendum est; *Dentes* animalium sæpe casu vel morbo lædi; aut monstrosos nasci: fatemur quoque colorem corporis variare; magnitudinem denique

nique raro constantem esse: pinnarum radios sæpe deficere aliquot; unde ergo securæ & universales petendæ notæ? Paucae sunt & erunt: dies deteger. Nos in prima via diffulas, tristes, nec tamen sufficientes sistimus descriptiones.

51. SCIÆNA RUBRA, ATAJA; Arab. *طايه* Ataja.

Holocentrum rubrum *Rupp. G.*
DESCR. *Corpus* obscure-rubrum, vittis longitudinalibus utrinque 8 alborubentibus: juxta dorsum obscure rubræ. Venter albus. *Vertex* spinulis retroverfis. *Dentes* setacei, breves, densi. *Labium* superius protractile: fossula frontis duabus spinis incurvis. *Iris* rubra, nitens, pupilla atra. *Squamæ* spinulosæ. *Lin. lat.* dorso propior. *Cauda* ascendens. *Operculum* anterius undique spinosum; basi spina fortiore. *Posterius* spinis tribus pone. *Tertium* operculum parvum, spinosum proxime ad branchias. *Annulus* osseus circa oculos ferrato-spinosus, antice bicornis. *P. D.* connexæ: prior albida, vittis 2 rubris, longitudinalibus, in fossa recumbens. Altera brevior, basi squamata. *P. A.* radii 2 spinosi primi: parvi; tertius admodum crassus, magnus. *P. C.* utroque latere radii 5 spinosi; reliquis radiis breviores: pinna medio flavicans. *P. V.* margine exteriori albido, postico nigro.

RAD. B. 8. D. $\frac{1}{1}$. $\frac{7}{7}$. P. 19. V. $\frac{1}{8}$. A. 14. C. 15.

52. SCIÆNA MURDJAN; *labiis retusis*. Arab. *Murdjan*. مرجان

Myripristis murdjan *C.*
DESCR. Priori Atajæ similis. *Corpus* ovato-oblongum: rubro æneum, nitens: dorsum obscurum, abdomen pallidius. *Labium* superius medio retusum protractile e fossula frontis triangulari: inferius longius, medio truncatum. *Dentes* minuti, multi, densi. *Lingua* triangularis, rubens, scabra. *Nares* margine dentatæ. *Vertex* planus, lineis 4 elatis, pone ramofo-frondosis. *Iris* rubra. *Oculi* cincti annulo osseo, inferne lobato-denticulato. *Opercula* squamosa, ferrato-dentata: posteriora pone uni-spinosa. *Squamæ* latæ, dentatæ. *L. lat.* supra dimidium corporis, dorso parallela. *Spina* ani tertia crassa. *P. D.* prima, vix cum altera connexa, tota in fossula recondenda. *P. secunda*, & *P. A.* squamis erectis septa. *Cauda* bifida. *P. omnes* rubræ: *V.* & *C.* margine exteriori albæ.

RAD. B. 7. D. $\frac{10}{10}$. $\frac{1}{15}$. P. 15. V. $\frac{1}{8}$. A. $\frac{4}{12}$. C. 19. *Djiddæ*.

53. SCIÆNA SAMMARA; dorso rubro-ænea: lateribus argenteis: vittis undique obscurioribus, punctis ocellatis.

Holocentrum sammara *Rupp.*
DESCR. A priori paucis his differt notis; *Corpus* lineari-lanceolatum. *Lingua* alba. *Opercula* anteriora spina forti: posteriora pone binis spinis.

spinis. *Spina ani* tertia longior quarta, eamque sinu postico recondit. *P. A.* hyalina: radio primo inermi, ultimo spinoso: ambobus rubris. *P. C.* hyalina, ad utrumque marginem rubra: radiis spinosis, supra sex, infra 5. *Rad. branch.* octavus vix conspicuus. *P. V.* albæ: *Pect.* rufescentes. *P. Dors. anterior*, in medio tres spinæ: singuli radii triangulo albo superne, & basi macula nivea. Posterior hyalina, radio secundo & tertio rubro. *Color* corporis superior rubro-æneus: latera & abdomen argentea. *Vittæ* & series longitudinalis squamarum pares; utrinque decem. *Squamæ* laterales in medio macula plurimorum ocellulorum, albidorum, circulo nigro: his vittæ constant.

RAD. B. 8. C. 20. reliqui ut prioris. Dimidiæ spith. longit.

DJIDDE. Arab. *Farer*. Aliis *Hömri* vel *Abu msammer*. Florente *Rhamno nabeca* verno tempore ludit. Hamo venatur profunditate 35 ad 37 Orgyarum, nec altius, neque demersus.

54. SCIÆNA SPINIFERA: rubra; pinnis dorsalibus connexis: capite spinoso, operculi anterioris spina longissima.

Holocentrum yunnanense
serum Rupp.

DESCR. *Dentes* maxillares densi, setacei, plurium ordinum. *Iris* rubra. *Vertex* binis fasciculis linearum elevatarum pone oculos: inter eos lineæ duæ; antæ, fossula longa, profunda. *Oculi* annulo osseo, spinoso. *Opercula anteriora* pone ferrato-dentata: infra spina forti, alba. *Posteriora*: antice squamata: pone, nuda, striata, margine spinosa: angulo superiore scuto osseo, dentato. *Dorsum* regione colli gibbum; sub pinna altera declive. *Cauda* linearis: pinna bifida. *P. A.* spina tertia longa, crassa, sinu postico recondens quartam. *Squamæ* latæ, margine dentatæ. *Color* argenteo-ruber: macula obscuriore utrinque pone oculos & ad basin *P. pect.*

RAD. numerus ut superioris (Sc. 52). Long. spith. 3.

DJIDDE. Arab. *Gahaja* vel *Gehaja*. قهايا Aliis *Afmud*. *Aculei* operculorum & pinnarum pungunt dolore ardenti, ut *Scorpionis* ictus; post aliquot horas cessat. Eadem vis etiam superiori (Sc. 53) adscribitur. Ambæ habitant inter *Corallia Mæandr.* Edules. *Spinifera* adeo pinguis, ut e majoribus sæpe excoquatur ultra libram adipis.

55. SCIÆNA ABU SAMF; ابو صنف cum prioribus forte eadem: aut tantum varietas. Maxime convenit cum *Murdjan*. *Dentes* incisores, validi, conici: molares obtusi. *Opercula* integra: posteriora uno aculeo: anteriora, nuda. *Dorsum* virens, guttis albis.

RAD. B. 6. P. 13. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{12}$. C. 17. D. $\frac{10}{20}$?

G

56. SCIÆNA

56. SCIÆNA GHANAM; *albida, lateribus utrinque vitta gemina, alba.*

Sceloporus ghanam Al.
 DESCR. Neque hæc multum distat similitudine cum cæteris. Dentes, Squamæ, Cauda, & Opercula ut in Murdjan. Opercula post. ut Spini-feræ. L. lat. dorso parallela, surgens a basi Operculi poster. Ei utrinque adjacet *Vitta* alba; sub fine pinnæ D. secedens. *Alia* vitta a vertice ad finem P. D. *Guttæ* laterales obscuræ; quincunciales. *Sp. ani* gradatim longiores.

DJIDDÆ. Arab. *Abu m'sammer*. ابو منمر LOHAJÆ *Ghanam*. غنم

57. SCIÆNA JARBUA; Arab. DJIDDÆ *Djarbua*. SUES *Djabûb* جابوب vel *Djabul* vel *Gabub*.

Therapon jarbua Blkr
 DESCR. *Color* argenteus, vittis utrinque duabus, curvis, in dorso confluentibus in annulum: sub his utrinque lineâ fusca, curva, in occipite & in media cauda coeuntes. Sub hac lineâ, alia flavida, obsoleta. In fronte fasciæ duæ nigræ & macula in medio dorso. *Opercula* ut in Murdjan. P. D. maculis 2 nigris in prima: in altera tres. P. C. lineis quatuor fuscis. P. A. & Pect. litura flava, longitudinali. *Iris* cærulea. L. lat. curvata supra medium corpus. *Dentes* subulati, simplices.

RAD. numerus ut in (*Sc. Samf.*)

58. SCIÆNA STRIDENS; Arab. *Korkor* vel *Gorgor* قرقر

Pseudopoma stridens Risso
 DESCR. L. lat. curva, dorso propior. *Color* cæruleo-argenteus: lineis longitudinalibus fuscis utrinque tribus, sæpe 4 vel 5. Reliqua ut in prioribus.

RAD. B. 6. D. $\frac{11}{11}$. $\frac{1}{15}$. P. 16. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{11}$. C. 16. Long. spith. Vivit herbis. Cum extrahitur aquis stridet sono *Kr, Kr*: unde & sortita nomen.

59. SCIÆNA GATERINA; *flavido-cærulescens, nigro-guttata, maculis sparsis.*

Plectrohynchus gaterina Blkr
 DESCR. *Labia* obtusa, pinguia. *Lingua* alba. *Palatum* rubrum. *Opercula* ut *Sc. Murdjan*: sed in eorum apice sub labio inferiore utrinque foramina tria, ordine posita. P. Pect. & V. flavæ, immaculatæ. Præterea forma corporis, Dentes, Nares, Cauda, L. lat., P. D., Sp. A., squamæ, vertex, ut congenerum. Abdomen immaculatum.

RAD. B. 7. D. $\frac{13}{33}$. P. 17. V. $\frac{1}{8}$. A. $\frac{3}{11}$. C. 17. Long. 3. spith.

DJIDDÆ. Arab. *Gaterin*. قطرين Inter corallia in brevibus habitat. Insipidi gustus. Strombi carne inescata capitur.

59. b) SCIÆNA ABU-MGATERIN; ابو مقطرين *vittis fuscis, utrinque quatuor, nigro guttatis, pinnis flavis.*

*Plectorhynchus
piscis Abu
Mgaterin*

DESCR. *Vittæ* fuscae, longitudinales, maculis rotundis: sitæ inter *P. D.* & *Pect.* Sub *P. P.* adhuc *Vittæ* utrinque duæ fuscae, sine maculis. In medio dorso antè *Vittæ* fusca angusta. *Pinnæ* sparsim maculatæ. *Gula* & *Labia* flava. *Oculi* contigui, iride obscura. *Spina A.* secunda longior tertia. Parva est; *digiti* longitudine. Ajebant piscatores hanc esse pullum Gaterinæ, & crescendo vittas deponere, aliumque macularum ordinem obtinere.

59. c) SCHOTAF شطاف vel SOFAT Arab. Perquam simillima Gaterinæ, quoad staturam corporis; squamas dentatas, os intus rubrum; at huic est membrana marginalis operculi posterioris rubra: in media maxilla dentes nulli. Labia, Nares, Opercula ut in Murdjan. *Pinnæ* nigricantes, totum corpus fuscum. Edulis. Ulnæ longitudine.

*Plectorhynchus
schotaf Riss*

59. d) FÆTELA; فتلة Dentes, Labia, Nares, Oculi, Vertex, Cauda, Squamæ priorum. Opercula anteriora non sinuata, subtus integra. *Spina A.* secunda longior & crassior tertia. Color fuscus, venter albidus, immaculatus. Labri charact. fert; ramentis subtilibus post spinas Dorf. Caterum Dentium indole & radiorum numero Gaterinæ jungenda. Edulis, sapida, pinguis; 3 uln. longitudine.

*Plectorhynchus
fætela L.*

60. SCIÆNA ARGENTEA, NAGEB; guttis nigris in corporis dimidio superiori.

*Pristipoma argen-
teum. C.*

DESCR. *Dentes* multi, densi, seracei, mobiles: ordo extimus major, incurvus. *Labium* & *Nares* ut in prioribus; harum, anteriores majores. *Opercula* ut congenerum: anteriora non sinuata; angulo inferiore dentata, rotundata; subtus integra. *Iris* argentea; superne fusca. *Vertex* squamatus; lineis 2 elatis, inter nares. *Cauda* leviter bifida, surgens. *Spina A.* prima brevis: secunda longa, fortis. *P. D.* in unam connatæ, prior rotundata: altera linearis: nigro-guttatæ: *P. V. & A.* antice rufescentes, apice acuminatæ. *Interstitia* radiorum in *P. C.* squamata basi. *Radii* inermes: *D* & *ani* squamis sepiuntur erectis, liberis. *L. lat.* ut Murdjan. *Squamæ* margine striatæ & ciliatæ, subtilissime. Caput, abdomen & laterum dimidia pars inferior immaculata.

DJIDDÆ. Arab. Nageb. Aliis Naqem. ناقم

RAD. B. 7. D. $\frac{11}{11}$. $\frac{1}{16}$ P. 16. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{11}$. C. 16.

61. SCIÆNA NEBULOSA, HAMRUR; Ar. *Schâûr*. شاور Aliis *Bónkose*. بنكسة

Lethrinus nebulosus Cuv.

Nebulis longitudinalibus cæruleis & fusco-flavescentibus. Ramenta post radios. Capitis declivitas recta. Cauda bifida.

RAD. D. $\frac{10}{20}$. P. 13. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{12}$. C. 17?

61. b) *Variat*: vittis longitudinalibus obsoletis violaceis; quarum una prope abdomen rubens, lata. Arab. *Abu hamrûr*.

62. SCIÆNA MAHSENA; fusca, lineata, fasciis transversis nebulosis, argenteis.

Lethrinus mahsena Cuv.

Arab. *Sjôûr mohseni*: Aliis *Sööbi*: vel *Höfni*: *Mæhseni*. محسني

DESCR. *Dentes* 18 in utraque maxilla, conici, validi: faucium setacei. Molares obtusi, lati. Ante *Nares* cirrhi conici. *Vertex* lævis, declivis. *Dorsi* principium gibbum. Post *Spinæ* *Dors.* ramenta ut *Labri*. Propter *Fossulam* *dors.* ad *Sciænas* pertinet. A *Perca* recedit *Operculis* integerrimis; *anter.* nudis, non sinuatis. *Posteriora* sunt squamata: pone angulo obtuso, osseo. *P. A.* spinæ gradatim majores. *Basis P. A. & D.* angulata. *Corpus* ovato-oblongum. *Squamæ* fuscae ramulis dentiformibus. *Fasciæ* argenteæ, immaculatæ. *Cauda* bifida. *Pinnæ* omnes rubro-violaceæ. *Radius* pect. secundus apice filum emittit.

RAD. B. 6. D. $\frac{10}{20}$. P. 13. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{12}$. C. 17?

Capta ad promontorium *Djinnâm*: plena exuviis piscium; inter quas *Echini* & *Haliotis tuberc.* adhuc dignoscebantur.

63. SCIÆNA HARAK; virescens, pinnis pallide rubris; macula utrinque nigra lineari infra lineam lateralem.

Lethrinus harak Rüpp.

DESCR. Priori similis. *Dentes* incisores 4 in utraque maxilla: laterales, retro obtusi, lati, & demum hemisphærici: unius seriei: pone incisores, alii setacei, numerosi. *Palatum* rubrum; membrana transversa. *Labia*, *Nares*, *Vertex*, *Cauda*, L. lat. *Spinæ*, interstitia rad. ut in præcedente. *Operculum* anterius, pone oculos squamatum; membrana integra, recta, rivulis elevatis. *Macula lateralis* nigra, linearis longitudinalis, colore fusco cincta, figura rectanguli.

Num. Rad. idem cum præcedente. D. $\frac{10}{23}$? Arab. *Abu m'harrak*.

64. SCIÆNA RAMAK; OBSOLETA; albido-virescens, lineis longitudinalibus obsoletis, violaceo-flavescentibus; pinnis rubentibus.

Lethrinus ramak Rüpp.

DESCR.

DESCR. Palatum, Nares, Vertex, Labia, Opercula, Cauda, pinnæ acuminatæ; Lin. lat. Spinarum ani ordo surgens; squamarum forma omnia ut priorum. Differt colore. Dentes medii tantillum majores.

RAD. D. $\frac{19}{10}$. Arab. *Ramak*. *رامك*

64. b) DIB (Arab.) *lamina transversa membranacea in utraque maxilla*. Dentes laterales acuti. Cæterum simillima priori: sed major 2 spitham.

64. c) Nomine tantum notæ sunt mihi sequentes: SULI: DJARD: MORK: SAKA: KERSIT,

65. SCIÆNA GRANDOCULIS; *cærulefcens*: labio inferiore gibbo.

Monotaxis grandoculis Bl.
Phaerodon grandoculis Ry.

DESCR. Ad Sc. (62.) accedit. *Figura ovato-oblonga*. Color albidus, cærulefcens, lineis obsoletis, pallidis. *Labia* carnosæ papillis rubris: inferius crassum, gibbum. *Dentes* incisores in utraque maxilla 6. Molares lati, plani, breves. *Nares* lineares, orbiculatæ. *Oculorum* interstitium tuberculatum. *Pinnæ* violascentes: *Pect.* pallide-rubræ. *P. D. & A.* pone lobo: hæ gradatim crescunt. *P. C.* bifida: interstitiis squamosis a basi ad apicem; quæ in hoc genere non communis nota. *L. lat.* ut in cæteris. *Opercula* integra.

DJIDDE. Arab. *Abu ajn ابو عين* i. e. *grandibus oculis*. Rad. D. $\frac{10}{11}$.

66. SCIÆNA CINERASCENS, TAHMEL; *cinereo-virescens*; lineis longitudinalibus flavis.

Pimelopterus tahmel
altipinnis W.

DESCR. Labium, Nares, Vertex, L. lat. Sp. A. ut priorum. *Opercula* integra, squamosa. *Corpus* ovato-oblongum. *Cauda* bifida, excisa; lobis obtusis. *Squamæ* integræ, rhombeæ, albidæ, ad basin, utrinque gutta ferrugineo-flava; unde lineæ longitudinales flavicantes per juncturas squamarum. *P. D. & A.* pars inermis elata, pone oblique truncata; angulo acuminato. *P. Pect.* margine exteriori albæ. *Dentes* filiformes, unius seriei.

RAD. B. 7. D. $\frac{11}{12}$. P. 18. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{1}{14}$. C. 15?

Arab. *Tâhmel*. *طاحمل قوس*

67. SCIÆNA SAFGHA; Arab. P. D. duplici $\frac{8}{8}$: immaculata. *Cauda* forficata. Oblonga, argentea; *Maxillæ* dentatæ; interior, longior. *Opercula* tenuiter ferrata.

Ambarji Commero
ni. cv.

68. SCIÆNA? ARMATA, GALEMPISH. Facies Scombri. *Cauda* bifida, fusca, interno margine albido. *Pinnæ* albæ: *D. & A.* apice nigræ. *L. lat.* recta. *Corpus* ovato-acuminatum, compressum; colore argenteo. Inter *P. D. & Caput* *Spina* rigida, horizontalis, antrorsum prominens.

Actula armata Bl.

SCOMBER.

69. SCOMBER LYSAN; *albido-maculatus*; *spinis dorsalibus septem primis separatis*.*Scomberoides lysan Bl.*

DESCR. Corpus oblongo-lanceolatum; dorsum & abdomen pariter curvatum. Color argenteus; supra fusco-cærulescens. *Dentes* numerosi, parvi, subulati. *Anus* post apicem P. V. *Squamæ* tantum apparentes, & in cute insculptæ, minutæ, lanceolatæ, imbricatæ, puncto medio impresso. *Spinæ* D. septem distinctæ: primæ duæ parvæ; reliquæ duplo majores, æquales, singulæ pone dorso alligatæ membrana; inter se non connexæ: quæque propria fossa recumbens; primæ duæ recte eriguntur reliquæ alternatim inclinatæ: tertia ad dextram, quarta ad sinistram &c. *Spinæ* ante A. in propriam pinnulam connexæ: secunda dimidio longior. P. D. & A. posteriores oppositæ: utriusque pars anterior elatior, triangularis: posterior humilis, linearis: composita multis pinnulis spuriis, apice separatis, basi connatis membrana. P. V. & A. albidæ. L. lat. non loricata: a capite ad P. A. initio undulato-curvata; duos sinus majores faciens, sub spina D. prima & quinta: dein recta procedit. P. Pet. hyalinæ, ovatæ. Circa Lin. lat. maculæ obsoletæ, fusæ.

RAD. B. 8. D. $\frac{7}{7}$. $\frac{1}{21}$. P. 17. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{2}{2}$. $\frac{1}{19}$. C. - -

DJIDDAE. Arab. *Myssaf*. Aliis. *Lysan*. LOHAJÆ Öbri. عربي

Obs. Scombri Genus commode *subdivitur*; a) Scombri pinnulis spuriis distinctis. b) Sc. pinn. spuriis unitis. c) Sc. p. sp. nullis; pinna bispinosa ante pinnam ani. d) Sc. pinnulis nullis; pinna bisp. ante P. A. vel occultata, vel nulla.

70. SCOMBER RIM, SPECIOSUS; *pallide aureus*; *fasciis verticis obliquis*; *corporis septem nigris, alternis*.*Scomberodon speciosus Bl.*

DESCR. Corpus ovato-lanceolatum. Abdomen rectum; in regione P. A. curvum. *Dentes* nulli. *Labia* æqualia, obtusa, superius protrahibile. *Nares* utrinque binæ, contiguæ, ovales, transversæ. *Oculi* iride argentea, antice aurea. *Vertex* convexus, nudus, glaber. *Opercula* triplicia, integra; anteriora squamata; postica nuda. P. D. prima, in fossula: altera opposita P. A. & parte eminentiore triangulares ambæ, basi membrana septæ, parte superiore lineari, nuda. P. P. falcata, longiores triplo ventralibus. *Cauda* teres. P. C. bifida, lobis lanceolatis. L. lat. dorso propior: a capite ad fasciam quintam arcuata, inde recta: carina obtuse elata; squamis dilatatis, postice mucronatis. *Squamæ*

mæ parvæ, integræ, deciduæ. *Color* corporis velut argenteus aureusque mixtus; ventre pallido; dorso fusco. *Pinnæ* flavæ: dorsales glaucæ: *Fasciæ* verticis obliquæ, supra connatæ, retro spectantes: in operculo continuatæ parum. *Corporis fasciæ* nigræ, transversæ, infra obsoletæ diversæ latitudinis, alternantes. Adhuc Octava restat, verum adeo obsoleta.

DJIDDAE. Arab. *Rîm*.

RAD. B. 7. D. $\frac{6}{8}$. $\frac{1}{20}$. P. 21. V. 5. seu 6. A. $\frac{2}{2}$. $\frac{1}{17}$. C. - -

71. SCOMBER FERDAU; *ovali-oblongus, argenteus, guttis aureis lateralibus; fasciis transversis fuscis quinque, obsoletis.* *Atula ferdau* Blk.

DESCR. *Color* argenteus; dorso obscuriore, cærulescente. *Guttæ* aureæ paucae per latera. *Fasciæ* transversæ, latæ, fuscae, utrinque quinque, a dorso ad abdomen descendentes, obsoletæ, lanceolatae, antrosum curvatæ. *Squamæ* parvæ, deciduæ. *L. lat.* fere recta perpetua. *Dentes* setacei, multi. *Labium* superius protractile. *Cirrhulus* conicus ante singulas nares. *Iris* alba. *Vertex* nudus, glaber, linea media ossea. *Opercula* integra, squamosa. *P. P.* superne falcatae: albidæ. *P. D.* posterior & *A.* membrana erecta utrinque septæ: parte anteriore elata, triangulari-lanceolata; altera lineari. *P. V.* breves, acuminatæ. Inter pinnae *D.* *spina* solitaria, brevis: & duæ parvæ, ante *P. A.* *Cauda* carina utrinque valida, elata. *P. C.* angulo recto excisa, glauca: lobis lanceolatis.

DJIDDAE. Arab. *Ferdau*.

RAD. B. 7. D. $\frac{6}{8}$. $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{29}$. P. 21. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{2}{2}$. $\frac{1}{24}$. C. 16?

71. b) BAJAD; *Varietas. Opercula* anteriora obesa. *Spinæ* ante *P. A.* sub cute reconditæ. *L. lat.* e regione *P. D.* secundæ elevatur in carinam loricaam æqualem. *P. P.* hyalinæ, reliquæ glaucæ. Vocatur quoque *Abu sansun*: vel *Hælj*. *Atula bajad* Blk.

72. SCOMBER IGNOBILIS, KIRM; *argenteus; dorso cærulescente: pinnis pectoralibus & ventralibus rufescentibus.*

DESCR. *Dentes* utriusque maxillæ unius ordinis, breves, subulati. Infra dentes superioris maxillæ, alii minores, setacei, numerosi. *Squamæ* parvæ, deciduæ. *P. D.* glaucæ; prior triangularis. *P. A.* parte elatiore subtus flava, cætera hyalina. *Spinæ* ante *P. A.* in pinnulam connexæ; posterior duplo major. *P. C.* lobus superior glaucus: inferior flavus.

flavus. *L. lat.* a capite ad P. A. curva & undulata: inde recta, loricata. *Carinae* laterales caudæ, elatæ; inter eas evanescente linea lat.

RAD. B. 8. D. $\frac{7}{7}$. $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{20}$. P. $\frac{1}{21}$. V. $\frac{1}{8}$. A. $\frac{2}{2}$. $\frac{1}{17}$. C. 18?

DJIDDE. Arab. *Kirm*. Aliis *Djarm* vel *Girb*. قرب

LOHAJÆ parvi vocantur *Korab*; majores *Djim*.

Labula fulvo guttata Blkr

73. SCOMBER FULVO-GUTTATUS; simillimus (S. 71.) *guttis* aureis per latera frequentibus, orbiculatis, inordinatis; ceterum glauco-cæruleus, nitens. *Iris* aurea. *Vertex* ante oculos cavus. *Labia*, *Dentes*, *Nares*, *Opercula* ut congeneris. A capite ad P. D. membrana polita, nuda, glauca. *L. lat.* primum arcuata, inde recta; in media cauda elevata in carinam. P. D. prima tota in fossula recondenda: quæ *spinulam* quoque recondit. P. D. & A. ut in congeneris: ut & P. P. *Pinnula* ante P. A. divisa in duos radios breves, membrana connexos, in fossula recond. P. V. approximate; in cavitate lata recond. *Cauda* teres; utrinque *carina* elata, acuta, ad basin P. C. latiore carinis lateralibus. P. C. angulo obtuso, longe bifida.

RAD. B. 7. D. $\frac{7}{7}$. $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{28}$. P. $\frac{1}{21}$. V. $\frac{1}{8}$. A. $\frac{2}{2}$. $\frac{1}{25}$. C. 19?

Arab. *Gazz*. قز

74. SCOMBER SANSUN; argenteo-nitens, immaculatus; caudæ carina elata, æquali.

Carangus sansun Blkr

DESCR. Affinis præcedenti. *Dentes* inferiores unius seriei, medii majores. Superiores una serie subulati, majores; pone dentes setacei, numerosi. *Carina* C. media valida, recta. P. V. & P. albæ: reliquæ fuscæ: P. D. margine superiori nigra. P. A. & C. margine inferiore flavæ. *Vertex* venis ramosis.

RAD. numerus ut prioris, sed D. $\frac{1}{22}$. A. $\frac{1}{16}$. C. 18?

Arab. *Abu sansun*. *Abu lajla*. ابو لعلية Baghe. Dheirak.

LOHAJÆ. Bockas,

75. SCOMBER DJEDABA; albus, lateribus & caudæ pinna flavis.

Caranx djeddaba Risso

DESCR. *Dentes* utriusque maxillæ unius seriei, parvi, subulati. *Corpus* lanceolatum: a capite ad P. A. modice curvum; inde abdomen magis curvatum. P. D. prima triangularis, æquilatera. P. C. flava: lobi superioris margo posticus flavus. *Spinæ* duæ ante P. A. connexæ in pinnulam peculiarem: posterior duplo longior. *Squamæ* persistentes. *Carinæ*

Carinæ nullæ in cauda. *L. lat.* a capite ad P. D. secundam arcuata circulariter: inde recta & elevata in carinam loricatam.

RAD. B. 8. D. $\frac{8}{8}$. $\frac{1}{25}$. P. 22. V. $\frac{9}{7}$. $\frac{1}{8}$. A. $\frac{2}{2}$. $\frac{1}{20}$. C. 17.

Arab. LOHAJ. *Sufnok*. سفنك Djidd. *Djedaba*. جدبة SUES *Bajad*.

Obs. Diversa tot nomina, quæ piscibus adscribimus, an totidem species vel varietates designent, vel sint-ne diversarum regionum denominationes ejusdem subiecti nescio? Nihil enim licentius esse potest artificio Nomenclaturæ, dum ex genio rerum non hauritur, sed fortuito vocabulorum conflatu formatur. Quos toties DJIDDÆ Pisces adscribimus, MARI RUBRO universo sunt communes: verum ex hac urbe, ceu *Museo Ichthyologico* nostros emittimus labores.

76. SCOMBER FALCATUS; *rhomboidalis*; *pinna secunda dorsi* ♂ *ani falcata*.

DESCR. *Corpus* glabrum: trapezi-forme; tribus lateribus rectis: primum a capite ad P. A.: secundum & tertium æqualia, breviora, a P. A. secunda ad caudam: quartum a capite ad P. D. secundam curvatum parum. *Color* argenteus: dimidium superius magis fuscum. *Piscis* sesquilingior quam latior. *Frons* perpendicularis, flavescent; faciem leoninam efficit. *Labia* obtusa, æqualia, superius protrahibile. *Nares* utrinque duplices, transversæ, propinquæ, oblongæ: posteriores majores. *Maxilla* superior glabra; inferior aspera; dentes nulli. *Opercula* nuda, integra. *L. lat.* dorso propior usque ad P. D.; inde medium secat corpus; semper parum undulata. *Squamæ* tenues, invicem & cuti adnatæ, quæ nuda apparet: apicibus elatæ; scabritie digitorum antrorsum motum, offendentes. *P. P.* ovatæ, obtusæ, fusæ. *P. V.* his longiores; pone oblique truncatæ: extrorsum fulvæ, introrsum albidæ. *P. D.* secunda & P. A. oppositæ: pars anterior utriusque elevata in apicem lanceolato-falcatum; ad apicem caudæ pertingentem: pars posterior humilis, linearis: membrana baseos nulla. Pars illa dorsalis fusca, ani introrsum fulva: pars hæc albido-hyalina. *P. C.* glauca; antrorsum fusca; margine postico flava: bifida plus dimidio, lobis lanceolatis, superiore longiore. *Spina* sub cute in medio dorso a capite ad P. D. Ante eas *Spina* horizontalis antrorsum versa, valida, interdum sub cute recondita. Inde *Spinæ* breves, ordine majores, membrana connexæ; prima sæpe recondita, reliquæ quinque manifestæ: singulis sua fossula. Eadem indoles *Spinarum* 2 ante P. A.

DJIDDÆ. Arab. Högel. هوجل LOHAJÆ *Dejmal*. ضيمال

RAD. B. 7. D. $\frac{5}{7}$. $\frac{1}{20}$. P. 18. V. $\frac{9}{6}$. A. $\frac{2}{2}$. $\frac{1}{18}$. C. 16.

77. SCOMBER EQUULA; *pinnulis pinnaque dorfi connatis.*

Leio gnathus caballus Ale.
Equula Lab. alla 112

DESCR. *Corpus* ovatum, compressum: 5 poll. long. 3 poll. latum: argenteo-nitens: læve, squamis subtilissimis. *Dentes* fetacei. *Labium* superius protrahibile: inferius curvum, retusum. *Frons* carinis ossis 2, elatis, antrorsum convergentibus. *Vertex*; carinis tribus inter oculos, media obtusa, & mobili simul cum labio: inter caput & P. D. formantibus callum lanceolatum. *Opercula* M. Br. adnata: anteriora subtus ferrata. *Iris* argentea. *Spinæ* duæ retroversæ, supra oculorum angulum. *Spina* D. & A. secunda, magna. *P. D.* & *A.* ad Caudam usque. *P. V.* latere superiore appendice membranacea, lanceolata. Ante pinnas *Callus* osseus, cavus, linearis: ante illum *Gibbus* osseus, acutus. *L. lat.* dorso propior: primum recta: inde surgens: versus caudam descendens. *P. C.* biloba, lobis obtusis.

RAD. B. 4. D. $\frac{8}{25}$. P. 18. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{18}$. C. 17.

Arab. *Abu kurse*. ابو كرسه i. e. sella præditus.

Leio gnathus oblongus Ale.

77. b) DJIDDÆ Melliet: LOHAJÆ Berbis; دردير A priore differt: *Magnitudine*; vix digiti long. corpore duplo longiore, quam lato, & lanceolata figura. *L. lat.* definit cum P. D. *Lobi* P. C. acuti. P. omnes glaucæ, margine flavæ; præter Pect. *Labium* superius multum prolapsens. Cætera signa eadem.

RAD. B. 4. D. $\frac{8}{24}$. P. 16. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{18}$. C. 16.

78. SCOMBER RHOMBEUS: *pinnis ventralibus uni-radiatis.*

argenteus P. 112
Menodactylus rhombeus Ale.

DESCR. *Corpus* compressum, argenteum: una cum P. D. & A. mensuratum, rhombeum. *Dentes* numerosi, subtiles. *Lingua* obtusa; prope apicem superne callo ovali, plano, albido, scabro. *Labia*, *Nares*, *Opercula*, ut congenerum. *Iris* argentea, supra & infra fusca. Ante P. D. *Spinæ* 5, minutæ, vix connexæ. Juxta P. V. *spinæ* duæ, albæ, parvæ: & pone singulam radii inermes minores 5, vix conspicui. *P. D.* & *A.* prima pars alba, triangularis, squamata, apice nigra: reliqua pars humilis, hyalina, linearis. *P. P.* leviter rotundatæ. *Cauda* brevis, lateribus compressa, non carinata. *P. C.* glauca, rotundato-exsecta. *L. lat.* dorso propior, parallela: in cauda recta, media. *Squamæ* parvæ.

DJIDDÆ. Arab. *Abu gurr* ابو قر vel *Abu tabak*. ابو طابك

RAD. B. 6. P. $\frac{1}{15}$. D. $\frac{4}{32}$. V. $\frac{1}{1}$. A. $\frac{3}{34}$. C. 16.

CHÆTODON.

OBSERV.

Genus hoc subdivisionem admittit: a) CHÆTODON: dentibus filiformibus, brevibus, numerosis, multorum ordinum, densis, acutis, interioribus sensim minoribus. P. Br. radiis 6. Spinæ P. A. 3. b) ABU-DEDDUF: dentibus maxillaribus unius seriei, filiformibus, contiguus, submobilibus, obtusis: dentibus faucium nullis: annulo subtus circa oculos. P. Br. rad. 5. Spinæ P. A. 2. c) ACANTHURUS: dentibus unius seriei, rigidis, acutis, contiguus, vel simplicibus vel lobatis. Cauda in utroque latere aculeo uno vel pluribus; exserto & rigido; vel mobili & recondendo. Diversum prorsus a Chætodonte Genus; aliquando propriam constituens familiam.

79. CHÆTODON ORBICULARIS; cinereo-fuscus; subrotundus; spinis dorsalibus nullis. Arab. major Kanaf: parvus Dakar.

Platan orbicularis L.

DESCR. Figura singularis; procul *Pleuronectem* simulans. Long. pedalis. Corpus sine cauda & pinnis spectatum est orbiculare: subtus rectum. Color cinereo-fuscus: venter albidus; pone flavicans. Puncta nigra sparsa per medium corpus, versus caudam & dorsum. Dentes numerosi, mobiles: exterior ordo filiformis, apice tridentatus: reliqui seracei; apice subulati. Labia obtusa, æqualia: superius, lateribus secedens. Nares utrinque duplices; remotæ: posteriores lineares: anteriores rotundæ. Iris flava. Frons declivis perpendiculariter. Opercula, integra, squamata. Dorsum compressum: ejusdem declivitatis ac caput; inde parum rotundatur: sub P. D. altissimum, dein descendit ad caudam. Gula appressa. Abdomen crassum: ad P. A. rectum: inde surgit & comprimitur ad caudam. Cauda latior quam longior: recte protensa. Squamæ rotundatæ, integræ. L. lat. dorso propior, non prorsus parallela: in cauda recta, media. Radii br. quatuor manifesti. P. Ventr. ovata, obtusæ, flavidæ introrsum, extrorsum fusco-virentes: perlucens. P. Pect. ovato-lanceolata; fusco-flavidæ. Ante P. D. & A. quasi rudimenta radiorum spinosorum sub cute. Margo anterior utriusque pinne sequitur directionem corporis antejacentis: dein rotundatur, angustior versus caudam. Utraque Pinna crassa, carnosa, squamata. P. C. pellucidior, crassa, squamata, excisa leviter.

RAD. B. 6. D. $\frac{3}{36}$. P. 16. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{0}{26}$. C. 16.

DJIDDE: frequens in saxosis.

80. CHÆTODON PASCIATUS; flavus; fascia oculari nigra: supra nucham, alba: per latera, ferrugineo-fusca.

Chaetodon pasciatus L.

DESCR. Corpus long 3. poll lat. $2\frac{1}{2}$ p. Caput conico-obtusum. Labium superius protractile. Dentes flexiles, filiformes, numerosi.

H 2

Labi-
Squa-
mæ

mæ rotundatæ, imbricatæ. *Ramenta* valida post spinas dorsales & ani. *Spinæ* D. & A. in fossula recondendæ. *Fascia* nigra per oculos, supra junctæ. Pone illam, brevior *alba*, lata magis infra. *Dorsi* initium flavum; reliqua ejus pars intra L. lat. nigra. *Fasciæ laterales* ferrugineo-fuscæ, utrinque octo; retrorsum surgentes oblique. *Vitta* fulva ambit basin P. D. dein nigra: postea ferrugineo-flava; margo flavus, terminatus linea ferrugineo-fusca. P. A. ferrugineo-flava. P. C. truncata, flavicans, fascia media fusca; margine postico albo; intra fascia ferruginea & linea flava transversa. P. V. flavæ, P. glaucæ.

RAD. B. 6. D. $\frac{1}{3}\frac{2}{6}$. P. 16. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{22}$. C. 16.

DJIDDÆ. Arab. *Tabak el kûs*.

81. CHÆTODON AURIGA; *albidus, oblique fasciatus; radio pinnæ dorsalis quinto in filum producto.*

Chaetodon auriga Faud

DESCR. *Corpus* 5 poll long. 3 p. lat. compressum, fere rhomboidale. *Os* conico-compressum, prominens. *Labia* rotundata, æqualia. *Dentes* plurimarum serierum. *Vertex* planus, squamatus, albo-rufescens, fasciis transversis fulvis, quatuor. *Caput* fascia laterali nigra, per oculos ad gulam transeunte. *Iris* nigra. *Dorsi* initium altum, inde rectum: abdomen pari figura. *Color* albido-cæruleus; fasciis obliquis fuscis, parallelis: primæ sex dorsales antrorsum descendunt: reliquæ denæ perpendiculariter retrorsum: pone totum corpus & cauda fulva. Margo posticus P. D. niger. P. A. lineis; nigra, alba, denique pallide-flava marginali. P. C. truncata, fulva: margine albo; luna flava retro-versa. *Filum* horizontale e radio inermi quinto ortum; & dimidio longius P. C. *Ramenta* valida post Sp. D. & A. L. lat. curvata. *Squamæ* rhomboidales.

RAD. B. 6. D. $\frac{1}{3}\frac{2}{7}$. P. 16. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{24}$. C. 17.

DJIDDÆ. Arab. LOHAJÆ *Mokti*. مقطي Vocatur & *Tabak el kuff* & *Schaußch*.

82. CHÆTODON TEIRA; *corpore rhombeo, fuscescente; fascia transversa duplici obscuriori: pinnis ventralibus, ani ♂ caudæ falcatis, corpore longioribus.*

Chaetodon teira Cr

DESCR. *Corpus* sine pinnis rhombeo-subrotundum, compressum, fuscum: fasciis transversis obscuris tribus: prima per oculos: secunda, regione P. P. tertia per caudæ basin. Truncus ab ore ad P. D. valde præceps. *Opercula* squamata. *Nares* utrinque duæ: anterior orbiculata; posterior oblonga, duplo grandior, sed angusta. *Squamæ* parvæ, dentatæ. L. lat. sursum curvata; dorso propior. *Dentes* numerosi, mobiles: exterior ordo

ordo dentibus tridentatis: interiores fere demersi in gingivis: superiores magis evidentes. *Iris* extus fusca; intus argentea. *P. C.* truncata. *P. P.* & caudæ albæ, basi nigræ. *P. D.* & *A.* nigricantes, elongatæ, falcatæ: primus radius inermis, longus; reliqui decrecentes. *P. D.* corpore duplo longior: *A.* brevior. *Spina* *P. D.* & *A.* postrema triplo longior antecedenti.

RAD. B. 5. D. $\frac{5}{37}$. P. 17. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{26}$. C. 17. Long. 1. uln.

LOHAJÆ. Arab. parvi *Teyra*. طيرة Magni *Dáakar*. دكار

83. CHÆTODON MESOLEUCOS; parte anteriore albus, posteriore fuscus, fasciis nigris.

Chaetodon mesoleucos Fink. W.

DESCR. *Truncus* ovatus, compressus. *Caput* conicum, angustum. *Labia* & *Dentes* ut congenerum. *Squamæ* ciliatæ, rhombeæ, magnæ; 14 occupantes seriem lateralem ab imo ad summum. *L. Lat.* curva; definens ante *P. D.* *P. P.* lanceolatæ, glaucæ. *P. V.* cum illis pari longitudine; albæ. *P. D.* pone oblique truncata: *A.* rotundata; ambæ fuscæ; basi densissime squamatæ. *Radii* spinosi in Dorsali sensim majores ad quartum: medius *P. A.* major tertio. *P. C.* nigra, truncata: *fascia* apicis lata, hyalina: ad basin lunula alba, cornibus fulvis. *Color* corporis albus, parte caput versus, fasciaque per oculos nigra: parte posteriore fusca, fasciis nigris, 12.

RAD. B. 6. D. $\frac{13}{37}$. P. 16. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{22}$. C. 17. Long. 3. poll.

MOCHHÆ. Arab. *Hadjan*.

84. CHÆTODON ASFUR; niger: fascia transversa, lunari-cuneata flava.

Urolacanthus asfur Stejneger

DESCR. *Truncus* ovalis. *Dentes*, multi, flexiles, filiformes. *Opercula* anteriora, pone spina valida, retroversa, semipollicari. *Fascia* in medio corpore transversa, flava, digiti latitudine, lunato-cuneata, cornibus retroversis. *P. D.* & *A.* horizontaliter protensæ, falcatæ. *P. C.* vix pollicaris: fulva, rotundata: linea nigra marginali. *L. lat.* curva, dorso propior. *Squamæ* rhombeæ, quincunciales, subtiliter dentatæ.

RAD. B. 6. D. $\frac{12}{3}$. P. 16. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{22}$. C. 16. Long. 5 poll. lar. $2\frac{1}{2}$.

LOHAJÆ. Arab. *Tabak el herr*. Aliis *Asfur*. عصفور

84. b) Varietas visa Mochhæ: carulefcens; lituris & fasciis obliquis; lineolis violaceis: *P. A.* brevior *P. C.*

Urolacanthus maculatus Stejneger

Inter corallia habitat. Corbe capitur, allectus carne Strombi. Caro amara; nec tamen venenata. Vocatur *Hæddaja*: an idem nomen cum *Hadjan*?

85. CHÆTODON MACULOSUS, ARUSA; cinereus, maculis transversis cæruleis: operculis anterioribus uni-spinosis.

DESCR. Corpus ovato-oblongum: dorsum curvum: abdomen rectum. Dentes numerosi, filiformes, introflexiles, apice simplices. Labium superius protractile. Frons inter oculos elata, plana, squamata. Opercula squamata: anteriora pone ferrata: infra spina retrospectante, forti, lanceolata. Color cinereo-sericeus. Ad nucham maculæ multæ, transversæ, lineares, cæuleæ: in operculis posterioribus & gula maculæ cæuleæ paucæ: pone medium corpus macula magna, transversa aurea; pone truncata, antice rotundata; superne sinibus cinereis interrupta. P. P. ovatæ, obtusæ. P. V. lanceolatæ, ultra anum pertingentes. P. D. superne recta, surgens retrorsum; pone falcata; sub falce perpendiculariter truncata. P. A. triangularis, infra recta, horizontalis. P. C. integra, parum rotundata. Spinæ dors. ordine longiores. Spinæ A. ordine duplo longiores precedentibus. Lin. lat. dorso propinqua, parallela. Squamæ versus caput latiores, margine striatæ, ferratæ. Cauda & P. C. cinerea, guttis flavis.

RAD. B. 5. D. $\frac{1}{3}\frac{2}{4}$. P. 19. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{24}$. C. 16.

LOHAJÆ. Arab. Arusa: vel Aruset el bâhr. عروسة البحر quod sponsam denotat; & cognominis loco interdum additur piscibus præstantioris formæ. Gr. Χαρόγυλος.

86. CHÆTODON SAXATILIS: albidus; fasciis transversis quinque nigris. (LINN.)

DESCR. Corpus ovatum. Dentes leviter emarginati, filiformes. Labia, Vertex, Opercula ut congenerum. Oculi subtus cineti annulo osseo, margine punctato. P. C. bifida. P. D. A. & C. nigro-fuscæ, basi squamis erectis septæ. L. lat. curva. Squamæ integræ.

RAD. B. 5. D. $\frac{1}{2}\frac{3}{7}$. P. 18. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{2}{15}$. C. 15? Long. spith.

DJIDDÆ. Arab. Gate, Gete, vel Gatqûit. أبو قنقوت non frequens; profunde inter corallia habitat. Est & alius hujus speciei minor.

87. CHÆTODON SORDIDUS; fusco-cinereus, ovatus, fasciis transversis obsoletis, quatuor.

DESCR. Dentes unius seriei, filiformes, æquales, contigui; apice obtusi. Labia, Nares, Oculi eorumque annulus osseus, ut congenerum. Opercula posteriora margine bidentata. Pinnæ cinereo-fuscæ. P. P. ovatæ, obtusæ. P. V. magis nigricantes, apice acuminatæ, & filo brevi terminatæ. P. A. & D. pone rotundatæ: basi carnosa, squamata. Spinæ

Spinæ D. squamis erectis septæ. P. C. flavescens, bifida, lobis obtusis. Sp. A. secunda duplo major prima. Interstitia radiorum squamata. *Dorsum* & *Abdomen* pone multum declivia. *Cauda* brevis, macula superne nigra. L. lat. dorso propior, non parallela: in cauda non evidens. *Squamæ* latæ, margine membranaceæ, vix dentatæ, *Color* cinereo-fuscus, sordidus, fasciis latis, transversis, pallidis. *Ramenta* parva post *Spinas* D.

RAD. B. 5. D. $\frac{13}{28}$. P. 19. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{2}{16}$. C. 14. Long. spith.

DJIDDÆ. Arab. *Abu defduf*. ابو دفوف inter corallia: rete capitur: *lapidus*.

88. CHÆTODON UNICORNIS fronte cornuta; cauda carinis utrinque duabus, elatis.

Nares unicornis

DESCR. *Corpus* ovato-oblongum, compressum, scabrum, cinereo-nitens. *Dentes* rigidi, unius seriei, conico-subulati: medii majores. *Labia* obtusa, superius fixum. Ante oculos *Cornu* horizontale rectum, conico-obtusum $\frac{1}{4}$ poll. altum. *Frons* recta, declivis. *Nares*, *Opercula* ut congenerum. Sub naribus *fulcus* lanceolatus, obliquus. *Branchiarum* apertura brevis: ibi incipit P. D. illa & P. A. ad *Caudæ* basin pergit. P. P. ovato-acuminatæ, ejusdem long. cum Ventr. P. C. medio truncata: utroque angulo lobum falcatum emittente. *Cauda* surgens: medio angustior: utrinque scuto duplici; priore rotundo, altero rhombeo. In utriusque medio *carina* quadranti-formis, compressa, rigida, pone rotundata, antice truncato-excisa, nigra, margine hyalino. L. lat. dorso propior, parallela.

RAD. B. 4. D. $\frac{6}{35}$. P. 17. V. $\frac{1}{4}$. A. $\frac{2}{31}$. C. 16. Long. 1. uln.

DJIDDÆ. Arab. *Abu garn*. ابو قرن i. e. *cornutus*. Frequentissimus: semper gregarius, numero 2 vel 400. Herbis vescitur, quas in ventre dissecti inveni. Caro non admodum grata. Jaculo vel rete; non hamo venatur. Retulit Piscator se vidisse *Aquilam* delapsam in gregem horum Chætodontum, qui adeo arcte se stipant; unde contigit, ut avis singulis unguibus totidem pisces corripuerit: qui varias in vias discedentes, unita vi *aquilam* lacerarunt.

89. CHÆTODON SOHAL; cauda utrinque carina ossæa, in fossula rubra.

Rhombote des sohal

DESCR. *Figura* ovata. *Dentes* una serie, contigui, crenati. *Caput* squamatum. *Opercula* integra. *Color* fuscus, lineis longitudinalibus violaceis: venter albicans. *Labia* æqualia. *Pinnæ* coriaceæ, violaceæ: pectorales macula flava. L. lat. obsoleta. P. D. a capite ad caudam con-

continuata. *P. A.* incipit in medio corpore, & terminatur ad caudam. *Cauda* medio truncata; angulis incurvis, duplo longioribus. In utroque latere *carina* longitudinalis ossea, rubra: recumbens in fossula rubra, & vulneris speciem referens. *Spina* pone & ante hanc carinam.

RAD. B. 3. D. $\frac{8}{39}$. P. 17. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{32}$. C. 16. Long. 3. spith.

Arab. *Sohal*: vel *Sahal*. سحل Aliis *Schausch*.

An *Chat. lineatus* LINN.? Dentes non sericei, numerosi; ut character

Chatodontis postulat: ista nota convenit cum *Sciæna*. Arab. *Boteit*.

Vicitat pulvere fundi marini. Caro nullius pretii.

90. CHÆTODON NIGROFUSCUS; cauda utrinque spina recumbente.

DESCR. Præcedenti proxime affinis. Differt: omnibus corporis partibus nigro-fuscis. *Pinnæ C. lobi* duplo breviores ipsa pinna, & falcati: *pinnæ* margo posticus, leviter albus. *Spina* lateralis caudæ hastato-subulata; erigenda tota e fossula. P. D. & A. radius spinosus primus sub cute reconditus.

RAD. B. 4. D. $\frac{8}{33}$. f. $\frac{9}{34}$. P. $\frac{1}{15}$. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{2 \cdot V \cdot 3}{26 \cdot V \cdot 27}$. C. 16. Long. 5. poll.

DJIDDÆ. Arab. *Tagā*. تق *Chatodon nigricans* LINN. ab hoc differt cauda integra.

90. b) GAHHM Arab. ægre ab hoc distinguitur; nisi colore undique nigro: basi P. C. violacea: Figura non oblonga, sed ovata. Dentibus non obovatis, sed lineari-obtusis, apice ferratis. Margo posticus P. P. parum flavescit. *Spina* D. & A. prima sub cute recondita.

RAD. B. 4. D. $\frac{8}{37}$. P. 18. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{2}{26}$. C. 16. Long. 3. spith.

In profundo versatur. Ludit tempore æstivo gregatim in superficie.

91. CHÆTODON BIFASCIATUS: cauda bifida, flava, fasciis duabus capitis nigris.

DESCR. Ovato-oblongus, argenteus: fasciis capitis nigris, latis una per oculos; altera per marginem operculorum. Vertex rugosus. Iris argentea. Labium superius longius. Dentes incisores utriusque maxillæ quini, validi, conico-obtusi. Maxillæ plenæ callis hemisphæricis, confertis, validis. Nares lineares: ante singulam foraminulum teres. L. lat. curva, dorso parallela, propior. Opercula anteriora, pone ferrata: posteriora pone acumine osseo. P. D. & C. flavæ: P. P. dimidio superiori flavæ, inferiori: albæ. P. V. nigræ. *Spinæ* D. & A. in fossa;

fossa; earum pars resupina squamis erectis: & pone angulo carneo.
Cauda protensa, linearis; pinna bifida. Spina prima P. A. quintuplo
brevior secunda.

RAD. B. 5. D. $\frac{11}{24}$. P. $\frac{9}{16}$. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{14}$. C. 17.

DJIDDE. Arab. *Rabagi* رباقي vel *Rabja* vel *Robgi*.

92. CHÆTODON PICTUS; albidus, lineis obliquis violaceis, fascia nigra oculorum & caudæ.

Chaetodon pictus L.

DESCR. Corpus compressum, fere rectanguli forma. Rostrum prominens. Labia æqualia. Vertex 5 lineis transversis fulvis. Fascia nigra per utrumque oculum, supra juncta. Utroque latere lineæ violaceæ, parallelæ: sex supremæ sursum ascendentes; reliquæ 12 deorsum. Fascia nigra obliqua per basin caudæ. P. D. nigra ante radios spinosos: pone rotundata ut & P. A. breviores P. C. quæ truncata, in medio lunula aurea, margine fusco. L. lat. curva, parallela margini P. D. Squamæ latæ, ferratæ, seriebus obliquis.

RAD. B. 6. D. $\frac{13}{8}$. P. 16. V. $\frac{1}{6}$. A. $\frac{3}{14}$. C. 17. *Mochhæ*.

93. CHÆTODON ABU DAFUR Arab. est caractere *Aruani* LINN. albus, fasciis tribus nigris: spinis Dors. 12. A. 2. *Djiddæ* habitat, rarior, inter corallia. spith. longit.

93. b) JAHÛD. جاهد an Chat.? pedalis long. Hamo venatur: caro inutilis.

93. c) HANNI: rostrum obtusum: dentes rigidi: molares obtusi plurium series: fasciæ 5, alternæ latiores: radii D. 3, 4, 5, inermes, longiores.

SILURUS.

94. SILURUS DOQMAK; pinna dorsali postica adiposa, ani radiis decem, *Baqus doqmak* branch. 2. cirrhis octo.

DESCR. Longitudo ulnæ & ultra. Corpus nudum. Caput depressum. Tentacula utrinque 4. exteriora longiora: extima labii superioris, longitudine dimidii corporis: extima labii infer. dimidio breviora. Dorsum convexum. Cauda bifida. L. lat. recta, supra dimidium corpus. Color piscis cinereus, subrus albidus. Radius primus dors. & pect. pone dentatus, osseus, sed apice mollis.

RAD. B. 2. D. 10. P. 11. V. 6. A. 12. C. 18.

In Nilo inferiori ad Deltam. Arab. *Doqmaq*. دواق

95. SILURUS BAJAD; *pinna dorsi postica adiposa; cirrhis 8.*

DESCR. Corpus magnitudine pedali. Color corporis & P. D. poster. (quæ adiposa) glaucus: reliquarum pinn. rufescens. Caput obtusum, depressum. Maxilla superior longior: intus duplici arcu transverso denticulorum permultorum. Tentacula seu cirrhi utriusque labii quatuor: In superiori laterales longissimi, ad medium P. D. adiposæ: medii ante nares, capite breviores. Inferioris maxillæ cirrhi extremi capite longiores. Caverna in utroque latere capitis ante oculos; magis conspicua, quum os aperitur. Supra P. Pect. aculeus fortis sub cute, retro spectans. L. lat. principio descendens; inde rectissima. Cauda recte protensa, versus apicem dilatata; pinna bifida. P. A. opposita D. adiposæ: quæ multo longior.

RAD. B. 5. D. $\frac{1}{10}$. P. $\frac{1}{11}$. V. 6. A. 12. C. 20.

In Nilo. Arab. Bajâd. بياض

96. SILURUS CORNUTUS; *pinnis pect. inermibus; radio pinnæ dorsalis primæ dentato.*

DESCR. Ovalis: a rostro ad caudam spithamalis. Rostrum rectum, compressum, apice parum recurvum, obtusum: dimidii corporis longitudine; ab oculis dimensum. Venter ante P. V. carinatus osse acuto. P. D. prima, radiis 3 pungentibus; incipiens post medium dorsi: primus radius ad mediam P. caudæ extensus, cultratus, striatus, rectus, acutus; subtus duplici ordine spinularum dentatus, ultra dimidium. Ad basin P. D. secundæ, corpus format angulum fere rectum; & pinna fita in declivitate; radiorum 6. P. C. rad 9.

MASSILIÆ. Gall. Chardonneret. Siccatum tantum vidi.

SALMO.

97. SALMO, Arab. ROSCHAL, رشال *pinnis albidis: caudæ dimidio inferiore rubro: colore argenteo.*

OBS. Est Hasselquistii Salmo dentex; quem Linn. ad Cyprinum rejecit: quamvis huc jure referendus. Membr. B. rad. 4. D. 10. V. 9. A. $\frac{1}{12}$. Dentibus subulatis, maximis. Dorsum fusco albidoque lineatum. Dentes prominentes, seu exserti.

97. b) SALMO NILOTICUS; Linn. est Arabum Rai: rad. D. 9. adeoque diversissimus ab Hasselquistii qui est Ægyptiorum NEFASCH. M. Br. ossibus 4. R. D. 23. dorso virescente: dentibus maxillæ infer. majoribus. P. C. basi squamata: quo caractere satis a congeneribus distinctus est: etiam a Thymallo, cui quoque R. D. 23, sed R. Br. 10. & dentes maxillæ superioris majores.

ESOX.

Hydrocyon, Farkali lu.
Alestes dentex M. Br.
Dorichadus niloticus M. Br. = Nefasch

ESOX.

98. ESOX MARGINATUS; pinna dorsali anique oppositis; linea laterali argentea; maxilla inferiori sextuplo longiori.

Hemirhamphus
marginatus Rlv

DESCR. Corpus lineare, utrinque attenuatum, lateribus parallelis: abdomine & dorso ejusdem crassitie. Long. sequispith. Altitudo crassitie s. squimajor. Caput supra horizontale, corpore angustius. Gula compressa. Labium superius triangulum æquicurum format horizontale, planiusculum; basi mobile & sponte surgens dum labium inferius deprimitur. Labium infer. sextuplo longius superiore; lanceolatum, depressum, planum, corneum. Dentes in junctura maxillarum numerosi, erecti, setacei, rigidi, parvi. Labiis conniventibus, inferiores extra labium superius prominent. Nares utrinque simplices, magnæ, reniformes, transversæ. Opercula ruda, integerrima. Oculi juxta verticem, parum remoti. Dorsum rectum, convexum. Abdomen rectum, planum; laterali linea marginatum usque ad P. V. Cauda attenuata, recta. L. lat a capite ad P. V. marginem abdominis constituit: dein elevatur, & oblique decurrit infra corporis medium: finitur sub apice P. D. Squamæ latæ, laxæ, integræ. Color totus albidus: dorsum & vertex fuscus. Vitta in utroque latere longitudinalis argentea, squamis crassioribus striatis. P. pect. juxta caput in medio latere, lanceolata, longitudine capitis (excepto labio infer.). P. V. pone $\frac{2}{3}$ corporis sitæ, ad marginem inferiorem utriusque lateris: pone excisæ: radio extimo & intimo incurvis, hoc longiore. P. A. glauca, extus flavescens: parva, triangularis: medio inter P. V. & C. P. D. extus flava: opposita P. A. sed major & latior. P. C. pectorali sequilongior, bipartita, lobis lanceolatis, inferiore, (quod peculiare) longiore. Superior pallide-flavus, margine postico fuscus.

Arab. Gambarûr, قنبر وى Djiddæ.

RAD B. 13. D. $\frac{2}{13}$. P. 11. V. $\frac{9}{10}$. A. $\frac{1}{10}$. C. 14.

Esoxi hepseto, LINN. valde affinis; & simul cum illo separandus in proprium genus, cujus character petendus a forma dentium & situ pinnarum. Qui in *Am. Acad.* designatur: labio infer. longiore, & P. A. differentibus; aut nova est species; aut prorsus diverſi generis.

98. b) FAR; Lohajæ: huic simillimus: supra lineam argenteam maculis nigris notatus. *Hemirhamphus* (at Ray

98. c) ESOX BELONE; Maris Rubri; linea laterali juxta abdomen; & pinnis pone excisis Rad. B. 14. D. 22. P. 13. V. 7. A. 21. C. 15.

Arab. Charman خرمان vel Choram.

ARGENTINA.

99. ARGENTINA GLOSSODONTA; *lingua basi tuberculis ossis dentata.*

DESCR. *Corpus* lineari-lanceolatum: facies Mugilis cephalis: *Color* argenteus, splendens: dorsum obscurius: venter albus: pinnae glaucae. *Caput* corporis latitudine, compressum, attenuatum, nudum. *Maxilla* superior longior apice conica, annulo nigro: non protractilis. *Inferior* intus in margine medio, callo æmulatur Mugilis carinam. *Dentes* in utriusque maxillae margine setacei, confertissimi, parvi rufescentes, multorum ordinum. In *palato* anteriore dentes setacei numerosi: medium palati nudum: in fundo dentes molares hemisphaerici, albi, validi, multi, in tres areas digesti: in parte linguae his dentibus subjacente, ejusdem indolis dentes plurimi. Tot dentibus basis linguae gibba, rigidissima: apex ejus albus, obtusus, nudus, mollis, gibbo isto dentato multo humilior. *Nares* duae orbiculatae, inter oculos & apicem rostri mediae. *Vertex* glaucus, modice declivis, planus, lateribus inter oculos tenuiter tuberculatus: medio sulco longitudinali, lato, obsoleto. *Oculi* iride argentea. *Opercula* nuda: anteriora linea longitudinali elata, undulata; pone in medio rugosa: margine postico emarginata. *Pylori* appendices 22. *Vesica aerea* coriacea, albida, cylindrica. *Squamae* latae, rotundatae, integrae, basi striatae, in lineas longitudinales imbricatae: quarum juncturae vittis longitudinalibus, obscurioribus a latere. *L. lat.* rectissima, dorso propior. *Br.* ossicula 8 evidenter: reliqua 5 exteriora in membrana coriacea quasi occultata; ut aegre transparent. Duae membr. br. sub gula uniuntur, rectae membrana coriacea, alba, striata, margine crenulata. *P. D.* in medio dorso, radiis utrinque alatis: pone ad basin glandula sphaerica albida, magna, unisulcata. *P. P.* in loco humili ac velut impresso recondendae, ut lateribus aequalia evadant. *P. V.* sitae sub basi dorsalis, remotae, & supra eas appendix membranaceus, triquetrum-lanceolatus. *P. C.* bifida, interstitiis squamatis. *Anus* ad apicem P. V. duplo remotior a P. A.

RAD. B. 13. D. 16. f. 18. P. 19. V. 10. f. 11. A. 8. C. 20.

DJIDDAE, Arab. Bönuk, بونك LOHAJÆ Bunuk.

100. ARGENTINA MACHNATA; *lineari-lanceolata, membr. br. ultra 30 radios.*

DESCR. *Caput* latitudine corporis: supra horizontale: subtus surgens. *Dentes* numerosi, subtilissimi, scabritiem referentes: tantum in maxillis, palato, linguae medio & basi. *Labium superius* brevius, recta protensum: in medio non protractile; ossibus lateralibus longis, mobilibus; lan-

lanceolatis, ad finem usque marginem dentato-scabris, membranæ dilatabili annexis; adeo ut eorum ope rictus valde dilatetur. *Labii inf.* latera, carina media longitudinali, valida, obtusa. Inter duas max. inf. *officulum* utrinque lanceolatum, utroque latere membranæ peculiari affixum; pone supra M. Br. apicem prominens, ossi Sepiæ simile; quale in aliis non vidi piscium generibus. *Nares* utrinque duplices, mediæ inter oculos & rostrum, contiguæ: posteriores longe majores, oblongæ, antè rotundatæ. *Oculi* grandes, vertici contigui: iride argentea. *Opercula* nuda, integerrima striis elevatis, pone membrana lata, striata, humiliore, appendiculata. *Vertex* planus; *fulco* latissimo, pone latiore, ovato, inter duas carinas obtusas, juxta oculos oblique striatus. *Dorsum* & Abdomen pari crassitie, lateribus parallelis. *L. lat.* parva, supra medium corpus; juxta caput parum descendens; inde rectissima. *Squamæ* mediocres, integræ, striatæ. *Color* piscis argenteus; dorso obscuriore, carulescente. P. D. A. C. glaucæ; P. A. & C. subtus flavescentes. P. D. & A. membrana erecta utrinque septa: earum pars anterior duplo elatior, triangularis: posterior humilior, linearis, tota inter membranas recondenda. Radii earum spinosi, filiformes, subflexiles; arctissime adhærentes radio sequenti. P. *Pect. & Abd.* flavescents, pone albidæ: ovato-acutæ: ejusdem magnitudinis: radio primo inermi, valido; auctæ appendice membranaceo, lanceolato, majori. *Situs* P. D. in medio dorso: V. ante D. P. A. propior P. C. quam V.

DJIDDE. Arab. *Machnat.*

RAD. D. $\frac{4}{24}$. P. 17. V. 15. A. $\frac{3}{17}$. C. 18. Br. radii sinistri 34; dextri 32: sæpius hunc numerum obtinui; in unico tantum variavit pisci. Ad genus Argentinæ hanc retuli ob dentes maxillæ, palati, linguæ, & pinnas V. multi-radiatas. Facies Clupeæ; sed abdomen non ferratum, verum obesum, rotundatum.

Hæc erat longa $2\frac{1}{2}$ spith. alta 2 poll. In dissecta, apparuit pylorus jecore circumdatus; sed appendices nullæ. Vesica aerea a capite ad anum protensa, hyalina, adhærens dorso & lateribus. P. C. est valde bifida, latere inferiori flavescens, lobis lanceolatis.

ATHERINA.

101. ATHERINA HEPSETUS.

Quam *Hasselquist* eodem descripsit nomine; aliquot notis differt ab Ægyptiaca: quæ digito longior non est, & digiti lati altitudine: dorsum crassum: abdomen attenuatum: venter planiusculus. *Corpus* pellucidum, hyalinum, & quasi nudum, licet squamatum: tantum e regione vittæ

longitudinalis opacum. *Maxillæ* denticulis minutissimis, plurimarum ferierum. In basi *Linguae* carina media elata, denticulis scabra. *Iris* macula fusca superne. *Oculi* rostro propiores. *Vertex* sine angulis, sed latus, planus, fronte decliva. *Opercula* divisa peculiari lamina subtriangulari. *Nares* prope labium simplices, oblongæ, perpendiculares, vix clausæ. *P. P.* vittæ insertæ: ventralibus duplo longiores. *P. D.* prima paulo post medium dorsum. *P. A.* ab ano remota. *L. lat.* duplex; non nigricans, sed tantum impressa. *Vitta* utrinque argentea, nitida, lata, recta, a *P. P.* ad caudæ apicem: alia, parva subtus a basi *P. V.* ad Anum: non vero ad inferiorem marginem puncta nigra.

RAD. B. 7. D. 6. 11. P. 16. V. $\frac{1}{6}$. A. 14. C. 17.

DJIDDÆ. Arab. *Abu geschgusch*: vel *Abu keskul*, vel *Keschkusch*.

102. *ATHERINA SIHAMA*; pinnis *V. subthoracis*; radiis *D. pinnae primæ undecim*.

DESCR. Magnitudo sesquipedalis. *Corpus* inter opercula postica crassius; inde attenuatum versus os & caudam: subpellucidum: Vittæ media argentea opaca, externe minus dignoscenda, nisi lumini obvertatur. *Caput* attenuato-depressum, subtus planatum. *Labia* obtusa, superius protractile. *Dentes* ut in precedente. *Oculi* pone capitis dimidium: iride albida, superne fusca. *Nares* utrinque duplices, propinquæ, rotundatæ, subæquales. *Vertex* inter oculos planus, squamatus. *Opercula*, *anteriora* pinguedine crassa, pellucida una serie ocellorum obscure-viridium, centro albo: *postica* squamata, integerrima: ab anterioribus divisa operculo medio, pone dentato, extrorsum serie ocellorum viridium, pupilla hyalina: serie ista utrinque sub gula continuante. *Squamæ* medioeres, rotundatæ, leviter denticulatæ. *Vittæ* utrinque longitudinalis opaca in medio corpore & alia subtus, incipiens a *P. V.* & definens ad *P. A.* *Color* totus albido-glaucus, dorso obscurior; pinnae omnes glaucae: sub vittâ puncta plurima nigra. *L. lat.* dorso propior; parallela juxta caput: in cauda recta & media. *P. Pect.* lanceolatæ; abdomini propiores; sub linea argentea. *P. V.* sub postica basi pectoralium; adeo ut pisces Thoracicus dicendus. *P. D.* incipit post *V.* & finitur supra regionem ani. *Anus* in medio corpore. *P. A.* opposita dorsali posteriori; cum expanditur truncata; complicata, leviter exacta; lobo inferiore brevior.

RAD. B. 6. D. $\frac{11}{11}$. 21. P. 16. V. 6. A. 23. C. 17.

LOWAJE. Arab. *Sjhâmi*.

CYPRINUS.

103. CYPRINUS BYNNI; *pinna dorsali radiis 13; tertio crasso, corneo.* *Bentus Bynni*

DESCR. Magnitudo cubitalis mensuræ. *Caput compressiusculum. Corpus* ovato-oblongum; totum argenteum. *Dorsum* declive per totam basin *pinnae*: *Abdomen* declive, per basin P. A. L. lat. infra medium corpus, sursum curva. *Cauda* linearis, parum surgens. *Cirri* oris 4; nonnisi ad nares pertingentes; inferiores crassiores. P. D. primæ 3 radii appressi sequenti osseo & quasi adnati, ut cum eo numerentur; quartus reliquis decuplo crassior subulatus; subtus canaliculatus, durissimus; apice terminatus cartilagine molliori; post hunc radii 10. P. C. bifida, acuta; rubra, basi alba. P. A. idem color. Reliquæ P. albidæ; margine crassiore rufescentes.

RAD. B. 3. D. $\frac{1 \cdot V. 3}{10 \cdot 12}$. P. 17. V. 9. A. 6. C. 19. Arab. *Bynni*. بني
Accedit ad *Cypr. Barbum*; sed huic abdomen curvum; & radius dors. fortis.

Niloticus, vulgatissimus, sapidus: quem omissum miror ab *Hasselquist*, sedulo investigatore piscium Niloticorum.

104. CYPRINUS NILOTICUS. Arab. *Lebès*. لبيس *Labes niloticus* *Cuv.*

Differt a *Cypr. rufesc.* *Hasselq.* quod huic radius *spinosus* nullus in P. P. Os sub capite. *Maxilla* superior, longior, obtusa, carnosa; utraque triplici margine gaudet: interiorem & extimum integerrimum: medium crenulatum.

104. b) *Varietatem* vidi, oris margine subtus duplici tertii loco erat utrinque caverna profunda, fistulæ similis. *Labes Forkschli* *Rybn*

105. CYPRINUS LEUCISCUS; (LINN.) *cauda subæquali, P. D. & A. ovatis.*

OBS. Duas vidi *Varietates*. Conveniunt: *Iride* alba: *Labio* superiore brevior *Verrice*, lato, plano; adeo ut *oculi* tribus suis diametris distent. *Litura* atrea longitudinalis in operculo postico pone. P. D. & A. ovata: C. vix exsecta. Color albus; dorsi obscurior.

Differunt. UNUS: *Dorso* a capite ad P. D. recto, fusco: *pinnis* glaucis: P. C. fasciæ nullæ: *lateralibus* versus caudam fasciis transversis, obsolete-fuscis.

ALTER: *Dorso* inter caput & P. D. curvo, glauco. *Pect.* & *V.* flavescens: P. A. fasciis obliquis flavis: P. D. nigro-punctata: P. C. fasciæ duplici transversa, lunata, nigra, retrorsum versa: pone eam ad marginem flavicante: corporis *lateralibus* argenteis, immaculatis.

DJIDDE. Arab. *Abu grymbi*. Aliis *Gubrumbi*. LOHAJE. *Budjenn*. بج

RAD. B. 4. D. 8. f. 9. P. 16. V. 7. A. 9. C. 17. Longit. pedis.

CLUPEA.

CLUPEA.

106. CLUPEA HAUMELA, lanceolata, nuda; pinnis V & A. nullis; dorsali per totum dorsum extensa; cauda lineari apterygia.

DESCR. Corpus sine squamis, politissimum, argenteum; versus dorsum compressum. Maxilla inferior, longior. Dentes subulate-compressi, validi, remoti, perpendiculares. Vertex planus, rhomboidalis. Nares simplices, transverse-oblongæ. Opercula cute communi obducta, nuda; pone utroque margine excisa; apice hyalina. L. lat. incipit a supremo angulo operculi non procul a dorso: inde mox descendit circa Pect., ac dein recta pergit ad apicem caudæ; abdomini propinqua & parallela. Cauda compressa, linearis; pinna nulla. Anus in medio corpore. P. Pect. basis ante apicem operculi. P. D. a nucha ad caudam continuata, colore glauco; & macula oblonga, longitudinali, argentea, cincta colore fusco. Post anum pinna nulla, sed Aculei 82 in cute reconditi; digito antrorsum moto sentiendi. Hac nota & facie intrat genus Clupeæ? quamvis P. V. desint.

RAD. B. 6. D. 133. P. 12. V. 0. A. 82. spinulæ. Long. 1. uln. lat. 2 poll.

MOCHMÆ. Arab. *Haumela*.

107. CLUPEA BÆLAMA, ENCRASICOLUS?

DESCR. Corpus lanceolatum, digito longius: dig. latum altum: compressum, argenteum: dorso fusco: P. V. & A. albidis: D. & C. glaucis. P. C. bipartita. P. D. incipit a fine baseos Ventr. & ejus basis finitur e regione ani. L. lat. rectissima trans medium corpus. Squamæ trilobæ, magnæ, deciduæ. Labium superius longius, obtusum, breve, conicum, fuscescens; annulo versus apicem ambiente impresso, hyalino. Vertex utrinque deflexus recti instar, carina media obtusa. Oculi iride rubra. Venter usque ad anum squamis carinatis scaber. Radii M. Br. transversî, æquales, pinnam linearem constituentes rectam a gula ad pectus.

DJIDDE. Gregatim natat. Tenuioris fortis homines salitam edunt: cæterum tantum pro esca venatoria; in quem usum servatur diu, sale condita.

Arab. *Lâaf* vel *Bælama*. Aliis *Sardin*.

RAD. B. 11. D. 14. P. 13? V. 7. A. 32. C. 18.

108. CLUPEA DORAB: pinnis ventralibus minutis, labio superiori dentibus porrectis bicorni; inferiori longiori, dentibus validioribus, erectis.

DESCR.

Chirocentrus dorab W.

DESCR. *Corpus* lineare, argenteum, dorso fuscum. *Labium* superius non protractile, recte protrusum. *Dentes* protensi, remoti, inæquales: duo medii majores, acutissimi. *Labium infer.* longius, magis dentatum, dentibus erectis, utroque latere senis, mediis sensim majoribus, subulatis. *Nares* utrinque binæ, obliquæ, propinquæ, oblongæ; posteriores majores. *Oculi* iride argentea. *Vertex* horizontalis; planatus, carina media valida, convexa. *Opercula* nuda, striato-rivulata. *Nucha* cærulea. *Color* totus argenteus: dorsum supra nitidum, cæruleum. *Squamæ* integræ, deciduæ. *L. lat.* recta, dorso propior; sed adeo obsoleta, vix conspicua. *P. D.* caudæ duplo propior quam capiti, ano opposita: media via dorsum parum gibbum. *Cauda* descendens. *Abdomen* rectum, acuminatum, ciliatum officulorum apicibus filiformibus, per paria prominentibus. *P. V.* vix videndæ; in pisce cubitali, unguem longæ. *P. P.* ala membranacea, lanceolata supra & infra: radius primus latus & validus. *P. D. & A.* membrana utrinque erecta. *P. C.* bifida ad basin.

DJIDDE. Arab. *Lyssan*. MOCHHE. *Machnat*. Dorab.

RAD. B. 8. D. 17. P. 14. V. 7. A. 34.

MUGIL.

109. MUGIL CRENILABIS; *pinna dorsali anteriore radiis 4. flexilibus: posteriore inermibus: labiis crenatis; inferiore bicarinato.*

Mugil crenilabis F.

DESCR. *Caput* supra squamatum, squamis laxis. *Corporis squamæ* latæ, carina media longitudinali, fusca. *L. lat.* obsoleta. *Labium* superius secedens a capite: inferius intus in medio bicarinatum. Utraque labia margine crenulata. *Spina D.* gracilis, flexilis; tres primæ pari crassitie, ordine breviores. *Spina V. & A.* quoque flexiles. *Pinnæ* omnes glauco-albidæ: caudæ lobi acuti. In basi P. Peçt. macula nigra, orbicularis.

In *Mari Rubro* frequens. Arab. *Arabi*.

RAD. B. 6. D. $\frac{4}{2}$ P. 17. V. $\frac{1}{2}$. A. $\frac{3}{11}$. C. 16. Long. $\frac{1}{2}$ uln.

109. b) MUGIL SEHELI; præcedentis forte varietas. *P. D. radii* rigidiores: *Labia* sine crenis & ciliis. *Carina* apicis in labio infer. fulco longitudinali, in duas carinas diviso. *Basis* P. Peçt. intus tota nigricans. *Vittæ* laterum valde obsoletæ. *P. P.* flavescens: V. albidæ: reliquæ glauæ.

RAD. P. 16. C. 14. Magnitudo $\frac{1}{4}$ uln.

K

Arab.

Arab. *Shéli*. LOHAJE: *Hari*. Cum plejades auroræ tempore occidunt hieme, prurit. Alia species *Mugilis Tobár*; طبار post occasum plejadum sociatur; cum pluvia & fulgur incidit.

109. c) ÖÜR, عوري labio utroque ciliato; inferiori uni-carinato; oculis pinguedine fere obtektis operculo, subius & lateribus, atque pone. Macula P. P. oblonga, obliqua. Vitta longitudinalis fusca, evidens.

109. d) Tâde طادة vel Ædda: labio unicarinato. Radiis pinnarum spinosis, rigidis. Spina dors. secunda longior prima. Labium superius subtilissime ciliatum. Macula P. Pect. nulla. P. V. D. & A. basi rufescentes. Caudæ lobi obtusi.

110. MUGIL CHANOS; pinna dors. unita; p. caudæ utrinque bi-alata.

DESCR. Oblongus; argenteus. Caput corpore angustius. Nares duæ teretes. Opercula nuda. Dentes & Cirrhi molles. Squamæ latæ, rotundatæ, tenue striatæ. Vertex planus, glaber sine squamis, glaucus. Labia integra: superius, medio emarginatum, a capite non sejunctum: inferius brevius; intus gibbo medio carinatum. L. lat. juxta caput sursum recurvata, dein rectissima, dorso propior. P. D. in medio dorso septa membrana erecta, libera, hyalina. P. Pect. & V. supra appendice membranacea, lanceolata. P. A. utrinque membrana. Cauda squamis rotundata: pinna valde forficata; versus medium utroque latere alis duabus membranaceis. M. Br. sub gula membr. coriacea nexæ & marginatæ. Inter radios branch. & operculum est Officulum latum; nescio utrum radiis an operculo adnumerandum.

RAD. B. 4. D. 14. P. 16. V. 11. A. 9. C. 20. Long. 1. Uln. Argentinæ accedit ob pinnam D. unicam, & Ventr. multiradiatis: at *Mugil* nominandus ob labium carinatum & dentes nullos; nec Vesicam aeream inveni similem Argentinarum.

DJIDDÆ. Arab. *Anged*. عنجد

110. b) Iste, *Anged*, sola magnitudine differt ab alio 3 uln. long. Græc. Χάνος. Turc. *Chani*.

MORMYRUS.

111. MORMYRUS KANNUME; rostro decurvo, prominente: pinna D. lineari, longitudine corporis dimidii.

DESCR. Corpus adeo compressum, Color albidus. Abdomen a capite ad anum rectum; inde surgens. Cauda linearis; pinna bifida, obtusa. Rostrum

Rostrum conico - deflexum, labio inferiore longiore. *Dentes* emarginati. *L. lat.* recta per medium corpus. Apertura branchialis perpendicularis. *P. V.* mediæ inter pect. & ani. *P. D.* linearis: ante *P. V.* incipiens; continuata ad *P. C.*

RAD. D. 63. P. 15. V. 6. A. 17. C. 20.

DAMIATÆ. Arab, *Kannûme*, قنومة

BALISTES.

Balistes asper

112. BALISTES ASSASI.

DESCR. Parvus: fuscus: ventre albo: *anus* niger, annulo fulvo. *Cauda* macula oblonga, alba, in qua triplex ordo verrucarum nigrarum. In *Vertice* inter oculos fasciæ transversæ, cæruleæ 4; tribus nigris alternantibus. *Iris* aurea. Ab oculo ad basin *P. Pect.* linea lanceolata nigra; ante eam linea lanceolata flava, margine albo-cærulescente. *Labia* flava. Ab ore ad basin *P. Pect.* linea ferrugineo-fusca. Corpus totum verrucis fuscis muricatum. *P. D.* anterior nigra recondenda: radii primi verrucoso-spinosi. *P.* reliquæ pallide-rufescentes.

DJIDDE. Arab. *Djemel* دجل vel *Azzazi*. عزازي Edulis; insipidus; spithamæ magnitudinis.

OSTRACION.

113. OSTRACION TURRITUS; *superciliis dorsoque spinis solitariis; abdomine spinis utrinque quatuor.*

Ostracion turritus L.

DESCR. Sub-tetragonus, tuberculatus: *cute* ossæ hexagonis contexta; futuris pellucidis; punctis elevatis multis scabra. *Crusta ventris* latissima, plana, ovata; antice attenuata, pone obtusa, sub ore emarginata, utroque latere *Spinis* 4. retrorsum spectantibus, versus caudam remotioribus. *Crusta* supra caudam triangularis, obtusa, ab utroque latere magno sinu emarginata. *Dorsum* convexum, lateribus marginatum: in medio *Gibbus* elevatus, compressus, triangularis: supra spina brevi, erecta, retrorsum versa. Totum corpus incrustatum; præter labia, caudam & pinnarum basin. *Frons* perpendicularis, rotunda, convexa, inter oculos depressa. *Oculi* plus duplo suo diametro remoti; iride aurea: ante utrumque foveola nigra, impressa, puncto medio albo, forte perforato. *Color* crustæ cinereo-flavicans: partium nudarum, fuscus: caudæ, cinereus, guttis fuscis. *Latere* declivi-concava.

RAD. D. 9. P. 10. A. 9. C. 10. Longit. 4 poll. lat. 2 poll.

МОСННÆ. Arab. *Djémel*. An huic vel priori genuinum nomen, nescio.

TETRAODON.

Mayraion fahaca 114. TETRAODON LINEATUS. Arab. *Fahaka*.

DESCR. *Corpus* quadragonum. *Squamæ* nullæ; sed *Aculei* retrorsum spectantes multi, appressi, & apice tantum exstantes cute: unde corpus asperum ab apice ad medium dorsum: deinde puncta impressa & latera glabra, sine aculeis & punctis. *Cauda* integra. *Labia* crassa, laxa, interne papillosa. *Dentes* incisores lati, in utraque maxilla duo; inferiores emarginati. *Iris* aurea, pupilla nigra. *Color* abdominis flavo-rufescens: Caput & dorsum glauco-cærulescentia: latera fusco-cærulescentia, *lineis* latis utrinque 4: quarum duæ supremæ utrinque obsoletæ, curvæ; tertia antice bifariam divisa, instar literæ V: infima alba, lata. *Frons* coarctata, glabra: tuberculis duobus ante oculos contiguus, & apice cirrhis instructis binis, brevibus. *Nares* pone illos. Piscis per os inflatus, distenditur in globi formam propter laxam abdominis cutem.

E *Nilo*. RAD. D. 12. P. 19. A. 9. C. 10.

INSECTA.

77

SILPHA.

1. SILPHA MULTISTRIATA; cinerea; elytris striis plurimis; thorace emarginato.

DESCR. *Facies* & magnitudo *Silphæ fabulosa*. Tota cinerea: striis in singulo Elytro 8. excavatis; interstitiis, microscopio visis, tuberculatis.

Alexandriæ sub herbis, rarius.

CHRYSOMELA.

2. CHRYSOMELA VIRIDI-CÆRULEA; ovata; elytris striis quinque.

DESCR. *Facies* & magnitudo *Chrys. graminis*. Color: caput, antennæ, pedes, pectus, abdomen cærulea: Thorax elytraque viridi-ænea. Thorax punctatus, marginibus rugosis, cæruleis. Elytra striis quinque, punctis sparse geminatis.

Alexandriæ, verno tempore rarius. Pulchrum animal.

CICINDELA.

3. CICINDELA LITTOREA; violaceo-ænea; elytris lunulis quatuor, cum margine confluentibus, albis.

DESCR. *C. campestri* paulo minor. Color capitis, antennarum, thoracis viridi-æneus: pedes ænei: abdomen æneo-violaceum: frons & maxillarum basis alba. Thorax quadratus, superne pilis albidis paucis, subtus inter pedes nudus, lateribus hirsutus. Abdomen medio nudum, versus latera vestitum hirsutiae alba. Pedes pilosi. Elytra obscure viridi-ænea, margine exteriori albo-flavicante. Cum hac albedine connectuntur lunulae 4 ejusdem coloris: harum anterior perpendiculariter fere e margine exit: secunda duabus componitur, una perpendiculariter e margine egrediente altera descendente & futuram fere elytrorum pertingente: tertia lunula & quarta ad basin elytrorum jacent rectae fere & erectae.

Suës, inter urbem & naves in brevibus sabulosis refluxente aqua discurrit, praesertim occidente sole.

CARABUS.

4. CARABUS SERRATOR; coleoptris ovatis, subplanis, pone truncatis, nigris, maculis inæqualibus, albis.

In desertis *Kahirinis* rarior. Sui generis pulcherrimus, magnus, apterus. Elytrorum margines subtiliter denticulati, quibus dum femora postica velocissime affricat, mirum magnumque producit strepitum.

TENEBRIO.

5. **TENEBRIO ARUNDINACEUS**; *alatus; obscure ferrugineus, villosus; antennarum tribus ultimis articulis orbiculatis, majoribus, pallidioribus.*

DESCR. (Microscopii ope instituta.) *Structura* tota ut in *Tenebr.* congenerebus alatis. *Longitudo* sesquilineæ, seu Pulicis maximi; sed angustior. *Corpus* lineare, coloris castanei, seu obscure-ferruginei, velut ex pulvere albido sordidi: quod sub microscopii luce videtur provenire ex villis albis. *Oculi* nigri. *Antennæ* longitudine thoracis cum capite, extrorsum crassiores, pilosæ: articulis undecim, quorum 8. inferiores oblongiusculi, reliqui tres majores orbiculati, verticaliter compressi, reliquis pallidiores. *Thorax* subquadratus, marginatus, punctatus. *Elytra* thorace una cum capite duplo longiora, linearia, obtusa, striis tenuissimis, punctatis, villosis. *Pedes* ejusdem cum corpore coloris: quatuor anteriores propinquissimi, postici remoti.

- Obs. 1) Tenebrionum alat. tanta videtur cum Carabis affinitas, ut vel genere jungantur, aut certe a Tenebr. Apteris, ipsa natura sic suadente separantur.
- 2) In Insulis Niloticis KAHIRÆ reperi initio Junii 1762 in culmo *Arundinis niloticæ* inter corticem & medullam farinam nigro-bruneam; in qua paulo profundius *Vermiculi* albi habitabant, Tenebrionis hujus, sine dubio Larvæ & pulveris illius architecti. Quo altius descendebatur, eo durior, pallidior magisque cohærens farina inventa est; donec demum in infimo caule manebat medulla adhuc alba & intacta. Hæc enim Arundo pulpa repletur albida, quæ vero jam in summitate culmi, cortice delapso extravasata; arida, sinuosa protumuit. Media pars simili modo exarida undosis plicis corrugabatur, quarum sinu hærebat ista farina. Suspicor spicas segetum effici nigras & quasi adustas ejusdem hujus Insecti vel haud absimilis arrosione; illas quippe aggreditur eo tempore, quo in culmo adhuc demersæ sunt, ubi plus pabuli invenit quam in segetibus ipsis, quarum medulla culmi parcior est corticique adhæret. Fieri ergo potest, ut semetipsum hac farina & latente in illa Insectorum progenie inquinatum, terræ dum committitur, noxam lata vicinia diffundat. Si res ita se habeat, animal istud inter nocentissima & hanc ob causam maxime notanda numerabitur. Minima sæpe Insecta gravissimam inferunt perniciem.

Cerealia sic arrosa & exusta sæpe inveniuntur. Vocatur ista nigredo Arabice *عين البنت* *Ajn el bint*; id est: *Oculus puellæ*; quia iste color oculorum, nativus vel pictus sexum decet.

6. **TENEBRIO ÆGYPTIUS**; *apterus; thorace subrotundo, antice & pone truncato; elytris obsoleto punctatis, striis tribus elevatis, lavibus; dorso planiusculo.*

Kahiræ. Mediæ magnitudinis.

7. **TENEBRIO LEVIS**; *apterus; nitens, thorace suborbiculato, marginato; elytris lavibus marginatis.*

Facies

Facies & magnitudo Carabi minoris. An Ten. caraboides? sed elytra marginata, non carinata.

Alexandriæ sub herbis.

8. TENEBRIO HISPIDUS; apterus; totus supra setis hispidus: thorace teretiufculo.

DESCR. Magnitudo Carabi majoris. Caput superne leviter hispidum, ut & pedes. Antennæ setis obsitæ, ferruginescentes, præsertim in apice: articulo ultimo reliquis multo minore & punctiformi. Thorax teretiufculus, tuberculis setiferis magis hispidus, ante & pone truncatus, linea marginali longe infra dimidium. Elytra apice truncata, supra subtusque striis plurimis tuberculatis, etiam sub margine. Cuique tuberculo seta infidet rigidiuscula. Omnes setæ corporis ferruginei coloris. Abdomen villosum.

Alexandriæ in hortis sub farmentis aridis captus mense Septembri: non frequens. *Kahira* copiosior.

Tenebr. 8, 9, 10 appellant Arab. vulgariter *Gomfifj* vel *Chón-fir*. جنس جنس sed in *Yemen* vocantur *Fæzaz*.

9. TENEBRIO VULGARIS; apterus; ater, elytris latere carinatis, singulis serie tuberculorum duplici: thorace planiusculo, pone spinoso, margine acuto.

DESCR. Totus ater, exceptis apicibus antennarum ferruginescentibus. Magnitudine brevior pollice. Elytra pone dilatato-rotundata. Thorax fere planus, ante valde emarginatus, pone truncatus; lateribus rotundatus, dilatato-marginatus, margine acuto surgente: in quibusdam utrinque in spinam pone exeunte. In medio thoracis disco lunula transversa elata, cornibus antrorsum spectans. Forma ergo thoracis plana, obstat quin ad *Tenebr. angulatum* referatur, quamvis in cæteris conveniat & loco natali communi.

Ubique in campo & hortis vagans.

10. TENEBRIO POLYCHRESTUS; apterus; elytris mucronatis, singulis striis novem elevatis.

DESCR. Totus niger. Longitudo sesqui-pollicis. Antennæ caput thoracemque exæquant: articulis 4 ultimis lentiformibus, ferrugineis: reliquis lineari-clavatis, nigris. Palpi duo, longiores: articulo ultimo latiore, compresso, apice truncato, pallido. Thorax convexus, nitidus, ante & pone truncatus villisque ferrugineis ciliatus: lateribus linea elevata marginatus. Elytra ovata: subtus, ubi latera abdominis amplectuntur planata, linea elata ambiente: altera linea lateribus carinata. Huic carinæ & futuræ interjacent in quovis elytro 9. striæ leviter elevatæ,

vata, pone concurrentes, infima obsoletiore. Interstitia striarum subrugosa. Apice demum utrumque elytron depresso-planum exit in *mucronem* rectum, linearem, obtusiusculum, superne teretem, transverse-obsolete striatum; versus apicem puncto magno impresso: subtus planato-excavatum. Nonnulli mucrone instruuntur perbrevis. *Pedum* tibiae & plantae hamis geminatis terminantur. *Femora* exterius subcompressa; subtus planata, bicarinata. In unico tantum, non in reliquis, *Maculam* vidi pilis ferrugineis constantem in medio unius futuræ, sub abdomine, post pedes.

An *Ten. mortifagus*? quamvis nostro longe minor, nec elytris, quantum mihi jam constat, striis elevatis.

In hortis ubique inter quisquilias.

- Obs. 1) Foeminae Turcarum liberae atque servientes albae *arrem saginandi* invenerunt in his Tenebrionibus; dum tres quovis mane & vespere butyro coctos comedunt simul cum liquamine.
- 2) Contra *Aurium dolorem*. Tenebriones aliquot coque cum oleo puro: hujus 2. aut 3. guttulas auri infunde; prompta medicina, vixque tribus vicibus repetita curat.
- 3) Contra *Morsum Scorpionis*. Tenebr. 4. vel 5. vivos, hoc enim palmarium est, in aquae copia sufficienti coque aperte, spatio $\frac{1}{6}$. horæ. Sic decoctum obtinetur colore rubicundo & sapore coffeæ. Scorpione læsus bibat scyphulam unam alteramve, vulnereque Tenebr. dissectum imponat: præsentissimo auxilio dolor avertitur; qui his in oris intensissimus esse solet per 24 horas, postea sponte cessans; rarissime enim morsus Scorpionis lethalis est.

11. TENEBRIO COTHURNATUS; *apterus, niger, thorace laevi, utrinque antice unidentato; elytris tuberculatis, striis 2 elatis.*

DESCR. Magnitudo Mortifagi. *Statura* peculiaris: dorso fat gibbo, parte anteriore humili brevique. Hanc ob causam, quum incedit pone multo altior apparet.

Kahiræ in desertis frequens; in urbe repertus rarior.

12. TENEBRIO ALEXANDRINUS; *niger, thorace spina utrinque obtusa, antice gibbo supra caput: coleopteris obtusis, striis quatuor aculeatis.*

An muricatus Linn.? Mortifago multo minor.

In desertis ruderatis *Alexandriæ*, verno tempore.

13. TENEBRIO SPINOSUS; *apterus; niger, thorace teretiusculo; elytris marginè laterali ferratis, singulis striis tribus spinosis, interjectis tuberculis acutis.*

In Desertis *Kahirinis*. Ex majoribus.

GRYLLUS.

14. GRYLLUS VIRIDIS; thorace depresso, ciliato, pedibus anticis spinosis; elytro singulo macula flava.

DESCR. Pedes antiqui reliquis multo crassiores eorumque femora carina antrosum unica, aculeata: tibiæ carina antrosum duplici, aculeata.

Alexandriæ in hortis.

15. GRYLLUS GREGARIUS.

DESCR. Facie & magnitudine prorsus convenit cum Gryllo migratorio: sitne tamen ejusdem speciei determinent alii. Vidimus illum maximo grege supra Kâhram volitantem, d. 23. Dec. 1761. & in hortos plateasque frequenter decidentem. Characteri in Syst. N. dato obstant maculæ Elytrorum magis confluentes in fascias transversas curvas, & color non totas maxillas induens niger, sed apice tantum, reliqua earum parte ejusdem cum capite coloris ferrugineo-lividi. Antennæ fusæ, longitudine capitis cum thorace. Thorax unico segmento constat: parte dimidia anteriore compressa ac multo arctiore, notata lineis 4. transversis, impressis: prima, seu marginali remotiore, obsoletiore: carina longitudinali obsoletiore. Pars dimidia posterior latior, supra basin elytrorum dilatato-plana, punctis plurimis excavata; pone marginata, longitudinali media elata.

Obs. *Gryllum gregar.* Arabes ubique vocant *Djerâd* جيران & *Judæi* in Yemen habitantes illum esse גרילא asseverabant. Beduini Ægypti gryllos hujus speciei, vivos torrent super carbones; alii deinde pedibusque rejectis, avidè consumunt. In Arabia Felici inter Mochham & Tâas vidi foeminas puerosque his aviculis venandis intentos, quas filo per thoracem deducto suspendebant usque ad 100, & pretio $\frac{1}{2}$. *Chomas* offerebant. Fasciculus totus assatur. Gryllo non solum pedes & alæ abripiuntur, sed & intestina, quæ capite aliquantum protrahito nudantur. Exsuccus certe cibus; innoxius tamen: nisi quod nimius ejus usus segnem caussset sanguinem vel temperamentum melancholicum, ut perhibent Arabes, illisque dicitur *Souda*. Ridiculam ceteroquin audiavi apologiam hujus alimenti: Gryllus vegetabilia pascitur pura, utilia, imò & medicatæ virtutis; fieri ergo non potest aliter, quin ipse salubris totus evadat. Parum tamen consumunt incolæ, ut numerum hujus infestis gregis vel tantillum minuant. Simplici non minus quam inutili artificio illum volentem abigunt ex agro in agrum ope panni bacillo longo affixi. Tota examina quovis passu provocavi; tanta eorum copia his in locis jam erat. Dum agmine facto alte volabant, aer e longinquo fumi speciem monstrabat. Transientes Grylli super verticem nostrum sono magnæ cataractæ fervebant. Ajunt Arabes Gryllum non depascere Cerealia matura & jam rigida; quod veritati consentaneum inveni; *Zea majs* enim & *Holci durra* folia, quæ $\frac{1}{2}$. ulnæ longitudinem assequuta fuerunt, margine tantum subinde erant arrosa.

Turdus felseuc. Nazolia, Gryllivora, estimandus certe propter hæc officia; quemque occidere vetuerunt Turcæ Edicto publico, vel solo Alcorani monitu; in quo libro nomen & famam habet. Virtus ad sanctitatem evecta inde ad fabulam delapsa, statuit avem hanc quotidie 10000. Gryllos occidere!

16. GRYLLUS MONSTROSUS.

DESCR. *Caput* cordatum; vertice conico, antice planiusculo, tricarinato, apice bidentato. *Frons* in spinam inter oculos erigitur. *Oculi* flavicantes, lineis longitudinalibus fuscis. *Antennæ* articulo infimo cylindrico, albido: secundo: sphaerico-fuscescente; reliqua earum parte fuscae, articulis numerosissimis; teretes, subulatae, versus apicem filiformi-setaceae. *Thorax* medio longitudinaliter convexus, crassior, puncto utrinque impresso: sed ante medium notatus angulo utrinque impresso: latera ambit membrana lata, rotundata, patens, rigida, ferrata. *Pedes* antici multo crassiores, spinosi: ceteri tenuiores, ad apicem femorum membrana denticulata, rotundata instructi. Immaturum vel pullum hunc Gryllum haud crediderim, quum recurvationi abdominis semper impedimento essent *Alæ* & *Elytra*, jam rudimentis parvis conspicua. Eorum quippe locum occupat abdomen ovatum, prorsus reflexum, atque propter talem suum situm, superne imbricatum quintuplici ordine squamarum membranacearum: quarum duo ordines marginales patentes, simplices: reliqui tres ordines erecti, medius quoque erectus, sed squamis fornicatis compositus. Omnes hæ squamæ proveniunt ex futura articulorum, quinque locis dilatata in membranulas: unde mira bestiolæ hujus oritur figura.

Alexandriæ ad salinas portus veteris.

PHALÆNA.

17. PHALÆNA PROFUGA; noctua; spiri-linguis; larvis; alis deflexis, fusco-viridibus, fasciis flavis: inferioribus rubris, maculis inaequalibus, nigris.

DESCR. Magnitudo *Phal. Caja*. *Caput* pallide flavum. *Oculi* magni, nigri, pupilla fusca: puncta nigra 2 utrinque pone antennis: macula nigra in media fronte. *Lingua* spiralis, testacea, longitudine si extendatur, antennarum, sita inter palpos flavos, utraque extremitate nigras. *Antennæ* setaceae, alis dimidio breviores, cinereae, subtus carina nigra. *Collare* albidum, margine undique fulvum, superne maculis 2 nigris, triangularibus, inter quas rima protenditur. *Thorax* albidus, lineis 3 cuneiformibus, latis, nigris, longitudinalibus. *Pectus* cinereum, punctis utrinque 3 nigris. *Dorsum* laeve, ferrugineum, punctis 7 nigris, solitariis in singulo segmento. *Abdomen* cinereum, triplici serie punctorum nigrorum in quovis segmento. *Pedes* cinerei: primum par notatum

notatum ad basin puncto nigro; tibiis extus nigro punctatis & pollice ferrugineo introrsum juxta basin instructis: medii paris tibiæ extus nigro punctatæ, introrsum spina gemina in geniculo medio: paris postici tibiæ immaculatæ, spina gemina in medio gaudent. *Alæ* rotundatæ: *superiores* subtus flavæ, maculis inæqualibus nigris, rubris albisque: superiore disco fericeæ, obscure-virides, margine inferiore pallide-flavo; fasciis 4 pallide-flavis: prima ad basin obliqua, minima, marginem internam non attingens: secunda pone medium alæ obliqua, paululum spinosa, latior, ante marginem internam desinens: tertia ultra alæ medium obliqua, subsinuosa, apice interiore confluens cum fascia postrema, ibique *denticulos* emittens tres, unum sursum spectantem, duos deorsum. Inter fascias obliquas ad marginem externum *lineola* albida, obliqua, introrsum terminata lineola nigra. Fascia quarta transversalis, recta, angustior, flava, ad angulum alæ posticum internum dilatata ibique, margini propius maculis 4 subrotundis, fuscis notata; quibus alia major, nigra imminet. Extrorsum juxta maculas marginales lineola longitudinalis, nigra: inter hanc & marginem alæ externam striæ 5 impressæ, ejusdem longitudinis. *Alæ inferiores* plicatæ, subsericeæ, rubræ, margine postico pallidiore, maculis 4 nigris, inæqualibus; quarum prima ovata, in medio fere alæ: reliquæ tres ad marginem posticum sitæ; intima puncto grandiore non major: media quadrangularis: tertia maxima, duabus appendicibus truncatis pone aucta. Alæ subtus ferrugineæ, macula punctisque nigris.

In *Archipelago* prope Insulam Meteline excepta in navi.

CYNIPS.

18. CYNIPS; SYCOMORI, APTERA.

DESCR. Longitudo lineæ: crassities fili tenuioris. *Corpus* depressum: statura sapius incurva. Totum animal 4 articulis subæqualibus constat: *Capite*, cui *antennæ* breves insident: *Thorace*: tertia parte constante tribus paribus *Pedum* & *scutello* supra, antice. Ultimus articulus basi dilatatus utrinque *aculeum* emittit, inque medio terminatur apice: intus transparent venæ duæ undulatæ, in cæteris partibus non adeo manifestæ. *Pedes* ferruginei, pellucentes, remoti fere omnes post mediam corporis zonam.

Obs. *Ab Alara C.* quam descripsit *Hasselquist*, hæc aptera differt corpore longiore, & aculeo postice utrinque uno, transverso, reflexo; an vero hæc nota speciei vel tantum sexus sit, incertus hæreo.

Excluditur in Sycomori foeminei germine singulo, quod inde, quasi foecundatum tumescit. (vide plura Plantar. Centur. VI. 100.)

VESPA.

19. VESPA QUADRI-PUNCTATA; capite thoraceque ferrugineo; fronte flava; abdominis fasciâ duplici flava, posteriore latiore, quadripunctata.

DESCR. Magnitudo Vespæ vulg. Caput villosum. Oculi nigri: inter illos triangulum obversum, flavum. In vertice tria puncta elata, nigro-nitida, oculi-formia & in modum trianguli disposita. Maxillæ prominentes, tridentatæ, ferrugineæ, margine nigræ infra Labium, quod emarginatum, subrotundum, flavum. Antennæ flavo-ferrugineæ, verficolores, longitudine fere thoracis. Thorax villosus, ferrugineus, im-maculatus, cujus coloris quoque sunt Pedes. Abdomen ovatum, fuscum: segmenti primi margo posticus supra flavus: secundum fuscum, latum: tertium undique flavum, superne punctis duobus nigris, totidemque subtus: quartum supra flavum, punctis 2 nigris, subtus fuscum; reliqua duo tota fusca.

Kahiræ frequens.

FORMICA.

20. FORMICA SALOMONIS; (Linn.) capite ferrugineo; thorace compresso; pedibus fusco-ferrugineis; abdomine villosa nigro. Inter thoracem & abdomen binodosa.

Formicis vulgaribus nostris persimilis, sed major. Cuniculos sub terra agit. Alexandriæ non infrequens.

21. FORMICA EDAX; capite abdomineque fusco; thorace testaceo, pone bidentato.

DESCR. Inter minimas est. Corpus villosum. Antennæ & Pedes toti testacei. Caput subtus rufescens. Inter thoracem & abdomen nodi duo testacei. Thorax pone spinis duabus, nudo oculo non conspicuis.

OBS. 1. A Brownii & Linn. non aliter differt hæc nostra, quam capite superne fusco; nam cæteris notis & molesta in ædibus præsentia convenit, sæpius insecta musei nostri devastans, donec Camphoræ antidoto avertetur.

2) Hujus speciei vidi plures capite & abdomine subæquali. Inter has rarius incedebat una alteraque, structura quidem cæteris similis, sed duplo grandior, capite fusco-rufescente & abdomine sesquimajore. An varietate vel sexu ut mariti & foemina se distinguunt a minoribus operariis & neutris?

22. FORMICA MALIGNA; parva, nigra, unisquamosa: Arab. Kâamûs.

Venenata, pungens dolore ut ex scorpionum morsu: qui levatur affuso Basilici recentis succo.

23. FORMICA

23. a) FORMICA ANIMOSA, *rubra*. Arab. *Kâas*.

Minor quam F. 22. Habitat in ligno. Oeconomis grata ob utile odium quo persequitur Formicas DHARR, *Phoenicem dactyliferam* exitiose infestantes. Ad hanc militiam conducitur acervatim *Heml* (onus Cameli) imperiali pretio.

23. b) INSULTANS; *nigra*. Cum *rubra* bellum gerit continuum; sed virtute inferior.

TABANUS.

24. TABANUS TESTACEUS; oculis albidis, margine & linea transversa fusco-virescente; dorso testaceo, lineis duabus nigris.

DESCR. Oculi punctati, punctis impressis. Rostrum nigrum. Antennæ testaceæ, apice fuscæ. Pectus & Frons alba, villosa. Thorax lineis aliquot fuscis obscurus. Abdomen testaceum. Pedum tibiæ & plantæ testaceæ: femora fusca.

Ubique, equis infestus. Arab. *Tajaq*.

CULEX.

25. CULEX MOLESTUS; antennis pilis verticillatis; rostro cinereo, apice nigro, crassiusculo; dorso fusco, fasciis sex pallidis.

DESCR. Magnitudo & facies *Culicis vulg. pipientis*. Oculi virescentes, globulis numerosissimis constantes. Frons fusca ut & Thorax. Rostrum subelavatum, sive crassius versus apicem & nigrum; inferiore parte cinereum. Antennæ setaceæ, rostro paulo breviores, pilorum majorum verticillis patentibus, circiter 13, ut mihi videbantur, ad basin singuli articuli. Nudo quidem oculo cernuntur, sed ægre; at illis interjecti pili densi, erecti, parvi; microscopio intuendi erunt. Pectus & Abdomen cinereo-albidum. Dorsum fuscum, futuris articulorum 6. vel 7. pallidis. Torum Corpus & Pedes pilosi: femora cinerea: tibiæ fuscæ. Alæ fuscæ, margine postico ciliatæ. Halteres cinerei, clava fusca.

Rosetta, *Kahira* & *Alexandria* immensa copia, nocte incommodus dormientibus & vix arcendus nisi cortina bene clausa.

ARANEA.

26. ARANEA SECTOR; abdomine ovato, circumcirca octodentato. Tela diametris secta. Rete construit horizontale, intertextum radiis quatuor undulatis, ad angulum rectum, seu cruciatim positis.

Reperta prope montem *Meihân* in *Yemen*.

27. ARANEA CITRICOLA; *Abdomine ovato, utrinque bidentato, ano bifido.*
Kahiræ in arboribus Citri, retia pandens horizontalia vario ordine per-
texta.
28. ARANEA RIVULATA; *abdomine oblongo cylindrico, fusco; dorso & ventre*
in media parte bruneo-dentatis: lateribus albo-rivulatis.
 DESCR. Inter minores. *Thorax vitreus, orbiculatus, medio impressus.*
Pedes subnudi: antici corpore quintuplo longiores. Texturam horizon-
talem struit, sine serierum ordine.
Kahiræ in ædibus frequens.
29. ARANEA INSIDIATRIX; *abdomine ovato, fusco-sericeo, pectore depresso,*
glauco, linea marginali & triangulo pone oculos fuscis. Tela laqueata.
 DESCR. Mediæ magnitudinis. *Oculi argenteo colore lucent. Abdomen ni-*
tens. Thorax fuscior. Maculæ duæ flavæ sub abdomine juxta thora-
cem. Pedes fere glauci, sine pilis: longissimi: antici corpore sesqui-
longiores.
In Ægypto frequens parietum foramina vestit tela cylindrica, in cujus fun-
do delitescit. Tubulum vero hunc extus undique ambit rete radi-
ante, & muscam errore implicitam, in foveam abstrahit suam.
30. ARANEA TRIFASCIATA; *abdominis dorso ovato, albido, lineis transversis*
nigris novem, fasciis latis niveo-sericeis tribus.
 DESCR. Inter majores. *Maxillæ atræ, nitidæ, anteriore latere albidæ. Palpi*
longitudine thoracis, filiformes, flavicantes, articulis 3, primo glabro,
reliquis setarum vellere hispidis. Oculi in formam gemini trianguli
eidem basi insistentis; ita ut quatuor oculi inferiore linea numerentur,
duo in superiore. Thorax abdomine triplo brevior, cordato-truncatus,
superne sericeo-albus, sublucente colore nigro: subtus niger, medio
flavus. Pedes antici toto corpore sesquilongiores: omnes hispidi setis:
nigri, annulis flavis, extremo articulo subulato, fere toto nigro. Abdo-
men dimidii pollicis longitudine, ovatum: supra lineis transversis ni-
gris 9. divisum quasi in 10. segmenta, pleraque albida, lutescentia, li-
neolis fuscis obsolete reticulata, glabra; exceptis primo, tertio & quin-
to, quæ pilis appressis nivea ac serici instar nitidissima apparent. Seg-
mentum 7. ejusdem coloris tantillum in medio dorso habet. Segmen-
tum primum duplo longius, variis punctis impressis signatur. In me-
dio segmenti 2. 3. & 5. punctulum nigrum; in margine postico seg-
menti 1. & 3. duo puncta impressa majora. Dorsi parte posteriore 5.
lineæ fusæ longitudinales apparent, quarum mediæ tres supra anum

concurrunt, extimæ vero basi incurvantur. *Subtus* medium abdomen macula bi-articulata, atra notatur, quatuor punctis argenteis aspersa: ante illam locus genitalium tuberculo in disco nigro distinguitur (foemellam enim describimus); post maculam anus est orbicularis, ferrugineus, multivalvis, fila emittens. Hæc omnia linea flava circumit, extra quam latera abdominis nigra nebulis mixta cinereis.

Kahira in horto capta initio Decbr. insidens reti verticali.

SCOLOPENDRA.

31. SCOLOPENDRA ADHÆRENS; *flava*. Arab. *Om arba u arbaen*. ام اربع واربعين

Spithamæ longitudine, flava; *Kahira* non admodum copiosa, ætatis tempore ferventissimo. Morsu lædit haud lethali, sed multum urente; minus tamen quam ex ictu Scorpionis. Omnibus pedibus carnem perforat, non avellenda. Ergo ignito ferro caput Scolopendræ leviter tangitur, quod mox elevat; & sic per omnia membra continuando, tandem avellitur.

32. LARVA GENERIS INDETERMINATI.

DESCR. Longitudo lineæ: crassities fili tenuissimi: color vitreus, pellucidus. *A dorso* si inspicitur, articuli sex ventricosi numerantur. *Primus* capite constat, cornibus, an pedibus? 4, articulatis, setaceis, punctatisque 2, fuscis oculi-formibus. Pone caput subtus duo pedes breviores cornibus istis, articulati, setacei pilis exiguis. *Alteri* articulo pedes duo adhærent paulo longiores, crassiores, vix pilosi. Articuli 3. & 4. nudi. *Quintus* gestat pedum par; quod facilius cernitur resupinato animalculo. Articulo *sexto* duo paria pedum affiguntur, articularum, unguiculorum & retrorsum majorum. Subtus articulus apparet quasi in duos minores divisus, cui singulo pedum par annectitur. In medio dorso transeunt velut cylindri duo flavescents. Subtus inspectum animal monstrat *palpos* varios, breves sub capite; & binas *lamellas* subovatas, membranaceas, articulo 3. & 4. adnatas.

In *Archipelago* inter Tubularias simplices capta.

CANCER.

A) BRACHYURI.

33. CANCER SARATAN; *brachyurus*; *thorace lavi, integerrimo, subquadrato, margine carinato*; *chelis verrucosis, margine carinato-ferratis*.

DESCR.

DESCR. *Color* flavido-rubens, ut cancri semicocti. *Oculi* elliptici, interque eos superne mucro obtusus eminens. *Thorax* subquadratus, punctis convexis plenus, pollicaris, margine supra acutus, & carina laterali pone oblique descendente. Pars antica multum carinata, repanda & inter oculos in frontem obrusam porrecta. *Chelæ* depressæ, subpilosæ, verrucosæ, margine & fornice ferratæ. Dextra minor erat in unico hujus speciei quem vidi; incertum igitur, an nota constans, vel casus fortuitus. *Carpi* rhomboidaliter convexi verrucosi, introrsum & basi exteriore ferrati. *Femora* supra carpos triquetra, angulis inferioribus ferratis. Reliquorum pedum femora compresso-triquetra. *Digiti* subulati, sine pollice. *Cauda* inflexa, lineari-lanceolata.

Obs. Corporis quidem figura, cæteris vero notis non accedit ad Cancrum Rumph. mus. tab. 10. fig. E.

Suës ad littora defluente aqua ludit in superficie maris; adveniente homine mox aufugit in cryptas. Arab. *Saratân*.

34. **CANCER CONVEXUS**; *brachyurus thorace transverso, ovali, concave punctato utroque latere; lavi, integerrimo; pone dimidium impressione laterali obliqua superne.*

Obs. Thorax nostri non tam sinuosus ut Rumph. Mus. Tab. 6. fig. N. licet cæteroquin similis. *Lobajæ*.

35. **CANCER MESSOR**; *brachyurus, thorace rectangulo, lavi; spinula utrinque pone oculum; manuum chelis sub-inermibus, carpis & femoribus introrsum ferratis.*

DESCR. *Color* obscure-cinereus, nigro-nebulosus. *Thorax* pollicaris, subrectangulus, pone paulo angustior, planiusculus, rugis acutis, obliquis. *Chelæ* obscure-violaceæ: subtus oblique rugosæ & introrsum vix tuberculosæ. *Pollex* utroque margine tuberculosus. *Femora* omnia transverse rugosa.

Ad pontem urbis *Suës* frequens inter lapides. Refluente aqua prodit; viride maris sedimentum faxis adhærens chelis alternatim decerpit & edit.

36. **CANCER PINNOTHERES**; *brachyurus; glaberrimus, thorace lavi, lateribus antice planato; caudæ carina media lata, obtuse-convexa; flavescentibus manibus.*

DESCR. Ovo columbæ minor, subglobosus, griseus, glaberrimus, molliusculus. *Antennæ* breves, setaceæ. *Thorax* fere hemisphæricus: latera antice planata. *Manus* cheliferæ, inermes, flavescentes, parum curvatæ. *Oculi* globosi, ori proximi. *Cauda* orbiculata, pari cum corpore

corpore latitudine, reflexa ut in congeneribus; medio obtuse nodoso-carinata. *Pedes* sine chelis.

Smirnae & *Constantinopoli* in omnibus fere Pinnis nidificans.

OBS. A *pinnothera* Linn. differt, quod manus parum incurvæ sunt, nec punctis tribus lateralibus gaudet.

36. b) *Lohajæ* vidi *Cancerum custodem* in *Pinna saccata* habitantem, huic similem statura, sed colore supra fusco-cæruleiscente: & chelarum pollice digitisque subtus hispidis setis serici instar. Sit-ne specie a nostra diversa, non judicaverim. (cnfr. infr. 56.)

37. CANCER PELAGICUS. Arab. *Abu djalambu* vel *Abu mochar*.

Suës frequens. Esca incolarum deliciosa, vel coctus, vel assatus butyro & cepa.

38. CANCER ANTENNATUS; *brachyurus*, *thorace subovato*, *antennis triplo longioribus*; *chelis cunei-formibus*.

DESCR. Ungue brevior: cinereus, nebulis nigris. *Antennæ* sericeæ, rufescentes, *thorace* triplo longiores: rarus in *brachyuris* character. *Frons* obtusa, repanda. *Oculi* breves, obtusi. *Thorax* planiusculus, ovatus, basi truncatus. *Chelæ* compressæ, inermes, subtus rubentes punctis obscurioribus; pedes reliqui sine chelis. *Carpi* femoribus longiores, introsum bidentati. *Cauda* ovata, inflexa, *thoracis* latitudine, utrinque ciliato-dentata.

Suës, habitans in foraminibus *Spongiæ Offic. violaceæ*. Quotquot vidi foemellæ erant.

39. CANCER CUBICUS; *brachyurus*; *thorace aculeato*, *sub-cubico*, *aculeis anteriorum majoribus multisque*; *manibus hispidis*, *crassis*.

DESCR. *Oculi* pedicellati. *Thorax* pilis hirtus, antice præsertim. *Manus* duplo crassiores reliquis pedibus, spinosæ & valde pilosæ. *Chela* introsum compressa & pilosa; subtus spinosa. *Digiti* adeo compressi, incurvi, margine interno acuto, nigro. *Pollex* ad basin unico denticulo obtusiusculo. *Femora* omnium pedum spinifera margine superiore. *Tibiæ* & tali parvis pedum 2, 3, 4 & 5 compressi, margineque inferiore ciliato-spinosi.

Massiliæ.

40. CANCER NIGER; *brachyurus*; *thorace lævi*, *utroque latere pone oculos tuberculis*, *quinque*.

M

DESCR.

DESCR. *Color* niger. *Frons* inter oculos fere recta, sulco marginata. *Thorax* latitudine digiti, sed duplo brevior: planiusculus, antice rotundatus, pone truncato-triangularis: denticulis obtusis quinque pone oculos, rugis lateralibus plenis: postica thoracis pars acuta. *Chelæ* teretiusculæ, inermes: manus & pollices apice obtusi, intus excavati cochlearis instar. *Dextræ* manus & pollices intus in forcipe unidentati: *sinistræ* sæpe inermes, aut parvulo dente. *Carpi* introrsum denticulo uno, ut & *Femora* primi paris.

Djiddæ inter corallia ramosa.

41. **CANCER SERRATUS**; *brachyurus*, *thorace laevi*, *semi-orbiculato*, *utrinque novem-dentato*, *fronte sexdentata*.

DESCR. *Oculi* globosi, pedicello latiores: dens latus exit e fronte sub quovis oculo. *Antennæ* setacæ, nigræ, vix pollicares. *Color* animalis cinereo-fuscus, subtus albidus. *Thorax* convexiusculus, antrorsum rotundato-ferratus, latitudine trium poll. longitudine duorum. *Serraturæ* pone oculos utrinque 9, inter oculos sex. *Pedes* ab utroque latere 5: tria paria media femoribus glabris, compressiusculis: tibiis & plantis utroque margine hirsutis, pollice nullo. *Postici* binis articulis ultimis membranaceis, ovatis, ciliatis. *Chelas* non vidi.

Djiddæ in Mari rubro.

42. **CANCER BIDENTATUS**; *brachyurus*; *thorace laevi*, *utrinque bidentato*, *semiorbiculato*, *chelis glabris*: *femoribus anticis introrsum ferratis*.

DESCR. Inter parvos est. *Color* rubro-flavescens. *Oculi* obovati. *Palpi* medii porrecti, breves, primum subclavati, supra clavam bilobi, lobo utroque subulato, superiore duplo majori. *Thorax* ungue minor, depressus, glaber, antice obtusus, repandus, pone rotundatus. *Dentes* duo ab utroque latere; post oculos unus, alter medio thoracis. *Chelæ* oblongæ, compressiusculæ, glabræ, thorace longiores. *Carpi* ad basin denticulati. *Femora* manuum extrorsum teretia: introrsum acute-carinata, ferrata. *Pedes* cæteri pollice nullo.

Sués; inter conchylia recenter expiscata inventus.

43. **CANCER TRIDENTATUS**; *brachyurus*; *thorace subrotundo*, *parum inæquali*, *utroque latere tridentato*.

DESCR. *Color* cinereus, nebulis obscurioribus. *Frons* obtusa, repanda. *Oculi* parvi. *Antennæ* setacæ, breves. *Thorax* longitudine feminis oryzæ: oblongior, planiusculus, inæqualis, utroque latere tribus denticulis, contiguis. *Chelæ* inermes, glabræ, obovatæ. *Carpi* semiglobosi, intror-

introrsum unidentati. *Femora* primora pariter unidentata interiore latere. *Pedum* reliquorum *Ungues* sine pollice. *Cauda* ovalis, thorace angustior.

Sués in *Spongia violacea*, rarus.

44. **CANCER LUNARIS**; *brachyurus*; *thorace laevi*, *utrinque medio latere unispinoso*; *frontis lobis tribus*, *medio marginato*.

DESCR. *Color* cinereus, punctis violaceis, subtus albidus. *Oculorum* pedicelli teretes, attenuati, albidus, superne punctis violaceis. *Thorax* subrotundus, depressiusculus: post spinas laterales carinatus margine; ante spinas tuberculis utrinque 3. majoribus in margine: fronti propius exstant tubercula parva, marginalia, utrinque sex: pone oculos angulus prominet. *Chelæ* margine & extus spinosæ, subtus albæ, superne violaceo-punctatæ. *Pollex* extrorsum carina longitudinali, planiuscula, transverse ferrata. *Pedum* reliquorum omnium plantæ & carpi flavi, compresso-dilatati, (sic enim commodius remigat animal) tibiæ subtus spinosæ: omnes pedes superne punctis violaceis. *Cauda* instruitur carina transversa, acuta, ferrata, pone ad basin.

Lohajæ in Mari rubro. *Rumphio* in Mari Indico. cfr. Mus. Amb.
Tab. VII. fig. 5. *Cancer lunaris*.

45. **CANCER SEGNI**; *brachyurus*; *thorace laevi*, *utroque latere novem-dentato*; *fronte quatuor-dentata*.

DESCR. Transverse-ovalis: latitudine spithamæ, sed longitudine inferior. *Color* superne obscure-viridis, nebulosus; subtus albidus. *Antennæ* setaceæ, nigrae, breves. In *Fronte* spinæ 4. inter oculos erectæ, obtusiusculæ: sub quoque oculo una validior. *Oculorum* pedicelli teretes, virides: oculi hemisphærici, nitentes, obscure-rubri, maculis albis: profunde inserti. *Chelæ* viridi-cæruleæ, apice albæ: in forcicis latere interiore una series callorum in singulo digito; in chela superne post basin pollicis spinæ duæ, contiguæ, antrorsum spectantes: ad basin juxta carpum superne spina valida, conica, cærulea, apice ferruginea. Præterea nullæ in chelis spinæ; sed duæ in carpi extrorsum: una introrsum, longior, fortior. *Femora* depressa, ob-cuneata. *Secundum & tertium par pedum* subteres, versus apicem compressum, pollice nullo, læve, digito subulato. *Quartum par* longe crassius, articulis duobus postremis compressissimis, membranaceis, dilatatis, ovatis, margine ciliatis. *Cauda* lata, albida, fusco-rivulata.

In *Mari rubro*. Tarde procedit in aqua.

46. **CANCER INCANUS**; *brachyurus*; *totus hirsutus, cinereus, chelis subtus albis, apice nudis, forcepe fusca.*

DESCR. Oblongior: cum pedibus latitudine sesquipollicari. *Frons inermis. Thoracis* latera utrinque tridentata: sed tactu potius exploranda quam visu, ob pilos confertissimos, quibus etiam *pedes* circumvestiuntur.

Djiddæ, inter Corallia.

47. **CANCER PELLITUS**; *brachyurus*; *thorace hirsuto, inæquali, utrinque quinque-dentato: fronte obtuse dentata: plantis posticis membranaceis, ovatis, ciliatis.*

Rumph. mus. Tab. 6. fig. o. Gall. Crable velouté. Massiliæ.

DESCR. Totus obscure-testaceus. *Frons* in medio obtuse tridentata, & in super dente minori juxta oculos. *Thorax* oblongus, depressus, rugis transverso-obliquis tuberculisque inæqualis; post oculos utrinque ferratus dentibus 5. contiguis. *Chelæ* extus quinquangulatae: digiti introrsum dentati tuberculis obtusis. *Carpus* forti spina armatur. *Pedes* quinti paris toti compressi, maxime articuli duo ultimi, pilis dense ciliati: planta ovato-lanceolata, sulco utrinque medio elato, glatro, longitudinali.

47. b) *Constantinopoli Varietatem* vidi hujus Cancris, minorem multo, glabram, fronte aliis prorsus obtusa & truncata, aliis acute-dentata: chelis sæpe quinquangulatis, interdum vix angulatis, nisi ab utroque margine.

48. **CANCER CORNUTUS.** (*Linn. Syst. N. 29.*) An Gallorum *Renaïse de la mer?* *Massiliæ.*

DESCR. *Thorax* ovatus, tuberculofus, margine valde spinosus. Tuberculi penicillos pilorum incurvatos gestant. *Manus* glabræ. *Chelæ* carpo angustiores, digitis rectis, teretibus. Reliqui pedes 8. exserti, hispidi pilis longis, densis.

49. **CANCER SULCATUS**; *brachyurus*; *thorace globoso, antica & supina parte atque lateribus sulcis labyrinthi-formibus, obliquis.*

DESCR. Obscure rubens. Nuce avellana duplo minor. *Oculi* longo pedicello filiformi, apice obtusi, nigri. *Antennæ* breves, subulatae. *Thorax* subglobosus, variis sulcis obliquis forma labyrinthi flexis & in se redeuntibus, præsertim in antica parte, seu pectore. *Chelæ* manuum ovatae, glabræ, inermes, æquales. *Ungues* cæterorum pedum simplices, sine pollice.

Suës in brevibus fabulosis, aqua relapsa, innumera grege vagatur: at periculo minante in cuniculos se recipit.

49. *) *CANCER VERRUCOSUS*; *brachyurus*; *thorace lævi, utrinque 6-dentato*; *fronte multi-dentata*; *manibus verrucosis, apice nigris*.

DESCR. *Os latum. Chela dextra glabra & sæpe major. Manuum apices nigri. Carpi quoque verrucosi. In reliquis pedibus carina femorum superior & tibiæ ac tali pilis hispidi. Ad Thoracis latera utrinque 6. dentes validi post oculos. Inter oculos antice dentes minores plurimi, serie varia*

Constantinop. Gr. Παγῆς. Turc. Pavuri. In multis convenit cum Paguro (Linn. 18.). Vivus vasculo immixtus, fortem sonitum edit, bullasque aereas ex ore emittit.

B) MACROURI.

50. *CANCER SCÆVOLA*; *macrourus*; *parasiticus*; *chelis muricatis, sinistra majore, albida latere interiore barbata*; *oculis oblique cuneatis, pedicellis compressis*.

Djiddæ inter corallia.

51. *CANCER AMBIDEXTER*; *macrourus*; *parasiticus*; *cauda setacea, aphylla: manu utraque æquali*. Arab. Komikom. *خمخم*

Djiddæ inter corallia. In Archipelago frequens ad littora, cochleas vacuas inhabitans.

52. *CANCER LAGOFODES*; *macrourus*; *cinereo-fuscus, pedibus hirsuto-hispidis; chela sinistra majori*.

DESCR. *Oculi terminales, nigri, hemisphærici, superne sinu pone emarginati: pedicelli teretes, pallide-cinerei, extrorsum paulo crassiores. Antennæ flavæ. Thorax pollicari major, lituris venisque carulescentibus, albo-punctatis. Pedes hirsutæ setosa hispidi. Chelæ setosæ, apice flavescentes; tuberculatæ & albæ in junctura forcicis.*

In Mari rubro parcius hospitans in cochleis, Strombo gallo, murice colo, aliisque.

53. *CANCER TINCTOR*; *macrourus*; *parasiticus*; *chelis muricatis, sinistra majore, rufescente, forcice interius tuberculato, violaceo*.

DESCR. *Oculi semiglobosi, crassiusculi, obscure virides, superne pone emarginati sinu vestito pilis setiformibus parvis. Pedicelli semipollicares, teretes, subtus & supra paulo planiores, albidi, annulo fusco-rubente in medio, versus apicem superne perpendiculariter obverso, fusco-rubente. Antennæ cinereæ, setosæ, thorace-longiores, articulo primo magno,*

M 3

globoso.

globofo; fetis hispido: secundo angustiore, laevi, compresso lanceolato-truncato. *Thorax* una cum cauda longitudine tripollicari basi mollis; sed exuerat forsitan senectam. *Chela sinistra* longe major: dimidio superiore tuberculata, inferiore laevis; margine extimo carinato-crenata, interiori spinosa, maculaque aureo-virenti ad basin notata. *Pollex* tuberculis violaceis plenus extus: introrsum tota junctura forficis, planata, lata, tuberculata, violacea. *Brachium & carpi* subtrigoni, marginibus dentati, superne obsolete aureo-virentes. *Chela dextra* longe minor, lanceolata, setosa. Secundi & tertii paris *Pedum* apices vel tali subulati, hispidissimi. Quartum par chelis parvis: quintum apice simplici. *Cauda* mollis.

In *Mari rubro* procul a litore. Unicum vidi, repertum a Socio itineris NIEBUHR in *Strombo* gallo latitantem.

54. CANCER SQUILLA. Arab. *Bargut*; i. e. *Pulex*. *Alexandriae*. Cauda & corpore glauco, punctis ferrugineis.

54. b) *Varietas fasciis transversis, fuscis*. Ad insulam *Imros*. Arab. *Ūnsul*.

55. CANCER SUBLUCANUS; *macrourus*; *incarnatus*, dorso nigro, thorace compresso, antice spina oculis longiore. *Djiddæ*.

DESCR. Sesquipollicis longitudinae: compressiusculus totus. *Antennæ* nigrae, corpore breviores. *Scuta* thoracis & corporis subtus conniventia, latera pectoris & caudæ regentia. *Chelæ* ovato-oblongæ, compressiusculæ, dorso nigrae, lateribus fusco-punctatæ: apice fetis appressis. *Dextra* major. *Cauda* supra nigro-fusca, cillis flavicantibus.

55. b) *VARIAT*: lineis albis interruptis, longitudinalibus post thoracem, dorso lucidiore; corpore minore præcedente.

56. CANCER CUSTOS; *macrourus*; *thorace laevi, rostro integerrimo; corpore pellucido, flavicante, albo punctato*.

DESCR. Sesquipollicaris: totus glaber, laevis, pellucidus, flavicans, albo punctatus. *Frontis* rostrum porrectum conicum, thorace triplo brevius, integerrimum. *Oculi* albicantes, pedicello tereti. *Antennæ* setaceæ, corpore breviores. *Femora* glabra, inermia. *Chelæ* æquales, unguis longitudine, cylindrica, tenues. *Pollex* uncinatus, digito paulo longior, *chelæ* cylindro triplo brevior.

Lohajæ intra *Pinnas* nigras: in *Saccatis* raro. (vid. supra Cancr. 36.)

57. CANCER ACANTHURUS; *macrourus*; *flavicans, thorace apice utrinque carinato; cauda medio latiore, scutis utrinque seta auctis*. *Djiddæ*.

DESCR.

DESCR. Vix pollicem æquat. *Antennæ* & *pedes* posteriores pallidi. *Thorax* antrorsum attenuatus, versus apicem superne utrinque carina erecta, ciliata marginatus. *Chelæ* æquales, pilosæ. *Cauda* ovato-oblonga, planiuscula, thorace latior; vena media, fusca, perlucens.

58. CANCER KERATHURUS; *macrourus*; *rostro ensato, superne serrata, subtus unidentato*; *thorace supra canalibus tribus*.

DESCR. Longitudo fere spithamæ; digito crassior. *Antennæ* corpore sesquilingiores. *Chelæ* parvæ. *Color* corporis glaucus, punctis ferrugineis; *Cauda* rubra, apice cæruleo. *Cornu* subtus unidentatum, teres, non-alatum. In dorso *Thoracis* tres canales, quorum medius terminatur in basi cornu. Ad latera utrinque sulcus fursum tendens, obliquus. His notis sufficienter distinguitur a *Squilla*, cui cæteroquin quoad figuram similis est.

Smirnae & Alexandriæ.

59. CANCER SEDENTARIUS; *macrourus*; *articularis*; *manibus adaactylis*.

DESCR. *Color* vitreus, flavesceus. *Caput* fere conicum, perpendiculare, ante paululum planatum, juxta verticem emarginatum. Ori utrinque sphaerula oculiformis adjacet; supra quamque harum, cylinder perpendicularis erigitur, *oculum* referens; sint-ne ergo huic animali duo oculorum paria, affirmare non sustineo. *Antennæ* setaceæ longitudine cylindrorum, lateri eorum anteriori affixæ. *Thorax* ovato-lanceolatus, septem-articulatus. *Cauda* lineari-attenuata, compressa, antice articulis 3. rotundatis, pone truncatis, utrinque unispinosis. Articuli duo angustiores apicem caudæ constituunt, cui insunt spinæ sex, vel setæ lineares, apice bifidæ, acutæ. *Pedes* utrinque decem: paria enim septem, thoracis septem articulis adhærent; omnia adactyla, præter quinti ordinis par, cæteris multo crassius, longius, *femoribus* compressis, apice uni-spinosis, carpis clavatis, chelis obovatis, ventricosis; digitis adeo curvatis, forficatis, introrsum dente instructis. Priora 4. paria *plantis* gaudent setaceis, curvatis & longitudine fœderantibus plantas *posteriores* pedum thoracicorum, quorum paria retrorsum majora majoraque: & *membrana* subtus acuta utrinque triplici, ovata, natatoria. Articulis Caudæ tribus, totidem pedum paria, versus apicem caudæ gradatim minora affiguntur, breviora, *femoribus* obovatis, membranaceis; *tibiis* recurvatis, concavis.

In *Mari mediterraneo*. Mirum in suo genere Animal Oculorum forma, & Pedum numero. Singularis architecturæ inhabitat domum, cubico-ventricosam, rugosam, gelatinosam, rigidam, utroque extremo patulam.

lam. Hic refidet incurvum, sæpe situm mutans: his cunis ova deponit pullosque excludit.

60. *CANCER FALCATUS; macrourus; manibus falcatis, edentulis, basi extus gibbis.*

DESCR. Linearis, $\frac{1}{2}$ poll. latus; $2\frac{1}{2}$ poll. longus. Color viridis, subtus flavescens. Corporis articuli novem; scutis posterioribus, latioribus. Antennæ longitudine palporum, apice subspiralium, simplicium. Frons obcordata, pone truncata, antice spinam inter oculos emittens. Oculi superne obliqui: pedicelli cylindrici. Thorax reſtanguſus; p'aniuſculus: duobus ſulcis dorſalibus qui ubi deſinunt antice ſuperne, recti formam reſert thorax, & femora priora tegit. Manus ſubularo-incurvæ, baſi extus gibbæ, incarnatæ. Femora antica craſſiſſima, interne planata, ſuperne carinata, extus convexa, cavitate alba molli pro recondendis tibiis; quæ compreſſæ, apice latiores, carina anguli rotundatæ. Caudæ baſi ſcuti tranſverſo, in quo carinæ ſex elatæ, planatæ, pone mucronatæ; ſequitur Scutum majus, ſemi-orbiculatum, depreſſius, margine carinis elatis, longitudinalibus, latis, dorſo acutis, pone mucronatis; in medio ſcuti gibbus, elatus, hemiſphæricus, carinis longitudinalibus, convexis, pone mucronatis, numero quinque. Sub hoc ſcuti ab utroque latere Folia ciliata duo & oſſicula duo; ſuperius latus eſt extrorſum ſerratum, inferius magis bifurcum.

Djiddæ, inter corallia frutiſoſa.

TERMES.

61. *TERMES ARDA, DESTRUCTOR; (Termes fatale. LINN.) Beitelfakih. Arab. Arda. ارداء*

OBS. Differentiam ſexus aut ſpeciei a Dn. ROLANDRO obſervatam, confirmare non potui; quum varietas vix attendenda intercedit. Quotquot vidi Termites (& innumeri erant,) grani oryzae magnitudinem, vel $\frac{1}{3}$ poll. non ſuperabant. Abdomen a latere flavescens, ſetis minutiffimis hiſpidum; circulis ſegmentorum ſufcis. Antennæ corpore dimidio breviores, maxillis plus duplo longiores. Nonnulli Termites Capite gaudebant majori, convexiore, bruno: thorace albedo - flavescente: maxillis arcuatis, porrectis: antennis articulis 14. Alii: capite anguſtiore: thorace ſufco: maxillis brevioribus: antennis articulis 10.

Inſectum hoc, crux orbis calidioris, viva non vidi imagine in Ægypto, neque in Arabia, ante urbem Beitelfakih. Cubiculum mihi designatum, occupaverat pridem Termes hoſpitibus expulſis. Circumſpicienti, ſe ſtatim prodidit cuniculis dædalæis digiti latitudine, ad parietem deductis & perpendiculariter e fundo ſurgentibus. Sociale animal unita vi laborat in deſtrueda re Oeconomica hominum. Mira tamen Creatoris providentia gentem inſectam damnavit lucifugam; alioquin enim incolas regione ejiceret: jam tem-

tempus operi impendere debet, jam opus vastatorem prodit. Quisque opificum argillæ humidæ granum ore affert & margini applicat. Eapropter canalis durante labore semper 2. poll. latitudine humet recenti adhuc incremento. Nonnulli interdum profiliunt, quasi speculandi causâ. Prima vespere ductus dirui. Illi contra, eadem nocte ruinam restaurabant 3 uln. longitudine. Ductum hinc & inde laceravi: substitit ejus propagatio, donec fenestræ erant clausæ. Candelam ardentem orificio objeci, magnò cum operatorum incommodo. Nihilominus inceptam continuabant porticum; furtim tamen & sub testò: quumque antea in tenebris & sub-umbra venam spatio 2. poll. producant horæ tempore, jam unius tantum poll. viam horæ intervallo absoluebant. Aliquando fornicem longitudine 5. uln. dejeci; basi tantum intacta. Tanta attoniti clade, tota siluerunt nocte; sequenti vero aurora, iterum fervebat opus. Tubus illæsus semper lævis & rectus; ruptus vero & reparatus, vulnera cicatrice monstrat.

Omnem in urbe Beitelsakih horticulturam affligit Termes, teneras decerpens propagines arborum mitioris fructus; inter quas *Caricam papayam* vehementissime lædit ad summa usque cacumina canales deducens. Quotidiana ergo adhibenda est attentio, & cuniculi destruendi. Truncum & radicem non aggreditur. Arborea *Citri*, utpote amaras, horret. Solent incolæ finum, quod abominatur Termes, trunco arborum circumponere. *Ocymum basil.* gratissima Arabibus planta ob odorem, verum & grata huic Insecto, quod arcent stercore ovino terræ admixto.

PANORPA HALTERATA; *alis albidis, reticulatis; halteribus tri-clavatis, corpore triplo longioribus.*

DESCR. *Corpus* long. pollicis. *Caput* supra flavum. *Oculi* globosi, cærulei; pupilla nigra. *Rostrum* conico-acuminatum, flavum, porrectum, capitis longitudine; absque palpis. *Antennæ* setaceæ, fuscæ, pollicares. *Collum* longum, cylindricum; supra cæruleo-fuscum, subtus flavicans. *Thorax* simili colore; gibbus. *Abdomen* dimidio corpore longius, primis articulis flavis, ut & *Chela*, quæ bifoliata. *Pedes* flavescentes. *Alæ* corpore longiores, rotundato-oblongæ; forma Ephemerarum & Panorparum; albidæ, reticulatæ cancellis distinctis; *Vena* forti, fusca, margini alæ exteriori propinqua, parallela plus media parte, inde alteri margini adcurvata. *Vena altera* obsoleta, flava, margini alæ exteriori propior, parallela, apicem alæ attingens. *Halteres* 3. poll. vel corpore triplo longiores. *Stylus* 2. poll. filiformis, flavus. *Clava prima* oblonga, utrinque acuminata, forma feminis Hordei, fusco-flavescens: *Secunda*: exterior, dimidio minor, cærulea, ejusdem figuræ: *tertia* terminatrix, oblonga, cærulea, apice extimo obtuso.

Obs. An *Ala quatuor*? Cardio denominationis in hac re versatur. Descriptio adornata est in animali egregie depicto; sed *alis secund.* nec margine, neque umbra manifestis: nisi venam, quam adscripsimus *alis super.* (tum certe præter modum tenuissimis & pellucidis) pro margine exteriori alarum infer. habere velis. Forma Insecti Neuroptera; sed *Halteres*? Inaudita proprietas civium hujus classis. An *alæ secund.* tam monstrose lineares? Nos denominationem potius ambiguum inscribere volumus Insecto ambiguo, quam novum genus vel novam prorsus Classem effingere, & jura nomenclaturæ summis in arte magistris præripere.

Beit el fakih capta vespere lucernæ advolans.

VER-

VERMES.

I. MOLLUSCA.

TEREDO.

1. TEREDO ARENARIA; *intra tubulum arenoso-argillaceum.*

DESCR. Animal digitum transversum *longum*: fili grossioris crassitie; colore carneo. *Tentacula* capitis numeratu difficillima; utrinque 5, & plura. Anteriora segmenta singula ab utroque latere duabus *Setis* (microscopio indagandis) vestita; posteriora uno tantum capillo: Tres articuli capiti proximi utrinque subtus *papilla* ramosa, scopæ forma.

Obs. Ad *Teredinem lapidariam* LINN. prope accedit; nisi domicilii, magnitudinis & papillæ ramosæ diversitas obstaret.

In fundo freti *Öresund* inter *Fucos* domunculam struit.

2. TEREDO CONCHILEGA; *intra tubulum membranaceum conchyliferum.*

Obs. Inhabitat tubum rotundum, membranaceum, in arena perpendiculariter descendentem pedis profunditate, ultra terræ superficiem latitudine digiti, vestitum *conchyliis* minutissimis. Aquæ refluxu nudatum animal, hic effugium a sole quarit: ægerime extrahitur illæsum.

Ad littora *Lohajæ*.

LIMAX.

3. LIMAX MARINUS; *dorso cinereo-ferrugineo; papillis numerosis acutiusculis.*

DESCR. *Longitudo* pollicaris. *Corpus* lineare, attenuatum, supra cinereo-ferrugineum; subtus & ad latera pallidius. *Foramen* laterale ad dextram evidens nudis oculis. *Tentacula* 4. pallido-pellucida. *Papillæ dorsales* innumeræ, acutiusculæ, ferruginescentes; vena undulata, albo-pellucida.

Obs. Ejusdem speciei videtur cum *Limace* marino *Rumphii*.

In *Mari mediterraneo* frustulis ligneis natantibus adhæret.

4. LIMAX TERGIPES; *albidus, digitis in dorso circiter duodecim.*

DESCR. *Magnitudo* pediculi majoris. *Forma* quibusdam ovata; aliis oblonga, subcaudata: hæc varietas species non distinguit; *Limaces* enim sæpe figuram mutare scimus. *Papillæ* obovatæ, utrinque sex. Vix tamen inire potui numerum, ob arctam densitatem, & perpetuum motum peristalticum, vivo animali: mortuo autem collabitur totum cor-

pus in globulum. Mirum mihi erat videre Limacem dorso & resupinatum reptare; quasi papillæ totidem essent digiti.

In fundo maris ad fretum *Öresund* inter fucos.

5. LIMAX MINIMUS; *pallide cinereus, seriebus papillarum dorsaliū quatuor.*

DESCR. *Magnitudo* feminis oryzæ. *Corpus* oblongo-arcatum, pallide cinereum, vena dorsali obscuriore; subtus pallidius. *Tentacula* 4, juxta caput albida. *Papillæ dorsales* ovato-oblongæ, obtusæ, cinerascens, plurimæ, digestæ, (ut videtur) in 4. lineas longitudinales. Dorsum nudum tota longitudine.

In *Mari mediterraneo*. Fucis natantibus incubuit.

NEREIS.

6. NEREIS CÆRULEA. In freto *Öresundico* & *Archipelago*.

OBS. Articulorum numerus valde inconstans: Dioptrico enim oculo adjutus in una Nereide articulos numeravi 19: in alia usque ad 64. Quædam Sp. V. injecta viva, *tubulum* linguiformem sub capite exferebat; qualem *Nereis lacustr.* semper protendit. Procul dubio, membrum hoc in omnibus hujus generis reperitur.

Phosphoream lucem fundebat nuper aquis extracta; non vero semper; longe minus omnem Oceanum illustrat; quum repetita sæpe & in diverso mari experientia ipsas Nereides inter animalia marina rarissima obtinuit. Credulas istas observationes & præcipitatum hypothesein Adriaticis remittimus undis.

7. NEREIS PELAGICA, RUBRA.

OBS. Articulorum numerus in hac quoque variat Nereide, (est enim vel 44. vel 74.) immota tamen specie. Sat velox natat, corpus velut horizontaliter flexendo per undas.

In mari *Öresundico* a nobis detecta, hæc Oceani incola. Tentavi, an noctiluca esset? nullam emisit lucem nec sponte, neque vasculo in quo tenebatur agitato. Semel tantum quum aquam effundebam, illa breviter micavit denudata; quod simili casu contigit cum alia NEREIDE VIRIDI. Postea neque unam vel alteram speciem reperire potui, ut experimenta hæc continuassem.

PRIAPUS.

OBSERV.

Character Genericus in vivo animali; determinatus. *Priapus* Corpore carnosissimo, tenero, basi affixo, superne plano; margine tentaculis numerosis; ore in medio protuberante; roto intra sacrum retractili.

8. PRIAPUS GIGANTEUS; cinereo-virescens; limbo plicato, corpore multoties latiore, tentaculis papilliformibus, virescentibus.

DESCR. Sui generis maximus, quatuor pollices longus & latus. *Limbus* margine plicatus, expanditur in aqua diametro plus quam pedali; plani-

planiusculus; papillis vel contactus, vel si multum dilatatur, versus os lineis radiantibus, oblitus. *Papillæ* longæ, cylindricæ, apice violaceæ, virescentes. *Os* in medio sæpe clausum; at exempto aqua animali, dilatatur in peripheriam duorum vel trium pollicum, exserens simul velut plicas inflatas, forma vesicæ. Vidi quoque ex ore recentis mortui papillas prodeuntes virides, atque *fila* alba, tenuia, semipollicaria, plurima. Quo altius oris moles extra corpus elevatur, eo magis rugosus & cavus redditur truncus; & hoc in vivo æque ac in mortuo vidi.

Obs. Corpus coeno sabuloso reconditum, solum limbum in margine superiore expandit. Venantibus se subtrahit ocyus, terræ se immergens; ope nervorum, e basi corporis, radicum instar, profunde & perpendiculariter descendunt. Mira *viscositas* papillarum, (vivi aut nuper mortui) tanta tenacitate adhærentium manibus vel cuicunque rei, ut potius ipsæ a corpore divellantur, quam a re tacta. Residua earum partes plurima deinde frictione vix detergantur.

In *Mari rubro* ad littora vadosa, *Lohajæ* & *Mochhæ*. Arab. *Tâbaket el bâhr*.

9. PRIAPUS ALBUS; *gelatinosus, albido-hyalinus, tentaculis parvis, papilliformibus, oblongis.*

DESCR. Diameter vix pollicis. Totus gelatinoso-pellucidus; vittis velut longitudinalibus, obscuris. *Tentacula* diametro (ut putaverim) tricesies breviora, papilliformia, remotiuscula, per totam superficiem superiorem inserta. Corpus intra *sacculum*, pro more congenerum, retrahitur; sed lente. Vivum, quem vitro clausum tenui, adeo tarde reptantem basi, vidi, ut horule patientia motum qualemcumque notaverim.

In *Mari rubro* lapidibus littoreis adhæret.

10. PRIAPUS RUBER; *totus rubens; glandulis marginalibus albis.*

DESCR. Diameter vivi ad basin pollicum $2\frac{1}{2}$: altitudo sesquipollicis. *Præputium*, seu saccus rectorius, longitudinaliter striatus. *Tentacula* marginis, fere pollicaria, subulata, plurimis seriebus conferta, carnosa, patientia, contractilia, versatilia. *Os* superne in medio hemisphærice protuberans, fissuris in centro duabus tribusve *Glandulæ* elatæ, albæ sub tentaculis in margine, circumcirca una serie: tentaculis dimidio breviores.

Obs. Vivus in vasculo aqua marina pleno receptus, basin corporis applicuit fundo radios in floribus effigiem late pandens. Aquæ dulcis, tantilla parte affusa, ilico intra saccum se recepit & clausit. Ejecta hac aqua, & marina iterum addita, animal denuo se explicuit. Spir. V. inutiliter fervatur, colorem, figuram, molem mutans.

Maris mediterranei littora juxta Catacombas *Alexandriæ* inhabitat, basi verticaliter affixus lapidi extra aquas eminenti & undis per vices asperfo. Arab. *Garindj el bâhr*.

11. PRIAPUS VIRIDIS: *fusco-virens, tentaculis diametri longitudine.*

DESCR. Diameter & altitudo pollicis. Os in medio plani superioris protuberans, hemispharicum, apertura lacera. *Tentacula* filiformia, multis seriebus conferta, corpore longiora, obscure-viridia; interdum fusca; interdum apice rufescentia. *Glandulæ* marginales sub *tentaculis* fusco-virentes. *Retractio* intra saccum lenta; impatiens tamen contrectationis, vel miscelæ liquoris alieni.

Obs. Servandus Sp. V. confestim injiciendus, aqua marina extractus. Nonnulli multum se contrahunt; alii patentes moriuntur figuram & virorem pulchre servantes. Priapos valde timent incolæ *Alexandriæ*, dum aquas natandi causa ingrediuntur. Retulit mihi aliquis, Vermem hunc recutitis molestissimum esse, & tumorem graviter dolentem causare. Pulvere lapidis lateritii pro medela utuntur.

In littore *Alexandrino* lapidibus submarinis infidet. Arab. *Karrafa*.

12. PRIAPUS POLYPUS; *basi dilatata; corpore cylindrico; tentaculis maculatis.*

DESCR. *Corpus* albidum, fusco-nebulosum: variæ mensuræ, usque ad bipollicarem longitudinem. *Basis*, diametro sesquipoll. albida: loco suo appressa & corpore latior, inque junctura, cincta una serie *Macularum* subconvexarum, albarum, in quibus punctum nigrum, parvum: quævis guttula ad marginem extendit par *linearum* ferruginearum; interque singulas simile par: quodcunque horum, includit vittam cærulescentem. *Tentacula* apicis plurima, diametro triplo breviora, fusco-maculata: exteriora rufescentia, interiora flava. Discus medius nudus; maculis, seu nebulis albis: circa oris cavitatem circulus ruber. *Fila* capillaria, rubra, bipollicaria, ex oris fovea rarius emissa.

Obs. Plurima in hoc verme peculiaria notavi, a) Corpus erigere valet in altitudinem duorum pollicum; deprimit, quoque ut convexum vix appareat, sed ejusdem cum margine superficiei. b.) *Fila* oris retrahit. Quum basin filii alicujus bacillo loco moverem totum statim penicillum filorum porrigebat; & deinde retraxit. c) Aliquot vermes, dum basis ita premebatur, simul ex maculis supra descriptis *fila* rubra emittebant breviora, & adhuc alia sub basi. d) Filum loco motum, ferro pressi ad basin corporis, vermis non sustinuit hanc vim, sed apicem clausum aperuit, & *tentacula* protulit. Alius vero experimenti scenam mutavit, & pressus apicem non solvebat, verum maculas baseos patefecit, e cavitare quarum *fila* rubra depromsit plurima.

In Mari rubro habitat juxta urbem *Ghomfodam*, adhærens *conchyliis*.

SCYL.

SCYLLÆA.

13. SCYLLÆA GHOMFODENSIS; *Tentaculis primis nudis, apice cavis, reliquis introrsum vittis ramosis.*

DESCR. *Corpus* compressum, versus dorsum latius, pollicare, vix unguem altum, pallide flavum, pellucidum; punctis fusco-ferrugineis. *Os* paulo prominens labio superiore, majore, bifido. *Tentacula* trium parium, ad latera dorsi, compressa: *prima* reliquis minora, obovata, margine obscuriore, utrinque nuda, apice antrorsum in margine cavo: *secunda* & *tertia* in medio corpore contigua, a primis remotiora, margine denticulato repanda & obscuriora; majora primis, extus nuda; intus villosa; vittis hyalinis, ramosis, sylvule instar dactyliferæ. *Dorsum* usque ad caudam planum; utroque margine fusco-punctatum; in medio serie longitudinali punctorum cæruleorum. *Cauda* post tertium par tentaculorum tota compressa; in dorso elevata in carinam rotundatam, repandam, margine fusciscentem, anterieus utrinque vittis ramosis, parvis, minoribus tentaculorum vittis. *Abdomen* canaliculatum, expansile ut *Limacum*: illius ope in fuco repit. In medio latere utrinque series longitudinalis *papillarum* quinque albarum, exiguarum: & præterea, *puncta* cærulea. *Intestina* translucent in lateribus: sub collo *filum* labyrinthi-forme, albidum & *globus* albus: deinde *globuli* tres majores, serie longitudinali, aurantii colore.

OBS. *Scyllæa pelagica* LINN. tentaculis mediis papillofis gaudet, & ultimo primoque similibus; quæ signa in nostram non incidunt; quæ vagabunda est; non affixa & quiescens.

In Mari rubro parcius inter *Ghomfodam* & *Djesân* incumbens fucis natantibus.

HOLOTHURIA.

14. HOLOTHURIA DENUDATA? *orbicularis, carulea, crista nulla, tentaculis dici nudis, radiis trifariam glandiferis.*

DESCR. *Diameter* latitudine digiti. *Paginæ superioris discus* vel nucleus, diametro dimidio minor ipsius animalis; paulum elatus, ut umbo clypei depressi; albidus, striis concentricis & e centro radiantibus decussatus, rigidus, margine obscure caruleus. *Limbus* disco dimidio angustior, cæruleus, immaculatus, pellucidus, flexilis, planus; linea circumcirca ad oram striis nigris centrum spectantibus composita. *Paginæ inferioris tentacula* omnia, disco jam descripto, nucleo scilicet non limbo affixa. In medio apparet *Ventriculus* limbi latitudine, basi globosus, superne terminatus ore cylindrico aperto; quod demitti & dilatari potest.

potest patulum ejusdem ambitus cum basi ventriculi: & conspectum dat *intestinorum*; quæ exferebantur gelatinosa, albida, longa. Reliquæ parti albæ nuclei adnectuntur *Tentacula* parvula, lævia, basi ovata, adunata in stylum filiformem, apice incrassatum; interiora tentacula alba; exteriora magis magisque cærulefcentia & pellucida, exeuntia ad limbi oram, non vero excedentia. Nuclei margini cæruleo adnectuntur tentacula multorum ordinum, limbo longiora, inæqualia; *exteriora*, seu superiora plerumque breviora; quorum longissima diametrum corporis parum superant; brevissima vix limbum excedunt: omnia filiformia, hyalino - cærulefcentia, linea media obscuriore; dimidia parte interiore nuda, dimidia exteriori triplici serie longitudinali ciliato-glandulosa: ad utrumque enim latus & subtrus in medio exeunt *pedicelli* hyalino - cærulefcentes, subverticillati, terminati glandula seu capitulo obscure - cæruleo. Pedicelli atque capitula versus apicem gradatim increfcunt: Series infera terminat tentaculum capitulo medio fere sessili, inter glandulas laterales pedicellatas. *Verticilli* pedicellorum sæpe 5. vel 6. in quovis tentaculo. Varie incurvat animal & extendit tentacula glandifera: at nuda ista, contrahit sæpe in cylindros crassiores, apice patulos. Limbus interdum margine leviter reflectitur. In fundo vasculi ubi *Holothurias* servavi vivas per horam unam alteramve, vidi *Ova* an excrementa? dejecta; subcubica, hyalina, circello fusco in medio baseos, & linea fusca, subsinuata; interior, erecta ad singulos 4. angulos laterales: Oculo tantum armato apparuere. Injectum Sp. V. animal colorem perdit & tentacula radii.

In Mari mediterraneo non visa ante *Massiliam*: at inde & trans *Melitam* crebrior, fine mensis Maji.

15. HOLOTHURIA SPIRANS; *ovalis, cærulea, oblique cristata, subtrus tentaculis disci albis, radiis longioribus, nudis, cæruleis.*

DESCR. Longitudo 2. poll. latitudo dimidii. *Superne*: Nucleus, ovalis, rigidus, in umbonem elatus, albidus, margine obscure - cæruleus, annulis ovatis, concentricis: nucleo interno perluciente fusco, seu obscure - cæruleo; basi cristæ in duas partes æquales divisa. A parte utraq; a centro ad limbum decurrit *linea* impressa, adeo obliqua, ut basi cristæ sit perpendicularis. Parte media inter hanc lineam & oram cristæ remotiorem alia est linea minus impressa, minus evidens. *Limbus* nucleo dimidio arctior, planus, flexilis, juxta nucleum pallide - cæruleus, inde versus marginem punctis nigris, seu obscure - cæruleis obsitus; prope oram linea nigra circumdatus: extrema ora pellucida, tenuis, dilute cærulea, immaculata. *Crista* semiorbicularis nucleo, non limbo, imposita; ab uno ejus margine ad alterum oblique transiens ita, ut
quam-

quamcunque extremitatem advertas, pone ad dextram, ante ad sinistram spectet. Crista compressa *limbo* flexili constat & *nucleo* rigido, subtriangulari, altitudine dupla, lateribus rotundiusculis, apice prominulo, obtuso, ad oram usque per limbum transeunte, venulis obscurioribus, tenuissimis reticulatus; margine cæruleo-punctatus, rigidus, hyalinus. *Limbus* flexilis, utrinque rotundatus, basi latissimus, versus apicem attenuatus, totus cærulescens venis margini parallelis, tenuibus, albidis, margine cæruleo.

Subtus. *Tentacula* omnia nucleo affixa; *disci* multa, limbo breviora, filiformia, basi & apice crassiora, albida, apice niveo, in magnum foramen dilatabili. *Tentacula radii*, seu marginis nuclei variorum ordinum, inæqualia, limbo sæpe longiora & corporis quoque latitudinem egredientia, subulato-filiformia, hyalino-cærulescentia, margine utroque & nervo medio obscuriore. Movere potest animal tentacula disci huc illucque; extendere & contrahere; ora dilatare vel comprimere, at radii tentacula minus abbreviat, sed vertit in varios situs. Nucleus ipse subtus niger, limbus pallide-cæruleus, punctis nigricantibus: in medio *ventriculus* albus, globosus, ore cylindrico, longo, aperto, multum dilatabili & retractili.

Obs. Holothuriæ hujus speciei in aqua diu servatæ, eam colore cæruleo tingunt: foetidam reddunt mortuæ, tentaculis radii delapsis. In Sp. V. prorsus albescent; tantum linea nuclei longitudinali nigra superstite. In ejusdem nuclei *annulis bullæ aeris* residui se manifestant vario motu, illosque vacuos probant, & quasi pulmones quarum ope natant Holothuriæ fere semper. Haud raro fundum vasculi petiverunt, emissio prius aere. Respirationi ergo inferviunt tentacula disci: nam dorso resupinatum animal, aperuit ora tentaculorum, quibus bullulæ aeræ adhæserunt. Navigat ope cristæ, tentaculis radii remigat, tentaculis se tollit in altum vel demergit.

In mari aliquando natat Sceleton hujus vermis, album, sola parte rigida corporis & cristæ superstite. In istis exuviis habitant Afili, Onisci & Monoculi parvi.

Nauta navis nostræ Gallus narravit, Holothuriam hanc Gallico idiomate vocari *Vallette*, & pacato mari piscari a nautis, qui farina aspersam, & cum oleo vel butyro frixam in edulem præparant escam.

Glutine nativo ubique adhæret: si chartæ imponatur oleo tinctæ, & umbroso loco servetur, colorem immutatum retinet; rubescit quidem; sed aqua affusa, ad colorem redit cæruleum & nativum. Non inveniusta est, quantum Vermi licet.

In *Mari mediterraneo* prope *Cap. S. Martini* capta tranquillo pelago.
An *Thalia* LINN.?

SEPIA.

16. SEPIA OCTOPODIA. Arab. *Sebbed* vel *Arfusis* vel *Achtabût*. *أخطبوط*

Obs. *Alexandria* ingratum animal hominibus aquas tranantibus: cuti enim adhæret suctione fortissima, sine vulnere aperto. Vir proprio damno instructus narrabat, ab hoc sodalizio Sepiæ ægerrime se extricasse. Locus læsus inflammabatur sine tumore; dolore intenso ad medullas usque penetrante; adeo ut dimidii mensis tempore incedere vix valuerit.

Smirna tam exosa non est Sepia. Græcis esca jejunalis; ova præsertim inter delicias. Intestinis exemptis, carnem bene tusam coquunt: vel sole siccata in longum tempus asservant; deinde aqua bene subacta super carbones torrent, vel alia arte coquinaria præparant.

MEDUSA.

α) LIMBO NON TENTACULATO.

17. MEDUSA TETRASTYLA; *hemispharica; tentaculis nullis; tubulis marginalibus quatuor, in prisma coadunatis.*

DESCR. Diameter interdum sesquispithamalis. Subtus versus marginem *tabulæ* gelatinosæ, lineares, pollicem latæ, tres pollices longæ, rectæ, extrorsum & introrsum planæ, crassiusculæ, conniventes, apice unitæ in *prisma* angulatum, fere sesquipollicem longum. Tota hyalina, gelatinosa, rigidiuscula; marginis tentaculis nullis.

In Mari rubro ad *Hammam Pharaïn* inter urbes *Sués* & *Tôr* in littore passim.

Arabes vocant omnes Medusas communi nomine *Kandil el bâhr*; id est: *Lucerna marina*.

18. MEDUSA OCTOSTYLA; *hemispharica; tentaculis margine nullis; subtus columna quatuor-plicata; apice lobis octo, multifidis; lateribus sedecim appendicibus.*

DESCR. *Pileus* hemisphæricus, pedalis diametri, tuberculosis emarginationibus, octo? radiis totidem pellucidis, e centro exeuntibus. Tentacula marginis nulla, sed *folioli* instar ad singulam emarginationem. Subtus ad basin pilei quatuor *columnæ* sesquipollicares; quæ uniuntur in unam molem cubiti crassitie, teretem, quadripollicarem, apice fissam in 8. *cylindros* digito crassiores, juxta marginem exeuntes: pollicari spatio simplicibus; altero spatio pollicari, varie ramosos. Ad latera magni cylindri sunt *appendices* circume circa verticales 16, compressæ, pollicares, quadrantiformes, margine inferiore recto, integerrimo, superiore quadrantis modo curvato, varie inciso. *Color* animalis hyalino-cærulescens.

In Mari rubro prope *Mochham*. Arab. *Homâd*.

19. MEDUSA ANDROMEDA; *hemisphærica; tentaculis nullis; brachiis octo teretibus, ramosissimis; inferius foliaceis.*

DESCR. *Corpus* diametro 4. poll. convexiusculum, margine integerrimum, hyalino-fuscum; *maculis* radiantibus, albis; majoribus spatulæ-formibus 16, compositis ovali macula versus centrum; versus limbum lamina hastata, apice biloba. Hæ maculæ ultra pollicem longæ, a margine usque ad tertiam partem corporis procedunt. Inter singulas juxta marginem interjacent maculæ ternæ, oblongæ, albæ, longitudinales, ungue breviores. Post basin macularum spatularum inter singulas adhuc *macula* oblonga, nigra, unguis longitudine. *Centrum* hyalinum, *cruce* nigra, pollicari, obsoleta. *Subtus* ad tertiam partem diametri octo *rami* exeunt, basi crassiores penna anserina, albi, teretes, ramosissimi, ultra limbum animalis 1. poll. prominentes; superne nudi, *Lichenis rangif.* forma, infra *Lich. paschalis*. *Ramuli* alterni, conferti, ramosi, apice velut corymbosi, ramis tenuissimis, filiformibus, fastigiatis, fuscis. *Subtus* hæc octo brachia tota plena *corymbis*, terminalibus ramulorum fuscis velut alba farina confersis, interque illos exeunt plurima *folia* membranacea, oblonga, sæpe semipollicaria; minora alba; majora olivacea, margine maculisque aliquot flavescens.

Copiosa in fundo littoris *Rubri Maris*; prope urbem *Tôr*. Pulcherrima & inter omnes sui generis maxime composita.

20. MEDUSA CORONA; *hemisphærica; tentaculis nullis; subtus brachiis octo cultratis; infra dentatis utrinque.*

DESCR. Diameter quadripollicaris. Tota hyalino-rufescens. *Centrum* cruce cærulea pollicari. *Brachia* subtus octo, longitudine disci, superne cultrata, subtus lata, apice bilobo, lateribus baseos dentatis, hinc inde ramosis, ramis denuo dentatis: dentes subconici, ungue breviores. Quia substantia rigida est; dorso imposita formam servat coronæ vel Lampadis chrySTALLINÆ; qualem candelis excipiendis magnatum triclinia præbent. Gratus oculorum lusus, dum viva est.

Ad *Suës* passim. Descriptio instituta in animal Sp. V. asservatum.

21. MEDUSA PERSEA; *hemisphærica, hyalina; intus annulo opaco, albo quater interrupto; marginis tentaculis nullis.*

DESCR. Diameter bipollicaris. *Annulus* internus albus, diametro plus quam pollicari, conflatus ex 4. visceribus teretibus crassi fili latitudine, transverse fusco-striatis, albis. *Margo* longe prominens, versatilis; cirrhis nullis. *Subtus* corpus medium rigidius, (an *ventriculus*?), crassum, teres, terminatum quatuor *brachiis*, sub-lanceolatis, fere pollicaribus,

fed varie flexilibus & dilatandis; margine undulatis. *Motus* Medusæ vivæ cernitur in margine & brachiis subtus. Asservando opus est Sp. V. fortissimo, qui cito diluitur aqua ab animali emissâ; adeoque sæpe innovari debet.

In *Mari mediterraneo*; unicam inveni.

22. MEDUSA CEPHEA; *pallio tuberculato, fusco-rufescente, margine crenato; brachiis subtus octo lanatis.*

DESCR. *Corpus* hemisphæricum, pellucidum, *tuberculis* plenum, fusco-rufescens, radiis ex centro 8. obsoletis, pallidioribus, terminatis in limbo lobo ovato, bifido. Inter duos radios semper sunt in margine *lobuli* semi-orbiculati 8, membrana ad apicem usque connexi. Sub pallio *rugæ* obscuriores, concentricæ; confertæ. Medio corpori subtus affixa, quatuor ligamentorum ope *Brachia* 8, hyalino-fusca, primum teretia, deinde in laminam trigonam vel deltoideam dilatata. Cujusvis laminæ tres anguli vestiuntur, (subtus præsertim) *ramificationibus* tenuibus, multiplicibus, velut *lana* fusco-rufescente. Iisdem angulis laminarum, (non vero apici) *corpuscula* affiguntur ovata, alba, hyalina, forma Vesicæ, sed tota farta & gelatinosa. Nonnullæ in centro produnt subtus *materiam* albam, reticulato-lanatam: an ova? Quibusdam *fila* albertia centro adhærebant, plurima, crassitie pennæ columbinæ; longitudine spithamæ & ultra.

Djiddæ habitat.

β) LIMBO TENTACULATO.

23. MEDUSA PROBOSCIDALIS; *hemisphærica; subtus in medio proboscide longa; tentaculis marginis sex.*

DESCR. Diameter poll. $2\frac{1}{2}$. *Supra* convexa, non excavata, quamvis sic appareat: multum hyalina & rigida. *Tentacula* filiformia sex, semidiametro corporis breviora; supra marginem extus affixa. *Margo* prominens, æqualis. *Proboscis* subtus e centro; basi digito crassior, sensim attenuata, subflexilis, lineis obsoletis, pallidioribus, apice truncata, fimbriata, membrana plicata, dimidium unguem longa, versatili. Cultro aperta proboscis farta deprehendebatur, nullo aperturæ vestigio. *Folia* subtus sex; singulum inter singula tentacula & proboscidem, pollicaria, cordata, apice fundum tentaculi attingentia; basi petiolo lineari in proboscide linea obsoleta decurrentia. In vivo animali arcte corpori adhærent; in Sp. V. facile decidunt, & proboscis pallet.

In *Mari mediterraneo*.

24. MEDUSA NOCTILUCA; *orbicularis, depressa; verrucis punctisque bruneis; marginis tentaculis octo rubris.*

DESCR. Diameter 3. poll. altitudo $1\frac{1}{2}$. *Superficies* convexa, clausa, hyalino - rufescens, maculis punctisque bruneis. *Circulus* perlucet labyrinthi - formis, pallide rubens, quater interruptus, radios curvos rubentes versus centrum emittens; *Margo* incurvus; fissus in Lobos 16; quorum quisque membrana hyalina connectit duos Lobulos linguiformes, rubros, extus bruneo-maculatos. Per hos lobulos, seu radios decurrit ab apice *nervus* ruber. Hi nervi bini semper associati supra fissuram loborum, figuram sistunt literæ *h* inversæ. *Tentacula* 8, rubra, pollicaria, compressa, subrigida, e fissura intra duos lobos prodeuntia. *Ventriculus* corpore duplo altior; subtus quadriplicatus. *Plicaturæ* cujusvis dorsum dimidia parte inferiore rotundatum, rigidum, bruneo - maculatum: dimidia parte ad apicem. Plicæ totæ sunt laxæ, immaculatæ, ora varie plicata. *Motus* Medusæ vivæ se exferit marginem inflectendo & evolvendo; ventriculum diverso modo jactando; tentacula flectendo, non vero contortuplicando.

OBS. *Varietas* est hæc nostra a PELAGICA, LINN. rara & pellucida. ALIA subopaca, punicea, *verrucis* pisi-formibus superne plena, quæ vero simul cum cortice externo tenui decidunt in Sp. V. *Ventriculus* non raro spithamalis, sub corpore pendens 4-lobatus.

Ulcerosas & scabie affectas manus hanc non impune tractare perhibetur. Ego sana cute illam gestavi sæpe diuque sine ustulationis sensu.

Hæc, si quæ alia, vera est Noctiluca. Multis experimentis in *Mari Mediterraneo*, ubi habitat, præsertim sub Insula *Majorci* institutis, mihi patuit, illam valde *phosphoream* esse. E margine lucem fortiolem amittit, quam e nucleo. Lacerata & in mare projecta, lucida via ad fundum descendebant fragmenta. Partes discerptæ, aquæ marinæ in vaseculo mixtæ & quassatæ copiose scintillant: & stagnando aquam cito corrumpunt. In cribello aquam superfudi; quæ dum transibat, partes istæ innumeris radiabant stellulis: & sæpe affusa aqua, lumen non minuebant. Id memorabile est, & magni canonis instar in hac Experientia: *Aquam marinam per chartam bibulam percolatam lucendi vim perdere.* Innumera Medusarum integrarum copia, & corpora undis attrita vel rupta, succumque gelatinosum effundentia totidem certe phosphoros accendunt: hinc tamen Theoriam universalem alii deducant, ego non Lente & modeste pendant, Medusæ - ne virtutem hanc obtineant ex aqua, vel hæc a Medusis; immensus scilicet Oceanus minimæ sui parti tanta miracula debebit!

25. MEDUSA MOLLICINA; *orbicularis, depressa; foraminibus lateralibus 12; tentaculis 12.*

DESCR. Diameter sesquipoll. *Color* hyalinus. *Plicæ* 12. ad peripheriam formantes foveolas obovatas, æqualiter distantes. *Margo* prominens intra tentacula, æqualis. *Tentacula* 12, supra marginem prodeuntia: ad

fundum fovearum singula: longitudine quartæ partis corporis; attenuata. *Subtus* in medio *macula* orbicularis limpida; *os* forte ventriculi: huic adjacet *annulus* obscurior, obsoleto radiatus, radiis versus centrum directis, pallidis. *Motus* ut in congeneribus, margine & tentaculis. Ob nimiam molliem in Sp. V. tota corrui.

In *Mari mediterraneo*.

26. MEDUSA PILEATA; ovato - campanulata; superne globo hyalino; intus nucleo rubro; oblongo; tentaculis marginis numerosis, basi flavis.

DESCR. Unicam obtinui, altam sesquipoll. latam pollice minus: campani-formem. Globus verticalis, magnitudine pisi majoris, latior basi, sessilis. Nucleus internus, an ventriculus? ruber, pollicem longus; in lobos 4? subtriquetros longitudinaliter fissos, undulatos, ante marginem terminatos. Margo parum coarctatus, tentaculis plurimis, corpore brevioribus, flavis, basi crassioribus. Cicatrix transversa, velut circumligati fili non procul a globo verticali; at casu exortam puto, nec ad characterem naturalem pertinere. Color nuclei pulcherrimus in Sp. V. hyalinus evadit.

In *Mari mediterraneo*.

27. MEDUSA CRUCIATA? hemisphærica, cruce rufescente, corporis latitudine.

DESCR. Magnitudo cerasi dimidiati. Figura sæpius hemisphærica, interdum late campanulata. Superne in medio apparent velut foraminula 4; vel annuli minutissimi, albi, approximati: loco inter illos medio, seu in centro corporis, secant se perpendiculariter duæ lineæ rufescentes, ab ora ad oram deductæ, cruce[m] fingentes. Margo tenuis, prominens, varie flexilis, sæpe rufescens; Tentaculis innumeris hyalinis, corporis semidiametro vix longioribus. Subtus, Nucleus, seu ventriculus opacus, rufescens, rigidus, terminatus 4. brachiis versatilibus, margine undato - fimbriatis. Motu marginis celeri natat. Sp. V. cui immittitur, post horulam novus & fortis immutandus erit.

28. MEDUSA EQUOREA; orbicularis, planiuscula, margine inflexo, villoso, tentaculato.

DESCR. Diameter spithamalis (communiter;) nam vidi & fustuli quasdam pedalis diametri & ultra, quarum cirrhi marginales ulnam superabant. Corpus gelatinosum, orbiculatum, depressum: a centro ad medium prorsus hyalinum, sine radiis; vel si qui sint, ex plicis peræ ortis & varie mutabilibus; huic parti corporis subtus appenditur Ventriculus velut pera dilatabilis; ore medio patulo, crispo, fimbriato, varie versatili & laxando.

laxando, diametro peræ dimidiæ. Huic ori digitus intrusus, peram elevare potest; corpus autem in isto loco pervium non est. A dimidio corpore, seu a fine peræ ad marginem *Radii* subtus decurrunt fufci, approximati, versus centrum directi; numero indefinito, pro magnitudine animalis. In typo descripto, mediæ staturæ, diametri scilicet spithamalis, radii erant 129. In parvis, dimidio pauciores. Horum radiorum bini semper propiores, linea hyalina distincti, canalem formant communicantem cum pera magna; quod patuit injecto mercurio, & infectione facta. Dum vivit animal, arctantur radii magis, adeo ut gemini unum simplicem formare videantur. Languente vel mortuo, dilatantur & hiscunt, margine undulas trahente. *Margo* tenuis, inflexus, non villosus. *Cirrhi* marginis inæquales; quidam pedis mensura. *Tentacula* marginis filiformia, ad quemcunque fere canalem radiorum singula; inæqualia, duplum diametri animalis æquantia. *Motus* peragitur inflexione varia cirrhorum & oris peræ; præcipue vero alterna inflexione & reflexione totius marginis. Rasa ligno, parum adeo in tenebris splendet. Servanda in Sp. V. magnam aquæ vim evomit & liquorem debilitat; qui ergo post horæ spatium permutabitur.

In *Oceano Atlantico* & *Mari mediterraneo* omnium frequentissima. *Danis* Vandmand; id est: *Aquarius*.

29. MEDUSA BEROE. Tres ejus vidi varietates vel species.

- a) ALBENS: nuce coryli duplo major, costis albis; ovalis, tentaculis nullis. Viva tremebat semper ciliis costarum, & color velut igneus vagabatur ab uno margine ad alterum. Inanem fuisse, puto. In vasculo, soli exposita illico mortua & collapsa. Inveniebatur ad ingressum *Freti Hispanici* copiose. In *Mari rubro* similem vidi, tam mollem & fluxam, ut nullo modo integram tractare, multo minus conservare potuerim.
29. b) DENSE: coryli nucis magnitudine, globoso-ovalis; costis rufescentibus; intus gelatina facta. E centro tentacula duo, rubra, corpore aliquoties longiora, exibant: Costæ tremunt. Lucet in tenebris. *Maris mediterranei* incola.
29. c) RUFESCENS; ovato-oblonga; sæpe 5. poll. longa; intus prorsus vacua. Gallis: *Concombre de la mer*. In *Mari mediterraneo* frequens.

NOVA GENERA MOLLUSCARUM.

- I. SALPA: corpore libero; gelatinoso, oblongo, utroque apice aperto; intus vacuo; intestino obliquo. Variat: a) nucleo globoso, opaco juxta anum. b) nucleo nullo; sed linea dorsali opaca.

Nomen mutuatum a Σάλπη pisce, Græcis cognito; & huic Vermi additum, ob similitudinem formæ cum tubo canoro. Animal plerumque gregarium; mira cohærens symmetria: motum corporis per systolen & diastolen siphonica arte perficiens.

- II. PTEROTRACHEA: corpore libero; gelatinoso, pinna gelatinosa, mobili ad abdomen vel caudam; oculis duobus intra caput.

Nomen sumtum a pinna mobili, affixa corpori pervio & tracheato.

- III. PHYSSOPHORA: corpore libero; gelatinoso, e vesicula aerea pendente; membris gelatinosis, sessilibus ad latera; tentaculis subtus plurimis.

Situs animalis hydrostaticus, sublatu pulmone extra corpus; ad formam machinæ quam Diabolum Cartesianum appellamus.

Omnes Maris Mediterranei cives.

- IV. FISTULARIA: corpore libero; tereti, longo, undique papilloso, subcoriaceo; tentaculis oris plurimis, retractilibus, apice dentatis.

Animal siphonizans; reciproce spirans; ex apertura laterali ori proxima fila emittens, post mortem.

SALPA.

α) APPENDICULATA.

30. SALPA MAXIMA; corpore utroque apice appendiculato.

DESCR. Inter omnes mihi visas maxima, latitudine 2. poll. longitudine spithamæ. Corpus hyalinum, subquadrangulum, rectum, fere lineare; variante tamen figura. Os transversum, latissimum. Labia infra apicem. Anterior pars obrufa. Nucleus globosus, obscure-testaceus, cortice hyalino prominens, magnitudine nucis juxta dorsum. Anus maximus, diametro pollicis; sub nucleo oblique pendulus, patulus. Appendix ad anum supra nucleum, ad dextrum latus, pollice longior, subulata, basi superne compressa. Appendix anterior a dorso procedit, basi utrinque plano-depressa, deinde conica, rigida magis & longa quam appendix caudæ. Intestinum a nucleo procedit teres, oblique versus

versus os tendens, transverse striatum, antrorsum attenuatum. *Motus* viva in jactatione appendicum, inque corporis systole & diastole, aquam forte transcolante, observatur.

Varietatem inveni corpore non pollicari; utraque appendice corporis longitudinem æquante. *Aliæ* obvenerunt, similes quidem, sed dorsibus coherentes. Illæ ad *Yvicam*, hæ in *Archipelago*, & prima illa maxima in *Freto Gaditano*.

31. SALPA PINNATA; ore terminali, linea dorsali hinc flava, inde alba, abdominis lineis duabus albo-rubentibus.

DESCR. Long. 2. poll. Crassities sæpe major digito. Corpus hyalinum, subtriquetrum. Nuclei loco per dorsum extenditur linea flava, citrei coloris, opaca: huic alia linea alba interius subjacet, fere latior, subpellucida, incipiens remotius ab ore, & extensa prope ad anum. Sub Abdominis plano ad utrumque angulum lateralem in medio videtur linea albido-violacea, multo brevior & arctior dorsali illa. Anus & Os terminale. Intestinum per corpus oblique transit pellucidum, anterie paulo attenuatum, transverse striatum subtiliter. Appendix in dorso prope os, pinniformis, triquetrum-prismatica; longitudine diversa; interdum pollicis.

OBS. 1) *Associantur* plures, vidi usque ad 10. & 11. in unum centrum conjungentes apices appendicum dorsali: interdum alternatim remotiores: interdum minus ordinate collocatæ. Globulus hic socialis, stellas refert radiantes & venusto ordine unitas; sed in Sp. V. foedus solvit. Salpæ hujus motus ut congenerum. In Sp. V. nulla exierit vincula abdominalia; ut plures solent aliæ hujus ordinis.

2) *Varietas*: lineis abdominis longioribus interruptis. Et hæc & prior, in Mari mediterr. frequentissima. Non procul a rupe Belgran juxta Insulam Yvicam. Majores istas sociales, & stellulas, ungue minores inveni; quid? quod intra Salpas ventricosas, visæ mihi sint parvula libere nataantes, casu, nescio quo, ingressæ!

32. SALPA DEMOCRATICA; punctata, fasciata, aculeis pone osto.

DESCR. Ovalis: digitum latum longa: subterragona: antice truncata. Vena corporis & nucleus baseos cæruleo colore & circa hunc, in nonnullis Circulus multi-radiatus, pallide-cæruleus. Os terminale. Cauda bifida; pilis duobus, corporis $\frac{2}{3}$ partes æquantibus. Præterea; supra caudam aculei duo breves longitudinaliter positi: superius ab utroque latere aculeus unus juxta dorsum, alter ad basin ani. Quando corpus per oris aperturam inflatur, operculum ani triangulare, se conspicendum præbet. Motus peragitur contrahendo ventriculum & aquam expellendo. *Uniantur* ordine bino: dorso hujus obverso ventriculo alterius,

rius, nucleos oblique erigendo: ordo autem uterque latera lateribus opponit sæpe oppositæ, interdum alternatim. Ex aqua sublata statim separatur societas.

Ad *Majorcam* incredibili copia implebant retia, quam primum aquis immittebantur.

33. SALPA MUCRONATA; ore laterali; mucrone hyalino, interno ad frontem dextro, ad anum sinistro; nucleo cæruleo oblongo.

DESCR. Digitum transversum longa: oblongo-ovata; antice obtusa, pone acuta; abdomine planiusculo, dorso convexiore, tota hyalina, præter nucleum & venas aliquot cæruleas. *Venæ* decurrunt linea una crassiore junctæ e nucleo versus os oblique: circa os formant annulum pentagonum: deinde in lineam iterum conveniunt, ad medium dorfi exeuntem. *Nucleus* opacus, oblongus, cæruleus, antice flavescens in medio corpore. *Fasciæ* transversæ, obsoletæ. *Os* infra apicem, transversum. *Mucro* internus, hyalinus: unus, ante os, ad dextram corporis (ore & abdomine deorsum verso); alter ad sinistram, juxta nucleum. Cohærent vivæ seriebus plurimis longitudinalibus, laminarum instar, & lateribus junctis lineas obliquas transversim formant. Ex aqua depromptæ, facile secedunt. Ob mollem corporis substantiam, forti egent Sp. V. si conservandæ sint.

In vicinia *Tvicæ* reticulis expiscata.

(β) APPENDICE NULLA.

34. SALPA PUNCTATA; ore subterminali; dorso rubro-punctato, pone mucronato; ano porrecto.

DESCR. *Corpus* hyalinum, sesquipoll. longum; crassitie digiti. *Os* ad marginem, transversum; infra apicem. *Frons* truncata. *Dorsum* punctis incarnatis, sparsis; ex punctis minoribus compositis in formam irregularem stellularum; sed microscopio opus ad ea detegenda. *Dorsum* pone declive, terminatum non procul a nucleo mucronulo gelatinoso. *Nucleus* globosus, opacus, ferrugineo-flavescens; in partis imæ medio. *Abdomen* obsolete-fasciatum. *Intestinum* obliquum a nucleo versus os filiforme, transverse striatum. *Anus* ad latus abdominis cylindricus; duplo latior, quam longior, recte protensus.

In *Mari mediterraneo* rarior; extra fretum Hispanicum majori copia. In Sp. V. facile collabitur.

35. SALPA CONFOEDERATA; ore terminali, dorso gibboso.

DESCR. Digiti minoris crassitie: pollice longior. *Corpus* subtetragonum, hyalinum, molle. *Dorsi basis*, quæ nucleum ambit, rigida, corpore latior, angulo medio dorsi & laterum subtrigona, subtus excavata. In plerisque ad utrumque angulum lateralem *Spinula* obtusa, prominula; in aliis deficit. Rigida hæc pars velut truncata antice videtur. *Gibbus* in dorso ante nucleum, subrigidus; ab utroque ejus latere spina acuta, prominula. Antice in dorso prope os, ab utroque latere gibbus, seu spinula major, obtusa, rigida, patens. In medio dorso, ab ore remotius duo tubercula minora, erecta, rigida. *Nucleus* globoso-ovatus, minor lente, obscure-bruneus. *Os* & *Anus* terminales. *Labia* ani, sæpe & oris adpersa punctis fulvis. *Linea* alba e nucleo orta perlucet, transiens per medium dorsum: & *Intestinum* sub-cylindricum, eadem via procedens, oblique ad labium oris inferius; transverse striatum. *Motus* patet labiorum ejectione & inflexione & corporis systole atque diastole; sic loco se movet & aquam percolat. Sociales *coherent* totis lateribus parallelo ordine, crassam membranam constituentes, in qua omnia ora in uno margine, in altero omnes nuclei. Hæc membrana duplici constat serie, vel duplici lamina composita animalibus; ita sibi unitis, ut dorso omnia introrsum, ventres extrorsum verantur: id est, alternatim; adeo ut, unius membranæ hospes dorsum *interferat* dorsis duorum animalium alterius membranæ.

Extra fretum *Hispanicum*: & in *Archipelago* ad Insulam *Serigo*.

36. SALPA FASCIATA; ovato-oblonga; ore terminali; abdomine fasciato; intestino filiformi incurvo supra nucleum.

DESCR. *Corpus* sesquipollicare: digiti crassitie; hyalinum. *Os* terminale, in medio. *Abdomen* fasciis 5. pallidioribus; totidemque obscurioribus, alternis. *Intestinum* obliquum, subulatum. *Nucleus* marginalis, ferrugineus. Supra illum quasi *Intestinum* parvum, filiforme, transverse-striatum; primo curvatum, dein apice incurvum magis, longitudine unguis. *Anus* conico-truncatus, in medio subtus.

Ad Ingressum *Archipelagi* rarius.

37. SALPA SIPHO; subcylindrica, obtusa, hyalina; nucleo bruneo; fronte tubulis duobus, apicibus perforatis, rubris.

DESCR. Vix digitum latum longa: penna anserina angustior: hyalino-alba. *Nucleus* prope basin, globosus, bruneus. Inde versus ocellum, quod rubrum est, extenditur *Intestinum* fusco-cæruleum, filiforme, ductu anguli recti vel ut litera S. *Apex* obtusus, tubulis binis, quorum sin-

guli apices patent *circellis* miniaceis. Tubi hyalini, prominuli, remotiusculi: alter, forte os? cauda alter? nam signa alia non vidi harum corporis partium: dumque vivum pressi animal, e quovis tubo aqua alte profiliebat. Hæc membra affinitatem monstrant generis *Salpæ* & *Alcyonii*.

In Mari rubro ad *Djiddam* copiose ad littora; basi affixa faxis marinis vel Spongiæ offic. violacææ.

38. SALPA AFRICANA; ore terminali; subtriquetra, transverse decem-striata; gibbo ad basin, aucto nucleis tribus.

DESCR. Longitudo sesquipoll. crassities digiti minimi. Corpus hyalinum subtriquetrum, dorso angulato, abdomine plano; transversis striis decem. Ad basin dorfi erigitur velut *pinna* crassa, ab ano ad dimidium dorsum extensa. In ejus basi juxta anum *Nucleus* est opacus, bruneus, globosus. Ad apicem *pinnae* alius *nucleus* globosus, subpellucidus, albidus. Inter utrosque alius albidus, figuræ retortæ, apice priorem bruneum tangens. *Anus* & *Os* terminales. *Motus* congenerum mechanismo peragitur, aquam corpore expanso hauriendo; & contracto expellendo per utrosque apices; qua arte procedit, ore præeunte.

Ad littora *Tunetana* capta.

39. SALPA SOLITARIA; hyalina, ovalis, ore terminali tubulo cæruleo; ano laterali cæruleo.

DESCR. Digitum latum longa: unguem lata, depressiuscula. *Nucleus* prope basin in medio, pallide-bruneus, globosus. Inde *Intestinum* flavo-virescens, duplici curvatura, literam S repræsentans, decurrit ad *foraminulum* sphincteri-forme laterale, ori quam basi propius, cæruleum. *Frons* obtusa, tubulo in medio prominente, cæruleo, subradiato, denticulato, lineæ longitudine; sed parte dimidia intra corpus retracto. Animal claudit hoc orificium dentes terminales connivendo in hemisphærii formam.

In Mari rubro ad *Djiddam*; gramini adhæret basi obliqua, immobilis.

40. SALPA POLYCRATICA; ore infra apicem; fronte caudaque truncatis.

DESCR. Longitudo sesquipoll. Latitudo digiti minimi. *Frons* plana; duobus *circellis* impressis; sat distinctis, præsertim, quum e Sp. V. eximitur. An Oculi? *Os* transversum subtus infra apicem. *Nucleus* globosus, fuscus. Abdomen fasciis 5. transversis, latis, linearibus, totum corpus ambientibus. In vivo animali vix apparent: at in Sp. V. coniecto, manifestiores evadunt. *Anus* a cauda remotus. *Intestinum* cylin-

cylindricum oblique percurrens. Denticulus sub cauda. *Rigidior* hæc cæteris omnibus sui generis; formam optime servat in Sp. V. & in vino combusto. Una mercurio repleta & siccata, formæ vestigia primæ optime retinuit excusso mercurio. *Cohærent* societate mira: dorsum dorso obversum; ita tamen, ut una adhæreat duobus dimidiis dorsis aliarum. Sic ora omnia extrorsum spectant. Sæpe plurium ulnarum funiculo sociali serpentum more se volvunt; dum ventriculi systole & diastole aquam transmittunt, fluminis instar, per longam hanc seriem; & hac arte respublica natat.

Extra fretum Gaditanum.

PTEROTRACHEA.

41. PTEROTRACHEA CORONATA; ventre caudaque pinniferis; capitis proboscide tereti, perpendiculari; frontis coronula aculeis decem.

DESCR. *Corpus* subteres: crassitie pollicis: longitudine fere spithamæ. *Caput* antice rotundatum; coronula in fronte spinis 10. conicis: harum tres utrinque constituunt lineas medias perpendiculares: extra illas superne utrinque duæ, una supra alteram. Infra coronam *Proboscis* dependet, fere duos pollices longa, nervo medio & apice in capitulum incrassato, albido: ore terminali. Apex hyalinus: & rota proboscis gelatina farta videtur: sub illa maculæ albidæ, parvæ, sparsæ interdum. Oculus uterque ad nucham interne prope marginem; hinc satis ab invicem remoti; constant macula ovali, transversa, fusca; cui introrsum imponitur *infundibulum*, seu conus inversus, obscure testaceus; recipiens sphaerulam hyalinam, similem bullæ aeræ. *Truncus* ab oculis ad caudam fere cylindricus; pone superne rotundatus, nec nisi basi cum cauda conjunctus, lævis, immaculatus: inferne juxta pinnam albo-maculatus: abdomen subtus torum asperum. Ante pinnam *Sacculus* duplex, an gula? ovatus, pendulus, hyalino-maculatus. *Anus* proxime supra ligamentum caudæ. In quibusdam supra anum in extremo trunco *nucleus* globosus, albidus, lente minor. *Cauda* verticalis, pollicaris; antice, sed inferius longo collo adnata trunco; cæterum triangularis, utrinque lineis 4, aculearis; angulato-scabra, terminata pinnula utrinque horizontali, semicordata, cauda quater brevior, prominente ultra caudæ apicem; ubi margine incumbit margini caudæ. *Pinna* pone medium trunci, orbicularis, diametro pollicis, compressa, basi incrassata, laminisque trunci albis utrinque crenatis, affixa. Subtus in margine pinnula alia, campanulata, puncto medio affixa, hyalina.

In Mari Mediterraneo & Archipelago.

42. PTEROTRACHEA HYALINA; *capite elongato, porrecto, laevi; pinnula centrali.*

DESCR. Gelatinosa, hyalina, vix pollicem longa; crassitie pennæ columbinæ. *Caput* antrorsum porrectum, elongatum, corona nulla. *Oculi* interni ad basin capitis. *Pinnula* subrotunda: sub medio corpore. *Gula* dependens nulla; nec in dorso nucleus. *Anus* sine pinna, attenuatus. Pellucidum animal vix discernitur in aqua, nisi oculis suis fuscis & motu celerrimo.

43. PTEROTRACHEA PULMONATA; *capite obtuso, hyalino: intestino respiratorio plumis ciliato.*

DESCR. *Corpus* gelatinosum, hyalino-rufescens; ab apice capitis ad nucleum pone dorsum sesquipoll. sed crassitie digiti minimi: subcylindricum. *Caput* a trunco non distinctum, obtusum; ore, parum intra apicem, transverso. *Oculi* interne positi, perlucens; constantes utrinque macula ovali, transversa, nigra, & juxta hanc antrorsum bullula quasi aerea hyalina, circulo nigro ambiente. *Truncus* subcylindricus; superne ad dorso tertiam partem a capite transverse impressus; juxta caudam elatus, rotundatus: *subtus* inter caput & pinnam gula quasi duplici, dependente, medio emarginata. Sub medio abdomine maculis, seu punctis albidis, opacis, plurimis; Eodem loco *Pinna* subrotunda, longitudinalis, diametro pollicis dimidii, compressa, hyalino-rufescens, versus marginem prorsus hyalina, nervis obscuris, tenuibus. Pone pinnam abdomen contrahitur. Intus *cylinder* trunco dimidio angustior; inque illo *intestinum* filiforme a capite ad nucleum caudæ flexuosum; ante subalbidum, pone rufescens; insinuatum *membro* opaco inter dorsum & caudam, ovato; erecto in multis, in aliis prostrato: pinna dimidio brevior; violaceo, basi fusco: obsito gelatinosa substantia; in qua pulsatio qualiscunque cernitur: dimidio superiori ciliato papillis filiformibus, plumulosis, albis, flexilibus; pone & ante nudum, liberum. *Cauda* hyalina, compressa, attenuata, nervis obscuris: $\frac{1}{2}$. poll. longa. *Motus* ope pinnæ & caudæ instituitur, quas vario situ flectit.

44. PTEROTRACHEA ACULEATA; *ventre aptero, cauda trunco longiore, lineis aculeatis; pinna terminali, horizontali.*

DESCR. *Corpus* longum $2\frac{1}{2}$. poll. hyalinum. *Nucleus* opacus, flavescens, ovato-acuminatus, similis fere femini citri, erectus, pollicem a capite remotus; circumdatus gelatinosa substantia pellucida, alba; pone tenuior, lateribus crassior, circumcirca soluta vel libera, nec nisi basi affixa corpori. Nec tamen longe ultra corpus eminet; sed antice trunco, cauda postice

postice circumdatur. Ad latus sinistrum *lobus* quidam antice annexus, subtrigonus, superne cristatus plumula, seu ramulis albidis, confertis. *Truncus* seu pars ante nucleum compressus, digitum latum crassus, superne & subtus undique convexus; plica lateris dextri antice oblique tractus: (sed suspicor, errorem a naturali forma abscedentem; nam animal ad me delatum mortuum, vel sine indicio vitæ;) subtus ante nucleum constrictus, hyalinus: perlucet in medio *cylinder* albus, digitum minimum crassus, basi venis albidioribus; antice oblique dextrorsum tractus, ut substantia corticæ; quod tamen abortivum mihi apparet: terminatus gelatina aquea, in cujus medio os orbiculare, pennæ anserinæ latitudine. *Cauda*, seu pars corporis pone nucleum, trunco plus duplo longior, compressa, ensiformis, ovato-acuminata, hyalina, infra & supra marginata limbo tenui, lineari, pinnæ anguillæ fere similis. Latera medio longitudinaliter angulata, & *aculeis* retrorsum versis scabra. Medio inter hanc lineam & marginem superiorem est alia linea aculeorum minorum: similis & infra. Juxta limbum caudæ superiorem aculei parvi & remotiores; etiam juxta nucleum corporis in margine sinistro. *Interne* pellucet utrinque duæ *lineæ* longitudinales albidæ, principio filiformes; ante medianam caudam usque ad apicem in laminas dilatatæ. *Pinna* caudæ horizontalis, duplex; utrinque enim una semicordata, digitum latum brevior, ad caudam parte semiovata, transverse striata, utrinque aculeis sparsis hispida, ultra caudam tertia parte prominens, ibique margo unius pinnæ alteri incumbit.

Alia occasione pars postica hujus animalis inventa est, cui pone erat appendiculata *Tænia* quædam viva, compressa, filiformis, alba, geniculis nigris, varie se flectens articulos elongando vel contrahendo.

Ad ingressum *Archipelagi*.

PHYSSOPHORA.

45. PHYSSOPHORA HYDROSTATICA; *ovalis; vesiculis lateralibus, trilobis pharimis, extrorsum apertis; intestino medio & tentaculis quatuor majoribus, rubris.*

DESCR. Crassities pollicis, longitudo sesquipoll. ovalis, compressa. Supra *vesicula* terminalis, ovaro-oblonga; pennæ columbinæ crassitie, erecta, exserta, aere semper plena. Ad utrumque latus *vesicæ* unius ordinis hyalinæ, trilobæ, una supra alteram: in uno latere tres, in altero quinque obliquæ; sed puto irregulari figura. *Lobus* extimus truncatus, ore orbiculari, limbo retractili & expansili. *Intestinum* medium, penna columbinæ angustius, extenditur a vesicula terminali ad ventriculum globosum;

bosum: filiforme, apice hyalinum, reliqua parte rubrum, basi crassius. *Ventriculus* in ima parte inter vesicas trilobas, globosus, cavus, ruber, ore orbiculari, *Tentaculis* seu papillis albidis, contortuplicatis, dum non extenduntur: atque *Vesiculis* globosis, diametro intestini, flavis, ad alterum latus 5, ad alterum 3. *Tentacula* majora subtus ad latera ventriculi, rubra: uni lateri 3; duo scilicet majora, pollicaria, unum brevius, pennæ columbinæ crassitie; versus medium incrassata, capitulo terminali albo. Lateri alteri duo minora: unum, apice apertum, secundum, intestino angustius, subulatum, semipollicare.

Vidi ALIAM, *Tentaculis* majoribus, subæqualibus. *Motus* mirus: vesicæ aereæ apicem semper in superficie tenet aquæ: Vesicis trilobis tremit, limbum oris retrahendo & propellendo: *Tentacula* ventriculi extendit & torquet; cornua quaquaversum tendit.

An *Medusa marsupialis* LINN.?

46. PHYSSOPHORA ROSACEA; *orbicularis; imbricata foliolis oblongis, horizontalibus, vesicæ affixis.*

DESCR. Non absimilis *flori* pleno deorsum inclinato. Tota hyalina, diametro pollicari. *Folia* semipoll. oblonga, obtusa, plana, decurva, numerosa plurium serierum, densa, mobilia, ad vesicam aeream sessilia. *Vesica aerea* in medio, ovata, obtusa, rufescens. *Tentacula* nonnulla subtus, filiformia, fufcescentia, varie dilatabilia; interdum foliis longiora. In Sp. V. vesica sola cum tentaculis perdurat, cætera delabuntur.

47. PHYSSOPHORA FILIFORMIS: *membris lateralibus oblongis, filiformibus, dependentibus.*

DESCR. Longitudo varia; usque ad spitham. Crassities fili. Tota hyalina, gelatinosa, dependens; superne capitulo ovato, obtuso, magnitudine seminis oryzæ, in quo bullula aerea oblonga, apice rufescens. *Membra* lateralia sæpius *secunda*; i. e. uni lateri affixa, sessilia, pendentia, suprema glandiformia; inferiora sensim majora. Vario gaudet motu: sæpe rufescunt: sæpe ad latus *feta* longa, dependens exit. *Apex* infimus; mihi nondum observatus. Servanda in Sp. V. totum filum in capitulum contrahit, & sibi valde dissimilis evadit, quare melius est, ut in aqua prius moriatur; dein collocentur singulæ proprio vitro, ne implicentur. Vivæ, vesica aere plena, tamen subsidere possunt; dum corpus arctando, se reddunt specificè graviore. Tenerrimæ sunt substantiæ; quapropter raro habentur illæ.

FISTULARIA.

48. FISTULARIA VITTATA: corpore molli, laxo; tentaculis lineari-lanceolatis, lateribus dentatis; tota vittis albis, fusco-punctatis.

DESCR. Corpus sesquipedale; digiti minimi crassitie: sæpe articulatam: una serie *tuberum* transversalium sequente vittas albas. Vittæ 5 latæ, albæ; nigro-punctatæ & fuscæ alternatim angustæ: & in singulis his, una series longitudinalis *guttarum* albidarum. Tentacula capiti proxima 12: rachis prominente carina convexa introrsum: media fusca, lateribus pallida; dentibus lateralibus medio fuscis, utrinque pallidis: duplo longioribus diametro rachis transversali. Viva *Fistularia* incurvat alternatim expanditque tentacula; sed flectendo retrahit parum dentes. *Glutinosi* papillis adhæret digito.

Ad urbem *Lohajam*, inter *Zosteras* frequens in fovea, refluyente aqua. Varietas vittis albis interruptis; cæterum simillima. Arab. omnes hujus generis vocant *Zibb elbâhr*. زيب البحر

49. FISTULARIA RECIPROCAN; tentaculis lineari-lanceolatis, utrinque ramosis.

DESCR. Corpus molle, vix dig. crassum; longum sesquipedale. Coarctare valet unam corporis partem usque ad fili tenuitatem, dum alteram distendit. Tentacula fusca; fere pollicaria: 12 & plura: acuta, lineari-lanceolata, utrinque dentata: animal ea semper movebat, non vero prorsus recondebat: morienti exhibant fila albida e foramine ad caput. Papillæ glutinosæ undique corpus regunt; oculo tamen non discernendæ. Discus planus, centro pallidus, inter Tentacula; quibus animal perpetuo ludit ea retrahendo & emittendo alternatim; haud aliter ac si novas semper protruderet linguas.

Ad littora prope *Sués*. *Lohajæ* vocatur *Hannasch elbâhr*.

50. FISTULARIA MAXIMA; corpore rigido, subtetragono, supra convexo, subtus albo, plano, marginato; linguis filiformibus, apice peltato-lacinatis.

DESCR. Corpus pedali longitudine: diametro poll. $2\frac{1}{2}$. durum; papillis scabrum: superne convexo trilaterale, nigrum: subtus planum, album, utroque latere margine prominulo. Linguae plurimæ, cinereo-hyalinæ, filiformes, apice peltato-multifidæ: non semper exsertæ ore. Illa, ut congeneres aquam ex ore longe diuque tanquam e siphone projicit.

Djiddæ rarior, *Lohajæ* frequens: *Mochhæ* passim: in littore sæpe sicco recubans, refluyente aqua.

51. FISTULARIA IMPATIENS; corpore rigido, cinereo: tentaculis 20. filiformibus, apice pelta subseptemfida, denticulata.

Q

DESCR.

DESCR. *Corpus* long. spith. crass. digiti: (sed varia mole se inflat & attenuat) duriusculum; verrucis hemisphaericis, approximatis, mamamilliformibus, in medio papillam albidam, obiectam exferentibus. *Color* cinereus, fasciis maculisve inordinatis, obscuris. *Tentacula* 20; in viva, aut nuperrime mortua numeranda: unguis longitudine, filiformia, hyalina, nigro-punctata, apice peltata lamina subrotunda; saepe septemfida, obtuse denticulata. Post tentacula cutis limbus extenditur membranaecus, multidentatus. Si tangitur viva, omnia retrahit tentacula & cutem restringit adeo, ut exiguum tantum foramen appareat eodem loco. Moriens aperit foramen, a capite unguis latitudine distans, unde fila quaedam procedunt. Papillae corporis glutinosae. An *Hirudo muricata*? LINN. nam tentaculis oclusis, prorsus Hirudinem refert. An *Pseudo-Polypus*?

Ad littora *Sués* passim, sub lapidibus, vel in poris Spongiae offic. viol.

II. TESTACEA.

CARDIUM.

52. CARDIUM AURICULA.

OBS. Inter specimina rerum Naturalium numerosa & rara, quae REGI clementissimo ex Aegypto & Arabia transmisit b. m. Prof. *Forckl*, concha haec locum habuit; jam conspicienda in thesauro exoticorum magnifico Illustrissimi Comitum Dn. MOLTKE. Ignota prorsus non est eruditis; delineata a *Regenfuso* in tab. IX. Voluminis 2. adhuc inediti. Media inter *Cardium retusum* & *hemiscardium*: LINN.

Testa alba, pellucida; cordata, sub-rhombea, dorso convexo; junctura elata, acuminata. Venter obtusior, laevis, vix sulcatus. Valvulae aequales. *Serie* longitudinales utriusque testae 24: lateris inferioris *denticulus* aequalibus, obtusissimis. *Sulci* intermedii subtilissime crenulati. *Ansa* (nates) distantes, spira introsum versa, obliqua. *Sinus* profundus, laevis, lunaris. Margo dorsalis ad finem continuatus, sub ansis revolutus, juncturam cardinis tegit, forma semilunulae vel auriculae, margine dentato. *Dens* remotior (ventr.) exstans. Sub illo intus *serobiculus* profundus, cui adjacet tuber longitudinale. *Limbus* testae e finu ad apicem sensim latior, superficie superiore depresso, tenuis; margine dentato. Longitudo Conchae poll. $2\frac{1}{4}$. latit. $1\frac{3}{4}$. crassities $1\frac{1}{2}$. (Eaton.)

VENUS.

53. VENUS GLOBOSA; testa subglobosa, alba, laevi; ano non distincto; margine laevi.

OBS. Ad littora prope *Sués* projecta testis solitariis; geminis perquam raris. Pleisque dentes cardinis detriti: In utraque testa duo; quorum alter bilobus. Sub vulva interne ad marginem canaliculus latus, inter duos margines prominentes. Externa facies *Cardii*.

54. VENUS

54. VENUS CORDATA; *gibba, transverse sulcata; ano distincto, ovali oblongo; margine integerrimo.*

Anus striatus, subconvexus. Concha varii coloris. Communissima ad littora *Maris rubri*: edulis. Arab. *Qouqa*.

MYA.

55. MYA OVATA; *testa ovata; cardinis dente primario horizontali, altero erecto subulato: in altera testa bifido.*

Color griseus, intus violaceus. Testæ bipollicares; modice convexæ. Edulis.

56. MYA PICTURUM. Arab. *Mahar*. Ad ripas *Nili*.

Dens cardinis anterior triangularis, erectus, acutus; posterior longior, crassior, dentato-ferratus. Valvæ breviores quam *Myæ pictæ*, *Europææ*. Intus colore albo-violascente.

SPONDYLUS.

57. SPONDYLUS PLICATUS; *testa inaurita, ovata, depresso, plicata, flavido-alba, plicis inermibus, vel squamis fornicatis, elatis.*

DESCR. Longitudo sesquipoll. Depressa testa, certo loco affixa. *Plicatura* est. *Mytili crista galli*: sed cardo Spondyli: basis rotundata; versus cardinem in acumen vel angulum rectum coit. In utraque testa intus Callus. Integre monstrant in dorso plicarum seriem unam *squamarum*, *erectarum*, *fornicarum*. In plerisque detritæ erant.

Juxta *Sués*.

- ARCA.

58. ARCA MULTISTRIATA; *testa lenticulari, inaurita, multifulcata; margine recto, integerrimo; natibus inflexis.*

DESCR. Diameter infra poll. testa leviter convexa, striis multis propinquis, longitudinalibus: aliis transversis, vix conspicuis. Margo integerrimus, latiore spatio planatus.

OSTREA,

59. OSTREA MACULOSA; *purpureo alboque varia; costis octo, interstitiorum striis squamato-imbricatis, pectine auriculis inæqualibus.*

Testa subrotunda, utrinque convexa. Canales interni remoti 7. vel 8. Margo tuberculofus. *Sués* parcius.

60. OSTREA SUPERFICIALIS; *testæ costis planiusculis, inæqualibus: (sape alternis latioribus) squamis erectis, imbricatis.*

Subrotunda; utrinque depressa, costis parum elatis, planatis, inæqualibus.
Testa 2. poll. longa: pellucens, violacea, fragilis. *Suës.*

61. OSTREA FORNICATA; *rudis, testa oblonga, lineari, cardinibus divergentibus, interne fornicatis.*

Grisea. Longitudine digiti. Edulis.

62. OSTREA REGULA; *testis planiusculis; cavitate subquadrata, abbreviata; cauda triplo-longiori lineari, antrorsum vel ad latus porrecta.*

DESCR. Ferruginea: linearis, recta, vel curva, vel angulo recto flexa; polymorpha: longa 3. poll. digito latior; plana. Fossula cardinis ut in congeneribus. Cavitas pro sede animalis perexigua; subquadrata, obscure-cærulea. Cauda obscure-ferruginea. Testa valde fragilis. *Suës.*

ANOMIA.

63. ANOMIA TRIDENTATA; *testis inæquivalvibus; ad juncturam tridentatis: testa longiore angulo basin marginata.*

DESCR. Magnitudo nucis. Testa flavescens, testacea, pellucida, tenuis, summe fragilis, inæquivalvis, nucleo animalis perlucente fusco: Antice, i. e. ad juncturam truncata, cono in medio prominente acuminato: lateribus planatis, depressis, angulo recto acuminatis. Testa longior, obovata, tertia parte ultra alteram prominens; parte media gibba, ovata, marginata, quadrisulcata; ad basin semilunaris, depressa, plana fere. Testa brevior, hemisphærica (angulis cardinis exceptis), glabra, basi magis gibba & transverse leviter striata; striis in medio curvatis; ad marginem baseos admodum incurvata. In cavitate, qua testa longior superat alteram, animal duas exserit Alas mobiles, compressas, transversas, subrotundas, bilobas, singulas latitudine ipsius testæ: medio obscure-violaceo crassiore; margine hyalino, tenui. Inter has alas extenditur retrorsum carina subulato-compressa, violacea; basi (i. e. antice) insidens Vexillo elato, compresso, transverso, mobili, semiorbiculato, utrinque alis alligato, hyalino, linea transversa utrinque decurva, violacea in medio. Apices cardinis laterales membrana hyalina ambiente, triangulari, mobili, acuta: inter hanc & vexillum ad latus testæ decurrit alia ala hyalina.

OBS. Testæ tam arte junctæ sunt apice & margine, ut sine fracturæ periculo, vel tantillum aperiri nequeant: quare ad Patellas videtur hæc Anomia propius accedere. Dum vivit, omnes alas celeriter movendo remigat; easque facile retrahit & recondit totas. Animal in Sp. V. interemptum testis exemi, & cardini tantum affixum vidi. Constabat placenta orbiculata, rugosa, albedo-virescente, medio fusca; basi juxta vexillum adiacebat globus flavicans, fere separatus. Vexillo vero & alis explicitis, carina duobus labiis (& post mortem

mortem rubris) se fistebat, perfecta veneris recondita imagine; cujus verecundia hac in Concha operculis consuluit natura.

In *Mari mediterraneo* rarius; natans in pelago pacato.

PINNA.

64. PINNA PICTA; *cardine articulado; testa ovata, glaberrima, fragilissima, obscure violacea, nebulis radiisque pallidioribus.*

DESCR. Longitudo 4. poll. Cardo sub hymene articulatus fossulis in utraque testa 8. contiguis, subrotundis. Radii e vertice nati albido-violacei, undulati; majores, remotiores: interque illos alii minores, velut ex punctis contiguis compositi. Omnium sui generis pulcherrima; verum ad moderandam quasi hanc superbiam, Testaceorum omnium fragillima.

Sues in brevibus passim.

NAUTILUS.

65. NAUTILUS PERTUSUS; *anfractibus compressis, transverse sulcatis, longitudinaliter striatis leviter; apertura poris pertusa.*

DESCR. Color niveus. Apertura non alia, nisi pori ad marginem. Anfractus ad basin recti, saepe dilatati: interdum lineares: apice spiritaliter convoluti.

Sues, in arena littorea frequens, sed minutus.

66. NAUTILUS ORBICULUS; *orbicularis, utrinque planus, spiris subconcentricis, moniliformibus; margine extus toto poris bijariam pertuso.*

Totus albus: lente parum major. Nisi hic Nautilus esset prorsus planus, sine ulla convexitate; facile haberem pro *Nautilite placentula*, in montibus *Kahirinis* calcareis petrefacto.

TROCHUS.

67. TROCHUS DENTATUS; *testa subumbilicata: columella torta, labro emarginato, anfractibus oblique rugosis, margine inferiore coronatis.*

DESCR. Magnitudo Trochi maculati. Color cinereo-albidus. Umbilicus nullus subtus; sed ob contortionem columellæ apparet quasi initium umbilici. Columella basi gibba, prominula; intus, quasi obtusus canaliculus. Labrum in semilunarem formam emarginatum. Subtus in vivo Annulus est colore viridi circa columellam. Apertura intus argenteo-nitens.

In *Mari rubro*. Græc. Κοχλῖς. Κοχ'λι. Arab. *Nehed*. دجج Rumpf.

21. D.? *Trochus papuanus* seu *longævus*.

Edulis, coctus sapore dulci.

68. TROCHUS NODOSUS; *testa imperforata, conica, striis transversis nodosis.*

DESCR. Testa sui generis magna, lata basi 2. poll totidem alta. Forma prorsus conica. Subtus anfractus planatus, albus: lineis concentricis, elevatis interrupte rubris, vix nodosis. Columella basi callum obtusum emittit. Testa extus tam declivis, ut spirarum divisio ægre appareat. Lineis elevatis multis, ex nodis concatenatis notatur. Tota colore ornatur albedo maculis rubris obliquis. Apertura edentula?

Unicum, eumque mutilum vidi ad *Ghobeibe*, a meridie urbis *Sués*.

69. TROCHUS TRISULCATUS; *turritus; anfractibus longitudinalibus rugatis; striis transversis spiræ tribus, ventris pluribus; apertura ante & pone emarginata.*

DESCR. Longitudo 4. poll. Color flavescens. Labium exterius ultra spiræ limites superne dilatatum; ad latus profunde emarginatum, quasi urnæ margo. In ima basi similis effundentis facies est, ut in Muricis forma. Apertura quadrata. Labrum interius glabrum columellæ appressum. Anfractus longitudinales, rugis elatis, remotis: & lineis excavatis, transversis, tribus, raro quatuor. In ima parte conchæ hæ lineæ plures quam 15.

Copiose projectus per littora meridionalia *Lohajæ*; vix ullum integrum reperi. Piscatores uno ore ajebant, se nunquam vivum vidisse hoc animal. Forte loca profunda, inaccessa habitat.

TURBO.

70. TURBO NEBULOSUS; *neritoides; testa late ovata, cinereo fuscoque nebulo-fa; transverse serrata; ore argenteo striato; columella unidentata.*

DESCR. Majores magnitudine *Helicis* capitis bovis: juniores, latiores, nigriores, magis striati. Detrito externo cortice argentea patet testâ. Columella planata, lævis, albida: in medio foveola oblonga, excavata: basi dente forti; vel potius canali inter duos dentes exciso. Labrum interne argenteo-rubens; transverse striatum; maxime in junioribus.

Ad urbem *Tör* frequens. Græcis coctus edulis. *Turbinis pulli* character incidit; notabilis tamen differentia dirimit.

71. TURBO DIVERGENS; *subumbilicatus; anfractibus rotundatis, transverse striatis; apertura prorsus separata a spirâ.*

DESCR. Color sanguineo-flavescens. Magnitudo fere nucis, sed forma sub-ovata. Anfractus initio a reliqua spirâ separatur.

Frequens *Possilis*, in montibus ad *Esiac* prope *Massiliam*.

72. TURBO DECLIVIS; *testa umbilicata, ovata, transverse striata, anfractibus supra declivibus, plicato-coronatis.* Ad *Sués*,

DESCR.

DESCR. Testa vix poll. alta; sæpe ovata; interdum subrotunda. *Color* albidus; striis transversis rubris. Subtus convexa, lineis elevatis, concentricis, interrupte-rubris. Sulcus prope umbilicum profundior; descendens spiraliter in ipsum umbilicum. *Anfractus* ut testæ ædium, supra declives, carinis elatis, longitudinalibus, basi in angulum obtusum prominentem terminatis: latera anfractuum perpendicularia, striis transversis, elatis, remote-nodosis. Apex testæ depressiusculus, obtusus.

HELIX.

73. HELIX DESERTORUM; *testa umbilicata, subrotunda, depressiuscula, anfractibus rotundatis, oblique striatis, labio interiore nullo.*

DESCR. *Apertura* obovato-ovalis: supra parum convexa, obtusa. *Color* griseo-ferrugineus, fasciis duabus tribusve transversis, albidis. Subtus convexior quam supra. Diameter pollicaris: altitudo semipoll. *Labium* exterius sine limbo.

Inter *Káhiram* & *Sués* in arbusculis deserti.

74. HELIX ARABICA; *turrita; terrestris; oblongo-conica, alba, subumbilicata, glabra; apertura muta.*

DESCR. Vix pollicaris, dimidium digitum lata. *Umbilici* initium breve, formatum e labio interiore adscendente. *Apertura* ovato-acuminata; *marginē* subtus & lateribus dilatato, leviter reflexo, superne spinis ap-pressis, obsoletis. *Color* albidus. Vivum non vidi.

Lohajæ. Arab. Hárhar.

75. HELIX JANTHINÆ.

DESCR. Animal massa membranacea, pellucida gaudet, qua adjuvante natat, constante bullulis vacuis, inæqualibus; convexa, ovata, adhærente pallio animalis. Dum extendit partem corporis anteriorem, simul monstrat *tentacula* utrinque duo, incurvata, subulata. *Color* obscure-violaceus antersum & magis exterius. Omnia tentacula in eadem linea transversa sita. Prope ad marginem exteriorem testæ *Proboscis* crassa, sæpe incurva: maxime autem ventricosa dum gravidum est animal, & pen-næ anserinæ diametrum superat; albida, violaceis punctis, basi rugosa. In ejus medio, duo *labia* majora rufescentia, obsita pilis in lineis transversis. Inter hæc, duo *alia* sunt labia versus tentacula, dimidio minora, albida, glabra, rima intermedia violacea. *Janthina* in vasculo aqua marina pleno, viva servata; altero mane mortua, e labiis proboscidis extrusit membrum globosum apice umbilicatum, hyalinum, venis longitudinalibus, violaceis. In fundo vitri parvæ arenulæ videbantur puniceæ; quæ microscopio inspectæ, cochleæ erant, matrem testæ simu-lantes,

lantes, non colore; corpore quoque dispari; nam ad aperturam duo vela transversa, subrotunda, pilis tremulis ciliata; quibus pulli hi remigabant: quique sine dubio soboles erant majoris conchæ; quum aqua aliis hospitiibus non mixta fuerat. Quid? quod, in multis aliis vitris postea viderim Janthinas demittere tales conchulas, matrem circumnatantes. Matricem in proboscide esse, putaverim, quum alia non apparuerunt ejus vestigia.

NERITA.

76. NERITA CORNEA *Linn.*

In viva, *denticuli* 4. obsoleti, in medio labii anterioris. *Lineolæ* elevatæ, longitudinales, undecim interne in labio exteriori. *Labium* interius plano-concavum, lævissimum. Testa rudis, transverse obsolete fulcata.

In *Mari rubro*. Edulis, cocta sapida. Arab. *Lyssaiq*. لريف

SERPULA.

77. SERPULA CINEREA; *testa filiformi, glabra, conglomerata, in mole pertusa.*

Testæ crassitie fili confertim & flexuose repentes: frustum pugni mole, magnis cavitatibus diverso modo pertusis: microscopio aspectæ glabræ & farina quasi conspersæ; colore cinereo albidæ. A *Serp. intricata* differt glabritie testæ & modo crescendi.

Massilia.

III. ZOOPHYTA.

GORGONIA.

78. GORGONIA CERATOPHYTA; *ramis difrichis, subdichotomis, compressiusculis, striatis, divaricatis, cortice glabro, albido, rubro-maculato.*

DESCR. *Crusta* albo-flava; ad utrumque latus caulium serie duplici punctorum obscure-violaceorum. *Medulla* carnei coloris & substantiæ; longitudinaliter striata. *Rami* varie flexi in eodem plano; & retis figuram formantes; quamvis non sint connexi.

Massilia.

79. GORGONIA VERTICILLATA; *ramis difrichis, alternis, crusta alba, anguloso-articulata, ansulis incurvis, verticillatis.*

DESCR.

DESCR. *Medulla* teres, albida, fili grossioris magnitudine. *Rami* recti, alterni, distincte positi, crusta albida, verticillata, angulis teretibus, incurvatis, ramis minoribus quaternis: majoribus quinis, senis &c.: verticillis approximatis.

In *Africa*. Arab. *Ærk el hir*.

80. GORGONIA SPONGIOSA; *ramosa; cortice spongioso, fusco, quincuncialiter pertuso; crassiore medulla; substantia carnea.* In *Africa*.

DESCR. *Medulla* nigra, longitudinaliter striata: diametro quadruplo minore quam cortex. *Rami* ad basin recti. *Cortex* spongiam prorsus refert: sed Aquaforti fervet: ut & crustæ Gorgoniarum omnium: pertusus scaturit poris magnis, sæpe ordine quincunciali dispositis.

81. GORGONIA VERRUCOSA; *ramis alternis, erectiusculis; crusta verrucis sparsis.*

DESCR. *Caulis* dichotomus, teres, penna columbina tenuior: *rami* ad basin semper curvi, dein erecti. *Medulla* teres, glabra. *Crusta* verrucis inæqualibus sparsis; sæpe oblongis: apice (dum maturæ) longitudinaliter fissis & apertis.

Variat. a) *Crusta alba*, verrucis oblongis, humilibus, medulla fusca.

b) *Crusta flava*, interdum ad radicem rubra: verrucis solum ad marginem: ramis externe compressis, glabris, medulla cinereo-cornea: an species diversa?

c) *Medulla nigra*; crusta alba; verrucis elatis, subrotundis, margini propinquis; unde caulis videtur compressus.

Massiliæ a) & b). - *Corficæ* c).

ALCYONIUM.

82. ALCYONIUM PHUSCA; (Gr. *Φῆσκα*.) corpore affixo; tereti, oblongo; crusta coriaceo-stuposa; apertura duplici laterali, sphinctere instructa.

DESCR. Longitudo $2\frac{1}{2}$ poll. crassities 1. poll. *Corpus* rubrum, læve, subteres, utrinque obtusum; varia forma; interdum rectum, interdum curvum. *Cortex* stuposa. *Saccus* intestinus, ovalis, ruber, pyloro humani ventriculi similis, duobus orificiis pertusus, quibus solis cohæret cortici; cætera enim sua mole separatur. Si magis compositum esset hoc animal, allegoricum fere dicerem.

OBS. Græci religiose jejunantes & carne & pisce abstinere. Conchylia tum gratissima sunt, quæ piscis & carnis nomina feliciter evitarunt. Phusca cruda editur.

editur; transversim secta & succo Limoniorum imbuta; cortice tamen rejecto. *Smirnae* saxi adhæret, manibusque avellitur. *Constantinopoli* profundum occupat, unde Urinatoria arte expiscatur.

SERTULARIA.

83. SERTULARIA OBSCURA; *rachi virescente; ramis alternis erectiusculis viridibus; cellulis albidis, omnibus simplici serie positis superne.*

An *Sert. myriophyllum* Linn.? Parva, inquinata & vetustate corrupta erat.

84. SERTULARIA SETACEA? sed ramis caret: (forte junior). Filiformis, recta, simplicissima, denticulis secundis; calycibus ovatis, sessilibus, raris. Longitudo poll. crassities setæ: color viridi-flavescens: ovaria seu calyces rarissime videbantur. Jam mortua & corrupta inventa ad ingressum *Archipelagi*, inter fucum acinarium.

85. SERTULARIA RIGIDA; *compressa, striata; denticulis oppositis, fastigiatis; apice floriferis; ramis sparsis.*

DESCR. Fusca, seu obscure-brunea, rigida, recta, latitudine fili: raro poll. longa: ramis paucis, rectis, rigidis, brevibus: sæpe nullis. *Articuli* obcordato-triangulares, compressi, supra denticulis tribus: uno pro rachi medullari, duobus pro ortu quovis corporis. In superficie folii serpit farmentis filiformibus, (non articulatis, ut sunt caules) folio adhærentibus: unde passim surgunt caules articulati isti.

OBS. Cum *Sert. bursaria* Linn. affinitatem habet: differentiæ sunt: a) ramis hæc nostra paucis, sæpe nullis gaudet. b) Non laxa & curva, sed recta & rigida. c) Ad exitum ramorum, articuli non sunt dimidiati, sed integri. d) Flores articularum seu polypi non exeunt juxta caulem; sed ex apice denticulorum.

Ad fretum *Öresund* in fucis ferrato.

HYDRA.

86. HYDRA SCYPHIFERA; *capsula mutica, oblonga; corpusculo tentaculis 10.*

DESCR. *Caulis* brevissimus; crassitie setæ equinæ; colore flavescens: rectus semper, subrigidus, transverse striatus, sed subtiliter, & in spiras, vel oblique. *Capsula* terminalis, caule longe crassior, ovato-oblonga, pellucida. Intus *Membrum* flavum, basi coarctatum: apice cinctum *tentaculis* 10. vel 11. brevibus, varie mobilibus, articulatis, cæruleiscentibus,

bus, subulatis. *Serpit* sarmentis subtilioribus, e quibus passim surgunt caules rigidi, scyphiferi.

In *Mari mediterr.* in fuco natante.

87. HYDRA MULTICORNIS; *nuda, clavata; tentaculis XIV. sparsis, subulatis.*

DESCR. *Magnitudo* prioris. *Color* incarnato-aqueus. Versus apicem crassior, claviformis; *clava* sub-acuminata: undique obfessa *Tentaculis* albidis, sparsis, fere 14, subulatis, longitudine corporis: verum digito ad-moto, retractilibus adeo, ut clava breviora evadant, & simul crassiora. Plures radicatae juxta invicem in fuco; at in nulla conspiciebantur rami laterales.

In freto *Öresund* inter fucos ad fundum maris. Alioquin *Hydræ* communiter aquas dulces colunt.

IV. CORALLIA.

MARIS RUBRI.

A) MADREPORA.

I. MADREPORA SOLIDA; *stellis undique confignis; marginibus coadunatis, membranaceis.*

OBS. 1. *Stellæ* cavæ, magnitudine seminis sinapeos; margine unitæ in parietes communes; graciles chartæ instar, & facile fragiles. Lapidea moles major vel parva, *stellas* tenet ejusdem semper magnitudinis.

Variatio. a) *Stellis radiarum lamellatis.*

b) *St. margine lamellaris; circulo centrali papillis lapideis, erectis, unius seriei.*

OBS. 2. *Corallia* his in oris obvia, ædibus fruendis apta sunt pleraque; & *Djidda* urbs tota, his lithophytis, ceu inhabitatum constat museum. Lapidēs 25. pedem cubicum æquantes; & e littore transvecti emuntur uno *Piafro* seu 40. *Parâ*; moneta Arab. Hinc *Systema Coralliorum* adornari potest perquam artificiale in a) SOLIDA; b) FRAGILIA, sensibus & officiis domesticis magis acceptum, quam nomenclaturæ eruditæ. Inter Solida, hæc species prima & frequentissima, constans materia subtiliore & compactiore reliquis.

Obs. 3. Nunquam satis admiranda Coralliorum copia in Mari rubro. Montes hi Litophyti vocantur *Sjaab*. شعب. Luxus & lusus Naturæ. His in locis Observator curiosus plura detegit paucis diebus, quam toto anno alibi. Scopuli & saxa littorea hic pretiosa sunt eruditis, incommoda navigantibus; Turcis præsertim qui altum mare timent & inter Insulas proficiscuntur. Magna putatur scientia Nautæ, hæc brevia prospicientis & evitantis. Discernuntur e longinquo colore ex albo-virescente; grato oculis otiosis spectaculo; opposito littoribus nudis, arenosis & tristibus. Usque ad decem Orgyas vidi hæc saxa surgentia. Dum aquis extrahuntur, suprema parte inveniuntur mollia, inde magis magisque cartilaginosa; fundus est lapis solidus. *Monachi Græci* in urbe *Tôr* habitantes interdum transmittunt Corallia *Kâbiram* & *Constantinopolim*: sed ab imperitis obviæ & communes leguntur species potissimum molliores; vix vero Corallia solida. Mihi obvenerunt specimina, dignissima Museis Europæicis; verum mora & sumtus abvehendi postulatur. Nullo negotio colliguntur. Incolæ paratos lapides habent in mari, quos facilius secant & ædibus struendis aptant, quam saxa Calcareæ, quæ totos montes adjacentes constituunt. Urbes *Tôr* & *Djidda* tam magnifice ædificatæ sunt. *Lobaça* fundamina tantum ædium saxo Corallino sternuntur. *Calx* e lapide hoc & testis Conchyliorum paratur alba, subtilis, optima. Hæc ustulatio non in fornace peragitur; sed rogos ligneus arboris *Secura* altitudine $1\frac{1}{2}$ ulnæ, & diametr. 6. vel 8. accumulatur, cui injiciuntur Corallia & Conchyilia in formam conii. Nychthemeri spatio peracto, extinguitur ignis. Calcis nomen in Yemen *Noura* نور in Ægypto erat *Djir* جير

2. MADREPORA FAVUS; *stellis margine coadunatis, rigidis.*

Obs. Lapis cavernosus: tubis longitudinalibus, crebris tabulis interceptis. Stellæ magnitudine parvi pisi: concavæ: hexagono-orbiculatæ: parietibus crassitie unguis: duris, compactis.

Variat. a) *Stellis diversæ magnitudinis*: in eodem lapide quædam lente non majores; pisi mole aliæ.

b) *Interstizia vel parietes; aut lamellati; aut lati, nudi.*

3. MADREPORA CAVERNOSA; *stellarum marginibus separatis, lamellis interjectis.* (*Favosa*. LINN.)

Obs. Magnitudo stellarum non solum obvia oculis nota characteristica est, verum & invariata in his lapidibus; adjungenda igitur definitioni; si subveniret mensurandi modus aptior, quam ex comparatione. Hujus Speciei stellæ, magnitudine lupini vel fabæ: concavæ, contiguæ: singulæ suo pariete discretæ, qui lamellis transversis uniuntur; quare & moles lapidis cavernosior apparet.

4. MADREPORA LABYRINTHIFORMIS; LINN. *costis undulato-labyrinthiformibus.*

Obs. In recenti & illasa Madrepora, costæ non retusæ, sed ferratæ, ob lamellas transversas ultra parietes communes exstantes. Lapis valde porosus.

5. MADREPORA ASTROITES; LINN. *stellis orbiculatis, marginibus separatis, lamellis interjectis.*

OBS. Perfamilis superiori 3: quoad figuram lamellarum & magnitudinem stellarum; sola harum figura circularis & minori profunditate. Crusta super crustam crescit. Semel illam reperi in montibus ad septentrionalem Djiddæ plagam.

6. MADREPORA MONILE; *stellis infundibuliformibus, disco vacuis, lateribus & parietibus obtectis, lamellis æqualibus, radiantibus, denticulatis, in alteram stellam continuatis.*

DESCR. Pori non sphærice cavi, sed planati in formam conii inversi, brevis, lati. *Stellæ* magnitudine pisi: centrum minus semine sinapeos, lamellis nullis; ideoque profundius. *Lamellæ* valde propinquæ; velut moniliformes: remotius a centro, interdum ramosæ: continuatæ supra stellarum parietes ab una ad alteram; ideoque parietes obregentes. Unica reperta in montibus iisdem.

7. MADREPORA DEDALÆA; *stellis subhexagonis; parietibus unitis, reticulatis, interne & margine dentatis.*

DESCR. Animal est *Priapus*; viridis vel cinereus; quisque suam stellam inhabitans; illuc se retrahens & occultans. *Stellæ* magnitudine parvi lentis prismaticæ, eadem apertura decurrentes ad intimam basin vel centrum lapidis; fere ut *Tubipora*. (an ejusdem generis?) Lapis admodum porosus & fragilis. *Parietes* sole siccati, demto incola, apparent nivei, pertenuis; serie longitudinali pertusi poris latis; retiformes: interne dentibus perpendicularibus subulatis, remotis; seriebus transversis, ad centrum non pertingentibus. In tubis quoque non sunt alii isthmi præter hos dentes. Margo parietum superior denticulatus.

8. MADREPORA MONASTERIATA; *parietibus in linguas lanceolatas, scabras elatis inter stellas contiguas; seminis sinapeos magnitudine.*

DESCR. *Parietes* communes: quamvis ipsæ stellulæ ob linguas interjectas, appareant remotæ. *Linguæ* in margine parietum erectæ, compressæ, longitudine dupla diametri stellæ, lanceolatæ, undique scabræ; quinque vel quatuor circa quamcunque stellam; communes quoque stellis adjacentibus. *Stellæ* inter linguas, teretes, radiantes lamellis: siccatae videntur pertusæ; æque ac cætera omnia reticulata, poris pervia, & nivea spectantur. Lapis spongiosus; tenax tamen & durabilis.

9. MADREPORA CONTIGNATIO; *incructans, planiuscula, orbiculata; stellis radii linearibus, versus centrum spectantibus: stellis disci ovatis, divaricatis, subcontiguis.*

DESCR. *Crusta* crustam tegit lapidisque molem format: vidi crustam pedis diametro planam, glutine virescente rectam, animalibus pleno, quum aquis extrahebatur: affixam subtus lapidi; nec liberam, ut Madrepora fungites. *Stellæ disci* pollicares, velut ex centro radiantes: lamellis omnibus antrorsum, seu ad centrum oblique versis. Discus reliquus stellis oblongis millepediformibus, convexis, dorsatis, lamellis transversis parallelis, ad utrumque apicem stellarum radiantibus; apicibus contiguus in interstitiis, quæ ipsis stellis latiora non sunt. Disci stellæ magnitudine & facie millepedum. *Lapis* interne cavernosus; tubis ad primam basin recta decurrentibus inter singulas stellarum lamellas isthmis transversis plurimis. Frustulam vidi Disci, lectam e monte littori vicino. Stellas offerebat ovaes, lente minores, convexas, læves (forte detritas); lamellis tantum in interstitiis stellarum circa quamque stellam radiantibus, unde cavitates istæ velut pinnatæ. Species-ne diversa?

Hæc species videtur, ad *areolatam* LINN. accedere.

10. MADREPORA FUNGITES; *orbicularis, lamellis denticulatis.* Arab. *Gæ-dâhh.* قدح

OBS. Fragilis; agariciformis, libera, frequens. *Alia*, & sine dubio Species diversa e montibus *Djiddæ* septentrionalibus a Dn. *Niebuhr* allata; pedis longitudine, oblonga, 5. poll. lata, lamellarum dentibus latis. Minores eandem figuram & proportionem habent dentium.

11. MADREPORA ORGANUM; *lamellis transversis combinantibus, rugosis, undulatis, vix remotis.*

12. MADREPORA CORALLIUM RUBRUM.

Parvum vidi ramum corallio insitum magno e mari advecto.

13. MADREPORA CACTUS; *ramis compressis divergentibus, intricatis, dichotomis, margine carinatis; lateribus contigue stellatis.*

DESCR. Non vidi nisi semifossilem e montibus allatam: sed pulcherrimam. Surgit ramis fere erectis, compressis, subdichotomis: versus novam dichotomiam latioribus; margine acutis, varie flexis; apice etiam carinatis, subtruncatis. *Stellæ* replent utraque latera ramorum, seriebus sæpe transversis, contiguis. *Lamellæ* e centro humiliore radiantes unitæ cum

cum lamellis vicinarum stellarum: propinquæ, humiles, filiformes, occupantes totam superficiem.

Fruticem vidi pedem altum: ab uno centro ad alterum stellarum, distantia non majore diametro parvi lentis: rami supremi unguem lati.

14. MADREPORA RUS; *superficie inæquali, spongioso-papilloso, stellis superficialibus, planiusculis, distantibus.*

DESCR. Rarior: Lapis compactus. Superficies velut salebroso & monticulosa carinis elatis, varie undulatis, dentatis. Loca vero tam altiora, quam depressa papilloso-spongiosa, sed subtiliter & oculo remotiori velut araneorum telis obducta apparent. In his papillis videntur stellulæ lamellis radiatæ, obscuræ, orbiculatæ, locis inferioribus inter carinas sitæ, remotæ, magnitudine seminis sinapeos: nec convexæ, nec concavæ, sed in ipsa superficie hærentes. Ubi carinæ profundius jacent, ibi stellulæ manifestiores. Inter altiores, omnia videntur papillis plena. Cavitates foraminulis sparsis, fili crassitie.

An *Madr. punctata* Linn.?

15. MADREPORA SERAILIA; *superficie subæquali, stellis distantibus, cavis, margine prominentibus, rotundis.*

DESCR. Lapis satis compactus. *Interstitia* stellarum elatis punctis oppleta. & prorsus solida. A singula stella descendit *Canalis*, in multos minores divisus & innumeris isthmis interceptus. *Stellæ* sinapeos semine majores, margine parum eminent ultra superficiem: Cavitatis autem superficie inferiores; orbiculatæ lamellis e centro radiantibus. Impari spatio distant a se invicem: modo uno, modo bino diametro suo; sparsæ sine ordine.

16. MADREPORA INCRUSTANS; *superficie inæquali, ortam stellis prominentibus, conico-truncatis, distantibus apice, cavis, intus lamellatis.*

DESCR. Lapis adeo compactus. Tota superficies & tubuli stellarum externi, subtiliter spongioso-papilloso. *Stellæ* inordinatæ, remotæ, prominentes, conico-truncatæ; basi pisi diametro, apice lentis. Cavitas margine lamellata, disco prorsus vacuo, descendente usque ad superficiem libellam. Interdum quidam *tubuli* stellares connati-eriguntur in dorsum altius: unde iterum novi tubuli laterales velut rami exeunt: sed ad regularem structuram pertinere, non crediderim.

Obs. Incertum, faciat-ne Madr. hæc solidos lapides ipsa; an stratis solum se sternat super alios lapides. Unica enim illa quam vidi, me dubitatione non eximit. Alias deinde observavi lapideum solidum effingere, sed per stratorum inductionem, crusta inferiore manente, aucta semper nova & habitata animalibus.

17. MADREPORÆ CHALCIDICUM; *stellarum tubis prominentibus, remotis cylindricis, interne & externe lamellatis: lentis magnitudine.*

DESCR. Superficies tota stellis aspera. Lapis cavernosus, durus: tubuli intercepti isthmis numerosis. Interstitia stellarum punctis elatis, parvis, plurimis. *Stellæ* lentis diametro: & parum a se invicem remotæ & elevatæ. *Lamellæ* perpendiculares: externæ & internæ fere æquales; hæ tamen majores, supra marginem parietis unitæ. *Parietes* adeo tenues, superne lamellis dentati. *Tubi* interne, medio cavi, non repleti lamellis.

18. MADREPORÆ CONCAMERATA; *plana, stellis margine prominulis, remotis, interstitiis lamellatis.*

DESCR. Semifossilem tantum vidi. Stellarum *margo* crassiusculus, elatus, lamellis dentatus. *Lamellæ* internæ minores (forte detritæ); adeo ut stella fere rota vacua: *externæ* internis continuatæ, iis majores, interstitia occupantes, eaque velut pinnata reddentes. *Lapis* porosus, durus: crustæ obesæ formam ferens.

19. MADREPORÆ DIVERGENS; *subglobosa, organifera, tubis divergentibus, ut ex centro sphaeræ, duplo diametro ultra superficiem exstantibus.*

DESCR. Unicam vidi; e monte supra dicto depromptam; forte eandem cum Madr. organo. Hæc sine dubio formam abortivam sphaeri obtinuit ex situ loci natalis; quum tubi soleant in aliis paralleli esse. *Tubuli* ultra superficiem prominentes cylindrici; extus elate longitudinaliter striati: intus lamellis usque ad centrum radiantibus oppleri: apice truncati: diametro toto a se invicem distant supra *superficiem*; quæ rugosa, vel tuberculosa. *Interne* tubi, ut in Madr. organo lamellis crebris, transversis ligantur & concentricis; quum in cæteris sint parallela. Lapis fragilis.

20. MADREPORA CORYMBOSA; *corymbi ramis apice crassioribus, striato-aculeatis; stellis terminalibus solitariis, rependo lobatis.*

DESCR. *Rami* digito crassiores, in corymbi formam positi; versus stellam terminalem latiores. *Extus* striis longitudinalibus, sursum aculeatis. *Stellæ* terminales, solitariae, magnæ, cavæ, poll. latæ; margine in lobos sinusque varie flexo. *Lamellæ* tot internæ, quot sunt striæ extus, pertingentes usque ad centrum. *Margine* denticulatæ? Fruticem vidi altitudine pedis.

B) MILLEPORA.

21. MILLEPORA DAMICORNIS? *ramosa, diffusa; poris undique sparsis, stellari-bus, immersis, ramorum apicibus conicis.* Arab. *Schawab.* شعب

DESCR. *Pori* stelliformes; (quid ergo obstat, quo minus ad Madreporæ genus referatur eodem jure, ac Corallium rubrum?) semine Sinapeos duplo minores; margine superiore prominulo; sparsi, distantes. *Interstitia* minutissime papilloso-punctata. *Rami* subteretes; vix pennæ anserinæ crassitie, sine ordine divisi; apicibus conico-subulatis. *Color* virescens & rufescens in recenti: siccata albescit.

22. MILLEPORA ALCICORNIS; *ramosa, diffusa, poris undique sparsis, stellanti-bus, immersis; ramorum apicibus obtusissimis, compressiusculis.*

Obs. *Pori* ut in priori. *Rami* penna anserina crassiores; apicibus obtusissimis: interdum emarginatis, dilatatis. *Color* virescens; sæpe violaceo-ruber: sicca albescit.

23. MILLEPORA LINEATA; *subdichotoma, ramis diffusis, patentissimis, sub-quadrangulis; apicibus subulatis, poris angularibus.*

DESCR. *Caulis* penna columbina crassior. *Pori* per angulos in quatuor series longitudinales digesti, stellares: sem. Sinap. duplo minores, distantes, margine superiore prominuli, immersi. *Rami* sæpe dichotomi, parentissimi: ubi alios ramos attingunt, concresecunt. *Ramuli* terminales, subulati, fere pollicares. *Color* recentis cinereo-virescens.

Obs. Profundiora maris loca inhabitat. Cum *Lineata* LINN. convenit descriptio; nisi quod in nostra rami non concatenati; nec caulis filiformis; sed multo crassior filo.

24. MILLEPORA MURICATA: LINN. Arab. *Náchl el báhr.* نخل البحر id est: *Palma marina.*

a) *Flavescentis*, in fruticem orbiculatum, subfastigiatum, sæpe ultra pedis diametrum diffusum.

b) *Rufescens*, digito crassior; poris lateralibus, hinc inde in cylindros pollicares productis: rarior e profundo expiscatur.

Est hæc species, ob poros stellares Madreporis adnumeranda, æque ac Corall. rubrum; vel hoc Milleporis adjiciendum. A priore hæc differt species: apicibus stellarum tubulatis, cylindricis, externe lævibus, striatis: illius autem rami digitiformes, obtusi, apice & externe punctato-porosi.

25. MILLEPORA EXESA; ramis conglomeratis, obtusissimis, fastigiatis, compressiusculis, nitentibus, virescentibus. Arab. *M'gawish*.

Obs. Vidi tres pollices altam; sæpe pedem latam: facies & color scorii ferri. Rami compressi; in multos manipulos connati: apice fastigiati, obtusissimi. Superficies porosa, nitens, olivaceo-virescens; apicibus magis flavicantibus. Inter rariores.

26. MILLEPORA DICHOTOMA; retiformis, læviuscula, ramis teretibus, subcompressis, apice obtusissimis, poris minutis.

DESCR. Tabulæ varie connascuntur. Rami crassitie pennæ anserinæ: vix scabri; connati in rete crassum; foraminibus sæpe ramis angustioribus. Apices ramorum dichotomi, cum rete compressi, sed tenuiores, obtusissimi, sæpe emarginati. Color flavicans. Profundum inhabitat: fragilis.

27. MILLEPORA LICHENOIDES; expansa, ramis teretibus alternis, ramosis, ciliato-dentatis.

DESCR. Stirps alba, ramosissima, non glomerata, sed in unum planum expansa: quamvis apices sæpe flexi. Rami teretes, compressi externe, i. e. secundum planum totius plantæ; ad exortum parum curvari, & quasi undulati: subtus glabri: punctis striatis ad utrumque latum obsoletis, & dentibus acutis, brevibus suboppositis; supra punctis elatis, sparsis. Rami omnes tam arcte, tantoque ordine dispositi, ut Millepora tota e longinquo referat reticulum.

28. MILLEPORA CELLULATA; conglomerata, ramis compressis; laciniis linearibus, obtusis.

DESCR. Color albidus, rufescens. Rami scabri punctis elatis & fetis; sæpe connati: punctis impressis, in lineis oblique decussantibus positis. Rami plerumque in globum glomerati: fracti, duplicem intus monstrant ordinem cellularum: latitudine sexties superant crassitiem.

Varietas: glabra; punctis impressis; tuberculis nullis elevatis: sed forte aquarum alluvie detritis.

An *Mill. Alticornis*, LINN.? Hæc poris nec sparsis, nec obsoletis.

29. MILLEPORA RETICULATA; expanso-sinuosa, reticulata, ramis interne compressis, porosissimis.

DESCR.

DESCR. *Color* albido-flavescens. *Pori* subrus aperti, conferti, fastigiati; non in verrucis prominentibus siti; an ergo diversa a *Reticulata*, LINN. vel diversæ maturitatis? Ramus fractus, poris intus plenus, ut *Arundo*: crassitie pennam columbinam vix æquat.

30. MILLEPORA CONGLOMERATA? *ramis compressis; verrucis quincuncialibus, apice apertis. Mill. compressa. LINN.?*

DESCR. Integram non vidi; ergo ignoro utrum plana sit, vel conglomerata. *Rami* compressi, ita ut duplo latiores quam crassiores sint. *Verruculae* elatae in utroque latere; margo uterque lævis. *Color* flavicans; interdum virefcens. Fractus ramus duplicem ordinem cellularum monstrat; ut in *Mill. Alcorni*; cui valde affinis.

Hæ quatuor species 27-30. *Massiliæ* inventæ.

C) LITOPHYTA.

31. LITOPHYTON FULMONARE; *carnosum. Arab. Lâhm el bâhr. لحم البحر*

DESCR. Flavo-virefcens; lamellis crassiusculis, labyrinthiformibus, plicato-undatis, subrus striatis, nudis; supra punctatis, papillofis. Caro flava, spongiosa, duriuscula. Stirps crassus; pedalis altitudinis; sesquiped. latit. Ajunt nunquam lapidescere.

32. LITOPHYTON ARBOREUM; flavo-virefcens, ramis teretibus, fuleatis, ramossissimis, ramulis oblongis, papillofis. Sesquipedale sæpe: stirpem valde diffundens; in aquis erectum. Rami alterni. *Ramuli* papillofi, laterales, terminales, unguem longi, flavidi, racemiformes.

33. LITOPHYTON FULVUM; *crustaceum, carneum, fulvum, punctatum; poris majoribus elatis.*

V. TESTACEA FOSSILIA.

MELITENSIA.

In lapide calcareo, ex quo tota constat Insula.

34. CARDIUM *solidum.*

35. VENUS *dione.*

36. ARCA a) *noæ.*

37. — b) *senilis.*

38. — c) *glycymeris.*

39. MYTILUS a) *modiolus*.
 40. ——— b) *lithophagus*.
 41. ANOMIA *terebratula*.
 42. OSTREA a) *edulis*.
 43. ——— b) *pecten*.
 44. ——— c) *obscura*? auribus æqualibus; valvula utraque convexa; radiis rotundatis, longitudinaliter striatis. Ab *Ostrea maxima* diversa, cui valvulae planæ.
 45. ECHINUS a) *lacunofus*.
 46. ——— b) *rosaceus*.
 47. ——— c) *pentagonus*; *oblongo-pentagonus*; *ambulacris quinis, bipartitis, superficie ocellata*.

DESCR. Longitudo spith. Subtus planus; umbilico profundo, lato, pentagono. E singulo angulo sulcus exit ad singulum angulum marginis. Superne prismatico-pentagonus, margine dilatato, oblongo, angulis rotundatis. Ambulacra 10, depressa, lineis oblique transversis notata; ad utrumque latus ambulacri terminatis puncto cavo; versus apicem latiora, apice rotundata; circa singulum pulvillum bina curve conniventia; nec tamen coeuntia. Pulvilli elati, oblongi, convexi. Vertex depressus. Color sæpe testaceus. Superficies supra & subtus ocellata, circellis impressis, punctatis, disco elato.

KAHIRENSIA.

48. NAUTILUS? a) *Gizenfis*. Ad Pyramides vulgaris, & in monte Calcareo ad Arcem Káhirinam. Jam a *Strabone* memoratus. Ubi-que hæret in faxo Calcareo hic vulgari, & per deserta sparsus, lapide matrice vitrificato & soluto. Adeo parvus. In fundo Maris rubri ad Sués similes vidi Nautilos; non convexos, sed depressos. Alii erant mixti cum arena albescente, sed tam parvi, ut vix nudo oculo discernendi fuerint.
 49. ——— b) *major*; pollicis diametro; simillimus priori; concamerationibus distinctis; depressus, placenta forma.
 50. ECHINUS a) *rosaceus*. Arab. *Surret el belad*. صرة البلاد
 51. ——— b) *lacunofus*.

MATERIA MEDICA

EX

OFFICINA

PHARMACEUTICA

KAHIRÆ

DESCRIPTA.

MATERIA MEDICA

KAHIRINA.

I. ANIMALIA.

Rotl.
Parà.

1. **M**umia humana. (Cerebrum magis in usu.) موميّة E Saccara. 8.
 2. Cornu Cervi. قرن الايل Dicitur differre a *Havn arajal*, C. Cv. ex Europa allatum. - - - - - 30.
 3. Os Sepia. Zibb el bàhr. زب البحر E Græcia & Alexandria. - 6.
Rarum: Aphrodisiac. putatur.
 4. Ebur. سن فيل E Sudan. (Æthiop.) - - - - - 8.
 5. Stercus Vespertilionum. Adfia. عذسية Arabes e deserto adferunt. 5.
Usurpatur interne & externe. Frequens. Ad tumores miscetur aceto.
 6. Cortex ovi Casuarii vel Struthionis. قشر بيض الدعام
 7. Ova Testudinis sicca. Beid el qolqom. بيض القلقم E regione Ba-hæiri, Arabes afferunt. - - - - - 1. Ovum. 10.
 8. Vipera. افاعي viva singula 1. parà. Caro sicca, unius - 4.
 9. Millepedes. Umm ali. ام على Kúhiræ. Corbis mensura - 4.
 10. Cantharides, virides. Dybbán hendi. دبان هندي Ex India. Rotl
sæpe 5; Patak: & sæpe 3j - - - - - 30.
In Stranguria. Rec. Canthar. 3j.
Sacchari 3ji.
- M. Divide in 4 partes æquales. Mane una pars recipitur;
expellit serum & parum sanguinis, sed sine noxa. Al-
tera die secunda portio, & sic contin.
11. Oculi Cancrorum præp. Ejn essaratán. عين السرطان Ex
Europa & Archipel. Ok 4. patak. - - - - - Rotl - 80.
 12. Meloe fasciata. دراريح E Syria. - - - - - 50.
 13. Coccionella. دود Ex Europa. Ad Confect. Al kerm. قرمتر 3j. 2½.
 14. Coccus

14. *Coccus baphica*. حب قرمز E Græcia. Tinctur. & medicum. 3j. 1½.
 15. *Cera Alba*. شمع ابيض Ætate affertur. - - - Rotl 24.
citrina. hieme affertur. - - - 24.
 16. *Gallæ quercinæ*. E Syria & Græcia; illæ meliores. - - 14.
Afs. عفس Tinctoriæ.
 17. *Gallæ Tamar*. Atl. Budjm. بجم Káhiræ. - - 4.
 Tinctoriæ, loco Gall. querc.
 18. *Nidus Insecti?* Tejhn. تيهان Ex Archipel. Decoct. cum saccharo 15.
 contra tussim.
 19. *Mater perlarum*. Arq tulia. عرق اللولي Ex India. 100 pro
 400 p. exportatur hinc Constantinop.
 20. *Sadof*. صدف Ex India per Sués: forma pulv. - - 8.
 21. *Unguis odoratus*. (opercula Cochl.) Dofr el afrít, صفر العفريت
 i. e. unguis dæmonis. E Mochha per Sués. Arabes etiam afferunt. 20.
 Nigritis fumigatorium est.
 22. *Castoreum*. Djild Menaster. جلد منستر - - 3j. 30.

II. MINERALIA.

1. *Bolus armeniat*. طين ارمني
 2. *Marga?* rubra. Tin machtúm áhmar. طين مختوم احمر Ex de-
 fertis Káhirinis. Cum AqF. leviter effervesceit. Usus interne &
 externe in hæmorrhagiis: &c. - - 4.
 3. *Terra Cretacea*. Tabaschir hendi. طباشير هندي Ex India. Ok, 400.
 3ß. Cum aqua contra Sitim febrilem infantum.
 4. *Cretacea*. Tin machtúm abead. طين مختوم ابيض Ex Ar-
 chipel. vilior. - - Rotl 15.
 5. *Argilla alba*. Læben adra. لبن عذري vel Læben marjam لبن مريم
 Ex Græcia & Palæstina. Pro augendo lacte: 3ß. interne.

6. *Mica. Talq abjad. طلق ابيض* Ex Ægypto superiore. - - 6.
Ufus parciior; in suffimentis & Alchemicis.
7. *Terra. Tîn machtûm rumi. طين مختوم رومي* vel *Abjad. ابيض*
Ex Archipel. Ufus frequentior quam Terræ sig. rubræ. - 12.
8. *Talcum. Selenites. Chrystallus mont. &c.*
9. *Corallia præpar. Murdjân medâbar. مرجان* Ex India & Venetia. 15.
10. *Millepora? Ghâb el bâhr. غاب البحر* Ex India. Rarior usus.
11. *Tubipora musca. Damm achavæjn. دم اخوين* Ex Archipel. &
Mari Rubro. Ufus rarior. - - 5.
12. *Lapis Judaicus. Zæjtûn benni Israil. نريتون بني اسرائيل* (i. e.
Olivæ Israelitar.) E Syria & Palæstin. Diureticum, - 12.
Pulvis rarus interne contra stranguriam.
13. *Aculei echini? Dûdajûb. دود ايوب* (i. e. *Vermes Joli.*) vel
Schijafe hadjazi. شيفاف حجازي E Syria & Hedjäs.
Ufus frequens. Pulvis cum aqua illinitur oculis inflammatis.
14. *Lapis Lazuli. حجر لزرورد* E Græcia. - - 10.
15. *Bitumen asphaltum. Qasrel jahûd قفر اليهود* E Syria. - 10.
Ufus rarior. Theriacam ingreditur.
16. *Minera Ferri rubra. Sandal hadîdi صندل حديدى*
17. *Lapis hamatites.* 18. *Crocus antimonii.*
19. *Minera Antimonii. Antimonia. انتيمونيا* Ex Europa. Ufus frequens. 18.
20. *Viride æris. Djinzâr. جنزارى* Ex Europa. Ufus pictorius. 50.
21. *Mercurius sublim. corros. Soleimâni.*
22. *Cinnab. nativ. Durûr âhmar. ضرور احمر* Ex Græcia. - 40.
23. *Flores Sulphuris. Zahr Kibrit.*
24. *Succinum præpar. Kehrebâ mdâba.*
25. *Mercur. dulcis. Merkûria ha lu.*
26. *Crocus martis. Aperiv. Zafran el hadîd musetta.*
27. *adstringens. Zafran el hadîd moqbed.*
28. *Cerussa. Afidâdj. اسيداج*

29. *Lac sulphuris.* Kibrít n'bagad.
 30. *Tutia præpar.* Tutie mdabar.
 31. *Vitriolum album?* Tutie bisraui. توتية بصروي Bâsræ. - 100.
 Ufus ophtalm. frequens. - 3j. 5.
 32. *Borax.* Bouraq. بورق Arabes ex deserto afferunt, - 6.
 33. *Natrum djellebe:* & *Schæbb djellabe.*
 34. *Sal jabinæ.* 42. *Sal prunellæ.* Taldj elhokâma, تاج الحكما
 35. *cochleariæ.* 43. *saturni.* Melh rosâs.
 36. *centaureæ.* 44. *viperæ.* Melh hajæ.
 37. *cedoariæ.* 45. *Tartar. vitriol.*
 38. *angelicæ.* 46. *Cremor tart.* كرمور طرطير Melh tartir.
 39. *chalybeatorum.* 47. *Tart. solubil.*
 40. *abstethii.* Melh assantîn. 48. *Tart. emetic.* طرطير مطرش
 41. *polychrest.* 49. *Arcanum duplic.*
 50. *Nitrum depurat.* Melh barûd abjad, ملح برود ابيض - 12.
 Ufus frequens. Barûd châm.
 51. *Sal gemmæ.* Melh machtûm. ملح مختوم Frustrula parva. - 1.
 Dicunt illud uno & exiguo loco in Ægypto superiore generari,
 ea nocte qua ros Ægyptiis Noqta dicta, decedit.
 52. *Zahr el medâbegh.* زهر الميدايع E Cupro & aceto paratur. - 12.
 Contra scabiem &c.
 53. *Lapis medicamentos.* Crollii. 54. *Mamirân.* (lap. obscur. gener.)

III. HERBÆ.

1. *Rosmarinus.* Hasalbân achdar. حصالبان اخضر Kâhiræ. - 4.
 2. *Salvia.* Marjamie. مرجمية E Syria & Suès. - 8.
 Infusum pectorale.
 3. *Euphrasia.* Farasiûn. فراسيون E Græcia. - 15.

4. *Anethum* شبت
 5. *Hyssopus*. زروفا E Palæstina. 18.
 6. *Borago*. *Liffân ettôr*. لسان الثور 7. *Hedera terrestr.*
 8. *Epithymum*. *Aftimûn*. افثيمون E Syria. 12.
 frequens decoct. in hypochondr.
 9. *Lavandula stæchad?* *Estachudes*. استاخودس E Syria & Barbaria. 8.
 conserv. ophtalm.
 10. *Betonita*. بيتونيكا Ex Europa. 50.
 11. *Chamædrys*. كماندريوس
 12. *Dictamn. cret.* مشكنر مشيع 13. *Mentha* نعناع
 14. *Orobanche crenata*. *Halûk*. هالوك Kâhiræ. frequens in compositis. 5.
 15. *Centaurium minus*. *Qantariûn*. قنطريون Kâhiræ. frequ. decoctum
 contra Colicam.
 16. *Achillæa agerat*. *Schiah*. شيخ vel *Bajtran* ديعتران Arabibus
Kajfun. قيسون frequentiss. Decoctum pro puerperis & hypochond.
 17. *Chamæpythis*. كمانيطوس 18. *Melilotus*. الكليل الملك
 19. *Absinthium*. شيبه 20. *Malva*. خبزه
 21. *Artemisia*. (elt *Ambros. ferot.*) *Demfise*. دمسيسه spont. Kâhir.
 freq. purgans. Ziij. vel decoctum ex $\frac{1}{2}$ Ok.
 22. *Parietaria*. حبشيشة الربح 23. *Alcea ficifol.* (Althea) ختبيه
 24. *Senna Meccens.* سنا مكى 14.
 25. *Alexandrina*. سنا صعيدى 4.
 26. *Aristolochia radix*. نرا راوند 27. *Viscum quercin.*
 28. *Tussilago*. طوسيلاجيله 29. *Scordium*. اسكرديون
 30. *Pimpinella*. جيببيللا 31. *Majorana*. مردقوس
 32. *Marrubium*. فراسيون 33. *Ruta*. سندب
 34. *Pulegium*. فوتج Ex Græcia. 25.
 35. *Scolopendrium*. (*Lingua cervina*).
 36. *Anastatica hierich.* Kaf marjam. كف مريم Ex deserto. singula $\frac{1}{2}$ parà.
 Usus superstit. fœminis parturientibus.

37. *Ghâfel*. عافل Ex Archipel. frequens - 17.
 38. *Mejchaktar m'schia*. مشكنرامشيع Ex Græcia. Exoleta herba. 24.
 39. *Zufa Kudsi*. نروفاقدسي E Palæstina & India, frequ. pectoralis. 10.
 40. *Ufnea*. لوشنه
 41. *Lichen*. *Schadajoret ennedde*. شجرة الندة Ex deserto 4.
 Vulneri ex ustione asperguntur cineres.
 42. *Agaricus*. اعاريقون Ex Græcia. An *Boletus arboreus*? - 20.
 43. *Capill. Veneris*. كبرية البير 44. *Ceterach*, an *Adiantum*?
 45. *Corallina*. Conferva.
 46. *Spongia*. *Höfn juseph*. حسن يوسف E littore Alexandr. - 8.
 Cum succo Citri & aqua mixta, frequens Cosmeticum.
 47. *Fucus*. *Hafchischet ettöbân*. حشيشة النعبان Alexandria. - 15.
 Cum semine Indigoferæ : Kabfün : & sem. sancto, compositum
 anthelmint. Frequens in usu.

IV. FOLIA ET FLORES.

1. *Jasminus officin. fl.* نهر يدسين Káhiræ. - corbis mens. 15.
 2. *Lavandula spica. fl.* Chozams. خرامه E Venetia. - 5.
 3. *Borago. fl.* E Syria. - 20.
 4. *Papaver. fl.* Rhoad. شقايف alius النعبان E Syria. - 15.
 5. *Rosa rubra*. ورد احمر
 6. *Carthamus tinctor.* Össor. عصفر Káhiræ. Usus tinctorius. 14.
 7. *Nymphaea lotus* Zahr ennoufar. زهر النوفر E Syria. 18.
 Pulvis ictericis frequens in usu.
 8. *Thea. fol. Schâi*. شاي Ex Europa. Scatula 70-100 parà.
 Frequens. Pectorale creditum.
 9. *Hypericum*. هيو فاريتون
 10. *Alcea ficifol. (Althea)* Káhiræ. Corb. 4 p. E Natolia melior.
 Ok. 30 p.

11. *Chamamel.* fl. بابونج قدسي E Syria. - - 30.
 12. *Aurant.* fl. نارنج 13. *Viola odorata.* Kâhiræ vulgar.
 14. *Coffia fistula.* حيار شنبير
 15. *Myrtus.* مرسيين Kâhiræ. E Syria melior. - - 4.
 16. *Laurus.* ورق غار E Græcia.
 17. *Origanum Saatar hendi.* سعتر Ex desert, Kâhir. Freq. culinaris
 & medic. - - 4.
 18. *Lawsonia inerm.* Henne. حنة fol. Kâhiræ. - - 26.
 19. *Nenupâr.* نيلوفر vel شنبين aliis 18.
 20. *Stoechad.*
 21. *Balaustia.* جننار vel جننار floribus puniceis. Corb. 15. p.
 22. *Malabatrûm.* fol. Sadedj hendi. سادج هندي Ex India. - 50.
 23. *Uraq elghafil.* ورق الغافل E Græcia. - - 30.
 Fol. freq. in medic. & a Judæis usurpat.
 24. *Kabûn.* كاب سون Ex India. - 3j. 1. p.
 Contra Vermes certiori usu quam Senna.
 25. *Ghalfil.* غلغل E Græcia. Judæis in usu. - - 30.

V. LIGNA.

1. *Aloe.* Oud kakaji. عود قاقاي 2. *Gujacum.* خشب الانبيا
 3. *Ebenus.* Abnus. ابنوس E Nigritia cum Carvanis; & ex India
 per Suës. Solis fabris in usu.
 4. *Sassafras.* Sassafrâs. ساسافراس Ex Archipel. Frequ. in Venereis. 20.
 5. *Lignum sanct.* Chaschab elenbija خشب الانبيا vel Chaschab el qad-
 disîn. خشب القدس 6-12.
 Ex Europa. Nautæ trochleas vendunt hoc ligno factas.
 Freq. in malo Vener.
 6. *Santal rubr.* Sandal ahmar. صندل احمر Ex India & Hedjâs. - 24.
 7. *Album.* Sandal abjad. صندل ابيض Ex India & Hedjâs. 24.
 Ex hoc parantur monilia oratorio - numeraria; *Pater-noster* dicta.
 8. *Viscum*

8. *Viscum quercin.*
9. *Sarsaparilla.* *Sabarina.* سبارينا vel *Ūschbe.* عشبه Ex Europa;
melior ex Barbaria. Frequens in Vener. - - 50.
10. *Amyris.* *Qafal.* قفل Ex Arabia felici. - - 4.
Ufus ad vasa fictilia infumanda. (Cent. Pl. III. 50.)
11. *Slichā.* سليخة (lignum flavum.) Ex Arabia & Syria. Ophthalmic.
frequ. - - 12.
12. *Bechôr marjam* بجزور مرجم E Syria & Palæstina. - 20.
Rarius. Fragrans. Tineis pellendis vestibis interjicitur in
cistula repositis.
13. *Qalîmbak.* قلنبكى Ex India. Fabris utile. - - 25.
14. *Chaschab abusiddn.* حشب ابوزيدان E Persia una cum Rhabarb.
Unc. 8 p. Frequens conserva; aphrodis. putatur.
15. *Ghataturfchi.* عطاطرشي Ex Candia. - - 5.
Frequ. Pulvis ad sanguinem sistendum; hinc usus in Circumci-
sione infantum utriusque sexus.
16. *Turbud* تربد vel *Turbul* تربل Ex India & Hedjâs. - 55.
Pulvis 3j cum saccharo, purgans.
17. *Oud qaqullæ.* عود قاقوله Ex India. - 3j. 2 parà. - 290-300.
Frequens refrigerans. Miscetur tabaco fumatorio, ob gratiorem
odorem.
18. *Chinchina.* Cortex. *Kenekîne.* كيناكينا Ex Europa. 3j. 3. p.
19. *Cassia, lignea.* سليخة Cortex. E. Syria. - - 60.
20. *Cinnamomum.* قرفة سيلانية Ex India.

VI. FRUCTUS.

1. *Calamus aromat.* قصب الدريزة 2. *Macis.* بسباسه
3. *Cubeba.* كبابه صيني 4. *Cardamom.* حب هال
5. *Cardamom. majus.* قاقلي جنشي 6. *Nux Myrist.* جوز طيب

U

7. *Piper*

7. *Piper longum*. دار فلفل 8. *Piper album*. فلفل ابيض 4.
 9. *Cornus*. قرنجق حب الشوم Ex Græcia. - - 4.
 10. *Rhus*. سماق Ex Syria. - - - 8.
 11. *Sabina*. سانيينا
 12. *Laurus*. bacca. Ex Græcia. Habb elghâr. حب الغار 18.
 Ingreditur Theriac.
 13. *Sebestena*. *Cordia*. Drupa. Sebestan vel Nabq mochajit. نبق مخيط Kâhiræ. Decoctum contra tussim. - - - 7.
 14. *Tamarindus*. تمر هندي Ex Sudân. (Æthiop.) - - 24.
 15. *Quercus*. glandes. Baloth. بلوط Ex Græcia. - - 8.
 16. *Uva corinthiaca*. قشليميش Ex Græcia. eularis. - - 4.
 17. *Cupressus*. Djauz essaru. جون السرو Kâhiræ. vulgaris.
 Pulvis odontalgicus, denti applicatus; vel gargarisma decocti.
 18. *Berberis*. جريدس bacca. Ex Græcia. Ok 20. p. frequ. - 10-15.
 Obstipans. Decoctum.
 19. *Juniperus*. bacca Arar. عرعر 20. *Myrtus*. مرسين bacca.
 21. *Alkekegi*. حب كالكج bacca.
 22. *Caryophyll. arom.* Qurumfil abjad. قرنفل ابيض Γαρφαλάς vel Μοσκόκαρ. Ex india. Parcius: confortans. 1 Rottl, 130 parâ dum Carvani adveniunt; postea rarius & pretiosius.
 23. *Colocynth*. pulpa.
 24. *Colocynth*. Schaham handal. شحم حنظل Ex Arabia. Ok 110. p. parce. Effertur Cstpl.
 25. *Fusaf*. فوفل Arica & Betel; malticatorium.
 26. *Momord. elater*. Katte el homar. قتا الحمار E Syria & Sinai. 100 pro 20.
 27. *Lawsonia inerm.* Habb tamra héne. حب تمر حني Kâhiræ. - 3.
 Parce. Decoctum pro infantum siti febrili.
 28. *Mesembryanth. nodifl.* Azrar et ghafûl. الزراري الغاسول E Desert. Kâhir; Decoctum antidor, creditum. - 5.
 29. *Pista*

29. *Pistacia lentisc.* *Föstuk scherqi* فستق شرقي vel *Habb qhûl.* حب عول. 7.
Aleppo. Parce medic. Plus mensæ secundæ.
30. *Myrobalan. emblic.* *Heliledj amledj.* هلياج اماج -
31. - - - *emblic?* *Heliledj beliledj.* هلياج بلياج -
- Frequ. in usu omnes species.
32. - - - *citrinus.* *Hel. asfar.* هلياج اصفر
Perhibent arborem anno 4ter fructum ferre. Ex India. 14.
33. - - - *chebul.* كابلې - - -
34. - - - *Belleric.* - - -
35. - - - *Indic. Hel. hendi scheiri.* هلياج هندي شعيري
36. *Bel hendi.* بيل هندي Ex India. Parce: obstipans. - - 24.
37. *Kydje* كجله vel *Chobz el ghorab* خبر الغراب vel *Æjsch elghorab.*
38. *Rite.* ريتة Drupa. Ex India. Frequ. Ad loturas vestium. 12.
39. *Habb belader,* حب بلادري vel *behâder,* vel *benâder.* Ex Græcia.
Ad Unguenta; Interne venenata? Fructus.
40. *Oud essalib* عود الصليب vel *Asat ed djin.* عصاة الجن E Syria
legumen. - - - - - 30.
Contra Colicam, pulvis cum saccharo.
41. *Habb hal habbeschi.* حب حال حبشي fruct. Ex Abyssinia, Nigrit. & Hedjâs. Frequ. in re culinaria & medica, loco piperis. 80.
42. *Fara ufarfara.* فارة ورفارة fruct. Kâhiræ hort. Arbor similis
Mimosæ Nilot. ego non vidi. Frequ. ægrotis fumigator. - 4.

VII. RADICES.

1. *Cyperus esculent?* Söod. سعد Ex Said. Colitur & Kâhiræ; ego non vidi. Contra Colicam & hypochondr. - - - 10.
2. *Nardur Ind. spica.* سنبل هندي Ex India. - - - 60.
3. *Valeriana.* والريانا 4. *Dactylis* الانجيل gramen. Corbis 5. p.

5. *Gentiana*. جنتيانا *Djentina*. E Græcia. Ok 60 p. - Rotl 24-
 6. *Helenium*. 7. *Biftorta*. بشتورته
 8. *Angelica*. انجيلية
 9. *Rhabarbar*. Ravend. راوند E Persia per Damascum: & per
 Basram cum Carvana Meccensi. Ex Archipelag. vilior.
 Ok-300-400 p. 3j. 2. p.
 10. *Consolida*. جماجم E Græcia. - 24.
 11. *Fragaria*. 25. *Anchusa*. ساق الهمام Alexandriæ. 5.
 12. *Artemisia*. 26. *Turbetum*. ترید تریدل an rad? Ex India 36.
 13. *Doronit*. درنج 27. *Rubus* عرق الجبار Alexandr. 5.
 14. *Brustus*. 28. *Alcea* ficifol. Kâhiræ vulgar.
 15. *Eryngium* شقاقل 29. *Asparagus* جذر هليون Ex Europa 25.
 16. *China*. خشب صيني 30. *Scilla* بصل عصل E Syria. singula 5.p.
 17. *Hellebor. alb.* خريق ابيض 31. *Zedoaria*. زرنده Ex India. - 24.
 18. - - *nigr.* خريق اسود 32. *Galanga*. خولجان Ex India. 24.
 19. *Cynoglossum*. لسان الكلب 33. *Asarum*. اسارون E Græcia. - 18.
 20. *Apium graveol.* كرفس 34. *Struthium*. كندس E Græcia. 24.
 21. *Pentaphyll* يابد افيلون 35. *Pyretrum*. عود القرح E Barbaria 24.
 22. *Capparis*. جذر كبير vulgaris. 36. *Acorus*. عرق ايكس E Græcia. 20.
 23. *Petroselin*. 37. *Madrage*. Ital. *Mandragora*.
 24. *Arum*. ترياق ابيض
 38. *Jalapa*. جلايا vel جلابا E Græcia. Ok. 400. p. *Pulvis jal.* *Sulf jalaba*.
 39. *Ipecacuanh*. Ex Europa. 3j. 3. p. *Pulv. ip.* *Ærq ed dahab*. عرق الذهب
 40. *Fœniculum*. جذر شمر (putatur Safafr.) E Græcia. - - 24.
 41. *Schœnanth*. Edcher. ادخر مكي Arabia. - - 20.
 42. *Glycyrrhiza*. عرق سوس E Græcia & Syria: melior ex Said. - 4.
 43. *Rabia tinct.* فوة الصباغين E Græcia. Diuretic. - 12.
 44. *Spice celt.* سنبل Ex Europa. Rotl 18. p. E Græcia. - 20.
 45. *Scammon*. Scamunia.

46. *Hermodactyl.* Surendjân صور تجان vel *Chamîre*. خميرة
Alexandriæ & e Barbaria. Exportatur Constantinop. - 10.
47. *Saq el hamâm.* ساق الحمام Tinctor. pro condit. } - 8.
48. *Leja ulwojje.* ليا ولوية Frequ. in compositis. } Alexandriæ. 6.
49. *Hözumbul alfi.* حزنبل الفي Contra Colic. } - 8.
50. *Oud elqarah.* عود القرح acris. Dentibus dolent. imponitur. } 40.
51. *Scherghedân.* شرغدان Non medica; sed tinctoria; quam } Barbaria.
Arabes soli emunt plurimam, & aluminis loco pulve- - 18.
rem addunt tincturis rubris lanam fucantibus.
52. *Chaulendjân aqarbi.* حولنجان عقاري frequ. aphrodisiac. } - 30.
pulv. cum lacte sumitur. } Ex India.
53. *Kurkum* كركم vel *Hurt.* هرت - 18.
54. *Turjaq abjad.* ترياقي ابيض In dolore ossium. - 18.
55. *Orchis.* Salep. Sähleb. سحلب vel *Chosä täaleb.* خصي تعلب - 40.
56. *Eschtivan.* اشتيوان vel *Bessanedj.* بسفانج in Siphilitid. - 20.
57. *Ærq djenäh.* عرق جناح Contra Colicam. - 20.
58. *Rakafe.* ركفة pulvis sternurator. - 6.
59. *Djamadjem.* دجامم semper miscetur cum Eschtivan - 16.
60. *Bahman akmar.* بهمن احمر ingreditur theriac. - 24.
61. *Örq el kalave.* عرق الحلاوة Pulvis ad vestes dealbandas. - 8.
Etiam ad condit. (confitures.) Ex Græciâ.
62. *Örq endjibar.* عرق انجبار - 6.
63. *Schæqajeq ennööman.* شقايف النعمان Ok. 3. p. -
64. *Luffäh abu nasä.* لفاح ابو نافع aphrodisiac. - 20.
In composit. & in unguentis.
65. *ÿakelün* ياكلون vel *Djakelün.* دجاكلون - 8.
66. *Örq öntorab.* عرق انطراب - 6.
67. *Moghat.* مغات - 18.

Harum 3 spec. pulvis mixtus aqua bibitur; in fracturis ossium. J

VIII. SEMINA.

1. *Tamárindus*. *Habb tamr hendi*. حب تمر هندي Ex Ægypto superiore 24.
Coquitur, vel in aqua per noctem digeritur & calidus vapor
admittitur genibus dolentibus in Gonagra.
2. *Anisum*. *Janisûn* يانسون vel *Anisûn*. Ex Ægypt. sup. - 20.
3. *Cuminum*. *Kamûn*. كمون Ex Ægypt. sup. - 10.
4. *Carum*. *Karavi andalusi*. كراوية افدلسي Ex Barbaria & Andalus. Cruda, contra Colicam. - 5.
5. *Apium graveolens*. *Kerafs*. كرفس Káhiræ. - 11.
In compositis. Semina hæc assumpta, sistere posse, ajunt vomitum navigantibus ortum ex agitatione maris & navigii.
6. *Rhus Sumak?* *Bizr essimaq*. بيزر السماف E Græcia. Ok. 10. p.
Sem. cocta cum oryza Dysenteriam sistunt.
7. *Daucus carota*. *Bizr djazar*. بيزر جزر Káhiræ. Aphrodisiac.
frequ. in usu. - 30.
8. *Feniculum*. Ex Ægypt. super. *Schamer*. شمر - 10.
9. *Solan. melong.* *Bizr beidindjan*. بيزر بيدنجان Káhiræ. - 30.
10. *Allium porrum*. *B. Korrat*. بيزر كرات Káhiræ. - 8.
11. - - - *cepa*. *B. basâl*. بيزر بصل Káhiræ. Aphrodis. - 30.
12. *Opobalsam*. *B. beilefsân*. بيزر بيلاسان Ex Arabia. Parcius. - 8.
13. *Zygophyllum desertorum*. *Kamûn Karamâni*. كمون كرمانى
Desert. Káhir. Frequ. contra Colicam, - 4.
14. *Portulaca oleracea*. *B. Ridjle*. بيزر رجلة Káhiræ. Frequ. in
composit. - 25.
15. *Laurus nobil. bacca*. *Habb el ghar*. حب الغار E Græcia. - 24.
16. *Peganum harmala*. *Bizr harmal*. بيزر حرمال E Desert, Káhir, 3.
Fumigator. & medicum.
17. *Sinapis nigra*. *B. kábar*. بيزر كبر Káhiræ. Aphrodis. - 8.
18. - - - *B. chardél*. بيزر خردل Káhiræ culta. - 3.
Culinaria: pulvis cum aceto & saccharo digeritur per noctem.

19. *Nigella. Habb faude.* حبة سوداء Ex Ægypto sup. 15.
Pistores cum pane miscent. Et medicum.
20. *Ocymum basfl. B. rikán.* جنرى ريحان Káhiræ. 10.
21. *Cichorium. Hendabe.* هندابى Ex Ægypto sup. 10.
22. *Trigonella famugr. B. helbe.* جنرى حلبة Káhiræ. Decoct. medic. 6.
23. *Citrus cedro. B. turundj.* جنرى طرنج Káhiræ. 40.
Meliora sem. ex Archipel. Contra Colicam.
24. *Dolichos. Másch.* ماش Ex Aleppo. 10.
Refrigerator. & Jusculi forma datur nutricibus ut galactophor.
25. *Lupinus. Termis.* قرمىس Káhiræ. Contra Vermes Cucumerarios. 4.
26. *Cucurb. lagen. Qara tauvil.* قرقع طويل Káhiræ. vulg.
27. *Cartham. tinctor. Bizr qortom.* جنرى قرطم tinctor & medic. 5.
28. *Pistacia terebinth. Habb el botm* حب البطم vel *Habb cha-*
dra. حب خضرة E Græcia. Freq. in compos. Ok. 10-20. p.
29. *Ricinus. Habb charua.* حب خروع purgans: & in oleis.
30. *Pinus. Snobar.* صنوبر Alep. *Föflug.* فستق Káhiræ. E Græ-
cia. Ok. 3. p. Culinaria & medic. creditur aphrodis.
31. *Bizr mæru.* جنرى مرو Ex Ægypt. super. culinar. & medic. 6.
32. *Lissân affûr.* لسان عصفور (i. e. *lingua avis*.) Ex India. Freq.
culinar. & med. 13.
33. *Schischm.* ششم Ex Sennâr cum Carvanis. 8.
Ophthalm. pulvis cum saccharo oculis aspergitur.
34. *Djabol lendi m'tarresch.* جبل هندى مطرش Ex India. 40.
Parce. Vomitor. ʒi cum decocto ficuum sicc.
35. *Bizr keshut.* جنرى كشوت E Syria. 24.
Judæis præsertim in usu. Cosmetic. interne sumtum.
36. *Bizr bindj.* جنرى بنج E Græcia. *Hyoscyamus Datora.* 36.
Soporiferum ægris & infantib.
37. *Habb el ghul.* حب الغول E Syria. 10.
Ingreditur compos. dictum *Mefattaqa* pro gravidis.

38. <i>Fumaria officin.</i> شهترج	48. <i>Papaver alb.</i> اخشخاش ابيض
39. <i>Urtica pilulif.</i> دترى قردص	49. <i>Linum</i> كتان
40. <i>Plantago maj.</i> لسان حمل	50. <i>Acetosa obtusif.</i> حماض
41. <i>Alcea ficifol.</i> دترى خنديه	51. <i>Lactuca</i> خس
42. <i>Malva rotundifol.</i> دترى خبيز	52. <i>Marum</i> مرو
43. <i>Vitis</i> كف مرجم agn. east. <i>Αργαία</i>	53. <i>Ammi.</i> نانحو Ex India. 24.
44. <i>Carduus maria.</i> لحلاج	54. & ex Ægypt. - 10.
45. <i>Cucum. orient.</i> حب خيار	55. <i>Anacardium.</i> حب بلادي
46. - - abd el avi عبد اللاوي	E Græcia. - 16.
47. <i>Cucurb. citrull.</i> حب بطيخ	56. <i>Cydon.</i> سفرجل E Græc. 20-60.
57. <i>Cuscuta.</i> دترى كشوت E Said. - 24.	
58. <i>Cina.</i> Bizr Charifanie. دترى خريسانيه E Persia per Syriam - 30.	
59. <i>Indigofera tinct.</i> Nile دترى نيله - 10.	
60. <i>Pæonia. rad.</i> Oud es salib. عود الصليب - 40.	
61. <i>Cataputia.</i> الدند Ex India. Venenos. purgans. - 80.	
62. <i>Coriandrum.</i> Kurbara. كبرج شامي	63. <i>Choghân.</i> خوغان (ignot.)

IX. GUMMATA, RESINÆ, SUCCI.

1. <i>Gummi arabicum.</i> Samgh túri. صمغ طوري Ab urbe Tôr. - 8.	
2. <i>Sandarac.</i> Sendarús. سندروس E Græcia. Pictor. pro vernigine. 36.	
3. <i>Olibanum.</i> Samgh lebân hedjazi. صمغ لبان حجازي Ex Arabia. 18.	
4. - - syriacum. S. lebân schami. صمغ لبان شامي E Græcia. 10.	
Ok 25. p. - - - - -	
5. <i>Tragacantha.</i> Ketîre bájda. كتيرة بيضة E Græcia. Ok 60-70. p. 10.	
Medic. & Textoribus sericariis.	
6. <i>Mimosa acacia.</i> Samgh arabi. صمغ عربي ابيض Ex Nigritia (Sennar.) 12.	
& Hedjas. - - - - -	
7. <i>G. Mimosa nigrum; vel G. arab. nigr.</i> Samgh saidi صمغ سعدي Ex Æg. 4.	
sup. Usus tantum pro atramento. - - - - -	
8. Gal-	

8. *Galbanum*. *Samgh qanavafcheq*. صمغ قناوافت. E Persia. 400.
drachm. 400. p. 33 interne contra Colicam.
9. *Opoponax*. *Samgh djoafchir*. صمغ جاواشبير. E Syria. - 50.
10. *Gutta*. *Robb erravendi*, رب الراوند i. e. *Robb rhabarbari*. Ex Ind. 50.
Purgans.
11. *Ladanum*. *Laden*. لادن. Candia. - - - 35.
Peste grassante, manu gestatur olfactorium.
12. *Elemi*. *Lami*. لامي. Ex India. Medicum; fumigator, & masticat. 40.
Decoctum in hæmorrhagia uteri post partum.
13. *Lacca*. *Samgh el lock*. صمغ اللك. Ex India, crustæ forma in ligno. 50.
14. *Samgh bochôr effiudân*. صمغ بخور السودان. Ex Abyssinia. 3j 5. p. 60.
In castratione sanguis sistitur hujus fumo.
15. *Chaulân hedjazi*. حولان حجازي. Ex Arabia. - - 16.
16. - - *Rob chaulan*. رب حولان. Ex India. - - 50.
17. *G. Euphorbiæ*. *Ferfiún*. فرفيون. E Barbaria. - - 10.
18. *Ref. Pini*. *Qalafunia* قلافونية vel *Samgh effnobar*. صمغ الصنوبر.
Ex Archip. Usus opificibus stanni. - - 5.
19. *G. Oleæ*. *Samgh effeitún*. صمغ الزيتون. Káhiræ. - - 10.
20. *R. scammon*. *G. Diacridii*. *Mahmûde*. محموده. E Syria.
Frequ. purgans.
21. *R. Jalapæ*. صمغ يالبا (magisterio di Jalap.) E Græcia. 3j. 10. p.
22. *Tamarindi*. *Tamrahendi*. تمر هندي. Ex Sudân seu Nigritia. - 10.
23. *Ketîre adjami* كتيرة عجمي vel *Hamra حمرة* vel *Kesrui*. كسروي.
E Persia. Ok. 30. p.
24. *Camphora*. *Kafûr*. كפור. Ex India. R. 60. p. Melior ex
Europa. - - - 120.
25. *Laudanum*. *Chals afiún*. حلس افيون. E Græcia. - 140.
26. *Suc. Glycyrrhiza*. *Rob Sús*. رب سوس. Ex Europa. - 40.
27. *Pix dura*. *Zift*. زفت. E Græcia. - Ok 2. p.
28. *Gluten vulgare*. *Ghere schami*. غره شامي. E Syria. - 15.

29. *Manna calabr. Sarachöfcht frandji.* صراحت فرنجي Ok 50-120. p.
Ex Europa. E Syria Ok 80. p.
30. *Aloe fucotrina. Sabr soqotri.* صبر سقطري Ex Hedjâs. - 24.
31. - *sabr belledi.* Vilior, ex Yemen.
32. *Myrrha. Mur.* مر Ex Arabia, sed melior ex Abyssinia.
33. - - *Bedellium.* صمغ مقل لثريق est myrrha imperfecta. - 30.
34. *Assa foetida.* صمغ حلتيت Ex India. - - - 70.
35. *Tacamehaca.* تاقا ماهاك E Græcia. - - - 25.
36. *Benzoë. Djau.* صمغ جاوي Ex India, Rotl. 1. patak vel
 $\frac{1}{2}$. pat. vel 25. parà.
37. *Sarcocolla. Anzarût.* انزروت 38. *Colophonia.*
39. *Rob ribâs.* رب ريباس E Græcia: melius e Syria. - 30.
40. *Hypocistis.* عصرة لحيث التيس E Syria. - - 25.

BALSAMA.

1. <i>Innocentiæ.</i>	6. <i>Sulphuris.</i>
2. <i>Meccense.</i>	7. - - <i>anisatum.</i>
3. <i>Peruvian.</i>	8. - - <i>succinat.</i>
4. <i>Copaivæ.</i>	9. - - <i>terebinthinat.</i>
5. <i>Hierosolymitan.</i>	

X. OLEA.

USITATA.

1. <i>Nucis mosch. Dehn djauztib.</i> vel
<i>Dehn bisbâs.</i>	6. <i>Nigellæ.</i>
2. <i>Hyperici.</i>	7. <i>Been.</i>
3. <i>Ovorum.</i>	8. <i>Aba cûchi.</i>
4. <i>Lauri.</i>	9. <i>Viperæ.</i>
5. <i>Coryli.</i>	10. <i>Scorpion. matthiol.</i> <i>Dehn akrab mattioli.</i>
	11. <i>Zacum.</i>

EXOLETA.

EXOLETA.

1. <i>Fœniculi.</i>	<i>Dehn schamar.</i>	6. <i>Succini.</i>	<i>Dehn kehribar.</i>
2. <i>Anisfor.</i>	- <i>anifun.</i>	7. <i>Ceræ.</i>	- <i>schamia,</i>
3. <i>Juniperi.</i>	- <i>arar.</i>	8. <i>Philosoph.</i>	
4. <i>Stoechad.</i>	- <i>stachudes.</i>	9. <i>Tart. per deliqu.</i>	
5. <i>Terebinthinæ.</i>	- <i>termentinæ.</i>	10. <i>Petræ.</i>	<i>Dehn tub.</i>

XI. SPIRITUS.

1. <i>Salis corrosiv.</i>	8. <i>Sarsaparill.</i>	<i>Ruh eleſpe.</i>
2. - <i>armoniat.</i>	9. <i>Salviæ.</i>	- <i>merjamie.</i>
3. <i>Nitri corrosiv.</i>	10. <i>Terebinth.</i>	- <i>termentina.</i>
4. <i>Vitrioli.</i>	11. <i>Lavandulæ.</i>	
5. <i>Sulphuris.</i>	12. <i>Meliſſæ.</i>	
6. <i>Succini volatil.</i>	13. <i>Pergamott.</i>	
7. <i>Tinct. ſal. tart.</i>	حلاص مالح طرطير	

XII. AQUÆ.

USU FREQUENTES: PRETIO 4, 6, 8 PARA ROTL.

1. <i>Origani majoran.</i>	برد قوش vel ما نزعتر
2. <i>Aneth. graveol.</i>	ما شبت & <i>fœnic.</i> ex <i>umbellis.</i>
3. <i>Rutæ.</i>	ما سدب <i>Moje ſeddeb.</i>
4. <i>Capilli ven.</i>	ما كندرة البير <i>Moje kisberet el bîr.</i>
5. <i>Fumaricæ.</i>	ما شاترج <i>Moje ſchataredj.</i>
6. <i>Aurant. flor.</i>	ما زهر <i>Moje zahar.</i>
7. <i>Rosæ.</i>	ما ورد <i>Moje ward.</i>
8. <i>Cichorii.</i>	ما هندبه <i>Moje Hindabe.</i>
9. <i>Borag. offic.</i>	ما لسان الثور <i>Moje Liſſân ettôr.</i>

10. *Plantag. maj.* Moje Liſſán el hemmel. ما لسان الحمل
11. *Citri cedro.* Moje Tarendj. ما ترنج
12. *Parietariæ.* Moje Haſchiſchet er rich. ما حشيشة الريح
13. *Salix. Ban.* E floribus masculis deſtillatur aqua uſitatiffima, dicta Moje chaláf. ما خلاف
14. *Apii & petroſelin.* Moje kerfis. ما قرفس
15. *Scabiei.* El hake. ما الحكة
16. *Ophthamica.* El ajn. ما العين
17. *Franca.* ما فرنجي
18. *Theriacal.*
19. *Myrti folior.* Marſin. ما مرسين
20. *Olibani.* Moje Libán. ما لبان
21. *Sem. anifi.* ما انيسون
22. *Malvæ rotundif.* Habíze. ما حبيزة
23. *Menthæ gentil. fol.* ما نعنec راس
24. *Card. mar. fol.* ما فحلاح
25. *Lawſonia inerm. flor.* ما تمر حنة

XIII. SYRUPI.

1. <i>Agrimón. Scheráb gháſe.</i> شراب غافة	10. <i>Hyſſopi. Sch. Zuſe.</i> نروفة
2. <i>Pomor. Sch. teſách</i> تفاح	11. <i>Nicotianæ. S. Dochán.</i> شراب دخان
3. <i>Perſicar. Choch & florum.</i> خوخ	12. <i>Ambroſiæ ferot. Demſiſe.</i> دمسيصة
4. <i>Menthæ. Sch. Nànaà.</i> نناع	13. <i>Fumaricæ.</i> ساتراج
5. <i>Prunor. Sch. Barkúk.</i> برفوف	14. <i>Byzantin.</i> ديناري
6. <i>Chebuli.</i> كابلې	15. <i>Cort. Citri.</i> قشر ترنج
7. <i>Myrti. Sch. Marſin.</i> مرسين	16. <i>Nymphaeæ.</i> نوفر
8. <i>Cichorii. Sch. Hendebaſa.</i> هندباسا	17. <i>Betonica.</i> يتونيكا
9. <i>Tamarind.</i> شراب تمر هندي	18. <i>Glycyrrhiæ.</i> شراب عرق سوس

XIV. CONSERVÆ, ELECTUARIA, EXTRACTA.

1. *Conservæ anacard.* البلادر
2. - *Violarum.* حبيرة بنفسج
3. - *Absinthii.* شيبه
4. - *Cydonior.* سفرجل
5. - *Ros alb.* تسرين
6. - *Menthæ.* نعناع
7. *Mel rosar.* عسل الورد
8. *Succ. rad. rubi.* شراب عرق الانجبار
9. *C. hyacinthi.* Madjan jakût.
10. *C. alkermes.* Mad. Kermes. e Cochenilla americ.
11. *Electuarium Fumariæ.* شهتره
12. - - *Episcop.* اسقف
13. - - *Diaphæn.* تمري
14. - - *Mubinum.*
15. - - *Trophera.* معجون اطريفل 3j. 5 - 10. p.
16. *Mithridatum.*
17. *Ther. diatesfar.* Turjaq.
18. *Diafcord.*
19. *Philonium roman.*
20. *Diarodon. solutiv.* دياروضون المسهل
21. - - *abatis.* دياروضون اباتيس
22. *Diaxil aloes.*
23. *Dia. ciminum.*
24. *Terpentina cypr.* ترمنينا قبرصي
25. *Opiata card.*
26. *Electuarium florum sæchad.* معجون الاسطوخودس
27. - - *Scillæ.* الانصل
28. - - *Diacathol.* دياكاتولكن
29. - - *Chamak.* امنكي

30. *Electuarium Mustaru.* الجدارو
 31. - - *Philosophor.* الفلاسفة
 32. - - *aromatic. rosatum.* الروماتيقو روزاتو
 33. - - *Cassia.* رب حيارشمبر Rotl. 15. p.

XV. UNGUENTA.

1. <i>Santali.</i> مرهم صندال	7. <i>Ægyptiac.</i>
2. <i>Galbani</i> مرهم قناوشق	8. <i>Neapolitan. Neapolitan.</i>
3. <i>Basilic.</i> مرهم زفت	9. <i>Apostolor.</i>
4. <i>Comitissæ.</i>	10. <i>Rosatium.</i>
5. <i>Altheæ.</i> مرهم حنطية (<i>alcea ficif.</i>)	11. <i>Populeum. Bubulio.</i>
6. <i>De plumbo.</i> مرهم رصاص	12. <i>Cerussæ.</i> مرهم سبيداج

XVI. PULVERES.

1. <i>Digestiv. usit. Söfûf el önsul.</i>	5. <i>Tragea Craton. exol.</i>
2. <i>Hierapicra. usit. ايارج فيقرا</i>	6. <i>Diamosc. exol.</i>
3. <i>Stomachal. usit.</i>	7. <i>Bezoard. exol.</i>
4. <i>Universal. exol.</i>	8. <i>Diamargaritac. Söfûf lului. exol.</i>
9. <i>Diatrag. calid. & frig. Söfûf el ketire. exol.</i>	
10. <i>Diatrion santalon. Söfûf telatet-aschkal sandal.</i>	

XVII. PILULÆ.

1. <i>Maslich. Hab el maslek.</i> حب المستكة
2. <i>Stomachicæ. Hab el mâade.</i> حب المعدة
3. <i>Hystericæ. Hab el niffa.</i> حب النساء
4. <i>Cholagogæ. Hab el safra.</i> حب الصفرة

5. *Hierapicra.*

5. *Hierapicr.* *Hab aijáredj fickre.* حب ايارج فيقرا
6. *Divinæ.* *Hab el lahi.* حب الالهى
7. *Arabicæ.* *Hab ærrabi.* حب عربى
8. *Suppositorii.* *Hab t'hammil.* حب تحاميل
9. *Hermodaçtyl.* *Hab furnahán.* حب سورنحان
10. *Cynoglossi.* *Hab lissán el kelb.* حب لسان الكلب
11. *Aurææ.* *Hab el dàhab.* حب الذهب
12. *Cochiæ.* *Hab kokaja.* حب قوقايا
13. *Fumariæ.* *Hab schachtaredj.* حب شاحترج
14. *Bdellii.* *Hab el makel.* حب المغل
15. *Trib.* *Hab mitlet.* حب مثلث
16. *Fætidæ.* *Hab el mantan.* حب المنثن
17. *Mercuriales.* *Hab el seibak.* حب الزبيف
18. *Agaric.* *Hab gharkún.* حب غارقون
19. *Sine quibus.* *Hab amumi.* حب عومى
20. *Lucis majoris.* *Hab el nûr el kbîr.* حب النور الكبير
21. *Rhabarbar.* *Hab ravend.* حب راوند
22. *Ammoniac.* *Hab el kellech.* حب الكلخ
23. *Becchicæ.* *Hab es fáale.* حب السلاء
24. *Mercur. dulcis.* *Hab Merkuri hellu.* حب مركاتر يوحلو
25. *Hab el kei.* حب الكى *Pro Fontenellis.* *Aperiuntur Merc. albo, præ-*
cipitato, Cera mixto; cortex cereus demitur: applicantur. Aperti fer-
vantur Globulis pisiformibus perforatis, e Radice Iridis Florentinæ.

XVIII. VARIA.

1. *Spidadj bunduki.* سبيداج E Venetia. Externe cum jasmino contra sca-
biem.
2. *Zernich asuad.* زرنىخ اسود Ex Europa. In Unguentis siphilit.
3. *Osteocolla.* *Tihán.* تيهان

4. *Iria fantala*. Talatet Sandál. ثلاثة صندال
5. *Mamotova - Koft*. rasura cornuum. Barádet karn el hartít. مرادة قرن الحريت
6. *Uva Corinth*. Aleppo. Qaschlamisch قشلميش vel Zebíb dörbeli. تربيب دريلي
7. *Kurfillæ*. كرسله E Syria.
8. *Kænbe*. كنبه Ex Æthiopia. Siliquæ: aphrodis. putantur.
9. *Charbaq*. خربق E Constantinop. radix. Contra Colicam.
10. *Næde*. ند E Constantinop. purgans.
11. *Tîn fîl*, تين فيل i. e. *figus Elefantis*. E Persia.
12. *Fetar asalius*. فطر اساليوس E Græcia. Ingreditur Theriac.
13. *Zebíb djæbbel*. تربيب جبل E Græcia. Medicis Muizidj. مويذيج Ad
Capillos auferendos.
14. *Bindj ahmar*. بنج احمر Ex Æg. Super. soporifer. & vulneribus im-
ponitur.
15. *Keschut*. E Syria. In Lexicis *Cuscuta*?
16. *Zen zallahat*. زنزلاحت Ex India. Melia?
17. *Qotne hamra*. قطنه حمرة E Rosetta. Pasta conficitur bubonibus im-
ponenda.
18. *Nachva hindi*. نخوه هندي Umbellata ex India.
19. *Petra*; دهنج دهي ad auferendas maculas oculorum, trita cum aqua;
pulvis oculis imponitur.
20. *Hobba ghali* (fruct. obscur.); oleo unguent fœminæ crines ut crescant.
Et contra dolores artuum.
21. *Schidæd el muddade* (obscur. caule volub.) Arabes aqua destill. uruntur ad
medicinam.