**CIHM
Microfiche
Series
(Monographs)**

**ICMH
Collection de
microfiches
(monographies)**

Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

© 1997

Technical and Bibliographic Notes / Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming are checked below.

- ☒ Coloured covers / Couverture de couleur
- ☐ Covers damaged / Couverture endommagée
- ☐ Covers restored and/or laminated / Couverture restaurée et/ou pelliculée
- ☐ Cover title missing / Le titre de couverture manque
- ☐ Coloured maps / Cartes géographiques en couleur
- ☐ Coloured ink (i.e. other than blue or black) / Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)
- ☐ Coloured plates and/or illustrations / Planches et/ou illustrations en couleur
- ☐ Bound with other material / Relié avec d'autres documents
- ☐ Only edition available / Seule édition disponible
- ☐ Tight binding may cause shadows or distortion along interior margin / La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la distorsion le long de la marge intérieure.
- ☐ Blank leaves added during restorations may appear within the text. Whenever possible, these have been omitted from filming / Il se peut que certaines pages blanches ajoutées lors d'une restauration apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont pas été filmées.
- ☐ Additional comments / Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessous.

- ☐ Coloured pages / Pages de couleur
- ☐ Pages damaged / Pages endommagées
- ☐ Pages restored and/or laminated / Pages restaurées et/ou pelliculées
- ☒ Pages discoloured, stained or foxed / Pages décolorées, tachetées ou piquées
- ☐ Pages detached / Pages détachées
- ☒ Showthrough / Transparence
- ☐ Quality of print varies / Qualité inégale de l'impression
- ☐ Includes supplementary material / Comprend du matériel supplémentaire
- ☐ Pages wholly or partially obscured by errata slips, tissues, etc., have been refilmed to ensure the best possible image / Les pages totalement ou partiellement obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure, etc., ont été filmées à nouveau de façon à obtenir la meilleure image possible.
- ☐ Opposing pages with varying colouration or discolourations are filmed twice to ensure the best possible image / Les pages s'opposant ayant des colorations variables ou des décolorations sont filmées deux fois afin d'obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the reduction ratio checked below /
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10x		14x		18x		22x		26x		30x	
		12x		16x		20x		24x		28x	32x

The copy filmed here has been reproduced thanks to the generosity of:

Bibliothèque générale,
Université Laval,
Québec, Québec.

The images appearing here are the best quality possible considering the condition and legibility of the original copy and in keeping with the filming contract specifications.

Original copies in printed paper covers are filmed beginning with the front cover and ending on the last page with a printed or illustrated impression, or the back cover when appropriate. All other original copies are filmed beginning on the first page with a printed or illustrated impression, and ending on the last page with a printed or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche shall contain the symbol $\longrightarrow$ (meaning "CONTINUED"), or the symbol ∇ (meaning "END"), whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at different reduction ratios. Those too large to be entirely included in one exposure are filmed beginning in the upper left hand corner, left to right and top to bottom, as many frames as required. The following diagrams illustrate the method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la générosité de:

Bibliothèque générale,
Université Laval,
Québec, Québec.

Les images suivantes ont été reproduites avec le plus grand soin, compte tenu de la condition et de la netteté de l'exemplaire filmé, et en conformité avec les conditions du contrat de filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en papier est imprimée sont filmés en commençant par le premier plat et en terminant soit par la dernière page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration, soit par le second plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires originaux sont filmés en commençant par la première page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en terminant par la dernière page qui comporte une telle empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la dernière image de chaque microfiche, selon le cas: le symbole $\longrightarrow$ signifie "A SUIVRE", le symbole ∇ signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., pouvant être filmés à des taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants illustrent la méthode.

MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)

APPLIED IMAGE Inc

1653 East Main Street
Rochester, New York 14609 USA
(716) 482 - 0300 - Phone
(716) 288 - 5989 - Fax

g... ..

CANADA
MINISTÈRE DES MINES
HON. ES.-L. PATENAUDE, MINISTRE; R.-G. McCONNELL, SOUS-MINISTRE;
COMMISSION GÉOLOGIQUE

MÉMOIRE 54

N° 2, SÉRIE BIOLOGIQUE

Liste annotée des plantes à
fleurs et des fougères de la
pointe Pelée, Ont., et des
régions avoisinantes.

PAR
C. K. Dodge

3 2356 004G4 1404

OTTAWA
IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT
1917

No. 1367

QE
185
A2
F
54

ÉCOLE D'ARPENTAGE ET DE GÉNIE FORESTIER

CANADA
MINISTÈRE DES MINES
HON. ES.-L. PATENAUDE, MINISTRE; R.-G. McCONNELL, SOUS-MINISTRE;
COMMISSION GÉOLOGIQUE

MÉMOIRE 54

N° 2, SÉRIE BIOLOGIQUE

**Liste annotée des plantes à
fleurs et des fougères de la
pointe Pelée, Ont., et des
régions avoisinantes.**

PAR
C. K. Dodge

OTTAWA
IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT
1917

TABLE DES MATIÈRES.

Introduction.....	1
Liste abrégée.....	7
INDEX.....	105

ILLUSTRATIONS.

Fig. 1. Carte représentant la pointe Pelée et ses environs.....	3
---	---

AVIS

Cet ouvrage est une traduction du rapport publié en anglais (n° 1366) dans l'année 1914.

MINISTÈRE DES MINES

HON. LOUIS CODERRE, Ministre; R.-W. BROCK Sous-Ministre.

Commission géologique

Liste annotée des plantes à fleurs et des fougères de la pointe Pelée, Ont., et des régions environnantes.

INTRODUCTION.

Dès 1882, un ornithologiste distingué et enthousiaste, Wm. E. Saunders, de London, Ont., visita la pointe Pelée, et après quelque recherches, apprit que cet endroit était situé sur la route suivie par les oiseaux dans leur migration du nord au sud. D'autres ornithologistes s'intéressèrent bientôt à cet endroit, et l'on forma une association sous la dénomination de: Great Lakes Ornithological Club, dont les membres actifs furent: M. Saunders, P. A. Taverner, alors à Détroit, Mich., et maintenant membre de la Commission géologique du Canada, Bradshae H. Swales, de Grosse-Isle, Mich., James S. Wallace et James Fleming d'Ontario. La localité devint si intéressante que l'on jugea à propos d'étudier autant que possible toutes les manifestations biologiques le long de cette route de migration, et P. A. Taverner suggéra à l'auteur de faire la liste de toutes les plantes à fleurs, des fougères et des variétés de plantes connexes. La première occasion se présenta en 1910. Après une visite à la pointe Pelée, on arriva à la conclusion que l'étude de la végétation serait intéressante et utile de deux manières: elle pourrait premièrement servir à l'étude de la migration des oiseaux; et deuxièmement elle augmenterait la somme de nos connaissances sur les plantes sauvages de l'ouest d'Ontario et de l'état de Michigan, où l'auteur a commencé cette étude depuis quelques années. Mais pour atteindre ce double but d'une manière satisfaisante, il faut non seulement examiner et faire la liste des plantes de la pointe Pelée, mais aussi de celles des îles du lac Érié situées immédiatement au sud et s'étendant jusqu'à la rive Ohio du lac Érié, et aussi de celles de tout le comté d'Essex. Ce travail a été entrepris avec ardeur, et le rapport suivant en est le résultat.

LOCALITÉS VISITÉES.

Le comté d'Essex, dans la province d'Ontario occupe une position remarquable et importante, étant le comté le plus méridional de cette province. Il est borné au nord par le lac Saint-Clair, à l'ouest par la rivière Détroit, et au sud par le lac Érié; il s'étend de l'ouest à l'est sur une longueur de quarante milles, et de trente milles du nord au sud; le terrain est généralement plat, à part une berge élevée le long du lac

Érié, et une partie déclive le long du lac Saint-Clair. La pointe Pelée est située au coin sud-est du comté et s'avance sur une longueur de 9 milles dans le lac Érié. À moins de 10 milles au sud-ouest de l'extrémité de cette pointe, est située l'île Pelée dans le lac Érié; cette île fait partie du comté d'Essex et est de beaucoup la plus grande île de la partie ouest du lac Érié; sa superficie est d'environ 13,000 acres. À l'extrémité sud de cette île, il y a une pointe étroite, longue de deux milles et demi, qui s'étend au sud vers la rive Ohio. Au sud et à l'ouest, et à peu de distance de cette île, on trouve de nombreuses îles plus petites qui appartiennent pour la plupart à l'État de l'Ohio. Les plus grandes sont les îles: Keiley, Put-in-Bay, Middle-Bass, Rattlesnake et Greene. De la rive Ohio, s'étendant dans une direction nord vers les îles ci-dessus nommées, il y a deux ou plusieurs péninsules. La route naturelle suivie par les oiseaux dans leur migration passe par la pointe Pelée, puis par les îles, et enfin les péninsules.

POINTE PELÉE.

Cette localité, d'après nos observations, est beaucoup moins défigurée par la main de l'homme, et garde sa végétation primitive plus complètement que n'importe quelle autre région sur les rives du lac et de la rivière ou même du comté. Une étude attentive de la botanique de cette localité étant le principal objet de notre travail, nous avons donné à ce sujet une attention particulière. P. A. Taverner et B. H. Swales, dans leur travail sur "Les oiseaux de la pointe Pelée"¹, ont bien décrit la pointe Pelée, et en ont dressé la carte; leur rapport a été publié en 1908, et nous ne donnerons de la pointe Pelée, que les descriptions qui seront nécessaires pour les besoins de notre sujet. C'est un morceau de terre triangulaire dont l'angle aigu s'avance d'environ 9 milles au sud dans le lac Érié, et dont la base située sur le côté nord est large d'à peu près six milles. Environ les neuf dixièmes de cette étendue étaient, et sont encore, formés par un grand marais très humide situé entre la plage ouest et celle de l'est. Ce marais était autrefois le rendez-vous des oiseaux aquatiques, et fameux pour la chasse aux canards; mais depuis quelques années, et surtout près de la base, le marais a été en grande partie desséché par des fossés et des pompes établies pour drainer et préparer le terrain pour la culture. Il n'y a pas de doute que la plus grande partie du marais finira par être occupée, et déjà son importance pour la chasse au canard sauvage a considérablement diminuée. Par suite de ces changements dans les conditions physiques, une grande partie de la végétation primitive a disparu, et des espèces appropriées aux conditions nouvelles du sol ont pris leur place; mais on trouve encore çà et là des endroits assez étendus qui portent encore les caractères de la

¹Réimprimé du Bulletin Wilson, n° 59, Juin, 1907.

végétation primitive, qui était tout à fait uniforme et peu variée quant aux espèces de plantes.

Les parties les plus humides étaient plus ou moins couvertes par la massette commune, le riz du Canada (*Zizania palustris* L.)¹ en grande abondance, une des herbes naturelles les plus élevées et les plus remarquables, et ayant souvent jusqu'à dix pieds de hauteur, par la prèle

Fig. 1. Carte représentant la point Pelée et ses environs.

des vases, le rubanier, la sagittaire, la léersie à fleurs de riz, le phragmite ou roseau, le scirpe des étangs ou jonc des chaisiers, la laiche grêle, la salicaire des marais, l'herbe aux sirènes, l'astère des marais ou aster à feuilles étroites, le grand bident (*Bidens trichosperma* (Michx.) Britton,

¹ On a reconnu récemment qu'il y avait deux espèces de riz sauvage. La variété *Zizania aquatica* L., la plus petite, n'avait pas été remarquée dans le temps.

var. *tenuiloba* (Gray) Britton), et, çà et là, par des talles abondantes de phalaris des canaris et de glycérie septentrionale (*Glyceria septentrionalis* Hitchc.) Dans les limites du marais, il ya plusieurs étangs et petits lacs qui recèlent dans leurs eaux un grand nombre de plantes caractéristiques, entre autres plusieurs espèces de plantes aquatiques, comme la valisnérie d'Amérique ou céleri sauvage, le nénuphar d'Amérique ou nymphe jaune des marais, la nymphe blanche, la brasénie de Schreber (water shield), et la naïade grêle. Sur le bord du marais, surtout le long du côté ouest, on trouve en grande abondance l'acorus aromatique ou belle angélique, le sumac vernis ou sumac poison, et la céphalanthée occidentale ou bois-bouton, qui atteignent une hauteur de vingt pieds et plus. Sur le côté est, il y a une plage sableuse, basse et étroite, bordée de buissons et d'arbres qui augmentent en allant vers le sud. Sur le côté ouest la plage est plus large et flanquée de dunes de sable couvertes de buissons et d'arbres. Il y a d'abord, en commençant au nord, une bande très étroite appelée localement "the narrows", qui va en s'élargissant vers le sud, jusqu'à ce que les rivages oriental et occidental réunissent leur partie boisée environ deux milles au nord de l'extrémité sud de la pointe, pour former ensuite, en allant vers le sud, un terrain sableux uni, couvert de bois, mais bordé sur le côté est d'une bande de terre riche et humide très boisée. En dehors du marais le sol est en grande partie composé de sable, bien qu'il y ait çà et là quelques parties en culture. La route venant de Leamington passe par la sus-dite "langue de terre" et se termine à l'extrémité sud de la pointe. En arrivant par cette route, le dernier jour du mois de mai 1910, l'auteur fut frappé de la beauté du spectacle, nouveau pour lui, formé par les ancolies du Canada en pleine floraison. Sur cette bande étroite, entre le rivage ouest et le marais, le noyer noir, un de nos plus beaux arbres, qui pousse ordinairement dans les terrains riches ou dans les fonds de rivière ou de ruisseau, est fréquent et paraît croître vigoureusement dans le sable pur, et le micocoulier est très commun. Ces deux arbres sont très abondants depuis la moitié jusqu'à l'extrémité sud de la pointe. On trouve aussi dans cette partie le frêne quadrangulaire et le févier, surtout sur le milieu et le haut de la plage, et environ une cinquantaine d'arbres qui bien qu'apparemment vigoureux poussent hors de leur lieu habituel de croissance. L'espèce prédominante de la partie boisée est le cèdre rouge, qu'on trouve en plus ou moins grande abondance le long du côté ouest. À environ mi-chemin de l'extrémité sud de la pointe, on trouve un groupe de pins blancs de bonne dimension, arbre qui croît ordinairement dans d'autres sols. Le hêtre rouge et le chêne à cœur jaune ou chêne noir (*Quercus velutina*, Lam.) sont communs; çà et là quelques hêtres châtaigniers.

La variété prédominante parmi les plantes herbacées est la polanisie odorante qui a poussé dans les jardins et les champs, et est devenue une herbe nuisible. Le caquiller maritime et le triplasis pourpre sont assez également distribués le long des deux rives. Sur le côté ouest, les buissons de sumac du Canada et de genévrier nain sont très abondants et retiennent d'une manière efficace les sables des dunes et des rivages contre l'action des vents. L'ammophile des sables, l'une des plantes les plus connues pour retenir le sable contre l'action du vent et des vagues, se rencontre par talles sur le côté est, mais il n'est nulle part en grande abondance. Le calamagrostis à longues feuilles, autre plante connue comme très efficace pour retenir les sables, est assez rare. Dans la bande de terrain riche et boisé, sur les côtés est et sud du grand marais, on rencontre les arbres et les plantes herbacées qui croissent ordinairement dans de semblables conditions mésophytiques: le frêne blanc ou franc frêne, le frêne noir, l'orme blanc, l'érable rouge, le tilleul d'Amérique ou bois blanc, le liard, le chêne à gros glands, le chêne prin, le platane, le saule à feuilles de pêcher, la renouée de Virginie, la sanguinaire du Canada, la cardamine de Douglass et la lobélie cardinale. Le févier à trois épines, le staphylier à feuilles ternées, appelé localement wahoo, le nopal ou opuntia occidental, le cornouiller à feuilles rudes, le mûrier rouge, le papayer atteignent très probablement leur limite septentrionale en cet endroit, et les deux derniers nommés tendent à disparaître rapidement. Il est peut-être très remarquable que nous n'ayons trouvé qu'un seul exemple de la famille des bruyères, l'arctostaphylos-raisin d'ours ou busserole; elle est très abondante et sert à retenir d'une manière très efficace les sables des dunes sur le côté ouest. Il y avait dans le grand marais beaucoup de canneberges, avant leur destruction par le drainage et le feu.

L'île Pelée, de beaucoup la plus grande des îles de la partie ouest du lac Erié fut examinée aussi attentivement que le temps disponible nous a permis de le faire. Elle est généralement unie, la roche n'étant recouverte que d'une mince couche de terre. La plus grande partie de la terre est en culture. Le sol est généralement bon, et on y récoltait autrefois beaucoup de raisins et de pêches; mais depuis quelques années, la culture de ces fruits a été négligée et l'on s'occupe beaucoup de la culture du tabac. Sur cette île, le chicot du Kentucky, le gainier du Canada, le técoma de Virginie ou jasmin-trompette, ce dernier étant très commun, semblent atteindre leur limite de croissance au nord.

Une revue des plantes croissant sur les autres îles a pu être faite grâce à l'étude botanique attentive effectuée sur toutes les îles situées au sud de la frontière internationale jusqu'à la rive Ohio, ainsi que sur les pointes et péninsules de ce rivage, par le prof. E. L. Moseley, qui

publia, en 1899, les conclusions de son travail et un catalogue des plantes.¹ Cette publication est un ouvrage d'une grande valeur, et l'auteur nous a gracieusement permis d'y puiser. Toutes les plantes mentionnées comme croissant sur ou autour des îles ou l'une des îles, et le long de la rive Ohio, proviennent de cette liste.

NOMBRE DES ESPÈCES REMARQUÉES DANS DIFFÉRENTES LOCALITÉS.

Le nombre des plantes observées à la pointe Pelée est de 583, sur l'île Pelée, de 408. et sur les deux, de 623; 40 espèces parmi celles de l'île n'ont pas encore été trouvées sur la pointe. Ces chiffres ne sont qu'approximatifs. Sur les îles au sud de la frontière internationale, le professeur Moseley a trouvé 612 espèces, dont 176 ne se trouvent pas à la pointe Pelée ni sur l'île Pelée. L'absence apparente d'un aussi grand nombre d'espèces est due surtout au peu d'étendue de la région examinée, car plusieurs des plantes trouvées par le Prof. Moseley, qui ne se rencontrent pas à la pointe Pelée ou sur l'île Pelée, sont connues comme très fréquentes et souvent abondantes dans l'ouest de l'Ontario, comme les espèces suivantes: *Cystopteris bulbifera* (L.) Bernh., *Allium tricoccum* Ait., *Erythronium americanum* Kerr., *Trillium erectum* L., *Ranunculus fascicularis* Muhl., *Hydrastis canadensis* L., *Jeffersonia diphylla* (L.) Pers., *Arabis canadensis* L., et plusieurs autres.²

Le Prof. Moseley a trouvé sur l'île Kelley seule, 461 espèces, et sur l'île Put-in-Bay, 439, tandis que, comme nous l'avons dit plus haut, il n'a été trouvé que 408 espèces sur l'île Pelée, dont la superficie est de beaucoup plus considérable que la superficie réunie de ces deux îles. Il est évident par conséquent que plusieurs espèces de plantes de l'île Pelée n'ont pas été trouvées, et qu'il y aurait là du travail à faire par un botaniste local. On devrait trouver sur cette île environ 650 à 700 espèces de plantes croissant sans culture, c'est-à-dire 242 à 292, ou environ 300 espèces de plus que celles qui sont mentionnées dans ce rapport. Cependant il est très probable qu'on ne pourra trouver sur l'île Pelée des plantes autres que celles mentionnées comme croissant à la pointe Pelée ou sur les autres îles du lac Érié, ou encore dans les autres parties du comté d'Essex.

En préparant la liste suivante, l'auteur s'est servi de toutes les sources de renseignements qu'il a pu trouver. Il a suivi la nomenclature du "Nouveau manuel de botanique illustré de Gray" et dans le cas contraire, le fait est mentionné. Plusieurs noms vulgaires ont été pris dans l'ouvrage illustré de Britton et Brown. L'auteur a eu plusieurs fois

¹ Catalogue des plantes à fleurs et des fougères qui croissent naturellement dans le comté d'Erie, Ohio et sur la péninsule et les îles du comté d'Ottawa. Par E. L. Moseley.

² Plusieurs des plantes ci-dessus nommées ont été trouvées dans d'autres parties du comté d'Essex et, insérées dans la liste.

recours à Agnes Chase, aide-scientifique en agrostologie systématique du "Bureau of Plant Industry" du département de l'Agriculture des États-Unis, pour l'examen de plusieurs espèces d'herbes; et à Kenneth K. Mackenzie de la ville de New-York, pour l'inspection de toutes les espèces de cypéracées, de joncs, et de plusieurs autres plantes.

LISTE ANNOTÉE.

POLYPODIACÉES (FAMILLE DES FOUGÈRES.)

Polypodium vulgare L. (Common polypody.) POLYPODE COMMUN.
Sur l'île Kelley. Rare.

Phegopteris hexagonoptera (Michx.) Fée. (Broad beach fern.)
POLYPODE PHÉGOPTÈRE.

Dans les bois épais près de Windsor. (Burgess.)

Phegopteris Dryopteris (L.) Fée. (Oak fern.) POLYPODE DRYOPTÈRE.

On rencontre fréquemment cette espèce dans les environs de Windsor. (F. P. Cravin.)

Adiantum pedatum L. (Maidenhair.) CAPILLAIRE DU CANADA.
Commun dans les endroits ombragés des environs de Windsor.
Rive Ohio.

Pteris Aquilina L. (Common brake.) GRANDE FOUGÈRE.

Abondante à la pointe Pelée, sur l'île Pelée et généralement dans le comté d'Essex.

Pellaea atropurpurea (L.) Link. (Cliff brake.) PELLÉE POURPRÉE.
Îles Kelley et Put-in-Bay, et rivage Ohio.

Asplenium Trichomanes L. (Maidenhair spleenwort.) POLYTRIC
OFFICINAL. Rive Ohio.

Asplenium platyneuron (L.) Oakes. (Ebony spleenwort.) DORADILLE ÉBÈNE.
Rive Ohio.

Asplenium angustifolium Michx. (Narrow-leaved spleenwort.) DORADILLE À FEUILLES ÉTROITES.

Dans les bois épais près d'Amherstburg. (MacLagan.) Rive Ohio.

Asplenium Filix-femina (L.) Bernh. (Lady fern.) DORADILLE FOUGÈRE-FEMELLE.

Rivage Ohio, et sans doute dans tout le comté d'Essex.

Camptosorus rhizophyllus (L.) Link. (Walking fern.) FOUGÈRE AMBULANTE.

Île Kelley et rive Ohio.

Polystichum acrostichoides (Mixon), Schott. (Christmas fern.)
FOUGÈRE DE NOËL.

Abondante autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Aspidium Thelypteris (L.) Sw. (Marsh shield fern.) ASPIDIE DES
MARAIS.

Très abondante dans les marais découverts ou légèrement ombragés de l'île Pelée et de la rive Ohio.

Aspidium noveboracense (L.) Sw. (New-York fern.) ASPIDIE DE
NEW-YORK.

Dans les petits bois et les buissons près de Windsor.

Aspidium Marginale (L.) Sw. ASPIDIE MARGINALE.

Fréquente dans les bois épais des environs de Windsor. (F. P. Cravin.)

Aspidium Goldianum Hook. (Goldie's fern.) ASPIDIE DE GOLDIE.
Dans les bois épais près d'Amherstburg. (MacLagan.)

Aspidium cristatum (L.) Sw. (Crested shield fern.) ASPIDIE À
CRÊTES.

Cà et là dans les endroits marécageux sur le côté est de la pointe Pelée et autour de Windsor. Fréquente sans doute dans toutes les autres parties du comté d'Essex.

Aspidium spinulosum (O. F. Müller) Sw. (Spinulose shield fern.)
ASPIDIE À PETITES POINTES.

Fréquente dans les bois épais de la pointe Pelée, sur les îles et sur le rivage Ohio. Sans doute fréquente aussi dans tout le comté d'Essex.

Aspidium spinulosum (O. E. Müller) Sw., var. **intermedium** (Muhl.)
D. C. Eaton. (Spinulose shield fern.) ASPIDIE À PETITES POINTES.

Dans les bois épais sur le côté est de la pointe Pelée et sur l'île Pelée. Probablement dans tout le comté d'Essex.

Cystopteris bulbifera (L.) Bernh. (Bulblet cystopteris.) CYSTOPTÉ-
RIDE BULBIFÈRE.

Sur les îles du lac Érié.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. (Brittle fern.) CYSTOPTÉ-
RIDE FRA-
GILE.

Sur l'île Kelley et le rivage Ohio.

Onoclea sensibilis L. (Sensitive fern.) ONOCLÉE SENSIBLE.

Abondante dans les endroits humides, découverts ou boisés ou couverts de buissons, sur le côté est de la pointe Pelée et sur l'île Pelée. On ne l'a pas trouvée sur les autres îles, mais elle croît en abondance sur le rivage Ohio.

Onoclea Strupthiopteris (L.) Hoffm. (Ostrich fern.) ONOCLÉE
AILE D'AUTRUCHE.

Fréquente dans le comté d'Essex. (F. P. Cravin.)

OSMONDACÉES. (FAMILLE DES FOUGÈRES FLEURIES.)

Osmunda regalis L. (Flowering fern.) FOUGÈRE FLEURIE.

Commune dans les marais découverts autour de Windsor.

Osmunda Claytonia L. (Clayton fern.) OSMONDE INTERROMPUE.
Fréquente autour de Windsor.

Osmunda cinnamomea L. (Cinnamon fern.) OSMONDE CANNELLE.
Commune autour de Windsor.

OPHIOGLOSSACÉES (FAMILLE DES OPHIOGLOSSES.)

Ophioglossum vulgatum L. (Adder's tongue.) OPHIOGLOSSÉ COMMUNE.

Pointe Cedar, rivage Ohio. Probablement fréquente dans le comté d'Essex, mais nous ne l'avons pas recherchée.

Botrychium simplex E. Hitchcock. (Little grape fern.) BOTRYCHION SIMPLE.

Remarqué à la pointe Cedar, et sur la rive Ohio.

Botrychium ramosum (Roth) Aschers. (Matricary grape fern.) BOTRYCHION DIVISÉ.

À la pointe Cedar, et sur la rive Ohio.

Botrychium virginianum (L.) Sw. (Rattlesnake fern.) BOTRYCHION DE VIRGINIE.

Fréquente dans les bois épais et dans les buissons sur le côté est de la pointe Pelée et sur l'île Pelée. Très probablement abondante dans tout le comté d'Essex.

ÉQUISÉTACÉES (Horsetail family.) PRÊLES.

Equisetum arvense L. (Common horsetail.) PRÊLE DES CHAMPS.

Dans les champs secs et humides sur la pointe Pelée et sur l'île Pelée. Commune dans tout le comté d'Essex. Sur l'île Kelley et la rive Ohio.

Equisetum sylvaticum L. (Wood horsetail.) PRÊLE DES BOIS.

Cà et là dans les endroits humides ombragés sur le côté est de la pointe Pelée et sur l'île Pelée. Sans doute dans tout le comté d'Essex.

Equisetum fluviatile L. (Pipes.) (Swamp horsetail.) PRÊLE DE MARAIS, QUEUE DE CHEVAL.

Abondante autour des étangs, dans les fossés, dans les eaux peu profondes, et dans les endroits humides, surtout dans le grand marais de la pointe Pelée. Aussi sur l'île Pelée et probablement dans tout le comté d'Essex.

Equisetum laevigatum A. Br. (Smooth scouring rush.) PRÊLE DOUCE.

On dit qu'elle se trouve sur les rebords des routes près de Windsor. D'après feu A. A. Eaton, cette espèce n'existe probablement pas dans l'ouest d'Ontario et de l'État de Michigan, et on l'a confondue avec la prêle d'hiver intermédiaire. A. A. Eaton.

Equisetum hyemale L. (Scouring rush.) PRÊLE D'HIVER.

Fréquente dans les endroits découverts et secs parmi les cèdres de la pointe Pelée et de l'île Pelée. Sans doute fréquente dans tout le comté d'Essex.

Equisetum hyemale L., var. **intermedium** A. A. Eaton. (Scouring rush.) PRÊLE D'HIVER INTERMÉDIAIRE.

Remarquée près de Windsor. D'après feu A. A. Eaton, on la confond souvent avec la prêle douce.

Equisetum hyemale L., var. **robustum** (A. Br.) A. A. Eaton. (Stout scouring rush.) PRÊLE D'HIVER FORTE.

Îles Put-in-Bay et Kelley, et rivage Ohio.

Equisetum variegatum Schleich (Variegated equisetum.) PRÊLE VARIÉE.

Abondante sur le rebords des étangs, sur le côté est de la pointe Pelée. Aussi sur les îles et la rive Ohio.

SÉLAGINELLACÉES (FAMILLE DES SÉLAGINELLES.)

Selaginella apus (L.) Spring. (Creeping selaginella.) SÉLAGINELLE RAMPANTE.

Dans les marais découverts le long de la rivière Détroit. Probablement dans tout le comté d'Essex, mais nous ne l'avons pas recherchée.

TAXACÉES (FAMILLE DES IFES.)

Taxus canadensis Marsh. (American Yew.) IF DU CANADA. BUIS.

Parmi les cèdres et les pins sur le côté ouest de la pointe Pelée. Apparemment rare. (Wallace Tilden.) Sur les rivages rocheux des îles.

PINACÉES OU CONIFÈRES (FAMILLE DES PINS.)

P. strobus L. (White pine.) PIN BLANC.

Çà et là sur la pointe Pelée. Forme un bocage à peu près à mi-chemin de l'extrémité de la pointe. Aussi dans les autres parties du comté. Rive Ohio.

Pinus sylvestris L. (Scotch fir.) PIN SYLVESTRE.

On trouve de beaux spécimens cultivés sur la rive nord du lac Érié, mais ils ne paraissent pas se multiplier.

Larix laricina (Du Roi) Koch. (American larch.) TAMARAC. ÉPINETTE ROUGE.

Çà et là dans les endroits humides, mais autrefois beaucoup plus abondant.

Juniper communis L. (Common juniper.) GÉNÉVRIER COMMUN.

On pourrait classer dans cette espèce quelques arbres sur la pointe Pelée. Rive Ohio.

Juniper communis L., var. **depressa** Pursh. (Low juniper.) GÉNÉVRIER NAIN.

Abondant sur le côté ouest de la pointe Pelée le long de la berge où près des dunes de sable, servant à retenir les sables contre l'action du vent. Ses fruits sont ordinairement très abondants. Se trouve aussi à l'extrémité sud de l'île Pelée. Rive Ohio.

Juniperus virginiana L. (Red cedar.) GÉNÉVRIER DE VIRGINIE.

Abondant et même forme l'espèce prédominante en plusieurs endroits sur le côté ouest de la pointe Pelée depuis la "langue de terre" jusqu'au bout de la pointe sud. Aussi sur l'île Pelée et çà et là sur la rive nord du lac Érié jusqu'à la rivière Détroit. Abondant sur les îles et la rive Ohio.

TYPHACÉES (FAMILLE DES MASSETTES.)

Typha latifolia L. (Common cat-tail.) QUENOUILLE.

Abondante dans les fossés et le grand marais de la pointe Pelée et sur l'île Pelée, et dans les endroits marécageux de tout le comté d'Essex. Île North-Bass et rive Ohio.

Typha angustifolia L. (Narrow leaved Cat-tail.) MASSETTE À FEUILLES ÉTROITES.

Fréquente et souvent en très grandes quantités sur les rebords du grand marais de la pointe Pelée. Île North-Bass et rive Ohio.

SPARGANIACÉES (FAMILLE DES RUBANIER.)

Sparganium eurycarpum, Engelm. (Broad fruited bur reed.) RUBANIER À GROS FRUITS.

Très commun dans le grand marais et les environs, dans les fossés et les endroits très humides de la pointe Pelée et de l'île Pelée. Île Middle-Bass et rive Ohio.

Sparganium americanum Nutt., var. **androcladum** (Engelm.)
Fernald et Eames. (Branching bur reed.) RUBANIER AMÉRICAIN.
Quelques spécimens dans le grand étang et les environs sur la
pointe Pelée. Île Middle-Bass et rive Ohio.

NAIADÉES (FAMILLE DES NAIADES.)

Potamogeton natans L. (Common floating pondweed.) POTAMOT
NAGEANT.

Dans les étangs et les petits lacs de la pointe Pelée et sur l'île
Pelée. Commun autour des autres îles.

Potamogeton americanus C. et S. (Long-leaved pondweed.) Po-
TAMOT D'AMÉRIQUE.

Quelques spécimens dans l'eau du côté est de la pointe Pelée.
Commun autour des îles.

Potamogeton amplifolius Tuckerm. (Large-leaved pondweed.) Po-
TAMOT À GRANDES FEUILLES.

Dans l'eau le long de la rive Ohio.

Potamogeton heterophyllus Schreb. (Various leaved pondweed.)
POTAMOT À FEUILLES VARIÉES.

Quelques spécimens dans l'eau du côté est de la pointe Pelée.
Près de Windsor. (Macoun.) Rive Ohio.

Potamogeton heterophyllus Schreb. forma **maximus** Morong.
(Various leaved pondweed.) GRAND POTAMOT À FEUILLES VARIÉES.

Île North-Bass et rive Ohio.

Potamogeton lucens L. (Shining pondweed.) POTAMOT BRILLANT.

Dans les eaux autour des îles et le long de la rive Ohio.

Potamogeton Richardsonii (Benn) Rydb. (Richardson pondweed.)
POTAMOT DE RICHARDSON.

Dans les eaux de l'extrémité nord du côté est de la pointe Pelée.
Sur les îles et la rive Ohio.

Potamogeton perfoliatus L. (Clasping-leaved pondweed.) POTA-
MOT PERFOLIÉ.

Dans l'eau le long de la rive Ohio.

Potamogeton zosterifolius Schumacher. (Eel-grass pondweed.) Po-
TAMOT COMPRIMÉ.

Quelques spécimens dans les grands fossés de l'extrémité nord
sur le côté est de la pointe Pelée. Commun autour des îles
et le long de la rive Ohio.

Potamogeton Hillii Morong. (Hill's pondweed.) POTAMOT DE HILL.
Le long de la rive Ohio.

Potamogeton Friesli Rupr. (Fries' pondweed.) POTAMOT DE FRIES.
 Dans les grands fossés sur le côté est de l'extrémité nord de la
 Pointe Pelée. Aussi autour de l'île Put-in-Bay et le long de la
 rive Ohio.

Potamogeton pusillus L. (Small pondweed.) PETIT POTAMOT.
 Dans l'eau le long de la rive Ohio.

Potamogeton foliosus Raf. (Leafy pondweed.) POTAMOT TOUFFU.
 Fréquent sur le côté est de l'extrémité nord de la pointe Pelée.
 Aussi autour des îles Put-in-Bay et Bass.

Potamogeton foliosus Raf., var. **niagarensis** (Tuckerm.) Morong.
 (Leafy pondweed.) POTAMOT TOUFFU DE NIAGARA.
 Autour de l'île Bass et le long de la rive Ohio.

Potamogeton pectinatus L. (Fennel-leaved pondweed.) POTAMOT
 PECTINÉ.

Quelques spécimens sur l'extrémité nord de la pointe Pelée, côté
 est. Abondant autour des îles et le long de la rive Ohio.

Potamogeton interruptus Kitaibel. (Interrupted pondweed.) PO-
 TAMOT INTERROMPU.

Autour de l'île Put-in-Bay.

Najas flexilis (Willd.) Rostk. et Schmidt. (Slender najas.) NAÏADE
 GRÊLE.

Dans les grands fossés sur le côté est de l'extrémité nord de la
 pointe Pelée. Aussi autour des îles.

Najas flexilis (Willd.) Rostk. et Schmidt, var. **robusta**. Morong.
 (Larger najas.) GRANDE NAÏADE.

Dans l'eau le long de la rive Ohio.

Najas gracillima (A. Br.) Magnus. (Thread-like najas. NAÏADE
 FILIFORME.

Dans l'eau le long de la rive Ohio.

JONCACÉES (FAMILLE DES SAGITTAIRES.)

Triglochin maritima L. (Seaside arrow-grass.) TRIGLOCHIN MARI-
 TIME.

Fréquent sur la pointe Pelée sur les sables humides ou les marais
 découverts, dans le grand marais et sur ses rebords.

ALISMACÉES (FAMILLE DES PLANTAINS D'EAU.)

Sagittaria latifolia Willd. (Broad-leaved arrow-head. Swan root.)
 RACINE DES CYGNES.

Commune dans les fossés et les endroits humides du grand marais
 de la pointe Pelée. Sur les îles et la rive Ohio.

Sagittaria arifolia Nutt. (Arum-leaved arrow-head.) SAGITTAIRE FLÈCHE D'EAU.

Le long de la rive Ohio.

Sagittaria heterophylla Pursh. (Sessile-fruited arrow-head.) SAGITTAIRE À FRUITS SESSILES.

Sur les bords des petits lacs dans le grand marais. Sur l'île Put-in-Bay et la rive Ohio.

Sagittaria graminea Michx. (Grass-leaved sagittaria.) SAGITTAIRE HERBACÉE.

Le long de la rive Ohio.

Alisma plantago-aquatica L. (Water plantain.) PLANTAIN D'EAU.

Abondant dans les fossés et les endroits très humides de la pointe Pelée et dans tout le comté d'Essex. Aussi sur les îles et la rive Ohio.

HYDROCHARIDÉES (FAMILLE DES HYDROCHARIDES.)

Elodea canadensis Michx. (Water-weed.) UDORE DU CANADA.

Commune dans les étangs et les petits lacs du grand marais de la pointe Pelée et sur l'île Pelée. Aussi sur les îles Kelley et Put-in-Bay et la rive Ohio.

Vallisneria spiralis L. (Wild celery.) VALISNÉRIE D'AMÉRIQUE.

Commune dans les étangs et les petits lacs du grand marais de la pointe Pelée. Abondant autour des îles et le long de la rive Ohio.

GRAMINÉES.

Andropogon scoparius Michx. (Broom beard grass.) ANDROPOGON À BALAIS.

Quelques spécimens sur les terrains secs découverts de la pointe Pelée et sur l'île Pelée. Rive Ohio.

Andropogon furcatus Muhl. (Forked beard grass.) ANDROPOGON FOURCHU.

Çà et là sur les terrains secs découverts de la pointe Pelée. Rive Ohio.

Sorghastrum nutans L. Nash. (Indian grass.) SORGHO COMMUN.

Dans les terrains sablonneux découverts sur la pointe Pelée. Apparemment rare. Rive Ohio.

Digitaria humifusa Pers. (Small crab grass.) PETITE DIGITAIRE.

Quelques spécimens sur les terrains sablonneux de la pointe Pelée et sur l'île Pelée. Île North-Bass et rive Ohio.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (Crab grass.) PANIC POURPRÉ.

Commun sur la pointe Pelée et l'île Pelée. Aussi sur les autres îles et sur la rive Ohio.

Panicum capillare L. (Old-witch grass.) PANIC CAPILLAIRE.

Commun dans les jardins, les champs et les endroits peu fréquentés de la pointe et de l'île Pelée. Sur les autres îles et la rive Ohio.

Panicum flexile (Gattinger.) Scribn. (Wiry panicum.) PANIC FLEXIBLE.

Commun dans les terrains sableux et humides sur le côté est de l'extrémité nord de la pointe Pelée.

Panicum philadelphicum Bernh. (Wood witch grass.) PANIC DE PHILADELPHIE.

Remarqué sur la pointe Pelée dans les terrains secs et sableux, sous les cèdres rouges. (A. B. Klugh.) Rive Ohio.

Panicum milliaceum L. (European millet.) PANIC MILLET. MILLET D'EUROPE.

Rive Ohio. Probablement aussi à l'état sauvage dans le comté d'Essex.

Panicum virgatum L. (Switch grass.) PANIC À BAGUETTES.

Ordinairement en touffes sur les terrains secs et sablonneux.

Abondant le long de la partie supérieure de la berge de la pointe Pelée. Aussi sur l'île Kelley et la rive Ohio.

Panicum agrostoides Spreng. (Agrostis-like panicum.) PANIC FAUSSE-AGROSTIS.

Île North-Bass.

Panicum depauperatum Muhl. (Starved panicum.) PANIC DE MISÈRE.

Quelques spécimens sur les terrains secs et maigres de la pointe Pelée. Rive Ohio.

Panicum dichotomum L. (Forked panicum.) PANIC FOURCHU.

Fréquent dans les bois de la pointe Pelée. (Burgess.) Aussi sur les îles.

Panicum huachucae Ashe. (Hairy panicum.) PANIC VELU.

Quelques spécimens sur les terrains sableux de la pointe Pelée.

On le trouverait sans doute dans tout le comté d'Essex.

Panicum scoparium Lam. (Scribner's panicum.) PANIC À LARGES FEUILLES.

Cà et là dans les terrain secs de la pointe Pelée. Probablement dans tout le comté d'Essex. Sur les îles et la rive Ohio.

Panicum clandestinum L. (Hispid panicum.) PANIC CLANDESTIN.

Pointe Cedar, rive Ohio.

Echinocloa crus-galli (L.) Beauv. (Barnyard grass.) ÉCHINOCLOÉ CRÊTE DE COQ.

Constitue une mauvaise herbe à la pointe Pelée et probablement dans tout le comté d'Essex, dans les jardins, les champs et les

endroits non cultivés, de préférence dans les lieux humides.
Aussi sur les îles et la rive Ohio.

Echinocloa Walteri (Pursh) Nash. (Salt-marsh cockspur grass.)
ÉCHINOCLOÉ DE WALTER.

Commune dans les lieux humides près des rivières qui se jettent
du côté nord du lac Érié. Rive Ohio.

Setaria glauca (L.) Beauv. (Foxtail.) SÉTAIRE GLAUQUE.

Mauvaise herbe des jardins et des champs dans tout le comté
d'Essex. Îles et rive Ohio.

Setaria viridis (L.) Beauv. (Green foxtail.) MIL SAUVAGE.

Mauvaise herbe des champs cultivés dans tout le comté d'Essex.
Rive Ohio.

Setaria italica (L.) Beauv. (Italian millet.) SÉTAIRE D'ITALIE.
MIL DES OISEAUX.

Croît isolément çà et là dans tout le comté d'Essex. Sur les îles
Middle-Bass et North-Bass, et sur la rive Ohio.

Cenchrus carolinianus Walt. (Sandbur.) GLOUTERON DES SABLES.

Se rencontre parfois sur les rebords des chemins dans tout le
le comté d'Essex. Sur les îles et la rive Ohio.

Zizania palustris L. (Indian rice.) FOLLE AVOINE. RIZ DU CANADA.

Très abondant et pousse en talles dans le grand marais de la
pointe Pelée. Aussi le long des rivages humides des ruisseaux
qui se jettent dans le lac Érié, et autour du lac St-Clair.
Aussi sur l'île Pelée, l'île Middle-Bass et la rive Ohio. Nous
n'avons pas remarqué la variété plus petite zizanie aquatique L.

Leersia virginica Willd. (White grass.) LÉERSIE DE VIRGINIE.

Fréquente dans les grands bois clairs sur le côté est de la pointe
Pelée. Aussi sur l'île Kelley et la rive Ohio.

Leersia oryzoides (L.) Sw. (Rice cut grass.) LÉERSIE À FLEURS DE
RIZ. FAUX-RIZ.

Commune sur la pointe Pelée le long des fossés et dans les lieux
humides, surtout dans le grand marais. Aussi sur les îles et
la rive Ohio.

Phalaris arundinacea L. (Reed canary grass.) PHALARIS ROSEAU.

Occasionnel dans les endroits humides de la pointe Pelée, surtout
dans le grand marais. Île Middle-Bass et rive Ohio.

Hierocloe odorata (L.) Wahlenb. (Vanilla grass.) HOUQUE ODO-
RANTE. FOIN DE SENTEUR.

Dans les lieux couverts d'herbe le long de la rivière Détroit.

Milium effusum L. (Millet grass.) MILLET ÉTALÉ.

Dans les bois clairs sur le côté est de la pointe Pelée.

Oryzopsis pungens (Torr.) Hitchc. (Slender mountain Grass.)
ORYZOPSIS GRÊLE.

Dans les terrains découverts autour de Windsor.

Oryzopsis asperifolia Michx. (White grained mountain rice.) RIZ
BLANC DES MONTAGNES.

Dans les lieux ombragés près de Windsor.

Oryzopsis racemosa (Sm.) Ricker. (Black-fruited mountain rice.)
PIPTATHÈRE NOIR.

Île Put-in-Bay. Apparemment rare.

Stipa spartea Trin. (Porcupine grass.) STIPE À TOUFFES RAIDES.
Terrains sableux. Rive Ohio.

Muhlenbergia sobolifera (Muhl.) (Rock muhlenbergia.) MUHLEN-
BERGIA DES ROCHERS.
Rive Ohio.

Muhlenbergia sylvatica Torr. (Wood muhlenbergia.) MUHLEN-
BERGIA DES BOIS.

Çà et là, à l'orée des bois, sur le côté est de la pointe Pelée. Île
Middle-Bass.

Muhlenbergia foliosa Trin. (Minnesota muhlenbergia.) MUHLEN-
BERGIA TOUFFUE.

Sur le rebord du grand marais de la pointe Pelée. Apparemment
rare.

Muhlenbergia mexicana (L.) Trin. (Meadow muhlenbergia.)
MUHLENBERGIA DU MEXIQUE.

Bords des bois sur le côté est de la pointe Pelée. Apparemment
peu abondante. Îles et rive Ohio.

Muhlenbergia racemosa (Michx.) BSP. (Marsh muhlenbergia.)
MUHLENBERGIA DES MARAIS.

Fréquente sur la pointe Pelée dans les lieux humides découverts.

Muhlenbergia Schreberi J. F. Gmel. (Nimble will.) MUHLEN-
BERGIA DE SCHREBER.

Commune à la pointe Pelée, dans les endroits secs et sablonneux
sous les cèdres et les autres arbres. Îles et rive Ohio.

Brachyelytrum erectum (Schreb.) Beauv. (Brachyelytrum.) MUH-
LENBERGIA DRESSÉE.

Rive Ohio.

Phleum pratense L. (Timothy.) PHLÉOLE DES PRÉS. MIL.

Un peu partout, par talles isolées. Îles et rive Ohio.

Alopecurus geniculatus L., var. **aristulatus** Torr. (Floating foxtail.)
VULPIN GENOUILLE.

Dans les lieux découverts très humides sur la pointe et l'île Pelée.
Îles et rive Ohio.

Sporobolus vaginiflorus (Torr.) Wood. (Sheathed rush grass.)
SPOROBOLÉ ENGAINÉ.

Îles Kelley et Put-in-Bay, et rive Ohio.

Sporobolus neglectus Nash. (Small rush grass.) SPOROBOLÉ PETIT
JONC.

Rive Ohio.

Sporobolus cryptandrus (Torr.) Gray. (Sand dropseed.) SPOROBOLÉ DES SABLES.

Fréquent sur les rives et les dunes de sable de la pointe Pelée.

Rive Ohio.

Agrostis alba L. (Red top.) AGROSTIDE BLANCHE.

Commune sur la pointe Pelée dans les prairies humides, et çà et là dans les lieux secs. Commune sur les îles et la rive Ohio.

Agrostis hyemalis (Walt) BSP. (Hair grass.) AGROSTIDE D'HIVER.

Çà et là dans les terrains secs de la pointe Pelée. Sur les îles Put-in-Bay et Middle-Bass, et la rive Ohio.

Agrostis perennans (Walt) Tuckerm. (Thin grass.) AGROSTIDE VIVACE.

Rive Ohio.

Calamovilfa longifolia (Hook) Hack. (Long-leaved reed grass.)
CALAMAGROSTIDE À LONGUES FEUILLES.

Se rencontre sur la partie supérieure de la rive de la pointe Pelée, mais en petite quantité. Lorsqu'elle est abondante, elle forme une des plantes les plus efficaces pour retenir les sables contre l'action du vent.

Calamagrostis canadensis (Michx.) Beauv. (Blue-joint grass.) FOIN BLEU. HERBE À LIENS.

Abondante dans le grand marais de la pointe Pelée et sur l'île Pelée, où elle forme des talles. Sur les îles Middle-Bass et North-Bass et sur la rive Ohio.

Ammophila arenaria (L.) Link. (Sea-sand reed.) AMMOPHILE DES SABLES.

Une herbe caractéristique des rivages. Elle forme de nombreuses talles sur le côté est de la pointe Pelée, mais n'est pas abondante sur le côté ouest. Lorsqu'elle est assez abondante, elle est des plus efficaces pour empêcher les vents et les vagues de transporter le sable. Rive Ohio.

Cinna arundinacea L. (Wood reed grass.) CINNA ROSEAU.

Dans les bois humides sur le côté est de la pointe Pelée. Apparemment rare. Rive Ohio.

Sphenopholis obtusata (Michx.) Scribn. (Blunt scaled Aetonia.)
SPHÉNOPHOLIS OBTUS.

Île North-Bass et rive Ohio.

Sphenopholis pallens (Spreng.) Scribn. (Pensylvania Aetonia.)
SPHÉNOPHOLIS PÂLE.

Îles et rive Ohio.

Koeleria cristata (L.) Pers. (Koeleria.) KEULÉRIE À CRÊTES.

Çà et là dans les terrains secs de la pointe Pelée. Rive Ohio.

Danthonia spicata (L.) Beauv. (Common wild oat grass.) DAN-
THONIE EN ÉPIS.

Fréquente dans les terrains secs de la pointe Pelée. Rive Ohio.
Île Put-in-Bay.

Spartina Michauxiana Hitchc. (Slough grass.) SPARTINE DE MI-
CHAUD.

Çà et là dans les marais découverts de la pointe Pelée et sur l'île
Pelée. Sur l'île Middle-Bass et la rive Ohio. Autrefois
comprise sous la dénomination de Spartine cynosure qu'on
regarde maintenant comme une autre espèce.

Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. (Racemed boutelous.) BOU-
TELOUE EN GRAPPES.

Rive Ohio.

Eleusine indica Gaertn. (Goose grass.) ELEUSINE DE L'INDE.

Rive Ohio.

Phragmites communis Trin. (Reed.) ROSEAU.

En talles abondantes dans le grand marais de la pointe Pelée, et
sur l'île Pelée.

Tridens flavus (L.) Hitchc. (Tall red top.) GRANDE AGROSTIDE JAUNE.
Rive Ohio.

Triplasis purpurea (Walt.) Chapm. (Sand grass.) TRIPLASIS PUR-
PURINE.

Commune dans les sables de la rive à la pointe Pelée, sur l'île
Kelley et sur la rive Ohio.

Eragrostis hypnoides (Lam.) BSP. (Creeping eragrostis.) ERA-
GROSTIDE RAMPEANTE.

Rive Ohio.

Eragrostis Frankii (Fisch, Mey., et Lall.) Steud. (Frank's eragrostis.)
ERAGROSTIDE DE FRANK.

Rive Ohio.

Eragrostis capillaris (L.) Nees. (Capillary eragrostis.) ERAGROS-
TIDE CAPILLAIRE.

Rive Ohio.

Eragrostis pilosa (L.) Beauv. (Tufted eragrostis.) ERAGROSTIDE
CHEVELUE.

Abondante dans les terrains secs sablonneux de la pointe Pelée.
Se rencontre aussi en abondance le long des talus de chemins

de fer et des grands chemins. Commune dans tout le comté d'Essex. L'*Eragrostis purshii* Schrad est comprise dans cette espèce. Île Kelley.

Eragrostis megastachya (Koeler) Link. ERAGROSTIDE À FORTE ODEUR.

Mauvaise herbe des jardins et des champs cultivés de la pointe Pelée. Îles.

Eragrostis pectinacea (Michx.) Steud. (Purple eragrostis.) ERAGROSTIDE POURPRÉE.

Pointe Cedar, rive Ohio.

Dactylis glomerata L. (Orchard grass.) DACTYLE PELOTONNÉ.

Çà et là sur la pointe Pelée, le long des chemins et autour des édifices. Île Pelée et rive Ohio.

Poa annua L. (Low spear grass.) PÂTURIN ANNUEL.

Autour des édifices, et surtout dans les pelouses, à la pointe Pelée et sur l'île Pelée. Probablement commun dans tout le comté d'Essex.

Poa compressa L. (Canada blue grass.) PÂTURIN COMPRIMÉ.

Commun dans les terrains secs sableux de la pointe Pelée. Îles et rive Ohio.

Poa pratensis L. (June grass.) PÂTURIN DES PRÉS.

Commun sur la pointe Pelée et l'île Pelée. L'herbe la plus commune dans les bois abattus, les champs, les pâturages et les pelouses. Abondant aussi sur les autres îles et la rive Ohio.

Poa debilis Torr. (Weak spear grass.) PÂTURIN GRÊLE.

Rive Ohio.

Glyceria nervata (Willd.) Trin. (Fowl meadow grass.) GLYCÉRIE NERVÉE.

Commune dans les lieux humides découverts et les bois clairs de la pointe Pelée. Sur les îles et la rive Ohio.

Glyceria pallida (Torr.) Trin. (Pale manna grass.) GLYCÉRIE PÂLE.

Rive Ohio.

Glyceria septentrionalis Hitch. (Northern manna grass.) GLYCÉRIE SEPTENTRIONALE.

Fréquente dans les fossés, dans les eaux peu profondes et autour des étangs de la pointe Pelée, surtout sur le côté est du grand marais. Îles. Autrefois comprises dans la dénomination de Glycérie flottante, (L.) R. Br.

Festuca octoflora Walt. (Slender fescue grass.) FÊTUQUE GRÊLE.

Çà et là dans les terrains secs sableux de la pointe Pelée. Rive Ohio.

Festuca ovina L. (Sheep's fescue.) FÊTUQUE OVINE.

Fréquente dans les terrains secs sableux de la pointe Pelée.

Festuca elatior L. (Meadow fescue.) FÉTUQUE DES PRÉS.

Çà et là dans les gazons de la pointe Pelée. Îles et rive Ohio.

Festuca nutans Spreng. (Nodding fescue.) FÉTUQUE NOUÉE.

Çà et là autour des bâtiments de ferme de la pointe Pelée. Îles du lac Érié, à part l'île Kelley.

Bromus secalinus L. (Common Chess.) BROME DES SEIGLES.

Çà et là autour des édifices et dans les champs cultivés de la pointe Pelée. Îles et rive Ohio.

Bromus commutatus Schrad. (Variable brome grass.) BROME VARIÉ.

Remarqué dans les terrains découverts seulement du côté ouest de l'île Pelée.

Bromus racemosus L. (Upright chess.) BROME DRESSÉ.

Marges des routes et des chemins de fer du comté d'Essex. (Burgess.) Commun sur les îles.

Bromus ciliatus L. (Fringed brome grass.) BROME DU CANADA. BROME CILIÉ.

Çà et là dans les bois clairs et les bocages de la pointe Pelée. Sur les îles Kelley et Rattlesnake et sur la rive Ohio.

Lolium perenne L. (Common darnel.) IVRAIE VIVACE.

Îles Kelley et Put-in-Bay.

Agropyron repens (L.) Beauv. (Couch grass.) CHIENDENT.

Çà et là autour des bâtiments de ferme et dans les champs abandonnés de la pointe Pelée. Probablement fréquent dans tout le comté d'Essex. Île Kelley et rive Ohio.

Agropyron dasystachyum (Hook.) Scribn. (Northern wheat grass.) AGROPYRON À ÉPIS LAINEUX.

Dans les terrains sableux rapprochés du rivage de l'île Pelée; mais nulle part en abondance.

Hordeum jubatum L. (Squirrel tail grass.) ORGE AGRÉABLE.

Çà et là autour des maisons de la pointe Pelée. Sur l'île Kelley et la rive Ohio. Devient commune dans plusieurs parties de l'ouest d'Ontario.

Elymus virginicus L. (Virginia wild rye.) ÉLYME DE VIRGINIE.

Çà et là sur les rebords des bois dans les lieux humides. Îles et rive Ohio.

Elymus Canadensis L. (Nodding wild rye.) ÉLYME DU CANADA. SEIGLE SAUVAGE.

Fréquente sur les parties élevées des rivages de la pointe Pelée et de l'île Pelée, mais peu abondante. Sur les autres îles et la rive Ohio.

Elymus canadensis L., var. **glaucofolius** (Muhl.) Gray. (Glaucous leaved wild rye.) ÉLYME À FEUILLES GLAUQUES.

Îles et rive Ohio.

Elymus striatus Willd. (Slender wild rye.) ÉLYME GRÊLE.

Çà et là dans les bois desséchés sur la pointe Pelée. Île Kelley rive Ohio.

Hystrix patula Moench. (Bottle-brush grass.) GYMNOTIC HÉRISSE.

Dans les bois clairs de la pointe Pelée. Îles et rive Ohio.

CYPÉRACÉES (FAMILLE DES SOUCHETS.)

Cyperus diandrus Torr. (Low cyperus.) SOUCHET DIANDRE.

Fréquent dans les terrains découverts de la pointe Pelée, surtout autour du grand marais. Îles et rive Ohio.

Cyperus rivularis Kunth. (Shining cyperus.) SOUCHET BRILLANT.
Rive Ohio.

Cyperus Schweinitzii Torr. (Schweinitz's cyperus.) SOUCHET DE SCHWEINITZ.

Fréquent dans les terrains secs sableux de la pointe Pelée. Commun sur la rive Ohio.

Cyperus esculentus L. (Yellow nut grass.) SOUCHET COMESTIBLE.
AMANDE DE TERRE.

Dans les terrains bas de la pointe Pelée (Burgess.)

Cyperus ferax Rich. (Michaux's cyperus.) SOUCHET DE MICHAUD.

Dans les sables humides près du rivage du lac Érié à l'ouest de Kingsville. Rive Ohio.

Cyperus strigosus L. (Straw-coloured cyperus.) SOUCHET ÉLANCÉ.

Fréquent dans les terrains humides et gazonnés de la pointe Pelée. Îles, et rive Ohio.

Cyperus Houghtonii Torr. (Houghton's cyperus.) SOUCHET DE HOUGHTON.

Fréquent le long des rives sableuses du lac St-Clair.

Cyperus filiculmis Vahl. (Slender cyperus.) SOUCHET GRÊLE.

Çà et là dans les terrains découverts et très secs de la pointe Pelée. Rive Ohio.

Dulichium arundinaceum (L.) Britton. (Dulichium.) DULICHIE ROSEAU.

Çà et là dans les lieux humides et découverts autour du grand marais. Rive Ohio.

Eleocharis obtusa (Willd.) Schultes. (Blunt spike rush.) ÉLÉOCHARIDE OBTUSE.

Çà et là dans les fossés et les vases de la pointe Pelée et sur les îles Pelées, Kelley, et North-Bass, et sur la rive Ohio.

Eleocharis palustris (L.) R. et S. (Creeping spike rush.) ÉLÉOCHARIDE DES MARAIS.

Commune sur la pointe Pelée et l'île Pelée. Probablement dans tout le comté d'Essex. Rive Ohio.

Eleocharis palustris (L.) R. et S., var. **glaucescens** (Willd.) Gray. (Slender creeping spike rush.) ÉLÉOCHARIDE GLAUQUE DES MARAIS. Sur les îles Pelée et Put-in-Bay, et sur la rive Ohio.

Eleocharis palustris (L.) R. et S., var. **vigens**, Bailey. (Large creeping spike rush.) GRANDE ÉLÉOCHARIDE DES MARAIS. Dans l'eau le long de la rive Ohio.

Eleocharis acicularis (L.) R. et S. (Needle spike rush.) ÉLÉOCHARIDE ACICULAIRE.

Commune autour des étangs et des petits lacs du grand marais de la pointe Pelée, et sur les îles Pelée, Bass, et sur la rive Ohio.

Eleocharis tenuis (Willd.) Schultes. (Slender spike rush.) ÉLÉOCHARIDE GRÊLE.

Çà et là dans les gazons humides de la pointe Pelée, et sur l'île Pelée.

Eleocharis acuminata (Muhl.) Nees. (Flat stemmed spike rush.) ÉLÉOCHARIDE À TIGE APLATIE.

Commune sur la rive Ohio.

Eleocharis intermedia (Muhl.) Schultes. (Matted spike rush.) ÉLÉOCHARIDE INTERMÉDIAIRE.

Île Bass et rive Ohio.

Stenophyllus capillaris (L.) Britton. (Hair-like Stenophyllus.) STÉNOPHYLLE CAPILLAIRE.

Dans les sables humides près de Sandwich. (Macoun.)

Fimbristylis autumnalis (L.) R. et S. (Slender fimbristylis.) FIMBRISTYLE GRÊLE.

Dans les sables humides près de Sandwich. (Macoun.) Rive Ohio.

Scirpus debilis Pursh. (Weak-stalked club rush.) SCIRPE À TIGE FAIBLE.

Le long de la rive Ohio.

Scirpus americanus Pers. (Three-square.) SCIRPE TRIQUÊTRE.

Très commun sur les rebords du grand étang de la pointe Pelée et le long du rivage du lac St-Clair. Sur les îles et la rive Ohio.

Scirpus Torreyi. (Torrey's bulrush.) SCIRPE DE TORREY.

Le long de la rive Ohio.

Scirpus occidentalis (Wats.) Chase. (Western bulrush.) SCIRPE OCCIDENTAL. SCIRPE DES ÉTANGS. JONC DES CHAISIER.

Commun à la pointe Pelée dans le grand marais et sur ses rebords et le long du rivage du lac St-Clair. Îles et rive Ohio.

Scirpus fluviatilis (Torr.) Gray. (River bulrush.) SCIRPE DES RIVIÈRES.

Fréquent sur la pointe Pelée dans les endroits très humides du grand marais. Île Put-in-Bay et rive Ohio.

Scirpus sylvaticus L. (Wood bulrush.) SCIRPE DES BOIS.
Île Put-in-Bay.

Scirpus atrovirens Muhl. (Dark-green bulrush.) SCIRPE VERT FONCÉ DES BOIS.

Commun dans les lieux humides découverts de la pointe Pelée et dans tout le comté d'Essex. Îles et rive Ohio.

Scirpus polyphyllus Vahl. (Leafy bulrush.) SCIRPE FEUILLU.
Île Middle-Bass.

Scirpus lineatus Michx. (Reddish bulrush.) SCIRPE ROUGEÂTRE.
Dans les gazons humides sur le côté est de la pointe Pelée. Apparemment peu fréquent. Sur les îles Kelley et North-Bass et sur la rive Ohio.

Scirpus cyperinus (L.) Kunth., var. **pelius** Fernald. (Wool grass.) SCIRPE LAINEUX.

Çà et là dans les endroits marécageux près du lac St-Clair. Le long de la rive Ohio.

Hemicarpha micrantha (Vahl.) Britton. (Hemicarpha.) HÉMICARPHA À PETITES FLEURS.

Dans les sables humides près d'Amherstburg. (Macoun.)

Cladium mariscoides (Muhl.) Torr. (Twig rush.) CLADIER MARISQUE.

Fréquent et en talles nombreuses dans les endroits marécageux de pointe Pelée et autour des étangs et des petits lacs du grand marais.

Scleria triglomerata Michx. (Tall nut rush.) SCLÉRIE À TROIS GLOMÉRULES.

Dans les lieux humides près de Sandwich. (Macoun.)

Carex muskingumensis Schwein. (Muskingum sedge.) LAICHE DE MUSKINGUM.

Le long de la rive Ohio.

Carex scoparia Schkuhr. (Pointed broom sedge.) LAICHE À BALAI.
Fréquente dans les lieux humides découverts de la pointe Pelée, et sur l'île Pelée.

Carex tribuloides Wahlenb. (Blunt broom sedge.) LAICHE ÉMOUSSÉE.

Çà et là dans les lieux humides sur la pointe Pelée, et sur l'île Pelée.

Carex tribuloides Wahlenb., var. **turbata** Bailey. (Blunt broom sedge.)

LAICHE RABOUGRIE.

Île North-Bass.

Carex cristata Schwein. (Crested sedge.) LAICHE À CRÊTE.

Dans les lieux humides découverts ou couverts de bois clairs de la pointe Pelée. Île North-Bass et rive Ohio.

Carex festucacea Schkuhr, var. **brevior** (Dewey) Fernald. (Fescue sedge.) PETITE LAICHE MERVEILLEUSE.

Îles Johnson, Kelley et Green, et rive Ohio.

Carex Bebbii Olney. (Bebb's sedge.) LAICHE DE BEBB.

Dans les terrains bas et découverts de la pointe Pelée. Apparemment rare.

Carex sterilis Willd. (Little prickly sedge.) LAICHE STÉRILE.

Rive Ohio.

Carex rosea Schkuhr. (Stellate sedge.) LAICHE ÉTOILÉE.

Fréquente dans les terrains secs découverts de la pointe Pelée.

Île Middle-Bass et rive Ohio.

Carex rosea Schkuhr., var. **radiata** Dewey. (Stellate sedge.) LAICHE ÉTOILÉE, VAR. RADÉE.

Dans les bois près d'Amherstburg.

Carex Muhlenbergii Schkuhr. (Muhlenberg's sedge.) LAICHE DE MUHLENBERG.

Se rencontre parfois dans les terrains sableux et découverts de la pointe Pelée. Rive Ohio.

Carex Muhlenbergii Schkuhr., var. **enervis** Boott. (Muhlenberg's sedge.) LAICHE DE MUHLENBERG var. FAIBLE.

Rive Ohio.

Carex cephalophora Muhl. (Oval-headed sedge.) LAICHE PORTE-TÊTES.

Se rencontre dans les lieux ombragés sur la pointe Pelée. Île Bass et rive Ohio.

Carex cephaloidea Dewey. (Thin-leaved sedge.) LAICHE CÉPHALOÏDE.

Rive Ohio.

Carex sparganioides Muhl. (Bur reed sedge.) LAICHE FAUX-RUBANIER.

Dans les lieux ombragés sur l'île Pelée. Îles Kelley et Rattlesnake, et rive Ohio.

Carex vulpinoidea Michx. (Fox sedge.) LAICHE FAUX-VULPIN.

Commune sur la pointe Pelée et dans tout le comté d'Essex, dans les gazons humides. Îles et rive Ohio.

- Carex stipitata** .hl. (Awl-fruited sedge.) LAICHE ÉPAISSE. LAICHE ALÈNE
 Dans les lieux très humides de la pointe Pelée, surtout sur les rebords du grand marais. Îles et rive Ohio.
- Carex Sartwellii** Dewey. (Sartwell's sedge.) LAICHE DE SARTWELL.
 Lieux humides découverts dans le grand marais de la pointe Pelée.
- Carex aquatilis** Wahlenb. (Water sedge.) LAICHE AQUATIQUE.
 Marge des étangs et des petits lacs du grand marais de la pointe Pelée. Île Put-in-Bay, et rive Ohio.
- Carex torta** Boott. (Twisted sedge.) LAICHE ENROULÉE.
 Sur la pointe Cedar, et sur la rive Ohio.
- Carex stricta** Lam. (Tussock sedge.) LAICHE DRESSÉE.
 Autour du grand marais de la pointe Pelée, surtout près des étangs et des petits lacs.
- Carex leptalea** Wahlenb. (Bristle-stalked sedge.) LAICHE POLYTRIQUE.
 Commune dans les lieux découverts et très humides de la pointe Pelée. Rive Ohio.
- Carex virescens** Muhl., var. **Swanii** Fernald. (Swan's sedge.) LAICHE VERDÂTRE, var. de SWAN.
 Près d'Essex Centre et de Amherstburg. (Macoun.) Près de Leamington. (Burgess.)
- Carex Davisii** Schwein. (Davis sedge.) LAICHE DE DAVIS.
 Île Kelley et rive Ohio.
- Carex albicans** Willd. (Whitish sedge.) LAICHE BLANCHÂTRE.
 Île Put-in-Bay.
- Carex varia** Muhl. (Emmons' sedge.) LAICHE VARIÉE.
 Se rencontre parfois dans les terrains secs sablonneux de la pointe Pelée parmi les cèdres rouges et les pins. Rive Ohio.
- Carex pennsylvanica** Lam. (Pennsylvania sedge.) LAICHE DE PENNSYLVANIE.
 Fréquente dans les terrains secs découverts de la pointe Pelée. Île Put-in-Bay, et rive Ohio.
- Carex eburnea** Boott. (Bristle-leaved sedge.) LAICHE D'IVOIRE.
 Sur les terrains secs et sableux de la pointe Pelée, parmi les cèdres rouges et les pins.
- Carex laxiflora** Lam. (Loose-flowered sedge.) LAICHE À FLEURS LÂCHES.
 Près de Amherstburg. (Macoun.) Île Kelley.

- Carex laxiflora** Lam., var. **varians** Bailey. (Loose-flowered sedge.)
LAICHE CHANGEANTE À FLEURS LÂCHES.
Peu fréquente dans les bois riches de la pointe Pelée. Sur les îles
Hen et Kelley, et sur la rive Ohio.
- Carex laxiflora** Lam., var. **blanda** (Dewey.) Boott. (Loose-flowered
sedge.) LAICHE DOUCE À FLEURS LÂCHES.
Fréquente dans les bois riches de la pointe Pelée. Île Kelley et
rive Ohio.
- Carex laxifolia** Lam., var. **latifolia** Boott. (White bear sedge.)
LAICHE À FEUILLES DE CÔTÉ.
Île Kelley.
- Carex granularis** Muhl. (Meadow sedge.) LAICHE GRANULEUSE.
Île Kelley et rive Ohio.
- Carex Crawei** Dewey. (Crawe's sedge.) LAICHE DE CRAWE.
Rive Ohio.
- Carex flava** L. (Yellow sedge.) LAICHE JAUNE.
Çà et là dans les terrains humides et découverts de la pointe
Pelée.
- Carex Oederi** Retz, var. **pumila** (Cosson et Germain) Fernald. (Green
sedge.) LAICHE VERTE.
Dans les sables humides autour des étangs et des petits lacs du
grand marais de la pointe Pelée, et le long de la rive nord du
lac Érié.
- Carex filiformis** L. (Slender sedge.) LAICHE FILIFORME.
Commune sur la pointe Pelée dans le grand marais et sur ses
rebords, et sur l'île Pelée.
- Carex lanuginosa** Michx. (Wooly sedge.) LAICHE LAINEUSE.
Dans les gazons humides de la pointe Pelée. Île Put-in-Bay.
- Carex riparia** W. Curtis. (River-bank sedge.) LAICHE DES LACS.
Sur les marais de la pointe Pelée. Rive Ohio.
- Carex squarrosa** L. (Squarrose sedge.) LAICHE RABOTEUSE.
Rive Ohio.
- Carex Frankii** Kunth. (Frank's sedge.) LAICHE DE FRANK.
Île Middle-Bass et rive Ohio.
- Carex comosa** Boott. (Bristle sedge.) LAICHE PLUMEUSE.
Commune sur la pointe Pelée, dans les endroits humides du grand
marais. Îles.
- Carex hystericina** Muhl. (Porcupine sedge.) LAICHE DES PORCS-
ÉPICS.
Commune dans les lieux très humides de la pointe spécialement
dans le grand marais. Îles Put-in-Bay et Middle-Bass, et
rive Ohio.

Carex lurida Wahlenb. (Sallow sedge.) LAICHE LIVIDE.
Rive Ohio.

Carex lupulina Muhl. (Hop sedge.) LAICHE LUPULINE.
Commune dans les marécages de la pointe Pelée. Îles et rive Ohio.

Carex intumescens Rudge. (Bladder sedge.) LAICHE VÉSICULEUSE.
Près d'Amherstburg. (Macoun.)

AROÏDÉES (FAMILLE DES GOUETS.)

Arisaema triphyllum (L.) Schott. (Jack-in-the-pulpit.) GOUET TRI-PHYLLE. OIGNON SAUVAGE.

Commune dans les bois riches de la pointe Pelée. Îles et rive Ohio.

Arisaema dracontium (L.) Schott. (Green dragon.) CALLE DES MARAIS.

Fréquente sur la Grosse-Isle, comté de Wayne, Mich., et on devrait pouvoir la trouver dans le comté d'Essex. Rive Ohio.

Symplocarpus fetidus (L.) Nutt. (Skunk cabbage.) SYMPLOCARPE FÉTIDE.

Commune autour de Windsor.

Acorus calamus L. (Sweet flag.) BELLE ANGÉLIQUE.

Commune à la pointe Pelée sur les rebords du grand marais, surtout le long de la "langue de terre", et à l'ouest de Colchester. Île Put-in-Bay, et rive Ohio.

LEMNACÉES (FAMILLE DES LENTICULES.)

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. (Greater duckweed.) GRANDE LENTICULE.

Commune à la pointe Pelée dans les fossés et les remous du grand marais. Rive Ohio.

Lemna trisulca L. (Ivy-leaved duckweed.) LENTICULE PROLIFÈRE.
Sur l'eau et dans l'eau autour de l'île Put-in-Bay, et sur la rive Ohio.

Lemna minor L. (Lesser duckweed.) LENTICULE MINEURE.

Couvre souvent les eaux stagnantes du grand marais de la pointe Pelée, aussi autour des îles et le long de la rive Ohio.

Wolffia columbiana Karst. (Columbia Wolffia.) WOLFFIE DE LA COLOMBIE.

Le long de la rive Ohio.

Wolffia punctata Griseb. (Brazil wolffia.) WOLFFIE DU BRÉSIL.
Rive Ohio.

COMMÉLINACÉES. (Spiderwort family) ÉPHÉMÉRINES.

Tradescantia reflexa Raf. (Reflexed spidewort.) ÉPHÉMÉRINE RÉFLEXE.

Rive Ohio.

Tradescantia virginiana L. (Spidewort.) ÉPHÉMÉRINE DE VIRGINIE.
Fréquente sur la rive Ohio.

PONTÉDÉRIACÉES (PONTÉDÉRIES.)

Pontederia cordata L. (Pickerel weed.) PONTÉDÉRIE À FEUILLES CORDÉES.

Fréquente dans les eaux peu profondes des étangs et des petits lacs du grand marais de la pointe Pelée. Îles, et rive Ohio.

Heteranthera dubia (Jacq.) MacM. (Water star grass.) LEPTANDRE À FEUILLES GRAMINÉES.

Dans l'eau tranquille autour des îles et sur la rive Ohio.

JUNDACEAE JONCÉES JONCS.

Juncus bufonius L. (Toad rush.) JONC CRAPAUD.

Commun à la pointe Pelée dans les lieux humides découverts, et sur l'île Pelée.

Juncus tenuis Willd. (Slender rush.) JONC GRÊLE.

Commun à la pointe Pelée autour et près des habitations, le long des routes et des sentiers. Îles et rive Ohio.

Juncus balticus Willd. var. *littoralis* Engelm. (Baltic rush.) JONC DE LA MER BALTIQUE.

Çà et là dans les terrains humides ou secs de la pointe Pelée.

Il ne paraît pas ici servir à retenir les sables. Rive Ohio.

Juncus effusus L. (Common rush.) JONC ÉPAIS. JONC COMMUN.

Çà et là dans les lieux humides et découverts de la pointe Pelée.

Île North-Bass, et rive Ohio.

Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau. (Small-headed rush.)

JONC FAUX-SCIRPE.

Rive Ohio.

Juncus canadensis J. Gay. (Canada rush.) Jonc du Canada.

Çà et là dans les marais de la pointe Pelée. Rive Ohio.

Juncus nodosus L. (Knotted rush.) JONC FAUX-SCIRPE NOUEUX.

Fréquent à la pointe Pelée sur les rebords du grand marais et dans les sables humides autour des étangs et des petits lacs.

Dans les fossés près de Leamington (Burgess.) Rive Ohio.

Juncus acuminatus Michx. (Sharp-fruited rush.) JONC À FRUITS POINTUS.

Près d'Essex Centre et à la pointe Pelée. (Macoun.)

Juncus Torreyi Coville (Torrey's rush.) JONC DE TORREY.

Fréquent dans les lieux bas et humides de la pointe Pelée. Rive Ohio.

Juncus alpinus Vill., var. **insignis** Fries. (Richardson's rush.) JONC DE RICHARDSON.

Çà et là sur la plage sableuse de la pointe Pelée. Île Kelley et rive Ohio.

Luzula saltuensis Fernald. (Hairy wood rush.) LUZULE POILUE.

Fréquente dans les bois clairs et les bosquets de la pointe Pelée.

Luzula campestris (L.) DC., var. **multiflora** (Ehrh.) Celak. (Common wood rush.) LUZULE CHAMPÊTRE, VAR. À FLEURS MULTIPLES.

Çà et là dans les terrains secs découverts de la pointe Pelée.

LILIACÉES.

Zygadenus chloranthus Richards. (Glaucous zygadenus.) ZYGADÈNE GLAUQUE.

Rive Ohio.

Uvularia grandiflora Sm. (Large-flowered bellwort.) UVULAIRE À GRANDES FLEURS.

Fréquente dans les terrains humides et boisés de la pointe Pelée. Îles, et rive Ohio.

Oakesia sessifolia (L.) Wats. (Sessile-leaved bellwort.) UVULAIRE À FEUILLES SESSIBLES.

Commune autour de Windsor.

Allium tricoccum Ait. (Wild leek.) POIREAU SAUVAGE.

Île de la pointe Pelée. Çà et là dans les autres parties du comté d'Essex, et abondant autrefois.

Allium cernuum Roth. (Wild onion.) OIGNON SAUVAGE.

Île Pelée, Newton Tripp, 1913. Îles, et rive Ohio.

Allium canadense L. (Wild garlic.) AIL SAUVAGE.

Abondant dans certains endroits de la pointe Pelée. Près de Colchester. (Macoun.) Île Kelley et rive Ohio.

Hemerocallis fulva L. (Common day lily.) LIS D'UN JOUR.

Mauvaise herbe qui résiste souvent à la culture; bien établie près des habitations de la pointe Pelée. Île North-Bass et rive Ohio.

Lilium philadelphicum L. (Wild orange-red lily.) LIS DE PHILADELPHIE.

Rive Ohio.

Lilium philadelphicum L. var. **andinum** (Nutt.) Ker. (Western red lily.) LIS ROUGE DE L'OUEST.

Dans les endroits sableux découverts le long du rivage du lac St-Clair.

Lilium Canadense L. (Wild yellow lily.) LIS DU CANADA.

Fréquent sur la pointe Pelée et l'île Pelée. Île Kelley.

Erythronium americanum Ker. (Yellow adder's tongue.) ÉRYTHRONE D'AMÉRIQUE.

Commun dans les bois autour de Windsor. Îles et rive Ohio.

Erythronium albidum Nutt. (White adder's tongue.) ÉRYTHRONE À FLEURS BLANCHES.

Dans les bois autour de Windsor. Îles Johnson, Kelley, et Rattlesnake et rive Ohio.

Camassia esculenta (Ker.) Robinson. (Wild hyacinth.) HYACINTHE SAUVAGE.

Île White dans la rivière Détroit. (Macoun.) Sur huit îles, et sur la rive Ohio.

Ornithogalum umbellatum L. (Star of Bethlehem.) BELLE DE JOUR. Île Put-in-Bay.

Asparagus officinalis L. (Garden asparagus.) ASPERGE OFFICINALE. Bien établie à la pointe Pelée dans un sol sableux léger. Îles et rive Ohio.

Smilacina racemosa (L.) Desf. (False spikenard.) SMILACINE À GRAPPES. RAISINETTE.

Commune à la pointe Pelée dans les bois clairs, ou sur les terrains découverts ou légèrement ombragés. Commune sur les îles et la rive Ohio.

Smilacina stellata (L.) Desf. (Star-flowered Salomon's Seal.) SMILACINE ÉTOILÉE.

Commune à la pointe Pelée dans les bois clairs, ou sur le haut du rivage et les lieux sableux découverts. Commune sur les îles et la rive Ohio.

Smilacina trifolia (L.) Desf. (Three-leaved Salomon's seal.) SMILACINE À TROIS FEUILLES.

Fréquente près de Windsor dans les lieux très humides. (F. P. Cravin.)

Maianthemum canadense Desf. (False lily-of-the-valley.) FAUX MUGUET.

Commun dans les terrains secs boisés de pointe Pelée. Rive Ohio.

Streptopus roseus Muhl. (Sessile-leaved twisted stalk.) STREPTOPE ROSE. ROGNON DE COQ.

Dans les bois épais autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Polygonatum biflorum (Walt.) Ell. (Small Salomon seal.) PETIT SCEAU DE SALOMON.

Commun à la pointe Pelée dans les bois clairs et les bocages. Rive Ohio.

Polygonatum commutatum (R. et S.) Dietr. (Great Salomon's seal.) GRAND SCEAU DE SALOMON.

Commun sur la rive nord du lac Érié et le long de la rivière Détroit. Commun sur les îles et la rive Ohio.

Trillium erectum L. (Ill-scented wake robin.) TRILLIE DRESSÉ.
Fréquent autour de Windsor. (F. P. Cravin.) Commun sur les îles et la rive Ohio.

Trillium grandiflorum (Michx.) Salisb. (Large flowered wake robin.) TRILLIE À GRANDES FLEURS.

Fréquent sur la pointe Pelée dans les bois clairs et les bocages.
Commun sur les îles et la rive Ohio.

Aletris farinosa L. (Colic root.) MÉDÉOLE FARINEUX.
Dans les bosquets sur sol sableux près de Leamington. (Burgess.)
Commun près de Sandwich. (Macoun.)

Smilax herbacea L. (Carrion flower.) SMILACE HERBACÉ.
Fréquent à la pointe Pelée dans les bois clairs; sur l'île Pelée et dans tout le comté d'Essex. Rive Ohio.

Smilax ecirrhata (Engelm.) Wats. (Upright smilax.) SMILACE À TIGE DROITE.

Fréquent à la pointe Pelée dans les bois riches et les bosquets.
Île Kelley et rive Ohio.

Smilax rotundifolia L. (Common green briar.) SMILACE À FEUILLES RONDES.

Île Put-in-Bay et rive Ohio.

Smilax rotundifolia L., var. **quadrangularia** (Muhl.) Wood
(Square-stemmed green briar.) SMILACE À TIGE CARRÉE.

Dans les bois humides de la pointe Pelée. (Macoun.) Dans les buissons près de Leamington. (Burgess.)

Smilax hispida Muhl. (Hispid green briar.) SMILACE HISPIDE.
Commun à la pointe Pelée dans les bosquets humides. Îles et rive Ohio.

DIOSCORÉES (FAMILLE DES IGNAMES.)

Dioscorea villosa L. (Wild yam root.) IGNAME VELUE.

Abondante à la pointe Pelée dans les bois et les bosquets et sur l'île Pelée. Rive Ohio. Porte aussi le nom de *D. paniculata* Michx. d'après le Bulletin 89, Département de l'Agriculture des États-Unis, Service de la Botanique industrielle.

AMARYLLIDÉES (FAMILLE DES AMARYLLIS.)

Hypoxis hirsuta (L.) Coville. HYPOXIDE HIRSUTE.

Commun dans les gazons autour de Windsor. (F. P. Cravin.) Rive Ohio.

IRIDÉES (FAMILLE DES IRIS.)

Iris versicolor L. (Large blue flag.) IRIS VERSICOLE. CLAJEUX.
Sur les rebords du grand marais de la pointe Pelée et autres lieux humides découverts.

Sisyrinchium angustifolium Mill. (Northern blue-eyed grass.)
BERMUDIENNE À FEUILLES ÉTROITES.

Fréquente autour de Windsor. Rive Ohio.

Sisyrinchium gramineum Curtis. (Common blue-eyed grass.) BER-
MUDIENNE ANTICIPÉE.

Çà et là autour de Windsor. Rive Ohio.

ORCHIDACÉES (FAMILLE DES ORCHIDÉES.)

Cypripedium parviflorum Salisb., var. **pubescens** (Willd.) Knight.
(Larger yellow lady's slipper.) CYPRIPEDE PUBESCENT.
Rive Ohio.

Habenaria flava (L.) Gray. (Tuberclod orchis.) ORCHIS JAUNE.
Sur la pointe Cedar, et la rive Ohio.

Habenaria ciliaris (L.) R. Br. (Yellow fringed orchis.) ORCHIS À LA-
BELLE CILIÉ.

Dans les terrains sableux près de Leamington (Burgess.) Près
de Windsor. (F. P. Cravin.)

Habenaria psychodes (L.) Sw. (Smaller purple fringed orchis.)
ORCHIS FIMBRIÉ.

Pointe Cedar, rive Ohio.

Pogonia ophioglossoides (L.) Ker. (Rose pogonia.) POGONIE ROSE.
Fréquente dans les gazons humides autour de Windsor (F. P.
Cravin.)

Spiranthes cernua (L.) Richard. (Nodding ladies' tresses.) SPI-
RANTHE PENCHÉE.

Commun le long de la rive nord du lac Érié.

Epipactis pubescens (Willd.) A. A. Eaton. (Downy rattlesnake
plantain.) ÉPIPACTIS PUBESCENTE.

Dans les bois riches près de Windsor. (F. P. Cravin.)

Corallorrhiza maculata Raf. (Large coral root.) CORALLORHIZE
TACHÉE.

Rive Ohio.

Liparis Loeselli (L.) Richard. (Fen orchis.) LIPARIS DE LOESEL.
Pointe Cedar, rive Ohio.

Aplectrum hyemale (Muhl.) Torr. (Putty root.) APLECTRUM D'HIVER.
Rive Ohio.

PIPÉRACÉES ou SAURURÉES PROV.

Saururus cernuus L. (Lizard's rail.) SAURURE PENCHÉ.

Dans les lieux humides près de la rivière Détroit en aval d'Amherstburg (MacLagan.)

SALICINÉES (FAMILLE DES SAULES.)

Salix nigra Marsh. (Black Willow.) SAULE NOIR.

Fréquent à la pointe Pelée dans les endroits humides et au rebord des bois, et parfois sur la plage. Ne forme ordinairement que des buissons. Îles, et rive Ohio.

Salix amygdaloides Anders. (Peach-leaved Willow.) SAULE À FEUILLES DE PÊCHER.)

Fréquent à la pointe Pelée dans les endroits découverts et humides et parfois le long de la "langue de terre." Abondant sur l'île Pelée.

Salix pentandra L. (Bay-leaved Willow.) SAULE À FEUILLES DE LAURIER.

Parfois planté, mais n'a pas été trouvé à l'état sauvage.

Salix lucida Muhl. (Shining willow.) SAULE BRILLANT.

Çà et là à l'extrémité nord de la pointe Pelée. Sur les îles Hen et Put-in-Bay, et sur la rive Ohio.

Salix alba L. (White willow.) SAULE BLANC.

Souvent planté et s'étendant apparemment sur la pointe Pelée et sur l'île Pelée.

Salix alba L., var. **vitellina** (L.) Koch. (White willow.) SAULE JAUNE. OSIER DORÉ.

Îles, et rive Ohio.

Salix babylonica L. (Weeping willow.) SAULE PLEUREUR.

Plantés en abondance et alignés le long des routes près du lac St. Clair. Ne paraît pas s'étendre.

Salix longifolia Muhl. (Sand bar willow.) SAULE À FEUILLES LONGUES.

Çà et là sur la pointe Pelée dans les terrains humides découverts près du grand marais, et sur les sables humides de la plage ou des environs. Commun sur les îles et la rive Ohio.

Salix cordata Muhl. (Heart-leaved willow.) SAULE À FEUILLES CORDÉES.

Fréquent sur l'île Pelée et les autres îles et sur la rive Ohio.

Salix glaucophylla Bebb. (Broad-leaved willow.) SAULE À FEUILLES GLAUQUES.

Sur la pointe Cedar et la rive Ohio.

Salix balsamifera Bebb. (Balsam willow.) SAULE BAUMIER.
On dit qu'il se trouve dans le comté de Kent, et il devrait y en avoir dans le comté d'Essex.

Salix pedicellaris Pursh. (Bag willow.) SAULE À FRUITS STIPITÉS.
Dans les lieux très humides autour de Windsor.

Salix discolor Muhl. (Glaucous willow.) SAULE DISCOLORE.
Çà et là sur l'île Pelée. Île Hen et rive Ohio.

Salix discolor Muhl., var. **eriocephala** (Michx.) Anders. (Glaucous Willow.) SAULE À FEUILLES D'APALANCHE.
Rive Ohio.

Salix petiolaris Sm. SAULE À CHATONS PÉDICELLÉS.
Terrains humides autour de Windsor.

Salix humilis Marsh. (Prairie willow.) SAULE HUMBLE.
Dans les terrains secs découverts autour de Windsor.

Salix sericea Marsh. (Silky willow.) SAULE GRIS.
Lieux marécageux près de Windsor.

Salix rostrata Richards. (Bebb's willow.) SAULE À ÉPERON.
Fréquent sur l'île Pelée. Autres îles et rive Ohio.

Salix candica Flugge. (Sage willow.) SAULE BLANCHÂTRE.
Terrains marécageux et découverts près de Windsor.

Salix purpurea L. (Purple willow.) SAULE POURPRE.
Dans les terrains humides et découverts de la pointe Pelée, près des édifices de pêcheries de Grubb. Îles Kelley et Put-in-Bay et rive Ohio.

Populus alba L. (White poplar.) PEUPLIER BLANC.
Çà et là sur la pointe Pelée; arbre planté et s'étendant par ses racines. Île Put-in-Bay et rive Ohio.

Populus tremuloides Michx. (American aspen.) PEUPLIER FAUX-TREMBLE.

Fréquent sur la pointe Pelée, mais abondant nulle part. Îles.

Populus grandidentata Michx. (Large-toothed aspen.) GRAND TREMBLE.

Çà et là sur la pointe Pelée et l'île Pelée. Île Put-in-Bay et rive Ohio.

Populus balsamifera L. (Balsam poplar) (Balm of Gilead.) PEUPLIER BAUMIER.

Petits arbres remarquables sur les terrains secs découverts de la Pointe Pelée et le long du bord supérieur de la berge ouest. Rive Ohio.

Populus deltoides Marsh. (Cottonwood.) LIARD.

Plusieurs grands arbres le long de la "langue de terre" et, avec d'autres arbres, sur les terrains riches de la pointe Pelée. Commun sur les îles et la rive Ohio.

Populus nigra L., var. **italica** Du Roi. (Lombardy poplar.) PEUPLIER D'ITALIE.

Planté çà et là sur la pointe Pelée et s'étendant par ses racines.

JUGLANDÉES (FAMILLE DES NOYERS.)

Juglans cinera L. (Butternut.) NOYER TENDRE.

Çà et là avec d'autres arbres sur les terrains secs de la pointe Pelée. Fréquent le long de la rive nord du Lac Érié. Rive Ohio.

Juglans nigra L. (Black walnut.) NOYER NOIR.

Abondant à la pointe Pelée où il croît dans le sable pur, et surtout le long de la "langue de terre." Très commun sur la rive nord du lac Érié et sur l'île Pelée. Autrefois sur les îles Kelley et Middle-Bass. Rive Ohio.

Carya ovata (Mill.) K. Koch. (Shagbark hickory.) CARYER ÉCAILLEUX.

Çà et là sur la pointe Pelée et près du lac St.-Clair. Abondant sur les îles et la rive Ohio.

Carya laciniosa (Michx.) Loud. (Big shell bark.) CARYER LACINIÉ.

Près de Colchester et probablement dans tout le comté d'Essex. Rive Ohio.

Carya alba (L.) K. Koch. (*C. tomentosa* Nutt.) (Mocker nut.) CARYER À CŒUR BLANC.

Très commun à la pointe et l'île Pelée. Île Put-in-Bay.

Carya microcarpa Nutt. (Small-fruited hickory.) CARYER À PETITS FRUITS.

Très abondant le long de la rive nord du lac Érié, et probablement dans le comté d'Essex. Île Pelée.

Carya glabra (Mill.) Spach. (Pignut hickory. Brown hickory.) CARYER GLABRE.

Près d'Amherstburg. Îles et rive Ohio.

Carya cordiformis (Wang.) K. Koch. (*C. amara* Nutt.) (Bitternut.) NOYER DUR.

Fréquent sur la Pointe et l'île Pelée. Rive Ohio.

BÉTULACÉES (FAMILLE DES BOULEAUX.)

Corylus americana Walt. (Common hazelnut.) COUDRIER D'AMÉRIQUE.

Çà et là sur la pointe Pelée à l'orée des bois et sur l'île Pelée. N'a pas été remarqué sur les autres îles. Rive Ohio.

Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch. (Ironwood.) OSTRYER DE VIRGINIE.

Commun sur la pointe Pelée, avec d'autres arbres dans les terrains riches. Îles et rive Ohio.

Carpinus caroliniana Walt. (Blue beech.) CHARME DE LA CAROLINE.

Peu fréquent sur la pointe Pelée, mais commun le long de la rive nord du lac Érié. Probablement dans tout le comté d'Essex.

Le long du lac St-Clair. Autrefois sur l'île Kelley.

Betula lutea Michx. f. (Yellow birch.) MERISIER BLANC.

Près de Kingsville, et plus à l'ouest le long de la rive nord du lac Érié.

Alnus incana (L.) Moench. (Speckled alder.) AULNE GRISÂTRE.

Dans les lieux humides près du lac St-Clair. Apparemment peu fréquent.

FAGACÉES (FAMILLE DES HÊTRES.)

Fagus grandifolia Ehrh. (Beech.) HÊTRE.

Nous ne l'avons pas rencontré sur la pointe Pelée, mais il est commun le long de la rive nord du lac Érié jusqu'à la rivière Détroit. Autrefois sur les îles Put-in-Bay et Middle Bass.

Castanea dentata (Marsh.) Borkh. (Chestnut.) CHÂTAIGNIER D'AMÉRIQUE.

Fréquent le long de la rive nord du lac Érié jusqu'à la rivière Détroit. Il y a encore de beaux arbres de cette espèce dans les bois autour de Windsor.

Quercus alba L. (White oak.) CHÊNE BLANC.

Nous ne l'avons pas rencontré sur la pointe Pelée, mais il est commun sur l'île Pelée. Sans doute dans tout le comté d'Essex. Sur les autres îles et sur la rive Ohio.

Quercus macrocarpa Michx. (Bur oak.) CHÊNE À GROS GLANDS.

Fréquent sur la pointe Pelée, avec d'autres arbres dans les terrains riches. Îles et rive Ohio.

Quercus bicolor Willd. (Swamp white oak.) CHÊNE PRIN BICOLORE.

Ça et là sur la pointe Pelée, avec d'autres arbres dans les terrains riches, et sur l'île Pelée, la rive du lac Érié, l'île Kelley et la rive Ohio.

Quercus Muhlenbergii Engelm. (Chestnut oak.) CHÊNE CHÂTAIGNIER.

Fréquent sur la pointe Pelée avec d'autres arbres, et le long de la rive du lac Érié. Îles et rive Ohio.

Quercus prinoides Willd. (Scrub Chesnut Oak.) CHÊNE CHÂTAIGNIER NAIN.

Remarqué par Thomas Burgess à la pointe Pelée.

Quercus rubra L. (Red oak.) CHÊNE ROUGE.

Très commun à la pointe Pelée où il est mêlé avec d'autres arbres, soit sur des terrains secs soit sur des terrains humides et riches. Commun sur les îles et la rive Ohio.

Quercus palustris Muench. (Pin oak.) CHÊNE PALUSTRE.

Près de Leamington (Burgess). Rive Ohio. Forme de beaux arbres autour de Windsor.

Quercus coccinea Muench. (Scarlet oak.) CHÊNE ÉCARLATE.

Fréquent sur les terrains secs autour de Windsor (F. P. Cravin.) Rive Ohio.

Quercus velutina Lam. (Yellow oak.) CHÊNE À ÉCORCE JAUNE. QUERCITRON.

Fréquent dans les terrains secs de la pointe Pelée mêlé à d'autres arbres. Îles Kelley et Put-in-Bay, et rive Ohio.

Quercus imbricaria Michx. (Laurel oak.) CHÊNE LAURIER.

Abondant sur la pointe Cedar, Rive Ohio.

URTICÉES (FAMILLE DES ORTIES.)

Ulmus fulva Michx. (Slippery elm.) ORME ROUGE.

Ça croît sur la pointe Pelée dans les terrains riches et mêlé à d'autres arbres. Très abondant sur l'île Pelée. Sur les autres îles et sur la rive Ohio.

Ulmus americana L. (American Elm.) ORME D'AMÉRIQUE.

Abondant à la pointe Pelée dans les terres riches et mêlé à d'autres arbres. Commun sur les îles et la rive Ohio.

Ulmus racemosa Thomas (Rock elm.) ORME À GRAPPE.

Fréquent autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Celtis occidentalis L. (Sugarberry.) (American nettle tree.) MI-COCOULIER OCCIDENTAL.

Abondant dans les terrains sableux de la pointe Pelée, surtout le long de la langue de terre. Rive du lac Érié et le long de la rivière Détroit. Commun sur les îles et la rive Ohio.

Canabis sativa L. (Hemp.) CHANVRE CULTIVÉ.

Très abondant sur la pointe Pelée où il croît sur les terrains secs et ombragés à l'état sauvage. Île pointe Pelée.

Humulus lupulus L. (Common hop.) HOUBLON COMMUN.

Remarqué sur la pointe Pelée et sur l'île pointe Pelée.

Maclura pomifera (Raf.) Schneider. (Osage orange.) MACLURE ÉPINEUX.

Employé souvent dans les haies du comté d'Essex, mais ne s'étend probablement pas à l'état sauvage.

Morus rubra L. (Red mulberry.) MÔRIER ROUGE.

On dit qu'il était autrefois abondant sur la pointe Pelée, mais nous n'en avons remarqué que quelques arbres en 1911. Abondant et formant souvent de gros arbres sur l'île Pelée. Fréquent le long de la rive nord du lac Érié. Sur les autres îles et la rive Ohio.

Urtica gracilis Ait. (Slender nettle.) ORTIE GRÊLE.

Commune sur la pointe Pelée au rebord du grand marais, le long des "arrows" et dans les autres lieux humides et ombragés. Commune sur les îles et la rive Ohio.

Laportea canadensis (L.) Gaud. (Wood nettle.) ORTIE DU CANADA.

Commune dans les bois riches de la pointe Pelée. Aussi commune sur les îles et la rive Ohio.

Pilea pumila (L.) Gray. (Richweed.) ORTIE NAIN.

Abondante dans les endroits humides ombragés de la pointe Pelée. Île Kelley et rive Ohio.

Boehmeria cylindrica (L.) Sw. (Wild false nettle.) BOEHMÉRIE CYLINDRIQUE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les lieux découverts ou légèrement ombragés. Commune sur les îles et la rive Ohio.

Parietaria pensylvanica Muhl. (Pennsylvania pellitory.) PARIÉTAIRE DE PENNSYLVANIE.

Abondante à la pointe Pelée sous les cèdres rouges et les autres arbres. Abondante sur les îles et la rive Ohio.

SANTALACÉES.

Comandra umbellata (L.) Nutt. (Bastard toad flax.) COMANDRE EN OMBELLE.

Fréquente sur la pointe Pelée dans les terrains sableux découverts ou ombragés et sur l'île Pelée. Rive Ohio.

ARISTOLOCHIACÉES.

Asarum canadense L. (Wild ginger.) ASARET DU CANADA.

Dans les terrains riches ombragés le long de la rivière Détroit.

POLYGONACÉES (FAMILLE DES SARRASINS.)

Rumex britannica L. (Great water dock.) RUMEX BRITANNIQUE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les limites et autour du grand marais, et sur l'île Pelée. Pointe Cedar, rive Ohio.

Rumex crispus L. (Yellow dock.) PATIENCE CRÉPUE.

Ça et là sur la pointe Pelée autour des habitations et dans les champs abandonnés. Abondante sur les îles et la rive Ohio.

Rumex altissimus Wood. (Pale dock.) RUMEX PÂLE.

Île Put-in-Bay.

Rumex verticillatus L. (Swamp dock.) RUMEX DES MARAIS.

Çà et là sur la pointe Pelée dans les lieux découverts et très humides. Rive Ohio.

Rumex obtusifolius L. (Bitter dock.) RUMEX À FEUILLES OBTUSES.

Autour des habitations et dans les champs rarement cultivés de la pointe Pelée. Commun sur les îles et la rive Ohio.

Rumex acetosella L. (Field sorrel.) OSEILLE DES CHAMPS.

Çà et là sur la pointe Pelée autour des habitations et dans les champs abandonnés. Îles Put-in-Bay et Kelley, et la rive Ohio.

Polygonum aviculare L. (Knot grass.) TRAINASSE.

Commune à la pointe Pelée autour des habitations et dans les endroits non cultivés. Abondante sur les îles et la rive Ohio.

Polygonum aviculare L., var. **littorale** (Link) Koch. (Shore knotweed.) RENOUÉE AVICULAIRE DES RIVAGES.

Île Kelley.

Polygonum erectum L. (Erect knotweed.) RENOUÉE DRESSÉE.

Çà et là autour des habitations de la pointe Pelée. Commune sur les îles et la rive Ohio.

Polygonum tenue Michx. (Slender knotweed.) RENOUÉE GRÊLE.

Rive Ohio.

Polygonum lapathifolium L. (Dock-leaved persicaria.) RENOUÉE À FEUILLES DE PATIENCE.

Commune sur la pointe Pelée sur les rebords des grands fossés et dans les autres lieux humides du grand marais, et sur l'île Pelée. Rive Ohio.

Polygonum tomentosum Schrank. (Slender pink persicaria.) RENOUÉE GRÊLE ROSÉE.

Fréquente à la pointe Pelée le long des rebords du grand marais, et çà et là comme mauvaise herbe près des habitations. Rive Ohio.

Polygonum amphibium L. (Water persicaria.) RENOUÉE AMPHIBIE.

Fréquente à la pointe Pelée le long des fossés et dans les lieux humides dans les limites et autour du grand marais, et sur l'île Pelée. Rive Ohio.

Polygonum Muhlenbergii (Meisn.) Wats. (Swamp persicaria.) RENOUÉE DE MUHLENBERG.

Commune à la pointe Pelée dans les lieux très humides du grand marais. Îles et rive Ohio.

Polygonum pensylvanicum L. (Pennsylvania persicaria.) **RENOUÉE DE PENNSYLVANIE.**

Fréquente à la pointe Pelée dans les gazons humides. Le long de la rivière Détroit (Maclagan.) Îles Kelley et Middle-Bass, et rive Ohio.

Polygonum hydropiper L. (Common smartweed.) **POIVRE D'EAU.**

Fréquente à la pointe Pelée dans les endroits humides découverts ou légèrement ombragés. Communs sur les îles et la rive Ohio.

Polygonum acre HBK. (Water smartweed.) **RENOUÉE ÂCRE.**

Abondante à la pointe Pelée sur les rebords du grand marais et le long de la "langue de terre" et dans les autres lieux humides. Îles et rive Ohio.

Polygonum orientale L. (Prince's feather.) **RENOUÉE D'ORIENT.**

Remarquée à l'état sauvage près des habitations de la pointe Pelée et paraissant persistante.

Polygonum persicaria L. (Lady's thumb.) **RENOUÉE PERSICAIRE. PILINGRE.**

Çà et là autour des habitations de la pointe Pelée et souvent abondante sur le rebord des fossés. Abondante sur les îles et la rive Ohio.

Polygonum hydropiperoides Michx. (Wild water pepper.) **RENOUÉE DOUCE.**

Çà et là sur la pointe Pelée dans les lieux humides et ombragés. Île Kelley.

Polygonum virginicum L. (Virginia Knotweed.) **RENOUÉE DE VIRGINIE.**

Dans les bois riches de la pointe Pelée. Rive Ohio.

Polygonum sagittatum L. (Arrow-leaved tear-thumb.) **RENOUÉE SAGITTÉE.**

Çà et là sur la pointe Pelée dans les terrains bas découverts ou ombragés et dans les lieux humides le long de la rive nord du lac Érié. Rive Ohio.

Polygonum convolvulus L. (Black bindweed.) **LISERON NOIR.**

Fréquent à la pointe Pelée comme mauvaise herbe dans les jardins et les champs cultivés. Commune sur les îles et la rive Ohio.

Polygonum scandens L. (Climbing false buckwheat.) **RENOUÉE GRIMPANTE.**

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains riches ombragés et sur l'île Pelée. Sur les autres îles et la rive Ohio.

Polygonum dumetorum L. (Copse buckwheat.) **RENOUÉE GRIMPANTE DES BUISSONS.**

Rive Ohio.

Fagopyrum esculentum Moench. (Buckwheat.) SARRASIN.

CHÉNOPODÉES (FAMILLES DES ANSÉRINES.)

Cycloloma atriplicifolium (Spreng) Coult. (Winged pigweed.)
TERRE-NOIX AILÉE.

Dans les terrains sableux près de Windsor. Pointe Cedar, rive Ohio.

Chenopodium ambrosioides L. (Mexican tea.) ANSÉRINE AMBROISIE.

Dans les champs cultivés et environs, le long de la rivière Détroit.

Chenopodium batrys L. (Jerusalem oak.) ANSÉRINE AROMATIQUE.
Çà et là dans les terrains secs sableux de la pointe Pelée. Île Kelley et rive Ohio.

Chenopodium capitatum (L.) Asch. (Strawberry blite.) ARROCHE-FRAISE.

Îles Middle-Bass et Green.

Chenopodium hybridum L. (Maple-leaved goosefoot.) ANSÉRINE HYBRIDE.

Remarquée sur la pointe Pelée comme plante nuisible dans les jardins et les champs cultivés. Îles et rive Ohio.

Chenopodium album L. (Lamb's quarters.) ANSÉRINE BLANCHIE.
CHOU GRAS.

Commune dans les jardins, les champs cultivés et les terrains non employés, à la pointe Pelée. Commune sur les îles et la rive Ohio.

Chenopodium album L., var. **viride** (L.) Moq. (Pigweed.) ANSÉRINE VERTE.

Commune sur les îles et la rive Ohio.

Chenopodium urbicum L. (Upright goosefoot.) ANSÉRINE DES VILLES.

Île Kelley.

Chenopodium Boscianum Moq. (Bosc's goosefoot.) ANSÉRINE DE BOSC.

Dans les bosquets sur terrains sableux près de la pointe Pelée. (Macoun.) Île Kelley.

Chenopodium leptophyllum Nutt. (Narrow-leaved goosefoot.) ANSÉRINE À FEUILLES ÉTROITES.

Terrains sableux boisés de la pointe Pelée (Burgess.)

Atriplex patula L., var **hastata** (L.) Gray. (Halberd-leaved Orache.)
ARROCHE À FEUILLES EN HALLEBARDE.

Çà et là sur la pointe Pelée comme mauvaise herbe autour des habitations. Rive Ohio.

Salsola kali L., var. **tenuifolia** G. F. W. Mey. (Russian thistle.)
CHARDON DE RUSSIE.

Çà et là sur la pointe Pelée comme mauvaise herbe autour des habitations.

AMARANTACÉES (FAMILLE DES AMARANTES.)

Amaranthus retroflexus L. (Amaranth pigweed.) AMARANTE RE-
PLIÉE.

Mauvaise herbe commune dans les jardins et les champs cultivés de la pointe Pelée. Commune sur les îles et la rive Ohio.

Amaranthus hybridus L. (Green amaranth.) AMARANTE VERTE.
Remarquée près de Leamington par Dearness. Commune sur les îles.

Amaranthus paniculatus L. (Purple amaranth.) AMARANTE
POURPRE.
Îles.

Amaranthus graecizens L. (Tumble weed.) AMARANTE GRECQUE.
Çà et là sur la pointe Pelée comme mauvaise herbe dans les champs sableux cultivés. Îles et rive Ohio.

Amaranthus blitoides Wats. (Prostrate amaranth.) AMARANTE
FAUSSE-BLITE.

Çà et là sur la pointe Pelée comme mauvaise herbe autour des habitations et dans les jardins. Îles et rive Ohio.

Acnida tuberculata Moq. (Western water hemp.) ACNIDE À FEUIL-
LES DE CHANVRE.

Sur les îles Kelley et Middle-Bass et la rive Ohio.

PHYTOLACCÉES (FAMILLE DES PHYTOLACQUES.)

Phytolacca decandra L. (Common poke.) PHYTOLACQUE COMMUNE.
Commune à la pointe Pelée dans les terrains sableux ombragés.
Le long de la rivière Détroit (Maclagan.) Îles et rive Ohio.

NYCTAGINÉES (FAMILLE DES NYCTAGES.)

Axybaphus nyctaginus (Michx.) Sweet. (Heart-leaved umbrella-
wort.) NYCTAGE PARASOL.

Le long des chemins de fer près de Windsor. Pointe Cedar, rive Ohio.

ILLÉCÉBRÉES.

Anychia polygonoides Raf. (Slender forked chickweed.) ANYCHIE
FAUSSE RENOUÉE. MOURON GRÈLE.

Île Put-in-Bay.

Anychia canadensis (L.) BSP. (Forked chickweed.) ANYCHIE DU CANADA.

Près d'Amherstburg. (Macoun.) Rive Ohio.

AIZOACÉES (FAMILLE DE MOLLUGINES.)

Mollugo verticillata L. (Carpet weed.) MOLLUGINE VERTICILLÉE.

Çà et là sur la pointe Pelée dans les terrains sableux découverts, et sur l'île Pelée.

CARYOPHYLLÉES (FAMILLE DES OEILLETS.)

Arenaria lateriflora L. (Blunt-leaved sandwort.) SABLINA LATÉ-RIFLORE.

Rive Ohio.

Arenaria serpyllifolia L. (Thyme-leaved sandwort.) SABLINA À FEUILLES DE THYM.

Fréquente sur la pointe Pelée sur les terrains secs découverts près des habitations. Îles et rive Ohio.

Arenaria stricta Michx. (Rock sandwort.) SABLINA DROUE.

Çà et là sur la pointe Pelée dans les terrains sableux découverts et souvent sur le haut du rivage. Îles et rive Oh.

Stellaria longifolia Muhl. (Long-leaved stitchwort.) STELLAIRE À LONGUES FEUILLES.

Fréquente à la pointe Pelée dans les gazons humides, et abondante en formes de talles dans le grand marais. Île Pelée. Rive Ohio.

Stellaria media (L.) Cyrill. (Common chickweed.) MOURON BLANC.

Commun sur la pointe Pelée comme mauvaise herbe de jardins et des champs. Abondant sur les îles et la rive Ohio.

Cerastium arvense L., var. **oblongifolium** (Torr.) Hollick et Britton. (Field mouse-ear chickweed.) CÉRAISTE DES CHAMPS À FEUILLES OBLONGUES.

Dans les terrains sableux de la pointe Pelée, où il forme une mauvaise herbe autour des habitations dans les jardins et les champs en culture. Sur l'île Pelée. Autres îles, et rive Ohio. Près d'Amherstburg.

Cerastium vulgatum L. (Common mouse-ear chickweed.) CÉRAISTE COMMUN.

Mauvaise herbe occasionnelle autour des habitations sur la pointe Pelée dans les jardins et les champs cultivées. Îles et rive Ohio.

Cerastium nutans Raf. (Nodding chickweed.) CÉRAISTE NUTANT.

Çà et là sur la Pointe Pelée dans les terrains sableux et découverts le long de la "langue de terre," Près d'Amherstburg. Îles et rive Ohio.

Agrostemna githago L. (Common cockle.) NIELLE DES CHAMPS.
Çà et là sur la pointe Pelée autour des habitations et dans les
endroits retirés, et sur l'île Pelée. Île Kelley et rive Ohio.

Lychnis alba, Mill. (White campion.) LYCHNIDE BLANCHE.
FLOQUET.

Le long des routes et dans les vieux champs cultivés près de
Windsor.

Silene antirrhina L. (Sleepy catchfly.) SILÈNE MUFLIER.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains sableux découverts
et sur l'île Pelée. Île Kelley et rive Ohio.

Silene dichotoma Ehrh. (Forked catchfly.) SILÈNE FOURCHUE.
Rive Ohio.

Silene noctiflora L. (Night flowering catchfly.) SILÈNE NOCTIFLORE.
Çà et là à la pointe Pelée autour des habitations et dans les
anciens champs.

Silene virginica L. (Fire pink.) SILÈNE DE VIRGINIE.

Îles Put-in-Bay, Kelley, Hartshorn, et Johnson, et rive Ohio.

Silene latifolia (Mill.) Britten et Rendle. (Bladder Campion.) SI-
LÈNE ENFLÉE.

Île Kelley.

Saponaria officinalis L. (Bouncing bet.) SAPONAIRE OFFICINALE.
Abondante à Pointe Pelée dans les terrains sableux découverts.
Îles et rive Ohio.

Dianthus barbatus L. (Sweet william.) OEILLET DU POÈTE. JA-
LOUSIE.

Fréquente autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

PORTULACÉES (FAMILLE DES POURPIERS.)

Claytonia virginica L. (Spring beauty.) CLAYTONIE DE VIRGINIE.
Commune à la pointe Pelée dans les terrains riches couverts de
bois ou de bosquets. Le long de la rivière Détroit. Îles et
rive Ohio.

Portulaca oleracea L. (Common Purslane.) POURPIER COMMUN.
Mauvaise herbe commune à la pointe Pelée dans les jardins
sableux et les champs.

CÉRATOPHYLLÉES (FAMILLE DES CORNIFLES.)

Ceratophyllum demersum L. (Hornwort.) CORNIFLE SUBMERGÉ.
Dans les étangs et les rivières basses près de la rivière Détroit.
(Maclagan.) Île Put-in-Bay.

NYMPHÉACÉES (FAMILLE DES NÉNUPHARS.)

Nymphaea advena Ait. (Yellow water lily.) NÉNUPHAR.

Autour des étangs et des petits lacs et dans les endroits très humides du grand marais à la pointe Pelée, et sur l'île Pelée. Autour de l'île Middle-Bass.

Nymphaea advena Ait., var. **variegata** (Engelm.) Fernald. (Variegated yellow water lily.) NÉNUPHAR VARIÉ.

Dans la baie Sandusky, rive Ohio.

Castalia tuberosa (Paine) Greene. (White water lily.) CASTALIE BLANCHE.

Commune dans les grands fossés, dans les étangs et les petits lacs du grand marais. Rare sur la rive Ohio.

Nelumbo lutea (Willd.) Pers. (Yellow Nelumbo.) NÉLUMBO JAUNE.

Abondant dans la baie Sandusky, rive Ohio.

Brasenia Schreberi Gmel. (Water shield.) BRASÉNIE DE SCHREBER.

Fréquente à la pointe Pelée dans les étangs et les petits lacs du grand marais. Rare sur la rive Ohio.

RENONCULACÉES (FAMILLE DES RENONCULES.)

Ranunculus circinatus Sibth. (Stiff water crowfoot.) RENONCULE CIRCINÉE.

Fréquente dans les eaux stagnantes sur l'île Pelée. Dans les lieux humides le long de la rive nord du lac Érié.

Ranunculus delphinifolius Torr. (Yellow water crowfoot.) RENONCULE JAUNE.

Çà et là à la pointe Pelée dans les fossés et les lieux humides. Îles et rive Ohio.

Ranunculus sceleratus L. (Cursed crowfoot.) RENONCULE SCÉLÉRATE.

Fréquente à la pointe Pelée sur les rebords du grand marais. Îles et rive Ohio.

Ranunculus abortivus L. (Small-flowered crowfoot.) RENONCULE ABORTIVE.

Commune à la pointe Pelée dans les bois riches et les bocages. Îles et rive Ohio.

Ranunculus recurvatus Poir. (Hooded crowfoot.) RENONCULE À CALICE RECOURBÉ.

Fréquente à la pointe Pelée dans les bois clairs et les bosquets et sur l'île Pelée.

Ranunculus fascicularis Muhl. (Early crowfoot.) RENONCULE FASCICULÉE.

Près de la rivière Détroit au-dessous d'Amherstburg. Île Johnson et Kelley, et rive Ohio.

Ranunculus septentrionalis Poir. (Swamp buttercup.) RENON-
CULE SEPTENTRIONALE.

Çà et là à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts
ou ombragés. Îles Put-in-Bay et Kelley, et rive Ohio.

Ranunculus hispidus Michx. (Hispid buttercup.) RENONCULE
HISPIDE.

Trouvée, paraît-il dans les lieux humides le long de la rivière
Détroit.

Ranunculus repens L. (Creeping buttercup.) RENONCULE COU-
CHÉE.

Fréquente autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Ranunculus pensylvanicus L.f. (Bristly crowfoot.) RENONCULE
DE PENNSYLVANIE.

Dans les gazons humides le long de la rive nord du lac Érié.
Rive Ohio.

Ranunculus acris L. (Tall crowfoot.) RENONCULE ÂCRE. MAR-
GUERITE JAUNE.

Remarquée autour de Leamington et Windsor. Île Put-in-Bay.

Thalictrum dioicum L. (Early meadow rue.) FIGAMON DIOÏQUE.
Abondant à la pointe Pelée dans les terrains ombragés le long de la
"langue de terre" et dans les bois riches. Îles et rive Ohio.

Thalictrum dasycarpum Fisch et Lall. (Purplish meadow rue.)
FIGAMON DIOÏQUE PURPURIN.

Commun à la pointe Pelée le long de la "langue de terre" et dans
les bois riches. Rive Ohio.

Thalictrum meadowum Muhl. (Tall meadow rue.) FIGAMON DU
CANADA. FAUX FIGAMON.

Rive Ohio.

Anemonella thalictroides (L.) Spach. (Rue anemone.) ANÉMONE
FAUX-FIGAMON

Remarquée par le prof. John Macoun sur l'île Pelée. Sur les
autres îles et la rive Ohio.

Hepatica tribola Chaix. (Round-lobed liverleaf.) HÉPATIQUE À
TROIS LOBES.

Dans les bois desséchés autour de Leamington. Îles et rive
Ohio.

Hepatica acutiloba DC. (Sharp-lobed liverleaf.) HÉPATIQUE À
LOBES AIGUS.

Dans les bois riches autour de Leamington. Îles et rive Ohio.

Anemone cylindrica Gray. (Long-fruited anemone.) ANÉMONE À
FRUITS LONGS.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains secs.

- Anemone virginiana** L. (Tall anemone.) ANÉMONE DE VIRGINIE.
Sur l'île Pelée et les autres îles.
- Anemone Canadensis** L. (Canada anemone.) ANÉMONE DU CANADA.
Çà et là à la pointe Pelée dans les lieux humides découverts. Îles
et rive Ohio.
- Anemone quinquefolia** L. (Wood anemone.) ANÉMONE DES BOIS.
SYLVIE.
Sur les rebords des bois et des bosquets à la pointe Pelée. Com-
mune autour de Windsor. Îles.
- Clematis virginiana** L. (Virgin's bower.) CLÉMATITE de VIRGINIE.
Fréquente sur l'île Pelée. Île North-Bass.
- Caltha palustris** L. (Marsh marigold.) SOUCI D'EAU. CORBEILLE
D'OR.
Çà et là à la pointe Pelée dans les lieux humides découverts ou
ombragés.
- Coptis trifolia** (L.) Salisb. (Gold thread.) SAVOYANE.
Commune à Windsor. (F. P. Cravin.)
- Aquilegia canadensis** L. (Wild columbine.) COLOMBINE.
Très abondante à la pointe Pelée le long de la "langue de terre."
Îles et rive Ohio.
- Actaea rubra** (Ait.) Willd. (Red Baneberry.) ACTÉE ROUGE.
Pointe Cedar, rive Ohio.
- Actaea alba** (L.) Mill. (White baneberry.) ACTÉE BLANCHE.
Rive Ohio.
- Hydrastis canadensis** L. (Golden seal.) HYDRASTE DU CANADA.
Remarquée dans les bois riches le long de la rivière Détroit.

MAGNOLIACÉES.

- Liriodendron tulipifera** L. (Tulip tree.) TULIPIER DE VIRGINIE.
Connu dans le commerce du bois sous le nom de bois blanc ou
peuplier jaune. Un arbre sur la ferme de Wallace Tilden
à la pointe Pelée. Il y avait encore de beaux spécimens en 1911
sur la rive nord du lac Érié jusqu'à la rivière Détroit vers
l'ouest. Rive Ohio.

ANONACÉES, (FAMILLE DES ANONES.)

- Asinima triloba** Dunal. (Common papaw.) PAPAYER COMMUN.
Le Prof. John Macoun rapporte qu'il était autrefois abondant
à la pointe Pelée. Nous ne l'avons pas trouvé en 1910, mais
nous avons vu de beaux spécimens près de Colchester en 1911.
Autrefois sur l'île Kelley.

MÉNISPERMÉES (FAMILLE DES MÉNISPERMES.)

Menispermum canadense L. (Moonseed.) MÉNISPERME DU CANADA. RAISIN DE COULEUVRE.

Fréquent à la pointe Pelée dans les bois riches et les bosquets. Îles et rive Ohio.

BERBÉRIDÉES (FAMILLE DES VINETTIERS.)

Podophyllum peltatum L. (Mandrake.) POMME DE MAI.

Fréquente et parfois abondante à la pointe Pelée dans les terrains secs et ombragés.

Jeffersonia diphylla (L.) Pers. (Twinleaf.) JEFFERSONIE GEMELLÉE.

Fréquente dans les bois autour de Windsor. (F. P. Cravin.) Île Johnson.

Caulophyllum thalictroides (L.) Michx. (Papoose root.) LÉONTICE PIGAMOÏDE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les bois riches et sur l'île Pelée. Île Johnson.

LAURINÉES.

Sassafras variifolium (Salisb) Ktze. (Sassafras.) SASSAFRAS À FEUILLES VARIÉES.

Commun dans les bois secs de la pointe Pelée. Près de Leamington, dans une petite anse du rivage du lac Érié, on a remarqué des arbres de 60 pieds de hauteur et d'un diamètre de deux pieds à 3 pieds du sol. On rapporte que, sur la rive Ohio, il y a quelques arbres de deux pieds et demi de diamètre à quatre pieds du sol.

Benzoin aestivale (L.) Nees. (Spice bush.) BENJOIN ODORANT.

Fréquent à la pointe Pelée dans les bois et bosquets humides, et sur l'île Pelée. Rive Ohio.

PAPAVÉRACÉES (FAMILLE DES PAVOTS.)

Sanguinaria canadensis L. (Blood root.) SANG-DRAGON.

Fréquent à la pointe Pelée dans les bois riches et les bouquets. Îles et rive Ohio.

FUMARIACÉES (FAMILLE DES FUMETERRES.)

Dicentra cucullaria (L.) Bernh. (Dutchman's breeches.) DIELYTRE EN CORNET.

Remarquée dans les terrains sableux à la pointe Pelée parmi les genévriers nains. Apparemment rare. Îles et rive Ohio.

Dicentra canadensis (Goldie) Walp. (Squirrel corn.) DIÉLYTRE
DU CANADA.

Dans les bois riches autour de Windsor. (F. P. Cravin).

Corydalis flavula (Raf.) DC. (Pale corydalis.) CORYDALE PÂLE.
Très abondante à la pointe Pelée dans les bois riches. (P. A.
Taverner.) Îles et rive Ohio.

Corydalis aurea Willd. (Golden corydalis.) CORYDALE DORÉE.
Rive Ohio.

Fumaria officinalis L. (Common fumitory.) FUMETERRE OFFI-
CINALE.

Île Kelley et rive Ohio.

CRUCIFÈRES (FAMILLE DES MOUTARDES.)

Draba verna L. (Whitlow grass.) DRAVE PRINTANIÈRE.

Dans les lieux abandonnés, sableux et sur les côtés des routes
autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Draba Caroliniana Walt. (Carolina Whitlow grass.) DRAVE DE
LA CAROLINE.

Très abondante à la pointe Pelée, dans les terrains secs découverts
près de la ferme d'Albert Gardner, et sur l'île Pelée. Rive
Ohio.

Alyssum alyssoides L. (Yellow alyssum.) ALYSSON JAUNE. THLAS-
PI JAUNE.

Mauvaise herbe remarquée à la pointe Pelée dans les terrains
secs découverts près des habitations. Îles et rive Ohio.

Thlaspi arvense L. (Field penny cress.) MONNAYÈRE. TABOURET.
Mauvaise herbe autour des villages et des villes.

Lepidium virginicum L. (Wild Peppergrass.) PASSERAGE DE VIRGINIE.
Commune à la pointe Pelée dans les jardins et les champs. Îles
et rive Ohio.

Lepidium apetalum Willd. (Apetalous peppergrass.) PASSERAGE
APÉTALE.

Se rencontre parfois à la pointe Pelée, près des habitations et
dans les jardins, et sur l'île Pelée. Le long de la rivière Détroit.

Lepidium campestre (L.) R. Br. (Field cress.) CRESSON DES
CHAMPS.

Se rencontre parfois à la pointe Pelée autour des habitations et le
long des routes. Îles Put-in-Bay et Kelley.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. (Shepherd's purse.) THLASPI
BOURSE À PASTEUR.

Mauvaise herbe commune à la pointe Pelée dans les jardins et les
champs cultivés. Abondante sur les îles et la rive Ohio.

Camelina sativa (L.) Crantz (False flax.) FAUX LIN.

Mauvaise herbe occasionnelle à la pointe Pelée autour des habitations.

Cakile edentula (Bigel) Hook. (American sea rocket.) CAQUILLIER MARITIME.

Commun à la pointe Pelée sur la plage sableuse, souvent en bas de la ligne des eaux. Îles et rive Ohio.

Brassica arvensis (L.) Ktze. (Common mustard.) MOUTARDE DES CHAMPS. SÉNEVÉ.

Mauvaise herbe des champs cultivés à la pointe Pelée, mais apparemment peu fréquente. Abondante sur les îles et la rive Ohio.

Brassica nigra (L.) Koch. (Black mustard.) MOUTARDE NOIRE.

Mauvaise herbe qui se rencontre parfois à la pointe Pelée autour des habitations et dans les jardins. Îles et rive Ohio.

Alliaria officinalis Andrz. (Garlic mustard.) ALLIAIRE OFFICINALE. Île Kelley.

Sisymbrium officinale (L.) Scop., var. **leiocarpum** DC. (Hedge mustard.) HERBE AUX CHANTRES.

Mauvaise herbe qu'on rencontre parfois à la pointe Pelée autour des habitations. Îles et rive Ohio.

Sisymbrium altissimum L. (Tumble mustard.) SISYMBRE TRÈS ÉLEVÉ.

Mauvaise herbe qu'on trouve parfois à la pointe Pelée autour des habitations. Îles et rive Ohio.

Sisymbrium caescens Nutt. (Tansy mustard.) SISYMBRE BLANCHÂTRE.

Commun à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou ombragés. Îles et rive Ohio.

Sisymbrium canescens Nutt., var. **brachycarpon** (Richards) Wats. (Tansy mustard.) SISYMBRE BLANCHÂTRE À PETITS FRUITS.

À la pointe Pelée. (Catalogue Canadien des Plantes.)

Erysimum cheiranthoides L. (Worm-seed mustard.) VÉLAR FAUSSE-GIROFLÉE.

Mauvaise herbe occasionnelle à la pointe Pelée autour des habitations et dans les vieilles prairies. Île Pelée.

Radicula nasturtium-aquaticum (L.) Britten et Rendle. (True water Cress.) CRESSON DE FONTAINE.

Dans les fossés et les ruisseaux autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Radicula sylvestris (L.) Druce. (Yellow cress.) CRESSON DES BOIS. Le long des routes près de Leamington.

Radicula palustris (L.) Moench. (Marsh cress.) CRESSON DES MARAIS.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les endroits humides sur les rebords du grand marais. Îles et rive Ohio.

Radicula palustris (L.) Moench., var. **hispida** (Desv.) Robinson. (Hispid yellow cress.) CRESSON JAUNE DES MARAIS.

Îles et rive Ohio.

Radicula Armoracia (L.) Robinson. (Horse radish.) CRANSON RUSTIQUE. MOUTARDE DE CAUCASIE.

Se rencontre parfois à la pointe Pelée. Îles et rive Ohio.

Barbarea vulgaris R. Br. (Common winter cress.) CRESSON D'HIVER.

Mauvaise herbe fréquente à la pointe Pelée dans les jardins et les prairies. Île Green et rive Ohio.

Barbarea stricta Andr. (Erect-fruited winter cress.) BARBARÉE DRESSÉE.

Île Green.

Dentaria diphylla Michx. (Two-leaved toothwort.) DENTAIRE À DEUX FEUILLES.

Dans les terrains riches et ombragés autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Dentaria laciniata Muhl. (Cut-leaved toothwort.) DENTAIRE LACINIÉE.

Dans les terrains riches ombragés le long de la rivière Détroit. Îles.

Cardamine bulbosa (Schreb.) BSP. (Spring cress.) CRESSON DU PRINTEMPS.

Se rencontre parfois à la pointe Pelée dans les bois riches et humides. Rive Ohio.

Cardamine Douglassii (Torr.) Britton. (Purple cress.) CRESSON POURPRÉ.

Dans les bois riches à la pointe Pelée. Îles et rive Ohio.

Cardamine Pensylvanicus (Muhl.) (Pennsylvania bitter cress.) CRESSON AMER.

Dans les lieux humides et ombragés à la pointe Pelée et rive Ohio.

Arabis lyrata L. (Lyre-leaved rock cress.) ARABETTE LYRÉE.

Commune à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts, et sur l'île Pelée. Rive Ohio.

Arabis dentata T. et G. (Toothed rock cress.) ARABETTE DENTÉE.

Commune à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts et ombragés le long de la "langue de terre." Îles Johnson, North-Bass et Green.

Arabis glabra (L.) Bernh. (Tower mustard.) TOURETTE GLABRE.
Occasionnelle à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts
ou légèrement ombragés. Île Johnson.

Arabis Drummondii Gray. (Purple rock cress.) ARABETTE DE
DRUMMOND.

Îles et rive Ohio.

Arabis hirsuta (L.) Scop. (Hairy rock cress.) ARABETTE HIRSUTE.
Île Mouse et rive Ohio.

Arabis laevigata (Muhl.) Poir. (Smooth rock cress.) ARABETTE
LISSE.

Très abondante à la pointe Pelée dans les terrains secs boisés.
Îles et rive Ohio.

Arabis canadensis L. (Sickle pod.) ARABETTE DU CANADA.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les terrains secs boisés et
sur l'île Pelée. Îles Johnson, Put-in-Bay, et Middle-Bass, et
rive Ohio.

CAPPARIDÉES. (FAMILLE DES CÂPRIERS.)

Polanisia graveolens Raf. (Clammy-weed.) POLANISIE ODORANTE.
Commune à la pointe Pelée sur la plage de sable. Elle s'est
développée dans les jardins et les champs sableux et est devenue
une herbe nuisible. Îles et rive Ohio.

RÉSÉDACÉES (FAMILLE DES MIGNONNETTES OU RÉSÉDAS.)

Reseda lutea L. (Yellow cut-leaved mignonnette.) MIGNONNETTE
JAUNE.

Île Kelley.

DROSÉRACÉES (FAMILLE DES ROSSOLIS.)

Drosera rotundifolia L. (Round-leaved sundew.) ROSSOLIS À
FEUILLES RONDÉS.

Dans les lieux marécageux autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Penthorum sedoides L. (Ditch stonecrop.) PENTHORE FAUX-ORPIN.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les lieux humides découverts.

Îles et rive Ohio.

Sedum acre L. (Mossy stone crop.) ORPIN ÂCRE. VERMICULAIRE
ÂCRE.

Occasionnel à la pointe Pelée et environs dans les terrains secs
sableux. Île Kelley et rive Ohio.

Sedum ternatum Michx. (Wild stone crop.) ORPIN À FEUILLES
TERNÉES.

Île Put-in-Bay.

Sedum purpureum Tausch. (Live-for-ever.) ORPIN COMMUN.
Occasionnel à la pointe Pelée près des habitations où il vit à l'état sauvage, et sur l'île Pelée. Îles Put-in-Bay et North-Bass, et rive Ohio.

SAXIFRAGÉES.

Tiarella cordifolia L. (False miterwort.) TIARELLE À FEUILLES CORDIFORMES.
Dans les bois riches de la pointe Pelée (Wallace Tilden.) Apparement rare.

Heuchera americana L. (Common Alum root.) GÉRANIUM ASTRINGENT.

Sur l'île Pelée et sur l'île Anherstburg. Sur les autres îles.

Mitella diphylla L. (Two-leaved bishop's cap.) MITELLE À DEUX FEUILLES.

Commune dans les terrains riches et ombragés autour de Windsor.

Parnassia Caroliniana Michx. (Caroline grass of Parnassus.) PAR-NASSIE DE LA CAROLINE.

Dans les lieux humides le long de la rive nord du lac Erie, et près de Sandwich.

Ribes cynosbati L. (Prickly gooseberry.) GROSEILLER-RONCE DE CHIEN.

Fréquent à la pointe Pelée dans les bois et les bosquets humides Îles et rive Ohio.

Ribes floridum L'Her. (Wild black currant.) GADELIER DE LA FLORIDE.

Commun à la pointe Pelée dans les bois et les bosquets humides, et sur l'île Pelée. Île Kelley et rive Ohio.

Ribes aureum Pursh. (Missouri currant.) GADELIER DE MISSOURI.
Remarqué quelquefois à l'état sauvage sur l'île Pelée. Île Kelley.

HAMAMÉLIDÉES.

Hamamelis virginica L. (Witch-hazel.) NOISETIER DE SORCIÈRE.
Commune à la pointe Pelée dans les bois clairs.

PLATANÉES (FAMILLE DES PLATANES.)

Platanus occidentalis L. (Sycamore.) PLATANE OCCIDENTAL.
Fréquent à la pointe Pelée mêlé à d'autres arbres sur les terrains riches. Îles et rive Ohio.

ROSACÉES (FAMILLE DES ROSIERS.)

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. (Nine-bark.) SPIRÉE À FEUILLES D'OBIER.

Commune sur les îles et la rive Ohio.

Spiraea salicifolia L. (Meadow sweet.) SPIRÉE À FEUILLES DE SAULE. TIÉ DU CANADA.

Fréquente à la pointe Pelée dans les lieux humides découverts.

Pyrus communis L. (Common pear.) POIRIER COMMUN.

Plusieurs gros arbres apparemment revenus peu à peu à l'état sauvage, le long de la rive nord du lac Érié. Îles Put-in-Bay et Kelley et rive Ohio.

Pyrus coronaria L. (American crab.) POMMIER À BOUQUET.

Nous ne l'avons pas remarqué à la pointe Pelée, mais il est abondant plus à l'ouest le long de la rive nord du lac Érié. Près d'Amherstburg. (Macoun.) Île Put-in-Bay.

Pyrus malus L. (Apple.) POMMIER COMMUN.

Fréquent à la pointe Pelée dans les endroits découverts. Îles et rive Ohio.

Pyrus cydonia L. (Commun quince.) COGNASSIER COMMUN.

Plusieurs arbres de belle apparence dans des parties abandonnées le long de la rive nord du lac Érié; mais ils ne sont pas à l'état sauvage.

Pyrus melanocarpa (Michx.) Willd. (Black chokeberry.) GUEULE NOIRE.

Commun autour de Windsor. Rive Ohio.

Pyrus americana (Marsh) DC. (American mountain ash.) SORBIER D'AMÉRIQUE.

Planté parfois dans le comté d'Essex. Îles Rattlesnake et Put-in-Bay. Probablement produits de graines apportées par des oiseaux.

Amelanchier canadensis (L.) Medic. (Common Juneberry.) POIRIER SAUVAGE.

Fréquent à la pointe Pelée dans les bois clairs. Îles et rive Ohio.

Amelanchier oblongifolia (T. et G.) Roem. (Shad bush.) AMELANCHIER À FEUILLES OBLONGUES.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains sableux découverts. Îles Mouse et Kelley et rive Ohio.

Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch. (Round-leaved Juneberry.) AMELANCHIER À FEUILLES RONDES.

Abondant parfois à la pointe Pelée dans les terrains sableux découverts.

Crataegus oxyacantha L. (English hawthorne.) AUBÉPINE COMMUNE.

Plantée comme arbre d'ornement et pour les haies, mais n'est pas encore à l'état sauvage.

Crataegus crus-galli L. (Cockspur thorn.) AUBÉPINE ERGOT DE COQ. SENELLIER.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les endroits couverts et les rebords des bois, et sur l'île Pelée. Rive Ohio.

Crataegus punctata Jacq. (Large-fruited thorn.) AUBÉPINE PONCTUÉE.

Commune à la pointe Pelée dans les endroits découverts et les bois clairs. On a remarqué près de Kingsville un arbre de deux pieds de diamètre à deux pieds du sol.

Crataegus tomentosa L. (Pear thorn.) AUBÉPINE TOMENTEUSE. Îles Kelly et Middle-Bass.

Crataegus mollis (T. et G.) Schelle. (Red-fruited thorn.) AUBÉPINE ÉCARLATE.

Fréquente à la pointe Pelée et sur l'île Pelée. Le long de la rivière Détroit. Île Kelley et rive Ohio.

Fragaria virginiana Duschene, var. **illinoensis** (Prince.) Gray. (Illinois strawberry.) FRAISIER DE L'ILLINOIS.

Îles Kelly, Put-in-Bay et Mouse, et rive Ohio.

Fragaria virginiana Duchesne. (Common strawberry.) FRAISIER COMMUN.

Commun à la pointe Pelée et sur l'île Pelée. Le long de la rivière Détroit. Île Kelley et rive Ohio.

Fragaria vesca L., var. **americana** Porter. (American wood strawberry.) FRAISE DE TABLE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les bois riches et clairs. Îles Kelley et Put-in-Bay et rive Ohio.

Waldsteinia fragaroides (Michx.) Trattinick. (Barren strawberry.) FRAISIER DE WALDSTEIN.

Fréquent autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Potentilla arguta Pursh. (Tall cinquefoil.) GRANDE POTENTILLE. Île Put-in-Bay et rive Ohio.

Potentilla monspeliensis L. (Rough cinquefoil.) POTENTILLE DE MONTPELLIER.

Mauvaise herbe occasionnelle à la pointe Pelée autour des habitations et dans les vieilles prairies, et sur l'île Pelée. Île Put-in-Bay et rive Ohio.

Potentilla paradoxa Nutt. (Bushy cinquefoil.) POTENTILLE FRUTESCENTE.

Abondante parfois à la pointe Pelée dans les terrains sableux découverts et le long de la rive nord du lac Érié.

Potentilla argentea L. (Silvery cinquefoil.) POTENTILLE ARGENTÉE.
Commune autour de Windsor dans les terrains maigres découverts.

Potentilla palustris (L.) Scop. (Marsh five-finger.) COMARET DES MARAIS.

Fréquent à Pointe Pelée dans les endroits humides dans les limites et autour du grand marais.

Potentilla anserina L. (Silver weed.) POTENTILLE ANSÉRINE. ARGENTINE.

Commune à la pointe Pelée et souvent abondante, ordinairement dans les terrains sableux secs près de la rive du lac. Îles Pelée, Middle-Bass, North-Bass, et Rattlesnake, et rive Ohio.

Potentilla canadense L. (Common cinquefoil.) POTENTILLE DU CANADA.

Occasionnelle à la Pointe Pelée dans les terrains secs découverts, et sur l'île Pelée. Rive Ohio.

Potentilla canadensis L., var. **simplex** (Michx.) T. et G. (Larger common cinquefoil.) GRANDE POTENTILLE DU CANADA.

Près d'Amherstburg. (Macoun.)

Filipendula rubra (Hill) Robinson. (Queen of the prairie.) FILIPENDULE.

Rive Ohio.

Geum canadense Jacq. (White avens.) BENOÎTE BLANCHE.

Commune à la pointe Pelée dans les bois et les bosquets riches.
Commune sur les îles et la rive Ohio.

Geum virginianum L. (Rough avens.) BENOÎTE DE VIRGINIE.
Île Pelée. Le long de la rivière Détroit. Île Put-in-Bay.

Geum strictum Ait. (Yellow avens.) BENOÎTE JAUNE.

Commune autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Geum vernum (Raf.) T. et G. (Spring avens.) BENOÎTE DU PRINTEMPS.

Île Pelée. Près d'Amherstburg. (Macoun.) Commune autour de Windsor. Île Johnson et rive Ohio.

Geum rivale L. (Water avens.) BENOÎTE DES RUISSEAUX.

Dans les terrains humides découverts ou ombragés autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Rubus idaeus L., var. **canadensis** Richardson (*Rubus strigosus* Michx. de la plupart des auteurs) (Wild red strawberry.) Voir Rhodora XI-236. RONCE FRAMBOISIER.

Occasionnelle de la pointe Pelée dans les lieux secs découverts, et sur l'île Pelée. Rive Ohio.

Rubus neglectus Peck (Purple wild raspberry.) RONCE POURPRE. Près d'Amherstburg. (Macoun.)

Rubus occidentalis L. (Black raspberry.) FRAMBOISIER NOIR.

Fréquent à la pointe Pelée dans les bois clairs. Îles et rive Ohio.

Rubus odoratus L. (Purple flowering raspberry.) RONCE ODORANTE. CALOTTES.

Une grosse talle sur le bord d'un large fossé dans le grand marais à la pointe Pelée. N'a pas été remarquée ailleurs.

Rubus triflorus Richards. (Dwarf raspberry.) RONCE NAIN.

Commune dans les terrains humides ombragés autour de Windsor.

Rubus alleghaniensis Porter (*R. villosus* de la plupart des auteurs.) (High bush blackberry.) RONCE DES ALLÉGHANYS.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts et souvent dans les terrains ombragés. Îles et rive Ohio.

Rubus hispidus L. (Running swamp blackberry.) RONCE HISPIDE. Commune autour de Windsor.

Rubus villosus Ait. (*R. canadensis* de la plupart des auteurs.) Dewberry. RONCE VELUE.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les terrains secs sableux. Îles et rive Ohio.

Agrimonia gryposepala Wallr. (Tall hairy agrimony.) GRANDE AIGREMOINE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains découverts ou légèrement ombragés surtout le long de la "langue de terre," et sur l'île Pelée. Île Kelley et rive Ohio.

Agrimonia parviflora Ait. (Many-flowered agrimony.) AIGREMOINE À PETITES FLEURS.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts, et sur l'île Pelée. Le long de la rive nord du lac Érié. Rive Ohio.

Rosa setigera Michx. (Climbing rose.) ROSE DES PRAIRIES.

Île Pelée et près de Amherstburg (Macoun.) Îles Johnson, Mouse, Kelley et Middle-Bass, et rive Ohio.

Rosa blanda Ait. (Meadow rose.) ROSE DES PELOUSES.

Île Pelée, île Old Hen, et rive Ohio.

Rosa rubiginosa L. (Sweetbrier.) ÉGLANTIER ODORANT.

Commun à la pointe Pelée sur les terrains unis secs et découverts. Îles et rive Ohio.

Rosa carolina L. (Swamp rose.) ROSE DE CAROLINE. ROSIER DES MARAIS.

Fréquente à la pointe Pelée dans les lieux bas humides et découverts. Îles et rive Ohio.

Rosa humilis Marsh. (Pasture rose.) ROSE DES PÂTURAGES.

Le long de la rivière Détroit et près de Leamington (Macoun.) Îles Kelley et Put-in-Bay et rive Ohio.

Prunus serotina Ehrh. (Wild black cherry.) CERISIER NOIR.

Fréquent à la pointe Pelée, surtout le long de la "langue de terre." Îles et rive Ohio.

Prunus virginiana L. (Choke cherry.) CERISIER À GRAPPES.

Fréquent à la Pointe Pelée sur les rebords des bois. Îles et rive Ohio.

Prunus pensylvanica L.f. (Wild red cherry.) CERISIER DE PENNSYLVANIE.

Commun le long de la rive nord du lac Érié.

Prunus institia L. (Bullace plum.) PRUNIER SAUVAGE. PRUNEAUTIER.

Le Prof. John Macoun l'a rencontré croissant à l'état sauvage sur l'île Pelée.

Prunus pumila L. (Sand cherry.) CERISIER NAIN. RAGOUMINIER.

Fréquent à la pointe Pelée dans les terrains sableux et découverts et sur la partie élevée de la plage. Rive Ohio.

Prunus avium L. (Sweet cherry.) CERISIER MERISIER. GUIGNIER.

Quelques arbres le long du rivage du lac Érié, apparemment échappés à la destruction. Île Kelley.

Prunus Cerasus L. (Common cherry.) CERISIER COMMUN.

Fréquent à l'état sauvage à la pointe Pelée et sur l'île Pelée.

Prunus americana Marsh. (Wild plum.) PRUNIER ROUGE.

Remarqué sur l'île Pelée. Le long de la rive nord du lac Érié. Îles Kelley et Put-in-Bay.

Prunus persica (L.) Stokes. (Peach.) PÊCHER.

Est porté à croître d'une manière permanente sur les îles du lac Érié, et sur la rive Ohio.

LÉGUMINEUSES.

Gymnocladus dioica (L.) Koch. (Kentucky coffee-tree.) CHICOT DU CANADA. BONDOC.

Remarqué, en 1882, sur l'île Pelée par le Prof. John Macoun.

Nous ne l'avons pas trouvé en 1912. Sur les autres îles et rive Ohio.

- Gleditsia triacanthos** L. (Honey locust.) FÉVIER À TROIS ÉPINES.
Plusieurs arbres grands et petits croissant sur la plage et les environs sur le côté est de la pointe Pelée, et çà et là le long de la rive nord du lac Érié jusqu'à la rivière Détroit. Sur les îles et la rive Ohio.
- Cassia marilandica** L. (Wild senna.) SÉNÉ SAUVAGE.
Île Johnson et rive Ohio.
- Cassia chamaecrista** L. (Partridge pea.) CASSE À GRANDES GOUSSES.
Rive Ohio.
- Cercis canadensis** L. (Redbud.) GAINIER DU CANADA. BOUTON ROUGE.
Île Pelée. (Macoun). Rive Ohio.
- Baptisia tinctoria** (L.) R. Br. (Wild indigo.) BAPTISIE DES TEINTURIERS.
Près de Colchester et de Sandwich (Macoun.) Près de Leamington et de Windsor.
- Lupinus perennis** L. (Wild lupine.) LUPIN VIVACE.
Près de Sandwich et de Leamington dans les terrains secs et découverts.
- Trifolium arvense** L. (Rabbit-foot clover.) TRÈFLE DES CHAMPS.
Dans les terrains abandonnés autour de Windsor. (F. P. Cravin.)
- Trifolium pratense** L. (Red clover.) TRÈFLE COMMUN.
Fréquent à la pointe Pelée dans les terrains découverts. Îles et rive Ohio.
- Trifolium reflexum** L. (Buffalo clover.) TRÈFLE DE BUFFALO.
Îles de la rivière Détroit. Île Johnson.
- Trifolium repens** L. (White clover.) TRÈFLE BLANC. TRIOLET.
Çà et là à la pointe Pelée dans les vieilles prairies et les pâturages. Îles et rive Ohio.
- Trifolium hybridum** L. (Alsike clover.) TRÈFLE HYBRIDE.
Çà et là à la pointe Pelée sur les terrains cultivés et environs. Île Put-in-Bay et rive Ohio.
- Trifolium agrarium** L. (Yellow clover.) TRÈFLE JAUNE.
Fréquent autour de Windsor. (F. P. Cravin.)
- Trifolium procumbens** L. (Low hop clover.) TRÈFLE COUCHÉ.
Île Gibraltar dans le lac Érié.
- Melilotus officinalis** (L.) Lam. (Yellow melilot.) MÉLILOT JAUNE.
Çà et là à la pointe Pelée près des habitations. Îles Johnson et Put-in-Bay et rive Ohio.

Melilotus alba Desr. (Sweet clover.) MÉLILOT BLANC. TRÉFLE D'ODEUR.

Çà et là à la pointe Pelée autour des habitations et le long des routes. Commun le long de la rivière Détroit. Abondant dans les champs autour de Windsor. Abondant sur les îles et la rive Ohio.

Medicago sativa L. (Alfalfa.) LUZERNE CULTIVÉE.

Rare à la pointe Pelée. Çà et là dans tout le comté d'Essex. Île Put-in-Bay et rive Ohio.

Medicago lupulina L. (Black medick.) LUZERNE LUPULINE.

Fréquente à la pointe Pelée autour des habitations. Îles et rive Ohio.

Robinia pseudo-acacia L. (Common locust.) ROBINIER FAUX-ACACIA.

Tend à croître à l'état sauvage d'une manière permanente à la pointe Pelée. Îles et rive Ohio.

Astragalus canadensis L. (Carolina milk vetch.) ASTRAGALE DU CANADA.

Fréquente le long de la rive nord du lac Érié. Îles et rive Ohio.

Desmodium nudiflorum (L.) DC. (Naked-flowered tick trefoil.)

DESMODIE À FLEURS NUES.

Rive Ohio.

Desmodium grandiflorum (Walt.) D.C. (Pointed-leaved tick trefoil.) DESMODIE À FEUILLES POINTUES.

Rive Ohio.

Desmodium rotundifolium (Michx.) D.C. (Prostrate tick trefoil.) DESMODIE À FEUILLES RONDES.

Rive Ohio.

Desmodium canescens (L.) DC. (Hoary tick trefoil.) DESMODIE BLANCHÂTRE.

Çà et là à la pointe Pelée dans les terrains sableux découverts, et le long de la rive nord du lac Érié. Îles et rive Ohio.

Desmodium bracteosum (Michx.) DC. (Large-bracted tick trefoil.) DESMODIE À BRACTÉE.

Le long de la rive nord du lac Érié. Rive Ohio.

Desmodium illinoense Gray. (Illinois tick trefoil.) DESMODIE DE L'ILLINOIS.

Rive Ohio.

Desmodium Dillenii Darl. (Dillen's tick trefoil.) DESMODIE DE DILLEN.

Çà et là à la pointe Pelée dans les terrains secs ombragés, et le long de la rive nord du lac Érié. Île Put-in-Bay.

Desmodium paniculatum (L.) DC. (Panicked tick trefoil.) DESMODIE PANICULÉE.

Çà et là à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou légèrement ombragés. Île Put-in-Bay et rive Ohio.

Desmodium canadense (L.) DC. (Showy tick trefoil.) DESMODIE DU CANADA.

Rive nord du lac Érié et le long de la rivière Détroit. Le long du lac St-Clair. Rive Ohio.

Desmodium sessifolium (Torr.) T. et G. (Sessile-leaved tick trefoil.) DESMODIE À FEUILLES SESSILES.

Terrains ombragés près d'Amherstburg.

Desmodium rigidum (Ell.) DC. (Rigid tick trefoil.) DESMODIE RIGIDE.

Rive Ohio.

Lespedeza violacea (L.) Pers. (Bush clover.) LESPÉDÉZIE VIOLETTE. Rive Ohio.

Lespedeza virginica (L.) Britton. LESPÉDÉZIE DE VIRGINIE.

Dans les bosquets le long de la rivière Détroit et près de Leamington. (Macoun.)

Lespedeza frutescens (L.) Britton. (Wand-like bush clover.) LESPÉDÉZIE À FLEURS EN TÊTE.

Bois et bosquets dans le comté d'Essex; terrains sableux. Rive Ohio.

Lespedeza hirta (L.) Hornem. (Hairy bush clover.) LESPÉDÉZIE POILUE.

Rive Ohio.

Lespedeza capitata Michx. (Round-leaved bush clover.) LESPÉDÉZIE À FEUILLES RONDES.

Le long de la rivière Détroit. Rive Ohio.

Vicia sativa L. (Spring vetch.) VESCE CULTIVÉE.

Îles North-Bass et Rattlesnake, et rive Ohio.

Vicia angustigolia (L.) Reichard. (Common vetch.) VESCE COMMUNE.

Mauvaise herbe fréquente autour de Windsor.

Vicia carolina Walt. (Carolina vetch.) VESCE DE CAROLINE.

Le long de la rivière Détroit. Îles et rive Ohio.

Vicia americana Muhl. (American vetch.) VESCE D'AMÉRIQUE.

Îles Kelley et North-Bass, et rive Ohio.

Lathyrus maritimus (L.) Bigel. (Beach pea.) GESSE MARITIME.

Le long de la rive nord du lac Érié. Apparemment peu fréquente. Rive Ohio.

Lathyrus palustris L. (Marsh vetchling.) GESSE DES MARAIS.

Fréquente à Pointe Pelée dans les gazons humides. Îles et rive Ohio.

Lathyrus ochroleucus Hook. (Cream-coloured vetchling.) GESSE À FLEURS JAUNES.

Îles et rive Ohio.

Aplos tuberosa Moench. (Wild bean.) APIOS TUBÉREUSE. PÉNACS.

Commun à la pointe Pelée le long de la "langue de terre" et sur le bord des bois et des bosquets, et sur l'île Pelée. Rive Ohio.

Strophostyles helvola (L.) Britton. (Trailing wild bean.) HARICOT GRIMPANT.

Fréquent et parfois abondant à la pointe Pelée dans les sables humides et le long de la plage. Îles et rive Ohio.

Amphicarpa monoica (L.) Ell. (Hog peanut.) AMPHICARPÉE MONOÏQUE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts et les bois clairs. Îles et rive Ohio.

Amphicarpa Pitcheri T. et G. (Pitcher's hog peanut.) AMPHICARPÉE DE PITCHER.

Fréquente à la pointe Pelée le long de la "langue de terre." Îles et rive Ohio.

LINÉES (FAMILLE DES LINS.)

Linum usitatissimum L. (Common flax.) LIN COMMUN.

Ça et là à la pointe Pelée autour des bâtiments de ferme. Île Kelley.

Linum sulcatum Riddell. (Grooved yellow flax.) LIN JAUNE.

Ça et là autour de Windsor. (F. P. Cravin.) Rive Ohio.

OXALIDÉES (FAMILLE DES OXALIDES.)

Oxalis violacea L. (Violet wood sorrel.) PAIN DE COUCOU. SURELLE. Rive Ohio.

Oxalis corniculata L. (Lady's sorrel.) OXALIDE CORNUE.

Fréquente à la pointe Pelée, dans les gazons, les jardins et les champs.

GÉRANIACÉES.

Geranium maculatum L. (Wild cranesbill.) GÉRANIUM MACULÉ.

Commun à la pointe Pelée dans les terrains découverts et les bois clairs et sur l'île Pelée. Île Kelley et rive Ohio.

Geranium Robertianum L. (Herb Robert.) HERBE À ROBERT.

Abondant à la pointe Pelée sous les cèdre srouges et les pins ou dans les bois riches et humides. Îles et rive Ohio.

Geranium carolinianum L. (Carolina cranesbill.) GÉRANIUM DE CAROLINE.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts. Îles et rive Ohio.

RUTACÉES.

Zanthoxylum americanum Mill. (Northern prickly ash.) FRÈNE PIQUANT. CLAVALIER À FEUILLES DE FRÈNE.

Commun à la pointe Pelée aux rebords des bois et des bosquets, et sur l'île Pelée. Îles Kelley et Middle-Bass et rive Ohio.

Ptelea trifoliata L. (Shrubby trefoil.) STAPHYLIER À FEUILLES TERNÉES.

Fréquent à la pointe Pelée le long de la "langue de terre" et ailleurs. On dit qu'il était autrefois plus abondant. Connu à la pointe Pelée sous le nom de "Wahoo." Le long de la rive nord du lac Érié. Très abondant sur l'île Pelée. Commun sur les autres îles et la rive Ohio.

SIMAROUBÉES (FAMILLE DES QUASSIAS.)

Ailanthus glandulosa Desf. (Tree-of-heaven.) AILANTE GLANDULEUX. BOIS AMER.

Ne se trouve pas dans le comté d'Essex. Îles et rive Ohio.

POLYGALÉES.

Polygala polygama Walt. (Racemed milkwort.) POLYGALA POLYGAME.

Dans les terrains secs autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Polygala senega L. (Seneca snakeroot.) POLYGALA DE VIRGINIE. Rive Ohio.

Polygala senega L., var. *latifolia* T. et G. (Seneca snakeroot.) POLYGALA À FEUILLES DE CÔTÉ. Rive Ohio.

Polygala sanguinea L. (Purple milkwort.) POLYGALA À FLEURS POURPRES.

Pointe Pelée (Burgess.) Près de Windsor. (J. M. Mac...)

Polygala verticillata L. (Whorled milkwort.) POLYGALA À FEUILLES CILLÉES.

Dans les terrains secs découverts d'Amherstburg à Sandwich. Rive Ohio.

EUPHORBIACÉES.

Acalypha virginica L. (Virginia three seeded mercury.) RICINELLE DE VIRGINIE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les lieux découverts, et souvent abondante comme mauvaise herbe des champs cultivés. Îles et rive Ohio.

Euphorbia polygonifera L. (Seaside spurge.) EUPHORBE À FEUILLES POLYGONALES.

Plante caractéristique de la plage sableuse de la pointe Pelée. Îles et rive Ohio.

Euphorbia serpens HBK. (Round-leaved spreading spurge.) EUPHORBE À FEUILLES RONDES.

Île Johnson.

Euphorbia Preslii Guss. (Upright spotted spurge.) EUPHORBE DE PRESLE.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts. Îles et rive Ohio.

Euphorbia hirsuta (Torr.) Wiegand. (Hairy spurge.) EUPHORBE DES BOIS. EUPHORBE HIRSUTE.

Le long des talus de chemins de fer autour de Windsor.

Euphorbia maculata L. (Milk purslane.) EUPHORBE MACULÉE.

Fréquente à la pointe Pelée près des habitations et le long des routes. Îles et rive Ohio.

Euphorbia corollata Michx. (Toothed spurge.) EUPHORBE DENTÉE. Îles et rive Ohio.

Euphorbia platyphylla L. (Broad-leaved spurge.) EUPHORBE À GRANDES FEUILLES.

Près de Colchester et le long de la rivière Détroit.

Euphorbia helioscopia L. (Wartweed.) RÉVEILLE-MATIN.

Près d'Essex-Centre. (Burgess.)

Euphorbia cyparissias L. (Cypress spurge.) EUPHORBE CYPRÈS.

Çà et là à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts. Îles et rive Ohio.

Euphorbia commutata Engelm. (Tinted spurge.) EUPHORBE COLORÉE.

Île Johnson.

LIMNANTHACÉES.

Floerkea proserpinacoides Willd. (False mermaid.) FAUSSE PROSERPINIE.

Sur une île de la rivière Détroit près d'Amherstburg.

ANACARDIACÉES (FAMILLE DES SUMACS.)

Rhus thyphina L. (Staghorn sumach.) SUMAC AMARANTE. VINAIGRIER.

Fréquent à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou légèrement ombragés. Îles et rive Ohio.

Rhus glabra L. (Smooth sumach.) SUMAC GLABRE.

Abondant sur l'île Pelée. Les autres îles et la rive Ohio.

Rhus vernix L. (Poison sumach.) BOIS CHANDELLE. SUMAC VERNIS.

Fréquent à la pointe Pelée dans les terrains humides le long de la "langue de terre" et dans les lieux marécageux, et sur l'île Pelée.

Rhus toxidendron L. (Poison ivy.) Sumac vénéneux. ARBRE À LA PUCE.

Très commun à Pointe Pelée dans les lieux humides riches, découverts et ombragés. Il recouvre souvent complètement des arbres de quarante et cinquante pieds de hauteur les rameaux n'ayant dans plusieurs cas que trois pouces de diamètre à un pied du sol. C'est un petit buisson quand il ne grimpe pas sur les arbres. La propriété de grimper est souvent attribuée à une autre variété. *R. Toxidendron* L., var. *radicans*, sumac vénéneux grimpant. Îles et rive Ohio.

Rhus canadensis Marsh. (Fragrant sumach.) SUMAC DU CANADA.

Très abondant à la pointe Pelée dans les terrains secs, découverts ou ombragés. Aussi abondant dans les sables de la rive ouest où, avec les genévriers nains, il sert à protéger efficacement les sables contre l'action des vents. Îles et rive Ohio.

AQUIFOLIACÉES (FAMILLE DES HOUX.)

Ilex verticillata (L.) Gray. (Black alder.) AULNE NOIRE. HOUX CANADIEN.

Occasionnelle à pointe Pelée dans les bosquets humides, et sur l'île Pelée. Île Green.

Ilex verticillata L. (Gray) var. *tenuifolia* (Torr.) Wats. (Bronx winterberry.) APALANCHE VERTE.

Près de Sandwich et de Leamington. (Macoun.)

CÉLASTRINÉES.

Evonymus atropurpureus Jacq. (Burning bush.) FUSAIN D'AMÉRIQUE.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains ombragés (Wallace Tilden.) Île Pelée. Île White dans la rivière Détroit, îles Hen et Kelley, et rive Ohio.

Evonymus obovatus Nutt. (Running strawberry bush.) FUSAIN
COURANT.

Fréquent à la pointe Pelée dans les terrains riches ombragés.
Le long du lac St-Clair. Îles et rive Ohio.

Celastrus scandens L. (Bittersweet.) CÉLASTRE GRIMPANT.

Très commun à la pointe Pelée dans les bois et les bosquets.
Îles et rive Ohio.

STAPHYLÉACÉES.

Staphylea trifolia L. (American bladder nut.) STAPHYLIER À FEUIL-
LES TERNÉES.

Çà et là près de Windsor. (F. P. Cravin.) Île Green et rive
Ohio.

ACÉRINÉES.

Acer spicatum Lam. (Mountain maple.) ÉRABLE BÂTARD.

Dans les bois riches autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Acer saccharum Marsh (*A. saccharinum* Wang) (Sugar maple.)
ÉRABLE À SUCRE.

Occasionnel à la pointe Pelée avec d'autres arbres. Îles et rive
Ohio.

Acer saccharum Marsh var. **nigrum** (Michx.) f. Britton. (Black
maple.) ÉRABLE NOIR.

Le long de la "langue de terre" à la pointe Pelée, et sur l'île Pelée;
Îles Kelley et North Bass, et rive Ohio. Le prof. C. S. Sargent
remarqua sur l'île Pelée une variété venant du sud qu'il nomma
A. Saccharum rugelii Rehd. Feuilles à 3 lobes.

Acer saccharinum L. (*A. dasycarpum* Ehrh.) (Silver maple.)
ÉRABLE ARGENTÉ.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains riches, mêlé à
d'autres arbres. Îles et rive Ohio.

Acer rubrum L. (Red maple.) ÉRABLE ROUGE. PLAINE.

Fréquent à la pointe Pelée dans les terrains riches avec d'autres
arbres, et sur l'île Pelée.

Acer negundo L. (Box elder.) NÉGONDO À FEUILLES DE FRÈNE.

Planté occasionnellement et retournant à l'état sauvage à la
pointe Pelée et sur l'île Pelée. Île Put-in-Bay et rive Ohio.

SAPINDACÉES.

Aesculus hippocastanum L. (Common horse-chestnut.) MAR-
RONNIER D'INDE.

Planté souvent dans le comté d'Essex, et s'étendant apparem-
ment le long de la rive nord du lac Érié.

Aesculus glabra Willd. (Fetid buckeye.) MARRONNIER GLABRE.
Îles Johnson, Middle-Bass et North-Bass, et rive Ohio.

BALSAMINÉES.

Impatiens pallida Nutt. (Pale touch-me-not.) BALSAMINE DES BOIS.

Fréquente autour de Windsor. (F. P. Cravin.) Îles Old-Hen et Rattlesnake.

Impatiens biflora Walt. (Spotted touch-me-not.) BALSAMINE JAUNE.
Commune à la pointe Pelée dans les lieux découverts ou ombragés. Îles et rive Ohio.

RHAMNÉES.

Rhamnus alnifolia L'Her. (Alder-leaved buckthorn.) NERPRUN À FEUILLES D'AULNE.

Dans les endroits humides découverts près du lac St-Clair.

Caenothus americanus L. (New Jersey tea.) CÉANTHE D'AMÉRIQUE.

Fréquent à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou ombragés. Rive Ohio.

Caenothus ovatus Desf. (Smaller red-root.) PETIT CÉANTHE.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou ombragés. Rive Ohio.

VITACÉES.

Psedera vitacea (Knerr) Greene. (*Ampelopsis quinquefolia* de la plupart des auteurs.) (Virginia creeper.) VIGNE VIERGE.

Commune à la pointe Pelée dans les terrains ombragés. Îles et rive Ohio.

Vitis labrusca L. (Northern fox grape.) VIGNE À FEUILLES COTONNEUSES.

Plusieurs pièces de vigne cultivée à la pointe Pelée et sur l'île Pelée appartiennent apparemment à cette espèce ou ses variétés.

Vitis bicolor Le Conte. (Summer grape.) VIGNE D'ÉTÉ.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains ombragés ou découverts et sur l'île Pelée.

Vitis cordifolia Michx. (Frost grape.) VIGNE DES RIVAGES.
Île Johnson.

Vitis vulpina L. (River bank grape.) VIGNE DES BORDS DES RIVIÈRES.

Commune à la pointe Pelée dans les terrains découverts ou ombragés. Îles et rive Ohio.

TILIACÉES.

Tilia americana L. (Basswood.) BOIS BLANC. TILLEUL D'AMÉRIQUE.

Commun à la pointe Pelée dans les terrains riches mêlé à d'autres arbres. Îles et rive Ohio.

Tilia Michauxii Nutt. (Southern basswood.) BOIS BLANC DU SUD, TILLEUL DE MICHAUX.

On dit qu'il y en a près de Sandwich et le long du lac St-Clair.

MALVACÉES (FAMILLE DES MAUVES.)

Abutilon Theophrasti Medic. (Indian mallow.) ABUTILON DES ANCIENS.

Occasionnelle à la pointe Pelée comme mauvaise herbe des jardins. Commun sur les îles.

Althaea rosea Cav. (Hollyhock.) ROSE TRÉMIÈRE.

Tend à passer à l'état sauvage et à croître d'une manière persistante sur les îles du lac Érié. Rive Ohio.

Sida spinosa L. (Prickly sida.) SIDA ÉPINEUX.

Île Kelley et rive Ohio.

Malva rotundifolia L. (Common mallow.) MAUVE À FEUILLES RONDES.

Fréquente à la pointe Pelée comme mauvaise herbe autour des habitations et les endroits écartés. Îles et rive Ohio.

Malva moschata L. (Musk mallow.) MAUVE MUSQUÉE.

Le long de la rive nord du lac Érié et sur les îles de la rivière Détroit. Île Kelley.

Hibiscus moscheutos L. (Swamp rose mallow.) KETMIE DES MARAIS.

Occasionnelle à la pointe Pelée sur les rebords du grand marais.

On dit qu'elle était autrefois fréquente. Abondante en plusieurs endroits le long de la rive nord du lac Érié. Îles de la rivière Détroit. Le long de la rive du lac St-Clair. Île North-Bass. Le Dr. E. L. Greene a nommé cette plante *H. opulifolius*, croyant que c'était une nouvelle espèce.

Hibiscus trionum L. (Flower-of-an-hour.) KETMIE VÉSICULEUSE. Île Kelley et rive Ohio.

HYPÉRICINÉES. (FAMILLE DES HERBES ST-JEAN.)

Hypericum perforatum L. (Common St. John's wort.) HERBE ST-JEAN.

Fréquente à la pointe Pelée le long des routes et dans les vieilles prairies, et sur l'île Pelée, l'île Kelley, et la rive Ohio.

Hypericum punctatum Lam. (Spotted St. John's wort.) MILLEPERTUIS PONCTUÉ.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les endroits ombragés. Île Rattlesnake, et rive Ohio.

Hypericum prolificum L. (Shrubby St. John's wort.) MILLEPERTUIS PROLIFIQUE.

Fréquent autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Hypericum Kalmianum L. (Kalm St. John's wort.) MILLEPERTUIS DE KALM.

Îles du lac Érié.

Hypericum mutilum L. (Dwarf St. John's wort.) MILLEPERTUIS NAIN.

Fréquent dans les terrains bas découverts autour de Windsor. (F. P. Cravin.) Rive Ohio.

Hypericum majus (Gray.) Britton. (Larger canadian St. John's wort.) MILLEPERTUIS DU CANADA.

Dans les terrains humides découverts autour du grand marais de la pointe Pelée.

Hypericum gentianoides (L.) BSP. (Orange grass.) MILLEPERTUIS EN BALAI.

Dans les champs sableux de Sandwich. (Macoun.)

Hypericum virginicum L. (Marsh St. John's wort.) ÉLODE DE VIRGINIE.

Commune à la pointe Pelée dans le grand marais et rebords. Rive Ohio.

CISTINÉES.

Hellanthemum canadense (L.?) Michx. (Long-branched frost weed.) HÉLIANTHÈME DU CANADA.

Près de Sandwich (Macoun.) Dans les terrains secs découverts près du lac St-Clair.

Lechea villosa Ell. (Large pinweed.) LÉCHÉA MAJEUR.

Très commun autour de Windsor dans les terrains secs découverts. Pointe Cedar, rive Ohio.

Lechea minor L. (Thyme-leaved pinweed.) LÉCHÉA MINEUR.

Dans les terrains découverts ou légèrement ombragés près de Windsor.

VIOLARIÉES (FAMILLE DES VIOLETTES.)

Viola cucullata Ait. (Marsh blue violet.) VIOLETTE À FEUILLES CUCULLÉES.

Commune autour de Windsor dans les terrains marécageux.

Viola palmata L. (Early blue violet.) VIOLETTE À FEUILLES PALMÉES.

Dans les bois humides près d'Amherstburg. Rive Ohio.

Viola sororia Willd. (Wooly blue violet.) VIOLETTE LAINEUSE.

Commune à la pointe Pelée dans les terrains ombragés. Rive Ohio.

Viola fimbriatula Sm. (Ovate leaved violet.) VIOLETTE FIMBRIÉE.
Commune autour de Windsor.

Viola sagittata Ait. (Arrow-leaved violet.) VIOLETTE À FEUILLES SAGITTÉES.

Près d'Amherstburg. Commune autour de Windsor.

Viola pedatifida G. Bon. (Prairie violet.) VIOLETTE PÉDALÉE.
Rive Ohio, mais rare.

Viola incognita Brainerd. (Sweet white violet.) VIOLETTE BLANCHE.
Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains riches ombragés.
Îles et rive Ohio.

Viola pubescens Ait. (Downy yellow violet.) VIOLETTE JAUNE VELUE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains ombragés. Îles et rive Ohio.

Viola scabriuscula Schwein. (Smooth yellow violet.) VIOLETTE JAUNE UNIE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les bois riches et les bosquets.
Îles et rive Ohio.

Viola striata Ait. (Pale violet.) VIOLETTE STRIÉE.
Près d'Amherstburg. Rive Ohio.

Viola Rafinesquii Greene. (Wild pansy.) VIOLETTE PENSÉE.

Sur l'île Pelée (Macoun.) Îles Johnson et Put-in-Bay, et rive Ohio.

CACTÉES.

Opuntia Rafinesquii Engelm. (Western prickly pear.) OPONCE OCCIDENTALE. NOPAL.

Abondant parfois à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts.

THYMÉLÉES.

Dirca palustris L. (Leatherwood.) BOIS DE PLOMB.

Fréquent dans les terrains ombragés près de Colchester.

ÉLÉAGNÉES.

Shepherdia canadensis (L.) Nutt. (Buffalo berry.) SHÉPERDIE DU CANADA.

Commune à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou ombragés.

LYTHRARIÉES.

Rotala ramosior (L.) Koehne. (Rotala.) ROTALE RAMIFIÉ.

Rive Ohio, mais rare.

Ammania coccinea Rottb. (Long-leaved ammania.) AMMANIE À FEUILLES LONGUES.

Rive Ohio.

Decadon verticillatus (L.) Ell. (Water willow.) DÉCADENT VERTICILLÉ.

Très abondant parfois à la pointe Pelée dans le grand marais et ses rebords. Îles et rive Ohio.

Lythrum alatum Pursh. (Wing-angled loosestrife.) SALICAIRE AILÉE.

Dans les lieux humides le long de la rive nord du lac Érié, de la rivière Détroit, et à l'est de Windsor. Îles Put-in-Bay et Middle-Bass, et rive Ohio.

ONAGRÉES.

Ludvigia alternifolia L. (Seedbox.) LUDWIGIE À FEUILLES ALTERNES.

Dans les terrains marécageux, les prairies et les pâturages près de Sandwich et de Windsor. (Alex. Wherry.)

Ludvigia polycarpa Short et Peter. (Many-fruited ludvigia.) LUDWIGIE À PLUSIEURS FRUITS.

Dans les terrains humides le long de la voie du chemin de fer près d'Amherstburg. (Macoun.)

Ludvigia palustris (L.) Ell. (Water purslane.) LUDWIGIE DES MARAIS.

Dans les lieux humides à la pointe Pelée. Rive Ohio.

Epilobium angustifolium (L.) (Great willow herb.) ÉPILOBE À ÉPI.

Rive Ohio.

Epilobium densum Raf. (Linear-leaved willow herb.) ÉPILOBE À FEUILLES LINÉAIRES.

Rive Ohio.

Epilobium coloratum Muhl. (Purple-leaved willow herb.) ÉPILOBE COLORÉ.

Îles Kelley et Middle-Bass, et rive Ohio.

Epilobium adenocaulon Haussk. (Northern willow herb.) ÉPILOBE DU NORD.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts. Îles Kelley et North-Bass et rive Ohio.

Oenothera biennis L. (Common evening primrose.) ONAGRE COMMUNE. HERBE AUX ÂNES.

Commune à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou ombragés, et souvent sur la plage sableuse. Îles et rive Ohio.

Oenothera rhombipetala Nutt. (Rhombic evening primrose.)

ONAGRE RHOMBIQUE.

Rive Ohio.

Gaura biennis L. (Biennial gaura.) GAURA BISANNUELLE.

Le long de la rivière Détroit et près de Windsor. Rive Ohio.

Circaea lutetiana L. (Enchanter's nightshade.) HERBE AUX SORCIÈRES.

Commune à la pointe Pelée dans les bois riches, et sur l'île Pelée.

Île Put-in-Bay.

Circaea alpina L. (Smaller enchanter's nightshade.) CIRCEE DES ALPES.

Rive Ohio.

HALORAGÉES.

Myriophyllum spicatum L. (Spiked water milfoil.) MYRIOPHYLLE À ÉPI. MILLEFEUILLE.

Très abondant à la pointe Pelée dans les grands fossés et les remous stagnants, et sur l'île Pelée.

Proserpinaca palustris L. (Mermaid-weed.) PROSERPINIE DES MARAIS.

Commune à la pointe Pelée dans le grand marais et les environs.

Rive Ohio.

ARALIACÉES.

Aralia racemosa L. (Spikenard.) ARALIE À FLEURS EN GRAPPES. Dans les bois riches près de Colchester.

Aralia nudicaulis L. (Wild salsaparilla.) SALSEPAREILLE SAUVAGE.

Commune à la pointe Pelée dans les bois humides et les bosquets.

Îles Green et Kelley, et rive Ohio.

Panax quinquefolium L. (Ginseng.) GINSENG.

On dit qu'il était autrefois abondant à la pointe Pelée et sur l'île

Pelée, mais nous n'en avons pas trouvé en 1910-11. Autre-

fois abondant sur les autres îles et la rive Ohio.

Panax trifolium L. (Ground-nut.) GINSENG À TROIS FEUILLES.

Dans les bois riches autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

OMBELLIFÈRES (FAMILLE DU PERSIL.)

Sanicula marilandica L. (Black snakeroot.) SANICLE DU MARYLAND.

Commune à la pointe Pelée et sur l'île Pelée. Île Put-in-Bay et rive Ohio.

Sanicula canadensis L. (Short-styled snakeroot.) SANICLE DU CANADA.

Le long de la rivière Détroit. Île Kelley et rive Ohio.

Erigenia bulbosa (Michx.) Nutt. (Harbinger-of-spring.) ÉRIGÉNIE BULBEUSE.

Île Kelley et rive Ohio.

Chaerophyllum procumbens (L.) Crantz. (Spreading Chervil.) CERFEUIL ÉTALÉ.

Île White dans la rivière Détroit (Macoun.) Île Kelley.

Osmorhiza claytoni (Michx.) Clarke (Wooly sweet cicely.) OSMORHIZE À STYLES COURTS.

Îles et rive Ohio.

Osmorhiza longistylis (Torr.) DC. (Smoother sweet cicely.) OSMORHIZE À LONGS STYLES.

Très abondante à la pointe Pelée dans les terrains riches découverts ou ombragés. Îles et rive Ohio.

Conium maculatum L. (Poison hemlock.) CIGUË TACHETÉE. CAROTTE À MOREAU.

Remarquée dans les terrains abandonnés près de Windsor.

Circuta maculata L. (Water hemlock.) CICUTAIRE MACULÉE.

Dans les terrains humides découverts sur l'île Pelée. Île Kelley et rive Ohio.

Cicuta bulbifera L. (Bulb-bearing water hemlock.) CICUTAIRE BULBIFÈRE.

Commune à la pointe Pelée dans le grand marais et les environs.

Îles et rive Ohio.

Carum carvi L. (Caraway.) ANIS DES VOSGES.

Occasionnel à la pointe Pelée comme mauvaise herbe autour des habitations. Îles et rive Ohio.

Sium cicutaefolium Schrank. (Water parsnip.) BERLE À LARGES FEUILLES.

Commune à la pointe Pelée dans le grand marais et les environs et sur l'île Pelée. Île Kelley et rive Ohio.

Cryptotaenia canadensis (L.) DC. (Honestwort.) CERFEUIL SAUVAGE.

Commune à la pointe Pelée dans les bois riches et humides et les bosquets, et sur l'île Pelée. Rive Ohio.

Zizia aurea (L.) Koch. (Golden alexanders.) ZIZIE DORÉE.

Occasionnelle à la pointe Pelée et sur l'île Pelée. Île Kelley.

Zizia cordata (Walt.) DC. (Heart-leaved alexanders.) ZIZIE CORDÉE.

Fréquente sur l'île Pelée. Occasionnelle le long de la rivière Détroit.

Taenidia integerrima (L.) Drude. (Yellow pimpernel.) BOUCAGE JAUNE.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou ombragés, et sur l'île Pelée. Îles Kelley et Put-in-Bay, et rive Ohio.

Thapsium aureum Nutt. (Meadow parsnip.) THAPSIE DORÉE.

Îles de la rivière Détroit (MacLagan.) Île Put-in-Bay et rive Ohio.

Thapsium barbinode (Michx.) Nutt. (Hairy-jointed meadow parsnip.) THAPSIE BARBINODE.

Île Pelée. Près de Colchester et le long de la rivière Détroit. Îles du lac Érié et rive Ohio.

Thapsium barbinode (Michx.) Nutt., var. **angustifolium** Coult. et Rose. (Hairy-jointed meadow parsnip.) THAPSIE BARBINODE À FEUILLES ÉTROITES.

Île Pelée (Macoun.) Îles Johnson et Mouse, et rive Ohio.

Pastinaca sativa L. (Parsnip.) PANAI CULTIVÉ.

Près des habitations à la pointe Pelée comme plante oubliée dans la culture, et sur l'île Pelée, l'île Kelley, et la rive Ohio.

Hieracleum lanatum Michx. (Cow parsnip.) BERCE LAINEUSE.

Rive Ohio.

Oxypolis rigidior (L.) Coult. et Rose. (Cowbane.) ATHUSE FÉTIDE.

Rive Ohio.

Daucus carota L. (Carrot.) CAROTTE CULTIVÉE.

Occasionnelle à la pointe Pelée autour des habitations, dans les vieux champs et sur l'île Pelée. Rive Ohio.

CORNÉES (FAMILLE DU CORNOUILLER.

Cornus canadensis L. (Dwarf cornel.) CORNOUILLER DU CANADA.

Dans les terrains humides ombragés autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Cornus florida L. (Flowering dogwood.) CORNOUILLER À FLEURS.

Abondant parfois le long de la rive nord du lac Érié. Près d'Amherstburg (Macoun.) Île Kelly et rive Ohio.

Cornus circinata L'Her. (Round-leaved cornel.) CORNOUILLER À FEUILLES ARRONDIES. BOIS DE CALUMET.

Occasionnel à la pointe Pelée sur les rebords des bois et abondant sur l'île Pelée. Îles Hen et Kelley et rive Ohio.

Cornus amomum Mill. (Silky cornel.) CORNOUILLER SOYEUX.

Commun à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts ou ombragés. Îles et rive Ohio.

Cornus asperifolia Michx. (Rough leaved cornel.) CORNOUILLER À FEUILLES RUDES.

Commun à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou ombragés, et le long de la rive nord du lac Érié. Îles et rive Ohio.

Cornus Baileyi Coult. et Evans. (Bailey's Cornel.) CORNOUILLER DE BAILEY.

Occasionnel à la pointe Pelée et le long de la rive nord du lac Érié.

Cornus stolonifera Michx. (Red osier dogwood.) CORNOUILLER BLANC. HART ROUGE.

Le long de la rive nord du lac Érié. Rive Ohio.

Cornus paniculata L'Her. (Panicked cornel.) CORNOUILLER PANICULÉ.

Commun à la pointe Pelée sur le rebord des bois et des bosquets et sur l'île Pelée.

Cornus alternifolia L.f. (Alternate-leaved cornel.) CORNOUILLER À FEUILLES ALTERNES.

Fréquent à la pointe Pelée dans les bois clairs et sur l'île Pelée. Rive Ohio.

Nyssa sylvatica Marsh (Black Gum.) TUPÉLO.

Entre Essex Centre et Leamington (Macoun.) Près de Colchester.

ÉRICACÉES (FAMILLE DES BRUYÈRES.)

Chimaphila umbellata (L.) Nutt. (Prince's pine.) HERBE À LA CLEF.

Rive Ohio.

Pyrola elliptica Nutt. (Shin leaf.) PYROLE ELLIPTIQUE.

Rive Ohio.

Monotropa uniflora L. (Indian pipe.) MONOTROPE UNIFLORE.

Fréquente autour de Windsor. (F. P. Cravin.) Rive Ohio.

Gaultheria procumbens L. (Wintergreen.) THÉ DU CANADA.

Commune dans les bois secs autour de Windsor.

Arctostaphylos Uva-ursi (L.) Spreng. (Bearberry.) RAISIN D'OURS.

Sur la plage ouest de la pointe Pelée où il sert à retenir les sables. Île Pelée.

Gaylussacia baccata (Wang.) C. Koch. (Black huckleberry.) AIRELLE NOIRE.

Commune dans les bois secs autour de Windsor.

Vaccinium pensylvanicum Lam. (Early sweet blueberry.) AIRELLE DE PENNSYLVANIE. BLUET.

Commune autour de Windsor.

Vaccinium vacillans. (Late low blueberry.) AIRELLE TARDIVE.
Commune dans les bois autour de Windsor.

Vaccinium corymbosum L. (Swamp blueberry.) AIRELLE CORYMBIFÈRE.

Commune dans les lieux marécageux autour de Windsor.

Vaccinium macrocarpum Ait. (Large cranberry.) CANNEBERGE
À GROS FRUITS. ATOCAS.

On dit qu'elle était autrefois abondante dans certaines parties
du grand marais à la pointe Pelée. Détruite par le drainage
et le feu.

PRIMULACÉES (FAMILLE DE PRIMEVÈRE.)

Lysimachia terrestris (L.) BSP. (Bulb-bearing loosestrife.) LYSIMAQUE BULBIFÈRE. LYSIMAQUE EFFILÉE.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les terrains humides et
découverts. Île Bass et rive Ohio.

Lysimachia nummularia L. (Moneywort.) HERBE AUX ÉCUS.

Dans les lieux humides le long de la rive nord du lac Érié. Île
Middle-Bass.

Lysimachia thyrsiflora L. (Tufted loosestrife.) LYSIMAQUE À FLEURS
EN THYRSE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les endroits humides découverts.
Rive Ohio.

Steironema ciliatum (L.) Raf. LYSIMAQUE CILIÉE.

Commune à la pointe Pelée dans les bois riches et les bosquets.
Îles et rive Ohio.

Steironema quadriflorum (Sims) Hitchc. (Prairie moneywort.)
LYSIMAQUE À QUATRE FLEURS.

Îles de la rivière Détroit, et près de Sandwich. (MacLagan.)

OLÉINÉES.

Fraxinus americana L. (White ash.) FRÈNE BLANC.

Fréquent à la pointe Pelée dans les terrains riches avec d'autres
arbres. Îles et rive Ohio.

Fraxinus pensylvanicus Marsh. (Red ash.) FRÈNE ROUGE.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains riches avec d'autres
arbres. Îles et rive Ohio. Le long du rivage du lac St-Clair.

Fraxinus quadrangulata Michx. (Blue ash.) FRÈNE BLEU.

Dans les terrains secs à la pointe Pelée avec d'autres arbres, le
long de la langue de terre. Abondant sur l'île Pelée. Sur les
autres îles du lac Érié et la rive Ohio.

- Fraxinus nigra** Marsh. (Black ash.) FRÈNE NOIR. FRÈNE GRAS.
Occasionnel à la pointe Pelée et ordinairement petit à travers les autres arbres; dans les terrains humides. Îles et rive Ohio.
- Syringa vulgaris** L. (Common lilac.) LILAS COMMUN.
Remarqué à l'état sauvage sur l'île Pelée. Bien établi sur l'île Kelley.
- Ligustrum vulgare** L. (Privet.) TROËNE COMMUN.
Rive Ohio.

GENTIANÉES.

- Gentiana crinita** Froel. (Fringed gentian.) GENTIANE À CRINIÈRE.
Abondante dans les lieux humides le long de la rive du lac Érié.
Rive Ohio.
- Gentiana quinquefolia** L. (Stiff gentian.) GENTIANE RAIDE.
Le long de la rivière Détroit (MacLagan.)
- Gentiana andrewsii** Griseb. (Closed gentian.) GENTIANE D'ANDRÉ.
Dans les endroits humides le long des rives du lac Érié et de la rivière Détroit. Fréquente autour de Windsor (F. P. Cravin.)
Rive Ohio.

APOCYNÉES.

- Vinca minor** L. (Common periwinkle.) PERVENCHE.
Îles Kelley et Middle-Bass et rive Ohio.
- Apocynum androsaemifolium** L. (Spreading dogbane.) APOCYN
À FEUILLES D'ANDROSÈNE.
Fréquent à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts et sur l'île Pelée. Îles Put-in-Bay et Middle-Bass et rive Ohio.
- Apocynum cannabinum** L. (Indian hemp.) CHANVRE INDIEN.
Fréquent à la pointe Pelée dans les terrains humides graveleux.
Îles et rive Ohio.
- Apocynum cannabinum** L., var. **pubescens** (R. Br.) DC. (Velvet dogbane.) APOCYN VELOUTÉ.
Dans les sables transportés à la pointe Pelée (Macoun.)

ASCLÉPIADÉES (FAMILLE DES ASCLÉPIADES.)

- Asclepias tuberosa** L. (Butterfly weed.) ASCLÉPIADE TUBÉREUSE.
Occasionnelle à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts.
Îles Put-in-Bay et North-Bass, et rive Ohio.
- Asclepias purpurascens** L. (Purple milkweed.) ASCLÉPIADE POUR-PRÉE.
Le long de la rivière Détroit (MacLagan.) Rive Ohio.

Asclepias incarnata L. (Swamp milkweed.) ASCLÉPIADE INCARNATE.

ASCLÉPIADE DES MARAIS.

Commune à la pointe Pelée dans les endroits humides découverts.
Îles et rive Ohio.

Asclepias syriaca L. (Common milkweed.) ASCLÉPIADE COMMUNE.
HERBE À OUATE.

Commune à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts et
dans les vieux champs cultivés. Îles et rive Ohio.

Asclepias phytolaccoides Pursh. (Poke milkweed.) ASCLÉPIADE
À FEUILLES DE PHYTOLAQUE.

Commune à la pointe Pelée. Occasionnelle sur l'île Pelée. Îles
de la rivière Détroit et terrains voisins de cette rivière (Mac-
lagan.) Île Put-in-Bay et rive Ohio.

Asclepias verticillata L. (Whorled milkweed.) ASCLÉPIADE VER-
TICILLÉE.

Rive Ohio.

Acerates floridana (Lam.) Hitchc. (Florida milkweed.) ACÉRATE DE
FLORIDE.

Le long de la rivière Détroit (MacLagan.) Près de Sandwich
(Macoun.)

Acerates viridiflora Ell. (Green milkweed.) ACÉRATE À FLEURS
VERTES.

Fréquent à la pointe Pelée sur le haut du rivage et dans les en-
virons. Rive Ohio.

Acerates viridiflora Ell., var. **lanceolata** (Ives) Gray. (Green
milkweed.) ACÉRATE LANCÉOLÉ.

Pointe Pelée (Macoun.) Rive Ohio.

CONVOLVULACÉES.

Ipomoea hederacea Jacq. (Ivy-leaved morning glory.) IPOMÉE À
FEUILLES DE LIERRE.

Remarquée à la pointe Pelée où elle croit à l'état sauvage dans un
terrain sableux.

Ipomoea purpurea (L.) Roth. (Common morning glory.) IPOMÉE
POURPRE.

Dans les terrains sableux près des habitations à Pointe Pelée.
Îles Put-in-Bay et North-Bass et rive Ohio.

Ipomoea pandurata (L.) G. F. W. Mey. (Wild potato vine.) IPOMÉE
PATATE DOUCE.

Très abondant à la pointe Pelée dans les terrains secs, et couvert
de fleurs blanches, le 20 août, 1910. Rive Ohio.

Convolvulus sepium L. (Hedge bindweed.) LISERON DES HAIES.

Fréquent à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts.
Îles et rive Ohio.

Convolvulus sepium L., var. **pubescens** (Gray) Fernald. (Trailing bindweed.) LISERON PUBESCENT.

Rive Ohio.

Convolvulus arvensis L. (Field bindweed.) LISERON DES CHAMPS.

Près des habitations et dans les vieilles prairies à la pointe Pelée.
Îles.

Cuscuta obtusiflora HBK. (Smartweed dodder.) CUSCUTE À FLEURS
OBTUSES.

Rive Ohio.

Cuscuta cephalanthi Engelm. (Button bush dodder.) CUSCUTE
DU CÉPHALANTE. CUSCUTE DU BOIS BOUTON.

Île Put-in-Bay.

Cuscuta indecora Choix. (Pretty dodder.) CUSCUTE JOLIE.

Rive Ohio.

Cuscuta gronovii Willd. (Love-vine.) CUSCUTE D'AMÉRIQUE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains découverts ou ombragés surtout sur le rebord du marais le long de la "langue de terre." Commune sur les îles du lac Érié.

POLÉMONIACÉES.

Phlox pilosa L. (Downy phlox.) PHLOX PILEUX.

Près d'Amherstburg dans les bois secs (Macoun.) Le long de la
rivière Détroit (MacLagan.) Rive Ohio.

Phlox divaricata L. (Blue Phlox.) PHLOX BLEU.

Commun à la pointe Pelée dans les bois clairs et riches. Îles et
rive Ohio.

Phlox subulata L. (Ground pink.) PHLOX RAMPANT.

Rive Ohio.

Polemonium reptans L. (Greek valerian.) POLÉMOINE BLEUE.

Rive Ohio.

HYDROPHYLLÉES.

Hydrophyllum virginicum L. (Virginia waterleaf.) HYDROPHYLLE
DE VIRGINIE.

Îles du lac Érié à l'exception des îles Kelley et Put-in-Bay. Rive
Ohio.

Hydrophyllum appendiculatum Michx. (Appendaged waterleaf.)
HYDROPHYLLE À APPENDICE.

Commune à la pointe Pelée dans les terrains humides ombragés.
Le long de la rivière Détroit (MacLagan.) Îles du lac Érié.

Phacelia Purshii Buckley. (Pursh's phacelia.) PHACÉLIE DE PURSH.
Îles Chicken, Johnson et Kelley, et rive Ohio.

BORRAGINÉES (FAMILLE DE LA BOURRACHE.)

Cynoglossum officinale L. (Common hound's tongue.) CYNO-
GLOSSE OFFICINALE.

Commune à la pointe Pelée près des habitations dans les terrains découverts, les champs cultivés et les bois clairs. Îles et rive Ohio.

Lappula virginiana (L.) Greene. (Beggar's lice.) CYNOGLOSSE DE MORRISON.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les terrains riches ombragés. Îles Kelley et Put-in-Bay et rive Ohio.

Lappula echinata Gilibert. (European stickseed.) BARNADETTE HÉRISSEE.

Occasionnelle à la pointe Pelée le long des routes et sur l'île Pelée. Îles Kelley et Middle-Bass et rive Ohio.

Myosotis virginica (L.) BSP. (Early scorpion grass.) MYOSOTIS DES MARAIS.

Île Put-in-Bay.

Mertensia virginica (L.) Link. (Bluebells.) MERTENSIE DE VIRGINIE.

Îles Johnson, Kelley et North-Bass et rive Ohio.

Lithospermum arvense L. (Corn gromwell.) GRÉMIL DES CHAMPS.

Mauvaise herbe à la pointe Pelée autour des habitations et dans les champs cultivés. Îles et rive Ohio.

Lithospermum Gmelini (Michx.) Hitchc. (Hairy puccoon.) GRÉMIL VELU.

Fréquent à la pointe Pelée dans les terrains sableux découverts sur le haut du rivage sableux et environs, et autour de Windsor. Îles et rive Ohio.

Lithospermum canescens (Michx.) Lehm. (Hoary puccoon.) GRÉMIL BLANCHÂTRE.

Le long de la rivière Détroit (Maclagan.) Rive Ohio.

Lithospermum angustifolium Michx. (Narrow-leaved puccoon.) GRÉMIL À FEUILLES ÉTROITES.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains sableux découverts.

Onosmodium hispidissimum Mackenzie. (Shaggy false gromwell.) FAUX GRÉMIL POILU.

Îles Johnson et rive Ohio.

Echium vulgare L. (Blue-weed.) VIPÉRINE COMMUNE.

Commune le long des chemins de fer. (F. P. Cravin.)

MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)

APPLIED IMAGE Inc.

1653 East Main Street
Rochester, New York 14609 USA
(716) 482 - 0300 - Phone
(716) 288 - 5989 - Fax

VERBÉNACÉES.

Verbena urticaefolia L. (White vervain.) VERVEINE BLANCHE.

Dans les terrains secs découverts à la pointe Pelée, mais apparemment peu fréquente. Îles et rive Ohio.

Verbena angustifolia Michx. (Narrow-leaved vervain.) VERVEINE À FEUILLES ÉTROITES.

Fréquente sur l'île Pelée. Île Kelley et rive Ohio.

Verbena hastata L. (Blue vervain.) VERVEINE BLEUE.

Souvent très abondante à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts. Îles et rive Ohio.

Lippia lanceolata Michx. (Fog fruit.) LIPPIE LANCÉOLÉE.

Endroits humides près de Leamington (Macoun.) Îles Johnson et Put-in-Bay et rive Ohio.

LABIÉES (FAMILLE DE LA MENTHE.)

Teucrium canadense L. (Common germander.) GERMANDRÉE DU CANADA.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts. Îles et rive Ohio.

Teucrium occidentale Gray. (Hairy germander.) GERMANDRÉE OCCIDENTALE.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les parties les plus sèches du grand marais. Rive Ohio.

Isanthus brachiatus (L.) BSP. (False pennyroyal.) ISANTHE BRANCHU.

Île Kelley, et commune sur la rive Ohio.

Scutellaria lateriflora L. (Mad-dog skullcap.) SCUTELLAIRE LATÉ-RIFLORE.

Commune à la pointe Pelée dans les bois riches et humides. Îles et rive Ohio.

Scutellaria versicolor Nutt. (Heart-leaved skullcap.) SCUTELLAIRE VERSICOLE.

Îles Johnson et Put-in-Bay et rive Ohio.

Scutellaria galericulata L. (Marsh skullcap) (Hooded willow herb.) TOQUE CASSIDE. TERTIONNAIRE. SCUTELLAIRE DES MARAIS.

Commune à la pointe Pelée dans le grand marais et environs, et sur l'île Pelée. Îles Put-in-Bay et Middle-Bass et rive Ohio.

Scutellaria parvula Michx. (Small skullcap.) SCUTELLAIRE PETITE.

Abondante parfois sur les terrains secs de l'île Pelée. Île Kelley et rive Ohio.

Marrubium vulgare L. (Common horehound.) MARRUBE COMMUNE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains secs autour des habitations. Îles et rive Ohio.

Agastache nepetoides (L.) Ktze. (Catnip giant hyssop.) HYSSOPE FAUSSE CHATAIRE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains ombragés. Le long de la rivière Détroit (MacLagan.) Îles Kelley et Johnson et rive Ohio.

Nepeta cataria L. (Catnip.) CHATAIRE COMMUNE. HERBE AUX CHATS.

Commune à la pointe Pelée près des habitations et dans les vieilles prairies. Îles et rive Ohio.

Nepeta hederacea (L.) Trevisan. (Ground ivy.) LIERRE TERRESTRE. Commun à la pointe Pelée et paraissant naturel en cet endroit. Îles et rive Ohio.

Prunella vulgaris L. (Heal-all.) PRUNELLE COMMUNE.

Commune à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts. Îles et rive Ohio.

Physostegia virginiana (L.) Benth. (False dragon head.) FAUSSE DRACOCÉPHALE.

Dans les terrains humides sableux le long de la rive du lac Érié. Îles Put-in-Bay et Middle-Bass et rive Ohio.

Lamium amplexicaule L. (Henbit.) LAMIER AMPLEXICAULE.

Occasionnel à la pointe Pelée comme mauvaise herbe des jardins. (Wallace Tilden.) Îles et rive Ohio.

Leonurus cardiaca L. (Common motherwort.) AGRIPAUME CARDIAQUE.

Commune à la pointe Pelée autour des habitations et dans les vieux champs cultivés. Îles et rive Ohio.

Stachys tenuifolia Willd., var. **aspera** (Michx.) Fernald. (Rough heldge nettle.) ÉPIAIRE ÂPRE.

Îles Middle-Bass et North-Bass et rive Ohio.

Stachys palustris L. (Woundwort.) ÉPIAIRE DES MARAIS.

Fréquente à la pointe Pelée dans le grand marais et environs, et sur l'île Pelée.

Monarda didyma L. (Bee balm.) MONARDE DIDYME.

Fréquente autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Monarda fistulosa L. (Wild bergamot.) MONARDE FISTULEUSE.

À la pointe Pelée. (Macoun.) Îles et rive Ohio.

Monarda mollis L. (Pale wild bergamot.) MONARDE PÂLE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou légèrement ombragés. Îles et rive Ohio.

Blephilia ciliata (L.) Raf. (Downy blephilia.) BLÉPHILIE CILIÉE.

Très abondante sur l'île Pelée dans les terrains découverts ou ombragés. Îles Johnson, Kelley et Put-in-Bay et rive Ohio.

Blephilia hirsuta (Pursh.) Benth. (Wood mint.) MENTHE DES BOIS.

Rive Ohio.

Hedeoma pulegioides (L.) Pers. (American pennyroyal.) HÉDÉOME.

Le long de la rivière Détroit (MacLagan.) Îles et rive Ohio.

Melissa officinalis L. (Common balm.) CITRONELLE.

Île Put-in-Bay.

Satureja glabra (Nutt.) Fernald. (Low calamint.) SARRIETTE GLABRE.

Rive Ohio.

Satureja hortensis L. (Summer savory.) SARRIETTE DES JARDINS. SARRIETTE COMMUNE.

Rive Ohio.

Satureja vulgaris (L.) Fritsch. (Calaminta clinopodium Benth (Field basil.) MÉLISSE CLINOPODE.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les terrains secs ou légèrement ombragés. Îles et rive Ohio.

Pycnanthemum virginianum (L.) Durand et Jackson. (Virginian mountain mint.) PYCNANTHÈME DE VIRGINIE.

Commun à la pointe Pelée dans les parties les plus sèches du grand marais. Île Put-in-Bay et rive Ohio.

Pycnanthemum pilosum Nutt. (Hairy mountain mint.) PYCNANTHÈME PILEUX.

Dans les terrains secs ombragés à la pointe Pelée, mais apparemment peu fréquent. Rive Ohio.

Lycopus virginicus L. (Purple bugle weed.) LYCOPE DE VIRGINIE.

Fréquent à la pointe Pelée dans les lieux humides découverts. Îles et rive Ohio.

Lycopus uniflorus Michx. (Common bugle weed.) LYCOPE COMMUN.

Fréquente à la pointe Pelée dans les lieux bas et humides.

Lycopus rubellus Moench. (Stalked water horehound.) LYCOPE ROUGEÂTRE.

Dans les gazons humides à la pointe Pelée. Apparemment peu fréquent. Îles et rive Ohio.

Lycopus americanus Muhl. (Cut-leaved water horehound.) LYCOPE D'AMÉRIQUE.

Commun et souvent abondant à la pointe Pelée dans les lieux humides découverts, surtout dans le grand marais et environs. Îles et rive Ohio.

Mentha spicata L. (Spearmint.) MENTHE VERTE.

Le long des routes sur l'île Pelée. Île Put-in-Bay et rive Ohio.

Mentha piperita L. (Pepper mint.) MENTHE POIVRÉE.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les endroits humides près des habitations et sur les sables humides de la plage.

Mentha arvensis L., var. **canadensis** (L.) Briquet. (American wild mint.) MENTHE DU CANADA.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts ou légèrement ombragés. Commune sur les îles et la rive Ohio.

Collinsonia canadensis L. (Horse balm.) COLLINSONIE DU CANADA.
Le long de la rivière Détroit (MacLagan.)

SOLANÉES (FAMILLE DE LA MORELLE.)

Solanum dulcamara L. (Nightshade.) MORELLE GRIMPANTE.

Commune à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts ou ombragés. Îles et rive Ohio.

Solanum nigrum L. (Common nightshade.) MORELLE NOIRE.
CRÈVE-CHIEN.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains riches découverts ou ombragés, et comme mauvaise herbe dans les jardins.
Îles et rive Ohio.

Solanum carolinense L. (Horse nettle.) MORELLE DE LA CAROLINE.
Rive Ohio.

Solanum rostratum Dunal. (Buffalo bur.) MORELLE ROSTRÉE.
Île Put-in-Bay et rive Ohio.

Physalis pruinosa L. (Strawberry tomat) COQUERET FRAISE.
Île Kelley.

Physalis heterophylla Nees. (Clammy ground cherry.) CERISE
DE TERRE.

Commune à la pointe Pelée dans les terrains sableux découverts.
Îles et rive Ohio.

Physalis heterophylla Nees, var. **ambigua** (Gray) Rydb. (Clammy ground cherry.) COQUERET AMBIGU.
Rive Ohio.

Physalis heterophylla Nees, var. **nyctaginea** (Dunal) Rydb. (Clammy ground cherry.) COQUERET NYCTAGINÉ.
Rive Ohio.

Physalis subglabrata Mackenzie et Bush. (Glabrate ground cherry.)
COQUERET GLABRE.

Le long de la rivière Détroit.

Physalis lanceolata Michx. (Prairie ground cherry.) COQUERET LANCÉOLÉ.

Île Kelley et rive Ohio.

Lycopersicon esculentum Mill (Tomato.) TOMATE COMMUNE.

On dit qu'elle est passée à l'état sauvage et est bien établie sur l'île Kelley et l'île Put-in-Bay.

Lycium halimifolium Mill. (Common matrimony vine.) LYCIET DE BARBARIE.

Occasionnel à la pointe Pelée comme plante à l'état sauvage et sur l'île Pelée. Île Kelley.

Hyoscyamus niger L. (Black henbane.) JUSQUIAME NOIRE. TABAC DU DIABLE.

Le long de la rivière Détroit. (Maclagan.)

Datura stramonium L. (Stramonium.) STRAMOINE COMMUNE. Rive Ohio.

Datura tarula L. (Purple stramonium.) STRAMOINE POURPRÉE.

Occasionnelle à la pointe Pelée comme mauvaise herbe autour des habitations et dans les lieux écartés.

SCROFULARINÉES.

Verbascum thapsus L. (Common mullein.) MOLÈNE COMMUNE.

Fréquente à la pointe Pelée comme mauvaise herbe des champs en culture.

Verbascum blattaria L. (Moth mullein.) HERBE AUX MITES.

Fréquente le long des routes sur l'île Pelée. Le long de la rivière Détroit et près de Windsor.

Verbascum lychnitis L. (White mullein.) MOLÈNE BLANCHE.

Sur le côté des routes près de Sandwich (Macoun.)

Linaria vulgaris Hill (Butter and eggs.) LIN DES CRAPAUDS.

Mauvaise herbe fréquente à la pointe Pelée autour des habitations. Îles et rive Ohio.

Scrophularia leporella Bicknell. (Hare figwort.) SCROFULAIRE DES LIÈVRES.

Fréquente à la pointe Pelée sur les rebords du grand marais. Îles et rive Ohio.

Pentstemon hirsutus (L.) Willd. (Hairy beard-tongue.) PENTSTÉMON HIRSUTE.

Fréquent à la pointe Pelée dans les terrains secs découvertes ou légèrement ombragés. Îles et rive Ohio.

Chelone glabra L. (Turtlehead.) CHÉLONÉE GLABRE.

Fréquent dans les terrains humides le long de la rive du lac Érié.

Mimulus ringens L. (Square-stemmed monkey flower.) MIMULE RINGENT.

Dans les fossés et les endroits humides autour du grand marais à la pointe Pelée et sur l'île Pelée. Île Bass et rive Ohio.

Conobea multifida (Michx.) Benth. (Conobea.) CONOBÉE MULTIFIDE.

Sur l'extrémité de la pointe sud de l'île Pelée (Macoun.) Île Kelley et rive Ohio.

Ilysanthes dubia (L.) Barnhart. (Long-stalked false pimpernel.) ILYSANTHES À LONGS PÉDONCULES.

Dans les terrains sableux et humides le long de la rive du lac Érié. Rive Ohio.

Veronica virginica L. (Culver's root.) VÉRONIQUE DE VIRGINIE. Îles de la rivière Détroit (MacLagan.) Rive Ohio.

Veronica Anagallis-aquatica L. (Water speedwell.) VÉRONIQUE MOURON D'EAU. Île Kelley.

Veronica officinalis L. (Common speedwell.) VÉRONIQUE OFFICINALE. Rive Ohio.

Veronica serpyllifolia L. (Thyme-leaved speedwell.) VÉRONIQUE À FEUILLES DE SERPOLET.

Fréquente à la pointe Pelée dans les gazons découverts et sur l'île Pelée. Île Put-in-Bay.

Veronica peregrina L. (Neckweed.) VÉRONIQUE VOYAGEUSE. Occasionnelle à la pointe Pelée comme mauvaise herbe dans les jardins et les champs et sur l'île Pelée. Îles Put-in-Bay, North-Bass et Rattlesnake et rive Ohio.

Veronica arvensis L. (Corn speedwell.) VÉRONIQUE DES CHAMPS. Dans les gazons découverts à la pointe Pelée. Commune sur les îles et la rive Ohio.

Semeria macrophylla Nutt. (Mullein foxglove.) SEYMÉRIE À GRANDES FEUILLES. Rive Ohio.

Gerardia pedicularia L. (Fern-leaved foxglove.) GÉRARDIE PÉDICULAIRE.

Dans les terrains secs découverts autour de Windsor. (F. P. Cravin.).

Gerardia virginica (L.) BSP. (Smooth false foxglove.) GÉRARDIE DE VIRGINIE.

Le long de la rivière Détroit (MacLagan.) Rive Ohio.

Gerardia auriculata Michx. (Auricled gerardia.) GÉRARDIE AURICULÉE.

Rive Ohio.

Gerardia purpurea L. (Purple Gerardia.) GÉRARDIE POURPRE.
Autour de Windsor. (F. P. Cravin.) Rive Ohio.

Gerardia paupercula (Gray) Britton. (Small-flowered gerardia.) GÉRARDIE À PETITES FLEURS.

Fréquente à la pointe Pelée autour du grand marais et sur l'île Pelée.

Gerardia tenuifolia Vahl. (Slender gerardia.) GÉRARDIE GRÊLE.
Dans les lieux humides le long de la rive du lac Érié. Le long de la rivière Détroit (Maclagan.) Île Kelley et rive Ohio.

Castilleja coccinea (L.) Spreng. (Scarlet painted cup.) CASTILÈJE ÉCARLATE.

Commune autour de Windsor (F. P. Cravin.) Rive Ohio.

Pedicularis canadensis L. (Common lousewort.) PÉDICULAIRE DU CANADA.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains ombragés, et sur l'île Pelée. Îles Kelley et Put-in-Bay et rive Ohio.

Pedicularis lanceolata Michx. (Swamp lousewort.) PÉDICULAIRE LANCÉOLÉE.

Dans les lieux humides le long de la rive du lac Érié. Le long de la rivière Détroit. (Maclagan.)

UTRICULARIÉES (FAMILLE DE L'UTRICULAIRE.)

Utricularia major L., var. **americana** Gray. (Greater bladderwort.)
UTRICULAIRE MAJEURE DU CANADA.

Dans les eaux peu profondes autour de Windsor.
(F. P. Cravin.) Rive Ohio.

Utricularia gibba L. (Humped bladderwort.) UTRICULAIRE BOSSUE.
Rive Ohio.

OROBANCHÉES.

Conopholis americana (L.f.) Wallr. (Squaw root.) CONOPHOLIDE D'AMÉRIQUE.

Île Put-in-Bay.

Orobanche uniflora L. (One-flowered cancer root.) OROBANCHE UNIFLORE.

Rive Ohio.

BIGNONIACÉES.

Tecoma radicans (L.) Juss. (Trumpet creeper.) JASMIN TROM-PETTE.

Commun sur l'île Pelée. Les autres îles du lac Érié et rive Ohio.

Catalpa speciosa W. & A. (Catawba tree.) CATALPA SUPERBE.

Souvent planté et apparemment acclimaté près de Kingsville.

Catalpa bignonioides Walt. (Catalpa.) CATALPA DE VIRGINIE.

Planté et croissant à l'état sauvage le long de la rive du lac Érié.

ACANTHACÉES.

Dianthera americana L. (Dense-flowered water willow.) DICLIP-TÈRE D'AMÉRIQUE.

Îles Put-in-Bay et Middle-Bass et rive Ohio.

PHRYMACÉES.

Phryma leptostachya L. (Lopseed.) PHRYMA À ÉPI GRÊLE.

Fréquent à la pointe Pelée dans les bois et les bosquets riches.

Îles Kelley et Put-in-Bay et rive Ohio.

PLANTAGINÉES.

Plantago cordata Lam. (Heart-leaved plantain.) PLANTAIN À FEUILLES CORDÉES.

Le long de la rivière Détroit. (Macoun.) Près d'Amherstburg (Macoun.)

Plantago major L. (Common plantain.) PLANTAIN À GRANDES FEUILLES.

Fréquent à la pointe Pelée autour des habitations et dans les lieux écartés. Îles et rive Ohio.

Plantago rugelii Dene. (Rugel's plantain.) PLANTAIN DE RUGEL.

Dans les prairies et les pâturages à la pointe Pelée. Îles et rive Ohio.

Plantago lanceolata L. (English plantain.) PLANTAIN LANCÉOLÉ. HERBE À COUTURES.

Occasionnel à la pointe Pelée comme mauvaise herbe le long des routes et dans les champs cultivés, et sur l'île Pelée.

Plantago aristata Michx. (Large-bracted plantain.) PLANTAIN ARISTÉ.

Sur le côté des routes près de Windsor. (Macoun.)

RUBIACÉES.

Galium aparine L. (Cleavers.) GAILLET GRATTERON.

Commun à la pointe Pelée dans les terrains riches ombragés, et
Îles et rive Ohio.

Galium pilosum Ait. (Hairy bedstraw.) GAILLET POILU.

Pointe Pelée. (Macoun.) Le long de la rivière Détroit et de la
rive Ohio.

Galium circaezans Michx. (Wild liquorice.) GAILLET FAUSSE-
CIRCÉE.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains secs ombragés, et
sur l'île Pelée. Îles Put-in-Bay, Middle-Bass et Rattlesnake,
et rive Ohio.

Galium lanceolatum Torr. (Wild liquorice.) GAILLET LANCÉOLÉ.

Dans les terrains secs boisés autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Galium boreale L. (Northern bedstraw.) GAILLET BORÉAL.

Fréquent sur l'île Pelée. Île Kelley et rive Ohio.

Galium trifidum L. (Small bedstraw.) GAILLET TRIFIDE.

Commun à la pointe Pelée sur les rebords du grand marais, sur-
tout le long de la "langue de terre" et sur l'île Pelée. Îles
Put-in-Bay, Middle-Bass et rive Ohio.

Galium tinctorium L. (Stiff marsh bedstraw.) GAILLET DES TEIN-
TURIERS.

Fréquent dans les endroits humides découverts à la pointe Pelée,
et sur l'île Pelée. Rive Ohio.

Galium concinnum T. et G. (Shinning bedstraw.) GAILLET BRIL-
LANT.

Rive Ohio.

Galium asperellum Michx. (Rough bedstraw.) GAILLET FAUSSE
ASPÉRULE.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les endroits humides couverts
de buissons. Île rive Ohio.

Galium triflorum Michx. (Sweet-scented bedstraw.) GAILLET ODO-
RANT.

Commun à la pointe Pelée dans les terrains riches ombragés, et
sur l'île Pelée. Île Rattlesnake.

Cephalanthus occidentalis L. (Buttonbush.) BOIS-BOUTON.

Abondant à la pointe Pelée sur les rebords du grand marais,
surtout le long de la "langue de terre." Îles et rive Ohio.

Houstonia longifolia Gaert (Slender-leaved houstonia.) HOUS-
TONIE À LONGUES FEUILLES.

Îles Rattlesnake et Put-in-Bay et rive Ohio.

Houstonia ciliolata Torr. (Fringed Houstonia.) HOUSTONIE CILIÉE.

Commune sur la rive Ohio.

CAPRIFOLIACÉES.

Diervilla lonicera Mill. (Bush honeysuckle.) DIERVILLE DU CANADA.

Dans les terrains secs autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Lonicera glaucescens Rydb. (Douglass honeysuckle.) CHÈVRE-FLEU LLE GLAUQUE.

Fréquent à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou ombragés. Îles et rive Ohio.

Symphoricarpos racemosus Michx. (Snowberry.) SYMPHORINE À GRAPPE.

Abondante à la pointe Pelée dans les terrains secs ombragés. Îles et rive Ohio.

Symphoricarpos racemosus Michx., var. **pauciflorus** Robbins. (Low snowberry.) SYMPHORINE BASSE.

Îles et rive Ohio.

Triosteum perfoliatum L. (Tinker's weed.) TRIOSTE PERFOLIÉ.

Autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Viburnum acerifolium L. (Dockmakie.) VIORNE À FEUILLES D'ÉRABLE.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou ombragés. Île Put-in-Bay.

Viburnum pubescens (Ait.) Pursh. (Downy arrow-wood.) VIORNE PUBESCENTE.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les bosquets, et sur l'île Pelée. Îles Kelley et Put-in-Bay et rive Ohio.

Viburnum dentatum L. (Arrow-wood.) VIORNE DENTÉE.

Formait des bosquets à la pointe Pelée. (Macoun.) Pas remarquée en 1910-11.

Viburnum lentago L. (Nannyberry.) VIORNE À MANCHETTES.

Fréquente à la pointe Pelée dans les bois humides, et sur l'île Pelée. Îles Kelley et Middle Bass, et rive Ohio.

Viburnum prunifolium L. (Black haw.) VIORNE OFFICINALE.

Commun sur la rive Ohio.

Sambucus canadensis L. (Common elder.) SUREAU BLANC.

Fréquent à la pointe Pelée dans les terrains riches découverts ou légèrement ombragés. Îles et rive Ohio.

VALÉRIANACÉES

Valeriana pauciflora Michx. (Large-flowered valerian.) VALÉRIANE À GRANDES FLEURS.

Rive Ohio.

DIPSACÉES.

Dipsacus sylvestris Huds. (Wild teasel.) CHARDON DES FORÊTS.

Dans les terrains découverts et sur le bord des routes le long de la rive du lac Érié. Île Kelley et rive Ohio.

CUCURBITACÉES.

Sicyos angulatus L. (One-seeded bur cucumber.) SICYOS ANGULEUX.

Occasionnel à la pointe Pelée comme plante naturelle dans les bosquets humides, et comme mauvaise herbe dans les cours et les champs. Îles Green, Rattlesnake et Put-in-Bay, et rive Ohio.

Echinocystis lobata (Michx.) T. et G. (Wild balsam apple.) ÉCHINO-CYSTIS LOBÉ.

Occasionnel à la pointe Pelée où il croît à l'état sauvage près des habitations. Îles et rive Ohio.

CAMPANULACÉES.

Specularia perfoliata (L.) A. DC. (Venus's looking glass.) SPÉCULAIRE PERFOLIÉ.

Île Pelée. Îles Kelley et Put-in-Bay, et rive Ohio.

Campanula americana L. (Tall bellflower.) CAMPANULE D'AMÉRIQUE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains humides ombragés, surtout sur les rebords du grand marais le long de la "langue de terre." Commune sur les îles et la rive Ohio.

Campanula rotundifolia L. (Harebell.) CAMPANULE DU CANADA.

Occasionnelle sur les rivages escarpés du lac Érié et sur les rivières rocailleuses des îles, excepté l'île Kelley. Rive Ohio.

Campanula aparinoides Pursh. (Marsh bellflower.) CAMPANULE ÉPINEUSE.

Commune à la pointe Pelée dans le grand marais et environs. Îles et rive Ohio.

LOBÉLIACÉES.

Lobelia cardinalis L. (Cardinal flower.) LOBÉLIE CARDINALE.

Dans les bois riches à la pointe Pelée. Îles et rive Ohio.

Lobelia siphilitica L. (Great lobelia.) GRANDE LOBÉLIE.

Fréquente à la pointe Pelée dans le grand marais et environs.

Îles Kelley, Middle-Bass, et North-Bass, et rive Ohio.

Lobelia spicata Lam. (Pale spiked lobelia.) LOBÉLIE EN ÉPI.

Fréquente sur l'île Pelée.

Lobelia Kalmii L. (Brook lobelia.) LOBÉLIE DE KALM.
Îles et rive Ohio.

Lobelia inflata L. (Indian tobacco.) LOBÉLIE ENFLÉE.
Occasionnelle le long de la rive du lac Érié. Île Put-in-Bay.

COMPOSÉES.

Vernonia noveboracensis Willd. (New-York ironweed.) VERNONIE DE NEW-YORK.

Île Pelée (Macoun.) (Voir nouveau manuel de botanique de Gray, illustré, p. 780.)

Vernonia fasciculata Nutt. (Western ironweed.) VERNONIE DE L'OUEST.
Rive Ohio.

Vernonia altissima Nutt. (Tall ironweed.) VERNONIE TRÈS ÉLEVÉE.
Près d'Essex-Centre. Extrait de l'Herbarium de la Commission géologique du Canada, IV, p. 202. Rive Ohio.

Vernonia illinoensis Gleason. (Illinois ironweed.) VERNONIE DE L'ILLINOIS.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts.
Sur les terrains bas et découverts autour du lac St-Clair. Île Kelley.

Eupatorium purpureum L. (Joe-pye weed.) EUPATOIRE POURPRÉE.
Rive Ohio.

Eupatorium purpureum L., var. **maculatum** (L.) Darl. EUPATOIRE MACULÉE.

Rive Ohio.

Eupatorium altissimum L. (Tall thoroughwort.) EUPATOIRE TRÈS ÉLEVÉE.

Île Johnson et rive Ohio.

Eupatorium sessifolium L. (Upland boneset.) EUPATOIRE À FEUILLES SESSILES.

Rive Ohio.

Eupatorium perfoliatum L. (Boneset.) EUPATOIRE PERFOLIÉE.

Commune à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts.
Îles et rive Ohio.

Eupatorium articaefolium Reichard (*E. ageratoides* L.f.) (White snakeroot.) EUPATOIRE À FEUILLES D'ORTIE.

Île Rattlesnake et rive Ohio.

Liatris scariosa Willd. (Large button snakeroot.) LIATRIS SCA-RIEUX.

Près de Leamington et le long de la rivière Détroit (Burgess)
Rive Ohio.

Liatris spicata (L.) Willd. (Dense button snakeroot.) LIATRIS EN ÉPI.

Rive Ohio.

Solidago caesia L. (Blue stemmed goldenrod.) VERGE D'OR BLEUÂTRE.
Abondante parfois le long de la rive nord du lac Érié. Îles et rive Ohio.

Solidago latifolia L. (Zigzag goldenrod.) VERGE D'OR À LARGES FEUILLES.

Îles Kelley, Green et Rattlesnake, et rive Ohio.

Solidago hispida Muhl. (Hairy goldenrod.) VERGE D'OR HISPIDE.
Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou légèrement ombragés. Îles et rive Ohio.

Solidago speciosa Nutt. (Showy goldenrod.) VERGE D'OR SUPERBE.
Rive Ohio.

Solidago patula Muhl. (Rough-leaved goldenrod.) VERGE D'OR À FEUILLES RUDES.

Île Kelley.

Solidago juncea Ait. (Early goldenrod.) VERGE D'OR HÂTIVE.
Occasionnelle à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts, et sur l'île Pelée. Rive Ohio.

Solidago juncea Ait., var. **scabrella** (T. et G.) Gray. (Early goldenrod.) VERGE D'OR HÂTIVE RUDE.

Près de Leamington. (Macoun.)

Solidago ulmifolia Muhl. (Elm-leaved goldenrod.) VERGE D'OR À FEUILLES D'ORME.

Îles et rive Ohio.

Solidago rugosa Mill. (Wrinkle-leaved goldenrod.) VERGE D'OR RIDÉE.

Dans les terrains secs découverts près de Windsor.

Solidago nemoralis Ait. (Field goldenrod.) VERGE D'OR DES CHAMPS.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts. Îles et rive Ohio.

Solidago canadensis L. (Canada goldenrod.) VERGE D'OR DU CANADA.

Commune à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts. Îles et rive Ohio.

Solidago altissima L. (Tall goldenrod.) VERGE D'OR TRÈS ÉLEVÉE.
Commune à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts sur le rebord des bois et des bosquets.

Solidago serotina Ait. (Late goldenrod.) VERGE D'OR GLABRE.
Fréquente à la pointe Pelée dans les bosquets et les rebords des bois riches. Le long de la rivière Détroit et de la rive Ohio.

Solidago rigida L. (Stiff goldenrod.) VERGE D'OR RIGIDE.

Sur les îles de la rivière Détroit. Île Middle-Bass et rive Ohio.

Solidago Riddellii Frank. (Riddell's goldenrod.) VERGE D'OR DE RIDDELL.

Rive Ohio.

Solidago graminifolia (L.) Salisb. (Bushy goldenrod.) VERGE D'OR LANCÉOLÉE.

Commune à la pointe Pelée et souvent abondante dans les terrains humides découverts. Îles et rive Ohio.

Boltonia asteroides (L.) L'Her. (Aster-like boltonia.) BOLTONIE FAUX-ASTER.

Îles Johnson et Put-in-Bay et rive Ohio.

Aster dicaricatus L. (White wood aster.) ASTER CORYMBIFORME.

Fréquent autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Aster macrophyllus L. (Large-leaved aster.) ASTER À GRANDES FEUILLES.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains secs ombragés.

Île Put-in-Bay.

Aster oblongifolius Nutt. (Aromatic aster.) ASTER AROMATIQUE.

Autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Aster novae-angliae L. (New-England aster.) ASTER DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains découverts et sur l'île Pelée. Commun autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Îles Kelley et Put-in-Bay.

Aster azureus Lindl. (Sky blue aster.) ASTER AZURÉE.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou légèrement ombragés. Commun autour de Windsor. (F. P. Cravin.) Rive Ohio.

Aster shortii Lindl. (Short's aster.) ASTER DE SHORT.

Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains secs. Îles et rive Ohio.

Aster undulatus L. (Wavy-leaved aster.) ASTER À FEUILLES ONDULÉES.

Près de Sandwich (MacLagan.) Près de Windsor. (Macoun.)

Aster Lowrieanus Porter, var. **lanceolatus** Porter. (Lowrie's aster.) ASTER LANCÉOLÉ.

Dans les bois clairs le long de la rive du lac Érié.

Aster sagittifolius Wedemeyer. (Arrow-leaved aster.) ASTER À FEUILLES SAGITTÉES.

Commun le long de la rive du lac Érié dans les terrains découverts ou légèrement ombragés. Autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Commun sur les îles et la rive Ohio.

- Aster leavis** L. (Smooth aster.) ASTER LISSE.
Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou légèrement ombragés. Commun autour de Windsor. (F. P. Cravin.) Rive Ohio.
- Aster polyphyllus** Willd. (Faxon's aster.) ASTER POLYPHYLLE.
Île Put-in-Bay et rive Ohio.
- Aster ericoides** L. (White heath aster.) ASTER ÉRICOÏDE.
Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts.
Dans les bosquets sur les sables de Windsor. (J. M. Macoun.)
Île Hen et rive Ohio.
- Aster amethystinus** Nutt. (Amethyst aster.) ASTER AMÉTHYSTE.
Autour de Windsor. (F. P. Cravin.)
- Aster multiflorus** Ait. (Dense flowered aster.) ASTER TRÈS FLEURI.
Dans les terrains secs découverts le long de la rive du lac Érié.
Commun près de Windsor. Île Put-in-Bay.
- Aster dumosus** L. (Bushy aster.) ASTER EN BUISSON.
Autour de Windsor. (F. P. Cravin.)
- Aster vimineus** Lam. (Small white aster.) PETIT ASTER BLANC.
Autour de Windsor. (F. P. Cravin.)
- Aster laterifolius** (L.) Britton. (Calico aster.) ASTER CALICO.
Commun le long de la rive du lac Érié et autour de Windsor.
- Aster Tradescanti** L. (Tradescant aster.) ASTER DE TRADESCANT.
Commun à la pointe Pelée dans le grand marais et environs et dans les autres lieux humides. Îles Pelée et Kelley.
- Aster paniculatus** Lam. (Panicked aster.) ASTER PANICULÉ.
Commun sur les îles et la rive Ohio.
- Aster salicifolius** Ait. (Willow aster.) ASTER À FEUILLES DE SAULE.
Rive Ohio.
- Aster junceus** Ait. (Rush aster.) ASTER À FEUILLES DE JONC.
Abondant à la pointe Pelée dans le grand marais.
- Aster puniceus** L. (Red-stalk aster.) ASTER PONCEAU.
Fréquent à la pointe Pelée dans les endroits marécageux découverts et le long des rives du lac Érié.
- Erigeron pulchellus** Michx. (Robin's plantain.) VERGEROLLE À FEUILLES DE PÂQUERETTE.
Commune autour de Windsor.
- Erigeron philadelphicus** L. (Philadelphia fleabane.) VERGEROLLE DE PHILADELPHIE.
Occasionnelle à la pointe Pelée dans les endroits découverts et les prairies. Îles.

Erigeron annuus (L.) Pers. (Sweet scabious.) VERGEROLLE ANNUELLE.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les bois riches. Îles et rive Ohio.

Erigeron ramosus (Walt.) BSP. (Daisy fleabane.) VERGEROLLE RUGUEUSE.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts. Îles et rive Ohio.

Erigeron canadensis L. (Horse-weed.) VERGEROLLE DU CANADA. Mauvaise herbe près des habitations à la pointe Pelée, dans les jardins et les prairies. Îles et rive Ohio.

Antennaria plantaginifolia (L.) Richards. (Plantain-leaved everlasting.) ANTENNAIRE À FEUILLES DE PLANTAIN.

Commune sur les îles Kelley et Put-in-Bay, et sur la rive Ohio.

Antennaria neglecta Greene. (Field cat's foot.) ANTENNAIRE DES CHAMPS.

Rive Ohio.

Gnaphalium polycephalum Michx. (Common everlasting.) IMMORTELE ODORANTE.

Fréquente à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts. Îles et rive Ohio.

Gnaphalium decurrens Ives. (Everlasting.) IMMORTELE BLANCHE. Rive Ohio.

Gnaphalium uliginosum L. (Low cudweed.) GNAPHALE DES VASES. Rive Ohio.

Inula helenium L. (Elecampane.) GRANDE AULNÉE.

Le long des routes et dans les champs dans le comté d'Essex. Rive Ohio.

Polymnia canadensis L. (Small flowered leafcup.) POLYMNIE DU CANADA.

Abondante le long de la rive sud de l'île Pelée. Îles et rive Ohio.

Silphium terebinthinaceum Jacq. (Prairie dock.) SILPHION DES PRAIRIES.

Près d'Amherstburg, et généralement le long de la rivière Détroit. Rive Ohio.

Silphium trifoliatum L. (Whorled rosinweed.) SILPHION À TROIS FEUILLES.

Près d'Amherstburg.

Silphium perfoliatum L. (Cup plant.) SILPHION PERFOLIÉ.

Îles de la rivière Détroit. (MacLagan.) Marge des champs près de Windsor. (Macoun.)

Ambrosia trifida L., (Great ragweed.) AMBROSIE TRIFIDE.

Occasionnelle à la pointe Pelée comme mauvaise herbe des champs cultivés. Abondante sur l'île Pelée. Commune sur les autres îles et la rive Ohio.

Ambrosia trifida L., var. **integrifolia** (Muhl.) T. et G. AMBROSIE TRIFIDE À FEUILLES ENTIÈRES.

Croît ordinairement avec la variété précédente.

Ambrosia arthemisiifolia L. (Common ragweed.) HERBE À POUX.

Commune à la pointe Pelée comme mauvaise herbe des jardins et des champs. Îles et rive Ohio.

Xanthium canadense Mill. (American cocklebur.) LAMPOURDE DU CANADA.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts. Îles et rive Ohio.

Xanthium commune Britton. (Common clotbur.) LAMPOURDE COMMUNE.

Rive Ohio.

Xanthium echinatum Murr. (Beach cocklebur.) LAMPOURDE HÉRISSEE.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les sables de la plage et des environs, et sur l'île Pelée.

Heliopsis helianthoides (L.) Sweet. (Ox-eye.) HÉLIOPSIS FAUX HÉLIANTHE.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts. Îles et rive Ohio.

Eclipta alba (L.) Hassk. (Eclipta.) ÉCLIPTE BLANCHE.

Rive Ohio.

Rudbeckia triloba L. (Thin-leaved cone flower.) RUDBECKIE À FEUILLES MINCES.

Rive Ohio.

Rudbeckia hirta L. (Yellow daisy.) RUDBECKIE HÉRISSEE.

Fréquente dans les terrains découverts le long de la rive du lac Érié. Îles.

Rudbeckia laciniata L. (Tall cone flower.) RUDBECKIE LACINIÉE.

Le long de la rivière Détroit. Rive Ohio.

Lepachys pinnata (Vent.) T. et G. (Gray-headed cone flower.) RUDBECKIE À TÊTE GRISE.

Près d'Amherstburg. Rive Ohio.

Helianthus annuus L. (Common sunflower.) SOLEIL.

Rive Ohio.

Helianthus giganteus L. (Tall sunflower.) SOLEIL GÉANT.

Peu fréquent à la pointe Pelée, mais commun le long de la rive du lac Érié. Îles et rive Ohio.

Helianthus divaricatus L. (Woodland sunflower.) HÉLIANTHE DIVARIQUÉ.

Dans les terrains secs ombragés le long de la rive du lac Érié.
Îles et rive Ohio.

Helianthus hirsutus Raf. (Stiff-haired sunflower.) HÉLIANTHE HIRSUTE.

Rive Ohio.

Helianthus strumosus L. (Pale-leaved wood sunflower.) HÉLIANTHE À FEUILLES PÂLES.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les bois clairs et les bosquets.
Rive Ohio.

Helianthus strumosus L., var. **mollis** T. et G. (Pale-leaved sunfl.) HÉLIANTHE À GRANDES FEUILLES.

Rive Ohio.

Helianthus trachelifolius Moll. (Throatwort sunflower.) HÉLIANTHE CAMPANULE.

Rive Ohio.

Helianthus decapetalus L. (Thin-leaved sunflower.) HÉLIANTHE À FEUILLES MINCES.

Rive Ohio.

Helianthus tuberosus L. (Jerusalem artichoke.) TOPINAMBOUR.
Çà et là à l'état sauvage à la pointe Pelée. Apparemment naturalisée le long de la rive du lac Érié. Îles Kelley et Put-in-Bay et rive Ohio.

Actinomeris alternifolia (L.) DC. (Actinomeris.) ACTINOMÈRE.

Rive Ohio.

Coreopsis tripteris L. (Tall coréopsis.) GRAND CORÉOPE.
Îles de la rivière Détroit. Îles et rive Ohio.

Bidens discordea (T. et G.) Britton. BIDENT DISCORDE.

Le long de la rivière Détroit (MacLagan.) Rive Ohio.

Bidens frondosa L. (Beggar-ticks.) BIDENT TOUFFU.

Commun à la pointe Pelée dans les terrains humides découverts.
Îles et rive Ohio.

Bidens comosa (Gray) Wiegand. (Leafy-bracted tickseed.) BIDENT CHEVELU.

Fréquent à la pointe Pelée dans les endroits humides du grand marais et des environs. Rive Ohio.

Bidens cernua Muhl. (Swamp beggar-ticks.) CHANVRE D'EAU.

Commun à la pointe Pelée dans les fossés et les endroits humides autour du grand marais. Rive Ohio.

Bidens cernua L. (Stick-tight.) BIDENT PENCHÉ.

Commun à la pointe Pelée dans le grand marais et environs, et sur l'île Pelée.

- Bidens laevis** (L.) BSP. (Larger bur-marigold.) BIDENT LISSE.
Commun à la pointe Pelée dans le grand marais et environs. Le long de la rive du lac Étié. Îles et rive Ohio.
- Bidens bipinnata** L. (Spanish needles.) BIDENT À AIGUILLES.
Île North-Bass et rive Ohio.
- Bidens trichosperma** (Michx.) Britton, var. **tenuiloba** (Gray) Britton.
(Tall tickseed sunflower.) GRAND BIDENT À PETITS LOBES.
Fréquent à la pointe Pelée et parfois abondant dans le grand marais et environs. Îles de la rivière Détroit. Îles Pelée et Kelley.
- Bidens aristosa** (Michx.) Britton. (Western tickseed sunflower.) BIDENT ARISTÉ.
Rive Ohio.
- Bidens Beckii** Torr. (Water marigold.) BIDENT DE BECK.
Dans les lieux très humides le long de la rivière Détroit. (Mac-lagan.) Rive Ohio.
- Actinea herbacea** (Greene) Robinson. (Stemless picradenia.) PICRADÉNIE HERBACÉE.
Rive Ohio.
- Helenium autumnale** L. (Swamp sunflower.) HÉLÉNIE AUTOMNALE.
Occasionnelle dans les endroits humides le long de la rive du lac Érié. Rive Ohio.
- Achillea millefolium** L. (Common yarrow.) HERBE À DINDE.
Commune à la pointe Pelée dans les terrains découverts. Îles et rive Ohio.
- Anthemis cotula** L. (May-weed.) CAMOMILLE DES CHIENS.
Mauvaise herbe fréquente à la pointe Pelée autour des habitations. Îles et rive Ohio.
- Chrysanthemum leucanthemum** L. var. **pinnatifidum** Lecocq et Lamothe. (Ox-eye daisy.) MARGUERITE BLANCHE.
Peu fréquent à la pointe Pelée. Île Put-in-Bay et rive Ohio.
- Chrysanthemum parthenium** (L.) Bernh. (Feverfew.) CHRYSANTHÈME MATRICAIRE.
Bien enracinée sur l'île Put-in-Bay.
- Chrysanthemum balsamita** L., var. **tenacetoides** Boiss. (Costmary.) CHRYSANTHÈME TANAISIE.
Île Pelée et rive Ohio.
- Tanacetum vulgare** L. (Common tansy.) TANAISIE COMMUNE.
Commune près des habitations à la pointe Pelée et sur l'île Pelée. Île Kelley.
- Tanacetum vulgare** L., var. **crispum** DC. (Tansy.) TANAISIE CRÉPUE.
Îles du lac Érié.

Artemisia caudata Michx. (Tall wormwood.) GRANDE ARMOISE.
Fréquente à la pointe Pelée sur la plage sableuse. Îles et rive Ohio.

Artemisia biennis Willd. (Biennial wormwood.) ARMOISE BISAN-
NUELLE.

Occasionnelle à la pointe Pelée comme mauvaise herbe dans les terrains humides. Îles Johnson, Middle-Bass et North-Bass et rive Ohio.

Calendula officinalis L. (Pot marigold.) SOUCI DES JARDINS.
Naturalisé sur l'île Put-in-Bay.

Erechtites hieracifolia (L.) Raf. (Fireweed.) CRÈVE-YEUX À FEUIL-
LES D'ÉPERVIERE.

Fréquent à la pointe Pelée sur les bords du grand marais. Îles et rive Ohio.

Senecio aureus L. (Golden ragwort.) SÉNÉÇON DORÉ.
Fréquent autour de Windsor. (F. P. Cravin.)

Senecio balsamitae Muhl. (Balsam groundsel.) SÉNÉÇON BAUMIER.
Occasionnel à la pointe Pelée dans les terrains secs découverts ou légèrement ombragés, et sur l'île Pelée. Île Put-in-Bay.

Senecio obovatus Muhl. (Round-leaf squaw-weed.) SÉNÉÇON À
FEUILLE RONDE.
Île Kelley.

Arctium minor Bernh. (Common burdock.) RAPACE BARDANE.
Mauvaise herbe commune à la pointe Pelée. Îles et rive Ohio.

Cirsium lanceolatum (L.) Hill. (Common thistle.) CHARDON LAN-
CÉOLÉ.

Occasionnel à la pointe Pelée autour des habitations et dans les vieilles prairies. Îles et rive Ohio.

Cirsium discolor (Muhl.) Spreng. (Field thistle.) CHARDON DIS-
COLORE.
Rive Ohio.

Cirsium altissimum (L.) Spreng. (Tall thistle.) CHARDON GÉANT.
Île Kelley et rive Ohio.

Cirsium muticum Michx. (Swamp thistle.) CHARDON MUTIQUE.
Occasionnel à la pointe Pelée dans les lieux humides découverts ou légèrement ombragés, et le long de la rive du lac Érié.

Cirsium arvense (L.) Scop. (Canada Thistle.) CHARDON DES CHAMPS.
Fréquent à la pointe Pelée dans les prairies et les pâturages.
Îles et rive Ohio.

Centaurea cyanus L. (Blue-dottle.) CENTAURÉE BLEUE.
Île Kelley.

Cichorium Intybus L. (Chicory.) CHICORÉE COMMUNE.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les vieilles prairies, et sur l'île Pelée. Îles Kelley et Middle-Bass et rive Ohio.

Krigia amplexicaulis Nutt. (Cynthia.) KRIGIE À GRANDE TIGE.

Occasionnelle sur l'île Pelée. Sur les îles de la rivière Détroit (Maclagan.) Île Kelley et rive Ohio.

Tragopogon porrifolius L. (Salsify.) SALSIFIS DES JARDINS.

Sur l'île Pelée et les autres îles.

Tragopogon pratensis L. (Goat's beard.) SALSIFIS DES PRÈS.

Dans les villes et le long des chemins de fer.

Taraxacum officinale Weber. (Common dandelion.) PISSENLIT OFFICINAL.

Abondant à la pointe Pelée comme mauvaise herbe dans les cours, les pâturages et les champs cultivés. Îles et rive Ohio.

Taraxacum erythrospermum Andr. (Red-seeded dandelion.) PISSENLIT À GRAINES ROUGES.

Rive Ohio.

Sonchus asper L. Hill. (Spiny-leaved sow-thistle.) LAITERON ÂPRE.

Mauvaise herbe des jardins et des lieux non cultivés de la pointe Pelée. Îles et rive Ohio.

Lactuca scariola L. (Prickly lettuce.) LAITUE ÉPINEUSE.

Fréquente à la pointe Pelée sur les bords des fossés. Îles et rive Ohio.

Lactuca canadensis L. (Wild lettuce.) LAITUE SAUVAGE.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les terrains riches découverts ou ombragés. Îles et rive Ohio.

Lactuca canadensis L., var. **montana** Britton. (Wild lettuce.) LAITUE DE MONTAGNES.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les bois clairs.

Lactuca hirsuta Muhl. (Hairy wood lettuce.) LAITUE HIRSUTE.

Dans les bosquets près de Leamington. (Macoun.)

Lactuca villosa Jacq. (Hairy-veined blue lettuce.) LAITUE BLEUE POILUE.

Rive Ohio.

Lactuca floridana (L.) Gaertn. (Florida lettuce.) LAITUE DE LA FLORIDE.

Îles de la rivière Détroit (Maclagan.) Îles Put-in-Bay et Green.

Lactuca spicata (Lam.) Hitchc. (Tall blue lettuce.) GRANDE LAITUE BLEUE.

Fréquente à la pointe Pelée sur les bords ombragés du grand marais surtout le long de la "langue de terre," et sur l'île Pelée. Îles Kelley et Put-in-Bay et rive Ohio.

Prenanthes racemosa Michx. (Glaucous white lettuce.) PRÉNANTHE à FLEURS EN GRAPPES.

Le long de la rivière Détroit. (MacLagan.)

Prenanthes racemosa Michx., var. **pinnatifida** Gray. (Glaucous white lettuce.) LAITUE GLAUQUE à FLEURS BLANCHES.

Près de Windsor. (Wm. Scott.)

Prenanthes alba L. (White lettuce.) PRÉNANTHE BLANCHE.

Occasionnelle à la pointe Pelée dans les terrains riches découverts ou ombragés, et le long de la rive du lac Érié. Îles à rive Ohio.

Prenanthes altissima L. (Tall white lettuce.) PRÉNANTHE TRÈS ÉLEVÉE.

Île Put-in-Bay et rive Ohio.

Hieracium venosum L. (Rattlesnake weed.) ÉPERVIÈRE VEINÉE.

Le long de la rivière Détroit. (MacLagan.)

Hieracium scabrum Michx. (Rough hackweed.) ÉPERVIÈRE RUDE.

Rive Ohio.

Hieracium gronovii L. (Gronovius hackweed.) ÉPERVIÈRE DE GRONOVIVS.

Près de Sandwich. (MacLagan.)

Hieracium canadense Michx. (Canada hackweed.) ÉPERVIÈRE DU CANADA.

Rive Ohio.

INDEX

A.			
	PAGE		PAGE
Abutilon des anciens.....	69	Ailanthus glandulosa.....	64
Abutilon Theophrasti.....	69	Ail sauvage.....	30
Acalypha virginica.....	65	Airelle corymbifère.....	77
Acanthacées.....	89	Airelle de Pensylvanie.....	76
Acérate à fleurs vertes.....	79	Airelle noire.....	76
Acérate de Floride.....	79	Airelle tardive.....	77
Acérate lancéolé.....	79	Aizoacées.....	44
Acerates floridana.....	79	Alder, black.....	66
Acerates viridiflora, var. lanceolata..	79	Alder-leaved buckthorn.....	68
Acerates viridiflora.....	79	Alder, speckled.....	7
Acer dasycarpum.....	67	Aletris farinosa.....	32
Acérinées.....	67	Alexanders, golden.....	74
Acer negundo.....	67	Alexanders, heart-leaved.....	74
Acer rubrum.....	67	Alfalfa.....	1
Acer saccharinum.....	67	Alismacées.....	77
Acer saccharum.....	67	Alisma plantago-aquatica.....	77
Acer saccharum rugelii.....	67	Alliaire officinale.....	77
Acer saccharum, var. nigrum.....	67	Alliaria officinalis.....	77
Acer spicatum.....	67	Allium canadense.....	77
Achillea millefol.	100	Allium cernuum.....	77
Acnida tuberculata.....	43	Allium tricoccum.....	77
Acnide à feuilles de chanvre.....	43	Alnus incana.....	77
Acorus calamus.....	28	Alopecurus geniculatus, var. arvensis	17
Actaea alba.....	48	latus.....	17
Actaea rubra.....	48	Alsike clover.....	60
Actée blanche.....	48	Althaea rosea.....	69
Actée rouge.....	48	Alum root, common.....	54
Actinea herbacea.....	100	Alysum alyssoides.....	50
Actinomère.....	99	Alysson jaune.....	50
Actinomeris.....	99	Amande de terre.....	22
Actinomeris alternifolia.....	99	Amarantacées.....	43
Adder's tongue.....	9	Amarante fausse-blite.....	43
Adder's tongue, white.....	31	Amarante grecque.....	43
Adder's tongue, yellow.....	31	Amarante pourpre.....	43
Adiantum pedatum.....	7	Amarante repliée.....	43
Aesculus glabra.....	68	Amarante verte.....	43
Aesculus hippocastanum.....	67	Amaranthus blitoides.....	43
Aetonia, blunt scaled.....	18	Amaranthus græcizens.....	43
Aetonia, pensylvanica.....	19	Amaranth, green.....	43
Agastache nepetoides.....	83	Amaranth pigweed.....	43
Agrimonia gryposepala.....	58	Amaranthus hybridus.....	43
Agrimonia parviflora.....	58	Amaranthus paniculatus.....	43
Agrimony, many-flowered.....	58	Amaranthus retroflexus.....	43
Agrimony, tall hairy.....	58	Amaryllidées.....	98
Agripaume cardiaque.....	83	Ambrosia arthemisifolia.....	98
Agropyron à épis laineux.....	21	Ambrosia trifida.....	98
Agropyron dasystachyum.....	21	Ambrosia trifida, var. integrifolia.....	98
Agropyron repens.....	21	Ambrosie trifide à feuilles entières.....	98
Agrostemma githago.....	45	Ambrosie trifide.....	98
Agrostide blanche.....	18	Amelanchier à feuilles oblongues.....	55
Agrostide d'hiver.....	18	Amelanchier à feuilles rondes.....	55
Agrostide: jaune, grande.....	19	Amelanchier canadensis.....	55
Agrostide vivace.....	18	Amelanchier oblongifolia.....	55
Agrostis alba.....	18	Amelanchier spicata.....	55
Agrostis hyemalis.....	18	American aspen.....	35
Agrostis-like panicum.....	15	American crab.....	55
Agrostis perennans.....	18	American elm.....	38
Aigremoine à petites fleurs.....	58	American larch.....	11
Aigremoine, grande.....	58	American nettle tree.....	36
Ailante glanduleux.....	64	American sea rocket.....	51

	PAGE		PAGE
American yew.....	10	Arabette du Canada.....	53
Ammania coccinea.....	72	Arabette hirsute.....	53
Ammania, long-leaved.....	72	Arabette lisse.....	53
Ammanie à feuilles longues.....	72	Arabette lyrée.....	52
Ammophila arenaria.....	18	Arabis canadensis.....	53
Ammophile des sables.....	18	Arabis dentata.....	52
Ampelopsis quinquefolia.....	68	Arabis Drummondii.....	53
Amphicarpa monoica.....	63	Arabis glabra.....	53
Amphicarpa Pitcheri.....	63	Arabis hirsuta.....	53
Amphicarpée de Pitcher.....	63	Arabis laevigata.....	52
Amphicarpée monoïque.....	63	Arabis lyræ.....	52
Anacardiées.....	66	Araliacées.....	73
Andropogon à balais.....	14	Aralia nudicaulis.....	73
Andropogon fourchu.....	14	Aralia racemosa.....	73
Andropogon furcatus.....	14	Aralie à fleurs en grappes.....	73
Andropogon scoparius.....	14	Arbre à la puce.....	66
Anémone à fruits longs.....	47	Arctium minor.....	101
Anemone canadensis.....	48	Arctostaphylos uva-ursi.....	76
Anemone cylindrica.....	47	Arenaria lateriflora.....	44
Anémone de Virginie.....	48	Arenaria serpyllifolia.....	44
Anémone des bois.....	48	Arenaria stricta.....	44
Anémone du Canada.....	48	Argentine.....	57
Anémone faux-pigamon.....	47	Arisæma dracontium.....	28
Anemonella thalictroides.....	47	Arisæma triphyllum.....	28
Anemone quinquefolia.....	48	Aristolochiacées.....	39
Anémone, rue.....	47	Armoise bisannuelle.....	101
Anemone virginiana.....	48	Armoise, grande.....	101
Anis des Vosges.....	74	Aroidées.....	28
Anonacées.....	48	Arroche-fraise.....	42
Anserine à feuilles étroites.....	42	Arrow-wood, downy.....	91
Anserine ambroisie.....	42	Arrow-grass, seaside.....	13
Anserine aromatique.....	42	Arrow-head, arum-leaved.....	14
Anserine blanche.....	42	Arrow-head, broad leaved.....	13
Anserine des villes.....	42	Arrow-head, sessile-fruited.....	14
Anserine hybride.....	42	Arrow-leaved tear-thumb.....	41
Anserine verte.....	42	Arrow-wood.....	91
Antennaire à feuilles de plantain.....	97	Artemisia biennis.....	101
Antennaire des champs.....	97	Artemisia caudata.....	101
Antenna.....	97	Artichoke, Jerusalem.....	90
Antennaria plantaginifolia.....	97	Arum-leaved arrow-head.....	14
Anthemis cotula.....	100	Asaret du Canada.....	39
Anychia canadensis.....	44	Asarum canadense.....	39
Anychia polygamoides.....	43	Asclépiade à feuilles de phytolaque.....	79
Anychie du Canada.....	44	Asclépiade commune.....	79
Anychie fausse renouée.....	43	Asclépiade des marais.....	79
Apalanche verte.....	56	Asclépiadées.....	78
Apios tubéreuse.....	63	Asclépiade incarnate.....	79
Apios tuberosa.....	63	Asclépiade pourprée.....	78
Aplectrum d'hiver.....	33	Asclépiade tubéreuse.....	78
Aplectrum hyemale.....	33	Asclépiade verticillée.....	79
Apocyn à feuilles d'androsène.....	78	Asclepias incarnata.....	79
Apocynées.....	78	Asclepias phytolaccoides.....	79
Apocynum androsæmifolium.....	78	Asclepias purpurascens.....	78
Apocynum cannabinum.....	78	Asclepias syriaca.....	79
Apocynum cannabinum, var. pubes- cens.....	78	Asclepias tuberosa.....	78
Apocyn velouté.....	78	Asclepias verticillata.....	79
Apple.....	55	Ash, black.....	78
Apple, wild balsam.....	92	Ash, blue.....	77
Aquifoliacées.....	66	Ash, northern prickly.....	64
Aquilegia canadensis.....	48	Ash, red.....	77
Arabette de Drummond.....	53	Ash, white.....	77
Arabette dentée.....	52	Asinima triloba.....	48
		Asparagus, garden.....	31

PAGE

53	Asparagus officinalis	31
53	Aspen, american	35
53	Aspen, large-toothed	35
52	Asperge officinale	31
53	Aspidie à crêtes	8
52	Aspidium cristatum	8
53	Aspidie à petites pointes	8
53	Aspidie de Goldie	8
53	Aspidie de New-York	8
53	Aspidie des marais	8
52	Aspidie intermédiaire à petites pointes	8
73	Aspidie marginale	8
73	Aspidium Goldianum	8
73	Aspidium marginale	8
73	Aspidium noveboracense	8
66	Aspidium spinulosum	8
101	Aspidium spinulosum, var. intermedium	8
76	Aspidium thelypteris	8
44	Asplenium angustifolium	7
44	Asplenium filix-femina	7
57	Asplenium platyneuron	7
28	Asplenium trichomanes	7
28	Aster à feuilles de jonc	96
39	Aster à feuilles de saule	96
101	Aster à feuilles ondulées	95
101	Aster à feuilles sagittées	95
28	Aster à grandes feuilles	95
42	Aster, amethyst	96
91	Aster améthyste	96
13	Aster amethystinus	96
14	Aster, aromatic	95
13	Aster aromatique	95
14	Aster, arrow-leaved	95
41	Aster azurée	95
91	Aster azureus	95
101	Aster, bushy	96
101	Aster calico	96
90	Aster, calico	96
14	Aster corymbiforme	96
39	Aster de la Nouvelle-Angleterre	95
39	Aster, dense flowered	96
79	Aster de Short	95
79	Aster de Tradescant	96
79	Aster divaricatus	95
78	Aster dumosus	96
79	Aster en buisson	96
78	Aster éricoïde	96
78	Aster ericoides	96
79	Aster, Faxon's	96
79	Aster junceus	96
79	Aster laevis	96
78	Aster lancéolé	95
79	Aster, large-leaved	95
78	Aster laterifolius	96
79	Aster-like boltonia	95
78	Aster lisse	96
77	Aster Lowricanus, var. lanceolatus	95
64	Aster, Lowrie's	95
77	Aster macrophyllus	95
77	Aster multiflorus	96
48	Aster, New-England	95
31	Aster novæ-angliæ	95

PAGE

Aster oblongifolius	95
Aster, panicled	96
Aster paniculatus	96
Aster paniculé	96
Aster, petit aster blanc	96
Aster polyphyllus	96
Aster polyphyllus	96
Aster ponceau	96
Aster puniceus	96
Aster, red-stalk	96
Aster, rush	96
Aster sagittæfolius	95
Aster salicifolius	96
Aster Shortii	95
Aster, Short's	95
Aster, sky blue	95
Aster, small white	96
Aster, smooth	96
Aster très fleuri	96
Aster Tradescant	96
Aster Tradescanti	96
Aster undulatus	95
Aster vimineus	96
Aster, waxy-leaved	95
Aster, white heath	96
Aster, white wood	95
Aster, wilow	96
Astragale du Canada	61
Astragalus canadensis	61
Athuse fétide	75
Atocas	77
Atriplex patula, var. hastata	42
Aubépine commune	56
Aubépine écarlate	56
Aubépine ergot de coq	56
Aubépine tomenteuse	56
Aubépine ponctuée	56
Aulnée	97
Aulne grisâtre	37
Aulne noire	66
Avens, rough	57
Avens, spring	57
Avens, water	57
Avens, white	57
Avens, yellow	57
Awl-fruited sedge	26
Axybaphus nyctaginus	43

B.

Bag willow	35
Balm, bee	83
Balm, common	84
Balm, horse	85
Balm of Gilead	35
Balsam apple, wild	92
Balsamine des bois	68
Balsaminées	68
Balsamine jaune	68
Balsam groundsel	101
Balsam poplar	35
Balsam willow	35
Baltic rush	29

	PAGE		PAGE
Baneberry, red.....	48	Bidens aristosa.....	100
Baneberry, white.....	48	Bidens Beckii.....	100
Baptisia tinctoria.....	60	Bidens bipinnata.....	100
Baptisie des teinturiers.....	60	Bidens cernua.....	99
Barbarea stricta.....	52	Bidens comosa.....	99
Barbarea vulgaris.....	52	Bidens connata.....	99
Barbarée dressée.....	52	Bidens discoidea.....	99
Bardane.....	101	Bidens frondosa.....	99
Bardanette hérissée.....	81	Bidens laevis.....	100
Barnyard grass.....	15	Bidens trichosperma, var. tenuiloba.....	100
Basil, field.....	84	Bident à aiguilles.....	100
Bastard toad flax.....	39	Bident aristé.....	100
Basswood.....	69	Bident chevelu.....	99
Basswood, southern.....	69	Bident de Beck.....	100
Bay-leaved willow.....	34	Bident discoide.....	99
Beach pea.....	62	Bident, grand à petits lobes.....	100
Beach fern, broad.....	7	Bident lisse.....	100
Bean, wild trailing.....	63	Bident penché.....	99
Bean, trailing wild.....	63	Bident touffu.....	99
Bearberry.....	76	Biennial gaura.....	73
Beard, goat's.....	102	Bignoniacées.....	89
Beard-grass, broom.....	14	Big shell bark hickory.....	36
Beard-grass, forked.....	14	Bindweed, black.....	41
Beauty, spring.....	45	Bindweed, field.....	80
Beard-tongue, hairy.....	86	Bindweed, hedge.....	80
Bebb's sedge.....	25	Bindweed, trailing.....	80
Bebb's willow.....	35	Birch, yellow.....	37
Bedstraw, hairy.....	90	Bishop's cap, two-leaved.....	54
Bedstraw, shining.....	90	Bitter cress, Pennsylvania.....	52
Bedstraw, small.....	90	Bitter dock.....	40
Bedstraw, rough.....	90	Bitternut.....	36
Bedstraw, northern.....	90	Bittersweet.....	67
Bedstraw, stiff marsh.....	90	Blackberry, high bush.....	58
Bedstraw, sweet-scented.....	90	Blackberry, running swamp.....	58
Bee balm.....	83	Black bindweed.....	41
Beech.....	37	Black currant, wild.....	54
Beech, blue.....	37	Black fruited mountain rice.....	17
Beggar-ticks.....	99	Black gum.....	16
Beggar-ticks, swamp.....	99	Black haw.....	91
Beggar's lice.....	81	Black walnut.....	36
Belle angélique.....	28	Bladder campion.....	45
Belle de jour.....	31	Bladder nut, american.....	67
Bellflower, marsh.....	92	Bladder sedge.....	28
Bellflower, tall.....	92	Bladderwort, great.....	88
Bellwort, large-flowered.....	30	Bladder wort, humped.....	88
Bellwort, sessile-leaved.....	30	Blephilia ciliata.....	84
Benjoin odorant.....	49	Blephilia, downy.....	84
Bénoîte blanche.....	57	Blephilia hirsuta.....	81
Bénoîte des ruisseaux.....	57	Bléphilie ciliée.....	84
Bénoîte de Virginie.....	57	Blite, strawberry.....	12
Bénoîte du printemps.....	57	Bloodroot.....	19
Bénoîte jaune.....	57	Blue beech.....	37
Benzoin estivale.....	49	Bluebells.....	81
Berberidées.....	49	Blueberry, early sweet.....	76
Berce laineuse.....	75	Blueberry, late low.....	77
Bergamot, pale wild.....	83	Blueberry, swamp.....	77
Bergamot, wild.....	83	Bluebottle.....	101
Berle à la larges feuilles.....	74	Blue-eyed grass, common.....	33
Bermudienne à feuilles étroites.....	33	Blue-eyed grass, northern.....	33
Bermudienne anticipée.....	33	Blue flag, large.....	33
Berry, Buffalo.....	71	Blue grass, Canada.....	20
Bétulacées.....	36	Blue-joint grass.....	18
Betula lutea.....	37	Blue lettuce, hairy-veined.....	102

AGE

100
100
100
99
99
99
99
99
100
100
100
100
99
100
99
100
99
99
73
89
36
41
80
80
80
37
54
52
40
36
67
58
58
41
54
17
16
91
36
45
67
28
88
88
84
81
81
84
42
49
37
81
76
77
77
101
33
33
33
20
18
102

	PAGE		PAGE
Blue lettuce, tall.....	102	Bromus ciliatus.....	21
Bluet.....	76	Bromus commutatus.....	21
Blue-weed.....	81	Bromus racemosus.....	21
Blunt broom sedge.....	25	Bromus secalinus.....	21
Blunt scaled Aetonia.....	18	Bronx winterberry.....	66
Blunt-leaved sandwort.....	44	Broom beard grass.....	14
Blunt spike rush.....	22	Broom sedge, blunt.....	25
Boehmeria cylindrica.....	39	Broom sedge, pointed.....	24
Boehmérie cylindrique.....	39	Brown hickory.....	36
Bois amer.....	64	Buckeye, fetid.....	68
Bois blanc.....	69	Buckthorn, alder-leaved.....	68
Bois blanc du sud.....	69	Buckwheat.....	42
Bois-bouton.....	90	Buckwheat, climbing false.....	41
Bois chandelle.....	66	Buckwheat, copse.....	41
Bois de calumet.....	75	Buffalo berry.....	71
Bois de plomb.....	71	Buffalo bur.....	85
Boltonia, aster-like.....	95	Bugle weed, common.....	84
Boltonia asteroides.....	95	Bugle weed, purple.....	84
Boltonie faux-aster.....	95	Buis.....	10
Bondue.....	59	Bulblet cypripetis.....	8
Boneset.....	93	Bullace plum.....	59
Boneset, upland.....	93	Bulrush, dark-green.....	24
Borraginées.....	81	Bulrush, leafy.....	24
Bosc's goosefoot.....	42	Bulrush, reddish.....	24
Botrychion de Virginie.....	9	Bulrush, river.....	24
Botrychion divisé.....	9	Bulrush, Torrey's.....	23
Botrychion simple.....	9	Bulrush, western.....	24
Botrychium ramosum.....	9	Bulrush, wood.....	24
Botrychium simplex.....	9	Bur oak.....	37
Botrychium virginianum.....	9	Bur, Buffalo.....	85
Bottle-brush grass.....	22	Bur cucumber, one-seeded.....	92
Boucéage jaune.....	75	Burdock, common.....	101
Bouncing bet.....	45	Burning bush.....	66
Bouteloua curtipendula.....	19	Bur-marigold, larger.....	100
Boutcloue en grappes.....	19	Bur reed, branching.....	12
Bouton rouge.....	60	Bur reed, broad fruited.....	11
Bower, virgin's.....	48	Bur reed sedge.....	25
Box elder.....	67	Bush, burning.....	66
Brachyelytrum.....	17	Bush clover.....	62
Brachyelytrum erectum.....	17	Bush clover, hairy.....	62
Brake, common.....	7	Bush clover, round-leaved.....	62
Branching bur reed.....	12	Bush clover, wand-like.....	62
Bouteloua Schreberi.....	46	Bush honeysuckle.....	91
Brasénie de Schreber.....	46	Bush, running strawberry.....	67
Brasil wolfia.....	28	Butter-and-eggs.....	86
Brassica arvensis.....	51	Buttercup, creeping.....	47
Brassica nigra.....	51	Buttercup, hispid.....	47
Bristle-leaved sedge.....	26	Buttercup, swamp.....	47
Bristle sedge.....	27	Butterfly weed.....	78
Bristle-stalked sedge.....	26	Butternut.....	36
Bristly crowfoot.....	47	Buttonbush.....	90
Brittle fern.....	8	Button bush dodder.....	80
Broad beach fern.....	7	Button snakeroot, dense.....	94
Broad fruited bur reed.....	11	Button snakeroot, large.....	93
Broad-leaved arrowhead.....	13		
Broad-leaved willow.....	34		
Brome cilié.....	21		
Brome du Canada.....	21		
Brome des seigles.....	21		
Brome dressé.....	21		
Brome grass, fringed.....	21		
Brome grass, variable.....	21		
Brome varié.....	21		

G.

Caetées.....	71
Cenothus americanus.....	68
Cenothus ovatus.....	68
Cakile edentula.....	51
Calamagrostide à longues feuilles.....	18
Calamagrostis canadensis.....	18

	PAGE		PAGE
Calaminta clinopodium.....	84	Carex Muhlenbergii.....	25
Calamint, low.....	84	Carex Muhlenbergii, var. <i>enervis</i>	25
Calamovilfa longifolia.....	18	Carex Oederi, var. <i>pumila</i>	27
Calendula officinalis.....	101	Carex pensylvanica.....	26
Calico aster.....	96	Carex riparia.....	27
Calle des marais.....	28	Carex rosea.....	25
Calottes.....	58	Carex rosea, var. <i>radiata</i>	25
Caltha palustris.....	48	Carex Sartwellii.....	26
Camassia esculenta.....	31	Carex scoparia.....	24
Camelina sativa.....	51	Carex sparganoides.....	25
Camomille des chiens.....	100	Carex stipata.....	26
Campanula americana.....	92	Carex stricta.....	26
Campanula aparinoides.....	92	Carex squarrosa.....	27
Campanulacées.....	92	Carex torta.....	26
Campanula rotundifolia.....	92	Carex tribuloides.....	25
Campanule épineuse.....	92	Carex tribuloides, var. <i>turbata</i>	25
Campanule d'Amérique.....	92	Carex varia.....	26
Campanule du Canada.....	92	Carex virescens, var. <i>Swanii</i>	26
Campion, bladder.....	45	Carex vulpinoidea.....	26
Campion, white.....	45	Carolina grass of Parnassus.....	54
Camptosorus rhizophyllus.....	7	Carolina whitlow grass.....	50
Canada anemone.....	48	Carotte à Moreau.....	74
Canada blue grass.....	20	Carotte cultivée.....	75
Canada rush.....	29	Carpet weed.....	44
Carrion root, one-flowered.....	88	Carpinus caroliniana.....	37
Carrion root, bis sativa.....	38	Carrion flower.....	32
Carrion root, à gros fruits.....	77	Carrot.....	75
Capillaire du Canada.....	7	Carum carvi.....	74
Capillary eragrostis.....	19	Carya alba.....	36
Capparidées.....	53	Carya amara.....	36
Caprifoliacées.....	91	Carya cordiformis.....	36
Capsella bursa-pastoris.....	50	Carya glabra.....	36
Caquillier maritime.....	51	Carya laciniosa.....	36
Caraway.....	74	Carya microcarpa.....	36
Cardamine bulbosa.....	52	Carya ovata.....	36
Cardamine Douglassii.....	52	Caryer à coeur blanc.....	36
Cardamine Pensylvanicus.....	52	Caryer à petits fruits.....	36
Cardinal flower.....	92	Caryer écailléux.....	36
Carex albicans.....	26	Caryer glabre.....	36
Carex aquatilis.....	26	Caryer lacinie.....	36
Carex Bebbii.....	25	Caryophyllées.....	44
Carex cephaloides.....	25	Cassia chamæcrista.....	60
Carex comosa.....	27	Cassia marilandica.....	60
Carex Crawei.....	27	Casse à grandes gousses.....	46
Carex cristata.....	25	Castalia tuberosa.....	46
Carex Davisii.....	26	Castalie blanche.....	37
Carex eburnea.....	26	Castanea dentata.....	88
Carex festucea, var. <i>brevior</i>	25	Castilleja coccinea.....	88
Carex filiformis.....	27	Castilleja écarlate.....	89
Carex flava.....	27	Catalpa.....	89
Carex Frankii.....	27	Catalpa bignonioides.....	89
Carex grabularis.....	27	Catalpa de Virginie.....	89
Carex hystericina.....	27	Catalpa speciosa.....	89
Carex intumescens.....	28	Catalpa superbe.....	89
Carex languinosa.....	27	Catawba tree.....	45
Carex laxiflora.....	26	Catchfly, forked.....	45
Carex laxiflora, var. <i>blanda</i>	27	Catchfly night flowering.....	45
Carex laxiflora, var. <i>varians</i>	27	Catchfly, sleepy.....	45
Carex laxifolia, var. <i>latifolia</i>	27	Catnip.....	83
Carex leptalea.....	26	Catnip giant hyssop.....	83
Carex lupulina.....	28	Cat's foot, field.....	97
Carex lurida.....	28	Cat-tail, common.....	11
		Cat-tail, narrow-leaved.....	11

25	<i>Caulophyllum thalictroides</i>	49
25	Céanothe d'Amérique.....	68
27	Céanothe petit.....	68
26	Cedar, red.....	11
27	Célastré grim pant.....	67
25	Célastrinées.....	66
25	<i>Celastrus scandens</i>	67
26	<i>Celtis occidentalis</i>	38
24	<i>Cenchrus carolinianus</i>	16
25	<i>Centaurea cyanus</i>	101
26	Centauree bleue.....	101
26	<i>Cephalanthus occidentalis</i>	90
27	Céraiste commun.....	44
26	Céraiste des champs à feuilles oblon- gues.....	44
25	Céraiste nutant.....	44
26	<i>Cerastium arvense</i> , var. <i>oblongi-</i> <i>folium</i>	44
26	<i>Cerastium nutans</i>	44
54	<i>Cerastium vulgatum</i>	44
50	Cératophyllées.....	45
74	<i>Ceratophyllum demersum</i>	45
5	<i>Cercis canadensis</i>	60
44	Cerfeuil étalé.....	74
37	Cerfeuil sauvage.....	74
32	Cerisier à grappes.....	59
75	Cerise de terre.....	85
74	Cerisier de Pensylvanie.....	59
36	Cerisier merisier.....	59
36	Cerisier nain.....	59
36	Cerisier noir.....	59
36	<i>Chærophyllum procumbens</i>	74
36	Chanvre cultivé.....	38
36	Chanvre d'eau.....	99
36	Chanvre indien.....	78
36	Chardon de Russie.....	43
36	Chardon des champs.....	101
36	Chardon des forêts.....	92
36	Chardon discoloré.....	101
44	Chardon géant.....	101
60	Chardon lancéolé.....	101
60	Chardon mutique.....	101
60	Charme de la Caroline.....	37
46	Châtaignier d'Amérique.....	37
46	Chataire commune.....	83
37	Chélonée glabre.....	86
88	Chlone glabra.....	86
88	Chêne à écorce jaune.....	38
89	Chêne blanc.....	37
89	Chêne châtaignier.....	37
89	Chêne écarlate.....	38
89	Chêne laurier.....	38
89	Chêne palustre.....	38
45	Chêne prin bicolore.....	37
45	Chénopodées.....	42
45	<i>Chenopodium album</i>	42
83	<i>Chenopodium album</i> , var. <i>viride</i>	42
83	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	42
97	<i>Chenopodium boatriss</i>	42
11	<i>Chenopodium Boscianum</i>	42
11	<i>Chenopodium capitatum</i>	42
	<i>Chenopodium hybridum</i>	42

	<i>Chenopodium leptophyllum</i>	42
	<i>Chenopodium urbicum</i>	42
	Chesnut.....	37
	Chesnut oak.....	37
	Chess, common.....	21
	Chess, upright.....	21
	Cherry, choke.....	59
	Cherry, clammy ground.....	85
	Cherry, common.....	59
	Cherry, glabrate ground.....	85
	Cherry, prairie ground.....	86
	Cherry, sand.....	59
	Cherry, sweet.....	59
	Cherry, wild black.....	59
	Cherry, wild red.....	59
	Chervil, spreading.....	74
	Chèvrefeuille glauque.....	91
	Chickweed, common.....	44
	Chickweed, common mouse-ear.....	44
	Chickweed, field mouse-ear.....	44
	Chickweed, forked.....	44
	Chickweed, nodding.....	44
	Chickweed, slender forked.....	43
	Chicot du Canada.....	59
	Chiendent.....	21
	<i>Chimaphila umbellata</i>	76
	Chicorée commune.....	102
	Chicory.....	102
	Chokeberry, black.....	55
	Choke berry.....	59
	Chou gras.....	42
	Christmas fern.....	8
	Chrysanthème matricaire.....	100
	Chrysanthème tanaïse.....	100
	<i>Chrysanthemum balsamita</i> , var. <i>ten-</i> <i>acetoïdes</i>	
	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> , var. <i>pinnatifidum</i>	100
	<i>Chrysanthemum parthenium</i>	100
	<i>Cichorium intybus</i>	102
	<i>Cicuta bulbifera</i>	74
	<i>Cicuta maculata</i>	74
	<i>Cicutaire bulbifère</i>	74
	<i>Cicutaire maculée</i>	74
	Ciguë tachetée.....	74
	<i>Cinna arundinacea</i>	18
	<i>Cinna roscau</i>	18
	Cinnamon fern.....	9
	Cinquefoil, bushy.....	57
	Cinquefoil, common.....	57
	Cinquefoil, larger common.....	57
	Cinquefoil, rough.....	56
	Cinquefoil, silvery.....	57
	Cinquefoil, tall.....	56
	<i>Circaea alpina</i>	73
	<i>Circaea lutetiana</i>	73
	Circée des Alpes.....	73
	<i>Cirsium altissimum</i>	101
	<i>Cirsium arvense</i>	101
	<i>Cirsium discolor</i>	101
	<i>Cirsium lanceolatum</i>	101
	<i>Cirsium muticum</i>	101
	Cistinées.....	70

	PAGE		PAGE
Citronelle.....	84	Conopholide d'Amérique.....	88
Cladier marisque.....	24	Conopholis americana.....	88
Cladium mariscoides.....	24	Convolvulacées.....	79
Clajoux.....	33	Convolvulus arvensis.....	80
Clammy-weed.....	53	Convolvulus sepium.....	80
Clasping-leaved pondweed.....	12	Convolvulus sepium, var. pubescens.....	80
Clavaliér à feuille de frêne.....	64	Conium maculatum.....	74
Claytonia Virginica.....	45	Copse buckwheat.....	41
Claytonie de Virginie.....	45	Coptis trifolia.....	48
Clayton fern.....	9	Coqueret ambigu.....	85
Cleavers.....	90	Coqueret fraise.....	85
Clématite de Virginie.....	48	Coqueret glabre.....	85
Clematis virginiana.....	48	Coqueret lancéolé.....	86
Cliff brake.....	7	Coqueret nyctaginé.....	85
Climbing false buckwheat.....	41	Corallorhize tachée.....	33
Climbing rose.....	58	Corallorrhiza maculata.....	33
Clotbur, common.....	98	Coral root, large.....	33
Clover, alsike.....	60	Corbeille d'or.....	48
Clover, Buffalo.....	60	Coréope, grand.....	99
Clover, bush.....	62	Coreopsis, tall.....	99
Clover, low hop.....	60	Coreopsis tripteris.....	99
Clover, rabbit-foot.....	60	Cornées.....	75
Clover, red.....	60	Cornel, alternate-leaved.....	76
Clover, sweet.....	60	Cornel, Bailey's.....	76
Clover, white.....	60	Cornel, dwarf.....	75
Clover, yellow.....	60	Cornel, panicled.....	76
Club rush, weak-stalked.....	23	Cornel, rough-leaved.....	76
Cockle, common.....	45	Cornel, round leaved.....	75
Cocklebur, american.....	98	Cornel, silky.....	75
Cocklebur, beach.....	98	Cornille submergé.....	45
Cockspur grass, salt-marsh.....	16	Cornouiller à feuilles alternes.....	76
Cockspur thorn.....	56	Cornouiller à feuilles arrondies.....	75
Coffee-tree, Kentucky.....	59	Cornouiller à feuilles rudes.....	76
Cognassier commun.....	55	Cornouiller à fleurs.....	75
Colic root.....	32	Cornouiller blanc.....	76
Collinsonia canadensis.....	85	Cornouiller de Bailey.....	76
Collinsonie du Canada.....	85	Cornouiller du Canada.....	75
Colombine.....	48	Cornouiller paniculé.....	76
Columbia Wolfia.....	28	Cornouiller soyeux.....	75
Comandra umbellata.....	39	Coru speedwell.....	87
Comaret des marais.....	57	Corn, squirrel.....	50
Commelinacées.....	29	Cornus alternifolia.....	76
Common brake.....	7	Cornus asperifolia.....	76
Common cat-tail.....	11	Cornus florida.....	75
Common chess.....	21	Cornus amonum.....	75
Common darnel.....	2	Cornus canadensis.....	75
Common day lily.....	30	Cornus circinata.....	75
Commancre en ombelle.....	39	Cornus Baileyi.....	76
Common floating pondweed.....	12	Cornus paniculata.....	76
Common fumitory.....	50	Cornus stolonifera.....	76
Common green briar.....	32	Corydale dorée.....	50
Common hazelnut.....	36	Corydale pâle.....	50
Common juniper.....	11	Corydalis aurea.....	50
Common smartweed.....	41	Corydalis flavula.....	50
Common wild oat grass.....	19	Corylus americana.....	36
Common wood rush.....	30	Costmary.....	100
Composées.....	93	Cottonwood.....	35
Cone flower, gray-headed.....	98	Couch grass.....	21
Cone flower, tall.....	98	Coudrier d'Amérique.....	36
Cone flower, thin-leaved.....	98	Cowbane.....	75
Conobea.....	87	Crab, american.....	55
Conobea multifida.....	87	Crab grass.....	14
Conobée multifide.....	87	Crab grass, small.....	14

PAGE		PAGE
88	Cranberry, large.....	77
88	Cranesbill, wild.....	63
79	Cranesbill, Carolina.....	64
80	Cranson rustique.....	52
80	Cratægus crus-galli.....	56
74	Cratægus mollis.....	56
41	Cratægus oxyacantha.....	56
48	Cratægus punctata.....	56
85	Cratægus tomentosa.....	56
85	Crawe's sedge.....	27
85	Creper, trumpet.....	89
86	Creper, virginia.....	68
85	Creeping buttercup.....	47
33	Creeping eragrostis.....	19
33	Creeping selaginella.....	10
33	Creeping spike rush.....	23
48	Cress, common winter.....	52
99	Cress erect fruited winter.....	52
99	Cress, field.....	50
99	Cress, hairy rock.....	53
99	Cress, hispid yellow.....	52
75	Cress, lyre-leaved rock.....	52
76	Cresson amer.....	52
76	Cresson de fontaine.....	51
75	Cresson des bois.....	51
76	Cresson des champs.....	50
76	Cresson des marais.....	52
75	Cresson d'hiver.....	52
75	Cresson du printemps.....	52
45	Cresson jaune des marais.....	52
76	Cresson pourpré.....	52
75	Cress, marsh.....	52
76	Cress, Pennsylvania bitter.....	52
75	Cress, purple.....	52
76	Cress, purple rock.....	53
76	Cress, smooth rock.....	53
75	Cress, spring.....	52
76	Cress, toothed rock.....	52
75	Cress, true water.....	51
87	Cress, yellow.....	51
50	Crested sedge.....	25
76	Crested shield fern.....	8
76	Crève-chien.....	85
75	Crève-yeux à feuilles d'épervière.....	101
75	Crowfoot, bristly.....	47
75	Crowfoot, cursed.....	46
75	Crowfoot, early.....	46
76	Crowfoot, hooded.....	46
76	Crowfoot, small-flowered.....	46
76	Crowfoot, stiff water.....	46
50	Crowfoot, tall.....	47
51	Crucifères.....	50
50	Cryptotania canadensis.....	74
50	Cucumber, one-seeded bur.....	92
36	Cucurbitacées.....	92
100	Cudweed, low.....	97
35	Culver's root.....	87
21	Cup plant.....	97
36	Cup, scarlet painted.....	88
75	Currant, Missouri.....	54
55	Currant, wild black.....	54
14	Cursed crowfoot.....	46
14	Cuscuta cephalanthi.....	80

	PAGE
Cuscuta indecora.....	80
Cuscuta g. onovii.....	80
Cuscuta obtusiflora.....	80
Cuscute à fleurs obtuses.....	80
Cuscute d'Amérique.....	80
Cuscute du bois bouton.....	80
Cuscute du céphalanthe.....	80
Cuscute jolie.....	80
Cycloloma atriplicifolium.....	42
Cynoglosse de Morrison.....	81
Cynoglosse officinale.....	81
Cynoglossum officinale.....	81
Cynthia.....	102
Cypéracées.....	22
Cyperus diandrus.....	22
Cyperus esculentus.....	22
Cyperus ferax.....	22
Cyperus filiculmis.....	22
Cyperus Houghtonii.....	22
Cyperus rivularis.....	22
Cyperus Schweinitzii.....	22
Cyperus strigosus.....	22
Cypress spurge.....	65
Cypripède pubescent.....	33
Cypripedium parviflorum var. pubes-	
cens.....	33
Cystoptéride bulbifère.....	8
Cystoptéride fragile.....	8
Cystopteris bulbifera.....	8
Cystopteris fragilis.....	8

D.

Dactyle pelotonné.....	20
Dactylis glomerata.....	20
Daisy, ox-eye.....	100
Daisy, yellow.....	98
Dandelion, common.....	102
Dande ion, red-seeded.....	102
Danthonia spicata.....	19
Danthonie en épis.....	19
Dark-green bulrush.....	24
Darnel, common.....	21
Datura stramonium.....	86
Datura tarula.....	86
Daucus carota.....	75
Davis sedge.....	26
Day lily, common.....	30
Décadent verticillé.....	72
Decadon verticillatus.....	72
Dentaire à deux feuilles.....	52
Dentaire laciniée.....	52
Dentaria diphylla.....	52
Dentaria laciniata.....	52
Desmodie à bractée.....	61
Desmodie à feuilles pointues.....	61
Desmodie à feuilles rondes.....	61
Desmodie à feuilles sessiles.....	62
Desmodie à fleurs nues.....	61
Desmodie blanchâtre.....	61
Desmodie de Dillen.....	61
Desmodie de l'Illinois.....	61
Desmodie du Canada.....	62
Desmodie paniculée.....	62

	PAGE		PAGE
Desmodie rigide.....	62	Early crowfoot.....	46
Desmodium bracteosum.....	61	Early meadow rue.....	47
Desmodium canadense.....	62	Ebony spleenwort.....	7
Desmodium canescens.....	61	Eclipta.....	98
Desmodium Dillenii.....	61	Eclipta alba.....	98
Desmodium grandiflorum.....	61	Eclipte blanche.....	98
Desmodium illinoense.....	61	Echinocloa crus-galli.....	15
Desmodium nudiflorum.....	61	Echinocloa Walteri.....	16
Desmodium paniculatum.....	62	Echinocloë crête de coq.....	15
Desmodium rigidum.....	62	Echinocloë de Walter.....	16
Desmodium rotundifolium.....	61	Echinocystis lobata.....	92
Desmodium sessifolium.....	62	Echinocystis lobé.....	92
Dewberry.....	58	Echium vulgare.....	81
Dianthera americana.....	89	Eel-grass pondweed.....	12
Dianthis barbatus.....	45	Églantier odorant.....	58
Dicentra canadensis.....	50	Elder, box.....	67
Dicentra cucullaria.....	49	Elder, common.....	91
Diclictère d'Amérique.....	50	Éléagnés.....	71
Diélytre en corne.....	49	Elecampane.....	97
Diervilla lonicera.....	91	Éléocharide aciculaire.....	23
Dierville du Canada.....	91	Éléocharide à tige aplatie.....	23
Digitaire petite.....	14	Éléocharide des marais.....	23
Digitaria humifusa.....	14	Éléocharide glauque des marais.....	23
Digitaria sanguinalis.....	14	Éléocharide grêle.....	23
Dioscorea villosa.....	32	Éléocharide intermédiaire.....	23
Dioscorées.....	32	Éléocharide obtuse.....	22
Dipsacées.....	92	Éleocharis acicularis.....	23
Dipsacus sylvestris.....	92	Eleocharis acuminata.....	23
Dirca palustris.....	71	Eleocharis intermedia.....	23
Ditch stonecrop.....	53	Eleocharis obtusa.....	22
Dock, bitter.....	40	Eleocharis palustris.....	23
Dock-leaved persicaria.....	40	Eleocharis palustris var. glaucescens.....	23
Dock, prairie.....	97	Eleocharis palustris, var. vicens.....	23
Dockmakie.....	91	Eleocharis tenuis.....	23
Dock, pale.....	40	Éleusine de l'Inde.....	19
Dock, swamp.....	40	Éleusine indica.....	19
Dock, yellow.....	39	Elm, american.....	38
Dodder, button nush.....	80	Elm, rock.....	38
Dodder, pretty.....	80	Elm, slippery.....	38
Dodder, smartweed.....	80	Elodea canadensis.....	14
Dogbane, spreading.....	78	Élude de Virginie.....	70
Dogbane, velvet.....	78	Élyme à feuilles glauques.....	22
Dogwood, flowering.....	75	Élyme de Virginie.....	21
Dogwood, red osier.....	76	Élyme du Canada.....	21
Doradille à fenilles étroites.....	7	Élyme grêle.....	22
Doradille ébène.....	7	Élymus canadensis.....	21
Doradille fougère femelle.....	7	Élymus canadensis, var. glaucifolius.....	22
Downy blephilia.....	84	Élymus striatus.....	22
Downy rattlesnake plantain.....	33	Élymus virginicus.....	21
Draba Caroliniana.....	50	Emmons' sedge.....	26
Draba verna.....	50	Enchanter's nightshade.....	73
Dragon head, false.....	83	Enchanter's nightshade, smaller.....	73
Drave de la Caroline.....	50	Épervière de Gronovius.....	103
Drave printanière.....	50	Épervière du Canada.....	103
Drosera rotundifolia.....	53	Épervière rude.....	103
Droséracées.....	53	Épervière veinée.....	103
Duckweed, greater.....	28	Éphémérine de Virginie.....	29
Duckweed, ivy-leaved.....	28	Éphémérine réfléxe.....	29
Duckweed, lesser.....	28	Épiaire àpre.....	83
Dulichie roseau.....	22	Épiaire des marais.....	83
Dulichium.....	22	Épilobe à épi.....	72
Dulichium arundinaceum.....	22		
Dutchman's breeches.....	49		

	PAGE		PAGE
Épilobe à feuilles linéaires.....	72	Eupatorium purpureum, var. macul- atum.....	93
Épilobe coloré.....	72	Eupatorium sessifolium.....	93
Épilobe du nord.....	72	Eupatorium urticifolium.....	93
Epipactis pubescente.....	33	Euphorbes à feuilles polygonales.....	65
Epilobium adenocaulon.....	72	Euphorbe à feuilles rondes.....	65
Epilobium angustifolium.....	72	Euphorbe à grandes feuilles.....	65
Epilobium coloratum.....	72	Euphorbe colorée.....	65
Epilobium densum.....	72	Euphorbe cyprés.....	65
Épinette rouge.....	11	Euphorbe dentée.....	65
Epipactis pubescens.....	33	Euphorbe de Presle.....	65
Épuisétacées.....	9	Euphorbe des bois.....	65
Equisetum arvense.....	9	Euphorbe hirsute.....	65
Equisetum fluviatile.....	9	Euphorbe maculée.....	65
Equisetum hyemale.....	10	Euphorbiacées.....	65
Equisetum hyemale, var. interma- dium.....	10	Euphorbia commutata.....	65
Equisetum hyemale, var. robustum..	10	Euphorbia corollata.....	65
Equisetum laevigatum.....	10	Euphorbia cyparissias.....	65
Equisetum sylvaticum.....	9	Euphorbia helioscopia.....	65
Equisetum variegatum.....	10	Euphorbia hirsuta.....	65
Érable argenté.....	67	Euphorbia maculata.....	65
Érable à sucre.....	67	Euphorbia platyphylla.....	65
Érable latard.....	67	Euphorbia polygonifera.....	65
Érable noir.....	67	Euphorbia Preslii.....	65
Érable rouge.....	67	Euphorbia serpens.....	65
Éragrostide à forte odeur.....	20	Europe: millet.....	15
Éragrostide capillaire.....	19	Evening primrose, common.....	73
Éragrostide chevelue.....	19	Evening primrose, rhombic.....	73
Éragrostide de Frank.....	19	Everlasting.....	97
Éragrostide pourpre.....	19	Everlasting, common.....	97
Éragrostide rampante.....	20	Everlasting, plantain-leaved.....	97
Eragrostis capillaris.....	19	Evonymus atropurpureus.....	66
Eragrostis Frankii.....	19	Evonymus obovatus.....	66
Eragrostis hypnoides.....	19		
Eragrostis megastachya.....	20	F.	
Eragrostis pectinacea.....	20	Fagacées.....	37
Eragrostis pilosa.....	19	Fagopyron esculentum.....	42
Erect knotweed.....	40	Fagus grandifolia.....	37
Ericacées.....	76	False flax.....	51
Erichtites hieracifolia.....	101	False foxglove, smooth.....	87
Erigenia bulbosa.....	74	False lily-of-the-valley.....	31
Erigénie bulbeuse.....	74	False mermaid.....	65
Erigeron philadelphicus.....	96	False pennyroyal.....	82
Erigeron annuus.....	97	False pimpernel, long-stalked.....	87
Erigeron canadensis.....	97	False spikenard.....	31
Erigeron pulchellus.....	96	Fausse dracocéphale.....	83
Erigeron ramosus.....	97	Fausse proserpine.....	65
Erysimum cheiranthoides.....	51	Faux grémil poilu.....	81
Érythron à fleurs blanches.....	31	Faux lin.....	51
Érythron d'Amérique.....	31	Faux muguet.....	31
Erythronium albidum.....	31	Faux-riz.....	16
Erythronium americanum.....	31	Feather, Prince's.....	41
Eupatoire à feuilles d'ortie.....	93	Fennel-leaved pondweed.....	13
Eupatoire à feuilles sessiles.....	93	Fen orchis.....	33
Eupatoire maculée.....	93	Fern, brittle.....	8
Eupatoire perfoliée.....	93	Fern, Christmas.....	8
Eupatoire pourpre.....	93	Fern, cinnamon.....	9
Eupatoire très élevée.....	93	Fern, Clayton.....	9
Eupatorium ageratoides.....	93	Fern, flowering.....	9
Eupatorium altissimum.....	93	Fern, Goldie's.....	8
Eupatorium perfoliatum.....	93	Fern, lady.....	7
Eupatorium purpureum.....	93	Fern, little grape.....	9

	PAGE		PAGE
Fern, matricary grape.....	9	Foxglove, smooth false.....	87
Fern, New-York.....	8	Fox sedge.....	25
Fern, ostrich.....	8	Foxtail.....	16
Fern rattlesnake.....	9	Foxtail, green.....	16
F.....	8	Foxtail, floating.....	17
.....sitive.....	8	Fragaria vesca, var. americana.....	56
.....p' ulose shield.....	7	Fragaria virginiana.....	56
.....walking.....	20	Fragaria virginiana, var. illinoensis.....	56
.....cuc grass, slende.....	21	Fraise de table.....	56
.....escue, meadow.....	21	Fraisier commun.....	56
Fescue, nodding.....	25	Fraisier de l'Illinois.....	56
Fescue sedge.....	20	Fraisier de Waldstein.....	58
Fescue, sheep's.....	21	Framboisier noir.....	19
Festuca elatior.....	21	Frank's eragrostis.....	27
Festuca nutans.....	20	Frank's sedge.....	77
Festuca octoflora.....	68	Fraxinus americana.....	78
Festuca ovina.....	21	Fraxinus nigra.....	77
Fetid buckeye.....	20	Fraxinus pensylvanicus.....	77
Fétuque des prés.....	21	Fraxinus quadrangulata.....	77
Fétuque grêle.....	21	Frène blanc.....	77
Fétuque nouée.....	20	Frène bleu.....	77
Fétuque ovine.....	100	Frène gras.....	78
Feverfew.....	60	Frène noir.....	64
Févier à trois épines.....	84	Frène piquant.....	77
Field basil.....	50	Frène rouge.....	13
Field cress.....	44	Fries' pondweed.....	21
Field mouse-ear chickweed.....	50	Fringed brome grass.....	70
Field penny cress.....	40	Frost weed, long-branched.....	82
Field sorrel.....	86	Fruit, fog.....	49
Figwort, hare.....	57	Fumariacées.....	50
Filipendule.....	57	Fumaria officinalis.....	50
Filipendula rubra.....	23	Fumeterre officinale.....	67
Fimbristyle grêle.....	23	Fusain courant.....	66
Fimbristylis autumnalis.....	45	Fusain d'Amérique.....	
Fire pink.....	101		
Fireweed.....	57		
Five-finger, marsh.....	23		
Flat stemmed spike rush.....	39		
Flax, bastard toad.....	63		
Flax, common.....	63		
Flax, grooved yellow.....	97		
Fleabane, daisy.....	96		
Fleabane, Philadelphia.....	17		
Floating foxtail.....	65		
Floerkea proserpinacoides.....	45		
Floquet.....	92		
Flower, cardinal.....	69		
Flower-of-an-hour.....	9		
Flowering fern.....	82		
Fog fruit.....	16		
Folle avoine.....	18		
Foin bleu.....	16		
Foin de senteur.....	14		
Forked beard-grass.....	45		
Forked catchfly.....	44		
Forked chickweed.....	43		
Forked chickweed, slender.....	15		
Forked panicum.....	7		
Fougère ambulante.....	8		
Fougère de Noël.....	9		
Fougère fleurie.....	20		
Fowl meadow grass.....	87		
Foxglove, fern-leaved.....	87		
Foxglove, mullein.....			

G.

Gadelier de la Floride.....	54
Gadelier de Missouri.....	90
Gaillet boréal.....	90
Gaillet brillant.....	90
Gaillet des teinturiers.....	90
Gaillet fausse-apérule.....	90
Gaillet fausse-circée.....	90
Gaillet gratteron.....	90
Gaillet lancéolé.....	90
Gaillet odorant.....	90
Gaillet poilu.....	90
Gaillet trifide.....	90
Gainier du Canada.....	90
Galium aparine.....	90
Galium asperellum.....	90
Galium boreale.....	90
Galium circaezans.....	90
Galium concinnum.....	90
Galium lanceolatum.....	90
Galium pilosum.....	90
Galium tinctorium.....	90
Galium trifidum.....	90
Galium triflorum.....	90
Garden asparagus.....	31
Garlic mustard.....	51
Garlic, wild.....	30

	PAGE		PAGE
Green sedge.....	27	Hélianthème du Canada.....	70
Grémil à feuilles étroites.....	81	Helianthem canadense.....	70
Grémil blanchâtre.....	81	Helianthus annuus.....	98
Grémil des champs.....	81	Helianthus decapetalus.....	99
Grémil, faux poilu.....	81	Helianthus divaricatus.....	99
Grémil velu.....	81	Helianthus giganteus.....	98
Gromwell, corn.....	81	Helianthus hirsutus.....	99
Gromwell, shaggy false.....	81	Helianthus trachelifolius.....	99
Grooved yellow flax.....	63	Helianthus strumosus.....	99
Groseille ronce de chien.....	54	Helianthus strumosus, var. mollis.....	99
Gueule noire.....	55	Helianthus tuberosus.....	99
Guignier.....	59	Héliopsis faux-hélianthe.....	58
Gum, black.....	76	Héliopsis helianthoides.....	98
Gymnocladus dioica.....	59	Hemerocallis fulva.....	30
Gymnastic hérisson.....	22	Hemicarpha.....	24
Ground cherry, clammy.....	85	Hémicarpha à petites fleurs.....	24
Ground cherry, glabrate.....	85	Hemicarpha micrantha.....	24
Ground cherry, prairie.....	86	Hemlock, poison.....	74
Ground ivy.....	83	Hemlock, water.....	74
Ground pink.....	80	Hemp.....	38
Ground-nut.....	73	Hemp, indian.....	78
Groundsel, balsam.....	101	Hemp, western water.....	43
		Henbane, black.....	86
H.		Henbit.....	83
Habenaria ciliaris.....	33	Hepatica acutiloba.....	47
Habenaria flava.....	33	Hepatica tribola.....	47
Habenaria psychodes.....	33	Hépatique à lobes aigus.....	47
Hackweed, Canada.....	103	Hépatique à trois lobes.....	47
Hackweed, Gronovius.....	103	Heracleum lanatum.....	75
Hackweed, rough.....	103	Heart-leaved umbrella wort.....	43
Hair grass.....	18	Herbe à coutures.....	89
Hair-like stenophyllus.....	23	Herbe à dinde.....	100
Hairy panicum.....	15	Herbe à la clef.....	76
Hairy wood rush.....	30	Herbe à liens.....	18
Halberd-leaved orache.....	42	Herbe à ouate.....	79
Halo:agées.....	73	Herbe à poux.....	98
Hamamélidées.....	54	Herb à Robert.....	63
Hamamelis virginica.....	54	Herbe aux ânes.....	73
Harbinger-of-spring.....	74	Herbe aux chantres.....	51
Harebell.....	92	Herbe aux chats.....	83
Hare fwort.....	86	Herbe aux écus.....	77
Hericot grim pant.....	63	Herbe aux mites.....	86
Hart rouge.....	76	Herbe aux sorcières.....	73
How-black.....	91	Herbe St-Jean.....	69
Hawthorne, english.....	56	Herb Robert.....	63
Hazelnut, common.....	36	Heteranthera dubia.....	29
Heal-all.....	83	Hêtre.....	37
Heart-leaved willow.....	34	Heuchera americana.....	54
Heath aster, white.....	96	Hibiscus moscheutos.....	69
Hedeoma pulgioides.....	84	Hibiscus trionum.....	69
Hédéome.....	84	Hickory, big shell bark.....	36
Hedge bindweed.....	80	Hickory, brown.....	36
Hedge mustard.....	51	Hickory, pignut.....	36
Hedge nettle, rough.....	83	Hickory, small-fruited.....	36
Hélénie automnale.....	100	Hickory, shagbark.....	36
Helenium automnale.....	100	Hieracium canadense.....	103
Hélianthe à feuilles minces.....	99	Hieracium gronovii.....	103
Hélianthe à feuilles pâles.....	99	Hieracium scabrum.....	103
Hélianthe à grandes feuilles.....	99	Hieracium venosum.....	103
Hélianthe campanule.....	99	Hierocloe odorata.....	16
Hélianthe divariqué.....	99	Hill's pondweed.....	12
Hélianthe hirsute.....	99	Hispid buttercup.....	47
		Hispid green briar.....	32

	PAGE	I.	PAGE
Hispid panicum.....	15	Hyssope fausse chataire.....	83
Hispid yellow cress.....	52	If du Canada.....	10
Hog peanut.....	63	Igname velue.....	32
Hog peanut, Pitcher's.....	63	Ilex verticillata.....	66
Hollyhock.....	69	Ilex verticillata, var. tenuifolia.....	66
Honewort.....	74	Ill-scented wake robin.....	32
Honey locust.....	60	Illécébrées.....	43
Honeysuckle, bush.....	91	Ilysanthes à longs pédoncules.....	87
Honeysuckle, Douglass.....	91	Ilysanthes dubia.....	87
Hooded crowfoot.....	46	Immortelle blanche.....	97
Hop, common.....	38	Immortelle odorante.....	97
Hop sedge.....	28	Impatiens biflora.....	68
Hordeum jubatum.....	21	Impatiens pallida.....	68
Horehound, common.....	63	Indian grass.....	14
Horehound, cut-leaved water.....	84	Indian hemp.....	78
Horehound, stalk water.....	84	Indian pipe.....	76
Hornwort.....	45	Indian rice.....	16
Horse balm.....	85	Indian tobacco.....	93
Horse nettle.....	85	Indigo, wild.....	60
Horse radish.....	52	Interrupted pondweed.....	13
Horsetail, common.....	9	Inula helenium.....	97
Horsetail, swamp.....	9	Ipomée à feuilles de lierre.....	79
Horsetail, wood.....	9	Ipomée patate douce.....	79
Horse-weed.....	97	Ipomée pourpre.....	79
Houblon commun.....	38	Ipomea hederacea.....	79
Houghton's cyperus.....	22	Ipomea pandurata.....	79
Hound's tongue, common.....	81	Ipomea purpurea.....	79
Houque odorante.....	16	Iridées.....	33
Houstonia ciliolata.....	90	Iris versicolor.....	33
Houstonia fringed.....	90	Iris versicolore.....	33
Houstonia longifolia.....	90	Ironweed, Illinois.....	93
Houstonia, slender-leaved.....	90	Ironweed, New-York.....	93
Houstonie à longues feuilles.....	90	Ironweed, tall.....	93
Houstonie ciliée.....	90	Ironweed, western.....	93
Houx canadien.....	66	Ironwood.....	37
Huckleberry black.....	76	Isanthe branchu.....	82
Humulus lupulus.....	38	Isanthus brachiatus.....	82
Hyacinth.....	31	Italian millet.....	16
Hyacinthe sauvage.....	31	Ivraie vivace.....	21
Hydrate du Canada.....	48	Ivy, ground.....	83
Hydrastis canadensis.....	48	Ivy-leaved duckweed.....	28
Hydrocharidées.....	14	Ivy, poison.....	66
Hydrophylle à appendice.....	80		
Hydrophylle de Virginie.....	80	J.	
Hydrophyllées.....	80	Jack-in-the-pulpit.....	28
Hydrophyllum appendiculatum.....	80	Jalousie.....	45
Hydrophyllum virginicum.....	80	Jasmin trompette.....	89
Hypéricinées.....	69	Jeffersonia diphylla.....	49
Hypericum gentianoides.....	70	Jeffersonie gemellée.....	49
Hypericum Kalmianum.....	70	Jerusalem artichoke.....	99
Hypericum majus.....	70	Jerusalem oak.....	42
Hypericum mutilum.....	70	Joe-pye weed.....	93
Hypericum perforatum.....	69	Joncées.....	13
Hypericum prolificum.....	70	Jonc à fruits pointus.....	29
Hypericum punctatum.....	70	Jonc commun.....	29
Hypericum virginicum.....	70	Jonc crapaud.....	29
Hypoxide hirsute.....	32	Jonc de la mer Baltique.....	29
Hypoxis hirsuta.....	32	Jonc des chaisiers.....	24
Hyoscyamus niger.....	86	Jonc de Torrey.....	30
Hystrix patula.....	22	Jonc du Canada.....	29
Hyssop, catnip giant.....	83	Jonc de Richardson.....	30
		Joncées.....	29

	PAGE		PAGE
Jonc épais.....	29	Laiche blanchâtre.....	26
Jonc faux-scirpe.....	29	Laiche céphaloïde.....	25
Jonc faux-scirpe noueux.....	29	Laiche changeante à fleurs lâches.....	27
Jonc grêle.....	29	Laiche de Belb.....	25
Juglandées.....	36	Laiche de Craze.....	27
Juglans cinerea.....	36	Laiche de Davis.....	26
Juglans nigra.....	36	Laiche de Frank.....	27
Juncus acuminatus.....	29	Laiche de Muhlenberg.....	25
Juncus alpinus, var. insignis.....	30	Laiche de Muhlenberg, var. faible.....	25
Juncus balticus, var. littoralis.....	29	Laiche de Muskingum.....	24
Juncus bufonius.....	29	Laiche de Pensylvanie.....	26
Juncus brachycephalus.....	29	Laiche de Sartwell.....	26
Juncus canadensis.....	29	Laiche des lacs.....	27
Juncus effusus.....	29	Laiche des porcs-épics.....	27
Juncus nodosus.....	29	Laiche d'ivoire.....	26
Juncus tenuis.....	29	Laiche dressée.....	26
Juncus Torreyi.....	30	Laiche douce à fleurs lâches.....	27
Juneberry, common.....	55	Laiche enroulée.....	26
Juneberry, round-leaved.....	55	Laiche épaisse.....	26
June grass.....	20	Laiche étoilée.....	25
Juniper communis.....	11	Laiche faux-rubaniér.....	25
Juniper communis var. depressa.....	11	Laiche faux-vulpin.....	25
Juniperus virginiana.....	11	Laiche filiforme.....	27
Jusquiame noire.....	86	Laiche granuleuse.....	27
		Laiche jaune.....	27
K.		Laiche kineuse.....	27
Kentucky coffee-tree.....	59	Laiche livide.....	28
Ketmie des marais.....	69	Laiche lupuline.....	28
Ketmie vésiculeuse.....	69	Laiche merveilleuse, petite.....	25
Keulérie à crêtes.....	19	Laiche plumeuse.....	27
Knot grass.....	40	Laiche polytrique.....	26
Knotted rush.....	29	Laiche porte-têtes.....	25
Knotweed, erect.....	40	Laiche rabotense.....	27
Knotweed, shore.....	40	Laiche rabougrie.....	25
Knotweed, slender.....	40	Laiche radice.....	25
Knotweed, virginia.....	41	Laiche stérile.....	25
Koeleria.....	19	Laiche variée.....	26
Koeleria cristata.....	19	Laiche verdâtre de Swan.....	26
Krigia amplexicaulis.....	102	Laiche verte.....	27
Krigia à grande tige.....	102	Laiche vésiculeuse.....	28
		Laiteron âpre.....	102
L.		Laitue bleue poilue.....	102
Labiée.....	82	Laitue de la Floride.....	102
Lactuca canadensis.....	102	Laitue de montagnes.....	102
Lactuca canadensis, var. montana.....	102	Laitue épinense.....	102
Lactuca floridana.....	102	Laitue glauque à fleurs blanches.....	103
Lactuca hirsuta.....	102	Laitue grande, bleue.....	102
Lactuca scariola.....	102	Laitue hirsute.....	102
Lactuca spicata.....	102	Laitue sauvage.....	102
Lactuca villosa.....	102	Lamb's quarters.....	42
Lady fern.....	7	Lamier amplexicaule.....	83
Lady's slipper, larger yellow.....	33	Lamium amplexicaule.....	83
Lady's sorrel.....	63	Lampoude commune.....	98
Lady's thumb.....	41	Lampoude du Canada.....	98
Ladies' tresses, nodding.....	33	Lampoude hérissée.....	98
Laiche à balai.....	24	Laportea canadensis.....	39
Laiche à crête.....	25	Lappula echinata.....	1
Laiche à feuilles de côté.....	27	Lappula virginiana.....	81
Laiche à fleurs lâches.....	26	Large blue flag.....	33
Laiche alène.....	26	Large coral root.....	33
Laiche aquatique.....	26	Large creeping spike rush.....	23
		Large-flowered bellwort.....	30
		Large flowered wake robin.....	32

	PAGE		PAGE
Large-leaved pondweed.....	12	Lilas commun.....	78
Large-toothed aspen.....	35	Liliacées.....	30
Larger najas.....	13	Lilium canadense.....	31
Larix laricina.....	11	Lilium philadelphicum.....	30
Late goldenrod.....	91	Lilium philadelphicum, var. andinum.....	30
Lathyrus maritimus.....	62	Limnanthacées.....	65
Lathyrus ochroleucus.....	63	Linaria vulgaris.....	86
Lathyrus palustris.....	63	Lin commun.....	63
Laurel oak.....	38	Lin des crapauds.....	86
Laurinées.....	49	Linées.....	63
Leafcup, small flowered.....	97	Lin jaune.....	63
Leaf, shin.....	76	Linum sulcatum.....	63
Leafy bulrush.....	24	Linum utilissimum.....	63
Leaf pondweed.....	13	Liparis de Loesel.....	33
Leatherwood.....	71	Liparis Loeseli.....	33
Léchée majeur.....	70	Lippia lanceolata.....	82
Léchée mineur.....	70	Lippie lancéolée.....	82
Lechea minor.....	70	Liquorice, wild.....	90
Lechea villosa.....	70	Liriodendron tulipifera.....	48
Leek, wild.....	30	Lis de Philadelphie.....	30
Leersia oryzoides.....	16	Lis du Canada.....	31
Leersia virginica.....	16	Lis d'un jour.....	30
Léersie à fleurs de riz.....	16	Liseron des champs.....	80
Léersie de Virginie.....	16	Liseron des haies.....	80
Légumineuses.....	59	Liseron noir.....	41
Lemnacées.....	28	Liseron pubescent.....	80
Lemna minor.....	28	Listris en épi.....	94
Lemna trisulca.....	28	Listris scariosa.....	93
Lenticule, grande.....	28	Listris spicata.....	94
Lenticule mineure.....	28	Lis rouge de l'ouest.....	30
Lenticule prolifère.....	28	Lithospermum angustifolium.....	81
Léontice pigamoide.....	49	Lithospermum arvense.....	81
Leonurus cardiaca.....	83	Lithospermum canescens.....	81
Lepichys pinnata.....	98	Lithospermum Gmelini.....	81
Lepidium apetalum.....	50	Little grape fern.....	9
Lepidium campestre.....	50	Little prickly sedge.....	25
Lepidium virginicum.....	50	Live-for-ever.....	54
Leptandre à feuilles graminées.....	29	Liverleaf, round-lobed.....	47
Lespedeza capitata.....	62	Liverleaf, sharp-lobed.....	47
Lespedeza frutescens.....	62	Lizard's rail.....	34
Lespedeza hirta.....	62	Lobelia, brook.....	93
Lespedeza violacea.....	62	Lobelia cardinalis.....	92
Lespedeza virginica.....	62	Lobéliacées.....	92
Léspédézie à fleurs en tête.....	62	Lobelia, great.....	92
Léspédézie à feuilles rondes.....	62	Lobelia inflata.....	93
Léspédézie de Virginie.....	62	Lobelia Kalmii.....	93
Léspédézie poilie.....	62	Lobelia, pale spiked.....	92
Léspédézie violette.....	62	Lobelia spicata.....	92
Lesser duckweed.....	28	Lobelia syphilitica.....	92
Lettuce, Florida.....	102	Lobelia cardinale.....	92
Lettuce, glaucous white.....	103	Lobélie de Kalm.....	93
Lettuce, hairy-veined blue.....	102	Lobélie en épi.....	92
Lettuce, hairy wood.....	102	Lobélie enflée.....	93
Lettuce, prickly.....	102	Lobélie, grande.....	92
Lettuce, tall blue.....	102	Loenst, common.....	61
Lettuce, wild.....	102	Locust, honey.....	60
Lettuce, tall white.....	103	Lolium perenne.....	21
Lettuce, white.....	103	Lombardy poplar.....	36
Liard.....	35	Long-fruited anemone.....	47
Liatis scarieux.....	93	Long-leaved pondweed.....	12
Lierre terrestre.....	83	Long-leaved reed grass.....	12
Ligustrum vulgare.....	78	Long-leaved tichwort.....	44
Lilac, common.....	78	Lonicera glaucescens.....	91

M.

	PAGE		PAGE
Merisier blanc.....	37	Moneywort, prairie.....	77
Mermaid, false.....	65	Monkey flower, square-stemmed.....	87
Mermaid-weed.....	73	Monnayère.....	50
Mertensia virginica.....	81	Monotropa uniflora.....	76
Mertensia de Virginie.....	81	Montrope uniflore.....	76
Mexican tea.....	42	Moonseed.....	49
Michaux's cyperus.....	22	Morelle de la Caroline.....	85
Micocoulier occidental.....	38	Morelle grimpante.....	85
Mignonnette jaune.....	53	Morelle noire.....	85
Mignonnette, yellow cut-leaved.....	53	Morelle rostrée.....	85
Mil.....	17	Morning glory, common.....	79
Mil des oiseaux.....	16	Morning glory, ivy leaved.....	79
Milfoil, spiked water.....	73	Morus rubra.....	39
Milk purslane.....	65	Motherwort, common.....	83
Milk vetch, carolina.....	61	Moth mullein.....	86
Milkweed, common.....	79	Mountain ash, american.....	55
Milkweed, Florida.....	79	Mountain maple.....	67
Milkweed, green.....	79	Mountain mint, hairy.....	84
Milkweed, poke.....	79	Mountain mint, virginian.....	84
Milkweed, purple.....	78	Mountain rice, black fruited.....	17
Milkweed, swamp.....	79	Mountain rice, white grained.....	17
Milkweed, whorled.....	79	Mouron blanc.....	44
Milkwort, purple.....	64	Mouron grêle.....	43
Milkwort, racemed.....	64	Mouse-ear chickweed, common.....	44
Milkwort, whorled.....	64	Mouse-ear chickweed, field.....	44
Millefeuille.....	73	Moutarde de capucin.....	52
Millepertuis de Kalm.....	70	Moutarde des champs.....	51
Millepertuis du Canada.....	70	Moutarde noire.....	51
Millepertuis en balai.....	70	Muhlenbergia des bois.....	17
Millepertuis nain.....	70	Muhlenbergia de Schreber.....	17
Millepertuis ponctué.....	70	Muhlenbergia des marais.....	17
Millepertuis prolifique.....	70	Muhlenbergia foliosa.....	17
Millet d'Europe.....	15	Muhlenbergia des rochers.....	17
Millet étalé.....	16	Muhlenbergia dressée.....	17
Millet grass.....	16	Muhlenbergia du Mexique.....	17
Millet, italian.....	16	Muhlenbergia mexicana.....	17
Milium effusum.....	16	Muhlenbergia racemosa.....	17
Mil sauvage.....	16	Muhlenbergia Schreberi.....	17
Mimule ringent.....	87	Muhlenbergia sobolifera.....	17
Mimulus ringens.....	87	Muhlenbergia sylvatica.....	17
Minnesota muhlenbergia.....	17	Muhlenbergia touffue.....	17
Mint, american wild.....	85	Muhlenberg's sedge.....	25
Mint, mountain hairy.....	84	Mulberry, red.....	39
Mint, pepper.....	85	Mullein, common.....	86
Mint, virginian mountain.....	84	Mullein foxglove.....	87
Mint, wood.....	84	Mullein, moth.....	86
Missouri currant.....	54	Mullein, white.....	86
Mitella diphylla.....	54	Mûrier rouge.....	39
Mitella à deux feuilles.....	54	Muskingum sedge.....	24
Miterwort, false.....	54	Musk mallow.....	69
Mocker nut.....	36	Mustard, black.....	51
Molène blanche.....	86	Mustard, common.....	51
Molène commune.....	86	Mustard, garlic.....	51
Mollugine verticillée.....	44	Mustard, tansy.....	51
Molluge verticillata.....	44	Mustard, hedge.....	51
Monarda didyma.....	83	Mustard, tower.....	53
Monarda fistulosa.....	83	Mustard, tumble.....	51
Monarda mollis.....	83	Mustard, worm-seed.....	51
Monarde didyme.....	83	Myosotis des marais.....	81
Monarde fistuleuse.....	83	Myosotis virginica.....	81
Monarde pâle.....	83	Myriophylle à épi.....	73
Moneywort.....	77	Myriophyllum spicatum.....	73

[illegible]

	PAGE		PAGE
Osage orange.....	38	Pariétaire de Pensylvanie.....	39
Oseille des champs.....	40	Parietaria pensylvanica.....	39
Osier doré.....	34	Parnassia caroliniana.....	54
Osmorhiza elaytoni.....	74	Parnassie de la Caroline.....	54
Osmorhiza longistylis.....	74	Parsnip.....	75
Osmorhize à longs styles.....	74	Parsnip, cow.....	75
Osmorhize à styles courts.....	74	Parsnip, meadow.....	75
Osmondacées.....	9	Parsnip, water.....	74
Osmunda cinnamomea.....	9	Partridge pea.....	60
Osmunda Claytonia.....	9	Passerage apétale.....	50
Osmunda regalis.....	9	Passerage de Virginie.....	50
Osmonde cannelle.....	9	Pastinaca sativa.....	75
Osmonde interrompue.....	9	Pasture rose.....	59
Ostrich fern.....	8	Patience crépue.....	39
Ostrya virginiana.....	37	Pâturin annuel.....	20
Ostryer de Virginie.....	37	Pâturin comprimé.....	20
Oval-headed sedge.....	25	Pâturin des prés.....	20
Oxalide cornue.....	63	Pâturin grêle.....	20
Oxalidées.....	63	Pea, beach.....	62
Oxalis corniculata.....	63	Peach.....	59
Oxalis violacea.....	63	Peach-leaved willow.....	34
Ox-eye.....	98	Peanut, hog.....	63
Ox-eye daisy.....	100	Peanut, Pitcher's hog.....	63
Oxypolis rigidior.....	75	Pea, partridge.....	60
		Pear, common.....	55
P.		Pear thorn.....	56
Pain de coucou.....	63	Pear, western prickly.....	71
Painted cup, scarlet.....	88	Pêcher.....	59
Pale corydalis.....	50	Pédiculaire lancéolée.....	88
Pale dock.....	40	Pédiculaire du Canada.....	88
Pale manna grass.....	20	Pedicularis canadensis.....	88
Panaïs cultivé.....	75	Pedicularis lanceolata.....	88
Panax quinquefolium.....	73	Pellaea atropurpurea.....	7
Panax trifolium.....	73	Pellée pourprée.....	7
Panic à baguettes.....	15	Pellitory, pensylvania.....	39
Panic à larges feuilles.....	15	Pénacs.....	63
Panic capillaire.....	15	Pennyroyal, false.....	82
Panic clandestin.....	15	Pennyroyal, american.....	84
Panic de misère.....	15	Pensylvania Aetonia.....	19
Panic de Philadelphie.....	15	Pensylvania pellitory.....	39
Panic fausse-agrostis.....	15	Pensylvania persicaria.....	41
Panic flexible.....	15	Pensylvania sedge.....	26
Panic fourchu.....	15	Penthorum sedoides.....	53
Panic millet.....	15	Pentstémon hirsute.....	86
Panic pourpré.....	15	Pentstemum hirsutus.....	86
Panic velu.....	14	Peppergrass, apetalous.....	50
Panicum agrostoides.....	15	Peppergrass, wild.....	50
Panicum capillare.....	15	Pepper, mint.....	85
Panicum clandestinum.....	15	Pepper, wild water.....	41
Panicum depauperatum.....	15	Periwinkle, common.....	78
Panicum dichotomum.....	15	Persicaria, dock-leaved.....	40
Panicum flexile.....	15	Persicaria, pensylvania.....	41
Panicum huachucae.....	15	Persicaria, slender pink.....	40
Panicum milliaceum.....	15	Persicaria, swamp.....	40
Panicum philadelphicum.....	15	Pervenche.....	78
Panicum scoparium.....	15	Petite laiche merveilleuse.....	25
Panicum virgatum.....	15	Peuplier baumier.....	35
Pansy, wild.....	71	Peuplier blanc.....	35
Papavéracées.....	49	Peuplier d'Italie.....	36
Papayer commun.....	48	Peuplier faux-tremble.....	35
Papoose root.....	49	Peuthore faux-orpin.....	53
Papaw, common.....	48	Phacelia purshii.....	81
		Phacelia, Pursh's.....	81

	PAGE		PAGE
Phacélie de Pursh.....	81	Plantago major.....	89
Phalaris arundinacea.....	16	Plantago rugelii.....	89
Phalaris roseau.....	16	Plantain à feuilles cordées.....	89
Phegopteris dryopteris.....	7	Plantain à grandes feuilles.....	89
Phegopteris hexagonoptera.....	7	Plantain aristé.....	89
Phléole des prés.....	17	Plantain, common.....	89
Phleum pratense.....	17	Plantain d'eau.....	14
Phlox bleu.....	80	Plantain de Rugel.....	89
Phlox, blue.....	80	Plantain, english.....	89
Phlox divaricata.....	80	Plantain, heart-leaved.....	89
Phlox, downy.....	80	Plantain lancéolé.....	89
Phlox pileux.....	80	Plantain, large-bracted.....	89
Phlox pilosa.....	80	Plantain, robin's.....	96
Phlox rampant.....	80	Plantain, Rugel's.....	89
Phlox subulata.....	80	Plant, cup.....	97
Phragmites communis.....	19	Platanées.....	54
Phryma à épi grêle.....	89	Platanée occidentale.....	54
Phrymaces.....	89	Platanus occidentalis.....	54
Phryma leptostachya.....	89	Plum, bullace.....	59
Physalis heterophylla.....	85	Plum, wild.....	59
Physalis heterophylla, var. ambigua.....	85	Poa annua.....	20
Physalis heterophylla, var. nyctaginea.....	85	Poa compressa.....	20
Physalis lanceolata.....	86	Poa debilis.....	20
Physalis pruinosa.....	85	Poa pratensis.....	20
Physalis subglabrata.....	85	Podophyllum peltatum.....	49
Physocarpus opulifolius.....	85	Pogonia ophioglossoides.....	33
Physostegia virginiana.....	83	Pogonie rose.....	33
Phytolacca dacandra.....	43	Pointed broom sedge.....	24
Phytolaccées.....	43	Poireau sauvage.....	30
Phytolacque commune.....	43	Poirier commun.....	55
Pickrel weed.....	29	Poirier sauvage.....	55
Picradenia, stemless.....	100	Poison hemlock.....	74
Picradénie herbacée.....	100	Poison ivy.....	66
Pigamon dioïque.....	47	Poison sumach.....	66
Pigamon dioïque purpurin.....	47	Poivre d'eau.....	41
Pigamon du Canada.....	47	Poke, common.....	45
Pignut hickory.....	36	Poke milkweed.....	79
Pigweed.....	42	Polanisia graveolens.....	53
Pigweed, amaranth.....	43	Polanisia odorante.....	53
Pigweed, winged.....	42	Polémoine bleue.....	80
Pilea pumila.....	39	Polémoniacées.....	80
Pilingre.....	41	Polemonium reptans.....	80
Pimpernel, long-stalked false.....	87	Polygala à feuilles de côté.....	64
Pimprnel, yellow.....	75	Polygala à fleurs pourpres.....	64
Pinacées.....	10	Polygala de Virginie.....	64
Pin blanc.....	10	Polygala polygama.....	64
Pine, prince's.....	76	Polygala polygame.....	64
Pink, round.....	80	Polygala sanguinea.....	64
Pin oak.....	38	Polygala seneca.....	64
Pin sylvestre.....	11	Polygala senega, var. latifolia.....	64
Pinus strobus.....	10	Polygala verticillata.....	64
Pinus sylvestris.....	11	Polygala verticillé.....	64
Pinweed, large.....	70	Polygalées.....	64
Pinweed, thyme-leaved.....	70	Polygonacées.....	39
Pipe, indian.....	76	Polygonatum biflorum.....	31
Pipéracées.....	34	Polygonatum commutatum.....	32
Pissenlit à graines rouges.....	102	Polygonum acre.....	41
Pissenlit officinal.....	102	Polygonum amphibium.....	40
Plaine.....	67	Polygonum aviculare.....	40
Plantaginées.....	79	Polygonum aviculare, var. littorale.....	40
Plantago aristata.....	89	Polygonum convolvulus.....	41
Plantago cordata.....	89	Polygonum dumetrum.....	41
Plantago lanceolata.....	89	Polygonum erectum.....	40

	PAGE		PAGE
Polygonum hydropiper.....	41	Potamogeton lucens.....	12
Polygonum hydropiperoides.....	41	Potamogeton natans.....	12
Polygonum lapathifolium.....	40	Potamogeton pectinatus.....	13
Polygonum Muhlenbergii.....	40	Potamogeton perfoliatus.....	12
Polygonum orientale.....	41	Potamogeton pusillus.....	13
Polygonum pensylvanicum.....	41	Potamogeton Richardsonii.....	12
Polygonum persicaria.....	41	Potamogeton zosterifolius.....	12
Polygonum sagittatum.....	41	Potamo à feuilles variées.....	12
Polygonum scandens.....	41	Potamo à grandes feuilles.....	12
Polygonum tenue.....	40	Potamo brillant.....	12
Polygonum tomentosum.....	40	Potamo comprimé.....	12
Polygonum virginicum.....	41	Potamo d'Amérique.....	12
Polymnia canadensis.....	97	Potamo de Fries.....	13
Polymnie du Canada.....	97	Potamo de Hill.....	12
Polypode commun.....	7	Potamo de Richardson.....	12
Polypode dryoptère.....	7	Potamo interrompu.....	13
Polypode phéoptère.....	7	Potamo nageant.....	12
Polydriacées.....	7	Potamo pectiné.....	13
Polypodium vulgare.....	7	Potamo perfolié.....	12
Polypody, common.....	7	Potamo petit.....	13
Polystichum acrostichoides.....	8	Potamo touffu.....	13
Polytrich officinal.....	7	Potamo touffu de Niagara.....	13
Pomme de mai.....	49	Potato vine, wild.....	79
Pommier à bouquet.....	55	Potentilla anserina.....	57
Pommier commun.....	55	Potentilla argentea.....	57
Pondweed, clasping-leaved.....	12	Potentilla arguta.....	56
Pondweed, common floating.....	12	Potentilla canadense.....	57
Pondweed, cel-grass.....	12	Potentilla canadensis, var. simplex.....	57
Pondweed, fennel-leaved.....	13	Potentilla monspeliensis.....	56
Pondweed, Fries'.....	13	Potentilla paradoxa.....	57
Pondweed, Hill's.....	12	Potentilla palustris.....	57
Pondweed, interrupted.....	13	Potentilla anserina.....	57
Pondweed, large-leaved.....	12	Potentilla argentée.....	57
Pondweed, long-leaved.....	12	Potentilla de Montpellier.....	56
Pondweed, leafy.....	13	Potentilla du Canada.....	57
Pondweed, Richardson.....	12	Potentilla frutescente.....	57
Pondweed, shining.....	12	Potentilla grande.....	56
Pondweed, small.....	13	Por marigold.....	101
Pondweed, various leaved.....	12	Pourpier commun.....	45
Pontederia cordata.....	29	Prairie dock.....	97
Pontédérie à feuilles cordées.....	29	Prairie monarda.....	77
Portulacées.....	45	Prairie violet.....	71
Poplar, balsam.....	35	Prairie willow.....	35
Poplar, Lombardy.....	36	Prêle de marais.....	9
Poplar, white.....	35	Prêle des champs.....	9
Populus balsamifera.....	35	Prêle des bois.....	9
Populus deltoides.....	35	Prêle d'hiver.....	10
Populus nigra, var. italica.....	36	Prêle d'hiver forte.....	10
Populus tremuloides.....	35	Prêle d'hiver intermédiaire.....	10
Porcupine grass.....	17	Prêle douce.....	10
Porcupine sedge.....	27	Prêle variée.....	10
Portulaca oleracea.....	45	Prénanthe à fleurs en grappes.....	103
Potamogeton americanus.....	12	Prénanthe blanche.....	103
Potamogeton amplifolius.....	12	Prénanthes alba.....	103
Potamogeton foliosus.....	13	Prénanthes altissima.....	103
Potamogeton foliosus, var. niagarensis.....	13	Prénanthes racemosa.....	103
Potamogeton Friesii.....	13	Prénanthes racemosa, var. pinnatifida.....	103
Potamogeton heterophyllum.....	12	Prénanthe très élevée.....	103
Potamogeton heterophyllum, forma maximus.....	12	Prickly ash, northern.....	64
Potamogeton Hillii.....	12	Prickly lettuce.....	102
Potamogeton interruptus.....	13	Prickly pear, western.....	71
		Prickly sida.....	69

	PAGE		PAGE
Primulacées.....	77	Queue de cheval.....	9
Prince's feather.....	41	Quince, common.....	55
Prince's pine.....	76		
Privet.....	78	R.	
Proserpinaca palustris.....	73	Racemed boutelous.....	19
Proserpinie des marais.....	73	Racine des cygnes.....	13
Prostrate amaranth.....	43	Radicula armoracia.....	52
Pruneautier.....	59	Radicula nasturtium-aquaticum.....	51
Prunella vulgaris.....	83	Radicula palustris.....	52
Prunelle commune.....	83	Radicula palustris, var. hispida.....	52
Prunier rouge.....	59	Radicula sylvestris.....	51
Prunier sauvage.....	59	Ragouminier.....	59
Prunus americana.....	59	Ragweed, common.....	98
Prunus avium.....	59	Ragweed, great.....	98
Prunus cerasus.....	59	Ragwort, golden.....	101
Prunus instititia.....	59	Raisin de couleuvre.....	49
Prunus pennsylvanica.....	59	Raisin d'ours.....	76
Prunus persica.....	59	Raisinette.....	31
Prunus pumila.....	59	Ranunculus abortivus.....	46
Prunus serotina.....	59	Ranunculus acris.....	47
Prunus virginiana.....	59	Ranunculus circinatus.....	46
Pseclera vitacea.....	68	Ranunculus delphinifolius.....	46
Ptelea trifoliata.....	64	Ranunculus fascicularis.....	46
Pteris aquilina.....	7	Ranunculus hispida.....	47
Puccoon, hairy.....	81	Ranunculus pennsylvanicus.....	46
Puccoon, narrow-leaved.....	81	Ranunculus recurvatus.....	47
Purple amaranth.....	43	Ranunculus repens.....	46
Purple eragrostis.....	20	Ranunculus scleratus.....	47
Purple milkwort.....	64	Ranunculus septentrionalis.....	47
Purple willow.....	35	Rapace.....	108
Purplish meadow rue.....	47	Raspberry, black.....	58
Purslane, common.....	45	Raspberry, dwarf.....	58
Purslane, milk.....	65	Raspberry, purple flowering.....	58
Purslane, water.....	72	Raspberry, purple wild.....	58
Putty root.....	33	Rattlesnake fern.....	9
Pycnanthème de Virginie.....	84	Rattlesnake plantain, downy.....	33
Pycnanthème pileux.....	84	Rattlesnake weed.....	103
Pycnanthemum pilosum.....	84	Red baneberry.....	48
Pycnanthemum virginianum.....	84	Redbud.....	60
Pyrola elliptica.....	76	Red cedar.....	11
Pyrole elliptique.....	76	Reddish bulrush.....	24
Pyrus americana.....	55	Red lily, western.....	30
Pyrus communis.....	55	Red mulberry.....	39
Pyrus coronaria.....	55	Red oak.....	38
Pyrus cydonia.....	55	Red osier dogwood.....	76
Pyrus malus.....	55	Red top.....	18
Pyrus melanocarpa.....	55	Red top, tall.....	19
		Red-root, smaller.....	58
Q.		Reed.....	19
Queen of the prairie.....	57	Reed canary grass.....	16
Quenouille.....	11	Reed grass, long-leaved.....	18
Quercitron.....	38	Reed grass, wood.....	18
Quercus alba.....	37	Reed, sea-sand.....	18
Quercus bicolor.....	37	Reflexed spidewort.....	29
Quercus coccinea.....	38	Renonculacées.....	46
Quercus macrocarpa.....	37	Renoncule abortive.....	46
Quercus imbricaria.....	38	Renoncule à calice recourbé.....	46
Quercus Muhlenbergii.....	37	Renoncule âcre.....	47
Quercus palustris.....	38	Renoncule circinée.....	46
Quercus prinoides.....	37	Renoncule couchée.....	47
Quercus rubra.....	38	Renoncule de Pennsylvanie.....	47
Quercus velutina.....	38	Renoncule fasciculée.....	46

	PAGE		PAGE
Renoncule hispide.....	47	Root, culver's.....	87
Renoncule jaune.....	46	Root, one-flowered cancer.....	88
Renoncule scélérate.....	46	Root, squaw.....	88
Renoncule septentrionale.....	47	Rosa blanda.....	58
Renouée âcre.....	41	Rosa carolina.....	59
Renouée à feuilles de patience.....	40	Rosacées.....	55
Renouée amphibie.....	40	Rosa humilis.....	59
Renouée aviculaire des rivages.....	40	Rosa rubiginosa.....	58
Renouée de Muhlenberg.....	40	Rosa setigera.....	58
Renouée de Pensylvanie.....	41	Roseau.....	19
Renouée de Virginie.....	41	Rose, climbing.....	58
Renouée d'Orient.....	41	Rose de Caroline.....	59
Renouée douce.....	41	Rose des pâturages.....	59
Renouée dressée.....	40	Rose des pelouses.....	58
Renouée grêle.....	40	Rose des prairies.....	58
Renouée grêle rosée.....	40	Rose, meadow.....	58
Renouée grimpante.....	41	Rose, pasture.....	59
Renouée grimpante des buissons.....	41	Rose pogonia.....	33
Renouée persicaire.....	41	Rose, swamp.....	59
Renouée sagittée.....	41	Rose trémière.....	69
Résédacées.....	53	Rosier des marais.....	59
Reseda lutea.....	53	Rosinweed, whorled.....	97
Réveille-matin.....	65	Rossolis à feuilles rondes.....	53
Rhamnées.....	68	Rotala.....	72
Rhamnus alnifolia.....	68	Rotala ramosior.....	72
Rhus canadensis.....	66	Rotala ramifié.....	72
Rhus glabra.....	66	Rough avens.....	57
Rhus toxidendron.....	66	Round-lobed liverleaf.....	47
Rhus typhina.....	66	Rubanie à gros fruits.....	11
Rhus vernix.....	66	Rubanie américain.....	12
Ribes aureum.....	54	Rubiacees.....	90
Ribes cynobasti.....	54	Rubus alleghaniensis.....	58
Ribes floridum.....	54	Rubus canadensis.....	58
Rice cut grass.....	16	Rubus hispidus.....	58
Rice, indian.....	16	Rubus idaeus, var. canadensis.....	58
Richardson pondweed.....	12	Rubus neglectus.....	58
Richardson's rush.....	30	Rubus occidentalis.....	58
Richweed.....	39	Rubus odoratus.....	58
Ricinelle de virginie.....	65	Rubus strigosus.....	58
River-bank sedge.....	27	Rubus triflorus.....	58
River bulrush.....	24	Rubus villosus.....	58
Riz blanc des montagnes.....	17	Rudbeckia hirta.....	98
Riz du Canada.....	16	Rudbeckia laciniata.....	98
Robert, herb.....	63	Rudbeckia triloba.....	98
Robinia pseudo-acacia.....	61	Rudbeckie à feuilles minces.....	98
Robinier faux-acacia.....	61	Rudbeckie à tête grise.....	98
Robin's plantain.....	96	Rudbeckie hérissée.....	98
Rock cress, hairy.....	53	Rudbeckie laciniée.....	98
Rock cress, lyre-leaved.....	52	Rue anémone.....	47
Rock cress, purple.....	53	Rue, early meadow.....	47
Rock cress, smooth.....	53	Rue, purplish meadow.....	47
Rock cress, toothed.....	52	Rue, tall meadow.....	47
Rock, elm.....	38	Rumex acetosella.....	40
Rock muhlenbergia.....	17	Rumex à feuilles obtuses.....	40
Rock sandwort.....	44	Rumex altissimus.....	40
Rogon de coq.....	31	Rumex britannica.....	39
Ronce des Alleghans.....	58	Rumex britannique.....	39
Ronce framboisier.....	58	Rumex crispus.....	39
Ronce hispide.....	58	Rumex des marais.....	40
Ronce naine.....	58	Rumex obtusifolius.....	40
Ronce odorante.....	58	Rumex pâle.....	40
Ronce pourpre.....	58	Rumex verticillatus.....	40
Ronce velue.....	58	Running strawberry bush.....	67

	PAGE		PAGE
Rutacées.....	64	Sand bar willow.....	34
Rush aster.....	96	Sandbur.....	16
Rush, Baltic.....	29	Sand cherry.....	59
Rush, Canada.....	29	Sand dropseed.....	18
Rush, common.....	29	Sand grass.....	19
Rush grass, sheath ed.....	18	Sandwort, blunt-leaved.....	44
Rush grass, small.....	18	Sandwort, rock.....	44
Rush, sharp-fruited.....	29	Sandwort, thyme leaved.....	44
Rush, knotted.....	29	Sang-dragon.....	49
Rush, Richardson's.....	30	Sanguinaria canadense.....	49
Rush, slender.....	29	Sanicle du Canada.....	74
Rush, small-headed.....	29	Sanicle du Maryland.....	73
Rush, Torrey's.....	30	Sanicula canadensis.....	74
Russian thistle.....	43	Sanicula marilandica.....	73
		Santalacées.....	39
S.		Sapindacées.....	67
Sabline à feuilles de thym.....	44	Sapindacées.....	45
Sabline droite.....	44	Saponaire officinale.....	45
Sabline latériflore.....	44	Saponaria officinalis.....	45
Sage willow.....	35	Sarrasin.....	42
Sagittaria arifolia.....	14	Sarriette commune.....	84
Sagittaire flèche d'eau.....	14	Sarriette des jardins.....	84
Sagittaria graminea.....	14	Sarriette glabre.....	84
Sagittaria heterophylla.....	14	Sartwell's sedge.....	26
Sagittaria latifolia.....	13	Sassafras.....	49
Sagittaire à fruits sessiles.....	14	Sassafras à feuilles variées.....	49
Sagittaire herbacée.....	14	Sassafras variifolium.....	49
Salicaire ailée.....	72	Satureja glabra.....	84
Salicées.....	34	Satureja hortensis.....	84
Salix alba.....	34	Satureja vulgaris.....	84
Salix alba, var. vitellina.....	34	Saule à chatons pédicellés.....	35
Salix amygdaloides.....	34	Saule à éperon.....	35
Salix babylonica.....	34	Saule à feuilles cordées.....	34
Salix balsamifera.....	35	Saule à feuilles d'apalanche.....	35
Salix candida.....	35	Saule à feuilles de laurier.....	34
Salix cordata.....	34	Saule à feuilles de pêche.....	34
Salix discolor.....	35	Saule à feuilles glauques.....	34
Salix discolor, var. ericephala.....	35	Saule à feuilles longues.....	34
Salix glaucophylla.....	34	Saule à fruits stipités.....	35
Salix humilis.....	35	Saule baumier.....	35
Salix longifolia.....	34	Saule blanc.....	34
Salix lucida.....	34	Saule blanchâtre.....	35
Salix nigra.....	34	Saule brillant.....	34
Salix pedicellaris.....	35	Saule discoloré.....	35
Salix pentandra.....	34	Saule gris.....	35
Salix petiolaris.....	35	Saule humide.....	35
Salix purpurea.....	35	Saule jaune.....	34
Salix rostrata.....	35	Saule noir.....	34
Salix sericea.....	35	Saule pleureur.....	34
Sallow sedge.....	28	Saule pourpre.....	35
Salomon's seal, great.....	32	Saururées.....	34
Salomon's seal, small.....	31	Saurure penché.....	34
Salomon's seal, star-flowered.....	31	Saururus cernuus.....	34
Salomon's seal, three-leaved.....	31	Savory, summer.....	84
Salt-marsh cockspur grass.....	16	Savoyane.....	48
Saisaparilla, wild.....	73	Saxifragées.....	54
Salsepareille sauvage.....	73	Scabious, sweet.....	97
Salsifis des jardins.....	102	Scarlet oak.....	38
Salsifis des prés.....	102	Sceau de Salomon, grand.....	32
Salsify.....	102	Sceau de Salomon, petit.....	31
Salsola kali, var. tenuifolia.....	43	Schweinitz's cyperus.....	22
Sambucus canadensis.....	91	Scirpe à tige faible.....	23
		Scirpe des bois.....	24
		Scirpe des étangs.....	24

	PAGE		PAGE
Scirpe des rivières.....	24	Sedge, pointed broom.....	24
Scirpe de Torrey.....	23	Sedge, porcupine.....	27
Scirpe feuillu.....	24	Sedge, river-bank.....	27
Scirpe laineux.....	24	Sedge, sallow.....	28
Scirpe occidental.....	24	Sedge, Sartwell's.....	26
Scirpe rougeâtre.....	24	Sedge, slender.....	27
Scirpe triquétre.....	23	Sedge, squarrose.....	27
Scirpe vert-foncé des bois.....	24	Sedge, stellate.....	25
Scirpus americanus.....	23	Sedge, Swan's.....	26
Scirpus atrovirens.....	24	Sedge, thin-leaved.....	25
Scirpus cyperinus, var. pelius.....	24	Sedge, tussock.....	26
Scirpus debilis.....	23	Sedge, twisted.....	26
Scirpus fluviatilis.....	24	Sedge, water.....	26
Scirpus lineatus.....	24	Sedge, white bear.....	27
Scirpus occidentalis.....	24	Sedge, whitish.....	26
Scirpus polyphyllus.....	24	Sedge, wooly.....	27
Scirpus sylvaticus.....	24	Sedge, yellow.....	27
Scirpus Torreyi.....	23	Sedum acre.....	53
Scleria triglomerata.....	24	Sedum purpureum.....	54
Sclérie à trois glomérules.....	24	Sedum ternatum.....	53
Scorpion grass, early.....	81	Seedbox.....	72
Scotch fir.....	11	Seigle sauvage.....	21
Scouring rush.....	10	Selaginella apus.....	10
Scribner's panicum.....	15	Selaginellacées.....	10
Scrofulaire des lièvres.....	86	Selaginelle rampante.....	10
Scrofularines.....	86	Seneca snakeroot.....	64
Scrophularia leporella.....	86	Senecio aureus.....	101
Scrub chesnut oak.....	37	Senecio balsamitae.....	101
Scutellaire des marais.....	82	Senecio obovatus.....	101
Scutellaire latriflore.....	82	Sénéçon à feuille ronde.....	101
Scutellaire petite.....	82	Sénéçon haumier.....	101
Scutellaria versicolore.....	82	Sénéçon doré.....	101
Scutellaria galericulata.....	82	Senellier.....	56
Scutellaire lateriflora.....	82	Séné sauvage.....	60
Scutellaria parvula.....	82	Sénévé.....	51
Scutellaria versicolor.....	82	Senna, wild.....	60
Sea-sand reed.....	18	Sensitive fern.....	8
Seaside arrow-grass.....	13	Sessile-fruited arrow-head.....	14
Seaside spurge.....	64	Sessile-leaved bellwort.....	30
Sea rocket, american.....	51	Sessile-leaved twisted stalk.....	31
Sedge, awl-fruited.....	26	Sétaire d'Italie.....	16
Sedge, Bebb's.....	25	Sétaire glauque.....	16
Sedge, bladder.....	28	Setaria glauca.....	16
Sedge, bristle.....	27	Setaria italica.....	16
Sedge, bristle-leaved.....	26	Setaria viridis.....	16
Sedge, bristle-stalked.....	26	Seymeria macrophylla.....	87
Sedge, bur reed.....	25	Seymerie à grandes feuilles.....	87
Sedge, Crawe's.....	27	Shad bush.....	55
Sedge, crested.....	25	Shagbark hickory.....	36
Sedge, Davis.....	26	Sharp-fruited rush.....	29
Sedge, Emmons'.....	26	Sharp-lobed liverleaf.....	47
Sedge, fescue.....	25	Sheathed rush grass.....	18
Sedge, fox.....	25	Sheep's fescue.....	20
Sedge, Frank's.....	27	Shepherdia canadensis.....	71
Sedge, green.....	27	Shépédie du Canada.....	71
Sedge, hop.....	28	Shepherd's purse.....	50
Sedge, little prickly.....	25	Shining cyperus.....	22
Sedge, loose-flowered.....	26	Shining pondweed.....	12
Sedge, meadow.....	27	Shin leaf.....	76
Sedge, Muhlenberg's.....	25	Sickle pod.....	53
Sedge, Muskingum.....	24	Sicyos angulatus.....	92
Sedge, oval-headed.....	25	Sicyos anguleux.....	92
Sedge, Pennsylvania.....	26	Sida épineux.....	69

	PAGE		PAGE
<i>Sida spinosa</i>	69	Smartweed, common.....	41
<i>Silene antirrhina</i>	45	Smartweed dodder.....	80
<i>Silène de Virginie</i>	45	Smartweed, water.....	41
<i>Silene dichotoma</i>	45	<i>Smilax</i> à feuilles rondes.....	32
<i>Silène enflée</i>	45	<i>Smilace</i> à tige carrée.....	32
<i>Silène fourchue</i>	45	<i>Smilace</i> à tige droite.....	32
<i>Silene latifolia</i>	45	<i>Smilace</i> herbacé.....	32
<i>Silène mufler</i>	45	<i>Smilace</i> hispide.....	32
<i>Silene noctiflora</i>	45	<i>Smilacina racemosa</i>	31
<i>Silène noctiflora</i>	45	<i>Smilacina stellata</i>	31
<i>Silene virginica</i>	45	<i>Smilacina trifolia</i>	31
Silky willow.....	35	<i>Smilacina</i> à grappes.....	31
Silphion à trois feuilles.....	97	<i>Smilacina</i> à trois feuilles.....	31
Silphion des prairies.....	97	<i>Smilacine</i> étoilée.....	31
Silphion perfolié.....	97	<i>Smilax</i> ecirrhata.....	32
<i>Silphium perfoliatum</i>	97	<i>Smilax</i> herbacea.....	32
<i>Silphium terebinthinaceum</i>	97	<i>Smilax</i> hispida.....	32
<i>Silphium trifoliatum</i>	97	<i>Smilax</i> rotundifolia.....	32
Silver maple.....	67	<i>Smilax</i> rotundifolia, var. quadrangulata.....	32
Silver weed.....	57	Smooth scouring rush.....	10
Simaroubées.....	64	Smooth sumach.....	66
<i>Sisymbre blanchâtre</i>	51	Snakeroot, black.....	73
<i>Sisymbre blanchâtre</i> à petits fruits.....	51	Snakeroot, dense button.....	94
<i>Sisymbre très élevé</i>	51	Snakeroot, large button.....	93
<i>Sisymbrium altissimum</i>	51	Snakeroot, seneca.....	64
<i>Sisymbrium canescens</i>	51	Snakeroot, short-styled.....	74
<i>Sisymbrium canescens</i> , var. brachycarpon.....	51	Snakeroot, white.....	93
<i>Sisymbrium officinale</i> , var. leiocarpum.....	51	Snowberry.....	91
<i>Sisyrinchium gramineum</i>	33	Snowberry, low.....	91
<i>Sisyrinchium angustifolium</i>	33	Solanées.....	85
<i>Sium cicutaefolium</i>	74	<i>Solanum carolinense</i>	85
Shie t, water.....	46	<i>Solanum dulcamara</i>	85
Shining willow.....	34	<i>Solanum nigrum</i>	85
Shore knotweed.....	40	<i>Solanum rostratum</i>	85
Skullcap, heart-leaved.....	82	Soleil.....	98
Skullcap, mad-dog.....	82	Soleil géant.....	98
Skullcap, marsh.....	82	<i>Solidago altissima</i>	94
Skullcap, small.....	82	<i>Solidago caesia</i>	94
Skunk cabbage.....	28	<i>Solidago canadensis</i>	94
Sleepy catchfly.....	45	<i>Solidago graminifolia</i>	95
Slender creeping spike rush.....	23	<i>Solidago hispida</i>	94
Slender cyperus.....	22	<i>Solidago juncea</i>	94
Slender fescue grass.....	20	<i>Solidago juncea</i> , var. scabrella.....	94
Slender fimbriatylis.....	23	<i>Solidago latifolia</i>	94
Slender forked chickenweed.....	43	<i>Solidago nemoralis</i>	94
Slender knotweed.....	40	<i>Solidago patula</i>	94
Slender mountain grass.....	17	<i>Solidago Riddellii</i>	95
Slender najas.....	13	<i>Solidago rigida</i>	94
Slender nettle.....	39	<i>Solidago rugosa</i>	94
Slender rush.....	29	<i>Solidago serotina</i>	94
Slender sedge.....	27	<i>Solidago speciosa</i>	94
Slender spike rush.....	23	<i>Solidago ulmifolia</i>	94
Slender wild rye.....	22	Sorber d'Amérique.....	55
Slipery elm.....	38	<i>Sorghastrum nutans</i>	14
Slough grass.....	19	<i>Sorgho commun</i>	14
Small crab grass.....	14	Sorrel, field.....	40
Small-flowered crowfoot.....	46	Sorrel, lady's.....	63
Small-fruited hickory.....	36	Souchet brillant.....	22
Small-headed rush.....	29	Souchet comestible.....	22
Small pondweed.....	13	Souchet diandre.....	22
Small rush grass.....	18	Souchet de Houghton.....	22
Small Salomon's seal.....	31	Souchet de Michaud.....	22

	PAGE		PAGE
Souchet de Schweinitz.....	22	Spurge, seaside.....	65
Souchet élané.....	22	Spurge, tinted.....	65
Souchet grêle.....	22	Spurge, toothed.....	65
Souci d'eau.....	48	Spurge, upright spotted.....	65
Souci des jardins.....	101	Square-stemmed green briar.....	32
Sow-thistle, spiny-leaved.....	102	Squarrose sedge.....	27
Spanish needles.....	100	Squaw root.....	88
Sparganiacées.....	11	Squaw-weed, round-leaf.....	101
Sparganium americanum, var. andro- cladum.....	12	Squirrel corn.....	50
Sparganium eurycarpum.....	11	Squirrel tail grass.....	21
Spartina Michauxiana.....	19	Stachys palustris.....	83
Spartine de Michaud.....	19	Stachys tenuifolia, var. aspera.....	83
Spear grass, low.....	20	Staghorn sumach.....	66
Spear grass, weak.....	20	Staphyléacées.....	67
Spearmint.....	85	Staphylea trifolia.....	67
Speedwell, common.....	87	Staphylier à feuilles ternées.....	64
Speedwell, corn.....	87	Staphylier à feuilles ternées.....	67
Speedwell, thyme-leaved.....	87	Star-flowered Salomon's seal.....	31
Speedwell, water.....	87	Star of Bethlehem.....	31
Speckled alder.....	37	Starved panicum.....	15
Spéculaire perfolié.....	92	Steironema ciliatum.....	77
Specularia perfoliata.....	92	Steironema quadriflorum.....	77
Sphénopholis pâle.....	19	Stellaire à longues feuilles.....	44
Sphenopholis pallens.....	19	Stellaire moyenne.....	44
Sphénopholis obtus.....	18	Stellate sedge.....	25
Sphenopholis obtusa.....	18	Stellaria longifolia.....	44
Spice bush.....	49	Stellaria media.....	44
Spidewort.....	29	Sténophylle capillaire.....	23
Spidewort, reflexed.....	29	Stenophyllus capillaris.....	23
Spikenard.....	73	Stick-tight.....	99
Spikenard, false.....	31	Stickseed, european.....	81
Spike rush, blunt.....	22	Stiff water crowfoot.....	46
Spike rush- creeping.....	23	Stipa spartea.....	17
Spike rush- flat stemmed.....	23	Stipe à touffes raides.....	17
Spike rush- large creeping.....	23	Stitchwort, long-leaved.....	44
Spike rush, matted.....	23	Stonecrop, ditch.....	53
Spike rush, needle.....	23	Stonecrop, mossy.....	53
Spike rush, slender.....	23	Stonecrop, wild.....	53
Spike rush, slender creeping.....	23	Stout scouring rush.....	10
Spinulose shield fern.....	8	Stramoine commune.....	86
Spiræa salicifolia.....	55	Stramoine pourprée.....	86
Spiranthe penchée.....	33	Stramonium.....	86
Spiranthes cernua.....	33	Stramonium, purple.....	86
Spirée à feuilles de saule.....	55	Strawberry, american wood.....	56
Spirée à feuilles d'obier.....	55	Strawberry, barren.....	56
Spirodella polyrhiza.....	28	Strawberry blite.....	42
Spleenwort, ebony.....	7	Strawberry, common.....	56
Spleenwort, maidenhair.....	7	Strawberry, Illinois.....	56
Spleenwort, narrow-leaved.....	7	Strawberry tomato.....	85
Sporobole des sables.....	18	Strawberry, wild red.....	58
Sporobole engainé.....	18	Straw-coloured cyperus.....	22
Sporobole petit jonc.....	18	Streptope rose.....	31
Sporobolus cryptandrus.....	18	Streptopus roseus.....	31
Sporobolus neglectus.....	18	Strophostyles helvola.....	63
Sporobolus vaginiflorus.....	18	St. John's wort, common.....	69
Spring avens.....	57	St. John's wort, dwarf.....	70
Spring beauty.....	45	St. John's wort, Kalm.....	70
Spring cress.....	52	St. John's wort, larger canadian.....	70
Spurge, broad-leaved.....	65	St. John's wort, marsh.....	70
Spurge, cypress.....	65	St. John's wort, shrubby.....	70
Spurge, hairy.....	65	St. John's wort, spotted.....	70
Spurge, round-leaved spreading.....	65	Sugarberry.....	38
		Sugar maple.....	67

	PAGE		PAGE
Sumac amarante.....	66	Tanaisie commune.....	100
Sumac du Canada.....	66	Tanaisie crépue.....	100
Sumac glabre.....	66	Tansy.....	100
Sumach, fragrant.....	66	Tansy, common.....	100
Sumach, poison.....	66	Tansy mustard.....	51
Sumach, smooth.....	66	Taraxacum erythrospermum.....	102
Sumach, staghorn.....	66	Taraxacum officinale.....	102
Sumac vénéneux.....	66	Taxacées.....	10
Sumac vernis.....	66	Taxus canadensis.....	10
Summer savory.....	84	Tea, mexican.....	42
Sundew, round-leaved.....	53	Tea, New-Jersey.....	68
Sunflower, common.....	98	Tear-thumb, arrow leaved.....	41
Sunflower, pale-leaved.....	99	Teasel, wild.....	92
Sunflower, pale-leaved wood.....	99	Tecoma radicans.....	89
Sunflower, stiff-haired.....	99	Terre-noix ailée.....	42
Sunflower, swamp.....	100	Tertionnaire.....	82
Sunflower, tall.....	98	Teucrium canadense.....	82
Sunflower, thin-leaved.....	99	Teucrium occidentale.....	82
Sunflower, throatwort.....	99	Thalictrum dasycarpum.....	47
Sunflower, western tickseed.....	100	Thalictrum dioicum.....	47
Sunflower, woodland.....	99	Thalictrum lopygamum.....	47
Sureau blanc.....	91	Thapsie barbinode.....	75
Surelle.....	63	Thapsie barbinode à feuilles étroites.....	75
Swamp buttercup.....	47	Thapsie dorée.....	75
Swamp dock.....	40	Thapsium aureum.....	75
Swamp horsetail.....	9	Thapsium barbinode.....	75
Swamp persicaria.....	40	Thapsium barbinode, var. angustifolium.....	75
Swamp rose.....	59	Thé du Canada.....	55
Swamp white oak.....	37	Thé du Canada.....	76
Swan root.....	13	Thin grass.....	18
Swan's sedge.....	26	Thin-leaved sedge.....	25
Sweetbriar.....	58	Thistle, Canada.....	101
Sweet cherry.....	59	Thistle, common.....	101
Sweet cicely, wooly.....	74	Thistle, field.....	101
Sweet cicely, smoother.....	74	Thistle, russian.....	43
Sweet clover.....	61	Thistle, swamp.....	101
Sweet flag.....	28	Thistle, tall.....	101
Sweet william.....	45	Thlaspi arvense.....	50
Switch grass.....	15	Thlaspi bourse à pasteur.....	50
Sycamore.....	54	Thlaspi jaune.....	50
Sylvie.....	48	Thorn, cockspur.....	56
Symphoricarpos racemosus, var. pauciflorus.....	90	Thorn, large-fruited.....	56
Symphorine à grappe.....	91	Thorn, pear.....	56
Symphorine basse.....	91	Thorn, red-fruited.....	56
Symplocarpe fétide.....	28	Thoroughwort, tall.....	93
Symphoricarpos racemosus.....	91	Thread-like najas.....	13
Symplocarpus fetidus.....	28	Three-leaved Salomon's seal.....	31
Syringa vulgaris.....	78	Three-square.....	23
T.		Throatwort sunflower.....	99
Tabac du diable.....	86	Thumb, lady's.....	41
Tabouret.....	50	Thyme-leaved sandwort.....	44
Tænidia integerrima.....	75	Thymèles.....	71
Tall anemone.....	48	Tiarella cordifolia.....	54
Tall crowfoot.....	47	Tiarelle à feuilles cordiformes.....	54
Tall meadow rue.....	47	Tickseed, leafy-bracted.....	99
Tall nut rush.....	24	Tickseed sunflower, western.....	100
Tall red top.....	19	Tick trefoil, Dillen's.....	61
Tamarac.....	11	Tick trefoil, hoary.....	61
Tanacetum vulgare.....	100	Tick trefoil, Illinois.....	61
Tanacetum vulgare, var. crispum.....	100	Tick trefoil, large-bracted.....	61
		Tick trefoil, naked flowered.....	61
		Tick trefoil paniced.....	62

	PAGE
Tick trefoil, pointed-leaved	61
Tick trefoil, prostrate	61
Tick trefoil, rigid	62
Tick trefoil, sessile-leaved	62
Tick trefoil, showy	62
<i>Tilia americana</i>	69
Tiliacées	69
<i>Tilia Michauxii</i>	69
Tilleul d'Amérique	69
Tilleul de Michaux	69
Timothy	1
Tinker's weed	91
Toad rush	29
Tobacco, indian	93
Tomate commune	86
Tomato	86
Tomato, strawberry	85
Toothwort, cut-leaved	52
Toothwort, two-leaved	52
Topinambour	99
Toque case le	82
Torrey's rush	23
Torrey's rush	30
Touch-me-not, pale	68
Touch-me-not, spotted	68
Tourette glabre	53
Tower mustard	53
<i>Tradescantia reflexa</i>	29
<i>Tradescantia virginiana</i>	29
<i>Tragopogon porrifolius</i>	102
<i>Tragopogon pratensis</i>	102
Trainasse	40
Tree-of-heaven	64
Trèfle blanc	60
Trèfle commun	60
Trèfle couché	60
Trèfle de Buffalo	60
Trèfle des champs	60
Trèfle d'odeur	61
Trèfle hybride	60
Trèfle jaune	60
Trefoil, shrubby	64
Tremble, grand	35
<i>Tridens flavus</i>	19
<i>Trifolium agrarium</i>	60
<i>Trifolium arvense</i>	60
<i>Trifolium hybridum</i>	60
<i>Trifolium pratense</i>	60
<i>Trifolium procumbens</i>	60
<i>Trifolium reflexum</i>	60
<i>Trifolium repens</i>	60
<i>Triglochin maritima</i>	13
<i>Triglochin maritima</i>	13
Trillie à grandes fleurs	32
Trillie dressé	32
<i>Trillium erectum</i>	32
<i>Trillium grandiflorum</i>	32
Triolet	60
Trioste perfolié	91
<i>Triosteum perfoliatum</i>	91
<i>Triplasis purpurea</i>	19
<i>Triplasis purpurina</i>	19
Troène commun	78

	PAGE
True water cress.....	51
Trumpet creeper.....	89
Tuberclered orchis.....	33
Tufted eragrostis.....	19
Tulipier de Virginie.....	48
Tulip tree.....	48
Tumble mustard.....	51
Tumble weed.....	43
Tupelo.....	76
Turtlehead.....	86
Tussock sedge.....	26
Twig rush.....	24
Twinleaf.....	49
Twisted sedge.....	26
Twisted stalk, sessile leaved.....	31
Typha angustifolia.....	11
Typhacées.....	11
Typha latifolia.....	11

U.

Udore du Canada.....	14
Ulmus americanus.....	38
Ulmus fulva.....	38
Ulmus racemosa.....	38
Umbrella wort, heart-leaved.....	43
Upland bonset.....	93
Upright chess.....	21
Upright goosefoot.....	42
Upright smilax.....	32
Urtica gracilis.....	39
Urticées.....	38
Utriculaire bossue.....	88
Utriculaire du Canada.....	88
Utricularia gibba.....	88
Utricularia vulgaris, var. americana.....	88
Utriculariées.....	88
Uvulaire à fleurs sessiles.....	30
Uvulaire à grandes fleurs.....	30
Uvularia grandiflora.....	30

v.

Vaccinium corymbosum.....	77
Vaccinium macrocarpum.....	77
Vaccinium pensylvanicum.....	76
Vaccinium vacillans.....	77
Valérianacées.....	91
Valeriana pauciflora.....	91
Valériane à grandes fleurs.....	91
Valerian, greek.....	80
Valerian, large-flowered.....	91
Valisnérie d'Amérique.....	14
Vallisneria spirallis.....	14
Vanilla grass.....	16
Variable brome grass.....	21
Variagated equisetum.....	10
Variagated yellow water lily.....	46
Various leaved pondweed.....	12
Vélar fausse-giroflée.....	51
Verbascum blattaria.....	86
Verbascum lychnitis.....	86
Verbascum thapsus.....	86

	PAGE		PAGE
Verbena angustifolia.....	82	Viburnum dentatum.....	91
Verbénacées.....	82	Viburnum lentago.....	91
Verbena hastata.....	82	Viburnum prunifolium.....	91
Verbena urticaefolia.....	82	Viburnum pubescens.....	91
Verge d'or à feuilles d'orme.....	94	Vicia americana.....	62
Verge d'or à feuilles rudes.....	94	Vicia angustifolia.....	62
Verge d'or à larges feuilles.....	94	Vicia carolina.....	62
Verge d'or bleuâtre.....	94	Vicia sativa.....	62
Verge d'or de Riddell.....	95	Vigne à feuilles cotonneuses.....	68
Verge d'or des champs.....	94	Vigne des bords de rivières.....	68
Verge d'or du Canada.....	94	Vigne des rivages.....	68
Verge d'or glabre.....	94	Vigne vierge.....	68
Verge d'or hâtive.....	94	Vigne d'été.....	68
Verge d'or hâtive rude.....	94	Vinaigrier.....	66
Verge d'or hispide.....	94	Vinca minor.....	78
Verge d'or lancéolée.....	95	Vine, common matrimony.....	86
Verge d'or ridée.....	94	Viola cucullata.....	70
Verge d'or rigide.....	95	Viola fimbriatula.....	71
Verge d'or superbe.....	94	Viola incognita.....	71
Verge d'or très élevée.....	94	Viola palmata.....	71
Vergerolle à feuilles de paquetette.....	96	Viola pedatifida.....	71
Vergerolle annuelle.....	97	Viola pubescens.....	71
Vergerolle de Philadelphie.....	96	Viola rafinesquii.....	71
Vergerolle du Canada.....	97	Violarices.....	70
Vergerolle rugueuse.....	97	Viola sagittata.....	71
Vermiculaire âcre.....	53	Viola scabriuscula.....	71
Vernonia altissima.....	93	Viola sororia.....	71
Vernonia fasciculata.....	93	Viola striata.....	71
Vernonia illinoensis.....	93	Violet, arrow-leaved.....	71
Vernonia noveboracensis.....	93	Violet, downy yellow.....	71
Vernonie de l'Illinois.....	93	Violet, early blue.....	71
Vernonie de l'ouest.....	93	Violet, marsh blue.....	70
Vernonie de New-York.....	93	Violet, ovate leaved.....	71
Vernonie très élevée.....	93	Violet, pale.....	71
Veronica anagallis-aquatica.....	87	Violet, prairie.....	71
Veronica arvensis.....	87	Violet, smooth yellow.....	71
Veronica officinalis.....	87	Violet, sweet white.....	71
Veronica peregrina.....	87	Violette à feuilles palmées.....	71
Veronica serpyllifolia.....	87	Violette à feuilles cucullées.....	70
Veronica virginica.....	87	Violette à feuilles sagittées.....	71
Véronique à feuilles de serpolet.....	87	Violette blanche.....	71
Véronique des champs.....	87	Violette fimbriée.....	71
Véronique de Virginie.....	87	Violette jaune velue.....	71
Véronique mouron d'eau.....	87	Violette jaune unie.....	71
Véronique officinale.....	87	Violette laineuse.....	71
Véronique voyageuse.....	87	Violette pédalée.....	71
Vervain, blue.....	82	Violette pensée.....	71
Vervaine à feuilles étroites.....	82	Violette striée.....	71
Vervaine blanche.....	82	Violet, woolly blue.....	71
Vervaine bleue.....	82	Viorne à feuilles d'érable.....	91
Vervain, narrow-leaved.....	82	Viorne à manchettes.....	91
Vervain, white.....	82	Viorne dentée.....	91
Vesce d'Amérique.....	62	Viorne officinale.....	91
Vesce commune.....	62	Viorne pubescente.....	91
Vesce cultivée.....	62	Vipérine commune.....	81
Vesce de Caroline.....	62	Virginia creeper.....	68
Vetch, american.....	62	Virginia knotweed.....	41
Vetch, Carolina.....	62	Virginia three seeded mercury.....	65
Vetch, common.....	62	Virginia wild eye.....	21
Vetchling, cream-coloured.....	63	Virgin's bower.....	48
Vetchling, marsh.....	63	Vitacées.....	68
Vetch, spring.....	62	Vitis bicolor.....	68
Viburnum acerifolium.....	91	Vitis cordifolia.....	68

	PAGE		PAGE
<i>Vitis labrusca</i>	68	Wild celery.....	14
<i>Vitis vulpina</i>	68	Wild columbine.....	48
Vulpin genouillé.....	17	Wild false nettle.....	39
W.		Wild garlic.....	30
Wake robin, ill-scented.....	32	Wildginger.....	39
Wake robin, large flowered.....	32	Wild hyacinth.....	31
Waldsteinia fragaroides.....	56	Wild leek.....	30
Walking fern.....	7	Wild liquorice.....	90
Walnut, black.....	36	Wild mint, american.....	85
Wand-like bush clover.....	62	Wild oat grass, common.....	19
Wartweed.....	65	Wild onion.....	30
Water avens.....	57	Wild orange-red lily.....	30
Water crowfoot, stiff.....	46	Wild potato vine.....	79
Water crowfoot, yellow.....	46	Wild rye, glaucous leaved.....	22
Water dock, great.....	39	Wild rye, nodding.....	21
Water hemlock.....	74	Wild rye, slender.....	22
Water hemlock, bulb-bearing.....	74	Wild rye, virginia.....	21
Water horehound, cut-leaved.....	84	Wild yam root.....	32
Water horehound, stalked.....	84	Wild yellow lily.....	31
Waterleaf, appendaged.....	80	Wild water pepper.....	41
Waterleaf, virginia.....	80	William, sweet.....	45
Water lily, variegated yellow.....	46	Willow aster.....	96
Water lily, white.....	46	Willow, bag.....	35
Water lily, yellow.....	46	Willow, balsam.....	35
Water marigold.....	100	Willow, bay-leaved.....	34
Water milfoil, spiked.....	73	Willow, Bebb's.....	35
Water parsnip.....	74	Willow, black.....	34
Water persicaria.....	40	Willow, broad-leaved.....	34
Water plantain.....	14	Willow, dense-flowered water.....	89
Water purslane.....	72	Willow, glaucous.....	35
Water sedge.....	26	Willow, heart-leaved.....	34
Water shield.....	46	Willow herb, great.....	72
Water smartweed.....	41	Willow herb, hooded.....	82
Water speedwell.....	87	Willow herb, linear leaved.....	72
Water star grass.....	29	Willow herb, northern.....	72
Water-weed.....	14	Willow herb, purple leaved.....	72
Water willow.....	72	Willow, peach-leaved.....	34
Water willow, dense-flowered.....	89	Willow, prairie.....	35
Weak spear grass.....	20	Willow, purple.....	35
Weak-stalked club rush.....	23	Willow, sage.....	35
Weed, butterfly.....	78	Willow, sand bar.....	34
Weeping willow.....	34	Willow, shining.....	34
Western bulrush.....	24	Willow, silky.....	35
Western red lily.....	30	Willow, water.....	72
Western water hemp.....	43	Willow, weeping.....	34
Wheat grass, northern.....	21	Willow, white.....	34
White adder's tongue.....	31	Winged pigweed.....	42
White avens.....	57	Winterberry, Bronx.....	66
White baneberry.....	48	Wintergreen.....	76
White bear sedge.....	27	Wiry panicum.....	15
White campion.....	45	Witch-haze.....	54
White grained mountain rice.....	17	Wolffia columbiana.....	28
White grass.....	16	Wolffia punctata.....	28
White oak.....	37	Wolffie de la Colombie.....	28
White pine.....	10	Wolffie du Brésil.....	28
White poplar.....	35	Wood anemone.....	48
White willow.....	34	Wood bulrush.....	24
Whitish sedge.....	26	Wood horsetail.....	9
Whitlow grass.....	50	Wood lettuce, hairy.....	102
Whitlow grass, carolina.....	50	Wood mint.....	84
Wild bean.....	63	Wood muhlenbergia.....	17
Wild bean, trailing.....	63	Wood nettle.....	39
		Wood reed grass.....	18

	PAGE		PAGE
Wood rush, common.....	30	Yellow adder's tongue.....	31
Wood rush, hairy.....	30	Yellow alyssum.....	50
Wood sorrel, violet.....	63	Yellow avens.....	57
Wood sunflower, pale-leaved.....	99	Yellow birch.....	37
Wood witch grass.....	15	Yellow dock.....	39
Wool grass.....	24	Yellow lily, wild.....	31
Wooly sedge.....	27	Yellow nelumbo.....	46
Worm-seed mustard.....	51	Yellow nut grass.....	22
Wormwood, biennial.....	101	Yellow oak.....	38
Wormwood, tall.....	101	Yellow sedge.....	27
Woundwort.....	83		
		Z.	
X.		Zanthoxylum americanum.....	64
Xanthium canadense.....	98	Zygadène glauque.....	30
Xanthium commune.....	98	Zygadenus chloranthus.....	30
Xanthium echinatum.....	98	Zigzag goldenrod.....	94
		Zizania palustris.....	16
Y.		Zizia aurea.....	74
Yam root, wild.....	32	Zizia cordata.....	74
Yarrow, common.....	100	Zizie cordée.....	74
		Zizie dorée.....	74

4
0
4
5
4
4
4
4