ROYAL BOTANIC GARDENS
KEW

M

DUPLICATE

02

INDEX KEWENSIS

1886 - 1895

Digitized by the Internet Archive
in 2013

<http://archive.org/details/indexkewensispla01dura>

INDEX KEWENSIS
PLANTARUM PHANEROGAMARUM

SUPPLEMENTUM PRIMUM

NOMINA ET SYNONYMA OMNIUM GENERUM ET SPECIERUM

AB INITIO ANNI MDCCCLXXXVI USQUE AD FINEM

ANNI MDCCCXCV COMPLECTENS

CONFECERUNT

THEOPHILUS DURAND & B. DAYDON JACKSON

BRUXELLIS

APUD ALFREDUM CASTAIGNE

VIA DICTA BERLAIMONT, 28

MCM I — MCM VI

PREFACE

THE Index Kewensis is so well-known that it is unnecessary to justify the publication of this first supplement for the decennial period of 1886-1895. There is one thing to be explained — the reason of the delay in its completion. It is a matter of conscience for the author of these lines to absolve Mr B. Daydon Jackson from all responsibility on this point. Shortly after the printing of this volume had begun in Brussels, the state of his own sight, already critical, became so much worse as to cause fear of total blindness. The completion of the work thus only became possible by printing with disheartening slowness, and the correction of proofs during many years, has only been accomplished at the cost of actual suffering.

These circumstances have been the cause of errors which otherwise would not have occurred. The undersigned therefore begs that these defects may not be attributed to his co-author, Mr B. Daydon Jackson, and he relies on the indulgence of all those to whom this work will be of service.

Th. DURAND.

Brussels, June 1906.

INDICIS KEWENSIS

SUPPLEMENTUM PRIMUM

NOMINA PLANTARUM PHANEROGAMARUM OMNIA

ANNIS 1886 - 1895 EDITA

COMPLECTENS

AALIUS — ABUTILON

A

- AALIUS**, Rumph. Herb. Amb. iii. (1750) 207 = **Sauropus**, Blume (Euphorb.).
androgyna, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 591 = *S. albicans*, Blume.
assimilis, Kuntze, l. c. = *S. assimilis*, Thw.
brevipes, Kuntze, l. c. = *S. brevipes*, Muell. Arg.
Ceratogynum, Kuntze, l. c. = *S. quadrangularis*, Muell. Arg.
compressa, Kuntze, l. c. = *S. compressus*, Muell. Arg.
forcipata, Kuntze, l. c. = *S. forcipatus*, Hook. f.
lanceolata, Kuntze, l. c. = *S. lanceolatus*, Hook. f.
macrantha, Kuntze, l. c. = *S. macranthus*, Hassk.
macrophylla, Kuntze, l. c. = *S. macrophyllus*, Hook. f.
oblongifolia, Kuntze, l. c. = *S. oblongifolius*, Hook. f.
pubescens, Kuntze, l. c. = *S. pubescens*, Hook. f.
quadrangularis, Kuntze, l. c. = *S. quadrangularis*, Muell. Arg.
retroversa, Kuntze, l. c. = *S. retroversus*, Wight.
rhamnoides, Kuntze, l. c. = *S. rhamnoides*, Blume.
rigida, Kuntze, l. c. = *S. rigidus*, Thw.
rostrata, Kuntze, l. c. = *S. rostratus*, Miq.
spectabilis, Kuntze, l. c. = *S. spectabilis*, Miq.
stipitata, Kuntze, l. c. = *S. stipitatus*, Hook. f.
sumatrana, Kuntze, l. c. = *S. sumatranus*, Miq.
trinervia, Kuntze, l. c. = *S. trinervius*, Hook. f. et Thoms.
ABAMA, Adans. = **Narthecium**, Moehr. (Liliac.).
americana, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 109 = *N. americanum*, Ker.
ABATIA, Ruiz et Pav. (Samydac.). — Ind. Kew. i. 1.
boliviana, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 214 (= *Graniera boliviana*, Mand. et Wedd.). — Bolivia.
microphylla, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. 34 (1892) 11. — Bras.
ABELEMIS, Rafn. ex Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sc. vi. (1892) 223 = **Anemone**, Linn. (Ranunc.).
petiolaris, Rafn. ex Britton, l. c. = *A. virginiana*, Linn.
ABELIA, R. Br. (Caprifol.). — Ind. Kew. i. 2.
angustifolia, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 47. — China.
parvifolia, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 358. — China.
rusticifolia X, Hort. ex Späth, in Gartenfl. (1892) 113 t. 1366. — Hybr. artif.
shikokiana, Makino, in Bot. Mag. Tokyo Soc. vi. (1892) 55 = *biflora*, Turcz.

ABELICEA, Reichb. = **Zelkova**, Spach (Urtic.).
acuminata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 621 = *Z. acuminata*, Planch.
cretica, Kuntze, l. c. = *Z. cretica*, Spach.
ulmoides, Kuntze, l. c. = *Z. crenata*, Spach.

ABENA, Neck. = **Stachytarpheta**, Vahl (Verbenac.).
cayennensis, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 117 = *S. cayennensis*, Vahl.
jamaicensis, Hitchc. l. c. = *S. jamaicensis*, Vahl.

ABERIA, Host (Bixin.). — Ind. Kew. i. 2.
hebecarpa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 43 = *Gardneri*, Clos.

ABIES, Linn. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 2.
Akatodo, Miyabe, ex Sargent, in Gard. and For. vi. (1893) 525 = *sachalinensis*, Mast.
alpestris, Brügg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub. xxix (1886) 126 = *excelsa*, DC.
lasiocarpa, Sargent, in Gard. and For. ii. (1889) 496 = *subalpina*, Engelm.
venusta, Sargent, l. c. = *bracteata*, Nutt.

ABOLBODA, Humb. et Bonpl. (Xyrid.). — Ind. Kew. i. 3.
Sceptrum, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, ii (1887) 286; (Oliver, ex im Thurm, in Timburi, v. (1886) 203). — Guian.

ABROMA, Juss. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 3.
sinuosa, Nichols. Dict. Gard. iv. (1888) 482. — Asia trop.

ABRONIA, Juss. (Nyctagin.). — Ind. Kew. i. 3.
Carletoni, Coult. et Fish. in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 349. — Colorado.
pogonantha, Heimerl, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 87. — Calif.
Suksdorfii, Coult. et Fish. in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 338. — Am. bor.

ABROTANELLA, Cass. (Composit.). — Ind. Kew. i. 4.
caespitosa, Petrie, ex T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 420. — N. Zel.
muscosa, T. Kirk, l. c. 422, t. 36. — N. Zel.

ABRUS, Linn. (Leguminos.). — Ind. Kew. i. 4.
Bottae, Defters, Voy. Yémen, (1889) 132. — Arab.
Schimperi, Hochst. ex Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 219 nomen. — Afr. trop.
somalensis, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 355. — Somal.

ABSOLMSIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 417 = **Astrostemma**, Benth. (Asclep.).
spartiodes, Kuntze, l. c. 418. = *A. spartioides*, Benth.

ABUTILODES, Sieg. Hort. Petrop. i. (1736) = **Modiola**, Moench (Malvac.).
carolinianum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 65 = *M. multifida*, Griseb.

ABUTILON, Tourn. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 4.
Abutilon, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 222 = *A. Avicennae*, Gaertn.
amoenum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 411. — Bras.
appendiculatum, K. Schum. l. c. 408. — Bras.
aristulosum, K. Schum. l. c. 379. — Bras.
attenuatum, Rob. et Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 104. — Mexic.
benense, Bak. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 338. — Boliv.
bicolor, Philippi, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 433; et in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 323. — Chili.
Bridgesii, Bak. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 338. — Bolivia.
cinctum, T. S. Brandeg. in Zoe, iii. (1893) 348 = *Bastardia hirsutiflora*, Presl.
cordatum, Garcke et K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 369. — Peruv.
costicalyx, K. Schum. ex Bak. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 271. — Bras.
discolor, Bak. f. l. c. 73. — Mexic.
Dugesii, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 447. — Mexic.
Eggersii, Bak. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 75. — Ins. Baham.
Flueckigerianum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 370. — Urug.
fluviale, K. Schum. l. c. 400. — Bras.
Galeottii, Bak. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 73. — Mexic.
Garcke, Bak. f. l. c. 336. — Chili.
Glaziovii, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 408. — Bras.
Hannii, Bak. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 268. — Austral.
hastatum, Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii. (1893) 279. — Penins. Mal.
hirsutum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 437. — Bras.
Holstii, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1894. (1894) 65; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A. (1895) 110 nomen = *intermedium*, Hochst.
inaequale, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 407. — Bras.

ABUTILON:

- inflatum, *Garcke et K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 401. — Bras.
 lineatum, *K. Schum. l. c.* 437. — Bras.
 Listeri, *Bak. f. in Journ. Bot. xxxi.* (1893) 269. — Ins. Christmas.
 longifolium, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 402. — Bras.
 malacum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.* (1886) 446. — Texas, Mexic.
 membranaceum, *Bak. f. ex J. N. Rose, in Contr. U. S. Nat. Herb. iii.* (1895) 312. — Mexic.
 minarum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 389. — Bras.
 molle, *Bak. in Kew Bull.* (1895) 212. — Afr. trop. or.
 monospermum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 396. — Bras.
 Mouraei, *K. Schum. l. c.* 410. — Bras.
 Muelleri-Friderici, *Garcke et K. Schum. l. c.* 423. — Bras.
 Nealeyi, *Coult. in Contr. U. S. Nat. Herb. i.* (1890) 32; et *l. c. ii.* (1891) 41. — Texas.
 neovidense, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 386. — Bras.
 Pedrae-brancae, *K. Schum. l. c.* 425. — Bras.
 peltatum, *K. Schum. l. c.* 398. — Bras.
 pilosum, *K. Schum. l. c.* 437. — Bras.
 purpurascens, *K. Schum. l. c.* 419. — Am. trop.
 Ranadei, *Woodrow et Staff, in Kew Bull.* (1894) 99. — Ind. Or.
 reventum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.* (1886) 418. — Ariz., Mexic.
 Rehmanni, *Bak. f. in Journ. Bot. xxxi.* (1893) 217. — Transv.
 rufivellum, *K. Schum. ex Bak. f. l. c.* 271 nomen. — Bras.
 scabridum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 413. — Bras.
 scabrum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv.* (1889) 41. — Mexic.
 Schenckii, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 412. — Bras.
 senile, *K. Schum. l. c.* 424. — Bras.
 silvaticum, *K. Schum. l. c.* 418. — Peruv., Bolivia.
 sinense, *Oliver, in Hook. Icon. Pl. xviii.* (1888) t. 1750. — China.
 sordidum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 406. — Argent.
 Tiubae, *K. Schum. l. c.* 381. — Bras.
 usambarensis, *K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1894 (1894) 65; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A.* (1895) 110 nomen = *longicuspe, Hochst.*
 virginale, *Hort. Damm. ex Regel, in Gartenfl.* (1891) 74. (Quid?). — Hab.?
 viride, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii.* (1893) 323. — Chili.
 wissaduloides, *Bak. f. ex J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii.* (1895) 312. — Mexic.
 Xanti, *A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii.* (1887) 301. — Calif.

ACACIA: Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 6.

- anisophylla, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.* (1886) 452. — Mexic.
 ataxantha «DC.» ex *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 194 (err. typ.) = *ataxacantha, DC.*
 Baileyana, *F. Muell. in Trans. and Proc. Roy. Soc. Vict. xxiv.* (July 1888) 168; et in *Gard. Chron.* (1894) n. 37 fig. 4. — Austral.
 Bakeri, *J. H. Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. x.* (Nov. 1895) 337, t. 21. — Austral.
 biaciculata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.* (1886) 452. — Mexic.
 californica, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii.* 1892. (1893) 221. — Calif.
 chrysothrix, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 194. — Afr. trop. or.
 cinerea, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx.* (1888) 240. — Afr. austro-occ.
 Cowleana, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix.* (1895) 81, nomen. — Austral.
 craspedocarpa, *F. Muell. in Chem. and Drug. Austral.* (March 1887) 73. — Austral.
 Delavayi, *Franch. Pl. Delav. (1890) 194.* — Yunnan.

ACACIA:

- dulcis, *Marl. et Engl. in Bot. Jahrb. x.* (1889) 24. — Afr. austro-occ.
 filiculoides, *Trel. ex Branner et Coville, Report Geol. Surv. Ark.* 1888, iv. (1891) 178 = *flicina, Willd.*
 frumentacea, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix.* (1895) 81, nomen. — Austral.
 glandulifera, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv.* (1890) 147. — Mexic.
 Goeringii, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx.* (1888) 239. — Afr. austro-occ.
 Graffiana, *F. Muell. in Chem. and Drug. Austral.* (May 1887) 118. — Austral.
 hereroensis, *Engl. Bot. Jahrb. x.* (1889) 20. — Afr. austro-occ.
 Holstii, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 194. — Afr. or.
 Howitti, *F. Muell. in Vict. Natural. x.* (May 1893) 16. — Austral.
 Jonesii, *F. Muell. et J. H. Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II, viii.* (July 1893) 13 t. 2. — Austral.
 kauaiensis, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 113. — Ins. Sandvic.
 Kellieri, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. vi.* (May 1892) 468. — Austral.
 Koia, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 113. — Ins. Sandvic.
 leptosperma, *Bello, Estud. fl. Porto-Rico, iii.* (1885) 154. — Ins. Porto-Rico.
 Luederitzii, *Engl. Bot. Jahrb. x.* (1889) 23. — Afr. austro-occ.
 lutea, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xvi. (1889) 327 = *Mimosa lutea, Mill.*
 Maidenii, *F. Muell. in Macleay Mem. Linn. Soc. N. S. Wales, (1893) 222 t. 29.* — Austral.
 Maras, *Engl. Bot. Jahrb. x.* (1889) 24. — Afr. austro-occ.
 Marlothii, *Engl. l. c.* 19. — Afr. austro-occ.
 melaleucoides, *F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. v.* 121 ex eod. *Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii.* (1890) 23 = *Sutherlandii, F. Muell.*
 Merrallii, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. v.* (June 1890) 18. — Austral.
 millefolia, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.* (1886) 427. — Mexic.
 Muelleriana, *J. H. Maiden et R. J. Baker in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II, viii.* (June 1894) 515, t. 25. — Austral.
 neglecta, *J. H. Maiden et R. J. Baker, l. c.* ix. (Sept. 1894) 163 t. 13. — Austral.
 O'Shanesii, *F. Muell. et J. H. Maiden, l. c.* viii. (July 1893) 15 in obs. — Austral.
 Pringlei, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii.* (1895) 316. — Mexic.
 pumila, *J. H. Maiden et R. J. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II, x.* (Nov. 1895) 385, t. 28. — Austral.
 Robecchii, *Pirotta, in Bull. Soc. bot. Ital.* (1893) 61. — Afr. or.
 Rossei, *F. Muell. in Vict. Natural. x.* (July 1893) 55. — Austral.
 Spilleriana, *J. E. Br. For. Fl. S. Austral. i.* t. 44. — Austral.
 spinosa, *Marl. et Engl. in Bot. Jahrb. x.* (1889) 20. — Afr. austro-occ.
 spirocarpoides, *Engl. Bot. Jahrb. x.* (1889) 23. — Afr. austr.
 spodioperna, *F. Muell. in Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II, iii.* (Jan. 1888) 164. — Austral. occ.
 Stuhlmannii, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 194. — Afr. or.
 Sutherlandii, *F. Muell. Ic. Acacia 12th. Decade* (1888) = *Albizzia Sutherlandii, F. Muell.*
 teitensis, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A.* (1895) 49 nomen = *subalata, Valke.*
 tenax, *Marl. in Bot. Jahrb. viii.* (1887) 254. — Afr. austr. (Kalahari).
 tequilana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii.* (1887) 409. — Mexic.
 uncinata, *Engl. Bot. Jahrb. x.* (1889) 21. — Afr. austro-occ.
 usambarensis, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 195. — Afr. or.
 Willardiana, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i.* (1890) 88 (= *Prosopis heterophylla, Benth.*). — Mexic.

ACACIA:

- xiphocarpa, *Hochst. ex. Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. (1892) 240. — Abyss.
 xiphiolada, *Bak. in Journ. Linn. Soc. xxii.* (1887) 468. — Madag.
 yunnanensis, *Franch. Pl. Delav. (1889) 193.* — Yunnan.
 zanzibarica, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 195 = *Pithecolobium zanzibaricum, S. Moore.*
- ACAENA** Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 13.
 capitata, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv.* (1894) 623. — Chili.
 euacantha, *Phil. l. c.* 620. — Chili.
 fuegina, *Phil. l. c.* 620. — Terr. Fuegia.
 leptophylla, *Phil. l. c.* 622. — Chili.
 longifolia, *Phil. l. c.* 624. — Chili.
 macrantha, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiii.* 1890 (1891) 383. — N. Zel.
 montana, *F. Muell. in Papers and Proc. Roy. Soc. Tasm.* (1891-92) 15. — Tasm.
 nivalis, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv.* (1894) 619. — Chili.
 parvifolia, *Phil. l. c.* 622. — Chili.
 Pearcei, *Phil. l. c.* 626. — Chili.
 petiolulata, *Phil. l. c.* 624. — Chili.
 sericea, *Phil. l. c.* 621. — Terr. Fuegia.

ACALYPHA Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 14.

- acmophylla, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi.* (1894) 436. — China.
 acuminata, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 188. — Madag.
 agrestis, *Morong, ex Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sc.* vii. (1893) 225. — Parag.
 albicans, *Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1887) 417 in syn. = *fallax, Muell. Arg.*
 aliena, *Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii.* (1891) 172. — Calif.
 ambigua, *Pax, in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 96. — Angola.
 amphigyne, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 467. — Bras.
 angustissima, *Pax, in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 99. — Congo.
 Bakeriana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1895) 1180. — Madag.
 Baurii, *Rob. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III. i.* (1895) 144. — Ins. Galap.
 capillaris, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 257. — Bolivia.
 collina, *Hayne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1887) 417 in syn. = *fallax, Muell. Arg.*
 comonduana, *Mills, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 222. — Calif.
 comorensis, *Pax, in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 95. — Ins. Comor.
 crotonoides, *Pax, l. c.* 97. — Angola.
 Dalzellii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1887) 414. — Ind. or.
 diminuta, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 194; et in *Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1895) 1198 et 1281. — Madag.
 dioica, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv.* (1890) 162. — Mexic.
 dissitiflora, *S. Wats. l. c.* xxvi. (1891) 148. — Mexic.
 erubescens, *Rob. et Greenm. in Proc. Am. Acad. xxix.* (1894) 393. — Mexic.
 filifera, *S. Wats. l. c.* xxii. (1887) 451. — Mexic.
 flavescens, *S. Wats. l. c.* xxvi. (1891) 149. — Mexic.
 floribunda, *Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1887) 417 in syn. = *fallax, Muell. Arg.*
 glandulifera, *Rob. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III. i.* (1895) 164. — Mexic.
 Hamiltoniana, *Hort. ex Bruant, Catal.* (1895) ex *Kew Bull.* (1896) 2 — Hab.
 haplostyla, *Pax, in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 98. — Congo.
 hibiscifolia, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club.* ix. (1895) 257. — Bolivia.
 Hildebrandtii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1892) 1005. — Madag.
 Humboldtiana, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 190; et in *Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1895) 1198. — Madag.

ACALYPHA:—

- hypogaea, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 451. — Mexic.
 irazuensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 616. — Costa-Rica.
 Johnstoni, Pax, in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 283. — Afr. trop.
 juliflora, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 95. — Madag.
 Leoni, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1895) 1197. — Madag.
 leptomyura, Baill. l. c. ii. (1892) 1004. — Madag.
 longipes, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 149. — Mexic.
 longispica, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 197. — Oceania.
 Lotsii, J. D. Sm. in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 544. — Guatem.
 madreporica, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 186; et in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1895) 1181. — Madag.
 meiodonta, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1895) 1197. — Madag.
 multispicata, S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* xxvi. (1891) 148. — Mexic.
 Noronhae, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 59. — Ins Fernando Noronha.
 novo-guineensis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 359. — Oceania.
 polynema, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 187; et in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1895) 1197. — Madag.
 Radula, Baill. l. c. t. 193. — Madag.
 ruderalis, Mart. ex Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sc.* vii. (1893) 225. — Parag.
 scandens, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 359. — Oceania.
 sessilifolia, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 450. — Mexic.
 somalensis, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 100. — Afr. trop. or.
 squarrosa, Pax, l. c. 91. — Madag.
 stenophylla, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 206. — Nov. Guin.
 stipularis, Engl. l. c. vii. (1886) 462. — Ins. Fiji.
 Stuhlmannii, Pax, l. c. xix. (1894) 99. — Afr. trop.-or.
 subviscida, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 440. — Mexic.
 Teuschii, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 98. — Angola.
 triumphans, L. Lind. et Rodig. in *Illustr. Hort.* (1888) 55 t. 55. = tricolor, Seem.
 urophylla, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 96. — Madag.
 Volkensii, Pax, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 239. — Afr. trop. or.
 vulneraria, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1895) 1180. — Madag.

ACAMPE, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 17.
 madagascariensis, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1891) ii. 608. — Madag.
 mombasensis, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 386. — Afr. trop. or.

ACANTHELLA, Hook. f. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 17.
 conferta, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 6. — Bras.

ACANTHOLIMON, Boiss. (Plumbag.). — Ind. Kew. i. 17.
 Ecae, Aitch. et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iii. (1886) 84. — Turkest.
 sarawschanicum, Golenkin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 85. — Turkest.
 speciosissimum, Aitch. et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1886) 85. — Turkest.

ACANTHONYCHIA, Rohrb. = **Pentacaena**, Bartl. (Illecebr.).
 ramosissima, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 232 = P. ramosissima, Hook. et Arn.

ACANTHOPANAX, Miq. (Araliac.). — Ind. Kew. i. 18.
 diversifolium, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 340. — China.
 setulosum, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 249. — China.

ACANTHOPHOENIX, H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. i. 18.
 grandis, Hort. ex *Illustr. Hort.* (1895) 185. — Bras.?

ACANTHOPHYLLUM, C. A. Mey. (Caryoph.). — Ind. Kew. i. 18.
 brevibracteatum, Lipsky, in *Mém. Soc. Natur. Kiew*, xii. (1889) 6. — Ross.
 kurdicum, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 90. — Persia.
 latifolium, Lipsky, in *Mém. Soc. Natur. Kiew*, xii. (1889) 6. — Ross.
 recurvum, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 606. — Turkest.
 spinosum, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 172 = *Dianthus spinosus*, Desf.

ACANTHOPSIS, Harv. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 19.
 carduifolia, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 200. — Afr. austr.
 glauca, Schinz, l. c. 201. — Afr. austr.
 spathularis, Schinz, l. c. 201. — Am. bor.

ACANTHOSPERMUM, Schrank (Compos.). — Ind. Kew. i. 19.
 australe, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 303 = brasili-
 um, Schrank.
 lecocarpoides, Rob. et Greenm. in *Am. Journ. Sc.* Ser. III. l. (1895) 141. — Ins. Galap.

ACANTHOSTACHYS, Link (Bromel.). — Ind. Kew. i. 19.
 ananassoides, Bak. *Handb. Bromel.* (1889) 25. — Bras.

ACANTHUS, Linn. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 19.
 Boissieri, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 62. — Graecia.
 Caroli-Alexandri, Hausskn. in *Gartenfl.* (1886) 626; et in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 62. — Graecia.
 caudatus, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 33. — Angola.
 Gaëd, Lindau, l. c. — Afr. trop.-or.
 mayaccanus, Büttn. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 37. — Congo.
 neo-guineensis, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 474 = ilicifolius, Linn.
 pubescens, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 390. — Afr. trop. or.

ACANTHYLLIS, Pomel = **Anthyllis**, Riv. (Legum.).
 armata, Batt. in Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* (1889) 251. — Alger.

ACCA, Berg. = **Psidium**, Linn. (Myrtac.).
 Glazioviana, Kiaersk. *Enum. Myrtac. Bras.* (1893) 115, t. 10 c. — Bras.

ACER, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 20.
 ambiguum, Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 457, fig. 218. — Japon.
 atropurpureum, Hort. ex Dippel, l. c. 426 = A. Pseudo-Platanus, Linn.
 Bedoi, Borb. *Enum. pl. Com. Castrif.* (1887) 267; et in *Termész. Füzet.* xiv. (1891) 70 = campestre, Linn.
 betulifolium, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 108. — China.
 Bornmuelleri X, Borb. in *Termész. Füzet.* xiv. (1891) 70 et 75 = campestre, Linn.
 cordatum, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 6. — China.
 cucullatum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 457, fig. 218. — Japon.
 Davidi, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. III. viii. (1885) 212. — China.
 decompositum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 464 = palmatum, Thunb.

ACER:—

- denticulatum*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 448 = monspessulanum, Linn.
 Dieckii, Pax, in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 402. — Hab.?
 digitatum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 577 (Quid?).
 divergens, C. Koch et Pax, ex Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 234. — Reg. Cauc.
 Duvertii X Hort. ex Pax, l. c. xvi. (1893) 397. — Hybr. artef.
 erosum, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 10. — China.
 erythrocarpum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 426 = A. Pseudo-Platanus, Linn.
 euchlorum, Hort. ex Dippel, l. c. 426. = A. Pseudo-Platanus, Linn.
 fallax, Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 238. — Dalm.
 floridanum, Pax, l. c. 243. — Florida.
 fulgens, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 435 = rubrum, Linn.
 Francheti, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897, in nota 12. — China.
 haplolum, Borb. in *Termész. Füzet.* xiv. (1891) 70 et 75 = campestre, Linn.
 Heckianum, Aschers. ex Wesm. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxix. (1890) 51 = monspessulanum, Linn.
 Henryi, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) t. 1896. — China.
 heterotomum, Borb. in *Termész. Füzet.* xiv. (1891) 70 et 75 = campestre, Linn.
 hungaricum, Borb. l. c. xiv. (1891) 70 = monspessulanum, Linn.
 incisum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 464 = palmatum, Thunb.
 leucoderme, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xxii. (1895) 367 = floridanum, Pax.
 liburnicum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 448 = monspessulanum, Linn.
 Lorbergi, Hort. ex Dippel, l. c. 451 = platanoides, Linn.
 Maximowiczii, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 11. — China.
 mexicanum, Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 212 = Negundo mexicanum, DC.
 microphyllum, Pax, l. c. 180. — Am. bor.
 Miyabei, Maxim. in *Bull. Acad. Sc. St-Petersb.* xxxii. (1888) 485. — Japon.
 molle, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 74. — Reg. Himal.
 multiserratum, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 107. — China.
 Murayanum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 426 = macrophyllum, Pursh.
 nebrodense, Tineo, ex Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 192 = A. Pseudo-Platanus, Linn.
 nepalense, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 410 = oblongum, Wall.
 oblongifolium, Hort. ex Dippel, l. c. 416 = oblongum, Wall.
 Oliverianum, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 2. — China.
 Pavia, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 436 = dasy carpum, Ehrh.
 Paxii, Franch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxiii. (1886) 464; et *Pl. Delav.* (1889) 144. — Yunnan.
 pinnatifidum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 464 = palmatum, Thunb.
 pulverulentum, Hort. ex Dippel, l. c. 578 (Quid?).
 purpureum, Hort. ex Dippel, l. c. 426. = A. Pseudo-Platanus, Linn.
 Rafinesquianum, Hort. ex Dippel, l. c. ii. (1892) 426 = A. Pseudo-Platanus, Linn.
 Reitenbachii, Hort. ex Dippel, l. c. 578 (conf. 451) = platanoides, Linn.
 ribesifolium, Hort. ex Dippel, l. c. 578 (conf. 463) = palmatum, Thunb.
 Rugelii, Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 243 = ? saccharinum, Wangerh.
 Schwerini, Pax, l. c. xvi. (1893) 398. — Reg. Himal.
 semiorbiculatum, Pax, l. c. vii. (1886) 181. — Am. bor.
 sinense, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 1. — China.
 splendens, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 435 = rubrum, Linn.

ACER:—

- sutchuenense, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 294. — China.
tauricum, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 441 = *campestre*, Linn.
tenellum, Pax, in Hook. Icon. Pl. xix. (1889) t. 1897. — China.
tetramerum, Pax, in Hook. l. c. sub t. 1897 in nota 13. — China.
trinerve, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 428. — Japon.
Tschonoskii, Maxim. in Bull. Acad. Sc. St-Petersb. xxxi. (1887). — Japon.
urophyllum, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 105. — China.
velutinum, Hort. ex Pax, in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 395 = *Trautvetteri*, Medwedj.
Wagneri, Hort. ex Wesm. in Bull. Soc. bot. Belg. xxix. (1890) 28 = *rubrum*, Linn.
Willkommii, Wettst. in Sitzb. Akad. Wiss. Wien, xcvi. 1889 (1890) 384 = *Asia Min.*
Worlei, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 426 = *A. Pseudo-Platanus*, Linn.
zoeschense, Pax, in Bot. Jahrb. vii. (1886) 233 = *neglectum*, Lange.

ACERAS, R. Br. (Orchid.) — Ind. Kew. i. 21.

- calcarata*, G. Beck, in Ann. Nat. Hofmus. Wien, ii. (1887) 55, t. 1 fig. 4 = *Orchis hircina*, Crantz.
Vayvae ×, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 276. — Hisp.
Vayredae, Rouy, Annot. Pl. Europ. (1890) 276 = *praec.*
Weddellii ×, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 108 in syn. — Gall.

ACERATES Ell. = **Gomphocarpus**, R. Br. (Asclepiad.).

- floridana*, Hitchc., in Trans. Acad. Sc. St-Louis, v. (1892) 508 = *G. longifolius*, Spreng.

ACERIPHYLLUM, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 a (1890) 52 (Saxifrag.) Bossii, Engl. l. c. 52. — China.**ACETOSELLA**, Moehr. (Prim. Lin. Hort. Priv. 4) (1736) = **Oxalis**, Linn. (Geraniac.).

- abyssinica*, *acuminata*, *acutifolia*, *adenodes*, *adenophylla*, *adspersa*, *affinis*, *aganophila*, *alata*, *albicans*, *algaensis*, *alsinoides*, *amara*, *amazonica*, *andicola*, *angusta*, *angustifolia*, *antucensis*, *approximata*, *aptera*, *arachnoides*, *arbuscula*, *arenaria*, *articulata*, *asinina*, *bahiensis*, *balsamifera*, *Barrelieri*, *Berlandieri*, *Berteroana*, *bifolia*, *bifrons*, *bifurca*, *biglandulosa*, *bipartita*, *borjensis*, *breviscapa*, *Bridgesii*, *bryodes*, *bupleurifolia*, *Burkei*, *Bustillosii*, *caesia*, *caespitosa*, *caledonica*, *calliantha*, *calva*, *campestris*, *cana*, *capillacea*, *caprina*, *cearensis*, *cernua*, *chrysanthia*, *ciliaris*, *cine-racea*, *clavifolia*, *collina*, *Commerstonii*, *compacta*, *compressa*, *confertifolia*, *conorhiza*, *convexula*, *coquimba*, *cordata*, *corniculata*, *crassicaulis*, *crenata*, *crispula*, *cruentata*, *Cumingii*, *cumulata*, *daphniformis*, *debilis*, *decaphylla*, *decipiens*, *delicata*, *densifolia*, *Deppei*, *dichondrifolia*, *dichotomifolia*, *diffusa*, *discolor*, *distans*, *disticha*, *divaricata*, *divergens*, *Dregei*, *droserodes*, *Drummondii*, *dumetorum*, *ebrectata*, *Eckloniana*, *Ehrensbergii*, *elatior*, *elegans*, *enneaphylla*, *eremobia*, *eriocladus*, *eriorhiza*, *erythrorhiza*, *euphorbioides*, *excisa*, *Falconiana*, *fasciculata*, *filiformis*, *flabellifolia*, *flava*, *florida*, *frutescens*, *Fruticula*, *Galeottii*, *Gardneriana*, *Gaudichaudii*, *Gayana*, *geminata*, *glabra*, *glandulosa*, *glauca*, *glauco-virens*, *Glazioviana*, *glutinosa*, *goyazensis*, *gracilis*, *Grahamiana*, *grammopetala*, *grandifolia*, *Griffithii*, *grisea*, *gyrorhiza*, *Haenkeana*, *hedyarodes*, *herpeticia*, *heterophylla*, *hirsuta*, *hirsutissima*, *hirta*, *hispidula*, *imbricata*, *incana*, *incarnata*, *insipida*, *Jacquiniana*, *japonica*, *laburnifolia*, *laciniata*, *lanata*, *lasiantha*, *lasioptala*, *lateriflora*, *Laureola*, *laxa*, *leptocalyx*, *leptophylla*, *ligulata*, *lilacina*, *limosa*, *Lindenii*, *linearis*, *lineata*, *liniflora*, *livida*, *lobata*, *lotodes*, *lunulata*, *lupinifolia*, *luteola*, *macrophylla*, *macrorrhiza*, *magellanica*, *mallobolba*, *mandiocana*, *maritima*, *medicaginea*, *megalorhiza*, *megapotamica*, *Meisneri*, *melanosticta*, *melilotodes*, *Meyeri*, *microphylla*, *minuta*, *modesta*, *mollis*, *montephylla*, *montevdensis*, *multicaulis*, *Mundtii*, *muscodes*, *myriophylla*, *natans*, *Neasi*,

ACETOSELLA:—

- neriosa*, Newwiedii, *nigrescens*, *nudiflora*, *obliquifolia*, *obtriangulata*, *obtusata*, *oregana*, *ornithopus*, *Ortiesii*, *ovata*, *oxyptera*, *pachyphylla*, *paludosa*, *papilionacea*, *paposa*, *pardalis*, *parvifolia*, *Pearcii*, *peduncularis*, *penicillata*, *pentantha*, *pentaphylla*, *physocalyx*, *pilosissima*, *pilulifera*, *platensis*, *platycaulis*, *platyphyllo*, *Poeppigii*, *Pohlana*, *polyphylla*, *polytricha*, *praetexta*, *primulifolia*, *prorepens*, *psilotricha*, *psoralodes*, *puberula*, *pubescens*, *punctata*, *purpurata*, *quinata*, *radiata*, *recticaulis*, *refracta*, *Regnellii*, *reticulata*, *rhombocaulis*, *rhombifolia*, *rosea*, *rosellata*, *rubra*, *rubrocincta*, *rupestris*, *rusciformis*, *saliciformis*, *sarmentosa*, *saxatilis*, *scandens*, *Schomburgkiana*, *Schradariana*, *Sellowiana*, *semiglandulosa*, *semiloba*, *sepium*, *sericea*, *serpens*, *setosa*, *simulans*, *spodiophylla*, *squamata*, *squarrosa*, *staphyloides*, *stellata*, *stictophylla*, *strictula*, *strigulosa*, *subcaulis*, *subcarnosa*, *succulenta*, *suffruticosa*, *tenella*, *tenera*, *tenuifolia*, *tephrodes*, *teretifolia*, *tetraphylla*, *tomentella*, *tomentosa*, *tortuosa*, *triangularis*, *trichocalyx*, *trilliifolia*, *truncatula*, *tuberosa*, *umbraticola*, *valdiviensis*, *variabilis*, *versicolor*, *verticillata*, *villosa*, *Vinaquillo*, *violacea*, *virginica*, *virgosa*, *Wrightii*, *xiphophylla*, *Zeyheri*, *zonata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 90-93, = *homonyma omnia Oxalidis*.
alba, Kuntze, l. c. 90 = *O. Acetosella*, Linn.
albida, Kuntze, l. c. 91 = *O. leucotricha*, Turcz.
ambigua, Kuntze, l. c. 90 = *O. mutabilis*, Sond.
arcuata, Kuntze, l. c. = *O. linearis*, Jacq.
aureo-flava, Kuntze, l. c. 91 = *O. parvifolia*, DC.
Bakeriana, Kuntze, l. c. = *O. villosa*, Bak.
bifida, Kuntze, l. c. = *O. bifida*, Thunb.
brevicaulis, Kuntze, l. c. = *O. brevicaulis*, Sond.
brevicaulis, Kuntze, l. c. = *O. brevicaulis*, Steud.
calligera, Kuntze, l. c. = *O. foveolata*, Turcz.
chinensis, Kuntze, l. c. = *O. stricta*, Linn.
clandestina, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 92 = *O. clandestina*, Phil.
comosa, Kuntze, l. c. 91 = *O. comosa*, E. Mey.
comosa, Kuntze, l. c. 92 = *O. comosa*, Prog.
confertifolia, Kuntze, l. c. 91 = *O. densifolia*, Zucc.
crispata, Kuntze, l. c. 90 = *O. fabaeifolia*, Jacq.
falcata, Kuntze, l. c. 91 = *O. linearis*, Jacq.
fontana, Kuntze, l. c. = *O. corniculata*, Linn.
gracilicaulis, Kuntze, l. c. = *O. Smithiana*, Eckl. et Zeyh.
hapalconidea, Kuntze, l. c. 92 = *O. geminata*, Hook. et Arn.
Hernandezii, Kuntze, l. c. = *O. decaphylla*, H. B. et K.
holosericea, Kuntze, l. c. 91 = *O. holosericea*, Sond.
holosericea, Kuntze, l. c. 92 = *O. holosericea*, Phil.
leucantha, Kuntze, l. c. 91 = *O. alba*, D. Don.
macrostylis, Kuntze, l. c. = *O. tubiflora*, Jacq.
Martiana, Kuntze, l. c. 90 = *O. corymbosa*, DC.
micrantha, Kuntze, l. c. 92 = *O. laxa*, Hook. et Arn.
minima, Kuntze, l. c. 91 = *O. commutata*, Sond.
ornata, Kuntze, l. c. 92 = *O. ornata*, Phil.
pentaphyllodes, Kuntze, l. c. 91 = *O. variifolia*, Steud.
Perdicaria, Kuntze, l. c. = *O. lobata*, Sims.
Philippiana, Kuntze, l. c. = *O. microphylla*, (Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 35).
polyantha, Kuntze, l. c. 92 = *O. geminata*, Hook. et Arn.
praecox, Kuntze, l. c. 93 = *O. praecox*, Prog.
purpurea, Kuntze, l. c. 90, 91 = *O. purpurea*, Linn.
pygmaea, Kuntze, l. c. 92 = *O. pygmaea*, Phil.
ramigera, Kuntze, l. c. 91 = *O. gymnoclada*, Turcz.
Savigniana, Kuntze, l. c. = *O. virgosa*, Molina?
semiglanca, Kuntze, l. c. 90 = *O. goniorhiza*, Eckl. et Zeyh.
Sonderiana, Kuntze, l. c. 91 = *O. minima*, Sond.
squammosoradiata, Kuntze, l. c. 92 = *O. squamoso-radicosa*, Steud.
stricta, Kuntze, l. c. 91 = *O. corniculata*, Linn.
sulfurea, Kuntze, l. c. = *O. pulchella*, Jacq.
trifoliata, Kuntze, l. c. 90 = *O. namaquana*, Sond.
uitenhagensis, Kuntze, l. c. 91 = *O. psilopoda*, Turcz.
viscosa, Kuntze, l. c. 91 = *O. viscosa*, E. Mey.
Zuccariniana, Kuntze, l. c. 93 = *O. Zuccarinii*, Prog.

ACHAETOGERON, A. Gray (Composit.). — Ind. Kew. i. 21.

- affinis*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 386. — Mexic.
Forreri, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 155. — Mexic.
linearifolius, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 139. — Mexic.

ACHAETOGERON:—

- Palmeri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 386. — Mexic.
pinnatifidus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 386. — Mexic.

ACHARITEA, Benth. (Verbenac.). — Ind. Kew. i. 21.

- glandulosa*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 43. — Madag.

ACHATOCARPUS, Triana (Amarant.). — Ind. Kew. i. 22.

- Balansae*, Schinz et Aufran, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 6. — Parag.
bicornutus, Schinz et Aufran, l. c. 7. — Parag.
microcarpus, Schinz et Aufran, l. c. 8. — Parag.
obovatus, Schinz et Aufran, l. c. Parag.

ACHETARIA, Cham. et Schlecht. = **Beyrichia**, Cham. (Scrophularin.).

- erecta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 456. = seq.
erecta, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 b. (1891) 74 = *B. villosa*, Benth.
floribunda, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 456 = *B. floribunda*, Benth.
ocymodes, Kuntze, l. c. = seq.
ocymodes, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 b. (1891) 74 = *B. ocymoides*, Cham. et Schlecht.
scutellarioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 456 = seq.
scutellarioides, Wettst., in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 b. (1891) = *B. scutellarioides*, Benth.

ACHILLEA, Linn. (Composit.) — Ind. Kew. i. 22.

- absinthoides*, Halácsy, in Denkschrift. Akad. Wiss. Wien, lxi. (1894) 243. — Graec.
acuminata, Fregn. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 344 = *A. Ptarmica*, Linn.
anthemoides, Freyn et Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 346. — Armen.
argyrophylla, Halácsy et Gheorgh. ex Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 221. — Thrac.
aromatica, Velen. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 355 = *multifida*, Griseb.
Baldaccii, Degen, l. c. xlv. (1895) 25. — Alban.
bucharica, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 163. — Buchara.
canescens, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxxii. 1893 (1894) 157. — Maced.
cappadocica, Hausskn. et Bornm. in Mitth. Bot. Ver. Jena, viii. (1890) 18. — Asia Min.
carinata, Formanek, in Deutsche bot. Monatsschr. viii. (1890) 65, 161 et 168. — Maced.
dacica, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 181; et Enum. fl. Transsilv. (1886) 317. = *oxyloba*, Schultz-Bip.
densifolia, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxxii. 1893 (1894) (Beitr. Fl. Serb. und Maced.) 66. — Maced.
eximia (err. typ. exima), Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxxii. 1893 (1894) 156. — Maced.
graja × Beyer, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) p. xii. — Eur. centr.
griseo-virens, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 133. — Reg. Cauc.
Hausmanniana ×, Suend. in Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 32. — Eur.
intermedia, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 10. — Asia Min.
Kernerii ×, Halácsy, in Denkschrift. Akad. Wiss. Wien, lxi. (1894) 243. — Graecia.
melanolepis, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 297. — Ins. Cypr.
Millii, Heldr. ex Boiss. l. c. 296 = *Clavennae*, Linn.
montenegrina, G. Beck et Szyszyl. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 148 = *abrotanoides*, Vis.
Muentzeriana, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 298. — Graecia.
pindicola, Hausskn. in Nym. Consp. fl. Europ. Suppl. (1889) 167; et in Mitth. Thür. Bot. Ver., N. Folge, vii. (1895) 28. — Graecia.
Schroeteri × Wolf, in Bull. trav. Soc. Murith. fasc. xvi-xviii. 1887-89 (1890) 27. — Helv.
schugnanica, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 164. — Asia centr.

ACHILLEA :—

serbica, Petrović, *Addit. ad fl. agri Nyss.* (1885) 102, et in Magnier, *Serin. fl. select.* viii. (1889) 155. — Serb. Shepardi, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 433. — Asia Min.
thracica, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 264. — Bulg.
tymphaea ×, Hausskn. in *Nym. Consp. fl. Europ.*, Suppl. (1889) 168; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vii. (1895) 28. — Graecia.
Vandasii, Velen. ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 237; et *Fl. Bulg.* (1891) 265. — Bulg.

ACHILUS, Hemsl. in *Kew Bull.* (1895) 39, et in Hook. *Icon. Pl.* xxiv. (1895) t. 2370. = **Globba**, Linn. (Scitamin.).
siamensis, Hemsl. *ll. cc.* = **Globba siamensis**, Hemsl.

ACHIMENES, P. Br. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 24.

gymnostoma, Fritsch. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenf.* iv. 3 b (1894) 175. — Argent.
pulchella, Hitchc. in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 114 = coccinea, Pers.
tubiflora, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sc.* vii. (1893) 185 = **Gloxinia tubiflora**, Hook.

ACHNERIA, P. Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 24.

ampla, Th. Dur. et Schinz, *Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 836 (= **Eriachne ampla**, Nees) — Afr. austr.
assimilis, Th. Dur. et Schinz, l. c. 836 (= **Eriachne assimilis**, Steud.) — Afr. austr.
microphylla, Th. Dur. et Schinz, l. c. 836 (= **Eriachne microphylla**, Nees) — Afr. austr.
pallida, Th. Dur. et Schinz, l. c. 836 (= **Eriachne pallida**, Nees) — Afr. austr.
tuberculata, Th. Dur. et Schinz, l. c. 836 (= **Eriachne tuberculata**, Nees) — Afr. austr.

ACHRADOTYPUS, Baill. in *Bull. Soc. Linn.*

Paris ii. (1890) 881. (Sapotac.).
artensis, Baill. l. c. 881. — Ins. Art.
Vieillardii, Baill. l. c. — N. Caled.

ACHRAS, Linn. (Sapotac.). — Ind. Kew. i. 25.

bahamensis, Bak. in Hook. *Icon. Pl.* xviii. (1888) t. 1795. = **Mimusops Sieberi**, A. DC.

ACHROANTHES, Rafin. = **Microstylis**, Lindl. (Orchid.)

corymbosa, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 184. = M. corymbosa, S. Wats.
floridana, Greene, l. c. 183. = M. floridana, Chapm.
maianthemifolia, Greene, l. c. 184 = M. maianthemifolia, Reichb. f.
monophylla, Greene, l. c. 183 = M. monophylla, Lindl.
montana, Greene, l. c. 183 = M. montana, Rothr.
ochreatea, Greene, l. c. 184 = M. ochreatea, S. Wats.
Pringlei, Greene, l. c. 184 = M. Pringlei, S. Wats.
purpurea, Greene, l. c. 184 = M. purpurea, S. Wats.
umbellulata, Greene, l. c. 184 = M. umbellulata, Lindl.

ACHYMUS, Vahl = **Streblus**, Lour. (Urticac.)

patens (err. cal.) «Soland.» ex Hook. f. *Fl. Brit.* Ind. v. (1888) 489 = **Achymus pallens**, Soland.

ACHYRANTHES, Linn. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 25.

elegantissima, Schinz, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 186. — Afr. centr. bor.
flabellifera, Boerl. in *Nederl. Kruidk. Arch.* v. (1891) 421. — Ind. or.
glabra, Heyne, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iv. (1885) 725 = **Psilotrichum lunulatum**, Mig.
lanuginosa, Schinz, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 174; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 186. — Afr. trop. or.
oblanceolata, Schinz, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 187. — Afr. centr. bor.
Welwitschii, Schinz, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 174; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 187. — Afr. trop.

ACHYROCLINE, Less. (Composit.). — Ind. Kew. i. 26.

deflexa, Rob. et Greenm. in *Am. Journ. Sc.* Ser. III. 1. (1895) 153. — Mexic.
pumila, Schinz, ex Klatt, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 429. — Afr. trop. or.
ramosissima, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 148. — Bolivia.
venosa, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iii. (1893) 57. — Boliv.
virescens, Klatt, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 40. — N. Granat.

ACHYRODES, Boehmer, in Ludw. Def. (1760) 420, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = **Lamarkia**, Moench (Gramin.).

aureum, Kuntze, l. c. (1891) 758. = L. aurea, Moench.

ACHYRONIA, Royen = **Aspalathus**, Linn. (Legumin.).

abietina, acanthes, aciphylla, aculeata, acuminata, aemula, affinis, Agardhiana, albens, Alopecurus, angustissima, anthyllodes, arachnodea, araneosa, argentea, argyrea, arida, armata, asparagodes, astroites, Bentharii, bracteata, Burchelliana, calcarata, callosa, canescens, capillaris, capitata, carnosia, Chamissonis, chenopoda, ciliaris, cinerascens, collina, comosa, costulata, crassifolia, cytisoides, dasyantha, densifolia, diffusa, divaricata, elongata, ericifolia, eriophylla, erythodes, exigua, exilis, falcata, ferox, filicaulis, Forbesii, fornicata, galeata, galiodes, garipensis, genistodes, glomerata, grandiflora, hirta, Hystrix, incurva, incurvifolia, Jacobaea, lactea, lanata, laricifolia, lepidia, leptophylla, leucophaea, linearifolia, longifolia, longipes, lotodes, macrantha, macrocarpa, marginalis, marginata, Meyeri, microdon, mollis, myrtillifolia, nervosa, nigra, nivea, nodosa, nudiflora, obtusata, opaca, orbiculata, pachyloba, pallenscens, Pappeana, parviflora, pedicellata, pedunculata, pinca, pinguis, polyccephala, Priori, propinqua, prostrata, psoraleodes, pungens, purpurea, recurva, retroflexa, rostrata, rubens, rubrofusca, rugosa, sanguinea, sarcantha, sarcodes, securifolia, sericea, setacea, spinescens, spinosa, stellaris, stenophylla, suaveolens, subulata, suffruticosa, tenuifolia, teres, thymifolia, tridentata, triguetra, truncata, ulicina, uniflora, variegata, venosa, vermiculata, verrucosa, villosa, virgata, vulnerans, Willdenowiana, Wurmbiana, Kuntze, Rev. Gen. 157-158 = **homonyma omnia**, Aspalathi alternifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 157 = **Asp. alternifolia**, Harv.
capitella, Kuntze, l. c. = **Asp. inops**, Eckl. et Zeyh.
cephalotes, Kuntze, l. c. = **Asp. cephalotes**, Thunb., spicata, Thunb.
contaminata, Kuntze, l. c. = **Asp. corymbosa**, E. Mey.
corradaefolia, Kuntze, l. c. = **Asp. rigescens**, E. Mey.
fasciculata, Kuntze, l. c. = **Asp. undulata**, Eckl. et Zeyh.
frankenoides, (err. cal. frankerioides) Kuntze, l. c. = **Asp. frankenioides**, DC.
incompta, Kuntze, l. c. = **Asp. incompta**, Thunb.
spicata, Kuntze, l. c. = **Asp. heterophylla**, E. Mey.
subtingens, Kuntze, l. c. = **Asp. adelphaea**, Eckl. et Zeyh.
ternata, Kuntze, l. c. = **Asp. ferruginea**, Banks.

ACHYRONYCHIA, Torr. et Gray (Illecebr.). — Ind. Kew. i. 26.

Rixfordii, Brandeg. in *Zoë*, i. (1890) 230. — Am. bor. occ.

ACHYROPHORUS, Adans. = **Hypochoeris**, Linn. (Compos.).

deserticola, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chili* (1891) 36. — Boliv.

ACHYROSPERMUM, Blume (Labiata). — Ind. Kew. i. 27.

Carvalhoi, Gürke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 343. — Afr. trop. or.
radicans, Gürke, l. c. 343. — Afr. trop. or.
urens, Baker in *Kew Bull.* (1893) 14. — Madag.

ACHYROTHALAMUS, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 541, et in *Engl. et Prantl., Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1893) 339. (Composit.).
marginatus, O. Hoffm. l. c. 542. — Afr. trop. or.
teitensis, O. Hoffm. l. c. 542. — Afr. trop. or.

ACIANTHUS, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 27.

cymbalariaefolius, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 209. — Ocean.

ACICALYPTUS, A. Gray (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 27.

eugenioides, Niedenzu, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1887) 86 = seq.
eugenioides, Drake, *Illustr. fl. Mor. Pacif.* (1890) 168. — Ins. Vit.

ACIDANTHERA, Hochst. (Irideae). — Ind. Kew. i. 27.

candida, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 404. — Afr. trop. or.
capensis, Benth. ex Baker, *Handb. Irid.* (1892) 187. — Afr. austr.
crispa, Pax, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 5. (1887) 155. = **Montbretia lacerata** Baker.
Forsythiana, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 186. — Afr. austr.
gracilis, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 154. — Afr. trop. or.
ixioides, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 188. — Afr. austr.
laxiflora, Baker, ex Oliver, in *Johnst. Kilima-Njaro Exped.* (1886) 346; et, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*, ii. (1887) 350, et *Handb. Irid.* (1892) 188. — Afr. trop. or.
pallida, Pax, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 5. (1887) 155.
pauciflora, Benth. ex Baker, *Handb. Irid.* (1892) 187. — Afr. austr.
rosea, Schinz, in *Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 198. — Afr. austr.
Tysoni, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 187. — Afr. austr.
unicolor, Hochst. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. Berl.* 1891 (1892) 175. — Abyss.
zanzibarica, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 188. = **gracilis**, Pax.

ACIDODENDRON, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 950

sphalm. = **ACINODENDRON** Kuntze = **ACINODENDRUM** Linn. = **Miconia**, Ruiz et Pav. (Melastom.).

ACIDOTON, P. Br. = **Securinega**, Comm. (Euphorb.).

Acidothamnus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 592 = S. Acidothamnus, Muell. Arg.
Baillonianus, Kuntze, l. c. = S. Bailloniana, Muell. Arg.
buxifolius, Kuntze, l. c. = S. buxifolia, Muell. Arg.
congestus, Kuntze, l. c. = S. congesta, Muell. Arg.
durissimus, Kuntze, l. c. = S. durissima, F. F. Gmel.
ellipticus, Kuntze, l. c. = S. elliptica, Muell. Arg.
flexuosus, Kuntze, l. c. = S. flexuosa, Muell. Arg.
fluggeodes, Kuntze, l. c. = S. fluggeoides, Muell. Arg.
griseus, Kuntze, l. c. = S. grisea, Muell. Arg.
Hilarianus, Kuntze, l. c. = S. Hilariana, Muell. Arg.
Leucopyrus, Kuntze, l. c. = **Fluggea Leucopyrus**, Willd.
obovatus, Kuntze, l. c. = **Fluggea microcarpa**, Blume.
phyllanthodes, Kuntze, l. c. = S. phyllanthoides, Muell. Arg.
ramiflorus, Kuntze, l. c. = S. ramiflora, Muell. Arg.
Schuechianus, Kuntze, l. c. = S. Schuechiana, Muell. Arg.
trichogynus, Kuntze, l. c. = S. trichogynis, Muell. Arg.
virosus, Kuntze, l. c. = **Fluggea microcarpa**, Blume.

ACIELLA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xli. (1894) 435 = **Loranthus**, Linn.

Balansae, Van Tiegh. l. c. (1894) 439. — N. Caled.
dictyophleba, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 86 et 445. = L. dictyophlebus, F. Muell.

ACIELLA:—

- Deplanchei*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 438. — N. Caled.
Kingiana, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 87 et 445. = L. Kingianus, Van Tiegh.
lanceolata, Van Tiegh. l. c. xli (1894) 437. — N. Caled.
lifensis, Van Tiegh. l. c. (1894) 438. — Ins. Lifu.
Pancheri, Van Tiegh. l. c. (1894) 437. — N. Caled.
pyramidata, Van Tiegh. l. c. (1894) 436. — N. Caled.
rubra, Van Tiegh. l. c. (1894) 438. — N. Caled.
tenuifolia, Van Tiegh. l. c. (1894) 439. — N. Caled.

ACINETA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 28.
Wrighti, Fraser, in Gardening World, v. (1889); et ex Lindenia, iv. (1888) 88 = *Lacaena spectabilis*, Reichb. f.

ACINODENDRON, Kuntze, Rev. Gen. 243 (1891) = **ACINODENDRUM**, Linn. = **Miconia**, Ruiz et Pav. (Melastomac.).

- acalyphodes*, Kuntze, l. c. (1891) 950 = *M. acalyphoides*, Naud.
acuminata, Kuntze, l. c. 949 = *M. striata*, Cogn.
acuminiferum, Kuntze, l. c. 950 = *M. acuminifera*, Triana.
aegrotans, Kuntze, l. c. = *M. arbutifolia*, Naud.
aeruginosum, Kuntze, l. c. = *M. desmantha*, Benth.
affine, Kuntze, l. c. = *M. affinis*, Macfad.
alatum, Kuntze, l. c. = *M. alata*, DC.
albicans, Kuntze, l. c. = *M. holosericea*, Triana.
alborufescens, Kuntze, l. c. = *M. albo-rufescens*, Naud.
alternans, Kuntze, l. c. = *M. alternans*, Naud.
alternifolium, Kuntze, l. c. = *M. Grisebachii*, Triana.
altissimum, Kuntze, l. c. = *M. altissima*, Cogn.
alypifolium, Kuntze, l. c. = *M. alypifolia*, Naud.
amazonicum, Kuntze, l. c. = *M. amazonica*, Triana.
ambiguum, Kuntze, l. c. = *M. ambigua*, DC.
amblyandrum, Kuntze, l. c. = *M. amblyandra*, Naud.
amoenum, Kuntze, l. c. = *M. amoena*, Triana.
amplexans, Kuntze, l. c. = *M. amplexans*, Cogn.
amplexicaule, Kuntze, l. c. = *M. amplexicaulis*, Naud.
amplum, Kuntze, l. c. = *M. ampla*, Triana.
ancistrophorum, Kuntze, l. c. (1891) 950 = *M. ancistrophora*, Triana.
andinum, Kuntze, l. c. = *M. andina*, Naud.
Andreanum, Kuntze, l. c. = *M. Andreana*, Cogn.
androsaemifolium, Kuntze, l. c. = *M. androsaemifolia*, Griseb.
angustifolium, Kuntze, l. c. = *M. angustifolia*, Griseb.
anisophyllum, Kuntze, l. c. = *M. anisophylla*, Triana.
anisotrichum, Kuntze, l. c. = *M. Berghesiana*, Naud.
annulatum, Kuntze, l. c. = *M. annulata*, Triana.
aplostachyum, Kuntze, l. c. = *M. aplostachya*, DC.
aponeurum, Kuntze, l. c. = *M. aponeura*, Triana.
appendiculatum, Kuntze, l. c. = *M. appendiculata*, Triana.
arborescens, Kuntze, l. c. = *M. calvescens*, DC.
arbutifolium, Kuntze, l. c. = *M. arbutifolia*, Naud.
argenteum, Kuntze, l. c. = *M. argentea*, DC.
argyreaum, Kuntze, l. c. = *M. argyrea*, Cogn.
argyrophyllum, Kuntze, l. c. = *M. argyrophylla*, DC.
asclepiadeum, Kuntze, l. c. = *M. asclepiadea*, Triana.
aspergillare, Kuntze, l. c. = *M. aspergillaris*, Naud.
aspermum, Kuntze, l. c. = *M. asperma*, Triana.
astrotrichum, Kuntze, l. c. = *M. astrotricha*, Triana.
atratum, Kuntze, l. c. = *M. atrata*, Wawra.
atrosanguineum, Kuntze, l. c. = *M. atrosanguinea*, Cogn.
Augusti, Kuntze, l. c. = *M. Augusti*, Cogn.
aulocalyx, Kuntze, l. c. = *M. aulocalyx*, Mart.
aureodes, Kuntze, l. c. = *M. aureoides*, Cogn.
aureum, Kuntze, l. c. = *M. aurea*, Naud.
axilliflorum, Kuntze, l. c. 949 = *M. axilliflora*, Naud.
Barbeyanum, Kuntze, l. c. 950 = *M. Barbeyana*, Cogn.
barbinerve, Kuntze, l. c. = *M. barbinervis*, Triana.
Benthamianum, Kuntze, l. c. = *M. Benthamiana*, Triana.
Bewlingii, Kuntze, l. c. = *M. Beurlingii*, Triana.
biglomeratum, Kuntze, l. c. = *M. biglomerata*, DC.
biperuliferum, Kuntze, l. c. = *M. biperulifera*, Cogn.
Boissierianum, Kuntze, l. c. = *M. Boissieriana*, Cogn.
boliviense, Kuntze, l. c. = *M. boliviensis*, Cogn.
Bourgaeum, Kuntze, l. c. = *M. Bourgaeana*, Cogn.

ACINODENDRON:—

- brachyantherum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 950 = *M. brachyanthera*, Triana.
brachybotryum, Kuntze, l. c. = *M. brachybotrya*, Triana.
brachycalyx, Kuntze, l. c. = *M. brachycalyx*, Triana.
bracteatum, Kuntze, l. c. = *M. bracteata*, Triana.
bracteolatum, Kuntze, l. c. = *M. bracteolata*, DC.
brasiliense, Kuntze, l. c. = *M. brasiliensis*, Triana.
brevipes, Kuntze, l. c. = *M. brevipes*, Benth.
Brittonii, Kuntze, l. c. = *M. Brittonii*, Cogn.
brunneum, Kuntze, l. c. = *M. brunnea*, DC.
bubalinum, Kuntze, l. c. = *M. bubalina*, Naud.
buddlejodes, Kuntze, l. c. = *M. budlejoides*, Triana.
bullatum, Kuntze, l. c. = *M. bullata*, Triana.
Burchellii, Kuntze, l. c. = *M. Burchellii*, Triana.
buxifolium, Kuntze, l. c. = *M. buxifolia*, Naud.
caelatum, Kuntze, l. c. = *M. caelata*, DC.
caeruleum, Kuntze, l. c. = *M. caerulea*, Naud.
calophyllum, Kuntze, l. c. = *M. myrtiformis*, Naud.
campestre, Kuntze, l. c. = *M. campestris*, Triana.
Candolleum, Kuntze, l. c. = *M. Candolleana*, Triana.
capitellatum, Kuntze, l. c. = *M. capitellata*, Cogn.
carassanum, Kuntze, l. c. = *M. carassana*, Cogn.
cardiophyllum, Kuntze, l. c. = *M. cardiophylla*, Cogn.
Carioanum, Kuntze, l. c. = *M. Carioana*, Cogn.
carneum, Kuntze, l. c. = *M. carnea*, Cogn.
caryophyllum, Kuntze, l. c. = *M. caryophyllacea*, Triana.
castaneaeflorum, Kuntze, l. c. = *M. castaneaefolia*, Naud.
cataractae, Kuntze, l. c. = *M. cataractae*, Triana.
caudatum, Kuntze, l. c. = *M. caudata*, DC.
caudigerum, Kuntze, l. c. = *M. caudigera*, DC.
cecidophorum, Kuntze, l. c. = *M. cecidophora*, Naud.
centrodesmum, Kuntze, l. c. = *M. centrodesma*, Naud.
centrophorum, Kuntze, l. c. = *M. centrophora*, Naud.
ceramicarpum, Kuntze, l. c. = *M. ceramicarpa*, Cogn.
cernuum, Kuntze, l. c. = *M. cernua*, Naud.
chaetodon, Kuntze, l. c. = *M. desmantha*, Benth.
Chamissoi, Kuntze, l. c. = *M. Chamissoi*, Naud.
chartaceum, Kuntze, l. c. = *M. chartacea*, Triana.
chionophyllum, Kuntze, l. c. = *M. chionophila*, Naud.
chlorocarpum, Kuntze, l. c. = *M. chlorocarpa*, Cogn.
chysoneum, Kuntze, l. c. = *M. chysoneura*, Triana.
chrysophyllum, Kuntze, l. c. = *M. fulva*, DC.
ciliare, Kuntze, l. c. = *M. ciliaris*, Triana.
ciliatum, Kuntze, l. c. 949 = *M. fragilis*, Naud.
cinchonifolium, Kuntze, l. c. 950 = *M. cinchonifolia*, DC.
cinerascens, Kuntze, l. c. = *M. cinerascens*, Miq.
cinereum, Kuntze, l. c. = *M. cinerea*, Cogn.
cinnamomifolium, Kuntze, l. c. 951 = *M. cinnamomifolia*, Triana.
cladranthum, Kuntze, l. c. = *M. clathrantha*, Triana.
coeleste, Kuntze, l. c. = *M. coelestis*, Naud.
Cogniauxii, Kuntze, l. c. 950 = *M. integrifolia*, Cogn.
comosum, Kuntze, l. c. = *M. comosa*, Cogn.
compressum, Kuntze, l. c. = *M. compressa*, Naud.
confertum, Kuntze, l. c. = *M. conferta*, Cogn.
confusum, Kuntze, l. c. = *M. confusa*, Cogn.
corallinum, Kuntze, l. c. = *M. corallina*, Spring.
cordatum, Kuntze, l. c. = *M. cordata*, Triana.
coriaceum, Kuntze, l. c. = *M. coriacea*, DC.
coronatum, Kuntze, l. c. = *M. coronata*, DC.
corymbiforme, Kuntze, l. c. = *M. corymbiformis*, Cogn.
costaricense, Kuntze, l. c. = *M. costaricensis*, Cogn.
crassifolium, Kuntze, l. c. = *M. crassifolia*, Triana.
crassinerve, Kuntze, l. c. = *M. crassinervia*, Cogn.
crassipes, Kuntze, l. c. = *M. crassipes*, Triana.
cremophyllum, Kuntze, l. c. = *M. cremophylla*, Naud.
crinitum, Kuntze, l. c. = *M. crinita*, Naud.
croceum, Kuntze, l. c. = *M. crocea*, Naud.
cruentum, Kuntze, l. c. = *M. cruenta*, Triana.
cubense, Kuntze, l. c. = *M. cubensis*, Wright.
cuneatum, Kuntze, l. c. = *M. cuneata*, Triana.
cuspidatum, Kuntze, l. c. = *M. cuspidata*, Naud.
cyanocarpum, Kuntze, l. c. = *M. cyanocarpa*, Naud.
cyathantherum, Kuntze, l. c. = *M. cyathanthera*, Triana.
decipiens, Kuntze, l. c. = *M. decipiens*, Cogn.
decussatum, Kuntze, l. c. 243 = *M. decussata*, D. Don.
delicatulum, Kuntze, l. c. 951 = *M. delicatula*, Rich.

ACINODENDRON:—

- densiflorum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 951 = *M. densiflora*, Naud.
denticulatum, Kuntze, l. c. = *M. denticulata*, Naud.
depauperatum, Kuntze, l. c. = *M. depauperata*, Gaertn.
desmanthum, Kuntze, l. c. 243 = *M. desmantha*, Benth.
dichyomum, Kuntze, l. c. 951 = *M. dichroa*, Cogn.
difficile, Kuntze, l. c. = *M. difficilis*, Triana.
dipsaceum, Kuntze, l. c. = *M. dipsacea*, Naud.
discolor, Kuntze, l. c. = *M. discolor*, DC.
dispar, Kuntze, l. c. = *M. dispar*, Benth.
divaricatum, Kuntze, l. c. = *M. divaricata*, Gaertn.
divergens, Kuntze, l. c. = *M. divergens*, Triana.
dodecandrum, Kuntze, l. c. = *M. dodecandra*, Cogn.
dolichopodium, Kuntze, l. c. = *M. dolichopoda*, Naud.
dolichorhynchum, Kuntze, l. c. = *M. dolichorrhyncha*, Naud.
domingense, Kuntze, l. c. = *M. domingensis*, Cogn.
Donianum, Kuntze, l. c. = *M. Doniana*, Naud.
Dorianum, Kuntze, l. c. = *M. Doriana*, Cogn.
durum, Kuntze, l. c. = *M. dura*, Triana.
egense, Kuntze, l. c. = *M. egensis*, Cogn.
Eichleri, Kuntze, l. c. = *M. Eichlerii*, Cogn.
elaeagnodes, Kuntze, l. c. = *M. elaeagnoides*, Griseb.
Elaeodendron, Kuntze, l. c. = *M. Elaeodendron*, Naud.
elaodes, Kuntze, l. c. = *M. elaeoides*, Naud.
elatum, Kuntze, l. c. = *M. elata*, DC.
elegans, Kuntze, l. c. = *M. elegans*, Cogn.
ellipticum, Kuntze, l. c. 950 = *M. obovalis*, Naud.
elongatum, Kuntze, l. c. 951 = *M. elongata*, Cogn.
epiphyticum, Kuntze, l. c. = *M. epiphytica*, Cogn.
erianthum, Kuntze, l. c. = *M. eriantha*, Cogn.
ericalyx, Kuntze, l. c. = *M. ericalyx*, Cogn.
eriocladum, Kuntze, l. c. = *M. erioclada*, Triana.
eriodontum, Kuntze, l. c. = *M. eriodonta*, DC.
erythranthum, Kuntze, l. c. = *M. erythrantha*, Naud.
eugenoides, Kuntze, l. c. = *M. eugenoides*, Triana.
fallax, Kuntze, l. c. 244 = *M. fallax*, DC.
fasciculatum, Kuntze, l. c. 951 = *M. fasciculata*, Gaertn.
favosum, Kuntze, l. c. = *M. favosa*, Naud.
Fendlerianum, Kuntze, l. c. = *M. Fendleriana*, Cogn.
ferruginatum, Kuntze, l. c. = *M. ferruginata*, DC.
ferrugineum, Kuntze, l. c. = *M. ferruginea*, DC.
flammeum, Kuntze, l. c. = *M. flammea*, Casar.
flavescens, Kuntze, l. c. = *M. flavescens*, Cogn.
floribundum, Kuntze, l. c. = *M. floribunda*, DC.
floridum, Kuntze, l. c. = *M. florida*, Naud.
foliosum, Kuntze, l. c. = *M. foliosa*, Triana.
formosum, Kuntze, l. c. = *M. formosa*, Cogn.
foveolatum, Kuntze, l. c. = *M. foveolata*, Cogn.
fragile, Kuntze, l. c. 949 = *M. Acinodendron*, Sweet.
Francavillanum, Kuntze, l. c. 951 = *M. Francavillana*, Cogn.
fulvum, Kuntze, l. c. 950 = *M. Solmsii*, Cogn.
furfuraceum, Kuntze, l. c. 951 = *M. furfuracea*, Griseb.
giganteum, Kuntze, l. c. = *M. gigantea*, Cogn.
gilvum, Kuntze, l. c. = *M. gilva*, Cogn.
glaberrimum, Kuntze, l. c. = *M. glaberrima*, Naud.
glabratum, Kuntze, l. c. = *M. glabrata*, Cogn.
glanduliferum, Kuntze, l. c. = *M. glandulifera*, Cogn.
glandulosum, Kuntze, l. c. 244 = *M. glandulosa*, Kuntze.
glauescens, Kuntze, l. c. 951 = *M. glaucescens*, Triana.
Glaziovianum, Kuntze, l. c. = *M. Glazioviana*, Cogn.
globuliferum, Kuntze, l. c. = *M. globulifera*, Naud.
globuliflorum, Kuntze, l. c. = *M. globuliflora*, Cham.
glomeratum, Kuntze, l. c. = *M. glomerata*, Triana.
goniocladium, Kuntze, l. c. = *M. gonioclada*, Triana.
goniostigma, Kuntze, l. c. = *M. goniostigma*, Triana.
gossypinum, Kuntze, l. c. = *M. gossypina*, Triana.
Goudotii, Kuntze, l. c. = *M. Goudotii*, Naud.
gracile, Kuntze, l. c. = *M. gracilis*, Triana.
grandiflorum, Kuntze, l. c. = *M. grandiflora*, Cogn.
granulosum, Kuntze, l. c. = *M. granulosa*, Naud.
gratissimum, Kuntze, l. c. = *M. gratissima*, Benth.
Grayanum, Kuntze, l. c. = *M. Grayana*, Cogn.
guatemalense, Kuntze, l. c. = *M. guatemalensis*, Cogn.
guayaquilense, Kuntze, l. c. = *M. guayaquilensis*, D. Don.

ACINODENDRON:—

- guianense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 244 = *M. guianensis*, Cogn.
haematostemon, Kuntze, l. c. 951 = *M. haematostemon*, Naud.
heliotropoides, Kuntze, l. c. = *M. heliotropoides*, Triana.
hemenostigma, Kuntze, l. c. = *M. hemenostigma*, Naud.
herpeticum, Kuntze, l. c. = *M. herpetica*, DC.
heteromerum, Kuntze, l. c. = *M. heteromera*, Naud.
hirtellum, Kuntze, l. c. = *M. hirtella*, Cogn.
hispidum, Kuntze, l. c. = *M. hispida*, Cogn.
holosericeum, Kuntze, l. c. 244 (*holosericum*) = *M. holosericea*, Turcz.
Hookerianum, Kuntze, l. c. 951 = *M. Hookeriana*, Triana.
humile, Kuntze, l. c. = *M. humilis*, Cogn.
hyemale, Kuntze, l. c. = *M. hyemalis*, St-Hil, et Naud.
hygrophilum, Kuntze, l. c. = *M. hygrophila*, Naud.
hymenanthrum, Kuntze, l. c. = *M. hymenanthra*, Triana.
hymenonerve, Kuntze, l. c. = *M. hymenonervia*, Cogn.
hyperprasinum, Kuntze, l. c. = *M. hyperprasina*, Naud.
hypoleucum, Kuntze, l. c. = *M. hypoleuca*, Triana.
ibaguense, Kuntze, l. c. = *M. ibaguensis*, Wright.
igniarum, Kuntze, l. c. = *M. igniaria*, Bonpl.
impetiolare, Kuntze, l. c. 244 = *M. impetiolaris*, D. Don.
inaequalifolium, Kuntze, l. c. 951 = *M. inaequalifolia*, Triana.
inaequidens, Kuntze, l. c. = *M. inaequidens*, Naud.
inapertum, Kuntze, l. c. = *M. inaperta*, Naud.
inconspicuum, Kuntze, l. c. = *M. inconspicua*, Miq.
integrifolium, Kuntze, l. c. 950 = *M. multispicata*, Naud.
intricatum, Kuntze, l. c. 951 = *M. intricata*, Triana.
ioneurum, Kuntze, l. c. = *M. ioneura*, Griseb.
Jucunda, Kuntze, l. c. = *M. Jucunda*, Triana.
Kappleri, Kuntze, l. c. = *M. Kappleri*, Naud.
Klotzschii, Kuntze, l. c. = *M. Klotzschii*, Triana.
Kraenzlinii, Kuntze, l. c. = *M. Kraenzlinii*, Cogn.
Krugii, Kuntze, l. c. = *M. Krugii*, Cogn.
lacerum, Kuntze, l. c. 244 = *M. lacera*, Naud.
laetum, Kuntze, l. c. 951 = *M. laeta*, Cogn.
laevigatum, Kuntze, l. c. 244 = *M. laevigata*, DC.
lamprarhenum, Kuntze, l. c. = *M. lamprarrhena*, Triana.
lamprophyllum, Kuntze, l. c. 951 = *M. lamprophylla*, Triana.
lanatum, Kuntze, l. c. = *M. lanata*, Triana.
lanceolatum, Kuntze, l. c. = *M. lanceolata*, DC.
Langsdorffii, Kuntze, l. c. = *M. Langsdorffii*, Cogn.
lappaceum, Kuntze, l. c. = *M. lappacea*, Triana.
latifolium, Kuntze, l. c. = *M. latifolia*, Naud.
lauriforme, Kuntze, l. c. = *M. lauriformis*, Naud.
laurinum, Kuntze, l. c. = *M. laurina*, Naud.
Lechleri, Kuntze, l. c. = *M. Lechleri*, Triana.
ledifolium, Kuntze, l. c. = *M. ledifolia*, Naud.
Lehmannii, Kuntze, l. c. = *M. Lehmannii*, Cogn.
lepidotum, Kuntze, l. c. = *M. lepidota*, DC.
leucocarpum, Kuntze, l. c. = *M. leucocarpa*, DC.
Liebmännii, Kuntze, l. c. = *M. Liebmannii*, Cogn.
ligustrinum, Kuntze, l. c. = *M. rhamnoides*, Naud.
ligustroides, Kuntze, l. c. = *M. ligustroides*, Naud.
lilacinum, Kuntze, l. c. = *M. lilacina*, Triana.
Lindenii, Kuntze, l. c. = *M. desmantha*, Benth.
lividum, Kuntze, l. c. = *M. livida*, Triana.
lonchophyllum, Kuntze, l. c. = *M. lonchophylla*, Naud.
longicaudatum, Kuntze, l. c. = *M. longicaudata*, Cogn.
longicuspis, Kuntze, l. c. = *M. longicuspis*, Cogn.
longifolium, Kuntze, l. c. = *M. longifolia*, DC.
longipedunculatum, Kuntze, l. c. = *M. longipedunculata*, Cogn.
longispicatum, Kuntze, l. c. = *M. longispicata*, Triana.
loreyodes, Kuntze, l. c. = *M. loreyoides*, Triana.
loxensis, Kuntze, l. c. = *M. loxensis*, DC.
lucidum, Kuntze, l. c. = *M. lucida*, Naud.
luridum, Kuntze, l. c. = *M. lurida*, Cogn.
lutescens, Kuntze, l. c. = *M. lutescens*, DC.

ACINODENDRON:—

- macranthum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 951 = *M. macrantha*, Triana.
macrophyllum, Kuntze, l. c. 244 = *M. macrophylla*, Triana.
macrostachyum, Kuntze, l. c. 951 = *M. macrostachya*, DC.
macrota, Kuntze, l. c. 244 = *M. macrota*, Cogn.
macrothyrsus, Kuntze, l. c. 951 = *M. macrothyrsa*, Benth.
Magdalenae, Kuntze, l. c. = *M. Magdalenae*, Triana.
majale, Kuntze, l. c. = *M. majalis*, Cogn.
Mandonii, Kuntze, l. c. = *M. Mandonii*, Cogn.
marginatum, Kuntze, l. c. = *M. marginata*, Triana.
martinicensis, Kuntze, l. c. = *M. martinicensis*, Cogn.
Martiusianum, Kuntze, l. c. = *M. Martiusiana*, DC.
Matthaei, Kuntze, l. c. = *M. Matthaei*, Naud.
Maximowiczianum, Kuntze, l. c. = *M. Maximowicziana*, Cogn.
medium, Kuntze, l. c. = *M. media*, Naud.
Melinonii, Kuntze, l. c. = *M. Melinonis*, Naud.
mellinum, Kuntze, l. c. = *M. mellina*, DC.
membranaceum, Kuntze, l. c. 952 = *M. membrancea*, Triana.
Mendonçaei, Kuntze, l. c. = *M. Mendonçaei*, Cogn.
meridense, Kuntze, l. c. = *M. meridensis*, Triana.
metallicum, Kuntze, l. c. = *M. metallica*, Triana.
mexicanum, Kuntze, l. c. = *M. mexicana*, Naud.
microcarpum, Kuntze, l. c. = *M. microcarpa*, DC.
micropetalum, Kuntze, l. c. = *M. micropetala*, Cogn.
minutiflorum, Kuntze, l. c. 245 = *M. minutiflora*, DC.
miocarpum, Kuntze, l. c. 952 = *M. miocarpa*, Naud.
molestum, Kuntze, l. c. = *M. molesta*, Cogn.
molle, Kuntze, l. c. = *M. mollis*, Triana.
molliculum, Kuntze, l. c. = *M. mollicula*, Triana.
molybdeum, Kuntze, l. c. = *M. molybdea*, Naud.
Mouraei, Kuntze, l. c. = *M. Mouraei*, Cogn.
mucronatum, Kuntze, l. c. 244 = *M. mucronata*, Naud.
multiflorum, Kuntze, l. c. 952 = *M. multiflora*, Cogn.
multinerve, Kuntze, l. c. = *M. multinervia*, Cogn.
multinervulosum, Kuntze, l. c. = *M. multinervulosa*, Cogn.
multiplinerve, Kuntze, l. c. = *M. multiplinervia*, Cogn.
muricatum, Kuntze, l. c. = *M. muricata*, Triana.
mutabile, Kuntze, l. c. = *M. mutabilis*, Triana.
myrtillifolium, Kuntze, l. c. = *M. myrtillifolia*, Naud.
Naudinii, Kuntze, l. c. 949 = *M. fragilis*, Naud.
neriifolium, Kuntze, l. c. 952 = *M. neriifolia*, Triana.
nervosum, Kuntze, l. c. 245 = *M. nervosa*, Triana.
neurocarpum, Kuntze, l. c. 952 = *M. neurocarpa*, Triana.
neurotrichum, Kuntze, l. c. = *M. neurotricha*, Cogn.
nitidissimum, Kuntze, l. c. = *M. nitidissima*, Cogn.
nitidum, Kuntze, l. c. = *M. nitida*, Naud.
nodosum, Kuntze, l. c. = *M. nodosa*, Cogn.
notabile, Kuntze, l. c. = *M. notabilis*, Triana.
novemnerve, Kuntze, l. c. 245 = *M. novemnervis*, Naud.
oblongifolium, Kuntze, l. c. 952 = *M. oblongifolia*, Cogn.
obovatum, Kuntze, l. c. = *M. obovata*, Triana.
obscurum, Kuntze, l. c. = *M. obscura*, Naud.
obtusum, Kuntze, l. c. = *M. obtusa*, Triana.
ochraceum, Kuntze, l. c. = *M. ochracea*, Triana.
octopetalum, Kuntze, l. c. = *M. octopetala*, Cogn.
octoscedium, Kuntze, l. c. = *M. octoscedium*, Cogn.
oligotrichum, Kuntze, l. c. = *M. oligotricha*, Naud.
orchaeotomum, Kuntze, l. c. = *M. orchaeotoma*, Naud.
organense, Kuntze, l. c. = *M. organensis*, Gaertn.
ovalifolium, Kuntze, l. c. = *M. ovalifolia*, Cogn.
ovatum, Kuntze, l. c. = *M. ovata*, Cogn.
pachyphyllum, Kuntze, l. c. = *M. pachyphylla*, Cogn.
paleaceum, Kuntze, l. c. = *M. paleacea*, Cogn.
panduratum, Kuntze, l. c. = *M. pandurata*, Triana.
paniculatum, Kuntze, l. c. = *M. paniculata*, Naud.
papillosum, Kuntze, l. c. = *M. papillosa*, Naud.
paradoxum, Kuntze, l. c. = *M. paradoxa*, Triana.
parviflorum, Kuntze, l. c. = *M. parviflora*, Cogn.
parvifolium, Kuntze, l. c. = *M. parvifolia*, Cogn.
patoense, Kuntze, l. c. = *M. patoensis*, Triana.
paucidens, Kuntze, l. c. = *M. pauciflora*, DC.
pauciflorum, Kuntze, l. c. = *M. pauciflora*, Triana.

ACINODENDRON:—

- pauciglandulosum*, Kuntze Rev. Gen. (1891) 952 = *M. pauciglandulosa*, Naud.
paulense, Kuntze, l. c. = *M. paulensis*, Naud.
pauperculum, Kuntze, l. c. = *M. paupercula*, Cogn.
Pavonianum, Kuntze, l. c. = *M. Pavoniana*, Naud.
pedicellatum, Kuntze, l. c. = *M. pedicellata*, Cogn.
penduliflorum, Kuntze, l. c. = *M. penduliflora*, Cogn.
pennipile, Kuntze, l. c. = *M. pennipilis*, Cogn.
Pentlandii, Kuntze, l. c. = *M. Pentlandii*, Naud.
pepericarpum, Kuntze, l. c. = *M. pepericarpa*, DC.
pergamentaceum, Kuntze, l. c. = *M. pergamentacea*, Cogn.
pernettifolium, Kuntze, l. c. = *M. pernettifolia*, Triana.
persicariaefolium, Kuntze, l. c. = *M. persicarifolia*, Cogn.
peruvianum, Kuntze, l. c. = *M. peruviana*, Cogn.
Petronianum, Kuntze, l. c. = *M. Petroniana*, Cogn.
et Saldn.
petropolitatum, Kuntze, l. c. = *M. petropolitana*, Cogn.
phaeophyllum, Kuntze, l. c. = *M. phaeophylla*, Triana.
phaeotrichum, Kuntze, l. c. = *M. phaeotricha*, Naud.
pichinchense, Kuntze, l. c. = *M. pichinchensis*, Benth.
pileatum, Kuntze, l. c. = *M. pileata*, DC.
pinetorum, Kuntze, l. c. = *M. pinetorum*, Naud.
piperifolium, Kuntze, l. c. = *M. piperifolia*, Triana.
Pittieri, Kuntze, l. c. = *M. Pittieri*, Cogn.
planinerve, Kuntze, l. c. = *M. planinervia*, Naud.
plantaginifolium, Kuntze, l. c. 950 = *M. splendens*, Triana.
plethoricum, Kuntze, l. c. 952 = *M. plethorica*, Naud.
Plukenetii, Kuntze, l. c. = *M. Plukenetii*, Naud.
plumiferum, Kuntze, l. c. = *M. plumifera*, Triana.
Poeppigii, Kuntze, l. c. = *M. Poeppigii*, Triana.
Pohlianum, Kuntze, l. c. = *M. Pohliana*, Cogn.
polyandrum, Kuntze, l. c. = *M. polyandra*, Gardn.
polygamum, Kuntze, l. c. = *M. polygama*, Cogn.
polyneurum, Kuntze, l. c. = *M. polyneura*, Triana.
prasinum, Kuntze, l. c. 245 = *M. prasina*, DC.
pseudoaplostachyum, Kuntze, l. c. 952 = *M. pseudoaplostachya*, Cogn.
pseudocentrophorum, Kuntze, l. c. = *M. pseudocentrophora*, Cogn.
Pseudo-Eichleri, Kuntze, l. c. = *M. pseudo-Eichleri*, Cogn.
pseudonervosum, Kuntze, l. c. = *M. pseudo-nervosa*, Cogn.
Pseudo-Petronianum, Kuntze, l. c. = *M. Pseudo-Petroniana*, Cogn.
psychrophilum, Kuntze, l. c. = *M. psychrophila*, Cogn.
pterocaulon, Kuntze, l. c. = *M. pterocaulon*, Triana.
pteropodum, Kuntze, l. c. = *M. pteropoda*, Benth.
puberulum, Kuntze, l. c. = *M. puberula*, Cogn.
pulchrum, Kuntze, l. c. = *M. pulchra*, Cogn.
pulverulentum, Kuntze, l. c. = *M. pulverulenta*, R. et P.
punctatum, Kuntze, l. c. = *M. punctata*, D. Don.
pusilliflorum, Kuntze, l. c. = *M. Gardneriana*, Naud.
pusulatum, Kuntze, l. c. = *M. pusulata*, Naud.
pyrifolium, Kuntze, l. c. = *M. pyrifolia*, Naud.
quadrangulare, Kuntze, l. c. = *M. quadrangularis*, Triana.
quadrifolium, Kuntze, l. c. = *M. quadrifolia*, Naud.
quintuplinerve, Kuntze, l. c. = *M. quintuplinervia*, Cogn.
Rabenii, Kuntze, l. c. = *M. Rabenii*, Cogn.
racemiferum, Kuntze, l. c. = *M. racemifera*, Triana.
racemosum, Kuntze, l. c. 245 = *M. racemosa*, DC.
Radula, Kuntze, l. c. 952 = *M. Radula*, Cogn.
radulifolium, Kuntze, l. c. = *M. radulaefolia*, Naud.
reclinatum, Kuntze, l. c. = *M. reclinata*, Naud.
reducens, Kuntze, l. c. = *M. reducens*, Triana.
Regelii, Kuntze, l. c. = *M. Regelii*, Cogn.
Regnellii, Kuntze, l. c. = *M. Regnellii*, Cogn.
resimium, Kuntze, l. c. = *M. resima*, Naud.
resimodes, Kuntze, l. c. = *M. resimoides*, Cogn.
reticulatum, Kuntze, l. c. = *M. reticulata*, Triana.
revolutum, Kuntze, l. c. = *M. revoluta*, Miq.
rhytidophyllum, Kuntze, l. c. = *M. rhytidophylla*, Naud.
Riedelii, Kuntze, l. c. = *M. Riedelii*, Naud.
rigens, Kuntze, l. c. = *M. rigens*, Naud.
rigidiusculum, Kuntze, l. c. = *M. rigidiuscula*, Cogn.
rigidum, Kuntze, l. c. = *M. rigida*, Triana.

ACINODENDRON:—

- rimale*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 952 = *M. rimalis*, Naud.
riparium, Kuntze, l. c. = *M. riparia*, Triana.
robustum, Kuntze, l. c. = *M. robusta*, Cogn.
robustissimum, Kuntze, l. c. = *M. robustissima*, Cogn.
rostratum, Kuntze, l. c. = *M. rostrata*, Cogn.
rotundifolium, Kuntze, l. c. = *M. rotundifolia*, and
rubens, Kuntze, l. c. = *M. rubens*, Naud.
rubiginosum, Kuntze, l. c. = *M. rubiginosa*, DC.
rubricans, Kuntze, l. c. = *M. rubricans*, Triana.
rufum, Kuntze, l. c. = *M. rufa*, Triana.
rufescens, Kuntze, l. c. = *M. rufescens*, DC.
rufipilum, Kuntze, l. c. = *M. rufipila*, Triana.
rugifolium, Kuntze, l. c. = *M. rugifolia*, Triana.
rugosum, Kuntze, l. c. = *M. rugosa*, Triana.
Ruizii, Kuntze, l. c. = *M. Ruizii*, Naud.
Rusbyanum, Kuntze, l. c. = *M. Rusbyana*, Cogn.
Sagotianum, Kuntze, l. c. = *M. Sagotiana*, Cogn.
Saldanhae, Kuntze, l. c. = *M. Saldanhaei*, Cogn.
salicifolium, Kuntze, l. c. = *M. salicifolia*, Naud.
Sancti-Philippi, Kuntze, l. c. = *M. Sancti-Philippi*, Naud.
sanguineum, Kuntze, l. c. = *M. sanguinea*, Triana.
sarmentosum, Kuntze, l. c. = *M. sarmentosa*, Cogn.
scabrum, Kuntze, l. c. = *M. scabra*, Cogn.
Schlechtendalii, Kuntze, l. c. = *M. Schlechtendalii*, Cogn.
Schlimii, Kuntze, l. c. = *M. Schlimii*, Triana.
Schwackei, Kuntze, l. c. = *M. Schwackei*, Cogn.
sclerophyllum, Kuntze, l. c. = *M. sclerophylla*, Triana.
scorpioides, Kuntze, l. c. = *M. scorpioides*, Naud.
scrobiculatum, Kuntze, l. c. = *M. scrobiculata*, Cogn.
secundiflorum, Kuntze, l. c. = *M. secundiflora*, Cogn.
Sellowianum, Kuntze, l. c. = *M. Sellowiana*, Naud.
seriale, Kuntze, l. c. = *M. serialis*, DC.
servulatum, Kuntze, l. c. = *M. galactantha*, Naud.
sessilifolium, Kuntze, l. c. = *M. sessilifolia*, Naud.
setinode, Kuntze, l. c. = *M. setinodis*, DC.
setosociliatum, Kuntze, l. c. = *M. setoso-ciliata*, Cogn.
setulosum, Kuntze, l. c. = *M. setulosa*, Cogn.
simplex, Kuntze, l. c. = *M. simplex*, Triana.
Sintenisii, Kuntze, l. c. = *M. Sintenisii*, Cogn.
smaragdinum, Kuntze, l. c. = *M. smaragdina*, Naud.
sordidum, Kuntze, l. c. = *M. sordida*, Triana.
speciosum, Kuntze, l. c. = *M. speciosa*, Naud.
spennerostachyum, Kuntze, l. c. = *M. spennerostachya*, Naud.
spicellatum, Kuntze, l. c. = *M. spicellata*, Bonpl.
spinulosa, Kuntze, l. c. = *M. spinulosa*, Naud.
spiraefolium, Kuntze, l. c. = *M. spiraefolia*, Triana.
Sprucei, Kuntze, l. c. = *M. Sprucei*, Triana.
squamulosum, Kuntze, l. c. = *M. squamulosa*, Triana.
stamineum, Kuntze, l. c. = *M. staminea*, DC.
staphidioides, Kuntze, l. c. 953 = *M. staphidioides*, Triana.
stelligerum, Kuntze, l. e. = *M. stelligera*, Cogn.
stenobotryum, Kuntze, l. c. = *M. stenobotrys*, Naud.
stenostachyum, Kuntze, l. c. = *M. stenostachya*, DC.
stenourum, Kuntze, l. c. = *M. stenoura*, Triana.
stipulare, Kuntze, l. c. = *M. stipularis*, Naud.
strictum, Kuntze, l. c. = *M. stricta*, Cogn.
stylosum, Kuntze, l. c. = *M. stylosa*, Cogn.
subcordatum, Kuntze, l. c. = *M. subcordata*, Cogn.
subglabrum, Kuntze, l. c. = *M. subglabra*, Cogn.
subnodosum, Kuntze, l. c. = *M. subnodosa*, Triana.
suborbiculare, Kuntze, l. c. = *M. suborbicularis*, Cogn.
subvernicosum, Kuntze, l. c. = *M. subvernica*, Cogn.
symplocoidum, Kuntze, l. c. = *M. symplocoidea*, Triana.
Taguavi, Kuntze, l. c. 950 = *M. latecrenata*, Naud.
tentaculiferum, Kuntze, l. c. 953 = *M. tentaculifera*, Naud.
tenuis, Kuntze, l. c. = *M. tenuis*, Triana.
Terera, Kuntze, l. c. = *M. Terera*, Naud.
ternatifolium, Kuntze, l. c. = *M. ternatifolia*, Triana.
tetragonum, Kuntze, l. c. = *M. tetragona*, Cogn.
tetrandrum, Kuntze, l. c. = *M. tetrandra*, Naud.
tetastomum, Kuntze, l. c. = *M. tetastoma*, Naud.
theaeforme, Kuntze, l. c. 950 = *M. Maximiliana*, DC.
theaezans, Kuntze, l. c. 953 = *M. theaezans*, Cogn.

ACINODENDRON:—

- Thomasianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 953 = *M. Thomasiana*, DC.
thyrsodeum, Kuntze, l. c. = *M. thyrsoides*, Naud.
tiliaefolium, Kuntze, l. c. = *M. tiliaefolia*, Naud.
tinifolium, Kuntze, l. c. = *M. tinifolia*, Naud.
Tiri, Kuntze, l. c. = *M. Tiri*, Triana.
tomentellum, Kuntze, l. c. = *M. tomentella*, Cogn.
tomentosum, Kuntze, l. c. 245 = *M. tomentosa*, D. Don.
Tonduzii, Kuntze, l. c. 953 = *M. Tonduzii*, Cogn.
toavense, Kuntze, l. c. = *M. toavensis*, Cogn.
Traillii, Kuntze, l. c. = *M. Traillii*, Cogn.
Trianae, Kuntze, l. c. = *M. Trianaei*, Cogn.
trichodes, Kuntze, l. c. = *M. trichodes*, Cogn.
trichotomum, Kuntze, l. c. = *M. trichotoma*, DC.
trinerve, Kuntze, l. c. = *M. trinervia*, D. Don.
triplinerve, Kuntze, l. c. 245 = *M. triplinervis*, R. et P.
triste, Kuntze, l. c. 953 = *M. tristis*, Spreng.
truncatum, Kuntze, l. c. = *M. truncata*, Triana.
tuberculatum, Kuntze, l. c. 245 = *M. tuberculata*, Triana.
Tuerckheimii, Kuntze, l. c. 953 = *M. Tuerckheimii*, Cogn.
tunicatum, Kuntze, l. c. = *M. tunicata*, Naud.
ulmarioides, Kuntze, l. c. = *M. arbutifolia*, Naud.
umbrosum, Kuntze, l. c. = *M. umbrosa*, Cogn.
undatum, Kuntze, l. c. = *M. undata*, Triana.
urophyllum, Kuntze, l. c. = *M. urophylla*, DC.
urticoides, Kuntze, l. c. = *M. urticoides*, Triana.
uviferum, Kuntze, l. c. = *M. uvifera*, Naud.
vaccinioides, Kuntze, l. c. = *M. vaccinioides*, Naud.
Vanthieri, Kuntze, l. c. = *M. Vantherii*, Naud.
velutinum, Kuntze, l. c. = *M. velutina*, Triana.
verrucosum, Kuntze, l. c. = *M. verrucosa*, Cogn.
versicolor, Kuntze, l. c. = *M. versicolor*, Naud.
verticillatum, Kuntze, l. c. = *M. verticillata*, Triana.
violaceum, Kuntze, l. c. = *M. violacea*, Cogn.
virescens, Kuntze, l. c. = *M. virescens*, Triana.
vismoides, Kuntze, l. c. = *M. vismioides*, Triana.
vittatum, Kuntze, l. c. = *M. vittata*, Cogn.
vulcanicum, Kuntze, l. c. = *M. vulcanica*, Naud.
Warmingianum, Kuntze, l. c. = *M. Warmingiana*, Cogn.
Weddellii, Kuntze, l. c. = *M. Weddellii*, Naud.
Willdenowii, Kuntze, l. c. = *M. Willdenowii*, Klotzsch.
Wrightii, Kuntze, l. c. = *M. Wrightii*, Triana.

ACINOS, Rupp. = *Calamintha*, Lam. (Labiata).
vulgaris, MacMill. Metasp. = *Clinopodium vulgare*, Linn.

ACIOA, Aubl. = *Couepia*, Aubl. (Rosac.).
Buchneri, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 88. — Congo.
campestris, Engl. l. c. 88. — Afr. trop.

ACIPHYLLA, Forst. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 28.
Kirkii, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 214, t. 17. — N. Zel.
simplex, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 440. — N. Zel.

ACISANTHERA, P. Br. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 28.
Goudotii, Cogn. ex Krassir, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenf. iii. 7. (1893) 150. — Am. trop.
paraguayensis, Cogn. in Mart. Fl. Brasil. xiv. iv. (1888) 596. — Parag.

ACKAMA, A. Cunn. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 29.
paniculata, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. ii (1890) 98. — Ind. Or., Austral.

ACNIDA, Linn. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 29.
tamariscina, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 535 = *tuberculata*, Moq.

ACNISTUS, Schott (Solanac.). — Ind. Kew. i. 29.
oblongifolius, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 232. — Bolivia.

ACOKANTHERA, G. Don (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 30.
abessinica, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 126 = seq.

ACOKANTHERA:—

- abyssinica*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 315. — Abyss.
Deffersii, Schweinf. ex Lewin, in Bot. Jahrb. xvii. Beibl. 41 (1893) 44 et 45. — Eritrea, Arab.
Ouabaio, Cathelineau, ex Lewin, l. c. 44. — Afr. trop. or. (Somal.)
Schimperi, Oliver, in J. Thoms. Through Masai Land Append. (1887) 351. — Afr. trop.

ACONITUM, Tourn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 30.

- Baumgartenianum*, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 179; et Enum. fl. Transsilv. (1886) 61 = *A. Lycotonomum*, Linn.
bosniacum, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. vi. (1891) 342, t. 10 fig. 1-6. — Bosn.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 381. — Yunnan.
fallacinum, Blocki, in Kneucker, Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 117. — Austro.-Hung.
Fortunei, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 20. — China.
lasianthum, Simonk. Enum. fl. Transs. (1886) 61 = *A. Lycotonomum*, Linn.
nanum, Simonk. l. c. 64 = *A. Napellus*, Linn.
noveboracense, A. Gray, ex Coville, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 190. — Am. bor.
racemosum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 276. — China.
Schurii, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. vi. (1891) 343. — Transsilv.
scaposum, Franch., in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 277. — China.
stenotomum, Borb. in Termész. Füzet. xvi. (1893) 44 = *A. Lycotonomum*, Linn.
superbum, Fritsch, in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 370. — Bosnia.
thyraicum, Blocki, in Kneucker, Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 59. — Carpath.

ACRANTHEMUM, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 254 = *Loranthus*, Linn.
natalitium, Van Tiegh, l. c. 255 = *L. natalitius*, Meissn.
Zeyheri, Van Tiegh. l. c. = *L. Zeyheri*, Harv.

ACRANTHERA, Arn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 32.

- Atropella*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 173. — Borneo.
mutabilis, Hemsl., in Journ. Bot. xxv. (1887) 204. — Perak.

ACRIDOCARPUS, Guill. et Perr. (Malpighiac.).
Ind. Kew. i. 32.
Humboldtii, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 267. — Madag.

ACRIOPSIS, Reinw. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 32.
purpurea, Ridl., in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iii. (1893) 406. — Penins. Mal.
Ridleyi, Hook. f., Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 79. — Singap.

ACROCEPHALUS, Benth. (Labiata). — Ind. Kew. i. 33.

- angolensis*, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 198. — Angola.
Buettneri, Gürke, l. c. — Afr. trop. occid.
callianthus, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 169. — Afr. trop. or.
campicola, Briq. l. c. — Congo.
elongatus, Briq. l. c. — Congo.
Fischeri, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 348. — Afr. trop. or.
gracilis, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 166. — Angola.
Heudelotii, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 689. — Senegamb.
indicus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 511 = *capitatus* Benth.
iododermis, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 167. — Congo.
lagoensis, Baker, in Kew Bull. (1895) 152. — Lagos.
Mechowianus, Briq. in Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 168. — Angola.

ACROCEPHALUS :—

minor, *Briq. Engl. Bot. Jahrb.* xix. (1894) 169. — Angola.
 paniculatus, *Briq. l. c.* 172. — Congo.
 Poggeanus, *Briq. l. c.* 170. — Congo.
 praealtus, *Briq. l. c.* 168. — Angola.
 reticulatus, *Briq. l. c.* 168. — Angola.
 Schweinfurthii, *Briq. l. c.* 171. — Afr. centr.-bor.
 sericeus, *Briq. l. c.* 170. — Angola.
 Welwitschii, *Briq. l. c.* 169. — Angola.
 zambesiacus, *Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 348. — Afr. trop. or.

ACROCOELIUM, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 988. **EUPHORBIACEAE**.
 congolanum, *Baill. l. c.* — Congo gall.

ACROCOMIA, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. i. 33.
 microcarpa, *Barb. Rodr. in Vellozia*, 1885-88, ed. 2, i. (1891) 107. — Bras.

ACRODICLIDIUM, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. i. 33.

Appelii, *Mez, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 519. — Bras.
 armeniacum, *Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 85 (= *Evonymodaphne armeniacae*, Nees). — Peruv.
 Canella, *Mez, l. c.* 90 (= *Aydedron Canella*, Meissn.). — Guian. gall.
 cayennense, *Mez, l. c.* 91 (= *Aydedron cayennense* Meissn.). — Guian. gall.
 cinnamomoides, *Mez, l. c.* 88 = *Nectandra cinnamomoides*, Nees.
 debile, *Mez, l. c.* 99. — Guian. gall.
 foveolatum, *Mez, l. c.* 92. — Guian. gall.
 geminiflorum, *Mez, l. c.* 84 = *Goeppertia geminiflora*, Meissn.
 limbosum, *Mez, l. c.* 89 = *Nectandra limbata*, Nees.
 Martinianum, *Mez, l. c.* 93. — Guian. gall.
 Meissneri, *Mez, l. c.* v. — Bras.
 pachycarpum, *Mez, l. c.* 91 = *Aydedron pachycarpum*, Meissn.
 parviflorum, *Mez, l. c.* 85 = *Mespilodaphne parviflora*, Meissn.
 Puchury-major, *Mez, l. c.* 87 = *Nectandra Puchury-major*, Nees.

ACROLASIA, Presl (Loas.). — Ind. Kew. i. 33.
 elata, *Phil., in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 5. — Chili.
 pinnatifida, *Phil. l. c.* 6. — Chili.

ACROLOPHIA, Pfitzer in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6. (1888) 133 = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).
 cochlearis, Schlechter et Bolus, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 332 = *E. cochlearis*, Lindl.
 comosa, Schlechter et Bolus, l. c. 330 = *E. comosa*, Sond.
 lamellata, Schlechter et Bolus, l. c. 332 = *E. lamellata*, Lindl.
 lunata, Schlechter et Bolus, l. c. 332 = *E. lunata*, Schlechter.
 micrantha, Schlechter et Bolus, l. c. 532 = *E. micrantha*, Lindl.
 sphaerocarpa, Schlechter et Bolus, l. c. 331 = *E. sphaerocarpa*, Sond.
 tristis, Schlechter et Bolus, l. c. 331 = *E. tristis*, Spreng.
 ustulata, Schlechter et Bolus, l. c. 332 = *E. ustulata*, Bolus.

ACRONYCHIA, Forst. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 33.
 lobocarpa, *F. Muell. in Journ. Bot.* xxx. (1892) 17. — Papuasias.

ACROSTACHYS, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 504 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
 Kirkii, Van Tiegh. l. c. — Zambes.
 Sandersoni, Van Tiegh. l. c. — Natal.

ACROSTEPHANUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 268 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
 Buchneri, Van Tiegh. l. c. = *L. Buchneri*, Engl.
 coronatus, Van Tiegh. l. c. — Congo gall.
 dependens, Van Tiegh. l. c. = *L. dependens*, Engl.

ACROSTEPHANUS :—

ogowensis, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 268 = *L. ogowensis*, Engl.
 Poggei, Van Tiegh. l. c. = *L. Poggei*, Engl.
 syringifolius, Van Tiegh. l. c. = *L. syringifolius*, Engl.
 truncatus, Van Tiegh. l. c. 268 = *L. truncatus*, Engl.
 tschintschochensis, Van Tiegh. l. c. = *L. tschintschochensis*, Engl.

ACROSTYLIA, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 227. **ORCHIDEAE**.
 paradoxa, *Frappier, l. c.* 228. — Ins. Bourbon.

ACTAEA, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 24.
 acerina, Prantl in Bot. Jahrb. ix. (1888) 246 = *Cimicifuga japonica*, Spreng.
 americana, Prantl, l. c. 246 = *Cimicifuga americana*, Michx.
 biternata, Prantl, l. c. 246 = *Cimicifuga biternata*, Miq.
 elata, Prantl, l. c. 246 = *Cimicifuga elata*, Nutt.
 obtusiloba, Prantl, l. c. 246 = *Cimicifuga obtusiloba*, Miq.
 simplex, Prantl, l. c. 246 = *Cimicifuga foetida*, Linn.
 viridiflora, *Greene, Pittonid.* ii. (Dec. 1890) 108. — Calif.

ACTEPHILA, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 35.
 nitida, «*Benth. et Hook.*» ex *Drake Ill. insul. Mar. Pacif.* (1892) 177 et 286. — Ins. Societ.

ACTINEA, Juss. = **Cephalophora**, Cav. (Composit.).
 acaulis, argentea, biennis, Bigelowii, Brandegei, chrysanthemodes, Cooperi, depressa, Doniana, grandiflora, insignis, leptoclada, linearifolia, odorata, Richardsonii, Rusbyi, scaposa, Vaseyi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 303 = *homonymia omnia Actinellae*.
 radiata, Kuntze, l. c. = *C. heterophylla*, Less.

ACTINELLA, Nutt. (Composit.). — Ind. Kew. i. 35.
 texana, *Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 27; et *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1892) 231. — Texas.

ACTINIDIA, Lindl. (Ternstr.). — Ind. Kew. i. 35.
 melanandra, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 278. — China.
 Miquelii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 196. — Malaya.
 tetramera, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 35. — China.
 trichogyna, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 278. — China.

ACTINODAPHNE, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. i. 35.
 ambigua, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 153. — Zeyl.
 campanulata, *Hook. f. l. c.* 148. — Ind. or.
 elegans, *Knowl. in Flora*, lxxi. (1888) 394. — Zeylan.
 hirsuta, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 152. — Malab.
 leiantha, *Hook. f. l. c.* 154. — Tenass.
 madraspatana, *Bedd. ex Hook. f. l. c.* 149. — Deccan.
 Maingayi, *Hook. f. l. c.* 151. — Malacca.
 malaccensis, *Hook. f. l. c.* 145. — Malacca.
 pisifera, *Hook. f. l. c.* 151. — Zeylan.
 sesquipedalis, *Hook. f. et Thoms. ex Hook. f. l. c.* 151. — Penins. Mal.

ACTINOMORPHE, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 570
 sphalm. = **Actinodaphne**, Nees (Laurin.).
 ambigua, Kuntze, l. c. = *A. ambigua*, *Hook. f. hirsuta*, Kuntze, l. c. = *A. hirsuta*, *Hook. f. madraspatana*, Kuntze, l. c. = *A. madraspatana*, *Bedd.*
 molochina, Kuntze, l. c. = *A. molochina*, Nees.

ACTINOPHLOEUS, Becc. ex K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 15. **PALMAE**.
 Schumannii, *Becc, l. c.* — N. Guin.

ACTINOPHORA, Wall. = **Schoutenia**, Korth. (Tiliac.).
 Godefroyana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 82 = *S. Godefroyana*, Baill.
 hypoleuca, Kuntze, l. c. = *S. hypoleuca*, Pierre.

ACTINOPHYLLUM, Ruiz et Pav. = **Trevesia**, Miq. (Aral.).
 palmatum, Blume, ex Boerl. in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 111 = *T. sundaica*, Miq.

ACTINOSTEMON, Mart. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 36.
 luquense, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sc.* vii. (1893) 228. — Parag.

ACTINOTINUS, Oliver, in Hook. Icon. Pl. xviii. (1888) t. 1740. (Gen. omnino delend. fide cl. Oliver).
 sinensis, Oliver. l. c. (vide supra).

ACTINOTUS, Labill. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 36.
 Schwartzii, *F. Muell. ex Vict. Natural.* v. (1889) (Index) = seq.
 Schwarzii, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* ix. (1887) 57 nomen; et in *Vict. Natural.* v. (Aug. 1888) 54. — Austral.

ACUAN(IA), Medic. = **Desmanthus**, Willd. (Legumin.).
 acuminata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 158 = *D. acuminatus*, Benth.
 arborescens, Kuntze, l. c. = *D. arborescens*, Boj.
 depressa, Kuntze, l. c. = *D. depressus*, Humb. et Bonpl.
 illinoensis, Kuntze, l. c. = *D. brachylobus*, Benth.
 incurva, Kuntze, l. c. = *D. incurvus*, Benth.
 Jamesii, Kuntze, l. c. = *D. Jamesii*, Torr. et Gray.
 leptoloba, Kuntze, l. c. = *D. leptolobus*, Torr. et Gray.
 reticulata, Kuntze, l. c. = *D. reticulatus*, Benth.
 velutina, Kuntze, l. c. = *D. velutinus*, Scheele.

ACUSTELMA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 804 (err. typ. 84) = **Cryptolepis**, R. Br. (Asclep.).
 Grandidieri, Baill. l. c. — Madag.

ACYNTHA, Medic. = **Sansevieria**, Thunb. (Haemod.).
 bracteata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 699 = *S. bracteata*, Bak.
 cylindrica, Kuntze, l. c. = *S. cylindrica*, Boj.
 Ehrenbergii, Kuntze, l. c. = *S. Ehrenbergii*, Schweinf.
 lanuginosa, Kuntze, l. c. = *S. lanuginosa*, Willd.
 longiflora, Kuntze, l. c. = *S. longiflora*, Sims.
 nilotica, Kuntze, l. c. = *S. nilotica*, Bak.
 Roxburghiana, Kuntze, l. c. = *S. Roxburghiana*, Schult. f.
 senegambica, Kuntze, l. c. = *S. senegambica*, Bak.
 thyrsiflora, Kuntze, l. c. = *S. thyrsiflora*, Thunb.
 zeylanica, Kuntze, l. c. = *S. zeylanica*, Willd.

ADA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 36.
 Lehmanni, *Rolfe, in Gard. Chron.*, (1891) ii. 34. — N. Granat.

ADANSONIA, Linn. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 36.
 Fony, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1890) 845. — Madag.
 Grandidieri, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1888) t. 79 E, 79 A. — Madag.
 Za, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par., ii. (1890) 845 et Hist. pl. Madag. Atlas t. 79 C, 79 D, 79 I. — Madag.

ADDISONIA, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 432. **COMPOSITAE**.
 virgata, *Rusby, l. c.* 432 t. 169. — Bolivia.

ADELANTHUS, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 554, nomen (Olacin.).

ADELIA, P. Br. = **Forestiera**, Poir. (Oleac.).
 angustifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 410 = *F. angustifolia*, Torr.
 Burchelliana, Kuntze, l. c. = *F. Burchelliana*, Oliv.
 cassinodes, Kuntze, l. c. = *F. cassinoides*, Poir.
 neomexicana, Kuntze, l. c. = *F. neo-mexicana*, A. Gray.
 parvifolia, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 148 = *F. acuminata*, Poir.
 phillyreodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 410 = *F. phillyreoides*, Torr.

ADELIA :—

pubescens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 410 = *F. ligustrina*, Poir.
reticulata, Kuntze, l. c. = *F. reticulata*, Torr.
rhamnifolia, Kuntze, l. c. = *F. rhamnifolia*, Griseb.
segregata, Kuntze, l. c. = *F. porulosa*, Poir.
sphaerocarpa, Kuntze, l. c. = *F. sphaerocarpa*, Torr.
virgata, T. S. Brandeg. in Zoe, iv. (1894) 406. — Calif.

ADELOBOTRYS, DC. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 37.

Boissieriana, Cogn. in Mart. Fl. Bras., xiv, iv. (1889) 21. — Peruv.
 Spruceana, Cogn., l. c. 18. — Bras.

ADELOPETALUM, Fitzg. in Journ. Bot. xxix.

(1891) 152. (Orchid.).
 bracteatum, Fitzg., l. c. — Austral.

ADENIA, Forsk. = **Modecca**, Linn. (Passifl.).

aculeata, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 572; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 84 = *M. aculeata*, Oliver.
australis, Engl. ll. cc. 572 et 85 = *M. australis*, R. Br.
cardiophylla, Engl. ll. cc. 573 et 84 = *M. cardiophylla*, Mast.
cordifolia, Engl. l. c. 84 = *M. cordifolia*, Blume.
glauca, Schinz, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 33. (1892) 1 — Transv.
globosa, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 576; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 85. — Afr. trop.
Keramanthus, Harms, in Engl. et Prantl, l. c. 84 = *Keramanthus* Kirkii, Hook. f.
Kirkii, Engl. l. c. = *M. Kirkii*, Mast.
lancoolata, Engl. ll. cc. 572 et 84. — Afr. centr. bor.
lobata, Engl. l. c. 572 = *M. lobata*, Jacq.
palmata, Engl. l. c. 84 = *M. palmata*, Lam.
panduriformis, Engl. ll. cc. 573 et 84 — Zambes.
populifolia, Engl. l. c. 573 = *M. populifolia*, Blume.
repanda, Engl. l. c. 573 = *M. Paschanthus*, Harv.
Schweinfurthii, Engl. ll. cc. 573 et 84. — Afr. trop.
senensis, Engl. ll. cc. = *M. senensis*, Klotzsch.
trilobata, Engl. ll. cc. = *M. trilobata*, Roxb.
Volkenii, Harms, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 281. — Afr. trop. or.
Welwitschii, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 573; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 84 = *M. Welwitschii*, Mast.
Wightiana, Engl. ll. cc. = *M. Wightiana*, Wall.

ADENIUM, R. et S. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 38.

Boehmianum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 259. — Afr. austro-occ. extratrop.
 micranthum, Stapf, in Kew Bull., (1894) 334. — Arab.

ADENOCALYMNA, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 38.

bullatum, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam., iv. 3 b. (1894) 214. — Bras.
 croceum, S. Moore, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1895) 419. — Bras.
 foveolatum, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 214 fig. 89. — Guian.
 helicocalyx, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 478. — Ins. Trinit., Venez.
 Paulistarium, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 214. — Bras.
 ocositense, J. D. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 209. — Guatem.
 portoricense, Stahl, ex Bello, Estud. fl. Porto Rico, vi. (1888) 186. — Ins. Portoric.
 reticulatum, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 214. — Bras.
 tephrocalyx, Bur., l. c. — Bras.

ADENOCARPUS, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 38.

anagryfolius, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 206 in obs. — Afr. bor.

ADENOCHLAENA, Boiss. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 39.

indica, Bedd. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 418. — Ind. or.

ADENOLISIANTHUS, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 98. **GEN-TIANEAE**.

arbores, Gilg, l. c. — Bras.
 virgatus, Gilg, l. c. — Bras.

ADENOPHORA, Fisch. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 39.

aurita, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 366. — China.
 capillaris, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 10. — China.
 himalayana, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 618. — Reg. Himal.
 jasionifolia, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 365. — China occ.
 khasiana, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 617 = *Campanula khasiana*, Hook. f. et Thoms.
 khasyana, Coll. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 80. — Reg. Himal.
 Maximowicziana, Makino, in Bot. Mag. Tokyo Soc. vi. (1892) 54. — Japon.
 pubescens, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 12. — China.
 remotidens, Hemsl. l. c. — China.
 rupicola, Hemsl. l. c. 13. — China.
 setulosa, Borb. Fl. Comit. Castriferr. (1887) 77 et 204. — Hung.
 stenophylla, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi (1889) 10 in obs. — Mandchuria.
 Turczaninowi, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 618. — Asia centr. bor.

ADENOPHYLLUM, Pers. (Composit.). — Ind. Kew. i. 40.

cancellatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 361 sphalm. = *Dysodia cancellata*, A. Gray.

ADENOPUS, Benth. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 40.

intermedius, Cogn. in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 227. — Ins. S. Thom. et Princip.

ADENOSTEGIA, Benth. = **Cordylanthus**, Nutt. (Scrophul.).

Bolanderi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 456 = *C. pilosus*, A. Gray, var.
 canescens, capitata, Kingii, laxiflora, maritima, mollis, Nevinii, Orcuttiana, pilosa, Pringlei, ramosa, tenuis, et Wrightii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 456-7 omnia homonyma *Cordylanthi*.
 canescens, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 181 = *C. canescens*, A. Gray.
 capitata, Greene, l. c. 180 = *C. capitatus*, Nutt.
 Kingii, Greene, l. c. 181; Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = *C. Kingii*, S. Wats.
 laxiflora, Greene, l. c. = *C. laxiflorus*, A. Gray.
 laxiflora, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.
 maritima, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 181 = *C. maritimus*, Nutt.
 maritima, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.
 mollis, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 181 = *C. mollis*, A. Gray.
 mollis, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.
 Nevinii, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 181 = *C. Nevinii*, A. Gray.
 Orcuttiana, Greene, l. c. = *C. Orcuttianus*, A. Gray.
 Orcuttiana, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.
 Parryi, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 181 = *C. Parryi*, S. Wats.
 pilosa, Greene, l. c. 180 = *C. pilosus*, A. Gray.
 Pringlei, Greene, l. c. 181 = *C. Pringlei*, A. Gray.
 ramosa, Greene, l. c. 180 = *C. ramosus*, Nutt.
 tenuis, Greene, l. c. = *C. tenuis*, A. Gray.
 tenuis, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.
 Wrightii, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 180 = *C. Wrightii*, A. Gray.
 Wrightii, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.

ADENOSTEMMA, Forst. (Composit.). — Ind. Kew. i. 40.

Lavenia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 304 = *viscosum*, Forst.
 Verbesina, Kuntze, l. c. = *Swartzii*, Cass.

ADENOSTEPHANUS, Klotzsch = **Euplassa**, Salisb. (Proteac.).

Glaziovii, Mez, ex Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27. (1890) 10. — Bras.
 obversiflorus, Mez, ex Taub. l. c. 9. — Bras.
 rufa, Loesen, in Flora, lxxii. (1889) 78. — Bras.

ADENOSTYLES, Cass. (Composit.). — Ind. Kew. i. 41.

calcareia, Brügg. in Jahresb. naturf. Ges. Graub. (1886) 55. — Helv.
 canescens, X, Seenholtz, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 332. — Austria.
 crassifolia, A. Kern. Sched. fl. Austro-Hung. v. (1888) 78. — Tyrol.
 Kernerii, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 181; et Enum. fl. Transsilv. (1886) 297. — Transs.
 leucophylla, Gremli, Neue Beitr. Fl. Schweiz, v. (1890) 77. — Helv.
 polyantha, Kern. in Pallas, Lexicon (anno?) ex Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 399. — Austria.
 stenotricha, Kern. ll. cc. — Austria.

ADESMIA, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 41.

adenophora, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1891) 16. — Am. austr. occ.
 brachysemeon, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 287. — Chili.
 caespitosa, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1891) 16. — Am. austr. occ.
 calycosa, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 288. — Chili.
 concinna, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 16. — Am. austr. occ.
 crassicaulis, Phil. l. c. 17. — Am. austr. occ.
 disperma, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 286. — Chili.
 dumosa, Phil. l. c. 433. — Chili.
 Fernandezi, Phil. l. c. 284. — Chili.
 furcata, Phil. l. c. 434. — Chili.
 Grisebachii, Phil. l. c. 285. — Chili.
 leucopogon, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 17. — Am. austr. occ.
 Medinae, Phil. ex K. Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 47 nomen. — Chili.
 melanocaulos, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 434. — Chili.
 melanthes, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 18. — Am. austr. occ.
 microcalyx, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 286. — Chili.
 Palenae, Phil. l. c. 282. — Chili.
 pentaphylla, Phil. l. c. 436. — Chili.
 polyphylla, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 18. — Am. austr. occ.
 Rahmeri, Phil. l. c. 15. — Am. austr. occ.
 Remyana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 435. — Chili.
 senticula, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 18. — Am. austr. occ.
 sentis, Phil. l. c. 18. — Am. austr. occ.
 subumbellata, Phil. l. c. 17. — Am. austr. occ.
 tenuicaulis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 282. — Chili.
 tenuis, Phil. l. c. 282. — Chili.
 torcaeae, Phil. l. c. 287. — Chili.
 villosa, Phil. l. c. 287. — Chili.
 virens, Phil. l. c. 435. — Chili.

ADICEA, Rafin. = **Pilea**, Lindl. (Urtic.).

acuminata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 622 = *P. acuminata*, Liebm.
 alsinifolia, Kuntze, l. c. = *P. alsinifolia*, Wedd.
 angulata, Kuntze, l. c. = *P. stipulosa*, Mig.
 anisophylla, Kuntze, l. c. = *P. anisophylla*, Wedd.
 anomala, Kuntze, l. c. 622. = *P. anomala*, Wedd.
 approximata, Kuntze, l. c. 623 = *P. approximata*, C. B. Clarke.
 arguta, Kuntze, l. c. 622 = *P. arguta*, Wedd.
 articulata, Kuntze, l. c. = *P. articulata*, Wedd.

ADICEA : —

- astrogramma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 622 = *P. astrogramma*, Miq.
atroviridis, Kuntze, l. c. 623 = *P. atroviridis*, Baker.
auriculata, Kuntze, l. c. 622 = *P. auriculata*, Liebm.
Balfourii, Kuntze, l. c. 623 = *P. Balfourii*, Baker.
betulifolia, Kuntze, l. c. 622 = *P. hederacea*, Wedd.
boehmerioides, Kuntze, l. c. = *P. boehmerioides*, Wedd.
Boiviniana, Kuntze, l. c. = *P. Boiviniana*, Wedd.
bracteosa, Kuntze, l. c. = *P. bracteosa*, Wedd.
capitellata, Kuntze, l. c. = *P. capitellata*, Wedd.
carnosula, Kuntze, l. c. = *P. carnosula*, Wedd.
celebica, Kuntze, l. c. = *P. celebica*, Miq.
centradenioides, Kuntze, l. c. = *P. centradenioides*, Seem.
cephalantha, Kuntze, l. c. = *P. cephalantha*, Wedd.
ceratocalyx, Kuntze, l. c. = *P. ceratocalyx*, Wedd.
ceratomera, Kuntze, l. c. = *P. ceratomera*, Wedd.
Chamaedrys, Kuntze, l. c. = *P. Chamaedrys*, Wedd.
chrysosplenoides, Kuntze, l. c. = *P. chrysosplenoides*, Wedd.
ciliaris, Kuntze, l. c. = *P. ciliaris*, Wedd.
ciliata, Kuntze, l. c. = *P. Swartzii*, Wedd.
citriodora, Kuntze, l. c. = *P. citriodora*, Wedd.
clandestina, Kuntze, l. c. = *P. clandestina*, Wedd.
Clarkei, Kuntze, l. c. 623 = *P. Clarkei*, Hook. f.
consanguinea, Kuntze, l. c. 622 = *P. consanguinea*, Wedd.
cordifolia, Kuntze, l. c. 623 = *P. cordifolia* Hook. f.
corymbosa, Kuntze, l. c. 622 = *P. corymbosa*, Blume.
crassifolia, Kuntze, l. c. = *P. densiflora*, Kunth.
Cruegeriana, Kuntze, l. c. = *P. Cruegeriana*, Wedd.
cuneifolia, Kuntze, l. c. = *P. cuneifolia*, Wedd.
cuneiformis, Kuntze, l. c. = *P. cuneiformis*, Wedd.
dauciodora, Kuntze, l. c. = *P. dauciodora*, Wedd.
deltoidea, Kuntze, l. c. = *P. deltoidea*, Liebm.
dendrophila, Kuntze, l. c. = *P. dendrophila*, Miq.
depressa, Kuntze, l. c. = *P. depressa*, Blume.
diffusa, Kuntze, l. c. = *P. diffusa*, Wedd.
diversifolia, Kuntze, l. c. = *P. diversifolia*, Wedd.
Dombeyana, Kuntze, l. c. = *P. Dombeyana*, Wedd.
elegans, Kuntze, l. c. = *P. elegans*, Wedd.
elliptica, Kuntze, l. c. = *P. elliptica*, Hook. f.
falcata, Kuntze, l. c. = *P. falcata*, Liebm.
fallax, Kuntze, l. c. = *P. fallax*, Wedd.
fasciata, Kuntze, l. c. = *P. fasciata*, Wedd.
flexuosa, Kuntze, l. c. = *P. flexuosa*, Wedd.
Forsythiana, Kuntze, l. c. = *P. Forsythiana*, Wedd.
Franquevilleana, Kuntze, l. c. = *P. Franquevilleana*, Wedd.
fruticosa, Kuntze, l. c. 623 = *P. fruticosa*, Hook. f.
glomerata, Kuntze, l. c. 622 = *P. glomerata*, Griseb.
gnidioides, Kuntze, l. c. = *P. gnidioides*, Griseb.
Goudotiana, Kuntze, l. c. = *P. Goudotiana*, Wedd.
grandifolia, Kuntze, l. c. = *P. grandis*, Wedd.
Griffithii, Kuntze, l. c. = *P. Griffithii*, Blume.
guadalupensis, Kuntze, l. c. = *P. guadalupensis*, Wedd.
heteronema, Kuntze, l. c. = *P. heteronema*, Griseb.
Hilariana, Kuntze, l. c. = *P. Hilariana*, Wedd.
hirsuta, Kuntze, l. c. = *P. hirsuta*, Wedd.
hirtella, Kuntze, l. c. = *P. hirtella*, Miq.
Hookeriana, Kuntze, l. c. = *P. Hookeriana*, Wedd.
hyalina, Kuntze, l. c. = *P. hyalina*, Fenzl.
hygrophila, Kuntze, l. c. = *P. hygrophila*, Blume.
inaequalis, Kuntze, l. c. = *P. inaequalis*, Wedd.
iners, Kuntze, l. c. = *P. Maximiliani*, Miq.
insolens, Kuntze, l. c. 623 = *P. insolens*, Wedd.
integrifolia, Kuntze, l. c. = *P. integrifolia*, Liebm.
involuta, Kuntze, l. c. 622 = *P. pubescens*, Liebm.
Kakurang, Kuntze, l. c. 623 = *P. Kakurang*, Blume.
laevicaulis, Kuntze, l. c. = *P. laevicaulis*, Wedd.
lamioides, Kuntze, l. c. = *P. lamioides*, Wedd.
lanceolata, Kuntze, l. c. = *P. lanceolata*, Wedd.
latifolia, Kuntze, l. c. = *P. latifolia*, Wedd.
laxa, Kuntze, l. c. = *P. laxa*, Wedd.
leucophaea, Kuntze, l. c. = *P. leucophaea*, Blume.
Lindeniana, Kuntze, l. c. = *P. Lindeniana*, Wedd.
longifolia, Kuntze, l. c. 623 = *P. longifolia*, Baker.
longipes, Kuntze, l. c. = *P. longipes*, Liebm.
lucens, Kuntze, l. c. = *P. lucens*, Wedd.
lucida, Kuntze, l. c. = *P. lucida*, Blume.
Lundii, Kuntze, l. c. = *P. Lundii*, Liebm.

ADICEA : —

- macrodonata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 623 = *P. macrodonata*, Baker.
Manniana, Kuntze, l. c. = *P. Manniana*, Wedd.
marginata, Kuntze, l. c. = *P. marginata*, Wedd.
melastomodes, Kuntze, l. c. 622 = *P. trinervia*, Wight.
mexicana, Kuntze, l. c. 623 = *P. mexicana*, Wedd.
microphylla, Kuntze, l. c. 622 = *P. muscosa*, Lindl.
modesta, Kuntze, l. c. 623 = *P. modesta*, Baker.
mollis, Kuntze, l. c. 622 = *P. mollis*, Wedd.
mongolica, Kuntze, l. c. 623 = *P. mongolica*, Wedd.
multiflora, Kuntze, l. c. = *P. multiflora*, Wedd.
nana, Kuntze, l. c. = *P. nana*, Liebm.
nitida, Kuntze, l. c. = *P. nitida*, Wedd.
nudicaulis, Kuntze, l. c. = *P. nudicaulis*, Wedd.
nummulariaefolia, Kuntze, l. c. = *P. nummulariaefolia*, Wedd.
nutans, Kuntze, l. c. = *P. nutans*, Wedd.
obliqua, Kuntze, l. c. = *P. obliqua*, Hook. f.
obtusata, Kuntze, l. c. = *P. obtusata*, Liebm.
ovalis, Kuntze, l. c. = *P. ovalis*, Griseb.
oxydon, Kuntze, l. c. = *P. bracteosa*, Wedd.
pachycarpa, Kuntze, l. c. = *P. pachycarpa*, Wedd.
Pavonii, Kuntze, l. c. = *P. Pavonii*, Wedd.
peltata, Kuntze, l. c. = *P. peltata*, Hance.
pendula, Kuntze, l. c. = *P. pendula*, Griseb.
peplodes, Kuntze, l. c. = *P. peplodes*, Hook. et Arn.
petiolaris, Kuntze, l. c. = *P. stipulosa*, Miq.
Poeppigiana, Kuntze, l. c. = *P. Poeppigiana*, Wedd.
portoricensis, Kuntze, l. c. = *P. portoricensis*, Wedd.
producta, Kuntze, l. c. = *P. umbrosa*, Wedd.
propinqua, Kuntze, l. c. = *P. propinqua*, Wedd.
pteropodon, Kuntze, l. c. = *P. pteropodon*, Wedd.
pulegifolia, Kuntze, l. c. = *P. pulegifolia*, Wedd.
punctata, Kuntze, l. c. = *P. punctata*, Wedd.
radicans, Kuntze, l. c. = *P. radicans*, Wedd.
repanda, Kuntze, l. c. = *P. repanda*, Wedd.
repens, Kuntze, l. c. 622 = *P. repens*, Liebm.
reticulata, Kuntze, l. c. 623 = *P. reticulata*, Wedd.
rhexioides, Kuntze, l. c. = *P. rhexioides*, Liebm.
rhizobola, Kuntze, l. c. = *P. rhizobola*, Miq.
rhombea, Kuntze, l. c. = *P. rhombea*, Liebm.
riularis, Kuntze, l. c. = *P. rivularis*, Wedd.
rotundata, Kuntze, l. c. = *P. rotundata*, Griseb.
rubiaefolia, Kuntze, l. c. = *P. rubiaefolia*, Blume.
rufa, Kuntze, l. c. = *P. rufa*, Wedd.
rugosa, Kuntze, l. c. = *P. rugosa*, Wedd.
Sanctae-crucis, Kuntze, l. c. = *P. Sanctae-crucis*, Liebm.
sarcophylla, Kuntze, l. c. = *P. sarcophylla*, Wedd.
scripta, Kuntze, l. c. = *P. scripta*, Wedd.
scrobiculata, Kuntze, l. c. = *P. scrobiculata*, Liebm.
semidentata, Kuntze, l. c. = *P. semidentata*, Wedd.
serpyllifolia, Kuntze, l. c. = *P. serpyllifolia*, Wedd.
serratifolia, Kuntze, l. c. = *P. serratifolia*, Wedd.
serrulata, Kuntze, l. c. = *P. serrulata*, Wedd.
sessiliflora, Kuntze, l. c. = *P. sessiliflora*, Wedd.
sessilifolia, Kuntze, l. c. = *P. sessilifolia*, Wedd.
smilacifolia, Kuntze, l. c. = *P. smilacifolia*, Wedd.
spathulata, Kuntze, l. c. = *P. spathulata*, Griseb.
Spruceana, Kuntze, l. c. = *P. Spruceana*, Wedd.
stelluligera, Kuntze, l. c. = *P. stelluligera*, Wedd.
stolonifera, Kuntze, l. c. = *P. stolonifera*, Wedd.
subcrenata, Kuntze, l. c. = *P. subcrenata*, Wedd.
sublucens, Kuntze, l. c. = *P. sublucens*, Wedd.
submissa, Kuntze, l. c. = *P. submissa*, Wedd.
subserrata, Kuntze, l. c. = *P. subserrata*, Wedd.
succulenta, Kuntze, l. c. = *P. succulenta*, Wedd.
ternifolia, Kuntze, l. c. = *P. ternifolia*, Wedd.
tetraphylla, Kuntze, l. c. = *P. tetraphylla*, Blume.
Thouarsiana, Kuntze, l. c. = *P. Thouarsiana*, Wedd.
thymifolia, Kuntze, l. c. 622 = *P. globosa*, Wedd.
Tyianacana, Kuntze, l. c. 623 = *P. Trianaeana*, Wedd.
trichosanthes, Kuntze, l. c. = *P. trichosanthes*, Wedd.
trichotoma, Kuntze, l. c. = *P. trichotoma*, Liebm.
trilobata, Kuntze, l. c. = *P. trilobata*, Wedd.
uliginosa, Kuntze, l. c. = *P. uliginosa*, Phil.
umbellata, Kuntze, l. c. = *P. insignis*, Blume.
umbrosa, Kuntze, l. c. = *P. umbrosa*, Wedd.
Urticella, Kuntze, l. c. = *P. Urticella*, Wedd.
urticifolia, Kuntze, l. c. 622 = *P. rupipendia*, Wedd.
variegata, Kuntze, l. c. = *P. variegata*, Seem.
venulosa, Kuntze, l. c. = *P. venulosa*, Blume.
verbascifolia, Kuntze, l. c. = *P. verbascifolia*, Wedd.
virgata, Kuntze, l. c. = *P. virgata*, Wedd.
vulcanica, Kuntze, l. c. = *P. vulcanica*, Liebm.
Wightii, Kuntze, l. c. = *P. Wightii*, Wedd.
Wrightiana, Kuntze, l. c. = *P. Wrightiana*, Wedd.

ADINA, Salisb. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 43.

- Galpini, Oliver, in Hook. Icon. Pl. xxiv. (1895) t. 2386. — Afr. austr.
lasiantha, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 378. — Afr. trop. or.
philippinensis, Vidal, rev. pl. vasc. Filip. (1886) 148. — Ins. Philipp.
pilulifera, Franch. ex Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 207 = *globifera*, Salisb.
rubescens, Hemsl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 204. — Perak.
rubrostipulata, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 378. — Afr. trop. or.

ADINANDRA, Jack (Ternstroemia). — Ind. Kew. i. 43.

- Hullettii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 192. — Malaya.
Miquelii, King, l. c. 192. — Pen. Mal.
verrucosa, Stapf, in Hook. Icon. Pl. xxiii. (1893) t. 2266. — Borneo.

ADLUMIA, Rafin. (Papaver). — Ind. Kew. i. 43.

- fungosa*, Greene, ex Britton, Stern, et Poggenb. Prel. Cat. (1888) 3 = *cirrhusa*, Rafin.

ADNARIA, Rafin. = Gaylussacia, H. B. et K. (Vacciniaceae).

- adenochaeta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 383 = *G. adenochaeta*, DC.
amoena, Kuntze, l. c. = *G. amoena*, Cham.
angulata, Kuntze, l. c. = *G. angulata*, Gardn.
angustifolia, Kuntze, l. c. = *G. angustifolia*, Cham.
brachycera, Kuntze, l. c. = *G. brachycera*, Torr. et Gray.
bracteata, Kuntze, l. c. = *G. bracteata*, Gardn.
brasiliensis, Kuntze, l. c. 382 = *G. Pseudo-Vaccinium*, Cham. et Schlecht.
caracasana, Kuntze, l. c. 383 = *G. caracasana*, DC.
Chamissonis, Kuntze, l. c. = *G. Chamissonis*, Meissn.
ciliata, Kuntze, l. c. = *G. ciliata*, Meissn.
crenata, Kuntze, l. c. = *G. crenata*, D. Don.
decipiens, Kuntze, l. c. = *G. decipiens*, Cham.
densa, Kuntze, l. c. = *G. densa*, Cham.
dependens, Kuntze, l. c. = *G. dependens*, G. Don.
dumosa, Kuntze, l. c. 382 = *G. dumosa*, Torr. et Gray.
fasciculata, Kuntze, l. c. 383 = *G. fasciculata*, Gardn.
frondosa, Kuntze, l. c. 382 = *G. frondosa*, Torr. et Gray.
Gardneri, Kuntze, l. c. 383 = *G. Gardneri*, Meissn.
glandulosa, Kuntze, l. c. 382 = *G. buxifolia*, H. B. et K.
hispidula, Kuntze, l. c. 383 = *G. hispida*, DC.
incana, Kuntze, l. c. = *G. thymelaoides*, Meissn.
lanceolata, Kuntze, l. c. = *Vaccinium acuminatisimum*, Miq.
ledifolia, Kuntze, l. c. = *G. ledifolia*, Mart.
Martii, Kuntze, l. c. = *G. Martii*, Meissn.
montana, Kuntze, l. c. = *G. hispida*, DC.
myrtilloides, Kuntze, l. c. = *G. hispida*, DC.
nitida, Kuntze, l. c. = *G. nitida*, Mart.
obscura, Kuntze, l. c. = *G. pallida*, Cham.
octosperma, Kuntze, l. c. = *G. octosperma*, Gardn.
oleaefolia, Kuntze, l. c. = *G. oleaefolia*, Dunal.
pallida, Kuntze, l. c. = *G. pallida*, Cham.
parvifolia, Kuntze, l. c. = *G. parvifolia*, Gardn.
pinifolia, Kuntze, l. c. = *G. pinifolia*, Cham. et Schlecht.
pulchra, Kuntze, l. c. = *G. pulchra*, Pohl.
resinosa, Kuntze, l. c. = *G. resinosa*, Torr. et Gray.
reticulata, Kuntze, l. c. = *G. reticulata*, Mart.
retusa, Kuntze, l. c. = *G. retusa*, Mart.
Rhododendron, Kuntze, l. c. = *G. Rhododendron*, Cham. et Schlecht.
Riedelii, Kuntze, l. c. = *G. Riedelii*, Meissn.
rigida, Kuntze, l. c. = *G. rigida*, Casar.
rugosa, Kuntze, l. c. = *G. rugosa*, Cham. et Schlecht.
salicifolia, Kuntze, l. c. = *G. salicifolia*, Cham. et Schlecht.
thymelaoides, Kuntze, l. c. = *G. thymelaoides*, Meissn.
ursina, Kuntze, l. c. = *G. ursina*, Torr. et Gray.
Vauthieri, Kuntze, l. c. = *G. Vauthieri*, Meissn.
villosa, Kuntze, l. c. = *G. villosa*, Gardn.
virgata, Kuntze, l. c. = *G. virgata*, Mart.
Vitis-Idaea, Kuntze, l. c. = *G. Vitis-Idaea*, Mart.

ADOLIA, Lam. = **Scutia**, Comm. (Rhamnac.).
arenicola, Kuntze, Rev. Gen. 117 = *S. arenicola*,
Reiss.

buxifolia, Kuntze, l. c. = *S. buxifolia*, Reiss.
capensis, Kuntze, l. c. = *S. Commersonii*, Brongn.
discolor, Kuntze, l. c. = *Berchemia discolor*, Hemsl.
myrtina, Kuntze, l. c. = *S. Commersonii*, Brongn.
obcordata, Kuntze, l. c. = *S. obcordata*, Bivona.

ADODENDRON, Neck. = **Rhodothermus**,
Reichb. (Ericac.).

Chamaecistus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 385 = *R.*
Chamaecistus, Reichb.

ADONIS, Dill. (Ranunc.). — Ind. Kew. i. 44.

abortiva (*abortivus*), Hausskn. in Mitt. Bot. Ges.
Jena, v. (1886) 60. — Graecia.

alpina, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 319 in
add. = *pyrenaica*, DC.

Barthei, Franch. in Bull. Soc. Philom. Sér. VIII,
vi. (1894) 89. — Mandchuria.

brevistyla (*brevistylus*) Franch. in Bull. Soc. bot. Fr.
xxxiii. (1886) 372. — Yunnan.

crinata, Stapf, in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien,
xxxix. (1889) 74 = *aleppica*, Boiss. = *aestivalis*,
Linn.

Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Sér. II. viii,
1885 (1886) 188. — China.

Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Philom. Sér. VIII,
vi. (1894) 91. — China occ.

inermis, Stapf, in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien,
xxxix. (1889) 74 = *flaminea*, Jacq. = *autumnalis*,
Linn. = *parviflora*, Fisch.

involuta, S. Pons, in Rouy et Fouc. Fl. de Fr.
i. (1893) 53 = *flammea*, Jacq.

ramosa (*ramosus*), Franch. in Bull. Soc. Philom.,
Sér. VIII. vi. (1894) 91. — Japon.

ruthenica, Stapf, in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien,
xxxix. (1889) 74 = *amurensis*, Regel et Radde, =
wolgensis, Stev.

sutchuenensis, Franch., l. c. 89. — China occ.

ADOPOGON, Neck. = **Krigia**, Schreb. (Compos.).

amplexicaule, Dandelion, *montanum*, *occidentale*, *virgi-*
nicum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 304. = homo-
nyma omnia *Krigiae*.

carolinianum, Britton ex Small et Vail, in Mem.
Torrey Bot. Club, iv. (1893) 133; et (1894) 346
= *Krigia virginica*, Willd.

ADORIUM, Rafin. = **Musenium**, Nutt. (Umbellif.).

divaricatum, Rydberg, in Bot. Surv. Nebraska, iii.
(1894) 37 = *M. divaricatum*, Pursh.

lucidum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 264 = *M. diva-*
ricatum, Nutt.

tenuifolium, Kuntze, l. c. = *M. tenuifolium*, Nutt.

AECHMEA, Ruiz et Pav. (Bromel.). — Ind. Kew.
i. 45.

alba, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1892) 375. —
Bras.

Alopecurus, Mez, l. c. 367. — Bras.

aquiloides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 698. —
Costa-Rica.

armata, Lindman, in Svensk Akad. Handl. xxiv. 8.
(1891) 33 t. 7 fig. 1-13. — Bras.

aureo-rosea, Baker, Handb. Bromel. (1889) 63. —
Bras.

Bernoulliana, Wittm. in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n.
32. (1891) 1. — Guatem.

billbergioides, Baker, Handb. Bromel. (1889) 38. —
Bras.

Blanchetii, Baker, l. c. (1889) 43. — Bras.

Blanchetii, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)
336 = *Streptocalyx Blanchetii*, Baker.

brachycaulis, Baker, Handb. Bromel. (1889) 53. —
Bras.?

brachyclada, Baker, l. c. 37. — Bolivia.

caesia, Ed. Morr. ex Baker, l. c. (1889) 43. — Bras.?

candida, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 41. — Bras.?

Castelnavii, Baker, l. c. 39. — Bolivia.

caudata, Lindman, in Svensk Akad. Handl. xxiv. 8.
(1891) 29 t. 6. fig. 1-9. — Bras.

Chantini, Baker, Handb. Bromel. (1889) 49. — Am.
austr.

chiriquensis, Baker, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 243.
— Amer. centr.

AECHMEA : —

chrysocoma, Baker, Handb. Bromel. (1889) 44. —
Bras.

conglomerata, Hort. Berol. ex Baker, l. c. 52. —
Bras.?

conspiciuarmata, Baker, l. c. 47. — Bras.

corallina, Brongn. ex Baker, l. c. 52. — Bras.

corymbosa, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)
216 (= *Billbergia corymbosa*, Mart.).

crocophylla, Baker, Handl. Bromel. (1889) 65. — Bras.

crocophylla, Lindman, in Svensk. Akad. Handl.
xxiv. 8. (1891) 34 = praec.?

cylindrata, Lindman, l. c. 32 t. 8 fig. 8-35. — Bras.

dealbata, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889)
58. — Bras.

Donnell-Smithii, Baker, in Journ. Bot. xxviii. (1890)
305. — Am. centr.

Drakeana, Ed. André, in Rev. Hort. (1888) 401;
et l. c. (1889) 372 cum. icon. et Bromel. Andrean.

(1889) 14 t. 6 a. — Ecuad.

eburnea, Baker, Handb. Bromel. (1889) 69. — Bras.

Edmondstonei, Baker, l. c. 38. — Ecuad.

eriantha, Brongn. ex Baker, l. c. 47. — Bras.

exsudans, Baker, l. c. 44. — Bras.

Fendleri, Ed. André, Bromel. Andrean. (1889) 13 in
obs. — Venez.

Fernandae, Baker, l. c. 64. — Am. austr.

flexuosa, Baker, in Gard. Chron. (1887) i. 8 =
spectabilis, Brongn.

Fraseri, Baker, Handb. Bromel. (1889) 61. — Ecuad.

Friedrichsthalii, Mez et J. Donn.-Sm. in Coult. Bot.
Gaz. xix. (1894) 263. — Guatem.

fusca, Baker, l. c. 69. — Bras.

Galeottii, (err. cal. *Galeottei*) Baker, l. c. 51. —
Mexic.

gamosepala, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n. 29.
(1891) 3 et 13. — Bras.

Germinyana, Baker, l. c. 66. — N. Granat.

Germinyana, Lindman, in Svensk. Akad. Handl.
xxiv. 8. (1891) 34 = praec.

gigantea, Baker, Handb. Bromel. (1889) 45. — Hab.?

gigantea, Baker, l. c. 65. — Bras.

gigantea, Lindman, l. c. 34. — Bras.

gigas, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 61 = *Lalindei*,
Linden et Rodig.

glomerata, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)
315 = *conglomerata*, Baker.

gracilis, Lindman, in Svensk. Akad. Handl. xxiv. 8.
(1891) 30 t. 6 fig. 10-16. — Bras.

grandiceps, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)
346. — Argent.

hamata, Mez, l. c. 347. — Hab.?

Henningsiana, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n.
29. (1891) 12. — Bras.

Hockeli, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 367 =
spectabilis, Brongn.

Hockeli, «Regel», ex Baker, Handb. Bromel. (1889)
52 = praec.

iguana, Wittm. in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 32.
(1891) 3. — Guatem.

immersa, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1889)
5 = *Karatas sarmentosa*, Baker.

involuta, Ed. André, in Rev. Hort. (1888) 564; et
Bromel. Andrean. (1889) 13 t. 5 fig. a. — Ecuad.

isabellina, Baker, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 305.
— Am. centr.

jucunda, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889)
55. — Bras.

Lagenaria, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)
372. — Bras.

Lamarckii, Mez, l. c. 372. — Hab.?

laxiflora, Mez, l. c. 335 = *Streptocalyx laxiflora*,
Baker.

Leopoldi, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889)
58 = *fasciata*, Baker.

leucocarpa, Ed. André, in Rev. Hort. (1888)
563; et Bromel. Andrean. (1889) 10 t. 4 b. — N.
Granat.

leucostachys, Baker, Handb. Bromel. (1889) 39. —
Hab.?

longicuspis, Baker, l. c. 60. — N. Granat.

AECHMEA : —

marmorata, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)
310 = *Billbergia marmorata*, Lem.

microthyrsa, Baker, in Kew Bull. (1892) 198. —
Bras.

miniata, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 53.
— Bras.

myriophylla, Ed. Morr. ex Baker, in Bot. Mag.
(1887) t. 6939; et Handb. Bromel. (1889) 55. — Bras.

Nicholsii, Baker, in Kew Bull. (1892) 128. — Ins.
Tobago.

oligosepala, Baker, Handb. Bromel. (1889) 48. —
Venez.

penduliflora, Ed. André, in Rev. Hort. (1888)
563; et Bromel. Andrean. (1889) 9 t. 4 a. — N. Gra-
nat.

phanerophlebia, Baker, l. c. 47. — Bras.

Platzmanni, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n. 29.
(1891) 2 et 12 = *floribunda*, Baker.

Plumieri, Baker, Handb. Bromel. (1889) 50. — Ind.
occid.

Plumieri, Ed. Morr. ex Baker, l. c. (1889) 45 =
lingulata, Baker.

Poeppigii, Baker, l. c. 37. — Reg. Amaz.

polystachya, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)
343 = *Glaziovii*, Baker.

Prieureana, Baker, Handb. Bromel. (1889) 39. —
Guian. gall.

pulchra, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)
374. — Bras.

purpurea, Baker, Handb. Bromel. (1889) 69. — Bras.

purpurea, Williams, Catal. (1889) 22; et ex Kew Bull.
(1890) 36. — N. Granat.

pycnantha, Baker, Handb. Bromel. (1889) 44. —
Hab.?

Regelii, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892) 339.
— Bras.

Ridleyi, Baker, Handb. Bromel. (1889) 47. — Bras.

rosea, Baker, l. c. 68. — Bras.

rosea, Hort. ex Baker, l. c. 42 = *suaveolens*, Kn. et
Westc.

Salzmanni, Baker, l. c. 49. — Bras.

Schomburgkii, Baker, l. c. 66. — Guian. brit.

Schultesia, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)
334. — Bras.

Selloana, Baker, Handb. Bromel. (1889) 60. — Bras.

servitensis, Ed. André, in Rev. Hort. (1888) 563;
et Bromel. Andrean. (1889) 11 t. 5 b. — N. Granat.

setigera, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889)
71 in syn. = *Billbergia thysioidea*, Mart.

Skinneri, Baker, in Hook. Icon. Pl. xix. (1889) t.
1851; et Handb. Bromel. (1889) 49. — Guatem.

squarrosa, Baker, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 305.
— Amer. centr.

squarrosa, Baker, Handb. Bromel. (1889) 63. — Bras.

stenophylla, Baker, l. c. 64. — Bras.

stephanophora, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 67. — Bras.

sulcata, Lindman, in Svensk Akad. Handl. xxiv. 8.
(1891) 31 t. 5 fig. 15-21. — Bras.

thysiflora, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)
332. — Bras.

tinctoria, Mez, l. c. 373 = *conspiciuarmata*, Baker.

tocantina, Baker, Handb. Bromel. (1889) 39. — Bras.

triticina, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)
369. — Bras.

turbinalcalyx, Mez, l. c. 359. — Bras.

Van Houtteana, Mez, l. c. 366 = *Quesnelia Van*
Houtteana, Ed. Morr.

virens, Brongn. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 45.
— Guian. gall.

vriesioides, Hort. ex Baker, l. c. 56 = *tillandsioi-*
des, Baker.

Wittmackiana, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)
340 = *Quesnelia Wittmackiana*, Regel.

Wulfschlaegelian, Mez, l. c. 380. — Guian. gall.

xiphophylla, Baker, Handb. Bromel. (1889) 63. —
Bras.?

AEGILOPS, Linn. = **Triticum**, Linn. (Gramin.).

Heldreichii, Holzm. ex Nym. Consp. fl. Europ.
Suppl. (1889) 342. = *T. caudatum*, Gren. et Godr.

AEGIPHILA, Jacq. (Verben.). — Ind. Kew. i. 46.

falcata, J. D. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893)
7. — Guatem.

setiformis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv.
(1895) 245. — Bolivia.

AEGLE, Correa (Rutac.). — Ind. Kew. i. 47.

Barteri, Hook. f. ex Oliver, in Hook. Icon. Pl. xxiii. (1894) 2. — Afr. trop. occid.

AEGOPODIUM, Knaut (Umbellifer.). — Ind. Kew. i. 47.

tribracteolatum, Schmalh. in Bull. Soc. géog. Cauc. (1892) 22; et in Ber. deutsch. bot. Ges. x. (1892) 289. — Reg. Cauc.

AEGOPOGON, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 47.

gracilis, Vasey, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 442 nomen; et in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 230. — Mexic.

AELUROPUS, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 47.

mucronatus, Terrac. in Ann. Ist. bot. Roma, v. (1894) 96 = arabicus, Steud.

AEOLANTHUS, Mart. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 47.

Buchnerianus, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 187. — Congo.

Buettneri, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 222. — Afr. trop. occid.

Candelabrum, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 186. — Angola.

canescens, Gürke in Bot. Jahrb. xxii (1895) 147. — Afr. trop. et austr.

elongatus, Briq. l. c. 188. — Angola.

elsholtzioides, Briq. l. c. 187. — Angola.

Engleri, Briq. l. c. 189. — Angola.

floribundus, Briq. l. c. 190. — Angola.

fruticosus, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 346. — Afr. trop. or.

Holstii, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 221. — Afr. trop. or.

ndorensis, Schweinf. in Hoeckel, Zum Rudolph See, App. (1892) 6. — Afr. trop.

Njassae, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 346. — Afr. trop. or.

obtusifolius, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 189. — Angola.

panganensis, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 346. — Afr. trop. or.

Prittwitzianus, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 134. — Afr. trop. or.

Stuhlmannii, Gürke, l. c. 345. — Afr. trop. or.

ukamensis, Gürke in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 147. — Afr. trop.

virgatus, Gürke l. c. 146. — Afr. trop.

Welwitschii, Briq. l. c. xix. (1894) 188. — Angola.

AEONIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 47.

macrostachya, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 551. — Ins. Borbon.

volucris, Cordem, l. c. 550. — Ins. Borbon.

AEONIUM, Webb et Berth. = **Sempervivum**, Linn. (Crassul.).

Bentejui, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 109 = S. Bentejui, Christ.

Doremae, Webb, l. c. 110 = S. mauriqueorum, Christ.

giganteum, Webb, l. c. 111 = S. canariense, Linn.

gomeraeum, Webb, l. c. = S. Paivae, Lowe.

macrolepum, Webb, l. c. 112 = S. macrolepum, Christ.

palmense, Webb, l. c. 112 = S. palmense, Christ.

virgineum, Webb, l. c. 111 = S. virgineum, Christ.

AËRANTHUS, Reichb. f. = **Mystacidium**, Lindl. (Orchid.).

brachycentron, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 303; Aër. et Gartenfl. (1891) 323. — Hab. ?

Englerianus, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 62. — Madag.

Gravenvuthii, Kraenzl. l. c. — Madag.

Hermannii, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 193. — Ins. Borbon.

ophioplectron, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 91. — Madag.

polyanthemus, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 121. — Madag.

strangulatus, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 192. — Ins. Borbon.

AËRANTHUS :—

trichoplectron, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 264. — Madag.

Wawrae, Reichb. f. ex G. Beck, Itin. Princ. Sax. Coburg, ii. (1888) 156. — Bras.

AËRIDES, Lour. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 48.

Augustianum, Rolfe, in Lindenia v. (1889) 39 tab. 210; et in Gard. Chron. (1890) i. 9 et 233 cum xylogr. — Ins. Philipp.

cristatum, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 53 = Vanda cristata, Lindl.

densiflorum, Wall. ex Hook. f. l. c. 72 = Cleisostoma spicatum, Lindl.

Godefroyanum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 814. — Cochinchina.

Huttonii, Veitch, Man. Orchid. Pl. vii. (1891) 70 = Saccolabium Huttonii, Hook. f.

Jansonii, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 66. — Burma.

leopardorum, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 60 = Saccolabium calceolare, Lindl.

lineare, Hook. f. l. c. 47. — Ind. or.

longicornu, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 44; et Icon. Pl. xxii. (1893) t. 2127. — Reg. Himal.

Picotianum, Hort. ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 378 in obs. = Houlettianum, Reichb. f.

platyphylum, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 64. — Hab. ?

racemiferum, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 68 = Sarcanthus pallidus, Lindl.

ramosum, Wall. ex Hook. f. l. c. 72 = Cleisostoma ramosum, Hook. f.

retrofractum, Wall. ex Hook. f. l. c. 46 = falcatum, Lindl.

Savageanum, Sand. ex Veitch, Man. Orch. Pl. vii. (1891) 78. — Hab. ?

Warneri, Hort. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 46 = crispum, Lindl.

AERVA, Forsk. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 49.

Curtisii, Oliver, in Hook. Icon. Pl. xxiii. (1892) t. 2201. — Perak.

desertorum, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 7. — Afr. austro-occ.

Leubnitziae, Kuntze, in Jahrb. bot. Gart. Berl. iv. (1889) 272. — Afr. austro-occ.

Pechuelii, Kuntze, l. c. 272. — Afr. austro-occ.

AESANDRA, Pierre ex L. Planch. Étud. prod. Sapot. (1888) 26 nomen; et Not. bot. Sapot. (1890) 2. **SAPOTACEAE**.

dongnaiensis, Pierre, l. c. 2. — As. trop.

AESCHRION, Vell. = **Picraena**, Lindl. (Simarub.).

excelsa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 183 = P. excelsa, Lindl.

AESCHYNANTHUS, Jack (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 49.

Hildebrandtii, Hemsl. in Bot. Mag. (1894) t. 7365. — Burma.

magnifica, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 212. — Borneo.

AESCHYNOMENE, Linn. (Leguminos.). — Ind. Kew. i. 50.

abyssinica, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 262 = A. Rueppelii, Baker.

amorphoides, Rose, ex Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 315. — Mexic.

arabica, Defters, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 303. — Arabia.

Elaphroxylon, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. iii. (1894) 319-20 fig. 124 = Herminiera Elaphroxylon, Guill. et Perr.

gracilipes, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 214. — Afr. trop. or.

kilimandscharica, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 262. — Afr. trop. or.

minutiflora, Taub. ex Engl. l. c. (1894) 14; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 214. — Afr. trop. or.

nivea, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 150. — Calif.

petraea, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 166. — Mexic.

AESCHYNOMENE :—

Pfundii, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 215. — Afr. trop. or.

Riedeliana, Taub. in Flora, xxii. (1889) 424. — Bras. rivularis, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 400. — Ins. Borbon.

sansibarica, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 214. — Afr. trop. or.

shirensis, Taub. l. c. 215. — Afr. trop. or.

Telekii, Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 263; et in Hoeckel, Zum Rudolph-See, App. (1892) 13. — Afr. trop. or.

Vigil, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 128. — Calif.

virginica, Britton, Stern et Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 13 = hispida, Willd.

AESCULUS, Linn. (Sapindac.). — Ind. Kew. i. 51.

balgiana, Ed. André, in Rev. Hort. (1894) 246. — Hybr. artef.

floribunda, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 398 = carnea, Hayne.

marylandica, Booth, Catal. ex Dippel, l. c. 403 = lutea, Wangenh.

plantierensis, Ed. André, in Rev. Hort. (1894) 246. — Hybr. artef.

spectabilis, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 398 = carnea, Hayne.

AËTANTHUS, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. i. c. fig. 128 (= **LORANTHACEAE**, Mutisii, Engl. l. c. 128 (= *Loranthus Mutisii*, H. B. et K.). — Ecuad., N. Granat.

AETHIONEMA, R. Br. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 52.

creticum, Boiss. et Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 61. — Creta, Asia min.

dimorphocarpum, Giraudias, in Bull. Soc. étud. scient. Angers, xxii. (1893) 165 = pyrenaicum, Bout.

gileadense, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 421. — Syria.

glaucescens, Halácsy, in Zool.-bot. Ges. Wien. Abh. xxxviii (1888) 748. — Graecia.

longistylum, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 421. — Syria.

ovalifolium, Lojaccono, Fl. Sicul. (1888) 83 = saxatile, R. Br.

schizopterum, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 60. — Persia.

spinatum, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. ii. (1891) 165 = Moriera spinosa, Boiss.

varians, Giraudias, in Bull. Soc. étud. scient. Angers, xix. (1890) 100. = pyrenaicum, Bout.

AETHONOPOGON, Hackel, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 788 = **Polytrias**, Hackel (Gramin.).

praemorsus, Hackel, ex Kuntze, l. c. = P. praemorsa, Hackel.

AETHONOPOGON, Hackel, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 788 = **Polytrias**, Hackel (Gramin.).

praemorsus, Hackel, ex Kuntze, l. c. = P. praemorsa, Hackel.

AFFONSEA, A. St-Hil. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 52.

Lucyi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 158 = Archidendron Lucyi, F. Muell.

Vaillantii, Kuntze, l. c. = Archidendron Vaillantii, F. Muell.

AFROMENDONCIA, Gilg, ex Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 111. **ACANTHACEAE**.

Gilgiana, Lindau, l. c. — Afr. trop.

Lindaviana, Gilg, l. c. — Afr. trop. occ.

phytorenoides, Gilg, ex Lindau, l. c. 112. — Afr. trop.

AFZELIA, J. F. Gmel. = **Seymeria**, Pursh (Scrophul.).

bipinnatisecta, Kuntze, Rev. Gen. 457 = S. bipinnatisecta, Seem.

decurva, Kuntze, l. c. = S. decurva, Benth.

macrophylla, Kuntze, l. c. = S. macrophylla, Nutt.

madagascariensis, Kuntze, l. c. = S. madagascariensis, Benth. et Hook. f. (fide Kuntze).

pectinata, Kuntze, l. c. = S. pectinata, Pursh.

pinnatifida, Kuntze, l. c. = S. pinnatifida, Hemsl.

scabra, Kuntze, l. c. = S. scabra, A. Gray.

virgata, Kuntze, l. c. = S. virgata, Benth.

AFZELIA, Sm. (Leguminos.). — Ind. Kew. i. 52. australis, Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. ii. (1888) 19. — Austral.

bijuga, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 27. — Madag.

bijuga, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 100. — N. Guin.

AGALINA vitiensis « Seem. » in Gartenfl. (1887) 71. (err. cal.) = *Agalma vitiensis*, Seem.

AGALLOCHUM, Rumph. = **Aquilaria**, Lam. (Thymel.).
graniflorum, Kuntze, Rev. Gen. 283 = Aq. grandiflora, Benth.
malaccense, Kuntze, l. c. = Aq. malaccensis, Lam.
sinense, Kuntze, l. c. = Aq. Ophispermum, Poir.

AGALLOSTACHYS, Beer = **Bromelia**, Linn. (Bromel.).
guyanensis, Beer, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 120 in syn. = *Pitcairnia guyanensis*, Baker.

AGALMA, Miq. = **Heplapleurum**, Gaert. (Araliac.).
rugosum, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indie, ii. (1890) 648. (= *Aralia rugosa*, Blume). — Java.

AGALMYLA, Blume (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 53.
parasitica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469. = staminea, Blume.

AGANISIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 53.
alba, Ridl. ex im Thurm, in Timehri, v. (1886) 204. = *Zygopetalum* (sp.).
ionoptera, Nichols. Dict. of Gard. i. (1885) 35; Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7270. — Peruv.
tricolor, N. E. Br. in Lindenia, i. (1885) 95 tab. 45 = *cyanea*, Lindl.

AGANOSMA, G. Don (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 53.
dichotomum, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 173 = *caryophyllum*, G. Don.

AGAPANTHUS, L'Herit. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 53.
africanus, Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. (1893) 354. (= *A. umbellatus*, L'Herit.) = *Agap. africanus*, Hoffmgg.

AGAPETES, G. Don (Vaccin.). — Ind. Kew. i. 53.
acuminatissimum, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 201 et 247. (= *Vaccinium acuminatissimum*, Miq.). — Malaya.
Forbesii, F. Muell. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 290. — N. Guin.
Helena, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 16 = *Vaccinium Helena*, F. Muell.
lanceolata, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 201 et 246 = *Vaccinium acuminatissimum*, Miq.
leptantha, Niedenzu, l. c. 201. (= *Vaccinium leptanthum*, Miq.). — Java, Sumatra.
Mannii, Hemsl. in Gard. Chron. (1892) ii. 364. — Reg. Himal.
Meiniana, F. Muell. in Vict. Natural. iii. (March 1887) 158. — Austral.
Moorhousiana, F. Muell. in Wing, South. Sc. Record, N. S. ii. (Feb. 1886). — N. Guin.
polyantha, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 224 et 246. (= *Vaccinium polyanthum*, Miq. ined. ?). — Malaya.
vitiensis, « Benth. et Hook. » ex Drake, Illustr. Insul. Maris Pacif. (1892) 223. — Ins. Pacif.
yunnanensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 366. — China occ.

AGARISTA, D. Don (Ericac.). — Ind. Kew. i. 53.
angustissima, Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 513. — Bras.
ericoides, Taub. l. c. 512. — Bras.

AGASTACHE, [Clayt. ex] Gronov. Fl. Virg. 88 (1762) ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 511 = **Lophanthus**, Benth. (Labiata).

AGASTACHE : —

Feniculum, Kuntze, Rev. Gen. 511 = *L. anisatus*, Benth.

Lophanthus, Kuntze, l. c. = *L. chinensis*, Benth.

nepetodes, Kuntze, l. c. = *L. nepetoides*, Benth.

rugosa, Kuntze, l. c. = *L. rugosus*, Fisch. et Mey.

scrophulariaefolia, Kuntze, l. c. = *L. scrophulariaefolius*, Benth.

tomentosa, Kuntze, l. c. = *L. tomentosus*, Regel.

urticifolia, Kuntze, l. c. = *L. urticifolius*, Benth.

AGATHIS, Salisb. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 54.
Palmerstoni, F. Muell. in Vict. Natural. viii (June 1891) 45 in syn.; et ex F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. iii. (1891) 17 = *Dammara Palmerstoni*.
robusta, F. M. Bailey, Cat. Woods Queensl. (Lond. Col. Ind. Exhib. 1886) 83 (= *Dammara robusta*, C. Moore). — Austral.

AGATHOSMA, Willd. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 54.
Wrightii, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 386. — Afr. austr.

AGATI, Adans. = **Sesbania**, Pers. (Legumin.).
sericea, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 75 = *S. sericea*, DC.

AGAURIA, Benth. et Hook. f. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 55.
buxifolia, Cordem. (= *Andromeda buxifolia*, Lam.) Fl. Ile Réunion (1895) 439 = *buxifolia*, Baker.
callibotrys, Cordem. l. c. 438. — Ins. Borbon.
nummularifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 332. — Madag.

AGAVE, Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 55.
aurea, T. S. Brandege, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 207. — Calif.
Baxteri, Baker, in Gard. Chron. (1888) i. 392; et Handb. Amaryll. (1888) 178. — Mexic.?
brunnea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 156. — Mexic.
Davilloni, Baker, in Kew Bull. (1892) 5. — Patr.?
Engelmanni, Trelease, in Missouri Bot. Gard. Rep. iii. 1891 (1892) 167, t. 55 et 56. — Patr.?
Franzosinii ×, Hort. Hamb. ex W. Wats. in Kew Bull. iii. (1887) 301; et Baker, in Gard. Chron. (1892) ii. 179, fig. 31. — Patr.?
Hanburii, Baker, in Kew Bull. (1892) 3. — Patr.?
Hartmani, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 156. — Mexic.
Henriquesii, Baker, in Gard. Chron. (1887) i. 732, fig. 70; et Handb. Amaryll. (1888) 170. — Mexic.?
huachucaensis, Sarg. in Gard. and For. viii. (1894) 184. — Arizona. (an praec. ?)
huachuensis, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 172. — Arizona.
integrifolia, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 185. — Mexic.
longispala, Tod. Hort. bot. Panorm. (1886) 34 t. 31. — Mexic.?
macroculmis, Tod. Ind. sem. hort. Panorm. (1888) 36; et Hort. bot. Panorm. t. 36. — Mexic.
Margaritae, F. S. Brandege, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 206 t. 10. — Calif.
Maximowicziana, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 303. — Patr.?
Morrisii, Baker, in Gard. Chron. (1887) i. 543 fig. 105; et Handb. Amaryll. (1888) 184. — Jamaica.
multilineata, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 168. — Mexic.?
Nickelsi, Hort. Amer. ex Rev. Hort. (1895) 579. — Texas? vel. Hybr. artef.
planifolia, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 479. — Mexic.
potosina, Robinson et Greenman, in Proc. Am. Acad. xxix. (1884) 392. — Mexic.
Pringlei, Engelm. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 182. — Calif.
protuberans, Engelm. ex Baker, l. c. (1888) 197 = *guttata*, Hemsl.
pumila, Hort. De Smet, ex Baker, l. c. 172. — Mexic.?
Richardsii, Hort. ex Baker, l. c. 184 = *striata*, Zucc.
Romani ×, Hort. De Smet, ex Baker, l. c. 166. — Hybr. artef.
scaberrima, Hort. Peacock, ex Baker, l. c. 182 = *Pringlii*, Engelm.

AGAVE : —

sebastianiana, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. (1885) 214. — Calif.

sobria, T. S. Brandege, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 207. — Calif.

Terraccianoi, Pax, in Gartenfl. (1893) 68 fig. 14. — Mexic.?

Todaroi, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 195. — Mexic.?

Troubetskoyana, Hort. ex Baker, in Kew Bull. (1892) 5. — Hab.?

vestita, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 163. — Mexic.

Villarum ×, Éd. André, in Rev. Hort. (1886) 465. — Hybr. artef.

weissenburgensis, « Wittm. » ex Baker, Kew Bull. (1889) 178 = *wiesenbergensis*, Wittm.

Wildingii, Tod. Hort. bot. Panorm. (1886) 36 t. 32; Baker, Handb. Amaryll. 187. — Mexic.?

AGELAEA, Soland. (Connarac.). — Ind. Kew. i. 57.
emetica, Baill. in Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 875; et Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 15. = *A. Lamarckii*, Planch.
heterophylla, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 66. — Afr. trop. or.
pentagyna, Radlk. in Sitz. math. phys. Cl. Bay. Akad. Wiss. xvi. (1886) 349. = *pentagyna*, Baill.
paradoxa, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1888) 65, fig. 35 — Afr. trop. occ.
Poggeana, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 65. — Congo merid.
usambarensis, Gilg, ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 86 = *obliqua*, Baker.

AGELANTHUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 246 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
brunneus, Van Tiegh. l. c. = *L. brunneus*, Engl.
Gilgii, Van Tiegh. l. c. = *L. Gilgii*, Engl.
glomeratus, Van Tiegh. l. c. = *L. glomeratus*, Engl.
Henriquesii, Van Tiegh. l. c. = *L. Henriquesii*, Engl.

AGERATELLA, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 419. **COMPOSITAE**.
microphylla, A. Gray, ex S. Wats. l. c. (= *Ageratum microphyllum*, Schultz Bip.). — Mexic.

AGERATUM, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 58.
callosum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 153. — Mexic.
intermedium, Hemsl. in Biol. centr. Am. iv. (1886) 102. — Ins. Cozumel.
rugosum, Coul. ex J. D. Smith, in Coul. Bot. Gaz. xx. (1895) 42. — Guat.

AGIABAMPOA, Rose, ex O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 390. **COMPOSITAE**.
congesta, Rose, l. c. — Mexic.

AGIALID (A), Adans. = **Balanites**, Delile (Simar.).
aeegyptiaca, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 183 = *B. aeegyptiaca*, Delile.
Roxburghii, Kuntze, l. c. = *B. Roxburghii*, Planch.

AGLAIA, Lour. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 57.
Beccarii, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 579. — Borneo.
Bergmanni, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 346. — Oceania.
cambodiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) sub t. 334. = *Milnea cambodiana*, Pierre.
cochinchinensis, Pierre, l. c. t. 334 A. = *pyramidata*, Hance.
cinerea, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 66. — Malacca.
Curtisii, King, l. c. 71. — Perak.
Ermischii, Warb. in Bot. Jahrb. xiii (1891) 345. — Oceania.
Forbesii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 68. — Malaya.
fusca, King, l. c. 62. — Ins. Andam.
glaucescens, King, l. c. 64. — Ins. Andam.
Goebeliana, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 345. — Oceania.
Harmandiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) t. 333 = *Milnea Harmandiana* Pierre.

AGLAIA : —

- heteroclitia, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 78. — Malaya.
 Hiernii, *King, l. c.* 74. — Malaya, Perak.
 hoanensis, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* (1895) t. 336. — Cochinch.
 humilis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 69. — Perak.
 Kunstleri, *King, l. c.* — Perak.
 lanuginosa, *King, l. c.* 71. — Perak.
 leucophylla, *King, l. c.* 66. — Perak.
 macrostigma, *King, l. c.* 78. — Perak.
 membranifolia, *King, l. c.* 75. — Malaya.
 Maingayi, *King, l. c.* 79. — Malacca, Perak.
 rugosa, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* (1895) sub. t. 335 = *Milnea rugosa, Pierre.*
 Scortechinii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 64. — Perak.
 sinensis, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* (1895) sub. t. 334 = odorata, *Lour.*
 squamulosa, *King, l. c.* 65. — Perak.
 verrucosa, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* (1895) sub. t. 335 = *Milnea verrucosa, Pierre.*
 Zollingeri, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 579. — Java.

AGLAONEMA, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 59.

- angustifolium, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 18. — Malaya.
 birmanicum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 529. — Burma.
 Clarkei, *Hook. f. l. c.* vi. (1893) 529. — Bengal.
 costatum, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1892) i. 426. — Perak.
 Helfer, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 529. — Tenass.
 minus, *Hook. f. l. c.* vi. (1893) 530. — Singap.
 nanum, *Hook. f. l. c.* vi. (1893) 530. — Perak.
 nebulosum, *N. E. Br. in Illustr. Hort.* xxxi. (1887) 67 t. 24. — Java.
 nicobaricum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 530. — Ins. Nicob.
 pumilum, *Hook. f. l. c.* 530; et in *Veitch. Catal.* (1894) 5 cum *xylogr.* — Burma.
 rotunda, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1893) 86; et *Journ. of Hort.* (1893) 379 fig. 56. — Malaya?
 Scortechinii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 530. — Perak.
 versicolor, *Hort. ex Gard. Chron.* (1893) i. 414. — Ind. or.

AGONIS, Lindl. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 59.

- ericoides, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull.* ii. (1891) 37. — Austral.
 lysicephala, *F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl.* ii. (1888) 24. (= *Melaleuca lysicephala*, *F. Muell. et Bail.*). — Austral.

AGOSERIS, Rafin. = **Troximon**, Nutt. (Composit.).

- alpestris, *apargioides, arizonica, aurantiaca, barbellulata, gracilis, grandiflora, heterophylla, humilis, laciniata, Marshallii, parviflora, plebeja, purpurea, retrorsa, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 304 = *homonyma omnia Troximonis.*
alpestris, *Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 177. = *T. alpestre, Gray.*
apargioides, *Greene, l. c.* = *T. apargioides, Less.*
arizonica, *Greene, l. c.* 176. = *T. arizonicum, Greene.*
aurantiaca, *Greene, l. c.* 177. = *T. aurantiacum, Hook.*
barbellulata, *Greene, l. c.* = *T. barbellulatum, Greene.*
chilensis, *Greene, l. c.* 178. = *Macrorhynchus chilensis, Less.*
Dens-leonis, *Greene, in Erythea, iii.* (1895) 23. — Nevada.
elata, *Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 177 = *T. Nuttallii, A. Gray.*
elata, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 304. = *T. Nuttallii, A. Gray.*
glaucia, *Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 176. = *T. glaucum, Nutt.*
gracilentia, *Greene, l. c.* 177. = *T. gracilens, A. Gray.*
grandiflora, *Greene, l. c.* 178. = *T. grandiflorum, A. Gray.*
Greeneana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 304. = *T. elatum, Greene.*

AGOSERIS : —

- heterophylla*, *Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 178. = *T. heterophyllum, Greene.*
hirsuta, *Greene, l. c.* 177. = *Leontodon hirsutum, Hook.*
intermedia, *Greene, in Erythea, i.* (1893) 175. — Calif.
laciniata, *Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 178. = *T. grandiflorum, var. laciniatum, A. Gray.*
laevigata, *Greene, l. c.* = *Macrorhynchus laevigatus, Fisch. et Mey.*
major, *Jepson, ex Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 179; et in *Bull. Torrey Bot. Club.* xviii. (1891) 325. = *T. elatum, Greene.*
Marshallii, *Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 178. = *T. Marshallii, Greene.*
parviflora, *Greene, l. c.* 176. = *T. parviflorum, Nutt.*
plebeia, *Greene, l. c.* 178. = *T. plebeium, Greene.*
Poeppigii, *Greene, l. c.* = *Macrorhynchus Poeppigii, DC.*
purpurea, *Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 177. = *T. purpureum, Greene.*
scorzonerifolia, *Greene, l. c.* = *Ammogeton scorzoneraefolium, Schrad.*
retorsa, *Greene, l. c.* 178. = *T. retrorsum, A. Gray.*
rosea, *Greene, l. c.* 176. = *T. roseum, Nutt.*

AGRIMONIA, Tourn. ex Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 60.

- glandulosa*, *Murb. in Lunds Univ. Arsskrift.* xxvii. v. (1892) 130 = seq.?
glandulosa, *Simonk. Enum. fl. Transsilv.* (1886) 223. = odorata, *Linn.*
mollis, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 221; et in *Mem. Torrey Bot. Club.* ix. (1895) 116. = *A. Eupatoria, Linn.*

AGROPYRON, J. Gaert. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 60.

- Buonapartis, Th. Dur. et Schinz. Consp. fl. Afric.* v. 1894. (1895) 936. (= *Triticum Buonapartis*, *Spreng.* — Afr. bor., *Reg. Cauc.*
desertorum, C. Richt. (an Schult.?) Pl. Europ. i. (1890) 126. (= *Triticum desertorum Fisch.*) — Ross. austr.
distachyum, Vasey, in A. Gray Man. Bot. North. U. S. ed. 6. (1890) 671. — Am. bor.
duplicatum, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 126. (= *Triticum duplicatum, Steud.*). — Graec.
Enysii, T. Kirk, in Trans N. Z. Inst. xxvii. 1894. (1895) 352. — N. Zel.
Langei X, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 126. — Dania.
piliferum, Benth. ex Aitch. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 126. — Turkest.
pseudocaninum, Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 594. = *caninum, Beauv.*
ramificum, C. Richt. Pl. Europ. i. (1895) 124 (= *Triticum ramificum, Link.*). — Graecia.
ramosum, C. Richt. l. c. 126. (= *Triticum ramosum, Trin.*). — Ross.
Thoroldianum, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 2262. — Tibet.
trichophorum, C. Richt. Pl. Europ. i. (1895) 124. (= *Triticum trichophorum, Link.*). — Litt. Austr.
unilaterale, Cassidy, in Bull. Iowa Agric. Exp. Sta. xii. (1890) 63. = *caninum, Beauv. var.*
violaceum, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 123. (= *Triticum violaceum, Horn.*). — Scand.

AGROSTEMMA, Linn. = **Lychnis**, Linn. (Caryophyll.).

- baldense* X, *Porta, ex Tanfani in Bull. Soc. bot. Ital.* (1892) 100. — Ital.
Walkerii X, *Dickson, in Gartenfl.* (1890) 529. — Hybr. artef.

AGROSTIS, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 61.

- airoides, Franch. Miss. Sc. Cap Horn.* v. (Phan.) (1889) 382 t. 11. — Terr. Magell.
attenuata, Vasey, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 337. — Oregon.
Berlandieri, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 96. — Mexic.
barbigera, C. Cordem. ex f. Cordem. Fl. Ile Réunion, (1895) 124. — Ins. Borbon.

AGROSTIS : —

- borbonica, C. Cordem. ex f. Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 124. — Ins. Borbon.
Bourgaei, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 95. — Mexic.
Chinantlae, Fourn. l. c. 96. — Mexic.
curvifolia, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 384. — Afr. austr.
densiflora, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 72; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 30. — Calif.
depressa, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club. xiii. (1886) 54. — Colorado.
diegoensis, Vasey, l. c. 55. — Calif.
Dyeri, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 441. — N. Zel.
Elliotii, Hook. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 65. — Madag.
exarata, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club. xiii. (1886) 54. — Am. bor. occ.
fallax, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 516. — Ins. Viti.
foliosa, Vasey, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 337; et xiii. (1886) 55. — Oregon.
gaditana, Coincy, in Morot, Journ. de Bot. (1894) 66 = *A. castillana, Boiss.*
Ghiesbreghtii, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 97. — Mexic.
Hallii, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 74; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 32. — Am. bor.
Hegetschweileri X, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1889) 47. — Helv.
hiemalis, Britton, Stern. et Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 68. = *scabra, Willd.*
Howellii, Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 76. — Oreg.
inflata, Scribn. in Canad. Record. Sc. (Nov. 1894) 152. — Am. bor.
kauaiensis, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 516. — Ins. Viti.
Kentrophyllum, K. Schum. ex Engl., in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 14; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 108. — Afr. trop. or.
Liebmanni, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 97. — Mexic.
Novae-Angliae, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 76. — Am. bor.
oregonensis, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club. xiii. (1886) 56. — Oregon.
Rossae, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 76. — Wyoming.
salaziensis, C. Cordem. ex f. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 124. — Ins. Borbon.
sandwicensis, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 515. — Ins. Viti.
Schaffneri, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 94. — Mexic.
simensis, Hochst. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 128 = *alba, Linn. var. simensis, Engl.*
setifolia, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 97. — Mexic.
striata, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 107. — N. Zel.
tacubayensis, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 95. — Mexic.
tenella, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 442. — N. Zel.
Virletii, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 96. — Mexic.

AGROSTISTACHYS, Dalz. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 66.

- filipendula, Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 487. — Penins. Mal.
Maingayi, Hook. f. l. c. 406. — Malacca.
Massoana, Vidal, Rev. pl. vasc. Filip. (1886) 342. — Ins. Philipp.

AGROSTOCRINUM, F. Muell. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 66.

- scabrum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1893) 1119 = *stypandroides, F. Muell.*

AGROSTOPHYLLUM, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 67.

- glumaceum, Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 824; et *Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2095. — Ind. or.

AGROSTOPHYLLUM : —

majus, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 824; et *Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2096. — Ind. or.
pauciflorum, Hook. f. *l. c.* 824; et 2097. — Zeylan.
zeylanicum, Hook. f. *l. c.* 824. — Zeylan.

AICHRYSON, Webb = **Sempervivum**, Linn. (Crassul.).
immaculatum, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 108. = *S. immaculatum*, Christ.

AILANTHUS, Desf. (Simarub.). — Ind. Kew. i. 66.
calycina, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* (1893) t. 294.
 (= *Pongelion calycinum*, Pierre). — Cochinch.
Fauveliana, Pierre, in *Laness. Pl. util. col. franç.* (1886) 306; et *Fl. For. Cochinch.* (1893) sub t. 294 et 295 (= *Pongelion Fauvelianum*, Pierre). — Cochinch.
japonica, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 364. = *glaudivola*, Desf.

AINSLIAEA, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 66.
glabra, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1888) 47 t. 14. — China.
gracilis, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 297. — China.
grossedentata, Franch. *l. c.* — China.
lancifolia, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. II.* x. (1887-88) 41. — China.
nervosa, Franch. in *Bull. Mus. Par. i.* (1895) 64. — Yunnan.
pertyoides, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ii. (1889) 70 t. iii. — China.
ramosa, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1888) 471. — China.
rubrifolia, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 296. — China.
sutchuenensis, Franch. *l. c.* — China.
triloba, Makino, in *Bot. Mag. Tokyo Soc.* vi. (1892) 55. — Japon.
yunnanensis, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ii. (1888) 70. — Yunnan.

AINSLIEA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 304. = **Ainsliaea**, DC. (Composit.).
latifolia, Kuntze, *l. c.* 305. = *A. pteropoda*, DC.

AIOUEA, Aubl. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 66.
Benthamiana, Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berl.* v. (1889) 48. — Bras.
Burchelliana, Mez, *l. c.* li. — Bras.
dubia, Mez, *l. c.* 34. (= *Cryptocarya dubia*, H. B. et K.). — Venez.
Gaudichaudii, Mez, *l. c.* 39. — Bras.
granatensis, Mez, *l. c.* 32. — Columb.
hirtella, Mez, *l. c.* 39. — Bras.
Jelskii, Mez, *l. c.* 33. — Peruv.
Meissneri, Mez, *l. c.* 46. (= *Aydendron tenellum*, Meissn.). — Bras.
myristicoides, Mez, *l. c.* 48. — Bras.
piauhyensis, Mez, *l. c.* 31. (= *Aydendron piauhyense*, Meissn.). — Bras.
pruinosa, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 448. — Bras.
Riedelii, Mez, *l. c.* 37. — Bras.
Severini, Mez, *l. c.* 31. — Bras.
tambillensis, Mez, *l. c.* 33. — Peruv.
tenuiflora, Nees, ex Mez, *l. c.* 49. (= *Ocotea indecora*, Schott).
Warmingii, Mez, *l. c.* 46. — Bras.

AIRA, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 66.
aciphylla, Franch. *Miss. Sc. Cap Horn*, v. Phan. (1889) 384. — Patag.
mexicana, Trin. ex Fourn. *Gramin. Mexic.* 1881. (1886) 111. in syn. = *Eatonia densiflora*, Fourn.

AJOUEA «Aubl.» ex Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berl.* v. (1889) 28 = **Aiouea**, Aubl. (Laurin.).

AJUGA, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 69.
Boninsimæ, Maxim. in *Bull. Acad. sc. St-Petersb.* xxxii. (1888) 620. — Ins. Boninsim.
brevipolus ×, Borb. in *Termész. Füzetek*, xii. (1889) 110. — Austr.-Hung.
brevipolus ×, Borb. *l. c.* — Austr.-Hung.
Hildebrandtii, Briq. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ix. 3 a. (1895) 210, nomen. — Madag.

AJUGA : —

humilis ×, Borb. in *Termész. Füzetek*, ii. (1889) 110. — Tyrol.
humilis, Porta, in *Atti Accad. Agiate* ix. (1891) 56; ex Willk. *Suppl. prodr. fl. Hisp.* (1893) 158. — Hisp.
oocephala, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 514. — Madag.
ovalifolia, Bureau et Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 150. — China.
perbracteata ×, Borb. in *Termész. Füzetek*, xii. (1889) 111. — Boruss.
Postii, Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 710; et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 a. (1895) 210. — Syria.
rhodopea, Velen. in *Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* (1892) 19. — Bulg.
suffrutescens, Lange, in *Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1893) 196. — Hisp.
turkestancia, Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 71; et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 a. (1895) 210. — Turkest.

ALAFIA, Thou. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 70.
Barteri, Oliver, in *Hook. Icon. Pl.* xx. (1891) t. 1992. — Afr. trop. occ.

caudata, Stapf, in *Kew Bull.* (1894) 123. — Angola.
cuneata, Stapf, *l. c.* 122. — Angola.
lucida, Stapf, *l. c.* 122. — Afr. trop. occid.
malouetoides, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 164. — Ins. Fernando Po.
reticulata, K. Schum. *l. c.* — Afr. trop. occ.
sarmentosa, Stapf, in *Kew Bull.* (1894) 123. — Angola.

ALAIRIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 374 sphalm. = **Mairia**, Nees (Compos.).
perezoides, Kuntze, *l. c.* = *M. perezoides*, Nees.

ALANGIUM, Lam. (Cornac.). — Ind. Kew. i. 70.
barbatum, «Baill.» ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 273. = *Marlea barbata*, R. Br.
Faberi, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1774. — China.
Zollingeri, «Baill.» ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 273. — Hab.?

ALBERSIA, Kunth = **Amarantus**, Linn. (Amarant.).
crispus, Aschers. ex Hausskn. in *Ber. deutsch. Bot. Ges.* viii. (1890) (General Vers.) (121 = *Euxolus crispus*, Less.). — Am. bor.
emarginata, Aschers. ex Hausskn. *l. c.* = *Am. viridis*, Linn.

ALBERTA, E. Mey. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 71.
minor, Baill. ex K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 89. — Madag.

ALBERTOKUNTZEA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 550 = **Seguiera**, Loeff. (Phytolac.).
americana, Kuntze, *l. c.* = *S. americana*, Linn.
coriacea, Kuntze, *l. c.* = *S. coriacea*, Benth.
floribunda, Kuntze, *l. c.* = *S. floribunda*, Benth.
foliosa, Kuntze, *l. c.* = *S. foliosa*, Benth.
Langsdorffii, Kuntze, *l. c.* = *S. Langsdorffii*, Moq.
longifolia, Kuntze, *l. c.* = *S. longifolia*, Benth.
macrophylla, Kuntze, *l. c.* = *S. macrophylla*, Benth.
parvifolia, Kuntze, *l. c.* = *S. parvifolia*, Benth.
Vauthieri, Kuntze, *l. c.* = *S. Vauthieri*, Moq.

ALBIZZIA, Durazz. (Legum.). — Ind. Kew. i. 71.
brevipes, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. v. (June 1890) 20 in obs. (= *Hausemannia brevipes*, F. Muell.) — Austral.
grandibracteata, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 193. — Afr. trop. or.
Hausemanni, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. v. (June 1890) 20 in obs. (= *Hausemannia glabra* K. Schum.)
maranguensis, Taub. ex *Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 241. — Afr. trop. or.
mollis, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* Ser. II. v. (June 1890) 20 in obs. = *Hausemannia mollis*, F. Muell.
occidentalis, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii.* (1892) 222. — Calif.
pseudo-Saponaria, Blume, ex Koorders et Valetton,

ALBIZZIA : —

in Meded. s'Lands Plantentuin n° xi. Bidr. n. i. (1894) 295 = *tomentella*, Mig.
pubigera, Blume, *l. c.* 295 = *tomentella*, Mig.
Toona, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl. i.* (1886) 18. — Austral.
trichopetala, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 468. — Madag.

ALBUCA, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 72.
Allenae, Baker, in *Gard. Chron.* (1888) i. 10. — Zanzib.

Buchanani, Baker, *l. c.* (1892) 488. — Afr. trop. or.
corymbosa, Baker, *l. c.* (1886) ii. 38. — Afr. austr.
Elliotii, Baker, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 71. — Transv.
Fischeri, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 165. — Afr. trop. or.
humilis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 153. — Natal.
longibracteata, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 472. — Afr. trop. or.
Massoni, Baker, in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 336. — Afr. austr.
purpurascens, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 473. — Afr. centr. bor.
Schweinfurthii, Engl. *l. c.* 473. — Afr. centr. bor.
Steudneri, Schweinf. et Engl. *l. c.* 472. — Afr. trop. or.
Tayloriana, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 424. — Afr. trop. or.
trichophylla, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) 94. — Natal.

ALCEA, Linn. = **Althaea**, Linn. (Malvac.).
arbelensis, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 132. — Mesopot.
peduncularis, Boiss. et Hausskn. *l. c.* — Persia.
Sibthorpii, Hausskn. in *Mith. Thur. bot. austr.* N. Folge, v. (1893) 60. — Graecia.
Tholozani, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 40. — Asia occ.

ALCHIMILLA, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 73.
acutangula, Buser, in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* iv. (1894) 69 = *vulgaris*, Linn.
acutidens, Buser, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 104 = *vulgaris*, Linn.
aggregata, Buser, in *Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat.* xxxiv. (1895) 121. — Helv.
anisiana, Wettst. in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xxvi. (1892) 41; et in *Kern. Sched. fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 6 = *alpina*, Linn.
argyrophylla, Oliver, in *Johnst. Kilima-Njaro Exped.* (1886) 340; et in *Hook. Icon. Pl.* xvi. (1888) t. 1505. — Afr. trop. or.
asterophylla, Tausch, ex Buser, in *Magnier, Scrin. fl. select.* xi. (1891) 250; in *Bull. Soc. Dauph. éch. pl. Sér. II. iii.* (1892) 93, et in *Bull. Herb. Boiss. App. v.* (1893) 492 = *alpina*, Linn.
Bachite, Hochst. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 237 in syn. = *arvensis*, Scop.
basaltica, Buser, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 476 nomen. — Gall.
cinerea, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. *Beibl.* n. 47 (1894) 31. — Afr. trop. or.
colorata, Buser, in *Bull. Soc. Dauph. éch. pl. Sér. II. iii.* (1892) 99; et in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* ii. (1892) 131 = *vulgaris*, Linn.
connivens, Buser, ex C. DC. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 492; et ii. (1894) 107 = *vulgaris*, Linn.
coriacea, Buser, in *Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II. iii.* (1892) 108; et in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* ii. (1892) 133 = *vulgaris*, Linn.
crinita, Buser, in *Magnier, Scrin. fl. select.* xi. (1892) 256; in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* ii. (1892) 133 et ex C. DC. in *Bull. Herb. Boiss. i.* App. ii. (1893) 492 = *vulgaris*, Linn.
cuspidens, Buser, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 106 in obs. = *vulgaris*, Linn.
decumbens, Buser, 44. = *vulgaris*, Linn.
demissa, Buser, *l. c.* 96. — Eur.
effusa, Buser, in *Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat.* xxxiv. (1895) 128 = *vulgaris*, Linn.
fallax, Buser, ex M. Besse, in *Bull. trav. Soc. Murith. fasc. xxi-xxii.* (1894) 122 nomen; et in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* iii. (1894) 65. = *alpina*, Linn.

ALCHIMILLA :—

- faroensis*, Buser, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. iv. (1894) 58 in obs. = *alpina*, Linn.
filicaulis, Buser, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492 et ii. (1893) 22. — Eur. centr. et occid.
firma, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xii. (1893) 279; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492 et App. ii. (1893) 34. — Helv.
 Fischeri, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 236. — Afr. trop. or.
fissimima, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 99 = *vulgaris*, Linn.
flabellata, Buser, in Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 101 = *vulgaris*, Linn.
flavescens, Buser, l. c. ii. (1894) 197 in obs. = *vulgaris*, Linn.
flexicaulis, Buser, ex C. DC. Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492; et App. ii. (1893) 34. — Jurass, Alpes.
frigida, Buser, ex C. DC., l. c. 491; et ii. (1894) 46 = *vulgaris*, Linn.
fulgens, Buser, in Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 104; et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 132. — Pyren.
gemmia, X, Buser, ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 491. — Helv.
glomerulans, Buser, l. c. i. App. ii. (1893) 30 = *vulgaris*, Linn.
grossidens, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 251; in Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 95; et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 129 = *alpina*, Linn.
heteropoda, Buser, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. iv. (1894) 75 = *vulgaris*, Linn.
 Holstii, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 86. — Afr. trop. or.
impexa, Buser, ex M. Besse, in Bull. trav. Soc. Murith. fasc. xxi-xxii. (1894) 124 nomen; et in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 130. — Helv.
incisa, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 255 et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. v. (1892) 132; et ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492. — Eur.
incominua, Buser, ex C. DC. l. c.; et App. ii. (1893) 34 = *vulgaris*, Linn.
 Johnstoni, Oliver, in Johnston, Kilima Njaro Exped. (1886) 340; et in Hook. Icon. Pl. xvi. (1888) t. 1504. — Afr. trop. or.
Lapeyroussii, Buser, in Bull. Herb. Boiss. i. App. ii. (1893) 18 = *vulgaris*, Linn.
lineata, Buser, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 131 = *vulgaris*, Linn.
longiuscula, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 101 = *vulgaris*, Linn.
micans, Buser, l. c. i. App. ii. (1893) 28. — Gall., Helv.
multidens, Buser, l. c. (1893) 6 et 27. — Sabaud.
obusa, Buser, ex C. DC. l. c. i. (1893) 492; et in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 126 = *vulgaris*, Linn.
pellens, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892); Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 95; et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 129 = *alpina*, Linn.
pastoralis, Buser, in Magnier, Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 108; et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 132 = *vulgaris*, Linn.
pilosissima, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 137 = *vulgaris*, Linn.
plicata, Buser, in Bull. Herb. Boiss. i. App. ii. (1893) 20. — Gall., Bohem., Suec.
psilophylla, Borb. ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 424. — Austria.
pusilla, Buser, in Bull. Herb. Boiss. i. App. ii. (1893) 6, 19 et 23. — Eur.
racemulosa, Buser, l. c. App. ii. (1893) 31. — Saband.
reniformis, Buser, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 127 = *vulgaris*, Linn.
saxatilis, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 250; Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 92; et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 128 = *alpina*, Linn.
Schmidelyana, Buser, ll. cc. 254, 101 et 132. — Gallia.
semisecta, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 94 = *vulgaris*, Linn.

ALCHIMILLA :—

- sericoneura*, Buser, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. = *alpina*, Linn.
sinuata, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 102 = *vulgaris*, Linn.
speciosa, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xii. (1893) 281; et ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492. — Eur.
splendens X, Christ, in Bull. Soc. Vaud. sc. nat. xxv. (1889) 52; et in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 253. — Helv.
straminea, Buser, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 117 = *vulgaris*, Linn.
strigosula, Buser, ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492; et ii. App. ii. (1893) 24. — Sabaud., Alp. Marit.
 Stuhlmannii, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 86. — Afr. centr.
subcrenata, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xii. (1893) 285; et ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. i. 492. — Eur.
tenuis, Buser, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. iv. (1894) 76 = *vulgaris*, Linn.
transiens, Buser, l. c. 56 = *alpina*, Linn.
trunciloba, Buser, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 119 = *vulgaris*, Linn.
ulgurensis, Engl. Pflanzenw. Ost Afr. A (1895) 131 nomen. — Afr. trop. or.
undulata, Buser, in Bull. Herb. Boiss. i. App. ii. (1893) 26. — Sabaud.
versipila, Buser, l. c. ii. (1894) 112 = *vulgaris*, Linn.
Vetteri, Buser, ex Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 470 nomen. — Italia.
Volkensii, Engl. Bot. Jahrb. xix, Beibl. 47 (1894) 30. — Afr. trop. or.
Wichurae, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 110 = *vulgaris*, Linn.

ALCHORNEA, Sw. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 73. discolor, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 420. — Penang.

ALECTOROLOPHUS, Moench = **Rhinanthus**, Linn. (Scrophul.).

- Alectorolophus*, Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 11 = *R. major*, Ehrh.
alpinus, Sterneck, l. c. 228 = *R. major*, Ehrh.
dinaricus, Murb. Beitr. Fl. Sudbosn. und Herceg. (1891) 69 t. 11. — Herceg.
ellipticus, Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 47 tab. 4. — Tirol.
Freynii, Sterneck, l. c. 48 = *R. Freynii*, Kern.
glaber, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1893) 1068 = *R. Crista-galli*, Linn.
glandulosus, Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 98 t. 6 = *R. Crista-galli*, Linn.
goniotrachus, Borb. ex Sterneck, l. c. 136 t. 7. — Eur. or. et merid.
Kernerii, Sterneck, l. c. 13 t. 4. — Austria, Ital.
lanceolatus, Sterneck, l. c. 272 = *R. major*, Ehrh.
puberulus X, Fritsch, in Ber. deutsch. bot. Ges. x. (1892) (11) = *R. puberulus*, Fritsch.
pubescens, Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 120 et 126 = *R. pubescens*, Boiss. et Heldr.
pulcher, Sterneck, l. c. 225 = *R. Crista-galli*, Linn.
pumilus, Sterneck, l. c. 49 t. 6. — Pyren.
ramosus, Sterneck, l. c. 129. — Monten.
serotinus, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 1069 = *R. Crista-Galli*, Linn.
Wagneri, Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 102. — Bulg.
Wettsteinii, Sterneck, l. c. 129. — Ital.

ALECTRA, Thunb. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 74. *dentata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 458 = *indica*, Benth.

- melampyroides*, Kuntze, l. c. = *brasilensis*, Benth.
parvifolia, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi, 1889 (1890) 195. — Afr. austro-occ. extratrop.
sessiliflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 458 = *melampyroides*, Benth.

ALECTRYON, Gaertn. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 74.

- macroccum*, Radlk. in Sitz. math.-phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 255. — Ins. Haw.
reticulatus, Radlk. l. c. — N. Guin.
strigosus, Radlk. l. c. — N. Guin.

ALEPIS, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 604 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
flavida, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 605 = *L. flavidus*, Hook. f.
polychroa, Van Tiegh. l. c. = *L. polychrous*, Colenso.

ALEPYRUM, Hieron. (non R. Br.) ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1892) 1021 = **Gai-mardia**, Gaudich. (Centrolepid.).

ALETES, Coult. et Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 125 (Umbellif.).
acaulis, Coult. et Rose, l. c. (= *Zizia Hallii*, Coult. et Rose). — Am. bor.

ALETRIS, Linn. (Haemodor.). — Ind. Kew. i. 74. *arabica*, Defflers, Voy. Yémen (1889) 179. — Arabia. Delavayi, Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 157 in obs. (nomen). — China.
Dickinsii, Franch. in Bull. Soc. Philom. Par. Sér. VII, x. (1886) 102 = *foliosa*, Bureau et Franch. foliolosa, Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 240. — Borneo.
foliosa, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 156 in obs. — China.
glabra, Bureau et Franch. l. c. — China.
glandulifera, Bureau et Franch. l. c. — China.
khasiana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 265. — Reg. Himal.
lanuginosa, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 155. — China.
laxiflora, Bureau et Franch. l. c. — China.
nepalensis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. (1892) 264. — Ind. or.
rigida, Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 241. — Borneo.
sikkimensis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 265. — Reg. Himal.
stenoloba, Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 157 in obs. (nomen). — China.

ALEXA, Moq. (Legum.). — Ind. Kew. i. 75. *Imperatricis*, Baker, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1794. — Guian. angl.

ALGA, Ludw. Def. (1737) 138, fide Kuntze = **Posidonia**, Kon. (Naiad.).
australis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 744 = *P. australis*, Hook. f.
oceanica, Kuntze, l. c. = *P. Caulini*, Konig.

ALGUELAGUM, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 511 ex **ALGUELAGUEN**, Adans. Fam. ii. 505, mutat. ab **ALGUE-LAGUEN**, Feuillée, Obs. iii. DC. Med. 4. t. 1, nomen aboriginum = **Sphacele**, Benth. (Labiata).
acuminatum, Kuntze, l. c. 512 = *S. acuminata*, Griseb.
alpinum, Kuntze, l. c. = *S. alpina*, Oerst.
bullatum, Kuntze, l. c. = *S. bullata*, H. B. et K.
calycinum, Kuntze, l. c. = *S. calycina*, Benth.
chilense, Kuntze, l. c. = *S. campanulata*, Benth.
clinopodioides, Kuntze, l. c. = *S. clinopodioides*, Griseb.
confertum, Kuntze, l. c. = *S. conferta*, Benth.
cordifolium, Kuntze, l. c. = *S. cordifolia*, Benth.
floribundum, Kuntze, l. c. = *S. floribunda*, Benth.
Grisebachii, Kuntze, l. c. = *S. hastata*, Griseb.
hastatum, Kuntze, l. c. = *S. hastata*, A. Gray.
lamiifolium, Kuntze, l. c. = *S. lamiifolia*, Benth.
mexicanum, Kuntze, l. c. = *S. mexicana*, Schauer.
muticum, Kuntze, l. c. = *S. mutica*, Benth.
paniculatum, Kuntze, l. c. = *S. paniculata*, Benth.
parviflorum, Kuntze, l. c. = *S. parviflora*, Benth.
Radula, Kuntze, l. c. = *S. Radula*, Benth.
Salviae, Kuntze, l. c. = *S. Lindleyi*, Benth.
salviaefolium, Kuntze, l. c. = *S. salviaefolia*, Benth.
speciosum, Kuntze, l. c. = *S. speciosa*, St-Hil.
subhastatum, Kuntze, l. c. = *S. subhastata*, Benth.
tenuiflorum, Kuntze, l. c. = *S. tenuiflora*, Benth.
tomentosum, Kuntze, l. c. = *S. tomentosa*, Benth.

ALIBERTIA, A. Rich. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 75.
amplexicaulis, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 370. — Bras.
bertierifolia, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. (1889) 384. — Bras.

ALIBERTIA :—

- claviflora, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi.* (1889) 387. — Peruv.
 concolor, *K. Schum. l. c.* 388 (= *Gardeniola concolor*, Cham.). — Bras.
 curviflora, *K. Schum. l. c.* 387. — Peruv.
 elliptica, *K. Schum. l. c.* 389 (= *Thieleodoxa elliptica*, Cham.). — Bras.
 humilis, *K. Schum. l. c.* 391. — Bras.
 latifolia, *K. Schum. l. c.* 386 (= *Cordia latifolia*, Benth.). — Bras.
 longiflora, *K. Schum. l. c.* 412. — Bras.
 macrophylla, *K. Schum. l. c.* 394. — Bras.
 myrciifolia, *K. Schum. l. c.* 293. — Bras., Guian.
 obtusa, *K. Schum. l. c.* 393. — Bras.
 oligantha, *K. Schum. l. c.* 385. — Bras.
 rigida, *K. Schum. l. c.* 391. — Bras.
 rotunda, *K. Schum. l. c.* 390. — Bras.
 sessilis, *K. Schum. l. c.* 395 = *A. Melloana*, *Hook. f.*
 triflora, *K. Schum. l. c.* 392 (= *Cordia triflora*, A. Rich.). — Bras.
 vacciniifolia, *K. Schum. (err. cal.) in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 84 = seq.*
 vaccinioides, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi.* (1889) 389. — Bras.
 verrucosa, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 371.* — Bras.

ALICASTRUM, P. Br. = **Brosimum**, Sw. (Urtic.).

- glaucum, *Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34.* (1892) 16 = *B. glaucum*, *Taub.*
Glaziovii, *Taub. l. c.* = *B. Glaziovii*, *Taub.*
rubescens, *Taub. l. c.* = *B. rubescens*, *Taub.*

ALISMA, Linn. (Alismac.). — Ind. Kew. i. 75.

- batrachiocarpum*, *St-Lager, in Carot. Étud. des fleurs, éd. 8, ii. (1889) 820 = ranunculoides*, *Linn.*
plantaginifolium, *St-Lager, l. c.* 821 = *A. Plantago*, *Linn.*

ALISMORCHIS, Thou. = **Calanthe**, R. Br. (Orchid.).

- abbreviata*, *Kuntze, Rev. Gen. (1891) 650 = C. abbreviata*, *Lindl.*
alba, *Kuntze, l. c.* = *C. alba*, *Reichb. f.*
alismifolia, *Kuntze, l. c.* = *C. alismifolia*, *Lindl.*
alpina, *Kuntze, l. c.* = *C. alpina*, *Hook. f.*
angraciflora, *Kuntze, l. c.* = *C. angraciflora*, *Reichb. f.*
angusta, *Kuntze, l. c.* = *C. angusta*, *Lindl.*
angustifolia, *Kuntze, l. c.* = *C. angustifolia*, *Lindl.*
aristulifera, *Kuntze, l. c.* = *C. aristulifera*, *Reichb. f.*
biloba, *Kuntze, l. c.* = *C. biloba*, *Lindl.*
brevicornu, *Kuntze, l. c.* = *C. brevicornu*, *Lindl.*
carinata, *Kuntze, l. c.* = *Eulophia virens*, *Spreng.*
chloroleuca, *Kuntze, l. c.* = *C. chloroleuca*, *Lindl.*
clavata, *Kuntze, l. c.* = *C. clavata*, *Lindl.*
conspicua, *Kuntze, l. c.* = *C. conspicua*, *Lindl.*
cubensis, *Kuntze, l. c.* = *C. cubensis*, *Reichb. f.*
densiflora, *Kuntze, l. c.* = *C. densiflora*, *Lindl.*
diploxiphion, *Kuntze, l. c.* = *C. diploxiphion*, *Hook. f.*
discolor, *Kuntze, l. c.* = *C. discolor*, *Lindl.*
elytroglossa, *Kuntze, l. c.* = *C. elytroglossa*, *Reichb. f.*
emarginata, *Kuntze, l. c.* = *C. emarginata*, *Lindl.*
Foerstermannii, *Kuntze, l. c.* = *C. Foerstermannii*, *Reichb. f.*
furcata, *Kuntze, l. c.* = *C. furcata*, *Batem.*
gigantea, *Kuntze, l. c.* = *C. gigantea*, *Hook. f.*
gracilis, *Kuntze, l. c.* = *C. gracilis*, *Lindl.*
gracillima, *Kuntze, l. c.* = *C. gracillima*, *Lindl.*
granatensis, *Kuntze, l. c.* = *C. granatensis*, *Reichb. f.*
Griffithii, *Kuntze, l. c.* = *C. Griffithii*, *Lindl.*
herbacea, *Kuntze, l. c.* = *C. herbacea*, *Lindl.*
japonica, *Kuntze, l. c.* = *C. japonica*, *Blume.*
labrosa, *Kuntze, l. c.* = *C. labrosa*, *Reichb. f.*
Lindleyana, *Kuntze, l. c.* = *C. plantaginea*, *Lindl.*
longipes, *Kuntze, l. c.* = *C. longipes*, *Hook. f.*
lyroglossa, *Kuntze, l. c.* = *C. lyroglossa*, *Reichb. f.*
Mannii, *Kuntze, l. c.* = *C. Mannii*, *Hook. f.*
Masuca, *Kuntze, l. c.* = *C. Masuca*, *Lindl.*
mexicana, *Kuntze, l. c.* = *C. mexicana*, *Reichb. f.*
natalensis, *Kuntze, l. c.* = *C. natalensis*, *Reichb. f.*
odora, *Kuntze, l. c.* = *C. odora*, *Griff.*
pachystalix, *Kuntze, l. c.* = *C. pachystalix*, *Reichb. f.*
parviflora, *Kuntze, l. c.* = *C. parviflora*, *Lindl.*

ALISMORCHIS :—

- phajodes*, *Kuntze, Rev. Gen. (1891) 650 = C. angustifolia*, *Lindl.*
plantaginea, *Kuntze, l. c.* = *C. sylvatica*, *Lindl.*
pleiochroma, *Kuntze, l. c.* = *C. pleiochroma*, *Reichb. f.*
puberula, *Kuntze, l. c.* = *C. puberula*, *Lindl.*
pulchra, *Kuntze, l. c.* = *C. pulchra*, *Lindl.*
purpurea, *Kuntze, l. c.* = *C. purpurea*, *Lindl.*
reflexa, *Kuntze, l. c.* = *C. reflexa*, *Maxim.*
rosea, *Kuntze, l. c.* = *C. rosea*, *Benth.*
rubens, *Kuntze, l. c.* = *C. rubens*, *Huegel.*
Scortechinii, *Kuntze, l. c.* = *C. Scortechinii*, *Hook. f.*
speciosa, *Kuntze, l. c.* = *C. speciosa*, *Lindl.*
sulphurea, *Kuntze, l. c.* = *C. sulphurea*, *Huegel.*
Textori, *Kuntze, l. c.* = *C. Textori*, *Miq.*
tricarinata, *Kuntze, l. c.* = *C. tricarinata*, *Lindl.*
tricolor, *Kuntze, l. c.* = *C. tricolor*, *Huegel.*
tubifera, *Kuntze, l. c.* = *C. tubifera*, *Hook. f.*
uncata, *Kuntze, l. c.* = *C. uncata*, *Lindl.*
vaginata, *Kuntze, l. c.* = *C. vaginata*, *Lindl.*
veratrifolia, *Kuntze, l. c.* = *C. veratrifolia*, *R. Br.*
vestita, *Kuntze, l. c.* = *C. vestita*, *Lindl.*
Wrayi, *Kuntze, l. c.* = *C. Wrayi*, *Hook. f.*
Zollingeri, *Kuntze, l. c.* = *C. Zollingeri*, *Miq.*

ALKANNA, Tausch (Boragin.).—Ind. Kew. i. 76.

- caliensis*, *Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 353.* — Graecia.
Haussknechtii, *Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 16.* — Asia min.
methanaea, *Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, vi. (1886) 32; et N. Folge, viii. (1895) 49 (1888) 32.* — Graecia.
pindicola, *Hausskn. ll. cc.* — Graecia.
primuliflora, *Hausskn. ex Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 16 = A. Haussknechtii; Bornm.*
Stribnyi, *Velen. Fl. Bulg. Suppl. (1891) 647.* — Bulg.

ALLAEANTHUS, Thw. (Urtic.).—Ind. Kew. i. 76.

- Kurzii*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 490.* — Ind. Or.

ALLAEOPHANIA, Thw. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 76.

- rugosa*, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 124 (= Hedysotis rugosa, Korth.).* — Java, Sumatra.
rugosa, *Kuntze, Rev. Gen. (1891) 276 = praec.*

ALLAGOPTERA, Nees = **Diplothemium**, Mart. (Palm.).

- arenaria*, *Kuntze, Rev. Gen. (1891) 726 = D. littorale*, *Mart. pr. p. et D. maritimum*, *Mart.*
campestris, *Kuntze, l. c.* = *D. littorale*, *Mart. pr. p. et D. campestre*, *Mart.*
caudescens, *Kuntze, l. c.* = *D. caudescens*, *Mart.*
leucocalyx, *Kuntze, l. c.* = *D. leucocalyx*, *Mart.*
Yorallyi, *Kuntze, l. c.* = *Jubaea Yorallyi*, *H. Wendl.*

ALLAMANDA, Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 77.

- magnifica*, *Williams, Catal. (1888) 19; et Kew Bull. (1889) 75 = A. Schottii*, *Pohl.*
Williamsii, *Hort. ex Gard. Chron. (1891) ii. 111, nomen; et ex Gard. xl. (1891) 1642 t. 830 = cathartica*, *Linn.*

ALLARDTIA, A Dietr. = **Tillandsia**, Linn. (Bromel.).

- Roetzlii*, *Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 207 = T. Roetzlii*, *Éd. Morr.*

ALLENROLFEA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 554

- = **Spirostachis**, S. Wats. (Chenopod.).
occidentalis, *Kuntze, l. c.* 546 = *S. occidentalis*, *S. Wats.*
patagonica, *Kuntze, l. c.* = *S. patagonica*, *Griseb.*
vaginata, *Kuntze, l. c.* = *S. vaginata*, *Griseb.*

ALLIARIA, Adans. = **Sisymbrium**, Linn. (Crucifer.).

- Alliaria*, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 167 = S. Alliaria*, *Scop.*
Wasabi, *Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1893) 168 = Eutrema Wasabi*, *Maxim.*

ALLIARIA, Rumph. Amboin. ii. (1741) 41 = **Dysoxylum**, Blume (Meliac.).

- acutangula*, *albicans*, *arborescens*, *Balanseana*, *'Beccariana*, *Beddomei*, *camalensis*, *caulostachya*, *chrysophyllina*, *costulata cuneata*, *cyrtobotrya*, *dasyphylla*, *densiflora*, *euneura*, *flavescens*, *Fraseriana*, *fraterna*, *gatoensis*, *Gaudichaudiana*, *glabra*, *glomerata*, *grandis*, *Griffithii*, *Halmaheirae*, *Klanderii*, *Kunthiana*, *lasiocarpa*, *latifolia*, *Lenormandiana*, *Lessertiana*, *Lobbii*, *macrantha*, *macrocarpa*, *macrostachya*, *Maingayi*, *malabarica*, *minutiflora*, *Miqueliana*, *mollissima*, *Muelleri*, *Nageliana*, *Nerstii*, *nitida*, *nutans*, *oppositifolia*, *otophora*, *pachypoda*, *pallens*, *Pancheri*, *parvifolia*, *procera*, *ramiflora*, *Richii*, *rosea*, *rufa*, *rufescens*, *samoensis*, *Schulzii*, *sessilis*, *setosa*, *similis*, *Spanoghei*, *speciosa*, *spectabilis*, *Teysmannii*, *trichostyla*, *Turczaninowii*, *unijuga*, *Vieillardii*, *Vrieseana*, *Kuntze, Rev. Gen. (1891) 109 = homonyma omnia Dysoxyl.*

acuminatissima, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 108 =

- D. alliaceum*, *Blume.*
alliacea, *Kuntze, l. c.* = *D. Forsteri*, *C. DC.*
Ammoovodes, *Kuntze, l. c.* = *D. amooroides*, *Miq.*
cauliflora, *Kuntze, l. c.* 109 = *D. Cumingianum*, *C. DC.*
Golodhara, *Kuntze, l. c.* = *D. binectariferum*, *Hook.*
Hiernii, *Kuntze, l. c.* = *D. cauliflorum*, *Hiern.*
lampungum, *Kuntze, l. c.* = *D. macrothyrsus*, *Miq.*
mollis, *Kuntze, l. c.* = *D. Hamiltonii*, *Hiern.*
multijuga, *Kuntze, l. cit.* = *D. Blumei*, *Miq.*
pubescens, *Kuntze, l. c.* 108 = *D. Becklerianum*, *C. DC.*
schizochilodes, *Kuntze, l. c.* = *D. schizochiloide*, *C. DC.*
thyrsoides, *Kuntze, l. c.* = *D. thyrsoides*, *Hiern.*
Zippeliana, *Kuntze, l. c.* 109 = *D. molle*, *Miq.*

ALLIONIA, Loebl. (Nyctagin.). — Ind. Kew. i. 77.

- Bandurriæ*, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xli. (1895) 274.* — Chili.
angustifolia, *Kuntze, Rev. Gen. (1891) 533 = Oxybaphus angustifolius*, *Nutt.*
Bodini, *Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 355 = Oxybaphus Bodini*, *Morong.*
bracteosa, *Kuntze, l. c.* = *Oxybaphus bracteosus*, *Griseb.*
Bushi, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 223.* — Am. bor.
campestris, *Kuntze, Rev. Gen. (1891) 533 = Oxybaphus campestris*, *Griseb.*
cordifolia, *Kuntze, l. c.* = *Oxybaphus cordifolius*, *Kunze.*
corymbosa, *Kuntze, l. c.* = *Oxybaphus glabrifolius*, *Vahl.*
elegans, *Kuntze, l. c.* = *Oxybaphus elegans*, *Choisy.*
excelsa, *Kuntze, l. c.* = *Oxybaphus micranthus*, *Choisy.*
expansa, *Kuntze, l. c.* = *Oxybaphus expansus*, *Vahl.*
floribunda, *Kuntze, l. c.* = *Oxybaphus floribundus*, *Choisy.*
glabra, *Kuntze, l. c.* = *Oxybaphus glaber*, *S. Wats.*
himalaica, *Kuntze, l. c.* = *Oxybaphus himalaicus*, *Edgew.*
Jarae, *Phil. in Anac. Mus. nat. Chile (1891) 72 = Boliv.*
linearifolia, *Kuntze, Rev. Gen. (1891) 533 = Oxybaphus linearifolius*, *S. Wats.*
oxybaphodis, *Kuntze, l. c.* = *Oxybaphus Wrightii*, *Hemsl.*
prostrata, *Kuntze, l. c.* = *Oxybaphus prostratus*, *Vahl.*
puberula, *Phil. in Anal. Mus. nat. Chile (1891) 71.* — Bolivia.
viscosa, *Kuntze, Rev. Gen. (1891) 533 = Oxybaphus viscosus*, *L'Hérit.*

ALLIUM, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 77.

- Bahri*, *Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 326.* — Turkestan.
Barthianum, *Aschers. et Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 670.* — Afr. bor.
Blomfieldianum, *Aschers. et Schweinf. l. c.* 671 t. 20. — Afr. bor.
cabulicum, *Baker, in Bot. Mag. (1893) t. 7294.* — Reg. Cabul.
californicum, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 12.* — Calif.

ALLIUM : —

- Candolleianum*, *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1898) 523 nomen; et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 240. — Reg. Cauc.
- chrysocephalum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 335. — China occ.
- Clarkei*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 344. — Reg. Himal.
- crispum*, *Greene, Pittonia*, i. (June 1888) 166. — Calif.
- cyatophorum*, *Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 154. — China.
- dichlamydeum*, *Greene, Pittonia*, i. (June 1888) 166. — Calif.
- elatum*, *Regel*, in *Gartenfl.* (1887) 369 t. 1251. — As. centr.
- fibrosum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 322. — Turcom.
- filifolium*, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 392. — Asia Min.
- filifolium*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 352 t. 11. — Turkest.
- getulum*, *Batt. et Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 75; et *Fl. de l'Alg.* (1895) 62. — Algeria.
- gracile*, *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 523, et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 239. — Reg. Cauc.
- gracilescens*, *Sommier et Levier*, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 51. — Reg. Cauc.
- grande*, *Lepshy, l. c.* xiii. (1894) 343. — Reg. Cauc.
- gusaricum*, *Regel, l. c.* x. (1887) 349 t. 3. — Asia centr.
- Hendersoni*, *Robinson et Seaton*, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 237. — Am. bor.
- Henryi*, *C. H. Wright*, in *Kew Bull.* (1895) 119. — China.
- Herderianum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 324. — Turcom.
- hierosolymorum*, *Regel, l. c.* xi. (1890) 301. — Palaest.
- hyalinum*, *Curran, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 87. — Calif.
- kansuense*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 590. — China.
- kansunense*, *Baker*, in *Bot. Mag.* (1893) t. 7290 = *praec.*
- Karyeteini*, *Post*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 165. — Syria.
- kaschianum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 338 t. 3. — Turkest.
- klarputenense*, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 378. — Armen.
- laceratum*, *Freyn, l. c.* xli. (1891) 60 = *lacerum*, *Freyn.*
- lacerum*, *Freyn, l. c.* xlii. (1892) 378. — Asia Min.
- leucosphaerum*, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iii. (1886) 117. — Afghan.
- Losciosii*, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 199. — Hisp.
- Machmelianum*, *Post, Pl. Postianae*, iii. (1892) 18. — Syria.
- massaessylum*, *Batt. et Trab. in Bull. Soc. bot. Fr.* xxxix. (1892) 74; *Atlas fl. Alg.* t. 17; et *Fl. de l'Alg.* (Monoc.) (1895) 57. — Alger.
- melananthum*, *Coincy*, in *Morot, Journ. de Bot.* ix. 336. — Hisp.
- monanthum*, *Maxim. in Bull. Acad. sc. St-Petersb.* xxxi. (1887) 109. — Mandchuria.
- monospermum*, *Fepson, ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 321. — Calif.
- montenegrinum*, *G. Beck et Szyszyl. Pl. in itin.* in Cern. et Alban. lect. (1888) 47 = *carinatum*, *Linn.*
- obtusum*, *Lemmon*, in *Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 69. — Calif.
- Pardoi*, *Loscios, ex Willk. Illustr. fl. Hisp.* (1886) t. 96. — Hisp., Alger.
- peninsulare*, *Lemmon, ex Greene, Pittonia*, i. (June 1888) 165. — Calif.
- petraeum*, *Genty*, in *Magnier, Scrin. fl. select.* viii. (1889) 151 = *fallax*, *R. et S.*
- platystylum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 328 t. 2. fig. 2. — Tibet.
- pseudostriatum*, *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 523 nomen; et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 238. — Reg. Cauc.
- rhodopeum*, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 58; in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 237; et *Fl. Bulg.* (1891) 560. — Bulg.
- Roborowskianum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 359 t. 7. — Mongol.

ALLIUM : —

- Rollii*, *Terrac. in Malpighia* iii. (1889) 289 = *sphaerocephalum*, *Linn.*
- serotinum*, *Don*, ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. (1892) 375 = *scapiflorum*, *Wight.*
- simile*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 359. — Turkest.
- Sintenisii*, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 377. — Armenia.
- Sprengeri*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 691 (err. typ. 591). — Syria.
- stenanthum*, *Drew*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 152. — Calif.
- subangulatum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 340 t. 5. — Asia centr.
- tanguticum*, *Regel, l. c.* 317. — China occ.
- tekesicolum*, *Regel, l. c.* 350 t. 6. — Turkest.
- tenuicaule*, *Regel, l. c.* 348 t. 4. — Buchara.
- thracicum*, *Halácsy et Georgh. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 223. — Bulg.
- tortifolium*, *Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix (1892) 338; et *Fl. de l'Alg.* (Monoc.) (1895) 62. — Algeria.
- Tourneuxii*, *Chab. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 319. — Algeria.
- triste*, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 393 = *tristissimum*, *Freyn et Sint.*
- tristissimum*, *Freyn et Sint. l. c.* — Asia Min.
- tristylum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 333 t. 2. fig. 3. — Turkest.
- turcomanicum*, *Regel, l. c.* 305. — Turkest.
- ubscolum*, *Regel, l. c.* 342 t. 5. — Mongol.
- unifolium*, *Vid. ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 321. — Calif.
- vancouverense*, *Macoun, Cat. Canad. Pl.* iv (1888) 37. — Ins. Vancouv.
- Walteri*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 357 t. vii. — Turkest.
- weichanicum*, *Palibin*, in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 142. — China.
- xypophyllum*, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iii. (1886) 118. — Turkest.
- Yatei*, *Aitch. et Baker, l. c.* 117. — Afghan.

ALLOCALYX, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 486. (Scrophular.)

microphylla, *Cordem. l. c.* — Ins. Borbon.

- ALLOCARYA**, *Green, Pittonia* i. (Feb. 1887) 12; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 258 = **Eritrichium**, *Schrad. (Boragin.)*.
- albiflora*, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 57 = *E. albiflorum*, *Griseb.*
- Austinae*, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 18. — Calif.
- australasica*, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 57 = *E. australasicum*, *DC.*
- brachycarpa*, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 14 = *Krynitzkia brachycarpa*, *A. Gray.*
- californica*, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 20 = *K. californica*, *A. Gray.*
- Chorisiana*, *Greene, l. c.* 13 = *K. Chorisiana*, *A. Gray.*
- Cooperi*, *Greene, l. c.* 19 = *E. Cooperi*, *A. Gray.*
- Cusickii*, *Greene, l. c.* 17. — Calif.
- diffusa*, *Greene, l. cit.* 14. — Calif.
- Echinoglochis*, *Greene, l. c.* 15 = *Echinosperrum* *Greenei*, *A. Gray.*
- Greenei*, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 259 = *Echinosperrum Greenei*, *A. Gray.*
- Hickmanii*, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 13. — Calif.
- hirta*, *Greene, l. c.* i. (Feb. 1888), 61. — Oregon.
- hispidula*, *Greene, l. c.* i. (Feb. 1887) 14. — Am. bor. occ.
- humilis*, *Greene, l. c.* 17. — *E. humile*, *DC.*
- humistrata*, *Greene, l. c.* 16 = *Krynitzkia californica*, *A. Gray.* var. *subglochidiata*, *A. Gray.*
- lithocarya*, *Greene, l. c.* = *Krynitzkia lithocarya*, *A. Gray.*
- mollis*, *Greene, l. c.* 20 = *E. molle*, *A. Gray.*
- myriantha*, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 125. — Calif.
- Nelsoni*, *Greene, l. c.* 48. — Wyoming.
- penicillata*, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 18. — Calif.
- plebeia*, *Greene, l. c.* = *Krynitzkia plebeia*, *A. Gray.*

ALLOCARYA : —

- procumbens*, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 17 = *Plagiobothrys procumbens*, *A. Gray.*
- scopulorum*, *Greene, l. c.* 16 = *Krynitzkia californica*, *A. Gray.*
- Scouleri*, *Greene, l. c.* 18 = *E. Scouleri*, *A. DC.*
- scripta*, *Greene, Pittonia*, i. (Nov. 1887) 142. — Calif.
- sessilifolia*, *Greene, l. c.* 17 = *Eritrichium sessiliflorum*, *DC.*
- stipitata*, *Greene, l. c.* 19. — Calif.
- stricta*, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1892) 231. — Calif.
- tenuifolia*, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 57. = *Krynitzkia tenuifolia*, *A. Gray.*
- trachycarpa*, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 14 = *Krynitzkia trachycarpa*, *A. Gray.*
- uliginosa*, *Greene, l. c.* 14 = *Eritrichium uliginosum*, *Phil.*
- vestita*, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 125. — Calif.

ALLODAPE, *Endl. = Lebetanthus*, *Endl. (Epa-crid).*

Myrsinites, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 391 = *L. americanus*, *Endl.*

ALLOMORPHIA, *Blume (Melastom.)*. — *Ind. Kew.* i. 83.

- Balansaei*, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1183. — Tonkin.
- Beccariana*, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Nederl. Indië*, i. 2. (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 467. — Borneo.
- bullata*, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 465. — Malacca.
- cordifolia*, *Cogn. in K. Schum. et Holll. Fl. Kais. Wilh. Land.* (1889) 87; in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 468. — N. Guin.
- longifolia*, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 466. — Borneo.
- longispicata*, *Cogn. l. c.* 531 et 465. — Borneo.
- macrophylla*, *Cogn. in K. Schum. et Holll. Fl. Kais. Wilh. Land.* (1889) 87; in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 537; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 468. — N. Guin.
- multiflora*, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1183. — Tonkin.
- multinervia*, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 537; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 531. — Borneo.
- quintuplinervia*, *Cogn. l. c.* 531 et 466. — Borneo.
- rosea*, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 301. — Penins. Mal.
- sertulifera*, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 531. — Borneo.

ALLOPHYLUS, *Lam. (Sapindac.)*. — *Ind. Kew.* i. 83 (sens. exten.).

- abyssinicus*, *Radlk. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia abyssinica*, *Hochst.*). — Afr. trop.
- alnifolius*, *Radlk. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 25; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 249 (= *Schmidelia alnifolia*, *Baker*). — Afr. trop.
- amazonicus*, *Radlk. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia amazonica*, *Mart.*). — Bras.
- angustatus*, *Radlk. l. c.* (= *Schmidelia angustata*, *Triana et Planch.*). — N. Granat.
- Bojerianus*, *Radlk. l. c.* 31 (= *Schmidelia Bojeriana*, *Camb.*). — Afr. trop.
- chartaceus*, *Radlk. l. c.* 313 (= *Schmidelia chartacea*, *Kurz*). — Reg. Himal.
- concanicus*, *Radlk. in Sitzungsber. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss.* xx. (1890) 230. — As. trop.
- crassinervis*, *Radlk. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. (1895) 312, nomen. — Am. trop.
- decipiens*, *Radlk. l. c.* 313 (= *Schmidelia decipiens*, *Arn.*). — Afr. austr.
- devicus*, *Radlk. l. c.* 512 (= *Schmidelia devica*, *Mart.*). — Bras.
- distachys*, *Radlk. l. c.* 313 (= *Schmidelia distachya*, *DC.*). — As. or.

ALLOPHYLUS: —

- edulis*, Radlk. ex Warm. in Medd. naturh. Foren. Kjöb. xxxvii. (1890) 244; et ex S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 340 (= *Schmidelia edulis*, St-Hil.). — Bras.
- erosus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia erosa*, Arn.). — Afr. austr.
- excelsus*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia excelsa*, Triana et Planch.). — Am. trop.
- ferruginus*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 249. — Afr. trop. or.
- floribundus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia floribunda*, Poepp. et Endl.). — Peruvia.
- glaber*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. (1892) 284 (= *Schmidelia glabra*, Roxb.). — As. trop.
- glabratus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia glabrata*, H. B. et K.). — Am. trop.
- Goudotii*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia Goudotii*, Triana et Planch.). — Am. trop.
- grandifolius*, Radlk. l. c. 313 (= *Schmidelia grandifolia*, Baker). — Afr. trop.
- grossedentatus*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia grosse-dentata*, Turcz.). — As. or.
- guaraniticus*, Radlk. l. c. 312 (= *Schmidelia guaranítica*, A. St-Hil.). — Bras.
- heterophyllus*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia heterophylla*, Camb.). — Bras.
- hirtellus*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia hirtella*, Hook.). — Afr. trop.
- killimandscharicus*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 249. — Afr. trop. or.
- laevigatus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia laevigata*, Turcz.). — Bras.
- leptostachyus*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. (1890) 284 (= *Schmidelia leptostachya*, Blume). — Java.
- magicus*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 250 in obs. (= *Schmidelia magica*, Baker). — Afr. trop.
- melanocarpus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia melanocarpa*, Arn.). — Afr. austr.
- mollis*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia mollis*, Kunth). — N. Granat.
- monophyllus*, Radlk. ex Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 250; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia monophylla*, Presl). — Afr. trop.
- mutabilis*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. (1890) 284 (= *Schmidelia mutabilis*, Blume). — Java.
- myrianthus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1894) 312 (= *Schmidelia mollis*, Triana et Planch.). — N. Granat.
- nitidulus*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia nitidula*, Triana et Planch.). — N. Granat.
- occidentalis*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia occidentalis*, Sw.). — Am. trop.
- paniculatus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia paniculata*, Poepp. et Endl.). — Peruvia.
- petiolatus*, (err. cal.) Radlk. ex Wilh. Müller, in Spengel, Zool. Jahrb. i. (1886) 51 = seq.
- petiolulatus*, Radlk. Monog. gener. Serjan. suppl. (Abhandl. bayer. Akad. Wiss. xvi. i.) (1886) 181; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312. — Bras.
- psilospermus*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230 in obs.; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312. — Martinica.
- puberulus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia puberula*, Camb.). — Bras.
- punctatus*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia punctata*, Poepp. et Endl.). — Peruvia.
- quercifolius*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia quercifolia*, Mart.). — Bras.

ALLOPHYLUS: —

- racemosus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia racemosa*, Linn.). — As. or.
- repandus*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 160 in obs. (= *Schmidelia repanda*, Baker). — Afr. trop.
- reticulatus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 nomen. — Am. trop.
- Rheedii*, Radlk. l. c. 313 (= *Schmidelia Rheedei*, Wight). — As. or.
- rhoidiphyllus*, Balf. f. in Trans. Roy. Soc. Edinb. xxxi. (1888) 60 = *rhusiphyllus*, Balf. f.
- rhomboidalis*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230 (= *Schmidelia rhomboidalis*, Nadeaud). — Ins. Tahit.
- rubifolius*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 292 (= *Schmidelia rubifolia*, Hochst.). — Afr. trop.
- scrobiculatus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia scrobiculata*, Poepp. et Endl.). — Peruvia.
- semdentatus*, Radlk. ex S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 341; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia semidentata*, Miq.). — Bras.
- sericeus*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia sericea*, Camb.). — Am. trop.
- simplex*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 247. — Madag.
- spicatus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia spicata*, DC.). — Afr. trop.
- strictus*, Radlk. l. c. 312 fig. 162. — Bras.
- ternatus*, Radlk. l. c. iii. 5. (1895) 313 = A. Cobbe, Bl. tomentosus, Boerl. Handl. Fl. Nederl. Indië, i. (1890) 284 (= *Schmidelia tomentosa*, Hook. f. — Borneo.
- trichodesmus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia trichodesma*, Boj.). — Ins. Maurit.
- villosus*, Radlk. l. c. iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia villosa*, Roxb.). — As. trop.
- vitiensis*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230 in obs. — Ins. Viti.

ALLOPLECTUS, Mart. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 84.

- cristatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 472 = *Pterygoloma cristatum*, Griseb.
- discolor*, Hook. f. in Bot. Mag. cxxii. (1892) ad calc. = A. Lynchei, Hook. f.
- Lynchei*, Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7271. — N. Granat.
- pubescens*, Benth. et Hook. f. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 472. — Jamaica.
- solitarius*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 238. — Bolivia.
- sylvarum*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 411. — Bras.

ALLUCIA cernua, Klotzsch ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. III. iii. (1890) 48 in syn. = *Renealmia strobilifera*, Poepp. et Endl.

strobilifera, Klotzsch, l. c. = R. strobilifera, Poepp. et Endl.

ALNASTER, Spach = **Alnus**, Linn. (Cupulifer.).

fruticosa, Somm. (an Ledeb. ?) in Nuov. Giorn. bot. Ital. xxv. (1893) 84 = *Alnus fruticosa*, Rupr.

ALNUS, Linn. (Cupulifer.). — Ind. Kew. i. 84.

- ambigua* ×, G. Beck, in Verh. zool. bot.-Ges. Wien, xxxviii. (1888) 767. — Austria.
- Aschersoniana*, Callier, in Sitzungs. Schles. Ges. vaterl. Cult. lxx. (1891-92) 82; et in Deutsche Bot. Monatsschr. x. (1892) 185. — Germ.
- Beckii*, Callier, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 53. — Germ.
- Fiekii* ×, Callier, in Sitzungs. Schles. Ges. vaterl. Cult. lxx. 1891. (1892) 83; et in Deutsche bot. Monatsschr. x. (1892) 186. — Germ.
- Figerti* ×, Callier, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 56. — Germ.
- hybrida* ×, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 149. — Germ.

ALNUS: —

- imperialis*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 161 = *glutinosa*, Linn.
- lanceolata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xcl. (1895) 514. — Peruvia.
- nervosa*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 148 = *cordata*, C. Koch.
- occidentalis*, Dippel, l. c. 158 fig. 78. — Am. bor.
- silesiaca* ×, Fiek, in Sitzungs. Schles. Ges. vaterl. Cult. lxx. 1891. (1892) 83. = seq. ?
- silesiaca* ×, Fiek et Pax, in Oest. Bot. Zeitschr. (1889) 408. — Germ.
- spuria* ×, Callier, in Sitzungs. Schles. Ges. vaterl. Cult. lxx. 1891. (1892) 79; et in Kneucker, Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 105 et 123. — Germ.
- Tauschiana* ×, Callier, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 53. — Germ.

ALOCASIA, Neck. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 85.

- aequiloba*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 119. — N. Guin.
- amabilis*, Hort. Bull. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 527 = *longiloba*, Mig.
- argyrea*, Sander, Catal. (1895) 36. — Hab. ?
- Augustiana*, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hort. (1886) 61 tab. 593. — Hab. ?
- Bachi* ×, Hort. ex Rodig. in Illustr. Hortic. (1888) 79 et (1890) 77 t. 110. — Hybr. artef.
- Chantrieri* ×, Éd. André, in Rev. Hort. (1887) 465 fig. 32. — Hybr. artef.
- Chantrieriana* ×, Hort. ex Rev. Hortic. (1887) 465. — Hybr. artef.
- Chantrieriana*, Rodig. in Illustr. Hortic. xxv. (1888) 79 t. 64. = praec. ?
- conspicua* ×, Éd. André, in Rev. Hortic. (1891) 175 et 367. — Hybr. artef.
- cordifolia*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 136 = *Caladium cordifolium*, Willd.
- coriacea*, L. Lind. ex Gard. Chron. (1893) i. 475. — Hab. ?
- Curtisii*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 347. — Penang.
- Dussii*, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7364 in syn. = *Colocasia antiquorum*, Schott.
- Dussii*, Dammer, in Gartenfl. (1892) 312. — Hab. ?
- eminens*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 105. — Malaya.
- Gaulainii* ×, Éd. André, ex Wien. Ill. Gartenzeit. (1890) 380. — Hybr. artef. ?
- gigas*, L. Lind. in L'Hort. Intern. Catal. (1886-87) 41 nomen. — Hab. ?
- grandis*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) ii. 890. — Ins. Ind. or.
- Lindeni*, Rodig. in Illustr. Hortic. (1886) 111 t. 153. — N. Guin.
- Luciani* ×, Pucci, ex Rodig. in Illustr. Hortic. xxxiv. (1887) 75 t. 27. — Hybr. artef.
- Margaritae*, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hortic. xxxiii. (1886) 155 t. 611. — Java.
- marginata*, N. E. Br., in Gard. Chron. (1887) ii. 712. — Bras.
- mortfontanensis* ×, Éd. André, in Rev. Hortic. (1891) 174. — Hybr. artef.
- nobilis*, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 731 nomen. — Hab. ?
- perakensis*, Hemsl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 205 = A. Beccarii, Engl.
- princeps*, Bull. Catal. (1888) 7, ex Kew Bull. (1889) 76. — Malesia.
- Pucciana* ×, Éd. André, in Rev. Hortic. (1887) 466. — Hybr. artef.
- reversa*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 38. — Ins. Philipp.
- Rex*, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 731 nomen. — Hab. ?
- Rodigasiana* ×, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hortic. (1890) 114; et (1891) 174. — Hybr. artef.
- Sanderiana*, Hort. ex Bull. Catal. (1894) 8 cum xylogr. — Malaya.
- Villeneuvei* ×, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hortic. xxxiv. (1889) 59 t. 21. — Hybr. artef.
- Watsoniana*, Hort. ex Gard. Chron. (1893). i. 442, fig. 83. — Sumatra.

ALOCASIOPHYLLUM, Engl. Bot. Jahrb. xv.

- (1893) 449, t. 19. **AROIDEAE**.
- kamerunianum*, Engl. l. c. — Afr. trop. occid.

ALOË, (Tourn.) Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 85. *agavifolia*, Schweinf., ex Penzig, in *Atti Congr. bot. Genova* (1892) 365, nomen. — Erythrea. *aurantiaca*, Baker, in *Gard. Chron.* (1892) i. 780. — Afr. austr. Bakeri, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 60. — Madag. Boehmii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 141. — Afr. trop. or. Boylei, Baker, in *Kew Bull.* (1892) 84. — Afr. austr. *brachystachys*, Baker, in *Bot. Mag.* (1895) t. 7399. — Zanzib. Brownii, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 34. — Afr. austr. Buchanani, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 119. — Afr. trop. or. Camperii, Schweinf., in *Bull. Herb. Boiss.* ii. App. ii. (1894) 66. — Erythrea. cernua, Tod. *Hort. bot. Panorm.* ii. (1890) 49 t. 36. — Madag. concinna, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 153. — Zanzib. confusa, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 141. — Afr. trop. or. Derbetzi, X., Hort. Deleuil, ex Rev. Hort. (1894) 147. — Hybr. artef. haworthioides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 529. — Madag. hereroensis, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 2. — Afr. austr. Hildebrandtii, Baker, in *Bot. Mag.* (1888) t. 6981. — Afr. trop. or. imbricata, X., Hort. ex Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 194. — Hybr. artef. Johnstoni, Baker, ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 351. — Afr. trop. or. Kirkii, Baker, in *Bot. Mag.* (1894) t. 7386. — Zanzibar. kniphofioides, Baker, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1939. — Afr. austr. Lanzae, Tod. *Hort. bot. Panorm.* ii. (1890) t. 39. — Afr. austr. lateritia, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 140. — Afr. trop. or. leptophylla, N. E. Br. in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 44. — Afr. austr. longiflora, Baker, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 756. — Afr. austr. Luntii, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 342; et in *Bot. Mag.* (1895) t. 7448. — Arabia. minima, Baker, l. c. (1895) 153; et in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2423. — Natal. Monteiroae, Baker, ex Monteiro, Delagoa Bay, (1891) 174 = seq. Monteiroi, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 523. — Mossamb. rabaiensis, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 410. — Afr. trop. or. Rossii, Tod. *Hort. bot. Panorm.* ii. (1891) 58 t. 40 (Rossi). — Madag. rubroviolacea, Schweinf., in *Bull. Herb. Boiss.* ii. App. ii. (1894) 71. — Arabia. sabaea, Schweinf. l. c. 74. — Arabia. Schoelleri, Schweinf. l. c. 107. — Erythrea. secundiflora, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 140. — Afr. trop. or. Simoniana, X., Hort. ex Wien. Ill. Gartenz. (1893) 194. — Hybr. artef. Steudneri, Schweinf. ex Penzig, in *Atti Congr. bot. Genova* (1893) 362 nomen; et in *Bull. Herb. Boiss.* ii. App. ii. (1894) 73. — Erythrea. tomentosa, Deters, Voy. Yémen (1884) 211. — Arabia. venenosa, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 87. — Congo. Volkensii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 141. — Afr. trop. or.

ALONA, Lindl. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 88. flaccida, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 39. — Chili. Foncki, Phil. l. c. 36. — Chili. grandiflora, Phil. l. c. 37. — Chili. Miersii, Phil. l. c. 35. — Chili. patula, Phil. l. c. 39. — Chili. phyllicifolia, Phil. l. c. 36. — Chili. rigida, Phil. l. c. 38. — Chili. sedifolia, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 69. — Bolivia.

ALOPECURUS, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 88. californicus, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xv. (1888) 13; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 25. — Calif. Howelli, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xi. (1888) 12; in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 87; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 27 fig. 1. — Oregon. involucreatus, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 440. — As. occ. Macounii, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xiv. (1888) 12; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 27 fig. 2. — Ins. Vancouv. mixtus, X., C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 39. — Helv. occidentalis, Scribn. in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 170. — Colorado. sericeus, Alboff, *Descr. nouv. esp. Abkasia* (1891) 16, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 251; et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 255. — Reg. Cauc. Stejnegeri, Vasey, in *Proc. U. S. Nat. Mus.* x. (1887) 153; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 24. — Ins. Command. (Mar. Behring.).

ALPHITONIA, Reissek (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 89. ponderosa, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 81. — Ins. Sandvic.

ALPHONSEA, Hook. f. et Thoms. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 89. Curtisii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 127. — Penang. cylindrica, King, l. c. 127. — Perak. lucida, King, l. c. 126. — Perak. subdehiscens, King, l. c. 126. — Perak.

ALPINIA, Linn. (Scitamin.). — Ind. Kew. i. 89. affinis, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 357. — N. Guin. africana, Ridl. in *Bolet. Soc. Brot.* vi. (1887) 203. — Ins. S. Thom. auranthia, Wall. ex Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 255 = A. Rafflesiana, Wall. bifida, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 275. — Oceania. decurva, Ridl. in *Journ. Bot.* xxix. (1886) 357. — N. Guin. decurvata, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 257. — Perak. Fraseriana, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1567. — Borneo. gracilis, Rich. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. (1890) 47 = Renealmia gracilis, Petersen. Manii, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 253. — Ins. Andam. petiolata, Baker, l. c. 255. — Perak. nutans, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land.* (1889) 28. — N. Guin. papilionacea, K. Schum. l. c. 29. — N. Guin. secunda, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 257. — Perak. speciosa, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 418 in obs. — Afr. trop. Wrayi, King, ex Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 252. — Penang. zingiberina, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1887) t. 6944. — Siam.

ALSEIS, Schott (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 90. involuta, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. (1889) 189. — Bras. labatioides, Karst. ex K. Schum. l. c. 180. — Bras.

ALSEODAPHNE, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. i. 90. crassipes, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 146. — Malacca. decipiens, Hook. f. l. c. 145. — Malacca. panduriformis, Hook. f. l. c. — Malacca. peduncularis, Hook. f. l. c. 144. — Penang. petiolaris, Hook. f. l. c. — Reg. Himal. umbelliflora, Hook. f. l. c. 145. — Malacca, Ind. bat.

ALSINANTHEMUM, Thalius, ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 238 = **Trientalis**, Linn. (Primulac.). europaeum, Greene, l. c. = T. europaea, Linn.

ALSINASTRUM, Schur = **Elatine**, Linn. (Elatin.). brachyspermum, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 62 = E. brachysperma, A. Gray.

ALSINE, Scop. = **Arenaria**, Linn. (Caryophyll.). Akinfjewi, Schmalh. ex Akinfiew, in *Bull. Soc. géogr. Cauc.* (1892) 12; et in *Ber. deutsch. bot. Ges.* x. (1892) 287. — Reg. Cauc. aquatica, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 346 = Cerastium aquaticum, Linn. baicalensis, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 70 = Stellaria umbellulata, Turcz. borealis, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 149 = Stellaria borealis, Bigel. bosniaca, G. Beck, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien.* vi. (1891) 317 et 321 t. 8 fig. 1-5. — Bosnia. Brotherana, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 112 = Stellaria Brotherana, Trautv. bulgarica, Velen. in *Sitzb. K. Bohm. Akad.* 1889. (1890) ii. 30; et *Fl. Bulg.* (1891) 93. — Bulg. ciliata, Schmalh. in *Ber. deutsch. bot. Ges.* x. (1892) 287 t. 17. fig. 1-5. — Reg. Cauc. circassica, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 449. — Reg. Transcauc. crassifolia, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 150 = Stellaria crassifolia, Ehrh. crispa, Holzinger, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 216 = Stellaria crispa, Cham. dunensis, Corbière, *Nouv. Fl. Norm.* (1893) 105 = Arenaria tenuifolia, Linn. fontinalis, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 356 = Stellaria crassifolia, Ehrh. frutescens, Simonk. *Enum. fl. Transs.* (1886) 141 = Arenaria setacea, Thuill. Garckeana, Aschers. et Sint. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 112. — Asia Min. Gayana, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 109 et 159. — Ins. Canar. graminea, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 150 = Stellaria graminea, Linn. Holostea, Britton, l. c. = Stellaria Holostea, Linn. humifusa, Britton, l. c. = Stellaria humifusa, Sw. Jamesii, Holzinger, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 216 = Stellaria Jamesii, Torr. kabirarum, Degen et Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 330. — Ins. Samothr. lanuginosa, Coste, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) p. cxvii; et in *Magnier, Scrin. fl. select.* xiii. (1894) 318. = Arenaria mucronata, Linn. littoralis, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 34 = Stellaria littoralis, Torr. longifolia, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 150 = Stellaria longifolia, Muhl. longipes, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 70 = Stellaria longipes, Goldie. mediterranea, Fouc. in *Soc. étud. fl. Franc.* (1892) n. 20, ex *Bull. Herb. Boiss.* i. App. (1892) 12 = Arenaria tenuifolia, Linn. nitens, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 33 = Stellaria nitens, Nutt. nivalis, Simonk. *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 142 = Arenaria verna, Linn. oxypetala, Wolosz. in *Spraw Kom. fizyj. Krajowej.* xxii. (1883) ii. 214. — Eur. Pavi, Willk. ex Herv. in *Magnier, Scrin. fl. select.* xi. (1892) 244; et in *Rev. gén. Bot.* iv. (1892) 152 t. 7 fig. 1. — Hisp. Pichleri, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 113. — Pelop. platyphylla, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 102 et 159. — Ins. Canar. pubera, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1893) 107 = Stellaria pubera, Michx. pungens, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien.* (1886) 20. — Persia. pusilla, Stapf, l. c. 10. — As. Min. rhaetica, Bruegg. in *Jahresb. Nat. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 29 = Arenaria verna, Linn. rhodocalyx, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 255 t. 8. — Reg. Cauc. rudbarendis, Stapf, in *Denkschr. Acad. Wien.* (1886) 20. — Persia. Skorpii, Velen. in *Sitzb. Böhm. Ges. Wiss.* 1889. (1890) 31; et *Fl. Bulg.* (1891) 93. — Bulg. stellata, Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien.* lxi. (1894) 474. — Graecia. stenosepala, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien.* (1886) 9. — As. Min.

ALSINE : —

- subuniflora*, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 35. — As. Min.
thessala, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 472. — Thessal.
Thevenaei, Reut. ex Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 242 (conf. Bull. Herb. Boiss. ii. App. ix. (1894) 13. — Gall.
Thomasiana, Somm. in Bull. Soc. bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 44 = *Arenaria Villarsii*, Balb.
Wiesneri, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, (1886) 20. — Persia.

- ALSINELLA**, Bilb. ex Linn. = **Sagina**, Linn. (Caryophyll.).
ciliata, Greene, Fl. Francisc. (1891) 126. — Calif.
crassicaulis, Greene, l. c. 125 = *S. crassicaulis*, S. Wats.
occidentalis, Greene, l. c. = *S. occidentalis*, S. Wats.
saginoides, Greene, l. c. = *Spergula saginoides*, Linn.

- ALSODEIA**, Thou. (Violar.). — Ind. Kew. i. 92.
Ancuparia, Welw. ex Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 92 in obs. — Angola.
camptoneura, Radlk. in Sitz. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 187 in obs. — Bras.
capillata, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 407. — Penins. Mal.
cinerea, King, l. c. 403. — Penins. Mal.
comosa, King, l. c. 407. — Penins. Mal.
condensa, King, l. c. 405. — Penins. Mal.
floribunda, King, l. c. 406. — Penins. Mal.
guatemalensis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 458. — Guatem.
Hookeriana, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 402. — Penins. Mal.
japurana, Radlk. in Sitz. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 182 in obs. — Bras.
Kunstleriana, King, l. c. 401. — Penins. Mal.
membranacea, King, l. c. 402. — Penins. Mal.
ovalifolia, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 18. — Am. austr.
pachycarpa, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 407. — Penins. Mal.
parvifolia, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 142. — Mexic.
petiolaris, Radlk. in Sitz. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 185 in obs. — Afr. trop. occ.
Scortechinii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 405. — Penins. Mal.
Stuhlmannii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 276. — Afr. trop. or.
usambarensis, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36 nomen. — Afr. trop. or.
Woermanniana, Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 90. — Gabon.
Wrayi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 403. — Penins. Mal.

- ALSODEIIDIDIUM**, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 248. **OLACINEAE**.
Schumanii, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

- ALSODEIOPSIS**, Oliver (Olac.). — Ind. Kew. i. 93.
Holstii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 45; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 248. — Afr. trop. or.
Poggei, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 71. — Congo.
Schumannii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) nomen. — Afr. trop. or.
Weissenborniana, f. Braun et K. Schum. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 165. — Afr. trop. occ.

- ALSMITRA**, M. Roem. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 93.
Muelleri, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. 3. xiv. (1887) 363. — N. Guin.
suberosa, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. ii. (1888) 28. — Austral.

- ALSTONIA**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 93.
actinophylla, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 138 = *verticilliosa*, F. Muell.
congensis, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 64. — Congo.

- ALSTROEMERIA**, Linn. (Amaryllid.). — Ind. Kew. i. 93.
apertiflora, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 135. — Parag.
Bakeri, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 335. — Argent.
Philippii, Baker, Handb. Amaryll. 140. — Chili.
piauhensis, Gardn. ex Baker, l. c. 136. — Bras.
Schenkiana, Baker, l. c. 134. — Bras.
Volckmanni, Baker, l. c. 139. — Chili.

- ALTENSTEINIA**, H. B. et K. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 94.
boliviensis, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 265. — Bolivia.
Hieronymi, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1895) 245. — Argent.
leucantha, Reichb. f. in Flora, lxi. (1886) 548. — Hab. ?

- ALTERNANTHERA**, Forsk. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 95.
boliviana, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 249. — Bolivia.
brasiliensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 537 = *Mogiphanes brasiliensis*, Mart.
chacoensis, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sc. vii. (1893) 208. — Parag.
costaricensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 538. — Costarica.
Kerberi, Uline et Bray, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 450. — Mexic.
Lehmannii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 8. — Columb.
mexicana, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. (1895) Beibl. n. 49 (1895) 8 in obs. (= *Telanthera mexicana*, Moq.) — Mexic.
multicaulis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 538 = *Mogiphanes straminea*, Mart.
porrigens, Kuntze, l. c. = *Telanthera porrigens*, Moq.
portoricensis, Kuntze, l. c. 340. — Portorico.
pubiflora, Kuntze, l. c. 538 = *Telanthera pubiflora*, Moq.
repens, Kuntze, l. c. 536 et 540 = *Alt. Achyrantha*, R. Br.
rigida, Robins. et Greenman, in Am. Journ. Sc. Ser. III. i. (1895) 143. — Ins. Galapag.
scirpoides, Hook. f. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 542. — Ins. Galapag.
stellata, Uline et Bray, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 451. — Mexic.

- ALTHAEA**, (Tourn.) Linn. (Malv.). — Ind. Kew. i. 95.
acerifolia, arborea, biennis, cretica, flava, insularis, maritima, micans, microphylla, oblongifolia, occidentalis, Olbia, phoenicea, plebeia, punctata, stenopetala, thuringiaca, triloba, trimestris, unguiculata, venosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 66 = *homonyma omnia* Lavatera.
arbelensis, Baker f. in Journ. Bot. xxviii. (1890) 209. — Mesopot.
assurgentifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 66 = *Lavatera assurgentiflora*, Kellogg.
denudata, Baker f. l. c. 208. — Armenia.
dissecta, Baker f. l. c. 143. — Syria.
Hausknechtii, Baker f. l. c. 144. — Syria.
hashmiriana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 66 = *Lavatera cachemiriana*, Camb.
kragujevacensis, Panic, ex Kew Bull. (1890) App. i. 3 nomen. — Eur. austro-or.
lasicalycina, Baker f. in Journ. Bot. xxviii. (1890) 144. — Armenia.
Loftusii, Baker f. l. c. 145. — Persia.
mauritanica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 66 = *Lavatera mauritanica*, Duchartre.
micrantha, Wiesb. ex Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 360 in obs. — Eur.
microchiton, Baker f. in Journ. Bot. xxviii. (1890) 144. — As. Min.
peduncularis, Baker f. l. c. 209. — Persia.
pontica, Baker f. l. c. 144. — Eur. or.
Sintenisii, Hausskn. ex Baker f. l. c. xxxii. (1894) 35. — Armenia.
Tholozani, Baker f. l. c. xxviii. (1890) 209. — Persia.

- ALTHENIA**, Petit (Naiad.). — Ind. Kew. i. 96.
australis, Aschers. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 1. (1887) 214 (= *Lepilaena australis*, f. Drumm.). — Austral.
cylindrocarpa, Aschers. l. c. 213 (= *Lepilaena cylindrocarpa*, Benth.). — Austral.

- ALTHOFFIA**, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 209. **TILIACEAE**.
tetrapyxis, K. Schum. l. c. — N. Guin.

- ALVEOLINA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 359 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
Melinoni, Van Tiegh. l. c. 360. — Guian. gall.

- ALVORDIA**, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. ii. (1889) 174. **COMPOSITAE**.
glomerata, T. T. Brandeg. l. c. — Calif.

- ALYSSUM**, Tourn. ex Linn. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 96.
alpinum, argyreum, auriculatum, Berlandieri, densiflorum, digitatum, Engelmannii, Fendleri, gnaphalodes, Gordonii, gracile, graecum, grandiflorum, lasiocarpum, Lindheimeri, mendocinum, Nuttallii, perpureum, recurvatum, repandum, Shortii, vestitum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = *homonyma omnia* Vesicariae.
americanum, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 224. — Alaska.
Amoris, Coincy, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 168; et Eclog. alt. pl. Hisp. (1895) 7. t. 2. — Hisp.
Bernhardii, Wettst. in Luer. Bibl. Bot. Heft xxv. (1892) 25. — Carinth., Carn.
Bornmuelleri, Hausskn. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 211 et 393 nomen. — As. Min.
Brasi, Loret, ex Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 192 = *edentulum*, Walldst. et Kit.
chlorocarpum, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. iv. (1893) 113. — Graecia.
Clastopus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = *Clastopus purpureus*, Bunge.
clypeatum, Durieu, ex Coss. Comp. fl. Atlant. ii. (1886) 236 in syn. = *scutigerum*, Durieu.
collicolum, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 180 = *montanum*, Linn.
denticulatum, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxxii. 1893. (1894) 177. — Maced.
desertorum, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, (1886) 33. — Persia.
Djurdjurae, Chod. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 19. — Algeria.
fallacinum ×, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. et iv. (1893) 114. — Graecia.
Gayanum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = *Vesicaria montana*, A. Gray.
Gerardi, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 177 = *alpestre*, Linn.
globosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = *Vesicaria Ludoviciana*, DC.
Heldreichii, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. iv. (1893) 113. — Graecia.
Jordani, Fouc. et Rouy, Fl. de Fr. ii. (1895) 176 = *alpestre*, Linn.
Moellendorffianum, Aschers. (in Blau, Reis. in Bosnien (1877) p. v. et 22) ex G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 73 et 174. — Bosnia.
Pichleri, Velen. Fl. Bulg. (1891) 38. — Bulg.
ptilotrichum, Durieu, ex Coss. Comp. fl. Atlant. ii. (1887) 236 in syn. = *granatense*, Boiss. et Reut.
ponticum, Velen. in Sitz. böhm. Ges. Wiss. (1892-93) 10. — Bulg.
pulvinare, Velen. in Sitz. böhm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 30; et Fl. Bulg. (1891) 39. — Bulg.
Reisseri, Velen. l. c. (1892-93) 12. — Bulg.
Ruprechtii, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 51 = *andinum*, Rupr.
saxigenum, Timb. in Lucante, Rev. de Bot. x. (1892) 54. — Gall.
scardicum, Wettst. in Luer. Bibl. Bot. Heft 26. (1892) 24 tab. 1. fig. 20, 21 et 25. — Alban.
Schauerianum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 16 = *Vesicaria argentea*, Schau.
singarense, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 49. — As. occ.
spathulaefolium, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxxii. 1893 (1894) 76. — Maced.

ALYSSUM :—

stenophyllum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = *Vesicaria Fendleri*, A. Gray.
Stribrnyi, Velen. Fl. Bulg. (1891) 640. — Bulg.
thracicum, Velen. l. c. (1891) 40. — Bulg.
Troodi, Boiss. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 49. —
Cypr.
vindobonense, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892)
469. — Austria.

ALYXIA, Banks (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 99.
acuminata, K. Schum. in K. Schum. et Hollr. Fl.
Kais. Wilh. Land, (1894) 110. — N. Guin.
composita, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 404. —
N. Guin.
lucida, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 503.
— Madag.
monilifera, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 182. —
Ins. Philipp.
polysperma, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix.
(1891) 33. — Madag.
semipallescens, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict.
i. 2 (1889) 18. — N. Guin.

AMAJOUA, Auct. = **Amaioua**, Aubl. (Rubiace.). —
Ind. Kew. i. 99.
fusiflora, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.
vi. (1889) 363 = *Duroia fusifera*, Hook. f.
genipoides, Spruce, ex K. Schum. l. c. 364 = *Duroia*
genipoides, Hook. f.
petiolaris, Spruce, ex K. Schum. l. c. 364 = *Duroia*
petiolaris, Hook. f.
pilosa, K. Schum. l. c. 360. — Bras.

AMANOA, Aubl. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 99.
laurifolia, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1893) 522. — Afr.
trop. occ.
Stenonia, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t.
211. — Madag.

AMARANTHUS, Linn. (Amarant.). — Ind. Kew.
i. 100.
acutifolius, Uline et Bray, in Coult. Bot. Gaz. xix.
(1894) 320 = *viridis*, Linn.
albo-marginatus, Uline et Bray, l. c. 318. — Calif.
Berlandieri, Uline et Bray, l. c. 268 = *polygonoi-*
des, Linn.
Bigelovii, Uline et Bray, l. c. 271. — Mexic.
bracteosus, Uline et Bray, l. c. 314. — N. Mexic.
carneus, Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 105. —
Calif.
chihuahensis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.
(1886) 436. — Mexic.
crispus, Terrac. in Atti Acad. Sc. Napol. Ser. 2. iv.
(1890) App. 2. — Italia mer.
leucospermus, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 446 = *leu-*
cocarpus, S. Wats.
Margaritae, Dam. in Wien. Illustr. Garten-Zeit.
(1887) 433-35 fig. 71. — Form. hort.
Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887)
476. — Mexic.
velutina, Spruce, ex K. Schum. l. c. 366 = *Duroia*
velutina, Hook. f.

AMARYLLIS, Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew.
i. 101.
carnosa, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.
vi. (1892) 280 = *Crinum asiaticum*, Linn.
coenosa, Herb. Ham. ex Hook. f. l. c. 281 = *Crinum*
defixum, Ker.
Leeana, Williams, Catal. (1889) 22. — Form. hort.
Tettani, Hort. ex Gartenfl. (1888) 626. — Form.
hort.

AMASONIA, Linn. f. (Verben.). — Ind. Kew. i.
103.
calycina, Hook. f. in Bot. Mag. (1887) t. 6915. —
Guian. angl.
punica, Hort. ex Hook. f. l. c. sub t. 6915 = *caly-*
cina, Hook. f.

AMBAIBA, Barrère, Ess. hist. nat. Fr. équiu. (1741)
10, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 623 = **Cecro-**
pia, Linn. (Urtic.).
acutifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 624 = *C. acu-*
tifolia, Tréc.
Adenopus, Kuntze, l. c. = *C. adenopus*, Mart.

AMBAIBA :—

albicans, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 624 = *C. albi-*
cans, Tréc.
bicolor, Kuntze, l. c. = *C. bicolor*, Klotzsch
carbonaria, Kuntze, l. c. = *C. carbonaria*, Mart.
cinerea, Kuntze, l. c. = *C. cinerea*, Miq.
commutata, Kuntze, l. c. = *C. commutata*, Schott.
concolor, Kuntze, l. c. = *C. concolor*, Willd.
costaricensis, Kuntze, 623. — Costarica.
cyrtostachya, Kuntze, l. c. 624 = *C. cyrtostachya*,
Miq.
dentata, Kuntze, l. c. = *C. dentata*, Klotzsch.
digitata, Kuntze, l. c. = *C. angustifolia*, Tréc.
Goudotiana, Kuntze, l. c. = *C. Goudotiana*, Tréc.
Hemsleyana, Kuntze, l. c. = *C. mexicana*, Hemsl.
hololeuca, Kuntze, l. c. = *C. hololeuca*, Miq.
Humboldtiana, Kuntze, l. c. = *C. Humboldtiana*,
Klotzsch.
Klotzschiana, Kuntze, l. c. = *C. Klotzschiana*,
Miq.
latiloba, Kuntze, l. c. = *C. latiloba*, Miq.
leucocoma, Kuntze, l. c. = *C. leucocoma*, Miq.
leucophaea, Kuntze, l. c. = *C. leucophaea*, Poepp.
lyratiflora, Kuntze, l. c. = *C. lyratiloba*, Miq.
membranacea, Kuntze, l. c. = *C. membranacea*, Tréc.
mexicana, Kuntze, l. c. = *C. mexicana*, Hemsl.
nivea, Kuntze, l. c. = *C. nivea*, Poepp.
obtusata, Kuntze, l. c. = *C. obtusata*, Tréc.
obtusifolia, Kuntze, l. c. = *C. obtusifolia*, Bertol.
pachystachya, Kuntze, l. c. = *C. pachystachya*, Tréc.
palmata, Kuntze, l. c. = *C. palmata*, Willd.
panamensis, Kuntze, l. c. = *C. panamensis*, Hemsl.
peltata, Kuntze, l. c. 623. = *C. peltata*, Linn.
pinnatiloba, Kuntze, l. c. 624 = *C. pinnatiloba*,
Klotzsch.
propinqua, Kuntze, l. c. = *C. propinqua*, Miq.
Ruiziana, Kuntze, l. c. = *C. Ruiziana*, Klotzsch.
Schiedeana, Kuntze, l. c. = *C. Schiedeana*, Klotzsch.
Schreberiana, Kuntze, l. c. = *C. Schreberiana*, Miq.
sciadophylla, Kuntze, l. c. = *C. sciadophylla*, Mart.
strigosa, Kuntze, l. c. = *C. strigosa*, Tréc.
surinamensis, Kuntze, l. c. = *C. surinamensis*, Miq.
Tenoreana, Kuntze, l. c. = *C. digitata*, Ten.
tubulosa, Kuntze, l. c. = *C. tubulosa*, Ruiz.

AMBERBOA, Less. = **Volutarella**, Cass. (Com-
posit.).
Omphalodes, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895)
294 = *V. Omphalodes*, Benth. et Hook. f.

AMBERBOIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 305 =
AMBERBOI, Adans. = **Volutarella**, Cass.
(Composit.).
divaricata, Kuntze, l. c. = *V. divaricata*, Benth. et
Hook. f.
Omphalodes, Kuntze, l. c. = *V. Omphalodes*, Benth.
et Hook. f.

AMBLYOPAPPUS, Hook. et Arn. (Composit.). —
Ind. Kew. i. 104.
pauciflorus, Phil. in Anal. Univ. Chil., xc. (1895)
29. — Chili.

AMBRINA, Spach = **Chenopodium**, Linn. (Che-
nopod.).
andicola, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 422.
— Chili.
incisa, Phil. l. c. 422. — Chili.
parvula, Phil. l. c. 421. — Chili.

AMBROSIA, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i.
105.
bipinnatifida, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay,
(1894) 187 = *Franseria bipinnatifida*, Nutt.
Chamissonis, Greene, l. c. 188 = *Franseria Cha-*
missonis, Less.
tarapacana, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1891) 50.
— Bolivia.

AMBROSINIA, Linn. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 105.
proboscidea, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.
v. 1894. (1895) 482 = *A. Bassii*, Linn.

AMBULIA, Lam. = **Limnophila**, R. Br. (Scro-
phular.).
fragrans, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 140
(= *Ruellia fragrans*, Forst.) = *L. serrata*,
Gaudich.

AMBULIA :—

hottonioides, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl.
Pflanzenfam. iv. 3 b. (1891) 73 fig. 33. — Ind. or.

AMBURANA, Schwacke et Taub. in Engl. et
Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 387.
(Legumin.).
Claudii, Schwacke et Taub. l. c. — Bras.

AMELANCHIER, Medic. (Rosac.). — Ind. Kew.
i. 105.
glabra, Greene, Fl. Francisc. (1891) 52 = *alnifolia*,
Nutt.
pallida, Greene, l. c. = *alnifolia*, Nutt.
Pringlei, Koehne, in Wissensch. Progr. Falk.
Realgymnas. Berlin (1890) 25 = *alnifolia*, Nutt.?
utahensis, Koehne, l. c. = *alnifolia*, Nutt.?

AMELLUS, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i.
105.
epaleaceus, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb.
Boiss. i. (1893) 74. — Afr. austr.

AMELLUS, P. Br. = **Melanthera**, Rohr (Com-
posit.).
abyssinicus, lanceolatus, madagascariensis, oxylepis, pun-
gens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 306 = *homonyma*
omnia Melantherae.
angustifolius, Kuntze, l. c. = *Echinocephalum*
angustifolium, Gardn.
asper, Kuntze, l. c. 305 = *M. deltoidea*, Michx.
discoideus, Kuntze, l. c. 306 = *Echinocephalum*
discoideum, Baker.
Echinocephalum, Kuntze, l. c. = *Echinocephalum*
lanceolatum, Gardn.
latifolius, Kuntze, l. c. = *Echinocephalum latifo-*
lium, Gardn.
microphyllum, Kuntze, l. c. = *M. lanceolata*, Benth.
niveus, Kuntze, l. c. = *M. hastata*, Michx.
scandens, Kuntze, l. c. = *M. Brownei*, Sch. Bip.

AMERIMNON, P. Br. = **Dalbergia**, Linn. f.
(Legumin.).
acutum, Afzelii, arbutifolium, armatum, assamicum,
Bakeri, bracteolatum, brasiliense, calycinum, campe-
chianum, Championii, confertiflorum, congestum,
cujabense, cultratum, densiflorum, densum, discolor,
emirnense, foliaceum, glandulosum, glaucescens, glome-
riflorum, gracile, Hancei, hircinum, hostile, inunda-
tum, javanicum, Junghuhnii, lanceolatum, lateriflor-
um, latifolium, luzoniense, macrospermum, malifo-
lium, melanoxylon, Milletii, multijugum, nigrum,
nitidulum, obovatum, ovatum, paniculatum, pubescens,
purpureum, reniforme, rimosum, riparium, rotundifo-
lium, rubiginosum, saxatile, Sissoo, spinosum, Spru-
ceanum, Stockii, sympatheticum, Thomsonii, villo-
sum, volubile, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 159 =
homonyma omnia Dalbergiae.
Benthianum, Kuntze, l. c. 159 = *D. polyphylla*,
Benth.
Cumingii, Kuntze, l. c. = *D. Cumingiana*, Benth.
ferrugineum, Kuntze, l. c. = *D. stipulacea*, Roxb.
frutescens, Kuntze, l. c. = *D. variabilis*, Vog.
Gardnerianum, Kuntze, l. c. = *D. congesta*,
R. Grah.
parviflorum, Kuntze, l. c. = *D. Junghuhnii*, Benth.
pinnatum, Kuntze, l. c. 159, 203 = *D. tamarindifo-*
lia, Roxb.
polyphyllum, Kuntze, l. c. 159 = *D. foliosa*, Benth.
Pseudosissoo, Kuntze, l. c. = *D. Championii*,
Thw.
sissoodes, Kuntze, l. c. = *D. latifolia*, Roxb.
stipulatum, Kuntze, l. c. = *D. velutina*, Benth.
tortum, Kuntze, l. c. = *D. monosperma*, Dalz.
violaceum, Kuntze, l. c. = *D. Miscolobium*, Benth.

AMICIA, H. B. et K. (Legumin.). — Ind. Kew. i.
106.
Lobbiana, Benth. ex Rusby, in Mem. Torrey Bot.
Club, iii. 3. (1893) 20. — Bolivia.

AMMANIA, Linn. (Lythrar.). — Ind. Kew. i. 106.
Koehnei, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii.
(1891) 271. — Am. bor. or.
mexicana, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas, (1895) t.
363. — Madag.

AMMIOPSIS, Boiss. (Umbellifer.). — Ind. Kew. i. 107.
Aristidis, Coss, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1889) 377. — Algeria.

AMMOCHARIS, Herb. (Amaryllid.). — Ind. Kew. i. 107.
coccinea, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 3. — Afr. austr.
Taveliana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 214. — Afr. austro-occ. extratrop.

AMMODENDRON, Fisch. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 107.
argenteum, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 180 (= *Robinia argentea*, Siev.) = *Ammod. Sieversii*, DC.

AMMOSELINUM, Torr. et Gray (Umbellifer.). — Ind. Kew. i. 107.
Butleri, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. vii. (1887) 294; et *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1891) 144 (= *Apium Butleri*, Engelm.). — Am. bor.

AMMOSPERMA, Hook. f. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 108.
teretifolium, Prantl, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 2. (1891) 170. — As. occ.

AMMOTHAMNUS, Bunge (Legumin.). — Ind. Kew. i. 108.
intermedius, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 181. — Turkest.

AMOMIS, Berg. = **Pimenta**, Lindl. (Myrtac.).
caryophyllata, Krug et Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 573 (= *Myrtus caryophyllata*, Jacq.) = *P. acris*, Kostel.

AMOMUM, Linn. (Scitamin.). — Ind. Kew. i. 108.
alboviolaceum, Ridl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 130. — Angola.
araneosum, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 234. — Tenass.
ciliatum, Baker, l. c. 238. — Zeyl.
crassilabium, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 48; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 149. — Afr. trop. or.
clatteroides, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 240. — Malacca.
erythrocarpum, Ridl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 130. — Angola.
glaucophyllum, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 415. — Afr. trop. occ.
gomphocheilos, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 236. — Perak.
humile, Rich. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1890) 46 = *Renealmia humilis*, Petersen.
Kayserianum, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 415. — Afr. trop. occ.
Kingii, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 241. — Reg. Himal.
Koenigii, Baker, l. c. 237. — Tenass.
labellosum, K. Schum. in K. Schum. et Holly. Fl. Kais. Wilh. Land, (1889) 27. — N. Guin.
laterale, Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii. (1893) 381. — Penins. Mal.
leptolepis, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 414. — Afr. trop. occ.
luteo-album, K. Schum. l. c. 413. — Afr. centr. bor.
macrocheilos, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 232. — Malacca.
macrodon, Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii. (1886) 309. — Penins. Mal.
macrolepis, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 416. — Afr. trop. occ.
macrostephanum, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 243. — Perak.
Maingayi, Baker, l. c. 235. — Malacca.
Mala, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 53; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 149. — Afr. trop. or.
megalocheilos, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 236. — Malacca.
metriocheilos, Baker, l. c. 234. — Malacca, Penang.
microstephanum, Baker, l. c. 239. — Concan.
Ophiuchus, Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii. (1893) 381. — Penins. Mal.

AMOMUM : —
pauciflorum, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 238. — Reg. Himal.
polyanthum, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 411. — Afr. centr. bor.
Ridleyi, Baker, in Kew. Bull. (1892) 128. — Singap.
rubro-luteum, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 236. — Malacca.
sanguineum, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 412. — Afr. centr. bor.
sphaerocephalum, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 234. — Penang.
stenoglossum, Baker, l. c. 234. — Perak.
trichanthera, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 276. — Oceania.
triorgyale, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 237. — Perak.
vittatum, Hance, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 53. — China.
xanthophlebium, Baker, in Hook. f. F. Brit. Ind. vi. (1892) 241. — Malacca.

AMOORA, Roxb. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 108.
gigantea, Pierre, in Laness. Pl. util. Col. franç. (1886) 311. — Cochinchina.
megalophylla, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 577. — Tonk.
myrmecophila, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 194. — Oceania.
Naumannii, C. DC. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 461. — N. Guin.
Ridleyi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 56. — Perak.
salomonensis, C. DC. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 461. — Ins. Salomon.
Wallichii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 56. — Ins. Andaman.

AMORPHA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 109.
hispidula, Greene, Fl. Francisc. (1891) 14; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 88. — Calif.
subglabra, Heller, Bot. expl. S. Texas (1895) 48 = *texana*, Buchl.
virgata, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 17 t. 171. — Georgia.

AMORPHOPHALLUS, Blume (Aroid.). — Ind. Kew. i. 109.
burmanicus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 517. — Burma.
chlorospathum, Kurz, ex Hook. f. l. c. 516. — Pegu.
Doryphorus, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 305. — Afr. trop. occ.
Eichleri, Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 7091. — Congo.
elatus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 517. — Penins. Mal.
Elliotii, Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7349. — Sierra-Leone.
glabra, F. M. Bailey, in Queensl. Dep. Agric. Bot. Bull. vii. (1893) 68; et in Gard. Chron. (1895) i. 484. — Austral.
haematospadix, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 517. — Penang.
oculatum, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 515 = *bulbifer*, Blume.
oncophyllum, Prain, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1896) 516; in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 80; et *Bot. Mag.* (1893) t. 7327. — Ins. Andam.
Prainii, Hook. f. l. c. 516. — Perak, Penang.
purpurascens, Kurz, ex Hook. f. l. c. 515. — Ind. or.
Rex, Prain, ex Hook. f. l. c. 514 = *campanulatus*, Blume.
sparsiflorus, Hook. f. l. c. 516. — Perak.
taccoides, Herb. Ham. ex Hook. f. l. c. 515 = *bulbifer*, Blume.

AMPACUS, Rumph. Herb. Amb. ii. 168 (1747) ex Kuntze, Rev. Gen. i. (1891) 98 = **Evodia**, Forst. (Rutac.).
accedens, *alata*, *alba*, *celastracea*, *crassinervis*, *cuspidata*, *densiflora*, *discolor*, *drupacea*, *elaeodendroides*, *floribunda*, *glabra*, *hortensis*, *latifolia*, *litoralis*, *madagascariensis*, *melaeifolia*, *micrococca*, *obtusifolia*, *pedunculosa*, *polybotrys*, *robusta*, *Roxburghiana*, *ruticarpa*, *tetragona*, *triphylla*, *viticina*, *xanthoxylodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) p. 98. = *homonyma omnia* *Evodiae*.

AMPACUS : —
angustifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 98 = *E. triphylla*, DC.
aromatica, Kuntze, l. c. = *E. glabra*, Blume.
Daniellii, Kuntze, l. c. = *Zanthoxylum Daniellii*, Benth.
grisea, Kuntze, l. c. = *Boninia grisea*, Planch. fide, Kuntze, l. c. (Quid? An sp. ined.?).
incerta, Kuntze, l. c. = *Acronychia Minahassae*, Miq.
macrophylla, Kuntze, l. c. = *E. accedens*, Blume.
trichotoma, Kuntze, l. c. = *E. fraxinifolia*, Hook. f.

AMPALIS, Boj. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 110.
Greveana, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 293 A. — Madag.

AMPELANUS, Rafin. = **Ensenia**, Nutt. (Asclepiad.).
albidus, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 314 = *E. albida*, Nutt.
ligulata, Heller, Bot. Expl. S. Texas (1895) 79 = *E. ligulata*, Benth.

AMPELOCISSUS, Planch. = **Vitis**, Linn. (Ampelid.).
acapulcensis, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 403. — Mexic.
arachmoidea, Planch. l. c. 375 = *V. indica*, Linn.
Arnottiana, Planch. l. c. 370 (= *V. indica*, W. et Arn.). — Ind. or.
artemisiaefolia, Planch. l. c. 377. — China.
barbata, Planch. l. c. 372 = *V. barbata*, Wall.
botryostachys, Planch. l. c. 413. — Ins. Philipp.
cardiospermoides, Planch. l. c. 459. — China.
cinnamomea, Planch. l. c. 408 = *V. cinnamomea*, Wall.
compositifolia, Planch. l. c. 412 = *V. compositifolia*, M. A. Laws.
cussoniaefolia, Planch. l. c. 395. — Afr. centr. bor.-or.
Erdwendbergii, Planch. l. c. 404. — Mexic.
filipes, Planch. l. c. 407. — As. trop.
gracilis, Planch. l. c. = *V. gracilis*, Wall.
Grantii, Planch. l. c. 394 = *V. Grantii*, Baker.
Helferi, Planch. l. c. 411 = *V. Helferi*, M. A. Laws.
imperialis, Planch. l. c. 408 = *V. imperialis*, Miq.
Kirkiana, Planch. l. c. 403. — Afr. austro-or.
Korthalsii, Planch. l. c. 410. — Ind. bat.
Lowii, Planch. l. c. 412 = *V. Lowii*, Hook. f.
Martini, Planch. l. c. 373. — As. trop. or.
Motleyi, Planch. l. c. 412 = *V. Motleyi*, Hook. f.
Muelleriana, Planch. l. c. 414. — N. Guin.
multistriata, Planch. l. c. 398 = *V. multistriata*, Baker.
nervosa, Planch. l. c. 372 = *V. nervosa*, M. A. Laws.
nitida, Planch. l. c. 411 = *V. nitida*, M. A. Laws.
orientalis, Planch. l. c. 462 = *V. orientalis*, Boiss.
polystachya, Planch. l. c. 411 = *V. polystachya*, Blume.
pulchra, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 257. — Afr. trop. or.
racemifera, Planch. l. c. 413 = *V. racemifera*, Jack.
Robinsonii, Planch. l. c. 415 = *V. rugosa*, Mac Fadyen.
spicigera, Planch. l. c. 406 = *V. macrostachya*, Miq.
thyrsiflora, Planch. l. c. 409 = *V. thyrsiflora*, Miq.
wrenaeifolia, Planch. l. c. 385. — Angola.
Volkensii, Gilg, in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 257. — Afr. trop. or.

AMPELODESMA, P. Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 110.
mauritanica, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1894 (1895) 874 (= *A. tenax*, Link.). — Reg. Medit. occ.
Thouarii, Th. Dur. et Schinz, l. c. 875 (= *A. madagascariensis*, Kunth). — Madag.

AMPELOPSIS, Rich. = **Vitis**, Linn. (Ampelid.).
aeiophylla, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 454 = *V. aeiophylla*, Boiss.
arbores, Kochne, Deutsche Dendrol. (1893) 400 (= *V. arborea*, Linn.).
arbores, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 221 = *prae*.

AMPELOPSIS : —

- brevipedunculata*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 400 (= *Cissus brevipedunculata*, Maxim.). — Japon. *cantonensis*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 460 = V. *cantonensis*, Seem. *cardiospermoides*, Planch. ex Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 460 ; et Pl. Delav. (1889) 140. — Yunnan. *citrullifolia*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 565 = V. *heterophylla*, Thunb. *citrullifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 565 = V. *heterophylla*, Thunb. *Delavayana*, Planch. ex Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 460; et in DC. Monog. Phan. v. (1887) 458. — Yunnan. *denudata*, Planch. l. c. 619. — Mexic. *dissecta*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 400 = V. *serjaniaefolia*, Maxim. *gilgilensis*, Koehne, l. c. 399. — Reg. Himal. *himalayana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. 574 = V. *hederacea*, Ehrh. *leoides*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 462 = V. *leoides*, Maxim. *Loureioides*, Hort. Mazel, ex Planch. l. c. 461 in syn. = V. *cantonensis*, Seem. *macrophylla*, Blume, ex Planch. l. c. 410 in obs. = V. *thyrsiflora*, Mig. *macrophylla*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 574 = V. *hederacea*, Ehrh. *orientalis*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 462 = V. *orientalis*, Boiss. *Regeliana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 565 = V. *heterophylla*, Thunb. *Roylei*, Hort. ex Dippel, l. c. 570 et 574 = V. *hederacea*, Ehrh. *rubifolia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 463 = V. *rubifolia*, Wall. *rubricaulis*, Carrière, ex Planch. l. c. 459 = V. *serjaniaefolia*, Maxim. *tomentosa*, Planch. ex Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 459; et in DC. Monog. Phan. v. (1887) 457. — Yunnan. *virginiana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) p. 574 = V. *hederacea*, Ehrh. *vittifolia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 454 = V. *persica*, Boiss.

AMPELOVITIS, Carr. in Rev. Hort. (1889) 204 cum icon. = **Vitis**, Linn. (Ampelid.). *Davidi*, Carr. l. c. — China. *intermedia*, Carr. l. c. (1891) 334. — China. *Romaneti*, Carr. l. c. (1892) 94. — China.

AMPHIBLEMMA, Naud. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 110. *acaulis*, Cogn. in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 89. — Angola. *ciliatum*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 528. — Congo gall. *lateriflorum*, Cogn. l. c. 529. — Congo gall. *Soyauxii*, Cogn. l. c. 1184. — Gabon.

AMPHICARPAEA, Ell. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 110 (Amphicarpa). *angustifolia*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 359 (= *Cologania angustifolia*, Kunth). — Mexic. *pulchella*, Taub. l. c. (= *Cologania pulchella*, H. B. et K.). — Mexic.

AMPHICARPON, Raf. = **Amphicarpum**, Kunth (Gramin.). *Amphicarpum*, Nash, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 352 = Purshii, Kunth.

AMPHIDOXIA, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 111. *Engleriana*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 274. — Afr. austr. *villosa*, O. Hoffm. l. c. xx. (1894) 232. — Afr. trop. or.

AMPHILOPHIUM, Kunth (Bignon.). — Ind. Kew. i. 111. *Glaziovii*, Bureau, ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 222. — Bras. *Jelskii*, Zahlb. in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, vii. (1892) 9. — Peruvia.

AMPHIPOGON, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 111. *pentacraspedon*, Hack. ex Wawra, Itin. Princ. S. Coburgi, ii. (1888) 102 (= *Pentacraspedon amphipogonoides*, Steud.). — Austral.

AMPHORCHIS, Thou. = **Cynorchis**, Thou. (Orchid.). *discolor*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 322. — Ins. Borbon. *reticulata*, Frappier, l. c. 231. — Ins. Borbon. *squamosa*, Frappier, l. c. 231 = C. *squamosa*, Lindl. *variegata*, Frappier, l. c. 234. — Ins. Borbon.

AMPHORICARPUS, Visiani (Composit.). — Ind. Kew. i. 112. *elegans*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 217. — Reg. Cauc.

AMPHOROCALYX, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 476. MELASTOMACEAE. *multiflorus*, Baker, l. c. — Madag.

AMSINCKIA, Lehm. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 112. *barbata*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 192. — Am. bor. occ. *campestris*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 262. — Calif. *collina*, Greene, l. c. — Calif. *grandiflora*, Kleeb, ex Greene, l. c. — Calif. *microcarpa*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 191. — Am. bor. occ.

AMSONIA, Walt. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 112. *Amsonia*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 262 = *Amsonia Tabernaemontana*, Walp.

AMYEMA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 506 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.). *aurantiaca*, Van Tiegh. l. c. 507 = L. *aurantiacus*, Cunn. *bifurcata*, Van Tiegh. l. c. = L. *bifurcatus*, Benth. *cana*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84. — Austral. *congener*, Van Tiegh. l. c. = L. *pendulus*, Sieb. *Gaudichaudii*, Van Tiegh. l. c. = L. *Gaudichaudii*, DC. *gibberulosa*, Van Tiegh. l. c. = L. *gibberulosus*, Tate. *Lechenaultii*, Van Tiegh. l. c. — Austral. *linophylla*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = L. *linophyllus*, Fenzl. *longifolia*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84 = L. *pendulus*, Sieb. *maytenifolia*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = L. *maytenifolius*, A. Gray. *Melaleuca*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84 = L. *pendulus*, Sieb. *Miquelii*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = L. *Miquelii*, Lehm. *nulans*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84 = L. *Quandang*, Lindl. *pendula*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = L. *pendulus*, Sieb. *Preissii*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84 = L. *linophyllus*, Fenzl. *pruinosa*, Van Tiegh. l. c. — Austral. *Quandang*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = L. *Quandang*, Lindl. *scoparia*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84 = L. *linophyllus*, Fenzl. *triantha*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = L. *trianthus*, Korth. *tristis*, Van Tiegh. l. c. = L. *tristis*, Zoll.

AMYGDALUS, Burm. Thes. Zeylan. (1737) 19 = **Heritiera**, Dryand. (Stercul.). *angustata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 75 = H. *angustata*, Pierre. *litoralis*, Kuntze, l. c. = H. *litoralis*, Dryand. *macrophylla*, Kuntze, l. c. = H. *macrophylla*, Wall. *minor*, Kuntze, l. c. = H. *Fomes*, Buch.-Ham. *Papilio*, Kuntze, l. c. = H. *Papilio*, Bedd.

AMYGDALUS, (Tourn.) Linn. = **Prunus**, Linn. (Rosac.). *Andersonii*, Greene, Fl. Francisc. (1894) 49 = P. *Andersonii*, A. Gray.

AMYGDALUS : —

Davidiana, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 606 = P. *Persica*, Stokes. *fasciculata*, Greene, Fl. Francisc. (1894) 49 = *Emplectocladus fasciculatus*, Torr. *Gessleriana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 606 = P. *nana*, Linn. *hippophoides*, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 66. — Oriens.

AMYLOTHECA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 261 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.). *angustifolia*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 444. — Ins. Salom. *Cumingii*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 264. — Ins. Philipp. *dictyophleba*, Van Tiegh. l. c. 262 = L. *dictyophlebus*, F. Muell. *Hollrungii*, Van Tiegh. l. c. = L. *Hollrungii*, K. Schum. *sumbawensis*, Van Tiegh. l. c. 265. — Ins. Sumbawa. *Zollingeri*, Van Tiegh. l. c. 264. — Macassar.

AMYRIS, P. Br. (Burserac.). — Ind. Kew. i. 113. *madrensis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 144. — Mexic. *parvifolia*, A. Gray, l. c. xxiii. (1888) 226. — Texas.

ANACAMPTI-ORCHIS ×, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 113. ORCHIDEAE. *fallax* ×, G. Camus, l. c. = *Anacamptis fallax*, G. Camus. — Gall.

ANACAMPTIS, Rich. = **Orchis**, Linn. (Orchid.). *fallax* ×, G. Camus, Vade-Mecum herb. Paris. ed. 6. (1890) ex Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 113. — Gall.

ANACHYRIS, Nees = **Paspalum**, Linn. (Gramin.). *rosea*, Fourn. Gram. Mexic. 1881. (1886) 2. — Mexic.

ANACOLOSA, Blume (Oclacin.). — Ind. Kew. i. 115. *Clarkii*, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1892) t. 266. — Cochinch.

ANACYCLUS, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 115. *Freynii*, Porta et Rigo, ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 82. — Hisp., Algeria.

ANADENDRUM, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 115. *latifolium*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 540. — Perak.

ANAECTOCALYX, Triana (Melastom.). — Ind. Kew. i. 115. *latifolia*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 713. — Venez.

ANAGALLIS, (Tourn.) Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 115. *acuminata*, Welw. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 221. — Angola. *Meyeri*, K. Schum. (in H. Meyer, Ostaf. Gletscherfahrten, Anhang 332) ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 330 = *Quartiniana*, Engl. *pulchella*, Welw. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 221. — Angola. *Quartiniana*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 330. — Afr. trop. or.

ANAGOSPERMA, Wettst. in Ber. deutsch. bot. Ges. xiii. (1895) 242 = **Euphrasia**, Linn. (Scrophul.). *dispermum*, Wettst. l. c. cum xylogr. = E. *disperma*, Hook. f.

ANAMOMIS, Griseb. = **Myrtus**, Linn. (Myrtac.). *dichotoma*, Sarg. in Gard. and For. vi. (1893) 130; et N. Am. Sylva, v. 32 t. = *Eugenia dichotoma*, DC.

ANAMOTHECA *grandiflora*, Hort. Damman, ex Gartenfl. (1893) 412 sphalm. (= *Anomotheca grandiflora*, Baker ? = *Lapeyrousia grandiflora*, Baker ?)

ANANAS, Tourn. ex Linn. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 116.

bracamorensis, Hort. Lind. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 23 = *sativus*, Schult. f.

bracteatus, Baker, l. c. = *sativus* Schult. f.

Mensdorffiana, Hort. ex Baker, l. c. 64 = *Aechmea Fernandae*, Baker.

microstachys, Lindman, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. xxiv. 8. (1891) 39 t. 7. fig. 20-23 = *Acanthostachys ananassoides*, Baker.

monstrosus, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 23 = *sativus*, Schult. f.

Pancheanus, Ed. André, Bromel. Andrean. (1889) 5. — Columb.

penangensis, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 23 = *sativus*, Schult. f.

proliferus, Hort. ex Baker, l. c. = *sativus*, Schult. f.

ANAPHALIS, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 116.

Bodinieri, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 306. — China.

Hellwigii, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 28. — Oceania.

lanata, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser. I. ii. (1889) 9 = *Gnaphalium japonicum*, Thunb.

Mariae, F. Muell. l. c. 8 — N. Guin.

mucronata, C. B. Clarke, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 136. — Reg. Himal. et Tibet.

pelliculata, Trimen, Handb. Fl. Ceyl. iii. (1895) 28 et Illustr. Handb. Fl. Ceyl. (1895) t. 58. — Zeylan.

saxatilis, Boerl. Handb. Fl. Ned. Indië. ii. 1. (1891) 240 (= *Antennaria saxatilis*, DC. — Java.)

sordida, Boerl. l. c. (= *Antennaria sordida*, Sch. Bip.). — Java.

prostrata, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser. I. ii. (1889) 9 = *Helichrysum prostratum*, Hook. f.

trinerveis, F. Muell. l. c. = *Gnaphalium trinerve*, Forst. f.

ANAPHRENIUM, E. Mey. (Anacard.). — Ind. Kew. i. 117.

crassinervium, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 37. — Afr. austro-occ. extratrop.

verticillatum, Engl. l. c. xv. (1893) 113. — Angola.

ANARRHINUM, Desf. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 117.

arabicum, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 377 = *arabicum*, Jaub. et Spach.

elatum, Kuntze Rev. Gen. (1891) 465. — (Quid?) an *Linaria Elatine*, Mill.?

fruticosum, Hochst. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 377 in syn. = *arabicum*, Jaub. et Spach.

Pechuelii, Kuntze, in Jahrb. bot. Gart. Berl. iv. (1886) 269. — Afr. austro-occ. extratrop.

ANARTHROPHYLLUM, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 117.

brevistipula, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 9. — Chili.

ANASTRAPHIA, D. Don (Composit.). — Ind. Kew. i. 117.

pauciflosculosa, Wright, ex Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 102. — Ins. Baham.

ANAXAGOREA, St-Hil. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 118.

Scortechinii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 68. — Perak.

ANCHOMANES, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 118.

Boehmii, Engl. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 454. — Afr. trop. or.

ANCHUSA, Linn. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 119.

macrocalyx, Haussk. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. 3. (1887) 71; et N. Folge. viii. (1895) 45. — Graecia.

moesiaca, Velen. in Sitz. böhm. Ges. Wiss. (1892-93) 44. — Bulg.

obtusifolia, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 905 = *Nonnea obtusifolia*, DC.

ANCHUSA : —

osmanica, Velen. in Sitz. böhm. Ges. Wiss. (1885) sep. 32, fide Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. (1889) 222; et Fl. Bulg. (1891) 391. = *officinalis*, Linn.

palmyrensis, Post, Pl. Postianae, iv. (1892) 9. — Syria.

Shattuckii, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 435. — Syria.

setosa, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 905 = *Nonnea lutea*, Reich. f.

Tiberiadis, Post, Pl. Postianae, iv. (1892) 9. — Syria.

vesicaria, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 906 = *Nonnea nigricans*, DC.

ANCISTROCLADUS, Wall. (Dipterocarp.). — Ind. Kew. i. 119.

Barteri, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 73. — Afr. trop. occ.

hamatus, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1895) 276 = *Vahlia*, Arn.

pentagynus, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 385. — Oceania.

ANCISTROPHYLLUM, G. Mann et H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. i. 118.

laeve, Drude, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 111 = seq.

laeve, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 458 (= *Laccosperma laeve*, G. Mann et H. Wendl.). — Afr. trop. occ.

opacum, Drude, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 111 = seq.

opacum, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 458 (= *Laccosperma opacum*, G. Mann et H. Wendl.). — Afr. trop. occ.

ANCYLOCLADUS, Wall. = **Willughbeia**, Roxb. (Apocyn.).

Beccarianus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 412. — Borneo.

celebicus, Kuntze, l. c. = *W. celebica*, Blume.

ceylanicus, Kuntze, l. c. = *W. ceylanica*, Thwaites.

coriaceus, Kuntze, l. c. = *W. coriacea*, Wall.

edulis, Kuntze, l. c. = *W. edulis*, Roxb.

firmus, Kuntze, l. c. = *W. firma*, Blume.

flavescens, Kuntze, l. c. = *W. flavescens*, Dyer.

grandiflorus, Kuntze, l. c. = *W. grandiflora*, Dyer.

javanicus, Kuntze, l. c. = *W. javanica*, Blume.

oblongus, Kuntze, l. c. = *W. oblonga*, Dyer.

rufescens, Kuntze, l. c. = *W. rufescens*, Dyer.

tenuiflorus, Kuntze, l. c. = *W. tenuiflora*, Dyer.

umbrosus, Kuntze, l. c. = *W. umbrosa*, Blume.

ANDRACHNE, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 121.

Clarkei, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 285. — Ind. or.

nummulariaefolia, Stapf, in Deutschr. Akad. Wien, li. (1886) 314 — As. occ.

phyllanthoides, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 398 = *Roemeriana*, Muell. Arg.

reflexa, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, li. (1886) 315. — As. occ.

Reverchonii, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 396. — Texas.

somalensis, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 322. — Afr. trop. or.

polypetala, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 592. — Anam.

virescens, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, li. (1887) 314. — As. occ.

ANDREOSMA, DC. = **Dontostemon**, Andr. (Crucifer.)

cardaminefolia, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. ii. (1891) 171 (= *Notoceras cardaminefolia*, DC.) = *Andrzeiowskia Cardamine*, Reichb.

ANDROCEPHALIUM, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 196. **EUPHORBIACEAE**.

quercifolium, Warb. l. c. 97. — Oceania.

ANDROCYMBIUM, Willd. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 121.

europaeum, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 188 = *Erythrostictus europaeus*, Lange.

roseum, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 289. — Afr. austro-occ. extratrop.

ANDROGRAPHIS, Wall. (Acanthac.). — Ind. Kew. i. 121.

laxiflora, Lindau, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 323 (= *Erianthera laxiflora*, Blume). — Java.

tenera, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 382 = *tenuiflora*, T. Anders.

ANDROMACHIA, Humb. et Bonpl. = **Liabum**, Adans. (Composit.). —

Maroni, Ed. André, in Rev. Hort. (1887) 496. — Bras.

ANDROMEDA, Linn. pr. p. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 122.

candida, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 365 = *Zenobia speciosa*, D. Don.

Lobbii, Hort. ex Dippel, l. c. 359 = *Leucothoe Davisiae*, Torr.

nikoensis, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxii. (1888) 496. — Japon.

ANDROPOGON, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 123.

acutiusculus, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 575. — Austral.

africanus, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 325. — Congo gall.

Afzelianum, Rendle, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 357. — Sierra-Leone.

Alopecurus, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 381. — Ins. Mascar.

ascinodis, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 87. t. 36. — Ind. or.

atensis, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 158. fig. 4. — Am. austr. trop.

Baileyi, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (May 1891) 16 (= *Sorghum laxiflorum* Bailey). — Austral.

Balansae, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 534. — Parag.

bonangensis, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 333. — Congo gall.

Brazzae, Franch. l. c. 326. — Congo gall.

Buchneri, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 649. — Angola.

campogiensis, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 114. — Cambod.

chrysopus, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Monoc.) (1895) 250 = *Aucherii*, Boiss.

Clarkei, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 49. — Ind. or.

confertus, Trin. ex Fourn. Gram. Mexic. 1881. (1886) 55. — Mexic.

congoensis, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 325. — Congo gall.

cryptopus, Trin. ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 432 = *incanus*, Hack.

Cymbachne, Hack. l. c. 450. — Bengal.

Delavayi, Hack. l. c. 404. — China.

digitatum, St-Lager, in Carot. Étud. des fleurs, éd. 8. ii. (1889) 898 = *A. Ischaemum*, Linn.

Dybowskyi, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 334. — Congo gall.

elegans, C. Cordem. ex J. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 122. — Ins. Borbon.

exothecus, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 632. — Abyss.

floccus, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. ii. (1894) 14. — Erythrea.

formosus, Klotzsch, ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 623 = *Schimperi* Hochst.

fragilissimus, Hochst. ex Hack. l. c. 366 sphalm. = *exilis*, Hochst.

gangeticus, Hack. l. c. 539. — Ind. or.

giganteus, C. Cordem. ex J. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 122 (giganteum). — Ins. Borbon.

glomeratus, Britton, Stern. et Poggenb. Prel. Catal. (1888) 67 = *macrourus*, Michx.

Hallii, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 294 = *Hallii*, Hack.

helophilus, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 98. — Afr. trop. or.

Hookeri, Munro, ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 614. — Ind. or.

Huegelii, Hack. l. c. 492. — Ind. or.

hylophilus, K. Schum. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 38 nomen = *helophilus*, K. Schum.

impressus, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 49. — Ind. or.

ANDROPOGON :—

- incanus*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 431. — Am. austr.
khasianus, Munro, ex Hack. l. c. 603 = *A. Nardus*, Linn.
Kunthii, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 59 in obs. — Hab.?
Kuntzeanus, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 478. — Ind. or.
Lecomtei, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii (1895) 329. — Congo gall.
minimus, C. B. Clarke, ex S. Elliot, in Journ. Linn Soc. xxx. (1894) 99. — Afr. trop. occ.
Mohrii, Hack. ex Scribn. in Coult. Bot. Gas. xiii. (1888) 295; et ex Vasey, Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 11. — Am. bor.
mucronatus, N. J. Anderss. ex Hack. DC. Monog. Phan. vi. (1889) 577. — Ind. or.?
multiplex, Hack. in DC. l. c. 637. — Abyss.
Munroi, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 87 t. 37. — Reg. Himal.
nemoralis, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 113. — Tonkin.
niariensis, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 330. — Congo gall.
nilagiricus, Hochst. ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 604 = *A. Nardus*, Linn.
Nyassae, Rendle, in Journ. Bot. xxxi. (1883) 358. — Afr. trop. or.
oryzeturum, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 477. — Zeyl.
osikensis, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 332. — Congo gall.
pachyarthus, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 469. — Ind. or.
pachyneurus, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 333. — Congo gall.
pauciflorus, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 348 (= *Sorghum pauciflorum*, Chapm.). — Florida.
platissimus, Hack. l. c. 691. — Natal.
platyphyllus, Hack. l. c. 428. — Columb.
polystictus, Hochst. ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 584 = *Heteropogon acuminatus*, Trin.
pratensis, Hochst. ex Hack. l. c. 463. — Abyss.
pteropechys, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 88 t. 38. — Ind. or.
Schinzi, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx (1888) 139; et in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 458 — Afr. austro-occ. extratrop.
spectabilis, F. Muell. ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 597 = *exaltatus*, R. Br.
tenuiberbis, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 435. — Afr. trop. centr.
Thollonii, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 324. — Congo gall.
tonkinensis, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 112. — Tonkin.
trichocladius, Rupr. ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1885) 524. — Mexic.
trichospirus, Hack. l. c. 536. — Bras.
tristis, Nees, ex Hack. l. c. 439. — Ind. or.
tuberculatus, Hack. l. c. 404. — Ind. or.
umbellatus, Hack. l. c. 401. — Zeyl.
unilateralis, Hack. l. c. 533. — Florida.
vulgare, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 113 = *Sorghum vulgare*, Pers.
yunnanensis, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 440. — Yunnan.

ANDROSACE, (Tourn.) Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 128.

- acuta*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 238. — Calif.
alaschanica, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxii. (1888) 503. — Mongol.
alchemilloides, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 455. — China.
axillaris, Franch. l. c. — China.
bisulca, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 103. — China.
britannica, Backh. ex Wien. Ill. Gartenz. (1890) 34; et Kew Bull. (1891) App. ii. 35. — (Quid?).
caucasica, Somm. et Levier, in Gard. Chron. (1892) ii. 399. — Reg. Cauc.
cinerascens, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 180. — Mexic.
coccinea, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 63, nomen. — Yunnan.

ANDROSACE :—

- cuscutiformis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 454. — China.
Delavayi, Franch. l. c. 456. — Yunnan.
Dieckeana, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 22. — Am. bor. occ.
dissecta, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 454. — China.
flavescens, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxii. (1888) 506. — Tibet.
Henryi, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) 1973. — China.
Mariae, Kanitz, Pl. expéd. Szechenyi in As. centr. coll. (1891) 36. — China.
mirabilis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 452. — China.
Raddeana, Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 49. — Reg. Caucas.
squarrosula, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxii. (1888) 504. — Tibet.
sutchuenensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 454. — China.
tapete, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxii. (1888) 505. — Tibet.
uniflora, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 23. — Am. bor. occ.
Twczaninowii, Freyn. in Oest. Bot. Zeitsehr. xl. (1890) 157 = *maxima*, Linn.

ANDROSTEPHIUM, Torr. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 129.

- coeruleum*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 57 = *violaceum*, Torr.

ANDROSYCE *indica*, Wedd. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 563 = *Elatostema ficoides*, Wedd.**ANDRYALA**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 129.

- spartioides*, Pomel, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 566 = *ragusina*, Linn.

ANEILEMA, R. Br. (Commelin.). — Ind. Kew. i. 130.

- bracteatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 719 = *nudiflorum*, R. Br. var.
Clarkei, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 430. — Afr. trop. or.
humile, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 270. — Oceania.
imberbe, Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii. (1893) 389. — Penins. Mal.
imbricatum, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 270. — Oceania.
Johnstonii, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 135. — Afr. trop. or.
keyense, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 269. — Oceania.
Kuntzei, C. B. Clarke, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 719 = *bracteatum*, Kuntze.
leiocaulis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost Afr. C (1895) 136. — Afr. trop. or.
papuanum, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 269. — Oceania.
Sacleuxii, Hua, in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 121. — Afr. trop. or.
semifoliatum, C. B. Clarke, ex S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1892) 498. — Bras.
tenerum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 530. — Madag.
tetraspermum, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 136. — Afr. trop. or.

ANEMONE, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 131.

- acuta*, Vail, ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, ii. (1890) 42 = *acutiloba*, Laws.
ajanensis, Prantl, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 249 (= *Pulsatilla ajanensis*, Regel et Tiling) = *vernalis*, Linn.
albida, Mariz, in Bolet. Soc. Brot. iv. (1886) 101 t. 2. — Lusit.
albiflora, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 46 = *coronaria*, Linn.
alpicola, Rouy et Fouc. l. c. 42 = *alpina*, Linn.
amurensis, Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 292 = *nemorosa*, Linn.
chilensis, F. Kurtz, in Bol. Acad. nac. cienc. Córdoba ix. (1886) 369 (= *Barneoudia chilensis*, J. Gay). — Chili.

ANEMONE :—

- coerulescens*, Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 4. (1886-88) 585 = *apennina*, Linn.
colossea, G. Beck, in Wawra. Itin. Princ. S. Coburg. ii. (1888) 1 = *Sellowii*, Pritz.
cyanea, Freyn, in Deutsche Bot. Monatsschr. viii. (1890) 176 = *Grayi*, Kell. et Behr.
Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 185. — China.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 366. — Yunnan.
Domeykoana, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 235 (= *Barneoudia Domeykoana*, Leyb.) — Chili.
Eunrenia, Hort. ex Bull. Soc. Tosc.ortic. (1894) 226. = *coronaria*, Linn.?
gelida, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 31. — China.
glaucofolia, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 363. — Yunnan.
Hemsleyi, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vi. (1891) 231. — Mexic.
Henryi, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1570. — China.
hirsutissima, MacMill. Metasp. Minnes. (1892) 239 = *patens*, Linn.
imbricata, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 8 t. 22 fig. 1-6. — Tibet.
Janczewskii, Giraudias, in Bull. Soc. bot. Fr. xxxviii. (1891) 255 = *Halleri*, All.
Keiskeana, T. Ito, ex Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxii. (1888) 478. — Japon.
Linnaeana, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 39 = *A. Pulsatilla*, Linn.
lipsiensis X, G. Beck, Fl. Nied. Oest. (1890) 407. — Eur. centr.
Lyallii, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vi. (1891) 227. — Am. bor. occ.
major, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 235; et xviii. (1894) 455 (= *Barneoudia major*, Phil.). — Chili.
nudicaulis, A. Gray, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 17 = *Ranunculus lapponicus*, Linn.
oregana, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 308. — Oregon.
peruviana, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vi. (1891) 227. — Peruvia.
praecox, Coste, in Bull. Soc. bot. Fr. xxxviii. (1891) p. liii. — Gall.
Regeliana, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 10; et Enum. pl. Mongol. (1889) ii. t. 3. — As. centr.
Scherfelii, Ullepitsch, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 12. — Hung.
serotina X, Coste, in Bull. Soc. bot. Fr. xxxviii. (1891) p. liii. — Gall.
tetonensis, Porter, ex Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vi. (1891) 224. — Idaho.
vesicatoria, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 62 = *Knowltonia vesicatoria*, Sims.
vindobonensis X, G. Beck, Fl. Nied. Oest. (1890) 487. — Austria.
Whyteana, Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 4. — Afr. trop. austro-or.

ANEMONELLA, Spach = **Anemone**, Linn. (Ranuncul.).

- thalictroides*, Trelease, Branner et Coville, in Branner, Rep. Geol. Surv. Ark. iv. 1888. (1891) 162 = *thalictroides*, Spach.

ANEMOPAEGMA, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 132.

- brevipes*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 420. — Bras.
decorum, S. Moore, l. c. 421. — Bras.
flavum, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 188. — Parag.
lanceolatum, Bureau, ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 215 nomen. — Bras.
longipes, K. Schum. l. c. — Bras.
scandens, Mello, ex K. Schum. l. c. — Bras.
sylvestre, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 421. — Bras.

ANEMONOSPERMOS, Moehr. Hort. Priv. 16 ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 306 = **Arctotis**, Linn. (Composit.).

ANEMONOSPERMOS : —

acaulis, *adpressa*, *aenea*, *amplexicans*, *angustifolia*, *aspera*, *bellidifolia*, *campanulata*, *canescens*, *Cinevria*, *diffusa*, *Dregei*, *clatior*, *elongata*, *fastuosa*, *flaccida*, *glandulosa*, *lanceolata*, *leiocarpa*, *leptorhiza*, *leucanthemodes*, *linearis*, *ocephala*, *petiolata*, *pinnatifida*, *pusilla*, *pygmaea*, *reptans*, *revoluta*, *stoechadifolia*, *venidiodes*, *verbascifolia*, *virgata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 306 = *homonyma omnia* Arctotidis.
glabrata, Kuntze, l. c. = *Arct. laevis*, Thunb.
glaucophylla, Kuntze, l. c. = *Arct. candida*, Thunb.
incana, Kuntze, l. c. = *Arct. argentea*, Thunb.

ANERINCLEISTUS, Korth. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 133.

Beccarii, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. 2. (1890) 531; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 478. — Borneo.
cordatus, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2310 (cordata). — Borneo.
Curtisii, Stapf, in Kew Bull. (1892) 196. — Penang.
dispar, Cogn. ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. 2. (1890) 531; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 479. — Borneo.

ANGELESIA, Korth. = *Trichocarya*, Miq. (Rosac.).

racemosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 215 = *T. racemosa*, Miq.

ANGELICA, (Riv.) Linn. (Umbellifer.). — Ind. Kew. i. 133.

brachyradia, Freyn, in Abhandl. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 607 = *sylvestris*, Linn.
californica, Jepson, in Erythraea i. (1893) 8; et ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 154. — Calif.
Canbyi, Coult. et Rose, Rev. N.-Am. Umbell. (1888) 40. — Am. bor.
dentata, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xii. (1887) 61 (= *Archangelica dentata*, Chapm.). — Florida.
elata, Velen. in Sitzb. böhm. Ges. Wiss. 1890 (1890) ii. 44; et Fl. Bulg. (1891) 201. — Bulg.
globifera, Freyn, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii (1888) 607 in syn. = *sylvestris*, Linn.
Hendersoni, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 80. — Am. bor. occ.
Hermisii, Mariz, in Bolet. Soc. Brot. xii. (1895) 215 = *lancifolia*, Spreng.
koreana, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxi. (1887) 51. — Corea.
multisecta, Maxim. l. c. — Japon.
Nelsoni, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 294. — Mexic.
Pancicii, Vandas, ex Velen. in Sitzb. böhm. Ges. Wiss. (1888) 448; et in Fl. Bulg. (1891) 200. — Bulg.
Pringlei, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 295. — Mexic.
scaberula, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 144. — China.
Seatonii, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 295. — Mexic.
villosa, Britton, Stern, et Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 22 = *Archangelica hirsuta*, Torr. et Gray.

ANGORCHIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. (1809) 314-19, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 650 = *Angraecum*, Bory (Orchid.).

alcicornis, *arachnopus*, *arcuata*, *armeniaca*, *articulata*, *ashantensis*, *bicaudata*, *biloba*, *Boutonii*, *Brongniartiana*, *camphyloplectron*, *capitata*, *caudata*, *Chailluana*, *citrata*, *clandestina*, *clavigera*, *conchifera*, *Cowanii*, *crassa*, *cryptodon*, *cucullata*, *Curnowiana*, *eburnea*, *Ellisii*, *falcata*, *fastuosa*, *fuscata*, *Galeandrae*, *gladiifolia*, *gracilis*, *Hildebrandtii*, *implicata*, *infundibularis*, *modesta*, *monodon*, *palmiformis*, *parvula*, *pectinata*, *pertusa*, *physophora*, *polystachya*, *pusilla*, *ramosa*, *recurva*, *rhipsalisocia*, *Rohrii*, *rostrata*, *saccifera*, *Scottiana*, *sesquipedalis*, *spatulata*, *striata*, *superba*, *tenuis*, *teretifolia*, *triquetra*, *vesicata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 651-52 = *homonyma omnia* Angraeci.
Criptangis, « Thou. » ex Kuntze, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 458 = *Angr. cryptodon*, Reichb. f.
Cucullangis, « Thou. » ex Kuntze, l. c. = *Angr. cucullatum*, Thou.

ANGORCHIS : —

dactyloceras, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 651 = *Listrostachys dactyloceras*, Reichb. f.
flabellifolia, Kuntze, l. c. = *Aëranthis flabellifolia*, Reichb. f.
Fragrangis, « Thou. » ex Kuntze, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 458 = *Angr. cucullatum*, Thou.
funalis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 651 = *Dendrophylax funalis*, Benth. et Hook. f.
hyalodes, Kuntze, l. c. = *Angr. hyaloides*, Reichb. f.
maxillarioides, Kuntze, l. c. = *Angr. maxillarioides*, Ridl.
megalorrhiza, Kuntze, l. c. = *Angr. megalorrhizum*, Reichb. f.
Pectangis, « Thou. » ex Kuntze, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 459 = *Angr. pectinatum*, Thou.
Papagayi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 651 = *Listrostachys Papagayi*, Reichb. f.
Sedenii, Kuntze, l. c. 652 = *Angr. arcuatum*, Lindl.
Triangis, « Thou. » ex Kuntze, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 458 = *Angr. triquetrum*, Thou.
Welwitschii, Kuntze, l. c. = *Listrostachys Welwitschii*, Reichb. f.

ANGRAECUM, Bory (Orchid.). — Ind. Kew. i. 134.

acutum, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 199 t. c. fig. b. — Ins. S. Thom.
Althoffii, Kraenzl. in Mitth. Deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 160. — Afr. trop. occ.
antennatum, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 61. — Kamerun.
appendiculatum, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 211. — Ins. Borbon.
Aschersonii, Kraenzl. in Mitth. Deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 160. — Afr. trop. occ.
astroarche, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 199 t. c. fig. a. — Ins. S. Thom.
avicularium, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 40. — Afr. trop.?
bistortum, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 75. — Afr. trop. occ.
Buchholzianum, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 334. — Kamerun.
Buyssonii, God.-Lebeuf, in L'Orchidophile, (1891) 282 cum xylogr. — Madag.
caffrum, Bolus, Icon. Orchid. austro-af. i. 1. (1893) t. 8. — Afr. austro-or.
calligerum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 552. — Hab.?
cephalotes, Kraenzl. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 4 (= *Listrostachys Metteniae*, Kraenzl.) — Kamerun.
comorense, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 60. — Ins. Comor.
costatum, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 211. — Ins. Borbon.
divaricatum, Frappier, l. c. 177. — Ins. Borbon.
du Buyssonii, God.-Lebeuf, in L'Orchidophile (1887) 280 = *Buyssonii*, God.-Lebeuf.
elegans, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 140. — Ins. S. Thom.
Elliotii, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 54. — Madag.
Englerianum, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 333 et xvii. (1893) t. 4 (= *Listrostachys Engleriana*, Kraenzl.). — Kamerun.
fimbriatum, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 387 t. 32 fig. 11-13. — Afr. trop. or.
Fournierianum, Kraenzl. in Gard. Chron. (1894) i. 808, ii. 43 fig. 7; Ed. André, in Rev. Hort. (1894) 582 cum icon. — Madag.
Germinyanum, Hort. Sand. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 7061. — Madag.
Gerrardi, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. i. (1893) t. 7 = *Mystacidium Gerrardi*, Bolus.
gracillimum, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 59 t. 5. — Kamerun.
Grandidierianum, Carrière, in Rev. Hort. (1887) 42 fig. 9 (= *Aëranthis Grandidierianus*, Reichb. f.) — Ins. Comor.
grandiflorum, Hort. ex Orchid. Album, xi. (1895?) t. 514 sphalm.) = *Aëranthus grandiflorus*, Lindl.
Gravenreuthii, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 62. — Kamerun.
Gyriamiae, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 388. — Afr. trop. or.

ANGRAECUM : —

Henriquesianum, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 231. — Afr. trop. occ. (Ins. Principis).
Henriquesianum, Rolfe in Gard. Chron. (1890) ii. 466 = *elegans*, Rolfe.
Keniae, Kraenzl. in Hoehnel, Zum Rudolph See, App. (1892) 4; et in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 59. — Afr. trop. or.
Kimballianum, Hort. ex Kew Bull. App. ii. (1890) 38 = *polystachyum*, A. Rich.
liliodorum, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 198. — Ins. Borbon.
longinode, Frappier, l. c. 210. — Ins. Borbon.
luteo-album, Kraenzl. in Bot. Jahrb. (1895) 27; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 158. — Afr. trop. or.
macilentum, Frappier, Catal. Orchid. Réunion (1889) 13 nomen; et ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 210. — Ins. Borbon.
malanganum, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 26. — Angola.
Maudae, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. 1. (1893) t. 9. — Afr. austro-or.
mauritanum, Frappier, Catal. Orchid. Réunion (1889) 13 = *gladiifolium*, Thou.
minutum, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 209. — Ins. Borbon.
nanum, Frappier, l. c. 208. — Ins. Borbon.
neglectum, Frappier, l. c. 202. — Ins. Borbon.
nutans, Frappier, l. c. 201. — Ins. Borbon.
Obrienianum, Hort. Sand. ex Gard. Chron. (1892) i. 816, nomen. (Quid?) — Hab.?
obversifolium, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 212. — Ins. Borbon.
pallidum, W. Wats. in Gard. and For. iii. (1890) 78. — Afr. trop. occ.
paniculatum, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 215. — Ins. Borbon.
patens, Frappier, l. c. 206. — Ins. Borbon.
pingue, Frappier, l. c. 214. — Ins. Borbon.
primulinum, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) 388. — Madag.
pseudopetiolum, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 207. — Ins. Borbon.
pugioniforme, Klotzsch, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 70 = *Sarcanthus oxyphyllus*, Wall.
Quintasii, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 140. — Ins. S. Thom.
Reichenbachianum, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 4, (1890) 74 t. 239, i. fig. 1-3. — Hab.?
Sanderianum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 168 = *modestum*, Hook. f.
Saundersiae, Bolus, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1728. — Natal.
Schoellerianum, Kraenzl. ex Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. ii. (1894) 112. — Erythrea.
Scottellii, Rendle, in Journ. Bot. (1895) 249. — Afr. trop. or.
Sedeni, L. Lind. et Rodig. in Lindenia, iii. (1887) 81 t. 135 (= *Listrostachys Sedeni*, Reichb. f.). — Afr. trop. or.
semipedale, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 389. — Afr. trop. or.
Smithii, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 37. — Afr. trop. or.
stenophyllum, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 200. — Ins. Borbon.
stipitatum, Frappier, l. c. 199. — Ins. Borbon.
stylosum, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 194. — Madag.
subclavatum, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 141. — Ins. S. Thom.
tenuifolium, Frappier, Fl. Ile Réunion (1895) 207. — Ins. Borbon.
thomense, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 141. — Ins. S. Thomé.
tricuspe, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 163. — Natal.
tridactylites, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) ii. 34. — Afr. trop. occ.
verrucosum, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 249. — Afr. trop. austro-or.
verruculosum, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 204. — Ins. Borbon.
virgula, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 27; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 157. — Afr. trop. or.
Whitheldii, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 249. — Sierra Leone.

ANGUINA, Mich. ex Linn. = **Trichosanthes**, Linn. (Cucurbit.).

angulata, Beccariana, bornensis, bracteata, celebica, cordata, coriacea, cucumerina, cucumerodes, cuspidata, dicaleosperma, dioeca, globosa, grandiflora, Hearnii, himalensis, Horsfieldii, incisa, integrifolia, japonica, Kirilowii, Lepiniana, longiflora, multiloba, nervifolia, ovata, ovigera, Patara, pentaphylla, Perrottetiana, pilosa, quinquangulata, subvelutina, sumatrana, tamnifolia, Thwaitesii, tricuspidata, trifoliata, truncata, villosa, villosula, Wallichiana, Wawraei, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 254 = *homonyma omnia* Trichosanthis. *anamalayna*, Kuntze, l. c. — T. *anaimlaiensis*, Bedd.

ANGULOIA, Ruiz et Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 136.

intermedia X, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) i. 798; et in *Lindenia*, iv. (1888) 8. — Hybr. nat. et artef. *Madouxiana* X, L. Lind. in Journ. des Orchid. v. (1894) 124; et in *Lindenia*, x. (1894) 7 t. 434. — Hybr. artef. *Mantini*, Hort. ex Illustr. Hort. (1895) 187 = *uniflora*, Pers.

ANGURIA, (Tourn.) Linn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 36.

diversifolia, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 20. — Guatem. *gloriosa*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 366. — Bras. *oblongifolia*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 9. — Guatem.

ANHALONIUM, Lem. = **Mammillaria**, Harv. (Cact.).

furfuraceum, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 130 = M. *furfuracea*, S. Wats. *fourdantianum*, Lewin, in Ber. deutsch. bot. Ges. xii. (1894) 289 in obs. — Hab. ? *Lewinii*, Hennings, ex Gartenfl. (1888) 410-11. fig. 92; et Kew Bull. (1889) 77 (= *Lophophora Williamsii*, Coult.). — Mexic.

ANIBA, Aubl. = **Ocotea**, Aubl. (Laurin.).

affinis, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 63 = *Aydendron affine*, Meissn. *albida*, Mez, l. c. 64. — Bras. *amazonica*, Mez, l. c. 69 = *Aydendron amazonicum*, Meissn. *bracteata*, Mez, l. c. 66 = *Ayd. bracteatum*, Nees. *Brittonii*, Mez, l. c. 54. — Bras. *Canelilla*, Mez, l. c. 53 = *Cryptocarya Canelilla*, H. B. K. *citrifolia*, Mez, l. c. 74 = *Aydendron citrifolium*, Nees. *desertorum*, Mez, l. c. 76 = *Ayd. desertorum*, Nees. *firmita*, Mez, l. c. 58 = *Ayd. firmitum*, Nees. *Gardneri*, Mez, l. c. 60 = *Ayd. Gardneri*, Meissn. *Hostmanniana*, Mez, l. c. 67 = *Ayd. Hostmannianum*, Nees. *intermedia*, Mez, l. c. 73 = *Ayd. intermedium*, Meissn. *Jenmani*, Mez, l. c. 70. — Guian. angl. *Kappleri*, Mez, l. c. 52. — Guian. bat. *laevigata*, Mez, l. c. 59 = *Aydendron laevigatum*, Meissn. *megaphylla*, Mez, l. c. 67. — Guian. gall. *Muca*, Mez, l. c. 57 = *Aydendron Muca*, Nees. *Muelleriana*, Mez, l. c. 72. — Guian. gall. *ovalifolia*, Mez, l. c. 77. — Guian. angl. *panurensis*, Mez, l. c. 58 = *Aydendron panurense*, Meissn. *parviflora*, Mez, l. c. 56 = *Aydendron parviflorum*, Meissn. *permollis*, Mez, l. c. 55 = *Aydendron permolle*, Nees. *perutilis*, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 6. — Columb. *Puchury-minor*, Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berl. v. (1889) 70 = *Nectandra Puchury-minor*, Nees. et Mart. *Ramagana*, Mez, l. c. 494. — Antill. *Ridleyana*, Mez, l. c. 77. — Bras. *riparia*, Mez, l. c. 62 = *Aydendron riparium*, Nees.

ANIBA : —

robusta, Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berl. v. (1889) 75 = *Aydendron robustum*, Klotzsch et Karst. *salicifolia*, Mez, l. c. 71 = *Aydendron salicifolium*, Ness. *Taubertiana*, Mez, l. c. 65. — Guian. gall. *Trinitatis*, Mez, l. c. 68 = *Aydendron Trinitatis*, Meissn. *venezuelana*, Mez, l. c. 63. — Venez. *viridis*, Mez, l. c. 61. — Bras.

ANIDRUM, Neck. = **Bifora**, Hoffm. (Umbellifer.).

americana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 264 = B. *americana*, Benth. et Hook. f. *radians*, Kunze, l. c. = B. *radians*, Bieb. *testiculatum*, Kuntze, l. c. = B. *testiculata*, Roth.

ANIL(A), Ludw. Defin. pl. (1837) 117 emend. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 159 et 938 = **Indigofera**, Linn. (Legumin.).

acutifolia, *adenocarpa*, *adscendens*, *affinis*, *alternans*, *amoena*, *angulosa*, *angustifolia*, *arabica*, *arenaria*, *argyrea*, *arrecta*, *aspera*, *asperifolia*, *atriceps*, *atro-purpurea*, *auricoma*, *australis*, *Baileyi*, *Bainesii*, *bifrons*, *Binderi*, *Blanchetiana*, *Bojeri*, *bongensis*, *brachystachya*, *bracteolata*, *Brassii*, *brevidens*, *Brunoniana*, *Bungana*, *Burchellii*, *Burkeana*, *caloneura*, *Cameronii*, *campestris*, *candicans*, *capitata*, *cardiophylla*, *caroliniana*, *celebica*, *chinesis*, *circinnata*, *complicata*, *compressa*, *concaeva*, *concinna*, *congesta*, *conjugata*, *cordifolia*, *corniculata*, *costaricensis*, *costata*, *cryptantha*, *cuneata*, *cuneifolia*, *cylindrica*, *dealbata*, *declinata*, *decora*, *decumbens*, *densiflora*, *denudata*, *depressa*, *digitata*, *dimidiata*, *diphylla*, *dissitiflora*, *disticha*, *divaricata*, *diversifolia*, *Dregeana*, *echinata*, *efoliata*, *Ehrenbergiana*, *elliptica*, *emarginella*, *endocaphylla*, *eriocarpa*, *erythrogramma*, *exigua*, *falcata*, *fastigiata*, *filicaulis*, *filifolia*, *filiformis*, *filipes*, *flabellata*, *flavicans*, *foliosa*, *frutescens*, *fulcrata*, *fulgens*, *geminata*, *glandulosa*, *glaucescens*, *glomerata*, *gracilis*, *grata*, *grisea*, *haplophylla*, *hebetata*, *hedranophylla*, *hedyantha*, *heterocarpa*, *heterophylla*, *heterotricha*, *Heudelottii*, *hilaris*, *hirsuta*, *hirta*, *hispida*, *humifusa*, *humilis*, *incana*, *intermedia*, *intricata*, *Knoblochii*, *leptocarpa*, *leptosepala*, *leucoclada*, *Lindheimeriana*, *linifolia*, *Lyallii*, *macra*, *macrocalyx*, *macrocarpa*, *macrophylla*, *madagascariensis*, *malacostachys*, *marginulata*, *medicaginea*, *melanadenia*, *micrantha*, *microcarpa*, *mollis*, *monophylla*, *multijuga*, *Mundiana*, *mysurensis*, *nigricans*, *nigritana*, *nudicaulis*, *nummularia*, *obcordata*, *oligophylla*, *ovata*, *ovina*, *oxalidea*, *Oxytropis*, *paniculata*, *Parkeri*, *parviflora*, *parvula*, *pascuorum*, *pauciflora*, *paucifolia*, *Pechuelli*, *pectinata*, *pedicellata*, *pedunculata*, *pentaphylla*, *Perrottetii*, *pilosa*, *pinifolia*, *podophylla*, *polycarpa*, *porrecta*, *pratensis*, *Prieuriana*, *procera*, *procumbens*, *pruinosa*, *psilostachya*, *pulchella*, *pungens*, *Quartiniana*, *quinquefolia*, *rhynchocarpa*, *rhytidocarpa*, *Rothii*, *rufescens*, *rugosa*, *sabulicola*, *sarmentosa*, *saxicola*, *Schimperii*, *Schultziana*, *secundiflora*, *senegalensis*, *sericea*, *sessiliflora*, *sessilifolia*, *seticulosa*, *setiflora*, *simplicifolia*, *sordida*, *Spachii*, *sparsa*, *sphaerocarpa*, *spicata*, *spinescens*, *spinosa*, *staphylla*, *stipularis*, *stricta*, *strobilifera*, *suaveolens*, *subcorymbosa*, *subulata*, *subulifera*, *sulcata*, *terminalis*, *tetragonoloba*, *tetrasperma*, *Teysmannii*, *Thibaudiana*, *tinctoria*, *tomentosa*, *torulosa*, *trichopoda*, *trifoliata*, *triquetra*, *tristis*, *trita*, *truxillensis*, *umbonata*, *uniflora*, *varia*, *velutina*, *venulosa*, *venusta*, *vestita*, *vineana*, *viscidissima*, *viscosa*, *Welwitschii*, *Wightii*, *Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 160 et 938-40 = *homonyma omnia* Indigoferae.

amorphodes, Kuntze, l. c. 938 = I. *amorphoides*, Faub. et Spach.

anabaptizata, Kuntze, l. c. = I. *anabaptista*, Steud. *angustata*, Kuntze, l. c. = I. *stenophylla*, Guill. et Perr.

argentea, Kuntze, l. c. = I. *semitrijuga*, Forsh.

argyroides, Kunze, l. c. = I. *argyroides*, E. Mey.

Arnottii, Kuntze, l. c. = I. *tenuifolia*, Rottb.

articulata, Kuntze, l. c. = I. *argentea*, Wall.

aspalathodes, Kuntze, l. c. = I. *aspalathoides*, Vahl.

Bakeriana, Kuntze, l. c. = I. *arrecta*, Benth.

benguensis, Kuntze, l. c. = I. *benguensis*, Baker.

Bongardiana, Kuntze, l. c. = I. *gracilis*, Bong.

ANIL(A) : —

coronillifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 309 = I. *coronillaefolia*, A. Cunn.

coronilloides, Kuntze, l. c. = I. *coronilloides*, Faub. et Spach.

crotarioides, Kuntze, l. c. = I. *crotarioides*, Baker.

cytisoides, Kunze, l. c. = I. *cytisoides*, Linn.

daleoides, Kuntze, l. c. = I. *daleoides*, Benth.

Dalzieliana, Kuntze, l. c. 938 = I. *triquetra*, Dalz.

dendroides, Kuntze, l. c. 939 = I. *dendroides*, Jacq.

dillwynioides, Kuntze, l. c. = I. *dillwynioides*, Benth.

exstipulata, Kuntze, l. c. 938 = I. *sarmentosa*, Linn. f.

galeoides, Kuntze, l. c. 939 = I. *galeoides*, DC.

glabra, Kuntze, l. c. 938 = I. *pentaphylla*, Murr.

gonioides, Kuntze, l. c. 939 = I. *gonioides*, Hochst.

hippocrepoides, Kuntze, l. c. = *Hosackia angustifolia*, G. Don.

Hochstetteri, Kuntze, l. c. = I. *anabaptista*, Steud.

hololeuca, Kuntze, l. c. = I. *alternans*, DC.

indica, Kuntze, l. c. 938 = I. *aspalathoides*, Vahl.

inhambensis, Kuntze, l. c. 939 = I. *inhambensis*, Klotzsch.

Kirkiana, Kuntze, l. c. 938 = I. *torulosa*, Baker.

Leprieurii, Kuntze, l. c. = I. *macrocarpa*, Leprieur.

lespedeoides, Kuntze, l. c. 160 = I. *lespedeoides*, H. B. et K.

lotoides, Kuntze, l. c. 938 = I. *lotoides*, Lam.

macrostachya, Kuntze, l. c. = I. *macrostachys*, Vent.

maritima, (sphalm.) Kuntze, l. c. = I. *maritima*, Baker.

mauritanica, Kuntze, l. c. = I. *coriacea*, Dryand.

mimosoides, Kuntze, l. c. 939 = I. *mimosoides*, Baker.

moluccana, Kuntze, l. c. = I. *trifoliata*, Linn.

nummulariaefolia, Kuntze, l. c. = I. *echinata*, Willd.

ornithopodioides, Kuntze, l. c. = I. *ornithopodioides*, Cham. et Schlecht.

phyllanthoides, Kuntze, l. c. = I. *phyllanthoides*, Baker.

prostrata, Kuntze, l. c. 938 = I. *enneaphylla*, Linn.

rupestris, Kuntze, l. c. = I. *poliotes*, Echl. et Zeyh.

sutherlandioides, Kuntze, l. c. = I. *sutherlandioides*, Welw.

tenuifolia, Kuntze, l. c. 938 = I. *angustifolia*, Linn.

et I. *capillaris*, Thunb.

tephrosioides, Kuntze, l. c. 940 = I. *tephrosioides*, H. B. et K.

thymoides, Kuntze, l. c. = I. *thymoides*, Baker.

tribuloides, Kuntze, l. c. = I. *tribuloides*, Boiss.

ultima, Kuntze, l. c. 938 = I. *vestita*, Baker.

vicioides, Kuntze, l. c. = I. *vicioides*, Faub. et Spach.

Zollingeriana, Kuntze, l. c. = I. *galeoides*, DC.

ANISACANTHUS, Nees (Acanthac.). — Ind. Kew. i. 137.

abditus, T. S. Brandeg. in Zoë, iii. (1893) 348. — Mexic.

brasiliensis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 371. — Bras.

caducifolius, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 18; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 328 (= *Jacobinia caducifolia*, Griseb.). — Argent.

ruber, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 371. — Bras.

ANISEIA, Choisy = **Ipomoea**, Linn. (Convolvul.).

Hackeliana, Schinz, in Verh. Bot. Ver Brand. xxx. (1888) 273 = I. *Hackeliana*, Hallier f.

ANISIFOLIUM, Rumpf, Hort. Amboin. ii. (1742) 133 t. 48 = **Limonia**, Linn. (Rutac.).

alatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 98 = L. *alata*, Wall.

alternans, Kuntze, l. c. = L. *alternans*, Wall.

curvispina, Kuntze, l. c. = L. *curvispina*, Miq.

Limonia, Kuntze, l. c. = L. *acidissima*, Linn.

pubescens, Kuntze, l. c. = L. *pubescens*, Wall.

spectabile, Kuntze, l. c. = L. *spectabilis*, Miq.

ANISOCHILUS, Wall. (Labi.). — Ind. Kew. i. 137.

africanus, Baker, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 94. — Sierra Leone.

ANISOCHILUS : —

Engleri, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 190 = *africanus*, Baker.
velutinus, Trim. Handb. Fl. Ceyl. iii. (1895) 377. — Zeyl.

ANISOCYCLA, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas, (1886) t. 49A; et in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1079. **MENISPERMACEAE**.
Grandidieri, Baill. ll. cc. — Madag.

ANISOMELES, R. Br. (Labiata). — Ind. Kew. i. 137.
indica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 512 = *ovata*, Benth.
secunda, Kuntze, l. c. = *A. Heydeana*, R. Br.

ANISOMERIS, Presl = **Chomelia**, Jacq. (Rubiaceae).
fasciculata, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 98. — Ind. occ.
obtusata, K. Schum. l. c. = *C. obtusata*, Cham. et Schlecht.
Preslii, K. Schum. l. c. = *C. Anisomeris*, Muell. Arg.
spinosa, K. Schum. l. c. = *C. spinosa*, Jacq.

ANISOPAPPUS, Hook. et Arn. (Compositae). — Ind. Kew. i. 138.
angolensis, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 170. — Angola.

ANISOPETALUM, Hook. = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).
lasianthum, Kuhl, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 763 = *B. lasianthum*, Lindl.

ANISOPHYLLEA, R. Br. (Rhizophorae). — Ind. Kew. i. 138.
Boehmii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 287. — Afr. trop. or.
fallax, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. 16. — Madag.
Thouarsiana, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 327. — Madag.

ANISOPODA, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 318 t. lii. **UMBELLIFERAE**.
bupleuroides, Baker, l. c. — Madag.

ANISOPTERA, Korth. (Dipterocarpae). — Ind. Kew. i. 138.
cochinchinensis, Pierre, in Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 298; et Fl. For. Cochinch. (1890) t. 235A. — Cochinch.
costata, Pierre, in Laness. l. c. = *robusta*, Pierre.
Curtisii, Dyer, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 100. — Penang.
Forbesii, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 45. — N. Guin.
grandiflora, Brandis, l. c. 43 t. 2 fig. 29. — As. trop.
parvifolia, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 382. — Oceania.
robusta, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1890) t. 236. — Cochinch.
tomentosa, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 45. — Ins. Philipp.
Vidaliana, Brandis, l. c. 44. — Ins. Philipp.

ANISOPUS, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 259. **ASCLEPIADEAE**.
Mannii, N. E. Br. l. c. — Afr. trop. occ.

ANISOSCIADIUM, DC. = **Echinophora**, Linn. (Umbellif.).
lanatum, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 261. — Arabia.

ANISOTES, Nees (Acanthae). — Ind. Kew. i. 139.
parvifolius, Oliver, in Hook. Icon. pl. (1886) t. 1527; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 346. (sphalm. Anisotis). — Afr. trop. or.
velutinus, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 76. — Afr. trop. or.

ANISOTOMA, Fenzl (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 139.
mollis, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45. (1894) 26 (= *Lophostephus mollis*, Harv.). — Afr. austr.
pedunculata, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 150. — Natal.

ANNESLIA (Anneslea, Auct.) Salisb. = **Calliandra**, Benth. (Legumin.).
calothyrsus, J. D. Smith, Pl. Guat. (1885?) n. 690 = *C. calothyrsa*, Miq.
eriophylla, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sc. xiv. (1894) 32 = *C. eriophylla*, Benth.
Quetzal, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 28. — Guatem.
reticulata, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xiv. (1894) 32 = *C. reticulata*, A. Gray.
tetragona, J. D. Smith, Pl. Guat. (1885?) n. 691 (Anneslia) = *C. tetragona*, Benth.

ANNESLEYA parvifolia, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 101 (an *Anneslia* sp.?) = *Inga parvifolia*, Hook. et Arn.

ANODA, Cav. (Malv.). — Ind. Kew. i. 139.
abutiloides, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 300. — Arizona.
arizonica, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 298. — Arizona.
denudata, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 357 (= *Sida denudata*, Nees et Mart.). — Bras., Parag.
Thurberi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 299. — Mexic.

ANODENDRON, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 139.
Aambe, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 454. — Oceania.
Benthamianum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 98. — Formosa.
oblongifolium, Hemsl. in Ann. of Bot. v. (1891) 504; et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2207. — Ins. Salom.

ANOECTOCALYX, « Triana » ex Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1198 sphalm. = **Anaectocalyx**, Triana (Melastom.).

ANOECTOCHILUS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 140.
Griffithii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 96; et Icon. pl. xxii. (1893) t. 2159. — Reg. Himal.
javanicus, Hort. ex Ridl. Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 338 = *Microstylis oculata*, Reichb. f.
Lansbergiae, L. Linden, in Illustr. Hortie. xxxiv. (1887) 7. t. 1; et in Gard. Chron. (1887) i. 421. — Malaya.
nobilis, Hort. ex Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 696 in syn. = *Physurus nobilis*, Reichb. f.
Sanderianus, Kraenzl, in Gard. Chron. (1895) ii. 484 = *Macodes Sanderiana*, Rolfe.
Tashiroi, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxi. (1887) 103. — Ins. Liukiu.
tetraphyllum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 96. — Ind. or.
xanthophyllum, Hort. ex Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 170 in syn. = *Lobbianus*, Planch.

ANOECTOMARIA ×, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 170. **ORCHIDEAE**.
Dominii, Rolfe l. c. (= *Anoectochilus Dominii*, Hort.). — Hybr. artef.

ANOGEISSUS, Wall. (Combret.). — Ind. Kew. i. 140.
Bentii, Baker, in Kew Bull. (1894) 332; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2354. — Arabia.
Harmandii, Pierre, in Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 315. — Cochinch.

ANOGR, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).
albicaulis, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 234 = *O. albicaulis*, Pursh.
coronopifolia, Britton, l. c. = *O. coronopifolia*, Torr. et Gray.
pallida, Britton, l. c. = *O. pallida*, Lindl.

ANOMALOPTERYS, G. Don, = **Acridocarpus**, Guill. et Perr. (Malpigh.).
adenophora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 87 = *Ac. adenophorus*, A. Juss.

ANOMALOPTERYS : —

angolensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 87 = *Ac. angolensis*, A. Juss.
argyrophylla, Kuntze, l. c. = *Ac. argyrophyllus*, A. Juss.
chloroptera, Kuntze, l. c. = *Ac. chloropterus*, Oliver.
corymbosa, Kuntze, l. c. = *Ac. corymbosus*, Hook. f.
excelsa, Kuntze, l. c. = *Ac. excelsus*, A. Juss.
galphimiaeifolia, Kuntze, l. c. = *Ac. galphimiaeifolius*, A. Juss.
natalitia, Kuntze, l. c. = *Ac. natalitius*, A. Juss.
orientalis, Kuntze, l. c. = *Ac. orientalis*, A. Juss.
pruriens, Kuntze, l. c. = *Ac. pruriens*, A. Juss.
Smeathmanni, Kuntze, l. c. = *Ac. Smeathmanni*, Guill. et Perr.
zanzibarica, Kuntze, l. c. = *Ac. zanzibaricus*, A. Juss.

ANONA, Linn. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 140.
cordifolia, Poepp. ex Szyszyl. in Diss. math.-nat. Acad. litt. Cracov. xxvii. (1894) 140 = *Rollinia cordifolia*, Szyszyl.
latifolia, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 69. — Sierra Leone.
longiflora, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 297. — Mexic.
Rodriguesii, Barb. Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio iv. (1894) 1 t. 1. — Bras.
Sanctae-crucis, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 305. — Bras.
Walkerii, S. Moore, l. c. 304. — Bras.

ANONYMOS, Gronov. = **Galax**, Linn. (Dipsac.).
aphyllus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 392 = *G. aphylla*, Linn.

ANOPLANTHUS, Endl. = **Phelypaea**, Tourn. (Orobanch.).
myzorrhizus, Solms, ex G. Beck, in Luers. Bibl. Bot. Heft, xix. (1890) 83 in syn. = *Orobancha chilensis*, Phil.

ANOPILOPHYTUM, Beer = **Tillandsia**, Linn. (Bromel.).
Binoti, Éd. Morr. ex Baker, Handl. Bromel. (1889) 200. = *T. brachyphylla*, Baker.
brachyphyllum, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 196 = *T. Funckiana*, Baker.
Krameri, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 197 = *T. Kramerii*, Baker.
luteum, Éd. Morr. l. c. 198 = *T. lutea*, Baker.
paniculatum, Éd. Morr. l. c. 200 = *T. geminiflora*, Brongn.
refulgens, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 197 = *T. meridionalis*, Baker.
stramineum, K. Koch, ex Baker, l. c. 150 = *Cara-guata straminea*, Baker.
undatum, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 197 = *T. globosa*, Wawra.
xiphoides, Beer, ex Baker, l. c. 164 = *T. xiphoides*, Ker.

ANOSPORUM, Nees = **Cyperus**, Linn. (Cyperac.).
ablepharum, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. sci. phys. Genève, xxxi. (1890) 125 (= *Scirpus ablepharus*, Griseb.). — Am. trop.
paraguayense, Maury, l. c. 124 t. 35. — Parag.
piliferum, Maury, l. c. t. 34. — Parag.
Schinzii, Boeck. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xix. Abhandl. (1888) 46. — Afr. austro-occ. extratrop.

ANOTIS, DC. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 142.
nummulariformis, Trim. Syst. Cat. Ceyl. Pl. (1885) 42 (= *Hedyotis nummulariformis*, Arn.). — Zeyl.

ANPLECTRUM, A. Gray (Melastom.). — Ind. Kew. i. 142.
assamicum, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 23. — Reg. Himal.
Beccarianum, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 568. — Borneo.
homoeandrum, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 161. — Borneo.

ANREDERA, Juss. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 142. *baselloides*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 147 = *Bous-singaultia baselloides*, H. B. et K.

ANSELLIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 142. *confusa*, N. E. Br. in *Lindenia*, ii. (1886) 36 in obs. — Afr. trop. occ. *congoënsis*, Rodigas, l. c. 35 t. 64. — Congo. *humilis*, Bull. Catal. (1891) 3; et ex *Gartenfl.* (1891) 333. — Zambes. *nilotica*, N. E. Br. in *Lindenia*, ii. (1886) 36. — Afr. trop. or.

ANTENNARIA, Gaertn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 143. *Mariae*, F. Muell. ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, II. i. (1891) 240 = *Anaphalis Mariae*, F. Muell.

ANTHAENANTIA, P. Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 143. *glauca*, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 237. — Afr. austro-occ. extratrop. *Hackeli*, *Arechav.* in *Anal. Mus. nac. Montevideo*, ii. (1894) 96 t. 5. — Urug. *lanata*, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 237 in obs. = *lanata*, Benth.

ANTHEMIS, Mich. ex Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 144. *adulterina* X, Wallr. ex E. Hallier, in Koch's Syn. Deutsch Fl. ed. 3 (1895) 1392. — Germ. *armeniaca*, Freyn et Sint. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 348. — Armen. turc. *caulescens*, Aitf. et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 76. — As. centr. *extraradialis*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 146. — As. Min. *flabellata*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 23. — Syria. *hirtella*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 278. — Buchar. *kabylica*, Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 454; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 72. — Algeria. *macroglossa*, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 85. — Reg. Cauc. *melanolepis*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 297. — Ins. Cypr. *meteorica*, Hausskn. ex Nym. *Consp. fl. Europ.*, Suppl. ii. (1889) 165. — Thess. *Muenteriana*, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 298. — Graecia. *numidica*, Batt. in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (suppl.) (1890). — Algeria. *ochroleuca* X, Celak. f. ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. v. (1887) p. cxixiii. — Bohem. *orbetica*, Panc. Nov. elem. fl. princip. Bulg. (1886) 27. — Bulg. *retusa*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 260 in syn. = *Brachmanni*, Boiss. et Heldr. *Saportana*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 92. — Reg. Transcauc. *Sintenisii*, Freyn; in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 147. — As. Min. *Tempskyana*, Freyn et Sint. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 347. — Armen. turc.

ANTHEPHORA, Schreb. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 146. *cenchroides*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 99 = *Hochstetteri*, Nees.

hermaphrodita, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 759 = *elegans*, Schreb. *Schinzi*, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx (1888) 139. — Afr. austro-occ. extratrop.

ANTHERICOPSIS, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 139. **LILIACEAE**. *Fischeri*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

ANTHERICUM, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 146. *acuminatum*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 411. — Afr. trop. or. *apodanthum*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 265. — Guatem.

ANTHERICUM : —

arvense, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 216. — Afr. austro-occ. extratrop. *aurantiacum*, Baker, ex Hemsl. *Biol. Centr.-Am.* iv. (1886) 91; et in *Engl. Bot. Jahrb.* viii. (1887) 289. — Guatem. *Bragae*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 138. — Afr. trop. or. *campestre*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 28; et *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 138. — Afr. trop. or. *crassinerve*, Baker, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 71. — Afr. austro-occ. extratrop. *dianellaefolium*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 529. — Madag. *Fischeri*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 468. — Afr. trop. or. *Giryamae*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 412. — Afr. trop. or. *Gregorianum*, Rendle, l. c. 416. — Afr. trop. or. *Lehmanni*, Baker, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 208. — Ecuad. *leucocomum*, Robins. et Greenman, in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 168. — Mexic. *macrophyllum*, Baker, ex Hemsl. *Biol. Centr.-Am.* iv. (1886) 91; et in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 209. — Guatem. *micranthum*, Baker, in *Journ. Bot.* xxxix. (1891) 71. — Transvaal. *milanjanum*, Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 51. — Afr. trop. or. *Nyassae*, Rendle, l. c. 52. — Afr. trop. or. *purpuratum*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 413. — Afr. trop. or. *rubellum*, Baker, in *Johnston Kilima Njaro Exped.* (1886) 347 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 252. — Afr. trop. or. *serotinum*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 8. — Arkansas. *speciosum*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 413 t. 33. — Afr. trop. or. *Stuhlmannii*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 138. — Afr. trop. or. *Taylorianum*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 415. — Afr. trop. or. *tuberosum*, Herb. Heyne, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 334 = *Chlorophytum arundinaceum*, Baker. *uyuiense*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 415. — Afr. trop. or. *venulosum*, Baker, in *Johnston Kilima Njaro Exped.* (1886) 347 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 352. — Afr. trop. or.

ANTHEROTOMA, Hook. f. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 148. *Antherotoma*, Krasser, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 154 = *Naudini*, Hook. f.

ANTHISTIRIA, Linn. f. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 148. *Helferi*, Munro, ex Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 665 (= *Themeda Helferi*, Hack.). — Tenass. Ins. Andam. *vulgaris*, Hack. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* II. 2. (1887) 29 (= *Themeda Forskhalii*, Hack.) — Orb. vet. reg. trop.

ANTHOBRYUM, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 51. **PRIMULACEAE**. *aretioides*, Phil. l. c. t. 2 fig. 4. — Bolivia. *tetragonum*, Phil. l. c. t. 2 fig. 3. — Bolivia.

ANTHOCLEISTA, Afzel. (Logan.). — Ind. Kew. i. 149. *amplexicaulis*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 506. — Madag. *Buchneri*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 576. — Angola. *grandiflora*, Gilg, l. c. 582. — Ins. Comor. *Hildebrandtii*, Gilg, l. c. 583. — Madag. *inermis*, Engl. *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 63. — Congo. *insignis*, Galpin, in *Kew Bull.* (1895) 150. — Afr. austr. *Kalbreyeri*, Baker, l. c. 99. — Afr. trop. occ. *laxiflora*, Baker, l. c. — Afr. trop. occ.

ANTHOCLEISTA : —

macrantha, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 578. — Angola. *magnifica*, Gilg, l. c. 584. — Gabon. *niamniamensis*, Gilg, l. c. 580. — Afr. centr. bor. *orientalis*, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 312. — Afr. trop. or. *parviflora*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 99. — Afr. trop. occ. *rhizophoroides*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 506. — Madag. *Schweinfurthii*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 579. — Afr. trop. *Stuhlmannii*, Gilg, l. c. 680. — Afr. trop. or. *Urbaniana*, Gilg, l. c. 584. — Madag. *zambesiaca*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 99. — Afr. trop. or.

ANTHODISCUS, G. F. W. Mey. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 149. *obovatus*, Benth. ex Wittm. in *Mart. Fl. Bras.* xii. 1. (1886) 358. — Bras.

ANTHOLOBUS, Bot. Centrabl. lxi. (1895) 362 sphalm. = **Anthobolus**, R. Br. (Santal.).

ANTHOLOMA, Labill. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 149. *Tiegheii*, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Feb. 1892) 164 nomen; ix. (Nov. 1892) 111; et in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 322. — N. Guin.

ANTHOLYZA, Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 149. *gracilis*, Pax, ex Engl. in *Abhandl. Press. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 177. — Afr. trop. or. *hantamensis*, Klatt, in *Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 228 (= *Hesperantha montana*, Klatt). — Afr. austr. *labiata*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 156. — Afr. trop. occ. *Schweinfurthii*, Baker, in *Gard. Chron.* (1894) i. 588. — Abyss. *Steingroeverii*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 156. — Afr. austro-occ. extratrop. *Watsoniana*, Pax, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 5. (1888) 156 (= *Gladiolus Watsonius*, Thunb.). = *revoluta*, Burm. f. *zambesiaca*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 232. — Afr. trop. or.

ANTHOSHOREA, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1891) sub t. 250 = **Shorea**, Roxb. (Dipterocarpaceae). *Harmandii*, Pierre, l. c. = *S. Harmandii*, Laness.

ANTHOSPERMUM, Linn. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 150. *humile*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 145. — Natal. *usambarense*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 165 in obs.; et in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 69. — Afr. trop. or. *viscosum*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 144 in syn. = *Phyllis viscosa*, Christ. *Whyteanum*, Hiern, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II., iv. (1894) 16. — Afr. trop. or.

ANTHOSTEMA, A. Juss. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 150. *Aubryanum*, Baill. in *Laness. Pl. util. col. franç.* (1886) 815 nomen (*Anthostemma*). — Seneg.

ANTHOTROCHE, Endl. (Solan.). — Ind. Kew. i. 150. *Healeana*, F. Muell. in *Vict. Natur.* viii. (Feb. 1891) 153; et in *Bot. Centrabl.* xlv. (1891) 385. — Austral.

ANTHOKANTHUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 150. *nivale*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 107. — Afr. or.

ANTHRISCUS, Bernh. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 150. *Vandasii*, Velen. in *Sitz. böhm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 35; et *Fl. Bulg.* (1891) 219. — Bulg. *velutinus*, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 73. — Reg. Cauc.

ANTHROTROCHE *Healiana*, F. Muell. in Vict. Natural. viii (May 1891) 4 nomen, sphalm. = *Anthotroche Healiana*, F. Muell.

ANTHURIUM, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 150.
acutum, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) ii. 776. — Bras.
Allendorffii X, Hort. ex Gartenfl. (1889) 121 t. 1293 fig. e. — Hybr. artef.
brevilobum, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 380 = *parvum*, N. E. Br.
burfordiense X, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 700. — Hybr. artef.
Chamberlainii, Mast. in Gard. Chron. (1888) i. 462 fig. 66, 67; Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7297. — Venez.?
Chantinianum X, Martinet, in Rev. Hort. (1889) 157. — Hybr. artef.
Crombezianum X, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hort. (1894) 552 cum icone. — Hybr. artef.
cruentum X, Éd. André, l. c. (1886) 50. — Hybr. artef.
cymbiforme, N. E. Br. in Gard. Chron. (1889) ii. 67. — Am. austr.?
Desmetianum X, Hort. ex Rodigas, in Illustr. Hort. (1888) 47 t. lii. — Hybr. artef.
eburneum, Williams, Catal. (1891) 24. — Hybr. artef.
excelsior X, Hort. ex Wien Ill. Gartenzeit. (1890) 307 cum icone. — Hybr. artef.
gandavense X, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 415. — Hybr. artef.
Goldringi X, Hort. ex Gard. and For. vi. (1893) 269. — Hybr. artef.
Greyanum X, Hort. ex Gard. and For. v. (1892) 525. — Hybr. artef.
Grusoni X, Hort. ex Gartenfl. (1889) 121 t. 1293 fig. a. — Hybr. artef.
Haradyanum X, Martinet, in Rev. Hort. (1889) 157. — Hybr. artef.
Hero X, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 652. — Hybr. artef.
Hollandi X, Hort. ex Gard. and For. vi. (1893) 269. — Hybr. artef.
tsarensis X, Éd. André, in Rev. Hort. (1888) 423. — Hybr. artef.
Kolbii X, Hort. ex Gartenfl. (1889) 121 t. 1293 fig. b. — Hybr. artef.
Laingi, Hort. ex Wien Ill. Gartenzeit. (1888) 333. — Form. hort.
Lawrenceanum, Éd. André, in Rev. Hort. (1888) 12 cum icone. — Hybr. artef.
longispdatum, Carrière, in Rev. Hort. (1888) 498. — Ins. Guadal.
Mooreanum, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) ii. 230. — Hab.?
Origiesii X, Hort. ex Gartenfl. (1889) 121 t. 1293 fig. d. — Hybr. artef.
Paradisae X, Williams, Catal. (1891) 24. — Hybr. artef.
punctatum, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) ii. 809. — Equad.
purpureum, N. E. Br. l. c. (1887) i. 575. — Bras.
Ridolfianum X, Pucci, in Bull. Soc. Tosc. Ort. (1891) 244 t. 8. — Hybr. artef.
roraimense, N. E. Br. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 286 (Oliver, ex im Thurn. in Timehri, v. (1886) 209). — Guian. angl.
rosaeiflorum X, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 731 nomen. — Hybr. artef.
roseum X, Hort. ex Boll. Soc. Tosc. Ort. (1888) 99. — Hybr. artef.
rotundispdatum X, L. Lind. et Rodigas, in Illustr. Hort. (1891) 9 t. 119. — Hybr. artef.
salmonium X, Hort. ex Illustr. Hort. (1895) 281 t. 42. — Hybr. artef.
subulatum, N. E. Br. in Gard. Chron. Ser. xxvii. (1886) 230. — Columb.
sylvestre, S. Moore, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1895) 503. — Bras.
Van Wambeckeanum X, Hort. ex Illustr. Hort. (1895) 281 = *Wambeckeanum*, Hort.
Wambeckeanum X, Hort. ex Illustr. Hort. (1895) 185. — Hybr. artef.
Wanbeckianum X, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 557 fig. 92 = *Wambeckeanum*, Hort.

ANTHURIUM : —

Wittmackii X, Hort. ex Gartenfl. (1889) 121 t. 1293 fig. c. — Hybr. artef.

ANTHYLLIS, Riv. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 153.

albana, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 37 t. ii. fig. 24, 26. — Albania.
alpicola, Brügg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxix. (1886) 25 = A. *Vulneraria*, Linn.
Cherleri, Brügg. l. c. = A. *Vulneraria*, Linn.
densifolia, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn. xxxii. 1893 (1894) 209. — Maced.?
depressa, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 203. — Hisp.
dinarica, G. Beck, Fl. von Südbosn. vi. (1891) 341 t. 19. — Bosnia.
fulgurans, Porta, in Nuov. Giorn. bot. Ital. xix. (1887) 303. — Ins. Balear.
Hegelschweileri, Brügg. ex Killias, in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 39 = A. *Vulneraria*, Linn.
scarzica, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 37. — Albania.

ANTIARIS, Lesch. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 153.

turbiniifera, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 215. — Ins. Salom.
ANTIAROPSIS, K. Schum. in K. Schum. Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 40. **URTICEAE**.
decipiens, K. Schum. l. c. — N. Guin.

ANTICHARIS, Endl. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 153.

Ascheroniana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 188. — Angola.
ebracteata, Schinz, l. c. 187. — Afr. austro-occ. extratrop.
imbricata, Schinz, l. c. — Afr. austro-occ. extratrop.
inflata, Marl. et Engl. in Bot. Jahrb. x. (1889) 251. — Afr. austro-occ. extratrop.
longifolia, Marl. et Engl. l. c. 252. — Afr. austro-occ. extratrop.

ANTIDESMA, Burm. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 154.

alatum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 358. — Penins. Mal.
alnifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 519. — Madag.
andamanicum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 364. — Ins. Andam.
apiculatum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 430. — China.
arbutifolia, Baker, l. c. xxii. (1887) 519. — Madag.
brunneum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 359. — Zeyl.
brachyscypha, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 519. — Madag.
comorense, Vathe et Pax, ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 529. — Ins. Comor.
erythroxyloides, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 214. — Madag.
Fordii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 430. — China.
gracilis, Hemsl. l. c. 431. — China.
Helferi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 357. — Ind. or.
Henryi, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 431. — China.
hasianum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 362. — Reg. Himal.
Kingii, Hook. f. l. c. 356. — Perak.
lanceolatum, Hook. f. et Thoms. ex Hook. f. l. c. 362 = *hasianum*, Hook. f.
leucocladon, Hook. f. l. c. 358. — Penins. Mal.
longipes, Hook. f. l. c. 355. — Perak.
longipes, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 529. — Afr. trop. occ.
microphyllum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 432. — China.
oblongum, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 364 = *martabanicum*, Presl.
olivaceum, K. Schum. in K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land, (1889) 76. — N. Guin.

ANTIDESMA : —

pachystachys, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 355. — Penins. Mal.
pendulum, Hook. f. l. c. — Perak.
pulvinatum, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 403. — Ins. Hawaii.
Schweinfurthii, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 530. — Afr. centr. bor.
Wattii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 366. — Ind. or.
Wawraeanum, G. Beck, ex Wawra, Itin. Princ. S. Co-burg. ii. (1888) 77. — Ins. Hawaii.

ANTIGONON, Endl. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 154.

flavescens, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 446. — Mexic.

ANTIRRHINUM, Tourn. ex Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 155.

antirrhiniflorum, Hitchc. in Rep. Missouri Bot. Gard. iv. (1893) 113; Heller, Bot. Expl. S. Texas (1895) 91 = *Maurandia antirrhiniflora*, Willd.
asarinum, St-Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 621 = A. *Asarina*, Linn.
Nevinianum, Orcutt in West Am. Scientist (1891) 208 = *Nevinianum*, A. Gray.
Watsoni, Vasey et Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi. (1888) 533. — Calif.

ANTOGOERINGIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 250 = *Stenosiphon*, Spach (Onagrar.).

linifolia, Kuntze, l. c. = S. *virgatum*, Spach.

ANTUNESIA, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1893) 178. **COMPOSITAE**.

angolensis, O. Hoffm. l. c. 179. — Angola.

ANUBIAS, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 157.

hastaeifolia, Engl. in Mitt. zu Forschungs. von Danckelm. ii. 149; et in Bot. Jahrb. xv. (1893) 462. — Afr. trop. occ.

ANYCHIA, Michx (Illecebr.). — Ind. Kew. i. 157.

canadensis, Britton, Stern, et Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 44 = *capillaris*, DC.
filiformis, Rafin. ex Britton in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 187 = *capillaris*, DC.

APALATOA, Aubl. = *Crudia*, Schreb. (Legumin.).

acuminata, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 394. = C. *acuminata*, Benth.
amazonica, Taub. l. c. = C. *amazonica*, Spruce.
aromatica, Taub. l. c. = C. *aromatica*, Willd.
bantamensis, Taub. l. c. 395 = *Pryona bantamen-sis*, Miq.
glaberrima, Taub. l. c. 394 = C. *obliqua*, Griseb.
oblonga, Taub. l. c. = C. *oblonga*, Benth.
pubescens, Taub. l. c. = C. *pubescens*, Spruce.
senegalensis, Taub. l. c. 395 = C. *senegalensis*, Planch.
tomentosa, Taub. l. c. 394 = C. *Parivora*, DC.
zeylanica, Taub. l. c. 395 = C. *zeylanica*, Benth.

APAMA, Lam. = *Bragantia*, Lour. (Aristoloch.).

corymbosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 63 = B. *corymbosa*, Griff.
Dalzellii, Kuntze, l. c. = B. *Dalzellii*, Hook. f.
racemosa, Kuntze, l. c. = B. *racemosa*, Lour.
tomentosa, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. III. i. (1888) 272 = B. *tomentosa*, Blume.

APATION *purpurascens*, Blume, ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 279 in syn. = *Liparis repens*, Ridl.

APEIBA, Aubl. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 158.

Schomburgkii, Szyszyl. in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Crac. xxvii. (1894) 140. — Guian., Venez.

APERA, Adans. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 158.

purpurascens, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888. l (1889) 106. — N. Zel.

APERULA, Blume = *Lindera*, Thunb. (Laurin.).

Meissneri, Herb. Calc. fide Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 182 = L. *assamica*, Kurz.

APHANAMIXIS, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) sub t. 334. *MELIACEAE*.
Rohituka, Pierre, l. c. — As. trop. austro-or.

APHANANDRIUM, Lindau, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 323. *ACANTHACEAE*.
Lehmannianum, Lindau, l. c. — Columb.

APHANANTHE, Planch. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 158.
aspera, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1. (1888) 66. — Japon.

APHANES, Linn. = *Alchemilla*, Linn. (Rosac.).
pusilla, Pomel, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888) 309 = *Al. cornucopioides*, Roem. et Schult.

APHANELYTRUM, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito 1889) 7 nomen. — *GRAMINEAE*.
decumbens, Hack. l. c. — Ecuad.

APHANIA, Blume = *Sapindus*, Linn. (Sapind.).
phylastreana, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) t. 329 B. — Cochinch.
viridis, Pierre, l. c. t. 329 A. — Cochinch.

APHANOCOCCUS, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. (1888) 74; et in Sitz. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 283. *SAPINDACEAE*.
celebicus, Radlk. l. c. — Ins. Celeb.

APHANOSTEPHUS, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 159.
pinulensis, Coult. ex J. D. Smith, Enum. pl. Guat. ii. (1891) n. 2407 nomen; et in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 98. — Guatem.
shirrobasis, Trelease, ex Coville et Branner in Rep. Geol. Surv. Ark. 1888, iv. (1891) 191 = *arkansanus*, A. Gray.

APHELANDRA, R. Br. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 159.
amoena, Bull. Catal. (1888) 7; et Kew Bull. (1889) 77 = *Blanchetiana*, Hook. f.
Blanchetiana, Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7179. — Bras.
chrysops, Bull. Catal. (1887) 7 et 9; et in Gard. Chron. (1887) i. 736 fig. 140 = *squarrosa*, Nees, var.
dubia ×, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hortie. (1894) 233 t. 15. — Hybr. artef.
gigantiflora, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 369. — Am. centr.
Heydeana, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 210. — Guatem.
inaequalis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 368. — Bolivia.
Macedoiana, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hortie. (1886) 11 t. 583. — Bras.
macrosiphon, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 367. — Bolivia.
montana, Lindau, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 322 (= *Lagochilium montanum*, Nees). — Am. austr.
simplex, Lindau, l. c. 366. — Bolivia.
tomentosa, Lindau, l. c. 369. — Venez.

APHELEXIS, D. Don (Composit.). — Ind. Kew. i. 161.
flexuosa, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 492. — Madag.
stenoclada, Baker, l. c. 493. — Madag.
sulphurea, Baker, l. c. — Madag.

APHLOIA, Benn. (Bixin.). — Ind. Kew. i. 160.
minima, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 444. — Madag.
myrtiflora, Galpin, in Kew Bull. (1895) 142. — Transvaal.

APHORA, Neck. = *Virgilia*, Lam. (Legumin.) (cfr. Ind. Kew.).
argentea, biflora, Burchellii, buxifolia, calyptrata, canescens, cordata, cuneifolia, glauca, lanceolata, micro-

APHORA : —

phylla, orbicularis, reticulata, sericea, speciosa, velutina, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 161 = *homonyma omnia* Podalyriae.
rotundifolia, Kuntze, l. c. 160 = *P. myrtillifolia*, Willd.

APHYLLARUM, S. Moore, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1895) 501. *AROIDEAE*.
tuberosum, S. Moore, l. c. t. 35. fig. 1-12. — Bras.

APHYLLON, Mitch. (Orobanch.). — Ind. Kew. i. 160.
californicum, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad., Ser. II. ii. (1889) 192 = *californicum*, A. Gray.
chilense, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 201 (= *Myzorrhiza chilensis*, Phil.). — Chili.

APHYLLORCHIS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 160.
Odoardi, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 345. — N. Guin.
Prainii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 117; et Icon. pl. xxii. (1894) t. 2192. — Reg. Himal.
vaginata, Hook. f. l. c. cc. 117; et t. 2193. — Reg. Himal.

APIASTRUM, Nutt. ex Torr. (Umbellif.) — Ind. Kew. i. 160.
patens, Coult. et Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 110; et Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 146 (= *Leptocaulis patens*, Nutt.). — Am. bor.

APICRA, Willd. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 160.
turgida, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 44. — Afr. austr.

APINELLA, Neck. = *Trinia*, Hoffm. (Umbellif.).
Dufourii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = *T. Dufourei*, DC.
frigida, Kuntze, l. c. (= *Rumia frigida* Boiss. et Heldr.) — Graecia.
glauca, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 503 = *T. vulgaris*, DC.
glauca, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = *praec.*
Guicciardi, Kuntze, l. c. (= *Rumia Guicciardii*, Boiss. et Heldr.) — Graecia.
Henningii, Kuntze, l. c. = *T. Henningii*, Hoffm.
hispida, Kuntze, l. c. = *T. hispida*, Hoffm.
Kitaibelii, Kuntze, l. c. = *T. Kitaibelii*, Bieb.
Lessingii, Kuntze, l. c. = *T. Lessingii*, Reichb. f.
scabra, Kuntze, l. c. = *T. scabra*, Boiss. et Noé.
seselioides, Kuntze, l. c. = *E. seselioides*, Ledeb.
taurica, Kuntze, l. c. = *Sanicula crithmifolia*, Willd.

APIOS, Moench (Legumin.). — Ind. Kew. i. 161.
Apios, MacMillan, in Bull. Torrey Bot. Club. xix. (1892) 15 = *tuberosa*, Moench.
Delavayi, Franch. Pl. Delav. (1890) 180. — Yunnan.
macrantha, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1946. — China.

APIUM, (Tourn.) Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 161.
alpinum, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 429 = *Carum alpinum*, Benth. et Hook. f.
Ammios, Caruel, l. c. 435 = *Ptychotis verticillata*, Duby.
andinum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 717. — Chili.
anisoides, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 459 = *Pimpinella anisoides*, Brign.
Berula, Caruel, l. c. 463 = *Sium erectum*, Huds.
Butleri, Engelm. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 453. — Texas, Arkans.
crinitum, Caruel, in Fl. Parl. Ital. viii. (1889) 441 = *Ammi crinitum*, Guss.
ferulaceum, Caruel, l. c. 428 = *Carum ferulaefolium*, Boiss.
flexuosum, Caruel, l. c. 433 = *C. flexuosum*, Nym.
luteum, Caruel, l. c. 458 = *Pimpinella lutea*, Desf.
montanum, Caruel, l. c. 429 = *Carum montanum*, Benth. et Hook. f.

APIUM : —

Pimpinella, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1886) 452 = *Pimpinella magna*, Linn.
Podagraria, Caruel, l. c. 467 = *Aegopodium Podagraria*, Linn.
rigidulum, Caruel, l. c. 434 = *Carum rigidulum*, Koch.
verticillatum, Caruel, l. c. 430 = *C. verticillatum*, Koch.
Tragium, Caruel, l. c. 460 = *Pimpinella Tragium*, Desf.

APLECTRUM, Torr. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 161.
spicatum, Britton, Stern. et Pogg. Prelim. Catal. (1888) 51 = *hiemale*, Nutt.

APLOPAPPUS, Cass. (Composit.). — Ind. Kew. i. 162.
cruentus, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 17. — Calif.
fasciculatus, Coult. et Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. (1888).
gracilis, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) = an *Aplop. gracilis*, A. Gray?
graveolens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 313, sphalm. = *Bigelowia dracunculoides*, DC.
Howellii, A. Gray. Syn. Fl. N. Am. ed. 2, Suppl. i. (1886) 446. — Oregon.
interior, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 65. — Calif.
Nealleyi, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 40; et ii. (1892) 186. — Texas.
niveus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 277. — Mexic.
spinulosus, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 168. — Calif.
tenuilobus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 385 et 432. — Mexic.
texanus, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 40; et ii. (1892) 241 = *Haploesthes* Greggii, A. Gray.
vernicosus, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 168. — Calif.

APLUDE, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 164.
varia, Hack. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2. (1887) 26; et in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 196. — As. et Austral. trop.

APOCOPIS, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. i. 164.
collina, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 84. — Tonk.
vaginata, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 8. — Ind. or.

APOCYNUM (Tourn.) Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 164.
floribundum, Greene, in Erythea, i. (1893) 151. — Calif.
pumilum, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay. (1894) 240. — Calif.
vestitum, Greene, l. c. — Calif.

APODANTHERA, Arn. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 164.
crispa, Cogn. in Bull. Acad. roy. Belg. Sér. III. xiv. (1888) 352. — Mexic.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 50. — Mexic.
Pringlei, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 149; et in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 83. — Mexic.
Roseana, Cogn. ex J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 317. — Mexic.

APODANTHES, Poit. (Cytin.). — Ind. Kew. i. 164.
globosa, S. Wats. ex Robinson, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 83. — Mexic.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 50. — Mexic.

APODINA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 353 = *Loranthus*, Linn. (Loranth.).
cucullaris, Van Tiegh. l. c. = *L. cucullaris*, Lam.
cupulifer, Van Tiegh. l. c. = *L. cupulifer*, H. B. et K.

APODINA : —

mexicana, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 353 = *Loranthus mexicanus*, Presl.

APODOCEPHALA, Baker (Composit.). — Ind. Kew. i. 164.

minor, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 28. — Madag.

APODOLIRION, Baker (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 164.

Ettae, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 26. — Natal. Macowani, Baker, l. c. — Afr. austr.

APODYTES, E. Mey. (Oclacin.). — Ind. Kew. i. 164.

cambodiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1892) t. 267. — Cochinch.

emirnenis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 458. — Madag.

Frappieri, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 377. — Ins. Borbon.

inversa, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 236. — Madag.

Stuhlmanni, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 71. — Afr. trop. or.

Thouarsiana, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 237. — Madag.

APOGONIA, Fourn. = *Rottboellia*, Linn. (Gramin.).

glabrata, Fourn. Gram. Mexic. 1881. (1886) 63. — Mexic. (cfr. Ind. Kew. i. 165).

ramosa, Fourn. l. c. — Mexic. (cfr. l. c.).

APONOGETON, Linn. f. (Naiad.). — Ind. Kew. i. 165.

Boehmii, Engl. in Notizbl. bot. Gart. i. (1895) 26. — Afr. trop. or.

flavidum, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 564 in syn. = monostachyum, Linn. f.

gracile, Schinz, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1894. (1895) 492. — Transvaal.

Heudelotii, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 271. (= *Ouvirandra Heudelotii*, Kunth). — Afr. austr.

Kraussianus, Hochst. ex Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 270 = leptostachyum, E. Mey.

Lagrangei, Éd. André, in Rev. Hortic. (1895) 380 cum icon = distachyum, Thunb.

lucens, Herb. Madr. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 564 in syn. = monostachyum, Linn. f.

Stuhlmannii, Engl. in Notizbl. bot. Gart. Berl. i. (1895) 26. — Afr. trop. or.

APOROSA, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 165.

aurea, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 351. — Ind. or.

Benthiana, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1583. — Penins. Mal.

Bourdillonii, Stapf, in Hook. l. c. xxiii. (1892) t. 2204. — Travanc.

Clellandii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 348. — Pegu.

falcifera, Hook. f. l. c. 352. — Perak.

globifera, Hook. f. l. c. 347. — Perak.

Griffithii, Hook. f. l. c. 353. — Penins. Mal.

Maingayi, Hook. f. l. c. 348. — Ind. or.

microsphaera, Hook. f. l. c. 350. — Perak.

nervosa, Hook. f. l. c. 350. — Malacca.

nigricans, Hook. f. l. c. 347. — Perak.

stellifera, Hook. f. l. c. 352. — Penang, Perak.

Wallichii, Hook. f. l. c. 350. — Reg. Himal.

APOSTASIA, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 165.

gracilis, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 242. — Borneo.

latifolia, Rolfe, l. c. — Perak.

APPENDICULA, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 166.

congesta, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 239. — Borneo.

cordata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 83; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2148. — Perak.

APPENDICULA : —

disticha, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 354 t. 270. — N. Guin.

echinocarpa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 85; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2152. — Penins. Mal.

elongata, Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii. (1893) 375. — Penins. Mal.

Koenigii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 84; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2149. — Ind. or.

lancifolia, Hook. f. l. c. 84; et t. 2150. — Perak.

Maingayi, Hook. f. l. c. 85; et t. 2151. — Penins. Mal.

Peyeriana, Kraenzl. in Gard. Chron. ii. (1891) 669. — Sumatra.

APTANDRA, Miers (Oclacin.). — Ind. Kew. i. 166.

Gora, Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, i. (1895) 315. — Congo gall.

APTOSIMUM, Burch. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 166.

albomarginatum, Marl. et Engl. in Bot. Jahrb. x. (1889) 249. — Afr. austr.

arenarium, Engl. l. c. 250. — Afr. austro-occ. extratrop.

decumbens, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 184. — Afr. austro-occ. extratrop.

elongatum, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 249. — Afr. austr.

lineare, Marl. et Engl. l. c. 250. — Afr. austro-occ. extratrop.

nanum, Engl. l. c. 249. — Afr. austr.

scaberrimum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 185. — Afr. austro-occ. extratrop.

Steingroeveri, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 149. — Afr. austro-occ. extratrop.

AQUILARIA, Lam. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 166.

Beccariana, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 77. — Borneo.

borneensis, Van Tiegh. ex Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 224. — Borneo.

sinensis, Gilg, in Engl. Bot. Jahrb. xviii (1894) 506; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 224 = grandiflora, Benth.

AQUILARIELLA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xl. (1893) 77 = *Aquilaria*, Lam. (Thymel.).

borneensis, Van Tiegh. l. c. = *A. borneensis*, Van Tiegh.

malaccensis, Van Tiegh. l. c. = *A. malaccensis*, Lam.

microcarpa, Van Tiegh. l. c. = *A. microcarpa*, Baill.

AQUILEGIA, (Tourn.) Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 166.

afghanica, P. Bruhl, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1893) ii. 309. — Ind. or.

atroviolacea, G. Beck, Fl. von Nieder-Oest. i. (1890) 400 = vulgaris, Linn.

dinarica, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien. vi. (1891) 341 t. 9 fig. 1-5. — Bosnia.

ecalcarata, Eastwood, in Zoe, ii. (1891) 226; iv. 3 t. 259; et in Proc. Calif. Acad., Ser. II. iv. (1895) 560. — Colorado.

ecalcarata, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 20 t. 8 fig. 12. — China.

eynensis, P. Bruhl, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1893) ii. 293 = vulgaris, Linn.

flabellata, Carrière, in Rev. Hortic. (1887) 548 fig. 116. — Form. hort.

micrantha, Eastwood, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iv. (1895) 559. t. 13. — Utah., Colorado.

Molleriana, Borb. et Freyn in Foldrajzi Közlemények (1894) ex Mariz, in Bolet. Soc. Brot. iv. (1886) 108. — Lusit.

pubescens, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 56. t. 1. — Calif.

recticornu, P. Bruhl, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1893) ii. 293 = vulgaris, Linn.

Rauwolfii, Hort. ex Kew Bull. App. i. (1890) 4. — Hab. ?

saximontana, Rydberg, ex Robinson Syn. Fl. N.-Amer. i. (1895) 43. — Colorado.

AQUILEGIA : —

Stuarti X, Balf. f. in Garden (1888) 344; et Rev. Hortic. (1888) 539. — Hybr. artef.

suaveolens, P. Bruhl, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1893) ii. 309. — Ind. or.

subaphylla, P. Bruhl, l. c. — Ind. or.

Wallichiana, Herb. Calc. ex P. Bruhl, l. c. 306 = vulgaris, Linn.

Winterbottomiana, P. Bruhl, l. c. 309 = vulgaris, Linn.

ARABIS, Linn. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 168.

atrorubens, Suksdorf, ex Greene, in Erythea, i. (1893) 223. — Washington.

Beckwithii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 467. — Am. bor. occ.

Bolanderi, S. Wats. l. c. — Am. bor. occ.

bosniaca, G. Beck, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, v. (1887) 71 = bellidifolia, Crantz.

brachycarpa, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 174 = Turrilis brachycarpa, Torr. et Gray.

columbiana, Macoun, Catal. Canad. Pl. iv. (1888) 304. — Columb. brit.

confinis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 466. — Am. bor.

digenea X, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. 1894. (1895) 314. — Hybr. artef.

elegans, Tineo, ex Lojaccono, Fl. Sicula, i. (1886) 106. — Sicil.

filifolia, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. (1887) 390 (= *Cardamine filifolia*, Greene). — Calif.

Freynii, Brugg. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 231. — Eur. centr.

grandiflora, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. (1889) 171 = petraea, Lam.

Howellii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 124. — Oregon, Calif.

humifusa, S. Wats. l. c. (= *Sisymbrium humifusum*, Vahl). — Am. bor.

intermedia, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 133 = F. reynii, Brugg.

junceae, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien, li. (1886) 297. — Persia.

Lemmoni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 467; et Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 61. — Am. bor. occ.

Linneana, Wettst. in Luer. Bibl. Bot. Heft 26. (1892) 18 = alpina, Linn.

longirostris, Eastwood, in Zoë, iii. (1893) 355, nomen = Streptanthus longirostris, S. Wats.

Macounii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 124. — Columb. brit.

Malinvaldiana, Rouy et Coincy, in Coincy, Eclog. pl. Hisp. i. (1893) 7 t. 1. — Hisp.

Murrii X, Khék, in Progr. Oberrealsch. Innsbruck (1891) 52; et in Deutsche Bot. Zeitsch. xii. (1894) 92. — Austria.

nana, Simonk. Enum. fl. Transilv. (1886) 75 = alpina, Linn.

paniculata, Franch. Pl. Delav. (1889) 57. — Yunnan.

Parishii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 468. — Calif.

pectinata, Greene, in Pittonia, i. (April 1889) 287. — Calif.

perennans, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 467. — Am. bor. occ.

pleurantha, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 763. — Chili.

pulchra, M. E. Jones, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 468. — Calif.

purpurascens, Howell, ex Greene, Pittonia, i. (Feb 1888) 161. — Oregon.

Reverchoni, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 302; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 542. — Hisp.

scopulorum, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 165 t. 8. — Calif.

secunda, Howell, in Erythea, iii. (1895) 33. — Am. bor. occ.

stylosa, Boiss. et Balansa, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 34. — As. Min.

surculosa, Terrac. in Atti Accad. sc. Napoli, Ser. II. iv. (1890) app. n. 2 = serpyllifolia, Vill.

tarapacana, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 4. — Bolivia.

ARABIS : —

virginica, Trelease, Branner et Coville, in Branner, Rep. Geol. Surv. Ark. 1888 (1891) 165 (= *Cardamini virginica*, Linn.) = *A. Ludoviciana*, C. A. Mey.

ARACHNANTHE, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 170.

alba, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*, iii. (1893) 369. — Penins. Mal.
Clarkei, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 567; *Hook. f. in Bot. Mag.* (1889) t. 7077. — Reg. Himal.
Maingayi, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1889) sub t. 7077 in obs.; et *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 28. — Malacca.

ARACHNIS, Blume = **Arachnanthe**, Blume, (Orchid.).

Beccarii, Reichb. f., in *Bot. Centralbl.* xxviii. (1886) 343. — Borneo.
Flos-aëvis, Reichb. f., l. c. = *Arachnanthe moschifera*, Blume.
Hookeriana, Reichb. f., l. c. = *Renanthera Hookeriana*, Reichb. f.
labrosa, Reichb. f., l. c. = *Arachnanthe bilinguis*, Benth.
Lowe, Reichb. f., l. c. 344 = *Arachnanthe Lowe*, Benth. et *Hook. f.*
Rohaniana, Reichb. f., l. c. 344 = *Renanthera Hookeriana*, Reichb. f.
Sulingi, Reichb. f., l. c. 343 = *Renanthera Sulingi*, Lindl.

ARALIA, Tourn. ex Linn. (Aral.). — Ind. Kew. i. 171.

Chabrieri, Hort. ex Carrière, in *Rev. Hortic.* (1887) 20; et (1891) 224. — N. Caled.
concinna, Hort. ex Truff. in *Rev. Hortic.* (1891) 224 = *spectabilis* Hort.
Kerckovei, Hort. ex Truff. l. c. 224 fig. 55. — Oceania.
leptophylla, Hort. ex Truff. l. c. — Melanesia.
longipes, Hort. ex Truff. l. c. — Austral.
Macdowalli, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* ii. (1887) 126. in obs.; et F. M. Bailey, *Syn. Quansl. Fl. Suppl.* ii. (1888) 31 (= *Panax Macdowalli*, F. Muell.) — Austral.
maculata, Hort. ex Truff. in *Rev. Hortic.* (1891) 224. — Oceania.
monstrosa, Hort. ex Truff. l. c. fig. 54. — Oceania.
Naumannii, E. March. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 469. — N. Guin.
Osyana, Hort. ex Truff. in *Rev. Hortic.* (1891) 224. — Oceania.
quercifolia, Hort. ex Truff. l. c. — N. Brit.
Reginae, Hort. ex Truff. l. c. — N. Hebrid.
rotunda, Hort. ex Truff. l. c. — Polynesia.
scopulorum, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*, ii. (1889) 165 t. 8. — Calif.
splendidissima, Hort. ex Truff. in *Rev. Hortic.* (1891) — N. Caled.
ternata, Hort. ex Truff. l. c. 225. — N. Brit.

ARAUCARIA, Juss. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 172.

Hunsteinii, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land.* (1889) 11. — N. Guin.

ARAUJIA, Brot. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 172.

grandiflora, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sc.* vii. (1893) 161 (= *Schubertia grandiflora*, Mart. et Zucc.). — Parag.
graveolens, Mast. in *Gard. Chron.* (1888) ii. 271 fig. 33 (= *Schubertia graveolens*, Lindl.). — Bras.
plumosa, Schlechter, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 449 (Arauja). — Argent.
Stormiana, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 161. — Parag.

ARBUTUS, (Tourn.) Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 172.

arizonica, Sarg. in *Gard. and For.* iv. (1891) 317 fig. 54, et N. Amer. Sylva v. 127 t. 233 (= *A. Menziesii*, Rothrock). — Arizona, Mexic.
floribunda, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 349 = *Pernettya phillyreaefolia*, DC.

ARBUTUS : —

nothocomarvos, Heldr. ex Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. I. (1889) 214 = *A. Unedo*, Linn.

ARCANGELINA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 759 = **Kralikia**, Coss. et Dur. (Gramin.).

africana, Kuntze, l. c. = *K. africana*, Coss. et Dur.

ARCEUTHOBIUM, Bieb. (Loranth.). — Ind. Kew. i. 172.

minutissimum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 227. — Reg. Himal.

ARCHANGELICA, Hoffm. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 173.

villosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = *hirsuta*, Torr. et Gray.

ARCHYTAEA, Mart. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 173.

alternifolia, Szyszyl. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 181. — As. trop. insul.

ARCTAGROSTIS, Griseb. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 173.

humilis, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1889) 41. — Nov. Semlia.

ARCTIUM, Linn. emend. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 306 = **Cousinia**, Coss. (Composit.).

aciculare, *Actinia*, *adnatum*, *affine*, *aintabense*, *albicaule*, *albidum*, *Alepidaeae*, *alpinum*, *amplissimum*, *anomalum*, *Antonowii*, *araneosum*, *arctotidifolium*, *arenarium*, *atropatanum*, *Aucher*, *aureum*, *auriculatum*, *Baberi*, *bachtiaricum*, *Belangeri*, *Bienertii*, *bipinnatum*, *Boissieri*, *Bonvalotii*, *brachypterum*, *bucharicum*, *buphthalmodes*, *Bungeanum*, *caesareum*, *Calcitrapa*, *calocephalum*, *Capusii*, *carduiforme*, *carduncelloideum*, *cataonicum*, *Chamaepeuce*, *chlorocephalum*, *chrysacanthum*, *commutata*, *concinnum*, *concolor*, *congestum*, *coronatum*, *crispum*, *cylindraceum*, *cylindrocephalum*, *cymbolopsis*, *decipiens*, *decurrens*, *deserti*, *dichotomum*, *discolor*, *dissectum*, *dolicholepis*, *elatum*, *erinaceum*, *eriobasis*, *eriocephalum*, *eriphorum*, *Falconeri*, *flavispinum*, *foliosum*, *gracile*, *grande*, *grandiceps*, *Griffithianum*, *Habitzi*, *hamosum*, *helianthum*, *Hermonis*, *heterophyllum*, *Hohenackeri*, *hololeucum*, *humile*, *hypoleucum*, *hystrix*, *ilicifolium*, *incomptum*, *inflatum*, *intermedium*, *integrifolium*, *involutum*, *jassense*, *karatavicum*, *kokanicum*, *Korolkowii*, *Krauseanum*, *lachnosphaerum*, *lappaceum*, *lasianthum*, *lasiolepis*, *lepidum*, *leptocephalum*, *libanoticum*, *lucidum*, *lyratum*, *macrocephalum*, *macrolepis*, *macropterum*, *microcephalum*, *molle*, *monocephalum*, *multilobum*, *neurocentrum*, *Noeanum*, *obovatum*, *odontolepis*, *oligocephalum*, *Olivieri*, *outichaschense*, *pentacanthum*, *pergamaceum*, *Pestalozzae*, *pinarocephalum*, *piptoccephalum*, *platylepis*, *polycephalum*, *prasinum*, *princeps*, *pseudomolle*, *pterocarpum*, *pugioniferum*, *pulchellum*, *pulchrum*, *purpureum*, *pusillum*, *pygmaeum*, *racemosum*, *Raddianum*, *radians*, *ramosissimum*, *recurvatum*, *sakawense*, *scariosum*, *Schmalhauseni*, *Schtschurowskianum*, *Seidlitzii*, *Semenowii*, *Sewerzowii*, *Smirnowii*, *squarrosus*, *stenocephalum*, *stenolepis*, *submuticum*, *tabrisianum*, *tenuifolium*, *Thomsonii*, *tomentellum*, *triflorum*, *turcomanicum*, *umbrosum*, *uncinatum*, *verbascifolium*, *verticillare*, *Verutum*, *xanthacanthum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307-308 = *homonyma omnia Cousiniae*.

actinocephalum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307 = **C. xiphiolepis**, Boiss.

alatum, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop. x.* (1887) 197 = *C. alata*, Schrenk.

alpicolum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307 = **C. alpina**, Bunge.

ambiguum ×, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. I. (1889) 179. — Bohem., Transsilv.

anisopterum, Kuntze, l. c. = **C. calolepis**, Boiss.

arctiodes, Kuntze, l. c. = **C. arctioides**, Schrenk.

assyriacum, Kuntze, l. c. = **C. leucochlora**, Bunge.

carlinodes, Kuntze, l. c. = **C. carlinoides**, DC.

centaurodes, Kuntze, l. c. = **C. centauroides**, Fisch. et Mey.

cirsiodes, Kuntze, l. c. = **C. cirsiodes**, Boiss. et Bal.

cynarodes, Kuntze, l. c. = **C. cynaroides**, C. A. Mey.

eryngioides, Kuntze, l. c. = **C. eryngioides**, Boiss.

ARCTIUM : —

Franchetianum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307 = **C. canescens**, Franch.

Kardlinii, Kuntze, l. c. 308. = **C. onopordioides**, Ledeb.

Komaroffii, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop. x.* (1887) 197 = **C. Komarowii**, C. Winkl.

microcarpum, Kuntze, l. c. = **C. microcarpa**, Boiss.

minutum, Kuntze, l. c. = **C. minuta**, Boiss.

mixtum ×, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. I. (1889) 179 = **C. mixta**, Simonk.

niveum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307 = **C. Trautvetteri**, Regel.

nothum ×, E. Hallier, in *Koch's Syn. deutsch. Fl. ed. 3.* (1895) 1512 (= *Lappa notha*, Rühm.). — Germ.

orientale, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop. x.* (1887) 197 = **Auchera orientalis**, DC.

orientale, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 367 = **C. Candolleana**, Faub. et Spach.

polyacanthum, Kuntze, l. c. = **C. onopordioides**, Ledeb.

proliferum, Kuntze, l. c. = **C. prolifera**, Faub. et Spach et **C. minuta**, Boiss.

serratulodes, Kuntze, l. c. = **C. serratuloides**, Boiss.

silybodes, Kuntze, l. c. 307 et 308 = **C. Kotschy**, Boiss.

sphaerocephalum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307 = **C. Chamaepeuce**, Boiss.

subracemosum ×, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. I. (1889) 179 = **C. subracemosa**, Simonk.

tenellum, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop. x.* (1887) 197 = **C. tenella**, Fisch. et Mey.

trachylepsis, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop. x.* (1887) 197 = **C. trachylepis**, Bunge.

thamnodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) = **C. thamnoides**, Boiss. et Hausskn.

wolgense, Kuntze, l. c. — Ross. mer.

xiphiolepis, Kuntze, l. c. = **C. xiphiolepis**, Boiss.

ARCTOMECON, Torr. et Frém. (Papaver.). — Ind. Kew. i. 174.

humile, Coville, in *Proc. Biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 67. — Am. bor. occ.

Merriami, Coville, l. c. 66. — Calif.

ARCTOSTAPHYLOS, Adans. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 174.

bicolor, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*, ii. (1889) 181 = *bicolor*, A. Gray.?

Caeciliana, Loes. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 553. — Mexic.

diversifolia, Parry, ex A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* II. i. (1886) 397. — Calif.

elegans, Jepson, in *Erythra*, i. (1893) 15. — Calif.

insularis, Greene et Parry, in *Bull. Calif. Acad.* ii. (1887) 494. — Calif.

Manzanita, Parry, l. c. 491. (= *Arct. pungens*, Auct.). — Am. bor. occ.

media, Greene, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 171. — Washington.

myrtifolia, Parry, in *Greene. Pittonia*, i. (March. 1887) 34. — Calif.

oppositifolia, Parry, ex A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* II. i. (1886) 397.

Parryana, Lemmon, in *Greene. Pittonia*, ii. (May 1890) 68. — Calif.

platyphylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 385 = **Arct. Manzanita**, Parry.

Pringlei, Parry, in *Bull. Calif. Acad.* ii. (1887) 494. — Mexic.

rupestris, Robinson et Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 112. — Mexic.

Stanfordiana, Parry, in *Bull. Calif. Acad.* ii. (1887) 493. — Calif.

viscida, Parry, l. c. 492. — Am. bor. occ.

ARCTOTIS, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 174.

caudata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 306 sphalm. = *candida*, Thunb.

Rueppellii, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 419 (= *Schnittspahnia Rueppellii*, Sch. Bip.). — Afr. trop. or.

scaposa, O. Hoffm. l. c. (= *Haplocarpha scaposa*, Harv.). — Afr. austr.

ARCTOUS, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 1. (1889) 48; et in Bot. Jahrb. xi. (1890) 141 = **Arctostaphylos**, Adans. (Ericac.).
alpina, Niedenzu, ll. cc. = *Arctost. alpina*, Spreng.

ARCULUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 444 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
Duthieanus, Van Tiegh. l. c. 445 = *L. Duthieanus*, King.

ARCYTOPHYLLUM, (Willd.) Roem. et Schult. = **Mallostoma**, Karst. (Rubiace.).
cachirensis, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 28 = *M. cachirensis*, Karst.
capitatum, K. Schum. l. c. = *M. capitatum*, Benth.

ARDISIA, Sw. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 174.
affinis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 63. — China.
amabilis, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 203. — Borneo.
brachythyrso, Stapf, l. c. 202. — Borneo.
caudata, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 63. — China.
densiflora, Krueg. et Urban. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 79. — Jamaica.
dissitiflora, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 501. — Madag.
Faberii, Hemsl. l. c. xxvi. (1889) 64. — China.
Fordii, Hemsl. l. c. — China.
Henryi, Hemsl. l. c. 65. — China.
imperialis, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 213. — N. Guin.
leptoclada, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 500. — Madag.
Listeri, Stapf, ex Hemsl. l. c. xxx. (1894) 213. — Ins. Tonga.
megaphylla, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 6; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2316. — Ins. Viti.
micrantha, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 27 (= *Paratheris micrantha*, J. D. Smith). — Guatem.
oocarpa, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 202. — Borneo.
pachyrrhachis, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (May 1891) 15; et in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 205 in syn. = *Bladhia pachyrrhachis*, F. Muell.
paschalis, J. D. Smith, Enum. pl. Guat. iii. (1891) n. 2465 nomen; et in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 5. — Guatem.
pectinata, J. D. Smith, in Coult. l. c. xii. (1887) 132. — Guatem.
picta, Hort. Bull. ex Gartenfl. (1886) 424 cum icone. — Bras.
poranthera, F. Muell. et C. Moore, in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xx. 1886 (1887) 43. — N. Guin.
tachibana, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 53. — Japon.
tufflora, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 67. — China.
Tuerckheimii, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 74. — Guatem.
venosa, Mast. ex J. D. Smith, l. c. xviii. (1893) 205. — Guatem.

ARDUINA, Adans. = **Kundmannia**, Scop. (Umbellif.).
sicula, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = *K. sicula*, Scop.

ARDUINA, Mill. = **Carissa**, Linn. (Apocyn.).
Carandae, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 170; K. Schum. in Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 127 = *C. Carandae*, Linn.
inermis, K. Schum. l. c. = *C. inermis*, Vahl.
laxiflora, K. Schum. l. c. = *C. laxiflora*, Benth.
Schimperi, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 168 = *C. Schimperii*, A. DC.
etramera, Sacleux, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 312. — Zanzib.
Xylopicron, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 170 = *C. Xylopicron*, Thou.

ARECA, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 177.
appendiculata, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. iv. (1891) 18. — Austral.
Micholitzii, Hort. ex Sand. Catal. (1895) 46. — N. Guin.
sechellarum, Hort. ex Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 348 = *Stevensonia grandifolia*, Duncan.

AREGELIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 698 = **Karatas**, Adans. (Bromel.).

ARENARIA, Rupp. ex Linn. (Caryophyll.). — Ind. Kew. i. 178.
alpicola, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, vi. (1891) 326 = *serpyllifolia*, Linn.
barbata, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 430; et Pl. Delav. (1889) 93. — Yunnan.
Boissieri, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 30 in obs. — Oriens.
brachyphylla, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 762 ou 771. — Chili.
catamarcensis, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 29. — Reg. Argent.
chokaiensis, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 397 t. 31; et Icon. fl. Japon. ii. (1892) t. 23. — Japon.
compacta, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 67; et in Contr. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 70 t. 5. — Calif.
condensata, Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 4. (1886-88) 670 = *serpyllifolia*, Linn.
crassifolia, Freyn, ex E. Hallier, in Koch, Syn. deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 292 = *serpyllifolia*, Linn.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 432; et Pl. Delav. (1889) 95. — Yunnan.
edulis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 430. — Mexic.
glandulosa, Williams, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 603 (= *Adenostemma glandulosum*, Benth.) = *Aren. Benthamii*, Edgew. et Hook. f.
holosteoides, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. 6. xv. 241. — China.
Kingii, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 627. — Calif.
kumaonensis, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 86 in obs. — Reg. Himal.
linearifolia, Franch. Pl. Delav. (1889) 96. — Yunnan.
longistyla, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 433; et Pl. Delav. (1889) 96 t. 24 b. — Yunnan.
merckiioides, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxii. (1888) 482. — Japon.
Moritziana, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 30 in obs. — Columb.
multifida, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi (1891) 136. — Mexic.
napuligera, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 429; et Pl. Delav. (1889) t. 24 a. — Yunnan.
nervosa, Halácsy et Charrel, in Oest. Bot. Zeitschr. (1892) 272. — Turc.
Nuttallii, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 30 in obs. — Am. bor. occ.
ovalifolia, Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop. viii. (1893) 40. — Reg. Caucas.
paludicola, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 298. — Calif.
platysperma, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 49 et 133 (= *Moerhingia platysperma*, Maxim.). — Japon.
pleurantha, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 763. — Chili.
pusilla, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien, li. (1886) 355 — As. Min.
pynophylloides, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 29. — Reg. Argent.
rhodocalyx, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 255. — Reg. Cauc.
Roborowskii, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 87 t. 29 fig. 8-16. — Tibet.
saginitoides, Maxim. l. c. 89 t. 31 fig. 1-17. — As. centr.
Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 307. — Bolivia.

ARENARIA : —
tejedensis, Huter, Porto et Rigo, ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 275. — Hisp.
transsilvanica, Simonk. in Erd. Flor. (1886) 148; in Termesz. Fuzet. x. (1886) 180; et Enum. fl. Transsilv. (1886) 140 = *rotundifolia*, Bieb.
trichophora, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 431; et Pl. Delav. (1889) 94. — Yunnan.
ursina, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 294. — Calif.
vestita, Baker, in Kew Bull. (1895) 212. — Afr. trop.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 431; et Pl. Delav. (1889) 94. — Yunnan.

ARENGA, Labill. (Palm.). — Ind. Kew. i. 181.
brevipes, Becc. Malesia, iii. (1889) 95 et 194. — Borneo.
Engleri, Becc. l. c. 184; et in Kew Bull. (1895) 19. — Formosa.
Listeri, Becc. in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1985. — Ins. Christmas.
microcarpa, Becc. in K. Schum. et Hollv. Fl. Kais. Wilh. Land, (1889) 16. — N. Guin.
undulatifolia, Becc. Malesia, iii. (1886) 92 et 192. — Borneo.

ARETHUSA, Gronov. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 182.
grandiflora, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 154. — Mexic.

ARETIA, Hall. = **Androsace**, Linn. (Primul.).
Mathildae, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 658 = *Andr. Mathildae*, Levier.
Mathildae, Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 50 in obs. = *praeac.*
occidentalis, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 411 = *Andr. occidentalis*, Pursh.

ARFEUILLEA Pierre, ex Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 362; et Fl. For. Cochinch. (1895) t. 322 B. **SAPINDACEAE**.
arborescens, Pierre, ll. cc. — Siam.

ARGEMONE, Tourn. ex Linn. (Papaver.). — Ind. Kew. i. 182.
corymbosa, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. (1886) 59 = *mexicana*, Linn.

ARGITHAMNIA, Sw. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 182.
purpurascens, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 466. — Bras.

ARGOMUELLERA, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 90. **EUPHORBIACEAE**.
macrophylla, Pax, l. c. — Afr. trop.

ARGOPHYLLUM, Forst. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 184.
Grunowii, Zahlbr. in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, iii. (1888) 278 t. 12. — N. Caled.

ARGOSTEMMA, Wall. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 183.
brachyantherum, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 168. — Borneo.
concinnum, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2380; et in Kew. Bull. (1895) 105. — Siam.
gracile, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 168. — Borneo.
involutum, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1556. — Perak.

ARGYLIA, D. Don (Bignon.). — Ind. Kew. i. 183.
bifrons, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 210. — Chili.
digitalina, Phil. l. c. 208. — Chili.
tenella, Phil. l. c. 209. — Chili.

ARGYREIA, Lour. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 183.
Grantii, Baker, in Kew Bull. (1894) 67. — Afr. trop.
Hanningtonii, Baker, l. c. — Afr. trop. or.
laxiflora, Baker, l. c. — Afr. trop. or.

ARGYREIA : —

- laxiflora*, Prain, in Journ. Linn. Soc. lxiii. (1894) 92 in syn. = *Lettsonia laxiflora*, Prain.
macrocalyx, Baker, in Kew Bull. (1894) 67. — Afr. trop. or.
Ridleyi, Prain, in Journ. Linn. Soc. lxiii. (1894) 98 in syn. = *Lettsonia Ridleyi*, Prain.

ARGYROCOME, Breyn. Prodr. ii. (1739) 43-44, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 308 = **Helipterum**, DC. (Composit.).

argyropsis, *canescens*, *chlorocephala*, *Charsleyae*, *citrina*, *condensata*, *corymbiflora*, *corymbosa*, *Cotula*, *dimorpholepis*, *Dregeana*, *exigua*, *eximia*, *floribunda*, *Forrestii*, *Frenchii*, *Haigii*, *heterantha*, *Humboldtiana*, *hyalosperma*, *laevis*, *Manglesii*, *moschata*, *polycephala*, *polygalifolia*, *polyphylla*, *pterochaeta*, *pygmaea*, *Pyrethrum*, *rosea*, *rubella*, *speciosissima*, *spicata*, *sterilescens*, *stipitata*, *stricta*, *tenella*, *Tiethensii*, *variegata*, *virgata*, *Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 308-309 = *homonyma omnia* **Helipteri**.

albicans, Kuntze, l. c. 309 = *H. incanum*, DC.
anthemodes, Kuntze, l. c. = *H. anthemoides*, DC.
ferruginea, Kuntze, l. c. = *Helichrysium squamosum*, Thunb.
fuscens, Kuntze, l. c. = *Podotheca fuscens*, Benth.
gnaphalodes, Kuntze, l. c. = **Helipterum gnaphaloides**, DC.
Margeritae, Kuntze, l. c. = *H. Margarethea*, F. Muell.
sesamodes, Kuntze, l. c. 308 = *Helichrysium sesamoides*, Willd.

ARGYRODENDRON, F. Muell. = **Tarrietia**, Blume (Stercul.).

Riedelianum, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1889) sub t. 193-95 in obs. = *T. Riedeliana*, Oliver.

ARGYROLOBIUM, Eckl. et Zeyh. (Legumin.).

— Ind. Kew. i. 184.
filicaule, Hochst. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 249. — Abyss.
Fischeri, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 207. — Afr. trop. or.
Harveyanum, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) sub t. 1525 in not. — Afr. austr.
kilimandscharicum, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 207. — Afr. trop. or.
margarinatum, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 161. — Afr. austr.
megarhizum, Bolus, l. c. xxiv. (1887) 175. — Transvaal.
shirense, Taub., in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 207. — Afr. trop. or.
stenorrhizon, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1525. — Afr. austr.
Stuhlmannii, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 207. — Afr. trop. or.

ARGYROTHAMNIA, Muell. Arg. = **Argithamnia**, Sw. (Euphorb.).

Fridae, Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 47 nomen. — Chili.

ARGYROXIPHIIUM, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 184.

virescens, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 219. — Ins. Hawai.

ARGYTHAMNIA, P. Br. = **Argithamnia**, Sw. (Euphorb.).

acalyphifolia, *aculeolata*, *angustissima*, *bahiensis*, *buettneriacea*, *castaneaefolia*, *cordata*, *heteropetala*, *linearifolia*, *multicostata*, *paludosa*, *palustris*, *Regnellii*, *Rutenbergii*, *senegalensis*, *stenophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 593-94 = *homonyma omnia* **Caperoniae**.
Brandegei, Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 220. — Calif.
corchorodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 594 = *C. corchoroides*, Muell. Arg.
heteropetaloides, Kuntze, l. c. = *C. heteropetaloides*, Muell. Arg.
Hochstetteri, Kuntze, l. c. = *C. serrata*, Presl.

ARGYTHAMNIA : —

Langsdorffii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 594 = *C. Langsdorffii*, Muell. Arg.
Muellerargoviana, Kuntze, l. c. = *C. Gardneri*, Muell. Arg.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 77. — Mexic.
polygama, Kuntze, l. c. = *Argith. lancifolia*, Muell. Arg.
savanillensis, Kuntze, l. c. 593 = *Argithamn. sp.* Columb.
servata, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 173. — Calif.

ARIA, Jacq. f. = **Pyrus**, Linn. (Rosac.).

Grantzii, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 712 = *P. Chamaemespilus*, Ehrh.
gracilis, Koehne, Deutsch. Dendrol. (1890) 17 = *P. sambucifolia*, Cham. et Schlecht.
hybrida, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 711 = *P. pinnatifida*, Ehrh.
semiincisa, G. Beck, l. c. 714 (= *Sorbus semi-incisa*, Borb.). — Hung.
sudetica, G. Beck, l. c. 711 = *P. Aria*, Ehrh.
succica, Koehne, ex Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. 1893 (1894) p. xlix; et Deutsch. Dendrol. (1893) 250 = *Pyrus intermedia*, Ehrh.
thuringiaca ×, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 711 = *P. pinnatifida*, Ehrh.
tormalis, G. Beck, l. c. 713 = *P. tormalis*, Ehrh.

ARIKURIROBA, Barb. Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, i. (1891) 5. **PALMAE**.
Capanemae, Barb. Rodr. l. c. t. 3. — Bras.

ARIOCARPUS, Scheidw. = **Mammillaria**, Haw. (Cact.).

fissuratus, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 195 (= *Anhalonium Engelmannii*, K. Schum.) — Mexic.
sulcatus, K. Schum. l. c. (= *Anhalonium Kotschubeyi*, Lem.) — Mexic.

ARISAEMA, Mart. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 185.

anomalum, Hemsl. in Journ. Bot. (1887) 205; Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7211. — Penins. Mal.
Givaldii, Baroni, in Bull. Soc. bot. Ital. (1893) 515; et in Bull. Soc. Tosc. Ort. (1893) t. 12 = *consanguineum*, Schott.
Kunstleri, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 496. — Ind. or.
parvum, N. E. Br. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 320. — China.
petiolulatum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 498. — Reg. Himal.
pictum, N. E. Br., ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 321. — China.
Prazeri, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 501. — Burma.
Scortechini, Hook. f. l. c. 503. — Penang, Perak.
ternatipartitum, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 47. — Japon.
Wallichianum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 500. — Reg. Himal.
Wattii, Hook. f. l. c. 498. — Reg. Himal.
Wrayi, Hemsl. in Journ. Bot. (1887) 205; Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7105. — Perak.

ARISTEA, (Soland.) Aiton (Irid.). — Ind. Kew. i. 186.

abyssinica, Pax, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 173. — Abyss.
Bakeri, Klatt, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 169. — Afr. austr.
Cooperi, Baker, Handb. Irid. (1892) 143. — Afr. austr.
elata, Baker, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58. — Afr. trop. or.
flexicaulis, Baker, l. c. 143. — Transvaal.
Johnstoniana, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 48. — Afr. trop. or.
Lastii, Baker, Handb. Irid. (1892) 142. — Afr. trop. or.
majubensis, Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 70; et Handb. Irid. (1892) 142. — Natal.

ARISTEA : —

oligocephala, Baker, Handb. Irid. (1892) 144. — Afr. austr.
paniculata, Baker, l. c. — Afr. austr.
paniculata, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 151. — Afr. austr.
platycaulis, Baker, in Gard. Chron. (1887) i. 732. — Afr. austro-occ. extratrop.
Tayloriana, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 48 in obs. — Afr. trop.
Zeyheri, Baker, Handb. Irid. (1892) 143. — Afr. austr.

ARISTIDA, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 186.

aequiglumis, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 381. — Transvaal.
alopecuroides, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 144. — Afr. austro-occ.
appressa, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 282. — Mexic.
Aristidis, Coss. Miss. scient. Tunisie (1883) ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Monoc.) (1895) 157. — Tunet.
arizonica, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club. xiii. (1886) 27; et Grass. of the South-West, i. (1891) t. 22. — Arizona.
Cassanellii, A. Terrac. in Ann. bot. Roma, v. (1894) 94. — Eritrea.
divergens, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 515; et iii. (1892) 48. — Am. bor. occ.
fugitiva, Vasey, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 80 nomen. — Calif. austr.
Havardi, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 27. — Texas.
herbacea, Steud. ex Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afric. v. 1894. (1895) 835 = *paradoxa*, Steud.
Hochstetteriana, G. Beck, ex Hack. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 144. — Afr. austro-occ.
Lemmonii, Scribn. in Trans. N. Y. Acad. Sci. xiv. (1894). — Arizona.
longicauda, Hack. in Bolet. Soc. Brot. vii. (1888) 143. — Mossamb.
manzanilloana, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 282. — Mexic.
Marlothii, Hack. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 400. — Afr. austro-occ. extratrop.
multicaulis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 533. — Madag.
Nealleyi, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 514; et iii. (1892) 45. — Texas.
Orcuttiana, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 27. — Calif. austr.
palustris, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 45. — Florida.
recta, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 365. — Congo gall.
redacta, Stapf, in Kew Bull. (1892) 85. — Ind. or.
Reverchonii, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 52. — Texas.
sahelica, Trab. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiv. (1887) 392. — Algeria.
sericans, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 381. — Transvaal.
spectabilis, Hack. ex Schinz, l. c. 380. — Transvaal.
Spegazzinii, Arechav. in Anal. Mus. nac. Buenos Aires, iv. (1895) 177 fig. 1. — Urug.
stipitata, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 143. — Afr. austro-occ. extratrop.
tunetana, Coss. (Miss. scient. Tunisie, 1883) ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Monoc.) (1895) 157. — Tunet.
villosa, Robins. et Greenman, in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 144. — Ins. Galap.

ARISTOLOCHIA, (Tourn.) Linn. (Aristoloch.). — Ind. Kew. i. 188.

atropurpurea, Parish, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 76. — Tenass.
Cathcartii, Hook. f. l. c. 77. — Reg. Himal.
chrysochloria, Barb. Rodr. in Vellozia, 1885-88, ed. 2 (1891) t. 23 A. — Bras.
Dammeriana, Mast. in Gard. Chron. (1895) i. 452. — Am. centr.
fastidiosa, (D'Almeida?) ex L. Planch. Les Aristol. (1891) 252. — Bras. (Quid?).

ARISTOLOCHIA : —

- filipendulina*, L. Planch. Les Aristol. (1891) 137 et 191 sphalm. = *filipendula*, Decne.
guadalajarana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 448. — Mexic.
heterophylla, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 361. — China.
Holtzei, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Feb. 1893) 160. — Austral.
leonensis, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 95. — Sierra Leone.
Linnemannii, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 301. — Oceania.
longicaudata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 447. — Mexic.
longipes, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 448. — Mexic.
loriflora, Mast. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 220. — Guatem.
megalophylla, K. Schum. in K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 104. — N. Guin.
Momandul, K. Schum. l. c. 105. — N. Guin.
monpinensis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. 2 x. (1887-88) 79. — China.
nana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 145. — Mexic.
Nashii, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 485. — Florida.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 447. — Mexic.
paraensis, (D'Almeida?) ex L. Planch. Les Aristol. (1891) 252. (Quid?). — Bras.
Pearcei, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 506. — Chili.
ridicula, N. E. Br., in Gard. Chron. (1886) ii. 360 fig. 73; et in Bot. Mag. (1887) t. 6934. — Bras.
salpinx, Mast. in Gard. Chron. ii. (1886) 456 fig. 32. — Parag.
silvatica, Barb. Rodr. in Vellozia, 1885-88. ed. 2. (1891) t. 22 et 23 b. — Bras.
Stuhlmannii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 169. — Afr. trop. or.
tequilana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 447. — Mexic.
Urbaniana, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27. (1890) 14. — Bras.

ARISTOTELIA, L'Hérit. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 190.

- gaultheriacea*, « F. Muell. » ex Bot. Centralbl. 1. (1892) 195 sphalm. = *A. Gaultheria*, F. Muell.
Gaultheria, F. Muell. in Journ. Bot. xxix. (1891) 176. — N. Guin.

ARKEZOSTIS, Rafin. = **Cayaponia**, Manso (Cucurb.).

- alata*, *amazonica*, *americana*, *Andreana*, *angustiloba*, *attenuata*, *Bonplandii*, *Buracavi*, *calycina*, *citrullifolia*, *cordifolia*, *coriacea*, *diversifolia*, *Espelina*, *excisa*, *ficifolia*, *floribunda*, *fluminensis*, *glandulosa*, *Glaziosi*, *gracillima*, *granatensis*, *grandiflora*, *heterophylla*, *hirsuta*, *latebrosa*, *latifolia*, *Lhotzkiana*, *longifolia*, *Maximowiczii*, *micrantha*, *Ottomaniana*, *ovata*, *pedata*, *pentaphylla*, *peruviana*, *petiolulata*, *plauhiensis*, *podantha*, *Poeppigii*, *racemosa*, *rigida*, *Ruizii*, *Sandia*, *setulosa*, *simplicifolia*, *Tayuya*, *ternata*, *Tibirica*, *tomentosa*, *triangularis*, *trilobata*, *tubulosa*, *villosissima*, *Weddellii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 255 = *homonyma omnia* Cayaponiae.
bonariensis, Kuntze, l. c. = *C. ficifolia*, Cogn.
Cabocla, Kuntze, l. c. = *C. globosa*, Silva Manso.
cordatifolia, Kuntze, l. c. = *C. Martiana*, Cogn.
Cruegeri, Kuntze, l. c. = *C. Cruegeri*, Cogn.
palmosa, Kuntze, l. c. = *C. palmata*, Cogn.
pilosa, Kuntze, l. c. = *C. diffusa*, Silva Manso.
trifoliata, Kuntze, l. c. = *C. trifoliolata*, Cogn.

ARMERIA, Linn. fide Kuntze Rev. Gen. (1891) 432 = **Phlox**, Linn. (Polemon.).

- adsurgens*, *amoena*, *bifida*, *caespitosa*, *canescens*, *divaricata*, *Drummondii*, *floridana*, *glaberrima*, *linearifolia*, *longifolia*, *maculata*, *nana*, *ovata*, *paniculata*, *pilosa*, *reptans*, *Richardsonii*, *Roemeriana*, *sibirica*, *speciosa*, *stellaria*, *subulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 = *homonyma omnia* Phlocis.
bryodes, Kuntze, l. c. = *P. bryoides*, Nutt.

ARMERIA : —

- Douglasii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 = *P. Douglasii*, Hook.
Hordii, Kuntze, l. c. = *P. Hoodii*, Rich.
muscodes, Kuntze, l. c. = *P. muscoides*, Nutt.

ARMERIA, Linn. (Plumbag.). — Ind. Kew. i. 190. *aegiales*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 246. — Chili.

- canescens*, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wiss. Wien (1894) 481 = *canescens*, Boiss.?
Delphini, Phil. l. c. 246. — Chili.
exaristata, Phil. l. c. 245. — Chili.
Henriquesii, Daveau, in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 170 in obs. — Lusit.
Langeana, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 7 cum xylogr. = *Henriquesii*, Daveau.
longevaginata, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 738. — Algér.
patagonica, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 244. — Chili.
Rouyana, Daveau, in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 166 cum icon; et in Bull. Soc. bot. Fr. xxxv. (1888) 331. — Hisp.
tenuifolia, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 245. — Chili.
trachyphylla, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 199. — Hisp.

ARMERIASTRUM, Lindl. = **Acantholimon**, Boiss. (Plumbag.).

- acerosum*, *acrostegium*, *araxanum*, *aristulatum*, *armenum*, *aspadanum*, *atropatanum*, *anganum*, *avenaceum*, *baltanense*, *Bodeanum*, *brachyphyllum*, *brachystachyum*, *bracteatum*, *bromifolium*, *cabulicum*, *caesareum*, *Calvertii*, *caryophyllaceum*, *cataonicum*, *cephalotes*, *curviflorum*, *cymosum*, *distachyum*, *eschkerense*, *fasciculare*, *Faustii*, *festucaceum*, *flexuosum*, *glumaceum*, *Griffithianum*, *gulistanum*, *heratense*, *horridum*, *Huetii*, *iconicum*, *Kavelinii*, *Kotschyii*, *latifolium*, *laxiflorum*, *libanoticum*, *longiflorum*, *lycaonicum*, *melananthum*, *oliganthum*, *Olivieri*, *Peronii*, *petraeum*, *polystachyum*, *pterostegium*, *quinquelobum*, *restiacum*, *Ruprechtii*, *sahendicum*, *scabrellum*, *schahrudicum*, *schirazianum*, *scirpinum*, *sengansense*, *setiferum*, *subulatum*, *tagalonicum*, *tenuiflorum*, *tomentellum*, *tragacanthium*, *truncatum*, *ulicinum*, *viscidulum*, *Wiedemannii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 393-94 = *homonyma omnia* Acantholimonis.
assyriacum, Kuntze, l. c. 393 = *Ac. venustum*, Boiss.
Balansae, Kuntze, l. c. = *Ac. armenum*, Boiss. et Huet.
dianthifolium, Kuntze, l. c. = *Ac. venustum*, Boiss.
diapensioides, Kuntze, l. c. = *Ac. diapensioides*, Boiss.
Echinus, Kuntze, l. c. = *Ac. androsaceum*, Boiss.
erinaceum, Kuntze, l. c. = *Ac. roseum*, Boiss.
ferox, Kuntze, l. c. = *Ac. Scorpius*, Boiss.
genistoides, Kuntze, l. c. = *Ac. genistoides*, Boiss.
Hausknechtii, Kuntze, l. c. = *Ac. armenum*, Boiss. et Huet.
incomptum, Kuntze, l. c. = *Ac. Scorpius*, Boiss.
kurdicum, Kuntze, l. c. = *Ac. brachystachyum*, Boiss.
lepturodes, Kuntze, l. c. = *Ac. lepturoides*, Boiss.
leucacanthum, Kuntze, l. c. = *Ac. Scorpius*, Boiss.
Listoniae, Kuntze, l. c. = *Ac. acerosum*, Boiss.
lycopodioides, Kuntze, l. c. = *Ac. lycopodioides*, Boiss.
Pinardii, Kuntze, l. c. = *Ac. acerosum*, Boiss.
puberulum, Kuntze, l. c. = *Ac. androsaceum*, Boiss.
splendidum, Kuntze, l. c. = *Ac. bracteatum*, Boiss.
Stockii, Kuntze, l. c. = *Ac. Stocksii*, Boiss.
subsessile, Kuntze, l. c. = *Ac. alaticum*, Bunge.
tartaricum, Kuntze, l. c. = *Ac. tataricum*, Boiss.
tenuifolium, Kuntze, l. c. = *Ac. Hohenackeri*, Boiss.

ARMORACIA, Gaertn. Mey. et Scherb. = **Cochlearia**, Linn. (Crucif.).

- brassicoides*, Scheutz, Pl. vasc. Jeniss. (1888) 82. — Sibiria.

ARNEBIA, Forsk. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 191.**ARNEBIA** : —

- decumbens*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 211 = *decumbens*, Coss.
inconspicua, Hemsl. et Lace, in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 326. — Belutsch.
macrothyrsa, Stapf, ex Wien. Ill. Gartenzeit. (1891) 128; et in Gard. Chron. (1891) i. 180. — Armenia.
Széchenyii, Kanitz, Pl. expéd. Széchenyi in As. centr. coll. (1891) 42. — As. cent.

ARNICA, Rupp. ex Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 192.

- acaulis*, Britton, Stern et Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 30 = *nudicaulis*, Ell.

ARODES, Heist. ex Fabric. Enum. pl. hort. Helmst. (1763) 42, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 739 = **Richardia**, Kunth (Aroid.).

- aethiopicum*, Kuntze, Rev. Gen. 740 = *R. africana*, Kunth.
albomaculatum, Kuntze, l. c. = *R. albo-maculata*, Hook. f.
angustilobum, Kuntze, l. c. = *R. angustiloba*, Schott.
hastatum, Kuntze, l. c. = *R. hastata*, Hook.
melanoleucum, Kuntze, l. c. = *R. melanoleuca*, Hook. f.

ARONIA, Mitch. = **Orontium**, Linn. (Aroid.). *aquatica*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 508 = *O. aquaticum*, Linn.**ARONIA**, Pers. = **Amelanchier**, Lindl. (Rosac.). *alpina* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 384 (= *Pyrus alpina*, Willd.). — Hybr. artef.

- floribunda*, Hort. ex Dippel, l. c. = *Pyrus arbutifolia*, Linn. f.
nigra, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 182 = *Pyrus nigra*, Sarg.
nigra, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 384 = *Pyrus arbutifolia*, Linn. f.
nigra, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 254 = *P. arbutifolia*, Linn. f.

ARONICUM, Neck. = **Doronicum**, Linn. (Composit.).

- atlanticum*, Chabert, in Bull. Soc. bot. Fr. xxxvii. (1891) 385 = *D. Pardalianches*, Linn.
barcense, Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 322 = *D. grandiflorum*, Lam.

ARRABIDAEEA, DC. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 193.

- amazonica*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 213 = *conjugata*, Mart.
arthrerion, Bur. in Baill. Hist. des pl. x. (1888) 28 in adnot. (= *Distictis arthrerion*, DC.). — Bras.
brachypoda, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 1213 (= *Bignonia brachypoda*, DC.). — Bras.
celastroides, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 213. — Bras.
cinerea, Bur. ex K. Schum. l. c. — Bras.
corymbifera, Bur. ex K. Schum. l. c. (= *Bignonia corymbifera*, Vahl.). — Am. austr.
craterophora, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 100 (= *Bignonia craterophora*, DC.). — Bras.
dichasta, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 6. — Guatem.
dichotoma, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 1212 = *corymbifera*, Bur.
dispar, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 215 (= *Bignonia Blanchetii*, DC.). — Bras.
fagoides, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 97 (= *Bignonia fagoides*, Cham.). — Bras.
inaequalis, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 28 (= *Bignonia inaequalis*, DC.). — Am. austr.
macrophylla, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 213 (= *Arr. platyphylla*, DC.). — Bras.
minutiflora, K. Schum. l. c. 214. — Am. austr.
mollis, Bur. ex K. Schum. l. c. 213 (= *Bignonia mollis*, Vahl.). — Bras.

ARRABIDAEA : —

- obliqua*, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 99 = *rotundata*, Bur.
potosina, K. Schum. et Loes. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 618. — Mexic.
puberula, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 99 (= *Cuspidaria puberula*, Mart.). — Bras.
pulchella, Bur. l. c. (= *Bignonia pulchella*, Cham.). — Bras.
rotundata, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 213 (= *Bignonia rotundata*, DC.). — Bras.
sciuripabulum, K. Schum. l. c. 224 in obs. — Reg. Amaz.
stenothyrus, K. Schum. l. c. 213 = *tuberculata*, DC.
subfastigiata, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 99 (= *Adenocalymna foribundum*, DC.). — Bras.
tripplinervia, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 28 (= *Bignonia triplinervia*, Mart.). — Am. austr.

ARRACACIA, Bancr. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 193.

- andina*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 37. — Am. austr.
bracteata, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 295. — Mexic.
Brandegei, Coult. et Rose, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 165. — Calif.
brevipes, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 296. — Mexic.
Coulteri, Rose, l. c. in obs. = *Tauschia Coulteri*, A. Gray.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 115. — Yunnan.
Donnell-Smithii, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 261 t. 15. — Guatem.
edulis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 430. — Mexic.
filiformis, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 296 nomen. — Mexic.
irazuensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265. — Costarica.
luxeana, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 54. — Guatem.
Mariana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 136. — Mexic.
multifida, S. Wats. l. c. — Mexic.
Nelsoni, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 296. — Mexic.
nudicaulis, Coult. et Rose, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 119. — Mexic.
ovata, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 296. — Mexic.
Parishii, Greene, Fl. Francisc. (1892) 318 = *Velaia Parishii*, Coult. et Rose.
peucedanifolia, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 114. (Arracacha). — Yunnan.
Pringlei, Coult. ex Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 297. — Mexic.
vaginata, Coult. et Rose, l. c. — Mexic.

ARTABOTRYS, R. Br. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 194.

- costatus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 37. — Perak.
gracilis, King, l. c. 35. — Perak.
grandifolius, King, l. c. 31. — Perak.
Lowianus, King, l. c. 34. — Perak.
madagascariensis, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 5 = *madagascariensis*, Miq. ?
Monteiroae, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1796. — Mossamb.
nitida, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 179. — Afr. trop. or.
oblongus, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 33. — Perak.
oxycarpus, King, l. c. 34. — Perak.
Rolfei, Vidal, Revis. pl. vasc. Filip. (1886) 39. — Ins. Philipp.
Scortechinii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 32. — Perak.
velutinus, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 71. — Sierra Leone.
venustus, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 32. — Perak.
Wrayi, King, l. c. 37. — Perak.

ARTANEMA, D. Don (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 194.

- longiflorum*, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1891) 79 = *sesamoides*, Benth.

ARTEMISIA, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 195.

- Aschurbajewi, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 334. — Turkest.
bothnica, Lundstr. ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 170 = *campestris*, Linn.
brachanthemoides, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 422. — Turkest.
Chamomilla, C. Winkl. l. c. x. (1887) 87. — Turkest.
dracunculina, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 279. — Mexic.
fastigiata, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 373. — As. centr.
Forwoodii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 133. — Dakota.
Jaggiana X, Wolf, in Bull. trav. Soc. Murith. fasc. xvi-xviii. (1890) 27. — Helv.
kabylica, Chabert, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 27. — Alger.
Kuschakewiczii, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 330. — Turkest.
laxa, Fritsch, in Kern. Sched. fl. Austro-Hung. vi. (1893) 88 = *glacialis*, Jacq.
laxiflora, St-Lager, in Cariot, Étud. des fleurs, éd. 8, ii. (1889) 455 = *A. Mutellina*, Vill.
microcephala, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 230. — Ins. Hawaii.
pamirica, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 329. — Turkest.
Pattersoni, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. I. ii. Suppl. (1886) 453. — Colorado.
petrosa, Fritsch, in Kern. Sched. fl. Austro-Hung. vi. (1893) 92 = *Baumgartenii*, Bess.
Pewzowi, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 3. — As. centr.-occ.
pygmaea, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 413. — Am. bor.
redolens, A. Gray, l. c. 393. — Mexic.
rhaetica, Brügg. Mitth. neue und krit. Form. (1886) 75 ex Jahresb. naturf. Gesells. Graub. xxix. (1884-85) = *A. Absinthium*, Linn.
sarawachanica, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 88. — Turkest.
Seileri X, Wolf, in Archiv. sc. phys. et nat. xxxviii. (1892) 375; et ex Magnier, Scrin. fl. select. xiii. (1894) 324. — Helv.
Skorniakowi, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 331. — Turkest.

ARTHAERUA, Schinz, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. I a. (1894) 109. **AMARANTACEAE**.

- Leubnitziae*, Schinz, l. c. fig. 63. — Afr. austro-occ. extratrop.

ARTHRAAXON, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 200.

- breviaristatus*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 350. — Reg. Himal., Yunnan.
glabrescens, Anderss. ex Hack. l. c. 357. = *ciliaris*, Beauv.
jubatus, Hack. l. c. 358. — Ind. or.
micans, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. ii. x. (1887) 109. — Tibet.
nudum, Benth. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 86 (= *Batratherum nudum*, Nees). — Bengal.
violaceum, Benth. ex C. B. Clarke, l. c. — Reg. Himal.

ARTHRAAXON, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 352 = **LORANTHUS**, Linn. (Loranth.).

- amplexifolium*, Van Tiegh. l. c. 353. — Peruv.
bicalyculatum, Van Tiegh. l. c. = *L. bicalyculatus*, Schult.
cardiophyllum, Van Tiegh. l. c. = *L. cardiophyllum*, Willd.
chanduyense, Van Tiegh. l. c. = *Psittacanthus chanduyensis*, Eichl.

ARTHRAAXON : —

- cordatum*, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 352 = *L. cordatus*, Hoffmssgg.
falcifrons, Van Tiegh. l. c. = *Psittacanthus falcifrons*, Mart.

ARTHROCHILIUM, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. (1890) 212 = **EPIPACTIS**, Adans. (Orchid.).

- palustre*, G. Beck, l. c. = *palustris*, Crantz.

ARTHROPODIUM, R. Br. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 200.

- ramulosum*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892. (1893) 337. — N. Zel.
reflexum, Colenso, l. c. xviii. 1885. (1886) 275. — N. Zel.

ARTHROSOLEN, C. A. Mey. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 200.

- flavus*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 40. — Afr. trop. austro-or.
latifolius, Oliver, in Johnston, Kilima-Njaro Exped. (1886) 345; et in Trans. Linn. Ser. II. ii (1887) 348. — Afr. trop. or.
sphaerocephalus, Baker, in Kew Bull. (1894) 341. — Arabia.

ARTHROSTEMA, Ruiz et Pav. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 200.

- hirtellum*, Cogn. ex J. D. Smith, Enum. pl. Guat. iii. (1893) n. 3328 nomen; et in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 286. — Guatem.
lanceolatum, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 142. — Hab. ?
parvifolium, Cogn. l. c. 143. — Guatem.

ARTHROSTYLIDIUM, Rupr. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 201.

- Prestoei*, Munro, in Kew Bull. (1895) 186. — Ins. Trinit.

ARTOCARPUS, Forst. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 201.

- bracteata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 540; et in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 7 t. 1 b. — Malacca.
Denisoniana, King, ll. cc. 544 et 14 t. 8 b. — Perak.
Forbesii, King, ll. cc. 539; et 7 t. 1 a. — Perak, Sumatra.
involutocrata, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 39. — N. Guin.
Kunstleri, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 540; et in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 9 t. 4. — Perak, Malacca.
Maingayi, King, ll. cc. 542; et 11 t. 8 a. — Perak, Malacca.
Lowii, King, ll. cc. 542; et 10 t. 7 a. — Perak.
Scortechinii, King, ll. cc. 542; et 12 t. 9. — Perak.

ARUBA, Aubl. = **SIMABA**, Aubl. (Simarub.).

- Cedron, crustacea, cuneata, cuspidata, ferruginea, floribunda, glabra, glandulifera, guianensis, macrophylla, Majana, nigrescens, obovata, orinocensis, salubris, suaveolens, subcymosa, suffruticosa, trichiloides, Warmingiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 103. = *homonyma omnia* Simabae.

ARUM, (Tourn.) Linn. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 202.

- Engleri*, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 22. — Persia.
grandiflorum, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 518 in syn. = *Thomsonia nepalensis*, Wall.
Magdalenae, Sprenger, in Bull. Soc. Tosc.ortic. (1894) 227. — Palaest.
modicense, Sprenger, l. c. = *italicum*, Mill.
sanctum, Damm. in Dammann, Catal. (1889) 3 et 5 fig. i; et in Gartenfl. (1889) 655 = *palaestinum*, Boiss.

ARUNDARBOR, Rumpf, Herb. Amboin. iv. (1743) 2-18 t. 2-4, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 760 = **BAMBUSA**, Schreb. (Gramin.).

- affinis, agrestis, amahussana, angulata, Apus, aristata, arundinacea, atra, aurea, aurostriata, Balcosa, Beecheyana, Bitung, Blancoi, Blumeana, Brandisii, Cantori, capitata, cornuta, distorta, Falconeri, ferva, flexuosa, Fortunei, Griffithiana, Helferii, Horsfieldii,*

ARUNDARBOR: —

- khasiana*, *levis*, *lima*, *lineata*, *Lumampao*, *marantifolia*, *marginata*, *Mastersii*, *maxima*, *mitis*, *monogyna*, *multiplex*, *nana*, *nutans*, *Oldhamii*, *orientalis*, *pellida*, *picta*, *polymorpha*, *prava*, *pungens*, *pygmaea*, *regia*, *remotiflora*, *Ritcheyi*, *spinosa*, *striata*, *tabacaria*, *Teba*, *tenuis*, *teres*, *textoria*, *vasaria*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 760-61 = *homonyma omnia* Bambusae.
- amplexifolia*, Kuntze, l. c. 760 = *Guadua amplexifolia*, f. et C. Presl.
- argenteostriata*, Kuntze, l. c. 761 = *B. argenteostriata*, Regel.
- Bambos*, Kuntze, l. c. 760 = *B. arundinacea*, Willd.
- brevifolia*, Kuntze, l. c. = *B. breviflora*, Munro.
- diffusa*, Kuntze, l. c. = *Guadua distorta*, Rupr.
- glomerata*, Kuntze, l. c. = *Dendrocalamus strictus*, Nees.
- Guadua*, Kuntze, l. c. = *Guadua angustifolia*, Kunth.
- kurilensis*, Kuntze, l. c. = *Arundinaria kurilensis*, Rupr.
- latifolia*, Kuntze, l. c. 761 = *Guadua latifolia*, Kunth.
- longinodes*, Kuntze, l. c. = *B. longinodis*, Mig.
- Luzoniae*, Kuntze, l. c. = *B. Luzoniae*, Munro.
- marantifolia*, Kuntze, l. c. = *Guadua marantifolia*, Franch.
- McClellandii*, Kuntze, l. c. = *B. Mac-Clellandii*, Munro.
- paniculata*, Kuntze, l. c. = *Nastus borbonicus*, f. F. Gmel.
- refracta*, Kuntze, l. c. = *Guadua refracta*, Munro.
- Tagoara*, Kuntze, l. c. = *Guadua Tagoara*, Kuntze.
- Trinii*, Kuntze, l. c. = *Guadua Trinii*, Rupr.
- Venezuelae*, Kuntze, l. c. = *Guadua Venezuelae*, Munro.
- virgata*, Kuntze, l. c. = *Guadua virgata*, Rupr.

- ARUNDASTRUM, Rumpf, Herb. Amboin. iv. 22 t. 7 (1744) ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 683 = **CLINOGYNE**, Salisb. (Scitam.).
- Benthamianum*, Kuntze, l. c. 684 = *Clinogyne grandis*, Benth. et Hook. f.
- canniforme*, Kuntze, l. c. 683 = *C. dichotoma*, Salisb.
- cuspidatum*, Kuntze, l. c. 684 (= *Donax cuspidata*, K. Schum.). — Afr. trop.
- filipes*, Kuntze, l. c. = *C. filipes*, Benth. et Hook. f.
- grande*, Kuntze, l. c. = *C. grandis*, Benth. et Hook. f.
- ramosissimum*, Kuntze, l. c. = *Phrynium ramosissimum*, Benth.
- Schweinfurthianum*, Kuntze, l. c. (= *Donax Schweinfurthiana*, K. Schum.). — Afr. trop.
- virgatum*, Kuntze, l. c. = *C. virgata*, Benth. et Hook. f.

- ARUNDINA, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 204.
- Cantleyi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 858; et *Icon. pl.* xxii. (1892) t. 2112. — Perak.
- revoluta*, Hook. f. l. c. — Perak.
- Sanderiana*, Kraenzl., in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 483. — Sumatra.

- ARUNDINARIA, Michx. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 204.
- alpina*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 117. — Afr. trop. or.
- baviensis*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 27. — Tonkin.
- nitida*, Hort. Kew, ex Kew Bull. Append. ii. (1894) 33 nomen. — Reg. Himal.
- quadrangularis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 71 = *Bambusa quadrangularis*, Fenzl.
- Sat, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 28. — Tonkin.
- Sodiroides*, Hack. ex Sodiroides, Gram. Ecuat. (Anal. Univ. Quito, 1889) 11 nomen. — Ecuat.

- ARUNDINELLA, Raddi (Gramin.). — Ind. Kew. i. 204.
- hispidula*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 761 = *brasilensis*, Raddi.
- robusta*, Fourn. Gram. Mexic. 1881. (1886) 54. — Mexic.

ASARCA, Lindl. = **Chloraea**, Lindl. (Orchid.).

- affinis*, *alpina*, *aurea*, *barbata*, *Besseri*, *calopogon*, *campestris*, *chlorosticta*, *chrysantha*, *chrysochloa*, *colina*, *Commersonii*, *crispa*, *crocata*, *cuneata*, *cygnea*, *cylindrostachya*, *dasyogon*, *densa*, *fimbriata*, *galeata*, *Gaudichaudii*, *Gayana*, *grandiflora*, *gymnoglossa*, *heteroglossa*, *homopetala*, *incisa*, *inconspicua*, *lamelata*, *Lechleri*, *litoralis*, *longipetala*, *magellanica*, *medilabia*, *multiflora*, *obovata*, *odontoglossa*, *patagonica*, *Pearcei*, *Poeppigiana*, *pogonata*, *prodigiosa*, *reflexa*, *Sceptrum*, *secunda*, *semibarbata*, *suaveolens*, *Unguicati*, *venosa*, *viridiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 652 = *homonyma omnia* Chloraea.
- bletiodes*, Kuntze, l. c. = *C. ulanthoides*, Lindl.
- conspicua*, Kuntze, l. c. = *C. spectabilis*, Phil.
- disodes*, Kuntze, l. c. = *C. disoides*, Lindl.
- Fonchii*, Kuntze, l. c. = *C. Fonkii*, Phil.
- insignis*, Kuntze, l. c. = *C. speciosa*, Poepp.
- longibracteata*, Kuntze, l. c. = *C. longibracteata*, Lindl.
- lutea*, Kuntze, l. c. = *C. cristata*, Lindl.
- Philippii*, Kuntze, l. c. = *C. Philippi*, Reichb. f.
- rhyphaloglossa*, Kuntze, l. c. = *C. rypaloglossa*, A. Rich.
- tuberculata*, Kuntze, l. c. = *C. verrucosa*, Phil.
- virescens*, Kuntze, l. c. = *C. Piquichen*, Lindl.

ASARUM, (Tourn.) Linn. (Aristol.). — Ind. Kew. i. 206.

- cardiophyllum*, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 65. — Yunnan.
- Delavayi*, Franch. l. c. 66. — Yunnan.
- Forbesii*, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxi. (1887) 92. — China.
- geophilum*, Hemsl. in Gard. Chron. (1890) i. 422; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7168. — China.
- grandiflorum*, Small, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1894) 150 = *virginicum*, Linn. var.
- macranthum*, Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7022. — Ins. Formosa.
- macranthum*, Small, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 136 = *virginicum*, Linn. var.
- maximum*, Hemsl. in Gard. Chron. (1890) i. 422; et in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 359. — China.
- pulchellum*, Hemsl. l. c. 422 et 360. — China.
- rotundifolium*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 720 = *europaeum*, Linn.
- sakawanum*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 260. — Japon.

ASCLEPIAS, Linn. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 207.

- aceratoides*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 154 = *aceratoides*, M. Curt.
- albicans*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 59. — Calif.
- albida*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 254. — Abyss.
- amabilis*, N. E. Br. l. c. 70. — Afr. trop. or.
- Buchenaviana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 261. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Buchellii*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1886) 336 = *Gomphocarpus tomentosus*, Burch.
- californica*, Greene, in Erythea, i. (1893) 92; et Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 242. — Calif.
- cochabambensis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 221. — Bolivia.
- conspicua*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 253. — Afr. centr. or.
- cultriformis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45. (1894) 31. — Afr. austr.
- decumbens*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 239 = *Asclepiodora decumbens*, A. Gray.
- denticulata*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 334. — Afr. trop.
- Dregeana*, Schlechter, l. c. 337 = *Gomphocarpus marginatus*, E. Mey.
- eximia*, Schlechter, l. c. 335. — Afr. trop.
- filiformis*, « Benth. et Hook. » ex Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 268 (= *Lagarinus filiformis*, E. Mey.). — Afr. austr.
- flavida*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 255. — Afr. trop. or.
- fulva*, N. E. Br. l. c. 254. — Afr. trop. or.
- Grantii*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 335 = *Gomphocarpus Grantii*, Oliver

ASCLEPIAS: —

- guatemalensis*, f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 297. — Guatem.
- humilis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 26 = *Gomphocarpus humilis*, Decne.
- integra*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 219. — Afr. trop. or.
- jaliscana*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 318. — Mexic.
- jangadensis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 398. — Bras.
- Kuntze, Schlechter, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 450. — Bolivia.
- labriformis*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 708. — Utah.
- latifolia*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 263 = A. Jamesii, Torr.
- leucocarpa*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 335. — Afr. trop.
- lineolata*, Schlechter, l. c. 336 = *Gomphocarpus lineolatus*, Decne.
- macrochila*, Schlechter, l. c. 355. — Afr. austr.
- macroura*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 436. — Mexic.
- mashonensis*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 356. — Afr. trop.
- palustris*, Schlechter, l. c. 336 = *Gomphocarpus palustris*, K. Schum.
- Petherickiana*, Schlechter, l. c. 336 = *Schozoglossum Petherickianum*, Oliver.
- Philippiae*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 219. — Afr. trop. or.
- propinqua*, N. E. Br. l. c. 254. — Afr. trop. or.
- pseudo-crispa*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 357. — Afr. austr.
- pygmaea*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 255. — Afr. trop. or.
- rigida*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxii. (1895) 357 = *Gomphocarpus rigidus*, Decne.
- rubicunda*, Schlechter, l. c. 336 = *fulva*, N. E. Br.
- schizoglossoides*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45. (1894) 32. — Afr. austr.
- Schweinfurthii*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 253. — Afr. centr.
- spectabilis*, N. E. Br. l. c. 254. — Afr. trop. or.
- tenuifolia*, N. E. Br. l. c. 255. — Afr. austr.
- texana*, Heller, Bot. Expl. S. Texas (1895) 77 t. 4. — Texas.
- tithymaloides*, Greene, in Erythea, i. (1893) 151. — Mexic.
- Tysoniana*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 358. — Afr. austr.

ASCOLEPIS, Nees (Cyper.). — Ind. Kew. i. 209.

- brasiliensis*, Benth. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1894. (1895) 651 (= *Platylepis brasiliensis*, Kunth). — Afr. et Am. trop.
- Oliveri*, Vatke et Hoepfner, ex C. B. Clarke, l. c. 652 in syn. = *speciosa*, Welw.
- Vatkeana*, Boeck, ex C. B. Clarke, l. c. 652 = *speciosa*, Welw.

ASIMINA, Adans. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 210.

- angustifolia*, A. Gray, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 163. — Florida.
- insularis*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1514; et Biol. Centr.-Am. i v. (1886) 96. — Yucatan.

ASPALATHUS, Amm. Stirp. Ruth. (1739) 203-10 t. 35 = **Caragana**, Lam. (Legumin.).

- ambigua*, *brevispinus*, Bungei, Chamlagu, *confertus*, *crassicaulis*, *cuneatus*, *frutescens*, *Gevardianus*, *grandiflorus*, *jubatus*, *microphyllus*, *polyacanthus*, *pygmaeus*, *Redowskii*, *spinosis*, *tenuis*, *uliginis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 161 = *homonyma omnia* Caraganae.
- Caragana*, Kuntze, l. c. = *C. arborescens*, Lam.
- nubigenus*, Kuntze, l. c. = *C. crassicaulis*, Benth.
- triflorus*, Kuntze, l. c. = *C. brevispina*, Benth.

ASPALATHUS, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 210.

- argyrella*, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 387. — Afr. austr.

ASPALATHUS : —

humilis, Bolus, *MacOwan*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 160. — Afr. austr.
leptoptera, Bolus, l. c. — Afr. austr.

ASPARAGUS, Tourn. ex Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 212.

albanensis, Hort. ex Illustr. Hort. (1895) 188. — Afr. austr.?
Buchanani, Baker, in *Kew Bull.* (1893) 211. — Afr. trop. or.
comorensis, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenz. (1888) 158; et ex Illustr. Hort. (1895) 60 fig. 8 = *crispus*, Linn.?
juniperoides, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 3. — Afr. austro-occ. extratrop.
myriocladus, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 43. — Natal.
Saundersiae, Baker, l. c. 42. — Natal.
Sprengeri, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 302; et in *Gartenfl.* (1890) 490 fig. 80. — Afr. austro-or.
Stendneri, Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 169 = *asiaticus*, Linn.
Tamaboki, Yatabe, in *Tokyo Bot. Mag.* vii. (1893) 61 t. 44. — Japon.
zeylanicus, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 317. — Zeylan.

ASPASIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 214.

Barclayi, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 210. — Hab. ?

ASPERULA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 214.

aristifera, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888. (1889) 88. — N. Zel.
asterocephala, Bornm. in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vii. (1895) 7 nomen. — Oriens.
Baenitzii, Heldr. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 280. — Attica.
baetica, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 80; et in *Magnier, Scrin. fl. select.* x. (1891) 191. — Hisp.
Boissieri, Heldr. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 281. — Graecia.
breviflora, Batt. in Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* (Dicot.) (1888) 392 = *aristata*, Linn.
dissitiflora, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 432. — Syria.
Doerfleri, Wettst. in *Luerss. Bibl. Bot. Heft* xxvi. (1892) 59 t. iii. fig. 9-12. — Albania.
Eugeniae, C. Richt. in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1888) 110 nomen; et in *Abhandl. Zool. Bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 219. — Austria.
ghautensis, Post, *Pl. Postianae*, iii. (1892) 10. — Syria.
Gussoneana, « Boiss. » ex Ces. Pass. et Gibelli, *Comp. fl. Ital.* (1886) 559 = *Gussonei*, Boiss.
hercegovina, Degen, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 15. — Herceg.
heteroclada, Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 30. — Gallia mer.
leiantha, Kern. ex Wettst. in *Murbeck, Beitr. Kennt. Fl. Bosn. und Herceg.* (1891) 114. — Eur.
Majori, Barbey, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 243 t. 6. — Ins. Saria (Cycl.)
majoriflora, Borb. ex Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brunn*, xxxii. 1893 (1894) 165. — Maced.
oetaea, Heldr. ex Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 156 = *lutea*, Sibth. et Sm.
pilosa, Degen, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 15 = *hexaphylla*, All.
puberula, Halácsy et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 38. — Graecia.
pulvinaris, Heldr. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 281. — Graecia.
Sherardi, Höck, ex E. Hallier, in *Koch's Syn. deutsch. Fl. ed. 3.* (1893) 1199 = *Sherardia arvensis*, Linn.
Sintenisii, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 38 in syn. = *puberula*, Halácsy et Sint.
sublongiflora, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 399. — Croatia.
taurica, Paczosky, Desor. *pl. gubern. Cherson.* (1889) 20; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 300. — Ross. mer.
Wettsteini, Adamovic, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vii. (1889) 117. — Eur. or.

ASPHODELINE, Reichb. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 215.

recurva, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 166. — Syria.

ASPHODELIRIS, Moehr. Hort. Priv. (1736) 15 pr. p. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 706 = **Tofieldia**, Huds. (Liliac.)

calyculata, cernua, falcata, glutinosa, gracilis, himalayica, japonica, nuda, nutans, occidentalis, sordida, stenantha, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Tofieldiae.
racemosa, Kuntze, l. c. = *T. pubens*, Willd.
sessiliflora, Kuntze, l. c. = *T. falcata*, Pers.

ASPHODELUS (Tourn.) Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 215.

comosus, Baker, in *Gard. Chron.* (1887) i. 799. — Reg. Himal.

ASPIDISTRA, Ker-Gawl. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 216.

longifolia, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 326. — Reg. Himal.
typica, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1894) 1129. — Tonkin. ?

ASPIDOPTERYS, A. Juss. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 216.

costulata, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* (1893) sub t. 275. — Cochinch.
Harmandiana, Pierre, l. c. t. 275. — Cochinch.
tomentosa, Pierre, l. c. t. 275 = *costulata*, Pierre.
yemensis, Defflers, Voy. Yémen (1889) 117 (*Aspidopteris*) = *Caucanthus edulis*, Forsk.

ASPILIA, Thou. (Compos.). — Ind. Kew. i. 217.

albiflora, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 425. — Mexic.
alternifolia, Klatt, in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 298. — Madag.
angustifolia, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 425. — Mexic.
asperifolia, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 413. — Afr. trop. or.
costaricensis, Klatt, ex Th. Dur. et Pitt. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 201. — Costarica.
Fischeri, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 413. — Afr. trop. or.
Glaziovii, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 106. — Bras. gondensis, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 413. — Afr. trop. or.
Holstii, O. Hoffm. l. c. 411. — Afr. trop. or.
involucrata, O. Hoffm. l. c. 413. — Afr. trop. or.
pachyphylla, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 143 = *Actinomeris pachyphylla*, Sch. Bip.
plurisetata, Schweinf. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 433; et in *Hoehn. Zum Rudolph Seem*, Append. (1892) 10. — Afr. trop. or.
Ramagii, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 42. — Ins. Fernando Noronha.
subpandurata, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 413. — Afr. trop. or.

ASPRELLA, Host = **Psilurus**, Trin. (Gramin.).

aristata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 732 = *P. naroides*, Trin.
Asprella, Schreb. = **Leersia**, Sw. (Gramin.).
aristata, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1893. (1894) 272. — N. Zel.
laevis, Petrie, l. c. xxvii. 1894 (1895) 406. — N. Zel.

ASSONIA, Cav. = **Dombeya**, Cav. (Stercul.).

acerifolia, Amelae, *antsianahensis*, Baroni, Bernieri, *biumbellata*, Boivini, Bojeriana, Breonii, Bruceana, *Burgessiae*, cannabina, Chapelieri, Coria, *crassipes*, *cuspidata*, cymosa, decanthera, *densiflora*, elliptica, *erythroclada*, ferruginea, *ficulnea*, *floribunda*, *glechomifolia*, *Greveana*, *guazumifolia*, *Hildebrandtii*, *Hilsebergii*, *hirsuta*, *Humboldtii*, *insignis*, *Kirkii*, *Lantiana*, *laurifolia*, *longicuspis*, *longifolia*, *longipes*, *lucida*, *lucubensis*, *macrantha*, *megaphylla*, *modesta*, *mollis*, *natalensis*, *obovatis*, *ovata*, *Parkeri*, *parviflora*, *pentaglossa*, *Pervillei*, *platanifolia*, *Pseudopopolus*, *punctata*, *repanda*, *reticulata*, *Richardii*, *rigida*, *rotundifolia*, *rubifolia*, *Schimperiana*, *spectabilis*, *sti-*

ASSONIA : —

fulacea, Thourarii, *tiliacea*, *tomentosa*, *triumfettifolia*, *umbellata*, *viburnifolia*, *Wallichii*, *xiphosepala*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 76 = *homonyma omnia* Dombeyae.
angulata, Kuntze, l. c. 76 = *D. acerifolia*, Baker.
botryodes, Kuntze, l. c. = *D. botryoides*, Baker.
mancharica, Kuntze, l. c. = *D. manaharica*, Baill.
palmeta, Kuntze, l. c. = *D. acutangula*, Cav.
rottleroides, Kuntze, l. c. = *D. rottleroides*, Baill.
quinqueseta, Kuntze, l. c. = *D. multiflora*, Planch.
tiliaefolia, Kuntze, l. c. = *D. acutangula*, Cav.

ASTELIA, Banks et Soland. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 217.

graminifolia, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 267 = *spicata*, Colenso.
hastata, Colenso, l. c. 265 = *microsperma*, Colenso.
Nadeaudi, Drake, *Fl. Polyn. franç.* (1892) 227; et *Illustr. fl. insul. Maris Pacif.* (1892) 319. — Ins. Societ.
planifolia, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 209. — N. Zel.
subrigida, Colenso, l. c. xix. 1886 (1887) 268. — N. Zel.

ASTEPHANIA, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1506; et in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. ii. (1887) 338. **COMPOSITAE**.

africana, Oliver, l. c. — Afr. trop. or.

ASTEPHANOCARPA, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 493. **COMPOSITAE**.

arbutifolia, Baker, l. c. — Madag.

ASTEPHANUS, R. Br. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 218.

neglectus, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45. (1894) 26. — Afr. austr.
stenolobus, K. Schum. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 15 nomen; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 321. — Afr. trop. or.

ASTER, Tourn. ex Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 218.

abyssinicus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Felicia abyssinica*, Sch. Bip.
acerosus, Kuntze, l. c. = *Aplopappus acerosus*, Bert.
acradenius, Kuntze, l. c. = *Bigelowia acradenia*, Greene.
Adelberti, Kuntze, l. c. 315 = *Aplopappus Chamissonis*, DC.
Aitchisoni, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 287. — Afghan.
Alamati, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 215 = *Solidago scabrida*, DC.
alaticus, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 407. — China.
albarracinensis, Pau, *Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 9. — Hisp.
Alberti, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 406. — Chili.
albidus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia albidula*, Hook. f.
albus, Kuntze, l. c. 317. — Chili.
amplexicaulis, Kuntze, l. c. = *Solidago amplexicaulis*, Torr. et Gray.
andinus, Kuntze, l. c. = *Aplopappus pinnatifidus*, Nutt.
Angelandri, Kuntze, l. c. = *Bigelowia Engelmanni*, A. Gray.
angulatus, Kuntze, l. c. = *Olearia angulata*, T. Kirk.
angustatus, Kuntze, l. c. = *O. oleifolia*, T. Kirk.
anthyllodes, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus anthyllodes*, Meyen et Walp.
antucensis, Kuntze, l. c. — Chili.
apargiodes, Kuntze, l. c. = *Aplopappus apargioides*, A. Gray.
araucanus, Kuntze, l. c. = *Apl. araucanus*, Phil.
arborescens, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia nitida*, Hook. f.
arbutodes, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus arbutoides*, Remy.
Archerianus, Kuntze, l. c. 315 = *Solidago rugosa*, Mill.
arguta, Kuntze, l. c. 317 = *Sol. arguta*, Ait.

ASTER:—

- armenus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317. — Armenia.
armerioides, Kuntze, l. c. = *Aplopappus armerioides*, A. Gray.
Asae, Kuntze, l. c. 315 = *Bigelowia paniculata*, A. Gray.
asperatus, Kuntze, l. c. = *Solidago patula*, Muhl.
asterodes, Kuntze, l. c. = *Aster Heterochaeta*, C. B. Clarke.
asteroides, MacMillan, Metasperm. Minn. (1892) 524 = *Sericocarpus conyzoides*, Nees.
asteroides, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 213 = *Baccharis asteroides*, Colla.
atacamensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Aplopappus rigidus*, Phil.
atenes, Kuntze, l. c. (= *Pyrrocoma rigida*, Phil.). — Chili.
aureus, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus aureus*, A. Gray.
Autrani, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 158. — Syria.
avienniaefolius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia avicenniaefolia*, Hook. f.
baccharodes, Kuntze, l. c. = *Solidago occidentalis*, Torr. et Gray.
Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 213 (= *Tripholium conspicuum*, Lindl.). — Bolivia.
Barrelieri, Pau, Not. bot. fl. Espan. iii. (1889) 30. — Hisp.
batangensis, Bur. et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 50. — China.
Baylahuen, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Aplopappus Baylahuen*, Remy.
Berberidis, Kuntze, l. c. = *Aplopappus Berberidis*, A. Gray.
Berlandieri, Kuntze, l. c. 315 = *Bigelowia Drummondii*, A. Gray.
Berteri, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus Berteri*, DC.
Bezanillana, Kuntze, l. c. (= *Pyrrocoma Bezanillana*, Remy). — Chili.
Bidwillii, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia virgata*, Hook. f.
Bloomeri, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus Bloomeri*, A. Gray.
binominatus, Kuntze, l. c. 315 = *Bigelowia Bigelovii*, A. Gray.
Bolanderi, Kuntze, l. c. 317 = *Big. Bolanderi*, A. Gray.
Bonplandii, Kuntze, l. c. 315 = *Solidago simplex*, H. B. et K.
Bowerii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 113. — Tibet.
brachylepis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Bigelowia brachylepis*, A. Gray.
Brandegei, Kuntze, l. c. = *Aplopappus Brandegei*, A. Gray.
brickelliioides, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 16 (= *Sericocarpus tomentellus*, Greene). — Oregon.
Brittonii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Solidago Bigelovii*, A. Gray.
Buchananii, Kuntze, l. c. = *Olearia alpicola*, F. Muell.
Buckleyi, Kuntze, l. c. 317 = *Solidago Buckleyi*, Torr. et Gray.
bullatus, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 359. — Mexic.
Bustillosianus, Kuntze, Gen. Rev. (1891) l. c. 317 = *Aplopappus bustillosianus*, Remy.
caesi, Kuntze, l. c. = *Solidago caesia*, Linn.
caespitosus, Kuntze, l. c. 315 = *Aplopappus acaulis*, A. Gray.
californicus, Kuntze, l. c. 314 = *Solidago californica*, Nutt.
canadensis, Kuntze, l. c. 317 = *Sol. canadensis*, Linn.
Canbyi, Kuntze, l. c. 315 = *Aplopappus integrifolius*, T. C. Porter.
Candollei, Kuntze, l. c. = *Solidago spathulata*, DC.
carnerosanus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 139. — Mexic.
carthamodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Aplopappus carthamoides*, A. Gray.
Cerberoanus, Kuntze, l. c. (= *Pyrrocoma Cerberoana*, Remy). — Chili.
ceruminensis, Kuntze, l. c. = *Bigelowia ceruminosa*, A. Gray.

ASTER:—

- chrysanthemifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Aplopappus chrysanthemifolius*, DC.
chryseus, Kuntze, l. c. 315 (= *Pyrrocoma aurea*, Phil.). — Chili.
Chrysothamnus, Kuntze, l. c. = *Bigelowia arborescens*, A. Gray.
ciliaris, Kuntze, l. c. = *Solidago juncea*, Ait.
ciliatus, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus ciliatus*, DC.
colchicus, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 89 et 519. — Reg. Transcauc.
Colensoi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Olearia Colensoi*, Hook. f.
coloratus, Kuntze, l. c. = *O. colorata*, Colenso.
commutatus, A. Gray, Syn. Fl. N. Amer. i. 2. (1888) 185. — Am. bor.
commixtus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Aster Herveyi*, A. Gray.
commutatus, Kuntze, l. c. = *Solidago Chapmanni*, A. Gray.
confertiflorus, Kuntze, l. c. 317 = *Solidago confertiflora*, DC.
confinis, Kuntze, l. c. = *Sol. confinis*, A. Gray.
Cooperi, Kuntze, l. c. = *Bigelowia Cooperi*, A. Gray.
coronopifolius, Kuntze, l. c. = *Big. coronopifolia*, A. Gray.
croceus, Kuntze, l. c. = *Aplopappus croceus*, A. Gray.
cuneatus, Kuntze, l. c. = *Apl. cuneatus*, A. Gray.
cuneifolius, Kuntze, l. c. = *Apl. cuneifolius*, Nutt.
cymbalioides, Kuntze, l. c. 315 = *Aster Candollii*, Harv.
decemflorus, Kuntze, l. c. = *Solidago Radula*, Nutt.
densifolius, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus densifolius*, Remy.
denticulatus, Kuntze, l. c. (= *Pyrrocoma denticulata*, Phil.). — Chili.
depressus, Kuntze, l. c. 318 = *Bigelowia depressa*, A. Gray.
Dieteria, Kuntze, l. c. 315 = *Aplopappus gracilis*, A. Gray.
Diplopappus, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. Diplopappus*, Remy.
divaricatus, Kuntze, l. c. = *Apl. divaricatus*, A. Gray.
Doellianus, Kuntze, l. c. = *Apl. Doellianus*, Phil.
Durandii, Kuntze, l. c. 916 = *Bigelowia teretifolia*, A. Gray.
Edwardii, Kuntze, l. c. = *Big. juncea*, Greene.
elongatus, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago elongata*, Nutt.
Elmeri, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 170. — Calif.
erectus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318. — Chili.
ericina, Kuntze, l. c. 313 = *Aplopappus ericoides*, DC.
eriophorus, Kuntze, l. c. 318 = *Leucopsis sericea*, Baker.
Euthamia, Kuntze, l. c. 316 = *Solidago tenuifolia*, Pursh.
excorticatus, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia excorticata*, J. Buch.
Faxoni, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 323. — Am. bor.
Ferdinandii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = *Olearia muricata*, Benth.
Fischeri, Kuntze, l. c. = *Aster divaricatus*, Nutt.?
fistulosus, Kuntze, l. c. = *Solidago pilosa*, Walt.
flavovirens, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. flavovirens*, Chapm.
flexuosus, Kuntze, l. c. 316 = *Aster Thomsoni*, C. B. Clarke.
foliosus, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus foliosus*, DC.
Fordii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 410. — China.
formosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = *Bigelowia pulchella*, A. Gray.
Forsteri, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia Forsteri*, Hook. f.
Forwoodii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 133. — Dakota.
Frostii, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Feb.-Mar. 1890) 167. — Austral.

ASTER:—

- frutescens*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 55. — Calif.
fulvidus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia fulvida* (Arch.).
fuscescens, Bur. et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 49. — China.
Gagei, « Phil. » ex Bot. Centralbl. v. 4. (1895) 287 sphalm. = *Aster Sagei*, Phil.
Gattingeri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago Gattingeri*, Chapm.
Gayanus, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus velutinus*, Remy.
glabratus, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. glabratus*, Phil.
glomeratus, Kuntze, l. c. = *Solidago glomerata*, Michx.
glutinosus, Kuntze, l. c. = *Aplopappus glutinosus*, DC.
gracillimus, Kuntze, l. c. = *Solidago gracillima*, Torr. et Gray.
graminifolius, Kuntze, l. c. 316 = *Solidago lanceolata*, Linn.
graveolens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 313 = *Bigelowia dracunculoides*, DC.
Grayanus, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus hirtus*, A. Gray.
Greenei, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. Greenei*, A. Gray.
grindelioides, Kuntze, l. c. 316 = *Apl. squarrosus*, Hook. et Arn.
grindelioides, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. grindelioides*, DC.
griseus, Kuntze, l. c. 316 (= *Pyrrocoma canescens*, Phil.). — Chili.
Guiradonis, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago Guiradonis*, A. Gray.
Haastii, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia Haastii*, Hook. f.
Haplopappus, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus sericeus*, DC.?
Harbourii, Kuntze, l. c. = *Bigelowia Parryi*, A. Gray.
Hartwegii, Kuntze, l. c. 318 = *Big. Hartwegii*, A. Gray.
Harveyanus, Kuntze, l. c. 316. — Afr. austr.
Hectorii, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia Hectori*, Hook. f.
Hemslayi, Kuntze, l. c. 316 = *Solidago paniculata*, DC.
Hendersoni, Fernald, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 273. — Idaho.
Henryi, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 411. — China.
heterophyllus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = *Bigelowia Wrightii*, A. Gray.
hirtellus, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus hirtellus*, Phil.
hispidulus, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. hispidulus*, DC.
hispidus, Kuntze, l. c. 316 = *Solidago nemoralis*, Ait.
holophyllus, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 412. — As. centr. bor.
Hookerianus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Aplopappus Hookerianus*, A. Gray.
Hoorebekia, Kuntze, l. c. = *Aplopappus Hoorebekia*, DC.
Houghtonii, Kuntze, l. c. = *Solidago Houghtoni*, Torr. et Gray.
Howardii, Kuntze, l. c. = *Bigelowia Howardii*, A. Gray.
Howellii, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus Hallii*, A. Gray.
ilicifolius, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. ilicifolius*, Remy.
illinitus, Kuntze, l. c. = *Apl. illinitus*, Phil.
incanopilosus, Sheld. in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 286 = *commutatus*, A. Gray.
inoxatus, Greene, in Erythra, iii. (1895) 119. — Calif.
insignis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia insignis*, Hook. f.
invenustus, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 179. — Calif.
Jacksonii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = *Solidago corymbosa*, Ellis.
Jamesii, Kuntze, l. c. = *Aplopappus Lyallii*, A. Gray.

ASTER:—

- Kernotii*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. I. ii. (1889) 10. — N. Guin.
lacunosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia lacunosa*, Hook. f.
laevigatus, Kuntze, l. c. 318. — Afr. austr.
lanatus, Kuntze, l. c. = *Aplopappus lanatus*, Hook. f.
lanceolatus, Kuntze, l. c. 313 = *Apl. lanceolatus*, Torr. et Gray.
lanceolatus, Kuntze, l. c. 314 = *Solidago lanceolata*, Linn.
lancifolius, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. lancifolia*, Chapm.
lanuginosus, Kuntze, l. c. 316 = *confusus*, Harv.
laricifolius, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus laricifolius*, A. Gray.
Lastarrianus, Kuntze, l. c. = *Apl. Lastarrianus*, Remy.
lateriflorus, Britton, in Report N. Y. Geol. Surv. ii. (1889) 138; et in Trans. N. Y. Acad. Sci. ix. (1889) 11 = *Aster diffusus*, Ait.
latifolius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 314 = *Solidago latifolia*, Linn.
latissimifolius, Kuntze, l. c. = *Sol. elliptica*, Ait.
Leavenworthii, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. Leavenworthii*, Torr. et Gray.
lecocephalus, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 254 = *Aster Lowieanus*, Porter.
leiospermus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Bigelovia leiosperma*, A. Gray.
lepidopodus, Robins. et Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 117. — Mexic.
lepidus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago lepidus*, DC.
leptocephalus, Kuntze, l. c. = *Sol. leptocephalus*, Torr. et Gray.
leucanthemifolius, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 119. — Nevada.
limosus, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 413. — China.
Lindheimerianus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago Lindheimeriana*, Scheele.
linearifolius, Kuntze, l. c. = *Aplopappus linearifolius*, DC.
linodes, Kuntze, l. c. 316 (= *Pyrrocoma linifolia*, Phil.). — Chili.
longipes, Kuntze, l. c. 318 (= *Pyrrocoma longipes*, Phil.). — Chili.
longulus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 18 t. 2. — Am. bor.
Lowieanus, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 121. — Am. bor.
Lyallii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia Lyallii*, Hook. f.
Mac Dougali, Robins. et Seaton, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 301. — Idaho.
Macraeanus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 (= *Pyrrocoma Macraeana*, Remy). — Chili.
macrocephalus, Kuntze, l. c. = *Aplopappus macrocephalus*, DC.
Macronema, Kuntze, l. c. = *Apl. Macronema*, A. Gray.
Marcusii, Kuntze, l. c. 316 = *Bigelovia albida*, M. E. Jones.
marginalis, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus marginalis*, Phil.
Marshallii, Kuntze, l. c. = *Solidago Marshallii*, Roth.
mexicanus, Kuntze, l. c. = *Sol. sempervirens*, Linn.
Meyenii, Kuntze, l. c. = *Aplopappus Meyenii*, Walp.
minor, Kuntze, l. c. 316 = *Apl. Parryi*, A. Gray.
minutus, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago minuta*, Linn.
missouriensis, Kuntze, l. c. = *Sol. missouriensis*, Nutt.
majus, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 325 = *Aster modestus*, Lindl.
mohavensis, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 126. — Calif.
mohavensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Bigelovia mohavensis*, Greene.
monactis, Kuntze, l. c. = *Aplopappus monactis*, A. Gray.
monticolus, Kuntze, l. c. = *Solidago monticola*, Chapm.

ASTER:—

- moschatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia moschata*, Hook. f.
Muehlenbergianus, Kuntze, l. c. 316 = *Solidago squarrosa*, Muehl.
multicaulis, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus multicaulis*, A. Gray.
multibracteolatus, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia multibracteolata*, Colenso.
multifolius, Kuntze, l. c. 316 (= *Pyrrocoma foliosa*, Phil.). — Chili.
multiradiatus, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago multiradiata*, Ait.
nanus, Kuntze, l. c. = *Sol. nana*, Nutt.
neozelandicus, Kuntze, l. c. 316 = *Olearia marginata*, Colenso.
nevadensis, Kuntze, l. c. 318 = *Bigelovia nevadensis*, A. Gray.
Nevinii, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus Palmeri*, A. Gray.
nitens, Kuntze, l. c. = Chili.
nummulariaefolius, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia nummularifolia*, Hook. f.
nulatus, Kuntze, l. c. 318 = *Bigelovia nudata*, DC.
Nuttallii, Kuntze, l. c. = *Aplopappus Nuttallii*, Torr. et Gray.
ochagaviensis, Kuntze, l. c. = *Apl. ochagavianus*, Phil.
odoros, Kuntze, l. c. = *Solidago odora*, Ait.
ohioensis, Kuntze, l. c. = *Sol. ohioensis*, Riddell.
Oldhami, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 414. — Formosa.
oleifolius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia oleifolia*, T. Kirk.
oligodontus, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus paucidentatus*, Phil.
operinus, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia operina*, Hook. f.
oppositifolius, Kuntze, l. c. 318 = *Bigelovia oppositifolia*, A. Gray.
Orcuttii, Vasey et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 113 t. 11. — Calif.
otagoensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = *Olearia dentata*, Hook. f.
ottomanum, Velen. in Sitzb. boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) ii. 48; et Fl. Bulg. (1891) 277. — Bulg.
Parishii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Bigelovia Parishii*, Greene.
parvifolius, Kuntze, l. c. (= *Pyrrocoma parvifolia*, DC.) — Chili.
patagoniensis, Kuntze, l. c. = *Aplopappus patagonicus*, Phil.
paucicapitatus, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 329. — Am. bor.
pauciflocculosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago pauciflocculosa*, Michx.
pectinatus, Kuntze, l. c. = *Aplopappus pectinatus*, Phil.
pedunculatus, Kuntze, l. c. = *Apl. pedunculatus*, Remy.
perfoliatus, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1717. — Afr. austr.
Peteroanus, Phil., in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 406. — Chili.
petiolaris, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago petiolaris*, Ait.
Philippii, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus paniculatus*, Phil.
phyllocephalus, Kuntze, l. c. = *Aplopappus rubiginosus*, Torr. et Gray.
Pickeringii, Kuntze, l. c. = *Aplopappus lanuginosus*, A. Gray.
pinus, Kuntze, l. c. 318 (= *Pyrrocoma pinus*, Phil.). — Chili.
pinatifidus, Kuntze, l. c. 313 et 316 = *Aplopappus spinulosus* DC
pityphyllus, Kuntze, l. c. (1891) 316 = *Aplopappus pinifolius*, A. Gray.
polyglossa, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago microglossa*, DC.
polyphyllus, Kuntze, l. c. = *Aplopappus polyphyllus*, Phil.
populifolius, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia populifolia*, Colenso.
pristiphyllus, Kuntze, l. c. 318 (= *Pyrrocoma pristiphylla*, Remy). — Chili.

ASTER:—

- procerus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 415. — China.
prostratus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 407. — Chili.
prunelloides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Aplopappus prunelloides*, DC.
psammophilus, Klatt, in Arb. Bot. Mus. Hamb. (1890). extr. 4; et in Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt, ix. (1892) 126. — Bras.
pseudamellus, Hook. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 659. — Reg. Himal.
pubens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = *Solidago Curtisii*, Torr. et Gray.
pulverulentus, Kuntze, l. c. 316 et 318 = *Sol. puberula*, Nutt.
pumilus, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. pumila*, Torr. et Gray.
Purschianus, Kuntze, l. c. 316 = *Sol. tortifolia*, Ellis.
Pyrrocoma, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus racemosus*, Torr.
radicans, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. radicans*, Remy.
Rafinesquii, Kuntze, l. c. 317 = *Solidago Shortii*, Torr. et Gray.
Rani, Kuntze, l. c. = *Olearia Cunninghamii*, Hook. f.
Remyanus, Kuntze, l. c. = *Aplopappus decurrens*, Remy.
Remyanus, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. Remyanus*, Wedd.
Rengifoanus, Kuntze, l. c. = *Apl. Rengifoanus*, Remy.
resinosus, Kuntze, l. c. 317 = *Apl. nanus*, Eaton.
retinervius, Kuntze, l. c. (= *Pyrrocoma reticulata*, Phil.). — Chili.
reversus, Kuntze, l. c. = *Aplopappus reflexus*, Phil.
Richardii, Kuntze, l. c. 318 = *Felicia Richardii*, Vathe.
Riddellii, Kuntze, l. c. 314 = *Solidago Riddellii*, Frank.
rigidus, Kuntze, l. c. = *Sol. rigida*, Linn.
Rothrockii, Kuntze, l. c. 317 = *Sol. spectabilis*, A. Gray.
rugosus, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. rugosa*, Mill.
rupestris, Kuntze, l. c. = *Sol. rupestris*, Rafin.
Sagei, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 405. — Araucania.
Samsonii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 415. — China.
Savatieri, Makino, in Tokyo Bot. Mag. viii. (1894) 172. — Japon.
Savianus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Solidago littoralis*, Savi.
saxatilis, Kuntze, l. c. 318 (= *Pyrrocoma saxatilis*, Remy). — Chili.
scaposus, Kuntze, l. c. = *Leucopsis scaposa*, Baker.
Schumannii, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus Poeppigianus*, A. Gray.
scoparius, Kuntze, l. c. 318. — Sibiria.
scopiformis, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus virgatus*, Phil.
scrobiculatus, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. scrobiculatus*, DC.
semialexicaulis, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 55. — Japon.
semidentatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia semidentata*, Decne.
sempervirens, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago sempervirens*, Linn.
Serenoi, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus Watsoni*, A. Gray.
setiger, Kuntze, l. c. 318 (= *Pyrrocoma setigera*, Phil.). — Chili.
Solanderi, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia Solandri*, Hook. f.
sonomensis, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 180. — Calif.
sonoriensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Bigelovia diffusa*, A. Gray.
sparsiflorus, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago sparsiflora*, A. Gray.
speciosus, Kuntze, l. c. = *Sol. speciosa*, A. Gray.
spinuliger, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus spinulosus*, Phil.
spithameus, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago spithamea*, M. A. Curt.

ASTER :—

- stelliger*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Aplopappus stelliger*, Remy.
stenophyllus, Kuntze, l. c. = *Apl. stenophyllus*, A. Gray.
Stenotus, Kuntze, l. c. 317 = *Apl. pygmaeus*, A. Gray.
Sternbergii, Kuntze, l. c. (= *Pyrrocoma angustifolia*, DC.). — Chili.
stewardensis, Kuntze, l. c. = *Olearia angustifolia*, Hook. f.
stolonifer, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus stoloniferus*, DC.
strictus, Kuntze, l. c. = *Solidago stricta*, Ait.
Stuebelii, Hieron., in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 334. — Peruvia.
sublitoralis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Solidago Elliottii*, Torr. et Gray.
suborbiculatus, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia suborbiculata*, Colenso.
suffruticosus, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus suffruticosus*, A. Gray.
subtropicus, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 139. — Am. bor. et austr.
Terrae-novae, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago Terrae-novae*, Torr. et Gray.
thermalis, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. i. (1895) 694. — Utah.
thyrsoides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Solidago macrophylla*, Banks.
Tolmieana, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. Tolmieana*, A. Gray.
Torreyi, Kuntze, l. c. 317 = *Sol. Drummondii*, Torr. et Gray.
Torreyi, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 37. — Calif.
trachyticus, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 37. — Bolivia.
Traillii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia Traillii*, T. Kirk.
Traversii, Kuntze, l. c. = *O. Traversii*, F. Muell.
tuganianus, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 253. — Reg. Cauc.
tuganus, Alboff, l. c. iii. (1895) 519 sphalm. = *tuganianus*, Alboff.
uliginosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago uliginosa*, Nutt.
ulmifolius, Kuntze, l. c. = *Sol. ulmifolia*, Muehl.
uncinatus, Kuntze, l. c. = *Aplopappus uncinatus*, Phil.
uniflorus, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. uniflorus*, Torr. et Gray.
uniligulatus, Kuntze, l. c. 317 = *Solidago neglecta*, Torr. et Gray.
valparaisanus, Kuntze, l. c. = *Aplopappus pulchellus* DC.
Vaseyi, Kuntze, l. c. 318 = *Bigelowia Vaseyi*, A. Gray.
velutinus, Kuntze, l. c. = *Solidago velutina*, DC.
venetus, Kuntze, l. c. = *Bigelowia veneta*, A. Gray.
venosus, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus reticulatus*, Phil.
venustus, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 247. — Utah, Colorado.
vernus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago verna*, M. A. Curt.
villiger, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus villosus*, Phil.
Virgaurea, Kuntze, l. c. 314 = *Solidago Virgaurea*, Linn.
viscidiflorus, Kuntze, l. c. 313 = *Bigelowia viscidiflora*, DC.
Wardii, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus Fremonti*, A. Gray.
Wattii, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 36. — Reg. Himal.
Whitneyi, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus Whitneyi*, A. Gray.
worcesterensis, Kuntze, 317 = *Aster imbricatus*, Haro.

ASTERANTHERA, Hanst. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 224.

- ovata*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 102 = *chiloensis*, Hanst.

ASTERISCIMUM, Cham. et Schlecht. (Umbellif.).

- Ind. Kew. i. 224.
Vidalii, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 711. — Chili.

ASTERISCODES, Moehr. = **Callistephus**, Cass. (Compos.).

- chinense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *C. hortensis*, Cass.

ASTERISCUS, Moench = **Odontospermum**, Neck. (Compos.).

- citriodorus*, Heldr. et Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. (1895) 411. — Ins. Cyclad.

ASTERISCUS, Siegesb. Fl. Petrop. (1736) 15 pr. p. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = **Odontospermum**, Neck. (Compos.).

- stenophyllum*, Kuntze, l. c. 319 = *O. stenophyllum*, Sch. Bip.

ASTEROCARPUS, Eckl. et Zeyh. = **Pterocelastus**, Meissn. (Celastrin.).

- Dregeanus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *P. Dregeanus*, Sond.
tricuspidatus, Kuntze, l. c. = *P. tricuspidatus*, Walp.

ASTEROPEIA, Thou (Samyd.). — Ind. Kew. i. 225.

- Bakeri*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 6. — Madag.
rhopaloides, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 564 = *Rhodoclada rhopaloides*, B. Ker.
sphaerocarpa, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 479. — Madag.

ASTEROSTIGMA, Fisch. et Mey. = **Staurostigma**, Scheidw. (Aroid.).

- luridum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 740 = *S. odorum*, Scheidw.
Riedelianum, Kuntze, l. c. = *S. Riedelianum*, Engl.

ASTIANTHUS, D. Don = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).

- viminalis*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 44 (= *Bignonia viminalis*, H. B. f. et K.). — Am. austr.

ASTILBE, Buch.-Ham. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 326.

- biternata*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 475 = *Tiarella biternata*, Vent.
Lemoinei X, Hort. ex Rev. Hort. (1895) 567 fig. 185. — Hybr. artef.
pinnata, Franch. in Journ. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 176 in obs.; et Pl. Delav. (1890) 231. — Yunnan.
podophylla, Franch. Pl. Delav. (1890) 231 in obs. = *podophylla*, Baill.?
polyandra, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 265 et 490 = *Spiraea Aruncus*, Linn.?
simplicifolia, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1893) 103. — Japon.

ASTRAGALUS, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 226.

- accidens*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 471. — Oregon.
accumbens, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 20 (= *Astr. procumbens*, S. Wats.). — N. Mexic.
acerbus, Sheld. l. c. 123 = *A. Dodgians*, M. E. Jones.
achtalensis, Conrath et Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 182. — Somchetia.
acrocarpus, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 64. — As. Min.
albatus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 128. — Calif.
albifolius, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1893) 417. — As. Min.
Alboffianus, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 186. — Daghest.
Alfalfalis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 29. — Chili.
algerianus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 121. = *tenuifolius*, Desf.
allanaris, Sheld. l. c. 141. — Washingt.

ASTRAGALUS :—

- alopecuroides*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fleurs, éd. 8. ii. (1889) 188 = *alopecuroides*, Linn.
alpinus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 65 = *frigidus*, A. Gray.
ammolotus, Greene, in Erythea, iii. (1895) 76. — Am. bor. occ.
amphioxys, Sheld. ex Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 87. — Am. bor. occ.
angustus, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 634. — Am. bor.
anisus, M. E. Jones, in Zoë, iv. (1893) 34. — Am. bor. occ.
Amunategui, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 31. — Chili.
apertus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 166 = *ervoides*, Hook. et Arn.
apilosus, Sheld. l. c. 22 = *glaber*, Michx.
aragonensis, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 234 = *tulolensis*, Pau.
araneosus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 170. — Am. bor. occ.
argillosus, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 241. — Utah.
argolicus, Hausskn. ex Nym. Conspl. fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 98 nomen; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge. v. (1893) 81. — Graecia.
argyroides, G. Beck, ex Staff. in Denkschr. Acad. Wien, li. (1886) 341. — As. occ.
arietinus, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 653. — Utah.
Aristidis, Coss. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1889) 256 = *cruciatum*, Link.
aragonensis, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 544 = *aragonensis*, Freyn.
Artemisiarum, M. E. Jones, in Zoë, iv. (1894) 369. — Am. bor. occ.
asclepiadoides, M. E. Jones, l. c. ii. (1891) 238. — Utah.
askabadensis, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 182. — Turkest.
astragalinus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 65 = *alpinus*, Linn.
asymmetricus, Sheld. l. c. 23. = *leucophyllus*, Torr. et Gray.
atropubescens, Coult. et Fish. in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 300. — Montana.
Autrani, Baldacci, in Malpighia, viii. (1894) 167; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 196. — Albania.
bajaensis, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 169. — Calif.
Barbeyanus, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 184. — Reg. Transcauc.
Barbeyanus, Post, l. c. i. (1893) 19. — Syria.
Barceloi, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 27. — Chili.
barbidens, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 185. — Daghest.
Barrowianus, Aitch. et Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 50. — Turkest.
Basineri, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 444. — Turkest.
bernardinus, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 661. — Calif.
Bodini, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 122. — Am. bor.
bolivianus, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 15. — Bolivia.
Bornmuelleri, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 403. — As. occ.
Borodini, Krassn. in Script. Hort. Univ. Petrop. ii. 1. (1887-88) 15. — As. occ.
brachycalyx, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 15. — Bolivia.
brachycephalus, Franch. Pl. Delav. (1890) 161. — Yunnan.
brachypetalus, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 446. — Turkest.
bucharicus, Regel, l. c. ix. (1886) 605. — Bukhara.
camptodontus, Franch. Pl. Delav. (1889) 160 t. 39. Yunnan.
candelarius, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 142. — Am. bor.
candicans, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 9 = *Prantianus*, Freyn.
candidissimus, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 149. — Calif.

ASTRAGALUS : —

Candollianus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1893) 140 = *Phaca Candolliana*, H. B. et K.
canispinus, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 181. — Afghan.
capitellus, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 260. — Am. austr.
Celakowskyanus, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 8. — As. Min.
centralis, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 132 = *microcystis*, Bunge.
ceramicus, Sheld. l. c. 19 (= *Astr. pictus*, A. Gray). — Am. bor. occ.
cerussatus, Sheld. l. c. 139. — Colorado.
cemerinus, G. Beck, ex *Stafp*, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 337. — As. occ.
Chamaephaea, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 211 et 402. — As. Min.
chilensis, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 157 = *procumbens*, Hook. et Arn.
chlorotaenius, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 12. — As. Min.
cibarius, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 149. — Am. bor. occ.
Cicadae, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 35. — Am. bor. occ.
circumdatius, Greene, *Pittonia*, i. (June 1888) 173. — Calif.
coccineus, T. S. Brandeg. in *Zoë*, ii. (1891) 72 = *grandiflorus*, S. Wats.
colliculus, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 19. — Bolivia.
Coltoni, M. E. Jones, in *Zoë*, ii. (1891). — Utah.
Conrathi, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 182. — Somchetia.
consectus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 143. — Am. bor. occ.
convallarius, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 207 = *serotinus*, A. Gray.
Cottonianus, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II, iii. (1886) 51. — Turkest.
crassicaupus, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 64 = *Tempskyanus*, Freyn et Sint.
crescenticarpus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 148. — Am. bor. occ.
Crotalariae, Sheld. l. c. 135 = *Phaca Crotalariae*, Benth.
cuspidocarpus, Sheld. l. c. 147. — Montana, Wyoming.
curvipes, Trautv. *Contrib. fl. Turcom.* (1885?) 12; et in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 446. — Turkest.
cyclophyllon, G. Beck, ex *Stafp*, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 339. — As. occ.
cymboides, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 650. — Utah.
Daleae, Greene, *Pittonia*, i. (Jan. 1888) 153. — Mexic.
Davidi, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II, viii. (1885) 214. — China.
demissus, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 221. — Nevada.
desperatus, M. E. Jones, in *Zoë*, ii. (1891) 243. — Utah.
Dessaueri, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 26. — Chili.
dichroanthus, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 13. — Armenia.
diurnus, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 450. — Oregon.
diversifolius, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 445. — Turkest.
Dodgianus, M. E. Jones, in *Zoë*, iii. (1893) 289. — Utah.
Durandianus, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II, iii. (1886) 54. — Persia.
Eastwoodae, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1894) 368. — Am. bor. occ.
Edmondi, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 131 (= *Astr. pectinatus*, Boiss.). — Syria.
eginensis, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 10. — Armenia.
elatiocarpus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 20 = *lotiflorus*, Hook.
elegans, Sheld. l. c. 154 = *oroboides*, Hornem.
elegantulus, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 207 (= *Astr. pectinatus*, Boiss.). — Syria.

ASTRAGALUS : —

Elmeri, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 98. — Calif.
Engelmanni, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 152. — Texas.
ensiformis, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 658. — Arizona.
eremicus, Sheld. ex Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 86 sphalm. = *eremiticus*, Sheld.
eremiticus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 161 = *Coulteri*, Benth.
ericalyx, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 211 et 401. — As. Min.
erythrocephalus, Freyn et Sint. l. c. xlii. (1892) 10. — Armenia.
erythrosemius, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 179. — Afghanistan.
euphraticus, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 186. — Armenia.
exegicus, Post, *Pl. Postianae*, iii. (1892) 7. — Syria.
famelis, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 23 = *fallax*, S. Wats.
fissilis, Freyn et Sint. ex *Somm. et Levier*, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1893) 526; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1893) 414. — Reg. Cauc.
fissus, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 415 in syn. = *fissilis*, Freyn et Sint.
flagellaris, Engelm. et Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 152 = *Engelmanni*, Sheld.
flaviflorus, Sheld. l. c. 158. = *flavus*, Nutt.
flavus, Sheld. l. c. = *Phaca flava*, Hook. et Arn.
foliolosus, Sheld. l. c. 138 = *pictus*, A. Gray, var.
Forwoodii, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 129. — Dakota.
franciscanus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 135. = *oocarpus*, A. Gray.
franciscuensis, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 666. — Calif.
Freynii, Alboff, *Prodr. fl. Colch.* (1895 61). — Reg. Cauc.
fuliginosus, G. Beck, ex *Stafp*, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 340. — As. occ.
Gambellianus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 21 = *nigrescens*, Nutt.
genuflexus, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 12. — Armenia.
giganteus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 65 = *alpinus*, Linn. var.
gilviflorus, Sheld. l. c. 21 = *triphyllus*, Pursh.
glandulosus, G. Beck, ex *Stafp*, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 334. — As. occ.
Goreanus, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser.* II, iii. (1886) 55. — Afghan.
Grallator, S. Wats. in *Zoë*, iii. (1892) 52. — Colorado.
grandiflorus, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 46. — Armenia.
Grisebachianus, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser.* II, iii. (1886) 52. — Afghanistan.
griseopubescentis, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 24 = *strigosus*, Coult. et Fish.
gypsaceus, G. Beck, ex *Stafp*, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 334. — As. occ.
haesitabundus, Lipsky, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 290. — Reg. Cauc.
hamadanus, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 186. — Persia.
Hasseanus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 124. — Calif.
Hegelmaieri, Willh. *Suppl. Prodr. fl. Hisp.* (1893) 235. — Hisp.
Heideri, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 157 nomen; et in *Sitzungsb. Akad. Wien*, xcvi. (1889) 388 t. 2 fig. 1-7. — As. Min.
Hendersoni, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 471 = *Watsoni*, Sheld.
Henryi, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1959. — China.
Holdichianus, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser.* II, iii. (1886) 54. — Turkest.
holosericeus, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 638. — Calif.
Hoodianus, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 111. — Oregon.
humillimus, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 61. — As. Min.
hyalinus, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 648. — Nebraska.

ASTRAGALUS : —

ibapensis, M. E. Jones, in *Zoë*, iii. (1893) 290. — Utah.
intermedius, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 656. — Arizona.
intonsus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 23 = *villosus*, Michx.
inversus, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 276. — Calif.
inyoensis, Sheld. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 86. — Calif.
Jepsoni, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 22 = *demissus*, Greene.
Julianus, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 667. — Calif.
Karoi, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 436. — Sibiria.
Kralikii, Coss. ex Batt. et Trab. *Fl. de l'Algerie* (Dicot.) (1889) 259. — Algeria.
Krueganus, Freyn et Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 211 et 443. — As. Min.
Kuntzei, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 123 = *tenellus*, Bunge.
laetevirens, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 30. — Chili.
laguroides, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 180. — Persia.
lanocarpus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 144. — Washington, Nevada.
latus, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 272. — Am. bor. occ.
lectulus, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 471. — Calif.
Leibergii, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 663. — Washington.
leucocystis, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 76 = *lanocarpus*, Sheld.
leucolobus, Parry, ex M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 270 (an *Astr. lectulus*, S. Wats.). — Calif.
leucothrix, Freyn et Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 406. — As. Min.
Levieri, Freyn, ex *Somm. et Levier*, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1893) 527; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 28. — Reg. Cauc.
limatus, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 126. — Am. bor. occ.
Lindleyanus, Sheld. l. c. 140 (= *Astr. strobiliferus*, Lindl.). — Armenia.
lingulatus, Sheld. l. c. 118. — Am. bor.
litangensis, Bureau et Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 24. — China.
Loczyi, Kanitz, *Pl. expd. Szechenyi in As. centr. coll.* (1891) 17. — As. centr.
longibracteatus, *Somm. et Levier*, in *Bull. Soc. bot. Ital.* iii. (1894) 31; et in *Act. Hort. Petrop.* x. (1893) 192. — Reg. Cauc.
longidens, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 181. — Armenia.
Lumsdenianus, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser.* II, iii. (1886) 52. — Turkest., Persia.
Maddougali, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 169. — Arizona.
macedonicus, Heldreich et Hadji, *Geogr. bot. Emp. Ottom. (Pl. de Salon.)* (1892) 19. — Maced.
macrophyus, *Somm. et Levier*, in *Bull. Soc. bot. Ital.* iii. (1894) 31; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 190. — Reg. Cauc.
Magdalenae, Greene, *Pittonia*, i. (Feb. 1888) 162 (= *Astr. candidissimus*, S. Wats.). — Calif.
Mandoni, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 19. — Bolivia.
megalacmus, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 419. — As. Min.
megalanthus, Freyn et Sint. l. c. xlii. (1892) 46 in syn. = *grandiflorus*, Freyn.
melanogramma, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 185. — Persia.
metanus, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 666. — Calif.
miquelensis, Greene, *Pittonia*, i. (March 1887) 33 = *anemophilus*, Greene.
misellus, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 449. — Oregon.
miserandus, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 76 = *bajaensis*, Sheld.
Mitchellii, Post, *Pl. Postianae*, i. (1890) 7. — Syria.

ASTRAGALUS : —

- moenocoppensis, *M. E. Jones*, in *Zoë*, ii. (1891) 12. — Am. bor. occ.
- monospermus, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 27. — Chili.
- moupinensis, *Franch.* in *Nowv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. (1885) 213. — China.
- muradicoideus, *Wettst.* in *Sitzungsb. Akad. Wien*, xcvi. 1889 (1889) 387. — As. Min.
- Murrii, *Huter*, in *Progr. Oberrealschule Innsbruck*. (1891) 53 et 57; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 31. — Tirol.
- musiniensis, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 671. — Utah.
- muticus, *Pau*, *Not. bot. fl. Espan.* ii. (1889) 8. — Hisp.
- myrianthus, *G. Beck*, ex *Stapf*, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 336. — As. occ.
- Nawabianus, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1886) 49. — Afghanistan, Turkest.
- neglectus, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 415 = *fissilis*, *Freyn et Sint.*
- neglectus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 59. — *Cooperi*, *A. Gray*.
- nemorosus, *Batt.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 263; et xlii. (1895) 207. — Algeria.
- Nevinii, *A. Gray*, ex *Lyon*, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 331 et 335 nomen; et in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 412. — Calif. austr.
- nigrescens, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 162. — Yunnan.
- nubigenus, *Taub.* in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 303 (= *Phaca nubigena*, *E. Mey.*). — Chili.
- oblatum, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 21 (= *Astr. nudus*, *S. Wats.*). — Am. bor. occ.
- oreites, *G. Beck*, ex *Stapf*, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 380. — As. Min.
- Orizabae, *Seaton*, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 117. — Mexic.
- pacificus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 174 (= *Astr. Hendersoni*, *S. Wats.*). — Am. bor. occ.
- palans, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iv. (1893) 37 = *lentiginosus*, *Dougl.*
- palmyrensis, *Post*, *Pl. Postianae*, i. (1890) 6. — Syria.
- panamintensis, *Sheld.* ex *Coult.* in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 87. — Calif.
- paphlagonicus, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 65. — As. Min.
- parviflorus, *MacMill.* *Metasp.* Minn. (1892) 325 = *gracilis*, *Nutt.*
- Pauli, *Loscos*, in *Pau*, *Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 8; et in *Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp.* (1893) 233. — Hisp.
- Peabodianus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iii. (1893) 295. — Utah.
- pencanus, *Phil.* in *Anat. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 30. — Chili.
- pentanthus, *Boiss.* *Fl. Or. Suppl.* (1888) 187. — Persia.
- pephragmenus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iv. (1893) 267. — Am. bor. occ.
- petropolitatus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 171 = *trichocalyx*, *Trautv.*
- phyllostachys, *Boiss.* *Fl. Or. Suppl.* (1886) 183. — Persia.
- Pichleri, *G. Beck*, ex *Stapf*, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 336. — As. occ.
- polycladus, *Bureau et Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 23. — China.
- Pondii, *Greene*, *Pittonia*, i. (April 1889) 288. — Calif.
- praelongus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 23 (= *Astr. procerus*, *A. Gray*). — Am. bor.
- praesignis, *Sheld.* l. c. 118 in nota = *viridis*, *Bunge*.
- Prantianus, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 415. — Armenia.
- Pringlei, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 449. — Mexic.
- proriferus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iv. (1893) 275. — Calif.
- pruniformis, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 660. — Oregon.
- Purshii, *Sheld.* ex *Coville*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1883) 87 = *leucolobus*, *M. E. Jones*.

ASTRAGALUS : —

- quinquefolius, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 450. — Mexic.
- rasus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 158. — Colorado.
- Rawlinsianus, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1886) 51. — Turkest.
- remulcus, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 658. — Arizona.
- Rengifo, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 25. — Chili.
- reventoides, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 661. — Montana.
- Richardsoni, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 126 = *Hallii*, *A. Gray*.
- Rothrockii, *Sheld.* l. c. 174. — Am. bor. occ.
- sabulosus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, ii. (1891) 239. — Utah.
- safranolicus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 138 = *foliolosus*, *Bunge*.
- saguntinus, *Pau*, *Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 31 nomen. — Hisp.
- salinus, *Howell*, in *Erythraea*, i. (1893) 111. — Oregon.
- saxatilis, *Freyn et Bornm.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 495. — As. Min.
- scalaris, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 270. — Mexic.
- scobinatulus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 24 = *Haydenianus*, *A. Gray*, var.
- Seatonii, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 676. — Mexic.
- selenaeus, *Greene*, in *Erythraea*, iii. (1895) 76 = *crescenticarpus*, *Sheld.*
- serbicus, *Wettst.* in *Sitzungsb. Acad. Wien*, xcvi. 1889, (1889) 390 in obs. nomen. — Serbia.
- Serenoi, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 130 (= *Astr. nudus*, *S. Wats.*). — Am. bor. occ.
- sericeus, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 406. — Armenia.
- sericopetalus, *Trautv.* in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 448. — Turkest.
- serpens, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 641. — Utah.
- Shepardii, *Post*, *Pl. Postianae*, i. (1889) 6 et iv. (1892) 5. — Syria.
- Shockleyi, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 659. — Nevada.
- Sileranus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, ii. (1891) 242. — Utah.
- sinaicus, *Boiss.* *Fl. Or. Suppl.* (1888) 174. — Reg. Medit. or.
- sinocarpus, *Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 19. — Bolivia.
- Sintenisii, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 407. — Armenia.
- siricus « Ten. » ex *Wettst.* in *Sitzungsb. Acad. Wien*, xcvi. 1889 (1889) 392 sphalm. = *siranicus*, *Ten.*
- Skorpili, *Velen.* *Fl. Bulg.* (1891) 148. — Bulg.
- sofianus, *Velen.* l. c. 152. — Bulg.
- Sommieri, *Freyn*, ex *Somm. et Levier*, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1893) 526; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 418. — Reg. Cauc.
- sophoroides, *M. E. Jones*, in *Zoë*, ii. (1891) 12. — Am. bor. occ.
- spatulatus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 22 = *caespitosus*, *A. Gray*.
- stenostachys, *G. Beck*, ex *Stapf*, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 333. — As. occ.
- Stephenianus, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1886) 49. — Turkest.
- striatiflorus, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 643. — Utah.
- Stribnyi, *Velen.* *Fl. Bulg.* (1891) 151. — Bulg.
- strigosus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 24 = *tener*, *A. Gray*.
- strigosus, *Coult. et Fish.* in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 299. — Montana.
- Suksdorfii, *Howell*, in *Erythraea*, i. (1893) 111. — Am. bor. occ.
- supervacaneus, *Greene*, in *Erythraea*, i. (1893) 221. — Calif.
- supervivus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 140 = *Candollianus*, *Boiss.*
- sutchuenensis, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 160. — Yunnan.

ASTRAGALUS : —

- suturalis, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 23 = *eriocarpus*, *S. Wats.*
- sylvaticus, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 262. — Oregon.
- syrticolus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 22 = *Thompsonae*, *S. Wats.*
- Talbotianus, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1886) 56. — Afghanistan.
- tanguticus, *Batalin*, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 485. — China.
- tatsienensis, *Bureau et Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 23. — China
- tejonensis, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 644. — Mexic.
- Tempskyanus, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1890) 211 et 442. — As. Min.
- tepicus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 172 = *ervoides*, *Hook. et Arn.*
- texanus, *Sheld.* l. c. 65 = *giganteus*, *S. Wats.*
- thormalis, *Greene*, in *Erythraea*, iii. (1895) 76 = *cuspidocarpus*, *Sheld.*
- tinctus, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 11. — Armenia.
- Toanus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iii. (1893) 296. — Am. bor. occ.
- tossiensi, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 416. — As. Min.
- Trabutianus, *Batt.* in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.)* (1889) 256 = *cruciatus*, *Link.*
- trachonticus, *Post*, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 426. — Syria.
- triflorus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 140 (= *Phaca triflora*, *DC.*). — Am. bor.
- turoloensis, *Pau*, *Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 20; et iv. (1891) 29; *Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp.* (1893) 234. — Hisp.
- Tweedyi, *Canby*, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 150. — Oregon.
- Uhlwormianus, *Freyn et Bornm.* ex *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 441. — As. Min.
- Ulothrix, *G. Beck*, ex *Stapf*, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 339. — As. occ.
- uintensis, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 670. — Am. bor. occ.
- umbraticus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 23 = *sylvaticus*, *S. Wats.*
- unguiculatus, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 63 = *Tempskyanus*, *Freyn et Sint.*
- uralensis, *Letvinoff*, in *Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou* (1893) 501. — Reg. Ural.
- Vandasii, *Velen.* in *Sitzb. Böhm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 34. — Bulg.
- velatus, *Trautv.* in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 450. — Turkest.
- vespertinus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 150 = *amphioxys*, *A. Gray*.
- vexilliflexus, *Sheld.* l. c. 21 = *pauciflorus*, *Hook.*
- vexillilongus, *Sheld.* l. c. 140 = *Candollianus*, *Royle*.
- virginicus, *Sheld.* ex *Coult.* in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1883) 88 = *sabulorum*, *A. Gray*.
- virgultulus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 165. — Colorado.
- viridis, *Sheld.* l. c. 118 = *A. Kentrophyta*, *A. Gray*.
- viridissimus, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 48. — As. Min.
- Watsoni, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 23 = *pacificus*, *Sheld.*
- Watsonianus, *Sheld.* l. c. 144 = *eriocarpus*, *S. Wats.*
- Weirianus, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1886) 54. — Turkest.
- Wetherilli, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iv. (1893) 34. — Am. bor. occ.
- Wettsteinianus, *Freyn et Sint.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 183. — Armenia.
- Winkleri, *Trautv.* in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 449. — Turkest.
- Wootoni, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 138 = *subcinereus*, *A. Gray*.
- xanthinus, *Freyn et Bornm.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 47; et in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 184. — As. Min.
- xylorrhizus, *Freyn et Sint.* l. c. xlii. (1892) 46. — Armenia.
- Yaquianus, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 270. — Mexic.

ASTRAGALUS: —

yunnanensis, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 162. — Yunnan.
Zingeri, Korzhinsky, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889?) 297. — Russia med.
Zionis, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 652. — Utah.
zonarius, Sheld. in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 124 = collinus, Boiss.

ASTRANTIA, (Tourn.) Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 239.
colchica, Alboff, *Prodr. fl. Colch.* (1895) 100; et *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 519. — Reg. Cauc.
pontica, Alboff, *ll. cc.* 99 et 521. — Reg. Cauc.

ASTROCARYUM, G. F. W. Mey. (Palm.). — Ind. Kew. i. 240.
horridum, Barb. *Rodr. in Vellosia*. 1885-88, ed. 2. i. (1891) 104. — Bras.
manacense, Barb. *Rodr. l. c.* 105 t. 1. — Bras.
Sechellarum, Hort. ex Baill. *Hist. des pl.* xiii. (1895) 348 = *Stevensonia grandifolia*, Duncan.
sociale, Barb. *Rodr. in Vellosia*, 1885-88, ed. 2. i. (1891) 103. — Bras.
yauaperyense, Barb. *Rodr. l. c.* — Bras.

ASTROCHLAENA, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 120. **CONVOLVULACEAE**.
cephalantha, Hallier f. *l. c.* 122. — Afr. trop. or.
Engleriana, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 330. — Afr. trop. or.
floccosa, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 121 (= *Ipomoea floccosa*, Vatke). — Afr. trop. or.
hyoscyamoides, Hallier f. ex *Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 37; et in *Bot. Jahrb.* xvii. (1894) 121 (= *Convolvulus hyoscyamoides*, Vatke). — Afr. trop.
lachnosperma, Hallier f. *l. c.* 121 (= *Ipomoea lachnosperma*, Choisy). — Afr. trop. or.
malvacea, Hallier f. *l. c.* (= *Convolvulus malvaceus*, Oliver). — Afr. austro-or. et trop. or.
melandrioides, Hallier f. *l. c.* 122. — Afr. trop. or.
physaloides, Engl (?) *Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 54 nomen. — Afr. trop. or.
polycephala, Hallier f., in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 122. — Afr. trop. or.
solanacea, Hallier f. *l. c.* 121. — Afr. trop. or.
Volkensii, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 331. — Afr. trop. or.

ASTRONIA, Noronha (Melastom.). — Ind. Kew. i. 240.
Beccariana, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1098. — N. Guin.
borneensis, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 536 nomen. — Borneo.
calycina, Vidal, *Rev. pl. vasc. Filip.* (1886) 136. — Ins. Philipp.
Candolleana, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1099. — Ins. Philipp.
Hollrungia, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 536 sphalm. = *Hollrungii*, Cogn.
Hollrungii, Cogn. in *K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 88; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1095. — N. Guin.
Novae-Hannoverae, *Engl. Bot. Jahrb.* vii. (1886) 468. — Melanesia.
papuana, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1895) 1095. — N. Guin.
pulchra, Vidal, *Revis. pl. vasc. Filip.* (1886) 136. — Ins. Philipp.
triplinervia, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 536. — Ins. Amboin.

ASTROTRICHA, DC. (Araliac.). — Ind. Kew. i. 241.
Biddulphiana, F. Muell. in *Vict. Natur.* vii. (Dec. 1890) 115; et ex *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 124. — Austral.
cuspidata, Vesque, *Epharmosis*, iii. (1892) 16; Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1893) 171. — Bras.
sulphurea, Vesque, in *DC. Monog. Phan.* vii. (1893) 173 (= *Quapoya sulphurea*, Poepp. et Endl.). — Peruvia.

ASTYDAMIA, DC. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 241.
latifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 265 = *latifolia*, Baill.

ASYSTASIA, Blume (Acanth.). — Ind. Kew. i. 241.
Buettneri, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 37. — Afr. trop. occ.
Coleae, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 223. — Reg. Somal.
linearis, S. Moore, in *Journ. Bot.* (1894) 136. — Afr. trop. or.
longituba, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 118. — Afr. trop. occ.
pusilla, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 55 t. 26. — Reg. Himal.
rostrata, Solms, ex Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 118; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 370 (= *Calophanes crenata*, Schinz). — Afr. austro-occ. extratrop.
varia, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 760. — Afr. austr.
variabilis, Trim. *Handb. Fl. Ceyl.* iii. (1895) 324. — Zeyl.

ASYSTASIELLA, Lindau, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 326. **ACANTHACEAE**.
atroviridis, Lindau, *l. c.* (= *Asystasia atroviridis*, T. Anders. — Ind. or.
Neesiana, Lindau, *l. c.* (= *Asystasia Neesiana*, Wall.). — Ind. or.

ATAENIA, Endl. = **Carum**, Linn. (Umbellif.).
Howellii, Greene, in *Pittonia*. i. (March 1888) 274 = C. Howellii, Coult. et Rose.
Kelloggii, Greene, *l. c.* = C. Kelloggii, A. Gray.
oregana, Greene, *l. c.* = C. oregana, S. Wats.

ATALANTIA, Correa (Rutac.). — Ind. Kew. i. 242.
paniculata, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 340 et xvii. (1893) 173 in obs. — Oceania.
stenocarpa, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 277. — Tonkin.

ATELEIA, Moç. et Sessé (Legumin.). — Ind. Kew. i. 242.
microcarpa, Millsp. in *Field Columb. Museum Bot. Ser. I.* (1895) 21 = microcarpa, D. Dietr.?
pterocarpa, Millsp. *l. c.* = pterocarpa, Moç. et Sessé?

ATHALMUM, « Neck. » ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 319 = **ATHALMUS**, Neck. = **Pallenis**, Cass. (Compos.).
spinusum, Kuntze, *l. c.* = P. spinosa, Cass.

ATHAMANTA, Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 243.
arachnoidea, Boiss. et Orph. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 262. — Graecia.
Dellacellae, Aschers. et Barbey, ex Coss. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxvi. (1889) 101 nomen. — Cyrenaica.
grisea, Stapf et Wettst. in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 319 — As. occ.
hemisphaerica, Stapf et Wettst. *l. c.* — As. occ.
Lobelii, Caruel, in *Parl. Fl. Ital.* viii. (1889) 348 = cretensis, Linn.
vestina, A. Kern. *Sched. fl. Austro-Hung.* iv. (1886) 37; E. Hallier, in *Koch's, Syn. Deutsch. Fl.* ed. 3. (1895) 1085. — Tirol.

ATHANASIA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 243.
ramosa, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 428. — Reg. Somal.
tridens, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2232. — Natal.
triloba, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 435. — Afr. austro-occ. extratrop.
peruviana, Zahlb. in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 7. — Peruvia.
subtriflora, Zahlb. *l. c.* 8 in obs. (= *Larnax subtriflora*, Miers). — Peruvia.

ATHEROLEPSIS, Hook. f. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 244.
venosa, Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 86 (Atherolepis). — Burma.

ATHRIXIA, Ker-Gawl. (Compos.). — Ind. Kew. i. 244.
Croniniana, F. Muell. in *Vict. Natur.* v. (1888) 76, 54. — Austral.
pinifolia, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 26. — Natal.

ATHYANA, Radlk. in *Th. Dur. Ind. Gen.* (1888) 73; et in *Sitz. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss.* xx. (1890) 282. **SAPINDACEAE**.
weinmannifolia, Radlk. *ll. cc.* — Parag., Argent.

ATITARA, Barrère, *Essai Fr. équinox.* (1741) 20 = **Desmoncus**, Mart. (Palm.).
aculeata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 727 = D. aculeatus, Wendl.
americana, Kuntze, *l. c.* = D. americanus, Lodd.
ataxantha, Kuntze, *l. c.* = D. ataxanthus, Barb. *Rodr.*
chinantlensis, Kuntze, *l. c.* = D. chinantlensis, Liebm.
costaricensis, Kuntze, *l. c.* 726. — Costarica.
druidiana, Kuntze, *l. c.* 727. — Mexic.
dubia, Kuntze, *l. c.* = D. polyacanthos, Mart.?
granatensis, Kuntze, *l. c.* = D. granatensis, Bull.
horrida, Kuntze, *l. c.* = D. horridus, Splitg.
latifrons, Kuntze, *l. c.* = D. latifrons, Bull.
leptospadix, Kuntze, *l. c.* = D. leptospadix, Mart.
macroacantha, Kuntze, *l. c.* = D. macroacanthos, Mart.
major, Kuntze, *l. c.* = D. major, Grueg.
mitis, Kuntze, *l. c.* = D. mitis, Mart.
oligacantha, Kuntze, *l. c.* = D. oligacanthus, Barb. *Rodr.*
orthacantha, Kuntze, *l. c.* = D. orthacanthos, Mart.
oxyacantha, Kuntze, *l. c.* = D. oxyacanthos, Mart.
palustris, Kuntze, *l. c.* = D. palustris, Trail.
phengophylla, Kuntze, *l. c.* = D. phengophyllus, Drude.
phoenicocarpa, Kuntze, *l. c.* = D. pycnacanthos, Mart.
polyacantha, Kuntze *l. c.* 726 = D. polyacanthos, Mart.
polyphylla, Kuntze, *l. c.* 727 = D. polyphylla, Poit.
prunifera, Kuntze, *l. c.* = D. prunifer, Poepp. et Endl.
pumila, Kuntze, *l. c.* = D. pumilus, Trail.
pycnacantha, Kuntze, *l. c.* = D. pycnacanthos, Mart.
riparia, Kuntze, *l. c.* = D. riparius, Spruce.
setosa, Kuntze, *l. c.* = D. setosus, Mart.

ATRACTOCARPA, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 675. **GRAMINEAE**.
congolensis, Th. Dur. et Schinz, *Consp. fl. Afr. y.* 1894 (1895) 945 sphalm. = olyraeformis, Franch.
olyraeformis, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris* i. (1897) 675; et in *Bonnier Rev. gen. et Bot.* (1887) 465 t. 25 (sphalm. olyraefolia). — Congo gall.

ATRACTYLIS, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 245.
conformis, Barbey, *Karpathos* (1895) 115 t. 8. — Ins. Karpathos.
Mernepthae, Aschers, *Schweinf. et Letourn. Illustr. fl. Egypte* (1887) 94. — Aegypt.

ATRAGENE, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 245.
tenuiloba, Britton, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 206 = *Clematis pseudoatragene*, Kuntze.

ATRAPHAXIS, Linn. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 245.
Muschketowi, Krassn. *Pl. nov. v. min. cogn.* (1886) 20; et ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1895) t. 7435. — As. centr.

ATRIPLEX, (Tourn.) Linn. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 245.
amboëse, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi (1890) 211. — Afr. austro-occ. extratrop.
angustifolia, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 426. — Chili.

ATRIPLEX : —

- axillaris, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*. (1891) 73. — Bolivia.
- Barclayana*, T. S. Brandeg, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*. ii. (1889) 200 = *Barclayana*, D. Dietr. ? *canescens*, T. S. Brandeg, l. c. = *canescens*, James ? conduplicata, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* i. (Nov. 1886) 429. — Austral.
- coquimbana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 425. — Chili.
- cordulata, *Jepson, in Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 304. — Calif.
- cornuta, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*, v. (1895) 718. — Utah.
- corrugata, S. Wats. in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 345. — Colorado.
- chenopodioides, Batt. in Batt. et Trab. *Fl. de l'Algérie* (1889) 755; et in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxviii. (1891) 315. — Algeria.
- costellata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 424. — Chili.
- curvidens*, T. S. Brandeg, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*. ii. (1889) 201. — Calif.
- densifolia, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 428. — Chili.
- depressa, *Jepson, in Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 304. — Calif.
- dilatata, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1889) 264. — Calif.
- Ehrenbergii, F. Muell. ex Aschers. et Schweinf. (*Suppl. Illustr. fl. Egypte*) in *Mém. Inst. Egypt.* ii. (1889) 771. — Egypt.
- fruticulosa, *Jepson, in Greene, Pittonia*, ii. (sept. 1892) 306. — Calif.
- glaucescens, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 74. — Bolivia.
- graciliflora, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*, v. (1895) 717. — Utah.
- humilis, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 74. — Bolivia.
- Hystrix, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 424. — Chili.
- leuca, *Phil. l. c.* 428. — Chili.
- linearis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 72. — Mexic.
- laticlave, F. Muell. *Icon. Austral. Salsol. Pl.* t. 6; et in *Vict. Natural.* ix. (april 1893) 187. — Austral.
- lurida, T. S. Brandeg, in *Proc. Calif. Acad.*, Ser. II ii. (1889) 200. — Calif.
- Madarcagae, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*. (1891) 73. — Bolivia.
- Magdalenae, T. S. Brandeg, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*. ii. (1889) 200. — Calif.
- microcarpa*, T. S. Brandeg, l. c. = *microcarpa*, D. Dietr. ?
- myriophylla, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 74. — Bolivia.
- nodosa, *Greene, in Pittonia*, i. (Mar. 1887) 40; et *Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 56. — Calif.
- oreophila, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 427. — Chili.
- podocarpa, *Phil. l. c.* — Chili.
- polyphylla, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 73. — Bolivia.
- Pugae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895). 426. — Chili.
- pusilla, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 73. — Bolivia.
- Quinii, F. Muell. in *Vict. Natural.* v. (Nov. 1888) 96. — Austral.
- radiata, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 368 = Wrightii, S. Wats.
- repanda, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 425. — Chili.
- Rusbyi, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 250. — Bolivia.
- salaris, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 74. — Bolivia.
- subdecumbens, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II* v. (1895) 716. — Utah.
- tridentata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 546. — Utah.
- trigonophylla, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 429. — Chili.
- trinervata, *Jepson, in Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 305. — Calif.
- tuberculata, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 368 = texana, S. Wats.

ATRIPLEX : —

- tularensis, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* II. iv. (1893) 182. — Calif.
- verna, *Jepson, in Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 305. — Calif.
- ATROPIS**, Rupr. = **Glyceria**, R. Br. (Gramin.).
- Borveri*, C. Richt. *Pl. Europ.* (1890) 92 = G. *Borveri*, Bab.
- festucaeformis*, C. Richt. l. c. 91 = G. *festucaeformis*, Heynh.
- Kjelmanni*, C. Richt. l. c. 92 = G. *Kjelmanni*, Lange.
- Lemmoni*, Vasey, *Illustr. N. Am. Grass.* ii. (1893) t. 90 (= *Poa Lemmoni*, Vasey). — Am. bor. occ.
- peisonis*, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* i. (1890) 89. — Austria.
- permixta*, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 92 = G. *permixta*, Guss.
- procumbens*, C. Richt. l. c. = G. *procumbens*, Sm.
- tenella*, C. Richt. l. c. = G. *tenella*, Lange.
- tenuifolia*, C. Richt. l. c. 92 = G. *tenuifolia*, Boiss.
- Vahlana*, C. Richt. l. c. = G. *Vahlana*, Fries.
- vilfoidea*, C. Richt. l. c. = G. *vilfoidea*, Fries.

ATYLOSIA, Wight et Arn. (Legumin.). — Ind.

- Kew. l. 248.
- burmanica, Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii (1890) 49. — Burma.
- cajanoides, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 397. — Ins. Borbon.

ATYLUS, Salisb. = **Isopogon**, R. Br. (Proteac.).

- adenanthodes*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 577 = I. *adenanthodes*, Meissn.
- anethifolius*, Kuntze, l. c. = I. *anethifolius*, Knight.
- asper*, Kuntze, l. c. = I. *asper*, R. Br.
- attenuatus*, Kuntze, l. c. = I. *attenuatus*, R. Br.
- axillaris*, Kuntze, l. c. = I. *axillaris*, R. Br.
- Baxteri*, Kuntze, l. c. = I. *Baxteri*, R. Br.
- buxifolius*, Kuntze, l. c. = I. *buxifolius*, R. Br.
- ceratophyllus*, Kuntze, l. c. = I. *ceratophyllus*, R. Br.
- crithmifolius*, Kuntze, l. c. = I. *crithmifolius*, F. Muell.
- cuneatus*, Kuntze, l. c. = I. *cuneatus*, R. Br.
- divergens*, Kuntze, l. c. = I. *divergens*, R. Br.
- Drummondii*, Kuntze, l. c. = I. *Drummondii*, Benth.
- formosus*, Kuntze, l. c. = I. *formosus*, R. Br.
- heterophyllus*, Kuntze, l. c. = I. *heterophyllus*, Meissn.
- latifolius*, Kuntze, l. c. = I. *latifolius*, R. Br.
- linearis*, Kuntze, l. c. = I. *linearis*, Meissn.
- longifolius*, Kuntze, l. c. = I. *longifolius*, R. Br.
- petiolaris*, Kuntze, l. c. = I. *petiolaris*, A. Cunn.
- polyccephalus*, Kuntze, l. c. = I. *polyccephalus*, R. Br.
- roseus*, Kuntze, l. c. = I. *roseus*, Lindl.
- scabriusculus*, Kuntze, l. c. = I. *scabriusculus*, Meissn.
- sphaerocephalus*, Kuntze, l. c. = I. *sphaerocephalus*, Lindl.
- teretifolius*, Kuntze, l. c. = I. *teretifolius*, R. Br.
- tridens*, Kuntze, l. c. = I. *tridens*, F. Muell.
- trilobus*, Kuntze, l. c. = I. *trilobus*, R. Br.
- tripartitus*, Kuntze, l. c. = I. *tripartitus*, R. Br.
- lacinatus*, Kuntze, l. c. = I. *uncinatus*, R. Br.
- villosus*, Kuntze, l. c. = I. *villosus*, Meissn.

AUBERTIELLA, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 73 sphalm. = **Audibertiella**, Briq.**AUBLETELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 47 = **Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.).

- Maconcou*, Pierre, l. c. = C. *Maconcou*, Aubl.

AUBRIETIA, Adans. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 249.

- elwendica, Stapf in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 301. — Persia.
- hybrida*, × Hausskn. in *Mith. Thür. Bot. Ver. N.* Folge, iii etiv. (1893) 111. — Graecia.

AUDIBERTIA, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 249.

- Mearnsii, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* viii (1889) 71; et in *Bull. Torrey Bot. Club*. xvi. (1889) 202. — Arizona.

AUDIBERTIELLA, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 73. **LABIATAE**.

- capitata, Briq. l. c. (= *Audibertia capitata*, A. Gray). — Calif.
- Clevelandi, Briq. l. c. (= *Audibertia Clevelandi*, A. Gray). — Calif.
- Dorrii, Briq. l. c. (= *Audibertia Dorrii*, Kell.). — Calif.
- grandiflora, Briq. l. c. (= *Audibertia grandiflora*, Benth.). — Calif.
- humilis, Briq. l. c. (= *Audibertia humilis*, Benth.). — Calif.
- incana, Briq. l. c. (= *Audibertia incana*, Benth.). — Am. bor. occ.
- nivea, Briq. l. c. (= *Audibertia nivea*, Benth.). — Calif.
- Palmeri, Briq. l. c. (= *Audibertia Palmeri*, A. Gray). — Calif.
- polystachya, Briq. l. c. (= *Audibertia polystachya*, Benth.). — Calif.
- stachyoides, Briq. l. c. (= *Audibertia stachyoides*, Benth.). — Calif.
- Vaseyi, Briq. l. c. (= *Audibertia Vaseyi*, T. C. Porter). — Calif.

AUGUSTA, Leandr. Sacram. = **Stiffitia**, Mikan (Compos.).

- Benthiana*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 319 = S. *Benthiana*, Baker.
- condensata*, Kuntze, l. c. = S. *condensata*, Baker.
- Martiana*, Kuntze, l. c. = S. *Martiana*, Baker.

AUKUBA « Thunb. » ex Koehne, Deutsche Den-drol. (1893) 435 = **Aucuba**, Thunb. (Cornac.).**AULACOCALYX**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 249.

- trilocularis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 81. — Sierra-Leone.

AULACODISCUS, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 249.

- enneandrus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 301 = *premnoides*, Hook. f.

AULISCONEMA, Hua, in Morot, *Journ. de Bot.* vi. (1892) 469. **LILIACEAE**.

- aspera*, Hua, l. c. 471 t. 14 fig. 1 (= *Disporopsis fusco-picta*, Hance). — China occ.
- Pernyi, Hua, l. c. 472 t. 14 fig. 2 — China.

AUSTRALINA, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 251.

- hispidula, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii, 1885 (1886) 266. — N. Zel.

AUTRANIA, C. Winkl. et Barbey, in Post, *Pl. Postianae*, iii. (1892) 11. **COMPOSITAE**.

- pulchella, C. Winkl. et Barbey, l. c. 12. — Syria.

AUXEMMA, Miers (Boragin.). — Ind. Kew. i. 252.

- Glazioviana, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892) 11. — Bras.
- oncocalyx*, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 396 = *Gardneriana*, Miers.
- oncocalyx*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892) 12. = *praec.*

AVENA, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 252.

- adzharica*, Alboff, *Prod. fl. Colch.* (1895) 257. — Reg. Cauc.
- breviaristata*, Barratte, in Batt. et Trab. *Fl. de l'Algérie* (Monoc.) (1895) 184. — Algeria.
- Letourneuxii*, Trab. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxvi. (1889) 411. — Algeria.
- pruinosa*, Trab. ex Batt. et Trab. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxv. (1888) 343 nomen = *breviaristata*, Barratte.

AVENASTRUM, Jessen = **Avena**, Linn. (Gramin.).

- Blavii*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien* v. (1890) 561 = *Avena compressa*, Heuff.
- Parlatorii*, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* i. (1890) 73 = *Avena Parlatorii*, Woods.

AVICENNIA, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. i. 254.

- spicata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 502. — Penins. Mal.

AXINAEAE, Ruiz et Pav. (Melastom.)—Ind. Kew. i. 255.
affinis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 449.—
Am. trop. austr.
costaricensis, *Cogn. l. c.* 1182 in add.; et ex *Th. Dur.*
et Schinz, in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxx. 1891 (1892)
247. — Costa Rica.
Drakei, *Cogn. in DC. l. c.* 447. — Ecuad.
Lehmannii, *Cogn. in Bot. Jahrb.* vii. (1887) 20. —
Columb.
pauciflora, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* (1891) 448.—
Ecuad.
speciosa, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii.
(1890) 57; *Cogn. in DC. l. c.* 1182. — Bolivia.
tomentosa, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 451.
— Peruvia.

AXINANTHERA, Karst. = **Bellucia**, Neck. (Melastom.).
Hostmanni, Karst. in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 352 =
B. *Hostmanni*, Naud.

AYENIA, Loeffl. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 255.
Berlandieri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886)
419. — Mexic.
Blanchetiana, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii.
(1886) 105. — Bras.
boliviana, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*. iii. 3.
(1893) 10. — Bolivia.
erecta, Mart. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii.
iii (1886) 103. — Bras.
filiformis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889)
42. — Mexic.
glabra, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 399. — Mexic.
glabrescens, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii.
(1886) 102. — Bras.
jaliscana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891)
133. — Mexic.
Palmeri, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 419. — Mexic.
paniculata, Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i.
(1891) 94. — Mexic.
Riedeliana, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. ii.
(1886) 104. — Bras.
truncata, Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891).
94. — Mexic.
Wrightii, Robins. in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 340.
— Mexic.

AZALEA, Linn. = **Rhododendron**, Linn. (Ericac.).
albiflora, Albrechtii, anthopogonodes, arborea, atrovirens,
aureobifolia, Augustinii, auriculata, baetica, barbata,
Boothii, brachyantha, brachycarpa, Brookeana, bul-
lata, Bureaui, californica, cammelliaeflora, campu-
mulata, campylocarpa, campylogyna, capitata, cataw-
biensis, caucasica, cephalantha, Championae, Chap-
mannii, chrysantha, ciliata, ciliatifolia, citrina, con-
cinna, crassa, daurica, decora, Delavayi, dilatata,
Edgeworthii, elliptica, Faberi, Falconneri, Farrerae,
fastigiata, ferruginea, formosa, Fortunei, fulgens,
glauca, grandis, Griffithiana, haematodes, Hanceana,
heliopsis, Henryi, hirsuta, Hodgsonii, Hookeri,
hypoglauca, isorata, jasminiflora, kamtschatica, Keis-
kei, Kendrickii, Keysii, lactea, lanata, lepidota,
leptocarpa, linearifolia, Lochae, lucida, macrophylla,
macrosepala, macrostemon, malayana, Mariae, mi-
crantha, microphyta, moulmeinensis, multicolor, nereis-
flora, nivalis, nivea, Nuttallii, oleifolia, pendula,
pitiosporifolia, polyclada, Przewalskii, pumila,
Redowskiana, retusa, rhombica, rigida, rigida, rubi-
ginosa, scabrifolia, Schlippenbachii, semibarbata,
Seniavini, setosa, Shepherdii, simiarum, staminea,
sublaeolata, taliensis, Taschiroi, Teysmannii,
Thomsonii, thymifolia, trichoclada, triflora, Tschon-
noskii, Veitchiana, virgata, Westlandii, Weyrichii,
yunanensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 386-87 =
homonyma omnia *Rhododendri*.
anthopogonodes, Kuntze, l. c. 387 = R. anthopogo-
noides, Maxim.
californica, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i.
(1889) 415 = R. occidentale, A. Gray.
canadensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 386 = R.
Rhodora, f. F. Gmel.
dianthiflora, Carr. in Rev. Hort. (1889) 391; et
(1891) 60 cum ic. et in Wien. Ill. Gartenzeit.
(1889) 442. — Japon.
japonica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 386 = R. Met-
ternichii, Sieb. et Zucc.

AZALEA : —
lamponga, Kuntze, Rev. Gen. (1891) p. 386 = R.
malayanum, Jack.
lanceifolia, Kuntze, l. c. = R. ponticum, Linn.
macrocarpa, Kuntze, l. c. = R. Dalhousiae, Hook. f.
Maddenii, Kuntze, l. c. 387 = R. Maddenii, Hook. f.
minor, Kuntze, l. c. 386 = R. punctatum, Andr.
Oldhamii, Kuntze, l. c. = R. Oldhami, Maxim.
parvifolia, Kuntze, l. c. = R. Anthopogon, D. Don.
Roylei, Kuntze, l. c. = R. cinnabarinum, Hook. f.
rustica ×, Hort. ex Rev. Hort. (1893) 195. —
Hybr. artef.
squamosa, Kuntze, l. c. (sphalm. = *Azal. squamata*,
Lindl.) = R. Farrerae, Tate.
sulfurea, Kuntze, l. c. = R. sulphureum, Franch.
Vervaeana, Hort. ex Gard. Chron. (1888) i. 799. —
Form. hort.
vaccinioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 386 = R. vac-
cinioides, Hook. f.
Wightii, Kuntze, l. c. sphalm. = R. Wightii,
Hook. f.

AZALEASTRUM, Hort. = **Rhododendron**, Linn.
(Ericac.).
albiflorum, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenz. (1888)
435 = R. albiflorum, Hook.

AZALEODENDRON ×, Rodigas, ex Gard. Chron.
(1893) i. 665 = **Azalea** × **Rhododendron**,
Hort. (Ericac.).

AZARA, Ruiz et Pav. (Bixin.). — Ind. Kew. i. 256.
Bergi, F. Phil. ex Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii.
(1893) 337. — Chili.
borealis, F. Phil. ex Phil. l. c. 340. — Chili.
Browneae, F. Phil. ex Phil. l. c. 335. — Chili.
crassifolia, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii.
(1893) 3 = Gilliesii, Hook. et Arn.
microphylla, Hort. ex Dippel. l. c. = dentata, Ruiz
et Pav.
pyncophylla, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii.
(1893) 340. — Chili.
subandina, Phil. l. c. 339. — Chili.

AZEDARACH, Linn. = **Melia**, Linn. (Meliac.).
elegans, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 110 = M. elegans,
Seem.
excelsa, Kuntze, l. c. = M. excelsa, Jack.
sempervirens, Kuntze, l. c. 109 = M. Azedarach,
Linn.
tomentosa, Kuntze, l. c. 110 = M. tomentosa, Roxb.

AZIMA, Lam. (Salvador.). — Ind. Kew. i. 257.
spinossima, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 147. —
Afr. austro-occ. extratrop.

AZORELLA, Lam. (Umbellif.). — Ind. Kew. i.
257.
albida, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 706.
Chili.
clandestina, Phil. l. c. 701. — Chili.
compacta, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 28.
— Bolivia.
crassipes, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894)
702. — Chili.
elegans, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890
(1891) 386. — N. Zel.
glacialis, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894)
704. — Chili.
laevigata, Phil. l. c. 781. — Chili.
Lehmannii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49
(1895) 71. — Columb. vel Ecuad.?
microdonta, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii.
1890 (1891) 387. — N. Zel.
nitens, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893)
270. — N. Zel.
nivalis, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 703.
— Chili.
obtusifolia, Phil. l. c. 701. — Chili.
pectinata, Phil. l. c. 700. — Chili.
Rahmeri, Phil. l. c. 703. — Chili.
vaginata, Phil. l. c. — Chili.

AZORINA, Feer, in *Bot. Jahrb.* xii. (1890) 611.
CAMPANULACEAE.
Vidalii, Feer, l. c. (= *Campanula Vidalii*, H. C.
Wats.). — Ins. Azor.

B

BABIANA, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew. i. 257.
macrantha, MacOwan, in *Journ. Linn. Soc.* xxv.
(1890) 394. — Afr. austr.
mononeura, Baker, Handb. Irid. (1892) 182. — Afr.
austr.
namaquensis, Baker, l. c. 181. — Afr. austro-occ.
occidentalis, Baker, l. c. 183. — Afr. austr.
spiralis, Baker, l. c. — Afr. austr.

BACCAUREA, Lour. (Euphorb.). — Ind. Kew. i.
258.
brevipes, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 372. —
Ind. or., Borneo.
Griffithii, Hook. f. l. c. 371. — Penins. Mal.
latifolia, King, ex Hook. f. l. c. 373. — Perak.
Maingayi, Hook. f. l. c. 370. — Penins. Mal.
malayana, King, ex Hook. f. l. c. 374. — Ind. or.,
Sumatra.
minor, Hook. f. l. c. 370. — Perak.
polyneura, Hook. f. l. c. 369. — Penins. Mal.
reticulata, Hook. f. l. c. 373. — Ind. or., Sumatra.
Scortechinii, Hook. f. l. c. 368. — Perak.
sparsiflora, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894)
97. — Afr. trop. occ.
symplocoides, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887)
376. — Perak.
Wallichii, Hook. f. l. c. 375. — Penins. Mal.
Wrayi, King, ex Hook. f. l. c. 374. — Perak.

BACCHARIS, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 258.
araucana, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894)
698. — Chili.
cochensis, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 343. —
Columb.
Cuervi, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894)
703. — Chili.
cyanosa, Phil. l. c. — Chili.
Gayana, Phil. l. c. 706. — Chili.
heterothalmoides, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*,
xix. (1892) 4. — Bolivia.
involucrata, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894)
707. — Chili.
Itatiaiae, Wawra, Itin. Princ. S. Coburg. ii. (1888)
28. — Bras.
Lehmannii, Klatt in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 39. —
Columb.
leija, Phil. in *Anal. Mus. Chile* (1891) 39. — Chili.
leptocephala, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii.
(1894) 700. — Chili.
litoralis, Phil. l. c. 699. — Chili.
Monteana, Phil. l. c. 702. — Chili.
Moritziana, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 50. —
Columb., Venez.
mucuchiesensis, Hieron. l. c. xxi. (1895) 342.
— Columb.
nemorosa, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894)
708. — Chili.
ocellata, Phil. l. c. 705. — Chili.
Palenae, Phil. l. c. 708. — Chili.
pascensis, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 344. —
Columb.
polyphylla, Klatt, in *Annal. naturh. Hofmus. Wien*,
ix. (1887) 359. — Ecuad.
pyncantha, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894)
701. — Chili.
Santeliciis, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 39.
— Am. austr. occ.
Stuebelii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 341. —
Peruvia.
subandina, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvi. i (1894)
707. — Chili.
subbimera, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 345.
— Peruvia.
tolimensis, Hieron. l. c. 343. — Columb.
trinitensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 319. — Ins. Trinit.
viscosa, Kuntze, l. c. 320 = glutinosa, Pers.
Vitis-Idea, Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*, ii.
(1887) 277, t. 43 a; (Oliver, ex im Thurm in *Timehri*
v. (1886) 197, sphalm. *Ideaea*). — Guian. angl.
Weddelliana, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 345.
— Columb.
Williamsi, F. Phil. ex Phil. in *Anal. Univ. Chil.*
lxxxvii. (1894) 701. — Chili.

- BACCHARODES**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 320 = **BACCHAROIDES**, Linn. Fl. Zeylan. (1747) 196 = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).
brachylepis, *calycinum*, *courtallense*, *molle*, *muticum*, *pedunculatum*, *phyllolaenum*, *punctatum*, *purpureum*, *reticulatum*, *Ritchiei*, *tenuis*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia*, *Vernoniae*.
frutescens, Kuntze, l. c. (= *Decaneurum frutescens*, DC.) — Java.
Holtonii, Kuntze, l. c. = *Centratherum Holtonii*, Baker.
violaceum, Kuntze, l. c. = *Centr. intermedium*, Less.
- BACKHOUSIA**, Hook. et Harv. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 261.
Bancroftii, F. M. Bailey et F. Muell, ex F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. I. (1886) 24. — Austral.
- BACLEA**, Greene in Erythea, i (1893) 238 = **Nemacladus**, Nutt. (Campanul.).
oppositifolia, Greene, l. c. = *N. oppositifolius*, Robins.
- BACOPA**, Aubl. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 261.
amplexicaulis, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1891) 76 = *Herpestis amplexicaulis*, Pursh.
chamaedryoides, Wettst, l. c. = *H. chamaedryoides*, H. B. et K.
floribunda, Wettst, l. c. 77 = *H. floribunda*, R. Br. *Hamiltoniana*, Wettst, l. c. 77 = *H. Hamiltoniana*, Benth.
lanigera, Wettst, l. c. = *H. lanigera*, Cham. et Schlecht.
Monniera, Wettst, l. c. = *H. Monniera*, Linn.
myriophylloides, Wettst, l. c. = *H. myriophylloides*, Benth.
nigrescens, Wettst, l. c. = *H. nigrescens*, Benth.
repens, Wettst, l. c. = *H. repens*, Cham. et Schlecht.
rotundifolia, Wettst, l. c. = *H. rotundifolia*, Pursh.
- BACTRIS**, Jacq. (Palm.). — Ind. Kew. i. 261.
Cohune, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 467. — Guatem.
insignis, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 305 (= *Guilhelma insignis*, Mart.). — Am. austr.
- BACULARIA**, F. Muell. (Palm.). — Ind. Kew. i. 262.
Albertisiana, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 108. — N. Guin.
Palmeriana, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 61. — Austral.
- BADIANIFERA**, Linn. Mat. Med. (1749) 180. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 6 = **Illicium**, Linn. (Magnol.).
anisatum, Kuntze, l. c. = *I. anisatum*, Linn.
cambodiana, Kuntze, l. c. = *I. cambodianum*, Hance.
floridana, Kuntze, l. c. = *I. floridanum*, Ellis.
Griffithii, Kuntze, l. c. = *I. Griffithii*, Hook. f. et Thoms.
major, Kuntze, l. c. = *I. majus*, Hook. f. et Thoms.
officinarium, Kuntze, l. c. = *I. anisatum*, Gaertn.
parviflora, Kuntze, l. c. = *I. parviflorum*, Michx.
- BADUSA**, A. Gray (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 263.
philippica, Vidal, Revis. pl. vasc. Filip. (1886) 150 (= *Exostemma philippicum*, Roem. et Schult.). — Ins. Philipp.
- BAECKEA**, Linn. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 263.
ambigua, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1892) 99. (= *Astartea ambigua*, F. Muell.). — Austral.
fascicularis, Niedenzu, l. c. (= *Ast. fascicularis*, DC.). — Austral.
intratropica, Niedenzu, l. c. (= *Ast. intratropica*, F. Muell.). — Austral.
obligomera, « Radlk. » Niedenzu, l. c., sphalm. = *oligomera*, Radlk.
- BAEOMETRA**, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 264.
Breyana, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 588 = *columellaris*, Salisb.
Breyana, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 414 = *praec.*
- BAERIA**, Fisch. et Mey. (Compos.). — Ind. Kew. i. 264.
Burkei, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 151. — Calif.
consanguinea, Greene. *Pittonia*, i. (March 1889) 284. — Calif.
Parishii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 83. — Calif.
- BAGNISIA**, Becc. (Burmanniace.). — Ind. Kew. i. 264.
episcopalis, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 48 (= *Geometra episcopalis*, Becc.). — Malaya.
Rodwayi, F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm. 1890 (1891) 232; et in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 257 in syn. = *Thismia Rodwayi*, F. Muell.
- BAHELIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 458 = **BAHEL** Adans. = **Artanema**, D. Don (Scrophul.).
angustifolia, Kuntze, l. c. = *A. angustifolium*, Benth.
fimbriata, Kuntze, l. c. = *A. fimbriatum*, D. Don.
longifolia, Kuntze, l. c. = *A. sesamoides*, Benth.
- BAHIA**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. l. 264.
alternifolia, Less. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 336 in syn. — Hab.?
desertorum, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 249. — Utah.
dissecta, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. viii. (1889) 68. — Am. bor.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 83. — Calif.
Schaffneri, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 142. — Mexic.
- BAIKIAEA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 264.
Eminii, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 387; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 198. — Afr. trop. or.
- BAILLONELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 13. **SAPOTACEAE**.
toxisperma, Pierre, l. c. 14. — Gabon.
- BAILLONIA**, Bocq. (Verben.). — Ind. Kew. i. 264.
spicata, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 880. — Chili?
- BAILLONODENDRON**, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 867 = **Dryobalanops**, Gaertn. (Dipteroc.).
malayanum, Heim, l. c.; et Recherch. Diptéroc. (1892) 83 = *D. oblongifolia*, Dyer.
- BAISSEA**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 264.
angolensis, Stapf, in Kew Bull. (1894) 126. — Angola.
brachyantha, Stapf, l. c. 125; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895), t. 2343 — Afr. trop. occ.
dichotoma, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.
laxiflora, Stapf, l. c. 124; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2342. — Afr. trop. occ.
tenuiloba, Stapf, l. c. 124. — Afr. trop. occ.
- BAKERELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 244 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
diplocrater, Van Tiegh. l. c. 246 = *L. diplocrater*, Baker.
microcuspis, Van Tiegh. l. c. = *L. microcuspis*, Baker.
- BAKERIA**, Éd. André, in Rev. Hortie. (1889) 84; Baker, Handb. Bromel. (1889) 89. **BROMELIA-CEAE**.
tillandsioides, Éd. André, ll. cc. — Bras.?
- BALANOCARPUS**, Bedd. (Dipteroc.). — Ind. Kew. i. 265.
acuminatus, Heim, in Mém. Assoc. Franç. Besang. 1892 (1893) 560. — Malaya.
anomalous, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 132 (anomala). — Kedah.
Curtisii, King, l. c. 131. — Penang, Perak.
Heimii, King, l. c. 133. — Penang, Perak.
Hemleyanus, King, l. c. 134. — Penang, Perak.
maximus, King, l. c. 133. — Perak.
penangianus, King, l. c. 131. — Penang, Perak.
- BALANOCARPUS**: —
sphaerocarpus, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 77. — Borneo.
Wrayi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. — Perak.
zeylanicus, Trimen, in Journ. Bot. (1889) 161; et Handb. Fl. Ceyl. i. (1893) 130 t. 14. — Zeylan.
- BALANOPHORA**, Forst. (Balanophor.). — Ind. Kew. i. 265.
decurrens, Fawcett, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, ii. (1886) 234. — Ins. Philipp.
Forbesii, Fawcett, l. c. 236. — Java.
Henryi, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 410. — China.
Hookeriana, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 102. — Reg. Himal.
laxiflora, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 410 t. 9 fig. 2-3. — China.
minor, Hemsl. l. c. fig. 1. — China.
multibrachiata, Fawcett, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1886) 236. — Sumatra.
ramosa, Fawcett, l. c. — Java.
Zollingeri, Fawcett, l. c. 234. — Ins. Salayer.
- BALFOURINA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 954 = **Didymaea**, Hook. f. (Rubiace.).
mexicana, Kuntze, l. c. = *D. mexicana*, Hook. f.
- BALIOSPEREUM**, Blume (Euphab.). — Ind. Kew. i. 265.
corymbiferum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 463. — Ind. or.
analayanum, Hook. f. l. c. — Ind. or.
- BALLOTA**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 266.
antilibanotica, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 20. — Syria.
fruticosa, Baker, in Kew Bull. (1895) 225. — Reg. Himal.
sagittata, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 607. — Turkest.
Wettsteinii, Reckinger, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 153 t. 1. — Ins. Cyp.
- BALLS-HEADLEYA** stipelosa, F. Muell. ex Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. i. (1886) 19. — Austral. (*Saxifrag.* indscript.).
- BALSAMEA**, Gled. = **Commiphora**, Jacq. (Burser.).
Apresvalii, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 226 d bis. — Madag.
Greveana, Baill. l. c. t. 226 c. — Madag.
tetramera, Baill. l. c. t. 226 d. — Madag.
- BALSAMORHIZA**, Hook. (Compos.). — Ind. Kew. i. 267.
invenusta, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 130 (= *Helianthus invenustus*, Greene). — Calif.
- BALTIMORA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 267.
monocephala, Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 360. — Mexic.
- BAMBUSA**, Schreb. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 267.
arnhemica, F. Muell. in Austral. Journ. Pharm. (Dec. 1886) 447. — Austral.
japonica, Hort. ex Gartenfl. (1889) 167. — Form. hort.
kurilensis, Myabe, in Mem. Bost. Soc. Nat. Hist. iv. vii. (1890) 271 (= *Arundinaria kurilensis*, Rupr.). — Ins. Kuril.
Mazeli, Hort. ex W. Wats. in Kew Bull. (1889) 298 = *aurea*, Siebold.
Moreheadiana, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker (1889) 71. — Austral.
nipponica, Makino, in Tokyo. Bot. Mag. ix. (1895) 72. — Japon.
palmata, Hort. ex Kew Bull. (1889) 79; et ex Gard. Chron. (1890) i. 641 fig. 106 = *tessellata*, Munro.
remotiflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 760. — Anam.
Simoni, Carr. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1890) subt. 7146 = *Arundinaria Simoni*, A. et C. Rivière.

BAMBUSA : —

tonkinensis, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 147 (= *Bonia tonkinensis*, Balansa). — Tonkin.
Veitchii, Carr. in *Rev. Hort.* (1888) 90; et Gard. *Chron.* (1888) i. 332 = *tessellata*, Munro.
Wiesneri, Carr. in *Rev. Hort.* lix. (1887) 83. — Japon.
Wrayi, Stapf, in *Kew Bull.* (1893) 114; et in *Hook. Icon. pl.* xxiii (1893) t. 2253. — Perak.

BANARA, Aubl. (Samyd.). — Ind. Kew. i. 268.
 pyramidata, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 33. — Bolivia.
sevrata, Warb. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1893) 32 = *Vellozii*, Gardn.

BANCALUS, Rumpf, *Herb. Amboin.* iii. (1743) 84 et 755, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 276 = **Nauclaea**, Linn. (Rubiace).

affinis, Bartlingii, canescens, cordatus, cuspidatus, Forsteri, glaber, glandulifer, gracilis, macrophyllus, Maingayi, missionis, mollis, obtusus, orientalis, peduncularis, purpureus, sericeus, strigosus, Synkorynes, zeylanicus, Kuntze, l. c. 276-77 = *homonyma omnia* Naucleae.
grandifolius, Kuntze, l. c. = *Sarcocephalus cordatus*, Mig.
rotundifolius, Kuntze, l. c. = *N. Haenkeana*, Steud.

BANCROFTIA, Macfad. = **Tovaria**, Ruiz et Pav. (Capparid.).
pendula, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 37 = *T. pendula*, Ruiz et Pav.

BANISTERODES, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 45 = **BANISTERIOIDES**, Linn. = **Xanthophyllum**, Roxb. (Polygon.).
affine, ellipticum, excelsum, glaucum, Griffithii, insigne, longifolium, Macintyrii, Maingayi, obscurum, rufum, stipitatum, vitellinum, Kuntze l. c. = *homonyma omnia* Xanthophylli.

BANKSIA, Forst. = **Pimelea**, Banks et Soland. (Thymel.).

alpina, altior, ammodoris, angustifolia, argentea, axiflora, Bowmannii, brachyphylla, brevifolia, buxifolia, cinerea, clavata, collina, colorans, concreta, Cornucopiae, curviflora, drupacea, elachantha, Eyrei, ferruginea, filiformis, flava, floribunda, Forrestiana, glauca, haematostachya, hirsuta, hispida, humilis, imbricata, latifolia, Lehmanniana, leptostachya, ligustrina, linifolia, longiflora, longifolia, Lyallii, microcephala, nervosa, nivea, octophylla, pauciflora, petraea, petrophila, Preissii, punicea, pygmaea, rosea, sanguinea, sericea, sericeo-villosa, sericostachya, serpyllifolia, simplex, spatulata, spectabilis, spicata, stricta, sylvestris, Traversii, trichostachya, Urvilleana, villifera, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 583 = *homonyma omnia* Pimeleae.

leptospermodes, Kuntze, l. c. = *P. leptospermoides*, F. Muell.

Maxwellii, Kuntze, l. c. = *P. Maxwellii*, F. Muell.
Milliganii, Kuntze, l. c. = *P. Milligani*, Meissn.
phylicodes, Kuntze, l. c. = *P. phylicoides*, Meissn.
physodes, Kuntze, l. c. = *P. physoides*, Hook.
spiculigera, Kuntze, l. c. = *P. spicata*, R. Br.
sulfurea, Kuntze, l. c. = *P. sulphurea*, Meissn.
tinctoria, Kuntze, l. c. = *P. suaveolens*, Meissn.
villosa, Kuntze, l. c. = *P. arenaria*, A. Cunn.

BANKSIA, Linn. f. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 270.
Elderiana, F. Muell. et Tate, *Elder Exped. Diagn. New Pl.* [2]; et ex *Bot. Centralbl.* lv. (1893) 317. — Austral.

BAOBABUS, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 66 = **BOABAB**, Mill. = **Adansonia**, Linn. (Malvac.).
digitata, Kuntze, l. c. 67 = *A. digitata*, Linn.
Gregorii, Kuntze, l. c. = *A. Gregorii*, F. Muell.
madagascariensis, Kuntze, l. c. = *A. madagascariensis*, Baill.

BAPHIA, Afzel. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 271.
capparidifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 311. — Madag.

BAPHIA : —

lancifolia, Baill. ex Laness. *Pl. util. col. franç.* (1886) 340 nomen. — Afr. trop. occ.
massaiensis, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 203. — Afr. trop. or.

BAPHIOPSIS, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 271.

Stuhlmannii, Taub. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1895) 388 in add. et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 203. — Afr. trop. or.

BAPTISTANIA, Barb. Rodr. ex Pfitzer, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1889) 220 sphalm. = **Baptistonia**, Barb.-Rodr. (Orchid.).

BARATRANTHUS, Miq. = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).

acuminatus, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 538. — Borneo.
Beccarii, Van Tiegh. l. c. — Borneo.
bicolor, Van Tiegh. l. c. — Perak.
Kingii, Van Tiegh. l. c. — Perak.
Lobbii, Van Tiegh. l. c. 501 = *L. Lobbii*, Hook. f.
nodiflorus, Van Tiegh. l. c. = *L. nodiflorus*, Thw.
productus, Van Tiegh. l. c. = *L. productus*, King.
Scortechinii, Van Tiegh. l. c. 538. — Perak.

BARTERIA, Hook. f. (Passifl.). — Ind. Kew. i. 276.

Braunii, *Engl. Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 392 et xv. (1893) 588. — Kameron.

BARBACENIA, Vand. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 272.

aequatorialis, Harms, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 146 = *Vellozia aequatorialis*, Rendle.
brevifolia, Taub. in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 2. — Bras.
capillaris, Pax, ex *Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 171 = *Xerophyta capillaris*, Baker.
Hildebrandtii, Pax, ex *Engl. l. c.* — Reg. Somal.
Holstii, Harms, ex *Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57 nomen. — Afr. trop. or.
scabrida, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 144. — Afr. trop. austro-occ.
Spekei, Harms, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 146 = *Vellozia Spekei*, Baker.
splendens, Harms, l. c. = *Vell. splendens*, Rendle.
tomentosa, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 144. — Afr. trop. or.

BARBAREA, R. Br. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 272.

abortiva ×, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena* iii. (1886) 274. — Germ.
adulterina ×, Hausskn. l. c. 278. — Germ.
alpicola, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift* xxvii. v. (1892) 170. — Bosnia.
Barbarea, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 259 = *vulgaris*, R. Br.
bosniaca, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift* xxvii. v. (1891) 169. — Bosnia.
conferta, Boiss. et Heldr. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 36. — Graecia.
croatica, Borb. et Vukot. in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1888) 421. — Croatia.
Gautieri, Fouc. et Rouy, *Fl. de Fr.* ii. (1895) 324 in add. = *intermedia*, Bor.
lippizensis, Caruel, in *Parl. Fl. Ital.* ix. (1893) 817 = *Nasturtium lippizense*, DC.
pinnata, Lebel, ex Rouy et Fouc. *Fl. de Fr.* i. (1893) 200. — Gall. occ.
Schulzeana, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, iii. (1886) 275. — Germ.

BARBEYA, Alboff, in *Mém. Sect. Oural. Soc. Russ. Géogr.* xiv. (1893), ex Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 250 = **Amphoricarpus**, Visiani (Compos.).

BARBEYA, Schweinf. ex Penzig, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1892) 269 nomen. **URTICEAE**.
oleoides, Schweinf. l. c. — Abyss.

BARBEYASTRUM, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 376. **MELASTOMACEAE**
corymbosum, Cogn. l. c. — Congo gall.

BARBOSA, Becc. in *Malpighia*, i. (1887). 339 **PALMAE**.
Pseudo-cocos, Becc., l. c. 352. — Bras.

BARJONIA, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. i. 272.
erecta, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1891) 285 = *racemosa*, Decne.

BARKHAUSIA, Moench = **Crepis**, Linn. (Compos.).

baetica, Colm. *Enum. pl. Penins. Iber.* iii. (1887) 446 = *C. spatulata*, Guss.
Hackelii, Colm. l. c. 447 = *C. taraxacifolia*, Thuill.
glanduligera, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 325. — As. centr.

BARLERIA, Linn. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 273.

angustiloba, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 20. — Afr. trop. or.
Antunesii, Lindau, l. c. xxii. (1895) 116. — Angola.
blepharoides, Lindau, l. c. xx. (1894) 24. — Afr. trop. or.
Boehmii, Lindau, l. c. 19. — Afr. trop. or.
calophylla, Lindau, l. c. 17. — Afr. centr. bor.
calophylloides, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.
comorensis, Lindau, l. c. 18. — Ins. Comor.
diffusa, Lindau, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 315 = *Somalia diffusa*, Oliver.
glandulifera, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 22. — Afr. trop. or.
grandicalyx, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 25. — Afr. centr. bor.
hereroensis, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 261. — Afr. austro-occ. extratrop.
Holstii, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 19. — Afr. trop. or.
kilimandscharica, Lindau, l. c. 26. — Afr. trop. or.
Kitchingi, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxi. (1887) 510. — Madag.
latiloba, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 261. — Afr. austro-occ. extratrop.
longifolia, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 32. — Afr. trop. or.
Marlothii, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 262. — Afr. austro-occ. extratrop.
mucronata, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 24. — Afr. trop. or.
natalensis, Lindau, l. c. 23. — Natal.
Newtoni, Lindau, l. c. xxii. (1895) 117. — Angola.
phillyreaefolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 510. — Madag.
prionitoides, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 262. — Afr. austro-occ. extratrop.
pulchra, Lindau, l. c. xx. (1894) 18. — Madag.
Sacani, Klotzsch, ex Lindau, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 368. — Afr. trop. or.
Schenckii, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 199. — Afr. austro-occ. extratrop.
Schweinfurthiana, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 26. — Afr. trop. or.
Stuhlmannii, Lindau, l. c. 20. — Afr. trop. or.
submollis, Lindau, l. c. 21. — Afr. trop. or.
sudanica, Lindau, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 368 (= *Dipteracanthus sudanicus*, Schweinf.). — Afr. trop.
ukamensis, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.
usambarica, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 21. — Afr. trop. or.
vincaefolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 339. — Madag.
Volkensii, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 22. — Afr. trop. or.
yemensis, Schweinf. ex Lindau, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 315. — Afr. trop.

BARNADESIA, Mutis (Compos.). — Ind. Kew. i. 275.

Trianae, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 71. — Columb.

BARRINGTONIA, Linn. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 275.

calyptrocalyx, K. Schum. in *K. Schum. et Holly. Fl. Kats. Wilh. Land* (1889) 91. — N. Guin.

BARRINGTONIA : —

- luzonensis, Vidal, *Revis. pl. vasc. Filip.* (1886) 133. — Ins. Philipp.
rubra, Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 621 = *acutangula*, Gaertn.
Schuchardtiana, K. Schum. in K. Schum. et Hollr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 92. — N. Guin.

BARTONIA, Muhl. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 276.
Moseri, Robins. et Greenm. ex Gilg, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 76 = *tenella*, Muhl.
virginica, Britton, Stern et Poggenb. *Prelim. Catal.* (1888) 36 = *tenella*, Muhl.

BARTSIA, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 276.
kilimandscharica, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 384. — Afr. trop. or.
orerensis, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 488. — Ins. Borbon.

BASANACANTHA, Hook. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 277.
Annae, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 374. — Bras.
calycina, K. Schum. l. c. 375. (= *Randia calycina*, Cham.). — Bras.
spinosa, K. Schum. l. c. 376 (= *Mussaenda spinosa*, Jacq.). — Am. trop.

BASANANTHE, Peyr. (Passiflor.). — Ind. Kew. i. 277.
heterophylla, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 252. — Afr. austro-occ. extratrop.

BASELLA, (Rheede) Linn. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 277.
excavata, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 44. — Madag.

BASICARPUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 562 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
Glaziovii, Van Tiegh. l. c. 565. — Bras.

BASILICUM, Moench = **Moschosma**, Reichb. (Labiata).
multiflorum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 512 = *M. multiflorum*, Benth.
myriostachyum, Kuntze, l. c. = *M. myriostachyum*, Benth. et Hook. f.
riparium, Kuntze, l. c. = *M. riparium*, Hochst.

BASILIMA, Rafin. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).
alpina, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 223 = *S. grandiflora*, Sweet.
grandiflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 215 = *S. salicifolia*, Linn.
Kirilowii, Kuntze, l. c. = *S. sorbifolia*, Linn.
Lindleyana, Kuntze, l. c. = *S. sorbifolia*, Linn.
Millefolium, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 57 = *S. Millefolium*, Torr.
Millefolium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 215 = *praec.*

BASILOXYLON, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 12 in obs. **STERCULIACEAE**.
Rex, K. Schum. l. c.; et in *Rev. deutsch. Bot. Ges.* iv. (1886) 82. — Bras.

BASSIA, All. = **Chenolea**, Thunb. (Chenopod.).
dasyphylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 546 = *Kochia dasyphylla*, Fisch. et Mey.
diffusa, Kuntze, l. c. = *Chenolea diffusa*, Thunb.
divaricata, Kuntze, l. c. (= *Echinopsilon divaricatus*, Kar. et Kir.) — Soongar.
eriantha, Kuntze, l. c. (= *Londesia eriantha*, Fisch. et Mey.). — Reg. Casp.
eriophora, Kuntze, l. c. 547 = *Kochia eriophora*, Schrad.
hirsuta, Kuntze, l. c. = *K. hirsuta*, Nolte.
hyssopifolia, Kuntze, l. c. = *K. hyssopifolia*, Schrad.
longicuspis, F. Muell. Austral. Salsol. Pl. (1891) t. 71; et in *Vict. Natural.* ix. (1893) 187. — Austral.
Luehmanni, F. Muell. Austral. Salsol. vii. (Aug. 1890) 47; et *Bot. Centralbl.* xliiii. (1890) 371. — Austral.
Londesia, F. Muell. l. c. 48 in obs. = *Kochia eriophora*, Schrad.
monticola, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 547 = *Kochia monticola*, Boiss.

BASSIA : —

- stelligera*, « F. Muell. » ex Bot. *Centralbl.* lii. (1892) 168 nomen.
suaedacea, F. Muell. in *Vict. Natural.* vii. (Aug. 1890) 42 nomen. — Austral.
sedodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 547 = *Kochia sedoides*, Schrad.

BASSIA, Koenig (Sapot.). — Ind. Kew. i. 277.
Hollrungii, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 214 (= *Illipe Hollrungii*, K. Schum.). — N. Guin.
microcalyx, Burch. in *Ann. Jard. Buitenz.* iii. (1888) 256. — Ins. Stewart.
May, Becc. ex Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1890) 5; et ex Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1890) 310 in syn. — Ind. bat.
Tatei, F. Muell. in *Vict. Natural.* vii. (Sept. 1890) 66. — Austral.

BASSOVIA, Aubl. (Solan.). — Ind. Kew. i. 279.
Donnell-Smithii, Coult. in *J. D. Smith, Pl. Guat.* ii. (1891) n. 53; et in *Bot. Gaz.* xvi. (1891) 145. — Guatem.
microphylla, Coult. l. c. 145. — Am. centr. et austr. mexicana, Robins. in *J. D. Smith, Pl. Guat.* ii. (1891) 53; et in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 171. — Guatem.
stenoloba, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 232 (= *Solanum stenolobum*, Van Heurck et Muell.). — Bolivia.

BASTARDIA, H. B. et K. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 278.
Berlandieri, A. Gray. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 295. — Mexic.
conferta, Garcke et K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1891) 362. — Bras.
elegans, K. Schum. l. c. — Bras.

BATEMANNIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 278.
peruviana, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 193; et ex *Gard. Chron.* (1895) i. 551. — Peruvia.

BATHYSA, Presl (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 278.
gymnocarpa, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 238. — Bras.
Mendonçaei, K. Schum. l. c. 239. — Bras.
Nicholsonii, K. Schum. l. c. 237. — Bras.

BATRACHIUM, S. F. Gray = **Ranunculus**, Linn. (Ranuncul.).
hirtissimum, Prahl, *Krit. Fl. Prov. Schles.-Holst.* ii. (1890) 4. — Slesv.-Holst.
Lobbianum, Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xix. (1894) 34. — Scand.
sceleratum, Th. Fries, ex A. Pehl, in *Bot. Notis.* (1893) 5 = *R. sceleratus*, Linn.

BATSCHIA, Vahl. = **Humboldtia**, Vahl (Legum.).
Baillonii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 162 = *H. Baillonii*, Hook. f.
Brunonis, Kuntze, l. c. = *H. Brunonis*, Wall.
unijuga, Kuntze, l. c. = *H. unijuga*, Bedd.
Vahlkiana, Kuntze, l. c. = *H. Vahlkiana*, Wight.

BAUCIS, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 838. **COMPOSITAE**.
lavandulifolia, Phil. l. c. 839. — Chili.

BAUHINIA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 279.
baviensis, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 217. — Tonkin.
Benthiana, Taub. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1891) 149 (= *B. macrostachya*, Benth.). — Bras.
bryoniflora, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 191. — Yunnan.
Burbridgei, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 143. — Borneo.
corumbensis, S. Moore, l. c. (1895) 348. — Bras.
Delavayi, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 192 t. 43. — Yunnan.
densiflora, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 191. — Yunnan.
diptera, Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 52. — Burma.
excurrens, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 143. — Borneo.

BAUHINIA : —

- Faberi*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii (1888) t. 1790. — China.
Galpini, N. E. Br. l. c. xx. (1891) t. 1994; et in *Gard. Chron.* (1891) i. 728. — Transv.
Glaziovii, Taub. in *Flora*, lxxv. (1892) 78. — Bras.
Holzei, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Jan. 1892) 131 nomen. — Austral.
Krugii, Urban, in *Stahl, Estud. fl. Porto-Rico*, iii. (1888) 128. — Ins. Portorico.
Marlothii, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 26. — Afr. austro-occ. extratrop.
pansamalana, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 27. — Guatem.
Pechuelii, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 263. — Afr. austro-occ. extratrop.
podopetala, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 313. — Madag.
Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 147. — Mexic.
punctiflora, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 314. — Madag.
pyrrhoclada, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 218. — Tonkin.
Rubeleruziana, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 27. — Guatem.
Rusbyi, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 326. — Am. austr.
suffruticosa, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 295. — Penins. Mal.
taitensis, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 200. — Afr. trop. or.
tenuiflora, Watt, ex C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 18. — Reg. Himal.
tortuosa, Collett et Hemsl. l. c. xxv. (1890) 52 t. 8. — Burma.
uniflora, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 451. — Mexic.
Urbaniana, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 169. — Afr. austro-occ. extratrop.
Vespertilio, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 347. — Bras.
Volkensii, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 200. — Afr. trop. or.
yunnanensis, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 190. — Yunnan.

BDELLIUM, Baill. ex Laness. Pl. util. colon. franç. (1886) 815 nomen = **Commiphora**, Jacq. (Burser.).
africanum (err. cal.? *africana*) Baill. l. c. = *C. africana*, Engl.

BEALIA, Scribn. ex Vasey, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 212 nomen = **Muehlenbergia**, Schreb. (Gramin.).
mexicana, Scribn. l. c. — Mexic.

BEAUMONTIA, Wall. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 282.
brevituba, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1582. — Hainan.
campanulata, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1893) 177. — Java.
indecora, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 759. — China.

BEAUVISAGEA, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1890) 15; et ex Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 288. **SAPOTACEAE**.
pomifera, Pierre, l. c. (= *Lucuma pomifera*, Zipp.). — N. Guin.

BECCARIANTHUS, Cogn. in Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 325; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1101. **MELASTOMACEAE**.
pulcher, Cogn. l. c. 325 et 1102. — Borneo.

BECCARIELLA, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1890) 30 = **Sideroxylon**, Linn. (Sapotac.).
amboinensis, Pierre, l. c. — Ins. Amboin.
Aylapi, Pierre, l. c. — Ins. Amboin.
Bilitbitan, Pierre, l. c. = *S. Bilitbitan*, Blanco.
celebica, Pierre, l. c. — Ins. Celeb.
Dulitan, Pierre, l. c. = *S. Dulitan*, Blanco.
coriacea, Pierre, l. c. = *N. Caled.*
firma, Pierre, l. c. = *S. firmum*, Pierre.
microcarpa, Pierre, l. c. = *S. microcarpum*, Pierre.

BECCARIELLA : —

- moluccana*, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 30 = *Sideroxylon moluccanum*, Burch.
papuanica, Pierre, l. c. = *Chrysophyllum papuanicum*, Pierre.
rubicunda, Pierre, l. c. — N. Caled.
Seberti, Pierre, l. c. = *Chrys. Seberti*, Panch.

BECCARINDA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 470 = **Slackia**, Griff. (Gesner.).

- Griffithii*, Kuntze, l. c. = *S. Griffithii*, C. B. Clarke.

BECCARINA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 249 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
xiphostachya, Van Tiegh. l. c. 250. (= *Trithecanthera xiphostachya*, Van Tiegh.). — Borneo**BECCARIODENDRON**, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 452. **ANONACEAE**.
grandiflorum, Warb. l. c. — Oceania.**BECLARDIA**, A. Rich. = **Cryptopus**, Lindl. (Orchid.).

- erostis*, Frappier, Catal. Orchid. Réunion (1880) 12, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 217. — Ins. Borbon.

BEDDOMEA, Hook. f. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 283.
luzoniensis, Vidal, Rev. pl. vasc. Filip. (1886) 84. — Ins. Philipp.**BEFARIA**, Mutis (Ericac.). — Ind. Kew. i. 283.
decora, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 77. — Ecuad.**BEGONIA**, (Tourn.) Linn. (Begon.). — Ind. Kew. i. 283.

- adenostegia*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 164. — Borneo.
Adonis ×, Hort. ex Gard. Chron. (1887) ii. 747. — Hybr. artef.
adscendens, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 26 t. 13. — Reg. Himal.
albo-picta, Hort. ex Gartenfl. (1886) 402 = *maculata*, Raddi.
Ameliae ×, Bruant, Catal. (1886) 4; et ex Duchartre in Journ. Soc. nat. hort. (1886) 153. — Hybr. artef.
antioquiensis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 207 (= *Casparya antioquiensis*, A. DC.). — Columb., Ecuad.
antioquiensis, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 = *praec.*
Baroni, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 480. — Madag.
Baumanni, Lemoine, in Le Jardin (1890) 273 cum ic.; et ex Wittmack in Gartenfl. (1891) 281 t. 1348 — Hab.?
Bertiui ×, Hort. ex Legros, in Rev. Hort. (1894) 247 et 294 fig. 93 et 94. — Hybr. artef.
bicolor, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887). — Mexic.
Bismarckii, Hort. ex Veitch, Catal. (1888) 10. — Form hort.
brevipetala, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 (= *Sasseea brevipetala*, A. DC.). — Venez.
Burbridgei, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 165. — Borneo.
californica, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. iii. (1891) 140. — Calif.
cataractarum, J. Braun et K. Schum. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 155. — Afr. trop. occ.
cilio-bracteata, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 40. — Afr. trop. occ.
Clementinae ×, Bruant, in Illustr. Hort. xxv. (1889) 11 t. 39. — Hybr. artef.
comorensis, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 139; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 38. — Ins. Comor.
convalliodora, C. DC. in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 538. — Guatem.
Cooperi, C. DC. l. c. 539. — Costarica.
cordifolia, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 (= *Sasseea cordifolia*, DC.). — Peruvia.

BEGONIA : —

- coronata* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 414. — Hybr. artef.
crassicaulis, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 149 (= *Casparya crassicaulis*, A. DC.). — Java.
Credneri ×, Haage et Schmidt, ex Gartenfl. (1890) 568 fig. 90. — Hybr. artef.
decora, Stapf, ex Kew Bull. (1893) 29. — Form hort.
Duchartrei ×, Bruant, ex Rev. Hort. (1892) 29 fig. 7; et ex Kew Bull. (1893) 29. — Form hort.
Dusenii, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 44. — Afr. trop. occ.
egregia, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 346. — Bras.
Elianii, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 387. — Oceania.
Eminii, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 141; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 282. — Afr. trop. or.
epilobioides, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 34. — Afr. trop. occ.
estrellensis, C. DC. in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 540. — Costarica.
excelsior ×, Lind. Catal. n. 123 (1893), ex Kew Bull. (1894) App. ii. 30. — Hybr. artef.
Faureana, Hort. ex Garnier, in Illustr. Hort. xlii. (1895) 152 t. 34 et 298 t. 43. — Bras.
fragilis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 479. — Madag.
fuchsiaefolia, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 (= *Stibadotheca fuchsiaefolia*, A. DC.). — Am. trop.
fulvo-villosa, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 386. — Oceania.
fusi-alata, Warb. l. c. xxii. (1895) 37. — Afr. trop. occ.
geranioides, Hort. ex Gard. Chron. (1888) ii. 501. — Form hort.
glaucophylla, Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7219. — Hab.?
globosa ×, Heinemann, ex Gartenfl. (1888) 645 fig. 143. — Hybr. artef.
grewiaefolia, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 (= *Casparya grewiaefolia*, A. DC.). — Columb., Ecuad.
Griffithiana, Warb. l. c. 142 (= *Mezierea Griffithiana*, A. DC.). — Reg. Himal.
Haageana, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1888) i. 49 et 127; et (1894) ii. 632 fig. 81. — Bras.
Henriquesii, C. DC. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 123. — Ins. S. Thom.
Henryi, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 322. — China.
Heydei, C. DC. in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 540. — Guatem.
Hieronimi, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 14. — Argent.
Hoegeana, Regel et Schmidt, in Gartenfl. (1886) 398. — Mexic.
hybrida ×, Hort. ex Rev. Hort. Belge, (1889) 90 cum icone — Hybr. artef.
incomparabilis ×, Hort. ex Gard. Chron. (1895) ii. 680 fig. 112. — Hybr. artef.
inostegia, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2309. — Borneo.
Jawezi, Laing, in Hamb. Gart. und Blumenzeit. (1894) 364. — Form hort.
Johnstoni, Oliver, in H. Johnston, Kilim. Exped. App. (1886) 340 nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 331. — Afr. trop. or.
jussiaeicarpa, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 33. — Afr. trop. occ.
kisuluana, Bütt. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1890) 45. — Angola.
lacunosa, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 140; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 42. — Afr. trop. occ.
Landsbergiae, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 202, = seq.
Lansbergeae, L. Lind. et Rodigas, in Illustr. Hort. xl. (1893) 41 t. 574. — Bras.
Lansbergei, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 479 = *praec.*
laportefolia, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 41. — Afr. trop. occ.
Le Maouti, Hort. ex Vallerand, in Le Jardin (1889), ex Illustr. Hort. (1889) 111. — Hab.?

BEGONIA : —

- Lesoudsii* ×, Éd. André, in Rev. Hort. (1888) 20 fig. 5. — Hybr. artef.
Luxii, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 541. — Guatem.
macrocarpa, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 43. — Afr. trop. occ.
macrostyla, Warb. l. c. 37. — Afr. trop. occ.
Meyeri, Johann. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 305; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 139. — Afr. trop. or.
microsperma, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 42. — Afr. trop. occ.
Molleri, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 141. — Ins. S. Thom.
montana, Warb., l. c. 146 (= *Sesseea montana*, A. DC.). — Venez.
myriantha, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 35. — Bolivia.
nepalensis, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 142 (= *Monopteron nepalense*, A. DC.). — Ind. or.
Neuberti ×, Hort. ex Gard. Chron. (1886) i. 815 et 825 fig. 185. — Hybr. artef.
oblongifolia, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 165. — Borneo.
obversa, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 26 t. 12. — Reg. Himal.
oxyanthera, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 35. — Afr. trop. occ.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 429. — Mexic.
pictaviensis ×, Bruant, ex Gard. Chron. (1891) i. 334; et ex Wien. Ill. Gartenz. Zeit. (1891) 155. — Hybr. artef.
Poggei, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 141; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 35. — Afr. trop.
portillana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 414. — Mexic.
Preussii, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 141; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 36. — Afr. trop. occ.
Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 136. — Mexic.
Prometheus ×, Hort. ex Gard. Chron. (1889) ii. 420. — Hybr. artef.
pulvinata, Hort. ex Illustr. Hort. (1894) 177. — Form hort.
quadrialata, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 140 fig. 47; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 43. — Afr. trop. occ.
Quintasii, C. DC. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 122. — Ins. S. Thom.
Rajah ×, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 313. — Hybr. artef.
rhopalocarpa, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 40. — Afr. trop. occ.
Rieckei, Warb. l. c. xiii. (1891) 388. — Oceania.
salaziensis, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 139 (= *Mezierea salaziensis*, Gaudich.). — Ins. Maur. it.
Scharffiana, Hook. f. in Bot. Mag. (1888) sub t. 7028 in obs. sphalm. = *Scharffii*, Hook. f.
Scharffiana, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 376; et in Gartenfl. (1888) 127, et 661 fig. 146 = *Scharffii*, Hook. f.
Scharffii, Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7028. — Bras.
sessilanthra, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 34. — Afr. trop. occ.
Sharpeana, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. ii. (Nov. 1887) 420, t. 7. — N. Guin.
Teusiana, J. Braun et K. Schum. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 155. — Afr. trop. occ.
Thiemei, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 542. — Hondur.
thomeana, C. DC. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 123. — Ins. S. Thom.
Trianae, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 — Columb., Ecuad.
trichosepala, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 542. — Guatem.
trispatulata, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 (= *Casparya trispatulata* A. DC.). — As. trop.

BEGONIA : —

- trisolcata, *Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1894) 142 (= *Monopteron trisolcatum*, A. DC.). — As. trop.
 Tuerckheimii, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 542. — Guatem.
 uniflora, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1890) 149. — Mexic.
 urticifolia, *Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1894) 144 (= *Pilderia urticifolia*, Klotzsch). — Venez.
 versaliensis, X, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* (1891) 446. — Hybr. artef.
 Warburgiana, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 325. — Bolivia.
 Wattii, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 26 t. 11. — Reg. Himal.
 Wrayi, Hemsl. in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 203. — Perak.
 Worthiana, X, Hort. ex Rev. Horticol. (1894) 247 in obs. — Hybr. artef.

- BEHRIA**, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. iv. (1887) 143. **LILIACEAE**.
 tenuiflora, Greene, l. c. — Calif.

- BEHURIA** Cham. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 288.
 cordifolia, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 13. — Bras.
 corymbosa, Cogn. l. c. — Bras.
 Glazioviana, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 415. — Bras.
 glutinosa, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 14. — Bras.
 parvifolia, Cogn. l. c. 12. — Bras.
 Mouraei, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 414. — Bras.

- BEILSCHMIEDIA**, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. i. 288.
 Brandisii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 123. — Reg. Himal.
 Cairocan, Vidal, *Rev. Pl. Vasc. Filip.* 1886) 223. — Ins. Philipp.
 Clarkei, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 122. — Reg. Himal.
 elata, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 96. — Afr. trop. occ.
 Gammieana, King, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 125. — Reg. Himal.
 grandifolia, Baill. ex Laness. *Pl. util. col. franç.* (1886) 239 nomen. — N. Caled.
 lachnostomonea, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (May 1892) 11; et in *Bot. Centralbl.* li. (1892) 91. — Austral.
 longipes, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 123. — Malacca.
 malaccensis, Hook. f. l. c. — Malacca.
 Maingayi, Hook. f. l. c. — Malacca.
 odorata, Baill. ex Laness. *Pl. util. col. franç.* (1886) 239. — N. Caled.
 sikkimensis, King, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 122. — Reg. Himal.
 zeylanica, Trim. *Syst. Catal. Ceyl. Pl.* (1885?) 75; ex *Handb. Fl. Ceyl.* iii. 440. — Zeyl.

- BEKETOWIA**, Krassn. in *Scripta bot. Hort. Univ. Petrop.* ii. 1 (1887-88) 12; Lipsky in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 365 = **Braya**, Sternb. et Hoppe (Crucif.)
 tian-shanica, Krassn. ll. cc. — China.

- BELANGERA**, Cambess. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 288.
 grandistipularis, Taub. in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 17. — Bras.

- BELIS**, Salisb. = **Cunninghamia**, R. Br. (Conif.).
 lanceolata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 798 = C. sinensis, R. Br.

- BELLARDIA**, All. = **Bartsia**, Linn. (Scrophul.).
 carnea, Wettst. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1891) 102 = *Trixago carnea*, Griseb.

- BELLEVALIA**, Lapeyr. = **Hyacinthus**, Tourn. (Liliac.).
 fuliginosa, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 306 = *Muscari fuliginosum*, Freyn.
 longipes, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 165. — Syria.
 pendulina, Chiovenda, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1894) 283; et in *Ann. Ist. bot. Roma* vi. i. (1895) 37. — Italia centr.

- BELLIOPSIS**, Pomel = **Bellium**, Linn. (Compos.).
 bellidioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 321 = *Bellium bellidioides*, Linn.
 crassifolia, Kuntze, l. c. = *Bellium crassifolium*, Mor.
 minuta, Kuntze, l. c. = *Bellium minutum*, Linn.

- BELLIS** (Tourn.) Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 289.
 orthopoda, Robins. et Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 117. — Mexic.
 purpurascens, Robins. l. c. xxvii. (1893) 172. — Mexic.
 radicans, Coss. et Durieu, ex Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér. (Dicot.)* (1890) 422. — Algeria.
 Vandasii, Velen. ex Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 179; et *Fl. Bulg.* (1891) 279. — Bulg.

- BELLOTA**, C. Gay = **Cryptocarya**, R. Br. (Laurin.).
 costaricensis, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 27. — Costarica.

- BELLUCIA**, Neck. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 290.
 circumscissa, Spruce, ex Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 515. — Bras.
 costaricensis, Cogn. ex Th. Dur. et Pitt. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 264. — Costarica.
 dichotoma, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 514. — Bras.
 imperialis, Sald. et Cogn. ex Cogn. l. c. 515. — Bras.

- BELMONTIA**, E. Mey. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 290.
 emirnenensis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 507. — Madag.
 Flanaganii, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 413. — Afr. austr.
 intermedia, Knobl. in *Bot. Centralbl.* ix. (1894) 326. — Afr. austr.
 Mechowiana, Schinz, in *Viertelj. Naturforsch. Gesells. Zürich*, xxxvi. (1891) 333. — Angola.
 natalensis, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 220. — Natal.
 platyptera, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 25. — Angola.
 pumila, Baker, l. c. — Afr. trop. occ.
 stricta, Schinz, in *Viertelj. Naturforsch. Gesells. Zürich*, xxxvi. (1891) 334. — Madag.
 Teuszii, Schinz, l. c. 335. — Angola.
 zambesiaca, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 25. — Zambesia.

- BELOPERONE**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 290.
 hians, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 194. — Calif.
 pansamalana, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 75. — Guatem.
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 160. — Mexic.
 ramulosa, Morong, in *Ann. N. Y. Acad.* vii. (1893) 194. — Parag.
 rectiflora, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 489. — Bras.
 riparia, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 432. — Bras.
 squarrosa, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 21 (= *Justicia squarrosa*, Griseb.). — Reg. Argent.
 tetrameroides, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 489. — Bolivia.
 velascana, Lindau, l. c. — Bolivia.

- BELOTIA**, A. Rich. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 290.
 mexicana, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1890) 28 = *grewiaefolia*, A. Rich.

- BELUTTAKAKA**, Adans. Fam. des pl. ii. (1763) 172 ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 413 = **Chone-morpha**, G. Don (Apocyn.).
 Griffithii, Kuntze, l. c. = C. Griffithii, Hook. f.
 macrophylla, Kuntze, l. c. = C. macrophylla, G. Don.
 malabarica, Kuntze, l. c. = C. malabarica, G. Don.

- BELVALA**, Adans. = **Struthiola**, Linn. (Thymel.).
 angustifolia, argentea, chrysantha, dodecapetala, Eckloniana, hirsuta, laxa, longiflora, lucens, Martiana, Mundtii, parviflora, rigida, striata, tomentosa, tuberculosa, virgata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 583-84 = *homonyma omnia Struthiolae*.
 dodecandra, Kuntze, l. c. 583 = S. erecta, Linn.
 glauca, Kuntze, l. c. 584 = S. virgata, Linn?
 juniperina, Kuntze, l. c. 583 = S. lineariloba, Meisn.
 myrsinites, Kuntze, l. c. = S. ovata, Thunb.

- BENEVIDESIA**, Sald. et Cogn. ex Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 604. **MELASTOMACEAE**.
 organensis, Sald. et Cogn. l. c. 605. — Bras.

- BENJAMINA**, Vell. = **Dictyoloma**, A. Juss. (Simarub.).
 peruviana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 103 = D. peruvianum, Planch.

- BENNETTIA**, R. Br. = **Galearia**, Zoll. (Euphorb.).
 longipes, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1596. — Silhet.

- BENTHAMIELLA**, Speg. ex Wettst. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 38. **SOLANEAE**.
 patagonica, Speg. l. c. — Patag.

- BENTHAMINA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xlii. (1895) 85 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
 alyxifolia, Van Tiegh. l. c. = L. alyxifolius, F. Muell.

- BENTHAMISTELLA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 458 = **Stellularia**, Benth. (Scrophul.).
 nigricans, Kuntze, l. c. = S. nigricans, Benth.

- BENTIA**, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 338; Lindau, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1895) 339. **ACANTHACEAE**.
 fruticulosa, Rolfe, ll. cc. — Arabia.

- BENZOIN**, Ludw. = **Lindera**, Thunb. (Laurin.).
 acuminatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 569 = L. acuminata, Villar.
 argenteum, Kuntze, l. c. (= *Daphnidium argenteum*, Kurz). — Burma.
 assamicum, Kuntze, l. c. 568 = L. assamica, Kurz.
 Benzoin, Coult. in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 164 = L. Benzoin, Meisn.
 bibracteatum, Kuntze, l. c. 569 (= *Daphnidium bibracteatum*, Nees.). — Java.
 Blumeianum, Kuntze, l. c. (= *Aperula cuspidata*, Blume). — Ins. Celebes.
 bootanicum, Kuntze, l. c. = L. bootanica, Meisn.
 caesium, Kuntze, l. c. = L. caesia, Reinw.
 caudatum, Kuntze, l. c. (= *Daphnidium caudatum*, Nees). — Ind. or.
 cuspidatum, Kuntze, l. c. = L. melastomacea, Villar.
 gemmiflorum, Kuntze, l. c. (= *Daphnidium gemmiflorum*, Blume). — Java.
 gracile, Kuntze, l. c. (= *Daphnid. gracile*, Nees). — Hab. Griffithii, Kuntze, l. c. = L. Griffithii, Meisn.
 heterophyllum, Kuntze, l. c. = L. heterophylla, Meisn.
 hypoleucum, Kuntze, l. c. = L. hypoglaucia, Maxim.
 insigne, Kuntze, l. c. (= *Aperula insignis*, Blume). — Sumatra.
 lanceolatum, Kuntze, l. c. (= *Aperula lanceolata*, Blume). — Java.
 latifolium, Kuntze, l. c. = L. latifolia, Hook. f.
 Laureola, Kuntze, l. c. = L. Laureola, Collett et Hemsl.
 lucidum, Kuntze, l. c. (= *Aperula lucida*, Blume). — Java.
 macrophyllum, Kuntze, l. c. (= *Daphnidium macrophyllum*, Blume). — Java.
 malaccense, Kuntze, l. c. = L. malaccensis, Hook. f.
 megaphyllum, Kuntze, l. c. (= *Aperula macrophylla*, Blume). — Java.
 Meisneri, Kuntze, l. c. = L. Meisneri, King.

BENZOIN: —

- membranaceum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 569 = *Lindera membranacea*, Maxim.
Micrantodaphne, Kuntze, l. c. = *L. reticulata*, Benth. et Hook. f.
Myrrha, Kuntze, l. c. = *Litsea trinervia*, Juss. ?
Nacusa, Kuntze, l. c. = *Litsea bifaria*, Benth.
nervosum, Kuntze, l. c. 568 = *Lindera nervosa*, Kurz.
obtusilobum, Kuntze, l. c. 569 = *L. obtusiloba*, Blume.
obtusum, Kuntze, l. c. = *L. obtusa*, Franch. et Sav.
oxyphyllum, Kuntze, l. c. (= *Aperula oxyphylla*, Blume). — Java.
pipericarpum, Kuntze, l. c. (= *Aperula pipericarpa*, Meissn.). — Sumatra.
polyanthum, Kuntze, l. c. (= *Aperula polyantha*, Blume). — Java.
puberulum, Kuntze, l. c. (= *Aperula puberula*, Blume). — Java.
pulcherrimum, Kuntze, l. c. = *L. pulcherrima*, Benth.
reticulatum, Kuntze, l. c. = *L. reticulata*, Benth. et Hook. f.
salicifolium, Kuntze, l. c. (= *Aperula salicifolia*, Blume). — Java.
sikkimensis, Kuntze, l. c. = *L. sikkimensis*, Meissn.
sinense, Kuntze, l. c. = *L. sinensis*, Hemsl.
strychnifolium, Kuntze, l. c. = *L. strychnifolia*, Villar.
subumbelliferum, Kuntze, l. c. (= *Aperula confusa*, Meissn.). — Java.
umbellatum, Kuntze, l. c. = *L. umbellata*, Thunb.
venosum, Kuntze, l. c. = *L. venosa*, Benth.

BERARDA, « Vill. », St-Lager, Étud. des fl., éd. 8. ii. (1889) 437 = *Berardia*, Vill. (Compos.).

BERBERIS (Tourn.), Linn. (Berberid.). — Ind. Kew. i. 292.

- acuminata*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii (1886) 387. — China.
aethnensis, « Presl » ex Ces. Pass., et Gibelli, Comp. fl. Ital. ii. (1886) 866 = *aethnensis*, Presl.
aurahuacensis, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1889) sub t. 7075 in syn. = *B. Lycium*, Royle.
barandana, Vidal, Rev. pl. vasc. Filip. (1886) 45. — Ins. Philipp.
Belstamiana, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1890) sub t. 7116 in syn. = *virescens*, Hook. f.
brachyacantha, Phil. ex Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 45 nomen. — Chili.
dictyophylla, Franch. Pl. Delav. (1889) 39 t. 11. — Yunnan.
dictyota, Jenson, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 319. — Calif.
divaricata, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iv. (1895). 203. — Bolivia.
Garciae, Pau, Not. bot. fl. Espan. ii. (1889) 6; Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 314. — Hisp.
gracilipes, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1754. — China.
Hakodate, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 117 = *vulgaris*, Linn.
Hallii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 12. — Ecuad.
Holstii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 69; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 181. — Afr. trop. oc.
Lehmannii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 15. — Columb.
levis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 380; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-8) 183 (= *B. Wallichiana*, Franch.). — Tibet.
magellanica, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 135 = *buxifolia*, Poir.
Moritzii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 16. — Venez.
Nevinii, A. Gray, ex A. Gray et S. Wats. Syn. Fl. N. Am. New ed. i. 1. (1895) 69. — Calif.
nigricans, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 10. — Costarica.
pachyacantha, Bienert, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 170 = *vulgaris*, Linn.
pallens, Franch. Pl. Delav. (1889) 36. — Yunnan.
pectinata, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 14. — Ecuad.
pindilicensis, Hieron. l. c. — Ecuad.
polyantha, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 302. — China.

BERBERIS: —

- Potadini, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 41. — China.
pruinosa, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 387. — China.
pumila, Greene, Pittonia, ii. (July 1891) 161. — Am. bor. occ.
pygmaea, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 166. — Chili.
rectinervia, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 204. (an. seq.?). — Bolivia.
rectinervis, Rusby, l. c. iii. 3. (1893) 5. — Bolivia.
rigida, Klotzsch, ex Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 49 (1895) 11 in syn. = *rigida*, Hieron.
rigida, Hieron. l. c. — Ecuad.
sanguinea, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886?) 194. — Tibet.
serrata, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 170. — Hab. ?
Sieboldii, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 117 = *vulgaris*, Linn.
sikokiana, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 283. — Japon.
Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 308. — Columb.
subtripplinervis, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 63. — Yunnan.
virescens, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7116. — Reg. Himal.
vitellina, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 15. — Venez.
Wagneri, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 164 = *pinnata*, Lag.
Warszewiczii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 49 (1895) 13. — Ecuad.
Wilcoxii, Kearn. in Trans. N. Y. Acad. xiv. (1894) 23. — Am. bor.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 388. — China.

BERCHEMIA, Neck. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 293.

- pauciflora*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 484. — Japon.
philippinensis, Vidal, Rev. pl. vasc. Filip. (1886) 91. — Ins. Philipp.
scandens, Trelease, in Trans. St-Louis Acad. v. (1889) 364; et in Rep. Geol. Surv. Arkans. iv. 1888 (1891) 172 = *volubilis*, DC.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 456. — China.

BERENDTIA, A. Gray (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 294.

- spinulosa*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 159. — Mexic.

BERGENIA, Moench = *Saxifraga*, Tourn. (Saxifrag.).

- ciliata*, Stein, in Gartenfl. (1886) 307; Clos, in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 397 = *S. ciliata*, Lindl.
crassifolia, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 587 = *S. crassifolia*, Linn.
Delavayi, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a. (1890) 50 = *S. Delavayi*, Franch.
Fortunei, Stein, in Gartenfl. (1886) 307 = *S. Fortunei*, Hook.
ligulata, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a. (1890) 50 = *S. ligulata*, Wall.
media, Engl. l. c. = *S. media*, Hook. et f. Thoms.
Milesii, Stein, in Gartenfl. (1886) 307 = *S. ligulata*, Wall.
orbicularis, Stein, l. c. = *S. orbicularis*.
ornata, Stein, l. c.; Clos in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 397 = *S. ornata*, Decne.
Stracheyi, Stein, l. c.; Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a. (1890) 50 = *S. Stracheyi*, Hook. f. et Thoms.

BERGINIA, Harv. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 294.

- Palmeri, Rose, ex Vasey et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 86. — Calif.

BERKHEYA, Ehrh. (Compos.). — Ind. Kew. i. 294.

- Antunesii, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 181. — Angola.

BERKHEYA: —

- caffra*, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 391. — Afr. austr.
debilis, MacOwan, l. c. — Afr. austr.
Echinus, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 181 in obs. = *Berkheyopsis Echinus*, O. Hoffm.
ferox, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 214. — Afr. austro-occ. extratrop.
Johnstoniana, Britten, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 22. — Afr. trop. austro-or.
Pechuelii, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 281 = *Berkheyopsis Pechuelii*, O. Hoffm.
Schenckii, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 214. — Afr. austro-occ. extratrop.
Schinzii, O. Hoffm. l. c. 213 = *Berkheyopsis Schinzii*, O. Hoffm.
Welwitschii, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 182. — Angola.

BERKHEYOPSIS, O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1893) 311; et in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 179. **COMPOSITAE.**

- aizoides*, O. Hoffm. l. c. — Angola.
angolensis, O. Hoffm. l. c. 180. — Angola.
diffusa, O. Hoffm. l. c. 181 (= *Gazania diffusa*, Oliver). — Afr. trop. or.
Echinus, O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1891) 311 = *Berkheyopsis Echinus*, O. Hoffm.
Pechuelii, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 181 (= *Berkheyopsis Pechuelii*, Kuntze). — Afr. austro-occ. extratrop.
Schinzii, O. Hoffm. l. c. 181 in obs.; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 89 (= *Berkheyopsis Schinzii*, O. Hoffm.). — Afr. austro-occ. extratrop.

BERLINIA, Soland. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 295.

- Eminii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 199. — Afr. trop. or.

BERMUDIANA, Linn. = *Sisyrinchium*, Linn. (Irid.).

- acris*, *angustifolia*, *arizonica*, *avenacea*, *azurea*, *bogotensis*, *californica*, *chilensis*, *convoluta*, *cuspidata*, *fasciculata*, *filifolia*, *Glaziovii*, *gracilis*, *graminifolia*, *grandiflora*, *incurvata*, *iridifolia*, *Jamesonii*, *juncea*, *Luzula*, *Mandonii*, *micrantha*, *minutiflora*, *monostachya*, *nervosa*, *Nuno*, *pachyrhiza*, *palmifolia*, *patagonica*, *Pearcei*, *pilifera*, *pusilla*, *quadrangulata*, *secundiflora*, *Sellowiana*, *sessiliflora*, *setacea*, *striata*, *ternifolia*, *tinctoria*, *tolucensis*, *trinervis*, *unispithacea*, *vaginata*, *Weirii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 699-700 = *homonyma omnia* *Sisyrinchii*.
bella, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 388 = *S. bellum*, S. Wats.
Berteroana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 699 = *S. leucanthum*, Colla.
congesta, Kuntze, l. c. = *S. palmifolium*, Linn.
Hartwegii, Kuntze, l. c. 700 = *S. tenuifolium*, Humb. et Bonpl.
homomalla, Kuntze, l. c. = *S. angustifolium*, Mill.
Marchio, Kuntze, l. c. = *S. alatum*, Hook.
marginata, Kuntze, l. c. = *S. palmifolium*, Linn.
restioides, Kuntze, l. c. = *S. restioides*, Spreng.
scabra, Kuntze, l. c. = *S. chilense*, Hook.

BERNARDIA, Houst. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 295.

- Brandegei*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 172 nomen = *mexicana*, Muell. Arg.
viridis, Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 223. — Calif.

BERRIA, Roxb. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 295.

- tahitensis*, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 22 (Berrya). — Ins. Tahit.

BERSAMA, Fresen. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 295.

- Engleri*, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 293 nomen = *Engleriana*, Gürke.
Engleriana, Gürke, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 307; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 381. — Afr. trop. or.

BERSAMA : —

- Holsti, *Gürke, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47. (1894) 36. — Afr. trop. or.
 lucens, *Szyszl. Pl. Rehmann.* ii. (1888) 50 (= *Natalia lucens*, Hochst.). — Natal.
paullinoides, Baker, ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 90 nomen = *usambarica*, *Gürke*.
Tysoniana, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2267. — Afr. austr.
usambarica, *Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 252. — Afr. trop. or.
Volkensii, *Gürke, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 381 nomen. — Afr. trop. or.

BERTIERA, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 296. longithyrsa, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 322. — Madag.
 parviflora, *Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 325. — Bras.
 racemosa, *K. Schum. in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 127. — Guinea.

BERTOLONIA, Raddi (Melastom.). — Ind. Kew. i. 296.
 angustifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 56 — Bras.
 Mosenii, *Cogn. l. c.* 55. — Bras.
 sanguinea, *Sald. ex Cogn. l. c.* 51. — Bras.
 Ulaei, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1185. — Bras.

BERULA, Hoffm. — **Sium**, Tourn. (Umbellif.).
 angustifolia, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 88 = angustifolia, *Mert. et Koch* = *S. erectum*, *Huds.*
erecta, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 115; et iii. (1895) 160 = *S. erectum*, *Huds.*

BESCHNERIA, Kunth (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 296.
 argyrophylla, Hort., ex W. Wats. in *Kew Bull.* (1889) 302 = *Dekosteriana*, *C. Koch*.
 glauca, Hort. ex W. Wats. l. c. — Form. hort.
 superba, Hort. Hamb. ex *Baker, Handb. Amaryll.* (1888) 162. — Hab.?
 viridiflora, Hort. Hamb. ex *Kew Bull.* (1892) 7 = yuccoides, *Hook.?*

BESLERIA, Plum. ex Linn. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 296.
 foliacea, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 240. — Bolivia.
 montana, *Britton, l. c.* — Bolivia.
 ovalifolia, *Britton, l. c.* — Bolivia.
 pansamalana, *J. D. Smith, Pl. Guat.* ii. (1891) 56; et in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 197. — Guatem.

BETONICA (Tourn.), Linn. = **Stachys** (Tourn.), Linn. (Labiata).
Cernagorae, G. Beck et *Szyszl. Pl. Cern. et Alb.* lect. (1888) 140. — Monten.
danica, Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 1. (1886-88) 446 = *S. Betonica*, *Benth.*
Haussknechtii, Uechtr. ex *Nym. Consp. fl. Eur. Suppl.* i. ii. (1889) 251 = *S. Betonica*, *Benth.*
Kelleri, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn.* xxx. (1892) 72. — Maced.

BETULA (Tourn.), Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 298.
Bhojpatra, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 108 = *Ermani*, *Cham.*
Castanae, Buch.-Ham. ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 599 in syn. = *utilis*, *D. Don.*
 globispica, *Shirai, in Tokyo Bot. Mag.* viii. (1894) 318. — Japon.
 hybrida, Bechst. ex *Fritsch, in Bot. Centralbl.* xlvi. (1891) 91. — Eur.
 Medwediewi, *Regel, in Gartenfl.* (1887) 383 fig. 95, et in *Act. hort. Petrop.* x. (1887) 375. — Reg. Cauc.
oxytzwienensis, Hort. ex *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 167 = *pendula*, *Roth.*
 Potanini, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 101. — China.
pseudocarpatica ×, *Simonk. Enum. fl. Transsilv.* (1886) 491. — Austria.
 Raddeana, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 129. — Daghest.

BETULA : —

- rotundata, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. (1890) 262 = alba, *Linn.*
 pulchella, Hort. ex *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 182 = *pumila*, *Linn.*
Sokolovi, Krassn, in *Script. bot. Univ. Petrop.* i. (1886) 185 nomen (Quid?). — Mont. Altai.
 tristis, Hort. ex *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 174 = alba, *Linn.*

BEURERA, Ehret = **Calycanthus**, Linn.

- ferax, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 5 = *C. laevigatus*, *Willd.*
 fertilis, Kuntze, l. c. = *C. glaucus*, *Willd.*
 florida, Kuntze, l. c. = *C. floridus*, *Linn.*
 laevigata, Millsp. Fl. West Virgin. (1892) 361 (*Beurera*) = *C. laevigatus*, *Willd.*
 praecox, Kuntze, l. c. = *Chimonanthus fragrans*, *Lindl.*

BEURERIA, « P. Br. » ex *Gürke, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1891) 87 = **Bourreria**, P. Br. (Boragin.).

- Andrieuxii*, *divaricata*, *domingensis*, *exsucca*, *formosa*, *grandiflora*, *havanensis*, *huanita*, *microphylla*, *revoluta*, *succulenta*, *spinifex*, *tomentosa*, *virgata*, *Gürke*, l. c. = *homonima omnia* *Bourreria*.
cumanensis, *Gürke*, l. c. = *Ehretia cumanensis*, *DC.*
fasciculata, *Gürke*, l. c. = *Ehretia fasciculata*, *H. B. et K.*
guatemalensis, *Gürke*, l. c. = *Bourreria grandiflora*, *Bertol.?*
velutina, *Gürke*, l. c. = *Bour. tomentosa*, *G. Don?*

BIASOLETTIA, Koch = **Chaerophyllum**, Linn. (Umbellif.).

- balkanica*, Velen. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 399. — Bulg.
pindicola, *Hausskn. in Nym. Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 144. — Graecia.

BICORNELLA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 300.

- Schmidtii*, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 67. — Ins. Comor.

BICUCULLA, Borekh. = **Dicentra**, Bernh. (Papaver.).

- canadensis*, Millsp. in *Bull. West Va. Agric. Exp. Sta.* ii. (1892) 327 = *D. canadensis*, *Walp.*
Cucullaria, Millsp. l. c. = *D. Cucullaria*, *Bernh.*
eximia, Millsp. l. c. = *D. eximia*, *Torr.*
fungosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 13 = *Adlumia cirrhosa*, *Raf.*

BIDENS (Tourn.), Linn. (Compos.) — Ind. Kew. i. 300.

- alamosana*, Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 104. — Mexic.
antiguensis, *J. M. Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 100. — Guatem.
aristosa, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 281 = *Coreopsis aristosa*, *Michx.*
artemisiaefolius, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 321 = *Cosmos sulphureus*, *Cav.*
aurantiacus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 388. — N. Zel.
bidentoides, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 281 = *Coreopsis bidentoides*, *Torr. et Gray.*
croceus, *Welw. ex O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 177. — Angola.
dahlroides, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 142. — Mexic.
decipiens, *Warnst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 392 et 475. — Eur.
discoides, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 281 = *Coreopsis discoides*, *Torr. et Gray.*
guatemalensis, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 44. — Guatem.
Hildebrandtii, *O. Hoffm. l. c.* xx. (1894) 234. — Afr. trop. or.
inermis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 278. — Mexic.
involutata, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 281 = *Coreopsis involutata*, *Nutt.*

BIDENS : —

- involvens*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 49. — Am. austr. occ.
laevis, *Britton, Stern et Poggenb. Prel. Catal.* (1888) 29 = *chrysanthemoides*, *Michx.*
ludens, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 390. — Mexic.
Montsulani, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 49. — Am. austr. occ.
nudata, *T. S. Brandeg. in Zoë, i.* (1890) 309. — Calif. *orientalis*, Velen. ex *Bornm. in Bot. Centralbl.* xxxvi. (1888) 61; et *Fl. Bulg.* (1891) 250. — Bulg.
Palmeri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 429. — Mexic.
pedunculatus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 49. — Am. austr. occ.
refracta, *T. S. Brandeg. in Zoë, i.* (1890) 310. — Calif. *reptans*, *Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 101 = *Coreopsis reptans*, *Linn.*
trichosperma, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 281 = *Coreopsis trichosperma*, *Michx.*
Volkensii, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 415. — Afr. trop. or.
Xantiana, *Rose, ex Vasey et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1890) 72. — Calif. austr.

BIFRENARIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 302.

- Charlesworthii*, *Rolfe, in Kew Bull.* (1894) 184. — Bras.
Dallemagnei, Hort. ex *Lindenia*, ix. (1893) 31 in syn. = *tyrianthina*, *Reichb. f.*

BIGELOWIA, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 302.

- diffusa*, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser.* II. iii. (1891) 144 (*BigeLOWIA*) = *diffusa*, *A. Gray?*
glareosa, *M. E. Jones, in Zoë, ii.* (1891) 247 (*BigeLOWIA*). — Utah.
Macronema, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 693 (*BigeLOWIA*) = *Aplopappus*, *Macronema*, *A. Gray.*
sinuata, *T. S. Brandeg. l. c.* iii. (1891) 144. — Calif.
turbinata, *M. E. Jones, l. c.* v. (1895) 691 (*BigeLOWIA*). — Am. bor. occ.

BIGNONIA (Tourn.), Linn. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 303.

- caudigera*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 415. — Bras.
columbiana, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 186. — Parag.
eximia, *Morong, l. c.* 187. — Parag.
grewioides, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 413. — Bras.
melioides, *S. Moore, l. c.* 414. — Bras.
modesta, *S. Moore, l. c.* 416. — Bras.
Morongii, *Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 185. — Parag.
roseo-alba, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 52. — Ins. Fernando Noronha.
Rodigasiana, *L. Lindl. in Illustr. Hort.* xl. (1893) 89 t. 583. — Peruvia.
rubescens, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 412. — Bras.
tomentella, *S. Moore, l. c.* 413. — Bras.

BIHAI (melius BIHAIA) Mill. = **Heliconia**, Linn. (Scitamin.).

- angustifolia*, *brasiliensis*, *conferta*, *curtispatha*, *dasyantha*, *densiflora*, *elegans*, *episcopalis*, *Ferdinando-Coburgii*, *glauca*, *hirsuta*, *Mariae*, *metallica*, *pendula*, *Poeppigiana*, *psittacorum*, *pulverulenta*, *Schiedeana*, *vellerigera*, *villosa*, *Wagneriana*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 684-85 = *homonyma omnia* *Heliconiae*.
acuminata, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 684 = *H. Bullia*, *Rich.*
Bourgaeana, *Kuntze, l. c.* = *H. Bourgaeana*, *Petersen.*
cannoda, *Kuntze, l. c.* = *H. hirsuta*, *Linn. f.*
imbricata, *Kuntze, l. c.* — Costarica.
luteofusca, *Kuntze, l. c.* = *H. Bihai*, *Linn.*
meridensis, *Kuntze, l. c.* = *H. latispatha*, *Benth.*

BIKKIA, Reinw. ex Blume (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 306.

- Commerçoniana*, *K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4. (1891) 20. — N. Guin.
grandifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 279 sphalm. = *grandiflora*, *Reinw.*

BIKKIA : —

macrophylla, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 20 (= *Portlandia macrophylla*, Brongn. et Gris). — N. Caled.
tetrandra, K. Schum. l. c. (= *Portlandia tetrandra*, Forst.). — Oceania.

BIKUKULLA, Adans. = **Dicentra**, Bernh. (Papaver.).
chrysantha, Coville, in Contrib. U.S. Nat. Herb. iv. (1893) 60 = *D. chrysantha*, Walp.
Cucullaria, Millsp. in Bull. W. Va. Agr. Exp. Sta. ii. (1892) 327 = *D. Cucullaria*, Bernh.
formosa, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 60 = *D. formosa*, Walp.
pauciflora, Coville, l. c. = *D. pauciflora*, S. Wats.

BIACUS, Rumpf, Herb. Amboin, i. (1741) 197 t. 81, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 98 = **Aegle**, Correa (Rutac.).
decandra, Kuntze, l. c. 99. = *A. decandra*, Naves.
Marmelos, Kuntze, l. c. = *A. Marmelos*, Linn.
trifoliata, Kuntze, l. c. = *Citrus trifoliata*, Linn.

BILLBERGIA, Thunb. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 306.
aureo-rosea, Hort. Lind. ex Baker, Handb. Bromel. (1899) 63. = *Aechmea aureo-rosea*, Baker.
Blireiana, Ed. André, in Rev. Hortic. (1889) 139. — Hybr. artef.
boliviensis, Baker, Handb. Bromel. (1889) 81. — Bolivia.
Burchellii, Baker l. c. 76 — Bras. austr.
caespitosa, Lindman, in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiv. viii. (1891) 35 t. 8 fig. 41-46. — Bras.
canephora, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 69 in syn. = *Aechmea viridis*, Baker.
Cappei, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 83 = *Beauteana*, Ed. André.
cylindrostachya, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1892) 395. — Bras.
distachya, Mez, l. c. 417. = *Burchellii*, Baker.
Enderi, Regel, in Gartenfl. (1886) 97 t. 1217; et in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 600. — Bras.
ensifolia, Baker, Handb. Bromel. (1889) 74. — Bras.
farinosa, K. Koch, ex Baker, l. c. 71 in syn. = *pyramidalis*, Lindl.
farinosa, Hort. ex Baker, l. c. 80 = *zebrina*, Lindl.
Herbaultii, Hort. ex Baker, l. c. 83 = *Beauteana*, Ed. André.
intermedia, Hort. ex Witte, in Gartenfl. (1891) 563 fig. 101 — Hybr. artef.
Jenischiana, X, Wittm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 4. (1887) 47. — Hybr. artef.
Krameriana, X, Wittm. in Gartenfl. (1888) 657. — Hybr. artef.
Lemoinei, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 72 = *thyrsoides*, Mart.
leodiensis, Hort. ex Th. Witte, in Gartenfl. (1892) 563 fig. 100. — Hybr. artef.
linearifolia, Baker, Handb. Bromel. (1889) 72. — Parag.
macrostachya, Brongn. ex Baker, l. c. 82 in syn. = *violacea*, Beer.
Morreniana, Baker, l. c. 74. — Hab.?
Perringiana, X, Wittm. in Gartenfl. (1890) 145 t. 1318. — Hybr. artef.
Pohlana, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1892) 403. — Bras.
Quintusiana, Hort. Makoy, ex Wittm. in Gartenfl. (1890) 202 fig. 49 = *Saundersii*, Hort. Bull.
Quintutiana, « Hort. Makoy », ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 78 sphalm. = praec.
Reichardtii, Hort. Morr. ex Baker, l. c. 74 = *Morreniana*, Baker.
Schimperiana, Wittm. ex Baker, l. c. 79. — Bras.
setosa, Hort. ex Baker, l. c. 71 in syn. = *pyramidalis*, Lindl.
Skinneri, Hort. Lind. ex Baker, in Hook. Icon. pl. xix (1889) sub t. 1851 = *Aechmea Skinneri*, Baker.
stipularis, Brongn. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 82 in syn. = *violacea*, Beer.
tillandsioides, Baker, l. c. 74. — Bras.
Tweediana, Baker, l. c. 73. — Bras.

BILLBERGIA : —

vexillaria, Ed. André, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 84. — Hybr. artef.
Windii, X, Hort. ex Baker, l. c. 83. — Hybr. artef.
Wittmackiana, X, Hort. ex Th. Witte, in Gartenfl. (1891) 328 fig. 69; et (1894) 393 t. 1405. — Hybr. artef.
Worleana, X, Wittm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 4 (1887) 47. — Hybr. artef.
Worleyana, « Wittm. » ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 83 sphalm. = praec.

BINECTARIA, Forsk. = **Imbricaria**, Comm. (Sapot.).
borbonica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 406 = *I. maxima*, Poir.
fragrans, Kuntze, l. c. = *I. fragrans*, Baker.
media, Kuntze, l. c. = *I. media*, Boj.
petiolaris, Kuntze, l. c. = *I. petiolaris*, A. DC.

BIOLETTIA, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 215. **COMPOSITAE**.
riparia, Greene, l. c. 216. — Calif.

BIOPHYTUM, DC. (Geran.). — Ind. Kew. i. 307.
albiflorum, F. Muell. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 325. — N. Guin.
crassipes, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 226. — Afr. trop. or.

BIOTA, D. Don = **Thuya**, Linn. (Conif.).
elegantissima, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 60 = *T. orientalis*, Linn.
semperverescens, Hort. ex Beissn. l. c. = *T. orientalis*, Linn.

BIOVULARIA, Kamienski, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 122. **LENTIBULARIAEAE**.
olivacea, Kamienski, l. c. 123 (= *Utricularia olivacea*, Wright). — Cuba.

BIPINNULA, Comm. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 307.
polysyca, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xi. (1888) 317. — Urüg., Montevid.

BISASCHERSONIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 408 = **Tetraclea**, Hiern (Ebenac.).
clusiaefolia, Kuntze, l. c. = *T. clusiaefolia*, Hiern.

BISBOECKELERA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 747. = **Hoppia**, Nees (Cyper.).
angustifolia, Kuntze, l. c. = *H. angustifolia*, Boeck.
irrigua, Kuntze, l. c. = *H. irrigua*, Nees.
longifolia, Kuntze, l. c. = *H. microcephala*, Boeck.

BISCUTELLA, Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 308.
angustifolia, Timb. in Lucante, Rev. de Bot. x. (1892) 56. — Gall.
brevicalvata, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1888) 39 = *auriculata*, Linn.
brevifolia, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 107 = *laevigata*, Linn.
nana, Rouy et Fouc. l. c. 105 et 108 = *laevigata*, Linn.

BISERRULA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 308.
Simeti, Tornab. Fl. Sicula (1887) 200 = *B. Pelecinus*, Linn.

BISGOEPPERTIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 426. = **Goepertia**, Griseb. (Gentian.).
gracilis, Kuntze, l. c. = *G. gracilis*, Wright.
volubilis, Kuntze, l. c. = *G. volubilis*, Griseb.

BIVONAEAE, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 309.
albiflora, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 166 = *Ionopsidium albiflorum*, Durieu.
Prolongoi, Prantl, l. c. = *Thlaspi Prolongi*, Boiss.

BLACKIA, Baill. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 309.
andamanica, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 403. — Ins. Andam.

BLACKSTONIA, Huds. = **Chlora** Ren. (Gentian.).
serotina, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 934 = *C. serotina*, Reichb.

BLADHIA, Thunb. = **Ardisia**, Sw. (Myrsin.).
amboinensis, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (May 1891) 16 = *A. amboinensis*, Scheff.
brevipedata, F. Muell. l. c. = *A. brevipedata*, F. Muell.
pachyrhachis, F. Muell. l. c. 15; et in Bot. Centralbl. xvi. (1891) 205. — Austral.
paniculata, Sudworth, in Gard. and For. (1891) 239 = *A. Pickeringia*, Nutt.
Pseudo-jambosa, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (May 1891) 16. — Austral.
reclinata, F. Muell. l. c. = *A. reclinata*, Scheff.

BLAERIA, Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 309.
Bugonii, Welw. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 327. — Angola.
flava, Bolus, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 289. — Afr. austr.
glutinosa, K. Schum. et Engl. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 327. — Afr. trop. or.
Johnstoni, Engl. l. c. 326. — Afr. trop. or.
Meyeri Johannis, K. Schum. et Engl. ex Engl. l. c. — Afr. trop. or.
setulosa, Welw. ex Engl. l. c. 328. — Angola.
silvatica, Engl. l. c. 326. — Afr. trop. or.
Whyteana, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 132, nomen. — Afr. trop. or.

BLAINVILLEA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 310.
Dallo-Vedovae, Terrac. in Ann. Ist. bot. Roma, v. (1894) 107. — Afr. or.

BLAKEA, P. Br. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 310.
amabilis, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1079 (= *Amaraboya amabilis*, Linden). — Columb.
Andreana, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 769; et in DC. l. c. — Columb.
brasiliensis, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 561. — Bras.
Grisebachii, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1071. — Venez.
guatemalensis, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 25. — Guatem.
longibracteata, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1074. — Venez.
Pittieri, Cogn. l. c. 1080; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 267. — Costarica.
princeps, Cogn. in DC. l. c. 1079 (= *Amaraboya princeps*, Linden). — Columb.
Spruceana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 560. — Bras.
subpeltata, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1075; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 266. — Costarica.

BLANCOA, Blume = **Didymosperma**, H. Wendl. (Palm.).
borneensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 727 = *D. borneensis*, Becc.
caudata, Kuntze, l. c. = *D. caudatum*, H. Wendl. et Drude.
hastata, Kuntze, l. c. = *D. hastatum*, Becc.
Horsfieldii, Kuntze, l. c. = *D. Horsfieldii*, H. Wendl. et Drude.
nana, Kuntze, l. c. = *D. nanum*, H. Wendl. et Drude.
porphyrocarpa, Kuntze, l. c. = *D. porphyrocarpon*, H. Wendl. et Drude.
Reinwardtiana, Kuntze, l. c. = *D. Reinwardtianum*, H. Wendl. et Drude.

BLASTANIA, Kotschy et Peyr. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 311.
Luederitziana, Cogn. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 152. — Afr. austro-occ. extra-trop.

BLASTUS, Lour. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 311.
borneensis, Cogn. ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. 2. (1890) 531; et in DC. Monog. Phan. vii (1891) 477. — Borneo.

BLASTUS : —

Cogniauxii, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2311. — Borneo.

BLATTARIA, Burm. = **Pentapetes**, Linn. (Stercul.).

phoenicea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 6 = P. phoenicea, Linn.

BLATTI, Adans. = **Sonneratia**, Linn. f. (Lythr.).

alba, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 238 = S. alba, Sm. apetala, Kuntze, l. c. = S. apetala, Buch.-Ham. caseolaris, Kuntze, l. c. = S. acida, Linn. f. Griffithii, Kuntze, l. c. = S. Griffithii, Kurz. leucantha, Kuntze, l. c. (= Chiratia leucantha, Montr.). — N. Caled. Pagatpat, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1892) 21 = S. Pagatpat, Blume.

BLECHUM, P. Br. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 311.

blechoides, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 115 = laxiflorum, Fuss.

BLEPHARIPPAPUS, Hook. (Compos.). — Ind. Kew. i. 311.

carneus, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 246 = Layia carnea, Torr. et Gray. chrysanthemoides, Greene, l. c. 247; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 201 = Layia chrysanthemoides, A. Gray. Douglasii, Greene, ll. cc. = Layia Douglasii, Hook. et Arn. elegans, Greene, ll. cc. 246 et 201 = Layia elegans, Torr. et Gray. Fremonti, Greene, ll. cc. = Layia Fremonti, A. Gray. gaillardoides, Greene, ll. cc. 246 et 200 = Layia gaillardoides, Hook. et Arn. graveolens, Greene, ll. cc. = Layia heterotricha, Hook. et Arn. heterotrichus, Greene, ll. cc. 245 et 200 = Layia heterotricha, Hook. et Arn. hieracioides, Greene, ll. cc. 246 et 200 = Layia hieracioides, Hook. hispida, Greene, ll. cc. 246 et 201 = Layia hispida, Greene. Jonesii, l. c. 247 = Layia Jonesii, A. Gray. laevis, A. Gray, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 73. — Am. bor. austro-occ. nemorosus, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 200. — Calif. nutans, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 247 (= Callichroa nutans, Greene). — Calif. oreganus, Greene, l. c. 246 = Layia Douglasii, Hook. et Arn. pentachaetus, Greene, l. c. = Layia pentachaeta, A. Gray. platyglossus, Greene, l. c. 246; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 201 = Layia platyglossa, A. Gray.

BLEPHARIS, Juss. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 311.

affinis, Lindau, in Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. C (1895) 369. — Afr. trop. or. Buchneri, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 30. — Angola, Congo. chrysotricha, Lindau, l. c. 32. — Afr. trop. or. dichotoma, Engl. l. c. x. (1889) 260. — Afr. austro-occ. extratrop. Hildebrandtii, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 29. — Afr. trop. or. hirta, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 65 (= Acanthodium hirtum, Hochst.). — Abyss. hirtella, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 28. — Angola. longifolia, Lindau, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 318 nomen. — Afr. trop. or. panduriformis, Lindau, l. c. 30. — Afr. trop. or. paradoxa, Fritsch, in Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, v. (1890) 493. — Madag. Passargei, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 117. — Afr. trop. occ. persica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 483 = edulis, Pers. pruinosa, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 260. — Afr. austro-occ. extratrop.

BLEPHARIS : —

rupicola, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1892) 389. — Abyss. Stuhlmanni, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 31. — Afr. trop. or. tetrasticha, Lindau, l. c. 29. — Angola. trinervis, Dewèvre, in Bull. Soc. bot. Belg. xxxi. 2. 1894. (1895) 104, nomen. — Congo austro-or.

BLEPHARISPERMUM, Wight (Compos.) — Ind. Kew. i. 312.

fruticosum, Klatt, ex Schinz. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 429. — Reg. Somal. lobatum, Klatt, l. c. 428. — Reg. Somal.

BLEPHAROCALYX, Berg = **Myrtus**, Tourn. (Myrtac.).

aromatica, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1892) 71 = Siphoneugenia aromatica, Berg. Cruckshanksii, Niedenzu, l. c. = Eugenia Cruckshanksii, Hook. et Arn.

BLEPHARODON, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. i. 312.

gomphocarpoides, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 243 = Nephrodia neriifolia, Benth. et Hook. f. Rahmeri, Phil. in Ann. Mus. nac. Chile (1891) 52. — Am. austr. occ. trivialis, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 243 = salicina, Decne.

BLETIA, Ruiz et Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 313.

alta, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 132. = verecunda, R. Br. Godseffiana, Kraenzl. in Gard. Chron. (1893) i. 442. — Bras.? Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 153. — Mexic. Pottsi, S. Wats. in T. Brigham, Guatem. App. (1887) 478 nomen, et in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 478. — Guatem. quadrifida, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 851 = Calanthe veratrifolia, R. Br. subaequalis, Reichb. f. in Flora, lxix. (1886) 553. — Ins. Antill.

BLINKWORTHIA, Choisy (Convolv.). — Ind. Kew. i. 313.

convolvuloides, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiii. (1894) ii. 91. — Burma.

BLITUM, (Tourn.) Linn. = **Chenopodium**, Linn. (Salsol.).

salsum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 421. — Chili.

BLOOMERIA, Kell. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 313.

montana, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. (1885) 281. — Calif.

BLUMEA, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 314.

Balfourii, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 213. — Ins. Salom. Bojeri, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 327. — Madag. caffra, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 274 (= Conyza caffra, DC.) = natalensis, Sch. Bip. celebica, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 239 (= Conyza celebica, Sch. Bip.) — Ins. Celeb. dasycoma, Boerl. l. c. (= Conyza dasycoma, Miq.) — Sumatra, Java. floresiana, Boerl. l. c. 238 (= Conyza floresiana, Sch. Bip.) — Ins. Flores. humifusa, Boerl. l. c. 237 (= Conyza humifusa, Miq.) — Java. Junghuhniana, Boerl. l. c. 239 (= Conyza Junghuhniana, Miq.) — Java. Korthalsiana, Boerl. l. c. 239 (= Conyza Korthalsiana, Miq.) — Sumatra. lanceolata, Warb. in Bot. Jahrb. xiii (1891) 446. — N. Guin. moluccana, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 239 (= Conyza moluccana, Gaudich.) — Ins. Molucc.

BLUMEA : —

spinidens, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 237 (= Conyza spinidens, Miq.) — Java, Sumatra. subracemosa, Boerl. l. c. 238 (= Conyza subracemosa, Miq.) — Java. sumbawensis, Boerl. l. c. 239 (= Conyza sumbawensis, Miq.) — Sumbawa. ternatensis, Boerl. l. c. 237 (= Conyza ternatensis, Miq.) — Ins. Ternate. Zollingeriana, Boerl. l. c. (= Conyza Zollingeriana, Sch. Bip.) — Java.

BLUMELLA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 441 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).

capitellata, Van Tiegh. l. c. = L. capitellatus, Wight et Arn. diantha, Van Tiegh. l. c. = L. dianthus, King. loniceroides, Van Tiegh. l. c. = L. loniceroides, Linn. f. psilantha, Van Tiegh. l. c. = L. psilanthus, Hook. f.

BLUMENBACHIA, Schrad. (Loas.). — Ind. Kew. i. 214.

Arechavaletae, Urban, in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. (1889) 217. — Urug. aspera, Urban, l. c. 222 (= Mentzelia aspera, Vell.) — Bras. Eichleri, Urban, l. c. 218 t. 55. — Bras. lateritia, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 281; et in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 37. — Bolivia. scabra, Urban, in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. (1889) 219 (= Gripeidea scabra, Meis.) — Bras. urens, Urban, l. c. 214 t. 57 fig. 1 = latifolia, Cambess.

BLYSMUS, Panz. = **Scirpus**, Tourn. (Cyperac.).

bifolius, Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 318 = S. rufus, Schrad.

BLYXA, Noronha (Hydrocharid.). — Ind. Kew. i. 315.

ceylanica, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 661. — Zeylan. ceratosperma, Maxim. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. i. (1889) 253. — Japon. echinosperma, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 661. (= Hydrotrophus echinospermus, C.B. Clarke). — Ind. or. Griffithii, Planch. ex Hook. f. l. c. 660. — Ind. or. japonica, Maxim. ex Aschers. et Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. i. (1889) 253. — Japon. lancifolia, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 661. — Reg. Himal. malayana, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 358. — Penins. Mal. oryzetorum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 661. — As. trop. or. radicans, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 236. — Afr. trop. Talboti, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 661. — Ind. or.

BOBARTIA, Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 215.

anceps, Baker, Handb. Irid. (1892) 121 — Afr. austr. Burchellii, Baker, l. c. 120. — Afr. austr. macrospatha, Baker, l. c. 119. — Afr. austr. natalensis, Klatt, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 168 (= Keitia natalensis, Regel) — Afr. austr. robusta, Baker Handb. Irid. (1892) 120. — Afr. austr.

BOBEA, Gaudich. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 315.

Hookeri, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 175 (= Rytidotus sandwicensis, Hook. f.). — Ins. Sandvic. Mannii, Hillebr. l. c. 173. — Ins. Sandvic. sandwicensis, Hillebr. l. c. 174 (= Chomelia sandwicensis, A. Gray) — Ins. Sandvic. timonioides, Hillebr. l. c. (= Obbea timonioides, Hook. f.). — Ins. Sandvic.

BOCAGEA, St. Hil. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 315.

aromatica, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 14 = aromatica, Triana et Planch.

BOCCONIA, Plum. ex Linn. (Papaverac.). — Ind. Kew. i. 315.
arborescens, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 141. — Mexic.
latispala, *S. Wats. l. c.* — Calif.
microcarpa, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 45. — China.
vulcanica, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 1. — Guatem.

BOEA, Comm. ex Lam. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 315.
Clarkeana, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 232. — China.
crassifolia, *Hemsl. l. c.* 233. — China.
Lowesii, *H. O. Forbes, in Journ. Bot.* xxv. (1887) 348. — N. Guin.
macrophylla, *Drake, in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii.* (1890) 130. — Tonkin.
microcarpa, *Drake, l. c.* — Tonkin.
umbellata, *Drake, l. c.* 129. — Tonkin.

BOEHMERIA, Jacq. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 316.
australis, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 173 = *dealbata, Cheesem.*
dealbata, Cheesem. l. c. xxiv. 1891 (1892) 410. — N. Zel.
Kurzii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 577. — Pegu.
Palmeri, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 453. — Mexic.
Weddelliana, *Vidal, Rev. pl. vasc. Filip.* (1886) 256. — Ins. Philipp.

BOEICA, C. B. Clarke, (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 317.
ferruginea, *Drake, in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii.* (1890) 129. — Tonkin.

BOERHAAVIA, Vaill. (Nyctagin.). — Ind. Kew. i. 317.
alamasona, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 110. — Mexic.
alata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 69. — Calif.
annulata, *Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1895) 177. — Calif.
capitata, *Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 209, nomen. — Afr. trop. or. elongata, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 199. — Calif.
fallacissima, *Heimerl, ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 223. — Afr. austro-occ. extratrop.
gracillima, *Heimerl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b. (1889) 26; et in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 86. — Mexic.
gypsophiloides, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 354 = *Senkenbergia annulata, Schau.* — Mexic.
heteroensis, *Heimerl, in Bot. Jahrb.* x. (1889) 9; et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b. (1889) 26. — Afr. austro-occ. extratrop.
Marlothii, *Heimerl, ll. cc.* 9 et 26. — Afr. austro-occ. extratrop.
octandra, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 145. — Mexic.
Palmeri, *S. Wats. l. c.* xxiv. (1889) 69. — Am. bor.
Schinzii, *Heimerl, ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 222. — Afr. austro-occ. extratrop.
Sonorae, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 111. — Mexic.
tarapacana, *Phil. in Am. Mus. nac. Chile* (1892) 71. — Chili.
triquetra, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 69. — Calif.
Xanti, *S. Wats., l. c.* — Calif.

BOERLAGEA, Cogn. in Boerl., Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 522 et 536; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 611. **MELASTOMACEAE.**
grandifolia, *Cogn. ll. cc.* 523 et 611. — Borneo.

BOERLAGELLA, Pierre, ex Boerl. in Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 305 in obs. = **Sideroxy-lon**, Linn. (Sapot.).

BOERLAGIA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 33 = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).
spectabilis, Pierre, l. c. — S. spectabile, Burch.

BOERLAGIODENDRON, Harms, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 8. (1894) 31. = **ESCHWEILERIA**, Zipp. ex Harms, l. c. **ARALIACEAE.**
Boerlagei, Harms, l. c. 32 in obs. (= *Eschweileria Boerlagei*, Warb.) = *Warburgii*, Harms.
barbatum, Harms, l. c. 31 (= *Eschw. barbata*, Zipp.). — Ind. or. bat.
carpophagarum, Harms, l. c. 32 (= *Eschw. carpophagarum*, Becc.). — Ind. or. bat.
geelvinkeanum, Harms, l. c. (= *Eschw. geelwinkeana*, Becc.). — Ind. or. bat.
helleborinum, Harms, l. c. 31 (= *Eschw. Helleborina*, Becc.). — Borneo.
insidiator, Harms, l. c. (= *Eschw. insidiator*, Becc.). — Borneo.
insigne, Harms, l. c. 32 (= *Eschw. insigne*, Miq.). — Ind. or. bat.
novo-guineense, Harms, l. c. 31 (= *Eschw. novo-guineense*, Scheff.). — N. Guin.
palmatum, Harms, l. c. 31 (= *Eschw. palmata*, Zipp.). — Ind. or. bat.
Pfeilii, Harms, l. c. 32 (= *Eschw. Pfeilii*, Warb.). — Ind. or. bat.
pulcherrimum, Harms, l. c. (= *Eschw. pulcherrima*, Vidal). — Ind. or. bat.
Teysmannii, Harms, l. c. 31 (= *Eschw. Teymannii*, Boerl.). — Ind. or. bat.
Warburgii, Harms, l. c. 32 (= *Eschw. Boerlagei*, Warb.). — Ind. or. bat.

BOESENBERGIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 685 = **Gastrochilus**, Wall. (Scitam.).
longiflora, Kuntze, l. c. = G. longiflora, Wall.
minor, Kuntze, l. c. = G. minor, King.
parvula, Kuntze, l. c. = G. parvula, Wall.
pulcherrima, Kuntze, l. c. = G. pulcherrima, Wall.
rubrolutea, Kuntze, l. c. = G. rubrolutea, Baker.
tiliaefolia, Kuntze, l. c. = G. tiliaefolia, Baker.
tillandsioides, Kuntze, l. c. = G. tillandsioides, Baker.

BOISDUVALIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).
bipartita, Greene, in Erythea, iii. (1895) 119. — Calif.
stricta, Greene, Fl. Francisc. (1891) 225; in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 106 = O. Torreyi, S. Wats.
stricta, Trelease, in Missouri Bot. Gard. Rep. v. (1894) 117 = praec.
subulata, Raimann, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 212 = O. subulata, Ruiz et Pav.

BOJERIA, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 318.
vestita, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 68. — Afr. trop.

BOLDUS, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 569 = **BOLDU**, Feuillée = **Bellota**, Mez (Lautin).
costaricensis, Kuntze, l. c. = B. costaricensis, Mez.

BOLELIA, Rafin. = **Downingia**, Torr. (Campa' nul.).
bicornuta, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 127 = D. bicornuta, A. Gray.
concolor, Greene, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 229 = D. concolor, Greene.
cuspidata, Greene, in Erythea, iii. (1895) 101. — Calif.
elegans, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 126; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 228 in obs. = D. elegans, Torr.
humilis, Greene, ll. cc. (May 1892) 226; et 229. — Calif.
insigne, Greene, ll. cc. (Dec. 1890) 126; et 228 = D. insigne, Greene.
laeta, Greene, in Erythea, i. (1893) 238. — Nevada.
montana, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 127 = D. montana, Greene.
ornatissima, Greene, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 229 = D. ornatissima, Greene.
pulchella, Greene, ll. cc. 26; et 228 = D. pulchella, Torr.

BOLELIA : —

pusilla, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 126 (= *Clintonia pusilla*, G. Don). — Chili.
tricolor, Greene, l. c. 127; et Man. Bot. San Franc. Bay. (1894) 229 = D. tricolor, Greene.

BOLLEA, Reichb. f. = **Zygopetalum**, Hook. (Orchid.).
Schroederiana, Hort. Sand. ex Gard. Chron. (1895) i. 497 fig. 70. — Columb.
Wendlandiana, Hort. ex Gard. and For. i. (1888) 315 = *Zygopetalum Wendlandi*, Reichb. f.

BOLUSAFRA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 162 = **Fagelia**, Neck. (Legumin.).
bituminosa, Kuntze, l. c. = F. bituminosa, DC.

BOMAREA, Mirb. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 319.
acuminata, Baker, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 212. — Columb.
chimboraensis, Baker, l. c. — Ecuad.
crassifolia, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 150. — N. Gran.
glaberrima, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 334. — Reg. Argent.
Herbertiana, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 155. — N. Gran.
Hieronymi, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 332. — Columb.
Kraenzlinii, Baker, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 213. — Columb.
macrocephala, Pax, l. c. xi. (1890) 331. — Reg. Argent.
parvifolia, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 154. — Peruvia.
Patini, Baker, l. c. 157. — N. Gran.
phyllostachya, Mast. ex Baker, l. c. 143. — Columb.
recurva, Baker, l. c. 145. — Peruvia.
sororia, N. E. Br. in Illustr. Hortie. xxxix. (1892) 19, t. 545. — Am. austr.
stenopetala, Baker, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 212; et Handb. Amaryll. (1888) 149. — Columb.
stricta, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 333. — Reg. Argent.
Stuebelii, Pax, l. c. — Peruvia.
vestita, Baker, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 213; et Handb. Amaryll. (1888) 152. — Columb.

BOMBAX, Linn. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 320.
calophyllum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 227. — Bras.
campestre, K. Schum. l. c. 229. (= *Pachira campes-tris*, Decne). — Bras.
Candollianum, K. Schum. l. c. 218. — Bras.
crenulatum, K. Schum. l. c. 219. — Bras.
cyathophorum, K. Schum. l. c. 228 (= *Pachira cyathophora*, Casar.). — Bras.
gracilipes, K. Schum. l. c. 221. — Bras.
Jenmani, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1720. — Guian. angl.
longiflorum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 228 (= *Pachira longiflora*, Decne). — Bras.
macrophyllum, K. Schum. l. c. 220. — Bras.
marginatum, K. Schum. l. c. 223 (= *Pachira margi-nata*, St-Hil.). — Bras.
Martianum, K. Schum. l. c. 224 (= *Pachira tomen-tosa*, Decne). — Bras.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 399. — Mexic.
Poissonianum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 225 (= *Pachira nitida*, Decne.). — Bras.
rhodognaphalon, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 269. — Afr. trop. or.
stenopetalum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 225 (= *Pachira stenopetala*, Casar.). — Bras.
tomentosa, Pierre, ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 291, nomen. — Cochinch.
Wittrockianum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 222. — Bras.

BONAMIA, A. Gray = **Breweria**, R. Br. (Convol-vul.).
agrostopolis, Hallier f. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 563 in obs. et xvi. (1893) 529 = Br. venulosa, Meissn.

BONAMIA : —

- Althoffiana*, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 329. — Afr. trop. or.
Balansae, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 508, 512, 513 et 526 in obs. — Parag.
Boivini, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 91. — Madag.
Burchellii, Hallier f. l. c. xv. (1893) 563 in obs.; et xvi. (1893) 529 = Br. *Burchellii*, Choisy.
cymosa, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 91 = *Ipomoea ramosissima*, Choisy.
elegans, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 529 = Br. *elegans*, Choisy.
ferruginea, Hallier, f. l. c. xvi. (1893) 530 = *Prevostea ferruginea*, Choisy.
glomerata, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 90 = Br. *glomerata*, Balf. f.
Herminieri, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 529 in obs. — Ins. Guadalup. et Sandvic.
Hildebrandtii, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 91 = Br. *Hildebrandtii*, Vathe.
linearis, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 530 et 531 = Br. *linearis*, R. Br.
maripoides, Hallier, f. l. c. xvi. (1893) 529 (= *Prevostea spectabilis*, Meissn.) — Bras.
media, Hallier f. l. c. 528 in obs. = Br. *media*, F. Muell.
minor, Hallier f. l. c. xviii (1894) 91. — Congo.
mossambicensis, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 91 (= *Prevostea mossambicensis*, Klotzsch) — Afr. trop. austro-or.
pannosa, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 530 = Br. *pannosa*, R. Br.
rosea, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 528 in obs. = Br. *rosea*, F. Muell.
semidigyna, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 528; et xviii. (1894) 90 = Br. *cordata*, Blume.
spectabilis, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 529; et xviii. (1894) 91 = Br. *spectabilis*, Choisy.
sericea, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 528 in obs. = Br. *sericea*, A. Gray.
Thouarsii, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 35. — Madag.
Trichantha, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 529, 530 et 563 in obs. — Bras.
umbellata, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 530 (= *Prevostea umbellata* Choisy). — Bras.
Volkenii, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 329. — Afr. trop. or.

BONAPARTEA, Haw. = **Agave**, Linn. (Amaryll.).
glauca, Hort. ex W. Wats. in Kew Bull. (1889) 303.
 = *Dasyliion glaucophyllum*, Hook.

BONATEA, Willd. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.)
minor, Mundt, ex Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 79 in syn. = H. *Mundtii*, Kraenzl.
Saundersiae, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1892 (1895) 89 = H. *Saundersiae*, Harv.
Steudneri, Th. Dur. et Schinz, l. c. 90 = H. *Steudneri*, Reichb. f.

BONDITIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 500 = BONTIA, Linn. = **Eremophila**, R. B. et **Pholidia**, R. Br. (Myoporin.).
adenotricha, Kuntze, l. c. 501 = *Pholidia adenotricha*, F. Muell.
alternifolia, Kuntze, l. c. = *Eremophila alternifolia*, R. Br.
angustifolia, Kuntze, l. c. = *Pholidia microtheca*, F. Muell.
Behriana, Kuntze, l. c. = Ph. *Behriana*, F. Muell.
Berryi, Kuntze, l. c. = *Eremophila Berryi*, F. Muell.
bignoniiflora, Kuntze, l. c. = Er. *bignoniiflora*, F. Muell.
Bowmanni, Kuntze, l. c. = Er. *Bowmanni*, F. Muell.
brevifolia, Kuntze, l. c. = *Pholidia brevifolia*, Benth.
Christophori, Kuntze, l. c. = *Eremophila Christophori*, F. Muell.
Clarkei, Kuntze, l. c. = Er. *Clarkei*, Oldfield.
crassifolia, Kuntze, l. c. = *Pholidia crassifolia*, F. Muell.
Dalyana, Kuntze, l. c. = Ph. *Dalyana*, F. Muell.
Delisserii, Kuntze, l. c. = Ph. *Delisserii*, F. Muell.
Dempsteri, Kuntze, l. c. = *Eremophila Dempsteri*, F. Muell.

BONDITIA : —

- densifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 501 = *Pholidia densifolia*, F. Muell.
denticulata, Kuntze, l. c. = *Eremophila denticulata*, F. Muell.
divaricata, Kuntze, l. c. = *Pholidia divaricata*, F. Muell.
Drummondii, Kuntze, l. c. = *Eremophila Drummondii*, F. Muell.
Duttonii, Kuntze, l. c. = Er. *Duttonii*, F. Muell.
Elderii, Kuntze, l. c. = Er. *Elderii*, F. Muell.
ericalyx, Kuntze, l. c. = Er. *ericalyx*, F. Muell.
exiliflora, Kuntze, l. c. = Er. *exiliflora*, F. Muell.
Forrestii, Kuntze, l. c. = Er. *Forrestii*, F. Muell.
Fraseri, Kuntze, l. c. = Er. *Fraseri*, F. Muell.
Freelingii, Kuntze, l. c. = Er. *Freelingii*, F. Muell.
gibbosifolia, Kuntze, l. c. = *Pholidia gibbosifolia*, F. Muell.
Gibsonii, Kuntze, l. c. = *Eremophila Gibsonii*, F. Muell.
Gilesii, Kuntze, l. c. = Er. *Gilesii*, F. Muell.
glabra, Kuntze, l. c. = Er. *Brownii*, F. Muell.
Goodwinii, Kuntze, l. c. = Er. *Goodwinii*, F. Muell.
graciliflora, Kuntze, l. c. = Er. *graciliflora*, F. Muell.
Hughesii, Kuntze, l. c. = Er. *Hughesii*, F. Muell.
imbricata, Kuntze, l. c. = *Pholidia imbricata*, Benth.
Latrobei, Kuntze, l. c. = *Eremophila Latrobei*, F. Muell.
leucophylla, Kuntze, l. c. = Er. *leucophylla*, Benth.
longifolia, Kuntze, l. c. = Er. *longifolia*, F. Muell.
Macdonellii, Kuntze, l. c. = Er. *Macdonellii*, F. Muell.
Mackinlayi, Kuntze, l. c. = Er. *Mackinlayi*, F. Muell.
maculata, Kuntze, l. c. = Er. *maculata*, F. Muell.
Maitlandii, Kuntze, l. c. = Er. *Maitlandii*, F. Muell.
Mitchelli, Kuntze, l. c. = Er. *Mitchelli*, Benth.
Oldfieldii, Kuntze, l. c. = Er. *Oldfieldii*, F. Muell.
oppositifolia, Kuntze, l. c. = Er. *oppositifolia*, R. Br.
Paisleyi, Kuntze, l. c. = Er. *Paisleyi*, F. Muell.
Pantonii, Kuntze, l. c. = Er. *Pantonii*, F. Muell.
platycalyx, Kuntze, l. c. = Er. *platycalyx*, F. Muell.
polyclada, Kuntze, l. c. = Er. *polyclada*, F. Muell.
resinosa, Kuntze, l. c. = *Pholidia resinosa*, Engl.
rotundifolia, Kuntze, l. c. = *Eremophila rotundifolia*, F. Muell.
santalina, Kuntze, l. c. = *Pholidia santalina*, F. Muell.
scoparia, Kuntze, l. c. = Ph. *scoparia*, R. Br.
serrulata, Kuntze, l. c. = *Eremophila latifolia*, F. Muell.
strongylophylla, Kuntze, l. c. = Er. *strongylophylla*, F. Muell.
Sturtii, Kuntze, l. c. = Er. *Sturtii*, R. Br.
subfloccosa, Kuntze, l. c. = Er. *subfloccosa*, F. Muell.
Turtonii, Kuntze, l. c. = Er. *Turtonii*, F. Muell.
viscida, Kuntze, l. c. = Er. *viscida*, Endl.
Weldii, Kuntze, l. c. = Er. *Weldii*, F. Muell.
Willsii, Kuntze, l. c. = Er. *Willsii*, F. Muell.
Woolsiana, Kuntze, l. c. = *Pholidia Woolsiana*, F. Muell.
Youngii, Kuntze, l. c. = *Eremophila Youngii*, F. Muell.

BONIA, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1890) 29. GRAMINEAE.
tonkinensis, Balansa, l. c. — Tonkin.

BONINIA, grisea, Planch. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 98 = *Evodia grisea*, Kuntze.

BONNETIA, Mart. et Zucc. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 321.
Roraimae, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 272, (Oliver, ex im Thurn, in Timchri, v. (1886) 190). — Guian. angl.

BOOPIS, Juss. (Calycer.). — Ind. Kew. i. 322.
australis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 818. — Chili.
bicolor, Phil. l. c. 813. — Chili.
breviflora, Phil. l. c. 814. — Chili.
breviscapa, Phil. l. c. 818. — Chili.
dubia, Phil. l. c. 815. — Chili.
integrifolia, Phil. l. c. 814. — Chili.
Miersii, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 277 (= *Nastanthus Miersii*, Phil.). — Chili.
Miersii, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 817 = praec.

BOOPIS : —

- monocephala*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 30. — Am. austr. occ.
Reichei, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 815. — Chili.

BOOTTIA, Wall. (Hydrocharid.). — Ind. Kew. i. 322.

- abyssinica*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 239. — Abyss.
crassifolia, Ridl. l. c. — Angola.
exserta, Ridl. l. c. 240. — Zambesia, Madag.
Fischeri, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 95. — Afr. trop. or.
Rohrbachiana, Aschers. et Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. II. i. (1889) 256. — Afr. centr.
Schinziana, Aschers. et Gürke, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 376. — Afr. austro-occ. extra-trop.

BORDEREA, Miégev. = **Dioscorea**, Lam. (Dioscoreac.).
humilis, Pax, en Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1887) 133 = *D. humilis*, Bert.

BORETTA, Neck. = **Daboecia**, D. Don (Ericac.).
cantabrica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 387 = *D. polifolia*, D. Don.
Daboecii, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 173 = *D. polifolia*, D. Don.

BORONIA, Sm. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 323.
Adamsiana, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, Ser. II. v. (June 1890) 15. — Austral.

BORRERIA, G. F. W. Mey. = **Spermacoce**, Linn. (Rubiace.).

- Baurii*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III. 1. (1895) 140. — Ins. Galap.
compacta, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. compacta*, Hochst.
deciptens, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 57. — Bras.
exserta, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. exserta*, Benth.
fastigiata, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 68. — Bras.
filifolia, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *Octodon filifolium*, Schum. et Thonn.
galapageia, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III. 1. (1895) 140. — Ins. Galap.
hispidia, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. hispidia*, Linn.
hispidia, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 62. — Bras.
inaperta, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. inaperta*, F. Muell.
Kotschyana, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 394 = *S. Kotschyana*, Oliver.
Lagurus, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 383. — Bras.
latifolia, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 61 = *S. latifolia*, Aubl.
leiophylla, K. Schum. l. c. 66. — Bras.
leucadea, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. leucadea*, Hochst.
monodon, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1890) 63. — Bras.
pacifica, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III. 1. (1895) 140. — Ins. Galap.
pogostoma, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. pogostoma*, Benth.
pygmaea, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 58. — Venez.
Runkii, K. Schum. l. c. 42. — Bras.
scabra, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 394 = *S. Ruelliae*, DC.
senensis, K. Schum. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 23; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 394 = *S. senensis*, Hiern.

BORRERIA :—

- setosa*, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *Octodon setosum*, Hiern.
stricta, K. Schum. l. c. 143 = *S. stricta*, Linn. f.
tenuissima, K. Schum. l. c. 144 = *S. tenuissima*, Hochst.
Warmingii, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 42. — Bras.
Wunschmanni, K. Schum. l. c. 53. — Bras.

BORAGINELLA, Siegesb. Fl. Petrop. (1736) 20, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 435 = **Trichodesma**, R. Br. (Borag.).

- africana*, *ambacensis*, *amplexicaulis*, *angustifolia*, *Aucherii*, *calcarata*, *Ehrenbergii*, *heliobaris*, *incana*, *indica*, *khassiana*, *latispala*, *laxiflora*, *microcalyx*, *mollis*, *stricta*, *zeylanica*, Kuntze l. c. 435-36 = *homonyma omnia* *Trichodesmatis*.
physalodes, Kuntze, l. c. = *T. physaloides*, A. DC.
Scottii, Kuntze, l. c. = *T. Scottii*, Balf. f.
trichodesma, Kuntze, l. c. = *T. calathiformis*, Hochst.

BOSCIA, Lam. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 325.

- Carsoni*, Baker, in Kew Bull. (1895) 288. — Afr. centr. austr.
coriacea, Pax, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 232; et in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 299. — Afr. trop. or.
corymbosa, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 186. — Afr. or.
Fischeri, Pax, in Engl. l. c. 186. — Afr. trop. or.
foetida, Schinz, in Abhandl. bot. Ver. Prov. Brand. xxix. (1888) 49. — Afr. austro-occ. extratrop.
grandiflora, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 186. — Afr. or.
Hildebrandtii, Gilg, l. c. — Afr. or.
Holstii, Pax, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 40; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 186. — Afr. or.
Pechuelii, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 261. — Afr. austro-occ. extratrop.
puberula, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 134. — Afr. austro-occ. extratrop.
pungens, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 186. — Afr. trop. or.
rotundifolia, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 299. — Afr. trop. or.
teitensis, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 186. — Afr. or.
variabilis, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 18 t. 1. — Burma.

BOSSIAEA, Ventenat. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 325.

- Stephensonii*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. i. (Feb. 1887) 1107. — Austral.

BOSWELLIA, Roxb. (Burserac.). — Ind. Kew. i. 325.

- campestris*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 41 nomen = *Hildebrandtii*, Engl.
Hildebrandtii, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 98. — Afr. trop. austro-or.

BOTOR, Adans. = **Psophocarpus**, Neck. (Legumin.).

- palustris*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 163 = *P. palustris*, Desv.
tetragonoloba, Kuntze, l. c. 162 = *P. tetragonolobus*, DC.

BOTHRIOCHLOA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 762. **GRAMINEAE**.

- anamitica*, Kuntze, l. c. — Anam.

BOTHRIOCHLINE, Oliver (Compos.). — Ind. Kew. i. 326.

- alternifolia*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 403. — Afr. trop. or.
cordifolia, Engl. l. c. A (1895) 110 nomen. — Afr. trop. or.
diversifolia, O. Hoffm. ex Engl. l. c. C (1895) 403. — Afr. trop. or.
laxa, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 388. — Afr. trop. et austr.

BOTHRIOCHLINE :—

- longipes*, N. E. Br. l. c. 389. — Afr. centr. bor.
marginata, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 403 (= *Vernonia marginata*, Oliver). — Afr. trop.
Meyeri, O. Hoffm. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62, et in Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 111 nomen. — Afr. trop. or.
oramballae, O. Hoffm. in Engl. l. c. C (1895) 403 M (= *Vernonia Moramballae*, Oliver et Hiern). — Afr. trop.

BOTRYANTHES, Kunth = **Muscari**, Mill. (Liliac.).

- granatensis*, Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 307 = *M. granatensis*, Freyn.
Kernerii, Nym. l. c. = *M. botryoides*, DC.
speciosus, Nym. l. c. = *M. neglectum*, Guss.
Strangwaisii, Nym. l. c. = *M. botryoides*, DC.

BOTRYOSPORA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 476. **EUPHORBIAEAE**.

- Kingii*, Hook. f. l. c. — Perak.

BOUCEROSIA, Wight et Arn. (Asclepiad.).

- Ind. Kew. i. 326.
Aaronis, H. C. Hart, Fauna and Fl. of Sinai (1891) 100, t. 4 (sphalm. *Aaronis*, in text.) — Arabia.
adenensis, Defflers, in Revue d'Égypte, (1894), ex Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 689, nomen. — Arabia.
Awdeliana, Defflers, ll. cc. nomen. — Arabia.

BOUCHEA, Cham. (Verbenac.). — Ind. Kew. i. 327.

- dissecta*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 68. — Calif.
prismatica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 502 = *Ehrenbergii*, Cham.
prismatica, Briq. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1895) 154 = *praec.*
pterygosperma, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) sphalm. = *pterygocarpa*, Schauer.

BOUCHETIA, DC. (Solan.). — Ind. Kew. i. 327.

- anomala*, Britton et Rusby, in Trans. N. Y. Acad. Sc. vii. (1887) 12 = *erecta*, DC.

BOUGAINVILLEA, Comm. (Nyctagin.). — Ind. Kew. i. 327.

- refulgens*, Bull. Catal. (1887) 9, nomen. — Bras.
spinosa, Heimerl, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b. (1889) 27 (= *Tricycla spinosa*, Cav.). — Reg. Argent.

BOURDONIA, Greene, in Erythea, i. (1893) 207

- = **Keerlia**, A. Gray (Compos.).
bellidifolia, Greene, l. c. = *K. bellidifolia*, A. Gray.
effusa, Greene, l. c. = *K. effusa*, A. Gray.

BOURNEA, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 2254. **GESNERACEAE**.

- sinensis*, Oliver, l. c. — China.

BOUTTONIA, DC. = **Periblema**, DC. (Bignon.).

- cuspidata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 483 = *P. cuspidata*, DC.

BOURRERIA, P. Br. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 327.

- Sonorae*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 62. — Calif.

BOUTELOUA, Lag. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 327.

- alamasana*, Vasey, ex Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 115. — Mexic.
americana, Scribn. in Proc. Acad. Philad. (1891) 306; Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 148 = *litigiosa*, Lag.
arenosa, Vasey, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 81 nomen; et Ill. N. Am. Grass. i. (1891) t. 34. — Mexic.
breviseta, Vasey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 58; et iii. (1894) 531. — Texas.

BOUTELOUA :—

- Fournierana*, Vasey, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 461 nomen; et ex Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 229 (= *Pentarraphis Fournierana*, Hack. et Scribn.) — Mexic.
hirta, Scribn. ex Vasey, l. c. 531 = *hirsuta*, Lag.
humilis, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889) 8 (= *Chondrosium humile*, Kunth) = *prostrata*, Lag.
major, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 10 in obs. = *oligostachya*, Torr.
microstachya, Dewey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 531 (= *Chondrosium microstachyum*, Fourn.). — Mexic., Texas.
Palmeri, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 9 in obs. = *hirsuta*, Lag.
Rahmeri, Phil. in Ann. Mus. nac. Chile (1892) 85. — Chili.
ramosa, Scribn. in Vasey, Illustr. N. Am. Grass. i. 1. (1891) t. 44. — Am. bor. austro-occ.
stolonifera, Scribn. in Proc. Acad. Philad. (1891) 306; et in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 314. — Calif.
stricta, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv (1888) 49; et in Illustr. N. Am. Grass. i. 1. (1890) t. 45. — Texas.
Triana, Scribn. in Proc. Acad. Phil. (1891) 307; et in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 314 (= *Atheropogon Triana*, Spreng.) = *B. Trianthera*, Benth.
uniflora, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 533. — Texas.
vestita, Scribn. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 531. — Texas.

BOUVARDIA, Salisb. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 328.

- Flos-Joannis*, K. Schum. ex Loes, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 621. — Mexic.
gracilis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 306. — Mexic.
Hogarthii, Hort. ex Gard. Chron. (1889) ii. 718 nomen. — Form. hort.
hybrida, Hort. ex Gartenfl. (1887) 289 t. 1248. — Form. hort.

BOWKERIA, Harv. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 328.

- cymosa*, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 390. — Transvaal.
simplicifolia, MacOwan, l. c. — Afr. austr.

BOWLESIA, Ruiz et Pav. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 328.

- axilliflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 513. — Chili.
cana, Phil. l. c. 510. — Chili.
cirrosa, Phil. l. c. 699. — Chili.
digitata, Phil. l. c. — Chili.
dumetorum, Phil. l. c. 514 (err. cal. ? *dumetorum*). — Chili.
glandulosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = *oppositifolia*, Buch.
Mandoni, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 41. — Bolivia.
Reichei, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 512. — Chili.

BOYKINIA, Nutt. (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 329.

- clata*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 183 = *occidentalis*, Torr. et Gray.
Jamesii, Engl. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a. (1890) 51 (= *Saxifraga Jamesii*, Torr.). — Am. bor. oc.
lycoctonifolia, Engl. l. c. (= *Sax. lycoctonifolia*, Maxim.). — As. or.
Nuttalli, Macoun. Canad. Board of Sc. (July 1895) extr. = *occidentalis*, Torr. et Gray.
ranunculifolia, Greene, Fl. Francisc. (1891) 190 = *Saxifraga ranunculifolia*, Hook.

BRACHIONIDIUM, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 329.

- Sherringii*, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 4. — Ins. Grenada.

- BRACEA**, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1898) ii. 101. *OLACINEAE*. paniculata, King, l. c. — Perak.
- BRACHISTUS**, Miens (Solan.). — Ind. Kew. i. 329. escuintlensis, Coult. in *J. D. Smith, Pl. Guat.* ii. (1891) 53; et *Bot. Gaz.* xvi. (1891) 144. — Guatem. Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 159. — Mexic.
- BRACHYACHAENIUM**, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 330. *COMPOSITAE*. incanum, Baker, l. c. t. 53. — Madag.
- BRACHYACTIS**, Ledeb. (Compos.). — Ind. Kew. i. 329. chinensis, Bur. et Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 69. — Tibet. linearifolia, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 123. — Mongolia.
- BRACHYCHAETA**, Torr. et Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 329. sphacelata, Britton, ex Kearn. in *Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 484 = cordata, Torr. et Gray. sphacelata, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 58 = praec.
- BRACHYCHILUM**, O. G. Petersen, in Bot. Tidskr. (1893) 262. *SCITAMINEAE*. Horsfieldii, O. G. Petersen, l. c. t. 17; Baker, in *Gard. Chron.* (1894) i. 652 (= *Hedychium Horsfieldii*, R. Br.). — Java.
- BRACHYCHITON**, Schott et Endl. = *Sterculia*, Linn. (Stercul.). *Carruthersii*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Aug. 1886) 50. — N. Guin. *rupestris*, K. Schum. in *Engl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 96. = *S. rupestris*, Lindl.
- BRACHYCOME**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 330. cuneifolia, Tate, in *Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xi. (1889) 83. — Austral. hispida, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 108. — Bolivia.
- BRACHYCORYTHIS**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 330. Engleriana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895). — 20. — Kamerun.
- BRACHYELYTRUM**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 330. africanum, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 382. — Transvaal. aristosum, Trelease, Branner et Coville, in *Branner, Rep. Geol. Surv. Ark.* iv. 1888 (1891) 235 = erectum, Beauv.
- BRACHYLOPHON**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1566. *MALPIGHIACEAE*. Curtisii, Oliver, l. c. — Penang. Hulletti, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 196. — Malacca. Scortechini, King, l. c. 197. — Perak.
- BRACHYOTUM**, Triana (Melastom.). — Ind. Kew. i. 331. alpinum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 167. — Ecuad. Andreanum, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 938. — Ecuad. Barbeyanum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 148. — Peruvia. Grisebachii, Cogn. l. c. 153. — Peruvia. Lindenii, Cogn. l. c. 159. — N. Gran. Maximowiczii, Cogn. l. c. 154. — Bolivia. rotundifolium, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 937. — Ecuad. Trianaei, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 167. — Peruvia.
- BRACHYPODIUM**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 331. andinum, Hack. ex Sodiro, *Gram. Ecuator. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 10 nomen. — Ecuad.
- BRACHYPODIUM** : — *glaucoirens*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 22 = *sylvaticum*, Huds. *multiflorum*, K. Schum. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 58; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 100 = *Bromus russorensis*, K. Schum. *ponticum*, Velen. in *Sitz. Bochn. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 71. — As. Min. *pubescens*, K. Schum. ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 128 = *Bromus russoriensis*, K. Schum. *Quartinianum*, Hack. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 137 (= *Festuca Quartiniana*, A. Rich.). — Abyss. *Wattii*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 90. — Reg. Himal.
- BRACHYSIPHON**, A. Juss. = *Sarcocolla*, Linn. (Penaeac.). *fucata*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 520; et in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1894) 212 = *S. fucata*, Endl.
- BRACHYSTEGIA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 332. Boehmii, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 197. — Afr. or. Fischeri, Taub. l. c. ; et in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 387. — Afr. or. flagristipulata, Taub. l. c. 198. — Afr. or. itoliensis, Taub. l. c. 197; et in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 387. — Afr. or. Oliveri, Taub. l. c. 97. — Afr. or. stipulacea, Taub. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 387. — Afr. trop. Welwitschii, Taub. l. c. — Angola.
- BRACHYSTELMA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 332. Buchanani, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 263. — Afr. trop. austro-or. caffrum, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 62. — Afr. austr. caffrum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 13. — Afr. austr. caudatum, N. E. Br. ex K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1891) 268 = *crispum*, R. Gr. edulis, Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 89 t. 14. — Burma. eiranthum, « Schlechter » ex K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1891) 268 sphalm. = oianthum, Schlechter. euphorbioides, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 149. — Afr. centr. bor. foetidum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 52. — Afr. austr. keniense, Schweinf. in *Hoehnel, zum Rudolph See, Append.* (1893) 8; et in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 344. — Afr. trop. or. magicum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 263. — Afr. centr. or. occidentale, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 53. — Afr. austr. oianthum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 53. — Afr. austr. phyteumoides, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 149. — Afr. centr. bor. pulchellum, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 53 (= *Micrastrer pulchellus*, Haw.) — Afr. austr. Schoenlandianum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45. (1894) 35. — Afr. austr. shirens, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 339 = Buchanani, N. E. Br.
- BRACHYSTELMARIA**, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51. (1895) 50. *ASCLEPIADEAE*. Gerrardi, Schlechter, l. c. 50. — Afr. austr. longifolia, Schlechter, l. c. — Afr. austr. macropetala, Schlechter, l. c. 51. — Afr. austr. natalensis, Schlechter, l. c. 50. — Afr. austr. ramosissima, Schlechter, l. c. — Afr. austr.
- BRACHYSTEPHANUS**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 332. africanus, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 31. — Afr. trop. austro-or.
- BRACHYSTEPHANUS** : — *cuspidatus*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 339. — Madag. Holstii, Lindau, in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 69; et in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 53. — Afr. trop. or. jaundensis, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 125. — Kamerun. longiflorus, Lindau, l. c. xx. (1894) 53; et in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 344. — Afr. trop. occ. occidentalis, Lindau, ll. cc. — Ins. S. Thom. yaudensis, Lindau, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 344. = jaundensis, Lindau.
- BRACKENRIDGEA**, A. Gray (Ochnac.). — Ind. Kew. i. 332. Hookerii, Gilg, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 143 (= *Gomphia Hookerii*, Planch.). — Penang.
- BRADBURYA**, Rafin. = *Centrosema*, Benth. (Legumin.). *angustifolia*, arenaria, bifida, bracteosa, brasiliana, conjugata, coriacea, dasyantha, fasciculata, ferruginea, grandiflora, heptaphylla, macrocarpa, pascuorum platycarpa, Plumieri, pubescens, rotundifolia, sinuata, venosa, vetula, vexillata, virginium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 164 = *homonyma omnia* *Centrosema*. *acutifolia*, Kuntze, l. c. = *Centrosema brasilianum*, Benth. *biflora*, Kuntze, l. c. = *C. virginianum*, Benth. *decumbens*, Kuntze, l. c. = *C. virginianum*, Benth. *dubia*, Kuntze, l. c. = *C. hastatum*, Benth. *glabra*, Kuntze, l. c. = *C. coriaceum*, Benth. *insulana*, Kuntze, l. c. = *C. brasilianum*, Benth. *longifolia*, Kuntze, l. c. = *C. angustifolium*, Benth. *oblonga*, Kuntze, l. c. = *C. coriaceum*, Benth. *triquetra*, Kuntze, l. c. = *C. triquetrum*, Benth. fide Kuntze.
- BRADLEYA**, Vell. = *Amphyrrhox*, Spreng. (Violar.). *latifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 40 = *A. latifolia*, Mart. *longifolia*, Kuntze, l. c. = *A. longifolia*, Spreng. *surinamensis*, Kuntze, l. c. = *A. surinamensis*, Eichl.
- BRADSHAWIA**, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II.* vi. (May, 1892) 473 = *Rhamphicarpa*, Benth. (Scrophul.). *macrosiphonia*, F. Muell. l. c. = *R. macrosiphonia*, F. Muell.
- BRAGANTIA**, Lour. (Aristol.). — Ind. Kew. i. 333. Dalzellii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 73. — Ind. or.
- BRAHEA**, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. i. 333. filifera, Hort. ex W. Wats. in *Kew Bull.* (1889) 296 = *Washingtonia filifera*, H. Wendl.
- BRAMIA**, Lour. = *Herpestis*, Gaertn. f. (Scrophul.). *Monniera*, Drake, *Fl. Polyn. franç.* (1892) 142 = *Gratiola Monniera*, Linn.
- BRANDEGEEA**, Cogn. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1890) 58. *CUCURBITACEAE*. Bigelovii, Cogn. l. c. 58 (= *Elaterium Bigelovii*, S. Wats.). — Colorado. monosperma, Cogn. l. c. 59 (= *Cyclanthera monosperma*, Brandeg.). — Calif.
- BRANDISIA**, Hook. f. et Thoms. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 333. racemosa, Hemsl. in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2383, et in *Kew Bull.* (1895) 114. — China.
- BRASENIA**, Schreb. (Nymphaeaceae). — Ind. Kew. i. 333. pelta, « Pers. » ex Casp. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2. (1886) 6 sphalm. = peltata, Pers.

BRASILETTIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 164 = **Peltophorum**, Walp. (Legumin.).
adnata, Kuntze, l. c. = *P. adnatum*, Griseb.
africana, Kuntze, l. c. = *P. africanum*, Sond.
brasiliensis, Kuntze, l. c. = *P. Linnaei*, Benth.
dasyrachis, Kuntze, l. c. = *P. dasyrachis*, Kurz.
dubia, Kuntze, l. c. = *P. Vogelianum*, Walp.
ferruginea, Kuntze, l. c. = *P. ferrugineum*, Benth.

BRASSAIOPSIS, Decne et Planch. (Araliac.). — Ind. Kew. i. 334.
glomerulata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = *glomerulata*, Regel.

BRASSAVOLA, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 342.
stricta, Hort. ex Gard. Chron. (1885) i. 501 et 505 fig. 92; et (1889) ii. 355. — Form. hort.

BRASSIA, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 334.
bicolor, Rolfe, in *Lindleyana*, viii. (1892) 87 t. 378. — Peruvia.
Leursii, Rolfe, in *Orchid Review*, i. (1893) 149. — Hab.?

BRASSICA, (Tourn.) Linn. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 334.
acris, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 17, 19 = *Diplo-taxis Sieberi*, Presl.
amplexicaulis, Batt. in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie* (Dicot.) (1888) 59. — Alger.
angustifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 20 = *frutescens*, Soland.?
arvensis, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 164; et Rev. Gen. (1891) 19 = *B. Sinapistrum*, Boiss.
aurasiaca, Coss. et Kralik, ex Coss. *Illustr. fl. Atlant.* i. 31 t. 22; et *Comp. fl. Atlant.* ii. (1887) 199. — Algeria.
Bourgeau, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 20. — Ins. Canar.
Dianae, Lacaita, ex Willk. *Suppl. Prod. fl. Hisp.* (1893) 309. in syn. = *Diplo-taxis maritima*, Rouy.
erucastroides, Stäpf, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 36. — Persia.
erucodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 17 = *Diplo-taxis erucoides*, DC.
frutescens, Kuntze, l. c. 20 = *frutescens*, Soland.?
glaucia, Kuntze, l. c. — Ins. Canar.
griquensis, N. E. Br. in *Kew. Bull.* (1894) 353. — Afr. austr.
juncea, Czern. ex Palibin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 109 = *juncea*, Coss.
lasiocalycina, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 66 (= *Erucastrum lasiocalycinum*, Boiss.). — As. Min.
Munbyana, Coss. et Durieu, ex Coss. *Comp. fl. Atlant.* ii. (1887) 199 in syn. = *setulosa*, Coss.
palmensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 20. — Ins. Palma.
Persoonii, Rouy et Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 51 = *sinapoides*, Roth.
radicata, Batt. in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie* (Dicot.) (1888) 59 = *fruticulosa*, Cyril.
Richeri, St-Lager, in Cariot, *Étude des fl.* éd. 8, ii. (1889) 54 = *Richeri*, Vill.
rupestris, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 20. — Ins. Mader.
setulosa, Coss. *Illustr. fl. Atlant.* i. 32 t. 23; et *Comp. fl. Atlant.* ii. (1887) 199. — Algeria.
Souliei, Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 262. — Algeria.
turgida, Rouy et Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 51 = *sinapoides*, Roth.
Vogelii, Kuntze, Rev. Gen. (1890) 20. — Ins. Cap. Virid.

BRASSO-CATTLEYA ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 78; et (1890) ii. 241. **ORCHIDEAE**.
Lindleyana ×, Rolfe, li. cc. (= *Laelia Lindleyana*, Veitch.). — Hybr. artef.

BRAUNERIA, Neck. = **Echinacea**, Moench (Composit.).
pallida, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 334. = *E. angustifolia*, DC.
purpurea, Britton, l. c. 334 = *E. purpurea*, Moench.

BRAVAISIA, DC. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 336.
tubiflora, Hemsl. in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1516; et *Biol. Centr.-Am.* iv. (1886) 106. — Ins. Cozumel (Yucatan).

BRAVOA, Lex. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 336.
densiflora, Robins. et Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 122. — Mexic.
singuliflora, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 479. — Mexic.

BRAYA, Sternb. et Hoppe (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 336.
pectinata, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 69. — Calif.
rubicunda, Franch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxiii. (1889) 403. — China occ.
sinensis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1892) 303. — China occ.
sinuata, Maxim. *Fl. Tangut.* (1889) 69 t. 28 fig. 24. 33. — Tibet.

BRAZZEIA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 609. **TILIACEAE**.
congoensis, Baill. l. c. — Congo gall.
Tholloni, Baill. l. c. ii. (1890) 868. — Congo gall.

BREDEMEYERA, Willd. (Polygal.). — Ind. Kew. i. 327.
Autrani, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 171. — Bras.
Barbeyana, Chod. l. c. 183. — Bras.
confusa, Chod. l. c. — Bras.
Huberiana, Chod. l. c. 172. — Bras.
Isabelliana, Barb. Rody. in *Vellozia*, i. (1885-8) Sec. edic. (1891) 5 t. 4. b. — Bras.

BREDIA, Blume (Melastom.). — Ind. Kew. i. 337.
quadrangularis, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 473. — China.

BREVOORTIA, Wood (Liliac.). — Ind. Kew. i. 337.
venusta, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 230 = *Brodiaea venusta*, Greene.

BREWERIA, R. Br. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 337.
angustifolia, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 155. — Florida.
argentea, Terrac. in *Ann. Ist. bot. Roma*, v. (1894) 104. — Afr. or.
baccharoides, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 68. — Zambesia.
buddleioides, Baker, l. c. 69. — Afr. trop. or.
campanulata, Baker, l. c. 68. — Gabon.
campanulata, K. Schum. ex Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 92 (= *Prevostea campanulata*, K. Schum.). — Afr. trop.
Codonanthus, Baker, ex Oliver, in *Hook. f. Icon. pl.* xxiii. (1894) sub t. 2276 in obs. (= *Prevostea africana*, Benth.). — Afr. trop.
conglomerata, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 68. — Angola.
densiflora, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 336. — Madag.
Heudelotii, Baker, ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2276; et in *Kew Bull.* (1894) 68. — Afr. trop. occ.
latifolia, Terrac. in *Ann. Ist. bot. Roma*, v. (1894) 104 (= *Seddera latifolia*, Hochst. et Steud.). — Afr. trop. or.
microcephala, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 68. — Angola.
mirabilis, Baker, ex Oliver, in *Hook. f. Icon. pl.* xxiii. sub t. 2276 in obs. — Gabon.
montevideensis, Peter, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1891) 16. — Reg. Argent.
rotundifolia, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 281. — Mexic.
semidigyna, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 440 = *cordata*, Blume.
sessiliflora, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 68. — Zambesia.
suffruticosa, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 275. — Afr. austro-occ. extratrop.
tenella, Peter, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1891) 16. — Georg., Florida.

BREWERIA : —
tiliaefolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 508. — Madag.
villosa, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 154. — Florida.

BREYNIA, Forst. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 337.
angustifolia, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 330. — Ind. or.
coronata, Hook. f. l. c. — Perak.
officinalis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1894) 427. — China.
reclinata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 331. — As. trop.
vestita, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 354. — Oceania.

BRICKELLIA, Ell. (Compos.). — Ind. Kew. i. 338.
brachiata, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 431 nomen. — Mexic.
cuspidata, A. Gray, l. c. xxii. (1887) 421. — Mexic.
desertorum, Coville, in *Proc. Biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 68 (= *Coleosanthus desertorum*, Coville). — Am. bor. occ.
glutinosa, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 385. — Mexic.
Knappiana, E. C. Drew, in *Greene, Pittonia*, i. (Oct. 1888) 260. — Calif.
lanciifolia, Robins. et Greenm. in *Am. Journ. Sc.* Ser. III. i. (1895) 152. — Mexic.
nutans, Robins. et Greenm. l. c. — Mexic.
orizabensis, Klatt, in *Annal. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 358. — Mexic.
pacayensis, Coult. *Bot. Gaz.* xvi. (1891) 98 (= *Coleosanthus pacayensis*, Coult.) — Guatem.
rhomboidea, Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 103. — Calif.
solidaginifolia, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 306. — Mexic.
squarrosa, Robins. et Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 108. — Mexic.

BRIDELIA, Willd. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 338.
burmanica, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 269. — Burma.
cinnamomea, Hook. f. l. c. 273. — Perak.
Curtisii, Hook. f. l. c. — Penang.
Fischeri, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 53. — Afr. trop. or.
Fordii, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1894) 419. — China.
Griffithii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 272. — Ind. or.
Kurzii, Hook. f. l. c. — Ins. Nicob.
minutiflora, Hook. f. l. c. 273. — As. trop. insul.
parvifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 594. — Anam.
penangiana, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 272. — Penang.
pustulata, Hook. f. l. c. 271. — Malacca.
rufa, Hook. f. l. c. 273. — Penang.
scleroneuroides, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 532. — Afr. centr. bor.
taitensis, Vathe et Pax, ex Pax, l. c. 531. — Afr. trop. or.
zanzibarensis, Vathe et Pax, l. c. 530. — Zanzib.

BRILLANTAISIA, Beauv. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 339.
anomala, Lindau, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 366; et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 296. — Afr. trop. or.
cicatricosa, Lindau, in *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 4. — Afr. trop. or.
Emini, Lindau, l. c. xvii (1893) 103. — Afr. centr. or.
lanciifolia, Lindau, l. c. 98. — Afr. trop. or.
madagascariensis, T. Anders, ex Lindau, l. c. xvii. 103. — Madag.
Molleri, Lindau, l. c. 99. — Ins. S. Thom.
nitens, Lindau, l. c. 102. — Afr. trop. occ.
Palisotii, Lindau, l. c. 99. — Afr. trop.
Preussii, Lindau, l. c. 100. — Kamerun.
salviflora, Lindau, l. c. 101; et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1895) 296. — Afr. trop. occ.

BRILLANTAISIA : —

Schumanniana, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 102. — Kamerun.
 Soyauxii, Lindau, l. c. 101. — Gabon.
 spicata, Lindau, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 50 et 54; et in Bot. Jahrb. xx. (1894) 4. — Afr. trop. or.
 ulugurica, Lindau, in Engl. Pflanzenfam. Ost-Afr. A (1895) 91 nomen; et l. c. xxii. (1895) 112. — Afr. trop. or.
 verruculosa, Lindau, l. c. 113. — Kamerun.

BRINTONIA, Greene, in Erythea, iii. (1895) 89 = **Solidago**, Vaill. (Compos.).
 discoidea, Greene, l. c. = S. discoidea, Torr. et Gray.

BRITOA, Berg = **Campomanesia**, Ruiz et Pav. (Rubiace.).
 Glasioviana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 6. — Bras.
 Langsdorffii, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1892) 74 (= *Acrandra Langsdorffii*, Berg, fide Kuntze). — Bras.
 Lundiana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 7. — Bras.

BRITTENIA, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië i. ii. (1890) 515; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 519. **MELASTOMACEAE**.
 subacaulis, Cogn. l. c. — Borneo.

BRITTONAMRA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 164 = **Cracca**, Benth. (Legumin.).
 caribaea, Kuntze, l. c. = C. caribaea, Benth.
 sericea, Kearns, in Trans. N. Y. Acad. Sc. xiv. (1894) 32 = C. sericea, A. Gray.

BRITTONELLA, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club. xx. (1893) 429. **MALPIGHIACEAE**.
 pilosa, Rusby, l. c. 430 t. 147. — Bolivia.

BRITTONIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 173 sphalm. = **BRISSONIA**, Neck. = **Indigofera**, Linn. (Legumin.).

BRIZA, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 339.
 gracilis, Hort. ex Kew Bull. (1892) Append. i. 4. — (Quid?).

BRIZOPYRUM, J. Presl = **Distichlis**, Rafin. (Gramin.).
 uninervium, Fourn. Gramin. Mexic. 1881 (1886) 121 = *Eragrostis uninervia*, Steud.

BROCCHIA, Vis. = **Cotula**, Linn. (Compos.).
 cinerea, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1890) 467 (= *B. cinerea*, Vis.) = *C. cinerea*, Delile.

BROCCHINIA, Schult. f. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 339.
 Andreana, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 88 = *cordylinoides*, Baker.
 demerarensis, X, Hort. ex Baker, l. c. = *cordylinoides*, Baker.

BROCCHONEURA, Warb. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44 nomen; et in Engl. Pflanzenfam. Ost-Afr. C (1895) 179. **MYRISTICACEAE**.
 pterocarpa, Warb. in Ber. Deutsch. bot. Ges. xiii. (1895) [89]. — Afr. trop.
 usambarensis, Warb. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44; et in Engl. Pflanzenfam. Ost-Afr. C (1895) 180. — Afr. trop. or.

BRODIAEA, Sm. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 340.
 bivalvis, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 224 (= *Milla bivalvis*, Baker). — Chili.
 Bridgesii, S. Wats. in Gard. and For. i. (1888) 125. — Calif.
 Hendersoni, Howell, ex Greene, Pittonia, i. (Feb. 1888) 164. — Oregon.
 Hendersoni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1888) 366 = *praeac*.
 Ida Maia, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 250 = *Brevoortia Ida-Maia*, Wood.

BRODIAEA : —

insularis, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. (1886) 134. — Am. bor. austro-occ.
 Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 78. — Calif.
 Poeppigiana, Kurtz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1894) 112 = *Milla Poeppigiana*, Baker.
 porrifolia, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 225 = *Milla porrifolia*, Baker.
 pulchella, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. (1886) 133 = *congesta*, Sm.
 sessilis, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 225 = *Milla sessiliflora*, Baker.
 uniflora, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1887) 57 = *Milla uniflora*, R. Grah.
 venusta, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 250 (= *Brevoortia venusta*, Greene). — Calif.

BROMELIA, (Plum.) Linn. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 340.

argentina, Baker, in Kew Bull. (1892) 194; et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 2228. — Reg. Argent.
 Balansae, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 181. — Parag.
 Desmetiana, Hort. ex Baker, in Bot. Mag. (1894) sub t. 7340 in syn. = *Dyckia Desmetiana*, Baker.
 Hieronymi, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 199. — Reg. Argent.
 Lagopus, Mez, l. c. 188 (= *Karatas Lagopus*, Ed. Morr.). — Panam.
 Legrellae, Mez, l. c. 179 = *Karatas Legrellae*, Ed. Morr.
 Lindmani, Mez, l. c. (1894) 621. — Bras.
 macrodosa, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 24 in syn. = *Ananas macrodotes*, Ed. Morr.
 Moensii, (sphalm. ? *Moensis*) Ed. Morr. ex Baker, l. c. 14 = *Distacanthus Morrenianus*, Baker.
 Morreniana, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 186 = *Distacanthus Morrenianus*, Baker.
 Poeppigii, Mez, l. c. 188. — Peruvia.
 Regnelli, Mez, l. c. 194. — Bras.
 reversacantha, Mez, l. c. 198. — Bras.
 sylvicola, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 490. — Bras.
 undulata, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 23 in syn. = *Ananas macradontes*, Ed. Morr.

BROMHEADIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 340.

alticola, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 338 t. 42. — Penins. Mal.
 rigida, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1893) 239. — Borneo.
 sylvestris, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 337. — Penins. Mal.

BROMUS, Dill. ex Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 341.

adjaricus, Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 51. — Reg. Cauc.
 barcensis, Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 584 = *erectus*, Linn.
 Benkeni, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. (1890) 107 = *asper*, Murr.
 demissus, Porta, in Nuov. Giorn. bot. Ital. xix. (1887) 328. — Ins. Balear.
 eburonensis, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 117 = *arduennensis*, Dumort.
 hannoveranus, X, C. Richt. l. c. — Germ.
 interruptus, G. C. Druce, in Journ. Bot. xxxii. (1895) 344. — Brit.
 Macounii, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48. — Ins. Vancouv.
 macrantherus, Hack. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiv. (1887) 395 in obs. = *rigidus*, Roth.
 macrantherus, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Monoc.) (1895) 226 = *praeac*.
 milanjanus, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 59. — Afr. trop. austro-or.
 nutans, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 945 = *tectorum*, Linn.
 Porteri, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 512. — Am. bor.
 Pumpelli, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 9 xylogr. = *Pumpellianus*, Scribn.
 Pumpellianus, Scribn. l. c. 9 t. 76, fig. d. — Am. bor. occ.

BROMUS : —

runssoroensis, K. Schum. in Engl. Pflanzenfam. Ost-Afr. C (1895) 116. — Afr. trop. or.
 scaberrimus, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 946 = *sterilis*, Linn.
 splendens, Velen. in Sitz. boehm. Ges. Wiss. (1886) 46 sep. ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. n. i. (1889) 337 = *arvensis*, Linn.
 tunetanus, Hack. ex Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Monoc.) (1895) 228 = *mollis*, Linn.

BRONGNIARTIA, H. B. et K. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 344.

inconstans, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 404. — Mexic.
 lupinoides, Taub. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 613 = *Peraltea lupinoides*, Kunth.
 nudiflora, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 146. — Mexic.
 Palmeri, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 97. — Mexic.

BROOKEA, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 444.

albicans, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 211. — Borneo.

BROSIMOPSIS, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 473. — **URTICEAE**.
 lactescens, S. Moore, l. c. t. 31. — Bras.

BROSIMUM, Sw. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 344.
 glaucum, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 4. — Bras.
 Glaziovii, Taub. l. c. 3. — Bras.
 rubescens, Taub. l. c. — Bras.

BROSSEA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 387 = **BROS-SAEAE**, Plum. = **Gaultheria**, Kalm (Ericac.).
acuminata, *adenolhris*, *anastomosans*, *antarctica*, *brachybotrys*, *bracteata*, *buxifolia*, *caespitosa*, *candida*, *conferta*, *crenulata*, *elliptica*, *erecta*, *fagifolia*, *ferruginea*, *foliolosa*, *formosa*, *fragrantissima*, *glabra*, *glaucifolia*, *Griffithiana*, *hirtiflora*, *hispida*, *insipida*, *lanceolata*, *lanigera*, *leucocarpa*, *Lindeniana*, *loxensis*, *microphylla*, *mucronata*, *nitida*, *odorata*, *oppositifolia*, *organensis*, *ovata*, *pichinchensis*, *Poeppigii*, *procumbens*, *purpurascens*, *ramosissima*, *reticulata*, *rigida*, *Roraimae*, *rufescens*, *rustebris*, *scabra*, *secunda*, *Shallon*, *strigosa*, *tomentosa*, *trichocalycina*, *trichophylla*, *triquetra*, *venusta* et *vestita*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 387 = *homonyma omnia Gaultheriae*.
antipoda, Kuntze, l. c. = *G. microphylla*, Hook. f.
bandongensis, Kuntze, l. c. = *G. leucocarpa*, Blume.
nummularioides, Kuntze, l. c. = *G. nummularioides*, D. Don.
Philippiana, Kuntze, l. c. = *G. mucronata*, Phil.
pyrolifolia, Kuntze, l. c. = *G. pyrolaeifolia*, Hook. f.
pyrolodes, Kuntze, l. c. = *G. pyrolaeifolia*, Hook. f.
scabra, Kuntze, l. c. = *G. odorata*, Willd.

BROTEROA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 322 = **BRO-TERA**, Willd. = **Cardopatum**, Juss. (Compos.).
amethystina, Kuntze, l. c. = *C. amethystinum*, Spach.
atractyloides, Kuntze, l. c. = *C. atractyloides*, Winkl.
Boryi, Kuntze, l. c. = *C. Boryi*, Spach.

BROUGHTONIA, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 344.

domingensis, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 491 (= *Cattleya domingensis*, Lindl.). — Ind. occ.
 fusca, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 844 = *Otocilus fusca*, Lindl.
 linearis, Wall. ex Hook. f. l. c. 836 = *Coelogyne ovalis*, Lindl.
 pendula, Wall. ex Hook. f. l. c. 843 = *Coel. alba*, Lindl.

BROUSEMICHEA, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 163. **GRAMINEAE**.
 seslerioides, Balansa l. c. — Tonkin.

BROUSSONETIA, L'Hérit. (Urticac.). — Ind. Kew. i. 344.

Kasii, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 17 = *papyriferia*, Vent.

- BROWNEA**, Jacq. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 344.
Crawfordii, $\times$ W. Wats. in Gard. Chron. (1891) i. 398. — Hybr. artef.
- BROWNLEEIA**, Harv. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 345.
Galpini, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. i. (1893) t. 42. — Afr. austr.
madagascavica, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 126 = *coerulea*, Harv.
monophylla, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 18 = *caerulea*, Harv.
- BROWNLOWIA**, Roxb. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. — 345.
lepidota, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 200. — Oceania.
- BRUCEA**, J. S. Mill. (Simarub.). — Ind. Kew. i. 345.
tenuifolia, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44; et *Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 12 nomen. — Afr. trop. or.
- BRUGMANSIA**, Pers. = **Datura**, Linn. (Solanac.).
aurca, Lagerh. in Gartenfl. (1893) 33. — Ecuad.
chlovantha, Hort. ex Garden (1894) 528 = *D. arboorea*, Linn.
cornigera, Lagerh. in Bot. Jahrb. xx. (1895) 663 = *D. cornigera*, Hook.
dolichocarpa, Lagerh. l. c. 665. — Ecuad.
longifolia, Lagerh. l. c. 666. — Ecuad.
versicolor, Lagerh. l. c. — Ecuad.
- BRUNELLA**, Tourn. ex Linn. = **Prunella**, Linn. (Labiata).
bicolor $\times$, G. Beck, in Oest. Bot. Zeitschr. (1890) 237. — Eur. centr.
capitellata, G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 146 = *P. vulgaris*, Linn.
clatior $\times$, G. Beck, l. c. Bosnia.
integerrima, G. Beck, l. c. = *P. laciniata*, Linn.
spuria $\times$, Stapf, in Kern. Sched. fl. Austro-Hung. iv. (1886) 69. — Austria.
vulgaris, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1892) 293 (= *B. vulgaris*, Benth.). = *P. vulgaris*, Linn.
- BRUNELLIA**, Ruiz et Pav. (Simarub.). — Ind. Kew. i. 345.
boliviana, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. iii. (1893) 13. — Bolivia.
integrifolia, Szyszyl. in Diss. math.-nat. Acad. litt. Cracov. xxvii. (1894) 141. — Venez.
Oliverii, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 160. — Bolivia.
Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 317. — N. Gran.
- BRUNSVIGIA**, Heist. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 346.
Banksiana, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 253 = *Slateriana* Benth. et Hook. f.
Kirkii, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 99. — Afr. trop. or.
Massaiana, L. Lind. et Rodigas, in Illustr. Hort. xxiv. (1887) 55 t. 19 = *Crinum Massaianum*, N. E. Br.
- BRYA**, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 347.
amorphoides, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 406 (= *Aeschynomene amorphoides*, Rose). — Mexic.
- BRYANTHUS**, S. G. Gmel. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 347.
coeruleus Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 385 = *taxifolius*, A. Gray.
- BRYODES**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 347.
minutissima, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 503. — Chili.
- BRYONIA**, Linn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 347.
marmorata, E. Petit, in Bot. Tidskr. xvii. (1889) 242. — Cors.
- BRYONIA** : —
monoica, Aitch. et Hemsl., in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 65. — Turkest.
- BRYPHYLLUM**, Salisb. (Crassul.). — Ind. Kew. i. 348.
pinnatum, Aschers. et Schweinf. Illustr. fl. Egypte, ex Mém. Inst. égypt. ii. (1887) 79 = *calycinum*, Salisb.
rubellum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 314. — Madag.
- BUCEPHALON**, Linn. = **Trophis** Linn. (Urtic.).
glabratum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 624 = *T. glabrata*, Liebm.
mexicanum, Kuntze, l. c. = *T. mexicana*, Bur.
- BUCEPHALOPHORA**, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 24 = **Rumex**, Linn. (Polygon.).
aculeata, Pau, l. c. = *R. bucephalophorus*, Linn.
- BUCERAS**, P. Br. = **Terminalia**, Linn. (Combretac.).
angustifolia, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 85 = *T. Bucas*, Wright.
Catapappa, Hitchc. l. c. = *T. Catappa*, Linn.
- BUCHANANIA**, Spreng. (Anacard.). — Ind. Kew. i. 349.
novo-guineensis, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 363. — Oceania.
- BUCHENROEDERA**, Eckl. et Zeyh. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 349.
lotononoides, S. Elliot, in Journ. Bot. xxix. (1891) 68. — Afr. austr.
- BUCHHOLZIA**, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 335. **CAPPARIDEAE**.
coriacea, Engl. l. c. — Kamerun.
macrophylla, Pax, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 232, et in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 300. — Gabon.
Tholloniana, Hua, in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 78. — Afr. trop. occ.
- BUCHNERA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. angolensis, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 70. — Angola.
Bragaana, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 360. (err. cal. ? *Bragaana*, loc. cit. ad calc.) — Afr. trop. or.
Browniana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 195. — Afr. austro-occ. extratrop.
Buettneri, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 72. — Afr. trop. occ.
ciliolata, Engl. l. c. 69. — Angola.
Henriquesii, Engl. l. c. — Angola.
Klingii, Engl. l. c. — Afr. trop. occ.
Lastii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 359. — Afr. trop. or.
longespicata, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 193. — Afr. austro-occ. extratrop.
multicaulis, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 69. — Angola, Congo.
Poggei, Engl. l. c. — Angola.
quadrifaria, Baker, in Kew Bull. (1895) 71. — Afr. centr. or.
quangensis, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 71. — Congo mer.
Reissiana, Buettner, ex Engl. l. c. 68 in obs. — Hab. ?
splendens, Engl. l. c. 71. — Angola.
subcapitata, Engl. l. c. — Angola.
Welwitschii, Engl. l. c. 70. — Angola.
- BUCHNERODENDRON**, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 161. **BIXINEAE**.
speciosum, Gürke, l. c. — Congo.
- BUDA**, Adans. = **Spergularia**, C. et J. Presl (Caryoph.).
borealis, S. Wats. in A. Gray, Man. Bot. N. Am. Stat. ed. vi. (1890) 90 = *S. rubra*, J. et C. Presl.
diandra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 50 = *S. diandra*, Boiss.
macrotheca, Kuntze, l. c. = *S. macrotheca*, Horn.
platensis, Kuntze, l. c. = *S. platensis*, Camb.
- BUDA** : —
rupestris, F. Hanb. Lond. Cat. Pl. ed. ix. 12 = *S. rupestris*, Guss.
- BUDDLEIA**, Houst. ex Linn. (Loganiac.). — Ind. Kew. i. 351.
albiflora, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 118. — China.
andina, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 222. — Bolivia.
chapelana, Robins. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 169. — Mexic.
cuspidata, Baker, in Kew Bull. (1895) 113. — Madag.
Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 65. — China.
Geisseana, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 111 (Buddleja). — Chili.
Glaziovii, Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 514. — Bras.
insignis, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 154 = *Lindleyana*, Fortune.
japonica, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 119 in obs. — Japon.
Nettoana, Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 514. — Bras.
pulchella, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 389. — Afr. austr.
salicifolia, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 153 = *Lindleyana*, Fortune.
speciosissima, Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 513. — Bras.
sphaerocalyx, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 505. — Madag.
Szyszyłowiczii, A. Zahlbr. in Ann. naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 6. — Peruvia.
usambarensis, Gilg, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 40 et 63 nomen; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 313. — Afr. trop. or.
utahensis, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 69; et in Contr. U. S. Nat. Herb. iv. (1895) 149 t. 12. — Calif.
variabilis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 120. — China.
Wrightii, Robins. in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 341. — Mexic.
- BUECHNERA**, « Linn. » ex Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1891) 94 sphalm. = **Buchnera**, Linn. (Scrophul.).
- BUETTNERIA**, Loefl. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 352.
amazonica, Poepp. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 92 = *catalpaefolia*, Jacq.
bauhinioides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 451 (Byttneria). — Madag.
benensis, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 155. — Bolivia.
Beyrichiana, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 96. — Bras.
boliviana, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 155. — Bolivia.
campestris, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 318 (Byttneria). — Bras.
charagmocarpha, S. Moore, l. c. 320 (Byttneria). — Bras.
coriacea, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 156. — Bolivia.
Curtisii, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1761. — Penang.
filipes, Mart. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 95. — Bras.
fruticosa, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 33; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 271. — Afr. trop. or.
glabra, Mart. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 94 in obs. (sp. dub.). — Bras.
Leesoni, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 319 (Byttneria). — Bras.
Martiana, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 94. — Bras.
melantha, Mart. ex K. Schum. l. c. (1886) 98. — Bras.
Melleri, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 154 (Byttneria). — Madag.
muricata, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 319 (Byttneria). — Bras.

BUETTNERIA : —

nitidula, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 384 (Byttneria). — Madag.
pentagona, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 90 = *jaculifolia*, Pohl.
pescapraeifolia, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 155. — Bolivia.
Spruceana, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 97. — Bras.
uaupensis, Spruce, ex K. Schum. l. c. 93. — Bras.
urticifolia, K. Schum. l. c. 98. — Bras.

BUFONIA, Sauv. ex Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. t. 352.

arcuata, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 285 (Buffonia). — Persia.
calycina, Boiss. et Hausskn. in Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 110. — Turkest.
capsularis, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. l. 111. (Buffonia). — Persia.
micrantha, Boiss. et Hausskn. in Boiss. l. c. (Buffonia). — Persia.
Teneriffae, Christ, in Engl. Bot. Jahrb. ix. (1888) 101. — Teneriffa.
tuberculata, Loscos, Trat. pl. Arag. iii. suppl. 8. (1886) 104; Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 273 (Buffonia). — Hisp.
valentina, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 15 in syn. = *tuberculata*, Loscos.
virgata, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 285. (Buffonia). — Persia.

BUFORRESTIA, C. B. Clarke (Commelin.). — Ind. Kew. l. 353.

minor, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 45 nomen; et in *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 136. — Afr. trop. or.

BUINALIS, Rafin. = **Siphonychia**, Torr. et Gray (Illecebr.).

americana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 534 = *S. americana*, Torr. et Gray.
diffusa, Kuntze, l. c. = *S. diffusa*, Chapm.
erecta, Kuntze, l. c. = *S. erecta*, Chapm.
Rugelii, Kuntze, l. c. = *S. Rugelii*, Chapm.

BULBINE, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 353.

platyphylla, Baker, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 468. — Afr. trop. or.

BULBINELLA, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. i. 353.

Aitoni, Th. Dur. et Schinz, Conspl. fl. Afr. v. 1893 (1895) 334 (= *Anthericum Aitoni*, Baker). — Afr. austr.
carnosa, Th. Dur. et Schinz, l. c. 334 (= *Anth. carnosum*, Baker). — Afr. austr.
Cauda-felis, Th. Dur. et Schinz, l. c. 334 (= *Anth. Cauda-felis*, Linn. f.). — Afr. austr.
floribunda, Th. Dur. et Schinz, l. c. 335 (= *Anth. floribundum*, Ait.). — Afr. austr.
nutans, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Anth. nutans*, Thunb.). — Afr. austr.
setosa, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Anth. setosum*, Willd.). — Afr. austr.

BULBOCODIUM, Ludw. Def. pl. (1737) 12, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 700 = **Romulea**, Maratti (Irid.).

arenarium, *barbatum*, *camerunianum*, *chloroleucum*, *Clusianum*, *Columnae*, *corsicum*, *crocifolium*, *cruciatum*, *cupreum*, *elongatum*, *filifolium*, *grandiscapum*, *latifolium*, *ligusticum*, *Linaresii*, *longifolium*, *neglectum*, *numidicum*, *purpurascens*, *ramiflorum*, *Requienii*, *roseum*, *simile*, *spirale*, *subulatum*, *tortuosum*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Romuleae.
campanulatum, Kuntze, l. c. = *R. hirsuta*, Eckl.
collinum, Kuntze, l. c. = *R. Bulbocodium*, Seb. et Maur.
dichotomum, Kuntze, l. c. = *R. rosea*, Eckl.
flavum, Kuntze, l. c. = *R. bulbocodioides*, Eckl.
Macowanii, Kuntze, l. c. = *R. Macowani*, Baker.
pubidum, Kuntze, l. c. = *R. rosea*, Eckl.
Revelieri, Kuntze, l. c. = *R. bulbocodioides*, Eckl.
Rollii, Kuntze, l. c. = *R. ramiflora*, Ten.
speciosum, Kuntze, l. c. = *R. rosea*, Eckl.

BULBOPHYLLUM, Thou. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 354.

albidum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 756. — Perak.
altispex, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 236. — Borneo.
anceps, Rolfe, in *Lindenia*, viii. (1892) 33 t. 351. — Borneo.
apodum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 766; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2043. — Penins. Mal.
approximatum, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 117. — Madag.
bicolor, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 770. — Reg. Himal.
bracteatum, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. iv. (1891) 17. — Austral.
breviflorum, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 236. — Borneo.
calyptratum, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 24. — Kamerun.
candidum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 770; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2050. — Reg. Himal.
carinatum, Cogn. in *Journ. des Orchid.* vi. (1895) 216; et in *Lindenia*, xi. (1895) 20. et 33 t. 495. — Borneo.
catenarium, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 235. — Borneo.
cauliflorum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 758. — Reg. Himal.
cirrhatum, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.
Clarkeanum, King et Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 333. — Ind. or.
Clarkei, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1888) 155; et in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 72. — Reg. Himal.
Cominsii, Rolfe, in *Kew Bull.* (1898) 138. — Ins. Salom.
comosum, Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 130 t. 19; in Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 762; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7283. — Burma.
compactum, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 48. — Ins. Comor.
compressum, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 172. — Ins. Borbon.
conchilioides, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 117. — Madag.
concinnum, Hook. f. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2038 a; et Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 187. — Ind. or.
confertum, Hook. f. l. c. v. (1890) 757; et t. 2035. — Reg. Himal.
Cordemoyi, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 172. — Ins. Borbon.
coriaceum, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 235. — Borneo.
coriophorum, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 119. — Madag.
cornutum, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 325. — N. Guin.
crassipes, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 760. — Ind. or.
curvibulbum, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 171. — Ins. Borbon.
cylindrocarpum, Frappier, l. c. 174. — Ins. Borbon.
Dearei, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1888) 156. — Borneo.
Dearei, Veitch, Man. Orch. Pl. iii. (1888) 95. — Ins. Philipp.
densiflorum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 139; et (1895) 7. — Laos, Siam.
denticulatum, Rolfe, l. c. (1891) 197 et in *Gard. Chron.* (1894) ii. 213. — Sierra-Leone.
Elliotti, Rolfe, ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 51. — Madag.
Epicianthes, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 753. — Java, Tenass.
Ericsoni, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1893) ii. 522. — Hab. ?
fallax, Rolfe, l. c. (1889) ii. 558. — Assam.
filiforme, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 25 (Bulbophyllum). — Kamerun.
Gamblei, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. 1890 187; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2039b. — Reg. Himal.
Gerlandianum, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 437. — N. Guin.

BULBOPHYLLUM : —

Globulus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 767; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2047. — Perak.
gymnopus, Hook. f. l. c. 764; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2040. — Reg. Himal.
Hamelini, Hort. ex Gard. and For. vi. (1893) 386; et ex *Kew Bull.* (1894) App. ii. 30. — Madag.
Hellwigianum, Kraenzl. ex Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 17. — Oceania.
Herbula, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 169. — Ins. Borbon.
Hookerianum, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 49; Wendl. ex Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1894) i. 685. — Afr. trop.
Humboldtii, Rolfe, ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 50. — Madag.
hymenanthum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 767; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2046. — Reg. Himal.
ichthyostomum, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 319. — N. Zel.
inaequale, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1886) 553. — Gabon.
inconspicuum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 102. — Japon.
inflatum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1891) 234; et in *Gard. Chron.* (1891) i. 334. — Sierra-Leone.
Johannis, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 592. — Madag.
kermesinum, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1889) 325. — N. Guin.
Kingii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 760. — Reg. Himal.
lemniscatoides, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) i. 672. — Java ?
leptanthum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 759; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2030 a. — Reg. Himal.
leptosepalum, Hook. f. l. c. 767; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2045. — Penins. Mal.
lineare, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 170. — Ins. Borbon.
longispicatum, Cogn. in *Journ. des Orchid.* iv. (1893) 265. — Bras.
macrocarpum, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion, (1895) 173. — Ins. Borbon.
membranifolium, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 756; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2034. — Perak.
Micholitzianum, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 484. — Sumatra.
micranthum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 768; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2048. — Tenass.
mishmeense, Hook. f. l. c. 769. — Reg. Himal.
modestum, Hook. f. l. c. 759; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1890) t. 2038b. — Perak.
Molossus, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1888) 155. — Madag.
montense, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 234. — Borneo.
montigenum, Ridl. l. c. — Borneo.
nervulosum, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 170. — Ins. Borbon.
nigripetalum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1891) 197; et in *Gard. Chron.* (1891) ii. 215. — Afr. trop. occ.
O'Brienianum, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1892) ii. 332 et in *Kew Bull.* (1893) Append. II. 30 nomen. — Reg. Himal.
Odoardi, Pfitz. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1888) 179. — Borneo.
oncidiophilum, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 485 = *Latourea oncidiochila*, Kraenzl.
Ophiuchus, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 118. — Madag.
paniculatum, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1889) 326. — N. Guin.
patens, King, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 187 in add.; Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2054 sub *B. vermiculare*. — Perak.
Pechei, Bull. Catal. 1891, ex *Gard. Chron.* (1891) i. 676; et Bot. Mag. (1893) t. 7286. — Burma.
perpusillum, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 592. — Madag.
Pervillei, Rolfe, ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 51. — Madag.
porphyroglossum, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 24 (Bulbophyllum). — Kamerun.

BULBOPHYLLUM :—

- protractum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 758; *et in Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) 2037. — Tenass.?
 psittacoglossum, *Reichb. f. ex Hook. l. c.* 754. — Tenass.
 pteriphiolum, *Rolfe, in Kew Bull.* (1894) 391. — Penang.
 Quintasii, *Rolfe, in Bolet. Soc. Brot.* ix. (1891) 138. — Ins. S. Thom.
 racemosum, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 61. — Borneo.
 resupinatum, *Ridl. in Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 198. — Ins. S. Thom.
 rufilabrum, *Parish, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 761. — Tenass.
 Sanderianum, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 4; *et ex Gard. Chron.* (1893) i. 291. — Bras.
 scaberulum, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 181 (= *Megaclinium scaberulum*, *Rolfe*). — Afr. austr.
 secundum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 764; *et in Hook. Icon. pl.* xxi. (1898) t. 2042. — Reg. Himal.
 spathaceum, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 170. — Burma.
 stenopetalum, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 25. — Kamerun.
 stenorhachis, *Kraenzl. l. c.* — Kamerun.
 striatellum, *Ridl. in Ann. of Bot.* iv. (1890) 335; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 189 in add. — Singap.
 suavissimum, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1889) i. 297; *et Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 768. — Burma.
 Thomsoni, *Hook. f. l. c.* 764; *et in Hook. Icon. pl.* (1890) t. 2041. — Reg. Himal.
 Toressae, *F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker*, (1889) 62. — Austral.
 trachyanthum, *Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 336. — N. Hibern.
 vermiculare, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 188 in obs. — Penins. Mal.
 virens, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 770. — Assam.
 viride, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 170. — Afr. trop. occ.
 vitiense, *Rolfe, l. c.* 5; *et ex Gard. Chron.* (1893) i. 291. — Ins. Viti.
 Watsonianum, *Reichb. f. in Flora*, lxxi. (1888) 155. — Ins. Hongkong.
 Wrayi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 766; *et in Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2844. — Perak.

BULGA, Linn. Syst. ed. I. (1735) 14, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 512 = **Ajuga**, Linn. (Labiata).
brachystemon, *Chamaecistus*, *flaccida*, *incisa*, *Iva*, *japonica*, *lobata*, *macrosperma*, *oblongata*, *ocephala*, *orientalis*, *parviflora*, *pyramidalis*, *robusta*, *salicifolia*, Kuntze, l. c. 512 et 513 = *homonyma omnia* Ajugae.
Chamaepitys, Kuntze, l. c. = *A. Chamaeipyris*, Schreb.
Laxmannii, Kuntze, l. c. = *A. Laxmanni*, Benth.
scoparia, Kuntze, l. c. = *A. Chamaecistus*, Ging.

BULBOSTYLIS, Kunth (Cyper.). — Ind. Kew. i. 356.
 abortiva, *C. B. Clarke, in J. Buchan. Nyassaland* (1889) 21; *et in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 610 (= *Fimbristylis abortiva*, Steud.). — Afr. trop.
 andongensis, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, l. c.* 611 (= *Fimbr. andongensis*, Ridl.). — Afr. trop. occ.
 aphyllanthoides, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Fimbr. aphyllanthoides*, Welw.). — Afr. trop. occ.
 barbata, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 651; *et in Th. Dur. et Schinz, l. c.* — Reg. calid. orb. vet.
 Boivini, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, l. c.* 612. — Ins. Comor.
 breviculmis, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Isolepis breviculmis*, Kunth). — Afr. austr.
 Buchananii, *C. B. Clarke, in J. Buchan. Nyassaland* (1889) 21 nomen. — Afr. trop. austro-or.
 Burchellii, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 612 (= *Fimbristylis Burchellii*, Ficalho et Hiern). — Afr. austr.

BULBOSTYLIS :—

- cardiocarpa, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 612 (= *Fimbristylis cardiocarpa*, Ridl.). — Afr. trop.
 cinnamomea, *C. B. Clarke, in J. Buchan. Nyassaland* (1889) 21; *et in Th. Dur. et Schinz l. c.* (= *Scirpus cinnamomeus*, Boeck.). — Afr. austr. et trop. austro-or.
 coleotricha, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, l. c.* 613 (= *Fimbristylis coleotricha*, Hochst.). — Abyss.
 collina, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Isolepis collina*, Kunth). — Afr. austr., Madag.
 cylindrica, *C. B. Clarke, l. c.* — Angola.
 festucoides, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Scirpus festucoides*, Poir.). — Madag., Borbon.
 filamentosa, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Scirpus filamentosus*, Vahl). — Afr. trop.
 humilis, *C. B. Clarke, l. c.* 614 (= *Isolepis humilis*, Kunth). — Afr. austro-or. et austr.
 Kirkii, *C. B. Clarke, l. c.* — Natal.
 laniceps, *C. B. Clarke, l. c.* — Afr. trop. occ.
 Lichtensteiniana, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Isolepis Lichtensteiniana*, Kunth). — Ins. S. Helena.
 macra, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Fimbristylis macra*, Ridl.). — Angola.
 megastachys, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Fimbr. megastachya*, Ridl.). — Angola.
 melanocephala, *C. B. Clarke, l. c.* 615 (= *Fimbr. melanocephala*, Ridl.). — Angola.
 neglecta, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Fimbr. neglecta*, Hemsl.). — Ins. S. Helena.
 oligostachya, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Scirpus oligostachys*, Boeck.). — Abyss.
 oritrepes, *C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 54; *et in Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Fimbristylis oritrepes*, Ridl.). — Angola.
 parva, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Fimbr. parva*, Ridl.). — Angola.
 puberula, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 652; *et in Th. Dur. et Schinz, l. c.* — As. et Afr. trop.
 pusilla, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Fimbristylis pusilla*, Hochst.). — Abyss.
 rarissima, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Cyperus rarissimus*, Steud.). — Abyss.
 Rehmanni, *C. B. Clarke, l. c.* — Transvaal.
 Renschii, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Scirpus Renschii*, Boeck.). — Madag.
 Schimperiana, *C. B. Clarke, l. c.* 616 (= *Isolepis Schimperiana*, Hochst.). — Abyss.
 schoenoides, *C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 54; *et in Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Isolepis schoenoides*, Kunth). — Afr. austr. et trop. occ.
 sphaerocarpa, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Scirpus sphaerocarpus*, Boeck.). — Afr. austr.
 striatella, *C. B. Clarke, l. c.* — Afr. austr. et trop. or.
 subspinescens, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 652. — Ind. or.
 trichobasis, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 616 (= *Scirpus trichobasis*, Baker). — Madag.
 Taylori, *C. B. Clarke, l. c.* — Zanzibar.
 trabeculata, *C. B. Clarke, l. c.* — Angola.
 zambeica, *C. B. Clarke, l. c.* — Zambesia.
 Zeyheri, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Scirpus Zeyheri*, Boeck.). — Afr. austr. et austro-or.

BULNESIA, C. Gay (Zygophyll.). — Ind. Kew. i. 356.
 arborea, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 12. — Hab.?

BUMELIA, Sw. (Sapot.). — Ind. Kew. i. 356.
 fragrans, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 43. — Ins. Fernando Noronha.
 leiogyna, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 4. — Guatem.
 mexicana, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 519. — Mexic.
 Palmeri, *Rose, in Gard. and For.* vii. (1894) 195 fig. 35. — Mexic.
 pleistochasia, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 4. — Guatem.

BUNCHOSIA, Rich. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 357.
 guadalajarensis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 401. — Mexic.
 Lanieri, *S. Wats. l. c.* xxi (1886) 461; *et in T. Brigh. Guatem. App.* (1887) 427. — Guatem.
 Palmeri, *S. Wats. l. c.* xxii. (1887) 401. — Mexic.
 parvifolia, *S. Wats. l. c.* xxiv. (1889) 42. — Calif.
 Pringlei, *S. Wats. l. c.* xxvi. (1891) 133. — Mexic.
 sonorensis, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891). — Mexic.

BUNIOTRINIA, Stapf et Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, li. (1886) 315. **UMBELLIFERAE**.
 juncea, *Stapf et Wettst. l. c.* — As. occ.

BUNIU, Linn. = **Carum**, Linn. (Umbellif.).
 Bourgaei, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 99. — As. Min.
 cataonicum, *Stapf et Wettst. Beitr. Fl. Lyc.* (1886) 261. — As. Min.
 cylindraceum, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 83 = *C. cylindricum*, Boiss. et Hochst.
 daucoides, *Hausk. in Mitth. Thur. Bot. Ver.* N. Folge, v. (1893) 114 = *C. daucoides*, Boiss.
 elegans, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 83. — Armenia.
 fallax, *Freyn, l. c.* xl. (1890) 211; *et xli.* (1891) 10. — As. Min.
 filipes, *Freyn et Conrath, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 305. — Reg. Cauc.
 incrassatum, *Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie* (Dicot.) (1888) 346 = *C. incrassatum*, Boiss.
 mauritanicum, *Batt. l. c.* = *C. mauritanicum*, Boiss. et Reut.
 microcarpum, *Freyn et Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 10 in obs.; *et xlv.* (1894) 99 = *C. microcarpum*, Boiss.
 Tempshyanum, *Freyn et Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 384. — Armenia.
 tenerum, *Hausk. in Nym. Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 144. — Graecia.

BUPHANE, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 358.
 longepedicellata, *Pax, in Bot. Jahrb.* x. (1889) 4. — Afr. austr.

BUPLEURUM, [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 359.
 americanum, *Coult. et Rose, Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 115. — Am. bor. occ.
 antiochium, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 427. — Syria.
 Boissieri, *Post, l. c.* 426; *et ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 251. — Syria.
 caricinum, *Cabanès, in Bull. Soc. sc. nat. Nîmes*, xix. (1891) 30. — Gall. mer.
 laxum, *Velen. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 396. — Bulg.
 mauritanicum, *Batt. in Bull. Soc. bot. Fr.* xxxv. (1888) 386. — Algeria.
 orbelicum, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) 407; *et Fl. Bulg.* (1891) 222. — Bulg.
 pekinense, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 327 nomen; *et in Noww. Arch. Mus. Paris*, Ser. II. x. (1888) 183. — China.
 petiolatum, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér.* VIII. vi. (1894) 117. — Yunnan.
 polymorphum, *Alb. Prodr. fl. Colch.* (1895) 101. — Reg. Cauc.
 quadridentatum, *Wettst. in Luers. Bibl. Bot.* Heft xxvi. (1892) 48 t. 3 fig. 16-19. — Maced., Albania.
 ranunculoideum, *St. Lager, in Cariot. Etud. des fl.*, éd. 8. ii. (1889) 337 = *ranunculoideus*, Linn.
 Rischawi, *Alb. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 450. — Reg. Cauc.
 Rischawianum, *Alb. l. c.* iii. (1895) 521 sphalm. = *Rischawi, Alb.*
 thracicum, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 381. — Turc.
 yunnanense, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér.* VIII. vi. (1894) 117. — Yunnan.

BURASAIA, Thou. (Menisperm.). — Ind. Kew. i. 360.
 australis, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 2. — Madag.

BURCKELLA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 3 = **Bassia**, Koenig (Sapot.)

Cocoa, Pierre, l. c. = *Bassia Cocco*, Scheff.

Erskineana, Pierre, l. c. 4; et ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 311 = *Bassia Erskineana*, F. Muell.

Hollrungii, Pierre, ll. cc. = *Bassia Hollrungii*, K. Schum.

May, Pierre, l. c. = *Bassia May*, Becc.

obovata, Pierre, l. c. = *Bassia obovata*, Forst.

BUREAVELLA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 16. **SAPOTACEAE**

Macleyana, Pierre, l. c. (= *Bassia Macleyana*, F. Muell. in Victor Ranval. i. (1885) 168, nomen.). — N. Guin.

BURLINGTONIA, Lindl. = **Rodriguezia**, Ruiz et Pav. (Orchid.).

caloplectron, « Reichb. f. » ex Williams, Catal. (1887) 21 = *R. caloplectron*, Reichb. f.

BURMANNIA, Linn. (Burmanniac.). — Ind. Kew. i. 361.

bifurca, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 665 = *coelestis*, Don.

candida, Griff. ex Hook. f. l. c. — As. trop. or.

gracilis, Ridl. in Journ. As. Soc. Straits Branch, (1890) 335. — Ind. or.

nepalensis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 666. — As. trop. or.

papillosa, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 232. — Borneo.

Wallichii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 666. — As. trop. or.

BURMEISTERA, Karst. et Triana (Campanul.). — Ind. Kew. i. 361.

cyclostigmata, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 291. — Costarica.

BURSA, Weber = **Capsella**, Medic. (Crucif.).

antipoda, *cochlearina*, *divaricata*, *Drummondii*, *grandiflora*, *humistrata*, *mexicana*, *pilosula*, *procumbens*, *pubens*, *tasmanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 20-21 = *homonyma omnia* Capsellae.

pauciflora, Kuntze, l. c. 20 = *Hutchinsia pauciflora*, Nym.

Prostii, Kuntze, l. c. = *Hutch. Prostii*, J. Gay.

tibetica, Kuntze, l. c. = *Capsella Thomsoni*, Hook. f.

BURSERIA, Jacq. (Burser.). — Ind. Kew. i. 362. *Eracouchii*, Baill. ex Lanes. Pl. util. col. franç. (1886) 367 = *Icica heterophylla*, DC.

australasica, F. M. Bailey, in Dept. Agric., Queensl. Bot. Bull. v. (1892) 8. — Austral.

Beandou, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas, (1892) t. 226 b. — Madag.

cerasifolia, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II, iii. (1891) 121. — Calif.

fragilis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 422. — Mexic.

glabrescens, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 313. — Mexic.

Jonesii, Rose, l. c. 314. — Am. bor. occ.

Hindsiana, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II, iii. (1891) 121. — Calif.

laxiflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 108 = seq. *laxiflora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 44. — Calif.

Nelsoni, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 314. — Mexic.

odorata, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II, ii. (1889) 138. = *fagaroides*, Engl.

Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 402. — Mexic.

Pringlei, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 145. — Mexic.

pubescens, S. Wats. l. c. xxiv. (1889) 44. — Calif.

Schaffneri, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 469. — Mexic.

Simaruba, Sarg. in Gard. and For. iii. (1890) 260; et N. Am. Sylva, i. 97 t. 41 et 42 = *gummifera*, Jacq.

tenuifolia, Engl. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 107. — Mexic.

tenuifolia, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 314 (an praec.?). — Mexic.

BUSERIA, Th. Dur. Ind. Gen. (1888) 501. **RUBIA-CEAE**.

resinosa, Th. Dur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 108 (= *Leiochilus resinosa*, Hook. f.). — Madag.

BUTEA, Koen. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 362.

monosperma, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 202 = *frondosa*, Roxb.

monosperma, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 366 = *praec.*

BUTTNERIA, Duham. = **Calycanthus**, Linn. (Calycanth.).

fertilis, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 175 (Buttneria) = *C. fertilis*, Walp.

florida, Kearney, l. c. 175 (Buttneria) = *C. floridus* Linn.

occidentalis, Greene, in Erythea, i. (1893) 207; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 119 = *C. occidentalis*, Hook. et Arn.

BUXUS, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 362.

bahamensis, Baker, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1806. — Ins. Baham.

chinensis, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 80 = *longifolia*, Boiss.

macrophylla, Hort. ex Dippel, l. c. = *sempervirens*, Linn.

Macowani, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1518. — Afr. austr.

Rolfei, Vidal, Pl. vasc. Filip. (1886) 233. — Ins. Philipp.

BYRSOCARPUS, Schum. et Thonn. (Connar.). — Ind. Kew. i. 363.

Baroni, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 462. — Madag.

BYRSONIMA, Rich. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 363.

indorum, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1895) 323. — Bras.

C

CACABUS, Benth. (Solan.). — Ind. Kew. i. 365.

integrifolius, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 63. — Chili.

Miersii, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1891) 16 (= *Dictyocalyx Miersii*, Hook. f.). — Peruv.

parviflorus, Rusby in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 233. — Bolivia.

CACALIA, Burm. Thes. Zeyl. (1737) 52 t. 21; Kuntze, Rev. Gen. (1891) 323 = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).

abyssinica, *accedens*, *acilepis*, *acuminata*, *acutangula*, *adamantium*, *adenophylla*, *adoensis*, *affinis*, *alpestris*, *ambigua*, *ammophila*, *amygdalina*, *angulifolia*, *angustifolia*, *aphantha*, *apiculata*, *Aplinii*, *apocynifolia*, *appendiculata*, *araneosa*, *aravana*, *aravipensis*, *arbo-rea*, *arborescens*, *arenaria*, *argentea*, *arguta*, *argyro-phylla*, *argyrotricha*, *arkansana*, *Aschenborniana*, *asteriflora*, *attenuata*, *auera*, *auriculata*, *bahamensis*, *Bainesi*, *barbata*, *barbinervis*, *Benthamiana*, *Beyrichii*, *Biafrae*, *blanda*, *Bolleana*, *borneensis*, *brachiata*, *brachylepis*, *brachyphylla*, *bracteata*, *brevifolia*, *brevi-petiolata*, *Buchingeri*, *buddleiaefolia*, *bullata*, *buxi-folia*, *Calvoana*, *Candolleana*, *Candollei*, *canescens*, *capituliflora*, *carduodes*, *chalybaea*, *Chamaedrys*, *Chamaepece*, *Chamissonis*, *chilanthia*, *cincta*, *cineria*, *clavata*, *clivorum*, *cognata*, *compacta*, *compactiflora*, *conferta*, *cordata*, *cordiaefolia*, *cordigera*, *coriacea*, *corymbiformis*, *corymbosa*, *Cotoneaster*, *Coulonii*, *cuabensis*, *Cumingiana*, *cuneifolia*, *cylindrica*, *cymosa*, *decumbens*, *delapsa*, *demulans*, *densiflora*, *Deppeana*, *desertorum*, *discolor*, *dissoluta*, *divergens*, *diversifolia*, *Doniana*, *dura*, *echitifolia*, *Ehrenbergiana*, *ehretiaefolia*, *elaeagnifolia*, *elegans*, *eremophila*, *erioclada*, *erilepis*, *erythrophila*, *esculenta*, *exilis*, *extensa*, *fagifolia*, *farinosa*, *fasciculata*, *fastigiata*, *ferruginea*, *filigera*, *firma*, *flexuosa*, *floccosa*, *foliosa*, *fragrans*, *Francavillana*, *frondosa*, *fruticosa*,

CACALIA : —

fruticulosa, *fulva*, *fuscopilosa*, *Gardneri*, *geminata*, *glabra*, *glabrata*, *glandulosa*, *glutinosa*, *Gomphrena*, *gracilis*, *Grantii*, *gratiola*, *grisea*, *guineensis*, *gym-noclada*, *Haenkeana*, *havanensis*, *Helferi*, *helophila*, *hexantha*, *hirtiflora*, *Hochstetterii*, *holosericea*, *Hook-keriana*, *koveaeifolia*, *hymenolepis*, *Hypochaeris*, *hypo-leuca*, *ignobilis*, *immunis*, *incana*, *indica*, *infun-dibularis*, *insignis*, *interjecta*, *intermedia*, *isotricha*, *jugalis*, *karaguensis*, *Karunshiana*, *Kirkii*, *Kotsch-yana*, *Kroneana*, *lacunosa*, *lanceolaris*, *lappodes*, *latifolia*, *lawrifolia*, *laxa*, *Leiboldiana*, *leiocarpa*, *Leopoldi*, *Lettermannii*, *leucophylla*, *lilacina*, *Lind-bergii*, *Lindheimeri*, *linearifolia*, *linearis*, *Livingsto-niana*, *Lobbii*, *lucida*, *Lyallii*, *macrocephala*, *macrophylla*, *madagascariensis*, *malabarica*, *Man-soana*, *Mariana*, *megapotamica*, *Melleri*, *mespilifolia*, *mexicana*, *micradenia*, *microcephala*, *miseria*, *mollis*, *mollissima*, *moluccensis*, *Monosis*, *monticola*, *Moritziana*, *mossambicensis*, *mucronifolia*, *mucronulata*, *muricata*, *myriantha*, *myriocephala*, *nemoralis*, *nitens*, *novae-boracensis*, *nudiflora*, *obconica*, *obovata*, *obscura*, *obtusata*, *obtusifolia*, *ochroleuca*, *octantha*, *oligolepis*, *ovata*, *oxylepis*, *paludosa*, *pandurata*, *panti-culata*, *patens*, *pauciflora*, *pectiniformis*, *pedunculata*, *peguensis*, *pellita*, *pentacantha*, *Perrottetii*, *petiolaris*, *platensis*, *polyanthos*, *populifolia*, *psilophylla*, *psilo-stachya*, *pteropoda*, *puberula*, *pulverulenta*, *pumila*, *punctata*, *pungens*, *pycnostachya*, *pyrifolia*, *Quarti-niana*, *quinqueflora*, *Radula*, *reflexa*, *Reinwardtiana*, *remotiflora*, *revoluta*, *Riedelii*, *rigidophylla*, *rosea*, *rosmarinifolia*, *Rothii*, *rubricaulis*, *rubrivamea*, *rusticoma*, *rugosa*, *rugulosa*, *rupestris*, *salicifolia*, *saligna*, *Salvinae*, *saxicola*, *scapigera*, *scariosa*, *Schiedeana*, *Schimperii*, *Schweinfurthii*, *schubenkiaefolia*, *sechellensis*, *secunda*, *secundifolia*, *Seemanniana*, *Sellowii*, *senegalensis*, *sericea*, *sevrata*, *sessilifolia*, *shivensis*, *simplex*, *simulata*, *Smithiana*, *solanifolia*, *sparsiflora*, *Spixiana*, *squamulosa*, *Steetzii*, *stellaris*, *stenocephala*, *stenophylla*, *Stoechas*, *stricta*, *suave-olens*, *subsessilis*, *subsimplex*, *subulata*, *subverticillata*, *syncephala*, *talaumifolia*, *tanalensis*, *tarchonantifolia*, *terniflora*, *Teymanniana*, *theophrastifolia*, *Thomae*, *Thomsoniana*, *Thwaitesii*, *tigvensis*, *toluccana*, *tomentella*, *tragiaefolia*, *travancorica*, *triantha*, *trice-phala*, *triflosculosa*, *turbinata*, *Tweediaeana*, *uncinata*, *undulata*, *unionis*, *varroniaefolia*, *venosissima*, *vepre-torum*, *verbascifolia*, *vestita*, *vialis*, *vivens*, *virgu-lata*, *viscidula*, *volkameriaefolia*, *Warmingiana*, *Westiniana*, *xanthophylla*, *zeylanica* *Zuccariniana*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 323 et 968-71 = *homo-nyma omnia* *Vernoniae*.

acaulis, Kuntze, l. c. 968 = *V. oligophylla*, Michx.

adproximata, Kuntze, l. c. 969 = *V. diffusa*, Less.

africana, Kuntze, l. c. = *V. Vernoneia*, Harv.

Alamanii, Kuntze, l. c. = *V. Alamanii*, DC.

Andersonii, Kuntze, l. c. = *V. Cumingiana*, Benth.

angustifolia, Kuntze, l. c. 968 = *V. Poskeana*, Vathe.

anisochaetodes, Kuntze, l. c. 969 = *V. anisochaet-oides*, Sond.

argyropappa, Kuntze, l. c. = *V. Salzmanni*, DC.

aristata, Kuntze, l. c. 968 = *V. natalensis*, Sch. Bip.

baccharioides, Kuntze, l. c. 969 = *V. baccharioides*, H. B. et K.

Baldwinii, Kuntze, l. c. = *V. Baldwinii*, Torr.

baptisanda, Kuntze, l. c. 968 = *V. uniflora*, Sch. Bip.

bardanodes, Kuntze, l. c. 969 = *V. bardanoides*, Less.

Baronii, Kuntze, l. c. = *V. Baroni*, Baker.

Beddomii, Kuntze, l. c. = *V. Beddomei*, Hook. f.

Bipontini, Kuntze, l. c. = *V. affinis*, Sch. Bip.

blumeodes, Kuntze, l. c. 969 = *V. blumeoides*, Hook. f.

brasiliensis, Kuntze, l. c. 323 et 968 = *V. scabra*, Pers.

burmanica, Kuntze, l. c. 323. — Burma.

Burtonii, Kuntze, l. c. = *V. Burtoni*, Oliver et Hiern.

capensis, Kuntze, l. c. = *V. pinifolia*, Less.

capitata, Kuntze, l. c. 969 (= *Distephanus capitatus*, Boj.). — Madag.

chlorolepis, Kuntze, l. c. 968 = *V. Steetziana*, Oliver et Hiern.

cladantha, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 968 = *Piptocarpa Sellowii*, Baker.

Clarkeana, Kuntze, l. c. 323 = *Centratherum Hookeri*, C. B. Clarke.

colorata, Kuntze, l. c. 968 = *V. senegalensis*, Less.

crotonodes, Kuntze, l. c. = *V. crotonoides*, Sch. Bip.

CACALIA : —

- cymosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 968 = *Vernonia missionis*, Gardn.
daphnoides, Kuntze, l. c. 970 = *V. daphnoides*, Walp.
debilis, Kuntze, l. c. = *V. Cotoneaster*, Less.
divaricata, Kuntze, l. c. 968 = *V. diffusa*, Less.
eleagnoides, Kuntze, l. c. = *V. Kraussii*, Sch. Bip.
erigeroides, Kuntze, l. c. 970 = *V. cinerea*, Less.
erubescens, Kuntze, l. c. 968 = *V. Ascheronii*, Sch. Bip.
eupatorioides, Kuntze, l. c. 324 = *V. eupatorioides*, Blume.
flotowioides, Kuntze, l. c. 970 = *V. flotowioides*, Baker.
frangulifolia, Kuntze, l. c. = *V. frangulaefolia*, H. B. et K.
fruticosa, Kuntze, l. c. 968 = *V. rigida*, Sw.
gerberiformis, Kuntze, l. c. = *V. Gerberae*, Oliver et Hiern.
Gerrardii, Kuntze, l. c. 968 = *V. Gerrardi*, Harv.
gigantea, Kuntze, l. c. 324 = *V. altissima*, Nutt.
Glazioviana, Kuntze, l. c. 968 = *V. Glazioviana*, Baker.
gnaphaloides, Kuntze, l. c. = *V. gnaphaloides*, Sch. Bip.
gochnatioides, Kuntze, l. c. = *V. gochnatioides*, Hook. et Arn.
graminifolia, Kuntze, l. c. = *V. angustifolia*, Michx.
graminifolia, Kuntze, l. c. 970 = *V. graminifolia*, Gardn.
Hookerii, Kuntze, l. c. = *Centratherum Hookeri*, C. B. Clarke.
inulifolia, Kuntze, l. c. = *V. inulaefolia*, Steud.
inuloides, Kuntze, l. c. = *V. inuloides*, DC.
lappodes, Kuntze, l. c. = *V. lappoides*, Baker.
latifolia, Kuntze, l. c. 968 = *V. Petersii*, Oliver et Hiern.
Lessingiana, Kuntze, l. c. = *V. barbata*, Less.
lessingoides, Kuntze, l. c. = *V. lessingoides*, Sch. Bip.
liatroides, Kuntze, l. c. = *V. liatroides*, DC.
ligulifolia, Kuntze, l. c. = *V. ligulaefolia*, Mart.
lithospermoides, Kuntze, l. c. = *V. lithospermoides*, Baker.
marginata, Kuntze, l. c. = *V. Jamesii*, Torr. et Gray.
marginata, Kuntze, l. c. 970 = *V. marginata*, Oliver et Hiern.
monocephala, Kuntze, l. c. = *V. monocephala*, Harv.
montevicensis, Kuntze, l. c. = *V. nitidula*, Less.
moquinioides, Kuntze, l. c. 970 = *V. moquinioides*, Baker.
nerifolia, Kuntze, l. c. 968 = *V. ruficoma*, Schlecht.
nigritiana, Kuntze, l. c. 970 = *V. nigritiana*, Oliver et Hiern.
nudicaulis, Kuntze, l. c. 968 = *V. Dregeana*, Sch. Bip.
nudicaulis, Kuntze, l. c. 970 = *V. nudicaulis*, Less.
octangularis, Kuntze, l. c. = *Baccharis Meyeniana*, Walp.
oligatoides, Kuntze, l. c. = *V. oligatoides*, Less.
oligophylla, Kuntze, l. c. 968 = *V. Cephalotes*, DC.
onopordioides, Kuntze, l. c. 970 = *V. onopordioides*, Baker.
patula, Kuntze, l. c. 324 = *V. chinensis*, Less.
piptocarphoides, Kuntze, l. c. = *V. piptocarphoides*, Baker.
plantaginoides, Kuntze, l. c. 969 = *V. plantaginoides*, DC.
Poeppigiana, Kuntze, l. c. 971 = *Piptocarpha Poeppigiana*, Baker.
polycephala, Kuntze, l. c. = *V. ferruginea*, Less.
pumila, Kuntze, l. c. 969 = *V. grandiflora*, Less.
pyramidale, Kuntze, l. c. = *V. Roxburghii*, Less.
quadrifolia, Kuntze, l. c. 971 = *V. quadriflora*, Baker.
ramiflora, Kuntze, l. c. 969 = *Piptocarpha ramiflora*, Baker.
Richardiana, Kuntze, l. c. 967 = *V. myriocephala*, A. Rich.
rhaponticoides, Kuntze, l. c. 971 = *V. rhaponticoides*, Baker.
salviaefolia, Kuntze, l. c. = *V. salvifolia*, Wight.
Salzmanni, Kuntze, l. c. = *V. Salzmanni*, DC.
scorpioides, Kuntze, l. c. = *V. scorpioides*, Pers.
scorpioides, Kuntze, l. c. 324 = *V. scorpioides*, Pers.
senegalensis, Kuntze, l. c. 969 = *V. Tenoreana*, Oliver.

CACALIA : —

- serratuloides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 969 = *Vernonia serratuloides*, H. B. et K.
Sinclairii, Kuntze, l. c. = *V. Sinclairii*, Benth.
sororia, Kuntze, l. c. = *V. scorpioides*, Pers.
spathulata, Kuntze, l. c. 969 = *V. atriplicifolia*, Jaub. et Spach.
squarrosa, Kuntze, l. c. = *V. teres*, Wall.
stahelinoides, Kuntze, l. c. 971 = *V. stahelinoides*, Harv.
stellata, Kuntze, l. c. 969 = *V. oppositifolia*, Less.
Sutherlandii, Kuntze, l. c. = *V. Sutherlandii*, Harv.
Thomsonii, Kuntze, l. c. = *V. Thomsoni*, Hook. f.
Tinneana, Kuntze, l. c. = *V. pumila*, Kotschy et Peyr.
tomentosa, Kuntze, l. c. 969 = *V. Monosis*, Sch. Bip.
tournefortioides, Kuntze, l. c. 971 = *V. tournefortioides*, H. B. et K.
trinervis, Kuntze, l. c. (= *Distephanus trinervis*, Boj.). — Madag.
uniflora, Kuntze, l. c. 969 = *V. remotiflora*, Rich.
urticifolia, Kuntze, l. c. 971 = *V. urticaefolia*, A. Rich.
vagans, Kuntze, l. c. 969 = *V. scandens*, DC.
verbascoides, Kuntze, l. c. = *V. verbascoides*, Walp.
vernonioides, Kuntze, l. c. = *V. dicarpa*, Less.
zanzibariensis, Kuntze, l. c. = *V. zanzibariensis*, Less.
zollingerianoides, Kuntze, l. c. = *V. zollingerianoides*, Sch. Bip.

CACALIA, Linn. = **Senecio**, Tourn. (Compos.).

- aurea*, MacMill. Metasp. Minnes. (1892) 556 = *S. aureus*, Linn.
globosa, Robins. et Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 119. — Mexic.
integerrima, MacMill. Metasp. Minnes. (1892) 556 = *S. integerrimus*, Nutt.
longipetiolata, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 157. — Mexic.
lugens, MacMill. Metasp. Minnes. (1892) 555 = *S. lugens*, Richards.
megaphylla, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 157. — Mexic.
obtusiloba, Robins. et Greenm. l. c. 158. — Mexic.
Palmeri, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 219. — Mexic.
paucispicata, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 158. — Mexic.
peltata, Robins. et Greenm. l. c. = *S. megaphylla*, Robins. et Greenm.
peltigera, Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 111. — Mexic.
platylepis, Robins. et Seaton, l. c. 110. — Mexic.
poculifera, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891). 143. — Mexic.
Pringlei, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 156. — Mexic.
silphifolia, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. iii. l. (1895) 158. — Mexic.
tridactylites, Robins. et Greenm. l. c. 159. — Mexic.

CACARA, Rumpf = **Pachyrhizus**, Rich. (Legumin.).

- erosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 165 = *P. angulatus*, Rich.
palmatiloba, Kuntze, l. c. = *P. palmatilobus*, Benth. et Hook. f.

CACCINIA, Savi (Boragin.). — Ind. Kew. i. 367.

- crassifolia*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 212 = *glauca*, Savi.

CACOUZIA, Aubl. (Combret.). — Ind. Kew. i. 367.

- littorea*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 293. — Afr. trop. or.
longispicata, Engl. l. c. — Afr. trop. or.
platyptera, Welw. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2203 in obs. = *paniculata*, Laws.

CACTUS, « Linn. » ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 258 = **Mammillaria**, Haw. (Cact.).

- acanthophlegma*, *acanthostephes*, *acicularis*, *aciculatus*, *actinopleus*, *aeruginosus*, *affinis*, *alpinus*, *amabilis*, *ancistrinus*, *anguineus*, *areolatus*, *argenteus*, *atrovirens*, *atrosanguineus*, *aulacanthus*, *aulacothele*, *aureiceps*, *auricomus*, *aurivirens*, *barbatus*, *Barlowii*, *bellatulus*, *biglandulosus*, *bihamatus*, *Bockii*, *brevimamma*, *brevisetus*, *calcaratus*, *carneus*, *Celsianus*, *centricirrhus*,

CACTUS : —

- centrispinus*, *cephalophorus*, *ceratocentrus*, *chrysanctanthus*, *cirrifer*, *clavus*, *compactus*, *compressus*, *conicus*, *conopsus*, *cornifer*, *corollarius*, *crassispinus*, *crebrispinus*, *crinitus*, *crocidatus*, *cruciger*, *curvispinus*, *dasyacanthus*, *dealbatus*, *decipiens*, *depressus*, *Diadema*, *discolor*, *divaricatus*, *divergens*, *dolichocentrus*, *eborinus*, *Echinus*, *Ehrenbergii*, *elegans*, *elephantidens*, *erectus*, *erectacanthus*, *eriacanthus*, *euclopus*, *eximius*, *fasciculatus*, *Fellneri*, *Fischeri*, *floribundus*, *Foersteri*, *formosus*, *foveolatus*, *fulvispinus*, *Funckii*, *fuscatus*, *geminatus*, *gibbosus*, *glabratus*, *gladiatus*, *glanduliger*, *glaucus*, *glochidiatus*, *gracilis*, *Grahami*, *grandicornis*, *grandiflorus*, *granulatus*, *grieseus*, *gummifer*, *Haageanus*, *haematactinus*, *hamatus*, *Heinei*, *heteromorphus*, *hexasanthus*, *Heyderi*, *Humboldtii*, *Hystrix*, *incurvus*, *intertextus*, *irregularis*, *isabellinus*, *jucundus*, *Karwinskianus*, *Kleinii*, *Kramerii*, *Kunthii*, *lactescens*, *lanifer*, *lasiacanthus*, *leucocentrus*, *leucodasyus*, *leucodictyus*, *leucotrichus*, *Linkeanus*, *lividus*, *longimamma*, *longisetus*, *loricatus*, *Ludwigii*, *macromeris*, *macrothela*, *Martianus*, *maschalacanthus*, *megacanthus*, *meiacanthus*, *melaleucus*, *micans*, *micracanthus*, *microceras*, *micromeris*, *minimus*, *mirabilis*, *missouriensis*, *mitis*, *mucronatus*, *Muehlenpfordtii*, *multiceps*, *mutabilis*, *Mystax*, *Neumannianus*, *niger*, *nigricans*, *nivosus*, *nobilis*, *nudus*, *obliquus*, *obvallatus*, *octacanthus*, *Odiervianus*, *olorinus*, *othele*, *Otonis*, *ovimamma*, *pallidus*, *pallidus*, *Parkinsonii*, *parvimamma*, *pallidus*, *Pazzanii*, *pectinatus*, *pentacanthus*, *Pfeifferianus*, *phacacanthus*, *phaeotrichus*, *phellospermus*, *phymatothela*, *pictus*, *Plaschnickii*, *Plecostigma*, *pleiocephalus*, *polycentrus*, *polycephalus*, *polyedrus*, *polygonus*, *polymorphus*, *polythela*, *polytrichus*, *pomaceus*, *Pottsii*, *pretiosus*, *prismaticus*, *procureus*, *pugionacanthus*, *pulchellus*, *pulcher*, *purpureus*, *pusillus*, *pycnacanthus*, *pyrrhocanthus*, *pyrrhocroacanthus*, *quadrispinus*, *radicans*, *recurvatus*, *recurvispinus*, *recurvus*, *regius*, *retusus*, *rhipidacanthus*, *rhodanthus*, *rhodocentrus*, *robustispinus*, *rufidulus*, *rufocroceus*, *rutilus*, *Salmidichianus*, *saxatilis*, *sceponocentrus*, *Schaeferi*, *Scheerii*, *Scheidweilerianus*, *Schellhaasi*, *Schiedeanus*, *Schlechtendalii*, *Seemannii*, *Seidelii*, *Seitzianus*, *Sempervivus*, *setosus*, *Severinii*, *sororius*, *spectabilis*, *sphaelatus*, *sphaericus*, *sphaerocentrus*, *spinareus*, *spinosissimus*, *squarrosus*, *Stella-aurata*, *stenocanthus*, *strobiliformis*, *Stueberi*, *subangularis*, *subcroceus*, *subechinatus*, *subpolyedrus*, *subtetragonus*, *subulifer*, *sulcolanatus*, *superfatus*, *tectus*, *tentaculatus*, *tenuis*, *tetracanthus*, *tomentosus*, *triacanthus*, *tubinatus*, *uberiformis*, *umbrinus*, *uncinatus*, *variamamma*, *versicolor*, *vetulus*, *villifer*, *virens*, *viridis*, *vulpinus*, *Webbianus*, *Wegeneri*, *Wildianus*, *Winkleri*, *woburnensis*, *Wrightii*, *xanthotrichus*, *Zegschwitzii*, *Zepnickii*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 259-261 = *homonyma omnia* Mammillariae.
alternatus, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 95. — Mexic.
ancistracanthus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. rhipidacantha*, Lem.
ancistrodes, Kuntze, l. c. = *M. ancistroides*, Lem.
atratus, Kuntze, l. c. 259 = *M. rhodantha*, Link et Otto.
Beneckei, Kuntze, l. c. 260 = *M. Goodriighii*, Scheer.
bocasanus, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 104 = *M. bocasana*, Poselg.
Brandegei, Coult. l. c. 96. — Calif. inf.
brunneus, Coult. l. c. 117. — Mexic.
caespititius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = *Mammillaria multiceps*, Salm-Dyck.
capillaris, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 107 (= *Mam. lanifera*, Salm-Dyck). — Mexic.
conoides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = *M. conoidea*, DC.
coronatus, Kuntze, l. c. 261 = *M. crebrispina*, DC.
cylindraceus, Kuntze, l. c. 260 = *M. eriacantha*, Hort.
densus, Kuntze, l. c. = *M. echinata*, DC.
densispinus, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 96. — Mexic.
disciformis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = *Echinocactus turbiniformis*, Pfeiff.
Dyckianus, Kuntze, l. c. = *M. acanthophlegma*, Lehm.
Echinaria, Kuntze, l. c. = *M. echinata*, DC.

CACTUS: —

- echinocactodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = *Mammillaria conoidea*, DC.
elongatus, Kuntze, l. c. = *M. elongata*, DC.
Engelmanni, Kuntze, l. c. = *M. recurvata*, Engelm.
Eschschieri, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 104. — Mexic.
exudans, Kuntze, l. c. = *M. exsudans*, Zucc.
Gabbii, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 109 = *M. Gabbii*, Engelm.
geminispinus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = *M. bicolor*, Lehm.
Goodridgii, Kuntze, l. c. = *M. Goodridgii*, Scheer.
Guillemianus, Kuntze, l. c. 261 = *M. decipiens*, Scheidw.
Halei, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 106 = *M. Halei*, T. S. Brandeg.
Staworthianus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 259 = *M. stellata*, Haw.
Kotschubeyi, Kuntze, l. c. 260 = *M. sulcata*, Salm-Dyck.
Klugii, Kuntze, l. c. = *M. elegans*, DC.
latimamma, Kuntze, l. c. = *M. pycnacantha*, Mart.
Lehmanni, Kuntze, l. c. = *M. recurva*, Lehm.
macracanthus, Kuntze, l. c. = *M. macracantha*, DC.
maculatus, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 117. — Mexic.
Meissneri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. acanthophlegma*, Lehm.
multisetus, Kuntze, l. c. = *M. multiceps*, Salm-Dyck.
niveus, Kuntze, l. c. 259 = *M. bicolor*, Lehm.
obconella, Kuntze, l. c. = *M. dolichocentra*, Lehm.
Palmeri, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1896) 108. — Mexic.
persicanus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. persicina*, Ehrenb.
Pondii, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 102 = *M. Pondii*, Greene.
Praelii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. viridis*, Salm-Dyck.
Pringlei, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 109. — Mexic.
pulcherrimus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261. = *M. pulcherima*, Ehrenb.
pulvilliger, Kuntze, l. c. 260 = *M. elongata*, DC?
radiosus, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 120 = *M. vivipara*, Engelm.
rosea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. rosea*, Scheidw.
Roseanus, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 105 = *M. setispina*, Engelm.
Rueschianus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261. = *M. Ruschiana*, Regel.
ruficeps, Kuntze, l. c. = *M. rhodantha*, Link et Otto.
scolymodes, Kuntze, l. c. = *M. scolymoides*, Scheidw.
setispinus, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 106 = *M. setispina*, Engelm.
senilis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. senilis*, Lodd.
subcurvatus, Kuntze, l. c. = *M. subcurvata*, A. Dietr.
tetracentrus, Kuntze, l. c. = *M. tetracentra*, Hort. Bern.
tetrancistrus, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 104 = *M. phellosperma*, Engelm.
texensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) = *M. Heyderi*, Muehlenpf.
tuberculatus, Kuntze, l. c. = *M. strobiliformis*, Scheer.
Vrieseanus, Kuntze, l. c. 260 = *M. speciosa*, De Vriese.
zephyranthodes, Kuntze, l. c. = *M. zephyranthoides*, Scheidw.

CADABA, Forsk. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 369.
juncea, Szyszyl. Polypet. Rehmann. (1887) 18 = *juncea*, Harv.
scandens, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 361. — Afr. trop. or.

CAESALPINIA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 370.
Andreana, M. Micheli, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 193. — N. Gran.

CAESALPINIA: —

- aphylla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 19. — Chili.
Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 22 = *Hoffmanseggiae* sp.
brachycarpa, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 123 = Hoffm. *brachycarpa*, A. Gray.
canescens, Fisher, l. c. = Hoffm. *canescens*, Fisher.
caudata, Fisher, l. c. = Hoffm. *caudata*, A. Gray.
drepanocarpa, Fisher, l. c. 122 = Hoffm. *drepanocarpa*, A. Gray.
Drummondii, Fisher, l. c. 123 = Hoffm. *Drummondii*, Torr. et Gray.
falcaria, Fisher, l. c. 122 = Hoffm. *falcaria*, Cav. Fisheriana, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 23 = *Hoffmanseggiae* sp.
fruticosa, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 123 = Hoffm. *fruticosa*, S. Wats.
gladiata, Fisher, l. c. 122 = Hoffm. *gladiata*, Benth. Godefroyana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 166. — Coch. Grisebachiana, Kuntze, l. c. = C. Bonduc, Linn.? *intricata*, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 123 = Hoffmannseggia *glabra*, Fisher.
Jamesii, Fisher, l. c. 123 = Hoffm. *Jamesii*, Torr. et Gray.
melanosticta, Fisher, l. c. = Hoffm. *melanosticta*, A. Gray.
multiflora, Robins. in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 167. — Mexic.
multijuga, Fisher, l. c. = Hoffmannseggia *multijuga*, S. Wats.
oxycarpa, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 122 = Hoffm. *oxycarpa*, Benth.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 47. — Calif.
pannosa, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 150. — Calif.
paucijuga, Benth. ex Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1977. — Ins. Trinit.
placida, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 131. — Calif.
platycarpa, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 122 = Hoffmannseggia *platycarpa*, Benth.
platyloba, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 425. — Mexic.
repens, Eastwood, in Zoë, iv. (1893) 116 t. 26. — Utah.
rosulata, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 23; et iv. (1895) 206 = *Fisheriana*, Rusby.
sessilifolia, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 450. — Mexic.
texana, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 123 = Hoffmannseggia *texana*, Fisher.
Taubertiana, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 345. — Bras.
virgata, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 123 = Hoffmannseggia *microphylla*, Torr.
Watsoni, Fisher, l. c. 122 = Hoffm. *gracilis*, S. Wats.

CAESALPINIODES, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 166 = **CAESALPINOIDES**, Linn. = **Gleditschia**, Clayton (Legumin.).
africanum, australe, caspium, heterophyllum, japonicum, macracanthum, monospermum, sinense, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 167 = *homonyma omnia* Gleditschiae.
triacanthum, Kuntze, l. c. = *G. triacanthos*, Linn.

CAESIA, R. Br. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 371.
brevicaulis, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 353 (= *Anthericum brevicaule*, Baker). — Afr. austr.
brevifolia, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Anth. brevifolium*, Thunb.). — Afr. austr.
contorta, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Anth. contortum*, Linn. f.). — Afr. austr.
scilliflora, Th. Dur. et Schinz, l. c. 354 (= *Anth. scilliflorum*, Eckl.). — Afr. austr.
subulata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 530. — Madag.
Zeyheri, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) (= *Anthericum Zeyheri*, Baker). — Afr. austr.

CAIOPHORA, Presl = **Blumenbachia**, Schrad. (Loas.).

CAIOPHORA: —

- albiflora*, Urban et Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 119. — Reg. Argent.
anemonoides, Urban et Gilg, l. c. 119. — Chili.
Archavaletae, Urban, l. c. 120. — Urug.
boliviana, Urban et Gilg, l. c. 119. — Bolivia.
Buracavi, Urban et Gilg, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 37. — Bolivia.
canarinoides, Urban et Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 119. — Bolivia.
cernua, Urban et Gilg, ex Kurtz, in Revista Museo La Plata, v. (1893) 829, et Sert. Cordob. (1893) 11; et in Engl. et Prantl, l. c. = *Blumenbachia cernua*, Griseb.
contorta, Urban et Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 119. — Chili, Peruvia.
dissecta, Urban et Gilg, l. c. 120. — Chili.
Eichleri, Urban, l. c. 121. — Bras.
Espigneira, Urban et Gilg, l. c. *Blumenbachia* *Eepigneera*, C. Gay.
heptomera, Urban et Gilg, l. c. — Bolivia.
hibiscifolia, Urban et Gilg, l. c. 119. — Reg. Argent.
horrida, Urban et Gilg, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 36. — Bolivia.
Kurtzii, Urban et Gilg, ex Kurtz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1894) 107. — Reg. Argent.
macrocarpa, Urban et Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 119. — Reg. Argent.
mollis, Urban et Gilg, l. c. — Reg. Argent.
Orbignyana, Urban et Gilg, l. c. — Bolivia.
Pavonii, Urban et Gilg, l. c. — Peruvia.
Prietea, Urban et Gilg, l. c. 120 = *Blumenbachia* *Prietea*, C. Gay.
pulchella, Urban et Gilg, ex Kurtz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1894) 111 nomen. — Reg. Argent.
Rahmeri, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 23. — Chili.
Rusbyana, Urban et Gilg, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 35. — Bolivia.
rosulata, Urban et Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 119. — Peruvia.
scabra, Urban, l. c. 121. — Bras.
superba, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 23. — Chili.

CAJU, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 167 = **CAJUM**, Rumpf = **Pongamia**, Vent. (Legumin.).
pinnatum, Kuntze, l. c. = *P. glabra*, Vent.

CALACANTHUS, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 483 = **Calacantha**, T. Anders. (Acanth.).
grandiflorus, Kuntze, l. c. = *C. Dalzelliana*, T. Anders.

CALADENIA, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 372.
cardiochila, Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. ix. (1887) 60 = *Cavinsiana*, F. Muell.
macrophylla, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 396. — N. Zel.
tentaculata, Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xii. (1889) 130. — Austral.
toxochila, Tate, l. c. 129. — Austral.

CALADIUM, Vent (Aroid.). — Ind. Kew. i. 372.
adamantinum, L. Lind. in Illustr. Hortic. (1890) 71 t. 532. — Peruvia.
amboinense, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 532 in syn. = *Homalomena caerulea*, Jungh.
heterotypicum, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 500 t. 35 fig. 13. — Bras.
lilliputiense, Rodigas, in Illustr. Hortic. (1895) 363 t. 47. — Venez.
medio-radiatum, L. Lind. et Rodigas, l. c. (1890) 51 t. 528. — N. Gran.
ovatum, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 519 in syn. = *Ariopsis peltata*, Nimmo.
rubescens, N. E. Br. in Gard. Chron. (1893) ii. 86. — Bras.
sagittatum, L. Lind. et Rodigas, in Illustr. Hortic. (1890) 101 t. 538. — Bras.

CALADIUM: —

venosum, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1893) ii. 86. — Bras.

CALAIS, DC. = **Microseris**, D. Don (Compos.). *Clevelandi*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 153. — Calif.

Kelloggii, Greene, l. c. ii. (1886) 49. — Calif. *Parryi*, Greene, l. c. = *Clevelandi*, Greene. *pluriseti*, Greene, Pittonia (Mar. 1887) 34. — Calif. *submembranacea*, Fernald, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 535. — Mexic.

CALAMAGROSTIS, Adans. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 374.

arctica, *Vasey, Illustr. N. A. Grass.* ii. (1893) t. 55; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 268. — Am. arct.

aurea, *Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1884)* 8 (= *Deyeuxia aurea*, Munro). — Ecuad. *bihariensis*, Simonk. in *Termész. Füzet.* x. (1886) 184; et *Enum. pl. Transsilv.* (1886) 566. — Transs.

breviseti, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club.* vi. (1894) 41 = *Pickeringii*, A. Gray. *cinnoides*, Scribn. l. c. 42 (= *C. cinnoides*, Spreng.) = *Deyeuxia Nuttalliana*, Vasey.

collina, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1887-88) 105. — China.

crassifolia, *Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 8 nomen. — Ecuad.

Curtisii, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 269 in obs. et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 209. — Am. bor.

densa, *Vasey, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 147 (densus), et *Illustr. N. Am. Grass.* ii. (1892) t. 40. — Calif.

dubia, *Scribn. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249. — Am. bor.

emirnenis, *Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 831 (= *Deyeuxia emirnenis*, Baker). — Madag.

epigea, « Roth » ex St-Lager, in *Cariot, Étud. des fl.* éd. 8, ii. (1889) 905 = *epigeios*, Roth.

Haussknechtiana ×, Torges, in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, viii. (1895) 16. — Germ.

Indagata ×, Torges et Hausskn. l. c. 26. — Germ. *irazuensis*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 763. — Costarica. *koelerioides*, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 147. — Calif.

longearistata, *Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 8 (= *Deyeuxia longearistata*, Wedd.). — Ecuad.

Macouniana, *Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249, et iii. (1892) 81. — Am. bor.

Mannii, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) = *Deyeuxia Mannii*, Hook. f.

Matsumurae, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 628. — Japon.

montanensis, *Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249, et iii. (1892) 82. — Am. bor.

moupinensis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1888) 106. — China.

pallida, *Vasey et Scribn. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249; et iii. (1892) 79. — Am. bor. (Washington).

paradoxa, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 346. — Reg. Cauc.

robusta, *Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249; et iii. (1892) 82. — Am. bor.

scabrescens, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1888) 105. — China.

scopulorum, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 722. — Utah.

Sodiroana, *Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 8 nomen. — Ecuad.

Spruceana, *Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 8 (= *Deyeuxia Spruceana*, Wedd.). — Ecuad.

Suksdorfii, *Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249; et iii. (1892) 82. — Am. bor.

Torgesiana ×, Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 69. — Germ.

Tweedyi, *Scribn. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249; t. iii. (1892) 83; et in *Vasey, Ill. N. Am. Grass.* ii. (1892) t. 44. — Washing.

CALAMAGROSTIS: —

villosa, St-Lager, in *Cariot, Étud. des fl.* éd. 8, ii. (1889) 906 = *Halleriana*, DC.

Wirtgeniana ×, Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi (1894) 68. — Germ.

Yatabei, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 627. — Japon.

CALAMINTHA, (Tourn.) Linn. (Labi.). — Ind. Kew. i. 375.

baborensis, Batt. in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 679; et in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxvi. (1889) 64. — Algeria.

Baumgarteni, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl. II.* i. (1889) 255 = *alpina*, Lam.

glabra, Trelease, ex Branner et Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* 1888, i. (1891) 211 = *Nuttallii*, Benth.

hungarica, Simonk. in *Termész. Füzet.* x. (1886) 182. — Eur. or.

hungarica, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl. II.* i. (1889) 255 = *praeac.*

intermedia, H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 220 = *sylvatica*, Bromf.

Kilimandschari, Gürke, ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 366. — Afr. trop. or.

mixta ×, Ausserdorfer, ex H. Braun. et Sennh. in *Oest. Bot. Zeitschr.* x. (1890) 158; G. Beck, *Fl. Nieder-Oest. ii.* (1892) 999. — Austria.

origanifolia, St-Lager, in *Cariot, Étud. des fl.* éd. 8, ii. (1889) 665, sphalm. = *Clinopodium origanifolium*, Labill.

CALAMOVILFA Hack. True Grasses (1890) 113. GRAMINEAE.

brevipilis, Hack. l. c. (= *Calamagrostis brevipilis*, A. Gray). — Am. bor.

longifolia, Hack. l. c.; et ex S. Wats. in *A. Gray, Man. N. Am. Bot.* ed. 6. (1890) 651 (= *Calamagrostis longifolia*, Hook.). — Am. bor.

CALAMUS, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 376.

armensis, *Becc. Malesia*, iii. (1886) 61. — Ins. Arm. *axillaris*, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 456. — Perak.

Barteri, *Drude*, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 111 nomen. — Sierra-Leone.

Brandisii, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 448. — Travanc.

conirostris, *Becc. l. c.* 461. — Perak.

Cuthbertsoni, *Becc. in Nuov. Giorn. bot. Ital.* xx. (1888) 179. — N. Guin.

densiflorus, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 445. — Perak.

digitatus, *Becc. l. c.* 442. — Zeyl.

diffusus, *Becc. l. c.* 447. — Penins. Mal.

Doriaei, *Becc. l. c.* 456. — Burma.

filipendulus, *Becc. l. c.* 443. — Perak.

Feanus, *Becc. l. c.* 448. — Tenass.

flabellatus, *Becc. Malesia*, iii. (1886) 62. — Borneo.

Gamblei, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 453. — Ind. or.

giganteus, *Becc. l. c.* 460. — Perak.

grandis, Hort. ex *Illustr. Hort.* (1895) 223. — Borneo?

Heudelotii, *Becc. et Drude, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 112 et 134. — Guinea.

Hollrungii, *Becc. in K. Schum. et Hollv. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 17. — N. Guin.

interruptus, *Becc. Malesia*, iii. (1886) 60. — N. Guin.

Lobbianus, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 451. — Penins. Mal.

luridus, *Becc. l. c.* 445. — Perak.

Martianus, *Becc. l. c.* 459. — Penang.

melanocarpus, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 392. — Penins. Mal.

myrianthus, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 451. — Burma.

neglectus, *Becc. l. c.* 458. — Malacca.

nicobaricus, *Becc. l. c.* 446. — Ins. Nicob.

pallidulus, *Becc. l. c.* 457. — Perak.

papuanus, *Becc. Malesia*, iii. (1886) 60. — N. Guin.

paspalanthus, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 450. — Perak.

perakensis, *Becc. l. c.* 451. — Perak.

Pseudosetal, *Becc. l. c.* 465. — Perak.

pseudo-tenuis, *Becc. l. c.* 445. — Zeyl.

CALAMUS: —

pygmaeus, *Becc. Malesia*, iii. (1886) 8. — Borneo. *radulosus*, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 443. — Perak.

rugosus, *Becc. l. c.* 443. — Perak.

robustus, L. Lind. et Rodigas, in *Illustr. Hort.* (1893) 19 t. 569. — Borneo.

serrulatus, *Becc. Malesia*, iii. (1886) 61. — N. Guin.

simplex, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 456. — Perak.

singaporensis, *Becc. l. c.* 454. — Penins. Mal.

Thwaitesii, *Becc. l. c.* 441. — Zeyl.

tomentosus, *Becc. l. c.* 455. — Perak.

travancoricus, *Bedd. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 452. — Deccan.

triqueter, *Becc. Malesia*, iii. (1886) 62. — Borneo.

vestitus, *Becc. l. c.* 59. — N. Guin.

viridispinus, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 458. — Perak.

zebrinus, *Becc. Malesia*, iii. (1886) 59. — N. Guin.

zeylanicus, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 455. — Zeyl.

CALANDRINIA, H. B. et K. (Portul.). — Ind. Kew. i. 378.

ambigua, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 34 = *sesuvioides*, A. Gray.

armeriifolia, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 25. — Chili.

calocephala, *Phil. l. c.* — Chili.

capiapina, *Phil. l. c.* — Chili.

Howellii, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 262. — Oreg.

sesuvioides, A. Gray, l. c. xxii. (1887) 278. — Calif.

spicigera, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 25. — Chili.

CALANTHE, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 378.

Augusti-Reignieri, Hort. ex Rev. *Hortic.* (1894) 134 = *Reignieri*, *Reichb. f.*

buccinifera, *Rolfe, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 318. — China.

Darblayana ×, Hort. Maron, ex God.-Leboeuf, in *l'Orchidophile* (1889) 178 cum ic. — Hybr. artef.

Davidi, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1888) 85. — China.

curantigoides, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 650 sphalm. = *curculigoides*, Lindl.

delphinoides, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 55. — Kamerun.

diploxiphion, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 849. — Perak.

ecarinata, *Rolfe, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 318. — China.

elytroglossa, *Reichb. f. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 853. — Reg. Himal.

Eyermaii ×, Hort. ex Gard. and For. iv. (1891) 16 fig. 3. — Hybr. artef.

fimbriata, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1887) 86. — China.

Fineti ×, Hort. ex Rev. *Hortic.* (1894) 134. = Hybr. artef.

gigantea, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 856. — Perak.

gigas ×, Hort. ex *Gartenfl.* (1894) 24. — Hybr. artef.

Halli ×, Hort. ex Wien, *Illustr. Garten-Zeit.* (1888) 108. — Hybr. artef.

inquilina ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1887) 168 (= *Phaius vestitus*, *Reichb. f.*). — Hybr. artef.

kirishimensis, *Yatabe, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1893) 253 t. 7. — Japon.

labrosa, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 856. — Tenass.

Mannii, *Hook. f. l. c.* 850. — Reg. Himal.

megalopha, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1887) 85. — China.

Muelleri, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 486. — N. Guin.

Mylesii ×, Williams, in *Warn. et Will. Orchid Alb.* ix. (1891) t. 402. — Hybr. artef.

ovalifolia, *Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 239. — Borneo.

pachystalix, *Reichb. f. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 850. — Reg. Himal.

CALANTHE : —

- rubens, *Ridl. in Gard. Chron.* (1890) i. 576. — Penins. Mal.
 Sanderiana, *Williams, Catal.* (1887) 21. — Cochinchina.
 Scortechinii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 854. — Perak.
 tubifera, *Hook. f. l. c.* 855. — Burma.
 Wrayi, *Hook. f. l. c. v.* (1890) 850. — Perak.

CALANTHIDIUM, Pfitzer, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6. (1888) 153. **ORCHIDEAE**.

- labrosum, *Pfitzer, l. c.*; et in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 49. — Moulm.

CALANTICA, Jaub. (Samyd.). — *Ind. Kew.* i. 379.).

- Jauberti*, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1886) 573 = *Bivinia Jaubertia*, *Tul.*
Lucida, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 20. — Madag.
Mantini ×, *Hort. ex Rev. Hort.* (1894) 134. — Hybr. artef.

CALAPPA, Rumpf, *Herb. Amboin.* i. (1741) 9/12 ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 982 = **Cocos**, *Linn.* (Palm.).

- acaulis, acrocomioides, amara, australis, botryophora, campestris, capitata, comosa, coronata, Datil, eriospatha, flexuosa, graminifolia, insignis, leiospatha, Martiana, Mihaniana, nucifera, oleracea, ovinocensis, petraea, pityrophylla, plumosa, Procopiana, Romanzoffiana, schizophylla, speciosa, Weddellii, Yatai*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* generis *Cocos*.
coccodes, Kuntze, l. c. = *Cocos Syagrus*, *Drude*.
elegantina, Kuntze, l. c. = *Cocos Weddelliana*, *Drude*.
Sancona, Kuntze, l. c. (= *Syagrus Sancona*, *Karst.*). — N. Gran.

CALATHEA, G. F. W. Mey. (Scitam.). — *Ind. Kew.* i. 379.

- Achira*, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 108 (= *Phrynium Achira*, *Poepp. et Endl.*). — Bras.
albicans, *A. Brongn. ex Petersen*, l. c. 97 nomen, = *undulata*, *Lind. et Éd. André*.
amplissima, *Petersen*, l. c. 115. — Bras.
Bakeri, *C. B. Clarke, ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss.* (1895) 464 nomen. — Am. centr.
barbata, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1898) 110. — Bras.
concolor, *Eichl. ex Petersen*, l. c. 126. — Hab.?
crotalifera, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 86. — Guatem.
cyclophora, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 17. — Guian. angl.
discolor, *G. F. W. Mey. ex Eggers, in Bot. Centralbl.* liii. (1893) 307. — Baloo.
Eichleri, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 108. — Bras.
Gardneri, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 18. — Bras.
Glaziovii, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 111. — Bras.
gracilis, *Petersen, in Vid. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 328. — Bras.
grandis, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 124. — Guian. batav.
humilis, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 489. — Bras.
inocephala, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 694. — Panama.
insignis, *Petersen, ex Eggers, in Bot. Centralbl.* liii. (1893) 307. — Baloo.
insignis, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 124. — Panama.
Koernickeana, *Petersen, in Vid. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 330. — Bras.
lanata, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 119. — Bras.
Lindbergii, *Petersen, l. c.* 113. — Bras.
Marcelli, *Hort. ex Petersen*, l. c. 118 = *virginalis*, *Lind.*
Neoviedii, *Petersen, l. c.* 117. — Bras.
Petersenii, *Eggers, in Bot. Centralbl.* liii. (1893) 304. t. l. — Baloo.

CALATHEA : —

- praecox*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 488. — Bras.
propinqua, *Hort. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 127 = *Koernickeana*, *Regel.*
rhizantha, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 433. — Gabon.
sciuroides, *Petersen, in Vid. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 329. — Bras.
Sodiroid, *Eggers, in Bot. Centralbl.* liii. (1893) 306. — Baloo.
straminea, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 118. — Bras.
subtilis, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 487. — Bras.
vaginata, *Petersen, in Vid. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 331. — Bras.

CALCEOLARIA, *Linn.* (Scrophul.). — *Ind. Kew.* i. 380.

- aconcaguina*, *Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1895) 150. — Chili.
algarrobenensis, *Phil. l. c.* 136. — Chili.
arachnoideo-crenatiflora, *Rodigas, in Illustr. Hort.* (1888) 51 t. 54. — Form. hort.
asperula, *Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1895) 153. — Chili.
auriculata, *Phil. l. c.* 151. — Chili.
bigemina, *Phil. l. c.* 158. — Chili.
bipartita, *Phil. l. c.* 156. — Chili.
Borchersi, *Phil. l. c.* 149. — Chili.
brunellifolia, *Phil. l. c.* 155. — Chili.
Burbridgei ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1886) 464. — Hybr. artef.
albula, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 391. — N. Zel.
Campanae, *Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1895) 152. — Chili.
cheiranthoides, *Phil. ex Reiche, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 49. — Chili.
compacta, *Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1894) 139. — Chili.
cordata, *Phil. l. c.* 159. — Chili.
crocea, *Phil. l. c.* 139. — Chili.
cuspidata, *Phil. l. c.* 148 = *petiolaris*, *Cav.?*
dumetorum, *Phil. l. c.* 144. — Chili.
effusa, *Phil. l. c.* 147. — Chili.
Georgiana, *Phil. l. c.* 138. — Chili.
glutinosa, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) nomen, et xviii. (1894) 483. — Chili.
Gmelini, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 134, = *integrifolia*, *Linn.*
irazuensis, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 292. — Costarica.
Kingi, *Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1895) 149. — Chili.
lepida, *Phil. l. c.* 140. — Chili.
longepetiolata, *Phil. l. c.* 144. — Chili.
Oreas, *Phil. l. c.* 137. — Chili.
Palenae, *Phil. l. c.* 155. — Chili.
pallida, *Phil. l. c.* 144. — Chili.
parvifolia, *Phil. l. c.* 136. — Chili.
Poeppigiana, *Phil. l. c.* 153. — Chili.
pristiphylla, *Phil. l. c.* 138. — Chili.
pubescens, *Phil. l. c.* 139. — Chili.
pulchella, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1892) 70. — Chili.
rupicola, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 273 et 290 nomen; et xviii. (1894) 483. — Chili.
salicariifolia, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 135. — Chili.
stachydifolia, *Phil. l. c.* 143. — Chili.
stellariifolia, *Phil. in An. Mus. nac. Chile* (1892) 70. — Chili.
Sturmii, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 392. — N. Zel.
tenerifolia, *Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1895) 157. — Chili.
villosa, *Phil. l. c.* 142. — Chili.
Williamsi, *Phil. l. c.* 158. — Chili.

CALCEOLARIA, *Loeffl. Iter Hisp.* (1758) ex Kuntze *Rev. Gen.* (1891) 40 = **Ionidium**, *Vent.* (Violar.).

- alba, anomala, atropurpurea, bicolor, bigibbosa, brevicaulis, caffra, calycina, capensis, communis, concolor, debilissima, elata, filiformis, floribunda, fruticulosa,*

CALCEOLARIA : —

- glutinosa, gracilis, heterosepala, Hieronymi, Ipecacuanha, lamata, lasiocarpa, linearis, longifolia, Lorentziana, Maximiliani, oppositifolia, Poaya, procumbens, ramosissima, setigera, Sprucei, stricta, thymifolia, verbenacea, Vernonii, villosissima*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 40-41 = *homonyma omnia* *Ionidii*.
angustata, Kuntze, l. c. 41 = *Ionidium angustatum*, *Klotzsch, fide Kuntze*.
arborea, Kuntze, l. c. = *Corynostylis Loefflingii*, *Spreng.*
Bangii, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 6. — Bolivia.
Botteri, Kuntze, l. c. = *I. Botteri*, *Turcz.*
brasiliensis, *Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sc.* vii. (1892) 51 = *I. album*, *St-Hil.*
circaeoides, Kuntze, l. c. = *I. circaeoides*, *H. B. et K.*
enneasperma, Kuntze, l. c. = *I. heterophyllum*, *Vent.*
Lehmannii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 57 in obs. = *I. Lehmannii*, *Hieron.*
lobelioides, Kuntze, l. c. = *I. lobelioides*, *Schlecht.*
microphylla, Kuntze, l. c. = *I. glutinosum*, *Vent.*
Mocinoana, Kuntze, l. c. = *I. calceolarium*, *Ging.*
occulta, Kuntze, l. c. = *I. occultatum*, *Polak.*
parvifolia, Kuntze, l. c. = *I. glutinosum*, *Vent.*
phyllanthoides, Kuntze, l. c. = *I. phyllanthoides*, *Planch. et Lind.*
riparia, Kuntze, l. c. = *I. oppositifolium*, *Roem. et Schult.*
Tatei, Kuntze, l. c. (= *Hybanthus Tatei*, *F. Muell.*). — Austral.
verticillata, Kuntze, l. c. = *I. polygalaeifolium*, *Vent.*

CALCEOLUS, (Tourn.) *Adans.* = **Cypripedium**, *Linn.* (Orchid.).

- alternifolius*, *St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd.* 8. ii. (1889) 816 = *Cypripedium Calceolus*, *Linn.*

CALDASIA, *Mutis* = **Helosis**, *Rich.* (Balanophor.).

- brasiliensis*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 590 = *H. guyanensis*, *Rich.*
mexicana, Kuntze, l. c. = *H. mexicana*, *Lehm.*

CALEA, *Linn.* (Compos.). — *Ind. Kew.* i. 384.

- angusturana*, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 56. — Columb.
caracasana, *Hieron. l. c.* in obs. = seq.
caracasana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 324 (= *Allo-carpus caracasanus*, *H. B. et K.*). — Venez.
floribunda, *Baker, in Kew Bull.* (1893) 157. — Bras.
glomerata, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 45. — Columb.
Liebmannii, *Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 145. — Mexic.
multiradiata, *Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1893) 120. — Mexic.
orizabaensis, *Klatt, in Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 145. — Mexic.
pachensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 56. — Columb.
Palmeri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 430. — Mexic.
pellucidinerva, *Klatt, ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 207. — Costarica.
robusta, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 151. — Bolivia.
sillaensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 324. — Venez.
ternifolia, *Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 277 t. 43b. (*Oliver, ex im Thurm, in Timehri*, v. [1886] 197.). — Guian. angl.
tolimana, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 57. — Columb.
Trianae, *Hieron. l. c.* 58. — Columb.
trichotoma, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1889) 299. — Guatem.

CALENDULA, *Linn.* (Compos.). — *Ind. Kew.* i. 383.

- foliosa*, *Batt. in Batt. et Trab. El. de l'Algér.* (Dicot.) (1888) 479. — Algeria.

CALENDULA :—

microphylla, Lange, ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. n. i. (1889) 178 = *microphylla*, Lange.

CALEPINA, Adans. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 334. *cochlearioides*, Kern. Sched. fl. Austro-Hung. vi. (1893) 15 = *C. Corvini*, Desv.

CALESIUM, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 151 = **CALESIAM**, Adans. = **Odina**, Roxb. (Anacard.). *acidum*, *asplenifolium*, *Barteri*, *discolor*, *edule*, *fruticosum*, *humile*, *obovatum*, *ornifolium*, *Schimper*, *Schweinfurthii*, *speciosum*, *triphyllum*, *velutinum* Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Odinae. *alatum*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1892) 153. — Reg. Somal. *cinereum*, Engl. l. c. — Reg. Somal. *ensifoliolatum*, Engl. l. c. — Reg. Somal. *fulvum*, Engl. l. c. — Afr. trop. or. *grande*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 151 = *O. Wadiae*, Roxb. *obcordatum*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1892) 153. — Reg. Somal. *tomentosum*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

CALETIA, Baill. = **Micranthemum**, Desf. (Euphorb.). *ericoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 595 = *M. ericoides*, Desf.

CALIMERIS, Nees = **Aster**, Tourn. (Compos.). *fruticosa*, C. Winkl. in Aet. Hort. Petrop. ix. (1886) 419. — As. centr.

CALLA, Linn. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 384. *Pentlandii*, Hort. ex Kew Bull. (1893) Append. ii. 30 = *Richardia Pentlandii*, Hort.

CALLIANDRA, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 386. *boliviana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 327. — Bolivia. *Chapadae*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 349. — Bras. *cinerea*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 70. — Bras. *Glaziovii*, Taub. l. c. 71. — Bras. *nitida*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 410. — Mexic. *Palmeri*, S. Wats. l. c. — Mexic. *Schwackeana*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 69. — Bras. *tolimensis*, Taub. ex Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 314. — N. Gran.

CALLIANTHEMUM, C. A. Mey. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 386. *anemonoides*, Kern. Sched. fl. Austro-Hung. v. (1888) 35 = *rutaefolium*, Reichb. *anemonoides*, Zahlbr. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1888) 57 = *praec.* *Kernerianum*, Freyn, ex Kern. Sched. fl. Austro-Hung. v. (1888) 36. — Austria.

CALLICARPA, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. i. 386. *caudata*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 76. — Ins. Philipp. *pilosissima*, Maxim. l. c. — Ins. Formos. *shikokiana*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 54. — Japon. *tosaensis*, Makino, l. c. 181. — Japon.

CALLICHLAMYS, Miq. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 386. *latifolia*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1894) 223. — Bras. *Peckoltii*, Bur. ex K. Schum. l. c. fig. 88. — Bras.

CALLICHROA, Fisch. et Mey. = **Layia**, Hook. et Arn. (Compos.). *Jonesii*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 228 = *Layia Jonesii*, A. Gray. *nutans*, Greene, l. c. 227. — Calif.

CALIPHURIA, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 384.

Bonplandii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1136 (Calliphuria) = *Hymenocallis Bonplandii*, Kunth.

candida, Baill. l. c. (Calliphuria) = *Eucharis candida*, Planch. et Lind.

Castelnaeana, Baill. l. c. 1135 (Calliphuria.). — Peruvia. *tenera*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 112. — N. Gran.

CALLIGONUM, Linn. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 387.

minimum, Lipski, Exc. bot. au delà Mer Casp. (1889) 19. — Rossia.

CALLIPRORA, Lindl. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.). *ixioides*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 318 = *B. ixioides*, S. Wats.

lugens, Greene, l. c. 319 = *B. lugens*, Greene.

scabra, Greene, in Erythea, iii. (1895) 126. — Calif.

CALLISTA, Lour. = **Dendrobium**, Sw. (Orchid.).

acerosa, *acicularis*, *acinaciformis*, *acrobatica*, *acuminatissima*, *Adae*, *adunca*, *aemula*, *affinis*, *aggregata*, *agrostophylla*, *albosanguinea*, *alpestris*, *amboinensis*, *amethystoglossa*, *amoena*, *ampla*, *anceps*, *angulata*, *angustifolia*, *antennata*, *Aphrodite*, *appendiculata*, *aquea*, *Arachnites*, *attenuata*, *aurantiaca*, *aurorosa*, *Bailei*, *Bairdiana*, *bambusifolia*, *barbatula*, *Bensoniae*, *bicamerata*, *bicaudata*, *bifalcis*, *bifaria*, *biflora*, *bigibba*, *biloba*, *Binnendykii*, *binocularis*, *bolboflora*, *Boothii*, *brachypetala*, *Brachypus*, *bursigera*, *calophylla*, *Calopogon*, *canaliculata*, *candida*, *capillipes*, *Cathcartii*, *chrysantha*, *chrysocrepis*, *chrysotoxa*, *ciliata*, *clavata*, *clavipes*, *Coelogyne*, *comata*, *connata*, *convexa*, *cornuta*, *crepidata*, *cretacea*, *crocata*, *cruenta*, *crumenata*, *crystallina*, *cucumerina*, *cumulata*, *cuspidata*, *densiflora*, *denudans*, *Devoniana*, *dicupha*, *Diodon*, *distachya*, *disticha*, *dixantha*, *Draconis*, *elongata*, *eriaeflora*, *erosa*, *eulophota*, *euphlebia*, *excavata*, *Falconeri*, *fimbriata*, *Findlayana*, *Fitzgeraldii*, *flavescens*, *flavivula*, *floribunda*, *Foelschei*, *foliosa*, *formosa*, *fugax*, *funiformis*, *furcata*, *fuscescens*, *Fytcheana*, *geminata*, *Gibsonii*, *glossotis*, *Gouldii*, *gracilicaulis*, *gracilis*, *graminifolia*, *grandiflora*, *grandis*, *gratissima*, *Griffithiana*, *haemoglossa*, *Harveyana*, *Hasseltii*, *herbacea*, *hercoglossa*, *heterocarpa*, *heterodea*, *Heyneana*, *hispidula*, *Hookeriana*, *Hornei*, *hymenantha*, *hymenoptera*, *incrassata*, *incurva*, *indivisa*, *Infundibulum*, *insignis*, *intermedia*, *javanica*, *Jerdonianae*, *Johannis*, *juncea*, *kentrophila*, *kentrophylla*, *Kingiana*, *Kuensteri*, *Kuhlii*, *labuana*, *lamellata*, *lancifolia*, *lasioglossa*, *Laviana*, *Leonis*, *leucoclora*, *leucolophota*, *lilacina*, *Linawiana*, *lituiflora*, *lobata*, *Lobbii*, *Loddigesii*, *lonchophylla*, *longicollis*, *longipes*, *Lubbersiana*, *lucens*, *Lowii*, *lunata*, *luteola*, *Macfarlanei*, *Macraei*, *macrantha*, *macrophylla*, *macropoda*, *Macropus*, *macrostachya*, *marginata*, *marmorata*, *megaceras*, *metachilina*, *microbulbon*, *misera*, *moniliformis*, *monophylla*, *Moorei*, *Mortii*, *moulmeinensis*, *mutabilis*, *nana*, *Nathanielis*, *nitidissima*, *nobilis*, *normalis*, *nuda*, *nutans*, *ochreatea*, *ochroleuca*, *ophioglossa*, *packyglossa*, *Palpebrae*, *pandurata*, *panduriformis*, *parca*, *Parishii*, *parviflora*, *pendula*, *perakensis*, *Perula*, *Phalaenopsis*, *platygastria*, *porphyrochila*, *praecincta*, *primulina*, *pugioniformis*, *pulchella*, *pumila*, *purpurea*, *pusilla*, *pycnostachya*, *pygmaea*, *quadrangularis*, *radians*, *ramosa*, *Reichenbachii*, *rep-tans*, *revoluta*, *rhodocentra*, *rhodopterygia*, *rigida*, *rotundata*, *Ruckeri*, *rugosa*, *salacense*, *sanguinolenta*, *sarcantha*, *scabrilinguis*, *Scortechinii*, *sculpta*, *secunda*, *senilis*, *sinuata*, *Smilliae*, *Spatella*, *spathacea*, *speciosa*, *spectabilis*, *spinescens*, *Stratiotes*, *strobiloe-ras*, *Stricklandiana*, *striolata*, *strongylantha*, *Stuartii*, *stiposa*, *subcaulis*, *subulata*, *sulcata*, *Sumneri*, *superbiens*, *taurina*, *tenella*, *tenuicaulis*, *teres*, *teretifolia*, *terminalis*, *tetracodris*, *tetracogona*, *tetrodon*, *thyrsodes*, *Tmesipteris*, *tortilis*, *transparens*, *Treacheriana*, *trichotoma*, *tricuspidis*, *tridentifera*, *triflora*, *trigonopus*, *tropaeoliflora*, *truncata*, *tuberifera*, *uncata*, *undulata*, *unguiculata*, *Veitchiana*, *veratrifolia*, *vexabilis*, *villosula*, *virginica*, *Wattii*, *Williamsonii*, *xantholeuca*, *xanthophlebia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 653-55 = *homonyma omnia* Dendrobii.

CALLISTA :—

aloefolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 653 = *D. Serra*, Lindl.

angulata, Kuntze, l. c. 654 = *D. homonymum*, Steud.

anosma, Kuntze, l. c. 653 = *D. superbum*, Reichb. f.

aphylla, Kuntze, l. c. = *D. Pierardi*, Roxb.

aurea, Kuntze, l. c. = *D. heterocarpum*, Wall.

Beckleri, Kuntze, l. c. 654 = *D. Mortii*, F. Muell.

bicolor, Kuntze, l. c. 653 = *D. subulatum*, Hook. f.

borneoensis, Kuntze, l. c. 654 = *D. Teymannii*, Miq.

Boxaleii, Kuntze, l. c. = *D. gratiosissimum*, Reichb. f.

breviflora, Kuntze, l. c. = *D. bicameratum*, Lindl.

Brymeriana, Kuntze, l. c. = *D. Brymerianum*, Reichb. f.

Calceola, Kuntze, l. c. = *D. Calceolaria*, Carey.

carinifera, Kuntze, l. c. = *D. carinatum*, Willd.

carnosa, Kuntze, l. c. = *D. atropurpureum*, Miq.

commutata, Kuntze, l. c. 653 = *D. homonymum*, Steud.

conostalyx, Kuntze, l. c. 654 = *D. conostalyx*, Reichb. f.

crassinodis, Kuntze, l. c. = *D. pendulum*, Roxb.

Cunninghamii, Kuntze, l. c. = *D. Cunninghamii*, Lindl.

cymbidioides, Kuntze, l. c. = *D. cymbidioides*, Lindl.

Dearii, Kuntze, l. c. = *D. Dearei*, Reichb. f.

eriaeodes, Kuntze, l. c. = *D. eriaeoides*, F. M. Bailey.

Fairfaxii, Kuntze, l. c. = *D. teretifolium*, R. Br.

falconiostrois, Kuntze, l. c. = *D. falcorostrum*, Fitzg.

Farmeri, Kuntze, l. c. = *D. Farmerii*, Paxt.

flabella, Kuntze, l. c. = *D. Macraei*, Lindl.

Fytcheana, Kuntze, l. c. = *D. Fytchianum*, Batem.

Gordonii, Kuntze, l. c. = *D. Gordonii*, S. Moore.

Huttonii, Kuntze, l. c. = *D. Huttonii*, Reichb. f.

hymenophylla, Kuntze, l. c. = *D. Hymenophyllum*, Lindl.

japonica, Kuntze, l. c. = *D. moniliforme*, Sm.

Jenkinsii, Kuntze, l. c. = *D. parviflorum*, Reichb. f.

Jonopus, Kuntze, l. c. 655 = *D. ionopus*, Reichb. f.

linguiformis, Kuntze, l. c. = *D. linguaeforme*, Sw.

longicornis, Kuntze, l. c. = *D. longicornu*, Lindl.

lycopodioides, Kuntze, l. c. = *D. lycopodioides*, Lindl.

Macarthiae, Kuntze, l. c. = *D. MacCarthiae*, Thw.

micrantha, Kuntze, l. c. = *D. Serra*, Lindl.

Mirbelliana, Kuntze, l. c. = *D. Mirbelianum*, Gaudich.

moschata, Kuntze, l. c. = *D. Calceolaria*, Carey.

oculata, Kuntze, l. c. 653 = *D. fimbriatum*, Hook.

ovata, Kuntze, l. c. = *D. chlorops*, Lindl.

oxystophylla, Kuntze, l. c. 654 = *D. rigidum*, R. Br.

pachyphylla, Kuntze, l. c. = *D. carnosum*, Teijsm. et Binn.

Reinwardtii, Kuntze, l. c. 655 = *D. Reinwardtii*, Lindl.

rigescens, Kuntze, l. c. = *D. formum*, Steud.

suavissima, Kuntze, l. c. = *D. chysotoxum*, Lindl.

subteres, Kuntze, l. c. = *D. acerosum*, Lindl.

Tattoniana, Kuntze, l. c. = *D. canaliculatum*, R. Br.

Teymannii, Kuntze, l. c. = *D. Teymannii*, Miq.

Wardiana, Kuntze, l. c. = *D. pendulum*, Roxb.

CALLISTACHYS, Vent. = **Oxylobium**, Andr. (Legumin.).

aciculifera, *acuta*, *alpestris*, *atropurpurea*, *capitata*, *cordifolia*, *cuneata*, *hamulosa*, *heterophylla*, *microphylla*, *obtusifolia*, *parviflora*, *procumbens*, *Pulteneae*, *reticulata*, *scandens*, *spectabilis*, *staurophylla*, *tricuspidata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 168 = *homonyma omnia* Oxylobii.

coriacea, Kuntze, l. c. = *O. retusum*, R. Br.

ilicifolia, Kuntze, l. c. = *O. trilobatum*, Benth.

retusa, Kuntze, l. c. = *O. virgatum*, Hort. Kew. ex Benth.

CALLISTEMMA, Boiss. = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).

palaestinum, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, ix. (1894) 477 = *S. palaestina*, Linn.

CALLITRICHE, Linn. (Halorag.). — Ind. Kew. i. 388.
bifida, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 215 = *autumnalis*, Linn.
longipedunculata, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 236. — Calif.
longistyla, Norm. in *Christiana Vidensk.-Selsk. Forhandl.* (1892) extr. 28. — Nouv.
microphylla, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887. (1888) 190. — N. Zel.
panormitana, Tornab. *Fl. Sicula* (1887) 245. — Sicilia.

CALLITRIS, Vent. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 389.
Commersonii, Th. Dur. et Schinz, *Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 951 (= *Pachylepis Commersonii*, Brongn.) — Ins. Maurit. et Madag.
juniperoides, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Cupressus juniperoides*, Linn.). — Afr. austr.

CALLOPSIS Volkensii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 47 nomen. — Afr. trop. or.

CALLUNA, Salisb. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 389.
Beleziana, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 500 = *vulgaris*, Salisb.

CALOCEPHALUS, R. Br. (Composit.). — Ind. Kew. i. 390.
Dittrichii, F. Muell. in *Wing. South. Sc. Record*, N. S. ii. (May 1886). — Austral.

CALOCHILUS, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 390.
Holtzei, F. Muell. in *Bot. Centralbl.* l. (1892) 127. — Austral.

CALOCHORTUS, Pursh (Liliac.). — Ind. Kew. i. 390.
amoenus, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1898) 71. — Am. bor. occ.
ciliatus, Robins. et Seaton, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1898) 238. — Washing.
collinus, Lemmon, in *Erythra*, iii. (1895) 49. — Calif.
excavatus, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1890) 71. — Calif.
Holtzei, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Mar. 1892) 180. — Austral.
Howellii, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 266; et in *Gard. and For.* iii. (1890) 348. — Oregon.
invenustus, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1890) 71. — Calif.
Lyoni, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 455. — Calif.
madrensis, S. Wats. l. c. xxiii. (1888) 283; et ex *Gard. Chron.* (1890) ii. 391 fig. 78. — Mexic.
obispoensis, Lemmon, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 180. — Calif.
Plummerae, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1890) 70. — Calif.
venustus, Greene, l. c. i. (Jan. 1888) 158. — Mexic.

COLOCRATER, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 175. *APOCYNEAE*.
Preussii, K. Schum. l. c. — Kamerun.

CALOLISIANTHUS, Gilg, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 99. *GENTIANEA*.
acutangulus, Gilg, l. c. 100 (= *Lisianthus acutangulus*, Mart.) — Bras.
amplissimus, Gilg, l. c. (= *Lis. amplissimus*, Mart.) — Bras.
frigidus, Gilg, l. c. (= *Lis. frigidus*, Sw.). — Ind. occ.
pendunculatus, Gilg, l. c. (= *Lis. pedunculatus*, Cham. et Schlecht.). — Bras.
pendulus, Gilg, l. c. (= *Lis. pendulus*, Mart.) — Bras.
pulcherrimus, Gilg, l. c. (= *Lis. pulcherrimus*, Mart.) — Bras.
speciosus, Gilg, l. c. (= *Lis. speciosus*, Cham. et Schlecht.). — Bras.

CALOMERIA, Vent. = **Humea**, Sm. (Compos.).
cassiniaeformis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 325 = *H. cassiniacea*, F. Muell.
ozothamnoides, Kuntze, l. c. = *H. ozothamnoides*, F. Muell.

punctulata, Kuntze, l. c. = *H. punctulata*, F. Muell.
squamata, Kuntze, l. c. = *H. squamata*, F. Muell.

CALONYCTION, Choisy = **Ipomoea**, Linn. (Convolvul.).
ventricosum, Hallier f., in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 556 nomen. — Mexic.

CALOPHACA, Fisch. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 391.
depressa, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) 2301. — Kashmir.
grandiflora, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 607; et in *Gartenfl.* (1886) 517 t. 1231. — Buchara.

CALOPHANES, D. Don (Acanthac.). — Ind. Kew. i. 391.
californica, Rose, ex Vasey et Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 85. — Calif.
crenata, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 415. — Natal.
fasciculiflora, Martelli, in *Nouv. Giorn. bot. Ital.* xx. (1888) 390 (= *Linostylis fasciculiflora*, Fenzl). — Afr. trop.
Palmeri, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 443. — Mexic.
peninsularis, Rose, ex Vasey et Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 75. — Mexic.

CALOPHYLLUM, Linn. (Guttifer.). — Ind. Kew. i. 391.
australianum, F. Muell. ex Vesque, *Epharm.* ii. (1889) t. 22; et in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 574 — Austral.
borneense, Vesque, ll. cc. 580. — Borneo.
buxifolium, Vesque, ll. cc. 9 t. 18; et 567. — Ins. Philipp.
cerasiferum, Vesque, ll. cc. 10 t. 32; et 585. — Ins. Vit.
Curtisii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 176. — Malaya.
inophylloide, King, l. c. t. 88; Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 549. — Malaya.
Kingianum, Engl. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 221 (= *C. microphyllum*, T. Anders.). — Ind. or.
Kunstleri, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 174; Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 607. — Malaya.
lanceolatum, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 381 = *Warburgii*, Engl.
medium, Zoll. ex Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 579 in syn. = *Teymanni*, Zoll.
Miqueli, Vesque, l. c. 607. — Sumatra.
molle, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 177. — Malaya.
nodosum, Vesque, *Epharm.* ii. (1889) 8 t. 10; et in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 559. — Borneo.
parvifolium, Vesque, l. c. 604 (= *C. macrophyllum*, T. Anders.). — Penins. Mal.
Prainianum, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 175; Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 550. — Malaya.
revolutum, L. C. Rich. ex Vesque, l. c. 596 = *lucidum*, Benth.
rupicolum, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 278. — Penins. Mal.
Schefferi, Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 609. — Ins. Gêbêh (Ind. bat.).
sclerophyllum, Vesque, *Epharm.* ii. (1889) t. 33; et in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 587. — Borneo.
venustum, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 180; Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 549. — Penins. Mal.
Vidalii, Ceron, in Vidal, *Revis. pl. vasc. Filip.* (1892) 229. — Ins. Philipp.
Warburgii, Engl. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 221 (= *C. lanceolatum*, Warb.). — Ins. Key.

CALOPOGON, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 392.
tuberosus, Britton, Stern et Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 52 = *pulchellus*, R. Br.

CALOPOGONIUM Desv. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 392.
racemosum, M. Micheli, in Morot, *Journ. de Bot.* vi. (1892) 187. t. 7. — N. Gran.

CALOPYXIS, Tul. = **Combretum**, Linn.
malifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 474. — Madag.
subumbellata, Baker, l. c. xxv. (1890) 316. — Madag.
trichophylla, Baker, l. c. — Madag.

CALORHABDOS, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 392.
latifolia, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 196. t. 4. — China.
stenostachya, Hemsl. l. c. — China.
venosa, Hemsl. l. c. 197. — China.

CALOROPHUS, Labill. = **Hypolaena**, R. Br. (Restiac.).
anceps, asper, Bentharii, Burchellii, exsulcus, fasciculatus, filiformis, gracilis, impolitus, laxiflorus, pubescens, tenuis, vestitus, virgatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 747 = *homonyma omnia* Hypolaenae.
clavatus, Kuntze, l. c. = *H. fastigiata*, R. Br.
digitatus, Kuntze, l. c. = *H. Eckloniana*, Nees.

CALOSPERMUM, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 11 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).
mammosum, Pierre, l. c. 13 = *L. mammosa*, A. DC.
parvum, Pierre, l. c. — Mexic.

CALOSTEPHANE, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. i. 392.
foliosa, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 436. — Afr. austro-occ. extratrop.
Marlothiana, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 276. — Afr. austro-occ. extratrop.
Schinzii, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 77. — Afr. austro-occ. extratrop.

CALOSTYLIS, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 679 in syn. sphalm. = **CALOSTYLIS**, Blume = **Eria**, Lindl. (Orchid.).

CALOTIS, R. Br. (Compos.). — Ind. Kew. i. 398.
latiuscula, F. Muell. et Tate, in *Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xiii. (1890) 107. — Austral.

CALTHA (Rupp.) Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 393.
Freyiniana, Heldr. ex G. Beck, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvi. (1886) 349 in syn. = *palustris*, Linn.
longirostris, G. Beck, l. c. 348; et in *Annal. naturh. Hofmus. Wien*, v. (1887) 69. — Bosnia.
marginata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 382. — N. Zel.
procumbens, Huth, in Baenitz, *Prosp. Herb. Eur.* (1894) p. 13; et ex *Oest. Bot. Zeitschr.*, (1893) xliii. 438. — Germ.
stagnalis, Magnier, ex Rouy et Fouc. *Fl. de Fr.* i (1893) 114 = *palustris*, Linn.

CALVOA, Hook. f. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 394
grandifolia, Cogn. in DC. *Monog. Phan.* vii. (1891) 424. — Ins. Rolas (Afr. trop. occ.).
Henriquesii, Cogn. l. c. 526. — Ins. S. Thom.
integrifolia, Cogn. l. c. 525. — Ins. S. Thom.
orientalis, Taub. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 46; et in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 296. — Afr. trop. or.

CALYCACANTHUS, K. Schum. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 126; et in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 337. *ACANTHACEAE*.
Magnusianus, K. Schum. ll. cc. — N. Guin.

CALYCOGONIUM, DC. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 394.
biflorum, Cogn. in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 276. — Ins. Portoric.
hispidulum, Cogn. in DC. *Monog. Phan.* vii. (1891) 944. — Ins. S. Doming.
Krugii, Cogn. in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 279. — Ins. Portoric.

CALYCOGONIUM : —

obliquum, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 947 (= *Chavianthus obliquus*, Griseb.). — Cuba. squamulosum, *Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 277. — Ins. Portoric.

CALYCORECTES, Berg (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 395.

densiflorus, *Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 82 (= *Siphoneugenia densiflora*, Berg). — Bras.

Pohlianus, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 117 (= *Schizocalyx Pohlianus*, Berg). — Bras.

Widgrenianus, *Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 82 (= *Siphoneugenia Widgreniana*, Berg). — Bras.

CALYCOTHRIX, Meissn. = **Calythrix**, Labill. (Myrtac.).

Sullivan, F. Muell. ex Sullivan, in *Rep. Austral. Assoc. Advanc. Sc.* (1890) 507, nomen = Calyt. Sullivan, F. Muell.

CALYCOTOME, Link (Legumin.). — Ind. Kew. i. 395.

hispanica, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1890) 162. — Hisp.

CALYPSO, Salisb. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 396.

bulbosa, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club* (1889) 203 = borealis, *Salisb.*

CALYPTRANTHES, Sw. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 396.

angustifolia, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 42. — Bras.

Bergii, *Krug et Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 601. — Cuba.

elegans, *Krug, l. c.* 599. — Ins. Antill.

Fawcettii, *Krug, l. c.* 600. — Ins. Antill.

ferruginea, *Krug et Urban, l. c.* 603 (= *Eugenia ferruginea*, Rich.). — Cuba.

Glazioviana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 35. — Bras.

Krugii, *Kiaersk. in Bot. Tidsskr.* xvii. (1889) 248 t. 11 c. et fig. 1. — Ins. Portoric.

obovata, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 38. — Bras.

obovata, *Krug et Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 600. — Ins. Antill.

Picardae, *Krug et Urban, ex Urban, l. c.* 595. — Ins. Haiti.

Sintensis, *Kiaersk. in Bot. Tidsskr.* xvii. (1889) 250 t. 11 b. — Ins. Portoric.

tobagensis, *Krug et Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 593. — Ins. Antill.

umbelliformis, *Krug et Urban, ex Urban, l. c.* 596. — Jamaic.

Warmingiana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 40. — Bras.

CALYPTRIDIMUM, Nutt. (Portul.). — Ind. Kew. i. 397.

monospermum, *Greene, in Erythra, iii.* (1895) 63 (= *Spraguea umbellata*, Coville). — Am. bor.

nudum, *Greene, Pittonia, i.* (July 1887) 64. — Calif. Parryi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 285. — Calif.

paniculatum, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 144 (= *Spraguea paniculata*, Kell.). — Am. bor. occ.

umbellatum, *Greene, l. c.* (= *Spraguea umbellata*, Torr.). — N. Mexic.

CALYPTRION, Ging. = **Corynostylis**, Mart. (Violar.).

excelsum, *Taub, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1895) 332 = *Coryn. Hybanthus*, Mart.

Hybanthus, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. Ser.* I (1895) 32 = *Coryn. Hybanthus*, Mart.

CALYPTROCALYX, Blume (Palm.). — Ind. Kew. i. 396.

elegans, *Becc. ex K. Schum. et Holll. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 16. — N. Guin.

CALYPTROCHILUM, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 30. **ORCHIDEAE**.

Preussii, *Kraenzl. l. c.* — Afr. trop. occ.

CALYPTROPSIDIUM, Berg = **Psidium**, Linn. (Myrtac.).

Sartorianum, *Krug et Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 581 (= *Mitranthes Sartorianus*, Berg). — Mexic.

Sintensis, *Kiaersk. in Bot. Tidsskr.* xvii. (1890) 280 t. 12b. et fig. 10. — Ins. Portoric.

CALYSACCION, Wight = **Ochrocarpos**, Thou. (Guttifer.).

eugenioides, *Planch. et Triana, ex Vesque, in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 524 = *O. eugenioides*, *Vesque*.

CALYSTEGIA, R. Br. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 398.

abyssinica, *Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 347. — Abyss.

CAMARA, Plum. ex Linn. = **Lantana**, Linn. (Verben.).

alba, brasiliensis, canescens, chamaedrifolia, involucreta, Kist, lucida, Lunduana, macrophylla, macropoda, Maximiliani, microcephala, mollis, Petitiona, Pohl-iana, procurrens, purpurea, Radula, rugulosa, salicifolia, Sellowiana, spicata, Spiraeastrum, stricta, tiliaefolia, trifolia, undulata, velutina, viscosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 371 et 503-504 = *homonyma omnia Lantanae*.

aculeata, *Kuntze, l. c.* 371 = *L. Camara*, Linn.

lippioides, *Kuntze, l. c.* 504 = *L. lippioides*, *Spreng.*

salviaefolia, *Kuntze, l. c.* = *L. salvifolia*, *Jacq.*

Salzmännii, *Kuntze, l. c.* = *L. Salzmännii*, *Schau.*

CAMAREA, St Hil. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 399.

lanata, *Chod. in Arch. sc. phys. et nat.* (1890), *ex Chod. in Mém. Soc. sc. phys. Genève*, xxxi. 2. (1892) n. 3. 20 t. 49. — Parag.

robusta, *Chod. l. c.* 21 t. 48. — Parag.

salicifolia, *Chod. l. c.* 20 t. 47. — Parag.

CAMARIDIUM, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 399.

boliviense, *Rolfe, ex Stapf, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 264. — Bolivia.

Lawrenceanum, *Rolfe, in Kew Bull.* (1894) 185; *et ex Rev. Hort.* (1894) 361. — Hab. ?

CAMAROTEA, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 37. **ACANTHACEAE**.

romiensis, *S. Elliot, l. c.* 38. — Madag.

CAMASSIA, Lindl. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 398.

Cusickii, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 479; *et in Gard. and For.* i. (1888) 172 et 174 fig. 32. — Oregon.

Engelmannii, *Sprenger, in Bollet. Soc. Tosc.ortic.* (1889) 101. — Am. bor.

Howellii, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 135. — Oregon.

Quamash, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 313 = *esculenta*, *Lindl.*

CAMELINA, Crantz (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 399.

ambigua, *Fouc. et Rouy, Fl. de Fr.* ii. (1895) 233 = *foetida*, *Fries*.

confusa, *Rouy et Fouc. l. c.* 235 = *silvestris*, *Wallr.*

rumelica, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* xli. (1891) 123; *et Fl. Bulg.* (1891) 43. — Rumel.

Souliei, (err. cal. ? *Soulieri*), *Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) p. ccxviii; *et xl.* (1893) 262; *et in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie*, App. ii. (1889) p. ii. (= *Brassica Souliei*, Batt.) — Algeria.

CAMELLIA, Linn. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 400.

chinensis, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 64 = *C. Thea*, *Link.*

Donkelaari, *Hort. ex Rev. Hort.* (1893) 412 = *seq.*

CAMELLIA : —

Donkelaaris, *Hort. ex Gard. Chron.* (1889) 429 cum xyl. — Form. hort.

sinensis, *Kuntze, in Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 195 in obs. = *C. Thea*, *Link.*

CAMILLEUGENIA, Frappier, ex Cordem. Fl. ile Réunion (1895) 234. **ORCHIDEAE**.

coccinellides, *Frappier, l. c.* 234. — Madag.

CAMPANEA, Decne. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 400.

picturata, *J. D. Smith, in Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1890) 28 t. 3. — Guatem.

CAMERIUM, Rumph. = **Aleurites**, Forst. (Euphorb.).

cordatum, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 595 = *A. cordata*, *Steud.*

moluccanum, *Kuntze, l. c.* = *A. triloba*, *Forst.*

trispermum, *Kuntze, l. c.* = *A. triloba*, *Forst.*

CAMPANOPSIS, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 378 = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campanul.).

acaulis, adpressa, androsacea, angustifolia, annularis, arenaria, arguta, Banksiana, Berteroi, Bojeri, brasiliensis, Burchellii, caffra, caledonica, capensis, capillacea, cartilaginea, cernua, costata, dalmatica, debilis, decipiens, denudata, dicentrifolia, divergens, Echlonii, emirzensis, epacridea, etbaica, exilis, fernandeziana, flaccida, graminifolia, hederacea, Hilsenbergii, homalanthina, huillana, humilis, inconspicua, ingrata, inambanensis, Kitaibelii, linifolia, madagascariensis, Mannii, Meyeri, montana, nudicaulis, oocarpha, oppositifolia, oxyphylla, paniculata, patula, pauciflora, peduncularis, pilosa, procumbens, prostrata, Pumilio, pusilla, ramulosa, riparia, robusta, Roxburghii, saxicola, silenodes, spinulosa, tenuifolia, tenuis, tuberosa, undulata, Wyleyana, Zeyheri, *Kuntze, l. c.* 378-79 = *homonyma omnia Wahlenbergiae*.

Bowkeriae, *Kuntze, l. c.* 379 = *W. Bowkeriae*, *Sind.*

campanulodes, *Kuntze, l. c.* 378 = *W. Cervicina*, *A. DC.*

dichotoma, *Kuntze, l. c.* 379 = *W. androsacea*, *A. DC.*

linarioides, *Kuntze, l. c.* = *W. linarioides*, *A. DC.*

lobelioides, *Kuntze, l. c.* = *W. pendula*, *Schrad.*

marginata, *Kuntze, l. c.* = *W. gracilis*, *Schrad.*

namaguana, *Kuntze, l. c.* = *W. annularis*, *A. DC.*

serpillifolia, *Kuntze, l. c.* = *Campanula serpyllifolia*, *Vis.*

stellarioides, *Kuntze, l. c.* = *W. stellarioides*, *Cham.*

CAMPANULA, [Tourn.] Linn. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 400.

Amasiae, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 435. — As. Min.

atlantica, *Coss. et Durieu, ex Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie* (Dicot.) (1888) 573 (= *C. afganica*, *Pomel*). — Algeria.

aurita, *Greene, Pittonia, i.* (Oct. 1888) 221. — Alaska.

Autraniana, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 115; *et iii.* (1895) 519. — Reg. Cauc.

Barbeyi, *Feer, in Journ. Bot.* xxviii. (1890) 271. — Italia.

bosniaca, *Murb. in Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 97 = *pseudo-phrygia*, *C. A. Mey.*

brassicifolia, *Somm. et Levier, in Nuov. Giorn. bot. Ital. Ser. II, ii.* (1895) 94. — Reg. Cauc.

breyinina, *G. Beck, Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1105 in obs. = *rotundifolia*, *Linn.*

brodensis, *Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 81 = *patula*, *Linn.*

Brotherorum, *Feer, in Journ. Bot.* xxviii. (1890) 273. — Reg. Cauc.

calcarata, *Somm. et Levier, in Nuov. Giorn. bot. Ital. Ser. II, ii.* (1895) 96. — Reg. Cauc.

calycantherrea, *Hort., Veitch, ex Gard. Chron.* (1889) ii. 718. — Form. hort.

cana, *Simonk. Enum. fl. Transs.* (1886) 383 = *bononiensis*, *Linn.*

cantabrica, *Feer, in Journ. Bot.* xxviii. (1890) 774; *et ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp.* (1893) 120. — Hisp.

castellana, *Pau, Not. bot. fl. Espan. i.* (1887) 24 = *C. Rapunculus*, *Linn.*

CAMPANULA : —

- catinensis*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 357 = *dichotoma*, Linn.
cephallenica, Feer, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 273. — Ins. Cephallen.
chrysosplenifolia, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 364. — Yunnan.
crassa, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, (1894) 11 = *expansa*, Frivald.
crenulata, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 365. — Yunnan.
Delavayi, Franch. l. c. 364. — Yunnan.
Dieckii, Lange, in *Dansk Vidensk. Selsk. Forh.* (1893) 195. — Hisp.
Dzaakii, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 118 iii. (1895) 90 et 519; et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 156. — Reg. Cauc.
epigaea, Janka, ex Degen, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 194. — Thracia.
erucifolia, Feer, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 268. — Ins. Karpathos.
exigua, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxxii. (1894). — Maced.
exigua, Rattan, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 339; et in *Bot. San Franc. Bay* (1894) 230. — Calif.
farinulenta, Ken. et Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 80. — Dalm.
fenestrellata, Feer, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 272. — Litt. Austriac.
flagellaris, Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 248. — Graecia.
Fondervisii, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 117. — Reg. Cauc.
groenlandica, Berl. in *Ofvers. Vet. Akad. Förh.* (1884) n. 7 p. 50; Lange, *Comp. fl. Groenl.* ii. (1887) 269. — Groenl.
Halacsyana, Baldacci, in *Malpighia*, viii. (1894) 280. — Albania.
Hawkinsiana, Hausskn. et Heldr. ex Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 87; Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 479. — Graecia.
hercegovina, Degen et Fiala, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1894) 303. — Herceg.
istriaca, Feer, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 371; Hallier, *Syn. Deutschl. Flora*, ed. 3 (1895) 1276. — Istria.
laciniata, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1886) 339 = *erucifolia*, Feer.
lepidia, Feer, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 273. — Dalm.
lyratella, Feer, l. c. 269. — Sauria.
mirabilis, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 228; et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 158. — Reg. Cauc.
moesiaca, Velen. in *Sitzungsb. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 385. — Bulg.
Oliveri, Rouy et Gautier, ex Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 326. — Pyren.
picturata, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1898) 28 t. 3. — Guatem.
pontica, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 116. — Reg. Cauc.
praecox, Miègev. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 304. — Pyren.
praesignis, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 1105 = *rotundifolia*, Linn.
pulvinaris, Haussk. et Bornm. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 19. — Cappadoc.
rapunculiformis, St Lager, in *Cariot, Étud. des fl.* ed. 8, ii. (1889) 547 = *rapunculoides*, Linn.
serpylliformis, Batt. et Trab. *Atlas fl. d'Algérie*, (1886) t. 6; et *Fl. de l'Algérie*, (Dicot.) (1890) 573. — Algeria.
Shepardii, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 25. — Syria.
solstitialis, A. Kern. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 669. — Austria.
Songeonii, Chabert, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 146. — Sabaud.
sporadum, Feer, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 269. — Ins. Sporad.
tymphaea, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 87. — Graecia.
Velenowskyi, Adamovic, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 408. — Serbia.
velutina, Velen. in *Sitzungsb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 54 = *lanata*, Frivald.
Villanii, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* n. i. (1889) = *caespitosa*, Scop.

CAMPANULA : —

- Wettsteinii*, Halácsy, et Baldacci ex Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 371 in syn. = *Edraianthus Wettsteinii*, Halácsy et Baldacci.

CAMPANUMOEIA, Blume (Campanul.). — Ind. Kew. i. 407.

- axillaris*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1775. — China.

CAMPHORATA, Ludwig = **Camphorosma**, Linn. (Chenop.).

- annuata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 548 = *C. annua*, Pall.
monandra, Kuntze, l. c. = *C. monandrum*, Bunge.
ovatum, Kuntze, l. c. = *C. ovatum*, Waldst. et Kit.
perennis, Kuntze, l. c. = *C. perennis*, Pall.
polygama, Kuntze, l. c. = *C. polygamum*, Bunge.
ruthenica, Kuntze, l. c. = *C. ruthenicum*, Bieb.

CAMPOMANESIA, Ruiz et Pav. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 408.

- Beaurepairiana*, Kiaersk. *Enum. Myrt. Bras.* (1893) 15. — Bras.
bracteolata, Kiaersk. l. c. 10. — Bras.
Cagaiteira, Kiaersk. l. c. 12. — Bras.
chrysophylla, Niedenzu, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 73. — Bras.
Glazioviana, Kiaersk. *Enum. Myrt. Bras.* (1893) 16. — Bras.
Guaviruba, Kiaersk. l. c. 8 (= *Abbevillea Guaviruba*, Berg.; an *C. Guaviruba* Benth. et Hook. f.?) — Bras.
itanarensis, Kiaersk. *Enum. Myrt. Bras.* (1893) 8; et *ex Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 73 (= *Abb. rugosa*, Berg.). — Bras.
maschalantha, Kiaersk. l. c. (1893) 8 (*Abb. maschalantha*, Berg.). — Bras.
neriifolia, Niedenzu, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 73. (= *Abb. neriiflora*, Berg.). — Bras.
protheceseptala, Kiaersk. *Enum. Myrt. Bras.* (1893) 11. — Bras.
psidioides, Niedenzu, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 73 (= *Abbevillea Langsdorffii*, Berg.). — Bras.
Rabeniana, Kiaersk. *Enum. Myrt. Bras.* (1893) 11. — Bras.
recurvata, Niedenzu, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 73 (= *Abbevillea recurvata*, Berg.). — Bras.
Regeliana, Kiaersk. *Enum. Myrt. Bras.* (1893) 8 (*Abb. Regeliana*, Berg.). — Bras.
rivularis, Niedenzu, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 73 (= *Abb. Fenzliana*, Berg.). — Bras.
rufa, Niedenzu, l. c. (= *Abb. rufa*, Berg.). — Bras.
Schlechtendalliana, Niedenzu, l. c. — Bras.
stictopetala, Kiaersk. *Enum. Myrt. Bras.* (1893) 8. — Bras.
Warmingiana, Kiaersk. l. c. 14. — Bras.

CAMPSPIS, Lour. = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).

- grandiflora*, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1894) 230 = *T. grandiflora*, Thunb.

CAMPSONEURA debilis, Warb. in Ber. deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) [84]. — (Quid?).**CAMPTOSEMA**, Hook. et Arn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 408.

- isopetalum*, Taub. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 369 (= *erythrinoides*, Benth.).
pentaphyllum, Taub. in *Flora*, lxxii. (1889) 428. — Bras.

CAMPTOSTEMON, Mast. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 408.

- aruense*, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 274. — Ins. Aru.
philippinense, Becc. l. c. 273 (= *Cumingia philippinensis*, Vidal). — Ins. Philipp.

CAMPULOSUS, Desv. = **Ctenium**, Panz. (Gramin.).

- aromaticus*, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1864) 45 = *aromaticus*, Trin.

CAMPULOSUS : —

- canescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 764 = *Ct. canescens*, Benth.
concinus, Kuntze, l. c. = *Ct. concinnum*, Nees.
elegans, Kuntze, l. c. = *Ct. elegans*, Kunth.
gangitis, Kuntze, l. c. = *Ct. carolinianum*, Panz.
rupestris, Kuntze, l. c. = *Ct. rupestre*, J. A. Schmidt.
serpentium, Kuntze, l. c. = *Ct. serpentium*, Steud.

CAMPYLANDRA, Baker = **Tupistra**, Ker-Gawl. (Liliac.).

- Fargesii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1893) 1113 in obs. = *Tupistra Fargesii*, Baill.
Fargesiana, Baill. l. c. 1114 sphalm. = *praec. tonkinensis*, Baill. l. c. 1113. — Tonk.
Wattii, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 78 t. 32. — Reg. Himal.

CAMPYLOTHECA, Cass. = **Coreopsis**, Linn.?

- (Compos.).
cosmoides, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 213 = *Cor. cosmoides*, A. Gray.
dichotoma, Hillebr. l. c. 212. — Ins. Hawaii.
hawaiiensis, Hillebr. l. c. 214 = *Bidens hawaiiensis*, A. Gray.
macrocarpa, Hillebr. l. c. = *Cor. macrocarpa*, A. Gray.
mauiensis, Hillebr. l. c. 213 = *Cor. mauensis*, A. Gray.
Menziesii, Hillebr. l. c. 216 = *Cor. Menziesii*, A. Gray.
molokaiensis, Hillebr. l. c. 212. — Ins. Hawaii.
pulchella, Hillebr. l. c. (= *Adenolepis pulchella*, Less.). — Ins. Hawaii.
Remyi, Hillebr. l. c. — Ins. Hawaii.
sandwicensis, Hillebr. l. c. 214 = *Bidens sandwicensis*, Less.

CAMPYNEMANTHE, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1893) 1109; et *Hist. des pl.* xii. (1894) 592. **LILIACEAE**.

- viridiflora*, Baill. l. c. — N. Caled.

CAMUNIUM, Adans. = **Aglaiia**, Lour. (Meliac.).

- sinense*, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) sub t. 334 in syn. = *chinense*, Roxb.

CAMUNIUM, Rumpf. = **Murraya**, Koen. (Rutac.).

- elongatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 99 = *M. elongata*, A. DC.
exoticum, Kuntze, l. c. = *M. exoticum*, Linn.
heptaphylla, Kuntze, l. c. = *M. heptaphylla*, Span.
Koenigii, Kuntze, l. c. = *M. Koenigii*, Spreng.
longifolia, Kuntze, l. c. = *M. longifolia*, Blume.

CANANGA, Rumph. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 410.

- Scortechini*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 42. — Perak.

CANARINA, Linn. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 410.

- canariensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 379 = *campanulata*, Linn.
Eminii, Aschers. et Schweinf. in *Sitzb. Ges. naturf. Fr.* (1892) 173. — Afr. trop.

CANARIUM, (Rumph.). Linn. (Burser.). — Ind. Kew. i. 410.

- Buettneri*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 101. — Afr. trop. occid.
caudatum, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1893) ii. 240. — Perak.
edule, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B (1895) 200 = *edule*, Hook. f.
Kunstleri, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1893) ii. 248. — Perak.
Manii, King, l. c. 247. — Ins. Andam.
obtusifolium, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 10. — Madag.
Planchonii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1893) ii. 240 (= *Santoria Planchonii*, A. W. Benn.). — Malaya.
polyphyllum, K. Schum. in *K. Schum et Holll. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 63. — N. Guin.

CANARIUM : —

resiniferum, Bruce, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 188. — Reg. Himal. Saphu, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 99. — Kame-run. sapidum, Hemsl. in Ann. of Bot. v. (1891) 504. — Ins. Salom. sikkimense, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 187 t. 12. — Perak.

CANAVALIA, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 411.

tortilis, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 396. — Ins. Bourbon. versicolor, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, iv. (1894) 5 t. 2. — Bras.

CANBYA, Parry (Papaverac.). — Ind. Kew. i. 411.

aurea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 445. — Mexic.

CANNA, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 412.

Verloti, Hort. Huber. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. iii (1890) 78, nomen = indica, Linn.

CANCRINIA, Kar. et Kir. (Compos.). — Ind. Kew. i. 411.

brachypappos, Winkl. in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 29. — Mongolia. lasiantha, C. Winkl. l. c. xiii. (1894) 235. — Turkest. lasiocarpa, C. Winkl. l. c. xii. (1892) 30. — Mongolia. Maximowicz, C. Winkl. l. c. 29. — Mongolia. paradoxa, C. Winkl. l. c. xi. (1891) 371. — Turkest.

CANDOLLEA, Labill. = **Styloidium**, Sw.

Morrallii, F. Muell. in Vict. Natural. v. (Oct. 1888) 76 = S. Morrallii, F. Muell. Tepperi, F. Muell. (sphalm. J.) in Mitth. Bot. Ver. Jena, vi. (1888) 5 = Tepperiana, F. Muell. Tepperiana, F. Muell. in Chem. and Drug. of Austral. (Jan. 1887) ex Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 374. — Austral.

CANDOLLINA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 269 = **Loranthus**, Linn.

Haenkeana, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 269 = L. Haenkeanus, Presl. malifolia, Van Tiegh. l. c. = L. malifolius, Presl.

CANISTRUM, Éd. Morr. = **Aechmea**, Ruiz et Pav. (Bromel.).

amazonicum, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 249 = Karatas amazonica, Baker. cyathiformis, Mez, l. c. 252. — Bras. Lindenii, Mez, l. c. 256 = Ae. eburnea, Baker. superbum, Mez, l. c. 621 in obs. = Wittrockia superba, Lindm.

CANNABINA, Ludw. = **Datisca**, Linn.

glomerata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 258 = D. glomerata, Baill.

CANSCORA, Lam. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 413.

heteroclita, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) p. 76 (= Gentiana heteroclita, Linn.). — Ind. or. tetragona, Schinz, in Viertel. Naturforsch. Ges. Zürich, xxxvi. (1891) 338. — Angola.

CANSJERA, Juss. (Oclacin.). — Ind. Kew. i. 413.

Helferiana, Valetton, Crit. overz. Olac. (1886) 159. — Tenass.

CANTHAROSPERMUM, Wight. et Arn. = **Atylosia**, Wight et Arn. (Legumin.).

molle, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 373 (mollis) = A. mollis, Benth. trineurum, Taub. l. c. = A. Candollei, Wight et Arn.

CANTHIUM, Lam. = **Plectronia**, Linn. (Rubiace.).

brevifolium, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 67. — Congo.

CANTUA, Juss. (Polemon.). — Ind. Kew. i. 414.

lanceolata, Peter, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 a (1891) 45. — Peruvia.

CANTUFFA, J. F. Gmel. = **Pterolobium**, R. Br. (Legumin.).

hexapetala, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 168 = P. indicum, A. Rich. indica, Kuntze, l. c. = P. indicum, A. Rich. lacerans, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1892) 172 = P. lacerans, Roxb. macrophylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 168. = P. indicum, A. Rich. microphylla, Kuntze, l. c. = P. indicum, A. Rich. nitens, Kuntze, l. c. = P. nitens, F. Muell. punctata, Kuntze, l. c. = P. punctatum, Hemsl. subvestita, Kuntze, l. c. = P. subvestitum, Hance.

CAOPIA, Adans = **Vismia**, Vand. (Hyperic.).

acuminata, affinis, Billbergiana, brasiliensis, cayennensis, confertiflora, dealbata, decipiens, ferruginea, frondosa, glabra, jupurensis, laevis, latifolia, lauriformis, laxiflora, leonensis, macrophylla, magnoliaefolia, Martiana, mexicana, micrantha, obtusa, panamensis, parviflora, petiolata, rubescens, sessilifolia, tomentosa, viridiflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 59 = homonyma omnia Vismiae. arborescens, Kuntze, l. c. 59 = Cratoxylon Blancoi, Blume. baccifera, Kuntze, l. c. = V. guianensis, Pers. crassa, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 204. — Bolivia. gracilis, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 52 in obs. = V. gracilis, Hieron. Mandurr, Hieron. l. c. 54 in obs. = V. Mandurr, Hieron. panamensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 59 = V. ferruginea H. B. et K. petiolata, Kuntze, l. c. = V. laurifolia, Pers. Reichardiana, Kuntze, l. c. = V. baccifera, Reichardt.

CAPERONIA, St-Hil. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 415.

latifolia, Pax, in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 159. — Ins. S. Thom. Stuhlmanni, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 81. — Afr. trop. or.

CAPITANYA, Schweinf. ex Penzig, Atti Congr. bot. Genova (1893) 355; et ex Gürke, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 105. **LABIATAE**.

ostegioides, Schweinf. l. c. 355 nomen. — Erithrea. ostegioides, Gürke, l. c. 106 t. 1. — Afr. or.

CAPNODES, Adans. = **Corydalis**, Vent. (Papaver.).

adiantifolium, aduncum, ambiguum, angustifolium, aureum, bracteatum, breviflorum, Bungeanum, Burmanni, Caseanum, chaerophyllum, claviculatum, conorhizum, cornutum, Cracca, crassifolium, crithmifolium, crystallinum, curvisiliqua, dasypterum, decumbens, edule, elegans, Falconeri, Fedschenkoanum, fibrosum, flabellatum, flaccidum, flavulum, fumariaefolium, Gebleri, giganteum, glaucescens, Gortschakowii, Govanianum, gracile, incisum, inconspicuum, junceum, Karelinianum, kaschgarcum, latiflorum, laxum, leptocarpum, Marschallianum, meifolium, melanochlorum, micropodum, Moorcroftianum, ochotense, ophiocarpum, pallidum, paniculigerum, pauciflorum, persicum, polygalinum, pruinatum, pulchellum, pumilum, racemosum, Raddeanum, ramosum, roseum, rupestre, rutifolium, Schelesnowianum, Scouleri, Semenowii, senanensis, Sewerzowii, Sheareri, sibiricum, streptocarpum, strictum, suaveolens, tenellum, tibeticum, trachycarpum, Turczaninowii, uvalense, Vernyi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 14-15 = homonyma omnia Corydalis.

acaule, Kuntze, l. c. 14 = Corydalis chroleuca, Engelm.

bitermum, Kuntze, l. c. = Cor. pauciflora, Pers. cachemirianum, Kuntze, l. c. = Cor. cashmeriana, Royle.

curviflorum, Kuntze, l. c. = Cor. curviflora, Maxim. heterocarpum, Kuntze, l. c. = Cor. pallida, Pers.

intermedium, Kuntze, l. c. = Cor. fabacea, Pers. jesoense, Kuntze, l. c. = Cor. jesoensis, Fum.

impatiens, Kuntze, l. c. = Cor. sibirica, Pers.

CAPNODES : —

linarioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 15 = Corydalis linarioides, Maxim. lenense, Kuntze, l. c. 14 = Cor. paeoniaefolia, Pers. oppositifolium, Kuntze, l. c. = Cor. rutaefolia, DC. rutaefolium, Kuntze, l. c. = Cor. rutaefolia, DC. remotum, Kuntze, l. c. 14 = Cor. bulbosa, DC. Savatieri, Kuntze, l. c. = Cor. laxa, Franch. Schanginii, Kuntze, l. c. = Cor. longiflora, Pers. speciosum, Kuntze, l. c. 15 = Cor. pallida, Pers. stramineum, Kuntze, l. c. = Cor. straminea, Maxim. verticillare, Kuntze, l. c. = Cor. rutaefolia, DC. vesicarium, Kuntze, l. c. 14 = Cor. versicaria, Pers. Wilfordii, Kuntze, l. c. 15 = Cor. pallida, Pers.

CAPNOIDES, Tourn. = **CAPNODES**, Adans. ex Kuntze = **Corydalis**, Vent. (Papaver.).

Bidwellianum, Greene, Fl. Francisc. (1891) 280 = Cor. Bidwelliana, S. Wats. Caseanum, Greene, l. c. = Cor. Caseana, A. Gray. micranthum, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 166 = Cor. micrantha, A. Gray. montanum, Britton, l. c. = Cor. montana, Engelm.

CAPNOPHYLLUM, Gaertn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 415.

peregrinum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = peregrinum, Lange.

CAPNORCHIS, Ludw. = **Dicentra**, Bernh. (Papav.).

canadensis, chrysantha, Cucullaria, eximia, formosa, pusilla, Roylei, scandens, thalictrifolia, torulosa, uniflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 15 = homonyma omnia Dicentrae. ochroleuca, Greene, Fl. Francisc. (1891) p. 279 = D. ochroleuca, Engelm. pauciflora, Greene, l. c. = D. pauciflora, S. Wats. peregrina, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 15 = D. lachenaiaeflora, Ledeb.

CAPNOREA, Rafin. = **Nicotiana**, Linn. (Solanac.).

ciliata, Greene, in Erythea, ii. (1894) 193 = Hesperochiron ciliatus, Greene.

pumila, Greene, l. c. = Hesp. pumilus, Porter.

CAPPARIS, (Tourn.) Linn. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 415.

Azelii, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 299. — Afr. trop. occ. boscioides, Pax, l. c. 297. — Abyss. brachyandra, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 185. — Afr. trop. or. burmanica, Coll. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 19 t. 2. — Ind. or. Carvalhoana, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 185. — Afr. trop. or. cucurbitina, King, in Journ. Linn. Soc. lviii. (1889) ii. 395. — Malaya. decidua, Pax, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 231 = C. Sodada, Forsk. elliptica, Hausskn. et Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 49. — Oriens. Fischeri, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 298. — Afr. trop. or. hainanensis, Oliver, in Hook. Ic. pl. xvi. (1887) t. 1588. — Hainan. hereroensis, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 396. — Afr. austro-occ. extratrop. Heydeana, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 197. — Guatem. Kunstleri, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 396. — Malaga. larutensis, King, l. c. 393. — Malaya. Poggei, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 298. — Congo. salicifolia, Hort. Par. ex Vesque, Epharm. i. (1889) t. 71. n. 79 = neriifolia, Radlk. Scortechinii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 394. — Malaya. urens, Rodr. in Vellozia, i. (1884-88) Sec. edic. (1891) 2 t. 2. — Bras.

CAPPARIS : —

Volkenisii, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 185. — Afr. trop. or.
xanthophylla, Coll. et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 20. — Burma.

CAPRARIA, [Tourn.] Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. p. 418.

annua, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 459 = *Scoparia annua*, Cham. et Schlecht.
dulcis, Kuntze, l. c. = *S. dulcis*, Linn.
elliptica, Kuntze, l. c. = *S. elliptica*, Cham.
ericacea, Kuntze, l. c. = *S. ericacea*, Cham. et Schlecht.
montevidensis, Kuntze, l. c. = *S. flava*, Cham. et Schlecht.
pinnatifida, Kuntze, l. c. = *S. flava*, Cham. et Schlecht.

CAPRIFOLIUM, Tourn. = **Lonicera**, Linn. (Caprifol.).

acuminatum, Altmannii, angustifolium, arboreum, asperifolium, Aucheri, biflorum, Bournei, bracteolare, Brandtii, caucasicum, cerasinum, Chamissoi, chrysanthum, eliatum, coerulescens, conjugiale, decipiens, dimorphum, Elisae, Ferdinandi, flavescens, floribundum, fragrantissimum, gibbiflorum, glabratum, glaucum, Glehnii, glutinosum, gracilipes, gynochlamydeum, Henryi, hellenicum, heterophyllum, hirsutum, hispidum, humile, hypoleucum, ibericum, involucreatum, japonicum, Karelinskii, leianthum, Leschenaultii, ligustrinum, linderifolium, Maackii, macranthum, Maximowiczii, micranthum, microphyllum, nervosum, Nummularia, nummulariaefolium, obovatum, Olga, orientale, ovatum, parvifolium, phyllocarpum, pileatum, purpurascens, quinqueloculare, ramosissimum, reticulatum, rupicolum, Ruprechtianum, Schmitzianum, segregiense, Semenowii, simile, spinosum, splendidum, Stabianum, Standishii, Sullivanii, sumatranum, syringanthum, tangutinum, tataricum, tenuiflorum, tomentellum, Tschonoskii, turcomanicum, ulahense, venulosum, Vidalii, Xylosteum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 273-74 = *homonyma omnia* *Lonicerae*.
adenocarpum, Kuntze, Rev. Gen. 274 = *L. implexa*, Soland.

americanum, Kuntze, l. c. = *L. grata*, Soland.
Amherstii, Kuntze, l. c. = *L. pilosa*, Maxim.
Borbasianum, Kuntze, l. c. = *L. reticulata*, Borbas.
Bungeanum, Kuntze, l. c. = *L. microphylla*, Willd.
cyrenaicum, Kuntze, l. c. = *L. etrusca*, Santi.
dumosum, Kuntze, l. c. = *L. albiflora*, Torr. et Gray.
fuschiodes, Kuntze, l. c. = *L. fuschiodes*, Torr. et Gray.

Hemslayanum, Kuntze, l. c. — China.
hypoglaucum, Kuntze, l. c. = *L. affinis*, Hook. et Arn.
interruptum, Greene, Fl. Francis. (1892) 347; et in Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 164 = *L. interrupta*, Benth.

Ledeburii, Greene, l. c. 346 = *L. involucreata*, Banks.
Magnevilleae, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 203 = *L. Caprifolium*, Linn.

mexicanum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 274 = *L. gibbosa*, Willd.

mollissimum, Kuntze, l. c. = *L. affinis*, Hook. et Arn.
Morrowii, Kuntze, l. c. = *L. chrysantha*, Turcz.

pilosum, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 210 = *L. hirsuta*, Eaton.
praecox, Kuntze, l. c. — China.

punicum, Kuntze, l. c. = *Symphoricarpos punicum*, Steud.

semperflorens, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 204 = *L. Periclymenum*, Linn.

subspicatum, Greene, Fl. Francisc. (1892) 348 = *L. hispidula*, Dougl.

Tartarinowii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 274 = *L. Tartarinowii*, Maxim.

Thomsonii, Kuntze, l. c. = *L. glauca*, Hook. f. et Thoms.

tragophyllum, Kuntze, l. c. = *L. tragophylla*, Hemsl.
valentinum, Pau, Not. bot. fl. Espan. iii. (1889) 30 nomen. — Hisp.

CAPRIOLA, Adans. = **Cynodon**, Rich. (Gramin.).

ciliaris, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 764 = *Cyn. ciliaris*, Benth.
convergens, Kuntze, l. c. = *Cyn. convergens*, F. Muell.

CAPRIOLA : —

Dactylon, Kuntze, l. c.; Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 159 = *Cyn. Dactylon*, Pers.
tenella, Kuntze, l. c. = *Cyn. tenellus*, R. Br.

CAPSELLA, Medic. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 418.

abortiva ×, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. et iv. (1893) 116. — Graecia.

alpina, Ces. Passer. et Gibelli, Comp. fl. Ital. ii. (1886) 824 = *Hutchinsia alpina*, R. Br.

humilis, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 96 = *C. Bursa-pastoris*, Moench.

lycia, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, li. (1886) 362. — As. Min.

stellata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 142. — Mexic.

thracica, Velen. in Sitzungsber. Boehm. Ges. Wiss. 1893. (1893) 11. — Thracia.

villosula, F. Muell. et Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix. (1895) 80, nomen. — Austral.

CAPSICUM, [Tourn.] Linn. (Solan.). — Ind. Kew. i. 419.

fasciculatum, Sturtevant, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 133. — Hab.?

CARACASIA, Szyszyl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 164. **TERNSTROE-MIACEAE**.

Tremadena, Szyszyl. l. c. (= *Vargasia Tremadena*, Ernst.) — Venez.

viridiflora, Szyszyl. l. c. (= *Varg. viridiflora*, Ernst.) — Venez.

CARAGANA, Lam. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 419.

aurantiaca, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 340. — As. centr.

decorticans, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1825. — Afghan.

pendula, Carr. in Rev. Hort. (1887) 268 = *arborescens*, Lam.

CARAGUATA, [Plum.], Lindl. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 420.

acoriifolia, Éd. André, in Rev. Hort. (1888) 565; et *Brom. Andr.* 56 t. 16 fig. b; Baker, Handb. Brom. 146. — Columb.

Bakeri, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 59. — Columb.

Beleana, Éd. André, in Rev. Hort. (1893) 114 fig. 27. — Hab.?

bracteosa, Éd. André, l. c. (1888) 565; et *Brom. Andr.* 47 t. 14 fig. a; Baker, Handb. Brom. 146. — Ecuad.

Candelabrum, Éd. André, l. c. 565; et 55 t. 19 fig. a; Baker, l. c. 148. — Columb.

conifera, Éd. André, l. c. 565; et 47 t. 15; Baker, l. c. 144; et in Bot. Mag. (1894) t. 7359. — Ecuad.

Devansayana, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 144 (= *Guzmannia Devansayana*, Éd. Morr.). — Ecuad.

gloriosa, Éd. André, in Rev. Hort. (1888) 565; et *Brom. Andr.* 48 t. 17 fig. c; Baker, l. c. 147. — Ecuad.

grandiflora, Baker, l. c. (1889) 145. — Ins. Porto-Rico.

hygrometrica, Éd. André, in Rev. Hort. (1888) 565; et *Brom. Andr.* 59 t. 18 fig. c; Baker, l. c. 152. — N. Gran.

Lehmanniana, Baker, Handb. Bromel. (1889) 150 (= *Schlumbergeria Lehmanniana*, Wittm.). — N. Gran.

lepidota, Éd. André, in Rev. Hort. (1888) 565; et *Brom. Andr.* 57 t. 19 fig. b; Baker, l. c. 149. — Ecuad.

Lindenii, Baker, l. c. (1889) 151 (= *Schlumbergeria Lindenii*, Éd. Morr.) — Peruvia.

magnifica, Hort. ex Baker, l. c. 142 = *Osyana*, Éd. Morr.

magnifica ×, Hort. ex Baker, l. c. 148. — Hybr. artef.

Melinonis, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 145 (= *Guzmannia Melinoni*, Regel). — Guian. gall.

CARAGUATA : —

Morreniana, Éd. André, in Rev. Hort. (1886) 12 cum. ic.; et *Brom. Andr.* 51; Baker, l. c. 147. — Ecuad.

Mosquerae, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 58. — Columb.

multiflora, Éd. André, in Rev. Hort. (1888) 565; et *Brom. Andr.* 54 t. 18 fig. 9 b; Baker, Handb. Brom. 148. — Columb.

palustris, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 58. — Columb.

pulchella, Éd. André, in Rev. Hort. (1888) 565; et *Brom. Andr.* 49 t. 17; Baker, Handb. Brom. 144. — Ecuad.

Schlumbergerii, Baker, l. c. (1889) 151 (*Schlumbergeria Morreniana*, Éd. Morr.). — Reg. Andina.

Sintenisii, Baker, l. c. 145. — Ins. Antill.

sphaeroidea, Éd. André, in Rev. Hort. (1888) 565; et *Brom. Andr.* 58 t. 19 fig. c; Baker, l. c. 149. — Columb.

straminea, Baker, l. c. (1889) 150. (= *Anoplophyton stramineum*, C. Koch). — Hab.?

violacea, Éd. André, in Rev. Hort. (1888) 565; et *Brom. Andr.* 50 t. 18 fig. a; Baker, Handb. Brom. 147. — Ecuad.

virescens, Baker, l. c. (1889) 151 (= *Puya virescens*, Hook.). — Peruvia.

vittata, Baker, l. c. 146 (= *Bonaparteia vittata*, Mart.) — Reg. Amazon.

CARAIPA, Aubl. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 420.

insidiosa, Rodr. in Vellozia, Sec. edic. (1891) 9. — Bras.

Lacerdae, Rodr. l. c. 9. — Bras.

palustris, Rodr. l. c. 8 t. 5 a. — Bras.

silvatica, Rodr. l. c. 8 t. 5 b. — Bras.

spuria, Rodr. l. c. 8 t. 5 c. — Bras.

CARALLUMA, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 420.

Aaronis, N. E. Br. in Gard. Chron. (1892) ii. 369 (= *Boucerosia Aaronis*, Hart). — Arabia.

acutangula, N. E. Br. l. c. (= *B. acutangula*, Decne). — Seneg.

Ango, N. E. Br. l. c. (= *Stapelia Ango* Rich.). — Abyss.

aperta, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1905 a. (= *Stapelia aperta*, Masson). — Afr. austr.

arabica, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 318. — Arabia.

arida, N. E. Br. in Gard. Chron. (1892) ii. 369 (= *Stapelia arida*, Masson). — Afr. austr.

armata, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1962. — Afr. austro-occ. extratrop.

Aucheriana, N. E. Br. in Gard. Chron. (1892) ii. 369 (= *Boucerosia Aucheriana*, Decne). — Arabia.

campanulata, N. E. Br. l. c. fig. 61; Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7274 (= *Bouc. campanulata*, Wight). — Zeyl.

chlorantha, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 37. — Afr. austr.

cicatricosa, N. E. Br. in Gard. Chron. (1892) ii. 369 (= *Bouc. cicatricosa*, Deffers). — Arabia.

Decaisneana, N. E. Br. l. c. (= *Bouc. Decaisneana*, Lem.). — Seneg.

codonoides, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 328. — Afr. trop. or.

dependens, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1903. — Afr. austr.

diffusa, N. E. Br. in Gard. Chron. (1892) ii. 369 (= *Boucerosia diffusa*, Wight). — Travanc.

Edithae, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 219. — Reg. Somal.

europaea, N. E. Br. in Gard. Chron. (1892) ii. 369 (= *Bouc. europaea*, Hook. f.). — Eur.; Afr. bor.

flava, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 335. — Arabia.

gracilipes, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 278; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 328. — Afr. trop. or.

hirtiflora, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 264. — Ins. Hanich (Mare Rubr.).

hottentorum, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) sub t. 1903 (= *Quaqua hottentorum*, N. E. Br.). — Afr. austro-occ. extratrop.

CARALLUMA : —

- incarnata, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1892) ii. 369 (= *Boucerosia incarnata*, *N. E. Br.*). — Afr. austr. indica, *N. E. Br. l. c.* (= *Bouc. Hutchinia*, Decne.). — Ind. or.
- lasiantha, *N. E. Br. l. c.* (= *Bouc. lasiantha*, Wight). — Ind. or.
- linearis, *N. E. Br. in Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1903 fig. a. — Afr. austr.
- longidens, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1892) ii. 369. — Nubia.
- Luntii, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1894) 335. — Arabia.
- lutea, *N. E. Br. in Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1901. — Afr. austr.
- mammillaris, *N. E. Br. in Hook. l. c.* sub t. 1902. (= *Boucerosia mammillaris*, *N. E. Br.*). — Afr. austro-occ. extratrop.
- maroccana, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1892) ii. 278 (= *Bouc. maroccana*, Hook. f.). — Marocco.
- Munbyana, *N. E. Br. l. c.* (= *Bouc. Munbyana*, Decne.). — Algeria.
- parviflora, *N. E. Br. l. c.* (= *Stapelia parviflora*, Masson). — Afr. austro-occ. extratrop.
- pauciflora, *N. E. Br. l. c.* (= *Boucerosia pauciflora*, Wight). — Ind. or.
- penicillata, *N. E. Br. l. c.* (= *Bouc. penicillata*, Deflers.). — Arabia.
- pruinosa, *N. E. Br. l. c.* (= *Stapelia pruinosa*, Masson). — Afr. austro-occ. extratrop.
- quadrangula, *N. E. Br. l. c.* (= *Boucerosia quadrangula*, Decne.). — Arabia.
- ramosa, *N. E. Br. in Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1904 (= *Stapelia ramosa*, Masson.). — Afr. austr. retrospiciens, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1892) ii. 370 (= *Desmidorchis retrospiciens*, Ehrenb.). — Abyss.
- socotrana, *N. Br. l. c.* (= *Boucerosia socotrana*, Balf. f.). — Ins. Socotra.
- somalica, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 264. — Reg. Somal.
- speciosa, *N. E. Br. l. c.* (= *Sarcocodon speciosum*, *N. E. Br.*). — Reg. Somal.
- Sprengeri, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 263 (= *Huernia Sprengeri*, Schweinf.). — Abyss.
- valida, *N. E. in Kew Bull.* (1895) 264. — Afr. (sine loco).
- tuberculata, *N. E. Br. l. c.* (= *Boucerosia Aucheriana*, Hook. f.). — Belutsch., Afghan.

CARDAMINE, [Tourn.] Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 420.

- amethystea, *Pancic, Nov. elem. fl. Princ. Bulg.* (1886) 15. — Bulg.
- andicola, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 1. — Chili.
- andina, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 71. — Chili.
- angelorum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 39. — Calif.
- arenicola, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 220 (= *A. virginiana*, Michx.). — Am. bor.
- barbaraeoides, *Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien.* lxi. (1894) 228. — Mont. Rhodop.
- bracteata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 85. — Chili.
- bulbosa, *Britton, Stern et Pogg. Prelim. Catal.* (1888) 4 = rhomboidea, DC.
- caespitosa, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 79. — Chili.
- californica, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 266; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 19 = paucisecta, Benth.
- cardiophylla, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 19. — Calif.
- ciliata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 77. — Chili.
- Delavayi, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 397. — China occ.
- deserticola, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 86. — Chili.
- Douglasii, *Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci.* ix. (1889) 8 = *Arabis Douglasii*, Torr.
- ecuadorensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xx. (1895) 19. — Ecuad.
- Fauriae, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII.* xii. (1888) 83. — Japon.

CARDAMINE : —

- Ferrarii* × *Burnat*, *Fl. Alpes Marit.* (1892) 184 in obs. — Pedem.
- filifolia, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 30 = *Arabis filifolia*, Greene.
- gemma, *Greene, l. c.* i. (Feb. 1888) 162. — Oregon.
- hispidula, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 79. — Chili.
- insularis, *Rouy et Fouc. Fl. de Fr.* i. (1893) 241 = resedifolia, Linn.
- integrifolia, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 71. — Chili.
- integrifolia, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* (1887) 389 = paucisecta, Benth.
- Johnstoni, *Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append.* (1886) 337 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 328. — Afr. trop. or.
- Killiasii ×, *Brügg. (ubi?)* (conf. *Ber. deutsch. bot. Ges.* vii. (1889) [131]). — Helv.
- kopaonikensis, *Pancic, ex Wettst. in Luerss. Bibl. Bot., Heft xxvi.* (1892) 20 = glauca, Spreng.
- Lavembergiana ×, *Rouy et Four. Fl. de Fr.* i. (1893) 235. — Gall.
- lazica, *Boiss. et Bal., ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 31. — As. Min.
- Lehmannii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 19. — Columb.
- Leibergii, *Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 4. (1895) 212. — Am. bor.
- Lyallii, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 466. — Amer. bor. occ.
- macrostachya, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 75. — Chili.
- micropetala, *Phil. l. c.* 76. — Chili.
- monticosa, *Phil. l. c.* 72. — Chili.
- multijuga, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 399. — China occ.
- Nuttallii, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* ii. (1887) 389 in obs. (= *Dentaria tenella*, Pursh.). — Calif.
- ochroleuca, *Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 297. — Persia.
- ovata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 69. — Chile.
- Palenae, *Phil. l. c.* 80. — Chili.
- Palmeri, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 38. — Calif.
- Peteroana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 74. — Chili.
- polemonioides, *Rouy, Fl. de Fr.* i. (1893) 234 in obs. — Eur. arct.
- pulcherrima, *Greene, in Erythea*, i. (1893) 148. — Am. bor. occ.
- quercetorum, *Howell, in Erythea*, iii. (1895) 33. — Oregon.
- Sandbergii, *Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) tab. 3 = Leibergii, Holzinger.
- Seedlitziana, *Albott, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 448. — Reg. Cauc.
- sinuata, *Greene, in Erythea*, i. (1893) 148. — Calif.
- Skorpili, *Velen. in Sitzungsber. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1896) ii. 29; et *Fl. Bulg.* (1891) 29. — Bulg.
- Soehrensii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 84. — Chili.
- speciosa, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, vix. (1889) 16. — Bolivia.
- stenoloba, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 303. — China.
- stricta, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 77. — Chili.
- thalictroides, *St Lager, in Cariot, Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 46 = thalictroides, All.
- tridens, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1893) 74. — Chili.
- triphylla, *Phil. l. c.* 72. — Chili.
- yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 398. — China.

- CARDAMOMUM**, Rumph. Hist. Amboin. v. (1745-47) 152 t. 65 fig. 1; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 685 = **Amomum**, Linn. (Scitam.).
- aculeatum, angustifolium, aromaticum, arundinaceum, biflorum, capitatum, cereum, Ceruga, ciliatum, Clusii, coccineum, corynostachyum, costatum, Dallachyi, dealbatum, eckinatum, Fenzlei, floribundum, foetens, giganteum, glaberrimum, globosum, gramineum, graminifolium, Grana-paradisi, hemisphaericum, heteran-

CARDAMOMUM : —

- tum, hirsutum, involucreatum, Koenigii, latifolium, Leonurus, limbatum, linguiforme, longiscapum, magnificum, Mannii, marginatum, maximum, Melegueta, molle, nemorale, palustre pilosum, pterocarpum, roseum, rubrum, rufescens, Sceptrum, spurium, subsericeum, subulatum, tomentosum, uliginosum, villosum, vitellinum, et Walang, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 685-87 = homonyma omnia Amomi.
- Afzelii, Kuntze, l. c. 685 = Amomum Granum-paradisii, Linn.
- album, Kuntze, l. c. = Elettaria alba, Blume.
- anthodiodes, Kuntze, l. c. = E. anthodiodes, Teijsm. et Binn.
- arboreum, Kuntze, l. c. = Costus Loureiri, Haran.
- Beccarianum, Kuntze, l. c. = Java.
- Binnendijkii, Kuntze, l. c. 687 (= *Donacodes villosa*, Teijsm. et Binn.) = Amomum villosum, Lour.
- cannicarpum, Kuntze, l. c. 687 = Am. cannaecarpum, Benth. et Hook. f.
- citratum, Kuntze, l. c. = Am. cereum, Hook. f.
- Daniellii, Kuntze, l. c. = Am. Daniellii, Hook.
- eriocarpum, Kuntze, l. c. = Java.
- grandiflorum, Kuntze, l. c. = Amomum Granum-paradisii, Linn.
- litorale, Kuntze, l. c. = Am. littorale, Koen.
- macrocephalum, Kuntze, l. c. 687 (= *Donacodes macrocephala*, Zoll. et Mor.) = Java.
- masticatorium, Kuntze, l. c. = Am. masticatorium, Thw.
- minus, Kuntze, l. c. 685 = Am. Cardamomum, Linn.
- minus, Kuntze, l. c. 687 = Elettaria minor, Blume.
- minutum, Kuntze, l. c. = El. minuta, Blume.
- pallidum, Kuntze, l. c. = El. pallida, Blume.
- pallidum, Kuntze, l. c. = El. paludosa, Miq.
- parviflorum, Kuntze, l. c. = Alpinia parviflora, Rolfe.
- Pininga, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 687 = Alpinia Pininga, D. Dietr.
- Scottii, Kuntze, l. c. = Elettaria Scottiana, F. Muell.
- Scyphus, Kuntze, l. c. = Amomum scyphiferum, Koen.
- sericeum, Kuntze, l. c. = Am. dealbatum, Roxb.
- solare, Kuntze, l. c. = Elettaria solaris, Blume.
- speciosum, Kuntze, l. c. 686 = El. speciosa, Blume.
- tridentatum, Kuntze, l. c. = Java.
- xanthioides, Kuntze, l. c. 687 = Amomum xanthioides, Wall.

- CARDAMON**, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 495 = **Lepidium**, Linn. (Crucifer.).
- sativum, G. Beck, l. c. = L. sativum, Linn.

CARDIANDRA, Sieb. et Zucc. (Saxifrag.). —

- Ind. Kew. i. 423.
- alternifolia, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 18 = Ehretia acuminata, R. Br.

CARDIOCHLAMYS, Oliver (Convolv.). — Ind.

- Kew. i. 423.
- velutina, *Hallier f. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 94. — Madag.

CARDIOSPERMUM, Linn. (Sapind.). — Ind.

- Kew. i. 423.
- dissectum, *Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 308 (= *Urvillea dissecta*, S. Wats.). — Am. bor.
- giganteum, *Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio*, iii. (1893) 9 t. 2. — Bras.
- integerrimum, *Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 307. — Bras.
- Palmeri, *Vasey et Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xiii. (1890) 147. — Ins. Clarion (Calif.).
- Pechuelii, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 262. — Afr. austro-occ.
- spinosa, *Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 308. — Calif.

CARDOPATIUM, Juss. (Compos.). — Ind. Kew. i. 424.

- atractylodes, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 517. — As. centr.

CARDUNCELLUS, Adans. (Compos.). — Ind. Kew. i. 424.

- caespitosus, Batt. et Trab. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxv. (1888) 343 et 390. — Algeria.
 Choulettianus, Pomel, ex Batt. in Bull. Assoc. franç. sci. (1889) 489; et Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1889) 515. — Algeria.
 cryptocephalus, Baker, in Kew Bull. (1895) 217. — Reg. Somal.
 Duvauxii, Batt. et Trab. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxv. (1888) 341 et 390. — Algeria.
 kentrophyllodes, Baker, in Kew Bull. (1895) 182. — Arabia.
 Pomelianus, Batt. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 354; et Atlas fl. Algérie (1880) 8 t. 3. — Algeria.
 Reboudianus, Batt. l. c. xxxvi. (1889) p. ccxxi; et in Bull. Assoc. franç. sci. (1889) 489. — Algeria.

CARDUUS [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 424.

- acantholepis, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363 = *Cnicus acantholepis*, Hemsl. agrestis, A. Kern. in Koch, Syn. deutsch. Fl. ed. 3 (1895) 1526 in syn. = *crispus*, Linn.
 americanus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362 = *Cnicus americanus*, A. Gray. amplifolius, Greene, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 217 = *Cnicus amplifolius*, Greene.
 Andersonii, Greene, l. c. 362 = *Cnicus Andersonii*, A. Gray.
 arizonicus, Greene, l. c. = *Cnicus arizonicus*, A. Gray.
 Assoi, Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 105 = *nigrescens*, Vill.
 baldschuanicus, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 152. — Buchara.
 Bunbergii, X, Hausskn. ex Kern. Sched. fl. Austro-Hung. v. (1888) 65. — Austria.
 bernardinus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 361. — Calif.
 Breweri, Greene, l. c. 363 = *Cnicus Breweri*, A. Gray.
 californicus, Greene, l. c. 359 in obs. et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 217 = *Cnicus californicus*, A. Gray.
 candidissimus, Greene, l. c. 359. — Calif.
 Choulettianus, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1888) 515 (= *Lamottea Choulettiana*, Pomel). — Algeria.
 colchicus, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 142. — Reg. Cauc.
 controversus, Sudre, in Lucante, in Rev. de Bot. xii. (1894) 22. — Gall.
 crassicaulis, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 357; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 217. — Calif.
 Drummondii, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1892) 142 = *Cnicus Drummondii*, A. Gray.
 edulis, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 217 = *Cnicus edulis*, A. Gray.
 eriocephalus, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 520. — As. centr.
 excelsior, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 364 = *Cnicus excelsior*, Robins.
 fontinalis, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 216 = *Cnicus fontinalis*, Greene.
 Fussii, Kern. ex Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 181; et Enum. fl. Transilv. (1886) 337 in syn. = *Kernerii*, Simonk.
 Gentyanus, X, Gillot, Herbor. Jura central. 1890 (1891). — Helv.
 Grahami, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363 = *Cirsium Grahami*, A. Gray.
 groedigenensis, X, Fritsch, in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 89; et ex Bot. Centralbl. xli. (1890) 84. — Austria.
 Haussknechtii, X, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, viii. (1895) 37. — Germ.
 heterolepis, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363. — Mexic.
 heteromorphus, X, Sennholz, in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 71. — Carinthia.
 Hillii, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 344 = *Cnicus Hillii*, Canby.

CARDUUS : —

- hydrophilus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 358; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 218. — Calif.
 intercedens, X, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vii. (1893) 41. — Graecia.
 Juratzkae, X, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. ii. (1892) 1231. — Austria.
 Kernerii, X, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 181; et Enum. fl. Transilv. (1886) 337. — Transs.
 Kheikii, X, Murr. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 214; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 94 = *Schulzeanus*, G. Ruhmer.
 laniceps, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 519. — As. centr.
 latisquamus, Freyn et Conrath, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 357 = *nutans*, Linn.
 leophyllus, Petrov. ex Bornm. in Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 88. — Bulg.
 linearifolius, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 563 = *Cnicus linearifolius*, S. Wats.
 longifolius, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 378. — As. centr.
 macedonicus, Charvel, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 340 nomen; et Pl. de Salonique (1892) 27. — Maced.
 mexicanus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363 = *Cnicus mexicanus*, Hemsl.
 mixtus, X, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 348. — Gall. occ.
 mohavensis, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 361. — Calif.
 Muellneri, X, Sennholz, in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 70. — Austria.
 neo-mexicanus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362 = *Cirsium neo-mexicanum*, A. Gray.
 niveus, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 378. — As. centr.
 ochrocentrus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363 = *Cnicus ochrocentrus*, A. Gray.
 odoratus, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 345 = *Cnicus pumilus*, Torr.
 Parryi, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362 = *Cnicus Parryi*, A. Gray.
 phyllolepis, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 51. — Hisp.
 pindicolus, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 86. — Graecia.
 Pitcheri, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 345 = *Cnicus Pitcheri*, Torr.
 plattensis, Rydberg, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3. (1895) 167 t. 2. — Nebraska.
 potosinus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 364. — Mexic.
 praticolus, X, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. i. (1892) 1232. — Austria.
 Pringlei, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 364 = *Cnicus Pringlei*, S. Wats.
 propinquus, Pomel, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.). (1889) 524. — Algeria.
 pseudohamulosus, X, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 1232. — Austria.
 quercetorum, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 218 = *Cnicus quercetorum*, A. Gray.
 raphilepis, Greene, l. c. 363 = *Cnicus raphilepis*, Hemsl.
 Rothrockii, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362 = *Cnicus Rothrockii*, A. Gray.
 Rusbyi, Greene, l. c. 361. — Arizona.
 Schulzeanus, Ruhm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1893) 177 sphalm. = *Schulzeanus*, X, Ruhm.
 scopulorum, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362 = *Cnicus eriocephalus*, A. Gray.
 sepincolus, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 25. — Graecia.
 stiriacus, X, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. ii. (1892) 1233. — Stiria.
 umbrosus, X, Simonk. Enum. fl. Transilv. (1886) 329. — Transs.
 velatus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363 = *Cnicus velatus*, S. Wats.
 venustus, Greene, l. c. 359; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 218. — Calif.
 vindobonensis, X, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. ii. (1893) 1238. — Austria.

CARELIA, Moehring, Hort. Priv. (1736)

- Kuntze, Rev. Gen. (1891) 325 = **CARELIA**, Adans. = **Ageratum**, Linn. (Compos.).
adscendens, albida, arbutifolia, brachystephana, conferta, corymbosa, domingensis, glandulifera Houstoniana, isocarphodes, latifolia, matricarioides, melissifolia, microcephala, mutica, paleacea, petiolata, purpurea, salicifolia, scabriuscula, sessilifolia, stricta, tomentosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 325 = *homonyma omnia* Agerati.
Agrianthus, Kuntze, l. c. = *Agrianthus corymbosus*, DC.
conyzoides, Kuntze, l. c. = *Ageratum conyzoides*, Linn.
echioides, Kuntze, l. c. = *Ager. echioides*, Hemsl.
maritima, Kuntze, l. c. = *Ager. conyzoides*, Linn.
matricarioides, Kuntze, l. c. = *Ager. matricarioides*, Less.

CAREX [Dill.] Linn. (Cyperac.). — Ind. Kew. i. 427.

- abacta, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 427 = *Michauxiana*, Boeck.
 acuta, L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad. xxii. (1886) 86 = *acutina*, L. H. Bailey.
 acutina, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 52. — Am. bor.
 affinis, F. Nyl. ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. II. i. (1890) 323 = *salina*, Wahlenb.
 akanensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 51. — Japon.
 albata, L. H. Bailey, in Macoun, Cat. Canad. Pl. iv. (1888).
 albida, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 9. — Am. bor.
 alburisina, Sheld. in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 284 = *laxiflora*, Lam.
 alma, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 50. — Calif.
 alsatica, X, Zahn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 363. — Eur.
 alterniflora, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 51. — Japon.
 angustisquama, Franch. l. c. 39. — Japon.
 Appelliana, X, Zahn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 364. — Alsatia.
 arcuata, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 106. — Japon.
 arrhyncha, Franch. l. c. Sér. VIII. vii. (1895) 30. — Japon.
 arridens, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 726. — Penins. Mal.
 Arthuriana, X, Beckm. et Figert, in Ber. deutsche bot. Ges. vii. (1889) 30; et in Deutsche Bot. Monatsschr. x. (1892) 176. — Germ.
 Asa-Grayi, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 427 = *Grayii*, Carey.
 assiniboinensis, W. Boott, in Coult. Bot. Gaz. ix. (1884) 91. — Am. bor.
 atlantica, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 425 = *echinata*, Murr.
 atractiformis, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 222. — Am. bor.
 Augustinowiczii, Meinsh. in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 411. — As. bor.-or.
 auriculata, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 19. — Am. bor.
 auriculata, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 106. — Japon.
 australis, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 262. — N. Zel.
 austro-caroliniana, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 428 = *caroliniana*, Buckley.
 axillaris, Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 456. — Perak.
 Baeuerlenii, F. Muell. ex Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, iv. (May 1889) 110 et 111, nomen. — Austral.
 Baileyi, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 220. — Am. bor.
 Bebbii, Olney, ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 55; et v. (1894) 97 = *tribuloides*, Wahlenb.
 Beckmanniana, X, Figert, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 185. — Germ.
 bella, L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 152. — Am. bor.-occ.

CAREX : —

- Berggreni, *Petrie*, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885. (1886) 297. — N. Zel.
 bidentula, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 41. — Japon.
 behurica, X, Simonk. *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 548. — Transs.
 binensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 28. — Japon.
 blepharicarpa, *Franch. l. c.* 46. — Japon.
 Bodinieri, *Franch. l. c.* 85. — Ins, Hong-Kong.
 botasgdensis, X, Kükenth. in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, v. (1893) 19. — Norv.
 bostrychostigma, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 118. — Mandchur.
 brachysandra, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1894) 40. — Japon.
 breviscapa, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 736. — Zeyl.
 Brittoniana, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 484. — Texas.
 Brongniartii, L. H. Bailey, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1886) 137 = vicaria, L. H. Bailey.
 Bruceana, Boott, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 717 in syn. = continua, C. B. Clarke.
 Brueckneri, X, Kükenth. in *Deutsche Bot. Monatsschr.* viii. (1890) 107. — Germ.
 Brueggeri, X, C. Richt. *Pl. Europ. i.* (1890) 170. — Helv.
 Calcitrapa, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 30. — Japon.
 californica, L. H. Bailey, in *Mem. Torr. Bot. Club*, i. (1889) 9. — Calif.
 capilliformis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 89. — China.
 capitulata, Boott, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 721 in syn. = rhizomatosa, Steud.
 capituliformis, *Meinsh. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 115. — Japon.
 capricornis, *Meinsh. l. c.* xxxi. (1887) 119. — Mandchur.
 castaneostachya, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost. Afr. A* (1895) 131 nomen. — Afr. trop. or.
 cercostachys, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 27. — Yunnan.
 Chevalieri, X, Corbière, in *Bull. Soc. Linn. Norm.* Sér. IV, ix. (1895) 76. — Gall. occ.
 chinensis, Munro, ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 738 = Munroi, Boott.
 chlamydea, *Norm. in Christian. Vidensk.-Selsk. Forhandl.* (1893) extr. 45. — Norv.
 chloroleuca, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 411 nomen; et in *Bot. Centralbl.* lv. (1893) 196. — Sibiria.
 Christii, X, Boeck. in *Bot. Centralbl.* xlii. (1890) 134. — Helv.
 ciliolata, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 38. — Japon.
 cincta, *Franch. l. c.* 35. — Japon.
 communis, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 41 = varia, A. Gray.
 conferto-spicata, Boeck. in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 206. — Columb.
 continua, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 717. — Reg. Himal.
 eontracta, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 34. — Japon.
 cooptanda, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 707. — Reg. Himal.
 Coreana, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 8. — Am. bor.
 crassinervia, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 38. — Japon.
 cremotachys, *Franch. l. c.* 34. — Yunnan.
 esomadensis, X, Simonk. *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 556. — Transs.
 curticeps, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 729. — Reg. Himal.
 curvifolia, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 41. — Reg. Argent.
 cyclocystis, Boeck. *l. c.* 47; C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. 748 in obs. (cycloristis.). — Tibet.
 cylindrostachys, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 32. — Tonkin.

CAREX : —

- Dallii, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 261. — N. Zel.
 decurtata, Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 414 = cryptocarpa, Cheesem.
 Delavayi, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 29. — Yunnan.
 densa, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 50. — Am. bor.
 dichroa, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 86 = thibetica, *Franch.*
 dichroa, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 304 = vesicaria, Linn.
 dicuspis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. vii. (1895) 42. — Japon.
 Dieckii, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 33. — Columb. angl.
 diffusa, Boott, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 717 = vesiculosa, Boott.
 diminuta, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 36. — China.
 dimorpha, Boeck. *l. c.* i. (1888) 45. — Reg. Himal.
 dinarica, Simonk. *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 533. — Transs.
 dissitiflora, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 32. — Japon.
 distracta, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 715. — Reg. Himal.
 dolichophylla, Link, ex C. B. Clarke, in *Bot. Mag.* (1893) t. 7288 in syn. = baccans, Nees.
 Donnell-Smithii, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 56. — Guatem.
 drepanorhyncha, *Franch. in Now. Arch. Mus. Paris*, Sér. II, x. (1887-88) 183. — China.
 Duernbergeri, X, Ritzberger, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 246. — Austria.
 Duftii, X, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, vi. (1888) 10. — Eur.
 durifolia, L. H. Bailey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 428 = Backii, Boott.
 Dussiana, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 36. — Ins. Martin.
 Duthiei, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 831. — Ind. or.
 ecostata, C. B. Clarke, *l. c.* 720. — Ind. or.
 Eleocharis, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 6. — Saskatch.
 erostrata, Boott, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 711. — Reg. Himal.
 exsiccata, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 6. — Am. bor.
 Fargesii, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 34. — China.
 fastigiata, *Franch. l. c.* 34. — Yunnan.
 Fauriei, *Franch. l. c.* Sér. VII. x. (1886) 105 (sphalm. Fauriae). — Japon.
 Favratii, X, Christ, ex Ber. *Deutsche bot. Ges.* viii. (1890) [173]. — Helv.
 feta, L. H. Bailey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 417. — Am. bor.-occ.
 filicina, Boeck. ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 717 in syn. = stramentitia, Boott.
 Fischeri, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 130. — Afr. trop. or.
 fissilis, Boott, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 714 et 715 in syn. = indica Linn. et distracta, C. B. Clarke.
 Fritschii, Waisbecker, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 51. — Hung.
 fucata, Boott, ex C. B. Clarke, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 710. — Sikkim.
 fulta, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 28. — Japon.
 funicularis, *Franch. l. c.* 57. — Japon.
 fuscifructus, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 742. — Assam.
 fuscolutea, Boeck. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 278. — Mexic.
 Fussii, X, Simonk. *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 548. — Transs.
 Fyllae, Holm, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 294; et *Consp. fl. Groenl.* iii. 2. (1887) 291. — Groenland.
 gansuensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 39. — Japon.
 gentilis, *Franch. l. c.* 84. — Yunnan.
 Gerhaldti, X, Figert, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* iv. (1886) 153. — Germ.

CAREX : —

- germanica, X, C. Richt. *Pl. Europ. i.* (1890) 169. — Germ.
 gifuensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 47. — Japon.
 grallatoria, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 113. — Ins. Kiu-Siu.
 grandis, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 13 = gigantea, Dewey.
 grandisquama, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 50. — Japon.
 gravaia, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 5. — Am. bor.
 hobkokensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 28. — Japon.
 Hectorsi, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 405. — N. Zel.
 Henningsiana, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 42 = vulpinaria, Raes.
 herbariorum, L. H. Bailey, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 150. — Am. bor.
 heteroclita, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 28. — Japon.
 heterolepis, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 48. — Tibet.
 Hieronymi, Boeck. *l. c.* 46. — Reg. Argent.
 Howellii, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 45. — Oreg.
 illota, L. H. Bailey, *l. c.* 15. — Am. bor.
 inaequalis, Boott, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 726. — Reg. Himal.
 inclinis, Boott, *l. c.* 728. — Reg. Himal.
 incompta, *Franch. Miss. scient. Cap. Horn*, v. [Phan.] (1889) 376 t. 6. — Reg. Magell.
 indagata, X, Torges et Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 26. — Eur.
 insignis, *Phil. ex K. Reiche, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 43, nomen. — Chili.
 interior, L. H. Bailey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1873) 426. — Am. bor.
 isomadensis, Simonk. ex K. Richt. *Pl. Eur. i.* (1890) — Transs.
 javanica, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 43. — Java.
 Johnstonii, Boeck. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 278. — Afr. trop. or.
 Jonesii, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 16. — Am. bor.
 kamikawensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 48. — Japon.
 Karoi, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 303 = capillaris, Linn.
 kashmirensis, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 743. — Cachem.
 Kirkii, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 297. — N. Zel.
 Kneuckeriana, X, Zahn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 412. — Austria.
 Kohtsii, X, C. Richt. *Pl. Europ. i.* (1890) 170. — Silesia.
 Krausei, Boeck. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 279 = capillaris, Linn.
 Krebsiana, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 32. — Japon.
 Kuntzeana, Boeck. *l. c.* 51. — Java.
 laeviculmis, *Meinsh. in Bot. Centralbl.* lv. (1893) 195. — Kamtschatka.
 lamprosandra, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 45. — Yunnan.
 lancea, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 341 = Schoenus lanceus, Thunb.
 lasiolepis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 46. — Japon.
 laticuspis, *Franch. l. c.* 58 = cryptocarpa, C. A. Mey.
 lazica, Boiss. et Balansa, ex Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 93 = pontica, Alboff.
 leiogona, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1865) 88. — Japon.
 leptocarpa, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 719 (leptocarpus). — Ind. or.
 Leutzii, X, Kneuck. ex Ber. *Deutsch. Bot. Ges.* x. (1892) [131]. — Germ.
 levicaulis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 37. — Japon.
 limnigena, X, Appel, ex Callier, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* x. (1892) 168. — Germ.
 litorhyncha, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 84. — Yunnan.

CAREX : —

- longepedunculata, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 41. — Tibet.
 longiacuminata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 104. — N. Zel.
 longibracteata, St-Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 863 = *C. Pseudo-Cyperus*, Linn.
 longiscuspis, Boeck. l. c. 49. — Tibet.
 longipedunculata, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 130. — Afr. trop. or.
 longhiensis, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 85. — Yunnan.
 louisianica, L. H. Bailey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 428 = Halei, Carey.
 lucidula, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 48 = recticulmis, Franch.
 lurida, L. H. Bailey, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1886) 63 = lupulina, Muhl.
 lurida, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 742. — Reg. Himal.
 Lycurus, K. Schum. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 58; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 129. — Afr. trop. or.
 Lyoni, F. Kurtz, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 419. — Alaska.
 Macounii, A. Bennett, in *Macoun, Catal. Can. Pl.* iv. (1888) 147. — Canada.
 macrantha, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 49. — Tibet.
 macrochlamys, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 49. — Japon.
 macrocystis, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 50. — Afr. austr.
 macrorhiza, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 43. — Reg. Argent.
 mahinoensis, Franch. l. c. 47. — Japon.
 malaccensis, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 722. — Penins. Mal.
 mandshurica, Meinsh. in *Bot. Centralbl.* lv. (1893) 197. — Mandchuria.
 marginaria, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 40. — Japon.
 Matsumurae, Franch. l. c. 50. — Japon.
 Meadii, Porter, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 122. — Am. bor.-or.
 melanolepis, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 47. — Reg. Himal.
 membranopacta, L. H. Bailey, l. c. xx. (1893) 428 = compacta, R. Br.
 microstoma, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 48 = pallescens, Linn.
 Milnei, Boott, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 715 = indica, Linn. var.
 minutiflora, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 51. — Reg. Himal.
 minuta, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 41. — Japon.
 misera, Franch. l. c. 51. — Japon.
 Mithala, X, Callier, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vi. (1888) 40. — Scand.
 mitrata, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 88. — Japon.
 mixta, X, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 607. — Gall. occ.
 moniliformis, Britton, in *Geol. Surv. N. Jersey*, ii. (1889) 278 = silicea, Olney.
 montanensis, L. H. Bailey, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 152. — Am. bor.-occ.
 Montis Eeka, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 486. — Ins. Sandvic.
 mosognensis, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 31. — Yunnan.
 moupinensis, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II, x. (1887-8) 102. — China.
 Muelleri, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 298 = *C. viridis*, Petrie. — N. Zel.
 munipoorensis, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 729. — Ind. or.
 Munroi, Boott, ex C. B. Clarke, l. c. 738. — Ind. ov.
 Murii, X, Appel, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 124; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 100. — Austria.
 mutans, Boott, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fr. Brit. Ind.* vi. (1894) 695 in syn. = Kobresia seticulmis, Boeck.
 monosperma, Macoun, *Cat. Canad. Pl.* ii. (1888) 109 in syn. = chordorrhiza, Linn. f.

CAREX : —

- Myabei, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 52. — Japon.
 Naegeli, X, Bruegg. ex Sennholz, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvii. (1887) 72. — Helv., Austria.
 nambuensis, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 44. — Japon.
 nemurensis, Franch. l. c. 30. — Japon.
 Niederleiniana, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 50. — Reg. Argent.
 Nordmanni, Kern. ex Palla, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) Sitzungsab. 69 = tomentosa, Linn.
 Novae-Zelandiae, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 273. — N. Zel.
 oahuensis, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 487 = wahuensis, C. A. Mey.
 obnupta, L. H. Bailey, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. iii. (1891) 104. — Calif.
 occidentalis, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 14. — Am. bor.
 Ohuboi, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 43. — Japon.
 oligantha, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1892) 80. — Chili.
 oligocarpa, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 746. — Tibet.
 oligophylla, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 305 = caespitosa, Linn.
 oligostachys, Meinsh. ex Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 117. — Mandchur.
 oranensis, Trab. in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Monoc.)* (1895) 111 = distans, Linn.
 otaruensis, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 34. — Japon.
 pachyrrhiza, Franch. l. c. 45. — Yunnan.
 pandanophylla, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 714. — Pegu.
 Pannwitziana, X, Figert, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* v. (1887) 97. — Germ.
 Paponii, X, Muret, ex Th. Dur. et Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxi. (1882) 285 nomen; et xxv. 1 (1886) 336. — Helv.
 paraguayensis, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sc. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1, 151 t. 45. — Parag.
 parvigluma, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 716. — Reg. Himal.
 patens, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 90. — Japon.
 Peckii, E. C. Howe, in *47th Annual Report N. York State Museum*, 1893 (1894) 166. — Am. bor.
 pedicellata, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 87 = ouria, Dewey.
 peraffinis, X, Appel, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* x. (1892) [77]. — Silesia.
 perakensis, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* (1894) 720. — Perak.
 pertenuis, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889). — Mexic.
 Petrae-fu Fae, X, Murr, in *Progr. K. K. Oberrealschule Innsbr.* (1891) 57; et in *Kneuck. Allg. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 76. — Tirol.
 phoenocarpa, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 90. — Yunnan.
 picea, Franch. l. c. 39. — Japon.
 picta, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 103. — N. Zel.
 pinguis, L. H. Bailey, in *Bull.* iii. *Geol. and Nat. Hist. Surv. Minn.* (1887) 22 = adusta, Boott.
 platyphylla, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 50 = siderosticha, Hance.
 plebeia, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 178. — Ind. or.
 plocamostyla, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 117. — Japon.
 polygyna, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 40. — Reg. Himal.
 polyneura, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 184. — N. Zel.
 pontica, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 93. — Reg. Cauc.
 Portae, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 165. — Ins. Balear.
 praelonga, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 707. — Reg. Himal.

CAREX : —

- praestans, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 723. — Ind. or.
 Prattii, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 32. — China.
 Pringlei, L. H. Bailey, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. 151. — Mexic.
 prionocarpa, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 87. — Japon.
 Provoti, Franch. l. c. 52. — China.
 pseudoaxillaris, X, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 168. — Europ.
 pseudo-echinata, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 34. — Reg. Argent.
 pseudohelvola, Kihlm. in *Meddel. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* (1888-91) 71; et in *Hjelt, Consp. fl. Fenn.* (1892) 256 = helvola, Blytt.
 pseudo-Mairii, X, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 479. — Gall.
 pseudovulpina, X, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 168. — Germ.
 quadriida, L. H. Bailey, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. iii. (1891) 104. — Calif.
 qualicumensis, L. H. Bailey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 428 = Macounii, A. Benn.
 recticulmis, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 48. — Japon.
 Regnelliana, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 34. — Bras.
 repanda, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 720. — Reg. Himal.
 resectans, Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 413 (= *C. inversa*, R. Br. var. *radicata*, Cheesem.). — N. Zel.
 rhizopoda, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 114. — Japon.
 rhyncophora, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 90. — China.
 riishirensis, Franch. l. c. 81. — Japon.
 rorulenta, Porta, in *Nouv. Giorn. bot. Ital.* xix. (1887) 321. — Ins. Balear.
 Rouyana, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 51. — Japon.
 rubro-brunnea, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 710. — Khasia.
 rufa, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 340 = Schoenoxiphium rufum, Nees.
 rufo-variegata, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 33. — Columb. angl.
 runssoroensis, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 129. — Afr. trop. or.
 sadoensis, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 41. — Japon.
 saltuensis, X, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 7. — Am. bor.
 Sanionis, X, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 170. — Germ.
 saruensis, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 85. — Japon.
 scabrinervia, Franch. l. c. 37. — Japon.
 Schenkiana, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 36. — Bras.
 scirpoides, Sartwell, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 426 (an *C. scirpoides*, Michx?). — Am. bor.
 scita, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 115. — Japon.
 Schlagintweitiana, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 48. — Reg. Himal.
 sclerocarpa, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 91. — China.
 sendaica, Franch. l. c. 42. — Japon.
 Sewelli, A. Bennett et C. B. Clarke, in *Trans. Bot. Soc. Edinb.* xvii. (1889) 456 t. 8. — Sibiria.
 sharenis, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 90. — Japon.
 shikokiana, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 47. — Japon.
 shimidzensis, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 33 = cernua, Boott.
 sikkimensis, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 708. — Reg. Himal.
 silesiaca, X, Figert, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vi. (1888) 146. — Germ.
 Sismani, Velen. in *Sitzungsab. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 67. — Bulg.
 smaragdina, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 398. — N. Zel.
 solstitialis, X, Figert, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vii. (1889) 86. — Germ.

CAREX : —

- Souliei, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 35. — China.
 spathulatus, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 559. — Malacca.
 specifixa, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 21. — Calif.
 spicato-paniculata, *Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1891 (1895) 690 nomem. — Afr. austr.
 spiralis, *Ewing, in Trans. nat. hist. Soc. Glasgow*, ii. 1886-87 (1888) 110. — Scotia.
 spissa, *L. H. Bailey, ex Hemsl. Biol. Centr.-Amer.* iv. (1886) 94. — Am. bor. austro-occ.
 spreta, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 6. — Am. bor.
 stachydesma, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 85. — Yunnan.
 stipitinux, *C. B. Clarke, ex Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1894-95) 31. — China.
 straminiformis, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 24. — Am. bor.
 subnivalis, *Arv.-Tow. ex Ber. Deutsch. Bot. Ges.* vii. (1890) [169]. — Gall.
 subsabulosa, *Norm. in Christian. Vidensk-Selsk. Forhandl.* (1893) extr. 48. — Norw.
 sutchuensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 45. — China.
 taliensis, *Franch. l. c.* 34. — Yunnan.
 tapinzensis, *Franch. l. c.* 44. — Yunnan.
 taraspensis, *Bruegg. et Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxxi. (1888) Beil. 193. — Helvet.
 tarumensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 86. — Japon.
 tenerina, *Murr. et Appel, in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 124. — Tirol.
 tenuiseta, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 43. — Japon.
 tetrasticha, *Boeck. Cyp. Nov.* i. (1888) 35. — Reg. Argent.
 texensis, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 97. — Am. bor.
 texensis, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 485. — Texas
 tibetica, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1887-88) 103. — China.
 Thomsoni, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xviij. 1885 (1886) 298. — N. Zel.
 tonkinensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 33. — Tonkin.
 toezensis, *X. Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 426. — Hung.
 trachycarpa, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 413 (= *C. muricata*, *Cheesem.*). — N. Zel.
 trappistarum, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 320. — China.
 Traversii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 262. — N. Zel.
 trichopoda, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 43. — Japon.
 tricolor, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 58; et in *Oest. bot. Zeitschr.* xl. (1890) 237. — Bulg.
 triquetrifolia, *Boeck. in Bot. Jahrb.* vii. (1886) 279. — Afr. aequat. or.
 trispiculata, *Boeck. Cyp. Nov.* i. (1888) 45. — Reg. Himal.
 tsangensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 44. — Yunnan.
 Turczaninowiana, *Meinsh. ex Korshinsky, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1892) 411. — As. bor.-or.
 Uechtritziiana, *X. C. Richt. Pl. Europ.* i. (1896) 170. — Germ.
 Uleana, *Boeck. Cyp. Nov.* i. (1888) 42. — Bras.
 Urbani, *Boeck. in Bot. Jahrb.* vii. (1886) 280 = *flava*, *Linn.*
 unciniiformis, *Boeck. Cyp. Nov.* i. (1888) 40. — Reg. Himal.
 urolepis, *Franch. Miss. scient. Cap Horn*, v. Bot. (1889) 376 t. 5. — Patag.
 urolepis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 36 = *xanthathera*, *Franch.*
 urostachys, *Franch. l. c.* 35. — Japon.
 uruguensis, *Boeck. in Bot. Jahrb.* vii. (1886) 277. — Reg. Argent.

CAREX : —

- usta, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 20. — Am. bor.
 usta, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 41. — Japon.
 Vallis-Rosetta, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 130. — Afr. trop. or.
 variabilis, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 18. — Am. bor.
 ventricosa, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 91. — Japon.
 vernacula, *L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 417. — Am. bor.-occ.
 vicaria, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 49. — Am. bor.
 vidua, *Boott, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 713. — Sikkim.
 vimariensis, *X. Hausskn. ex Ber. Deutsch. Bot. Ges.* x. (1890) [131]. — Germ.
 Volkensii, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 130. — Afr. trop. or.
 vulgaris, *L. H. Bailey [conf. Mac Mill. Metasp. Minn. (1892) 123] = stricta, Lam.*
 Walteriana, *L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 420 = *striata, Michx.*
 Warmingii, *Holm, in Lange, Consp. fl. Groenl.* ii. (1887) 290; et ex *Engl. Bot. Jahrb.* viii. (1887) 244 = *Bigelovii, Torr.*
 Winterbottomi, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 727. — Reg. Himal.
 Wrightii, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 47. — Japon.
 xanthathera, *Franch. l. c.* 88. — Japon.
 xerantica, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 151. — Am. brit.
 yesinensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 88. — Japon.
 yosemitana, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) = *Sartwelliana, Olney.*
 yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 31. — Yunnan.
 Zahnii, *X. Kneuck. in Deutsch. bot. Monatsschr.* ix. (1891) 60; et in *Bull. Trav. Soc. Murith. fasc.* xix-xx. (1892) 78. — Helv.

CARICA, *Linn. (Passifl.)*. — Ind. Kew. i. 441.

- aurantiaca, *Bull. ex Solms, in Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. (1889) 186 (= *Vasconcellia aurantiaca*, *Regel.*) — N. Gran.
 Bonplandiana, *Hort. Par. ex Solms, l. c.* 178 = *quercifolia, Solms.*
 Bourgeauii, *Solms, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1894) 98. — Am. trop.
 caudata, *T. S. Brandeg. in Zoë, iv.* (1894) 401. — Calif.
 cestriflora, *Solms, in Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. (1889) (= an *C. cestriflora*, *A. DC.*) — N. Gran.
 cubensis, *Solms, l. c.* 177. — Ins. Antill.
 gracilis, *l. c.* 182 (= *Papaya gracilis*, *Regel.*) — Ecuad.
 hastaeifolia, *Hort. ex Solms, l. c.* 179 in obs. = *quercifolia Solms.*
 Manihot, *Solms, l. c.* 186 (= *Vasconcellia Manihot*, *Triana et Planch.*) — N. Gran.
 platanifolia, *Solms, l. c.* 177 et 182. — Peruvia.
 pubescens, *Solms, l. c.* 185 (= *Vasconcellia pubescens*, *A. DC.*) — Peruvia.
 quercifolia, *Solms, l. c.* 178 (= *Vasconcellia quercifolia*, *St-Hil.*) — Am. austr.
 triloba, *Mast. ex Solms, l. c.* in syn. = *heterophylla, Poepp. et Endl.*

CARICINA, *St-Lager, in Cariot. Étud. des fleurs*, éd. 8. ii. (1889) 880 = **Carex**, *Linn. (Cyperac.)*.

- approximata, *St-Lager, l. c.* 879 = *C. approximata, Hoppe.*
 brizoides, *St-Lager, l. c.* 877 = *C. brizoides, Linn. canescens, St-Lager, l. c.* = *C. canescens, Linn.*
 chondorrhiza, *St-Lager, l. c.* 874 in obs. = *C. chondorrhiza, Ehrh.*
 disticha, *St-Lager, l. c.* 880 = *C. disticha, Huds.*
 divisa, *St-Lager, l. c.* 874 = *C. divisa, Huds.*
 divulsa, *St-Lager, l. c.* 875 = *C. divulsa, Good.*
 compacta, *St-Lager, l. c.* 874 = *C. compacta, Wimm.*
 curvula, *St-Lager, l. c.* 876 = *Carex curvula, vAll.*

CARICINA : —

- cyperoides, *St-Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8; ii.* (1889) 879 = *Carex cyperoides, Linn.*
 elongata, *St-Lager, l. c.* 878 = *C. elongata, Linn.*
 foetida, *St-Lager, l. c.* = *C. foetida, All.*
 incurva, *St-Lager, l. c.* 873 = *C. incurva, Lightf.*
 microstyla, *St-Lager, l. c.* 873 = *C. microstyla, Gay.*
 multicaulis, *St-Lager, l. c.* 877 = *C. Schreberi, Schrank.*
 muricata, *St-Lager, l. c.* 875 = *C. muricata, Linn.*
 ovalis, *St-Lager, l. c.* 878 = *C. ovalis, Good.*
 paniculata, *St-Lager, l. c.* 876 = *C. paniculata, Linn.*
 paradoxa, *St-Lager, l. c.* = *C. paradoxa, Willd.*
 remota, *St-Lager, l. c.* 879 = *C. remota, Linn.*
 setifolia, *St-Lager, l. c.* 874 = *C. divisa, Huds.*
 stellulata, *St-Lager, l. c.* 870 = *C. stellulata, Good.*
 teretiuscula, *St-Lager, l. c.* 875 = *C. teretiuscula, Good.*
- CARICINELLA**, *St-Lager, in Cariot. Étud. des fleurs*, éd. 8. ii. (1889) 880 = **Carex**, *Linn. (Cyperac.)*.
 laevis, *St-Lager, l. c.* = *C. dioica, Linn.*
 microglochin, *St-Lager, l. c.* 880 = *C. microglochin, Wahlenb.*
 pauciflora, *St-Lager, l. c.* 881 = *C. pauciflora, Lightf.*
 pulicaris, *St-Lager, l. c.* = *C. pulicaris, Linn.*
 rupestris, *St-Lager, l. c.* 882 = *C. rupestris, All.*
 scabra, *St-Lager, l. c.* 880 = *C. scabra, Forst.*

CARISSA, *Linn. (Apocyn.)*. — Ind. Kew. i. 441.

- pilosa, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 259. — Afr. austro-occ. extratrop.
 revoluta, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 33. — Madag.

CARLINA, *Linn. (Compos.)*. — Ind. Kew. i. 441.

- acanthophylla, *Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v.* (1887) 85; et ex *Nym. Consp. fl. Eur.* ii. 1. (1889) 78. — Graecia.
 longicaulis, *Somm. et Levier, in Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II, ii. (1895) 91. — Reg. Cauc.
 olympica, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxix. (1891). — Graecia.
 pallescens, *Wettst. in Sitzungsabz. zool.-bot. Ges. Wien*, xcviij. 1889. (1889) 371 fig. 1-8. — As. Min.
 semiamplexicaulis, *Form. in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 86; et *Kvetná, iii.* (1892) 593. — Moravia.
 subdecurrens, *Vandas, l. c.* xxxviii. (1888) 413 = *aggregata, Willd.*
 thracica, *Velen. in Sitzungsabz. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 384. — Thracia.

CARLOMOHRIA, *Greene, in Erythea*, i. (1893) 246

- = **Halesia**, *Linn. (Styrac.)*.
 carolina, *Greene, l. c.* = *H. tetraptera, Ellis.*
 diptera, *Greene, l. c.* = *H. diptera, Ellis.*
 parviflora, *Greene, l. c.* = *H. parviflora, Michx.*

CARLOWRIGHTIA, *A. Gray (Acanth.)*. — Ind.

- Kew. i. 442.
 cordifolia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 406. — Mexic.
 corymbosa, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 80. — N. Zel.
 fimbriata, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser.* II. iii. (1891) 161. — Calif.
 glabrata, *Fernald, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 536. — Mexic.
 ovata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 406. — Mexic.
 pectinata, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser.* II. iii. (1891) 160. — Calif.
 pubens, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 406. — Mexic.
 serpyllifolia, *A. Gray, l. c.* 405. — Mexic.

CARLUDOVICA, *Ruiz et Pav. (Cyclanth.)*. — Ind.

- Kew. i. 442.
 Caput-Medusae, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1890) t. 7118. — Hab. ?
 Drudei, *Mast. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 3. (1887) 99. — Am. centr.
 gigantea, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 737 et 738. — Panama.

CARLUDOVICA : —

- Hookeri*, H. Wendl. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 738 = *latifolia*, Ruiz et Pav.
humilis, Kuntze, l. c. = *palmata*, Ruiz et Pav.
microcephala, Hort. Berol. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7263. — Costar.
palmifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 738 = *Plumierii*, Kunth.
rotundifolia, H. Wendl. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 7083. — Costar.

- CARMELITA**, C. Gay = **Chaetanthera**, Ruiz et Pav. (Compos.).
spatulata, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 831. — Chili.

- CARMICHAELIA**, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 442.
curta, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892 (1893) 271. — N. Zel.
diffusa, Petrie, l. c. 972. — N. Zel.
micrantha, Colenso, l. c. xxvi. 1893 (1894) 313. — N. Zel.
Muelleriana, Regel, in Gartenfl. (1887) 611; et in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 377. — N. Zel.?
multicaulis, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892 (1893) 329. — N. Zel.
orbiculata, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 459. — N. Zel.
prona, T. Kirk, l. c. xxvii. 1894 (1895) 350. — N. Zel.
Suteri, Colenso, l. c. xxiii. 1890 (1891) 383. — N. Zel.

- CAROPODIUM**, Stapf et Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Acad. Wien. li. (1886) 317. **UMBELLIFERAE**.
meoides, Stapf et Wettst. l. c. — As. occ.

- CARPESIUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 443.
Atkinsonianum, Hemsl. in Kew Bull. (1892) 157. — China.
eximium, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 58. — China.
Faberi, C. Winkl. l. c. — China.
humile, C. Winkl. l. c. 70. — China.
Lipskyi, C. Winkl. l. c. 68. — China.
minus, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 431 tab. 13. — China.
velutinum, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 73. — China.

- CARPHA**, Banks et Soland. (Cyperac.). — Ind. Kew. i. 443.
bracteosa, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 656. — Afr. austr.

- CARPINUS**, Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 443.
Carpinus, Sargent, in Gard. and For. vi. (1893) 364 = *japonica*, Blume.
ulmifolia, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 742 = *C. Betulus*, Linn.
virginiana, Sudw. in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 43; et in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1894) 153 = *caroliniana*, Walt.

- CARPODINUS**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 444.
Barteri, Stapf, in Kew Bull. (1894) 19. — Afr. trop. occ.
calabaricus, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.
camptoloba, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 132. — Congo.
complicata, K. Schum. l. c. — Hab.?
incerta, K. Schum. l. c. — Togo.
lanceolata, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 132. — Congo.
leptantha, K. Schum. l. c. — Gabon.
papuanus, F. Muell. l. c. lx. (1894) 226 nomen. — N. Guin.
parviflorus, Stapf, in Kew Bull. (1894) 19. — Afr. trop. occ.
pauciflora, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 131. — Togo.
subrepanda, K. Schum. l. c. 132. — Kamerun.
uniflorus, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2340; et in Kew Bull. (1894) 19. — Afr. trop. occ.

- CARRICHTERA**, Adans. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 444.

- annua*, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 173 = *C. Vella*, DC.

- CARRUTHIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 141 = **Aitonia**, Thunb. (Sapind.).
capensis, Kuntze, l. c. 142 = *A. capensis*, Thunb.

- CARTHAMODES**, Manetti, Virid. Florent. (1751), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 325 = **Carduncellus**, Adans. (Compos.).
araneosum, *eriocephalum*, *mitissimum*, *pectinatum*, *pinnatum*, Kuntze, l. c. 325-26 = *homonyma omnia* Carduncelli.
Carduncellus, Kuntze, l. c. = *Card. monspeliensis*, All.
caeruleus, Kuntze, l. c. = *Card. caeruleus*, Less.
hispanicum, Kuntze, l. c. = *Card. caeruleus*, Less.

- CARTHAMUS**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 444.
calvus, Batt. in Bull. Assoc. franç. Avanc. sci. (1889) 489; et in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie [Dicot.] (1889) 510 (= *Carduncellus calvus*, Boiss. et Reut.). — Algeria.
carlinoides, Batt. in Batt. et Trab. l. c. 510 (= *Onobroma carlinoides*, Pomel). — Algeria.
carthamoides, Batt. l. c. 511 (= *O. carthamoides*, Pomel). — Algeria.
strictus, Batt. l. c. 510. — Algeria.

- CARUELINA**, Kuntze, Rev. Gen. 277 (1891) = **Chomelia**, Jacq. (Rubiace.).
angustifolia, *anisomeris*, *brasiliiana*, *estrellana*, *fasciculata*, *filipes*, *hirsuta*, *intercedens*, *Martiana*, *obtusata*, *occidentalis*, *oligantha*, *parviflora*, *pedunculosa*, *Pohliana*, *pubescens*, *sericea*, *sessilis*, *spinosa*, *tenuiflora*, *transiens*, *tristis*, *Vauthieri*, *vulpina*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Chomeliae.
malaneoides, Kuntze, l. c. = *C. malaneoides*, Muell. Arg.
ribesoides, Kuntze, l. c. = *C. ribesoides*, Benth.

- CARUM**, Rupp. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 445.
acuminatum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 23 in obs. = *Pimpinella acuminata*, C. B. Clarke.
angelicaefolium, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 319. — Madag.
brachyactis, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 428. — Syria.
caespitosum, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1886) 256. — As. Min.
Candolleum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 128 = *Pimpinella Candolleana*, Wight et Arn.
cardiocarpum, Franch. l. c. 120. — Yunnan.
caudatum, Franch. l. c. 126. — Yunnan.
Chaberti, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 387. — Algeria.
coriaceum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 127. — Yunnan.
cruciatum, Franch. l. c. 124. — Yunnan.
Delavayi, Franch. l. c. 120. — Yunnan.
dissectum, Franch. l. c. 123. — Yunnan.
filicinum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 121. — Yunnan.
flaccidum, Franch. l. c. 126 = *Pimpinella flaccida*, C. B. Clarke.
gracile, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 258 in syn. = *rupestre*, Boiss. et Heldr.
Heyneanum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 127 in obs. = *Pimpinella Heyneana*, Wall.
holopetalum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 48. — Japon.
Hookeri, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 122 = *Pimpinella Hookeri*, C. B. Clarke.
Howellii, Coult. et Rose, Revis. N. Am. Umbell. (1888) 129. — Oregon.
imbricatum, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 208. — Afr. trop. austro-occ.
involutum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 (= *C. involutatum*, Baill.) = *Roxburghianum*, Benth.

CARUM : —

- Lemmoni*, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 283. — Calif.
leptocladum, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 66 t. 22. — Afghan.
loloense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 125. — Yunnan.
molle, Franch. l. c. 120. — Yunnan.
nudum, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 428. — Syria.
olympicum, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 255. — As. Min.
paniculatum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 122. — Yunnan.
purpureum, Franch. l. c. 127. — Yunnan.
saxicolum, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 103; et in Bull. Herb. Boiss. (1895) 523. — Reg. Cauc.
scaberulum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 125. — Yunnan.
schizopetalum, Franch. l. c. Sér. VIII. ii. (1890) 198. — China.
segetum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 267 = *C. Ridolfia*, Benth. et Hook. f.
sinense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 119. — Yunnan.
tenerum, Franch. l. c. 122 = *Pimpinella tenera*, Benth. et Hook. f.
trichomanifolium, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 64. — Yunnan.
yunnanense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 128. — Yunnan.

- CARUMBUM**, Reinw. = **Homalanthus**, A. Juss. (Euphorb.).
novo-guineense, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 199. — N. Guin.

- CARUSIA**, Mart. ex Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 4. (1890) 73 = **Burdochia**, Mart. (Malpigh.).

- CARVALHOA**, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 189. **APOCYNACEAE**.
campanulata, K. Schum. l. c. — Mossamb.

- CARYA**, Nutt. (Jugland.). — Ind. Kew. i. 446.
alba, Britton, Stern et Pogg. Prelim. Catal. (1888) 49 = *tomentosa*, Nutt.
Fernowiana, Sudworth, Trees of Washingt. (1891) 6. — Am. bor.
minima, Britton, Stern et Pogg. Prelim. Catal. (1888) 49 = *amara*, Nutt.
ovata, Britton, Stern et Pogg. l. c. = *alba*, Nutt.

- CARYELLA** madagascariensis, Bourn. ex Payment. Histol. comp. Eénac. (1892) 114. (Quid?). — Madag.

- CARYOCAR**, Linn. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 446.
coriaceum, Wittm. in Mart. Fl. Bras. vii. i. (1886) 352. — Bras.
crenatum, Wittm. l. c. 351. — Bras.
cuneatum, Wittm. l. c. 352. — Bras.
gracile, Wittm. l. c. 350. — Bras.
intermedium, Wittm. l. c. 352. — Bras.
toxifera, Rodr. in Vellozia, i. (1885-88) Sec. edição, (1891) 11. — Bras.

- CARYOCHLOA**, Spreng. = **Oryzopsis**, Michx. Gramin.).
panicoides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 775 = *O. setacea*, Rich.
setifolia, Kuntze, l. c. 764 (= *Urachne simplex*, Trin. et Rupr.). — Chili.
stipodes, Kuntze, l. c. 765 (= *Piptatherum sphacelatum*, Boiss.). — Persia.
trichotoma, Kuntze, l. c. (= *Arachne trichotoma*, Trin.). — Bras.

- CARYOPTERIS**, Bunge (Verben.). — Ind. Kew. i. 446.
ningpoënsis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 264. — China.
parvifolia, Batalin. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 98. — China.

CARYOPTERIS : —

sinensis, Dippel, Handb. Laubholzk. i. (1889) 59 fig. 24 = *C. Mastacanthus*, Schau.

CARYOSPERMUM, Blume, (Celastr.). — Ind. Kew. i. 447.

alpestre, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *Celastrus alpestris*, Blume.

philippinense, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 89. — Ins. Philipp.

CARYOTA, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 447.

mitis, Herb. Calc. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 419 = *Wallichia dispicha*, T. Anders.

CASEARIA, Jacq. (Samyd.). — Ind. Kew. i. 449.

Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 34. — Bolivia.

Brighami, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 459. — Guatem.

gelonioides, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 567. — Madag.

gelonioides, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1893) 51 = praec.

laetioides, Warb. l. c. — Guatem.

membranacea, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 214. — Bolivia.

mollis, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 50. — N. Guin.

riparia, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 363. — Bras.

Tulasneana, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 51 (= *Pitumba Tulasneana*, Baill.). — Ins. Maurit.

Zahlbruckneri, Szyszyl. in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 226. — Peruvia.

CASSANDRA, D. Don (Ericac.). — Ind. Kew. i. 449.

ferruginea, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 184 = *Lyonia ferruginea*, Nutt.

jamaicensis, Niedenzu, l. c. = *Lyonia jamaicensis*, D. Don.

CASSEBEERIA, Dennst. = **Sonerila**, Roxb. (Melastom.).

angustata, *arguta*, *Bensonii*, *biflora*, *Brunonis*, *elegans*, *erecta*, *Fordii*, *Gardneri*, *grandiflora*, *Griffithii*, *Harveyi*, *hirsutula*, *insignis*, *Jungkuhniana*, *khasiana*, *laeviuscula*, *lanceolata*, *linearis*, *magnifica*, *molocana*, *nudiscula*, *obliqua*, *pedunculosa*, *picta*, *pilosula*, *robusta*, *rotundifolia*, *scapigera*, *secunda*, *squarrosa*, *stricta*, *tenera*, *tenuifolia*, *Teymanniana*, *tomentella*, *travancorica*, *Wallichii*, *Wightiana*, *versicolor*, *violifolia*, *zeylanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 245-46 = *homonyma omnia* *Sonerilae*.

affinis, Kuntze, l. c. 245 = *S. zeylanica*, Wight et Arn.

amabilis, Kuntze, l. c. (= *S. amabilis*, Bedd.) = *S. Clarkei*, Cogn.

amabilis, Kuntze, l. c. 953 = *S. amabilis*, Kurz.

Arnottiana, Kuntze, l. c. 245 = *S. Wightiana*, Arn.

axillaris, Kuntze, l. c. 953 = *S. versicolor*, Wight.

Beccariana, Kuntze, l. c. = *S. Beccariana*, Cogn.

borneensis, Kuntze, l. c. = *S. borneensis*, Cogn.

brachyandra, Kuntze, l. c. 245 = *S. tenera*, Royle.

Clarkei, Kuntze, l. c. = *S. Clarkei*, Cogn.

cordifolia, Kuntze, l. c. 953 = *S. cordifolia*, Cogn.

emaculata, Kuntze, l. c. 245 = *S. emaculata*, Roxb.

glaberrima, Kuntze, l. c. 953 = *S. zeylanica*, Wight et Arn.

Gunneratnei, Kuntze, l. c. = *S. linearis*, Hook. f.

hirtella, Kuntze, l. c. = *S. hirtella*, Cogn.

heterostemon, Kuntze, l. c. = *S. obliqua*, Korth.

heterophylla, Kuntze, l. c. 245 = *S. heterophylla*, Jacq.

Hookeriana, Kuntze, l. c. 245 = *S. Wightiana*, Arn.

impatiens, Kuntze, l. c. = *S. Impatiens*, Becc.

Kurzii, Kuntze, l. c. 246 = *S. amabilis*, Kurz.

margaritacea, Kuntze, l. c. 953 = *S. margaritacea*, Lindl.

margaritacea, Krasser, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 177 = praec.

papuana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 953 = *S. parviflora*, Cogn.

parviflora, Kuntze, l. c. = *S. parviflora*, Cogn.

CASSEBEERIA : —

peperomiaefolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 353 = *S. peperomiaefolia*, Oliver.

pumila, Kuntze, l. c. = *S. zeylanica*, Wight et Arn.

purpurascens, Kuntze, l. c. = *S. purpurascens*, Becc.

rhombifolia, Kuntze, l. c. 246 = *S. zeylanica*, Wight et Arn.

rostrata, Kuntze, l. c. = *S. zeylanica*, Wight et Arn.

triflora, Kuntze, l. c. 953 = *S. triflora*, Cogn.

tuberculifera, Kuntze, l. c. = *S. tuberculifera*, Cogn.

velutina, Kuntze, l. c. = *S. velutina*, Cogn.

CASSIA, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 449.

Cuthbertsoni, F. Muell. in Vict. Naturalist, (Oct. 1888) 75. — Austral.

densistipulata, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 200. — Afr. or.

depressa, Pollard, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 515 t. 251. — Am. bor.

mississippiensis, Pollard, l. c. xxi. (1894) 219. — Am. bor.

Morongii, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 91. — Parag.

multiplinnata, Pollard, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 515 t. 250. — Am. bor.

oocarpa, Baker, in Kew Bull. (1895) 181. — Arabia.

Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 409. — Mexic.

Simpsoni, Pollard, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 221. — Florida.

Stuhlmannii, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 201. — Afr. or.

tarapacana, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 20. — Chili.

usambarensis, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 57; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 201. — Afr. trop. or.

zygophylloides, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 79. — Bras.

CASSIDISPERMUM, Hemsl. in Ann. of Bot. vi. (1892) 208. **SAPOTACEAE**.

megahilum, Hemsl. l. c. t. 14 — Ins. Salomon.?

CASSINE, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 454.

attenuata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 = *Elaeodendron attenuatum*, A. Rich.

australis, Kuntze, l. c. = *E. australe*, Vent.

Buchananii, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 551. — Afr. trop. austro-or.

Burchellii, Loes. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 193. — Afr. austr.

Burkeana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 (= *Mystroxylon Burkeanum*, Sond.) = *E. Rehmanni*, Szyszyl.

comorensis, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 551. — Ins. Comor.

confertiflora, Loes. l. c. 553 (= *Mystroxylon confertiflorum*, Tul.) — Afr. trop.

crocea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 = *E. croceum*, DC.

curtipetala, Kuntze, l. c. = *E. curtipendulum*, Endl.

dentata, Kuntze, l. c. = *Elaeocarpus dentatus*, Vahl.

elliptica, Kuntze, l. c. = *Elaeodendron ellipticum*, DC.

Engleriana, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 552. — Zanzib.

eucleaeformis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 (= *Mystroxylon eucleaeforme*, Sond.) — Afr. austr.

Fortunei, Kuntze, l. c. = *Elaeodendron Fortunei*, Turcz.

glauca, Kuntze, l. c. = *E. glaucum*, Pers.

gymnosporioides, Kuntze, l. c. = *E. glaucum*, Pers.

Holstii, Loes. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 233. — Zanzib.

Hookeriana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 = *Elaeocarpus Hookerianus*, Raoul.

japonica, Kuntze, l. c. = *Elaeodendron japonicum*, Franch.

lycioides, Kuntze, l. c. = *E. lycioides*, Baker.

macrocarpa, Kuntze, l. c. (= *Mystroxylon macrocarpum*, Sond.) — Afr. austr.

megalophylla, Kuntze, l. c. 150 sub *Maurocenia* = *Turpinia megalophylla*, Tul.

CASSINE : —

melanocarpa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 = *Elaeodendron melanocarpum*, F. Muell.

micrantha, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 551 (= *Elaeodendron micranthum*, Tul. — Habs?)

nitidula, Kuntze, l. c. = *E. nitidulum*, Baker.

oligantha, Kuntze, l. c. = *E. oliganthum*, Baker.

orientalis, Kuntze, l. c. = *E. orientale*, Jacq.

papillosa, Kuntze, l. c. = *E. capense*, Eckl. et Zeyh.

pauciflora, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 551 (= *Elaeodendron pauciflorum*, Tul.) — Hab.?

pilosa, Kuntze, l. c. = *E. pilosum*, Baker.

pubescens, Kuntze, l. c. (= *Mystroxylon pubescens*, Eckl. et Zeyh.) — Afr. austr.

quadrangulata, Kuntze, l. c. = *Elaeodendron quadrangulatum*, Reiss.

Rehmanni, Kuntze, l. c. (= *Mystroxylon Burkeanum*, Sond.) = *E. Rehmanni*, Szyszyl.

rotundata, Kuntze, l. c. = *E. rotundatum*, DC.

Schweinfurthiana, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 550. — Afr. trop. or.

sphaerophylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 = *Elaeodendron sphaerophyllum*, Presl.

Szyszyłowiczii, Kuntze, l. c. = *E. glaucum*, Szyszyl.

tomentosa, Kuntze, l. c. = *Cervantesia tomentosa*, Ruiz et Pav.

trachyclada, Kuntze, l. c. = *Elaeodendron trachycladum*, Baker.

vaccinioides, Kuntze, l. c. = *E. vaccinioides*, Baker.

Zollingeri, Kuntze, l. c. 150 in syn. sub *Maurocenia Zollingeri*, Kuntze = *Triceros cochinchinensis*, Zoll.

CASSINIA, R. Br. (Compos.). — Ind. Kew. i. 454.

rubra, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 216. — N. Zel.

spatulata, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 572 = *leptophylla*, R. Br.

CASSIPOUREA, Aubl. (Rhizophor.). — Ind. Kew. i. 455.

verticillata, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 5. — Bras.

CASSUPE, Humb. et Bonpl. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 455.

alba, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 63. — N. Gran.

CASSUVIUM, Rumpf = **Semecarpus**, Linn. f. (Anacard.).

acuminatum, *albescens*, *Anacardium*, *aruense*, *auriculatum*, *australiense*, *Balsanae*, *cochinchinense*, *coriaceum*, *cuneatum*, *Forstenii*, *fulviverve*, *Gardneri*, *glaucum*, *heterophyllum*, *Kurzii*, *laevigatum*, *marginatum*, *Moonii*, *neocaledonicum*, *nicobarense*, *nigroviride*, *obovatum*, *obscurum*, *panduratum*, *parvifolium*, *Perronetii*, *philippinense*, *pubescens*, *Roxburghii*, *scabridum*, *subpeltatum*, *subracemosum*, *travancoricum*, *Walkeri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 151-52 = *homonyma omnia* *Semecarpi*.

atrum, Kuntze, l. c. 151 = *Oncocarpus vitiensis*, A. Gray.

caesium, Kuntze, l. c. = *S. heterophylla*, Blume.

longifolium, Kuntze, l. c. = *S. Anacardium* Linn. f. vel *S. Cassavica*, Roxb.?

Spanogheanum, Kuntze, l. c. = *S. longifolia*, Blume.

vitiense, Kuntze, l. c. 152 = *Oncocarpus vitiensis*, A. Gray.

CASSYTHA, Linn. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 455.

Tepperiana, Ludw. ex Tepper, in Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 342. — Ins. Kangaroo.

CASTALIA, Salisb. = **Nymphaea**, Linn.

alba, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club. xv. (1888) 85 = *N. alba*, Linn.

elegans, Greene, l. c. = *N. elegans*, Hook.

flava, Greene, l. c. = *N. flava*, Leitm.

gigantea, Britten, in Journ. Bot. xxvi. (1888) 9 = *N. gigantea*, Hook.

Gilbertii, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 48. — Parag.

Leibergii, Morong, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 124 = *N. tetragona*, Georgi?

CASTALIA : —

- mexicana*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 12 = *Nymphaea mexicana*, Zucc.
odorata, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 85 = *N. alba*, Linn.
polysepala, Greene, l. c. 84 = *Nuphar polysepalum*, Engelm.
reniformis, Trelease, ex Branner et Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888 i. (1888) i. (1891) 164 = *Nym. reniformis*, DC.
reniformis, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 147 = *praec.*
rubrodiscalis, Greene, l. c. xv. (1888) 85 = *Nuphar rubrodiscum*, Morong.
tuberosa, Greene, l. c. = *N. tuberosa*, Payne.

CASTANEA, Tourn. ex Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 455.

- Castanea*, Sudworth, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 152 = *sativa*, Mill.
dentata, Sudworth, l. c. 154; et in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 154 = *sativa*, Mill.

CASTANEOPSIS, Spach (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 456.

- argyrophylla*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1885) 622. — Ind. angl.
borneensis, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 99 t. 90. — Borneo.
catalpaefolia, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 621. — Perak.
Clarkei, Hook. f. l. c. 623. — Reg. Himal.
Curtisii, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 107 t. 103. — Penang.
diversifolia, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 620. — As. trop. or.
Hullettii, King, ex Hook. f. l. c. 623. — As. trop. or.
Mottleyana, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 96 t. 86. — Borneo.
nepelioides, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 624. — Perak.
turbinata, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 232. — Borneo.
Wallichii, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 624. — Penins. Mal.

CASTILLEJA, Mutis (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 456.

- Bryanti*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 192. — Calif.
gloriosa, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 203. — Am. bor.
hololeuca, Greene, in West-Am. Scientist, iii. (1886) 3; et in Pittonia, i. (Mar. 1887) 38. — Calif.
macrostigma, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 173. — Mexic.
mexicana, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 404. — Mexic.
Suksdorfii, A. Gray, l. c. xxii. (1887) 311. — Washington. (Am. bor.).

CATABROSA, P. Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 458.

- araratica*, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 358. — Armenia.
caucasica, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 259. — Reg. Cauc.
colchica, Alboff, l. c. — Reg. Cauc.
hierochloides, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 67 = *Colpodium hierochloides*, Hausskn. et Bornm.
latifolia, Phil. in Anal. Mus. nac. Chil. (1892) 85 in obs. = *aquatica*, P. Beauv.

CATALPA, Scop. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 450.

- Bungei*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 49 = *ovata*, G. Don.
Catalpa, Sudworth, in Gard. and For. ii. (1891) 166 (= *Cat. Catalpa*, Karst.). = *bignonioides*, Walt.
Fargesii, Bur. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. vii. (1894) 195. — China.
himalayaca, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 50 = *ovata*, G. Don.
himalayensis, Hort. ex Dippel, l. c. = *ovata*, G. Don.
nana, Hort. ex Dippel, l. c. 51 = *ovata*, G. Don.
pumila, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenzeit. (1890) 317 nomen. — Form. hort.

CATALPA : —

- Thunbergii*, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenzeit. (1890) 318 nomen. — Form. hort.
umbraculifera, Hort. ex Bull. Soc. Tosc.ortic. (1888) 330. — China.
Wallichiana, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenz. (1890) 318 = *Kaempferi*, Sieb. et Zucc.

CATANANCE, St-Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 531 = *Catananche*, Linn. (Compos.).

CATANTHERA, F. Muell. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 289. VACCINIACEAE.

- lysipetala*, F. Muell. l. c. — N. Guin.

CATAPODIUM, Link = *Festuca*, Linn. (Gramin.).

- Lolium*, Hack. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1887) 75 = *Festuca Lolium*, Balansa.
Lolium, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér, (Monoc.) (1895) 233 = *praec.*

CATASETUM, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 458.

- apertum*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 284. — Hab. ?
Bungerothi, N. E. Br. in *Lindenla*, ii. (1886) 21 t. 57; et in *Illustr. Hortie.* xxxiv. (1887) 31 t. 10. — Am. austr.
chloranthum, Cogn. in *Journ. des Orchid.* v. (1894) 251. — Peruvia.
Claesianum, L. Lind. et Cogn. l. c. iv. (1893) 267. — Bras.
Cogniauxii, L. Lind. l. c. vi. (1895) 223 nomen = *umbriatum*, Lindl. et Paxt.
collare, Cogn. l. c. vi. (1895) 154. — Venez.
comosum, Cogn. l. c. 266. — Venez.
costatum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 72. — Am. austr.
Darwinianum, Rolfe, l. c. (1889) i. 394. — Guian. angl.
decipiens, Reichb. f. in *Lindenla*, iii. (1887) 99 t. 144. — Venez.
ferox, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1895) ii. 262. — Hab. ?
Finetianum, L. Lind. et Cogn. in *Journ. des Orchid.* iv. (1894) 362. — Columb.
fuliginosum, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1887) 473 = *Darwinianum*, Rolfe.
galeritum, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 616; et in *Lindenla*, ii. (1886) 41 t. 67. — Hab. ?
Garnettianum, Rolfe, l. c. (1888) ii. 692; Hook. f. in *Bot. Mag.* (1889) t. 7069. — Am. austr.
hymenophorum, Cogn. in *Journ. des Orchid.* vi. (1895) 215; et in *Lindenla*, xi. (1895) 14 et 24. — Am. austr.
imperiale, L. Lind. et Cogn. in *Journ. des Orchid.* v. (1895) 316; et in *Lindenla*, x. (1890) 50 t. 460; et in *Gard. Chron.* (1895) i. 328. — Bras. (an hybr. spont. ?).
Imshoottianum, L. Lind. et Cogn. l. c. iv. (1893) 266; et in *Lindenla*, ix. (1893) 41 t. 403. — Bras.
Lehmanni, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 602; et in *Gartenfl.* (1886) 289 t. 1223. — Columb.
Lemosii, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 394; et ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1895) t. 7444. — Bras.
Lichtensteinii, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1892) i. 171; et in *Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6 (1892). — Hab. ?
Lindenii, Cogn. in *Journ. des Orchid.* v. (1895) 365. — Bras.
Luciani, Cogn. l. c.; et in *Lindenla*, x. (1895) 47 t. 454. — Am. austr.
mirabile, Cogn. l. c. 355; et 55 t. 458. — Bras. ? (an hybr. spont. ?).
pallidum, Cogn. in *Journ. des Orchid.* v. (1894) 252. — N. Gran.
pileatum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 616. — Hab. ?
pulchrum, N. E. Br. in *Lindenla*, iii. (1887) 51 t. 120; et in *Gard. Chron.* (1888) i. 10. — Bras.
punctatum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 364; et in *Lindenla*, xi. (1895) 35 t. 496. — Bras.
quadricolor, Cogn. in *Journ. des Orchid.* vi. (1895) 73. — Am. austr.
quornus, Hort. ex Hamb. Gart. und Blum. (1888) 285 sphalm. = *C. Gnomus*, Reichb. f.

CATASETUM : —

- Randii*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 394. — Bras.
revolutum, Cogn. in *Journ. des Orchid.* v. (1894) 303. — Bras.
Rodigasianum, Rolfe, in *Lindenla*, v. (1889) 41 t. 259. — Bras.
semitrosum ×, G. Beck, in Wien. Illustr. Gart. Zeit. (1895) 415. — Hybr. artef.
splendens, Cogn. in *Journ. des Orchid.* v. (1894) 302; et in *Lindenla*, x. (1895) 49 et 51 t. 455 et 456. — Bras. ? (an hybr. spont. ?).
stupendum, Cogn. l. c. cc. vi. (1895) 13; xi. (1895) 17 t. 487. — Peruvia ?
tapiriceps, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 136. — Bras.
uncatum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 283. — Bras.

CATEVALA, Medic. = *Haworthia*, Duval (Liliac.).

- affinis*, *altilinea*, *angolensis*, *angustifolia*, *asperiuscula*, *asperula*, *attenuata*, *bilineata*, *Bolusii*, *chlorocantha*, *coarctata*, *Cooperi*, *cordifolia*, *cuspidata*, *cymbiformis*, *denticulata*, *fasciata*, *glabrata*, *glaucula*, *Greenii*, *hybrida*, *icosiphylla*, *laetevirens*, *margaritifera*, *minima*, *mirabilis*, *nigra*, *pallida*, *papillosa*, *Peacockii*, *pilifera*, *polyphylla*, *Radula*, *recurva*, *reticulata*, *rigida*, *rugosa*, *scabra*, *semiglabrata*, *sordida*, *subattenuata*, *subfasciata*, *subregularis*, *subrigida*, *subulata*, *tesselata*, *Tisleyi*, *tortuosa*, *translucens*, *turgida*, *venosa*, *viscosa*, *vittata*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 707 = *homonyma omnia* *Haworthiae*.
arachnodes, Kuntze, l. c. = *H. arachnoidea*, Duval.
marginata, Kuntze, l. c. = *H. albicans*, Haw.
Reinwardtii, Kuntze, l. c. = *H. Reinwardtii*, Haw.
setosa, Kuntze, l. c. = *H. setata*, Haw.

CATHCARTHIA, Hook. f. (Papaver.). — Ind. Kew. i. 460.

- Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 390 (= *Meconopsis Delavayi*, Franch.). — China.
lancifolia, Franch. l. c. 391 (= *M. lancifolia*, Franch.). — China.

CATHEA, Salisb. = *Calopogon*, R. Br. (Orchid.).

- tuberosa*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 34 = *C. pulchellus*, R. Br.

CATHEDRA, Miers (Olin.). — Ind. Kew. i. 460.

- grandiflora*, Loes. in *Flora*, lxxii. (1889) 75. — Bras.

CATOPSIS, Griseb. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 460.

- alba*, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 192 = *Tillandsia monadelpha*, Baker.
aloides, Baker, l. c. 156 (= *Tillandsia aloides*, Cham. et Schlecht.). — Mexic.
apicroides, Baker, in *Journ. Bot.* (1887) 175; et *Handb. Bromel.* (1889) 154 (= *Tillandsia apicroides*, Cham. et Schlecht.). — Mexic.
Fendleri, Baker, l. c. 175; et 155. — Venez.
flexuosa, Baker, l. c. 175; et 154. — Bolivia.
Garckeana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 70. — Columb.
Hahnii, Baker, in *Journ. Bot.* (1887) 175; et *Handb. Bromel.* (1889) 155. — Mexic.
inconspicua, Baker, l. c. 174; et 153 (= *Pogospermum inconspicuum*, Brongn.). — Guian. gall.
maculata, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 155. — Bras. austr.
nitida, Baker, in *Journ. Bot.* (1887) 174; et *Handb. Bromel.* (1889) 154; et in *Kew Bull.* (1893) 280 (= *Tillandsia nitida*, Hook.). — Am. trop. et subtrop.
nutans, Baker, in *Journ. Bot.* (1887) 176; et *Handb. Bromel.* (1889) 156 (= *Tillandsia nutans*, Sw.). — Am. trop.
pendula, Baker, Handb. Bromel. (1889) 155. — Mexic.
Schumanniana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 70; Baker, Handb. Bromel. (1889) 154. — N. Gran.
stenopetala, Baker, in *Journ. Bot.* (1887) 176; et *Handb. Bromel.* (1889) 156. — Guatem.
tripinnata, Baker, Handb. Bromel. (1889) 156. — Am. trop. austr.

CATOPSIS : —

vitellina, Baker, in *Journ. Bot.* (1887) 176 pr. p.; et *Handb. Bromel.* (1889) 156. — Venez.

CATTIMARUS, Rumpf, *Herb. Amboin.* iii. (1743) 177 t. 113, ex Kuntze. Rev. Gen. (1891) 76 = **Kleinhovia**, Linn. (Stercul.).
hospitus, Kuntze, l. c. 77 = *K. hospita*, Linn.

CATTLEYA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 460.

Albertii ×, Hort. ex God.-Lebœuf, *L'Orchidophile* (1890) 321 cum ic. — Hybr. artef.

Alexandrae, L. Lind. et Rolfe, in *Gard. Chron.* (1892) i. 522; et *Lindenia*, viii. (1892) 45 et 47 t. 357 et 358. — Bras.

Aliciae ×, L. Lind. l. c. xi. (1895) 31 t. 494. — Hybr. spont.?

Amesiae, Hort. Sand. ex Kew Bull. (1893) 30 = an seq.?

Amesiana, Hort. ex Williams, *Orchid. Grow. Man.* ed 6 (1885) 173 = *Laelia amesiana*, Reichb. f.

amoena ×, Hort. ex God.-Lebœuf, *L'Orchidophile* (1891) 273 cum ic. — Hybr. artef.

Aquinii, *Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio*, i. (1891) 23 t. 4 c. — Bras.

Arthuri ×, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1894) i. 103. — Hybr. artef.

autumnalis, Hort. ex *Orchid Alb.* vii. (1888) sub t. 323 = *Boweringiana*, Veitch.

Balantiniana ×, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1889) i. 264; et in *Reichenbachia*, ii. t. 91. — Hybr. artef.

Batalini, Sander et Kraenzl. l. c. (1892) ii. 332. — Bras.

Behrensiana ×, Hort. ex *Gartenfl.* (1892) 183. — Hybr. artef.

blesensis ×, Hort. Gall. ex Rev. *Hortic.* (1892) 416 = *Laelio-Cattleya blesensis*, Warn. et Will.

Brannae ×, Hort. ex Rev. *Hortic.* (1895) 63. — Hybr. artef.

Brownii, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 156. — Bras.

Bullieri, Carr. in Rev. *Hortic.* (1886) 444 = *labiata*, Lindl.

Burberryana ×, Hort. ex Kew Bull. (1893) 30. — Hybr. artef.

Buyssoniana ×, Hort. ex O'Brien, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 588 fig. 116 = *granulosa*, Lindl.

Cassandra ×, Rolfe, l. c. (1888) i. 596. — Hybr. artef.

Chloris ×, Hort. l. c. (1893) ii. 525 fig. 88. — Hybr. artef.

citrino-intermedia ×, Rolfe, ex *Gartenfl.* (1888) 423. — Hybr. artef.

Dallei ×, Hort. ex Rev. *Hortic.* (1894) 292. — Hybr. artef.

Dallemagnei ×, Hort. l. c. 334. — Hybr. artef.

Dukeana, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 576. — Hab.?

epidenarioides, Hort. ex Rolfe, l. c. (1889) i. 619 = *luteola*, Lindl.

flaveola, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 473. — Hab.?

Fowleri ×, Sander et Kraenzl. l. c. (1895) ii. 178. — Hybr. artef.

Frithii ×, Hort. Veitch, l. c. (1889) i. 8. — Hybr. artef.

Gibeziae, L. Lind. et Rodigas, in *Lindenia* iii. (1887) 77 t. 133 = *intermedia*, R. Grah.

hackbridgensis ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1890) ii. 8. — Hybr. artef.

Harrisii ×, Hort. l. c. (1887) i. 104. — Hybr. artef.

Juno ×, L. Barron, l. c. (1895) ii. 118. — Hybr. artef.

Kienastiana ×, Hort. ex Rev. *Hortic.* (1895) 63. — Hybr. artef.

Kimballiana, L. Lind. et Rodig. in *Lindenia*, ii. (1886) 85 t. 89. — Venez.

Kraenzlini ×, Hort. ex *Gartenfl.* (1892) 183. — Hybr. artef.

Krameriana, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) ii. 323. — Bras.

leucoglossa ×, Hort. ex Kew Bull. (1893) 30. — Hybr. artef.

Lindeni, Hort. Lind. ex *Journ. of Hort.* xxi. (1890) 491 fig. 64 = *gigas*, Lind. et André.

Lourryana ×, Hort. ex *Gard. et For.* (1891) 293 et ex *Gartenfl.* (1892) 183. — Hybr. artef.

CATTLEYA : —

Maloriana, Lind. in *Illustr. Hortic.* (1886) 102 nomen = *maxima*, Lindl.

Mantini ×, Mant in Rev. *Hortic.* (1894) 534, 558 et (1895) 63, 129 fig. 35. — Hybr. artef.

Massaiana, Warn. et Williams, *Orchid Alb.* viii. (1889) t. 362 (an Hybr. spont.?). — Columb.

Measuresii ×, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 526. — Hybr. artef.

Mendeli, L. Lind. et Rodigas, in *Lindenia*, ii. (1886) 17 t. 55. — Hab.?

Minacia ×, Hort. ex Kew Bull. (1893) App. ii. 31. — Hybr. artef.

O'Brieniana, Hort. ex *Journ. of Hort.* xx. (1890) 25 fig. 4 = *intermedia*, R. Grah.

Oweniana ×, Hort. ex Kew Bull. (1893) 30. — Hybr. artef.

Parthenia ×, Bleu, in *Lindenia*, vi. (1890) 75 t. 276; et in *Reichenbachia*, Ser. II. ii. 39 t. 67. — Hybr. artef.

Phile ×, Hort. ex Kew Bull. (1893) 30. — Hybr. artef.

Principis ×, Hort. l. c. — Hybr. artef.

Rex, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 684; et in *Lindenia*, vi. (1890) 53 t. 265. — Am. austr.

rochellensis, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 533 in syn. = *labiata*, Lindl.

Schroederiae, Reichb. f. l. c. (1887) i. 512 = *Schroederiana*, Reichb. f.

Sororia ×, Reichb. f. l. c. 40; et ex *Orchid Alb.* ii. (1888) t. 307. — Hybr. artef.?

splendidissima ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1886) ii. 10. — Hybr. artef.

Statteriana ×, Hort. ex Kew Bull. (1893) App. ii. 21; et L. Lind. in *Lindenia*, x. (1894) 97 in obs. — Hybr. artef.

suavior ×, Reichb. f. ex Veitch, *Man Orch. Pl.* ii. (1888) 92. — Hybr. artef.

sulphurea ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1889) i. 802 = *luteola*, Lindl.

Vedasti ×, Perren. ex God.-Lebœuf, *L'Orchidophile* (1891) 48 cum ic. — Hybr. artef.

Victoria Regina ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1892) i. 586 et 809 fig. 115 et 116; et in *Reichenbachia* t. 85. — Hab.?

violacea, Rolfe, l. c. (1889) i. 802 (= *C. superba*, Schomb.). — Am. trop. austr.

violacea, Maury, in *Morot Journ. de Bot.* iii. (1889) 272 = *superba*, Schomb.

Wagneri, Hort. ex *Gard. Chron.* (1886) ii. 10 = *Wagneri*, Reichb. f.?

Warocqueana, L. Lind. in *Journ. des Orchid.* i. (1890) 189 = *labiata*, Lindl.

Zenobia ×, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1887) ii. 552. — Hybr. artef.

CATUTSJERON, (corr. ex KATOUTSJEROË) Adams, = **Holigarna**, Buch. Ham.

Arnottianum, Kuntze, Rev. Gen. 152 = *H. Arnottiana*, Hook. f.

Beddomei, Kuntze, l. c. = *H. Beddomei*, Hook. f.

ferrugineum, Kuntze, l. c. = *H. ferruginea*, March.

Grahami, Kuntze, l. c. = *H. Grahamii*, Hook. f.

Helferi, Kuntze, l. c. = *H. Helferi*, Hook. f.

CAUCALIS, Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 462.

pedunculata, Baker, f. in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 15. — Afr. trop. or.

Sintenisii, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 144. — As. Min.

Torgesiana, Hausskn. in *Nym. Consp. Suppl.* II. i. (1889) 135; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver.*

N. Folge, v. (1893) 107. — Graecia.

turgenioides, Stapf et Wettst. ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 372. — As. Min.

CAULANTHUS, S. Wats. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 462.

Lemmoni, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 261. — Calif.

CAULINIA, Moench = **Kennedya**, Vent. (Legumin.).

CAULINIA : —

Beckxiana, eximia, glabrata, macrophylla, microphylla, nigricans, procurrens, prorepens, retusa, Stirlingii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 171 = *homonyma omnia* Kennedyae.

bimaculata, Kuntze, l. c. = *Hardenbergia monophylla*, Benth.

bracteata, Kuntze, l. c. = *K. prostrata*, R. Br.

carinata, Kuntze, l. c. = *K. parviflora*, Meisn.

coccinea, Kuntze, l. c. = *K. prostrata*, R. Br.

Comptoniana, Kuntze, l. e. = *Hardenbergia Comptoniana*, Benth.

inophylla, Kuntze, l. c. = *K. coccinea*, Vent.

CAVANILLESIA, Ruiz et Pav. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 463.

arbores, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 237 (= *Pouretia tuberculata*, Mart. et Zucc.). — Bras.

CAVANILLA, Thunb. = **Pyrenacantha**, Wight (Olac.).

grandiflora, Kunze, Rev. Gen. (1891) 111 = *P. grandiflora*, Baill.

hamassana, Kuntze, l. c. = *P. kamassana*, Baill.

Kirkii, Kuntze, l. c. = *P. Kirkii*, Baill.

Vogeliana, Kuntze, l. c. = *P. Vogeliana*, Baill.

volubilis, Kuntze, l. c. = *P. volubilis*, Wight.

CAVENDISHIA, Lindl. (Vacciniac.). — Ind. Kew. i. 463.

callista, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 5 t. 2. — Guatem.

Klotzschiana, Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 206 (= *Socratesia melastomoides*, Klotzsch). — Am. austr. trop.

paniculata, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 215. — Bolivia.

pubescens, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 138 (= *Thibaudia pubescens*, H. B. et K.). — Bolivia.

CEANOTHUS, Linn. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 464.

arbores, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. (1886) 144. — Calif.

Arnoldi ×, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 536 in obs. — Hybr. artef.

Arnouldi ×, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 396 = *praec.*?

californicus, Kell. ex K. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* iv. (1894) 181. — Calif.

connivens, Greene, *Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 16. — Calif.

cuneatus, K. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* iv. (1894) 204. — Calif.

eglandulosus, Trelease, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. i. (1888) 110 = *cordulatus*, Kell.

grandiflorus, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* (1892) 534 = *ovalis*, Bigel.

impressus, Trelease, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. i. (1888) 112. — Calif.

intermedius ×, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 396. — Hybr. artef.

Jepsonii, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 78. — Calif.

leucodermis, Greene, in *Kew Bull.* (1895) 15. — Calif.

macrophyllus, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* 533 = *americanus*, Linn.

multiflorus, Hort. ex Dippel, l. c. = *americanus*, Linn.

megacarpus, K. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* iv. (1894) 205 = *macrocarpus*, Nutt.

nevadensis, Kell. ex K. Brandeg. l. c. 181. — Calif.

Orcuttii, Parry, in *Proc. Davenport Acad. Sci.* v. (1889) 194. — Calif.

oreganus, Nutt. ex K. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* iv. (1894) 180 in obs. — Oreg.

pallidus ×, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 396. — Hybr. artef.

Palmeri, Trelease, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. i. (1888) 109. — Calif.

Parryi, Trelease, l. c. — Calif.

parvifolius, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 79 (an seq.?). — Calif.

parvifolius, Trelease, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. i. (1888) 110. — Am. bor. occ.

CEANOOTHUS : —

- pinetorum, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 80. — Calif.
 pumilus, *Greene, in Erythraea*, i. (1893) 149. — Oregon.
 roseus, *Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 395. — Hybr. artef. ?
 rugosus ×, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 88. — Calif.
 sorediatus, *W. S. Lyon, in Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 204 et 333 = arboreus, *Greene*.
 tomentosus, *Parry, in Proc. Davenp. Acad.* v. (1889) 190. — Am. bor.
 vestitus, *Greene, Pittonia*, ii. (June 1890) 101. — Calif.

CECROPIA, Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 464.

- Bureauiana, *Alad. Richt. ex Bot. Centralbl.* li. (1892) 238. — Hab. ?
 dealbata, *Williams, Catal.* (1887) 21. — N. Gran.
 Juranyana, *Alad. Richt. ex Bot. Centralbl.* li. (1892) 238. — Guiana.
 Levyana, *Alad. Richt. l. c.* — Nicarag.
 Radlkoferana, *Alad. Richt. l. c.* — Columb.
 scaberrifolia, *Alad. Richt. l. c.* — Nicarag.

CEDRELA, P. Br. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 465.

- barbata, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 575. — Bras.
CEDRELOPSIS, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas. (1893) t. 257. **MELIACEAE**.
 Grevei, *Baill. l. c.* — Madag.

CEDRONELLA, Riv. (Labiata). — Ind. Kew. i. 465.

- aurantiaca, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 435 nomen; et *l. c.* xxii. (1886) 408. — Mexic.
 coccinea, *Greene, Pittonia*, i. (Jan. 1888) 157. — Mexic.
 rupestris, *Greene, l. c.* (Feb. 1888) 164 (= *C. cana*, Hook. var. *lanceolata*, A. Gray). — N. Mexic.

CEDRUS, [Tourn.] Mill. (Conif.). — Ind. Kew. i. 465.

- sempervirens, *Mast. ex Bolet. Soc. Brot.* xii. (1895) 54. — Hab. ?
 torulosa, *Mast. l. c.* 53. — Ind. lusit.

CEIBA, Medic. = **Eriodendron**, DC. (Malvac.).

- Burchellii, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 211. — Bras.
 erianthos, K. Schum. l. c. = *E. leiantherum*, DC.
 jasminodora, K. Schum. l. c. 213 = *E. jasminodorum*, St-Hil.
 phaeosanthes, K. Schum. l. c. 214 = *E. phaeosanthes*, Decne.
 pubiflora, K. Schum. l. c. 213 = *E. pubiflorum*, St-Hil.
 Rivieri, K. Schum. l. c. 212 = *E. Rivieri*, Decne.
 Samauma, K. Schum. l. c. 210 = *E. Samauma*, Mart.

CELASTRUS, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 465.

- articulata, *Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 363 = orbiculata, *Thunb.*
 baccatus, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 11. — Madag.
 diversifolius, *Hemsl. l. c.* xxiii. (1886) 123. — China.
 latifolius, *Hemsl. l. c.* — China.
 hypoglaucus, *Hemsl. in Ann. of Bot.* ix. (1895) 150. — China.
 maritimus, *Bolus, l. c.* xxiv. (1887) 173. — Afr. austr.
 papuana, *Warb., in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 366. — Oceania.
 racemulosa, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 455. — China occ.
 variabilis, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 124. — China.

CELMISIA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 467.

- Adamsii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 329. — N. Zel.
 Armstrongii, *Petrie, l. c.* xxvi. 1893 (1894) 269. — N. Zel.

CELMISIA : —

- Brownii, *F. R. Chapm. in Trans. N. Z. Inst.* xxii. (1890) 444. — N. Zel.
 campbellensis, *F. R. Chapm. l. c.* xxiii. 1890 (1891) 407. — N. Zel.
 Chapmanii, *T. Kirk, in Gard. Chron.* (1891) i. 731 146. — N. Zel.
 Macmahoni, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 327. — N. Zel.
 Martini, *J. Buch, l. c.* xix. 1886 (1887) 213. — N. Zel.
 membranacea, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 470. — N. Zel.
 parva, *T. Kirk, l. c.* xxvii. 1894 (1895) 328. — N. Zel.
 perpusilla, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 470. — N. Zel.
 prorepens, *Petrie, l. c.* xix. 1886 (1887) 326. — N. Zel.
 robusta, *J. Buch, l. c.* xix. 1886 (1887) 215 t. 18. — N. Zel.
 ruahinensis, *Colenso, l. c.* xxvii. 1894 (1895) 388. — N. Zel.
 Rutlandii, *T. Kirk, l. c.* xxvii. 1894 (1895) 329. — N. Zel.
 setacea, *Colenso, l. c.* xxi. 1888 (1889) 88. — N. Zel.

CELOSIA, Linn. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 467.

- angustifolia, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 179. — Madag.
 Freynii, *Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 297. — As. Min.
 intermedia, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 179. — Afr. austro-occ. extratrop.
 micrantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 514. — Madag.
 pleiogyne, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 541. — Costarica.
 Schweinfurthiana, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 177; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 172. — Afr. trop. or.
 spathulifolia, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 6. — Afr. austro-occ. extratrop.
 Swinhoei, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 318. — Hainan.
 triuncinella, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 189. — Madag.
 Welwitschii, *Schinz, l. c.* 179. — Angola.

CELSIA, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 468.

- Berneti, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 437. — Oriens.
 brevipedicellata, *Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 376. — Afr. trop. or.
 floccosa, *Porta, in Nuov. Giorn. bot. Ital.* xix. (1887) 313 = *Verbascum Portae*, Willk.
 Freynii, *Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 297. — As. Min.
 glandulifera, *Post, Pl. Postianae*, ii. (1891) 19. — Syria.
 parviflora, *Engl. ex Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1891) 52 sphalm. ? = parvifolia, *Engl. ?*
 parvifolia, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 252. — Afr. austro-occ. extratrop.
 roripifolia, *Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 404. — Thracia.
 Sedgwickiana, *Schimp. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 376. — Abyss.

CELTIDOPSIS, Fr. Priemer, in *Bot. Jahrb.* xvii. 1893 429 et 470 = **Celtis**, Linn. (Urtic.).

- citrifolia, *Fr. Priemer, l. c.* (= *Mertensia citrifolia*, Kunth) = *Celtis pubescens*, *H. B. et K.*

CELTIS, Tourn. ex Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 469.

- betulaefolia, *Vandas, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 221. — Herceg.
 gomphophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 521. — Madag.
 grewioides, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 287. — Oceania.
 iguanaeus, *Sarg. Silv. N.-Amer.* vii. (1895) 64 = aculeata, *Sw.*
 ilicifolia, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 160. — Afr. trop. or.

CELTIS : —

- nervosa, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1894) 450. — Formosa.
 scabra, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 44 = occidentalis, *Linn.*
 serrata, *Hort. ex Dippel, l. c.* 43 = australis, *Linn.*

CENCHRUS, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 470.

- gracillimus, *Nash, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 300. — Florida.
 Palmeri, *Vasey, in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 80 nomen; in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 211; et in *Illustr. N. Am. Grass.* ii. t. 3. — Calif.

CENTAUREA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 470.

- adjarica, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 639. — Reg. Transcauc.
 albisipina, *Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 81. — Afghan.
 Amani, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 434; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 23. — Syria.
 amphibola ×, *Hauskn. in Mitth. bot. Ver. Jena* iii. 2 et 3 (1884) 229. — Eur.
 argyrocephala, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 240. — Armenia.
 arisitensis ×, *Coste et Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 573. — Gall.
 Aschersohniana ×, *Vetter, ex Ber. deutsch. bot. Ges.* (1890) [144]. — Helv.
 austriacoides ×, *Wolosz. in Spraw. Kom. fizyj. Krajowej.* xxvii. (1892) 206; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 108. — Eur.
 Aylmeri, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 218. — Reg. Somal.
 balsamitoidea, *Post, Pl. Postianae*, ii. (1891) 15. — Syria.
 Beckiana ×, *Muellner, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvii. (1888) 27. — Austria.
 Bertolonii, *Hauskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 34. — Eur.
 biformis, *Timb. in Lucante, Rev. de Bot.* x. (1892) 262 = maculosa, *Lam.*
 Bolleana, *Bolle, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 234 (= *Amberboa Bollei*, Sch. Bip.). — Ins. Canar.
 borina, *Velen. in Sitzungsber. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 36. — Eur.
 bosniaca, *Murb. in Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 97 = pseudophrygia, *C. A. Mey.*
 brevisipina, *Hauskn. in Nym. Conspl. fl. Eur. Suppl. II.* i. (1889) 187; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vii. (1895) 46. — Graecia.
 carpatica, *Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 153. — Bucov.
 Charrelhii, *Halácsy et Dörfler, in Jahr.-Katal. Wien bot. Tauschver.* (1894) 6. — Maced.
 Claryi, *Debeaux, in Soc. hist. nat. Toulouse (Mars 1889) ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.)* (1889) 496 = pullata, *Linn.*
 confusa ×, *Coste et Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 578. — Gall.
 Cossoniana, *Batt. l. c.* xxxv. (1888) 341. — Algeria.
 crispatula, *Timb. in Lucante, Rev. de Bot.* x. (1892) 262 in syn. = maculosa, *Lam.*
 dhofarica, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 182. — Arabia.
 Doddsii, *Post, ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 515; et in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 434. — Syria.
 Duvauxii, *Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 341 et 390. — Algeria.
 epapposa, *Simonk. Enum. fl. Transsilv.* (1886) 350 = Biebersteinii, *DC.*
 euxina, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 50. — Eur.
 Formanekii, *Halácsy, ex Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn.* xxx. (1892) extr. 15; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 55. — Maced.
 Freynii, *Sint. et Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1892) 472. — Armenia.
 Funkii, *Pau, Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 34 = Pauli, *Loscos.*
 gemensis ×, *Hauskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 35. — Italia.
 Gheorghieffii, *Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 222. — Bulg.

CENTAUREA : —

- halkensis, *F. Major et Barbey, Halki* (1891) 4 t. 1. — Ins. Halki.
- Heldreichii, *Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 315. — Graecia.
- Holzmanniana, *Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 316 in syn. = iberica, *Trautv.*
- hortorum, *Pau, Not. bot. fl. Espan. i.* (1887) 12. — Hisp.
- illapelina, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 43. — Chili.
- javornikiensis, *Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 153; et in *Kvetena ii.* (1892) 578. — Moravia.
- kroumirensis, *Coss. ex Batt. et Trab., Fl. del'Algér.* (Dicot.) (1889) 500 = nicaeensis, *All.*
- lacera, *Simonk. Enum. fl. Transilv.* (1886) 345 = *C. Jacea, Linn.*
- lanata, *Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 146 nomen. — Herceg.
- lapsanifolia, *Frey, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 473. — As. Min.
- leptocephala, *Coste et Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 575. — Gall.
- Loretii, *Coste et Sennen, l. c.* 377. — Gall.
- Ludovici, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 186; et in *Termész. Füzet.* xv. i. (1892) 244. — Hung.
- macedonica, *Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 244. — Graecia.
- macracantha, *Coss. et Durieu, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]* (1889) 501 = pungens, *Pomel.*
- Malinvaldiana, *Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 355; et in *Batt. et Trab. Atlas fl. Algér.* (1886) 15 t. 11. — Algeria.
- Margaritae, *Hort. ex Gard. Chron.* (1891) ii. 741 fig. 108 = odorata, *Burm. f.*
- melanocalathia, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 235 = *C. Jacea, Linn.*
- microcarpa, *Coss. et Durieu, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]* (1889) 500. — Algeria.
- mirabilis, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 425. — Lusit.
- Nouelii, *Franch. ex Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 285. — Gall.
- Omphalodes, *O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1893) 330 (= *Stephanochilus Omphalodes, Coss. et Durieu*). — Alger.
- omphalotricha, *Coss. et Durieu, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]* (1889) 497. — Afr. bor., Hisp.
- Pecho, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 640. — Reg. Transcauc.
- pentelica, *Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, vii. (1895) 45. — Graecia.
- peregrina, *Coste et Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1893) 574; et in *Bull. Herb. Boiss.* iii. App. i. (1895) 14. — Gall.
- Perlakiana, *Borb. in Termész. Füzet.* xv. i. (1892) 244. — Hung.
- Pinae, *Pau, Not. bot. fl. Espan. i.* (1887) 12. — Hisp.
- plumosa, *Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser.* II. iii. (1886) 81. — Persia.
- psephelloides, *Frey, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 237. — Armenia.
- pseudosolstitialis, *Debeaux, Not. pl. nouv. ou peu conn. rég. Médit.* (1895); ex *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 376. — Gall.
- ramosissima, *Frey, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 237. — As. Min.
- redempta, *Heldr. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1890) 243. — Creta.
- similata, *Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena*, iii. 2 et 3 (1884) 229. — Eur.
- Sintenisii, *Frey, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 238. — Armenia.
- subcordata, *Frey, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 238. — Armenia.
- subcordata, *Frey, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 238. — Armenia.
- Willd.
- tartarea, *Velen. in Abhandl. Böhm. Ges. Wiss.* (1886) 25 = affinis, *Friv.*
- Tempskyana, *Frey, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 238. — Armenia.
- thessala, *Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1889) 86. — Graecia.
- tossiensi, *Frey, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 238. — Armenia.
- Zeitschr. xlii. (1892) 238. — Armenia.

CENTAUREA : —

- trachonitica, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 434. — Syria.
- Tuba, *Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 156. — Cauc.
- tymphaea, *Hausskn. in Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* II. i. (1889) 186; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge vii. (1895) 44. — Graecia.
- Vandasii, *Velen. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 72. — Eur. or.
- Velenovskyi, *Adamovic, l. c.* xliii. (1893) 172. — Serbia.
- vicentina, *Welw. ex Henriques, in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 223 t. 2. = fraylensis, *Sch. Bip.*
- vicina, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 312. — Reg. Cauc.

CENTAURIUM, Gilib. = **Erythraea**, Borkh. (Gentian.).

- linariaefolium, *G. Beck, Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 934 = *E. linarifolia, Pers.*

CENTEMA, Hook. f. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 477.

- biflora, *Schinz, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1a (1893) 107; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 183. — Afr. trop.
- cruciata, *Schinz, l. c.* 184. — Transv.

CENTIPEDA, Lour. (Compos.). — Ind. Kew. i. 477.

- minima, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 326 (= *C. minima, Al. Br.* 1867) = orbicularis, *Lowr.*
- minuta, *Drake, Fl. Polyn. Franç.* (1892) 110 (an *C. minima, C. B. Clarke?*). — Orb. vet. reg. trop.

CENTOTHECA, Desv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 478.

- madagascariensis, *Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 66 (= *Poa madagascariensis, Lam.*). — Madag.
- mucronata, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 765 = praec.

CENTRADENIA, G. Don (Melastom.). — Ind. Kew. i. 478.

- Bernoullii, *Carrio, ex Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 118. — San Salv.

CENTRANTHUS, DC. (Valerian.). — Ind. Kew. i. 478.

- Sieberi, *Heldr. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xl. (1890) 295. — Creta.

CENTROPOGON, Presl (Campanul.). — Ind. Kew. i. 479.

- erythraeus, *Drake, in Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 237. — Am. austr.
- gamosepalus, *Zahlbr. in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 434. — Peruvia.
- gesneraeformis, *Drake, in Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 239. — Ecuad.
- gracilis, *Drake, l. c.* 238. — Ecuad.
- grandidentatus, *Zahlbr. in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 439 (= *Lobelia grandidentata, Schlecht.*). — Mexic.
- guatemalensis, *Robins. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 4. — Guatem.
- hirtiflorus, *Drake, in Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 239. — Ecuad.
- Karstenii, *Zahlbr. in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 436. — Ecuad.
- laciniatus, *Zahlbr. ex Loes. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 623. — Mexic.
- longipes, *Zahlbr. in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 439 (= *Siphocampylus longipes, Vatke.*). — Venez.
- Lucyanus, *Schoenland, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1889) 65. — Hab.?
- Mandonis, *Zahlbr. in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 438. — Bolivia.
- pallidus, *Drake, in Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 239. — Ecuad.
- reticulatus, *Drake, l. c.* 238. — Ecuad.
- sciaphilus, *Zahlbr. in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 435. — Peruvia.
- vernicosus, *Zahlbr. l. c.* 440. — Peruvia.
- yungasense, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 371. — Bolivia.

- CEPHAELIS**, Sw. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 480.
- Bearii, « *Linden* » ex *Hamb. Gartenzeit.* (an *C. Beerii, Teijsm. et Binn.?*) (1888) 571. — Mexic.
- Beeriana, *Fenzl, ex Pokorny, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvi. (1886) 292. — Bras.
- glomerulata, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 12 t. i. — Guatem.

CEPHALANTHERA, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 481.

- alba, *Fritsch, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 81 = seq.
- alba, *Simonk. Enum. fl. Transsilv.* (1886) 504 = pallens, *Rich.*
- angustifolia, *Simonk. l. c.* 505 = ensifolia, *Rich.*
- Andrusi, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 163. — Mesopot.
- kurdica, *Bornm. ex Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 143. — Kurdistan.
- longifolia, *Fritsch, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 81 = ensifolia, *Rich.*

CEPHALANTHUS, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 481.

- angustifolius, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk.* i. (1889) 164 = occidentalis, *Linn.*
- breviflorus, *Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 129. — Bras.
- coriaceus, *K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4. (1891) 58. — Afr. trop. occ.
- glabratus, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 128 = *C. Sarandi, Cham. et Schlecht.*
- peruvianus, *Spruce, ex K. Schum. l. c.* 129. — Peruvia.

CEPHALARIA, Schrad. (Dipsac.). — Ind. Kew. i. 481.

- atlantica, *Coss. et Dur. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]* (1889) 417 = mauritanica, *Pomel.*
- calcareia, *Alboff, Prodr. fl. Colch.* (1895) 126. — Reg. Cauc.
- maroccana, *Coss. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]* (1889) 417. — Marocco.
- salicifolia, *Post, in Bull. Soc. Vaud. sc. nat.* xxv. (1889) 59. — Syria.
- Sintenisii, *Frey, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 144. — As. Min.
- tenella, *Payne, List. Pl. East. Palest.* 108; ex *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 285. — Palaest.

CEPHALOCEREUS, Pfeiff. = **Cereus**, Haw. (Cact.).

- californicus, *Hort. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 182. — Calif.
- chrysomallus, *K. Schum. l. c.* = *C. chrysomallus, Hemsl.*
- Columna, *K. Schum. l. c.* = *C. Columna-Trajani, Karw.*
- Hoppenstedii, *K. Schum. l. c.* (= *Pilocereus Hoppenstedtii, Roez.*). — Mexic.
- Melocactus, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* vi. ii. (1890) 215; et *l. c.* 181 = *C. fluminensis, Mig.*
- pasacanus, *Weber [Paris.], ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 182. — Am. austro-occ.

CEPHALOCROTON, Hochst. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 481.

- cordifolius, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 520. — Madag.

CEPHALOPHORA, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. i. 483.

- Barchesi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 33. — Chili.
- gracilis, *Phil. l. c.* 34. — Chili.
- lanceolata, *Phil. l. c.* 35. — Chili.
- Leguiffei, *Phil. l. c.* 30. — Chili.
- Peraltae, *Phil. l. c.* 31. — Chili.
- robusta, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. iii. (1893) 63. — Bolivia.
- spatulata, *F. Phil. ex Anal. Phil. Univ. Chil.* xc. (1895) 33. — Chili.
- Stolpi, *Phil. l. c.* 34. — Chili.
- vallenariensis, *Phil. l. c.* 32. — Chili.

CEPHALORRHYNCHUS, Boiss. = **Lactuca**, Tourn. (Compos.).
confertus, Conrath et Freyn, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 477. — As. Min.

CEPHALOSTIGMA, A. DC. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 482.
Fockeanum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 257. — Afr. austro-occ. extratrop.

CEPHALOTAXUS, Sieb. et Zucc. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 482.
adpressa, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholzk. (1891) 174 = *Taxus baccata*, Linn.
brevifolia, Hort. ex Beissn. l. c. 174 = *T. baccata*, Linn.
Griffithii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 648. — Reg. Himal.
koraiana, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholzk. (1891) 181 = *pedunculata*, Sieb. et Zucc.
Mannii, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1523. — Khasia.

CERASTIUM [Dill.] Linn. (Caryophyll.). — Ind. Kew. i. 483.
adenotrichum, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 338. — As. Min.
algericum, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888) 149 = *pumilum*, Curt.
alpicolum, Brügg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 34 = *arvense*, Linn.
amblyodontum, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 384. — N. Zel.
balcanicum, Vandas, in Nym. Consp. fl. Eur. ii. 1. (1889) 62; et ex Velen. Fl. Bulg. (1891) 87. — Bulg.
Blyttii ×, Baenitz, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 365. — Norv.
bosniacum, G. Beck, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ii. (1886) 62 = *tomentosum*, Linn.
brachycarpum, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1886) 355. — As. Min.
brachyodon, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 338. — Armenia.
brachypodium, Robins. ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 150; et in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 277. — Am. bor.
cerastoides, Britton, l. c. 152 = *Stellaria cerastoides*, Linn.
dinaricum, G. Beck et Szyszyl. Pl. Cern. et Alban. lect. (1888) 62; et ex Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1889) 117. — Monten.
Dollineri, G. Beck, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 62 = *lanigerum*, Clem.
erectum, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 268 (= *C. erectum*, Coss. et Germ.) = *quaternellum*, Fenzl.
grande, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 229. — Alaska.
Hieronimi, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 26. — Reg. Argent.
Kochii, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 35 = *alpinum*, Linn.
Laestadianum ×, H. Samzelius, in Bot. Notis. (1890) 177. — Scand.
laticum, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 121. — Persia.
madagascariense, Pax, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 588. — Madag.
madrense, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 269. — Mexic.
mixtum ×, Huter, ex Hallier, in Koch, Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 317. — Germ.
montenegrinum, G. Beck et Szyszyl. Pl. Cern. et Alban. lect. (1888) 62 = *odontolepis*, G. Beck et Szyszyl.
oblongifolium, C. Anders. Cat. Pl. Nev. 118 = *nuttans*, Rafn.
odontolepis, G. Beck et Szyszyl. Pl. Cern. et Alban. lect. (1888) 62. — Monten.
orbicolum, Velen. in Sitzb. Böhm. Ges. Wiss. 1890 (1890) ii. 42; et Fl. Bulg. (1891) 88. — Bulg.
pauciflorum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 772. — Chili.
physospermum, C. Gay, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. (1889) 62 = *Boissieri*, Nym.
Poeltianum, Brügg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 34 in syn. = *arvense*, Linn.

CERASTIUM: —
ponticum, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 449; et Prodr. fl. Colch. (1895) 37. — Reg. Cauc.
schizopetalum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 483. — Japon.
Sellowii, « Cham. et Schlecht. » ex Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 53 = *Sellowii*, Schlecht.
texanum, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 97. — Texas.
truncatulum, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892 (1893) 327. — N. Zel.
tucumanense, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 25. — Reg. Argent.
undulatifolium, Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 41. — Reg. Cauc.

CERASUS, [Tourn.] Linn. = **Prunus**, Linn. (Rosac.).
Anti-Libani, Post, Pl. Postianae, i. (1890) 8. — Syria.
emarginata, Greene, Fl. Francisc. (1891) 50 (non Dougl.) = *P. emarginata*, Walp.
californica, Greene, l. c. = *P. marginata*, Walp.
Jacquemontii, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 198. — Reg. Himal., Afghan.
racemosa, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 217 = *P. Padus*, Linn.
occidentalis, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vii. (1887) 396 (= *C. occidentalis*, Loisel.) = *P. occidentalis*, Sw.

CERATANDRA, Eckl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 487.
atrata, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 123 = *ochroleuca*, Eckl.

CERATANTHERA, Hornem. = **Globba**, Linn. (Scitam.).
Beaumeizii, Ed. Heckel, in Ann. Fac. sci. Marseille, i. 1. (1891) 27. — Afr. trop. occ.

CERATOCHILUS, Blume = **Saccolabium**, Blume (Orchid.).
papuanus, Kraenzl. ex Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 19. — Oceania.

CERATODISCUS, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1892) 176. **GESNERACEAE**.
conchaefolius, Batalin, l. c. — China.

CERATOCEPHALUS, Burm. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 326 = **Spilanthes**, Jacq. (Compos.).
Acmella, *anaethinus*, *Beccabunga*, *bicolor*, *caespitosus*, *ciliatus*, *commutatus*, *exasperatus*, *fimbriatus*, *insipidus*, *javanicus*, *Karwinskianus*, *leiocarpus*, *leucanthus*, *macropodus*, *nitidus*, *papposus*, *parvifolius*, *Poeppigii*, *ramosus*, *repens*, *sessilis*, *subhirsutus*, *wrens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 326 = *homonyma omnia* *Spilanthes*.
americanus, Kuntze, l. c. = *S. Mutisii*, H. B. et K.
arnicoides, Kuntze, l. c. = *S. arnicoides*, DC.
debilis, Kuntze, l. c. = *S. Acmella*, Murr.
decumbens, Kuntze, l. c. = *S. arnicoides*, DC.
diffusus, Kuntze, l. c. = *S. diffusus*, Poepp. et Endl.
ecliptodes, Kuntze, l. c. = *Jaegeria hirta*, Less.
grandiflora, Kuntze, l. c. = *S. Acmella*, Murr.
Salivaria, Kuntze, l. c. = *S. alba*, L'Hérit.
sessilifolius, Kuntze, l. c. = *Jaegeria hirta*, Less.
tenellus, Kuntze, l. c. = *S. Acmella*, Murr.
wedeloides, Kuntze, l. c. = *Ecliptera elliptica*, DC.

CERATODES, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 548 = **CERATOIDES** Kramer, Tent. Bot. (1744) 146 = **Ceratocarpus**, Buxb. (Chenopod.).
arenarium, Kuntze, l. c. 548 = *Ceratoc. arenarius*, Linn.

CERATOLOBUS, Blume (Palm.). — Ind. Kew. i. 487.
discolor, Becc. Malesia, iii. (1886) 63. — Borneo.

CERATOPETALUM, Sm. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 487.
Virchowii, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Mar. 1891) 181. — Austral.

CERATOPHYLLUM, Linn. (Ceratophyll.). — Ind. Kew. i. 488.
cristatum, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. (1894) 748 = *demersum*, Linn.

CERATOSANTHES, Burm. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 488.
angustiloba, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 37. — Ins. Fernando Noronha.
parviflora, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xvi. (1888) 232. — Bras.
cuneata, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 37. — Ins. Fernando Noronha.
rupicola, Ridl. l. c. 38. — Ins. Fernando Noronha.

CERATOSEPALUM, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2307. **TILIACEAE**.
digitatum, Oliver, l. c. — Afr. trop. or.

CERATOSTEMA, Juss. (Vaccin.). — Ind. Kew. i. 488.
Andreana, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 75. — Peruvia.
Hookeri, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx (1892) 137. — Bolivia.
Mandoni, Britton, l. c. — Bolivia.
mutans, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 207 (= *Thibaudia mutans*, Klotzsch). — Guian.
serrata, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 138. — Bolivia.

CERATOSTYLIS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 488.
ampullacea, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 487. — Sumatra?
clathrata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 825; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2099. — Perak.
eriaeoides, Hook. f. l. c. (1891) t. 2074 b (= *Eria pygmaea*, Hook. f.). — Perak.
lancifolia, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 826. — Perak.
himalaica, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.
malaccensis, Hook. f. l. c. 823; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2098. — Penins. Mal.
pellita, Reichb. f. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 809 in syn. = *Eria leiophylla*, Linn.
pendula, Hook. f. l. c. 826; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2100. — Perak.
robusta, Hook. f. l. c. 827. — Perak.

CERATOTHECA, Endl. (Pedalin.). — Ind. Kew. i. 488.
integribractea, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 156. — Angola.
lamiifolia, Engl. l. c. — Afr. trop.

CERBERA, Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 489.
floribunda, K. Schum. in K. Schum. et Hollv. Fl. Kais. Wilh. Land, (1889) 111. — N. Guin.

CERCESTIS, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 489.
congensis, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 448. — Congo.

CERCIDIUM, Tul. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 489.
Torreyanum, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 388; et Sylva N. Amer. iii. 85 t. 130 = *Parkinsonia Torreyana*, S. Wats.
viride, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1892) 172 (= *Retinophloeum viride*, Karst.). — Am. austr.

CERCIS, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 489.
racemosa, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1894. — China.
texensis, Sarg. in Gard. and For. iv. (1891) 448 et Sylva N. Amer. iii. 97 t. 135 = *reniformis*, S. Wats.

CEROCARPUS, H. B. et K. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 489.
arizonicus, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 14 = *ledifolius*, Nutt.
involutus, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 190. — Calif.
paucidentatus, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sc. xiv. (1894) 31 = *parvifolius*, Nutt.

CEREFOLIUM, Riv. = **Anthriscus**, Hoffm. (Umbellif.).

Anthriscus, G. Beck, in *Annal. naturh. Hofmus.* Wien, x. (1895) 210 = *A. vulgaris*, Bernh.
fumarioides, G. Beck, in Schubert, *Park von Abbazia* (1894) 97 = *A. fumarioides*, Spreng.
siculum, G. Beck, in *Annal. naturh. Hofmus.* Wien, x. (1895) 211 in obs. = *A. sicula*, DC.
enuifolium, G. Beck l. c. 210 = *A. sylvestris*, Hoffm.

CEREUS, Mill. (Cact.). — Ind. Kew. i. 489.

Arendtii, Hildm. et Mathes. in *Monats. für Kakteenh.* iv. (1894) 173. — Urug.
Balansaei, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* ix. n. (1890) 210. — Parag.
Baumannii, Fenzl, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvi. (1886) 294. — Bras.
chalybaeus, Hort. Berol. ex K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 176 (= *C. chalybaeus*, Hort.). — Bras.?
Cochal, Orcutt, in *West Am. Scientist*, vi. (1889) 29; et ex K. Schum. in *Monats. für Kakteenh.* v. (1895) 74. — Calif.
Cumengii, Weber [Paris.], in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 317. — Calif.
Diguetti, Weber, l. c. 319. — Calif.
eriocarpus, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 27. — Chili.
Eruca, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. ii. (1889) 163 t. 7; et ex K. Schum. in *Monats. für Kakteenh.* v. (1895) 73. — Calif.
Glaziovii, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. n. (1890) 200. — Bras.
gunmosus, Hort. ex Weber [Paris.], in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 317 in obs. = *Cumengii*, Weber [Paris.].
Hermannianus, Suring. in *Versl. Kon. Akad. Wet. Amsterd.* Ser. III. ii. 1885 (1886) 194. — Ind. bat.
Hildmannianus, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. n. (1898) 202; et in *Monats. für Kakteenh.* ii. (1892) 55 cum ic. — Bras.
Hoppenstedtii, K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 181. — Mexic.
Kreggii, K. Schum. in *Monats. für Kakteenh.* v. (1895) 149. — Hab.?
lasianthus, K. Schum. in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 208. — Am. austr.
melanotrichus, K. Schum. l. c. — Am. austr.
melanurus, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. n. (1890) 200. — Bras.
microsphaericus, K. Schum. l. c. 197. — Bras.
monstruosus, Hort. ex K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 178 = *monstruosus*, Steud.?
obtusangulus, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. n. (1890) 198. — Bras.
Plmeri, Hort. ex Weber, [Paris.], in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 318 = *Schottii*, Engelm.
parvulus, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. n. (1890) 197. — Bras.
Pecten-aborigenum, « Engelm. » ex Gard. and For. (1894) 335 fig. 51 = seq.
Pecten-aborigenum, Engelm. ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 429. — Mexic.
queretaroensis, Weber [Paris.], ex Mathes. in *Monats. für Kakteenh.* i. (1891) 27. — Mexic.
Sargentianus, Orcutt, in *Gard. and For.* iv. (1891) 436 fig. 69. — Calif.
saxicolus, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 121. — Parag.
speciosus, K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 179 (= *Cactus speciosus*, Cav.). — Mexic.
striatus, T. S. Brandeg. in *Zoë*, ii. (1891) 19. — Calif.
Warmingii, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. n. (1890) 204. — Bras.

CERINTHE, [Tourn.] Linn. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 492.
lamprocarpa, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, vii. v. (1992) 86. — Herceg.
oranensis, Batt. in *Bull. Assoc. franç. avanc. sci.* (Congr. Toul.) (1887) extr. 6 t. 81; et in *Bull. Soc. Dauph.* Sér. II, i. (1890) 24. — Algeria.

CERINTHODES, Ludwig, Defin. Gen. (1737) 5, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 436 = **Mertensia**, Roth (Boragin.).

alpinum, ellipticum, lanceolatum, longistylum, maritimum, oblongifolium, paniculatum, rivulare, serrulatum, sibiricum, simplicissimum, stylosum, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Mertensiae*.
davuricum, Kuntze, l. c. = *M. dahurica*, D. Don.
virginicum, Kuntze, l. c. = *M. pulmonarioides*, Roth.

CEROPEGIA, Linn. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 493.

angusta, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 261 — Angola.
antennifera, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 46. — Afr. austr.
Beccariana, Martelli, *Fl. Bogos.* (1886) 56. — Abyss.
caffrorum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 358. — Afr. austr.
constricta, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 260. — Afr. centr. or.
crassifolia, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 273. — Afr. austr.
debilis, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1895) ii. 358. — Afr. trop. austro-or.
denticulata, K. Schum. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 38; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 327. — Afr. trop. or.
distincta, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 262. — Zanzib.
filipendula, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 150. — Angola.
Galpinii, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 23. — Afr. austr.
leucotaenia, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 151. — Angola.
loranthiflora, K. Schum. l. c. 150. — Abyss.
medoensis, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 263. — Afr. or.
Meyeri-Johannis, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 343. — Afr. trop. or.
Monteiroae, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1887) t. 6927; et in *Monteiro, Delagoa Bay* (1891) 175. — Mosamb.
mozambicensis, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 273. — Afr. trop. or.
nana, Coll. et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 89 t. 13. — Burma.
nigra, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 261. — Reg. Nigrit.
pachystelma, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 47. — Afr. austr.
parviflora, Trim. in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 164; et *Plat. illust. Fl. of Ceyl.* (1895) t. 63. — Zeyl.
purpurascens, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 152. — Angola.
pygmaea, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.
racemosa, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 262. — Afr. centr. bor.
radicans, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 12. — Afr. austr.
Rendallii, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1894) 100. — Transv.
Sandersoniae, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1887) t. 6927. = *Sandersoni*, Decne.
scandens, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 262. — Angola.
setifera, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 48. — Afr. austr.
sobolifera, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 261. — Abyss.
stenantha, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 152. — Afr. centr. bor.
subtruncata, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 260. — Abyss.
tentaculata, N. E. Br. l. c. 260. — Afr. austro-occ. extratrop.
tomentosa, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 33. — Afr. austr.
umbraticola, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 153. — Angola.
volubilis, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 261. — Angola.
Woodii, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 34. — Afr. austr.

CESTICHIS, Thou. = **Liparis**, Rich. (Orchid.).
decurrens, Pfitzer, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6. (1888) 131 = *Platystylis decurrens*, Lindl.

disticha, Pfitzer, l. c. = *L. disticha*, Lindl.

latifolia, Pfitzer, l. c. = *L. latifolia*, Lindl.

pendula, Pfitzer, l. c. = *L. longipes*, Lindl.

CESTRUM, Linn. (Solanac.). — Ind. Kew. i. 494.

fasciculiflorum, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 17. — Bras.

irazuense, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 450. — Costarica.

rigidum, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 234. — Bolivia.

CHADSIA, Grandidieri, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1886) t. 38. — Madag.

granitica, Baill. l. c. tab. 39. — Madag.

CHAENACTIS, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 496.

alpina, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Sér.* II. v. (1895) 699. — Utah.

lacera, Greene, *Pittonia*, i. (April 1889) 291. — Calif.

scaposa, Eastwood, in *Zoë*, ii. (1891) 231. — Colorado.

CHAENANTHE, Lindl. = **Diadenium**, Poepp. et Endl. (Orchid.).

micrantha, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 656 = *D. micranthum*, Poepp. et Endl.

Parkeri, Kuntze, l. c. = *D. Barkeri*, Benth. et Hook. f.

CHAENOCEPHALUS, Griseb. (Composit.). — Ind. Kew. i. 497.

arborescens, O. Hoffm. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1890) 239 (= *Verbesina arborescens*, H. B. et K.). — Ecuad.

CHAENOMELES, Lindl. = **Pyrus**, Linn. (Rosac.).

alpina, Koehne, in *Gartenfl.* (1891) 61; et *Deutsche Dendrol.* (1893) 262 = *P. japonica*, Thunb.

chinensis, Koehne, ll. cc. = *P. sinensis*, Poir.

CHAENOSTOMA, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 497.

canariense, Wettst. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 69 = *Lyperia canariensis*, Webb.

corymbosum, Marl. et Engl. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 253. — Afr. austro-occ. extratrop.

fruticosum, Wettst. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 69 = *Lyperia fruticosa*, Benth.

hereroense, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 150. — Afr. austro-occ. extratrop.

lyperiaeflorum, Wettst. l. c. = *Urbania lyperiaeflora*, Vathe.

lyperioides, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 253. — Afr. austro-occ. extratrop.

pedicellatum, Engl. l. c. = *Lyperia pedicellata*, Kl.

micranthum, Engl. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 356. = *Lyperia micrantha*, Klotzsch.

triste, Wettst. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 69 = *Lyperia tristis*, Linn.

CHAEROPHYLLUM, Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 497.

aurantiacum, Post, *Pl. Postianae*, iii. (1892) 8. — Syria.

balcanicum, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 30. — Bulg.

Biasoletii, G. Beck, in *Annal. naturh. Hofmus.* Wien, x. (1895) 212 = *Biasoletia tuberosa*, Koch.

Borodini, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 451; et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 106. — Reg. Cauc.

Borodinianum, Alboff, l. c. iii. (1895) 521 = *praec. gagaosorum*, Velen. in *Bot. Centralbl.* xxxvi. (1888) 60. — Bulg.

ghilanicum, Stapf et Wettst. in *Denkschr. Akad. Wien* lxi. (1886) 54. — Asia occ.

CHAEROPHYLLUM : —

gracile, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 120. — Armenia.
 oligocarpum, Post, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 258; et in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 429. — Syria.
 rubellum, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 105. — Reg. Cauc.
 Schmalhauseni, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 451. — Reg. Cauc.

CHAETACANTHUS, Nees = **Calophanes**, D. Don (Acanthac.).
 setiger, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 38; in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 302; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 367 (= *Ch. setigera*, Nees) = *Cal. Persoonii*, Nees.

CHAETAEA, Jacq. = **Buettneria**, Loeffl. (Stercul.).
 hirsuta, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iii. iii. (1893) 10 = *B. hirsuta*, Ruiz et Pav.
 paraguayensis, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1892) 63. — Parag.

CHAETANTHERA, Ruiz et Pav. (Compos.). — Ind. Kew. i. 498.
 andina, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 6. — Chili.
 apiculata, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 456 = *Eganina apiculata*, Remy.
 araucana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 10. — Chili.
 brachylepis, Phil. l. c. 12. — Chili.
 comata, Phil. l. c. 8. — Chili.
 crenata, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 456 = *Chondrochilus crenatus*, Phil.
 delicatula, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 13. — Chili.
 elata, Phil. l. c. 9. — Chili.
 euphrasoides, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 284 (= *Elachia euphrasoides*, DC.). — Chili.
 foliosa, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 11. — Chili.
 glabraia, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 456 = *Tylloma glabratum*, DC.
 involuocrata, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 6. — Chili.
 lanigera, Phil. l. c. 9. — Chili.
 montana, Phil. l. c. 10. — Chili.
 nana, Phil. l. c. 7. — Chili.
 obtusata, Phil. l. c. — Chili.
 pentapetala, Phil. l. c. 13. — Chili.
 pratensis, Phil. l. c. 12. — Chili.
 Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 368. — Peruvia.

CHAETOCALYX, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 499.
 Glaziovii, Taub. in Flora. lxxii. (1889) 425. — Bras. ilheutica, Taub. l. c. — Bras.

CHAETOCARPUS, Thw. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 499.
 africanus, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 113. — Congo.
 pubescens, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 461. — Zeylan.

CHAETOCHLAMYS, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 490; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 354. **ACANTHACEAE**.
 macrostipon, Lindau, ll. cc. — Bolivia.
 marginata, Lindau, ll. cc. 491 et 354. — Bolivia.
 Rusbyi, Lindau, ll. cc. — Bolivia.

CHAETOASTRA, DC. = **Tibouchina**, Aubl. (Melast.).
 galipensis, Klotzsch, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 248 = *T. longifolia*, Baill.

CHAETOLEPIS, Miq. (Melast.). — Ind. Kew. i. 500.
 brevistrigillosa, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 172. — Cuba.
 Grisebachii, Cogn. l. c. — Cuba.

CHAETOSPORA, R. Br. = **Schoenus**, Linn. (Cyper.).
 intermedia, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. (1890) 128 in syn. = *S. intermedius*, Bruegg.

CHAETOSTOMA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 501.
 Joanae, Glaziov, ex Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 28. — Bras.
 luteum, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 590. — Bras.
 Petronianum, Sald. et Cogn. ex Cogn. l. c. 591. — Bras.
 trauninense, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 30. — Bras.

CHAETOTHYLAX, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 501.
 boliviensis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 492. — Bolivia.
 Rothschi, Lindau, l. c. — Nicarag.

CHAETURUS *morrubifolius*, St-Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 681 (= *Chaeturus Marrubiastrum*, Spenn.) = *Leonurus Marrubias-trum*, Linn.

CHAILLETIA, DC. (Chailletiac.). — Ind. Kew. i. 501.
 andamanica, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 93. — Ins. Andam.
 Bocageana, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 107. — Ins. S. Thom.
 capitulifera, Spruce, ex Baill. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 376 = *Tapura capitulifera*, Baill.
 Hookeri, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 91. — Penins. Mal.
 latifolia, Spruce, ex Baill. in Mart. Fl. Bras. vii. i. (1886) 371 (= *Dichapetalum latifolium*, Baill.). — Bras.
 odorata, Spruce, ex Baill. l. c. (= *Dichapetalum odoratum*, Baill.). — Bras.
 oleifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 306. — Madag.
 tenuifolia, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 91. — Perak.

CHALCAS, Linn. = **Murraya**, Koen. (Rutac.).
 exotica, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. Ser. i. (1895) 25 = *M. exotica*, Linn.

CHAMAECERASUS, [Tourn.] Medic. = **Lonicera**, Linn. (Caprifol.).
 Alberti, Späth, in Rev. Hort. (1886) 547 = *Lonicera* (sp.).
 Niagerilli, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 226 = *L. fragrantissima*, Carr.

CHAMAECISTUS, S. F. Gray = **Loiseleuria**, DC. (Ericac.).
 procumbens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 388 = *L. procumbens*, Desf.

CHAMAECYPARIS, Spach = **Thuya**, Tourn. (Conif.).
 acuta, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 92 = *T. obtusa*, Benth. et Hook. f.
 atrovirens, Hort. ex Beissn. l. c. 69 = *T. sphaeroidalis*, Rich.
 plumosa, Hort. ex Beissn. l. c. 87 = *T. pisifera*, Benth. et Hook. f.
 thyoides, Sargent, in Gard. and For. ii. (1889) 484 = *T. sphaeroidalis*, Rich.

CHAMAEDAPHNE, Catesby, Nat. Hist. Carol. ii. (1740-43) t. 98 App. t. 17, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 388 = **Kalmia**, Linn. (Ericac.).
 angustifolia, cuneata, glauca, hirsuta, latifolia, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Kalmiae.
 ericoides, Kuntze, l. c. = *K. ericoides*, Griseb.

CHAMAEDAPHNE, Moench. = **Cassandra**, D. Don (Ericac.).
 calyculata, Baill. Hist. Pl. xi. (1892) 179 = *Cass. calyculata*, G. Don.

CHAMAEDOREA, Willd. (Palm.). — Ind. Kew. i. 502.
 Pringlei, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 157. — Mexic.
 stolonifera, H. Wendl, ex Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7265. — Mexic.

CHAMAEDREA stolonifera «H. Wendl.» e Hook. f. in Bot. Mag. (1892) sub t. 7265 sphalm. = *Chamaedorea stolonifera*, H. Wendl.

CHAMAEDRYFOLIA, Dill. Cat. Pl. Afr. Shawii (1738) n. 133, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 625 = **Forskohlea**, Linn. (Urtic.).
 angustifolia, candida, procridifolia, tenacissima, viridis, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Forskohleae.

CHAMAejasme, Amm. Ruth. (1739) 16. t. 2 ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 584 = **Stellera**, J. G. Gmel. (Thymel.).
 Lessertii, Kuntze, l. c. = *S. Lessertii*, C. A. Mey.
 stachyodes, Kuntze, l. c. = *S. Lessertii*, C. A. Mey.
 Stelleriana, Kuntze, l. c. = *S. Chamaejasme*, Linn.

CHAMAEMELUM, Vis. = **Matricaria**, Linn. (Compos.).
 heterolepis, Freyn et Sint. ex Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 349. — Armenia.
 repens, Freyn et Sint. l. c. — Armenia.
 rupestre, Somm. et Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II, ii. (1895) 86. — Reg. Cauc.

CHAMAENERIUM, [Tourn.] Adans. = **Epilobium**, Linn. (Onagrar.).
 latifolium, Helm, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 305 = *E. latifolium*, Sweet.

CHAMAERAPHIS, R. Br. = **Setaria**, P. Beauv. (Gramin.).
 corrugata, effusa, glauca, italica, latiglumis, paniculifera, pauciseta, Schiedeana, setosa, sulcata, uniseta, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 771 = *homonyma omnia* Setariae.
 brachiariaeformis, Kuntze, l. c. = *Panicum brachiarieaeforme*, Steud.
 caudata, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1894) 264. — Parag.
 cirrhosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 770 = *S. cirrhosa*, Fourn.
 costata, Kuntze, l. c. 771 = *Panicum flavescens*, Sw.
 Crus-Ardeae, Kuntze, l. c. = *P. Crus-Ardeae*, Willd.
 excurrens, Kuntze, l. c. = *P. plicatum*, Lam.
 Forbesiana, Kuntze, l. c. (= *P. Forbesianum*, Nees). — Ind. or.
 Jurgensii, Kuntze, l. c. 770 = *S. Jurgenseni*, Fourn.
 Lindenbergia, Kuntze, l. c. 771 = *P. Lindenbergia*, Ness.
 musaeifolia, Kuntze, l. c. = *P. musaeifolia*, Klotzsch.
 nepalensis, Kuntze, l. c. = *P. plicatum*, Lam.
 nervodes, Kuntze, l. c. = *P. plicatum*, Lam.
 palmifolia, Kuntze, l. c. = *P. palmifolium*, Poir.
 paucifolia, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 265 (*paucifolius*). — Parag.
 plicata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 768 = *Panicum plicatum*, Lam.
 prostrata, Kuntze, l. c. 770 = *P. Leptachyrium*, Doell.
 speciosa, Kuntze, l. c. = *P. speciosum*, R. Br.
 verticillata, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 196 = *S. verticillata*, P. Beauv.
 viatica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 770 = *Panicum prostratum*, Beauv.
 viridis, Millsp. Fl. West Virgin. (1892) 466; Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 196 = *S. viridis*, Beauv.

CHAMAERIPHES, Dill. = **Hyphaene**, Gaertn. (Palm.).
 benguelensis, compressa, coriacea, crinita, macrostipma, thebaica, turbinata, ventricosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 728 = *homonyma omnia* Hyphaenes.
 coriacea, Baill. Hist. Pl. xiii. (1892) 298 = *coriacea*, Kuntze [vide supra].
 guineensis, Baill. l. c. = seq.
 guineensis, Kuntze, Rev. Gen. 728 = *H. thebaica*, Mart.

- CHAMAESARACHA**, A. Gray (Solan.). — Ind. Kew. i. 505.
conioides, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 287 = *conioides*, Benth. et Hook. f.
echinata, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 355. — Japon.
heterophylla, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 174. — China.
potosina, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 161. — Mexic.
sinensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 174. — China.
Watanabaei, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 315 t. 29. — Japon.
- CHAMAESPACOS**, Schrenk (Labiata). — Ind. Kew. i. 505.
afghanicus, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 97. — Afghan.
- CHAMAETHRINAX**, H. Wendl. ex R. Pfister, Beitr. vergl. Anat. Sabaleenblätter (1891) 19 nomen. **PALMAE**.
Hookeriana, H. Wendl. ex Pfister, l. c. 46. — Hab. ?
- CHAMELUM**, Phil. (Irid.). — Ind. Kew. i. 505.
Bodenbenderi, Kurtz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1894) 112 nomen. — Chili.
- CHAMISSONIA**, Lindl. = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).
cheiranthifolia, Raim. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 17 = *O. cheiranthifolia*, Hornem. ?
conforta, Kearns = *O. strigulosa*, Torr. et Gray.
tenuifolia, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 445 = seq.
tenuifolia, Raim. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 217 = *O. tenuifolia*, Cav.
- CHAMISSOMNEIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 326 = **Schlechtendalia**, Less. (Compos.)
luzulifolia, Kuntze, l. c. 327 = *S. luzulaefolia*, Less.
- CHAMORCHIS**, Rich. = **Herminium**, Linn. (Orchid.).
alpina, Simonk. Enum. fl. Transs. (1886) 504 = *H. alpina*, Rich.
- CHAMPEREIA**, Griff. (Santal.). — Ind. Kew. i. 506.
Gaudichaudiana, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 70. — Malacca.
- CHAPELIERIA**, A. Rich. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 506.
Melleri, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 78 (Chapelliera). = *Tamatavia Melleri*, Hook. f.
- CHARDINIA**, Desf. (Compos.). — Ind. Kew. i. 506.
orientalis, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 261 = *xeranthemoides*, Desf.
- CHARIANTHUS**, D. Don (Melast.). — Ind. Kew. i. 506.
corymbosus, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 714 (= *Melastoma corymbosa*, L. C. Rich.). — Am. trop.
longifolius, Cogn. l. c. 715. — Dominica.
- CHARIESSA**, Miq. = **Villaresia**, Ruiz et Pav. (Olacinae).
Morei, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1893) 245. — Austral.
samoensis, Engl. l. c. (= *Pleuropetalon samoense*, A. Gray). — Ins. Samoens.
- CHARISTEMMA**, Janka, in Termész. Füzetek, x. (1886) 62 = **Scilla**, Linn. (Liliac.).
fastigiata, Janka, l. c. = *S. fastigiata*, Viv.
- CHASALIA**, Comm. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 507.
gracilis, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 183. — Borneo.
virens, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 133 = *Psychotria virens*, Hiern.
- CHASMANATHERA**, Hochst. (Menisperm.). — Ind. Kew. i. 507.
Bakis, Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 803 = *Tinospora Bakis*, Miern.
- CHASMIA**, Schott. = **Arrabidaea**, DC. (Bignon.).
Rego, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 479 = *A. Agnuscatus*, DC.
Salzmanni, Kuntze, l. c. = *A. Salzmanni*, DC.
- CHATINIA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 350 = **Loranthus**, Linn.
auriculata, Van Tiegh. l. c. 351 = *L. auriculatus*, Oliver.
calyculata, Van Tiegh. l. c. = *L. calyculatus*, DC.
Kerberi, Van Tiegh. l. c. = *L. Kerberi*, Fourn.
Schiedeana, Van Tiegh. l. c. = *L. Schiedeana*, Cham. et Schlecht.
- CHAUNOSTOMA**, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 9. **LABIATAE**.
mecistandrum, J. D. Smith, l. c. t. 3. — Guatem.
- CHEILOTHECA**, Hook. f. (Monotrop.). — Ind. Kew. i. 508.
malayana, Seortech. ex Hook. f. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1564. — Penins. Mal.
- CHEIRANTHUS**, Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 508.
luteus, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, II. (1889) 37 = *luteus*, Dulac.
occidentalis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 261. — Am. bor. occ.
roseus, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 57 t. 21 fig. 1-12. — China.
- CHEIROSTYLIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 510.
Franchetiana, King et Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 341. — Ind. or.
- CHELIDONIUM**, Tourn. ex Linn. (Papaver.). — Ind. Kew. i. 510.
lasiocarpum, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1739. — China.
sutchuenense, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 293 = *Stylophorum sutchuenense*, Franch.
- CHELONANTHUS**, Gilg = **Lisianthus**, Linn. (Gentian.).
acutangulus, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 98 = *L. tetragonus*, Benth.
angustifolius, Gilg, l. c. = *L. angustifolius*, H. B. et K.
bifidus, Gilg, l. c. = *L. bifidus*, H. B. et K.
campanulatus, Gilg, l. c. = *L. campanuloides*, Spruce.
chelonoides, Gilg, l. c. = *L. chelonoides*, Linn.
fistulosus, Gilg, l. c. = *L. fistulosus*, Poir.
Schomburgkii, Gilg, l. c. = *L. Schomburgkii*, Griseb.
uliginosus, Gilg, l. c. = *L. uliginosus*, Griseb.
viridiflorus, Gilg, l. c. = *L. viridiflorus*, Mart.
- CHELONESPERMUM**, Hemsl. in Ann. of Bot. vi. (July 1892) 205. **SAPOTACEAE**.
fijiense, Hemsl. l. c. 207. — Ins. Fiji.
majus, Hemsl. l. c. 286. — Ins. Salomon.
minus, Hemsl. l. c. 207. — Ins. Salomon.
unguiculatum, Hemsl. l. c. — Hab. ?
- CHILONOPSIS**, Miq. (Labiata). — Ind. Kew. i. 511.
Benthamiana, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 298 (= *Bostrychanthera deflexa*, Benth.). — China.
- CHENOLEA**, Thunb. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 511.
Cornischiiana, F. Muell. in Bot. Centralbl. xxvi. (1889) 228 in syn. = *Bassia Cornischiiana*, F. Muell.
divaricata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 10. — As. centr.
eriophora, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 102. — Afghan.
sedoides, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 10. — Eur., Asia.
- CHENOPODIUM**, [Tourn.] Linn. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 511.
acutifolium, Phil. in Ann. Univ. Chil. xci. (1895) 420. — Chili.
aromaticum, Hort. ex Kew Bull. (1892) Append. i. 6. — Germ.
Borbasii ×, Murr. in Progr. Realsch. Innsbr. (1891) 56; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xi. (1893) 9 et xii. (1894) 99. — Tirol.
bryoniaefolium, A. Bunge, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 16. — As. bor. or.
Buchanani, T. Kirk, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 139; et in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 446-467. — N. Zel.
capitatum, S. Wats. ex Britton, in Geol. Surv. N. Jersey, ii. (1889) 207 = *capitatum*, Aschers.
chilense, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 418. — Chili.
hastatum, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 703 = *C. Bonus-Henricus*, Linn.
latifolium, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 418. — Chili.
patagonicum, Phil. l. c. 419. — Patagon.
prostratum, Bunge, ex Herder, in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 594. — Sibiria.
prostratum, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 14 = *Suaeda nudiflora*, Moq.
sparsiflorum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 419. — Chili.
subaphyllum, Phil. l. c. 421. — Chili.
trifurcatum, Phil. l. c. 418. — Chili.
- CHERSODOMA**, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 32. **COMPOSITAE**.
candida, Phil. l. c. tab. 1. fig. 6. — Chili.
- CHEVALIERIA**, Gaudich. = **Aechmea**, Ruiz et Pav. (Bromel.).
Fernandae, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 64 in syn. = *Ae. Fernandae*, Baker.
gigantea, Maury, in Bull. Assoc. Franç. (Congr. de Toulouse) 1887 (1888) 556; in Le Jardin (1888) 8 171 cum xylogr.; et in Rev. Hortic. (1888) 370 fig. 83 = *Ae. gigantea*, Baker.
Magdalenae, Ed. André, in Rev. Hortic. (1888) 503; et Bromel. Andr. 65 = *Ae. Magdalenae*, Ed. André.
- CHIANTHEMUM**, Sieg. Fl. Petrop. (1736) 31pr. p. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 703 = **Galanthus**, Linn. (Amaryll.).
Elwesii, Kuntze, l. c. = *G. Elwesii*, Hook. f.
graecum, Kuntze, l. c. = *G. graecum*, Orph.
nivale, Kuntze, l. c. = *G. nivalis*, Linn.
Olgae, Kuntze, l. c. = *G. Olgae*, Orph.
plicatum, Kuntze, l. c. = *G. nivalis*, Linn.
- CHILIOTRICHUM**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 514.
angustifolium, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 401. — Chili.
longifolium, Phil. l. c. — Chili.
tenue, Phil. l. c. — Chili.
- CHIMARRHIS**, Jacq. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 515.
Hookeri, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vii. vi. (1889) 259. — Peruvia.
pisoniaeformis, « Baill. » ex K. Schum. l. c. 226 = *Sickingia pisoniaeformis*, Baill.
- CHIMONANTHUS**, Lindl. (Calycanth.). — Ind. Kew. i. 515.
nitens, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1600. — China.

CHIOCOCCA, P. Br. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 515.
alba, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 94 = *racemosa*, Linn.

CHIOGENES, Salisb. (Vaccin.). — Ind. Kew. i. 515.
hispidula, Baill. Hist. Pl. xi. (1892) 184 = *hispidula*, Torr. et Gray.

CHIONACHNE, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 515.
Massii, *Balansa*, in Morot, *Journ. de Bot.* iv. (1890) 78. — Tonk.
Sclerachne, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Bot. Bull.* [ii.] (1891) 21. — Austral.

CHIONODOXA, Boiss. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 516.
sardensis, Barr et Sugden, *Catal.* (1883), ex *Garden*, xxviii. (1885) 178 t. 175; *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 371. — As. Min.

CHIONOGRAPHIS, Maxim. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 516.
lutea, Baill. Hist. Pl. xii. (1894) 593 = *japonica*, Maxim.

CHIONOLAENA, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 516.
eleagnoides, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 88. — Mexic.
innovans, Wawra, *Itin. Princ. S. Coburg*. ii. (1888) 30. — Bras.
Sartorii, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 89. — Mexic.

CHIRIDIUM, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 483 = *Loranthus*, Linn.
Beccarii, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 541. — Borneo.
Lijndenianum, Van Tiegh. l. c. 484 = *L. Lijndenianus*, Zoll.
longissimum, Van Tiegh. l. c. 541. — Sumatra.
setigerum, Van Tiegh. l. c. 484 = *L. setigerus*, Korth.
speciosum, Van Tiegh. l. c. = *L. speciosus*, Wall.
verticillatum, Van Tiegh. l. c. 541. — Perak.

CHIRITA, Buch.-Ham. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 516.
Balansae, Drake, in Bull. Soc. Philom. Sér. VIII. ii. (1890) 138. — Tonkin.
bracteosa, Drake, l. c. 39. — Tonkin.
depressa, Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7213. — China.

CHIRONIA, Linn. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 516.
densiflora, S. Elliot, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 69. — Afr. austr.
fruticosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 sphalm. = *Orphium frutescens*, E. Mey.
lancifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1898) 334. — Madag.
laxiflora, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 25. — Zambesia.

CHIROPETALUM, A. Juss. = *Argithamnia*, Sw. (Euphorb.).
Pavonianum, Pax, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1890) 45 = *A. Pavoniana*, Muell. Arg.
Schiedeanum, Pax, l. c. = *A. Schiedeana*, Muell. Arg.
Sponiella, Pax, l. c. = *A. sponiella*, Muell. Arg.

CHISOCHETON, Blume (Meliac.). — Ind. Kew. i. 517.
annulatus, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 31. (Chizocheton). — Perak.
Balansae, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 578. — Tonk.
Kunstleri, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 27. — Perak.
laxiflorus, King, l. c. 33. — Perak.
macrophyllus, King, l. c. 22. — Penang.
macrothyrus, King, l. c. 33. — Perak.

CHISOCHETON : —

Princeps, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1844. — Penang.
pauciflorus, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 27. — Perak.
rubiginosus, King, l. c. 29. — Perak.

CHLAMIDACANTHUS, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 58; et in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1895) 343. *ACANTHACEAE*.
euphorbioides, Lindau, l. c. 109, 61 et 343 fig. 137. — Madag.

CHLAMYDOCARDIA, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 39; et in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1895) 329. *ACANTHACEAE*.
Buettneri, Lindau, l. c. — Afr. trop. occ.
subrhomboides, Lindau, l. c. xxii. (1895) 119. — Kamerun.

CHLAMYDOCARYA, Baill. (Olac.). — Ind. Kew. i. 518.
Soyauxii, Engl. Bot. Jahrb. xxii. (1893) 73. — Gabon.

CHLAMYPHORUS, Klatt, in Leopoldina, Heft xxv. (1889) 106. *COMPOSITAE*.
obvallatus, Klatt, l. c. 107. — Bras.

CHLAMYSPOURUM, Salisb. = *Thysanotus*, R. Br. (Liliac.).
anceps, *arbusculum*, *asperum*, *Baueri*, *dichotomum*, *Drummondii*, *exiliflorum*, *glaucum*, *isantherum*, *junceum*, *pauciflorum*, *scabrum*, *tenue*, *tuberosum*, Kuntze Rev. Gen. (1891) 708 = *homonyma omnia* *Thysanoti*.
chrysanthemum, Kuntze, l. c. = *T. chinensis*, DC.
Menziesii, Kuntze, l. c. = *T. Patersonii*, R. Br.
thyrsodeum, Kuntze, l. c. = *T. thyrsodeus*, Baker.

CHLEVAX *athous*, Cesati, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 265 in syn. = *Ferula meoides*, Linn.

CHLOANTHES, R. Br. (Verben.). — Ind. Kew. i. 518.
coeruleus, F. Muell. et Tate, in *Elder Exped. Diagn. new. pl.* [I.] et ex Bot. Centralbl. lv. (1893) 317. — Austral.
Teckiana, F. Muell. in *Vict. Natural.* vi. (Oct. 1889) 104; et ex Bot. Centralbl. xl. (1889) 268. — Austral.

CHLORAEAE, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 518.
Arechavaletae, Kraenzl. in Bot. Jahrb. ix (1888) 316; *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1895) 107 t. 20 fig. 2. — Reg. Argent.
Bugainvilleana, Franch. *Miss. scient. Cap Horn*, v. (Phan.) (1889) 366. — Reg. Magell.
Pigichen, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 652 sphalm. = *C. Piquichen*, Lindl.
Teixeirana, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 107 t. 18 fig. 4 (= *Geoblasta Teixeiraana*, Rodr.). — Bras.
Ulantha, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 278 (= *Ulantha grandiflora*, Hook.). — Ins. S. Vinc.

CHLORANTHUS, Sm. (Chloranth.). — Ind. Kew. i. 519.
angustifolius, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1580. — China.
Henryi, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 367. — China.
nervosus, Collett et Hemsl. l. c. xxviii. (1890) 118. — Burma.

CHLORIS, Sw. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 519.
cenchriformis, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1070 (= *Lepidopyronia cenchriformis*, A. Rich.). — Abyss.
longifolia, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 284 t. 19. — Mexic.
neglecta, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 423. — Florida.

CHLORIS : —

obtusifolia, *Balansa*, in Morot, *Journ. de Bot.* iv. (1890) 166. — Tonk.
Savatieri, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1070. — Ins. Cap. Virid.
spathacea, Baill. l. c. (an *C. spathacea*, Hochst.?). — Arabia.

CHLOROCODON, Hook. f. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 520.
ecornutum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 111 (ecornuta). — Afr. trop. austro-or.

CHLOROCYATHUS, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1557. *ASCLEPIADEAE*.
Monteiroae, Oliver, l. c.; *Monteiro*, *Delagoa Bay* (1891) 176. — Mossamb.

CHLOROGALUM, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. i. 520.
purpureum, T. S. Brandeg. in *Zoë*, iv. (1893) 159. — Calif.

CHLOROLUMA, Baill. Hist. pl. xi. (1892) 294. *SAPOTACEAE*.

CHLOROPHORA, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 520.
tenuifolia, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 139. — Ins. S. Thom.

CHLOROPHYTUM, Ker-Gawl. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 520.
africanum, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 470 = *Dasystachys Grantii*, Benth. et Hook. f.
aureum, Engl. Bot. Jahrb. l. c. 469. — Afr. centr. bor.
brachystachyum, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 711. — Reg. Nyass.
bukobense, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 139. — Afr. trop. or.
campanulatum, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 161 = *Dasystachys campanulata*, Baker.
chinense, Bureau et Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 154. — China.
chloranthum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 529. — Madag.
colubrinum, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 162 = *Dasystachys colubrina*, Baker.
cordatum, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 468. — Afr. centr. bor.
densiflorum, Engl. l. c. 470. — Angola.
elongatum, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35 (1892) 9. — Bras.
falcatum, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 161 = *Dasystachys falcata*, Baker.
fusiforme, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 419. — Afr. trop. or.
gracile, Baker, l. c. xxv. (1890) 348. — Madag.
Holstii, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 29; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 140. — Afr. trop. or.
khassianum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 334. — Khasia.
marginatum, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 422. — Afr. trop. or.
miserum, Rendle, l. c. 420. — Afr. trop. or.
moniliforme, Rendle, l. c. 418. — Afr. trop. or.
papillosum, Rendle, l. c. 423. — Afr. trop. or.
pleiostachyum, Th. Dur. et Schinz. *Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 352 = *Dasystachys pleiostachya*, Baker.
puberulum, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 139. — Afr. trop. or.
ramiferum, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 521. — Afr. trop. or.
Schimperi, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 161. — Abyss.
somaliense, Baker, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 469. — Reg. Somal.
tenuifolium, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 228. — Reg. Somal.
viridescens, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 140. — Afr. trop. or.

CHLOROPSIS, Hackel = **Trichloris**, Fourn. (Gramin.).

Blanchardiana, J. Gay, ex Vasey, Ill. N. Am. Grass. i. ii. (1891) sub t. 25 in syn. = *T. verticillata*, [vel potius, fasciculata] Fourn.
Blanchardiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 771 = *praec.*
crinita, Kuntze, l. c. = *Chloris crinita*, Lag.
fasciculata, Kuntze, l. c. = *T. fasciculata*, Fourn.
pluriflora, Kuntze, l. c. = *T. pluriflora*, Fourn.
Pumilio, Kuntze, l. c. = *Chloris Pumilio*, R. Br.

CHLOROSTELMA, *fritillarioides*, Welw. ex Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 162 in syn. = *Xysmalobium fritillarioides*, Rendle.

CHOISYA, H. B. et K. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 520.
dumosa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 224. — Am. bor.

CHOMELIA, Jacq. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 521.

affinis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 380. — Afr. trop. or.
angolensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Tarenna angolensis*, Hiern.
asiatica, Kuntze, l. c. = *T. zeylanica*, Gaertn.
Buchananii, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 380. — Afr. trop. or.
conferta, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 = *Tarenna conferta*, Hiern.
congensis, Kuntze, l. c. = *T. congensis*, Hiern.
coriacea, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 19; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 17 = *Enterospermum nigricans*, Hook. f.
corymbosa, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 74 = *Tarenna zeylanica*, Gaertn.
cuspidata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 (= *Stylacoryna cuspidata*, E. Mey.). — Afr. austral.
Dallachiana, Kuntze, l. c. (= *Webera Dallachiana*, F. Muell.). — Austral.
fragrans, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 74 (= *Wahlenbergia fragrans*, Blume). — Malaya.
grandiflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Tarenna grandiflora*, Hiern.
mollissima, Kuntze, l. c. (= *Webera mollissima*, Benth.). — China.
Morongii, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 127. — Parag.
mosambicensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Tarenna mosambicensis*, Hiern.
mosambicensis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 379 = *praec.*
myrtifolia, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 373. — Bras.
nigrescens, K. Schum. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 380 = *Coptosperma nigrescens*, Hook. f.
nigrescens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Tarenna nigrescens*, Hiern.
nilotica, Kuntze, l. c. = *T. nilotica*, Hiern.
nitidula, Kuntze, l. c. = *T. nitidula*, Hiern.
pallidula, Kuntze, l. c. = *T. pallidula*, Hiern.
Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 137. — Mexic.
sambucina, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Pa-vetta sambucina*, DC.
sechellensis, Kuntze, l. c. (= *Webera sechellensis*, Baker). — Ins. Seychell.
tetramera, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *T. tetramera*, Hiern.
tetramera, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 74 = *Tarenna tetramera*, Hiern.

CHONDRILLA, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 522.
Albertoregelia, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 337. — Buchara.

CHONDROCHILUS, Phil. = **Chaetanthera**, Ruiz et Pav. (Compos.).
grandiflorus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 15. — Chili.
lanatus, Phil. l. c. 14. — Chili.

CHONDROPHORA Rafin. New Fl. N. Am. iv. (1836) 79 ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 317 = **Bigelowia**, DC. (Compos.).
Drummondii, Heller, Bot. Explor. S. Texas i. (1895) 101 = *B. Drummondii*, A. Gray.
Engelmanni, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 317 = *B. Engelmanni*, A. Gray.
Howardi, Britton, l. c. = *B. Howardi*, A. Gray.
nauseosa, Britton, l. c. = *B. graveolens*, A. Gray.
nudata, Britton, l. c. = *B. nudata*, DC.
virgata, Greene, in Erythea, iii. (1895) 91 = *B. nudata*, DC.

CHONDROHYNCHA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 522.
bicolor, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 393. — Costa-rica.
Lendyana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 103. — Hab.?

CHONDROSUM, Desv. = **Bouteloua**, Lag. (Gramin.).
Drummondii, Fourn. Gramin. Mexic. 1881 (1886) 137. — Mexic.
Trinii, Fourn. l. c. 135. — Mexic.

CHONOLEA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 546 err. typ. = **Chenolea**, Thunb. (Chenop.).

CHORILAENA, Endl. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 523.
Hasseltii, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Sept. 1889) 87; et ex Bot. Centralbl. xl. (1889) 94. — Austral.

CHORIOLUMA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 892; et Hist. pl. xi. (1892) 287.
SAPOTACEAE.
coriacea, Baill. l. c. (= *Sideroxylon coriaceum*, Baill.). — N. Caled.

CHORISIA, H. B. et K. (Malv.). — Ind. Kew. i. 523.
soluta, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 1. — Guatem.

CHORISPERMUM, R. Br. = **Chorispora**, DC. (Crucif.).
exscapum, *ibericum*, *persicum*, *sibiricum*, *syriacum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 26 = *homonyma omnia* *Chorisporae*.
elegans, Kuntze, l. c. 26 = *Chorispora sabulosa*, Cambess.
strictum, Kuntze, l. c. = *Diptychocarpus strictus*, Trautv.

CHORISTIGMA, Baill. Hist. des pl. xl. (1892) 454 = **Schoepfia**, Schreb. (Olin.).
grandifolium, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 454 = *S. grandifolia*, Baill.

CHORISTYLIS, Harv. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 524.
shirensis, Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 13. — Reg. Nyass.
virescens, Baker f. l. c. — Reg. Nyass.

CHORIZANTHE, R. Br. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 524.
Andersoni, Parry, in Proc. Davenp. Acad. v. (1889) 176. — Am. bor. occ.
densa, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 496 et 499. — Chili.
deserticola, Phil. l. c. 298. — Chili.
Douglasii, Parry, in Proc. Davenp. Acad. v. (1889) 176 = *Douglasii*, Benth.?
fasciculata, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 497. — Chili.
flava, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 202. — Calif.

CHORIZANTHE : —

humilis, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 495. — Chili.
illapelina, Phil. l. c. 497. — Chili.
insignis, Curran, in Bull. Calif. Acad. i. (1885) 275. — Calif.
intricata, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 495. — Chili.
mutabilis, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 203. — Calif.
Nortoni, Greene, Pittonia, ii. (July 1891) 164. — Calif.
parviflora, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 494. — Chili.
pauciflora, Phil. l. c. 495. — Chili.
pulchella, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 203. — Calif.
robusta, Parry, in Proc. Davenp. Acad. v. (1889) 176. — Am. bor. occ.
tenuis, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 499. — Chili.
Vaseyi, Parry et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 64 t. 10. — Calif.
viridis, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 498. — Chili.
Vortriedei, T. S. Brandeg. in Zoë, iv. (1893) 158. — Calif.

CHOROZEMA, Sm. = **Chorizema**, Labill. (Legumin.).
Lowii ×, Hort. ex Rev. hort. Belge, xx. (1892) 265 cum ic. — Hybr. artef.

CHRISTOPHORIANA, Burm. Afr. dec. (1738) 145-7 t. 51, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) l. = **Knowltonia**, Salisb. (Ranuncul.).
capensis, *daucifolia*, *gracilis*, *hirsuta*, *vesicatoria*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) l. = *homonyma omnia* *Knowltoniae*.
rotundifolia, Kuntze, l. c. 931 = *K. rotundifolia*, Huth.

CHROSPERMA, Rafin. = **Zygadenus**, Michx. (Liliac.).
muscaetoxicum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 708 = *Z. muscaetoxicum*, Regel.

CHRYSACTINIA, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 525.
pinnata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 153. — Mexic.
truncata, S. Wats. l. c. — Mexic.

CHRYSAMPHORA, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 191 = **Darlingtonia**, Torr. (Sarracen.)
californica, Greene, l. c. = *D. californica*, Torr.

CHRYSANTHELLUM, Rich. (Compos.). — Ind. Kew. i. 525.
americanum, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 101 = *procumbens*, Rich.

CHRYSANTHEMUM, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 526.
achilleifolium, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 200 = *achilleaefolium*, DC.
arassanicum, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 372. — Turkest.
canariense, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 146 (= *Preauxia canariensis*, Sch. Bip.). — Ins. Canar.
Clausonis, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 463. — Algeria.
crithmifolium, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 146 = *crithmifolium*, Brouss.
Decaisneanum, N. E. Br. in Kew Bull. ii. (1888) 98. — Japon.
Dugourii, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 146 (= *Preauxia Dugourii*, C. Bolle). — Ins. Canar.
filifolium, Christ, l. c. 168 (= *Monoptera filifolia*, Sch. Bip.). — Ins. Canar.
Gayanum, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 466 = *Pyrethrum Gayanum*, Coss. et Durieu.
gloriosum, Hort. ex Gard. Chron. (1886) ii. 749. — Form. hort.

CHRYSANTHEMUM : —

- grandiflorum, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 464 (= *Balsamita grandiflora*, Desf.). — Afr. bor.
huronense, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 327 = *Tanacetum huronense*, Nutt.
jacobaeifolium, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 168 (= *Preauxia jacobaeifolia*, Sch. Bip.). — Ins. Canar.
macrocarpum, Coss. et Kral. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 460. — Afr. bor.
Marschallii, Aschers. ex O. Hoffm. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 373 (= *Pyrethrum roseum*, Bieb.). — As. occ.
ochroleucum, C. Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 244 = *ochroleucum*, Masf.
Pervallarii, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 168 = *Perralderii*, Sch. Bip.
richteroides, Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 86. — Turkest.
tatsienense, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 72. — China.
tenuissimum, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 123 (= *Pyrethrum tenuissimum*, Trautv.). — Turkest.
Tchihatcheffii, Hort. ex Kew Bull. (1893) Append. i. 6 (= *Pyrethrum Tchihatchewi*, Hort.). — Oriens?
trichophyllum, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 202 = *Tanacetum trichophyllum*, Regel et Schmalh.
Walteri, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 123 t. 3 fig. 3. — Turkest.
Webbii, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 168 = *Webbii*, Masf.

CHRYSOBALANUS, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 527.
Stuhlmannii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 191. — Afr. or.

CHRYSOCHLAMYS, Poepp. et Endl. (Guttifer.). — Ind. Kew. i. 528.
guatemalticana, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 26. — Guatem.

CHRYSOCOME, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 446 = **Chrysocoma**, Linn. (Compos.).

CHRYSOGLOSSUM, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 529.
assamicum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 784; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2063. — Assam.
erraticum, Hook. f. fl. cc. 784; et t. 2062. — Reg. Himal.
macrophyllum, King et Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 335. — Penins. Mal.
maculatum, Hook. f. fl. cc. 784; et t. 2064. — Zeylan.

CHRYSOMA, Nutt. = **Solidago**, Vaill. (Compos.).
arborescens, Greene, in Erythea, iii. (1895) 10 = *Bigelowia arborescens*, A. Gray.
brachylepis, Greene, l. c. 12 = *Big. brachylepis*, A. Gray.
Cooperi, Greene, l. c. = *Big. Cooperi*, A. Gray.
cuneata, Greene, l. c. 11 = *Aplopappus cuneatus*, A. Gray.
diffusa, Greene, l. c. 10 = *Bigelowia diffusa*, A. Gray.
domingensis, Greene, l. c. = *Gundlachia dominicensis*, A. Gray.
ericoides, Greene, l. c. 11 = *Aplopappus ericoides*, DC.
laricifolia, Greene, l. c. 14 = *Apl. laricifolius*, A. Gray.
nana, Greene, l. c. 10 = *Apl. nanus*, Eaton.
Palmeri, Greene, l. c. 12 = *Apl. Palmeri*, A. Gray.
paniculata, Greene, l. c. 12 = *Bigelowia paniculata*, A. Gray.
Parishii, Greene, l. c. 10 = *Big. Parishii*, Greene.
pauciflosculosa, Greene, l. c. 8 = *Sol. pauciflosculosa*, Michx.
pinifolia, Greene, l. c. 12 = *Aplopappus pinifolius*, A. Gray.
teretifolia, Greene, l. c. 12 = *Bigelowia teretifolia*, A. Gray.

CHRYSOPHYLLUM, Linn. (Sapot.). — Ind. Kew. i. 529.
alnifolium, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 522. — Guiana gall.
Balansae, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 901. — N. Caled.
cinereum, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 522. — Angola.
Deplanchei, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 899. — N. Caled.
dioicum, Koorders et Valetton, in Mededeel. s'Lands Plantent. n. xi. Bijdr. n. i. (1894) 131. — Java.
elegans, Raunkjær ex Warm. in Vid. Medd. naturh. Foren. (1889) 9. — Bras.
gonocarpum, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 523 (= *Sapota gonocarpa*, Mart. et Eckl. — Bras.
glaucescens, Engl. l. c. 521. — Bras.
intermedium, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 898. — N. Caled.
lissophyllum, Pierre, ex Baill. l. c. 903. — N. Caled.
longipes, Baill. l. c. 900. — N. Caled.
macrocarpum, Baill. l. c. 901. — N. Caled.
marginatum, Radlk. in Act. Congr. bot. Anvers (1887) 170 (= *Myrsine marginata*, Hook. et Arn.). — Bras.
Melinoni, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 521. — Guian. gall.
Msolo, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44 et 52; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 306 t. 37. — Afr. trop. or.
papuanicum, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 30 = *Beccariella papuanica*, Pierre.
polynesium, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 277. — Ins. Hawai.
pyriforme, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 899 (= *Epiluma pyriformis*, Baill.). — N. Caled.
reticulatum, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 522. — Bras.
Stuhlmannii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 306. — Afr. trop. or.
Welwitschii, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 521. — Angola.

CHRYSOPOGON, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 530.
minor, Vasey, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 460 nomen. — Mexic.
verticillatus, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 899 = *A. Gryllus*, Linn.
villosulis, Vidal, Revis. pl. vasc. Filip. (1886) 291 = *violascens*, Irin.

CHRYSOPSIS, Ell. (Compos.). — Ind. Kew. i. 530.
Berlandieri, Greene, in Erythea, ii. (1894) 96 = *villosa*, DC.
caespitosa, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 694 [non Nutt.]. — Utah.
columbiana, Greene, in Erythea, ii. (1894) 95. — Am. bor. occ.
Nuttallii, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 316. — Am. bor.
pilosa, Britton, l. c. = *gossypina*, Nutt.
pumila, Greene, in Erythea, ii. (1894) 95. — Colorado.
Rutteri, Greene, l. c. 96 = *villosa*, DC.
rudis, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 174. — Calif.
stenophylla, Greene, in Erythea ii. (1894) 96 = *villosa*, DC.
viscida, Greene, l. c. 105 = *villosa*, DC.

CHRYSOSPERMA, Rafin. = **Zygadenus**, Michx. (Liliac.).
muscatotoxicum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 703 = *Z. muscatotoxicum*, Regel.

CHRYSOSPLENium, Tourn. ex Linn. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 531.
aomorense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 103. — Japon.
aomorense, Tokubuchi, ex Makino, in Tokio Bot. Mag. ix. (1895) 334 nomen (an sp. praec.?). — Japon.
Calcitrapa, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris. Sér. VIII. ii. (1890) 104. — Japon.

CHRYSOSPLENium : —

ciliatum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 102; et in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 108 t. 30. — China.
corrugatum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 102 = *costulatum*, Franch.
costulatum, Franch. l. c. 101. — Japon.
crenulatum, Franch. l. c. 102. — Japon.
gracile, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 234. — China.
Henryi, Franch. l. c. Sér. III. ii. (1890) 112 t. 4b; et in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 102. — China.
macrophyllum, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1744. — China.
microspermum, Franch. in Nouv. Mém. Mus. Paris, Sér. III. ii. (1890) 109; et in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 162. — China.
nodulosum, Franch. l. c. Sér. VIII. ii. (1890) 103 = *costulatum*, Franch.
nodulosum, Tokubuchi, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 334 nomen (an sp. praec.?). — Japon.
pumilum, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 249. — China.
shiobarense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 104. — Japon.
sibericum, Stephen, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. ii. (1890) 107 in syn. = *alternifolium*, Linn.
stamineum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 103. — Japon.
tian-schanicum, Krassn. in Script. Hort. bot. Univ. Petrop. ii. i. (1887-88) 16. — China.
tosaense, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 52. — Japon.
villosum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 305. — China.

CHRYSOTHAMNUS, Nutt. = **Bigelowia**, DC. (Compos.).
albidus, Greene, in Erythea, iii. (1895) 107 = *B. albidus*, M. E. Jones.
Bigelovii, Greene, l. c. 112 = *B. Bigelovii*, A. Gray.
Bloomeri, Greene, l. c. 115 = *Aplopappus Bloomeri*, A. Gray.
Bolanderi, Greene, l. c. 111 = *B. Bolanderi*, A. Gray.
californicus, Greene, l. c. = *B. dracunculoides*, DC.
ceruminosus, Greene, l. c. 94 = *B. ceruminosa*, A. Gray.
elegans, Greene, l. c. — Colorado.
frigidus, Greene, l. c. 112. — Am. bor. occ.
graveolens, Greene, l. c. 108 = *B. dracunculoides*, DC.
Greenei, Greene, l. c. 94 = *B. Greenei*, A. Gray.
Howardii, Greene, l. c. 113 = *B. Howardii*, A. Gray.
juncus, Greene, l. c. 113 = *B. juncea*, Greene.
leiospermus, Greene, l. c. = *B. leiosperma*, A. Gray.
mohavensis, Greene, l. c. = *B. mohavensis*, Greene.
nevadensis, Greene, l. c. 114 = *B. nevadensis*, A. Gray.
Parryi, Greene, l. c. 113 = *B. Parryi*, A. Gray.
puberulus, Greene, l. c. 93 = *B. viscidiflora*, DC. var.
pulchellus, Greene, l. c. 107 = *B. pulchella*, A. Gray.
trichophyllum, Greene, l. c. 94 = *B. viscidiflora*, DC.
Vaseyi, Greene, l. c. 96 = *B. Vaseyi*, A. Gray.

CHRYSOXYLON, Wedd. = **Pogonopus**, Klotzsch (Rubiace.).
speciosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *P. speciosus*, Schau.
tubulosum, Kuntze, l. c. = *P. tubulosus*, Schau.

CHUPALON, Adans. = **Thibaudia**, Ruiz et Pav. (Vaccin.).
acuminatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 383 = *Cavendishia acuminata*, Benth.
alatum, Kuntze, l. c. 384 (= *Proclesia alata*, Klotzsch). — Peruvia.
alnifolium, Kuntze, l. c. (= *Pr. alnifolia*, Klotzsch). — Venezuela.
Benthamianum, Kuntze, l. c. = *Cavendishia acuminata*, Benth.

CHUPALON : —

- bracteatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 383. (= *Proclesia bracteata*, Klotzsch). — Peruvia.
capitatum, Kuntze, l. c. 384 = *Cavendishia nobilis*, Lindl.
complectens, Kuntze, l. c. 383 = *Cav. complectens*, Hemsl.
cordatum, Kuntze, l. c. 384 (= *Proclesia cordata*, Klotzsch). — Venezuela.
cordifolium, Kuntze, l. c. (= *Pr. cordifolia*, Klotzsch). — N. Granat.
crassifolium, Kuntze, l. c. 383 = *Cavendishia crassifolia*, Hemsl.
Endresii, Kuntze, l. c. = *Cav. Endresii*, Hemsl.
formosum, Kuntze, l. c. = *Psammisia formosa*, Klotzsch.
guianense, Kuntze, l. c. 384 = *Ps. guianensis*, Klotzsch. — Ecuador.
Hartwegianum, Kuntze, l. c. (= *Proclesia Hartwegiana*, Klotzsch).
latifolium, Kuntze, l. c. 383 = *Cavendishia latifolia*, Hemsl.
laurifolium, Kuntze, l. c. = *Cav. laurifolia*, Benth. et Hook. f.
leucostomum, Kuntze, l. c. 384 = *Psammisia leucostoma*, Benth.
melastomodes, Kuntze, l. c. 383 = *Cavendishia melastomoides*, Benth. et Hook. f.
nobilis, Kuntze, l. c. 384 = *Cav. nobilis*, Lindl.
penduliflorum, Kuntze, l. c. 383 = *Psammisia penduliflora*, Klotzsch.
pseudopubescent, Kuntze, l. c. 384 (= *Proclesia Pseudopubescent*, Klotzsch). — N. Granat.
pubescens, Kuntze, l. c. 383 = *Cavendishia pubescens*, Hemsl.
Quereme, Kuntze, l. c. 384 = *Cav. Quereme*, Benth. et Hook. f.
scabriusculum, Kuntze, l. c. (= *Proclesia scabriuscula*, Klotzsch). — Ecuador.
splendens, Kuntze, l. c. (= *Pr. splendens*, Klotzsch). — N. Granat.
strobiliferum, Kuntze, l. c. (= *Pr. strobilifera*, Klotzsch). — N. Granat.
tarapotanum, Kuntze, l. c. = *Cavendishia tarapotana*, Benth. et Hook. f.
veraguense, Kuntze, l. c. 383 = *Cav. veraguensis*, Hemsl.
Warscewiczii, Kuntze, l. c. = *Cav. Warscewiczii*, Hemsl.

- CHUQUIRAGA**, Juss. (Compos.). — Ind. Kew. i. 532.
alpestris, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, iv. (1894) 20 t. 5. (Chuquiragua). — Bras.
chapadensis, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 389. — Bras.
ferox, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 266 (Chuquiragua) (= *Flotovia ferox*, Wedd.). — Reg. Andin.
glabra, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 30 (Chuquiragua). — Chili.
incana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 829. — Chili.
juniperina, Phil. l. c. 830. — Chili.
retinens, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 390. — Bras.

- CHUSQUEA**, Kunth (Gramin.). — Ind. Kew. i. 532.
Caamanoi, Sodiro, Gram. Ecuat. (Anal. Univ. Quito 1889) 11 nomen. — Ecuad.
Maurofernandeziana, Pitt. et Hack. in Anal. Inst. fis.-geogr. nac. S. José (1891) sep. (Viajo valle R. Grande de Terraba) 15 nomen. — Costarica
quitensis, Sodiro, Gram. Ecuat. (Anal. Univ. Quito, 1889) 11 nomen. — Ecuad.
Spencei, Ernst, in Rev. cient. mens. Univers. centr. Venez. i. (1887) 132. — Venez.

- CHYMSYDIA**, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 235; et Prodr. fl. Colch. (1895) 110, **UMBEL-LIFERA**.
agasylloides, Alboff, ll. cc. — Reg. Cauc.

- CHYTRACULIA**, P. Br. = **Calypttrantes**, Sw. (Myrtac.)
affinis, *anceps*, *aromatica*, *axillaris*, *bimarginata*, *bipennis*, *Blanchetiana*, *brasiliensis*, *bullata*, *can-*

CHYTRACULIA : —

- data*, *cephalantha*, *clusiaefolia*, *concinna*, *cordata*, *costaricensis*, *cubensis*, *cuprea*, *cuspidata*, *densiflora*, *dichotoma*, *eripoda*, *fasciculata*, *fastigiata*, *Forsteri*, *glomerata*, *grandifolia*, *Karwinskyana*, *lanceolata*, *Langsdorffii*, *Lindeniana*, *longifolia*, *loranthifolia*, *lucida*, *macrophylla*, *Martiusiana*, *maschalantha*, *melanoclada*, *multiflora*, *mutabilis*, *nigricans*, *Nummularia*, *obscura*, *obversa*, *Otonis*, *ovalifolia*, *ovata*, *paniculata*, *pauciflora*, *platyphylla*, *Poeppigiana*, *Pohl-iana*, *polyantha*, *pteropoda*, *pulchella*, *Regeliana*, *rigida*, *rufa*, *Ruiziana*, *Schiedeana*, *Schlechtendal-iana*, *scoparia*, *Spruceana*, *strigipes*, *tetraptera*, *Thomasiana*, *tuberculata*, *Tussaceana*, *variabilis*, *Widgreniana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 238 = *homonyma omnia generis Calyptrantes*.
arboorea, Kuntze, l. c. = *Cal. Chytraculia*, Sw.
Bergiana, Kuntze, l. c. (= *Mitranthes Langsdorffii*, Berg). — Bras.
Browneana, Kuntze, l. c. (= *M. Browniana*, Berg). — Bras.
eugenioides, Kuntze, l. c. = *Cal. eugenioides*, Camb.
Gardneriana, Kuntze, l. c. (= *Mitranthes Gardneriana*, Berg). — Bras.
grammica, Kuntze, l. c. = *Cal. musciflora*, Berg.
pendula, Kuntze, l. c. = *Cal. Chytraculia*, Sw.
Riedeliana, Kuntze, l. c. (= *Mitranthes Riedeliana*, Berg). — Bras.
Sartoriana, Kuntze, l. c. (= *M. Sartoriana*, Berg). — Mexic.
Selloana, Kuntze, l. c. (= *M. ovalifolia*, Berg). — Bras.
Syzygium, Kuntze, l. c. = *Cal. Syzygium*, Sw.

- CHYTRANTHUS**, Hook. f. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 533.
setosus, Radlk. in Sitz. Math. phys. Akad. Muench. xx. (1890) 232 et 240. — Afr. trop. occ.

- CICCA**, Adans. = **Julocroton**, Mart. (Euphorb.).
Ackermanniana, *argentea*, *conspurcata*, *decaloba*, *dovato-phylla*, *fuscescens*, *Gardneri*, *geraensis*, *hondensis*, *humilis*, *lanceolata*, *microcalyx*, *montevideensis*, *nervosa*, *peruviana*, *pycnophylla*, *Riedeliana*, *solanacea*, *tri-quetra*, *verbascifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 595 = *homonyma omnia Julocrotonis*.

- CICHLANTHUS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 253 = **Loranthus**, Linn.
atropurpureus, Van Tiegh. l. c. = *L. atropurpureus*, Blume.
chinensis, Van Tiegh. l. c. = *L. chinensis*, DC.
chrysanthus, Van Tiegh. l. c. = *L. chrysanthus*, Blume.
ferrugineus, Van Tiegh. l. c. = *L. ferrugineus*, Roxb.
fuscus, Van Tiegh. l. c. = *L. fuscus*, Blume.
Jadoriki, Van Tiegh. l. c. = *L. Jadoriki*, Sieb.
lepidotus, Van Tiegh. l. c. = *L. lepidotus*, Blume.
philippinensis, Van Tiegh. l. c. = *L. philippinen-sis*, Cham. et Schlecht.
pulverulentus, Van Tiegh. l. c. = *L. pulverulentus*, Wall.
repandus, Van Tiegh. l. c. = *L. repandus*, Blume.
Schultesii, Van Tiegh. l. c. = *L. Schultesii*, Blume.
Scurrula, Van Tiegh. l. c. = *L. Scurrula*, Linn.
umbellifer, Van Tiegh. l. c. = *L. umbellifer*, Schult.

- CICHORIUM**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 534.
balearicum, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 311. — Ins. Balear.

- CICUTA**, [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 534.
californica, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 271 (non A. Gray) = *Oenanthe californica*, S. Wats.
linearifolia, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 415 (= *Prionosciadium linearifolium*, Coult. et Rose). — Mexic.
occidentalis, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 7. — Calif.
pumila, F. Behm, in Bot. Notiz. (1887) 180. — Scand.
purpurata, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 8. — Am. bor. occ.
vagans, Greene, l. c. 9. — Am. bor. occ.

- CICUTARIA**, Mill. = **Molopospermum**, Koch (Umbellif.).
peloponnesiaca, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 266 = *M. cicutarium*, DC.

- CIENFUEGOSIA**, Cav. = **Fugosia**, Juss. (Malvac.).
anomala, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 2 = *Gossypium anomalum*, Wawra et Peyr.
argentina, Gürke, in Mart. Fl. Bras. xii. m. (1892) 579. — Reg. Argent.
pentaphylla, K. Schum, in Bot. Jahrb. x. (1889) 48. — Afr. austro-occ. extratrop.
Riedelii, Gürke, in Mart. Fl. Bras. vii. m. (1892) 576. — Bras.
tripartita, Gürke, l. c. 578 = *Redoutea tripartita*, H. B. et K.

- CIMICIFUGA**, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 535.
calthaefolia, Maxim. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1746. — China.
dahurica, Huth, in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 316 (= *Actinospora dahurica*, Turcz.). — As. centr.

- CINERARIA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 537.
albicans, N. E. Br. in Gard. Chron. (1895) i. 39. — Afr. austr.
Anampoza, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 496 = *Senecio Anampoza*, Baker.
arnautorum, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. 163. — Bulgar.
Aspasia, Hort. ex Gard. Chron. (1888) i. 799 nomen. — Form. hort.
aurita, Hort. ex Garden, xxxviii. (1890) 252 t. 770 = *lanata*, Curtis.
bosniaca, G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 163. — Bosnia.
Coincyi, Willd. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 86 (= *Senecio Coincyi*, Rouy). — Hisp.
Eminii, Aschers. ex Schweinf. in Sitzb. Ges. naturf. Fr. Berl. (1892) 173. — Afr. trop.
flatnitzensis, Pacher, Nachtr. Fl. Karnt. (1894) 59. — Carinthia.
hygrophila, Klatt, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 299 (= *Senecio hygrophilus*, Klatt). — Madag.
kilimandscharica, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 439. — Afr. trop. or.
seminuda, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 438. — Afr. austro-occ. extratrop.

- CINNA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 539.
miliacea, Griseb. ex Fourn. Gramin. Mexic. 1881. (1886) 91 in syn. — Mexic.

- CINNAMOMUM**, [Tourn.] Linn. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 539.
Cinnamomum, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 94 = *zeylanicum*, Nes.
gracile, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 134. — Deccan.
macrocarpum, Hook. f. l. c. 133. — Canara.
Mercadoi, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 224. — Ins. Philip.
mollissimum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 131. Penang.
Oliveri, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. v. (1892) 24. — Austral.

- CINNASTRUM**, Fourn. = **Deyeuxia**, Clar. (Gramin.).
miliaceum, Fourn. Gramin. Mexic. 1881. (1886) 91 = *Cinna miliacea*, Griseb.
poaeforme, Fourn. l. c. = *D. poaeformis*, H. B. et K.

- CIRCINUS**, Medic. = **Hymenocarpos**, Savi (Legumin.).
circinatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 171 = *H. circinnatus*, Willd.

- CIRRHOPETALUM**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 540.

CIRRHOPE TALUM : —

- Amesianum, Rolfe, in *Lindenian*, vii. (1891) 55 t. 314 — Ind. bat.
- Andersoni, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 777; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2055. — Reg. Himal.
- aureum, Hook. f. *Il. cc.* 777; et sub t. 2056; et t. 2057 b. — Malabar.
- Blepharistes, Hook. f. l. c. 779 (= *Bolbophyllum Blepharistes*, Reichb. f.). — Ind. or.
- brevipes, Hook. f. l. c. 777; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2056. — Reg. Himal.
- Brienianum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 62. — Borneo.
- Collettianum, Hemsl. ex Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) t. 20. sphalm. = seq.
- Collettii, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 131 t. 20; et in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 773. — Burma.
- compactum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 281. — Tenass.
- concinnum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 190; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2060b. — Penins. Mal.
- Dyerianum, King et Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 335 = *pumilum*, Hook. f. *elatum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 775. — Reg. Himal.
- elegantulum, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1891) i. 552; et in *Kew Bull.* (1892) App. 23. — Ind. or.
- Gamblei, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 778; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2058. — Reg. Neilgherr.
- guttulatum, Hook. f. l. c. 776. — Reg. Himal.
- gracillimum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 34. — Burma?
- japonicum, Makino, *Illustr. Fl. of Japon* (1891) t. 42. — Japon.
- Layardi, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 210. — N. Caled.
- Lendyanum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 70 (= *Bolbophyllum Lendyanum*, Reichb. f.). — Hab.?
- Mastersianum, Rolfe, in *Lindenian*, vi. (1890) 33 t. 255. — Ind. bat.
- mundulum, Hort. Bull. ex *Gard. Chron.* (1891) i. 676. — As. trop.
- mysorensis, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 34. — Ind. or. austr.
- nodosum, Rolfe, l. c. 35. — Ind. or.
- parvulum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 778; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2060a. — Reg. Himal.
- Peyerianum, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 485. — Sumatra.
- planibulbe, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1893) 364. — Penins. Mal.
- pulchrum, N. E. Br. in *Illustr. Hort.* xxxiii. (1886) 139 t. 608; et in *Lindenian*, iv. (1888) 45 t. 145. — Ins. Halmahera.
- Restrepia, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1893) 365. — Penins. Mal.
- Rothschildianum, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1895) ii. 608 fig. 102. — Hab.?
- sarcophyllum, King et Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 335. — Ind. or.
- setiferum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 35. — Reg. Himal.
- strangularium, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 186 et 214; et ex *Gartenfl.* xxxvii. (1888) 37 (= an *C. pulchrum*, Rolfe?). — Hab.?
- taeniphyllum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 786. — Tenass.
- Thomsoni, Hook. f. l. c. 786; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2059. — Reg. Neilgherr.
- umbellatum, Frappier, ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 176 (*Cirropetalum*) = *Thouarsii*, Lindl.
- viridiflorum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 179; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2061. — Reg. Himal.
- Wendlandianum, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1891) i. 612; et in *Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 5. (1892) 79 t. 243 fig. 1-5. — Ind. or.
- Whiteanum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 7. — Ins. Molucc.

CIRSIIUM, [Tourn.] Adans. = Cnicus, Tourn. (Compos.).

- albanum, Wettst. in *Luerss. Bibl. Bot. Heft* xxvi. (1892) 71 t. 5. fig. 24 = *Cirsium ligulare*, Boiss.
- Albowlanum, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 153; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 19. — Reg. Cauc.
- aleutrense, Porta, ex Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 64. — Austria.
- albidum, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1888) 53, (sep.) ex Nym. *Consp. Fl. Eur.* ii. I. 180. — Bulg.
- armatum, Velen. *Il. cc.* 52; et 180. — Bulg.
- auriculatum, G. Camus, ex Belèze, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 503 = *Cn. pratensis*, Willd.
- balcaricum, Porta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 309. — Ins. Balear.
- balcaricum, Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886) 20 in obs. = *crinitum*, Boiss.
- Benzii, Murr. in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1888) 205; (1893) 177; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 95. — Tirol.
- Boulayi, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 106. — Gall.
- Caput-Medusae, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 10. — Reg. Cauc.
- Castriferrei, Borbas, *Enum. pl. Castrif.* (1889) 195. — Hung.
- chlorocomos, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1893) 154; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 14. — Reg. Cauc.
- costaricensis, Klatt, ex Th. Dur. et Piit. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 214. — Costarica.
- czepeliense, Herb. Rouy, ex G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 81 in obs. — Hung.
- elbrusense, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 16. — Reg. Cauc.
- erisihalooides, Murr. in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1893) 178; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1894) 95. — Tirol.
- extraneum, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1242. — Austria.
- Fabium, Porta, ex Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 63. — Austria.
- finissimum, Rota, ex Rodegher, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 519 nomen. — Italia.
- foliosum, Rhiner, in *Verh. zool., bot. Ges. Wien*, xxxvii. (1887) *Sitzb.* 72. — Helv. Carinthia.
- galaticum, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 467 = *Sintenisii*, Freyn.
- Galissierianum, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 104 et 107 — Gall.
- Golleri, Huter, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* (1895) 399. — Tirol.
- Greneri, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 107 in obs. — Gall.
- Grecescui, Rouy, l. c. xxxvii. (1890) 164. — Eur. or.
- Halacsyi, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxx. (1892) 63. — Maced.
- Haynaldi, Borbas, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 250; G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1202. — Hung.
- Heldreichii, Halaczky, l. c. xl. (1890) 114. — Graecia.
- horridum, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxxiii. (1895) 28. — Epiria.
- Jouffroyi, Neyra et G. Camus, in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. ii. (1893) 41. — Gallia.
- Kheki, Murr. in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1893) 117; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 95. — Tirol.
- Kusnezowianum, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 155; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 16. — Reg. Cauc.
- Lamottei, Neyra et G. Camus, in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. ii. (1893) 40. — Gallia.
- Liebmanni, Sch. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128 in syn. — Mexic.
- Lofhae, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 15. — Reg. Cauc.
- lokense, Conrath et Freyn, ex Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 468. — Armenia.
- macedonicum, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxx. (1892) 64; et xxxii. (1894). — Maced.

CIRSIIUM : —

- Mailhoi, Giraudias, in *Bull. Assoc. pyrén. éch. pl.* i. (1891), ex *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) *Bibl.* 175. — Pyren.
- Morrisii, Bicknell, in *Malpighia*, viii. (1894) 392. — Italia.
- Neyrae, G. Camus, in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. ii. (1893) 41. — Gallia.
- Noli-tangere, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 11. — Reg. Cauc.
- orizabense, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128 in syn. — Mexic.
- paniculatum, Porta, in *Atti Accad. Agiati*, ix. (1891) 38; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 104. — Hisp.
- persimile, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1244. — Austria.
- pindicolum, Hausskn. in *Nym. Consp. Suppl.* II. i. (1889) 181; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge* vii. (1895) 39. — Graecia.
- pisidium, Wettst. in *Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien*, xcvi. 1889 (1890) 370 t. 3 fig. 9-12. — As. Min.
- Przybylskii, Eichenfeld, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 377. — Stiria.
- pugnax, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 12. — Reg. Cauc.
- pulchrum, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 81. — Gallia.
- regense, Sch. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128. — Mexic.
- Sintenisii, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 466. — As. Min.
- Spitzneri, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxxii. (1894) 66. — Maced.
- Stoderianum, Dürrenberger, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 410. — Austria.
- Stonium, Porta, ex Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 63. — Austria.
- Straussianum, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, ix (1891) 18. — Persia.
- subcanum, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1244. — Austria.
- suberisithales, G. Beck, l. c. 1246. — Austria.
- submedium, Hy, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. App. I. (1895) 13. — Gallia.
- subrivarum, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1244. — Austria.
- suspiciosum, G. Beck, l. c. 1243. — Austria.
- svaneticum, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 20. — Reg. Cauc.
- Treuinfelsianum, Ausserdorfer, in *Herb. Norm.*, sched. ad cent. xxxi. (1894) 18; et ex Murr. in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 100. — Tyrol.
- triste, A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 62. — Austria.
- tymphaeum, Hausskn. in *Nym. Consp. Suppl.* ii. I. 181; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge* vii. (1895) 38. — Graecia.
- urbanum, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1242. — Austria.
- valentinum, Porta, in *Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 38. — Hisp.
- Velenowskyi, Vand. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889. (1890) ii. 268. — Eur. or.
- vindobonense, Halacsy, in *Bot. Centralbl.* xxxii. (1887) 381. — Austria.
- viride, Velen. ex Nym. *Consp. Suppl.* ii. I. 181; Bornm. in *Bot. Centralbl.* xxxvi. (1888) 88. — Bulg.
- Waisbeckeri, Simonk. in *Köszeg oidek. edényes*, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 381. — Hung.
- Willkommianum, « Porta et Rigo » ex Batt. et Trab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 344 = seq.
- Willkommianum, Porta, ex Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886) 19; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 309. — Ins. Balear.

CISSUS, Linn. = Vitis, Tourn. (Ampelid.).

- acris, Planch. in *DC. Monog. Phan.* v. (1887) 576. = *V. acris*, F. Muell.
- acutissima, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 259. — Afr. trop. or.
- adenocaulis, Steud. ex Planch. in *DC. Monog. Phan.* v. (1887) 586. — Afr. trop.
- Agnus-Castus, Planch. l. c. 598. — Zambes.

CISSUS: —

alnifolia, Schweinf. ex Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 577. — Afr. centr. bor.
amboinensis, Zippel, ex Planch. l. c. 448 (= *Tetrastigma amboinensis*, Planch.). — Ins. Amboin.
amplexa, Planch. l. c. 593 = V. *amplexa*, Baker.
andongensis, Planch. l. c. 572 = V. *andongensis*, Welw.
Andraeana, Planch. l. c. 533. — N. Gran.
aralioides, Planch. l. c. 513 = V. *aralioides*, Baker.
aristolochioides, Planch. l. c. 508. — Siam.
aristolochiaefolia, Planch. l. c. 488. — Zambes.
asperifolia, Planch. l. c. 539. — Bras.
Bakeriana, Planch. l. c. 599. — Afr. trop.
Barterii, Planch. l. c. 491 = V. *Barterii*, Baker.
Bauerleni, Planch. l. c. 515. — N. Guin.
bignonioides, Schweinf. ex Planch. l. c. 481 = V. *suberosa*, Planch.
Blanchetiana, Planch. l. c. 556. — Bras.
Bodiniana, Hort. Par., sphalm. ex Planch. l. c. 517 (= *Baudiniana*, Brouss.) = V. *antarctica*, Benth.
Boivinii, Planch. l. c. 498. — Madag.
brachypoda, Planch. l. c. 520 = V. *brachypoda*, F. Muell.
Buchananii, Planch. l. c. 601. — Afr. trop.
bukobensis, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 258. — Afr. trop. or.
Burchellii, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 537 = V. *Burchellii*, Baker.
cactiformis, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 258. — Afr. trop. or.
campestris, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 536 = V. *campestris*, Baker.
canarensis, Planch. l. c. 620 in add. = V. *canarensis*, Dalz.
cerasiformis, Planch. l. c. 621 in add. = V. *cerasiformis*, Teyss. et Binn.
chloroleuca, Planch. l. c. 592 = V. *chloroleuca*, Welw.
chontalensis, Planch. l. c. 624 in add. = V. *chontalensis*, Seem.
chrysadenia, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 39. — Afr. trop. or.
clematidea, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 566 = V. *clematidea*, F. Muell.
coccinea, Mart. ex Planch. l. c. 557. — Bras.
cocciniaefolia, Schweinf. ex Planch. l. c. 674 = V. *palmatifida*, Baker.
congesta, Planch. l. c. 590 = V. *congesta*, Baker.
convolvulacea, Planch. l. c. 501. — Siam.
cornifolia, Planch. l. c. 492 = V. *cornifolia*, Baker.
corylifolia, Planch. l. c. 484 = V. *corylifolia*, Baker.
Crameriana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 241. — Afr. austro-occ. extratrop.
crassifolia, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 508 = V. *crassifolia*, Baker.
crassiuscula, Planch. l. c. 608 = V. *crassiuscula*, Baker.
crinita, Planch. l. c. 581. — Afr. centr. bor.
crotalariaoides, Planch. l. c. 577. — Afr. trop.
cucumerifolia, Planch. l. c. 474. — Afr. trop. or.
curvipoda, Planch. l. c. 573. — Afr. trop. occ.
cuspidata, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 498. — Madag.
cussonioides, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 195. — Natal.
cussoniaefolia, Schweinf. ex Planch. l. c. 395 (= *Ampelocissus cussoniaefolia*, Planch.). — Afr. trop.
debilis, Planch. l. c. 569 = V. *debilis*, Baker.
diffusiflora, Planch. l. c. 496 = V. *diffusiflora*, Baker.
Duparquetii, Planch. l. c. 599. — Zanzib.
egregia, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 259. — Afr. trop. or.
Eminii, Gilg, l. c. — Afr. trop. or.
Erdwenderbergii, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 405 in obs. (= *Ampelocissus Erdwenderbergii*, Planch.). — Mexic.
erythrochlora, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 38. — Afr. trop. or.
farinosa, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 488 = V. *farinosa*, Baker.
Fischeri, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 259. — Afr. trop. or.

CISSUS: —

flavicans, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 591 = V. *flavicans*, Baker.
floribunda, Planch. l. c. 493 = V. *floribunda*, Baker.
Forsteniana, Planch. l. c. 500 = V. *Forsteniana*, Mig.
furcata, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 287. — Bras.
gastropus, Welw. ex Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 583 in syn. = V. *macropus*, Hook.
Gibertii, Planch. l. c. 543 = V. *Gibertii*, Baker.
gigantea, Planch. l. c. 622 in add. = V. *gigantea*, Bedd.
glaberrima, Planch. l. c. 498. — Penang.
glaucoamea, Planch. l. c. 506. — N. Caled.
Goudotii, Planch. l. c. 586. — Madag.
grisea, Planch. l. c. 622 in add. = V. *grisea*, Baker.
Grisebachii, Planch. l. c. 541. — Cuba.
grandifolia, Warb. in Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 199. — Oceania.
hastata, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 502 = V. *hastata*, Mig.
hebecarpa, Hochst. ex Planch. l. c. 606 in syn. = V. *Thonningii*, Baker pr. p.
hederaefolia, Planch. l. c. 514. — Afr. trop. occ.
hexangularis, Thorel, ex Planch. l. c. 511. — Cochinch.
Heyneana, Planch. l. c. 476 = V. *Heyneana*, Wall.
hibiscinus, Delile, ex Planch. l. c. 384 = V. *ipomeaefolia*, Baker.
Hildebrandtii, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 260 t. 17 a-c. — Afr. trop. or.
hispidia, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 623 in add. = V. *hispidia*, Eckl. et Zeyh.
Hochstetteri, Planch. l. c. 480 = V. *Hochstetteri*, Mig.
Hookeri, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 287. — Penins. Mal.
humilis, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 629 in add. = V. *humilis*, N. E. Br.
inaequilaterus, E. Mey. ex Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 44 in syn. = *cuneifolia*, Eckl. et Zeyh.
integrifolia, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 483 = V. *integrifolia*, Baker.
inundata, Planch. l. c. 537 = V. *inundata*, Baker.
jatrophioides, Planch. l. c. 579 = V. *jatrophioides*, Welw.
javalensis, Planch. l. c. 624 in add. = V. *javalensis*, Bull.
karaguensis, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C Beibl. n. 47 (1895) 261. — Afr. trop. or.
kilmandscharica, Gilg, in Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 39. — Afr. trop. or.
Kirkiana, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 601. — Afr. trop. or.
Knitteli, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 260. — Afr. trop. or.
Koehneana, Fred. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Afr. (1889) 22. — Afr. centr. or.
Lentiana, Volk. et Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 260. — Afr. trop. or.
lineata, Warb. in Engl. Bot. Jahrb. xiii. (1891) 370. — Oceania.
Mannii, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 610 = V. *Mannii*, Baker.
maranguensis, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 38. — Afr. trop. or.
meliaefolia, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 558. — Bras.
mexicana, Hort. ex Bull. Soc. Tosc.ortic. (1888) 298 fig. 25 (an *C. mexicana*, Moç. et Sessé?). — Mexic.
microdiptera, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 629 in add. = V. *microdiptera*, Baker.
microdonta, Planch. in DC. l. c. 482 = V. *microdonta*, Baker.
modicoides, Planch. l. c. 503. — Cochinch.
morifolia, Planch. l. c. 478. — Angola.
Muelleri, Planch. l. c. 516. — Austral.
nervosa, Planch. l. c. 564. — N. Guin.
novemfolia, Planch. l. c. 519 = V. *novemfolia*, Wall.
nymphaeifolia, Planch. l. c. 484 = V. *nymphaeifolia*, Welw.
oblonga, Planch. l. c. 517 = V. *oblonga*, Benth.
odontadenia, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 261. — Afr. trop. or.

CISSUS: —

Oliveri, Gilg, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 46 = *Oliveriana*, Gilg.
Oliveriana, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 258. — Afr. trop. or.
oliviformis, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 513. — Sierra-Leone.
opaca, Planch. l. c. 518 = V. *opaca*, F. Muell.
orientalis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 227 in obs. (= *C. orientalis*, Lam.) = V. *arborea*, Linn.
pallida, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 477 = V. *pallida*, Wight et Arn.
palmatifida, Planch. l. c. 473 = V. *palmatifida*, Baker.
paniculata, Planch. l. c. 481 = V. *paniculata*, Balf. f.
pannosa, Planch. l. c. 539 = V. *pannosa*, Baker.
paraguayensis, Planch. l. c. 554. — Parag.
Parkeri, Planch. l. c. 550 = V. *Parkeri*, Baker.
pauciflora, Eckl. et Zeyh. ex Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 44 = *pauciflora*, DC.
pauciflora, Burch. ex Planch. l. c. 469 in syn. (= *Rhoicissus pauciflora*, Planch.). — Afr. austr.
pendula, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 594 = V. *pendula*, Welw.
Planchoniana, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 258. — Afr. trop. or.
Plumervii, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 532. — Ins. S. Doming.
penninervis, Planch. l. c. 520 = V. *penninervis*, F. Muell.
Pohlaii, Planch. l. c. 520 = V. *Pohlaii*, Baker.
polydactyla, Planch. l. c. 560 = V. *polydactyla*, Mig.
praecox, Schweinf. ex Planch. l. c. 492 in syn. = V. *cornifolia*, Baker.
pruriens, Planch. l. c. 595 = V. *pruriens*, Welw.
piscicarpa, Zippel, ex Planch. l. c. 441 = *Tetrastigma piscicarpum*, Planch.
psoralifolia, Planch. l. c. 567 = V. *psoralifolia*, F. Muell.
purpurascens, Zippel, ex Planch. l. c. 500 in syn. = V. *rostrata*, Mig.
Rafflesiae, Korth. ex Planch. l. c. 443 in syn. = V. *Rafflesiae*, Mig.
reticulata, Blume, ex Planch. l. c. 574. — Java.
retivenia, Planch. l. c. 576 = V. *reticulata*, M. Laws.
rhamnoidea, Planch. l. c. 516. — N. Guin.
rheifolia, Planch. l. c. 507. — Cambod.
rostrata, Korth. ex Planch. l. c. 500 = V. *rostrata*, Mig.
Roxburghii, Planch. l. c. 572 = V. *Roxburghii*, Wight et Arn.
Roylei, Hort. Kew. ex Planch. l. c. 451 in obs. (= *Parthenocissus himalayana*, Planch.?). — Reg. Himal.
rubifolia, Planch. l. c. 596 in obs. = V. *pruriens*, Planch.?
rubiginosa, Planch. l. c. 486 = V. *rubiginosa*, Baker.
Saponaria, Planch. l. c. 574 = V. *Saponaria*, Benth.
sarcocephala, Schweinf. ex Planch. l. c. 403 (= *Ampelocissus sarcocephala*, Planch.). — Afr. centr.
scabra, Planch. l. c. 549 = V. *scabra*, Baker.
scabricaulis, Planch. l. c. 543. — Bras.
Schimperi, Hochst. ex Planch. l. c. 589 = V. *oxyphylla*, A. Rich.
Schweinfurthii, Planch. l. c. 591. — Afr. centr. bor.
sciaphila, Gilg, in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 46 nomen; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 258. — Afr. trop. or.
Selloana, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 521 = V. *Selloana*, Baker.
semivirgata, Planch. l. c. 538. — Bras.
serjanioides, Planch. l. c. 588. — Abyss.
serpens, Hochst. ex Planch. l. c. 606 in syn. = V. *Thonningii*, Baker pr. p.
sesquipedalis, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. (1895) 259. — Afr. trop. or.
siamica, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 506. — Siam.
Smithiana, Planch. l. c. 491 = V. *Smithiana*, Baker.
spectabilis, Hochst. ex Planch. l. c. 609 in obs. (= *C. nivea*, Hochst.). — Abyss.
spectabilis, Planch. l. c. 507. — Reg. Himal.
stipulacea, Planch. l. c. 597 = V. *stipulacea*, Baker.

CISSUS : —

- stenoloba*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 578 = *V. stenoloba*, Welw.
sterculifolia, Planch. l. c. 519 = *V. sterculifolia*, F. Muell.
Stuhlmannii, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 260. — Afr. trop. or.
subavenia, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 241. — Cuba.
subciliata, Planch. l. c. 594 = *V. subciliata*, Baker.
suberosa, Planch. l. c. 481 = *V. suberosa*, Baker.
subglaucescens, Planch. l. c. 591. — Reg. Zambes.
subrhomboidea, Planch. l. c. 547 = *V. subrhomboidea*, Baker.
subtetragona, Planch. l. c. 499. — Tonk.
sulcicaulis, Planch. l. c. 547 = *V. sulcicaulis*, Baker.
ternata, Planch. l. c. 558 = *V. ternata*, Baker.
thalictrifolia, Planch. l. c. 560. — Madag.
Thomsoni, Planch. l. c. 565 = *V. Thomsoni*, Lawson.
Thwaitesii, Planch. l. c. 502. — Zeyl.
tiliaefolia, Planch. l. c. 491. — Afr. trop. centr.
Trianae, Planch. l. c. 555. — N. Gran.
tricuspis, Burch. ex Planch. l. c. = *V. tricuspis*, Baker.
trifolia, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 71 = *V. trifolia*, Linn.
Tweediana, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 534. = *V. Tweediana*, Baker.
ukerevensis, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 260. — Afr. trop. or.
ulmifolia, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 552 = *V. ulmifolia*, Baker.
usambarensis, Gilg, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 31 = *Oliveriana*, Gilg.
Viticella, Webb, ex Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 587 in syn. = *V. adenocaulis*, Miq.
Volkenii, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 37. — Afr. trop. or.
Welwitschii, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 489 = *V. Welwitschii*, Baker.
Wightii, Planch. l. c. 478. — Ind. or.
Wrightiana, Planch. l. c. 536. — Cuba.

CLASTOPUS, Bunge = **Vesicaria**, Tourn. (Crucif.).
bicolor, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien, (1886) 33. — Persia.

CLATHROSPERMUM, Planch. (Anonac.) — Ind. Kew. i. 553.
Baillonii, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 70. — Afr. trop. occ.
Heudelotii, S. Elliot, l. c. 71. — Afr. trop. occ.

CLAUSENA, Burm. f. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 553.
Hildebrandtii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 229. — Afr. trop. or.
lenis, Drake, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 276. — Tonk.

CLAVIGA, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 311 sphalm. = **Clavija**, Ruiz et Pav.
cauliflora, Regel, l. c. = *Clavija cauliflora*, Regel.

CLAVIJA, Ruiz et Pav. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 554.
antioquiensis, Radlk. in Math.-Phys. Sitzb. Akad. Muench. xix. (1889) 255. (= *Theophrasta antioquiensis*, Linden). — Venez.
cauliflora, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 696. — N. Granat.
Ernestii, « Hook f. » ex Rev. Hort. (1888) 239 = *Ernstii*, Hook f.
Ernstii, Hook f. in Bot. Mag. (1887) t. 6928. — Venez.
Jelskii, Szyszył. in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 225. — Peruvia.

CLAYTONIA, Gronov. ex Linn. (Portul.). — Ind. Kew. i. 554.
aurantiaca, *brevifolia*, *calycina*, *cuneifolia*, *Linaria*, *mexicana*, *minima*, *napiiformis*, *reflexa*, *sarmentosa*, *spinescens*, *teretifolia*, *trigona*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *homonyma omnia* Talini.

CLAYTONIA : —

- acaulis*, *affinis*, *alba*, *avenaria*, *aurea*, *axilliflora*, *Berteroana*, *cachinalensis*, *caespitosa*, *calycotricha*, *capitata*, *caulescens*, *colchaguensis*, *compacta*, *compressa*, *conferta*, *coquimbensis*, *corymbosa*, *Cumingii*, *demissa*, *denticulata*, *dianthodes*, *diffusa*, *discolor*, *erythrocoma*, *fasciculata*, *Fenzlii*, *ferruginea*, *floribunda*, *frigida*, *Gaudichaudi*, *Gilliesii*, *glomerata*, *graminifolia*, *grandiflora*, *hirtella*, *Landbeckii*, *leucocephala*, *lingulata*, *litoralis*, *longiscapa*, *macilentia*, *megarhiza*, *Meyeniana*, *minutissima*, *modesta*, *mucronulata*, *multicaulis*, *nitida*, *oblongifolia*, *occulta*, *paniculata*, *pilosuscula*, *Poeppigiana*, *polyclados*, *procumbens*, *prostrata*, *ramosissima*, *rupestris*, *Saxifraga*, *sevicea*, *setosa*, *spectabilis*, *spicata*, *splendens*, *tenuifolia*, *tricolor*, *trifida*, *tuberosa*, *umbellata*, *virgata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *homonyma omnia* Calandriniae.
arenicola, Henderson, in Bull. Torrey Bot. Club. xxii. (1895) 49. — Am. bor.
atacamensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *Calandrinia calycina*, Phil.
Barnesii, Kuntze, l. c. 56 = *Cal. Chamissoi*, Barn.
Bonplandiana, Kuntze, l. c. 57 = *Talinum lineare*, R. Br.
Bodini, Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 288. — Texas.
Breueri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *Calandrinia Breueri*, S. Wats.
caffra, Kuntze, l. c. = *Portulaca caffra*, Thunb.
ciliata, Kuntze, l. c. = *Calandrinia ciliata*, DC.
cistiflora, Kuntze, l. c. = *Cal. cistiflora*, Gill.
Collana, Kuntze, l. c. = *Talinum diffusum*, Colla.
densiflora, Kuntze, l. c. = *Calandrinia densiflora*, Barn.
Gayana, Kuntze, l. c. = *Cal. biflora*, Meyen.
Grayana, Kuntze, l. c. = *Cal. nevadensis*, A. Gray.
Hallii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 283. — Calif.
Humboldtiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *Calandrinia acaulis*, H. B. et K.
latifolia, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 15 = *caroliniana*, Michx.
maritima, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *Calandrinia maritima*, Nutt.
Menziesii, Kuntze, l. c. = *Cal. Menziesii*, Torr. et Gray.
mutandra, Kuntze, l. c. 56 = *Cal. calycina*, Phil.
nubigena, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1892) 294. — Calif.
Nuttalliana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *Talinum parviflorum*, Nutt.
parva, Kuntze, l. c. = *Cal. pygmaea*, A. Gray.
parvifolia, Moçino, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 283. — Am. bor.
patens, Kuntze, l. c. 56 = *Talinum patens*, Willd.
peruviana, Kuntze, l. c. 57 = *Calandrinia Phacosperma*, DC.
Philippiana, Kuntze, l. c. = *Cal. densiflora*, Phil.
picta, Kuntze, l. c. = *Cal. arenaria*, Cham.
polycarpodes, Kuntze, l. c. = *Cal. polycarpoides*, Phil.
potentilloides, Kuntze, l. c. = *Cal. potentilloides*, Barn.
pusilla, Kuntze, l. c. = *Cal. pusilla*, Barn.
salsolodes, Kuntze, l. c. = *Cal. salsoloides*, Barn.
saxosa, T. S. Brandeg. in Zöe, iv. (1893) 150. — Calif.
speciosa, Kuntze, l. c. = *Cal. discolor*, Lindl.
tenuis, Kuntze, l. c. = *Talinum gracile*, Colla.
triangularis, Kuntze, l. c. 56 = *T. triangulare*, Willd.
- CLEISOSTOMA**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 555.
andamanicum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 71. — Ins. Andam.
bicuspidatum, Hook. f. l. c. 75. — Himal.
bipunctatum, Hook. f. l. c. 73. — Tenass.
brevipes, Hook. f. l. c., et in Ann. Bot. Gard. Calc. v. l. (1895) 55 t. 82. — Sikkim, Assam.
congesta, F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. xi. l. (1895) 17. — Austral.
cristatum, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 370. — Penins. Mal.

CLEISOSTOMA : —

- firmulm*, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 344. — N. Guin.
Hansemanni, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 254. — N. Guin.
Kunstleri, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2335. — Perak.
marsupiale, Kraenzl. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 34. — N. Guin.
Micholitzii, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 462. —
Nugentii, F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. xi. l. (1895) 17. — Austral.
ramosum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 72. — Reg. Himal.
ringens, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 724. — Ins. Philipp.
tenerum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 73. — Ind. or. — Zeyl.
uteriferum, Hook. f. l. c. 74. — Perak.

CLEISTANTHES, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 607 sphalm. = **Cleistanthus**, Hook. f. (Euphorb.).

CLEISTANTHUS, Hook. f. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 555.
Blancoi, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 234. — Ins. Philipp.
cupreus, Vidal, l. c. 235. — Ins. Philipp.
decurrens, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 278. — Perak.
ellipticus, Hook. f. l. c. 281. — Perak.
gracilis, Hook. f. l. c. 277. — Penins. Mal.
Helferi, Hook. f. l. c. 280. — Tenass.
heterophyllus, Hook. f. l. c. 276. — Malacca.
hirsutulus, Hook. f. l. c. 278. — Perak.
laevis, Hook. f. l. c. 277. — Penins. Mal.
lancifolius, Hook. f. l. c. — Tenass.
macrophyllus, Hook. f. l. c. — Perak.
Maingayi, Hook. f. l. c. 280. — Penins. Mal.
malaccensis, Hook. f. l. c. 277. — Penins. Mal.
membranaceus, Hook. f. l. c. 278. — Perak.
nitidus, Hook. f. l. c. 280. — Penins. Mal.
parvifolius, Hook. f. l. c. 281. — Perak.
pedicellatus, Hook. f. l. c. — Penins. Mal.
podocarpus, Hook. f. l. c. — Perak.
stipulatus, Hook. f. l. c. — Perak.

CLEMATICISSUS, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 422. **AMPELIDEAE**.
angustissima, Planch. l. c. (= *Vitis angustissima*, F. Muell.). — Austral.

CLEMATIS, Dill. ex Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 556.
Addisonii, Britton, ex A. M. Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, ii. (1890) 28. — Virginia.
anemoniflora, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 157 = *florida*, Thunb.
aphylla, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 259. — N. Zel.
atragenoides, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 481. — China.
australis, T. Kirk, Specim. Stud. Handb. N. Zeal. Fl. (1889) 5. — N. Zel.
Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 3. — Bolivia.
Benthiana, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 2. — China.
brevicaudata, Hort. [an DC.?] ex Gard. and For. v. (1892) 739 t. 138. — As.
chrysocoma, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 362. — China.
cochabambensis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 3. — Bolivia.
dasyandra, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 7. — China.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1885) 360. — China occ.
elata, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 20. — Tibet.
Fargesii, Franch. l. c. viii. (1894) 273. — China.
fasciculiflora, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 5. — China.
formosana, Kuntze, in Hook. Icon. pl. xx. (1896) t. 1945. — Ins. Formos.

CLEMATIS : —

- Hendersoni* X, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 160. — Hybr. artef.
Henryi, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1819. — China.
ianthina, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 159. — Reg. Amur.
lancifolia, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 18. — China.
leiocarpa, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1888) t. 1533. — China.
longifoliolata, Kuntze in Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1887) 49 = hexapetala, Linn. f. obscura, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 6. — China.
orientalis, Hort. ex Gartenfl. (1894) 610 = graveolens, Lindl.
ovalifolia, Ito, ex Maxim. in Bull. Acad. Sci. Pétersb. xxxi. (1887) 12. — Japon.
Palmeri, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 118. — Ariz.
Pievoti, Hort. ex Gard. and For. i. (1888) 359 = brevicaudata, DC.
pogonandra, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 8. — China.
Potanini, Maxim. l. c. 9. — China.
Prattii, Hemsl. in Kew Bull. (1892) 82. — China.
pseudoflammula, Schmalh. ex Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 276. — Reg. Cauc.
ranunculoides, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 360. — China occ.
rhodochlora, Éd. André, in Rev. Hortie. lix. (1887) 449. — Japon (vel form. hort.).
Sargentii, Lavallée, ex Gard. and For. i. (1888) 344 = Pitcheri,
Stuhlmannii, Hieron. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 180. — Afr. trop. or.
Suksdorfii, Robins. in A. Gray Syn. Fl. N. Am. i. 1. (1895) 4. — Washingt.
Tashiroi, Maxim. in Bull. Acad. Sci. Pétersb. xxxii. (1888) 477. — Japon.
tosaensis, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1897) 50. nomen. — Japon.
Traversiana, Kuntze, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 50 = hexapetala,
viornoides X. Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. (1890) 42. — Hybr. artef.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 361. — China.

CLEMATOCLETHRA, Maxim. in Act. Hort.

- Petrop. xi. (1889) 36. **TERSTROEMIAACEAE**.
actinidioides, Maxim. l. c. 38. — China.
cordifolia, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 279. — China.
Faberi, Franch. l. c. — China.
Hemsleyi, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 873. — China.
integrifolia, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 38. — China.
lasioclada, Maxim. l. c. — China.
Maximowiczii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 873. — China.
scandens, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 38. — China.
strigillosa, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 280. — China.
tomentella, Franch. l. c. — China.

CLEOME, Linn. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 558.

- arborea*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 128 = *Isomeris arborea*, Nutt.
areysiana, Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 297. — Arabia.
brachystyla, Deflers, in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 39; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 65. — Arabia.
ephemera, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 112. — Calif.
glandulosissima, Gilg in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 184. — Afr. trop. or.
grandifolia, F. Muell. in Syst. Cens. Austral. Pl. Third Suppl. (1886) 3. — Austral.
Hanburyana, Penzig, in Atti Congr. bot. Genova (1893) 330. — Erithrea.
hispidia, Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1888) 346 = *polytricha*, Deflers.

CLEOME : —

- hispidia*, Ehrenb. ex Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 39 = *brachystyla*, Deflers.
Hulletii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 392. — Malaya.
Isomeris, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 200. = *Isomeris arborea*, Nutt.
Luederitziana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. Abhandl. (1888) 51. — Afr. austro-occ. extratrop.
lutea, E. Mey. ex Szyszy. Polypet. Thalam. Rehmann. (1888) 17 = *Polanisia lutea*, Sond.
macedonica, Heldr. ex Nadj, Emp. Ottom. Geogr. bot. (1892) 11 [conf. Oest. Bot. Zeitschr. (1892) 271]. — Maced.
maculata, Szyszy. Polyp. Thalam. Rehmann. (1887) 17 = *Polanisia maculata*, Sond.
melanosperma, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 415. — Mexic.
ovalifolia, Deflers, in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 40. — Afr. trop. or.
platycarpa, Schinz, in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxix. Abhandl. (1888) 50. — Afr. austro-occ. extratrop.
polytricha, Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 41. — Arabia.
potosina, Robins. in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 165. — Mexic.
Schimperi, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 294. — Abyss.
serrulata, Pax, l. c. 293. — Afr. trop. or.
suffruticosa, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. xxix. Abhandl. (1888) 50. — Afr. austro-occ. extratrop.
tenuis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 39. — Calif.
usambarica, Pax, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 14 et 60; et ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 184. — Afr. trop. or.

CLEOMELLA, DC. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 560.

- Palmerana*, M. E. Jones, in Zoé, ii. (1891) 236. — Utah.

CLEOMODENDRON, Pax, in Ber. deutsch. bot. Gesells. ix. (1891) 38; et in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 276. **CAPPARIDACEAE**.

- somalense*, Pax, ll. cc. 33 et 276; et in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 224. — Afr. trop. or.

CLERMONTIA, Gaudich. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 560.

- arborescens*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 242 = *Cyanea arborescens*, Mann.
coerulea, Hillebr. l. c. — Ins. Sandvic.
Gaudichaudii, Hillebr. l. c. 243 = *Delissea clermontioides*, Gaudich.
multiflora, Hillebr. l. c. 242. — Ins. Sandvic.
pallida, Hillebr. l. c. 241. — Ins. Sandvic.
pyrularia, Hillebr. l. c. 243. — Ins. Sandvic.

CLERODENDRON, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. i. 560.

- aggregatum*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 177. — Madag.
alatum, Gürke, l. c. 182. — Afr. trop.
aucubifolium, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 102. — Madag.
Bakeri, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 175. — Congo.
Balfouri, Hort. ex Gartenfl. (1886) 139 in syn. = *Thomsoni*, Balf.
Baronianum, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2241. — Madag.
breviflorum, Ridl. in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 43 (breviflora.). — Ind. or.
Buchholzii, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 176. — Afr. trop. occ.
Buchneri, Gürke, l. c. 172. — Angola, Congo.
Buettneri, Gürke, l. c. 174. — Gabon.
bukobense, Gürke, l. c. 182. — Afr. trop. or.
caeruleum, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 115. — Afr. austr.

CLERODENDRON : —

- cephalanthum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1550; et in Gard. Chron. (1888) i. 652. — Ins. Zanzib.
congense, Baker, in Kew. Bull. (1892) 127 = *Bakeri*, Gürke.
congense, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 65 (congenensis). — Congo.
Dinklagei, Gürke, l. c. xviii. (1894) 175. — Kamerun.
eriphyllum, Gürke, l. c. 178. — Afr. trop. or.
eucalycinum, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2242. — Madag.
Fischeri, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 27; et in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 172. — Afr. trop. or.
formicarum, Gürke, l. c. xviii. (1894) 179. — Afr. trop.
formosanum, Maxim. in Bull. Acad. Sci. Pétersb. xxxi. (1887) 85. — Ins. Formos.
Fortunei, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 259. — China.
fuscum, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 175. — Afr. trop. or.
Godefroyi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 505. — Cochinch.
grandifolium, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 173. — Congo.
Holstii, Gürke, in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 27 nomen. — Afr. trop. or.
Holtzei, F. Muell. in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xxiv. (1891) 75. — Austral.
indicum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 586 = *C. Siphonanthus*, R. Br.
Johnstoni, Oliver, in H. Johnston. Kilim. Exped. Append. (1886) 344, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 346. — Afr. trop. or.
kinabaluense, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 216. — Borneo.
lanceolatum, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 181. — Afr. trop. or.
longipetiolatum, Gürke, l. c. 178. — Ins. Zanzib.
magnificum, Warb. l. c. xiii. (1891) 428. — Oceania.
melanocrater, Gürke, l. c. xviii. (1894) 180. — Afr. centr. or.
micans, Gürke, l. c. 180. — Madag.
minutiflorum, Baker, in Kew Bull. (1894) 150. — Ins. Aldabra.
mirabile, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 513. — Madag.
moupinense, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II, x. (1888) 68 = *Microtaena moupinensis*, Franch.
myricoides, Gürke, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1895) 176 = *myricoides*, R. Br.
myrmecophila, Ridl. in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 42. — Penins. Mal.
natalense, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 183. — Natal.
ovalifolium, Engl., Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 124 sphalm. = ovale, Klotzsch.
pleiosciadium, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 177. — Ins. Zanzib.
polycephalum, Baker, in Kew Bull. (1895) 116. — Lagos.
Poggei, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 181. — Afr. trop.
Preussii, Gürke, l. c. 175. — Kamerun.
pulverulentum, Engl., Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 94 nomen. — Afr. trop. or.
Rumphianum, Bull. Catal. (1887) 9. — Java.
sansibarense, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 181; et ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. (1894) 27 nomen. — Ins. Zanzib.
Schweinfurthii, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 177. — Afr. trop.
serotinum, Hort. ex Dippel, Deutsch. Dendrol. i. (1889) 58 = *trichotomum*, Thunb.
Sieboldii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 505 = *Caryopteris divaricata*, Maxim.
Silvaeanum, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 148. — Ins. S. Thom.
speciosum, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 171. — Angola.
spinescens, Gürke, l. c. 180 = *Cyclonema spinescens*, Oliver.
Stuhlmanni, Gürke, l. c. 173. — Afr. trop. or.

CLERODENDRON : —

subpandurifolium, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 506. — Assam.
sylvaticum, Briq. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1895) 176 = *Cyclonema sylvaticum*, Hochst.
tanganyikense, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 71. — Afr. trop. or.
ternatum, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 205. — Afr. austro-occ. extratrop.
toxicarium, Baker, ex Gürke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 341. — Afr. trop. or.
tripplinerve, Rolfe, in *Bolet. Soc. Brot.* xi. (1893) 87 = *formicarum*, Gürke.
uncinatum, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 206. — Afr. austr. (pars bor.).
Welwitschii, Gürke, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 174. — Angola.

CLETHRA, Gronov. ex Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 562. (Ericac.).
cutervoana, Szyszył, in *Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 227. — Peruvia.
Delavayi, Franch. in *Morot Journ. de Bot.* ix. (1895) 370. — Yunnan.
Fargesii, Franch. l. c. 369. — China.
occidentalis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 389 = *tini-folia*, Sw.
peruviana, Szyszył, in *Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 227. — Peruvia.
Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 157. — Mexic.
scandens, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 53 = *Clematoclethra scandens*, Maxim.

CLEVELANDIA, Greene, ex T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1891) 157, et ex O. Hoffm. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1893) 99. *SCROPHULARINEAE*.
Beldingi, Greene, *ll. cc.* — Calif.

CLEYERA, DC. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 562.
Fortunei, Hook. f. in *Gard. Chron.* (1895) i. 10; et in *Bot. Mag.* (1895) t. 7434. — Japon.

CLIANTHUS, Banks et Soland. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 562.
maximus, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 294. — N. Zel.

CLIBADIUM, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 562.
arborescens, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 26. — Guatem.
asperum, Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 406. = *Baillieria aspera*, Aubl.
Donnell-Smithii, Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 98. — Guatem.

CLIONE integrifolia, C. A. White, in *Am. Natural.* xxii. (1888) 1029 sphalm. = *Cleome integrifolia*, Torr. et Gray

CLIDEMIA, D. Don (Melastom.). — Ind. Kew. i. 563.
acutifolia, Cogn. ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 32. — Bolivia.
affinis, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 493 (= *Staphidium affine*, Naud.). — Bras.
ampla, Cogn. l. c. 1023. — Columb., Venez.
attenuata, Cogn. l. c. 1006 (= *Staphidium attenuatum*, Naud.). — Ins. S. Thom. (Am.).
Barbeyana, Cogn. l. c. 1014. — Cuba.
Biolleyana, Cogn. l. c. 1193; et ex Th. Dur. et Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 264. — Costarica.
boliviensis, Cogn. ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 94. — Bolivia.
Bonplandii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 501 (= *Sagraea Bonplandii*, Triana). — Am. trop.
bullosa, Cogn. l. c. 490 (= *Melastoma bullosum*, Spreng.). — Bras., Guian.
Candolleana, Cogn. l. c. — Bras.
capilliflora, Cogn. l. c. 308 (= *Sagraea capilliflora*, Triana). — Bras.

CLIDEMIA : —

capillipes, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 509 (= *Sagraea capillipes*, Triana). — Bras.
capituliflora, Cogn. l. c. 1021. — Cuba.
cordata, Cogn. ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 211. — Bolivia.
coriacea, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 510 (= *Sagraea coriacea*, Triana). — Guian. angl.
cubensis, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1021. — Cuba.
cymifera, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 25. — Guatem.
discolor, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1025 (= *Sagraea discolor*, Triana). — N. Granat.
dispar, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 497 (= *Calophysa dispar*, Triana). — Peruvia.
divaricata, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1015. — Cuba.
domingensis, Cogn. in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 283 (= *Sagraea domingensis*, DC.). — Ins. Antill.
Donnell-Smithii, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 5. — Guatem.
epiphytica, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1025. — N. Gran.
Fendleri, Cogn. l. c. 1016. — Venez.
flexuosa, Cogn. l. c. 1103 (= *Calophysa flexuosa*, Triana). — Venez.
Francavillana, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 502. — Bras.
glandulifera, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 289. — Guatem.
grandifolia, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1018. — Antill., Venez.
Grisebachii, Cogn. l. c. 1009. — Jamaica.
heteroneura, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 506 (= *Sagraea heteroneura*, Triana). — Bras., Ecuad.
impetiolaris, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1016 (= *Staphidium impetiolare*, Naud.). — Am. austr.
Kapplerii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 496. — Guian. bat.
macrandra, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1013. — Cuba.
melanophylla, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 511 (= *Sagraea melanophylla*, Triana). — Bras.
minutiflora, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 507 (= *Sagraea minutiflora*, Triana). — Bras.
Naudiniana, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 990 (= *Staphidium dependens*, Naud.). — Mexic.
pilosa, Cogn. l. c. 1023 (= *Sagraea pilosa*, DC.). — Jamaica.
platyphylla, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 499 (= *Sagraea platyphylla*, Triana). — Bras.
obliqua, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1017 (= *Staphidium obliquum*, Naud.). — Am. austr.
ossaeaeformis, Cogn. l. c. 1011 (= *Miconia ossaeaeformis*, Naud.). — Antill.
pilosissima, Cogn. ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 211. — Bolivia.
pleiostemon, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1000 (= *C. rariflora*, Benth.). — Bras.
polystachya, Cogn. l. c. 1021 (= *Staphidium polystachyum*, Naud.). — Porto-Rico.
purpureo-violacea, Cogn. ex Th. Dur. et Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 263. — Costarica.
pusilliflora, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1010. — Ins. S. Doming.
Raddiana, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 509. — Bras.
radicans, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 288. — Costarica.
rariflora, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1017 (= *Melastoma rariflora*, Bonpl.). — Venez.
rubrinervis, Cogn. *Monog. Phan.* vii. (1891) 1013 (= *Staphidium rubrinervis*, Naud.). — Cuba.
Rusbyi, Cogn. ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 211. — Bolivia.
salicifolia, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1009 (= *Ossaea salicifolia*, Crueg.). — Ins. Trinit.
septuplinervia, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 506. — Peruvia.

CLIDEMIA : —

serpens, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1025. — N. Gran.
sessiliflora, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 505. — Peruvia.
sparsiflora, Griseb. (*Veget. Carib.* n. 565), ex Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1043 in syn. (= *Henriettella lateriflora*, Triana.). — Ins. Antill.
trichodes, Sagot, ex Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 612 = *Miconia robusta*, Cogn.
trichopetala, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1013. — Cuba.
umbrosa, Cogn. l. c. 1019 (= *Melastoma umbrosa*, Sw.). — Antill.

CLIFFORTIA, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 564.
pilifera, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 162. — Afr. austr.

CLIFTONIA, Banks (Cyrill.). — Ind. Kew. i. 565.
monophylla, Britton, sec. Sargent N. Amer. Sylva, ii. (1892) 7 t. 51, cum cit. erron. [Conf. *Bull. Torr. Bot. Club*, xvi. (1889) 310] = *ligustrina*, Spreng.

CLINACANTHUS, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 565.
nutans, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 63 = *C. Burmanni*, Nees.

CLINOGYNE, Salisb. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 565.
dichotoma, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 684 sphalm. = *Maranta grandis*, Miq. = *dichotoma*, Salisb.
purpurea, Ridl. in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 132. — Angola.

CLINOPODIUM, Linn. = **Calamintha**, Tourn. (Labiata.).
abyssinicum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 515 = *Cal. abyssinica*, A. Rich.
Acinos, Kuntze, l. c. 513, 515 = *Cal. Acinos*, Clairv.
aduense, Kuntze, l. c. = *Cal. aduensis*, Strobl.
alpinum, Kuntze, l. c. = *Cal. alpina*, Lam.
alternipilosum, Kuntze, l. c. = *Satureia alternipilosa*, C. Koch.
annuum, Kuntze, l. c. = *Cal. annua*, Schrenk.
approximatum, Kuntze, l. c. = *Satureia approximata*, Frivald.
Benthonii, Kuntze, l. c. = *Micromeria Benthoni*, Webb et Benth.
betulifolium, Kuntze, l. c. = *Cal. betulifolia*, Boiss. et Bal.
biflorum, Kuntze, l. c. = *Micromeria biflora*, Benth.
bolivianum, Kuntze, l. c. = *M. boliviana*, Benth.
bonariense, Kuntze, l. c. = *M. bonariensis*, Fisch. et Mey.
Bourgaeuanum, Kuntze, l. c. = *M. Bourgaeana*, Webb.
bracteolatum, Kuntze, l. c. = *M. bracteolata*, Benth.
Brownei, Kuntze, l. c. 514 = *M. Brownei*, Benth.
Calamintha, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 24 et 32 = seq.
Calamintha, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 515 = *Cal. officinalis*, Moench.
Campanella, Kuntze, l. c. = *Satureia Campanella*, Ehrenb.
candidissimum, Kuntze, l. c. = *Cal. candidissima*, Munby.
canum, Kuntze, l. c. = *Cal. graveolens*, Benth.
capitellatum, Kuntze, l. c. = *Micromeria capitellata*, Benth.
chinense, Kuntze, l. c. = *Cal. chinensis*, Benth.
coccineum, Kuntze, l. c. = *Cal. coccinea*, Benth.
coerulescens, Kuntze, l. c. = *Cal. caerulescens*, Wedd.
confine, Kuntze, l. c. = *Cal. confine*, Hance.
congestum, Kuntze, l. c. = *Micromeria congesta*, Boiss. et Hausskn.
consentinum, Kuntze, l. c. = *M. graeca*, Benth.
cordatum, Kuntze, l. c. = *M. cordata*, Moris.
cremnophilum, Kuntze, l. c. = *M. cremnophila*, Boiss. et Heldr.
creticum, Kuntze, l. c. = *Cal. cretica*, Benth.

CLINOPODIUM: —

- cristatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 515 = *Micromeria cristata*, Griseb.
cryptanthum, Kuntze, l. c. = *Cal. cryptantha*, Vathek.
cuneifolium, Kuntze, l. c. = *Satureia cuneifolia*, Ten.
cymuligerum, Kuntze, l. c. = *Micromeria cymuligera*, Boiss. et Hausskn.
Darwinii, Kuntze, l. c. = *M. Darwinii*, Benth.
debile, Kuntze, l. c. = *Cal. debilis*, Benth.
densiflorum, Kuntze, l. c. = *Micromeria densiflora*, Benth.
dentatum, Kuntze, l. c. = *Cal. dentata*, Chapm.
depauperatum, Kuntze, l. c. = *Cal. depauperata*, Bunge.
Douglasii, Kuntze, l. c. = *Micromeria Douglasii*, Benth.
ellipticum, Kuntze, l. c. = *M. elliptica*, C. Koch.
ericifolium, Kuntze, l. c. 514 = *M. varia*, Benth.
filiforme, Kuntze, l. c. 515 = *M. filiformis*, Benth.
floridum, Kuntze, l. c. = *Cal. floriola*, Boiss.
Forbesii, Kuntze, l. c. = *Micromeria Forbesii*, Benth.
fruticosum, Kuntze, l. c. = *M. marifolia*, Benth.
Gilliesii, Kuntze, l. c. = *M. Gilliesii*, Benth.
glabellum, Kuntze, l. c. = *Cal. glabella*, Benth.
glabrum, Kuntze, l. c. = *Cal. Nuttallii*, Benth.
glandulosum, Kuntze, l. c. = *Cal. glandulosa*, Benth.
gracile, Kuntze, l. c. 514 = *Cal. gracilis*, Benth.
gracum, Kuntze, l. c. 515 = *Micromeria canescens*, Benth.
grandiflorum, Kuntze, l. c. = *Cal. grandiflora*, Moench.
graveolens, Kuntze, l. c. = *Cal. graveolens*, Benth.
Haussknechtii, Kuntze, l. c. = *Cal. Haussknechtii*, Bunge.
helianthemifolium, Kuntze, l. c. = *Micromeria helianthemifolia*, Webb et Berth.
hispidum, Kuntze, l. c. = *M. hispida*, Boiss. et Heldr.
hortense, Kuntze, l. c. = *Satureia hortensis*, Linn.
Hydaspidis, Kuntze, l. c. = *Micromeria Hydaspidis*, Falc.
imbricatum, Kuntze, l. c. = *M. Forskähle*, Benth.
incanum, Kuntze, l. c. = *Cal. incana*, Boiss.
inodorum, Kuntze, l. c. = *Micromeria inodora*, Benth.
intermedium, Kuntze, l. c. = *Satureia intermedia*, C. A. Mey.
julianodes, Kuntze, l. c. = *Micromeria julianoides*, Webb et Berth.
julianum, Kuntze, l. c. = *M. Juliana*, Benth.
lanatum, Kuntze, l. c. = *M. lanata*, Benth.
lepidum, Kuntze, l. c. = *M. lepidum*, Webb et Berth.
libanotica, Kuntze, l. c. = *M. libanotica*, Boiss.
macrostemon, Kuntze, l. c. = *Cal. macrostema*, Benth.
maritimum, Kuntze, l. c. = *Cal. maritima*, Benth.
microphyllum, Kuntze, l. c. = *Micromeria microphylla*, Benth.
mimulodes, Kuntze, l. c. = *Cal. mimuloides*, Benth.
molle, Kuntze, l. c. = *Micromeria mollis*, Benth.
montanum, Kuntze, l. c. = *Satureia montana*, Linn.
multicaule, Kuntze, l. c. = *Cal. multicaulis*, Maxim.
Nepeta, Kuntze, l. c. = *Cal. Nepeta*, Savi.
nervosum, Kuntze, l. c. = *Micromeria nervosa*, Benth.
niveum, Kuntze, l. c. = *Cal. nivea*, Boiss.
nubigenum, Kuntze, l. c. = *Micromeria nubigena*, Benth.
nummulariaefolium, Kuntze, l. c. = *M. nummularifolia*, Boiss.
Olla, Kuntze, l. c. = *Satureia Olla*, Ehrenb.
pachyphyllum, Kuntze, l. c. = *Satureia hortensis*, Linn.
Palmeri, Kuntze, l. c. = *Cal. Palmeri*, A. Gray.
parvifolium, Kuntze, l. c. = *Micromeria parviflora*, Reiche.
patavinum, Kuntze, l. c. = *Cal. patavina*, Host.
Pomelianum, Kuntze, l. c. = *Cal. nervosa*, Pomel.
purpureum, Kuntze, l. c. (purpurea) = *Micromeria purpurea*, A. Gray.
rigidum, Kuntze, l. c. = *Satureia rigida*, Bartr.
rotundifolium, Kuntze, l. c. = *Ziziphora acinoides*, Linn.

CLINOPODIUM: —

- Salzmännii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 515 = *Satureia inodora*, Salzmann.
serpyllifolium, Kuntze, l. c. = *Micromeria serpyllifolia*, Boiss.
simense, Kuntze, l. c. 516 = *Cal. simensis*, Benth.
sinaicum, Kuntze, l. c. = *Micromeria sinaica*, Benth.
spicigerum, Kuntze, l. c. = *Satureia alternipilosa*, C. Koch.
spinosum, Kuntze, l. c. = *Sat. approximata*, Frivald.
stamineum, Kuntze, l. c. = *Cal. staminea*, Boiss.
stoloniferum, Kuntze, l. c. = *Micromeria stolonifera*, Benth.
suaveolens, Kuntze, l. c. = *Cal. suaveolens*, Boiss.
subnudum, Kuntze, l. c. = *Micromeria Pulegium*, Benth.
tenuis, Kuntze, l. c. = *M. tenuis*, Benth.
tenuifolium, Kuntze, l. c. = *M. graeca*, Benth.
terebinthinaceum, Kuntze, l. c. 514 = *M. Teneriffae*, Benth.
teydense, Kuntze, l. c. 516 = *M. teydensis*, C. Bolle.
Thymbra, Kuntze, l. c. = *Satureia Thymbra*, Linn.
thymifolium, Kuntze, l. c. = *Cal. thymifolia*, Host.
thymodes, Kuntze, l. c. = *Micromeria thymoides*, De Not.
umbrosum, Kuntze, l. c. = 514 *Cal. umbrosa*, Fisch. et Mey.
usuriense, Kuntze, l. c. 516 = *Cal. usuriensis*, Regel et Maack.
vimineum, Kuntze, l. c. = *Micromeria obovata*, Benth.
Walterianum, Kuntze, l. c. = *Cal. caroliniana*, Sweet.
xalapense, Kuntze, l. c. = *Micromeria Brownei*, Benth.

CLITANDRA, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 566.

- Barteri, Stapf, in Kew Bull. (1895) 20. — Afr. trop. occ.
 Mannii, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.
 orientalis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 315. — Afr. trop. or.
 robustior, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 130. — Congo.
 Schweinfurthii, Stapf, in Kew Bull. (1895) 20. — Afr. centr. bor.

CLITORIA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 566.

- Hanceana, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 187. — China.
 sericea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 407. — Mexic.
 triflora, S. Wats. l. c. — Amer. bor.

CLIVEOCHARIS ×, Hort. ex Gartenfl. (1891) 416 = Cliveucharis, Rodigas.

CLIVEUCHARIS ×, Rodigas, ex Rev. Hort. lxiii. (1891) 316 et ex Gard. Chron. (1891) I. 708 (sphalm. Clivencharis). — AMARYLLIDACEAE.

pulchra ×, Hort. ll. cc. — Hybr. artef.

CLIVIA, Lindl. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 566.

- sulphurea, Laing, ex Wien. Ill. Gartenzeit. (1888) 275 = miniata, Regel

CLOMPANUS, Rumpf, Herb. Amboin. ii. 168-170 (1743); ex Kuntze, Rev. Gen. 77 (1891) = Sterculia, Linn.

- affinis, alata, Alexandri, arabica, Barteri, bicolor, Bidwillii, Blumei, caribaea, caudata, ceramica, Chicha, cinerea, colorata, comosa, cuneata, cuspidata, discolor, ensifolia, ferruginea, frondosa, fulgens, gracilis, grandifolia, linearicarpa, linearis, linguifolia, lurida, macrophylla, madagascariensis, mexicana, oblonga, oblongata, oblongifolia, parviflora, parvifolia, populifolia, propinqua, punctata, purpurascens, quadrifida, Roxburghii, rufa, rugosa, rupestris, scaphigera, Spangleri, stipularis, stipulata, striata, striatiflora, subpelata, Thwaitesii, tubulata, uvens, versicolor, villosa, Zippelii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 78 = homonyma omnia Sterculiae.
 acerifolia, Kuntze, l. c. = *S. acerifolia*, A. Cunn.

CLOMPANUS: —

- africana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 77 = *S. Triphaca*, R. Br.
 apetalata, Kuntze, l. c. 78 = *S. carthaginensis*, Cav.
 armata, Kuntze, l. c. = *S. ornata*, Wall.
 australis, Kuntze, l. c. = *S. Trichosiphon*, Benth.
 coccinea, Kuntze, l. c. 77 = *S. coccinea*, Roxb.
 cochinchinensis, Kuntze, l. c. 78 = *S. cochinchinensis*, Pierre.
 cordata, Kuntze, l. c. 77 = *S. javanica*, R. Br.
 cordifolia, Kuntze, l. c. 78 = *S. cordifolia*, Blanco.
 diversifolia, Kuntze, l. c. = *S. diversifolia*, G. Don.
 dongnaiensis, Kuntze, l. c. = *S. dongnaiensis*, Pierre.
 excelsa, Kuntze, l. c. 77 = *S. excelsa*, Mart.
 foetida, Kuntze, l. c. = *S. foetida*, Linn.
 gracilipes, Kuntze, l. c. 78 = *S. gracilipes*, Pierre.
 Gregorii, Kuntze, l. c. = *S. diversifolia*, G. Don.
 Haenkeana, Kuntze, l. c. = *S. acerifolia*, Hemsl.
 Hamiltonii, Kuntze, l. c. 77 = *S. coccinea*, Roxb.
 Harmandii, Kuntze, l. c. 78 = *S. Harmandii*, Pierre.
 hypochrea, Kuntze, l. c. = *S. hypochrea*, Pierre.
 javanica, Kuntze, l. c. 77 = *S. campanulata*, Wall.
 lissophylla, Kuntze, l. c. 78 = *S. lissophylla*, Pierre.
 longifolia, Kuntze, l. c. = *Cola acuminata*, Schott. et Endl.
 malabarica, Kuntze, l. c. 77 = *S. guttata*, Roxb.
 Mastersii, Kuntze, l. c. 78 = *S. Mastersii*, Mart.
 monosperma, Kuntze, l. c. = *S. nobilis*, Sm.
 paradoxa, Kuntze, l. c. = *S. ramiflora*, Benth.
 peltata, Kuntze, l. c. = *Pterospermum heterophyllum*, Hance.
 Pexa, Kuntze, l. c. = *S. Pexa*, Pierre.
 pruriens, Kuntze, l. c. = *S. Ivira*, Sw.
 pubescens, Kuntze, l. c. 77 = *S. Tragacantha*, Lindl.
 pyriformis, Kuntze, l. c. 78 = *S. platanifolia*, Linn. f.
 rubiginosa, Kuntze, l. c. 77 = *S. rubiginosa*, Vent.
 simplex, Kuntze, l. c. = *S. platanifolia*, Linn. f.
 speciosa, Kuntze, l. c. 78 = *S. speciosa*, K. Schum.
 stigmarota, Kuntze, l. c. = *S. stigmarota*, Pierre.
 Thorellii, Kuntze, l. c. = *S. Thorellii*, Pierre.
 tomentosa, Kuntze, l. c. = *S. tomentosa*, Guill. et Perr.

CLOSLIA, Remy, (Compos.). — Ind. Kew. i. 566.

- brachypetala, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1895) 711. — Chili.
 digitata, Phil. l. c. 710. — Chili.
 elata, Phil. [Iter Atac. n. 197]. l. c. — Chili.
 foliosa, Phil. l. c. 709. — Chili.
 villosa, Phil. l. c. 712. — Chili.
 viridis, Phil. l. c. 710. — Chili.

CLUSIA, Linn. (Guttif.). — Ind. Kew. i. 567.

- angustifolia, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1888) 420. — Bras.
 articulata, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 124. — Columbia.
 axillaris, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1888) 413. — Bras.
 Burchellii, Engl. l. c. 416. — Bras.
 calyptrata, Vesque, Epharm. iii. (1892) 8 t. 20; et in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 76. — Ins. Portoric.
 carachensis, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 139. — Venez.
 cartilaginea, Vesque, l. c. 97. — Ins. S. Doming.
 colorans, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1888) 426. — Guian. angl.
 columnaris, Engl. l. c. 432. — Bras.
 Couleti, Duchassaing, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 95 in syn. = minor, Linn.
 crubescens, Vesque, l. c. 63 sphalm. = erubescens, V. que.
 cyclanthera, Vesque, l. c. 136 in syn. = columnaris, Engl.
 dependens, Pav. ex Vesque, l. c. 177 in syn. = Chrysoclamys dependens, Planch. et Triana.
 erubescens, (err. cal. crubescens) Vesque, l. c. 63. — Columb.
 grandifolia, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1888) 429. — Bras.
 Jenmani, Engl. l. c. 432. — Guian. angl.

CLUSIA : —

- Lehmanni, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 65. — Columb.
 macropoda, *Klotzsch*, ex *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 424. — Guian. angl.
 Martiana, *Engl. l. c.* 411. — Bras.
 Martini, *Sagot*, ex *Engl. l. c.* 425 = palmicida, *L. C. Rich.*
 mexicana, *Vesque, Epharm.* iii. (1892) 9 t. 24 et 25; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 84. — Mexic.
 microphylla, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 426. — Guian. angl.
 pallida, *Engl. l. c.* 414. — Peruvia.
 parvicapsula, *Vesque, Epharm.* iii. (1892) 10 t. 34; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 98. — Peruvia.
 parviflora, [*Sald. mss.*] *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 407; et in *Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1898) 225. — Bras.
 peruviana, *Szysyl. in Diss. Cl. Mat.-phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 225. — Peruvia.
 penduliflora, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 412. — Bras.
 petiolata, *Klotzsch*, ex *Engl. l. c.* 423 = grandiflora, *Splitg.*
 Planchoniana, *Engl. l. c.* 431 (= *Polythecandra Spruceana*, *Planch. et Triana*). — Bras.
 Poeppigiana, *Engl. in Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1895) 225 (= *C. alba*, *Ruiz et Pav.*). — Peruvia.
 polysepala, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 427. — Bras.
 prismandra, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 80 in syn. = penduliflora, *Engl.*
 pulcherrima, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 414. — Ecuad.
 purpurea, *Engl. l. c.* 416 (= *Arrudea purpurea*, *Splitg.*). — Guian. bat.
 ramosa, *Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 204. — Bolivia.
 Riedeliana, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 410. — Bras.
 riparia, *Sagot*, ex *Engl. l. c.* 405 = cuneata, *Benth.*
 Schomburgkii, *Vesque, Epharm.* iii. (1892) 7 t. 94 et 95; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 69. — Guian. angl.
 sessilis, *Klotzsch*, ex *Engl. ex Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 405. — Guian. angl.
 spathulaefolia, *Engl. l. c.* 412. — Bras.
 tetrastigma, *Vesque, Epharm.* iii. (1892) 7 t. 16 et 17; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 71. — Cuba.
 trochiformis, *Vesque*, *ll. cc.* 4, tab. 3 et 47 (= *Tovomitopsis Spruceana*, *Engl.*). — Peruvia.
 viscida, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 422. — Bras.

CLUSIANTHEMUM, Vieill. = **Garcinia**, Linn. (Guttifer.).

- coriaceum*, Vieill. ex *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 418 in syn. = *G. Mungotia*, *Deplanche.*
densiflorum, Vieill. l. c. 420 = *G. densiflora*, *Vieill.*
pedicellatum, Vieill. l. c. = *G. Mungotia*, *Deplanche.*

CLUYTIA, Boerh. ex Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 568.

- kilimandscharica, *Engl. in Hochnel, zum Rudolph See*, Append. (1892) 5; et in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 285. — Afr. trop. or.
 leuconeura, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 112. — Afr. trop. or.
 mollis, *Pax, l. c.*; et in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 64. — Afr. trop. or.
 robusta, *Pax*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 241. — Afr. trop. or.
 Stuhlmanni, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 112. — Afr. trop. or.

CLYPEOLA, Linn. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 568.

- minima, *Stäpf*, in *Denkschr. Acad. Wien*, (1886) 35. — Persia.
 Raddeana, *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 448. — Reg. Cauc.

CNESTIS, Juss. (Connarac.). — Ind. Kew. i. 569.

- bullata, *Baill. Hist. pl. Madag. Atlas*, (1886) t. 17. — Madag.

CNESTIS : —

- calocarpa, *Gilg*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 192. — Afr. or.
 confertiflora, *Gilg, l. c.* 193. — Afr. or
 urens, *Gilg*, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1891) 67; et in *Engl. Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 330. — Kamerun.

CNICUS, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 569.

- amplifolius, *Greene, Pittonia*, i. (July 1887) 70. — Calif.
 calcareus, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 704. — Utah.
 Chrismarii, *Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 108. — Mexic.
 Clarkei, $\times$, *H. C. Wats.* ex *F. E. Hanb. Lond. Cat. Pl. ed. ix.* (1895) 24. — Brit.
 clavatus, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 704. — Utah.
 darwasicus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 427. — Buchara.
 Echinus, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 328 = carlinoides, *Fisch.*
 excelsior, *Robins. in Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 179. — Mexic.
 fontinalis, *Greene*, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 151. — Calif.
 glabrifolius, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 523. — As. centr.
 Hillii, *Canby*, in *Gard. and For.* iv. (1891) 101. — Am. bor.
 imbricatus, *Robins. ex Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l.* (1895) 159. — Mexic.
 jucundus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 427. — Buchara.
 Liebmanni, *Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128 (= *Cirsium Liebmanni*, *Sch.-Bip.*). — Mexic.
 lilacinus, *Greene*, in *Bull. Calif. Acad.* ii. 7. (1887) 404 = occidentalis, *A. Gray.*
 linearifolius, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 143. — Mexic.
 neglectus, *Parish*, ex *Greene*, in *Bull. Calif. Acad.* ii. 7. (1887) 404 in obs. = lilacinus, *Parish.*
 nidulus, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 705. — Utah.
 odoratus, *Britton*, *Stern et Pogg. Prelim. Cat.* (1888) 30 = pumilus, *Torr.*
 orizabensis, *Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128 (= *Cirsium orizabense*, *Sch.-Bip.*). — Mexic.
 portoricensis, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 329. — Ins. Portoric.
 Pringlei, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 156. — Mexic.
 reglensis, *Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128 (= *Cirsium reglense*, *Sch.-Bip.*). — Mexic.
 sairamensis, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 522. — As. centr.
 Semenowi, *C. Winkl. l. c.* 523 in obs. — As. centr.
 tolucanus, *Robins. et Seaton*, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 111. — Mexic.
 velatus, *S. Wats. l. c.* xxvi. (1891) 143. — Mexic.
 Woodwardii, $\times$, *H. C. Wats.* ex *F. J. Hanb. Lond. Cat. Pl. ed. 9* (1895) 24. — Brit.

CNIDIUM, Cusson = **Selinum**, Linn. (Umbellif.).

- apioidum, *St-Lager*, in *Cariot, stud. des fl. éd.* 8. ii. (1889) 351 = *Carum rigidulum*, *Koch.*
 pauciradiatum, *Somm. et Levier*, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. ii.* (1895) 76. — Reg. Cauc.
 Reichenbachii, *Huter*, ex *Nym. Consp. Fl. Eur.* ii. 1. (1889) 140. — Dalm.

COAXANA, Coult. et Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5. (1895) 297. **UMBELLIFERAE.**

- purpurea, *Coult. et Rose, l. c. t. 5.* — Mexic.

COBAEA, Cav. (Polemon.). — Ind. Kew. i. 572.

- penduliflora, *Peter*, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1891) 44 = penduliflora, *Hook. f.*
 triflora, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 75. — Guatem.

COCCINIA, Wight et Arn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 572.

- Buettneriana, *Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 351. — Gabon.

COCCINIA : —

- grandiflora, *Cogn. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 34; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 211. — Afr. trop. or.
 lalambensis, *Penzig*, in *Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 342. — Erithrea.
 Rehmannii, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 418. — Transv.
 rigida, *Cogn. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 211. — Afr. trop. or.
 Schinzii, *Cogn. ex Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 419. — Transv.

COCCOCYPSELUM, R. Br. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 573.

- anomalum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 311. — Bras.
 discolor, *Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag.* (1893) t. 7278 in syn. = hirsutum, *Barth.*
 glabrum, *Britton*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 108. — Bolivia.
 guianense, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 315 (= *Tontanea guianensis*, *Aubl.*). — Guian.
 macropodum, *Britton*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 16 = *Geophila macropoda*, *DC.*

COCCOLOBA, Linn. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 573.

- Barbeyana, *Lindau*, in *Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 185. — Peruvia.
 Billbergii, *Lindau, l. c.* 219. — Columb.
 cozumelensis, *Hemsl. Biol. Centr.-Amer.* iv. (1886) 108. — Ins. Cozumel.
 Cruegeri, *Lindau*, in *Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 209. — Ins. Trinit.
 Curtisii, *Lindau, l. c.* 159 (= *C. laurifolia*, *Jacq.*). — Florida.
 cylindrostachys, *Lindau, l. c.* 163. — Bras.
 dioica, *Karst. ex Lindau, l. c.* 170. — Venez.
 Eggersiana, *Lindau, l. c.* 153. — Ins. S. Doming.
 fallax, *Lindau, l. c.* 172. — Ins. Trinit.
 floribunda, *Lindau, l. c.* 217 (= *Campderia floribunda*, *Benth.*). — Guatem.
 geniculata, *Lindau, l. c.* 141. — Cuba.
 Glaziovi, *Lindau, l. c.* 163. — Bras.
 grandiflora, *Lindau, l. c.* 175. — Bras.
 Grisebachiana, *Lindau, l. c.* 195. — Ins. Trinit.
 jamaicensis, *Lindau, l. c.* 206. — Jamaica.
 Jurgenseni, *Lindau, l. c.* 188. = *Schiedeana*, *Lindau*, — Mexic.
 Krugii, *Lindau, l. c.* 145. — Antill.
 laxiflora, *Lindau, l. c.* 191. — Bras.
 Lehmannii, *Lindau, ex Hieron. l. c.* xx. (1895) 7. — Columb.
 leptostachyoides, *Lindau, l. c.* xiii. (1890) 207. — Jamaica.
 Liebmanni, *Lindau, l. c.* 189. — Mexic.
 Lindeniana, *Lindau, l. c.* 182 (= *Campderia Lindeniana*, *Benth.*). — Mexic.
 longipes, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 446. — Bras.
 microphylla, *Morong*, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 213. — Parag.
 Moritziana, *Klotzsch*, ex *Lindau*, in *Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 216 (= *C. ovata*, *Benth.*). — Guiana.
 Mosenii, *Lindau, l. c.* 173. — Bras.
 nematostachya, *Lindau, l. c.* 208 (= *Campderia nematostachya*, *Griseb.*). — Panama.
 nigrescens, *Lindau, l. c.* 192. — Ins. Trinit.
 nodosa, *Lindau, l. c.* 147. — Ins. S. Doming.
 novogranatensis, *Lindau, l. c.* 192. — Columb.
 oblonga, *Lindau, l. c.* 136. — Bras.
 Orizabae, *Lindau, l. c.* 189. — Mexic.
 paraguayensis, *Lindau, l. c.* 215. — Paraguay.
 pendula, *Salzm. ex Lindau, l. c.* 180 (= *C. nitida*, *H. B. et K.*). — N. Granat.
 peruviana, *Lindau, l. c.* 213. — Peruvia.
 praecox, *Wright*, ex *Lindau, l. c.* 142. — Cuba.
 recurva, *Newm. ex Lindau, l. c.* 180 (= *C. nitida*, *H. B. et K.*). — N. Granat.
 reflexa, *Lindau, l. c.* 141. — Cuba.
 rubiginosa, *Mart. ex Lindau, l. c.* 138 (= *C. acrostichoides*, *Cham.*). — Bras.
 Ruiziana, *Lindau, l. c.* 215. — Am. trop.
 Sagotii, *Lindau, l. c.* 184. — Guan. gall.

COCCOLOBA : —

- sarmentosa, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 446. — Bras.
 Schiedeana, Lindau, in *Engl. Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 187. — Mexic.
 Schwackeana, Lindau, l. c. 200. — Bras.
 scrobiculata, Lindau, l. c. 140. — Ins. S. Doming.
 Sintenisii, Urban, ex Lindau, l. c. 157. — Ins. Portorico.
 sparsifolia, Lindau, l. c. 195. — Bras.
 sphaerococca, Lindau, l. c. 185. — Peruvia.
 spinescens, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 212. — Parag.
 Spruceana, Lindau, in *Engl. Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 162. — Venez.
 subcordata, Lindau, l. c. 131 (= *Erythroxylon subcordatum*, DC.). — Ins. S. Doming.
 tenaiflora, Lindau, l. c. 190. — Bras.
 tiliacea, Lindau, l. c. 198. — Reg. Argent.
 Trianaei, Lindau, l. c. 213. — N. Granat.
 Trinitatis, Lindau, l. c. 142. — Ins. Trinit.
 Urbaniana, Lindau, l. c. 155. — Ins. Antill.
 verruculosa, Lindau, l. c. 154. — Ins. Antill.
 Wrightii, Lindau, l. c. 151. — Cuba.
 yucatanica, Lindau, l. c. 190. — Mexic.

- COCCULUS**, DC. (Menisp.). — Ind. Kew. i. 574.
 affinis, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1760. — China.
 lonchophyllus, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 8 (= *Holopeira lonchophylla*, Miers = *C. Ferrandianus*, Gaudich. ?). — Ins. Sandvic.
 integer, Hillebr. l. c. 7. — Ins. Sandvic.
 Kunsteri, King, in *Journ. As. Soc.* lviii. (1889) ii. 384. — Malaya.
 Selwynii, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 6 (= *Hypserpa Selwynii*, F. Muell.). — Austral.
 virgatus, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 8. — Ins. Sandvic.

- COCHLEARIA**, Tourn. ex Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 475.
 Conwayi, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894) 4. — Reg. Himal.
 micacea, E. S. Marshall, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 289 t. 346 = *groenlandica*, Linn.
 stenocarpa, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 202 = *anglica*, Linn.

- COCHLIODA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 575.
 Noezliana, Rolfe, in *Lindeniana*, vi. (1890) 55 t. 266; et in *Orchid. Alb.* xi. (1895) t. 509. — Am. austr. ?
 Notzliana « Rolfe » ex l'Orchidophile (1892) 272 cum ic., sphalm. = *Noezliana*, Rolfe.

- COCHRANEA**, Miers (Borag.). — Ind. Kew. i. 576.
 anchusaefolia, Gürke, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1894) 97 (= *Heliotropium anchusaefolium*, Poir.). — Bras., Reg. Argent.
 crassifolia, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 349 (= *Heliotropium crassifolium*, Phil.). — Chili.
 glutinosa, Phil. l. c. (= *Heliotropium glutinosum*, Linn.). — Chili.
 Kingi, Phil. l. c. 350. — Chili.
 longistyla, Phil. l. c. 349 (= *Heliotropium longistylum*, Phil.). — Chili.
 parviflora, Phil. l. c. 350. — Chili.
 sentis, Phil. l. c. 351. — Chili.
 taltalensis, Phil. l. c. 349. — Chili.

- COCOS**, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 576.
 australis, Drude et Brandt, (an Mart. ?) in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 451 fig. 72. — Form. hort.
 Chavisiana, Rodr. ex Becc. in *Malpighia*, i. (1887) 445. — Bras.
 Chiragua, Becc., l. c. 446. — Am. trop.
 Drudei, Becc., l. c. 445. — Am. trop.
 odorata, Rodr. Pl. nov. jard. bot. Rio, i. (1891) 11 t. 4a et 5c. — Bras.
 Orbignyana, Becc. in *Malpighia*, ii. (1888) 147. — Am. trop.

COCOS : —

- picrophylla, Rodr. Les Palm. 26 et t. 3 fig. 2 ab. ex Becc. in *Malpighia*, i. (1889) 448. — Bras.
 Pynaertii, Hort. ex Gard. Chron. (1891) i. 683 = *Weddelliana*, H. Wendl.
 pulposa, Rodr. Pl. nov. jard. bot. Rio, i. (1891) 14 t. 4b. — Bras.

- CODARIA**, Linn. = **Lerchea**, Kalm (Rubiace.).
 interrupta, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 279 = L. interrupta, Korth.
 longicauda, Kuntze, l. c. = L. longicauda, Linn.

- CODIAEUM**, Rumph. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 576.
 Stellingianum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 353. — Oceania.

- CODON**, Linn. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. i. 577.
 Schenkii, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 173. — Afr. austro-occ. extratrop.

- CODONOCEPHALUM**, Fenzl (Compos.). — Ind. Kew. i. 577.
 Peacockeanum, Aitch. et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 75 t. 31 et 32. — Persia.

- CODONOPSIS**, Wall. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 577.
 Henryi, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1967. — China.
 Tangshen, Oliver, l. c. t. 1966. — China.
 ussuriensis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 6. — As. bor. temp.

- COELACHNE**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 577.
 madagascariensis, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1890) 348. — Madag.

- COELACHYRUM**, Nees = **Eragrostis**, P. Beauv. (Gramin.).
 indicum, Hack. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 2 (1887) 61 = *E. brevifolia*, Benth.

- COELOCARPUM**, Balf. f. [sphalm. COELOCARPUS] (Verben.). — Ind. Kew. i. 578.
 madagascariensis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 43. — Madag.

- COELOCARYON**, Warb. in *Ber. deutsch. Bot. Ges.* xiii. (1895) (85).
 Preussii, Warb. l. c. — Afr. trop. occ

- COELODEPAS**, Hassk. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 578.
 ferrugineum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 420. — Malacca.
 longifolium, Hook. f. l. c. — Perak.

- COELOGYNE**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 578.
 anceps, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 840. — Perak.
 Beccarii, Reichb. f. in *Bot. Centralbl.* xxviii. (1886) 345. — N. Guin.
 borneensis, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 62. — Borneo.
 bulbocodioides, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1888) 84. — China occ.
 carinata, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 191. — N. Guin.
 carnea, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 838. — Perak.
 Clarkei, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1893) i. 740. — Hab. ?
 cuprea, Wendl. et Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1892) i. 618; et in *Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6 (1893) 110 t. 263 fig. 1-8. — Malacca ?
 Edelfeldtii, F. Muell. et Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 421. — N. Guin.
 elegans, Reichb. f. in *Flora* (1886) 561; et in *Gard. Chron.* (1887) i. 145. — Tibet.
 flavida, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 839 = *flavida*, Hook. f.
 flexuosa, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 209. — Java.
 Foerstermanni, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 262 et (1887) i. 798. — Archip. Sund.

COELOGYNE : —

- Griffithii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 638. — Ind. or.
 Kingii, Hook. f. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 1 (1895) 25 t. 38. — Perak.
 lactea, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 521. — Burma.
 lamellata, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 36. — N. Hebrid.
 longibracteata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 194 in add.; et in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 1. (1895) 25 t. 39. — Perak.
 longipes, Hook. f. l. c. 195 in add. — Reg. Himal.
 lycastoides, F. Muell. et Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 179. — Ins. Samoens.
 Mac Donaldi, F. Muell. et Kraenzl. l. c. xlv. (1894) 209. — Hab. ?
 macrobulbon, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 830. — Penins. Mal., Borneo.
 Maingayi, Hook. f. l. c. 831. — Malacca.
 Micholicziana, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1891) ii. 300; et in *Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6. (1892) 100 t. 256. — N. Guin.
 Mossiae, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 156; et in *Gard. Chron.* (1894) i. 400 fig. 49. — Ind. or.
 occultata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 832. — Reg. Himal.
 papillosa, Ridl. ex Stapf, in *Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 238. — Borneo.
 purpurascens, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 842. — Zeyl.
 pustulosa, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 353. — N. Guin.
 rubens, Ridl. in *Gard. Chron.* (1890) i. 576; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 195. — Ins. Langkavi.
 Sanderiae, Kraenzl. ex O'Brien, in *Gard. Chron.* (1893) i. 360 et 547; et in *Reichenbachia* (1893) t. 56. — Hab. ?
 Sanderiana, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 361 fig. 52 sphalm. (non Reichb. f.) = *Sanderiae*, Kraenzl.
 Sanderiana, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 764. — Archip. Sundaic.
 stellaris, Reichb. f. l. c. (1886) i. 8 et 73. — Am. centr.
 stenochila, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 837. — Perak.
 suaveolens, Hook. f. l. c. 832. — Reg. Himal.
 Swania, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 183; et in *Reichenbachia*, ii. 2. (1895 ?) t. 92. — Ins. Philipp.
 tenuis, Rolfe, l. c. (1893) 171. — Borneo.
 Treutleri, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 194; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1892) t. 2105. — Ind. or.
 xylobioides, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 482. — Sumatra.
 Veitchii, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 282. — N. Guin.

- COELONEURUM**, Radlk. in *Sitzb. Math.-phys. Akad. Muench.* xix. (1889) 280. **SOLANACEAE.**
 Eggersii, Radlk. l. c. 281. — Ins. Antill.
 lineare, Radlk. l. c. — Ins. Antill.

- COELOPLEURUM**, Ledeb. = **Archangelica**, Hoffm. (Umbellif.).
 maritimum, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 148, et *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 91. — Terr. Washing.

- COELOSTEGIA**, Benth. (Malv.). — Ind. Kew. i. 579.
 borneensis, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 272. — Borneo.
 sumatrana, Becc. l. c. — Sumatra.

- COELOSTYLIS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 87 = **Echinopterys**, A. Juss. (Malpigh.).
 glandulosa, Kuntze, l. c. = *E. Lappula*, A. Juss.

- COFFEA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 579.
 baviensis, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* x. (1895) 235. — Tonk.
 Floresiana, Boerl. *Handb. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) 136 nomen. — Ins. Flores.
 liberica, Bull. ex K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1898) 105 = *liberica*, Hiern.
 sumatrana, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 272. — Sumatra.
 triflora, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) 14

COFFEA : —

136 (= *Lachnostoma triflorum*, Korth.) = *khasiana*, Hook. f.
uniflora, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 132. — N. Guin.

COGNIAUXIA, Baill. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 580.

ampla, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 349. — Gabon.
Brazzaei, Cogn. l. c. Sér. III. xvi. (1888). 237. — Congo. gall.
cordifolia, Cogn. l. c. Sér. III. xiv. (1887) 350. — Gabon.

COHNIA, Kunth = **Cordylina**, Comm. (Liliac.).

flabelliformis, Corderm. in Bonnier, Rev. gén. Bot. iv. (1892). 369. = *Cord. flabelliformis*, Corderm.

COHNIELLA, Pfitz. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. li. 6. (1889) 194. **ORCHIDEAE**.

quekettoides, Pfitz. l. c. — Guatem.

COILOTOPALUS, P. Br. = **Cecropia**, Loebl. (Urtic.).

peltata, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 230 = *Cecr. peltata*, Linn.

COINCYA, Rouy, in Deyrolle, Le Naturaliste, Sér. II. xiii. (1891) 248. **CRUCIFERAE**.

rupestris, Rouy, l. c. (= *Raphanus rupestris*, Porta et Rigo). — Hisp.

COINOCHLAMYS, T. Anders. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 580.

gabonica, Solerod. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1892) 29 (= *Mostuea gabonica*, Baill.). — Gabon.
Poggeana, Gilg, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 558. — Congo.
Schweinfurthii, Gilg, l. c. 560. — Afr. centr. bor.

COIX, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 580.

lingulata, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 5. — Burma.
puellarum, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 77. — Tonk.
stenocarpa, Balansa, l. c. — Tonk.
tubulosa, Hack. ex Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 260. — Oceania.

COLA, Schott et Endl. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 580.

Ballayi, Cornu, ex Heckel, in Ann. Inst. bot.-géol. Marseille, i. (1893) 101 et 104 fig. 9. — Afr. trop. occ.
crispiflora, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 136. — Afr. trop. occ.
Duparquetiana, Baill. ex Heckel, in Ann. Inst. bot.-géol. Marseille, i. (1892) 150 nomen. — Hab.?
lepidota, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 136. — Kamerun.
macrantha, K. Schum. l. c. 137. — Gabon.
pachycarpa, K. Schum. l. c. — Kamerun.
sphaerosperma, Heckel, in Ann. Inst. bot.-géol. Marseille, i. (1893) 154. — Afr. trop.

COLCHICUM, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 581.

algeriense, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Monoc.). (1895) 76. — Algeria.
Bornmuelleri, Freyn, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1889) 319; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 379. — As. Min.
Guessfeldtianum, Aschers. et Schweinf. in (Suppl. Illustr. fl. Egypte) Mém. Inst. Égypt. ii. (1889) 774. — Aegypt.
hungaricum, Fanka, in Termész. Füzetek, x. (1886) 75. — Hung.
merenderoides, Perrier et Sonjeon, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 429. — Sabaud.
procurrens, Baker, in Gard. Chron. (1890) i. 192. — As. Min.
Psaridis, Heldr. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889). — Graecia.

COLDENIA, Linn. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 382.

angelica, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 62. — Calif.
brevicalyx, S. Wats. l. c. — Am. bor. austro occ.
Darwini, Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1891) 90 (= *Galapagoa Darwinii*, Hook. f.). — Ins. Galapag.
fusca, Gürke, l. c. (= *Gal. fusca*, Hook. f.). — Ins. Galap.
glabra, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 230. — Chili.
grandiflora, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1892) 55. — Chili.
mitis, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 229. — Chili.
paronychioides, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1892) 55. — Chili.
phaenocarpa, Phil. l. c. 56. — Chili.
parviflora, Phil. l. c. — Chili.
plicata, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1895) 163 = *Nuttallii*, Hook.
tenuis, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 55. — Chili.
virens, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 229. — Chili.

COLEA, Boj. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 582.

aberrans, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 687. — Madag.
Boivini, Baill. l. c. 685. — Madag.
coccinea, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 36. — Madag.
compressa, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 248 (= *Bignonia compressa*, Lam.). = *decora*, Boj.
concinna, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1890) 337. — Madag.
Humboldtiana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 687. — Madag.
Lantziana, Baill. l. c. — Madag.
longepetiolata, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1890) 338. — Madag.
macrantha, Baker, l. c. 337. — Madag.
macrophylla, Baker, l. c. — Madag.
Poirrei, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 685. — Madag.
racemosa, Baill. l. c. = *decora*, Boj.
racemosa, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1890) 336. — Madag.

COLEOSANTHUS, Cass. = **Brickellia**, Ell. (Compos.).

baccharioides, *betonicifolius*, *brachyphyllus*, *californicus*, *cordifolius*, *corymbosus*, Coulteri, *cylindraceus*, *dentatus*, *diffusus*, *floribundus*, *frutescens*, *Galeottii*, *grandiflorus*, *Greenii*, *hastatus*, *hebecarpus*, *hymenochlaenus*, *incanus*, *lanatus*, *Leemontii*, *linifolius*, *longifolius*, *microphyllus*, *mohavenensis*, *multiflorus*, *oblongifolius*, *oliganthus*, *Palmeri*, *Parryi*, *parvulus*, *pendulus*, *pinifolius*, *Pringlei*, *reticulatus*, *scoparius*, *secundiflorus*, *Seemannii*, *simplex*, *spinulosus*, *squamosus*, *thyrsiflorus*, *tomentellus*, *veronicifolius*, *Wislizenii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 328 = *homonyma* omnia *Brickelliae*.
atractylodes, Kuntze, l. c. = *B. atractylodes*, A. Gray.
cedrosensis, Greene, in Erythea, i. (1893) 54 = *B. cedrosensis*, Greene.
cuspidata, Greene, l. c. = *B. cuspidata*, A. Gray.
desertorum, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1895) 119 = *B. desertorum*, Coville.
glandulosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 328 = *B. Rosalesia*, Benth. et Hook. f.
Knappianus, Greene, in Erythea, i. (1893) 54 = *B. Knappiana*, Drew.
lacinia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 328 = *B. dentata*, Sch. Bip.
pacayensis, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 46. — Guatem.
rhomboides, Greene, in Erythea, i. (1893) 54 = *B. rhomboides*, Greene.
rigidus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 328 = *B. Hartwegi*, A. Gray.
Rusbyi, Kuntze, l. c. = *B. Rusbyi*, A. Gray.
squarrosus, Kuntze, l. c. = *B. Cavanillesii*, A. Gray.
tener, Kuntze, l. c. = *B. Wrightii*, Dur. et Hilg.

COLEOSANTHUS : —

Wrightii, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xiv. (1894) 43 = *B. Wrightii*, A. Gray.

COLEOTRYPE, C. B. Clarke (Commelin.). — Ind. Kew. i. 582.

Baroni, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 530. — Madag.

COLEUS, Lour. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 583.

aquaticus, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 218. — Afr. trop. or.
Autrani, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 129. — Abyss.
Bernieri, Briq. l. c. 128. — Madag.
camporum, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 214. — Afr. trop. or.
coeruleus, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 217. — Afr. trop. or.
comosus, Hochst. ex Gürke l. c. 212. — Abyss.
decumbens, Gürke, l. c. 211. — Afr. trop. or.
decurrens, Gürke, l. c. 215. — Kamerun.
dissitiflorus, Gürke, l. c. 217. — Kamerun.
dysentericus, Baker, in Kew Bull. (1894) 10. — Nigrit.
elongatus, Trimen, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 165. — Zeylan.
Eureka X, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 808. — Form. hort.
flavo-virens, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 347. — Afr. trop. or.
gomphophyllus, Baker, in Kew Bull. (1895) 225. — Reg. Somal.
Goudoti, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 126. — Madag.
gracilifolius, Briq. l. c. 127. — Madag.
gymnostomus, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 212. — Afr. trop. or.
Kilimandschari, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1891) 361 nomen. — Afr. trop. or.
leucophyllus, Baker, in Kew Bull. (1895) 292. — Afr. centr. austro-or.
longipetiolatus, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 65; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 214. — Afr. trop. or.
maculatus, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 210. — Afr. trop. or.
maranguensis, Gürke, l. c. 216. — Afr. trop. or.
Mechowianus, Briq. l. c. 183. — Angola.
membranaceus, Briq. l. c. 182. — Congo mer.
mirabilis, Briq. l. c. 183. — Angola, Congo.
montanus, Gürke, l. c. 218. — Kamerun.
nervosus, Briq. l. c. — Congo centr.
Penzigii, Schweinf. ex Penzig, in Att. Congr. bot. Genova (1893) 355 nomen; Baker, in Gard. Chron. (1893) ii. 616. — Erithrea.
Poggeanus, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 182. — Congo merid.
Preussii, Gürke, l. c. 219. — Afr. trop. occ.
punctatus, Baker, in Kew Bull. (1895) 291. — Afr. centr. austr.
repens, Gürke, in Bot. Jahrb. (1894) 213. — Afr. trop. occ.
rupestris, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. (1853) n. 2172], ex Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 131 = *C. Schimperii*, Vathe.
salagensis, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 220. — Afr. trop. occ.
scandens, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 51; et l. c. 221. — Afr. trop. or.
Schweinfurthii, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 181. — Afr. centr. bor.
shirensis, Gürke, l. c. 216. — Afr. trop. or.
silvaticus, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 51; et l. c. 213. — Afr. trop. or.
tricholobus, Gürke, l. c. 62 et 220. — Afr. trop. or.
trichophorus, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 130. — Abyss.

- COLEUS** : —
vestitus, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 224. — Reg. Somal.
viridis, Briq. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 181. — Congo merid.
Welwitschii, Briq. l. c. 185. — Angola.
- COLINIL**, Adans. = **Tephrosia**, Pers. (Legumin.).
cinereum, Hitchc. in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 75 = *T. cinerea*, Pers.
roseum, Hitchc. l. c. = *T. grandiflora*, Pers.
- COLLABIUM**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 583.
Wrayi, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 784; et in *Icon. pl.* xxi. (1891) 2065. — Perak.
- COLLETIA**, Comm. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 584.
campanulata, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1893) 6. = Chili.
dumosa, Phil. l. c. 7. = Chili.
foliosa, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 16. — Bolivia.
- COLLINSIA**, Nutt. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 584.
arvensis, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1892) 232. — Calif.
concolor, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 49. — Calif.
Davidsonii, S. B. Parish, in *Zoë*, iv. (1893) 147. — Calif. *floribunda*, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 55 (= *Tonella floribunda*, A. Gray). — Calif.
franciscana, Bioletti, in *Erythea*, i. (1893) 17; et in *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 272. = Calif. *Greenei*, A. Gray ex Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 272. — Calif.
Rattani, A. Gray, l. c. — Calif.
stricta, Greene, *Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 23. — Calif.
Wrightii, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 84. — Calif.
- COLLOMIA**, Nutt. (Polemon.). — Ind. Kew. i. 584.
atacamensis, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 217. — Chili.
debilis, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 127 (= *Gilia debilis*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
diversifolia, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 128. — Calif.
linearis, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xi. (1895) 217 = *coccinea*, Lehm.
Pringlei, Peter, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 a. (1891) 48. — Mexic.
Rawsoniana, Greene, *Pittonia*, i. (Oct. 1888) 221. — Calif.
Soehrensii, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 218. — Chili.
- COLLOTAPALUS**, « P. Br. » sphalm. = **COLLOTAPALUS**, P. Br. = **Cecropia**, Loeff. (Urtic.).
peltata, Hitchc. in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 130 = *Cecr. peltata*, Linn.
- COLOBANTHUS**, Bartl. (Caryophyll.). — Ind. Kew. i. 585.
alatus, Pax, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1893) 28. — Reg. Argent.
brevisepalus, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 357; et in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 175. — N. Zel.
Buchanani, T. Kirk, *ll. cc.* 358 et 175. — N. Zel.
caespitosus, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 384. — N. Zel.
canaliculatus, T. Kirk, l. c. 357; et in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 174. — N. Zel.
Meigeni, Phil. ex Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 459 nomen. — Chili.
Muelleri, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. (1895) 356; et in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 174. — N. Zel.
repens, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 261. — N. Zel.
- COLOCASIA**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 585.
Devansayana, L. Lind. et Rodigas, in *Illustr. Hort.* xxxiv. (1886) 97 t. 501. — N. Guin.
gigantea, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 524. — As. trop.
Mannii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 524. — Assam.
Wendlandii, Engl. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 524 in syn. = *fallax*, Schott.
- COLOGANIA**, Kunth (Legumin.). — Ind. Kew. i. 585.
hirta, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 315 (= *Galactia hirta*, Mart. et Gal.). — Mexic.
Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 271; et xxv. (1890) 147. — Mexic.
- COLOPTERA**, Coult. et Rose, Revis. N. Am. Umbellif. (1888) 49. **UMBELLIFERAE**.
Jonesii, Coult. et Rose, l. c. 58. — Utah.
Newberryi, Coult. et Rose, l. c. 49. — Am. bor. occ.
Parryi, Coult. et Rose, l. c. 50 (= *Cymopterus glomeratus*, DC.). — Wyoming.
- COLPODIUM**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 585.
hierochloides, Hausskn. et Bornm. ex Bornm. in *Mitth. Thür. Bot. Ver.*, N. Folge, vi. (1894) 67. — Oriens.
- COLQUHOUNIA**, Wall. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 586.
martabanica, Kurz, ex Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 38 = *elegans*, Wall.
- COLUBRINA**, Rich. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 586.
arborea, T. S. Brandeg. in *Zoë*, iv. (1894) 401. — Calif.
Beccariana, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 367. — N. Guin.
glabra, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 44. — Calif.
mexicana, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 315. — Mexic.
- COLUMBARIA**, J. et C. Presl = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).
fissa, Timb. in *Lucante, Rev. de Bot.* x. (1892) 250. — Gall.
Guitardi, Timb. l. c. — Gall.
gramuntia, Timb. l. c. = *S. gramuntia*, Linn.
- COLUMBIA**, Pers. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 586.
integrifolia, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 372. — Oceania.
- COLUMNEA**, Plum. ex Linn. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 586.
angustifolia, *bicolor*, *capitata*, *chrysantha*, *circinnata*, *coccinea*, *coriacea*, *corymbosa*, *cristata*, *dichroa*, *dimidiata*, *Foseithii*, *ichthyoderma*, *lanata*, *meridensis*, *multiflora*, *Patrisii*, *peltata*, *pubescens*, *Schlimii*, *semicordata*, *sparsiflora*, *tetragona*, *tigrina*, *villosa*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 471-72 = *homonyma* *Alloplecti*.
aggregata, Kuntze, l. c. 472 = *Codonanthe aggregata*, Hanst.
ascendens, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 239. — Bolivia.
Benthiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 471 = *Alloplectus tenuis*, Benth.
boliviana, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 238. — Bolivia.
chloronewra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 472 = *Nematanthus longipes*, DC.
ciliosa, Kuntze, l. c. = *Episcia ciliosa*, Hanst.
congesta, Kuntze, l. c. = *Alloplectus congestus*, Deene, ex J. Linden, *Catal.* n. 5 (1850).
corticicola, Kuntze, l. c. = *Nematanthus corticicola*, Schrad.
costaricensis, Kuntze, l. c. 471. — Costarica.
Endlicheriana, Kuntze, l. c. 472 = *Alloplectus pendulus*, Poepp. et Endl.
gracilis, Kuntze, l. c. = *Hypocyrtia gracilis*, Hook.
- COLUMNEA** : —
Grisebachiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 472 = *Alloplectus cristatus*, Mart.
Hansteiniana, Kuntze, l. c. = *All. strigosus*, Hanst.
Hookeriana, Kuntze, l. c. = *Hypocyrtia glabra*, Hook.
Humboldtiana, Kuntze, l. c. 471 = *Alloplectus hispidus*, Mart.
Klotzschiana, Kuntze, l. c. 172 = *All. villosus*, Hanst.
latisejala, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 239. — Bolivia.
Lindenii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 471. — N. Granat.
longipes, Kuntze, l. c. 472 = *Nematanthus longipes*, DC.
macrocalyx, Kuntze, l. c. = *Hypocyrtia macrocalyx*, Hanst.
macrophylla, Kuntze, l. c. = *Hyp. macrophylla*, Poepp. et Endl.
Martiana, Kuntze, l. c. = *Hyp. hirsuta*, Mart.
Mojinoana, Kuntze, l. c. 471 = *Alloplectus glaber* DC.
Nummularia, Kuntze, l. c. = *Hypocyrtia Nummularia*, Hanst.
peruviana, Zahlbr. in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 8. — Peruvia.
Poeppigiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 471 = *Alloplectus speciosus*, Poepp. et Endl.
Presliana, Kuntze, l. c. = *Nematanthus radicans*, Presl.
radicans, Kuntze, l. c. = *Hypocyrtia radicans*, Klotzsch et Hanst.
scabrida, Kuntze, l. c. = *Hyp. scabrida*, Lem.
Schlimii, Kuntze, l. c. 471 = *Col. Lindenii*, Kuntze.
Selloana, Kuntze, l. c. 472 = *Hypocyrtia Selloana*, Klotzsch et Hanst.
sericea, Kuntze, l. c. = *Hyp. sericea*, Hanst.
serrulata, Kuntze, l. c. = *Nematanthus serrulatus*, Presl.
Sprucei, Kuntze, l. c. 471. — Ecuad.
strigillosa, Kuntze, l. c. 472 = *Hypocyrtia strigillosa*, Mart.
Weirii, Kuntze, l. c. 471. — N. Granat.
- COLURIA**, R. Br. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 587.
Henryi, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 94. — China.
- COLUTEA**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 587.
armata, Hemsl. et Lace, in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. 322 t. 39. — Belutsch.
Delavayi, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 158 t. 38. — Yunnan.
uniflora, G. Beck, ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, (1886) 64. — As. occ.
- COLUTEASTRUM**, Moehr. = **Lesserti**, DC. (Legumin.).
abbreviatum, *annulare*, *argenteum*, *brachystachyum*, *candidum*, *capitatum*, *carnosum*, *depressum*, *excisum*, *flexuosum*, *fruticosum*, *inflatum*, *lanatum*, *macrostachium*, *obtusatum*, *Pappeanum*, *physodes*, *polystachyum*, *procumbens*, *prostratum*, *pubescens*, *spinescens*, *stenolobum*, *subumbellatum*, *sulcatum*, *tenuifolium*.
Kuntze, Rev. Gen. (1891) 172 = *homonyma* *Lessertiae*.
capense, Kuntze, l. c. 171 = *L. pulchra*, Sims.
dubium, Kuntze, l. c. = *L. diffusa*, R. Br.
glabratum, Kuntze, l. c. = *L. brachypus*, Haw.
herbaceum, Kuntze, l. c. = *L. linearis*, DC.
humile, Kuntze, l. c. = *L. falciformis*, DC.
parviflorum, Kuntze, l. c. 172 [sphalm.] = *L. pauciflora*, Haw.
perennans, Kuntze, l. c. 171 = *L. perennans*, DC.
vesicarium, Kuntze, l. c. = *L. tomentosa*, DC. et *vesicaria*, DC.
- COMAROSTAPHYLIS**, Zucc. = **Arctostaphylos**, Adans. (Ericac.).
diversifolia, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vii. (1887) 406 = *A. diversifolia*, Parry.
- COMBRETOPSIS**, K. Schum. in K. Schum. et

COMBRETOPSIS : —

Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 69. *OLACI-NEAE*.
pentaptera, K. Schum. l. c. (= *Lophoxyxis pentaptera*, Engl.). — N. Guin.

COMBRETUM, Linn. (Combret.). — Ind. Kew. i. 588.

abbreviatum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 292. — Afr. trop. or.
bacciferum, Pierre, ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 316 nomen (baccifera). — Cochinch.
Boehmii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 75 nomen = C. Nyikae, Engl.
bracteosum, Brandis, ex Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 123 nomen. — Ind. or.
Bragae, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.
camporum, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 62. — Congo.
Carvalhoi, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 292. — Afr. trop. or.
coriaceum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 247. — Afr. austro-occ. extratrop.
deciduum, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 58. — Burma.
deserti, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.
discolor, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1893) 9. — Bras.
Eilkerianum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 246. — Afr. austro-occ. extratrop.
exalatum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 290. — Afr. trop. or.
Fischeri, Engl. l. c. — Afr. trop. or.
fragrans, F. Hoffm. Beitr. Kennntn. Fl. Centr.-Ost-Afr. (1889) 31. — Afr. centr.
glandulosum, F. Hoffm. l. c. 33. — Afr. centr.
gondense, F. Hoffm. l. c. 32. — Afr. centr.
grandifolium, F. Hoffm. l. c. 29. — Afr. centr.
glutinosum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B (1895) 404 nomen. — Afr. trop. or.
hereroense, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 245. — Afr. austro-occ. extratrop.
Hildebrandtii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.
Holstii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.
Illairei, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 15 nomen. — Afr. trop. or.
Illairii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.
infundibuliforme, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 292. — Afr. trop. or.
laurifolium, Engl. l. c. — Afr. trop. or.
Leuconili, Schweinf. in Hoeckel, zum Rudolph See, Append. (1892) 12. — Afr. trop.
littoreum, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 18; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 17 nomen. — Afr. trop. or.
meruense, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.
microlepidotum, Engl. l. c. 290. — Afr. trop. or.
mossambicense, Engl. l. c. 292 (= *Poivrea mossambicensis*, Klotzsch). — Mossamb.
mweroense, Baker, in Kew Bull. (1895) 290. — Afr. centr. austr.
Nyikae, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.
oblongum, F. Hoffm. Beitr. Kennntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 34. — Afr. centr.
obovatum, F. Hoffm. l. c. 28. — Afr. centr.
olivaceum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 288. — Afr. trop. or.
Oliverianum, Engl. l. c. 424 in add. — Afr. trop. or.
parvifolium, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 290. — Afr. trop. or.
Petersii, Engl. l. c. (= *Argyrodendron Petersii*, Klotzsch). — Mossamb.
phaneropetalum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 315. — Madag.

COMBRETUM : —

pisoniiflorum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 293 (= *Shedendron pisoniiflorum*, Klotzsch). — Mossamb.
pisonioides, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 10. — Bras.
primigenum, Marl. in Bot. Jahrb. x. (1889) 49. — Afr. austro-occ. extratrop.
purpureiflorum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 292. — Afr. trop. or.
Raimbaulti, Heckel, in Les remèd. et Repert. de Pharm. (1891) = micranthum, G. Don.
rupicolum, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 28. — Ins. Fernando-Noronha.
Schelei, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 27 nomen; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.
Schumannii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.
splendens, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.
taborense, Engl. l. c. 290. — Afr. trop. or.
tenuispicatum, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.
transvaalense, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 202. — Transv.
trichopetalum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 292. — Afr. trop. or.
trichophyllum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 315. — Madag.
truncatum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 288 = Oliverianum, Engl.
turbinatum, J. Hoffm. Beitr. Fl. Centr.-Ost-Afr. (1889) 28. — Afr. centr.
ukambense, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.
umbricola, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 17 nomen; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 288. — Afr. trop. or.
usaramense, Engl. l. c. 290. — Afr. trop. or.
Volkensii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 18; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 290. — Afr. trop. or.
Wakefieldii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.

COMINSIA, Hemsl. in Ann. of Bot. v. (1891) 507 t. 28; et ex Gartenfl. (1891) 109. *SCITAMINEAE*.
Guppyi, Hemsl. ll. cc. — Ins. Salom.

COMMELINA, Plum. ex Linn. (Commel.). — Ind. Kew. i. 590.

angustissima, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 135. — Afr. trop. or.
Beccariana, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 87. — Abyss.
Boehmiana, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 135. — Afr. trop. or.
echinosperma, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.
Elliotii, C. B. Clarke et Rendle, ex S. Elliot in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 98. — Afr. trop.
esculenta, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 377 in syn. = *Aneilema esculentum*, Wall.
guineensis, Hua, in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 118. — Afr. trop. occ.
kilimandscharica, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 134. — Afr. trop. or.
lanuginosa, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 380 in syn. = *Aneilema lanuginosum*, Wall.
lunata, Heyne, l. c. 374 in syn. = *ensifolia*, R. Br. lutea, Cordemoy, Fl. Ile Reun. (1895) 147. — Ins. Borb.
montana, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 156 nomen. — Abyss.
obscura, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 135. — Afr. trop. or.
Schinzii, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 428. — Madag.
speciosa, Heller, Bot. Expl. S. Texas, 22, sphalm. = *leiandra*, C. B. Clarke.
Swingleana, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 160. — Florida.
trilobosperma, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 134. — Afr. trop. or.

COMMERÇONIA, F. Muell. ex Tate, in Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. xi. (1889) 82 = *Commersonia*, Forst. (Stercul.).

COMMERSONIA, Forst. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 593.

Tatei, F. Muell. ex Tate, in Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. xi. (1889) 82 (*Commerçonina*). — Austral.

COMMIPHORA, Jacq. (Burser.). — Ind. Kew. i. 593.

campestris, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 97. — Afr. trop. or.
caryaefolia, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2287. — Afr. austr.
cinerea, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 139. — Afr. austro-occ. extratrop.
crenato-serrata, Engl. l. c. 140. — Afr. austro-occ. extratrop.
cuneifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1899) 304. — Madag.
dulcis, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 141. — Afr. austro-occ. extratrop.
Eminii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 230. — Afr. trop. or.
Fischeri, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1893) 97. — Afr. trop. or.
fraxinifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 459. — Madag.
glaucescens, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 283. — Afr. austro-occ. extratrop.
Guerichiana, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1890) 141. — Afr. austro-occ. extratrop.
Holstii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16 et 25; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 229. — Afr. trop. or.
kilimandscharica, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 230. — Afr. trop. or.
laxiflora, Engl. l. c. — Afr. trop. or.
laxiflora, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 459. — Madag.
mollis, F. Hoffm. Beitr. Kennntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 21. — Afr. centr. or.
pteleifolia, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16 nomen; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 229. — Afr. trop. or.
resiniflua, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 15. — Abyss.
saxicola, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 283. — Afr. austro-occ. extratrop.
serrulata, Engl. l. c. xv. (1893) 96. — Reg. Somal.
somalensis, Engl. l. c. — Reg. Somal.
spatulifoliolata, Engl. l. c. xix. (1894) 140. — Afr. austro-occ. extratrop.
Stuhlmannii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 230. — Afr. trop. or.
virgata, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 139. — Afr. austro-occ. extratrop.
Woodii, Engl. l. c. xv. (1893) 97. — Natal.

COMOLIA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 593.
parvifolia, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 283. — Bras.
tetraquetra, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 603. — Bras.

COMOCLADIA, P. Br. (Anacard.). — Ind. Kew. i. 593.

Engleriana, Loesen, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 615. — Mexic.

COMOROA, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2408. *RUTACEAE*.

pisocarpa, Oliver, l. c. — Ins. Comor.

COMPERIA, C. Koch = **Orchis**, Linn.
harduchorum, Bornm. et Kraenzl. ex Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 141. — Persia.

COMPSOA, D. Don = **Tricyrtis**, Wall. (Liliac.).

flava, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 708 = T. flava, Maxim.
formosana, Kuntze, l. c. = T. formosana, Baker.
hirta, Kuntze, l. c. = T. hirta, Hook.
latifolia, Kuntze, l. c. = T. latifolia, Maxim.
macropoda, Kuntze, l. c. = T. macropoda, Miq.

COMPTONIA, Banks = **Myrica**, Linn.

pergrina, Coulter, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 127 = *M. asplenifolia*, Linn.

CONANTHERA, Ruiz et Pav. (Haemodor.). — Ind. Kew. i. 594.

trimaculata, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 226. et xviii. (1894) 436 (= *Cumingia trimaculata*, D. Don). — Chili.
variegata, Fenzl, ex H. W. Reichardt, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvi. (1886) 299. — Chili.

CONCHOPETALUM, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. (1888) 81; et in Sitzb. Akad. Muench. xx. (1890) 295. **SAPINDACEAE**.

madagascariense, Radlk. l. c. — Madag.
madagascariense, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1893) t. 250 a = praec.

CONDALIA, Cav. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 594.

lycioides, Weberbauer, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 404 (= *Zizyphus lycioides*, A. Gray). — Mexic.
obtusifolia, Weberbauer, l. c. (= *Z. obtusifolia*, A. Gray). — Am. bor.
Parryi, Weberbauer, l. c. (= *Z. Parryi*, Torr.). — Calif.

CONIOSELINUM, Fisch. = **Ligusticum**, Linn. (Umbellif.).

bipinnatum, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 233 = *Selinum canadense*, Michx.
chinense, Britton, Stern et Pogg. Prelim. Catal. (1888) 22 = *Sel. canadense*, Michx.

CONNAROPSIS, Planch. (Geran.). — Ind. Kew. i. 594.

macrophylla, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 201. — Perak.

CONNARUS, Linn. (Connar.). — Ind. Kew. i. 595.

Englerianus, Gilg, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 316. — Congo merid.
longistipitatus, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 191. — Afr. or.
nigrens, Gilg, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 317. — Nigrit.
pachyneurus, Radlk. in Sitzb. math.-phys. Akad. Muench. xvi. (1886) 365. — Bras.
Pottsi, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 463. — Guatem.
pseudoracemosus, Gilg, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 317. — Gabon.
Stuhlmannianus, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 192. — Afr. trop. or.

CONOCEPHALUS, Blume (Urtic.). — Ind. Kew. i. 596.

amboinensis, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 189 (= *Poikilospermum amboinense*, Zipp.). — Ins. Amboin.
amoenus, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 545. — Penins. Mal.
Scortechinii, King, l. c. 545. — Penins. Mal.

CONOMORPHA, A. DC. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 597.

verticillata, Zahlbr. in Ann. naturh. Hofm. Wien, vii. (1892) 3. — Peruvia.

CONOPODIUM, Koch (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 597.

elatum, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xiii. (1891) 83; et Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 205. — Hisp.
pyrenaicum, Jeanb. et Timb.-Lagr. Le Capsir, (1887), ex Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 157. — Pyren.
Richter, Rony, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 231. — Gall. merid.

CONOSTEGIA, D. Don (Melast.). — Ind. Kew. i. 598.

Bernoulliana, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 698. — Am. centr.
bigibbosa, Cogn. in Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 252. — Costarica.

CONOSTEGIA : —

Cooperii, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 705. — Costarica.
Donell-Smithii, Cogn. l. c. 706; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 252. — Costarica.
Grisebachii, Cogn. l. c. 700. — Jamaica.
hirtella, Cogn. in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 4; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 711. — Guatem.
lanceolata, Cogn. l. c. 708; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 253. — Costarica.
Lindenii, Cogn. l. c. 705. — Cuba.
mexicana, Cogn. l. c. 707. — Mexic.
Monteleagreana, Cogn. l. c. 1189 [Append.]; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 251. = Costarica.
Pittieri, Cogn. ex Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvii. (1888) 176. — Costarica.
Poeppigii, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1887) 211. — Bras.
puberula, Cogn. in DC. Monog. Phan. (1891) 703. — Am. centr.
Trianaei, Cogn. l. c. 702. — N. Granat.
viridis, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 286. — Guatem.

CONVALLARIA, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 599.

aetnea, Tornab. Fl. Sicula (1887) 534. — Sicil.
polygonata, St-Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 768 = *Polygonatum officinale*, All.

CONVOLVULUS, [Tourn.]. Linn. (Convolv.). — Ind. Kew. i. 597.

agrestis, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 101 (= *Evolvulus agrestis*, Schweinf.). — Afr. trop.
angolensis, Baker, in Kew Bull. (1894) 67. — Angola.
arabicus, Hochst. ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 100 = *glomeratus*, Choisy.
Ascheroni, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 349. — Abyss.
Binghamiae, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vii. (1887) 417. — Calif.
Boedeckerianus, Peter, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 a. (1891) 18. — Afr. austr.
Bornmuelleri, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 56. — Oriens.
chrysorrhizus, Forst. ex Wien. Illustr. Gartenz. (1888) 288 = *Ipomoea Batatas*, Linn.
fastigiatus, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 97 (= *Breweria fastigiata*, Balf. f.). — Ins. Socotr.
Fauroti, Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 121. — Afr. or.
geranioides, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 222. — Chili.
glandulosus, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 102 (= *Rhodorrhiza glandulosa*, Webb). — Ins. Canar.
hadramauticus, Baker, in Kew Bull. (1894) 337. — Arabia.
hamphilahensis, Terracc. in Ann. Inst. bot. Roma, v. (1894) 105. — Afr. or.
inconspicuus, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 106. — Afr. austr.
kentrocaulos, Steud. ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 119 = *Ipomoea tuberosa*, Rich.
Kilimandschari, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 348. — Afr. trop. or.
macrocalycinus, Hausskn. et Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 66 = *holosericeus*, Bieb.
mucronatus, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 246. — Afr. austr.
ndorensis, Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 351, nomen. — Afr. trop. or.
ornatus, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 247. — Afr. austr.
ovatus, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 221. — Chili.
Parishii, Peter, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 533 nomen. — Californ.
Philippisae, Baker, in Kew Bull. (1895) 221. — Reg. Somal.

CONVOLVULUS : —

praelongus, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 403. — Bras.
rhynchophyllus, Baker, ex Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 247, nomen. — Afr. austr.
Schimperi, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 347. — Abyss.
Schweinfurthii, Engl. l. c. 348. — Abyss.
segobricensis, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 7; Willk. Suppl. Prod. Fl. Hisp. (1874) 168, in obs. [sphalm. segobricensis] = *aroensis*, Linn.
sinuatodentatus, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 98. — Burma.
Sintenisii, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 349. — Ins. Cypr.
sphaerophorus, Baker, in Kew Bull. (1895) 221. — Reg. Somal.
spicatus, Peter, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 99. — Arabia.
Steudneri, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 350. — Abyss.
subacaulis, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 265.
Thomsoni, Baker, in Kew Bull. (1894) 67. — Afr. trop. austro-or.
truncatella, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 495. — N. Zel.
ulosepalus, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 103. — Afr. austr.
venosus, Hallier f. l. c. 109. — Teneriffa.
verticillatus, Pavon, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 543 = *Jacquemontia polyantha*, Hallier f.

CONYZA, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 607.

amplexicaulis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 489. — Madag.
andicola, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1891) 38. — Am. austr. occ.
araucana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 696. — Chili.
armeriifolia, Phil. l. c. 680. — Chili.
australis, Phil. Reconoc. Rio Palena (1886) 125; ex Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1894) 683. — Patag.
Bocconi, Tornab. Fl. Sicula (1887) 303. — Sicil.
capillipes, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 387. — Bras.
colinensis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1895) 688. — Chili.
conglomerata, Phil. l. c. 687. — Chili.
copiapina, Phil. l. c. 686. — Chili.
Coxi, Phil. l. c. 690. — Chili.
cyanea, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 125 nomen. — Afr. trop. or.
cylindrica, Baker, in Kew Bull. (1895) 317. — Arabia.
depilis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 691. — Chili.
deserticola, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1891) 38. — Am. austr.-occ.
elata, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. viii. (1893) 78. — Austral.
Ellisii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 489 = *C. Garnierii*, Klatt.
foliosa, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 692. — Chili.
gigantea, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 408. — Afr. trop. or.
glabrata, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 690. — Chili.
lateralis, Phil. l. c. 679. — Chili.
longipedunculata, Klatt, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 22. — Madag.
miniata, Klatt, l. c. 23. — Madag.
minutiflora, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 692. — Chili.
Moelleri, Phil. l. c. 686. — Chili.
monocephala, Phil. l. c. 680. — Chili.
monticola, Phil. l. c. 685. — Chili.
nemoralis, Phil. l. c. 689. — Chili.
patens, Phil. l. c. 691. — Chili.
Paulseni, Phil. l. c. 682. — Chili.
pencana, Phil. l. c. 695. — Chili.
plebeja, Phil. l. c. 685. — Chili.
pulsatilloides, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 225. — Afr. aequat. or.

CONYZA : —

- pyncophylla, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 693. — Chili.
 ruderalis, *Phil. l. c.* 694. — Chili.
 serratifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 488. — Madag.
 setulosa, *F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) — Chili.
 spartioides, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 224. — Afr. trop. or.
 spicata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 679. — Chili.
 spicata, *Phil. l. c.* xci. (1895) 679. — Chili.
 stenodonta, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 316. — Arabia.
 stenophylla, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 687. — Chili.
 subscaposa, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 225. — Afr. trop. or.
 tamborensis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië.* ii. 1. (1891) 237. — Sumbawa.
 Telekii, *Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 421 nomen; et in *Hoehn. zum Rudolph See*, Append. (1892) 10. — Afr. trop. or.
 tenera, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1895) 682. — Chili.
 tenera, *Phil. l. c.* 684. — Chili.
 thernarum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 327. — Madag.
 valdisiana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 697. — Chili.
 Volkensii, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 224. — Afr. trop. or.
 yungasensis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 55. — Bolivia.

COPAICA, Mill. = **Copacifera**, Linn. (Legumin.).
bijuga, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 172 = *C. bijuga*, Wild.

- bracteata*, Kuntze, l. c. = *C. bracteata*, Benth.
coleosperma, Kuntze, l. c. = *C. coleosperma*, Benth.
confertiflora, Kuntze, l. c. = *C. confertiflora*, Benth.
conjugata, Kuntze, l. c. = *C. Gorskiana*, Benth.
copallifera, Kuntze, l. c. = *C. Guibourtiana*, Benth.
coriacea, Kuntze, l. c. = *C. coriacea*, Mart.
disperma, Kuntze, l. c. = *C. disperma*, Willem.
elliptica, Kuntze, l. c. = *C. elliptica*, Mart.
guyanensis, Desf.
hymenaeifolia, Kuntze, l. c. = *C. hymenaeifolia*, Moric.
Jussieu, Kuntze, l. c. = *C. Jussieu*, Hayae.
Langsdorffii, Kuntze, l. c. = *C. Langsdorffii*, Desf.
marginata, Kuntze, l. c. = *C. marginata*, Benth.
Martii, Kuntze, l. c. = *C. Martii*, Hayne.
Mopane, Kuntze, l. c. = *C. Mopane*, J. Kurk.
multijuga, Kuntze, l. c. = *C. multijuga*, Hayne.
oblongifolia, Kuntze, l. c. = *C. oblongifolia*, Mart.
officinalis, Kuntze, l. c. = *C. officinalis*, Linn.
rigida, Kuntze, l. c. = *C. rigida*, Benth.
trapezifolia, Kuntze, l. c. = *C. trapezifolia*, Hayne.

COPAIFERA, Linn. (Legum.). — Ind. Kew. i. 610.
Cornui, Heckel, in *Ann. Fac. sci. Marseille*, fasc. i. (1891) 15. — Afr. trop.
Gorskia, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. 1888 (1889) 172 sphalm. = *C. Gorskiana*, Benth.
Salikounda, Heckel, in *Ann. Fac. sci. Marseille*, iii. (1891) 4. t. 16. — Afr. trop.

COPERNICIA, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. i. 610.
alba, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 246. — Parag.
rubra, Morong, l. c. 247. — Parag.

COPROSMA, Forst. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 611.
alba, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 388. — N. Zel.
areolata, Cheesem, l. c. xviii. 1885 (1886) 315. — N. Zel.
aurantiaca, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 464. — N. Zel.
autumnalis, Colenso, l. c. xix. 1886 (1887) 263. — N. Zel.
Buchanani, T. Kirk, l. c. xxiv. 1891 (1892) 424. — N. Zel.
coffaeoides, Colenso, l. c. xxi. 1888 (1889) 87. — N. Zel.
crassicaulis, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* vi. (1894) 186. — Borneo.

COPROSMA : —

- cymosa*, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 186. — Ins. Sandvic.
heterophylla, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 263 = *rhannoides*, A. Cunn.
Hookeri, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 187. — Borneo.
latifolia, Colenso, ex Cheesem, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 229 = *grandifolia*, Hook. f.
lentissima, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 465. — N. Zel.
macrocarpa, Cheesem, l. c. xx. 1887 (1888) 147. — N. Zel.
montana, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 185. — Ins. Sandvic.
multiflora, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 86. — N. Zel.
orbiculata, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 465. — N. Zel.
pendula, Colenso, l. c. xxi. 1888 (1889) 84. — N. Zel.
perpusilla, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 466. — N. Zel.
Petriei, Cheesem, l. c. xviii. 1885 (1886) 316; et ex *Bot. Centraltbl.* xlvi. (1891) 28. — N. Zel.
pubens, Petrie, l. c. xxvi. 1893 (1894) 267 = *ramulosa*, Petrie.
ramulosa, Petrie, l. c. xxvii. 1894 (1895) 406. — N. Zel.
retusa, Petrie, l. c. xxvi. 1893 (1894) 268. — N. Zel.
rigida, Cheesem, l. c. xix. 1886 (1887) 243. — N. Zel.
rufescens, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 261 = *rotundifolia*, A. Cunn.
stephanocarpa, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 187. — Ins. Sandvic.
tenuifolia, Cheesem, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 315. — N. Zel.
turbinata, Colenso, l. c. xxiv. 1891 (1892) 389. — N. Zel.

COPTOSPELTA, Korth. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 611.

macrophylla, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1892) 51 = *flavescens*, Roxb.

CORALLOCARPUS, Welw. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 612.

- glomeruliflorus*, Schweinf. ex Deflers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 304 in syn. = *Phialocarpus glomeruliflorus*, Deflers.
Schinzi, Cogn. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 153. — Afr. austro-occ. extratrop.
sphaerocarpus, Cogn. l. c. 154. — Afr. austro-occ. extratrop.

CORALLODENDRON, Tourn. = **Erythrina**, Linn. (Legumin.).

- abyssinicum*, *acanthocarpum*, *arborescens*, *bracteatum*, *breviflorum*, *Brucei*, *cafrum*, *Crista-Galli*, *divaricatum*, *excelsum*, *falcatum*, *fussum*, *glaucum*, *herbaceum*, *holosericeum*, *horridum*, *huillense*, *leptorhizum*, *lithospermum*, *Livingstonianum*, *lobulatum*, *longipes*, *mite*, *monospermum*, *Mulungu*, *nervosum*, *ovalifolium*, *patens*, *princeps*, *resupinatum*, *reticulatum*, *roseum*, *rubrinerve*, *senegalense*, *setosum*, *spathaceum*, *strictum*, *suberifera*, *suberosum*, *sumatranum*, *umbrosum*, *velutinum*, *Vespertilio*, *Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 172-173 = *homonyma omnia* Erythrinae.
americanum, Kuntze, l. c. 172 = *E. cornea*, Ait.
australe, Kuntze, l. c. = *E. Corallodendron*, Linn. var.
corallobes, Kuntze, l. c. = *E. corallobes*, DC.
Humei, Kuntze, l. c. 173 = *E. Humeana*, Spreng.
latissimum, Kuntze, l. c. = *E. tomentosa*, R. Br.
occidentale, Kuntze, l. c. 172 = *E. Corallodendron*, Linn. var. *occidentale*, Linn.
orientale, Kuntze, l. c. = *E. indica*, Lam.

CORALLODISCUS, Batalin, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1894) 145. **GESNERACEAE.**
conchaefolius, Batalin, l. c. — China.

CORALLORHIZA, Hall. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 612.

- Corallorhiza*, Mac Millan, *Metasp. Minn.* (1892) 174; et in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 15 (= *C. Corallorhiza*, Karst.). = *innata*, R. Br.

CORCHORUS, [Tourn.] Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 612.

- Allenii*, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Oct. 1891) 85. nomen; et in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. vi. 1891 (May 1892) 462. — Austral.
cinerascens, Deflers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 300. — Arabia.
Elderii, F. Muell. in *Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral.* ix. (1887) 58. — Austral.
hamatus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 458. — Madag.

CORDIA, Linn. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 613.

- Andersonii*, Gürke, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 83 (= *Varronia canescens*, Anderss.). — Ins. Galap.
atrofusca, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 12. — Bras.
aurantiaca, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 26. — Afr. trop.
Blancoi, Vidal, *Rev. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 192. — Ins. Philip.
Caput-Medusae, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 28 (1893) 15. — Bras.
chrysocarpa, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 27. — Angola.
dichotoma, Gürke, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 84 = *C. bifurcata*, Roem. et Schult.
Fischeri, Gürke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 335. — Afr. trop. or.
flava, Gürke, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 83 (= *Varronia flava*, Anderss.). — Ins. Galap.
galapagensis, Gürke, l. c. (= *V. scaberrima*, Anderss.). — Ins. Galap.
Glaziovii, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 14 (= *Patagonula Glaziovii*, Mez.). — Bras.
Haenkeana, Mez, in *Bot. Jahrb.* xii. (1890) 560. — Peruv.
harara, G. Beck, in *Paulitschke, Harrar* (1888) 357. — Afr. trop. or.
Heudelotii, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 27. — Afr. trop. occ.
Holstii, Gürke, ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 51; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 335. — Afr. trop. or.
Hookeriana, Gürke, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 83 (= *C. linearis*, Hook. f.). — Ins. Galap.
Irvingii, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 113. — Lagos.
jucunda, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 401. — Bras.
Kirkii, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 28. — Zambesia.
leucomalla, Taub., in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 14. — Bras.
longipeda, Mez, l. c. xii. (1890) 550. — Bras.
longipes, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 27. — Angola.
Meziana, Gürke, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 84 (= *C. amplifolia*, Mez.). — Am. trop.
Millenii, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 27. — Lagos.
Nettoana, Taub., in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 11. — Bras.
obovata, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 28. — Abyss.
Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 62. — Calif.
Palmeri, Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) tab. 9 = *C. Sonorae*, Rose.
pilosissima, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 28. — Angola.
platythyrsa, *Baker, l. c.* 28. — Afr. trop. occ.
populifolia, *Baker, l. c.* 27. — Afr. trop. occ.
Pringlei, Robins. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 169. — Mexic.
quarensis, Gürke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 335. — Afr. trop. or.
senegalensis, Hochst. ex Baker, in *Kew Bull.* (1894) 28 = *obovata*, Baker.
serrata, Gürke, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 83. — Am. austr.
somaliensis, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 28. — Reg. Somal.
Sonorae, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 106. — Mexic.

CORDIA : —

- Sprucei, Mez, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 549. — Bras.
 Stuhlmannii, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 335. — Afr. trop. or.
 thyrsoiflora, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 18 = Ehretia serrata, Roxb.
 venosa, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 143. — China.
 Watsoni, N. E. Rose, ex Vasey et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 89. — Mexic.
 Zedambae, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 58. — Abyss.

CORDIERA, A. Rich. = **Alibertia**, A. Rich. (Rubiaceae).

- bertierifolia, claviflora, concolor, curviflora, edulis, elliptica, humilis, longiflora, macrophylla, obtusa, oligantha, rigida, sessilis, vinosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 279 = homonyma omnia Alibertiae.
 Garapatica, Kuntze, l. c. = A. edulis, A. Rich.
 hexagyna, Kuntze, l. c. = A. hexagyna, Karst.
 jacquinioides, Kuntze, l. c. = A. jacquinioides, Griseb.
 myricifolia, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 393 = A. myricifolia, K. Schum.
 vaccinioides, Kuntze Rev. Gen. 279 = A. vaccinioides, K. Schum.

CORDYLINE, Royen (Liliaceae). — Ind. Kew. i. 615.

- flabelliformis, Corderm. Fl. Ile Réunion. (1895) 151 (an C. flabelliformis, Kunth?). — Ins. Bourbon.
 Hectori, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892 (1893) 334. — N. Zel.
 lineata, Hort. ex Rodigas, in Illustr. Hort. xl. (1893) 121 t. 590 = indivisa, Steud.
 macrophylla, Corderm. Fl. Ile Réunion. (1895) 153 = C. macrophylla, C. Koch.
 Rashleighana, X, Hort. ex Gard. Chron. (1886) i. 818. — Hybr. artef.

COREOPSIS, Linn. (Compositae). — Ind. Kew. i. 616.

- arizonica, O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1890) 243 = Leptosyne arizonica, A. Gray.
 Buchneri, Klatt, Leopoldina, Heft xxv. (1889) 107. — Angola.
 Buchneri, Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 103 (an praec?). — Angola.
 cordifolia, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 109 = Bidens cordifolia, Sch. Bip.
 cordylocarpa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 428. — Mexic.
 coriacea, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1899) 414. — Afr. trop. or.
 exaristata, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.
 Fischeri, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.
 frondosa, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.
 Holstii, O. Hoffm. l. c. 415. — Afr. trop. or.
 Jordini, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 109 = Bidens Jordini, Sch. Bip.
 kilimandscharica, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 234. — Afr. trop. or.
 lineata, Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 103. — Angola.
 longifolia, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 47. — Am. bor.-or.
 nucensis, Heller, Bot. Expl. S. Texas, (1895) 106 = coronata, Hook.
 oligantha, Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 103. — Angola.
 oligoiflora, Klatt, in Leopoldina, Heft xxv. (1889) 107. — Angola.
 polycephala, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 108 = Bidens polycephala, Sch. Bip.
 petrophila, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 428. — Mexic.
 serrulata, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 109 = Bidens serrulata, Sch. Bip.
 simplicifolia, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 435. — Abyss.
 Stuhlmannii, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 415. — Afr. trop. or.
 trilobata, Vahl, ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90 in syn. = Montania pauciflora, Klatt.

CORETHROGYNE, DC. (Compositae). — Ind.

- Kew. i. 617.
 cana, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. 1885 (1886) 223. — Calif.

CORIARIA, Niss. ex Linn. (Coriariae). — Ind. Kew. i. 618.

- papuana, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 22. — Oceania.
 terminalis, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xxiv. (1892) t. 2220. — China.

CORION, Mitch. = **Spergularia**, J. et C. Presl (Caryophyllae).

- medium, N. E. Br. in Bot. Exch. Club Brit. Isles, Report for 1892 (1893) = Spergularia media.

CORIS, Tourn. ex. Linn. (Primulaceae). — Ind. Kew. i. 618

- purpurea, St-Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 576 = monspeliensis, Linn.

CORMIGONUS, Rafin. = **Bikkia**, Reinw. (Rubiaceae).

- campanulata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 279 (= Grisia campanulata, Brongn.). — N. Caled.
 carneus, Kuntze, l. c. — N. Caled.
 Deplanchei, Kuntze, l. c. — N. Caled.
 fritillarioides, Kuntze, l. c. (= Grisia fritillarioides, Brongn.). — N. Caled.
 macrophylla, Kuntze, l. c. (= G. macrophylla, Brongn.). — N. Caled.
 neritifolia, Kuntze, l. c. (= G. neritifolia, Brongn.). — N. Caled.
 Pancheri, Kuntze, l. c. (= Bikkiaopsis Pancheria). — N. Caled.
 portlandioides, Kuntze, l. c. (= Tatea portlandioides, Seem.). — N. Caled.
 tetrandus, Kuntze, l. c. = B. grandiflora, Reinw.

CORMONEMA, Reissek (Rhamnaceae). — Ind. Kew. i. 618.

- mexicana, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. III. (1895) 315. — Mexic.
 Nelsoni, Coul., l. c. — Mexic.

CORMUS, Spach = **Pyrus**, Linn. (Rosaceae).

- crenata, Koehne, in Gartenfl. (1891) 59; et Deutsche Dendrol. (1893) 255 = P. crenata, D. Don.
 lanata, Koehne, l. c. 59 et 254 = P. lanata, D. Don.

CORNIDIA, Ruiz et Pav. = **Hydrangea**, Linn. (Saxifragaceae).

- integerrima, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 189 = Schizophragma hydrangeoides, Sieb. et Zucc.

CORNUELLA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 66. **SAPOTACEAE**.

- venezuelanensis, Pierre, l. c. (1891) 68. — Venez.

CORNUS, [Tourn.] Linn. (Cornaceae). — Ind. Kew. i. 619.

- Baileyi, Coul., et Evans, in Coul., Bot. Gaz. xv. (1890) 37; et in Gard. and For. iii. (1890) 464. fig. 58. — Am. bor.
 Greenei, Coul., et Evans, in Coul., Bot. Gaz. xv. (1890) 36; et ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 159 (sphalm. ? Coul. et Rose). — Calif.
 hongkongensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 345. — China.
 Nuttalli, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 436 = glabrata, Benth. ?
 occidentalis, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. IV. (1893) 117 = pubescens, Nutt.
 scabridus, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. viii. 1885 (1886) 250. — China.
 Volkensii, Harms, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 301. — Afr. trop. or.

CORONILLA, Tourn. ex Linn. (Leguminosae). — Ind. Kew. i. 620.

- Pomeli, Batt. ex Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 353; et in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (1889) 288 = juncea, Linn.
 scorpioides, St-Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 311 = scorpioides, Koch.

CORONOPUS, Rupp. = **Senebiera** DC. (Crucif.).

- Coronopus, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 265 (= C. Coronopus, Karst.) = S. Coronopus, Poir.
 Helenianus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 = S. pinnatifida, DC. ?
 integrifolius, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 161 (= C. integrifolius Spreng.) = S. integrifolia, DC.
 lepidioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 = S. lepidioides, Coss.
 linodes, Kuntze, l. c. 26 = S. integrifolia, DC.
 niloticus, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 161 (= C. niloticus, Spreng.) = S. nilotica, Delile.
 pectinatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 = S. pinnatifida, DC.
 pinnatifidus, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 238 (= C. pinnatifidus, Dulac) = S. pinnatifida, DC.
 violaceus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 = S. violacea, Munby.

CORTUSA, Linn. (Primulaceae). — Ind. Kew. i. 620.

- pekinensis, A. Richt. in Termeszt. Füzetek (1894) 130. — China.

CORUNASTYLIS, Fitzg. Austral. Orchids, ii, iii. (Dec. 1888). **ORCHIDEAE**. [= **Anticheirostylis**, Fitzg., 1891].

- apostasioides, Fitzg. l. c. — Austral.

CORYANTHES, Hook. (Orchidaceae). — Ind. Kew. i. 621.

- Bungerothii, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) ii. 210; et in Lindenia vi. (1890) 11. t. 244. — Venez.
 leucocorys, Rolfe, l. c. vii. (1891) 13 t. 293. — Peruvia.
 macrocorys, Rolfe, l. c. viii. (1892) 17. t. 342. — Peruvia.
 orbiculata, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxxiii. 1890 (1891) 389. — N. Zel.

CORYCIUM, Sw. (Orchidaceae). — Ind. Kew. i. 621.

- tricuspidatum, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 176 et 2075 fig. 13. — Afr. austr.

CORYDALIS, Vent. (Papaveraceae). — Ind. Kew. I. 621.

- anthriscifolia, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. viii. 1885 (1886) 196. — China.
 balcanica, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 28; et Fl. Bulg. (1891) 21. — Bulg.
 bicalcarata, Velen. Fl. Bulg. (1891) 20. — Bulg.
 Boweri, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 108. — Tibet.
 cachemiriana, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1886) 392 = pachycentra, Franch.
 calcarea, Alboff, Prod. fl. Colchic. (1895) 17. — Reg. transcauc.
 capillipes, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. vii. x. (1886) 139. — Japon.
 cheilanthifolia, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 302. — China.
 cheirifolia, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 285. — Yunnan.
 conspersa, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 49 t. 25 fig. 1-5. — Tibet.
 Crista-galli, Maxim. l. c. 47 t. 25. fig. 26-31. — Tibet.
 cristata, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 47. — China.
 curviflora, Maxim. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xiii. (1886) 37, nomen; et Fl. Tangut. (1889) 41. t. 20. fig. 1-11. — China.
 Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. viii. 1885 (1886) 198. — China.
 Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 393. — China.
 Duthiei, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 49, in obs. t. 25. fig. 12-17. — Reg. Himal.
 echinocarpa, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 393. — China.
 elata, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 20. — China.
 Fargesii, Franch. l. c. viii. (1894) 290. — China.
 flexuosa, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. viii. 1885 (1886) 197. — China.

CORYDALIS : —

- glareosa, *Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 27. — Cauc.
 gracilis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 395. — China.
 hamata, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 291. — Tibet.
 Hannae, *Kanitz, Pl. exp. Szechenyi in Asia centr. coll.* (1891) 7. — Asia centr.
 Hendersonii, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 109. — Tibet.
 leiosperma, *Conrath, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 50. — Bosnia.
 livida, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 49. — China.
 lopinensis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 283. — China.
 micrantha, *A. Gray, ex Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 189. — Amer. bor. austr.
 moupinensis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III.* viii. 1885 (1886) 198. — China.
 mucronata, *Franch. l. c.* 197. — China.
 mucronifera, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 51. t. 24. fig. 19-21. — Tibet.
 oxypetala, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 392. — China.
 pachycentra, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 45. — Yunnan.
 petrophila, *Franch. l. c.* 47. — Yunnan.
 Potanini, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 48. — China.
 Prattii, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 284. — China.
 pulchella, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 44. — Yunnan.
 scaberula, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 40 t. 24 fig. 1-11. — Tibet.
 scandens, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 391 = *Dicentra scandens, Walp.*
 slivenensis, *Velen. ex Nym. Consp. Fl. Eur. et Fl. Bulg.* (1891) 20. — Bulg.
 Souliei, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 283. — China.
 stenantha, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 49. — Yunnan.
 straminea, *Maxim. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. (1886) 38. nomen; et *Fl. Tangut.* (1889) 44. t. 20. fig. 17-24. — China.
 swanetica, *Krassnow, Enum. pl. nouv. Swanétie* (1891) 15. — Reg. Caucas.
 stenantha, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 49. — China.
 taliensis, *Franch. l. c.* 48. — Yunnan.
 temulifolia, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 290. — China.
 thalictrifolia, *Franch. l. c.* 291. — China.
 tomentella, *Franch. l. c.* 292. — China.
 tongolensis, *Franch. l. c.* 285. — China.
 trifoliolata, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 392. — China.
 trisecta, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 284. — China.
 triternata, *Franch. l. c.* 290. — Yunnan.
 yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 394. — China.

- CORYLUS**, [Tourn.] Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 622.
 calyculata, *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 132 fig. 63. — Am. bor.
 colchica, *Alboff, Prod. fl. Colch.* (1895) 219. — Reg. Cauc.
 rostrata, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 132 = *calyculata, Dippel.*
 serotina, *Hort. ex Dippel. l. c.* = *americana, Walt.*
 tibetica, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 102. — China.
 urticaefolia, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 128 = *C. Avellana, Linn.*
 virginiana, *Hort. ex Dippel. l. c.* 132 = *calyculata, Dippel.*

- CORYMBIS**, Thou. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 623.
 brevistylis, *Hook. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 92. — Perak.
 decumbens, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. (1895) 276. t. 67 (= *Chloidia decumbens, Lindl.*). — Am. austr.
 leptantha, *Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45 et 53; et *ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A.* (1895) 83 et 89 = *corymbosa, Thou.*

CORYMBIS : —

- longiflora, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 92. — Penins. Mal.
 rhytidocarpa, *Hook. f. l. c.* — Perak.

- CORYNOLOBUS** *brachycarpus*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii (1886) 524 in syn. = *Erucastrum brachycarpum, Rouy.*

- CORYNOPHALLUS**, Schott = **Amorphophallus**, Blume (Aroid.).
 angolensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 741 (= *Hydrosme angolensis, Schott.*). — Afr. trop.
 consimilis, Kuntze, l. c. = *A. consimilis, Blume, Fontanesii, Kuntze, l. c.* = *A. Fontanesii, Kunth.*
 gratus, Kuntze, l. c. (= *Hydrosme grata, Engl.*). — Afr. trop.
 Hohenackeri, Kuntze, l. c. = *Rhaphiophallus Hohenackeri, Schott.*
 maximus, Kuntze, l. c. (= *Hydrosme maxima, Engl.*). — Afr. trop.
 mossambicensis, Kuntze, l. c. = *A. mossambicensis, Klotzsch.*

- CORYNOSTYLIS**, Mart. (Violar.). — Ind. Kew. i. 623.

- palustris, *Rodr. in Vellozia, i.* (1885-88), Sec. edic. (1891) 4. t. 3. — Bras.
 pubescens, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 306. — Bras.

- CORYPHA**, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 623.
 decora, *Hort. Bull. Catal.* (1887) 10; et *ex W. Wats. in Kew Bull.* iii. (1889) 294 = *Livistona inermis, R. Br.*
 Martiana, *Becc. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 429. — Burma.

- CORYTHEA**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 451. **EUPHORBACEAE.**
 filipes, *S. Wats. l. c.* — Mexic.

- CORYTHOLOMA**, Decne. = **Gesneria**, Mart. (Gesnerac.).
 allagophyllum, Fritsch, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1894) 180. = *G. allagophylla, Mart.*
 maculatum, Fritsch, l. c. = *G. maculata, Mart.*
 magnificum, Fritsch, l. c. = *G. magnifica, Otto et Dietr.*
 splendens, Fritsch, l. c. fig. 79 = *G. splendens, Van Houtte.*
 tuberosum, Fritsch, l. c. = *G. tuberosa, Mart.*
 cardinale, Fritsch, l. c. = *G. cardinalis, Lehm.*

- COSMOS**, Cav. (Composit.). — Ind. Kew. i. 624.
 aurantiaca, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxv.* (1889) 105. — Guatem.
 exiguus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 429. — Mexic.
 hybridus, *Hort. ex Gard. and For. i.* (1888) 474. — Mexic.?

- COSSIGNIA**, « Comm. » ex Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 354 = **Cossinia**, Comm. (Sapind.).

- COSSONIA**, Durieu = **Raffenaldia**, Godr. (Crucif.).
 intermedia, *Coss. Ill. fl. Atlant. i.* (1884) 53; et *Comp. fl. Atl. ii.* (1887) 224. — Marocc.
 platycarpa, *Coss. l. c. i.* 54. t. 37; et *ii.* (1887) 225. — Marocc.

- COSTAEA**, A. Rich. = **Purdiaea**, Planch. (Cyrill.).
 nutans, *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1892) 182 = *Purdiaea nutans, Planch.*

- COSTULARIA**, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 658. **CYPERACEAE.**
 Baroni, *C. B. Clarke, l. c.* — Madagasc.
 Melleri, *C. B. Clarke, l. c.* — Madagasc.
 natalensis, *C. B. Clarke, l. c.* — Natal.
 pantopoda, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Cladium pantopodum, Baker, pr. p.*) — Madagasc.
 recurva, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Rhynchospora leucocarpa, Ridl.*). — Madagasc.

- COSTUS**, Linn. (Scitamin.). — Ind. Kew. i. 625.
 acaulis, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 481. t. 33. fig. 1-5. — Bras.
 bicolor, *J. Braun et K. Schum. in Mitth. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 151. — Kamerun.
 elegans, *Hort. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 52 = *Malortieanus, Wendl.*
 Englerianus, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 419; et *in Monatsschr. Kakteenk.* iii. (1893) 13. — Kamerun.
 Friedrichsenii, *Petersen, in Bot. Tidsskr.* xviii. (1893) 260 t. 15. — Hab.?
 giganteus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 687 = *Kuntzei, K. Schum.*
 giganteus, *Welw. mss. ex Ridl. in Journ. Bot.* xxv. (1887) 131. — Angola.
 Kingii, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 250. — Perak.
 Kuntzei, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 422 in obs. (= *C. giganteus, Kuntze.*) — Costa-Rica.
 lanceolatus, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 56. — Bras.
 laxus, *Petersen, l. c.* — Costarica.
 Lucanusianus, *J. Braun et K. Schum. in Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 151; et *ex K. Schum. in Gartenfl.* xli. (1892) 482. t. 1379. — Kamerun.
 mexicanus, *Liebm. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 59 nomen; et *in Bot. Tidsskr.* xviii. (1893) 261 t. 16. — Mexic.
 mosaicus, *Bull. Catal.* (1887) 10. — Congo.
 pauciflorus, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 421. — Gabon.
 phyllocephalus, *K. Schum. l. c.* 420. — Angola.
 pistiifolius, *K. Schum. l. c.* 424. — Angola.
 pubescens, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 481. — Bras.
 pumilus, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 58. — Bras.
 spectabilis, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 422 = *Kaempferia spectabilis, Fenzl.*
 Tappenbeckianus, *J. Braun et K. Schum. in Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 152. — Kamerun.
 trachyphyllus, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 420. — Afr. trop. centr. bor.
 unifolius, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1892) ii. 696 = *Englerianus, K. Schum.*
 Warmingii, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 57. — Bras.

- COTINUS**, [Tourn.] Linn. = **Rhus**, Linn. (Anacard.).
 cotinoides, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 216. = *R. cotinoides, Nutt.*
 Cotinus, *Sargent, in Gard. and For.* iv. (1891) 340 = *R. Cotinus, Linn.*

- COTONEASTER**, Rupp. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 625.
 angustifolia, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 221. — Yunnan.
 cordata, *Focke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1888) 21 = *Crataegus cordata, Soland.*
 coriacea, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 222. — Yunnan.
 glaucophylla, *Franch. l. c.* — Yunnan.
 intermedia, *Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) p. cxxii. = *tomentosa, Lindl.*
 moupinensis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III.* viii. 1885 (1886) 224. — China.
 mucronata, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 223. — China.
 pannosa, *Franch. l. c.* — Yunnan.
 sikkimensis, *Hort. ex Wien. Illustr. Gartenz.* (1890) 248. — Reg. Himal.
 salicifolia, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III.* viii. 1885 (1886) 225. — China.

- COTTENDORFIA**, Schult. f. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 626.
 guianensis, *Klotzsch, ex Baker, Handb. Bromel.* (1889) 129 (= *Anoplophyton guianense, Beer.*) — Guiana.
 neogranatensis, *Baker, l. c.* — N. Gran.
 Pearcei, *Baker, l. c.* 128. — Am. austr. trop.
 Weddelliana, *Brongn. ex Baker, l. c.* 129. — Bolivia.

- COTULA**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 626.

COTULA : —

- Goyeni, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885, (1886) 295. — N. Zel.
 Hombronii, *Franch. Miss. scient. Cap Horn* (1886) 345. — Fret. Magell.
 scariosa, *Franch. l. c.* 334 = *Leptinella scariosa*, Cass.
 venosa, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 388. — N. Zel.

COTYLANThERA, Blume (Gentian.). — Ind. Kew. i. 626.

- tenella, *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2, (1895) 64 (= *Eophylon tenellum*, A. Gray). — Ins. Pacif.

COTYLEDON, Tourn. ex Linn. (Crassul.). — Ind. Kew. i. 627.

- Aizoon, *Schoenl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* III. 2a. (1890) 33 (= *Umbilicus Aizoon*, Ferzl.). — As. min.
 alsinoides, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 231 = *Tillaea alsinoides*, Hook. f.
 attenuata S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 472. — Calif.
 Barbeyi, *Schweinf. ex Penzig, in Att. Congr. Bot. Genov.* (1893) 341; *W. Wats. in Gard. Chron.* (1893) i. 624. — Arabia, Erithrea.
 lanceolata, *Greene, Pittonia, i.* (1889) 264 = *linearis*, Greene.
 linearis, *Greene, Pittonia, i.* (1889) 285. — Calif.
 nubigena, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1891) 136. — Calif.
 patens, *Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]* (1888) 329 = *C. Umbilicus*, Linn.
 pendulinus, *Batt. l. c.* = *C. Umbilicus*, Linn.
 Pringlei, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 148. — Mexic.
 rubens, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 155. — Calif.
 sikokiana, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* v. (1891) 213 nomen. — Japon.
 subrigidum, *Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 105. — Mexic.

COTYLELOBIOPSIS, Heim, Rech. Diptérocarp. (1892) 125. DIPTEROCARPEAE.

- Beccariana, *Heim, l. c.* (an *Cotylelobium Beccarii*, Pierre?). — Borneo.

COTYLELOBIUM, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1889) sub t. 235. DIPTEROCARPEAE.

- Beccarianum, *Heim, Rech. Diptérocarp.* (1892) 122 [an sp. seq. ?]. — Borneo.
 Beccarii, *Pierre, l. c.* (1891) t. 258 b. (= *Vatica Beccariana*, Heim). — Borneo.
 Burckii, *Heim, Rech. Diptérocarp.* (1892) 122 = *flavum*, Pierre.
 flavum, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* (1891) t. 258 a (= *Vatica Burckii*, Heim). — Cochinch.
 Harmandii, *Heim, Rech. Diptérocarp.* (1892) 122 (= *Vatica Harmandii*, Heim). — Borneo.
 hopeifolium, *Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 971 = *Hopea Heimiana*, Brandis.
 Melanoxylon, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* (1889) sub t. 235 (= *Anisoptera ? Melanoxylon*, Hook.). — Borneo.
 philippinense, *Heim, ex Brandis, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 134 = *Shorea Mangachapoi*, Blume.
 scabriusculum, *Brandis, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 114; et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* III. 6 (1895) 268 (= *Vatica scabriuscula*, A. DC.). — As. trop.

COUBLANDIA, Aubl. = **Muelleria**, Linn. f. (Legumin.).

- mexicana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 173 = seq. mexicana, *Taub. in Bot. Centralbl.* xlvii. (1891) 389 = *M. mexicana*, Benth.

COUEPIA, Aubl. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 628.

- amazonica, *Fritsch, in Ann. naturh. Hofmus. Wien.* v. (1890) 12. — Bras.
 floccosa, *Fritsch, l. c.* — Guatem.
 insignis, *Fritsch, l. c.* xi. — Bras.
 Schottii, *Fritsch, l. c.* xiii. — Bras.

COULTERELLA, Vasey et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 71; et ex O. Hoffm., in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1890) 390. COMPOSITAE.

- capitata, *Vasey et Rose, l. c.* t. 1; et 390. — Calif.
 Vaseyi, *Rose, ex O. Hoffm. l. c.* iv. 5. (1893) 390. —

COULTERINA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = **Physaria**, A. Gray (Crucif.).

- didymocarpa, *Geyeri, Newberryi, oregana*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Physariae.

COULTEROPHYTUM, Robins. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1893) 168. UMBELLIFERAE.

- laxum, *Robins. l. c.* 169. — Mexic.

COUMAROUNA, Aubl. = **Dipteryx**, Schreb. (Legumin.).

- alata, *Taub. in Bot. Centralbl.* xlvii. (1891) 389 = *D. alata*, Vogel.
 coriacea, *Taub. l. c.* = *D. nudipes*, Tul.
 crassifolia, *Taub. l. c.* = *D. crassifolia*, Benth.
 oleifera, *Taub. l. c.* = *D. oleifera*, Benth. et Hook. f.
 oppositifolia, *Taub. l. c.* = *D. oppositifolia*, Willd.
 reticulata, *Taub. l. c.* = *D. reticulata*, Benth.
 rosea, *Taub. l. c.* = *D. rosea*, Spruce.
 tetraphylla, *Taub. l. c.* = *D. tetraphylla*, Spruce.

COURSETIA, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 629.

- axillaris, *Coult. et Rose, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1891) 81. — Texas.
 mexicana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 424 = *Willardia mexicana*, Rose.

COURTOISIA, Nees (Cyper.). — Ind. Kew. i. 629.

- assimilis, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 596 (= *Cyperus assimilis*, Steud.). — Abyss.

COUSINIA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 629.

- afghanica, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 273. — Afghan.
 Aitchisoni, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 308. — Afghan., Persia.
 Aitchisoni, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 275. — Afghan.
 Albertoregelii, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 91. — Turkest.
 alpica, *Borszczow, ex C. Winkl. l. c.* xii. (1892) 282 = *alpina*, Bunge.
 amara, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 88. — Turkest.
 amoena, *C. Winkl. l. c.* xiii. (1894) 237. — Turkest.
 Antonowi, *C. Winkl. l. c.* xi. (1889) 135 t. 2 fig. 2. — Turkest.
 arbelensis, *C. Winkl. et Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 566 et 567, t. 14. — Kurdist.
 arida, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xv. (1892) 190. — Persia.
 aurea, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 475. — Turkest.
 Barbeyi, *C. Winkl. l. c.* xii. (1892) 274. — Persia.
 Batalini, *C. Winkl. l. c.* 248. — Buchara.
 Beckeri, *Trautv. l. c.* ix. (1886) 457. — Turkest.
 bicolor, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 204. — Armenia.
 bucharica, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 473 et 477. — Buchara.
 caespitosa, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 93. — Turkest.
 carduchorum, *C. Winkl. et Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 566 et 568 t. 15. — Kurdist.
 corymbosa, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 89. — Turkest.
 cynaroides, *C. Winkl. ex Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 79 = *afghanica*, C. Winkl.
 darwasica, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 249. — Buchara.
 Dayi, *Post, Pl. Postianae*, ii. (1891) 13. — Syria.
 decolorans, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 206. — Armenia.
 deserti, *Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 77 = *arida*, C. Winkl.
 dichacantha, *Lipsky, Exc. bot. au delà Mer Casp.* (1889) 12. — Rossia.
 divaricata, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 334. — Turkest.

COUSINIA : —

- fallax, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 471. — As. centr.
 Fetissowi, *C. Winkl. l. c.* xii. (1892) 247. — Turkest.
 Francheti, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 578 in obs. (= *C. canescens*, Franch.). — China.
 Gilesi, *C. Winkl. l. c.* xii. (1892) 251. — As. centr.
 Gmelini, *C. Winkl. l. c.* 241. — Persia.
 hastifolia, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 571. — As. centr.
 Haussknechti, *C. Winkl. l. c.* xii. (1892) 238. — Persia.
 Hemsleyana, *C. Winkl. l. c.* 228. — Afghan.
 hissarica, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 93. — Buchara.
 interrupta, *C. Winkl. l. c.* xii. (1892) 229. — Turkest.
 intertexta, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 169. — Armenia.
 jassyensis, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 472. — Turkest.
 Komarowii, *C. Winkl. l. c.* 470 in obs. — As. centr.
 kurdica, *C. Winkl. et Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 564 et 567, t. 13. — Kurdist.
 laetevirens, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 576. — Turkest.
 lanata, *C. Winkl. l. c.* xiii. (1894) 238. — Turkest.
 lancifolia, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 572. — As. centr.
 Layardi, *Ball et Barbey, [Note sur le] Cousinia Layardi* (1890) 2 cum ic.; *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 196. — Kurdist.
 lyratifolia, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 90. — Turkest.
 Massalskyi, *C. Winkl. l. c.* xi. (1889) 131 in obs. — Armenia.
 Newesskyana, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 333. — Turkest.
 nivea, *C. Winkl. l. c.* xii. (1892) 261. — As. centr.
 Onopordon, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 207. — Armenia.
 orientalis, *O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1890) 319 = *Auchera orientalis*, DC.
 pannosa, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 578. — Turkest.
 perennis, *C. Winkl. l. c.* xi. (1892) 192. — Afghan.
 persarum, *C. Winkl. l. c.* xli. (1892) 227. — Persia.
 poliothrix, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 577. — Turkest.
 Postiana, *C. Winkl. l. c.* xii. (1892) 223. — Syria.
 pseudomollis, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 470. — As. centr.
 pulchra, *C. Winkl. l. c.* 478. — Buchara.
 pusilla, *C. Winkl. l. c.* 468. — Buchara.
 pygmaea, *C. Winkl. l. c.* 467. — Buchara.
 Raddeana, *C. Winkl. l. c.* 473 in obs.; et xi. (1889) 132 t. 1. — Turkest.
 rotundifolia, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 579. — Turkest.
 sarawschanica, *C. Winkl. l. c.* ix. (1886) 424. — As. centr.
 Schlagintweitii, *C. Winkl. l. c.* xii. (1892) 262. — Ind. or.
 Schmalhauseni, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 474. — As. centr.
 semidecurrens, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 574. — Turkest.
 simulatrix, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 573. — Turcom.
 Sintenisii, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 205. — Armenia.
 speciosa, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 579. — As. centr.
 splendida, *C. Winkl. l. c.* xiii. (1894) 240. — Turkest.
 Stapfiana, *Freyn et Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 218. — As. Min.
 stephanophora, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 575. — Buchara.
 Stocksi, *C. Winkl. l. c.* xii. (1892) 216. — Belutschist.
 tomentella, *C. Winkl. l. c.* x. (1887) 469. — Turkest.
 turcomanica, *C. Winkl. l. c.* xi. (1889) 133 tab. 2 fig. 1. — Turkest.
 Wesheni, *Post, Pl. Postianae*, ii. (1891) 13. — Syria.
 Winkleriana, *Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 79. — Afghan.

COUSSAPOA, Aubl. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 630.

- Leopoldi, *Hort. ex Rev. Hortic.* (1894) 251. — Bras.

COUSSAREA, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 630.
frondosa, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 374. — Bras.

COUTAREA, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 631.
hexandra E. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 156; et in Bot. Jahrb. x. (1889) 315 = *speciosa*, Aubl.
octomera, Hemsl. Biol. Centr.-Amer. iv. (1886) 101. — Ins. Cozumel.

COUTHOVIA, A. Gray (Logan.). — Ind. Kew. i. 631.
densiflora, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 215. — N. Guin.

COUTOUBEA, Aubl. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 631.
scandens, Knobl. in Bot. Centralbl. ix. (1894) 356. = *volubilis*, Mart.

COVILLEA, M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 229 = **Larrea**, Cav. (Ficoid.).
divaricata, Coville, l. c. = *L. divaricata*, Cav.

CRABBEA, Harv. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 631.
undulatifolia, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 263. — Afr. austr.
velutina, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 135. — Afr. trop. or.

CRACCA, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 631.
bicolor, M. Micheli, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 444. t. 11. — Guatem.
micrantha, M. Micheli, ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 286. — Costarica.

CRACCA, Linn. = **Tephrosia**, Pers. (Legumin.).
acaciaefolia, *adunca*, *aemula*, *aequilata*, *ambigua*, *amoena*, *andongensis*, *angustissima*, *Ansellii*, *arabica*, *astragalina*, *barbiger*, *Bidwillii*, *brachycarpa*, *brachystachya*, *bracteolata*, *brevipes*, *brunnea*, *calophylla*, *canescens*, *capensis*, *capillipes*, *chrysophylla*, *cephalantha*, *concinna*, *coriacea*, *crassifolia*, *crocea*, *dasyphylla*, *decumbens*, *densiflora*, *dichotoma*, *dichrocarpa*, *diffusa*, *dimorphophylla*, *discolor*, *disperma*, *dolichocarpa*, *Dregeana*, *elegans*, *elongata*, *eriocarpa*, *falcata*, *fasciculata*, *filiformis*, *filipes*, *flammea*, *flexuosa*, *Forrestiana*, *frutescens*, *fruticosa*, *fulvivenis*, *glomeruliflora*, *gracilipes*, *graminifolia*, *grandiflora*, *heterantha*, *hispidula*, *huilensis*, *humilis*, *juncea*, *Kirkii*, *Kraussiana*, *laevigata*, *lamprolobioides*, *lanata*, *leiocarpa*, *leptoclada*, *leucantha*, *Lindheimeri*, *linearis*, *longipes*, *lupinifolia*, *lurida*, *macrocarpa*, *macropoda*, *madrensis*, *mariana*, *melanocalyx*, *myrtifolia*, *nana*, *nematophylla*, *nicaraguensis*, *nitens*, *noctiflora*, *nubica*, *obcordata*, *oblongata*, *oblongifolia*, *oligophylla*, *pallens*, *paniculata*, *pedicellata*, *Perriniana*, *phaeosperma*, *platycarpa*, *pogonostigma*, *polysperma*, *polystachya*, *polyzyga*, *porrecta*, *pulchella*, *pusilla*, *radicans*, *remotiflora*, *reptans*, *reticulata*, *rigidula*, *rosea*, *secunda*, *semiglabra*, *Senna*, *senticosa*, *sericea*, *simplicifolia*, *sphaeroperma*, *spicata*, *spinosa*, *stipularis*, *Stuartii*, *subtriflora*, *tenuis*, *totia*, *toxicaria*, *uniovulata*, *velutina*, *venosa*, *vestita*, *virginiana*, *Vogelii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 174-175 = *homonyma omnia* Tephrosiae.

anthyllodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 174 = *T. anthyllodes*, Hochst.

astragalodes, Kuntze, l. c. = *T. astragaloides*, Benth.

candida, Kuntze, l. c. 173 = *T. singuliflora*, F. Muell.

cinerea, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 79 = *T. cinerea*, Pers.

conferta, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 174 = *T. singuliflora*, F. Muell.

emerodes, Kuntze, l. c. = *T. emeroides*, A. Rich.

floridana, M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 35. — Florida.

intermedia, Small, l. c. xxi. (1894) 303. — Florida.

lathyroides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 175 = *T. lathyroides*, Guill. et Perr.

leptostachya, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 18 = *T. leptostachya*, DC.

CRACCA : —

onobrychodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 175 = *T. onobrychoides*, Nutt.

orobodes, Kuntze, l. c. = *T. oroboides*, H. B. et K. oxygera, Kuntze, l. c. = *T. oxygona*, Walp.

Richardiana, Kuntze, l. c. = *T. vicioides*, A. Rich.

rigida, Kuntze, l. c. = *T. rigida*, Baker.

Schottii, M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 25 in obs. — Columb.

Smallii, M. Vail, l. c. 33. — Am. bor. or.

sophorodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 175. = *T. sophoroides*, DC.

vicioides, Kuntze, l. c. = *T. vicioides*, Schlecht.

CRAMBE, Tourn. ex Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 632.

arbores, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 94. — Ins. Canar.

gomeraea, Webb ex Christ, l. c. — Ins. Canar.

laevigata, DC. ex Christ, l. c. — Ins. Canar.

Viracana, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 93 = *Pritzellii*, C. Bolle.

CRANICHIS, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 632.

candida, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. vi. (1895) 248 = *similis*, Reichb. f.

multiflora, Cogn. l. c. = *foliosa*, Lindl.

CRANIOTOME, Reichb. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 633.

furcata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 516 = *versicolor*, Reichb.

CRANOCARPUS, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 633.

Mezii, Taub. in Flora, lxxii. (1889) 128 et 426. — Bras.

CRANTZIA, Schreb. = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).

asiatica, *bilocularis*, *densiflora*, *lanceolata*, *macrophylla*, *micrantha*, *natalensis*, *nobilis*, *paniculata*, *pilosa*, *Willdenowii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 99 = *homonyma omnia* Toddaliae.

nitida, Kuntze, l. c. = *T. aculeata*, Pers.

schmidelioides, Kuntze, l. c. = *T. schmidelioides*, Baker.

CRANTZIA, Scop. = **Alloplectus**, Mart. (Gesnerac.).

capitata, *circinnata*, *coccinea*, *congesta*, *coriacea*, *corymbosa*, *costaricensis*, *dichrus*, *ichthyoderma*, *Lindenii*, *multiflora*, *parviflora*, *Patrisii*, *pendula*, *semicordata*, *speciosa*, *Sprucei*, *strigosa*, *tetragona*, *tigrina*, *villosa*, *Wrinii*, *Fritsch*, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. IV. 3b. (1894) 168 = *homonyma omnia* Alloplecti.

CRASSINA, Scep. = **Zinnia**, Linn. (Compos.).

acerosa, *angustifolia*, *anomala*, *bicolor*, *elegans*, *grandiflora*, *juniperifolia*, *linearis*, *maritima*, *pumila*, *verticillata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 331 = *homonyma omnia* Zinniae.

intermedia, Kuntze, l. c. = *Z. pauciflora*, Linn.

leptopoda, Kuntze, l. c. = *Z. pauciflora*, Linn.

multiflora, Kuntze, l. c. = *Z. pauciflora*, Linn.

peruviana, Kuntze, l. c. = *Z. pauciflora*, Linn.

tenuiflora, Kuntze, l. c. = *Z. pauciflora*, Linn.

CRASSOCEPHALUM, Moench = **Gynura**, Cass. (Compos.).

aurantiacum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 331 = *G. aurantiaca*, DC.

Cusimbua, Kuntze, l. c. = *G. angulosa*, DC.

densifolium, Kuntze, l. c. = *G. densifolia*, Miq.

Pseudochina, Kuntze, l. c. = *G. pseudo-china*, DC.

pubigerum, Kuntze, l. c. 332 = *G. sarmentosa*, DC.

Teysmannianum, Kuntze, l. c. 331. — Java.

CRASSULA, Dill. ex Linn. (Crassul.). — Ind. Kew. i. 633.

acinaciformis, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 204. — Transv.

alsinoides, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 231 = *Tillaea alsinoides*, Hook. f.

andicola, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 239 = *T. andicola*, Phil.

aquatica, Schoenl. in Engl. et Prantl, Natürl.

CRASSULA : —

Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 37 = *T. aquatica*, Linn.

Coleae, Baker, in Kew Bull. (1895) 214. — Reg. Somal.

cordifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 315. — Madag.

curta, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 144. — Natal.

fragilis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 469. — Madag.

heterotricha, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 203. — Natal.

Holstii, Pax, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 59 nomen. — Afr. trop.

Macowani, S. Elliot, in Journ. Bot. xxix. (1891) 69. — Afr. austr.

peduncularis, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 239; et xviii. (1894) 417 = *Tillaea peduncularis*, Smith.

pentandra, Schoenl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 37 = *T. pentandra*, Royle.

pharnaceoides, Schoenl. l. c. (= *C. pharnaceoides*, C. A. Mey.) = *T. pharnaceoides*, Hochst.

recurva, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 684. — Afr. austr.

rhomboidea, N. E. Br. l. c. (1886) ii. 712. — Afr. austr.

Schmidtii, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 602; et in Gartenfl. xxxv. (1886) 345. t. 1225. (= *C. impressa*, N. E. Br., non Dietr.). — Afr. austr.

Solieri, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 239 = *Tillaea Solieri*, Gay.

Schweinfurthii, Hort. Dammann, ex Gartenfl. xli. (1892) 525. — Abyss.

umbraticola, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 145. — Natal.

Volkensii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 189. — Afr. trop. or.

CRATAEGUS, Tourn. ex Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 635.

Carrierei, Hort. Vauvel, ex Kew Bull. (1892) Append. i. 24; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 234. — Hybr. artif.

dahurica, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 240 = *pinnatifida*, Bunge.

Dippeliana, Lange, in Bot. Tidsskr. xix. (1895) 261. — Hab. ?

Douglasi, Macoun, Cat. Canad. Pl. i. (1886) 523 = *coccinea*, Linn.

Downingii, Hort. ex Kew Bull. (1892) Append. i. 24. — Form. hort.

filicifolia, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 238 = *monogyna*, Jacq.

flexispina, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 424 = *flava*, Ait.

florida, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 231 = *parvifolia*, Soland.

germanica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 215 = *Pyrus germanica*, Hook. f.

grignonensis, Mouillef. ex Wien. Illustr. Gartenzeit. (1890) 248. — Form. hort. ?

intermixta, G. Beck, Fl. Nied. Oest. ii. i. (1892) 706. — Austria.

intricata, Lange, in Bot. Tidsskr. xi. (1895) 264. — Am. bor.

Lavallei, Hort. Paris, ex Sarg. N. Amer. Sylva. vi. (1892) 91 in syn. = *C. Crus-galli*, Linn.

oxyacanthidea, St-Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 291 = *C. Oxyacantha*, Linn.

paucifoliata, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 22 = *C. Oxyacantha*, Linn.

Philippii, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 240. = *pinnatifida*, Bunge.

Wattiana, Hemsl. et Late, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1891) 323 t. 40. — Belutsch.

CRATAEVA, Linn. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 636.

mucronata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 38 = *Nie-buhria mucronata*, Kuntze.

CRATERICARPIUM, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).

subulatum, Raimann, in Engl. et Prantl, Natürl.

CRATERICARPIUM : —

Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 212, sphalm. = *Oe. subulata*, Ruiz et Pav.

CRATERISPERMUM, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 637.

orientale, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 387. — Afr. trop. or.

CRATEROSIPHON, Engl. et Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 275; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1894) 233. **THYMELAEACEAE**.

scandens, Engl. et Gilg, ll. cc. — Kamerun.

CRATEROSTEMMA, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 154; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 266. **ASCLEPIADEAE**. Schinzii, K. Schum. ll. cc. — Afr. austro-occ. extratrop.**CRATEROSTIGMA**, Hochst. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 637.

nanum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 357 = *Torenia nana*, Benth.

CRAWFURDIA, Wall. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 637.

luzoniensis, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 191. — Ins. Philipp.
volubilis, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 79 (= *Pterygocalyx volubilis*, Maxim.). — As. centr. bor.

CREMANTHODIUM, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. i. 638.

Potanini, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 150. — China.

CREMASPORA, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 638.

confluens, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 383. — Afr. trop. or.
heterophylla, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.
triflora, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 88 = *africana*, Benth.

CREMASTUS, Miers = **Bignonia**, Linn.

pulchra, Bureau, ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1894) 222. — Bras.

CREMOCARPUS, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 133 = **Cremoncarpon**, Boiss. (Rubiace.).

Boivinianus, K. Schum. l. c. = *Cremoncarpon Boivinianum*, Bull.

CREMOLOBUS, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 638.

bolivianus, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 17. — Bolivia.

CREPIDOCARPUS, Klotzsch = **Scirpus**, Linn. (Cyper.).

Schinzii, Klotzsch, ex Boeck, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 46 = *S. cubensis*, Poepp. et Kth.

CREPINELLA, Marchal (ex Oliver) in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 275 (Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 194). **ARALIA-CEAE**.

gracilis, Marchal, ll. cc. 275 et 195. — Guian. angl.

CREPINODENDRON, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 28. **SAPOTACEAE**.

crotonoides, Pierre l. c. (1890) 28 = *Chrysophyllum crotonoides*, Klotzsch.

CREPIS, [Vaill.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 638.

Aitchisoni, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 324. — Afghan.

Bakeri, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 73. — Calif. balcanica, Velen. zolastni otisk Vestnik (1890); et Fl. Bulg. (1891) 334. — Bulg.

Baldaccii, Haldasy, in Verh. zool. bot. Ges. Wien, xlii. 1892 (1893) 577. — Albanien.

CREPIS : —

blattarifolia, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 502 = *blattarioides*, Vill.

bupleurifolia, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 268 = *Sonchus bupleurifolius*, Boiss. et Kotschy.

chloroclada, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 78. — Burma.

Claryi, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888) 563. — Algeria.

confusa, Wolosz. in Spraw. Kom. fizyj. Krakow. xxi. (1888) ii. 126 = *grandiflora*, Tausch.

cylindrica, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 500.

dinarica, G. Beck, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 169 t. 3 fig. 2 = *incarnata*, Tausch.

Geisseana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 328. — Chili.

geracioides, Hauskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. II. i. (1889) 201; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge. vii. (1895) 52. — Graecia.

heterophylla, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 475. — China.

heterophylla, Klatt, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 368. — Mexic.

hispanica, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 11; et ii. (1889) 30. — Hisp.

hyemalis, Ces. Passer. et Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 452 (= *Barkhausia hyemalis*, Biv.) = *C. taraxacifolia*, Thuill.

kilimandscharica, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 402. — Afr. trop. or.

longipes, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 476. — China.

modocensis, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 48. — Calif.

moesiaca, Degen et Baldacci, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 302. — Monten., Herceg.

mucronata, Ces. Passer. et Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 252 (= *Barkhausia mucronata*, Bertol.) = *C. alpestris*, Reichb.

Murmanni, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 325 = *lampsanoides*, Froel.

nigra, Velen, in Act. Soc. Sci. Bohem. (1887) 23, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. (1889) 201 = *viscidula*, Froel.

oenipontana, J. Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii (1893) 178; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii (1894) 19. — Tirol.

oligophylla, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 426. — Angola.

orbicula, Velen, Zolastni otisk Vestnik (1890); et Fl. Bulg. (1891) 334. — Bulg.

prenanthoides, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 477. — China.

scorzoneroides, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 120. — Hisp.

sorocephala, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 116 t. 4 fig. 1-4. — Tibet.

Stockiana, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 82. — Afghanistan.

suberosa, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (1889) 561 (= *Barkhausia suberosa*, Coss. et Durieu). — Algeria.

subcaposa, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 78. — Burma.

trichocarpa, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 257. — China.

turicensis, Bruegg. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. (1886) 202. — Helv.

Umbrella, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 255. — Yunnan.

valentina, Willk. Suppl. Fl. Hisp. (1893) 116 = *pulchra*, Linn.

CRESSA, Linn. [Convolvul.]. — Ind. Kew. i. 642.

aphylla, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. i. (1895) 80 t. 5. — Texas.

Ballii, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888) 629. — Algeria.

CRINODENDRON, Molina = **Tricuspidaria**, Ruiz et Pav. (Tiliac.).

dependens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 82 = *T. dependens*, Ruiz et Pav.

CRINUM, Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 642.

angolense, Benth. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 80. — Angola.

angustifolium, Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xii. (1889) 117 nomen = *flaccidum*, Herb.

argentinum, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 325. — Reg. Argent.

Bakeri, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 194. — As. or. insul.

Colensoi, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 93. = *C. Moorei*, Hook. f.

crassicaule, Baker, l. c. 85. — Afr. trop. austro-or.

crassipes, Baker, in Gard. Chron. (1887) ii. 126; et l. c. 90. — Hab.?

Douglasii, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. x. (1895) 27. — Austral.

jemenicum, Hort. ex Damman, in Gartenfl. (1892) 26 fig. 12. = *latifolium*, Linn.

jemense « Hort. Damman » ex Gard. Chron. (1893) i. 658 = *praec.*

Kunthianum, Hort. Damman, ex Wien. Illustr. Gartenz. (1890) 358 fig. 76; et in Kew Bull. (1891) App. ii. 46. — Hab.?

Lastii, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 79. — Afr. trop. or.

longitubum, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 141. — Angola.

Mackenii, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 93 = *C. Moorei*, Hook. f.

macrantherum, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 448. — Melanesia.

Makoyanum, Hort. ex Rev. hort. Belg., xiii. (1887) 241 cum xylogr. = *C. Moorei*, Hook. f.

Massaianum, N. E. Br. in Kew Bull. ii. (1888) 100. — Zanzib.

modestum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 528. — Madag.

natalense, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 93. = *C. Moorei*, Hook. f.

pauciflorum, Miq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 285 in syn. = *Pancratium triflorum*, Roxb.

pedicellatum, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 142. — Afr. trop. or.

pedunculatum, Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xii. (1889) 117 nomen = *flaccidum*, Herb.

Poggei, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 141. — Afr. trop.

Powellii, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 95. — Hybr. artef.

Rautanenianum, Schinz, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 250. — Afr. austro-occ. extratrop.

Roozenianum, O'Brien, in Gard. Chron. (1891) i. 701. — Jamaica.

Schimperi, Vathe, ex K. Schum. in Gartenfl. xxxviii. (1889) 561 t. 1309; et ex Bot. Mag. (1895) t. 7417. — Abyss.

Thruppii, Baker, ex Oliver, in F. L. James, Unkn. Horn of Afr., Append. (1888) 322; et Handb. Amaryll. (1888) 79. — Reg. Somal.

Wattii, Baker, l. c. 76. — Ind. or.

yemensse, Hort. Damman, in Gard. Chron. (1893) i. 658 (= *C. jemenicum*, Hort. Damman) = *latifolium*, Linn.

CRISTARIA, Cav. (Malv.). — Ind. Kew. i. 643.

cyanea, Phil. ex Baker f. in Journ. Bot. xxx. (1892) 76. — Chili.

divaricata, Phil. l. c. 77. — Chili.

flexuosa, Phil. in Anal. Mus. nac. Chilic. (1891) 10. — Am. austr. occ.

grandidentata, Phil. ex Baker f. in Journ. Bot. xxx. (1892) 77. — Chili.

microptera, Phil. ex Baker f. l. c. xxxii. (1894) 37. — Chili.

ranunculifolia, Phil. ex Baker f. l. c. xxx. (1892) 78. — Chili.

saniculaefolia, Phil. l. c. 77. — Chili.

CROCODILODES, Adans. = **Berkheya**, Ehrh. (Compos.).

annectens, coriaceum, corymbosum, cruciatum, cuneatum, Dregel, Ecklonis, eryngiifolium, palmatum, pinnatum, pungens, purpureum, seminivum, setiferum, Spoked-

CROCODILODES : —

- num. subulatum, umbellatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 332-3 = *homonyma omnia* Berkheya.
- acanthopodium, aristosum, bilobum, bipinnatifidum, cardopatitfolium, carlinifolium, cirsiifolium, discolor, echinaceum, echinopodium, epitrachys, Eriobasis, erysithales, Gerrardii, glabratum, glabriusculum, grandifolium, Helianthiflorum, heterophyllum, M'Kenii, membranifolium, microcephalum, multijugum, onopordifolium, petiolatum, pinnatifidum, platypterum, polyacanthum, Radula, rhaponticum, rigidum, sonchifolium, speciosum, sphaerocephalum, viscosum, Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 332-3 = *homonyma omnia* Stobaeae [= Berkheya].
- acarnodes*, Kuntze, l. c. (= *Stobaea acarnoides*, DC.). — Afr. austr.
- aculeatum*, Kuntze, l. c. 332 = *B. obovata*, Willd.
- angustifolium*, Kuntze, l. c. = *B. lanceolata*, Willd.
- armatum*, Kuntze, l. c. = *B. carthamoides*, Willd.
- atractylodes*, Kuntze, l. c. = *B. carlinoides*, Willd.
- barbatum*, Kuntze, l. c. = *B. carlinoides*, Willd.
- decurrens*, Kuntze, l. c. = *B. scolymoides*, DC.
- fruticosum*, Kuntze, l. c. = *B. fruticosa*, Ehrh.
- gazanoides*, Kuntze, l. c. = *B. gazanioides*, Harv.
- gorterodes*, Kuntze, l. c. = *B. gorteroides*, Oliver et Hiern.
- Harveyanum*, Kuntze, l. c. = *B. seminivea*, Harv.
- herbaceum*, Kuntze, l. c. = *B. cynaroides*, Willd.
- herpicoides*, Kuntze, l. c. = *B. herpicoides*, Sond.
- insignis*, Kuntze, l. c. = *B. subulata*, Harv.
- minus*, Kuntze, l. c. = [Quid. ?] — Afr. austr.
- onobromodes*, Kuntze, l. c. (= *Stobaea onobromoides*, DC.).
- oppositifolium*, Kuntze, l. c. = *B. grandiflora*, Willd.
- scolymodes*, Kuntze, l. c. (= *Stobaea scolymoides*, DC.). — Afr. austr.
- spinosum*, Kuntze, l. c. (= *Stobaea oppositifolia*, DC.). — Afr. austr.
- stobaeodes*, Kuntze, l. c. = *B. stobaeoides*, Harv.

CROCOPSIS, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 324, *AMARYLLIDEAE*.
argentinum, Pax, l. c. xi. (1889) 325. — Reg. Argent.
fulgens, Pax, l. c. — Reg. Argent.

CROCUS, [Tourn.] Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 644.
Autrani, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 242. — Reg. Cauc.
Mouradi, Whittall, in The Garden, xxxv. (1889) 373. — As. Min.
officinalis, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. (1890) 187. — Austria.
Vilmæ, Fiala, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 247; et in Wissensch. Mitth. Bosn. und Herceg. i. (1893) 562 cum ic. — Bosnia.

CROIXIA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 32. *SAPOTACEAE*.
Beccariana, Pierre, (err. cal. ? *Beccanaria*) l. c. 33. — Born., Penins. Mal.

CROSSANDRA, Salisb. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 646.
brachystachys, Lindau, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. vi. 3 b. (1895) 319. = *nilotica*, Oliver.
leikipiensis, Schweinf. in Hoehnelt, zum Rudolph See, Append. (1892) 7. — Afr. trop. or.
likipiensis, Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 391 = *praec.*
mucronata, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 35. — Afr. trop. or.
parvifolia, Lindau, l. c. 37. — Afr. trop. or.
primuloides, Lindau, l. c. 36. — Angola.
pungens, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.
Stenandrium, Lindau, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 319 (= *Polythrix Stenandrium*, Nees) = *C. madagascariensis*, T. Anders.
tridentata, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 370. — Afr. trop. or.

CROSSOPETALUM, P. Br. = **Myginda**, Linn. (Celastr.).
Bredemeyeri, distichum, ilicifolium, integrifolium, lati-

CROSSOPETALUM : —

- folium, microphyllum, pallens, rotundatum, scoparium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 116 = *homonyma omnia* Mygindae.
- aquifolium*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 70 = *M. aquifolia*, Griseb.
- gonocladum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 70. — Antill.
- myrsinodes*, Kuntze, l. c. = *M. myrsinoides*, H. B. et K.
- pallens*, Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. I. (1895) 32 = *M. pallens*, Sm.
- Rhacoma*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 70 (= *C. Rhacoma*, Crantz) = *M. Rhacoma*, Sw.
- theodes*, Kuntze, (Rev. Gen. (1891) 116 = *M. theoides*, Berth.

CROSSOPTERYX, Fenzl (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 646.
africana, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 378 (= *C. africana*, Baill.) = *Kotschyana*, Fenzl.

CROSSOSOMA, Nutt. (Dilleniace.). — Ind. Kew. i. 646.
parviflora, Robins. et Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 114. — Mexic.

CROSSOSTYLIS, Forst. (Rhizophor.). — Ind. Kew. i. 646.
Cominsii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 212 t. 10. —
Seemannii, A. F. W. Schimp. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 51 = *Hoplopetalum Seemannii*, A. Gray.

CROTALARIA, Dill. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 646.
adenocarpoides, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 206. — Afr. trop. or.
agatiflora, Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 244 nomen; et in Hoehnelt, zum Rudolph See, Append. (1892) 13. — Afr. trop. or.
aurantiaca, Baker, in Kew Bull. (1895) 213. — Reg. Somal.
Belckii, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 159. — Afr. austro-occ. extratrop.
Boehmii, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 204. — Afr. trop. or.
burmanica, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 38. — Burma.
Cornetii, Taub. et Dewèvre, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. 2, 1894 (1895) 99; et xxxiv. 2 (1895) 94. — Congo.
damarensis, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 27. — Afr. austro-occ. extratrop.
cuspidata, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 205. — Afr. trop. or.
Fischeri, Taub. l. c. — Afr. trop. or.
grandibracteata, Taub. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 48; et l. c. 206. — Afr. trop. or.
griquensis, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 174. — Afr. austr.
Harmsiana, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 205. — Afr. trop. or.
Holstii, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Acad. Wiss. (1894) 63 et 64; et in Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 104 et 106 nomen. — Afr. trop. or.
huillensis, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 205 in obs. = *ramosissima*, Baker.
imperialis, Taub. l. c. 206. — Afr. trop. or.
Jamesii, Oliver, in Hook. Icon. pl. (1886) t. 1530; et in F. L. James, Unkn. Horn of Afr. Append. (1888) 319 t. 5. — Reg. Somal.
karagwensis, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 204. — Afr. trop. or.
katangensis, Dewèvre, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. 1894. 2 (1895) 99. — Congo.
kilimandscharica, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 246. — Afr. trop. or.
lachnocarpoides, Engl. l. c. — Abyss.
laxiflora, Baker, in Kew Bull. (1895) 64. — Afr. trop. austro-or.
Leubnitziana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 158. — Afr. austro-occ. extratrop.

CROTALARIA : —

- leucoclada*, Baker, in Kew Bull. (1895) 214. — Reg. Somal.
- luteo-rubella*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 462. — Madag.
- macrocarpa*, Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 338. — Abyss. [Erithrea].
- macropoda*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 463. — Madag.
- Marlothii*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 27. — Afr. austro-occ. extratrop.
- massaiensis*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 205. — Afr. trop. or.
- megistantha*, Taub. l. c. 206. — Afr. trop. or.
- mesopotamica*, Taub. l. c. 207. — Afr. trop. or.
- parvula*, G. Beck, in Paulitschke, Harvar (1888) 454 fig. 7. — Afr. trop. or. [Harvar].
- passerinoides*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 204. — Afr. trop. or.
- Pechueliana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 157. — Afr. austro-occ. extratrop.
- perpusilla*, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 37 t. 5. — Burma.
- Phillipsiae*, Baker, in Kew Bull. (1895) 213. — Reg. Somal.
- picensis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 13. — Am. austr. occ.
- pilularia*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 204. — Afr. trop. or.
- polychotoma*, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16 et 24; et in Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 16 et 23 nomen. — Afr. trop. or.
- reptans*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 204. — Afr. trop. or.
- similis*, Hemsl. in Ann. of Bot. ix. (1895) 152. — Ins. Form.
- Schweinfurthii*, Taub. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 64, nomen. — Afr. trop. or.
- Stuhlmannii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 204. — Afr. trop. or.
- uguenensis*, Taub. l. c. 206. — Afr. trop. or.
- Urbaniana*, Taub. in Flora, lxxii. (1889) 423. — Bras.
- Vatkeana*, Taub. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 245. — Abyss.
- yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. (1889) 151. — China.
- CROTON**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 651.
affinis, Maiden et R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. ix. (Sept. 1894) 160 t. 12. — Austral.
aigburtenensis, Hort. ex Gard. Chron. (1886) ii. 749. — Form. hort.
- alamosanum*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 111. — Mexic.
- ardisioides*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 393. — Penins. Mal., Borneo.
- Bakerianus*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 849. — Madag.
- Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 256. — Bolivia.
- Baroni*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 863. — Madag.
- Bernieri*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 163 = *C. Berniera*, Baill.
- calomeris*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 860; et l. c. (1891) t. 164. — Madag.
- calvescens*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 147. — Mexic.
- Camponi*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 847; et Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 161. — Madag.
- Catati*, Baill. ll. cc. 851; et t. 158. — Madag.
- comanthus*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 460. — Bras.
- confertum*, Baker, in Kew Bull. (1895) 186. — Arabia.
- corumbensis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 457. — Bras.
- costaricensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 614. — Costa-Rica.
- delphinianus*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 928. — Madag.
- dissimilis*, Baill. l. c. ii. (1890) 861. — Madag.
- Doctoris*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 456. — Bras.

CROTON : —

- Elaeagni, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 848; *et Hist. pl. Madag.*, Atlas (1890) t. 156. — Madag.
- elaegnoides, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 147. — Mexic.
- Elliotianus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 863. — Madag.
- eluterioides, *Lotsy, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 352 t. 25 fig. 7-10. — Guatem.
- erythrostachys, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 391. — Malacca.
- Evansianum, *Hort. ex Rev. Hort.* (1894) 534. — Form. hort.
- furcellatus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 967. — Madag.
- fuscirameus, *Baill. l. c.* 927. — Madag.
- Grevanus, *Baill. l. c.* ii. (1890) 848; *et Hist. pl. Madag.*, Atlas (1890) t. 157. — Madag.
- Griffithii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 392. — Ind. or.
- guatemalensis, *Lotsy, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 353, t. 25, fig. 1-6. — Guatem.
- heterochrous, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 862. — Madag.
- hilaris, *Baill. l. c.* ii. (1891) 927. — Madag.
- Hildebrandtii, *Baill. l. c.* ii. (1890) 847. — Madag.
- horridulus, *Baill. l. c.* ii. (1891) 977. — Madag.
- Humboldtii, *Baill. l. c.* ii. (1890) 846; *et Hist. pl. Madag.*, Atlas (1890) t. 155. — Madag.
- hypochalibaeum, *Baill. l. c.* ii. (1890) 862. — Madag.
- incisum, *Baill. Hist. pl. Madag.*, Atlas (1891) t. 162. — Madag.
- inops, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 864. — Madag.
- lasiopyrus, *Baill. l. c.* ii. (1891) 926. — Madag.
- leuconeurus, *Pax, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 533. — Afr. trop. centr.
- longipes, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 721. — Calif.
- macroboxus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 863. — Madag.
- macrochlamys, *Baill. l. c.* — Madag.
- microprunus, *Baill. l. c.* 861. — Madag.
- Magdalenae, *Mills, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 220. — Calif.
- microbotrys, *Pax, in Bot. Jahrb.* x. (1889) 35. — Afr. austr.
- mimeticus, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 453. — Bras.
- mollivelum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 926. — Madag.
- Muelleri, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 399. — Texas.
- myriaster, *S. Elliot, in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 967 in syn. = *Scotti, Baill.*
- Newmannii, *Hort. Bull. Catal.* (1887) 10 et 6 cum icone = *Codiaeum variegatum, Blume.*
- nigritanum, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 97. — Afr. trop. occ.
- nivifer, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 456. — Bras.
- odoratus, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 58. — Ins. Fernando-Noronha.
- pachecensis, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 459. — Bras.
- picturatum, *Ed. André, in Rev. Hort.* (1888) 423 = *Codiaeum variegatum, Blume.*
- piluliferum, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 256. — Bolivia.
- Poggei, *Pax, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 534. — Congo.
- polytrichus, *Pax, l. c.* 533. — Afr. trop. centr.
- Regeli, *Hort. ex Rev. Hort.* (1894) 534. — Form. hort.
- salviformis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 926. — Madag.
- Sanctae-Crucis, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 455. — Bras.
- sarcopetaloides, *S. Moore, l. c.* 454. — Bras.
- Scarciesii, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 96. — Afr. trop. occ.
- sclerodorum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 968. — Madag.
- Scotti, *Baill. l. c.* 967. — Madag.

CROTON : —

- somalensis, *Vatke et Pax ex Pax, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 535. — Reg. Somal.
- sparsiflorus, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 221. — Parag.
- stanneum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 850. — Madag.
- Stuhlmanni, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 80. — Afr. trop. or.
- subaemulans, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 851. — Madag.
- submetallicum, *Baill. l. c.* ii. (1891) 966. — Madag.
- tenuicuspis, *Baill. l. c.* 927. — Madag.
- tenuilobus, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 439. — Mexic.
- turneraefolius, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 458. — Bras.
- Turrialva, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 614. — Costarica.
- vernicosus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 519. — Madag.

- CROTONOGYNE**, *Muell. Arg. (Euphorb.)*. — Ind. Kew. i. 657.
- angustifolia, *Pax, in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 83. — Gabun.
- gabunensis, *Pax, l. c.* 82. — Gabon.
- Poggei, *Pax, l. c.* 84. — Congo.

- CROTONOPSIS**, *Michx (Euphorb.)*. — Ind. Kew. i. 658.
- spinosa, *Nash, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 157. — Florida.

- CROZOPHORA**, *A. Juss. = Chrozophora Neck. (Euphorb.)*.
- Warionii, *Coss. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.)* (1888) 804. — Algérie.

- CRUCKSHANKSIA**, *Hook. (Rubiaceae)*. — Ind. Kew. i. 658.
- Darapskyana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 738. — Chili.
- Geisseana, *Phil. l. c.* 737. — Chili.
- oblonga, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 275 (= *Oreopolus oblongus, Phil.*). — Chili.
- paradoxa, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 738. — Chili.
- verticillata, *Phil. l. c.* 737. — Chili.

- CRUMINIUM**, *Desv. = Centrosema DC. (Legumin.)*.
- virginianum, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 269 = *Clitoria virginiana, Linn.*

- CRUSEA**, *Cham. et Schlecht. (Rubiaceae)*. — Ind. Kew. i. 659.
- aphylla, *Heller, Bot. Expl. S. Texas*, (1895) 80 t. 5. — Texas.
- coronata, *Robins. et Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 387. — Mexic.
- cruciata, *S. Wats. l. c.* xxv. (1890) 152. — Mexic.
- megalocarpa, *S. Wats. l. c.* xxvi. (1891) 137. — Mexic.
- Palmeri, *A. Gray, l. c.* xxi. (1886) 381 et 431, nomen. — Mexic.
- triccoca, *Heller, Bot. Expl. S. Texas*, i. (1895) 97 = *allococca, A. Gray.*
- villosa, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 152. — Mexic.

- CRUZIA**, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 558. **LABIATAE**.
- serpyllacea, *Phil. l. c.* — Patagonia.

- CRYPISIS**, *Ait. (Gramin.)*. — Ind. Kew. i. 659.
- alopecuroides, *St-Lager, in Cariot, Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 887 (= *alopecuroides, Schrad.*). = *Heleochoa alopecuroides*.

- CRYPTANDRA**, *Sm. (Rhamn.)*. — Ind. Kew. i. 659.
- scabrida, *Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xii. (Dec. 1889) 129. — Austral.

- CRYPTANGIUM**, *Schrad. ex Nees (Cyper.)*. — Ind. Kew. i. 660.
- brevifolium, *Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 24. — Bras.
- ciliatum, *Boeck. Cypr. Nov.* ii. (1890) 28. — Bras.
- dioicum, *Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 24. — Bras.
- distichophyllum, *Boeck. Cypr. Nov.* ii. (1890) 28. — Bras.
- griseum, *Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 23. — Bras.
- insigne, *Boeck. l. c.* 23. — Bras.
- Kuntzeanum, *Boeck. Cypr. Nov.* i. (1888) 32. — Ins. Trinit.
- melanocarpum, *Boeck. l. c.* ii. (1890) 28. — Bras.
- parviflorum, *Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 23. — Bras.
- Schenckianum, *Boeck. Cypr. Nov.* ii. (1890) 27. — Bras.
- tenuifolium, *Boeck. l. c.* i. (1888) 32. — Bras.
- tremulum, *Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 24 in obs. = *Lagenocarpus tremulus, Nees.*

- CRYPTANTHE**, *Benth. et Hook. f. (= Cryptantha, Lehm.) = Krynitzkia, Fisch. et Mey. (Boragin.)*.
- affinis, *Greene, Pittonia*, i. (Nov. 1887) 119 = *K. affinis, A. Gray.*
- ambigua, *Greene, l. c.* 113 = *K. ambigua, A. Gray.*
- angustifolia, *Greene, l. c.* 112 = *K. angustifolia, A. Gray.*
- barbigera, *Greene, l. c.* 114 = *K. barbigera, A. Gray.*
- Bartolomaei, *Greene, l. c.* ii. (May 1892) 232. — Calif.
- cedrosensis, *Greene, l. c.* i. (Nov. 1887) 117 = *K. cedrosensis, Greene.*
- Clevelandi, *Greene, l. c.* — Calif.
- congesta, *Greene, l. c.* 111 = *Eritrichium congestum, DC.*
- crassiseipala, *Greene, l. c.* 112 = *K. crassiseipala, A. Gray.*
- crinita, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 66. — Calif.
- cycloptera, *Greene, Pittonia*, i. (Nov. 1887) 120 = *K. cycloptera, Greene.*
- denticulata, *Greene, l. c.* 114 = *K. denticulata, Greene.*
- dimorpha, *Greene, l. c.* 112 = *Eritrichium dimorphum, Phil.*
- dumetorum, *Greene, l. c.* = *K. dumetorum, Greene.*
- echinella, *Greene, l. c.* 115. — Am. bor. occ.
- Fendleri, *Greene, l. c.* 120 = *K. Fendleri, A. Gray.*
- flaccida, *Greene, l. c.* 115 = *K. oxycarya, A. Gray.*
- foliosa, *Greene, l. c.* 113 = *K. foliosa, Greene.*
- geminata, *Greene, l. c.* 119. — Calif.
- glareosa, *Greene, l. c.* 111 = *Eritrichium glareosum, Phil.*
- glomeriflora, *Greene, l. c.* 116. — Calif.
- hispidissima, *Greene, l. c.* 118. — Calif.
- intermedia, *Greene, l. c.* 114 = *K. intermedia, A. Gray.*
- Jonesii, *Greene, l. c.* 113 = *K. Jonesii, A. Gray.*
- Kelseyana, *Greene, l. c.* ii. (May 1892) 232. — Am. bor. occ.
- laxiflora, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895), 503. — Chili.
- leiocarpa, *Greene, Pittonia*, i. (Nov. 1887) 117 = *K. leiocarpa, Fisch. et Mey.*
- linearis, *Greene, l. c.* 111 = *K. linearis, A. Gray.*
- maritima, *Greene, l. c.* 117 = *K. maritima, Greene.*
- micromeres, *Greene, l. c.* 113 = *K. micromeres, A. Gray.*
- microstachys, *Greene, l. c.* 116 = *K. microstachya, Greene.*
- mohavensis, *Greene, l. c.* 120 = *K. mohavensis, Greene.*
- muriculata, *Greene, l. c.* 113 = *K. muriculata, A. Gray.*
- nemaclada, *Greene, l. c.* 118. — Calif.
- oxygona, *Greene, l. c.* 120 = *K. oxygona, A. Gray.*
- Pattersoni, *Greene, l. c.* = *K. Pattersoni, A. Gray.*
- patula, *Greene, l. c.* i. (Mar. 1889) 265. — Calif.
- polycarpa, *Greene, l. c.* i. (Nov. 1887) 114. — Calif.
- Pondii, *Greene, l. c.* i. (April 1889) 291. — Calif.
- pterocarya, *Greene, l. c.* i. (Nov. 1887) 120 = *K. pterocarya, A. Gray.*
- pusilla, *Greene, l. c.* 115 = *K. pusilla, A. Gray.*
- racemosa, *Greene, l. c.* = *K. racemosa, Greene.*

CRYPTANTHE : —

- ramosa*, Greene, l. c. = *K. ramosa*, A. Gray.
ramosissima, Greene, l. c. 116 = *K. racemosa*, Greene.
Rattani, Greene, l. c. i. (Jan. 1888) 160. — Calif.
recurvata, Coville, in Contr. U. S. Nat. Herb. iv. (1895) 167. — Calif.
rostellata, Greene, l. c. 116 = *K. rostellata*, Greene.
sparsiflora, Greene, l. c. = *K. sparsiflora*, Greene.
submollis, Coville, in Contr. U. S. Nat. Herb. iv. (1895) 167 = *K. holoptera*, A. Gray.
texana, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 112 = *K. texana*, A. Gray.
Torreyana, Greene, l. c. 118 = *K. Torreyana*, A. Gray.
utahensis, Greene, l. c. 120 = *K. utahensis*, A. Gray.
Watsoni, Greene, l. c. = *K. Watsoni*, A. Gray.

CRYPTANTHUS, Otto et Dietr. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 660.

- andicola*, Moritz, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 4 syn. = *Karatas albo-rosea*, Baker?
angustifolius, Baker, l. c. 15 — Guian. Brit.
clavatus, Hort. ex Baker, l. c. 63 in syn. = *Aechmea aurantiaca*, Baker.
cochleatus, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 17. — Bras.
emergens, Lindm. in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. xxiv. 8 (1891) 19 t. 2 fig. 1-12. — Bras.
Glaziovii, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 202. — Bras.
Lubbersianus, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 17. — Bras.
Makoyanus, Baker, l. c. 16. — Bras.
Morrenianus, Regel, in Gartenfl. (1888) 157; et in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 693 = *Distiactanthus Morrenianus*, Baker.
praetextus, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 16. — Bras.
Regelii, Hort. Makoy, ex Baker, l. c. 17 nomen. (Quid?).
testaceus, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 15 = *undulatus*, Otto et Dietr.
suaveolens, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 16. — Bras.?
Schwackeanus, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 203. — Bras.

CRYPTOCARPUS, H. B. et K. (Nyctagin.). — Ind. Kew. i. 660.

- capitatus*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 71. — Calif.

CRYPTOCARYA, R. Br. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 660.

- andamanica*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 118. — Ins. Andam.
Andersoni, King, ex Hook. f. l. c. 120. — Reg. Himal.
Aschersoniana, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berlin, v. (1889) 11. — Bras.
Bancroftii, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. [ii] (1891) 16. — Austral.
Burckeana, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 315. — Oceania.
chinensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 370 (= *Beilschmiedia chinensis*, Ham.). — China.
depressa, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 316. — Oceania.
enervis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 119. — Malacca.
Ferrarsi, King, ex Hook. f. l. c. 118. — Ins. Andam.
glaucosepala, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 45. — Madag.
graveolens, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. [ii] (1891) 16. — Austral.
ilocana, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 223. — Ins. Philipp.
insignis, F. M. Bailey, in Dept. Agr. Bot. Bull. [ii] (1891) 15. — Austral.
Kurzii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 119. — Tenass.
longistylis, Mez, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 518. — Bras.
luzoniensis, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 223. — Ins. Philipp.
Mannii, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 382. — Ins. Sandvic.

CRYPTOCARYA : —

- minima*, Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berlin, v. (1889) 14 = *Aydendron floribundum*, Meissn.
oblata, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. ix. (1894) 11. — Austral.
Palmerstoni, F. M. Bailey, l. c. [ii] (1891) 16. — Austral.
pauciflora, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 515. — Madag.
rugulosa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 118. — Malacca.
saligna, Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berlin, v. (1889) 13. — Bras.
Villarii, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 223. — Ins. Philipp.

CRYPTOCORYNE, Fisch. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 660.

- affinis*, N. E. Br. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 494. — Perak.
elliptica, N. E. Br. l. c. 495. — Perak.

CRYPTOLAPPA [A. Juss.] Kuntze, Rev. Gen. (1891) 88 = **Camarea**, St-Hil. (Malpigh.).

- affinis*, *axillaris*, *discolor*, *hirsuta*, *linearifolia*, *pulchella*, *sericea*, *triphylla*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Camareae.
ericoides, Kuntze, l. c. = *C. ericoides*, St-Hil.

CRYPTOLEPIS, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 660.

- apiculata*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26 nomen; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 320. — Afr. trop. or.
Barteri, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1895) 219 nomen. — Afr. trop. occ.
capensis, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 47. — Afr. austr.
Elliotii, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 300. — Afr. trop. or.
hypoglauca, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 28 nomen; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 320. — Afr. trop. or.
Monteiroae, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1591. — Mossamb.
obtus, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 320. — Afr. trop. or.
obtus, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 110. — Afr. trop. austro-or.
Sizenandi, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 86. — Angola.
triangularis, N. E. Br. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 92. — Afr. trop. occ.
Welwitschii, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii (1895) 301. — Afr. trop. or.

CRYPTOMERIA, D. Don. (Conif.). — Ind. Kew. i. 662.

- arawacarioides*, Carrière, in Rev. Hortic. (1890) 518; et Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholzk. (1891) 146 = *japonica*, D. Don.
compacta, Hort. ex Beissn. l. c. 147 = *japonica*, D. Don.
Lobbii, Hort. ex Beissn. l. c. 146 = *japonica*, D. Don.
mucronata, Hort. ex Beissn. l. c. 146 = *japonica*, D. Don.
variegata, Hort. ex Beissn. l. c. 147 = *japonica*, D. Don.
pungens, Hort. ex Beissn. l. c. = *japonica*, D. Don.
viridis, Hort. ex Beissn. l. c. 146 = *japonica*, D. Don.

CRYPTOPHASEOLUS, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 176. **LEGUMINOSAE**.

- anamensis*, Kuntze, l. c. 177. — Anam.

CRYPTOPHORANTHUS, Rodr. Gen. et sp. Orch. nov. ii. (1881) p. 79 **ORCHIDEAE**.

- atropurpureus*, Rolfe in Gard. Chron. (1887) ii. 693 (= *Pleurothallis atropurpurea*, Lindl.). — Jamaica, Cuba.
Dayanus, Rolfe, l. c. 693 fig. 134 et in Illustr. Hortic. xxxix (1892) 21 t. 546 (= *Masdevallia Dayana*, Reichb. f.). — N. Gran.
gracilentus, Rolfe, l. c. (= *Masdevallia gracilentus*, Reichb. f.). — Costarica.

CRYPTOPHORANTHUS : —

- hypodiscus*, Rolfe in Gard. Chron. (1889) ii. 693 (= *Masdevallia hypodiscus*, Reichb. f.). — Hab.?
maculatus, Rolfe, l. c. — Bras.?
minutus, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 5. — Hab.?
oblongifolius, Rolfe, l. c. 5. — Am. austr.

CRYPTOPHRAGMIUM, Nees = **Gymnostachyum**, Nees (Acanth.).

- affine*, *ceylanicum*, *Cumingianum*, *febrifugum*, *hirsutum*, *leptostachyum*, *paniculatum*, *polyanthum*, *Thwaitesii*, *tomentosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 483 = *homonyma omnia* Gymnostachii.

CRYPTOSTEPHANUS, Welw. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 662.

- haemanthoides*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 142. — Afr. trop. or.

CTENANTHE, Eichl. (Scitamin.). — Ind. Kew. i. 662.

- casupoides*, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1890) 162. — Bras.
lanceolata, Petersen, l. c. 163. — Bras.
Lubbersiana, Eichl. ex Petersen, l. c. 159 = *Stromanthus Lubbersiana*, Ed. Morr.
Muelleri, Petersen, l. c. 161. — Bras.

CTENIUM, Panz. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 662.

- Newtonii*, Hack. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 229. — Dahomey.

CUCUMIS, [Tourn.] Linn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 664.

- aculeatus*, Cogn. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 209. — Afr. trop. or.
parvifolius, Cogn. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 19. — Madag.
Sacleuxii, Hort. ex Wien. Illust. Gartenz. (1890) 298; et ex Kew Bull. (1891). Add. ii. 40. — Zanzib.

CUCULLARIA, Kramer, Tent. (1744) 10 = **Callipeltis**, Stev. (Rubiace.).

- aperta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 279 = *Call. aperta*, Boiss.
microstegia, Kuntze, l. c. = *Call. microstegia*, Boiss.

CUCURBITA [Tourn.] Linn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 665.

- cordata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 50. — Calif.
mexicana, Dammann, Catal. (1890-91) 42; et ex Kew Bull. (1891) Add. ii. 40. — Mexic.

CUDRANUS, Rumph. = **Cudrania**, Tréc. (Euphorb.).

- spinosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 623 = *Cudrania javanensis*, Tréc.

CULCASIA, Beauv. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 666.

- Mannii*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 3. (1887) 116; et in Gartenfl. (1887) 84 = *Denhamia Mannii*, Hook. f.
tenuifolia, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 447. — Kamerun.

CULCITIUM, Humb. et Bonpl. (Compos.). — Ind. Kew. i. 666.

- ferrugineum*, Klatt, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 363. — Am. centr.
peruvianum, Klatt, l. c. — Peruvia.

CUMARUNA, J. F. Gmel. = **Dipteryx**, Schreb. (Legumin.).

- alata*, *crassifolia*, *nudipes*, *oleifera*, *oppositifolia*, *reticulata*, *rosea*, *tetraphylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 177 = *homonyma omnia* Dipterygis.

CUMINUM [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 666.

- cuminodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 266 = *Lagoechia cuminoides*, Linn.

CUNILA, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 667.

CUNILA : —

longiflora, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 444. — Mexic.
 origanoides, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 278 = C. Mariana, Linn.
 pycnantha, Robins et Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 391. — Mexic.

CUPANIA, Plum. ex Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 667.

andronensis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 308. — Madag.
 dissitiflora, Baker, l. c. — Madag.
 elegans, L. Lind. ex Gard. Chron. (1893) i. 474; et ex Rev. Hort. (1893) 339. — Form. hort.
 flagelliformis, F. M. Bailey, in *Dep. Agric. Bot. Bull.* viii. (1893) 73. — Austral.
 pleurophylla, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (April 1887) 170, nomen. — Austral.
 sericopeltis, F. M. Bailey, in *Dep. Agric. Bot. Bull.* v. (1892) 11. — Austral.
 Shirleyana, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* ii. (1888) 15. — Austral.

CUPANIOPSIS, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 668.

dictyophylla, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench.* xx. (1890) 359. — N. Guin.
 macroptala, Radlk. l. c. 357. — N. Guin.
 platycarpa, Radlk. l. c. 359. — N. Guin.
 subserrata, Radlk. l. c. — N. Guin.

CUPHEA, P. Br. (Lythrac.). — Ind. Kew. i. 668.

avigera, Robins, et Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 105. — Mexic.
 Glaziovii, Koehne, ex Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 5. — Bras.
 Heydei, Koehne, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 256. — Guatem.
 Lehmanni, Koehne, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 244. — Columb.
 mesochloa, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 141 (= C. viridostoma, S. Wats.). — Mexic.
 Niederleinii, Koehne, ex Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 5. — Reg. Argent.
 Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 429. — Mexic.
 persistens, Koehne, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 277. — Reg. Argent.
 Pringlei, S. Wats., l. c. xxv. (1890) 149. — Mexic.
 Reipublicae, Robins. et Seaton, l. c. xxviii. (1893) 106. — Mexic.
 retroscabra, S. Wats. l. c. xxii. (1897) 413. — Mexic.
 Schwackei, Koehne, ex Schwacke, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 28 (1890) 9 nomen; et xv. Beibl. n. 38 (1893) 6. — Bras.
 viridostoma, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 412 = mesochloa, Greene.

CUPRESSUS, Tourn. ex Linn. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 671.

Corneyana, Hort. ex Dangeard, Le Botaniste, Sér. iii. (1893) 177. — Form. hort.
 Devoniana, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 116 = Juniperus phoenicea, Linn.
 Doniana, Hort. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 645 = sempervirens, Linn.
 ericoides, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 67 = Chamaecyparis sphaeroidea, Spach.
 filiformis, Hort. ex Beissn. l. c. 63 = Biota orientalis, Endl.
 orientalis, Hort. ex Beissn. l. c. 102 = C. semper-virens, Linn.
 pendulata, Hort. ex Beissn. l. c. 63 = Biota orientalis, Endl.
 Reinwardti, Hort. ex Beissn. l. c. 103 = C. macrocarpa, Hartw.

CUPUIA, Aubl. = **Coupoiui**, Aubl. (Apocyn.). — Martiniana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 414 (= *Cou-puia Martiniana*, Miers). — Am. aust.**CURATELLA**, Linn. (Dilleniace.). — Ind. Kew. i. 671.

imperialis, Hort. ex Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 296 = Martiusella imperialis, Pierre.

CURCULIGO, Gaertn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 671.

capitulata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 703 = recurvata, Dryand.
 rhizophylla, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 237 = Hypoxis rhizophylla, Baker.

CUSPIDOCARPUS, Spenn. = **Micromeria**, Benth. (Labiata).

thymifolius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 514 = M. rupestris.

CYBELE, Salisb. et Knight = **Stenocarpus**, R. Br. (Proteace.).

Cunninghamii, elegans, gracilis, heterophylla, intermedia, laurina, Milnei, rubiginosa, saligna, sinuata, villosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 577-78 = homonyma omnia Stenocarpi.
 dareodes, Kuntze, l. c. 578 = S. dareoides, Brongn. et Gris.
 umbellata, Kuntze, l. c. 577 = S. Forsteri, R. Br.

CURCUMA, Linn. (Scitamin.). — Ind. Kew. i. 672.

Bakeriana, Hemsl. in Gard. Chron. (1892) i. 682. — N. Guin.
 coccinea, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 216 in syn. = Roscoeana, Benth.
 sylvestris, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 378. — Penins. Mal.
 urceolata, Rich. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. (1890) 167 = Saranthe urceolata, Petersen.

CURTIA, Cham. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 672.

conferta, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 357 (= S. conferta, Mart.). — Bras.
 intermedia, Knobl. l. c. (= S. intermedia, Prog.). — Bras.
 obtusifolia, Knobl. l. c. (= S. obtusifolia, Benth.). — Bras.
 patula, Knobl. l. c. (= S. patula, Mart.). — Bras.
 pusilla, Knobl. l. c. (= S. pusilla, Griseb.). — Bras.
 tenuifolia, Knobl. l. c. 323 (= Exacum tenuifolium, Aubl.). — Am. trop.
 verticillaris, Knobl. l. c. = gentianoides, Cham. et Schlecht.

CUSCUTA, [Tourn.] Linn. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 672.

andina, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 224. — Chili.
 aurea, Phil. l. c. — Chili.
 candicans, Genn. ex Nym. Consp. Suppl. ii. i. (1889) 221 = planiflora, Ten.
 globosa, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 48. — Ins. Fernando Noronha.
 Kilimanjari, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append. (1886) 343 nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 343. — Afr. trop. or.
 ndorensis, Schweinf. in Hoehnel, zum Rudolph See, Append. (1892) 7. — Afr. trop. or.
 Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 64. — Calif.
 purpurata, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 225. — Chili.
 Veatchii, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 189. — Calif.

CUSPARIA, Humb. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 674.

Engleriana, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 4. — Bras.
 Glazioviana, Taub. l. c. 5. — Bras.
 undulata, Hemsl. in Gard. Chron. (1892) ii. 396. — Bras.

CUSPIDARIA, DC. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 674.

bracteata, Bureau, ex Baill. Hist. des pl. x. (1888) in nota 5. = Setilobus bracteatus, Baill.
 corymbifera, Baill. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b, (1894) 216 = trifoliata DC.
 hibiscifolia, Bureau, in Baill. Hist. des pl. x. (1888) 29 (= Bignonia hibiscifolia, Cham.). — Bras.
 pulchella, Baill. l. c. in nota = Arrabidaea pulchella, Bureau.

CUSPIDARIA : —

pulchella, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 216 (an praec.?). — Bras.

CUSSAMBIUM, Rumpf. = **Schleichera** Willd. (Sapind.).

oleosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 143 = S. trijuga, Willd.

CUSSONIA, Thunb. (Aral.). — Ind. Kew. i. 674.

chartacea, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 211. — Natal.
 Holstii, Harms, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 64; et in Pflanzenw.-Ost-Afr. C (1895) 298. — Afr. trop. or.
 lanceolata, Harms, l. c. A (1895) 130 nomen. — Afr. trop. or.

CUTANDIA, Willk. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 675.

divaricata, C. Richt. Pl. Europ. i (1889) 78 = divaricata, Benth.
 memphitica, C. Richt. l. c. 77 (= C. memphitica, Benth.). = scleropoides, Willk.

CUVIERA, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 675.

physinodes, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 94. — Gabon.

CYAMOPSIS, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 675.

serrata, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 161. — Afr. austro-occ. extratrop.
 tetragonolobus, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 259 (= Psoralea tetragonoloba, Linn.) = psoraloides, DC.

CYANANDRIUM, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv.

(1895) t. 2419. MELASTOMACEAE
 guttatum, Stapf, l. c. — Borneo.
 rufum, Stapf, l. c. sub t. 2419. — Borneo.

CYANANTHUS, Wall. (Campanul.). — Ind. Kew. i.

Delavayi, Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 280. — (= C. barbatus, Franch.). — Yunnan.
 longiflorus, Franch. l. c. — Yunnan?
 macrocalyx, Franch. l. c. 279. — Yunnan.
 petiolatus, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 147. — China occ.

CYANASTRUM, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx (1891) t. 1965. HÆMODORACEAE.

cordifolium, Oliver, l. c. — Afr. trop. occ.

CYANEA, Gaudich. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 675.

acuminata, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 254 (= Delissea acuminata, Gaudich.). — Ins. Sandvic.
 angustifolia, Hillebr. l. c. 253 (= D. angustifolia, Presl.). — Ins. Sandvic.
 arborea, Hillebr. l. c. 261. — Ins. Sandvic.
 asplenifolia, Hillebr. l. c. 260 (= Delissea asplenifolia, Mann). — Ins. Sandvic.
 atra, Hillebr. l. c. 263. — Ins. Sandvic.
 comata, Hillebr. l. c. 256. — Ins. Sandvic.
 coriacea, Hillebr. l. c. 254 (= Delissea coriacea, A. Gray). — Ins. Sandvic.
 ferox, Hillebr. l. c. 259. — Ins. Sandvic.
 fissa, Hillebr. l. c. 255 (= Delissea fissa, Mann). — Ins. Sandvic.
 Gibsonii, Hillebr. l. c. 263. — Ins. Sandvic.
 hirtella, Hillebr. l. c. 255. (= Delissea hirtella, Mann). — Ins. Sandvic.
 holophylla, Hillebr. l. c. 257. — Ins. Sandvic.
 Kunthiana, Hillebr. l. c. 264 (= Delissea Kunthiana, Gaudich.?). — Ins. Sandvic.
 macrostegia, Hillebr. l. c. 263. — Ins. Sandvic.
 Mannii, Hillebr. l. c. 253 (= Delissea Mannii, W.T. Brigham). — Ins. Sandvic.
 procera, Hillebr. l. c. 262. — Ins. Sandvic.
 obtusa, Hillebr. l. c. 256 (= Delissea obtusa, A. Gray). — Ins. Sandvic.
 platyphylla, Hillebr. l. c. (= D. platyphylla, A. Gray). — Ins. Sandvic.
 recta, Hillebr. l. c. 255 (= D. recta, Wawra.). — Ins. Sandvic.

CYANEA : —

scabra, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 256. — Ins. Sandvic.
 solanacea, *Hillebr. l. c.* 259. — Ins. Sandvic.
 solenocalyx, *Hillebr. l. c.* 258. — Ins. Sandvic.

CYANELLA, Linn. (Haemodor.). — Ind. Kew. i. 675.

racemosa, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 394. — Afr. austr.

CYANOCARPUS, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 55. **PROTEACEAE**.
 Nortoniana, F. M. Bailey, *l. c.* — Austral.**CYANOPHYLLUM**, Naud. = **Miconia**, Ruiz et Pav. (Melastom.).

aspersum, L. Lind. ex Gard. Chron. (1893) i. 475; et ex Rev. Hort. (1893) 339. — Am. trop.

CYANOTIS, D. Don (Commelin.). — Ind. Kew. i. 676.

Dybowski, *Hua, in Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 122. — Congo gall.
 somaliensis, C. B. Clarke, in *Kew Bull.* (1895) 229. — Reg. Somal.

CYATHISCUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 538 = **Loranthus**, Linn.

nodiflorus, Van Tiegh. *l. c.* 539 = *L. nodiflorus*, Thw.
 productus, Van Tiegh. *l. c.* = *L. productus*, King.

CYATHOCALYX, Cham. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 676.

virgata, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 28 = *Cananga virgata*, Hook. f. et Thoms.

CYATHOCLINE, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 617.

purpurea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 333 = *lyrata*, Cass.

CYATHOPUS, Brongn. et Gris (Epacrid.). — Ind. Kew. i. 677.

sikkimensis, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2395. — Reg. Himal.

CYATHOSTEMMA, Griff. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 677.

acuminatum, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 4 et in Ann. Gard. Calc. I. 13 t. 41 — Perak.
 Hooker, King, *ll. cc.* 61 et 10 t. 40. — Malaya.
 Scortechini, King, *ll. cc.* 61 et 12 t. 38. — Malaya.
 Wrayi, King, *ll. cc.* 61 et 12 t. 39. — Malaya.

CYATHULA, Lour. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 677.

crispa, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 188. — Transv.
 erinacea, *Schinz, l. c.* 189; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 173. — Afr. trop. or.
 lanceolata, *Schinz, ll. cc.* 188 et 173. — Afr. trop. or.
 orthacantha, *Schinz, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1a. (1893) 108 (= *Pupalia orthacantha*, Hochst.). — Abyss.

CYBIANTHUS, Mart. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 677.

collinus, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 391. — Bras.

CYBISTAX, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 677.

Sprucei, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 240. — Peruv.
 subtomentosa, K. Schum. *l. c.* — Bras.

CYCAS, Linn. (Cycad.). — Ind. Kew. i. 677.

Beddomei, Hort. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 650 = *circinalis*, Linn.
 Bellefonti, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hort. xxxiii. (1886) 27 t. 586. — Tonk.
 villosa, Herb. Van Royen, fide A. DC. ex Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 957 in syn. = *Encephalartos caffer*, Miq. var.

CYCLAMEN, [Tourn.] Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 678.

alpinum, Hort. Dammann, ex Gartenfl. (1892) 526. — Hab. ?

Pentelici, F. Hildeb. in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 44 (1894). — Graecia.

punicum, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 356. — Tunet.

rotundifolium, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. ed. 8. ii. (1889) 573 = *europaeum*, Linn.

saldense, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 354; et in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.), (1889) 720 = *africanum*, Boiss. et Reut.

tauricum, Hort. Dammann, ex Gartenfl. (1892) 526. — As. min.

CYCLAMINUS, [Hall.] Aschers. in Ber. deutsch. bot. Gesells. x. (1892) 235 = **Cyclamen**, Tourn. (Primul.).

coa, Aschers. *l. c.* = *C. coum*, Mill.

europaea, Aschers. *l. c.* (= *Cyclaminus europaeus*, Scop.) = *C. europaeum*, Linn.

graeca, Aschers. *l. c.* = *C. graecum*, Link.

neapolitana, Aschers. *l. c.* = *C. neapolitanum*, Ten. persica, Bonnet, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 195 = seq.

persica, Aschers. in Ber. deutsch. bot. Gesells. x. (1892) 235 = *C. latifolium*, Sibth. et Sm.

repanda, Aschers. *l. c.* = *C. hederacifolium*, Ait.

CYCLANTHERA, Schrad. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 778.

Donnell-Smithii, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 290. — Guatem.

micrantha, Cogn. ex Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 319. — Mexic.

monosperma, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 159 = *Brandegia Bigelovii*, Cogn.

Pittieri, Cogn. ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 275. — Costarica.

Pringlei, Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 106. — Mexic.

Rusbyi, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii (1890) 284. — Bolivia.

Siemiradzki, Szyszyl. in Diss. Cl. Math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 231. — Peruvia.

testudinea, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 138. — Calif.

Tonduzii, Cogn. ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 274. — Costarica.

CYCLANTHUS, Poit. (Cyclanthac.). — Ind. Kew. i. 678.

Godseffianus, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1892) i. 731. — Hab. ?

CYCLEA, Arn. (Menisperm.). — Ind. Kew. i. 678.

elegans, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 387. — Penins. Mal.

madagascariensis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 443. — Madag.

racemosa, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1938. — China.

CYCLOCHEILON, Oliver, in Kew Bull. (1895) 222 = **Holmskioldia**, Retz. (Verbenac.).

somaliense, Oliver, *l. c.*; et in Hook. Icon. pl. t. 2439 (somalense). — Afr. trop.

CYCLOLOMA, Moq. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 679.

atriplicifolium, Coulter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 143; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 366 = *platyphyllum*, Moq.

CYCLOSTEMON, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 680.

aquifolium, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 49. — Madag.

assamicus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 342. — Reg. Himal.

calocarpus, Hook. f. *l. c.* 343. — Ins. Andam.

confertiflorus, Hook. f. *l. c.* 341. — Canara.

Curtisii, Hook. f. *l. c.* 343. — Penang.

ellipticus, Hook. f. *l. c.* 342. — Ind. or.

CYCLOSTEMON : —

glaber, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 527. — Ins. S. Thom.

Griffithii, Hosh. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 340. — Reg. Himal.

Helferi, Hook. f. *l. c.* 343. — Ind. or.

Henriquesii, Pax, in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 158. — Ins. S. Thom.

lancifolius, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 340. — Reg. Himal.

nervosus, Hook. f. *l. c.* 342. — Perak.

nitidus, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 527. — Ins. Comor.

CYCNIMUM, E. Mey. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 680.

ajugaefolium, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 74. — Afr. trop. or.

Buchneri, Engl. *l. c.* 73. — Angola.

cameroonianum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 361 = *Rhamphicarpa camerooniana*, Oliver.

camporum, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 73. — Afr. trop.

Carvalhi, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 360. — Afr. trop. or.

Herzfeldianum, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58; et in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 74 = *Rhamphicarpa Herzfeldiana*, Vathe.

Heuglinii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 361. — Afr. trop. or.

Meyeri-Johannis, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 383; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 361 (an *C. Herzfeldianum*, Engl. ?).

pratense, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 361. — Afr. trop. or.

recurvum, Engl. *l. c.* = *Rhamphicarpa recurva*, Oliver.

serratum, Engl. *l. c.* 360 = *R. serrata*, Klotzsch.

tubulosum, Engl. *l. c.* 361 = *R. tubulosa*, Benth.

veronicifolium, Engl. *l. c.* = *R. veronicifolia*, Vathe.

Volkensii, Engl. *l. c.* 360. — Afr. trop. or.

CYCNOCHESES, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 680.

chlorochilum, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) i. 144 cum ic.; in Journ. of Hort. (1888) 462 cum xylogr. et in Gard. and For. v. (1892) 88 [chlorochilon].

— Guiana, Venez.

glanduliferum, Rolfe, in Gard. and For. v. (1892) 90. — Mexic.

peruvianum, Rolfe, in Lindenia, vii. (1891) 29 t. 301; et in Gard. and For. v. (1892) p. 90. — Peruvia.

Rossianum, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 456; et in Gard. and For. v. (1892) 90. — Hab. ?

versicolor, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 596; et in Gard. and For. v. (1892) 88. — Bras.

CYLINDROLEPIS, Boeck. in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 75 = **Mariscus**, Gaertn. (Cyperac.).

Rehmanniana, Boeck. in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 73 = *M. Rehmannianus*, C. B. Clarke.

CYMBALARIA, Medik. = **Linaria**, Mill. (Scrophul.).

Cymbalaria, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 58 = *L. Cymbalaria*, Linn.

hepaticaeifolia, Wettst. *l. c.* = *L. hepaticaeifolia*, Spreng.

microcalyx, Wettst. *l. c.* = *L. microcalyx*, Boiss.

pallida, Wettst. *l. c.* = *L. pallida*, Ten.

CYMBIDIUM, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 682.

Gammieanum, King et Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 339. — As. trop.

Humboldtii, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) ii. 8. — Madag.

minimifolium, Thw. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 37 in syn. = *Sarcophilus minimifolius*, Hook. f.

Munronianum, King et Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 238. — As. trop.

pulcherrimum, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1891) ii. 712. — Ind. or.

CYMBIDIUM : —

- sikkimensis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 9. — Reg. Himal.
 Simonsianum, King et Panl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. ii. (1895) 239. — As. trop.
 Tracyanum, Hort. ex Gard. Chron. (1890) ii. 702 et 718; et (1891) i. fig. 34 [Traceyanum] = grandiflorum, Griff.
 Winnianum X, Hort. ex Reichenbachia, ii. 6. (1894) t. 75. — Hybr. artef.

CYMBOPETALUM, Benth. (Anonac.). — Ind.

- Kew. i. 683.
 odoratissimum, Rodr. in *Vellozia*, i. (1885-88) Sec. edic. (1891) i. t. 1. — Bras.
 stenophyllum, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 2. — Guatem.

CYMBOPOGON, Spreng. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).

- circinnatus, Hochst. ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 599 = A. laniger, Desf.

CYMOSEPALUM, Baker, in Kew Bull. (1895) 103. **LEGUMINOSAE**.

- Baroni, Baker, l. c. — Madag.

CYMOPTERUS, Rafin. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 684.

- acaulis, Rydberg, Bot. Surv. Nebr. iii. (1894) 38 = glomeratus, DC.
 decipiens, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 246 = glomeratus, DC.
 ibapensis, M. E. Jones, l. c. iii. (1893) 302. — Am. bor. occ.
 Jonesii, Coult. et Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 80. — Utah.
 megacephalus, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 14. — Arizona.
 Newberryi, M. E. Jones, l. c. iv. (1893) 47. = Ferula Newberryi, S. Wats.
 panamintensis, Coult. et Rose, ex Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1895) 116. — Calif.
 Parryi, M. E. Jones, in Zoë, iv. (1893) 48 t. 25 = C. Fendleri, A. Gray.
 purpurascens, M. E. Jones, l. c. iv. (1893) 277. = montanus, Torr. et Gray, var.
 utahensis, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1889) 685. — Utah.

CYNANCHUM, Linn. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 684.

- abyssinicum, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253 = abyssinicum, Decne.
 acuminatifolium, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 104. — (= Vincetoxicum acuminatum, Decne.). — China.
 acuminatum, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253 (= Cynoctonum acuminatum, Benth.). — Afr. trop. occ.
 Adalinae, K. Schum. l. c. — Afr. trop. occ.
 affine, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 104. — China.
 altiscandens, K. Schum. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 64; et in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 324. — Afr. trop. or.
 amplexicaule, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 104. (= Vincetoxicum amplexicaule, Sieb. et Zucc.). — As. centr. et or.
 arenosum, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252 (= Orthosia arenosa, Decne.). — Bras.
 brevidens, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 257. — Congo, Zambes.
 canescens, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252 = Vincetoxicum canescens, Willd.
 complexum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 256 et 337 = mossambicense, K. Schum.
 Eichleri, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253 (= Orthosia Eichleri, Fourn.). — Bras.
 eurychitoides, K. Schum. l. c. — Madag.
 Eurychiton, K. Schum. l. c. (= Cynoctonum eurychiton, Decne.). — Madag.

CYNANCHUM : —

- flavidens, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 256. — Reg. Somal.
 Fordii, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 106. — China.
 formosanum, Hemsl. l. c. (= Cynoctonum formosanum, Maxim.). — Formosa.
 formosum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 112. — Peruvia, Ecuad.
 fraternum, N. E. Br. l. c. 256. — Abyss.
 fuscum, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252 = Vincetoxicum fuscum, Reichb.
 grandifolium, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 106. (= Vincetoxicum macrophyllum, Sieb. et Zucc.). — As. or.
 hastifolium, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 297. — Abyss.
 hastifolium, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253 [an praec.?] — Abyss.
 Holstii, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.
 Huteri, K. Schum. l. c. 252. = Vincetoxicum Huteri, Vis. et Aschers.
 insulanum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 107. — (= Cynoctonum insulanum, Hance). — Hainan.
 insulanum, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253 = praec.
 japonicum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 107 (= Vincetoxicum japonicum, Morr. et Decne.). — Corea, Japon.
 kenowiense, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252 (= Vincetoxicum kenowiense, Wight) = V. officinale, Moench.
 laeve, K. Schum. l. c. — Java.
 leucanthum, K. Schum. l. c. 253 fig. 73 g. — Madag.
 linearifolium, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 107. — China.
 madagascariense, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253. — Madag.
 mandshuricum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 107 (= Vincetoxicum mandshuricum, Hance). — China.
 medium, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252 = Vincetoxicum medium, Decne.
 mensense, K. Schum. l. c. 253; et in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* 324 in obs. = V. mensense, Schweinf. Meyer. Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 2 (= Cynoctonum Meyeri, Decne.) = V. Meyeri, Benth. et Hook. f.
 minutiflorum, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252. — Afr. or.
 mongolicum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 107 (= Vincetoxicum mongolicum, Maxim.). — China.
 Mooreanum, Hemsl. l. c. 108 (= V. chinense, S. Moore). — China.
 mossambicense, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 323; et in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 254. — Afr. trop. or.
 multiflorum, K. Schum. l. c. 252 (= Orthosia multiflora, Fourn.). — Mexic., Bras.
 natalitium, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii, Beibl. n. 45 (1894) 32. — Afr. austr.
 nivale, G. Beck, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 131 = Vincetoxicum nivale, Boiss. et Heldr.
 obscurum, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253. — Angola.
 pachyphyllum, K. Schum. l. c. (= Cynoctonum pachyphyllum, Decne.). — Chili.
 parviflorum, K. Schum. l. c. 252 = V. parviflorum, Decne.
 petrense, Hemsl. et Lace, in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) 326. — Belutch., Afghan.
 polyanthum, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253. — Afr. centr.
 purpureum, K. Schum. l. c. = roseum, R. Br.
 repandum, K. Schum. l. c. (= Cynoctonum repandum, Decne.). — Madag.
 sarcostemmaoides, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 323; et in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252. — Afr. trop. or.
 schistoglossum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 271. — Afr. austr.
 stenophyllum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 108. — China.

CYNANCHUM : —

- thesioides, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252 = Vincetoxicum thesioides, Freyn.
 tmoleum, K. Schum. l. c. = V. tmoleum, Boiss.
 umbrosum, K. Schum. l. c. (= Orthosia umbrosa, Decne.). — Bras.
 undulatum, K. Schum. l. c. (= Cynoctonum undulatum, Decne.). — Chili.
 urceolatum, K. Schum. l. c. 253 (= Orthosia urceolata, Fourn.). — Bras.
 vagum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 257. — Congo.
 verticillatum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 109. — China.
 volubile, Hemsl. l. c. (= Vincetoxicum volubile, Decne.). — Corea, Mandshuria.
 Zeyheri, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 3. — Afr. austr.

CYNARA, Vaill. (Compos.). — Ind. Kew. i. 684.

- aurantica, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 400. — Syria.

CYNOCRAMBE, Tourn. = **Theligonum**, Linn. (Urtic.).

- macrantha, Poulsen, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1a (1893) 124 = T. macranthum, Franch.

CYNOCTONUM, E. Mey. = **Vincetoxicum**, Moench (Asclep.).

- acutifolium, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 201. — Chili.
 Mitreola, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 258 = Mitreola petiolata, Torr. et Gray.

CYNOGLCROSSOSPERMUM, Siegesb. Fl. Petrop. (1736) 40, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 436 = **Echinosperrum**, Sw. (Boragin.).

- affine, anisacanthum, brachycentrum, Bungei, capense, concavum, consanguineum, cynosum, deflexum, diffusum, diploloma, divaricatum, Lappula, latifolium, macranthum, marginatum, mexicanum, microcarpum, oligacanthum, patulum, Redowskii, semicinctum, semiglabrum, sessiliflorum, sinaicum, spathulatum, strictum, tenue, virginicum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 436-37 = homonyma omnia Echinosperrmi.
 caspicum, Kuntze, l. c. 437 = E. semiglabrum, Ledeb.
 cristatum, Kuntze, l. c. = Paracaryum cristatum, Boiss.
 cynoglossodes, Kuntze, l. c. = E. cynoglossoides, Lehm.
 echinophorum, Kuntze, l. c. = Lappula echinophora, Kuntze.
 omphalodes, Kuntze, l. c. = E. omphaloides, Schrenk.
 spinocarpum, Kuntze, l. c. = E. Vahlianum, Lehm.

CYNOGLOSSUM, [Tourn.] Linn. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 686.

- abyssinicum, Hochst. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 353. — Abyss.
 Azocarti, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxx. (1884) 62, et xc. (1895) 553. — Chili.
 heterocarpum, Kuntze, ex Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1892?) 121 t. 160; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* 166 = arundanum, Coss.
 Hochstetteri, Vathe, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 353 nomen. — Abyss.
 Johnstoni, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 29. — Afr. trop. or.
 punctatum, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 44. — Transsilv.
 rotatum, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1892) 3. — Bulg.

CYNOMETRA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 688.

- Glaziovii, Taub. in *Flora*, lxxv. (1892) 76. — Bras.
 Lyallii, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 344. — Madag.
 minutiflora, F. Muell. in *Austral. Journ. Pharm.* (April 1886) 123; et *ex Bot. Centralbl.* xxvii. (1886) 21. — N. Guin.
 ramiflora, F. M. Bailey, Cat. Woods Queensl. (Lond. Col. Ind. Exhib. 1886) 24 = Afzelia australis, Bailey.

CYNORCHIS, Thou. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 688

- anacamptoides*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 18. — Afr. trop. or.
Baronii, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 58. — Madag.
compacta, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 149. — Natal.
Cordemoyi, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion. (1895) 229. — Ins. Bourbon.
elata, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 58. — Madag.
pauciflora, Rolfe, l. c. — Madag.
Volkensii, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 18. — Afr. trop. or.

CYNOSORCHIS, Thou. = **Cynorchis**, Thou. (Orchid.)

- anacamptoides*, Kränzl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 151 = *C. anacamptoides*, Kraenzl.
angustipetala, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1893) 90 = *Cynorchis angustipetala*, Ridl.
arnottoides, Reichb. f. ex Th. Dur. et Schinz, l. c. = *Cynorchis arnottoides*, Reichb. f.
aurantiaca, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 123. — Madag.
Baronii, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 90 = *Cynorchis Baronii*, Rolfe.
Brauniana, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 62. — Madag.
brevicornu, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1893) 90 = *Cynorchis brevicornu*, Redl.
calanthoides, Th. Dur. et Schinz, l. c. = *Cynorchis calanthoides*, Kraenzl.
calcarata, Th. Dur. et Schinz, l. c. = *Cynorchis squamosa*, Lindl.
elegans, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 150; et in Gard. Chron. (1888) i. 424. — Madag.
glandulosa, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 123. — Madag.
grandiflora, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 91 = *Cynorchis grandiflora*, Ridl.
hispidula, Th. Dur. et Schinz, l. c. = *Cynorchis hispidula*, Ridl.
laxiflora, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Amphorchis laxiflora*, Blume). — Ins. Bourbon.
lilacina, Th. Dur. et Schinz, l. c. 92 = *Cynorchis lilacina*, Ridl.
Lowiana, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 150; et in Gard. Chron. (1888) i. 424. — Madag.
occidentalis, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 189 (1895) 92 (= *Amphorchis occidentalis*, Lindl.). — Afr. trop. occ.
parviflora, Reichb. f. ex Th. Dur. et Schinz, l. c. 92 in obs. — Ins. Borb.
Ridleyi, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Amphorchis lilacina*, Ridl.). — Madag.
speciosa, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 122. — Madag.
stenoglossa, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 63. — Madag.
tenella, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 124. — Madag.
Volkensii, Kraenzl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 151. — Afr. trop. or.

CYNOSURUS, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 688.

- pygmaeus*, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 322. — Ins. Balear.

CYPELLA, Herb. (Irid.). — Ind. Kew. i. 689.

- linearis*, Baker, Handb. Irid. (1892) 65 (= *Moraea linearis*, H. B. et K.). — Venez.

CYPERELLA, Kramer, Tentam. bot. (1744) 41

- = **Luzula**, DC. (Juncac.).
campestris, Mac Mill. Metasp. Minnes. (1892) 143 = *L. campestris*, DC.

CYPERUS, [Mich.], Linn. (Cyperac.). — Ind. Kew. i. 689.

- Adansonii*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 546. — Senegal.
alboviridis, C. B. Clarke, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 62. — Madag.

CYPERUS : —

- alpestris*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 122. — Afr. trop. or.
amomodorus, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.
Andreanus, Maury, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 393. — Ecuad.
Arechavaletae, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 9. — Urug.
arrhizus, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 577 = *sphaerospermus*, Schrad.
atroviridis, C. B. Clarke, l. c. 548. — Fernando-Po.
aureus, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 8. — Reg. Argent.
Baikiei, C. B. Clarke in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 550. — Afr. trop. occ.
Balansae, Maury, in Mém. Soc. Sc. phys. Genève, xxxi. (1890) 130 t. 39. — Parag.
betschuanus, Boeck. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 406. — Afr. austr.
biradiatus, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 186 (= *Pycneus*, sp.). — Bras.
Blodgettii, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 316. — Am. bor.
Bolusii, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 585 = *Mariscus Bolusii*, C. B. Clarke.
Bonianus, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 186 (= *Pycneus*, sp.). — Tonk.
Botteri, Boeck. in Kneuck. l. c. 227. — Mexic.
brunneo-vaginat, Boeck. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 407. — Afr. austr.
brunnescens, Boeck. Cyf. Nov. ii. (1890) 3. — Singap.
Buchanani, Boeck. l. c. i. (1888) 4. — Afr. trop. or.
Buchholzii, Boeck. l. c. 3. — Kamerun.
Buckleyi, Britton, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 461. — Am. bor. occ.
Buettneri, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 3. — Afr. trop. occ.
bulbosus, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 581 = *usitatus*, Burch.
Cadamosti, Bolle, ex E. H. L. Krause, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 400. — Ins. S. Vinc.
calcaratus, S. Wats. in A. Gray, Man. N. Am. Bot. ed. 6 (1890) 570 = *pseudovegetus*, Steud.
capitiduensis, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Sc. phys. Genève, xxxi. (1890) n. 1, 129 t. 38. — Parag.
Carruthii, Wood, in B. B. Smyth, Check list pl. Kansas, (1892) 26. — Kansas.
catharinensis, Boeck. Cyf. Nov. ii. (1890) 9. — Bras.
celluloso-reticulatus, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 202. — Bras.
ciliolatus, Boeck. Cyf. Nov. ii. (1890) 5. — Bras.
cinereus, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Sc. phys. Genève, xxxi. (1890) n. 1, 127 t. 36 B. — Parag.
circinatus, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 64 t. 2 fig. 1, 2. — Ins. Fernando-Noronha.
Clarkeanus, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 123 = *Mariscus Taylori*, C. B. Clarke.
clavinus, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 551. — Bornou.
compresso-triqueter, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 10 (= *Mariscus*, sp.). — Ins. Portoric.
cuspidatus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 532. — Madag.
cylindricus, Britton, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 466. — Texas.
cylindrostachyus, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 451 nomen. — Costarica.
debilissimus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 532. — Madag.
decipiens, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 467. — Ins. Sandvic.
deremensis, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 50; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 119. — Afr. trop. or.
discolor, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 7. — Ins. S. Thomas.
Donianus, Boeck. in Kneuck. Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 165. — Tonk.
Durandii, Boeck. l. c. 185 = *Pycneus flavescens*, P. Beauv.

CYPERUS : —

- Dussii*, Boeck. Cyf. Nov. ii. (1890) 37. — Ins. Martin.
echinatus, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 99 = *Baldwinii*, Torr.
efolius, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 226. — Costarica.
Eggersii, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 53. — Ins. Portoric.
elephantinus, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 559. — Natal.
ferrugineus, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 225. — Bras.
flexibilis, Maury, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 392. — Columb.
foliosissimus, Boeck. Cyf. Nov. ii. (1890) 7. — Reg. Argent.
Frerei, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 563. — Zanzibar.
friburgensis, Boeck. Cyf. Nov. ii. (1890) 2. — Bras.
frionensis, Boeck. l. c. 10. — Bras.
fulgens, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 563. — Afr. trop.
fusco-ater, Meinsh. ex Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 406. — As. bor. or.
fuscoferrugineus, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 226. — Bras.
galapagensis, Caruel, in Rendic. Accad. Lincei, v. (1889) 621. — Ins. Galapagos.
glaucophyllus, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 4. — Afr. trop. or.
glaucoviridis, Boeck. in Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 230. — Afr. trop.
gondanus, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 3 = *Mariscus diurensis*, C. B. Clarke.
grandis, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 564; et ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 121. — Zanzibar.
Grantii, Boeck. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 102 et 108. — Afr. trop. or.
grossarius, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 590 in syn. = *Pycneus sanguinolentus*, C. B. Clarke.
haematocephalus, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 564. — Afr. austro-or. extratrop.
Halei, Torr. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 213. — Florida.
Hallii, Britton, l. c. 211. — Texas.
Harla, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 451 nomen. — Costarica.
Hartii, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 9 = *Mariscus flabelliformis*, H. B. et K.
haspanoides, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 565. — Afr. aequat. or.
hawaicensis, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 470 = *Mariscus hawaianensis*, Mann.
Hieronymi, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 7. — Reg. Argent.
Hillebrandii, Boeck. ex Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 464. — Ins. Sandvic.
Hildebrandtii, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 118. — Afr. trop. or.
hypochlorus, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 468. — Ins. Sandvic.
ibensis, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 565. — Afr. trop. or.
indicus, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 6. — Reg. Himal.
intricato-ramosus, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1885) 186 = *Pycneus melanostachyus*, C. B. Clarke.
Iwasakii, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 47. — Japon.
ixiocarpus, F. Muell. in Trans. et Proc. Roy. Soc. Vict. xxiii. (April 1887) 55. — Austral.
Jaeggii, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 2 (= *Pycneus*, sp.). — Montevide.
Jenmani, C. B. Clarke, ex Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sc. vii. (1893) 252. — Parag.
Kamphoeveneri, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 5. — Ins. Nicobar.
Kleinianus, Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 596 in syn. = *Courtoisia cyperoides*, Nees.
Krebsii, Boeck. Cyf. Nov. ii. (1890) 2. — Japon.
Krugii, Boeck. l. c. i. (1888) 8. — Ins. Portoric.
Kunthianus, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 468. — *Mariscus Kunthianus*, Gaudich.

CYPERUS : —

- Kuntzei*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 1. (= *Pycneus*, sp.). — Anam.
- leptophyllus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 595 = *Mariscus vestitus*, C. B. Clarke.
- leucostachys*, Boj. ex C. B. Clarke, l. c. 653 = *Rynchospora adscendens*, C. B. Clarke.
- limbatus*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Sc. phys. Genève, xxxi. (1890) n. 1, 129 t. 37. — Parag.
- locuples*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 566. — Reg. Nigrit
- lomatophyllus*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 125 [Quid ?]. — Afr. trop. or.
- longifolius*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 581 = *zambesiensis*, C. B. Clarke.
- longicaulis*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 202. — Am. trop. ?
- longespiciatus*, Boeck. l. c. 229. — Bras.
- lucentinigricans*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 59; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 119. — Afr. trop. or.
- macrolepis*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 226. — Costarica.
- macropus*, K. Schum. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 570 = *niveoides*, C. B. Clarke.
- manilensis*, Boeck. ex Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 264. — Oceania.
- Mannii*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 568. — Kamerun, Fernando-Po.
- mapanioides*, C. B. Clarke, l. c. — Congo.
- marangensis*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 120. — Afr. trop. or.
- Marlothii*, Boeck. in Bot. Jahrb. xi. (1889-90) 407 = *Mariscus Marlothii*, C. B. Clarke.
- Martindalei*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 98. — Florida.
- martinicensis*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 38. — Ins. Martin.
- maucensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 469. — Ins. Sandvic.
- Mendoncae*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 9. — Bras.
- Minarum*, Boeck. l. c. 5. — Bras.
- mollipes*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 122 = *Mariscus mollipes*, C. B. Clarke.
- monocephalus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 531. — Madag.
- montanus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 4. — Reg. Argent.
- Montis-Sellae*, K. Schum. ex Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 186. — Oceania.
- natalensis*, Hort. ex Gard. and For. iii. (1890) 469 = *Mariscus sparganifolius*, C. B. Clarke ? (conf. Kew Bull. [1891] Add. II, 40).
- Niederleinianus*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) (= *Pycneus*, sp.). — Reg. Argent.
- niveoides*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 570. — Congo.
- Noronhae*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 66. — Ins. Fernando-Noronha.
- Oatesii*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 618. — Burma.
- ochrocarpus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 122. — Afr. trop. or.
- ochrocephalus*, C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, iv. (1894) 53; et in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 571. — Afr. trop. occ.
- oleraceus*, Roxb. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 611 in syn. = *bulbosus*, Vahl.
- oxycarioides*, Britton, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 465. — Texas.
- paniceus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 38. — Ind. or.
- parvispiculatus*, Boeck. l. c. i. (1888) 7. — Ins. S. Thomas.
- pectinatus*, Hilsenb. et Boj. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 581 in syn. = *uncinatus*, Poir.
- pergracilis*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 1. — Reg. Argent.
- Pethericki*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 571. — Afr. trop. bor. or.

CYPERUS : —

- phaeorrhizus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 119. — Afr. trop. or.
- phleoides*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 469 = *Mariscus phleoides*, Nees.
- Picardae*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 229. — Ins. Haiti.
- Pittieri*, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 6, nomen; et in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 230. — Costarica.
- platycaulis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 532. — Madag.
- protractus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 572 (= *C. tegetum*, Balf. f.). — Ins. Socotra.
- pseudocephalus*, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 464 nomen. — Costarica.
- pseudo-Haspan*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 47. — Japon.
- pseudo-niveus*, Boeck. in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxix. Abh. (1888) 45. — Afr. austro-occ. extratrop.
- pseudosphacelatus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 7. — Ins. Trinit.
- pseudosurinamensis*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 201 (= *Pycneus*, sp.). — Ins. Martin.
- punctorius*, Schrad., ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 580 = *textilis*, Thunb.
- pungens*, Boeck. ex Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iii. (1886) 121. — Belutsch.
- purpureo-vaginat*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 8. — Bras.
- purpureo-variegatus*, Boeck. l. c. 37. — Ins. Martin.
- purpureus*, Boeck. in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxix. Abh. (1888) 45. — Afr. austro-occ. extratrop.
- quinespicatus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 226. — Bras.
- Randuzii*, Boeck. l. c. 228 [err. typ. = *Tonduzii*]. — Costarica.
- redolens*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Sc. phys. Genève, xxxi. (1890) n. 1, 126 t. 36. — Parag.
- regiomontanus*, Britton, in Contrib. Nat. Herb. i. (1895) 362 = *Mariscus Haenkei*, Presl.
- Rehmannianus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 542 = *Pycneus Rehmannianus*, C. B. Clarke.
- riónensis*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 12. — Bras.
- rufostriatus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 575. — Madag.
- Rusbyi*, Britton, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 461. — Texas, N. Mexic.
- scaberrimus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 3. — Bras.
- Schaffneri*, Boeck. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 273. — Mexic.
- Schenckianus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 4. — Bras.
- Schinzii*, Boeck. in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxix. Abh. (1888) 45. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Schmitzianus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 226. — Mexic.
- senegalensis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 577. — Senegal.
- Serrae*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 227. — Bras.
- setiformis*, Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 405 (= *Pycneus*, sp.). — As. bor. or.
- Sintenisi*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 12 (= *Mariscus*, sp.). — Ins. Portoric.
- socialis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 577 (= *C. latifolius*, Ridl.). — Angola.
- Solmsii*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 228. — Hab. ?
- somaliensis*, C. B. Clarke, in Kew Bull. (1895) 229. — Reg. Somal.
- spiculatus*, Wood, in B. B. Smyth, Check list pl. Kansas (1892) 26. — Kansas.
- spongioso-vaginat*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 5. — Bengal.
- Stuhlmanni*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 578; et ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 118. — Afr. trop. or.
- subaequalis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 531. — Madag.

CYPERUS : —

- subaphyllus*, Boeck. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 139. — Afr. austro-occ. extratrop.
- subcapitatus*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 616. — Ind. or.
- Swartzii*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 10 in obs. = *Kyllingia filiformis*, Sw.
- sylvicola*, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 208 t. 1. fig. 4. — Ins. S. Thom.
- Taubertii*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 185 (= *Pycneus*, sp.). — Bras.
- Taylori*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 578. — Mombassa.
- tomaiophyllus*, K. Schum. ex C. B. Clarke, l. c. 594; et ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 122 = *Mariscus tomaiophyllus*, C. B. Clarke.
- Tonduzianus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 187. — Costarica.
- Torreyi*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 215 = *cylindricus*, Britton.
- tosaensis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 47. — Japon.
- trigonus*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 11. — Ins. Portoric.
- trinidadensis*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 7. — Ins. Trin.
- tucumanensis*, Boeck. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 274. — Argent.
- Uleanus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 5. — Bras.
- umbellatus*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 470 = *Mariscus umbellatus*, Vahl.
- umbilensis*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 595 = *Mariscus umbilensis*, C. B. Clarke.
- Urbani*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 10 (= *Mariscus*, sp.). — Ins. Portoric.
- vaginatissimus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 121. — Afr. trop. or.
- validus*, Boeck. in Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 229. — Bras.
- varius*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 202. — Reg. Argent.
- vialis*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 65. — Ins. Fernando-Noronha.
- virens*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 6. — Reg. Argent.
- viridispicatus*, Boeck. l. c. 8. — Reg. Urug.
- Wrightii*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 215. — N. Mexic.
- zambesiensis*, C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 53; et ex Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 581. — Afr. trop. austro-or.
- zanzibarensis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 581. — Zanzibar.

CYPHIA, Berg. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 700. tortilis, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 356. — Afr. austr.

CYPHOKENTIA, Brongn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 700. *Heanei*, Hort. ex Rev. Hort. Iviii. (1886) 230. — Hab. ?

CYPHOMANDRA, Mart. (Solan.). — Ind. Kew. i. 700. *dichotoma*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 231. — Boliv. *heterophylla*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 16. — Bras.

CYPRIPEDILON, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 = **Cypripedium**, Linn. (Orchid.). *Marianus*, Rouy, in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 58 = *Cypripedium Calceolus*, Linn.

CYPRIPEDIUM, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 701. *Adonis*, X, Hort. Will. ex Williams, Cat. new pl. (1893) 7; et Orchid. Alb. xi. (1895) t. 500. — Hybr. artef. *Albertianum*, X, J. Hye, in Gard. Chron. (1892) ii. 672; Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 3 cum ic. — Hybr. artef.

CYPRIPEDIUM : —

- album*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 512. — Hybr. artef.
Alcides ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 40. — Hybr. artef.
Alfredi ×, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 294. — Hybr. artef.
Alice ×, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 294. — Hybr. artef.
almum ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 512. — Hybr. artef.
amabile ×, A. Bleu, in Rev. Hort. lxiii. (1891) 406 cum ic. — Hybr. artef.
amandum ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 174. — Hybr. artef.
Amesianum ×, Williams, Cat. new pl. (1887) 22; et Orchid Alb. viii. (1889) t. 340. — Hybr. artef.
Antigone ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) ii. 716. — Hybr. artef.
apiculatum ×, Hort. Veitch, ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 617. — Hybr. artef.
Arnoldiae ×, Hort. ex Gard. and For. viii. (1894) 425 fig. 67 (an seq.?). — Hybr. artef.
Arnoldianum ×, Hort. ex W. A. Manda, in Gard. Chron. (1890) ii. 632. — Hybr. artef.
Atys ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 6. — Hybr. artef.
Aylingii ×, L. Castle, in Journ. of Hort. (1890) 480 fig. 74; Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 792 fig. 131. — Hyb. artef.
Baconis ×, Kraenzl. in Gard. Chron. (1892) i. 170. — Hybr. artef.
Barteti ×, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. lviii. (1886) 84; God. Lebeuf, L'Orchidophile (1886) 121 cum xylogr. — Hybr. artef.
Beatrice ×, N. E. Br. in Gard. Chron. (1889) ii. 266. — Hybr. artef.
bellatulum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 746 et 749 fig. 99; *Lindenia*, iv. (1888) t. 149. — As. trop. or.
Berenice ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 136. — Hybr. artef.
Berggrenianum ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 788. — Hybr. artef.
Binoi, Hort. ex Illustr. Hort. xxxiv. (1887) 19; et L'Orchidophile (1890) 111 cum icone = *Selenipedium vittatum*, Reichb. f.
Bragatium ×, L. Lind. in *Lindenia*, vi. (1890) 81 t. 279; et ex Gard. Chron. (1891) i. 406 et 784. — Hybr. artef.
Brownii ×, Hort. ex Gard. Chron. (1891) ii. 49; Orchid Rev. i. (1893) 326. — Hybr. artef.
Buchananianum ×, Hort. Measur. ex Rolfe, l. c. (1890) i. 73. — Hybr. artef.
Buchanianum ×, Gower, in The Garden, xxxv. (1889) 8; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 236. — Hybr. artef.
burfordiense ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 724. — Hybr. artef.
caligare ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 264. — Hybr. artef.
callosum, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 326, (1887) i. 314 fig. 64, *Lindenia* ii. (1886) 53 t. 73. — Siam vel Cochinch.
calurum ×, Reichb. f. l. c. (1886) i. 73. — Hybr. artef.
cambridgeanum, Hort. ex Journ. Hort. xiv. (1887) 376 t. 66; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1893) 238. — Hab. ?
barbati-Veitchianum ×, Bleu, in *Lindenia*, v. (1889) 75 t. 238. — Hybr. artef.
Canhamiae ×, Hort. ex Gard. Chron. (1887) ii. 746; et (1894) ii. 667 fig. 86. — Hybr. artef.
Cannartianum, Hort. ex *Lindenia*, iii. (1887) 93 t. 141 (= *C. Roebelini*, Reichb. f.) = philippinense, Reichb. f.
cardinale ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 526; et (1890) i. 558; Orchid Alb. viii. (1889) t. 370. — Hybr. artef.
Carrierei ×, Hort. Gall. ex Le Monit. d'Hortic. (1887) 54; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 239. — Hybr. artef.
Cassiope ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 200. — Hybr. artef.
Castleanum ×, Rolfe, l. c. (1891) i. 39 et 70;

CYPRIPEDIUM : —

- et in Reichenbachia, Ser. II. (1892) 97 t. 45. — Hybr. artef.
Celia ×, Rolfe, l. c. (1891) i. 104. — Hybr. artef.
Ceres ×, N. E. Br. l. c. 360, (1892) i. 214. — Hybr. artef.
Chamberlainianum, O'Brien, l. c. (1892) i. 234; et ex Rev. Hort. (1892) 104 fig. 27 et 28. — N. Guin.
Charlesianum ×, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 430. — Hybr. artef.
Charlesworthii, Rolfe, in Orchid Rev. i. (1893) 303; *Lindenia*, x. (1894) 25 t. 443; Bot. Mag. (1895) t. 7416. — Ind. or.
chelseense ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 407. — Hybr. artef.
chinense, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 230. = *Henryi*, Rolfe.
chlorops ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 584. — Hybr. artef.
claptonense ×, Reichb. f. l. c. (1889) i. 168; Rev. Hort. (1891) 533 [claptoniense]. — Hyb. artef.
Claudii ×, L. Linden, in *Lindenia*, ix. (1893) 29 t. 397. — Hybr. artef.
Cleopatra ×, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 458. — Hybr. artef.
Clinkberryanum ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) ii. 86 fig. 18. — Hybr. artef.
concinnum ×, Bull. Catal. (1887) 16. — Hybr. artef.
conco-Lawre, ×, Hort. ex Orchid Rev. ii. (1894) 339; *Lindenia*, ix. (1894) 51 t. 408; Orchid Alb. xi. (1895) t. 506. — Hybr. artef.
conspicuum ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 521; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 248. — Hybr. artef.
Constance ×, N. E. Br. l. c. (1890) ii. 294. — Hybr. artef.
Coppinianum ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 nomen. — Hybr. artef.
Corvingianum ×, Hort. ex Garten Mag. (1891) 495; Orchid Rev. i. (1893) 327. — Hybr. artef.
corrugatum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 251. — China.
Cowleyanum ×, Hort. ex O'Brien, in Gard. Chron. (1892) i. 72; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 248. — Hybr. artef.
Cythera ×, Hort. ex Rolfe, l. c. (1890) i. 72. — Hybr. artef.
Dallemagnei ×, Hort. ex *Lindenia*, ix. (1894) 57 t. 411. — Hybr. artef.
Daisyae ×, Hort. ex Gard. Chron. (1892) ii. 301; et ex Gard. and For. v. (1892) 463 fig. 79. — Hybr. artef.
Deboisianum ×, Hort. l. c. (1890) ii. 747 = *Desboisianum*, Hort.
delicatumum ×, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 552. — Hybr. artef.
delicatum ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1894) 251. — Hybr. artef.
Denisianum ×, O'Brien, l. c. (1894) ii. 118. — Hybr. artef.
Desboisianum ×, Ch. de Bosschere, in Gard. Chron. (1890) ii. 747 (*Deboisianum*); in *Lindenia*, vi. (1890) 77 t. 277; et ex Gard. Chron. (1891) i. 731. — Hybr. artef.
Dibdin ×, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 162. — Hybr. artef.
dilectum, Reichb. f. l. c. (1888) i. 330 [an hybr. spont. ?]. — Hab. ?
discolor ×, Reichb. f. [ubi ?] ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1893) 253. — Hybr. artef.
doliare ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 447. — Hybr. artef.
Doris ×, Hort. ex Rolfe, l. c. (1890) ii. 716. — Hybr. artef.
Edithae ×, Kraenzl. l. c. (1892) ii. 458. — Hybr. artef.
Electra ×, Rolfe, l. c. (1888) i. 297. — Hybr. artef.
elegans, Reichb. f. in Flora, lxi. (1886) 560. — Tibet.
Elinor ×, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 38; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 255. — Hybr. artef.
Elliottianum, O'Brien (an Reichb. f. ?) in Gard. Chron. (1888) ii. 501 et 532; *Lindenia*, iv. (1888) 87 t. 186; Orchid Alb. ix. (1891) t. 397. — Ins. Philipp.
enfieldense ×, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 88. — Hybr. artef.

CYPRIPEDIUM : —

- Engelhardtiae* ×, L. Linden, in *Lindenia*, vi. (1890) 81 et 93 t. 285. — Hybr. artef.
Ernestianum ×, Hort. ex Journ. of Hort. xiv. (1887) 375 fig. 67; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 256. — Hybr. artef.
Eucharis ×, Desbois, in Gard. Chron. (1893) i. 195; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 256. — Hybr. artef.
Euryale ×, Veitch, Man. Cypris. (1889) 83; et ex Kew Bull. (1890) Add. ii. 43. — Hybr. artef.
exul, O'Brien, in Gard. Chron. (1892) i. 522 fig. 77. — Nepal.
Eyermannianum ×, Rolfe, l. c. (1890) ii. 746; et ex Reichenbachia, Ser. II. i. (1892) t. 38 fig. 2. — Hybr. artef.
Fargesii, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 267. — China.
fascinatingum ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. (1894) 25. — Hybr. artef.
fasciolatum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 232. — China.
Figaro ×, O'Brien, in Gard. Chron. (1889) ii. 750. — Hybr. artef.
Fitchianum ×, Will. New pl. catal. (1888) 20; et in Warn. et Will. Orchid Alb. viii. (1889) t. 350. — Hybr. artef.
Fraseri ×, "Reichb. f." ex *Lindenia*, vi. (1890) 29 t. 253. — Hybr. artef.
Galatea ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) i. 168. — Hybr. artef.
Gaskellianum ×, Gower, in Garden (1890) 150; = *C. Niobe*, Rolfe.
Germianum ×, Hort. Veitch, ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 200. — Hybr. artef.
Gibezianum ×, L. Linden, in *Lindenia*, ix. (1894) 85 t. 425. — Hybr. artef.
gigas ×, O'Brien, in Gard. Chron. (1892) i. 136; Journ. of Hort. xxiv. (1892) 257 fig. 42. — Hybr. artef.
Godseffianum ×, Hort. ex Gard. Chron. (1888) i. 296; et ex Rev. Hort. Belg. (1892) 85. — Hybr. artef.
Gravesiae ×, R. M. Grey, in Gard. Chron. (1894) i. 298 fig. 34. — Hybr. artef.
Henryi, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 211. — China.
Hephaestus ×, A. H. Kent, ex Gard. Chron. (1888) i. 425. — Hybr. artef.
Hera ×, Rolfe, l. c. (1890) i. 104 et 105; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 264. — Hybr. artef.
Hermione ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1892) ii. 682. — Hybr. artef.
himalaicum, Rolfe, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 319. — China occ., Sikkim, Nepal.
Hornianum ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) 428. — Hybr. artef.
Horneri ×, Hort. ex Orchid Rev. ii. (1894) 80. — Hybr. artef.
Houtteanum ×, Hort. ex Gard. Chron. (1888) i. 561 = *C. Van Houtteanum*, Hye.
Huybrechtsianum ×, Hort. Vervae, ex Ch. de Bosschere, in Gard. Chron. (1892) i. 554; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. (1893) 206 [*Huybrechtsianum*]. — Hybr. artef.
Hyeaenum ×, L. Linden et Rodigas, ex Gard. Chron. (1886) i. 567, 590 et 680. — Hybr. artef.
insigne, Ridl. l. c. (1891) ii. 94. — Nepal.
Inspirator ×, de Kerchove, in Rev. Hort. Belg. (1894) 25. — Hybr. artef.
Io ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 488. — Hybr. artef.
Isabelianum, Pucci, Les Cypris. (1891) 123 = *Selenipedium Isabelianum*, Rod.
Janus ×, Hort. ex Gard. and For. viii. (1895) 64. — Hybr. artef.
Joungianum ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 (an *C. Youngianum*, Rolfe ?). — Hybr. artef.
Juno ×, N. E. Br. in Gard. Chron. (1891) i. 360. — Hybr. artef.
Kimballianum, L. Linden, in *Lindenia*, ii. (1886) 42 in nota. — Burma.
Kravianum ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 nomen. — Hybr. artef.
Lathamii ×, Hort. ex Journ. of Hort. (1888) 174. — Hybr. artef.
Lathamianum ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 360; et ex Gartenfl. (1889) 528 fig. 79. — Hybr. artef.

CYPRIPEDIUM : —

- Laucheanum* ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 nomen. — Hybr. artef.
Laurae ×, Hort. ex Orchid. Rev. ii. (1894) 80. — Hybr. artef.
Lauvibel ×, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 502, 560 et 561 fig. 82; et ex Lindenia, ix. (1893) 49 t. 407 = *Laurebellum*, Hort.
Lauvibellum ×, Lawrence l. c. (1892) i. 502; et (1892) i. 561. — Hybr. artef.
Lebaudyannum ×, Hort. l. c. (1895) ii. 90. — Hybr. artef.
Leda ×, Hort. l. c. (1892) i. 202. — Hybr. artef.
Lemoineanum ×, Reichb. f. l. c. (1886) i. 558. — Hybr. artef.
Lemoiniarianum ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 712; et in Reichenbachia ii. t. 89. — Hybr. artef.
Leonae ×, L. Linden, in Lindenia, viii. (1892) 51 t. 360. — Hybr. artef.
Leyserianum ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xx. (1894) 169 cum ic. — Hybr. artef.
lineolare ×, Reichb. f. ex Gard. Chron. (1887) i. 447. — Hybr. artef.
Littleanum ×, Hort. l. c. (1895) ii. 36. — Hybr. artef.
Leopoldianum ×, Hort. ex Gard. Chron. (1895) i. 333. — Hybr. artef.
Lucienianum ×, Hort. ex Lindenia, viii. (1892) 55. t. 362. — Hybr. artef.
luteum, Franch. in *Nov. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 88. — China.
Macfarlanei ×, Kraenzl. in Gard. Chron. (1891) ii. 300. — Hybr. artef.
macrochilum ×, Hort. l. c. (1894) ii. 343. — Hybr. artef.
Maeserelianum ×, Hort. ex Rodigas, in Illustr. Hort. (1887) 23 t. 77; et (1889) 23 cum ic. — Hybr. artef.
Magdalena ×, Hort. ex O'Brien, in Gard. Chron. (1895) i. 228. — Hybr. artef.
Malyanum ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 nomen. — Hybr. artef.
margaritaceum, Franch. in *Bull. Soc. Phil. Paris*, Sér. VII. xii. (1888) 141; et in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 265; *L'Orchidophile* (1888) 368 cum ic. — China.
marmoratum ×, Hort. ex Gard. Chron. (1887) i. 576 fig. 109. — Hybr. artef.
Massainum ×, Hort. ex Weathers, l. c. (1893) ii. 267 fig. 48. — Hybr. artef.
Maynardi ×, Rolfe, l. c. (1890) ii. 702; in Reichenbachia (1892) t. 43 fig. 1; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893) 293. — Hybr. artef.
Measuresianum ×, Will. New pl. catal. (1887) 18 et 22 cum ic.; et Orchid Alb. vii. (1888) 304; Rev. Hort. Belg. (1888) 266 cum ic. — Hybr. artef.
memoria-Moensi ×, L. Linden, in Lindenia, viii. (1892) 53 t. 461; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 282. — Hybr. artef.
micranthum, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 265. — China.
Minerva ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 464; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 283; God. Lebeuf, in *L'Orchidophile* (1890) 35. — Hybr. artef.
Minos ×, Hort. Veitch, ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893) 283. — Hybr. artef.
Miteanum, L. Lind. et Rodigas, in Lindenia, iv. (1887) 7 t. 146; et in Gard. Chron. (1888) ii. 326 = *ciliolare*, Reichb. f.
Moensianum, Hort. ex Lindenia, iii. (1887) 69 t. 129 et in Gard. Chron. (1888) i. 561. — Ins. Philipp.
Murillo ×, Desbois, in Gard. Chron. (1893) i. 163. — Hybr. artef.
neo-guineense, L. Linden, (1888) i. 505 nomen = *Rothschildianum*, Reichb. f.
Nicholsonianum ×, Hort. ex Orchid. Rev. i. (1893) 374 [sphalm. *Nicholsianum*] et 379. — Hybr. artef.
Niobe ×, Rolfe, ex Gard. Chron. (1890) i. 91; Orchid Alb. x. (1893) tab. 438. — Hybr. artef.
nitidissimum ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 6; et in Reichenbachia, Ser. II, i. t. 27. — Hybr. artef.
Numa ×, Hort. l. c. (1890) i. 608; et (1890) ii. 7 [Numae]. — Hybr. artef.
obscurum ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 8. — Hybr. artef.
Oenone ×, Hort. ex Rolfe, l. c. (1890) i. 260; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 287. — Hybr. artef.

CYPRIPEDIUM : —

- Olenus* ×, Hort. Measures ex Gard. Chron. (1895) i. 613. — Hybr. artef.
orbum ×, Rolfe, l. c. (1887) ii. 772. — Hybr. artef.
ornatum ×, Hort. l. c. (1892) i. 428. — Hybr. artef.
orphanorum ×, Hort. l. c. (1887) ii. 747 [an seq. ?]. — Hybr. artef.
Orphanum ×, Hort. Veitch, ex Reichb. f. l. c. (1886) ii. 166; Orchid Alb. x. (1893) t. 455. — Hybr. artef.
Orpheus ×, Rolfe, l. c. (1891) i. 39; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 288. — Hybr. artef.
Pageanum ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 164. — Hybr. artef.
Pallas ×, N. E. Br. l. c. (1891) i. 360. — Hybr. artef.
Paris ×, Rolfe, in Orchid. Rev. i. (1893) p. 88 fig. 6. — Hybr. artef.
Parksianum ×, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 88. — Hybr. artef.
pavoninum ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 264. — Hybr. artef.
Parvati, Hort. ex Rev. Hort. lviii. (1886) 85 in obs. = *Barteti*, Hort.
Petersianum ×, Reichb. f. in Gard. Chron. l. c. (1888) i. 331. — Hybr. artef.
Penelaus ×, Hort. ex Journ. of Hort. xxvi. (1892) 319 fig. 45; et ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 290. — Hybr. artef.
Peteri ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 577 fig. 110. — Hybr. artef.
picturatum ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183; et ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893) 290. — Hybr. artef.
Pitcherianum, Manda, in Am. Florist, iii. (1887) 178 = *C. Argus*, Reichb. f.
Pitcherianum ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 42; et (1889) i. 72 fig. 10; Orchid Alb. x. (1893) t. 453. — Hybr. artef.
pleistochlorum ×, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 552. — Hybr. artef.
plunium ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 40. — Hybr. artef.
politum ×, Hort. l. c. (1887) i. 764 fig. 143; et ex Gartenfl. (1887) 499. — Hybr. artef.
Pollettianum ×, Rolfe, in Journ. of Hort. xxiii. (1891) 559 t. 101; in Reichenbachia, (1892) t. 43 fig. 2. — Hybr. artef.
polystigmaticum ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 407. — Hybr. artef.
porphyrospilum, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893) 293 = *pyncnoterum*, Reichb. f.
praestans, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 776; et (1887) ii. 242; et in Illustr. Hort. xxxii. (1887) 35 et 73 t. 26. — Borneo.
Pryorianum ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893) 293. — Hybr. artef.
pusillum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 211. — Florida.
regale ×, Bull. Catal. (1887) 10. — Hybr. artef.
Richardsoni ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893) 295. — Hybr. artef.
robustus ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1889) i. 394; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 295. — Hybr. artef.
Reichenbachianum, Hort. ex Lindenia, iii. (1887) 90. = *longifolium*, Warn. et Reichb. f.
Robinianum ×, Hort. ex Orchid. Rev. ii. (1894) 79. — Hybr. artef.
Robinsonianum ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 nomen. — Hybr. artef.
Rothschildianum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 457 et 554; Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7102. — N. Guin.
rubrum ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1894) 296. — Hybr. artef.
Sanderae ×, Hort. ex Rev. Hort. (1895) 249 et 250 = *Sanderianum*, Reichb. f.
Sanderianum ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 273; et in Reichenbachia, i. t. 3. — Hybr. artef.
Saundersianum ×, O'Brien, l. c. (1888) ii. 407. — Hybr. artef.
Savageanum ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 407. — Hybr. artef.
Schroederiae ×, Reichb. f. in Orchid Alb. v. (1886) t. 196; Veitch, Man. Orch. Pl. iv. 105. — Hybr. artef.

CYPRIPEDIUM : —

- Seegerianum* ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1894) 300 = *Siegerianum*, Hort.
siamense, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 161. — Siam.
sibyroloense ×, L. Linden, in Illustr. Hort. xi. (1893) 69 t. 579. — Hybr. artef.
Siegerianum ×, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 431. — Hybr. artef.
Simoni ×, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 190. — Hybr. artef.
Smithii ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893) 301. — Hybr. artef.
southgatense ×, Hort. ex Journ. of Hort. xxv. (1892) 39 fig. 6. — Hybr. artef.
Statterianum ×, Hort. ex Journ. of Hort. xxvii. (1893) 417 fig. 611; et ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893). — Hybr. artef.
stenophyllum ×, Reichb. f. ex Will. l. c. 303. — Hybr. artef.
superclivare ×, Hort. ex Gard. Chron. (1887) ii. 747; Will. l. c. 305. — Hybr. artef.
Swinburnei ×, Hort. l. c. (1892) i. 88 et 136. — Hybr. artef.
Sylvia ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) i. 682. — Hybr. artef.
Taganti ×, God.-Lebeuf, in *L'Orchidophile* (1887) 64. — Hab. ? vel Hybr. artef. ?
Tautzianum ×, Hort. ex Gard. Chron. (1886) ii. 681; et Reichenbachia, ii. (1889) t. 65. — Hybr. artef.
Thibautianum ×, [Hort. Veitch] ex Reichb. f. l. c. (1886) i. 104. — Hybr. artef.
tibeticum, King, ex Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 320. — China, occ. India.
tonkinense, Hort. ex Lindenia ii. (1886) 61 t. 77 = *concolor*, Benth.
triumphans ×, O'Brien, in Gard. Chron. (1894) i. 198. — Hybr. artef.
turpe ×, Hort. ex God.-Lebeuf, in *L'Orchidophile* (1888) 87 nomen. — Hybr. artef.
Van Houtteanum ×, Hye, ex Lindenia, iii. (1887) 71 t. 130. — Hybr. artef.
variopictum ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 407. — Hybr. artef.
Vervaeckianum ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 712 = *C. Euryale*, Veitch.
Vipani ×, Hort. ex Kew Bull. (1891) Add. ii. 41, et ex Journ. of Hort. xxiv. (1892) 421 fig. 73. — Hybr. artef.
Volonteanum, Hort. ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1890) ii. 7 et 66 = *C. Hookerae*, Reichb. f.
Weathersianum ×, L. Linden, in Lindenia, ix. (1894) 29 t. 397. — Hybr. artef.
Weidlichianum ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183. — Hybr. artef.
Wendlandi, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183; et ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 48. — Hybr. artef.
Winnianum ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 362; Journ. of Hort. xxii. (1893) 71 fig. 12; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 314. — Hybr. artef.
Wolterianum, Kraenzl. in Gard. Chron. (1895) i. 166. — Hab. ? (an Hybr. spont. ?)
Youngianum ×, Rolfe, l. c. (1890) ii. 183; et in Reichenbachia, Ser. I, i. (1891) t. 31. — Hybr. artef.
yunnanense, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 231. — China.
Yvonnae ×, Hort. ex Garnier, in Illustr. Hort. xlii. (1895) 23 t. 26; et Rev. Hort. (1895) 392 [Yvonne]. — Hybr. artef.

CYPSSELOCARPUS, F. Muell. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 702.
haloragoides, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 180 = *haloragoides*, F. Muell.

CYRTANDRA, Forst. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 702.
Baileyi, F. Muell. in F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* III. (1890) 51. — Austral.
begoniaefolia, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 328. — Ins. Sandvic.
biserrata, Hillebr. l. c. 329. — Ins. Sandvic.
bracteata, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 417. — Oceania.

CYRTANDRA : —

- Clarkei, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 213. — Borneo.
 Cuminsii, Hemsl. in *Kew Bull.* (1895) 137. — Ins. Salom.
 dubiosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 472. — Java.
 filipes, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 336. — Ins. Sandvic.
 gracilis, Hillebr. *l. c.* 333. — Ins. Sandvic.
 Grayana, Hillebr. *l. c.* 330. — Ins. Sandvic.
 Hellwigii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 27. — Oceania.
 Hillebrandi, Oliver, ex Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 331. — Ins. Sandvic.
 latebrosa, Hillebr. *l. c.* 337. — Ins. Sandvic.
 Listeri, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc. xxv.* (1894) 213. — Ins. Pacif.
 Lydgatei, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 335. — Ins. Sandvic.
 lysiosepala, Hillebr. *l. c.* 330. — Ins. Sandvic.
 macrocalyx, Hillebr. *l. c.* 329. — Ins. Sandvic.
 paritiiifolia, Hillebr. *l. c.* 328. — Ins. Sandvic.
 procera, Hillebr. *l. c.* 329. — Ins. Sandvic.
 Schraderi, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 217. — N. Guin.
 suffruticosa, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii.* (1893) 330. — Penins. Mal.
 Terrae-Guilelmi, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 217. — N. Guin.
 Wawrae, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 328 (= *C. peltata*, Wawra). — Ins. Sandvic.

- CYRTANDROMOEIA**, Zoll. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 703.
 megaphylla, Hemsl. in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1555. — Perak.

- CYRTANTHUS**, Ait. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 703.
 brachyscyphus, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 55. — Afr. austr.
 Galpini, Baker, in *Kew Bull.* (1892) 83. — Afr. austr.
 Huttoni, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 55. — Afr. austral.
 intermedia ×, Hort. Bull. ex Gard. Chron. (1893) i. 413. — Hybr. artef.
 lutescens, Hort. ex Kew Bull. (1889) 77 = *Anoiganthus breviflorus*, Baker.
 parviflorus, Baker, in *Gard. Chron.* (1891) i. 104. — Afr. austr.
 rectiflorus, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 55. — Afr. austr.

- CYRTOPEPERA**, Lindl. = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).
flexuosa, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 363. — Afr. trop. or.
Holstiana, Kraenzl., ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 41. — Afr. trop. or.
papuana, Ridl. in *Journ. Bot. xxv.* (1886) 354. — N. Guin.
papillosa, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 336. — Natal.
 Regnierii, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 294; *L'Orchidophile* (1886) 223 cum ic. — Cochinch.

- CYRTOPODIUM**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 704.
 Aliciae, L. Linden et Rolfe, in *Lindenia*, viii. (1892) 23 t. 371. — Bras.
 flavescens, Cogn. in *Mart. Fl. Bras. vi.* (1895) 74. — Guian.
 Parkinsonii, F. Muell. et Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 256. — N. Brit.
 plantagineum, Cordem. *Fl. Ile Réunion.* (1895) 225 (= *Limodorum plantagineum*, Thou.). — Ins. Borb.
 Saintlegerianum, Hort. ex Gard. Chron. (1888) ii. 180; et ex *Gartenfl.* xxxvii. (1888) 597 = *punctatum*, Lindl.

- CYRTORHYNCHA**, Nutt. = **Ranunculus**, Tourn.
Cymbalaria, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 161 = *R. Cymbalaria*, Linn.

- CYRTOSPERMA**, Griff. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 705.

CYRTOSPERMA : —

- ferox, N. E. Brown et L. Lind. in *Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 39 t. 153; et ex *Gard. Chron.* (1892) ii. 123. — Borneo.

- CYRTANTHE**, R. Br. = **Richea**, R. Br. (Epicrid.).
dracophylla, Gunnii, *pandanifolia*, et *scoparia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 391 = *homonyma omnia* Richeae.

- CYSTOPUS**, Blume = **Odontochilus**, Blume (Orchid.).
brevistylis, *calcaratus*, *Clarkei*, *crispus*, *Elwesii*, *flavescens*, *grandiflorus*, *jauberti*, *lanceolatus*, *longiflorus*, *macranthus*, *pectinatus*, *pumilus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 658 = *homonyma omnia* *Odontochili*.
flavus, Kuntze, *l. c.* = *O. lanceolatus*, Blume.

- CYSTOSTEMON**, Balf. f. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 705.
socotrense, « Balf. f. » ex Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1894) 126 = *socotranum*, Balf. f.

- CYTINUS**, Linn. (Cytin.). — Ind. Kew. i. 706.
 Baroni, Baker f. in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 469. — Madag.
 oxylepis, Robins. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 321. — Mexic.

- CYTISOPSIS**, Jaub. et Spach (Legumin.). — Ind. Kew. i. 706.
 spinosa, Conrath, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 327. — Armen.

- CYTISUS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 706.
absinthioides, Velen. ex Degen, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 423 in syn.; Briq. *Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 181 = *supinus*, Linn. var.
 ganipilus, Velen. ex Nadj, *Géogr. bot. Emp. Ottom.* (1892) 17 nomen. — Thrac.
 ambiguus, Adamovic, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 406. — Serb.
 arenarius, Simonk. in *Math. és Termész. Kozlem.* xxii. (1888) 361, ex Briq. *Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 173 = *supinus*, Linn.
 australis, A. Kern, ex Wohlfarth. in *Koch, Syn. Deutschl. Fl.* ed 3 (1892) 509 = *nigricans*, Linn.
 Boissieri, Briq. *Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 148 (= *Sarothamnus eriocarpus*, Boiss. et Reut.). — Hisp.
 bosniacus, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 119 = *ciliatus*, Willd.
 bucovinensis, Simonk. in *Math. és Termész. Kozlem.* xxii. (1888) 361; ex Briq. *Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 173 = *supinus*, Linn.
 canariensis, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 102 = *canariensis*, Steud.
 cananensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 178 sphalm. = *canariensis*, Steud.
 cantabricus, « Reichb. » ex Briq. *Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 147. — Hispan.
 catalaunicus, Briq. *l. c.* 149 (= *Sarothamnus catalaunicus*, Webb). — Hisp.
 cetius ×, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 833. — Austria.
 colchicus, Alboff, *Prod. Fl. Colch.* (1895) 53. — Reg. Cauc.
 danubialis, Velen. in *Abh. Böhm. Ges. Wiss.* (1890) ii. 43; et *Fl. Bulg.* (1891) 130 = *supinus*, Linn. var.
 Frivaldszkyanus, Degen, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 422; Briq. *Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 175 = *hirsutus* Linn. subsp. *pallidus*, Briq.
 Haynaldi, Simonk. *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 173; Briq. *l. c.* 170 = *hirsutus*, Linn. var.
 Hillebrandtii, Briq. *l. c.* 137 (= *Genista Hillebrandtii*, Christ). — Ins. Canar.
 insubricus, Wettst. ex Briq. *l. c.* 124 = *Laburnum anagyroides*, Medic.
 Jacquinianus, Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 5 = seq.
 Jacquinianus, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 438 = *Laburnum anagyroides*, Medic.

CYTISUS : —

- Jankae*, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) 31; et *Fl. Bulg.* (1891) 129 = *supinus*, Linn. var.
 Kernerii, Blocki, in *Kneuch, Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 137; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 107. — Eur. centr.
 Kernerii, Mugg. Kan. et Knapp [Die bish. bek. Pfl. Slav. (1866) 160] ex Briq. *Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 166 et 173 = *supinus*, Linn. et *hirsutus*, Linn.
 kosmariensis, « Ball » ex Koehne, in *Just. Bot. Jahresh.* xvii. (1889) 166, sphalm. = *osmariensis*, Ball.
 leiostichus, Borb. *Pl. Com. Temés.* (1884) 78, ex Briq. *Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 176 = *aus-triacus*, Linn.
 Linneanus, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 437 et (1891) 173 et 264 fig. 7-12 et 21 = *Laburnum anagyroides*, Medic.
 monopestulanus, Briq. *l. c.* 94 sphalm. = *monopestulanus*, Linn.
 mutabilis, Loscos, ex Briq. *l. c.* 143 in syn. = *patens*, Linn.
 Noëanus, Reichb. ex Briq. *l. c.* 182 = *supinus*, Linn.
 osmariensis, « Ball » ex Briq. *l. c.* 113 = *hosmariensis*, Ball.
 pannonicus, Simonk. in *Math. és Termész. Kozlem.* xxii. (1888) 361 ex Briq. *l. c.* 173 = *supinus*, Linn.
 podolicus, Blocki, in *Kneuch, Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 137; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 109. — Eur. centr.
 praecox ×, ex Kew Bull. (1892) Append. i. 24. — Hybr. artef. ?
 rhodopeus, Wagn. ex Degen, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 423; et in syn. Briq. *Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 180 in obs. = *supinus*, Linn. var.
 Rocheli, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 332 = *capitatus*, Jacq.
 Sauzeanus, Burn. et Briq. *Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 27 et 157. — Gall.
 shipkaënsis, Dippel, *Neuh. Offerte Nation. Arboret.* (1892-3) 27 nomen. — Reg. Balkan.
 Spachianus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 178 = *Genista Spachiana*, Webb.
 stenopetalus, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 162; Briq. *Étud. Cytis. Alp.-Mar.* 138 = *maderensis*, Masf.
 subspinescens, Briq. *l. c.* 60 et 163. — Eur.
 supranubius, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 178 = *fragrans*, Lam.
 szeplighettis, Koehne, ex Briq. *l. c.* 188. — (Quid ?)
 tridentatus, Batt. in *Batt et Trab. Fl. de l'Algér.* (Decot.) (1888) 206 = *Genista tridentata*, Linn.
 tridentatus, Taub. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1893) 239 = *praec.*
 trifolius, Briq. *Étud. Cytis. Alp.-Mar.* 107 sphalm. = *triflorus*, Linn.
 versicolor ×, Briq. *l. c.* 165 in obs. — Hybr. artef.
 virens, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 128; Briq. *l. c.* 178 et 179 = *supinus*, Linn. var.
 virens, Wohlfarth, in *Koch, Syn. Deutschl. Fl.* ed. 3. (1892) 511. — Austria.
 virens ×, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 834. — Austria.
 Watereri ×, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 129 t. 4; Briq. *Étud. Cytis. Alp.-Marit.* (1894) 124 = *Laburnum Watereri* ×, Briq.
 Weissmanni, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 449 ad calc. ex Briq. *l. c.* 124 129 = *insubricus* Wettst. ?

D

- DACRYDIUM**, Soland. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 708.
 Foncki, Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 168 (= *Lepidothamnus Foncki*, Phil.). — Am. austr. occ.
 Hookerianum, Eichl. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 1. (1887) 107. = *Pherosphaera Hookeriana*, Archer.

DACTYLAENA, Schrad. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 708.
Glazioviana, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892) 1. — Bras.

DACTYLOPHORA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 549 = **Loranthus**, Linn.
verticillata, Van Tiegh. l. c. 550 = *Dendrophthoe verticillata*, Schiff.

DACTYLODES, Zanoni-Monti, Rar. Stirp. (1743) 94-95 t. 66, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 772 = **Tripsacum**, Linn. (Gramin.).
angulatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 773 = *T. dactyloides*, Linn.
fasciculatum, Kuntze, l. c. = *T. fasciculatum*, Trin.

DACTYLOCLADUS, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2341. **MELASTOMACEAE**.
stenostachya, Oliver, l. c. — Borneo.

DACTYLOCTENIUM, Willd. = **Eleusine**, Gaertn. (Gramin.).
aegyptium, Richt. Pl. Europ. i. (1889) 68. (= *D. aegyptium*, Willd.). = *E. aegyptiaca*, Desf.

DACTYLOPETALUM, Benth. (Rhizophor.). — Ind. Kew. i. 709.
parvifolium, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 78. — Afr. trop. occ.

DACTYLOSTELMA, Schlechter, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 452. **ASCLEPIADEAE**.
boliviense, Schlechter, l. c. — Bolivia.

DAEMIA, R. Br. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 709.
barbata, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51, (1895) 43. — Afr. austr.
cordifolia, K. Schum. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 17; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 324 = *extensa*, R. Br.

DAEMONOROPS, Blume (Palm.). — Ind. Kew. i. 710.
didymophylla, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 468. — Penins. Mal., Sumatra.
Kunstleri, Becc. in *Hook. f. l. c.* 469. — Perak.
Kurzianus, *Hook. f. l. c.* 463. — Ins. Andam.
macrophyllus, Becc. in *Hook. f. l. c.* 470. — Perak.
Manii, Becc. in *Hook. f. l. c.* 463. — Ins. Andam.
micracanthus, Becc. in *Hook. f. l. c.* 467. — Malacca.
oligophyllus, Becc. in *Hook. f. l. c.* — Perak.
propinquus, Becc. in *Hook. f. l. c.* 467. — Penins. Mal., Sumatra.
Sabut, Becc. in *Hook. f. l. c.* 469. — Perak.
Sepal, Becc. in *Hook. f. l. c.* 465. — Perak.
tabacinus, Becc. in *Hook. f. l. c.* 466. — Perak.
vagans, Becc. in *Hook. f. l. c.* 469. — Perak.

DAHLIA, Cav. (Composit.). — Ind. Kew. i. 710.
dissecta, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 141. — Mexic.
Lehmanni, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 55. — Columb.
pubescens, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 142. — Mexic.

DAIS, Royen (Thymel.). — Ind. Kew. i. 710.
anthylloides, Eckl. et Zeyh. ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1893) t. 7303 = *Lasiosiphon anthylloides*, Meissn.
rhannifolia, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1895) t. 318. — Madag.

DALBERGIA, Linn. f. (Legum.). — Ind. Kew. i. 710.
Boehmii, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 218. — Afr. trop. or.
cochinchinensis, Pierre, ex Laness. *Pl. util. col. franç.* (1886) 289. — Cochinch.
Delavayi, Franch. *Pl. Delav.* i. (1889) 186. — China.
Ecastophyllum, Taub. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 335. = *Hecastaphyllum* Browni, Pers.
Fischeri, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 218. — Afr. trop. or.
frutescens, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 324 = *variabilis*, Vogel.

DALBERGIA : —
mimosoides, Franch. *Pl. Delav.* i. (1889) 187. — China.
Muelleri, Taub. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 336. — Orb. vet. reg. trop.
myriabotrys, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1890) 311. — Madag.
pterocephala, Baker, l. c. 312. — Madag.
scorpioides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 466. — Madag.
Stuhlmannii, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 217. — Afr. trop. or.
trichocarpa, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1890) 311. — Madag.
yunnanensis, Franch. *Pl. Delav.* i. (1889) 187. — Yunnan.
Wattii, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1895) 17 t. 5. — Reg. Himal.

DALEA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 712.
annua, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 178 = *alopecuroides*, Willd.
Benthani, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. ii. (1889) 148. — Calif.
boliviana, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 259. — Bolivia.
capitata, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 146. — Mexic.
cutervoana, Szyszyl. in *Diss. Cl. math. phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 222. — Peruvia.
cyanea, Greene, *Pittonia*, i. (Jan. 1888) 153. — Mexic.
Dalea, Mac Mill. *Metasp. Minn.* (1892) 330. = *alopecuroides*, Willd.
evanescens, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. ii. (1889) 146. — Calif.
filiciformis, Robins. et Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 382. — Mexic.
glaberrima, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 470. — Mexic.
gracillima, S. Wats. l. c. 404. — Mexic.
Lumholtzii, Robins. et Fernald, l. c. xxx. (1895) 115. — Mexic.
maritima, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. ii. (1891) 125. — Calif.
neglecta, Robins. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 329. — Mexic.
pazensis, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 18. — Bolivia.
plumosa, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 448. — Mexic.
revoluta, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 404. — Mexic.
Seemannii, S. Wats. ex C. R. Orcutt, in *West Am. Scientist*, ii. (1886) 55 nomen; et in *Proc. Am. Acad.* xxii. (June 25 1887), 470. — Calif.
tinctoria, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. ii. (1889) 147. — Calif.
trochilina, T. S. Brandeg. l. c. Ser. II. iii. (1893) 220. — Calif.
unifoliolata, Robins. et Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 383. — Mexic.
vetula, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. ii. (1889) 146. — Calif.
virgata, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 442 t. 9. — Costarica.
viridiflora, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 448. — Mexic.

DALECHAMPIA, Plum. ex Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 713.
cynanchoides, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser.* II. iv. (1895) 468. — Bras.
Didierei, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1891) t. 198. — Madag.
Hildebrandtii, Pax, in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 28; et in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 107. — Ins. Zanzib.
Kurzii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 468. — Ind. or.
sylvestris, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser.* II. iv. (1895) 467. — Bras.

DAMAPANA, Adans. = **Smithia**, Ait. (Legumin.).
aeschynomenodes, *bigemina*, *blanda*, *capitata*, *capitulifera*, *ciliare*, *coerulescens*, *dichotoma*, *gracilis*, *gran-dis*, *japonica*, *nodulosa*, *purpurea*, *salsuginea*, *sensitiva*, *setulosa*, *strigosa*, *strobilantha*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 179. = *homonyma omnia* Smithiae.

DAMAPANA : —
africana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 179 = *S. Kot-schii*, Benth.
conferia, Kuntze, l. c. = *S. geminiflora*, Roth.
picantha, Kuntze, l. c. = *S. pycnantha*, Benth.

DAMMARA, [Rumph.] = **Agathis**, Salisb. (Conif.).
Palmerstoni, F. Muell. *Syst. Cens. Austral. Pl. Suppl.* iv. (1889) 4 nomen; in *Vict. Natural.* viii. (June 1891) 45; et in *Bot. Centrabl.* xlviii. (1891) 221 = *Agathis Palmerstoni* F. Muell.

DAMMAROPSIS, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 296. **URTICEAE**.
Kingiana, Warb. l. c. — Oceania.

DANAIS, Comm. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 715.
Lyallii, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 481. — Madag.
nummularifolia, Baker, l. c. — Madag.

DANTHONIA, DC. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 715.
aristata, St-Lager, *Étud. des fl. éd. 8. ii.* (1889) 936. = *Tridodia decumbens*, Beauv.
Bachmanni, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 385. — Afr. austr.
borussica, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1894) 109. — Afr. trop. or.
chrysurus, K. Schum. l. c. 110. — Afr. trop. or.
lasiantha, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1890) 349. — Madag.
longearistata, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 131 (= *Trisetum longiaristum*, A. Rich.). — Abyss.
nana, Engl. l. c. — Abyss.
nardoides, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1892) 84. — Chili.
oreophila, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 406 (= *D. pallida*, Petrie). — N. Zel.
pallida, Petrie, l. c. xxvi. 1893 (1894) 271 = *oreophila*, Petrie.

DAPANIA, Korth. (Geran.). — Ind. Kew. i. 716.
scandens, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1997. — Perak.

DAPHNANDRA, Benth. (Monimiac.). — Ind. Kew. i. 716.
aromatica, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* i. (1886) 46. — Austral.

DAPHNE, Tourn. ex Linn. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 716.
cantabrica, Willk. *Ill. Fl. Hisp.* (1890?) 108 t. 152; et ex *Oest. Bot. Zeitschr.* (1890) 459. — Hisp.
composita, Gilg, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 238 = *pendula*, Lin.
kabylica, Chab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 30. — Alger.
papyracca, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 422 in obs. = *Edgeworthia chrysanthra*, Lindl.
retusa, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 318. — China occ.
tenera, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 505. — Chili.
tenuiflora, Bureau et Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 151. — China.

DAPHNIPHYLLUM, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 718.
borneense, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 224. — Borneo.
conglutinatum, Hemsl. in *Kew Bull.* (1895) 137. — Ins. Salom.
Kingii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 354. — Perak.
lancifolium, Hook. f. l. c. — Perak.
Scortechinii, Hook. f. l. c. — Perak.

DAPHNOPSIS, Mart. et Zucc. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 718.
Beta, Taub. in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 5. — Bras.
coriacea, Taub. l. c. 7. — Bras.
emarginata, Gilg, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a, (1894) 236 = *D. Pavoni*, Meissn.

DAPHNOPSIS : —

- longifolia, *Taub. in Bot. Jahrb.* xii, Beibl. n. 27 (1890) 9. — Bras.
macrophylla, Gilg, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 236 = *D. Humboldtii*, *Meissn.*
occidentalis, *Krug et Urb.*, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 349 (= *Daphne occidentalis*, Sw.). — Jamaica.
Philippiana, *Krug et Urb.* l. c. 343. — Ins. Porto-Rico.
radiata, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 30. — Guatem.
Schwackeana, *Taub. in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 61, et xv. Beibl. n. 38 (1893) 8. — Bras.
Sellowiana, *Taub. in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 7 — Bras.
sessiliflora, *Gris, ex Taub. l. c.* 18. — Bras.
Tuerckheimiana, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 13. — Guatem.

DARBYA, A. Gray = **Buckleya**, Torr. (Santal.).
umbellata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 589 in syn. sphalm. = *umbellulata*, A. Gray.

DASYLEPIS, Oliver (Bixin.). — Ind. Kew. i. 719.
integra, *Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 44; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 277. — Afr. trop. or.
leonensis, *Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 15 = *Scottellia leonensis*, *Oliver.*

DASYLIRION, Zucc. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 719.
inermis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 167. — Mexic.
juncaefolium, *Hort. ex W. Wats. in Kew Bull.* (1889) 303 = *quadrangulatum*, *S. Wats.*

DASYNEMA, Schott = **Sloanea**, Linn. (Tiliac.).
surinamensis, *Endl. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii, iii. (1886) 194 in obs. = *Sagotia racemosa*, *Baill.*

DASYSTACHYS, Baker (Liliac.). — Ind. Kew. i. 719.
densiflora, *Baker, ex Engl. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 470 = *Chlorophytum densiflorum*, *Engl.*

DASYSTOMA, Rafin. = **Dasistoma**, Rafin. = **Gerardia**, Linn. (Scrophul.).
laevigata, *Britton, ex Morong, in Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 483 = *G. laevigata*, *Rafin.*
virginica, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 295 = *G. quercifolia*, *Benth.*

DATURA, Linn. (Solan.). — Ind. Kew. i. 720.
Cornucopia, *Hort. ex The Garden* (1894) 224. — Form. hort.
tarapacana, *Phil. in Ann. Mus. nac. Chili*, (1892) 63. — Chili.

DAUCUS, [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 720.
Aristidis, *Coss, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 377 in syn. = *Ammiopsis Aristidis*, *Batt.*
jordanicus, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 431. — Syria.
Masclerii, *Corbière, Nouv. Fl. Norm.* (1893) 264 = *gummifer*, *Lam.*
ponticus, *Velen, in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) 34; et *Fl. Bulg.* (1891) 198. — Bulg.
pumilus, *Caruel, in Parl. Fl. Ital.* viii. (1889) 534 = *Caucalis pumila*, *Linn.*
Reboudii, *Coss, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 379. — Algérie.
setifolius, *Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x.* (1887) 191 = *Psammogeton setifolium*, *Boiss.*
stenopterus, *Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 379. — Algeria.
subsessilis, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 272. — Ins. Cypr.

DAVEANA, Willk. ex Maris, in *Bolet. Soc. Brot.* ix. (1891) 220 et 243; et in *Magnier, Scrin. fl. select.* xii. (1893). **COMPOSITAE.**
anthemoides, *Maris, l. c.* 220 et 244. — Lusit.

DAVIESIA, Sm. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 721.
Croniniana, *F. Muell. in Vict. Natural.* x. (April 1894) 194; et *ex Bot. Centralbl.* lviii. (1894) 189. — Austral.

DAYDONIA, Britten, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 11 = **Anneslea**, Wall. (Legum.).
crassipes, *Britten, l. c.* = *A. crassipes*, *Hook.*
fragrans, *Britten, l. c.* = *A. fragrans*, *Wall.*

DEANEA, Coult. et N. E. Rose, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 372; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3. (1895) 298, **UMBELLIFERAE.**
nudicaulis, *Coult. et N. E. Rose, l. c.* t. 6. — Mexic.
tuberosa, *Coult. et N. E. Rose, l. c.* 373. — Mexic.

DEBESIA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 708 = **Acrospira**, Welw. (Liliac.).
asphodelodes, *Kuntze, l. c.* = *A. asphodeloides*, *Baker.*

DEBREGEASIA, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 722.
ceylanica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 592. — Zeylan.
dentata, *Hook. f. l. c.* 591. — Ind. or.
squamata, *King, ex Hook. l. c.* — Perak.

DECABELONE, Decne. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 722.
grandiflora, *K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 276. — Afr. austr.

DECACERAS, Harv. = **Anisotoma**, Fenzl (Asclep.).
Arnoldii, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. 45 (1894) 26 in obs. = *Brachystelma Arnoldii*, *Baker.*
Arnottii, *K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 267 (= *D. Arnoldii*, *Schlecht.*) = *A. Arnoldii*, *Baker.*

DECAISNEA, Hook. f. et Thoms. (Berberid.). — Ind. Kew. i. 722
Fargesii, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 233; et *ex Rev. Hort.* (1893) 447. — Chin.

DECAISNELIA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 584 = **Gyrinopsis**, Decne. (Thymel.).
Cumingiana, *Kuntze, l. c.* = *G. Cumingiana*, *Decne.*

DECAISNINA, Van Tiegh, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 435 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
alata, *Van Tiegh. l. c.* xlii. (1895) 437. — Ins. Molucc.
amplexans, *Van Tiegh. l. c.* 436 = *L. amplexans*, *Van Tiegh.*
Beccarii, *Van Tiegh. l. c.* 487. — N. Guin.
glauca, *Van Tiegh. l. c.* 456. — Timor.
Hombrovi, *Van Tiegh. l. c.* — Timor.
Muelleriana, *Van Tiegh. l. c.* = *L. Muellierianus*, *Van Tiegh.*
triflora, *Van Tiegh. l. c.* = *L. triflorus*, *Spanh.*
signata, *Van Tiegh. l. c.* = *L. signatus*, *Van Tiegh.*

DECASPORA, R. Br. = **Trochocarpa**, R. Br. (Epacrid.).
lawrina, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 391 = *T. lawrina*, *R. Br.*

DECASCHISTIA, Wight et Arn. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 723.
affinis, *Pierre, ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1899) 47. — Cochinch.
ficifolia, *Mart. in Gard. Chron.* (1888) ii. 565, et 1890 ii. 628 fig. 122. — Burma.

DECASPERMUM, Forst. (Myrt.). — Ind. Kew. i. 723.
Vitis-Idaea, *Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 150. — Borneo.

DECATOCA, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict.* New Ser. I. ii. (1889) 25; *Baill. Hist. des pl.* xi. (1892) 203.
Spencerii, *F. Muell. l. c.* 26 et 203. — N. Guin.

DECKERA, Sch. Bip. = **Picris**, Linn. (Composit.).
comosa, *Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 544 (= *Helminthia comosa*, *Boiss.*) — Hisp., Algér.

DECLIEUXIA, H. B. et K. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 723.
Alfredi, *Ernst, in Rev. cient. mens. Univ. Venez.* i. (1887) 222. — Venez.
fruticosa, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 279 = *chiococcoides*, *H. B. et K.*

DECODON, J. F. Gmel. = **Nesaea**, Comm. (Lythrar.).
myrtifolius, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 249 = *N. myrtifolia*, *Desf.*
salicifolius, *Kuntze, l. c.* = *N. salicifolia*, *H. B. et K.*

DECUMARIA, Linn. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 724.
sinensis, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1741. — China.

DEERINGIA, R. Br. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 724.
holostachya, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 342. — Madag.

DEERINGIA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 267 = *Deringa*, *Adans.* = **Cryptotaenia**, DC. (Umbellif.).
canadensis, *Kuntze, l. c.* 266 = *C. canadensis*, *DC.*

DEFLERSIA, Schweinf. ex Penzig, in *Atti Congr. bot. Genova* (1893) 359 nomen. **EUPHORBIA-CEAE.**
erythrocoeca, *Schweinf. l. c.* — Erithrea.

DEGUELIA, Aubl. = **Derris**, Lour. (Legumin.).
acuminata, *amoena*, *brachyptera*, *brevipes*, *canarensis*, *chinensis*, *Cumingii*, *cuneifolia*, *discolor*, *elegans*, *elliptica*, *evalata*, *ferruginea*, *floribunda*, *glabrata*, *Heyneana*, *javanica*, *Korthalsiana*, *laxiflora*, *longifolia*, *lucida*, *macroloba*, *macrophylla*, *Maingayana*, *marginata*, *microptera*, *montana*, *multiflora*, *negensis*, *nobilis*, *oblonga*, *panicula*, *parviflora*, *platyptera*, *polyantha*, *polyphylla*, *polystachya*, *pubinervis*, *pyrrhoyrsa*, *robusta*, *secunda*, *sinuata*, *Spanogheana*, *subavenis*, *sumatrana*, *thyrsiflora*, *trifoliata*, *vestita*.
Wightii, *Taub. in Bot. Centralbl.* xlvii. (1891) 386 = *homonyma omnia generis* *Derreos*.
Hanceana, *Taub. l. c.* = *D. oblonga*, *Hance*.
Stuhlmannii, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 218. — Afr. trop. or.
timoriensis, *Taub. in Bot. Centralbl.* xlvii. (1891) 386 = *D. guyanensis*, *Benth.*

DEHAASIA, Blume (Laurin.). — Ind. Kew. i. 724.
Kurzii, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 125. — Tenass., Ins. Andam.

DEINBOLLIA, Schum. et Thonn. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 724.
kilimandscharica, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 250. — Afr. trop. or.
ramiflora, *Taub. l. c.* — Afr. trop. or.

DELAVAYA, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 462. **SAPINDACEAE.**
toxocarpa, *Franch. l. c.* (nomen improprium) = *yunnanensis*, *Franch.*
yunnanensis, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 142. — Yunnan.

DELILEA, Spreng. = **Elvira**, Cass. (Compos.).
biflora, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 333 = *E. Martyni*, *Cass.*
inelegans, *Kuntze, l. c.* (= *Desmocephalum inelegans* *Hook. f.*); *Ins. Galap.*
repens, *Kuntze, l. c.* (= *Microcaccia repens*, *Hook. f.*) — Ins. Galap.

DELIMA, Linn. = **Tetracera**, Linn. (Dillen.).
laevis, Maingay, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.
lxiii. (1889) ii. 362. — Malaya.

DELISSEA, Gaudich. (Campanul.). — Ind. Kew.
i. 725.
fallax, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 251. — Ins.
Sandvic.
laciniata, Hillebr. *l. c.* 249. — Ins. Sandvic.
parviflora, Hillebr. *l. c.* 251. — Ins. Sandvic.
sinuata, Hillebr. *l. c.* 250. — Ins. Sandvic.

DELOSTOMA, D. Don (Bignon.). — Ind. Kew.
i. 725.
roseum, K. Schum, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflan-
zenfam.* iv. 3b. (1894) 239 (= *Codazzia rosea*,
Karst. et Triana). — Columb.
speciosum, K. Schum. *l. c.* (= *Codazzia speciosa*,
Karst.). — N. Gran.

DELPHINIUM, Tourn. ex Linn. (Ranunc.). —
Ind. Kew. i. 725.
Aitchisonii, Huth, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 395. —
Cachem.
Amani, Post., in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 152;
et ex Huth, *l. c.* 444. — Syria.
apetalum, Huth, *l. c.* 398. — Turkest.
apiculatum, Greene, *Pittonia*, i. (April 1889) 285. —
Calif.
armeniaceum, Stapf, ex Huth, in *Bot. Jahrb.* xx.
(1895) 380. — Armenia.
Barbeyi, Huth, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 335
t. 17. — Colorado.
Batalini, Huth, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 432. —
Turkest.
bitermatum, Huth, *l. c.* 422. — Turkest.
Blochmanae, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 247 (= *D.*
ornatum, Greene, *Fl. Francisc.* 304). — Calif.
Bonvaloti, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*,
Sér. VIII, v. (1893) 165. — China.
Borbasii, Formanek, in *Verh. Naturf. Ver. Brunn.*
xxxii. (1894) 175. — Maced.
bracteosum, Somm. et Levier in *Act. Hort. Petrop.*
xiii. (1893) 25. — Reg. Cauc.
Burkei, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 183. — Am.
bor. occ.
caerulescens, Freyn, ex Stapf, in *Denkschr. Acad.*
Wien (1886) 25. — Persia.
camporum, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 183. —
Am. bor. occ.
campylocentrum, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* x.
(1887) 31. — China.
campylopodium, Freyn, ex Stapf, in *Denkschr. Acad.*
Wien (1886) 19. — As. Min.
ceratophorum, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii.
(1886) 377. — Chin. occ.
chefoense, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*,
Sér. VIII, v. (1893) 170. — China.
coelestinum, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii.
(1894) 276. — China.
columbianum, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 193
(= *D. Nuttallii*, A. Gray). — Am. bor. occ.
Davidi, Franch. in *Bull. Soc. Phil. Paris*, Sér. VIII.
v. (1893) 179. — China.
Delavayi, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii.
(1886) 379. — Chin.
densiflorum, Duthie, ex Huth, in *Bot. Jahrb.* xx.
(1895) 393. — Cachem., India, China.
dinaricum, G. Beck. et Szyszyl. *Pl. Cern. et Alb. lect.*
(1888) 91. — Monten.
dissectum, Huth, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 403. —
Mongolia.
Duhmbergii, Huth, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893)
330 t. 16. — Ross. mer.
Ehrenbergii, Huth, *l. c.* 336 t. 17. — Mexic.
elatum, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 28 = *taliense*,
Franch.
Emiliae, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 120 et *Syn. Fl.*
N. Am. I. i. (1895) 51; *Gard. Chron.* (1894) ii.
434. — Calif.
Englerianum, Huth, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895)
418. — Ross., Turkest. Reg. Cauc.
Fargesii, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér.
VIII, v. (1893) 164. — China.
Freynii, Huth, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 372 =
halophilum, Huth,

DELPHINIUM : —

Geyeri, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 189. — Am.
bor. occ.
grandiflorum, Franch. *Pl. Delav.* (1885) 24 = *mosoy-
nense*, Franch.
halophilum, Huth, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 487. —
Persia.
hamatum, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 28. — Yunnan.
Henryi, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér.
VIII, v. (1893) 177. — China.
Hirschfeldianum, Heldr. et Holzm. ex Boiss. *Fl. Or.*
Suppl. (1888) 19. — Ins. Aegina.
hirticaule, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii.
(1894) 275. — China.
iliense, Huth, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 462. —
Turkest., Sibiria.
kumaonense, Huth, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893)
333. — Reg. Himal.
lankongense, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 26. — Yunnan.
laxiflorum, Freyn, ex Stapf, in *Denkschr. Acad.*
Wien (1886) 25. — Persia.
leiocarpum, Huth, in *Helios*, xi. (1873) 73; et in *Bull.*
Herb. Boiss. i. (1844) 334. — Eur. or., As. occ.
Leroi, Franch. ex Huth, *l. c.*; et in *Bot. Jahrb.* xx.
(1895) 474. — Kilim N'Jaro.
leucophaeum, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 118. —
Am. bor. occ.
likiangense, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*,
Sér. VIII, v. (1893) 180. — China.
longipes, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér.
III, viii. 1885 (1886) 191 = *Davidi*, Franch.
macedonicum, Halácsy et Charvel, ex Charvel, in
Oest. Bot. Zeitschr. xi. (1891) 374 nomen; et in
Charvel [Nadj Effendi] *Emp. Ottom., Géogr. bot.*
(1892) 8. — Maced.
macrostachyum, Boiss. ex Huth, in *Bot. Jahrb.* xx.
(1895) 441. — Kurdistan.
madrense, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890)
141. — Mexic.
Maximowiczii, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*,
Sér. VIII, v. (1893) 164. — China.
mosoyense, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*,
Sér. VIII, v. (1893) 163. — China.
narbonense, Huth, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893)
333. — Gallia.
oliganthum, Franch. *Pl. Delav.* i. (1889) 29 = *likian-
gense*, Franch.
oreophilum, Huth, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 412. —
Turkest.
ornatum, Greene, *Fl. Francisc.* (1892) 304. — Calif.
orthocentrum, Franch. in *Bull. Soc. Phil. Paris*,
Sér. VIII, v. (1893) 178. — China.
oxysepalum, Pax et Borbas, in *Term. tudom. közl.*
xxii. (1890) 647; Pax, in *Verh. bot. Ver. Prov.*
Brand. xxxiii. (1892) 88. — Carpath.
pachycentrum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxix.
(1892) 301. — China.
paphlagonicum, Huth, in *Bull. Herb. Boiss.* i.
(1893) 328. — As. Min.
pauperculum, Greene, *Pittonia*, i. (Mar. 1889) 284.
— Am. bor. occ.
Penardi, Huth, in *Abh. und Vortr. Gesamtgeb. d.*
Naturw. iv. (1892) 18; in *Helios*, x. (1893) 34; et
in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 206. — Am. bor.
Penhardi, « Huth » ex Robins. in A. Gray et
S. Wats. *Syn. Fl. N. Am. I. i.* (1895) 46 in obs.
sphalm. = Penardi, Huth.
ponticum, Hausskn. et Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.*
xl. (1890) 211, nomen. — As. Min.
Potanini, Huth, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 332
t. 14. — China.
Przewalskii, Huth, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 407. —
Mongolia.
pyncocentrum, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii.
(1836) 379. — China.
pyramidatum, Alboff, *Descr. nouv. esp. pl.* (1891) II.
[Trav. Soc. Hort. Odessa (1891)]. — Reg. Cauc.
quercetorum, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or.*
Suppl. (1888) 20. — Persia
recurvatum, Greene, *Pittonia*, i. (April 1889) 285.
— Calif.
rossicum, Rouy, in Rouy et Fouc. *Fl. de Fr. i.*
(1893) 134 in obs. = *fissum*, Waldest. et Kit.
saccatum, Huth, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 328
t. 16. — Persia.
Schlagintweitii, Huth, *l. c.* 329. — Cachem.
Schmalhauseni, Alboff, *Descr. nouv. esp. pl.* (1891)

DELPHINIUM : —

II, [Trav. Soc. hort. Odessa (1891)]; et *Prod. fl.*
Colchic. (1895) II; Huth, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895)
441. — Reg. Transcauc.
sertiferum, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*,
Sér. VIII, v. (1893) 171. — China.
Sintenisii, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliiii. (1893)
374. — As. Min.
siwanense, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*,
Sér. VIII, v. (1893) 162. (= *D. cheilanthum*,
Franch. *Pl. David.* i. 22). — China.
somcheticum, Conrath et Freyn, ex Freyn, in *Bull.*
Herb. Boiss. iii. (1895) 37. — As. Min.
Souliei, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér.
VIII, v. (1893) 172. — China.
suave, Huth, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 470. — Afghan.
sutchuenense, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*,
Sér. VIII, v. (1893) 178. — China.
syncarpum, Freyn ex Stapf, in *Denkschr. Acad.*
Wien (1886) 26. — Persia.
taliense, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér.
VIII, v. (1893) 174. — China.
tanguticum, Huth, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893)
331 t. 15. — China.
tatsienense, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*,
Sér. VIII, v. (1893) 169. — China.
tenuisectum, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 184. —
Mexic.
ternatum, Huth, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 421. —
Turkest.
thessalonicum, Charvel [Nadj] *Géogr. bot. Emp.*
Ottom. [Pl. de Sal.] (1892) 46 nomen. — Oriens.
tongolense, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*,
Sér. VIII, v. (1893) 166. — China.
trichophorum, Franch. *l. c.* — China.
trilobatum, Huth, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 330.
— Reg. Himal.
turkestanicum, Huth, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895)
420. — Turkest.
Uechtritzianum, Panic, ex Huth, in *Bot. Jahrb.* xx.
(1895) 278. — Serbia, Albania.
viride, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888)
268; et in *Gard. and For. i.* (1888) 149. —
Mexic.
Winklerianum, Huth, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895)
419. — Turkest.
yunnanense, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*,
Sér. VIII, v. (1893) 173. — China.
Zalil, Aitch. et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.*
iii. (1886) 30 t. 3. — Persia.

DELPYA, Pierre *Fl. For. Coch.* (1895) t. 328
= **Paranephelium** Miq. (Sapind.).
muricata, Pierre *l. c.* = *P. muricatum*, Pierre.

DENDROBIUM, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. i.

727.
albiflorum, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 323. —
N. Guin.
Apollo ×, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1895) i. 294.
— Hybr. artef.
appendiculiforme, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.*
xlv. (1894) 335. — N. Guin.
Aspasia ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1892) i. 214. —
Hybr. artef.
atroviolaceum, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) i. 512;
et (1892) i. 214; *Hook. f. Bot. Mag.* (1894) t. 7371.
— N. Guin.
Augustae-Victoriae, Kraenzl. in *Gartenfl.* (1894)
115. — N. Guin.
aurantiacum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii.
98. — Assam.
Baeuerleni, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest.*
Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 162. — N. Guin.
Benita ×, Hort. ex O'Brien, in *Gard. Chron.* (1893)
i. 355. — Hybr. artef.
bolboflorum, Falc. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v.
(1890) 729. — Reg. Himal.
brachythecum, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in
Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 161. — N. Guin.
bracteosum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii.
809; et in *Lindenia*, ii. (1886) 55 t. 71. — N.
Guin.
Broomfieldii, Fitzg. *Austral. Orchids*, ii. II. (Dec.
1888) = *undulatum*, R. Br.
caespitosum, King et Pantling, in *Journ. As. Soc.*
Beng. (1895) ii. 332. — Ind. or.

DENDROBIUM : —

- Cassiope* ×, Hort. ex Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 200; et (1890) ii. 620. — Hybr. artef.
- Cathcartii*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 727; et *Icon. pl.* (1890) t. 2022. — Reg. Himal.
- cerasinum*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1889) 334. — N. Guin.
- chryseum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) i. 233; *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1888) 392; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 738. — Reg. Himal.
- chryscephalum*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1893) ii. 122. — Hab.?
- chrysodiscus* ×, Hort. ex Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 197. — Hybr. artef.
- chrysolabium*, Rolfe, l. c. 770. — N. Guin.
- clavipes*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 728. — Perak, Java.
- Cogniauxianum*, Kraenzl. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 280. — N. Guin.
- Copelandianum*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 179. — N. Guin.
- cornutum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 730; et *Icon. pl.* (1890) t. 2029. — Perak.
- crocatum*, Hook. f. l. c. vi. (1890) 185. — Perak.
- curviflorum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 281. — Reg. Himal.
- Cuthbertsoni*, F. Muell. in *Trans. and Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 175. — N. Guin.
- Cybele* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) ii. 778. — Hybr. artef.
- delicatulum*, Kraenzl. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1889) 17; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 162. — Oceania.
- Doreyanum*, L. Linden, in *L'Hort. intern. Catal.* (1888-89) 48, nomen. — N. Guin.
- eboracense*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 419. —
- eriaeoides*, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* ii. (1888) 56. — Austral.
- Fairfaxii*, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 798. — Ins. N. Hebrid.
- flavidulum*, Ridl. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 185 in add. — Singap.
- Forbesii*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 323. — N. Guin.
- Friedricksianum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 648. — Siam.
- Gazellae*, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 436. — N. Guin.
- glomeratum*, Hort. Veitch, ex Gard. Chron. (1894) i. 653. — N. Guin.
- glomeratum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 155. — Ins. Molucc.
- glomeriflorum*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1895) ii. 200. — Hab.?
- gracilicaule*, Kraenzl. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1894) 187. — Oceania.
- grande*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 724. — As. trop. or.
- hamatum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 183. — Cochinch.
- Hellwigianum*, Kraenzl. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 16. — Oceania.
- hercoglossum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 487; et ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 185. — Malacca.
- Hildebrandii*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 182. — Ind. or.
- Hollrungii*, Kraenzl. in *Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land.* (1889) 32. — N. Guin.
- Hosei*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 363. — Penins. Mal.
- hymenanthum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 732; et vi. (1890) 185 = *hymenopterum*, Hook. f.
- hymenopterum*, Hook. f. *Icon. pl.* (1890) t. 2032; et in *Fl. Brit. Ind.* vi. 185 in obs. (= *D. hymenanthum*, Hook. f.). — Ind. angl.
- hyperanthiflorum*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 333. — N. Brit.
- illustre* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1895) ii. 14, fig. 4. — Hybr. artef.
- inauditum*, Reich. f. l. c. (1886) ii. 552; et in *Lindenia*, ii. (1886) 66 = *longicolle*, Lindl.
- inflatum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 6. — Java.
- isochiloides*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 334. — Ins. Pacif.

DENDROBIUM : —

- Jofftii*, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 71. — Austral.
- Kaernbachii*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 163. — N. Guin.
- kentochilum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 731; et *Icon. pl.* (1890) t. 2030. — Perak.
- kentrophylem*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 725. — Perak.
- kinabaluense*, Ridl. ex Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 234. — Borneo.
- Kunstleri*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 714. — Perak.
- lacteam*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 334. — N. Hibern.
- Leeanum*, O'Brien, in Gard. Chron. (1894) ii. 640, fig. 88. — Hab.?
- lineale*, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 381. — N. Guin.
- listeroglossum*, Kraenzl. in *Reichb. f. Xen. Orch.* iii. 6. (1892) 108 t. 260 II. fig. 9, 16. — As. trop. or.
- Loddigesii*, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) ii. 155 (= *D. pulchellum*, Lodd.). — Hab.?
- lonchophyllum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 714; et *Icon. pl.* (1890) t. 2018. — Perak, Java.
- longipes*, Hook. f. l. c. 713; et *Icon. pl.* (1890) t. 2017. — Perak.
- Mac Carthiae*, Pfitz. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6. (1888) 174 = *D. Macarthiae*, Thw.
- Mac Gregorii*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 301; et in Gard. Chron. (1894) ii. 90. —
- macropodium*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 713; et *Icon. pl.* (1890) t. 2020. — Perak.
- megaceras*, Hook. f. l. c. 713; et 2031. — Malacca.
- melanodiscus* ×, Hort. ex Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 297 et 300. — Hybr. artef.
- melanophthalmum* ×, Reichb. f. ex Gard. Chron. (1886) i. 426. — Hybr. spont.
- Melkeaeum*, Kraenzl. l. c. (1894) ii. 306. — Hab.?
- moulmeinense*, Parish, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 746; et *Icon. pl.* (1810) t. 2033. — Tenass.
- moulmeinense*, Hort. Low, ex Warn. et Will. Orchid. Alb. x. (1893) t. 448 = *infundibulum*, Lindl.
- muryniacum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 551. — Hybr. artef.
- nanum*, Hook. f. *Icon. pl.* xix. (1889) t. 1853; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1898) 717. — Malabar.
- Nestor* ×, O'Brien, in Gard. Chron. (1892) i. 718. — Hybr. artef.
- niveum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 104 (= *D. Macfarlanei*, Reichb. f.). — Austral.
- Novae-Hiberniae*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 301. — N. Hibern.
- nycteridoglossum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 616. — N. Guin.
- O'Brienianum*, Kraenzl. l. c. (1892) i. 266. — Ins. Philipp.
- Owenianum* ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) i. 226. — Hybr. artef.
- pachyceras*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 164. — N. Guin.
- panduriferum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 186. — Pegu.
- perakense*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 712; et *Icon. pl.* (1890) t. 2019. — Perak.
- percnanthum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 70; et in *Lindenia*, ii. (1886) 28. — Ins. Molucc.
- Pitcherianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 392. — Hybr. artef.
- platycaulon*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 139. — Ins. Philipp.
- pleurothalloides*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 178. — N. Guin.
- podagraria*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 728; et *Icon. pl.* (1890) t. 2026. — Burma, Tenass.
- pogonates*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 199. — Borneo.
- polyphlebium*, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 242 = *rhodopterygium*, Reichb. f.
- prionochilum*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 162. — N. Guin.
- pumilum*, Parish, et Reichb. f. in *Trans. Linn. Soc.* xxx. (1894) 150 t. 31 = *quadrangulare*, Parish.

DENDROBIUM : —

- punicum*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 324. — N. Guin.
- psychrophilum*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser.* ii. (1889) 24. — N. Guin.
- pyropum*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 362. — Penins. Mal.
- quadrangulare*, Parish, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 714. — Tenass.
- quadrangulare*, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 553. — Burma.
- Regnier* ×, Regnier, ex Rev. Hort. (1894) 192. — Hybr. artef.
- reptans*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxvi. (1886) 323. — N. Guin.
- rhodostele*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 360. — Penins. Mal.
- rhodostictum*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 300. — N. Guin.
- robustum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 33. — N. Guin.
- Rolfeae* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) i. 522. — Hybr. artef.
- rubens* ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) i. 226. — Hybr. artef.
- rutiferum*, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 746; et in *Lindenia*, iii. (1887) 49 t. 119. — N. Guin.
- Sanderianum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 155. — Borneo.
- sanguineum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1895) ii. 292. — Borneo.
- Schneiderae*, F. M. Bailey, *Occas. Pap. n. I.* 7, et *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* II, (1888) 57. — Austral.
- Schneiderianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 209. — Hybr. artef.
- Scortechini*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 741. — Perak.
- seriatum*, Wall. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 796 = *Eria acervata*, Lindl.
- serpens*, Hook. f. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 1, (1895) 10 t. 16. — Perak.
- speciosissimum*, Hort. ex Rev. Hort. (1895) 415. — Borneo.
- sphenochilum*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 254. — N. Guin.
- Stratiotes*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 266; et (1886) ii. 176 fig. 34; et in *Illustr. Hort.* xxxiv. (1886) 109 t. 602. — Ins. Sund.
- streblaceras*, Reichb. f. l. c. (1886) i. 266. — Ins. Sund.
- subclausum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 361. — Ins. Molucc.
- subulatum* « Hook. f. » *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 726 sphalm. = *subulatum*, Lindl.
- tenuicaule*, Hook. f. l. c. vi. (1890) 184 in add. — Ins. Andam.
- tigrinum*, Rolfe, ex Hemsl. in *Ann. of Bot.* v. (1891) 507. — Ins. Salomon.
- tosaense*, Makino, Ill. *Bot. Jap.* (1891), ex *Journ. Bot.* (1891) 383. — Japon.
- trigonopus*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 682. — Burma.
- trippterum*, Wall. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 790 = *Trias oblonga*, Lindl.
- triquetrum*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 322. — N. Guin.
- tropaeoliflorum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 186, in add. — Perak.
- tuberiferum*, Hook. f. l. c. v. (1890) 728; et *Icon. pl.* (1890) t. 2025. — Perak.
- velutinum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 33. — Burma.
- Venus* ×, Hort. ex Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 608; et (1893) i. 290. — Hybr. artef.
- versicolor*, Cogn. in *Journ. des Orch.* vi. (1895) 153. — Assam.
- Warburgianum*, Kraenzl. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 280. — N. Guin.
- Wattii*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 725; et in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 721. — Munni-pore.
- Williamsianum* ×, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 334. — Hybr. artef.

DENDROCALAMUS, Nees. (Gramin.). — Ind. *Kew* i. 731.

maximus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 773 = *Hamiltonii*, Nees et Arn.

DENDROCALAMUS : —

sikkimensis, *Gamble, ex Oliver, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1770. — Reg. Himal.

DENDROCHILUM, Blume (Orchid.). — Ind.

Kew. i. 731.
cobolbine, *Reichb. f. in Flora*, lxxxi. (1888) 151. — Java.
conopseum, *Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv.* (1894) 336. — Borneo.
linearifolium, *Hook. f. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1850; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 782. — Perak.
Micholitzianum, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 486. — Sumatra.
pallidiflorum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 782 sphalm. = pallidiflavens, *Blume*.

DENDROMECON, Benth. (Papaver.). — Ind.

Kew. i. 732.
flexile, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 216 = rigidum, *Benth.*
Harfordii, *Kell. ex Greene, l. c.* 217 = rigidum, *Benth.*

DENDROPEMON, Blume = **Loranthus**, Linn.

alatus, Van Tiegh. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xlii. (1895) 170. — Ins. S. Doming.
cubensis, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 69; et xlii. (1895) 170 = L. cubensis, *Grisol.*
domingensis, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 69; et xlii. (1895) 170 = L. domingensis, *Desv.*
laxiflorus, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 170 = L. laxiflorus, *Desv.*
loranthoides, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 70. — Ind. occ.?
parvifolius, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 170 = L. parvifolius, *Sw.*
pauciflorus, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 69; et xlii. (1895) 170 = L. pauciflorus, *Sw.*
portoricensis, Van Tiegh. ll. cc. = L. portoricensis, *DC.*
psilobotrys, Van Tiegh. ll. cc. = L. psilobotrys, *DC.*

DENDROPHTHOE, Mart. = **Loranthus**, Linn.

acacioides, Van Tiegh. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xlii. (1895) 85 et 252 = L. acacioides, *A. Cunn.*
angustifolius, Van Tiegh. l. c. (1895) 85 = L. angustifolius, *R. Br.*
curvatus, Van Tiegh. l. c. 252 = L. curvatus, *Blume*.
longiflorus, Van Tiegh. l. c. (1895) 85 et 252 = L. longiflorus, *Desr.*
orbicularis, Van Tiegh. l. c. 252. — Hab.?
pentandrus, Van Tiegh. l. c. = L. pentandrus, *Linn.*
praelongus, Van Tiegh. l. c. = L. praelongus, *Blume*.
vitellinus, Van Tiegh. l. c. 85 et 252 = L. vitellinus, *F. Muell.*
ligulatus, Van Tiegh. l. c. = L. ligulatus, *Thw.*
nilgherrensis, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 252 = L. nilgherrensis, *Wight.*
odontocalyx, Van Tiegh. l. c. 85 = L. odontocalyx, *F. Muell.*

DENDROPHYLAX, Reichb. f. (Orchid.). — Ind.

Kew. i. 733.
Fawcettii, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1888) ii. 533. — Ind. occ.

DENDRORCHIS, Thou. in *Nouv. Bull. Soc.*

Philom. Paris (1809) 314-19, ex Kuntze Rev. Gen. (1891) 658 = **Polystachya**, *Hook. (Orchid.)*.
acutifolia, *Adansoniae, affinis, alpina, anceps, Bennetiana, bifida, bracteosa, caduca, caloglossa, caracasana, carea, clavata, coriscensis, elastica, elegans, estrellensis, extinctoria, foliosa, galericulata, golungensis, fussieuana, laxiflora, leonensis, lineata, nana, odorata, Ottoniana, pachyglossa, paulensis, puberula, pubescens, purpurea, pyramidalis, ramulosa, reflexa, rhodoptera, rosea, rosellata, rufinula, setifera, shirensis, similis, Steudneri, superposita, tessellata, virescens, Wightii, Zollingeri*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Polystachyae*.
capensis, Kuntze, l. c. = P. Ottoniana, *Reichb. f.*

DENDRORCHIS : —

dendrobiflora, Kuntze Rev. Gen. (1891) 658. = P. dendrobiflora, *Reichb. f.*
galeata, Kuntze, l. c. = P. grandiflora, *Lindl.*
masayensis, Kuntze, l. c. = P. masayensis, *Reichb. f.*
membranacea, Kuntze, l. c. = (*Chloidi vernalis*, *Lindl.*). — Ind. occ.
minuta, Kuntze, l. c. = P. zeylanica, *Lindl.*
minutiflora, Kuntze, l. c. = P. zeylanica, *Lindl.*
polystachyon, Kuntze, l. c. = P. zeylanica, *Lindl.*

DENDRORCHIS, polydendris, «Thou.» ex Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 459 (= *Dendrobium polystachys*, *Thou.*) = *Polystachya mauritiana*, *Spreng.*

DENDROSTELLERA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xl. (1893) 74 = **Stellera**, J. G. Gmel. (Thymel.).

Griffithii, Van Tiegh. l. c. 75 = S. Lessertii, *C. A. Mey.*
Lessertii, Van Tiegh. l. c. = S. Lessertii, *C. A. Mey.*
spicata, Van Tiegh. l. c. = S. Lessertii, *C. A. Mey.*
stachyoides, Van Tiegh. l. c. = S. Lessertii, *C. A. Mey.*

DENHAMIA, Meisn. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 733.

viridissima, *F. M. Bailey et F. Muell. Rep. Exped. Bellenden-Ker* (1889) 35. — Austral.

DENTARIA, [Tourn.] Linn. = **Cardamine**, Linn. (Crucif.).

cardiophylla, Robins. Syn. Fl. N. Am. l. i. (1895) 155. = C. cardiophylla, *Greene*.
gemmata, *Howell, ex Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1888) 162 = C. gemmata, *Greene*.
Rapini X, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 245 = digenea, *Gremli*.
pachystigma, S. Wats. Syn. Fl. N. Am. l. i. (1895) 155 = C. californica *Greene*, var.

DENTIMETULA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xlii. (1895) 265 = **Loranthus**, Linn.

dodoneaeifolia, Van Tiegh. l. c. = L. dodoneaeifolius, *DC.*

DERMATOBOTRYS, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1940. — **SCROPHULARIACEAE**.

Saundersii, *Bolus, l. c.*; et in *Bot. Mag.* (1894) t. 7369. — Afr. austro-or.

DEROEMERA, Reichb. f. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

acuminata, Rendle et Schlechter, in *Journ.* xxxiii. (1895) 277 (Deroemia). — Afr. trop. or.
aphylla, Schlechter et Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 277 in obs. = H. aphylla, *Reichb. f.*

DERRIS, Lour. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 734.

Fordii, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1771. — China.

grandiflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 203. — Java
Koolgibberah, *F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker* (1889) 38. — Austral.

polyphylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 312. — Madag.

DESCHAMPSIA, P. Beauv. (Gramin.). — Ind.

Kew. i. 734.
Berteroana, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 228 = Berteroiana, *Trin.*?
Chapmani, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 401. — N. Zel.
gracillima, T. Kirk, in *Journ. Bot.* xxiv. (1891) 237. — Ins. Auckland.
Hookeri, T. Kirk l. c. 238. — N. Zel.
Hookeriana, *Scribn. in Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 97 in obs. (= *Aira latifolia*, *Hook.*). — Am. bor. mexicana, *Scribn. in Proc. Acad. Phil.* (1891) 300. — Mexic.
Novae-Zelandiae, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 402. — N. Zel.
nubigena, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 521. — Ins. Sandvic.
pallens, *Hillebr., l. c.* 520. — Ins. Sandvic.

DESCHAMPSIA : —

paludosa, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 56 (*Aira Wibeliana*, *Sond.*). — Germ.
penicillata, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 354. — N. Zel.
Pringlei, *Scribn. in Proc. Acad. Phil.* (1891) 300. — Mexic.
pusilla, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 403. — N. Zel.
setacea, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 57 = discolor, *Roem. et Schult.*
tenella, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 402. — N. Zel.

DESCURAINIA, Webb et Berth. = **Sisymbrium**, Linn. (Crucif.).

Bourgaeana, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 89 = S. Bourgaeana, *Fourn.*
canescens, Prantl, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2. (1891) 192 = Erysimum pinnatum, *Nutt.*
Cumingiana, Prantl, l. c. = S. Cumingianum, *Fisch. et Mey.*
Hartwegiana, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 173 = S. Hartwegianum, *Fourn.*
incisa, Britton, l. c. = S. incisum, *Engelm.*
pinnata, Britton, l. c. = Erysimum pinnatum, *Nutt.*
Preauxiana, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 90 = Sisymbrium Preauxianum, *Webb.*
Sophia, Webb, ex Prantl, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2. (1892) 192 = S. Sophia, *Linn.*
tanacetifolia, Prantl, in *Engl. et Prantl, l. c.* = S. tanacetifolium, *Linn.*

DESDEMONA, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. iv. II. (1895) 408. **SCROPHULARIACEAE**.

pulchella, S. Moore, l. c. t. 27 fig. 2-9. — Bras.

DESMANTHODIUM, Benth. (Compos.). — Ind.

Kew. i. 735.
Trianea, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 52. — Columb.

DESMANTHUS, Willd. (Legumin.). — Ind.

Kew. i. 735.
bicornutus, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 426. — Mexic.
Cooleyi, Trelease, ex Branner et Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkansas* for 1888, i. (1891) 178 = Jamesii, *Torr. et Gray.*
fruticosus, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 131, t. 13. — Ins. Carmen.
illinoensis, Mac Mill. Metasp. Minn. (1892) 388 (= *Acuania illinoensis*, Kuntze) = D. brachylobus, *Benth.*
oligospermus, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1891) 133. — Calif.
paucifoliolatus, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 14. — Madag.

DESMARIA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xlii. (1895) 458 = **Loranthus**, Linn.

mutabilis, Van Tiegh. l. c. = L. mutabilis, *Poepp. et Endl.*

DESMAZERIA, Dum. = **Demazeria**, Dum. (Gramin.).

acutiflora, Th. Dur. et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 900 (= *Brizopyrum acutiflorum*, *Nees*). — Afr. austr.
alternans, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= B. alternans, *Nees*). — Ins. S. Hel.
balearica, Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 134. — Ins. Balear.
triticea, *Presl, ex Willk. l. c.* 135. — Sicil.

DESMIDORCHIS, Ehrenb. = **Boucerosia**, Wight et Arn. (Asclep.).

Aucheriana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 418 = B. Aucheriana, *Decne.*
crenulata, Kuntze, l. c. = B. crenulata, *Wight.*
Decaisneana, Kuntze, l. c. = B. Decaisniana, *Lem.*
diffusa, Kuntze, l. c. = B. diffusa, *Wight.*
europaea, Kuntze, l. c. = B. Gussoniana, *Hook.*

DESMIDORCHIS : —

- indica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 418 = *B. Hutchinsonia*, Decne.
pauciflora, Kuntze, l. c. = *B. pauciflora*, Wight.
quadrangula, Kuntze, l. c. = *B. Forskalii* Decne.
Stockiana, Kuntze, l. c. = *Caralluma edulis*, Benth.
umbellata, Kuntze, l. c. = *B. umbellata*, Wight et Arn.

DESMODIUM, Desv. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 736.

- albiflorum*, Cordem. Fl. Ile Réunion. (1895) 403. — Ins. Bourbon.
amans, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 135. — Mexic.
bioculatum, S. Wats. l. c. 425. — Mexic.
callianthum, Franch. Pl. Delav. (1890) 173. — Yunnan.
cinerascens, Franch. l. c. 174. — China.
Godefroyanum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 196. — Cochinch.
guadalajaranum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 147. — Mexic.
hamulatum, Franch. Plant. Delav. (1889) 175. — Yunnan.
hispidum, Franch. l. c. 174. — Yunnan.
hondurensis, M. Micheli, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 284. — Hondur.
jaliscanum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 406. — Mexic.
Lindheimeri, M. A. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 120. — Mexic.
Mandoni, Britton, l. c. xvi. (1889) 261. — Boliv.
mexicanum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 271. — Mexic.
Pringlei, S. Wats. l. c. — Mexic.
procumbens, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 76 = spirale, DC.
prostratum, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 128. — Calif.
rhabdocladum, Franch. Plant. Delav. (1889) 173. — China.
scopulorum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1886) 47. — Calif. inf.
Stuhlmannii, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 217. — Afr. trop. or.
subsessile, Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 118. — Mexic.
subspicatum, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 135. — Mexic.
tanganyikense, Baker, in Kew Bull. (1895) 65. — Afr. trop.
Tweedyi, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. vii. (1890) 183. — Texas.
youngasense, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 261. — Bolivia.
yunnanense, Franch. Plant. Delav. (1889) 172. — Yunnan.

DESMOSTACHYS, Planch. (Olcin.). — Ind. Kew. i. 739.

- nitidus*, Planch. ex Valetton, Crit. Overs. Olcin. (1886) 205 = *Planchonianus*, Miers.
Preussii, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 70. — Kamerun.

DESROUSSEAUXIA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 358 = **Loranthus**, Linn. *nodosa*, Van Tiegh. l. c. = *L. nodosus*, Desc**DETANDRA**, Miers = **Sychnosepalum**, Eichl. (Menisperm.).

- paraensis*, K. Schum. ex Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 5 = *S. paraense*, Eichl.
pubistaminea, K. Schum. l. c. 4. — Bras.
Sagotiana, K. Schum. l. c. 5 = *S. Sagotianum*, Eichl.

DEUTEROCOHNIA, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. m. (1894) 507. **BROMELIACEAE**.

- longipetala*, Mez. l. c. (1894) 507 (= *Dyckia longipetala*, Baker). — Am. austr. trop.

DEUTZIA, Thunb. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 739.**DEUTZIA** : —

- albida*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 97. — China.
discolor, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 275. — China.
discolor, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. 487. — Japon.
glomeriflora, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 236. — China occ.
Lemoinei ×, Hort. Lemoine, ex Rev. Hort. (1894) 214; et ex Gartenfl. (1895) 566 fig. 105. — Hybr. artef.
longifolia, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 235. — China.
Maximowicziana, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 52 et viii (1894) 505; = *hypoleuca*, Maxim.
pulchra, Vidal, Revis. Fl. Vasc. Filip. (1886) 124. — Ins. Philipp.
Watereri ×, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 185. — Hybr. artef.
Wellsii ×, Hort. ex Koehne, l. c. — Hybr. artef.

DEYEUXIA, Clar. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 739.

- arundina*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 84. — Chili.
borealis, Macoun, Cat. Can. Pl. (1888) 207, nomen = *vancouverensis*, Vasey.
breviaristata, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48. — Ins. Vancouv.
chrysophylla, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1892) 83. — Chili.
columbiana, Macoun, Cat. Can. Pl. (1888) 207, nomen = *Columb. brit.*
dubia, Scribn. in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 174. — Am. bor. occ.
emirnisensis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 533. — Madag.
epileuca, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 247 t. 20 c 10-16. — Borneo.
glomerata, Vasey, ex Macoun, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 288 nomen. — Canada.
Hillebrandi, Munro, ex Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 519. — Ins. Sandvic.
javanica, Boerl. in Ann. Jard. Buit. viii. (1889) 71 = *Calamagrostis javanica*, Steud.
laxiflora, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 83. — Chili.
nardifolia, Phil. l. c. — Chili.
tenuifolia, Phil. l. c. — Chili.
Treutleri, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2396. — Reg. Himal.
trisetoides, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1892) 83. — Chili.
variegata, Phil. l. c. — Chili.
vancouverensis, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48 — Am. bor. occ.

DIALIUM, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 741. *madagascariense*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 30 B. — Madag.**DIALYANTHERA**, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1885) 89. **ANONACEAE**. *Otoba*, Warb. l. c. — Am. austr. trop.**DIANELLA**, Lam. (Lillac.). — Ind. Kew. i. 711. *reflexa*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 396. — N. Zel.
straminea, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. vii. (Jan. 1893) 435 t. I. — Japon.**DIANTHERA**, Gronov. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 741.

- bicolor*, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 15. — Afr. austro-occ. extratrop.
bullata, N. E. Br. in Illustr. Hort. (1886) 43 t. 589. — Borneo.
carnosa, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 14. — Afr. austro-occ. extratrop.
incerta, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1893) 226. — Calif.
laetevirens, Baill. Hist. des pl. x. (1891) 446 = *Galesia laetevirens*, A. Gray.

DIANTHERA : —

- laevilinguis*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 20 = *Rhytiglossa laevilinguis*, Nees.
obtusifolia, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 195 = *Rhytiglossa obtusifolia*, Nees.
ovata, Trelease, ex Branner et Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888. i. (1891) 210 = *humilis*, Engelm. et Gray.
paludosa, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 432. — Bras.
polygaloides, S. Moore, l. c. 433. — Bras.
Sonorae, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 67. — Calif.
Sonorae, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 195 nomen = *Tetramerium ovalifolium*, Oerst.
violacea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 979 = *Beloperone violacea*, Planch. et Linden.

DIANTHUS, Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. i. 742.

- acrochlonis*, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien. (1886) 5. — As. Min.
albanicus, Wettst. in Luer. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 34. — Alban.
angolensis, Hiern, ex Williams, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 301. — Angola.
Aristidis, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888), append. 2 p. v. — Algeria.
auranticus, Post, in Journ. Bot. xxiv. (1888) 422. — Syria.
basianicus, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1885) 77. — Mesopot.
Borbasi, Vandas, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 193. — Volhyn.
Bornmuelleri, Hausskn. in Mllh. Bot. Ver. Jena. ix. (1891) 16; et ex Williams in Journ. Linn. Soc. xxix. (1893) 460. — As. Min.
brevicalyx, G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 63 = *inodorus*, Linn.
carpathicus, Borb. in Termesz. Fuzét. xii. (1889) 44; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 75 in syn. = *spiculifolius*, Schur.
carpathicus, Wolosz. in Spraw. Kom. fizyj. Krajowej, xxii. (1888) ii. 214. — Reg. Carpath.
curticeps, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 97. — Bosnia.
Deserti, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 6. — Syria.
Endressi, Zahlbr. ex Conrath, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 51 = *deltoides*, Linn.
Engleri, Hausskn. et Borm. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 15; et ex Williams in Journ. Linn. Soc. xxix. (1893) 410. — As. Min.
eretmopetalus, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, (1886) 349. — As. Min.
Formanekii, Borb. ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brunn. xxxii. (1894) 39. — Maced.
Freynei, Vandas, in Sitz. Böhm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 255 t. 9 fig. 6; G. Beck. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 332. — Bosnia.
giganteiformis, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 32. — Hung.
Giuliae, « Janka » ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 59 sphalm. = *D. Guliae*, Janka.
Hanyri ×, Burnat, Fl. Alp. Marit. (1892) 223. — Alp. Marit.
Holzmannianus, Heldr. et Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 58 nomen. — Graecia.
Huebneri × Seehaus, in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxxiii. (1892) 95. — Germ.
kastembeluensis, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 375. — As. Min.
Kitaibelii, Janka, ex G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1889) 192 = *petraeus*, W. et K.
Laucheanus ×, Bolle, ex Bolle et Aschers. in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxxiii. Abhandl. (1892) 102. — Germ.
Lisae, ×, Burnat, Fl. Alp. Marit. (1892) 233. — Alp. Marit.
Lumnitzeri Wiesb. Schles. bot. Tauschver. (1882) ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 85 = *plumarius*, Linn.
marginatus, Lacaita, in Nuov. Giorn. bot. Ital. xix. (1887) 130 nomen. — Ital.

DIANTHUS : —

- Maris, Willd. ex Williams, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1893) 415. — Alpes.
 marisensis, Simonk. in Termész. Füzet. ix. (1885) 37; ex Enum. pl. Transs. (1886) 118. — Trans.
 mecistocalyx, Williams, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 199. — Transv.
 medunensis, G. Beck et Szyszyl., Pl. Cern. (1888) 65; et in Bull. Soc. bot. Fr. xxxvi. (1889) 118. — Monten.
 melandrioides ×, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 29; et ii. (1889) 15. — Hisp.
 Monteilii, Burnat, Fl. Alp. Marit. (1891) 221. — Alp. Marit.
 moviensis, Williams, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 199. — Transv.
 narbonensis, Rouy, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 64 in syn. = brachyanthus, Boiss.
 Nassireddini, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 279. — Persia.
 Nelsoni, Williams, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 200. — Transv.
 Nicolai, Beck et Szyszyl., Pl. Cern. (1888) 65 t. 3; et in Bull. Soc. bot. Fr. xxxvi. (1889) 117. — Monten.
 oetaeus, Heldr. ex Nym. Consp. ii. 1. (1889) 57, nomen = gracilis, Sibth. et Sm.
 pachypetalus, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 278. — As. occ.
 Pancicii, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1886) extr. 9; et Fl. Bulg. (1891) 79. — Bulg.
 persicus, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 16. — Persia.
 praevertens, Williams, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1893) 408 (= *D. serrulatus*, Schloss.). — Croatia.
 pulverulentus, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, (1886) 279. — Persia.
 pulverulentus, Wettst. in Sitzungsber. Akad. Wien xviii. 1889 (1890) 382. — As. Min.
 purpureo-luteus, Velen. Fl. Bulg. (1891) 73. — Bulg.
 pusillus, Freyn et Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 75. — Armen.
 quadrangulus, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1891 (1893) 372. — Bulg.
 rhodopeus, Velen. l. c. (1890) 40; et Fl. Bulg. (1891) 69. — Bulg.
 roseo-luteus, Velen. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 226; et Fl. Bulg. (1891) 72 in syn. — Rumel.
 rumelicus, Velen. Fl. Bulg. (1891) 78. — Bulg.
 scardicus, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 31 t. II. fig. 1-5. — Alban.
 Seehausianus ×, Aschers. ex K. A. Seehaus, in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxxiv. (1893) 12. — Germ.
 semperflorens, Hort. ex A. Voss, in Gartenfl. (1895) 514 = *D. carthusianorum*, Linn.
 serbicus, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 34 = pinifolius, Sm.
 serresianus, [Charrel] Nadj, Emp. Ottom. Géogr. bot. (1892) 12 nomen; Halcásy et Charrel, ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) p. 271. — Turc.
 sessiliflorus, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 78. — Armenia.
 setisquamosus, Hausskn. et Bornm. ex Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 15. — As. Min.
 Sintenisii, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 376. — As. Min.
 Skorpili, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1890) ii. 40; et Fl. Bulg. (1891) 68. — Bulg.
 slavonicus, Williams, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1893) 380. — Slavonia.
 Smithii, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 33 = pinifolius, Sm.
 Stribrnyi, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 15. — Bulg.
 subulosus, Conrath, et Freyn, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 76. — As. Min.
 Tatrae, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 32. — Hung.
 tergestinus, Simonk. in Magyar Növényf. Lapok, xii. (1888) 21 [an Reichb.?]. — Croat.
 tristis, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1890) ii. 41; et Fl. Bulg. (1891) 80. — Bulg.
 turcicus, Velen. l. c. 1892 (1893) 273. — Eur. auto-or.
 Vandasii, Velen. l. c. 1892 (1893) 16. — Bulg.

DIANTHUS · —

- velebiticus, Borb. ex Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 275 nomen. — Bulg.
 Velenowskyi, Borb. in Termész. Füzet. xiv. (1893) 46. — Eur. or.
 Wawrae, Freyn, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 79. — As. Min.

DIARRHENA, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 746.

- diandra, Hitchc. in Kansas Acad. Sci. (1891) 529; et in Trans. Acad. Sci. St-Louis, v. (1892) 529 = americana, Beauv.
 mandshurica, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 628. — China.

DIASCIA, Link et Otto (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 746.

- cordata, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 151. — Natal.
 purpurea, N. E. Br. l. c. (1895) 151. — Natal.
 ramosa, S. Elliot, in Journ. Bot. xxix. (1891) 69. — Afr. austr.

DIASPERUS, Linn. = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).

- abnormis, acidissimus, acuminatus, acutifolius, acutissimus, acutus, Adami, adenodiscus, adenophyllus, aeneus, affinis, albiflorus, albus, almadensis, amentuliger, anabaptizatus, Andersonii, angolensis, angustifolius, angustissimus, anisobolus, arborescens, arenicolus, arvensis, asper, assamicus, Augustinii, australis, avicularis, axillaris, bahiensis, Baillonianus, balaensis, benguelensis, Berteroanus, bicolor, birmanicus, Blanchetianus, Blancoanus, Bojerianus, borneensis, botryanthus, Bourgeoisii, brevipes, buxifolius, cacuminum, calycinus, capillaris, carnosulus, carolinensis, Carpentariae, casticum, cataractarum, caudatus, cauliflorus, Chamaecerasus, chlorophaeus, chrysanthus, cinereus, cladanthus, cladotrichus, Clarkei, Clausenii, cochinchinensis, columnaris, compressus, consanguineus, corcovadensis, coriaceus, cornutus, crassifolius, cryptophilus, cuspidatus, cyanospermus, cyclanthera, debilis, decipiens, dictyospermus, diffusus, discoides, discolor, distichus, dumetosus, elegans, ellipticus, Emblica, Epiphyllanthus, erythrinus, Faguetii, fallax, fasciculatus, fastigiatus, Ferdinandii, fimbriatus, flagelliformis, fluitans, Francavilleanus, frondosus, Fuernrohrii, fuscoluridus, fuscus, Galeotianus, Gastroeemii, glabrescens, gladiatus, glaucescens, glaucinus, glaucophyllus, glaucus, Glazioni, glomerulatus, gomphocarpus, Goudotianus, gracilentus, gracilipes, gracilis, grandifolius, grandisepalus, graveolens, Grayanus, Griffithii, Griesbachianus, Gueinzii, Gunnii, Hamrur, Hasskarlianus, Helferti, heliotropus, heteradenius, heterodoxus, heterophyllus, hirtellus, hoghalensis, hypoleucus, hyssopifolius, incurvus, indicus, insignis, jacobinensis, janeirensis, javanicus, juncus, khasicus, Kirkianus, Klotzschianus, Kollmanianus, Korthalsii, Kuentleri, Kurzianus, lacteus, lacunarius, laevigatus, lagoensis, lamprophyllus, lanceolatus, lasiognus, latifolius, Lawii, laxiflorus, leptocaulis, leptocladus, leptophyllus, Leschenaultii, leucogynus, Liebmannianus, Lindbergii, linearis, loandensis, longifolius, Macraei, macrocalyx, macropus, madagascariensis, maderaspatensis, mammosus, Mannianus, Manono, marianus, Martii, Melleri, Meyerianus, micrandrus, micranthus, microcladus, Microdendron, microphyllinus, microphyllus, minutiflorus, minutulus, mirabilis, Missionis, Mocinianus, mollis, montanus, montevidensis, multicaulis, multiflorus, myrianthus, Myrsinites, myrtaceus, myrtifolius, nanogynus, nanus, nemorum, neogranatensis, neopeltandrus, nevocarpus, nigrescens, Niruri, nitidulus, nummulariaefolius, nutans, obtusatus, octomerus, odontadenius, oligotrichus, oppositifolius, orbicularis, orbiculatus, oreophilus, ovalifolius, ovatus, oxycarpus, pacificus, pallidus, parvifolius, Pavonianus, pectinatus, pendulus, pentandrus, perpusillus, persimilis, Pervilleanus, petiolaris, phillyreaefolius, physocarpus, pilosus, pinifolius, piscatorum, platycalyx, podocarpus, Pohlianus, polycarpus, polyphyllus, pomiferus, prostratus, prinosus, Pseudocicca, Pseudocornami, Pseudoniruri, pulcher, pumilus, purpureus, quercinus, racemiger, ramulosus, ramosissimus, Regnellianus, Reinwardtii, reticulatus, rhabdocarpus, Rheedii, rhytidospermus, Riedelianus, rigens, rigida-

DIASPERUS : —

- lus, Roeperianus, rosellus, rosmarinifolius, rotundatus, rotundifolius, Roxburghii, rubellus, ruber, rufidulus, rufoglaucus, rupestris, ruscifolius, salicifolius, salviaefolius, samarensis, sandawicensis, scaber, scabrifolius, scandens, Schomburgkianus, scoparius, Seemannianus, Sellowianus, semicordatus, senensis, sericeus, silheticus, similis, simplicicaulis, singalensis, sociatilis, spathulifolius, speciosus, sponiaefolius, Spruceanus, squamifolius, stenopterus, subcarnosus, subcrenulatus, submarginatus, suberosus, sublanatus, subobscurus, subscandens, sundaicus, tenellus, tenuicaulis, Teysmannii, Thomsonii, Thwaitesianus, torrentium, trachyspermus, tremulus, umbraeus, urceolatus, Urinaria, vacciniifolius, venulosus, Vieillardii, villosus, virens, virgulatus, vitiensis, wagapensis, Welwitschianus, Wilkesianus, Wrightii, Zippellianus. — Kuntze, Rev. Gen. (1891) 596-603 = homonyma omnia Phyllanthi.
 adiantodes, Kuntze, l. c. 598 = *P. adiantoides*, Klotzsch.
 albizziodes, Kuntze, l. c. 601 = *P. albizzoides*, Hook. f.
 anamiticus, Kuntze, l. c. = *Glochidion anamiticum*, Kuntze.
 andamanicus, Kuntze, l. c. = *P. Helferi*, Muell. Arg.
 antillanus, Kuntze, l. c. 597 = *P. nobilis*, Muell. Arg.
 arboreus, Kuntze, l. c. 597 = *Glochidion arboreum*, Wight.
 Arnottianus, Kuntze, l. c. = *Gl. Arnottianum*, Muell. Arg.
 asper, Kuntze, l. c. = *P. asperus*, Muell. Arg.
 baecobotryodes, Kuntze, l. c. = *P. baecobotryoides*, Wall.
 Beckleri, Kuntze, l. c. = *P. simplex*, Retz.
 Benthamianus, Kuntze, l. c. = *Glochidion macrophyllum*, Benth.
 Bernierianus, Kuntze, l. c. = *P. Bernierianus*, Baill.
 Berryanus, Kuntze, l. c. 597 = *P. indicus*, Muell. Arg.
 Billardieri, Kuntze, l. c. 598 = *Glochidion Billardieri*, Baill.
 brachylobus, Kuntze, l. c. = *Gl. brachylobum*, Muell. Arg.
 brasiliensis, Kuntze, l. c. = *P. Conami*, Sw.
 brunneus, Kuntze, l. c. 601 = *Gl. brunneum*, Hook. f.
 bupleuroides, Kuntze, l. c. 598 = *P. bupleuroides*, Baill.
 Burchelli, Kuntze, l. c. = *P. Burchelli*, Muell. Arg.
 caledonicus, Kuntze, l. c. = *Glochidion caledonicum*, Muell. Arg.
 calocarpus, Kuntze, l. c. 598 = *Gl. zeylanicum*, A. Juss.
 celastroides, Kuntze, l. c. = *P. celastroides*, Muell. Arg.
 choretroides, Kuntze, l. c. = *P. choretroides*, Muell. Arg.
 ciccoides, Kuntze, l. c. = *P. ciccoides*, Muell. Arg.
 cinerascens, Kuntze, l. c. = *Glochidion cinerascens*, Miq.
 coccineus, Kuntze, l. c. = *Gl. coccineum*, Muell. Arg.
 coluteodes, Kuntze, l. c. 599 = *P. colutaeoidea*, Baill.
 compressicaulis, Kuntze, l. c. = *Glochidion compressicaule*, Kurz.
 concolor, Kuntze, l. c. = *Gl. concolor*, Muell. Arg.
 conterminus, Kuntze, l. c. = *P. simplex*, Retz.
 cordatus, Kuntze, l. c. = *Glochidion cordatum*, Scem.
 coronatus, Kuntze, l. c. 597 = *P. penangensis*, Muell. Arg.
 crotalariodes, Kuntze, l. c. 599 = *P. crotalarioides*, Zipp.
 Cumingii, Kuntze, l. c. = *Glochidion Cumingii*, Muell. Arg.
 Curtisii, Kuntze, l. c. 601 = *Gl. Curtisii*, Hook. f.
 cygnorum, Kuntze, l. c. 599 = *P. calycinus*, Labill.
 cyrtophylloides, Kuntze, l. c. = *P. cyrtophylloides*, Muell. Arg.
 cyrtophyllus, Kuntze, l. c. = *Glochidion cyrtophyllum*, Miq.
 cyrtostylus, Kuntze, l. c. = *Gl. cyrtostylum*, Miq.

DIASPERUS : —

- dalbergiodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 597 = *P. reticulatus*, Poir.
Daltonii, Kuntze, l. c. 599 = *Glochidion Daltoni*, Kierz.
dasyanthus, Kuntze, l. c. = *Gl. dasyanthum*, Kierz.
dasystylus, Kuntze, l. c. 601 = *Gl. dasystylum*, Kurz.
depressus, Kuntze, l. c. 599 = *P. pedunculatus*, Kostel.
desmocarpos, Kuntze, l. c. 601 = *Pl. desmocarpos*, Hook. f.
desmogyne, Kuntze, l. c. = *Pl. desmogyne*, Hook. f.
ditassodes, Kuntze, l. c. 599 = *P. ditassoides*, Muell. Arg.
emblicodes, Kuntze, l. c. = *P. polyphyllus*, Willd.
ericodes, Kuntze, l. c. = *P. ericoides*, Torr.
eriocarpus, Kuntze, l. c. = *Glochidion eriocarpum*, Champ.
erythroxyloides, Kuntze, l. c. = *P. erythroxyloides*, Muell. Arg.
flagifolius, Kuntze, l. c. = *Glochidion sphaerogynum*, Kierz.
Fagueti, Kuntze, l. c. = *Gl. Fagueti*, Muell. Arg.
Finlaysonianus, Kuntze, l. c. 602 = *Gl. superbium*, Beull.
flavidus, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. flavidum*, Kurz.
flexuosus, Kuntze, l. c. = *P. japonicus*, Muell. Arg.
floribundus, Kuntze, l. c. 597 = *P. Wightianus*, Muell. Arg.
flueggeaeformis, Kuntze, l. c. 599 = *P. glaucus*, Wall.
fulvirameus, Kuntze, l. c. = *Glochidion fulvirameum*, Miq.
Gamblei, Kuntze, l. c. 601 = *Gl. Gamblei*, Hook. f.
Gardneri, Kuntze, l. c. 597 = *Gl. Gardneri*, Thw.
Gaudichaudii, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. marianum*, Muell. Arg.
genistodes, Kuntze, l. c. = *P. genistoides*, Sond.
glaucifolius, Kuntze, l. c. = *Glochidion glaucifolium*,
glaucogynus, Kuntze, l. c. = *Gl. Moonii*, Thw.
goniocarpus, Kuntze, l. c. = *Gl. goniocarpum*, Hook. f.
guyanensis, Kuntze, l. c. = *P. attenuatus*, Miq.
heteranthus, Kuntze, l. c. 597 = *Glochidion Wallichianum*, Muell. Arg.
Heyneanus, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. Heyneanus*, Wight.
hirsutus, Kuntze, l. c. = *Gl. hirsutum*, Voigt.
Hohenackeri, Kuntze, l. c. = *Gl. Hohenackeri*, Bedd.
hongkongensis, Kuntze, l. c. = *Gl. hongkongense*, Muell. Arg.
Hookeri, Kuntze, l. c. = *P. Urinaria*, Linn.
impubes, Kuntze, l. c. 598 = *Glochidion sinicum*, Hook. et Arn.
insulanus, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. insulanum*, Muell. Arg.
jabbalpurensis, Kuntze, l. c. 602 [= *Phyllanthi*, sp.]. — Ind. or.
Jardinii, Kuntze, l. c. 599 = *P. Jardini*, Muell. Arg.
Johnstonei, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion Johnstoni*, Hook. f.
Fussienus, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. rigidum*, Muell. Arg.
kanalanstis, Kuntze, l. c. = *Gl. Lenormandi*, Muell. Arg.
kanalophilus, Kuntze, l. c. = *Gl. kanalense*, Baill.
Kipareh, Kuntze, l. c. 599 et 602 = *Gl. glaucum*, Blume.
Lambertianus, Kuntze, l. c. = *Gl. Lambertianum*, Muell. Arg.
lanceolaris, Kuntze, l. c. = *Bradlea lanceolaria*, Roxb.
lathyroides, Kuntze, l. c. = *P. lathyroides*, H. B. et K.
leiostylus, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion leiostylum*, Kurz.
littoralis, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. littorale*, Blume.
Llanosii, Kuntze, l. c. = *G. Llanosi*, Muell. Arg.
loranthoides, Kuntze, l. c. = *P. loranthoides*, Baill.
lucidus, Kuntze, l. c. = *Glochidion lucidum*, Blume.
lutescens, Kuntze, l. c. = *Gl. lutescens*, Blume.
macrocarpus, Kuntze, l. c. = *Gl. macrocarpum*, Blume.

DIASPERUS : —

- macrochorion*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 599 = *Gl. macrochorion*, Muell. Arg.
macrophyllus, Kuntze, l. c. = *Gl. macrophyllum*, Muell. Arg.
macrostigma, Kuntze, l. c. = *Gl. macrostigmum*, Hook. f.
micrantheodes, Kuntze, l. c. = *Phyll. micrantheoides*, Baill.
malabaricus, Kuntze, l. c. = *P. malabaricum*, Muell. Arg.
microbotrys, Kuntze, l. c. 601 = *Gl. microbotrys*, Hook. f.
mimosodes, Kuntze, l. c. 600 = *P. mimosoides*, Sw.
Miquelianus, Kuntze, l. c. 600 = *P. simplex*, Retz.
mishmiensis, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion mishmiense*, Hook. f.
moluccanus, Kuntze, l. c. = *Gl. moluccanum*, Blume.
Moonii, Kuntze, l. c. = *Gl. Moonii*, Thw.
Muellerianus, Kuntze, l. c. 597 = *P. floribundus*, Muell. Arg.
multilocularis, Kuntze, l. c. 600 et 602 = *Glochidion multiloculare*, Voigt.
myrtilloides, Kuntze, l. c. 600 = *P. myrtilloides*, Griseb.
neilgherrensis, Kuntze, l. c. = *Glochidion neilgherrense*, Wight.
nemorale, Kuntze, l. c. = *Gl. nemorale*, Thw.
neocaledonicus, Kuntze, l. c. 597 = *P. Vieillardii*, Baill.
Neohollandiae, Kuntze, l. c. 600 = *P. Novae-Hollandiae*, Muell. Arg.
nepalensis, Kuntze, l. c. = *Glochidion velutinum*, Muell. Arg.
nephradeniis, Kuntze, l. c. = *P. longiflorus*, Heyne.
nirurioides, Kuntze, l. c. = *P. nirurioides*, Muell. Arg.
nitidus, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion zeylanicum*, A. Juss.
nubigenus, Kuntze, l. c. = *Gl. nubigenum*, Hook. f.
nummularioides, l. c. 600 = *P. nummularioides*, Muell. Arg.
oblatum, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion oblatum*, Hook. f.
obliquus, Kuntze, l. c. 600 = *Glochidion zeylanicum*, A. Juss.
obovatus, Kuntze, l. c. = *Gl. obovatum*, Sieb. et Zucc.
obscurus, Kuntze, l. c. = *Gl. obscurum*, Blume.
ornatus, Kuntze, l. c. = *Gl. ornatum*, Kurz.
pallidifolius, Kuntze, l. c. = *P. pulcher*, Wall.
Pancherianus, Kuntze, l. c. = *Glochidion Pancherianum*, Muell. Arg.
pedunculatus, Kuntze, l. c. 597 = *P. longipes*, Muell. Arg.
Peltandra, Kuntze, l. c. 600 = *P. Thwaitesianus*, Muell. Arg.
peperomioides, Kuntze, l. c. 597 = *P. Finlaysonianus*, Wall.
perakensis, Kuntze, l. c. 597 = *Glochidion perakense*, Hook. f.
permixtus, Kuntze, l. c. 598 = *Gl. coriaceum*, Thw.
Perottetianus, Kuntze, l. c. 600 = *Gl. neilgherrense*, Wight.
philippinensis, Kuntze, l. c. = *Gl. philippinense*, Benth.
pinnatus, Kuntze, l. c. 597 = *Flueggea microcarpa*, Blume.
Poeppigianus, Kuntze, l. c. = *Glochidion Poeppigianum*, Muell. Arg.
polygonodes, Kuntze, l. c. = *P. polygonoides*, Spruce.
portoricensis, Kuntze, l. c. 602. — Ins. Antill.
praetervisus, Kuntze, l. c. 600 = *P. parvifolius*, Buch.-Ham.
pycnocarpus, Kuntze, l. c. = *Glochidion pycnocarpum*, Bedd.
pycnophyllus, Kuntze, l. c. = *Gl. microphyllum*, Muell. Arg.
Ralphii, Kuntze, l. c. 601 et 603 = *Gl. Ralphii*, Hook. f.
ramiflorus, Kuntze, l. c. 600 = *Gl. ramiflorum*, Forst.
rhomboidalis, Kuntze, l. c. = *P. rhomboidalis*, Muell. Arg.
sclerophyllus, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion sclerophyllum*, Hook. f.

DIASPERUS : —

- sikkimensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 601 = *P. Hamiltonianus*, Muell. Arg.
sphaerogynus, Kuntze, l. c. = *Glochidion sphaerogynum*, Kurz.
spinulosus, Kuntze, l. c. 597 = *P. Lauri*, J. Grah.
stellatus, Kuntze, l. c. = *Glochidion rigidum*, Muell. Arg.
stenocladus, Kuntze, l. c. = *P. Adami*, Muell. Arg.
Stocksii, Kuntze, l. c. = *P. indicus*, Muell. Arg.
stylosus, Kuntze, l. c. = *P. Griffithii*, Muell. Arg.
symplocodes, Kuntze, l. c. = *Glochidion montanum*, Thw.
symphoricarpodes, Kuntze, l. c. = *P. symphoricarpoides*, H. B. et K.
taitensis, Kuntze, l. c. = *Gl. taitense*, Baill.
tetrandrus, Kuntze, l. c. = *P. Teysmanni*, Muell. Arg.
thymodes, Kuntze, l. c. 601 = *P. thymoides*, Sieb.
tomentosus, Kuntze, l. c. = *Glochidion tomentosum*, Dalz.
triandrus, Kuntze, l. c. = *Gl. eleutherostylum*, Muell. Arg.
trichogynus, Kuntze, l. c. = *Gl. trichogynum*, Muell. Arg.
varians, Kuntze, l. c. = *Gl. varians*, Miq.
velutinus, Kuntze, l. c. = *Gl. velutinum*, Wight.
verrucosus, Kuntze, l. c. (= *Securinegae* sp.). — Afr. austr.
Vespertilio, Kuntze, l. c. = *Glochidion Vespertilio*, Muell. Arg.
villicaulis, Kuntze, l. c. = *Gl. villicaule*, Hook. f.
virgatus, Kuntze, l. c. 601 et 603 = *P. simplex*, Retz.
Wightianus, Kuntze, l. c. 597 = *Glochidion ellipticum*, Wight.
Wightianus, Kuntze, l. c. 603 = *Gl. rubrum*, Blume.
williamsioides, Kuntze, l. c. 601 = *P. williamsioides*, Griseb.
zeylanicus, Kuntze, l. c. 601 et 603 = *Glochidion zeylanicum*, A. Juss.
Zollingeri, Kuntze, l. c. = *Gl. Zollingeri*, Miq.
zygophylloides, Kuntze, l. c. = *P. zygophylloides*, Muell. Arg.

DIASPIS, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 314, MALPIGHIACEAE.

albida, Niedenzu, l. c. — Afr. trop. or.

DIASTEMA, Benth. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 747.

- Lehmanni*, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 695. — N. Granat.
picta, Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 241. — Columb.

DICELLA, Griseb. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 747.

- nudiflora*, Chod. in Arch. sci. phys. et nat. (1890), ex Chad. in Mém. Soc. phys. Genève, xxxi. 2 (1892) n. 3, 23. — Parag.

DICENTRA, Bernh. (Papav.). — Ind. Kew. i. 748.

- macrantha*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1937. — China.

DICHAEEA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 748.

- cornuta*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 479 t. 32 fig. 1-3. — Bras.

- hamata*, Rolfe, ex Stapf, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 264. — Bolivia.

DICHAELIA, Harv. = **Brachystelma**, R. Br. (Asclep.).

- breviflora*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51. (1895) 49. — Afr. austr.
elongata, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1884) 35. — Afr. austr.
Galpinii, Schlechter, l. c. 25. — Afr. austr.
natalensis, Schlechter, l. c. 35 = *B. natalensis*, Schlechter.
pallida, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 49. — Afr. austr.
pygmaea, Schlechter, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 262. — Afr. austr.

DICHAELIA : —

undulata, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 36. — Afr. austr.
villosa, Schlechter, l. c. 25. — Afr. austr.

DICHAEOPSIS, Pfitzer, Entwurf Natürl. anordn. Orch. (1887) 107; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6, (1889) 207 = **Dichaea**, Lindl. (Orchid.).

DICHAESPERMUM, *aurantiacum*, Hassk. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 378 in syn. = *Aneilema pauciflorum*, Wight.
Koenigii, Hassk. ex Hook. f. l. c. 381 = *A. Koenigii*, Wall.
paniculatum, Hook. f. et Thoms. ex Hook. f. l. c. = *A. paniculatum*, Wall.

DICHAETANTHERA, Endl. (Melast.). — Ind. Kew. i. 748.
altissima, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 382. — Madag.
asperima, Cogn. l. c. 381. — Madag.
crassinodis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 476; Cogn. l. c. — Madag.
grandifolia, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1180 (append.); et ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix (1891) 17 — Madag.
lanceolata, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 383. — Madag.
latifolia, Cogn. l. c. 380. — Madag.
parvifolia, Cogn. l. c. — Madag.
reticulata, Cogn. l. c. 381. — Madag.
rosea, Cogn. l. c. 381. — Madag.

DICHAPETALUM, Thou. = **Chaillietia**, DC.
angolense, Chod. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 672. — Angola.
Brownii, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 205. — Madag.
crassifolium, Chod. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 672. — Angola.
deflexum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 235 = *C. deflexa*, Klotzsch.
latifolium, Baill. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 370. — Bras.
Lautzianum, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 205. — Madag.
mossambicense, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 235 = *C. mossambicensis*, Klotzsch.
nigrescens, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 207. — Madag.
odoratum, Baill. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 371. — Bras.
Spruceanum, Baill. l. c. 371. — Peruvia.
subsessilifolium, Chod. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 671. — Angola.
umbellatum, Chod. l. c. — Angola.
vestitum, Baill. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 371. — Bras., Guian.

DICHELOSTEMMA, Kunth. = **Brodiaea**, Sw. (Liliac.).
Ida-Maia, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 318 = *B. Ida-Maia*, Wood.

DICHONDRA, Forst. (Convolvul.). — Ind. Kew. vi. 749.
evolulacea, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 268 = *repens*, Forst.

DICHOPSIS, Thw. (Sapot.). — Ind. Kew. i. 749.
Lamponga, Pierre, ex L. Planch. Étud. prod. Sapot. (1888) 47 nomen. — Cambodia.

DICHORISANDRA, Mikan (Commel.). — Ind. Kew. i. 749.
acaulis, Cogn. in Illustr. Hort. xli. (1894) 297. t. 19. — Bras.
angustifolia, L. Lind. et Rodig. l. c. xxxix. (1892) 81 t. 158. — Ecuad.
Glaziovii, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 2. — Bras.

DICHOSTYLIS, Beauv. = **Scirpus**, Linn. (Cyper.).

DICHOSTYLIS : —

aristata, Palla, in Bot. Jahrb. x. (1888) 299 = *Cyperus aristatus*, Rottb.
Baldwinii, Palla, l. c. = *C. Baldwinii*, Torr.
congesta, Palla, l. c. = *Fimbristylis Vahl*, Link.

DICHOTOMA, Sch. Bip. = **Sclerocarpus**, Jacq. (Compos.).
coffeaecola, Sch. Bip. ex Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 360 in syn., nomen = *S. coffeaecolus*, Klatt.

DICHROCEPHALA, L'Hérit. (Compos.). — Ind. Kew. i. 750.
gossypina, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 326. — Madag.
integrifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 333 = *Hippia integrifolia*, Linn. f.
linearifolia, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 406. — Afr. trop. or.

DICHROMENA, Michx. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 750.
canescens, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Sci. phys. Genève, xxxi. (1890) n. 1, 143 t. 42 — Bras. Parag.
cephalotes, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 100 = *leucocephala*, Michx.
colorata, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 141 = *leucocephala*, Michx.
fasciata, Maury, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 396. — Columb.
nivea, Boeck, in Contrib. Herb. Frankl. I. (1895) 20 = *D. Reverchonii*, S. H. Wright.
nivea, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 101 = *diphylla*, Torr.
Reverchonii, S. H. Wright, l. c. ix. 1882) 86 — Am. bor.
Watsoni, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 101. — Guatem.

DICHROSTACHYS, Wight et Arn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 751.
myriophylla, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 314. — Madag.
nyassana, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 195. — Afr. or.
unijuga, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 467. — Madag.

DICHROTRICHUM, Reinw. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 751.
bracteatum, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 212. — Borneo.

DICKINSIA, Franch. in Nouv. Mém. Mus. Paris, Sér. II, viii. 1885 (1886) 244. **UMBELLIFERAE**.
hydrocotylodes, Franch. l. c. t. 8 fig. a. — China.

DICLIDOCARPUS, A. Gray = **Trichospermum**, Blume (Tiliac.).
javanicus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 83 = *T. javanicum*, Blume.

DICLIPTERA, Juss. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 751.
alternans, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 47. — Afr. trop. occ.
Carvalhoi, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 371. — Afr. trop. or.
cochabambensis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 479. — Bolivia.
Ehrenbergii, Lindau, l. c. 480. — Mexic.
falciflora, Lindau, l. c. — Bras.
formosa, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. iii. (1891) 162. — Calif.
Hensii, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 120. — Congo.
kamerunensis, Lindau, l. c. 121. — Afr. trop. occ.
Maclearii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 356. — Ins. Christmas.
magnibracteata, Collett et Hemsl. l. c. xxviii. (1890) 108. — Burma.
Marlothii, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.

DICLIPTERA : —

Muelleri Ferdinandi, Lindau, Bot. Jahrb. xix. (1894) 5. — N. Guin.
Niederleiniana, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 48 (1894) 18. — Reg. Argent.
papuana, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 207. — N. Guin.
Quintasii, Lindau, l. c. xxii. (1895) 121. — Natal.
Schumanniana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 204. — Afr. austro-occ. extratrop.
usambarica, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 46. — Afr. trop. or.

DICOMA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 752.
elegans, Welw. ex O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 184; et in Bot. Jahrb. xv. (1893) 544. — Angola.
foliosa, O. Hoffm. l. c. 184 et 543. — Angola.
incana, O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 339 = *Brachyachae-nium incanum*, Baker.
Nachtigalii, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 545; et l. c. — Afr. austro-occid.
plantaginifolia, O. Hoffm. l. c. 546. — Angola.
Poggei, O. Hoffm. l. c. — Angola.
quinquenervia, Baker, in Kew Bull. (1895) 290. — Afr. centr. austr.
Schinzii, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 543. — Afr. austro-occid.
Schimperi, Baill. ex O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1893) 339 = *Hochstetteria Schimperii*, DC.
Welwitschii, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 184; et in Bot. Jahrb. xv. (1893) 544. — Angola.

DICLYTRA, Borkh. = **Dicentra**, Bernh. (Papav.).
chrysantha, *orchroleuca*, *pauciflora* et *uniflora*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 187 = *homonyma omnia*, Dicentrae.

DICORYPHE, Thou. (Hamamelid.). — Ind. Kew. i. 752.
guatteriaefolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 473. — Madag.
laurifolia, Baker, l. c. 474. — Madag.
retusa, Baker, l. c. 473. — Madag.
stipulacea, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1886) t. 60 = (an *D. stipulacea*, Jaume St-Hil. ?). — Madag.

DICRAEA, Thou. = **Podostemon**, Michx. (Podostemac).
quangensis, Engl. in Bot. Jahrb. (1894) 134. — Congo.
Warmingii, Engl. l. c. 135. — Congo.

DICRANOLEPIS, Planch. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 753.
Benthamiana, Van Tiegh. in Ann. Sc. Nat. Sér. VII. xvii. (1893) 197 [cf. Gilg, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 513 in obs.]. — Kamerun.
Buchholzii, Engl. et Gilg, l. c. xix. (1894) 273. — Kamerun.
cerasifera, Gilg, l. c. 272. — Afr. centr. bor.
convalliodora, Gilg, l. c. 271. — Congo.
grandiflora, Engl. l. c. vii. (1886) 338. — Ins. Fernando-Po.
oligantha, Gilg, l. c. xix. (1894) 274. — Gabon.
Schweinfurthii, Gilg, l. c. 271. — Afr. centr. bor.
Soyauxii, Engl. l. c. vii. (1885) 337. — Gabon.
thomensis, Engl. et Gilg, l. c. xix. (1894) 273. — Ins. S. Thom.
usambarica, Gilg, l. c. xix. (1894) 272. — Afr. trop. or.
vestita, Engl. l. c. vii. (1886) 337. — Kamerun.

DICRASTYLIS, Drum. (Verben.). — Ind. Kew. i. 753.
Costelloi, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Queensl. Bot. Bull. iv. (1891) 14. — Austral.
Weddii, F. M. Bailey, l. c. x. (1895) 24. — Austral.

DICRAURUS, Hook. f. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 753.
diffusus, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 214 = *leptocladus*, Hook. f.

DICTYANTHUS, Decne. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 753.
ceratopetala, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 208. — Guatem.
tuberosus, *Robins, in Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 180. — Mexic.

DICTYOSTEGA, Miers (Burm.). — Ind. Kew. i. 754.
usambarica, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45 (Dictyostegia) = *Gymnosiphon usambaricus*, Engl.

DIDELOTIA, Baill. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 754.
Afzelii, *Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3, (1894) 387. — Sierra Léone.

DIDIAREA, Baill. in *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, i. (1895) 22. **SAPINDACEAE**.
madagascariensis, *Baill. l. c.* 22.; et *Hist. pl. Madag. Atlas* (1895) t. 261-62. — Madag.
mirabilis, *Baill. l. c.* 23; in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1894?) 1182; et *l. c.* t. 262 A-D. — Madag.

DIDISCUS, DC. = **Trachymene**, Rudge (Umbel. l. f.).
Croninianus, *F. Muell. in Victor. Natural.* vi. (Feb. 1895) 144; et ex *Bot. Centralbl.* lxii. (1895) 29 et 93 = *T. Croninian.*, *F. Muell.*
elachocarpus, *F. Muell. l. c.* ix. (Aug. 1892) 58 et *l. c.* li. (1892) 397. — Austral.
Gillinae, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 81 nomen. — Austral.

DIDISSANDRA, C.B. Clarke (Cyrtandr.). — Ind. Kew. i. 754.
aspera, *Drake in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. ii. (1890) 127. — Tonkin.
confertiflora, *Drake l. c.* — Tonkin.
glandulosa, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 175. — China.
lancifolia, *Franch. in Now. Arch. Mus. Paris*, Sér. II, x. (1887-88) 63. — China.
longifolia, *Franch. l. c.* — China.
longipes, *Hemsl. in Kew Bull.* (1895) 115; et in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2379. — China.
primulaeflora, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 176. — Tibet.
saxatilis, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 227. — China.
sesquifolia, *C. B. Clarke, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1797. — China.
speciosa, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 228. — China.

DIDYMIA, Philippi, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 57 (Cyperac.).
cyperomorphia, *Phil. l. c.* t. I. = *Mariscus flavus*, *Vahl.*

DIDYMOCARPUS, Wall. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 755.
albomarginatus, *Hemsl. in Journ. Bot.* xxv. (1887) 204. — Perak.
areolatus, *Stapf, in Trans. Linn. Soc.*, Sér. II, iv. (1894) 213. — Borneo.
atrosanguinea, *Ridl. l. c.* iii. (1893) 328. — Penins. Mal.
flavobrunnea, *Ridl. l. c.* 329. — Penins. Mal.
Fordii, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 22. — China.
Hancei, *Hemsl. l. c.* — China.
heterophylla, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Sér. II, iii. (1893) 329. — Penins. Mal.
kamerunensis, *Engl. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 79. — Afr. trop. occ.
Kinnearii, *F. Muell. in Vict. Natural.* iii. (March 1887) 159; et ex *Bot. Centralbl.* xxx. (1887) 278. — Austral.
lacunosa, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1892) t. 7236; et ex *Gard. Chron.* (1893) ii. 120 et 211 fig. 38. — Penang.
lilacina, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Sér. II, iii. (1893) 330. — Penins. Mal.

DIDYMOCARPUS : —
neurophylla, *Coll. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 102. — Burma.
pectinata, *C. B. Clarke, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 226. — Perak.
pusillus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 508. — Madag.
pyroliflora, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Sér. II, iii. (1893) 330. — Penins. Mal.
quinquevulnera, *Ridl. l. c.* 328. — Penins. Mal.
rotundifolia, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 230. — China.
salicina, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Sér. II, iii. (1893) 329. — Penins. Mal.
stenanthos, *C. B. Clarke, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1799. — China.
Zollingeri, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 477 sphalm. = *Chirita Zollingeri*, *C. B. Clarke*.

DIDYMOPANAX, Decne. (Araliac.). — Ind. Kew. i. 756.
acuminatum, *E. March. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxviii? (1889) 52. — Bras.
anomalum, *Taub. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 511. — Bras.
cordatum, *Taub. l. c.* 509. — Bras.
falcatum, *E. March. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 2. (1889) 51. — Bras.
Glaziovii, *Taub. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 510. — Bras.
Pittieri, *E. March. ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 280. — Costarica.
Urbanianum, *E. March. ex Urban, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 326. — Ins. Martinica.
venulorum, *Taub. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 510. — Bras.

DIDYMOSPERMA, H. Wendl. et Drude (Palm.). — Ind. Kew. i. 756.
borneensis, *Becc. Malesia*, iii. (1889) 197. — Borneo.
gracilis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 420. — Assam.
hastata, *Becc. Malesia*, iii. (1889) 199. — Penins. Mal.
Hookeriana, *Becc. l. c.* 186. — Penins. Mal.

DIERBACHIA, Spreng. = **Dunalia**, H. B. et K. (Solan.).
acnistodes, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 451 = *Dun. acnistoides*, *Miers*.
brachyacantha, *Kuntze, l. c.* = *Dun. brachyacantha*, *Miers*.
cyanea, *Kuntze, l. c.* = *Dun. cyanea*, *Rouv.*
lilacina, *Kuntze, l. c.* = *Dun. lilacina*, *Miers*.
lycioides, *Kuntze, l. c.* = *Dun. lycioides*, *Miers*.
ramiflora, *Kuntze, l. c.* = *Dun. ramiflora*, *Miers*.
senticosa, *Kuntze, l. c.* = *Dun. senticosa*, *Miers*.

DIEFFENBACHIA, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 756.
Fournieri, *Hort. ex Gard. Chron.* (1890) ii. 70. — Columb.
Leoncae, *Hort. ex Rev. Hort.* (1894) 251. — Columb.
Makoyana, *Hort. ex Gard. Chron.* (1890) ii. 70. — Columb.
Meleagris, *L. Linden et Rodig. in Illustr. Hort.* xxxix. (1892) t. 559. — Ecuad.
Olbia, *L. Linden et Rodig. l. c.* 31 t. 548. — Peruvia.
picturata, *L. Linden et Rodig. l. c.* 101 t. 562. — Venez.
Seguine, *Baill. Hist. des pl.* xiii. (1895) 439 = *D. Seguine*, *Schott?*

DIERVILLA, Tourn. ex Linn. (Caprif. ol.). — Ind. Kew. i. 757.
Diervilla, *Macmill. in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 15 = *trifida*, *Moench*.
fallax, *Boerl. Handb. Fl. Ned. Indië* ii. 1. (1891) 6 (= *Weigelia fallax*, *Miq.*). — Java.
hybrida ×, *Hort. ex Dippel, Deutsch. Dendrol.* i. (1889) 274. — Hybr. artef.
rivularis, *Gattinger, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 191. —

DIETES, Salisb. = **Moraea**, Linn. (Irid.).

DIETES : —
Macleaii, *Hort. ex Baker, Handb. Irid.* (1892) 60 in obs. = *Moraea iridioides*, *Linn.*

DIGITALIS, [Tourn.] Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 757.
Charreltii, *Heldr. ex Charrel, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892). — Maced.
Nadji, *Heldr. et Nadji [Charrel] Emp. Ottom. (Pl. de Salon.)* (1892) 33. — Oriens.

DIGITARIA, Heist. ex Adans. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).
tarapacana, *Phil. in Ann. Mus. nac. Chile* (1892) 80. — Chil.
thyrsoides, *Balansa, in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 138. — Tonk.
timorensis, *Balansa, l. c.* = *P. timorense*, *Kunth*.

DILKEA, Mast. (Passiflor.). — Ind. Kew. i. 758.
Johannesii, *Rodr. in Vellozia*, Sec. edic. i. (1885-88) 22. — Bras.

DILLENIA, Linn. (Dilleniace.). — Ind. Kew. 759.
alata, *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1893) 123 = *alata*, *Banks*.
Albertisiana, *Martelli, in Becc. Malesia* iii. (1886) 161. — N. Guin.
apetala, *Martelli, l. c.* 163 = *Wormia apetala*, *Gaudich.*
artocarpaefolia, *Martelli, l. c.* = *W. artocarpaefolia*, *Baker*.
auriculata, *Martelli, l. c.* 159. — N. Guin.
Baillonii, *Pierre ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 81; et ex *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 128 (= *D. pentagyna*, *Pierre*). — Cochinch.
Beccariana, *Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 158. — Borneo.
biflora, *Martelli, l. c.* 163 = *Wormia biflora*, *A. Gray*.
Burbidgei, *Martelli, l. c.*; *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 123 = *W. Burbidgei*, *Hook. f.*
castaneaefolia, *Martelli, l. c.* = *W. castaneaefolia*, *Miq.*
crassisejala, *Martelli, l. c.* 156. — Borneo.
elata, *Pierre, ex Gilg., in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 125. — Ind.
excelsa, *Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 163; *Gilg, l. c.* 123 = *W. excelsa*, *Jack.*
ferruginea, *Gilg, l. c.* = *W. ferruginea*, *Gilg.*
glabra, *Martelli, in Becc. Malesia*, in. (1886) 157. — Borneo.
Hookeri, *Pierre, ex Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 125. — Cochinch.
luzoniensis, *Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 163 = *W. luzoniensis*, *Vidal*.
Macdonaldi, *Martelli, l. c.* = *W. Macdonaldi*, *F. Muell.*
macrocarpa, *Ruiz, ex Vesque, in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 62 = *Clusia Pavoni*, *Planch. et Triana*.
madagascariensis, *Martelli, in Beccari, Malesia*, iii. (1886) 163 = *Wormia madagascariensis*, *DC.*
magnicapsula, *Pav. ex Vesque, in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 62 = *Clusia Pavonii*, *Planch. et Triana*.
magnoliaefolia, *Martelli, in Becc. Malesia* iii. (1886) 155. — Sumatra.
mattadensis, *Martelli, l. c.* 160. — Borneo.
meliosmaefolia, *Pierre, ex Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 123 = *meliosmaefolia*, *Hook. f.*
membranifolia, *Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1887) 163 = *Wormia membranifolia*, *Seem.*
micrantha, *Martelli, l. c.* 156. — Borneo.
minor, *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1893) 125 = *Wormia minor*, *Zoll.*
oblonga, *Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 163; *Gilg, l. c.* 123 = *W. oblonga*, *Wall.*
ochreatea, *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 123 = *W. ochreatea*, *Miq.*
pauana, *Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 156. — Borneo.

DILLEIA : —

- magnoliaefolia*, Martelli, in Becc. Malesia, iii. (1886) 155. — Sumatra.
parvifolia, Martelli, l. c. 158. — Borneo.
pauciflora, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1893) 123 = *Wormia pauciflora*, Zoll. et Mor.
pulchella, Gilg, l. c. = *W. pulchella*, Jack.
reticulata, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) n. 367. — Malaya.
rubescens, Ruiz, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 63 in syn. = *Clusia elliptica*, H. B. et K.
speciosa, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 124 = *Reifferscheidia speciosa*, Presl.
suffruticosa, Martelli, in Becc. Malesia, iii. (1886) 163; Gilg, l. c. 123 = *Wormia suffruticosa*, Griff.
thurifera, Pav. ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 59 in syn. = *Clusia thurifera*, Planch. et Triana.
tomentella, Martelli, in Becc. Malesia, iii. (1886) 159. — Borneo.
triquetra, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1893) 123 = *W. triquetra*, Rottb.

DILOPHIA, T. Thoms. (Crucif.) — Ind. Kew. i. 759. ebracteata, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 72. t. 28 fig. 34-45. — Tibet.
sinuata, Maxim. l. c. fig. 46-54. — Tibet.

DIMERESIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 411; et in Syn. Fl. N. Am. i. u. Suppl. (1886) 448. **COMPOSITAE**.
Howellii, A. Gray, l. c. 411 et 449. — Oreg.

DIMERIA, R. Br. (Gramin.) — Ind. Kew. i. 760. connivens, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 689, in add. — Ind. or.
falcata, Hack. l. c. 85. — China.
glabriuscula, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 83. — Austral.
Lehmannii, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 82. — Zeylan.
leptorhachis, Hack. l. c. 87. — Zeylan.
pubescens, Hack. l. c. 83. — Zeylan.
Thwaitesii, Hack. l. c. 78. — Zeylan.
Woodrovi, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2312. — India.

DIMEROCOSTUS, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 687. **SCITAMINEAE**.
strobilacea, Kuntze, l. c. — Panama.

DIMORPHANDRA, Schott (Legumin.). — Ind. Kew. i. 760.
megacarpa, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 345. — Bras.

DIMORPHANTHERA, F. Muell. in Wing. South Sci. Record, N. S. ii. (Feb. 1886) in obs.; et in Trans. Roy. Soc. Vict. i. n. (1889) 19. **VACCINIACEAE**.
amblyornidis, F. Muell. l. c. (1886) in obs. (= *Agapetes amblyornidis*, Becc.) — Borneo.
meliphaeidum, F. Muell. l. c. (= *A. meliphaeidum*, Becc.) — Malaya.
Moorhousiana, F. Muell. l. c.; et ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 163. (= *A. Moorhousiana*, F. Muell.) — Austral.

DIMORPHOCALYX, Thw. (Euphorb.) — Ind. Kew. i. 760.
capillipes, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 405. — Singap.
Kunsteri, King, ex Hook. f. l. c. — Penang.
Lawianus, Hook. f. l. c. 404. — Ind. or.
malayanus, Hook. f. l. c. — Ind. or., Borneo.

DINAEBA, Delile = **Bouteloua**, Lag. (Gramin.).
pubescens, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 111. — Afr. trop. or.

DINEMAGONUM, A. Juss. (Malpigh.) — Ind. Kew. i. 761.
maculigerum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 725. — Chili.

DINOCHLOA, Buese (Gramin.) — Ind. Kew. i. 761. *scandens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 773 = *D. Tjankorreh*, Buese.

DIOCLEA, H. B. et K. (Composit.) — Ind. Kew. i. 761.
comosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 179 = *guianensis*, Benth.
coriacea, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 22. = *coriacea*, Benth.

DIODIA, Gronov. (Rubiace.) — Ind. Kew. i. 761. *apiculata*, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 313 = *Spermacoce tenella*, H. B. et K.
assurgens, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 22 = *S. tenella*, H. B. et K.
aulacosperma, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 394. — Afr. trop. or.
dichotoma, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 10 = *glabra*, Willd.
Gardneri, K. Schum. l. c. 402. — Bras.
gymnocephala, K. Schum. l. c. 16 (= *Borreria gymnocephala*, DC.). — Bras.
Kuntzei, K. Schum. l. c. 15. — Bras.
macrophylla, K. Schum. l. c. 401. — Bras.
riparia, Sagot, ex K. Schum. l. c. 27 = *sarmen-tosa*, Sw.
saponarifolia, K. Schum. l. c. 16. (= *Borreria saponariaefolia* Cham. et Schlecht.) — Bras.
spicata, K. Schum. l. c. 23 = *spicata*, Miq.

DIONCOPHYLLUM, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 870. **BIXACEAE**.
Tholloni, Baill. l. c. — Congo Gall.

DIONYCHIA, Naud. (Melast.) — Ind. Kew. i. 762. *gracilis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 338. — Madag.

DIOSCOREA, Plum. ex Linn. (Dioscor.). — Ind. Kew. i. 762.
Beccariana, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 83. — Abyss.
Bisantaca, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 296 in syn. = *alata*, Linn.
Buchholziana, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 333. — Kamerun.
Burchellii, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 1. — Afr. austr.
calyculata, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 295. — Am. centr.
caucasica, Lipsky, in Bull. Soc. Natur. Kieff, (1893) 143 t. 6-7; Alboff, in Act. Hort. Petrop. xii. (1893) 439; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 263. — Reg. Cauc.
Cerubulium, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 291 in syn. = *spinosa*, Roxb.
Collettii, Hook. f. l. c. 290. — Burma.
colocasiaefolia, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 145. — Kamerun.
coriacea, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 292 in syn. = *oppositifolia*, Linn.
crepitans, Ham. ex Hook. f. l. c. 294 = *glabra*, Roxb.
cryptantha, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 528. — Madag.
cyanisticta, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 10. — Costarica.
decemangularis, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 295 = *sativa*, Linn.
decipiens, Hook. f. l. c. 293. — Burma.
deflexa, Hook. f. l. c. — Penins. Mal.
Devipata, Ham. ex Hook. f. l. c. 296 = *alata*, Linn.
dicanandra, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 13. — Guatem.
Dregeana, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 274. (= *Helmia Dregeana*, Kunth). — Afr. austr.
Dugesii, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 330. — Mexic.
dumetorum, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 274 = seq.
dumetorum, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 5. (1887) 133. (= *Heimia dumetorum*, Kunth) = *triphyllo*, Schimp.
Forbesii, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 2. — Afr. trop. austro-or.

DIOSCOREA : —

- gibbiflora*, Hook. f., Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 294. — Ind. or.
Hamiltoni, Hook. f. l. c. — Ind. or.
hirsuticaulis, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 324. — Mexic.
Hoffa, Cordem. Fl. Ile Réunion. (1895) 159. — Ins. Borbon.
holmioidea, Mawry, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 267 fig. 11. — Am. austr. trop.
Holstii, Harms, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 147. — Afr. trop. or.
Hurchusia, Ham. et Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 296 in syn. = *alata*, Linn.
hybrida × Hort. ex Nichols, Dict. of Gard. iv. (1888) 537. — Form. hort.
hylophila, Harms, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 51, et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 146. — Afr. trop. or.
incrassata, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 295 = *Hamiltoni*, Hook. f.
Jacquemontii, Hook. f. l. c. 296. — Concan.
jaliscana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 438. — Mexic.
lanceolata, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 292 in syn. = *oppositifolia*, Linn.
lucida, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 60. — Madag.
malifolia, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 1. — Afr. austr.
militaris, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 324. — Mexic.
minima, Robins. et Seaton, l. c. xxviii (1893) 115. — Mexic.
minutiflora, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 332; et xv 146 (err. cal. *multiflora*) t. 8. — Kamerun.
monadelphae, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1887) 133 = *monadelpha*, Griseb.
multiflora, Engl. ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 146 sphalm. = *minutiflora*, Engl.
Mundtii, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 1. — Afr. austr.
nipponica, Makino, Ill. Fl. Jap. (1891) t. 45; et ex Journ. Bot. xxix (1891) 383. — Japon.
obcuneata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 293. — Zeylan.
octangularis, Ham. ex Hook. f. l. c. 296 in syn. = *alata*, Linn.
odoratissima, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 146. — Afr. trop. occ.
orbiculata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 292. — Penang.
ovata, Ham. ex Hook. f. l. c. 292. = *Hamiltoni*, Hook. f.
papuana, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 273. — N. Guin.
pedicellata, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 240. — Parag.
perdicum, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 13. — Bras.
phaseoloides, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 149. — Afr. centr. or.
plumifera, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 324. — Mexic.
polyclados, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 294. — Singap. Java.
Preussii, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 147. — Kamerun.
Pringlei, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 323. — Mexic.
rhypogonoides, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1868. — Ins. Hongkong.
sagittata, Royle, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 294 = *glabra*, Roxb.
sagittifolia, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 147. — Afr. centr. or.
sansibarensis, Pax, l. c. 146. — Afr. trop. or.
Schweinfurthiana, Pax, l. c. 149. — Afr. centr. or.
Stuhlmannii, Harms, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 146. — Afr. trop. or.
thamnoidea, Hort. ex Correns, in Sitzungsber. Akad. Wien, xcvi (1889) 672 et 673 nomen, (Quid?).
Tokoro, Makino, ex Miyabe, in Tokyo Bot. Mag. viii. (1894) 485 nomen. — Japon.
Tunga, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 295 in syn. = *sativa*, Linn.

DIOSCOREA: —

Tysoni, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 2. — Afr. austr.
undatiloba, Baker, l. c. 8. — Natal.
versicolor, Ham. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 295 in syn. (sphalm *versicola*) = sativa, Linn.
Wallichii, Hook. f. l. c. — Ind. or.
Wightii, Hook. f. l. c. 291. — Travanc.

DIOSCOREOPHYLLUM, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 181. **MENISPERMACEAE**.
Volkensii, Engl. l. c. 182. — Afr. trop. or.

DIOSCORIDA, St. Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 764 = **Dioscorea**, Plum.

DIOSPHAERA, Feer, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 519. = **Trachelium**, Journ. (Campanul.).
asperuloides, Feer, l. c. 523. = *T. asperuloides*, Boiss.
chalcidica, Feer, l. c. 521. — Graec.
dubia, Feer, l. c. 522 = *T. rumelicum*, Boiss.
Jacquini, Feer, l. c. 520 = *T. Jacquini*, Boiss.

DIOSPYROS, Linn. (Ebenac.). — Ind. Kew. i. 766.

acris, Hemsl. in *Kew Bull.* (1895) 136. — Ins. Salom.
armata, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 69. — China.

aurantium, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hort. (1887) 349 = *D. Kaki*, Linn. f.
Bertii, André, l. c. = *D. Kaki*, Linn. f.
bilocularis, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2336. — Singap.

caliginosa, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II, iii. (1893) 318. — Penins. Mal.

calycina, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 306. = *D. Lotus*, Linn.

conocarpa, Gürke, ex K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 311. — Gabon.

coreacea, « Hiern », ex Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 1. (1891) 317 sphalm. = *coriacea*, Hiern.

Cumingii, Gürke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 162 = *philippinensis*, A. DC.

dictyonema, « Hiern » ex Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 1. (1891) 316 sphalm. = *dictyonema*, Hiern.

elliptica, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hort. lix. (1887) 349. = *D. Kaki*, Linn. f.

Fischeri, Gürke, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 311. — Afr. trop. or.

guianensis, Gürke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1 (1891) 163 = *D. Paralea*, Steud.

Hildebrandtii, Gürke, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 312. — Madag.

laxa, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1894) 108 = *maritima*, Blume.

lenticellata, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 333. — Madag.

melanoxydon, Ces., Passer, et Gibelli, *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 403 (= *D. melanoxydon*, Willd.) = *D. Ebenum*, Koen.

microcarpa, Gürke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1 (1891) 163 = *D. Cargillia*, F. Muell.

mollis, Gürke, l. c. 162 (= *Gunisanthus mollis*, Kurz) = *martabanica*, C. B. Clarke.

Oldhami, Maxim. in *Bull. Acad. Sci. Pétersb.* xxxi. (1887) 67. — Ins. Formos.

peregrina, Gürke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1 (1891) 164 fig. 87 (= *Embryopteris peregrina*, Gaertn.). = *D. Embryopteris*, Pers.

pergamacea, « Hiern. » ex Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 1. (1891) 317 sphalm. = *pergamena*, Hiern.

philippensis, Gürke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 164 = *discolor*, Willd.

Preussii, Gürke, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 313. — Kamerun.

pseudebenus, Parment. *Histol. comp.* Ebenac. (1892) 29 = *Euclea pseudebenus*, E. Mey.

DIOSPYROS: —

pseudo-ebenum, Koerd. et Valet. in Mededeel. s' Lands Plantent. n. xi, Bijdr. n. 1 (1894) 58 = *Euclea pseudebenus*, E. Mey.

rhombifolia, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 70. — China.

Sahuti, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hort. lix. (1887) 349 = *D. Kaki*, Linn. f.

sinensis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 71. — China.

Soyauxi, Gürke et K. Schum. ex Gürke, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 312. — Gabon.

Stuhlmannii, Gürke, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 306. — Afr. trop. or.

utilis, Hemsl. in *Ann. of Bot.* ix. (1895) 154. — Formos.

Walkerii, Gürke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 162 (= *Patonia Walkerii*, Wight) = *D. Gardneri*, Thw.

Wieseneri, Carrière, in Rev. Hort. lix. (1887) 83. = *D. Kaki*, Linn. f.

DIPCADI, Medic. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 768.

Bakerianum, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 217. — Afr. austro-occ. extratrop.

Clarkeanum, Schinz, l. c. 218. — Afr. austro-occ. extratrop.

Durandianum, Schinz, in *Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1893 (1895) 374. — Afr. austro-occ. extratrop.

longibracteatum, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 218. — Afr. austro-occ. extratrop.

Marlothii, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 3. — Afr. austr.

minor, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 346. — Concan.

occidentale, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 119. — Afr. trop. occ.

sansibaricum, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 142. — Afr. trop. or.

spirale, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 7. — Afr. austr.

DIPELTA, Maxim. (Caprifol.). — Ind. Kew. i. 769.

elegans, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 174. — China.

DIPETALIA, Rafin. = **Oligomeris**, Cambess. (Resed.).

Burchellii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 39. = *O. Burchellii*, Harv.

Dregeana, Kuntze, l. c. = *O. Dregeana*, Muell. Arg.

spathulata, Kuntze, l. c. = *O. spathulata*, E. Mey.

subulata, Kuntze, l. c. = *O. glaucescens*, Cambess.

DIPHACA, Lour. = **Ormocarpum**, Beauv. (Legumin.).

coerulea, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 319. = *O. caeruleum*, Balf. f.

gracilis, Taub. l. c. = *Arthrocarpum gracile*, Balf. f.

verrucosa, Taub. l. c. — Afr. trop. occ.

Kirkii, Taub. l. c. = *O. Kirkii*, S. Moore.

mimosoides, Taub. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 213. = *O. mimosoides*, S. Moore.

trachycarpa, Taub. l. c. — Afr. trop. or.

trichocarpa, Taub. l. c. 213. — Afr. trop. or.

verrucosa, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 319. = *O. verrucosum*, Beauv.

DIPHRYLLUM, Rafin. = **Listera**, R. Br. (Orchid.).

australe, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 659. = *L. australis*, Lindl.

convallarioides, Kuntze, l. c. = *L. convallarioides*, Nutt.

cordatum, Kuntze, l. c. = *L. cordata*, R. Br.

Eschscholtzianum, Kuntze, l. c. = *L. Eschscholtziana*, Cham. et Schlecht.

japonicum, Kuntze, l. c. = *L. japonica*, Blume.

micranthum, Kuntze, l. c. = *L. micrantha*, Lindl.

ovatum, Kuntze, l. c. = *L. ovata*, R. Br.

pinetorum, Kuntze, l. c. = *L. pinetorum*, Lindl.

DIPHYLAX, Hook. f. in Hook. *Icon. pl.* xix. (1889). t. 1865. **ORCHIDEAE**.

DIPHYLAX: —

urceolata, Hook. f. in Hook. *Icon. pl.* xix. (1889). t. 1865 (= *Habenaria urceolata*, Hook. f.) — Reg. Himal.

DIPHYSA, Jacq. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 769.

racemosa, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 97 t. 3. — Am. bor. occ.

suberosa, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 405. — Mexic.

DIPLACHNE, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 769.

aristata, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 534. — Madag.

biflora, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 387. — Transv.

Brandegei, Vasey, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* 2. ii. (1889) 213. — Calif.

bulgarica, Bornm. in *Bot. Centralbl.* xxxvi. (1888) 156; et lxi. (1890) 165; et in *Bull. Soc. Dauph.* (1890) 28 = *serotina*, Link.

caudata, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 113. — Afr. trop. or.

cinerea, Hack. in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 403. — Afr. austro-occ. extratrop.

grandiglumis, Hack. l. c. 404. (= *Leptochloa grandiglumis*, Nees). — Afr. austr.

pallida, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 387. — Transv.

patula, St. Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 937 = *serotina*, Link.

Reverchonii, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 118; et *Illustr. N. Am. Grass.* i. ii. (1891) t. 43. — Texas.

rigida, Vasey, l. c. t. 44 = *rigida*, Benth.

saccharoides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 349. — Madag.

squarrosa, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1889) 72 = *Molinia squarrosa*, Trin.

tarapacana, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile.* (1892) 88. — Am. austr. occ.

Thoroldi, Stapf, ex Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 121. — Tibet.

Tracyi, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xv. (1888) 49. (= *Leptochloa Tracyi*, Beal). — N. Mexic.

Vulpiastrum, Aschers. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 35 et 38 = (*Rabdochloa Vulpiastrum*, De Not.). — Afr. trop.

DIPLACRUM, R. Br. = **Scleria**, Berg (Cyper.)

africanum, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 668. — Afr. trop.

longifolium, C. B. Clarke, l. c. 669 (= *Pteroscleria longifolia*, Griseb.). — Bras., Afr. trop. occ.

DIPLACUS, Nutt. = **Mimulus**, Linn. (Scrophul.).

grandiflorus, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 156 (= *D. longiflorus* Greene, non Nutt.). — Calif.

linearis, Greene, l. c. = *M. linearis*, Benth.

parviflorus, Greene; l. c. i. (Mar. 1887) 36. — Calif.

speciosus, Davy, in *Erythea*, ii. (1894) 101. — Calif.

DIPLADENIA, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 770.

congesta, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 169. — Ecuad.

eximia, Hemsl. in *Gard. Chron.* (1893) ii. 120. — Am. austr.

Marie-Henriettae, Hort. Sand. ex *Gard. Chron.* (1892) i. 731 = *atropurpurea*, A. DC.

Myriophyllum, Taub. ex Ule, in *Cruls, Rapp. expl. plat. centr. Brésil* (1894) 355 et 361; 11 Feb. 1896. — Bras.

tennifolia, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 169 = *polymorpha*, Muell. Arg.

velutina, K. Schum. l. c. = *gentianoides*, Muell. Arg.

DIPLANTHERA, Banks et Soland. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 770.

speciosa, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1894) 235. (= *Deplanchea speciosa*, Vieill.). — N. Caled.

DIPLATIA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 501. = **Loranthus**, Linn.
Alberticii, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 88. — N. Guin.
grandibractea, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 502. = *L. grandibracteus*, F. Muell.
tenuifolia, Van Tiegh. l. c. — Austral.

DIPLECTRIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 246 = **Anplectrum**, A. Gray, (Melast.).
annulata, *assamica*, *biligulata*, *confinis*, *Korthalsii*, *latifolia*, *ligulata*, *nodosa*, *pallens*, *reformata*, *rostrata*, *stipularis*, *viminialis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 246 = *homonyma omnia* Anplectri.
Beccariana, Kuntze, l. c. 953 = *A. Beccarianum*, Cogn.
bibracteata, Kuntze, l. c. 246 = *Creochiton bibracteata*, Blume.
cyanocarpa, Kuntze, l. c. = *A. glaucum*, Triana.
divaricata, Kuntze, l. c. = *A. divaricatum*, Triana.
myrtifolia, Kuntze, l. c. = *Medinilla myrtiformis*, Triana.
pudibunda, Kuntze, l. c. = *Creochiton pudibunda*, Blume.
tetrandra, Kuntze, l. c. = *A. glaucum*, Triana.

DIPLOCYATHUS, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 281 = **Diplocyatha**, N. E. Br. (Asclep.).

DIPLOGATHA, « N. E. Br. » ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 281 sphalm. = **Diplocyatha**, N. E. Br. (Asclep.).

DIPLOGLOTTIS, Hook. f. (Sapind.?) — Ind. Kew. i. 771.
diphyllostegia, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. First Suppl. (1886) 14 (= *Cupania diphyllostegia*, F. Muell.). — Austral.

DIPLOGON, Rafin. = **Chrysopsis**, Nutt. (Compos.)
Breweri, *graminifolium*, *hyssopifolium*, *oreganum*, *pilosum*, *pinifolium*, *scabellum*, *trichophyllum*, *villosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 334 = *homonyma omnia* Chrysopseos.
falcatum, Kuntze, l. c. = *C. villosa*, DC.
Nuttallianum, Kuntze, l. c. = *C. pilosa*, Nutt.

DIPLOMORPHA, Griff. = **Agyneia**, Linn. (Euphorb.).
bacciformis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 603 = *A. bacciformis*, A. Juss.

DIPLOPAPPUS, Cass. = **Aster**, Tourn. (Compos.).
chrysophyllus, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 362 in syn. = *Cassinia fulvida*, Hook. f.

DIPLOPELTIS, Endl. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 772.
madagascariensis, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 357. — Madag.

DIPLOPHRACTUM, Desf. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 773.
philippinense, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 71. — Ins. Philipp.

DIPLORRHYNCHUS, Welw. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 773.
angolensis, Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 85. — Angola.
Poggei, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 142 fig. 540. — Congo.
Welwitschii, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 85 = *angolensis*, Buett.

DIPLOSPORA, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 773.
fruticosa, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 283. — China.
parvifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 280. — As. trop.

DIPLOSTEPHIUM, H. B. et K. (Composit.). — Ind. Kew. i. 773.
antisianense, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 338. — Ecuad.

DIPLOSTEPHIUM : —
cochense, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi (1895) 341. — N. Gran.
glandulosum, Hieron. l. c. 339. — Am. austr.
Hartwegii, Hieron. l. c. 337. — N. Gran.
incanum, Hieron. l. c. 340. — Peruvia.
ochroleucum, Klatt, l. c. viii. (1887) 37 — Columb.
rhododendroides, Hieron. l. c. xxi. (1895) 340. — N. Granat.
tacorense, Hieron. l. c. 337. — Peruvia.

DIPLOSTIGMA, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 334; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 256. **ASCLEPIADEAE**.
canescens, K. Schum. ll. cc. 334 et 257. — Afr. trop. or.

DIPLOTAXIS, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 773.
Blancoana, Giraudias, in Bull. Soc. sc. Angers (1881) = *Brassica Blancoana*, Boiss.
Delagei, Pomel, ex Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 476. — Algeria.
fruticulosa, Tod. ex Caruel, in Parl. Fl. Ital. ix. (1893) 962. — Ins. Melit.
heterophylla, Porta et Rigo, ex Porta. in Atti Accad. Agiat. ix. 1891 (1892) sep. 7; Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 309. — Hisp.
Rouyana, Janka, ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 309 in syn. = *maritima*, Rouy.
segobricensis, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 28 nomen. — Hisp.
stenocarpa, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 46 = *Erucastrum obtusangulum*, Reichb.
valentina, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 9; Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 309. — Hisp.

DIPLOTHEMIUM, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. i. 774.
jangadense, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 499 t. 36. — Bras.

DIPLYCOSIA, Blume (Ericac.). — Ind. Kew. i. 774.
chrysothrix, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 191. — Borneo.
cinnamomifolia, Stapf, l. c. 195. — Borneo.
kinabaluensis, Stapf, l. c. 193. — Borneo.
memecyloides, Stapf, l. c. 194. — Borneo.
Myrtillus, Stapf, l. c. 192. — Borneo.
penduliflora, Stapf, l. c. 193. — Borneo.
pinifolia, Stapf, l. c. 192. — Borneo.
punctulata, Stapf, l. c. 193. — Borneo.
rufa, Stapf, l. c. 191. — Borneo.
urceolata, Stapf, l. c. — Borneo.

DIPLODOPHYLLUM, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1895) 177 = **Loranthus**, Linn.
Digueti, Van Tiegh. l. c. 178. — Calif.

DIPOMA, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 404; et Pl. Delav. (1889) 63. **CRUCIFERAE**.
iberideum, Franch. ll. cc. 405; et 64 t. 17. i. — Yunnan.

DIPORIDIUM, Wendl. f. = **Ochna**, Linn.
Afzelii, *brevipes*, *ciliatum*, *Kirkii*, *leptocladum*, *leucophaeum*, *macrocalyx*, *madagascariense*, *mauritanum*, *Mechowianum*, *membranaceum*, *mossambicense*, *multiflorum*, *polycarpum*, *pulchrum*, *pumilum*, *serratifolium*, *squarrososum*, *Wallichii*, *Wightianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 105 = *homonyma omnia* Ochnae.
andravinese, Kuntze, l. c. 105 = *O. andravinese*, Baill.
ardisioides, Kuntze, l. c. = *O. ardisioides*, Webb.
Bernieri, Kuntze, l. c. = *O. Bernieri*, Baill.
Boivinianum, Kuntze, l. c. = *O. Boiviniana*, Baill.
brachypodum, Kuntze, l. c. = *O. brachypoda*, Baill.
comorensis, Kuntze, l. c. = *O. comorensis*, Baill.
fascicularis, Kuntze, l. c. = *O. fascicularis*, Blanco.
Humboldtianum, Kuntze, l. c. = *O. Humboldtiana*, Baill.
macranthum, Kuntze, l. c. = *O. macrantha*, Baker.
micropetalum, Kuntze, l. c. = *O. micropetala*, Hochst.

DIPORIDIUM : —
obovatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 105 = *O. obovata*, Baill.
parvifolium, Kuntze, l. c. = *O. parvifolia*, Baker.
Pervilleanum, Kuntze, l. c. = *O. Pervilleana*, Baill.
quangense, Kuntze, l. c. = *O. quangensis*, R. Buett. n.
vaccinoides, Kuntze, l. c. = *O. vaccinioides*, Baker.

DIPSACUS, Linn. (Dipsac.). — Ind. Kew. i. 775.
chinensis, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 377. — China.

DIPTERYGIA, Presl = **Asteriscium**, Cham. et Schlecht (Umbellif.).
armocarpa, *chilensis*, *flexuosa*, *polycephala*, *ramosissima*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 267 = *homonyma omnia* Asteriscii.
anthodes, Kuntze, l. c. = *A. anethoides*, Turcz.
Closii, Kuntze, l. c. = *A. chilense*, Cham. et Schlecht.
foliosa, Kuntze, l. c. (= *Gymnophyton foliosum*, Phil.). — Chili.
Hemsleyana, Kuntze, l. c. = *A. flexuosum*, Hemsl.
Kingii, Kuntze, l. c. (= *Gymnophyton Kingi*, Phil.). — Chili.
nuda, Kuntze, l. c. (= *Tritanenum nudum*, Jurcz.). — Chili.
Philippiana, Kuntze, l. c. (= *Eremocharis fruticosa*, Phil.). — Chili.
pozzodes, Kuntze, l. c. = *A. pozzoides*, Clos.
spinescens, Kuntze, l. c. (= *Gymnophyton spinescens*, Phil.). — Chili.
spinosissima, Kuntze, l. c. (= *Gymnophyton spinosissimum*, Phil.). — Chili.
verrucosa, Kuntze, l. c. = *A. chilense*, Cham. et Schlecht.

DIRICHLETIA, Klotzsch (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 777.
asperula, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 378. — Afr. trop. or.

DISCOSPERMUM, Dalz. = **Diplospora**, DC. (Rubiace.).
confusum, *Griffithii*, *javanicum*, *malaccense*, *pubescens*, *singulare*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 281 = *homonyma omnia* Diplospora.
biloculare, Kuntze, l. c. = *Dipl. Kurzii*, Hook. f.
dubium, Kuntze, l. c. = *Dipl. viridiflora*, DC.
fruticosum, Kuntze, l. c. = *Dipl. fruticosa*, Hemsl.
parvifolium, Kuntze, l. c. 280 = *Dipl. parvifolia*, Kuntze.

DIPTEROCARPUS, Gaertn. (Dipteroc.). — Ind. Kew. i. 776.
affinis, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 31. — Ins. Philipp.
artocarpifolius, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Fr. (1886) 297. nomen; et Fl. For. Cochinch. fasc. 14 (1889) t. 213 A. — Cochinch.
bancanus, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 196. — Ins. Bangka.
Bourdillonii, Brandis, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2403. — Travanc.
cancanus, « Burck. », ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 31, sphalm. = *bancanus*, Burck.
condorensis, Pierre, Fl. Fr. Cochinch., fasc. 14 (1889) t. 244 c. — Cochinch.
Duperreana, Pierre, ex Laness. Pl. util. Col. Fr. (1886) 297; et Fl. For. Cochinch. fasc. 14 (1889) t. 219. — Cochinch.
Dyeri, Pierre, ll. cc. 297; et t. 216-17. — Cochinch.
Jourdainii, Pierre, ll. cc. 298; et t. 220. — Cochinch.
Kerrii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 93. — Malacca.
Kunstleri, King, l. c. 93. — Perak.
pulcherrimus, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iii. (1893) 283 = *oblongifolius*, Blume.
punctulatus, Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc. 14 (1889) t. 221. — Cochinch.
Scortechinii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 91. — Perak.
Skinneri, King, l. c. — Penang.
speciosus, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxv. (1895) 38. — Ins. Philipp.
Thorelii, Pierre, ex Laness. Pl. util. Col. Fr. (1886) 297, nomen. — Cochinch.

DIPTEROCARPUS : —

velutinus, Vidal, *Pl. vasc. Filip.* (1886) 59. — Ins. Philipp.
Warburgii, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 32. — Ins. Philipp.

DIPTERONIA, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1898. *SAPINDACEAE*.
sinensis, Oliver, l. c. — China.

DIRICHLETIA, Klotzsch (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 777.

insignis, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 30 fig. 8. — [an *D. insignis*, Vatke?] — Madag.

involuta, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 482. — Madag.

leucophlebia, Baker, l. c. xxv. (1890) 321. — Madag.

sphaerocephala, Baker, l. c. — Madag.

ternitolia, Baker, l. c. xxii. (1887) 482. — Madag.

trichophlebia, Baker, l. c. 483. — Madag.

DISA, Berg (Orchid.). — Ind. Kew. i. 777.

apetala, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 21; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 153. — Afr. trop. or.

basutorum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 17. — Afr. austr.

Baurii, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 174 fig. 12. Afr. austr.

bivalvata, Th. Dur. et Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* (1892-1895) 100 (= *Ophrys bivalvata*, Linn.) = *D. melaleuca*, Sw.

brevicornis, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 196. (= *Monadenia brevicornis*, Lindl.) — Afr. austr.

caffra, Bolus, l. c. 171. fig. 9 — Afr. austr.

clavigera, Bolus, [Orch. Cape Penins.] in *Trans. South. Afr. phil. Soc. v. i.* (1888) 140; (= *Schizodium clavigerum*, Lindl.) — Afr. austr.

conferta, Bolus, Icon. *Orchid. austro-afric. i. i.* (1893) t. 28. — Afr. austr.

Culveri, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 17. — Afr. austr.

delphinoides, Haw. ex Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 39 = aconitoides, Sond.

densiflora, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 197 (= *Monadenia densiflora*, Lindl.) — Afr. austr.

Emini, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 248. — Afr. trop. or.

erubescens, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 297. — Afr. trop. or.

falcata, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 46. — Afr. austr.

fallax, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 64. — Madag.

fragrans, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 50 (1895) 40. — Afr. austr.

frigida, Schlechter, l. c. 18. — Afr. austr.

Gregoriana, Rendle, in *Journ. Bot.* xxx. (1895) 398. — Afr. trop. or.

Gueinzii, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 201 (= *Schizodium Gueinzii*, Reichb. f.) — Afr. austr.

hamatopetala, Rendle, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 47. — Afr. trop.

kewensis, Hort. ex W. Wats. in *Gard. Chron.* (1893) i. 625; et (1895) ii. 273 fig. 51. — Hybr. artef.

kilimanjarica, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 399. — Afr. trop. or.

Langleyensis, Hort. ex Gard. *Chron.* (1894) ii. 35 fig. 5. — Hybr. artef.

longipetala, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 201 (= *Schizodium longipetalum*, Lindl.) — Afr. austr.

macrostachya, Bolus, l. c. 197 (= *Monadenia macrostachya*, Lindl.) — Afr. austr.

micrantha, Bolus, [Orch. Cape Penins.] in *Trans. South Afr. phil. Soc. v. i.* (1888) 142, et l. c. 196 (= *Monadenia micrantha*, Lindl.) — Afr. austr.

micropetala, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 7. — Afr. austr.

multiflora, Bolus, [Orch. Cape Penins.] in *Trans. South Afr. phil. Soc. v. i.* (1888) 140; et in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 196 (= *Monadenia multiflora*, Lindl.) — Afr. austr.

DISA : —

obliqua, Bolus, in *Trans. South Afr. phil. Soc. v. i.* (1888) 162; et in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 201 (= *Schizodium obliquum*, Lindl.) — Afr. austr.

Oliveriana, Reichb. f. in *Flora*, lxxix. (1886) 547. — Hab. ?

ophrydea, Bolus, [Orch. Cape Penins.] in *Trans. South. Afr. phil. Soc. v. i.* (1888) 142; et in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 196 (= *Monadenia ophrydea*, Lindl.) — Afr. austr.

oreophila, Bolus, l. c. xxv. (1889) 170 fig. 8. — Afr. austr.

Papilio, Th. Dur. et Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1892 (1895) 105 (= *Penthea Papilio*, Lindl.) — Afr. austr.

Preussii, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 64. — Kamerun.

rodantha, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 50 (1895) 40. — Transv.

sabulosa, Bolus, Icon. *Orchid. Austro-Afr. i. i.* (1893) t. 27. — Afr. austr.

saxicola, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 41. — Afr. austr.

Stairsii, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 728. — Afr. trop. or.

stenoglossa, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 173 fig. 11. — Natal.

tripetaloides, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1889) i. 360 (= *Orchis tripetaloides*, Linn. f.) — Afr. austr.

Tysoni, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 172 fig. 10. — Afr. austr.

Vasselotii, Bolus, ex Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 47 nomen. — Afr. austr.

Veitchii, Hort. ex Gard. and For. iv. (1891) 305; The Garden, xlii. (1892) 408 t. 882; Gard. Chron. (1894) ii. 93. — Hybr. artef.

Wissmannii, Kränzl. in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) ii; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 154. = Gregoriana, Rendle.

zombaensis, Rendle, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 47. — Afr. trop.

DISCHIDIA, R. Br. (Asclepiad.). Ind. Kew. i. 778.

antennifera, Becc. *Malesia*, ii. (1886) 270 t. 63, fig. 8-12. — Borneo.

borneensis, Becc. l. c. 262. t. 47 fig. 7-12. — Borneo.

digitiformis, Becc. l. c. 265. — Ins. Celeb.

ericaeiflora, Becc. l. c. 266. t. 63 fig. 18-20. — Borneo.

Hellwigii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 205. — Oceania.

imbricata, Warb. l. c. 206 in obs. (= *Conchophyllum imbricatum*, Blume) = *D. Collyria*, Wall.

kutschinensis, « Becc. » ex K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 288. = seq.

kutcinensis, Becc. *Malesia*, ii. (1886). 266. — Borneo.

longiflora, Becc. l. c. 263 t. 62 fig. 1-6. — Ins. Molucc.

longifolia, Becc. l. c. 271. — N. Guin.

merguensis, Becc. l. c. 266. — Mergui.

micrantha, Becc. l. c. 270. — Borneo, Sumatra.

Milnei, Hemsl. in *Ann. of Bot.* v. (1891) 506; et in *Kew Bull.* (1895) 137. — Ins. Solom.

papuana, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 205. — Oceania.

pedunculata, Warb. l. c. 206. — Oceania.

retusa, Becc. *Malesia*, ii. (1886) 270. — Ins. Kei.

ruscifolia, Decne, ex Becc. l. c. 272. — Ins. Philipp.

soromensis, Becc. l. c. 271. — N. Guin.

squamulosa, Becc. l. c. 266. — Borneo.

DISCHISTOCALYX, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) = **Distichocalyx**, T. Anders. (Acanth.).

bignoniiflorus, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 307. = *Ruellia bignoniaceiflora*, S. Moore.

Buchholzii, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 14. — Afr. trop. occ.

confertiflorus, Lindau, l. c. 13. — Afr. trop. or.

laxiflorus, Lindau, l. c. 13. — Afr. trop. or.

DISCOCACTUS, Pfeiff. (Cact.). — Ind. Kew. i. 779.

alteolens, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1894) 190 in obs. = *alteolens*, Lem.

placentiformis, K. Schum. l. c. = insignis, Pfeiff.

DISCOLOBIUM, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 778.

junceum, M. Micheli, in *Mém. Soc. scienc. phys. Genève*, xxx. (1889) n. 7, 80 tab. 24. — Parag.

DISCOLUMA, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 290. *SAPOTACEAE*.

Gardneri, Baill. l. c. (= *Chrysophyllum Gardneri*, Mart. et Eichl.). — Bras.

DISCOUPLEURA, DC. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 779.

major, Britt. Stern et Pogg. *Prel. Cat.* (1888) 22 = capillacea, DC.

DISEPALUM, Hook. f. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 779.

longipes, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 69. — As. trop.

DISOXYLUM, Blume (Meliac.). — Ind. Kew. i. 806.

andamanicum, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 49. — Ins. Andam.

angustifolium, King, l. c. 39. — Pahang.

Baillonii, Pierre ex Laness. *Pl. util. Col. Franç.* (1886) 309. — Cochinch.

dumosum, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 39. — Perak.

interruptum, King, l. c. 40. — Perak.

Loureiirii, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Col. Franç.* (1886) 309. — Cochinch.

megalanthum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 211 t. 9. — Ins. Pacif.

microbotrys, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 47. — Ins. Andam. et Nicobar.

papillosum, King, l. c. 50. — Perak.

racemosum, King, l. c. 47. — Ins. Andam. et Nicobar.

rugulosum, King, l. c. 49. — Perak.

turbinatum, King, l. c. 43. — Perak.

venulosum, King, l. c. 42. — Perak.

DISPERIS, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 780.

circumflexa, Th. Dur. et Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1892 (1895) 118 = secunda, Sw.

concinna, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 43. — Afr. austr.

disaeformis, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 47. — Afr. austr.

gracilis, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 44. — Afr. austr.

guttata, Frappier, ex Cordem. *Fl. Ile Réunion*. (1895) 255. — Ins. Bourbon.

Johnstoni, Reichb. f. ex Oliver, in *H. Johnston, The Kilim. Exped.*, Append. (1886) 346 nomen; et in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1887) 349. — Afr. trop. or.

kilimanjarica, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 400 t. 32 fig. 8-10. — Afr. trop. or.

nemorosa, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 297. — Afr. trop. or. germ.

stenoglossa, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 19. — Afr. austr.

Thornecrofti, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

DISPORUM, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 780.

chinense, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 708 = pullum, Salisb.

Hookeri, Britton, in *Bull. Torr. Bot. Club*, xv. (1888) 188 = Hookeri, Nichols.

lanuginosum, Britton, l. c. = lanuginosum, Nichols.

latipetalum, Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 139. — Burma.

maculatum, Britton, in *Bull. Torr. Bot. Club*, xv. (1888) 188 (= *Prosartes maculata*, A. Gray).

— Am. bor.

majus, Britton, l. c. 188 (= *P. oregana*, S. Wats.)

— Am. bor. occ.

DISPORUM : —

Menziesii, Britton, in Bull. Torr. Bot. Club, xv. (1888) 188 = *Menziesii*, Nichols.
parvifolium, Britton, l. c. (= *Prosartes parvifolia*, S. Wats.). — Calif.
trachyanthum, Britton, l. c. = *lanuginosum*, Nichols.

DISSANTHELIUM, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 780.
Bourgaei, Fourn. Gramin. Mexic. 1881 (1886) 113. — Mexic.

DISSOCHAETA, Blume (Melastom.). — Ind. Kew. i. 780.
Beccariana, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 559. — Borneo.
marumoides, Cogn. l. c. 556. — Sumatra.
montana, Cogn. l. c. 558. — Sumatra.
quintuplinervis, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. II. (1890) 533; et l. c. 556. = *Hederella quintuplinervis*, Stapf.
Schumannii, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 563; et in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Willh. Land. 88. — N. Guin.

DISSOCHONDROS, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 770 = **Setaria**, Beauv. (Gramin.).
bifidus, Kuntze, l. c. [sphalm. ?] = *S. biflora*, Hillebr.

DISSOTIS, Benth. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 781.
alpestris, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 295. — Afr. trop. or.
angolensis, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 371. — Angola.
Autraniana, Cogn. l. c. vii. (1891) 1180 (Append.). — Congo.
Brazzaei, Cogn. l. c. 372. — Congo gall.
Candolleana, Cogn. l. c. 373. — Angola.
crenulata, Cogn. l. c. 376. — Angola.
cryptantha, Baker, in Kew Bull. (1894) 345. — Afr. trop. or.
gracilis, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 366. — Angola.
Hensii, Cogn. l. c. 372. — Congo.
Johnstoniana, Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 14. — Afr. trop.
lanceolata, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 366. — Angola.
longicaudata, Cogn. l. c. 373. — Angola.
Sizenandi, Cogn. in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 88. — Afr. centr. austr.
speciosa, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 295. — Afr. trop. or.
Thollonii, Cogn. ex Büttn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 96; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 373. — Congo gall.
tristemoides, Cogn. l. c. 370. — Afr. trop. occ.
Welwitschii, Cogn. l. c. 371. — Angola.

DISTASIS, DC. = **Chaetopappa**, DC. (Compos.).
asteroides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 334 = *C. asteroides*, DC.
Parryi, Kuntze, l. c. = *C. Parryi*, A. Gray.

DISTEGANTHUS, Lem. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 781.
Moensi, Hort. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1888 ?) 693 in syn. = *Cryptanthus Morrenianus*, Regel.

DISTEGIA, Rafn. = **Lonicera**, Linn. (Caprifol.).
Ledebourii, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 164 = *L. Ledebourii*, Eschs.

DISTERIGMA, Niedenzu, ex Drude, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 1. (1889) 52; et in Bot. Jahrb. xi. (1896) 209 = **Vaccinium**, Linn.
acuminatum, Niedenzu, l. c. 209 = *V. acuminatum*, H. B. et K.
agathosmoides, Niedenzu, l. c. 224 = *V. agathosmoides*, Willd.

DISTERIGMA : —

cuspidatum, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1896) 220 = *V. cuspidatum*, Planch.
dendrophilum, Niedenzu, l. c. = *V. dendrophilum*, Benth.
empetrifolium, Niedenzu, ex Drude, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 1. (1889) 52 = *V. empetrifolium*, H. B. et K.
epacridifolium, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1896) 210 = *V. epacridifolium*, Benth.
Humboldtii, Niedenzu, l. c. 224 = *V. Humboldtii*, Klotzsch.
penaeoides, Niedenzu, l. c. 210 = *V. penaeoides*, H. B. et K.
pernettyoides, Niedenzu, l. c. 224 = *V. pernettyoides*, Griseb.
staphelioides, Niedenzu, l. c. 210 = *V. staphelioides*, Planch.
terniflorum, Niedenzu, l. c. 224 = *V. terniflorum*, Dunal.

DISTIACANTHUS, Baker, Handb. Bromel. (1889) 18. **BROMELIACEAE**.
Morrenianus, Baker, l. c. 14 (= *Cryptanthus Morrenianus*, Regel) — Peruvia.
scarlatinus, Hort. Linden, ex Baker, l. c. (= *Bromelia scarlatina*, Ed. Morr.). — Am. austr.

DISTICHLIS, Rafn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 782.
humilis, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 86. — Chili.
marginata, Phil. l. c. — Chili.
miseria, Phil. l. c. — Chili.
spicata, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vii. (1887) 415 = *maritima*, Rafn.
spicata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 773 = *spicata*, Greene.

DISTICHOCALYX, T. Anders. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 782 [Conf. etiam **DISCHISTOCALYX**, Lindau].

DISTICTIS, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 782.
elongata, Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 218 = *Bignonia elongata*, Vahl.
Mansoana, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 35. — Bras.
Mansoana, Bureau, in Vid. Meddel. naturh. Forer. Kjöeb. (1892-3) 422; et l. c. (1894) 218 = *praec. Rovirosana*, f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 7. — Am. centr.

DISTIGOCARPUS, Sarg. in Gard. & For. vi. (1893) 364, sphalm. = **DISTEGOCARPUS**; Sieb. et Zucc. = **Carpinus**, Linn. (Cupul.).

DISTOECHA, Phil. in Ann. Mus. Nac. Chile. (1891) 36. **COMPOSITAE**.
taraxacoides, Phil. l. c. t. 2 fig. 2. — Chili.

DISTYLIUM, Sieb. et Zucc. (Hamamel.). — Ind. Kew. i. 782.
stellare, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 233. — Java.

DITASSA, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 782.
humilis, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 163. — Parag.
rotundifolia, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 255 in obs.; et Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 242 = *Husnotia rotundifolia*, Fourn.
tassadioides, Schlechter, in Oest. Bot. Zeitsch. xlv. (1895) 451. — Bolivia.

DITAXIS, Vahl = **Argythamnia**, Sw. (Euphorb.).
aphoroides, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 45 = *A. aphoroides*, Muell. Arg.
Blodgettii, Pax, l. c. (= *Aphora Blodgettii*, Torr.). — Florida.
catamarcensis, Pax, l. c. = *A. catamarcensis*, Hieron.
humilis, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 45 = *A. humilis*, Muell. Arg.
mercurialina, Coulter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 213 = *A. mercurialina*, Muell. Arg.

DITAXIS : —

montevidensis, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 45 = *A. montevidensis*, Muell. Arg.

DITHECINA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii (1895) 489 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
Balansae, Van Tiegh. l. c. — Tonk.
coccinea, Van Tiegh. = *L. coccineus*, Jack.
ligustrina, Van Tiegh. l. c. = *L. ligustrinus*, Wall.
racemifera, Van Tiegh. l. c. = *L. coccineus*, Jack.
terrestris, Van Tiegh. l. c. = *L. terrestris*, Hook. f.

DIURIS, Sm. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 783.
bracteata, Fitzg. Austral. Orchids, ii, iv, (1891). Austral.
cuneata, Fitzg. l. c. — Austral.
platichilus, Fitzg. l. c. — Austral.
Sheaffiana, Fitzg. l. c. — Austral.
spatulata, Fitzg. l. c. — Austral.

DIZYGOSTEMON, Radlk. ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 74. **SCROPHULARINEAE**.
floribundum, Radlk. l. c. (= *Beyrichia floribunda*, Benth.). — Bras.

DIZYGOTHECA, N. E. Br. in Kew Bull. (1892) 197. **ARALICEAE**.
leptophylla, Hemsl. l. c. (1893) 156 (= *Aralia leptophylla*, Veitch.) — Hab. ?
Nilsonii, N. E. Br. l. c. (1892) 197; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2323. — N. Caled. ?
Reginae, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 181. — N. Caled.

DOBINEA, Buch.-Ham. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 783.
Delavayi, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1890) 835. (= *Podoon Delavayi*, Baill.) — China.
Delavayi, Radlk. in Sitz. math.-phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 339 in obs. (= *Podoon Delavayi*, Baill.) — China.

DODECADENIA, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. i. 784.
Griffithii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 181. — Reg. Himal.
paniculata, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.

DODECATHEON, Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 784.
alpinum, Greene, in Erythea, iii. (1895) 39 (= *D. Jeffreyi*, Coult.). — Calif.
Clevelandii, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 213. — Calif.
conjugens, Greene, in Erythea, iii. (1895) 40. — Am. bor. occ.
crenatum, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 74. — Washington.
cruciatum, Greene, l. c. i. (June 1888) 213. — Calif.
cruciferum, K. Brandeg. in Zoë, i. (1890) 18, 20 sphalm. = *cruciatum*, Greene.
Cusickii, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 73. — Am. bor. occ.
glastifolium, Greene, in Erythea, iii. (1895) 71. — Calif.
Hendersonii, A. Gray, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 233. — Washington.
Media, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 209, sphalm. = *D. Meadia*, Linn.
patulum, Greene, l. c. 211. — Am. bor. occ.
pauciflorum, Greene, l. c. ii. (May 1890) 72 = *D. Meadia*, Linn. var.
radicatum, Greene, in Erythea, iii. (1895) 37. — Am. bor. occ.
splendidum, Hort. ex Wien. Gart. Mag. (1888) 205-06 fig. 44 = *D. Meadia*, Linn.
tetrandrum, Suksdorf, ex Greene, in Erythea, iii. (1895) 40. — Am. bor. occ.
viviparum, Greene, in Erythea, iii. (1895) 38 (= *D. crenatum*, Greene). — Am. bor. occ.

DODONAEA, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 784.
Hansenii, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Oct. 1891) 93. — Austral.

DODONAEA : —

- pachyneura, F. Muell. in *Trans. et Proc. Roy. Soc. Vict.* xxi. (April 1887) 51. — Austral.
petiolaris, F. Muell. *Pl. coll. Capric.* (1886) 2. — Austral. occ.
stenoptera, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 88. — Ins. Sandvic.

DOELLOCHLOA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 773 = **Monochaete**, Doell (Gramin.).
fastigiata, Kuntze, l. c. = *M. fastigiata*, Doell.

DOLIA, Lindl. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 785.
albescens, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 44. [an seq. ?] — Chili.
albescens, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 4. — Chili.
canescens, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 46. — Chili.
eremobia, Phil. l. c. 45. — Chili.
foliosa, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 68. — Am. austr. occ.
incana, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 4 (= *Alibrexia incana*, Phil.). — Chili.
grandiflora, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 44. — Chili.
hirsutula, Phil. l. c. 46. — Chili.
macrocalyx, Phil. l. c. 45. — Chili.
puberula, Phil. l. c. 43. — Chili.
tarapacana, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile*, (1892) 68. — Chili.

DOLICHANDRONE, Fenzl (Bignon.). — Ind. Kew. i. 785.

- atrovirens, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1894) 240. = *falcata*, Seem.
Hildebrandtii, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 31. — Afr. or.
hirsuta, Baker, l. c. — Zambes.
latifolia, Baker, l. c. — Afr. trop. or.
longissima, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1894) 240. = *D. Rheedii*, Seem.
obtusifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 31. — Afr. trop. or.
platycalyx, Baker, l. c. 30. — Afr. or.
Smithii, Baker, l. c. — Zambes.
spathacea, K. Schum. *Fl. Kais. Wilh. Land*, (1889) 123 = *D. Rheedii*, Seem.

DOLICHOGYNE, DC. = **Nardophyllum**, Hook. (Compos.).
glabra, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 39. — Chili.

DOLICHOS, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 785.

- Eminiana, Taub. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 383. — Afr. centr. or.
pratensis, Taub. l. c. = *D. Chloryllis*, Harv.
erectus, Baker f. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 10. — Afr. trop.
kilimandscharicus, Taub. in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47. (1894) 32. — Afr. trop. or.
lupinoides, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 66. — Afr. centr. or.
maranguensis, Taub. ex *Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 271; et (1894) 59. — Afr. trop. or.
monophyllus, Taub. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 383; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 224. — Afr. trop. or.
pratensis, Taub. l. c. iii. 3. (1894) 383. = *D. Chloryllis*, Harv.
platypus, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 289. — Afr. centr. austro-or.
pteropus, Baker, l. c. 66. — Afr. centr. or.
Schweinfurthii, Taub. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 383. — Afr. centr. or.
simplicifolius, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1893) t. 7318. — Afr. trop. or.
Volkensii, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 224. — Afr. trop. or.

DOLICHOS : —

- xiphophyllus, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 66. — Afr. centr. or.

DOLIOCARPUS, Roland, (Dilleniace.). — Ind. Kew. i. 787.

- calineoides, Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 114 (= *Pinzana calineoides* Eichl.). — Bras.
castaneifolius, Gilg, l. c. 115 = *grandiflorus*, Eichl.
coriacea, Gilg, l. c. 114. = *Pinzana coriacea*, Mart. et Zucc.
Eichlerianus, Gilg, l. c. = *castaneifolius*, Mart.
guyanensis, Gilg, l. c. = *D. Soramia*, DC.
oaxacanus, Szyszyl. in *Diss. math. nat. Acad. litt. Cracov.* xxvii (1894) 139. — Mexic.
scandens, Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1893) 114 = *D. Calinea*, J. F. Gmel.

DOMBEYA, Cav. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 787.
acerifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 449. — Madag.

- arabica, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 315. — Arabia.
australis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 8. — Madag.
Baroni, Baker, l. c. xxii. (1887) 450. — Madag.
biumbellata, Baker, l. c. — Madag.
blattiolens, Frappier, ex *Cordem. Fl. Ile Réunion*. (1895) 311. — Ins. Borbon.
botryoides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 298. — Madag.
Buettneri, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 133. — Afr. trop. occ.
ciliata, *Cordem. Fl. Ile Réunion*. (1895) 312. — Ins. Borbon.
cincinnata, K. Schum. ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 24, 25 et 36; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 271. — Afr. trop. or.
crassipes, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1888) t. 73. — Madag.
elegans, *Cordem. Fl. Ile Réunion*. (1895) 310. — Ins. Borbon.

- Frappierana, *Cordem. l. c.* 312. — Ins. Borbon.
gemina, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 297. — Madag.
Gilgiana, K. Schum. ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 24, 25 et 36 nomen.; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 270. — Afr. or.
hirsuta, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1890) 78 = *Schimperiana*, Rich.
insignis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 450. — Madag.
lancea, Frappier, ex *Cordem. Fl. Ile Réunion*. (1895) 313. — Ins. Borbon.

- Lastii, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 270. — Afr. trop. or.
leucoderma, K. Schum. l. c. 270. — Afr. trop. or.
lucubensis « Baill. » ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 76 = *loucoubensis*, Baill.
megaphylla, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 449. — Madag.
obovata, *Cordem. Fl. Ile Réunion*. (1895) 313. — Ins. Borbon.
orbicularis, *Cordem. l. c.* 315. — Ins. Borbon.
pedunculata, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 269. — Afr. trop. or.
pilosa, *Cordem. Fl. Ile Réunion*. (1895) 312. — Ins. Borbon.
pulchra, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 142. — Transv.
reclinata, *Cordem. Fl. Ile Réunion*. (1895) 315. — Ins. Borbon.
Richardi, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1888) t. 75. — Madag.
Richardiana, *Cordem. Fl. Ile Réunion*. (1895) 318. — Ins. Borbon.
scabrida, *Cordem. l. c.* 315. — Ins. Borbon.
Thouarsii, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1888) t. 77. — Madag.
viburnoides, *Cordem. Fl. Ile Réunion*. (1895) 309 (= *Assonia viburnoides*, DC.). — Ins. Borbon.
xiphosepala, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 298. — Madag.

DONAX, Lour. = **Clinogyne**, Salisb. (Scitam).
arillata, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 438. — Kamerun.
azuwea, K. Schum. l. c. 434. — Afr. trop.
Blumei, K. Schum. l. c. 435 in obs. — Hab. ?
canniformis, K. Schum. l. c. 440 in obs. = *Thalia canniformis*, Forst.
comorensis, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1895) 1200 = *Marantochloa comorensis*, Brongn.
congensis, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893). — Congo.
cuspidata, K. Schum. l. c. 440 in obs. = *Maranta cuspidata*, Rosc.
filipes, K. Schum. l. c. 436 in obs. = *Clinogyne filipes*, Benth.
gracilis, K. Schum. l. c. 440 in obs. = *C. gracilis*, Benth. et Hook. f.
leucantha, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 436. — Kamerun.
oligantha, K. Schum. l. c. 435. — Gabon.
purpurea, K. Schum. l. c. 440 in obs. = *Clinogyne purpurea*, Ridl.
Schweinfurthiana, K. Schum. l. c. 437. — Afr. trop.
virgata, K. Schum. l. c. 440 in obs. = *Maranta virgata*, Wall.
ugandensis, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 150. — Afr. trop. or.

DONELLA, Pierre, ex Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 294. — **SAPOTACEAE**.

DONIOPHYTUM, Wedd. (Compos.). — Ind. Kew. i. 788.
anomalum, Kurtz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1894) 108 = *Chuquiraga anomala*, D. Don. —

DONNELLSMITHIA, Coult. et Rose, in Coult. *Bot. Gaz.* xv. (1890) 15. **UMBELLIFERAE**.
guatemalensis, Coult. et Rose, l. c. t. 2. — Guatem.

DONTOSTEMON, Andr. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 789.
elegans, Maxim. *Enum. Pl. Mongol.* (1889) 57. — Mongol.

DOONA, Thev. (Dipteroc.). — Ind. Kew. i. 789.
disticha, Heim, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 153; et *Rech. Diptéroc.* (1892) 72 = seq.
disticha, Pierre., *Fl. For. Cochinch.* (1890) sub t. 237 in obs. = *Vatica disticha*, A. DC.
javanica, Burck, in *Ann. Jard. Buit.* vi. (1887) 235 t. 29 fig. 7. — Java.
micrantha, Burck, l. c. 234. (= *Petalandra micrantha*, Hassk.). — Java, Sumatra.
multiflora, Burck, l. c. 231 = *Hopea multiflora*, Brandis.
nitida, Heim, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 153; et *Rech. Diptéroc.* (1892) 72 = *Vateria nitida*, Thw.
odorata, Burck, in *Ann. Jard. Buit.* vi. (1887) 233 = *Hopea odorata*, Roxb.

DOPATRIUM, Buch.-Ham. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 789.
nanum, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 94. — Afr. trop. occ.
Schweinfurthii, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 75. — Afr. trop.
tricolor, Wettst. l. c. — Afr. trop.

DOREMA, D. Don (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 789.
serratum, Aitch. et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 70. — Afghan.

DORITIS, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 789.
Braceana, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 196 in obs. — Reg. Himal.

DORONICUM, Tourn. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 789.
atlanticum, Chab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 385 in syn. = *D. Pardalianches*, Linn.
atlanticum, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 187 [an praec. ?] — Algeria.

DORONICUM : —

- Halacsyi*, × Eichenfeld, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 10. — Austria.
macrolepis, Freyn et Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 351. — Armen.
filosum, Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 322 = *cordatum*, Wulf.
Tournefortii, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 186. — Lusit.

DORSTENIA, Plum. ex Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 790.

- bicuspid*, « Schweinf. » ex Bureau, in Bull. Mus. Paris. iii. (1895) 62, sphalm. = *bicornis*, Schweinf. Buchanan, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 142. — Afr. trop. or.
caulescens, Schweinf. ex Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894). Afr. centr. bor.
choconiana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 477. — Guatem.
crispata, S. Wats. l. c. 452. — Mexic.
debilis, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 294 c. — Madag.
Dinklagei, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 143. — Afr. trop. occ.
Hildebrandtii, Engl. l. c. 146. — Afr. aequat. or.
Holstii, Engl. l. c. 145. — Afr. trop. or.
Humboldtiana, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 294 b. — Madag.
kameruniana, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 142. — Afr. trop. occ.
Massoni, Bureau, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 70. — Gabon.
mungensis, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 145. — Afr. trop. occ.
ophiocomma, K. Schum. ex Engl. l. c. — Afr. trop. occ.
palmata, Engl. l. c. 146. — Afr. centr. bor.
Pogei, Engl. l. c. — Congo.
poinsettifolia, Engl. l. c. 142. — Afr. trop. occ.
Preussii, Engl. l. c. 143. — Sierra-Leone.
prorepens, Engl. l. c. 144. — Afr. trop. occ.
Richardi, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1888) t. 75. — Madag.
scabra, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 142. — Afr. trop. occ.
scaphigera, Bureau, in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 60. — Congo Gall.
Telekii, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 190 nomen; et in Hoeknel, Zum Rudolph See (1892) App. 4. — Afr. trop. or.
ulugurensis, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92 nomen. — Afr. trop. or.
Volkensii, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 143. — Afr. trop. or.
Walleri, Hemsl. in Gard. Chron. (1893) ii. 178. — Afr. trop.
zanzibarica, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1581. — Ins. Zanzib.

DORTMANNIA Linn. = **Lobelia**, Plum. (Campanul.).

- acuminata*, *acutidens*, *alpina*, *amoena*, *amygdalina*, *anceps*, *appendiculata*, *aquatica*, *assurgens*, *Bergiana*, *Berlandieri*, *Boivinii*, *Boykinii*, *brevifolia*, *Breyneii*, *Bridgesii*, *camporum*, *Canbyi*, *capillifolia*, *cardinalis*, *chinensis*, *chirensis*, *cirsifolia*, *Cliffortiana*, *collina*, *colorata*, *columnaris*, *concolor*, *conglobata*, *cordigera*, *coronopifolia*, *corymbosa*, *Cymbalaria*, *decipiens*, *Deckenii*, *decurrens*, *dentata*, *depressa*, *divaricata*, *diversifolia*, *Dregeana*, *Eckloniana*, *Ehrenbergii*, *ensiformis*, *erecta*, *Erinus*, *fastigiata*, *Feayana*, *fendralis*, *ferrens*, *fistulosa*, *fulgens*, *Gardneriana*, *Gaudichaudii*, *Ghiesbreghtii*, *Gibberoa*, *gibbosa*, *glandulosa*, *gracilis*, *graminea*, *Griffithii*, *gruma*, *Haenkeana*, *heterophylla*, *hirsuta*, *hyssopifolia*, *inconspicua*, *infesta*, *inflata*, *longifolia*, *loxensis*, *Lucaeana*, *Ludoviciana*, *macrostachys*, *madagascariensis*, *Melleri*, *membranacea*, *microsperma*, *minutiflora*, *mishmica*, *modesta*, *mollis*, *monticola*, *mucronata*, *nana*, *neglecta*, *nerifolia*, *Nuttallii*, *Orizabae*, *parviflora*, *patula*, *pauciflora*, *phyllostachya*, *pinifolia*, *polyphylla*, *puberula*, *pubescens*, *pulchella*, *purpurascens*, *purpurea*, *pusilla*, *pyramidalis*, *quadrangularis*, *racemosa*, *radicans*, *reticulata*, *retrorsa*, *rhomboifolia*, *rhytidosperma*, *robusta*, *rosea*, *rotundifolia*, *Roughii*, *rupestris*, *Sartorii*,

DORTMANNIA : —

- scaevolifolia*, *Schimperi*, *senegalensis*, *sessilifolia*, *setacea*, *sonchifolia*, *spicata*, *stenophylla*, *stricta*, *subnuda*, *subpubera*, *succulenta*, *syphilitica*, *tenera*, *tenuior*, *tomentosa*, *trigona*, *trigonocaulis*, *trinitensis*, *triquetra*, *trullifolia*, *Tupa*, *wens*, *vagans*, *valdiviana*, *Warczewiczii*, *zeylanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 379-80 et 972-73 = *homonyma omnia* Lobeliae.
alsinodes, Kuntze l. c. 972 = *L. alsinoides*, Lam.
arguta, Kuntze, l. c. = *Siphocampylus giganteus*, G. Don.
Berteri, Kuntze, l. c. = *L. serrata*, Meyen.
Besseriana, Kuntze, l. c. = *L. polyphylla*, Hook.
blanda, Kuntze, l. c. (= *Tupa blanda*, D. Don). — Chili.
bracteosa, Kuntze, l. c. = *L. polyphylla*, Hook.
Browniana, Kuntze, l. c. = *L. gibbosa*, Labill.
campanulodes, Kuntze, l. c. = *L. radicans*, Thunb.
caudata, Kuntze, l. c. (= *Tupa caudata*, Griseb.). — Ind. occ.
chamaedryfolia, Kuntze, l. c. = *L. chamaedryfolia*, A. DC.
circaeodes, Kuntze, l. c. = *L. circaeoides*, A. DC.
cordata, Kuntze, l. c. 971 = *L. Preslii*, A. DC.
cyphodes, Kuntze, l. c. 972 = *L. cyphoides*, Haw.
digitalifolia, Kuntze, l. c. (= *Tupa digitalifolia*, Griseb.). — Ind. occ.
dioica, Kuntze, l. c. = *L. dioica*, R. Br.
Doniana, Kuntze, l. c. 971 = *L. secunda*, Linn. f.
Engelmanniana, Kuntze, l. c. 972 = *L. mucronata*, Engelm.
ensifolia, Kuntze, l. c. (= *Tupa ensifolia*, A. DC.). — Ins. S. Doming.
erinodes, Kuntze, l. c. = *Laurentia erinoides*, Nichols.
exaltata, Kuntze, l. c. = *Haynaldia exaltata*, Kanitz.
excelsa, Kuntze, l. c. = *L. salicifolia*, Sweet.
filiformis, Kuntze, l. c. = *L. serpens*, Lam.
flavescens, Kuntze, l. c. = *L. conglobata*, Lam.
flexuosa, Kuntze, l. c. = *L. natalensis*, A. DC.
Gattingerii, Kuntze, l. c. = *L. Gattingeri*, A. Gray.
Hartwegii, Kuntze, l. c. = *L. Hartwegi*, Benth.
Hilaireana, Kuntze, l. c. = *Haynaldia Hilaireana*, Kanitz.
humifusa, Kuntze, l. c. = *L. alsinoides*, Lam.
imberbis, Kuntze, l. c. (= *Tupa imberbis*, Griseb.). — Ind. occ.
lavendulacea, Kuntze, l. c. = *L. triquetra*, Linn.
Leschenaultiana, Kuntze, l. c. = *L. excelsa*, Leschen.
linarioides, Kuntze, l. c. = *L. linarioides*, A. DC.
Martagon, Kuntze, l. c. (= *Tupa Martagon*, Griseb.). — Ind. occ.
mexicana, Kuntze, l. c. = *L. flexuosa*, A. DC.
micrantha, Kuntze, l. c. = *L. trigona*, Roxb.
montana, Kuntze, l. c. = *L. Rhynchoptetalum*, Hemsl.
muscodes, Kuntze, l. c. = *L. muscoides*, Cham.
nicotianifolia, Kuntze, l. c. 973. = *L. nicotianae-folia*, Heyne.
nummularioides, Kuntze, l. c. = *L. nummularioides*, Cham.
obovata, Kuntze, l. c. = *L. incana*, Ruiz et Pav.
ocimodes, Kuntze, l. c. = *L. ocimoides*, Kuntze.
organensis, Kuntze, l. c. = *Haynaldia organensis*, Kanitz.
ovata, Kuntze, l. c. (= *Tupa ovata*, G. Don). — Peruv.
persicifolia, Kuntze, l. c. = *L. persicaefolia*, Cav.
Philippiana, Kuntze, l. c. 972. (= *Tupa montana*, Phil.). — Chili.
pratiodes, Kuntze, l. c. 973. = *L. pratiodes*, Benth.
rapunculodes, Kuntze, l. c. = *L. rapunculoides*, H. B. et K.
Reinwardtiana, Kuntze, l. c. = *L. trigona*, Roxb.
Sonderiana, Kuntze, l. c. 972. (= *Mesleria Dregeana*, Sond.). — Afr. austr.
spartioides, Kuntze, l. c. 973. = *L. spartioides*, D. Dietr.
splendens, Kuntze, l. c. = *L. fulgens*, Willd.
subcuneata, Kuntze, l. c. = *L. affinis*, Wall.
subdentata, Kuntze, l. c. = *L. polyphylla*, Hook. et Arn.
subrepens, Kuntze, l. c. = *L. surrepens*, Hook. f.
thapsodea, Kuntze, l. c. = *Haynaldia thapsoides*, Kanitz.

DORTMANNIA : —

- thermalis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 973 = *L. leptocarpa*, Griseb.
trialata, Kuntze, l. c. = *L. trigona*, Roxb.
uranocoma, Kuntze, l. c. 973 = *Haynaldia uranocoma*, Kanitz.
xalapensis, Kuntze, l. c. = *L. Cliffortiana*, Linn.
yuccodes, Kuntze, l. c. = *L. yuccoides*, Hillebr.
DORYALIS « E. Mey. » = **Dovyalis**, E. Mey. (Bixin.)
abyssinica, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 44. = *Aberia abyssinica*, Clos.
caffra, Warb. l. c. 44. = *A. caffra*, Harv. et Sond.
hebecarpa, Warb. l. c. = *A. Gardneri*, Clos.
longispina, Warb. l. c. = *A. longispina*, Harv.
macrocalyx, Warb. l. c. = *A. macrocalyx*, Oliver.
mollis, Warb. l. c. = *A. mollis*, Oliver.
rhamnoides, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 217. (= *Dovyalis rhamnoides* Burch.) = *ziziphoides*, E. Mey.
rotundifolia, Engl. l. c. (= *D. rotundifolia*, Harv.) = *celastroides*, Sond.
tristis, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 44. = *A. mollis*, Sond.
verrucosa, Warb. l. c. = *A. verrucosa*, Hochst.
Zeyheri, Warb. l. c. = *A. Zeyheri*, Sond.

DORYANTHES, Correa (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 791.

- Guilfoylei*, F. M. Bailey, in Australasian of Melbourne (Nov. 1892) cum ic.; et in Dep. Agric. Bot. Bull. vii. (1893) 67; Rev. Hort. (1893) 391. — Austral.
Larkini, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 413. — Austral.

DORYCNIUM, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 791

- hispanicum*, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 15 [sp. collect.]. — Hisp.
ibericum, Hort. ex Kochne, Deutsche Dendrol. (1893) 333 in obs. = *Lotus tenuifolius*, Reichb.

DOWNINGIA, Torr. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 792.

- bicornuta*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. Suppl. (1886) 395. — Calif.
concolor, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 153. — Calif.
insignis, Greene, Pittonia, (May 1890) 80. — Calif.
ornatissima, Greene, l. c. 80. — Calif.
tricolor, Greene, l. c. 79. — Calif.

DRABA, Dill. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 792.

- afghanica*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 55. — Afghan.
alpina, Wormskj. ex Lange, Consp. fl. Groenl. ii. (1887) 247 in syn. = *aurea*, M. Vahl.
amplexicaulis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 403. — China.
aurea, M. Vahl, ex Lange, Consp. Fl. Groenl. ii. (1887) 247. — Groenl.
Beleziana ×, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 198. — Gallia.
Boissierii, Baldacii, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. ii. i. (1894) 115. — Eur. mer., Algeria.
bosniaca, G. Beck, in Ann. naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 75. = *lasiocarpa*, Rochel.
bracteata, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 482. = *Coelonema draboides*, Maxim.
Breweri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii (1888) — Am. bor.
Candollei, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 208 et 210. = *aizoides*, Linn.
claviformis, Fouc. et Rouy, l. c. 225 = *verna*, Linn.
corsica, Stein, in Gartenfl. (1886) 423 (= *D. olympica*, Auct. Ital.). — Cors.
Crockeri, Lemmon, in Bull. Torrey Bot. Club. xvi. (1889) 221. — Calif.
dentata, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 224 = *verna*, Linn.
Doerfleri, Wettst. in Lueres, Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 22 t. 1 fig. 4-8. — Albania.
elegans, Maxim. Enum. pl. Mongol. (1889) 57 t. 7 fig. 1-4. — China.

DRABA : —

- erostra, Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 495. — Graecia.
furcipila, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 224 = verna, Linn.
glabrescens, Rouy et Fouc. l. c. 220 et 228 = verna, Linn.
grandiflora, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VII, xii. (1888) 83. — Japon.
grassensis, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 209 = aizoides, Linn.
hirtella, Rouy et Fouc. l. c. 220 = verna, Linn.
intricatissima, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 5. — Am. austr. occ.
Lacaitae, Boiss. Fl. or. Suppl. (1888) 53. — Graecia.
lanciformis, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 213 = tomentosa, Wahlenb.
Ledebouvi, Rouy et Fouc. l. c. 217 = incana, Linn.
leptophylla, Rouy et Fouc. l. c. 221 et 223 = verna, Linn.
longisiliqua, Schmalh. ex Akinfiew in *Bull. Soc. géogr. Cauc.* (1892) 10; et *Fl. Cauc. centr.* (1894) 69; et in *Ber. deutsch. bot. Ges.* xi (1892) 286 t. 16 fig. 3-6. — Reg. Cauc.
majuscula, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii (1895) 221 = verna, Linn.
Montbretiana, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 33. — Reg. Cauc.
moupinensis, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II, viii. (1886) 200. — China.
nana, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, (1886) 17. — As. Min.
nemorialis, « Linn. » Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II, x. (1887-8) 200 sphalm. = nemorosa, Linn.
ossetica, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 30. — Reg. Cauc.
Palanderiana, Kjellm. *Fanerog. Vest-Eskim. Land*, 45 t. 3. — Am. bor. occ.
Revelieri, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 228 = verna, Linn.
Saffordi, Phil. in *Britton, Fl. Straits Magell.* ex *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 82. — Am. austr.
Schoenleini, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 290, nomen; et xviii (1894) 454. — Chili.
sessilis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 255. — Calif.
Sonorae, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. v. (1886) 63. — Mexic.
subnitens, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 230 = verna, Linn.
subrotunda, Rouy et Fouc., l. c. 228 = verna, Linn.
subsecunda, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 35. — Reg. Cauc.
subsessilis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1888) 255. — Calif.
surculosa, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 401. — Chin. occ.
Toeffleri ×, Stein, in *Gartenfl.* (1886) 424. — Hybr. spont.
virescens, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 230 = verna, Linn.
vulgaris, Rouy et Fouc., l. c. 221 et 224. = verna, Linn.
yunnanensis, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 402. — Yunnan.

DRABOPSIS, C. Koch = **Sisymbrium**, Tourn. (Crucif.).
oronticum, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, (1886) 50. — Persia.

DRACAENA, Vand. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 795.
anerleyensis, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 257. — Hybr. artef.
argenteo-striata, Hort. Bull. Catal. (1888) 8; et ex *Gard. Chron.* (1888) ii. 273. — Ins. Maris austr.
Bakeri, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 60. — Madag.
Barteti ×, Carr. in *Rev. Hort. Belg.* lvi. (1886) 178. Hybr. artef.
Bergmani ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 257. — Hybr. artef.
brachystachys, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 328. — Penang.

DRACAENA : —

- Braunii, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 479. — Kamerun.
 Buettneri, Engl. l. c. 478. — Gabon.
 congesta, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 388. — Penins. Mal.
 Coulingii, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 731. — Form. hort.
 cuprea, L. Lind. et Rodig. in *Illustr. Hort.* xl. (1893) 9 t. 567. — Ind. or.
 Douceti, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 808; et ex *Rev. Hort. Belg.* xix. (1893) 257. — Form. hort.
 Duchneri, (an potius Buchneri ?) Hort. ex *Rev. Hort.* (1894) 251. — Ins. Fernando-Po.
 Fischeri, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 477. — Afr. trop. or.
 Godseffiana, Hort. ex *Rev. Hort.* (1890) 201; et ex *Rev. Hort. Belg.* xix. (1893) 113; et ex *Gard. Chron.* (1894) ii. 212. — Afr. trop. occ.
 Goldieana, Hort. ex *Illustr. Hort.* xlii. (1895) 256 fig. 36. — Afr. trop. occ.
 granulata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 327. — Perak.
 laxissima, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 478. — Congo.
 longifolia, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 388. — Penins. Mal.
 Maingayi, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 392. — Penins. Mal.
 marmorata, Baker, in *Bot. Mag.* (1889) t. 7078. — Singap.
 nutans, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 406. — Penins. Mal.
 Papahu, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 143. — Afr. trop. or.
 petiolata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 331. — Assam.
 Poggei, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 478. — Congo.
 Poulllei, Hort. ex *Rev. Hort.* (1888) 530. — Form. hort.
 Preussii, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 477. — Kamerun.
 Sanderiana, Hort. Sand. ex *Rev. Hort.* (1890) 201; et ex *Gard. Chron.* (1893) i. 443 et 445. fig. 65. — Afr. trop. occ.
 sepiaria, Dam., in *Gartenfl.* (1887) 136. — Ins. Viti.
 serrulata, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 342. — Arabia.
 Steudneri, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 143. — Afr. trop. or.
 usambarensis, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 30; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 144. — Afr. trop. or.

DRACAENOPSIS, Planch. = **Cordyline**, Comm. (Liliac.).
lineata, Rodig. in *Illustr. Hort.* xl. (1893) 121 in obs. = C. indivisa, Steud.

DRACO, Heist. [1748] = **Dracaena**, Vand. (Liliac.).
Afzelii, angustifolia, arborea, aurea, bicolor, cameruniana, cincta, cinnabari, concinna, cylindrica, densiflora, elliptica, fragrans, fruticosa, glomerata, Goldieana, Hookeriana, humilis, Kirkii, Kochiana, Mannii, marginata, ovata, Porteri, reflexa, schizantha, spicata, stenophylla, surculosa, timorensis, umbraculifera, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 716 = homonyma omnia Dracaenae.
atropurpurea, Kuntze, l. c. = D. elliptica, Thunb.
dragonalis, Kuntze, l. c. = D. Draco, Linn.
Finlaysonii, Kuntze, l. c. = D. Finlaysonii, Baker.
Fontanesii, Runtze, l. c. = D. Fontanesiana, Schull.
Hookeriana, Kuntze, l. c. = D. Hookeriana, C. Koch.
Ombet, Kuntze, l. c. = D. Draco, Linn.
Perrottetii, Kuntze, l. c. = D. Perrottetii, Baker.
phrynioides, Kuntze, l. c. = D. phrynioides, Hook.
Saposchnikowii, Kuntze, l. c. = D. Saposchnikowii, Regel.
thalioides, Kuntze, l. c. = D. thalioides, Hort. Makoy.
Thwaitesii, Kuntze, l. c. = D. spicata, Roxb.

DRACOCEPHALUM, Linn. (Labiata). — Ind. Kew. i. 796.
 caucasicum, Lipsky et Akinfiew, in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1894) 326. — Reg. Caucas.

DRACOCEPHALUM : —

- Faberii, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 291. — China.
 Gobi, Krassn. in *Script. Hort. Univ. Petrop.* ii. i. (1887-88) 19. — China.
 prunelliforme, Maxim. in *Bull. Acad. Sci. Pétersb.* xxx. (1887) 90. — Japon.
 villosum, Krassn. in *Script. Hort. Univ. Petrop.* ii. i. (1887-88) 20. — China.

DRACONTOCEPHALUM, St. Lager, in *Cariot. stud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 671 = **DRACONTOCEPHALUM**, Hassk. = **Dracocephalum**, Linn. (Labiata).
integrifolium, St. Lager, l. c. = **Dracocephalum** Ruyschiana, Linn.
lacineatum, St. Lager, l. c. = **Dracoc. austriacum**, Linn.

DRACONTOMELON [Dracontomelum], Blume (Anacard.). — Ind. Kew. i. 797.
 laxum, K. Schum. in *K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land.* (1889) 65. — N. Guin.
 vitiense, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1891) 151 (an *D. vitiense*, Engl. ?) — Ins. Viti.

DRACOPHYLLUM, Labill. (Epacrid.). — Ind. Kew. i. 797.
 Featonianum, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 477. — N. Zel.
 imbricatum, Colenso, l. c. xxv. 1892 (1893) 331. — N. Zel.
 recurvatum, Colenso, l. c. xxi. 1888 (1889) 92 = latifolium, A. Cunn.
 rubrum, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 200. — N. Zel.
 Sayeri, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* ii. (Mar. 1887) 85; et in *Bot. Centraibl.* xxx. (1887) 356. — Austral.
 tenuicaulis, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 476. — N. Zel.

DRAKAEA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 797.
 Huntiana, F. Muell. in *Vict. Natural.* v. (April 1889) 174. — Austral.

DRAPETES, Banks (Thymel.). — Ind. Kew. i. 798.
 macrantha, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 487. — N. Zel.

DREGEA, E. Mey. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 798.
 abyssinica, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 326; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 293. = *Hoya africana*, Decne.
 africana, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 55. = *Hoya africana*, Decne.
 rubicunda, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 147. — Afr. trop.
 sinensis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 115. — China.

DREPANOPHYLLUM, Wibel = **Falcaria**, Hort. (Umbellif.).
 Falcaria, Simonk. *Enum. fl. Transs.* (1886) 251. = *Sium Falcaria*, Linn.

DRIESENIA, Korth. (Melast.). — Ind. Kew. i. 798.
 ciliata, Becc. ex Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vi. (1891) 476. — Borneo.
 crystallina, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) sub. t. 2414. — Borneo.
 glanduligera, Stapf, l. c. xxiii. (1894) t. 2291. — Borneo.
 microthrix, Stapf, l. c. t. 2292. — Borneo.
 scorpioides, Stapf, l. c. xxv. (1895) t. 2414. — Borneo.
 Teymannii, Cogn. ex *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië* i. ii. (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 475. — Borneo.

DRIMIA, Jacq. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 798.
 angustitepala, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893.) 475. [Drimya] — Afr. trop. or.

DRIMIA : —

Hildebrandtii, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 474 [Drimya]. — Afr. trop. or.
macrantha, *Baker, l. c.* Beibl. n. 35 (1892) 7 in obs.
(= *Ornithogalum macranthum*, Baker) — Afr. austr.
pauciflora, *Baker, l. c.* 6. — Afr. austr.

DRIMIOPSIS, Lindl. et Paxt. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 799.
Holstii, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 62; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 143. — Afr. trop. or.

DRIMYS, Forst. (Dilleniace.). — Ind. Kew. i. 799.
semecarpoides, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (May 1891) 15; et *ex Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 204. — Austral.

DROGUETIA, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 799.
parviflora, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.*, Index (1895) 17 = pauciflora, *Wedd.*
umbricola, *Engl. l. c.* C (1895) 164. — Afr. trop. or.

DROSERA, Linn. (Droser.). — Ind. Kew. i. 799.
Beleziana X, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1895) 496. — Gall.
chrysoplepis, *Taub. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 505. — Bras.
circinnaria, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 314. — N. Zel.
flagellifera, *Colenso, l. c.* xxiii. 1890 (1891) 384. — N. Zel.
Lovellae, *F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull.* vii. (1893) 61. — Austral.
minutula, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 81. — N. Zel.
polynura, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 460. — N. Zel.
praeefolia, *Tepper, in Bot. Centralbl.* l. (1892) 353. — Austral.
triflora, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 461. — N. Zel.

DRYADAEA, Linn. = **Dryas**, Linn. (Rosac.).
Drummondii, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 215 = *Dryas Drummondii*, *Richards.*
octopetala, Kuntze, l. c. = *Dryas octopetala*, Linn.

DRYAS, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 801.
lanata, Stein, ex *Correv. in Gard. Chron.* (1891) i. 340 = octopetala, Linn.

DRYMARIA, Willd. (Caryoph.). — Ind. Kew. i. 801.
anomala, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 143. — Mexic.
carinata, *T. S. Brandeg. in Zoë.* ii. (1891) 70. — Calif.
debilis, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. ii.* ii (1889) 131. — Calif.
diffusa, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 130 t. 12. — Ins. Carmen.
filiformis, *Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 117. — Mexic.
longepedunculata, *S. Wats. l. c.* xxv. (1890) 142. — Mexic.
oxalidea, *Pax, in Bot. Jahrb.* xviii. (1893) 31. — Mexic.
polystachya, *T. S. Brandeg. in Zoë.* ii. (1891) 70. — Calif.
procumbens, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1895) 304. — Mexic.
tenuis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 142. — Mexic.
Veatchii, Curran, in *Proc. Calif. Acad. Ser. ii.* i. (1888) 227 = crassifolia, *Benth.*
viscosa, *S. Wats. ex C. R. Orcutt, in West Am. Scientist.* ii. (1886) 57 nomen; et *in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 469. — Calif.

DRYMONIA, Mart. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 801.
maculata, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 410. — Bras.

DRYMOPHLOEUS, Zipp. (Palm.). — Ind. Kew. i. 802.
olivaeformis, *W. Wats. in Gard. and For.* (1891) 330 fig. 57 = appendiculatus, *Miq.*

DRYOBALANOPS, Gaertn. f. (Dipteroc.). — Ind. Kew. i. 802.
Halkii, *Korth. ex Burck, in Ann. Jard. Buit.* vi. (1887) 243 = Anisoptera costata, *Korth.*
lanceolata, *Burck, l. c.* 244. — Borneo.
neglectus, *Korth. ex Burck, l. c.* 243 in obs. = *Hopea sericea*, *Blume.*

DRYPETES, Vahl (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 802.
diversifolia, *Krug et Urb. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 353. — Ins. Baham.
Dussii, *Krug et Urb. l. c.* 355. — Ins. Martinica.
ilicifolia, *Krug et Urb. l. c.* 352. — Ins. Puerto Rico.
keyensis, *Krug et Urb.* 354; *Sarg. Sylva N. Am.* vii (1895) 25 t. 307 (= *D. glauca*, *Chapm.*). — Florida.
lateriflora, *Krug et Urb. ll. cc.* 354; et 27 t. 308 = crocea, *Poit.*
serrata, *Krug et Urb. l. c.* 354 = glomerata, *Griseb.*

DRYPIS, Mich. (Caryoph.). — Ind. Kew. i. 802.
jacquiniana, *Murb. et Wettst. in Luer. Bibl. Bot.* Heft xxvi (1892) 28; et *in Oest. Bot. Zeitschr.* (1891) 239; et (1892.) 358 = spinosa, Linn.
Linneana, *Murb. et Wettst. ll. cc.* 28 et 239 = spinosa, Linn.

DUBANUS, Rumpf = **Pometia**, Forst. (Sapind.).
acuminatus, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 143 = *Nephelium acuminatum*, *Hook. f.*
pinnatus, *Kuntze, l. c.* = *P. pinnata*, *Forst.*
tomentosus, *Kuntze, l. c.* = *P. eximia*, *Bedd.*

DUBAUTIA, Gaudich. (Compos.). — Ind. Kew. i. 802.
Knudsenii, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 223. — Ins. Sandvic.
raillardoides, *Hillebr. l. c.* 224. — Ins. Sandvic.

DUCHARTRELLA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 563 = **Holostylis**, *Duch. (Aristol.)*.
reniformis, *Kuntze, l. c.* 564 = *H. reniformis*, *Duchartre.*

DUCHESNEA, Focke, in *Engl. & Prantl, Naturl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1888) 33 = DUCHESNEA, Sm. = **Fragaria**, Linn. (Rosac.).
filipendula, *Focke, l. c.* = *F. filipendula*, *Hemsl.*
indica, *Focke, l. c.* = *F. indica*, *Andr.*

DUGUETIA, A. St-Hil. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 803.
glabra, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xvi. (1889) 14. — Bolivia.
leiophylla, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 281. — Hondur.
Sanctae-Crucis, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 299. — Bras.

DULACIA, Neck. = **Couepia**, Aubl. (Legumin.).
Glazioviana, *Taub. in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34. (1892) 7. — Bras.

DULACIA, Vell. = **Liriosma**, Poepp. & Endl. (Olin.).
acuta, *adhaerens, candida, Gardneriana, grandiflora, guianensis, inopiflora, macrophylla, ovata, pallida, pauciflora, Pohliana, Spruceana*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 111 = *homonyma omnia Liriosmae.*

DULICHIUM, Pers. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 803.
arundinaceum, *Heller, in Bull. Torrey Bot. Club.* xxi. (1894) 29 = spathaceum, *Pers.*

DUNALIA, Spreng. = **Lucya**, DC. (Rubiace.).
tetrandra, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 281 = *L. tuberosa*, *DC.*

DUNBARIA, Wight et Arn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 804.
singuliflora, *F. Muell. in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 1890 (1891) 74. — Austral.

DUPATYA, Vell. = **Paepalanthus**, Mart. (Eriocaul.).
aciphylla, *affinis, alpina, amoena, andicola, angustifolia, anomala, anthemidiflora, appressa, arenaria, argentea, Argyrolinon, Armeria, atrovirens, bahiensis, bifida, bisulcata, Blanchetiana, blepharophora, Bongardii, Brachypus, brasiliensis, caespititia, caespitosa, calva, canescens, capillacea, capillaris, Capito, caulescens, ciliata, circinnata, Clauseniana, compacta, conduplicata, confusa, consanguinea, corymbosa, crassicaulis, crassifolia, curvifolia, decussa, densa, densiflora, denudata, dichotoma, distichophylla, divaricata, dubia, eburnea, elata, elegans, ensifolia, Erigeron, eriophylla, exigua, falcifolia, fastigiata, fertilis, flaccida, flagellaris, flavescens, flaviceps, flavidula, fluitans, fluviosa, fuscoater, Gardneriana, geniculata, glauca, glaucescens, goyazensis, gracilis, graminea, granatensis, guyanensis, heterophylla, Hilareti, hirsuta, homomalla, Humboldtii, imbricata, incana, intermedia, inundata, ithyphylla, Kegelliana, Klotzschiana, Lamarchii, lanato-alba, lanceolata, Langsdorffii, lanuginosa, laricifolia, latifolia, laxifolia, leucoblephara, Liebmanna, lingulata, longifolia, Lundii, luxurians, macrocephala, Martiana, melaleuca, meridensis, microphylla, minarum, minutula, mucronata, muscosa, myocephala, neglecta, nitens, nitida, nivea, nubigena, oblonga, obtusifolia, ochrocephala, Oerstediana, oligocephala, ovata, oxyphylla, pachyphylla, pauciflora, perpusilla, petraea, pilifera, pilosa, pilulifera, Plantago, plumosa, polyantha, polygona, prolifera, propinqua, prostrata, puberula, pubescens, pulchra, pulla, pusilla, ramosa, reclinata, regalis, Regelliana, rigida, rigidula, rufula, Ruprechtiana, saxatilis, saxicola, Schlechtendalii, Schlimii, Schomburgkii, Schuechiana, scirpea, Sellowiana, sessiliflora, simplex, spadicea, spathulata, speciosa, spiralis, stricta, subtilis, succisa, supina, tenuis, tortilis, triangularis, trichopetala, trichophylla, truxillensis, tuberosa, umbellata, uncinata, vaginata, verticillata, villosula, viridis, vivipara, Wahlbergii, Weddelliana, Widgreniana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 745-46 = *homonyma omnia Paepalanthi.*
bisumbellata, *Kuntze, l. c.* 745 = *P. Steudeliana*, *Koern.*
bryodes, *Kuntze, l. c.* = *P. bryoides*, *Kunth.*
centaurodes, *Kuntze, l. c.* = *P. centauroides*, *Koern.*
chrysantha, *Kuntze, l. c.* = *P. morulus*, *Kunth.*
dendrodes, *Kuntze, l. c.* = *P. dendroides*, *Kunth.*
dianthodes, *Kuntze, l. c.* = *P. dianthoides*, *Mart.*
elongata, *Kuntze, l. c.* = *P. helichrysoides*, *Kunth.*
fasciculata, *Kuntze, l. c.* = *P. congestus*, *Kunth.*
Fischeriana, *Kuntze, l. c.* = *P. nardifolius*, *Kunth.*
Freyreissii, *Kuntze, l. c.* = *P. paludosus*, *Kunth.*
Funkeana, *Kuntze, l. c.* = *P. Funkeanus*, *Koern.*
helminthorhiza, *Kuntze, l. c.* = *P. helminthorhizus*, *Mart.*
macrorrhiza, *Kuntze, l. c.* 746 = *P. macrorrhizus*, *Kunth.*
pedunculata, *Kuntze, l. c.* = *P. falcatus*, *Nees.*
philodicodes, *Kuntze, l. c.* = *P. philodicoides*, *Koern.*
planifolia, *Kuntze, l. c.* = *P. monticola*, *Mart.*
plantaginea, *Kuntze, l. c.* = *P. zosterifolius*, *Kunth.*
plantaginodes, *Kuntze, l. c.* = *P. plantaginoides*, *Koern.*
polytrichodes, *Kuntze, l. c.* = *P. polytrichoides*, *Kunth.*
Riedelliana, *Kuntze, l. c.* = *P. Vauthierianus*, *Kunth.*
sedodes, *Kuntze, l. c.* = *P. sedoides*, *Koern.*
selaginodes, *Kuntze, l. c.* = *P. selaginoides*, *Koern.*
Spixiana, *Kuntze, l. c.* = *Eriocaulon quinqueangulare*, *Linn.*
velozoides, *Kuntze, l. c.* = *P. vellozoides*, *Koern.*
vernoniodes, *Kuntze, l. c.* = *P. vernonioides*, *Kunth.*
xeranthemodes, *Kuntze, l. c.* = *P. xeranthemoides*, *Koern.**

DUPINIA, Scop. = **Ternstroemia**, Linn. f. (Ternstroem.).

DUPINIA :—

japonica, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 439 = *T. japonica*, Thunb.

DURANDEA, Planch. (Lincae).—Ind. Kew. i. 804. *pallida*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 56. — N. Guin.

DURANDEELDEA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 603. = **Acidoton**, Sw. (Euphorb.). *urens*, Kuntze, l. c. = *A. urens*, Sw.

DURANTA, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. i. 804. *Benthami*, Briq. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1895) 160. — Bolivia.

DURIO, Adans. (Malv.). — Ind. Kew. i. 804. *affinis*, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 246. — Borneo. *conicus*, Becc. l. c. 241. — Borneo. *dulcis*, Becc. l. c. 243 t. 14. — Borneo. *gratissimus*, Becc. l. c. 244 t. 22. — Borneo. *graveolens*, Becc. l. c. 242. — Borneo. *kutejensis*, Becc. l. c. 251 (= *Lahia kutejensis*, Hassk.). — Borneo. *sumatranus*, Becc. l. c. 249 t. 23. — Sumatra. *testudinarius*, Becc. l. c. 244 t. 13, 14 et 36 f. 17-19. — Borneo.

DUROIA, Linn. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 804. *hirsuta*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 367 = *Amajoua hirsuta*, Poepp. & Endl.

DUSSIA, Krug et Urb. ex Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1892) 193. **LEGUMINOSAE**. *martinicensis*, Krug et Urb., l. c. — Ins. Martin.

DUTHIEA, Hack. ex Procop.-Procop. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlv (1895) 200. **GRAMINEAE**. *bromoides*, Hack. l. c. — Ind. angl.

DUVALIA, Haw. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 804. *dentata*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 365. — Afr. austr. *transvaalensis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 54. — Afr. austr.

DUVALIELLA, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 1011, et Rech. Diptéroc. (1892) 72. **DIPTEROCARPEAE**. *problematica*, Heim, ll. cc. — Penang.

DUVAUA, Kunth = **Schinus**, Linn. (Anacard.). *spinosa*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 76 = *S. spinosus*, Engl.

DUVERNOYA, E. Mey. = **Adhatoda**, Nees (Acanth.). *Andromeda*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 42. — Afr. trop. occ. *Buchholzii*, Lindau, l. c. — Afr. trop. occ. *Descampsii*, Dewèvre, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. ? 1894 (1895) 104. (nomen) — Afr. austro-or. *extensa*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 372 = *Justicia extensa*, T. Anders. *interrupta*, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 123. — Afr. trop. or. *orbicularis*, Lindau, l. c. — Kamer. *paniculata*, Lindau, l. c. xx. (1894) 43 = *A. paniculata*, Benth. *pumila*, Lindau, l. c. 44. — Afr. trop. *pyramidata*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 124. — Kamer. *salviiflora*, Lindau, l. c. xx (1894) 42. — Afr. trop. or. *Stachytarpheta*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 339 [an seq. ?]. — Afr. trop. *stachytarphetoides*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 372. — Afr. trop. or. *Stuhlmannii*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 43; et l. c. A (1895) 95; et C (1895) 372 = *Justicia extensa*, T. Anders. *tenuis*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 44. — Afr. trop. occ. *trichocalyx*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 122. — Natal,

DYCKIA, Schult. f. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 805. *acaulis*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 137 (= *Navia acaulis*, Mart.). — Am. austr. *affinis*, Baker, l. c. 133. — Parag. *argentea*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii, III. (1894) 492. — Bras. *Augustae*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 135 (= *Encholirion Augustae*, Schomb.). — Guian. brit. *biflora*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii, III. (1894) 486. — Bras. *bracteata*, Mez, l. c. 476. — Bras. *Burchellii*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 131. — Montevideo. *caulescens*, Baker, l. c. 137 (= *Navia caulescens*, Mart.). — Am. austr. *cinerea*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii, III. (1894) 469. — Bras. *coccinea*, Mez, l. c. 491. — Bras. *consimilis*, Mez, l. c. 479. — Bras. *decomposita*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 136. — Reg. Argent. *Desmetiana*, Baker, in Bot. Mag. (1894) t. 7340. — Bras. ? *gemellaria*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 131 = *sulphurea*, K. Koch. *Gilliesii*, Baker, l. c. 136. — Reg. Argent. *Glaziovii*, Baker, l. c. 133. — Bras. *grandifolia*, Baker, l. c. 136. — Bras. *Grisebachii*, Baker, l. c. 130. — Reg. Argent. *lagoensis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii, III. (1894) 483. — Bras. *linearifolia*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 131. — Bras. *longipetala*, Baker, l. c. 135. — Am. austr. trop. *macracantha*, Baker, l. c. 137. — Bras. *maritima*, Baker, l. c. 136. — Bras. austr. *micracantha*, Baker, l. c. 135. — Bras. austr. *microcalyx*, Baker, l. c. 133. — Parag. *minarum*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii, III. (1894) 483. — Bras. *missionum*, Mez, l. c. 477. — Reg. Argent. *Morreniana*, Mez, l. c. 496. — Hab. ? *myriostachya*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 137. — Bras. *Niederleinii*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii, III. (1894) 474. — Reg. Argent. *orobanchoides*, Mez, l. c. 475. — Bras. *racemosa*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 132. — Bras. *ramosa*, Hort., ex Baker, l. c. 134 = *altissima*, Lindl. *regalis*, Linden et Éd. Morr. ex Baker, l. c. 134 = *frigida*, Hook. f. *rubra*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n. 29 (1891) 16. — Bras. *Schwackeana*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii, III. (1894) 478. — Bras. *Selloa*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 136 (= *Prionophyllum Sellowii*, K. Koch.). — Bras. *sordida*, Baker, l. c. 134. — Bras. *spectabilis*, Baker, l. c. 138 (= *Encholirion spectabile*, Mart.). — Bras. *subinermis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii, III. (1894) 487. — Bras. *subsecunda*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 135. — Bras. *tenuis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii, III. (1894) 485. — Bras. *trichostachya*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 133. — Bras. *Tweediei*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii, III. (1894) 485. — Urug. *vaginosa*, Mez, l. c. 490. — Bras. *velascana*, Mez, l. c. 476. — Reg. Argent. *Warmingii*, Mez, l. c. 481. — Bras. *Weddelliana*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 132. — Bras.

DYERA, Hook. f. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 805. *borneensis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 751. — Borneo.

DYERELLA, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 123 = **Vateria**, Linn. (Dipteroc.). *scabriuscula*, Heim, l. c. ; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 153 = *V. scabriuscula*, Thw.

DYEROPHYTUM, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 394 = **Vogelia**, Lam (Plumbag.). *africanum*, Kuntze, l. c. = *V. africana*, Lam. *indicum*, Kuntze, l. c. = *V. indica*, Gils. *pendulum*, Kuntze, l. c. = *V. pendula*, Balf. f.

DYPSIDIUM, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1172; et Hist. des pl. xiii. (1895) 371. — **PALMAE**. *Catatanum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1173. — Madag. *emirnense*, Baill. l. c. — Madag. *Vilersianum*, Baill. l. c. — Madag.

DYPSIS, Noronha (Palm.). — Ind. Kew. i. 805. *Boiviniana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1164. — Madag. *concinna*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 526. — Madag. *Curtisii*, Baker, l. c. — Madag. *heterophylla*, Baker, l. c. 552. — Madag. *Lantzeana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1163. — Madag. *polystachya*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii (1887) 525. — Madag. *rhodotricha*, Baker, l. c. — Madag. *Thouarsiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1163. — Madag. *Vilersiana*, Baill. l. c. 1165. — Madag.

DYSCHORISTE, Nees = **Calophanes**, D. Don (Acanth.).

adscendens, *amena*, *angustifolia*, *bilabiata*, *capitata*, *ciliata*, *costata*, *crinita*, *decumbens*, *gracilis*, *Heudelotiana*, *hirsutissima*, *humistrata*, *hyssopifolia*, *lavandulacea*, *linearis*, *madagascariensis*, *Maranhonis*, *microphylla*, *multicaulis*, *natalensis*, *oblongifolia*, *Persoonii*, *Pulegium*, *quadrangularis*, *quitensis*, *radicans*, *repens*, *Schiedeana*, *Serpyllum*, *setosa*, *siphonantha*, *Tweediana* et *vagans*, Kuntze; Rev. Gen. (1891) 485-86 = *homonyma omnia* generis *Calophaneos*. *Burchellii*, Kuntze, l. c. 485 = C. Burkei, T. Anders. *erecta*, Kuntze, l. c. = C. Nagehana, Nees. *erythrorhiza*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b (1895) 302 = *Homotropium erythrorhizum*, Nees. *Fischeri*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 11. — Afr. trop. or. *glandulosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 486 = C. Persoonii, T. Anders. *Hildebrandtii*, Lindau, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26, 39 et 41 = C. Hildebrandtii, S. Moore. *humilis*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 15. — Reg. Argent. *hygrophylloides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 486 = C. *hygrophylloides*, Nees. *Jasminum*, l. c. = C. *Jasminum-mexicanum*, Nees. *kilimandscharica*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 367. — Afr. trop. or. *madurensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 486 = C. *littoralis*, T. Anders. *mauritiana*, Kuntze, l. c. = *Hypoestes serpens*, R. Br. *Niederleinii*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 15. — Reg. Argent. *ovata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 486 = C. *linearis*, A. Gray. *Perrottettii*, Kuntze, l. c. = C. *Perrottettii*, Nees. *rufopila*, Boiv. ex Baill. Hist. des pl. x. (1890) 443 in syn. = *Synchoriste rufopila*, Baill. *tenera*, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 116. — Angola. *thunbergiiflora*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 367 = C. *thunbergiaeflora*, S. Moore. *trichocalyx*, Lindau, l. c. = C. *trichocalyx*, Oliver.

DYSODIA, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. i. 805. *glandulosa*, O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1890) 266 [an Cav. vel Less. ?] (= *Willdenowa glandulosa*, Cav.). — Ecuad.

DYSODIA : —

papposa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 334 = *chrysanthemoides*, Lag.
papposa, Hitchcock, in Trans. Acad. Sc. St-Louis. v. (1892) 503 = praec.

DYSOPHYLLA, Blume (Labiata). — Ind. Kew. i. 806.

communis, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 114 = *auriculata*, Blume.
Andersoni, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1891) II. 298. — Sikkim.
peguana, Prain, l. c. 299. — Sikkim.
porophylloides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 530, sphalm. = *Dysodia porophylloides*, A. Grag.

DYSOXYLUM, Blume (Meliac.) — Ind. Kew. i. 806.

Arnoldianum, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 61 — N. Guin.
Forsythianum, Warb. in Bot. Jahrb. xiii (1891) 343 [Dysoxylon]. — N. Guin.
novoguineense, Warb. l. c. 344. — N. Guin.
Pettigrewianum, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. v (1892) 9. [Dysoxylon]. — Austral.
vestitum, Warb. in Bot. Jahrb. xiii, (1891) 343 — N. Guin.

DYSPHANIA R. Br. (Illecebr.) — Ind. Kew. i. 806.

simulans, F. Muell. et Tate, ex Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. viii (1886) 71. — Austral.

E**EARINA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 807.

alba, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 267. — N. Zel.
samoensiana, F. Muell. et Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 211. — Ins. Samoens.

EASTWOODIA, T. S. Brandeg. in Zoë, iv, (1894) 397 t. 30. **COMPOSITAE**.

elegans, T. S. Brandeg. l. c. — Calif

EATONIA, Rafin. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 807.

densiflora, Fourn. Gramin. Mexic. 1881 (1886) 111. — Mexic.
Dudleyi, Vasey, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 116 = *nitida*, Nash.
nitida, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1892) 511 = *purpurascens*, Rafin.

EBELINGIA, Reichb. = **Harrisonia**, R. Br. (Simarub.)

abyssinica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 103 = *H. abyssinica*, Oliver.
paucijuga, Kuntze, l. c. = *H. paucijuga*, Benn.

EBENIDIUM, Jaub. et Spach = **Ebenus**, Linn. (Legumin.).

Bourgeani, *creticum*, *depressum*, *longipes*, *macrophyllum*, *pinnatum*, *plumosum*, *Sibthorpii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 180 = *homonyma omnia* Ebeni.
Monbrettii, Kuntze, l. c. = *Ebenus Montbrettii*, Jaub. & Spach.
pogonotropis, Kuntze, l. c. = *Ebenus barbigera*, Boiss.
tragacanthodes, Kuntze, l. c. = *Ebenus stellata*, Boiss.

EBENUS, Linn. (Leguminos.). — Ind. Kew. i. 807.

Armitagei, Schweinf. et Taub. ex Schweinf. et Aschers. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 645. — Afr. bor.
candidus, G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 38. — As. Min.

EBENUS, Rumpf, ex Burm. Thes. Zeyl. (1737) 91, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 408 = **Maba**, Forst. (Ebenac.).**EBENUS** : —

abyssinica, *acapulcensis*, *acuminata*, *albena*, *andamanica*, *Andersoni*, *Beccarii*, *brevifolia*, *caribaea*, *cauliflora*, *compacta*, *confertiflora*, *cordata*, *diffusa*, *elliptica*, *fasciculosa*, *foliosa*, *geminata*, *Grisebachii*, *Hilairei*, *Hillebrandi*, *humilis*, *inconstans*, *intricata*, *javanica*, *lamponga*, *lancea*, *lanceolata*, *laurina*, *Maingayi*, *major*, *Mannii*, *Mellinoni*, *merguensis*, *micrantha*, *Molleyi*, *myrmecocalyx*, *myrmecocarpa*, *natalensis*, *nigrescens*, *oblongifolia*, *obovata*, *ovalifolia*, *Pavonii*, *punctata*, *quiloensis*, *reticulata*, *rufa*, *ruminata*, *salicifolia*, *sandwicensis*, *sericea*, *seychellarum*, *sumatrana*, Kuntze, l. c. 408 = *homonyma omnia* Maba.
hemicyclodes, Kuntze, l. c. = *M. hemicycloides*, F. Muell.
hermaphrodica, Kuntze, l. c. = *M. hermaphrodica*, Zoll.
Mualata, Kuntze, l. c. = *M. Mualata*, Welw.
Teysmannii, Kuntze, l. c. = *M. Teyssmanni*, Hassk.
Vieillardii, Kuntze, l. c. = *M. Vieillardii*, Hiern.

ECBOLIUM, Kurz. (Acanthac.). — Ind. Kew. i. 808.

amplexicaule, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 136. — Afr. trop. or.
barlerioides, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 42 in obs. = *Isoglossa barlerioides*, S. Moore.

ECBOLIUM, Riv. ex Linn. = **Justicia**, Linn. (Acanth.).

abyssinicum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 980 = *J. glabra*, Koen.
acuminatissimum, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa acuminatissima*, Miq.). — Guian.
acuminatum, Kuntze, l. c. = *Adhatoda acuminata*, Nees.
adenostachyum, Kuntze, l. c. (= *Tyloglossa adenostachya*, Nees). — Bras.
Adhatoda, Kuntze, l. c. 487 = *Adhatoda Vasica*, Nees.
ascendens, Kuntze, l. c. 979 = *A. Lindeniana*, Nees.
aequilabre, Kuntze, l. c. 980 (= *Amphiscopia aequilabris*, Nees). — Bras.
alterum, Kuntze, l. c. 979 (= *Diantherae* sp.). — Borneo.
amaranthodes, Kuntze, l. c. 978 = *J. ceylanica*, T. Anders.
amazonicum, Kuntze, l. c. 980 (= *Rhytiglossa amazonica*, Nees). — Bras.
americanum, Kuntze, l. c. = *Dianthera americana*, Linn.
Amherstiae, Kuntze, l. c. = *D. nodosa*, Benth. & Hook. f.
Anagallis, Kuntze, l. c. = *D. Anagallis*, Hemsl.
anagaloides, Kuntze, l. c. = *Adhatoda anagaloides*, Nees.
Andersonii, Kuntze, l. c. 978 = *Dianthera virgata*, Benth.
andrographioides, Kuntze, l. c. 980 = *J. andrographioides*, C. B. Clarke.
androsaemifolium, Kuntze, l. c. = *Dianthera androsaemifolia* Griseb.
angustatum, Kuntze, l. c. = *J. angustata*, Warb.
angustifolium, Kuntze, l. c. = *Dianthera angustifolia*, Benth. & Hook. f.
Ansellianum, Kuntze, l. c. = *D. Anselliana*, Benth. & Hook. f.
arabicum, Kuntze, l. c. 979 = *Adhatoda leptostachya*, Nees.
arenicolum, Kuntze, l. c. 980 = *J. arenicola*, Engl.
argyrostachyum, Kuntze, l. c. = *J. argyrostachya*, T. Anders.
Arnottianum, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa Arnottiana*, Nees). — Bras.
asclepiadeum, Kuntze, l. c. (= *Simonisia asclepiadea*, Nees) — Bras.
asperum, Kuntze, l. c. = *Adhatoda aspera*, Nees.
assamicum, Kuntze, l. c. = *J. assamica*, C. B. Clarke.
Atherstonii, Kuntze, l. c. = *J. Atherstoni*, T. Anders.
Atkinsonii, Kuntze, l. c. = *J. Atkinsoni*, T. Anders.
auriculata, Kuntze, l. c. = *Adhatoda auriculata*, Nees.
axillare, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa axillaris*, Nees). — Bras.

ECBOLIUM : —

bahiense, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 980 = *Adhatoda bahiensis*, Nees.
Balfourii, Kuntze, l. c. 979 = *J. rigida*, Balf. f.
Barteri, Kuntze, l. c. = *J. Barteri*, T. Anders.
barbatum, Kuntze, l. c. 980 (= *J. barbata*, Bertol.). — Guatem.
Beddomei, Kuntze, l. c. = *Adhatoda Beddomei*, C. B. Clarke.
Betonica, Kuntze, l. c. 487 = *J. Betonica*, Linn.
Beyrichii, Kuntze, l. c. 980 = *J. nummularia*, Mart.
blepharostegium, Kuntze, l. c. = *J. debilis*, Lam.
boerhaaviaefolium, Kuntze, l. c. = *Adhatoda boerhaaviaefolia*, Nees.
Bojeri, Kuntze, l. c. (= *Anisostachya Bojeri*, Nees). — Madag.
Bojerianum, Kuntze, l. c. = *Adhatoda Bojeriana*, Nees.
Bonneyanum, Kuntze, l. c. = *J. Bonneyanum*, F. Muell.
borneense, Kuntze, l. c. 979 (= *Diantherae* sp.). — Borneo.
brachystachyum, Kuntze, l. c. 980 = *J. brachystachya*, Thorr.
Brandisii, Kuntze, l. c. = *J. Brandisii*, T. Anders.
breviflorum, Kuntze, l. c. = *Dianthera breviflora*, Hemsl.
burmanicum, Kuntze, l. c. = *J. burmanica*, C. B. Clarke.
caloneurum, Kuntze, l. c. = *J. caloneura*, Kurz.
calycinum, Kuntze, l. c. = *Dianthera calycina*, Benth. & Hook. f.
campestre, Kuntze, l. c. = *D. campestris*, Benth. & Hook. f.
campylostemon, Kuntze, l. c. = *J. campylostemon*, T. Anders.
Candelariae, Kuntze, l. c. = *Dianthera Candelariae*, Hemsl.
candicans, Kuntze, l. c. = *D. candicans*, Benth. & Hook. f.
caracasenum, Kuntze, l. c. = *Beloperone caracasana*, Fenzl.
carthaginense, Kuntze, l. c. = *Beloperone violacea*, Planch. & Lind.
cavernarum, Kuntze, l. c. = *J. cavernarum*, F. Muell.
cayennense, Kuntze, l. c. = *Dianthera cayennensis*, Griseb.
chamaedryodes, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa chamaedryodes*, Nees). — Bras.
chamaevanthodes, Kuntze, l. c. 487. — Costarica.
Championii, Kuntze, l. c. = *J. Championi*, T. Anders.
chapadanum, Kuntze, l. c. 979 = *Aphelandra pectinata*, Willd.
chloropterum, Kuntze, l. c. 980 = *J. chloroptera*, Baker.
chrysotrichomum, Kuntze, l. c. (= *Tyloglossa chrysotrichoma*, Nees). — Bras.
ciliatum, Kuntze, l. c. (= *T. ciliata*, Nees). — Bras.
Clarkeanum, Kuntze, l. c. 979 = *Dianthera debilis*, C. B. Clarke.
collinum, Kuntze, l. c. 980 = *D. collina*, C. B. Clarke.
comatum, Kuntze, l. c. 487 = *D. comata*, Linn.
congruum, Kuntze, l. c. 980 = *Adhatoda congrua*, Nees.
cordatum, Kuntze, l. c. = *J. cordata*, T. Anders.
cordifolium, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa cordifolia*, Nees). — Bras.
corymbulosum, Kuntze, l. c. (= *J. corymbulosa*, Bertol.). — Guatem.
crassifolium, Kuntze, l. c. = *Dianthera crassifolia*, Chapm.
crinitum, Kuntze, l. c. 978 = *J. micrantha*, Heyne.
cuneatum, Kuntze, l. c. 980 = *J. cuneata*, Vahl.
cuneiforme, Kuntze, l. c. 979 = *J. cuneifolia*, Nees.
cuspidatum, Kuntze, l. c. 980 (= *Rhytiglossa cuspidatum*, Nees). — Bras.
cydoniaefolium, Kuntze, l. c. = *Adhatoda cydoniaefolia*, Nees.
dasycarpum, Kuntze, l. c. = *J. dasycarpa*, Kurz.
dasyclados, Kuntze, l. c. = *Dianthera dasyclados*, Benth. & Hook. f.
debile, Kuntze, l. c. = *J. debilis*, Lam.
decussata, Kuntze, l. c. = *J. decussata*, Roxb.
depauperatum, Kuntze, l. c. = *J. depauperata*, T. Anders.
desertorum, Kuntze, l. c. = *J. desertorum*, Engl.

ECBOLIUM: —

- dichotomum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 487 et 980 = *Dianthera dichotoma*, C. B. Clarke.
diffusum, Kuntze, l. c. 487 = J. diffusa, Willd.
distortum, Kuntze, l. c. 980 = *Dianthera distorta*, Benth. & Hook. f.
divergens, Kuntze, l. c. 487 et 980 (= *Rhytiglossa divergens*, Nees). — Bras.
Ecklonianum, Kuntze, l. c. 980 (= *Rhytiglossa Eckloniana*, Nees). — Afr. austr.
elegans, Kuntze, l. c. = J. elegans, Pohl.
eranthemoides, Kuntze, l. c. = J. eranthemoides, F. Muell.
Esenbeckii, Kuntze, l. c. 979 (= *Amphiscopia montana*, Nees). — Bras.
Eustachianum, Kuntze, l. c. 980 = *Dicliptera Vahlana*, Nees.
extensum, Kuntze, l. c. = J. extensa, T. Anders.
fasciatum, Kuntze, l. c. = J. fasciata, E. Mey.
Felisbertianum, Kuntze, l. c. = *Adhatoda Felisbertiana*, Nees.
flaccidum, Kuntze, l. c. = J. flaccida, Kurz.
flagelliforme, Kuntze, l. c. = J. flagelliformis, C. B. Clarke.
flavum, Kuntze, l. c. = *Barleria flava*, Jacq.
flexuosum, Kuntze, l. c. = *Adhatoda flexuosa*, Nees.
fragile, Kuntze, l. c. = J. fragilis, Wall.
furcatum, Kuntze, l. c. = J. furcata, Jacq.
Gendarussa, Kuntze, l. c. 487 = J. Gendarussa, Burm. f.
geniculatum, Kuntze, l. c. = *Dianthera secunda*, Griseb.
genistifolium, Kuntze, l. c. = J. genistifolia, Engl.
genistiforme, Kuntze, l. c. = *Adhatoda genistiformis*, Nees.
genuflexum, Kuntze, l. c. (= J. *genuflexa*, Nees et Mart.). — Bras.
Gilliesii, Kuntze, l. c. = *Adhatoda Gilliesii*, Nees.
glandulosum, Kuntze, l. c. = *Adh. glandulosa*, Nees.
glauescens, Kuntze, l. c. 979 = *Adh. ciliata*, Nees.
glaucum, Kuntze, l. c. 980 = J. glauca, Rottl.
grandifolium, Kuntze, l. c. = J. grandifolia, T. Anders.
Griffithii, Kuntze, l. c. = *Dianthera Griffithii*, Benth.
Grisebachianum, Kuntze, l. c. 979 = *Dianthera glandulosa*, Griseb.
grossum, Kuntze, l. c. 980 = J. grossa, C. B. Clarke.
havanense, Kuntze, l. c. = *Dianthera comata*, Linn.
Helferi, Kuntze, l. c. = J. Helferi, C. B. Clarke.
hereroense, Kuntze, l. c. 980 = J. hereroensis, Engl.
Hemslayanum, Kuntze, l. c. 978 (= *Ruellia leptostachya*, Wall.). — Ins. Philipp.
heterantherum, Kuntze, l. c. 979 = *Beloperone violacea*, Planch. & Lind.
heterocarpum, Kuntze, l. c. 980 = J. heterocarpa, T. Anders.
hirsutolabiatum, Kuntze, l. c. 979 (= *Rhaphidospora tenella*, Nees). — Java.
hirsutum, Kuntze, l. c. 980 (= *Rhytiglossa hirsuta*, Nees). — Peruv.
holosericeum, Kuntze, l. c. = *Adhatoda holosericea*, Nees.
Hookerianum, Kuntze, l. c. = *Dianthera Hookeriana*, Benth. & Hook. f.
hygrophiloides, Kuntze, l. c. = J. hygrophiloides, F. Muell.
hyssopifolium, Kuntze, l. c. 487 = J. hyssopifolia, Linn.
Hyssopus, Kuntze, l. c. 980 (= *Rhytiglossa Hyssopus*, Nees). — Bras.
ilhense, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa ilhensis*, Moric.). — Bras.
inaequale, Kuntze, l. c. = *Dianthera inaequalis*, Benth. & Hook. f.
incanum, Kuntze, l. c. = *Adhatoda incana*, Nees.
indicum, Kuntze, l. c. = *Dianthera indica*, C. B. Clarke.
inficiens, Kuntze, l. c. = J. inficiens, Vahl.
insulare, Kuntze, l. c. = J. insularis, T. Anders.
Kempeanum, Kuntze, l. c. = J. Kempeana, F. Muell.

ECBOLIUM: —

- khasiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 980 = J. khasiana, C. B. Clarke.
Kirkianum, Kuntze, l. c. = J. Kirkiana, T. Anders.
Kotschyi, Kuntze, l. c. (= *Tyloglossa Kotschyi*, Hochst.). — Afr. trop.
Kurzianum, Kuntze, l. c. 979 = J. flava, Kurz.
Kurzii, Kuntze, l. c. 980 = J. Kurzii, C. B. Clarke.
laetum, Kuntze, l. c. = *Dianthera laeta*, Hiern.
laevilingue, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa laevilinguis*, Nees). — Bras.
lancifolium, Kuntze, l. c. (= *Amphiscopia lancifolia*, Nees). — Peruv.
latiflorum, Kuntze, l. c. = J. latiflora, Hemsl.
latifolium, Kuntze, l. c. = *Dianthera latifolia*, Benth. & Hook. f.
lavandulifolium, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa lavandulifolia*, Nees). — Bras.
laxum, Kuntze, l. c. = J. laxa, T. Anders.
leptanthum, Kuntze, l. c. = J. leptantha, T. Anders.
leptostachyum, Kuntze, l. c. = *Dianthera Wallichii*, Benth. & Hook. f.
Linaria, Kuntze, l. c. = J. Linaria, T. Anders.
Lindenianum, Kuntze, l. c. = *Dianthera Lindeniana*, Hemsl.
lincare, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa linearis*, Nees). — Bras.
lineolatum, Kuntze, l. c. = J. lineolata, Ruiz & Pav.
lithospermifolium, Kuntze, l. c. = *Hygrophila guianensis*, Nees.
longiflorum, Kuntze, l. c. = *Dianthera longiflora*, Benth. & Hook. f.
longifolium, Kuntze, l. c. = *Adhatoda longifolia*, Nees.
lucidum, Kuntze, l. c. = *Dianthera secunda*, Griseb.
Maingayi, Kuntze, l. c. = J. Maingayi, C. B. Clarke.
majus, Kuntze, l. c. = *Adhatoda major*, Nees.
Mannii, Kuntze, l. c. = J. Mannii, T. Anders.
Martianum, Kuntze, l. c. = *Adhatoda Martiana*, Nees.
maynense, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa maynensis*, Nees). — Bras.
membranifolium, Kuntze, l. c. (= *Rhaphidospora membranifolia*, Miq.). — Java.
menthodes, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa menthoides*, Nees). — Bras.
Meyenianum, Kuntze, l. c. = *Beloperone Meyeniana*, Nees.
mexicanum, Kuntze, l. c. = *Dianthera mexicana*, Benth. & Hook. f.
microstachyum, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa microstachya*, Nees). — Peruv.
Middletonii, Kuntze, l. c. 978 = J. haplostachya, T. Anders.
minus, Kuntze, l. c. 980 = J. minor, T. Anders.
molle, Kuntze, l. c. = J. mollis, E. Mey.
montanum, Kuntze, l. c. = J. montana, Wall.
Moricandianum, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa Moricandiana*, Nees). — Guian.
Moritzianum, Kuntze, l. c. 979 = *Dianthera comara*, Linn.
Moritzianum, Kuntze, l. c. 980 = *Adhatoda Moritziana*, Nees.
nanum, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa nana*, Nees). — Mexic.
natalense, Kuntze, l. c. = *Adhatoda natalensis*, Nees.
Neesianum, Kuntze, l. c. = J. Neesiana, Wall.
neuranthum, Kuntze, l. c. = J. neurantha, Collett & Hemsl.
nilgerrhense, Kuntze, l. c. = J. nilgerrhensis, Wall.
nodosum, Kuntze, l. c. = *Adhatoda nodosa*, Benth. & Hook. f.
nothum, Kuntze, l. c. = J. notha, C. B. Clarke.
nudum, Kuntze, l. c. = *Adhatoda nuda*, Nees.
oblongum, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa oblonga*, Nees). — N. Granat.
obtusifolium, Kuntze, l. c. = *Dianthera ovata*, Walt.
odorum, Kuntze, l. c. = J. odora, Vahl.
Oerstedtii, Kuntze, l. c. 978 = *Dianthera glabra*, Benth. & Hook. f.
Orbignianum, Kuntze, l. c. 981 = *Adhatoda Orbigniana*, Nees.
orchiodes, Kuntze, l. c. = J. orchiodes, Linn. f.

ECBOLIUM: —

- oreophilum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 981 = J. oreophila, C. B. Clarke.
origanodes, Kuntze, l. c. = *Adhatoda origanoides*, Nees.
Orthotactus, Kuntze, l. c. 979 (= *Amphiscopia Moricandiana*, Nees). — Bras.
ovatum, Kuntze, l. c. 978 = *Dianthera ovata*, Walt.
pacificum, Kuntze, l. c. 981 = J. pacifica, Hemsl.
palustre, Kuntze, l. c. = J. palustris, T. Anders.
paniculatum, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa paniculata*, Nees). — Bras.
parviflorum, Kuntze, l. c. = *Dianthera parviflora*, A. Gray.
parvifolium, Kuntze, l. c. = D. parvifolia, Benth. & Hook. f.
patulum, Kuntze, l. c. = *Adhatoda patula*, Nees. — Bras.
pauciflorum, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa pauciflora*, Nees). — Bras.
pectorale, Kuntze, l. c. 487 = *Dianthera pectoralis*, J. F. Gmel.
peplodes, Kuntze, l. c. 981 = D. peploides, Griseb.
periplocifolium, Kuntze, l. c. = *Adhatoda periplocifolia*, Nees.
petiolare, Kuntze, l. c. 981 = J. petiolaris, E. Mey.
plicatum, Kuntze, l. c. = *Adhatoda plicata*, Nees.
Poeppigianum, Kuntze, l. c. = (*Rhytiglossa Poeppigiana*, Nees). — Bras.
Pohlmanum, Kuntze, l. c. (= *Amphiscopia Pohlman*, Nees). — Bras.
polygonodes, Kuntze, l. c. (= J. *polygonoides*, H. B. & K.). — N. Granat.
polystachyum, Kuntze, l. c. 488 et 981 = J. polystachya, Lam.
procumbens, Kuntze, l. c. 488 = J. procumbens, Linn.
protractum, Kuntze, l. c. 981 = *Adhatoda protracta*, Nees.
psychrioides, Kuntze, l. c. = J. psychotrioides, Thou.
ptychostomum, Kuntze, l. c. = J. ptychostoma, Wall.
pubigerum, Kuntze, l. c. = J. pubigera, Wall.
punduatum, Kuntze, l. c. 488 = J. punduana, Wall.
punctatum, Kuntze, l. c. 981 = *Dianthera punctata*, Vahl.
quadrifarium, Kuntze, l. c. = J. quadrifaria, Wall.
quinqueangulare, Kuntze, l. c. = J. quinqueangulare, Koen.
racemosum, Kuntze, l. c. = J. racemosa, Ruiz & Pav.
reflexiflorum, Kuntze, l. c. 487 = *Adhatoda reflexiflora*, Nees.
repens, Kuntze, l. c. 981 (= *Rhytiglossa repens*, Nees). — Bras.
refractifolium, Kuntze, l. c. 487. — Costarica.
reptans, Kuntze, l. c. = *Dianthera reptans*, J. F. Gmel.
retusum, Kuntze, l. c. = J. retusa, Vahl.
rhodopterum, Kuntze, l. c. = J. rhodoptera, Baker.
rigidum, Kuntze, l. c. = *Dianthera rigida*, Benth. & Hook. f.
roseum, Kuntze, l. c. (= *Amphiscopia rosea*, Nees). — Bras.
rostratum, Kuntze, l. c. = J. rostrata, Bertol.
Rostellaria, Kuntze, l. c. 979 = J. neglecta, T. Anders.
rotundifolium, Kuntze, l. c. 981 = J. rotundifolia, E. Mey.
Ruizianum, Kuntze, l. c. = *Dianthera lineolata*, Tafalla.
ringiodes, Kuntze, l. c. 488. — Java.
salicifolium, Kuntze, l. c. 981 = J. salicifolia, T. Anders.
salsolodes, Kuntze, l. c. = J. salsoloides, T. Anders.
salviaefolium, Kuntze, l. c. 488 et 981 = J. salviaeflora, H. B. & K.
sarmentosum, Kuntze, l. c. 981 (= *Rhytiglossa sarmentosa*, Nees). — Bras.
scabrum, Kuntze, l. c. 488 = *Adhatoda scabra*, Nees.
Schimperianum, Kuntze, l. c. 981 = *Adhatoda Schimperiana*, Hochst.
secundum, Kuntze, l. c. 488 = *Dianthera secunda*, Griseb.

ECBOLIUM: —

- Sellinii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 979 (= *Amphiscopia ciliata*, Nees). — Reg. Argent.
sessile, Kuntze, l. c. 488 = *Dianthera sessilis*, *J. F. Gmel.*
setaceum, Kuntze, l. c. 979 = *Dianthera ciliata*, *Benth. & Hook. f.*
simplex, Kuntze, l. c. 488 = *J. simplex*, *D. Don.*
spartioides, Kuntze, l. c. 981 = *J. spartioides*, *T. Anders.*
speciosum, Kuntze, l. c. 488 = *Dianthera speciosa*, *Benth. & Hook. f.*
spergulifolium, Kuntze, l. c. 981 = *J. spergulaefolia*, *T. Anders.*
sphaerospermum, Kuntze, l. c. 979 = *J. sphaerosperma*, *Vahl.*
speciosum, Kuntze, l. c. 488 = *Dianthera speciosa*, *Benth. & Hook. f.*
spicatum, Kuntze, l. c. 979 = *Adhatoda spicata*, *Nees.*
squarrosus, Kuntze, l. c. = *Dianthera nodosa*, *Benth. & Hook. f.*
strobilaceum, Kuntze, l. c. (= *Amphiscopia strobilacea*, *Nees.*) — Bras.
subserratum, Kuntze, l. c. = *J. Gendarussa*, *Burm. f.*
sulcatum, Kuntze, l. c. = *Adhatoda sulcata*, *Nees.*
Swartzii, Kuntze, l. c. 979 = *Adh. divergens*, *Nees.*
symphyanthum, Kuntze, l. c. 981 (= *Rhytiglossa symphyantha*, *Nees.*) — Bras.
tenellum, Kuntze, l. c. = *J. tenella*, *T. Anders.*
tenuiflorum, Kuntze, l. c. = *J. tenuiflora*, *Ruiz. & Pav.*
thymifolium, Kuntze, l. c. = *Adhatoda thymifolia*, *Nees.*
tranquebariense, Kuntze, l. c. = *J. tranquebariensis*, *Linn. f.*
trichotomum, Kuntze, l. c. 488. — Costarica.
trifoliodes, Kuntze, l. c. 981 = *J. trifolioides*, *T. Anders.*
trinervium, Kuntze, l. c. = *J. trinervia*, *Vahl.*
triste, Kuntze, l. c. = *Adhatoda tristis*, *Nees.*
Tweedianum, Kuntze, l. c. = *Adh. Tweediana*, *Nees.*
umbrosum, Kuntze, l. c. = *Adh. umbrosa*, *Nees.*
vagans, Kuntze, l. c. = *J. vagans*, *Collett & Hemsl.*
vasculosum, Kuntze, l. c. = *J. vasculosa*, *Wall.*
Velasquezii, Kuntze, l. c. = *J. Velasquezii*, *Bertol.*
velutinum, Kuntze, l. c. (= *Anisostachya velutina*, *Nees.*) — Madag.
venosum, Kuntze, l. c. = *J. cristata*, *Pohl.*
ventricosum, Kuntze, l. c. = *J. ventricosa*, *Wall.*
verticillare, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa verticillaris*, *Nees.*) — Ins. Puerto-Rico.
villosum, Kuntze, l. c. 978 = *Adhatoda divaricata*, *Nees.*
violaceum, Kuntze, l. c. 981 = *J. violacea*, *Vahl.*
virgatum, Kuntze, l. c. = *Dianthera virgata*, *Benth.*
Willdenowii, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa scabra*, *Nees.*) — Hab. ?
Wrightii, Kuntze, l. c. 981 = *J. Wrightii*, *A. Gray.*
wynadense, Kuntze, l. c. = *J. wynadensis*, *Heyne.*
xipotence, Kuntze, l. c. 979 (= *Rhytiglossa leucophloea*, *Nees.*) — Bras.
Zeylanicum, Kuntze, l. c. 978 = *J. Hookeriana*, *T. Anders.*
Zollingerianum, Kuntze, l. c. 981 = *J. Zollingeriana*, *C. B. Clarke.*

ECCLINUSA, Mart. (Sapot.). — Ind. Kew i. 808.
brevipes, *Pierre. Not. bot. Sapot.* (1891) 57. — Bras.
costata, *Pierre, l. c.* 56. — Bras.
Glaziovii, *Pierre, l. c.* — Bras.
Grisebachii, *Pierre, l. c.* 57. — Ins. Trinit.
lanceolata, *Pierre, l. c.* (= *Passaveria lanceolata* *Mart. & Eichl.*) — Bras.
sanguinolenta, *Pierre, l. c.* 50 in obs. (= *Ragala sanguinolenta*, *Pierre.*) — Hab. ?

ECDYSANTHERA, Hook. et Arn. (Apocyn.). — Ind. Kew i. 808.
inflata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 163 = *Anodendron inflatum*, *Hassk.*
myrtifolia, K. Schum. l. c. (= *Dendrocharis myrtifolia*, *Mik.*) — Malaya.

ECHEANDIA, Orteg. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 808.
brevifolia, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 441. — Mexic.
nodosa, *S. Wats. l. c.* xxvi. (1891) 156. — Mexic.
parviflora, *Baker, ex Hemsl. Biol. Centr.-Am.* iv. (1886) 91; et in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 209. — Guatem.

ECHEVERIA, DC. = **Cotyledon**, Linn. (Crassul.).
bracteosa, K. Schum. ex T. Rümpler, Die Sukkulanten (1892) 77. — Hab. ?

ECHIDNOPSIS, Hook. f. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 809.
Dammanniana, *Sprenger, in Dammann, Catal.* (1892) 4 fig. 5; *Wien. Illustr. Gartenz.* (1892) 351 fig. 59; *Gartenfl.* (1892) 526 fig. 107; *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1894) ii. 530. — Eritrea.
Dammanniana, *Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 349 nomen = praec.
nubica, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 263. — Nubia.
tessellata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 274 = *cereiformis*, *Hook. f.*
Virchowii, K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* (1893) 98 cum ic.; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 328. — Afr. trop. or.

ECHINACANTHUS, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 809.
dichotomus, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 489. — Java.
javanicus, *Kuntze, l. c.* — Java.

ECHINOCACTUS, Link et Otto (Cact.). — Ind. Kew. i. 809.
alteolens, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv, II (1890) 246 = *Discocactus alteolens*, *Lam.*
bolansis, *Runge, in Gartenfl.* (1889) 106 fig. 21. — Hab. ?
constrictus X, *Hildm. in Monatsschr. f. Kakteenk.* i. (1891) 15. — Hybr. artef.
disciformis, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 189 = *turbiniiformis*, *Pfeiff. et Otto.*
Dregeanus, *Hort. ex W. Moeller, in Rev. Hort.* (1895) 186. — Hab. ?
Grusonii, *Hildm. in Monatsschr. f. Kakteenk.* i. (1891) 4 et 45 cum ic. — Mexic.
Haselbergii, *Foerst. Handb. d. Cacteenk.* i. (1886) 563; et ex *Hook. f. in Bot. Mag.* (1888) t. 7009. — Hab. ?
leucotrichus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 27. — Chile.
Lewisii, K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* v. (1895) 11 (= *Anhalonium Lewisii*, *Hennings*) — Mexic. ?
Maddowellii, C. R. Orcutt, in *West-Am. Scientist* (1894) 118 cum xylogr. — Mexic.
Mac Dowellii, *Rebut, ex Monatsschr. f. Kakteenk.* iv. (1894) 133 (an praec. ?). — Hab. ?
mitis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 493. — Chili.
multicostatus, *Hildm. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 187; *W. Moell. in Rev. Hort.* (1895) 186. — Mexic.
Orcuttii, *Engelm. ex C. R. Orcutt, in West-Am. Scientist.* ii. (1886) 46 cum fig. — Calif.
Peninsulae, L. Weber, in *Bull. Mus. Paris.* i. (1895) 320. — Calif.
placentiformis, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv, II. (1890) 246 (= *E. placentiformis*, *Lehm.*) = *Discocactus insignis*, *Pfeiff.*
rinconadensis, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 189 in obs. = *rinconensis*, *Poselg.*
Schumannianus, *Nicolai, in Monatsschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 175. — Parag.
senilis, *Phil. in Gartenfl.* (1886) 485 t. 1230 a. — Chili.
Trollietii, *Rebut, ex K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk.* v. (1895) 184. — Mexic.

ECHINOCAARPUS, Blume (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 813.
sinensis, *Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 147 [an *E. sinensis*, *Hance* ?] — China.

ECHINOCEREUS, Engelm. = **Cereus**, Haw. (Cact.).
amoenus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 185 = *C. amoenus*, *Hemsl.*
bicolor, « Galeotti, » ex *Wien. Illustr. Gartenzeit.* (1893) 83. [Quid ?]. — Mexic.
cinnabarinus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 185 (= *Echinopsis cinnabarina*, *Labour.*) — Bolivia.
clavatus, K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* (1895) 123. — Am. austr.
Hildmannii, *Arendt, in Monatsschr. f. Kakteenk.* i. (1891) 146. — Hab. ?
hypogaeus, A. Weber, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 185 (= *Eulychnia clavata*, *Phil.*) — Chili.
Knippelianus, *Liebner, in Monatsschr. f. Kakteenk.* v. (1895) 170. — Mexic.
leonensis, *Mathsfon, l. c.* i. (1891) 66. — Mexic.
Pentlandii, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 185 (= *Echinopsis Pentlandii*, *Salm-Dyck*). — Peruvia.
pulchellus, K. Schum. l. c. = *Cereus pulchellus*, *Pfeiff.*
Rungei, K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* (1895) 124 (= *E. texensis*, *Runge*). — Texas.

ECHINOCHLOA, Beauv. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).
disticha, St. Lager, in *Cariot., Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 892 = *P. Crus-galli*, *Linn.*
oryzoides, *Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien.* xli. (1891) 742 = *P. Crus-galli*, *Linn.*

ECHINOCYSTIS, Torr. & Gray (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 812.
Brandegei, *Cogn. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 215; et iii. (1890) 59 (= *Vaseyanthus Bigelovii*, *N. E. Rose*) = *Brandegea Bigelovii*, *Cogn.*
cirrhopedunculata, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 100 in obs. — Mexic.
Coulteri, T. S. Brandeg. in *Zoë*, iv. (1894) 402. — Calif.
echinata, *Britton, Stern & Pogg. Prelim. Cat.* (1888) 20 = *lobata*, *Torr. et Gray.*
macrocarpus, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 284. — Bolivia.
minima, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. ii.* ii. (1889) 159 et 216. — Calif.

ECHINOPANAX, Decne et Planch. = **Fatsia**, Decne et Planch. (Araliac.).
japonicum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = *F. japonica*, *Decne et Planch.*
papyrifera, Kuntze, l. c. = *F. papyrifera*, *Benth. & Hook. f.*

ECHINOPEPON, Naud. = **Echinocystis**, Torr. et Gray (Cucurbit.).
cirrhopedunculatus, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 100 = *Echinoc. cirrhopedunculatus*, *N. E. Rose.*
insularis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 51. — Ins. S. Pedro Martin (Calif. austr.).
Palmeri, S. Wats. l. c. 52. — Mexic.

ECHINOPHORA, Tourn. ex Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 814.
chrysantha, *Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 121. — Armen.

ECHINOPS, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 814.
bipinnatus, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 217. — As. Min.
chaetocephalus, *Pomel. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1890) 482. — Algeria.
Conrathi, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 356. — As. occ.
eryngiifolius, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 419. — Afr. trop. or.
galaticus, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 355. — As. Min.

ECHINOPS: —

- heterocephalus, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 11. — As. Min.
 Hoehnelii, Schweinf. in v. Hochnel, *Zum Rudolph See*, Append. (1892) 11. — Afr. trop. or.
 macedonicus, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxxii. (1894) 166. — Maced.
 major, St Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 412 = *sphaerocephalus*, Linn.
 minor, St Lager, l. c. 413 = E. Ritro, Linn.
 niveus, Henderson, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 261 = *Cousinia nivea*, C. Winkl.
 quercifolius, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 356 = *bannaticus*, Rechel.
 Sintenisii, Freyn, l. c. — Armen.
 spinosissimus, Freyn, l. c. 354. — As. Min.
 thracicus, Velen. in *Sitz. Bochm. Gen. Wiss.* 1890 (1890) ii. 49; et *Vestniki* 49. — Thracia.

ECHINOPSILON, Moq. = **Chenolea**, Thunb. (Chenop.).

tibeticus, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 10 = C. divaricata, Hook. f.

ECHINOPSIS, Zucc. = **Cereus**, Haw. (Cact.).

- gemmata, K. Schum. in Mart. *Fl. Bras.* iv. 11. (1890) 231 = C. turbinatus, Pfeiff.
 leucantha, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 184 = C. leucanthus, Pfeiff.
 obrepandus, K. Schum. l. c. (= *Echinocactus obrepandus*, Salm-Dyck). — Bolivia.
 minuscula, Cat. Rebut, ex K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* v. (1895) 105 = *Rebutia minuscula*, K. Schum.
 Salmiana, Hort. Germ. ex Rud. Meyer. in *Monatss. f. Kakteenk.* v. (1895) 155. — Hab. ?

ECHINOPUS, Tourn. ex Adans. = **Echinops**, Linn. (Compos.).

- galalensis, Schweinf. in Aschers. & Schweinf. (Suppl. Illustr. fl. Égypte) in *Mém. Inst. Égypt.* ii. (1889) 762. — Aegypt.

ECHINOSPERMUM, Sw. (Borag.). — Ind. Kew. i. 816.

- virginianum, Britton, Stern, & Pogg. *Prelim. Cat.* (1888) 37 = virginicum, Lehm.
 zapateri, Pau, ex Magnier, *Scrin. fl. select.* xiii. (1895) 72 = *barbatum*, Lehm.

ECHINOSTACHYS, Brongn. = **Aechmea**, Ruiz et Pav. (Bromel.).

- hystrix, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiii. Beibl. n. 29. (1891) 4 = A. hystrix, Ed. Morr.
 Prieureana, Brongn. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 39 = A. Prieureana, Baker.

ECHINOTHAMNUS, Engl. Bot. *Jahrb.* xiv. (1892) 383. **PASSIFLOREAE**.

- Pechuelii, Engl. l. c.; K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* v. (1895) 54. — Afr. austro-occ. extra-trop.

ECHINUS, Lour. = **Mallotus**, Lour. (Euphorb.).

- Baillonianus, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 977; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1891) t. 175 = M. Baillonianus, Muell. Arg.
 integrifolius, Baill. l. c. 978 = M. integrifolius, Muell. Arg.
 oppositifolius, Baill. l. c.; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1891) t. 174 = *Croton oppositifolius*, Geisel.

ECHITES, P. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 817.

- apocynifolia, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 435. — Mexic.
 boliviana, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 219. — Bolivia.
 comosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 414. — Am. centr.
 contorta, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 166. — Columb.
 macrophylla, Zahlbr. in *Annal. Hofmus. Wien*, ii. (1892) 5. — Peruvia.

ECHIUM, Tourn. ex Linn. (Borag.). — Ind. Kew. i. 820.

- Argentae, Pau. *Not. bot. fl. Españ.* i. (1887) 22 = vulgare, Linn.
 balearicum, Porta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 318. — Ins. Balear.
 Bourgaeum, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 126 = *Auberianum*, Webb et Berth.
 frutescens, Coincy, in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 65. — Hisp.
 horridum, Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 336. — Algeria.

ECLIPTICA, Rumpf, *Herb. Amboin.* vi. (1750) 48 f. 18.1; ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 334 = **Eclipta**, Linn. (Compos.).

- alba, elliptica, lanceolata, platyglossa, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Ecliptae.
 latifolia, Kuntze, l. c. = *Blainvillea rhomboidea*, Cass.

ECTADIOPSIS, Benth. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 822.

- Buettneri, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 219. — Congo.
 cryptolepioides, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 10. — Afr. austr.
 lanceolata, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 803. — Angola.
 nigritiana, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 219 = *nigritana*, Benth. ?
 scandens, K. Schum. l. c. — Angola.
 Welwitschii, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 803. — Angola.

ECTINOCLADUS, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 822.

- Benthami, Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 211; Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2341. — Afr. trop. occ.

EDITHCOLEA, N. E. Br., in *Kew Bull.* (1895) 220. **ASCLEPIADEAE**.

- grandis, N. E. Br. l. c. — Reg. Somal.

EDRAIANTHUS, A. DC. = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campanul.).

- pumiliorum, Maly, ex Wettst. *Monog. Edraj.* (1887) 192 in syn. = *Hedreanthus dinaricus*, Wettst.
 Wettsteinii, Halácsy & Baldacci, ex Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitsch.* xli. (1891) 377. — Montenegro.

EDWARDIA, Rafin. = **Cola**, Schott et Endl. (Stercul.).

- acuminata, argentea, cauliflora, clavata, digitata, ficifolia, gabonensis, heterophylla, laurifolia, quinqueloba, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 79 = *homonyma omnia* Colae.
 caricifolia, Kuntze, l. c. = C. Afzelii, Mart.

EGANIA, Remy = **Chaetanthera**, Ruiz et Pav. (Compos.).

- appressa, Phil. in *Anal. Mus. Nac. Chile* (1891) 34. — Chili.
 revoluta, Phil. l. c. — Chili.

EGLETES, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 822.

- prostrata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 334 = *domingensis*, Cass.

EHRETIA, Linn. (Borag.). — Ind. Kew. i. 823.

- acutifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 28. — Afr. trop. occ.
 angolensis, Baker, l. c. 29. — Angola.
 cordifolia, Robins. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 319; et ex Pringle, in *Gard. and For.* vii. (1894) 153. — Mexic.
 divaricata, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 24. — Zambes.
 Fischeri, Gürke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 336. — Afr. trop. or.
 formosana, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 144. — Ins. Formos.
 Hanceana, Hemsl. l. c. 145. — China.
 keyensis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii (1891) 424. — Oceania.

EHRETIA: —

- littoralis, Gürke, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 16 nomen; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam* C (1895) 335. — Afr. trop. or.
 Luxiana, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. 1. (1893) 5. — Guatem.
 macrophylla, Baker, in *Kew Bull.* (1891) 29. — Afr. trop. or.
 mexicana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi (1891) 144. — Mexic.
 Navesii, Vidal, *Rev. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 194. — Ins. Philipp.
 nemoralis, Gürke, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 26 nomen, et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 336. — Afr. trop. or.
 silvatica, Gürke, l. c. (1893) 63 nomen; et in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 46. — Afr. trop. or.
 Stuhlmannii, Gürke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 336. — Afr. trop. or.
 teitensis, Gürke, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 31 nomen; et in *Engl. l. c.* — Afr. trop. or.

EHRHARTA, Thunb. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 824.

- uniglumis, Fenzl, ex Th. Dur. & Schinz. *Consp. Fl. Afr.* V. 1894 (1895) 770 in syn. = *Tricholaena uniglumis*, Feuzl.

EICHLERINA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 174 = **Loranthus**, Linn.

densiflora, Van Tiegh. l. c. 175. = L. densiflorus, Benth.

Deppeana, Van Tiegh. l. c. = L. Deppeanus, Cham. & Schlecht.

elegans, Van Tiegh. l. c. = L. elegans, Mart.

Liebmanni, Van Tiegh. l. c. = L. Liebmanni, Oliver

orbicularis, Van Tiegh. l. c. = L. orbicularis, H. B. & K.

rhynchophylla, Van Tiegh. l. c. = L. rhynchophyllus, Eichl.

vulgaris, Van Tiegh. l. c. = L. vulgaris, Mart.

EKEBERGIA, Sparrm. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 824.

- suavis, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1893) t. 256. — Madag.

ELACHANTHERA, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Dec. 1886) 108. **LILIACEAE**.

Sewelliae, F. Muell. l. c. — Austral.

ELACHOLOMA, F. Mull. et Tate, in *Vict. Natural.* xii. (June 1895) 14. **PEDALINEAE**.

Hornii, F. Muell. & Tate, l. c.; et in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 82. — Austral.

ELAEAGIA, Wedd. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 824.

- grandis, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 208. — Bolivia.

ELAEAGNUS, [Tourn.] Linn. (Elaeagn.). — Ind. Kew. i. 825.

Davidi, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II x. (1887-88) 77. — Tibet.

pyriformis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 202. — Reg. Himal.

sativa, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 207. = *augustifolia*, Linn.

sinensis, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 428 = *pungens*, Thunb.

ELAEIS, Jacq. (Palm.). — Ind. Kew. i. 825.

Dybowski, Hua, in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 315. — Congo gall.

ELAEOCARPUS, Burm. ex Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 825.

- acuminatus, Korders & Valetton, in *Mededel. s' Lands Plantent.* n. xi, Bijdr. n. i (1894) 258. — Java ?
 Braceanus, Watt, ex C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 8. — Ind. or.
 culminicola, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 23. — Oceania.

ELAEOCARPUS : —

- dalechampioides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 452. — Madag.
 decipiens, Hemsl. ex Forbes & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 94. — As. or.
 Eumundi, F. M. Bailey, in *Proc. Roy. Soc. Queensl.* (1894) 5. — Austral.
 Hildebrandtii, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris* i. (1886) 562; et *Hist. pl. Madag., Atlas* (1889) t. 93. — Madag.
 Humblotii, Baill. *ll. cc.* 562 et 94. — Madag.
 Jackii, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S.* I. ii. (1889) 3. = ferrugineus, Steud.
 Kirtonii, F. Muell. ex F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl., Suppl.* i. (1886) 8. — Austral.
 latescens, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S.* I. ii. (1889) 2. — N. Guin.
 longifolia, C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 67. — Austral.
 Parkinsonii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 377. — Oceania.
 Reedyi, F. Muell. in *Trans. & Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 175 in obs. — N. Guin.
 rhodanthoides, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 560; et *Hist. pl. Madag., Atlas* (1889) t. 91. — Madag.
 Richardi, Baill. *ll. cc.* 563; et t. 94. — Madag.
 Sayeri, F. Muell. in *Trans. & Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 174. — N. Guin.
 sericeus, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 137. — Borneo.
 sphaericus, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1890) 5 = E. Ganitrus, Roxb.
 Thouarsii, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 563; et *Hist. pl. Madag., Atlas* (1889) t. 96. — Madag.
 undulatus, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 378. — Oceania.
 viscosus, Warb. *l. c.* xviii. (1894) 201. — Oceania.

ELAEODENDRON, Jacq. f. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 826.

- confertifolium, Szyszyl. *Pl. Rehmann.* ii. (1888) 37 (= *Myrtostyloxylon confertifolium*, Eckl. & Zeyh.). — Afr. austr.
 glaucus, Szyszyl. *l. c.* 36. — Afr. austr.
 gymnosporoides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 460. — Madag.
 lycioides, Baker, *l. c.* xxv. (1889) 306. — Madag.
 Rehmannii, Szyszyl. *Pl. Rehmann.* ii. (1888) 37. — Afr. austr.
 somalense, Engl. ex Loesen. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 550 in syn. = Cassine Schweinfurtiana, Loesen.
 zanzibaricum, Schweinf. ex Loesen. *l. c.* = C. Schweinfurtiana, Loesen.

ELAEOLUMA, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 293. **SAPOTACEAE**.
 Schomburgkiana, Baill. *l. c.* (= *Myrsine Schomburgkiana*, Miq.). — Bras.**ELAEOSELINUM**, Koch (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 827.
 polygamum, Caruel, in *Parl. Fl. Ital.* viii. (1889) 509 = *Laserpitium polygamum*, Linn.**ELATERIUM**, Jacq. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 827.
 longisepalum, Cogn. ex N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 318. — Mexic.
 pauciflorum, Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx 1891 (1892) 276. — Costarica.**ELATINE**, Linn. (Elatin.). — Ind. Kew. i. 827.
 aetolica, Haldacz & Wettst. ex Wettst. in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 312. — Graecia.
 inaperta, Lloyd, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 58. — Gall.
 tetrandra, Maxim. in *Bull. Acad. St-Petersb.* xxxii. (1888) 484. — Japon.**ELATINOIDES**, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b (1891) 58 = **Linaria**, [Tourn.] Mill. (Scrophul.)**ELATINOIDES** : —

- aegyptiaca, Brunneri, cirrhosa, commutata, dichondraefolia, Elatine, ramosissima, spartioides, spuria, Wettst. *l. c.* = homonyma omnia Linariae.

ELATOSTEMA, Forst. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 828.

- ciliatum, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 574. — Ind. or.
 bulbothrix, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1894) 230 [Elatostemma]. — Borneo.
 Clarkei, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 569. — Bengal.
 Griffithii, Hook. f. *l. c.* — Assam.
 filicinum, Baker, ex Focke, in *Abh. Naturw. Ver. Bremen*, xiii. (1895) 164 in obs. — Hab.?
 Finisterrae, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 19 [Elatostemma]. — Oceania.
 hexadontum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 524. — Madag.
 lineare, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. ii. iv. (1894) 228. — Borneo.
 lithoneurum, Stapf, *l. c.* 230 [Elatostemma]. — Borneo.
 Lowi, Stapf, *l. c.* 229. — Borneo.
 nasutum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 571. — Reg. Himal.
 novo-guineense, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 290 [Elatostemma]. — N. Guin.
 orientale, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 164 [Elatostemma]. — Afr. trop. or.
 pusillum, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 568. — Reg. Himal.
 reptans, Hook. f. *l. c.* 567. — Ind. or.
 stellatum, Hook. f. *l. c.* 572. — Reg. Himal.
 thalictroides, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. ii. iv. (1894) 229. — Borneo.
 thomense, Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 163. — Ins. S. Thom.
 Treutleri, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 571. — Reg. Himal.
 Walkerae, Hook. f. *l. c.* 566. — Zeyl.
 Wightii, Hook. f. *l. c.* 570. — Ind. or.

ELATTOSTACHYS, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 828.

- tetraporandra, Radlk. in *Sitz. Math. Phys. Acad. Muench.* xx. (1890) 267. — Oceania.

ELCOMARHIZA, Rodr. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* IV. 2. (1895) 305. in obs. **ASCLIPADEAE**.
 amilacea, Rodr. *l. c.* — Bras.**ELEMIFERA**, Linn. = **Amiris**, P. Br. (Burser.)
 balsamifera, decandra, lineata, maritima, Plumieri, silvatica, Tecomaca, terebinthifolia, thyrsoflora, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 100 = homonyma omnia Amirydis.

- bipinnata, Kuntze, *l. c.* = Bursera bipinnata, Engl.
 hexandra, Kuntze, *l. c.* = Dacryodes hexandra, Griseb.

ELEOCHARIS, R. Br. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 829.

- amphibia, C. B. Clarke, in *Journ. Bot.* xxv (1887) 270 (= *Heleocharis amphibia*, Durieu). — Eur. occ.
 amphibia, Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 320 = praec.
 anceps, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 596 (= *Heleocharis anceps*, Ridl.). — Afr. trop.
 carniolica, C. B. Clarke, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 269 (= *Heleocharis carniolica*, Koch). — Eur. austr.
 comosa, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 143 = acicularis, R. Br.
 complanata, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 598 (= *Heleocharis complanata*, Boeck.). — Afr. trop.
 contracta, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1. 139 t. 41 C. — Parag.
 flexifolia, Reichb. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 622 = *Scirpus flaccifolius*, Steud.

ELECHARIS : —

- Hildebrandtii, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 598 (= *Heleocharis Hildebrandtii*, Boeck.). — Afr. trop.
 intermedia, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1. 138 t. 41 A. — Parag.
 mitrata, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 599 (= *Scirpus mitratus*, Griseb.). — Am. et Afr. trop.
 Naumanniana, C. B. Clarke, *l. c.* (= *Heleocharis Naumanniana*, Boeck.). — Afr. trop.
 neo-zelandica, C. B. Clarke, ex T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 260. — N. Zel.
 paraguayensis, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1. 137. t. 41 B. — Parag.
 Parishii, Britton, in *Journ. N. Y. Microsc. Soc.* v. (1889) 111. — Calif.
 sanguinea, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1. 135 t. 40 c. — Parag.
 subvivipara, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 629; et in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 601 (= *Heleocharis subvivipara*, Boeck.). — Ind. or., Madag.
 trilophus, C. B. Clarke, *l. c.* 601. — Senegal.
 villaricensis, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1. 138 t. 40 B. — Parag.
 Wolfii, A. Gray, ex Britton, in *Journ. N. Y. Microsc. Soc.* v. (1889) 105 = *Scirpus Wolfii*, A. Gray.

ELEPHANTOPUS, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 831.

- angolensis, O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 172. — Angola.

ELETTARIOPSIS, Baker, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 251. **SCITAMINEAE**.

- Curtisii, Baker, *l. c.* 252. — Penang.
 exserta, Baker, *l. c.* 251. — Penins. Mal.
 longituba, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1893) 382. — Penins. Mal.
 serpentina, Baker, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 252. — Penang.

ELEUSINE, Gaertn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 839.

- blepharoglossis, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 113. — Afr. trop. or.

ELEUTHERANTHERA, Poit. (Compos.). — Ind. Kew. i. 832.

- areolata, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 107. Am. austr.
 divaricata, Millsp. *Field Columb. Mus. Bot. Ser. I* (1895) 53 = *Melampodium divaricatum*, DC.
 ruderalis, Hitchc. in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv (1893) 99 = *Ogiera ruderalis*, Griseb.

ELEUTHEROCOCCUS, Maxim. (Aral.). — Ind. Kew. i. 832.

- Henryi, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1711. — China.
 leucorrhizus, Oliver, *l. c.* — China.

ELIONURUS, Humb. et Bonpl. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 832.

- barbiculmis, Hack. ex Scribn. in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 296; et in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 339. — Am. bor. occ.
 hirtifolius, Hack. in *DC.* *l. c.* 341. — Afr. trop. occ.
 lividus, Hack. *l. c.* 337. — Parag.
 platypus, Hack. *l. c.* 335. (= *Andropogon platypus*, Trin.). — Sierra-Leone.
 tristis, Hack. *l. c.* 331. — Madag.

ELLEANTHUS, Presl (Orchid.). — Ind. Kew. i. 833.

- yungasensis, Rolfe, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 262. — Bolivia.

ELLERTONIA, Wight (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 833.
sessilis, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 144. — Ins. Mayotte.

ELLIPANTHUS, Hook. f. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 833.
luzoniensis, *Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 104. — Ins. Philipp.
sterculiaefolius, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 209 t. 8. — Burma.

ELLIPEIA, Hook. f. & Thoms. (Anon.). — Ind. Kew. i. 833.
costata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 26. — Burma.
leptopoda, *King, l. c.* 25. — Perak.
pumila, *King, l. c.* 27. — Perak.
undulata, *Scortech, ex King, l. c.* 56 in syn. = *Polyalthia Scortechinii, King.*

ELODEA, Michx (Hydrochar.). — Ind. Kew. i. 834.
chinensis, *Casp. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 1 (1889) 251, sphalm. = *chilensis, Casp.*

ELSHOLTZIA, Willd. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 834.
Oldhami, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 277. — Formosa.
Patrinii, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 517 = *cristata, Benth.*
rugulosa, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 278. — China.

ELSOTA, Adans. = **Securidaca**, Linn. (Polygal.).
acuminata, bralata, bracteata, complicata, Goudotiana, Hostmanni, Lamarchii, lanceolata, lateralis, longifolia, longipedunculata, macrocarpa, major, marginata, ovalifolia, pubescens, rivinifolia, rufescens, Schlechtendalia, Sellowiana, silvestris, tavoyana, tomentosa, virgata, volubilis, Welwitschii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 46 = *homonyma omnia Securidacae.*
calophylla, Kuntze, l. c. 46 = *S. Corytholobium, A. W. Benn.*
corymbosa, Kuntze, l. c. = *S. corymbosa, Triana & Planch.*
corymbosa, Kuntze, l. c. = *S. Cumingii, Hassk.*
mollis, Kuntze, l. c. = *S. volubilis, Linn.*
retusa, Kuntze, l. c. = *S. retusa, Spruce.*

ELVASIA, DC. (Ochnac.). — Ind. Kew. i. 834.
elvasioides Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 145 in obs. = *E. Hostmannia, Planch.*
Hostmanniana, Planch. ex Gilg, l. c. sphalm. = *E. Hostmannia, Planch.*

ELYMUS, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 834.
ambiguus, *Vasey & Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 280. — Colorado.
americanus, *Vasey & Scribn. ex Macoun, Catal. Canad. Pl.* iv. (1888) 245; et l. c. 280 in syn. = *glauca, Buckl.*
attenuatus, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 132 — Russia.
clymoides, *Swezey, Cat. Nebraska Pl.* (1891) 15 = *E. Sitanion, Schult.*
erianthus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1892) 13 t. 5. — Chili.
Macounii, *Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 119. — Am. bor. occ.
nitidus, *Vasey, l. c.* 120. — Oregon.
salinus, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 725. — Am. bor. occ.
vancouverensis, *Macoun, ex Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club.* xv. (1888) 48. — Ins. Vancouv.

ELYNA, Schrad. = **Kobresia**, Willd. (Cyper.).
scirpina, *Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 2 (1887) 122 = *K. scirpina, Willd.*

ELYNANTHUS, Nees = **Tetraria**, Beauv. (Cyper.).
microstachys, Nees, ex C. B. Clarke in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 659 in syn. = *T. aristata, C. B. Clarke.*
sodaliun, Franch, Miss. scient. Cap Horn. v. (1889) 375. t. 8. — Reg. Magell.
usambarensis, K. Schum, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 59 nomen. — Afr. trop. or.
ustulatus, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 663 = *T. rottboelliodes, C. B. Clarke.*

ELYTRANTHE, Blume = **Loranthus**, Linn.
ampullacea, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1. (1889) 188 = *L. ampullaceus, Roxb.*
Arnottiana, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 439 = *L. Arnottianus, Korth.*
Brandisiana, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1. (1889) 188 = *L. Brandisianus, Kurz.*
capitellata, Engl. l. c. 189 = *L. capitellatus, Wight & Arn.*
globosa, Engl. l. c. = *L. globosus, Roxb.*
leucosiphon, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 439 = *L. leucosiphon, Griff.*
Maingayi, Van Tiegh. l. c. = *L. Maingayi, Hook. f.*
trigona, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1. (1889) 188 = *L. trigonus, Wight & Arn.*

EMBELIA, Burn. f. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 836.
Flueckigeri, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (April 1892) 200; et in *Bot. Centralbl.* l. (1892) 313. — Austral.
furfuracea, *Coll. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 82. — Ind. or.
kilimandscharica, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47. (1894) 45. — Afr. trop. or.
longifolia, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 62. (= *Samara longifolia, Benth.*). — Ins. Hongkong.
minutifolia, *Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 201. — Borneo.
oblongifolia, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 62. — China.
obovata, *Hemsl. l. c.* (= *Samara obovata, Benth.*). — China.
pacific, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 282. — Ins. Sandvic.
phaedenia, *Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 201. — Borneo.
spiraeoides, *Stapf, l. c.* — Borneo.
tortuosa, *Stapf, l. c.* 200. — Borneo.

EMERUS, Burm. = **Sesbania**, Scop. (Legumin.).
brachycarpus, exasperatus, grandiflorus, longifolius, macropterus, procumbens, puniceus, simpliciusculus, tetrapterus, Thurberi, tomentosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 180-81 = *hominyma omnia Sesbaniae.*
Sesban, Kuntze, l. c. 180. = *S. aegyptiaca, Poir.*
sphaerospermus, Kuntze, l. c. 181. = *S. sphaerocarpa, Welw.*
vesicarius, Kuntze, l. c. = *S. platycarpa, Pers.*

EMILIA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 837.
integrifolia, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 69. — Afr. centr. or.

EMINIA, Taub. in Ber. deutsch. bot. Ges. ix. (1891) 29; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 359 = **Rhynchosia**, (Legumin.).
antennulifera, Taub. in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 349; *Hemsl. in Ann. Bot. v.* (1891) 408; *Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 360 = *R. antennulifera, Baker.*
eminens, Taub. in Ber. deutsch. bot. Ges. ix. (1891) 30 t. 2 et 3; et l. c. 360 = *antennulifera, Taub.*

EMINIUM, Blume = **Helicophyllum**, Schott (Aroid.).
intortum, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 741 = *H. Rauwolfii, Schott.*
Lehmannii, Kuntze, l. c. = *H. Lehmanni, Regel.*
spiculatum, Kuntze, l. c. = *H. crassipes, Schott.*

EMMENANTHE, Benth. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. i. 837.
foliosa, *M. E. Jones, in Zoë, iv.* (1893) 278. — Utah.

EMMENOPTERYS, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1823. **RUBIACEAE.**
Henryi, *Oliver, l. c.* — China.

EMMEORHIZA, Endl. = **Emeorrhiza**, Pohl (Umbell.).
umbellata, *K. Schum. l. c.* 408. — Bras.

EMPETRUM, [Tourn.] Linn. (Empetr.). — Ind. Kew. i. 837.
bilobum, *Phil. ex Oest. Bot. Zeitschr.* XLIII (1893) 27. — Chili.

ENALLAGMA, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 54. **BIGNONIACEAE.**
cucurbitina, *Baill. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 247 (= *Crescentia cucurbitina, Linn.*). — Am. trop.
obovata, *Baill. l. c.* (= *C. obovata, Benth.*) = *cucurbitina, Baill.*

ENALUS, Aschers & Garcke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. I. (1889) 254 = **Enhalus** L. C. Rich. (Hydrochar.).
acorooides, *Aschers. & Garcke, l. c.* = *Enh. Koenigii, L. C. Rich.*

ENANTIOPHYLLA, Coult. & N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 55. **UMBELLIFERAE.**
Heydeana, *Coult. & N. E. Rose, l. c.* 56 t. 5. — Guatem.

ENARGEA, Banks = **Luzuriaga**, Ruiz & Pav. (Liliac.).
polyphylla, *F. Muell. in Vict. Natural.* iv. (Dec. 1886) 109 = *L. erecta, Kunth.*
radicans, *F. Muell. l. c.* = *L. radicans, Ruiz & Pav.*

ENARTHROCARPUS, Labill. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 838.
tragicerus, *Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 67. — Persia.

ENCELIA, Adans. (Compos.). — Ind. Kew. 838.
cedrosensis, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 17. — Calif. [Ins Cedros].
fruticulosa, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 54 (= *Hopkirkia fruticulosa, Spreng.*). — Am. austr.
glutinosa, *Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l.* (1895) 155. — Mexic.
grandiflora, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 702 (= *Helianthella argophylla, Coville.*). — Calif.
hypargyrea, *Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. II. l.* (1895) 155. — Mexic.
laciniata, *Vasey & N. E. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi.* (1888) 535. — Calif.
nutans, *Eastwood, in Zoë, ii.* (1891) 230. — Colorado.
oblonga, *Robins. & Fernald, in Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 118. — Mexic.
Palmeri, *Vasey & N. E. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi.* (1888) 535. — Mexic., Calif.
pleistocephala, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 189. — Guatem.
radians, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 176. — Calif.
rhombifolia, *Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l.* (1895) 155. — Mexic.
stricta, *Scaton, in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 120. — Mexic.
ventorum, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 175. — Calif.

ENCEPHALARTOS, Lehm. (Cycad.). — Ind. Kew. i. 838.
septentrionalis, *Schweinf. ex Eichl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* II. 1. (1887) 22. — Afr. trop. bor.

ENCHOLIRION, Benth. & Hook. f. = **ENCHOLIRIUM**, Mart. = **Dyckia**, Schult. f. (Bromel.) *Glaziovii*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 505. — Bras.

ENDECANTHUS, Humblotii, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 241. — Madag.

ENDIANDRA, R.Br. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 839. *Cowleyana*, F. M. Bailey, in Dept. Brisbane, Agric. Bot. Bull. v. (1892) 23. — Austral. *dichrophylla*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 12; et ex Bot. Centralbl. li. (1892) 91. — Austral. *exostemonea*, F. Muell. l. c. (June 1892) 42; et l. c. i. (1892) 251. — Austral. *Sankeyana*, F. M. Bailey, in Dept. Brisbane, Agric. Bot. Bull. viii. (1893) 82. — Austral. *Lowiana*, F. M. Bailey, l. c. v. (1892) 24. — Austral. *Maingayi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 127. — Malacca.

ENDLICHERA, Presl = **Emmeorhiza**, Pohl (Rubiace.). *umbellata*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 38. = *Emm. brasiliensis*, Walp.

ENDLICHERIA, Nees = **Aydendron**, Nees (Laurin.). *arunciflora*, Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berlin. v. (1889) 131 = *Ampelodaphne arunciflora*, Meissn. *Browniana*, Mez, l. c. 115 = *Aydendron macrophyllum*, Meissn. *columbiana*, Mez, l. c. 115 (= *Oreodaphne columbiana*, Meissn.) — Columb. *dysodantha*, Mez, l. c. 118 (= *Goeppertia dysodantha*, Nees). — Peruvia. *glomerata*, Mez, l. c. 127. — Bras. *gracilis*, Mez, l. c. 124. — Guian. gall. *guadalupensis*, Mez, l. c. 124. — Ins. Guadalup. *impressa*, Mez, l. c. 132 = *Phoebe impressa*, Meissn. *Lhotskyi*, Mez, l. c. 122 = *Ocotea Lhotskyi*, Nees. *longifolia*, Mez, l. c. 119 (= *Goeppertia longifolia*, Nees). — Peruv. *macrophylla*, Mez, l. c. 128 = *Ampelodaphne macrophylla*, Meissn. *multiflora*, Mez, l. c. 130 = *Amp. dasyantha*, Meissn. *panicularis*, Mez, l. c. 128 (= *Goeppertia panicularis*, Nees). — Bras. *paradoxa*, Mez, l. c. 114. — Peruvia. *piriformis*, Mez, l. c. 116 (= *Mespilodaphne piriformis*, Nees). — Guian. gall. *reflectens*, Mez, l. c. 126 (= *Goeppertia reflectens*, Nees). — Guian. angl. *rubiflora*, Mez, l. c. 494. — Columb. *Sprucei*, Mez, l. c. 125 (= *Goeppertia Sprucei*, Meissn.). — Bras. *rubiflora*, Mez, l. c. 495. — N. Granat. *Szyszyłowiczii*, Mez, l. c. — Peruvia. *tomentella*, Mez, l. c. 115. — Peruvia. *villosa*, Mez, l. c. 129. — Ins. Jamaica.

ENDONEMA, A. Juss. (Penacac.). — Ind. Kew. i. 840. *lateriflora*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 210 = *Thunbergii*, A. Juss.

ENDOSPERMUM, Benth. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 840. *perakense*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 458. — Perak.

ENDUSA, Miers (Oclac.). — Ind. Kew. i. 840. *punctata*, Radlk. in Sitzb. Phys.-Math. Cl. Akad. Muench. xvi. (1886) 313. — Peruvia.

ENDYMION, Dum. = **Scilla**, Linn. (Liliac.). *Lacaillei*, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 574. = *S. festalis*, Salisb.

ENGELHARDTIA, Leschen. (Jugland.). — Ind. Kew. i. 841. *nudiflora*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 597; et in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1747. — Penang. *pterococca*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 637 = *spicata*, Blume.

ENGLERAstrum, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 178. **LABIATAE**. *Schweinfurthii*, Briq. l. c. — Afr. centr. bor.

ENGLERELLA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 46. **SAPOTACEAE**. *macrocarpa*, Pierre, l. c. 47. — Guian. gall.

ENGLERIA, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 273; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1890) 152. **COMPOSITAE**. *africana*, O. Hoffm. l. c.; *Oliver*, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2205. — Afr. austro-occ. extratrop.

ENGLERINA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 257 = **Loranthus**, Linn. *Holstii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Holstii*, Engl.

ENGLERODAPHNE, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 274; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 236 fig. 81. **THYME-LAEACEAE**. *leiosiphon*, Gilg, l. c. — Afr. trop. or.

ENGLEROPHOENIX, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 728 = **Maximiliana**, Mart. (Palm.). *caribaeum*, Kuntze, l. c. = *M. caribaea*, Griseb. & H. Wendl. *Maripa*, Kuntze, l. c. = *M. Maripa*, Drude. *regia*, Kuntze, l. c. = *M. regia*, Mart.

ENICOSTEMA, Blume (Gentian.). — Ind. Kew. i. 841. *verticillare*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 131 = *littorale*, Blume. *verticillatum*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 313 = *littorale*, Blume.

ENKIANTHUS, Lour. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 841. *brachyphyllus*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 371. — Yunnan. *chinensis*, Franch. l. c. — Yunnan. *nikoensis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. viii. (1894) 215 = *Andromeda nikoensis*, Miq. *subsessilis*, Makino. l. c. = *A. subsessilis*, Maxim.

ENSLENIA, Nutt. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 841. *racemosa*, Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. i. (1895) 38 (= *E. racemosa*, Griseb.) = *Roulinia Jacquinii*, Decne.

ENTANDROPHRAGMA, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 582 et 583. **MELIACEAE**. *angolense*, C. DC. l. c. — Angola.

ENTEROLOBIUM, Mart. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 842. *contortisiliquum*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 102. = *E. Timbouva*, Benth. et Hook. f.

ENTEROPOGON, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. i. 843. *macrostachyus*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 31 nomen (an *E. macrostachyum*, Munro?) — Afr. trop. or. *monostachyus*, K. Schum. l. c. 17; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 110 = *Leptochloa monostachya*, Roem. & Schult. *sechellense*, « Benth. » ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894. (1895) 859 [nom. mutat.]. (= *Ctenium sechellense*, Baker) = *E. sechellarum*, (Benth.). — Ins. Seychell.

EOMECON, Hance (Papav.). — Ind. Kew. i. 842. *chionantha*, Bull. Catal. (1888) ex Gard. Chron. (1888) ii. 273. —

EPACRIS, Forst. (Epacrid.). — Ind. Kew. i. 842. *affinis*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 199. — N. Zel.

EPALLAGE, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 843. *dissitifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 494. — Madag.

EPERUA, Aubl. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 843. *Jenmani*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1955. — Guian. brit.

EPHEDRA, Tourn. ex Linn. (Gnet.). — Ind. Kew. i. 843. *araucana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 520. — Chili. *breana*, Phil. l. c. 519. — Chili. *Linnaei*, Stapf, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893). 58 et 579 ad calc = *distachya*, Linn. *multiflora*, Phil. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wiss. Wien. (1887) 43; et in Anal. Mus. nac. Chile, (1891). 77. — Chili. *Przewalskii*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wiss. Wien. (1889) 40. — As. centr. *sarcocarpa*, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 112; Stapf in Denkschr. Akad. Wiss. Wien. (1889) 61. — Afghanistan. *viridis*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 220 = *nevadensis*, S. Wats.

EPICAMPES, J. et C. Presl (Gramin.). — Ind. Kew. i. 844. *ligulata*, Scribn. ex Vasey, Illustr. N. Am. Guin. I. ii. (1891) add.; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. III. i. (1892) 58. — Ariz., Mexic. *rigens*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 82 = *Sporobolus rigens*, E. Desv.

EPICATTLEYA ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1889). I. 491. **ORCHIDEAE**. *guatemalensis* ×, Rolfe, l. c. (= *Cattleya guatemalensis*, T. Moore). — Guatem.

EPICHROXANTHA, Eckl. et Zeyh. ex Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl (1893) 76 = **EPICHRO-CANTHA**, Eckl. et Zeyh. = **Gnidia**, Linn. (Thymel.).

EPICLASTOPELMA, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 114; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b (1895) 353. **ACANTHACEAE**. *glandulosum*, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.

EPIDENDRUM, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 845. *alsum*, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 281 [Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 202]. — Guian. angl. *amabile*, Hort. ex God.-Leboeuf in L'Orchidophile (1887) 304 cum ic. = *dichromum*, Lindl. *auriculigerum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 34. — Hab. ? *Barbeyanum*, Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 607. — Costarica. *bituberculatum*, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 209. — Hab. ? *calceolare*, Ham, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 60 = *Saccolabium calceolare*, Lindl. *Capartianum*, L. Lind. in Lindenia, vii. (1891) 93. t. 333. — Bras. *dellense* ×, O. Brien, in Gard. Chron. (1891) i. 584; et ex Gartenfl. (1891) 360. — Hybr. artef. *Ellisii*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 184. — Columb. *Endresio-Wallisii* ×, Hort. ex Rev. Hortic. (1895) 250. — Hybr. artef. *falsum*, Reichb. f. in Flora, lxi. (1886) 553. N. Granat. *geniculatum*, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 45 in syn. = *Aerides multiflorum*, Roxb. *Godseffianum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) i. 136. — Bras. *Hartii*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 157. — Ins. Trinit. *Imthurnius*, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, ii. (1887) 282 t. 46 a. [Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 203 (im Thurnii).] — Guian. angl. *Laucheanum*, Rolfe, in Gartenfl. (1892) 183; et in Kew Bull. (1893) 63. — N. Granat. *longipetalum*, God. Leboeuf. in L'Orchidophile (1892) 257. — Guatem.

EPIDENDRUM: —

- Martinianum, Rolfe, in *Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 43. t. 550. — Hab. ?
 montigena, Ridl. ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II, ii. (1887) 282. [Oliver, ex im Thurn, in *Timelri*, v. (1886) 203]. — Guian. angl.
 Mooreanum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1891) 190. — Costarica.
 O'Brienianum $\times$, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1888) i. 770-71 fig. 103; et (1889) 8. — Hybr. artef.
 Ortgiesi, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 473. — Hab. ?
 Palmeri, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 6. — Mexic.
 Pfavii, Rolfe, l. c. (1894) 392. — Costarica.
 pristis, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 262. — Hab. ?
 pugioniforme, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 305. — Mexic.
 pumilum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 171. — Costarica.
 pusillum, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1894) ii. 669. — Bras. ?
 tricolor, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 63. — Venez.
 tridentatum, W. Fawcett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 12. — Ins. Jamaic.
 Umlaufi, Zahlbr. in *Wien. Illustr. Gart.-Zeit.* (1893) t. 2; ex Gartenfl. (1893) 503 cum ic. — Hab. ?
 violascens, Ridl. ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II, ii. (1887) 282. [Oliver, ex im Thurn, in *Timelri*, v. (1886) 203]. — Guian. angl.
 Wendlandianum, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1893) ii. 58; et in Reichb. f. *Xen. Orchid.* iii. 8 (1894) 129. t. 274 i. et ii. fig. 1-3. — Mexic.
 yungasense, Rolfe, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. 3. (1895) 262. — Bolivia.

EPIDORCHIS, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* (1809) 314?; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 659. = **Mystacidium**, Lindl. (Orchid.).

- aphylla, Kuntze, l. c. 660 = *M. aphyllum*, Benth.
 brachystachya, l. c. 659. = *Aëonia brachystachya*, Lindl.
 Burchellii, Kuntze, l. c. 660 = *Angraecum Burchellii*, Reichb. f.
 Calceolus, Kuntze, l. c. = *A. Calceolus*, Thou.
 carpophora, Kuntze, l. c. = *A. carpophorum*, Thou.
 caulescens, Kuntze, l. c. = *M. caulescens*, Ridl.
 disticha, Kuntze, l. c. = *M. distichum*, Pfitz.
 erythropollinia, Kuntze, l. c. = *M. erythropollinium*, Reichb. f.
 exilis, Kuntze, l. c. = *M. exile*, Th. Dur. & Schinz.
 expansa, Kuntze, l. c. = *Angraecum expansum*, Thou.
 fragrans, Kuntze, l. c. = *A. fragrans*, Thou.
 fragrantissima, Kuntze, l. c. = *Listrostachis fragrantissima*, Reichb. f.
 Gerrardii, Kuntze, l. c. = *M. Gerrardi*, Bolus.
 Gilpiniae, Kuntze, l. c. = *M. Gilpiniae*, Th. Dur. & Schinz.
 graminifolia, Kuntze, l. c. = *M. graminifolium*, Ridl.
 Guoyaniana, Kuntze, l. c. = *M. radicosum*, Th. Dur. & Schinz.
 ichneumonea, Kuntze, l. c. = *Angraecum ichneumoneum*, Lindl.
 imbricata, Kuntze, l. c. = *A. imbricatum*, Lindl.
 inaperta, Kuntze, l. c. = *M. inapertum*, Ridl.
 Lansbergii, Kuntze, l. c. = *Angraecum Lansbergii*, Reichb. f.
 Lehmannii, Kuntze, l. c. (= *Aeranthus Lehmannii*, Reichb. f.)
 longicornis, Kuntze, l. c. = *M. longicornu*, Th. Dur. & Schinz.
 macrostachya, Kuntze, l. c. 659 = *Aëonia macrostachya*, Lindl.
 megalorhiza, Kuntze, l. c. 660 = *Angraecum megalorrhizon*, Reichb. f.
 micrantha, Kuntze, l. c. = *M. micranthum*, Th. Dur. & Schinz.
 multiflora, Kuntze, l. c. = *M. caulescens*, Ridl.
 muscicola, Kuntze, l. c. = *M. muscicolum*, Th. Dur. & Schinz.
 ochracea, Kuntze, l. c. = *M. ochraceum*, Ridl.
 parviflora, Kuntze, l. c. = *Angraecum parviflorum*, Thou.

EPIDORCHIS: —

- pectinata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 660 = *M. pectinatum*, Benth. & Hook. f.
 pellucida, Kuntze, l. c. = *M. pellucidum*, Benth. & Hook. f.
 physophora, Kuntze, l. c. = *M. physophorum*, Th. Dur. & Schinz.
 polystachya, Kuntze, l. c. 659 = *Aëonia polystachya*, Benth. & Hook. f.
 recta, Kuntze, l. c. 660 = *Angraecum rectum*, Thou.
 saccifera, Kuntze, l. c. = *A. sacciferum*, Lindl.
 subulata, Kuntze, l. c. = *A. subulatum*, Lindl.
 tenella, Kuntze, l. c. = *M. tenellum*, Ridl.
 tridens, Kuntze, l. c. = *Angraecum tridens*, Lindl.
 vagans, Kuntze, l. c. = *A. vagans*, Lindl.
 vestita, Kuntze, l. c. = *A. vestitum*, Lindl.
 viridis, Kuntze, l. c. = *M. viride*, Ridl.
 volucris, Kuntze, l. c. 659 = *Aëonia Auberti*, Lindl.
 xanthopollinia, Kuntze, l. c. = *M. xanthopollinium*, Reichb. f.

EPYGYNUM, Wight (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 851. Beccarii, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 178. — Borneo.

EPILASIA, Benth. & Hook. f. (Compos.). — Ind. Kew. i. 851.

hemilasia, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. 202 (= *E. hemilasia*, C. B. Clarke) = Bungei, C. B. Clarke.

EPILOBIUM, Dill. ex Linn. (Onagrar.). — Ind. Kew. i. 851.

alpestre, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. i. (1892) 689 = *trigonum*, Schrank.

anglicum $\times$, Marsh in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 8. — Brit.

biharicum $\times$, Simonk. in *Termész. Füzetek*, x. (1886) 181; et *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 228. — Transsilv.

Castrikerrei, Borb. *Geogr. atq. enum. pl. Castrif.* (1887-88) 274. — Hung.

clavatum, Trelease, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* ii. (1891) 111. t. 48. — Am. bor. occ.

colchicum, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 86. — Reg. Cauc.

Darveri $\times$, C. Richt. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli (1891) Sitzb. 21. — Austria.

delicatum, Trelease, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* ii. (1891) 99. t. 28. — Oregon.

exaltatum, Drew, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 151. — Calif.

glaucum, Howell, *Coll. Pacif. Coast Pl.* (1887); ex *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1887) 24; Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 225 = *oreganum*, Greene.

gracilipes, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 351. — N. Zel.

holosericeum, Trelease, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* ii. (1891) 91. t. 17. — Calif.

madrense, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 274. — Mexic.

Marshallianum $\times$, Hausskn. in *Bot. Exch. Club Brit.-Isl.*, Report for 1891 (1892) 336. — Brit.

miguelse, Leveillé, in *Le Monde des pl.* iii. (1894) 91. — Ins. Azor.

Muellerianum, Leveillé, l. c. 275. — Austral.

nanum, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 315. — N. Zel.

Nassireinulci, Staff, in *Denkschr. Akad. Wiss. Wien*, (1886) 57. — As. occ.

niveum, T. S. Brandeg. in *Zoë*, iii. (1892) 242 t. 24. — Calif.

oreganum, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 225 = *subcaesium*, Greene.

Parishii, Trelease, in *Zoë*, i. (1890) 210; et in *Missouri Bot. Gard. Rep.* ii. (1892) 97. t. 27. — Calif.

percollinum $\times$, Simonk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 182. — Hung.

prostratum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 23. — Oceania.

Pringleanum, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, vii. (1888-89) 5. — Am. bor. occ.

pyncotrichum $\times$, Borb. in *Akad. Ertok*, ix. (1888 ?) 7; et *Geogr. atq. enum. pl. Castrif.* (1888-89) 272. — Hung.

EPILOBIUM: —

- Radoi, Borb. *Geogr. atq. enum. pl. Castrif.* (1888-89) 273. — Hung.
 rivulare $\times$, Celak. ex Sagerski et Schneid. Fl. Centr. Carpath. 180. — Hung.
 Schmalhausianum $\times$, M. Schulze, in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, vi. (1888) 37; viii. (1890) 8. — Eur.
 stenophyllum $\times$, Borb. *Geogr. atq. enum. pl. Castrif.* (1888-89) 273. — Hung.
 subcaesium, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1892) 295 (= *E. oreganum*, Greene). — Oregon.
 Tarni $\times$, de Laremb. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* II. i. (1889) 122. — Gall.
 tiarogynum, Norm. in *Christ. Vidensk.-Selsk. Forh.* (1893) extr. 25; ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 117. — Norv.
 ursinum, Parish, ex Trelease, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* ii. (1891) 100. t. 31. — Calif.

EPILUMA, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 287. **SAPOTACEAE.**

pyriformis, Baill. l. c. (= *Chrysophyllum pyriforme*, Baill.). — N. Caled.

EPIMEDIIUM, [Tourn.] Linn. (Berber.). — Ind. Kew. i. 854.

acuminatum, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 109. — China.

brevicornu, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 42. — China.

Davidi, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris. Sér.* II. viii. 1885 (1886) 195. — Tibet.

Fargesii, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 281. — China.

sutchuenense, Franch. l. c. 282. — China.

EPIPACTIS, Adans. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 855.

africana, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 252. — Afr. trop. or.

Austinae, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 429. = *Chloraea Austinae*, A. Gray.

chloidophylla Wettst. l. c. 428 = *Cephalanthera chloidophylla*, Reichb. f.

cucullata, Wettst. l. c. 429 = *C. cucullata*, Boiss. et Helds.

grandiflora, Lloyd et Fouc. *Fl. Ouest Fr.* éd. 4. (1886) 341 = *grandiflora*, Sm.

longibracteata, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 428 = *Cephalanthera longibracteata*, Blume.

ochroleuca, St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 811 (= *E. ochroleuca*, Baumg.) = *C. pallens*, Rich.

orbicularis, C. Richt. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, (1887) 190. — Austria.

oregana, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 429 = *Cephalanthera oregana*, Reichb. f.

Schmalhauseni $\times$, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 284. — Russia.

speciosa $\times$, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1889) 396 t. 3 fig. 1 et 427; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* i. (1890) 214. — Austria.

EPIPETRUM, Phil. = **Dioscorea**, Linn.

bilobum, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile*, (1892) 11. t. 3. — Chili.

polyanthes, Reiche, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 44 nomen. — Chili.

EPIPHYLLUM, Haw. (Cact.). — Ind. Kew. i. 855.

acuminatum, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 222. t. 45. — Bras.

Gaertneri, K. Schum. l. c. 218. — Bras.

Gibsoni, Hort. ex Rev. *Hortic.* lxiii. (1886) 283 sphalm. = *Russelianum*, Hook.

Makoyanum, Hort. ex Rev. *Hortic. Belg.* xv. (1889) 229 = *Russelianum*, Hook.

obtusangulum, Lindl. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 198 = *Cereus obtusangulus*, K. Schum.

EPIPOGON, Ledeb. = **Epipogon**, S. G. Gmel. (Orchid.).

Epipogon, Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 105 = *aphyllum*, Sw.

EPIPREMNUM, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 856.
humile, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 549 (= *Anadryum humile*, Schott). — Penins. Mal., Borneo.

EPISCOENUS, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 657. **CYPERACEAE**.
quadrangularis, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austr.

EPISCIA, Mart. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 856.
densa, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1895) 17. — Guian. brit.
Fendleriana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 473. — Costarica, Panama.

EPISTEPHIUM, Kunth (Orchid.). — Ind. Kew. i. 856.
lucidum, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 141, t. 30. — Bras.

EPITHEMA, Blume (Gesner.). — Ind. Kew. i. 856.
thomense, Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 145. — Ins. S. Thom.

ERAGROSTIS, Host (Gramin.). — Ind. Kew. i. 857.
alopecuroides, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 168. — As. trop. occ.
amabilis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 773 et 774 = plumosa, Link.
annulata, Rendle, ex S. Elliot, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 72. — Afr. austro. occ. extratrop.
atropioides, Hillbr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 531. — Ins. Sandvic.
bahamensis, Hitchc. *Pl. of Bahamas* (1893) 149; et in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 149. — Ins. Baham.
barbinodis, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 390. — Transv.
Barrelieri, Daveau, in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 289; et in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 651. — Eur. mer., Afr. bor.
Beyrichii, J. G. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 117 t. 56. — Arkans., Texas.
biflora, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 390. — Afr. austr.
bipinnata, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 113 (= *Briza bipinnata*, Linn.) = cynosuroides, Beauv.
Botteri, Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 115. = poaloides, Beauv.
Buchanani, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 114. — Afr. trop. or.
caroliniana, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 49. (= *Poa caroliniana* Spreng.) = E. Purshii, Hort. ex Schrad.
collocarpa, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 64; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 114. — Afr. trop. or.
densiflora, Hack. ex Sodiro, *Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 9 nomen. — Ecuad.
densissima, Sodiro, l. c. — Ecuad.
denudata, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 392. — Transv.
diversiflora, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 285. — Mexic.
emarginata, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 238. — Afr. austro. occ.
enodis, Hack. l. c. 148. — Afr. austro. occ.
Eragrostis, Karst. *Deutschl. Fl.* (1880-83) 389; Macmill. *Metasp. Minn.* (1892) 75 (= *Briza Eragrostis*, Linn.) = minor, Host.
glomerata, L. H. Dewey, ex Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 543 = conferta, Trin.
grandiflora, J. G. Smith & Bush, ex J. G. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 117 t. 56. — Indiana, Texas.
grandis, Hillbr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 528. — Ins. Sandvic.
hawaiiensis, Hillbr. l. c. 530. — Ins. Sandvic.
hispida, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 114. — Afr. trop. or.
hypnoides, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 774 = seq.

ERAGROSTIS : —

hypnoides, Britton, Stern & Poggenb. *Prelim. Cat.* (1888) 69. (= *Poa hypnoides*, Lam) = reptans, Nees.
inamoena, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 115. — Afr. trop. or.
incana, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 163 fig. 6. — Am. austr. trop.
interrupta, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkansas, 1888.* i. (1891) 237 = oxylepis, Trin.
Kennedyae, F. Turner, in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II.* viii. (June 1894) 535. — Austral.
laetevirens, K. Schum. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 12. — Afr. trop.
lasiophylla, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 114. — Afr. trop. or.
laxissima, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 58; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. A.* (1895) 99 = macilenta, Steud.
Marlothii, Hack. in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 404. — Afr. austr.
megalostachya, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl.* éd. 8. ii (1889) 935 = major, Host.
membranacea, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 148. — Afr. austro. occ.
micrantha, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 388. — Afr. austr.
montana, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 168. — As. trop. occ.
monticola, Hillbr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 531 (= *Poa monticola*, Gaudich.). — Ins. Sandvic.
mucronata, Deflers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 69 (= *Uniola mucronata*, Linn.). — Arab.
olivacea, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 114. — Afr. trop. or.
Oreuttiana, Vasey, in *Contr. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 269. — Calif.
Palisoti, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 887.
pallens, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 392. — Transv.
pallida, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 285. — Mexic.
patentissima, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 391. — Transv.
perbella, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 38; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 115. — Afr. trop. or.
phleoides, Hillbr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 530 = Ins. Sandvic.
Rahmeri, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 88. — Am. austr. occ.
Rankingi, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull.* ii. (1891) 22. — Austral.
refracta, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 49 (= *Poa refracta*, Muhl.) = pectinacea, Nees.
rigida, Scribn. in *Proc. Acad. Philad.* (1891) 304; Vasey, *Grass. South-West* (1891) t. 41 = sessilispica, Buchl.
rigidifolia, Hochst. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 133. — Abyss.
Scotelliana, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 99. — Sierra Leone.
spicata, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 146. — Calif. inf.
sporoboloides, J. G. Smith et Buch, ex J. G. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 116 t. 54. — Indian., Texas.
stricta, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull.* iii. (1891) 19. — Austral.
Thunbergii, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 222 = cynosuroides, Roem. et Schult.
Thunbergii, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1892) 1055 [an praec. ?] — Afr. austr.
thyrsoides, Hillbr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 529. — Ins. Sandvic.
trichodes, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xxii. (1895) 465. = Geyeri, Steud.
truncata, Hack. in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 405. — Afr. austr.
Warburgii, Hack. l. c. xiii. (1891) 262. — Oceania.

ERANTHEMUM, Linn. (Acanth.), — Ind. Kew. i. 859.

ERANTHEMUM : —

affine, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 420. — Oceania.
fastigiatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 489 = *Daedalacanthus montanus*, T. Anders.
lateriflorum, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 55 t. 27. — Ind. or.
Ludovicianum, Büttn. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 41 = *Pseuderanthemum Ludovicianum*, Radlk.
pacificum, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 475. — N. Hannov.
parviflorum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 420. — Oceania.
plumbaginoides, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* ii. (1888) 264 cum xylogr. — Gabon.
polyanthum, C. B. Clarke, ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 2000. — Assam.
polyneuronum, C. B. Clarke, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 495. — Ava.
tubiflorum, Radlk. ex Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 311 = *Daedalacanthus tubiflorus*, T. Anders.
Whartonianum, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894) 214. — Ins. Salom.

ERANTHIS, Salisb. (Ranunc.) — Ind. Kew. i. 860.
albiflora, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* viii. 1885 (1886) 191. — Tibet.

ERATICA, [Gunn], Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz k.* i. (1889) 292 = *Olearia Gunniana*, Hook.

ERECHTITES, Rafin. (Compos.). — Ind. Kew. i. 860.
diversifolia, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 324. — N. Zel.

ERICOCOCTIS, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 281 = **Mallostoma**, Karst. (Rubiace.).
acerosa, Kuntze, l. c. = *Houstonia acerosa*, Benth. et Hook. f.
capitata, Kuntze, l. c. = *Hedyotis Hartwegiana*, Wedd.
caracasana, Kuntze, l. c. = *Mallostoma caracasana*, Benth. & Hook. f.
Cervantesii, Kuntze, l. c. = *Hedyotis Cervantesii*, H. B. & K.
conferta, Kuntze, l. c. = *Mallostoma confertum*, Benth. & Hook. f.
crassifolia, Kuntze, l. c. = *Hedyotis crassifolia*, Spruce, fide Kuntze.
ericoides, Kuntze, l. c. = *H. ericoides*, Willd.
filiformis, Kuntze, l. c. = *Mallostoma filiforme*, Benth. & Hook. f.
hypnoides, Kuntze, l. c. = *Hedyotis hypnoides*, H. B. & K.
hyssopifolia, Kuntze, l. c. = *Mallostoma hyssopifolium*, Benth. & Hook. f.
juniperifolia, Kuntze, l. c. = *M. juniperifolium*, Benth. & Hook. f.
laricifolia, Kuntze, l. c. = *Mallostoma laricifolium*, Benth. & Hook. f.
microphylla, Kuntze, l. c. = *Hedyotis microphylla*, H. B. & K.
nitida, Kuntze, l. c. = *Mallostoma nitidum*, Benth. & Hook. f.
setosa, Kuntze, l. c. = *M. setosum*, Benth. & Hook. f.
thymifolia, Kuntze, l. c. = *M. thymifolium*, Benth. & Hook. f.

EREMANTHUS, Less. (Compos.). — Ind. Kew. i. 861.
purpurascens, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2282. — Bras.

EREMIASTRUM, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 861.
Orcuttii, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 132. — Calif.

EREMINULA, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 248 = **Dimeresia**, A. Gray (Compos.).
Howellii, Greene, l. c. = *D. Howellii*, A. Gray.

EREMOCARYA, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 58 = *Eritrichium*, Schrad. (Borag.).
lepida, Greene, l. c. 59 = *E. micranthum*, Phil. var.
micrantha, Greene, l. c. 59 = *E. micranthum*, Phil. var.

EREMOCHLOA, S. Wats. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 861.
bimaculata, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 265. — Ind. or.
ciliatifolia, Hack. l. c. — Ind. or.
falcata, Hack. l. c. 263 (= *Ischaemum falcatum*, Nees). — China.
leersoides, Hack. l. c. 264 (= *I. leersoides*, Munro). — China.
muricata, Hack. l. c. 262 (= *I. pectinatum*, Trin.). — Ind. or., Austral.
ophiuroides, Hack. l. c. 261 (= *I. ophiuroides*, Munro). — China.
zeylanica, Hack. l. c. 263 (= *I. falcatum*, Thw.). — Zeylan.

EREMOCRINUM, M. E. Jones, in Zoë, iv. (1893) 53. t. 25; Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 536. **LILLIACEAE**.
albomarginatum, M. E. Jones, ll. cc. (= *Hesperanthus albomarginatus*, M. E. Jones). — Calif.

EREMOLEPIS, Griseb. (Loranth.). — Ind. Kew. i. 861.
microcalyx, Ernst, in Rev. cient. mens. Univ. centr. Venez. i. (1887) 133. — Venez.

EREMOLOBIUM, *aegyptiacum*, Aschers. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 30 = *Malcolmia aegyptiaca*, Spreng.

EREMOLUMA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. 925; et Hist. des pl. xi. (1892) 291. **SAPOTACEAE**.
Sagotiana, Baill. ll. cc. 925 et 292. — Guian.

EREMOMASTAX, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 8; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 297 = *Paulo-Wilhelmia*, Hochst. (Acanth.).
crossandriflora, Lindau, ll. cc. = *P. Sclerochiton*, Lindau.

EREMOPHILA, R. Br. (Myopor.). — Ind. Kew. i. 861.
Battii, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. Ser. II. v. (June 1890) 187. — Austral.
Merralli, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Sept. 1892) 63 nomen. — Austral.
Phillipsii, F. Muell. l. c. 76. — Austral.
Tietkensii, F. Muell. & Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xiii. (1890) 109 = *E. Latrobei*, F. Muell.

EREMOSPARTUM, Fisch. & Mey. [Eremosparton] (Legum.). — Ind. Kew. i. 862.
Schumannii, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 184. — Turkest.

EREMOSPATA, Mann & H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. i. 862.
deerrata, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 458 = *Calamus deerratus*, Mann & H. Wendl.

EREMOSTACHYS, Bunge (Labiata.). — Ind. Kew. i. 62.
adpressa, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 538. — Turkest.
Alberti, Regel, l. c. 537. t. 8. — Turkest.
Beckeri, Regel, l. c. 561. t. 7. — Persia.
Boissieriana, Regel, l. c. 559. — Turkest.
cordifolia, Regel, l. c. 550. t. 5. — Turkest.
desertorum, Regel, l. c. 563. t. 7. — Turkest.
ericalyx, Regel, l. c. 564. t. 9. — Turkest.
Fetisowi, Regel, l. c. 547. t. 5 (= *Phlomis Alberti*, Regel). — Turkest.
hissarica, Regel, l. c. 542. t. 4. — Turkest.
nuda, Regel, l. c. 540. t. 3. — Turkest.

EREMOSTACHYS: —

pauciflora, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 226. — Turkest.
persimilis, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 98. — Turkest.
Regeliana, Aitch. & Hemsl. l. c. 99. — Afghan.
sarawschanica, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 548 t. 5. — Turkest.
transiliensis, Regel, l. c. 556 t. 6. — Songar.
Trautvetteriana, Regel, l. c. 551 t. 5. — Turkest.
uniflora, Regel, l. c. 558 t. 7. — Turkest.

EREMOTHAMNUS, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 278. **COMPOSITAE**.
Marlothianus, O. Hoffm. l. c. 279. — Afr. austro-occ. extratrop.

EREMURUS, Bieb. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 862.
Ascheroni, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 243. — Turkest.
parviflorus, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 609. — Buchara.

ERIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 862.
albiflora, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 170. — Ind. or.
andamanica, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 801; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2073. — Ins. Andam.
Andersoni, Hook. f. ll. cc. 795; et t. 2069. — Reg. Himal.
augustifolia, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 237. — Borneo.
aporina, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 808; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2081. — Perak.
australiensis, F. M. Bailey. Occas. Pap. n° 1. 8; Syn. Queensl. Fl. Suppl. ii. 57. — Austral.
calamifolia, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 191. — Assam.
cinnabarina, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 183; et in *Lindenia*, x. (1894) 35. t. 448. — Borneo.
chioniana, Kraenzl. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 203. — Ind. or.?
confusa, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1850; et Fl. Brit. Ind. v. (1899) 796. — Ind. or.
crassicaulis, Hook. f. ll. cc. 805; et t. 2076. — Bengal.
cristata, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 139. — Moulmein.
elata, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1848; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 794. — Perak.
exilis, Hook. f. ll. cc. 788; et (1891) t. 2074. — Travanc.
Fordii, Rolfe, in Gard. Chron. (1886) ii. 584 = *carinata*, Gibs.
gracilis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 806; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2078. — Perak.
grandis, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 237. — Borneo.
iridifolia, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 790; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2067. — Perak.
japonica, Maxim. in Bull. Acad. Sci. St Pétersb. xxxi. (1887) 103. — Japon.
Kingii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1898) 790; et in Hook. Icon. pl. (1891) t. 2067 = *Scortechinii*, Stapf.
Kurzii, T. Anders. ex Hook. f. l. c. (1890) 797 = *bractescens*, Lindl.
lancifolia, Hook. f. l. c. (1890) 804; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2075. — Perak.
Lauchiana, Kraenzl. in Gard. Chron. (1892) i. 809. — Hab.?
leptocarpa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 805; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2077. — Perak.
longifolia, Hook. f. ll. cc. 790; et (1891) t. 2068. — Perak.
luchuensis, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1892) 131. — Japon.
Maingayi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 798; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2072. — Penang.
major, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 237. — Borneo.
marginata, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 200; et ex Hook. f. in Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 237. — Burma.
Mathewsii, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 213 = *Phreatia Mathewsii*, Reichb. f.
Micholitzii, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 460. — N. Guin.

ERIA: —

monticola, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 806 (= *Trichostema biflora*, Griff.). — Malacca.
oligantha, Hook. f. l. c. 807 et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2079. — Penang.
pellipes, Reichb. f. ex Hook. f. l. c. 802. — As. trop.
puberula, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 226. — N. Guin.
pygmaea, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 804 = *Ceratostylis eriaeoides*, Hook. f.
ramosissima, Wall. ex Hook. f. l. c. 826 = *C. himalaica*, Hook. f.
recurvata, Hook. f. l. c. 797; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2070. — Perak.
saccifera, Hook. f. ll. cc. 797; et t. 2071. — Perak.
Scortechinii, Hook. f. ll. cc. 809; et (1892) t. 2082. — Perak.
Scortechinii, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 237. — Borneo.
striolata, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 554; et in Illustr. Hort. xxxv. (1888) 35 t. 48. — N. Guin.
Thwaitesii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 803 (= *Eria velutina*, Thw.). — Zeyl.
tomentosa, Hook. f. l. c. 803 (= *Epidendrum tomentosum*, Koen.). — Ind. or.
tuberosa, Hook. f. l. c. 807; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2080. — Perak.
umbonata, F. Muell. ex Kraenzl. ex Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 163. — N. Guin.

ERIACHNE, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 865.
aurea, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 836 = *aurea*, Nees.
capensis, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *capensis*, Steud.
Eckloni, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *Eckloni*, Nees.

ERIANTHEMUM, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 248 = *Loranthus*, Linn.
Dregei, Van Tiegh. l. c. = *L. Dregei*, Eckl. et Zeyh.
Schelei, Van Tiegh. l. c. = *L. Schelei*, Engl.
taborensis, Van Tiegh. l. c. = *L. taborensis*, Engl.

ERIANTHUS, Michx. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 864.
Balansae, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 133. — Parag.
chrysothrix, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 6. — Ind. or.
compactus, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 419. — Am. bor.
flavescens, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 96. — Afr. trop. or.
Hookeri, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 143. — Ind. or.
pallens, Hack. l. c. 143. — Reg. Himal.
pedicellaris, Hack. l. c. 137 (= *Saccharum pedicellare*, Trin.). — N. Caled.
Trinii, Hack. l. c. 135. — Mexic., Am. austr.
violacens, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 96. — Afr. trop. or.

ERICA, [Tourn.] Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 865.
adenophylla, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 181. — Afr. austr.
algida, Bolus, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 238. — Afr. austr.
aspalathifolia, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 182. — Afr. austr.
barbertona, Galpin, in Kew Bull. (1895) 148. — Transvaal.
Baurii, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 178. — Afr. austr.
Brownleeae, Bolus, l. c. 185. — Afr. austr.
cafferum, Bolus, l. c. 184. — Afr. austr.
Cooperi, Bolus, l. c. 179. — Afr. austr.
eriopodon, Bolus, l. c. 186. — Afr. austr.
Fairii, Bolus, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 236. — Afr. austr.
Flanaganii, Bolus, l. c. 238. — Afr. austr.
flava, Bolus, l. c. 239. — Afr. austr.
frigida, Bolus, l. c. 235. — Afr. anstr.

ERICA:—

- Guthriei, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 234. — Afr. austr.
 haemantha, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 181. — Afr. austr.
 inops, Bolus, l. c. 186. — Afr. austr.
 Johnstoniana, Britten, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 23. — Afr. trop.
 Junonis, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 234. — Afr. austr.
 Lerouxiae, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 182. — Afr. austr.
 maesta, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 239. — Afr. Austr.
 Marlothii, Bolus, l. c. 237. — Afr. austr.
 missionis, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 179. — Afr. austr.
 natalitia, Bolus, l. c. 187. — Natal.
 nubigena, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 236. — Afr. austr.
 oresigena, Bolus, l. c. 238. — Afr. austr.
 Rhodopis, Bolus, l. c. 239. — Afr. austr.
 satureioides, Sond. ex Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 187 = Tysoni, Bolus.
 Schlechteri, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 235. — Afr. austr.
 tetrastigmata, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 178. — Afr. austr.
 trichadenia, Bolus, l. c. 183. — Afr. austr.
 Tysoni, Bolus, l. c. 181. — Afr. austr.
 Urna-iridis, Bolus, l. c. 180. — Afr. austr.
 Vilmoriana, Hort. ex Carr. l. c. in obs. = Wilmorei, Knowl. et Weste.
 Vilmoriniana, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* (1891) 235. in obs. = Wilmorei, Knowl. et Weste.
 Whyteana, Britten, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 24. — Afr. trop.
 Willmoreana, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* (1891) 235. in obs. = Wilmorei, Knowl. et Weste.
 Willmoriana, Hort. ex Carr. l. c. in obs. = Wilmorei, Knowl. et Weste.
 Woodii, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 237. — Afr. austr.

ERICAMERIA, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

- arborescens, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 175 = Bigelovia arborescens, A. Gray.
 cuneata, McClatchie, in *Erythea*, ii. (1894) 124 = Aplopappus cuneatus, A. Gray.
 monactis, McClatchie, l. c. = A. monactis, A. Gray.

ERICODES, Moehr. = **Erica**, [Tourn.] Linn. (Eric.).

- abietinum, accomodatum, acutum, adenophorum, adonemum, aduncum, aequale, affine, aggregatum, Aitonianum, albens, albescens, ampullaceum, andromediflorum, angustatum, Aphanes, appressum, arboreum, ardens, argenteum, aristatum, aristifolium, armatum, articulare, aureum, australe, axilliflorum, azaleae-folium, azoricum, baccans, Banksii, barbatum, barbigerum, Bartlingianum, Benthonianum, Bergianum, bicolor, blandum, Blanfordicum, blennium, borboniaefolium, Boweanum, brachiale, brachycentrum, bracteatum, brevifolium, Broadleyanum, bruniodens, bruniaefolium, Burchellii, caducum, caledonicum, campanulatum, canaliculatum, capillare, capitatum, carduifolium, carinatum, cephalotes, cernuum, cerviciflorum, Chamissonis, chlamydisflorum, chlorolomum, chlorosepalum, chrysanthum, ciliare, cinerascens, cinereum, cistifolium, claviferum, coarctatum, coccineum, colorans, comosum, condensatum, confertum, conicum, conspicuum, Constantia, cordatum, corifolium, coroniferum, Corydalis, crassifolium, crassiseptum, cruentum, cubicum, cumuliflorum, curviflorum, curvisepalum, curvirostre, cymosum, daphniflorum, decipiens, decorum, deflexum, delictosum, demissum, denticulatum, depressum, desmanthum, dianthifolium, dilatatum, diosmifolium, diotiflorum, discolor, distans, distortum, dumosum, dysanthum, elegans, empetrifolium, Eriopus, exiguum, exsurgens, fabrilis, fasciculare, fastigiatum, faustum, filamentosa, filiforme, filipendulum, fimbriatum, flaccum, flammeum, flavicans, flavicomum, flexicaule, flocciflorum, floccosum, floribundum, floridum, foliaceum, formosum, fragrans, fucatum, fulgidum, gibbosum, gigan-

ERICODES:—

- teum, Gillii, gilvum, glanduliferum, glandulosum, glaucum, globosum, glomeratum, glutinosum, gnaphalodes, grandiflorum, Halicacaba, hebecalyx, Hesseanum, hirsutum, hirtum, hirtiflorum, hispidulum, humifusum, humile, imbricatum, incarnatum, inclusum, incommutatum, inconspicuum, incurvum, inflatum, insultum, intermedium, intervallare, involucreatum, involvens, Irbyanum, irregulare, ixanthum, jasminiflorum, Kraussianum, lachnaeum, lactiflorum, laetum, laevigatum, lamprotes, lanatum, lanuginosum, lascivum, latifolium, Lawsonianum, laxum, Lehmannii, leiophyllum, leptopus, leucanthum, leucodesmum, lineatum, longiaristatum, longifolium, longipes, lucidum, luteum, macrolomum, macrophyllum, mammosum, margaritaceum, marifolium, medium, melantherum, Mertensianum, Meyerianum, minutissimum, mirum, modestum, molle, monadelphum, Monsonianum, moschatum, mucosum, mucronatum, multiflorum, Muscari, nanum, nidularium, nigrum, nitens, nitidum, nivale, niveum, nodiflorum, nudiflorum, nutans, obliquum, oblongiflorum, obtusatum, odoratum, oophyllum, opulentum, ovinum, oxycoccifolium, pallens, palliflorum, paniculatum, parviflorum, Passerinae, patens, patulum, pedicellatum, pedunculare, peltatum, penicillatum, persolutum, perspicuum, petiolatum, physanthum, physodes, physophyllum, piliferum, piluliferum, planifolium, plumosum, podophyllum, pogonanthum, polifolium, polyanthum, polycondon, polycomum, praecox, praestans, procumbens, propendens, protrudens, puberulum, pubescens, pubigerum, pulchellum, pumilum, purpureum, pusillum, pycnanthum, pyramidale, pyramidiforme, quadraeflorum, racemosum, ramentaceum, recurvatum, regeminans, regium, retortum, Roxburghii, rubens, rufescens, rupicolum, Russelianum, sacciflorum, sagittatum, salax, scabrinusculum, scoparium, selaginifolium, senile, seriphiifolium, serratifolium, setaceum, setiferum, setosum, setulosum, sexfarium, sitiens, socciflorum, speciosum, spectabile, sphaerocephalum, spicatum, spumosum, squamosum, squarrosus, stamineum, Steinbergianum, stellatum, stenanthum, stenophyllum, strigosum, stylare, subterminal, subulatum, suffultum, sulcatum, taxifolium, tenellum, tenue, tenuicaule, tenuiflorum, tenuifolium, teretiusculum, tetragonum, Tetralix, teucriifolium, Thunbergii, thymifolium, tomentosum, transparent, triceps, trichophorum, trichophyllum, triflorum, triphyllum, triste, turbiniflorum, turgidum, turmale, turrigerum, umbellatum, umbelliflorum, unibracteatum, unilaterale, vagans, variabile, varium, velitare, ventricosum, verecundum, vernicifolium, versicolor, verticillatum, vesiculare, vestifolium, vestitum, villosum, virescens, virgineum, viridiflorum, viridipurpureum, viscarium, Walkei, Wendlandianum, Willdenowii, Zeyheri, Kuntze; Rev. Gen. (1891) 963-68 = homonyma omnia Ericae.
 arboreum, Kuntze, l. c. 389 = E. arborea, Linn.
 caffrum, Kuntze, l. c. 965 = E. urceolaris, Berg.
 calycina, Kuntze, l. c. 965 = E. vespertina, Linn. f.
 calyculata, Kuntze, l. c. = E. penicilliflora, Salisb.
 capax, Kuntze, l. c. = E. oblata, Andr.
 caterviflorum, Kuntze, l. c. = E. catervaeiflora, Salisb.
 cerinthodes, Kuntze, l. c. = E. cerinthoides, Linn.
 craterviflorum, Kuntze, l. c. [Quid?] an E. catervaeiflora, Salisb.?
 cristiflorum, Kuntze, l. c. = E. cristaeiflora, Salisb.
 cylindricum, Kuntze, l. c. = E. tenuiflora, Andr.
 cyrilliflorum, Kuntze, l. c. = E. palustris, Andr.
 densiflorum, Kuntze, l. c. = E. Uhria, Andr.
 dichroum, Kuntze, l. c. 966 = E. dichrus, Spreng.
 doliiforme, Kuntze, l. c. 965 = E. blanda, Andr.
 empetroides, Kuntze, l. c. 966 = E. empetroides, Andr.
 genistifolium, Kuntze, l. c. = E. genistaeifolia, Salisb.
 glomiflorum, Kuntze, l. c. 965 = E. reflexa, Link.
 glumiflorum, Kuntze, l. c. 966 = E. glumaeiflora, Klotzsch.
 herbaceum, Kuntze, l. c. 963 = E. carnea, Linn.
 herrenhausense, Kuntze, l. c. 965 = E. cylindrica, Wendl.
 Hibbertianum, Kuntze, l. c. = E. Hibbertia, Andr.
 insultum, Kuntze, l. c. = E. insula, Forbes.
 lachnaeodes, Kuntze, l. c. = E. lachnaeoides, G. Don.
 lavendulifolium, Kuntze, l. c. = E. lavandulaefolium, Salisb.

ERICODES:—

- Leeanum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 000 = E. Leea, Andr.
 luteoalbum, Kuntze, l. c. = E. leucantha, Link.
 lycopodioides, Kuntze, l. c. = E. lycopodioides, Hornem.
 Mackeyi, Kuntze, l. c. = E. Tetralix, Linn.
 Massonii, Kuntze, l. c. = E. Massoni, Linn. f.
 melastomum, Kuntze, l. c. = E. Petiverii, Wild.
 Meuronii, Kuntze, l. c. 967 = E. Meuronii, Benth.
 minus, Kuntze, l. c. 965 = E. perlata, Forbes.
 Nivenii, Kuntze, l. c. = E. Nivenia, Andr.
 onosmiflorum, Kuntze, l. c. = E. onosmaeflora, Salisb.
 pallidopurpureum, Kuntze, l. c. 963 = E. vagans, Linn.
 pavettiflorum, Kuntze, l. c. 967 = E. pavettaeflora, Salisb.
 pectinifolium, Kuntze, l. c. 965 = E. erubescens, Andr.
 pellucidum, Kuntze, l. c. = E. venusta, Forbes.
 pendulum, Kuntze, l. c. = E. stricta, Donn.
 periplociflorum, Kuntze, l. c. 967 = E. periplocaeflora, Salisb.
 Petiverii, Kuntze, l. c. 965 = E. Sebana, Donn.
 placentiflorum, Kuntze, l. c. = E. tiaraeflora, Andr.
 Plukenetii, Kuntze, l. c. 967 = E. Plukenetii, Linn.
 polygaliflorum, Kuntze, l. c. = E. polygalaeflora, Klotzsch.
 polytrichifolium, Kuntze, l. c. = E. lusitanica, Rudolph.
 Savileanum, Kuntze, l. c. = E. Savilea, Andr.
 scoparium, Kuntze, l. c. 390 = E. scoparia, Linn.
 Shannonianum, Kuntze, l. c. = E. Shannonea, Andr.
 sicifolium, Kuntze, l. c. = E. sicaefolia, Salisb.
 simplicifolium, Kuntze, l. c. = E. brucinaeformis, Salisb.
 Solandrianum, Kuntze, l. c. = E. Solandra, Andr.
 Sparmanii, Kuntze, l. c. = E. Sparmani, Linn. f.
 sphaeranthum, [sphaalm. = sphaeranthum?] = E. sphaerantha, Spreng.
 splendens, Kuntze, l. c. 965 = E. tumida, Ker-Gawl.
 stagnale, Kuntze, l. c. = E. sulphurea, Andr.
 strigilifolium, Kuntze, l. c. = E. elongata, Lodd.
 tenuissimum, Kuntze, l. c. = E. gracilis, Salisb.
 tetrathecodes, Kuntze, l. c. 967 = E. tetrathecodes, Benth.
 traguliferum, Kuntze, l. c. 965 = E. nitida, Andr.
 trichomum, Kuntze, l. c. 967 = E. trichoma, Benth.
 tubiflorum, Kuntze, l. c. 965 = E. ignescens, Andr.

ERIGERODES, Linn. Fl. Zeyl. (1747) 197, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 335 = **Epaltes**, Cass. (Compos.).

- australe, brasiliense, Cunninghamii, divaricatum, gariepinum, Harrisii, mexicanum, pleiochaetum, pygmaeum, Tatei, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 335 = homonyma omnia generis Epaltes.

ERIGERON, Linn. (Compos.).—Ind. Kew. i. 873.

- alomosanus, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 102. — Mexic.
 Alinae, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii, i. (1891) 237 = Vittadinia Alinae, F. Muell.
 andryaloides, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 288 (= Conyza andryaloides, DC.).—Reg. Himal., Tibet.
 angustata, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 181. — Calif.
 angustifolia, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894). 418. — Chili.
 araucanus, Phil. l. c. 142. — Chili.
 aristales, Phil. l. c. 412. — Chili.
 aureus, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 169, = Aplopappus Brandegei, A. Gray.
 Austinae, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 100. — Calif.
 barbellulatus, Greene, l. c. 65. — Calif.
 Biolettii, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 181. — Calif.
 Blasdalei, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 124. — Calif.
 Bonplandii, J. Buchan. in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 213. — N. Zel.
 brachycomoides, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii, i. (1891) 237 = Vittadinia brachycomoides, F. Muell.

ERIGERON : —

- Brandegei, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 226. — Calif.
 brevicaulis, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 416. — Chili.
 Brittonianus, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3. (1893) 54. — Bolivia.
 californicus, *Jepson, in Bull. Torrey Bot. Club.* xviii. (1891) 324. — Calif.
 calvus, *Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 69. — Calif.
 chihuahuensis, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 169 = *Achaetogeron pinnatifidus*, *A. Gray.*
 cochlearifolius, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 414. — Chili.
 colimensis, *Phil. l. c.* 420. — Chili.
 comonduanus, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 229. — Calif.
 conjunctus, *Millsp. l. c.* 227. — Calif.
 coninus, *Howell, in Erythea*, iii. (1895) 35. — Am. bor. occ.
 coronarius, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 167. — Mexic.
 Covillei, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 20. — Calif.
 cupularoides, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 343. — Dahuria.
 depilis, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 417. — Chili.
 ecuadoriensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 336. — Ecuad.
 elegantulus, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 65. — Calif.
 exilis, *A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 422. — Mexic.
 Fernandezi, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii* (1894) 418. — Chili.
 Forreri, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 169. = *Achaetogeron Forreri, Greene.*
 fraternus, *Greene, l. c.* = *A. affinis, A. Gray.*
 Galeottii, *Greene, l. c.* 168 = *A. Galeottii, A. Gray.*
 Gaudini, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxxi. (1887-88) 85 = *Villarsii, Bell.*
 geminilobus, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 228. — Calif.
 glabrescens, *X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. (1886) 86; *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* 174. — Helv.
 Hartwegi, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 21. — Calif.
 Heleniastrum, *Greene, l. c.* i. (1893) 150. — Mexic.
 heteromorphus, *Robins. in Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 173. — Mexic.
 hirtopilosus, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 336. — Peruvia.
 hybridus, *Hieron. l. c.* 334. — N. Granat.
 hyperboreus, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1892) 227. — Alaska.
 Ibari, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 413. — Reg. Magellan.
 illapelinus, *Phil. l. c.* 411. — Chili.
 inconspicuus, *Mac Mill. Metasp. Minn.* (1892) 268 = *asper, Nutt.*
 inopatus, *A. Gray. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 387. — Mexic.
 involutus, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 227. — Calif.
 lacarensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 424. — Chili.
 Lehmanni, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 49 = *loxensis, Hieron.*
 leptophyllus, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1892) 226. — Colorado.
 loxensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 335. — N. Granat.
 macer, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, II. i. (1891) 237 = *Vittadinia macra, F. Muell.*
 mendocinus, *Greene, in Erythea*, ii. (1894) 106 (= *C. andicola, Phil.*, non DC.). — Am. occ.
 Moelleri, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 419. — Chili.
 moupinensis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris. Sér. II.* viii. 1885 (1886) 36. — Tibet.
 multiceps, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 167 (= *E. caespitosus, Vasey et N. E. Rose*, non Nutt.). — Calif.
 nemoralis, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 420. — Patagon.

ERIGERON : —

- nubigenus, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 423. — Chili.
 oxyphyllus, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 20. — Arizona.
 Parryi, *Canby et N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 65. — Montana.
 parviflorus, *X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. (1886) 86. in syn.; et xxxi. Beil. (1887-88) 86. — Helv.
 patagonicus, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 414. — Patagon.
 pellitus, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 49. = *hybridus, Hieron.*
 petrocallis, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 21. — Nevada.
 petrophilus, *Greene, Pittonia*, i. (Oct. 1888) 218; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 181. — Calif.
 pratensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 419. — Chili.
 Pugae, *Phil. l. c.* 416. — Chili.
 purisimanus, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 225. — Calif.
 ramosus, *Britton, Stern et Pogg. Prelim. Cat.* (1888) 27 = *strigosus, Muell.*
 robustum, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 290 = *Brachyactis robusta, Benth.*
 sanctarum, *S. Wats. ex T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* i. (Oct. 11. 1888) 212 nomen; *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (Jan. 31. 1889) 83. — Calif.
 scabrellus, *Greene, in Erythea*, ii. (1894) 108. — Calif.
 Schleicheri, *Gremli, Fl. anal. Suisse* (1886) 280 = *Villarsii, Bell.*
 Seemannii, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 168 = *Achaetogeron Seemannii, A. Gray.*
 setiferus, *Post, ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 289; et in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 433. — Syria.
 Shepardi, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 22. — Syria.
 Sonnei, *Greene, Pittonia*, i. (Oct. 1888) 218. — Calif.
 stolonifer, *Greene, l. c.* ii. (Sept. 1891) 169. — Am. bor. occ.
 strigosus, *Greene, l. c.* 169 = *Achaetogeron Palmeri, A. Gray.*
 Stuebelii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 335. — N. Granat.
 subtrinervis, *Rydberg, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 328. — Am. bor.
 Telekii, *Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 418 nomen; et in *Hoehnel, zum Rudolph See, App.* (1892) 9. — Afr. trop. or.
 tener, *M. E. Jones, in Zoë*, ii. (1891) 248. = *E. Eatonii, A. Gray.*
 Turneri, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1892) 227. — Alaska.
 Tweedyanus, *Canby et N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 65. — Montana.
 Tweedyi, *Canby, l. c.* xiii. (1888) 17 = *tener, A. Gray.*
 umbrosus, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 290 (= *Conyza Roylei, Kar. et Kir.*) — Afghan.
 Vidali, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 410. — Chili.
 visidulus, *Greene, Pittonia*, i. (June, 1888) 174. — Calif.
 Williamsi, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 413. — Chili.
 Wislizeni, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 168 = *Achaetogeron Wislizeni, A. Gray.*
 Xanti, *Engelm. ex Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 228. — Calif.

ERIOBOTRYA, Lindl. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 877.

- Griffithii, *Franch. Pl. Delav.* i. (1890) 224 = *Photinia Griffithii, Decne.*
 lasiogyne, *Franch. l. c.* 225. — China.
 philippinensis, *Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 623. — Ins. Philipp.
 prionophylla, *Franch. Pl. Delav.* i. (1890) 225 t. 46. — Yunnan.

ERIOCARPUM, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

- australe, *Greene, in Erythea*, ii. (1894) 108. — Am. bor. austro-occ.
 blephariphyllum, *Greene, l. c.* iii. (1895) 14 = *A. blephariphyllum, A. Gray.*
 coloradense, *Greene, l. c.* ii. (1894) 110 = *Aster coloradoensis, A. Gray.*
 gracile, *Greene, l. c.* 109 = *Aplopappus gracilis, A. Gray.*
 gymnocephalum, *Greene, l. c.* = *A. gymnocephalus, DC.*
 junceum, *Greene, l. c.* 108 = *A. junceus, Greene.*
 phyllocephalum, *Greene, l. c.* iii. (1895) 15 = *A. phyllocephalus, DC.*
 rubiginosum, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club* v. (1894) 316 = *A. rubiginosus, Torr. et Gray.*
 rubiginosum, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 15 = *praec.*
 spinulosum, *Greene, l. c.* ii. (1894) 108 = *A. spinulosus, DC.*
 stenolobum, *Greene, l. c.* 109. — Mexic.

ERIOCAULON, Linn. (Eriocaul.). — Ind. Kew. i. 877.

- alpestre, *Hook. f. & Thoms. ex Hook. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 578. — Reg. Himal.
 articulatum, *Morong, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 353 = *septangulare, With.*
 bilobatum, *Morong, l. c.* xix. (1892) 226. — Mexic.
 Capillus-naiadis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 572. — As. trop.
 Carsoni, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II.* v. (Sept. 1890) 250; et *ex Bot. Centralbl.* xlv. (1890) 302. — Austral.
 Collettii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 575. — Burma.
 collinum, *Hook. f. l. c.* 584. — Ind. or.
 decemflorum, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St-Petersb.* viii. (93) 7. — China.
 decline, *Maxim., l. c.* = China.
 Duthiei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 578. — Ind. or.
 elegantulum, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 14 nomen; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 133. — Afr. trop. or.
 graphitum, *F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 82 nomen. — Austral.
 Helferii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 583. — Tenass.
 Hookerianum, *Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 243. — Borneo.
 kiusianum, *Maxim. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 578 = *alpestre, Hook. f. et Thoms.*
 jalscanum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 157. — Mexic.
 Kiusianum, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St-Petersb.* viii. (93) 22. — China.
 leptodictyon, *A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 420. — Mexic.
 longicuspis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 573. — Zeylan.
 minutum, *Hook. f. l. c.* 579. — Ind. or.
 mitophyllum, *Hook. f. l. c.* 575. — Khasia.
 nipponicum, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St-Petersb.* viii. (93) 9. — Japon.
 Philippo-Coburgi, *Szyszyk. ex Wawra, Itin. Princ. S. Coburg.* ii. (1888) 96. — Zeylan.
 polycephalum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 573. — Ind. or.
 Pringlei, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 283. — Mexic.
 Pumilio, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 581. — Reg. Himal.
 Schimperii, *Koern. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 154 nomen. — Abyss.
 sexangulare, *Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 576 in syn. = *Wightianum, Mart.*
 sikokianum, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St-Petersb.* viii. (93) 10. — Japon.
 subcaulescens, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 573. — Zeylan.
 Volkensii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 133. — Afr. trop. or.
 Walkeri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 583. — Zeylan.

ERIOCEPHALUS, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 880.

Luederitzianus, *O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss.* (1893) 86; *et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1894) 270. — Afr. austro-occ. extratrop. pinnatus, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* x. (1889) 277. — Afr. austro-occ. extratrop.

ERIOCHLOA, H. B. & K. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 881.

aristata, *Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 229. — Mexic.

bolbodes, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* ii. Append. ii. (1894) 17 (= *Helopus bolbodes*, Hochst.). — Abyss.

Lemmoni, *Vasey & Scribn. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 442 nomen; *et in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 21. — Am. bor. austro-occ. longifolia, *Vasey, l. c.* 21. — Florida.

ramosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 775 = annulata, Kunth *et polystachya* H. B. & K.

sericea, *Munro, ex Vasey, l. c.* 21. — Am. bor. austro-occ.

ERIOCHEMA, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. i. 880.

Sanderae ×, Hort. ex *Rev. Hort.* (1895) 249. — Hybr. artef.

ERIOCOMA, H. B. et K. = **Montanoa**, Cerv. (Compos.).

Aschenbornii, *clematidea*, *crenata*, *elegans*, *gracilis*, *hibiscifolia*, *Karwinskyi*, *microcephala*, *mollissima*, *Olivae*, *ovalifolia*, *pyramidata*, *speciosa*, *ternifolia*, *tomentosa*, *triloba*, *uncinata*, *xanthiifolia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336 = *homonyma omnia* Montanoae.

atriplicifolia, Kuntze, l. c. = *M. arborescens*, C. Koch.

Hartwegiana, Kuntze, l. c. = *M. grandiflora*, Hemsl.

Hemslayana, Kuntze, l. c. = *M. grandiflora*, Hemsl.

Moritziana, Kuntze, l. c. = *M. Moritziana*, Sch. Bip. in *Herb. Kew.*

ERIODENDRON, DC. (Malv.). — Ind. Kew. i. 880.

acuminatum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 418. — Mexic.

tomentosa, *Robins. ex Pringle, in Gard. and For.* vii. (1894) 153; *et in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 314. — Mexic. = *Ceiba tomentosa*, Britton & E. G. Baker.

hypoleucum, *Spruce, ex Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 75. — [Quid?]. Nab.?

ERIOCOMA, H. B. & K. = **Montanoa**, La Llave. (Compos.).

Lehmannii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 55. — Columb.

ERIODICTYON, Benth. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. i. 881.

californicum, *Greene, Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 23; *et Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 256 = glutinosum, Benth.

Parryi, *Greene, l. c.* 22 = *Nama Parryi*, A. Gray.

ERIOGLOSSUM, Blume (Sapind.). — Ind. Kew. i. 881.

rubiginosum, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 236. = *rubiginosum*, Brandis?

ERIOGONUM, Michx. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 881.

agninum, *Greene, Pittonia*, ii. (July 1891) 165. — Calif.

Alleni, *S. Wats. in A. Gray, Man. N. Am. Bot.* ed. 6. (1890) 734; *et in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 134. — Virginia.

aureum, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 718. — Utah.

bicolor, *M. E. Jones, in Zoë*, iv. (1893) 281. — Utah.

brachyanthum, *Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 185. — Calif.

ERIOGONUM : —

citharaeforme, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 266. — Calif.

coriaceum, *Coult. & E. M. Fish. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 375 (= *E. texanum*, Coult. & E. M. Fish.). — Texas.

Davidsonii, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 295 = molestum, *S. Wats.*

denudatum, *Curran, in Bull. Calif. Acad.* i. (1885) 274. = *Nemacaulis Nuttallii*, Benth.

deserticola, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 125. — Calif.

elegans, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 173. — Calif.

esmeraldense, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 85. — Nevada.

fastigiatum, *Parry, in West-Am. Scientist*, vi. (1889) 102. — Calif.

flexum, *M. E. Jones, in Zoë*, ii. (1891) 15. — Am. bor. occ.

gracilipes, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 85. — Calif.

grande, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1887) 38. — Calif.

Haussknechtii, *Dammer, in Gartenfl.* (1891) 493 fig. 92. — Am. bor.

irretitum, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 202. — Calif.

Jonesii, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 455. — Calif.

longilobum, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 720. — Utah.

Mearnsii, *Parry, in Trans. N. Y. Acad. Sci.* viii. (1889) 72. — Am. bor.

minutiflorum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 125. — Calif.

molle, *Greene, Pittonia*, i. (June 1888) 207. — Ins. Cedros.

Nealleyi, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 48, *et* ii. (1891) 391. — Texas.

ridularium, *Coville, l. c.* iv. (1893) 186. — Calif.

nivale, *Canby, ex Coville, l. c.* 187. — Calif.

Nortoni, *Greene, Pittonia*, ii. (July 1891) 165; *et Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 46. — Calif.

Ordii, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 468. — Ariz.

pendulum, *S. Wats. l. c.* xxiii. (1888) 265. — Oregon.

Pondii, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1889) 267. — Calif.

Pringlei, *Coult. & E. M. Fish. in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 351. — Ariz.

rubescens, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1887) 39. — Calif.

rubiflorum, *M. E. Jones, in Zoë*, iv. (1893) 281. — Utah.

speciosum, *Drew, in Bull. Torrey Bot. Club.* xvi. (1889) 152. — Calif.

taxifolium, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1889) 267 = Wrightii, Torr. var.

texanum, *Coult. & E. M. Fish. in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1891) 350 = *coriaceum*, Coult. & E. M. Fish.

tripodum, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1887) 39. — Calif.

ERIOGYNIA, Hook. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).

caespitosa, *S. Wats. in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 242 = *S. caespitosa*, Nutt.

Hendersonii, *Canby & Greene, Pittonia*, ii. (May 1892) 219. — Calif.

uniflora, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 130; *et in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 242. — Montana.

ERIOPE, Humb. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 882.

elegans, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 114. — Parag.

nudicaulis, *Briq. l. c.* 116. — Parag.

trichopoda, *Briq. l. c.* 115. — Parag.

ERIPHORUM, Linn. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 882.

aquatile, *Norm. in Christ. Vidensk.-Selsk. Forh.* (1893) extr. 43. — Norv.

japonicum, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St-Petersb.* xxxi. (1887) 111. — Japon.

Kernerii, *Ullepitsch, in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 421. — Hung.

ERIOPHYLLUM, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. i. 883.

absinthiaefolium, *bilernatum*, *neomexicanum*, *nudicaule*, *oblongifolium*, *oppositifolium*, *pedatum*, *sinuata*, *Woodhousei*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336-37 = *homonyma omnia* Bahiae.

achillaeoides, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 207. — Calif.

alternifolium, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336. — Am. bor.

ambrosioides, Kuntze, l. c. = *Bahia ambrosioides*, Lag.

anthemodes, Kuntze, l. c. = *B. anthemoides*, A. Gray.

arachnoideum, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 207. — Calif.

artemisiaefolium, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336 = *Bahia stoechadifolia*, DC.

Bigelowii, Kuntze, l. c. 337 = *B. Bigelovii*, A. Gray.

chrysanthemodes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 337 = *B. chrysanthemoides*, A. Gray.

croceum, *Greene, in Erythra*, iii. (1895) 124. — Calif.

Jepsonii, *Greene, Pittonia*, ii. (July 1891) 165; *et Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 207. — Calif.

Nevinii, A. Gray, *ex Lyon, in Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 335, nomen, *et Syn. Fl. N. Am.* i. ii. Suppl. (1886) 452. — Calif.

obovatum, *Greene, in Erythra*, iii. (1895) 123. — Calif.

resinosum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336 = *Galin-soga resinosa*, DC.

speciosum, *Greene, l. c.* i. (1893) 149. — Calif.

tanacetiflorum, *Greene, Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 21. — Calif.

ERIOSEMA, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 883.

andongense, *Hiern, ex Baker f. in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 148. — Angola.

Buchanani, *Baker f. l. c.* 145. — Afr. trop.

cyclophyllum, *Welw. ex Baker f. l. c.* — Angola.

Elliotii, *Baker f. l. c.* 229. — Afr. trop. or.

erythrocarpon, G. Beck, in *Paulitschka, Harrar* (1888) 455. t. 10 = *Flemingia rhodocarpa*, Baker.

filipendulum, *Welw. ex Baker f. in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 235. — Angola.

gracillimum, *Baker f. l. c.* 232. — Angola.

holophyllum, *Baker f. l. c.* 99. — Afr. centr.

leucanthum, *Welw. ex Baker f. l. c.* 234. — Angola.

linifolium, *Baker f. l. c.* 228. — Afr. centr.

macrostipula, *Baker f. l. c.* 142. — Afr. centr.

montanum, *Baker f. l. c.* — Afr. trop.

multiflorum, *Robins. ex Pringle, in Gard. and For.* vii. (1894) 153; *et in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 316. — Mexic.

Palmeri, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 408. — Mexic.

prunelloides, *Welw. ex Baker f. in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 232. — Angola.

psiloblepharum, *Welw. ex Baker f. l. c.* 233. — Angola.

pulcherrimum, *Baker f. l. c.* 99. — Afr. centr.

pulcherrimum, *Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 375. — Afr. centr.

ramosum, *Baker f. in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 146. — Angola.

Schweinfurthii, *Baker f. l. c.* 231. — Afr. trop.

scioanum, *Avetta, ex Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xxi. (1889) 346; *et in Annuar. Ist. bot. Roma*, vi. (1895) 49. — Afr. trop. or.

shirense, *Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 11. — Afr. trop. or.

sparsiflorum, *Baker f. in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 144. — Afr. centr.

terniflorum, *Hiern, ex Baker f. l. c.* 234. — Angola.

Welwitschii, *Hiern, ex Baker f. l. c.* 229. — Angola.

ERIOSOLENA, Blume = **Daphne**, Linn. (Thymel.).

longifolia, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 69. = *D. longifolia*, Meins.

ERIOSPERMUM, Jacq. (Liliac.). Ind. Kew. i. 884.

Bakerianum, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 215. — Afr. austro-occ. extratrop.

ERIOSPERMUM : —

confertum, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35. (1892) 5. — Afr. austr.
porphyrovalve, *Baker, in Journ. Bot.* xxix. (1891) 71. — Transvaal.
triphyllum, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 471. — Afr. trop. or.

ERIOSPORA, Hochst. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 884.

Oliveri, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, C. nsp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 676 (= *Trilepis Oliveri*, Boeck.) — Afr. trop. or.
Rehmanniana, *C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 54; et l. c. 676 (= *Tr. Rehmanniana*, Boeck.) — Transvaal.
Schweinfurthiana, *Benth. ex C. B. Clarke, l. c.* 676. (= *Carpha Schweinfurthiana*, Boeck.) — Afr. centr.
setifera, *C. B. Clarke, l. c.* 676 (= *Fintelmannia setifera*, Ridl.) — Madag.
villosula, *C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv.* (1894) 54; et l. c. 676. — Afr. trop.
virgata, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 128. — Afr. trop. or.

ERIOSTEMON, Sm. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 884.

argyreus, *F. Muell. & Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xi. (1890) 107. — Austral.
Carruthersi, *F. Muell. in Vict. Natural.* vii. (Aug. 1890) 46; et *ex Bot. Centralbl.* xliii. (1890) 371. — Austral.

ERITRICHUM, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 609 = **Eritrichium**, Schrad. (Borag.).**ERISMANTHUS**, Wall. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 885.

sinensis, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1578. — Ins. Hainan.

ERITRICHIMUM, Schrad. (Borag.). — Ind. Kew. i. 885.

affine, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 523. — Chili.
alfalfalis, *Phil. l. c.* 525. — Chili.
armeriifolium, *Phil. l. c.* 551. — Chili.
axillare, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 57. — Am. austr-occ.
Bouchersii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 531. — Chili.
bracteatum, *Phil. l. c.* 548. — Chili.
Bridgesii, *Phil. l. c.* 515. — Chili.
calandrinoides, *Phil. l. c.* 541. — Chili.
carriazense, *Phil. l. c.* 526. — Chili.
cephalanthum, *Phil. l. c.* 520. — Chili.
cinereum, *Phil. l. c.* 545. — Chili.
Closii, *Phil. l. c.* 528. — Chili.
debile, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 57. — Chili.
delicatum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 544. — Chili.
denudatum, *Phil. l. c.* 527. — Chili.
Dichita, *Phil. l. c.* 516. — Chili.
diplasiantum, *Phil. l. c.* 530. — Chili.
divaricatum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 534. — Chili.
dolichophyllum, *Phil. l. c.* 520. — Chili.
dolichophyllum, *Phil. l. c.* 522. — Chili.
fallax, *Phil. l. c.* 518. — Chili.
filagineum, *Phil. l. c.* 536. — Chili.
flavicans, *Phil. l. c.* 544. — Chili.
floribundum, *Phil. l. c.* 532. — Chili.
foliosum, *Phil. ex Reiche, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 49 nomen; et l. c. 533. — Chili.
Germaini, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 550. — Chili.
glabratum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 56. — Chili.
glomeruliferum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 521. — Chili.
gracile, *Phil. l. c.* 519. — Chili.
graminifolium, *Phil. l. c.* 547. — Chili.
haplostachyum, *Phil. l. c.* 537. — Chili.

ERITRICHIMUM : —

illapelinum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 548. — Chili.
inconspicuum, *Phil. l. c.* 534. — Chili.
Jankae, Simonk. Enum. fl. Transs. (1886) 408 = nanum, Schrad.
Kingi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 516. — Chili.
laxiflorum, *Phil. l. c.* 527. — Chili.
lignosum, *Phil. l. c.* 524. — Chili.
limonium, *Phil. l. c.* 566. — Chili.
longifolium, *Phil. l. c.* 522. — Chili.
macrocalyx, *Phil. l. c.* 536. — Chili.
microphyllum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 57. — Chili.
Mite, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 539. — Chili.
oliganthum, *Phil. l. c.* 535. — Chili.
oppositifolium, *Phil. l. c.* 542. — Chili.
parvulum, *Phil. l. c.* — Chili.
pedicellare, *Phil. l. c.* 549. — Chili.
polycaulum, *Phil. l. c.* 542. — Chili.
Pugae, *Phil. l. c.* 532. — Chili.
pulchellum, *Phil. l. c.* 545. — Chili.
pustulosum, *Phil. l. c.* 537. — Chili.
Rengifoanum, *Phil. l. c.* 529. — Chili.
rigidum, *Phil. l. c.* — Chili.
sessilifolium, Greene, Pittonia, i. (1887) 17 sphalm. = sessiliflorum, DC.
spatulatum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 517. — Chili.
sphaerophorum, *Phil. l. c.* 539. — Chili.
talquinum, *Phil. l. c.* 517. — Chili.
uspallatense, *Phil. l. c.* 521. — Chili.
vernum, *Phil. l. c.* 550. — Chili.
Vidali, *Phil. l. c.* 525. — Chili.
virens, *Phil. l. c.* 519. — Chili.

ERLANGIA, Sch. Bip. (Compos.). — Ind. Kew. i. 886.

Schinzii, *O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 71. — Afr. austro-occ. extratrop.

ERNESTIA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 886.

ovata, *Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 929. — N. Granat.

ERNSTAMRA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 434. = **Wigandia**, H. B. & K. (Hydrophyll)

caracasana, Kuntze, l. c. = W. caracasana, H. B. & K.
crispa, Kuntze, l. c. = W. crispa, H. B. & K.
herbacea, Kuntze, l. c. = W. herbacea, Choisy.
macrophylla, Kuntze, l. c. = W. urens, H. B. & K.
scorpiodes, Kuntze, l. c. = W. scorpiodes, Choisy.
urens, Kuntze, l. c. = W. urens, Choisy.

ERODIUM, L'Hérit. (Geran.). — Ind. Kew. i. 887.

aragonense, Loscos, *Trat. pl. Arag.* ii. (1877-79?) 228; ex Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 266. — Hisp.
californicum, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 97 et *Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 70. — Calif.
Choulettianum, Coss. ex Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 386. — Algeria.
Juliani, Batt. l. c. in obs. = Choulettianum, Coss.

EROTEUM, Sw. = **Freziera**, Sw. (Ternstroem.).

subintegrifolium, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 9. — Bolivia.
yungasium, Rusby, l. c. = F. yungasia Tul.

ERPORCHIS, Thou. = **Platylepis**, A. Rich. (Orchid.).

bracteata, glandulosa, heteromorpha, sechellarum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 660 = homonyma omnia Platylepidis.
Cryptoripis, Thou, ex Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 462 = Platylepis goodyeroides.

ERRERANA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937. = **Pleiococca**, F. Muell. (Rutac.).

Wilcoxiana, Kuntze, l. c. 938 = P. Wilcoxiana, F. Muell.

ERTELA, Adans. = **Monnieria**, Linn. (Rutac.)
bahiensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 100 = M. bahiensis, Engl.
trifolia, Kuntze, l. c. = M. trifolia, Linn.

ERUCA, Tourn. ex Adans. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 888.

drepanensis, Caruel, in *N. Giorn. Bot. Ital.* xxiii. (1891) 240; et *Fl. Ital.* ix. (1891) 973. — Sicilia.
macrocapa, Caruel, l. c. (= *Brassica macrocarpa*, Guss.) — Sicilia.

ERUCAGO, Tourn. ex Adans. = **Bunias**, Linn. (Crucif.).

segetum, Tourn. ex Coss. Comp. Fl. Atlant. ii. (1887) 363 in syn. = B. Erucago, Linn.

ERUCARIA, Gaertn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 889.

Reboudii, Coss. Comp. Fl. Atlant. ii. (1887) 212 in syn. = Reboudia erucarioides, Coss. & Durieu.
rupestris, Huter, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) litt. 51 (= *Coincya rupestris*, Rouy). — Hisp.

ERUCASTRUM, Presl = **Brassica**, Tourn. (Crucif.).

brachycarpum, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 524. — Hisp.
bracteatum, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 54 = B. Erucastrum, Linn.
cardaminoides, Webb, ex C. Bolle, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 231 in obs. = canariense, Webb.
leptopetalum, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 67; et *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 183 B. leptopetala, Sond.

ERVUM, Tourn. = **Vicia**, Tourn. (Legumin.).

longepedunculatum, Willk. et Costa, ex Debeaux, Not. plus. pl. nouv. ou peu conn. Rég. Médit. (1895), ex Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 375 = V. gracilis, Loisel.
nemorale, Giraudias, in Magnier, Scrin. fl. select. vi. 115; et in Bull. Soc. Dauph. xv. (1888) 604. — Gallia.

ERYCIBE, Roxb. (Convolv.). — Ind. Kew. i. 890.

aenea, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiii. (1894) ii. 85. — Perak.
albida, Prain, l. c. 87. — Penins. Mal.
angulata, Prain, l. c. 84. — Malaya.
angustifolia, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 524 nomen. — Borneo.
festiva, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiii. (1894) ii. 87. — Penins. Mal.
Hellwigii, Prain, l. c. 84 in obs. — N. Guin.
micrantha, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 503 et 524 nomen. — Ins. Philipp.
peguensis, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiii. (1894) ii. 83. — Pegu.
praecipua, Prain, l. c. 86. — Penang.
Staphiana, Prain, l. c. 87. — Perak, Telass.

ERYNGIUM, [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 890.

alismaefolium, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 64. — Calif.
alternatum, Coult. & N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3. (1895) 298. Mexic.
aristulatum, Jepson, in *Erythea*, i. (1893) 62. — Calif.
armatum, Coult. & N. E. Rose, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 141; et *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 96. — Am. bor. occ.
armatum, Csato, ex Simonk. Enum. fl. Transsylv. (1886) 249. = planum, Linn.
coquiabanum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 713. — Chili.
digitifolium, Stapf & Wettst. ex Stapf, in *Denksch. Akad. Wien*, (1886) 26. — As. Min.
floridanum, Coult. & N. E. Rose, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 142 in obs; et *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 96. — Florida.
Harknessii, Curran, ex Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 148. — Calif.
Huteri, Porta & Rigo, ex Porta, in *Atti Accad. Agiati* ix. 1891 (1892) extr. 29; et *Willk. Suppl. Prodr. Fl.* (1893) 196. — Hisp.

ERYNGIUM: —

- involutum, *Coult. & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 299. — Mexic.
 Lemmoni, *Coult. & N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 279. — Arizona.
 lycium, *Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien* (1886) 25. — As. Min.
 Ludovicianum, Morong, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiv. (1887) 51 = virgatum, *Lam. var. Lam.*
 macracanthum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 715. — Chili.
 madrese, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 274. — Mexic.
 mexicanum, *S. Wats. l. c.* xxvi. (1891) 136. — Mexic.
 montanum, *Coult. & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 300. — Mexic.
 multicapitatum, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 124. — Parag.
 Nelsoni, *Coult. & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 300. — Mexic.
 orientale, *Stapf & Wettst. in Denkschr. Akad. Wien* (1888) 47. — As. occ.
 pulchellum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 715. — Chili.
 Seatonii, *Coult. & N. E. Rose, in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 118; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3. (1895) 300. — Mexic.
 spinosissimum, *Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien* (1886) 25. — As. Min.
 thessalonicum, *Nadj. [Charrel] Emp. Ottom. [Pl. de Salon.]* (1892) 22. — Thessal.
 Vaseyi, *Coult. & N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 142; et *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 97. — Am. bor. occ.

ERYSIMUM, [Tourn.] Linn. (Crucif.). — Ind.

- Kew. i. 892.
 albiflorum, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus albiflorus, T. Anders.*
 altaicum, *Maxim. Enum. pl. Mongol.* (1889) 64 = *Sisymbrium altaicum, C. A. Mey.*
 arenicola, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 124 (= *Cheiranthus arenicola, Greene.*) — Washington.
 austriacum, *Maxim. Enum. pl. Mongol.* (1889) 65 (= *Cheiranthus austriacus, Bunge.*) — As. centr.
 Blancheanum, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 38. — As. occ.
 brevistylum, *Somm. et Levier. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 29. — Reg. Cauc.
 Burnati, *Vidal, in Magnier. Scrin. fl. select.* xiv. (1895) 340. — Gall.
 californicum, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 69. — Calif.
 callicarpum, *Lipski. in Mém. Soc. hist. Nat. Kiew*, xi. (1891) extr. 17; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 280. — Reg. Cauc.
 capitatum, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 269; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 21 = *Cheiranthus capitatus, Dougl.*
 chamaephyton, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 63. — Tibet.
 cinereum, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus scoparius, Brouss.*
 contractum, *Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 30. — Reg. Cauc.
 corinthium, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 (corinthus) = *Cheir. corinthius, Boiss.*
 cuspidatum, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 32 = *Syrenia cuspidata, Reichb.*
 filifolium, *Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 41. — Pers.
 frigidum, *Boiss. & Hausskn. l. c.* 39. — Pers.
 gladiiferum, *Boiss. & Hausskn. l. c.* 40. — Pers.
 heterophyllum, *Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, lxxv. (1895) 377. — Serb.
 himalayense, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus himalayensis, Camb.*
 hirschfeldioides, *Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 39. — Mesopot.
 inconspicuum, *Mac Millian, Metasp. Minn.* (1892) 268 = *parviflorum, Nutt.*
 insulare, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 218 = *Cheiranthus insularis, Greene.*

ERYSIMUM: =

- intermedium* X, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 244. t. 1. — Austria.
Knowlesii, *Wettst. l. c.* 283. = *Cheiranthus Knowlesii, Walp.*
kurdicum, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 38. — Pers.
libanoticum, Post, Pl. Postianae, iii. (1892) 5. — Syria.
linifolium, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 622. (= *Sisymbrium linifolium, Nutt.*) — Am. bor.
Menziesii, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus Menziesii, Benth. et Hook. f.*
microstylum X, *Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, iii et iv. (1893) 109. — Graecia.
mutabile, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus mutabilis, L'Hérit.*
nasturtioides, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 40. — Pers.
nitvarium, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus nitarius, Pall.*
parryoides, Wettst. l. c. = *C. parryoides, Kurz.*
patens, Loscos, Trat. pl. Arag. iii. suppl. 7^o (1886) 71; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 299. — Hisp.
scoparium, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 283. = *C. scoparius, Willd.*
semperflorens, Wettst. l. c. = *C. semperflorens, Schousb.*
Senoneri, Wettst. l. c. = *C. Senoneri, Heldr. et Sart.*
Stewartii, Wettst. l. c. = *C. Stewartii, T. Anders.*
syrticolum, Sheld. in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 285 = *C. syrticola, Greene.*
tenuifolium, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus tenuifolius, L'Hérit.*
Thalianum, Fritsch, in Bot. Centralbl. xliii. (1890) 14; *G. Beek, Fl. Nied.-Oestr. II. i.* (1892) 480 (= *E. Thalianum, Kitt.*) = *Sisymbrium Thalianum, J. Gay.*
virescens, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 283 = *C. virescens, Webb.*
Wahlenbergii, Simonk. Enum. fl. Transylv. (1886) 85 = *hieracifolium, Linn.*
yunnanense, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr., xxxiii. (1886) 404. — China.

ERYSIMUM, [Tourn.] Linn. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 et 931 [Gen. collect.] (Crucif.).

- Allionii, alpestre, amplexicaule, androsaceum, arcuatum, arenosum, Aucheri, auriculatum, blepharophyllum, Cadmea, Carduochorum, cebennense, collinum, crassifolium, decumbens, dentatum, drabaeforme, Dregeanum, Drummondii, eriopodium, erubescens, flagellosum, flaviflorum, Halleri, hirsutum, Holboellii, ionocalyx, laevigatum, laxum, longirostre, ludovicianum, lusitanicum, lyratum, Montbretianum, murale, neglectum, ochroleucum, pachyrhizum, parvulum, patens, patulum, pendulum, petiolare, petraeum, Piasezkii, platyspermum, procurrens, Pseudoturritia, pubicalyx, purpureum, resediflorum, saxatile, serpyllifolium, serratum, sinuatum, spatulatum, Stelleri, Stevenianum, strictum, tibeticum, trichopodium, Turrita, vernum, okoscenyse, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 933-34 = homonyma omnia Arabidis.*
albidum, Kuntze, l. c. 28 = *Arabis albyda Stev. et alpina, Linn.*
alyssoides, Kuntze, l. c. 933 (= *Stevenia alyssoides, Adams & Fisch.*) — Sibir.
ambiguum, Kuntze, l. c. = *A. petraea, Linn.*
aubrietoides, Kuntze, l. c. = *A. aubrietoides, Boiss.*
bracteatum, Kuntze, l. c. = *Streptanthus bracteatus, A. Gray.*
Breweri, Kuntze, l. c. = *S. Breweri, A. Gray.*
bryoides, Kuntze, l. c. = *Arabis bryoides, Boiss.*
canadense, Kuntze, l. c. 28 = *A. canadensis, Linn.*
carinatum, Kuntze, l. c. 933 = *Streptanthus carinatus, Wright.*
ciliatum, Kuntze, l. c. = *A. Scopoliana, Boiss.*
conringioides, Kuntze, l. c. = *A. conringioides, Ball.*
cordatum, Kuntze, l. c. = *Streptanthus cordatus, Torr.*
erysimoides, Kuntze, l. c. = *Arabis erysimoides, Kar. & Kir.*
falcatum, Kuntze, l. c. = *A. Turczaninowii, Ledeb.*

ERYSIMUM: —

- falklandicum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 933* = *Arabis macloviana, Hook.*
flavescens, Kuntze, l. c. = *Streptanthus flavescens, Hook.*
frutescens, Kuntze, l. c. = *A. fruticulosa, C. A. Mey.*
fruticulosum, Kuntze, l. c. = *A. incarnata, Lamb.*
glabrum, Kuntze, l. c. = *A. perfoliata, Linn.*
glandulosum, Kuntze, l. c. = *Streptanthus glandulosus, Hook.*
Heritieri, Kuntze, l. c. 29 = *Cheiranthus mutabilis, L'Hérit.*
heterophyllum, Kuntze, l. c. 933 = *Caulanthus Coulteri, S. Wats.*
hyacinthodes, Kuntze, l. c. = *Streptanthus hyacinthoides, Hook.*
hispidum, Kuntze, l. c. = *S. hispidus, A. Gray.*
Kardinianum, Kuntze, l. c. = *Arabis glandulosa, Kar. & Kir.*
lycium, Kuntze, l. c. = *A. deflexa, Boiss.*
maculatum, Kuntze, l. c. = *Streptanthus maculatus, Nutt.*
molle, Kuntze, l. c. = *Arabis vochinensis, Spreng.*
nepetifolium, Kuntze, l. c. = *A. nepetaefolia, Boiss.*
nudicaule, Kuntze, l. c. = *A. nudiuscula, E. Mey.*
nudum, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium nudum, Boiss.*
Nuttallianum, Kuntze, l. c. = *Streptanthus repandus, Nutt.*
Nuttallii, Kuntze, l. c. = *A. spatulatum, Nutt.*
platycarpum, Kuntze, l. c. = *Streptanthus platycarpus, A. Gray.*
polygalodes, Kuntze, l. c. = *Strep. polygaloides, A. Gray.*
Preslianum, Kuntze, l. c. = *Arabis Turrita, Linn.*
puberulum, Kuntze, l. c. = *A. canescens, Nutt.*
resediflorum, Kuntze, l. c. 25 et 933 = *Nasturtium arabiforme, DC.*
rupestre, Kuntze, l. c. 933 = *Arabis ciliata, R. Br.*
sulfureum, Kuntze, l. c. 934 = *A. sulphurea, Boiss.*
taraxacifolium, Kuntze, l. c. = *A. arvensis, Edgew.*
tortuosum, Kuntze, l. c. = *Streptanthus tortuosus, Kell.*
Wettsteinianum, Kuntze, l. c. 933 = *Arabis alpina, Linn.*

ERYTHRAEA, Renealm. (Gentian.). — Ind. Kew i. 894.

- Carueliana, Terrac. in Bull. Soc. Bot. Ital.* iv. (1894) 179 (sp. coll.). — Eur., Asia, Afr. bor.
curvistaminea, Wittr. in Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 317. —
divaricata, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 312. — Ins. Balear.
exaltata, Coville, Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 150 = *E. Douglasii, A. Gray.*
exaltata, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 258 = *praec.*
japonica, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxi. (1887) 67. — Japon.
Morieri, Corbière, in Mém. Soc. sc. nat. Cherb. xxv. (1887) 269-71; et *Nouv. Fl. Norm.* (1893) 334 = *ramosissima, Pers.*
subspicata, Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1889. (1890) II. 37. — Bulg.
twrcica, Velen. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. (1886) 219 = *glomerata, Wittr.*

ERYTHRINA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew i. 895.

- aurantiaca, Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 30. t. I. — Ins. Fernando Noronha.
costa-ricensis, M. Micheli, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 445. — Costarica.
edulis, Triana, ex M. Micheli, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 145. — Columb.
flabelliformis, Kearn. in Trans. N. Y. Acad. Sci. xiv. (1894) 32. — Arizona.
Humei, [N. E. Br.] in Monteiro, Delagoa Bay (1891) 159. nomen (an *E. Humeana, Spreng.?*). — Mossamb.

ERYTHROCEPHALUM, Benth. (Compos.). — Ind. Kew i. 896.

- dianthiflorum, O. Hoffm. in Bolet Soc. Brot.* x. (1892) 183; et in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 541. — Angola.

ERYTHROCEPHALUM :—

Stuhlmannii, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 420. — Afr. trop. or.

ERYTHROCHLAMYS, Guerke in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 222. **LABIATAE**.
spectabilis, Guerke, l. c. — Afr. trop. or.**ERYTHROCOCCA**, Benth. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 896.
abyssinica, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 87. — Abyss.
bongensis, Pax, l. c. 88. — Afr. trop.
Fischeri, Pax, l. c. — Afr. trop. or.
mitis, Pax, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 238. — Afr. trop. or.**ERYTHRONIUM**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 896.
citrinum, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 480. — Oreg.
Hendersoni, S. Wats. l. c. 479; et ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1888) t. 7017 = grandiflorum, Pursh.
Howellii, S. Wats. l. c. 480. — Am. bor.
Johnsonii, H. N. Bolander, in *Erythra*, iii. (1895) 127. — Oregon.
mesochoreum, Knerr, in *B. B. Smyth, Check List pl. Kansas* (1892) 26. — Kansas.
montanum, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 130. — Am. bor. occ.**ERYTHROPHLOEUM**, Afzel. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 897.
chlorostachys, Hennings, ex Taub. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 127 (= *E. chlorostachys*, Baill.) = *E. Laboucherii*, F. Muell.
Dinklgei, Taub. l. c. 386. — Kamer.
gabunense, Taub. l. c. — Gabon.
pubistamineum, Hennings, in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 39 fig. 8. — Angola.**ERYTHROSPERMUM**, Lam. (Bixin.). — Ind. Kew. i. 897.
ampullaceum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 455. — Madag.
bancanum, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* xi. (1893) 192 t. xvi. — Ins. Banka.
Boivinianum, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 599; et *Hist. pl. Madag. Atlas*, t. 118. — Madag.
capitatum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 302. — Madag.
coffaeae-folium, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 605. — Madag.
corymbosum, Baill. l. c. 606; et *Hist. pl. Madag. Atlas*, t. 120. — Madag.
crassipes, Baill. l. c. 605. — Madag.
ecarinatum, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* xi. (1893) 191 t. xv. — Ins. Molucc.
elegans, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 600. — Ins. Comor.
Fischeri, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 226. — Afr. trop. or.
hypoleucum, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1899. — China.
latifolium, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* xi. (1893) 192. — Ins. Linggu.
Laurei, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 600. — Madag.
longistipulatum, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* xi. (1893) 193. — Archip. Malay.
montanum, Teysm. & Binn. ex Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* xiii. (1893) 191 = ecarinatum, Burck.
nossibeense, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 600. — Madag.
novo-granatense, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 35. — Columb.
Pervillei, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 606. — Madag.
recurvifolium, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 301. — Madag.
Richardianum, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 605. — Madag.
Rignyanum, Baill. l. c. — Madag.**ERYTHROSPERMUM** :—

Scortechinii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 116. — Malaya.
sparsiflorum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 455. — Madag.

ESCALLONIA, Mutis (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 898.
andina, Phil. in *Annal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 502. — Chili.
bracteata, Phil. l. c. 500. — Chili.
glutinosa, Phil. l. c. 499. — Chili.
Mandoni, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3. (1893) 25. — Boliv.
promaucana, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 500. — Chili.
Pugae, Phil. l. c. 501. — Chili.
Rahmeri, Phil. l. c. 502. — Chili.
rigida, Phil. l. c. 503. — Chili.
sparsiflora, Phil. l. c. 505. — Chili.**ESCHSCHOLTZIA**, Cham. (Papav.). — Ind. Kew. i. 899.
ambigua, Greene, *Fl. Francisc.* (1896) 286; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 11. — Calif.
cucullata, Greene, in *Erythra*, ii. (1894) 120; et ex *Gard. Chron.* (1894) ii. 434. — Calif.
glaucua, Greene, *Pittonia*, i. (Mar. 1887) 45. — Calif.
Lemmoni, Greene, in *West-Am. Scientist*, iii. (1887) 157; et *Fl. Francisc.* (1892) 287. — Calif.
leptandra, Greene, *Pittonia*, i. (June 1888) 170. — Am. bor. occ.
maritima, Greene, l. c., i. (July 1887) 60. — Calif.
minutiflora, Parish, ex Greene, l. c. i. (June 1888) 169 = modesta, Greene.
modesta, Greene, l. c. — Calif.
Palmeri, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 23. — Ins. Guadal. (Calif.).
ramosa, Greene, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 217. — Calif.
rhombipetala, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 12. — Calif.
tenuisecta, Greene, *Pittonia*, i. (June 1888) 169 = californica, Cham. et Schlecht.**ESCHWEILERIA**, Mart. = **Lecythis**, Linn. (Myrtac.).
amara, Niedenzu, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1892) 40 = amara, Berg?
Idatimon, Niedenzu, l. c. = L. Idatimon, Aubl.
ovalifolia, Niedenzu, l. c. = L. ovalifolia, DC.
Poiteaui, Niedenzu, l. c. = L. Poiteaui, Berg.
retusa, Niedenzu, l. c. = L. retusa, Spruce.
salebrosa, Niedenzu, l. c. = L. salebrosa, Berg.
Schomburgkii, Niedenzu, l. c. = L. Schomburgkii, Berg.
Spruceana, Niedenzu, l. c. = L. Spruceana, Berg.
turbinata, Niedenzu, l. c. = L. turbinata, Berg.
valida, Niedenzu, l. c. (= *Chytroia valida*, Miers). — N. Granat.**ESCHWEILERIA**, Zipp. ex Boerl. in *Annal. Jard. Buit.* vi. (1887) 112 [OSMOXYLON, Blume pr. p.] = **Boerlagiodendron**, Burck (Aral.).
barbata, Boerl. l. c. 117 (= *O. barbata*, Becc.) = *B. barbata*, Harms.
Boerlagei, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 295 = *B. Warburgii*, Harms.
carpophagum, Boerl. in *Annal. Jard. Buit.* vi. (1887) 120 (= *O. carpophagum* Becc.) = *B. carpophagum*, Harms.
Gelwinkiana, Boerl. l. c. 120 (= *O. Gelwinkiana*, Becc.) = *B. Gelwinkiana*, Harms.
helleborinum, Boerl. l. c. 115 (= *O. helleborinum*, Becc.) = *B. helleborinum*, Harms.
insidiatrix, Boerl. l. c. 120 (= *O. insidiator*, Becc.) = *B. insidiator*, Harms.
insignis, Boerl. l. c. 122 (= *O. insigne*, Becc.) = *B. insigne*, Harms.
novo-guineensis, Boerl. l. c. 118 (= *O. novo-guineense*, Becc.) = *B. novo-guineense*, Harms.
palmata, Zipp. ex Boerl. l. c. 116 = *B. palmatum*, Harms.
Pfeilii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 396 = *B. Pfeilii*, Harms.**ESCHWEILERIA** :—

fulcherrima, Boerl. in *Annal. Jard. Buit.* vi. (1887) 123 (= *O. fulcherrimum*, Vidal) = *B. pulcherrimum*, Harms.
Teysmannii, Boerl. l. c. 119 = *B. Teysmannii*, Boerl.

ESENBECKIA, H. B. & K. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 899.
flava, T. S. Brandeg. in *Zoë*, i. (1890) 378 t. 12. — Calif.
Hartmannii, Robins. & Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 115. — Mexic.**ESMERALDA**, Reichb. f. = **Arachnanthe**, Blume (Orchid.).
bella, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 136. — Hab.?
Clarkei, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 552 = *A. Clarkei*, Rolfe.**ETAERIA**, Blume = **Hetaeria**, Blume (Orchid.).
elongata, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xxii (1894) t. 2190. — Penins. Mal.**ETHANIUM**, Salisb. = **Renealmia**, Linn. f. (Scitam.).
africanum, bracteosum, breviscapum, exaltatum, macranthum, Mannii, mexicanum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 690 = homonyma omnia *Renealmiae*.
aromaticum, Kuntze, l. c. 689 = *R. occidentalis*, Sweet.
cinnamatum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 424. — Gabon.
Pacosecora Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 689 = *R. Pacosecora*, Horan.
racemosum, Kuntze, l. c. = *R. breviscapa*, Poepp. & Endl.
silvestre, Kuntze, l. c. = *R. sylvestris*, Horan.
thyrsodum, Kuntze, l. c. = *R. thyrsoides*, Poepp. & Endl.**EUADENIA**, Oliver (Capparid.). — Ind. Kew. i. 901.
alimensis, Hua, in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 81. — Afr. trop. occ.
major, Hua, l. c. 82. — Guin.**EUBRACHION**, Hook. f. (Loranth.). — Ind. Kew. i. 901.
ambiguum, *Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* III. i. (1889) 192 (= *Viscum ambiguum*, Hook. & Arn.). — Urug.**EUCALYPTUS**, L'Hérit. (Myrt.). — Ind. Kew. i. 901.
Andreana, Carr. in *Rev. Hortie.* (1890) 346 fig. 104 et 105. — Tasman.
Bauerlesii, F. Muell. in *Vict. Natural.* vii. (Oct. 1890) 76; et ex *Bot. Centralbl.* xlv. (1890) 236. — Austral.
Bosistoana, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* x. (1895) 293; et ex *Bot. Centralbl.* lxiv. (1895) 365. — Austral.
Kruseana, F. Muell. l. c. x. (1895) 233. — Austral.
Lansdowneana, F. Muell. & J. E. Brown, in *J. E. Brown, For. Fl. S. Austral.* pt. 9 (1890) [t. 31]. — Austral.
Maideni, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. iii. (Feb. 1890) 1020 tt. 28, 29. — Austral.
Muelleri, J. B. Moore, in *Proc. Roy. Soc. Tasman.* 1886 (1887) 208. — Tasmania.
Naudiniana, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* (July 1886) 239; et ex *Bot. Centralbl.* xxviii. (1886) 179. — N. Brit.
Rameliana X, Trabut. in *Mém. Assoc. Franç. Marseille*, 1891 (1892) 463. — Hybr. artef.**EUCHARIS**, Planch. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 903.
Bakeriana, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1890) i. 416. fig. 61; et ex *Hook. f. in Bot. Mag.* (1890) t. 7144. — N. Granat.
Lehmanni, Regel, in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 313 t. 1300 fig. 1; et in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 591 (691, err. typ.). — Columb.

EUCCHARIS : —

- Lowii, *Baker, in Gard. Chron.* (1893) i. 538. fig. 78. — N. Granat.
Stevensi X, *Hort. ex l. c.* (1890) i. 640. — Hybr. artef.

EUCHRESTA, Benn. (Legum.). — Ind. Kew. i. 903.

- tenuifolia*, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 200. — China.

EUCLEA, Murr. (Eben.). — Ind. Kew. i. 903.

- karaguensis*, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 305. — Afr. trop. or.
microcarpa, *Guerke, l. c.* — Afr. trop. or.
oppositifolia, *Parment. Histol. comp. Ebénac* (1892) 142 = *Diospyros oppositifolia*, *Thiwb.*
Stuhlmannii, *Guerke, l. c.* Afr. trop. or.
suberifolia, *Parment. Histol. comp. Ebénac* (1892) 116 et 142 = *Diospyros suberifolia*, *Decne.*
urijiensis, *Hiern, in Journ. Bot. xxxiii.* (1895) 179. — Afr. trop. or.

EUCNIDE, Zucc. = **Mentzelia**, Linn. (Loas.).

- grandiflora*, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 317 [*Eucnida*] (= *Microsperma grandiflora*, *Groenl.*) — Mexic.

EUCOMIS, L'Hérit. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 904.

- humilis*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 152. — Natal.
pallidiflora, *Baker, in Gard. Chron.* (1887) ii. 154. — Afr. austr.
robusta, *Baker, l. c.* (1894) ii. 562. — Natal.
zambesiaca, *Reichb. f. l. c.* (1886) ii. 8. — Zambes.

EUCOMMIA, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1950; et xxiv. (1895) t. 2361. **MAGNOLIA-CEAE**.

- ulmoides*, *Oliver, l. c.* — China.

EUCROSIA, Ker-Gawl. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 904.

- eucrosioides*, *Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 5 (1887) 115 (= *Calliopsyche eucrosioides*, *Herb.*) — Am. austr.

EUCRYPHIA, Cav. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 904.

- glutinosa*, *Focke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 131. — Chili.

EUGEISSONA, Griff. (Palm.). — Ind. Kew. i. 904.

- major*, *Becc. Malesia*, iii. (1886) 3 (*Eugeissonia*). — Borneo.

EUGENIA, Mitch. ex Linn. (Myrt.). — Ind. Kew. i. 904.

- acutiflora*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 164. — Bras.
acutangula, *K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 89. — N. Guin.
adenodes, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 176. — Bras.
aggregata, *Kiaersk. l. c.* 162 (= *Phyllocalyx cerasiflora*, *Berg.*) — Bras.
aggregata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 475. — Madag.
agrostophylla, *F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl.* xi. i. (1895) 16. — Austral.
alegrensis, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 180. (= *Myrciaria capitata*, *Berg.*) — Bras.
Alexandri, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 626. — Jamaica.
amplectens, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 81 (= *Stenocalyx sessilifolius*, *Berg.*) — Bras.
ampullaria, *Stapp, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 153. — Borneo.
antiseptica, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 238. — Java.
apiculata, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 81 (= *Myrcianthes apiculata*, *Berg.*) — Bras.
apodophylla, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (April 1892) 197; et *ex Bot. Centralbl.* 1. (1892) 311. — Austral.
aprica, *Trim. Handb. Fl. Ceyl.* ii. (1894) 186. — Zeyl.

EUGENIA : —

- argyrocalyx*, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 391. — Oceania.
aromatica, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 239 = *caryophyllata*, *Thunb.*
Asa-Grayi, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 658. — Cuba.
Aschersoniana, *F. Hoffm. Beitr. Kennin. Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 35. — Afr. trop.
augustana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 153. — Bras.
Baeuerleinii, *F. Muell. in Australas. Journ. Pharm.* (June 1886) 19; et *ex Bot. Centralbl.* xxviii. (1886) 149. — N. Guin.
bahamensis, *Kiaersk. in Bot. Tidskr.* xvii. (1890) 266, t. 8 A et fig. 4. — Ins. Baham.
Bellonis, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 611. — Ins. Puerto-Rico.
biseriata, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 180 (= *Myrciaria disticha*, *Berg.*) — Bras.
Blumeana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 239 = *ramosissima*, *Wall.*
boliviensis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 28. — Boliv.
botequimensis, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 156. — Bras.
brachymischa, *Kiaersk. l. c.* 165. — Bras.
brachysepala, *Kiaersk. l. c.* 125. — Bras.
brevipedunculata, *Kiaersk. l. c.* 139. — Bras.
brunea, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 81. — Bras.
Buettneriana, *K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 89. — N. Guin.
bunchosiifolia, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx grandifolius*, *Berg.*) — Bras.
Cabelludo, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 180 (= *Myrciaria glomerata*, *Berg.*) — Bras.
caldensis, *Kiaersk. l. c.* (1893) 162 (= *Phyllocalyx limbatus*, *Berg.*) — Bras.
calystegia, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx calystegius*, *Berg.*) — Bras.
cambucarana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 151. — Bras.
camporum, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 106. — Parag.
cauliflora, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 299. — Penins. Mal.
Championi, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 296 (= *Acmena Championi*, *Benth.*) — Ins. Honkong.
chnoosepala, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 174. — Bras.
christovana, *Kiaersk. l. c.* 184. — Bras.
cleveraeifolia, *Yatabé, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 405, t. 13. — Japon.
Coolminiana, *C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 207. — Austral.
corcovadensis, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 126. — Bras.
crassiflora, *Kiaersk. l. c.* 132. — Bras.
Cruegeri, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 625. — Ins. Antill.
cuprea, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx cupreus*, *Berg.*) — Bras.
dentata, *Niedenau, l. c.* (= *Stenocalyx dentatus*, *Berg.*) — Bras.
dasyblastia, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Stenocalyx dasyblastus*, *Berg.*) — Bras.
diaphana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 154. — Bras.
dolichophylla, *Kiaersk. l. c.* 157. — Bras.
Dussii, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 646. — Ins. Guadalup.
edulis, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 162. (= *Phyllocalyx edulis*, *Berg.*) — Bras.
Eggersii, *Kiaersk. in Bot. Tidskr.* xvii. (1890) 368 t. 12 et fig. 5. — Ins. Puerto-Rico.
ellipsoidea, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 134. — Bras.
elongata, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 82 (= *Phyllocalyx racemosus*, *Berg.*) — Bras.

EUGENIA : —

- eurysepala*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 117. — Bras.
Fadyenii, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 622. — Ins. Antill.
Fergusonii, *Trim. Handb. Fl. Ceyl.* ii. (1894) 172; et *Pl. illustr. Handb. Fl. Ceyl.* (1894) t. 38. — Zeyl.
filipes, *Baill. Hist. pl. Madag. Atlas* (1895) t. 328. — Madag.
Fitzgeraldi, *F. Muell. & Bailey, in Vict. Natural.* viii. (June 1891) 45; et *ex Bot. Centralbl.* xlvii. (1891) 221. — Austral.
fluvialis, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 296. — China austr.
fuscopunctata, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 155 (= *Stenocalyx grandifolius*, *Berg.*) — Bras.
galalonensis, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 641. — Cuba.
Garberi, *Sarg. in Gard. and For.* ii. (1889) 28 fig. 87; et *N. Am. Sylva*, v. 49 t. CCIX=procera, *Poir.*
glanduliflora, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 180. — Bras.
glandulosissima, *Kiaersk. l. c.* 147. — Bras.
Glazioviana, *Kiaersk. l. c.* 128. — Bras.
glomerata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 390. — Oceania.
goyazensis, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 82 (= *Phyllocalyx Regelianus*, *Berg.*) — Bras.
gracilipes, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 158. — Bras.
gracillima, *Kiaersk. l. c.* 120. — Bras.
grandiglandulosa, *Kiaersk. l. c.* 181 (= *Myrciaria Spruceana*, *Berg.*) — Bras.
Grisebachii, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 627. — Cuba.
gryposperma, *Krug & Urb. ex Urb. l. c.* 650. — Ins. Martinic.
Guaquiea, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 181. — Bras.
guineensis, *Baill. ex Laness. Pl. util. Colon, Franç.* (1886) 822 (= *Syzygium guineense*, *DC.*) — Afr. trop. occ.
Hagendorffii, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 179 (= *Myrciaria Hagendorffii*, *Berg.*) — Bras.
haitiensis, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 616. — Ins. Haiti.
Harrisii, *Krug & Urb. l. c.* 632. — Antill.
Hartii, *Kiaersk. in Bot. Tidskr.* xvii. 271. t. 9 B et fig. 6. — Jamaica.
hedraiophylla, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (April 1892) 198; et *ex Bot. Centralbl.* 1. (1892) 312. — Antill.
Holtzei, *F. Muell. in Australas. Journ. Pharm.* (June 1886) 199; et *ex Bot. Centralbl.* xxviii. (1886) 148. — Austral.
ilalensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 326. — Ecuad.
iteophylla, *Krug & Urb. ex Urb. l. c.* xix. (1895) 611. — Cuba.
Isabeliana, *Kiaersk. in Bot. Tidskr.* xvii. (1890) 272 t. 8 B et fig. 7. — Ins. S. Doming.
itaguahiensis, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 81 (= *Stenocalyx Langsdorffii*, *Berg.*) — Bras.
itatiaensis, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 166. — Bras.
Jaboticaba, *Kiaersk. l. c.* 185 (= *Myrciaria Jaboticaba*, *Berg.*) — Bras.
Johnsoni, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (April 1892) 199; et *ex Bot. Centralbl.* 1. (1892) 312. — Austral.
jurububensis, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 143. — Bras.
kinabaluensis, *Stapp, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 152. — Borneo.
Krugii, *Kiaersk. in Bot. Tidskr.* xvii. (1890) 259. — Ins. Puerto-Rico.
lagoensis, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 123. — Bras.
leiocarpa, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 662 (= *Ananomis ferruginea*, *Griseb.*) — Cuba.
leptomischa, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 121. — Bras.

EUGENIA: —

- leucophloea*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 183 (= *Myrciaria leucophloea*, Berg). — Bras.
longipedunculata, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 81 (= *Stenocalyx longipes*, Berg). — Bras.
longipes, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 391. — Oceania.
longiracemosa, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 149. — Bras.
lucescens, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx Luschnatianus*, Berg). — Bras.
Luehmanni, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 10; et ex Bot. Centralbl. li. (1892) 90. — Austral.
Lundiana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 162 (= *Phyllocalyx Regelianus*, Berg). — Bras.
Macoorai, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. v. (1892) 15. — Austral.
magnifolia, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 136. — Bras.
malangensis, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 81 (= *Myrtopsis malangensis*, O. Hoffm.). — Angola.
Marshiana, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 652 (= *E. Marshiana*, Griseb.?) — Ins. Antill.
maranhensis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 183 (= *Myrciaria maranhensis*, Berg). — Bras.
maschalantha, Kiaersk. l. c. 183. — Bras.
media, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 79 (= *Catinga media*, Sagot). — Guian.
melanadenia, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 607. — Cuba.
membranifolia, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx membranaceus*, Berg). — Bras.
Milletiana, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 297 (= *Syzygium odoratum*, Hook. & Arn.). — China.
minensis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 184 (= *Myrciaria minensis*, Berg). — Bras.
minutiflora, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (April 1892) 197; et ex Bot. Centralbl. l. (1892) 311. — Austral.
moschata, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 79 (= *Catinga moschata*, Aubl.). — Am. austr.
mutabilis, Niedenzu, l. c. 8 (= *Stenocalyx mutabilis*, Berg). — Bras.
Myrcianthes, Niedenzu, l. c. (= *Myrcianthes edulis*, Berg). — Bras.
myrsinocarpa, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 5 nomen. — Austral.
Myrtillus, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 153. — Borneo.
Nettoana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 179. — Bras.
neurocalyx, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kois. Wilh. Land (1889) 90. — N. Guin.
nutans, K. Schum. l. c. — N. Guin.
oblongifolia, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Stenocalyx oblongifolius*, Berg). — Bras.
oblongifolia, Niedenzu, l. c. 79 (= *Catinga oblongifolia*, Sagot). — Am. austr.
obtusiflora, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 168. — Bras.
octopleura, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 653. — Antill.
odoratissima, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iii. (1891) 12 in obs. = *E. Fitzgeraldi*, F. Muell.
oligandra, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 612. — Cuba.
oligantha, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 474. — Madag.
ophthalmantha, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 159 (= *Stenocalyx geminiflorus*, Berg). — Bras.
ovalifolia, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 390 (= *Jambosa ovalifolia*, Blume). — N. Guin.
oxyoentophylla, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 145. — Bras.

EUGENIA: —

- pallescens*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 162. — Bras.
Parodiana, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 107. — Parag.
parvifolia, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 207, in obs; et in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xxvii. 1893 (1894) 85. — Austral.
pedunculata, Trim. in Journ. Bot. xxvii. (1889) 162. — Zeyl.
phitrantha, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 185. — Bras.
phiebotomonides, Kiaersk. l. c. 159 (= *Stenocalyx lanceolata*, Berg). — Bras.
Picardae, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 608 (= *Eugenia microphylla*, L. C. Rich.). — Ins. S. Doming.
piadadensis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 176. — Bras.
pilosula, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 612. (= *E. angustifolia* Berg). — Ins. Haiti.
pilotantha, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 169. — Bras.
Pitanga, Kiaersk. l. c. 155; Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Stenocalyx Pitanga*, Berg). — Bras.
plicata, Niedenzu, l. c. 81 (= *Stenocalyx Riedelianus*, Berg). — Bras.
Plumieri, Niedenzu, l. c. 82 (= *Myrcia glomerata*, Berg). — Ins. Martin.
Preneloupia, Kiaersk. in Bot. Tidskr. xvii. (1890) 275, t. 7, B et fig. 8. — Ins. S. Doming.
pseudodichasiantha, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 177. — Bras.
pseudovericillata, Kiaersk. l. c. 140. — Bras.
puberula, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx pubescens*, Berg). — Bras.
pulcherrima, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 159. — Bras.
Rabeniana, Kiaersk. l. c. 186 (= *Myrciaria trunciflora*, Berg). — Bras.
reticulata, Trim. Handb. Fl. Ceyl. ii. (1894) 185. — Zeyl.
retusa, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx retusus*, Berg). — Urug.
rhombea, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 644. — Florida, Antill.
robusto-venosa, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 137. — Bras.
rotundata, Trimen, Handb. Fl. Ceyl. ii. (1894) 185. — Zeylan.
salomonensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 212. — Ins. Salom.
sandwicensis, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 129 = *sandwicensis*, A. Gray.
santensis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 163 (= *Phyllocalyx grandifolius*, Berg). — Bras.
Sauvallei, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 661. — Cuba.
Sayeri, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 5, nomen. — Austral.
seriato-pedunculata, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 170. — Bras.
seriato-racemosa, Kiaersk. l. c. 151. — Bras.
seriato-ramosa, Kiaersk. l. c. 170. — Bras.
sericea, Kiaersk. l. c. 129. — Bras.
Serrasuela, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 652. — Ins. Puerto-Rico.
sinensis, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 298 (= *Syzygium buxifolium*, Hook. & Arn.). — China.
Sintensisii, Kiaersk. in Bot. Tidskr. xvii. (1890) 263 t. 7 c. et fig. 3. — Ind. occ.
Sintensisii, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 650. — Ins. Puerto-Rico.
sordida, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. v. (1892) 15. — Austral.
Stahlia, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 650. — Porto-Rico.
stenosepala, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 155. — Bras.
sticheromischia, Kiaersk. l. c. 172. — Bras.
stictosepala, Kiaersk. l. c. 119. — Bras.

EUGENIA: —

- stirpiflora*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 672 (= *Myrciaria stirpiflora*, Berg). — Ins. Antill.
stricta, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 163 = *Phyllocalyx strictus*, Berg). — Bras.
subundulata, Kiaersk. l. c. 129. — Bras.
suffrutescens, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx herbaceus*, Berg). — Bras.
sulcivenia, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 632. — Jamaica.
tenuipedunculata, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 131. — Bras.
Theodora, Kiaersk. l. c. 160. — Bras.
umbellulifera, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 665 (= *Myrcia umbellulifera*, Berg). — Am. trop.
undulatifolia, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx limbatulus*, Berg). — Bras.
velutiflora, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 144. — Bras.
Villae-Novae, Kiaersk. l. c. 141. — Bras.
vicentina, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 621. — Ins. S. Vincent.
Warmingiana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 138 (= *E. bimarginata*, Berg). — Bras.
Widgreniana, Kiaersk. l. c. 175 (= *Siphoneugenia Widgreniana*, Berg). — Bras.
Willdenowii, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 81 (= *Stenocalyx Pseudopsidium*, Berg). — Ins. Martinica.
- EUGENIOIDES**, Kuntze = **EUGENOIDES**, Linn. = **Symplocos**, Jacq. (Styrac.).
acuminatum, *acutum*, *adenophyllum*, *Adenopus*, *angustatum*, *apicale*, *arborum*, *Arcecha*, *bahiense*, *bancanum*, *bapticum*, *bracteale*, *caerulescens*, *caudatum*, *cestrifolium*, *celastrineum*, *cerasifolium*, *cernuum*, *ciliatum*, *Claussenii*, *coccineum*, *congestum*, *cordifolium*, *coriaceum*, *coronatum*, *costaricanum*, *costatum*, *crassifolium*, *crassipes*, *cubense*, *cuneatum*, *decorum*, *dryophyllum*, *elegans*, *estrellense*, *fasciculatum*, *ferrugineum*, *foliosum*, *Fordii*, *glaucescens*, *glomeratum*, *gracile*, *grandiflorum*, *hebanthum*, *hirsutum*, *hispidulum*, *Hohenackeri*, *Hookeri*, *jucundum*, *kurgense*, *laetum*, *lanceifolium*, *latiflorum*, *laxiflorum*, *leiostachyum*, *Lenormandianum*, *leucanthum*, *lucidum*, *Lundii*, *macrocarpum*, *macrophyllum*, *Maingayi*, *marginale*, *Martii*, *martinicense*, *microphyllum*, *minus*, *monanthum*, *montanum*, *micronatum*, *myrtaceum*, *neriifolium*, *nicoabaricum*, *nitens*, *nitidum*, *nudum*, *obovatum*, *obtusum*, *octopetalum*, *odoratissimum*, *oligandrum*, *ophirens*, *oxyphyllum*, *paniculatum*, *parviflorum*, *pauciflorum*, *pendulum*, *phaeocladon*, *platyphyllum*, *prionophyllum*, *pubescens*, *pulchrum*, *pycnanthum*, *pycnobotryum*, *pyrifolium*, *racemosum*, *ramentaceum*, *reflexum*, *repandulum*, *revolutum*, *rhannifolium*, *Ribes*, *rigidum*, *roseum*, *rotundifolium*, *rubiginosum*, *rufescens*, *Schiedeanum*, *sevrulatum*, *sessile*, *sinicum*, *speciosum*, *sulcatum*, *Sumuntia*, *tetrandrum*, *theaeifolium*, *Thwaitesii*, *tinctorium*, *tomentosum*, *uniflorum*, *urceolare*, *variabile*, *versicolor*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 975 = *homonyma omnia generis Symploci*.
anamallayanum, Kuntze, l. c. = *S. anamallayana*, Bedd.
Beddomei, Kuntze, l. c. = *S. reticulata*, f. Grah.
Benthaminianum, Kuntze, l. c. = *S. ciliata*, Benth.
Brongniartianum, Kuntze, l. c. = *S. Lenormandiana*, Brongn. & Gris.
ciliatum, Kuntze, l. c. = *S. ciliata*, Mig.
crataegoides, Kuntze, l. c. = *S. crataegoides*, Buch-Ham.
crenatum, Kuntze, l. c. = *S. lanceolata*, A. DC.
diengense, Kuntze, l. c. 409. — Java.
fasciculatum, Kuntze, l. c. = *S. fasciculata*, Zoll.
guianense, Kuntze, l. c. 975 = *S. Ciponima*, L'Hérit.
Hartwegii, Kuntze, l. c. = *S. Hartwegi*, A. DC.
Henschelii, Kuntze, l. c. = *S. Henschelii*, Benth.
Jurgensenii, Kuntze, l. c. = *S. Jurgensenii*, Hemsl.
lachnobotryum, Kuntze, l. c. = *S. ferruginea*, Roxb.
laurinum, Kuntze, l. c. 409 = *S. spicata*, Roxb.
Matthewsii, Kuntze, l. c. 975 = *S. Mathewsii*, DC.

EUGENIODES:

- pallidum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 975 = *S. crataegoides*, Buch.-Ham.
paraense, Kuntze, l. c. = *S. Ciponima*, L'Hérit.
ramosissimum, Kuntze, l. c. 409 = *S. ramosissima*, Wall.
salaccense, Kuntze, l. c. = *S. salaccensis*, Mig.
sessifolium, Kuntze, l. c. = *S. subsessilis*, Choisy.
spicatum, Kuntze, l. c. 975 = *S. caryophylloides*, Zoll.
Stawellii, Kuntze, l. c. 976 = *S. spicata*, Roxb.
stravadioides, Kuntze, l. c. = *S. stravadioides*, Brongn. & Gris.
theaeifolia, Kuntze, l. c. 409 = *S. theaeifolia*, D. Don.
theaeforme, Kuntze, l. c. = *S. Alstonia*, L'Hérit.
wynadense, Kuntze, l. c. 975 = *S. acuminata*, Bedd.

EULALIA, Kunth = **Pollinia**, Trin. (Gramin.).

- ciliata*, *dispar*, *eucnemis*, *fimbriata*, *gracillima*, *grata*, *hirtiflora*, *irritans*, *Mackinlayi*, *mollis*, *monantha*, *nuda*, *pallens*, *phaeothrix*, *quadrinervis*, *rufispica*, *speciosa*, *spectabilis*, *tenuis*, *Thwaitesii*, *vagans*, *velutina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 775 = *homonyma omnia* Polliniae.
contorta, Kuntze, l. c. = *P. articulata*, Trin.
fulva, Kuntze, l. c. = *P. Cumingii*, Nees.
tristachya, Kuntze, l. c. = *P. argentea*, Trin.
vimenea, Kuntze, l. c. = *P. imberbis*, Nees.

EULOPHIA, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 912.

- aemula*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 26. — Afr. austr.
aequalis, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 182 = *Lissochilus aequalis*, Lindl.
Antunesii, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 236. — Angola.
arenaria, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Lissochilus arenarius*, Lindl.
aristata, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 169. — Afr. trop. or.
bella, N. E. Br. in Gard. Chron. (1889) ii. 210; Rolfe, in Kew Bull. (1890) 45. — Zambesia.
bilamellata, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 1. et 26. — Transvaal.
bicarinata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 6 (= *Cyrtopera bicarinata*, Lindl.). — Ind. or.
Buchanani, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Lissochilus Buchanani*, Reichb. f.
Buchanani, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 19 = *Cymbidium Buchanani*, Reichb. f.
burmanica, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 5. — Burma.
calanthoides, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 1. — Natal.
candida, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 6 (= *Cyrtopera candida*, Lindl.). — Reg. Himal.
chlorantha, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 9. — Afr. austr.
clitellifer, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 184 = *Lissochilus clitellifer*, Reichb. f.
chrysantha, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 2. — Natal.
congoensis, Cogn. in Journ. des Orchid. vi. (1895) 155.; et in Lindenia xi. (1895) 15. t. 486. — Congo.
corallorhiziformis, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 9. — Afr. austr.
deflexa, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 192. — Natal.
dispersa, [N. E. Br.] in Monteiro, Delagoa Bay (1891) 174; et in Kew Bull. (1892) 127 = *Lissochilus dispersus*, Rolfe.
Dusenii, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 254. — Kamer.
elata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 3. — Perak.
Elliotii, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 52. — Madag.
flaccida, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50. (1895) 3. — Natal.
flava, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 7 (= *Cyrtopera flava*, Lindl.). — Reg. Himal., Ins. Hong-Kong.
flexuosa, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 157 = *Cyrtopera flexuosa*, Rolfe.
fragrans, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 27. — Afr. austr.
Galpini, Schlechter, l. c. 10. — Afr. austr.

EULOPHIA : —

- gigantea*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1888) i. 616. fig. 83; et in Kew Bull. (1889) 90 = *Lissochilus giganteus*, Welw.
gracillima, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 292. — Calabar.
holochila, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 132; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 196. — Burma.
humilis, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 165. — Afr. trop. or.
Holstiana, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 23; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 157. — Afr. trop. or.
Holtzei, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Juli 1889) 55 = *Pachystoma Holtzei*, F. Muell.
inaequalis, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 3. — Natal.
Krebsii, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Lissochilus Krebsii*, Reichb. f.
lachnocheila, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 2. — Burma.
latifolia, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 139; et in Gard. Chron. (1892) ii. 583. — Ins. S. Thoma.
laxiflora, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 4. — Natal.
Ledienii, Stein, in Verh. Schles. Ges. Vaterl. Kult. (1886), ex Stein, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 609 in syn.; N. E. Br. in Kew Bull. (1889) 90 = *maculata*, Reichb. f.?
longepedunculata, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 383. — Afr. trop. or.
longibracteata, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 22 = *Galeandra longibracteata*, Lindl.
longisepala, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, iv. (1894) 43. — Afr. trop.
lunata, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 45. — Afr. austr.
Mackenii, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) ii. 583. — Natal.
macra, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 120. — Madag.
macrobulbon, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 7 (= *Cyrtopera macrobulbon*, Parish & Reichb. f.). — Ind. or.
macrorhizon, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.
Mannii, Hook. f. l. c. 4 (= *Cyrtopera Mannii*, Reichb. f.). — Assam.
Mechowii, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 23 = *Orthochilus Mechowii*, Reichb. f.
milanjiana, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, iv. (1894) 44. — Afr. trop.
missionis, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 168. — Afr. trop. or.
nigricans, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 5. — Natal.
Nyasae, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, iv. (1894) 44. — Afr. trop.
obtusa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 3 (= *Cyrtopera obtusa*, Lindl.). — Ind. or.
Oliveriana, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Cyrtopera Oliveriana*, Reichb. f.
pandurata, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 52. — Madag.
porphyroglossa, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Lissochilus porphyroglossus*, Reichb. f.
praestans, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 166. — Zambesia.
Preussi, Kraenzl., in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 54. — Sierra-Leoni.
Reichenbachiana, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Cymbidium Buchanani*, Reichb. f.
Renschiana, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 25 = *Orthochilus Renschianus*, Reichb. f.
ruwenzoriensis, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 166. — Afr. trop. or.
sanguinea, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 8 (= *Cyrtopera sanguinea*, Lindl.). — Reg. Himal.
Schweinfurthii, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 54. — Afr. trop.
Shupangae, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 157 = *Cyrtopera Shupangae*, Reichb. f.

EULOPHIA : —

- speciosa*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 184 = *Lissochilus speciosus*, R. Br.
stenantha, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 27. — Afr. austr.
striata, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 53 = *pulchra*, Lindl.
subulata, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 167. — Afr. trop. or.
tabularis, Bolus, in Trans. South Afr. phil. Soc. v. i. (1888) 108. — Afr. austr.
tuberculata, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 184 = *Lissochilus platypetalus*, Lindl.
ustulata, Bolus in Trans. South Afr. phil. Soc. v. i. (1888) 110; et l. c. — Afr. austr.
Walleri, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 157 = *Cyrtopera Walleri*, Reichb. f.
Warburgiana, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 6. (1893) 115 t. 266 II. fig. 8-12. — Ins. Philipp.
Welwitschii, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 236 = *Orthochilus Welwitschii*, Reichb. f.
Woodii, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 5. — Natal.

EULOPHIDIUM, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. VI. (1888) 188 = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).

maculatum, Pfitz. l. c. = *Eulophia maculata*, Lindl.

EULOPHIELLA, Rolfe, in Lindenia vii. (1891) 77. ORCHIDEAE.

Elisabethae, Rolfe, l. c. t. 325; Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7387. — Madag.

EULOPHIOPSIS, Pfitz. Entwurf. Natürl. anordn. Orchid. (1887) 105; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6. (1888) 183. = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).

scripta, Pfitz. l. c. 183 (= *Eulophia scripta*, Lindl.). — Ins. Mascar.

EULOPHUS, Nutt. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 913.

- Bolanderi*, Coult. & N. E. Rose, Revis. N. Am. Umbell. (1888) 112 = *Peucedanum Bolanderi*, A. Gray.
californicus, Coult. & N. E. Rose, l. c. 114 = *P. californicum*, A. Gray.
Parishii, Coult. & N. E. Rose, l. c. 112 (= *Pimpinella Parishii*, Coult. & N. E. Rose). — Calif.
Pringlei, Coult. & N. E. Rose, l. c. — Am. bor. austro-occ.
tenuifolius, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 276 (= *Musenopsis tenuifolia*, Coult. & N. E. Rose). — Mexic.
ternatus, S. Wats. l. c. (= *Musenopsis ternata*, S. Wats.). — Mexic.

EULYCHNIA, Phil. (Cact.). — Ind. Kew. i. 913.

clavata, Phil. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 185 (= *Echinocereus hypogaeus*, Weber). — Chili.

EUNANUS, Benth. = **Mimulus**, Linn. (Scrophul.).

- angustifolius*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 23. — Nevada.
Austinae, Greene, l. c. i. (Mar. 1887) 36. — Calif.
Congdoni, Greene, in Erythea, i. (1893) 247 = *M. Congdoni*, Robins.
Cusichii, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 36. — Am. bor. occ.
nanus, Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 244 = *M. nanus*, Hook. & Arn.
pulchellus, Drew, ex Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 104. — Calif.
subsecundus, Greene, l. c., i. (Mar. 1887) 37 = *M. subsecundus*, A. Gray.
subuniflorus, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay. (1894) 275 = *M. Douglasii*, A. Gray.

EUONYMUS, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 913.

acanthocarpus, Franch. Pl. Delav. (1889) 129 (Evoonymus). — Yunnan.

EUONYMUS: —

- aculeatus, *Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 209. — China.
 amygdalifolius, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 453 (Evonymus). — China.
 carnosus, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 118. — Formosa.
Cavriei, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 495 (Evonymus) = japonica, *Thunb.*
 cornutus, *Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 209. — China.
fimbriatus, Baill. ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 312 (Evonymus) = *Lophopetalum fimbriatum*, *Wight*
 gracillimus, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 118. — China.
Hamiltonianus, Dippel, ex Koehne, *Deutsche Den-drol.* (1893) 365 (Evonymus) = *Sieboldianus*, *Blume*.
 ilicifolius, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.*, xxxiii. (1886) 453 (Evonymus). — China.
 linearifolius, *Franch.*, l. c. 455. — China.
 lanceolatus, *Yatabé, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1893) 179. — Japon.
 macrocarpus, *Gamble, ex Oliver, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1763. — Ind. or.
 linifolius, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 491 (Evonymus) = nanus, *Bieb.*
 myrianthus, *Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 210. — China.
Parishii, *Trelease, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, v. 1889 (1892) 354. — Calif.
pulchellus, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 495 (Evonymus) = japonicus, *Linn. f.*
pyramidalis, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* lix. (1887) 89 in syn. (Evonymus) = japonicus, *Linn. f.*
radicans, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 495 (Evonymus) = japonicus, *Linn. f.*
Tanakae, *Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb.* xxxi. (1887) 22. — Japon.
Tashiroi, *Maxim. l. c.* 23. — Japon.
 venosus, *Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 210. — China.
 yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 454 (Evonymus). — China.

EUOSMA, Andr. = Logania, R. Br.

- buxifolia*, callosa, campanulata, cordifolia, crassifolia, depressa, fasciculata, flaviflora, latifolia, linifolia, longifolia, micrantha, nuda, ovata, pusilla, serpyllifolia, spermacocca, stenophylla, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 425 = *homonyma omnia Loganiae*.
ciliolata, *Kuntze, l. c.* [Vernoniae sp.]. — *N. Zel.*
tetragona, *Kuntze, l. c.* [Vernoniae sp.]. — *N. Zel.*

EUPATORIOPHALACRON, Adans. = Eclipta, (Compos.).

- album*, *Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 99 = *Ecl. erecta*, *Linn.*

EUPATORIOPSIS, Hieron. in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 43 (1893) 46. COMPOSITAE.

Hoffmanniana, *Hieron. l. c.* — Bras.

EUPATORIUM, [Tourn.]. Linn. (Compos.). —

- Ind. Kew. i. 915.
 abronium, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 355. — Mexic.
 anisochromum, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 186. — Costarica.
 badium, *Klatt, ex Th. Dur. et Pitt. l. c.* — Costarica.
 brickellioides, *Klatt, in Arb. Bot. Mus. Hamb.* (1890) extr. 2. — Bras.
 bullatum, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 34. — Columb.
 capillifolium, *Small, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 311 = *foeniculaceum*, *Willd.*
 carnosum, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 337. — Costarica.
 chlorophyllum, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 187. — Costarica.
 chrysocephalum, *Klatt, Bot. Beibl. zur Leopoldina*, (1895) 2. — Costarica.
 clibadioides, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 105. — Bras.
 collodes, *Robins. & Greene, in Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 152. — Mexic.

EUPATORIUM: —

- constipatiflorum, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 355. — Mexic.
 coperense, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 330. — N. Granat.
 costaricense, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 337. — Costarica.
 cotacachense, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 331. — Ecuad.
 dasycarpum, *A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 420. — Mexic.
 densiflorum, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 136. — Parag.
 didymum, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 356. — Bolivia.
Donnell-Smithii, *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 95. — Guatem.
 drepanophyllum, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 356. — Yucatan.
 Durandi, *Klatt, ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 189. — Costarica.
 Ecuadorae, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 356. — Ecuad.
 eleutheranthemum, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 53. — Bolivia.
 filicaule, *Sch. Bip. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 384 in obs.; et xxvii. (1893) 170. — Mexic.
Fraseri, Hort. ex *Kew Bull.* iii. (1889) 40 (= *E. Frasieri*, *Poit.*) = *ageratoides*, *Linn.*
 griseum, *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 43. — Guatem.
 guanaiense, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 333. — Bolivia.
 hymenophyllum, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 190. — Costarica.
 Lehmannianum, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 34. — Columb.
 leivense, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 329. — N. Granat.
 Lemmoni, *Robinson, in Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 171. — Mexic.
 Lobbii, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 355. — Mexic.
 loxense, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 331. — Ecuad.
 loxense, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 357. — Ecuad.
 lyratum, *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 96. — Guatem.
 madrense, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 137. — Mexic.
 malachophyllum, *Klatt, in Arb. Bot. Mus. Hamb.* (1890) extr. 3. — Bras.
 microphyllum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 384 in obs. — Mexic.
 myrianthum, *Klatt, in Bot. Beibl. zur Leopoldina* (1895) 3. — Costarica.
 myriocephalum, *Klatt, in Leopoldina, Heft* xxv. (1889) 104. — Costarica.
 nemorosum, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 35. — Columb.
 pacacanum, *Klatt, in Bot. Beibl. zur Leopoldina* (1895) 3. — Costarica.
 Palmeri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 383. — Mexic.
 parasiticum, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 357. — Costarica.
 pellium, *Klatt, l. c.* — Venez.
 phyllocephalum, *Klatt, l. c.* 358. — Bolivia.
 Pittieri, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 192. — Costarica.
 polanthum, *Klatt, in Bot. Beibl. zur Leopoldina* (1895) 3. — Costarica.
 pratense, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 193. — Costarica.
 Pringlei, *Robins. & Greene, in Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 152. — Mexic.
 probum, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1890) i. 321 fig. 48. — Peruvia.
 rafaense, *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 97. — Guatem.
 Robinsonianum, *Greene, in Erythraea*, i. (1893) 150. — Mexic.
 roseum, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 194. — Costarica.
 Rusbyi, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 334. — Bolivia.

EUPATORIUM: —

- Saltivarii, *Sch. Bip. ex Robins. & Seat. in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 108. — Mexic.
 Schaffneri, *Sch. Bip. ex Robinson, l. c.* xxvii. (1893) 171. — Mexic.
 Sipolisii, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1893) 158. — Bras.
 soratense, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 333. — N. Granat.
 stipuliferum, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 210. — Bolivia.
 strictum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 384. — Mexic.
 Stuebelii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 329. — Am. austr.
 tacotanum, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 35. — Columb.
 thymifolium, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 1. — Boliv.
 tinctorium, *Pohl, ex Oliver, in Kew Bull.* (1892) 179 = laeve, *DC.*
 tolimense, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 45. — Columb.
 Thielemanum, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 191. — Costarica.
 Tonduzii, *Klatt, in Bot. Beibl. zur Leopoldina* (1895) 4. — Costarica.
 turbacense, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 332. — N. Granat.
 umbrosum, *Klatt, l. c.* viii. (1887) 35. — Columb.
 Valverdeanum, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 188. — Costarica.
 venulosum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 384. — Mexic.
 Vaseyi, *Porter, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 128. — Am. bor.
 vernonioides, *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 45. — Guatem.
- EUPHORBIA, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. I. 921.**
 Abbottii, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 150; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2347. — Ins. Aldabra.
 abortiva, *Porta, in Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 67; et *ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 262. — Hisp.
 adenensis, *Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 67. — Arab.
 akdagensis, *Stapp, in Denkschr. Akad. Wien* (1886) 24. — As. min.
 alciornis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 517. — Madag.
 anagalloides, *Baker, l. c.* xxv. (1890) 344. — Madag.
 angolensis, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 117. — Angola.
 aprica, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 616. — Madag.
 araucana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 508. — Chili.
 aristata, *Schmalh. in Ber. deutsch. bot. Ges.* x. (1892) 292 t. 17 fig. 13. — Reg. Cauc.
 Armourii, *Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. I* (1895) 28 t. 2. — Yucatan.
 assamica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 269. — Reg. Himal.
 Bakeriana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 623. — Madag.
 Bartolomaei, *Greene, Pittonia*, i. (April 1889) 290. — Calif.
 benedicta, *Greene, l. c.* (Mar. 1889) 263. — Calif.
 betacea, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 623. — Madag.
 biserrata, *Millsp. in Zoë, i.* (1890) 347. — Calif.
 blepharostipula, *Millsp. ex N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 77. — Calif.
 Blodgettii, *Engelm. ex Hitchcock, Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 126. — Ins. Baham.
 Brandegei, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 226. — Calif.
 burmanica, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1546. — Burma.
 calderensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 510. — Chili.
 carmenensis, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 133. — Ins. Carmen.
 carpatica, *Woloszczak, in Spraw. Kom. fiz.* xxvii. (1892) 153. — Reg. Carpath.

EUPHORBIA: —

- carthaginensis, *Porta et Rigo*, in *Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 66; *Willk. Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 154 t. 183. — *Hisp.*
 cervicornu, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 878. — Congo gall.
 chamaepepoides, *Lotsy, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 351. — *Guatem.*
 Clarkeana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 253. — *Ind. bor. occ.*
 Commersonii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 623. — *Madag.*
 comonduana, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 229. — *Calif*
 complanata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 196. — *Oceania.*
 conjuncta, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 227. — *Calif.*
 corynoclada, *F. Muell. in Wing South. Sc. Record*, N. S. ii. (April 1886). — *Austral.*
 cymbiformis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 255. — *Bolivia.*
 cyparissoides, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 123. — *Afr. or.*
 daphnoides, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 671. — *Madag.*
 demnatensis, *Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 803, nomen. — *Marocc.*
 digitata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 146. — *Mexic.*
 djurensis, *Schweinf. ex Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 119. — *Afr. trop.*
 Elquiensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 509. — *Chili.*
 elwendica, *Staff, in Denkschr. Akad. Wien* (1886) 45. — *As. occ.*
 Emodi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 250. — *Reg. Himal.*
 Engleri, *in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — *Afr. trop. or.*
 Erythraea, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 412. — *China.*
 espinosa, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 120. — *Afr. trop. or.*
 esuloides, *Velen. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* (1886) 276; et *Fl. Bulg.* (1891) 505. — *Bulg.*
 Fauroti, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* i. (1887) 135. — *Afr. or.*
 Fischeri, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 117. — *Afr. trop. or.*
 Fournieri, *Hort. ex Rev. Hort.* (1895) 249. — *Hab.?*
 galapageia, *Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 144. — *Ins. Galapag.*
 geminiloba, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 228. — *Calif.*
 glanduligera, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 142. — *Afr. austro-occ. extratrop.*
 gossypina, *Pax, l. c.* 119. — *Afr. trop. or.*
 grandicornis, *Goebel, Pflanzenbiol. Schilderungen*, i. 62. — *Afr. austr.?*
 Grandidieri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 615. — *Madag.*
 Greenei, *Millsp. in Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 88. — *Am. bor. occ.*
 Griffithii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 259. — *Reg. Himal.*
 Guerichiana, *Pax, ex Engl. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 143. — *Afr. austro-occ. extratrop.*
 gracillima, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 438. — *Mexic.*
 guadalajarana, *S. Wats. l. c.* xxii. (1887) 449. — *Mexic.*
 hadramautica, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 341. — *Arab.*
 Halácsyi, *Formanek in Verh. naturw. Ges. Brunn*, xxxiii. 1894 (1895) 128. — *Eur. or.*
 Henryi, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 413. — *China.*
 hereroensis, *Pax, in Bot. Jahrb.* x. (1889) 35. — *Afr. austro-occ. extratrop.*
 heterochroma, *Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — *Afr. trop. or.*
 hexagonoides, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 161. — *Mexic.*
 Hildebrandtii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 615. — *Madag.*

EUPHORBIA: —

- hippocrepica, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 414. — *China.*
 Hochstetteriana, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 123 in obs. (= *E. Schimperii* Boiss.). — *As.*
 Holstii, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 121. — *Afr. trop. or.*
 incerta, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1891) 171. — *Calif.*
 intermixta, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 74. — *Mexic.*
 involuta, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 227. — *Calif.*
 Jonesii, *Millsp. in Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 89. — *Arizona.*
 kilimandscharica, *Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 287. — *Afr. trop. or.*
 Kralickii, *Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 791. — *Afr. bor.*
 lanceolata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 508. — *Chili.*
 laredana, *Millsp. ex Coult. in Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 88; et *ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 390. — *Texas.*
 leucocephala, *Lotsy, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 350 t. 24. — *Guatem.*
 lineata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 455. — *Mexic.*
 lohaensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 671. — *Madag.*
 longecornuta, *Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 286. — *Abyss.*
 longecornuta, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 161. — *Mexic.*
 longeramosa, *S. Wats. l. c.* — *Mexic.*
 lorifolia, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 395. — *Ins. Sandvic.*
 lyciopsis, *Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — *Afr. trop. or.*
 macrophylla, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 122. — *Afr. trop.*
 macropodoides, *Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 164. — *Mexic.*
 macraulonia, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 507. — *Chili.*
 mancinella, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 623. — *Madag.*
 mandshurica, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 360. — *Songar.*
 Marlothii, *Pax, in Bot. Jahrb.* x. (1889) 36. — *Afr. austro-occ. extratrop.*
 membranacea, *Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — *Afr. trop. or.*
 microappendiculata, *Lotsy, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 349. — *Guatem.*
 minuta, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 76. — *Am. austr. occ.*
 misella, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 146. — *Mexic.*
 Nealleyi, *Coult. & Fisher, in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 351; et *in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 391. — *Texas.*
 neo-mexicana, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* II. v. (1886) 56 (= *E. inaequilatera*, Engelm. pr. p.). — *N. Mexic.*
 niciciana, *Borb. in Term. Fuzét.* xiv. (1893) 53. — *Serb.*
 Normanni, *Schmalh. ex Lipsky, in Mém. Soc. hist. nat. Odessa*, xi. (1891) extr. 35; et *in Ber. deutsch. bot. Gesells.* x. (1892) 293 t. 16 fig. 15. — *Reg. Cauc.*
 noxia, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 124. — *Reg. Somal.*
 Nyikae, *Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 31, 33, 39 et 40; et *in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — *Afr. trop. or.*
 oblongicaulis, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 185 = *hadramautica, Baker.*
 occidentalis, *Drew, in Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 152. — *Calif.*
 ornata, *Staff, in Denkschr. Acad. Wien* (1886) 44. — *As. occ.*
 orthoclada, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 517. — *Madag.*
 ovalleana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 508. — *Chili.*

EUPHORBIA: —

- pachysantha, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 623. — *Madag.*
 Parishii, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* ii. v. (1886) 56. — *Calif.*
 pectinata, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 640. — *Reg. Transcauc.*
 petrina, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 75. — *Ins. S. Pedro Martin (Calif. austr.).*
 Pirottiae, *Terrac. in Ann. Ist. Bot. Rom.* v. (1894) 97. — *Afr. trop. or.*
 platycephala, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 122. — *Afr. trop.*
 plicata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 438; et xxii. (1887) 450. — *Mexic.*
 Poggei, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 118. — *Congo polyphylla, Engelm. ex N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 215. — *Am. bor.*
 Pondii, *Millsp. ex Vasey & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 12. — *Calif. austr.*
 porphyrantha, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 510. — *Chili.*
 portulana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 73. — *Mexic.*
 Preussii, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 123. — *Kamer.*
 pseudoserpyllifolia, *Millsp. in Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 87. — *Am. bor. occ.*
 purisimana, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 225. — *Calif.*
 pusillima, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 162. — *Syria.*
 quadrangularis, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 119. — *Afr. trop. or.*
 Quintasii, *Pax, in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 156. — *Ins. S. Thom.*
 ramosa, *Seaton, in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 121. — *Mexic.*
 Reboudiana, *Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 794. — *Algeria.*
 reflexa, *Formanek in Verh. Naturw. Ges. Brunn*, xxxiii. 1894 (1895) 22. — *Eur. or.*
 retroscabra, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 449. — *Mexic.*
 rubrosperma, *Lotsy, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 349. — *Guatem.*
 rugulosa, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 81; et *Fl. Francisc.* (1891) 92 = *serpyllifolia Pers. var.*
 Rusbyi, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* ii. i. (1886) 57. — *Arizona.*
 sapiifolia, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 616. — *Madag.*
 sarmentosa, *Welw. ex Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 121. — *Angola.*
 Schleintzii, *Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam* iii. 5 (1890) 105. — *Austral.*
 Schurii, *X. Simonk. in Termész. Fuzét.* x. (1886) 183. — *Transsilv.*
 scripta, *Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 159. — *Reg. Cauc.*
 shirensis, *Baker, f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 38. — *Afr. trop.*
 Sipolisii, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1893) 158. — *Bras.*
 spinescens, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 120. — *Afr. trop. or.*
 stenoclada, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 672; et *Hist. pl. Madag., Atlas*, t. 152. — *Madag.*
 strictior, *Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* . (1892) 214 t. 18. — *Am. bor.*
 subapoda, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 671. — *Madag.*
 subpeltata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 146. — *Mexic.*
 subreniformis, *S. Wats. l. c.* xxi. (1886) 439 (subreniforme). — *Mexic.*
 systyloides, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 121. — *Zanzib.*
 tacnensis, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 77. — *Peruvia.*
 tanaitica, *Paczosky, Mat. fl. steph. prov. Don* (1891) 78. — *Ross.*
 tarapacana, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 76. — *Chili.*

EUPHORBIA: —

- Teke*, Schweinf. ex Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 118. — Afr. trop.
tomentulosa, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 476. — Calif.
trichadenia, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 125. — Angola.
tuberosa, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 111. — Mexic.
uniglandulosa, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 476. — Mexic.
usambarica, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 122. — Afr. trop. or.
Vaseyi, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 48 (= *Ricinella Vaseyi*, Coult.). — Texas.
velutina, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 57. — Calif.
velutina, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 242. — Afr. trop. or.
velutina, K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 74. — N. Guin.
verna, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 506. — Chili.
villosula, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 118. — Afr. trop. or.
Volkenii, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 242. — Afr. trop. or.
Wallichii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 258. — Reg. Himal.
Watsonii, Millsp. in Zöf. i. (1890) 347. — Calif.
Wightiana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 248. — Deccan.
Whyteana, Baker f. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 39. — Afr. trop.

EUPHRASIA, Linn. (Scrophul.), — Ind. Kew. i. 931.

- alpestris*, Harz, in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 136. — Bohem.
alpina, Gremli Excursionsfl. f. d. Schw. ed. 7 (1893) 318 (= *E. alpina*, Lam.) = officinalis, Linn.
aurea, F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 113. — Chili.
borneensis, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 210. — Borneo.
Brandisii, Freyn, ex Freyn et Brandis, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 622 = officinalis, Linn.
brevipila, Burn. et Gremli in Journ. Bot. (1884) 167. — Helv.
caespitosa, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 116. — Chili.
calvescens X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii. (1893) 1060. — Austria.
capitulata, Townsend, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 164 = officinalis, Linn.
carpatia, Zapal. in Spraw. Kom. fizyj. Krajowej xxiv. (1889) 270. — Hung.
Christii X, Favrat, in Gremli, Neue Beitr. iv. (1887) 27; et in Nouv. Mem. Soc. Helv. sci. nat. xxiv. (1895) 28. — Helv.
Cockayniana, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 269. — N. Zel.
dinarica, G. Beck, in Ann. Naturhist. Hofm. Wien, ii. (1887) 140 t. vi. fig. 4-6; Murb. in Lunds Univers. Arskrift, xxvii. (1891) 72 = tricuspidata, Linn.
drosocalyx, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 289.
Favratii X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 451. — Hung.
flavicans, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 114. — Chili.
Freynii X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 452. — Tirol.
gracilis, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 115. — Chili.
Gremlii X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 453. — Tirol.
humilis, Harz, in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 136. — Bohem.
hybrida X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 454. — Austro-Hung.
illyrica, Wettst. l. c. xliii. (1893) 131; Borb. in Bot. Centralbl. liv. (1893) 130 in obs. — Austria.

EUPHRASIA: —

- intercedens* X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 455. — Eur. centr.
jabalambrensis, Pau, Not. bot. fl. Espan. ii. (1889) 33 nomen. — Hisp.
Jaeggii X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 450. — Tirol.
Jordani X, Wettst. l. c. 454. — Tirol.
Kernerii, Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 101; G. Beck. Fl. Nied.-Oest. ii. 2 (1893) 1060. — Austria.
liburnica, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 172. — Austro-Hung.
Maximowiczii, Wettst. ex Puhalin in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 133 nomen. — China.
montana, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 116 = *E. Philippii*, Wettst.
multicuspidata, Kostel. ex Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 376 in syn. = officinalis, Linn.
olympica, Halácsy et Sint. l. c. xl. (1890) 39 = officinalis, Linn.
paludosa, Townsend, in The Bot. Exch. Club Brit. Isles Report for 1890 (1891) 307; et in Journ. Bot. xxix. (1891) 161 = officinalis, Linn.
parvula, Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 101 = officinalis, Linn.
permixta, Gremli, ex Wettst. l. c. — Helv.
Philippii, Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 101 = montana, Phil.
picta, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 2 (1893) 1059. = picta.
Portae, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 196. — Austro-Hung.
pubibunda, Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 432. = officinalis, Linn.
Rechingeri X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 454. — Austro-Hung.
rigida, Harz, in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 136. — Bohem.
Sintenisii, Halácsy, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 107 = officinalis, Linn.
stiriaca, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 239. — Austro-Hung.
stricta, G. Beck. & Szyszyl. Pl. Cernag. lect (1888) 130 = officinalis, Linn.
Tatrae, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 248 = officinalis, Linn.
tenuifolia, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 117. — Chili.
tenuis, Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 101 (= *E. gracilis*, Phil.). — Chili.
Townsendiana, Freyn, ex Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 101 = officinalis, Linn.
transiens, Borb. in Bot. Centralbl. liv. (1893) 129 = officinalis, Linn.
tricolor, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 264. — N. Zel.
variabilis, Freyn, in Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 55. — Austria.
vestinensis X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 452. — Tirol.
villariensis, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 114. — Chili.

EUPOMATIA, R. Br. (Anon.). — Ind. Kew. i. 932.

- Belgraveana*, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. ii. (June 1887) 4; et in Bot. Centralbl. xxx. (1887) 325. — Austral.

EURAPHIS, Trin. = **Pappophorum**, Schreb. (Gramin.).

- Pumilio*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 776 = *B. bromoides*, Hochst. & Steud.

EUREIANDRA, Hook. f. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 933.

- Balfourii*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Ser. III. iv. (1887) 348. — Ins. Socotra.

EUROTIA, Adans (Chenop.). — Ind. Kew. i. 933.

- lanata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 199 = *lanata*, Moq.?

EUROTIUM, Sw. = **Freziera**, Sw. (Ternstroem.).

- arbutifolium*, boliviense, calophyllum, candicans, canescens, cordatum, Dombeyanum, ferrugineum, guianense, lanatum, longipes, macrophyllum, nervosum, reticulatum, sericeum, suberosum, tomentosum, undulatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = *homonyma omnia* Freziera.
theodes, Kuntze, l. c. 62 = *Cleyera theoides*, Choisy.
tomentosum, Kuntze, l. c. = *F. sericea*, Humb. & Bonpl.

EURYA, Thunb. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 933.

- angulosa*, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 190 = *Freziera angulosa*, Tul.
arbutifolia, Szyszyl. l. c. = *F. arbutifolia*, Planch. & Triana.
boliviensis, Szyszyl. l. c. = *F. boliviensis*, Wawra.
calophylla, Szyszyl. l. c. = *F. calophylla*, Triana & Planch.
candicans, Szyszyl. l. c. = *F. candicans*, Tul.
canescens, Szyszyl. l. c. = *F. canescens*, Humb. & Bonpl.
castaneifolia, Vesque, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 155 et 158. — Reg. Himal.
cavinervis, Vesque, l. c. — Reg. Himal.
cernua, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 190 = *Freziera cernua*, Tul.
cordata, Szyszyl. l. c. 190 = *cordata*, Tul.
distichophylla, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xliii. (1886) 77. — China.
Dombeyana, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 190 = *F. Dombeyana*, Tul.
ferruginea, Szyszyl. l. c. = *F. ferruginea*, Wawra.
Friedrichsthaliana, Szyszyl. l. c. — Guatem.
guianensis, Szyszyl. l. c. = *F. guianensis*, Wawra.
gynandra, Vesque, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 160. — China.
integrifolia, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 189 = *Freziera integrifolia*, Benth.
Karsteniana, Szyszyl. l. c. 190. — Guatem.
Korthalsiana, Vesque, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 155 et 157. — Java.
Lehmannii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. (1895) Beibl. 49. — Columb.
longipes, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 190 = *Freziera longipes*, Tul.
macrophylla, Szyszyl. l. c. = *F. macrophylla*, Tul.
mexicana, Szyszyl. l. c. 189 = *F. mexicana*, Turcz.
nervosa, Szyszyl. l. c. 190 = *F. nervosa*, Humb. & Bonpl.
nitida, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. (1895) 50. — Columb.
ochracea, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 189 = *Cleyera ochracea*, DC.
reticulata, Szyszyl. l. c. 190 = *Freziera reticulata*, Humb. & Bonpl.
roraimensis, Szyszyl. l. c. = *F. roraimensis*, Tul.
sanguinea, Vesque, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1894) 159. — Ins. Samoëns.
sericea, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 190 = *Freziera sericea*, Humb. & Bonpl.
suberosa, Szyszyl. l. c. = *F. suberosa*, Tul.
syphilitica, Szyszyl. l. c. 189 = *Cleyera syphilitica*, Choisy.
theoides, Szyszyl. l. c. = *Freziera theoides*, Sw.
undulata, Szyszyl. l. c. 190 = *F. undulata*, Willd.
varians, Vesque, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 155 et 157. — Java.
verrucosa, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. (1895) Beibl. 51. — Columb. vel Ecuad.
Wrayi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) II. 196. — Perak.
Yungasiae, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 190 = *Freziera Yungasiae*, Tul.

EURYBIA, Cass. = **Olearia**, Moench. (Compos.).

- ilicifolia*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 290 (= *E. erubescens*, DC.) = *Olearia myrsinoides*.

EURYGANIA, Klotzsch (Vaccin.). — Ind. Kew. i. 934.
subcrenulata, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 207 = *V. subcrenulatum*, Klotzsch.

EURYOPS, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 934.
dacrydioides, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1508; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 340. — Afr. trop. or.
pedunculatus, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 147. — Afr. austr.
Schenckii, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 88. — Afr. austró-occ. extratrop.

EUSCAPHIS, Sieb. & Zucc. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 935.
aponica, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 262; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 366 = *staphyleoides*, Sieb. & Zucc.

EUSTEGIA, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 937.
macropetala, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 358. — Afr. austr.
plicata, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 218. — Afr. austr.

EUSTEPHIA, Cav. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 936.
argentina, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 328. — Reg. Argent.
marginata, Pax, l. c. — Reg. Argent.

EUSTIGMA, Gardn. & Chapm. (Hamamel.). — Ind. Kew. i. 936.
Balansae, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1954. — Tonkin.

EUTOCA, R. Br. = **Phacelia**, Juss. (Hydrophyll.).
diversicolor, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 830. — Hab. ?
grandis, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 226. — Chili.
litoralis, Phil. l. c. 228. — Chili.
lamarifolia, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 54. — Am. austro-occ.
pedunculosa, Phil. l. c. — Chili.
Peraltae, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 227. — Chili.

EUTREMA, R. Br. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 937.
Eschscholtzianum, Robinson, Syn. Fl. N. Am. i. I. (1895) 135 = *Braya Eschscholtziana*, Hook. & Arn. Przewalskii, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 68. — China.
thibeticum, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 201. — Tibet.
yunnanense, Franch. Pl. Delav. (1889) 61. — Yunnan.

EUTRIANA, Trin. = **Bouteloua**, Lag. (Gramin.).
racemosa, Trin. ex Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 141 in syn. = *B. Triathera*, Benth.

EUXENIA, Cham. = **Podanthus**, Lag. (Compos.).
ovalifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 338 = *P. ovatifolius*, Lag.

EVACIDIUM, Pomel (Compos.). — Ind. Kew. i. 938.
Heldreichii, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 313 = *atlanticum*, Pomel.

EVACOPSIS, Pomel = **Evax**, Gaertn. (Compos.).
angustifolia, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 333. — Algeria.
mareotica, Pomel, l. c. 334 = *Filago mareotica*, Delile.

EVAX, Gaertn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 938.
acaulis, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 184. — Calif.
Cavanillesii, Rouy, in Le Naturaliste (1884) 557 = *carpetana*, Lange.
involuta, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 185 = *Psilocarphus caulescens*, Benth.

EVAX: —
gallica, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) p. xvii in syn. = *E. Cavanillesii*, Rouy.
linearifolia, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 333. — Algeria.
mucronata, Pomel, l. c. — Tunet.
psilantha, Pomel, l. c. — Algeria.

EVERARDIA, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 287 [Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 210]. **CYPERACEAE**.
montana, Ridl, l. c. t. 52 (Ridl. ex im Thurn., l. c. err. cal. *montano*). — Guian. angl.

EVODIA, Forst. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 939.
Belahe, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 590; et Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 166. — Madag.
Boiviniana, Baill. ll. cc. 591; et t. 168. — Ins. Comor.
Bojeriana, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 169. — Madag.
crassinervis, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 59. — N. Guin.
cuspidata, K. Schum. l. c. 57. — N. Guin.
Daniellii, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 104 (= *Zanthoxylum Daniellii*, Benn.). — China.
discolor, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii (1887) 456. — Madag.
floribunda, Baker, l. c. 457. — Madag.
grisea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 98 = *Boninia grisea*, Planch.
lobocarpa, F. Muell. in Journ. Bot. xxx. (1892) 17 = *Acronychia lobocarpa*, F. Muell.
macrocarpa, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 209. — Perak.
magnifolia, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 590; et Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 167. — Madag.
mollis, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 339. — Oceania.
Nadeaudi, Drake, Fl. Polyn. Franç. (1893) 27 (= *Melicope tahitensis*, Nadeaud). — Ins. Societ.
pachyphylla, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 210. — Penins. Mal.
pilulifera, King, l. c. — Perak.
Schullei, Warb., in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 338. — Oceania.
subunifoliolata, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 138. — Borneo.
tenuistyla, Stapf, l. c. 137. — Borneo.
tetragona, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 57. — N. Guin.
viridans, Drake, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 273. — Tonk.

EVOLVULUS, Linn. (Convolv.). — Ind. Kew. i. 939.
Karstenii, Peter, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 19 (= *Majera coerulea*, Karst.). — Columb.
prostratus, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 320. — Mexic.
Lavae, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. bot. Genova (1893) 351. — Erithea.
rotundifolius, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 530 = *Breweria rotundifolia*, S. Wats.

EXACULUM, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1887) 743; et Epit. Fl. Eur. ii. (1894) 141 = **Cicendia**, Griseb. (Gentian.).

EXACUM, Linn. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 940.
Hoffmannii, Schinz, in Viertelj. Naturforsch. Gesells. Zurich, xxxvi. (1891) 327. — Madag.

EXARRHENA, R. Br. = **Myosotis**, Linn. (Borag.).
Colensoi, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 351. — N. Zel.

EXCOECARIA, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 941.
glaulescens, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 48. — Madag.

EXCOECARIA: —
glomeriflora, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 241. — Afr. trop. or.
lissophylla, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 203. — Madag.
rectinervis, Kurz, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 473 (= *Actephila rectinervis*, Kurz). — Ins. Nicob.
robusta, Hook. f. l. c. 474. — Concan.
venenifera, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 113. — Afr. trop. or.

EXOCARPUS, Labill. (Santal.). — Ind. Kew. i. 942.
brachystachys, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 391. — Ins. Sandvic.

EXOgonium, Choisy = **Ipomoea**, Linn. (Convolvul.).
Uhdeanum, Fenzl, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 559 = *I. tubulosa*, Hemsl.
villosum, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 28 (= *I. villosa*, Meissn. ex Mart.). — Bras.

EXOTHEA, Macfad. = **Hypelate**, P. Br. (Sapind.).
Copalillo, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 81. —
paniculata, Radlk. l. c. (= *E. paniculata*, Walp.) = *H. paniculata*, Cambess.

F

FABERIA, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 479. **COMPOSITAE**.
sinensis, Hemsl. l. c. et in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1815. — China.

FABIANA, Ruiz & Pav. (Solan.). — Ind. Kew. i. 944.
araucana, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 759. — Am. austr.
Barrisii, Phil. l. c. 763. — Chili.
lutescens, Phil. l. c. 760. — Chili.
squamata, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 61. — Am. austr. occ.

FABRICIA, Scop. = **Alysicarpus**, Neck. (Legumin.).
belgaumensis, *bupleurifolia*, *ferruginea*, *hamosa*, *lengi-folia*, *monilifera*, *porrecta*, *pubescens*, *rugosa*, *tetragonoloba*, *Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 181-82 = *homonyma omnia* Alysicarpi.
cylindrica, Kuntze, l. c. 182 = *A. rugosus*, DC.
nummulariaefolia, Kuntze, l. c. 181 = *A. vaginalis*, DC.

FAGELIA, Schrank = **Calceolaria**, Linn. (Scrophul.).
adscendens, *alba*, *alternifolia*, *amplexicaulis*, *andina*, *angustiflora*, *argentea*, *bellidifolia*, *bicolor*, *bicrenata*, *biflora*, *calycina*, *cana*, *canescens*, *cerasifolia*, *corymbosa*, *crenata*, *crenatiflora*, *cuneiformis*, *Darwinii*, *deflexa*, *dentata*, *dilatata*, *divaricata*, *erioclada*, *excelsa*, *extensa*, *ferruginea*, *flexuosa*, *Fothergillii*, *glandulosa*, *glaucia*, *gossypina*, *gracilis*, *graminifolia*, *Hartwegii*, *heterophylla*, *hispida*, *hypericina*, *hypoleuca*, *hyssopifolia*, *integrifolia*, *involuta*, *lamiifolia*, *lanata*, *lanceolata*, *latifolia*, *laxa*, *linearis*, *lobata*, *Matthewsii*, *mexicana*, *montana*, *Morisi*, *nana*, *nivalis*, *nudicaulis*, *oblonga*, *ovata*, *padifolia*, *paralia*, *parviflora*, *perfoliata*, *petiolaris*, *pinifolia*, *pinnata*, *pisacomensis*, *plectranthifolia*, *polifolia*, *polyrhiza*, *pulverulenta*, *punctata*, *punicea*, *purpurea*, *racemosa*, *rosmarinifolia*, *rotundifolia*, *salicifolia*, *saxatilis*, *scabra*, *scapiflora*, *serrata*, *sessilis*, *Sinclairii*, *stricta*, *tenuis*, *tetragona*, *thyrsiflora*, *tomentosa*, *triandra*, *trifida*, *tripartita*, *undulata*, *uniflora*,

FAGELIA :—

- verticillata*, *violacea*, *virgata*, *viscosa*, *viscosissima*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 459-60 = *homonyma omnia* Calceolariae.
arachnoidea, Kuntze, l. c. 459 = *C. arachnoidea*, R. Grah.
Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 236. — Bolivia.
bartsiaefolia, Rusby, l. c. 235. — Bolivia.
Berteri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 459-60 = *C. Berteri*, Colla.
chelonoides, Kuntze, l. c. = *C. chelonoides*, H. B. & K.
ericodes, Kuntze, l. c. = *C. ericoides*, Fuss.
helianthemodes, Kuntze, l. c. = *C. helianthemoides*, H. B. & K.
inflexa, Kuntze, l. c. 460 = *C. serrata*, Lam.
lavandulifolia, Kuntze, l. c. = *C. lavandulaefolia*, H. B. & K.
melissifolia, Kuntze, l. c. = *C. melissaefolia*, Benth.
mollissima, Kuntze, l. c. = *C. integrifolia*, Murr.
nitida, Kuntze, l. c. = *C. adscendens*, Lindl.
Pavonia, Kuntze, l. c. = *C. Pavonii*, Benth.
scabiosifolia, Kuntze, l. c. = *C. scabiosaefolia*, Sims.
scabra, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 236 in obs. = *scabra*, Kuntze.
sibthorpioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 459-60 = *Calceolaria sibthorpioides*, H. B. & K.
tenuiflora, Kuntze, l. c. sphalm. = *C. terniflora*, Cav.
utricularioides, Kuntze, l. c. = *C. utricularioides*, Hook.

FAGONIA, Tourn. ex Linn. (Zygophyll.). — Ind. Kew. i. 944.

- Luntii*, Baker, in Kew Bull. (1894) 330. — Arabia.
minutistipula, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 33. — Afr. austro-occ. extratrop.
nummularifolia, Baker, in Kew Bull. (1895) 181. — Arabia.
Palmeri, Vasey et N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 82. — Calif. inf.
subaphylla, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 12. — Chili.

FAGRAEA, Thunb. (Logan.). — Ind. Kew. i. 945.

- Alteniana*, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (July 1889) 45 nomen. — Austral.
Woodiana, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. (Sept. 1886) 323; et ex Bot. Centralbl. xxix. (1887) 241. — N. Guin.

FAGUS, [Tourn.] Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 945.

- asiatica*, « DC. » ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 121 et 580 ad calc. = *F. Sieboldii*, Endl.
atropurpurea, Sudw. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1893) 43; et in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 153 = *ferruginea*, Ait.
Carroni, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 85 = *F. Moorei*, F. Muell.
crispa, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 52 = *sylvatica*, Linn.
cucullata, Hort. ex Dippel, l. c. = *sylvatica*, Linn.
incisa, Hort. ex Dippel, l. c. 51 = *sylvatica*, Linn.
japonica, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 101. — Japon.
quercifolius, « Pers. » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 51 et 581 = *sylvatica*, Linn.

FALCARIA, Riv. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 946.

- persica*, Stapf et Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 48. — Persia.
serrata, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 360 = *vulgaris*, Bernh.

FALCATA, J. F. Gmel. = **Amphicarpaea**, Eil. (Legumin.).

- comosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 182 = *A. monoica*, Eil.
Edgeworthii, Kuntze, l. c. = *A. Edgeworthii*, Benth.
Pitcheri, Kuntze, l. c. = *A. Pitcheri*, Torr. & Gray.

FALKIA, Linn. (Convolv.). — Ind. Kew. i. 946.

- abyssinica*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 344. — Abyss.
diffusa, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 85. — Afr. austr.
villosa, Hallier f. l. c. — Afr. austr.

FARADAYA, F. Muell. (Verben.). — Ind. Kew. i. 946.

- Albertisii*, F. Muell. Papuan Pl. viii. (1886). — N. Guin.
parviflora, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 208. — Oceania.
ternifolia, F. Muell. Papuan Pl. viii. (1886) 46. — N. Guin.

FARAMEA, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 946.

- americana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 282 = *odoratissima*, DC.
Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 45. — Bolivia.
breviflora, Benth. ex Brillon in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 109. — Bolivia.

FARFUGIUM, Lindl. = **Senecio**, Tourn. (Compos.).

- giganteum*, Hort. Dammann, ex Gartenfl. (1892) 525 = *S. Kaempferi*, DC.

FARGESIA, Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1067; Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 251. **GRAMINEAE**.

- spathacea*, Franch. ll. cc. — China.

FAROA, Welw. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 947.

- Boehmii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 313. — Afr. trop. or.
Buchanani, Baker in Kew Bull. (1894) 26. — Afr. trop. or.
gomphrenoides, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 313. — Afr. trop. or.
graveolens, Baker, in Kew Bull. (1894) 26. — Afr. trop. or.
involutrata, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 331. — Afr. trop.
pusilla, Baker, in Kew Bull. (1894) 26. — Afr. trop. or.
Schweinfurthii, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 330. — Afr. trop.

FARSETIA, Turra (Crucif.). — Ind. Kew. i. 947.

- italica*, Ces., Pass et Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 837 = *Aubrietia deltoidea*, Guss.
longistyla, Baker, in Kew Bull. (1895) 211. — Reg. Somal.
ramosissima, Helder. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 30. — Aegypt.

FAUREA, Harv. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 948.

- arborea*, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 29. — Afr. aequat. or.
usambarensis, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

FAURIA, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. vii. X. (1886) 140. **SAXIFRAGEAE**.

- japonica*, Franch. l. c. 141. — Japon.

FAVRATIA, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 610 = **Campanula**, Linn.

- Zoysii*, Feer, l. c. = *C. Zoysii*, Wulf.

FAXONIA, T. S. Brandeg. in Zoë, iv. (1894) 403 t. 31. **COMPOSITAE**.

- pusilla*, T. S. Brandeg. l. c. — Calif

FEDIA, Adans. = **Patrinia**, Juss. (Valer.)

- angustifolia*, gibbosa, heterophylla, monandra, palmata, *saniculifolia*, *scabra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 302 = *homonyma omnia* Patriniae.
ovata, Kuntze, l. c. = *P. villosa*, Juss.

FEERIA, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 517. **CAMPANULACEAE**.

- angustifolia*, Buser, l. c. 518 (= *Trachelium angustifolium*, Schousb.). — Maroc.

FEIJOA, Berg (Myrt.). — Ind. Kew. i. 949.

- Schenckiana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1891) 186. — Bras.

FELICIA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 949.

- Boehmii*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 407. — Afr. trop. or.
Cameronii, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. I. ii. (1889) 7. — N. Guin.
Fischeri, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 407. — Afr. trop. or.
linearis, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 146. — Natal.

FERDINANDUSA, Pohl (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 949.

- Goudotiana*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 211. — Guiana angl.
Guianiae, Spruce, ex K. Schum. l. c. 208. — Bras.
lanceolata, K. Schum. l. c. 209. — Bras.
Sprucei, K. Schum. l. c. 210. — Bras.
uaupensis, Spruce, ex K. Schum. l. c. 212. — Bras.

FERNANDIA, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 47 = **Heterophragma**, DC. (Bignon.).

- Fernandi*, Baill. ex K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 243 = *Ferdinandoa superba*, Seem.
superba, Baill. l. c. 48 = *Ferdinandoa superba*, Seem.

FERNSEEA, Baker, Handb. Bromel. (1889) 20. **BROMELIACEAE**.

- Itatiaiae*, Baker, l. c. 21. (= *Bromelia Itatiaia*, Wawra). — Bres.

FEROLIA, Barrère, = **Parinarium**, Aubl. (Rosac.).

- asperula*, brasiliensis, capensis, chrysophylla, cordata, coriacea, corymbosa, costata, curatellifolia, excelsa, *Gardneri*, glaberrima, glabra, Griffithiana, indica, *Jacksoniana*, macrophylla, *Mobola*, montana, nitida, *Nonda*, oblongifolia, obtusifolia, *Pohl*, polyandra, *polynura*, robusta, *salicifolia*, *scabra*, *Sprucei*, subcordata, *travancorica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 216 = *homonyma omnia* Parinari.
amazonica, Kuntze, l. c. = *P. excelsum*, Sabine.
campestris, Kuntze, l. c. = *P. campestre*, Aubl.
minutiflora, Kuntze, l. c. = *P. Griffithianum*, Benth.
sumatrana, Kuntze, l. c. = *P. costatum*, Blume.

FERRARIA, Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 950.

- Welwitschii*, Baker, Handb. Irid. (1892) 74. — Angola.

FERULA, Tourn. ex Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 950.

- Barbeyi*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 10. — Syria.
Bilasi, Post, l. c. 9. — Syria.
Cossoniana, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 340 et 388 nomen = *longipes*, Coss.
Erythraeae, Schweinf. ex Pensig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 343 nomen. — Erithrea.
hispanica, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 116 = *Hisp.*
longipes, Coss. ex Bonn. & Mawry, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 314; et ex Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 388. — Algeria.
Loscosii, Willk. [Delect. sem. Hort. bot. Prag. (1882)] ex ej. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 206. — *Hisp.*
marmarica, Aschers. & Taub. ex Aschers. & Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 649. — Afr. bor.
parva, Freyn & Bornm. ex Freyn, in Oest.-Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 121. — Armen.
purpurea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 453. — Am. bor. occ.
suaveolens, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 69 t. 20 et 21. — Persia.
tunetana, Pomel. ex Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 478. — Algeria.

FERULAGO, Koch = **Ferula**, Linn. (Umbell.).

- Amari*, Post. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 264; et in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 439. — Syria.
asperula, Freyn & Sint. ex Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 122. — Armen.

FERULAGO: —

- aurantiaca*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 430. — Syria.
Blancheana, Post, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 265; et l. c. 430. — Syria.
vescens, Coss. & Durieu, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 368. — Algeria.

FESTUCA [Tourn.] Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 952.

- aetnensis*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 108 (= *F. aetnensis*, Walp.) = ciliata, Pers.
algeriensis, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 212. — Algeria.
aurasiaca, Trab. l. c. 215 = rubra, Linn.
Braunii ×, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 103. — Germ.
casapaltensis, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1885) 62. — Peruvia.
californica, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 277. — Calif.
chrysophylla, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 88. — Chili.
Commersonii, Franch. Miss. scient. Cap Horn, v. Bot. (1889) 388 t. 8 fig. c. — Fret. Magell.
contracta, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 353. — N. Zel.
flava, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 10 nomen. — Ecuad.
glaucantha, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 155 = ovina, Linn.
glumosa, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 10. — Ecuad.
grandis, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 216 = rubra, Linn.
Hackelii ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 97 [an seq. ?]. — Austria.
Hackelii, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 101. — Austria.
Haussknechtii ×, Torges, in Mitth. Bot. Ver. Jena, vii. (1889) 6. — Europ.
hispanica, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 109 (= *Nardurus montanus*, Boiss.). [an Kunth ?]. — Hisp.
hypophylla, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 89. — Am. austro-occ.
infesta, Hack. ex Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 347 nomen. — Algeria.
Jonesii, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 278. — Am. bor. austro-occ.
juncea, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 88. — Chili.
lamprophylla, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 64. nomen. — Algeria.
leioclada, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 10. — Ecuad.
maroccana, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 215 = rubra, Linn.
milaniana, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 59. — Afr. trop.
minor, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl., éd. 8. ii. (1889) 940 = *F. Halleri*, All.
numidica, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 214. — Algeria.
obovalis, Willd. ex Fourn. Gramin. Mexic. 1881 (1886) 124 [sphalm. ?] (= *Diplachne procera* Spreng.) = *orgyalis*, Willd.
oregona, « Vasey » ex Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 4 (1894) 264, sphalm. = *oregana*, Vasey.
patens, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 110 (= *Brachypodium patens*, Nym.). — Lusit.
paupera, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 89. — Am. austro-occ.
Pichincha, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 10 nomen. — Ecuad.
pogonantha, Franch. Min. scient. Cap Horn, v. Bot. (1889) 387. — Patag.
pseudovina, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 103 [an *F. Pseudovina*, Hack. ?] = ovina, Linn.
rigidior, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 105 = *pumila*, Vill.
rupicaprina, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 104 = ovina, Linn.
salinaria, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 184; et Enum. Fl. Transsilv. (1886) 586 = *Glyceria distans*, Wahlenb.

FESTUCA: —

- Salzmanni*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 110 = *F. Salzmanni*, Boiss.
sardoa, Hack. in Barb. Comp. Fl. Sard. (1884) 71. — Sard.
scabrescens, Hack. ex Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 215 = rubra, Linn.
Sodiroides, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 10. nomen. — Ecuad.
stenantha, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 104 [an *F. stenantha*, Nym. ?] = ovina, Linn.
sulcata, G. Beck, l. c. 103 [an *F. sulcata*, Hack. ?] = ovina, Linn.
texana, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 119. — Texas.
tuberculosa, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 110 = *tuberculosa*, Coss. & Durieu.
viridula, Vasey, Ill. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 93; et Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 279. — Calif.

FEUILLÉE, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 182 = **Fevillaea**, Linn. 1735 [non FEVILLE, Linn. 1737], gen. collect. (Legumin.).

- amara*, *angolensis*, *anthelmintica*, *basaltica*, *Boivini*, *brachycalyx*, *coriaria*, *elliptica*, *ferruginea*, *Forbesii*, *fulgens*, *glabrescens*, *glomeriflora*, *granulosa*, *Jaubertiana*, *Julibrissin*, *Lebbeh*, *litoralis*, *lucida*, *montana*, *obovata*, *odoratissima*, *paucana*, *pallida*, *Petersiana*, *polyphylla*, *procera*, *Quartiniana*, *retusa*, *rhombifolia*, *rotundata*, *rufa*, *salajeriana*, *saponaria*, *Schimperii*, *stipulata*, *subfalcata*, *Thozetiana*, *tomentella*, *versicolor*, *viridis*, *Welwitschii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 187-189 = *homonyma omnia* Albizziae.
abbreviata, *aculeata*, *alternans*, *amazonica*, *angelica*, *angustifolia*, *axillaris*, *bella*, *bicolor*, *Blanchetii*, *bombycina*, *brevipes*, *californica*, *calothyrsa*, *calycina*, *canescens*, *capillata*, *caracasana*, *carbonaria*, *chilensis*, *codonandra*, *comosa*, *crassipes*, *Cruegeri*, *Cumingii*, *depauperata*, *dysantha*, *emarginata*, *eriphylla*, *expansa*, *falcata*, *foliolosa*, *formosa*, *Gardneri*, *glomerulata*, *glyphoxylon*, *gracilis*, *grandiflora*, *Griffithii*, *Guildingii*, *haematocephala*, *haematomma*, *Harrisii*, *hirsuta*, *hirtiflora*, *Houstoni*, *humilis*, *Lambertiana*, *lanata*, *laxa*, *leptopoda*, *linearis*, *longipes*, *longipinna*, *macrocephala*, *Magdalenae*, *malacocarpa*, *mollissima*, *myriophylla*, *Pacara*, *Peckoltii*, *pedicellata*, *portoricensis*, *prostrata*, *Purdiei*, *purpurea*, *reticulata*, *rigida*, *scutellifera*, *Seemannii*, *squarrosa*, *subnervosa*, *subspicata*, *taxifolia*, *tenuiflora*, *tergemina*, *tetragona*, *tetraphylla*, *trinervia*, *turbinata*, *Tweddii*, *umbrosa*, *virgata*, *viscidula*, *Wendlandii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 187-89 = *homonyma omnia* Calliandrae.
acrocephala, *acuminata*, *affinis*, *aggregata*, *alba*, *bahiensis*, *barbata*, *Billbergiana*, *Blanchetiana*, *Bonplandiana*, *brachyptera*, *bracteosa*, *bullata*, *campanulata*, *capitata*, *carnosa*, *cayennensis*, *chartacea*, *ciliata*, *cinnamomea*, *conferta*, *coruscans*, *cylindrica*, *densiflora*, *diadema*, *disticha*, *dominicensis*, *edulis*, *fagiifolia*, *fastuosa*, *Fendleriana*, *ferrugineo-hirta*, *flagelliformis*, *globulifera*, *graciliflora*, *Guilleminiana*, *Hayesii*, *heterophylla*, *heteroptera*, *hispida*, *insignis*, *juglandifolia*, *lallensis*, *lanceaefolia*, *lateriflora*, *laurina*, *leicalycina*, *lenticellata*, *lenticifolia*, *leptantha*, *leptoloba*, *Lindeniana*, *lineata*, *Luschnathiana*, *macrophylla*, *maritima*, *martinicensis*, *Mathewsiana*, *maynensis*, *Meisneriana*, *membranacea*, *multicaulis*, *multijuga*, *myriantha*, *negrensis*, *nobilis*, *nuda*, *obtusata*, *Oerstediana*, *panamensis*, *Pavoniana*, *pezizifera*, *platyptera*, *plumifera*, *Poeppigiana*, *pruriens*, *punctata*, *quaternata*, *rubiginosa*, *rufescens*, *rufinervis*, *Ruiziana*, *Salzmanniana*, *scabruscula*, *sciniifolia*, *Sciadion*, *sessilis*, *setifera*, *setosa*, *speciosa*, *spectabilis*, *splendens*, *spuria*, *stenocalyx*, *stenoptera*, *stipularis*, *strigillosa*, *subnuda*, *tarapotensis*, *tenuifolia*, *Thibaudiana*, *tomentosa*, *tubulifera*, *umbellifera*, *umbriatica*, *uruguensis*, *velutina*, *venosa*, *vestita*, *villosissima*, *virescens*, *virgulosa*, *vismiaefolia*, *vulpina*, *xalapensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 187-189 = *homonyma omnia* Ingae.
acatlensis, *albicans*, *altissima*, *ampla*, *asplenifolia*, *auriculata*, *Bertholonii*, *bisgemina*, *borneensis*, *brevifolia*, *bubalina*, *campestris*, *cauliflora*, *circularis*, *clypearia*, *coccinea*, *cochleata*, *cognata*, *contorta*, *corymbosa*, *dawsonensis*, *divaricata*, *diversifolia*, *dulcis*, *dumosa*, *excelsa*, *filamentosa*, *filicifolia*, *filipes*, *flori-*

FEUILLÉE: —

- bunda*, *Fournieri*, *furcata*, *Glaziovii*, *Hendersonii*, *hymenaeifolia*, *Hystrix*, *inaequalis*, *incurialis*, *Jung-huhniana*, *Kegelii*, *laeta*, *Langsdorffii*, *latifolia*, *laxiflora*, *leucophylla*, *ligustrina*, *lindsaeifolia*, *longiflora*, *lusoria*, *macrostachya*, *Mathewsii*, *micradenia*, *micrantha*, *microcalyx*, *microcarpa*, *monilifera*, *montana*, *Mottleyana*, *multiflora*, *oblonga*, *obovalis*, *panurensis*, *paraguensis*, *pedicellaris*, *Pervilleana*, *prehensilis*, *pruinosa*, *pubescens*, *ramiflora*, *rhombea*, *rostrata*, *Saman*, *sanguinea*, *scalaris*, *Selloi*, *simabifolia*, *sophorocarpa*, *Spruceana*, *subacuta*, *subcoriacea*, *torta*, *triflora*, *umbellata*, *Unguis-Cati*, *unifoliolata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 187-89 = *homonyma omnia* Pithecolobii.
aeschynomenes, Kuntze, l. c. = *Calliandra aeschynomenes*, Benth.
alata, Kuntze, l. c. 184 = *Inga brevipes*, Benth.
amplebractea, Kuntze, l. c. = *Calliandra bracteosa*, Benth.
asplenoides, Kuntze, l. c. = *C. mertensioides*, Benth.
bahiensis, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium foliolosum*, Benth.
Bakeriana, Kuntze, l. c. = *Albizzia pedicellata*, Baker.
Beccariana, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium fasciculatum*, Benth.
Benthianiana, Kuntze, l. c. = *Calliandra fasciculata*, Benth.
Berteroana, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium fragrans*, Benth.
Bourgoni, Kuntze, l. c. 187 = *Inga Buorgoni*, DC.
brevispicata, Kuntze, l. c. 184 = *I. dumosa*, Benth.
campanulata, Kuntze, l. c. = *Albizzia lentiscifolia*, Benth.
Cataractae, Kuntze, l. c. 185 = *Pithecolobium glomeratum*, Benth.
Catharinae, Kuntze, l. c. = *Inga striata*, Benth.
caviflora, Kuntze, l. c. 187, sphalm. = *Pithecolobium claviflorum*, Spruce.
cearana, Kuntze, l. c. 185 = *Calliandra umbellifera*, Benth.
Championii, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium lucidum*, Benth.
chrysantha, Kuntze, l. c. 187 = *Acacia chrysantha*, DC. ?
cochlocarpa, Kuntze, l. c. 185 = *Pithecolobium Anaremotemo*, Mart.
colletiodes, Kuntze, l. c. = *Calliandra colletioides*, Griseb.
commutata, Kuntze, l. c. = *Serianthes myriadenia*, Planch.
contortisiliqua, Kuntze, l. c. = *Enterolobium Timboüva*, Mart.
coriacea, Kuntze, l. c. = *Inga sertulifera*, DC.
corniculata, Kuntze, l. c. = *Albizzia Milleti*, Benth.
cyclocarpa, Kuntze, l. c. 187 = *Enterolobium cyclocarpum*, Griseb.
cynometroides, Kuntze, l. c. = *Inga cynometroides*, Bedd.
dariensis, Kuntze, l. c. = *I. dariensis*, Seem.
dimidiata, Kuntze, l. c. 185 = *Calliandra filipes*, Benth.
discolor, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium adianthifolium*, Benth.
distachya, Kuntze, l. c. = *Albizzia lophantha*, Benth.
dubia, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium marginatum*, Spruce.
elliptica, Kuntze, l. c. 187 = *Albizzia elliptica*, Fourn.
Endlicheri, Kuntze, l. c. 185 = *Inga fasciculata*, Poepp. & Endl.
fasciculata, Kuntze, l. c. = *Calliandra surinamensis*, Benth.
flexuosa, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium geminatum*, Benth.
fulvescens, Kuntze, l. c. = *P. ferrugineum*, Benth.
gummifera, Kuntze, l. c. 185 = *Enterolobium ellipticum*, Benth.
heterophylla, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium angulatum*, Benth.
hymenaeodes, Kuntze, l. c. = *Calliandra hymenaeoides*, Benth.

FEUILLÉE: —

- hypoleuca*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 188 = *Albizzia Harveyi*, Fourn.
ignota, Kuntze, l. c. 185 = *Inga longiflora*, Spruce.
incana, Kuntze, l. c. = *Albizzia canescens*, Benth.
incerta, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium Blancheti*, Benth.
indurata, Kuntze, l. c. = *P. stipulare*, Benth.
Inga, Kuntze, l. c. 182-184 = *Inga vera*, Willd.
ingodes, Kuntze, l. c. = *I. ingoides*, Willd.
jinicul, Kuntze, l. c. 188 = *I. jinicuil*, Cham. & Schlecht.
Jiringa, Kuntze, l. c. 185 = *Pithecolobium lobatum*, Benth.
Jupumba, Kuntze, l. c. = *P. trapezifolium*, Benth.
lebbekodes, Kuntze, l. c. 188 = *Albizzia odoratisima*, Benth.
longifolia, Kuntze, l. c. 185 = *Pithecolobium Vahliaum*, Benth.
malaccensis, Kuntze, l. c. 186 = *P. confertum*, Benth.
mangensis, Kuntze, l. c. = *P. parvifolium*, Benth.
marginata, Kuntze, l. c. 188 = *Inga marginata*, Willd.
media, Kuntze, l. c. 186 = *I. micradenia*, Spruce.
microphylla, Kuntze, l. c. = *Albizzia myriophylla*, Benth.
multifoliolata, Kuntze, l. c. = *Calliandra microphylla*, Benth.
mutata, Kuntze, l. c. = *Inga panurensis*, Spruce.
mutica, Kuntze, l. c. = *Calliandra sessilis*, Benth.
myriadenia, Kuntze, l. c. 188 = *Serianthes myriadenia*, Planch.
neocaledonica, Kuntze, l. c. 186 = *S. calycina*, Benth.
nova, Kuntze, l. c. = *Inga microcalyx*, Spruce.
pachyloma, Kuntze, l. c. = *Calliandra parviflora*, Benth.
peruviana, Kuntze, l. c. = *Inga longipes*, Benth.
pilosula, Kuntze, l. c. = *I. pilosiuscula*, Desv.
plana, Kuntze, l. c. = *I. cordistipula*, Mart.
platyloba, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium sericiflorum*, Benth.
polycephala, Kuntze, l. c. 188 = *Enterolobium polycephalum*, Griseb.
quassiaefolia, Kuntze, l. c. 186 = *Inga nitida*, Willd.
Quitaro, Kuntze, l. c. 186 = *Calliandra stipulacea*, Benth.
reticulata, Kuntze, l. c. = *Inga Feuillei*, DC.
rubra, Kuntze, l. c. = *Albizzia purpurea*, Boiv.
saltuum, Kuntze, l. c. = *A. montana*, Benth.
sapinodes, Kuntze, l. c. = *Inga sapinoides*, Willd.
Sassa, Kuntze, l. c. = *Albizzia fastigiata*, Oliver.
Schomburgkii, Kuntze, l. c. 189 = *Enterolobium Schomburgkii*, Benth.
Selloana, Kuntze, l. c. = *Inga Sellowiana*, Benth.
Serianthes, Kuntze, l. c. 186 = *Serianthes grandiflora*, Benth.
Sesseana, Kuntze, l. c. = *Inga coriacea*, G. Don.
sessiliflora, Kuntze, l. c. = *I. dysantha*, Benth.
Sesuya, Kuntze, l. c. = *I. laxiflora*, Benth.
similis, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium affine*, Baker.
stipulacea, Kuntze, l. c. = *Inga rufiseta*, Benth.
Sarapota, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium macrophyllum*, Spruce.
tenuis, Kuntze, l. c. = *Inga nutans*, Mart.
terminalis, Kuntze, l. c. 187 = *Pithecolobium polycephalum*, Benth.
texana, Kuntze, l. c. = *Calliandra conferta*, Benth.
Tozeri, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium grandiflorum*, Benth.
vitiensis, Kuntze, l. c. 189 = *Serianthes vitiensis*, A. Gray.
Zygia, Kuntze, l. c. 187 = *Albizzia Brownei*, Walp.

FICARIA, [Dill.] Hall. = **Ranunculus**, Linn.
pumila, Velen. in N. Beitr. Kennn. Fl. Ost-Rumel. und Bulg. ex Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 108 = *R. Ficaria*, Linn.

FICINIA, Schrad. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 957.
acrostachys, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 635 (= *Scirpus acrostachys*, Steud.). — Afr. austr.

FICINIA: —

- angustifolia*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 635 (= *Hemichlaena angustifolia*, Schrad.). — Afr. austr.
capillaris, Nees, ex C. B. Clarke, l. c. 636 = *F. Bergiana*, Kunth.
capillifolia, C. B. Clarke, l. c. 637 (= *Hemichlaena capillifolia*, Schrad.). — Afr. austr.
cinnamomea, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austro-occ. et austr.
ferruginea, C. B. Clarke, l. c. 638 (= *Acrolepis ferruginea*, Nees). — Afr. austr.
fimbriata, E. Mey. ex C. B. Clarke, l. c. 641 = *paradoxa*, Nees.
ignorata, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 18. — Afr. austr.
leiocarpa, Zeyh. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 643 = *sylvatica*, Kunth.
longifolia, C. B. Clarke, l. c. 640 (= *Hemichlaena longifolia*, Nees). — Afr. austr.
lucida, C. B. Clarke, l. c. 640. — Afr. austr.
Macowani, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austr.
micrantha, Boeck. ex C. B. Clarke, l. c. 635 = *angustifolia*, C. B. Clarke.
pusilla, C. B. Clarke, l. c. 641. — Afr. austr.
Rehmanniana, Boeck. ex C. B. Clarke, l. c. 635 = *angustifolia*, C. B. Clarke.
Schinziana, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 47 = *Scirpus diabolicus*, Steud.
tenuis, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 645 (= *Melanocranus tenuis*, Eckl.). — Afr. austr.

FICUS, Tourn. ex Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 957.

- albidula*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 523. — Madag.
aldabrensis, Baker, in Kew Bull. (1894) 151. — Ins. Aldabra.
araneosa, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 529. — Perak.
ardisioides, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894). — Congo.
Armiti, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 404. — N. Guin.
artocarpifolia, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 517 in syn. = *callosa*, Willd.
assimilis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 345. — Madag.
Baeuerleinii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 408. — N. Guin.
barbata, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 168. — Angola.
Bellengeri, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales, (1893) 81. — Austral.
Bernaysii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 406. — N. Guin.
bhotanica, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 519. — Ind. or.
bongoensis, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 166. — Afr. centr. bor.
botryoides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 523. — Madag.
brachiata, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1888) II. 65. — Sumatra.
broussonetiaeifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 345. — Madag.
Buchneri, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 157. — Afr. trop.
Buettneri, Warb. l. c. — Afr. trop. occ.
Canonii, N. E. Br. in Gard. Chron. (1888) i. 9 (= *Artocarpus Canonii*, Hort. Bull.). — Ins. Societ.
casearioides, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 403. — N. Guin.
Cavroni, Carrière, in Rev. Hort. (1887) 329. — Bras.
Chalmersii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 406. — N. Guin.
chlamydodora, Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 40; et in Bot. Jahrb. xx. (1894) 163. — Afr. trop.
chrysocerasus, Welw. ex Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 167. — Angola.
Clarkei, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 536. — Khasia.
cocculifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 521. — Madag.

FICUS: —

- comorensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 152. — Ins. Comor.
congensis, Engl. l. c. viii. (1887) 59. — Congo.
conglobata, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 525. — Ind. or.
crassipes, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 60. — Austral.
cyathistipula, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 173. — Afr. trop. or.
damarensis, Engl. l. c. x. (1886) 5. — Afr. austro-occ. extratrop.
dimorpha, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1888) II. 66. — Sumatra.
dumosa, King, l. c. 67. — Sumatra.
duriuscula, King, l. c. lv. (1887) II. 408. — N. Guin.
Dusenii, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 168. — Afr. trop. occ.
Edelfeltii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 402. — N. Guin.
excavata, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 526. — As. trop.
excentrica, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 168. — Afr. trop. occ.
fasciculata, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 524. — Perak.
fasciculata, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 175. — Zanzib.
fasciculata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 78; et xxvi. (1891) 152. — Mexic.
Forbesii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1888) II. 66. — Sumatra.
furcata, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 173. — Congo bor.-or.
Gazellae, Engl. l. c. vii. (1886) 452. — Ins.
gracilipes, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. [iii]. (1891) 16. — Austral.
Grevei, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1894) t. 298. — Madag.
guadalajarana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 151. — Mexic.
guatteriaefolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 346. — Madag.
Guerichiana, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 130. — Afr. austro-occ. extratrop.
guttata, Kurz. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 534 (= *Covellia guttata*, Wight). — Ind. or.
hesperidiiformis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 401. — N. Guin.
Hillii, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. [iii] (1891) 16. — Austral.
Holstii, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 160. — Afr. trop. or.
jaliscana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 150. — Mexic.
kinabaluensis, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 226. — Borneo.
lanigera, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 162. — Afr. trop. or.
Laurus, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1894) t. 301. — Madag.
Lawesii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 403. — N. Guin.
lyrata, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 172. — Afr. trop. occ.
malifolia, Warb. l. c. 165. — Afr. trop. or.
mallotocarpa, Warb. l. c. 154. — Afr. trop. or.
medullaris, Warb. l. c. 169. — Afr. trop. or.
Miquelii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 405; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 524 (= *F. caulocarpa*, Miq.). — N. Guin.
Naumannii, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 451. — N. Guin.
nigrescens, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 520. — Ind. or.
Novae-Hannoverae, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 453. — Ins. N. Hannov.
obpyramidata, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 525. — Perak.
Odoardi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) 409. — N. Guin.
oxystipula, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 345. — Madag.
pachyclada, Baker, l. c. xxii. (1887) 522; et xxx. (1890) 345. — Madag.

FICUS: —

- Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 77. — Ins. S. Pedro Martin (Calif. austr.)
 Pantoniiana, King, in *Journ. Linn. Soc. Beng.* lv. (1887) II. 407. — N. Guin.
 pauper, King, l. c. 410. — N. Guin.
 persicifolia, Welw. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 162. — Afr. trop.
 Petersii, Warb. l. c. 164. — Mossamb.
 phanerophlebia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 522. — Madag.
 Preussii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 156. — Afr. trop. occ.
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 150. — Mexic.
 Pringsheimiana, F. Braun & K. Schum. in *Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 153. — Afr. trop. occ.
 pulvinata, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 169. — Zanzib.
 pulvinifera, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 522. — Madag.
 Radula, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 229 (= *Pharmacosyce Radula*, Miq.) — Am. trop.
 radulina, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 151. — Mexic.
 rhizophoraephylla, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lv. (1887) II. 410. — N. Guin.
 Rokko, Warb. et Schweinf. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 164. — Afr. trop.
 Sakalavarum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 523. — Madag.
 sansibarica, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 171. — Zanzib.
 Scratchleyana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lv. (1887) II. 404. — N. Guin.
 segaarensis, Engl. Bot. *Jahrb.* vii. (1886) 453. — N. Guin.
 setiflorus, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 226. — Borneo.
 Sonorae, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 78. — Mexic.
 soronensis, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lv. (1887) II. 411. — N. Guin.
 subcalcarata, Warb. et Schweinf. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 155. — Afr. centr. bor.
 stellulata, Warb. l. c. 152. — Afr. trop. occ.
 stenoclada, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 346. — Madag.
 sterculioides, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 175. — Afr. trop. or.
 Stuhlmannii, Warb. l. c. 161. — Afr. trop. or.
 syringifolia, Warb. l. c. 170. — Afr. trop.
 Tashiroi, Maxim. in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxii. (1888) 621. — Archip. Ya-Yama.
 tessellata, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 156. — Afr. trop. occ.
 Ti-Koua, Bureau, in *Morot, Journ. de Bot.* ii. (1888) 213 t. 7. — Yunnan.
 tremula, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 171. — Zanzib.
 triangularis, Warb. l. c. 170. — Afr. trop. occ.
 trichoclada, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 524. — Madag.
 truncata, King, [an Miq. ?] ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 507 (= *Urostigma truncatum*, Miq.) — As. trop.
 umbilicata, Bureau, ex Drake, *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 195. — Ins. Mangarewa.
 usambarensis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 159. — Afr. trop. or. (Zanzib.).
 vestito-bracteata, Warb. l. c. 159. — Ins. Comor.
 verruculosa, Warb. l. c. 166. — Angola.
 Vohsenii, Warb. l. c. 155. — Afr. trop. occ.
 Volkenii, Warb. l. c. 167. — Afr. trop. or.
 vulcanica, Wawra, Itin. *Princ. S. Coburg.* ii. (1888) 78. — Java.
 Watkinsiana, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* [iii] (1891) 18. — Austral.
 Welwitschii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 160. — Angola.
 zanzibarica, Boeck. ex Engl. in *Abh. Preuss. Acad. Wiss.* (1894) 20. — Zanzib.

FILAGO, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 965.
 aetnensis, Tornab. *Fl. Sicula* (1887) 323. — Sicil.

FILAGO: —

- angustifolia*, Batt. in Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 441 = *exigua*, Sibth.
dichotoma, Pomel, ex Batt. et Trab. l. c. = F. Cupaniana, Parl.
Heldreichii, Batt. in Batt. et Trab. l. c. 439 (= *Evax Heldreichii*, Parl.). — Afr. bor.
intermedia X, Hausskn. in *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* (1889) 173; et in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, N. Folge, vii. (1895) 30. — Graecia.
multicaulis, Heller, [Bot. Explor. S. Texas] in *Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. i.* (1895) 102 = *Evax multicaulis*, DC.
numidica, Pomel, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 336; et ex Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 440. — Algeria.
Pomeli, Batt. in Batt. et Trab. l. c. 442 (= *Evacopsis montana*, Pomel). — Algeria.
prolifera, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 329 = *Evax prolifera*, Nutt.
similata X, Hausskn. in *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* (1889) 173; et in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, N. Folge, vii. (1895) 30. — Graecia.

FILETIA, Miq. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 966.
 africana, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 41. — Afr. trop. occ.

FILICIUM, Thw. (Burser.). — Ind. Kew. i. 966.
 abbreviatum, Radlk. in *Sitz. math.-phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 277. — Madag.
 elongatum, Radlk. ex Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 252; et in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) 360. — Afr. trop. or.

FILIPENDULA, Tourn. ex Linn. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).
 denudata, Fritsch, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 591 = S. Ulmaria, Linn.
 subdenudata, Fritsch, l. c. = S. Ulmaria, Linn.

FIMBRISTEMMA, Turcz. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 966.
 calycosa, F. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 196 t. 16. — Guatem.
 stenosepala, F. D. Smith, l. c. xviii. (1893) 208. — Guatem.

FIMBRISTYLIS, Vahl (Cyper.). — Ind. Kew. i. 966.
 Actinoschoenus, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 650 (= *Actinoschoenus filiformis*, Benth.). — Zeylan.
 africana, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 691 (= *Abildgaardia pilosa*, Nees). — Afr. trop.
 albo-iridis, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 638. — Ind. or.
 atrosanguinea, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 611 (= *Scirpus atrosanguineus*, Boeck.). — Afr. aequat. or.
 atrosanguinea, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 = praec.
 ciliatifolia, Britton, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 459 nomen. — Mexic.
 cinnamomea, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 (= *Scirpus cinnamomeus*, Boeck.). — Afr. trop.
 Eggersii, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 17. — Ins. Baham.
 faulensis, G. Beck, in *Annal. Natur. Hofmus. Wien*, iii. (1888) 252. — Ins. Stewart.
 filamentosa, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 (= *Scirpus filamentosus*, Vahl). — Afr. trop.
 fusciniux, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 638. — Ind. or.
 Gambleana, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 40. — Ind. or.
 hawaiiensis, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 472. — Ins. Sandvic.
 junciformis, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 197 (= *Isolepis junciformis*, H. B. & K.). — Am. trop.
 Kingii, Gamble, *Cyp. Nov.* ii. (1890) 40. — Ind. or.
 Kingii, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 633. — Ind. or.

FIMBRISTYLIS: —

- laniceps*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 = *Bulbostylis laniceps*, C. B. Clarke.
lanifera, K. Schum. l. c. = *Scirpus lanifera*, Boeck.
laxiflora, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 607. — Madag.
maxima, K. Schum. *Fl. Kais. Willh. Land* (1889) 24. — N. Guin.
merguensis, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 642. — Penins-Mal.
nigritana, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 608. — Afr. trop. occ.
nipponensis, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 47. — Japon.
oligostachya, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 (= *Scirpus oligostachyus*, Boeck.). — Abyss.
pilosa, K. Schum. l. c. 124 (= *Schoenus pilosus*, Willd.). — Afr. trop.
purpureo-atra, C. B. Clarke, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 II. (1892) 149; et in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 609 (= *Scirpus purpureo-ater*, Boeck.). — Abyss.
pycnoccephala, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 473. — Ins. Sandvic.
recta, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 80 = *monostachya*, Hassk.
Schimperiana, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 = *Bulbostylis Schimperiana*, C. B. Clarke.
Schinzii, Boeck. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxix. (1888) 47 (= ? *Scirpus nodosus*, Rottb.). — Afr. austro-occ. extratrop.
schoenoides, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 (= *Isolepis schoenoides*, Kunth). — Afr. austr.
semitrirsuta, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 18. — China.
setacea, Leprieur, ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 604 = *diphylla*, Vahl.
Sintenisi, Boeck. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 276. — Ins. Portoric.
sphaerocarpa, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 (= *Scirpus sphaerocarpus*, Boeck.). — Afr. trop.
stolonifera, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 637. — Ind. or.
subbulbosa, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 39. — As. trop.
subtrabeculata, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 633. — Ind. or.
subumbellata, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125. — Afr. trop. or.
tenuifolia, Nees, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 639 in syn. = *compressa*, Boeck.
tokyoensis, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 47. — Japon.
tonensis, Makino, l. c. ix (1895) 260. — Japon.
transiens, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 124. — Afr. trop. or.
trichophora, Steud. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 605 = *exilis*, Roem. & Schult.
triflora, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 14; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 124 (= *Cyperus triflorus*, Linn.). — Afr. trop.
vaginata, Boiv. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 606 = *ferruginea*, Vahl.
verrucifera, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* ix. (1895) 259 (= *Isolepis verrucifera*, Maxim.). — Japon.
Warburgii, K. Schum. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 265. — Oceania.
zambesica, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 = *Bulbostylis zambesica*, C. B. Clarke.

FINSCHIA, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 297.
PROTEACEAE.
rufa, Warb. l. c. — Oceania.

FIRMIANA, Marsigli = **Sterculia**, Linn.
Barteri, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 97 = S. Barteri, Mast.
fulgens, K. Schum. l. c. = S. fulgens, Mast.

FISCHERIA, DC. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 969. *crispiflora*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 230 = *scandens*, DC.

FISSILIA, Comm. = **Olax**, Linn. *disparilis*, Comm. ex Valet. Crit. overz. Olac. (1886) 121 in syn. = *O. psittacorum*, DC.

FISTULARIA, Linn. = **Rhinanthus**, Linn. (Scrophul.). *Alectorolophus*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 103 = *R. major*, Ehrh. var. *alpina*, Wettst. l. c. = *R. minor*, Ehrh. var. *angustifolia*, Wettst. l. c. = *R. angustifolius*, C. C. Gmel. *Crista-galli*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 460 = *R. major* et *minor*, Ehrh. *Crista-galli*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 103 = *R. minor*, Ehrh. *dinarica*, Wettst. l. c. = *R. dinaricus*, Murb. *major*, Wettst. l. c. = *R. major*, Ehrh. *minor*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 460 = *R. minor*, Ehrh. *pubescens*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 103 = *R. major*, Ehrh. var. *rumelica*, Wettst. l. c. = *R. rumelicus*, Velen. *serotina*, Wettst. l. c. = *R. serotinus*, Oborny.

FLACOURTIA, [Comm.], L'Hérit. (Bixin.) — Ind. Kew. i. 969. *elliptica*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 43 (= *Xylosma ellipticum*, Tul.). — Zanzib.

FLANAGANIA, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 10. **ASCLEPIADEAE**. *orangeana*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

FLAVERIA, Juss. (Compos.). — Ind. Kew. i. 970. *anomala*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 178. — Mexic. *elata*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic. *perfoliata*, Sch.-Bip. ex Klatt, l. c. — Mexic. *ramosissima*, Klatt, l. c. — Mexic.

FLEMINGIA, Roxb. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 970. *macrocalyx*, Baker f. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 12. — Afr. trop. *yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. i. (1888) 185. — Yunnan.

FLEURYA, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 970. *glaberrima*, G. Beck, in Annal. Natur. Hofmus. Wien, iii. (1888) 253. — Ins. Stewart. *lanceolata*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 163. — Afr. trop. or.

FLOERKEA, Willd. (Geran.). — Ind. Kew. i. 970. *alba*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 100 = *Limnanthes alba*, Hartw. *rosea*, Greene, l. c. = *L. rosea*, Hartw. *versicolor*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 62. — Calif.

FLOSCOPA, Lour. (Commelin.). — Ind. Kew. i. 971. *aquatica*, Hua, in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 122. — Congo gall. *Clarkeana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 720. — Costarica.

FLUCKIGERA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 551 = **Ledenbergia**, Klotzsch (Phytol.). *seguierodes*, Kuntze, l. c. = *L. seguieroides*, Klotzsch.

FLUCKIGERIA, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1895) 488. **COMPOSITAE**. *Fritschii*, Rusby, l. c. — Bolivia.

FLUGGEEA, Willd. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 971. *Bailloniana*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 76 in obs. (= *Securinea Bailloniana*, Muell. Arg.). — Afr. trop.

FLUGGEEA : —

fagitolia, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 236. — Afr. trop. or. *nitida*, Pax in Bot. Jahrb. xix. (1894) 76. — Mossamb.

FOCKEA, Endl. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 972. *angustifolia*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1894) 146 (= *Brachystelma circinnatum*, Marl.). — Afr. austr. *crispa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 296 = *capensis*, Endl. *edulis*, K. Schum. l. c. — Afr. austr. *multiflora*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii (1893) 145. — Afr. trop. *Schinzii*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 259. — Angola. *sessiliflora*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 44. — Transvaal. *undulata*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 260. — Transvaal.

FOETIDIA, Comm. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 972. *clusioides*, Baker, in Kew Bull. (1895) 104. — Madag.

FONTANESIA, Labill. (Oleac.). — Ind. Kew. i. 972. *angustifolia*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 104 fig. 59. — Hab. ? *angustifolia*, Hayne, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 505 [an praec. ?] = *phillyraeoides*, Labill. *californica*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 206 = *F. Fortunei*, Carr.

FONTBRUNEA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 31 = **Sideroxylon**, [Dill.] Linn. (Sapot.). *malaccensis*, Pierrel. l. c. = *S. malaccense*, C. B. Clarke.

FORCIPELLA, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 444; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 343. **ACANTHACEAE**. *madagascariensis*, Baill. l. c. — Madag.

FORDIA, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 160, **LEGUMINOSAE**. *cauliflora*, Hemsl. l. c. t. x. — China.

FORDIOPHYTON, Stapf, in Ann. Bot. vii. (1892) 314. **MELASTOMACEAE**. *cantonense*, Stapf, l. c. 314. (= *Sonerila Fordii*, Oliver). — China. *Faberi*, Stapf, l. c. 314. — China. *Fordii*, Krasser, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 175 = *cantonense*, Stapf. *integrifolium*, Stapf, in Ann. Bot. vii. (1892) 314. — Perak.

FORESTIERA, Poir. (Oleac.). — Ind. Kew. i. 972. *Eggersiana*, Krug, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 339. — Ins. S. Thom. *macrocarpa*, T. S. Brandeg. in Zool. iv. (1894) 404. — Calif. *racemosa*, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 158. — Mexic. *segregata*, Krug & Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 339 (= *Myrica segregata*, Jacq.). — Florida, Antill. *tomentosa*, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 158. — Mexic.

FORSELLESIA, Greene, in Erythraea, i. (1893) 206 = **Glossopetalon**, A. Gray (Celastr.). *nevadensis*, Greene, l. c. = *G. nevadense*, A. Gray. *spinescens*, Greene, l. c. = *G. spinescens*, A. Gray.

FORSTERA, Linn. f. (Stylid.). — Ind. Kew. i. 973. *truncatella*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 196. — N. Zel.

FORSTERONIA, G. F. W. Mey. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 972. *mollis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 218. — Boliv. *obscura*, Rusby, l. c. 219. — Boliv. *paniculata*, Casar, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 200 in syn. = *Molopanthera paniculata*, Turcz.

FORSYTHIA, Vahl (Oleac.). — Ind. Kew. i. 973. *intermedia* X, Zabel, in Gartenfl. (1885) 36; Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 108. — Hybr. artef. *Sieboldii*, Hort. ex Dippel, l. c. 109 fig. 63. — China.

FORSYTHIOPSIS, Baker (Acanth.). — Ind. Kew. i. 973. *australis*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xix. (1891) 37. — Madag.

FOTHERGILLA, Murr. (Hamamel.). — Ind. Kew. i. 973. *Carolina*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 180 = *F. Gardeni*, Murr.

FOUQUIERA, H. B. & K. (Tamarisc.). — Ind. Kew. i. 973. *gigantea*, C. R. Orcutt, in West-Am. Scientist, ii. (1886) 48 = *columnaris*, Kell.

FOURCROYA, Spreng. = **Furcraea**, Vent. (Amaryll.). *Bedinghausii*, Éd. André, in Rev. Hortie. (1895) 468 fig. 154 & 155 = *Furcraea Bedinghausii*, C. Koch. *Roezii*, Éd. André, l. c. (1887) 353 fig. 71. — Mexic. *gigantea*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B (1895) 369 = *F. gigantea*, Vent.

FRADINIA, Pomel = **Mecomischus**, Coss. (Compos.). *halimifolia*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Decot.) (1889) 450 = *Anthemis halimifolia*, Munby.

FRAGARIA, [Tourn.] Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 974. *americana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 222; et in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 116 = *vesca*, Linn. *filipendula*, Hemsl. ex Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 239. — China. *illinoensis*, Prince, ex Hitchc. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, v. (1892) 493 = *virginiana*, Duchesne. *praestabilis* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 748. — Austria. *Zapateriana*, Pau, Not. bot. Fl. Espan. iii. (1889) 18 = *elatio*, Ehrh.

FRANCA, Michel. = **Frankenia**, Linn. *grandifolia*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 38 = *F. grandifolia*, Cham. & Schlecht.

FRANCHETELLA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 267 = **Heteromorpha**, Cham. & Schlecht. (Umbellif.). *arborescens*, Kuntze, l. c. = *H. arborescens*, Cham. & Schlecht.

FRANCHETELLA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 24; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 291 = **Lucuma**, Molina (Sapot.). *tarapotensis*, Pierre, l. c. = *L. tarapotensis*, Eichl.

FRANSERIA, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. i. 976. *acanthicarpha*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 129 = *Franseria Hookeriana*, Nutt. *acuminata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 171. — Calif. *andina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 40. — Chili. *Bryanti*, M. K. Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 232. — Calif. *divaricata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 171. — Calif.

FRANSERIA : —

- exigua*, Wawra, *Itin. Princ. S. Coburg*, ii. (1888) 41. — Am. bor.
fruticosa, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 50. — Am. austro-occ.
Magdalenae, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*, ii. (1889) 170. — Calif.
nivea, Robinson et Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 117. — Mexic.

FRASERA, Walt. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 976.

- coerulea*, A. J. Mulford, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 118. — Am. bor.
Cusickii, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 310. — Oreg.
montana, A. J. Mulford, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 119. — Am. bor.
tubulosa, Coville, in *Proc. Biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 71. — Calif.
utahensis, M. E. Jones, in *Zoë*, ii. (1891) 13. — Am. bor. occ.

FRAXINUS, Tourn. ex Linn. (Oleac.). — Ind. Kew. i. 976.

- acutifolia*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 85 et 442 ad calc. = *excelsior*, Linn.
amarissima, Hort. ex Dippel, l. c. 84 = *excelsior*, Linn.
americana, Marsh. Arboret. Am. (1785) 50; ex Dippel, l. c. 79 = *caroliniana*, Mill.
arbutifolia, Hort. ex Dippel, l. c. 76 = *pubescens*, Lam.
aucubaefolia, Hort. ex Dippel, l. c. 77 = *pubescens*, Lam.
bracteata, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 84. — China.
calabrica, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 90 = *angustifolia*, Vahl.
californica, Hort. ex Dippel, l. c. 80 = *oregana*, Nutt.
ciliata, Dippel, l. c. 72; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 509 = *dipetala*, Hook. et Am.
concauaefolia, Hort. ex Dippel, l. c. 83 = *excelsior*, Linn.
cucullata, Balt. ex Dippel, l. c. 83 et 442 ad calc. = *excelsior*, Linn.
edentata, Hort. ex Dippel, l. c. 90 = *oxycarpa*, Willd.
Elonza, Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 87 fig. 46; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 513. — Hab.?
exoniensis, Hort. ex Dippel, l. c. 85 et 442 ad calc. = *excelsior*, Linn.
globosa, Hort. ex Dippel, l. c. 83 = *excelsior*, Linn.
glomerata, Hort. ex Dippel, l. c. 83 = *excelsior*, Linn.
humilis, Hort. ex Dippel, l. c. = *excelsior*, Linn.
insularis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 86. — China.
intermedia, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 84 = *excelsior*, Linn.
linearis, Hort. ex Dippel, l. c. 85 et 410 ad calc. = *excelsior*, Linn.
lucida, Hort. ex Dippel, l. c. = *excelsior*, Linn.
lutea, Lodd. ex Dippel, l. c. 86 = *excelsior*, Linn.
Mentha, Hort. ex Dippel, l. c. 94 = *parvifolia*, Lam.
nana, « Dippel. » ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 514 et 580 ad calc. = *oxyphylla*, Bieb.
numidica, Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 96; Koehne, l. c. 515. — Algeria.
oxyacanthifolia, Hort. ex Dippel, l. c. 70 = *xanthoxyloides*, Wall.
parvifolia, Dippel, l. c. 82 in obs.; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 599 = *F. Bungeana*, DC.
platypoda, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1929. — China.
pumila, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 83 = *excelsior*, Linn.
Regeli, Dippel, l. c. 97 fig. 53; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 515. — Turkest.
Schiedei, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 172 = *ciliata*, Dippel.
scolopendrifolia, Hort. ex Dippel, l. c. 83 = *excelsior*, Linn.

FRAXINUS : —

- Scolopendrium*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 83 = *excelsior*, Linn.
spectabilis, Hort. ex Dippel, l. c. 84 = *excelsior*, Linn.
taurica, Hort. ex Dippel, l. c. 90 = *oxycarpa*, Willd.
texensis, Sarg. N. Am. Sylva. vi. (1894) 47 t. 260 = *americana*, Linn.
tortuosa, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 84 = *excelsior*, Linn.
turkestanica, Carrière, in *Rev. Hort.* (1887) 63 = *angustifolia*, Vahl.
verticillata, Lodd. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 85 et 410 ad calc. = *excelsior*, Linn.
Willdenowiana, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 515. — Hab.?

FREESIA, Klatt (Irid.). — Ind. Kew. i. 977.

- alba*, Hort. ex Baker, *Handb. Irid.* (1892) 167 = *refracta*, Klatt.
angolensis, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1894) 187 (= *Anomatheca angolensis*, Baker). — Afr. austr.
cruenta, Klatt, l. c. (= *A. cruenta*, Lindl.). — Afr. austr.
curvifolia, Klatt, l. c., nomen — Afr. austr.
grandiflora, Klatt, l. c. (= *Anomatheca grandiflora*, Baker). — Afr. austr.
juncea, Klatt, l. c. = *Lapeyrousia juncea*, Pourr.
juncifolia, Klatt, l. c. 188 (= *Morphixia juncifolia*, Baker). — Afr. austr.

FREMONTODENDRON, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 74 = **Fremontia**, Torr. (Stercul.).

- californicum*, Coult. l. c. = *F. californica*, Torr.

FRESENIA, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 978.

- foliosa*, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 431. — Afr. austro-occ. extratrop.
pinnatifolia, Klatt, ex Schinz, l. c. 432. — Afr. austro-occ. extratrop.

FREYCINETIA, Gaudich. (Pand.). — Ind. Kew. i. 978.

- angustissima*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 359. — Guin.
Carolana, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* ii. (1887) 126 in obs. = *insignis*, Blume.
Forbesii, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 359. — N. Guin.

FREYERA, Reichb. = **Chaerophyllum**, Linn. (Umbell.).

- balcanica*, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 370 (= *Biasoletia balcanica*, Velen.). — Bulg.
balcanica, « Velen. » ex Nadji, [Charrel] Pl. de Salon. [Emp. Ottom.] (1892) 23 = *praec.*
longiradia, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 370 in syn. = *balcanica*, Halácsy.

FREZIERA, Sw. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 978.

- boliviensis*, Wawra, in *Mart. Fl. Bras.* xii. l. (1886) 284. — Boliv.
ferruginea, Wawra, l. c. — Peruv.
guianensis, Wawra, l. c. — Guian. angl.
inaequilatera, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 63. — Bolivia.

FRITILLARIA, [Tourn.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 979.

- aintabensis*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* iii (1895) 164. — Syria.
agrestis, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 67. — Calif.
alpina, Freyn & Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 327. — As. Min.
Bornmuelleri, Hausskn. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 393. — As. min.
canaliculata, Baker, in *Gard. Chron.* (1890) i. 288. — Kurdistan.
citrina, Baker, l. c. (1893) i. 538. — As. Min.
coccinea, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 250; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 310. — Calif.

FRITILLARIA : —

- contorta*, Hort. ex Baker, in *Gard. Chron.* (1886) i. 681. — Hab.?
Davidi, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1887-88) 93 t. 16, fig. B. — Tibet.
glauca, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 153. — Oregon.
hericaulis, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 38. — As. Min.
linearis, Coult. & Fisher, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 352. — Dakota.
lophophora, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 153; Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2219. — China.
Perryi X, Hort. ex Reuthe, in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 117. — Calif.
Przewalskii, Maxim. ex Batalin. in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 105. — China.
Raddeana, Regel, l. c. x. (1887) 365; et in *Gartenfl.* xxxvi. (1887) 583. — Turkest.
Regis-Georgii, Heldr. & Holzm. ex Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 184 in obs. — Graecia.
Stracheyi, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 353. — Reg. Himal.
Stribnyi, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 61. — Bulg.
viridiflora, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 164. — Syria.
Whittallii, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 506. — As. Min.
zagrica, Staff, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 351; Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 568. — Persia.

FRÖELICHIA, Moench (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 980.

- alata*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 437. — Mexic.
juncea, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sc.* Ser. III. l. (1895) 143. — Ins. Galap.
texana, Coult. et Fisher, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 350. — Texas.
texana, Coult. & N. E. Rose, ex Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 363 [an praec. ?]. — Texas.

FUCHSIA, [Plum.] Linn. (Onagr.). — Ind. Kew. i. 980.

- boliviana*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 214. — Bolivia.
Garleppiana, Kuntze & Wittm. in *Gartenfl.* xlii. (1893) 461 fig. 96. — Bolivia.
Glazioviana, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34. (1892) 16. — Bras.
myrtifolia, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 429 = *discolor*, Lindl.
Pringlei, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 106. — Mexic.
Riccartoniana, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 429 = *globosa*, Lindl.
semperflorens X, Rozain, in *Wien. Illustr. Gartenz.* (1888) 244. — Hybr. artef.
splendens, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. iii. (1893) 226 in obs. = *microphylla*, H. B. & K.
Thompsoni, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 430 = *gracilis*, Lindl.

FUGOSIA, Juss. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 981.

- areysiana*, Deflers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 299. — Arabia.

FUIRENA, Rottb. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 981.

- calolepis*, K. Schum. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 20 et 21; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 126. — Afr. trop. or.
ciliaris, K. Schum., l. c. 126 = *Scirpus ciliaris*, Linn.
glauca, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 646 = *coerulescens*, Steud.
macrostachya, Boeck. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 67 = *pachyrrhiza*, Rendle.
repens, Boeck. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 277. — Mexic.
tenuifolia, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 648 = *pubescens*, Kunth.

FUIRENA : —

Trilobites, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 666. — Deccan.
Welwitschii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 132. — Afr. trop.

FUMANA, Spach = **Helianthemum**, Tourn. (Cistin.).

Barrelieri, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 313 = *H. glutinosum*, Pers.
ericoides, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. ii. (1889) 12 = *H. ericoides*, Dunal.

FUMARIA, Tourn. (Papav.). — Ind. Kew. i. 982.

abortiva, Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, iii. et iv. (1893) 102. — Graecia.
Alberti, X., Fouc. & Rouy, *Fl. de Fr.* i. (1893) 178. — Gall.
atlantica, Coss. & Durieu, ex Coss. *Comp. Fl.* Atlant. ii. (1887) 90 = *agraria*, Lag.
grandiflora, Nym. *Consp. Fl. Eur.*, Suppl. (1889) 18 = *Sarcocapnos grandiflora*, Rouy.

FUNCKIA, Willd. = **Astelia**, Banks & Soland. (Liliac.).

albicans, alpina, Cunninghamii, fragrans, graminifolia, grandis, hastata, Menziesiana, microsperma, montana, nervosa, polyneuron, pumila, Solandri, spicata, subrigida, trinervia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 711 = *homonyma omnia Asteliae*.
Hookeriana, Kuntze, l. c. = *A. Cunninghamii*, Hook.
Waialealae, Kuntze, l. c. = *A. Waialealia*, Wawra.

FURCILLA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 85 = **Loranthus**, Linn.

Bidwillii, Van Tiegh. l. c. = *L. Bidwillii*, Benth.
myrtifolia, Van Tiegh. l. c. = *L. myrtifolius*, R. Br.

FURCRAEA, Vent. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 984.

albispina, Hort. *Palerm. ex Baker*, in *Gard. Chron.* (1893) ii. 584. — Hab. ?
pubescens, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 201; et in *Bot. Mag.* (1892) t. 7250. — Mexic.
Roelzii, Ed. André, in *Rev. Hort.* (1887) 353 fig. 1 = *F. Bedinghausii*, C. Koch.

FUSANUS, R. Br. (Santal.). — Ind. Kew. i. 984.

ignorum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 589 = *spicatus*, R. Br.

G

GAEDAWAKKA, Linn. *Fl. Zeyl.* (1747) 203; ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 606 = **Chaetocarpus**, Thw. (Euphorb.).

Blanchetii, coriacea, Pohl, pubescens, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Chaetocarpi*.
globosa, Kuntze, l. c. = *Mettenia globosa*, Griseb.
Schomburgkiana, Kuntze, l. c. — Am. austr.

GAERTNERA, Lam. (Logan.). — Ind. Kew. i. 984.

morindoides, Baker, in *Kew Bull.* (1892) 83. — Guinea.
rufinervis, Stapf, in *Trans Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 183. — Borneo.

GAERTNERIA, Medic. = **Franseria**, Cav. (Compos.).

bipinnatifida, Chamissonis, cordifolia, discolor, dumosa, eriocentra, fruticosa, hispida, Hookeriana, ilicifolia, tenuifolia, tomentosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 339 = *homonyma omnia Franseriae*.
acanthicarpa, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 332 = *F. Hookeriana*, Nutt.
ambrosioides, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 339 = *F. ambrosioides*, Cav.
artemisioides, Kuntze, l. c. = *F. artemisioides*, Meyen & Walp.
deltoides, Kuntze, l. c. = *F. deltoidea*, Torr.
Meyeniana, Kuntze, l. c. = *F. artemisioides*, Meyen & Walp.

GAGEA, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 985.

algeriensis, Chab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 320 in syn. = *G. Liottardi*, Schult. f.
glauca, Blocki, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* v. (1887) 65. — Eur. centr.-or.
Haechelii, X., Dufft et M. Schulze, in *Mitth. Geogr. Ges. Jena* iii, 2 et 3 1884 (1885) 224. — Germ.
pomeranica, Rütke, in *Verh. bot. Ver. Prov. Brand.* xxxiv. (1893) 15. — Germ.
puymaurensis, H. & A. Marcaillh. d'Aym. in *Revue de Bot. ix.* (1891) 229 et 291 = *foliosa*, Schult. f.
szepusiana, Ulleptsch, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 399. — Hung.
Welwitschii, G. Beck, *Fl. Nied.-Oestr. i.* (1890) 175 in syn. = *hybrida*, Schur.

GAGNEBINA, Neck. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 985.

lutescens, Vell. *Fl. Flum. i. t.* 116 text. ed. Netto, 45 = *Manettia lutescens*, K. Schum.

GAHNIA, Forst. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 986.

Boninsimae, Maxim. in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxi. (1887) 112. — Japon.
exigua, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii, 1885 (1886) 279 = *rigida*, T. Kirk.
Mannii, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 482. — Ins. Sandvic.
multiglumis, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii, 1885 (1886) 280 = *setifolia*, Steud.
parviflora, Colenso, l. c. 279 = *setifolia*, Steud.
robusta, T. Kirk, l. c. xxvi. 1893 (1894) 261. — N. Zel.
scaberula, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 278 = *setifolia*, Steud.

GAIDENDRON, G. Don = **Loranthus**, Linn.

breviflorum, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. Beibl. n. 45 (1895) 5. — Columb.
ligustrinum, Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. i. (1889) 178 = *L. ligustrinus*, Wall.
Tagua, Engl. l. c. = *L. Tagua*, H. B. & K.

GAILLARDIA, Foug. (Compos.). — Ind. Kew. i. 986.

Richardsoni, Hort. ex *Kew Bull.* iii. (1889) 41 = *aristata*, Pursh.
suavis, Britton & Rusby, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1887) 11 = *simplex*, Scheele.

GAILLONIA, A. Rich. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 986.

dubia, Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 73 t. 30. — Afghan.

GAIMARDIA, Gaudich. (Centrolepid.). — Ind. Kew. i. 986.

minima, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 491. — N. Zel.

GAJANUS, Rumpf, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 189 = **Inocarpus**, Forst. (Legumin.).

edulis, Kuntze, l. c. = *I. edulis*, Mart.
guianensis, Kuntze, l. c. = *I. edulis*, Mart.
lanceolata, Kuntze, l. c. = *I. edulis*, Mart.
provacensis, Kuntze, l. c. (= *Bocoa provacensis*, Aubl.). — Guian.

GALACTIA, P. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 986.

Aschersoniana, Taub. in *Flora*, lxxii. (1889) 427. — Bras.
crassifolia, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 368 (= *Collaea crassifolia*, Benth.). — Bras.
discolor, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 194. — Guatem.
erecta, Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 502 = *sessiliflora*, Torr. & Gray.
fasciculata, Vail, l. c. — Florida.
Galactia, Vail, l. c. 500 in obs. = *pendula*, Pers.
galactioides, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 77 = *impressa*, Wright.
Grayi, Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 503 = *heterophylla*, A. Gray.

GALACTIA : —

grewiaefolia, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 368 (= *Collaea grewiaefolia*, Benth.). — Bras.
heterophylla, Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 502 = *marginalis*, Benth.
macrophylla, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 378 (= *Collaea macrophylla*, Benth.). — Bras.
montana, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 334. — Bolivia.
multiflora, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 315. — Mexic.
regularis, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 14 = *glabella*, Michx.
rotundifolia, M. Micheli, in *Morat, Journ. de Bot.* vi. (1892) 188 t. 8. — N. Granat.
scarlatina, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 378 (= *Collaea scarlatina*, Benth.). — Bras.
speciosa, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 262 = *Collaea speciosa*, DC.
Tashiroi, Maxim. in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxi. (1887) 34. — Ins. Liukiu.
tenera, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 190 = *Genista virgata*, Link.
varians, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* x. (1895) 22. — Austral.
volubilis, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 208; et Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 507 = *pilosa*, Ell.

GALACTITES, Moench (Compos.). — Ind. Kew. i. 987.

pumila, Porta, in *Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 39 [sphalm. *Galactitis*]; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 107. — Hisp.

GALACTOXYLON, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 6; Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 300. **SAPOTACEAE**.

Pierrei, Baill. l. c. (= *Bassia Galactoxylon*, F. Muell.). — Archip. Ind.

GALACTOXYLUM, « Pierre » ex L. Planch. *Étud. prod. Sapot.* (1888) 26 = *praec.*

GALANTHUS, Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 987.

Alleni, Baker, in *Gard. Chron.* (1891) i. 298. — Reg. Cauc.
bulgaricus, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 539 = *gracilis*, Celak.
byzantinus, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 226. — Eur. or.
caucasicus, Baker, l. c. (1887) i. 312; et *Handb. Amaryll.* (1888) 17 = *nivalis*, Linn. var.
coreyensis, Leichtl. ex Le Jardin (1888) 139 = *nivalis*, Linn.
Fosteri, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) i. 458. — As. Min.
globosus, Wilks, in *Garden* (1887) i. 393 = *G. Elwesii*, Hook. f.
gracilis, Celak. in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1891) i. 195 t. 9; Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 539. — Bulg.
Ikariae, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 506. — Ins. Nikaria.
maximus, Velen. *Fl. Bulg.* 1891) 540. — Bulg.
Olgae-Reginae, Hort. ex *Gard. and For.* i. (1888) 499 = *G. Olgae*, Orph.
Perryi, Hort. ex Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 258. — Reg. Cauc.
Reginae-Olgae, Hort. ex Le Jardin (1888) 140 = *G. Olgae*, Orph.
Sharlocki, Casp. ex *Gard. Chron.* (1888) i. 243 = *nivalis*, Linn.
Sharlocki, « Casp. » ex Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 17 = *nivalis*, Linn.

GALATEA, Salisb. = **Eleutherine**, Herb. (Irid.).
americana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 701 = *E. platicata*, Herb.

GALATELLA, Cass. = **Aster**, Tourn. (Compos.).
illyrica, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. 5 (1897) 104 = *A. trinervis*, Desf.

GALAXIA, Thunb. (Irid.). — Ind. Kew. i. 988.
purpurea, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl.*
Afr. v. 1893 (1895) 161. — Afr. austr.

GALBULIMIMA, F. M. Bailey, in Dept. Agric.
Brisbane Bot. Bull. ix. (1894) 5. *MAGNOLIA*-
CEAE.
baccata, F. M. Bailey, l. c. — Austral.

GALE, Tourn. = **Myrica**, Linn.
californica, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay
(1894) 298 = *M. californica*, Cham.

GALEANDRA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 988.
andamanensis, Rolfe, in Gard. Chron. (1895) ii. 581.
— Ins. Andam., Tenass.
Batemanii, Rolfe, l. c. (1892) ii. 431 (= *G. Baueri*,
Batem.); Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895)
294. — Am. centr.
bituberculata, Rolfe, l. c. (1895) ii. 581. — Hab. ?
Claesii, Cogn. in Journ. des Orchid. iv. (1893) 202;
in Lindenia, ix. (1893) 17 t. 391; et in Mart. Fl.
Bras. iii. IV. (1895) 301. — Bras.
d'Escagnolleana, Reichb. f. in Illustr. Hort. xxxiv.
(1887) 63 t. 22; et in Gard. Chron. (1892) ii.
431 = palustris, Rodr.
d'Escagnolleana, Hort. ex Gard. Chron. (1888) ii.
328 sphalm. = *G. d'Escagnolleana*, Reichb. f.
flaveola, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 512. —
Hab. ?

GALEARIA, Zoll. & Mor. (Euphorb.). — Ind.
Kew. i. 988.
Helleri, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 378. —
Tenass.
Lindleyana, Hook. f. l. c. 379. — Penang.
Maingayi, Hook. f. l. c. 377. — Malacca.
subulata, Hook. f. l. c. 379. — Penang, Perak.

GALEDUPA, Lam. = **Pongamia**, Vent. (Legumin.).
pinnata, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflan-
zenfam. iii. 3 (1894) 344 = *P. glabra*, Vent.

GALEGA, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind.
Kew. i. 989.
coronilloides, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.
xliii. (1893) 413. — As. Min.

GALEOLA, Lour. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 990.
Cathcartii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 89. —
Reg. Himal.
Falconeri, Hook. f. l. c. 88. — Reg. Himal.
pusilla, Hook. f. l. c. 89. — Pegu.

GALEOPSIS, Linn. (Labiata). — Ind. Kew. i. 990.
balatonensis, Borb. in Termész. Füzet. xvii. (1894)
66 = *G. Ladanum*, Linn. var.
crenifrons, Borb. l. c. 65 = speciosa, Mill. var.
Eversiana, Murr. in Deutsch. Bot. Monatsschr.
xii. (1894) 20. — Tirol.
flanatica, Borb. in Termész. Füzet. xvii. (1894)
68 = *G. Ladanum*, Linn. var.
flavescens, Borb. Enum. pl. Com. Castriferr. (1887)
346; et in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 346
= speciosa, Mill. var.
hispida, Borb. in Termész. Füzet. xvii. (1894) 65
= speciosa, Mill. var.
ionantha, Borb. l. c. 65 = *G. Tetrahit*, Linn. var.
lactiflora, Borb. l. c. = *G. Tetrahit*, Linn. var.
leiotricha, Borb. (Békésvarmegye flórajaja (1881-88)
ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 234 =
speciosa, Mill. var.
litoralis, Borb. in Termész. Füzet. xvii. (1894) 65
= *G. Ladanum*, Linn. var.
longiflora, Timb. & Marçais, in Magnier, Scrinia
fl. select. vi. (1887) 116 = *G. Ladanum*, Linn.
Marrubastrum, Borb. in Termész. Füzet. xvii.
(1894) 65 = *G. Ladanum*, Linn.
Murriana, Borb. & Wettst. ex Murr. in Oest. Bot.
Zeitschr. xxxviii. (1888) 238; et in Progr. Innstr.
Ober-Real Schule (1890-91) = pubescens, Bess.
var.
ochroerythrea, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.
Holst. ii. (1890) 170 = *G. Wirtgeni*, Ludw. X.
pallens X, Briq. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 389.
— Eur.

GALEOPSIS : —

Pernkofferi X, Wettst. in Kern. Sched. Fl. Austro-
Hung. vi. (1893) 41 = pallens, Briq. X.
persetosa, Borb. in Termész. Füzet. xvii. (1894) 65
= *G. Tetrahit*, Linn. var.
polychroma X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii.
(1893) 1016. — Austria.
silvestris, Borb. in Termész. Füzet. xvii. (1894) 73
= *G. Tetrahit*, Linn. var.
subspeciosa, Borb. l. c. 65 = pubescens, Bess. var.
sublatensis, Borb. l. c. 66 = *G. Tetrahit*, Linn. var.
Timbali X, Hariot, in Bull. Herb. Boiss. i.
Append. i. (1893) 39. — Gall.

GALEOTTIA, Nees = **Glockeria**, Nees (Acanth.).
glandulosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 490 = *Gl.*
glandulosa, Oerst.
haematodes, Kuntze, l. c. = *Gl. haematodes*, Oerst.
sessilifolia, Kuntze, l. c. = *Gl. sessilifolia*, Oerst.

GALINSOGA, Ruiz & Pav. (Compos.). — Ind.
Kew. i. 990.
calva, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893)
61. — Boliv.

GALINSOGAEA, Himpel, Fl. Elsass-Lothr. (1891)
187 = **Galinsoga**, Cav. (Compos.).

GALIPEA, Aubl. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 991.
ciliata, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892)
3. — Bras.

GALIMUM, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 991.
aberrans X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii. (1893)
1123. — Austria.
anfractum, Sommier & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital.
Ser. II. iii. (1894) 29. — Reg. Cauc.
aracuanum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894)
731. — Chili.
Baldacii, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl.
(1890) 165. — Montenegro.
Baumgartneri, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii. (1893)
1124. — Austria.
bulgaricum, Velen, Fl. Bulg. (1891) 231. — Bulg.
bullatum, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894)
300. — Reg. Cauc.
buxifolium, Greene, in Bull. Calif. Acad. II. vi.
(1886) 150 et 400. — Ins. S. Cruz. (Calif.).
catalinense, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. I. ii. Suppl.
(1886) 445. — Calif.
cymulosum, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888)
432. — As. occ.
dacium, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890)
163 = asperuliflorum, Borb. ?
Degenii, Baldacci, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv.
(1895) 131. — Alban.
effulgens X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii. (1893)
1124. — Austria.
elegans X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii.
(1892) 351; et xliii. (1893) 108. — Austro-Hung.
fistulosum, Sommier & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital.
Ser. II. iii. (1894) 31; et in Act. Hort. Petrop. xiii.
(1894) 195. — Reg. Cauc.
flaccidum, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 34. — Calif.
Forsteri, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894)
735. — Reg. Magellanic.
grande, Mcblatchie, in Erythra, ii. (1894) 124. — Calif.
Guillemotii X, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893)
301. — Gall. occ.
Honoriatae X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii.
(1893) 108. — Austro-Hung.
farynae X, Woloszczak, l. c. xxxvii. (1887) 227. —
Galicia.
lanatum, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 282 (= *Vail-*
lantia lanata, Delile). — Egypt.
lanuginosum, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888)
432. — As. occ.
laxum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 732.
— Chili.
leptum, Phil. l. c. 734. — Chili.
Leyboldii, Kern. Sched. Fl. Austr. vi. (1893) 80 =
rubrum, Linn.
luteum, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii.
(1889) 387 = verum, Linn.
Mandoni, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii.
(1891) 263. — Bolivia.

GALIMUM : —

marisense, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 281.
— Transsilv.
miguelense, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 34. —
Calif.
occidentale, Mcblatchie, in Erythra, ii. (1894) 124.
— Calif.
oligotrichum, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886)
285 = pseudo-aristatum, Schur.
ovalleanum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894)
734. — Chili.
pabulosum, Sommier & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital.
Ser. II. ii. (1894) 31. — Reg. Cauc.
peregrinum, Britt., Stern et Pogg. Prel. Catal.
(1888) 24 = hispidulum, Michx.
Petroanum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894)
733. — Chili.
plumosum, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3
(1893) 49. — Bolivia.
polonicum, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii.
(1887) 189. — Eur. centr.
pseudo-Polycarpon, Sommier & Levier, in Bull.
Soc. Bot. Ital. Ser. II. iii. (1894) 30. — Reg.
Cauc.
pynotrichum, Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi.
(1893) 70 = *G. Mollugo*, Linn.
Reiseri, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895)
338 t. 18. — Ins. Sporad.
rhodopeum, Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.
(1892-93) 32. — Bulg.
Schiedeanum X, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-
Holst. Theil ii. (1890) 114. — Slesv.-Holst.
spectabile X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii.
(1893) 1123. — Austria.
stenophyllum, Baker, in Kew Bull. (1895) 69. —
Afr. trop.
subuliferum, Sommier & Levier, in Act. Hort.
Petrop. xii. (1892) 151. — Reg. Cauc.
telanthos, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894)
732. — Chili.
turcicum, Velen, Fl. Bulg. (1891) 231 = *G. Heuf-*
feli, Borb.
Volckmanni, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv.
(1894) 732. — Chili.
Wettsteini, Ullepitsch, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii.
(1893) 421. — Hung.
Willkommianum, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 354 in syn.; et in Batt. et Trab. Fl. de
l'Algér. [Dicot.] = parisiense, Linn.

GALPHIMIA, Cav. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 996.
australis, Chod. in Arch. scienc. phys. et nat. (1890);
ex Chod. in Mem. Soc. sc. phys. Gen. xxxi. 2 (1892)
n. 3, 22. — Parag.
platyphylla, Chod. in Arch. sc. phys. et nat. (1890);
ex Chod. in Mem. Soc. sc. phys. Gen. xxxi. 2 (1892)
n. 3, 23. — Parag.
sessilifolia, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.
iii. 5 (1895) 313. — Mexic.
vestita, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886)
421. — Mexic.

GALPINIA, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 345.
LYTHRARIEAE.
transvaalica, N. E. Br. l. c. 346; Oliver, in Hook.
Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2375. — Transvaal.

GALPINSIA, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club,
v. (1894) 236 = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).
Hartwegii, Britton l. c. = *Oe. Hartwegii*, Benth.

GALVEZIA, Domb. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 996.
juncea, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser.
II. iii. (1891) 225 = seq.
juncea, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887)
311 (= *Maurandia juncea*, Benth.). — Chili.
speciosa, A. Gray, l. c. in obs. (= *Antirrhinum*
speciosum, A. Gray). — Chili.

GAMBEYA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 61;
Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 296. *SAPOTA*-
CEAE.
africana, Pierre, l. c. 63 (= *Chrysophyllum africanum*,
G. Don). — Ins. Fernando-Po.
Boiviniana, Pierre, l. c. (= *Chrys. Boivinianum*,
Hartig.). — Madag.

GAMBEYA :—

mammosa, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1891) 61 (= *Lucuma mammosa*, Gaertn. f.). — Am. austr.
subnuda, Pierre, l. c. (= *Chrys. subnudum*, Baker). — Afr. trop.

GAMPODA, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 443; Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 275. **MENISPERMACEAE**.
densiflora, Baker, l. c. — Madag.

GANDASULIUM, Rumpf. *Herb. Amboin.* v. (1845-47) 175; ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 690 = **Hedychium**, Koen. (Scitam.).

coccineum, *coronarum*, *densiflorum*, *ellipticum*, *Gomezianum*, *gracile*, *Griffithianum*, *Hasseltii*, *Horsfieldii*, *intermedium*, *lanatum*, *lingulatum*, *palembanicum*, *peregrinum*, *Roxburghii*, *simile*, *Spanogheanum*, *speciosum*, *spicatum*, *sumatranum*, *thyrsiforme*, *venustum*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Hedychii*.
angustifolium, Kuntze, l. c. = *H. coccineum*, Buch.-Ham.
flavum, Kuntze, l. c. = *H. coronarium*, Koen.
Sieboldii, Kuntze, l. c. = *H. spicatum*, Smith?

GANSBIUM, Adans. = **Erophila**, DC. (Crucif.).
vernum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 30 = *E. vulgaris*, DC.

GARCINIA, Linn. (Guttif.). — Ind. Kew. i. 997.

andamanica, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 170; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 328. — Ins. Andam.

angolensis, *Vesque*, *Epharmosis*, ii. (1889) 13; *et in DC. l. c.* 335. — Angola.

aphanophrasia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 295. — Madag.

Baikieana, *Vesque*, *Epharmosis*, ii. (1889) 13; *et in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 336. — Afr. trop. occ.
Balansae, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 827 = *tonkinensis*, *Vesque*.

Boeringii, Pierre, *ex Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 363. — Java?

bosoboscensis, Pierre, *ex Vesque*, in *DC. l. c.* 484 (= *G. Maingayi*, Vidal). — Ins. Philipp.

Buchanani, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 354. — Afr. trop.

Cadelliana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 154 = *G. Lanessanii*, Pierre.

cambodgiensis, *Vesque*, *Epharmosis*, ii. (1889) 14 t. 92 et 93 (= *G. Andersonii*, Pierre); *et in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 316. — Cambod.

cauliflora, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 446. — Madag.

cernua, Baker, l. c. — Madag.

Commerstonii, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 484 (= *Rhedia Commerstonii*, Planch. et Triana). — Madag.

costata, Hemsl. *ex King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 161; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 409; — Perak.

curvinervis, *Vesque*, *Epharmosis*, ii. (1889) 14; *et in DC. l. c.* 331. — Gabon.

cuspidata, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 152; *Vesque*, in *DC. l. c.* 365. — Malaya.

decipiens, *Vesque*, in *DC. l. c.* 482 (= *Ochrocarpus diversifolius*, Baill.). — Ins. Nossibe.

densiflora, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 171. — Malaya.

disepala, *Vesque*, *Epharmosis*, ii. (1889) t. 159; *et in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 48. — Madag.

diversitolia, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 153; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 351. — Malaya.

dumosa, King, l. c. 167; *Vesque*, l. c. 465. — Malaya.

floribunda, Mast. *ex Vesque*, l. c. 488. — Lagos.

Forbesii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 162; *Vesque*, l. c. 486. — Sumatra.

glomerata, *Vesque*, l. c. 320 (= *G. densiflora*, King). — Perak.

guineensis, *Vesque*, l. c. 335 (= *Stalagmites guineensis*, Don). — Afr. trop. occ

GARCINIA :—

Havilandii, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 132. — Borneo.

Kingii, Pierre, *ex Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 407. — Ins. Andam.

Kunstleri, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 165; *Vesque*, l. c. 485. — Perak.

lucida, *Vesque*, l. c. 311. — Afr. trop. occ.

Mestoni, F. M. Bailey, *Rep. Exped. Bellenden-Ker*, (1889) 31; *et Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. 8. — Austral.

moulmeinensis, Pierre, *ex Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 392. — Moulmein.

novo-guineensis, *Vesque*, l. c. 643. — N. Guin.

opaca, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 160; *et in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 411. — Malaya.

orthoclada, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 446. — Madag.

ovalifolia, Baill. *ex Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 331 in syn. = *curvinervis*, *Vesque*.

pachyphylla, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 295. — Madag.

Pervillei, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 485 (= *Rhedia Pervillei*, Planch. et Triana). — Madag.

polyphlebia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 447. — Madag.

Prainiana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 171; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 329. — Malaya.

Roxburghii, Herb. Kew, *ex Vesque*, l. c. 456 = *G. Horsfieldiana*, Pierre.

Scortechinii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1894) ii. 166 = *G. Gaudichaudii*, Planch. et Triana, var.

tonkinensis, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1891) 379 (= *G. Balansae*, Baill.). — Tonkin.

ulugurensis, *Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. A* (1895) 92 nomen. — Afr. trop.

uniflora, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 167; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 476. — Perak.

urophylla, *Scortech.* *ex King*, l. c. 167; *et Vesque*, l. c. 467. — Malaya.

Vilertierna, Pierre, *ex Laness. Pl. util. Col. Franç.* (1886) 319, sphalm. = *G. Velersiana*, Pierre.

Volkensii, *Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. C* (1895) 275. — Afr. trop. or.

Vriesiana, Pierre, *ex Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 328. — Celebes.

Warrenii, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Nov. 1891) 109; *in Bot. Centralbl.* xlix. (1891) 362; *et ex Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 641. — Austral.

Wrayi, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 152 = *merguensis*, Wright, var.

GARDENIA, Ellis (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 999.

Campanula, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 310. — Penins. Mal.

Gossleriana, J. Braun & K. Schum. in *Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 157. — Kamerun.

Hansemannii, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 220. — N. Guin.

Hiernii, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 50. — Sierra Leone.

longiflora, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 153. — Ins. Philipp.

obscura, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 349, in obs. — Ins. Philipp.

ovularis, F. M. Bailey, in *Dep. Agric. Brisbane Bot. Bull.* vii. (1893) 64. — Austral.

riparia, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. C* (1895) 381. — Afr. trop. or.

succosa, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 483. — Madag.

GARDNERIA, Wall. (Logan.). — Ind. Kew. i. 1000.

multiflora, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 53. — Japon.

GARNOTIA, Brongn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1001.

GARNOTIA :—

Fergusonii, Trim. in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 170. — Zeyl.

panicoides, Trim. l. c. — Zeyl.

sandwicensis, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 513. — Ins. Sandvic.

GARULEUM, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1001.

Schinzii, O. Hoffm. *ex Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 74. — Afr. austro-occ. extratrop.

Woodii, Schinz, l. c. iii. (1895) 440. — Natal.

GASTERIA, Duval (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1001.

radulosa, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 43. — Hab. ?

transvaalensis, Baker, l. c. 44. — Transvaal.

GASTONIA, Comm. (Aral.). — Ind. Kew. i. 1002.

sechellarum, Harms, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 43 = *Polyscias Sechellarum*, Baker.

simplicifolia, Zipp. *ex Boerl.* in *Annal. Jard. Buit.* vi. (1887) 125 = *Osmoxylon Miquelii*, Boerl.

GASTROCHILUS, D. Don = **Saccolabium**, Blume (Orchid.).

acaulis, *acuminatus*, *acutifolius*, *ampullaceus*, *bellinus*, *bifidus*, *bigibbus*, *brevifolius*, *cephalotes*, *chionanthus*, *clavatus*, *compressus*, *congestus*, *constrictus*, *curvifolius*, *distichus*, *fasciculatus*, *filiformis*, *flavus*, *flexuosus*, *fragrans*, *gemmatus*, *gracilis*, *Helferi*, *inconspicuus*, *intermedius*, *Jerdonianus*, *lanatus*, *longifolius*, *maculatus*, *miniatus*, *minimiflorus*, *nilagiricus*, *niveus*, *obliquus*, *obtusifolius*, *ochraceus*, *pachyglossus*, *papillosus*, *Pechei*, *penangianus*, *perpusillus*, *Pumilio*, *pusillus*, *quinquefidus*, *retusus*, *roseus*, *rostellatus*, *tenuicaulis*, *viridiflorus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 661 = *homonyma omnia Saccolabii*.

ascendens, Kuntze, l. c. = *S. ascendens*, Lindl.

aphyllus, Kuntze, l. c. = *Angraecum aphyllum*, Thou.

biglandulosus, Kuntze, l. c. = *S. distichum*, Lindl.?

bipunctatus, Kuntze, l. c. = *S. bipunctatum*, Par. & Reichb. f.

Blumei, Kuntze, l. c. = *Rhynchostylis retusa*, Blume.

coriaceus, Kuntze, l. c. = *Aërides coriaceum*, Sw.

Dasyopogon, Kuntze, l. c. = *S. calceolare*, Lindl.?

densiflorus, Kuntze, l. c. = *Cleisostoma spicatum*, Lindl.

dentatus, Kuntze, l. c. = *S. acutifolium*, Lindl.

denticulatus, Kuntze, l. c. = *S. acutifolium*, Lindl.

giganteus, Kuntze, l. c. = *Vanda densiflora*, Lindl.

gorwaticus, Kuntze, l. c. = *Rhynchostylis retusa*, Blume.

Griffithii, Kuntze, l. c. = *Microsaccus javensis*, Blume.

laxiflorus, Kuntze, l. c. = *S. lineare*, Lindl.

micranthus, Kuntze, l. c. = *Omocea micrantha*, Blume.

paniculatus, Kuntze, l. c. = *S. ramosum*, Lindl.

paniculatus, Kuntze, l. c. = *S. lineare*, Lindl.

parviflorus, Kuntze, l. c. = *S. micranthum*, Lindl.

parvulus, Kuntze, l. c. = *S. buccosum*, Reichb. f.

praemorsus, Kuntze, l. c. = *Rhynchostylis retusa*, Blume.

racemiferus, Kuntze, l. c. = *Sarcanthus pallidus*, Lindl.

ramosus, Kuntze, l. c. = *S. ramosum*, Lindl.

reflexus, Kuntze, l. c. = *Renanthera elongata*, Lindl.

retusus, Kuntze, l. c. = *Rhynchostylis retusa*, Blume.

Rheedei, Kuntze, l. c. = *Rh. retusa*, Blume.

ringens, Kuntze, l. c. = *Aërides radicosum*, A. Rich.

speciosus, Kuntze, l. c. = *Aërides maculosum*, Lindl.

spicatus, Kuntze, l. c. = *Rhynchostylis retusa*, Blume.

strictus, Kuntze, l. c. = *Angraecum striatum*, Thou.

trichromus, Kuntze, l. c. = *S. pallens*, Cathcart.

undulatus, Kuntze, l. c. = *Cleisostoma undulatum*, Reichb. f.

GASTROCHILUS: —

violaceus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 661 = *Rhynchostylis violacea*, Reichb. f.
Wightianus, Kuntze, l. c. = *Aërides radicosum*, A. Rich.

GASTROCHILUS, Wall. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1002.

albo-lutea, Baker, in Gard. Chron. (1894) ii. 34. — Ins. Andam.
biloba, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 379. — Penins. Mal.
Curtisii, Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7363. — Penins. Mal.
minor, King, ex Baker, in Hook. f. Fl. [Brit. Ind. vi. (1890) 217. — Perak.
rubro-lutea, Baker, l. c. 218. — Khasia.
tiliaefolia, Baker, l. c. — Khasia.
tillandsioides, Baker, l. c. — Perak.

GASTRODIA, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1002.

exilis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 123. — Khasia.
Hectori, f. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 214 t. 15. — N. Zel.
minor, Petrie, l. c. xxv. 1892 (1893) 273 t. 20 ff. 5-7. — N. Zel.
leucopetala, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 268. — N. Zel.
sesamoides, Petrie, l. c. xxvi. 1893 (1894) 272. — N. Zel.
shikokiana, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.

GAUDICHAUDIA, H. B. & K. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 1003.

Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 421. — Mexic.
Uhdeana, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 30 (1891) 3. — Mexic.

GAUDINIA, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1003.

coarctata, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 845 (= *Avena geminiflora*, Kunth). — Ins. Azor.
filiformis, Albert, in Magnier, Scrin. fl. select. vi. (1887) 120. — Gall.

GAULTHERIA, Kalm, ex Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 1003.

Blumii, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 21 (= *Diplycosia microphylla*, Becc.). — Malaya.
borneensis, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 190. — Borneo.
discolor, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 21. — N. Guin.
divergens, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 198. — N. Zel.
epiphyta, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 474. — N. Zel.
florida, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 192. — Chili.
glabra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 388 sphalm. = *scabra*, Willd.
hidalgensis, Loesen. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 552. — Mexic.
Jelskii, Zahlbr. in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 229. — Peruv.
lanceolata, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 193. — Chili.
mundula, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 21. — N. Guin.
salicifolia, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 192. — Chili.
subcorymbosa, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 476. — N. Zel.

GAURA, Linn. (Onagr.). — Ind. Kew. i. 1004.

Nealleyi, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 38; et ii. (1891) 118. — Texas.

GAUTIERA, Rafin = *Gaultheria*, Kalm. (Ericac.).

GAUTIERA: —

procumbens, Torr. Fl. N. Y. (1843) 433; ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 350 = *Gaultheria procumbens*, Linn.

GAYA, H. B. & K. (Malv.). — Ind. Kew. i. 1004.

gracilipes, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 348. — Bras.
Guerkeana, K. Schum. l. c. 354. — Bras.
pilosa, K. Schum. l. c. 355. — Bras.

GAYLUSSACIA, H. B. & K. (Vaccin.). — Ind. Kew. i. 1005.

hirtella, Klotzsch, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 323 (= *G. hirtella*, Torr. & Gray) = *dumosa*, Torr. & Gray.
pruinosa, Loesen. in Flora, lxxii. (1889) 77. — Bras.

GAYOPHYTUM, A. Juss. (Onagr.). — Ind. Kew. i. 1005.

eriospermum, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 103. — Calif.
lasiospermum, Greene, Pittonia, ii. (July 1891) 164. — Calif.

GAZANIA, Gaertn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1005.

bracteata, N. E. Br. in Gard. Chron. (1894) I. 620. — Natal?
diffusa, Oliver, in H. Johnston. The Kilim. Exped. (1886) 342, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 340 t. 61. — Afr. trop.
Pechuelii, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 267 = *Berkheyopsis Pechuelii*, O. Hoffm.
Schenkii, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 216. — Afr. austro-occ. extratrop.
Schinzii, O. Hoffm. l. c. 215. — Afr. austro-occ. extratrop.

GEIGERIA, Griessel. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1006.

acicularis, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 175; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 82. — Angola.
angolensis, O. Hoffm. l. c. 175 et 85. — Angola.
Luederitziana, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 81. — Afr. austro-occ. extratrop.
odontoptera, O. Hoffm. l. c. 85. — Afr. austro-occ. extratrop.
ornativa, O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 208; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 82. — Afr. austro-occ. extratrop.
rigida, O. Hoffm. l. c. 84. — Afr. austro-occ. extratrop.
Schinzii, O. Hoffm. l. c. 80. — Afr. austro-occ. extratrop.
spinosa, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 175. — Angola.
vigintiquamea, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 83. — Afr. austro-occ. extratrop.

GEIJERA, Schott (Rutac.). — Ind. Kew. i. 1006.

salicifolia, Tate, in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral. xii. (1889) 74, nomen = *parviflora*, Lindl.

GEISSANTHUS, Hook. f. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 1006.

Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 217. — Bolivia.
boliviana, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 140. — Bolivia.

GEISSASPIS, Wight (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1006.

psittacorhyncha, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 321. — Afr. trop. occ.

GEISSOLEPIS, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 177. COMPOSITAE.

suaedaefolia, Robinson, l. c. — Mexic.

GEISSOMERIA, Lindl. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1006.

mexicana, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 369. — Mexic.

GEISSORHIZA, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1006.

Bellendeni, Macowan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 393; et Baker, Handb. Irid. (1892) 156. — Afr. austr.
Bolusii, Baker, l. c. 158. — Afr. austr.
Dregei, Baker, l. c. — Afr. austr.
geminata, E. Meyer, ex Baker, l. c. 159. — Afr. austr.
gracilis, Baker, l. c. 155. — Afr. austr.
graminifolia, Baker, l. c. — Afr. austr.
Pappei, Baker, l. c. 154. — Afr. austr.

GEISSOSPERMUM, Allem. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 1007.

laeve, Baill. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 146 (= *G. laeve*, Miers) = *G. Vellozii*, Fr. Allem.

GELASINE, Herb. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1007.

trichantha, Baker, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 215. — Guatem.

GELONIUM, Gaertn. = *Ratonia*, DC. (Sapind.).

arborea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 144 = *Cupania laevis*, Pers.
brevipes, Kuntze, l. c. (= *Molinaea brevipes*, Radlk.). — Madag.
cupanioides, Kuntze, l. c. = *Cupania laevis*, Pers.
macrantha, Kuntze, l. c. (= *Molinaea macrantha*, Radlk.). — Ins. Maurit.
petiolaris, Kuntze, l. c. (= *Mol. petiolaris*, Radlk.). — Madag.
retusa, Kuntze, l. c. (= *Mol. retusa*, Radlk.). — Madag.
Tolambitu, Kuntze, l. c. = *Cupania Tolambitou*, Cambess.

GELONIUM, Roxb. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1007.

bifarium, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 459 in syn. = *lanceolatum*, Willd.

GELSEMIUM, Weinm. Phytant. iii. (1742) 13-15 t. 530 f. c.; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 479 =

Tecoma, Juss. (Bignon.)
amboinense, capense, *dendrophilum*, *fulgens*, *fulvum*, *Gaudichaudii*, *grandiflorum*, *Hillii*, *hirtum*, *insigne*, *leptophyllum*, *Maximiliani*, *molle*, *radicans*, *stans*, *undulatum*, *valdivianum*, *viminale*, Kuntze, l. c. 478-80 = *homonyma omnia Tecomatis*.
alatum, Kuntze, l. c. 479 = *T. Guarume*, DC.
azaleaeiflorum, Kuntze, l. c. = *T. rosaefolia*, H. B. & K.
cuspidatum, Kuntze, l. c. = *Nyctocalos brunfelsiaeiflorus*, Teijsm. & Binn.
jasminodes, Kuntze, l. c. = *T. jasminoides*, Lindl.
ochroxanthum, Kuntze, l. c. = *T. australis*, R. Br.
Pandorea, Kuntze, l. c. = *T. australis*, R. Br.
rosifolium, Kuntze, l. c. = *T. rosaefolia*, H. B. & K.
sambucifolium, Kuntze, l. c. = *T. stans*, Juss.

GEMMINGIA, Heist, ex Fabr. Enum. Pl. Helmst. (1759); ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 701 =

Belamcanda, Adans. (Irid.).
chinensis, Kuntze, l. c. = *B. punctata*, Moench.

GENIOSPORUM, Wall. (Labi.). — Ind. Kew. i. 1008.

affine, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 197. — Afr. trop.
angolense, Briq. l. c. 164. — Angola.
coloratum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 517 = *strobiliferum*, Wall.
glabrum, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 196. — Madag.
lasistachyum, Briq. l. c. 164. — Angola.
membranaceum, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 122. — Madag.
rotundifolium, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 163. — Angola.
scabridum, Briq. l. c. 165. — Afr. trop. occ.

GENIOSTOMA, Forst. (Logan.). — Ind. Kew. i. 1008.

arborescens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 = *rupestre*, Forst.

GENIPA, [Tourn.]. Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1008.

echinocarpa, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1886) 380 (= *Randia echinocarpa*, DC.) — Mexic.

GENISTA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1009.

abyssinica, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 120 = *Argyrolobium abyssinicum*, *Faub. & Spach.*
acquinotialis, Briq. l. c. 121 = *Arg. acquinotiale*, *Welw.*

afghanica, Briq. l. c. 120 = *Arg. stenophyllum*, *Boiss.*

afyrica, Briq. l. c. 119 = *Arg. uniflorum*, *Harv.*
anabaptizata, Briq. l. c. 121 = *Arg. virgatum*, *Baker.*

Andreana, A. Puiss. in *Rev. Hort.* lviii. (1886) 372; et *Rev. Hort.* Belge, xix (1893) 127 cum ic. = *Cytisus scoparius*, *Link.*

angulata, *Taub.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1893) 234 = *parviflora*, *Poir.*

arabica, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 120; et 183 = *Argyrolobium arabicum*, *Faub. & Spach.*

ascendens, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 120 = *Argyrolobium ascendens*, *Walp.*

Aucherii, Briq. l. c. 121 = *Arg. prostratum*, *Boiss.*

austriaca, Scheele in *Flora*, xxvi. (1843) 438, fide Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 175 in syn. = *Cytisus supinus*, *Linn. var.*

Bakeri, Briq. l. c. 121 = *Argyrolobium ramosissimum*, *Baker.*

Ballii, Briq. l. c. 120 = *Arg. stipulaceum*, *Ball.*

Bottae, Briq. l. c. = *Arg. Bottae*, *Faub. & Spach.*

calycina, Briq. l. c. = *Arg. calycinum*, *Faub. & Spach.*

Charegia, Coss. ex Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]. (1889) 201 = *ferox*, *Poir.*

collina, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 119 = *Argyrolobium collinum*, *Eckl. & Zeyh.*

connata, Briq. l. c. = *Arg. connatum*, *Harv.*

Cossoniana, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]. (1889) 197. — Algeria.

crassifolia, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1895) 119 = *Argyrolobium crassifolium*, *Eckl. & Zeyh.*

crotolarioides, Briq. l. c. 120 = *Arg. crotolarioides*, *Faub. & Spach.*

demnatis, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]. (1886) 201. nomen. — Marocco.

dorycnoides, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 120 = *Argyrolobium dorycnoides*, *Baker.*

Eckloniana, Briq. l. c. = *Argyrolobium patens*, *Eckl. & Zeyh.*

elongata, Scheele, in *Flora*, xxvi. (1843) 438; Briq. l. c. 168 = *Cytisus hirsutus*, *Linn. var.*

emirnenensis, Briq. l. c. 121 = *Argyrolobium emirnenensis*, *Baker.*

filiformis, Briq. l. c. 120 = *Arg. filiforme*, *Eckl. & Zeyh.*

flaccida, Briq. l. c. = *Arg. flaccidum*, *Faub. & Spach.*

formosa, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* (1890) 227 = *Cytisus racemosus*, *Carr.*

Harveyi, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1893) 119 = *Argyrolobium pilosum*, *Harv.*

Hillebrandii, Christ. in *Batt. Jahrb.* ix. (1888) 121 = *Cytisus Hillebrandii*, *Briq.*

Hillebrandii, « Christ. » ex Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) sphalm. = *praec.*

incana, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 119 = *Argyrolobium incanum*, *Eckl. & Zeyh.*

involuta, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 120 = *Arg. involutatum*, *Harv.*

Jacquini, Scheele, in *Flora*, xxvi. (1843) 438; Briq. l. c. 167 = *Cytisus hirsutus*, *Linn. var.*

kabylica, Coss. ex Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1888) p. 225 in obs. = *G. Vepres*, *Pomel.*

Kotschyi, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 121 = *Argyrolobium Kotschyi*, *Boiss.*

lunaris, Briq. l. c. 120 = *Arg. lanceolatum*, *Eckl. & Zeyh.*

maroccana, Briq. l. c. = *Arg. microphyllum*, *Ball.*

microsoma, Briq. l. c. = *Arg. pumilum*, *Eckl. & Zeyh.*

Millii, *Heldr. ex Boiss. Fl. Cr. Suppl.* (1888) 160. — Graecia.

GENISTA : —

mingrelica, *Alboff, Prodr. Fl. Colch.* (1895) 52. — Reg. Cauc.

moesiaca, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 19 = *depressa*, *Bieb.*

nigricans, *Scheele*, *Cytis. Alp. Marit.* (1894) 19 = *Cytisus nigricans*, *Linn.*

nyssana, *Petrov. in Magnier, Scrin. fl. select.* viii. (1889) 54. — Serbia.

obsoleta, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 119 = *Argyrolobium obsoletum*, *Eckl. & Zeyh.*

ornithopodioides, Briq. l. c. 121 = *Arg. ornithopodioides*, *Faub. & Spach.*

pauciflorum, Briq. l. c. 119 = *Arg. petiolare*, *Walp.*

Petitiana, Briq. l. c. = *Arg. Petitionum*, *A. Rich.*

polyphylla, Briq. l. c. 119 = *Argyrolobium polyphyllum*, *Eckl. & Zeyh.*

polysperma, Briq. l. c. 120 et 188 = *Arg. Andrewsianum*, *Steud.*

pteroclada, *Taub.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1893) 234 = *parviflora*, *Poir.*

pubescens, *Bourg. ex Perez Lara, Fl. Gadit.* (1886-92) 489 = *hirsuta*, *Vahl.*

ramentacea, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 123 = *Petteria ramentacea*, *Presl.*

remota, Briq. l. c. 120 = *Argyrolobium remotum*, *Hockst.*

rhodopea, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 20. — Bulg.

rosea, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 121 et 187 = *Argyrolobium roseum*, *Faub. & Spach.*

rumelica, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) II. 43. — Rumel.

salicifolia, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* iii. (1893) 666 = *tinctoria*, *Linn.*

Schimperia, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 121 = *Argyrolobium Schimperianum*, *Hochst.*

sessiliflora, Briq. l. c. 119 = *Argyrolobium candidans*, *Eckl. & Zeyh.*

stenocarpa, *Janka*, in *Termész. Füzet.* viii. (1884) 70; Briq. l. c. 134 = *Cytisus tridentatus*, *Vukot.*

stipulacea, Briq. l. c. 119 = *Argyrolobium stipulaceum*, *Eckl. & Zeyh.*

supina, *Scheele* [in *Flora*, xxvi. (1843) 438;] ex Briq. l. c. 179 in syn. = *Cytisus supinus*, *Linn. var.*

tenuis, Briq. l. c. 120 = *Argyrolobium tenue*, *Eckl. & Zeyh.*

Thunbergii, Briq. l. c. 119 = *Arg. sericeum*, *Eckl. & Zeyh.*

trigonelloides, Briq. l. c. 121 et 186 = *Arg. trigonelloides*, *Faub. & Spach.*

uniflora, Briq. l. c. 120 et 188 = *Arg. uniflorum*, *Faub. & Spach.*

velutina, Briq. l. c. 119 = *Arg. velutinum*, *Eckl. & Zeyh.*

Walpersiana, Briq. l. c. 120 = *Arg. rupestre*, *Walp.*

Weldeniana, *Scheele* [in *Flora* (1843) 438] ex Briq. l. c. (1894) 123 = *Petteria ramentacea*, *Presl.*

Zeyheri, Briq. l. c. 120 = *Argyrolobium molle*, *Eckl. & Zeyh.*

GENOSIRIS, Labill. = **Patersonia**, R. Br. (Irid.).

Drummondii, *graminea*, *inaequalis*, *limbata*, *longiscapa*, *macrantha*, *Maxwellii*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 701 = *homonyma omnia Patersoniae*.

babianodes, *Kuntze*, l. c. = *P. babianoides*, *Benth.*

GENTIANA, Tourn. ex Linn. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 1010.

ajanensis, *Murb. in Act. Hort. Berg.* ii. 3 (1892) 24. — Silesia.

alba, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 124 = *aquatica*, *Linn.*

albescens, *Frans. ex Kusnezow, Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 266. — China.

albida, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 468. — Europ.

americana, *Macmill. Metasp. Minnes.* (1892) 421 = *crinita*, *Froel.*

anisodonta, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1885) 122. et in *Termész. Füzet.* (1893) = *obtusifolia*, *Willd.*

antarctica, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 339. — N. Zel.

GENTIANA : —

antecedens, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 232 = *germanica*, *Willd.*

antipoda, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 440 nomen; et xxvii. 1894 (1895) 340. — N. Zel.

araucana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 205. — Chili.

arrecta, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 124. — Yunnan.

baltica, *Murb. in Act. Hort. Berg.* ii. 3 (1892) 4. — Eur.

bella, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 124. — Yunnan.

biflora, *Regel, ex Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 62; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 176. — As. centr.

brevidens, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 376. — Reg. Himal.

bulgarica, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1886) 457; et *Fl. Bulg.* (1891) 382. — Bulg.

californica, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 69. — Calif.

calycina, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 567 = *obtusifolia*, *Willd.*

carpatica, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 4; *Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 55. — Austro-Hung.

castanetorum, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 286, sphalm. = *castanetorum*, *Borb.*

caucasica, *Simonk. Enum. Fl. Transsylv.* (1886) 398 = *carpatica*, *Wettst.*

cephalantha, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 125. — Yunnan.

chalybaea, *G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien.* ii. (1887) 130 t. 5 fig. 1 = *verna*, *Linn.*

chinensis, *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxv. (1894) 250; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana*, (1894) 133. — As. centr.

Clarkei, *Kusnezow, Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 276 (= *G. pygmaea*, *C. B. Clarke*). — Reg. Himal.

coriacea, *St. Lager, in Cariot, Étud. des fl.*, éd. 8. (1895) 586 = *acaulis*, *Linn.*

corymbifera, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 336. — N. Zel.

crassuloides, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 104. — China.

crassuloides, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris.* Ser. VIII. iii. (1891) 148 [an praec.?] — Tibet.

cynanchiflora, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 126. — Yunnan.

dinarica, *G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien.* ii. (1887) 128 t. 4 fig. 10 = *acaulis*, *Linn.*

Ettingshauseni, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. I.* ii. (1889) 27. — N. Guin.

Fatrae, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 69 = *germanica*, *Willd.*

Favratii, *Ritterer, ex Favrat, in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xiii-xv.* (1887) 62 = *verna*, *Linn.*

filicaulis, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 127. — China.

foliiformis, *Borb. in Termész. Füzet.* xvi. (1893) 51 in obs. = *calycina*, *Boiss. & Hausskn.*

Franchetiana, *Kusnezow, Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 243. — As. centr.

Freyniana, *Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 345. — As. Min.

frondisepala, *Borb. l. c.* 219 = *rhaetica*, *A. & J. Kern.*

gelida, *Hort. ex Kew Bull.* iii. (1889) 41 = *septemfida*, *Pall.*

glomerata, *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxiv. (1892) 507. — Turkest.

Grayi, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 59. — Am. bor.

Grombcewskii, *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxv. (1894) 349; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 167. — Turkest.

Grunnii, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 63; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 246. — As. centr.

Haengsti, *Hausm. ex Kew Bull.* iii. (1889) 91 = *Kummeriana*, *Sendt.*

Haynaldi, *Kanitz, Pl. exped. Szechenyi in As. centr. coll.* (1891) 39 = *linoides*, *Franch.*

GENTIANA: —

- Henryi, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 128. — China.
- hexaphylla, *Maxim. in Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxv. (1894) 349; *et Etud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 126. — As. centr.
- Huxleyi, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 64; *et l. c.* 280. — As. centr.
- irrovota, *Franch. ex Kusnezow, Etud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 102 in syn. = otophora, *Franch.*
- jankae, *Kanitz, Pl. exped. Szechenyi in As. centr. coll.* (1891) 41 = rhodantha, *Franch.*
- Jamesii, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 128. — China.
- Kummeriana, *X. Sendt. ex Le Jardin* (1888) 76; *et ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii.* (1889) 218. — Eur.
- lactea, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 206. — Chili.
- leucomelaena, *Maxim. in Mém. biol. Acad. Imp.* xiii. (1891) 175; *et in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxiv. (1892) 505. — Mongol., Tibet.
- lineata, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 334 t. 27. — N. Zel.
- linoides, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 129. — Yunnan.
- Lipskyi, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 361. — Reg. Cauc.
- longepetiolata, *Kusnezow, l. c.* (1893) 62; *et Etud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 137. — As. centr.
- lutescens, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1888) sep. 89; *et Fl. Bulg.* (1891) 383. — Bulg.
- lycopodioides, *Staff, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 208. — Borneo.
- macrocalyx, *Celak, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1890) 447; *et ex Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 157 = germanica, *Willd.*
- Makinoi, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 60; *et Etud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 89. — Japon.
- Maximowiczii, *Kanitz, Pl. exped. Szechenyi in As. centr. coll.* (1891) 39 = aperta, *Maxim.*
- Maximowiczii, *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxiv. (1892) 505; *et Etud. Sous-genre Eugentiana* (1894) 236. — China.
- melandrifolia, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 129. — Yunnan.
- microdonta, *Franch. ex Hemsl. l. c.* 130. — China.
- microphyta, *Franch. ex Hemsl. l. c.* — Yunnan.
- multibracteolata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 389. — N. Zel.
- neapolitana, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 44 = G. Columnae, *Ten.*
- nipponica, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxii. (1888) 507. — Japon.
- norica, *A. & J. Kern. in Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 56 = germanica, *Willd.*
- otophora, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 130. — Yunnan.
- ovatiloba, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 60. — Mexic.
- palustris, *St. Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8* ii. (1889) 584 = G. Pneumonanthe, *Linn.*
- paradoxa, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1894) 230; *et Prodr. Fl. Colch.* (1895) 173. — Reg. Cauc.
- picta, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 131. — Yunnan.
- pilosa, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 42 = germanica, *Willd.*
- praecox, *A. & J. Kern. in Kern. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. Abh.* (1888) 669; *et Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 61. — Austria.
- praevalens, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 234 = germanica, *Willd.*
- praevalens, *Borb. ex Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 494 ad calc. = germanica, *Willd.*
- Prattii, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 63; *et Etud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 245. — As. centr.
- pseudoaquatica, *Kusnezow, ll. cc.* 63; *et 246.* — As. centr.

GENTIANA: —

- pseudogermanica, *Gelmi, Prosp. Fl. Trentina* (1893) = germanica, *Willd.*
- pterocalyx, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 132. — Yunnan.
- puberula, *Franch. ex Hemsl. l. c.* — Yunnan.
- pulla, *Franch. ex Hemsl. l. c.* 133 = Franchetiana, *Kusnezow.*
- purpurata, *Maxim. ex Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxiv. (1892) 506; *et Etud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 251. — As. centr.
- ramiflora, *Szábó, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 474 = asclepiadea, *Linn.*
- Regeli, *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxiv. (1892) 507; *et Etud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 156. — As. centr.
- rhodantha, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 133. — China.
- rigescens, *Franch. ex Hemsl. l. c.* 134. — Yunnan.
- Rockhillii, *Hemsl. l. c.* xxx. (1894) 137. — Sierra Leone.
- rosularis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. iii.* (1891) 148 = G. Szechenyi, *Kanitz.*
- rubicunda, *Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II, x.* (1888) 62. — China occ.
- Rusbyi, *Greene, ex Kusnezow, Etud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 54. — N. Mexic.
- scaberrima, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 59. — Am. bor.
- sikokiana, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxii. (1888) 508. — Japon.
- siphonantha, *Maxim. ex Kusnezow, l. c.* xxxiv. (1892) 506; *et Etud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 171. — Mongol.
- spathulifolia, *Kusnezow, ll. cc.* xxxv. (1894) 351. — China centr.
- Spenceri, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 335. — N. Zel.
- stellariaefolia, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 135. — Yunnan.
- stiriaca, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 1, t. 3 fig. 1 = germanica, *Willd.*
- suecica, *Murb. in Act. Hort. Berg.* ii. 3 (1892) 10 = campestris, *Linn.*
- superba, *Greene, Pittonia, i.* (Jan. 1888) 155. — Mexic.
- sutchenensis, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 136. — China.
- symphyandra, *Murb. in Lunds Univ. Arsskrift* xxvii, v. (1892) 89 = lutea, *Linn.*
- Szechenyi, *Kanitz, Pl. exped. Szechenyi in As. centr. coll.* (1891) 40. — As. centr.
- tergestina, *G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii.* (1887) 130; *et Fl. Nied.-Oest. ii. ii.* (1893) 239 = verna, *Linn.*
- thermalis, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 427. — Am. bor.
- tetraphylla, *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxv. (1894) 350; *et Etud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 125. — China.
- tortuosa, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 707. — Utah.
- trichotoma, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 61; *et Etud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 137. — As. centr.
- Uechritzii, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 69 = germanica, *Willd.*
- valdiviana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 206. — Chili.
- vandelliioides, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 137. — China.
- venosa, *Hemsl. l. c.* t. 3. — China.
- Wettsteinii, *Woloszczak, in Spraw. kom. fiz.* xxviii. (1892); *ex Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1893) 108 = carpatica, *Wettst.*

GEOBLASTA, *Rodr. in Vellozia, ed. 2* (1891) 133 = *Chloraea*, *Lindl. (Orchid.).*

Teixeirana, *Rodr. l. c.* = *Chloraea Teixeiraana, Cogn.*

GEODORUM, *Jacks. (Orchid.).* — Ind. Kew. i. 1016.

formosanum, *Rolfe, ex Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 157. — Ins. Formosa.

GEOFFROYA, *Murr. = Geoffraea, Linn. (Legumin.).*

striata, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 87 = *Geoffraea superba, Humb. & Bonpl.*

GEONOMA, *Willd. (Palm.).* — Ind. Kew. i. 1016.

decora, *L. Lind. & Rodigas, in Illustr. Hortic.* xli. (1894) 364 t. 23. — Bras.

Martiana, *Hort. ex Baill. Hist. des pl.* xiii. (1895) 388 = *Asterogyne* sp.

GEOPHILA, *D. Don (Rubiace.).* — Ind. Kew. i. 1017.

Ascheronianiana, *Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1889) 74. — Congo.

herbacea, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 300 = reniformis, *Cham. & Schlecht.*

herbacea, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 119; *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 129 = praec.

ioides, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 392. — Afr. trop. or.

melanocarpa, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 313. — Penins. Mal.

GEOSIRIS, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii.* (1890) 1149; *et Hist. des pl.* xiii. (1895) 152.

IRIDEAE.

aphylla, *Baill. l. c.* — Madag.

GERANIOSPERMUM, *Siegesb. = Pelargonium, L'Hérit. (Geran.).*

abrotanifolium, acetosum, aconitophyllum, alpinum, alternans, amatymbicum, anethifolium, angustifolium, anti-dysentericum, apiifolium, appendiculatum, artemisiaefolium, articulatum, asarifolium, astragalifolium, attenuatum, australe, betulinum, bicolor, bifolium, bubonifolium, cafrum, campestre, candicans, capillare, capitatum, carnosum, caulifolium, ceratophyllum, chamaedrifolium, Chelidonium, clavatum, confusum, coronopifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cuculatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, moniliforme, multibracteatum, multicaule, multiradiatum, myrrhifolium, nervifolium, Nivenii, oblongatum, ochroleucum, odoratissimum, Oenotherae, ovale, oxalidifolium, papilionaceum, patulum, peltatum, penniforme, pilosum, pinnatum, pulchellum, pulverulentum, punctatum, quercifolium, glutinosum, quinquelobatum, quinquevenerum, radiculatum, Radula, ramosissimum, rapaceum, reflexum, reniforme, revolutum, ribifolium, Rodneyanum, roseum, sanguineum, scabrum, scandens, schizopetalum, sericeum, setosum, sibthorpiaeefolium, spatulatum, spinosum, stipulaceum, ternatum, tetragonum, tomentosum, trifidum, trifoliatum, triphyllum, triste, urbanum, variegatum, velutinum, viscosissimum, vitifolium, Zeyheri, zonale, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 93-95 = homonyma omnia Pelargonii.

adulterinum, *Kuntze, l. c.* 94 = P. adulterinum, *L'Hérit.*

alchemillodes, *Kuntze, l. c.* = P. alchemilloides, *L'Hérit.*

althaeodes, *Kuntze, l. c.* = P. althaeoides, *L'Hérit.*

angulosum, *Kuntze, l. c.* = P. acerifolium, *L'Hérit.*

athananthodes, *Kuntze, l. c.* = P. athamanthoides, *L'Hérit.*

cardiophyllum, *Kuntze, l. c.* = P. setulosum, *Turcz.*

carinatum, *Kuntze, l. c.* = P. carinatum, *Sweet.*

centaurodes, *Kuntze, l. c.* = P. centauroides, *L'Hérit.*

cordifolium, *Kuntze, l. c.* = P. cordatum, *L'Hérit.*

cortusifolium, *Kuntze, l. c.* = P. cortusaefolium, *L'Hérit.*

dichondrifolium, *Kuntze, l. c.* = P. dichondraefolium, *DC.*

elongatum, *Kuntze, l. c.* = P. tabulare, *L'Hérit.*

fragile, *Kuntze, l. c.* = P. tripartitum, *Willd.*

fumarioides, *Kuntze, l. c.* = P. fumarioides, *L'Hérit.*

glechomodes, *Kuntze, l. c.* = P. glechomoides, *A. Rich.*

GERANIOSPERMUM: —

- grossularioides*, Kuntze Rev. Gen. (1891) 95 = *Pelargonium australe*, Willd.
heracleifolium, Kuntze, l. c. = *P. heracleifolium*, Lodd.
hirsutum, Kuntze, l. c. = *P. atrum*, L'Hérit.
hirtum, Kuntze, l. c. = *P. tenuifolium*, L'Hérit.
humifusum, Kuntze, l. c. 94 = *P. parvulum*, DC.
jatrofifolium, Kuntze, l. c. 95 = *P. jatrophaefolium*, DC.
malvifolium, Kuntze, l. c. = *P. malvaefolium*, Jacq. f.
multifidum, Kuntze, l. c. = *P. multifidum*, Harv.
munitum, Kuntze, l. c. = *P. crithmifolium*, Sw.
oxalodes, Kuntze, l. c. = *P. oxaloides*, Willd.
pinatifidum, Kuntze, l. c. 94 = *P. carneum*, Jacq.
proliferum, Kuntze, l. c. = *P. barbatum*, Jacq.
radulifolium, Kuntze, l. c. = *P. radulaefolium*, Steud.
senecioides, Kuntze, l. c. = *P. senecioides*, L'Hérit.
tabulare, Kuntze, l. c. = *P. saniculaefolium*, Willd.
terebintaceum, Kuntze, l. c. = *P. graveolens*, L'Hérit.
tricolor, Kuntze, l. c. 95 = *P. violareum*, Jacq.
violiflorum, Kuntze, l. c. = *P. violaeiflorum*, DC.

GERANIUM, [Tourn.]. Linn. (Geran.). — Ind. Kew. i. 1017.

- armenium*, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hortic. lxiii. (1891) 350 cum ic. = *armenum*, Boiss.
Bangii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 314. — Bolivia.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 442. — China occ.
decipiens ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, N. Folge, v. (1893) 65. — Graecia.
ecuadoriense, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 30. — Ecuad.
humile, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 56. — Ins. Sandvic.
hybridum ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ges. Jena, iii. 278. — Germ.
kilimandscharicum, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) II. 274. — Afr. trop. or
melanandrum, Franch. Pl. Delav. (1889) 112. — Yunnan.
moupinense, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885. (1886) 208. — Tibet.
nanum, Coss. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 119, nomen. — Marocco.
napuligerum, Franch. Pl. Delav. (1889) 115. — Yunnan.
neapolitanum, Terrac. Prodr. Fl. Lucan. i. (1893) 90 = *G. Robertianum*, Linn.
niveum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 421. — Mexic.
oenense ×, Borbas, in Prog. Ober-Real Schule Innsbruck (1891) 53; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 93. — Tirol.
peruvianum, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 316. — Peruv.
platypetalum, Franch. Pl. Delav. (1889) 111. — Yunnan.
pogonanthum, Franch. l. c. — Yunnan.
pulchrum, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 143. — Natal.
renifolium, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 315. — Peruv.
Ruizii, Hieron. l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) 31. — Peruv.
sepaloroseum, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 12. — Bolivia.
Sintenisii, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 104. — Armen.
strigosum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 442. — China occ.
Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 316. — Peruv.
tridens, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 55. — Ins. Sandvic.
umbelliforme, Franch. Pl. Delav. (1889) 115 t. 25. — Yunnan.
yunnanense, Franch. l. c. 114. — Yunnan.
Wislizeni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 421. — Mexic.

GERARDIA, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1022.

- Besseyana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 295. — Am. bor.
paupercula, Britton, l. c. = *purpurea*, Linn.
punctata, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 172; et xxvii. (1893) 183. — Mexic.
virginica, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 40 = *quercifolia*, Pursh.
virginica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 460 = *praec.*

GERARDIOPSIS, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 359, SCROPHULARINEAE.

Fischeri, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

GERBERA, Gronov. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1923.

- Delavayi*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 68. — China.
emirnsensis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 498. — Madag.
Jamesoni, Bolus, ex Gard. Chron. (1889) t. 772 fig. 122; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 7087. — Transvaal.
nepalensis, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 345 = *Clustanthium nepalense*, Kuntze.
parva, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 27; *Oliver*, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2379. — Afr. austr.
raphanifolia, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 67. — China.
ruficoma, Franch. l. c. 68. — China.
Tanantii, Franch. l. c. vii. (1893) 155. — China.

GERMAINIA, Balansa & Poitrass. = Anthistiria, Linn. f. (Gramin.).

- khasyana*, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 50. — Reg. Himal.

GESNERA, Plum. ex Adans. = Gesneria, Linn. sulcata, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 237. — Bolivia.

GESNERIA, Linn. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 1024.

- albiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 473 = *Pentarrhaphia albiflora*, Decne.
angustior, Kuntze, l. c. = *P. longiflora*, Lindl.
auriculata, Kuntze, l. c. = *Rhytidophyllum auriculatum*, Hook.
Berteroana, Kuntze, l. c. = *R. Berteroanum*, Mart.
calycosa, Kuntze, l. c. = *Pentarrhaphia calycosa*, Decne.
catalpiflora, Kuntze, l. c. = *P. catalpaeflora*, Decne.
cubensis, Kuntze, l. c. = *P. cubensis*, Decne.
cumanensis, Kuntze, l. c. = *P. cumanensis*, Hanst.
cuneifolia, Fritsch, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 184 = *P. cuneifolia*, Moc. & Sessé.
fruticosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 473 = *P. craniolaria*, Decne.
Hahnii, Hort. Paris, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 719 = *Isoloma Hahnii*, Hort. Paris.
Hermieri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 473 = *Pentarrhaphia longiflora*, Lindl.
hispida, Kuntze, l. c. = *P. Sloanei*, Hanst.
Lessertiana, Kuntze, l. c. = *P. catalpaeflora*, Decne.
leucomalla, Kuntze, l. c. = *Rhytidophyllum leucomallon*, Hanst.
Lindleyana, Kuntze, l. c. = *Pentarrhaphia longiflora*, Lindl.
montana, Kuntze, l. c. = *P. longiflora*, Lindl.
neglecta, Kuntze, l. c. = *P. neglecta*, Hanst.
parviflora, Kuntze, l. c. = *P. catalpaeflora*, Decne.
petiolaris, Kuntze, l. c. = *Rhytidophyllum petiolare*, DC.
Plumieriana, Kuntze, l. c. = *R. Plumerianum*, DC.
tenera, Kuntze, l. c. = *Pentarrhaphia tenera*, Hanst.
verrucosa, Kuntze, l. c. = *P. verrucosa*, Decne.
viridiflora, Kuntze, l. c. = *P. viridiflora*, Hanst.

GETHYLLIS, Plum. ex Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1025.

- fusiformis*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 279 in syn. = *orchiodes*, Gaertn.

GEUM, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 1025.

- albarracinense*, Pau, Not. bot. Fl. Españ. i. (1887) 23. — Hisp.
alpinum, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 216 [alpina]. — N. Zel.
Billieti ×, Gillot, in Rev. scient. Bourb. (1894); 136; *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 521. — Gall. centr.
hirtigenum ×, Borb. in Termész. Füzet. xiv. (1893) 48. — Bulg.
Jankae ×, G. Beck, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 104. — Mont. Rhodop.
Kolbianum, Obrist & Stein, ex Stein, in Gartenfl. (1886) 461 in syn. = *rhaeticum*, Bruegg.
latilobum, Sommier & Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 44. — Reg. Cauc.
leiospermum, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 267. — N. Zel.
macedonicum, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxx. (1892) = *nitidostylum*, Formanek.
nitidostylum, Formanek, l. c. xxxiii. (1895) 53. — Maced.
pratense ×, Pau, Not. bot. Fl. Espan. i. (1887) 22; et iii. 13. — Hisp.
speciosum, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 244; et Prodr. Fl. Colch. (1895) 80. — Reg. Cauc.
Sredinskianum, Krassnow, Enum. pl. nouv. Swanétie [Bull. Soc. Natur. Khark.] (1891) 21; *Alboff*, l. c. 245. — Reg. Cauc.
teszense ×, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 215. — Transsilv.
Velenovskyi ×, Borb. in Termész. Füzet. xiv. (1893) 48. — Bulg.
waldsteinioides, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 79. — Reg. Cauc.

GEUNSLA, Blume (Verben.). — Ind. Kew. i. 1026.

- Beccariana*, Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 165. — Borneo.

GIFOLARIA, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 335 = Filago, Linn. (Compos.).

- floribunda*, Kralik, ex Pomel, l. c. xxxv. (1888) 335. — Tunet.

GIGALOBIBUM, P. Br. = Entada, Adans. (Legumin.).

- scandens*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 82 = *E. scandens*, Benth.

GILGIA, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 80. EUPHORBIACEAE.

- candida*, Pax, l. c. (1894) 81. — Afr. trop. or.

GILIA, Ruiz et Pav. (Polem.). — Ind. Kew. i. 1027.

- abrotanifolia*, Nutt. ex Greene, in Erythea, iii. (1895) 104. — Calif.
ambigua, Rattan, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 339. — Calif.
Chamissonis, Greene, in Erythea, iii. (1895) 105 (= *G. achilleaeifolia*, A. Gray). — Calif.
copiapina, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 213. — Chili.
gilioides, Greene, in Erythea, i. (1893) 93 = *Colloimia gilioides*, Benth.
glabrata, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 213. — Chili.
gloriosa, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 184 t. 9. — Calif.
glutinosa, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 212. — Chili.
gracilis, Phil. l. c. 214. — Chili.
Howardi, M. E. Jones, in Zöf. ii. (1891) 250. — Utah.
involucrata, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 53. — Am. austr. occ.
Johowi, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 291. — Chili.
lanigera, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 215. — Chili.
laxa, Vasey & N. E. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi. (1886) 531. — Calif.
maculata, Farish, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 93. — Calif.
McVickeriae, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 712. — Utah.

GILIA : —

- mellita*, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 71. — Calif. *modesta*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 212. — Chili.
Nevini, A. Gray, ex Lyon, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 335, nomen. — Ins. Catal.
nudicaulis, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 211. — Chili.
Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 61. — Calif. austr.
parvula, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 72. — Calif.
pentstemonoides, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 279. — Colorado.
Pringlei, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 401. — Mexic.
ramosissima, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 53. — Am. austro-occ.
rubra, Heller, in *Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Expl. S. Texas]* i. (1895) 81 = *coronopifolia*, Pers.
Sonora, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 90. — Calif. inf.
staminea, Greene, in *Erythra*, iii. (1895) 105. — Calif.
superba, Eastwood, in *Zoë*, iv. (1893) 122, 296 t. 27 = *subnuda*, Torr.
Triodon, Eastwood, l. c. 121. — Am. bor. occ.

GILBERTIA, Ruiz & Pav. (Aral.). — Ind. Kew. i. 1028.

- arborea*, E. March. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Acad. roy. Belg.* xxx. 1891 (1892) 281. — Am. trop.
japonica, Harms, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 41. — Japon.
parviflora, Harms, l. c. (= *Dendropanax parviflorum*, Benth.). — As. trop. et subtrop.
protea, Harms, l. c. (= *Dendropanax proteum*, Benth.). — China.

GILLENIA, Moench (Rosac.). — Ind. Kew. i. 1028.

- stipulata*, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* iv. 1888 (1891) 179 = *stipulacea*, Nutt.

GILLIESIA, Lindl. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1028.

- monophylla*, Reiche, in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 276. — Chili.

GINALLOA, Korth. (Loranth.). — Ind. Kew. i. 1028.

- Beccariana*, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 647. — Borneo.
tenuifolia, Van Tiegh. l. c. — Borneo.
Zollingeri, Van Tiegh. l. c. — Borneo.

GINURA, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 163, sphalm. = **Gynura**, Cass. (Compos.).**GIRARDINIA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 1029.

- vitifolia*, Franch. in *Novv. Arch. Mus. Paris*, Ser. II. x. (1887-8) 80. — Tibet.

GITHAGO, Adanson = **Lychnis**, Linn. (Caryophyll.).

- gracilis*, Haussk. in *Mitth. Thur. Bot. Ver. N. Folge*, v. (1893) 47 = *Agrost. gracilis*, Boiss.

GIVOTIA, Griff. (Euphorbiac.). — Ind. Kew. i. 1029.

- madagascariensis*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 810. — Madag.

GLADIOLUS, [Tourn.] Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1029.

- Adlami*, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) i. 233; et *Handb. Irid.* (1892) 219. — Transvaal.
antholyzoides, Baker, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 70; et l. c. 227. — Transvaal.
Bakeri, Klatt, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 213. — Afr. trop.

GLADIOLUS : —

- Bolusii*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 208. — Afr. austr.
brachyscyphus, Baker, l. c. 210. — Afr. austr.
brevispithus, Klatt, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 214. — Angola.
Buchanani, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 212. — Zambesia.
Buettneri, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 155; Baker, *Handb. Irid.* (1892) 220. — Afr. trop. occ.
caudatus, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 74. — Afr. centr.-or.
Carsoni, Baker, l. c. — Afr. centr. or.
Elliotii, Baker, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 70; et *Handb. Irid.* (1892) 215. — Transvaal.
erectiflorus, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 293. — Afr. centr. austr.
flexuosus, Baker, l. c. (1894) 390. — Afr. centr. or.
gracillimus, Baker, l. c. (1895) 74. — Afr. centr. or.
Grantii, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 206. — Afr. centr. or.
Hanningtoni, Baker, l. c. 212. — Afr. trop. or.
Hibbertii, Hort. ex Baker, l. c. 217 = *blandus*, Aiton.
hybridus X, Hort. ex Illustr. Hort. xxxvii. (1890) 107 t. 512. — Hybr. artef.
inandensis, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 207. — Natal.
kilimandscharicus, Pax, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 175. — Afr. trop. or.
Kirkii, Baker, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 524; et *Handb. Irid.* (1892) 222. — Afr. austr.
Leichtlini, Baker, l. c. (1889) ii. 154; et 114. — Transvaal.
Lemoinei X, Hort. ex Baker, l. c. 217 = *blandus*, Aiton.
lucidor, Baker, l. c. 227 (= *Homoglossum lucidor*, Baker). — Afr. austr.
Macowani, Baker, l. c. 217. — Afr. austr.
Massonii, Klatt, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 220. — Afr. austr.
micranthus, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 212. — Afr. austr.
micranthus, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, i. (1885) 82. — As. Min.
microphyllus, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 206. — Afr. austr.
nanceianus X, Hort. ex Baker, l. c. 229; et in *Gard. Chron.* (1893) i. 130 fig. 21. — Hybr. artef.
nervosus, Baker, l. c. 228 (= *Antholyza nervosa*, Thunb.). — Afr. austr.
Niveni, Baker, l. c. 210. — Afr. austr.
Oatesii, Rolfe, in *Oates, Matebeleland*, ed. ii. (1889) 410; Baker, l. c. 226. — Afr. austr.
oligophlebius, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 73. — Afr. centr.-or.
oppositifolius, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 291 fig. 41, sphalm. = *oppositiflorus*, Herb.
paludosus, Baker, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 70; et *Handb. Irid.* (1892) 209. — Transvaal.
Pappei, Baker, l. c. 208. — Afr. austr.
pauciflorus, Baker, ex Oliver, in *H. Johnston, The Kilim. Exped. Append.* (1886) 346 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 350; et *Handb. Irid.* 206. — Afr. trop.
Paxii, Klatt, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 224. — Angola.
platyphyllus, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) ii. 456. — Afr. austr.
primulinus, Baker, l. c. (1890) ii. 122; et *Handb. Irid.* (1892) 222. — Afr. trop. austro-or.
pubescens, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 154. — Angola.
Rehmanni, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 216. — Transvaal.
Rogersii, Baker, l. c. 208. — Afr. austr.
salmoneus, Baker, l. c. 217. — Afr. austr.
scaphochlamys, Baker, l. c. — Afr. austr.
Scullyi, Baker, l. c. 224. — Afr. austro-occ. extratrop.
Sintenisii, Baker, l. c. 202. — Armenia tunc.
spatheaceus, Papp, ex Baker, l. c. 208. — Afr. austr.
spathulatus, Baker, l. c. 223. — Afr. austr.
splendidus, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 406. — Afr. trop. or.
sulphureus, Baker, ex Oliver, in *H. Johnston, The Kilim. Exped. Append.* (1886) 346 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 350. — Afr. trop.

GLADIOLUS : —

- Taylorianus*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 405. — Afr. trop. or.
Thomsoni, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 223. — Afr. trop.
tritomoides, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 74. — Afr. centr.-or.
twicensis X, Hort. ex Gard. Chron. (1880) ii. 183. — Hybr. artef.
Tysoni, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 220. — Afr. austr.
victoralis X, Sprenger, ex Gard. Chron. (1893) i. 596; et ex *Gartenfl.* (1893) 730. — Hybr. artef.
Woodii, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 207. — Natal
zambesiacus, Baker, l. c. 212. — Zambesia.

GLANDULIFOLIA, Wendl. = **Adenandra**, Willd. (Rutac.).

- amoena*, *biseriata*, *brachyphylla*, *ciliata*, *coriacea*, *fragrans*, *gracilis*, *humilis*, *Kraussii*, *lasiantha*, *macradenia*, *marginata*, *obtusata*, *pubescens*, *rotundifolia*, *serpyllacea*, *viscida*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 100 = *homonyma omnia Adenandrae*.
mundiaefolia, Kuntze, l. c. = *A. mundiaefolia*, Eckl. & Zeyh.
villosa, Kuntze, l. c. = *A. cuspidata*, E. Mey.

GLASTARIA, Boiss. = **Texiera**, Jaub. & Spach (Crucif.).

- glastifolia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 30 = *T. glastifolia*, Jaub. & Spach.

GLAUCIUM, Tourn. ex Hall. (Papav.). — Ind. Kew. i. 1032.

- acutidentatum*, Haussk. & Bornm. ex Bornm. in *Mitth. Bot. Ver. Jena, N. Folge*, vi. (1894) 65. — Oriens.
caricum, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 16. — As. Min.
pulchrum, Stapf, l. c. 27. — Persia.

GLAUX, [Tourn.]. Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 1032.

- densiflora*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 51. — Am. austr. occ.
mucronata, Phil. l. c. 50. — Am. austro. occ.

GLAZIOPHYTON, Franch. in Morot, *Journ. de Bot.* iii. (1889) 277. **GRAMINEAE**.

- mirabile*, Franch. l. c. — Bras.

GLAZIOVIA, Benth. & Hook. f. = **Glaziova**, Bureau (Bignon.).

- bauhinoides*, Bureau, ex Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 38. — Bras.

GLECHOMA, Linn. = **Nepeta**, Linn. (Labiata).

- agrestis*, *andrica*, *annua*, *Apuleji*, *aristata*, *azurea*, *Balbisii*, *barbata*, *biloba*, *bombaiensis*, *brevifolia*, *cadmea*, *caesarea*, *calycina*, *campestris*, *camphorata*, *Cataria*, *cephalotes*, *chionophila*, *ciliaris*, *Clarkei*, *concolor*, *connata*, *crinita*, *crispa*, *cryptantha*, *curvidens*, *curviflora*, *cyanea*, *daëniensis*, *dasyangula*, *densiflora*, *denutata*, *depauperata*, *discolor*, *distans*, *elliptica*, *erecta*, *eristachys*, *foliosa*, *Fordii*, *glabrescens*, *glomerata*, *glutinosa*, *Govaniana*, *gracilescens*, *graciliflora*, *granatensis*, *grandiflora*, *grata*, *heliotropifolia*, *hispanica*, *hymenodonta*, *isaurica*, *ispahanica*, *italica*, *japonica*, *junceae*, *kokamirica*, *kokanica*, *Kotschyi*, *lagopsis*, *lamiifolia*, *lamiopsis*, *laxiflora*, *leptantha*, *leptoclada*, *leucolaema*, *leucophylla*, *leucostegia*, *linearis*, *longibracteata*, *macrosiphon*, *mallophora*, *maracandia*, *Mariae*, *marifolia*, *micrantha*, *mollis*, *multibracteata*, *nepalensis*, *Nepetella*, *nervosa*, *nuda*, *Olgae*, *Orichiana*, *oxyodonta*, *parnassica*, *Perrettii*, *persica*, *petraea*, *podostachys*, *prostrata*, *pubescens*, *pungens*, *racemosa*, *vaphanorhiza*, *reticulata*, *rugosa*, *saccharata*, *salviaefolia*, *schirazana*, *Schtschurowskiana*, *scordotis*, *septemrenata*, *sessilifolia*, *Sewerzowii*, *sibirica*, *Sibthorpii*, *spathulifera*, *speciosa*, *Spruneri*, *stenantha*, *subhastata*, *subincisa*, *subsessilis*, *supina*, *tenuifolia*, *teucriifolia*, *teydea*, *tmolea*, *Trautvetteri*, *tuberosa*, *ucranica*, *violacea*, *viscida*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 518-19 = *homonyma omnia Nepetae*.

GLECHOMA: —

- ballotifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 518 = *Nepeta ballotiaefolia*, Hochst.
Bentharii, Kuntze, l. c. = *N. gracilis*, Salisb.
betonicifolia, Kuntze, l. c. = *N. betonicaefolia*, C. A. Mey.
bulgarica, Borb. in Termész. Fuzét. xiv. (1893) 51 = *N. Glechoma*, Benth.
calaminthodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 518 = *N. ruderalis*, Buch.-Ham.
Calvertii, Kuntze, l. c. = *N. Calverti*, Boiss.
canescens, Kuntze, l. c. = *N. italica*, Linn.
cilicica, Kuntze, l. c. = *N. cilicica*, Boiss.
Everardii, Kuntze, l. c. = *N. Everardii*, S. Moore.
globulata, Hazsl. [Mag. Edeny nov. 238, sphalm] ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxix (1889) 310 (= *G. lobulata*, Kit.) = *N. Glechoma*, Benth.
humilis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 518 = *N. bracteata*, Benth.
laevigata, Kuntze, l. c. = *N. spicata*, Benth.
macrura, Kuntze, l. c. = *N. Cataria*, Linn.
marrubiodes, Kuntze, l. c. = *N. marrubioides*, Boiss. & Heldr.
melissifolia, Kuntze, l. c. = *N. melissaefolia*, Lam.
multifida, Kuntze, l. c. = *N. lavandulacea*, Linn.
Mussinii, Kuntze, l. c. = *N. Mussini*, Spreng.
pusilla, Kuntze, l. c. = *N. pungens*, Benth.
pyncnantha, Kuntze, l. c. = *N. cilicica*, Boiss.
rotundifolia, Kuntze, l. c. = *N. floccosa*, Benth.
Ruprechtii, Kuntze, l. c. = *N. Ruprechtii*, Boiss.
serbica, Halácsy & Wettst. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii, Sitz. (1888) 71; et ex Bot. Centralbl. xxxv. (1888) 61 = *N. Glechoma*, Benth.
teucrioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 518 = *N. lasiocephala*, Benth.
Thomsonii, Kuntze, l. c. = *N. Thomsoni*, Benth.

GLEDITSCHIA, Clayton, ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1033.

- amorphoides*, Taub. in Ber. deutsch. bot. Ges. x. (1892) 638. — Reg. Argent., Bolivia.
australis, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xliii. (1887) 208 t. 5. — China.
coccinea, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 320 = *japonica*, Miq.
Delavayi, Franch. Pl. Delav. (1890) 189. — Yunnan.
nana, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 658 = *sinensis*, Lam.
officinalis, Hemsl. in Kew Bull. (1892) 82. — China.
pachycarpa, Balansa, ex Drake, in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 217, nomen. — Tonk.
Rolfei, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 115. — Ins. Philipp.

GLINUS, Linn. = **Mollugo**, Linn. (Ficoid.).

- Bainesii*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 40. — Afr. centr.
Spergula, Pax, l. c. (= *G. Spergula*, Steud.) = *M. oppositifolia*, Linn.

GLIRICIDIA, H. B. & K. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1033.

- guatemalensis*, M. Micheli, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 442 t. 10. — Guatem.
Lambii, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 533. — Mexic.

GLOBBA, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1033.

- alba*, Ed. Morren, in Belg. Hort. xxxv. (1885) 286 t. 20 = *albobracteata*, N. E. Br.
Andersoni, C. B. Clarke, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 202. — Reg. Himal.
atrosanguinea X, Hort. ex Rev. Hort. lix. (1887) 346. — Hybr. artef.
brachycarpa, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 205. — Perak.
canarensis, Baker, l. c. 206. — Canara.
cernua, Baker, l. c. 205. — Penins. Mal.
Clarkei, Baker, l. c. 210. — Ind. or.
elongata, Baker, l. c. 203, in syn. = *uliginosa*, Miq.
floribunda, Baker, l. c. — Penins. Mal.
Hookeri, C. B. Clarke, ex Baker, l. c. 202. — Reg. Himal.

GLOBBA —

- Kingii*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 204. — Penins. Mal.
pallidiflora, Baker, l. c. — Penins. Mal.
pauciflora, King, ex Baker, l. c. 205. — Ins. Andam.
platystachya, Baker, l. c. 206. — Canara.
pulchella, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 26. — N. Guin.
refractibulbigera, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 690. — Burma.
siamensis, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 204. — Siam. Cambod.
stenothyrsa, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 204. — Tenass.
subscaposa, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 135. — Burma.
substrigosa, King, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 202. — Tenass.
variabilis, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1893) 378. — Penins. Mal.
Wallichii, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 203. — Penang.

GLOBIFERA, J. F. Gmel. = **Micranthemum**, Michx (Scrophul.).

- adenandra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 461 (= *Hemianthus adenander*, Wright). — Cuba.
arenarioides, Kuntze, l. c. (= *Amphiolanthus arenarioides*, Griseb.). — Cuba.
bryodes, Kuntze, l. c. (= *A. bryoides*, Griseb.). — Cuba.
callitrichodes, Kuntze, l. c. = *M. callitrichoides*, Wright.
ciliolata, Kuntze, l. c. = *M. ciliolatum*, Wright.
elatinodes, Kuntze, l. c. = *M. elatinoides*, Wright.
erosa, Kuntze, l. c. (= *Hemianthus multiflorus*, Wright). — Cuba.
micranthemodes, Kuntze, l. c. = *M. Nuttallii*, A. Gray.
punctata, Kuntze, l. c. (= *Hemianthus punctatus*, Wright). — Cuba.
reflexa, Kuntze, l. c. = *M. reflexum*, Wright.
rotundata, Kuntze, l. c. = *M. rotundatum*, Griseb.
tetrandra, Kuntze, l. c. = *M. tetrandrum*, Wright.
trisetosa, Kuntze, l. c. (= *Hemianthus trisetosus*, Wright). — Cuba.

GLOBIMETULA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 264 = **Loranthus**, Linn.

- Braunii*, Van Tiegh. l. c. 265 = *L. Braunii*, Engl.
cupulata, Van Tiegh. l. c. 264 = *L. cupulatus*, DC.
Dinklagei, Van Tiegh. l. c. 265 = *L. Dinklagei*, Engl.
oreophilus, Van Tiegh. l. c. = *L. oreophilus*, Oliver.
unguiformis, Van Tiegh. l. c. = *L. unguiformis*, Engl.
Zenkeri, Van Tiegh. l. c. = *L. Zenkeri*, Engl.

GLOBOCARPUS, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 239; et Epit. Fl. Ital. ii. (1894) 262 = **Oenanthe** [Tourn.] Linn. (Umbell.).

- oenanthoides*, Caruel, l. c. = *O. globulosa*, Linn.

GLOBULARIA, Tourn. ex Linn. (Selag.). — Ind. Kew. i. 1034.

- Cambessedii*, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 140. — Hisp.
fuexensis X, Giraudias, in Bull. Soc. Bot. Rochel. xi. (1889-90) 208. — Gall.
Galissieri X, Giraudias, l. c. — Gall.
Sintenisii, Hausskn. & Wettst. ex Wettst. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 274 t. 7 fig. 1-5. — Kurdistan.

GLOCHIDION, Forst. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1034.

- anamiticum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 601. — Anam.
assamicum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 319. — Reg. Himal.
brunneum, Hook. f. l. c. 312. — Penins. Mal.
celastroides, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 24. — Java.
coronatum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 326. — Ind. or.
Curtisii, Hook. f. l. c. 327. — Penang.

GLOCHIDION: —

- desmocarum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 318. — Ind. or.
desmogyne, Hook. f. l. c. 310. — Tenass.
Gamblei, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.
goniocarpum, Hook. f. l. c. 309. — Penins. Mal.
Helferi, Hook. f. l. c. 311. — Tenass.
Helferi, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 24 = praec.
insulare, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 310. — Penang.
Johnstonei, Hook. f. l. c. 314. — Ind. or.
khasicum, Hook. f. l. c. 324. — Reg. Himal.
laevigatum, Hook. f. l. c. 319. — Ind. or.
macrostigma, Hook. f. l. c. 313. — Penang.
microbotrys, Hook. f. l. c. 319. — Penins. Mal.
mishmiense, Hook. f. l. c. 327. — Reg. Himal.
nanogynum, Hook. f. l. c. 318. — Ind. or.
nubigenum, Hook. f. l. c. 315. — Reg. Himal.
oblatum, Hook. f. l. c. 312. — Reg. Himal.
perakense, Hook. f. l. c. 317. — Perak.
Ralphii, Hook. f. l. c. 314. — Ind. or.
sclerophyllum, Hook. f. l. c. 313. — Penins. Mal.
sericeum, Hook. f. l. c. 326. — Penins. Mal.
sericeum, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 24 = praec.
Talboti, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 310 = *tomentosum*, Dalz.
tenuistylum, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 223. — Borneo.
Thomsoni, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 318. — Reg. Himal.
villicaula, Hook. f. l. c. 326. — Ind. or., Yunnan.

GLORIOSA, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1035.

- speciosa*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 158 (= *Clinostylis speciosa*, Hochst.) = *abyssinica*, A. Rich.
Glossidea, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 349 = **Loranthus**, Linn.
bitermata, Van Tiegh. l. c. 350 = *L. bitermatus*, Hoffmannsseg.
glaucomoma, Van Tiegh. l. c. = *Psittacanthus glaucomoma*, Eichl.
grandifolia, Van Tiegh. l. c. = *P. grandifolius*, Mart.
peronopetalus, Van Tiegh. l. c. = *P. peronopetalus*, Eichl.

GLOSSOCARYA, Walp. (Verben.). — Ind. Kew. i. 1035.

- scandens*, Trim. Syst. Catal. Ceyl. Pl. (1885) 69; Handb. Fl. Ceyl. iii. (1895) 324; et Illustr. (1895) t. 73. — Zeyl.

GLOSSOGYNE, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1035.

- orthochaeta*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Nov. 1891) 110; et ex Bot. Centralbl. xlix. (1891) 363. — Austral.

GLOSSONEMA, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1036.

- affine*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 249. — Abyss.
edule, N. E. Br. l. c. 183. — Arabia.
Elliottii, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 304. — Afr. trop. or.
Thruppii, Oliver, in F. L. James, Unkn. Horn of Afr. Append. (1888) 320. — Reg. Somal.

GLOSSOPETALON, A. Gray (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1036.

- meionandrum*, Koehne, in Gartenfl. xliii. (1894) 237 fig. 52. — Colorado.

GLOSSORHYNCHA, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 341. ORCHIDEAE.

- amboinensis*, Ridl. l. c. 342 t. 44. — Amboina.

GLOSSOSTELMA, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 321. ASCLEPIADEAE.

- angolense*, Schlechter, l. c. 322 t. 352b. — Angola.

GLOSSOSTIGMA, Wight et Arn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1036.

GLOSSOSTIGMA: —

- diandrum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 461 = *spathulatum*, Wight & Arn.
submersum, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 401. — N. Zel.
trichodes, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Dec. 1892) 128; et in Bot. Centralbl. liii. 125. — Austral.

GLUTA, Linn. (Anacard.). — Ind. Kew. i. 1038.

- Harmandiana*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 307, nomen. — Cochinch.

GLYCERIA, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1037.

- altissima*, Garcke, Deutschl. Fl. ed. 16 (1890) 500 in syn. = *aquatica*, Wahlenb.
angustata, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48 (= *Atropis angustata*, Griseb.). — Oregon.
festucaeformis, Degen, ex Sommer, in Bull. Soc. Bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 51 (= *G. festucaeformis*, Heynh.) = *distans*, Wahlenb.
grandis, S. Wats. in A. Gray, Man. N. U. St. A. Bot. ed. 6 (1890) 667; et in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 140 = *aquatica*, Wahlenb.
laxa, Scribn. ex L. Rand & J. H. Redfield, Prel. Cat. pl. Mount Desert (1890) 180. — Am. bor.
pumila, Macoun, ex Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48, nomen. — Ins. Vancouv.
retinosa, Velen. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. (1889) 359 = *arundinacea*, M. Bieb.

GLYCINE, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1037.

- maranguensis*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 220. — Afr. trop. or.
pseudojavanica, Taub. l. c. — Afr. trop. or.
repens, Taub. l. c. — Afr. trop. or.

GLYCINOPSIS, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 190 = **Periandra**, Mart. (Legumin.).

- acutifolia*, Berteroana, coccinea, densiflora, heterophylla, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Perianthae.
mediterranea, Kuntze, l. c. = *P. dulcis*, Mart.

GLYCOSMIS, Correa (Rutac.). — Ind. Kew. i. 1039.

- montana*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 285b. — Corinch.

GLYCYRRHIZA, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1039.

- inflata*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 484. — China.

GLYPHAEA, Hook. f. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 1039.

- Boivini*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 550. — Madag.
chalybaea, Baill. l. c. — Madag.

GLYPTOPETALUM, Thw. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1039.

- calocarpum*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 209. — As. trop.
Griffithii, Prain, l. c. — Ind. or.

GLYPTOSTROBUS, Endl. = **Taxodium**, Rich. (Conif.).

- columnaris*, Carrière, in Rev. Hort. (1881) 528 = *T. distichum*, Rich.

GMELINA, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. i. 1039.

- hainanensis*, Oliver, in Hook. Icon. Pl. xix. (1889) sub t. 1874. — Hainan.
uniflora, Stapf, in Hook. l. c. xxiv. (1895) t. 2391. — Borneo.

GNAPHALIUM, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1040.

- acutifolium*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 12. — Chili.
agreste, Phil. l. c. 22. — Chili.
americanum, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 185 = *Anaphalis margaritacea*, R. Br.
Andersoni, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 132 = *Leontopodium Andersoni*, C. B. Clarke.

GNAPHALIUM: —

- andicola*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 17. — Chili.
andinum, Phil. l. c. 24. — Chili.
antennarioides, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 135. — Am. mer.
argyrolepis, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 46. — Chile.
bellidifolium, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 19. — Chili.
bicolor, Bioletti, in Erythraea, i. (1893) 16. — Calif.
canum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 11. — Chili.
columbianum, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 52. — Columb.
corymbosum, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 71. — China.
Dedekensii, Bureau et Franch. l. c. 70. — China.
deplatum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 10. — Chili.
diffusum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 490. — Madag.
ecuadoriense, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 347. — Ecuad.
fastigiatum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 15. — Chili.
Griffithii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 339 = *Anaphalis Griffithii*, Hook.
Helleri, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 280. — Am. bor. or.
heterophyllum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 14. — Chili.
imbaburensis, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 347. — Ecuad.
Julietii, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 23. — Chili.
lanceolatum, Hort. ex S. Mottet in Rev. Hort. (1894) 459 in obs. = *Helichrysum rupestre*, DC.
Liebmannii, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft. xxiii. (1887) 89. — Mexic.
linearifolium, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 135 = *Leontopodium linearifolium*, Benth. et Hook. f.
longifolium, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 13. — Chili.
maximum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 340. — Java.
minutula, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 472. — N. Zel.
Moelleri, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 11. — Chili.
mucronatum, Phil. l. c. 20. — Chili.
nivale, Phil. l. c. 21. — Chili.
nobile, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 70. — China occ.
obconicum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 340 = *Helichrysum obconicum*, DC.
obscurum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 26. — Chili.
paludosum, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 441. — N. Zel.
Peteroanum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 21. — Chili.
Pichleri, Murb. in Lunds Univ. Arsskrift., xxvii. v. (1892) 106. — Herceg.
polybotryum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 24. — Chili.
Pringlei, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 387. — Mexic.
procumbens, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 25. — Chili.
pterigoideum, Klatt, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 24. — Madag.
Remyanum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 8. — Chili.
robustum, Phil. l. c. 16. — Chili.
Serranoi, Phil. l. c. 7. — Chili.
Sieboldianum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 133 = *Leontopodium alpinum*, Cass.
sinense, Franch., l. c. 133 = *L. sinense*, Hemsl.
spatulatum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 20. — Chili.
Stracheyi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 133. — Himalaya, China.
subnudum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 15. — Chili.

GNAPHALIUM: —

- subulatum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 130. — China.
tarapacanicum, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 46. — Chile.
thibeticum, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 72. — China.
tomentosum, Hort. ex S. Mottet, in Rev. Hort. (1894) 459, in obs. = *Helichrysum rupestre*, DC.
Villarroeli, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 9. — Chili.
Weddellianum, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 57. — Bolivia.

GNAPHALODES, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 1046.

- amphibola*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 183 = *Micropus amphibolus*, A. Gray.
californica, Greene, l. c. = *M. californicus*, Fisch. et Mey.

GNEMON, Rumpf, Herb. Amboin. (1741) 1181 t. 71, 72; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 796 = **Gnetum**, Linn.

- amazonica*, cuspidata, latifolia, leptostachya, microstachya, neglecta, nigra, nodiflora, paniculata, urens, venosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 796 = *homonyma omnia* Gneti.
Brunoniana, Kuntze, l. c. = *Gnet. Gnemom*, Linn.
edulis, Kuntze, l. c. = *Gnet. scandens*, Roxb.
Griffithii, Kuntze, l. c. = *Gnet. Gnemom*, Linn.
indica, Kuntze, l. c. = *Gnet. funiculare*, Blume.
Leyboldii, Kuntze, l. c. = *Gnet. Leyboldi*, Tul.
ovalifolia, Kuntze, l. c. = *Gnet. Gnemom*, Linn.

GNETUM, Linn. (Gnet.). — Ind. Kew. i. 1046.

- costatum*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 13. — N. Guin.
macrostachyum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 642. — Penins. Mal.
microcarpum, F. Muell. in Bot. Centralbl. l. (1892) 195, nomen. — N. Guin.
ovalifolium, Karst. in Annal. Jard. Buit. xl. (1893) 215. — Ins. Ceram.
verrucosum, Karst. l. c. 216. — Archip. Mal.

GNIDIA, Linn. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 1046.

- anthylloides*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 265 in obs. = *Lasiosiphon anthylloides*, Meissn.
apiculata, Gilg, l. c. 263. — Afr. trop.
Bakeri, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 227 = *Dais gnidioides*, Baker.
Bojeriana, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 312. — Madag.
Buchananii, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 261. — Afr. trop. or.
Burchellii, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 229 = *Lasiosiphon Burchellii*, Meissn.
calocephala, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 265 in obs. = *Arthrosolen calocephalus*, C. A. Mey.
chrysantha, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 258. — Afr. centr. bor.
deserticola, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 263. — Afr. trop. or.
dichotoma, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 229. — Afr. austr.
djurica, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 268. — Afr. trop.
dshurica, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 228 = *praec.*
Emini, Engl. & Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 265. — Afr. trop.
fastigiata, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv (1894) 41. — Afr. trop.
Fischeri, Engl. & Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 266. — Afr. trop. or.
flava, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 258 in obs.; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 227 = *flava*, Lindl.?
genistifolia, Engl. & Gilg, l. c. 267. — Angola.
glaucula, Gilg, l. c. 265, in obs. = *Lasiosiphon glaucus*, Fresen.
glauescens, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 283 = *Arthrosolen glaucescens*, Oliver

GNIDIA : —

- gymnostachya*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 228 = *Arthrosolen gymnostachys*, C. A. Mey.
Hildebrandtii, Gilg, l. c. = G. *Hildebrandtii*, S. Elliot.
Hoepfneriana, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 268. — Afr. austro-occ. extratrop.
Holstii, Engl. & Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 257; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 226. — Afr. trop. or.
igneae, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 258. — Afr. trop. or.
katangensis, Gilg, & Dewevre, l. c. 276; et in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. 2. 1894 (1895) 105. — Congo austro-or.
lamprantha, Gilg, l. c. 264. — Afr. trop. or.
latifolia, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 283 = *Arthrosolen latifolius*, Oliver.
laxa, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 226 = *Arthrosolen laxus*, C. A. Mey.
leiantha, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 261. — Afr. trop.
macrorrhiza, Gilg, l. c. 264. — Afr. trop. occ.
madagascariensis, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 313. — Madag.
Mittuorum, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 260. — Afr. trop.
Oliveriana, Engl. & Gilg, l. c. 262. — Afr. trop. occ.
Poggei, Gilg, l. c. 259. — Afr. trop. occ.
polyantha, Gilg, l. c. 265. — Natal.
polycephala, Gilg, ex Engl. l. c. 138 et 264, in obs. = *Arthrosolen polycephalus*, C. A. Mey.
pubescens, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 314. — Madag.
Rehmannii, Szyszl., ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16. — Afr. austr.
rubrocincta, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 259. — Afr. trop. occ.
Schweinfurthii, Gilg, l. c. 261. — Afr. trop.
socotrana, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 228; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B (1895) 335 = *socotranum*, Balf. f.
spicata, Gilg, l. c. iii. 6a (1894) 228 = *Arthrosolen spicatus*, C. A. Mey.
stenophylla, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 258. — Afr. trop. or.
stenosiphon, Gilg, l. c. 258. — Afr. trop. bor.-or.
Stuhlmanni, Gilg, l. c. 266. — Afr. trop. or.
usinjensis, Gilg, l. c. 269. — Afr. trop. or.
Vatkeana, Engl. & Gilg, ex Gilg, l. c. 267. — Afr. trop.
- GNIDIOPSIS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 75 = **Gnidia**, Linn. (Thymel.).
albicans, Burmanni, *carinata*, *coriacea*, *decurrens*, *hypericina*, *juniperifolia*, *linoides*, *microcephala*, *monticola*, *obtusissima*, *oppositifolia*, *parviflora*, *scabra*, *stypelioides*, *subulata*, Van Tiegh. l. c. 76-77 = *homonyma omnia* Gnidiae.
insularis, Van Tiegh. l. c. 77 = *Lasiosiphon insulare*, Mig.

GOCHNATIA, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1047.

- australis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 834. — Chili.
Berteroana, Phil. l. c. 835. — Chili.
curviflora, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 337 = *Moquinia curviflora*, Griseb.
cuspidata, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 833. — Chili.
integerrima, Phil. l. c. — Chili.
laxiflora, Phil. l. c. 835. — Chili.
litoralis, Phil. l. c. 832. — Chili.
multiflora, F. Phil. ex Phil. l. c. 836. — Chili.
racemosa, Phil. l. c. 834. — Chili.
tarapacana, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 34. — Chili.

GODETIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).
micropetala, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 32; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 134. — Calif.**GODETIA** : —

- pulcherrima*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 217. — Calif.

GOEBELIA, Bunge = **Sophora**, Linn. (Legumin.).
reticulata, Freyn, & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 66. — As. Min.**GOETHEA**, Nees (Malv.). — Ind. Kew. i. 1048.
cauliflora, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 466 = *strictiflora*, Hook.**GOETZEA**, Wydl. (Solan.). — Ind. Kew. i. 1048.
Eggersii, Urban, ex Radlk. in Sitz. math.-phys. Akad. Muench. xix. (1889) 281 in syn. = *Coeleoneurum Eggersii*, Radlk.**GOLDBACHIA**, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1048.
lancifolia, Franch in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 408. — China.**GOLIONEMA**, « S. Wats. » ex O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 389 = **Oligonema**, S. Wats. (Compos.).
heterophylla, « S. Wats. » l. c. = O. *heterophylla*, S. Wats.**GOMIDESIA**, Berg = **Myrcia**, DC. (Myrt.).
Cerqueiria, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 78 (= *Cerqueiria Sellowiana*, Berg.). — Bras.
crocea, Niedenzu, l. c. 77 = *Jacquiniana*, Berg.
nitida, Niedenzu, l. c. = *Chamissoana*, Berg.**GOMPHANDRA**, Wall. (Olacin.). — Ind. Kew. i. 1049.
andamanica, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 115. — As. trop. ins.
comosa, King, l. c. 112. — Ins. Andam.
Cumingiana, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 229 [Cumingianus] = *Gomphandra Cumingiana* Villar.
gracilis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 115. — Perak.
javanica, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 217 = *Lasianthera javanica*, Miq.
lanceolata, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 112. — Penins. Mal.
lysipetala, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 139. — Borneo.
Maingayi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 114. — Penins. Mal.
mappioides, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 227. — Ins. Soemba (As. trop. or.).
nyssifolia, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 114. — Penins. Mal.
parviflora, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 218 = *Lasianthera parviflora*, Miq.
vitiensis, Valetton, l. c. 230 (= *Stemonurus vitiensis*, Seem.). — Ins.**GOMPHIA**, Schreb. (Ochn.). — Ind. Kew. i. 1049.
guatemalensis, Engl. ex T. Brigham, Guatem. App. (1887) 426, nomen. — Guatem.**GOMPHILUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 285.
SAPOTACEAE.
Martiana, Baill. l. c. (= *Lucuma gomphiaefolia*, Mart. et Miq.). — Bras.**GOMPHOCALYX**, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1887) 485. **RUTACEAE**.
herniarioides, Baker, l. c. 486. — Madag.**GOMPHOCARPUS**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1050.
acerateoides, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 16. — Afr. austr.
adscendens, Schlechter, l. c. — Afr. austr.
affinis, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 27. — Afr. austr.
alatus, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 51. — Afr. austr.**GOMPHOCARPUS** : —

- amoenus*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 124. — Angola.
arenarius, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 52. — Afr. austr.
asclepiaceus, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 7. — Afr. austr.
aureus, Schlechter, l. c. — Afr. austr.
auriculatus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 236 (= *Acerates auriculata*, Eugelm.). — Am. bor.
bisacculatus, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. App. (1896) 343, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 341. — Afr. austr.
brevipes, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 28. — Afr. austr.
concinus, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 270. — Afr. austr.
cornutus, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 132. — Afr. trop.
cucullatus, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 17. — Afr. austr.
cultriformis, Harv. ex Schlechter, l. c. 31 = *Asclepias cultriformis*, Schlechter.
dependens, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 125. — Angola.
depressus, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 29. — Afr. austr.
fallax, Schlechter, l. c. — Afr. austr.
foliosus, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 126. — Afr. trop.
fragrans, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 30. — Afr. austr.
Galpinii, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 18. — Afr. austr.
geminatus, Schlechter, l. c. 8. — Afr. austr.
geminiflorus, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 31. — Afr. austr.
glaucophyllus, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 19. — Afr. austr.
grandiflorus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 237 = *grandiflorus*, Decne.
Grantii, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 269, in obs. = *Schizoglossum Grantii*, Oliver.
Harveyanus, Schlechter, l. c. 270 = *Xysmalobium pedunculatum*, Harv.
insignis, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 32. — Afr. austr.
involutatus, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 8 = *Xysmalobium involutatum*, Decne.
longifolius, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 236 = *longifolius*, Spreng.
longifolius, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 9 = *Xysmalobium gomphocar-poides*, Decne.
macropus, Schlechter, in Journ. Bot. xxxi. (1894) 353. — Afr. austr.
meliodorus, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 33. — Afr. austr.
Meyerianus, Schlechter, l. c. — Afr. austr.
ochroleucus, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 30. — Natal.
orbicularis, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 34 = *Xysmalobium orbiculare*, E. Mey.
ovatus, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 20. — Afr. austr.
pachyglossus, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 35. — Afr. austr.
pachystephanus, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 52. — Afr. austr. extratrop.
Palmeri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 436. — Mexic.
palustris, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 127; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 115. — Angola.
parviflorus, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 35 = *Xysmalobium parviflorum*, Harv.
rectinervis, Schlechter, l. c. 38. — Afr. austr.
rhizophyllus, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 322. — Afr. trop. or.
rivularis, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 36. — Afr. austr.
robustus, Schlechter, l. c. 37, nomen. — Afr. austr.

GOMPHOCARPUS: —

- roseus, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 127; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 237. — Angola.
- scaber, K. Schum. l. c. 124 = rhizophyllus, *Engl.*
- Schinianus, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 356 in obs.; et l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 37. — Afr. austr.
- schizoglossoides, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 21. — Afr. austr.
- semiamplexens, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 128. — Afr. trop.
- simplex, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 21. — Afr. austr.
- spathulatus, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 269 in obs. = Schizoglossum spathulatum, K. Schum.
- stenoglossus, Schlechter, l. c. xxxii. (1894) 257; et in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 40 = Krebsia stenoglossa, Schlechter.
- stockenstromensis, Schlechter, l. c. 40 = Xysmalobium stockenstromensis, S. Elliot.
- suaveolens, Schlechter, l. c. 38. — Afr. austr.
- trachyphyllus, K. Schum. l. c. 237; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 237 (= *G. scaber*, K. Schum.), — Afr. trop. or.
- transvaalensis, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 22. — Afr. austr.
- trifurcatus, Schlechter, l. c. 9 = Woodia trifurcata, Schlechter.
- undulatus, Schlechter, l. c. 10 = Xysmalobium undulatum, R. Br.
- validus, Schlechter, l. c. 23. — Afr. austr.
- velutinus, Schlechter, l. c. 22. — Afr. austr.
- viridiflorus, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 236 = viridiflorus, Spreng.
- Woodii, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 258. — Afr. austr.

GOMPHOLOBIUM, Sm. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1050.

- Eatoniae, F. Muell. in *Vict. Natural.* vi. (May-June 1889) 38. — Austral.

GOMPHOSTEMMA, Wall. (Labiata). — Ind. Kew. i. 1051.

- Curtisii, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1891) ii. 315; et in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iii. 2 (1891) 266. — Penins. Mal.
- Hemsleyanum, Prain, ex Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 116. — Ind. angl.
- microcalyx, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1891) ii. 316; et in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iii. 2 (1891) 251. — Penins. Mal.
- rugosum, Prain, l. c. iii. 2 (1891) 262. — As. trop.
- Scortechinii, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1891) ii. 315; et l. c. 260. — Penins. Mal.
- Wallichii, Prain, l. c. cc. 314; et 245. — Ind. or.

GOMPHOSTIGMA, Turcz. (Logan.). — Ind. Kew. i. 1051.

- virgatum, Baill. *Hist. des pl.* ix. (1888) 348 = scoparioides, Turcz.

GOMPHRENA, Linn. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 1051.

- decipiens, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 437 = *G. Sonorae*, Torr.
- Nealleyi, Coult. & Fischer. in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. 349; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 362. — Texas.
- nitida, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1890) 48 = *G. Neallyi*, Coult. & Fisch.
- platandra, F. Muell. in *Trans. & Proc. Roy. Soc. Viet.* xxiii. (April 1887) 52. — Austral.
- Pringlei, Coult. & Fisch. in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 349. — Mexic.
- Tuerckheimii, Uline & Bray, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 161. — Guatem.

GONGORA, Ruiz & Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1053.

- flaveola, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 456. — Hab. ?

GONGRONEMA, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1053.

- glabriflora, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 411. — N. Guin.
- Welwitschii, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 145 = Sphaerocodon obtusifolium, Benth.

GONGYLOCARPUS, Cham. & Schlect. (Onagr.). — Ind. Kew. i. 1053.

- frutescens, M. K. Curran, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* i. (1888) 231 = *Gaura fruticulosa*, Benth.
- fruticulosus, T. S. Brandeg. l. c. Ser. II. ii. (1889) 158 t. 5 = *Gaura fruticulosa*, Benth.

GONIOLIMON, Boiss. = **Statice**, Tourn. (Plumbag.).

- Heldreichii, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien.* (1886) 241 = *S. Heldreichii*, Halácsy.

GONIOLOBIUM, G. Beek, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien.* Setz. (1890) 17; et *Fl. Nied.-Oest.* II. i. (1892) 478; Fritsch, in *Bot. Centralbl.* xliii. (1890) 13 = **Conringia**, Hist. (Crucif.).

- austriacum, G. Beck, l. c. cc. 19; et 479 = *C. austriaca*, Sweet.

GONIORRHACHIS, Taub. in *Flora*, lxxv. (1892) 77; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1892) 137. **LEGUMINOSAE**.

- marginata, Taub. l. c. — Bras.

GONIOTHALAMUS, Hook. f. & Thoms. (Anon.). — Ind. Kew. i. 1053.

- cauliflorus, K. Schum. in *K. Schum. & Hollv. Fl. Kais. Wilh. Land I* (1889) 48. — N. Guin.
- Curtisii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 75. — Perak.
- Kunstleri, King, l. c. 73. — Perak.
- mollis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 306. — Oceania.
- Prainianus, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 72. — Perak.
- Ridleyi, King, l. c. 76. — Singap.
- roseus, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 130. — Borneo.
- Scortechinii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1892) ii. 77. — Perak.
- stenopetalus, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 129. — Borneo.
- subvenius, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 71. — Perak.
- tenuifolius, King, l. c. — Perak.
- uvarioides, King, l. c. 78. — Malaya.
- Wrayi, King, l. c. — Perak.

GONOCARYUM, Miq. (Ins. sed.). — Ind. Kew. i. 1054.

- Harmandianum, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. xvii. (1892) t. 368a. — Cochinch.
- lobospermum, Valetton, Crit. overz. Olac. (1886) 249 [lobosperma] = *Phlebocalymna lobosperma*, F. Muell.
- longeracemosum, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1895) ii. 120. — Singap., Perak.
- subrostratum, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. xvii. (1892) t. 268b. — Cochinch.

GONOCRYPTA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 804 (err. cal. 84) = **Cryptolepis**, R. Br. (Thymel.).

- Grevei, Baill. l. c. — Madag.

GONOLOBUS, Michx (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1054.

- acuminatus, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 399. — Mexic.
- angustifolius, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 302. — Cuba.
- atratus, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 436. — Mexic.
- caudatus, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 399. — Mexic.
- chihuahuensis, A. Gray, l. c. 398. — Mexic.

GONOLOBUS: —

- ellipticus, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 222 [elliptica]. — Bolivia.
- guatemalensis, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 302 (= *G. velutinus*, J. D. Smith). — Guatem.
- Haussknechtii, K. Schum. l. c. — Mexic.
- petiolaris, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 396. — Mexic.
- scaber, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 302. — Venez.
- sororius, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 431. — Mexic.
- stenopetalus, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 39. — Mexic.
- suberiferus, Robinson, l. c. xxvii. (1893) 181. — Mexic.

GONYSTYLUS, Teijsm. & Binn. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 1054.

- affinis, Radlk., in *Sitz. Akad. Wiss. Muench.* xvi. (1886) 329. — Borneo.
- pluricornis, Radlk., l. c. — Borneo.
- Maingayi, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 200. — Malacca.

GONZALAGUNEA, Ruiz et Pav. fide Kuntze = **Gonzalea**, Pers. (Rubiace.).

- incanescens, nuda, parviflora, pulverulenta, secunda, tomentosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 284 = *homonyma omnia* Gonzaleae.

GONZALAGUNIA, Ruiz & Pav. = **Gonzalea**, Pers. (Rubiace.).

- hirsuta, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 291 = *Gonzalea spicata*, DC.
- mollis, Spruce, ex K. Schum. l. c. 290. — Ecuad.

GONZALEA, Pers. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1055.

- glabra, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 152. — Mexic.
- thyrsoides, F. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 188. — Guatem.

GOODENIA, Sm. (Gooden.). — Ind. Kew. i. 1055.

- cirrifica, F. Muell. in *Austral. Journ. Pharm.* (March 1886) 81. — Austral.
- Elderii, F. Muell. & Tate, in *Bot. Centralbl.* liii. (1893) 268. — Austral.
- fascicularis, F. Muell. & Tate, in *Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xiii. (1890) 108. — Austral.
- Forestii, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (Aug. 1892) 58; et (Sept. 1892) 63 [Forestii]; et in *Bot. Centralbl.* lii. (1892) 46. — Austral.
- Horniana, Tate & F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 82, nomen. — Austral.
- O'Donnellii, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* (Aug. 1886); et ex *Bot. Centralbl.* xxvii. (1886) 54. — Austral.
- Pumilla, R. Br. ex *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 30, sphalm = pumila, R. Br.
- pusilliflora, F. Muell. in *Vict. Natural.* v. (May 1888) 11; et in *Bot. Centralbl.* xxxv. (1888) 99. — Austral.
- Stephensoni, F. Muell. l. c. iii. (Feb. 1887) 138; et l. c. xxx. (1887) 242. — Austral.
- subintegra, F. Muell. l. c. v. (May 1888) 13. — Austral.
- Watsoni, F. Muell. & Tate, in *Bot. Centralbl.* liii. (1893) 268. — Austral.

GOODYERA, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1056.

- biflora, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 114. — Reg. Himal.
- cordata, Benth. ex Hook. f. l. c.; Hook. f. *Icon. pl.* xxii. (1894) t. 2187 (= *Georchis cordata*, Lindl.). — Ind. or.
- foliosa, Benth. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 113 (= *Georchis foliosa*, Lindl.). — Ind. or.
- formosana, Rolfe, ex Hemsl. in *Ann. Bot.* ix. (1895) 159. — Ins. Formos.
- fusca, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 112. — Reg. Himal.
- gracilis, Hook. f. l. c. 112. — Perak
- hachijoensis, Yatabe, in *Tokyo Bot. Mag.* v. (1891) 1 t. 19. — Japon.

GOODYERA : —

- papuaana, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 355. — N. Guin.
 Prainii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 112. — Assam.
 pendula, *Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersb.* xxxii. (1888) 623. — Japon.
 robusta, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 113. — Khasia.
 Rodigasciana, *L. Linden. in Illustr. Hort.* xxxiv. (1886) 175 t. 616. — N. Guin.
 vittata, *Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 113; *et Icon. pl.* xxii. (1894) t. 2185. — Reg. Himal.

GORDONIA, Ellis (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 1057.

- acuminata, *Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 58. — Ins. Philipp.
 Altamaha, *Sarg. in Gard. and For.* (1889) 616; *Dippel, Handb. Laubholz.* iii. (1893) 31 = pubescens, *L'Hérit.*
 axillaris, *Szyszl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 185 = anomala, *Spreng.*
 grandis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 203. — Perak.
 imbricata, *Ktng, l. c.* 204. — Perak.
 Lesiertii, *Szyszl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 185 = anomala, *Spreng.*
 luzonica, *Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 57. — Ins. Philip.
 multinervis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 205. — Perak.
 Scortechinii, *King, l. c.* 204. — Perak.
 Vidalii, *Szyszl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 185 (= *G. acuminata*, *Vidal*) — Ins. Philipp.

GOSSYPIANTHUS, Hook. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 1057.

- decipiens, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 543 = Hebanthe decipiens, *Hook. f.*
 guianensis, *Kuntze, l. c.* = *H. guianensis*, *Klotzsch.*
 Hookerianus, *Kuntze, l. c.* = *H. Hookeriana*, *Hemsl.*
 mollis, *Kuntze, l. c.* = *H. mollis*, *Hemsl.*
 subnudus, *Kuntze, l. c.* = *H. subnuda*, *Hemsl.*

GOSSYPIUM, Linn. (Malv.). — Ind. Kew. i. 1057.

- areysianum, *Defflers, Esq. géogr. bot.* (1895?) 49; *et in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 299, in syn. = *Fugosia areysiana*, *Defflers.*
 Harknessii, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 136. — Calif.
 lanceaeforme, *Miers, ex Britten, in Journ. Bot.* xxxi. (1893) 331. — Mexic.
 multiglandulosum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 10. — Chili.

GOTHOFREDA, Vent. = **Oxypetalum**, R. Br. (Asclep.).

- aqualiflora, albiflora, ampliflora, appendiculata, Arnotiana, Banksii, brevipes, Brunonis, capitata, coalita, coerulea, confertiflora, coriacea, corymbifera, crispa, densiflora, dentata, Dombeyana, erecta, eriantha, erostis, foliosa, glomerata, grandiflora, Guillemianiana, Hilariiana, incana, integriloba, Jacobinae, lagoensis, lanata, ligulata, linearis, Luschmalthii, lutescens, macrolepis, maritima, Martii, microphylla, microstemma, minarum, mollis, monantha, montana, mucronata, mutica, nigrescens, pachyglossa, pachygyna, pallida, paludosa, pannosa, pardensis, parviflora, patula, paupercula, pedicellata, propinqua, pulera, Schottii, Selloana, Siliculae, squamulata, stigmatosa, stricta, suaveolens, subhirtella, ternifolia, tomentosa, villosa, Wightiana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 419-20 = homonyma omnia *Oxypetali.*
 andina, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 220. — Bolivia.
 arachnoida, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 419 = *O. arachnoidum*, *Fourn.*
 birostrata, *Kuntze, l. c.* 420 = *O. Hookeri*, *Decne.*
 deltodea, *Kuntze, l. c.* = *O. deltoideum*, *Fourn.*

GOTHOFREDA : —

- Fournieriana*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 420 = *O. parvifolium*, *Fourn.*
 gracilis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, vii. (1893) 162. — Parag.
 multicaulis, *Kuntze, l. c.* = *O. campestre*, *Decne.*
 nitida, *Kuntze, l. c.* = *O. umbellatum*, *Gardn.*
 obliquifolia, *Kuntze, l. c.* = *O. saxatile*, *Decne.*
 oblongifolia, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, vii. (1893) 162. — Parag.
 probiscidia, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 420 = *O. proboscideum*, *Fourn.*
 solanodes, *Kuntze, l. c.* = *O. solanoides*, *Hook. & Arn.*
 ultima, *Kuntze, l. c.* = *O. multicaule*, *Fourn.*

GOUANIA, Jacq. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 1058.

- Bishopii, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 83. — Ins. Sandvic.
 Hillebrandii, *Oliver, ex Hillebr. l. c.* — Ins. Sandvic.
 Lehmannii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 41 — Columb.
 longispicata, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 256. — Afr. trop. or.
 mexicana, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 314. — Mexic.

GOULDIA, A. Gray (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1059.

- coriacea, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 168 (= *Petesia coriacea*, *Hook. & Arn.*) — Ins. Sandvic.
 hirtella, *Hillebr. l. c.* 169. — Ins. Sandvic.
 macrocarpa, *Hillebr. l. c.* 170. — Ins. Sandvic.
 terminalis, *Hillebr. l. c.* 168 (= *Petesia terminalis*, *Hook. & Arn.*) — Ins. Sandvic.

GOUPIA, Aubl. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1059.

- cinerascens, *Poepp. ex Baill. in Mart. Fl. Bras.* xiii. (1886) 372 = *Dichapetalum vestitum*, *Baill.*

GOVENIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1059.

- boliviensis, *Rolfe, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. 3 (1895) 263. — Bolivia.
 elliptica, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 153. —

GRADERIA, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1059.

- subintegra, *Mast. in Gard. Chron.* (1893) ii. 799 fig. 122. — Afr. austr.

GRAFFENRIEDA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1059.

- boliviensis, *Cogn. ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 28. — Bolivia.

GRAMMANTHES, DC. (Crassul.). — Ind. Kew. i. 1059.

- Heylandiana, *Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 162 (= *Umbilicus Heylandianus*, *Webb & Berth.*) — Ins. Canar.

GRAMMATOPHYLLUM, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1059.

- Cominsii, *Rolfe, in Ann. Bot.* v. (1891) 506. — Ins. Salom.
 Guilelmi, *Kraenzl. in Gartenfl.* (1894) 114. — N. Guin.
 leopardinum, *Reichb. f. in Flora*, lxxxii. (1888) 151. — Ins. Molucc.
 Seegerianum, *X, Hort. ex Gard. Chron.* (1891) ii. 49. — Hybr. artef.

GRAMMOSCIADIUM, DC. = **Chaerophyllum**, Linn. (Umbellif.).

- pauciradium, *Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 120 = *G. Aucheri*, *Boiss.*

GRANATUM, Rumph. = **Carapa**, Aubl. (Meliac.).

- guianense, *moluccense, nicaraguense, proserum, surinamense*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 110 = homonyma omnia *Carapae.*
 obovatum, *Kuntze, l. c.* = *C. moluccensis*, *Lam.*

- GRANTIA**, Griff. = **Wolffia**, Horkel (Lemn.).
 brasiliensis, *Mac Mill. Metasp. Minn.* (1892) 134 = *W. brasiliensis*, *Wedd.*
 columbiana, *Mac Mill. l. c.* 135 = *W. columbiana*, *Karst.*

GRANTIA, Boiss. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1060.

- senecionoides, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 317. — Arabia.

GRAPHISTEMMA, Champ. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1051.

- pictum, *Baill. Hist. des pl.* x. (1890) 253 = pictum, *Champ.*

GRAPHORCHIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. Paris (1809) 314-19; ex *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 661 = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).

- abyssinica, adamanensis, aloifolia, articulata, Arundinae, atrovirens, baginsensis, beravensis, bicarinata, bicolor, bracteosa, burmanica, caffra, callichroma, campestris, candida, cochlearis, comosa, concolor, cristata, densiflora, Dregeana, elata, ensata, exaltata, explanata, filiculis, Fitzalanii, flava, galbana, gracilis, graminea, guineensis, hians, holochila, Holtzei, lachnocheila, lamellata, lurida, lutea, macrobulbon, macrorhiza, macrostachya, maculata, madagascariensis, Mannii, Meleagris, micrantha, Milnei, natalensis, nuda, nutans, obtusa, ochreate, ovalis, parvilabris, Petersii, pileata, platyphala, pratenensis, pulchra, ramosa, reticulata, rupestris, Rutenbergiana, sanguinea, Saundersiana, scripta, sphaerocarpha, squalida, stachyodes, stenopetala, sumatrana, tenella, tristis, vaginata, venosa, venulosa, violacea, virens, Zeyheriana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 662 = homonyma omnia *Eulophiae.*
 bicolor, *Kuntze, l. c.* 663. = *E. herbacea*, *Lindl.*
 Blumeana, *Kuntze, l. c.* = *E. emarginata*, *Blume.*
 capensis, *Kuntze, l. c.* 662 = *E. barbata*, *Spreng.*
 ciliata, *Kuntze, l. c.* = *E. gracilis*, *Lindl.*
 clavicornis, *Kuntze, l. c.* = *E. hians*, *Spreng.*
 calographis, *Thou. ex Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 459 = *E. pulchra*, *Lindl.*
 cucullata, *Kuntze, l. c.* = *Polystachya grandiflora*, *Lindl.*
 decipiens, *Kuntze, l. c.* = *E. graminea*, *Lindl.*
 dipodiformis, *Kuntze, l. c.* = *E. dipodiformis*, *Reichb. f.*
 dubia, *Kuntze, l. c.* = *E. campestris*, *Wall.*
 emarginata, *Kuntze, l. c.* = *E. hians*, *Spreng.*
 flabellata, *Kuntze, l. c.* = *Cyrtopodium flabellatum*, *Spreng.*
 inconspicua, *Kuntze, l. c.* = *E. graminea*, *Lindl.*
 lissochilodes, *Kuntze, l. c.* = *E. lissochilodes*, *Lindl.*
 Monographis, *Thou. ex Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 459 = *E. scripta*, *Lindl. var.*
 odontoglossa, *Kuntze, l. c.* = *E. aculeata*, *Spreng.*
 ovalis, *Kuntze, l. c.* = *E. barbata*, *Spreng.*
 plantaginea, *Kuntze, l. c.* = *Cyrtopodium plantagineum*, *Benth.*
 rufa, *Kuntze, l. c.* (= *Cyrtopoda rufa*, *Thw.*) = sanguinea, *Lindl.*

GRATIOLA, [Rupp.]. Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1060.

- adenocaula, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Petersb.* xxxii. (1888) 513. — Japon.
 concinna, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 264. — N. Zel.
 mexicana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 159. — Mexic.

GRATWICKIA, F. Muell. in Chem. & Drug. Australas. (Nov. 1895); *et ex Bot. Centralbl.* lxiv. (1895) 445. **COMPOSITAE.**

- monochaeta, *F. Muell. fl. cc.* — Austral.

GRAVESIA, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1061.

- angustifolia, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 522. — Madag.
 Humblotii, *Cogn. l. c.* 521. — Madag.
 porphyrovalvis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 477; *Cogn. l. c.* 522. — Madag.
 primuloides, *Cogn. l. c.* 523. — Madag.

GRAVESIA : —

- pusilla, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 523. — Madag.
reticulata, *Cogn. l. c.* 521. — Madag.
Rutenbergiana, *Baill. ex Cogn. l. c.* 522. — Madag.

GRAVISIA, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1892) 298 = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).
chrysocoma, Mez, l. c. 301 = *Ae. chrysocoma*, Baker.
exsudans, Mez, l. c. 300 = *Ae. exsudans*, Baker.

GREENEA, Wight & Arn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1061.
corymbosa, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4. (1891) 37 = *G. Jackii*, Wight & Arn.

GREENEINA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 628 = **Helicostylis**, Tréc. (Urtic.).
affinis, Kuntze, l. c. = *H. Poeppigiana*, Trece.
Poeppigiana, Kuntze, l. c. = *H. Poeppigiana*, Trece.

GREENELLA, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 1061.
ramulosa, Greene, *Pittonia*, i. (May 1889) 302. — Calif.

GREENONIA, Webb & Berth. = **Sempervivum**. Rupp. (Crassul.).
ferrea, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 114 = *S. ferreum*, Christ.
polysphaericum, Webb, l. c. = *S. polysphaericum*, Christ.
quadrantal, Webb, l. c. = *S. Aizoon*, Christ.
rupifraga, Webb, l. c. = *S. rupifragum*, Christ.
sedifolia, Webb, l. c. 115 = *S. sedifolium*, Christ.

GREIGIA, Regel (Bromel.). — Ind. Kew. i. 1062.
vulcanica, Ed. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 563; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 13. — Columb.

GREVELLINA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1894) 1160. **MELIACEAE**.
scoparia, Baill. l. c. — Madag.

GREVILLEA, R. Br. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 1062.
Kennedyana, F. Muell. in *Trans. & Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 172. — Austral.
pinnatifida, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* ii. (1888) 52 (= *Kermadecia pinnatifida*, F. M. Bailey). — Austral.
Renwickiana, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. i. (Feb. 1887) 1105. — Austral.
scoparia, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas* (1893) t. 258. — Madag.
Van Houtteana, Hort. ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1889) sub t. 7070, in syn. = *asplenifolia*, Knight.
Williamsoni, F. Muell. in *Vict. Natural.* x. (Dec. 1893) 129. — Austral.

GREWIA, Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 1064.
aldabrensis, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 147. — Ins. Aldabr.
ambongensis, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 559. — Madag.
amplifolia, Baill. l. c. 558. — Madag.
astropetala, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* x. (1888) t. 161. — Cochinch.
Bakeriana, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 559. — Madag.
barombiensis, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 124. — Afr. trop. occ.
betulaefolia, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 548. — Madag.
Boehmiana, Fred. Hoffm. *Beitr. Kenntn.: Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 15. — Afr. centr.-or.
botryantha, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 557. — Madag.
bracteata, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 300. — Madag.
Celle, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 550. — Madag.
celtidifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 301. — Madag.

GREWIA : —

cernua, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 300. — Madag.
coerulea, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 263. — Afr. trop. or.
chalybaea, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas* (1888) t. 85. — Madag.
comorensis, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1885) — Ins. Comor.
conocarpa, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 264. — Afr. trop. or.
cyclea, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 559; et *Hist. pl. Madag., Atlas* (1888) 86. — Madag.
discolor, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 551. — Madag.
discolor, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 300. — Madag.
densa, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 122. — Afr. trop. or.
dubia, Defflers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 300. — Arabia.
elatostemoides, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 27. — Burma.
fallax, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 116. — Afr. trop. or.
flavicans, Boiv. ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 548. — Madag.
gonioclinia, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 119. — Afr. trop. or.
glyphaeoides, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 552. — Madag.
Hildebrandtii, Baill. l. c. 551. — Madag.
Humboldtii, Baill. l. c. 549. — Madag.
hypoglauca, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 263. — Afr. trop. or.
hypopetala, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* x. (1888) t. 157. — Cambod.
lavanalensis, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 548; et *Hist. pl. Madag., Atlas* (1888) t. 84. — Madag.
lorifolia, Baill. l. c. t. 83. — Madag.
mayottensis, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 557. — Madag.
minutiflora, Baill. l. c. 551. — Madag.
nodisepala, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 120. — Afr. trop. or.
nossibeensis, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 549. — Madag.
obovata, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 18; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 263. — Afr. trop. or.
oligandra, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* x. (1888) t. 163. — Cochinch.
pachycalyx, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 123. — Afr. trop. or.
pedunculata, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 263. — Afr. trop. or.
penninervis, Boiv. ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 552. — Madag.
Pervillei, Baill. l. c. 548. — Madag.
picta, Baill. l. c. 557. — Madag.
plagiophylla, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 119. — Afr. trop. or.
praecox, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 117. — Afr. trop. or.
Puttkameri, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 371. — Oceania.
Radula, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 299. — Madag.
repanda, Baker, l. c. — Madag.
rhytidophylla, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 122. — Afr. trop. or.
Richardiana, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 558. — Madag.
Schinzii, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 124. — Afr. austro-occ. extratrop.
serrata, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 549. — Madag.
similis, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 118. — Afr. trop. or.
Stuhlmannii, K. Schum. l. c. 121. — Zanzib.
tiliaecarpa, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 552. — Madag.
triflora, Baill. l. c. 587 (= *Vincentia triflora*, Boj.). — Madag.

GREWIA : —

tristis, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 116. — Afr. trop. or.
viscosa, Boiv. ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 557. — Madag.
zizyphifolia, Baill. l. c. 550. — Madag.

GREYIA, Hook. & Harv. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 1065.

Flanagani, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) sub t. 2349, in text. — Afr. austr.
Flanigani, Bolus, l. c. t. 2349, sphalm. = *praec.*
Radlkoferi, Szyszyl. *Pl. Rehmann.* ii. (1888) 49 — Transvaal.

GRISAS, Linn. (Myrt.). — Ind. Kew. i. 1065.
tetrapetala, Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1892) 39 = *Aubletiana*, Miq.

GRIELUM, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 1066.
Marlothii, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 16. — Afr. austro-occ. extratrop.

GRIFFONIA, Baill. = **Bandeiraea**, Welw. (Legum.).
speciosa, Taub. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 147 = *B. speciosa*, Welw.

GRINDELIA, Willd. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1066.

camporum, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 171. — Calif.
Hendersoni, Greene, *Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 18. — Am. bor. occ.
lanata, Greene, l. c. ii. (Sept. 1892) 290 — Am. bor. occ.
montana, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 429. — Chili.
paludosa, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 172. — Calif.
patens, Greene, *Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 290; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 172. — Calif.
procera, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 172. — Calif.
tarapacana, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 38. — Chili.

GRISELINIA, Forst. f. (Cornac.). — Ind. Kew. i. 1067.

alata, Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 163 — Chili.
jodiniifolia, Taub. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 390 = *Decostea jodiniifolia*, Griseb.
racemosa, Taub. l. c. = *D. racemosa*, Phil.
ruscifolia, Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 167; K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1894) 779 = *D. ruscifolia*, Clos.
ruscifolia, Taub. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 391 = *praec.*
scandens, Taub. l. c. 398 = *Decostea scandens*, Ruiz & Pav.

GROBYA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1067.
fascifera, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 551. — Hab. ?

GRUMILEA, Gaertn. = **Psychotria**, Linn (Rubiace.).

exserta, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 392. — Afr. trop. or.
lauracea, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.
nesophila, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 116 = *nesophila*, F. Muell.
platyphylla, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 392. — Afr. trop. or.
Purtschelleri, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 401. — Afr. trop.
serpens, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 116 = *P. serpens* Linn.
stricta, K. Schum. l. c. — N. Guin.

GRUSONIA, Hort. Nicolai, ex K. Schum. in *Monatschr. f. Kakteen* iv. (1894) 110. **ACTEAE**.
cereiformis, Hort. Nicolai, ex K. Schum. l. c. — Hab. ?

GUADELLA, Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 676, *GRAMINEAE*.
marantifolia, Franch. l. c. — Gabon.

GUAIAECUM, Plum. ex Linn. (Zygophyll.). — Ind. Kew. i. 1068.
guatemalense, Herb. Kew. ex T. Brigham, Guatem., App. (1887) 427, nomen. — Guatem.

GUAJAVA, Moehr. = **Psidium**, Linn. (Myrtac.).
acutangula, aeruginea, alata, albida, amplexicaulis, anceps, anthomega, arborea, aquatica, argentea, australis, basantha, Benthiana, buxifolia, ciliata, cinerea, costaricensis, crenata, cuneata, cuprea, decussata, densicoma, Doniana, elegans, firma, fluvialis, Gardniana, glaucescens, grandifolia, herbacea, hians, humilis, inaequilatera, incanescens, indica, itanarensis, lactea, lanceolata, Langsdorffii, Larnotteana, laurifolia, leptoclada, marahensis, macrosperma, maronhensis, mengahiensis, microcarpa, mollis, montana, Moritziana, Myrsinites, nutans, oblongata, oblongifolia, Oerstediana, oligosperma, ovoidea, ovatifolia, parvifolia, paranensis, parviflora, persicifolia, Poliana, polycarpa, humilis, radicans, refracta, rhombea, Richardiana, Riedeliana, riparia, robusta, rubescens, Ruiziana, salutaris, Schiedeana, sericea, Sieberiana, sorocabensis, Sprucei, suffruticosa, turbiniflora, umbrosa, Widgreniana, ypanemensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 239-40 = *homonyma omnia* Psidii.
Berteroana, Kuntze, l. c. 240 = *P. Berterianum*, Berg.
campomanesiodes, Kuntze, l. c. = *P. campomanesiodes*, Berg.
Cattleiana, Kuntze, l. c. 239 = *P. Cattleianum*, Sabine.
guajabita, Kuntze, l. c. 240 = *P. Guajabita*, A. Rich.
guineensis, Kuntze, l. c. 239 = *P. Araça*, Raddi.
maritensis, Kuntze, l. c. = *P. maritense*, Mart.
multiflora, Kuntze, l. c. = *Campomanesia multiflora*, Blume.
myrsinodes, Kuntze, l. c. = *P. myrsinoides*, Berg.
obovata, Kuntze, l. c. = *P. Cattleianum*, Sabine.
myrtoides, Kuntze, l. c. = *P. myrtoides*, Berg.
pilosa, Kuntze, l. c. = *P. rufum*, Mart.
pyrifera, Kuntze, l. c. = *P. Guajava*, Linn.
salicifolia, Kuntze, l. c. 240 = *P. crenatum*, Berg.
striatula, Kuntze, l. c. 239 [sphalm. *triatula*] = *P. striatulum*, DC.

GUAPEBA, Gomez = **GUAPEIBA**, Gomez = **Lucuma**, Juss. (Sapot.).
amazonica, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 43 = *Pouteria*, amazonica, Radlk.
Cainito, Pierre, l. c. 42 = *L. Cainito*, A. DC.
coriacea, Pierre, l. c. — Bras.?
crassifolia, Pierre, l. c. 43 = *Pouteria amazonica*, Radlk.
fragans, Pierre, l. c. 41. — Parag.
Glazioviana, Pierre, l. c. 43, nomen. — Bras.
glomerata, Pierre, l. c. = *L. glomerata*, Miq.
gomphiaefolia, Pierre, l. c. 43 = *Pouteria gomphiaefoliae*, Radlk.
laevigata, Pierre, l. c. 42 = *L. laevigata*, A. DC.
lasiocarpa, Pierre, l. c. = *L. lasiocarpa*, A. DC.
lucens, Pierre, l. c. 43 = *L. lucens*, Mart. & Miq.
nerifolia, Pierre, l. c. 42 = *L. nerifolia*, Hook. & Arn.
nitida, Pierre, l. c. = *L. nitida*, A. DC.
ochrosperma, Pierre, l. c. 43 = *Pouteria amazonica*, Radlk.
parinarioides, Pierre, l. c. = *L. parinarioides*, Radlk.
psammophila, Pierre, l. c. 42 = *L. psammophila*, A. DC.
salicifolia, Pierre, l. c. = *Labatia salicifolia*, Mart.
semecarpifolia, Pierre, l. c. 43, nomen. — Ins. Martin.
stylosa, Pierre, l. c. 42. — Panama.
torta, Pierre, l. c. 43 = *L. torta*, A. DC.

GUARDIOLA, Cerv. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1068.
rotundifolia, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 317. — Mexic

GUAREA, Allem. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 1068.
Balansae, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 568. — Parag.

Bilibil, C. DC. l. c. 570. — Columb.
dumetorum, C. DC. l. c. 569. — Parag.
frutescens, C. DC. l. c. 567. — Parag.
Jaeggiana, C. DC. l. c. 570. — Bras.
leucantha, C. DC. l. c. 568. — Parag.
L'Herminieri, C. DC. l. c. 571. — Ins. Guadal.
Luxii, C. DC. ex J. D. Smith. in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 2. — Guatem.
nemorensis, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 569. — Parag.
Palmeri, N. E. Rose, ex C. DC. in Coult. l. c. xix. (1894) 39. — Mexic.

GUATTERIA, Ruiz & Pav. (Anon.). — Ind. Kew. i. 1069.
grandiflora, J. D. Smith. in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 25. — Guatem.

GUAZUMA, Plum. ex Adans. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 1070.
Guazuma, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 95 = *tomentosa*, H. B. & K.

GUERKEA, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 180. *APOCYNACEAE*.
floribunda, K. Schum. l. c. — Gabon.

GUETTARDA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1070.
costaricensis, K. Schum. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1895) 7, nomen. — Costarica.
Leai, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 40. — Ins. Fernando Noronha.
macrosperma, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 204. — Guatem.

GUIDONIA, P. Br. = **Laetia**, Adans. (Bixin.).
apetala, calophylla, coriacea, corymbulosa, cupulata, lucida, procera, suaveolens, Thammia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *homonyma omnia* Laetiae.
icosandra, Kuntze, l. c. = *L. Guidonia*, Sw.
serrata, Kuntze, l. c. = *Aphloia mauritiana*, Baker.
ternstroemioides, Kuntze, l. c. = *L. ternstroemioides*, Griseb.

GUIDONIA, Plum. ex Adans. = **Casearia**, Jacq. (Samyd.).
amplissima, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 567 = *C. amplissima*, Tul.
elliptica, Baill. l. c. = *C. elliptica*, Tul.
fragilis, Corderm. Fl. Ile Réunion (1895) 357 = *C. fragilis*, Vahl.
nigrescens, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 567 = *C. nigrescens*, Tul.
ovata, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 379. — Afr. trop. occ.
Tulasneana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 567. — Madag.

GUILLANDINODES, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 190 = **Schotia**, Jacq. (Legumin.).
brachypetalum, capitatum, Forbesianum, latifolium, Kuntze, l. c. 190 = *homonyma omnia* Schotiae.
afum, Kuntze, l. c. 190 = *S. speciosa*, Jacq.
humboldtoides, Kuntze, l. c. = *S. humboldtoides*, Oliver.

GUIOA, Cav. = **Cupania**, Linn. (Sapind.).
arterifolia, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 357. — N. Guin.
cambodiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. xx (1894) t. 317a. — Cochinch.
comesperma, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 357. — N. Guin.
curvidens, Radlk. l. c. 359. — N. Guin.
dictyophylla, Radlk. l. c. 360. — N. Guin.
hospita, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 346. — N. Guin.
macropetala, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 357. — N. Guin.
platycarpa, Radlk. l. c. 359. — N. Guin.
plurinervis, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 346. — N. Guin.
subserata, Radlk. in Sitz. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 358. — N. Guin.

GULDENSTAEDTIA, Dum. = **Gueldenstaedtia**, Fisch. & Mey. (Legumin.).
yunnanensis, Franch. Pl. Delav. (1890) 164 t. 40. — Yunnan.

GUMIRA, Rumph. = **Premna**, Linn. (Verben.).
abbreviata, acuminata, adenosticta, amplexens, attenuata, barbata, bengalensis, bracteata, cardiophylla, ceramensis, cordifolia, coriacea, corymbosa, Cumingiana, cyclophylla, Dallachyana, divaricata, esculenta, ferruginea, flavescens, grossa, herbacea, hispida, integerrima, interrupta, japonica, khasiana, laevigata, leucostoma, limbata, longifolia, lucidula, macrophylla, marianarum, micrantha, microphylla, milleflora, nauseosa, nitida, oblongata, opulifolia, philippinensis, pinguis, procumbens, pubescens, punctulata, punduana, purpurascens, pyramidata, quadrifolia, racemosa, resinosa, scandens, senensis, taitensis, Thwaitesii, vestita, villosa, Wightiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 507-08 = *homonyma omnia* Premnae.
mollissima, Kuntze, l. c. 508 = *P. latifolia*, Roxb.
odorata, Kuntze, l. c. = *P. pubescens*, Blume.
thyrsodea, Kuntze, l. c. = *P. thyrsodea*, Wight.
trichostoma, Kuntze, l. c. = *P. parasitica*, Blume.
truncata, Kuntze, l. c. = *P. corymbosa*, Rottl. & Willd.
viburnodes, Kuntze, l. c. = *P. viburnoides*, A. Rich.

GUNDELIA, [Tourn.]. Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1072.
tenuisecta, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 168. — Armen.

GUNNERA, Linn. (Halorag.). — Ind. Kew. i. 1072.
arenaria, Cheesem. ex T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 348. — N. Zel.
dentata, T. Kirk, l. c. 346. — N. Zel.
elongata, T. Kirk, l. c. 345 = *flavida*, Colenso.
microcarpa, T. Kirk, l. c. 348. — N. Zel.
mixta, T. Kirk, l. c. 344. — N. Zel.
ovata, Petrie, l. c. xxv. 1892 (1893) 274 = *mixta* & *flavida*, Colenso.

GUNNIOPSIS, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 44 = **Aizoon**, Linn. (Ficoid.).
quadrifaria, Pax, l. c. = *A. quadrifarium*, F. Muell.

GURANIA, Cogn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 1072.
boliviana, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 38. — Bolivia.
Cogniauxiana, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, iv. (1894) 16 t. 4. — Bras.
Donnell-Smithii, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 10. — Guatem.
macrophylla, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, iv. (1894) 10 t. 3. — Bras.

GUSSONIA, Spreng. = **Actinostemon**, Mart. (Euphorb.).
angustifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 606 = *A. caribaeus*, Griseb.?
australis, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon australis*, Muell. Arg.). — Bras.
brasiliensis, Kuntze, l. c. = *A. Sprengelii*, Baill.
bundiana, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon Lundianus*, Didr.). — Bras.
cuneata, Kuntze, l. c. = *A. cuneatus*, Baill.
desertorum, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon desertorum*, Muell. Arg.). — Bras.
echinata, Kuntze, l. c. = *A. echinatus*, Muell. Arg.
estrellensis, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon estrellensis*, Muell. Arg.). — Bras.
Gardneri, Kuntze, l. c. (= *D. Gardneri*, Muell. Arg.). — Bras.
grandifolia, Kuntze, l. c. (= *D. grandifolius*, Klotzsch) = *A. Klotzschianus*, Baill.
imbricata, Kuntze, l. c. = *A. imbricatus*, Muell. Arg.
lagoensis, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon lagoensis*, Muell. Arg.). — Bras.
lanceolata, Kuntze, l. c. = *A. lanceolatus*, Saldanka.
lasiocarpa, Kuntze, l. c. = *A. lasiocarpus*, Baill.

GUSSONIA: —

Leptopus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 606 (= *Dactylostemon leptopus*, Muell. Arg.). — Bras.
macrocarpa, Kuntze, l. c. = *A. macrocarpus*, Muell. Arg.
mandiocana, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon mandiocanus*, Muell. Arg.). — Bras.
multiflora, Kuntze, l. c. = *A. caribaeus*, Griseb.
oligandra, Kuntze, l. c. = *A. oligandrus*, Baill.
sparsifolia, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon sparsifolius*, Muell. Arg.). — Bras.
trachycarpa, Kuntze, l. c. = *A. trachycarpus*, Muell. Arg.
verticillata, Kuntze, l. c. *A. verticillatus*, Baill.

GUSTAVIA, Linn. (Myrt.). — Ind. Kew. i. 1073.

hexapetala, Hook. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 669 = *antillana*, Miess.

GUTENBERGIA, Sch. Bip. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1073.

leiocarpa, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. C (1895) 402. — Afr. trop. or.

GUTIERREZIA, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1073.

baccharoides, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 428. — Chili.
compacta, Phil. l. c. 427. — Chili.
copiapina, Phil. l. c. 425. — Chili.
Iserni, Phil. l. c. 427 (= *Brachyris Iserni*, Phil.). — Chili.
paniculata, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 281; et xviii. (1894) 444 [an *G. paniculata*, A. Gray?]. — Chili.
Sarothrae, Britton & Rusby, in Trans. N. Y. Acad. Sci. vii. (1887) 10 = *G. Enthamia*, Torr. & Gray.
Sarothrae, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 341 = *praec. spatulata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 426. — Chili.
taftalensis, Phil. l. c. — Chili.

GUZMANIA, Ruiz & Pav. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 1074.

angustifolia, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 62 = *Caraguata angustifolia*, Baker.
Bulliana, Ed. André, in Rev. Hort. (1886) 324 = *C. angustifolia*, Baker.
crispa, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1887) 173; et Handb. Bromel. (1889) 153. — N. Granat.
Furstenbergiana, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 61 = *Caraguata Furstenbergiana*, Kirch. & Wittm.
grandis, Hort. Lind. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 50 = *Aechmea mexicana*, Baker.
imperialis, Hort. ex Ed. André, Bromel. Andrean. (1889) 96, in syn. = *Tillandsia nigrescens*, Ed. André.
Kraenzliniana, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 62. — Columb.
maculata, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 47 = *Aechmea augusta*, Baker.
spectabilis, Hort. ex Baker, l. c. 51 = *Aechmea spectabilis*, Brongn.

GYMINDA, Sarg. in Gard. and For. iv. (1891) 4 = **Myginda**, Jacq. (Celastr.).

Grisebachii, Sarg. l. c. = *M. integrifolia*, Poir.

GYMNACRANTHERA, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) [94.] **MYRISTICACEAE**.

GYMNADENIA, R. Br. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

Aschersoni ×, Bruegg. & Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 175. — Helv.
Aschersonianana, « Bruegg. & Killias » ex Nym. Consp. Fl. Europ. Suppl. ii. i. (1889) 293 = *praec.*
cyclochila, Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 396 = *H. cyclochila*, Franch. & Sav.
Heuffleri ×, Wettst. in Ber. Deutsch. bot. Ges. vii. (1889) = *H. nigra*, R. Br.
Le Grandiana ×, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 217. — Gall.

GYMNADENIA: —

Mac Owaniana, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 46 = *Brachycorythis* Mac Owaniana, Reicheb. f.
micrantha, Wettst. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1889) 308 = *micrantha*, Kern.
nigra, Wettst. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien (1889) 83; et in Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1889) 308 = *H. nigra*, R. Br.
pyrenaica, Giraudias, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 479 = *pyrenaica*, Philippe.
rubra, Wettst. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1889) 83; et in Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1889) = *Nigritella rubra*, C. Richt.
sesamoides, Parish, in Grant, Orchids of Burma, (1895) 326. — Burma.
souppensis ×, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 167; et Atlas Occh. env. Paris t. 35. — Gall.
Stracheyi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 128. — Reg. Himal.
suaveolens, Wettst. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1889) 317 in obs. = *H. nigra*, R. Br.

GYMNAGATHIS, Stapf, in Ann. Bot. vi. (1892) 315. **MELASTOMACEAE**.

peperomifolia, Stapf, l. c. (= *Sonerila peperomifolia*, Oliver). — China.

GYMNANTHERA, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1075.

paludosa, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 213 = *Dicerolepis paludosa*, Blume.

GYMNEMA, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1075.

cuspidatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 420 = *pergularioides*, Wight & Gardn.
cuspidatum, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 284 = *praec.*
longepedunculata, Schweinf. in Hoehnel, zum Rudolph See. App. (1892) 8 [longepedunculatum]. — Afr. trop.
parvifolium, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped., App. (1886) 343. nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 342. — Afr. trop. or.

GYMNIGRITELLA ×, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 484 (Orchid.).

Heuffleri ×, G. Camus, l. c. (= *Nigritella*, Heuffleri, Kern.) = *Habenaria nigra*, R. Br.
suaveolens ×, G. Camus, l. c. (= *Nigritella suaveolens*, Koch) = *H. nigra*, R. Br.

GYMNOCARPOS, Forsk. (Illecebr.). — Ind. Kew. i. 1076.

salsoloides, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 104. — Ins. Canar.

GYMNOLOMIA, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1076.

canescens, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 174. — Mexic.
decumbens, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 165. — Mexic.
decurrens, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90. — Mexic.
Ehrenbergiana, Klatt, l. c. — Mexic.
hirsuta, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 42. — Ecuad.
Liebmännii, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90. — Mexic.
rudis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 424. — Mexic.
sericea, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90. — Mexic.
silvatica, Klatt, l. c. xxv. (1889) 104; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxi. (1893) 199 [silvatica]. — Costarica.
tripartita, Robinson, & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 154. — Mexic.

GYMNOLUMA, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 292 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

glabrescens, Baill. l. c. = *L. glabrescens*, Mart. & Eichl.

GYMNOPENTZIA, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1076.

pilifera, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 26. — Natal.

GYMNOPETALUM, Arn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 1076.

leucostichum, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned Indië, I. ii. (1890) 595 = *leucostictum*, Miq.

GYMNOPOGON, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1077.

ambiguus, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 69 = *racemosus*, Beauv.
mesense, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. 2 (1894) 32. — Abyss.
rupestre, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 73 — Ins. Fernando Noronha.

GYMNOSIPHON, Blume (Burm.). — Ind. Kew. i. 1077

Trinitatis, Fohow, in Pringsh. Jahrb. xx. (1889) 477. — Ins. Trinit.
usambaricus, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 138. — Afr. trop. or.

GYMNOSPORA, Benth. & Hook. f. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1077.

acuminata, Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 32 = *Celastrus acuminatus*, Linn.
ambonensis, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 231 — Afr. trop. or.
Bachmannii, Loes. l. c. 232. — Afr. austro-occ.
buxifolia, Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 34 = *Celastrus buxifolius*, Linn.
crenulata, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 38. — Afr. austro-occ. extratrop.
cuneifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 460. — Madag.
fasciculata, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 232 (= *Catha fasciculata*, Tul.). — Malaya.
gracilipes, Loesen, in Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. C (1895) 246 = *gracilipes*, Welw.
gracilis, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. xix. (1893) t. 304b. — Cochinch.
huillensis, Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 35 = *Celastrus huillensis*, Welw.
laurina, Szyszyl. l. c. = *C. laurinus*, Thunb.
luteola, Szyszyl. l. c. = *C. luteolus*, Delile.
mekongensis, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. xix. (1893) t. 303a. — Cochinch.
nemorosa, Szyszyl. l. c. = *C. nemorosus*, Eckl. & Zeyh.
obscura, Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. B (1895) 509, nomen. — Afr. trop.
pallida, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 32. — Burma.
polyacantha, Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 33 = *Celastrus polyacanthus*, Sond.
putterlickioides, Loesen, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 25 et 51. — Afr. trop.
Rehmannii, Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 34. — Natal.
Schlechteri, Loesen, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 193. — Afr. austr.
stylosa, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. xix. (1893) t. 304a. — Cochinch.
tenuispina, Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 33 = *Celastrus tenuispinus*, Sond.
undata, Szyszyl. l. c. 33 = *C. undatus*, Thunb.
Woodii, Szyszyl. l. c. 35. — Natal.
Zeyheri, Szyszyl. l. c. 33 = *Cel. Zeyheri*, Sond.

GYMNOSTACHYUM, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1077.

decurrens, Stapf, in Kew Bull. (1894) 357. — Pahang.

GYMNOTHRIX, Spreng. = **GYMNOTRIX**, Beauv. = **Pennisetum**, Pers. (Gramin.).

cladodes, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 123, in syn. = *P. glaucifolium*, Hochst.

GYNANDRIRIS, Parl. = **Iris**, Tourn.

sicula, Todaro, Hort. bot. Panorm. ii. (1890) 43 in syn. (*Gynandrisis*) = *Moraea sicula*, Todaro.

GYNERIUM, Humb. & Bonpl. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1078.
triaristatum, Sodiolo, *Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 8, nomen. — Ecuad.
Wolfii, Sodiolo, l. c. — Ecuad.

GYNOCHTHODES, Blume (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1079.
tetrandra, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 284 = *sublan- ceolata*, Miq.

GYNOPLEURA, Cav. (Passifl.). — Ind. Kew. i. 1079.
rugosa, Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1886) 159 (= *Malesherbia rugosa*, C. Gay). — Chili.

GYNOPOGON, Forst. = **Alyxia**, Banks (Apocyn.).
acuminatus, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151. — N. Guin.
brevipes, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 776. — N. Caled.
buxifolius, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. buxifolia*, R. Br.
calceoides, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 781. — N. Caled.
celastrinus, Baill. l. c. [*celastrinum*] — N. Caled.
clusiophyllus, Baill. l. c. [*clusiophyllum*] — N. Caled.
coriaceus, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. coriacea*, Wall.
erythrocarpus, K. Schum. l. c. = *A. erythrocarpa*, Vathe.
fascicularis, K. Schum. l. c. 151 = *A. fascicularis*, Benth.
gracilis, K. Schum. l. c. = *A. gracilis*, Benth.
ilicifolius, K. Schum. l. c. = *A. ilicifolia*, F. Muell.
Labillardieri, K. Schum. l. c. = *A. stellata*, Roem. & Schult.
laurinus, K. Schum. l. c. = *A. laurina*, Gaudich.
laurinus, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 781 [*laurinum*]. — N. Caled.
madagascariensis, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. madagascariensis*, A. DC.
Microbuxus, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 776. — N. Caled.
pumilus, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. pumila*, Hook. f.
rosmarinifolius, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 781 [*rosmarinifolium*]. — N. Caled.
rubricaulis, Baill. l. c. 776. — N. Caled.
ruscifolia, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. ruscifolia*, R. Br.
sapiifolius, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 775 [*sapiifolium*]. — N. Caled.
semperflorens, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. semperflorens*, Panch. [fide Kuntze].
stellatus, Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 171, in nota [*stellatum*] = *stellatum*, Forst.
suavis, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 775 [*suave*]. — N. Caled.
torquatus, l. c. 781. — N. Caled.
zeylanicus, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. ceylanica*, Wight.

GYNOSTEMMA, Blume (Curcubit.). — Ind. Kew. i. 1079.
cardiosperma, Cogn. ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2225. — China.

GYNOXYS, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1079.
Hallii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 64. — Ecuad.
nervosa, Hieron. l. c. xxi. (1895) 354. — N. Granat.
psilophylla, Klatt, in *Annal. Natürl. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 357. — Bolivia.
Stuebelii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 355. — Ecuad.
Trianae, Hieron. l. c. 353. — N. Granat.

GYNURA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1079.
auriculata, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 426. — Angola.
aurita, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 151. — China.
coerulea, O. Hoffm. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 86. — Afr. austro-occ. extratrop.
Fischeri, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 416. — Afr. trop. or.
Meyeri-Johannis, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.
purpurascens, Vidal, *Rev. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 164. — Ins. Philip.
scandens, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 416. — Afr. trop. or.
sonchifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 495. — Madag.
Valeriana, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1507; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 339. — Afr. trop. or.
zeylanica, Trim. *Handb. Fl. Ceyl.* iii. (1895) 44; et *Pl. illustr. Handb. Fl. Ceylon* (1895) t. 58. — Zeyl.

GYPSOPHILA, Linn. (Caryophyll.). — Ind. Kew. i. 1080.
antilibanotica, Post, *Pl. Postianae*, ii. (1891) 6. — Syria.
arsusiana, Williams, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 322 (= *Ankyropetalum arsiusianum*, Kotschy). — Syria.
bioculata, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2332. — Persia.
capillipes, Freyn & Sint. ex Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 363. — As. Min.
coelosyriaca, Williams, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 322. (= *Ankyropetalum coelosyriacum*, Boiss. & Hausskn.). — Oriens.
digena X. Borb. in *Termész. Füzet.* xiii. (1890) 84. — Hung.
Haussknechti, Boiss. *Fl. Or., Suppl.* (1888) 86. — Mesopot.
herniarioides, Boiss. l. c. 84. — Afghan.
hygrophila, Post, *Pl. Postianae*, ii. (1891) 6. — Syria.
hungarica, Borb. in *Doerfler, Herb. norm., Sched. ad Cent.* xxxi. (1894) ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 462 = *paniculata*, Linn.
Jaubertiana, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 89 (= *G. sphaerulifolia*, Boiss.). — As. Minor.
laconica, Boiss. & Heldr. ex Boiss. l. c. 88. — Graecia.
lignosa, Hemsl. & Lace, in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) 322. — Belutch. brit.
pallida, Stapf, in *Denkschr. Acad. Wien* (1886) 13. — Persia.
pinifolia, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 87. — As. Min.
platyphylla, Boiss. l. c. — Turkest.
producta, Stapf, in *Denkschr. Acad. Wien* (1886) 12. — Persia.
pulchra, Stapf, l. c. 13. — Persia.
Raddeana, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* x. () 698; et in *Gartenfl.* xli. (1892) 89 fig. 3-8. — Turkest.
Reuteri, Williams, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 322 (= *Ankyropetalum Reuteri*, Boiss. & Hausskn.). — Oriens.

GYROSTACHYS, Pers. = **Spiranthes**, Rich. (1818) (Orchid.).
aculata, *aguacatensis*, *apiculata*, *aprica*, *Arrabidae*, *assurgens*, *aurantiaca*, *balanophorostachya*, *bicola*, *bonariensis*, *bracteosa*, *brevifolia*, *brevilabris*, *campe- rum*, *cerma*, *chilensis*, *chlorops*, *cinnabarina*, *comosa*, *congesta*, *costaricensis*, *cuculligera*, *cuspidata*, *dilatata*, *ensifolia*, *Eugenia*, *gracilis*, *graminea*, *grandiflora*, *guttuosa*, *hemichroa*, *hirta*, *homalogastra*, *inaequila- tera*, *latifolia*, *Lindleyana*, *lineata*, *longilabris*, *longi- petiolata*, *lupulina*, *macrantha*, *macrostachya*, *ma- drensensis*, *Mandonii*, *mechoacana*, *minor*, *minutiflora*, *montana*, *nesophila*, *neuroptera*, *odorata*, *oestriifera*, *orthosepala*, *ovalis*, *pauciflora*, *peruviana*, *picta*, *plan- taginea*, *polyantha*, *porrifolia*, *prasophylla*, *pterygan- tha*, *pyramidalis*, *ramentacea*, *rubestris*, *saccata*, *sagittata*, *sancita*, *Schaffneri*, *Scopulariae*, *simplex*, *Smithii*, *stylites*, *tenuis*, *thelymitra*, *trilineata*, *trunca- ta*, *vaginata*, *vernalis*, *villosa*, *Warmingii*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 663-64 = *homonyma omnia Spi- rantheos*.
aphylla, Kuntze, l. c. 664 = *S. orchioides*, A. Rich.

GYROSTACHYS: —
chloriformis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 664 = *S. chloreaeformis*, A. Rich. & Gal.
Funkiana, Kuntze, l. c. = *S. Funkiana*, A. A. Rich. & Gal.
gemmaifera, Kuntze, l. c. = *S. Romanzoffiana*, Cham. & Schlecht.
Haenkeana, Kuntze, l. c. 663 = *S. peruviana*, Presl.
Hostmannii, Kuntze, l. c. 664 = *S. Hostmannii*, Reicheb. f.
lanceolata, Kuntze, l. c. 663 = *S. orchioides*, A. Rich.
lanceolata, Kuntze, l. c. 664 = *S. orchioides*, A. Rich.
novifuburgensis, Kuntze, l. c. = *S. australis*, Lindl.
orchioides, Kuntze, l. c. = *S. orchioides*, A. Rich.
ovalifolia, Kuntze, l. c. = *S. Preslii*, Lindl.
papulosa, Kuntze, l. c. (= *Stenorhynchus papulosus* Lindl.). — Mexic.
praeox, Kuntze, l. c. 663 = *S. gracilis*, Beck.
Romanzoffiana, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 71 = *S. Romanzoffiana*, Cham.
sarcoglossis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 663 = *S. speciosa*, Lindl.
sceptrodes, Kuntze, l. c. 664 = *S. sceptroides*, Reicheb. f.
speciosa, Kuntze, l. c. = *S. colorata*, N. E. Br.
spiralis, Kuntze, l. c. = *S. autumnalis*, Rich.
Stenorhynchus, Kuntze, l. c. = *S. australis*, Lindl.
sulfurea, Kuntze, l. c. = *S. sulphurea*, Hemsl.
unilateralis, Kuntze, l. c. 663 = *S. diuretica*, Lindl.
Wightiana, Kuntze, l. c. = *S. australis*, Lindl.

GYROSTEMON, Desf. (Phytolacc.). — Ind. Kew. i. 1081.
australasicum, Heimerl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b (1889) 12 = *G. Cyclothea*, Benth.

GYROTHECA, Salisb. = **Lachnanthes**, Ell. (Haemod.).
capitata, Morong, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 472; et in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 117 = *L. tinctoria*, Ell.

H

HAASTIA, Hook. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1082.
montana, J. Buch. in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 215. — N. Zel.

HABENARIA, Willd. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1082.
achalensis, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 133. — Reg. Argent.
aequatorialis, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 391. — Afr. trop. or.
Aitchisoni, Reicheb. f. ex Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 113; Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 370 [Aitchisonii]. — Afghan.
alpestris, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1893) 74. — Bras.
altior, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 394. — Afr. trop. or.
amalfitana, Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 113. — Columb.
andamanica, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 134. — Ins. Andam.
anguiceps, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 164. fig. 2. — Afr. austr.
angustata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 664. — Java.
anomala, Lindl. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 206. — Abyss.
arachnoides, MacOwan, ex Kraenzl. l. c. 150 in syn. = *H. MacOwaniana*, Kraenzl.
arcuata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 155. — Reg. Himal.
Archavaletae, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 185. — Urug.
arietina, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 138. — Reg. Himal.
aristata, Hook. f. l. c. 158. — Ind. or., Zeyl.

HABENARIA : —

- aurea, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 209. — Afr. trop. occ.
avana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 148. — Burma.
Barberae, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 7. — Afr. austr.
barrina, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 202 t. d fig. b. — Ins. S. Thom.
Bauerleni, F. Muell. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 488. — N. Guin.
bicornuta, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 156. — Ind. or.
Blumei, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 664 (= *Platanthera Blumei*, Lindl.). — Java.
Bonatea, Pfitz. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 6. (1888) 95 = *H. Bonatea*, Reichb. f. borneensis, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 240. — Borneo.
brachyphylla, Reichb. f. ex Aitch. & Hemsl. l. c. Ser. II. iii. (1886) 113 = *brachyphylla*, Aitch. brachyphylla, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 153 (= *Platanthera brachyphylla*, Kraenzl.). — Ind. or.
bracteata, Matsudaira, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 470. — Japon.
Brandisii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 160. — Pegu.
breviloba, Hook. f. l. c. 159. — Zeyl.
Buchananiana, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 247. — Afr. trop.
Buettneriana, Kraenzl. l. c. xvi. (1893) 68. — Togo.
caldensis, Kraenzl. l. c. 128 (= *H. paludosa*, Rodr.). — Bras.
camptoceras, Rolfe, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 319. — China occ.
candida, Lindl. ex Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 217. — Afr. trop. occ.
Candolleana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1893) 73. — Bras.
cardiophila, Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 182, nomen; et in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 144. — Afr. trop. or.
carnea, N. E. Br. in Gard. Chron. (1891) ii. 729, fig. 105; et (1892) ii. 300 fig. 51. — Penang.
Childori, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.
chloroleuca, Frapp. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 257. — Ins. Borbon.
ciliolaris, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 169. — Ins. Hongkong.
cinnabarina, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 173. — Madag.
Clarkei, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 148. — Ind. or.
combrista, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 294. — Abyss.
Commerstoniana, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 259 = seq.
Commerstoniana, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 75 (= *Gymnadenia Commerstoniana*, A. Rich.). — Ins. Borbon.
concinna, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 155; et in Hook. Icon. pl. xxv. (1894) t. 2320. — Khasia.
confusa, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iv. (1893) 65. — Bras.
conopodes, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 124. — Madag.
constricta, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 161 (= *Peristylus constrictus*, Lindl.). — Ind. or.
corcovadensis, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 120. — Bras.
culiciflora, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 278. — Afr. trop. or.
cultriformis, Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 181, nomen; et in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 89. — Afr. trop. or.
Culveri, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 14. — Afr. austr.
dauphynensis, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 56. — Madag.
Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 86. — Tibet.
decipiens, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 165 et 197 = *H. Griffithii*, Hook. f.

HABENARIA : —

- deflexa, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. exsicc. 1853 n. 606] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 183, nomen; et in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 146. — Abyss.
diphylla, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 76 = *cordata*, R. Br.
ditricha, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 151. — Tenass.
eburnea, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 293. — Afr. trop. occ.
ecaadata, Kraenzl. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 152; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 19. — Afr. trop. or.
Elliotii, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 57 t. 12 sub fals. nom. *Holothr. madagascariensis*, Rolfe. — Madag.
Elliotii, Rolfe, ex Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 70 [an praec.?]. — Madag.
Emini, Kraenzl. l. c. xix. (1894) 245. — Afr. trop.
Engleriana, Kraenzl. l. c. xvii. (1893) 68. — Afr. trop. occ.
erinacea, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 261 (= *Peristylus erinacea*, Frapp.). — Ins. Borbon.
filifera, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 154. — Mexic.
flagellifera, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48 (= *Coeloglossum flagelliferum*, Maxim.). — Japon.
flavescens, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 150. — Concan.
flexa, Reichb. f. ex Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 97. — Bras.
foliosa, Reichb. ex Kraenzl. l. c. 214 = *polyphylla*, Reichb. f.
Foxii, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 124. — Madag.
furfuracea, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 144. — Khasia.
fusifera, Hook. f. l. c. 147. — Travanc.
Galpini, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. i. (1893) t. 17. — Transvaal.
Gardneri, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 158. — Zeyl.
genuflexa, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 279. — Afr. trop.
Gibsoni, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 135; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 239. — Concan.
gigas, Hook. f. l. c. 160. — Perak.
glaucofolia, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 152. — China occ.
Glazioviana, Kraenzl. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1893) 84. — Bras.
goyazensis, Cogn. l. c. 77. — Bras.
gracillima, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 163. — Khasia.
guadalajarana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 456 = *clypeata*, Lindl.
Hamiltoniana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 160 (= *Herminium Hamiltonianum*, Lindl.). — Ind. or.
Helferi, Hook. f. l. c. 164 (= *Gymnadenia Helferi*, Reichb. f.). — Ind. or.
Hieronymi, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 187. — Reg. Argent.
Hochstetteriana, Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 180 (= *H. replicata*, Hochst.). et in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 73. — Afr. trop. or.
holochila, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 432. — Ins. Sandvic.
Holstii, Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 53; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 246. — Afr. trop. or.
Holtzei, F. Muell. in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xxiv. 1890 (1891) 128. — Austral.
Horsfieldiana, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 167. — Java.
humilis, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1893) 67. — Bras.
ichneumoniformis, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 125. — Madag.
ingrata, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 279. — Afr. trop. or.
insignis, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 32. — Afr. austr.

HABENARIA : —

- involuta, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 165 fig. 3. — Natal.
jaliscana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 455. — Mexic.
janeirensis, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 127. — Bras.
javanica, Kraenzl. l. c. 162. — Java.
Johannae, Kraenzl. l. c. 77. — Ins. Comor.
Kayseri, Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62; et l. c. xix. (1894) 246. — Afr. trop. or.
khasiana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 151. — Khasia.
Kingii, Hook. f. l. c. 144. — Perak.
Korthalsiana, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 170. — Java?
Kraenzliniana, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 50 (1895) 35. — Afr. austr.
Lagunae-sanctae, Kraenzl. l. c. xvi. (1893) 119. — Bras.
latifolia, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 80 (= *Satyrium latifolium*, Thou.) = *chlorantha*, Spreng.
latifolia, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 260 (= *Peristylus latifolius*, Thou.). — Ins. Mascar.
latilabris, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 153. — Ind. or.
Lawii, Hook. f. l. c. 162 (= *Peristylus Lawii*, Wight). — Ind. or.
Lecardi, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1894) 150. — Seneg.
Lefeburiana, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 80 = *Herminium Lefeburianum*, A. Rich.
Lehmanni, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 97 = seq.
Lehmanniana, Kraenzl. l. c. — Columb.
leonensis, "Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 217. Sierra Leone [cit. falsa] ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. (1895) 80 = *candida*, Lindl.
leptobrachiata, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 293. — Abyss.
leptocaulon, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 154. — Reg. Himal.
longa, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 261 (= *Peristylus longus*, Frapp.). — Ins. Borbon.
longibracteata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 166 (= *Platanthera longibracteata*, Lindl.). — Burma.
lucaeapensis, M. L. Fernald, in Zool. iv. (1894) 379. — Calif.
MacOwaniana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1889) i. 168 (= *Brachycorythis MacOwaniana*, Reichb. f.). — Afr. austr.
MacOwaniana, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 150. — Afr. austr. extratrop.
macroceratitis, Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 141, in syn. = *longicalcarata*, A. Rich.
macrochlamys, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 223. — Tenass.
macrura, Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 183, nomen; et in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 152. — Angola.
malabarica, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 159. — Ind. or.
malleifera, Hook. f. l. c. 143. — Ind. or.
Mandersii, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 133; et in Hook. f. l. c. 146. — Burma.
maritima, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1892) 298; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 306. — Calif.
Medusa, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 203. — Java?
Melvillei, Ridl. ex Kraenzl. l. c. 203. — Bras.
microcorys, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. exsicc. 1853 n. 634] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 183; Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 152 = *vaginata*, A. Rich.
microrhynchus, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 36. — Afr. austr.
Millari, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. [iii]. (1891) 18. — Austral.
monophylla, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 134; et in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 143. — Burma.

HABENARIA : —

- militaris, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 518; Rolfe, in *Lindeniana*, vii. (1891) 63 t. 318. — Cam-bodia.
- montana, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 82 (= *Platanthera chlorantha*, Cust.). — Eur., Afr. bor.
- Montolivaea, Kraenzl. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 183; et in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 172 (= *Montolivaea elegans*, Reichb. f.). — Abyss.
- Moritzii, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. ii. (1887) 284 [Oliver, ex im Thurn, in *Timehri*, v. (1886) 206]. — Guian., Venez.
- Muelleriana, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 72. — Bras.
- multipartita, Blume, ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 194. — Java.
- Mundtii, Kraenzl. l. c. 79. — Afr. austr.
- muricata, Reichb. f. ex Kraenzl. l. c. 140. — Ins. Philipp.
- Murtoni, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 144. — Penins. Mal.
- ndiana, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 393. — Afr. trop. or.
- nematocaulon, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 154. — Reg. Himal.
- nuda, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1892) 96 = H. Sprucei, Cogn.
- njamniamica, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 106. — Afr. trop.
- Oldhami, Kraenzl. l. c. 205. — Japon.
- oligantha, Hochst. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 182, in syn. = perbella, Reichb. f.
- oligantha, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 154. — Reg. Himal.
- Orchidis, Hook. f. l. c. 142 (= *Platanthera Orchidis*, Lindl.). — Reg. Himal.
- pachycaulon, Hook. f. l. c. 154. — Reg. Himal.
- pantothrix, Kraenzl. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 181, nomen; et in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 89. — Afr. trop.
- papuana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 179; et xviii. (1894) 188. — N. Guin.
- Parishii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 161. — Tenass.
- Pervillei, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 209. — Madag.
- Petitiana, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 83 (= *Peristylus Petitianus*, A. Rich.). — Abyss.
- Philippisii, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 227. — Reg. Somal.
- Poggeana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 207. — Congo mer.
- polyantha, Kraenzl. l. c. xxii. (1895) 19; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 152. — Afr. trop.
- polyodon, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 139. — Ind. or.
- polyphylla, Boiv. ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 258, in syn. = H. sigillum, Thou.
- polyphylla, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 214. — Afr. austr.
- porrecta, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 167 fig. 5. — Natal.
- praestans, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 203. — Afr. trop. or.
- Prainii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 159. — Ind. or.
- Pringlei, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 184. — Mexic.
- quadrifolia, Frapp. ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 259. — Ins. Borbon.
- rabaiensis, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 390. — Afr. trop. or.
- ravicolorata, Reichb. f. ex Oliver, in Johnston, Kilima-njaro Exped. (1886) 346, nomen = seq. raricolorata, Reichb. f. ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1887) 350, nomen. — Afr. trop.
- Regnellii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 60. — Bras.
- Rehmanni, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 169 fig. 6. — Transvaal.

HABENARIA : —

- reniformis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 152 (= *Hermidium reniforme*, Lindl.). — Ind. or., — China.
- retroflexa, F. Muell. & Kraenzl. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 488. — N. Guin.
- rhynchocarpa, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 145 (= *Platanthera rhynchocarpa*, Thw.). — Zeyl.
- Richardi, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 259 (= *Platanthera Richardi*, Frapp.). — Ins. Borbon.
- Ridleyana, Kraenzl. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 179. — Afr. trop.
- Ridleyana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 65 [an praec. ?]. — Abyss.
- Riedelii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 80. — Bras.
- robustior, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 160 (= *Peristylus robustior*, Wight). — Ind. or.
- Rodriguesii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 42 t. 7 fig. 3. — Bras.
- Roemeriana, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 85 (= *Peristylus Quartianus*, A. Rich.). — Abyss.
- ruwenzoriensis, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 280. — Afr. trop. or.
- saccata, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 49. — Calif.
- sacculata, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 85 (= *Peristylus sacculatus*, Balf. f.). — Ins. Borbon.
- samoensis, F. Muell. & Kraenzl. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 487. — Ins. Samoens.
- Schaffneri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 283; Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 135. — Mexic.
- Schlechteri, Kraenzl. ex Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 35. — Afr. austr.
- Schenckii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 61. — Bras.
- secundiflora, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 260 (= *Peristylus secundiflorus*, Frapp.). — Ins. Borbon.
- secundiflora, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 165; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2321. — Reg. Himal.
- sikkimensis, Hook. f. l. c. 155. — Reg. Himal.
- socotrana, Reichb. f. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 144. — Socotra.
- Soyauxii, Kraenzl. l. c. xvi. (1893) 93. — Afr. trop. occ.
- spatulifera, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 86. — Bras.
- spiralis, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 260 (= *Peristylus spiralis*, S. Moore). — Ins. Borbon.
- spiraloides, Cordem. l. c. 551, in add. — Ins. Borbon.
- splendens, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 395. — Afr. trop. or.
- Sprucei, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 40. — Bras.
- stenantha, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 153. — Reg. Himal.
- stauroglossa, Kraenzl. in K. Schum. & Hollr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 35. — N. Guin.
- stenorhynchos, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 33. — Afr. austr.
- Stoliczkae, Kraenzl. l. c. xvi. (1893) 215. — Ind. or.
- Stocksii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 158. — Ind. or.
- Suzannae, Hort. ex *Gard. Chron.* (1894) ii. 278 fig. 38. — Hybr. artef.
- Taubertiana, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 69. — Bras.
- tenuicornis, Wall. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 149, in syn. = furcifera, Lindl.
- tentaculata, Pfliz. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1888) 95 (= *Glossula tentaculata*, Lindl.). — China.
- tenuicaulis, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 396. — Afr. trop. or.
- tenuispica, Rendle, l. c. xxxiii. (1895) 293. — Afr. trop. or.
- tetrapetaloides, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 34. — Afr. austr.
- Thomsoni, Reichb. f. ex Oliver, in J. Thoms. *Through Masai Land* Append. (1887) 353, nomen. — Afr. trop.

HABENARIA : —

- Thouarsii, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 87 (= *Satyrium flexuosum*, Thou.). — Ins. Mascar.
- torta, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 159. — Ind. or., Zeyl.
- tosaensis, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 48. — Japon
- transvaalensis, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 6. — Transvaal.
- travancorica, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 135. — Tenass.
- trifurcata, Hook. f. l. c. 135. — Khasia.
- Tysoni, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 166. — fig. 4. — Afr. austr.
- Ulaei, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 74. — Bras.
- undulata, Frapp. ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 256. — Ins. Borbon.
- unidentata, Blume, ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 158. — Java.
- Urbaniana, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 45. — Bras.
- urceolata, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 73 t. 30; Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 165 (= *Diphyllax urceolata*, Hook. f.). — Reg. Himal.
- Usambarae, Kraenzl. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57; et *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 98. — Afr. trop. or.
- variabilis, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 294. — Abyss.
- ventricosa, Frapp. ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 257. — Ins. Borbon.
- viridi-aurea, Lindl. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 102 = heptadactyla, Reichb. f.
- Vogelii, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 295. — Afr. trop. occ.
- Volkensiana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 244. — Afr. trop. or.
- Wilfordii, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 295. — Sierra-Leone.
- Zenkeriana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 247. — Kamerun.
- zosterostyloides, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 155. — Penins. Mal.

HABRACANTHUS Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1085
pyramidalis, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 484. — Am. trop.

HACKELOCHLOA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 776 = **Manisuris**, Sw. (Gramin.).
granularis, Kuntze, l. c. = M. granularis, Sw.

HAEMANTHUS. [Tourn.]. Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1086.
bivalvis, G. Beck, in *Paulitschka, Harrar* (1888) 452 fig. 1. — Afr. trop. or.
callosus, Burchell, ex Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 71. — Afr. austr.
Cooperi, Baker, l. c. 70. — Afr. austr.
eurysiphon, Harms, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 27. — Afr. trop. or.
Germanianus, J. Braun & K. Schum. in *Mitth. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) extr. 1. — Kamerun.
Katherinae, N. E. Br. in *Monteiro, Delagoa Bay* (1891) 170. [an Baker ?]. — Mossamb.
Kundianus, J. Braun & K. Schum. in *Mitth. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) extr. 1. — Kamerun.
Lindenii, N. E. Br. in *Illustr. Hort.* xxxvii. (1890) 89 t. 512 et xli. (1894) 13 fig. 3; et in *Gard. Chron.* (1890) ii. 436 fig. 85; et (1893) i. 483. — Congo.
longipes, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 332. — Kamerun.
Mackenii, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 69. — Natal.
micrantherus, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 140. — Afr. trop.
robustus, Pax, l. c. 140. — Afr. trop. or.
somaliensis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 227. — Reg. Somal.
superbus, Hort. ex Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 66 = magnificus, Herb.

HAEMARIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1087.
Otletae, Rolfe, in *Illustr. Hort.* xxxviii. (1891) 31 t. 524. — As. trop. or.
Olletae, « Rolfe », ex Gard. Chron. (1891) i. 469, sphalm. = praec.

HAEMASTEGIA, Klatt, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 102 = **Erythrocephalum**, Benth. (Compos.).
foliosa, Klatt, l. c. = *E. foliosum*, O. Hoffm.

HAEMATOTOXYLON, Linn. (Légumin.). — Ind. Kew. i. 1087.
boreale, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 426. — Mexic.

HAEMOCHARIS, Salisb. = **Laplacea**, H. B. & K. (Ternstroem.).
acutifolia, Mart. ex Wawra, in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 290 = *L. semiserrata*, Camb.
anceps, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = *Bonnetia anceps*, Mart.?
buxifolia, Szyzyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 184. — Sumatra.
camellioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = *L. camellioides*, Sond.
Courtyana, Kuntze l. c. = *L. Curtyana*, A. Rich.
marginata, Kuntze, l. c. 63 = *L. marginata*, Choisy.
obovata, Mart. ex Wawra, in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 290 = *Laplacea semiserrata*, Camb.
ovalis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 63 = *L. ovalis*, Choisy.
praemorsa, Kuntze, l. c. 62 = *L. praemorsa*, Splitg.
pubescens, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. (1895) 48 = *L. pubescens*, Triana & Planch.
sessilis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = *Bonnetia sessilis*, Benth.
stricta, Kuntze, l. c. = *B. stricta*, Nees & Mart.
symplocoides, Kuntze, l. c. = *L. symplocoides*, Triana & Planch.
venulosa, Kuntze, l. c. = *Bonnetia venulosa*, Mart.
vulcanica, Kuntze, l. c. = *L. vulcanica*, Kunth.

HAENELIA, Walp. = **Amellus**, Tourn. (Compos.).
anisata, *coelopodia*, *hispidia*, *Lychmitis*, *microglossa*, *nana*, *scabrida*, *strigosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 341 = *homonyma omnia* Amelli.

HAENIANTUS, Griseb. = **Linociera**, Sw. (Oleac.).
obovatus, Krug & Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 342. — Ins. Puerto-Rico.

HAHNIA, Medic. = **Pyrus**, Linn. (Rosac.).
Hostii, Dippel, Handb. Laubholzk. iii. (1893) 378 = *P. Aria*, Ehrh.
suecica, Dippel, l. c. 377 = *P. intermedia*, Ehrh.

HAKA, Schrad. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 1087.
Bakeriana, F. Muell. & Maiden, in *Macleay Memor. Vol. Linn. Soc. N. S. Wales* (1893) 226 t. 30; et ex Bot. Centralbl. lix. (1894) 303. — Austral.
breviflora Wawra, Itin. Princ. Sax.-Coburg. ii. (1888) 73. — Austral.
Brookeana, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* i. (Nov. 1886) 430; et ex Bot. Centralbl. xxix. (1887) 114. — Austral.
Macraeana, F. Muell. l. c. — Austral.
Persiehana, F. Muell. l. c. 430; et 115. — Austral.

HALENIA, Borekh. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 1089.
candida, Ramirez, in *Inform. Secret. Foment. Mexic. (Excurs. Mont. Ajusco)* (1895) 34. — Mexic.
crassiuscula, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 113. — Mexic.
Palmeri, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 401. — Mexic.
Pringlei, Robinson & Seaton, l. c. xxviii. (1893) 113. — Mexic.

HALESIA, Linn. (Styrac.). — Ind. Kew. i. 1089.
Fortunei, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 75. — China.

HALGANIA, Gaudich. (Borag.). — Ind. Kew. i. 1089.
Gustafseni, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. v. (June, 1890) 188. — Austral.

HALIMOCNEMIS, C. A. Mey. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 1089
gibbosa, *Woloszczak*, ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 9. — Persia.

HALIMUS, Rumpf, Herb. Amboin. vi. (1748-50) 165. t. 72 f. i.; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 263 = **Sesuvium**, Linn. (Ficoid).
congensis, *crystallinus*, *Edmonstonii*, *Portulacastrum*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Sesuvii.
maritima, Kuntze, l. c. = *S. Portulacastrum*, Linn.?
sesuviodes, Kuntze, l. c. = *S. digynum*, Welw.

HALLACKIA, Harv. = **Huttonaea**, Harv. (Orchid.).
pulchra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 665 = *Hutt. pulchra*, Harv.

HALLOMUELLERA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 267 = **Crantzia**, Nutt. (Umbell.).
lineata, Kuntze, l. c. = *C. lineata*, Nutt.

HALLOSCHULZIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 705 = **Stenomeris**, Planch. (Dioscor.).
Cumingiana, Kuntze, l. c. = *S. Cumingiana*, Becc.
dioscoreaefolia, Kuntze, l. c. = *S. dioscoreaefolia*, Planch.

HALOCNEMUM, Bieb. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 1090.
cruciatum, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 185 [an *H. cruciatum*, Tod.?] = *Salicornia cruciata*, Forsk.

HALORAGIS, Forst. (Halorag.). — Ind. Kew. i. 1091.
Baeuerleinii, F. Muell. in *Trans. et Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 132; et ex Bot. Centralbl. xxxii. (1887) 147. — Austral.
bibracteolata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 462. — N. Zel.
exalata, F. Muell. in *Trans. et Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 133, in obs. (= *H. alata*, Jacq. pr. p.). — Austral.
Meionectes, F. Muell. l. c. 127 (*Meionectes Brownii*, Hook. f.). — Austral.
minima, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 259. — N. Zel.
pyncnostachya, F. Muell. in *Trans. et Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 135. — Austral.
sclopetifera, F. Muell. l. c. 136. — Austral.
spicata, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 325. — N. Zel.

HALOSTACHYS, C. A. Mey. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 1091.
caspica, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 186 = *caspia*, C. A. Mey.

HALOXYLON, Bunge (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 1091.
Schweinfurthii, Aschers. ex Aschers. & Schweinf. *Illustr. Fl. Egypt. [Mém. Inst. Égypt. ii. (1887) 128]* (= *Anabasis articulata*, Moq.-Tand.). — Aegypt.

HAMAMELIS, Gronov. (Hamamel.). — Ind. Kew. i. 1092.
mollis, Oliver, ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 291, nomen; et in Hook. *Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1742. — China.

HAMELIA, Jacq. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1092.
calycosa, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xii. (1887) 132. — Guatem.
versicolor, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 416. — Mexic.
xerocarpa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 284. — Costa-rica.

HAMMARBYA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 665 = **Malaxis**, Soland. (Orchid.).
paludosa, Kuntze, l. c. = *M. paludosa*, Sw.

HAMMATOLOBIMUM, Fenzl (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1092.
Ludovicia, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]. (1889) 288 = *Ludovicia Kremeriana*, Coss.

HAMPEA, Schlecht. (Malv.). — Ind. Kew. i. 1092.
stipitata, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 461. — Guatem.

HANBURIA, Seem. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 1092.
parviflora, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 299; et xv. (1890) 27. — Guatem.

HANCEA, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 309. **LABIATAE**.
sinensis, Hemsl. l. c. 310 t. 6. — China.

HANCEA, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 16 (1891) sub t. 244 = **Hopea**, Roxb. (Dipteroc.).
Beccariana, Pierre, l. c. = *Hop. Beccariana*, Burck.
Beccarii, Pierre, l. c. = *Hop. Beccarii*, Burck.
cernua, Pierre, l. c. = *Hop. cernua* Teijsm. & Binn.
dryobalanoides, Pierre, l. c. = *Hop. dryobalanoides* Miq.
Griffithii, Pierre, l. c. = *Hop. Griffithii*, Kurz.
Meogaravan, Pierre, l. c. = *Hop. Meogaravan*, Miq.
micrantha, Pierre, l. c. = *Hop. micrantha*, Hook. f.
microptera, Pierre, l. c. = *Hop. microptera*, Dyer.
Pierrei, Pierre, l. c. et sub t. 248 = *Hop. Pierrei*, Hance.

HANSEMANNIA, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 201; Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1891) 102. **LEGUMINOSAE**.
aruensis, Warb. l. c. xiii. (1891) 334. — Oceania.
brevipes, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 103. — N. Guin.
glabra, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 201. — N. Guin.
mollis, K. Schum. l. c. 202. — N. Guin.
oblonga, Hemsl. in *Kew Bull.* (1892) 125. — Ins. Salom.
pachycarpa, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 333. — Oceania

HANSTEINIA, Oerst. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1093.
crenulata, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 242. — Bolivia.
gracilis, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 345; et in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 58 (= *Glocleria gracilis*, Nees). — Mexic.
Oerstedii, Lindau, l. c. (= *H. gracilis*, Oerst.). — Am. centr.

HAPALINE, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 1093.
Brownii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 521; et in Bot. Mag. (1893) t. 7325. — Penins. Mal.

HAPLOCOELUM, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 1093.
trigonocarpum, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 249. — Zanzib.

HAPLODISCUS, Benth. & Hook. f., fide Phil. (Compos.).
densifolius, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1895) 624. — Chili.
elatus, Phil. l. c. 617. — Chili.
exserens, Phil. l. c. 614. — Chili.
fallax, Phil. l. c. 622. — Chili.
graveolens, Phil. l. c. 619. — Chili.
humilis, Phil. l. c. 621. — Chili.
Ischnos, Phil. l. c. 616. — Chili.
Kingi, Phil. l. c. 615. — Chili.
Lanabechi, Phil. l. c. 616. — Chili.
latifolius, Phil. l. c. 623. — Chili.
longiscapus, Phil. l. c. 620. — Chili.

HAPLODISCUS: —

pachyphyllus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1895) 614. — Chili.
Peteroanus, Phil. l. c. 620. — Chili.
polycladus, Phil. l. c. 622. — Chili.
sphacelatus, Phil. l. c. 613. — Chili.
tenuifolius, Phil. l. c. — Chili.
vernicosus, Phil. l. c. 618. — Chili.
Zanartui, Phil. l. c. — Chili.

HAPLODYPISIS, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1167; et Hist. des pl. xiii. (1895) 370. **PALMAE**.

Pervillei, Baill. l. c. 1167. — Madag.

HAPLOPAPPUS, Endl. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

acanthodon, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1895) 603. — Chili.

anethifolius, Phil. l. c. 595. — Chili.
armerioides, Phil. l. c. 597. — Chili.
australis, Phil. l. c. 598. — Chili.
axilliflorus, Phil. l. c. 611. — Chili.
baccharidifolius, Phil. l. c. 606. — Chili.
bellidifolius, Phil. l. c. 593. — Chili.
brachylepis, Phil. l. c. 594. — Chili.
Candollei, Phil. l. c. 599. — Chili.
corniculatus, Phil. l. c. 609. — Chili.
deserticola, Phil. l. c. 592. — Chili.
Domeykoi, Phil. l. c. 590. — Chili.
Fluehmanni, Phil. l. c. — Chili.
Foncki, Phil. l. c. 606. — Chili.
formosus, Phil. l. c. 601. — Chili.
heterocomus, Phil. l. c. 608. — Chili.
heterophyllus, Phil. l. c. 607. — Chili.
hirsutus, Phil. l. c. 600. — Chili.
involutus, Phil. l. c. 593. — Chili.
leucanthemifolius, Phil. l. c. 605. — Chili.
limarensis, Phil. l. c. 602. — Chili.
litoralis, Phil. l. c. 610. — Chili.
obovatus, Phil. l. c. 604. — Chili.
pallidus, Phil. l. c. 596. — Chili.
Peteroanus, Phil. l. c. 609. — Chili.
platylepis, Phil. l. c. 591. — Chili.
setigerus, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 281 = *Pyrrhocomma setigera*, Phil.
stenophyllus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 604. — Chili.
Stolpi, Phil. l. c. 595. — Chili.
subandinus, Phil. l. c. 598. — Chili.
Vidali, Phil. l. c. 601. — Chili.
Villanuevae, Phil. l. c. 592. — Chili.

HAPLOPHLOGA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1168; et Hist. des pl. xiii. (1895) 370. — **PALMAE**.

Bernieriana, Baill. l. c. 1171. — Madag.
comorensis, Baill. l. c. — Ins. Comor.
loucoubensis, Baill. l. c. — Nossibe.
Poirreana, Baill. l. c. 1168. — Madag.

HAPLOPHYLLUM, Reichb. = **APLOPHYLLUM**, A. Juss. = **Ruta**, Linn.

angustifolium, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 15 = *R. rosmarinifolia*, Fuss.
Bornmuelleri, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 401. — As. Min.
chaborasium, Boiss. & Hausskn. in Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 148. — As. occ.
eremophilum, Boiss. & Hausskn. in Boiss. l. c. 149. — Persia.
eriocarpum, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 106. — As. Min.
Haussknechtii, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 148. — As. occ.
latifolium, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 15 = *R. pubescens*, Willd.
leiocarpum, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 107 = *R. villosa*, Bieb.
fycnanthum, Boiss. & Hausskn. in Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 148. — Persia.

HAPLOSTACHYS, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 346. **LABIATAE**.

HAPLOSTACHYS: —

Grayana, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 346 (= *Phyllostegia haplostachya*, A. Gray). — Ins. Sandvic.
rosmarinifolia, Hillebr. l. c. 347. — Ins. Sandvic.
truncata, Hillebr. l. c. (= *Phyllostegia truncata*, A. Gray). — Ins. Sandv. c.

HAPLOSTICHANTHUS, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Mar. 1891) 180. **ANONACEAE**.
Johnsoni, F. Muell. l. c. — Austral.

HARBOURIA, Coult. & N. E. Rose, Revis. N. Am. Umbell. (1888) 125. **UMBELLIFERAE**.
trachypleura, Coult. & N. E. Rose, l. c. (= *Thaspium trachypleurum*, A. Gray). — Am. bor. austro-occ.

HARFORDIA, Greene & Parry, in Proc. Davenport Acad. Nat. Sci. v. (1888) 27. **POLYONEAE**.
fruticosa, Greene & Parry, l. c. 28 (= *Pterostegia fruticosa*, Greene). — Calif.
macroptera, Greene & Parry, l. c. (= *Pterostegia macroptera*, Benth.). — Calif.

HARIOTA, Adans. = **Rhipsalis**, Gaertn. (Cact.).
cereiformis, *conferta*, *coriacea*, *crispata*, *cylindrica*, *fasciculata*, *floccosa*, *horrida*, *Houlletiana*, *Knightii*, *macrocarpa*, *micrantha*, *monacantha*, *pachyptera*, *paradoxa*, *penduliflora*, *pentaptera*, *platycarpa*, *ramulosa*, *rhombica*, *Riedeliana*, *robusta*, *spathulata*, *teres*, *trigona*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 262-63 = *homonyma omnia* *Rhipsalidis*.

alata, Kuntze, l. c. 262 = R. Swartziana, Pfeiff.
boliviana, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 40. — Bolivia.

cereuscula, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 262 = R. *Saglionis*, Otto.

cinerea, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 35. — Bolivia.

cruciformis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 262 = R. *cereiformis*, Foerst.

grandiflora, Kuntze, l. c. = R. *funalis*, Salm.-Dyck.
lunbricalis, Kuntze, l. c. = R. *sarmentacea*, Otto & Dietr.

mesembryanthemodes, Kuntze, l. c. = R. *mesembryanthemoides*, Haw.

parasitica, Kuntze, l. c. = R. *Cassytha*, Gaertn.

ramosissima, Kuntze, l. c. 263 (= *Lepismium ramosissimum*, Lem.). — Bras.

rugosa, Kuntze, l. c. = R. *rugulosa*, Lem.

salicornioides, Kuntze, l. c. = R. *salicornioides*, Haw.

squamulosa, Kuntze, l. c. = R. *Mittleri*, Foerst.

triquetra, Kuntze, l. c. (= *Lepismium fluminense*, Miq.). — Bras.

villigera, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II. (1890) — Bras.

HARMANDIA, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 770; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 452. **OLACINEAE**.

flavescens, Pierre, ex Heim, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 123 (= *Vatica Harmandiana*, Laness.). — Cochinch.

Kunstleri, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) II. 100. — Perak.

mekongensis, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 770. — Laos.

HARPAGOPHYTUM, DC. (Pedalin.). — Ind.

abbreviatum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 670. — Madag.

dimidiatum, Baill. l. c. 669. — Madag.

Grandidieri, Baill. l. c. — Madag.

peltatum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 341 — Madag.

pinnatifidum, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 255. — Afr. austr.

HARPALECE, [Mog. & Sessé ex] DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1094.

hidalgensis, Taub. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 613. — Mexic.

Loeseneriana, Taub. l. c. 612. — Mexic.

rupicola, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 26. — Guatem.

HARPECHLOA, Kunth (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1094.

altera, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 57. — Afr. trop., Transvaal.

Falx, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 764 = *capensis*, Kunth.

HARPULLIA, Roxb. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 1094.

aeruginosa, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 278. — N. Guin.

arborea, Radlk. l. c. xvi. (1886) 404 (= *Ptelea arborea*, Blanco). — Ins. Philipp.

camptoneura, Radlk. l. c. xx. (1890) 360. — Mexic.

cochinchinensis, Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc. xxi. (1895) t. 332 A. — Cochinch.

condorensis, Pierre, l. c. t. 332. — Cochinch.

crustacea, Radlk. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 67. — N. Guin.

divaricata, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 279. — Austr.

frutescens, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 278. — N. Guin.

leptococca, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 278. — N. Guin.

marginata, Radlk. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 362. — Austr.

oococca, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 278. — N. Guin.

pedicellaris, Radlk. l. c. 279. — N. Guin.

ramiflora, Radlk. l. c. 278. — N. Guin.

rhachiptera, Radlk. l. c. — N. Guin.

zanguebarica, Radlk. l. c. 279 (= *Majidea zanguebarica*, J. Kirk). — Afr. trop. or.

HARTOGHIA, *capensis*, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet. (1895) 237 = *Prunus Lauro-Cerasus*, Linn.

HARTOGIA, Linn. = **Agathosma**, Willd. (Rutac).

acerosa, *acutifolia*, *adenocaulis*, *affinis*, *alaris*, *anomala*, *asperifolia*, *bisulca*, *capitata*, *chortophylla*, *ciliata*, *collina*, *craspedata*, *crassifolia*, *cuspidata*, *decumbens*, *Dregeana*, *Eckloniana*, *elata*, *elegans*, *erecta*, *fastigiata*, *florida*, *florulenta*, *foliosa*, *fraudulenta*, *Gillivrayi*, *glabrata*, *glandulosa*, *gonaquensis*, *gracilicaulis*, *hirta*, *hirtella*, *Hookeri*, *humilis*, *involuta*, *Joubertiana*, *juniperifolia*, *juniperina*, *lancifolia*, *latipetala*, *ledifolia*, *linifolia*, *marifolia*, *Martiana*, *microphylla*, *minuta*, *montana*, *monticola*, *mucronulata*, *Mundtii*, *nigra*, *nigromontana*, *Nivenii*, *orbicularis*, *parviflora*, *patula*, *pentachotoma*, *pilifera*, *planifolia*, *prolifera*, *propinqua*, *pubescens*, *pubigera*, *punctata*, *recurvifolia*, *robusta*, *rubra*, *sabulosa*, *sedifolia*, *serpyllacea*, *spinosa*, *squamosa*, *tabularis*, *tenuis*, *thymifolia*, *Ventianiana*, *villosa*, *virgata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 100-02 = *homonyma omnia*, *Agathosmatis*.

ambigua, Kuntze, l. c. 101 = A. *ambigua*, Sond.

apiculata, Kuntze, l. c. = A. *apiculata*, G. F. W. Mey.

aulonophylla, Kuntze, l. c. = A. *commutata*, Sond.

barosmifolia, Kuntze, l. c. = A. *barosmaefolia*, Eckl. & Zeyh.

barosmodes, Kuntze, l. c. = A. *barosmoides*, Sond.

blaerioides, Kuntze, l. c. = A. *blaerioides*, Cham.

cephalotes, Kuntze, l. c. = A. *globutiflora*, Presl.

cerefolia, Kuntze, l. c. = A. *Cerefolium*, Bartl.

eriantha, Kuntze, l. c. = A. *Schlechtendalii*, Sond.

ericodes, Kuntze, l. c. = A. *ericodes*, Schlecht.

leptospermodes, Kuntze, l. c. = A. *aristata*, Presl.

lycopodiodes, Kuntze, l. c. = A. *lycopodioides*, Bartl. & Wendl.

melaleucodes, Kuntze, l. c. = A. *melaleucoides*, Sond.

platypetala, Kuntze, l. c. = A. *platypetala*, Eckl. & Zeyh.

puberula, Kuntze, l. c. = A. *gnidioides*, Schlecht.

stenopetala, Kuntze, l. c. = A. *filipetala*, Eckl. & Zeyh.

Thunbergiana, Kuntze, l. c. = A. *Thunbergiana*, Bartl. & Wendl. var. ?

umbellata, Kuntze, l. c. = A. *bifida*, Bartl. & Wendl.

HARTOGIA, Linn. f. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1095.

lanceolata, Eckl. & Zeyh. ex Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 32 = *capensis*, Linn. f.

HARTWRIGHTIA, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 264. *COMPOSITAE*.

floridana, A. Gray, l. c. 65. — Florida.

HARVEYA, Hook. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1095.

foliosa, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 352, nomen. — Erithrea.
versicolor, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 362. — Afr. trop. or.

HASSELLTIA, H. B. & K. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 1095.

guatemalensis, Warb. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 32. — Guatem.

HAUYA, [Moç. & Sessé] ex DC. (Onagrar.). — Ind. Kew. i. 1096.

arborescens, Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 253 = *Oenothera arborescens*, Kell.
arborescens, T. S. Brandeg. l. c. ii. (1889) 157 = *praec. californica*, S. Wats. l. c. Ser. II. i. (1888) 253 = *Oenothera arborescens*, Kell.

Heydeana, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 3. — Guatem.

Rodriguezii, J. D. Smith, l. c. — Guatem.

HAVETIA, H. B. & K. (Guttif.). — Ind. Kew. i. 1096.

caryophylloides, Vesque, in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 327; *Epharmos*. iii. (1892) t. 73; et in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 158 (= *Havetiopsis caryophylloides*, Planch. & Triana). — N. Grana.

hippocrateoides, Vesque, l. c. 327; t. 73; et 157 (= *Havetiopsis hippocrateoides*, Planch. et Triana). — Peruv.

Martii, Vesque, l. c. 327, 15 t. 73; et 154 (= *Havetiopsis Martii*, Planch. et Triana). — Bras.

obovata, Spruce, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1891) 161, in syn. = *Oedematopus obovatus*, Planch. et Triana.

HAVETIOPSIS, Planch. et Triana (Guttif.). — Ind. Kew. i. 1096.

laurifolia, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1888) 438 (= *Havetia laurifolia*, Mart.). — Bras.
obovata, Spruce, ex Engl. l. c. 437 = *Oedematopus obovatus*, Planch. et Triana.

HAVILANDIA, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 209. *BORAGINEAE*.

borneensis, Stapf, l. c. — Borneo.

HAWORTHIA, Dunal (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1096.

columnaris, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 45. — Hab. ?

stenophylla, Baker, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1974 — Transvaal.

tenuifolia, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 2. — Afr. austr.

HAYNALDIA, Schur = **Agropyron**, J. Gaertn. (Gramin.).

hordeacea, Hack. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 80 = *A. orientale*, Roem. & Schult.

hordeacea, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 242 = *A. orientale*, Roem. & Schult.

HAZARDIA, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 28 = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

Berberidis, Greene, in Erythea, ii. (1894) 112 = *A. Berberidis*, A. Gray.

cana, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 29 = *Diplostephium canum*, A. Gray.

cruenta, Greene, in Erythea, ii. (1894) 112 = *A. cruentus*, Greene.

HAZARDIA : —

detonsa, Greene, Pittonia i. (1887) 29 = *Diplostephium canum*, Greene.

Orcuttii, Greene, in Erythea, ii. (1894) 112 = *A. Orcuttii*, A. Gray.

serrata, Greene, in Pittonia, i. (1887) 30. — Calif.

squarrosa, Greene, in Erythea, ii. (1894) 112 = *A. squarrosus*, Hook. & Arn.

HEARNIA, F. Muell. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 1097.

aquatica, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21 (1895) t. 333 b. — Cochinch.

Balansae, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 580. — Tonkin.

HEBANTHE, Mart. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 1097.

Philippo-Coburgi, Zahlbr. ex Wawra, Itin. Princ. Sax.-Coburg. ii. (1888) 57. — Bras.

HEBENSTREITIA, Linn. (Selag.). — Ind. Kew. i. 1097.

angolensis, Rolfe, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 174. — Angola.

rariflora, Terrac. in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 424. — Afr. trop. or.

HECASTOPHYLLUM, H. B. & K. = **Ecastaphyllum** P. Br. (Legumin.).

amazonicum, Radlk. Ueber anal. Char. Dalberg. (1892) 40. — Bras.

negrense, Radlk. l. c. — Bras.

Riedelii, Radlk. l. c. — Bras.

HECATACTIS, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. I. ii. (1889) 13 = **Myriactis**, Less. (Compos.).

HECHTIA, Klotzsch (Bromel.). — Ind. Kew. i. 1098.

Besseyana, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 140 = *stenopetala*, Klotzsch.

longifolia, Hort. ex Baker, l. c. — Hab. ?

rosea, Ed. Morr. ex Baker, l. c. — Mexic.

pedicellata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 155. — Mexic.

Pringlei, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 167. — Mexic.

HEDEOMA, Pers. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 1098.

jucunda, Greene, Pittonia, i. (1888) 156. — Mexic.

HEDERA, Tourn. ex Linn. (Aral.). — Ind. Kew. i. 1098.

acuta, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 243 = *H. Helix*, Linn.

algeriensis, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 164; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 241 = *H. Helix*, Linn.

angularis, Hort. l. c. 163 = *H. Helix*, Linn.

arborescens, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.

aurantiaca, Hort. l. c. ; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 241 = *H. Helix*, Linn.

azorica, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.

baccifera, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 243 = *H. Helix*, Linn.

cambwoodiana, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 162 = *H. Helix*, Linn.

canariensis, Hort. l. c. 163 = *H. Helix*, Linn.

caucasica, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.

chrysocarpa, Hort. l. c. 163 = *H. Helix*, Linn.

chrysophylla, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.

conglomerata, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.

contracta, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.

cordata, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.

cordifolia, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 247 = *H. Helix*, Linn.

dentata, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 162 = *H. Helix*, Linn.

elegantissima, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 247 = *H. Helix*, Linn.

Glimii, Hort. l. c. 249 = *H. Helix*, Linn.

gracilis, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 163 = *H. Helix*, Linn.

HEDERA : —

grandifolia, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 243 = *H. Helix*, Linn.

hibernica, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 163; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 241 = *H. Helix*, Linn.

himalaica, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.

japonica, Hort. l. c. 162 et 164 = *H. Helix*, Linn.

maderensis, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 241 = *H. Helix*, Linn.

palmaria, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 163 = *H. Helix*, Linn.

pennsylvanica, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 245 = *H. Helix*, Linn.

poetica, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 163 = *H. Helix*, Linn.

purpurea, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.

rhombica, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.

Roegneriana, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 242 = *H. Helix*, Linn.

submarginata, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 247 = *H. Helix*, Linn.

taurica, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 164; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 243 = *H. Helix*, Linn.

vegeta, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 243 = *H. Helix*, Linn.

viridis, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.

vitifolia, Hort. l. c. 245 = *H. Helix*, Linn.

Willsiana, Hort. l. c. 247 = *H. Helix*, Linn.

HEDERELLA, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) sub t. 2415. *MELASTOMACEAE*.

Forbesii, Stapf, l. c. — N. Guin.

multiflora, Stapf, l. c. t. 2415. — Borneo.

quintuplinervis, Stapf, l. c. t. 2416 (= *Dissochaeta quintuplinervis*, Cogn.). — Borneo.

tetrandra, Stapf, l. c. t. 2415. — Borneo.

HEDREANTHUS, Griseb. = **EDRAIANTHUS**, A. DC. = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campa-

nul.).

caricinus, Wettst. in Denkschr. Akad. Wien, liii. (1887) 204 (= *E. caricinus*, Schott, Nym. & Kotschy) = *W. tenuifolia*, A. DC.

croaticus, Wettst. l. c. 202. (= *E. croaticus*, Kern.). = *W. Kitaibelii*, A. DC.

dalmaticus, Wettst. l. c. 205 (= *E. dalmaticus*, A. DC.) = *W. dalmatica*, A. DC.

dinavicus, Wettst. l. c. 192. — Eur. centr.

graminifolius, Wettst. l. c. 200 (= *E. graminifolius*, A. DC.) = *W. graminifolia*, A. DC.

Kitaibelii, Wettst. l. c. 196 (= *E. Kitaibelii*, Wettst.) = *W. Kitaibelii*, A. DC.

Murbeckii X. Wettst. in Fysiogr. Sällskop. Handl. ii. (1891) 98; et ex Murb. in Lunds Univ. Arskrift, xxvii. v. (1892) 93. — Herceg., Bosn.

niveus, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 296. — Bosn.

Pumilio, Wettst. in Denkschr. Akad. Wien, liii. (1887) 190 (= *E. Pumilio*, A. DC.) = *W. Pumilio*, A. DC.

serbicus, « Petrov. » ex G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 289 = seq.

serbicus, Wettst. in Denkschr. Akad. Wien, liii. (1887) 206 (= *E. serbicus*, Petrov.). — Serb.

serpyllifolius, Wettst. l. c. 193 (= *E. serpyllifolius*, A. DC.) = *Campanula serpyllifolia*, Vis.

tenuifolius, Wettst. l. c. 197 (= *E. tenuifolius*, A. DC.) = *W. tenuifolia*, A. DC.

Wettsteini, Halácsy & Bald. ex Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 371; et Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 292. — Austro-Hung.

HEDYCARYA, Forst. (Monim.). — Ind. Kew. i. 1099.

alternifolia, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 215. — Ins. Tonga.

salomonensis, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 137. — Ins. Salom.

HEDYCHIMUM, Koen. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1099.

aureum, C. B. Clarke & Mann, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 229. — Ind. or.

crassifolium, Baker, l. c. 228. — Perak.

HEDYCHUM : —

- Elwesii*, Baker, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 226. — Khasia.
Hookeri, C. B. Clarke, ex Baker, l. c. 230. — Khasia.
longicornutum, Griff. ex Baker, l. c. 228. — Malacca.
luteum, Herb. Calc. ex Baker, l. c. 232. — Assam.
marginatum, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 75 t. 31; Baker, l. c. 236. — Ind. or.
Wilkeanum ×, Hort. ex W. Wats. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 276. — Hybr. artef.

HEDYOSMOS, Mitchell = **Cunila**, Linn. (Labiata.).
angustifolius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = *C. angustifolia*, Benth.

- fasciculatus*, Kuntze, l. c. = *C. fasciculata*, Benth.
galioides, Kuntze, l. c. = *C. galioides*, Benth.
incanus, Kuntze, l. c. = *C. incana*, Benth.
incisus, Kuntze, l. c. = *C. incisus*, Benth.
leucanthus, Kuntze, l. c. = *C. leucantha*, Benth.
lythrifolius, Kuntze, l. c. = *C. lythrifolia*, Benth.
menthoides, Kuntze, l. c. = *C. menthoides*, Benth.
microcephalus, Kuntze, l. c. = *C. microcephala*, Benth.
origanoides, Kuntze, l. c. = *C. Mariana*, Linn.
polyanthus, Kuntze, l. c. = *C. polyantha*, Benth.
secundus, Kuntze, l. c. = *C. secunda*, S. Wats.
spicatus, Kuntze, l. c. = *C. spicata*, Benth.
stachyodes, Kuntze, l. c. = *C. stachyoides*, Mart. & Gal.
strictus, Kuntze, l. c. = *C. stricta*, Benth.

HEDYOTIS, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1100.
athroantha, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 65. — Ind. or.
brachypetala, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 740. — Chili.
coprosmodies, Trim. Syst. Cat. Ceyl. (1885) 42; et *Handb. Fl. Ceyl.* ii. (1894) 306. — Zeyl.
inconspicua, F. Phil. ex Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 739. — Chili.
Johnstoni, Oliver, in H. Johnston. *The Kilim. Exped.*, App. (1886) 341; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 335. — Afr. trop. or.
macrostegia, Stapf, l. c. Ser. II. iv. (1894) 170. — Borneo.
protrusa, Stapf, l. c. 169. — Borneo.
pulchella, Stapf, l. c. — Borneo.
tenuipes, Hemsl. ex Forb. et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 375. — China.

HEDYSARUM, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1103.

- americanum*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 201 = boreale, Nutt.
candidum, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 80. — Armen.
cyprum, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 189. — Ins. Cypr.
ecbatanum, G. Beck, ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 74. — Persia.
flavescens, Coult. et Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 300. — Am. bor.
Maitlandianum, Aitch. & Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 57. — Turkestan.
Wrightianum, Aitch. & Baker, l. c. — Afghan., Turkestan.
xanthinum, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 49. — As. Min.

HEERIA, Meissn. = **Anaphrenium**, E. Mey. (Anacardi.).
concolor, dispar, paniculosa, pulcherrima, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 152 = *homonyma omnia* *Anaphrenii*.
insignis, Kuntze, l. c. = *A. mucronatum*, Bernh.

HEERIA, Schlecht. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1107.
axillaris, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 138 (= *Heterocentron axillare*, Naud.). — Mexic., Am. centr.

HEINSIA, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1108.
pulchella, K. Schum. in Engl. et Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 84 = *jasminiflora*, DC.

HEISTERA, Linn. = **Muraltia**, Neck. (Polyg.).
acicularis, acipetala, angulosa, anthospermifolia, asparagifolia, Beiliana, brevicornu, calycina, carnosa, ciliaris, cliffortiifolia, crassifolia, depressa, divaricata, Dregei, dumosa, ericifolia, fasciculata, filiformis, humilis, incompta, juniperifolia, lancifolia, laricifolia, laxa, leptorhiza, longicuspis, macrocarpa, macroceras, macropetala, micrantha, mixta, obovata, ononidifolia, Pappeana, parviflora, pauciflora, pilosa, Poirerii, pubescens, rigida, squarrosa, stipulacea, striata, tenuifolia, trinervia, Zeyheri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 47 = *homonyma omnia* *Muraltiae*.
alopecuroides, Kuntze, l. c. = *M. alopecuroides*, D. C.
Candollei, Kuntze, l. c. = *M. De Candollei*, Echl. & Zeyh.
conferta, Kuntze, l. c. = *M. satuireioides*, Burch.
diffusa, Kuntze, l. c. = *M. stipulacea*, Burch.
ericodes, Kuntze, l. c. = *M. Burmanni*, DC.
metalsiaefolia, Kuntze, l. c. = *M. rubeacea*, Echl. & Zeyh.
phylicodes, Kuntze, l. c. = *M. phylicodes*, DC.
reticulata, Kuntze, l. c. = *M. origanoides*, Presl.
saturejoides, Kuntze, l. c. = *M. satuireioides*, Burch.
serpyllodes, Kuntze, l. c. = *M. serpyllodes*, DC.

HEISTERIA, Jacq. (Oclacin). — Ind. Kew. i. 1108.
costaricensis, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 255. — Costa Rica.
microcalyx Sagot, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 112. — Am. austr.

HELENIATRUM, Mill. Gard. Dict. (1739) = **Helenium**, Linn. (Compos.).

- amphibolum*, autumnale, Bigelowii, Bolanderi, brevifolium, Curtissii, elegans, fimbriatum, Hoopesii, integrifolium, laciniatum, mexicanum, microcephalum, nudiflorum, ooclinium, puberulum, quadridentatum, tenuifolium, Thurberi, vernale, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 342 = *homonyma omnia* *Helenii*.
Helenium, Kuntze, l. c. = H. Nuttallii, A. Gray.
occidentale, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 202. — Calif.
parviflorum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 341 = *Helenium nudiflorum*, Nutt.
varium, Kuntze, l. c. = H. mexicanum, H. B. & K.

HELENIUM, Linn. Syst. i. (1735) 16 [non 1753] = **Inula**, Linn. (Compos.).

- acaule*, acuminatum, africanum, ammophilum, anatolicum angustifolium, Arbuscula, Aschersonianum, Aucherianum, auriculatum, bifrons britannicum, candidum, Cappa, caspium, confertiflorum, cordatum, cuspidatum, ensifolium, Falconeri, fragile, germanicum, glomeratum, grande, grandiflorum, graveolens, Griffithii, heterolepis, hirtum, Hookeri, Kalapani, limonifolium, macrophylla, macrospermum, Mannii, Montebretianum, montanum, multicaule, nervosum, obtusifolium, Oculus-Christi, polygonatum, racemosum, rhizocephalum, Royleanum, rubricaulis, salicinum, Seidlitzii, Simonsii, somalense, squarrosus, suaveolens, Vaillantii, viscosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 342-43 = *homonyma omnia* *Inulae*.
crithmoides, Kuntze, l. c. = I. crithmoides, Linn.
Csatoi, Kuntze l. c. 343 = I. Csatoi ×, Borb.
eupatorioides, Kuntze, l. c. = I. eupatorioides, DC.
grantioides, Kuntze, l. c. = I. grantioides, Bern.
helenioides, Kuntze, l. c. = I. helenioides, DC.
hispidum, Kuntze, l. c. = I. squarrosa, Linn.
intermedium, Kuntze, l. c. = I. intermedia ×, Steud.?
Kanitzii, Kuntze, l. c. 342 = I. Oculus-Christi, Linn.
litorale, Kuntze, l. c. 343 = I. litoralis ×, Borb.
macrocephalum, Kuntze, l. c. = I. Royleana, DC.
macrolepis, Kuntze, l. c. = I. britannica, Linn.
microcephalum, Kuntze, l. c. = I. microcephala ×, Borb.
officinale, Kuntze, l. c. 342 = I. Helenium, Linn.
orientale, Kuntze, l. c. = I. glandulosa, Puschk.
repandum, Kuntze, l. c. 343 = I. britannica, Linn.
revolutum, Kuntze, l. c. = I. Pulicaria revoluta, Nym.
rhizocephalodes, Kuntze, l. c. = I. rhizocephaloides, C. B. Clarke.
salviodorum, Kuntze, l. c. = I. Cappa, DC.

HELENIUM : —

- sericeum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 342 (= *Schizogyne obtusifolia*, Cass.). — Ins. Canar.
strictum, Kuntze, l. c. 343 = I. stricta, Tausch.
thapsodes, Kuntze, l. c. = I. thapsoides, Boiss.
Vrabelyanum, Kuntze, l. c. (= I. *Vrabelyanum* × Kern.) = I. stricta, Tausch.
vulgare, Kuntze, l. c. 342 = I. Conyza, DC.

HELENIUM, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1108.

- collinum*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 281 = *Cephalophora collina*, Phil.
setigerum, Britton & Robinson, in *Trans. N. V. Acad. Sci.* vii. (1887) 11 (= *Amblyolepis setigera*, DC.). — Texas.

HELEOCHARIS, Lestib. = **Eleocharis**, R. Br. (Cyper.).

- bahamensis*, Boeck, Cyper. Nov. ii. (1890) 11. — Ins. Baham.
brasiliensis, Boeck, l. c. 13. — Bras.
caduca, Aschers. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. (1895) 597 = *E. capitata*, R. Br.
crispovaginata, Boeck, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 206. — Ecuad.
cubensis, Boeck, Cyper. Nov. ii. (1890) 10. — Cuba.
hyalino-vaginata, Boeck, ex Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 43, nomen. — Chili.
Kuntzei, Boeck, l. c. i. (1888) 14 = *E. afflata*, Steud.
Lehmanniana, Boeck, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 205. — Ecuad.
Loefgreniana, Boeck, Cyper. Nov. ii. (1890) 12. — Bras.
Mendoncae, Boeck, l. c. — Bras.
Minarum, Boeck, l. c. — Bras.
minutiflora, Boeck, in Bot. Jahrb. vii. (1886) 274. — Ins. S. Thom.
paracicularis, Boeck, l. c. 275, in obs. = *Scirpus paracicularis*, Wright.
plantaginea, R. Br. ex Boeck, Cyper. Nov. ii. (1890) 14 = *E. plantaginea*, R. Br.
punctata, Boeck, ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 464. — Costa Rica.
Reichei, Boeck, ex Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 43, nomen. — Chili.
Schnaffneri, Boeck, l. c. vii. (1886) 274. — Mexic.
Schenckii, Boeck, Cyper. Nov. ii. (1890) 13. — Bras.
squamata, Boeck, l. c. 11. — Bras.
striata, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 149 = *E. palustris*, R. Br.
Vulcani, Boeck, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 206. — Columb.

HELEOCHLOA, Host (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1109.

- brachystachys*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 35 (= *Vilfa brachystachys*, Presl.). — Sicil.
compacta, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 814 (= *Crypsis compacta*, Steud.). — Seneg.
Myosurus, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Crypsis Myosurus*, Nees). — Aegypt.

HELIA, Mart. = **Lisianthus**, Linn. (Gentian.).

- alata*, alba, alpestris, amplissima, angustifolia, arborea, auriculata, bifida, campanulacea, coeruleus, crassicaulis, densiflora, elegans, Elisabethae, fistulosa, frigida, glabra, glandulosa, grandiflora, macrantha, macrophylla, Mathewsii, obtusifolia, ovalis, paniculata, pendula, pratensis, Princeps, pulcherrima, pulchra, pumila, purpurascens, ramosissima, revoluta, Schomburgkii, speciosa, splendens, Spruceana, tenuifolia, tetragona, trifidus, uliginosa, vasculosa, virgata, viridiflora, viscosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 427-28 = *homonyma omnia* *Lisianthi*.
acutangula, Kuntze, l. c. 427 = L. trifidus, H. B. K.
amoena, Kuntze, l. c. 428 = L. uliginosus, Griseb.
campanulodes, Kuntze, l. c. = L. campanuloides, Spruce.
chelonodes, Kuntze, l. c. 427 = L. chelonoides, Linn. f.
cujabana, Kuntze, l. c. = L. acutangulus, Mart.
daturodes, Kuntze, l. c. 428 = L. daturoides, Griseb.

HELIA: —

gracilis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 428 = *L. uliginosus*, Griseb.
loranthoides, Kuntze, l. c. = *L. loranthoides*, Griseb.
Martii, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 101 = *L. Martii*, Griseb.
nemorosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 428 (= *Irlbachia Bonplandiana*, Fenzl). — N. Granat.
nerioides, Kuntze, l. c. = *L. nerioides*, Griseb.
Oerstedtii, Kuntze, l. c. = *L. alatus*, Aubl.
spathulata, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 (1895) 101 = *L. spathulatus*, H. B. & K.
thamnoides, Kuntze, l. c. — *L. thamnoides*, Griseb.

HELIANTHELLA, Torr. & Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 1109.

Aldersonii, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 259. — Calif.
castanea, Greene, l. c. 127; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 190. — Calif.
madrensis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 278. — Mexic.
Pringlei, S. Wats. l. c. xxi. (1886) 389. — Mexic.

HELIANTHEMUM, Tourn. ex Hall. (Cistin.). — Ind. Kew. i. 1109.

affine, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. ii. (1895) 304 = *hirtum*, Pers.
argyreum, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 329; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2360. — Arabia.
Chatenieri, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. ii. (1895) 307. — Gall. mer.
chihuahuanum, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 268. — Mexic.
digeneum X, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 306. — Gall. mer.
hercegovinum, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 83 = *vulgare*, Gaertn.
hirtiforme X, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 306. — Gall. mer.
littorale, Rouy & Fouc. l. c. 286 et 288 = *guttatum*, Mill.
majus, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 6 = *canadense*, Michx.
majus, Bicknell, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 257 [an praec. ?]. — Am. bor.
metilense, Coss. & Duviol ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 96, nomen; et *Ill. Fl. Atlant.* i. 112 t. 71 = *getulum*, Pomel.
Milleri, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 285 = *guttatum*, Mill.
monspessulanum X, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 311. — Gall. mer.
Nashi, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 147. — Florida.
nutans, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Akad.* Ser. II. ii. (1889) 129. — Calif.
occidentale, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 144. — Ins. S. Cruz. (Calif.).
ochroleucum X, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 303. — Gall.
Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 268. — Mexic.
rosmarinifolium, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.]. 33 = *H. Libanotis*, Willd.
Sancti-Antonii, Schweinf. ex Aschers. & Schweinf. Ill. Fl. Egypte [Mém. Inst. Egypt.] ii. (1887) 45 et 748 = *ventusum*, Boiss.
Scopolii, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 295 et 298 = *vulgare*, Gaertn.
skericense, Simonk. in *Termész. Füzet.* x. (1886) 180 = *rupifragum*, A. Kern.

HELIANTHUS, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1112.

atacamensis, Phil. in *Anal. Mus. nat. Chile* (1891) 48. — Chili.
aracuanus, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1894) 39. — Chili.
australis, Phil. l. c. 39. — Chili.
copiapinus, Phil. l. c. 37. — Chili.
Cusickii, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 415. — Oreg.
Gayanus, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 39. — Chili.

HELIANTHUS: —

imbaburensis, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 348. — Ecuad.
invenustus, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 284 = *Balsamorhiza invenusta*, Coville.
Navarri, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 37. — Chili.
niveus, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 173 = *Encelia nivea*, Benth.
niveus, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 350. — Peruv.
Stuebelii, Hieron. l. c. 349. — Peruv.

HELICHRYSUM, Vaill. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1113.

achyroclinoides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 328. — Madag.
album, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 24. — Natal.
argyrolepis, MacOwan, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 387. — Afr. austr.
amplexicaule, Baker, l. c. xxii. (1887) 491. — Madag.
Antandroi, S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 29. — Madag.
araneosum, Baker, l. c. xxii. (1887) 491. — Madag.
argyranthum, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 410. — Afr. trop. or.
arnicoides, Cordem. Fl. Ile Reunion (1875) 533 (= *Gnaphalium arnicoides*, Lam.). — Ins. Bourbon.
betsiliense, Klatt, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 24. — Madag.
biterrense, Coste & Mouret, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) p. cxli. = *H. Stoechas*, DC.
Buchananii, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 429. — Zambesia.
confertum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 25. — Natal.
cordatum, [Engl. ?] Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 132 [Quid ?]. — Afr. trop.
crispo-marginatum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 328. — Madag.
damarensis, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 275. — Afr. austro-occ. extratrop.
decorum, [N. E. Br. in] *Monteiro, Delagoa Bay* (1891) 170 [an DC. ?]. — Mossamb.
devium, J. Y. Johnson, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 62. — Madera.
densiflorum, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2286. — Afr. trop. austro-or.
dracunculifolium, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 292. — Persia.
Engleri, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 232. — Afr. trop. or.
ericifolium, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 329. — Madag.
Faradifani, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 29. — Madag.
farinosum, Baker, l. c. xxii. (1887) 491. — Madag.
fulvum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 146. — Natal.
geminatum, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 101. — Angola.
Guilelmi, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 426. — Afr. trop. or.
Hoehnelii, Schweinf. in *Hoehnel, zum Rudolph See. App.* (1892) 10; et ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 426, nomen. — Afr. trop. or.
Humboldtii, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 297. — Ins. Comor.
Kilimanjari, Oliver, in *Johnst. Kilim. Exped., App.* (1886) 342; et in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1887) 338. — Afr. trop. or.
Lastii, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 430. — Afr. trop. or.
Lentii, Volk. & O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 410. — Afr. trop. or.
leimanthium, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 101. — Angola.
leptolepis, [N. E. Br. in] *Monteiro, Delagoa Bay* (1891) 168. — Mossamb.
maranguense, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 411. — Afr. trop. or.
Marlothianum, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 275. — Afr. austro-occ. extratrop.
Mechowianum, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 101. — Angola.
Meyeri-Johannis, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 427. — Afr. trop. or.

HELICHRYSUM: —

milaniense, Britten, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 19. — Afr. trop.
ochraceum, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 297. — Ins. Comor.
parviflorum, [N. E. Br. in] *Monteiro, Delagoa Bay* (1891) 167. — Mossamb.
pauciflorum, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 351. — N. Zel.
phaceloma, F. Muell. & Tate, in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 81, nomen. — Austral.
Pichleri, Barbey, in *Bull. Soc. vaud. sci. nat.* xxi. (1885) 90. — Ins. Karpathos.
platycephalum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 492. — Madag.
Purdiei, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 440; et xxvi. 1893 (1894) 273. — N. Zel.
pygmaeum, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 12. — Syria.
reflexum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1894) 356. — Transvaal.
roseo-niveum, Marloth & O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 275. — Afr. austro-occ. extratrop.
sarmentosum, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 411. — Afr. trop. or.
Stuedenei, Schweinf. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 430, in syn. = *fruticosum*, Vathe.
Stirlingii, F. Muell. in *Vict. Natural.* vi. (Feb.-Mar. 1890) 166; et in *Bot. Centralbl.* xli. (1890) 398. — Austral.
Stuhlmannii, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 232. — Afr. trop. or.
valentinum, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 117. — Hisp.
Volkensii, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 410. — Afr. trop. or.
Webbii, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 168 (= *Gnaphalium Webbii*, Sch. Bip.) = *gossypinum*, Sch. Bip.
Whyteanum, Britten, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1894) 19. — Afr. trop.

HELIGIA, Lour. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 1117.
erratica, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 189. — Reg. Himal.

Forbesiana, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Sept. 1886) 63; et ex *Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 84. — N. Guin.
formosana, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 394; et in *Annal. Bot.* ix. (1895) 156. — Ins. Formos.
Sayeriana, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Nov. 1886) 93. — Austral.
travancorica, Bedd. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 191. — Deccan.
Whelani, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 55. — Austral.

HELICODEA, Lem. = **Billbergia**, Thunb. (Bromel.).

Baraquiniana, Lem. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 81, sphalm. (= *H. Bariquiana*, Lem.) = *B. decora*, Pepp. & Endl.

HELICONIA, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1117.

Bourgaeana, Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 14. — Mexic.
Burchellii, Baker, in *Ann. Bot.* vii. (1893) 197. — Bras. centr.
chocomiana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 284; et in *Gard. and For.* i. (1888) 161 fig. 31. — Guatem.
conferta, Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 13. — Ins. Guadalup.
curtispatha, Petersen, l. c. 15. — Panama.
elegans, Petersen, l. c. 12. — Am. trop.
Ferdinando-Coburgi, Szyszyl. ex Wawra, Itin. Princ. Sax. Coburg. ii. (1888) 88. — Bras.
illustris, Hort. Bull. ex Gard. Chron. (1893) i. 413; et ex *Illustr. Hort.* xlii. (1895) 288. — Ins. Maris austr.
imbricata, Baker, in *Ann. Bot.* vii. (1893) 191 (= *Bihai imbricata*, Kuntze). — Costarica.
platystachys, Baker, l. c. 199. — Columb., Guatem.

HELICONIA : —

- roseo-striata*, Hort. ex Illustr. Hort. xlii. (1895) 288. — Form. hort.
spectabilis, L. Lindl. & Rodigas, in Illustr. Hort. xxxix. (1892) 71 t. 556. — As. trop. austr.
Wagneriana, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1890) 13. — Panama.

HELICTERES, Pluk. ex Linn. (Stercul.). — Ind.

- Kew, i. 1117.
cuneata, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 24. — Bras.
Eichleri, K. Schum. l. c. 16. — Bras.
Lhotzkyana, K. Schum. l. c. 19. — Bras.
longepedunculata, K. Schum. l. c. 26. — Bras.
microphylla, K. Schum. l. c. 28. — Bras.
mollis, K. Schum. l. c. 22. — Bras.
Rusbyi, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 155. — Bolivia.
Urbani, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 22. — Guian. angl.
velutina, K. Schum. l. c. — Bras.

HELIETTA, Tul. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 1118.

- longifoliata*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 69. — Parag.

HELINUS, E. Mey. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 1118.

- integrifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 120, in syn. = *ovatus*, E. Mey.

HELIOCARPUS, Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 1118.

- attenuatus*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 420. — Mexic.
Palmeri, S. Wats. l. c. — Mexic.
polyandrus, S. Wats. l. c. — Mexic.

HELIOPHILA, Burm. f. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1118.

- patens*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2325. — Afr. austr.
tenuis, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 99. — Afr. austr.

HELIOPSIS, Pers. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1119.

- bupthalmoides*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 172 = *bupthalmoides*, Dunn.
filifolia, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 153. — Mexic.
helianthodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 343 = seq.
helianthoides, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 28 = *laevis*, Pers.

HELIOTROPIUM, [Tourn.] Linn. (Borag.). — Ind. Kew. i. 1119.

- abbreviatum*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 224. — Bolivia.
albiflorum, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 267. — Afr. austro-occ. extratrop.
albohispidum, Baker, in Kew Bull. (1895) 220. — Reg. Somal.
album, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 614 = *europaeum*, Linn.
andinum, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 224. — Bolivia.
auratum, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 56. — Am. austr. occ.
Balfouri, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 97 (= *H. odorum*, Balf. f.). — Ins. Socotr.
Boissieri, Guerke, l. c. 96 (= *H. confertiflorum*, Boiss. et Noë). — Persia.
bolivianum, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 225. — Bolivia.
brachystachyum, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 96 (= *Heliophytum brachystachyum*, DC.). — Peruv.
Breanum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 357. — Chili.
brevifolium, Phil. l. c. — Chili.
Bridgesii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 224. — Bolivia

HELIOTROPIUM : —

- canum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 356. — Chili.
congestum, Baker, in Kew Bull. (1894) 336. — Arabia.
crispulum, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 96 (= *Heliophytum crispulum*, Fresen.). — Bras.
drepanophyllum, Baker, in Kew Bull. (1894) 336. — Arabia.
Eduardi, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 59. — Abyss.
Fresenii, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 97 (= *H. incanum*, Fresen.). — Abyss.
Fumana, Guerke, l. c. (= *Schleidenia Fumana*, Fresen.). — Bras.
Gardneri, Guerke, l. c. (= *S. Gardneri*, Fresen.). — Bras.
Geissei, F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 352. — Chili.
glomeratum, Terrac, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 424. — Reg. Somal.
gymnostomum, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1755. — Gilgit.
hispidulum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 356. — Chili.
Izagae, Phil. l. c. 355. — Chili.
Kotschyi, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 95 (= *Heliophytum Kotschyi* Bunge) = *tuberculosis*, Boiss.
lagoense, Guerke, l. c. 97 (= *Schleidenia lagoensis*, Warm.). — Bras.
leiocarpum, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 168. — Parag.
leptostachyum, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 97 (= *Schleidenia leptostachya*, Fresen.). — Bras.
lineare, Guerke, l. c. 96 (= *Heliophytum lineare*, A. DC.). — Afr. austr.
linifolium, Guerke, l. c. 97 (= *Preslea linifolia*, A. St. Hil.). — Bras.
longiflorum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 354. — Chili.
longipetiolatum, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 97 (= *Schleidenia longipetiolata*, Fresen.). — Bras.
macranthum, Guerke, l. c. 97 (= *Schleidenia macrantha*, Fresen.). — Bras.
macrodon, Guerke, l. c. 97 (= *S. macrodon*, Fresen.). — Bras.
macrostachyum, Guerke, l. c. 96 = *macrostachyum*, Hemsl.
Martii, Guerke, l. c. 97 (= *H. dasycarpum*, Fresen.). — Bras.
messerschmidoides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 438 = *Tournefortia fruticosa*, Ker-Gawl.
messerschmidoides, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 94 = *praec. odorum*, Guerke, l. c. 96 (= *Heliophytum odorum*, Fresen.). — Bras.
Oliverianum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 268. — Afr. austro-occ. extratrop.
paradoxum, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 97 (= *Schleidenia paradoxa*, Mart.). — Bras.
parciflorum, Guerke, l. c. (= *S. parciflora*, Mart.). — Bras.
persicariaefolium, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 169 = *monostachyum*, Cham.
phyllasepalum, Baker, in Kew Bull. (1894) 30. — Zambesia.
piuhiense, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 97 (= *H. ovalifolium*, Fresen.). — Bras.
Pringlei, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 170. — Mexic.
pubescens, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 97 (= *Schleidenia pubescens*, Fresen.). — Bras.
pullulans, Guerke, l. c. (= *Schleidenia pullulans*, Fresen.). — Bras.
Schweinfurthi, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 350. — Syria.
stenostachyum, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 97 (= *Preslea stenostachya*, A. St. Hil.). — Bras.

HELIOTROPIUM : —

- subracemosum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 97 (= *Schleidenia subracemosa*, Warm.). — Bras.
subulatum, Hochst. ex Martelli, Fl. Bogos. (1886) 59 = *zeylanicum*, Lam.
tuberculatum, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 94 (= *Messerschmidia tuberculata*, Cham.). — Afr. austr.
Vatkei, Guerke, l. c. 96 (= *H. calcareum*, Vatke). — Afr. trop.
vernicosum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 355. — Chili.

HELIPTERUM, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1122.

- Battii*, F. Muell. in Vict. Natural. x. (Jan. 1894) 144. — Austral.
Fitzgibboni, F. Muell. in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xiii. (1890) 170; et ex Bot. Centralbl. xliii. (1890) 276; et xlv. (1891) 122. — Austral.
Jesseni, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Aug. 1890) 45; et ex Bot. Centralbl. xliii. (1890) 372. — Austral.
Troedelii, F. Muell. l. c. vii. (Oct. 1890) 76; et xlv. (1890) 237. — Austral.

HELLEBORINE, Martyn, Hist. Pl. (1736) t. 50; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 665 = **Calopogon**, R. Br. (Orchid.).

- graminifolia*, Kuntze, l. c. = *C. parviflorus*, Lindl.
multiflora, Kuntze, l. c. = *C. multiflorus*, Lindl.
pallida, Kuntze, l. c. = *C. pallidus*, Chapman.
tuberosa, Kuntze, l. c. = *C. pulchellus*, R. Br.

HELLEBORODES, Moehring = **Eranthis**, Salisb. (Ranunc.).

- cilicicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 3 = *E. cilicica*, Schott & Kotschy.
hyemale, Kuntze, l. c. = *E. hyemalis*, Salisb.
sibiricum, Kuntze, l. c. = *E. sibirica*, DC.
uncinatum, Kuntze, l. c. = *E. uncinata*, Turcz.

HELLEBORUS, [Tourn.] Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 1123.

- Baumgarteni*, Kovats, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 122 = *purpurascens*, Waldb. & Kit.
chinensis, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 27. — China.
fissus ×, Schiffr. in Denkschr. Akad. Naturforsch. lvi. (1890) 175. — Eur. or.
Heyderi ×, Hort. ex Schiffr. l. c. 169. — Reg. Caucas.
kamtschatensis ×, Hort. ex Schiffr. l. c. 173. — Hybr. artef. ?
Kochii, Schiffr. l. c. 85; et in Bot. Jahrb. xi. (1890) 108 = *orientalis*, Lam.
lucidus ×, Hort. ex Schiffr. l. c. 175. — Hybr. artef. ?
macranthus, Freyn, ex Schiffr. l. c. 76; et in Bot. Jahrb. xi. (1890) 105 = *niger*, Linn.
Personati, Masclef, in Bonnier, Rev. gén. Bot. i. (1889) 606; et in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 238 = *viridis*, Linn.
siculus, Schiffr. in Denkschr. Akad. Naturforsch. lvi. (1890) 123 t. 6. — Sicil.
spinescens, Tausch, ex Schiffr. in Bot. Jahrb. xi. 103, in syn. = *corsicus*, Willd.
thibetanus, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 190. — Tibet.
viridescens ×, Schiffr. in Denkschr. Akad. Naturforsch. lvi. (1890) 176. — Europ. centr.

HELLWIGIA, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 279. **ZINGIBERACEAE**.

- pulchra*, Warb. l. c. — Oceania.

HELODEA, Caruel, Epit. Fl. Europ. i. (1892) 106 = **HEODEA**, Reichb. = **Elodea**, Michx (Hydrochar.).**HELODES**, St. Lager = **ELODES**, Adans. = **Hypericum**, [Tourn.] Linn.

- glandulosum*, St. Lager, in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 84 = *H. Elodes*, Huds.

HELOPHYLLUM, Hook. f. = **Phyllachne**, Forst. (Stylid.).
muscoides, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 318. — N. Zel.

HELOSCIADIUM, Koch = **Apium**, Tourn. (Umbell.).
 biternatum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 718. — Chili.
simense, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 318, in syn. = *Pimpinella simensis*, Benth. & Hook. f.

HELWINGIA, Willd. (Aral.). — Ind. Kew. i. 1125.
chinensis, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 97. — China.

* HELXINE, Linn. = **Fagopyrum**, Tourn. (Polygon.).
acutata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 553 = *F. cymosum*, Meissn.
Fagopyrum, Kuntze, l. c. = *F. esculentum*, Moench.
tartarica, Kuntze, l. c. = *F. tataricum*, Gaertn.

HEMEROCALLIS, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1125.
aurantiaca, Baker, in Gard. Chron. (1890) ii. 94. — Hab.?
serotina, Focke, in Abh. Naturw. Ver. Brem. x. (1888) 158. — Hab.?
Thunbergii, Baker, in Gard. Chron. (1890) ii. 94. — Japon.

HEMIARTHRON, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 352 = **Loranthus**, Linn.
divaricatus, Van Tiegh. l. c. = *L. divaricatus*, H. B. & K.

HEMIBOEA, C. B. Clarke, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1798. **GESNERACEAE**.
follicularis, C. B. Clarke, l. c. sub t. 1798. — China.
Henryi, C. B. Clarke, l. c. t. 1798. — China.
subcapitata, C. B. Clarke, l. c. sub t. 1798. — China.

HEMICARPHA, Nees & Arn. = **Scirpus**, Tourn. (Cyperac.).
axillaris, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 104 = *S. micranthus*, Vahl.
micrantha, Britton, l. c.; et xxi. (1894) 35 = *S. micranthus*, Vahl.

HEMICYCLIA, Wight & Arn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1126.
Wightii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 339. — Deccan.

HEMIDIODIA, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 29 = **Spermaceae**, Dill. (Rubiace.).
ocimifolia, K. Schum. l. c. = *S. ocimifolia*, Willd.

HEMIGENIA, R. Br. (Labiata). — Ind. Kew. i. 1126.
Biddulphiana, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Sept. 1890) 67. — Austral.
Tysoni, F. Muell. l. c. x. (Nov. 1893) 109; et ex Bot. Centralbl. lvii. (1894) 62. — Austral.

HEMIGRAPHIS, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1120.
Blumeana, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fr. Kais. Wilh. Land (1889) 124. — N. Guin.
chinensis, T. Anders. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 238 (= *Ruellia chinensis*, Nees). — China.
primulifolia, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 219 = *primulaefolia*, Vell.
reptans, Engl. l. c. vii. (1886) 474 = *reptans*, T. Anders.
szechuanica, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 384. — China.

HEMILOPHIA, Franch. Pl. Delav. (1889) 65; Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 164. **CRUCIFERAE**.
pulchella, Franch. l. c. — Yunnan.

HEMIORCHIS, Kurz (Scitum.). — Ind. Kew. i. 1127.
Godefroyi, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1895) 1196. — As. trop. or.
Harmandi, Baill. l. c. — As. trop. or.
Thoreliana, Baill. l. c. — As. trop. or.

HEMIPERIS, Frapp. ex. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 235 = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).
brachycentra, Frapp. l. c. 250. — Ins. Borbon.
breviplectra, Frapp. l. c. 244. — Ins. Borbon.
calcaripotens, Frapp. l. c. 252. — Ins. Borbon.
clavata, Frapp. l. c. 247. — Ins. Borbon.
constellata, Frapp. l. c. 246. — Ins. Borbon.
crispa, Frapp. l. c. 241. — Ins. Borbon.
exilis, Frapp. l. c. 238. — Ins. Borbon.
falcata, Frapp. l. c. 241. — Ins. Borbon.
fissirostris, Frapp. l. c. 228, in syn. = *Acrostylis paradoxa*, Frapp.
globulosa, Frapp. l. c. 249. — Ins. Borbon.
imbellis, Frapp. l. c. 244. — Ins. Borbon.
ludens, Frapp. l. c. 239. — Ins. Borbon.
micrantha, Frapp. l. c. — Ins. Borbon.
nervilabris, Frapp. l. c. 250. — Ins. Borbon.
nitida, Frapp. l. c. 245. — Ins. Borbon.
pelicanides, Frapp. l. c. 251. — Ins. Borbon.
pleiades, Frapp. l. c. 243. — Ins. Borbon.
purpurea, Frapp. l. c. — 251. — Ins. Borbon.
ringens, Frapp. l. c. 245. — Ins. Borbon.
simplex, Frapp. l. c. 248. — Ins. Borbon.
tenella, Frapp. l. c. 237. — Ins. Borbon.
trilinguis, Frapp. l. c. 242. — Ins. Borbon.

HEMIPILIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1127.
flabellata, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 152. — China occ.

HEMISTEPTA, Bunge = **Saussurea**, DC. (Compos.).
carthamodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 344 = *S. affinis*, Spreng.

HEMITOMES, A. Gray = **Newberrya**, Torr. (Monotrop.).
pumilum, Greene, in Erythea, ii. (1894) 121. — Calif.

HEMIZONIA, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1127.
anomala, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. Suppl. (1886) 451. — Calif.
citrina, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 194. — Calif.
Clevelandi, Greene, l. c. — Calif.
Greeneana, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 24. — Ins. S. Benito.
Heermannii, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 194. — Calif.
Kelloggii, Greene, l. c. — Calif.
Palmeri, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 24. — Calif.
scabrella, Drew, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 151. — Calif.

HEMSLEYA, Cogn. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 490; et in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1822. **CUCURBITACEAE**.
chinensis, Cogn. l. c. — China.
tonkinensis, Cogn. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 613. — Tonkin.

HEMSLEYNA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 88 = **Thryallis**, Mart. (Malpigh.).
brachystachya, Kuntze, l. c. = *T. brachystachya*, Lindl.
latifolia, Kuntze, l. c. = *T. latifolia*, Mart.
longifolia, Kuntze, l. c. = *T. longifolia*, Mart.

HENNINGSOCARPUM, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 117 = **Llavea**, Liebm. (Celastr.).
integrifolium, Kuntze, l. c. = *L. integrifolia*, Hemsl.
viscosum, Kuntze, l. c. = *L. viscosa*, Liebm.

HENOSIS, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 771; vi. (1890) 189; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2051. **ORCHIDEAE**.
longipes, Hook. f. l. c. (= *Bulbophyllum longipes*, Reichb. f.). — Tenass.

HENRIBAILLONIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 606 = **Cometia**, Thou. (Euphorh.).
lucida, Kuntze, l. c. 607 = *C. lucida*, Baill.
Thouarsii, Kuntze, l. c. = *C. Thouarsii*, Baill.

HENRIETTEA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1128.
Glazioviana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 532. — Bras.
Saldanhaei, Cogn. l. c. — Bras.
Spruceana, Cogn. l. c. 530. — Bras.

HENRIETTELLA, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1128.
boliviensis, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1045. — Bolivia.
glabra, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 538 = *umbelliflora*, Triana.
Glazioviana, Cogn. l. c. 539. — Bras.
hispidula, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 30; et in DC. Monog. Phan. viii. (1891) 1046. — Columb.
membranifolia, Cogn. [in Sint. Pl. Portoric. n. 5730 et 5968] in DC. l. c. 1042. — Ins. Portorii.
ovata, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 540. — Bras.
tovarensis, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1044. — Venez.

HENRIQUEZIA, Spruce (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1129.
Jenmani, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 135. — Guiana angl.

HENRYA, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 111; et in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1971. **APOCYNACEAE**.
Augustiniana, Hemsl. l. c. — China.

HENRYA, Nees = **Tetramerium**, Nees (Acanth.).
costata, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 406. — Mexic.
grandifolia, Fernald, in Conlt. Bot. Gaz. xx. (1895) 537. — Mexic.
imbricans, J. D. Smith, in Coult. l. c. xvi. (1891) 198. — Guatem.

HENSLOVIA, Blume (Santal.). — Ind. Kew. i. 1129.
sessiliflora, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 409. — China.

HEPATICA, Dill. ex Linn. = **Anemone**, Linn. (Ranunc.).
acuta, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vi. (1891) 234 = *A. acutiloba*, Laws.
media × *Simonk.* Enum. Fl. Transsilv. (1886) 58; et in Termész. Füzet. x. (1886) 179. — Transsilv.

HEPPIELLA, Regel (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 1129.
viscida, Fritsch, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 176 = *atrosanguinea*, Regel.

HEPTAPLEURUM, Gaertn. (Aral.). — Ind. Kew. i. 1129.
gymnocarpum, Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 6 (1890) 183 (= *Pterotropis gymnocarpa*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.
impresum, C. B. Clarke, ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 243. — Reg. Himal.
littorale, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 647 (= *Parapanax littorale*, Miq.). — Sumatra.
octophyllum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = *octophyllum*, Benth. & Hook. f.
redivivum, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 648 (= *Agalma redivivum*, Seem.). — Borneo.
rugosum, Bourl. l. c. (= *A. rugosum*, Miq.). — Java.
rugosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = *praec.*
samoense, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 6 (1890) 183 (= *Paratropis samoensis*, A. Gray). — Ins. Samoa.

HEPTAPLEURUM : —

sessile, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1891) 648 (= *Brassia sessilis*, Seem.). — Sumatra.
vitense, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 7 (1892) 409, in add. (= *Agalma vitense*, Seem.). — Ins. Fiji.
Volkenzii, Harms, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 41 (= *Schefflera Volkenzii*, Harms). — Afr. trop. or.

HERACLEUM. Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 1130.

acuminatum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 144. — Yunnan.
atlanticum, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.], (1889) 370 = *H. Sphondylium*, Linn.
Baillietianum, Timb.-Lagr. & Marçais, in Lucante, Rev. de Bot. vii. (1888-89) 331. — Gall. austro-occ.
calcareum, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 116. — Reg. Cauc.
macranthum, Borb. Enum. pl. Comit. Castrif. (1888) 236 = *H. Sphonaylium*, Linn.
massyciticum, Staff & Wettst. ex Staff, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 27. — As. Min.
Rapula, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 145. — Yunnan.
scabridum, Franch. l. c. — Yunnan.
scabrum, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 115. — Reg. Cauc.
simplicifolium, Wettst. in Spraw Kom. Fizyogr. Krajow. xxii. (1888) II. 210. — Hung.
ternatum, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) II. 46; et Vestnika (1893) 46. — Bulg.
verticillatum, Panic, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 269. — Maced.
yunnanense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 143. — Yunnan.

HERBERTIA, Sweet (Iridae). — Ind. Kew. i. 1131.

Watsoni, Baker, Handb. Irid. (1892) 71. — Texas.

HERITIERA, [Dryand.] Ait. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 1130.

sylvatica, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 66. — Ins. Philipp.

HERMANNIA, Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 1131.

abyssinica, K. Schum. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 236, in obs. = *Mahernia abyssinica*, Hochst.
affinis, K. Schum. ex Schinz, l. c. xxxi. (1890) 180. — Afr. austro-occ. extratrop.
amabilis, Marloth, ex K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 42. — Afr. austro-occ. extratrop.
Bolusii, Szyszyl. Polypet. Rehmann. (1887) 49. — Afr. austr.
cana, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 42. — Afr. austr.
cristata, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 156; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7173. — Afr. austr.
diffusa, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1890) 80 = *diffusa*, Linn. f.
exappendiculata, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 25 [Quid?]. — Afr. trop.
Fischeri, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 134. — Afr. trop. or.
fruticulosa, K. Schum. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 233. — Afr. austro-occ. extratrop.
Guerkeana, K. Schum. ex Schinz, l. c. 231. — Afr. austro-occ. extratrop.
glanduligera, K. Schum. ex Schinz, l. c. 232. — Afr. austro-occ. extratrop.
grandifolia, N. E. Lr. in Kew Bull. (1895) 143. — Transvaal.
Helianthemum, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 44. — Afr. austro-occ. extratrop.
inamocera, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 270. — Afr. trop. or.
lanceifolia, Szyszyl. Polypet. Rehmann (1887) 141. — Transvaal.

HERMANNIA : —

linnaeoides, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 42 = *Mahernia gracilis*, Harv.
malvaefolia, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 24. — Natal.
montana, N. E. Br. l. c. 143. — Transvaal.
Oliveri, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 134. — Afr. trop. or.
Palmeri, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 67. — Calif.
Rehmannii, Szyszyl. Polypet. Rehmann. (1887) 47. — Afr. austr.
Schinzii, K. Schum. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 235. — Afr. austro-occ. extratrop.
solaniflora, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 43. — Afr. austro-occ. extratrop.
stellulata, K. Schum. l. c. 42 = *Mahernia stellulata*, Harv.
tigrensis, F. Hoffm. Beitr. Kennt. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 13. — Afr. centr. or.
verticillata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1890) 80 = *Mahernia verticillata*, Linn.

HERMBSTAEDTIA, Reichb. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 1133.

argenteiformis, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 209. — Afr. austro-occ. extratrop.
linearis, Schinz, l. c. 210. — Afr. austro-occ. extratrop.
scabra, Schinz, l. c. 209. — Afr. austro-occ. extratrop.

HERMESIAS, Loeff. = **Brownea**, Jacq. (Legumin.).

Ariza, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 191 = *B. Ariza*, Benth.
capitellata, Kuntze, l. c. = *B. capitella*, Jacq.
cauliflora, Kuntze, l. c. = *B. cauliflora*, Poepp. & Endl.
coccinea, Kuntze, l. c. = *B. coccinea*, Loeff.
grandiceps, Kuntze, l. c. = *B. grandiceps*, Jacq.
latifolia, Kuntze, l. c. = *B. latifolia*, Jacq.
leucantha, Kuntze, l. c. = *B. leucantha*, Jacq.
leucantha, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1892) 146 = *praec.*
negrensis, Taub. l. c. = *B. negrensis*, Benth.
racemosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 191 = *B. racemosa*, Jacq.
Rosa, Kuntze, l. c. = *B. Rosa-de-monte*, Berg.
speciosa, Kuntze, l. c. = *B. Rosa-de-monte*, Berg.

HERMINIUM, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1133.

alaschanicum, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 105. — Mongol.
biporosum, Maxim. l. c. 106. — Reg. Tangut.
Duthiei, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 130. — Reg. Himal.
failax, Hook. f. l. c. 129 = *fallax*, Lindl.
grandiflorum, Lindl. ex Hook. f. l. c. = *H. Josephi*, Reichb. f.
orbiculare, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 129. — Reg. Himal.
pugioniforme, Lindl. ex Hook. f. l. c. 130. — Reg. Himal.

HERMIONE, Salisb. = **Narcissus**, Tourn. [Amaryll.].

lacticolor, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 7 = *N. Tazetta*, Linn. var.

HERMUPOA, Loeff. = **Steriphoma**, Spreng. (Capparid.).

elliptica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 38 = *S. elliptica*, Spreng.
paradoxa, Kuntze, l. c. = *S. paradoxa*, Endl.
peruviana, Kuntze, l. c. 39 = *S. peruviana*, Spruce.

HERNANDIA, Plum. ex Linn. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 1134.

beninensis, Welw. ex Henriques, in Bolet. Soc. Bot. x. (1892) 155. — Ins. S. Thom.

HERNIARIA, [Tourn.] Linn. (Illecebr.). — Ind. Kew. i. 1134.

Hartungii, Parl. ex C. Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 234. — Ins. Canar.
maskatensis, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge. vi. (1894) 51. — Arabia.

HERPESTIS, Gaertn. f. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1134.

auriculata, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 172. — Mexic.
caroliniana, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 39 = *amplexicaulis*, Pursh.
Eiseni, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 278 (= *Ranapalus Eiseni*, Kell.) = *rotundifolia*, Pursh.
exilis, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 191. — Calif.

HERSCHELIA, Lindl. = **Disa**, Berg. (Orchid.).

graminifolia, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 111 = *D. graminifolia*, Ker-Gawl.

HERTIA, Neck. = **Othonnopsis**, Jaub & Spach (Compos.).

angustifolia, cheirifolia, ciliata, chrytaefolia, cneorifolia, intermedia, pallens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 344 = *homonyma omnia* Othonnopsidis.
serrulata, Kuntze, l. c. — Afr. austr.

HERYA, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 410. **CELASTRINEAE**.

anomala, Cordem. l. c. — Ins. Borbon.

HERZOGIA, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 60; Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. II. (1890) 669 = **Evodia**, Forst. (Rutac.).

odorifera, K. Schum. II. cc. 60; et 670 = *E. hortensis*, Forst.

HESPERALCEA, Greene, Pittonia, ii. (Sept 1892) 301 = **Sidalcea**, A. Gray (Malv.).

malachroides, Greene, l. c.; E. G. Baker, in Journ. Bot. (1894) 36 = *S. malachroides*, A. Gray.

HESPERALOEË, Engelm. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1136.

parviflora, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 436 = *yuceaefolia*, Engelm.

HESPERANTHA, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1136.

albomarginata, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 251 = *Eremocrinum albomarginatum*, M. E. Jones.
alpina, Pax, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 174 = *Geissorhiza alpina*, Hook. f.
candida, Baker, Handb. Irid. (1892) 151. — Afr. austr.
fibrosa, Baker, l. c. 149. — Natal.
gracilis, Baker, l. c. — Afr. austr.
kilimanjarica, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 402. — Afr. trop. or.
lactea, Baker, Handb. Irid. (1892) 151. — Natal.
leucantha, Baker, l. c. 150. — Natal.
modesta, Baker, l. c. 150. — Natal.
namaquensis, Baker, l. c. 149. — Afr. austro-occ. extratrop.
pulchra, Baker, l. c. — Afr. austr.
Tysoni, Baker, l. c. — Afr. austr.
Volkenzii, Harms, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 28. — Afr. trop. or.
Woodii, Baker, Handb. Irid. (1892) 150. — Natal.

HESPERANTHEMUM, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 490 = **Anthacanthus**, Nees (Acanth.).

aciculare, armatum, microphyllum, purpurascens, spinosum, tetrastichum, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Anthacanthi.

HESPERIDOPSIS, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 30 gen. coll. Crucifer.

brevipes, Kuntze, l. c. = *Malcomia brevipes*, Boiss.
circinatus, Kuntze, l. c. = *M. circinata*, Boiss.
dentatus, Kuntze, l. c. = *Dontostemon dentatus*, Ledeb.

HESPERIDOPSIS: —

- eglandulosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 30 = *Dontostemon dentatus*, Ledeb.
integrifolius, Kuntze, l. c. = *D. integrifolius*, Ledeb.
micranthus, Kuntze, l. c. = *D. micranthus*, C. A. Mey.
oblongifolius, Kuntze, l. c. = *D. dentatus*, Ledeb.
perennis, Kuntze, l. c. = *D. perennis*, C. A. Mey.
pinnatifidus, Kuntze, l. c. = *D. pectinatus*, C. A. Mey.
scorpioides, Kuntze, l. c. = *Malcolmia scorpioides*, Boiss.

- HESPERIS**, Linn. (Crucif.). — Ind. Kew, i. 1136.
aintabica, Post, in *Fourn. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 420. — Syria.
aladabadensis, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 32. — Persia.
carpatia, Zapalowicz, in *Spraw. Kom. Fizyogr. Krajowej*, xxiv. (1889) 106. — Eur.
desertorum, Velen, in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1892-93) 7. — Bulg.
dinarica, G. Beck, in *Fahreskat. Wien. bot. Tauschver.* (1894) 6 et in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, x. (1895) 174. — Born.
nivalis, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 45. — Persia.
meda, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 32. — Persia.
sabanda, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 3 = *matronalis*, Linn.

- HESPERIS**, Linn. (1835) emend. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 30-33 et 934-36 = gen. collect. Crucif.
abyssinica, *altissima*, *amplexicaulis*, *andina*, *anomala*, *antarctica*, *arctica*, *Arnottiana*, *arundana*, *Assoana*, *athrocarpa*, *auriculata*, *axillaris*, *Belangeri*, *Berlandieri*, *Berteroana*, *brachycarpa*, *Bungei*, *calycina*, *capensis*, *ciliolata*, *confusa*, *contorta*, *corymbosa*, *corniculata*, *Coulteri*, *crassifolia*, *Cumingiana*, *dahurica*, *damascena*, *decipiens*, *diffusa*, *dumulosa*, *elliptica*, *Eschscholtziana*, *exasperata*, *foliosa*, *fragilis*, *fugax*, *fuscescens*, *garicipina*, *glauca*, *gracilis*, *granatensis*, *Griffithiana*, *halophila*, *heteromalla*, *himalaica*, *hispanica*, *hispidula*, *imbricatifolia*, *incisa*, *Jacquemontii*, *juncica*, *lasiocarpa*, *lasioloba*, *laxiflora*, *Lechleri*, *Ledebourii*, *leptocarpa*, *Limosella*, *linifolia*, *Loeselii*, *magellanica*, *Mandonii*, *minutiflora*, *mollissima*, *myriophylla*, *nivea*, *officinalis*, *oligantha*, *Orbignyana*, *orientalis*, *orophila*, *Palmeri*, *Parryi*, *parvifolia*, *patula*, *pauciflora*, *peruviana*, *petraea*, *Piasezkii*, *pinnatifida*, *polyceratia*, *polysperma*, *Preauxiana*, *pumila*, *pusilla*, *ramosa*, *ramulosa*, *reflexa*, *Remyana*, *sagittata*, *salsuginea*, *Schaffneri*, *scholaris*, *septacea*, *solidaginea*, *Sophia*, *spectabilis*, *stenophylla*, *streptocarpa*, *strictissima*, *stricta*, *subspinescens*, *subulata*, *suffruticosa*, *supina*, *tanacetifolia*, *Thaliana*, *tibetica*, *Tilingii*, *toxophylla*, *tripinnata*, *Turczaninowii*, *uniflora*, *verna*, *versicolor*, *virgata*, *Virletii*, *Wallichii*, *Weddellii*, *wolgense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 934-36 = *homonyma omnia* Sisymbrii.

- aculeolata*, *bicolor*, *Bungei*, *cabulica*, *circinnata*, *cymbalaria*, *flexuosa*, *gracca*, *Ledebourii*, *Meyeri*, *nana*, *Orsiniana*, *strigosa*, *torulosa*, Kuntze, l. c. 934-36 = *homonyma omnia* Malcolmiae.

- arabica*, *aspera*, *chenopodifolia*, *damascena*, *dumulosa*, *elliptica*, *farinosa*, *fenestralis*, *flavida*, *fragrans*, *glandulosa*, *incana*, *livida*, *lunata*, *montana*, *obovata*, *ovatifolia*, *revoluta*, *robusta*, *Stoddartii*, *thessala*, *varia*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Matthiolae.

- acaulis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 934 = *Matthiola humilis*, DC.

- alpina*, Kuntze, l. c. = *Braya alpina*, Sternb.

- Bourgeana*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium Bourgaeum*, Fourn.

- brachycarpa*, Kuntze, l. c. = *S. canescens*, Nutt.

- brassiciformis*, Kuntze, l. c. = *S. brassicaeforme*, C. A. Mey.

- brevipes*, Kuntze, l. c. = *S. nudum*, Boiss.

- Broussonetii*, Kuntze, l. c. 935 = *Malcolmia littorea*, R. Br.

- cabulica*, Kuntze, l. c. 934 = *Sisymbrium pumilum*, Steph.

HESPERIS: —

- chorastanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 935 = *Matthiola chorassanica*, Bunge.
ciliolata, Kuntze, l. c. 934 = *Sisymbrium ciliolatum*, Fourn.
cochahuensis, Kuntze, l. c. = *S. cochahuense*, Wedd.
Columnae, Kuntze, l. c. 33 = *S. orientale*, Linn.
confusissima, Kuntze, l. c. 936 = *Malcolmia nana*, Boiss.
deltodea, Kuntze, l. c. 934 = *Sisymbrium deltoideum*, Hook.
dubia, Kuntze, l. c. 935 = *Braya rosea*, Bunge.
erysimoides, Kuntze, l. c. 33 = *Sisymbrium erysimoides*, Desf.
Eschscholtziana, Kuntze, l. c. 935 = *Braya Eschscholtziana*, Benth. & Hook. f.
exacoides, Kuntze, l. c. = *Malcolmia exacoides*, Spreng.
falcata, Kuntze, l. c. 934 = *Sisymbrium falcatum*, Fourn.
flavissima, Kuntze, l. c. = *Smelowskia flavissima*, Kar. & Kir.
Galleotiana, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium Galeotianum*, Fourn.
glabella, Kuntze, l. c. 935 = *Braya alpina*, Sternb.
glabra, Kuntze, l. c. 936 = *Matthiola incana*, R. Br.
grandiflora, Kuntze, l. c. = *Malcolmia Bungei*, Boiss.
Hartwegiana, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium incisum*, Engelm.
Hermanniana, Kuntze, l. c. 936 = *S. persicum*, Schrad.
humifusa, Kuntze, l. c. 934 = *Arabis lyrata*, Linn.
hygrophylla, Kuntze, l. c. 936 = *Sisymbrium humile*, C. A. Mey.
integrifolia, Kuntze, l. c. = *Matthiola crassifolia*, Boiss. & Gay.
involuta, Kuntze, l. c. 935 = *Braya involutata*, Ledeb.
iriodes, Kuntze, l. c. 934 = *Sisymbrium Irio*, Linn.
limosellodes, Kuntze, l. c. 935 = *S. Limosella*, Fourn.
littoralis, Kuntze, l. c. = *S. litorale*, Phil.
longepedicellata, Kuntze, l. c. 934 = *S. incisum*, Engelm.
maderensis, Kuntze, l. c. 33 = *Matthiola maderensis*, Lowe.
malcolmioides, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium malcolmioides*, Coss. & Dur.
maxima, Kuntze, l. c. = *S. Irio*, Linn.
Meyeri, Kuntze, l. c. = *Malcolmia Ledebourii*, Boiss.
micrantha, Kuntze, l. c. 935 = *Matthiola parviflora*, R. Br.
millefolia, Kuntze, l. c. 33 = *Sisymbrium millefolium*, Ait.
niagarensis, Kuntze, l. c. 935 = *S. officinale*, Scop.
nubigena, Kuntze, l. c. (= *Eutrema nubigena*, Humb. & Bonpl.). — Ecuador.
pandurifolia, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium pandurifolium*, Kuntze.
pilosa, Kuntze, l. c. 935 = *Braya pilosa*, Hook.
pinnata, Kuntze, l. c. 936 = *Sisymbrium canescens*, Nutt.
Planchoniana, Kuntze, l. c. (= *Eudema grandiflora*, Planch.). — Am. austr.
primulifolia, Kuntze, l. c. 935 = *Eutrema primulaefolia*, Hook. f. & Thoms.
promontorii, Kuntze, l. c. 936 = *Sisymbrium capense*, Thunb.
pubescens, Kuntze, l. c. = *S. pinnatum*, Barn.
pyrenaica, Kuntze, l. c. = *S. austriacum*, Jacq.
rigidula, Kuntze, l. c. 935 = *S. altissimum*, Linn.
rosea, Kuntze, l. c. 936 = *Braya rosea*, Bunge.
ruderalis, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium officinale*, Scop.
runawurensis, Kuntze, l. c. = *S. rupestre*, Edgew.
rupestris, Kuntze, l. c. 935 = *Eutrema Humboldtii*, Spreng.
sepulata, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium altissimum*, Linn.
siliquosa, Kuntze, l. c. = *Braya siliquosa*, Bunge.
silvestris, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium lyratum*, Burm.

HESPERIS: —

- spathulifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 935 = *Sisymbrium spathulaefolium*, A. Gray.
stelligera, Kuntze, l. c. = *Matthiola torulosa*, DC.
Thomsonii, Kuntze, l. c. = *S. Thomsonii*, Hook.
titicacense, Kuntze, l. c. = *S. titicacense*, Walp.
versicolor, Kuntze, l. c. = *Braya versicolor*, Turcz.
Villarsii, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium austriacum*, Jacq.
Zanoni, Kuntze, l. c. = *S. pinnatifidum*, DC.

HESPEROCHIRON, S. Wats. (Hydrophyll.) —

- Ind. Kew, i. 1137.
ciliatus, Greene, *Pittonia*, i. (Mar. 1889) 282. — Nevada.
nanus, Greene, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 110 = *californicus*, S. Wats.

HESPEROMANNIA, A. Gray (Compos.). —

- Ind. Kew, i. 1137.
arbuscula, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 232. — Ins. Sandvic.

HESPEROPEUCE, Lemmon, Third Rep. Calif.

- St. Board Forest (1890) 100, 126 t. 9 = **Tsuga**, Carr. (Conif.).
Pattoniana, Lemmon, l. c. = *T. Pattoniana*, Engelm.

HESSEA, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew, i. 1137.

- Rehmanni*, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 22. — Transvaal.
spiralis, Baker, l. c. 22. — Afr. austr.
Zeyheri, Baker, l. c. — Afr. austr.

HETAERIA, Blume (Orchid.). — Ind. Kew, i. 1137.

- elata*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 116. — Perak.
Helferi, Hook. f. l. c. 115. — Tenass.
occulta, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 57 (= *H. occulta*, Lindl.) = *Platylepis goodyeroides*, Reichb. f.
rubicunda, Drake, *Fl. Polyn. Franc.* (1892) 218, in obs. (= *H. rubicunda*, Reichb. f.); et Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 7 (1892) 312 = *Ramphidia rubicunda*, Reichb. f.
Societatis, Drake, l. c. — Ins. Societ.
vaginalis, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 58 = *vaginalis*, Reichb. f.

HETERADELPHIA, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 108; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 302. **ACANTHACEAE**.

- Paulowilhelmia*, Lindau, l. c. — Ins. S. Thom.

HETERANTHERA, Ruiz & Pav. (Ponteder.). — Ind. Kew, i. 1138.

- dubia*, Mac Mill. *Metasp. Minn.* (1892) 138 = *graminea*, Vahl.
dubia, Morong, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 105 = *praec.*

HETEROCENTRUM, Hemsl. = **HETEROCENTRUM**, Hook. & Arn. = **Heeria**, Schlecht (Melast.).

- Arstedii*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras. xiv. III.* (1885) 297 = *H. Oerstedii*, Cogn.
elegans, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 247 [*Heterocentrum*] = *Heeria elegans*, Schlecht.
Oerstedii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras. xiv. IV.* (1883) 597 — Am. centr.

HETERODERIS, Boiss. = **Crepis**, Vaill. (Compos.).

- egyptiaca*, Schweinf. ex Aschers. & Schweinf. [*Suppl. Illustr. Fl. Egypte*] in *Mém. Inst. Egypt.* ii. (1889) 766. — Egypt.

HETEROGAURA, Rothrock (Onagrar.). — Ind. Kew, i. 1139.

- heterandra*, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 106 = *californica*, Rothrock.

HETEROMORPHA, Cass. = **Heterolepis**, Cass. (Compos.).

aliena, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 344 = *H. decipiens*, Cass.

inuloides, Kuntze, l. c. sphalm. = *H. decipiens*, Cass.

mitis, Kuntze, l. c. = *H. mitis*, DC.

peduncularis, Kuntze, l. c. = *H. peduncularis*, DC.

HETEROMORPHA, Cham. & Schlecht. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 1139.

stenophylla, Welw. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 317, nomen. — Angola.

HETEROPHRAGMA, DC. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 1140.

longipes, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 31. — Zambesia. *quadriloculare*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 243 = *H. Roxburghii*, DC.

HETEROPOGON, Pers. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1140.

melanocarpus, Dewey, ex Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 493 = *acuminatus*, Trin.

HETEROPSIS, Kunth (Aroid.). — Ind. Kew. i. 1140.

Jenmani, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1949. — Guian. angl.

HETEROPTERIS, H. B. & K. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 1140.

amplexicaulis, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 67. — Parag.

cultriformis, Chod. in *Mém. Soc. sci. phys. Genève* xxxi. 2. n. 3 (1892) 18. — Parag.

pirayuensis, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 66. — Parag.

portillana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 402. — Mexic.

pseudoangustifolia, Chod. in *Arch. sci. phys. & nat.* (1890); ex Chod. in *Mém. Soc. sci. phys. Genève* xxxi. 2. n. 3 (1892) 17. — Parag.

retusa, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 2. — Guatem.

HETEROPTYXIS, Harv. (Lythrar.). — Ind. Kew. i. 1141.

canescens, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2407. — Transvaal.

HETEROSAMARA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 47 = **Polygala**, [Tourn.], Linn.

birmanica, Kuntze, l. c. = *P. birmanica*, Chod.

HETEROSCIADIUM, Lange, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 198. **UMBELLIFERAE**.

androphilum, Lange, l. c. — Hisp.

HETEROTHECA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1141.

deltoides, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 359. — Peruvia.

subaxillaris, Britton & Rusby, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1887) 10 = *H. Lamarkii*, Cass.

subaxillaris, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* i. (1891) 190 = *praeac.*

HETEROTOMA, Zucc. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 1142.

aurita, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Scr.* II. iii. (1891) 149. — Calif.

gibbosa, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 280. — Mexic.

HETEROTRICHUM, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1142.

Eggersii, Cogn. ex Stahl, *Estad. Fl. Puerto-Rico*, iv. (1886) 99; in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 282; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 956. — Ins. Puerto-Rico.

glandulosum, Cogn. in *DC. l. c.* 955. — Venez.

globuliflorum, Cogn. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxvii. 2 (1888) 176; et in *DC. l. c.* 958. — Costarica.

HEUCHERA, Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 1142.

Drummondii, Hort. ex Gard. Kew, *Herbac. Pl.* (1895) 227. — Hab.?

Hapemani, Coult. & Fischer, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 348 (= *Sullivantia Hapemani*, Coult.). — Am. bor.

maxima, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 149. — Ins. S. Cruz (Calif.).

novo-mexicana, Wheelock, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 200. — N. Mexic.

Williamsii, Eaton, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 62. — Montana.

HEURNIA, « R. Br. » ex K. Schum. (1895) 280; et in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 280 [sphalm.?] = **Huernia**, R. Br. (Asclep.).

HEWITTIA, Wight & Arn. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 1142.

Barbeyana, Chod. & Roulet, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 191. — Seneg.

sublobata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 441 = *bicolor*, Wight & Arn.

HEXALECTRIS, Rafin. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1143.

aphyllus, A. Gray, *Man. N. Am. Bot.* ed. 6 (1890) 501 = *aphylla*, Rafin.

HEXAPORA, *Curtisii*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 189, in obs. = *Micropora Curtisii*, Hook. f.

HEXAPTERA, Hook. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1143.

Constitutionis, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1893) 335. — Chili.

tridens, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 6. — Chili.

virens, Phil. l. c. — Chili.

HEYDIA, Dennst. = **Scleropyrum**, Arn. (Santal.).

Maingayi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 587 = *S. Maingayi*, Hook. f.

HIBBERTIA, Andr. (Dillen.). — Ind. Kew. i. 1144.

Aubertii, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 119 = *coriacea*, Baill.

Brongniartii, Gilg, l. c. 115 = *Trisema salicifolia*, Brongn. & Gris.

conspicua, Gilg, l. c. 118 = *Pachynema conspicuum*, Drum. & Harv.

coriacea, Gilg, l. c. 115 = *Trisema coriacea*, Hook. f.

cuneiformis, Gilg, l. c. 118 = *Candollea cuneiformis*, Labill.

Drummondii, Gilg, l. c. 116 = *H. Ochrolasia*, Benth.

Ferdinandi-Muelleri, Gilg, l. c. 117 = *glaberrima*, F. Muell.

glaberrima, Gilg, l. c. 118 = *polygonoides*, F. Muell.

Millari, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* ii. (1888) 5. — Austral.

raccmosa, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 118 = *Candollea pedunculata*, R. Br.

Readii, Hort. ex Gilg, l. c. 120. — Hab.?

scandens, Gilg, l. c. 117 = *volubilis*, Andr.

tetrandra, Gilg, l. c. 118 = *Candollea tetrandra*, Lindl.

Vieillardii, Gilg, l. c. 115 = *Trisema Vieillardii*, Brongn. & Gris.

Wayapii, Gilg, l. c. — N. Caled.

HIBISCUS, Linn. (Malv.). — Ind. Kew. i. 1145.

albiflorus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 68 = *Gossypium roseum*, Tod.

anomalus, Kuntze, l. c. = *G. anomalum*, Wawra & Peyr.

argutus, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 212. — Reg. Somal.

australis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Fugosia australis*, Benth.

barbadensis, Kuntze, l. c. 67 = *Gossypium barbadense*, Linn.

HIBISCUS: —

biseptus, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 418. — Mexic.

Blumei, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Thespesia macrophylla*, Blume.

Burtonii, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* ii. (1891) 7. — Austral.

campestris, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Fugosia campestris*, Benth.

Cavanillesii, Kuntze, l. c. = *F. digitata*, Pers.

cernuus, Kuntze, l. c. 68 = *Gossypium cernuum*, Tod.

cytisifolius, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 447. — Madag.

deciduus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 68 = *Gossypium barbadense*, Linn.

Drummondii, Kuntze, l. c. 69 = *Fugosia Drummondii*, A. Gray

drynarioides, Kuntze, l. c. = *Gossypium drynarioides*, Seem.

Engleri, K. Schum. l. c. — Afr. austro-occ. extratrop.

flaviflorus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 [flaviflorum] = *Fugosia flaviflora*, F. Muell.

Fleckii, Guerke, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 404. — Afr. austro-occ. extratrop.

fruticosus, Kuntze, Rev. Gen. (1901) 68 = *Gossypium fruticosum*, Tod.

geminiflorus, Ernst, in *Rev. cient. mens. Univ. centr. Venez.* i. (1887) 219. — Venez.

gossypoides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Gossypium Sturtii*, F. Muell.

gravaefolius, G. Kuntze, in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 198, sphalm. = *grewiaefolius*, Hassk.?

Henningsianus, Guerke, in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1892) 559 — Bras.

Hilairii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Fugosia phlomidifolia*, A. Fuss.

Ingenhousii, Kuntze, l. c. 69 = *Ingenhouzia triloba*, Moq. & Sessé

Jussieu, Kuntze, l. c. = *Fugosia sulfurea*, St. Hil.

latifolius, Kuntze, l. c. = *F. latifolia*, Benth.

Lebelei, Naud. in *Rev. Hortic.* (1893) 449. — China.

Marlothianus, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 46. — Afr. austr.

Mesnyi, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 291. — Cochinch.

micranthela, « Cav. » ex G. Kuntze, in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 198. [Quid?]

myriaster, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 7. — Madag.

Nanking, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 68 = *Gossypium herbaceum*, Linn.

nummularifolius, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 448. — Madag.

oblatum, Baker, l. c. — Madag.

oligospermus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 68 = *Gossypium barbadense*, Linn.

Peterianus, Guerke, in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1892) 547. — Bras.

phanerandrus, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 297. — Madag.

phlomidifolius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 [phlomidifolia] = *Fugosia phlomidifolia*, A. Fuss.

Pohlil, Guerke, in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1892) 564. — Bras.

populifolius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Fugosia populifolia*, Benth.

Preslii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Thespesia tomentosa*, Presl.

purpurascens, Kuntze, l. c. 68 = *Gossypium arborescens*, Linn.

racemosus, Kuntze, l. c. = *G. barbadense*, Linn.

Redoutei, Kuntze, l. c. 69 = *Fugosia heterophylla*, Spach.

religiosus, Kuntze, l. c. 68 = *Gossypium herbaceum*, Linn.?

rhodanthus, Guerke, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 405. — Afr. trop.

Robinsonii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Gossypium Robinsonii*, E. Muell.

Schinzii, Guerke ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 176. — Afr. austro-occ. extratrop.

HIBISCUS: —

- Scotellii, E. G. Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 74. — Sierra Leone.
 Selloi, Guerke, in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1892) 554. — Bras.
 tomentosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 68 = *Gossypium tomentosum*, Nutt.
 tripartitus, Kuntze, l. c. 69 [tripartita] = *Fugosia tripartita*, Steud.
 Upingtoniae, Guerke, ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 178. — Afr. austro-occ. extra-trop.
 Volkensii, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 266. — Afr. trop. or.
 xiphocuspis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 447. — Madag.

HICKORIA, *olivaeformis* & Peccan, C. Mohr, in *Pharm. Rundsch.* viii. 56 [sphalm.] = **HICORIA**, Rafin. = **Hicoria**, Nutt.

HICORIA, Rafin. = **HICORIUS**, Rafin. = **Carya**, Nutt. (Jugland.).

- acuminata*, Dippel, *Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 336 = *C. sulcata*, Nutt.
alba, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 284 = *C. alba*, Nutt.
aquatica, Britton, l. c. = *C. aquatica*, Nutt.
Fernowiana, Sudworth, *Trees of Wash.* (1891), ex Sarg. *Sylva N. Am.* vii. (1895) 145 = *C. myristicaeformis*, Nutt.
glabra, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 284 = *C. glabra*, Mill.
laciniata, Sarg. in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 354; et *Sylva N. Am.* vii. (1895) 157 t. 398-99 = *C. sulcata*, Nutt.
mexicana, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 283 = *C. mexicana*, Engelm.
microcarpa, Britton, l. c. = *C. microcarpa*, Nutt.
minima, Britton, l. c. 284 = *C. amara*, Nutt.
myristicaeformis, Britton, l. c. 284 = *C. myristicaeformis*, Nutt.
odorata, Dippel, *Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 332 = *C. microcarpa*, Nutt.
ovata, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 283 = *C. alba*, Nutt.
Pecan, Britton, l. c. 282 = *C. olivaeformis*, Nutt.
sulcata, Britton, l. c. 283 = *C. sulcata*, Nutt.

HICORIUS, Rafin. = **Carya**, Nutt. (Jugland.).

- albus*, Sarg. in *Gard. and For.* ii. (1889) 460 = *C. alba*, Nutt.
aquaticus, Sarg. l. c. (= *H. aquaticus*, Rafin.) = *C. aquatica*, Nutt.
glaber, Sarg. l. c. = *C. porcina*, Nutt.
minimus, Sarg. l. c. 460 = *C. amara*, Nutt.
myristicaeformis, Sarg. l. c. = *C. myristicaeformis*, Nutt.
odoratus, Sarg. l. c. = *C. microcarpa*, Nutt.?
ovatus, Sarg. l. c. = *C. alba*, Nutt.
Pecan, Sarg. l. c. = *C. olivaeformis*, Nutt.
sulcatus, Sarg. l. c. = *C. sulcata*, Nutt.

HIERACIODES, Moehr. *Hort. Priv.* (1736) 48, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 344 = **Crepis**, Vaill. (Compos.).

- acaule*, *aculeatum*, *acuminatum*, *albidum*, *alpestre*, *alpinum*, *Andersonii*, *arabicum*, *armenum*, *asperum*, *athous*, *aurum*, *bellidifolium*, *bithynicum*, *bulbosum*, *Burenianum*, *bursifolium*, *caespitosum*, *carbonarium*, *causasicum*, *chrysanthum*, *ciliatum*, *Columnae*, *corniculatum*, *creticum*, *crocifolium*, *decumbens*, *depressum*, *dioriticum*, *Dioscoridis*, *djamilense*, *elbrusense*, *elegans*, *erucifolium*, *fallax*, *flexuosum*, *foetens*, *foetidum*, *fuscipappum*, *glomeratum*, *Gmelini*, *gracilipes*, *heterophyllum*, *heterotrichum*, *hierosolymitanum*, *Hookerianum*, *Huetii*, *incanum*, *insulare*, *integrum*, *intermedium*, *japonicum*, *jubatum*, *Keiskeanum*, *khorrassanicum*, *Kitaibelii*, *Kotschyannum*, *longipes*, *lyratum*, *macrophyllum*, *macropus*, *multicaule*, *multiflorum*, *nanum*, *neglectum*, *Newii*, *occidentale*, *olympicum*, *oreades*, *paludosum*, *pinnatifidum*, *praemorsum*, *pulchrum*, *pulmonariaefolium*, *turpureum*, *pygmaeum*, *racemiferum*, *Raulinii*, *Reuterianum*, *rigens*, *rubrum*,

HIERACIODES: —

- rumicifolium*, *runcinatum*, *Ruprechtii*, *Sahendi*, *Schimperii*, *Schultzii*, *setosum*, *sibiricum*, *Sibthorpiannum*, *Sieberi*, *silhetense*, *smyrnaeum*, *spathulatum*, *Stenoma*, *Stoliczkai*, *Suffrenianum*, *taraxacifolium*, *tectorum*, *tenuifolium*, *tingitanum*, *Triasii*, *vesicarium*, *viscidulum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 344-46 = *homonyma omnia* *Crepidis*.
abyssinicum, Kuntze, l. c. 345 = *Crepis RaepPELLII*, Sch. Bip.
achyrophorodes, Kuntze, l. c. = *C. achyrophoroides*, Vaitke.
andryalodes, Kuntze, l. c. = *C. chondrilloides*, Jacq.
auriculifolium, Kuntze, l. c. = *C. auriculaefolia*, Sieber.
caulescens, Kuntze, l. c. = *C. glauca*, Torr. & Gray.
chondrilloides, Kuntze, l. c. = *C. Jacquini*, Tausch.
comosum, Kuntze, l. c. = *C. comata*, Banks & Soland.
conyzifolium, Kuntze, l. c. = *C. grandiflora*, Tausch.
crocum, Kuntze, l. c. = *C. Pallasii*, Turcz.
divaricatum, Kuntze, l. c. 346 = *C. divaricata*, F. Schultz.
glabrum, Kuntze, l. c. = *C. glabra*, Boiss.
Heldreichianum, Kuntze, l. c. 345 = *C. divaricata*, Boiss. & Heldr.
hiemale, Kuntze, l. c. 346 = *C. taraxacifolia*, Thuill.
Kochianum, Kuntze, l. c. = *C. Kochii*, Tschihatch.
lampsanodes, Kuntze, l. c. = *C. lampsanoides*, Froel.
latiale, Kuntze, l. c. 345 = *C. lacera*, Tenore.
leontodontoides, l. c. = *C. leontodontoides*, All.
Loweannum, Kuntze, l. c. = *C. andryaloides*, Laws.
Marschallii, Kuntze, l. c. = *C. Marschallii*, Sch. Bip.
molle, Kuntze, l. c. = *C. succisaefolia*, Tausch.
montanum, Kuntze, l. c. = *C. incarnata*, Tausch.
Oliverianum, Kuntze, l. c. = *C. Hookeriana*, Oliver & Hiern.
oporinodes, Kuntze, l. c. = *C. oporinoides*, Boiss.
pannonicum, Kuntze, l. c. = *C. rigida*, Waldst. & Kit.
patulum, Kuntze, l. c. 346 = *Lapsana virgata*, Desf.
pontanum, Kuntze, l. c. 345 = *C. montana*, Reichb.
prenanthodes, Kuntze, l. c. = *C. prenanthoides*, Hemsl.
pterothecodes, Kuntze, l. c. = *C. pterothecoides*, Boiss.
pusillum, Kuntze, l. c. 346 (= *Heterodevis pusilla*, Boiss.). — Persia.
pyrenaicum, Kuntze, l. c. 345 = *C. blattarioides*, Vill.
ramosissimum, Kuntze, l. c. 346 = *C. ramosissima*, Urv.
robertioides, Kuntze, l. c. = *C. robertioides*, Boiss.
senecioides, Kuntze, l. c. = *C. senecioides*, Delile.
strictum, Kuntze, l. c. 345 = *C. Bungei*, Ledeb.
tergloviense, Kuntze, l. c. = *C. hyoseridifolia*, Reichb.
Turczaninowii, Kuntze, l. c. 346 = *C. Pallasii*, Turcz.
willemetioides, Kuntze, l. c. = *C. willemetioides*, Boiss.

HIERACIUM, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1149.

- abruptifolium*, Vukot. ex G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1893) 1309, in syn. = *racemosum*, Waldst. & Kit.
acanthodon, Arv. & Gautier, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 361. — Gall.
acrogymnon, Malme, in *Bot. Notiser* (1891) 178; et in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 248 = *vulgatum*, Fries.
acroleucum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 55; et *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. (1889) 69. — Scandinav.
acutulum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) = *H. Pilosella*, Linn.
adenocephalum, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 371 (= *Pilosella adenocephala*, Sch. Bip.). — Bolivia.

HIERACIUM: —

- adenoclinium*, Arv. *Hier. Alp.* (1888) 108. — Cors.
adpersum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) 48. — Scandinav.
aemulum, Arv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 331. — Pyren.
aflingense ×, Murr. in *Progr. Ober-Realsch. Innsbruck* (1891) 54; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1894) 97. — Tirol.
agronomon ×, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 171 = *florentinum*, All.
albaticum ×, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 651 et 666. — Albania.
albaticeps, *Dahlst. in Bot. Notiser* (1892) 165 = *murorum*, Linn.
albidulum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 18. — Scandinav.
alboviride, M. Brenner, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 112. — Europ.
Alfenzinum, Evers, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 425. — Austria.
amblycephalooides, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 13; et ii. 4 (1894) 31. — Scandinav.
amblyphyllarium, *Dahlst. l. c.* ii. 4 (1894) 58. — Scandinav.
amblyphyllum, *Dahlst. l. c.*, in syn. = *amblyphyllarium*, *Dahlst.*
amphibolum ×, A. Rehm, in *Oest. Bot. Zeitsch.* xlv. (1894) 241. — Austria.
amphigenum, Arv. ex Briq. in *Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 211; et in *Bull. Herb. Boiss.* v. 623. — Sabaud.
ampliceps, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 39. — Scandinav.
amplifolium, *Almq. ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. (1890) 69. — Scandinav.
amplifolium, Arv. *Hier. Alp.* (1888) 105. — Gall.
amplum, Greene, in *Erythra*, iii. (1895) 101. — Washington.
amygdalinum, Arv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 370. — Pyren.
anacraspedon, A. Rehm, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlii. (1895) 330 = *flagellare*, Willd.
anadenium, Arv. *Hier. Alp.* (1888) 41 = *subnivalis*, Gren. & Godr.
anatolicum, Freyn & Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 263. — As. Min.
anchusoides, Arv. *Hier. Alp.* (1888) 13. — Europ.
anchusoideum, St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl.* ed. 8, ii. (1889) 508 = *anchusoides*, Arv.
Andrzejewskii, Blochi, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 153; et in *Woloszczak in Spraw. kom. fizyogr. Krajowej* (1888) ii. 203. — Europ.
anfractiforme, E. S. Marshall, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 183 = *subanfractum*, E. S. Marshall.
anfractiforme, *Almq. [Dahlstedt. Hierac. exsicc. Fasc. iii. (1889)]*, ex *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 108 = *vulgatum*, Fries.
angulatum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 59. — Scandinav.
angusticeps, M. Brenner, in *Medd. Soc. Faun. & Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 107. — Europ.
anisocephalum, A. Rehm, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 326 = *prussicum*, Naeg. & Peter.
anthelacophilum, A. Rehm, l. c. 334 = *bifurcum*, Bieb.
anthyllidifolium, Murr. in *Deutsche Bot. Monatsschr.* viii. (1890); et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 222, in obs; et xlv. (1895) 222. — Austria.
apariaeforme, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 41; et xx. iii. 1 (1894) 12 [apargiaeforme?]; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 38. — Scandinav.
apenninum, *Levier, ex Sommier et Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xxiii. (1891) 261. — Italia.
aphyllum, Naeg. et Peter, *Hierac.* ii. (1886) 234. — Europ.
approximatum, A. Rehm, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 343 = *leptophyton*, Naeg. & Peter.

HIERACIUM: —

- apricorum*, Wiesb. ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1294 = *gadense*, Wiesb.
aquilonium, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 9 = *alpinum*, Linn.
aracioides, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 354. — Pyren.
arancosum, Arv. Hier. Alp. (1888) 49 = *pulmonarioides*, Vill.
arctogenum, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Europ. Suppl. ii. i. (1889) 199 (= *Pilosella arctogena*, Norrl.) = *cymosum*, Linn.
arvatum, Arv. Hier. Alp. (1888) 44 = *heterodon*, Arv.
arenicola, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 297, nomen. — Austria.
arense ×, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 15 (1890) 19. — Scandinav.
argothrix, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 303. — Europ.
argyreum, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 333. — Hisp.
argyrotichum, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 340; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 345. — Bulg.
armenum, Freyn. & Sint. ex Freyn, l. c. 344. — As. Min.
Arnelli, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 97. — Norv.
aronicifolium, Arv. Hier. Alp. (1888) 102. — Gall.
arrectipes, Alm. ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. 7 (1890) 43; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 41. — Scandinav.
arrosium, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 14. — Scandinav.
asteriforme, Arv. & Lamotte, ex Arv. Hier. Alp. (1888) 116 = *conieum*, Arv.
asterinum, Arv. & Briq. ex Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 622. — Sabaud.
astolonum, Vukot. ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 380 = *florentinum*, Hall.
atratiiforme, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 371 = *nigrescens*, Willd.
atricapillum, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 297, in obs. — Hung.
atricomum, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 105. — Europ.
atrocephalum, Schmalh. in Ber. deutsch. bot. Gezells. x. (1892) 290. — Reg. Cauc.
atrocrocum, Peter, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 45 = *auricula*, Linn.
atrocladum, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 342 = *brachiatum*, Bert.
attractum, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 340. — Gall. mer.
aurantiacoides, Arv. Hier. Alp. (1888) 9. — Europ.
aureo-purpureum, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 11 = *bifurcum*, Bieb.
auriculifolium, Arv. ex Briq. ex Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 626. — Sabaud.
auriculinum, Alm. ex Dahlst. in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 16; et ii. 4 (1894) 38 et 40; et in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 15 (1890) 102. — Scandinav.
auriculinum ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1283. — Europ.
aussigense, Wiesb. [in Baenitz, Herb. Europ. n. 6319] ex Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 466 = *bifidum*, Waldst. & Kit.
austriacum, Britton, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 195; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1295 = H. Dollineri, F. Schultz.
austriacum, Uechtr. ex Peter, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 382. — Austria.
Autrani, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 25. — Syria.
axiflorum, Arv. & Briq. ex Briq. l. c. ii. (1894) 624. — Sabaud.
Aymericianum, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 346. — Pyren.
Backhousei, Hanbury, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 74. — Brit.

HIERACIUM: —

- baeticum*, Arv. & Reverch. ex Herv. in Rev. gén. bot. iv. (1892) 154; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 331; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 120. — Hisp.
Baldaccianum ×, Freyn, in Malpighia, vi. (1892); et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 650 et 664. — Albania.
Baldaccii, Haldacsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 223. — Montenegro.
Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iii. 3 (1893) 66. — Bolivia.
Barbeyi, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 24 et 411. — Syria.
Barrerianum, Arv. & Mailho, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 338. — Gall. mer.
basifolium, Alm. in Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 43; et ex Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 38 = *caesium*, Fries.
baticum, Dahlst. [Herb. Hier. Scand. Cent. v. (1893) n. 15] in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 133. — Scandinav.
Beckianum, Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 669. — Armen.
bellulum, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 38. — Scandinav.
benulum, Magnusson, ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 34. — Scandinav.
Berardianum, Arv. Hier. Alp. (1888) 59. — Gall.
berdoense, Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajowej (1888) ii. 202. — Hung.
biflorum, Arv. Hier. Alp. (1888) 3 = H. Peleterianum, Méral.
bifrons, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 555; et l. c. 97. — Europ.
bipes, Dahlst. [Herb. Hier. Scand. Cent. iii. (1893) n. 34]; et in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 102. — Scandinav.
boreum, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 1 (1894) 20 = *alpinum*, Linn.
Bornmuelleri, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 54; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 510. — As. Min.
bosniacum, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 171 = *magyaricum*, Naeg. & Peter.
bosniacum, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 508 et 654. — Bosnia.
Boswelli, E. F. & W. R. Linton, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 178. — Scotia.
Boutignyanum, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 335. — Pyren.
brachyacron, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 327 = *flagellare*, Willd.
brachycephalum, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 200 (= *Pilosella brachycephala*, Norrl.) = *suecicum*, Fries.
brachypodium, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 130. — Scandinav.
Brandisii ×, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 646 et 664. — Bosnia.
brassicoides, Arv. ex Wilczek, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) p. cclxviii. — Valesia.
breadalbanense, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 261. — Scotia.
Briquetianum, Arv. ex Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 627. — Sabaud.
britannicum, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 366. — Anglia.
brumale, Arv. Hier. Alp. (1888) 71. — Gall.
brunellaeforme, Arv. l. c. 69. — Europ.
brunopolitanum, Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 425 = *glaucoptis*, Fries.
Bubelae, Blocki, ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 154, in obs. — Austro-Hung.
buglossoides, Arv. Hier. Alp. (1888) 72 = *onosmoides*, Fries.
bulgaricum, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 347; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 344. — Bulg.
Burnati, Arv. Hier. Alp. (1888) 24. — Pedem.
Burserianum, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 256. — Pyren.
caerulaceum, Arv. Hier. Alp. (1888) 73. — Gall.
caesiiceps, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 118. — Europ.

HIERACIUM: —

- caesiomurorum*, Lindb. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 35; Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 44. — Scandinav.
caesiovirens, Dahlst. [Herb. Hier. Scand. Cent. iii. (1892) n. 43] in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 122. — Scandinav.
caespitans, Dahlst. l. c. i. 7 (1894) 31. — Scandinav.
caespitosum, Dahlst. l. c. ii. 4 (1894) 42, in syn. = *pleiocaulon*, Dahlst.
calcidicum, « Boiss. & Heldr. » ex Oest. Bot. Zeitschr. (1890) 490, ad calc. = *chalcidicum*, Boiss. & Heldr.
caledonicum, Hanbury, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 75. — Brit.
Calisii, Evers, ex Huter, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 70, in obs. = *leucocephalum*, Bartl.
callistophyllum, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 168. — Scotia.
calomelanum, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 333 = *glomeratum*, Fries.
calophyllum, Uechtr. ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 384. — Europ. or.
cambricum, Hanbury, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 226. — Brit.
campylopodium, Dahlst. Herb. Hier. Scand. Cent. v. (1893) n. 7; et in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 93 et 142, in obs. — Scandinav.
canaliculatum, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 104. — Europ.
caniceps, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 368. — Scotia.
canipes, Alm. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 31. — Scandinav.
canitiosum, Dahlst. in Bot. Notiser (1892) 155 = *vulgatum*, Fries.
cantianum, Hanbury, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 232. — Brit.
canum, Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 379. — Europ.
capnoides, Kern. ex Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 231. — Europ.
capnostylum, Dahlst. & Elfstr. ex Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 61 et 63; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 38. — Scandinav.
cappadocicum, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 55; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 507. — As. Min.
Carenorum, Hanbury, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 227. — Brit.
caricinum, Arv. Hier. Alp. (1888) 17. — Europ.
Castrillerrei, Borb. Geogr. atq. enum. pl. Comit. Castri. (1889) 201. — Hung.
catractarum, Arv. ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 121, nomen; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 330. — Hisp.
caucasicum, Naeg. & Peter, ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 380. — Reg. Cauc.
cebennense, Arv. ex Martin, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 19. — Gall.
cenisium, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiv. (1887) 580; et Hier. Alp. (1888) 32. — Gall.
centripetale, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 166. — Brit.
cepenum, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 338. — Bavar.
ce-atodon, Arv. Hier. Alp. (1888) 69. — Europ.
ceratophyllum, Arv. l. c. 68 = *rupicolum*, Fries.
ceramotum, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 52. — Scandinav.
cerinthiforme, Backh. ex Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 169. — Brit.
Chaberti ×, F. O. Wolf, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 175. — Vales.
Chaboissaei, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 196 = *pallidum*, Fries.
chaetodon, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 23. — Scandinav.
chalybaeum, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 360. — Gall. centr.
chiclense, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 47. — Peruvia.
chloropoides, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 324 = *prussicum*, Naeg. & Peter.

HIERACIUM: —

- chloroleucum, *Dahlst.* [Hier. exsicc. Fasc. i. (1889) n. 93] in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 37. — Scandinav.
- chloromelanum, *Peter*, in *Jahrb. Schweiz. Alpenclub*, xxxii. (1887) 352-59. — Helv.
- chnoodes, *Peter*, l. c. — Helv.
- chondrilloideum, *St. Lager*, in *Cariot. Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 510 = *chondrilloides*, *Vill.*
- christianiense, *Dahlst.* ex *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 11. — Norv.
- chrysocephalum, *Norrl.* ex *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 200 (= *Pilosella chrysocephala*, *Norrl.*) = *suecicum*, *Fries.*
- chrysostylum, *Linder*, ex *Elfstr. Bot. utflygter* (1890) 67; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 53. — Scandinav.
- cichoriaceum, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 92 = *juratum*, *Fries.*
- Cieselskii, *Blocki*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 297, in obs. — Hung.
- ciliatidens, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 1 (1894) 31, ad calc. = *petiolatum*, *Elfstr.*
- ciliatum, *X.* *Blocki*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 227. — Hung.
- ciliiferum, *A. Rehm.* in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 345 = *paragogum*, *Naeg. & Peter.*
- cincinnulatum, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 119. — Europ.
- cinericeus, *M. Brenner*, l. c. 92. — Europ.
- clovense, *E. F. Linton*, in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 178. — Scotia.
- coalescens, *Norrl.* ex *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) (= *Pilosella coalescens*, *Norrl.*) = *H. Pilosella*, *Linn.*
- coarctatum, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 92 = *juratum*, *Fries.*
- cochleare, *X.* *Kern.* ex *Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1889) 258. — Europ.
- cochleatiforme, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) 10 = *H. Blyttianum*, *Fries.*
- coderianum, *Arv. & Gautier*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 350. — Pyren.
- coeruleum, *Arv.* in *Bull. Soc. Dauph.* xiii. (1886) 557 = *caeruleum*, *Arv.*
- cololepium, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 94. — Scandinav.
- colophyllum, *Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1889) 309. — Europ.
- columnare, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 86. — Gall.
- comminutum, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 113. — Scandinav.
- comosum, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xx. 3 (1895) 17. — Scandinav.
- congestum, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 56; et in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1894) 509 = *cappadocicum*, *Freyn.*
- conforme, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 116. — Europ.
- conjunctum, *X.* *G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatschr.* vi. (1888) 122. — Europ.
- conringiaefolium, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 106. — Gall.
- conyzoides, *Arv.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxi. (1894) 369. — Pyren.
- copidophyllum, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 72. — Scandinav.
- copulatum, *X.* *G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatschr.* vi. (1888) 123. — Europ.
- coracinum, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) 64. — Norv.
- coriifolium, *Arv.* *Hier. Alp.* (1886) 78. — Gall.
- coronariaefolium, *Arv.* l. c. 56. — Gall.
- coronarum, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 106. — Europ.
- corrutium, *X.* *G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatschr.* vi. (1888) 123. — Europ.
- corymbuliferum, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 8. — Europ.
- cottianum, *Arv.* in *Bull. Soc. Dauph.* xiii. (1886) 557; et *Hier. Alp.* (1888) 102. — Europ.
- creperum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 64. — Scandinav.
- crepidifolium, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 89. — Gall.

HIERACIUM: —

- crispulum, *Dahlst.* [Hier. exs., Fasc. i. (1889) n. 61] in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 89, in syn. = *vulgatum*, *Fries.*
- crispum, *Elfstr.* ex *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 45; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 14 = *alpinum*, *Linn.*
- croccum, *Dahlst.* l. c. ii. 4 (1893) 18 = *floribundum*, *Wimm. & Grab.*
- cruentatum, *Lübeck.* ex *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 44. — Scandinav.
- cruentifolium, *Dahlst. & Lübeck.* ex *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxi. 3 (1894) 144. — Scandinav.
- cruentum, *Naeg. & Peter*, ex *Sagorshi & Schneid. Fl. Centralkarp.* ii. (1891) 303; et ex *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 380. — Europ.
- cryptadenum, *Arv.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 329. — Gall.
- cryptanthum, *Arv. & Marc d'Aym.* in *Lucante, Rev. de Bot.* ix. (1891) 38. — Pyren. gall.
- cumbriense, *Hanbury*, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 226. — Scotia.
- cuneatum, *Arv. & Gautier*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 342. — Gall. mer.
- cuneolatum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 39. — Scandinav.
- curvatiforme, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 67. — Scandinav.
- curvatipes, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xx. iii. 1 (1894) 19, in obs. = *alpinum*, *Linn.*
- curvatum, *Elfstr. Bot. Utflygter* (1890) 47; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 45. — Scandinav.
- Custoris, *X.* *Bruegg.* ex *Killias*, in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 114. — Helv.
- cyaneum, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 69. — Europ.
- cynodon, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 103. — Europ. bor.
- Czetizianum, *X.* *Simonk.* *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 367. — Transsilv.
- Dalhstedtii, *Almq.* ex *Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 60. — Scandinav.
- delicatulum, *Arv.* ex *Murr.* in *Bot. Deutsche Monatschr.* viii. (1890) 108. — Tirol.
- delphinale, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 47. — Gall.
- Delpinoi, *Baldacci*, in *Malpighia*, vi. (1892) et ex *Freyn*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 649. — Montenegro.
- deltophyllum, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 120. — Gall.
- depilatifolium, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 140. — Scandinav.
- depilatum, *Almq.* ex *Elfstr. Bot. Utflygter* (1890) 66; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 51. — Scandinav.
- diabolicum, *X.* *Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 235. — Europ.
- digeneum, *G. Beck.* ex *Peter*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 381. — Europ.
- diluviale, *A. Rehm.* in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 341 = *brachiatum*, *Bert.*
- dimorphoides, *Norrl.* ex *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 199 (= *Pilosella dimorphoides*, *Norrl.*) = *flammeum*, *Fries.*
- dissimile, *Lindeb.* ex *Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 60. — Scandinav.
- dissquamatum, *Elfstr.* l. c. 19 = *alpinum*, *Linn.*
- distinctum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 30. — Scandinav.
- divaricans, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 124. — Europ.
- divergens, *Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1889) 332. — Europ.
- doronicifolium, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 98. — Gall.
- doronicoides, *Arv.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1894) 340. — Gall. mer.
- drazeticum, *Arv. & Marc. d'Aym.* l. c. 364. — Pyren.
- dublanense, *A. Rehm.* in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 323 = *collinum*, *Gockn.*
- dubiosum, *X.* *G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatschr.* vi. (1888) 122. — Europ.
- duplicatum, *Almq.* [in *Dahlst. Hier. exsicc.* Fasc. ii. (1889) n. 84.] in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 38. — Scandinav.
- duriceps, *Hanbury*, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 260. — Scotia.

HIERACIUM: —

- Dybowskiianum, *A. Rehm.* in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 346 = *trigenes*, *Naeg. & Peter.*
- ecuadoriense, *Arv.* ex *Peter.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 387. — Ecuad.
- effusum, *Arv. & Briq.* ex *Briq.* in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 631. — Sabaud.
- eginense, *Freyn & Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 270. — Armen. turc.
- elatus, *X.* *A. Rehm.* in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 332. — Europ.
- elegantulum, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 24. — Scandinav.
- Elfstrandii, *Dahlst.* l. c. 79; *Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 27. — Scandinav.
- Elisaeanum, *Arv.* ex *Willh. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 120; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 332. — Hisp.
- enginense, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 101 = *mollitum*, *Arv.*
- epacrum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 70. — Scandinav.
- ericetorum, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 391. — Tirol.
- ericetorum, *Ravaud*, ex *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 193 = *vulgatum*, *Fries.*
- erigerontinum, *Arv.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 328. — Gall.
- erioleion, *Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1889) 296. — Europ.
- eriopodum, *Kern.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 12; et xlv. (1895) 394 = *illyricum*, *Naeg. & Peter.*
- eriotachyum, *Borb.* ex *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 192 = *anisophyllum*, *Boiss.*
- erucoides, *Arv.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 360. — Alp.
- erysibodes, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 33. — Scandinav.
- erythrellum, *Arv.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 359. — Pyren.
- erythrommum, *A. Rehm.* in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 337 = *brachiatum*, *Bert.*
- erythrotrichum, *A. Rehm.* l. c. = *brachiatum*, *Bert.*
- esketanense, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1898) 60. — Scandinav.
- eudaedalium, *Stenstr.* ex *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 249. — Scandinav.
- euprepes, *Hanbury*, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 206. — Brit.
- eurycibe, *Dahlst.* [Herb. Hier. Scand., Cent. ii. (1892) n. 59] in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 150. — Scandinav.
- eustales, *E. F. & W. R. Linton*, in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 195. — Scotia.
- exacutum, *Dahlst.* l. c. xxiii. 15 (1890) 33 = *seq. exacutum*, *Norrl.* ex *Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl.* ii. 1. (1889) 200 (= *Pilosella exacuta*, *Norrl.*) = *H. Pilosella*, *Linn.*
- exaltatum, *Arv.* *Spicil. Hier. Suppl.* i. (1886) 41. — Pyren.
- exaltatum, *Dahlst.* in *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 42; et in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxi. 3 (1894) 35 = *caesium*, *Fries.*
- exaltatum, *Dahlst.* ex *Andersson*, in *Bot. Notiser* (1890) 92 [an praec. ?] = *murorum*, *Linn.*
- exilentum, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 90 = *epime-dium*, *Fries.*
- eximifolium, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 21; et ii. 4 (1894) 71 = *alpinum*, *Linn.*
- expallens, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 78 = *subincisum*, *Arv.*
- expallidifolium, *Dahlst.* ex *Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 26. — Scandinav.
- expansiceps, *Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 43. — Scandinav.
- expansum, *Dahlst.* [Herb. Hierac. Scand., Cent. iii. (1892-93) n. 22] in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) 61 = *alpinum*, *Linn.*
- extensiforme, *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 197. — Scandinav.
- extrorsifrons, *Elfstr.* *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 20 = *alpinum*, *Linn.*
- farinaceum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 33. — Scandinav.

HIERACIUM: —

- fariniceps*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 30. — Norv.
farrense, Hanbury, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 75. — Brit.
Fatrae, Pax, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 42. — Carpath.
Fawei ×, Arv. Hierac. Alp. (1888) 5; et in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 619. — Gall.
Favreanum, Arv. l. c. (1888) 39 = glanduliferum, Hoppe.
Ferdinandi ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. ii. (1893) 1287. — Austria.
Fiehii, Uechtr. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 191 = corymbosum, Fries.
finmarkicum, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 13 = alpinum, Linn.
firmitipes, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 331 = macrostolonum, G. Schneid.
fistulosum, A. Rehm. l. c. 346 = nigriceps, Naeg. & Peter.
flaccidum, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 99. — Europ.
Flammula, Arv. Hier. Alp. (1888) 9. — Europ.
flavicaule, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 337 = brachiatum, Bert.
flaviforme, A. Rehm, l. c. 340 = brachiatum, Bert.
flexile ×, Kotula, ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 119, 140 et 251. — Hung.
flexicaule ×, Freyn & Vandas, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 645 et 666. — Oriens.
flocciferum, Arv. in Lucante, Rev. de bot. ix. 31. — Gall.
floccifrons, Elfstr. Bot. Utflýgter (1890) 61 = dissimili, Lindb.
floccosum, Arv. Hier. Alp. (1888) 57. — Gall.
florentinoides, Arv. l. c. 16. — Europ.
folioliferum, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 8. — Scandinav.
formicarium, Th. Fries, ex Elfstr. l. c. 29 = vulgatum, Fries.
Foucaudianum, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 337. — Pyren.
fronditerum, Elfstr. Bot. Utflýgter (1890) 38; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 21. — Scandinav.
fuciflorum, Arv. Hier. Alp. (1888) 4 = H. Peleterianum, Mirat.
fulcratum, Arv. ex Brig. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 621. — Sabaud.
fuliginosum, Laest. in Elfstr. Bot. Utflýgter (1890) 35; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 24 = fuliginosum, Anders.
furculatum, Elfstr. Bot. Utflýgter (1890) 66; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 59. — Scandinav.
furvicolour, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 108. — Europ.
fuscatum, Elfstr. Bot. Utflýgter (1890) 56; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 49. — Scandinav.
gadense, Wiesb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 198 = staticae-folium, Vill.
galaticum, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 11 = macranthum, Ten.
galbanum, Dahlst. ex Andersson, in Bot. Notiser (1890) 92 = murorum, Linn.
galbeum, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. (1892) 113. — Europ.
galicience, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 71, in obs. — Austro-Hung.
garganum, Arv. Hier. Alp. (1888) 92 = juranum, Fries.
Gelmianum, Sarntheim, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 275. — Venetia.
gemellum, Alm, ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 65. — Scandinav.
glabellum, Dahlst. in Bot. Notiser (1886) 140; et ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 174 = dovrense, Fries.
glabratoides, Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 221; xlv. (1895) 428; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 98 = glabratum, Hoppe.
glabriceps, G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien. ii. (1887) 170 = florentinum, All.
glabridens, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 18. — Scandinav.
glandulatum, Elfstr. l. c. xvi. iii. 7 (1890) 42; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 28. — Scandinav.

HIERACIUM: —

- glandulosodentatum*, G. Schneid. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 24 = vulgatum, Fries.
glaucicolor, Dahlst. in Bot. Notiser (1886) 139; et in Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 174 = dovrense, Fries.
glaucoccephalum ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 78. — Europ.
glaucocchlorum, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 328 = flagellare, Willd.
glaucovirens, Dahlst. in Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 55; et in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 169 = diaphanum, Fries.
globiceps, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 51. — Scandinav.
globularifolium, Arv. Hier. Alp. (1888) 6. — Gall.
glossodes, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 134. — Scandinav.
gnaphalium, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 325 = prussicum, Naeg. & Peter.
Godryi, Orphanides, [Fl. Graec. exsicc. n. 347] ex Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 331 = H. Gaudryi Boiss.
Grabowskianum ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 207. — Europ.
gracillimum, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 142; Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 6 = alpinum, Linn.
grammophyllum, Stenstr. in Bot. Notiser (1895) 216. — Scandinav.
grandidens, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 136; Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 27 = alpinum, Linn.
graniticolum, Linton, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 145. — Scotia.
Greenii, Porter & Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 120 (= *Pilosella spathulata*, Sch. Bip.). — Am. bor. occ.
Grenlii, Arv. Hier. Alp. (1888) 35 = dentatum, Hoppe.
grisencense, Beyer, in Wiss. Beil. Progr. Andreas-Realgymn. Berl. (1891), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 177. — Europ.
griselliceps, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 90. — Europ.
grivastellum, Dahlst. [Hier. exs., Fase. i. (1889) n. 80 et 81] in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 41 = caesium, Fries.
Grofae, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyogr. Krajowej, xxvii. (1892) 142. — Europ.
Gussenbauerianum, Pacher, Nacht. Fl. Karnt. (1894) 71. — Carinth.
gypticola, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 296 = praealtum, Gochn.
gyroflexum, Arv. Hier. Alp. (1888) 54 = vogesiaceum, Moug.
halense, Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 429. — Tirol.
handoelense, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 73. — Scandinav.
hanense ×, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 15 (1890) 19. — Scandinav.
Hankae, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 342 = venetianum, Naeg. & Peter.
hastatulum, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 40; et in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 76. — Scandinav.
hastatum, Ravaut, ex Arv. Hier. Alp. (1888) 22 = inclinatum, Arv.
hastile, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 347. — Pyren.
Heerii, Bruegg, ex Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 112 = humile, Jacq.
helobium, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 329 = flagellare, Willd.
helveolum, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 13 = floribundum, Wimm. & Grab.
helveticum, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 192 = picroides, Vill.
helvopurpureum, Dahlst. [Hier. exsicc. Fasc. iv. (1891) n. 21] in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 9. — Scandinav.

HIERACIUM: —

- hemipsilum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 106. — Europ.
hepaticolor, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 28. — Fennia.
hercegovinum, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien ii. (1887) 172 = umbelliferum, Naeg. & Peter.
hercegovinicum, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 644 = marmoreum, Vis. & Panic.
herjedalicum, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 7 = cernuum, Fries.
Hervieri, Arv. in Bull. Soc. Dauph. Ser. II. ii. (1891) 57 = boreale, Fries.
heterodon, Arv. Hier. Alp. (1888) 45. — Gall.
heterophyllum, Arv. l. c. 48. — Gall.
hibernicum, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 258. — Hibern.
hirticaula, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 199 (= *Pilosella hirticola*, Norrl.) = pratense, Tausch.
hispidulum, Arv. Hier. Alp. (1888) 43 = humile, Jacq.
hoglandicum, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 88. — Europ.
holophyllum, M. Brenner, l. c. 127. — Europ.
holophyllum, Linton, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 376; et in The Bot. Exch. Club Brit. Isles. Report for 1890 (1891) 304. — Brit.
holoskense, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 320 = H. Pilosella, Linn.
Hostianum, Wiesb. [in Ges. Doubl. Verz. Schles. Tausch. 1883-84] ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. (1893) 1307 = laevigatum, Willd.?
Howellii, A. Gray, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 73. — Oregon.
hugeliense, Dahlst. in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 27. — Scandinav.
hungaricum ×, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 365. — Transsylv.
hyalinum, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1881-92 (1892) 100. — Europ.
hygrophilum, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 81. — Norv.
hypareticum, Alm, [ex Aug. Berlin, Kärle Svenska exped. Grönland (1883)] ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 50. — Gröenl., Scandinav.
hypoleucum, Arv. Hier. Alp. (1888) = H. Faurei, Arv.
hypomaerum, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 106. — Scandinav.
igneum, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 268 (= *H. aureopurpureum*, Freyn). — Armen. turc.
imitans, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 102. — Europ.
impressiforme, Dahlst. in Bot. Notiser (1892) 161 = mercurum, Linn.
incanescens, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 297, nomen. — Hung.
incertum ×, G. Schneid. in Deutsche Bot. Monatschr. vi. (1888) 123. — Europ.
inclinatum, Arv. Hier. Alp. (1888) 21. — Gall.
incrassatum ×, Blocki, in Oest. Zeitschr. xlii. (1892) 350. — Austro-Hung.
informe, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 23. — Fennia.
ilingulatum, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 7. — Scandinav.
insignitum, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 70. — Norv.
integratum, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxviii. (1893) 112. — Scandinav.
integrifolium, Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 21. — Scandinav.
intermedium ×, G. Schneid. in Deutsche Bot. Monatschr. vi. (1888) 122. — Europ.
intermixtum, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 103. — Europ.
intermixtum, Dahlst. [Hier. exsicc. Fasc. iv. (1891) n. 22] in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 10. — Scandinav.
intertextum, Arv. Hier. Alp. (1888) 53. — Gall.
intricatum, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. 1 (1889) 195 = pallidum, Biv.
intumescens ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 230. — Europ.

HIERACIUM: —

- irriguum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 50; *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxvi. 3 (1894) 139 (an *H. irriguum*, Griseb.?). — Scandinav.
ischnophilum, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 339 = *brachiatum*, Bert.
islandicum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 15 = *floribundum*, *Wimm. & Grab.*
istriacum, Freyn, ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 191 = *barbatum*, *Tausch.*
jablonicense, *Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajowej*, xxv. (1890) i. 66. — Hung.
jaceoides, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 91. — Tirol.
javalambrense, *Pau, Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 22; *Willk, Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 123. — Hisp.
jemtlandicum, Norrl. ex Nym. *Consp. Fl. Eur.* ii. 1 (1889) 119 (= *Pilosella jemtlandica*, Norrl.) = *flammeum*, *Lindb.*
joconianum, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 385. — Europ.
Jordani, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 60 = *lanatum*, *Vill.*
juratense, *Gremli, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 198 = *bupleuroides*, *Gmel.*
Kindbergii X, *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 15 (1890) 56. — Scandinav.
Kloiberi, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 329 = *flagellare*, *Willd.*
knautiaefolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 83 = *murorum*, *Linn.*
Koracis, *Boiss. Fl. Or., Suppl.* (1888) 328 = *bracteolatum*, *Sibth. & Sm.*
Krasani, *Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajowej*, xxv. (1890) i. 65. — Hung.
krynaviense, *Woloszczak, l. c.* xxii. (1888) ii. 204. — Hung.
lacerifolium, *Almq. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1888) 19; *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 72. — Scandinav.
lachnopsilon, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 351. — Pyren.
laciniatofolium, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 109. — Europ.
lacistophyllum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 104. — Scandinav.
laete-virens, *Sommier & Levier, in Boll. Soc. Bot. Ital.* (1893) 526; *et in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1894) 196. — Reg. Cauc.
lagarophyllum, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 320 = *brachiatum*, Bert.
lagarophyton, A. Rehm. l. c. 321 = *auriculiforme*, *Fries.*
lamprodes, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 66. — Scandinav.
langwellense, *F. Hanbury, in Journ. Bot.* xxvi. (1888) 206. — Brit.
lanifolium, *Naeg. & Peter, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 663 = *H. Waldsteinii*, *Tausch.*
lansicum, *Arv. & Ravaut, in Arv. Hier. Alp.* (1888) 58. — Gall.
lappachense, *Murr, in Kneucker, Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 231. — Tirol.
laricense, *Gautier & Timb. in Bull. Soc. Dauph.* xii. (1885) 512, in syn. = *sonchoides*, *Arv.*
latilobum, *Almq. ex Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3. (1893) 166. — Scandinav.
lautumiarum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 6. — Scandinav.
leiophanum, *Dahlst. l. c.* ii. 4 (1893) 11 = *floribundum*, *Wimm. & Grab.*
lelosoma X, *Naeg. & Peter, Hierac. ii.* (1886) 62. — Europ.
Leithneri, *Heldr. & Sart, ex Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 384. — Graecia.
lemanianum, *Arv. ex Briq, in Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 214. — Sabaud.
leontodontoides, *Arv. & Briq. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 625. — Sabaud.
lepidiforme, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1898) 47. — Scandinav.
lepidotum, *Stenstr. l. c.* 45; *Dahlst. in K. Svensk. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 118. — Scandinav.
lepidulum, *Stenstr. ll. cc.* 50; *et* 131. — Scandinav.

HIERACIUM: —

- lepidum*, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 79 = *caesium*, *Fries.*
leptoglossum, *Dahlst. ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 25; *et in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 53. — Scandinav.
leucense X, F. O. Wolf, in *Bull. trav. Soc. Murith.* Fasc. 21-22 (1894) 132. — Helv.
leucocheilos, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 344 = *sulphureum*, *Doell.*
leucochlorum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 30 = *piliferum*, *Hoppe.*
leucopelmatum X, *Naeg. & Peter, Hierac. ii.* (1886) 80. — Europ.
leucopsis, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 40 = *glanduliferum*, *Hoppe.*
leucothecum, *Uechtr. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 343. — As. Min.
Leyi, *F. Hanbury, in Journ. Bot.* xxxii. (1894) 226. — Brit.
ligulellum, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xliii. 1 (1894) 11 = *alpinum*, *Linn.*
lima, *F. Hanbury, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 206. — Brit.
lincoptense X, *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xliii. 15 (1890) 46. — Scandinav.
Linderi X, F. O. Wolf, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) p. 155. — Vales.
lineatum, *Almq. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 72; *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 241 = *rigidum*, *Hartm.*
lineatum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 80 = *caesium*, *Fries.*
linguatum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 4 = *H. Pilosella*, *Linn.*
liopogon, *Gren. ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl.* éd. 8, ii. (1889) 517 (= *H. leiopogon*, *Gren.*) = *saxetanum*, *Fries.*
lipnitchianum, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 325 = *prussicum*, *Naeg. & Peter.*
lithophilum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 68. — Gall.
litigiosum, *Arv. l. c.* 102 = *valdepilosum*, *Vill.*
lobulatum, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 120. — Europ.
lombicense X, *Woloszczak, [Spraw. kom. fizyogr. Krajowej, xxv. l. (1891)] ex Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 111 *et* 140. — Europ.
longipes, *Freyn & Sint, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 262; *et in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 504 *et* 668. — As. Min.
lorophyllum, *Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 196 = *alpinum*, *Linn.*
lugubre, G. O. Andersson, in *Bot. Notiser* (1890) 93; *et in Bot. Centralbl.* xlvi. (1891) 258 = *murorum*, *Linn.*
lustratum, *Arv. & Guillot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 342. — Gall.
lycodontum, *Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 329. — Pyren.
macilentum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 90 = *epimedium*, *Arv.*
macrantheloides, *Dahlst. (Hier. exsicc. Fasc. iv.* (1891) n. 26) *in Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 17. — Scandinav.
macroGLOSSUM, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 224 = *prussicum*, *Naeg. & Peter.*
macrolepidum, *Norrl. in Act. Soc. Faun. & Fl. Fenn.* iii. (1888) 18 = *H. Peleterianum*, *Morat.*
macrostolum X, G. Schneid. ex *Formanek, Květena*, ii. (1892) 373. — Moravia.
macrotonum, *Dahlst. [Hier. exs. Fasc. ii. (1889) n. 98 *et* 99] in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 83 *et* 86. — Scandinav.
maculosum, *Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 12. — Scandinav.
Magnussonii X, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 4. — Scandinav.
mallotum, *Stenstr. in Bot. Notiser* (1895) 215. — Scandinav.
Malmel, *Dahlst. l. c.* (1892) 158 = *vulgatum*, *Fries.*
Mandoni, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 266. (= *Pilosella Mandoni*, Sch. Bip.). — Bolivia.

HIERACIUM: —

- mapirense*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 371. — Bolivia.
marginellum, *Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 28; *et ex Anderss. in Bot. Notiser* (1890) 91. — Scandinav.
Marshalli, *Linton, in Journ. Bot.* xxix. (1891) 271. — Brit.
Martrini, *Arv. in Lucante, Rev. de Bot.* xii. (1894) 25. — Gall.
Massoniae, *Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat.* xxviii. (1892) 38; *et in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* iii. (1893) 124 = *boreale*, *Fries.*
mediiforme, G. O. Andersson, in *Bot. Notiser* (1890) 91; *et in Bot. Centralbl.* xlvi. (1891) 257 = *vulgatum*, *Fries.*
medionigrescens, *Almq. ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 53 = *atratum*, *Fries.*
megalocephalon, *Nash, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 152. — Florida.
melainon, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 50. — Scandinav.
melandryfolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 57. — Gall.
melanocalathium, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 321 = *H. Auricula*, *Lam.*
melanolepis, *Norrl. in Act. Soc. Faun. & Fl. Fenn.* iii. (1888) 90. — Fennia.
melanomallum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) 57. — Scandinav.
melanophilum, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 343 = *leptophyton*, *Naeg. & Peter.*
melanops, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* xliii. (1886) 558; *et Hier. Alp.* (1888) 75. — Delph.
menthaefolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 55. — Gall.
meridionale, *Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. iv.* (1893) n. 25] *in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 252; *et in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 34. — Scandinav.
mesodicoides, *Dahlst. l. c.* ii. 4 (1894) 34. — Scandinav.
mesodicum, *Dahlst. (Hier. exsicc. Fasc. iv.* (1891) n. 16) *; et l. c. i. 7* (1891) 14. — Scand.
mespilifolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 93 = *prenanthoides*, *Vill.*
Michaeli X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. II. (1893) 1280. — Austria.
Mickiewiczii, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 323 = *stoloniflorum*, *W. & K.*
mikrosabinum, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 170 = *cymosum*, *Linn.*
misancinum X, *Naeg. & Peter, Hierac. ii.* (1886) 238. — Europ.
modestum, *Ravaud, Guid. bot. Dauph.* 12^e excurs. (1891) 49 = *prenanthoides*, *Vill.*
Mokragerae, *Naeg. & Peter, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 456. — Serbia.
molybdium, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 15. — Scandinav.
molybdochroum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4. (1893) 86. — Scandinav.
montanum, G. Schneid. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 22 = *alpinum*, *Linn.*
montenegrinum X, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 648 *et* 665. — Oriens.
multifrons, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. & Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 121. — Europ.
mucescens, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 30. — Scandinav.
muranense, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 335 = *brachiatum*, Bert.
Murrianum, *Arv. ex Murr, in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 222; *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 629. — Tirol., Sabaud.
Muteli, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 25. — Gall.
mutilatum, *Almq. ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 74. — Scandinav.
naszodense X, *Simozk. Enum. Fl. Transs.* (1886) 366. — Transsilv.
nanocollinum, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 331 = *spathiphyllum*, *Naeg. & Peter.*
Nataliae, *Borb. in Termész. Füzetek*, xlv. (1893) 50. — Europ.

HIERACIUM: —

- nematocladus*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 342 = leptophyton, Naeg. & Peter.
- neodoronicum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 337. — Pyren.
- neoprenanthes*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 560; et Hier. Alp. (1888) 94. — Gall.
- neviophyllum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 100. — Gall.
- Neyraeanum*, Arv. l. c. 20. — Gall.
- niankoviense*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 328 = flagellare, Willd.
- nigrellum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 38 = armerioides, Arv.
- nigribracteum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 336 = brachiatum, Bertol.
- nigricanticeps*, Stenstr. Värml. Archierac. (1890) 27. — Scandinav.
- nigritellum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 37 = ustulatum, Arv.
- nigrocollinum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 133. — Dakota.
- nivipilum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 335 = fallax, Naeg. & Peter.
- nordlandicum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 98. — Scandinav.
- nudiceps*, Pernhoffer, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 477 = vulgatum, Fries.
- nudum*, Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. II, i. (1889) 197 = scorzoneraefolium, Vill.
- nudum*, Kern. ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 381 = glabratum, Hoppe.
- Nylanderianum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 117. — Europ.
- obscurans*, Elfstr. Bot. Utflygter (1890) 37; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 35. — Scandinav.
- obtusulum*, Stenstr. Värml. Archierac. (1890) 57. — Scandinav.
- odontophyllum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 270; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 506. — Oriens.
- odontotrichum*, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 342; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 342. — Bulg.
- oligodon* X, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 51. — Europ.
- oligolepium*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 34. — Scandinav.
- onegense*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. 1. (1889) 199 (= *Pilosella onegense*, Norrl.). — Europ.
- opeatodontum*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 20. — Scandinav.
- orbicans*, Alm. ex Stenstr. l. c. 23; Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 162. — Scand.
- orbolense*, Stenstr. l. c. 62. — Scandinav.
- orcadense*, W. R. Linton, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 196. — Ins. Orcad.
- orthopodum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 117 = atratum, Fries.
- ovaliceps*, Norrl. in Act. Soc. et Fl. Fenn. iii. 4 (1888) 82 = alpinum, Linn.
- ovatum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 341. — Gall. mer.
- pachyphyllum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. & Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 115. — Europ.
- panaeolum*, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 123. — Scandinav.
- pannosiforme*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 504 et 667. — Armen.
- pannulatium*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 109. — Scandinav.
- pantepylon*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 339 = brachiatum, Bert.
- Paolovicii*, Naeg. & Peter, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 663. —
- paphlagonicum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 260; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 506. — Oriens.
- paraguayense*, Arv. ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 386. — Parag.
- parcepilosum*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 560; et Hierac. Alp. (1888) 103 (= *H. breynium*, A. Kern.). — Gall.
- parcidentatum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. & Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 110. — Europ.

HIERACIUM: —

- pardalinum*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. iii. (1892?) n. 100] in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 255. — Scandinav.
- parvuliceps*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 97. — Europ.
- patentissimum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 651 et 656. — Armen.
- peculiare*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 125. — Scandinav.
- pedosum*, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 32; et in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. III n. 1 (1894) 24, in obs. = alpinum, Linn.
- Pellatium*, Arv. Hier. Alp. (1888) 28 = elongatum, Willd.
- pellucidum*, Alm. ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. 7 (1890) 55 = vulgatum, Fries.
- penicillatum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 98. — Europ.
- penninum* X, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 165. — Europ.
- perciiliatum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. III. 1 (1894) 16 = alpinum, Linn.
- pereffusum*, Elfstr. l. c. 24 = alpinum, Linn.
- periplecum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 355. — Pyren.
- personatiforme*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 106. — Scandinav.
- petiolatum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 100. — Europ.
- petiolatum*, Elfstr. Botaniska Utflygter (1890) 36; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 18. — Scandinav.
- petrophilum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 50 = amplexicaule, Linn.
- philanthrax*, Stenstr. Värml. Archierac. (1899) 25. — Scandinav.
- phlomidifolium*, Arv. Hier. Alp. (1888) 56 = thapsoides, Arv.
- pholidotum*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 46. — Scandinav.
- pictisquamum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 322 = auriculiforme, Fries.
- picinum*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. iii. (1893) n. 39] in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 112. — Scandinav.
- Pictorum*, W. R. Linton, in Journ. Bot. xxix. (1891) 271. — Brit.
- piliperdum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 321 = *H. Pilosella*, Linn.
- pinetorum*, A. Rehm. l. c. 341 = brachiatum, Bert.
- pinnatifidum*, Lönnr. ex Dahlst. in Bot. Notiser (1892) 163 = murorum, Linn.
- plaiense* X, Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajow. xxii. (1888) II. 201. — Hung.
- plantagineum*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 560; et Hier. Alp. (1888) 31. — Gall.
- platyphyllum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 124 = boreale, Fries.
- plecophyllum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 354. — Pyren.
- pleiocaulon*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 42. — Scandinav.
- pleiophyllum*, (Auct.?) ex G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 174, nomen. — Bosnia.
- plicato-acuminatum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 339 = brachiatum, Bert.
- plumiferum*, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 322. — Europ.
- poecilochroum*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. v. (1893) n. 13] l. c. 128; et in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 128. — Scandinav.
- poecilophyllum*, Dahlst. et A. Magnuss, ex Dahlst. l. c. 134. — Scandinav.
- poecilostictum*, Dahlst. Hier. exsicc. Fasc. iv. (1891) n. 50. — Scandinav.
- pogonatum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 344. — Pyren.
- pogonites*, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 306. — Europ.
- poliodermum*, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 15 (1890) 119. — Scandinav.
- pollinarium*, F. Hanbury, in Journ. Bot. xxvi. (1888) 206. — Brit.

HIERACIUM: —

- polonicum*, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 303. — Europ.
- polymorphum*, G. Schneid. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 240; et in Deutsche Bot. Monatsschr. vi. (1888) 163. — Europ.
- polysarcon*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 332 = spathophyllum, Naeg. & Peter.
- porrigens*, Alm. ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. III. 7 (1890) 61; et xxvi. 3 (1894) 48. — Scandinav.
- porimense*, Freyn & Vandas, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 668. — Hercegov.
- Portae*, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 118. — Hisp.
- potamophilum*, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 29. — Scandinav.
- praematurum*, Elfstr. l. c. 24; et in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 142. — Scandinav.
- praesteneriforme*, Alm. ex Dahlst. [Hier. exsicc. fasc. ii. (1889) n. 86]; et in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 40. — Scandinav.
- praetenellum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. 7 (1890) 77. — Scandinav.
- praetenerum*, Alm. ex Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 153. — Scandinav.
- praetubulosum*, Dahlst. [Hier. exsicc. Fasc. iv. (1891) n. 25] in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 19 = fuscum, Vill.
- praeustum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 75 = melanops, Arv.
- praeustum*, Dahlst. in Bot. Notiser (1886) 140; et in Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 174 = dovrense, Fries.
- praspinatum*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Afr. Eur. ii. 1. (1889) 200 = *H. Pilosella*, Linn.
- prasiophaeum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 349. — Pyren.
- prasoides*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. iv. (1893) n. 3] in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 88, in syn. = intumescens, Norrl.
- prenanthoidum*, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 520 = prenanthoides, Vill.
- prenanthomorphum* X, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 163. — Europ.
- primulaeforme* X, Arv. Hier. Alp. (1888) 5. — Gall.
- prionatum*, Arv. l. c. 35 = dentatum, Hoppe.
- prelixoides*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 102. — Europ.
- prolixum*, Norrl. in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn. iii. 4 (1888) 94 = murorum, Linn.
- proximum*, F. Hanbury, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 76. — Brit.
- pseudeximium*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 75. — Norv.
- pseudoatratum*, Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajow. xxii. (1888) II. 201. — Hung.
- pseudobifidum*, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 48 et 49. — Ross. mer.
- pseudoboreale*, Arv. Hierac. Alp. (1888) 124 = boreale, Fries.
- pseudobupleuroides* X, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 74. — Europ.
- pseudodeciapiens*, G. Schneid. in Deutsche Bot. Monatsschr. vi. (1888) 122. — Europ.
- pseudodepilatum*, Alm. ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 54. — Scandinav.
- pseudoerophorum*, Lovet & Timb. ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 384. — Gall.
- pseudoflammeum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 27 = fuscum, Vill.
- pseudoglomeratum*, Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajow. xxii. (1888) II. 203. — Hung.
- pseudogratile*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 334 = bifurcum, Bieb.
- pseudo-hybridum*, Arv. in Lucante, Rev. de Bot. xiii. (1895) 70 (356). — Gall.
- pseudojuranum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 92. — Gall.
- pseudolanatum*, Arv. l. c. 60. — Gall.
- pseudonigrescens*, Alm. ex Dahlst. [in Dahlst. Hier. exs. Fasc. iii. (1889) n. 22] ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. III. 7 (1890) 53 = atratum, Fries.

HIERACIUM: —

- pseudonostomoides, *Dahlst.* [*Hier. exsicc.* Fasc. iii. (1889) n. 26 et 27] in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 25. — Scandinav.
- pseudopersonatum, *G. Schneid.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 23. — Moravia.
- pseudopictis, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 110 = *cydoniaefolium*, *Vill.*
- pseudoporrectum, *Naeg. & Peter, ex Murr.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vii. (1890). — Tirol.
- pseudopratense, *Uechtr. ex Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 237. — Europ.
- pseudo-prenanthoides, *Wilczek, ex Cottet & Castella*, in *Bull. Soc. Frib. sci. nat.* 1887-90 (1891) 230, in syn. = *strictum*, *Fries.*
- pseudo-pulmonarioides, *Pacher, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 197 = *amplexicaule*, *Linn.?*
- pseudo-Wimmeri, *G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vi. (1888) 122. — Europ.
- psilophyllum, *G. Andersson*, in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 15 (1890) 47. — Scandinav.
- pteropogon, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 59. — Gall.
- ptychophyllum, *Dahlst.* in *Bot. Notiser* (1892) 156 = *vulgatum*, *Fries.*
- pubescens, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 42. — Scandinav.
- pulchrum, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* xiv. (1887) 583; et *Hier. Alp.* (1888) 30. — Gall.
- pullatum, *Dahlst.* [*Hier. exsicc.* Fasc. i. n. 99] in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 239, in syn. = *rigidum*, *Hartm.*
- pullulum, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 92. — Europ.
- pulvinatum, *Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur.* ii. 1. (1889) 199 (= *Pilosella pulvinata*, *Norrl.*) = *flammeum*, *Waldst. & Kit.*
- purpurifolium, *Elfstr. Botaniska Utflýgter* (1890) 35. — Scandinav.
- pyncophyllum, *Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 385. — Europ. centr.
- querciticum, *Freyn, ex Ber. Deutsch. Bot. Ges.* iv. (1886) 194, in syn. = *graniticum*, *Sch. Bip.*
- Rachii, « Vukot. » ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 176 = *H. Racskii, Vukot.*
- radiosum, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 95. — Europ.
- Ravandii, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 58. — Gall.
- ravidum, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 113. — Europ.
- reboudianum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 63. — Gall.
- reductum, *Freyn & Sint.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 667. — Armen.
- Rehmanni, *Woloszczak, ex Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 111 = *juratum*, *Fries?*
- remansens, *Malmé, in Bot. Notiser* (1891) 178 = *vulgatum*, *Fries.*
- repandifrons, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 123. — Europ.
- resupinatum, *Almq. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1-89) 58; *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 58 = *porrigens*, *Almq.*
- reticulatum, *Naeg. & Peter, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 663. —
- rhombifolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 47 = *urticaecum*, *Arv.*
- rigidifolium, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xx. iii. 1 (1894) 15 = *alpinum*, *Linn.*
- Rostafinskii, *Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 350. — Europ.
- Rostani, *X. Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 229. — Europ.
- Rouyanum, *X. F. O. Wolf, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) p. 176. — Valesia.
- rubens, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) — Norv.
- rubicundum, *F. J. H. Moffat, ex F. Hanbury in Rep. Bot. Exch. Club Brit. Isles for 1885* (1886) 376; *F. Hanbury, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 208. — Brit.
- rubiginosum, *F. Hanbury, l. c.* xxxii. (1894) 229 = *vulgatum*, *Fries.*
- rubristylum, *A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv.* (1895) 345 = *calomastix*, *Naeg. & Peter.*
- rupicoloides, *Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajow.* xxii. (1888) II. 204. — Hung.

HIERACIUM: —

- rupigenum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 46. — Gall.
- Rusbyi, *Greene, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 248. — N. Mex., Texas.
- sagittatum, *Lindb. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 24; *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 179. — Scandinav.
- Sagorskii, *X. G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vi. (1888) 122. — Europ.
- salicifolium, *Reverch.* in *Arv. Hier. Alp.* (1888) 126 = *umbellatum*, *Linn.*
- salvifolium, *Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 352. — Pyren.
- sancium, *X. Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 69. — Europ.
- Sandbergii, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xx. iii. 1 (1894) 21, in obs. = *nigrum*, *Linn.*
- Sapiehae, *Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1888) 297, nomen. — Hung.
- sarcophyllum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1883) 15; *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 171. — Scandinav.
- saussureoides, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 3 = *H. Peleterianum*, *Mérat.*
- saxigenum, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 89. — Europ.
- scandinavicum, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 11; et ii. 4 (1893) 31. — Scandinav.
- scanicum, *Dahlst.* [*Hier. exsicc.* Fasc. ii. (1889) n. 73-75] in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 89. — Scandinav.
- scapiforme, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 117. — Europ.
- scaposum, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 330. — Pyren.
- scariolaceum, *Arv. l. c.* 367. — Alp.
- scariolaefolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 108 = *viscosum*, *Arv.*
- scepusiense, *Simonk. in Term. tud. Közl.* (1890) 490 = *H. Ullepicii*, *Uechtr.*
- schoenbrunnense, *X. G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. 11. (1893) 1298. — Austria.
- sciadophorum, *X. G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vi. (1888) 27. — Europ.
- Scribneri, *Small, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 20. — Tennessee.
- scitulum, *Woloszczak, in Spraw. fizyogr. Kom. Krajow.* xxi. (1888) 128. — Hung.
- sclerotrichum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 15 = *fallax*, *Willd.*
- scorpioideum, *Arv. l. c.* 71 = *brumale*, *Arv.*
- scoticum, *F. Hanbury, in Journ. Bot.* xxvi. (1888) 206. — Scotia.
- seckauense, *X. Pernh. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 364. — Stiria.
- seidense, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xx. 3 (1895) 21. — Scandinav.
- segureum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 90. — Gall.
- semauricula, *X. G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* v. (1887) 20. — Germ.
- semidovrense, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 64; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 5, 6 et 57. — Scandinav.
- semiglobosum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 71. — Scandinav.
- semilanatum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 61 = *pseudolanatum*, *Arv.*
- semiplanum, *A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv.* (1895) 338 = *brachiatum*, *Bert.*
- seneciflorum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 99 = *doronici-folium*, *Arv.*
- septentrionale, *Arv. l. c.* 86 = *columnare*, *Arv.*
- serratifrons, *Almq. ex Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 82. — Scandinav.
- sertuliferum, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 126. — Europ.
- serratum, *X. Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 200. — Europ.
- setheiriforme, *A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv.* (1895) 344 = *leptophyton*, *Naeg. & Peter.*
- seusanum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 65. — Gall.
- Scheppigianum, *X. Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 651 et 665. — Oriens.

HIERACIUM: —

- scissiforme, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 17 = *floribundum*, *Wimm. & Grab.*
- seidense, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xx. iii. 1 (1894) 21 = *alpinum*, *Linn.*
- septentrionis, *Elfstr. l. c.* 31, ad calc. = *praematurum*, *Elfstr.*
- siliginellum, *Dahlst.* ex *Porat*, in *Bot. Notiser* (1894) 40 = *vulgatum*, *Fries.*
- silsinum, *X. Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 227. — Europ.
- Sintenisii, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 269. — Armen. turc.
- sinuasifrons, *Almq. [Dahlst. Hier. exs. Fasc. I (1888) n. 10-13] ex Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 53. — Scandinav.
- sipikorensse, *Freyn & Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 270 = *H. Sintenisii, Freyn & Sint.*
- Solilapidis, *Evers, l. c.* xliii. (1893) 86 et 426. — Tirol.
- sinuans, *F. Hanbury, in Journ. Bot.* xxx. (1882) 167. — Scotia.
- Smithii, *X. Arv. Hier. Alp.* (1888) 8. — Gall.
- sonchoides, *Arv. Suppl. Monog. Pilos. & Hier.* (1886) 8. — Gall.
- sparsidens, *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3. (1893) 138. — Scandinav.
- sparsivatum, *X. Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 70. — Europ.
- spectandum, *Timb. in Jeanbern. & Timb. Le Cap-sir* (1887) 153 (*Bull. Soc. sci. phys. & nat. Toul.* vii. 1886). — Pyren.
- spelaeum, *Arv. ex Briq. in Bull. Soc. bot. Genève*, vii. (1894) iii. [an seq. ?]. — Gallia.
- speluncarium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 50 = *amplexicaule*, *Linn.*
- spicatifolium, *Arv. l. c.* 97 = *lancelatum*, *Vill.*
- splendens, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 70. — Scandinav.
- splendidum, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 116. — Scandinav.
- spurium, *X. Bruegg.* in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. (1886) 133; et xxxi. Beil. (1887-88) 218. — Helv.
- squalidum, *X. Arv. Hier. Alp.* (1888) 45. — Gall.
- squamatum, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 329. — Gall.
- stachyoideum, *Arv. ex Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 387. — Bolivia.
- stellulatum, *Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 369 = *H. Bauhini, Schult.*
- stenoclinium, *Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 335. — Pyren.
- stenodon, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 52. — Scandinav.
- stenophyes, *W. R. Linton, in Journ. Bot.* xxxi. (1893) 181. — Scotia.
- stenoplectum, *Arv. & Huter, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 363. — Tyrol.
- stipatum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 48. — Scandinav.
- stiriacum, *Kern. ex Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 384. — Stiria.
- storliense, *Norrl. in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* iii. 4 (1888) 105 = *vulgatum*, *Fries.*
- stricticeps, *Dahlst.* in *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 56; et in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 73. — Scandinav.
- strigulosum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 103. — Europ.
- strigulosum, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 25. — Syria.
- strigosum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 103 = *cottianum*, *Arv.*
- styriacum, *Kern. ex Oest. Bot. Zeitschr.* (1895) 233 = *racemosum*, *Waldst. & Kit.*
- subalpestre, *Norrl. in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* iii. 4 (1888) 111 = *vulgatum*, *Fries.*
- subalpinum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 88. — Europ.
- subanfractum, *E. S. Marshall, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 183. — Brit.
- subauriculaeforme, *Lönnr. ex Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 15 (1890) 29. — Scandinav.
- subauriculoides, *Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 190. — Europ.

HIERACIUM: —

- subbarbatum*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. n. (1893) 1309 = *racemosum*, Waldst. & Kit.
subcaesium, Formanek, Kvetena, ii. (1892) 473 = *mucrum*, Linn.
subcanipes, Dahlst. in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 29. — Scandinav.
subcaulescens, Naeg. & Peter, ex Oest. Bot. Zeitschr. (1889) 451. — Eur. centr.
subcordatum, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 115. — Scandinav.
subcurvatum, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 23 = *alpinum*, Linn.
subdecolorans, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 23. — Scandinav.
subellipticum, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 23 = *alpinum*, Linn.
subelongatum ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 225. — Europ.
subfloribundum, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 35 = *floribundum*, Wimm. & Grab.
subfurculatum, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. n. 1 (1894) 31, ad calc. = *finmarkicum*, Elfstr.
subglabratum ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1893) 1203. — Austria.
subincisum, Arv. Hier. Alp. (1888) 77. — Europ.
subintegratum, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 31, ad calc. = *comosum*, Elfstr.
subirriguum, Dahlst. ex Porat, in Bot. Notiser (1894) 42 = *murorum*, Linn.
sublactum ×, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) p. 236. — Gall. mer.
sublaeve, Arv. Hier. Alp. (1888) 72 = *buglossoides*, Arv.
sublaeve, Freyn & Bornm. ex Freyn. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 364 = *scabrum*, Linn.
sublanatum, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. ii. 1 (1889) 196 = *pellitum*, Fries.
sublineatum, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 10. — Scandinav.
subnigrescens, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 131. — Scandinav.
subobscurens, Dahlst. ex Porat, in Bot. Notiser (1894) 41 = *serratifrons*, Almq.
subortum ×, G. Schneid. in Deutsche Bot. Monatschr. vi. (1888) 122. — Europ.
subperfoliatum, Arv. Hier. Alp. (1888) 92 = *jura-num*, Fries.
subpratense, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 200 (= *Pilosella subpratensis*, Norrl.). = *succicum*, Naeg. & Peter.
subrigidum, Almq. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 61. — Scandinav.
subrosulatum, Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 503. — Armen.
subrubens, Arv. Hier. Alp. (1888) 5 = *H. Faurei*, Arv.
subrude, Arv. l. c. 72 = *buglossoides*, Arv.
subsinuatum, Borb. in Vortrag Bot. Fachconf. Ungar. Naturh. Gesells. 1892 (1893) 46; et in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 69. — Hung.
subspeciosum ×, Naeg. in Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 147. — Europ.
substellatum ×, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 236, nomen. — Gall.
substoloniflorum, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 379. — Alp. Eur.
subtriangulare, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 17. — Scandinav.
subtubulasens, Dahlst. [Hier. exsicc. Fasc. iii. (1887) n. 12] in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 16. — Scandinav.
subvestitum, Timb. in Jeanbern. & Timb. Le Cap-sir (1887) 154 [Bull. Soc. sci. phys. & nat. Toul. vii. 1886]. — Pyren.
subvillosum, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 345 in 391; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 343. — Bulg.
subvirens, Arv. Hier. Alp. (1888) 121. — Gall.
succicum, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 200. — Fennia.
suivalense, Norrl. ex Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 15 (1890) 41 (= *Pilosella suivalensis*, Norrl.). — Scandinav.

HIERACIUM: —

- Sundbergii*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. 7 (1890) 45; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 32 = *alpinum*, Linn.
suomense, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 199 (= *Pilosella suomense*, Norrl.) = *cymosum*, Linn.
supplicatum, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 62. — Scandinav.
surrejanum, F. Hanbury, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 230. — Brit.
sylvaticum, Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. 1891 (1892) 45. — Hisp.
symphytaceum, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 561; et Hier. Alp. (1888) 112. — Gall.
sympodiale, Borb. ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 186, nomen. — Hung.
szepusiense, Simonk. ex Termész. Közöny (1890) 490 (= *H. rhodopaeum*, Auct. Hung.). — Hung.
tanense, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 14 = *alpinum*, Linn.
taraxaciforme, Arv. Suppl. Monog. Hier. (1886) 15; et Hier. Alp. (1888) 80 = *bifidum*, Kit.
tarnense, Arv. et Sudre, in Lucante. Rev. de Bot. xii. (1894) 25. t. 2; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1895) 199. — Gall.
Tatrae, Borb. in Bot. Centralbl. lvii. (1894) 100, nomen. — Hung.
tempendense, Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 504. — Armen.
tenebricosum, Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 31; et in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 148. — Scandinav.
tenebrosum, Norrl. in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn. iii. 4 (1888) 106 = *vulgatum*, Fries.
tenuilingua, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 9 (= *Pilosella tenuilingua*, Norrl.) = *H. Pilosella*, Linn.
tenuissimum, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. xlv. (1895) 336 = *brachiatum*, Bert.
thapsifolium, Arv. Hier. Alp. (1888) 55. — Gall.
thapsiforme, Uechtr. ex Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 290. — Europ.
thapsigenum ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 339. — Bavar.
thapsoides, Arv. Hier. Alp. (1888) 56. — Gall.
Theenii, Timb. in Jeanbern. & Timb. Le Capsir (1887) 153 [Bull. Soc. sci. phys. et nat. Toul. vii. (1886)]. — Pyren.
thyraicum, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. (1889) 74. — Transsilv.
Timbalianum, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 348. — Pyren.
tolpidifolium, Arv. l. c. 343. — Pyren.
tomentellum ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 79. — Europ.
tómóense ×, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1883) 371. — Transsilv.
tómóense ×, Simonk. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 200 = *praec.*
tómóense, Simonk. ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) in = *tómóense*, Simonk.
Torrepaudoj, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 123. — Hisp.
transalpinum, Arv. Hier. Alp. (1888) 97 = *lanceo-latum*, Vill.
transiens, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 111. — Scandinav.
transiens, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 262. — Bulg.
translucens, Arv. Hier. Alp. (1888) 84. — Gall.
triangulare, Almq. ex Stenstr. Värml. Archier. (1889) 17; Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 69. — Scandinav.
trichocerinthe, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 334. — Pyren.
trichocladum, Arv. Hier. Alp. (1888) 38 = *armeo-rioides*, Arv.
trichoderma, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv (1895) 322 = *collinum*, Gochl.
trichodermum, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 345. — Pyren.
trichodontum, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 266 (= *Pilosella trichodontia*, Sch. Bip.). — Bolivia.

HIERACIUM: —

- tricholepidum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 362. — Alp. Marit.
trichoneurum, Prantl, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 196 = *glabratum*, Hoppe.
tuberculatum, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 260; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 505. — As. Min.
tumescens, Norrl. Bidr. till Skand. Hier.-flora (1888) 80; et ex Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 88. — Scandinav.
turbiniceps, Dahlst. [Hier. exsicc. fasc. iv. (1891) n. 80] in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 96. — Scandinav.
turritifolium, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 363. — Pyren.
Twardowskianum, A. Rehm. & Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 190 = *H. Pilosella*, Linn.
uberans ×, Murr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 205, et xliii. (1893) 179; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 97. — Tirol.
ucenicum, Arv. Hier. Alp. (1888) 52 = *saxatile*, Vill.
Uechtritizianum, G. Schneid. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 23 = *eximium*, Backh.
Ullepicii, Blochi, in Deutsche Bot. Monatsschr. (1887) 24. — Hung.
umbelluliferum, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 198 = *cymosum*, Linn.
urticeum, Arv. Hier. Alp. (1888) 47. — Gall.
urticaefrons, Dahlst. in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 35. — Scandinav.
ustulatum, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 561; et Hier. Alp. (1888) 36. — Gall.
vaellistense, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 15 = *alpinum*, Linn.
valbonnense, Arv. Hier. Alp. (1888) 48 = *pedemontanum*, Burn. & Grenli.
Valdelievrei, Murr. in Progr. Ober. Realsch. Innsbr. (1890-91) ex Oest. Bot. Zeitschr. (1891) 280. — Tirol.
valentinum, Arv. & Reverch. ex Herv. in Rev. gén. bot. (1892) 156; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 119. — Hisp.
validum, Arv. in Herv. Rech. fl. bass. Loire, 4e livr. (1885) 34 = *boreale*, Fries.
valsianum ×, Sarnth. ex Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 179. — Europ.
Vandasii, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 343; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 343. — Bulg.
varangerense, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. n. 1 (1894) 31, ad calc. = *gracilentum*, Backh.
varatineuse, Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajowej, xxii. (1888) n. 202 = *H. Bauhini*, Dolliner.
variicolor, Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1890) 22. — Suec.
vatricosum, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 84. — Scandinav.
Velenovskyi, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 346; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 344. — Bulg.
venetum, « Boiss. & Reut. » ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 455, ad calc. = *vestitum*, Boiss. & Reut.
verbenacum, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 191 (= *H. verbenacum*, Arv.) = *umbellatum*, Linn.
vernantianum, Arv. & Brig. ex Brig. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 630. — Sabaud.
versifolium, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 117. — Europ.
vestmannicum, Dahlst. ex Porat, in Bot. Notiser (1894) 42 = *rigidum*, Hartm.
viduatum, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 348. — Pyren.
villiceus, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 114. — Europ.
villiferum, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 329. — Europ.
villipes, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 6 = *H. Pilosella*, Linn.
villosiceps, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 105. — Europ.
villosiflorum, Dahlst. et A. Magnuss. ex Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 47 = *alpinum*, Linn.

HIERACIUM: —

- villosipes*, Pax, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 42. — Carpath.
violascens, Alm. ex Dahlst. in Bot. Notiser (1886) 164 [Hier. exsicc. Fasc. ii. n. 95]; et in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 136 = *murorum*, Linn.
violascens, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 192 = *prenanthoides*, Linn.
virgatum, Peter, ex O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 385. — Eur. centr.
virgicale X, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 72. — Europ.
viride, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 561; et Hier. Alp. (1888) 73. — Gall.
viridiceps, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 96. — Europ.
viscidum, Arv. ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 383. — Europ.
vitellicolor, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 36 = *alpinum*, Linn.
vilasitense X, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 646. — Bosnia.
Wahlenbergii, Pax, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1896) 43. — Carpath.
Weberi X, G. Schneider, in Sagorski & Schneider, Fl. Centralkarp. (1891) 275 et 363. — Europ.
Wiesbawianum, Uechtr. in Deutsche Bot. Monatschr. (1884) 102; G. Beck, Fl. Nied-Oest. ii. 11. (1893) 1293. — Austr.
Woloszczakii, Blochi, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 297, nomen. — Hung.
wulhense, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 330 = *macrostolonum*, G. Schneid.
Xatardianum, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 353. — Gall. mer.
Zapalowickii X, Woloszczak, in Spraw. Kom. fizy-jogr. Krajowej, xvii. (1892) II. 298. — Europ.
zetlandicum, Beeby, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 243. — Ins. Zetland.
ziljevanum, Oborny, ex Murb. in Lunds. Univ. Arskrift. xxvii. v. (1892) 95 = *H. Fussianum*, Schur.

HIEROBOTANA, Briq. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 148. **VERBENACEAE**.
inflata, Briq. l. c. (= *Verbena inflata*, Kunth). — Columb.

HIERAPICRA, Siegesb. Fl. Petrop. (1736) 54
 ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 346 = **Carbenia**,
 Adans. (Compos.).
benedicta, Kuntze, l. c. 347 = *C. benedicta*, Adans.

HIEROCHLOE, S. G. Gmel. (Gramin.). — Ind.
 Kew i. 1161.
Hookeri, Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. xxxii. (1888) 627 (= *Ataxia Hookeri*, Griseb.). — Ind. or.
Horsfieldii, Maxim. l. c. (= *A. Horsfieldis*, Kunth). — Java.
japonica, Maxim. l. c. 626. — Japon.
odorata, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 67 = *borealis*, Roem. & Schult.
repens, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 560 (= *Holcus repens*, Host) = *borealis*, Roem. & Schult.
sikkimensis, Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. xxxii. (1888) 626. — Reg. Himal.
tenuis, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 798 (= *Ataxia tenuis* Trin.). — Afr. austr.

HIERONYMA, Baill. = **Hyeronima**, Allem.
 (Euphorb.).
reticulata, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 255 (= *Antidesma reticulata*, Planch.). — Bolivia.

HIERONYMELLA, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 327. **AMARYLLIDAE**.
clidanthoides, Pax, l. c. — Reg. Argent.

HILARIA, H. B. & K. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1161.
rigida, Scribn. ex Vasey, Illustr. Am. Gram. i. 11. (1891) t. 2; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 14 = *rigida*, Vasey.

HILDEBRANDTIA, Vatke (Convolv.). — Ind.
 Kew. i. 1161
somalensis, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 87. — Afr. trop. or.

HILLERA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 551 = **HILLERIA**. Vell. = **Mohlana**, Mart. (Phytol.).
secunda, Kuntze, l. c. = *M. nemoralis*, Mart.

HILLIA, Jacq. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1161.
boliviana, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 43. — Boliv.
illustris, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 202 = *tubaeflora*, Chum.
Saldanhaei, K. Schum. l. c. 201. — Bras.

HIMANTANDRA, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. ii. (1887) 5 = **Eupomatia**, R. Br. (Anonac.).

HIMANTOCHILUS, T. Anders. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1161.
comorensis, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 61. — Ins. Comor.
macrophyllus, Lindau, l. c. 60. — Afr. trop. or.
marginatus, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.
Zenkeri, Lindau, t. c. 60. — Afr. trop. occ.

HIMANTOPHYLLUM, Spreng. = **Clivia**, Lindl. (Amaryll.).
atrovanguineum, Williams, Catal. (1888) 20 = *C. miniata*, Regel.

HINDSIA, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1162.
breviflora, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 165. — Bras.
glabra, K. Schum. l. c. — Bras.
phyllocalyx, K. Schum. l. c. 169 — Bras.

HIPPAGROSTIS, Rumpf, Herb. Amboin. vi. (1749) 14 t. 5, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 776 = **Oplismenus**, Beauv. (Gramin.).
Burmmanii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 777 = *O. Burmmanii*, Beauv.
composita, Kuntze, l. c. = *O. compositus*, Beauv.
hirtella, Kuntze, l. c. = *O. compositus*, Beauv.
loliacea, Kuntze, l. c. = *O. compositus*, Beauv.
setaria, Kuntze, l. c. = *O. undulatifolius*, Beauv.
undulatifolia, Kuntze, l. c. = *O. undulatifolius*, Beauv.

HIPPEASTRUM, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1162.
africanum, Welw. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 49, in ols. = *H. Reginae*, Herb.
angustifolium, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 321. Reg. Argent.
brachyandrum, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 42, in Gard. Chron. (1890) ii. 154; et in Bot. Mag. (1894) t. 7344. — Am. austr. extratrop.
Mandoni, Baker, l. c. 49. — Bolivia.
pallidum, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 321 (= *Habranthus pallidus*, Lodd.).
petiolatum, Pax, l. c. 330. — Reg. Argent.
purpureum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 703 = *equestre*, Herb.
scopulorum, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 49. — Bolivia.
soratense, Baker, l. c. 42. — Bolivia.
tubispathum, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 329. — Reg. Argent.
Wolteri, Wiltm. in Gartenfl. (1895) 201 fig. 49 et 465 t. 1418 = *equestre*, Herb.

HIPPIONUM, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 428 = **HIPPION**, F. W. Schmidt, = **Enicostema**, Blume (Asclap.).
vericillatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 428 (= *Hippion verticillatum*, F. W. Schmidt). = *E. littorale*, Blume.

HIPPOBROMUS, Eckl. & Zeyh. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 1162.
apetalus, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 381 (= *Melicocca apetalus*, Poir.). — Ins. Borbon.
pauciflorus, Radlk. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) — Afr. austr.

HIPPOCASTANUM, Tourn. ex Rupp. = **Aesculus**, Linn. (Sapind.).
californicum, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 73. — Spach.

HIPPOCRATEA, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1163.
Buchananii, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 235. — Afr. trop. or.
Buchholzii, Loesen, l. c. 234. — Kamerun.
cambodiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 19 (1893) t. 302 B. — Cambodia.
Chesseana, Pierre, l. c. t. 381 B. — Cochinch.
crenata, K. Schum. & Loesen, ex Loesen, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 228 = *Gymnema crenatum*, Klotzsch.
dinhensis, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 19 (1893) t. 301 A. — Cochinch.
Grisebachii, Loesen, l. c. 227 (= *H. verrucosa*, Griseb.). — Parag.
malifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 307. — Madag.
micrantha, Baker, l. c. 307. — Madag.
Miersii, Loesen, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 228 (= *Pristimera apiculata* Miers). — Am. austr.
Poggei, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 238. — Congo merid.
Rowlandii, Loesen, l. c. 238. — Afr. trop. occ.
Stuhlmanniana, Loesen, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 228. — Zanzib.
Volkensii, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 238. — Afr. trop. or.
Zenkeri, Loesen, l. c. — Kamerun.

HIPPOCREPIS, Lindl. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1164.
Bornmuelleri, Hausskn. ex Bornm. in Mittl. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 53. — Persia.
elongatula, Hochst. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 171, in syn. = *constricta*, Kuntze.
fruticosa, Rony, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 116. — Hisp.

HIPPODAMIA, Decne = **Solenophora**, Benth. (Gesner.).
Endlicheriana, Fritsch, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 183 = *S. Endlicheriana*, Hanst.
insignis, Fritsch, l. c. = *S. insignis*, Hanst.
obscura, Fritsch, l. c. = *S. obscura*, Hanst.

HIPPOPHAE, Linn. (Elaeag.). — Ind. Kew. i. 1164.
angustifolia, « Lodd. » ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 214 = *rhamnoides*, Linn.
rhamnoides, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 720 = *rhamnoides*, Linn.
taurica, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 214 = *rhamnoides*, Linn.

HIPPOTIS, Ruiz & Pav. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1165.
brevipes, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 298. — Peruv.
tubiflora, Spruce, ex K. Schum. l. c. — Peruv.

HIPTAGE, Gaertn. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 1165.
bengalensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 88 = *H. Madablota*, Gaertn.
calycina, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 272 A. — Cochinch.
elliptica, Pierre, l. c. t. 272 B. — Cochinch.
Harmandiana, Pierre, l. c. t. 270 B. — Cochinch.
lucida, Pierre, l. c. Fasc. 18 (1893) t. 273 A. — Cochinch.
macrocarpa, Choizat, in Archiv. sci. phys. & nat. (1890) in Bull. Soc. Bot. Suisse i. 35; et in Mém. Soc. sci. phys. & nat. Genève, xxi. 2 n. 3 (1893) 116 t. 46. — Parag.
microcarpa, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 274 B. — Cochinch.
parvifolia, Niedenzu, in Bot. Jahrb. Beibl. n. 30 (1891) 2. — Bras.
pulcherrima, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii (1892) 67. — Parag.
triacantha, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 273 A. — Cochinch.

HIRNELLIA, Cass. = **Myriocephalus**, Benth. (Compos.)

appendiculata, *gracilis*, *nuda*, *rhizocephala*, *Rudallii*, *Stuartii*, *suffruticosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 346 = *homonyma omnia* Myriocephali.
helichrysoides, Kuntze, l. c. = *M. helichrysoides*, A. Gray.
Querinae, Kuntze, l. c. = *M. Querinae*, F. Muell.

HIRSCHIA, Baker, in Kew Bull. (1895) 317. **COMPOSITEAE**.
anthemidifolia, Baker, l. c. — Arabia.

HIRSCHFELDIA, Moench = **Brassica**, Town. (Crucif.)
consobrina, Pomel, Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 61 = *B. adpressa*, Boiss.

HIRTELLA, Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 1166.
Burchellii, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 10. — Bolivia.
egensis, Fritsch, in Annal. Naturl. Hofmus. Wien, v. (1890) 10. — Bras.
Glaziovii, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 8. — Bras.
pulchra, Fritsch, in Annal. Naturl. Hofmus. Wien, v. (1890) 9. — Bras.
Thouarsiana, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 874; et Hist. fl. Madag. Atlas (1886) t. 13. — Madag.

HITCHENIA, Wall. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1167.
caulina, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 224. — Concan.
musacea, Baker, l. c. 225 (= *Curcuma musacea*, Wall.). — Penins. Mal.

HOEHNELIA, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 422, nomen; in Hoehnel. Zum Rudolph See, Append. (1892) 9; O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 388. **COMPOSITAE**.
vernonioides, Schweinf. l. c. — Afr. trop.

HOFERIA, Scop. = **Ternstroemia**, Linn. f.
japonica, Franch. Pl. Delav. (1889) 105 = *T. japonica*, Thunb.

HOFFMANNIA, Sw. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 1167.
brachycarpa, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 108. — Bolivia.
gesnerioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 285 = *Ophryococcus gesnerioides*, Oerst.
latifolia, Kuntze, l. c. 284. — Peru., Costarica.
pallida, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 44. — Bolivia.
Pearcei, Rusby, l. c. — Bolivia.
Peckii, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 327. — Bras.
rotata, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 204. — Guatem.

HOFFMANSEGGIA, Cav. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1168.
andina, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 19. — Chili.
canescens, Fisher, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 149. — Mexic.
fruticosa, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 451. — Mexic.
glabra, Fisher, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 147. — Calif.
gladiata, Fisher, l. c. 146. — Mexic.
intricata, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Akad. Ser. II. ii. (1889) 151. — Calif.
multijuga, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 451. — Mexic.
parviflora, M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxx. (1889) n. 7, 87 t. 25. — Parag.
platycarpa, Fisher, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 146. — Mexic.
rubra, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 25. — Afr. austro-occ. extratrop.
ternata, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 19. — Chili.

HOFFMANSEGGIA: —
texensis, Fisher, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 147. — Texas.

HOFFMEISTERIA, Walp. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1168.
crassifolia, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 53. — Mexic.
fasciculata, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Akad. Ser. II. ii. (1889) 167 = *fasciculata*, Walp.
pubescens, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 54. — Mexic.

HOHENBERGIA, Schult. f. = **Aechmea**, Ruiz et Pav. (Bromel.).
angusta, Mez. in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 270 = *A. multiceps*, Baker.
Blanchetii, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 49 = *A. Blanchetii*, Ed. Morr.
chrysocoma, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 44 = *A. chrysocoma*, Baker.
eriantha, Mez. in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 269 = *A. eriantha*, Bronyn.
guetacea, Mez, l. c. 272. — Bras.
membranostrobilus, Mez, l. c. 269. — Bras.
pycnantha, Mez, l. c. 273 = *A. pycnantha*, Baker.
Ridleyi, Mez, l. c. — Bras.
Salzmanni, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 49 = *A. Salzmanni*, Baker.

HOILBRENCKIA, *formosa*, Hort. ex Gard. Kew i. Polypet. (1894) 101. = *Staphylea colchica*, Stev.

HOLALAFIA, Stapf, in Kew Bull. (1894) 123; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2350. **APOCYNACEAE**.
multiflora, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.

HOLARRHENA, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 1168.
Fischeri, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 316; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 137. — Afr. trop. or.

HOLBOELLIA, Wall. (Berber.). — Ind. Kew. i. 1168.
cuneata, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1811. — China.

HOLCUS, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1168.
longiaristatus, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 907 = *mollis*, Linn.

HOLLANDAEA, F. Muell. in Chem. and Drug. Australas. (June 1887) 173. **PROTEACEAE**.
Sayeri, F. Muell. l. c. (= *Helicia Sayeri*, F. Muell.). — Austral.

HOLLRUNGIA, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 212; et xv. (1893) 564; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 88. **PASSIFLORAE**.
aurantioides, K. Schum. l. c. — N. Guin.

HOLOCARYA, Th. Dur. Ind. Gen. (1888) 184.
sphalm. = **Holocarpa**, Baker (Rubiaceae).

HOLODISCUS, Maxim. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).
ariaefolius, Greene. Man. Bot. San Franç. Bay (1894) 113 = *S. ariaefolia*, Smith.

HOLALAFIA. « Stapf » ex K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 188.
sphalm. = **Holalafia** Stapf (Apocyn.).

HOLOSTACHYS, Greene, Fl. Francisc. (1891) 173 in syn. *sphalm.* = **Halostachys**, C. A. Mey. (Chenop.).

HOLOSTEMMA, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1170.
annularis, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 250 = *H. Rheedei*, Wall.
sinense, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 103 (= *Metaplexis Hemsleyana*, Oliver). — China.

HOLOSTEUM, Dill. ex Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. i. 1170.
macropetalum, Hausskn. & Bornm. ex Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena. ix. (1891) 15. — As. Min.

HOLOTHRIX, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1170.
arachnoidea, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. (1892) 69 = *Peristylus arachnoideus*, A. Rich.
glaberrima, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 125. — Madag.
hispidula, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 70 = *parvifolia*, Lindl.
longiflora, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 237. — Angola.
madagascariensis, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 55. — Madag.
micrantha, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 31. — Afr. austr.
montigena, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 295. — Abyss.
multisecta, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 170 fig. 7. — Afr. austr.
platydactyla, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 66. — Kamerun.
pleistodactyla, Kraenzl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 151; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 17. — Afr. trop. or.
puberula, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 278. — Afr. trop. or.
Schmidtii, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 66. — Ins. Comor.
Usambarae, Kraenzl. l. c. xix. (1894) 248. — Afr. trop. or.

HOLOZONIA, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 199 = **Lagophylla**, Nutt. (Compos.).
filipes, Greene l. c. = *L. filipes*, A. Gray.

HOOKERA, Salisb. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).
aurea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 712 = *Milla aurea*, Baker.
bivalvis, Kuntze, l. c. = *M. bivalvis*, Baker.
brevipes, Kuntze, l. c. = *M. brevipes*, Baker.
Bridgesii, Kuntze, l. c. = *B. Bridgesii*, S. Wats.
californica, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 1362 = *B. californica*, Lindl.
capitata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 138 = *B. capitata*, Benth.
crocea, Kuntze, l. c. = *B. crocea*, S. Wats.
gracilis, Kuntze, l. c. = *B. gracilis*, S. Wats.
grandiflora, Kuntze, l. c. = *B. grandiflora*, Sm.
hirtella, Kuntze, l. c. = *Milla hirtella*, Baker.
hyacinthina, Kuntze, l. c. = *B. lactea*, S. Wats.
ixiodes, Kuntze, l. c. = *B. ixiodes*, S. Wats.
laxa, Kuntze, l. c. = *B. laxa*, S. Wats.
leptandra, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 74. — Calif.
macropoda, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 138 = *B. terrestris*, Kellogg.
minor, Britton, ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1891) 318 = seq.
minor, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 138 = *B. minor*, S. Wats.
multiflora, Britten, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 51 = *B. multiflora*, Benth.
Orcuttii, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 138. — Calif.
parviflora, Kuntze, l. c. 711 = *B. multiflora*, Benth.
patagonica, Kuntze, l. c. 712 = *Milla patagonica*, Baker.
peduncularis, Kuntze, l. c. = *B. peduncularis*, S. Wats.
Poeppigiana, Kuntze, l. c. = *Milla Poeppigiana*, Baker.
porrifolia, Kuntze, l. c. = *M. porrifolia*, Baker.
rosea, Greene in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 137. — Calif.
Sellowiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 712 = *Milla Sellowiana*, Baker.
sessilis, Kuntze, l. c. = *M. sessilis*, Baker.
setacea, Kuntze, l. c. = *M. setacea*, Baker.
stellaris, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 137 = *Brodiaea stellaris*, S. Wats.
subbiflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 711 = *Milla subbiflora*, Baker.

HOOKERA: —

terrestris, Britton, ex Greene. Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 319 = *Brodiaea terrestris*, Kell. *uniflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 711 = *Milla uniflora*, R. Grah.

HOMAIDA, Adans = **Biarum**, Schott (Aroid.).

Bovei, *Carduchorum*, *eximia*, *Olivieri*, *Pyrami*, *Spruneri*, *tenuifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 742 = *homonyma omnia* Biari.
Bovei, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 456 = B. *Bovei*, Blume.
graminea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 742 = B. *tenuifolium*, Schott.
Russelliana, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 456 = B. *Russellianum* Schott.
tenuifolium, Baill. l. c. = B. *tenuifolium*, Schott.

HOMALANTHUS, A. Juss. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1171.

Moerenhoutianus, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Maris Pacif. (1892) 293 (= *Carumbium Moerenhoutianum*, Muell. Arg.). — Ins. Tahit.
nutans, Benth. & Hook. f. ex Drake, l. c. (= *C. nutans*, Muell. Arg.). — Ins. Vitiens.
populneus, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1892) 96 (= *C. populneum*, Muell. Arg.). — As. trop.

HOMALIUM, Jacq. (Samyd.). — Ind. Kew. i. 1171.

albiflorum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 575 (= *Nisa albiflora*, Boiv.) = *albiflorum*, O. Hoffm.?
axillare, Baill. l. c. 574 = *axillare*, Benth.
Bailloni, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 23. — Madag.
brachystylum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 573 (= *Blackwellia brachystylis*, Tul.). — Madag.
brevipedunculatum, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 21. — Madag.
Buchholzii, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 36 — Afr. trop.
circumpinnatum, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. (1892) 17. — Austral.
cymosulum, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 22. — Madag.
dasyanthum, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 36 = *Griffithianum*, Kurz.
Deplanchei, Warb. l. c. 36 (= *Blackwellia Deplanchei*, Vieill.). — N. Caled.
dictyoneurum, Warb. l. c. 36 = *Pierrea dictyoneura*, Hance.
erianthum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 574; et Hist. pl. Madag., Atlas, t. 132 (= *Blackwellia eriantha*, Tul.). — Madag.
fasciculatum, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 21. — Madag.
frutescens, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 36. — Java.
guianense, Warb. l. c. = H. *Racoubea*, Sw.
Hildebrandtii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 576 = *involucratum*, O. Hoffm.
Hoffmannianum, Baill. l. c. 575. — Madag.
hondurensis, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 4. — Am. centr.
Humblotii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 574. — Madag.
integrifolium, Baill. l. c. = *paniculatum*, Benth.
integrifolium, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 24 = praec.
lanceolatum, S. Elliot, l. c. 23. — Madag.
laxiflorum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 575; et Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 126 (= *Myrianthea laxiflora*, Tul.). — Madag.
leucophlaeum, Baill. ll. cc. 576; et t. 128 (= *Nisa leucophloea*, Tul.). — Madag.
lucidum, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 24. — Madag.
nobile, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 575; et Hist. pl. Madag. Atlas (1889) t. 127. — Madag.
nudiflorum, Baill. l. c. (= *Nisa nudiflora*, DC.). — Madag.
oppositifolium, Baill. l. c. (= *Myrianthea oppositifolia*, Tul.). — Madag.

HOMALIUM: —

paniculatum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 574 = *paniculatum*, Benth.
planiflorum, Baill. l. c.; et Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 133 (= *Blackwellia planiflora*, Boiv.). — Madag.
polyandrum, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 36. — N. Caled.
rubiginosum, Warb. l. c. (= *Blackwellia rubiginosa*, Vieill.). — N. Caled.
sanguineum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 575; et Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 122 (= *Nisa sanguinea*, Boiv.). — Madag.
scleroxylon, Baill. ll. cc. 575; et t. 121 (= *Nisa scleroxylon*, Tul.). — Madag.
Stuhlmannii, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. C (1895) 278. — Afr. trop. or.
Thouarsianum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 571a (= *Blackwellia Thouarsiana*, Tul.). — Madag.
urceolatum, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 22. — Madag.
Villarianum, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 142. — Ins. Philipp.

HOMALOCENCHRUS, Mieg. ex Hall. Hist.

Stirp. Helv. ii. (1768), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 777 = **Leersia**, Soland. (Gramin.).
angustifolius, Kuntze, l. c. — Afr. centr.
Gouinii, Kuntze, l. c. = L. *Gouini*, Fourn.
lenticularis, Kuntze, l. c. = L. *lenticularis*, Michx.
lenticularis, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, v. (1894) 33 = praec.
ligularis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 777 = L. *ligularis*, Trin.
monandrus, Kuntze, l. c. = L. *monandra*, Sw.
ovatus, Kuntze, l. c. = L. *ovata*, Poir.
virginicus, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. ix. (1889) 14 = L. *virginica*, Willd.

HOMALOMENA, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 1171.

angustifolia, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 533 (= *Calla angustifolia*, Jack.). — Perak.
deltoides, Hook. f. l. c. 536. — Perak.
elliptica, Hook. f. l. c. — Perak.
Griffithii, Hook. f. l. c. 534. — Malacca, Borneo.
humilis, Hook. f. l. c. 533. — Penins. Mal., Borneo.
Kingii, Hook. f. l. c. 535. — Penins. Mal.
lancifolia, Hook. f. l. c. 533. — Penins. Mal.
nutans, Hook. f. l. c. 535. — Perak.
obliquata, Hook. f. l. c. 534. — Penins. Mal.
ovata, Hook. f. l. c. 536 (= *Chamaecladon ovatum*, Schott). — Penins. Mal.
paludosa, Hook. f. l. c. 531. — Perak.
pontederaefolia, Griff. ex Hook. f. l. c. 533. — Penins. Mal.
pumila, Hook. f. l. c. — Penins. Mal.
Scortechinii, Hook. f. l. c. 534. — Perak.
trapezifolia, Hook. f. l. c. = Perak.
truncata, Hook. f. l. c. 535 (= *Chamaecladon truncatum*, Schott). — Penins. Mal.
velutina, Scortech. ex Hook. f. l. c. 534. — Perak.

HORMOLOTUS, Oliver, in Johnston, Kilima-njaro Exped. (1886) 337 et 339, nomen = **Ornithopus**, Linn. (Legumin.).

Johnstoni, Oliver, l. c. nomen = O. *coriandrinus*, Hochst. & Steud.

HOMERIA, Vent. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1172.

bicolor, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 157. — Afr. austr.
pallida, Baker, Handb. Irid. (1892) 75. — Afr. austr.

HOMILACANTHUS, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 129. **ACANTHACEAE**.

Gregorii, S. Moore, l. c. t. 343. — Afr. trop. or.

HOMOEANTHUS, Spreng. = **HOMOIANTHUS**, Bonpl. = **Perezia**, Lag. (Compos.).

bellidifolius, Phil. in Ann. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 306. — Chili.
brevicaulis, Phil. l. c. 309. — Chili.
calophyllus, Phil. l. c. 305. — Chil.
capito, Phil. l. c. 309. — Chili.

HOMOEANTHUS: —

humilis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 307. — Chili.
nivalis, Phil. l. c. 308. — Chili.
Remyanus, Phil. l. c. 310. — Chili.
triceps, Phil. l. c. 307. — Chili.
variabilis, Phil. l. c. 306. — Chili.

HOMOTROPA macranthum, Schuttl. ex Small, in Mem. Torrey Bot. Club., iii. (1893) 11, in syn.; et iv. (1894) 150 = *Asarum virginicum*, Linn.**HONCKENYA**, Willd. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 1172.

parva, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 115. — Afr. trop. occ.

HONDBESSEION, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 285 = **HONDBESSEN**, Adans. = **Paederia**, Rupp. (Adans.).

calycinum, *densiflorum*, *foetidum*, *Gardneri*, *lanuginosum*, *lineare*, *piliferum*, *tomentosum*, *verticillatum*, *Wallichii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 285-6 = *homonyma omnia* Paederiae.

HOODIA, Sweet (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1172.

parviflora, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 265. — Angola.

HOOBIBRENKIA formosa, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 473 = *Staphylea colchica*, Stev.**HOOKERELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 26 = **Loranthus**, Linn.

tenuiflora, Van Tiegh. l. c. 26 = L. *tenuiflorus*, Hook. f.

HOOKERINA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 718 = **Hydrothrix**, Hook. f. (Ponted.),

Gardneri, Kuntze, l. c. = Hydr. *Gardneri*, Hook. f.

HOPEA, Roxb. (Dipterocarp.). — Ind. Kew. i. 1173.

Beccariana, Burch. in Ann. Jard. Buit. vi. (1887) 240. — Borneo.
borneensis, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 972. — Borneo.
bracteata, Burch. in Ann. Jard. Buit. vi. (1887) 239 (= *Balanocarpus Curtisii*, King). — Borneo.
celebica, Burch. l. c. vi. (1887) 237. — Ins. Celeb.
cordifolia, Trim. Handb. Fl. Ceyl. i. (1893) 126. — Zeyl.
coriacea, Burch. in Ann. Jard. Buit. vi. (1887) 237. — Borneo.
Curtisii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 124. — Perak.
Dyeri, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 972. — Borneo.
ferrea, Lanessan, Pl. util. Colon. Franç. (1886) 300; *Pierre*, Fl. For. Cochinch. Fasc. 16 (1891) t. 249. — Cochinch.
ferrea, Heim, Recherch. Diptéroc. (1892) 62 = praec.
globosa, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 61. — Perak.
grisea, Brandis, l. c. 63. — Borneo.
Hasskarliana, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 64 = *micrantha*, Hassk.
Heimiana, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 63 (= *Cotylelobium hopeifolium*, Heim). — Borneo.
Helferi, Brandis, l. c. 62 (= *Vatica Helferi*, Dyer). — Mergui.
intermedia, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 126. — Penang.
javanica, Burch. in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 64. — Java.
javanica, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 64 = *Doona javanica*, Burch.
longiflora, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 63. — Borneo.
Lowii, Dyer, ex Brandis, l. c. — Borneo, Sumatra.
microcarpa, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 954. — Borneo.
microptera, Dyer, ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 68 = H. *Dyeri*, Heim.

HOPEA:

- multiflora, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 60. — Sumatra.
 nervosa, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii (1893) ii. 124. — Perak.
 Nicholsoni, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 971 = *H. Beccariana*, Burck.
 nigra, Burck, in *Ann. Jard. Bot.* vi. (1887) 238. — Borneo?
 plagata, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 62. (= *Anicoptera pl. gata*, Blume). — Ins. Philipp.
 Recopei, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 301; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 16 (1891) t. 247. — Cochinch.
 sarawakensis, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 971. — Borneo.
 suavis, Kurz, ex Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 62, in obs. = *H. Hefleri*, Brandis.
 Thorelii, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 16 (1891) t. 245. — Cochinch.
 Treubii, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 955; et *Recherch. Diptéroc.* (1892) 62. — Borneo.
 Vesquei, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 971. — Borneo.

- HOPLOPHYTUM**, Beer = **Aechmea**, Ruiz et Pav. (Bromel.).
dealbatum, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 58 = *A. dealbata*, Ed. Morr.
grande, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 50 = *A. mexicana*, Baker.
lineatum, Hort. Bull. ex Gard. *Chron.* (1893) i. 414. [lineatus]. — Hab.?
luteum, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 42. = *A. floribunda*, Mart.
Makoyanum, Hort. ex Rev. *Hortic.* (1894) 250. — Bras.

HORDEUM, [Tourn.] Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1173.

- Caput-Medusae*, Hack. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1887) 83 (= *H. Caput-Medusae*, Loret & Barr.) = *Elymus Caput-Medusae*, Linn.
crinitum, St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd. 8.* ii. (1889) 910, in obs. (= *H. crinitum*, Desf.) = *E. Caput-Medusae*, Linn.
cylindricum, St. Lager, l. c. 909 = *H. cylindricum*, Murc.
Delileanum, Hack. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 2 (1887) 88 = *Elymus Delileanus*, Schult.
sativum, Jessen, *Deutsche Excurs. Fl.* 551; ex G. Beck, *Fl. Nied.-Oest. i.* (1890) 117 = *sativum*, Pers.

- HORKELIA**, Cham. & Schlecht. = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).
Kelloggii, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. iv. (1887) 416. — Calif.
Parryi, Greene, l. c. — Calif.

- HORSFIELDIA**, Willd. = **Myristica**, Linn.
glabra, Warb. in *Ber. deutsch. Bot. Ges.* xiii. (1895) [83] = *M. glabra*, Blume.
Irya, Warb. l. c. [85] = *M. Irya*, Gaertn.
leptocarpa, Warb. l. c. [89], nomen. — Hab.?

- HORSFORDIA**, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 296. **MALVACEAE**.
alata, A. Gray, l. c. (= *Sida alata*, S. Wats.). — Mexic.
Newberryi, A. Gray, l. c. (= *Abutilon Newberryi*, S. Wats.). — Mexic.
Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 40 — Calif. austr.
Purissimae, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 135 = *rotundifolia*, S. Wats.
rotundifolia, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 40. — Calif.

- HORTENSIA**, Comm. = **Hydrangea**, Linn. (Saxifr.).
aspera, Ham. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 319 = *Hydr. aspera*, Dougl.

- HORTIA**, Vand. (Rutac.) — Ind. Kew. i. 1115.
megaphylla, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34. (1892) 6. — Bras.

- HORTONIA**, Wight (Monim.). — Ind. Kew. i. 1175.
angustifolia, Trimm. *Syst. Cat. Ceyl. Pt.* (1885) 75 et *Handl. Fl. Ceyl.* iii. 437. — Zeyl.

- HOSACKIA**, Dougl. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1175.
alamosana, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 96. — Mexic.
 Bryanti, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 144. — Calif.
chihuahuana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 270. — Mexic.
denticulata, Drew, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 151. — Calif.
 Haydoni, C. R. Orcutt, in *West Am. Sci.* vi. (1889) 63. — Am. bor.-occ.
maritima, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 288 = *Lotus humilis*, Greene.
nivea, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 470. — Calif.
nudata, Vasey & N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 14 (= *Syrmatium nudatum*, Greene). — Calif.
occulta, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. VII. (1887) 394. — Ins. S. Cruz (Calif.).
 Palmeri, Vasey & N. E. Rose, in *Proc. U. S. Nat. Mus.* xi. (1888) 529. — Calif.
plebeia, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 144. — Calif.
sericea, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkansas*, iv. 1888. (1891) 174 = *H. Purshiana*, Benth.
 Waltoni, Vasey & N. E. Rose, in *Proc. U. S. Nat. Mus.* xi. (1888) 528. — Calif.

- HOSTA**, Tratt. = **Funkia**, Spreng. (Liliac.).
lanceifolia, Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 5 (1887) 40 = *lanceifolia*, Tratt.
Sieboldiana, Engl. l. c. = *F. Sieboldiana*, Hook.

- HORNEA**, Baill. (Passiflor.) — Ind. Kew. i. 1176.
guineensis, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 26 = *Paropsia guineensis*, Oliver.

- HOUSTONIA**, Gronov. ex Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1176.
arenaria, N. E. Rose, ex Coult. & N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 70. — Calif. inf.
asperuloidis, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1891) 142. — Calif.
Brandegeana, N. E. Rose, ex Coult. & N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 83. — Calif. inf.
brevipes, N. E. Rose, l. c. 83. — Calif. inf.
Croftiae, Britton & Rusby, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1887) 10. — Texas.
fruticosa, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 132. — Ins. Carmen.
minor, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 302 = *patens*, Ell.
polypremoides, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 379. — Mexic.
salenia, Heller, [Bot. Explor. S. Texas] in *Contrib. Herb. Frankl. and Marsch. Coll.* i. (1895) 96. t. 9. — Texas.

- HOULTTUYNIA**, Thunb. (Piper.). — Ind. Kew. i. 1176.
californica, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1891) 168 = *californica*, Benth. & Hook. f.

- HOWELLIA**, A. Gray (Campanul.). — Ind. Kew. i. 1171.
limosa, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 81; et *Man. Bot. San. Franc. Bay* (1894) 228. — Calif.

- HOYA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1177.
affinis, Hemsl. in *Kew Bull.* (1892) 126; *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2247 B. — Ins. Salom.
Aldrichii, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 355. — Ins. Christmas.
Cominsii, Hemsl. in *Ann. Bot.* v. (1891) 505; et in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2248. — Ins. Salom.

HOYA:

- Guppyi*, Oliver, in *Guppy, Salom. Isl.* 298; et in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2247 A. — Ins. Salom.
inconspicua, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894). 213. — Ins. Salom.
neo-guineensis, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 471. — N. Guin.

- HUBERIA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1178.
glabrata, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 409. — Bras.
Glazioviana, Cogn. l. c. — Bras.
minor, Cogn. l. c. — Bras.
parvifolia, Cogn. l. c. 410. — Bras.
peruviana, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 10. — Peruv.
triplinervis, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 410. — Bras.

- HUERNIA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1178.
arabica, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 265. — Arabia.
aspera, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 364; et in *Bot. Mag.* (1888) t. 7000. — Zanzib.
Engleri, Terrac. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, v. (1894) 105. — Afr. trop. or.
Loeseneriana, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51. (1895) 55. — Afr. austr.
macrocarpa, Schweinf. ex K. Schum. in *Gartenfl.* (1892) 526 fig. 108; (1895) 353 t. 1416; et in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iv. (1894) 155. — Eritrea.
Penzigii, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) i. 719. — Afr. bor. or.
Penzigii, Baker, ex Penzig, in *Att. Congr. bot. Genova* (1893) 349 = *praec.*
primulina, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1906. — Afr. austr.
similis, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 265. — Angola.
Sprengeri, Schweinf. ex Dammann, *Catal.* (1893) 46; K. Schum. in *Montasschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 74 et 104; et ex *Gard. Chron.* (1893) i. 414 = *Caralluma Sprengeri*, N. E. Br.
stapeloides, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 55. — Afr. austr.

- HUFELANDIA**, Nees = **Beilschmiedia**, Nees (Laurin.).
curviramea, Mez. in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 18 = *Ayendron curvirameum*, Meissn.
emarginata, Mez, l. c. 18 = *Cryptocarya emarginata*, Meissn.
mexicana, Mez, l. c. 20. — Mexic.
rigida, Mez. ex Taub. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 519. — Bras.

- HUGONIA**, Linn. (Lineae). — Ind. Kew. i. 1178.
brewerioides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 301. — Madag.
castanea, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 599; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas t. 117. — Madag.
lanceifolia, Baill. l. c. 598. — Madag.
montana, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 13 (1893) t. 281 A. — Cochinch.
sphaerocarpa, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 598; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas t. 117. — Madag.

- HULLETIA**, King, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 547. **URTICEAE**.
dumosa, King l. c. — Perak.
Griffithiana, King, l. c. (= *Dorstenia Griffithiana*, Kurz). — Perak.

- HUMBLOTIA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 593; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1892) t. 220; Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1890) 23. **EUPHORBIACEAE**.
comorensis, Baill. ll. cc. — Ins. Comor.

- HUMBOLDTIA**, Ruiz & Pav. = **Pleurothallis**, R. Br. (Orchid).
acianthera, *acuminata*, *acutissima*, *affinis*, *agatophylla*, *alpestris*, *amoena*, *angustifolia*, *antennifera*, *apiculata*, *arachnantha*, *Arbuscula*, *Archidonae*, *arcuata*, *aristata*, *articulata*, *asperilinguis*, *atropurpurea*, *aurea*, *auriculata*, *barbata*, *Barberiana*, *barbulata*, *Beyrichii*, *bicarinata*, *bicornis*, *bicurvus*, *bidentata*, *bilamellata*, *Biserrula*, *bivalvis*, *boliviana*, *breviflora*, *brevipes*,

HUMBOLDTIA: —

Bufonis, *cabellensis*, *capillaris*, *cardiostola*, *cardiothallis*, *Cardium*, *casapensis*, *Cassidis*, *caulescens*, *cauliflora*, *Centranthera*, *Chamaelepanthes*, *chamensis*, *chloidothylla*, *chloroleuca*, *chrysantha*, *ciliata*, *circumflexa*, *clandestina*, *cochlearis*, *conanthera*, *convoluta*, *cordata*, *cordifolia*, *coriaca*, *corniculata*, *crassifolia*, *crassipes*, *crenata*, *crepidophylla*, *crocodiliceps*, *cubensis*, *cyclochlora*, *declivis*, *decurrens*, *decurva*, *delicatula*, *dendrophila*, *diffusa*, *Dinothervii*, *diptera*, *dubia*, *dura*, *elegans*, *elongata*, *emarginata*, *endotrachya*, *ephemera*, *erinacea*, *exasperata*, *expansa*, *filifera*, *fimbriata*, *flexuosa*, *floribunda*, *floripecten*, *florulenta*, *Fockei*, *foetens*, *foliata*, *fonsflorum*, *foveata*, *fragilis*, *fraterna*, *Fritillaria*, *Fuegi*, *fulgens*, *galeata*, *gelida*, *geniculata*, *gigantea*, *glandulifera*, *Glossopogon*, *glumacea*, *gracillima*, *grandiflora*, *gratiosa*, *Grobii*, *harpophylla*, *Hartwegii*, *hastulata*, *hemirhoda*, *hians*, *Hoffmannseggiana*, *hymenantha*, *hypnicola*, *Hystrix*, *immersa*, *Imrayi*, *inaequalis*, *incompta*, *incurva*, *insignis*, *intricata*, *Kefersteiniana*, *Klotzschiana*, *Krameriana*, *laevigata*, *lamellaris*, *Lanceana*, *Lanceola*, *lanceolata*, *lateritia*, *laurifolia*, *laxa*, *leontoglossa*, *leucopyramis*, *ligulata*, *Lindenii*, *Lingua*, *linguifera*, *longicaulis*, *longilabris*, *longerostis*, *loranthophylla*, *luctuosa*, *macra*, *macrocardia*, *macrophylla*, *macrorhiza*, *Magdalenae*, *malachantha*, *Mandonii*, *marginalis*, *marginata*, *Mathewsii*, *memor*, *meridana*, *microcardia*, *microlepanthes*, *microphylla*, *minutalis*, *Miqueliana*, *miseria*, *modestissima*, *monocardia*, *Moritzii*, *moschata*, *maramensis*, *navicularis*, *navilingius*, *nicaraguensis*, *nittiorhyncha*, *obovata*, *ochreate*, *orbicularis*, *pachyglossa*, *pachyphylla*, *palmiformis*, *pan-durifera*, *Pantasmi*, *papillosa*, *parvifolia*, *pectinata*, *peduncularis*, *pedunculata*, *perpusilla*, *phyllocardia*, *picta*, *pilifera*, *pisifera*, *plantagina*, *plumosa*, *Poeppigii*, *polyliria*, *polystachya*, *pristeglossa*, *procumbens*, *prolifera*, *prostrata*, *pruinosa*, *pubescens*, *pulchella*, *punctata*, *punctulata*, *pusilla*, *pyrsodes*, *quadrifida*, *quintensis*, *racemiflora*, *ramulosa*, *recurva*, *retusa*, *rigidifolia*, *Roezlei*, *roseopunctata*, *rostriflora*, *rubens*, *rubroviridis*, *ruberrima*, *rufobrunnea*, *rupestris*, *ruscifolia*, *saltatoria*, *Sanderana*, *sarcophylla*, *sawrocephala*, *scabrata*, *scabrilungis*, *scabripes*, *scariosa*, *Schiedei*, *sclerophylla*, *secunda*, *segoiensis*, *semipellucida*, *semiscabra*, *semperflorens*, *seriata*, *serriifera*, *setigera*, *sicaria*, *Sirene*, *Smithiana*, *soratana*, *sphenochila*, *spiculifera*, *Sprucei*, *stenopetala*, *stenostachya*, *striata*, *strappifolia*, *subsinnuata*, *tentaculata*, *tenuissima*, *teres*, *tricarinata*, *trichophora*, *trichopoda*, *tridentata*, *trifida*, *trilineata*, *trippterantha*, *tripterygia*, *Trulla*, *truncata*, *truxillensis*, *tubulosa*, *undulata*, *uniflora*, *univaginata*, *velaticaulis*, *velatipes*, *ventricosa*, *verrucosa*, *villosa*, *violacea*, *viridula*, *vittata*, *Warmingii*, *Weddelliana*, *Wilsonii*, *xanthochlora*, *xiphochila*, *zephyrina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 666-68 = *homonyma omnia* *Pleurothalleos*.
aspasiensis, Kuntze, l. c. 667 = *Pleurothallis aspas-censis*, Reichb. f.
biflora, Kuntze, l. c. = *P. orbicularis*, Lindl.
ceratothallis, Kuntze, l. c. = *P. ceratathallis*, Reichb. f.
discoidea, Kuntze, l. c. = *P. discoidea*, Lindl.
Gardneri, Kuntze, l. c. = *Restrepia Gardneri*, Benth.
Jamesonii, Kuntze, l. c. = *Pleurothallis Jamiesoni*, Lindl.
lepanthiformis, Kuntze, l. c. = *P. villosa*, Knowl. & Westc.
longissima, Kuntze, l. c. = *P. racemiflora*, Lindl.
Miersii, Kuntze, l. c. 668 = *Restrepia Miersii*, Reichb. f.
monophylla, Kuntze, l. c. 667 = *Pleurothallis emarginata*, Lindl.
Mosenii, Kuntze, l. c. = *P. Moseni*, Reichb. f.
muscoidea, Kuntze, l. c. = *P. muscoidea*, Lindl.
octomeriodes, Kuntze, l. c. = *P. octomerioides*, Lindl.
pachyphylla, Kuntze, l. c. 666 = *P. crassifolia*, H. C. Focke.
phalangifera, Kuntze, l. c. 667 = *P. Mathewsii*, Lindl.
polygonodes, Kuntze, l. c. = *P. polygonoides*, Griseb.
Reichenbachiana, Kuntze, l. c. = *P. Roezlii*, Reichb. f.
restrepoides, Kuntze, l. c. = *P. restrepoides*, Lindl.
Reymondii, Kuntze, l. c. = *P. Raymondi*, Reichb. f.

HUMBOLDTIA: —

sertularioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 668 = *Pleurothallis sertularioides*, Spreng.
subpellucida, Kuntze, l. c. 666 = *P. loranthophylla*, Reichb. f.
testifolia, Kuntze, l. c. = *P. testaeifolia*, Lindl.
tribulodes, Kuntze, l. c. = *P. tribuloides*, Lindl.
ujarensis, Kuntze, l. c. = *Restrepia ujarensis*, Reichb. f.
villipensa, Kuntze, l. c. = *Pleurothallis vilipensa*, Reichb. f.

HUMBOLDTIA, Vahl (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1179.
decurrens, Bedd. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2368. — Travanc.

HUMEA, Sm. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1179.
corymbulosa, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Jan. 1893) 144 [corymbulosa]; et ex Bot. Centralbl. liii. (1893) 397 (= *Pithocarpa corymbulosa*, Lindl.). — Austral.
gracillima, F. Muell. ll. cc. — Austral.
macra, F. Muell. ll. cc. (= *Acomis macra*, F. Muell.). — Austral.
rutidosis, F. Muell. ll. cc. (= *Acomis rutidosea*, F. Muell.). — Austral.

HUNTERIA, Roxb. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 1179.
africana, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 317. — Afr. trop. or.

HUSSONIA, Boiss. = **Enarthrocarpus**, Labill. (Crucif.).
Sonisii, Pomel. ex Coss. Comp. Fl. Atlant. ii. (1887) 216, in syn. = *Erucaria Aegiceras*, J. Gay.

HUTCHINSIA, [R. Br.] Ait. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1180.
gracilis, Hort. ex Kew Bull. iii. (1889) 43, nomen. — Hab. ?
pauciflora, Cabanès, in Bull. Soc. sci. nat. Nimes xix. (1891) 18 = *Capsella pauciflora*, Koch.
perpusilla, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1599. — Gilgit.

HUTERA, Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. 1891 (1892) 6; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 293. **UMBELLIFERAE**.
rupestris, Porta, l. c. (= *Coincya rupestris*, Rouy.). — Hisp.

HYACINTHELLA, Caruel, Epit. Fl. Eur. i. (1892) 46 = **HYACINTHELLA**, Schur = **Hyacinthus**, Tourn. (Liliac.).

HYACINTHUS, [Tourn.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1180.
Battandieri, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 386 (= *Bellevalia Battandieri*, Freyn). — Algeria.
fallax, Th. Dur. & Schinz, l. c. 387 (= *B. fallax*, Pomel.). — Algeria.
mauritanicus, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *B. mauritanica*, Pomel.). — Algeria.
Pechuelii, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 274 (= *Pseudogaltonia Pechuelii*, Kuntze). — Afr. austro-occ. extratrop.
variabilis, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 388 (= *Bellevalia variabilis*, Freyn). — Algeria.

HYBANTHUS, Jacq. = **Ionidium**, Vent. (Violar.).
albus, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 333 = *I. album*, A. St. Hil.
bicolor, Taub. l. c. = *I. bicolor*, A. St. Hil.
brevicaulis, Taub. l. c. = *I. brevicaule*, Mart.
brexifolius, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 584 (= *Viola buxifolia*, Poir.). — Madag.
communis, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 333 = *I. commune*, A. St. Hil.
Ipecacuanha, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 401 = *I. Ipecacuanha*, Vent.

HYBANTHUS: —

lanatus, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 333 = *Ionidium lanatum*, A. St. Hil.
linifolius, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 584 = *I. linifolium*, DC.
miniatus, F. Muell. & Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xiii. (June 1890) 97; xix. (July 1895) 83 = *I. heterophyllus*, Vent.
Poya, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 333 = *I. Pooiya*, A. St. Hil.
suffruticosus, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 606 = *I. heterophyllum*, Vent.
villosissimus, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 333 = *I. villosissimum*, A. St. Hil.

HYBOPHRYNIUM, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 428. **MARANTACEAE**.
Braunianum, K. Schum. l. c. — Afr. trop.

HYDNOCARPUS, Gaertn. f. (Bixin.). — Ind. Kew. i. 1182.

anthelminticus, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 303. [sphalm. *Hydrocarpus*]. — Cochinch.
cucurbitina, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) r. 120. — Malaya.
Curtisii, King, l. c. 119. — Malaya.
Kingii, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 21 = *Scortechinii*, King.
Kuensteri, Warb. l. c. = *Taraktogenos Kuensteri*, King.
Kurzii, Warb. l. c. = *F. Kurzii*, King.
macrocarpa, Warb. l. c. = *Asteriastigma macrocarpa*, Bedd.
nana, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 118. — Malaya.
Scortechinii, King, l. c. 118. — Malaya.
serrata, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 21. — Cochinch.
tomentosa, Warb. l. c. = *Taraktogenos tomentosa*, King.
Wrayi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 121. — Malaya.

HYDNOPHYTUM, Jack (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1182.

Beccarii, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 221. — N. Guin.
costatum, Drake, in Morot. Journ. de Bot. x. (1895) 240. — Tonk.
Forbesii, Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7218. — N. Guin.
Hellwigii, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 209. — Oceania.
laurifolium, Warb. l. c. 210. — N. Guin.
macrophyllum, Warb. l. c. xiii. (1891) 441. — Oceania.

HYDNORA, Thunb. (Cytin.). — Ind. Kew. i. 1182.
bogonensis, "Becc." Martelli, Fl. Bogos. (1886) 70 = *bogotensis*, Becc.

HYDRAGONUM, Sieg. Fl. Petr. (1736). ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 390 = **Cassandra**, D. Don (Ericac.).
calyculatum, Kuntze, l. c. = *C. calyculata*, D. Don.

HYDRANGAEA, Gronov. (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 1182.

Bretschneiderii, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1894) 320, fig. 171. — China.
cyanea, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 223 = *H. Thunbergii*, Sieb.
cyanoclada, Hort. l. c. 221 = *H. Hortensia*, DC. var.
Davidi, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885. (1886) 227. — Tibet.
integerrima, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a (1891) 76 = *scandens*, Pochp.
Jelskii, Zahlbr. in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 218. — Peruv.
longipes, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 227. — China occ.

H. anthelmintica, Pierre is correct

HYDRANGEA : —

- longipes*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 273. — China.
macrocephala, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 322 = *opuloides*, Lam.
mandschurica, Hort. ex Dippel, l. c. 323; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 187 = *opuloides*, Lam.
nigra, Hort. ex Dippel, l. c. = *opuloides*, Lam.
peckinensis, Hort. ex Dippel, l. c. 320 = H. Breit-schneideri, Dippel.
roseo-alba, Hort. ex Fl. des Serres (1894) 221, t. 1649-50 = H. Hortensia, DC.
sinensis, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet (1894) 221 = *radiata*, Walt.
serratifolia, Engl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a (1891) 76 = *serratifolia*, Phil. f.
Sieboldii, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 323 = *opuloides*, Lam.
sikokiana, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 45. — Japon.
sinensis, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 322 = *opuloides*, Lam.
urticaefolia, Hort. ex Dippel, l. c. 314; et ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 219 = *arborescens*, Linn.

- HYDRIASTELE**, H. Wendl. & Drude (Palm.). — Ind. Kew. i. 1183.
Wendlandiana, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 342 = H. Wendl. & Drude.

HYDROCOTYLE, [Tourn.] Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 1183.

- alsophila*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 261. — N. Zel.
ambigua, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 21 = *umbellata*, Linn.
amoena, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 83. — N. Zel.
aracana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 509. — Chili.
Canbyi, Coult. & N. E. Rose, in Bot. Gaz. xii. (1887) 103; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 135. — Civit. Foed.
capensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 268 = H. Solandra, Linn. f.
Carrerae, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 507. — Chili.
colorata, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 260. — N. Zel.
comocarpa, F. Muell. in Vict. Natural. iii. (June 1887) 127; et ex Bot. Centralbl. xxx. (1887) 214. — Austral.
corynophora, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. v. (June 1890) 20. — Austral.
eccentrica, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1890) 36. — Bolivia.
echinella, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 191. — N. Zel.
ecostata, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 62. — Ind. or.
heterophylla, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 410. — Afr. austr.
involuta, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 262. — N. Zel.
Lechleri, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 508. — Chili.
nitens, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 386. — N. Zel.
novo-guineensis, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 24. — N. Guin.
nuanavoids, F. Muell. in Bot. Centralbl. l. (1892) 194, nomen. — N. Guin.
pauciflora, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 508. — Chili.
Rahmeri, Phil. l. c. 507. — Chili.
ramiflora, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 46. — Japon.
rubescens, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Ser. VIII. vi. (1894) 108. — Yunnan.
septemloba, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 410. — Afr. austr.
sibthorpioides, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 83. — N. Zel.

HYDROCOTYLE : —

- sylicola*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 434. — Ins. Bourbon.
uliginosa, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 509. — Chili.
Wilfordi, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 45. — Japon.

- HYDROLEA**, Linn. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. i. 1184.
sansibarica, Gilg. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 335. — Afr. trop. or.

- HYDROSME**, Schott = **Amorphophallus**, Blume (Aroid.).
borneensis, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 458, nomen. — Borneo.
dracontoides, Engl. l. c. 461. — Afr. trop. or.
Fischeri, Engl. l. c. 460. — Afr. trop. or.
Hohenackeri, Engl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 3 (1887) 128. — Hab?
Leopoldiana, Mast. in Gard. Chron. (1887) i. 542 et 544 fig. 122 et 123; et in Illustr. Hort. xxxiv. (1887) 65 t. 23. — Congo.
Preussii, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 459. — Kamerun.
sparsiflora, Engl. l. c. 462. — Afr. trop.

- HYDROSTACHYS**, Thou. (Podost.). — Ind. Kew. i. 1186.
Bismarckii, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 137. — Congo.
Hildebrandtii, Engl. l. c. 136. — Madag.
multipinnata, Engl. l. c. 137. — Afr. trop. or.
nana, Engl. l. c. 136. — Madag.
pinnatifolia, Engl. l. c. 137. — Madag.
Rutenbergii, Buchenau, in Abh. naturw. Ver. Brem. x. (1889) 375, t. 6 fig. 1-8. — Madag.

- HYDROTAENIA**, Lindl. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1186.
Van Houttei, Baker, Handb. Irid. (1892) 69 (= *Tigridia Van Houttei*, Roezl.). — Mexic.

- HYDROTHRIX**, Hook. f. in Ann. Bot. i. (1887) 889; Schoenl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 3 (1887) 75. **PONTEDERIACEAE**.
Gardneri, Hook. f. ll. cc. 90, t. 7, et 75 — Bras.

- HYGROPHILA**, R. Br. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1186.
asteracanthoides, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 6. — Abyss.
coerulea, Martelli, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xx. (1888) 390 = *coerulea*, T. Anders.
crenata, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 6. — Afr. trop. or.
glandulosa, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 367 = *Nomaphila glandulosa*, Klotzsch.
laevis, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3b (1895) 297 = *N. laevis*, Nees.
parviflora, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 7. — Afr. trop. or.
petiolata, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3b (1895) 297 = *Nomaphila petiolata*, Decne.
quadrangularis, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 367 = *N. quadrangularis*, Klotzsch.
saxatilis, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 333. — Penins. Mal.
spiciformis, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 5. — Afr. trop. or.
stricta, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 297 = *Nomaphila stricta*, Nees.
Teusii, Lindau, l. c. 5. — Angola.
Volkensii, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 47 (1894) 46. — Afr. trop. or.

- HYLODENDRON**, Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 386. **LEGUMINOSAE**.
gabunense, Taub. l. c. — Gabon.

- HYLOGYNE**, Salisb. & Knight = **Telopea**, R. Br. (Proteac.).

HYLOGYNE : —

- oreades*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 578 = *Telopea oreades*, F. Muell.
spathulata, Kuntze, l. c. = *T. speciosissima*, R. Br.
truncata, Kuntze, l. c. = *T. truncata*, R. Br.

- HYLOMECON**, Maxim. = **Stylophorum**, Nutt. (Papaver.).
japonicum, Prantl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1889) 139 = *S. japonicum*, Miq.

- HYLOPHILA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1187.
lanceolata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 110 = *lanceolata* Miq.

- HYMENACHNE**, Beauv. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).
polymorpha, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 143. — Cochinch.

- HYMENAEA**, Allem. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1187.
microphylla, Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 149. — Bras.

- HYMENANTHERA**, R. Br. (Violar.). — Ind. Kew. i. 1187.
obovata, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 350. — N. Zel.

- HYMENATHERUM**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1187.
anomalum, Canby & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 105. — Mexic.

- HYMENOCALLIS**, Salisb. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1187.
concinna, Baker, in Gard. Chron. (1893) ii. 150. — Mexic.
deflexa, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 128 (= *Ismene deflexa*, Herb.). — Peruvia.
Deleuilii, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 218. — Tonkin.
galvestonensis, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 129. — Texas.
Horsmanni, Baker, l. c. 125. — Mexic.
Niederleinii, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 326. — Rég. Argent.
nutans, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 128 (= *Ismene nutans*, Herb.). — Am. austr.?

- HYMENOCARDIA**, Wall. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1188.
lasiophylla, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 79. — Afr. trop. or.
mollis, Pax, l. c. xv. (1893) 528. — Afr. trop.
Poggei, Pax, l. c. 529. — Afr. trop.

- HYMENOCHARIS**, Salisb. = **Ischnosiphon**, Koern. (Scitam.).
Arouma, bambusacea, densiflora, farinosa, gracilis, guianensis, hirsuta, Koernickiana, laxa, leucophaca, orbiculata, ovata, Parkeri, plurispicata, rotundifolia, secunda, smaragdina, spicata, surinamensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 691 = *homonyma omnia generis Ischnosiphonos*.
Jaquinii, Kuntze, l. c. = *I. polyphyllus*, Koern.

- HYMENOPAPPUS**, L'Hérit. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1189.
caroliniensis, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 338 = *scabrescens*, L'Hérit.
radiata, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 122. — Arizona.

- HYMENOTHRIX**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 1189.
glandulosa, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 278. — Mexic.
Palmeri, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 391. — Mexic.

- HYMENOXYS**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1189.
Schaffneri, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldinc. Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.

HYOSCYAMUS, [Tourn.] Linn. (Solan.). — Ind. Kew. i. 1189.

Boveanus Aschers. & Schweinf. (Illustr. Fl. Egypt.) in Mém. Inst. Égypt. ii. (1887) 113 = *Scopolia Boveana*, Dunal.

flaccidus, Wright, in Kew Bull. (1895) 184. — Arabia.

saguntinus, Pau, Not. Bot. Fl. Españ. iii. (1889) 34, nomen. — Hisp.

HYPAELYPTUM, Vahl = **Hypolytrum**, Rich. (Cyper.).

albiceps, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 127 = *Lipocarpha albiceps*, Ridl.

pulcherrimum, K. Schum. l. c. = *L. pulcherrima*, Ridl.

senegalense, K. Schum. l. c. = *L. argentea*, R. Br.

HYPECOUM, Tourn. ex Linn. (Papaver.). — Ind. Kew. i. 1190.

egyptiacum, Aschers. et Schweinf. (Illustr. Fl. Egypt.) in Mém. Inst. Égypt. ii. (1887) 37 = *imberbe*, Sibth.

ponticum, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1893 (1894) ii. 37. — As. Min.

HYPERICOIDES, *gummifera*, Cambess. ex Vesque in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 334, in syn. = *Garcinia Smeathmanni*, Oliver.

HYPERICUM, Tourn. ex Linn. (Hyper.). — Ind. Kew. i. 1191.

aetneum, Tornab. Fl. Sicula (1887) 171. — Sicil. Ardasenovi, Keller & Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 450. — Reg. Cauc.

bacciferum, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 140 = *H. Androsaemum*, Linn.

boreale, Bicknell, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1890) 211 = *mutilum*, Linn. var.

Decaisneanum, Coss. & Davaeu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 104. — Cyren.

deplatum, Freyn & Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 366 = *origanifolium*, Willd.

fimbriatum, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 138 = *fimbriatum*, Lam.

galioides, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 103. — Armen.

geminiflorum, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 144. — Ins. Formosa.

gentianoides, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 9 = *H. Sarothra*, Michx.

Gumbletoni, Hort. Segrez. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 39 = *patulum*, Thunb.

haplophylloides, Halácsy & Baldacci, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlii. 1892 (1893) 578. — Albania.

irazuense, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 61 = *stenopetalum*, Turcz.

Jankae, Nym. Conspl. Fl. Eur., Suppl. ii. i. (1889) 75. — Thrac.

kemense, Schweinf. in Hoehnel, Zum Rudolph See, Append. (1892) 15. — Afr. trop. or.

kiboëse, Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 329. — Afr. trop. or.

kiloëse, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append. (1886) 338, nomen (an praec.). — Afr. trop.

lobocarpum, Gattinger, The Tennessee Flora (1887) 28 [labocarpum]; et in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 275. — Am. bor.

longistylum, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1534. — China.

Macgregorii, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 2. — N. Guin.

macrocalyx, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 103. — As. Min.

majus, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 225 = *canadense*, Linn.

modestum, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 126. — Ins. Cypr.

Moscrianum ×, Éd. André, in Rev. Hort. lxi. (1888) 463, fig. 110 et 111; Le Jardin (1889) 269; et ex Gard. Chron. (1894) ii. 333, fig. 38. — Hybr. artef.

HYPERICUM: —

minus, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 39 = *hircinum*, Linn.

multiflorum, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 39 = *elatum*, [Dryander in] Ait.

myricariifolium, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 321. — N. Granat.

Noëanum, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 130. — Thracia.

opacum, Sarg. in Gard. and For. v. (1892) 304, cum ic. = *cistifolium*, Lam.

orbiculare, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 405. — Thrac.

pachyphyllum, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 24 t. 3. — Burma.

parvulum, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 154. — Mexic.

paucifolium, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 143. — Mexic.

ponticum, Lipsky, in Mem. Soc. hist. nat. Kiev, xii. (1892) extr. 16; et in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 282. — Reg. Cauc.

portoricense, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 60. — Ins. Puerto Rico.

Prattii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 303. — China.

pruinatum, Boiss. & Balansa, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 128. — As. Min.

Pumilio, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 65. — Oriens.

Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 143. — Mexic.

Roberti, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 183, nomen. — Algeria.

Sancti-Antonii, Schweinf. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 70. — Desert. Aegypt.-Arab.

sanctum, Degen, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 333. — Ins. Samothr.

senanense, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 16. — Japon.

Sintenisii, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 365. — Armen.

Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 320. — Peruvia.

Tauberti, Aschers. & Barb. ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 104 = *H. Decaisneanum*, Coss. & Davaeu.

Tempskianum, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 102. — Armen.

tomentellum, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 365. — Armen.

trinervium, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 144. — Ins. Formos.

vermiculare, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 129. — Mesopot.

Webbianum, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 37 = *H. Androsaemum*, Linn.

yezoëse, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 16. — Japon.

yunnanense, Franch. Pl. Delav. (1889) 103. — Yunnan.

HYPOCALYMNA, Meissn. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 1196.

dimorphandrum, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 99 = *Baeckea dimorphandra*, F. Muell.

Drummondii, Niedenzu, l. c. 99 = *B. Drummondii*, Benth.

fumanum, Niedenzu, l. c. = *B. fumana*, F. Muell.

oxycoccoides, Niedenzu, l. c. = *B. oxycoccoides*, Benth.

platystemon, Niedenzu, l. c. = *B. platystemona*, Benth.

schollerifolium, Niedenzu, l. c. = *B. scholleraefolia*, Lehm.

HYPOCALYPTUS, Thunb. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1196.

cordifolius, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1893) 240 = *obcordatus*, Thunb.

HYPOCHAERIS, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1196.

acaulis, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 371 (= *Achyrophorus acaulis*, Remy). — Am. austr.

HYPOCHAERIS: —

carpathica, Pax. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 26. — Mont. Carpath.

chilensis, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 371 (= *Achyrophorus chilensis*, Sch. Bip.). — Chili.

Claryi, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) p. 222; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 536. — Alger.

coronopifolius, Franch. Miss. scient. Cap Horn, v. (1889) 350 (= *Achyrophorus coronopifolius*, Sch. Bip.). — Reg. Magell.

cupressarum, F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 313. — Chili.

deserticola, Phil. l. c. 318. — Chili.

eurylepis, Phil. l. c. 317. — Chili.

glabrata, Phil. l. c. 315. — Chili.

graminifolia, Phil. l. c. 320. — Chili.

grandiflora, F. Phil. ex Phil. l. c. 313. — Chili.

hirta, Phil. l. c. 319. — Chili.

hispidula, Phil. l. c. 316. — Chili.

Hookeri, Phil. l. c. 314. — Chili.

Ibari, Phil. l. c. 320. — Reg. Magell.

laciniosa, Phil. l. c. 319. — Chili.

lutea, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 153 = *brasilensis*, Griseb.

melanolepis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 321. — Chili.

Nahuelvutae, Phil. l. c. 315. — Chili.

nana, Phil. l. c. 323. — Chili.

pumila, Phil. l. c. 322. — Chili.

pygmaea, Phil. l. c. 321. — Chili.

Shermanum, Phil. l. c. 323. — Chili.

taraxacoides, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 49 [sphalm. ?] (= *Oreophila taraxacifolia*, Meyen). — Peruvia.

taraxacoides, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 371 = *taraxacoides*, Benth. & Hook. f.

Volckmanni, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 317 (= *Achyrophorus Volckmanni*, Phil.). — Chili.

HYPOCRYPTA, Mart. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 1196.

pulchra, N. E. Br. in Gard. Chron. (1894) 244. — Columb.

HYPOCISTIS, Ludw. = **Cytinus**, Linn.

americana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 563 = *C. americanus*, R. Br.

Andrieuxii, Kuntze, l. c. = *C. Andrieuxii*, Hemsl.

sanguinea, Kuntze, l. c. = *C. dioicus*, Juss.

HYPOCYLIX, Woloszczak, ex Stapf, in Denkschr. Acad. Wien (1886) 7. **SALSOLACEAE**.

Kerner, *Woloszczak*, l. c. 8. — Persia.

HYPOESTES, Soland. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1197.

acuminata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 512. — Madag.

aldabrensis, Baker, in Kew Bull. (1894) 150. — Ins. Aldabra.

chloroclada, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 513. — Madag.

ciliata, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 51. — Afr. trop. occ.

congestiflora, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 511. — Madag.

consanguinea, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 50. — Afr. trop. occ.

depauperata, Lindau, l. c. 52. — Transvaal.

echioides, Lindau, l. c. = Afr. trop. or.

glandulifera, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xix. (1891) 41. — Madag.

grandifolia, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 49. — Afr. centr. bor.

Hildebrandtii, Lindau, l. c. 48. — Afr. trop. or.

inaequalis, Lindau, l. c. 50. — Afr. trop. occ.

incompta, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 41. — Madag.

kilimandscharica, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 47. — Afr. trop. or.

longilabata, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 40. — Madag.

microphylla, Baker, l. c. xxii. (1887) 511. — Madag.

HYPOESTES: —

- moschata, F. Muell. in *Vict. Natural*, viii. (Dec. 1891) 115, nomen. — Austral.
 Neesiana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 491. — Afr. trop.
 nummularifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 340. — Madag.
 obtusifolia, Baker, l. c. xxii. (1887) 512. — Madag.
 phaylopsoides, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 34. — Afr. trop.
 phyllostachya, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 511. — Madag.
 Preussii, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 48. — Afr. trop. occ.
 pulchra, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 244. — N. Granat
 salicifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 491. — Java.
 sessilifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 512. — Madag.
 Staudtii, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 122. — Kamerun.
 tenuispica, Delile, ex Martelli, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xx. (1888) 395, in syn. = H. Forskalei, R. Br.
 triticea, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 51. — Afr. trop. occ.
 Volkensii, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 47 (1894) 47. — Afr. trop. or.

HYPOLYTRUM, Rich. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 1198.

- Kuntzeanum, Boeck, *Cyper. Nov.* i. (1888) 23 = Cladium jamaicense, Grantz.
 madagascariense, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 666, nomen. — Madag.
 nemorum, C. B. Clarke, l. c. (= *Hyphaelyptum nemorum*, Beauv.). — Afr. trop.
 penangense, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 679. — Penang.
 Schraderianum, Hort. Bull. ex *Gard. Chron.* (1893) i. 414 = Schraderianum, Nees?
 testaceum, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 667, nomen. — Madag.
 turgidum, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 679. — Zeylan.

HYPOPHYTIS, Dill. ex Adans. (Monotropeae). — Ind. Kew. i. 1198.

- Hypophytis, Small, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 137 = M. Hypophytis, Linn.
 Rivini, Rupp. jun. ex Cess. Passer. & Gibelli, *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 418 = M. Hypophytis, Linn.

HYPOXIS, Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1199.

- acuminata, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 3. — Natal.
 colchicifolia, Baker, l. c. — Hab.?
 curculigoides, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1893) t. 2259. — Afr. austr.
 Fischeri, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 143. — Afr. trop. or.
 floccosa, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 357. — Afr. austr.
 Gregoriana, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 408. — Afr. trop. or.
 hirsuta, Coville, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 118 = erecta, Linn.
 laikipiensis, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 407. — Afr. trop. or.
 oligotricha, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 3. — Natal.
 olivacea, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 98, nomen. — Afr. trop.
 racemosa, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 30. — Guatem.
 Saarpata, Ham. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 278, in syn. = Curculigo recurvata, Dryand.
 Schlechteri, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1893) t. 2250 B. — Afr. austr.
 Scullyi, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 2. — Afr. austro-occ. extratrop.
 subspicata, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 143. — Afr. trop. austro-occ.
 Woodii, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 3. — Natal.

HYPSELODENDRON, Schimper. Hochst. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 192, in syn. = Ureia Hypselodendron, Wedd.

HYP SOPHILA, F. Muell. in *Vict. Natural*, iii. (April. 1887) 168. **CELESTRINEAE**.

- Halleyana, F. Muell. l. c. — Austral.
 oppositiflora, F. Muell. l. c. ix. (May 1892) 11. — Austral.
 oppositifolia, « F. Muell. » ex Bot. Centralbl. li. (1892) 91, sphalm. = praec.

HYPTIS, Jacq. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 1200.

- ammotricha, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 526, sphalm. = ammotropha, Griseb.
 Balansae, Briq. in *Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 113. — Parag.
 cinerea, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 200. — Parag.
 collina, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1891) 164. — Calif.
 dumetorum, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 200. — Parag.
 Glaziovii, Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 716. — Bras.
 gracilipes, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 201. — Parag.
 incana, Briq. in *Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 111. — Parag.
 mirabilis, Briq. l. c. 113. — Parag.
 Muellieri, Briq. l. c. — Parag.
 Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 68. — Mexic.
 Seemannii, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 407. — Mexic.
 tripartita, Briq. in *Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 111. — Parag.

HYSSOPUS, [Tourn.]. Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 1202.

- cinereus, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1888) 23 = officinalis, Linn.

HYSTRIX, Moench = **Asprella**, Humb. (Gramin.).

- californica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 778 = A. californica, Benth.
 gracilis, Kuntze, l. c. = Gymnostachyum gracile, Hook. f.
 Hystrix, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 89; Millsp. *Fl. West Virgin.* (1892) 474 = A. Hystrix, Willd.
 sibirica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 778 = A. sibirica, Trautv.

I**IBERIS**, Dill. ex Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1202.

- aniensis, Fouc. & Rouy, *Fl. de Fr.* ii. (1895) 123 = spathulata, J. P. Berg.
 Badali, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* ii. (1889) 11 = Lagascana, DC.
 Costei, Fouc. & Rouy, *Fl. de Fr.* ii. (1895) 130 = pinnata, Linn.
 latealata, Porta & Rigo, in *Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 9; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 296. — Hisp.
 pinetorum, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 21; Willk. l. c. 295. — Hisp.
 Reverchoni, Debaux, ex Willk. l. c. 332. — Hisp.
 Rollii, Terrac. ex Chiovenda, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 406. — Ital.
 vinetorum, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 21 = amara, Linn.?

IBERVILLEA, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 75 = **Maximowiczia**, Cogn. (Cucurb.).

- Lindheimeri, Greene, l. c. = M. Lindheimeri, Cogn.
 Sonorae, Greene, l. c. = M. Sonorae, S. Wats.
 tripartita, Greene, l. c. = M. tripartita, Cogn.

IBOGA, J. Braun & K. Schum. in *Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 157. **APOCYNACEAE**.

- Vateriana, J. Braun & K. Schum, l. c. — Kamerun.

ICACINA, A. Juss. (Oacin.). — Ind. Kew. i. 1203. Guessfeldtii, Aschers, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 250. — Loango.
 Poeppigiana, Valetton, *Crit. overs. Oacin.* (1886) 187 = Mappia Poeppigiana, Baill.

ICACOREA, Aubl. = **Ardisia**, Sw. (Myrsin.).

- borbonica, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 442 (= *Badula borbonica*, A. DC.). — Ins. Borbon.
 crassa, Cordem. l. c. 443 (= *B. crassa*, A. DC.) = A. insularis, Baker.
 decumbens, Cordem. l. c. 444. — Ins. Borbon.
 grammisticta, Cordem. l. c. 443. — Ins. Borbon.
 insularis, Cordem. l. c. = A. insularis, Baker.
 ovalifolia, Cordem. l. c. (1895) 444 (= *Badula ovalifolia*, A. DC.). — Ins. Mascar.
 paniculata, Sudworth, in *Gard. and For.* vi. (1893) 324; Sarg. N. Am. *Sylva*, v. 153, t. 240 = A. Pickeringia, Nutt.

ICHNOCARPUS, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 1204.

- affinis, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 173 = ovatifolius, A. DC.
 Morlae, Eggers, in *Bot. Centralbl.* liii. (1893) 305. — Ecuad.
 pruinosis, O. G. Petersen, in *Bot. Tidshr.* xviii. (1893) 264, t. 18. — Hab.?

ICHTHYOMETHIA, P. Br. = **Piscidia**, Linn. (Legum.).

- Piscipula, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 191 = P. Erythrina, Linn.
 Piscipula, Hitchc. in *Gard. and For.* iv. (1891) 472; Sarg. N. Am. *Sylva*, iii. 53 t. 117 = P. Erythrina, Linn.

ICHTHYOTHERE, Mart. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1204.

- ovata, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 387. — Bras.

IDOTHEA, Kunth = **Drimia**, Jacq. (Liliac.).

- altissima, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 712 = Urginea altissima, Baker.
 Bateri, Kuntze, l. c. = D. Barteri, Baker.
 Burchellii, Kuntze, l. c. = D. Burchelli, Baker.
 concolor, Kuntze, l. c. = D. concolor, Baker.
 Cowanii, Kuntze, l. c. = D. Cowanii, Ridl.
 laxiflora, Kuntze, l. c. = D. laxiflora, Baker.
 rigidifolia, Kuntze, l. c. = D. rigidifolia, Baker.
 robusta, Kuntze, l. c. = D. robusta, Baker.

IGUANURA, Blume (Palm.). — Ind. Kew. i. 1204.

- ambigua, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 125. — Borneo.
 bicornis, Becc. l. c. 188. — Penins. Mal.
 corniculata, Becc. l. c. 187. — Penins. Mal.
 brevipes, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 416. — Perak.
 diffusa, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 123. — Perak.
 elegans, Becc. l. c. 123. — Borneo.
 macrostachya, Becc. l. c. 101. — Borneo.
 malaccensis, Becc. l. c. 123. — Penins. Mal.
 palmuncula, Becc. l. c. 126. — Borneo.
 parvula, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 417. — Perak.
 polymorpha, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 189. — Perak.

ILEOSTYLUS, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 489, et xlii. (1895) 25 = **Loranthus**, Linn.

- Kirkii, Van Tiegh. l. c. 489 = L. Kirkii, Van Tiegh.
 micranthus, Van Tiegh. l. c. 25 = L. micranthus, Hook. f.

ILEX, [Tourn.]. Linn. (Ilicin.). — Ind. Kew. i. 1205.

- amygdalifolia, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 15. — Boliv.
 Berteroi, Loes. ex Urb. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 320. — Ins. S. Doming.
 boliviana, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 15. — Boliv.
 californica, T. S. Brandeg. in *Gard. and For.* vii. (1894) 414. — Calif.

ILEX: —

- camelliaefolia*, Carr. in Rev. Hort. l. ix. (1887) 234 = *I. Aquifolium*, Linn.
capitellata, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 278 B. — Cochinch.
caroliniana, Trelease, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, v. (1892) 347 (= *Cassine caroliniana*, Walt.). — Am. bor.
ciliata, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 369 et 582, ad calc. = *I. Aquifolium*, Linn.
condorensis, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 279 A. — Cochinch.
Congonha, Mart. ex Valetton, Crit. overs. Olacin. (1886) 199, in syn. = *Villaresia Congonha*, Miers.
corallina, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 448. — China occ.
cubana, Loes. ex Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 314. — Cuba.
dubia, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1883) 11; *Trelease*, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 374 (= *Prinos dubius*, G. Don). — Am. bor.
Dugesii, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 533. — Mexic.
epiphytica, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) n. 134. — Perak.
eugeniaefolia, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 278 B. — Cochinch.
excavata, Pierre, l. c. t. 278 A. — Cochinch.
fabrilis, Pierre, l. c. t. 280 A. — Cochinch.
ficoidea, Hemsl. ex Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 116. — Ins. Hongkong.
Fischeri, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. l. ix. (1887) 43 = *I. Aquifolium*, Linn.
glomerata, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) n. 135. — Perak.
guianensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *I. Macoucoua*, Pers.
Harmandiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 277. — Laos.
hexandra, Bello, Estud. Fl. Porto-Rico, iv. (1886) 38. — Ins. Puerto Rico.
Hookeri, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) n. 266 t. 14. — Sikkim.
hypaneura, Loes. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 321. — Cuba.
integrifolia, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 63 = *integra*, Thunb.
Jelskii, Zahbr. in Diss. math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 223. — Peruv.
Krugiana, Loes. ex Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 317. — Ins. Antill.
Lindenii, Loes. ex Urb. l. c. 323. — Cuba.
longipes, Chapm. ex Trelease, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, v. (1889) 346 (= *Nemopanthes canadensis*, Gattinger). — Am. bor.
macrocarpa, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1787. — China.
mitis, Radlk. in Act. Congr. bot. Anvers (1887) 172 = *Sideroxylon mite*, Linn.
monticola, A. Gray, ex Dieck, Neu. offerte Nat. Arboret. (1892-93) 19. — Am. bor.
Peragua, Trelease, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, v. (1892) 346 in obs. = *caroliniana*, Trelease.
prunifolia, Muehlb. Cat. pl. Am. sept. (1813) 17, ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 515 = *Nemopanthes lucida*, C. Koch.
racemosa, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1863. — China.
revoluta, Stapf, l. c. xxiii. (1893) t. 2263; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 134. — Borneo.
Riedlaei, Loes. ex Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893). — Ins. Antill.
rubra, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 422. — Mexic.
sikkimensis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) n. 265 t. 13. — Sikkim.
Thorelii, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 280 B. — Cochinch.
tonkinensis, Pierre, l. c. sub t. 278, in obs. — Tonkin.
triflora, T. S. Brandeg. in Gard. and For. vii. (1894) 414. — Calif.
Urbaniana, Loes. ex Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 316. — Ins. Puerto Rico.
vacciniifolia, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 140. — Borneo.

ILEX: —

- Wrightii*, Trelease, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, v. (1892) 349 = *lanceolata*, Chapm.
Wrightii, Loes. ex Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 328. — Cuba.
yunnanensis, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 128. — Yunnan.

- ILICIODES**, (-oides) Dum.-Courset = **Nemopanthes**, Rafin. (Ilicin.).
canadense, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *N. canadensis*, DC.
mucronata, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 217 = *N. canadensis*, DC.

- ILLICIUM**, Linn. (Magnol.). — Ind. Kew, i. 1208.
evenium, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) n. 374. — Malaya.
manipurensis, Watt. ex King, in Ann. Bot. Gard. Calc. iii. n. (1891) 200, t. 40 B. — Ind.
Simonsii, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxii. (1888) 480; Watt. l. c. 201 t. 39 B. — Reg. Himal.
Tashiroi, Maxim, l. c. 479. — Japon.
verum, Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7005. — China.

- ILLIGERA** Blume (Combret.). — Ind. Kew, i. 1208.
villosa, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 22, t. 9. — Ind. angl.

- ILLIPE**, F. Muell. = **Bassia** Koen. (Sapot.).
butyracea, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 509 = *B. butyracea*, Roxb.
Cocca, Engl. l. c. = *B. Cocca*, Scheff.
cuneata, Engl. l. c. = *B. cuneata*, Bl.
elongata, Engl. l. c. = *B. elongata*, Miq.
Erskineana, Engl. ex Boerl. Fl. Ned. Indië, ii. 1 (1891) 310 = *B. Erskineana*, F. Muell.
fulva, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 509 = *Dasyaulus fulvus*, Thw.
fusca, Engl. l. c. 510. — Borneo.
Hollrungii, K. Schum. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 107 (= *Burchella Hollrungii*, Pierre) = *B. Hollrungii*, K. Schum.
insignis, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 509 = *B. insignis*, Radlk.
Korthalsii, Engl. l. c. = *B. Korthalsii*, Pierre.
latifolia, Engl. l. c. = *B. latifolia*, Roxb.
Macleyana, Pierre, Not. Bot. Sapot. (1890) 16, cum cit. falsa = *Bureavella Macleyana*, Pierre.
May, Boerl. Handb. Fl. Ned. Indië, ii. 1 (1891) 310 (= *Burchella May*, Pierre) = *B. May*, Becc.
Mottleyana, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 509 = *B. Mottleyana*, De Vriese.
neriifolia, Engl. l. c. = *Dasyaulus neriifolius*, Thw.
obovata, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 4 = *B. obovata*, Forst.
pallida, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 509 = *B. pallida*, Burck.

- ILYSANTHES**, Rafin. (Scrophul.). — Ind. Kew, i. 1208.
ciliata, Kuntze, Rev. Gén. (1891) 461 = *Bonnaya brachiata*, Link & Otto.
ruelleodes, Kuntze, l. c. = *B. reptans*, Spreng.

- IMANTOPHYLLUM**, Benth & Hook. f. = **IMATOPHYLLUM** Hook. = **Clivia**, Lindl. (Amaryll.).
atrosanguineum, Williams, Catal. (1888) 20 = *C. miniata*, Regel.

- IMBRICARIA**, Comm. (Sapot.). — Ind. Kew, i. 1208.
gigantea, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 919, in obs. — Hab. ?
Pierrei, Baill. l. c. — Ins. Maurit.
sechellarum, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2315. — Ins. Sechell.

- IMHOFIA**, Heist. Desc. nov. gen. Brunsv. (1753) 19, 20 = **Nerine**, Herb. (Amaryll.).
amabilis, *curvifolia*, *elegans*, *erubescens*, *excellens*, *filifolia*, *flexuosa*, *humilis*, *lucida*, *marginata*, *Mitchamiae*, *Moorei*, *pubica*, *sarniensis*, *Spoorththiae*, *undulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 704 = *homonyma omnia* Nerines.
Camii ×, Kuntze, l. c. = *N. Camii*, Baker.

IMHOFIA: —

- Duparquetiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1132; Baker, in Gard. Chron. (1894) ii. 624. — Afr. austr.
Herberti ×, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 704 — Hybr. artef.
Meadowbankii ×, Kuntze, l. c. = *N. Meadowbankii*, Baker.
O'Brienii ×, Kuntze, l. c. = *N. O'Brienii*, Baker.

- IMPATIENS**, Riv. ex Linn. (Geran.). — Ind. Kew, i. 1209.
affinis, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 45 et 52, in obs. — Afr. trop. occ.
assurgens, Baker, in Kew Bull. (1895) 64. — Afr. centr. or.
auricomma, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 596. — Ins. Comor.
auricomma, Poisson, in Le Jardin (1893) 53; et (1894) 9 fig. 3; Hook. f. in Bot. Mag. (1894) 738 [an praec. ?] — Ins. Comor.
Bakeri, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 49, in obs. — Madag.
Baummanni, Warb. l. c. 52. — Afr. trop. occ.
bisaccata, Warb. l. c. 53. — Madag.
chaetodontata, Franch. Pl. Delav. (1889) 155. — Yunnan.
corchorifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 448. — China.
Cornucopia, Franch. Pl. Delav. (1889) 121. — Yunnan.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 445. — China occ.
delicatula, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 599; et Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 173. — Madag.
digitata, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 252, t. 26. — Afr. trop. or.
dimorphophylla, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 446. — China occ.
divaricata, Franch. l. c. 447. — China occ.
dorstenioides, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 49, in obs. = *Trimorphocarpum dorstenioides*, Baker.
ecalcarata, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 30, t. 4. — Burma.
Ehlersii, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 294 nomen; et in Hoehnel, Zuni Rudolph See, Append. (1892) 14. — Afr. trop. or.
Eminii, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 254. — Afr. trop. or.
filipes, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 594. — Madag.
Fischeri, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 254. — Afr. trop. or.
fissicornis, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 87. — China.
furcellata, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 101. — Corea.
gomphophylla, Baker, in Kew Bull. (1895) 64. — Afr. centr. or.
hamata, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 52. — Afr. trop. or.
Hawkeri, W. Bull. ex Gard. Chron. (1886) i. 761, fig. 168; et ex Illustr. Hort. xxxiv. (1887) 9, t. 2. — Ins. Maris austr.
Herzogii, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 204. — N. Guin.
Hildebrandtii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 595. — Madag.
Hochstetteri, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 391. — Afr. trop.
Holstii, Engl. & Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 46 et 53; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 254. — Afr. trop. or.
Jequinii, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 337. — Oceania.
kamerunensis, Warb. l. c. xxii. (1895) 51. — Kamerun.
Lantziiana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 595. — Madag.
macradenia, Baill. l. c.; et Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 172. — Madag.
manaharensis, Baill. l. c. 595. — Madag.
mirabilis, Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7195. — Ins. Langkawii.

IMPATIENS: —

- nana*, Engl. & Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 68; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 254. — Afr. trop. or.
notolopha, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 91. — China.
odontopetala, Maxim. l. c. 90. — China.
papilionacea, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 253. — Afr. trop. or.
platyceras, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 89. — China.
plebeja, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 101. — Corea.
Potanini, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 90. — China.
Preussii, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 50. — Kamerun.
procruidoides, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 254. — Afr. trop. or.
procumbens, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 447. — China.
raphidothrix, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 253. — Afr. trop. or.
recurvicornis, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 88. — China.
rhapidithrix, Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 55 = *raphidothrix*, Warb.
Rödigi, L. Lind. in Illustr. Hort. xxxvi. (1889) 25, t. 528. — Java.
rostellata, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 209. — Tibet.
rubro-maculata, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 253. — Afr. trop. or.
runssorensis, Warb. l. c. 254. — Afr. trop. or.
sacculata, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 53. — Madag.
salicifolia, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 170 [an Baker?]. — Madag.
shirensis, Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 7. — Afr. trop.
Sodenii, Engl. & Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 55; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 253. — Afr. trop. or.
Stairsii, Warb. l. c. 254. — Afr. trop. or.
Stuhlmannii, Warb. l. c. — Afr. trop. or.
swertioides, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 49. — Angola.
tawetensis, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 253. — Afr. trop. or.
trichochila, Warb. l. c. — Afr. trop. or.
trichoclada, Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 55; [sphalm.? an *I. trichochila*, Warb.?]. — Afr. trop. or.
tubulosa, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 102. — Corea.
uguenensis, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 255. — Afr. trop. or.
uliginosa, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 448. — China.
ulugurensis, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 50. — Afr. trop. or.
vittata, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 209. — China occ.
Volkensii, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 253 t. 26. — Afr. trop. or.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 445. — China occ.
Zenkeri, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 51. — Kamerun.
Zollingeri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 76 (= *I. radicans*, Zoll. & Mor.). — Java.

IMPERATA, Cyrillo (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1210.

- brevifolia*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 26; et in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 97 = *I. Hookeri*, Rupr.
constricta, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 140 = *Saccharum constrictum*, H. B. & K.
jaculatoria, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 198 = *jaculatoria*, Roem. & Schult.
minutiflora, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 100. — Peruvia.
tenuis, Hack. in DC. l. c. 689. — Bras.

INCARVILLEA, Juss (Bignon.). — Ind. Kew. i. 1211.

- Berezovskii*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 181. — China.
Bonvaloti, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 141. — Tibet.
Delavayi, Bureau et Franch. l. c. 138; et in Rev. Hort. (1893) 544 cum ic.; Gartenfl. (1894) 2 t. 1398. — China.
grandiflora, Bureau et Franch. l. c. 138. — China.
lutea, Bureau et Franch. l. c. 137. — Yunnan.
Potanini, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 492; et xiv. (1895) 180. — China.
Principis, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 136. — Tibet.
variabilis, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 177; et xiv. (1895) 180. — China.

INDIGOFERA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1211.

- acutifolia*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 163. — Afr. austro-occ. extratrop.
alboglandulosa, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. ii. 1891 (1892) 258. — Abyss.
asparagoides, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 210. — Afr. trop. or.
Bergii, Valke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 38. — Afr. trop.
brachybotrys, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 309. — Madag.
Charlieriana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 165. — Afr. austro-occ. extratrop.
chaetodonta, Franch. Pl. Delav. (1889) 155. — China occ.
cinerascens, Franch. l. c. 153. — China occ.
Delavayi, Franch. l. c. 154. — Yunnan.
coronillaefolia, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 119 = *I. Gerardiana*, R. Grah.
demissa, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 209. — Afr. trop. or.
desmodioides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 463. — Madag.
desmodioides, Baker, in Kew Bull. (1894) 331. — Arabia.
dimorphophylla, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 164. — Afr. austro-occ. extratrop.
drepanocarpa, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 209. — Afr. trop. or.
Hofmanniana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 162. — Afr. austro-occ. extratrop.
Holstii, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 18 et 62. — Afr. trop.
lanuginosa, Taub. ex Engl. l. c. 17. — Afr. trop.
longebarbata, Engl. l. c. 1891. ii. (1892) 257. — Abyss.
longiflora, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 210. — Afr. trop. or.
microcharoides, Taub. l. c. 209. — Afr. trop. or.
mollis, Franch. Pl. Delav. (1889) 156. — Yunnan.
Oliveri, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 259, nomen; et in Hoehnel, Zum Rudolph See, App. (1892) 13. — Afr. trop. or.
ormocarpoides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 464. — Madag.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Akad. xxii. (1887) 404. — Mexic.
Pechuelii, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 263. — Afr. austro-occ. extratrop.
pendula, Franch. Pl. Delav. (1889) 156. — Yunnan.
polysphaera, Baker, in Kew Bull. (1895) 65. — Afr. trop. centr. or.
reticulata, Franch. Pl. Delav. (1889) 153. — Yunnan.
reticulata, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 335. — Hab.?
Roylei, Hort. ex Koehne, l. c. = *Gerardiana*, R. Grah.
Roylii, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz, iii. (1893) 692 = praec.
saxicola, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 28. — Afr. austro-occ. extratrop.
scaberrima, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 163. — Afr. austro-occ. extratrop.
Scarciesii, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 76. — Sierra Leone.
sensitiva, Franch. Pl. Delav. (1889) 157. — Yunnan.
sericophylla, Franch. l. c. — Yunnan.

INDIGOFERA: —

- Sofa*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 76. — Sierra Leone.
tritoidea, Baker, in Kew Bull. (1895) 214. — Reg. Somal.
Volkensii, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 210. — Afr. trop. or.

INGA, Scop. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1214.

- boliviana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 9. — Bolivia.
bullata, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. v. (June 1890) 20, in obs. = *Affonsea bullata*, Benth.
comosa, F. Muell. l. c. = *A. juglandifolia*, A. St. Hil.
juglandifolia, F. Muell. l. c. = *A. juglandifolia*, A. St. Hil.
Pittieri, M. Mich. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 446, t. 13. — Costarica.

INGENHOUSIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 348 = **INGENHOUSIA**, Bert. = **Rhethinodendron**, Meissn. (Compos.)

- Berteroi*, Kuntze, l. c. = *R. Berteroi*, Hemsl.

INTSIA, Thou. = **Afzelia**, Sm. (Legumin.).

- africana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 192 = *A. africana*, Sm.
attenuata, Kuntze, l. c. = *A. attenuata*, Klotzsch.
bijuga, Kuntze, l. c. = *A. bijuga*, A. Gray.
bracteata, Kuntze, l. c. = *A. bracteata*, Vog.
quanzensis, Kuntze, l. c. = seq.
Petersiana, Kuntze, l. c. = *A. quanzensis*, Welw.
quanzensis, Kuntze, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 33 = *A. quanzensis*, Welw.
retusa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 192 = *A. retusa*, Kurz.
rhombodea, Kuntze, l. c. = *A. rhombodea*, Welw.

INULA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1219.

- altissima*, Camus, Catal. pl. Fr. & Suisse, (1888) (= *Conyza altissima*, Debeaux & Naudin). — Gall.
aromatica, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 345. — Armen.
attica, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 466. — Graecia.
Bakeriana, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 411 (= *Bojeria vestita*, Baker). — Ins. Maurit.
crassifolia, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 72, t. 12. — Ind. or.
crassinervis, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 104, nomen; et in Bot. Jahrb. viii. (1887) 228. — Hung.
denticulata, Borb. l. c. xxxviii. (1888) 325. — Hung.
fruticosa, Sch. Bip. (in Schimp. Pl. Abyss. ii. n. 664) ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1882) 432 = *arbuscula*, Delile.
glauca, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 276. — Turkest.
Gombczewskii, C. Winkl. l. c. xiv. (1895) 149. — Turkest.
macedonica, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vii. (1895) 34. — Graecia.
mènesiensis ×, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 13. — Hung.
methanaea, Hausskn. in Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 176; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, viii. (1895) 33. — Graecia.
microcephala ×, Borb. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 235. — Hung.
Neilreichii, G. Beck, ex Formanek, Květena, ii. (1892) 528; et Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1182. — Morav.
pleiocephala ×, Borb. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 239. — Hung.
orgyalis, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 291. — Armenia.
pseudoconyza, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 453. — Reg. Cauc.
pseudoensiformis ×, Borb. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 232. — Hung.
pseudoensiformis ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1182 = *pseudoensifolia*, Borb.
scabridula, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn. xxx. (1892) 59. — Maced.
Schmalhauseni, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 420. — Turkest.

INULA: —

schugnanica, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 276. — Turke.
sericata X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 11. (1893) 1182. — Austr.
serrata, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 50. — China.
speciosa, O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 203 (= *Bojeria speciosa*, DC.). — Madag.
subulata, Baker, in Kew Bull. (1894) 333. — Arabia.
valiensis, Tausch, ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 11. (1893) 1182, in syn. = *pseudoensifolia*, Borb.
vindobonensis X, G. Beck, l. c. 1185. — Austria.

INULOPSIS, O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 149. **COMPOSITAE**.
scaposa, O. Hoffm. l. c. (= *Haplopappus scaposus*, DC.). — Bras.

IODANTHUS, Torr. & Gray (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1221.
pinnatifidus, Prantl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 183 = *pinnatifidus*, Steud.

IODES, Blume (Oclac.). — Ind. Kew. i. 1221.
reticulata, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 126. — Perak.
velutina, King, l. c. 127. — Penins. Mal.

IODINA, Hook. & Arn. (Santal.). — Ind. Kew. i. 1220.
cuneifolia, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 470 = *cuneifolia*, Miers.

IONIDIUM, Vent. (Violar.). — Ind. Kew. i. 1221.
durum, Baker, in Kew Bull. (1895) 180. — Arabia.
Lehmannii, Hieron, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 57 (1895) — Columb.
nyassense, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 277. — Afr. trop. or.

IONOPSIDIUM, Reichb. = **Cochlearia**, Tourn. (Crucif.).
Savianum, Ball, ex Coss. Comp. Fl. Atl. ii. (1887) 263 (= *Bivonaea Saviana*, Caruel). — Ital.

IONORCHIS, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1 (1890) 215 = **Limodorum**, Sw. (Orchid.).
abortiva, G. Beck, l. c. = *L. abortivum*, Sw.

IOXYLON, Rafin. = **Maclura**, Nutt. (Urtic.).
pomiferum, Rafin. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 139 = *M. aurantiaca*, Nutt.

IPHIGENIA, Kunth (Lilac.). — Ind. Kew. i. 1222.
Oliveri, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 466. — Afr. trop. or.
pauciflora, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 86. — Abyss.
somalensis, C. B. Clarke, in Kew Bull. (1895) 228. — Reg. Somal.

IPHIONA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1222.
mucronata, Aschers. & Schweinf. [Ill. Fl. Égypte] in Mém. Inst. Égypt. ii. (1887) 86 = *juniperifolia*, Cass.
subulata, Baker, in Kew Bull. (1894) 333. — Arabia.

IPOMOEA, Linn. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 1222.
aculeata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 442 = *Convolvulus aculeatus*, Linn.
acuminata, Baker, in Kew Bull. (1894) 72 = *zambesiaca*, Britten.
adenioides, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 270. — Afr. austro-occ. extratrop.
adumbrata, Rendle & Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 173. — Angola.
agrestis, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 345, in syn. = *Evolvulus agrestis*, Schweinf.
alata, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 108. — Mexic.

IPOMOEA: —

Althoffiana, Dammer, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 333. — Afr. trop. or.
amnicola, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 170. — Parag.
amplexicaulis, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 535. — Mexic.
andongensis, Rendle & Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 171. — Angola.
angustisecta, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 245 = *Bolusiana*, Schinz.
arenicola, Rendle & Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 176. — Angola.
argenteaurata, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 132. — Afr. trop. occ.
argentina, Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 30. — Reg. Argent.
asclepiadea, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 142. — Afr. trop.
asperifolia, Hallier f. l. c. 125. — Angola.
Assumptionis, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 170. — Parag.
aspericaulis, Baker, in Kew Bull. (1894) 70. — Angola.
auriculata, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 130 = *cordofana*, Choisy.
Bakeri, Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 85 (= *I. discolor*, Baker). — Afr. centr. or.
Barteri, Baker, in Kew Bull. (1894) 70. — Afr. trop. occ.
bathycolpos, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 144. — Afr. austr.
benguensis, Baker, in Kew Bull. (1894) 69. — Angola.
Bernouilliana, Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 30. — Guatem.
bipinnatifida, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 246. — Afr. austro-occ. extratrop.
blepharophylla, Hallier f. ex Engl. l. c. xviii. (1894) 125. — Afr. trop.
Bolusiana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 271. — Afr. austro-occ. extratrop.
Buchanani, Baker, in Kew Bull. (1894) 73. — Afr. trop.
Buchneri, Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 20; et ex Hallier f., in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 151. — Angola.
bullata, Oliver, in H. Johnst. Kilim. Exped., App. (1886) 343, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 343, t. 62. — Afr. trop. or.
caespitosa, Hallier f., in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 552 = *Skinneria caespitosa*, Choisy.
caespitosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443 = *linifolia*, Blume.
camerunensis, Taub. in Gartenfl. (1891) 394, t. 1352. — Kamerun.
Carletoni, Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 211, t. 17. — Am. bor.
Carsoni, Baker, in Kew Bull. (1894) 71. — Afr. centr. or.
cephalantha, Baker, l. c. 69. — Afr. trop. or.
chaetocaulos, Hallier f., in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 133. — Afr. trop.
chloroneura, Hallier f., l. c. 132. — Angola.
Choisyana, Wight & Arn. ex Hallier f. l. c. 130, in obs. = *Argyria Choisyana*, Wight.
chrysochaetia, Hallier f., l. c. 133. — Loango.
cicatricosa, Baker, in Kew Bull. (1895) 221. — Reg. Somal.
coerulea, Bello, ex Stahl, Estud. fl. Puerto-Rico, vi. (1888) 158 = *caerulea*, Bello.
comosperma, Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. vii. (1892) 242 (= *Calonyction comospermum*, Bojer). — Afr. trop., Ins. Vitiens.
convolvulifolia, Hallier f., in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 126. — Afr. trop. bor.-or.
convolvuloides, Hallier f. l. c. 140. — Afr. austr.
convolvuloides, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 273. — Afr. austro-occ. extratrop.
cordatosepala, Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 170 (= *I. cardiosepala*, Meissn.). — Bras.
cordobana, Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 31. — Reg. Argent.
costaricensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443. — Costarica.

IPOMOEA: —

crepidiformis, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 131. — Afr. trop. or.
crispa, Hallier f. l. c. 143 = *Convolvulus crispus*, Thunb.
demissa, Hallier f. l. c. 129. — Afr. trop.
diplocalyx, Baker, in Kew Bull. (1894) 71. — Reg. Zambes.
discoidesperma, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 27. — Guatem.
discolor, Baker, in Kew Bull. (1894) 69 = *I. Bakeri*, Britten.
Elliottii, Baker, l. c. — Afr. austr.
elytrocephala, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 134. — Afr. trop.
emarginata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443 = *reniformis*, Choisy.
Emini, Hallier f. l. c. 150. — Afr. trop.
Engleriana, Dammer, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 41; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 333. — Afr. trop. or.
eurysepala, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 125. — Kordofan
Fendleriana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443. — Venezuela.
fruticosa, Kuntze, l. c. — Venezuela.
fulvicaulis, Boiss. ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 128 = *Aniseia fulvicaulis*, Hochst.
gracillima, Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 30. — Venezuela.
gracillima, Prain, in Journ. Linn. Soc. lxiii. (1894) ii. 111. — Burma.
grandiflora, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 153 = *Calonyction grandiflorum*, Choisy.
Grayi, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 107. — Mexic.
Grisebachiana, Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 30 = *Jacquemontia luxurians*, Hallier f.
Hackelia, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 12. — Afr. austro-occ. extratrop.
Hallieriana, Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 170 [sphalm.? *Halleriana*] (= *I. zambesiaca*, Britten). — Zambesia.
Hanningtonii, Baker, in Kew Bull. (1894) 70. — Afr. trop. or.
Hardwickii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 160 (= *Convolvulus Hardwickii*, Spreng.). — As. et Afr. trop.
hellebarda, Schweinf. ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 142 = *sagittata*, Hook.
heterosepala, Baker, in Kew Bull. (1895) 222. — Reg. Somal.
hewittoides, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 127. — Angola.
Holubii, Baker, in Kew Bull. (1894) 72. — Reg. Zambes.
Holstii, Dammer, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 17, nomen. — Afr. trop.
huillensis, Baker, in Kew Bull. (1894) 70. — Angola.
humifera, Rendle & Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 177. — Angola.
hypoxantha, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 128. — Afr. trop.
Hystrix, Hallier f. l. c. 146. — Afr. trop. or.
incomta, Hallier f. l. c. 151. — Zanzib.
inconspicua, Baker, in Kew Bull. (1894) 71. — Afr. trop.
intrapilosa, N. E. Rose, in Gard. and For. vii. (1894) 367. — Mexic.
Jicama, T. S. Brandeg, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 188. — Calif.
Kilimandschari, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 332. — Afr. trop. or.
Kingii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiii. (1895) ii. 110. — Ind. angl.
Kirkiana, Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 85 (= *I. shirensis*, Baker). — Afr. trop.
Klotzschii, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 332 (= *I. stenophylla*, Klotzsch). — Afr. trop. or.
laeta, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 439. — Mexic.
Lambii, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 535. — Mexic.
lapathifolia, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 142. — Afr. trop. austro-or.

IPOMOEA: —

- leoneensis, *Robinson*, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 170. — Mexic.
 leptocaulos, *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 126. — Afr. trop. occ.
 leptosiphon, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 280. — Mexic.
 Lesteri, *Baker*, in *Kew Bull.* (1891) 273, nomen; et (1892) 83. — Afr. trop. occ.
 Leucanthemum, *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 124 (= *Calycanthemum Leucanthemum*, Klotzsch). — Afr. trop.
 linosepala, *Hallier f. l. c.* 130. — Angola.
 longipes, *Engl. l. c. x.* (1889) 246. — Afr. austr.
 lophantha, *Hallier f. l. c.* xviii. (1894) 134. — Afr. trop. or.
 macrantha, *Peter*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 31. — Guatem.
 madrensis, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 281. — Mexic.
 magnifica, *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 152. — Afr. trop.
 Magnusiana, *Schinz*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 272. — Afr. austro-occ. extratrop.
 Marlothii, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 244. — Afr. austro-occ. extratrop.
 Matthewsiana, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 443. — Peruvia.
 medians, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 473 (= *Pharbitis medians*, Choisy.). — Ins. Borbon.
 megalochlamys, *Baker*, in *Kew Bull.* (1894) 72. — Angola.
 microcephala, *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 131. — Afr. trop. or.
 moerensis, *Baker*, in *Kew Bull.* (1895) 291. — Afr. trop.
 Morongii, *Britten*, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 171. — Parag.
 Morsoni, *Baker*, in *Kew Bull.* (1894) 71. — Sierra Leone.
 nana, *Collett & Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1890) 97. — Burma.
 Neallyi, *Coulter*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1890) 46 (= *Antirrhinum maurandiodes*, A. Gray). — Texas.
 nuda, *Baker*, in *Kew Bull.* (1894) 72. — Angola.
 nuda, *Peter*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 31 (= *Opeculina tuberosa*, Meissn.). — Guatem.
 obtusata, *Moric*, ex *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 542 = *Jacquemontia obtusata*, *Hallier f.*
 odontosepala, *Baker*, in *Kew Bull.* (1894) 73. — Afr. trop. or.
 Oenotherae, *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 125 = *Convolvulus Oenotherae*, *Vatke*.
 ophthalmantha, *Hallier f. l. c.* 141. — Afr. trop.
 ornithopoda, *Robinson*, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 183. — Mexic.
 oxyphylla, *Baker*, in *Kew Bull.* (1894) 71. — Angola.
 Palmeri, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 63. — Mexic.
 Pearceana, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 443. — Peruvia.
 pellita, *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 130. — Afr. austr.
 perlonga, *Robinson*, ex *Pringle*, in *Gard. and For.* vii. (1894) 153; et in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 319. — Mexic.
 pharbitiformis, *Baker*, in *Kew Bull.* (1895) 291. — Afr. trop.
 phyllosepala, *Baker*, l. c. (1894) 69 = *Hewittia bicolor*, *Wight & Arn.*
 pinnatifida, *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 552 = *pinnatifida*, *G. Don*?
 plantaginea, *Hallier f. l. c.* xviii. (1894) 147 = *Convolvulus plantagineus*, *Choisy*.
 polytricha, *Baker*, in *Kew Bull.* (1894) 71. — Afr. trop. occ.
 popahensis, *Collett & Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1890) 97. — Burma.
 porrecta, *Rendle & Britten*, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 172. — Angola.
 Pringlei, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 307. — Mexic.
 Protea, *Rendle & Britten*, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 176. — Angola.

IPOMOEA: —

- punctata, *Baker*, in *Kew Bull.* (1895) 184. — Arabia.
 pyramidalis, *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 152. — Angola.
 quinquefolia, *Hochst.* ex *Hallier f. l. c.* 147. — Abyss.
 racemigera, *F. Muell & Tate*, in *Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xiii. (1890) 108. — Austral.
 repandula, *Baker*, in *Kew Bull.* (1894) 110. — Lagos.
 Robertsii, *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1887) t. 6052. — Queensland.
 rhodocalyx, *A. Gray*, ex *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 439. — Mexic.
 rostrata, *Peter*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 30. — Guatem.
 rubro-viridis, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 507. — Madag.
 sagittaeformis, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 474. — Ins. Borbon.
 salaziana, *Cordem. l. c.* (1895) 474. — Ins. Borbon.
 Saltiana, *Rendle*, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 178. — Abyss.
 Schrenkiana, *Peter*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 30. — Am. bor.
 semisagitta, *Griseb.* ex *Peter*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 31 (= *Merremia pedata*, *Hallier f.*). — Mesopot.
 shirambensis, *Baker*, in *Kew Bull.* (1894) 72. — Zambes.
 shirensis, *Baker*, in *Kew Bull.* (1894) 74 = *I. Kirkiana*, *Britten*.
 shupangensis, *Baker*, l. c. 73. — Zambes.
 Simonsiana, *Rendle*, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 178. — Afr. trop.
 sindica, *Stapf*, in *Kew Bull.* (1894) 346. — Ind. angl.
 sinuata, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 442 = *carnosa*, *R. Br.*
 Smithii, *Baker*, in *Kew Bull.* (1894) 73. — Congo.
 speciosa, *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 143 = *sagittata*, *Lam.*
 stellaris, *Baker*, in *Kew Bull.* (1894) 73. — Afr. trop. occ.
 stenophylla, *Klotzsch*, ex *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 23 = *I. Klotzschii*, *Dammer*.
 Stocksii, *Peter*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 31. — Ind. angl.
 Stuhlmannii, *Dammer*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1896) 333. — Afr. trop. or.
 supersticiosa, *Rodr. Vellosia*, 1885-86, sec. edic. (1891) 61 t. 17. — Bras.
 syringaeifolia, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 507. — Madag.
 taborana, *Dammer*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 333. — Afr. trop. or.
 tambelensis, *Baker*, in *Kew Bull.* (1894) 72. — Reg. Zambes.
 tanganyikensis, *Baker*, l. c. (1895) 70. — Afr. trop. centr. or.
 tenuifolia, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 446 = *quinata*, *R. Br.*
 texana, *Coult.* in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 45. — Texas.
 tortugensis, *Peter*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 31 (= *Merremia pentaphylla*, *Hallier f.*). — Guatem.
 uliginosa, *Welw.* ex *Rendle*, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 179, in obs. — Angola.
 vagans, *Baker*, in *Kew Bull.* (1894) 70. — Afr. trop. occ.
 velutipes, *Welw.* ex *Rendle*, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 175. — Angola.
 Vogelii, *Baker*, in *Kew Bull.* (1894) 71. — Afr. centr. bor.
 Wakefieldii, *Baker*, l. c. 72. — Afr. trop.
 Walcottiana, *J. W. Rose*, in *Gard. and For.* vii. (1894) 366. — Mexic.
 Wattii, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 49, t. 22. — Kohima.
 Welwitschii, *Vatke*, ex *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 146. — Angola.
 Woodii, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1894) 101. — Afr. austr.
 xanthophylla, *Hochst.* ex *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 113 (= *Merremia xanthophylla*, *Hallier f.*). — Abyss.

IPOMOEA: —

- xiphosepala, *Baker*, in *Kew Bull.* (1894) 69. — Angola.
 zambesiaca, *Baker*, l. c. 70. — Reg. Zambes.
 zambesiaca, *Britten*, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 85 = *I. Hallieriana*, *Britten*.
 IPO, Pers. = **Antiaris**, *Lesch.* (Urtic.).
Bennettii, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 629 = *A. Bennettii*, *Seem.*
innoxia, *Kuntze*, l. c. = *A. toxicaria*, *Lesch.*
macrophylla, *Kuntze*, l. c. = *A. macrophylla*, *R. Br.*
palembanica, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 629 = *A. palembanica*, *Miq.*
rufa, *Kuntze*, l. c. = *A. rufa*, *Miq.*

- IPSEA**, *Lindl.* (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1228.
malabarica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 812 (= *Pachystoma malabaricum*, *Reichb. f.*). — Malabar.
Thomsoniana, *Pfitz.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. VI. 6 (1888) 154 (= *Pachystoma Thomsonianum*, *Reichb. f.*). — Zeyl.
Wrayana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1892) 812; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2085. — Perak.

- IRESENE**, *P. Br.* (Amaranth.). — Ind. Kew. i. 1228.
alternifolia, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 72. — Mexic.
Benthamiana, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 543 = *Hebanthe parviflora*, *Benth.*
laxa, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 454. — Mexic.
muscodes, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 542 = *Alternanthera muscoides*, *Benth. & Hook. f.*
paniculata, *Kuntze*, l. c. = *celosioides*, *Linn.*
Pringlei, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 161. — Mexic.
radicata, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 542 = *Alternanthera radicata*, *Hook. f.*
Schaffneri, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 437. — Mexic.
scirpodes, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 542 = *Alternanthera scirpoides*, *Hook. f.*
subscaposa, *Kuntze*, l. c. = *A. subscaposa*, *Hook. f.*

- IRIDORCHIS**, *Thou.* in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* Paris (1809) 314, 9; ex *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 668 = **Oberonia**, *Lindl.* (Orchid.).
anceps, *angustifolia*, *anthropophora*, *apophylla*, *bicornis*, *brachystachya*, *Brunonian*, *caulescens*, *Clarkei*, *cylindrica*, *demissa*, *ensifolmis*, *Falconeri*, *ferruginea*, *forcipata*, *Gardneriana*, *gracilis*, *Griffithiana*, *Helferi*, *imbricata*, *iridifolia*, *Jenkinsiana*, *Lindleyana*, *Lobbiana*, *longibracteata*, *lanata*, *maxima*, *microphylla*, *miniata*, *Myosurus*, *myriantha*, *obcordata*, *orbicularis*, *pachyrhachis*, *pachystachya*, *platycaulon*, *pyrulifera*, *recurva*, *rufilabris*, *Scortechinii*, *Scyllae*, *similis*, *spathulata*, *tahitensis*, *tenuis*, *Thibae*, *Titania*, *Treutleri*, *truncata*, *verticillata*, *Wallichii*, *Wightiana*, *zeylanica*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 669 = *homonyma omnia* *Oberoniae*.
equitans, *Kuntze*, l. c. = *O. brevifolia*, *Lindl.*
heliophylla, *Kuntze*, l. c. = *Malaxis heliophila*, *Reichb. f.*

- IRIA**, *Hedw. f.* = **Fimbristylis**, *Vahl* (Cyper.).
obtusifolia, *Hitchcock*, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 141 = *F. obtusifolia*, *Kunth*.

- IRIARTEA**, *Ruiz & Pav.* (Palm.). — Ind. Kew. i. 1229.
fusca, *Drude*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 3 (1887) 60. — Columb.

- IRIHA**, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 751 = **IRIA**, *Hedw. f.* = **Fimbristylis**, *Vahl* (Cyper.).
acicularis, *Kuntze*, l. c. 753 = *F. acuminata*, *Vahl*.
acuminata, *Kuntze*, l. c. 751 = *F. acuminata*, *Vahl*.
aestivalis, *Kuntze*, l. c. = *F. aestivalis*, *Vahl*.
androgyna, *Kuntze*, l. c. 753 = *F. androgyna*, *R. Br.*
angularis, *Kuntze*, l. c. = *F. angularis*, *Link.*
aphylla, *Kuntze*, l. c. (= *Abilgaardia aphylla*, *Kunth*) = *F. bahiensis*, *Steud.*
apus, *Kuntze*, l. c. = *F. Vahlia*, *Link.*

IRIHA:

- Arnottiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 753 = *Fimbristylis Arnottiana*, Boeck.
autumnalis, Kuntze, l. c. = *F. autumnalis*, Roem. & Schult.
barbata, Kuntze, l. c. = *F. barbata*, Benth.
Basteri, Kuntze, l. c. = *F. Barteri*, Boeck.
biflora, Kuntze, l. c. = *F. cyperoides*, R. Br.
bispicata, Kuntze, l. c. = *F. bispicata*, Nees & Meyer.
bisumbellata, Kuntze, l. c. = *F. spathacea*, Roth.
caespitosa, Kuntze, l. c. = *F. caespitosa*, Boeck.
capillaris, Kuntze, l. c. = *F. capillaris*, A. Gray.
capitata, Kuntze, l. c. = *F. capitata*, R. Br.
cardiocalpa, Kuntze, l. c. = *F. cardiocalpa*, F. Muell.
cinnamometorum, Kuntze, l. c. = *F. cyperoides*, R. Br.
compressa, Kuntze, l. c. = *F. compressa*, Boeck.
consanguinea, Kuntze, l. c. = *F. complanata*, Link.
corynocarya, Kuntze, l. c. = *F. corynocarya*, F. Muell.
crassipes, Kuntze, l. c. = *F. crassipes*, Boeck.
cymosa, Kuntze, l. c. = *F. cymosa*, R. Br.
debilis, Kuntze, l. c. = *F. debilis*, F. Muell.
denudata, Kuntze, l. c. (sphalm.) = *F. denudata*, R. Br.
depauperata, Kuntze, l. c. = *F. diphylla*, Vahl.
disticha, Kuntze, l. c. = *F. disticha*, Boeck.
Drummondii, Kuntze, l. c. = *F. anomala*, Boeck. et castanea, Vahl.
elata, Kuntze, l. c. = *F. denudata*, R. Br.
Eragrostis, Kuntze, l. c. = *F. Eragrostis*, Hance.
falcata, Kuntze, l. c. = *F. junciformis*, Kunth.
falcifolia, Kuntze, l. c. = *F. falcifolia*, Boeck.
ferruginea, Kuntze, l. c. = *F. ferruginea*, Vahl.
filifolia, Kuntze, l. c. = *F. filifolia*, Boeck.
fimbristylodes, Kuntze, l. c. = *F. disticha*, Boeck.
furva, Kuntze, l. c. = *F. furva*, R. Br.
fusca, Kuntze, l. c. = *Abilgaardia fusca*, Nees.
globulosa, Kuntze, l. c. = *F. Fimbristylis globulosa*, Kunth.
glomerata, Kuntze, l. c. = *F. spathacea*, Roth.
gracilis, Kuntze, l. c. = *F. tenuis*, Roem. & Schult.
Hanceana, Kuntze, l. c. = *F. rigidula*, Nees.
hawaiiensis, Kuntze, l. c. = *F. hawaiiensis*, Hillebr.
Hookeriana, Kuntze, l. c. = *F. Hookeriana*, Boeck.
insignis, Kuntze, l. c. = *F. insignis*, Thou.
junccea, Kuntze, l. c. = *F. junccea*, R. Br.
junciformis, Kuntze, l. c. = *F. junciformis*, Kunth.
leptoclada, Kuntze, l. c. = *F. leptoclada*, Benth.
leucocolea, Kuntze, l. c. = *F. leucocolea*, Benth.
leucostachya, Kuntze, l. c. = *F. leucostachya*, Roem. & Schult.
macrantha, Kuntze, l. c. = *F. macrantha*, Boeck.
macrostachya, Kuntze, l. c. = *F. macrostachya*, Boeck.
Martii, Kuntze, l. c. = *F. bahiensis*, Steud.
microcarya, Kuntze, l. c. = *F. microcarya*, F. Muell.
miliacea, Kuntze, l. c. = *F. miliacea*, Vahl.
monandra, Kuntze, l. c. = *F. argentea*, Vahl.
monostachya, Kuntze, l. c. = *F. monostachya*, Hassk.
mucronata, Kuntze, l. c. = *F. Barteri*, Boeck.
Muelleriana, Kuntze, l. c. = *F. monandra*, F. Muell.
multifolia, Kuntze, l. c. = *F. cymosa*, R. Br.
Neilsonii, Kuntze, l. c. = *F. Neilsoni*, F. Muell.
nutans, Kuntze, l. c. = *F. nutans*, Vahl.
obtusangula, Kuntze, l. c. = *F. rara*, R. Br.
oxystachya, Kuntze, l. c. = *F. oxystachya*, F. Muell.
pauciflora, Kuntze, l. c. = *F. pauciflora*, R. Br.
paupercula, Kuntze, l. c. = *F. paupercula*, Boeck.
pentaptera, Kuntze, l. c. = *F. pentaptera*, Kunth.
Pierottii, Kuntze, l. c. = *F. Pierottii*, Miq.
pilosa, Kuntze, l. c. = *F. pilosa*, Vahl.
platystachya, Kuntze, l. c. = *F. Schultzei*, Boeck.
polymorpha, Kuntze, l. c. = *F. diphylla*, Vahl.
polytrichodes, Kuntze, l. c. = *F. polytrichoides*, R. Br.
pterygosperma, Kuntze, l. c. = *F. pterigosperma*, R. Br.
punctata, Kuntze, l. c. = *F. punctata*, R. Br.
pycnoccephala, Kuntze, l. c. = *F. pycnocephala*, Hillebr.

IRIHA: —

- quinguangularis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 752 = *Fimbristylis quinguangularis*, Kunth.
rara, Kuntze, l. c. = *F. rara*, R. Br.
retusa, Kuntze, l. c. = *F. leptoclada*, Benth.
rhyticarya, Kuntze, l. c. = *F. rhyticarya*, F. Muell.
salbundia, Kuntze, l. c. = *F. salbundia*, Kunth.
scaberrima, Kuntze, l. c. = *F. scaberrima*, Nees.
schoenodes, Kuntze, l. c. = *F. schoenodes*, Vahl.
sericea, Kuntze, l. c. = *F. sericea*, R. Br.
solidifolia, Kuntze, l. c. = *F. solidifolia*, F. Muell.
spadicea, Kuntze, l. c. = *F. spadicea*, Vahl.
sphaerocephala, Kuntze, l. c. = *F. monandra*, F. Muell.
spiralis, Kuntze, l. c. = *F. spiralis*, R. Br.
spirostachya, Kuntze, l. c. = *F. diphylla*, Vahl.
squarrosa, Kuntze, l. c. = *F. squarrosa*, Vahl.
stricta, Kuntze, l. c. = *F. Schomburgkiana*, Steud.
subaristata, Kuntze, l. c. = *F. subaristata*, Benth.
subbulbosa, Kuntze, l. c. = *F. schoenoides*, Vahl.
subtetrastrachya, Kuntze, l. c. = *F. nigrobrunnea*, Thw.
tenera, Kuntze, l. c. = *F. tenera*, Roem. & Schult.
tenuicula, Kuntze, l. c. = *F. tenuicula*, Boeck.
tetragona, Kuntze, l. c. = *F. tetragona*, R. Br.
thermalis, Kuntze, l. c. = *F. thermalis*, S. Wats.
Thomsonii, Kuntze, l. c. = *F. Thomsoni*, Boeck.
Thonningiana, Kuntze, l. c. = *F. Thonningiana*, Boeck.
torta, Kuntze, l. c. = *F. junciformis*, Kunth.
triflora, Kuntze, l. c. = *F. triflora*, K. Schum.
trigastrocarya, Kuntze, l. c. = *F. trigastrocarya*, F. Muell.
uliginosa, Kuntze, l. c. = *F. uliginosa*, Hochst.
umbellata, Kuntze, l. c. = *F. castanea*, Vahl.
vaginata, Kuntze, l. c. = *F. leptoclada*, Benth.
Vahlia, Kuntze, l. c. = *F. Vahlia*, Link.
velata, Kuntze, l. c. = *F. squarrosa*, Vahl.
Xyridis, Kuntze, l. c. = *F. Xyridis*, R. Br.

- IRIS**, Tourn. ex Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1228.
Amasiana, Bornm. ex Hausskn. in Flora (1889) 140. in syn. = *I. Danfordiae*, Baker.
athoa, Foster, in Gard. Chron. (1893) i. 711. — Graecia.
atrofusca, Baker, in Gard. Chron. (1893) i. 384; et in Bot. Mag. (1894) t. 7379 sub *I. atropurpurea* Baker var. *atrofusca* (Baker). — Palaest.
atropurpurea, Baker, in Gard. Chron. (1889) i. 330. — Syria.
Bakeriana, Foster, in Bot. Mag. (1889) t. 7084; Baker, Handb. Irid. (1892) 42. — Armenia.
Barnumae, Foster & Baker, in Gard. Chron. (1888) ii. 182; et in Bot. Mag. (1889) t. 7050; Baker, Handb. Irid. (1892) 21. — Armenia.
benacensis, A. Kern. ex Stapf, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien (1887) 649; Baker, Handb. Irid. (1892) 35. — Tirol.
Biliotti, Foster, in Gard. Chron. (1887) 738; Baker, Handb. Irid. (1892) 37. — As. Min.
Bismarckiana, Regel, ex Wien. Gartenzeit. (1892) 855, fig. 72; Baker, Handb. Irid. (1892) 18; et in Gard. Chron. (1893) i. 506. — Syria.
Bornmuelleri, Hausskn. in Flora (1889) 140; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 326 = *I. Danfordiae*, Baker.
bosniaca, G. Beck, ex Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. (1887) 195; et in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, v. (1890) 573. — Bosn.?
Burnati, Baker, Handb. Irid. (1892) 33. — Alpes Marit.
cardiopetala, Borbas, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 325 = *spuria*, Linn.
caroliniana, S. Wats. in A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. 6 (1890) 514; et in Proc. Am. Acad. xxv. (1898) 134; Baker, Handb. Irid. (1892) 12. — Carolina.
Clarkei, Baker, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 275; et Handb. Irid. (1892) 25. — Reg. Himal.
compressa, [N. E. Br.] in Monteiro, Delagoa Bay (1891) 171. — Mossamb.
cretica, Herb. ex Baker, Handb. Irid. (1892) 3 = *cretensis*, Fanka.
crociformis, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 326, in syn. = *I. Bornmuelleri*, Hausskn.
cypriana, Foster & Baker, in Gard. Chron. (1888) ii. 182; Baker, Handb. Irid. (1892) 37. — Cyprus.

IRIS: —

- Delavayi*, M. Micheli, in Rev. Hortie. (1895) 398, fig. 128 et 129. — Tunnan.
drepanophylla, Aitch. & Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1887) 115; Baker, Handb. Irid. (1892) 46. — As. centr. occ.
Duthiei, Foster, in Gard. Chron. (1887) i. 611; Baker, Handb. Irid. (1892) 25. — Kumaon.
flava, Tornab. Fl. Sicula (1887) 212. — Sicil.
Fosteriana, Aitch. & Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1887) 114; Baker, in Bot. Mag. (1892) t. 7215. — Afghan.
Gatesii, Foster, in Gard. Chron. (1890) ii. 18, fig. 3; Baker, Handb. Irid. (1892) 18. — Armenia.
gilgitensis, Baker, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 264; et Handb. Irid. (1892) 34. — Tibet.
graminifolia, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 326. — As. Min.
Grant-Duffii, Baker, Handb. Irid. (1892) 7. — Palaest.
Griffithii, Baker, l. c. 32. — Afghan.
Haussknechtii, Bornm. (Pl. exsicc. Anatol. n. 1864) ex Baker, l. c. 4. — As. Min.
Henryi, Baker, l. c. 6. — China.
Hookeriana, Foster, in Gard. Chron. (1887) i. 611; Baker, in Bot. Mag. (1893) t. 7276. — Reg. Himal.
Kingiana, Foster, in Gard. Chron. (1887) i. 611; Baker, in Bot. Mag. (1887) t. 6957 = *kumaonensis*, Wall.
Kochii, A. Kern. ex Stapf, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien (1887) 649; Baker, Handb. Irid. (1892) 35. — Istria.
lazica, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 232. — Reg. Cauc.
lineata, Foster, ex Regel, in Gartenfl. xxxvi. (1887) 201, t. 1244 = *I. Suwarowi*, Regel.
Löczyi, Kanitz, Fl. expd. Széchenyi in As. centr. coll. (1891) 58. — As. centr.
lupina, Foster, in Gard. Chron. (1887) i. 738; Baker, Handb. Irid. (1892) 19. — Armenia.
lutea, St. Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 794 = *lutea*, Lam.
macedonica, Nadj [Charvel] Emp. Ottom. [Pl. de Salon.] (1892) 40, nomen. — Maced.
Mandaliscae, Tineo, ex Tornab. Fl. Sicula (1887) 512. — Sicil.
Mariae, Barbey, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1891) 206; et in Gartenfl. xlii. (1893) 488 fig. 106. — Aegypt.
Mariae, Hort. Leichtl. ex Gard. Kew, Herb. Pl. (1895) 241 (an praec.?). — Hab.?
Meda, Stapf, in Bot. Ergeb. Polak Exped. Pers. (1886) 20; Baker, in Bot. Mag. (1889) t. 7040. — Persia.
Moggridgei, Baker, Handb. Irid. (1892) 34. — Alpes Marit.
parkor X, Foster, in Gard. Chron. (1895) i. 612. — Hybr. artef.
propendens, Lange, in Bot. Tidsskr. (1895) 255. — Hab.?
Robinsonii, Hort. ex Gard. Chron. (1888) ii. 263 = *Robinsoniana*, F. Muell.
Sari-nazarens, Foster, ex Gartenfl. xlii (1893) 487. — Palaest.
Stocksii, Hemsl. & Lace, in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 320 = *Xiphion Stocksii*, Bak.
Suwarowi, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 619; et in Gartenfl. (1886) 398; Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7029. — Buchara.
Thoroldi, Baker, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 118; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2302. — Tibet.
tigrina, Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 274, in syn. = *kumaonensis*, Wall.
trojana, A. Kern. ex Stapf, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1887) 650; Baker, Handb. Irid. (1892) 12. — As. Min.
Van Houttei X, Hort. Leichtl. ex Baker, Handb. Irid. (1892) 20. — Hybr. artef.
Wattii, Baker, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 273; et Handb. Irid. (1892) 17 [sphalm. Wattii]. — Ind angl.

- IRMISCHIA**, Schlecht. = **Metastelma**, R. Br. (Asclep.).
Paralias, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 229 = *M. Paralias*, Decne.

IRMISCHIA: —

suberosa, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 229 = *Metastelma suberosum*, Griseb.

IRVINGIA, Hook. f. (Simarub.). — Ind. Kew. i. 1232.

gabonensis, Baill. ex Lanen. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 212; et in Annal. Inst. bot.-geol. Marseille, i. ii. (1893) 1, cum xylogr. — Gabon.
Harmandiana, Pierre, ex Laness. l. c. (1886) 306 nomen. — Cochinch.
malayana, Oliver, in Kew Bull. (1890) 118. — Malaya.
Oliveri, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 263 B. — Annam.

ISACHNE, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1232.

biflora, C. Cordem. in Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 115 (= *Panicum biflorum*, Lam.) = *albense*, Trin.
Buettneri, Hack., ex Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 69. — Gabon.
cernua, C. Cordem. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 115. — Ins. Borbon.
cochinchinensis, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 137. — Cochinch.
comata, Munro, ex Hackel, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1866. — Ins. Aneit.
elegans, C. Cordem. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 115. — Ins. Borbon.
globosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 778 = *australis*, R. Br.
Jardini, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 739 (= *Panicum Jardini*, Steud.). — Guinea.
longifolia, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 115. — Ins. Borbon.
pallens, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 504. — Ins. Sandvic.

ISANTHERA, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1233.

lanata, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 418. — Oceania.
parviflora, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 331. — Penins. Mal.

ISANTHUS, Michx (Labiata). — Ind. Kew. i. 1233.

brachiatus, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 44 = *coeruleus*, Michx.
brachiatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = *praec.*

ISATIS, Tourn. ex Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1233.

athoa, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 65. — Graecia.
bullata, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 37. — Turkest.
lanceolata, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 18. — As. Min.
pyramidata, Stapf, l. c. 19. — As. Min.
stenocarpa, Stapf, l. c. 37. — As. occ.
transsilvanica, Simonk. in Termesz. Fuzét. x. (1886) 180; et Enum. Fl. Transsilv. (1886) 101 = *praecox*, Kit.

ISCHAEMUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1234.

angustifolium, Hack. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1773; et in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 24 (= *Spodiopogon angustifolius*, Trin.). — As. trop.
aureum, Hack. in DC. l. c. 224 (= *Spodiopogon aureus*, Hook.). — Ins. Loo-Choo.
Beccarii, Hack. in DC. l. c. 247. — Borneo.
brachyatherum, Fenzl, ex Hack. in DC. l. c. 239 (= *Andropogon brachyatherus*, Hochst.). — Afr. trop. or. bor.
chrysatherum, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 14 et 28. — Afr. trop.
chrysartherus, K. Schum. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 13, 31, sphalm. = *chrysatherum*, K. Schum.

ISCHAEMUM: —

commutatum, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 209. — Zeylan.
cordatum, Hack. ex Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 260 (= *Spodiopogon chordatus*, Trin.). — As. trop. insul.
eristachyum, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 218. — China, Japon.
Feildingianum, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 101. — Johore.
foliosum, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 222. — N. Hibern. N. Caled.
heterotrichum, Hack. l. c. 220. — Ins. Mascar.
hirtum, Hack. in DC. l. c. 228. — Zeylan.
Huegelii, Hack. in DC. l. c. 252. — Ind. or.
impressum, Hack. in DC. l. c. 210. — As. trop.
koleostachys, Hack. in DC. l. c. 220 (= *Andropogon koleostachys*, Steud.). — Ins. Borbon.
lutescens, Hack. in DC. l. c. 221. — Ins. Sandvic.
magnum, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 102. — Penins. Mal.
notatum, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 246. — Ind. or.
petiolare, Hack. in DC. l. c. 238 (= *Spodiopogon petiolare*, Trin.). — Ind. or.
pilosum, Hack. in DC. l. c. 240 (= *S. pilosus*, Nees). — Ind. or.
ramosissimum, Hack. in DC. l. c. 249. — As. trop.?
rivale, Hack. in DC. l. c. 228. — Zeylan.
spathulatum, C. Cordem. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 121. — Ins. Borbon.
sulcatum, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 248. — Ind. or.
tallanum, Rendle, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 359. — Sierra Leone.
Turneri, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 233. — N. Hibern. N. Caled.

ISCHNANTHUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot.

Fr. xlii. (1895) 260 = *Loranthus*, Linn.
Ehlersii, Van Tiegh. l. c. = L. Ehlersii, Schweinf.
kagehensis, Van Tiegh. l. c. = L. kagehensis, Engl.
Lecardii, Van Tiegh. l. c. = L. Lecardii, Engl.
luluensis, Van Tiegh. l. c. = L. luluensis, Engl.
parviflorus, Van Tiegh. l. c. = L. parviflorus, Engl.
woodfordioides, Van Tiegh. l. c. = L. woodfordioides, Schweinf.

ISCHNEA, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. n. (1889) 13. COMPOSITAE.

elachoglossa, F. Muell. l. c. — N. Guin.

ISCHNOSIPHON, Koen. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1234.

hirsutus, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 135. — Bras.
Koernickeanus, Petersen, l. c. 140. — Bras.
Mariae, Eggers, in Bot. Centralbl. liii. (1893) 307, t. 2. — Ins. Baloo.
Martianus, Eichl. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 138. — Bras.
pruinosis, Petersen, in Bot. Tidsskr. xviii. (1893) 264 t. 18. — Hab.?
secundus, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 135. — Bras.
smaragdinus, Eichl. ex Petersen, l. c. 137 (= *Calathea smaragdina*, Linden). — Bras.

ISEILEMA, Anders. = *Anthistiria*, Linn. (Gramin.).

anthephoroides, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 683. — Ind. or.
laxum, Hack. in DC. l. c. 682 (= *Isail. prostratum*, Anders.). — Ind. or. Zeylan.
prostratum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 778 = *A. prostrata*, Willd.

ISERTIA, Schreb. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1235.

bullata, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 286. — Bras.
longifolia, K. Schum. in Vid. Medd. naturh. Foren. (1889) 349; et in Mart. l. c. 289 (= *Psychotria longifolia*, Hoffmagg). — Bras.
rosea, Spruce, ex K. Schum. in Mart. l. c. 284. — Bras.

ISNARDIA, Linn. = *Ludwigia*, Linn. (Onagrar.).
arcuata, Hirtella, limfolia, natais, parviflora, pilosa.
polycarpa, prostrata, spathulata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 251 = *homonyma omnia* Ludwigiae.
jussieuodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 251 = *L. parviflora*, Roxb.
suffruticosa, Kuntze, l. c. = *L. capitata*, Michx.

ISOCAULON, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 352 = *Loranthus*, Linn.

americanum, Van Tiegh. l. c. = *L. americanus*, Jacq.
flavo-viride, Van Tiegh. l. c. = *Psittacanthus flavo-viridis*, Eichl.

ISOCHILUS, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1235.

unilateralis, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 323. — Mexic.

ISOCOMA, Nutt. = *Bigelovia*, Nutt. (Compos.).

acradenia, Greene, in Erythea, ii. (1894) 111 = *B. acradenia*, Greene.
arguta, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 175. — Calif.
coronopifolia, Greene, in Erythea, ii. (1894) 111 = *B. coronopifolia*, A. Gray.
Drummondii, Greene, l. c. = *B. Drummondii*, A. Gray.
Hartwegii, Greene, l. c. = *B. Hartwegii*, A. Gray.
heterophylla, Greene, l. c. = *Linosyris heterophylla*, A. Gray.
pluriflora, Greene, l. c. = *B. pluriflora*, A. Gray.
tridentata, Greene, l. c. = *B. tridentata*, Greene.
veneta, Greene, l. c. = *B. veneta*, A. Gray.

ISOGLOSSA, Oerst. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1236.

Bachmanni, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 57. — Afr. trop. occ.
ciliata, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 265 (= *Rhytiglossa ciliata*, Nees). — Afr. austr.
comorensis, Lindau, l. c. xx. (1894) 54. — Ins. Comor.
flava, Lindau, l. c. xxii. (1895) 125; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 91. — Afr. trop. or.
glandulifera, Lindau, l. c. xx. (1894) 54. — Afr. trop. occ.
grandiflora, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 34, in obs. (= *Ecteinanthus grandiflorus*, T. Anders.). — Afr. trop. austro-or.
hypoestiflora, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 58. — Afr. trop. occ.
ixodes, Lindau, l. c. xxii. (1895) 124; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 130. — Afr. trop. or.
lactea, Lindau, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 49, et l. c. xx. (1894) 55. — Afr. trop. or.
laxa, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append. (1886) 344; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 345. — Afr. trop.
milaniensis, S. Moore, l. c. Ser. II. iv. (1894) 33. — Afr. trop.
mossambicensis, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 372. — Afr. trop. or.
Oerstadiana, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 56. — Afr. trop. or.
origanoides, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 34 (= *Rhytiglossa ciliata*, Nees). — Afr. austr.
rubescens, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 57. — Afr. trop. or.
runssorica, Lindau, l. c. 56. — Afr. trop. or.
violacea, Lindau, l. c. xxii. (1895) 125. — Afr. trop. or.
Volkensii, Lindau, l. c. xx. (1894) 55. — Afr. aequat. or.

ISOLEPIS, R. Br. = *Scirpus*, Linn. (Cyper.).

abyssinica, Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 605 = *Fimbristylis exilis*, Roem. & Schult.
andina, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 79. — Am. austr. occ.
gracillima, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 148, in syn.; et ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 612 = *S. capillaris*, Linn.

ISOLEPIS: —

- humillima*, Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 616 = *Bulbostylis striatella*, C. B. Clarke.
monostachya, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 79. — Am. austr. occ.
Novae-Zelandiae, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 102. — N. Zel.
oreophila, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 79. — Am. austr. occ.
perpusilla, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 634 = *S. venustus*, Boeck.
praeusta, Nees, ex C. B. Clarke, l. c. 639 = *Ficinia laevis*, Nees.
pubiculmis, Hochst. ex C. B. Clarke, l. c. 605 (= *Isol. pubiculmis*, Boeck.) = *Fimbristylis exilis*, Roem. & Schult.
reticularis, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 277. — N. Zel.
rugosa, Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 618 (= *Isol. rugosa*, Boeck.) = *S. articulatus*, Linn.
subtristachya, Hochst. ex C. B. Clarke, l. c. 611 = *Bulbostylis barbata*, C. B. Clarke.

ISOLOMA, Decne (Gesner.). — Ind. Kew. i. 1258.

- Hahnii*, Hort. Par. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 719. — Mexic.
jaliscanum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 159. — Mexic.

ISOMERIS, Nutt. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 1238.

- aborea*, «Nutt.» ex Greene, Pittonia, i. (June 1888) 200, sphalm. = *arborea*, Nutt.

ISONEMA, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 1239.

- Buchholzii*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 340. — Kamerun.

ISOPETALUM, Sweet = *Pelargonium*, L'Hérit. (Geran.).

- dentatum*, Eckl. & Zeyh. ex Szyszyl. Polyp. Thal. Rehmman. (1888) 13 = *P. alchemilloides*, Willd.

ISOPOGON, R. Br. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 1239.

- Dawsoni*, R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. ix. (Mar. 1895) 658, t. 45. — Australia.
Fletcheri, F. Muell. l. c. (Sept. 1894) 151. — Austral.

ISOPTERA, Scheffer, ex Burck, Minjak, Tengkwang, Batavia (1886) 27: et in Ann. Jard. Bot. vi. (1887) 222. DIPTEROCARPEAE.

- borneensis*, Scheff. II. cc. — Borneo.

ISOPYRUM, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 1240.

- auriculatum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 376. — China.
Henryi, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1745. — China.
peltatum, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 190. — China.
sutchuenense, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 284. — China occ.
thalictroides, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 23 = *thalictroides*, Linn.
trifolium, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 265 = *Coptis tritolia*, Salisb.
vaginatum, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 18. — China.

ISOSTIGMA, Less. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1240.

- Vailiana*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 149. — Parag.

ISOTHYLAX, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 877 (gen. vel. sect.?) = *Sphaerothylox*, Bisch. (Podost.).

IRYANTHERA, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) [84]. MYRISTICACEAE.

- Hostmanni*, Warb. l. c. (= *Myristica Hostmanni*, Benth.). — Columb.
macrophylla, Warb. l. c. 85 (= *M. macrophylla*, Benth.). — Bras.

ITEA, Gronov. ex Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 1240.

- ilicifolia*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1538. — China.
parviflora, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 153. — Formosa.
riparia, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 57. — Burma.

ITEILUMA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 892 = *Sideroxylon*, Linn. (Sapot.).ITOASIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 590 = *Corynaea*, Hook. f. (Balanoph.).

- crassa*, Kuntze, l. c. = *C. crassa*, Hook. f.
Purdiei, Kuntze, l. c. = *C. Purdiei*, Hook. f.
sphaerica, Kuntze, l. c. = *C. sphaerica*, Hook. f.
Sprucei, Kuntze, l. c. = *C. Sprucei*, Eichl.

IVESIA, Torr. & Gray = *Potentilla*, Linn. (Rosac.).

- sabulosa*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 680, in syn. = *P. sabulosa*, M. E. Jones.
santolinoides, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 99, sphalm. = *santolinoides*, A. Gray.
Shockleyi, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 263. — Calif.

IXERIS, Cass. = *Lactuca*, Tourn. (Compos.).

- scaposa*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 45. — Sibiria.

IXIA, Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1241.

- angustifolia*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 182 (= *Morphixia angustifolia*, Klatt). — Afr. austr.
brevifolia, Baker, Handb. Irid. (1892) 165. — Afr. austr.
Cooperi, Baker, l. c. 166 (= *Morphixia Cooperi*, Baker). — Afr. austr.
galaxioides, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 184 = *monadelpha*, D. Delar.
grandiflora, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, l. c. 181 (= *Morphixia grandiflora*, Klatt) = *monadelpha*, D. Delar.
nervosa, Baker, Handb. Irid. (1892) 166 (= *Morphixia nervosa*, Baker). — Afr. austr.
purpurea, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 186 (= *Morphixia purpurea*, Klatt) = *monadelpha*, D. Delar.
trichorhiza, Baker, Handb. Irid. (1892) 165 (= *Morphixia trichorhiza*, Baker). — Natal.
Zeyheri, Baker, l. c. 166. — Afr. austr.

IXIOLIRION, Fisch. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1242.

- macranthum*, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 132 = *montanum*, Herb.

IXONANTHES, Jack (Lineae.). — Ind. Kew. i. 1243.

- Hancei*, Pierre, ex Laness, Pl. util. Colon. Franç. (1886) 306. — Cochinch.

IXOPHORUS, Schlecht. = *Setaria*, Beauv. (Gramin.).

- glaucus*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 428 = *S. glauca*, Beauv.
italicus, Nash, l. c. = *S. italica*, Roem. & Schult.
verticillatus, Nash, l. c. 422 = *S. verticillata*, Beauv.
viridis, Nash, l. c. 423 = *S. viridis*, Beauv.

IXORA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1243.

- abyssinica*, *assimilis*, *bidentata*, *Bowkeri*, *brachycalyx*, *canescens*, *Cooperi*, *crebrifolia*, *dolichosepala*, *edentula*,

IXORA: —

- gardneriaefolia*, *Gerrardii*, *glaucescens*, *gracilipes*, *hispida*, *hispidula*, *Hookeriana*, *humilis*, *indica*, *involuta*, *lanceolata*, *littorea*, *longipes*, *macrosepala*, *Mannii*, *mollis*, *monticola*, *natalensis*, *neurocarpa*, *obovata*, *Oliveriana*, *opulina*, *Pseudoamboinica*, *puberula*, *rigida*, *sambucina*, *silvatica*, *stenophylla*, *subcana*, *subcuneata*, *subvelutina*, *triflora*, *Wrightii*, *Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286-87 = *homonyma omnia* Pavettae.
acuminata, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *P. acuminata*, Korth.
arborescens, Boerl. l. c. = *P. arborescens*, Hassk.
attenuata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Webera attenuata*, Hook. f.
baviensis, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 234. — Tonk.
Blumeana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *Pavetta odorata*, Blume.
borbonica, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 507 — Ins. Borbon.
borneensis, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 35 = *Pavetta borneensis*, Mig.
borneensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *praec. Buchholzii*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 340. — Kamerun.
campaniflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Webera campaniflora*, Hook. f.
canarica, Kuntze, l. c. = *W. canarica*, Hook. f.
Candolleana, Kuntze, l. c. 286 = *Pavetta breviflora*, DC.
ciliolata, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *P. ciliolata*, Korth.
ciliolata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *praec. Clerodendron*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 311. — Penins. Mal.
corymbosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *Pavetta caffra*, Linn. f.
debilis, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 234. — Tonk.
floribunda, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *Pavetta floribunda*, Mig.
genipifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *P. Baconia*, Hiern.
Glenii, Kuntze, l. c. = *P. Gleniei*, Thw.
gracilis, Kuntze, l. c. = *P. gracilis*, Rich.
Hiernii, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 82. — Sierra Leone.
hyssophila, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = *P. longituba*, Mig.
incana, Kuntze, l. c. 286 = *P. gracilis*, Klotzsch.
kavalliana, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 388. — Afr. trop. or.
keyensis, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 436. — Oceania.
kinabaluensis, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 178. — Borneo.
Korthalsiana, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *Pavetta Korthalsiana*, Mig.
Korthalsii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *P. oblonga*, Korth.
Kurzii, Kuntze, l. c. 278 = *Webera Kurzii*, Hook. f.
leucoxydon, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *Pavetta leucoxydon*, Mig.
leucoxydon, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = *praec. longituba*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *Pavetta longituba*, Mig.
longituba, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = *praec. lucens*, Kuntze, l. c. (1891) 278 = *Webera lucens*, Hook. f.
macrocoma, Kuntze, l. c. 287 = *W. grandifolia*, Zoll. & Mor.
macroptera, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *Pavetta macroptera*, Mig.
mollissima, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 234, in obs. = *Webera mollissima*, Benth.
mucronata, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 436. — N. Guin.
neglecta, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *Pavetta acuminata*, Korth.
nilagirica, Kuntze, l. c. 378 = *Webera nilagirica*, Hook. f.
nilagirica, Kuntze, l. c. 286 = *Pavetta Brunonis*, Wahl.

IXORA: —

- odorata*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 135 = *Pavetta odorata*, Blume.
ovata, Boerl. l. c. 136 (= *Myonima ovata*, Decne). — Timor.
pachyphylla, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 484. — Madag.
paludosa, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 136 = *Pavetta paludosa*, Blume.
paludosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = praec.
platythyrsa, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 320. — Madag.
polita, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 135 = *Pavetta polita*, Mig.
Reinwardtii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *P. montana*, Reinw.
reticulata, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 135 = *P. reticulata*, Blume.
reticulata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = praec.
Roxburghii, Kuntze, l. c. (1891) 286 = *Pavetta indica*, Linn.
Singalang, Kuntze, l. c. = *P. calycina*, Korth.
siphonantha, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2236. — Madag.
stellulata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Webera stellulata*, Hook. f.
stenophylla, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 311 (= *Pavetta stenophylla*, Korth.). — As. trop.
sumatrana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *Pavetta grandifolia*, Korth.
Teysmanniana, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 135 = *P. Teysmanniana*, Mig.
Wallichii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Webera Wallichii*, Hook. f.
Westi ×, J. Hudson, in *The Garden*, xlii. (1892) 498, t. 886. — Hybr. artef.

IXORHEA, Fenzl, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* (1886) 287. **BORAGINEAE**.
Tschundiana, Fenzl, l. c. 288. — Reg. Argent.

J

JABOROSA, Juss. (Solan.). — Ind. Kew. i. 1244.
araucana, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 17. — Araucania.
bipinnatifida, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 270, et xviii. (1894) 454 (= *Lonchostigma bipinnatifidum*, Phil.). — Chili.

JACARANDA, Juss. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 1245.
macrocarpa, Bureau & K. Schum. ex K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 234. — Reg. Amazon.

JACARATIA, DC. = **Jaracatia**, Marcg. (Passifl.).
digitata, Solms, in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1889) 191 (= *Carica digitata*, Poepp. & Endl.). — Bras., Peruv.
Solmsii, Urb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1898) 158. — Kamerun.

JACKSONAGO, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 191 = **Wiborgia**, Thunb. (Legum.).
cuspidata, *flexuosa*, *fusca*, *obcordata*, *sericea*, *tetraptera*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Wiborgiae.
armata, Kuntze, l. c. = *W. spinescens*, Eckl. & Zeyh.

JACKSONIA, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1425.
Clarkei, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. ii. (Aug. 1887) 193. — Austral.
dodecandra, Macmill. Metasp. Minn. (1892) 270 = *Cleome dodecandra*, Michx.
Forrestii, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. ii. (Aug. 1887) 194. — Austral.
tenuifolia, Greene, Pittonia, ii. (1891) 175 = *Polanisia tenuifolia*, Torr. & Gray.
trachysperma, Greene, l. c. ii. (Sept. 1891) 175 = *P. trachysperma*, Torr. & Gray.
uniglandulosa, Greene, l. c. 174 = *P. uniglandulosa*, DC.

JACOBABEA, Burm. Thes. Zeyl. (1737) 124, t. 55 = **Vicoa**, Cass. (Compos.).
cernua, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 347 = *Vicoa cernua*, Dalz.
divaricata, Kuntze, l. c. = *V. divaricata*, Benth. & Hook. f.
flexuosa, Kuntze, l. c. = *Inula flexuosa* Boiss.
indica, Kuntze, l. c. = *Vicoa auriculata*, Cass.
pulicariaeformis, Kuntze, l. c. = *Inula pulicariaeformis*, DC.
sarana, Kuntze, l. c. = *I. sarana*, Boiss.
vestita, Kuntze, l. c. = *Vicoa vestita*, Benth. & Hook. f.

JACOBABEASTRUM, Mannetti (1751), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) = **Euryops**, Cass. (Compos.).
abrotanifolium, *algoense*, *arabicum*, *Athanasiae*, *calvescens*, *Candollei*, *diversifolium*, *Dregeanum*, *empetridifolium*, *lateriflorum*, *lineare*, *linifolium*, *longipes*, *multifidum*, *oligoglossum*, *pectinatum*, *pinifolium*, *punctatum*, *Serra*, *spatheaceum*, *subcarnosum*, *subsessile*, *sulcatum*, *tenuissimum*, *trifidum*, *trifurcatum*, *trilobum*, *virgineum*, Kuntze, l. c. 347-48 = *homonyma omnia* Euryopsidis.
asparagodes, Kuntze, l. c. 347 = *E. asparagoides*, Less.

JACOBINIA, Moric. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1246.
coccinea, Hiern. in *Kew Bull.* (1893) 268. — Am. trop.
magnifica, Lindau, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 351 (= *Cyrtanthera magnifica*, Nees). — Bras.
Neesiana, Lindau, l. c. (= *Sericographis Sellowiana*, Nees). — Bras.
ovata, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 405. — Mexic.
parabolica, Lindau, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 351 (= *Sericographis parabolica*, Nees). — Bras.
pauciflora, Lindau, l. c. (= *S. pauciflora*, Nees). — Bras.
Pohlana, Lindau, l. c. (= *Cyrtanthera Pohlana*, Nees). — Bras.
Sellowiana, Lindau, l. c. (= *C. Sellowiana*, Nees). — Bras.

JACQUEMONTIA, Choisy (Convolv.). — Ind. Kew. i. 1246.

bifida, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 543 (= *Aniseia Velloziana*, Choisy). — Bras.
cumanensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 441 = *ferruginea*, Choisy.
Curtisii, Peter, ex Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 543. — Florida.
densiflora, Hallier f. l. c. — Am. trop.
euricola, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 47. — Ins. Fernando Noronha.
floribunda, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) (= *Convolvulus floribundus*, H. B. & K.). — Am. austr.
fusca, Hallier f. l. c. (= *Ipomoea fusca*, Meissn.). — Am. trop.
gracillima, Hallier f. l. c. 541 (= *Aniseia gracillima*, Choisy). — Bras.
heterantha, Hallier f. l. c. 543 (= *A. heterantha*, Choisy). — Bras.
luxurians, Hallier f. l. c. (= *Ipomoea luxurians*, Moric.). — Bras.
Maximiliani, Peter, ex Hallier, l. c. nomen. — Bras.
multiflora, Hallier f. l. c. (= *Convolvulus mucronifera*, Choisy pr. p.). — Am. austr.
oaxacana, Hallier f. l. c. — Mexic.
obtusata, Hallier f. l. c. 542, in obs. = *serrata*, Meissn.
ovalifolia, Hallier f. l. c. 542; et xviii. (1894) 96 (= *Ipomoea ovalifolia*, Choisy). — Ins. Sandvic.
Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 63. — Mexic.
paniculata, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 95 (= *Convolvulus parviflorus*, Vahl). — Geront. trop.
paraguayensis, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 172. — Parag.
polyantha, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 543 = *violacea*, Choisy.

JACQUEMONTIA: —

ruderaria, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 543 (= *Convolvulus havanensis*, Jacq.). — Ind. occ.
rufa, Hallier f. l. c. — Bras.
Selloi, Hallier f. l. c. 543 (= *Ipomoea Selloi*, Meissn.). — Bras.
Smithii, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 160. — Mexic.
solanifolia, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 542 (= *Ipomoea solanifolia*, Linn.). — Ind. occ.
spicaeflora, Hallier f. l. c. 543 (= *Ipomoea spicaeflora*, Choisy). — Bras.
thomensis, Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 143. — Ins. S. Thom.
Zollingeri, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 543 (= *Convolvulus Zollingeri*, Choisy). — Ins. Saraja.

JACQUINIA, Linn. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 1247.

smaragdina, Hort. ex Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 331 = *Dehneria smaragdina*, Decne.

JAEGGIA, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 253 = **Modecca**, Lam. (Passifl.).
repanda, Schinz, l. c. = *M. Paschanthus*, Harv.

JAESCHKEA, Kurtz (Gentian.). — Ind. Kew. i. 1246.

canaliculata, Knobl. in *Bot. Centralbl.* ix. (1894) 387 = *latisejala*, C. B. Clarke.
oligosperma, Knobl. l. c. = *gentianoides*, Kurtz.

JAGERA, Blume (Sapind.). — Ind. Kew. i. 1247.
latifolia, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench.* xx. (1890) 264. — N. Guin.

JALISCOA, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 153; O. Hoffm. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 388. **COMPOSITAE**.
Pringlei, S. Wats. l. c. — Mexic.

JAMBOLIFERA, Linn. = **Acronychia**, Forst. (Rutac.).

acidula, *arborescens*, *Baueri*, *Endlicheri*, *heterophylla*, *imperfata*, *laevis*, *petiolaris*, *Porteri*, *retusa*, *Richii*, *terandra*, *trifoliata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 102 = *homonyma omnia* Acronychiae.
melicopodes, Kuntze, l. c. = *A. melicopodes*, F. Muell.

JAMBOSA, DC. = **Eugenia**, Mich. (Myrt.).
baladensis, Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 84 (= *Caryophyllus baladensis*, Brongn. & Gris). — N. Caled.
Caryophyllus, Niedenzu, l. c. 85 (= *Caryophyllus aromaticus*, Linn.). — E. caryophyllata, Thunb.
elegans, Niedenzu, l. c. 84 (= *C. elegans*, Brongn. & Gris). — N. Caled.
myrtifolia, Niedenzu, l. c. = *myrtifolia*, Sims
neurocalyx, Niedenzu, l. c. = *neurocalyx*, A. Gray.
nutans, Niedenzu, l. c. = *E. nutans*, K. Schum.
pterocarpa, Niedenzu, l. c. 85 (= *Caryophyllus pterocarpus*, Vieill.). — N. Caled.
Schumanniana, Niedenzu, l. c. (= *E. neurocalyx*, K. Schum.). — N. Guin.

JAMESBRITTENIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 46 = **Sutera**, Roth (Scrophul.).
dissecta, Kuntze, l. c. = *S. glandulosa*, Roth.

JANUSIA, A. Juss. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 1249.

Barbeyi, Chod. in *Arch. scienc. phys. et nat.* (1890), ex Chod. in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. 2 n. 3 (1893) 19. — Parag.

JAPARANDIBA, Adans. = **Gustavia**, Linn. (Myrtac.).

angustifolia, *angusta*, *brasiliiana*, *dubia*, *fastuosa*, *longifolia*, *Pocchigiana*, *pubescens*, *Ruiziana*, *speciosa*, *superba*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 240 = *homonyma omnia* Gustaviae.
antillana, Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1892) 37 = *G. antillana*, Miers.
gracillima, Niedenzu, l. c. = *G. gracillima*, Miers.

JAPARANDIBA : —

- hexapetala*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 240 = *Gustavia fastuosa*, Willd.
latifolia, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii, 7 (1892) 37 = *G. latifolia*, Miers.
Marcgraviiana, Niedenzu, l. c. = *G. Marcgraviiana*, Miers.
pterocarpa, Niedenzu, l. c. = *G. pterocarpa*, Miers.

JARDINEA, Steud. = **Thelepogon**, Roth (Gramin.).
congoënsis, Franch. ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 377, in syn. = *Rhytachne congoënsis*, Hack.

JASIONE, Linn. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 1249.
adpressifolia, Pau, Not. bot. Fl. Espan. i. (1887) 19; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 126. — Hisp.
appressifolia, Pau, l. c. = *montana*, Linn.
Espadanae, Pau, l. c. = *montana*, Linn.
propullulans, Freyn, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien xxxviii. (1888) 618 = *supina*, Sieb.

JASMINONERIUM, Linn. Fl. Zeyl. (1747) 191, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 414 = **Carissa**, Linn. (Apocyn.).
acuminatum, *africanum*, *Carandas*, *cryptophlebium*, *densiflorum*, *edule*, *erythrocarpum*, *ferox*, *grandiflorum*, *haematocarpum*, *macrocarpum*, *madagascariense*, *oblongifolium*, *ovatum*, *pubescens*, *sechellense*, *suavisimum*, *tomentosum*, *xylopicron*, Kuntze, l. c. 414 = *homonyma omnia* Carissae.
bispinosum, Kuntze, l. c. = *C. Arduina*, Lam.
dulce, Kuntze, l. c. = *C. edulis*, Vahl.
grandifolium, Kuntze, l. c. = *C. grandiflora*, A. DC.
inermis, Kuntze, l. c. = *C. macrophylla*, Wahl.
latiflorum, Kuntze, l. c. = *C. laxiflora*, Benth.
sulcinum, Kuntze, l. c. = *C. spinarum*, Linn.?

JASMINUM, [Tourn.] Linn. (Oleac.). — Ind. Kew. i. 1249.
Afu, Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 308. — Afr. trop. or.
angolense, Baker, in Kew Bull. (1895) 95. — Angola.
asphanodon, Baker, l. c. (1893) 13. — Madag.
Bakeri, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 86. — Sierra-Leone.
bogosense, Becc. ex Martelli, Fl. Bogos. (1886) 51. — Abyss.
brachycyphum, Baker, in Kew Bull. (1895) 93. — Zambes.
brevipes, Baker, l. c. — Angola.
bukobense, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 308. — Afr. trop. or.
coeruleum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 410. — Ins. S. Thom.
discolor, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 59. — China.
elegans, Knobl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 534. — Ins. Nossibe.
Eminii, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 309. — Afr. trop. or.
Engleri, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 46. — Afr. trop. or.
Hildebrandtii, Knobl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 538. — Afr. trop. or.
Holstii, Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 63; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 309. — Afr. trop. or.
inornatum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890 ou 1889) 78. — China.
italicum, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 146 = *humile*, Linn.
Kirkii, Baker, in Kew Bull. (1895) 94. — Zambes.
longipes, Baker, l. c. — Angola.
megalosiphon, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 309. — Afr. trop. or.
Meyeri Johannis, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 334. — Afr. trop. or.
microphyllum, Baker, in Kew Bull. (1895) 93. — Angola.

JASMINUM: —

niloticum, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 309. — Afr. trop. or.
nummularifolium, Baker, in Kew Bull. (1895) 100. — Madag.
obovatum, Baker, l. c. 94. — Angola.
obtusifolium, Baker, l. c. 93. — Afr. trop. occ.
octocuspe, Baker, l. c. 110? — Madag.
oleacearpum, Baker, l. c. 95. — Zambes.
pachyphyllum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 79. — China.
parvifolium, Knobl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 534. — Ins. Nossibe.
Preussii, Knobl. l. c. 536. — Kamerun
primulinum, Hemsl. ex Baker, in Kew Bull. (1895) 109; et ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2384. — China.
rambayense, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 410. — Java.
Schroeterianum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 256. — Afr. austro-occ. extratrop.
sinense, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 80. — China.
singuliflorum, F. M. Bailey & F. Muell. ex F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. i. (1886) 38. — Austral.
Smithii, Baker, in Kew Bull. (1895) 93. — Afr. trop.
somaliense, Baker, l. c. 218. — Reg. Somal.
stenodon, Baker, l. c. 94. — Angola.
Stuedneri, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1891) 334, in obs. = *floribundum*, R. Br.
tenuifolium, Baker, in Kew Bull. (1895) 95. — Afr. trop.
ternum, Knobl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 535. — Angola Loango.
tomentosum, Knobl. l. c. 536. — Zanzib.
triumphans, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 148 = *revolutum*, Linn.
urophyllum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 81. — China.
Walleri, Baker, in Kew Bull. (1895) 93. — Zambes.
Welwitschii, Baker, l. c. 94. — Angola.

JASONIA, Cass (Compos.). — Ind. Kew. i. 1251.
camphorata, Rony, pl. Europ. rarior. iv. (1895) 12 t. 35. — Ins. Lamped. et Melit.

JATROPHA, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1251.
acerifolia, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 109. — Afr. trop. or.
angustidens, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 172 [an *J. angustidens*, Muell. Arg. ?]. — Calif.
asplenifolia, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 108. — Reg. Somal.
carpinifolia, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 240. — Afr. trop. or.
heterophylla, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 382. — Deccan.
Hildebrandtii, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 108. — Afr. trop. or.
melanosperma, Pax, l. c. 110. — Afr. trop.
palmatifida, Baker, in Kew Bull. (1895) 227. — Reg. Somal.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 76. — Mexic.
prunifolia, Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 14; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 240. — Afr. trop. or.
Schweinfurthii, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 110. — Afr. trop. centr.
spicata, Pax, l. c. 109. — Afr. trop. or.
Stuhlmannii, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 240. — Afr. trop. or.
tuberosa, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 111. — Afr. trop.

JATUS, Rumpf. Herb. Amboin. iii. (1743) 34. t. 18; Kuntze, Rev. Gen. (1891) 508 = **Tectona**, Linn. f. (Verben.).
grandis, Kuntze, l. c. = *T. grandis*, Linn. f.
Hamiltonianus, Kuntze, l. c. = *T. Hamiltoniana*, Wall.
philippinensis, Kuntze, l. c. = *T. philippinensis*, Benth. & Hook. f.

JAUMEA, Pers. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1252.
altissima, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 425. — Angola.
angolensis, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 178. — Angola.
Oliveri, Vathe, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 348. — Hab. ?
tenuifolia, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.

JAUNDEA, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 388, in add. CONNARACEAE.
Zenkeri, Gilg, l. c. — Kamerun.

JODANTHUS *pinnatifidus*, Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 183 = *Iodanthus pinnatifidus*, Steud.

JOHRENIA, DC. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 1253.
Pichleri, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 266. — Thracia.
platypoda, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 71. — Afghan.
Porteri, Post, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 266; et in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 431. — As. occ.
Westii, Post, Pl. Postianae iii. (1892) 9. — Syria.

JOLLYA, Pierre, ex Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 298, nomen = **Achradotypus**, Baill. (Sapot.).

JONORCHIS, G. Beck. Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 215 = **Limodorum**, Sw. (Orchid.).
abortiva, G. Beck, l. c. = *L. abortivum*, Sw.

JONTHLASPI, Siegesb = **Clypeola**, Linn. (Cru- cif.).
ciliatum, *cyclodonteum*, *dichotomum*, *echinatum*, *elegans*, *hispidum*, *lappaceum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 34 = *homonyma omnia* Clypeolatis.
lanuginosum, Kuntze, l. c. = *C. eriocarpa*, Cav.
microcarpum, Caruel, in Parl. Fl. Ital. ix. (1893) 1051 = *C. microcarpa*, Moris.
monospermum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 34 = *C. Jonthlaspi*, Linn.

JOSEPHIA, Salisb. = **Dryandra**, R. Br. (Pro- teac.).
Arctotidis, *armata*, *Baxteri*, *bipinnatifida*, *calophylla*, *carduacea*, *comosa*, *concinna*, *conferta*, *cuneata*, *falcata*, *foliolata*, *formosa*, *Fraseri*, *Hewardiana*, *horrida*, *Kippistiana*, *longifolia*, *mucronulata*, *nana*, *nivea*, *nobilis*, *obtusata*, *patens*, *plumosa*, *polycephala*, *praemorsa*, *Preissii*, *pteridifolia*, *pulchella*, *quercifolia*, *runcinata*, *sclerophylla*, *Serra*, *Shuttleworthiana*, *speciosa*, *squarrosa*, *tenuifolia*, *tridentata*, *vestita*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 578 = *homonyma omnia* Dryandrae.
carlinodes, Kuntze, l. c. = *D. carlinoides*, Meissn.
cirsioides, Kuntze, l. c. = *D. cirsioides*, Meissn.
proteodes, Kuntze, l. c. = *D. proteoides*, Lindl.
seneciniifolia, Kuntze, l. c. = *D. seneciifolia*, R. Br.
serratulodes, Kuntze, l. c. = *D. serratuloides*, Meissn.
stuppea, Kuntze, l. c. = *D. stuposa*, Lindl.

JOZOSTE, Nees = **Actinodaphne**, Nees (Laurin.).
angustifolia, *areolata*, *borneensis*, *campanulata*, *cochin- chinensis*, *concolor*, *confertiflora*, *corymbosa*, *elegans*, *furfuracea*, *glabra*, *glauca*, *glomerata*, *gracilis*, *heterophylla*, *hirsuta*, *Hookeri*, *lanata*, *leiantha*, *macrophylla*, *macroptera*, *Maingayi*, *malaccensis*, *mollis*, *moluccana*, *molochina*, *multiflora*, *obovata*, *pauciflora*, *procera*, *pruinosa*, *pubescens*, *quercina*, *reticulata*, *rufescens*, *Rumphii*, *salicina*, *scleroptera*, *sesquipedalis*, *Sieboldiana*, *sikhimensis*, *speciosa*, *sphaerocarpa*, *stnophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 569-70 = *homonyma omnia* generis Actinodaphnes.
heterophylla, Kuntze, l. c. = *A. angustifolia*, Nees.
longifolia, Kuntze, l. c. = *A. madraspatana*, Bedd.
Monii, Kuntze, l. c. = *A. molochina*, Nees.
Wightiana, Kuntze, l. c. = *A. hirsuta*, Hook. f.

JOSSINIA, Comm. = **Eugenia**, Linn. (Myrt.).
tinifolia, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1895)
 t. 339. — Madag.

JUANULLOA, Ruiz & Pav. (Solan.). — Ind.
 Kew. i. 1254.
membranacea, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv.
 (1894) 233. — Bolivia.
pedunculata, Rusby, l. c. 234. — Bolivia.
 Sargii, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz, xviii.
 (1893) 5, t. 1. — Guatem.

JUBAEA, H. B. & K. (Palm.). — Ind. Kew. i.
 1254.
chilensis, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 397 =
spectabilis, H. B. & K.

JUGLANS, Linn. (Jugland.). — Ind. Kew. i.
 1256.
alata, Carr. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii.
 (1892) 319 = *intermedia*, Dippel.
asplenifolia, Hort. ex Dippel, l. c. 318 et 582 =
regia, Linn.
dissecta, Hort. ex Dippel, l. c. = *regia*, Linn.
fertilis, Hort. ex Dippel, l. c. = *regia*, Linn.
frutescens, Hort. ex Dippel, l. c. 318 = *regia*,
 Linn.
fruticosa, Hort. ex Dippel, l. c. 318 et 582, ad calc.
 = *regia*, Linn.
intermedia ×, Dippel, l. c. 318. — Form. hort.
mexicana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891)
 152. — Mexic.
ovalis, Wangenh. Beitr. deutsch. Holz. Forstw.
 (1887) 24; ex Dippel, Handb. Laubholz. ii.
 (1892) 335 = *Carya ovata*, C. Koch.
prametiensis, Hort. ex Dippel, l. c. 582 = *regia*,
 Linn.
prachartwienensis, Hort. ex Dippel, l. c. 318 = *praec*
salicifolia, Hort. ex Dippel, l. c. = *regia*, Linn.
Vilmoriniana ×, Hort. Lavallée, ex Vilm. in Gard.
 and For. iv. (1891) 51; et ex Dippel, l. c. =
intermedia, Dippel

JULOCROTON, Mart. (Euphorb.). — Ind. Kew.
 i. 1255.
Brittonianum, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.
 vii. (1893) 222. — Parag.

JUNCCELLUS, Kunth (Cyper.). — Ind. Kew. i.
 1256.
alopecuroides, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit.
 Ind. vi. (1893) 595; et in Th. Dur. & Schinz,
 Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 543 (= *Cyperus*
alopecuroides, Rottb.). — Geront. trop.
laevigatus, C. B. Clarke, l. c. 596; et 549 (= *C.*
laevigatus, Linn.). — Amphig. trop.
inundatus, C. B. Clarke, l. c. 595; et 544 (= *C.*
inundatus, Roxb.). — Bengal, China.
pustulatus, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz,
 Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 546 (= *C. pustula*
tus, Vahl). — Afr. trop.
pygmaeus, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.
 vi. (1893) 596; et l. c. 546 (= *C. pygmaeus*, Rottb.).
 — Amphig. trop.
serotinus, C. B. Clarke, l. c. 594 (= *C. serotinus*,
 Rottb.). — Eur. mer., As. mer. or.

JUNCODES, Moehr. Hort. Priv. (1736) 55; Kuntze,
 Rev. Gen. (1891) 722 = **Luzula**, DC. (Juncac.).
Alopecurus, *antarcticum*, *arcuatum*, *bolivienne*, *caespito*
sum, *campestre*, *canariense*, *caricinum*, *Carolinae*,
elegans, *exclsum*, *Forsteri*, *Hieronymi*, *japonicum*,
Johnstonii, *lacteum*, *luteum*, *macusaniense*, *niveum*,
pedemontanum, *peruvianum*, *plumosum*, *purpureum*,
racemosum, *rufescens*, *spadiceum*, *spicatum*, Kuntze,
 l. c. 724-25 = *homonyma omnia* Luzulae.
chilense, Kuntze, l. c. 724 = *L. campestris*, DC.
Leiboldii, Kuntze, l. c. = *L. Leiboldii*, Buchen.
luzulinum, Kuntze, l. c. = *L. Hostii*, Desv.
memorosum, Kuntze, l. c. = *L. albida*, DC.
nodulosum, Kuntze, l. c. = *L. graeca*, Kunth.
nutans, Kuntze, l. c. = *L. pediformis*, DC.
pilosum, Kuntze, l. c. = *L. vernalis*, DC.
Seuberti, Kuntze, l. c. = *L. elegans*, Guthnick.
silvaticum, Kuntze, l. c. = *L. maxima*, DC.

JUNCOIDES, [Dill.] Adans. = **Luzula**, DC.
 (Junc.).
comosum, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894)
 64 = *L. comosa*, E. Mey.
divaricatum, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb.
 iv. (1893) 209; Sheld. l. c. 65 = *L. parviflora*,
 Desv.
giganteum, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894)
 62 = *L. gigantea*, Desv.
glabratum, Sheld. l. c. 63 = *L. glabrata*, Desv.
hyperboreum, Sheld. l. c.; Coville, in Mem. Torrey
 Bot. Club, v. (1894) 107 = *L. hyperborea*, R. Br.
nivale, Coville, l. c. 108 = *L. nivalis*, Laest.
parviflorum, Coville, Contrib. U. S. Nat. Herb. iv.
 (1893) 209; Sheld. l. c. 63 = *L. parviflora*,
 Desv.

JUNCUS, [Tourn.] Linn. (Junc.). — Ind. Kew. i.
 1255.
allioides, Franch. in Nouv. Mus. Paris, Sci. II. x.
 (1887-88) 99; Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)
 399. — Tibet.
Balansae, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887)
 397, in obs. = *punctorius*, Linn. f.
beringensis, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)
 226. — Kamtschatka, Japon.
brachyanthus, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.
 [Monoc.] (1895) 84 = *J. Fontanesii*, J. Gay.
brachycephalus, Buchenau, l. c. 268 = *canadensis*,
 J. Gay.
caesariensis, Coville, in Mem. Torrey Bot. Club, v.
 (1894) 106 = *asper*, Engelm.
carpathicus, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886)
 183 = *alpinus*, Vill.
Clauseris, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.
 [Monoc.] (1895) 84 = *lampocarpus*,
 Ehrh.
Congdoni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887)
 480. — Calif.
crassifolius, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)
 326 = *scirpoides*, Lam.
diastrophanthus, Buchenau, l. c. 309. — Japon.
fallax, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.]
 (1895) 86. — Algeria.
Fockei, Buchenau, in Bot. Jahrb. ii. (1890) 358. —
 N. Holl.
georgianus, Coville, ex Small, in Bull. Torrey Bot.
 Club, xxii. (1895) 44. — Georgia.
glandulosus, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix.
 (1887) 320. — Ins. Balear.
gymnocarpus, Coville, in Mem. Torrey Bot. Club,
 v. (1894) 106 = *J. Smithii*, Engelm.
khasiensis, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 407.
 — Ind. or.
luxurians, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886
 (1887) 269; Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)
 232. — N. Zel.
luzuliformis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris,
 Sér. II. x. (1887-88) 99; Buchenau, l. c. 204. —
 Tibet.
macranthus, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)
 398. — China bor.
mauritanicus, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv.
 (1887) 395 = *punctorius*, Linn. f.
Maximowiczii, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)
 394. — Japon.
modestus, Buchenau, l. c. 203. — China bor.
nematocaulon, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892)
 400; et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2234. —
 Assam.
oreganus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888)
 267; Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 366. —
 Oregon.
paucicapitatus, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)
 307. — Sitcha.
polyanthemus, Buchenau, l. c. xxi. (1895) 261. —
 Austral.
Potanini, Buchenau, l. c. xii. (1890) 394. — China
 bor.
Przewalskii, Buchenau, l. c. 401. — China occ.
Regelii, Buchenau, l. c. 414. — Am. bor. occ.
scalovicus ×, Aschers. & Graebner, in Ber. deutsch
 bot. Gesells. xi. (1893) 524. — Germ.
sikkimensis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 400;
 et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2235. — Reg.
 Himal.

JUNCUS: —
stylosus, C. B. Clarke, Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 595.
 Khasia.
tenageius, S. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii.
 (1889) 443 = *tenageius*, Dulac.
Torreyi, Coville, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii.
 (1895) 303. — Nebraska.
uncialis, Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 105. —
 Calif.
validus, Coville, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895)
 305. — Am. bor.

JUNIPERUS, Tourn. ex Linn. (Conif.). — Ind.
 Kew. i. 1260.
Jacobi, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891)
 120 = *chinensis*, Linn.
Kanitzii ×, Csato, in Magyar Növényt. Lapok,
 x. (1886) 145. — Austria.
Myurus, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz.
 (1891) 117 = *phoenicea*, Linn.
nutans, Hort. ex Beissn. l. c. 125 = *virginiana*,
 Linn.
oblongo-pendula, Loud. ex Beissn. l. c. 137 = *com*
munis, Linn.
polymorpha, Hort. ex Beissn. l. c. 125 = *virginiana*,
 Linn.
Shepherdii, Hort. ex Beissn. l. c. 122 = *sphaerica*,
 Lindl.
Smithipendula, Hort. ex Beissn. l. c. 125 = *virgi*
niana, Linn.
tripartita, Hort. ex Beissn. l. c. 126 = *virginiana*,
 Linn.
walensis, Hort. ex Beissn. l. c. 138 = *communis*,
 Linn.
utahensis, « Engelm. » ex Beissn. l. c. = *occiden*
tal, Hook.
utahensis, Lemmon, in Rep. Calif. Stat. Board.
 For. 183 = *californica*, Carr, var.

JURIGHAS, Linn. (1747) ex Kuntze, Rev. Gen.
 (1891) 144 = **Filicium**, Thw. (Burser.).
decipiens, Kuntze, l. c. = *F. decipiens*,

JURINEA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i.
 1261.
aggregata, Freyn & Sint, ex Freyn, in Bull. Herb.
 Boiss. iii. (1895) 471. — Armen.
ancistrophylla, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 310. —
 Afghan.
Antunowi, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889)
 145, t. 3 fig. 4. — Turkest.
baldschuanica, C. Winkl. l. c. xi. (1890) 283. —
 Turkest.
bucharica, C. Winkl. l. c. ix. (1886) 525. —
 Buchara.
bipinnatifida, C. Winkl. l. c. xi. (1890) 322. —
 Buchara.
cartaliniana, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 311. —
 Reg. Cauc.
coronopifolia, Sommier & Levier, in Act. Hort.
 Petrop. xiii. (1893) 48. — Reg. Cauc.
cypria, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 311. — Ins.
 Cypr.
derderioides, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix.
 (1886) 525. — Turkest.
dolomiaea, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 311, in obs.
 (= *J. macrocephala*, Benth.). — Ind. or.
edulis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894)
 337 (= *Saussurea edulis*, Franch.). — China
 occ.
Levieri, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 257;
 et Prodr. Fl. Colch. (1895) 145. — Reg. Cauc.
maxima, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890)
 336. — Turkest.
mollis, Wettst. in Sitzb. Akad. Wiss. Wien, xcvi.
 (1889) 575. — As. centr.
monocephala, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc.
 Ser. II. iii. (1886) 80. — Persia.
nivea, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890)
 321. — Turkest.
pontica, Hausskn. & Freyn, ex Hausskn. in Mitth.
 Bot. Ver. Jena, (1891) 18. — Pontus.
pumila, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 243
 t. 9; et ex Sommier & Levier, in Act. Hort. Petrop.
 xiii. (1893) 46. — Reg. Cauc.

JURINEA: —

- Souliei, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 337. — China occ.
transsilvanica, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 344 = *mollis*, Reichb.
variabilis, Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1893) 80 t. 34. — Reg. Afghan.

JUSSIAEA, Hill = **Jussieuia**, Linn. (Onagrar.). — Ind. Kew. i. 1262.

Lagunae, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 111. — Parag.

JUSTAGO, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 39 = **Gynandropsis**, DC. (Capparid.).

cleomoides, Kuntze, l. c. (= *Roeperia cleomoides*, F. Muell.) = *G. Muelleri*, Benth.

JUSTICIA, Houst. ex Linn. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1263.

- acuminata*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 351 (= *Rhytiglossa acuminata*, Nees). — Venez.
aequilabris, Lindau, l. c. 350 (= *Amphiscopia aequilabris*, Nees). — Bras.
aethiopica, Martelli, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xx. (1888) 393. — Afr. trop.
amazonica, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rhytiglossa amazonica*, Nees). — Bras.
Anagallis, Lindau, l. c. 351 (= *Dianthera Anagallis*, Hemsl.). — Mexic.
androsaemifolia, Lindau, l. c. 350 (= *Dianthera androsaemifolia*, Griseb.). — Ins. S. Doming.
anfractuosa, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 54. — Ind. or.
angustata, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 423. — Oceania.
angustifolia, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Dianthera angustifolia*, Benth. & Hook. f.). — Bras.
arenicola, Engl. Bot. *Jahrb.* x. (1889) 264. — Afr. austro-occ. extratrop.
arida, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 38. — Madag.
Bailloni, S. Elliot, l. c. — Madag.
Bakeri, S. Elliot, l. c. 39. — Madag.
beloperonoides, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 127. — Afr. trop. or.
Beyrichii, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Amphiscopia Beyrichii*, Nees). — Bras.
Buettneri, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 68. — Guin.
campestris, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Dianthera campestris*, Benth. & Hook. f.). — Bras.
cardiochlamys, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 6. — N. Guin.
catharinensis, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 485. — Bras.
cayennensis, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Dianthera cayennensis*, Griseb.). — Guiana.
caudata, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 405. — Mexic.
Chalmersi, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 6. — N. Guin.
cydoniifolia, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Adhatoda cydoniifolia*, Nees). — Bras.
dasyclados, Lindau, l. c. (= *Dianthera dasyclados*, Benth. & Hook. f.). — Bras.
delicatula, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 39. — Madag.
desertorum, Engl. Bot. *Jahrb.* x. (1889) 263. — Afr. austro-occ. extratrop.
diclipteroides, Lindau, l. c. xx (1894) 65. — Afr. trop. or.
diosmophylla, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 349 (= *Adhatoda diosmophylla*, Nees). — Afr. austr.
distorta, Lindau, l. c. 350 (= *Dianthera distorta*, Benth. & Hook. f.). — Bras.

JUSTICIA: —

- dumetorum*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 193. — Parag.
Emini, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 68. — Afr. trop. or.
Engleriana, Lindau, l. c. 62. — Afr. trop. or.
fallax, Lindau, l. c. 74. — Guin.
filifolia, Lindau, l. c. 70. — Afr. trop. or.
Fischeri, Lindau, l. c. 65. — Afr. trop. or.
fruticulosa, Lindau, l. c. 75. — Afr. centr. bor.
Garckeana, Buettn. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 38. — Congo merid.
genistifolia, Engl. Bot. *Jahrb.* x. (1889) 264. — Afr. austro-occ. extratrop.
Glaziovii, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 483. — Bras.
Gregorii, S. Moore, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 138. — Afr. trop. or.
Guerkeana, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 201. — Afr. austro-occ. extratrop.
hantamensis, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 66. — Afr. austro-occ.
hereroensis, Engl. l. c. x. (1889) 264. — Afr. austro-occ. extratrop.
heterophylla, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Dianthera heterophylla*, Benth. & Hook. f.). — Bras.
hilaris, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 40. — Madag.
Hoepfneri, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 66. — Angola
Hyssopus, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rhytiglossa Hyssopus*, Nees). — Mexic.
insolita, T. S. Brandeg, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 195. — Calif.
Karschiana, Buettn. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 40. — Angola.
Kuntzei, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 483. — Bolivia.
laevilinguis, Lindau, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 243; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rhytiglossa laevilinguis*, Nees). — Bras.
latiflora, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 245. — China.
leikipiensis, S. Moore, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 137. — Afr. trop. or.
leptocarpa, Lindau, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 39; et in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 70. — Afr. trop. or.
leptostachya, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 245. — China.
leucodermis, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 202. — Afr. austro-occ. extratrop.
linearis, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 161. — Mexic.
longecalcarata, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 73. — Afr. trop. or.
Lorentziana, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 48 (1894) 20 = *campestris*, Griseb.
lucida, Lindau, l. c. 20 (= *Leptostachya lucida*, Nees). — Bras.
Lushnatii, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350. — Bras.
madagascariensis, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 64. — Madag.
malangana, Lindau, l. c. 71. — Angola.
marginata, Lindau, l. c. 73. — Angola.
Martiana, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Amphiscopia Martiana*, Nees). — Bras.
matammensis, Lindau, l. c. 349 (= *Adhatoda matammensis*, Schweinf.). — Afr. trop.
Melampyrum, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1894) 32. — Afr. trop.
Meyeniana, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Beloperone Meyeniana*, Nees). — Bras.
microphylla, Lindau, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 373 (= *Adhatoda microphylla*, Klotzsch). — Afr. trop.
mossambicensis, Lindau, l. c. (= *Dicliptera mossambicensis*, Klotzsch). — Afr. trop.
namaensis, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 202. — Afr. austro-occ. extratrop.

JUSTICIA: —

- nana*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rhytiglossa nana*, Nees). — Mexic.
neurantha, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 107. — Burma.
nyassana, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 66. — Afr. trop. or.
pilosa, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Adhatoda pilosa*, Nees). — Bras.
oblonga, Lindau, l. c. (= *Dianthera oblonga*, Benth. & Hook. f.). — N. Granat.
obtusa, Lindau, l. c. 349 (= *Rostellularia obtusa*, Nees). — As. trop.
obtusifolia, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 20 (= *Rhytiglossa obtusifolia*, Nees). — Am. bor.
Palmeri, N. E. Rose, ex Vasey & N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 75. — Mexic.
parviflora, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Dianthera parviflora*, A. Gray). — Am. bor.
Paxiana, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 63. — Afr. trop. occ.
Poeppigiana, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 48 (1894) 20 (= *Leptostachya Poeppigiana*, Nees). — Peruvia.
Poggei, Lindau, l. c. xx. (1894) 61. — Congo.
polymorpha, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 203. — Afr. austro-occ. extratrop.
Pringlei, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 173. — Mexic.
Pseudorungia, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 63. — Afr. trop. or.
pygmaea, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 484. — Bras.
repens, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 351 (= *Rhytiglossa repens*, Nees). — Bras.
riojana, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 19. — Reg. Argent.
Rostellaria, Lindau, l. c. xx. (1894) 74, in obs; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 373. — Afr. trop. or.
rostellarioides, Lindau, l. c. 69. — Afr. trop. occ.
Ruiziana, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rhytiglossa Ruiziana*, Nees). — Peruvia.
Rusbyana, Lindau, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 243. — Bolivia.
sansibarensis, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 71. — Zanzibar.
sarmentosa, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 351 (= *Rhytiglossa sarmentosa*, Nees). — Bras.
Schenkiana, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 485. — Bras.
Schwackeana, Lindau, l. c. 482. — Bras.
sexsulcata, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 67. — Afr. trop. occ.
sisparensis, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rungia sisparensis*, T. Anders.). — Ind. or.
speciosa, Lindau, l. c. (= *Dianthera speciosa*, Benth. & Hook. f.). — N. Granat.
Steingroeveri, Schinz, ex Lindau, l. c. 349. — Afr. austro-occ. extratrop.
strobilacea, Lindau, l. c. 350 (= *Amphiscopia strobilacea*, Nees). — Bras.
suaveolens, Lindau, l. c. 349 (= *Adhatoda suaveolens*, Nees). — Arabia.
symphyantha, Lindau, l. c. 350 (= *Rhytiglossa symphyantha*, Nees). — Bras.
thomensis, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 126. — Ins. S. Thom.
togoensis, Lindau, l. c. xx. (1894) 72. — Afr. trop. occ.
ukambensis, Lindau, l. c. 69. — Afr. trop. or.
ulugurica, Lindau, l. c. xxii. (1895) 126. — Afr. trop. or.
umbrosa, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 48 (1894) 20 = *Adhatoda umbrosa*, Nees.
Urbaniana, Lindau, l. c. xx. (1894) 64. — Afr. trop. or.

JUSTICIA: —

- vagans, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 107. — Burma.
 variegata *Martelli, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xx. (1888) 393 (= *Adhatoda variegata*, Nees). — Afr. trop.
 velascana, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 484. — Bolivia.
 Whytei, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 32. — Afr. trop.

K**KADSURA**, Kaempf. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 1.

- Championi, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 4. — Hongkong.
 chinensis, *C. B. Clarke, l. c.* — Hongkong.
 lanceolata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 376; *et in Ann. Gard. Calc.* iii. (1891) 223 t. 73b. — Malaya.
 Wattii, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 4. — Reg. Himal.

KADUA, Cham. et Schlecht. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1.

- foliosa, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 164. — Ins. Sandvic.
 formosa, *Hillebr. l. c.* 165. — Ins. Sandvic.
 Knudsenii, *Hillebr. l. c.* 162. — Ins. Sandvic.
 littoralis, *Hillebr. l. c.* 166. — Ins. Sandvic.
 Remyi, *Hillebr. l. c.* 162. — Ins. Sandvic.

KAEMPFERIA, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1.

- aethiopica, *Solms, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45. — Afr. trop.
 Andersoni, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 221. — Burma.
 atrovirens, *N. E. Br. in Illustr. Hort.* xxxiii. (1886) 143 t. 610. — Borneo.
 brachystemon, *K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 30; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 169. — Afr. trop. or.
 concinna, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 221. — Perak.
 involucrata, *King, ex Baker, l. c.* — Reg. Himal.
 Kirkii, *Wittm. & Perring, in Gartenfl.* xlii. (1893) 57 t. 1364 = *Cienkowskyia Kirkii, Hook. f.*
 parvula, *King, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 223. — Penins. Mal.
 pleiantha, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 425. — Congo, Angola.
 Prainiana, *King, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 220. — Penins. Mal.
 sikkimensis, *King, ex Baker, l. c.* 223. — Reg. Himal.
 siphonantha, *King, ex Baker, l. c.* 222. — Ins. Andam.
 speciosa, *Baker, l. c.* 220. — Burma.

KAERNBACHIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = **Microsemma**, Labill. (Ternstrem.).

- salicifolia, *Kuntze, l. c.* = *M. salicifolia, Labill.*

KALAHARIA, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 110;

- Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 172. **VERBENACEAE.**
 spinescens, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 340 = *Cyclonema spinescens, Oliver.*
 spinipes, *Baill. Hist. des pl. xi.* (1892) 111 = *Clerodendron spinescens, Guerke.*

KALANCHOË, Adans. (Crassul.). — Ind. Kew. ii. 2.

- brachycalyx, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 470. — Madag.
 bracteata, *S. Elliot, l. c.* xxix. (1891) 15. — Madag.
 brevicaulis, *Baker, l. c.* xxii. (1887) 470. — Madag.
 carnea, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1886) i. 298; *et* (1887) i. 211 fig. 48 (*Calanchoe*). — Afr. austr.

KALANCHOË: —

- Cassiopeja, *Dammann, in Monatssch. f. Kakteenk.* iii. (1893) 150. — Hab. ?
 deficiens, *Aschers. & Schweinf. Illustr. fl. Égypte,* (1887) 79 (*Calanchoe*) = *aegyptiaca, DC.*
 gomphophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 471. — Madag.
 Grandidieri, *Baill. Hist. pl. Madag. Atlas* (1888) t. 57. — Madag.
 Holstii, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 38; *et Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 189. — Afr. or.
 integra, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 229 = *crenata, Haw. ?*
 integrifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 471. — Madag.
 lateritia, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 19; *et Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 189. — Afr. or.
 laxiflora, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 472. — Madag.
 marmorata, *Baker, in Gard. Chron.* (1892) ii. 300; *et in Bot. Mag.* (1894) t. 7333 (= *K. grandiflora, A. Rich.*). — Abyss.
 multiflora, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 173. — Afr. austro-occ. extratrop.
 ndorensis, *Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 232 nomen; *et in Hochnel, Zum Rudolph See, Append.* (1892) 13 [*Calanchoe*]. — Afr. trop. or.
 Nyikae, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 38; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 189. — Afr. or.
 obtusa, *l. c.* 29 *et* 189. — Afr. or.
 pilosa, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 289. — Afr. centr. austro-or.
 pubescens, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 470. — Madag.
 rosea, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 21. — Kohima.
 Schweinfurthii, *Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 341. — Erithrea.
 somaliensis, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 214. — Reg. Somal.
 streptantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 472. — Madag.
 Stuhlmannii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 188. — Afr. or.
 subpeltata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 472. — Madag.
 sulphurea, *Baker, l. c.* 471. — Madag.
 teretifolia, *Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 299. — Arabia.
 verticillata, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 14. — Madag.

KALBFUSSIA, Sch. Bip. = **Leontodon**, Linn. (Compos.).

- cirtensis, *Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 540 = *L. Mulleri, Ball.*

KALLSTROEMIA, Scop. = **Tribulus**, Linn. (Zygophyll.).

- angustifolia, *Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 4 (1890) 88 = *T. angustifolius, Benth.*
 bicolor, *Engl. l. c.* = *T. bicolor, F. Muell.*
 californica, *A. M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club.* xxii. (1895) 230 = *T. californicus, S. Wats.*
 hystrix, *Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 4 (1890) 88 = *T. hystrix, R. Br.*
 macrocarpa, *Engl. l. c.* = *T. macrocarpa, F. Muell.*
 pentandra, *Engl. l. c.* (= *Tribulopsis pentandra, R. Br.*). — Austral.
 ranunculiflora, *Engl. l. c.* = *T. ranunculiflorus, F. Muell.*
 Solandri, *Engl. l. c.* = *T. Solandri, F. Muell.*

KALUHABURUNGHOS, Linn. Fl. Zeyl. (1747) 202, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 607 = **Cleistanthus**, Hook. f. (Euphorb.).

- acuminatus, *angolensis, apodus, Blancoi, Boivinianus, chartaceus, Cunninghamii, Dallachyanus, decurrens, diversifolius, ellipticus, ferrugineus, gracilis, Helferi, heterophyllus, hirsutus, laevis, lanceolatus, lancifolius, macrophyllus, Maingayi, malabaricus, malac-*

KALUHABURUNGHOS: —

- censis, *membranaceus, myrianthus, nitidus, pallidus, parvifolius, patulus, pedicellatus, podocarpus, poly-stachyus, robustus, semiopacus, stenophyllus, stipitatus, stipularis, stipulatus, sumatranus, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 607 = *homonyma omnia Cleistanthi. monoecus, Kuntze, l. c.* = *C. monoicus, Muell. Arg. nanopetalus, Kuntze, l. c.* (= *Nanopetalum myrianthus, Hassk.*). — As. trop.
 oblongifolius, *Kuntze, l. c.* = *C. chartaceus, Muell. Arg.*

KANAHIA, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 3.

- laniflora, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 233 = *laniflora, R. Br.*

KARANGOLUM, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 272 = **KARA-ANGOLAM**, Adans. = **Alangium**, Lam. (Cornac.).

- barbatum, *Kuntze, l. c.* = *Marlea barbata, R. Br. chinense, Kuntze, l. c.* = *M. begonifolia, Roxb. ebenaceum, Kuntze, l. c.* = *M. ebenacea, C. B. Clarke.*
 Faberi, *Kuntze, l. c.* = *Alangium Faberi, Oliver. Griffithii, Kuntze, l. c.* = *Marlea Griffithii, C. B. Clarke.*
 Mohillae, *Kuntze, l. c.* = *Alangium Mohillae, Tul. nobile, Kuntze, l. c.* = *Marlea nobilis, C. B. Clarke. platanifolium, Kuntze, l. c.* = *M. platanifolia, Sieb. & Zucc.*
 salviaefolium, *Kuntze, l. c.* 272 *et* 273 = *Alangium Lamarckii, Thw.*
 vitiense, *Kuntze, l. c.* 273 = *Marlea vitiensis, Benth.*
 Zollingeri, *Kuntze, l. c.* = *Aiangium Zollingeri, Baill.*

KARATAS, Mill. (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 3.

- albo-rosea, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 4 (= *Nidularium albo-roseum, Griseb.*). — Venez.
 amazonica, *Baker, in Gard. Chron.* (1886) i. 814; *et Handb. Bromel.* (1889) 5. — Am. austr.
 ampullacea, *Baker, l. c.* (= *Nidularium ampullaceum, Ed. Morr.*). — Bras.
 Antoineana, *Baker, l. c.* 6 (= *N. Antoineanum, Wawra*). — Bras.
 carcharodon, *Baker, l. c.* 12 (= *N. carcharodon, Éd. Morr.*). — Bras.
 chlorosticta, *Baker, l. c.* 7 (= *N. chlorostictum, Éd. Morr.*). — Bras. ?
 cruenta, *Baker, l. c.* 10 (= *N. cruentum, Regel*). — Bras.
 cyanea, *Baker, l. c.* 5 (= *N. cyaneum, Linden ex Éd. André*). — Bras. ?
 denticulata, *Baker, l. c.* 4 (= *N. denticulatum, Regel*). — Bras.
 Ferdinando-Coburgi, *Baker, l. c.* 6 (= *N. Ferdinando-Coburgi, Wawra*). — Bras.
 Johannis, *Baker, l. c.* 11 (= *N. Johannis, Carrière*). — Bras. ?
 laciniosa, *Lindm. in Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl.* xxiv. 8 (1891) 18, t. 2 fig. 22-25. — Bras.
 leucophoea, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 7 (= *Nidularium leucophoeum, Éd. Morr.*). — Hab. ?
 macrantha, *Baker, l. c.* 8, in obs. — Bras.
 Makoyana, *Baker, l. c.* 11 (= *Nidularium Makoyanum, Regel*). — Bras. ?
 marmorata, *Baker, l. c.* 11. — Bras. ?
 neglecta, *Baker, l. c.* 6. — Bras. ?
 Nidus-puellae, *Ed. André, in Rev. Hort.* (1888) 563; *Baker, l. c.* 2. — Columb.
 Princeps, *Baker, l. c.* 10 (= *Nidularium Princeps, Éd. Morr.*). — Bras.
 Redoutei, *Baker, l. c.* 3. — Hab. ?
 Regnellii, *Baker, l. c.* 10 (= *Nidularium giganteum, Baker*). — Bras.
 rutilans, *Baker, l. c.* 9 (= *N. rutilans, Éd. Morr.*). — Bras.
 sarmentosa, *Baker, l. c.* 5 (= *N. sarmentosum, Regel*). — Bras.
 tristis, *Baker, l. c.* (= *N. triste, Regel*). — Bras.

KAREKANDELIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 234 = **KARE-KANDEL**, Adans. = **Carallia**, Roxb. (Rhizoph.).

- brachiata, *Kuntze, l. c.* 236 = *C. integerrima, DC.*

KAREKANDELIA: —

calycina, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 235 = *Carallia calycina*, Benth.
celebica, Kuntze, l. c. = *C. celebica*, Blume.
confinis, Kuntze, l. c. = *C. lanceaefolia*, Roxb.
cuspidata, Kuntze, l. c. = *C. cuspidata*, Blume.
lanceaefolia, Kuntze, l. c. = *C. lanceaefolia*, Roxb.
multiflora, Kuntze, l. c. = *C. multiflora*, Blume.

KAUKENIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 406 = **KAUKEN**, Burm. Thes. Zeyl. (1737) 133 = **Mimusops**, Linn. (Sapot.).

acuminata, *cafra*, *cuneifolia*, *dissecta*, *elata*, *Elengi*, *Erythroxylon*, *floribunda*, *fruticosa*, *globosa*, *hexandra*, *javanica*, *Kauki*, *Kirkii*, *Kummel*, *lacera*, *longifolia*, *Mochisia*, *multinervis*, *parvifolia*, *Roxburghiana*, *rufula*, *subsericea*, *surinamensis*, *timorensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 406 = *homonyma omnia* *Mimusopseos*.

littoralis, Kuntze, l. c. = *M. littoralis*, Kurz.
Salzmannii, Kuntze, l. c. = *M. Salzmannii*, A. DC.

KAYEA, Wall. (Guttif.). — Ind. Kew ii. 4.

caudata, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 183; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 621. — Malaya.

elegans, King, *ll. cc.* 183; et 622. — Malaya.
Garciae, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 629. (= *Vidalia Garciae*, F. Vill.). — Ins. Philipp.
grandis, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 182; *Vesque*, in *DC. l. c.* 622. — Malaya.
Larnachiana, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Jan. 1887) 126; et *ex Bot. Centralbl.* xxx. (1887) 213; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 625. — Austral.

Kunstleri, King, *ll. cc.* 182; et 620. — Malaya.
Navesii, *Vesque*, in *DC. l. c.* 628 (= *Vidalia Navesii*, F. Vill.). — Ins.

Wrayi, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 181. — Malaya.

KEDRASTIS, Medic. (Cucurbit.). — Ind. Kew. ii. 4

Boehmii, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér.* 3, xiv. (1887) 357. — Afr. trop. or.
longipedunculata, Cogn. *ex Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 421. — Natal.

KEENANIA, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 4.

ophiorrhizoides, *Drake*, in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 117; et in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 217 t. 4. — Tonkin.
tonkinensis, *Drake*, *ll. cc.* 118; et 217. — Tonkin.

KEERLIA, A. Gray & Engelm. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 4.

mexicana, A. Gray, *ex S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 422. — Mexic.

KELLERONIA, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 400. **ZYGOPHYLLEAE**.

splendens, Schinz, l. c. t. 9. — Reg. Somal.

KELLOGGIA, Torr. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 4.

chinensis, *Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 11. — Yunnan.

KENTIA, Blume (Palm.). — Ind. Kew. ii. 4.

elegantissima, *Linden*, *Catal.* (1888), *ex Gard. Chron.* (1888) ii. 328, nomen. — Hab.?
sapida, *Drude*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 3 (1887) 73 (= *Areca sapida*, Soland.). — N. Zel.

KENTROPHYLLUM, Neck. = **Carthamus**, Linn. (Compos.).

monspeliensium, Ces., Passer. & Gibelli, *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 499 = *Carduncellus monspeliensis*, All.
pinnatum, Ces., Passer. & Gibelli, l. c. = *C. pinnatus*, DC.
tingitanum, Ces., Passer. & Gibelli, l. c. = *C. caeruleus*, Less.

KERMADECIA, Brongn. & Gris (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 5.

KERMADECIA: —

pinnatifida, F. M. Bailey, *Cat. Woods Queensl.* (Lond. Col. Ind. Exhibit. 1886) 69 = *Grevillea pinnatifida*, F. M. Bailey.

KERNERA, Medic. = **Cochlearia**, Linn. (Crucif.).
alpina, Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 167 = *C. brevicaulis*, *Facch.*

KETELEERIA, Carr. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 6.
Davidiana, *Beissn. Handb. Nadelholz.* (1891) 423, figur. 117 (= *Abies Davidiana*, Franch.). — China.
sacra, *Beissn. l. c.* 426 (= *A. sacra*, Arm. David). — China.

KEYSERLINGIA, Brongn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 6.
mollis, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 197 (= *Edwardsia mollis*, Royle). — Afghan.

KIBARA, Endl. (Monim.). — Ind. Kew. ii. 6.
hirsuta, *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 316. — N. Guin.

KIBESSIA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 6.
coriacea, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 536; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1891) 109. — Borneo.

echinata, Cogn. *ll. cc.* 536; et 1108 = *simplex*, Korth.

galeata, Cogn. *ll. cc.* 537, et 1110 (= *Rectomitra galeata*, Blume). — Borneo.

gracilis, Cogn. l. c. 1110. — Borneo.

hirtella, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 536, nomen; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1107. — Borneo.

Korthalsiana, Cogn. *ll. cc.* 537; et 1111 (= *Rectomitra Korthalsiana*, Blume). — Borneo.

rostrata, Cogn. l. c. 1111. — Borneo.

tessellata, *Staff.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 162. — Borneo.

Teysmanniana, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1109. — Borneo.

KIELMEYERA, Murr. (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 6.

bracteosa, Mart. *ex Wawra*, in *Mart. Fl. Bras.* xii. (1886) 326 = *Bonnetia anceps*, Mart.

gracilis, *Wawra*, in *Mart. l. c.* 308. — Bras.

longifolia, Mart. *ex Wawra*, in *Mart. l. c.* 307 =

petiolaris, Mart.

KIERSERA, Nees = **Bonnetia**, Mart. & Zucc (Ternstroem.).

anceps, *paniculata*, *sessilis*, *venulosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = *homonyma omnia* *Bonnetiae*.

KIGELIANTHE, Baill. *Hist. des pl. n.* (1888) 50. **BIGNONIACEAE**.

Grevei, *Baill. l. c.* — Madag.

Hildebrandtii, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 244. — Madag.

KIGGELARIA, Linn. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 7.

grandifolia, *Warb.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 278. — Afr. trop. or.

serrata, *Warb.* *ex Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 33; et l. c. — Afr. trop. or.

KINGINDA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 7 = **Mitrephora**, Blume (Anonac.).

diversifolia, *excelsa*, *grandiflora*, *humilis*, *macrantha*, *Maingayi*, *obtus*, *polyphyrena*, *Thorelii*, *tomentosa*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* *Mitrephorae*.

Heyneana, Kuntze, l. c. = *Melodorum Heyneanum*, Thw.

multiflora, Kuntze, l. c. = *Uvaria multiflora*, *Teyss.* & *Binn.*

KINGELLA, Van Tiegh., in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 250 = **Loranthus**, Linn.

Scortechinii, Van Tiegh. l. c. = *L. Scortechinii*, King.

KIRENGESHOMA, Yatabé, in *Tokyo Bot. Mag.* iv. (1890) 1, **SAXIFRAGEAE**.
palmata, *Yatabé l. c.* 1, t. 18. — Japon.

KLEINIA, Juss. = **Jaumea**, Pers. (Compos.).
carnosa, *compositarum*, *mexicana*, *Oliveri*, *peduncularis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 348 = *homonyma omnia* *Jaumeae*.

KLOTZSCHIA, Cham. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 8.
rhizophylla, *Urb.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 508. — Bras.

KNAUTIA, Linn. = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).

Breindlii, G. Beck, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 352 = *S. arvensis*, Linn.

budensis, [G. Beck. ?] *ex Borb.* in *Bot. Centralbl.* lvii. (1894) 101. — Germ.

byzantina, *Fritsch*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 429. — Thrac.

carniolica, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 352 = *S. sylvatica*, Linn.

Clementei, G. Beck, l. c. = *dalmatica*, G. Beck.

cupularis, Janka & Simonk. *ex Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 294 = *S. arvensis*, Linn.

dalmatica, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 352. — Dalm.

Fleischmanni, G. Beck, l. c. 354 (= *Trichera Fleischmanni*, Nym.). = *S. arvensis*, Linn.

illyrica, G. Beck, l. c. 351. — Litt. Adriat.

intercedens ×, G. Beck, l. c. 353. — Austria.

intermedia, *Pernh. & Wettst.* in *Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1892) n. 2227; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 254. — Austro-Hung.

involuta, *Sommier & Levier*, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 46. — Reg. Cauc.

montenegrina, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 351 = *illyrica*, G. Beck.

persicina, *Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 99. — Austria.

Petteri, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 352 = *dalmatica*, G. Beck.

rigidiuscula, G. Beck, l. c. 354. [an seq. ?]. = *S. arvensis*, Linn.

rigidiuscula, *Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 99 (= *Trichera Fleischmanni*, Nym.). = *S. arvensis*, Linn.

Sendtneri, *Bruegg.* in *Jahresb. Nat. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 81 = *S. arvensis*, Linn.

serajewensis, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 353 = *S. sylvatica*, Linn.

tergestina, G. Beck, l. c. 354 = *S. sylvatica*, Linn.

travnicensis, G. Beck, l. c. = *S. arvensis*, Linn.

veneta, G. Beck, l. c. = *S. arvensis*, Linn.

KNEIFFIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).

fruticosa, *Raimann*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 214 = *Oe. fruticosa*, Linn.

KNEMA, Lour. = **Myristica**, Linn.

intermedia, *Warb.* in *Ber. Deutsch. bot. Ges.* xii. (1895) [83] = *M. intermedia*, Blume.

retusa, *Warb.* l. c. = *M. retusa*, King.

KNIPHOFIA, Moench (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 9.

ankaratrensis, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 347. — Madag.

citrina, *Baker*, in *Gard. Chron.* (1893) ii. 552. — Afr. austr.

decaphebia, *Baker*, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 6. — Afr. austro-occ. extratrop.

densiflora, *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 163. — Afr. trop. or.

drepanophylla, *Baker*, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 5. — Afr. austro-occ. extratrop.

elegans, *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 162. — Afr. trop. or.

Evansii, *Baker*, in *Kew Bull.* (1895) 152. — Natal.

grandis ×, *Hort.* *ex Gumbleton*, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 562. — Hybr. artef.

hybrida ×, *Otto Mann*, *ex Gumbleton*, l. c. — Hybr. artef.

Kirkii, *Baker*, l. c. (1887) ii. 712. — Afr. trop. austro-occ.

KNIPHOFIA —

- linearifolia, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 5. — Afr. austro-occ. extratrop.
 longicollis, [*Hort. Leichlin*] *Baker, in Gard. Chron.* (1893) i. 682. — Natal.
 longistyla, *Baker, in Kew Bull.* (1893) 158. — Zambesia.
 maxima X, *Hort. ex Gumbleton, in Gard. Chron.* (1889) ii. 562. — Hybr. artef.
 modesta, *Baker, in Journ. Bot.* (1889) 43; *et in Bot. Mag.* (1893) t. 7293. — Afr. austr.
 Nelsoni, *Mast, in Gard. Chron.* (1892) i. 554 fig. 83. — Afr. austr.
 nobilis X, *Hort. ex Gumbleton, in Gard. Chron.* (1889) ii. 563. — Hybr. artef.
 Northiae, *Baker, in Journ. Bot.* (1889) 43; *in Gard. Chron.* (1891) ii. 66; *et in Bot. Mag.* (1895) t. 7412. — Afr. austr.
 Saundersii X, *Hort. ex Gumbleton, in Gard. Chron.* (1889) ii. 562. — Hybr. artef.
 spectabilis X, *Hort. ex Gumbleton, l. c.* — Hybr. artef.
 Tysoni, *Baker, in Journ. Bot.* xxvii. (1889) 43. — Afr. austr.
 Uvaria, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 294 = *aloides, Moench.*
 zombensis, *Baker, in Kew Bull.* (1893) 158. — Zambesia.

KNOWLTONIA, Salisb. (Ranuncul.). — Ind.

- Kew. ii. 9.
 brevistylis, *Szyszył. Polyph. Rehmann.* (1887) 7. — Natal.
 canescens, *Szyszył. l. c.* 8. — Transvaal.
 capensis, *Huth, in Abh. und Vortr. Gesamtgeb. Naturw.* iii. (1890) 69 = *Adonis capensis, Linn.*
 transvaalensis, *Szyszył. Polyph. Rehmann.* (1887) 7. — Transvaal.

KOBRESIA, Willd. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 9.

- angusta, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 695. — Sikkim.
 bipartita, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 101 = *caricina, Willd.*
 capillifolia, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 697 (= *Elyna capillifolia, Decne.*) — Ind. or.
 curvirostris, *C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.* 699 (= *Hemicarex curvata, C. B. Clarke.*) — Sikkim.
 Duthiei, *C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.* 697. — Kumaon.
 elata, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. (1890) 32. — Tibet.
 filicina, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. 696 (= *Hemicarex filicina, C. B. Clarke.*) — Reg. Himal.
 fissiglumis, *C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.* — Nepal.
 foliosa, *C. B. Clarke, l. c.* — Ind. or.
 pratensis, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 266. — Sibiria.
 pygmaea, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 696 (= *Hemicarex pygmaea, C. B. Clarke.*) — Ind. or.
 Sargentiana, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 139. — Tibet.
 uncinoides, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 698 (= *Carex uncinoides, C. B. Clarke.*) — Ind. or. Tibet.
 vaginosa, *C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.* 695. — Sikkim.

KOCHIA, Rottb. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 10.

- lobostoma, *F. Muell. in Vict. Natural.* iii. (Nov. 1886) 92. — Austral.
 sanguinea, *Willk. in Oest. Bot. Zeitschr.* xi. (1890) 218. — Hisp.
 spongiocarpa, *F. Muell. in Vict. Natural.* iii. (Nov. 1886) 92. — Austral.

KOEHNNEAGO, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 =

- Euosmia**, Humb. & Bonpl. (Rubiace.).
 caripensis, Kuntze, l. c. = *E. caripensis, Humb. & Bonpl.*

KOELERA, « Pers. » St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 911 = **Koeleria**, Pers. (Gramin.).

KOELERIA, Pers. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 10.

- brevifolia, *Reut. ex Barbey, in Bull. Soc. Dauph.* xiii. (1886) 554. — Europ.
 dasyphylla, *Willk. in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 148. — Hisp.
 glabra, *Janka, ex Nym. Consp. Fl. Eur.* ii. I. (1889) 235 = *cristata, Pers.*
 longiglumis, *Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 394; *et in Batt. & Trab. Fl. de l'Alger.* [Monoc.] (1895) 194 = *pubescens, Beauv.*
 mucronata, *Trab. l. c.* = *pubescens, Beauv.*
 repens, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 394 = *cristata, Pers.*
 rigidula, *Simonk. in Termész. Füzet.* x. (1886) 184; *et Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 570 = *cristata, Pers.*

KOELLIA, Moench = **Pycnanthemum**, Michx (Labiata.).

- albescens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = *P. albes-cens, Torr. & Gray.*
 aristata, Kuntze, l. c. = *P. aristatum, Michx.*
 californica, Kuntze, l. c. = *P. californicum, Torr.*
 clinopodioides, Kuntze, l. c. = *P. clinopodioides, Torr. & Gray.*
 flexuosa, *MacMill. Metasp. Minn.* (1892) 452; *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 279 = *P. linifolium, Pursh.*
 hyssopifolia, *Britton, l. c.* = *P. hyssopifolium, Benth.*
 incana, *Baill. Hist. des pl. x.* (1892) 31 = *seq.*
 incana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = *P. incanum, Michx.*
 lanceolata, Kuntze, l. c. = *P. lanceolatum, Pursh.*
 leptodon, Kuntze, l. c. = *P. leptodon, A. Gray.*
 montana, Kuntze, l. c. = *P. montanum, [montana] Michx.*
 mutica, *Britton, ex Small, et Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv.* (1893) 145 = *P. muticum, Pers.*
 nuda, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = *P. nudum, Nutt.*
 pilosa, *Baill. Hist. des pl. x.* (1892) 31 = *P. pilosum, Nutt.*
 pilosa, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 279 = *praec.*
 pycnanthemodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = *P. Tullia, Benth.*
 Torreyi, Kuntze, l. c. = *P. Torrei, Benth.*
 verticillata, Kuntze, l. c. = *P. aristatum, Michx.*
 virginiana, *MacMill. Metasp. Minn.* (1892) 454; *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 280 = *seq.*
 virginiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = *P. linifolium, Pursh.*
 virginicum, *Baill. Hist. des pl. x.* (1892) 31 = *praec.*

KOELPINIA, Pall. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 11.

- latifolia, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 284. — Turkest.
 macrantha, *C. Winkl. l. c.* 285. — Turkest.

KOELREUTERIA, Laxm. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 11.

- bipinnata, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 453; *et in Rev. Hort.* lx. (1888) 393, fig. 93. — China.

KOHLERIA, Regel = **Isoloma**, Decne. (Gesner.).

- bogotensis, *Fritsch, in Engl. & Prandl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 178 = *I. bogotense, Nichols.*
 Deppeana, *Fritsch, l. c.* 179 = *I. Deppeanum, Hemsl.*
 digitaliflora, *Fritsch, l. c.* 178 = *I. digitaliflorum, Linden & André.*
 gigantea X, *Fritsch, l. c.* — Hybr. artef.
 Luciani X, *Fritsch, l. c.* — Hybr. artef.
 ocellata, *Fritsch, l. c.* = *I. ocellatum, Benth. & Hook. f.*

KOKERA, Adans. = **Chamissoa**, H. B. & K. (Amarant.).**KOKERA** —

- acuminata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 543 = *Chamissoa acuminata, Mart.*
 Blancheti, Kuntze, l. c. = *C. Blanchetii, Moq.*
 celosioides, Kuntze, l. c. = *C. celosioides, Griseb.*
 paniculata, Kuntze, l. c. 542 = *C. altissima, Nees & Mart.*

KOLOMIKTA, « Regel » ez Dippel, Handb.

- Laubholz. iii. (1893) 23 sphalm. = **KALOMIKTA**, Regel = **Actinidia**, Lindl. (Ternstr.).
 mandshurica, « Regel » ex Gard. Kew. i. Polypet. (1994) 41 = *A. Kolomikta, Rupr.*

KOMAROFFIA, Kuntze, in Act. Hort. Petrop.

- x. (1887) 144; *Prantl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 274. **RANUNCULACEAE.**
 divaricata, Kuntze, l. c. (= *Nigella divaricata, Franch.*) — Turkest.
 diversifolia, « Kuntze » ex Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 274 = *divaricata, Kuntze.*

KONIGA, R. Br. = **Alyssum**, Tourn. (Crucif.).

- fruticosa, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 93. — Ins. Canar.
 gracilis, Webb, ex Christ, l. c. 91 (= *Lobularia intermedia, Webb & Berth.*) — Ins. Canar.
 marginata, Webb, [in Bourg. Pl. Canar. exsicc. (1846)] ex Coss. Illustr. Fl. Atlant. i. (1889) 63, t. 43. — Maroc., Ins. Canar.
 maritima, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 175 (= *K. maritima, R. Br.*) = *A. maritimum, Lam.*
 Vogeliana, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 92. — Ins. S. Vinc.

KOOMPASSIA, Maing. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 12.

- Beccariana, *Taub. in Ber. Deutsch. bot. Ges.* x. (1892) 641. — Borneo.
 excelsa, *Taub. l. c.*; *et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 155 (= *Abauria excelsa, Becc.*) — Borneo.

KOON, Gaertn. = **Pachygona**, Miers (Menisp.).

- oleosus, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* (1895) t. 328 b = *Pistacia oleosa, Lour.*

KOPSIA, Dennst. = **Orobanche**, Tourn.

- cochinchinensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 415. — Cochinch.
 nana, *Freyn, ex Freyn & Brandis, in Verh. zool-bot. Ges. Wien, xxxviii.* (1888) 623 = *O. nana, Noé.*

KORTHALSIA, Blume (Palm.). — Ind. Kew. ii. 13.

- Scortechinii, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 475. — Perak.
 tenuissima, *Becc. Malesia*, ii. (1886) 275, in obs. — Penins. Mal.

KOSARIA, Forsk. = **Dorstenia**, Linn. (Urtic.).

- cuspidata, *Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. bot. Genova* (1893) 331 = *D. cuspidata, Hochst.*
 palmata, *Schweinf. ex Engl. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 147 = *D. palmata, Engl.*

KOSTELETZKYA, Presl (Malv.). — Ind. Kew. ii. 13.

- althaeifolia, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 224 = *virginica, Presl.*
 Buettneri, *Guerke, ex Buettner, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1889) 92. — Congo.
 flava, *E. G. Baker, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 74. — Sierra Leone.
 stellata, *Fernald, ex Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 532. — Mexic.
 Thurberi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 314. — Am. bor. occ.

KRAMERIA, Loeffl. (Polygal.). — Ind. Kew. ii. 13.

- bicolor, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 417. — Mexic.

KRAUNIA, Rafin. = **Wistaria**, Nutt. (Legumin.). *australis*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 175 = *W. australis*, F. Muell. *brachybotrys*, Greene, l. c. = *W. brachybotrys Siebold*. *chinensis*, Greene, l. c. = *W. chinensis*, Siebold. *floribunda*, Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 271 = *W. floribunda*, Willd. *frutescens*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 175 (= *K. frutescens*, Rafin.) = *W. frutescens*, Poir. *megasperma*, Greene, l. c. = *W. megasperma*, F. Muell.

KREBSIA, Harv. = **Gomphocarpus**, R. Br. (Asclep.). *carinata*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1887) 269. — Afr. austr. *corniculata*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 40 = *G. corniculatus*, D. Dietr. *stenoglossa*, Schlechter, in Journ. Bot. xxiii. (1887) 270, in obs.; et l. c. — Afr. austr.

KRUGIA, Urban, in Ber. Deutsch. bot. Gesells. xi. (1893) 375. **MYRTACEAE**. *elliptica*, Urban, l. c. 376 (= *Marlierea elliptica*, Griseb.) = *ferruginea*, Urban. *ferruginea*, Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 604 (= *Myrcia ferruginea*, DC.). — Ins. Antill.

KRUGELLA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 50. **SAPOTACEAE**. *Hartii*, Pierre, l. c. 52. — Ins. Trinit.

KRYNITZKIA, Fisch. & Mey. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 14. *echinoides*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 709. — Utah. Gray, Vasey et N. E. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi. (1888) 596. — Calif. *micrantha*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 187 = *micrantha*, A. Gray. *peninsularis*, N. E. Rose, ex Vasey & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 85. — Calif. inf. *racemosa*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 187 = *racemosa*, Greene. *utahensis*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ed. 2, ii. 1 (1886) 427 (= *Cryptanthus utahensis*, Greene.). — Utah.

KUENCKELIA, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 92 = **KUNCKELIA**, Heim = **Vateria**, Linn. (Diptéroc.).

KUHNIASTERA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 192 = **KUHNISTERA**, Lam. = **Petalostemon**, Michx. (Legumin.). *agastachya*, candida, carnea, compacta, decumbens, emarginata, exilis, flavescens, foliosa, gracilis, grisea, ornata, rosea, Searlsiae, tenuifolia, villosa, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Petalostemonos. *compacta*, Kuntze, l. c. = *P. macrostachyus*, Torr. *phleodes*, Kuntze, l. c. = *P. phleoides*, Torr. & Gray. *pinnata*, Kuntze, l. c. = *P. corymbosus*, Michx.

KUHNISTERA, Lam. = **Petalostemon**, Michx. (Legumin.). *Feayi*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 149 = *P. Feayi*, Chapm. *multiflora*, Heller, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 197 = *P. multiflorus*, Nutt. *occidentalis*, Heller, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xiv. (1895) 33 = *P. candidus*, Michx. *pulcherrima*, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. i. (1895) 50 t. 2 [Bot. Expl. S. Texas] = *P. virgatum*, Scheele. *purpurea*, Macmill. Metasp. Minn. (1892) 329 = *P. violaceus*, Michx.

KUMLIENIA, Greene. (Ranunc.). — Ind. Kew. ii. 15. *Cooleyae*, Greene, in Erythra. ii. (1894) 193 (= *Ranunculus Cooleyae*, N. E. Rose). — *hystricola*, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. (1886) 387. — Calif.

KUNCKELIA, Heim, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 153; et Recherch. Diptéroc. (1892) 39 [Kuenckelia] = **Stemonoporus**, Thw. (Diptéroc.). *reticulata*, Heim, ll. cc. = *S. reticulatus*, Thw.

KUNTHIA, Dennst. = **Garuga**, Roxb. (Burser.). *floribunda*, javanica, mollis, pinnata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 107 = *homonyma omnia* Garugae.

KUNZEA, Spreng. = **Purshia**, DC. (Rosac.). *glandulosa*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1892) 299 = *P. glandulosa*, Curran.

KURRIMIA, Wall. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 15. *gracilis*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Philipp., (1886) 89. — Ins. Philippin. *luzonica*, Vidal, l. c. 88. — Ins. Philipp.

KURZAMRA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = **Soliera**, Clos (Labi.). *pulchella*, Kuntze, l. c. 521 = *S. pulchella*, Clos.

KURZIA, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 479 et 547, in obs. = **Hulletia**, King (Urtic.).

KURZINDA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 938 = **Apteron**, Kurz (Rhamn.). *lanceolatum*, Kuntze, l. c. = *A. lanceolatum*, Kurz.

KYDIA, Roxb. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 15. *brasiliensis*, Rodr. Pl. nov. jard. bot. Rio, iii. (1893) 2 t. 1. — Bras.

KYLLINGA, Rottb. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 15. *blepharinotha*, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 145, in syn. (Kyllingia) = *triceps*, Rottb. *cartilaginea*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 28; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 123 (Kyllingia). — Afr. trop. or. *chrysanthia*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 123 (Kyllingia). — Afr. trop. or. *eximia*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 529. — Reg. Somal. *flexuosa*, Boeck, Cyper. Nov. ii. (1890) 1 (Kyllingia). — Ins. Jamaica. *microstyla*, C. B. Clarke, in Kew Bull. (1895) 229. — Reg. Somal. *oblonga*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 530. — Afr. trop. or. *planiceps*, C. B. Clarke, l. c. 531. — Congo. *scirpina*, Reichb. ex C. B. Clarke, l. c. 615 = *Scirpus cubensis*, Poebp. & Kunth. *teres*, C. B. Clarke, l. c. 533. — Congo. *Schimperi*, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss, ed. Hohenack, n. 2201], ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 145, in syn. = *triceps*, Rottb.

L

LABATIA, Mart. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 16. *Beaurepairei*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 515 (= *Lucuma Beaurepairei*, Glaziov & Raunk.). — Bras. *ciliolata*, Engl. l. c. — Bras. austr. *glomorata*, Radlk. ex Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. i. (1890) 142 (an *L. glomorata*, Pohl?). — Bras. *lanceolata*, Engl. l. c. — Pohl. *tovarensis*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 515. — Columb.

LABISIA, Lindl. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 17. *alata*, N. E. Br. in Illustr. Hortie. xxxiv. (1886) 123, t. 605. — Ind. or. *Malouana*, L. Linden & Rodigas, l. c. 102, in obs. — Hab. ? *pothoina*, Hort. Linden, ex Gard. Chron. (1888) ii. 328, nomen. — Hab. ? *smaragdina*, L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hortie. xxxix. (1892) 91, t. 560. — Borneo.

LABORDEA, Benth. = **Labordia**, Gaudich. (Logan.). *glabra*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 291. — Ins. Sandvic. *Grayana*, Hillebr. l. c. 291. — Ins. Sandvic. *lephocarpha*, Hillebr. l. c. 289. — Ins. Sandvic. *triflora*, Hillebr. l. c. 293. — Ins. Sandvic.

LABOURDONNAISIA, Boj. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 17. *costata*, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 10, in obs. — Hab. ? *madagascariensis*, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 917. — Madag.

LABRAMIA, A. DC. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 17. *coriacea*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 908. — Madag. ?

LABURNUM, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 17. *biflorum*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 107 = *alpinum*, f. *S. Presl*, var. *intermedium*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 673 = *L. Watereri*, Dippel. *Jacquianum*, Hort. Dieck. ex Neuheit. Nat. Arboret. Dieck. (1892-93) 19 = *Cytisus Jacquianus*, Wettst. *Linneanum*, Hort. l. c. = *C. Linneanus*, Wettst. *serotinum*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 673, in syn. = *L. Watereri*, Dippel. *Watereri* X, Briq. Étud. Cytis. Alpes Marit. (1894) 124 = seq. *Watereri* X, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 673 = *Cytisus Watereri*, Wettst.

LACCOSPERMA, G. Mann & H. Wendl. = **Ancistrophyllum**, G. Mann & H. Wendl. (Palm.). *laevis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 729 (= *L. laevis*, G. Mann & H. Wendl.). — Afr. trop. *opaca*, Kuntze, l. c. (= *L. opacum*, G. Mann & H. Wendl.). — Afr. trop. *secundiflora*, Kuntze, l. c. = *A. secundiflorum*, G. Mann & H. Wendl.

LACHENALIA, Jacq. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 18. *Bachmanni*, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35 (1892) 8. — Afr. austr. *Cami*, Hort. ex Reuthe, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 156. — Form. hort. *Comesi* X, Sprenger, l. c. xl. (1891) 358, fig. 77. — Hybr. artef. *lilacina*, Hort. ex Reuthe, l. c. xxxviii. (1889) 157. — Form. hort. *Massoni*, Baker, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 336. — Afr. austro-occ. extratrop. *polyphylla*, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35 (1892) 7. — Afr. austr. *Regeliana* X, Sprenger, in Gartenfl. xl. (1891) 356, fig. 76. — Hybr. artef. *succulenta*, Masson, ex Baker, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 336. — Afr. austr. *undulata*, Masson, ex Baker, l. c. — Afr. austr.

LACHNAEA, Linn. (Thymelaeac.). — Ind. Kew. ii. 18. *filamentosa*, Gilg. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 240 = *buxifolia*, Lam. *funicaulis*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 408. — Afr. austr.

LACHNOCAULON, Kunth (Eriocaul.). — Ind. Kew. ii. 19. *anceps*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 360 = *L. Michauxii*, Kunth.

LACHNOSTYLIS, *oppositifolia*, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. ii. n. 123] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 335, in syn. = *Nuxia dentata*, R. Br. *ternifolia*, Hochst. ex Engl. l. c. = *N. congesta*, R. Br.

LACINIARIA, Hill = **Liatris**, Schreb. (Compos.).
acidota, Boykinii, Chapmanii, cylindracea, elegans,
Garberi, gracilis, graminifolia, pauciflora, punctata,
pyncostachya, *spicata*, *tenuifolia*, Kuntze, Rev. Gen.
 (1891) 349 = *homonyma omnia* Liatridis.

LACTARIA, Rumph. = **Ochrosia**, Juss. (Apocyn.).
elliptica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 415 = *O. elliptica*, Labill.
Kilneri, Kuntze, l. c. = *O. Kilneri*, F. Muell.
maculata, Kuntze, l. c. = *O. borbonica*, J. F. Gmel.
marianensis, Kuntze, l. c. = *O. marianensis*,
 A. DC.
Moorei, Kuntze, l. c. = *O. Moorei*, F. Muell.
oppositifolia, Kuntze, l. c. = *Cerbera oppositifolia*,
 Lam.
parviflora, Kuntze, l. c. = *Ochrosia elliptica*,
 Labill.
sandwicensis, Kuntze, l. c. = *O. sandwicensis*,
 A. Gray.

LACTUCA, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind.
 Kew. ii. 19.
alatifolia, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii.
 (1890) 79. — Ind. or.
amagawaensis, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi.
 (1892) 56. — Japon.
atropurpurea, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
 (1895) 294 = *grandiflora*, Franch.
contracta, Velen, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.
 ii. (1889) 189; Bornm. in Bot. Centralbl. xxxvi.
 (1888) 89 = *chondrillaeflora*, Boreau.
elata, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.
 xxiii. (1888) 481. — China.
elegans, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)
 262. — China.
Faberia, Franch. l. c. 294 = *Faberia sinensis*,
 Hemsl.
Forsteniana, Boerl. Hndl. Fl. Ned. Indië, ii. 1.
 (1891) 245, nomen. — Ins. Celeb.
grandiflora, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
 (1895) 260 (= *L. atropurpurea*, Franch.). —
 Yunnan.
Hemslayi, Franch. l. c. 293, in obs. = *Prenanthes*
Faberii, Hemsl.
hirsuta, Franch. l. c. 258. — Yunnan.
Hochstetteri, Sch. Bip. [in Schimpf. Pl. Abyss. i.
 n. 128], ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891
 (1892) 454. (= *Pyrrhopappus Hochstetteri*, A.
 Rich.). — Abyss.
hasiana, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
 (1895) 292, in obs. = *Prenanthes khasiana*,
 C. B. Clarke.
Kanitziana, Martelli, ex Boerl. Fl. Ned. Indië, ii. 1.
 (1891) 245, nomen. — Borneo.
laevigata, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 322 (= *Mul-*
gedium laevigatum, DC.). — Afghan.
likiangensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
 (1895) 259. — Yunnan.
longirostra, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc.
 Ser. II. iii. (1886) 82. — Afghan.
luzonica, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 165. —
 Ins. Philipp.
Mutsumurae, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892)
 56. — Japon.
nana, Baker, in Kew Bull. (1893) 17. — Afr. trop.
melanantha, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
 (1895) 291. — Yunnan.
napifera, Franch. l. c. 292. — Yunnan.
numidica, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.
 [Dicot.] (1889) 553; et Append. ii. 14; et in
 Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 403. — Algeria.
ochroleuca, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
 (1895) 293, in obs. = *Prenanthes ochroleuca*,
 Hemsl.
oligocephala, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver.
 N. Folge, vi. (1894) 55 (= *Zollhoferia oligocephala*,
 Hausskn. & Bornm.). — Oriens.
polypodiifolia, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
 (1895) 265. — Yunnan.
rostrata, Boerl. Hndl. Fl. Ned. Indië, ii. 1 (1892)
 245 = *Prenanthes rostrata*, Blume.
rostrata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 349 = *gracili-*
flora, DC.
Schulzeana, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi.
 (1889) 72. — Angola.

LACTUCA : —

Souliei, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)
 257. — China.
spicata, Hitchcock, in Trans. St. Louis Acad. Sci.
 v. (1892) 506 = *leucophaea*, A. Gray.
spicata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 349. = *alpina*,
 Benth. & Hook. f.
taliensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
 (1895) 263. — Yunnan.
Tatarinowii, Franch. l. c. 293, in obs. = *Prenanthes*
Tatarinowii, Maxim.
thibetica, Franch. l. c. — China.
triflora, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn.
 Soc. xxii. (1888) 485. — China.
villosa, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal.
 (1888) 31 = *acuminata*, Spreng.
Welwitschii, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix.
 (1891) 30. — Madag. Angola.
yunnanensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
 (1895) 264. — Yunnan.

LADANUM, Dill = **Galeopsis**, Tourn. (Labiata).
dubium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 521 = *G. Lada-*
num, Linn.
Tetrahit, Kuntze, l. c. = *G. Tetrahit*, Linn.

LADENBERGIA, Klotzsch (Rubiaceae). — Ind.
 Kew. ii. 21.
discolor, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889)
 146. — Peruvia.
graciliflora, K. Schum. l. c. 145. — Peruvia.
pedunculata, K. Schum. l. c. 146 = *Cinchona*
pedunculata, Karst.
physophora, Spruce, ex K. Schum. l. c. 151, in syn.
 = *Remijia physophora*, Benth.

LAELIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 21.
Arnoldiana ×, Hort. ex Gard. Chron. (1891) i.
 740 et 742 = *Laelio-Cattleya Arnoldiana*,
 Rolfe.
Batmanniana ×, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 263. —
 Hybr. artef.
Euterpe ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 533. — Hybr.
 artef.
exoniensis ×, Veitch. Man. Orch. Pl. ii. (1887) 95;
 et Orchid. Alb. x. (1893) t. 443 (= *Cattleya*
exoniensis. — Hybr. artef.
Eyerianiana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii.
 91 (an Hybr. spont.?) — Mexic.
felix, Veitch, Man. Orch. Pl. ii. (1887) 96 =
Cattleya felix, Reichb. f.
Fincheniana ×, O'Brien, in Gard. Chron. (1893)
 i. 194; et (1893) ii. 805 fig. 123 et 806. — Hybr.
 spont.
Gouldiana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 41;
 et Orchid. Alb. t. 371. — Mexic.
Horniana ×, Reichb. f. l. c. 770; et ex Lindeniana,
 iv. (1888) 8. — Hybr. artef.
juvenilis ×, Bleu, in Journ. des Orchid. i. (1890)
 230; L. Linden, in Lindeniana, ix. (1893) 65 t. 415.
 — Hybr. artef.
lilacina, Philbrick, ex Veitch, Man. Orch. Pl. ii.
 (1887) 89; Rolfe, in Gard. Chron. (1890) ii. 241.
 — Bras.
Lindleyana, Veitch, Man. Orch. Pl. ii. (1887) 73
 (= *L. Lindleyana*, Nichols.) = *Cattleya Lind-*
leyana, Reichb. f.
lobata, Veitch, l. c. 74, cum icone = *C. lobata*,
 Lindl.
Measuresiana, Williams, Orch. Grow. Man. ed. 6
 (1886?) add.; Warn. & Williams, Orchid. Alb.
 v. (1886) t. 207; et vii. (1888) t. 306 = *Laelio-*
Cattleya Schilleriana, Rolfe.
Oweniae ×, L. Linden, in Lindeniana, viii. (1892) 79
 t. 374. — Hybr. artef.
Oweniana ×, Hort. ex O'Brien, in Gard. Chron.
 (1893) i. 682. — Hybr. artef.
pachystele ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 596 (an
 Hybr. spont.?). — Hab.?
porphyritis ×, Reichb. f. l. c. (1886) i. 72. — Hybr.
 artef.
Reichenbachiana, Wendl. & Kraenzl. in Reichb. f.
Xen. Orchid. iii. 6 (1892) 97 t. 254 i. fig. 1-7. —
 Hab.?
Russelliana, Hort. ex Williams, Orch. Grow. Man.
 ed. 6, 366 = *purpurata*, Lindl. et Paxt.

LAELIA : =

Timora ×, Hort. ex N. E. Br. in Gard. Chron.
 (1887) ii. 428 [sphalm *Timorax*]. — Hybr. artef.
Tresederiana ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 136. —
 Hybr. artef.
triophthalma, Veitch, Man. Orch. Pl. ii. (1887) 97
 = *Cattleya triophthalma*, Reichb. f.
vitellina ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) i. 365
 fig. 53. — Hybr. artef.
LAELIO-CATTLEYA ×, Rolfe, in Journ. Linn.
 Soc. xxiv. (1887) 168 (Orchid.).
albanensis ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1893) ii.
 584. — Hybr. artef.
amanda ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 802; et ii. 78. —
 Hybr. artef.
Amesiana ×, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv.
 (1887) 168; et l. c. (1889) ii. 78. — Hybr.
 artef.
Andreana ×, Maron, in Rev. Hort. lxvii. (1895)
 401. — Hybr. artef.
Arnoldiana ×, Rolfe, in Journ. des Orchid. ii.
 (1891) 134; et in Lindeniana, vii. (1891) 25 t. 299.
 — Hybr. artef.
Aurora ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 380;
 et (1890) i. 8. — Hybr. artef.
bella ×, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887)
 169; et l. c. (1888) i. 361 et (1889) ii. 78. —
 Hybr. artef.
blesensis, Hort. ex Warn. & Williams, Orchid. Alb.
 xi. (1895?) t. 519. — Hybr. artef.
broomfieldensis ×, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii.
 223. — Hybr. artef.
Brymeriana, J. O'Brien, l. c. (1895) ii. 338. —
 Hybr. artef.
callistoglossa ×, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv.
 (1887) 168; et in Gard. Chron. (1889) ii. 78
 (= *Laelia callistoglossa*, Reichb. f.). — Hybr.
 artef.
caloglossa ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 79. — Hybr.
 artef.
Canhamiana ×, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv.
 (1887) 169; et l. c. (1889) ii. 79 (= *Laelia Canha-*
miana, Reichb. f.). — Hybr. artef.
Cassandra ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) ii. 596;
 (1889) i. 491; (1889) ii. 79; et (1890) ii.
 529 (= *Cattleya Cassandra*, Rolfe). — Hybr.
 artef.
Cassiope ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 620; (1890) i. 8;
 et (1892) i. 88. — Hybr. artef.
Cauwenberghei ×, L. Linden, in Lindeniana, ix.
 (1893) 91 t. 428. — Hybr. artef.
corbeillensis ×, Hort. Maron, ex Rev. Hort. lxvi.
 (1894) 527. — Hybr. artef.
croomfieldensis ×, Hort. l. c. lxvii. (1895) 63 (an
broomfieldensis ×, Hort.?). — Hybr. artef.
decia ×, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 699 fig.
 89. — Hybr. artef.
Digbyana-Mossiae ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 742; et
 (1889) ii. 79. — Hybr. artef.
Dominiana ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 79. — Hybr.
 artef.
Dormaniana ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 555; et (1889)
 ii. 79 (= *Cattleya Dormaniana*, Reichb. f.). —
 Hybr. artef.
elegans ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 619; (1889) ii. 79;
 et (1890) ii. 241 (= *Cattleya elegans*, Morr.). —
 Hybr. artef.
eximia ×, Hort. ex Gard. Chron. (1890) i. 800;
 Rolfe, in Lindeniana, ix. (1893) 7 t. 386. — Hybr.
 artef.
exoniensis ×, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv.
 (1887) 169; et l. c. (1889) i. 619; (1889) ii. 155
 (= *Cattleya exoniensis*, Reichb. f.). — Hybr.
 artef.
fausta ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 619 et (1889) ii.
 155 (= *Cattleya fausta*, Reichb. f.). — Hybr.
 artef.
felix ×, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887)
 169; et l. c. (1889) i. 619; (1889) ii. 155 (= *Catt-*
leya felix, Reichb. f.). — Hybr. artef.
Horniana ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii.
 155; et (1890) ii. 241 (= *Laelia Horniana*,
 Reichb. f.). — Hybr. artef.

LAELIO-CATTLEYA: —

- Lindeni* ×, Hort. ex L. Linden, in *Lindenia*, x. (1894) 33, t. 447. — Hybr. artef.
Mardelli ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 746; et ii. 155 (= *Cattleya Mardelli*, Seden). — Hybr. artef.
Maynardii ×, Hort. ex Rev. Hort. lxiii. (1890) 294; et ex Gard. Chron. (1893) i. 715, fig. 108. — Hybr. artef.
Mylamiana ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 169; et in Gard. Chron. (1889) ii. 155; (1890) ii. 241 (= *Laelia Mylamiana*, Reichb. f.). — Hybr. artef.
pachystele ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 596; et (1889) ii. 79. — Hybr. artef.
Pallas ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1890) i. 8. — Hybr. artef.
Philbrickiana ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 169; et l. c. (1889) ii. 155; (1890) ii. 242 (= *Laelia Philbrickiana*, Reichb. f.). — Hybr. artef.
porphyritis ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 155; (1890) ii. 242 (= *L. porphyritis*, Reichb. f.). — Hybr. artef.
Sallieri ×, Maron, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 511. — Hybr. artef.
Sayana, L. Linden, in *Journ. des Orchid.* v. (1894) 220; et in *Lindenia*, x. (1894) 65, t. 463. — Hybr. artef.
Schilleriana ×, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1887) ii. 155; (1890) ii. 241 et 653 (= *Laelia Schilleriana*, Reichb. f.). — Hybr. artef.
Schulziana ×, L. Linden, in *Lindenia*, xi. (1895) 21, t. 489. — Hybr. artef.
Sedeni ×, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 155; et (1890) ii. 653 (= *Laelia Sedeni*, Reichb. f.). — Hybr. artef.
Stegoleffiana ×, Hort. ex Rev. Hort. lxvi. (1894) 89 = seq.
Stegolowiana ×, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 756. — Hybr. artef.
stella ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 322. — Hybr. artef.
Timora ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 155 (= *Laelia Timora*, N. E. Br.). — Hybr. artef.
Tresederiana ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 155 (= *L. Tresederiana*, Reichb. f.). — Hybr. artef.
trionophthalma ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 802; et ii. 155 (= *L. trionophthalma*, Veitch). — Hybr. artef.
triophthalma ×, Rolfe, l. c. (1890) ii. 653 (= *Cattleya triophthalma*, Reichb. f.). = praec.
Varjenewskiana, L. Linden, in *Lindenia*, x. (1894) 71, t. 466. — Hybr. artef.
Veitchiana ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 169; et in *Gard. Chron.* (1889) i. 802; et ii. 155; (1890) ii. 653 (= *Cattleya Veitchiana*, Dominy). — Hybr. artef.
Victoria ×, Rolfe, l. c. (1888) ii. 578; et (1889) ii. 156 et 560 (= *Laelia Victoria*, Veitch). — Hybr. artef.
Welsiana ×, Hort. ex Rev. Hort. lxvii. (1895) 63. — Hybr. artef.
Zenobia ×, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1889) i. 802; et ii. 156 (= *Cattleya Zenobia* Rolfe.). — Hybr. artef.

LAGAROSIPHON. Harv. (Hydrochar.). — Ind. Kew. ii. 22.

- crispus*, *Rendle*, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 380, t. 3 fig. 1-7. — Afr. trop. or.
densus, *Rendle*, l. c. xxii. (1886) 235. — Madag.
hydriloides, *Rendle*, l. c. xxx. (1895) 381 t. 32 fig. 1-7. — Afr. trop. or.
Nyassae, *Ridl.* l. c. xxii. (1886) 234. — Afr. trop.
Nyassae, *Guerke*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 95. — Afr. trop. or.
rubellus, *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 234 [rubella]. — Angola.
tenuis, *Rendle*, l. c. xxx. (1895) 380, t. 31, fig. 1-7. — Afr. trop. or.

LAGASCEA, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 23.

- glandulosa*, *Fernald*, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 534. — Mexic.
parvifolia, *Klatt*, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 360. — Venezuela.

LAGENANTHUS, Gilg. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 99. GENTIANAE.

- princeps*, *Gilg*, l. c. (= *Schlimia Princeps*, Regel). — N. Granat.

LAGENARIA, Ser. (Cucurbit.). — Ind. Kew. ii. 23.

- Lagenaria*, Cockerell, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 95 = vulgaris, *Seringe*.
verrucosa, Hort. ex *Gartenfl.* xxxix. (1890) 106 = vulgaris, *Seringe*.
virginialis, Hort. ex *Gard. Chron.* (1892) i. 85 fig. 16 = vulgaris, *Seringe*.

LAGENOCARPUS, Nees (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 23.

- campestris*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 754 = *Cryptangium campestre*, *Boeck*.
densifolius, Kuntze, l. c. = *C. Minarum*, *Boeck*.
humilis, Kuntze, l. c. = *C. humile*, *Boeck*.
junciformis, Kuntze, l. c. = *C. junciforme*, *Boeck*.
Kuntzeanus, Kuntze, l. c. = *C. Kuntzeanus*, *Boeck*.
leptocladus, Kuntze, l. c. = *C. leptocladum*, *Boeck*.
Minarum, Kuntze, l. c. = *C. Minarum*, *Boeck*.
polyphyllus, Kuntze, l. c. = *C. polyphyllum*, *Boeck*.
stellatus, Kuntze, l. c. = *Bras*.
strictus, Kuntze, l. c. = *Cryptangium uliginosum*, *Schrad*.
tenuifolius, Kuntze, l. c. = *C. tenuifolius*, *Boeck*.
triquetrus, Kuntze, l. c. = *C. triquetrum*, *Boeck*.
uliginosus, Kuntze, l. c. = *C. uliginosum*, *Schrad*.

LAGENOPHORA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 23.

- Harioti*, *Franch*, in *Miss. scient. Cap Horn*, v. Bot. (1889) (= *L. Commersonii*, *Hariot*). — Am. austr.
stragulata, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 471. — N. Zel.

LAGERSTROEMIA, Linn. (Lythrar.). — Ind. Kew. ii. 23.

- angustifolia*, *Pierre*, ex *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 323. — Cochinch.
Batitana, *Vidal*, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 139. — Ins. Philipp.
cochinchinensis, *Pierre*, ex *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 321. — Cochinch.
crispa, *Pierre*, l. c. 322. — Cochinch.
Koehneana, *K. Schum.* in *K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 85. — N. Guin.
nervosa, *Pierre*, ex *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 322. — Cochinch.
paniculata, *Vidal*, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 140 = *Pterocalymna paniculata*, *Turcz.*
petiolaris, *Pierre*, ex *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 321. — Cochinch.

LAGETTA, Juss. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 23.

- Wrightiana*, *Krug & Urban*, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 350. — Cuba.

LAGGERA, Sch.-Bip. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 23.

- falcata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 350 = *flava*, *Benth. & Hook. f.*
stenoptera, *O. Hoffm.* ex *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 76. — Afr. austro-occ. extratrop.
Volkensii, *O. Hoffm.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 408. — Afr. trop. or.

LAGOA, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1887) 260;

- Baill. Hist. des pl.* x. (1890) 251. ASCLEPIADEAE.
calcarata, *Baill.* l. c. (= *Zygostelma calcaratum*, *Fourn.*). — Bras.
calcarata, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 257 = praec.

LAGOPHYLLA, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 24.

- congesta*, *Greene*, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 199. — Calif.

LAGOSERIS, Hoffmigg & Link = Crepis, Linn. (Compos.).

- caspiaca*, *Paczosky*, *Expl. flor. et phyt. stepp. Kalmyks.* (1892) 90 [Bull. Soc. Natur. Kiev]. — Russia.
runcinata, *Boiss.* *Fl. Or. Suppl.* (1888) 329 (= *Pterotheca runcinata*, *Trautv.*). — Armenia.

LAGOTIS, J. Gaertn. (Selag.). — Ind. Kew. ii. 24.

- borealis*, *Baill.* ex *Wettst.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 87 (= *Gymnandra borealis*, *Pall.*) = *glauc*, *f. Gaertn.*
Gmelini, *Baill.* ex *Wettst.* l. c. (= *L. Gmelini*, *Rupr.*) = *glauc*, *f. Gaertn.*
Gregorjevi, *Krassn.* in *Script. Univ. Petrop.* ii. 1. (1887-88) 19. — China.
ramalana, *Batalin*, in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 177. — Tibet.
Stelleri, *Baill.* ex *Wettst.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1887) 87 (= *L. Stelleri*, *Rupr.*) = *glauc*, *f. Gaertn.*

LAGUNAEA, G. Don (Malv.). — Ind. Kew. ii. 25.

- Schinzii*, *Guerke*, ex *Schinz*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 180. — Afr. austro-occ. extratrop.

LAMANONIA, Vell. = Belangera, Cambess. (Saxif.).

- cuneata*, *denticulata*, *glabra*, *tomentosa*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 227 = *homonyma omnia* *Belangerae*.
grandistipularis, *Taub.* in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892) 16 = *Belangera grandistipularis*, *Taub.*

LAMIACANTHUS, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 492;

- Lindau*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 303. ACANTHACEAE.
viscosus, Kuntze, l. c. — Java.

LAMIMUM, [Tourn.] Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 25.

- balcanicum*, *Velen.* in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1892-93) 54. — Bulg.
holsaticum ×, *Prahl*, *Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 169. — Holsat.
pallidiflorum, *G. Beck*, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 144 = *maculatum*, *Linn.*
pelasgicum, *Heldr.* ex *Charrel*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 381, nomen. — Maced.
scardicum, *Wettst.* in *Luerss. Bibl. Bot.* Heft xxvi. (1892) 82. — Albania.
setidens, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 58. — As. Min.
sibiricum, *Cordem.* *Fl. Ile Réunion* (1895) 488 = *Leonurus sibiricus*, *Linn.*

LAMOUROUXIA H. B. & K. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 26.

- brevifolia*, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sc.* Ser. III. i. (1895) 170, sphalm. = *breviflora*, *Benth.*
coccinea, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 404 = *viscosa*, *H. B. & K.*
exserta, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. i. (1895) 171. — Mexic.
gracilis, *Robinson & Greenm.* l. c. 174. — Mexic.
hyssopifolia, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 404. — Mexic.
integerrima, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 189. — Guatem.
integerrima, *J. D. Smith*, ex *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. i. (1895) 173. — Mexic.
longifolia, *Robinson & Greenm.* l. c. 170 = *longiflora*, *Benth.*
Nilsonii, *Robinson & Greenm.* l. c. 174. — Mexic.
Pringlei, *Robinson & Greenm.* in *Gard. and For.* viii. (1895) 273 et 275 fig. 39; et l. c. 170. — Mexic.
Smithii, *Robinson & Greenm.* l. c. 172. — Mexic.

LAMPAYA, Phil. ex Murillo, Pl. medic. Chili

- (1889) 163, nomen; et in *Anal. Mus. Nac. Chile* (1891) 58. VERBENACEAE.
medicinalis, *Phil.* l. c. (1891) t. 2, fig. 5. — Chili.
officinalis, *Phil.* ex *Murillo*, *Pl. medic. Chili* (1889) 163, nomen [an praec. ?]. — Chili.

LAMPROCOCCUS, Beer = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).
brachycaulis, Éd. Morren, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 53 = *A. brachycaulis*, Baker.
speciosus, Hort. Bull., ex Gard. Chron. (1893) i. 414. — Hab. ?

LAMPROCONUS, Lem. = **Pitcairnia**, L'Hérit. (Bromel.).
aurantiacus, Éd. Morren, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 114, in syn. = *Pitcairnia densiflora*, Brongn.

LAMPROPHYLLUM, Miers = **Rheedia**, Linn. (Guttif.).
Gardnerianum, Miers, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 1. (1888) 462 (= *L. Gardnerianum*, Triana & Planch.) = *R. Gardneriana*, Planch. & Triana.

LANDESIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 546 err typ. = **LONESIA**, Fisch. & Mey. = **Chenolea**, Thunb. (Chenop.).

LANDOLPHIA, Beauv. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 27.
angustifolia, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 315. — Afr. trop. or.
bracteata, Dewèvre, in Annal. Soc. scient. Brux. xix. (1895) sep. 31. — Afr. trop. occ.
comorensis, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37 = *florida*, Benth.
crassipes, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 409, in obs.; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 130 (= *Vahea crassipes*, Radlk.). — Madag.
gummifera, K. Schum. ll. cc. (= *Vahea gummifera*, Poir.). — Madag.
Lecontei, Dewèvre, in Annal. Soc. scient. Brux. xix. (1895) sep. 25. — Congo gall.
lucida, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 130. — Congo.
madagascariensis, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 406, in obs. (= *Vahea madagascariensis*, Boj.). — Madag.
Monteiroi, [N. E. Br. in] Monteiro, Delagoa Bay. (1891) 160. — Mossamb.
parvifolia, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 50; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 129. — Angola.
Thollonii, Dewèvre, in Annal. Soc. scient. Brux. xix. (1895) sep. 50. — Congo gall.
tomentosa, Dewèvre. l. c. 41 (= *Vahea tomentosa*, Leprieur) = *L. Heudelotii*, A. DC.

LANDUKIA, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 446 = **Vitis**, [Tourn.] Linn. (Ampelid.).
Landuk, Planch. l. c. 447 = *V. Landuk*, Mig.

LANIUM, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 28.
Berkeleyi, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 392. — Bras.

LANKESTERIA, Lindl. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 28.
batangana, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Ruellia batangana*, J. Braun & K. Schum.). — Afr. trop. occ.

LANTANA, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 28.
amoena, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 52. — Ins. Fernando Noronha.
Chamissonis, Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 151 (= *Riedelia Chamissonis*, Schau.). — Bras.
concinna, Baker, in Kew Bull. (1895) 223. — Reg. Somal.
spicata, Benth. & Hook. f. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 504. — Reg. Argent.

LANTHORUS, Presl = **Loranthus**, Linn.
Blumeanus, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 488. — Java, Borneo.
Cumingii, Van Tiegh. l. c. 488. — Ins. Philipp.
macrostachys, Van Tiegh. l. c. = *L. macrostachys*, Korth

LANTHORUS : —

pentasepalus, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 488 = *L. pentasepalus*, Roxb.
pentapetalus, Van Tiegh. l. c. = *L. pentasepalus*, Van Tiegh.
polycarpus, Van Tiegh. l. c. = *L. polycarpus*, Wall.

LAPEYROUSIA, Pourr. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 30.

Barklyi, Baker, Handb. Irid. (1892) 171. — Afr. austro-occ. extratrop.
Burchellii, Baker, l. c. — Afr. austr.
caudata, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 213; Baker, l. c. 172. — Afr. austro-occ. extratrop.
coerulea, Schinz, l. c. 212; Baker, l. c. 168. — Afr. austro-occ. extratrop.
congesta, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 403. — Afr. trop. cr.
grandiflora, [N. E. Br. in] Monteiro, Delagoa Bay (1891) 171. — Reg. Mossamb.
holostachya, Baker, in Kew Bull. (1894) 391. — Afr. trop.
homoidea, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 5 1893 (1894) 191 (= *Gladiolus fissifolius*, Jacq.). — Afr. austr.
leptostachya, Baker, Handb. Irid. (1892) 170. — Natal.
Pappei, Baker, l. c. — Afr. austr.
Sandersoni, Baker, l. c. 169. — Transvaal.
Welwitschii, Baker, l. c. 168. — Angola.

LAPHAMIA, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. ii. 30; O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 257.
congesta, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 703. — Arizona.
gilensis, M. E. Jones, in Zool. ii. (1891) 15. — Am. bor. occ.
gracilis, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 703. — Arizona.
Toumeyii, Robinson & Greene, in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 176. — Am. bor.

LAPLACEA, H. B. & K. (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 30.
camellioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62, sphalm. = *camenioides*, Sond.
Courtyana, Kuntze, l. c. = *Curtyana*, A. Rich.
vulcanica, Kuntze, l. c., sphalm. = *vulcanica*, Korth.

LAPORTEA, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 30.
armata, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 293. — N. Guin.
sessiliflora, Warb. l. c. 292. — N. Guin.

LAPPA, [Tourn.] Rupp. = **Arctium**, Linn. (Compos.).
Ritschliana X, Aschers. in Ber. Deutsch. bot. Ges. ix. (1891) [99]. — Eur. centr.
subracemosa X, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 340. — Transsilv.

LAPPULA, Moench = **Echinosperrum**, Sw. (Borag.).
affinis, Guerke in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. affine*, Kar. & Kir.
anisacantha, Guerke l. c. 107 = *E. anisacanthum*, Turcz.
barbata, Guerke, l. c. = *E. barbatum*, Lehm.
brachycentra, Guerke, l. c. = *E. brachycentrum*, Lehm.
Bungei, Guerke, l. c. = *E. Bungei*, Boiss.
capensis, Guerke, l. c. = *E. capense*, DC.
ciliata, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. ciliatum*, A. Gray.
consanguinea, Guerke in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. consanguineum*, Fisch. & Mey.

LAPPULA : —

cynoglossoides, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. cynoglossoides*, Lehm.
deflexa, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 859 = *E. deflexum*, Lehm.
deflexa, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *praec.*
deflexa, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *deflexa*, Caruel.
diffusa, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. diffusum*, Lehm.
dipoloma, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. dipoloma*, Fisch. & Mey.
echinophora, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 214 = *E. Redowskii*, Lehm.
floribunda, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. floribundum*, Lehm.
heteracantha, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. heteracanthum*, Ledeb.
hispidia, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. hispidum*, A. Gray.
macrantha, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. macranthum*, Ledeb.
marginata, Guerke, l. c. 107 = *E. marginatum*, Lehm.
mexicana, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. mexicanum*, Hemsl.
microcarpa, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. microcarpum*, Ledeb.
nana, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 861 = *E. Eritrichium nanum*, Schrad.
nervosa, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. californicum*, A. Gray.
patula, Aschers. ex Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. patulum*, Lehm.
pilosa, Hitchcock, Spring Fl. Manhattan (1894) 30 = *E. Redowskii*, Lehm.
pinetorum, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. pinetorum*, Greene.
Redowskii, Greene, l. c. = *E. Redowskii*, Lehm.
Redowskii, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *praec.*
rupestris, Guerke, l. c. = *E. rupestre*, Schrenk.
sessiliflora, Guerke, l. c. = *E. sessiliflorum*, Boiss.
sinaica, Aschers. ex Schweinf. [Illustr. Fl. Egypte] in Mém. Inst. Egypt. ii. (1887) 111 = *E. sinaicum*, A. DC.
spinocarpa, Aschers. ex Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 215 = *E. Vahliaum*, Lehm.
stricta, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. strictum*, Ledeb.
stylosa, Guerke, l. c. = *E. microcarpum*, Ledeb.
tenuis, Guerke, l. c. = *E. tenue*, Ledeb.
texana, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 273 = *E. Redowskii*, Lehm.
tuberculosa, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. Vahliaum*, Lehm.
ursina, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. ursinum*, Greene.
virginiana, Greene, l. c. = *E. virginianum*, Lehm.

LAPSANA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 31.
cancellata, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 69, in obs. — Austria.
Freynii, Borb. l. c. = *intermedia*, Bieb.
glandulosa, Freyn & Sint. l. c. xlii. (1892) 266 = *intermedia*, Bieb.

LARIX, Tourn. ex Adans. (Conif.). — Ins. Kew. ii. 31.
amurensis, Hort. ex Beissner, Handb. Nadelholz. (1891) 328 = *dahurica*, Turcz.
Larix, Kern. & Wettst. in Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 104 = *seq.*
Larix, Sudw. in Gard. and For. ii. (1891) 166 = *europaea*, DC.

LARIX :—

Potanini, *Batalin*, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1894) 385. — Tibet.

LARREA, Cav. (Zygophyll.). — Ind. Kew. ii. 32. *tridentata*, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 75 = *mexicana*, Moric.

LASEGUEA, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 32. *bracteata*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 171. — Bras. Mandoni, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 220. — Bolivia.

LASERPITIUM, Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 32. *dauciforme*, Schmalh. ex Akinfiew, in *Bull. Soc. géogr. Cauc.* (1892) 207; et in *Ber. Deutsch. bot. Gesells.* x. (1892) 289. — Reg. Cauc. *glaucum*, Post, *Pl. Postianae*, ii. (1891) 10. — Syria.

LASIANATHERA, Beauv. (Oclacin.). — Ind. Kew. ii. 34. *amazonica*, Rodr. [*Herb. Mus. bot. Amaz. n.* 337]. *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 12, t. 7 A. — Bras. bor. *umbellata*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 117. — Perak.

LASIANTHUS, Jack (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 34. *euneurus*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 185. — Borneo. *glomeriflorus*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 92, nomen. — Afr. trop. *kilimandscharicus*, K. Schum. l. c. C (1895) 393. — Afr. trop. or. *kinabaluensis*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 184. — Borneo. *macrocalyx*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 130. — Afr. trop. *membranaceus*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 184. — Borneo. *rotundatus*, Stapf, l. c. 185. — Borneo. *trichophlebus*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 388. — China. *umbellata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 290. — Java.

LASIANTHUS, Linn. = **Gordonia**, Ellis (Ternstroem.). *acuminatus*, *ellipticus*, *excelsus*, *Maingayi*, *obtus*, *pubescens*, *pyramidalis*, *spicosus*, *zeylanicus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 63 = *homonyma omnia* *Gordoniae*. *axillaris*, Kuntze, l. c. = *G. anomala*, Spreng. *pyramidalis*, Kuntze, l. c. = *G. Lasianthus*, Linn.

LASIOCHLOA, Kunth (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 35. *alopecuroides*, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 393. — Natal.

LASIOCOCCA, Hook. f. *Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1587; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 456. **EUPHORBACEAE**. *sympylliaefolia*, Hook. f. ll. cc. — Reg. Himal.

LASIOCORYS, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 35. *Pechuellii*, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 271. — Afr. austro-occ. extratrop.

LASIODISCUS, Hook. f. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 35. *Pervillei*, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas* (1894) t. 290. — Madag.

LASIOSIPHON, Fresen. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 36. *Baroni*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 342. — Madag. *djuricus*, Gilg. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 269 = *Gnidia djurica*, Gilg. =

LASIOSIPHON :—

Emini, Engl. & Gilg. ex Gilg. in *Bot. Jahrb.* ii. (1894) 269 = *Gnidia Emini*, Engl. & Gilg. *Fischeri*, Engl. & Gilg. ex Gilg. l. c. = *G. Fischeri*, Engl. & Gilg. *genistifolius*, Engl. & Gilg. ex Gilg. l. c. 268 = *G. genistifolia*, Engl. & Gilg. *Hildebrandtii*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 47. — Madag. *Hildebrandtii*, Vatke, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 310 = *G. Vatkeana*, Engl. & Gilg. *Hoepfnerianus*, Vatke, ex Gilg. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 268 = *G. Hoepfneria*, Gilg. *Kraussii*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 310 = *G. djurica*, Gilg. *lampranthus*, Gilg. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 265 = *G. lamprantha*, Gilg. *Oliveri*, Vatke, ex Gilg. l. c. 264 = *G. Oliveriana*, Engl. & Gilg. *polyanthus*, Gilg. l. c. 265 = *G. polyantha*, Gilg. *rhamnifolius*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 343. — Madag. *saxatilis*, S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 46. — Madag. *Stuhlmanni*, Gilg. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 267. in syn. = *G. Stuhlmanni*, Gilg. *Vatkei*, Engl. *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 167, in obs. = *G. Vatkeana*, Engl. & Gilg. *usinjensis*, Gilg. l. c. xix. (1894) 269, in syn. = *G. usinjensis*, Gilg.

LASIORHIZA, Lag. = **Leuceria** Lag. (Compos.). *Barrasiana*, *canescens*, *concinna*, *coquimbensis*, *fragrans*, *Gayana*, *glabra*, *glabriuscula*, *integrifolia*, *Landbeckii*, *modesta*, *multifida*, *nutans*, Remy, Poeppigii. *polyclados*, *salina*, *tenerifolia*, *tenuisecta*, *thermarum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 350 = *homonyma omnia* (Chabraeae) *Leuceriae*. *amoena*, *candidissima*, *Cerveroana*, *coerulescens*, *congesta*, *erichlaena*, *floribunda*, *foliosa*, *Garciana*, *Menana*, *Meyeniana*, *multiflora*, *Neaei*, *oligocephala*, *paniculata*, *peduncularis*, *scrobiculata*, *tenuis*, Kuntze, l. c. 350 = *homonyma omnia* *Leuceriae*. *acanthodes*, Kuntze, l. c. = *L. acanthoides*, D. Don. *glandulosa*, Kuntze, l. c. = *L. glandulosa*, D. Don. *hieracioides*, Kuntze, l. c. = *L. hieracioides*, Cass. *Philippiana*, Kuntze, l. c. = *L. glandulosa*, Phil. *pulchella*, Kuntze, l. c. = *L. pulchella*, D. Don. *senecioides*, Kuntze, l. c. = *L. senecioides*, Hook. & Arn.

LASIOSTELMA, Benth. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 36. *Benthami*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 297. — Natal.

LASTARRIAEA, Remy (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 36. *linearis*, Phil. ex Parry, in *Proc. Davenport Acad. Sci.* v. (1886) 36; et in *Anal. Univ. Chili*, xci. (1895) 501. — Chili. *stricta*, Phil. ll. cc. 501 et 36. — Chili.

LASTHENIA, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 36. *Burkei*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 204. — Calif. *carnosa*, Greene, l. c. 205. — Calif. *chrysanthia*, Greene, l. c. 204. — Calif. *chrysostoma*, Greene, l. c. 205. — Calif. *conjugens*, Greene, *Pittonia*, i. (Oct. 1888) 221; et l. c. 204. — Calif. *Fremonti*, Greene, l. c. — Calif. *gracilis*, Greene, l. c. 206. — Calif. *hirsutula*, Greene, l. c. — Calif. *macrantha*, Greene, l. c. 205. — Calif. *microglossa*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 205. — Calif. *platycarpa*, Greene, l. c. — Calif. *tenella*, Greene, l. c. 205. — Calif. *uliginosa*, Greene, l. c. — Calif. *Volkmanni*, Phil. in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 369, t. 1302, fig. 1. — Chili.

LATANIA, Comm. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 36. *borbonica*, Hort. ex W. Wats. in *Gard. Chron.* (1886) i. 75 = *Livistona chinensis*, Mart.

LATHRAEA, Linn. (Orobanch.). — Ind. Kew. ii. 37. *purpurea*, Cummins, ex King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 137. — Reg. Himal. *slaminea*, Janka, in *Magyar. Növényt. Lapok*, x. (1886) 148 = *squamaria*, Linn.

LATHYRUS, [Tourn.], Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 37. *Alfredi*, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 449. — Calif. *alpestris*, Taub. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 354 (= *Orobus alpestris*, Waldst. & Kit.) = *canescens*, Gren. & Godr. *arizonicus*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 454. — Arizona. *armenus*, Celak, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 85 (= *Orobus armenus*, Boiss. & Huet). — Armenia. *asphodeloides*, St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd.* 8. ii. (1889) 209 (= *O. asphodeloides*, Gouan) = *pannonicus*, Garke. *Bauhini*, Genty, in *Bull. Soc. Dauph. Sér. 2.* iii. (1892) 90 = *canescens*, Gren. & Godr. *bijugatus*, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 457. — Idaho. *brachypterus*, Celak, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 47. — As. Min. *canescens*, Taub. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 354 (= *Orobus canescens*, Linn. f.) = *canescens*, Gren. & Godr. *cicerinus*, St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd.* 8. ii. (1889) 206 = *L. Cicer*, Linn. *cinctus*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 263. — Calif. *coriaceus*, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 452. — Utah. *cyaneus*, Celak, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 46 (= *Orobus cyaneus*, Stev.) = *cyaneus*, C. Koch. *Dinklagei*, Engl. *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 94. — Afr. trop. occ. *elegans*, Porta & Rigo, ex Porta, in *Atti Accad. Agiati*, ix. (1891) extr. 23; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 240. — Hisp. *Emodi*, Fritsch, in *Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien*, civ. (1895) 516 (= *L. luteus*, Baker). — Reg. Himal. *filiformis*, Celak, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 47 (= *O. canescens*, Boiss.). — Thracia. *filiformis*, Genty, in *Bull. Soc. Dauph. Sér. 2.* iii. (1892) 91 (= *Orobus filiformis* Lam.) = *canescens*, Linn. f. *gracillimus*, Reiche, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 47, nomen. — Chili. *graminifolius*, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 454 = *palustris*, Linn. *hygrophilus*, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 219. — Afr. trop. or. *Jepsonii*, Greene, *Pittonia*, ii. (Dec. 1890) 158; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 85. — Calif. *kilimandscharicus*, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 219. — Afr. trop. or. *laetiflorus*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 105; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 451. — Calif. *laevigatus*, Fritsch, in *Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien*, civ. (1895) 517 (= *Orobus laevigatus*, Waldst. & Kit.) = *montanus*, Bernh. ? *laxiflorus*, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 185 (= *Orobus laxiflorus*, Desf.) = *hirsutus*, Linn. *Layardi*, Ball, ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 195. — Persia. *Libani*, Fritsch, in *Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien*, civ. (1895) 517 (= *Orobus grandiflorus*, Boiss.). — Syria. *longipes*, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 453. — Mexic. *macrorrhizus*, St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd.* 8. ii. (1889) 208 = *montanus*, Bernh. *nissolia*, St. Lager, l. c. 204 = *L. Nissolia*, Linn. *numidicus*, Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 388; et in *Batt. & Traß. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 279. — Algeria.

LATHYRUS —

- Nuttallii, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 450. — Am. bor. occ.
obovatus, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 455 = *nevadensis*, S. Wats.
occidentalis, Fritsch, in *Sitzungsb. Akad. Wiss.* Wien, civ. (1895) 499, in obs. et 517 = *montanus*, Bernh.
oregonensis, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 456. — Oregon.
pauciflorus, Fernald, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 335. — Oregon.
puberulus, White?, ex Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 85. — Calif.
rigidus, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 455. — Oregon.
Schimper, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 265. — Abyss.
Sibthorpii, Baker, in *Gard. Chron.* (1890) i. 704. — Reg. Byzant.
spathulatus, Celak. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 6. — As. Min.
subvillosus, Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1888) 59 (= *Orobis subvillosus*, Ledeb.) = *Vicia subvillosa*, Boiss.
transsilvanicus, Fritsch, in *Sitzungsb. Akad. Wiss.* Wien, civ. (1895) 517 (= *Orobis transsilvanicus*, Spreng.) = *montanus*, Bernh.
Tremoliansus, Pau, *Not. bot. Fl. Espan.* iv. (1891) 29 [cf. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1892) *Bibl.* 99-100] = *O. canescens*, Linn. f.?
utahensis, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 678. — Utah.
variabilis, Celak. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1888) 47 (= *Orobis variabilis*, Boiss. & Kotschy). — Cilicia.
varius, Cesati, Passer. & Gibelli, *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 690 = *pannonicus*, Garcke.
violaceus, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 105; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 451. — Calif.

LATOUREA, Benth. & Hook. f. = LATOURIA, Blume = **Dendrobium**, Sw. (Orchid.).
oncidiocchila, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 336. — N. Guin.

LATUA, Phil. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 39.

pubiflora, Baill. *Hist. des pl.* ix. (1888) 334 = *venenata*, Phil.

LAUGERIA, Vahl (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 39.
densiflora, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. [Pl. of Baham.] (1893) 93 = *densiflora*, Benth. & Hook. f.

LAUNAEA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 39.
glabra, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1887-88) 42. — China occ.
goracensis, O. Hoffm. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 370 (= *Brachyramphus goracensis*, DC.) = *Lactuca goracensis*, Sch. Bip.
lampsanoides, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1887-88) 42. — Tibet.

LAUNAYA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 350 = **Launea**, Cass. (Compos.).
acanthodes, Kuntze, l. c. — Persia.
angustifolius, Kuntze, l. c. (= *Zollikoferia arabica*, Boiss.). — Arabia, Afr. bor.
Cassiniana, Kuntze, l. c. — Aegypt.; Arabia.
fallax, Kuntze, l. c. — Aegypt.; Persia, Afghan.
massavensis, Kuntze, l. c. — Afr. bor.; Arabia.
polyclada, Kuntze, l. c. — Persia; Beluchist.
pumila, Kuntze, l. c. — Hispan.; Arabia.
resedifolia, Kuntze, l. c. = *Sonchus chondrilloides*, Desf.
stenocephala, Kuntze, l. c. — Beluchist.
Stochsiana, Kuntze, l. c. — Beluchist.
temuloba, Kuntze, l. c. — Syria; Arabia.

LAURENTIA, Michx. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 39.
ovatifolia, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 166. — Mexic.

LAURIDIA, Eckl. & Zeyh. = **Elaeodendron**, Jacq. (Celastr.).

LAURIDIA : —

multiflora, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 38. — Afr. austro-occ. extratrop.

LAUROCERASUS, [Tourn.] M. Roem. = **Prunus**, Linn. (Rosac.).
colchica, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* iii. (1893) 649 = *P. Laurocerasus*, Linn.
myrtifolia, Hort. ex Dippel, l. c. 650 et 736 = *P. lusitanica*, Linn.

LAUTEMBERGIA, Baill. = **Alchornea**, Sw. (Euphorb.).

coriacea, Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1890) 56 = *A. coriacea*, Muell. Arg.

LAVANDULA, Tourn. ex Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 43.

Allardi X, F. Hy. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. Append. I. (1895) 16. — Gall.

aurigerana, Mailho, in *Bull. Soc. Bot. Rochel.* (1889) 42 = *L. Spica*, Cav.

bipinnata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 521 = *L. Burmanni*, Benth.

Burnati X, Briq. *Lab. Alp. Marit.* iii. (1895) 468. — Gall. mer.

foliosa, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 130. — Ins. Canar.

hybrida, Reverchon, ex Briq. *Lab. Alp. Marit.* iii. (1895) 469 = *L. Spica*, Cav.

macra, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 339. — Arabia.

LAVATERA, Linn. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 43.

Davaei, Pereira Continho, in *Bolet. Soc. Brot.* xi. (1893) 122. — Lusit.

microphylla, Baker, f. in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 211. — Marocco.

pseudo-trimestris, Rouy, ex Pereira Continho, in *Bolet. Soc. Brot.* xi. (1893) 127, in obs. = *trimestris*, Linn.

Rigoi, Porta, in *Nouv. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 300. — Ins. Balear.

stenopetala, Coss. & Durieu, [in *Bourg. Pl. Algér. exsic.* (1856)] ex Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 113; Coss. *Ill. Fl. Alg.* ii. (1893) 8 t. 100. — Algeria.

LAVAUXIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).

brachycarpa, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 235 = *Oe. brachycarpa*, Britton.

triloba, Raim. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 215 = *Oe. triloba*, Nutt.

LAVIDIA, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 837. **COMPOSITAE**.

caespitosa, Phil. l. c. — Potag.

LAVIGERIA, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 17 (1892) sub t. 267. **OLACINEAE**.

macrocarpa, Pierre, l. c. (= *Icecina macrocarpa*, Oliver). — Ins. Fernando-Po.

salutaris, Pierre, l. c. — Congo gall.

LAVOISIERA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 44.

angustifolia, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 595. — Bras.

caparaensis, Schwacke & Cogn. ex Schwacke, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 28 (1890) 10; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 95. — Bras.

minor, Cogn. l. c. 94. — Bras.

paulensis, Cogn. l. c. 89. — Bras.

Schwackeana, Glaziov, ex Cogn. l. c. 90. — Bras.

uliginosa, Cogn. l. c. 88. — Bras.

LAWEA *berberifolia* « Lindl. » ex Dippel, *Handb. Laubholz* iii. (1893) 601, sphalm. (= *Lowea berberifolia*, Lindl.) = *Rosa berberifolia*, Pall.

LAWIA, Griff. ex Tul. = **Terniola**, Tul. (Podost.).

Dalzellia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 562 = *T. Lawii*, Wedd.

foliosa, Kuntze, l. c. = *T. foliosa*, Wedd.

pedunculatus, Kuntze, l. c. = *T. pedunculatus*, Wedd.

ramosissima, Kuntze, l. c. = *T. ramosissima*, Wedd.

LAYIA, Hook. & Arn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 45.

hispidia, Greene, *Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 20. — Calif.

LAZAROLUS, Medic. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).
Pollverii, « Medic. » ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 177 (= *L. Pollveria*, Medic.) = *Pyrus auricularia*, Knoop.

LEANDRA, Raddi (Melast.). — Ind. Kew. ii. 45.

acuminata, Cogn. in *Mart. Pl. Bras.* xiv. IV. (1886) 143. — Bras.

acutiflora, Cogn. l. c. 162 (= *Clidemia acutiflora*, Naud.). — Bras.

adenothrix, Cogn. l. c. 165. — Bras.

alpestris, Cogn. l. c. 128 (= *Clidemia alpestris*, Gardn.). — Bras.

alterninervia, Cogn. l. c. 115. — Bras.

anisophylla, Cogn. l. c. 186 (= *Clidemia anisophylla*, DC.). — Guiana.

aptera, Cogn. l. c. 127 (= *C. aptera*, DC.). — Bras.

aristigera, Cogn. l. c. 185 (= *Oxymeris aristigera*, Triana). — Bras. Peruv.

aspera, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 655. — Bras.

atrata, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 189. — Bras.

atropurpurea, Cogn. l. c. 106. — Bras.

atroviridis, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 644. — Bras.

attenuata, Cogn. l. c. 617. — Bras.

aurea, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 142 (= *Clidemia aurea*, Cham.). — Bras.

australis, Cogn. l. c. 104 (= *C. australis*, Cham.). — Bras.

Balansaei, Cogn. l. c. 106. — Parag.

barbinervis, Cogn. l. c. 159 (= *Oxymeris barbinervis*, Cham.). — Bras.

Bergiana, Cogn. l. c. 89. — Bras.

Blanchetiana, Cogn. l. c. 122. — Bras.

Boissieriana, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 184. — Peruvia.

boliviensis, Cogn. ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 29. — Bolivia.

Brackenridgei, Cogn. l. c. 179 (= *Oxymeris Brackenridgei*, Triana). — Bras.

breviflora, Cogn. l. c. 182. — Bras.

calvescens, Cogn. l. c. 170 (= *Oxymeris calvescens*, Triana). — Bras.

cancellata, Cogn. l. c. 103. — Bras.

carassana, Cogn. l. c. 120 (= *Clidemia carassana*, DC.) — Bras.

cardiophylla, Cogn. l. c. 99. — Bras.

catharinensis, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1188. — Bras.

chaetocalyx, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 168 (= *Clidemia chaetocalyx*, A. Gray). — Bras.

chaetodon, Cogn. l. c. 178 (= *C. chaetodon*, Naud.). — Am. trop.

ciliolata, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 663. — Bras.

cinerea, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 71 (= *Clidemia cinerea*, Griseb.). — Cuba.

cinnamomea, Cogn. l. c. 77 (= *Oxymeris cinnamomea*, Triana). — N. Granat.

circumscissa, Cogn. l. c. 154. — Bras.

confusa, Cogn. l. c. 119. — Bras.

cordifolia, Cogn. l. c. 98 (= *Clidemia cordifolia*, Naud.). — Bras.

cordigera, Cogn. l. c. 166 (= *Oxymeris cordigera*, Triana). — Bras.

coriacea, Cogn. l. c. 608. — Bras.

cornioides, Cogn. l. c. 76 (= *Oxymeris cornioides*, Triana). — Mexic.

costaricensis, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 658; et ex Th. Dur & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 248. — Costarica.

crenata, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 137 (= *Clidemia crenata*, Don). — Bras.

cuneata, Cogn. l. c. 161 (= *C. cuneata*, Naud.). — Bras.

cuspidata, Cogn. l. c. 175 (= *Oxymeris cuspidata*, Triana). — Bras.

dasytricha, Cogn. l. c. 113 (= *Clidemia dasytricha*, A. Gray). — Bras.

debilis, Cogn. l. c. 174 (= *C. debilis*, Naud.). — Bras.

LEANDRA: —

- deflexa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 168 (= *Oxymeris deflexa*, Triana). — Bras.
dendroides, *Cogn. l. c.* 190 (= *O. dendroides*, Triana). — Bras.
dentata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 662. — Bras.
dichotoma, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 200 (= *Clidemia dichotoma*, D. Don). — Am. trop.
diffusa, *Cogn. l. c.* 146. — Bras.
dispar, *Cogn. l. c.* 117 (= *Clidemia dispar*, Naud.). — Bras.
divaricata, *Cogn. l. c.* 196 (= *C. divaricata*, Naud.). — Afr. trop.
dolichantha, *Cogn. l. c.* 105 (= *C. dolichantha*, Naud.). — Bras.
dolichodons, *Cogn. l. c.* 176. — Bras.
echinata, *Cogn. l. c.* 607. — Bras.
eggersiana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 641. — Ins. Jamaica.
Eichleri, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 140. — Bras.
erinacea, *Cogn. l. c.* 98. — Bras.
eriocalyx, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 642. — Bras.
erostrata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 139 (= *Clidemia erostrata*, DC.). — Bras., Bolivia.
fallax, *Cogn. l. c.* 125 (= *C. fallax*, Cham.). — Bras.
fastigiata, *Cogn. l. c.* 154. — Bras.
Fendleri, *Cogn. l. c.* 145. — Venezuela.
flavescens, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 631. — Bras.
floribunda, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 135 (= *Oxymeris floribunda*, Triana). — Bras.
fluminensis, *Cogn. l. c.* 169. — Bras.
foveolata, *Cogn. l. c.* 100 (= *Clidemia foveolata*, DC.). — Bras.
fragilis, *Cogn. l. c.* 88. — Bras.
Francavillana, *Cogn. l. c.* 197. — Bras.
Freyreissii, *Cogn. l. c.* 190. — Bras.
fulva, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 658. — Costarica.
Gardneriana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 96. — Bras.
glabrata, *Cogn. l. c.* 172 (= *Clidemia glabrata*, Bunbury). — Bras.
glandulifera, *Cogn. l. c.* 207 (= *Oxymeris glandulifera*, Triana). — Bras.
Glazioviana, *Cogn. l. c.* 86. — Bras.
gracilis, *Cogn. l. c.* 163. — Bras.
grandifolia, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 690; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 250. — Costarica.
Grayana, *Cogn. l. c.* 665. — Bras.
Herinquiniana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 129. — Parag.
heterobasis, *Cogn. l. c.* 193. — Bras.
hirtella, *Cogn. l. c.* 187. — Bras.
horrida, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1188. — Bras.
inaequalifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 206 (= *Clidemia inaequalifolia*, DC.). — Bras.
intermedia, *Cogn. l. c.* 193 (= *Oxymeris intermedia*, Triana). — Bras.
ionopogon, *Cogn. l. c.* 129 (= *O. ionopogon*, Triana). — Bras.
Itatiaiae, *Cogn. l. c.* 173 (= *O. Itatiaiae*, Wawra). — Bras.
laevigata, *Cogn. l. c.* 177 (= *O. laevigata*, Triana). — Bras.
lancifolia, *Cogn. l. c.* 145. — Bras.
lacunosa, *Cogn. l. c.* 138. — Bras.
lasiopetala, *Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 249. — Costarica.
lasiostachya, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 172. — Bras.
laxa, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 642. — Bras.
Lehmannii, *Cogn. in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 20; et l. c. 657. — Columb.
limbata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 180. — Bras.
Lindeniana, *Cogn. l. c.* 136. — Bras.
linearifolia, *Cogn. l. c.* 149. — Bras.
longibarbis, *Cogn. l. c.* 107 (= *Clidemia longibarbis*, DC.). — Bras.

LEANDRA: —

- longicoma, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 202. — Bras.
longisetosa, *Cogn. l. c.* 181. — Bras.
longistyla, *Cogn. l. c.* 80. — Bras.
lutea, *Cogn. l. c.* 152. — Bras.
macropora, *Cogn. l. c.* 171 (= *Oxymeris macropora*, Triana). — Bras.
melanodesma, *Cogn. l. c.* 73 et 115 (= *Clidemia melanodesma*, Naud.). — Am. trop.
membranifolia, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 682. — Bras.
mexicana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 57 (= *Clidemia mexicana*, Cogn.). — Mexic., Guatem.
miconiastrum, *Cogn. l. c.* 147 (= *C. miconiastrum*, Naud.). — Bras.
micropetala, *Cogn. l. c.* 205 (= *C. micropetala*, Naud.). — Bras.
microphylla, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 655. — Bras.
mollis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 126. — Bras.
Mosenii, *Cogn. l. c.* 114. — Bras.
Mouraei, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 663. — Bras.
multiplinervis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 180 (= *Clidemia multiplinervis*, Naud.). — Am. trop.
multisetosa, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 632. — Bras.
nervosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 73 (= *Clidemia nervosa*, Naud.). — Peruv., Ecuad.
neurotricha, *Cogn. l. c.* 160. — Bras.
Nianga, *Cogn. l. c.* 96 (= *Clidemia Nianga*, DC.). — Bras.
niangaeformis, *Cogn. l. c.* 93. — Bras.
Niederleinii, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1188. — Reg. Argent.
nutans, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 676. — Bras.
oblongifolia, *Cogn. l. c.* 649. — Bras.
oligochaeta, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 101 (= *Clidemia oligochaeta*, Cham.). — Bras.
organensis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 659. — Bras.
organensis, *Cogn. l. c.* 622 = therezopolitana, *Cogn. ossaeoides*, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 75 (= *Clidemia ossaeoides*, Naud.). — Venez.
ovata, *Cogn. l. c.* 134. — Bras.
pallida, *Cogn. l. c.* 167. — Bras.
papillata, *Cogn. l. c.* 108. — Bras.
paraguayensis, *Cogn. l. c.* 208 (= *Oxymeris paraguayensis*, Triana). — Parag.
parvifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 150. — Bras.
pectinata, *Cogn. l. c.* 78. — Bras.
penduliflora, *Cogn. l. c.* 176 (= *Clidemia penduliflora*, Naud.). — Bras.
pennipilis, *Cogn. l. c.* 144 (= *Oxymeris pennipilis*, Triana). — Bras.
Pickeringii, *Cogn. l. c.* 183 (= *O. Pickeringii*, Triana). — Bras.
pilosissima, *Cogn. l. c.* 130. — Bras.
polychaeta, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1186. — Bras.
polystachya, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 132 (= *Clidemia polystachya*, Naud.). — Bras.
pubescens, *Cogn. l. c.* 188 (= *Oxymeris pubescens*, Triana). — Bras.
pulchra, *Cogn. l. c.* 163. — Bras.
pulverulenta, *Cogn. l. c.* 138 = Grayana, *Cogn. pulverulenta*, *Cogn. l. c.* 208 (= *Oxymeris pulverulenta*, Triana). — Guian. gall.
purpurascens, *Cogn. l. c.* 110 (= *Clidemia purpurascens*, DC.). — Bras.
pustulata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 636. — Bras.
quinquedentata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 156 (= *Oxymeris quinquedentata*, DC.). — Bras.
quinquenodis, *Cogn. l. c.* 157 (= *O. quinquenodis*, DC.). — Bras.
refracta, *Cogn. l. c.* 186. — Bras.
Regnellii, *Cogn. l. c.* 116 (= *Oxymeris Regnellii*, Triana). — Bras.

LEANDRA: —

- retropila, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 198. — Bras., Peruvia.
reversa, *Cogn. l. c.* 198 (= *Oxymeris reversa*, Triana). — Bras.
rhamnifolia, *Cogn. l. c.* 194 (= *Clidemia rhamnifolia*, Naud.). — Bras.
rhodopogon, *Cogn. l. c.* 109 (= *C. rhodopogon*, DC.). — Bras.
ribesiaeiflora, *Cogn. l. c.* 121 (= *C. ribesiaeiflora*, Cham.). — Bras.
Riedeliana, *Cogn. l. c.* 164 (= *Oxymeris Riedeliana*, Triana). — Bras.
rigida, *Cogn. l. c.* 134. — Bras.
rubida, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 679. — Bras.
rufescens, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 204 (= *Tschudya rufescens*, DC.). — Bras., Guiana.
salicina, *Cogn. l. c.* 150 (= *Melastoma salicina*, Sw.). — Bras.
Schwackei, *Cogn. l. c.* 610. — Bras.
secunda, *Cogn. l. c.* 199 (= *Oxymeris secunda*, Triana). — Bras., Peruv.
secundiflora, *Cogn. l. c.* 195 (= *Clidemia secundiflora*, DC.). — Bras., Peruv.
sessiliflora, *Cogn. l. c.* 610. — Bras.
sessilifolia, *Cogn. l. c.* 75 (= *Oxymeris sessilifolia*, Triana). — N. Granat.
simplicicaulis, *Cogn. l. c.* 141 (= *Clidemia simplicicaulis*, Naud.). — Bras.
solenifera, *Cogn. l. c.* 192 (= *Melastoma solenifera*, Triana). — Am. trop.
strigilliflora, *Cogn. l. c.* 126 (= *Clidemia strigilliflora*, Naud.). — Bras.
Saldanhaei, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 666. — Bras.
Schenckii, *Cogn. l. c.* 636. — Bras.
sphaerocarpa, *Cogn. l. c.* 676. — Bras.
stellulata, *Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 58; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 660. — Bolivia.
sublanata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 118. — Bras.
subtrinervis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 677. — Bras.
subseriata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 73 (= *Clidemia subseriata*, Naud.). — Am. trop.
sulfurea, *Cogn. l. c.* 153 (= *C. sulfurea*, Naud.). — Bras.
sylvatica, *Cogn. l. c.* 131. — Bras.
tetragona, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 635. — Bras.
tetraptera, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 111. — Bras.
tetraquetra, *Cogn. l. c.* 112 (= *Clidemia tetraquetra*, Cham.). — Bras.
ternata, *Cogn. l. c.* 142. — Bras.
therezopolitana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1186. — Bras.
tomentosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 609. — Bras.
trauninensis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 666. — Bras.
tristis, *Cogn. l. c.* 1187. — Bras.
Ulaei, *Cogn. l. c.* 1186. — Bras.
Urbaniana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 148. — Bras.
urophylla, *Cogn. l. c.* 184 (= *Oxymeris urophylla*, Triana). — Bras.
velutina, *Cogn. l. c.* 155 (= *Clidemia velutina*, Naud.). — Bras.
verticillata, *Cogn. l. c.* 203 (= *Tschudya verticillata*, DC.). — Guian. gall.
vesiculosa, *Cogn. l. c.* 158. — Bras.
viscosa, *Cogn. l. c.* 133. — Bras.
Warmingiana, *Cogn. l. c.* 102. — Bras.
xanthocoma, *Cogn. l. c.* 124 (= *Clidemia xanthocoma*, Naud.). — Bras.
xantholasia, *Cogn. l. c.* 94 (= *C. xantholasia*, DC.). — Bras.
xanthopogon, *Cogn. l. c.* 123 (= *C. xanthopogon*, Naud.). — Bras.
xanthostachys, *Cogn. l. c.* 93. — Bras.

- LEAVENWORTHIA**, Torr. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 45.
uniflora, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 171 = Michauxii, Torr.
- LEBECKIA**, Thunb. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 45.
inflata, Baker, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1576. — Afr. austr.
longipes, Bolus, in Hook. l. c. t. 1552. — Afr. austr.
retamoides, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1885) t. 44 C — Madag.
Wrightii, Bolus, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) sub t. 1552. — Afr. austr.
- LECANORCHIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 46.
malaccensis, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 371. — Penins. Mal.
- LECANOSPERMA**, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 430. **RUBIACEAE**.
lycioides, Rusby, l. c. 431, t. 148. — Bolivia.
- LECHEA**, Kalm (Cistin.). — Ind. Kew. ii. 46.
divaricata, Shuttlew. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 249. — Florida.
intermedia, Leggett, ex Britton & Hollick, in Rep. Geol. Surv. New Jersey ii. (1889) 54 = Leggettii, Britton & Hollick,
Leggettii, Britton & Hollick, ex Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 6. — Am. bor.
maritima, Leggett, ex Britton & Hollick, in Rep. Geol. Surv. New Jersey, ii. (1889) 56 = thymifolia, Michx.
stricta, Leggett, ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 251. — Am. bor.
tripetala, Britton, l. c. 252 = Skinneri, Benth.
- LECONTEA**, A. Rich. (Rubiaceae). — Ind. Kew. ii. 46.
farinosa, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 486. — Madag.
- LECOQUIA**, Caruel, Epit. Fl. Eur. ii. (1894) 261 = **Lecokia**, DC. (Umbell.).
- LEDOCARPUM**, DC. = **Balbisia**, Cav. (Geran.).
microphyllum, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 11. — Am. austr. occ.
- LEEA**, Royen, ex Linn. (Ampelid.). — Ind. Kew. ii. 47.
cuspidifera, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 461. — Madag.
Naumannii, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 466. — Melanesia.
- LEERSIA**, Soland. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 48.
japonica, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.
oryzoidea, « Linn. » ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 899 = oryzoides, Sm.
- LEFEBURIA**, A. Rich. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 48.
benguellensis, Welw. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 322. — Angola.
longipedicellata, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 300. — Afr. trop. or.
Stuhlmannii, Engl. l. c. — Afr. trop. or.
Upingtoniae, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 206. — Afr. austro-occ. extratrop.
Welwitschii, Engl. in Engl. en Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 322. — Angola.
- LEFROVIA**, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 378. **COMPOSITAE**.
rhaponticoides, Franch. l. c. — Bolivia.
- LEGOUSIA**, Durande, ex Hedw. = **Specularia**, Heist. (Campanul.).
hybrida, Gérard, in Rev. bot. (1890) 168 [sphalm. Legouxia] = S. hybrida, A. DC.
- LEGGOUZIA**, Delarbre = **LEGOUSIA**, Durande = **Specularia**, Heist. (Campanul.).
biflora, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 109 = S. biflora, A. Gray.
coloradoense, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. i. [Bot. Explor. S. Texas] (1895) 99 = S. Lindheimeri, Vathe.
leptocarpa, Britton, l. c. = S. leptocarpa, A. Gray.
perfoliata, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1893) 309 = S. perfoliata, A. DC.
- LEHMANIELLA**, Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1895) 101. **GENTIA-NEAE**.
acuminata, Gilg, l. c. — Columbia vol. Ecuad. ?
- LEIOCHILUS**, Knowles & Westc. = **Leochilus**, Knowles & Westc. (Orchid.).
labiatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 656 = L. cochlearis, Lindl.
- LEIOLUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 285 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).
pubens, Baill. l. c. = L. pubens, Mart. & Miq.
- LEIOPHYLLUM**, Hedw. f. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 49.
pyrolaeiflorum, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 436 = Tolmiea occidentalis, Hook.
- LEIPHAIMOS**, Schlecht. & Cham. = **Voyria**, Aubl. (Gentian.).
angustiloba, Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 104 = V. angustiloba, Spruce.
aphylla, Gilg, l. c. = V. aphylla, Pers.
azurea, Gilg, l. c. 105. — Venez.
clavata, Gilg, l. c. = V. clavata, Splitg.
corymbosa, Gilg, l. c. = V. corymbosa, Splitg.
flavescens, Gilg, l. c. = V. flavescens, Griseb.
leucantha, Gilg, l. c. = V. leucantha, Miq.
nivea, Gilg, l. c. = V. nivea, Miq.
nuda, Gilg, l. c. = V. nuda, Splitg.
obconica, Gilg, l. c. = V. obconica, Progel.
platypetala, Gilg, l. c. = V. platypetala, Baker.
primuloides, Gilg, l. c. = V. primuloides, Baker.
Spruceana, Gilg, l. c. 105 = V. Spruceana, Benth.
sulphurea, Gilg, l. c. = V. sulphurea, Prog.
trinitensis, Gilg, l. c. = V. trinitensis, Griseb.
- LEITGEBIA**, Eichl. (Violar.). — Ind. Kew. ii. 50.
im-Thurniana, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 271, t. 37; Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 189. — Guian. angl.
- LEMNA**, Linn. (Lemnac.). — Ind. Kew. ii. 50.
disperma, Hegelm. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 290. — Austral.
- LEMURORCHIS**, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 58. **ORCHIDEAE**.
madagascariensis, Kraenzl. l. c. 58. — Madag.
- LENS**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 51.
Lenticula, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 388 = L. Lenticula, Alef.
villosa, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 277 (= *Ervum villosum*, Pomel). — Algér.
- LENTISCUS**, Linn. = **Pistacia**, Linn. (Anacard.).
atlantica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 152 = P. atlantica, Desf.
chinensis, Kuntze, l. c. 153 = P. chinensis, Bunge.
Kakrasinghee, Kuntze, l. c. 152 = P. Khinjuk, Stocks.
mexicana, Kuntze, l. c. 153 = P. mexicana, H. B. & K.
musica, Kunze, l. c. = P. mutica, Fisch. & Mey.
Terebinthus, Kuntze, l. c. = P. Terebinthus, Linn.
vera, Kuntze, l. c. = P. vera, Linn.
- LENZIA**, Phil. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 51.
vernonioides, Sch. Bip. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1892) 414. — Chili.
- LEONITIS**, Spach = **Leonotis**, R. Br. (Labiata.).
malacophylla, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 142. — Natal.
mollissima, Guerke, l. c. 141. — Afr. trop.
Schinzi, Guerke, l. c. 143 — Afr. austro-occ.
- LEONOTIS**, R. Br. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 51.
Bachmannii, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 143. — Transv., Natal.
decadonta, Guerke, l. c. 144. — Afr. trop. or.
latifolia, Guerke, l. c. 143. — Natal.
laxifolia, MacOwan, in Kew Bull. (1893) 13. — Afr. austr.
- LEONTICE**, Linn. (Berberid.). — Ind. Kew. ii. 51.
alpina, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 493 = altaica, Pall.
- LEONTODON**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 51.
ciliatus, Terrac, in Ann. Ist. bot. Roma, iv. 1889-90 (1891) 174 (= *Afargia ciliata*, Presl) = Preslii, DC.
clavatus, Sagorsky & Schneider, Fl. Centralkarpat. (1891) 254; et ex Pötfuzetek (1892) 141 = L. Taraxaci, Loisel.
Djurdjurae, Coss. & Durieu, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 541. — Algeria.
Ehrenbergii, Hort. Kew. ex Gard. Kew. Herb. Pl. (1895) 259 (= *Hemilepis Ehrenbergii*, Kuntze). — Hab. ?
Haussnechtii, Uechtr. ex Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 87. — Graecia.
hispanicum, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 540 = hispanicum, Poir.
leontodontoides, Batt. in Batt. & Trab. l. c. 539 (= *Millina leontodontoides*, Cass.) = fasciculatus, Nym.
medius, Simonk. in Bot. Centralbl. xlix. (1892) 268 (= *Afargia media*, Host) = pyrenaicus, Gouan.
nudicaule, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 348 = hirtus, Linn.
Reboudianum, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 540 (= *Fidelia Reboudiana*, Pomel). — Algeria.
Reverchonii, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 109; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 547 = pyrenaicus, Gouan.
Salzmannii, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 540 = Salzmannii, Ball.
tingitanum, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 539 = tingitanus, Ball.
tuberosum, Batt. l. c. = tuberosus, Linn.
- LEONTOPODIUM**, R. Br. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 53.
linearifolium, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 148 = linearifolium, Benth. & Hook. f.
Mariae, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser. I. ii. (1889) 8, in syn. = Anaphalis Mariae, F. Muell.
sinense, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 424, t. 12. — China.
Stracheyi, C. B. Clarke, ex Hemsl. l. c. xxx. (1894) 136 — Reg. Himal., Tibet.
- LEOPOLDIA**, Parl. = **Muscari**, Mill. (Liliac.).
maritima, Ostermeyer, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 299, in obs. = *maritima*, Parl.
Spreitzenhoferi, Heldr. ex Ostermeyer, l. c. — Creta.
- LEPACHYS**, Rafin. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 54.
mexicana, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 277. — Mexic.
- LEPANTHES**, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 54.
Blumenawii, Prodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 117. — Bras. bor.

LEPANTHES: —

- carunculigera, *Reichb. f. in Flora*. lxi. (1886) 557. — N. Granat.
 costata, *Reichb. f. l. c.* — N. Granat.
 cryptantha, *Rodr. Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 120. — Bras. bor.
 dasyphylla, *Reichb. f. in Flora*. lxi. (1887) 557. — N. Granat.
 densiflora, *Rodr. Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 119. — Bras. bor.
 funerea, *Rodr. l. c.* 118. — Bras. bor.
 gracilis, *Rolfe, in Kew Bull.* (1892) 208. — Hab. ?
 pilosella, *Reichb. f. in Flora*. lxi. (1886) 556. — N. Granat.
 plurifolia, *Rodr. Vellozia*, 1885-88 Sec. edic. (1891) 118. — Bras. bor.
 quartzicola, *Rodr. l. c.* 119. — Bras. bor.
 tracheia, *Reichb. f. in Flora*. lxi. (1886) 557. — Nov. Gran.
 yauaperyensis, *Rodr. Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 117. — Bras. bor.

- LEPARGYRAEA, Steud. = LEPARGYREA, Rafin. = **Elaeagnus**, Linn.
 argentea, Greene, in *Pittonia*, ii. (Dec. 1892) 122 = *Shepherdia argentea*, Nutt.
 canadensis, Greene, l. c. = *S. canadensis*, Nutt.
 rotundifolia, Greene, l. c. = *S. rotundifolia*, Parry.

- LEPERIZA, Herb. = **Urceolina**, Reichb. (Amaryll.).
 miniata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 704 = *U. miniata*, Benth. & Hook. f.
 urceolata, Kuntze, l. c. = *U. pendula*, Herb.

- LEPIAGLAIA, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 21 (1895) sub t. 334 = **Aglaia**, Lour. (Meliac.).
 pyramidata, Pierre, l. c. = *A. pyramidata*, Pierre.

- LEPIDAGATHIS, Willd. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 55.
 Andersoniana, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 16. — Afr. trop. or.
 Caput-Medusae, *S. Moore, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 313. — Afr. centr.
 cephalotes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 492 = *hyalina*, Nees.
 Schweinfurthii, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 16. — Afr. centr. bor.
 thymifolia, *Colett. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 106. — Burma.

- LEPIDARIA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 439 = **Loranthus**, Linn.
 bicarinata, Van Tiegh. l. c. 440. — Borneo.
 biflora, Van Tiegh. l. c. 441. — Ins. Philipp.
 Forbesii, Van Tiegh. l. c. 440 = *L. Forbesii*, King.
 macrophylla, Van Tiegh. l. c. — Borneo.
 quadriflora, Van Tiegh. l. c. 441. — Ins. Philipp.
 vaginata, Van Tiegh. l. c. — 440. — Borneo.

- LEPIDIUM, Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 56.
 arbuscula, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 10. — Ins. Sandvic.
 heterophyllum, M. E. Jones, in *Zoë*, iii. (1893) 284 = *integrifolium* Nutt. var. *heterophyllum*, S. Wats.
 iberideum, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 88 = *graminifolium*, Linn.
 Jaredi, T. S. Brandeg. in *Zoë*, iv. (1894) 398; et in *A. Gray & S. Wats. Syn. Fl. N. Am.* i. 1. (1895) 124. — Calif.
 Kirkii, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 439. — N. Zel.
 lasiophyllum, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* i. (1889) 207, sphalm = *lasiocarpum*, Nutt.
 Matau, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 323. — N. Zel.
 matritense, Pau, *Not. bot. Fl. Espan.* i. (1887) 8. — Hisp.
 medium, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 36 (= *L. intermedium*, A. Gray). — Am. bor. occ.

LEPIDIUM: —

- Merralli, *F. Muell. in Vict. Natural.* vii. (Dec. 1890) 114; et ex in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 124. — Austral.
 myrianthum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 5. — Chile.
 oahuense, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 10 = *owahiense*, Cham. & Schlecht.
 obtusatum, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 423. — N. Zel.
 occidentale, Howell, in *Erythraea*, iii. (1895) 32 = *Menziesii*, DC.
 oreganum, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 274 pr. p. = *strictum*, Rattan.
 oreganum, Howell [Pacif. Coast Pl. Coll. (1887)] ex Greene, l. c. pr. p. = *dictyotum*, A. Gray.
 Palmeri, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 39. — Calif. austr.
 Pichleri, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 63. — Persia.
 Rahmeri, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*. (1891) 5. — Am. austr. occ.
 Remyi, *Drake, Fl. Polyn. Franç.* (1890) 106. — Ins. Sandvic.
 Reverchoni, *Debeaux, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 332. — Hisp.
 rosulatum, *Tornab. Fl. Sicul.* (1887) 122. — Sicil.
 scopulorum, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 625, Robinson, in A. Gray et S. Wats. in *Syn. Fl. N. Am.* New ed. i. 1. (1895) 125 (= *L. heterophyllum*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
 utahense, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 226 = *integrifolium*, Nutt.

- LEPIDOLOPHA, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 236. **COMPOSITAE**.
 Komarowi, *C. Winkl. l. c.* — Turkest.

- LEPIDOPETALUM, Blume = **Ratonia**, DC. (Sapind.).
 hebecladum, *Radlk. in Sitz. math.-phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 269. — N. Guin.
 subdichotomum, *Radlk. l. c.* — N. Guin.
 xylocarpum, *Radlk. l. c.* — N. Guin.

- LEPIDOSPARTUM, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. ii. 58.
 latisquamum, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 133. — Nevada.
 striatum, *Coville, in Proc. biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 73; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 140, t. II. — Calif.

- LEPIDOSPERMA, Labill. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 58.
 teres, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 662 = *Tetraria Rottboellii*, C. B. Clarke.

- LEPIDOTRICHUM, Velen. & Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 324; et in *Bull. Soc. Dauph. Sér. II.* i. (1890) 28. **CRUCIFERAE**.
 Uechtritzianum, *Velen. l. c.* (1889) 324. — Bulg.

- LEPIDOTURUS, Baill. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 59.
 ulmifolius, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 201. — Madag.

- LEPIGONUM, Wahlbg. = **Spergularia**, J. & C. Presl. (Caryoph.).
 tenue, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 63. — Calif.

- LEPILAENA, J. Drum. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 59.
 monandra, *Petrie, in N. Zel. Journ. Sc. i.* (1891) 70, nomen. — N. Zel.

- LEPIONOPSIS, Valetton, in *Annal. Jard. Bot. Buitenz.* xiii. 2 (1895) 252. **APOCYNÉAE**.
 ternatensis, *Valetton, l. c.* 253, t. 28. — Ins. Ternat.

- LEPISANTHES, Blume, (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 60.
 cambodiana, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 21 (1895) t. 326, B = *tetraphylla*, *Radlk. canescens*, «Radlk.» ex Pierre. l. c. t. 325, B sphalm (= *Hemigyrosa canescens*, Thw.) = *tetraphylla*, *Radlk.*
 mekongensis, *Pierre, l. c. t.* 326. — Cochinch.

- LEPISMIUM, Pfeiff. = **Rhipsalis**, Gaertn. (Cact.).
 cavernosum, *Lindb. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* iv. ii. (1890) 289 = *R. cavernosa*, *Lindb.*
 dissimile, G. A. Lindberg, in *Gartenfl.* xxxix. (1890) 148, fig. 37, et 38; et ex *Illustr. Hort.* xxxix. (1890) 148, fig. 338. = *R. dissimilis*, K. Schum.

- LEPISTEMON, Blume (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 60.
 asterostigma, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 217. — N. Guin.
 binectariferum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 446 = *L. Wallichii*, Choisy.
 leiocalyx, *Stapp, in Kew Bull.* (1895) 113. — Ind. or.
 lignosum, *Dammer, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 53; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 331. — Afr. trop. or.
 Wallichii, *Prain, in Journ. Soc. As. Beng.* lxiii (1894) ii. 111 = *flavescens*, Blume.

- LEPISTEMONOPSIS, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 331. **CONVOLVULACEAE**.
 Volkensii, *Dammer, l. c.* — Afr. trop. or.

- LEPTACTINIA, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 60.
 Laurentiana, *Deweye, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 2 1894 (1895) 102, nomen; et xxxiv. 2 (1895) 95. — Congo occ.
 Leopoldi II, *Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1889) 75. — Congo.

- LEPTALEUM, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 60.
 hamatum, *Hemsl. & Lacc, in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) t. 321. — Belutch. brit.

- LEPTASPIS, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 61.
 conchifera, *Hack. in Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 211, t. G fig. A. — Angola.

- LEPTOCARPYDION, Hochst. = **Triodia**, R. Br. (Gramin.).
 plumosum, *Hochst. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 877 = *T. plumosa*, Benth.

- LEPTOCHLAENA, Spreng. = **Leptolaena**, Thou. (Chlaenac.).
 Bernieriana, «Baill.» ex Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 174 = *L. Bernieri*, Baill.
 ferruginea, «S. Elliot,» ex Engl. & Prantl, l. c. — Madag.
 parviflora, «S. Elliot,» ex Engl. & Prantl, l. c. = *L. parviflora*, S. Elliot.
 turbinata, «Baker,» ex Engl. & Prantl, l. c. = *L. turbinata*, Baker.

- LEPTOCHLOA, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 60.
 albemarlensis, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. i. (1895) 145. — Ins. Galapag.
 bipinnata, *Herb. Berol.* ex Baill. *Herb. Boiss.* ii. (1893) 1075 = *Eragrostis cynosuroides*, Roem. & Schult.
 falcata, *Hack. ex Schinz, l. c.* iii. (1895) 386. — Afr. austr.
 mexicana, *Scribner, in Bull. Torrey Bot. Club* (1891) 313. — Mexic.
 Nealleyi, *Vasey ex Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 534 — Texas.
 plectostachya, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 112. — Afr. trop. or.
 yemensis, *Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. bot. Genova* (1893) 366, nomen. — Erithrea.

LEPTOCHLORIS, Munro, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 771 = **Chloris**, Sw. (Gramin.).
crinita, Munro, ex Kuntze, l. c. = *C. crinita*, Lag.

LEPTODERMIS, Wight. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 62.
crassifolia, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 67. — Ind. or.
diffusa, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 373. — China.
umbellata, Batalin, l. c. 374. — China.
vestita, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 390. — China.

LEPTODESMIA, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 62.
Bojeriana, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 465, in obs. = *Hallia*? *Bojeriana*, Baill.
pulchella, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. iv. (Oct. 1890) 2, t. 12. — Japon.

LEPTOGLOTTIS, DC. = **Schrankia**, Willd. (Legumin.).
uncinata, Rydberg, Fl. Nebraska, (1895) = *S. uncinata*, Willd.

LEPTOLAENA, Thou. (Chlaenac.). — Ind. Kew. ii. 63.
Bernieri, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 564; et Hist. pl. Madag., Atlas (1888) t. 88. — Madag.
cuspidata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 297. — Madag.
parviflora, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 6. — Madag.
rubella, S. Elliot, l. c. 7. — Madag.

LEPTOLEPIS, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 31. **CYPERACEAE**.
tibetica, Boeck. l. c. — Tibet.

LEPTOMISCHUS, Drake, in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 117; et in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 208. **RUBIACEAE**.
primuloides, Drake, ll. cc. 117 et 209, t. 4. — Tonk.

LEPTONYCHIA, Turcz. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 63.
heteroclita, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1890) 86 = *glabra*, Turcz.

LEPTORCHIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. (1809) 14/9, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 669 = **Liparis**, Rich. (Orchid.).

abyssinica, *acuminata*, *acutissima*, *affinis*, *alata*, *arnoglossophylla*, *auriculata*, *aurita*, *barbata*, *Beccarii*, *Beddomei*, *bicornis*, *biloba*, *bistriata*, *bituberculata*, *bootanensis*, *Bowkeri*, *brachyglottis*, *brachystalix*, *caespitosa*, *campestris*, *campylostalix*, *capensis*, *Cathcartii*, *clavigera*, *Clypeolum*, *compressa*, *condylobulbon*, *connata*, *cordifolia*, *crenulata*, *crispifolia*, *Cumingii*, *cuspidata*, *Dalzellii*, *decurrens*, *deflexa*, *delicatula*, *Dendrochilum*, *Diodon*, *disepta*, *distans*, *disticha*, *Dolabella*, *Duthiei*, *Eggersii*, *elata*, *elegans*, *elliptica*, *ferruginea*, *flaccida*, *flavescens*, *Forbesii*, *Gamblei*, *glossula*, *gracilis*, *grandiflora*, *Griffithii*, *grossa*, *guineensis*, *Guingangae*, *habenarina*, *hawaiensis*, *japonica*, *Jovis-Pluvii*, *Kappleri*, *Krameri*, *lacerata*, *lancifolia*, *latifolia*, *liliifolia*, *longa*, *longicaulis*, *longipes*, *longipetala*, *lutea*, *luteola*, *macrocarpa*, *Manii*, *minima*, *montana*, *nervosa*, *neuroglossa*, *obscura*, *ochracea*, *odontostoma*, *odorata*, *olivacea*, *Pachypus*, *pallida*, *Parishii*, *parva*, *parviflora*, *pectinata*, *perpusilla*, *plantaginacea*, *platyphylla*, *platyrachis*, *plicata*, *polycardica*, *Prainii*, *pulchella*, *puncticulata*, *purpurascens*, *pusilla*, *ramosa*, *reflexa*, *resupinata*, *revoluta*, *Ridleyi*, *rostrata*, *rupestris*, *Sandersiana*, *Stachyurus*, *stenoglossa*, *Stricklandiana*, *tenuifolia*, *Thwaitesii*, *torta*, *tricallosa*, *triloba*, *Trimenii*, *venosa*, *vestita*, *viridiflora*, *viridipurpurea*, *Wagneri*, *Walkei*, *Welwitschii*, *Wightiana*, *Wrayi*, *xanthina*, Kuntze, l. c. 671 = *homonyma omnia* Liparidis.

LEPTORCHIS: —

atropurpurea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 671 = *Liparis repens*, Ridl.
coelogynodes, Kuntze, l. c. = *L. coelogynoides*, F. Muell.
commutata, Kuntze, l. c. = *L. cordifolia*, Hook. f.
cordifolia, Kuntze, l. c. = *L. nepalensis*, Lindl.
flavileptis, Thou, ex Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 459 = *L. flavescens*, Lindl.
Gerardii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 669 = *L. Gerrardii*, Reichb. f.
Lindleyana, Kuntze, l. c. = *L. atropurpurea*, Lindl.
Loeslii, MacMill. Metasp. Minn. (1893) 173 = *L. Loeslii*, A. Rich.
ornithorrhynchos, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 669 = *L. ornithorrhynchos*, Ridl.
tradesantiaefolia, Kuntze, l. c. = *L. tradesantifolia*, Lindl.
Wendlandii, Kuntze, l. c. = *L. Wendlandi*, Reichb. f.

LEPTORHOEO, C. B. Clarke, (Commelin.). — Ind. Kew. ii. 64 [Leptorhoës].
floribunda, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 218 = *filiformis*, C. B. Clarke.
tenuifolia, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 113. — Mexic.

LEPTOSIPHONIUM, F. Muell. Descr. notes Papuan Pl. vii. (1886) 32. **ACANTHACEAE**.
Stricklandi, F. Muell. l. c. — N. Guin.

LEPTOSPERMUM, Forst. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 64.
Wocroonaran, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden Ker. (1889) 40. — Austral.

LEPTOSTACHYA, Mitch. = **Phryma**, Linn. (Verben.).
carolinensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 508 = *P. leptostachya*, Linn.
leptostachya, MacMill. Metasp. Minn. (1893) 442 = *P. leptostachya*, Linn.

LEPTOSYNE, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 65.
dissecta, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 176 = *dissecta*, A. Gray.
mexicana, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 429. — Mexic.
parthenioides, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 176 (= *L. parthenioides*, A. Gray). = *Coreocarpus parthenioides*, Benth.
pinnata, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 176. — Mexic.
Pringlei, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. i. (1895) 155. — Mexic.

LEPTOTAENIA, Nutt. = **Ferula**, Tourn. (Umbell.).
anomala, Coult. & N. E. Rose, Revis. N. Am. Umbellif. (1888) 53. — Calif.
Eatonii, Coult. & N. E. Rose, l. c. — Utah.
purpurea, Coult. & N. E. Rose, l. c. — Am. bor. occ.
Watsoni, Coult. & N. E. Rose, l. c. — Am. bor. occ.

LEPTOTES, Lindl. = **Tetramicra**, Lindl. (Orchid.).
minuta, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii, 323 = *T. minuta*, Rolfe.

LEPYRODICLIS, Fenzl = **Arenaria**, Rupp. (Caryoph.).
cerastoides, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien. ii. (1886) 19 (an *L. cerastoides*, Kar. & Kir.?). — As. occ.
paniculata, Stapf, l. c. — As. occ.
quadridentata, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 84. — China.

LEPYROXIS canadensis, Beauv. ex Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 92, in syn. = *Agrostis mexicana*, Linn.

LERCHEA, Hall. Comm. Gott. (1751) 223, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 549 = **Suaeda**, Forsk. (Chenopod.).
baccata, *calceoliformis*, *corniculata*, *heterocarpa*, *heterophylla*, *hortensis*, *lunifolia*, *maritima*, *microphylla*, *microsperma*, *monoica*, *physophora*, *pterantha*, *vermiculata*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Suaedae.

LESCHENAULTIA, R. Br. (Gooden.). — Ind. Kew. ii. 66.
striata, F. Muell. ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 123, sphalm. = *stricta*, F. Muell.

LESPEDEZA, Michx. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 67.
capillipes, Franch. Pl. Delav. (1890) 165. — Yunnan.
Delavayi, Franch. l. c.; et in Rev. Hortie. (1890) 225, fig. 70. — Yunnan.
fasciculiflora, Franch. l. c. 169. — Yunnan.
frutescens, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 205 = *violacea*, Pers.
hirtella, Franch. Pl. Delav. (1890) 167. — Yunnan.
intermedia, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xii. (1893) 63 = *violacea*, Pers.
Prainii, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 46. — Burma.
racemosa, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 720. — Japon. Corea.
sericophylla, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 45. —
trigonoclada, Franch. Pl. Delav. (1890) 167. — Yunnan.
virginica, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xii. (1893) 64 = *sessiliflora*, Michx.
yunnanensis, Franch. Pl. Delav. (1890) 166. — Yunnan.

LESQUERELLA, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 250 = **Vesicaria**, Tourn. (Crucif.).
alpina, S. Wats, l. c. 251 = *V. alpina*, Nutt.
angustifolia, S. Wats, l. c. 253 = *V. angustifolia*, Nutt.
arctica, S. Wats, l. c. 255 = *V. arctica*, Richards.
argentea, S. Wats, l. c. 252 = *V. argentea*, Schauer.
argentea, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 203 = *V. ludoviciana*, DC.
argyrea, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 251 = *V. argyrea*, A. Gray.
cinerea, S. Wats, l. c. 255. — Arizona.
densiflora, S. Wats, l. c. 251 = *V. densiflora*, A. Gray.
Douglasii, S. Wats, l. c. 255. — Am. bor. occ.
Engelmanni, S. Wats, l. c. 254 = *V. Engelmanni*, A. Gray.
Fendleri, S. Wats, l. c. 255 = *V. Fendleri* & *stenophylla*, A. Gray.
globosa, S. Wats, l. c. 252 = *V. globosa*, Pers.
Gordoni, S. Wats, l. c. 253 = *V. Gordoni*, A. Gray.
grandiflora, S. Wats, l. c. 250 = *V. grandiflora* Hook.
gracilis, S. Wats, l. c. 253 = *V. gracilis*, Hook. f.
Kingii, S. Wats, l. c. 251 = *V. Kingii*, S. Wats.
lasiocarpa, S. Wats, l. c. 251 = *V. lasiocarpa*, A. Gray.
Lescurii, S. Wats, l. c. 250 (= *Alyssum Lescurii*, A. Gray). — Tennessee.
Lindheimeri, S. Wats, l. c. 253 = *V. Lindheimeri*, A. Gray.
ludoviciana, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 252 = *V. ludoviciana*, DC.
mendocina, Kurtz, in Revista Museo La Plata, v. (1883) 284 [Sert. Cordobensem 6] = *V. mendocina*, Phil.
montana, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxii. (1888) 251 = *V. montana*, A. Gray.
montevidensis, S. Wats, l. c. = *V. montevidensis*, Eichl.
Nuttallii, S. Wats, l. c. 252 = *V. Nuttallii*, Torr. & Gray.
occidentalis, S. Wats, l. c. 251 = *V. occidentalis*, S. Wats.
pallida, S. Wats, l. c. 253 = *V. pallida*, Nutt.
Palmeri, S. Wats, l. c. 252 = *V. repanda*, Nutt.
repanda, S. Wats, l. c. 254 = *V. repanda*, Nutt.
purpurea, S. Wats, l. c. 253 = *V. purpurea*, A. Gray.

LESQUERELLA : —

- recurvata*, S. Wats, l. c. 253 = *V. recurvata*, S. Wats.
Schaffneri, S. Wats, l. c. 254 = *V. Schaffneri*, S. Wats.
Wardii, S. Wats, l. c. 252 et 255. — Arizona.

LESSERTIA, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 67.

- emarginata*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 166. — Afr. austro-occ. extratrop.
incana, Schinz, l. c. 167. — Afr. austro-occ. extratrop.

LESSINGIA, Cham. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 67.

- Lemmoni*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 412. — Arizona,
tenuis, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 124. — Calif.

LETHIA indica, « DC. » ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 96. sphalm. = *Sethia indica*, DC.**LETO**, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 33. **COMPOSITAE**.

- tenuifolia*, Phil. l. c. t. 1 fig. 3. — Chili.

LETTESOMIA, R. Br. (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 68.

- aggregata*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiii. (1894) ii. 92, in obs. = *aggregata*, Roxb.
confusa, Prain, l. c. 96. — Burma.
Curtisii, Prain, l. c. 100. — Penins. Mal.
Kunstleri, Prain, l. c. — Malaya.
laxiflora, Prain, l. c. 92. — Burma.
longifolia, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 95. — Burma.
Mastersii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiii. (1894) ii. 98. — Assam., Burma.
pallida, Prain, l. c. 97 (= *Argyria pallida*, Choisy). — Burma.
Ridleyi, Prain, l. c. 98. — Penins. Mal.

LEUCADENDRON, Linn. = **Protea**, Linn.

- attenuatum*, *buxifolium*, *crinitum*, *ellipticum*, *Gueinzii*, *lineare*, *molle*, *nutans*, *pedunculatum*, *penicillatum*, *puberum*, *reflexum*, *Rochetianum*, *spathulatum*, *tomentosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 578-79 = *homonyma omnia*, Leucospermi.
formosum, Kuntze, l. c. = *Protea formosa*, R. Br.
heterophyllum, Kuntze, l. c. = *Leucospermum diffusum*, R. Br.
Mundtii, Kuntze, l. c. = *L. Mundtii*, Meissn.
totta, Kuntze, l. c. = *L. tottum*, R. Br.
truncatum, Kuntze, l. c. = *L. Zeyheri*, Meissn.

LEUCAENA, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 69.

- Greggii*, S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 272. — Mexic.
lanceolata, S. Wats, l. c. xxi. (1886) 427. — Mexic.

LEUCANTHEMUM, Burm. Dec. Pl. Afr. (1738) 161/2 758 f. 1 (non f. 2), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 351 = **Osmitopsis**, Cass. (Compos.).

- astericoides*, Kuntze, l. c. = *O. astericoides*, Cass.

LEUCANTHEMUM, [Tourn.] Linn. = **Chrysanthemum**, Tourn. (Compos.).

- chloroticum*, Kern. & Murb. ex Murb. in Lunds Univ. Arsskrift. xxvii. v. (1892) 109. — Herceg.
fissum, Timb.-Lagr. ex Galiss. in Bull. Soc. bot. Rochel. xi. (1889) = *C. graminifolium*, Linn.
intersitum X, Hausskn. in Mitth. Thur. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 25. — Graecia.
laciniatum, Huter, ex Porta et Rigo in Nuov. Giorn. Bot. Ital. ii. () 268; et in Ann. Ist. Bot. Roma, iv. (1891) 159. — Italia.
lawatum, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. II. i. (1889) 169 = *C. ceratophylloides*, All.
lobulatum, Levier, ex Levier & Sommier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxiii. (1891) 258. — Italia.
nanum, St Lager, in Cariot. Etud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 481 = *C.*

LEUCANTHEMUM : —

- occitanicum*, Sudre, in Rev. de Bot. Toul. (Janv. 1894) [sp. collect.], ex Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 199. — Gall.

LEUCAS, Burm. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 70.

- abyssinica*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 193, in obs. = *Lasiocorys abyssinica*, Benth.
altissima, Engl. l. c. x. (1889) 268. — Afr. austro-occ. extratrop.
bracteosa, Guerke, l. c. xxii. (1895) 139. — Afr. trop.
argyrophylla, Briq. l. c. xix. (1894) 193, in obs. = *Lasiocorys argyrophylla*, Vathe.
bukobensis, Guerke, l. c. xxii. (1895) 139. — Afr. trop.
capensis, Engl. l. c. x. (1889) 268 = *Lasiocorys capensis*, Benth.
Coleae, Baker, in Kew Bull. (1895) 226. — Reg. Somal.
Collettii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 313. — Burma.
Fleckii, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 140. — Afr. austro-occ. extratrop.
Holstii, Guerke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 51, 62, 65; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 342. — Afr. trop. or.
Jamesii, Baker, in Kew Bull. (1895) 225. — Reg. Somal.
macrophylla, Vathe, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 38. —
micrantha, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 136. — Afr. trop.
milanjiana, Guerke, l. c. 141. — Afr. trop. or.
Nyassae, Guerke, l. c. 137. — Afr. trop. or.
orbicularis, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 343. — Afr. trop. or.
paucijuga, Baker, in Kew Bull. (1895) 226. — Reg. Somal.
Poggeana, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 193. — Congo mer.
Schweinfurthii, Guerke, l. c. xxii. (1895) 136. — Afr. centr. bor.
stachydiformis, Briq. l. c. xix. (1894) 193, in obs. = *Lasiocorys stachydiformis*, Hochst.
stenophylla, Guerke, l. c. xxii. (1895) 138. — Zanzib.
Stormsii, Guerke, l. c. 140. — Afr. trop.
thymoides, Baker, in Kew Bull. (1895) 226. — Reg. Somal.
tomentosa, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 343. — Afr. trop. or.
villosa, Guerke, l. c. 137. — Sansib.
usagarensis, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 138. — Afr. trop. or.
Volkensii, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 342. — Afr. trop. or.
Welwitschii, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 141. — Angola.

LEUCERIA, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 70.

- achilleifolia*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1891) 495 (= *Leuchaeria achilleifolia*, Hook. et Arn.). — Patagon.
anthemidifolia, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 102. — Chili.
apiifolia, Phil. l. c. 111. — Chili.
araucana, Phil. l. c. 105. — Chili.
aurita, Phil. l. c. 106. — Chili.
Barrasiana, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 439 (= *Chabraea Barrasiana*, J. Gay). — Chili.
Contrayerba, Kurtz, in Bol. Acad. nac. cienc. Córdoba xiii. (1893) 201; et in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1894) 112. — Reg. Argent.
debilis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 107. — Chili.
discolor, Phil. l. c. — Chili.
fuegina, Phil. l. c. 98. — Am. austr. occ.
glabrata, Phil. l. c. 103. — Am. austr. occ.
Hahnii, Franch. Miss. scient. Cap Horn. v. [Bot.] (1889) 349 t. 3. — Reg. Mayell.
Iburi, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 99. — Am. austr. occ.
lepida, Phil. l. c. 110. — Am. austr. occ.
longifolia, Phil. l. c. 106. — Am. austr. occ.
leucomalla, Phil. l. c. 100. — Am. austr. occ.
magna, Phil. l. c. 108. — Am. austr. occ.
nivea, Phil. l. c. 104. — Am. austr. occ.

LEUCERIA : —

- nudicaulis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 100. — Am. austr. occ.
pauciflora, Phil. l. c. 109. — Am. austr. occ.
popelana, Phil. l. c. 101. — Am. austr. occ.
racemosa, Phil. l. c. 111. — Am. austr. occ.
sonchoides, Phil. l. c. 104. — Am. austr. occ.
stricta, Phil. l. c. 109. — Am. austr. occ.
tenerifolia, Phil. l. c. 102. — Am. austr. occ.

LEUCOBARLERIA, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 353. **ACANTHACEAE**.

- nivea*, Lindau, l. c. 354. — Reg. Somal.
polyacantha, Lindau, l. c. — Reg. Somal.
Robecchii, Lindau, l. c. — Reg. Somal., Arabia.

LEUCOBOTRYS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 503 = **Loranthus**, Linn.

- adpressa*, Van Tiegh. l. c. 504. — Tonk.
inflata, Van Tiegh. l. c. 503. — Tonk.
pilosa, Van Tiegh. l. c. 545. — Ins. Subawa.

LEUCOCALANTHE, Rodr. Hort. Flumin. (1891) 49; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 242, in obs. **BIGNONIACEAE**.

- aromatica*, Rodr. l. c. 47, t. 7. — Bras.

LEUCOCORYNE, Lindl. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 71.

- uniflora*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 57 = *Triteleia uniflora*, Lindl.

LEUCOLENA, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 340. **ORCHIDEEAE**.

- ornata*, Ridl. l. c. t. 43. — Malacca.

LEUCONOCARPUS riparius, Spruce, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. vii. (1893) 241 = *Moronebea riparia*, Planch. & Triana.**LEUCONOTIS**, Jack. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 72.

- tenuifolia*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 470. — N. Brit.

LEUCONYMPHAEA, Ludw. = **Nymphaea**, Linn.

- alba*, *amazonum*, *ampla*, *blanda*, *elegans*, *flava*, *Gardneriana*, *gigantea*, *gracilis*, *Jamesoniana*, *lasiophylla*, *Lotus*, *mexicana*, *oxyptala*, *Parkeriana*, *sansebariensis*, *stellata*, *tetragona*, *tuberosa*, *tussilagifolia*, *undulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 11-12 = *homonyma omnia* Nymphaeae.
Berneriana, Kuntze, l. c. = *N. stellata*, Willd.
candida, Kuntze, l. c. = *N. alba*, Linn.
coerulea, Kuntze, l. c. = *N. stellata*, Willd.
emirnenis, Kuntze, l. c. = *N. stellata*, Willd.
Goudotiana, Kuntze, l. c. = *N. amazonum*, Mart. & Zucc.
intermedia, Kuntze, l. c. — Burma.
odorata, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 228 [odorata] = *N. odorata*, Soland.
reniformis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 11-12 = *N. odorata*, Soland.
reniformis, MacMill. Metasp. Minn. (1893) 228 = seq.
rubra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 11-12 = *N. Lotus*, Linn.

LEUCOPHAE, Webb & Berth. = **Sideritis**, Linn. (Labiata.).

- Dendrochahorra*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 138 = *S. Dendrochahorra*, C. Bolle.
discolor, Wedd, ex Christ, l. c. 137 = *S. discolor*, C. Bolle.
eriocephala, Webb, ex Christ, l. c. 139 = *S. dasygynaphala*, Webb.
infernalis, Christ, l. c. 140 = *S. infernalis*, C. Bolle.
marmorea, Christ, l. c. 139 = *S. marmorea*, C. Bolle.
nervosa, Christ, l. c. — Ins. Teneriffa.
stricta, Webb, ex Christ, l. c. = *S. candicans*, Webb.

LEUCOPHYTA, R. Br. = **Calocephalus**, R. Br. (Compos.).

citrea, *Dittrichii*, *Drummondii*, *Francisii*, *lactea*, *multiflora*, *platycephala*, *Sonderi*. Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 352 = *homonyma omnia* Calocephali. *aeruodes*, Kuntze, l. c. = *C. aeruoides*, *Benth.* *angianthodes*, Kuntze, l. c. = *C. angianthoides*, *Benth.* *Lessingii*, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (April 1873). — Austral.

LEUCOPOGON, R. Br. (Epacrid.). — Ind. Kew. ii. 72. *heterophyllus*, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 198. — N. Zel.

LEUCORCHIS, Blume = **Didymoplexis**, Griff. (Orchid.). *micradenia*, *Benth.* & *Hook. f.* ex *Drake*, *Ill. Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 313 (= *Epiphanes micradenia*, *Reichb. f.*). — Ins. Vitiens.

LEUCOSALPA, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 35. **SCROPHULARIEAE**. *madagascariensis*, S. Elliot, l. c. 36. — Madag.

LEUCOSCEPTRUM, Sm. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 78. *sinense*, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 310. — China.

LEUCOTHOË, D. Don (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 74. *populifolia*, *Dippel*, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 353, fig. 234 = *Lyonia populifolia*, *K. Koch.* *stenophylla*, *Loesen.* in *Flora*, lxxii. (1889) 78. — Bras.

LEUZIA, « DC. » St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl.* éd. 8 ii. (1889) 436 = **Leuzea**, DC. (Compos.).

LEVYA, Bureau, ex *Baill. Hist. des pl.* x. (1888) 28. **BIGNONIACEAE**. *nicaraguensis*, Bureau, l. c. 29. — Nicaragua.

LEWISIA, Pursh. (Portul.). — Ind. Kew. ii. 75. *Kelloggii*, *K. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iv. (1894) 88, t. 4. — Calif.

LEYCESTERIA, Wall. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 75. *stipulata*, *Fritsch.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 169; et in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien.* xlv. (1895) 57, t. 4 = *Pentaptyxis stipulata*, *Hook. f.*

LHOTZKYA, Schau. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 75. *Smeatoniana*, *F. Muell.* in *Austral. Journ. Pharm.* ii. (Jun. 1887) 5; et in *Bot. Centralbl.* xxx. (1887) 326. — Austral.

LIABUM, Adans. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 75. *angustissimum*, *A. Gray.* in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 432. — Mexic. *bolivianum*, *Klatt.* in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien.* ix. (1894) 362. — Bolivia. *cervinum*, *Robinson.* in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 317. — Mexic. *columbianum*, *Klatt.* in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 47. — Columb. *corymbosum*, *Klatt.* in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien.* ix. (1894) 362. — Bolivia. *ecuadoriense*, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 60. — Ecuad. *hastatum*, *Britton.* in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 263. — Bolivia. *Klattii*, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci.* Ser. 3 l. (1895) 156. — Mexic. *Lehmanni*, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 61. — Ecuad. *liaboides*, *Hieron.* l. c. 63, in obs. = *lyratum* *A. Gray.* *Liebmanni*, *Klatt.* in *Leopoldina.* Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.

LIABUM: —

longiradiatum, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 354. — Ecuad. *niveum*, *Hieron.* l. c. xix. (1894) 62. — Columb. *ovatum*, *Britton.* in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 263 = *ovatum*, *Ball.* *Palmeri*, *A. Gray.* in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1887) 432. — Mexic. *platylepis*, *Sch. Bip.* ex *Klatt.* in *Leopoldina.* Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic. *polyanthum*, *Klatt.* ex *Th. Dur. & Pitt.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 209. — Costarica. *Rusbyi*, *Britton.* in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 263. — Bolivia. *Stuebelii*, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 353. — Ecuad. *vulcanicum*, *Klatt.* viii. (1887) 47. — Columb.

LIATRIS, Schreb. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 75. *Helleri*, *Porter.* in *Bull. Torrey Bot. Club.* xviii. (1891) 147. — Am. bor. occ. *magnifica*, *Hort.* ex *Gard. Kew. Herb. Pl.* (1895) 263. — Am. bor.

LIBERTIA, Spreng. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 76. *azurca*, *Hort.* ex *Baker.* *Handb. Irid.* (1892) 118 = *Orthosanthos multiflorus*, *Sweet.*

LIBOCEDRUS, Endl. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 77. *papuana*, *F. Muell.* in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S.* i. v. (1889) 32; *Beissn. Handb. Nadelholzk.* (1891) 31. — N. Guin.

LICANIA, Aubl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 77. *Gardneri*, *guianensis*, *longistyla*, *pallida*, *platypus*, *Salzmannii*, *Sprucei*, *tomentosa*, *utilis*, *Kuntze.* *Rev. Gen.* (1891) 217 = *homonyma omnia* Moquileae.

affinis, *Fritsch.* in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien.* iv. (1889) 50; *Kuntze.* l. c. — Ind. occ. *apetala*, *Fritsch.* l. c. 54 = *Moquilea floribunda*, *Benth.* *apetala*, *Kuntze.* l. c. (1891) 217 = *praec.* *bracteosa*, *Fritsch.* l. c. = *M. licaniaeflora*, *Sagot.*

Britteniana, *Fritsch.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 6. — Am. austr. *compacta*, *Fritsch.* in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien.* iv. (1888) 52. — Guian. brit. *cymosa*, *Fritsch.* l. c. 47. — Bras. *egensis*, *Fritsch.* l. c. 58. — Bras. *Gardneri*, *Fritsch.* l. c. 56 = *Moquilea Gardneri*, *Hook. f.* *gracilis*, *Taub.* in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892) 8. — Bras. *Hookeri*, *Fritsch.* in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien.* iv. (1889) 56 = *Moquilea pallida*, *Hook. f.* *Hostmanni*, *Fritsch.* l. c. 42. — Surin. *laxiflora*, *Fritsch.* l. c. 46. — Guian. brit. *longistyla*, *Fritsch.* l. c. 56 = *Moquilea longistyla*, *Hook. f.*

membranacea, *Sagot.* ex *Laness.* *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 130; et ex *Fritsch.* l. c. 48 = *incana*, *Aubl.*

minutiflora, *Fritsch.* l. c. 54 = *Moquilea minutiflora*, *Sagot.* *obtusifolia*, *Fritsch.* l. c. 53 = *M. parviflora*, *Blume.* *octandra*, *Kuntze.* *Rev. Gen.* (1891) 217 = *M. Turiuva*, *Hook. f.* *organensis*, *Fritsch.* in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien.* iv. (1889) 59 = *M. organensis*, *Miers.* *pallida*, *Britton.* in *Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 9. — Bolivia. *platypus*, *Fritsch.* in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien.* iv. (1889) 53 = *Moquilea platypus*, *Hemsl.*

Poeppigii, *Fritsch.* l. c. 49. — Bras. *Salzmanni*, *Fritsch.* l. c. = *M. Salzmanni*, *Hook. f.* *Sprucei*, *Fritsch.* l. c. 55 = *M. Sprucei*, *Hook. f.* *tomentosa*, *Fritsch.* l. c. 52 = *M. tomentosa*, *Benth.* *utilis*, *Fritsch.* l. c. 56 = *M. utilis*, *Hook. f.*

LICHTENSTEINIA, Wendl. = **Loranthus**, Linn. *elegans*, *Van Tiegh.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 254 = *Lor. elegans*, *Cham. & Schlecht.* *speciosa*, *Van Tiegh.* l. c. = *Lor. speciosus*, *Dietl.*

LICUALA, Thunb. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 77. *arbuscula*, *Becc.* *Malesia*, iii. (1886) 79. — Borneo. *bidentata*, *Becc.* l. c. 80. — Borneo. *bintulensis*, *Becc.* l. c. 75. — Borneo. *borneensis*, *Becc.* l. c. 85 t. 6. — Borneo. *cordata*, *Becc.* l. c. 84. — Borneo. *ferruginea*, *Becc.* in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 432. — Penins. Mal. *Fordiana*, *Becc.* *Malesia*, iii. (1889) 198. — China. *furcata*, *Becc.* l. c. Borneo. *Kingiana*, *Becc.* *Malesia*, iii. (1889) 193. — Penins. Mal. *Kersteniana*, *Hort.* ex *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 249. — Hab. ? *Kunstleri*, *Becc.* in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 433. — Perak. *malajana*, *Becc.* *Malesia*, iii. (1889) 197. — Penins. mal. *mattanensis*, *Becc.* l. c. 86 t. 7. — Borneo. *modesta*, *Becc.* l. c. 195. — Penins. Mal. *olivifera*, *Becc.* l. c. 78. — Borneo. *orbicularis*, *Becc.* l. c. 83. — Borneo. *petiolulata*, *Becc.* l. c. 77. — Borneo. *pusilla*, *Becc.* l. c. 194. — Borneo. *sarawakensis*, *Becc.* l. c. 81. — Borneo. *Scortechini*, *Becc.* l. c. 192. — Penins. Mal. *spathellifera*, *Becc.* l. c. 76. — Borneo. *spicata*, *Becc.* l. c. 88 t. 8. — Borneo. *Veitchii*, *W. Wats.* in *Gard. Chron.* (1886) i. 139 nomen; *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1888) t. 7053. — Borneo.

LIGARIA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 345 = **Loranthus**, Linn. *coronata*, *Van Tiegh.* l. c. 348 *cuneifolia*, *Van Tiegh.* l. c. 347 = *L. cuneifolius* *Ruiz & Pav.* *emarginata*, *Van Tiegh.* l. c. 348. — Peruv. *lanceolata*, *Van Tiegh.* l. c. — Chili. *Orbignyana*, *Van Tiegh.* l. c. — Bolivia, Peruv. *viscoides*, *Van Tiegh.* l. c. = *L. viscoides*, *Poepp.*

LIGHTFOOTIA, L'Hérit. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 78. *arabidifolia*, *Engl. Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 53. — Afr. trop. or. *glomerata*, *Engl. l. c.* 52. — Afr. trop. or. *Sodenii*, *Engl. l. c.* — Afr. trop. or.

LIGIA, Fasano = **Thymelaea**, Tourn. *Glaziovii*, *Warm.* in *Vidensk. Selsk. Skr.* 6 Raekke. naturw. og mathemo iv. (1888) 465 t. 22 f. 11-16 et t. 23. — Bras.

LIGUSTICUM, Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 79. *acuminatum*, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris.* Sér. VIII. vi. (1894) 131. — Yunnan. *acutifolium*, *T. Kirk.* in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 429-30, nomen; et in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 237. — N. Zel. *alpinum*, *F. Kurtz.* in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 464 = *Pachypleurum alpinum*, *Ledeb.* *angelicaefolium*, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris.* Sér. viii. vi. (1894) 133. — Yunnan. *Arafae*, *Alboff.* in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 250 t. 8. — Reg. Cauc. *brachylobum*, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris.* Sér. VIII. vi. (1894) 134. — Yunnan. *canadense*, *Britton.* in *Mem. Torrey Bot. Club.* v (1894) 240 = seq. *canadense*, *Vail.* ex *Small & Vail.* in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1893) 120 [canadensis] = *actaeifolium*, *Michx.* *Canbyi*, *Coult. & N. E. Rose.* *Rev. N. A. Umbell.* (1888) 87. — Montana.

LIGUSTICUM : —

- Carvifolia*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 339 = *Selinum Carvifolia*, Linn.
daucoides, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 135 (= *Trachydium daucoides*, Franch.). — Yunnan.
Delavayi, Franch. l. c. 131. — Yunnan.
Eastwoodae, N. E. Rose, ex *Eastwood*, in Zöe. iv. (1893) 17; *Coult. & N. E. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 320 t. 13. — Colorado.
ferulaceum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 135, in obs. — China.
glaucescens, Franch. l. c. 134. — Yunnan.
Grayi, *Coult. & N. E. Rose*, *Revis. N. A. Umbell.* (1888) 88. — Am. bor. occ.
Huteri, *Porta*, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 306. — Ins. Balear.
involucratum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 136. — Yunnan.
Macouni, *Coult. & N. E. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 289, t. 23. — Alaska.
mucronatum, *Hort.* Kew ex *Gard.* Kew Herb. Pl. (1895) 263 (= *Neogaya mucronata*, Schrenk.). — Sibiria.
multivittatum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 133. — Yunnan.
physospermifolium, *Alboff*, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 109. — Reg. Cauc.
Porteri, *Coult. & N. E. Rose*, *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 86. — Am. bor. occ.
pteridophyllum, Franch. ex *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) sub t. 1958, in obs.; et in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 132. — Yunnan.
shikokianum, *Makino*, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 51. — Japon.
sinense, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xx (1891) t. 1958. — China.
tenuifolium, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, iii. (1894) 136 (= *Selinum tenuifolium*, Wall.). — Yunnan.
verticillatum, *Coult. & N. E. Rose*, ex *N. E. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 320, t. 12 (= *Angelica verticillata*, Hook.). — Am. bor.
Wallichii, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 136 (= *Selinum striatum*, Benth.). — Yunnan.

LIGUSTRINA, Rupr. = **Syringa**, Linn. (Oleac.).
pekinensis, Regel, ex *Dippel*, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 119 = *S. pekinensis*, Rupr.

LIGUSTRUM, [Tourn.] Linn. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 81.

- deciduum*, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 90. — China.
Henryi, *Hemsl.* l. c. — China.
magnoliaefolium, *Hort.* ex *Dippel*, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 129 = *lucidum*, *Ait.*
multiflorum, *Hort.* ex *Baill.* in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 880, in obs. = *Baillonia spicata*, *Baill.*
ovatum, *Hort.* ex *Dippel*, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 128 = *japonicum*, *Thunb.*
Regelianum, *Hort.* *Lemoine*, ex *Dippel*, l. c. 133 = *L. Ibota*, *Sieb. & Zucc.*
strongylophyllum, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 93. — China.

LILAEOPSIS, Greene, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 192 = **Crantzia**, Nutt. (Umbell.).
lineata, Greene, l. c. = *C. lineata*, Nutt.

LILIASTRUM, Ludw. = **Paradisea**, Mazz. (Liliac.).

liliforme, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 712 = *P. Liliastrum*, *Bertol.*

LILIUM, Tourn. ex Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 81.

- Bakerianum*, *Collett & Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 138. — Burma.
Biondii, *Baroni*, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II, ii. (1895) 337. — China.

LILIUM : —

- chinense*, *Baroni*, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II, ii. (1895) 333. — China.
claptonense, *Hort.* *Low.* ex *Hook.* f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 351, in syn. = *primulinum*, *Baker.*
dahuricum, *Hort.* ex *Reuthe*, in *Gartenfl.* xli. (1891) 476 = *dauricum*, *Ker-Gawl.*
Dalhansonii ×, *Hort.* ex *Garden* (1893) t. 927; et ex *Gartenfl.* xliii. (1894) 24. — Hybr. artef.
Delavayi, *Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 314. — China occ.
Duchartrei, *Franch.* in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II, x. (1887-88) 96. — Tibet.
elegans ×, *T. S. Ware*, in *Gartenfl.* (1891) xli. 475. — Hybr. artef.
Fargesii, *Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 317. — China occ.
formosum, *Franch.* l. c. 313. — China occ.
Henryi, *Baker*, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 660; (1890) ii. 380 cum xylogr. et in *Bot. Mag.* (1891) t. 7177. — China centr.
lankogense, *Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 317. — China occ.
Lowii, *Baker*, in *Bot. Mag.* (1892) t. 7232; in *Garden* (1892) i. 219, t. 953; et ex *Gard. Chron.* (1893) ii. 120, fig. 29 (= *L. nepalense*, *Collett & Hemsl.*). — Ind. or.
mirabile, *Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 310. — China.
myriophyllum, *Franch.* l. c. 313. — China occ.
neilgherrense, *Collett & Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 138 = *primulinum*, *Baker.*
nepalense, *Collett & Hemsl.* l. c. t. 32 = *Lowii*, *Baker.*
ochraceum, *Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 319. — China occ.
papilliferum, *Franch.* l. c. 316. — China occ.
parviflorum, *Holzing*, in *Contrib. U. S. Nat. Mus.* iii. 4 (1895) 253 = *columbianum*, *Hanson.*
primulinum, *Baker*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 351; et in *Bot. Mag.* (1892) t. 7227. — Ind. or.
sanguineo-purpureum, *G. Beck*, in *Annal. Naturhist. Hofmus. Wien*, v. (1890) 569 = *carnolicum*, *Bernh.*
stylosum, *Klotzsch*, ex *Hook.* f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 351, in syn. = *polyphyllum*, *D. Don.*
sulphureum, *Baker*, ex *Hook.* f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 351; et in *Bot. Mag.* (1892) t. 7257. — Burma.
sutchuenense, *Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 318. — China.
taliense, *Franch.* l. c. 319. — China occ.
yunnanense, *Franch.* l. c. 314. — Yunnan.

LIMACIA, Lour. (Menisperm.). — Ind. Kew. ii. 88.
Kunstleri, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 383. — Penins. Mal
sagittata, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1749. — China.

LIMEUM, Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 88.
fenestratum, *Heimerl*, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b (1889) 9 = *Semonvillaea fenestrata*, *Fenzl.*
glaberrimum, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 132. — Afr. austro-occ. extratrop.
pterocarpum, *Heimerl*, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b (1889) 9 = *Semonvillaea pterocarpa*, *J. Gay.*

LIMNANTHEMUM, S. Gmel. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 85.
aquaticum, *Britton*, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* ix. (1889) 12 = *trachyspermum*, *A. Gray.*

LIMNODEA, Dewey, ex *Coult.* in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 518 = **Thurberia**, Benth. (Gramin.).
arkansana, *Dewey*, l. c. = *T. arkansana*, *Benth.*

LIMNOBIUM, Rich. (Hydrochar.). — Ind. Kew. ii. 84.
Spongia, *Baill.* *Hist. des pl.* xiii. (1895) 192 = *L. Spongia*, *Steud.*

LIMNOPEUCE, Adans. = **Hippuris**, Linn. (Halorag.).
vulgaris, « *Vaillant* » ex *Greene*, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 138 = *H. vulgaris*, Linn.

LIMNOSIPANEA, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 84.
erythraeoides, *K. Schum.* in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 253 = *Sipanea erythraeoides*, *Cham.*

LIMODORUM, [Tourn.] Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 85.
graminifolium, *Ham.* ex *Hook.* f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 857 = *Arundina bambusifolia*, *Lindl.*
parviflorum, *Nash*, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 158 = *Calopogon parviflorus*, *Lindl.*
striatum, *Reinw.* ex *Hook.* f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 854 = *Calanthe angustifolia*, *Lindl.*
Trabutianum, *Batt.* in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 297; et in *Batt. & Trab. Fl. d'Algér.* (1886) 15, t. 10; et *Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 33. — Algérie.

LIMODORUM, Ludw. Def. (1737) 120, ex *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 671 = **Epipactis**, Adans. et **Cephalanthera**, Reichb. (Orchid.).
acuminatum, *Kuntze*, l. c. = *Ceph. ensifolia*, *Rich.*
athense ×, *Kuntze*, l. c. = Belg.
Austinae, *Kuntze*, l. c. = *Ceph. Austinae*, *Benth. & Hook.*
chloidophyllum, *Kuntze*, l. c. = *Ceph. chloidophylla*, *Reichb. f.*
cucullatum, *Kuntze*, l. c. = *Ceph. cucullata*, *Boiss. & Heldr.*
erectum, *Kuntze*, l. c. = *Ceph. pallens*, *Rich.*
falcatum, *Kuntze*, l. c. = *Ceph. falcata*, *Blume.*
giganteum, *Kuntze*, l. c. = *Epipactis Royleana*, *Lindl.*
grandiflorum, *Kuntze*, l. c. = *Cephalanthera ensifolia*, *Rich.*
latifolium, *Kuntze*, l. c. = *Epipactis latifolia*, *All.*
longibracteatum, *Kuntze*, l. c. = *Cephalanthera longibracteata*, *Blume.*
longifolium, *Kuntze*, l. c. = *Ceph. ensifolia*, *Rich.*
microphyllum, *Kuntze*, l. c. = *Epipactis microphylla*, *Sw.*
oreganum, *Kuntze*, l. c. = *Cephalanthera oregana*, *Reichb. f.*
palustre, *Kuntze*, l. c. = *Epipactis palustris*, *Crantz.*
papillosum, *Kuntze*, l. c. = *Epip. papillosa*, *Franch.*
Royleanum, *Kuntze*, l. c. = *Epip. Royleana*, *Lindl.*
rubiginosum, *Kuntze*, l. c. = *Epip. atrorubens*, *Schult.*
rubrum, *Kuntze*, l. c. = *Cephalanthera rubra*, *Rich.*
speciosum ×, *Kuntze*, l. c. = Belg.
Thunbergii, *Kuntze*, l. c. = *Epipactis Thunbergii*, *A. Gray.*
veratrifolium, *Kuntze*, l. c. = *Epip. consimilis*, *D. Don.*
violaceum, *Kuntze*, l. c. = *Epip. latifolia*, *All.*

LIMONIASTRUM, Moench (Plumbag.). — Ind. Kew. ii. 86.
Feei, *Batt.* in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 726 = *Bubania Feei*, *Girard.*

LIMONIOIDES, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 394 = **LIMONOIDES**, *Sieg.* = **Limoniastrum**, *Moench*, (Plumbag.).
monopetalum, *Kuntze*, l. c. = *Limoniastrum articulationum*, *Moench.*
Guyonianum, *Kuntze*, l. c. = *L. Guyonianum*, *Durieu.*

LIMONIUM, Moehr. = **Statice**, Tourn. (Plumbag.).
alutaceum, *anceps*, *arabicum*, *articulatum*, *australe*, *axillare*, *bicolor*, *Billardieri*, *Bourgeani*, *brasiliense*, *Brunneri*, *cabulicum*, *caesium*, *callicomum*, *cancellatum*

LIMONIUM: —

carnosum, *chrysocomum*, *Companyonis*, *confusum*, *congestum*, *corculum*, *corinthiacum*, *corymbulosum*, *cosyrense*, *cumanum*, *dalmaticum*, *decipiens*, *decumbens*, *delicatulum*, *dichotomum*, *dictyocladum*, *diffusum*, *Dregeanum*, *duriusculum*, *effusum*, *elatum*, *emarginatum*, *eximium*, *ferulaceum*, *flexuosum*, *Franchetii*, *fruticans*, *furfuraceum*, *Girardianum*, *globulariaefolium*, *globuliferum*, *Gougetianum*, *grewiaefolium*, *Griffithii*, *gummiferum*, *Humboldtii*, *iconicum*, *incanum*, *insigne*, *Jovibarba*, *Kaufmannianum*, *Krausianum*, *latifolium*, *leptolobum*, *leptophyllum*, *leptostachyum*, *linifolium*, *lychnidifolium*, *macrophyllum*, *macropterum*, *macrorhabdon*, *macrorhizon*, *minutum*, *minutiflorum*, *mucronatum*, *myrianthum*, *nudum*, *obovatum*, *occidentale*, *ochranthum*, *ocymifolium*, *ornatum*, *otolepis*, *ocalifolium*, *papillatum*, *pectinatum*, *pedicellatum*, *perfoliatum*, *plumosum*, *Preauxii*, *pruinatum*, *psilocladon*, *puberulum*, *pycnanthum*, *roseum*, *rupicolum*, *salicorniacea*, *salsuginosum*, *Sartorii*, *scabrum*, *Schrenkiana*, *Semenovii*, *serbicum*, *Sibthorpium*, *Sieberi*, *spathulatum*, *speciosum*, *spicatum*, *Stocksii*, *suffruticosum*, *tenellum*, *Thouinii*, *tomentellum*, *trigonodes*, *tuberculatum*, *tubiflorum*, *Wrightii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 394-96 = *homonyma omnia* *Statice*.

arborescens, Kuntze, l. c. 395 = *S. fruticans*, Webb. *Behn*, Kuntze, l. c. = *S. Limonium*, Linn. *Besserianum*, Kuntze, l. c. = *S. tatarica*, Linn. *Bonducellii*, Kuntze, l. c. = *S. Bonducellii*, *Lestib.* *brassicifolium*, Kuntze, l. c. = *S. brassicaefolia*, Webb & Berth.

carolinianum, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 255 = *S. caroliniana*, Walt. *Cossonianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 395 = *S. corymbulosa*, Nym.

densiflorum, Kuntze, l. c. = *S. oleaefolia*, Scop. *desertorum*, Kuntze, l. c. = *S. tatarica*, Linn. *Dodartii*, Kuntze, l. c. = *S. auriculataefolia*, Vahl. *Dubyi*, Kuntze, l. c. = *S. Dubyei*, Gren. & Godr. *Dufourii*, Kuntze, l. c. = *S. Dufourei*, Girard. *Durieu*, Kuntze, l. c. = *S. Duriaei*, Girard. *Gmelinii*, Kuntze, l. c. = *S. Gmelini*, Koch. *gracuum*, Kuntze, l. c. = *S. rorida*, Sibth. & Sm. *Guaicuru*, Kuntze, l. c. = *S. chilensis*, Phil. *japonicum*, Kuntze, l. c. = *S. australis*, Spreng. *lobatum*, Kuntze, l. c. = *S. Thouini*, Viv. *Meyeri*, Kuntze, l. c. = *S. myosinum*, Linn. et Gmelini, Koch.

myosuroides, Kuntze, l. c. = *S. myosuroides*, Regel. *Owerinii*, Kuntze, l. c. 396 = *S. Owerini*, Boiss. *peruvianum*, Kuntze, l. c. = *Peruvia*. *rariflorum*, Kuntze, l. c. 395 = *S. Limonium*, Linn. *sedoides*, Kuntze, l. c. 396 = *S. sedoides*, Regel. *sinense*, Kuntze, l. c. = *S. australis*, Spreng. *Sewerzowii*, Kuntze, l. c. = *S. Sewerzowii*, Regel. *Suwarowii*, Kuntze, l. c. = *S. Suwarowii*, Regel.

LIMOSELLA, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 86.

ciliata, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 96. — N. Zel.

LINANTHUS, Benth. = *Gilia*, Ruiz & Pav. (Polemon).

acicularis, Greene, Pittonia, ii. (Aug. 1892) 259; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 250. — Calif. *ambiguus*, Greene, ll. cc. 256; et 249 = *G. ambigua*, Rattan.

androsaceus, Greene, ll. cc. 258; et 250 = *G. androsacea*, Steud.

aureus, Greene, l. c. 257 = *G. aurea*, Nutt. *bellus*, Greene, l. c. 256 = *G. bella*, A. Gray.

bicolor, Greene, l. c. 260 = *G. tenella*, Benth. *Bigelovii*, Greene, l. c. 253 = *G. Bigelovii*, A. Gray.

Bolanderi, Greene, l. c. 255 = *G. Bolanderi*, A. Gray.

breviculus, Greene, l. c. 259 = *G. brevicula*, A. Gray. *ciliatus*, Greene, l. c. 260 = *G. ciliata*, Benth.

demissus, Greene, l. c. 257 = *G. demissa*, A. Gray.

dianthiflorus, Greene, l. c. 254 = *Fenzlia dianthiflora*, Benth.

filipes, Greene, l. c. 255 = *Gilia filipes*, Benth. *grandiflorus*, Greene, l. c. 250 (= *Leptosiphon grandiflorus*, Benth.) = *G. densiflora*, Benth.

LINANTHUS: —

Harknessii, Greene, Pittonia, ii. (Aug. 1892) 255 = *G. Harknessii*, Curran.

Jonesii, Greene, l. c. 254 = *G. Jonesii*, A. Gray. *Lemmoni*, Greene, l. c. 257 = *G. Lemmoni*, A. Gray.

liniflorus, Greene, l. c. 249 = *G. liniflora*, Benth. *lulcolus*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 121. — Calif.

montanus, Greene, l. c. 120. — Am. bor. occ. *neglectus*, Greene, l. c. 24. — Calif.

nudatus, Greene, l. c. 120. — Calif. *Parryae*, Greene, Pittonia, ii. (Aug. 1892) 256 = *G. Parryae*, A. Gray.

parviflorus, Greene, l. c. 258 (= *Leptosiphon parviflorus*, Benth.) = *G. micrantha*, Steud.

pharnaceoides, Greene, l. c. 254 = *G. pharnaceoides*, Benth.

pusillus, Greene, l. c. 255 = *G. pusilla*, Benth. *Rattani*, Greene, l. c. 257 = *G. Rattani*, A. Gray.

rosaceus, Greene, l. c. 259; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 250 = *G. micrantha*, Benth. *serrulatus*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 120. — Calif.

LINARIA, Tourn. ex Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 86.

aragonensis, Loscos, *Trat. pl. Arag.* Suppl. 6 (1886 ?) 34; Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1887) 35, t. 111; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 176. — *Hisp.*

auriculata, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 622 = *L. Elatine*, Mill.

baborensis, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 642 = *pinifolia*, Poir.

Badali, Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1892) 33, t. 110; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 176. — *Hisp.*

Blanca, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* ii. (1889) 10; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 173. — *Hisp.*

Breissonii X, Corbière, *Nouv. Fl. Normand* (1893) 427. — Gall. occ.

Camusi X, Hérilbaud, in Bull. Herb. Boiss. App. iv. (1894) 27. — Gall.

Cossoni, Barratte, in *Coss. Ill. Fl. Atlant.* ii. (1887) 89, t. 155; *Bonnier & Barratte, Cal. vasc. pl. Tunis* (1886) 317. — Tunetia.

Doumetii, Coss. ex Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. Dicot. (1889) 640; *Bonnet & Barratte, Explor. Tunis. Illustr. bot.* (1895) t. 12, fig. 1-8. — Afr. bor.

euxina, Velen. in Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 125. — Bulg.

fallax, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. i. [Dicot.] (1889) 640; *Coss. Ill. Fl. Atlant.* ii. (1887) 87, t. 154. — Algérie.

Fontanesii, Coss. ex Batt. & Trab. i. (1889) 641 = *L. Cossoni*, Barratte.

fragrans, Porta & Rigo, in *Atti Accad. Agiati* ix. 1891 (1892) 52; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 174. — *Hisp.*

gobantesiana, Coincy, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 27. — *Hisp.*

hederifolia, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 622 (= *L. hederiaefolia*, Steud.), = *L. Elatine*, Mill.

Hérilbaudi X, G. Camus, in Bull. Herb. Boiss. i. Append. i. (1893) 42. — Gall.

heterophylla, Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 248 (= *Antirrhinum heterophyllum*, Schousb.). — Ins. Canar.

Linaria, Karst. *Deutschl. Fl.* (1880-83) 947; Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 59 = *L. vulgaris*, Mill.

Pancicii, Janka, ex Nym. *Consp. Fl. Eur.* ii. i. (1890) 232 = *macedonica*, Griseb.

patula, Baker, in Kew Bull. (1895) 222. — Reg. Somal.

Pelliceriana, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 621 = *L. Pelisseriana*, Mill.

Perezii, Nym. *Consp. Fl. Eur.*, *Suppl.* ii. 1 (1890) 234. — *Hisp.*

Reverchoni, Wittrock, in Act. Hort. Berg. i. 4 (1891) 11, cum ic.; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 173. — *Hisp.*

LINARIA: —

Rodriguezii, Porta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 313. — Ins. Balear.

sofiana, Velen. in Sitzungs. Boehm. Ges. Wiss. (1887) 453 = *italica*, Trevir.

subrotunda, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 622 = *spuria*, Mill.

LINDENBERGIA, Lehm. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 89.

indica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 462 = *polyantha*, Royle.

ruderalis, Kuntze, l. c. = *urticaefolia*, Lehm. *sinaica*, Terrac. in Ann. Ist. Bot. Roma, v. (1894) 103 = *sinaica*, Benth.

LINDERA, Thunb. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 89.

cercidifolia, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 387. — China.

citrodora, Hemsl. l. c. — Japon., Ins. Loo Choo. *communis*, Hemsl. l. c. — China.

fragrans, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1788. — China.

fruticosa, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 388. — China.

grandifolia, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 220. — Borneo.

latifolia, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 183. — Reg. Himal.

Laureola, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 119. — Burma.

malaccensis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 183. — Penins. Mal., Borneo.

megaphylla, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 389. — China.

Meissneri, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 182. — Reg. Himal.

obovata, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1887-88) 76. — Tibet.

Oldhami, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 390. — Formosa.

populifolia, Hemsl. l. c. — China.

puberula, Franch. in *Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1888) 77. — Tibet.

reflexa, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 391. — China.

sinensis, Hemsl. l. c. 392. — China.

Tzumu, Hemsl. l. c. — China.

LINDERNIA, All. = *Vandellia*, Linn. (Scrophul.).

angustifolia, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 73 = *V. angustifolia*, Benth.

diffusa, Wettst. l. c. = *V. diffusa*, Linn.

elata, Wettst. l. c. = *V. elata*, Benth. *gratioloides*, Lloyd & Fouc. *Fl. Ouest Fr.* éd. 4 (1886) 246 = *Ilysanthes riparia*, Rafin.

hirsuta, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 73 = *V. hirsuta*, Buch.-Ham.

Hookeri, Wettst. l. c. 80 = *V. Hookeri*, C. B. Clarke.

lobelioides, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 357 = *V. lobelioides*, Oliver.

mollis, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 73 = *V. mollis*, Benth.

molluginoides, Wettst. l. c. 80 = *V. molluginoides*, Benth.

nummulariaefolia, Wettst. l. c. = *V. nummularifolia*, D. Don.

pedunculata, Wettst. l. c. = *V. pedunculata*, Benth.

scabra, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 80 = *V. scabra*, Benth.

sessiliflora, Wettst. l. c. = *V. sessiliflora*, Benth.

Stuhlmannii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 357. — Afr. trop. or.

LINDELOFIA, Lehm. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 89.

longiflora, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 379; Gürke in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2a (1894) 103 = *spectabilis*, Lehm.

LINDNERIA, Th. Dur. & Lubbers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) p. ccxvi = **Pseudogaltonia**, Kuntze (Liliac.).

fibrillosa, Th. Dur. & Lubbers, l. c. t. 18; Baker, in Gard. Chron. (1890) ii. 240 = P. Pechuelii, Kuntze.

Pechuelii, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 376 = P. Pechuelii, Kuntze.

LINGOUM, Rumpf = **Pterocarpus**, Linn. (Legum.).

acuminatum, echinatum, erinaceum, esculentum, indicum, lucens, macrocarpum, Marsupium, melliferum, Rohrii, rufescens, santalinum, sericeum, simplicifolium, tinctorium, villosum, violaceum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 193 = *homonyma omnia* Pterocarpi.

acuminatum, Kuntze, l. c. = P. ancylocalyx, Benth. *officinale*, Kuntze, l. c. = P. Draco, Linn.

pubescens, Kuntze, l. c. = P. Amphymenium, DC.

LINKIA, Cav. = **Persoonia**, Sm. (Proteac.).

acerosa, acicularis, angulata, angustiflora, arborea, articulata, brachystylis, Caley, Chamaepeuce, Chamaepitys, comata, confertiflora, cornifolia, Cunninghamii, curvifolia, diadema, elliptica, falcata, fastigiata, ferruginea, graminea, Gunnii, hakeaeformis, hirsuta, juniperina, ledifolia, linearis, longifolia, lucida, marginata, media, microcarpa, Mitchellii, mollis, nutans, oblongata, pinifolia, prostrata, quinquerivis, revoluta, rigida, rudis, rufiflora, saccata, salicina, Sandersiana, scabra, scabrella, sericea, striata, sulcata, tenuifolia, tertiifolia, tortifolia, trinervis, virgata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 579 = *homonyma omnia* Persooniae.

dillwynioides, Kuntze, l. c. = P. dillwynioides, Meissn.

myrtilloides, Kuntze, l. c. = P. myrtilloides, Sieber. *oxycocoides*, Kuntze, l. c. = P. oxycocoides, Sieber.

Toro, Kuntze, l. c. = P. Toru, A. Cunn.

LINOCIERA, Sw. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 90. *africana*, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1894) 129. — Abyss.

axillaris, Knobl. l. c. 87 et 153 (= *Chionanthus axillaris*, Benth. & F. Muell.). — Austral.

Blumeana, Knobl. l. c. (= *Ch. glomerata*, Blume). — Sumatra.

callophylla, Knobl. l. c. (= *Ch. callophylla*, Blume). — Malaya.

caribaea, Knobl. l. c. (= *Ch. caribaea*, Jacq.). = *glomerata*, Pohl.

caudata, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 84. — Burma.

coriacea, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 458. — Ins. Borbon.

coriacea, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 181. — Ins. Philipp.

cuspidata, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1894) (= *Chionanthus cuspidata*, Blume). — Ins. Celebes.

cyanocarpa, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 457. — Ins. Borbon.

diversifolia, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1894) (= *Chionanthus diversifolia*, Miq.). — Sumatra.

domingensis, Knobl. l. c. (= *Ch. domingensis*, Lam.). = *glomerata*, Pohl.

Dussii, Knobl. l. c. (= *Maysea Dussii*, Krug & Urban). — Ins. Antill.

litorea, Knobl. l. c. (= *Ch. littorea*, Miq.). — Sumatra.

elliptica, Knobl. l. c. (= *Chionanthus elliptica*, Blume). — Malaya.

laxiflora, Knobl. l. c. (= *Ch. laxiflora*, Blume). — Borneo.

macrocarpa, Knobl. l. c. (= *Ch. macrocarpa*, Blume). = *insignis*, C. B. Clarke.

Mannii, Solered. in Sitzungsber. Bot. Ver. Muench. (1891) extr. 9; et ex Knobl. in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 17. — Gabon.

obscura, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 457. — Ins. Borbon.

picrophloia, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1894) (= *Chionanthus picrophloia*, F. Muell.) = *intermedia*, Wight.

pluriflora, Knobl. l. c. — Borneo.

quadristaminea, Knobl. l. c. (= *Chionanthus quadristaminea*, F. Muell.). — Austral.

LINOCIERA: —

ramiflora, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1894) (= *Ch. ramiflora*, Roxb.). = *macrophylla*, Wall.

sessiliflora, Hemsl. in Ann. Bot. v. (1891) 504. — Ins. Salom.

spicata, Knobl. l. c. (= *Chionanthus spicata*, Blume). — Malaya.

sumatrana, Knobl. l. c. 87 et 133 (= *Ch. sumatrana*, Blume). — Sumatra.

timorensis, Knobl. l. c. (= *Ch. timorensis*, Blume). — Timor.

verrucosa, Solered. in Sitz. Bot. Ver. Muench. (1891) extr. 8; et in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 399; xlv. 17 (= *Vangueria verrucosa*, Sieb.). — Ins. Mauriti.

Welwitschii, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1895) 129 (= *Maysea Welwitschii*, Knobl.). — Afr. trop. occ.

LINODES, Ludw. = **Radiola**, Dill. (Lineae).

Radiola, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 87 = R. Linoides, Roth.

LINOSPADIX, Becc. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 90.

Forbesii, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 358. — N. Guin.

Hollrungii, Becc. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 16. — N. Guin.

Micholitzii, Ridl. in Gard. Chron. (1895) ii. 262. — N. Guin.

LINOSTOMA, Wall. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 90.

albifolium, Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 63] *Veslosia*, 1885-88, sec. éd. (1891) 67. t. 20. — Bras. bor.

LINOSYRIS, Moehr. Hort. Priv. (1736) 60; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 687 = **Thesium**, Linn. (Santal.)

acutissima, alatawica, alpina, amblystachya, angulosa, aphylla, aurea, australis, Basniniana, Bergeri, Boissieriana, brachyphylla, brasiliensis, capitata, capitellata, capituliflora, carinata, ciliata, commutata, compressa, confinis, corniculata, corymbuligera, crassifolia, debilis, densiflora, diffusa, dicaricata, ebracteata, Eckloniana, elatior, exul, flexuosa, foliosa, Frisae, funalis, glomeruliflora, gnidiacea, grisea, heterophylla, himalensis, hispida, humifusa, humilis, impressa, intermedia, juncea, juncifolia, Kerriana, Krebsii, laxiflora, libanotica, lineata, longifolia, macrantha, macrostachya, madagascariensis, maritima, megalismontana, micromeria, micropogon, multicaulis, nevadensis, nigromontana, pallida, paniculata, Parnassi, parvifolia, phyllostachya, pinifolia, procumbens, quinqueflora, racemosa, ramosa, rariflora, refracta, repens, rostrata, rupestris, saxatilis, scabra, scandens, selaginea, spartea, spicata, spinosa, spinulosa, squarrosa, stricta, Szowitsii, tauricaula, tenuis, tenuissima, teretifolia, Thunbergiana, triflora, Turczaninowii, virens, virgata, Wightiana, Zeyheri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 588 = *homonyma omnia* Thesii.

amplexicaulis, Kuntze, l. c. = T. euphorbioides, Berg.

brevifolia, Kuntze, l. c. = T. leptocaulis, Sond.

chinensis, Kuntze, l. c. = T. australe, R. Br.

decurrens, Kuntze, l. c. = T. australe, R. Br.

ericifolia, Kuntze, l. c. = T. ericaefolium, A. DC.

ericodes, Kuntze, l. c. = T. ericoides, R. Br.

euphrasioides, Kuntze, l. c. = T. euphrasioides, Berg.

galioides, Kuntze, l. c. = T. galioides, A. DC.

Linophyllum, Kuntze, l. c. 587 = T. bavarum, Schrank, intermedium, Schrad. et divaricatum, Jan.

lobeloides, Kuntze, l. c. 588 = T. lobeloides, A. DC.

montana, Kuntze, l. c. = T. bavarum, Schrank.

sedifolia, Kuntze, l. c. = T. crassifolium, Sond.

stellerodes, Kuntze, l. c. = T. stelleroides, Faub. & Spach.

LINUM, Tourn. ex Linn. (Lineae). — Ind. Kew. ii. 90.

adenophorum, Hausskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 65. — Oriens.

LINUM: —

Aristidis, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885?) 337; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 175 = *corymbiferum*, Desf.

Boissieri, Aschers. & Sint. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 137. — As. Min.

campanulatum, Hort. ex Kew Bull. (1889) 45 = *flavum*, Linn.

emirnense, Hilsenb. & Bojer, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 598. — Madag.

floridanum, Trel. in Trans. St. Louis Acad. v. (1886) 13 = *virginicum*, Linn.

lignosum, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 22. — As. Min.

Luscharii, Stapf, l. c. 22. — As. Min.

macrosepalum, Stapf, l. c. 42. — As. Min.

Peyroni, Post, Pl. Postianae, iii. (1892) 6. — Syria.

Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 269. — Mexic.

Reuteri, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 139. — Syria.

rigidissimum, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 424. — As. occ.

sterile, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 42. — As. Min.

thracicum, Degen, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 55 = *flavum*, Linn.

Volkensii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 226. — Afr. trop. or.

Wetschkyanum, E. Fieck, in Kneucker, Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 233. — Reg. Cauc.

LIPARIS, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 93.

acuminata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 696; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2007. — Khasia.

bambusaefolia, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.

Beccarii, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 284. — Ind. or. austr.

Beddomei, Ridl. l. c. 268. — Ind. or. austr.

Bernieri, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 185. — Ins. Borbon.

bifolia, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iv. (1895) 289. — Bras.

bifolia, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 814 = L. Loeslii A. Rich.

Cathcartii, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1808; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 694. — Reg. Himal.

caulescens, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 186. — Ins. Borbon.

clavigera, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 294. — Java.

cordifolia, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1811; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 692. — Reg. Himal.

cornicaulis, Makino, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 213, nomen. — Japon.

Cumingii, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 292. — Malacca.

cuspidata, Ridl. l. c. 266. — Ins. Societ.

Dalzellii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 698. — Concan.

decurrens, Reichb. f. ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 291 (= *Platystylis decurrens*, Lindl.). — As. trop.

deflexa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 697; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2008. — Reg. Himal.

delicatula, Hook. f. ll. cc. xix. (1889) t. 1889; et v. (1890) 705. — Ind. or.

distans, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 71. t. 29; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 704. — Assam.

Dolabella, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2010; Hook. f. l. c. vi. (1890) 183. — Khasia.

Duthiei, Hook. f. ll. cc. xix. (1889) t. 1857 b; et vi. (1890) 701. — Reg. Himal.

elegantissima, Hort. ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 340 = *Microstylis calophylla*, Reichb. f.

Flammula, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 183. — Ins. Borbon.

Forbesii, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 283. — Java.

fulgens, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 620. — Ins. Philipp. ?

LIPARIS: —

- Gamblei, *Hook. f. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1812; *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 693; *et in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. i. (1895) 2, t. 3. — Ind. or.
 gracilis, *Hook. f. ll. cc.* xxi. (1890) t. 2011; *et vi.* (1890) 182. — Perak.
 gracilis, *Rolfe, in Bolet. Soc. Brot.* ix. (1891) 138. — Ins. S. Thoma.
 Griffithii, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 285; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 700. — Bootan.
 Hookeri, *Ridl. l. c.* 288. — Khasia.
 inconspicua, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 48. — Japon.
 japonica, *Maxim. in Bull. Acad. sci. Pétersb.* xxxi. (1887) 102. — Japon.
 lacerata, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 284; *et Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 702. — Borneo.
 lancifolia, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1855; *et l. c.* 700. — Khasia.
 Layardi, *F. Muell. in Wing's South. Sci. Rec.* New Ser. i. (Dec. 1885), *ex Bot. Centralbl.* xxvi. (1886) 87. — N. Caled.
 macrantha, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1854; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 704 = *distans*, C. B. Clarke.
 macrantha, *Rolfe, ex Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 156. — Ins. Formos.
 macrocarpa, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 696. — Reg. Himal.
 minuta, *Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc.* 7 (1892) 306; *et Fl. Polyn. Franç.* (1892) 209. — Ins. Societ.
 nectarina, *Frappier, Fl. Ile Réunion* (1895) 184. — Ins. Borbon.
 obscura, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1886; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 702. — Zeyl.
 Parishii, *Hook. f. l. c.* vi. (1890) 182. — Ind. or.
 pectinata, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 277. — Ins. Philipp.
 perpusilla, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1856 b; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 706. — Ind. or.
 platyphylla, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 264; *et l. c.* 695. — Ind. or.
 platyrachis, *Hook. f. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1890; *et l. c.* 706. — Reg. Himal.
 Prainii, *Hook. f. ll. cc.* t. 1857; *et* 700. — Assam.
 prionotes, *Lindl. ex Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 297. nomen = *Sarcocochilus* sp.
 pulchella, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1810; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 693. — Khasia.
 puncticulata, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 119 *et* 272. — Madag.
 punctilabris, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 184. — Ins. Borbon.
 pusilla, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 119; *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1856 a, *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 701. — Madag.
 repens, *Ridl. l. c.* 279 (= *Malaxis atropurpurea*, Blume). — Java.
 resupinata, *Ridl. l. c.* 290; *in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1888; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 705; *et vi.* (1890) 182. — Reg. Himal.
 robusta, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2012; *et l. c.* 182, in syn. = *latifolia*, Lindl.
 scaposa, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 183. — Ins. Borbon.
 Scortechini, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 703; *et vi.* (1890) 182, in syn.; *et in Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2009 = *latifolia*, Lindl.
 Simmondsii, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* iii. (1891) 18. — Austral.
 tenuifolia, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2013; *et Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 182. — Assam.
 Thwaitesii, *Hook. f. ll. cc.* v. (1890) 692; *et* t. 2006. — Zeylan.
 torta, *Hook. f. ll. cc.* xxi. (1890) t. 2014; *et vi.* (1890) 182. — Khasia.
 trilobata, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 295. — Ins. Philipp.
 Trimenii, *Ridl. l. c.* xxiv. (1888) 350; *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1836; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 695. — Zeylan.

LIPARIS: —

- venosa, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 350; *et v.* (1890) 695; *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1836; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 695. — Ind. or.
 verrucosa, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 185. — Ins. Borbon.
 vexillifera, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1895) 289 = *elliptica*, Reichb. f.
 Wrayii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 181. — Perak.
 xanthina, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 275. — Madag.
 zeylanica, « Lodd, » *ex Ridl. l. c.* 297. — Nomen omnino delendum, fide cl. Ridl. [Conf. Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 183].

LIPOCARPHA, R. Br. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 94.

- argentea, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 649 = *albiceps*, Ridl.
 atropurpurea, Boeck. *Cyper. Nov. i.* (1888) p. 21 = *pulcherrima*, Ridl.
 Barteri, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 650. — Reg. Nigrit.
 multibracteata, C. B. Clarke, l. c. — Angola.
 Rautanenii, Boeck. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 179 = *Scirpus Isolepis*, Boeck.
 tenera, Boeck. *Cyper. Nov. i.* (1888) 21 = *pulcherrima*, Ridl.

LIPOCHAETA, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 94.

- Aprevaliana, *Drake, Ill. Fl. Ins. Maris Pacif.* (1888) 71, t. 34. — Ins. Sandvic.
 flexuosa, *Drake, l. c.* 73, t. 36. — Ins. Sandvic.
 hastata, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 208. — Ins. Sandvic.
 peduncularis, *Drake, Ill. Fl. Ins. Maris Pacif.* (1888) 72, t. 35. — Ins. Sandvic.

LIPOSTOMA, D. Don = **Coccocypselum**, R. Br. (Rubiace.).

- prostratum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 275. — Bras.

LIPPIA, Houst. ex Linn. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 94.

- aphylla, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 623. — Chili.
 aprica, *Phil. l. c.* xci. (1895) 415. — Chili.
 barbata, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 196. — Calif.
 boliviana, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 243. — Bolivia.
 disepala, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 622. — Chili.
 fastigiata, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 196. — Calif.
 fimbriata, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 244. — Bolivia.
 floribunda, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 59. — Chile.
 Foncki, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 620. — Chili.
 formosa, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1891) 163. — Calif.
 gracilis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 620. — Chili.
 lantanoideis, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1892) 329 = *geminata*, H. B. & K.
 lignustrina, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* ix. (1889-90) 181 = *lycioides*, Steud.
 litoralis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 624. — Chili.
 montana, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1891) 163. — Calif.
 nutans, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. i. (1895) 162. — Mexic.
 oaxacana, Robinson & Greenman, l. c. — Mexic.
 Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 67. — Mexic.
 Recolletae, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 196. — Parag.

LIPPIA: —

- salsoloides, Briq. in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzentam.* iv. 3a (1894) 152 = *salsoloides*, Benth & Hook. f.

LIPPOMUELLERA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 579 = **Agastachys**, R. Br. (Proteac.).

- odorata, Kuntze, l. c. = A. odorata, R. Br.

LIRIODENDRON, Linn. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 96.

- fastigiata, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 155 *et* 736 = L. Tulipifera, Linn.

LIRIOPE, Lour. (Haemodor.). — Ind. Kew. ii. 96.

- graminifolia, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 425 (= L. graminifolia, Baker) = *spicata*, Lour.
 minor, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vii. (1893) 323 (= *Ophiopogon minor*, Royle?). — Japon.

LISIANTHIUS, P. Br. = **Lisianthus**, Linn. (Gentian.).

- axillaris, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 429 = *Leianthus axillaris*, Hemsl.
 brevidentatus, Kuntze, l. c. = L. brevidentatus, Hemsl.
 Seemannii, Kuntze, l. c. = L. Seemannii, Griseb.
 Skinneri, Kuntze, l. c. = L. Skinneri, Hemsl.

LISIANTHUS, Linn. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 96.

- graciliflorus, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* v. (1892) 18. — Austral.
 im Thurnianus, Oliver, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1887) 279 [Oliver, ex im Thurn, in *Tiwehri*, v. (1886) 199]. — Guian. angl.

LISSOCARPA, Benth. (Styrac.). — Ind. Kew. ii. 97.

- Benthamii, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 460 = seq. Benthamii, Guerke, in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 180; Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2413. — Bras., Venez.

LISSOCHILUS, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 97.

- abyssinicus, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 27 (= *Hypodematium abyssinicum*, A. Rich.). — Abyss.
 affinis, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 193. — Afr. trop. or.
 Antunesii, Rolfe, in *Bolet. Soc. Brot.* vii. (1889) 237. — Angola.
 barombensis, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 51. — Kamerun.
 brevisepalus, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 195. — Afr. trop. or.
 Buettneri, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 53. — Afr. trop.
 cornigerus, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 194. — Afr. trop. or.
 dispersus, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1893) i. 684 (= *Eulophia disperma*, N. E. Br.). — Afr. trop. or.
 Dybowski, Godefr.-Léboeuf, in *L'Orchidophile* (1892) 300; *et in Rev. Hortie. Belge.* xix. (1893) 47. — Congo gall.
 Elliotii, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 169. — Afr. trop. or.
 gracilior, Rendle, l. c. — Afr. trop. or.
 Graefei, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1891) i. 749 *et* (1893) i. 684, *et in Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 8 (1894) 125, t. 272 = L. Krebsii, Reichb. f.
 mediocris, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 193. — Afr. trop. or.
 micranthus, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 53. — Afr. trop.
 milanjanus, Rendle, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1894) 46. — Afr. trop.
 monticolus, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 172. — Afr. trop. or.
 papilionaceus, Rendle, l. c. 170. — Afr. trop. or.
 parvulus, Rendle, l. c. 196. — Afr. trop. or.
 pulchellus, Rendle, l. c. — Afr. trop. or.
 ruwenzoriensis, Rendle, l. c. 170. — Afr. trop. or.
 saccatus, Rendle, l. c. 172. — Afr. trop. or.

LISSOCHILUS: —

- shirensis, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 171. — Afr. trop. or.
 Stuhlmanni, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 248. — Afr. trop.
 Taylori, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 293. — Afr. trop. or.
 validus, Rendle, *l. c.* xxxiii. (1895) 197. — Afr. trop.

LISTERA, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 98.
 borealis, Morong, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (18 3) 30. — Am. bor. art.
 shikokiana, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vii. (1893) 68. — Japon.

LISTROSTACHYS, Reichb. = **Angraecum**, Thou. (Orchid.).

- Althoffii, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 47 = A. Althoffii, Kraenzl.
 Aschersoni, Th. Dur. & Schinz, *l. c.* 48 = A. Aschersoni, Kraenzl.
 Bakeri, Th. Dur. & Schinz, *l. c.* = A. Bakeri, Kraenzl.
 Braunii, Th. Dur. & Schinz, *l. c.* = A. cephalotes, Kraenzl.
 Bucholiziana, Th. Dur. & Schinz, *l. c.* = A. Bucholizianum, Kraenzl.
 clavata, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 251. — Sierra-Leone.
 divitiflora, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 28; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 95 et C (1895) 158. — Afr. trop. or.
 Engleriana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 254, in obs. = A. Engleriana, Engl.
 filiformis, Kraenzl. *l. c.* xxii. (1895) 28. — Afr. trop.
 forcipata, Kraenzl. *l. c.* xix. (1894) 254. — Kamerun.
 graminifolia, Kraenzl. *l. c.* xxii. (1895) 29; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 158. — Afr. trop. or.
 Metteniae, Kraenzl. in Reichb. f. *Xen. Orchid.* iii. 7 (1893) 122 II. fig. 9-15. — Afr. trop. occ.
 palmiformis, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 49 = A. palmiforme, Thou.
 tenuifolia, [Engl. ?] *Pflanzenw. Ost-Afr. A*. (1895) 117. — Quid?
 trachypus, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 253. — Kamerun.
 urostachya, Kraenzl. *l. c.* xxii. (1895) 29; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 158. — Afr. trop. or.
 Zenkeri, Kraenzl. *l. c.* xix. (1894) 252. — Afr. trop. occ.

LITHOCARDIUM, Linn. = **Cordia**, Linn. (Borag.).

- album, acutifolium, adnatum, affine, alliodorum, ambiguum, amplifolium, anabaptistum, angiocarpum, angustifolium, asperum, asterophorum, Aubletii, bantamense, bicolor, bogotense, Boissieri, Bonplandii, brachypodium, brachytrichum, bracteatum, brevispicatum, caffrum, calocephalum, calocomum, calophyllum, canescens, canum, caracasenum, Chamissonianum, convolvuliflorum, corchorifolium, cordifolium, crenatum, crenulatum, crispiflorum, cujabense, cuneiforme, curassavicum, dasycephalum, decandrum, diospyrifolium, discolor, divaricatum, diversifolium, dodecandrum, ellipticum, exaltatum, excelsum, Finlaysonianum, flavescens, foliolosum, fragrantissimum, Fresenii, fulvosum, Galeottianum, Gerascanthus, glabratum, glabrum, glandulosum, grande, grandiflorum, grandifolium, Greggii, Griffithii, guayaquilense, guincense, Haenkeanum, hebecarpum, hermanniaefolium, heterophyllum, hirsutum, hispidissimum, hispidum, hypoleucum, insigne, intermedium, laeve, lanceolatum, laxiflorum, leptocaulon, leucocalyx, leucocephalum, leucomum, leucophlyctis, limum, lineare, longifolium, longipedum, Macleodii, macrocephalum, macrophyllum, macrostachyum, magnoliaefolium, mariquitense, microcephalum, mirandum, moluccanum, monicum, mucronatum, multispicatum, Myxa, nervosum, nitidum, niveum, nodosum, oaxacanum, obliquum, obovatum, obscurum, obtusum, ochraceum, octandrum, ovale, oxyphyllum, paniculare, parvifolium, peruvianum, piauiense, podocephalum, Poeppigii, polyphylla,

LITHOCARDIUM: —

- polystachyum, pubescens, reticulatum, revolutum, riparium, rotatum, Rothii, rotundifolium, Roxburghii, rufescens, salicifolium, salicinum, scaberrimum, Schomburgkii, Schottianum, Scouleri, Sebestana, Sellowianum, senegalense, sericalyx, serratum, sessilifolium, silvestre, Sprucei, striatum, suaveolens, subcordatum, subdentatum, subpubescens, sulcatum, superbum, tenuifolium, tetrandrum, tetraphyllum, Thibaudianum, tomentosum, Toqueve, trachyphyllum, tremulum, trichocladum, trichostemon, truncatum, umbraculiferum, venosum, verbenaceum, vestitum, villicaulum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 976-77 = homonyma omnia Cordiae.
 abyssinicum, Kuntze, *l. c.* 976 = C. Myxa, Linn.
 album, Kuntze, *l. c.* 438 = C. alba, Roem. & Schult.
 Andersonii, Kuntze, *l. c.* 976, (= *Varronia canescens*, Anderss.). — Ins. Galapag.
 Blanchetii, Kuntze, *l. c.* = C. Blanchetii, DC.
 Colococca, Kuntze, *l. c.* 438 = C. Colococca, Linn.
 corylifolium, Kuntze, *l. c.* 976 = C. alba, Roem. & Schult.
 corymbosum, Kuntze, *l. c.* 438 = C. corymbosa, Willd.
 cylindrostachyum, Kuntze, *l. c.* 438 et 977 = C. cylindristachya, Roem. & Schult.
 dichotomum, Kuntze, *l. c.* 976 = C. bifurcata, Roem. & Schult.
 elaeagnodes, Kuntze, *l. c.* 977 = C. elaeagnoides, DC.
 ferrugineum, Kuntze, *l. c.* 438 = C. ferruginea, Roem. & Schult.
 flarum, Kuntze, *l. c.* 977 (= *Varronia flava*, Anderss.). — Ins. Galapag.
 galapagosenum, Kuntze, *l. c.* 976 (= *Varronia scaberrima*, Anderss.). — Ins. Galapag.
 gerascanthodes, Kuntze, *l. c.* 977 = C. gerascanthoides, H. B. & K.
 globosum, Kuntze, *l. c.* 438 = C. globosa, H. B. & K.
 guazumifolium, Kuntze, *l. c.* 976 = C. urticifolia, Cham.
 Hartwigsiana, Kuntze, *l. c.* = C. Hartwissianum, Regel.
 Hookerianum, Kuntze, *l. c.* = C. linearis, Hook. f.
 lanatum, Kuntze, *l. c.* = C. tomentosa, Roem. & Schult.
 lantanodes, Kuntze, *l. c.* = C. lantanoides, Spreng.
 Leschenaultii, Kuntze, *l. c.* = C. oblongifolia, Thw.
 Lockartii, Kuntze, *l. c.* 438 = C. Lockartii, Kuntze.
 macranthum, Kuntze, *l. c.* = C. paucidentata, Fresen.
 martinicense, Kuntze, *l. c.* = C. martinicensis, Roem. & Schult.
 mezanum, Kuntze, *l. c.* 976 = C. amplifolia, Mez.
 Muneco, Kuntze, *l. c.* = C. Muneco, H. B. & K.
 Neowedianum, Kuntze, *l. c.* = C. Neowedianum, A. DC.
 Panicularia, Kuntze, *l. c.* 439 = C. panicularis, Rudge.
 parviflorum, Kuntze, *l. c.* 976 = C. serratifolia, H. B. & K.
 Perrottetii, Kuntze, *l. c.* 977 = C. Perrottetii, A. DC.
 platyphyllum, Kuntze, *l. c.* = C. latifolia, Cham.
 salviaefolium, Kuntze, *l. c.* = C. salviaefolia, Fuss.
 scabridum, Kuntze, *l. c.* 439 = C. scabrida, Mart.

LITHOPHRAGMA, Torr. & Gray = **Tellima**, R. Br. (Saxifr.).

- rupicola, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 102. — Calif.
 scabrella, Greene, *l. c.* = T. scabrella, Greene.
 tripartita, Greene, *l. c.* = T. tripartita, Greene.
 Williamsii, Greene, *l. c.* = Heuchera Williamsii, Eaton.

LITHOSANTHES, Blume = **Litosanthes**, Blume (Rubiace.).

- Brauniana, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 441. — N. Guin.
 novo-guineensis, Warb. *l. c.* 442. — N. Guin.

LITHOSPERMUM [Tourn.] Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 98.

- calicola, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 182. — Mexic.
 carolinense, MacMill. *Metasp. Minn.* (1893) 438 = hirtum, Lehm.

LITHOSPERMUM: —

- glandulosum, Velen. in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1892-93) 46. — Bulg.
 Gmelini, Hitchcock, *Spring Fl. Manhattan* (1894) 30. — Am. bor.
 revolutum, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 182. — M-xic.
 tubuliflorum, Greene, *Pittonia*, i. (Jan. 1888) 155. — Mexic.

LITOSANTHES, Blume (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 100.

- Brauniana, Warb. ex Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 142. — N. Guin.
 novo-guineensis, Warb. *l. c.* — N. Guin.

LITSAEA, Pers. = **Litsea**, Lam. (Laurin.).

LITSEA, Lam. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 100.

- albajana, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 227. — Ins. Philipp.
 albicans, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 171 [Litsaea] (= *Tetranthera albicans*, Kurz). — Burma.
 angustifolia, Hook. f. *l. c.* 169 [Litsaea]. — Ind. or.
 assamica, Hook. f. *l. c.* 161 [Litsaea]. — Reg. Himal.
 Beedomei, Hook. f. *l. c.* 177 [Litsaea]. — Deccan.
 Blumii, Hook. f. *l. c.* 160 [Litsaea] (= *L. ferruginea*, Blume). — Malacca, Java.
 castanea, Hook. f. *l. c.* 171 [Litsaea]. — Malacca.
 cauliflora, Trim. *Handb. Fl. Ceyl.* iii. (1895) 450 [Litsaea]. — Zeylan.
 cauliflora, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 219 [Litsaea]. — Borneo.
 chartacea, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 170 [Litsaea] (= *Tetranthera chartacea*, Wall.). — Reg. Himal.
 confertifolia, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 379, t. 7. — China.
 cordata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 177 [Litsaea] (= *Tetranthera cordata*, Jack). — As. trop.
 coriacea, Hook. f. *l. c.* 166 [Litsaea] (= *T. coriacea*, Heyne). — Deccan.
 cupularis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 380. — China.
 Faberi, Hemsl. *l. c.* 381. — China.
 firma, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) [Litsaea] (= *Tetranthera firma*, Blume). — As. trop.
 Garciae, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 228. — Ins. Philipp.
 geniculata, Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 476 [Litsaea] (= *Tetranthera geniculata*, Nees). — Virgin., Florida.
 glabrata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 174 [Litsaea] (= *T. glabrata*, Wall.). — Ind. or.
 gracilipes, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 387. — China.
 gracilipes, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 159 [Litsaea]. — Malacca.
 grandis, Hook. f. *l. c.* 162 [Litsaea] (= *Tetranthera firma*, Blume). — As. trop.
 guatemalensis, Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 479 [Litsaea]. — Guatem.
 Helferiana, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 172 [Litsaea]. — Tenass.
 Hookeriana, Hook. f. *l. c.* 166 [Litsaea] (= *Tetranthera Hookeriana*, Meissn.). — Zeylan.
 hupeana, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 382. — China.
 iteodaphne, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 173 [Litsaea] (= *Tetranthera iteodaphne*, Thw.). — Zeylan.
 Kingii, Hook. f. *l. c.* 156 [Litsaea]. — Reg. Himal.
 Kurzii, King, ex Hook. f. *l. c.* 164 [Litsaea]. — Ins. Andam.
 lancifolia, Hook. f. *l. c.* 159 [Litsaea] (= *Tetranthera lancifolia*, Roxb.). — Reg. Himal., Borneo.
 laurifolia, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 304 = sebifera, Fuss.
 laxiflora, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 383, t. 8. — China.
 leiantha, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 171 [Litsaea] (= *Tetranthera leiantha*, Kurz). — Ins. Andam.

LITSEA : —

- longipes, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 172 [Litsaea]. — Tenass.
 Maingayi, Hook. f. l. c. 175. — Malacca.
 Mannii, King, ex Hook. f. l. c. 180. — Reg. Himal.
 martabanica, Hook. f. l. c. 164 [Litsaea] (= *Tetranthera martabanica*, Kurz). — Martab. Tenass.
 Meissneri, Hook. f. l. c. 169 [Litsaea] (= *L. ? khasiana*, Meissn.). — Khasia.
 membranifolia, Hook. f. l. c. 159. — Reg. Himal.
 mishmiensis, Hook. f. l. c. 161 — Reg. Himal.
 mollis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 383. — China.
 myristicaefolia, Hook. f. l. c. 172 [Litsaea] (= *T. myristicaefolia*, Wall.). — Ind. or.
 nitida, Hook. f. l. c. 174 [Litsaea] (= *T. nitida*, Roxb.). — Reg. Himal.
 nuculanea, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 166 [Litsaea]. — Tenass., Siam.
 oblonga, Hook. f. l. c. 168. — Reg. Himal.
 oleoides, Hook. f. l. c. 175 [Litsaea] (= *T. oleoides*, Meissn.). — Reg. Himal.
 oreophila, Hook. f. l. c. 156 (= *Lindera Hookeri*, Meissn.). — Reg. Himal.
 Orizabae, Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 479 (= *Persea Orizabae*, Mart. & Gal.). — Mexic.
 Panamonja, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 175 [Litsaea] (= *Tetranthera Panamonja*, Ham.). — Ind. or.
 parvifolia, Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 481 (= *Umbellularia parvifolia*, Hemsl.). — Mexic.
 penangiana, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 171. — Penang.
 petiolata, Hook. f. l. c. — Penang.
 Playfairi, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 384. — China.
 pungens, Hemsl. l. c. 384. — China.
 rangoonensis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 163 (= *Tetranthera rangoonensis*, Meissn.). — Burma.
 rotundifolia, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 385. — China.
 salicifolia, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 167 [Litsaea] (= *Tetranthera salicifolia*, Roxb.). — Ind. or.
 semecarpifolia, Hook. f. l. c. 165 [Litsaea] (= *Tetranthera semecarpifolia*, Wall.). — Ind. or.
 sericea, Hook. f. l. c. 156 [Litsaea] (= *T. sericea*, Wall.). — Reg. Himal.
 sessiliflora, Hook. f. l. c. 160. — Penang.
 Stocksii, Hook. f. l. c. 176 (= *Tetranthera lanceae-folia*, Grah.). — Ind. or.
 Thomsonii, Hook. f. l. c. 170 (= *T. Thomsonii*, Meissn.). — Ind. or.
 undulata, Hook. f. l. c. 185 (= *T. ligustrina*, Nees). — Zeylan.
 variabilis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 386. — China.
 venulosa, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 161 [Litsaea] (= *Tetranthera venulosa*, Meissn.). — Deccan.
 verticillata, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 226. — Ins. Philipp.
 Wallichii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 160 [Litsaea] (= *Lindera nervosa*, Kurz). — Ind. or.

- LITTONIA**, Hook. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 101.
 Baudii, Terrac. in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 425. — Reg. Somal.
 Hardeggeri, G. Beck, in *Paulitschka, Harrar* (1888) 451 fig. 8-9. — Reg. Somal.
 obscura, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 342. — Arabia.

- LITTORELLA**, Berg. (Plantag.). — Ind. Kew. ii. 101.
 uniflora, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 301 (= *L. uniflora*, Aschers.). — juncea, Berg.

- LIVISTONA**, R. Br. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 101.
 Alfredi, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (Oct. 1892) 112; et ex *Bot. Centralbl.* liii. (1893) 28. — Austral.
 Drudei, F. Muell. ex Drude, in *Bot. Jahrb.* xvi. Beibl. n. 39 (1893) 11 = australis, Mart.
 Drudei, Wendl. [conf. W. Wats, in *Gard. Chron.* (1886) i. 140] (an praec. ?). — Hab. ?

LIVISTONA : —

- filamentosa, Hort. Petrop. ex R. Pfister, *Beitr. vergl. Anat. Sabalenblätter*, (1892) 25. — Hab. ?
 Kingiana, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 199. — Penins. Mal.

- LLOYDIA**, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 101.
 ixiolirioides, Baker, ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2215. — China.
 trisecta, Baker, l. c. t. 2215. — China, Tibet.

- LOASA**, Adans. (Loas.). — Ind. Kew. ii. 101.
 canarinoides, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 281 (= *Illiaria canarinoides*, Lenne & C. Koch). — Bolivia.
 carunculata, Urban & Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 118. — Bolivia.
 chilensis, Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 159 (= *Huidobria chilensis*, C. Gay). — Chili.
 chilensis, Urban & Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 118 = praec.
 fruticosa, Urban & Gilg, l. c. (= *Huidobria fruticosa*, Phil.). — Chili.
 Gayana, Urban & Gilg, l. c. 117 (= *L. sagittata*, C. Gay). — Chili.
 heptamera, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 281; et in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 36, in syn. = horrida, Britton.
 horrida, Britton, l. cc. 2; et 36. — Bolivia.
 ignea, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 24. — Chili.
 nana, Phil. ex Urban & Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iil. 6a (1894) 117. — Chili.
 patagonica, Urban & Gilg, l. c. — Patagon.
 petrophila, Urban & Gilg, ex Kurtz, in *Verrh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1894) 111; et l. c. — Reg. Argent.
 rostrata, Urban, in *Mart. Fl. Bras.* (1889) 208; et ex Urban & Gilg, l. c. 118. — Bras.

- LOASELLA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 650 = **Sympetaleia**, A. Gray. (Loas.).
 rupestris, Baill. l. c. = S. rupestris, S. Wats.

- LOBELIA**, Adans. = **Scaevola**, Linn. (Goode-niac.)
 amblyanthera, angulata, apteranthera, atriplicina, attenuata, auriculata, canescens, Chamissoniana, collaris, coriacea, crassifolia, cuneiformis, cylindrocarpa, depauperata, enantophylla, fasciculata, Gaudichaudii, glabra, glandulifera, globulifera, gracilis, hispida, holosericea, Hookeri, humifusa, humilis, lanceolata, linearis, longifolia, macrophylla, macrostachya, micrantha, microcarpa, microphylla, mollis, nitida, Oldfieldii, oppositifolia, ovalifolia, oxycelona, paludosa, parvifolia, phlebotepala, piliplena, pilosa, platyphylla, porocarya, procera, restiacea, revoluta, sericophylla, spinescens, stenophylla, striata, tomentosa, tortuosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 377-78 = homonyma omnia Scaevolae.
 aemula, Kuntze, l. c. 378 = S. saligna, Forst.
 anchusifolia, Kuntze, l. c. = S. anchusaefolia, Benth.
 Brooksiana, Kuntze, l. c. = S. Brookeana, F. Muell.
 calendulacea, Kuntze, l. c. = S. suaveolens, R. Br.
 Cunninghamii, Kuntze, l. c. = S. Cunninghamii, DC.
 myrtifolia, Kuntze, l. c. = S. Groeneri, F. Muell.
 sericea, Kuntze, l. c. 377 = S. Koenigii, Vahl.
 thesiodes, Kuntze, l. c. = S. thesioides, Benth.
 velutina, Kuntze, l. c. = S. Koenigii, Vahl.

- LOBELIA**, Plum. ex Linn. (Lobel.). — Ind. Kew. ii. 102.
 barbata, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii (1891) 444. — N. Guin.
 Baumannii, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 46; et l. c. xix. Beibl. n. 47 (1894) 51. — Afr. trop. or.
 Breynii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 402 (= *Rapuntium Breynii*, Presl) = L. Breynii, Lam.
 cymbalarioides, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 50. — Afr. trop. or.
 Dunnii, Greene, Pittonia, i. (May 1889), 297 = *Palmerella debilis*, A. Gray.

LOBELIA : —

- ensifolia, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 103 (= *Tupa ensifolia*, A. DC.). — Ins. S. Doming.
 Gilgii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 131. — Afr. trop.
 Glazioviana, Zahlbruckn. in *Medd. Naturh. Foren. Kjob.* (1895) 67. — Bras.
 gracilens, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 393. — Mexic.
 Gregoriana, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 66. — Afr. trop. or.
 Holstii, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 51. — Afr. trop. or.
 hypoleuca, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 238. — Ins. Sandvic.
 kilimandscharica, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 52. — Afr. trop. or.
 linnaeoides, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 405. — N. Zel.
 lukwangelensis, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 131. — Afr. trop.
 maranguensis, Engl. l. c. C (1895) 401. — Afr. trop. or.
 Martagon, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 103 (= *Tupa Martagon*, Griseb.). — Ind. occ.
 minutula, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 50. — Afr. trop. or.
 Molleri, Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 137. — Ins. S. Thom.
 novella, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 167. — Mexic.
 Nyassae, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 401. — Afr. trop. or.
 Palmeri, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 297 = *Palmerella tenera*, A. Gray.
 picta, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 112. — Mexic.
 polyphylla, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 136 = polyphylla, Hook. & Arn.
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 157. — Mexic.
 Rothrockii, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 297 = *Palmerella debilis*, A. Gray, var.
 sublibera, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 157. — Mexic.
 Stuhlmanni, Schweinf. ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 401. — Afr. trop. or.
 Tayloriana, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 67. — Afr. trop. or.
 Telekii, Schweinf. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 409, nomen. — Afr. trop. or.
 ulugurensis, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 92. — Afr. trop.
 usambarensis, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 50. — Afr. trop. or.
 Volkensii, Engl. l. c. 49. — Afr. trop. or.
 yuccoides, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 237. — Ins. Sandvic.

- LOBOSTEMON**, Lehm. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 107.
 cryptocephalum, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 30. — Afr. centr. or.

- LOBULARIA**, Desv. = **Alyssum**, Tourn. (Crucif.).
 marginata, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 92. — Ins. Canar.
 palmensis, Webb, ex Christ, l. c. — Ins. Canar.

- LOCANDI[A]**, Adans. = **Samadera**, Gaertn. (Simarub.).
 glandulifera, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 17 (1892) sub t. 262 = S. glandulifera, Roxb.
 Harmandii, Pierre, l. c. t. 261 = S. Harmandii, Pierre.
 indica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 104 = S. indica, Gaertn.
 lucida, Kuntze, l. c. = S. lucida, Planch.
 madagascariensis, Kuntze, l. c. = S. madagascariensis, A. Juss.
 mekongensis, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 17 (1892) t. 263 = S. mekongensis, Pierre.
 merguensis, Pierre, l. c. sub t. 262. — Cochinch.
 pendula, Pierre, l. c. = *Manangula pendula*, Blanco.

LOCELLA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 261 = **Loranthus**, Linn.
cuneata, Van Tiegh. l. c. = *L. cuneatus*, Heyne.
goodeniifolia, Van Tiegh. l. c. = *L. goodeniifolius*, DC.
lobeliifolia, Van Tiegh. l. c. = *L. lobeliifolius*, DC.
montana, Van Tiegh. l. c. = *L. montanus*, DC.

LOCHNERA, Reichb. = **Vinca**, Linn. (Apocyn.)
lancea, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 145 = *V. lancea*, Boj.
pusilla, K. Schum. l. c. = *V. pusilla*, Murr.

LOCKHARTIA, Hook. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 107.
cladoniophora, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 151. — Hab. ?

LODOICEA, Comm. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 108.
Sonnerati, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 323 = *L. Callypyge*, Comm.

LOEFLINGIA, Linn. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 108.
Saharae, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 163 = *hispanica*, Linn.

LOESLIA, Linn. (Polemon.). — Ind. Kew. ii. 108.
Carionis, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 55. — Guatem.

LOGANIA, R. Br. (Logan.). — Ind. Kew. ii. 108.
choretroides, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Nov. 1889) 118; et ex Bot. Centralbl. xli. (1890) 28. — Austral.
flaviflora, F. Muell. ll. cc. v. (Mar. 1889) 165; et 461. — Austral.

LOGFIA, Cass. = **Filago**, Linn. (Compos.).
Willkommii, Pomel. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 336. — Hisp.

LOLIUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 108.
hybridum ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 32. — Germ.
longiglume, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 955 = *temulentum*, Linn.

LOMATOPHYLLUM, Willd. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 109.
purpureum, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 325 = *borbonicum*, Willd.

LONCHOCARPUS, H. B. & K. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 109.
Glaziovii, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 83. — Bras.
lucens, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 77. — Sierra Leone.
paullinioides, Baker, l. c. xxii. (1887) 466. — Madag.
polystachyus, Baker, l. c. xxv. (1890) 313. — Madag.
speciosus, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 161. — Mossamb., Transvaal.
subulidentatus, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1890) 53. — Congo.
Theuszi, Buettn. l. c. 51 [Teusczi]. — Angola.

LONICERA, Linn. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 110.
Amhersti, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 263, fig. 175 (= *L. pilosa*, Maxim.). — Japon.
belgica, Hort. ex Dippel, l. c. 442, ad calc. = *L. Periclymenum*, Linn.
Bella ×, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 525. — Hybr. artef.
Braceana, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) in obs. — Ind. or.
Bournei, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. l. c. xxiii. (1888) 360. — China.
coerulescens, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 233, fig. 149. — Hybr. artef.

LONICERA : —

cotinifolia, C. A. Mey. ? [Beitr. Pflanzenk. russ. Reichs. v. (1830) 51] ex Dippel, l. c. 228 = *L. Xylosteum*, Linn.
crassifolia, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 172; et in Gartenfl. xlii. (1893) 332. — China.
deflexicalyx, Batalin, l. c. 173. — China.
emphyllocalyx, Maxim. in Bull. Acad. sci. Pétersb. xxxi. (1887) 58. — Japon.
flavescens, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 260, fig. 173. — Columb.
Fortunei, Hort. ex Dippel, l. c. 225 = *L. Standishii*, Carr.
fuchsoides, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 362, t. 9. — China.
fuchsoides, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 214 = *sempervirens*, Linn.
gibbiflora ×, Dippel, l. c. 237, fig. 151 (= *Xylosteum gibbiflorum*, Rupr.). — Hybr. artef.
gigantea, Hort. ex Dippel, l. c. 205 = *etrusca*, Sancti.
gynochlamydea, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 362. — China.
Halleana, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 217 et 444, ad calc. = *flexuosa*, Thunb.
Henryi, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 359. — China.
heteroloba, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 174; et in Gartenfl. xlii. (1893) 333. — China.
Hildebrandtiana, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 64, t. 11. — Ind. or.
inconspicua, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 172. — Tibet.
italica, Schm. [Oestr. Baumz. (1794) 106], ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 202 = *L. Caprifolium*, Linn.
kamtschatica, Hort. ex Dippel, l. c. 246 = *orientalis*, Lam.
Kesselringi, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 310; et in Gartenfl. (1891) 124, fig. 41. — Kamtschatka.
Korolkowii, Stapf, in Gard. and For. vi. (1893) 34. — Turkest.
Kirilowi, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 266 = *coerulea*, Linn.
litangensis, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 173. — Tibet.
macrophylla, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 444, ad calc. = *glauca*, Hill.
Magnevilleae, Hort. ex Dippel, l. c. 213 = *sempervirens*, Linn.
marylandica, Hort. ex Dippel, l. c. 444 ad calc. = *glauca*, Hill.
micrantha, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 525. — As. centr.
minuta, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1892) 170; et ex Gartenfl. xlii. (1893) 331. — China.
minutiflora ×, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 523. — Hybr. artef.
misera ×, Zabel l. c. — Hybr. artef.
mueniensis ×, Rehder, in Gartenfl. xlii. (1893) 102, fig. 19. — Hybr. artef.
muscariensis ×, Rehder, l. c. 100, fig. 18. — Hybr. artef.
Niagaralli, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 226 = *fragrantissima*, Carr.
notha ×, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 525. — Hybr. artef.
obscura, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 63. — Ind. or.
ovalis, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 170. — China.
permixta ×, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 523. — Hybr. artef.
Phyllomachae, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 247 = *orientalis*, Lam.
pileata, Oliver, in Hook. Icon pl. xvi. (1887) t. 1585. — China.
praeiflorens, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 169; et in Gartenfl. xlii. (1893) 331. — Mandchuria.
Regeliana, Petzold & Kirchn. [im Arboret. Musk. (1864) 433]; ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 220 fig. 140. — As. or.
reticulata, Forb. [ubi ?] ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 274. — [Quid ?].

LONICERA : —

salicifolia ×, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 524. — Hybr. artef.
scabrida, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris. Sér. II. viii. 1885 (1886) 252. — Tibet.
Schmitziana, Roetz [in Cat. Mexic. Pflanz. 1858] ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 247 fig. 159. — Mexic.
segreziensis, Lavallée [Arboret. Segrez. (1878) 142] ex Dippel, l. c. 221. — Reg. Himal.
similis, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 366. — China.
sinensis, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 224 = *L. Standishii*, Carr.
strophophora, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris. Sér. VII. x. (1886) 142. — Japon.
szechuanica, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 172. — China.
thibetica, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 48. — Tibet.
tougatayamaensis, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 55. — Japon.
tragophylla, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 367. — China.
trichosantha, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 48. — Tibet.
uniflora, Blume, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 257 = *gracilipes*, Miq.
vaccinifolia, Hort. ex Dippel, l. c. 282 = *Symphoricarpos montanus*, H. B. & K.
valentina, Pau, Not. bot. Fl. Espan. iii. (1889) 30, nomen; et ex Willh. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 134. — Hisp.
verna, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 202 = *L. Caprifolium*, Linn.
vulgaris, Roehl. [Deutschl. Fl. ii. (1813) 176]; ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 228 = *L. Xylosteum*, Linn.
xylosteoides, Tausch [in Flora, xxi. (1838) 736], ex Dippel, l. c. = *L. Xylosteum*, Linn.
Youngii, Hort. ex Dippel, l. c. 215 et 445, ad calc. = *ciliosa*, Poir.
Zabelii ×, Rehder, in Gartenfl. xlii. (1893) 104. — Hybr. artef.

LOPEZIA, Cav. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 112.
angustifolia, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 168. — Mexic.
clavata, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II ii. (1889) 157, t. 4. — Calif.
cornuta, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 429. — Mexic.
gracilis, S. Wats. l. c. — Mexic.

LOPHIOLA, Ker-Gawl. (Haemodor.). — Ind. Kew. ii. 115.
americana, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 78 = seq. *americana*, Coville, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 118 (= *L. americana*, Wood) = *aurea*, Ker-Gawl.
tomentosa, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 53 = *aurea*, Ker-Gawl.

LOPHOPAPPUS, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 487. **COMPOSITAE**.
foliosus, Rusby, l. c. t. 213; et in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 213. — Bolivia.

LOPHOPETALUM, Wight & Arn. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 113.
Beccarianum, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) sub t. 307 B. — Borneo.
Duperreanum, Pierre, l. c. t. 307 A. — Cochinch.

LOPHOPHORA, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 131. **CACTEAE**.
Williamsii, Coult. l. c. (= *Anhalonium Williamsii*, Lem.). — Am. bor.

LOPHOPOGON, Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 26. **GRAMINEAE**.
tenax, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 83. — Cochinch.
tridentatus, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 254 (= *Andropogon tridentatus*, Roxb.). — Ind. or.
truncatiglume, Hack. l. c. 255 (= *Lophopogon truncatiglume*, F. Muell.). — Austral.

LOPHOPYXIS, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1714; et Fl. Brit. Ind. v. (1888) 476. **EUPHORBIACEAE**.
combretocarpa, *Engl. ex Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 257 (= *Treubia cambreticarpa*, Pierre). — Ceram.
Maingayi, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1714. — Malacca.
pentaptera, *Engl. in Sitz. Preuss. Akad. Wiss.* xviii. (1893) 265 (= *Combretopsis pentaptera*, K. Schum.). — N. Guin.
Pierrei, Boerl. *Handl. Fl. Ned.-Indie*, i. 2 (1890) 673. — Ind. bat. (Ceram).
Schumannii, Boerl. l. c. 674. — N. Guin.

LOPHOSTOMA, Meissn. = **Linostoma**, Wall. (Thymel.).
albifolium, Gilg, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 232. — Reg. Amaz.

LOPHOTOCARPUS, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) p. x. **ALISMACEAE**.
calycinus, J. G. Smith, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 25 (= *Lophiocarpus calycinus*, M. Micheli). — Am. bor.
guyanensis, J. G. Smith, l. c. (= *Lophiocarpus guyanensis*, M. Micheli). — Reg. trop. amphig.
guyanensis, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 487 = praec.

LORANTHUS, Linn. (Loranth.). — Ind. Kew. ii. 114.
ambiguus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 98. — Zanzibar.
amplexans, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 83. — Austral.
angolensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 101. — Angola.
anguliflorus, *Engl. l. c.* 107. — Angola.
Arnotianus, Wight, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 207 = *L. Wightii*, Hook. f.
aurantiacus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 124. — Zanzibar.
aurantiacus, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 26. — Afr. trop.
Batangae, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 98. — Afr. trop. occ.
Beccarii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 98. — Perak.
Braunii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 93. — Afr. trop. occ.
brevipes, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 83. — Austral.
brunneus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 88. — Angola.
Buchholzii, *Engl. l. c.* 91. — Afr. trop. occ.
Buchneri, *Engl. l. c.* 114. — Congo.
bukobensis, *Engl. l. c.* 102. — Afr. trop. or.
campestris, *Engl. l. c.* 95. — Afr. trop. or.
Casuarinae, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 343. — Penins. Mal.
celtidifolius, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 123. — Afr. trop. or.
centiflorus, *Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 222. — Borneo.
cinereus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 103. — Angola.
cistoides, Welw. ex *Engl. l. c.* — Angola.
Collettii, *King, ex Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 120. — Burma.
constrictiflorus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 119. — Afr. trop.
Cornetii, *Dewevre, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 2 (1894) 106, nomen; et xxxiv. 2 (1895) 92. — Congo.
crassissimus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 122. — Afr. trop. or.
crassipetalus, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 91. — Perak.
crassus, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 217. — Penins. Mal.
curvirameus, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 165. — Afr. trop. or.
Delavayi, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 535. — Yunnan.

LORANTHUS : —
dependens, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 117. — Angola.
dianthus, *King & Scortechini, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 96. — Perak.
dichrous, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 123. — Afr. trop. occ.
djurensis, *Engl. l. c.* 90. — Afr. centr. bor.
dschallensis, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 166. — Afr. trop. or.
Duthieanus, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 94. — Perak.
Ehlersii, *Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 197, nomen. — Afr. trop. or.
elegantulus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 121. — Afr. trop. or.
emarginatus, *Engl. l. c.* 100. — Angola.
Emini, *Engl. l. c.* 113. — Afr. trop. or.
erectus, *Engl. l. c.* 99. — Afr. trop. or.
estipitatus, *Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 221. — Borneo.
Faurotii, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* i. (1887) 135. — Arab., Afr. trop. or.
Finisterrae, *Warb. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 20. — N. Guin.
Fischeri, *Engl. l. c.* xx. (1894) 85. — Afr. trop. or.
flexilis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 253. — Bolivia.
fulvus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 103. — Angola.
Forbesii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 100. — Sumatra.
gabonensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 127. — Afr. trop. occ.
gibberulus, *Tate, in Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral.* viii. (1886) 71. — Austral.
Gilgii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 91. — Angola.
glomeratus, *Engl. l. c.* 89. — Angola.
grandifrons, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 93. — Perak.
griseus, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 46. — Madag.
Guerichii, *Engl. Bot. Jahrb.* xix. (1894) 130. — Afr. austro-occ. extratrop.
Haastii, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 24. — N. Zel.
Havilandii, *Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 222, in obs. — Borneo.
Hemsleyanus, *King, in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 120 = *odoratus*, Wall.
Henriquesii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 88. — Angola.
Hildebrandtii, *Engl. l. c.* 96. — Afr. trop. or.
hirsutissimus, *Engl. l. c.* 100. — Afr. trop. or.
Hollrungii, *K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 105. — N. Guin.
Holstii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 127. — Afr. trop. or.
inornus, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1 (1895) 163. — Mexic.
irangensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 111. — Afr. trop. or.
intermedius, *Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 205. — Deccan.
kagehensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 129. — Afr. trop. or.
Kayseri, *Engl. l. c.* 89. — Zanzibar.
kilimandscharicus, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 166. — Afr. trop. or.
Kingianus, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 83. — Austral.
Kingii, *Scortech. ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 99. — Perak.
Kirkii, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 23. — N. Zel.
Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 95. — Perak.
laciniiatus, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 166. — Afr. trop. or.
lampongus, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 100. — Sumatra.
Lecardii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 128. — Senegamb.
Leschenaultii, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 83. — Austral.
Lobbii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 204. — Penang.

LORANTHUS : —
loranthoideus, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 70. — Ind. occ.
loniceroides, *Pav. ex Van Tiegh. l. c.* xlii. (1895) 387. — Mexic.
Lowii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 98. — Perak.
luluensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 128. — Congo.
mabaeoides, *Trim. in Journ. Bot.* xxvii. (1889) 166. — Zeyl.
Maingayi, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 222. — Malacca.
malaccensis, Hook. f. l. c. 210. — Malacca.
Mechowii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 118. — Angola.
microphyllus, *Engl. l. c.* 86. — Afr. trop. or.
mirabilis, *Van Heurck & Muell. Arg. ex Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 547, in obs. = *Stemmatophyllum Cumingii*, *Van Tiegh.*
Molleri, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 120. — Angola.
mollissimus, *Engl. l. c.* 119. — Angola.
Muelleri, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 83. — Austral.
Muellerianus, *Van Tiegh. l. c.* — Austral.
mweroensis, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 292. — Afr. trop.
nummulariaefolius, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* i. (1887) 135, in obs. — Reg. Somal.
ogowensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 117. — Afr. trop. occ.
Palmeri, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 438. — Mexic.
panganensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 92. — Afr. trop. or.
Parishii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 205. — Tenass.
parviflorus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 127. — Afr. trop. occ.
pendulus, Welw. ex *Engl. l. c.* 117 = *dependens*, *Engl.*
platyphyllus, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 96. — Perak.
Poggei, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 116. — Congo.
Preussii, *Engl. l. c.* 118. — Afr. trop. occ.
productus, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 91. — Perak.
psilanthus, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 222. — Reg. Himal.
Ralphii, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 23. — N. Zel.
Raoulii, *Van Tiegh. l. c.* 20. — N. Zel.
rhamnifolius, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 87. — Afr. trop. or.
sabaensis, *Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 222. — Borneo.
Sadebeckii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 122. — Afr. trop. or.
sansibarensis, *Engl. l. c.* 121. — Zanzib.
Schelei, *Engl. l. c.* 105. — Afr. trop. or.
Schweinfurthii, *Engl. l. c.* 124. — Afr. centr. bor.
Scortechinii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 94. — Perak.
Seemannianus, *K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 106. — N. Guin.
sigensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 101. — Afr. trop. or.
Sonorae, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 73. — Mexic.
sordidus, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 46. — Madag.
Soyauxii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 97. — Afr. trop. occ.
Stocksii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 213. — Concan.
Stuhlmannii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 85. — Afr. trop. or.
subulatus, *Engl. l. c.* 112. — Afr. trop. or.
sulfureus, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 165. — Afr. trop. or.
syringifolius, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 115. — Afr. trop. or.
taborensis, *Engl. l. c.* 106. — Afr. trop. or.
tenuifolius, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 83. — Austral.

LORANTHUS : —

terrestris, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 207. — Reg. Himal.
thelocarpus, *Hook. f. l. c.* 211. — Penins. Mal.
truncatus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 115. — Afr. trop. occ.
tschintschochensis, *Engl. l. c.* 116. — Loango.
ugogensis, *Engl. l. c.* 96. — Afr. trop. or.
unguiformis, *Engl. l. c.* 94. — Afr. trop. or.
usambarensis, *Engl. l. c.* 111. — Afr. trop. or.
verrucosus, *Engl. l. c.* 120. — Afr. centr. bor.
villosiflorus, *Engl. l. c.* 125. — Angola.
vittatus, *R. Br. ex Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 439. — Austral.
Volkensii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 110. — Afr. trop. or.
Welwitschii, *Engl. l. c.* 87. — Angola.
Wightii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1836) 207. — Deccan.
woodfordioides, *Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 198, nomen; et in *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 129. — Afr. trop. or.
Zenkeri, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 95. — Afr. trop. occ.
zizyphifolius, *Engl. l. c.* 92. — Afr. trop. or.

LORETIA, Duv. Jouve = **Festuca**, Linn. (Gramin.).
delicatula, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 24 = *F. delicatula*, Link.
gypsophila, Willk. Illustr. Fl. Hisp. i. (1885?) 125 t. 86b; et l. c. = *F. gypsophila*, Hack.
tenuis, Hack. ex Willk. l. c. 127, t. 87a = *F. tenuis*, Nym.

LOREYA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 118.
minor, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 522. — Bras.

LORICARIA, Wedd. = **Tafalla**, D. Don (Compos.).
microphylla, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 51 (= *T. microphylla*, Wedd.). — Ecuad.
reticulosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 352 = *Baccharis genistelloides*, Pers.
scolopendrina, Kuntze, l. c. = *B. scolopendra*, Hook.
Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 346. — Peruvia.
thyoides, Hieron. l. c. = *Tafalla thyoides*, Lam.
thyodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 352 = *T. thyoides*, D. Don.

LOROGL-ORCHIS X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 110. **ORCHIDEAE**.
Lacazei X, G. Camus, l. c. — Gall.

LOROGLOSSUM, Rich. = **Orchis**, Linn. (Orchid.).
calcaratum, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien. v. (1890) 576 = *O. caprina*, Crantz.
caprinum, G. Beck, l. c. 574 = *O. caprina*, Crantz.

LOTODES, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 193 = LOTOIDES, Siegesb. = **Psoralea**, Linn. (Legumin.).

acaule, aculeatum, adscendens, andongense, aphyllum, Archeri, argenteum, argophyllum, axillare, azureum, badocanum, balsamicum, Bowleanum, cafrum, californicum, campestre, candicans, canescens, capitatum, carneum, castoreum, cinereum, cuspidatum, cyphocalyx, decumbens, digitatum, divaricatum, drupaceum, erianthum, esculentum, fasciculare, glandulosum, glaucinum, Guerinii, hamatum, hirtum, humile, hypogaeum, Jauvertianum, lachnostachyum, leucanthum, linearifolium, marginatum, Martini, melanocarpum, micranthum, multijugum, Mundtianum, Mutisii, obliquum, obtusifolium, odoratissimum, oligophyllum, Onobrychis, orbiculare, patens, pentaphyllum, physodes, pinnatum, plicatum, plumosum, polyphyllum, polystictum, pustulatum, racemosum, repens, rhombifolium, rotundifolium, simplex, spicatum, Stachydis, stipulatum, striatum, strobilinum, subacaule, tenax, tenuiflorum, tenuifolium, tenuissimum, Testariae, Thomii, tomentosum, trianthum, uncinatum, velutinum, venustum,

LOTODES : —

virgatum, Zeyheri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 194 = *homonyma omnia* Psoraleae.
americanum, Kuntze, l. c. 193 = *P. dentata*, DC.
angustifolium, Kuntze, l. c. 194 = *P. angustifolia*, L'Hérit.
biflorum, Kuntze, l. c. = *P. biflora*, Harv.
bituminosum, Kuntze, l. c. 193 = *P. bituminosa*, Linn.
cephalanthum, Kuntze, l. c. 194 = *P. badocana*, Blanco.
corylifolium, Kuntze, l. c. 193 = *P. corylifolia*, Linn.
ellipticum, Kuntze, l. c. = *P. lanceolata*, Pursh.
floribundum, Kuntze, l. c. 194 = *P. tenuiflora*, Pursh.
fruticans, Kuntze, l. c. = *P. bracteata*, Berg.
parvum, Kuntze, l. c. = *P. adscendens*, C. Muell.
psoralodes, Kuntze, l. c. = *P. melilotoides*, Michx.
restioides, Kuntze, l. c. = *P. restioides*, Eckl. & Zeyh.

LOTONONIS, Eckl. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 118.

filifolia, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 158. — Transvaal.
foliosa, Bolus, l. c. xxiv. (1887) 173. — Afr. austr. longiflora, Bolus, l. c. xxiv. (1887) 159. — Afr. austro-occ. extratrop.
Marlothii, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 26. — Afr. austr.
namaquensis, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 159. — Afr. austro-occ. extratrop.

LOTUS, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 119.

argensis, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 83. — Calif.
argyophyllum, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 149 = *Hosackia argophylla*, A. Gray.
argyraeus, Greene, l. c. 144 = *H. argyraea*, Greene.
balsamiferus, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 93 = *H. balsamifera*, Kell.
Benthani, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 148; et l. c. = *H. cytisoides*, Benth.
Biolettii, Greene, ll. cc. ii. (May 1892) 222; et 94. — Calif.
Bollei, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 123. — Ins. Capit. Virid.
cedrocensis, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 144 = *Hosackia flexuosa*, Greene.
chihuahuensis, Greene, l. c. 146 = *H. chihuahuana*, S. Wats.
confinis, Greene, in Erythraea, i. (1893) 258. — Am. bor. occ.
crassifolius, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 147; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 93 = *Hosackia crassifolia*, Benth.
Davidsonii, Greene, in Erythraea, i. (1892) 207 (= *L. sulphureus*, Greene). — Calif.
dendroideus, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 148 (= *Syrmatium dendroideum*, Greene). — Calif.
denticulatus, Greene, l. c. 139; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 91 = *Hosackia denticulata*, Drew.
distichus, Greene, l. c. 149 = *H. disticha*, Greene.
Douglasii, Greene, l. c. = *H. decumbens*, Benth.
eriophorus, Greene, in Erythraea, i. (1893) 207; et Man. San Franc. Bay (1894) 94 (= *L. tomentosus*, Greene). — Calif.
erythrorhizus, Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 238. — Ins. Canar.
formosissimus, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 147; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 92 = *Hosackia gracilis*, Benth.
glaber, Greene, ll. cc. 148 et 93 = *H. glabra*, Torr.
grandiflorus, Greene, ll. cc. 145 et 92 = *H. grandiflora*, Benth.
guadalupensis, Greene, l. c. 144 (= *H. grandiflora*, Greene, non Benth.). — Calif.
hamatus, Greene, l. c. 150 = *H. micrantha*, Nutt.
Haydonii, Greene, l. c. 149 = *H. Haydoni*, Orcutt.
Heermanni, Greene, l. c. ii. (Dec. 1890) 150; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 94 = *H. Heermanni*, Dur. & Hilg.
Helleri, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 312; et ex Greene, in Pittonia, ii. (Dec. 1890) 138 = *Hosackia Purshiana*, Torr. & Gray, pr. p.

LOTUS : —

Hillebrandii, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 122. — Ins. Canar.
hirtellus, Greene Pittonia, ii. (Dec. 1890) 142; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 92. — Calif.
hosackioides, Coss. in Roudaire, Rapp. dern. expéd. Chott. 189; ex Bonnet in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 232 = *L. Roudairei*, Bonnet.
humilis, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 140 = *Hosackia maritima*, Greene.
humistratus, Greene, l. c. 139; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 91 = *H. brachycarpa*, Benth.
incanus, Greene, l. c. 147 = *H. incana*, Torr.
juncus, Greene, l. c. 148; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 93 = *H. juncea*, Benth.
kabylicus, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 246 = *corniculatus*, Linn.
lalambensis, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 339, nomen. — Eritrea.
lathyroides, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 146 = *Hosackia lathyroides*, Dur. & Hilg.
leucophaeus, Greene, l. c. 145; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 92 = *H. grandiflora*, Benth.
leucophyllus, Greene, l. c. 149 = *H. sericea*, Benth.
macranthus, Greene, l. c. 146 = *Hosackia macrantha*, Greene.
Mearnsii, Britton, l. c. 144 = *H. Mearnsii*, Britton.
mollis, Greene, l. c. 143 = *H. mollis*, Greene.
neo-mexicanus, Greene, l. c. 144. — N. Mexic.
nevadensis, Greene, l. c. 149 (= *Syrmatium nevadense*, Greene) = *H. decumbens* Benth. var.
nevadensis, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 84. — Calif.
niveus, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 145 (= *Syrmatium niveum*, Greene). — Calif.
nudatus, Greene, l. c. 148 (= *S. nudatum*, Greene). — Ins. Cedros.
nudiflorus, Greene, l. c. 141; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 91 = *Hosackia nudiflora*, Nutt.
Nuttallianus, Greene, l. c. 150 = *H. prostrata*, Nutt.
oblongifolius, Greene, l. c. 146 = *H. oblongifolia*, Benth.
ornithopus, Greene, l. c. 149 = *H. ornithopus*, Greene.
procumbens, Greene, l. c. = *H. procumbens*, Greene.
puberulus, Greene, l. c. 142 = *H. puberula*, Benth.
rigidus, Greene, l. c. = *H. rigida*, Benth.
Roudairei, Ed. Bonnet, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 232, cum xylogr.; Bonnet & Baratte. Ill. Phanerog. Tunisie, (1895) t. 6 fig. 1-8. — Reg. Tunet.
rubellus, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 141; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 91 = *Hosackia rubella*, Nutt.
salsuginosus, Greene, ll. cc. 140; et 91 = *H. maritima*, Nutt.
stipularis, Greene, ll. cc. 147; et 93 = *H. stipularis*, Benth.
stagnalis, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 244 = *hispidus*, Desf.
sulphureus, Greene, Pittonia, ii. (Sept. (1892) 293. — Calif.
strigosus, Greene, l. c. (Dec. 1890) 141; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 92 = *H. strigosa*, Nutt.
subsessilis, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Verein, N. Folge, vi. (1894) 65. — Oriens.
superbus, Bornm. l. c. — Oriens.
tomentellus, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 140. — Calif.
tomentosus, Greene, l. c. 150 = *Hosackia tomentosa*, Hook. & Arn.
Torreyi, Greene, l. c. 146; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 92 = *H. Torreyi*, A. Gray.
trispermus, Greene, in Erythraea, i. (1893) 258. — Calif.
Veatchii, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 148 = *Hosackia Veatchii*, Greene.
Watsoni, Greene, l. c. 149 = *H. Watsoni*, Vasey & Coult.
Wrightii, Greene, l. c. 143 = *H. Wrightii*, A. Gray.

LOURYA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, (1888) i. 743; et Hist. des pl. xii. (1894) 525. *LILIA-CEAE*.
campanulata, Baill. l. c.; Carrière, in Rev. Hortie. (1894) 84 fig. 27 et cum iconc. — Cochinch.

LOUTERIDIUM, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xliii. (1888) 283; et xxiv. (1889) 85; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 295. *ACANTHACEAE*.
Donnell-Smithii, S. Wats. l. c. 284; J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 29 t. 7 (= *Neolin-denia mexicanus*, Baill.). — Mexic., Guatem.

LOWIA, Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii. (1886) 308; Petersen, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 10. *SCITAMINEAE*.
borneensis, Baker, in Bot. Mag. (1894) sub t. 7351 (= *Orchidanthe borneensis*, N. E. Br.). — Borneo.
longiflora, Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii. (1886) 305; Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 264 (= *O. longiflora*, N. E. Br.). — Perak.
maxillarioides, Baker, in Bot. Mag. (1894) t. 7351 (= *Protamomum maxillarioides*, Ridl.). — Penins. Mal.

LOXANIA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 386 = **Loranthus**, Linn.
loniceroides, Van Tiegh. l. c. 387 = *L. loniceroides*, Pav.
microphylla, Van Tiegh. l. c. = *L. microphyllus*, Kunth.

LOXANTHERA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 260 = **Loranthus**, Linn.
Beccarii, Van Tiegh. l. c. — Borneo.
lampungus, Van Tiegh. xlii. (1894) 449. — Sumatra.

LOXOCALYX, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 308. *LABIATAE*.
urticifolius, Hemsl. l. c. 309 t. 5. — China.

LOXODON, Cass. = **Chaptalia**, Vent. (Compos.).
bicolor, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 369, sphalm. (= *Oxydon bicolor*, Less.) = *C. runcinata*, H. B. & K.

LOXOPTERYGIUM, Hook. f. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 121.
Grisebachii, Hieron. & Lorentz, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 173. — Reg. Argent.

LOXOSTEMON, Hook. f. & Thoms. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 121.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 400. — China occ.

LUBINIA, Comm. = **Lysimachia**, Tourn. (Primul.).
nutans, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. i. (1890) 112 = *L. atropurpurea*, Link. & Otto.

LUCILIA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 121.
araucana, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 5. — Chili.
dioica, Phil. l. c. 6. — Am. austr. occ.
Lehmanni, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 51. — Equad.

LUCINAEAE, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 122.
nervulosa, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 174. — Borneo.
pentacme, Stapf. l. c. — Borneo.
polyperma, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 64 = *L. Morinda*, DC.

LUCUMA, Molina (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 122.
Baillonii, Zahlbr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 287; Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 892. — N. Caled.
baladensis, Baill. l. c. 896. — N. Caled.

LUCUMA : —

Balansana, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 22 = *Epiluma pyramiformis*, Baill.
Beaurepairei, Glaziov & Raukiaev, ex Raukiaev, in Vidensk. Meddel. naturh. Foren. (1889) 869 [Symb. Fl. Bras. centr. xxxi. 7]. — Bras.
buchaniaefolia, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 25 (= *Urbanella buchaniaefolia*, Pierre). — Columb.
crebrifolia, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 898. — N. Caled.
Deplanchei, Baill. l. c. 894 (= *Rhamnoluma novo-caledonica*, Baill.). — N. Caled.
discolor, Baill. l. c. 935. — N. Caled.
jacquiniaefolia, Baill. l. c. 897. — N. Caled.
laetevirens, Baill. l. c. 894. — N. Caled.
lanceolata, Raukiaev, ex Warm. in Vidensk. Meddel. naturh. Foren. (1889) 870 [Symb. Fl. Bras. centr. xxxi. 8]. — Bras.
neo-caledonica, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 29 (= *Poissonella neo-caledonica*, Pierre). — N. Caled.
nevecaledonica, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 1 (1890) 142 = seq.
novo-caledonica, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 526 = *Rhamnoluma novo-caledonica*, Baill.). — N. Caled.
oblonga, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 25 (= *Urbanella oblonga*, Pierre). — Ins. Antill.
pinifolia, Baill. [err. cal. *Peucephylla*] in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 895. — N. Caled.
pomifera, Zippel, ex Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 15 (= *Beauvisagea pomifera*, Pierre.). — Hab. ?
pomifera, Pecholt, in Pharm. Journ. and Trans. Ser. III. xviii. (May 1888) 952; et L. Planch. Etud. prod. Sapot. (1888) 81. — Bras.
rubicunda, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 883. — N. Caled.
Unmackiana, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iv. (1891) 12. — Austral.

LUCYA, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 122.
terandra, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 27 = *tuberosa*, DC.

LUDWIGIA, Linn. (Onagrar.). — Ind. Kew. ii. 122.
Swartziana, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 457. — Ins. Martinica.
diffusa, Greene, Fl. Francisc. (1891) 227 = *Jussieuia repens*, Linn.

LUEDDEMANNIA, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 122.
triloba, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 283; et in Gard. Chron. (1895) ii. 713 fig. 118. — Am. austr. andina.

LUEDERITZIA, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 45. *MALVACEAE*.
pentaptera, K. Schum. l. c. (= *Pavonia clathrata*, Mast.). — Afr. austro-occ.
Pirottae, Terrac. in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 422. — Reg. Somal.

LUERSENIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 268 = **Cuminum**, Tourn. (Umbellif.).
Cuminum, Kuntze, l. c. = *C. Cuminum*, Linn.

LUETKEA, Bong. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).
caespitosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 217 = *S. caespitosa*, Nutt.
caespitosa-elatior, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xiv. (1894) 31 = *S. elatior*, S. Wats.
Hendersoni, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 219. — Calif.
pectinata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 217 = *S. pectinata*, Torr. & Gray.
uniflora, Kuntze, l. c. (= *Eriogynia uniflora*, S. Wats.). — Montana.

LUHEA, DC. = **Luehea**, Willd. (Tiliac.).
Conwentzii, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 154. — Bras.
Eichleri, K. Schum. l. c. 158. — Bras.

LUINA, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 122.
Piperi, Robinson, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 43 t. 6, fig. 1-6. — Am. bor.

LUISIA, Gaudich. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 123.
Amesiana, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 173; Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 8 (1894) 279. — Burma.
Beccarii, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 344. — Borneo.
Cantharis, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 193. — Burma.
filiformis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 23. — Silhet.
Gamblei, Hook. f. l. c. 25; et in Ann. Bot. Gard. Calc. v. 1. (1895) 35 t. 53. — Ind. or. .
Griffithii, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 6 (1893) 119, t. 269 fig. 1-9 (= *Vanda Griffithii*, Lindl.). — Reg. Himal.
Grovesii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 25. — Bengal.
micrantha, Hook. f. l. c. 23. — Assam.
striata, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 7 (1893) 120, in obs. — As. trop.
tristis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 25. — Penang, N. Caled.
tristis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 672 = *teretifolia*, Gaudich.

LUNANIA, Hook. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 124.
cuspidata, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 47. — Am. austr.

LUNARIA, Tourn. ex Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 124.
pachyrrhiza, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 422 (= *L. annua*, Heuff.). — Hung.

LUPINUS, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 125.
adsurgens, Drew, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 150; Greene, Fl. Francisc. (1891) 41 = *latifolius*, Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 17. — Bolivia.
canescens, Howell, in Erythra, i. (1893) 110. — Am. bor. occ.
capitatus, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 171. — Arizona.
carnosulus, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. VI. (1886) 144; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 104. — Calif.
chihuahuensis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 423. — Mexic.
Covillei, Greene, in Proc. Acad. Phil. 1892 (1893) 365. — Calif.
Cusickii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 469. — Oregon.
eminens, Greene, in Erythra, i. (1893) 125; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 106. — Calif.
ermineus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 146. — Mexic.
eximius, Dary, in Erythra, iii. (1895) 116. — Calif.
fallax, Greene, in Erythra, ii. (July 1894) 119; et ex Gard. Chron. (1894) ii. 434. — Calif.
floribundus, Greene, in Proc. Acad. Phil. (1892) 364. — Calif.
formosus, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 105; et Fl. Francisc. (1894) 42. — Calif.
franciscanus, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 64 = *littoralis*, Dougl.
gracilentus, Greene, in Proc. Acad. Phil. (1893) 365. — Calif.
jucundus, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 106. — Calif.
ligulatus, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 215. — Oregon.
longipes, Greene, Fl. Francisc. (1891) 41. — Am. bor. occ.
malacophyllus, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 215. — Nevada.
Michenerii, Greene, in Erythra, ii. (1894) 119. — Calif.
mucronulatus, Howell, l. c. i. (1893) 109. — Oregon.
nemoralis, Greene, Fl. Francisc. (1891) 42. — Calif.
oreophilus, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 13. — Chili.
pachylobus, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 65; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 104. — Calif.

LUPINUS : —

- pallidus*, T. S. Brandeg. in *Zoé*, iv. (1893) 203. — Calif.
polycarpus, Greene, *Pittonia*, i. (June 1888) 171; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 103. — Calif.
propinquus, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 126; et *l. c.* 107. — Calif.
saxosus, Howell, *l. c.* i. (1893) 110. — Am. bor. occ.
Shockleyi, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 470. — Calif.
silvestris, Drew, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 150; et *Fl. Francisc.* (1894) 41 = *albi-caulis*, Dougl.
somaliensis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 213. — Reg. Somal.
Tidestromii, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 17. — Calif.
tricolor, Greene, *l. c.* i. (1893) 126; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 106 = *jucundus*, Greene.
tricolor, Hort. ex Gard. Kew, *Herb. Pl.* (1895) 281 [an praec. ?]. — Form. hort.
umbellatus, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 145. — Calif.

- LUPSIA**, Neck. = **Galactites**, Moench (Compos.).
Durieu, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 352 = *G. Duriei*, Spach.
Galactites, Kuntze, *l. c.* = *G. tomentosa*, Moench.
Hillii, Kuntze, *l. c.* 120 = *G. Hillii*, F. Muell.
Lehmannii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 41, in obs. = *G. Lehmannii*, Hieron.
lupulodes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 118 et 119 = *G. domingensis*, Linn.
orbicularis, Kuntze, *l. c.* 119 = *G. Meyeni*, Steud.

- LUPULUS**, Tourn. ex Mill. = **Humulus**, Linn. (Urtic.).
scandens, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl. éd. 8*, ii. (1889) 733 (= *L. scandens*, Lam.) = *H. Lupulus*, Linn.

- LUSSA**, Rumpf = **Brucea**, J. S. Muell. (Simarub.).
amarissima, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 104 = *B. sumatrana*, Roxb.
antidysenterica, Kuntze, *l. c.* = *B. ferruginea*, L'Hérit.
macrophylla, Kuntze, *l. c.* = *B. macrophylla*, Oliver.
mollis, Kuntze, *l. c.* = *B. mollis*, Wall.
quercifolia, Kuntze, *l. c.* = *B. quercifolia*, Seem.

- LUVUNGA**, Buch.-Ham. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 126.
nitida, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 18 (1893) t. 283. — Cochinch.

- LUXEMBERGIA**, A. St. Hil. (Ochnac.). — Ind. Kew. ii. 127.
Schwackeana, Taub. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 504. — Bras.

- LUZULA**, DC. (Juncace). — Ind. Kew. ii. 127.
caespitosa, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 187 = *pediformis*, DC.
Cheesemani, Buchenau, in *Bot. Jahrb.* xii. (1890) 146. — N. Zel.
Favati ×, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 185. — Helv.
japonica, Buchenau, in *Bot. Jahrb.* xii. (1890) 82. — Japon.
Johnstoni, Buchenau, *l. c.* 79. — Afr. trop. or.
subclavata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 276. — N. Zel.
Volkensii, Buchenau, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 192. — Afr. trop. or.

- LYALLIA**, Hook. f. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 128.
andicola, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 7 t. 1 fig. 7. — Am. austr. occ.

- LYCASTE**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 128.
Arnoldiae, Hort. ex Gartenfl. xli. (1892) 183. — Hab. ?

LYCASTE : —

- cinnabarina*, Rolfe, in *Orchid. Rev.* i. (1893) 303, et in *Lindenia*, viii. (1893) 23 t. 394 (= *Maxillaria cinnabarina*, Warscew.). — Peruvia.
Imschootiana ×, L. Linden, & Cogn. in *Lindenia*, ix. (1893) 55 t. 410; in *Gard. Chron.* (1893) ii. 756 et 775, fig. 119; et in *Journ. des Orchid.* iv. (1894) 328 fig. 72. — Hybr. artef.
Lindeniana, Hort. ex Kew Bull. (1891) 65. — Form. hort.
Luciani ×, Van Imschoot & Cogn. in *Lindenia*, ix. (1893!) 59 t. 412; *Gard. Chron.* (1893) ii. 756; et in *Journ. des Orchid.* iv. (1894) 361. — Hybr. artef.
Lucianiana, Hort. ex Orchid. Alb. ii. (1883) 28 = *L. Luciani*, Van Imschoot & Cogn.
Lucieniana, Hort. ex *Rev. Hort.* Belg. xx. (1894) 47 = *L. Luciani*, Van Imschoot & Cogn.
macropogon, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 200. — Costarica.
schoenbrunnensis, Umlauf, in *Wien. Illustr. Gart. Zeit.* (1893) 287; et ex *Gard. Chron.* (1894) ii. 118, fig. 18. — Hybr. artef.

- LYCHNIS** [Tourn.] Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 128.
andicola, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 61 (= *Silene andicola*, Gill.). — Bolivia.
Davidi, Franch. in *Nowv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 204. — Tibet.
glandulosa, Maxim. *Fl. Tangut.* (1889) 95. — China.
laciniata, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl. éd. 8*, ii. (1889) 113 (= *L. laciniata*, Lam.) = *L. Flos-Cuculi*, Linn.
mongolica, Maxim. *Enum. Fl. Mongol.* (1889) 94. — Mongol.
segetalis, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl. éd. 8*, ii. (1889) 113 = *L. Githago*, Linn.
Taylorae, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 150. — Am. bor.
umbellifera, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl. éd. 8*, ii. (1889) 113 (= *L. umbellifera*, Lam.) = *L. Flos-Jovis*, Desr.

- LYCHNODISCUS**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 130.
cerospermus, Radlk. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1890) 344. — Afr. trop. occ.

- LYCHNOPHORA**, Mart. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 130.
Itatiaiae, Wawra, *Itin. Princ. S. Coburg.* ii. (1888) 17. — Bras.

- LYCIOIDES**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 406 = **LYCIOIDES**, Linn. *Hort. Cliff.* (1738) 488 = **Bumelia**, Sw. (Sapot.).
angustifolium, *buxifolium*, *crenulatum*, *Dunantii*, *ferox*, *Hayesii*, *laetevirens*, *lanuginosum*, *obovatum*, *obtusifolium*, *occidentale*, *parvifolium*, *persimile*, *retusum*, *rotundifolium*, *Sartorum*, *spiniflorum*, *subsessiliflorum*, *tenax*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 406-07 = *homonyma omnia Bumeliae*.
Candolleana, Kuntze, *l. c.* 406 = *B. spinosa*, Linn.
myrsinifolium, Kuntze, *l. c.* = *Sideroxylon obovatum*, Lam.
spinosum, Kuntze, *l. c.* = *B. lycioides*, Willd.

- LYCIUM**, Linn. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 130.
breanum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 22. — Chili.
carinatum, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 65. — Mexic.
cedrosense, Greene, *Pittonia*, i. (Mar. 1889) 268. — Calif.
Chanar, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 68. — Am. occ.
crassispina, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 25. — Chili.
glandulosissimum, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 183. — Afr. austro-occ. extratrop.
Hassei, Greene, *Pittonia*, i. (Oct. 1888) 222. — Calif.

LYCIUM : —

- Morongii*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 180. — Parag.
nanum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 25. — Chili.
pachyclados, Phil. *l. c.* 26. — Chili.
peruvianum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 30 = *obovatum*, Miers.
retusum, Robinson & Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 120. — Mexic.
rhadinum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 24. — Chili.
rhombifolium, Dippel, in *Dosch & Scriba, Excursionsfl. Grossh. Hessen* (1888) 218; et *Handb. Laubholz.* i. (1889) 24; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 518 = *ovatum*, Poir.
sessiliflorum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 22. — Chili.
Shockleyi, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 311. — Am. bor. occ.
umbellatum, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 74. — Calif.
venosum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 22. — Chili.
Vergarae, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 67. — Am. austr. occ.
villosum, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 184. — Afr. austro-occ. extratrop.

- LYCOPERSICUM**, Hill (Solan.). — Ind. Kew. ii. 131.
bipinnatifidum, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 63. — Am. austr. occ.
puberulum, Phil. *l. c.* 64. — Am. austr. occ.

- LYCOPUS**, Tourn. ex Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 132.
intermedius ×, Hausskn. ex Nym. *Consp. Fl. Eur.* ii. i. (1890) 259. — Thessal.

- LYCOSERIS**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 132.
boliviana, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 266. — Bolivia.

- LYGISTUM**, P. Br. = **Manettia**, Linn. (Rubiace.).
acutifolium, *barbatum*, *Beyrichianum*, *calycosum*, *canescens*, *ciliatum*, *congestum*, *glandulosum*, *gracile*, *Guilleminianum*, *hirtellum*, *hispidum*, *ignitum*, *luteo-rubrum*, *marginatum*, *meridense*, *microcarpum*, *mite*, *paniculatum*, *pedunculatum*, *pleiodon*, *racemosum*, *reclinatum*, *Tweedeanum*, *umbellatum*, *zimapanicum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 287-88 = *homonyma omnia Manettiae*.
album, Kuntze, *l. c.* 387 = *M. Lygistum*, Sw.
Bangii, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 43. — Bolivia.
pubescens, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 288 = *M. luteo-rubra*, Benth.

- LYONIA**, Nutt. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 133.
ferruginea, Loesen, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 552 = *ferruginea*, Nutt. ?
floribunda « C. Koch » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 445, ad calc. = *Leucothoe floribunda*, Nutt. ?

- LYONSIA**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 133.
diversifolia, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 204. — N. Guin.
mollis, Warb. *l. c.* xiii. (1891) 406. — N. Guin.
pedunculata, Warb. *l. c.* — N. Guin.

- LYPERIA**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 133.
elegantissima, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 195. — Afr. austro-occ. extratrop.
grandiflora, Galpin, in *Kew Bull.* (1895) 151. — Transvaal.
littoralis, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 192. — Afr. austro-occ. extratrop.

- LYROCARPA**, Hook. & Harv. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 134.
Xanti, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 127 t. 2. — Calif.

LYSIANA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 599 = **Loranthus**, Linn.
Casuarinae, Van Tiegh. l. c. 601; et xlii. (1895) 86 = **L. Casuarinae**, Mig.
Exocarpi, Van Tiegh. ll. cc. 603 et 86 = **L. Exocarpi**, Behr.
linearifolia, Van Tiegh. ll. cc. = **L. linearifolius**, Hook. f.
Murrayi, Van Tiegh. ll. cc. = **L. Murrayi**, Tate.
vittata, Van Tiegh. l. c. 86 = **L. vittatus**, R. Br.

LYSILOMA, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 134.
candida, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 153. — Calif.
formosa, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 83 = **Calliandra formosa**, Benth.
Watsoni, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 99. — Mexic.

LYSIMACHIA [Tourn.] Linn. (Primul.). — Ind. Kew. ii. 134.
africana, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 55 et 59; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 304. — Afr. trop. or.
albescens, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 460. — Yunnan.
auriculata, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 47. — China.
capillipes, Hemsl. l. c. 48. — China.
circaeoides, Hemsl. l. c. 49. — China.
congestiflora, Hemsl. l. c. 50. — China.
crispidens, Hemsl. l. c. et t. 1. — China.
daphnoides, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 285. — Ins. Sandvic.
Delavayi, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 457. — Yunnan.
drynariifolia, Franch. l. c. 462. — Yunnan.
Fargesii, Franch. l. c. 463. — China.
Fordiana, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1983. — China.
glaucina, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 457. — Yunnan.
grandifolia, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 107; et in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2405. — Siam.
Hemsleyi, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 461. — Yunnan.
Hemsleyana, Maxim. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1980. — China.
Henryi, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 52. — China.
heterogenea, Hemsl. l. c. 53, in obs. = *heteroganea*, Klatt.
hypericoides, Hemsl. l. c. xxix. (1892) 314. — China occ.
involuta, Hemsl. l. c. 315. — China occ.
longipes, Hemsl. l. c. 316. — China occ.
Lydgatei, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 284. — Ins. Sandvic.
miltandra, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 458. — China.
negrolineata, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 315. — China occ.
omeiensis, Hemsl. l. c. 314. — China occ.
ophelioides, Hemsl. l. c. xxvi. (1890) 54. — China.
paludicola, Hemsl. l. c. — China.
parvifolia, Hemsl. l. c. 55. — China.
platypetala, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 59. — Tibet.
pterantha, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 56 t. 2. — China.
pumila, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1890) 460 (= *Bernardina pumila*, Bando). — China.
Remyi, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 284. — Ins. Sandvic.
rotundifolia, Hillebr. l. c. — Ins. Sandvic.
rubiginosa, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 56; et in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1981. — China.
simulans, Hemsl. l. c. 57. — China.
stenosepala, Hemsl. l. c. — China.
Tanakae, Maxim. in Bull. Acad. sci. Pétersb. xxxi. (1887) 66. — Japon.
terrestris, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 34 = *stricta*, Ait.

LYSIMACHIA: —
trichopoda, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 464. — Yunnan.
violascens, Franch. in Cat. sem. Hort. Bot. Paris (1891) nomen; et in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 459. — China.
Volkensii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 304. — Afr. trop. or.
yunnanensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 462. — Yunnan.

LYSINOTUS, D. Don (Gesneriac.). — Ind. Kew. ii. 135.
ophiorrhizoides, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 224. — China.
pubescens, C. B. Clarke, l. c. xxv. (1889) 58. — Ind. or.

LYSIPOMA, Spreng. = **Lysipomia**, H. B. & K. (Campanul.).
Bourgoini, Ernst, in Riv. cient. Univ. Venez. (1887) 134. — Venezuela.

LYSIS, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 397 = **Apochoris**, Duby (Primul.).
pentapetala, Kuntze, l. c. = **A. pentapetala**, Duby.

LYTANTHUS, Wettst. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 271 = **Globularia**, Tourn. (Selagin.).
amygdalifolius, Wettst. l. c. 272 = **G. amygdalifolia**, Webb.
salicinus, Wettst. l. c. = **G. salicina**, Lam.

LYTHRUM, Linn. (Lythrar.). — Ind. Kew. ii. 136.
adsurgens, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 12; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 140. — Calif.
Bryanti, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 155. — Calif.
catinense, Tornab. Fl. Sicula (1887) 240. — Sicil.
hyssopifolium, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 305 (= **L. hyssopifolium**, Thunb.) = **L. Hyssopifolia**, Linn.
salicarium, St. Lager, l. c. = **L. Salicaria**, Linn.
Sanfordi, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 12. — Calif.

M

MABA, Forst. (Eben.). — Ind. Kew. ii. 137.
caribaea, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 151 = *caribaea*, Hiern.
Elliotii, Hiern, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 85. — Sierra Leone.
Sintenisii, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 327. — Ins. Puerto Rico.

MABEA, Aubl. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 137.
indorum, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 469. — Bras.

MACAIREA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 137.
foveolata, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 596. — Bras.

MACAGLIA, Vahl = **Aspidosperma**, Mart. et Zucc. (Apocyn.).
australis, *bicolor*, *camporum*, *dasycarpa*, *decipiens*, *desmantha*, *discolor*, *disperma*, *excelsa*, *Gardneri*, *Gomeziana*, *Hilariana*, *macrecarpa*, *macrophylla*, *Martii*, *megalocarpa*, *melanocalyx*, *multiflora*, *nobilis*, *oblonga*, *obscura*, *olivacea*, *pachyptera*, *platyphylla*, *Polliana*, *populifolia*, *pyrifolia*, *refracta*, *Spruceana*, *subincana*, *tomentosa*, *Vargasii*, *verbascifolia*, *verruculosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 416 = *homonyma omnia Aspidospermatis*.
Quebracho, Kuntze, l. c. = **A. Quebracho**, Blanco.

MACARANGA, Thou. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 138.
alchorneifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 344. — Madag.

MACARANGA: —
ankafinensis, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 992. — Madag.
Brandisii, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 453. — Tenass.
clavata, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 349. — N. Guin.
Curtisii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 448. — Penang.
cuspidata, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 351. — N. Guin.
densiflora, Warb. l. c. 350. — N. Guin.
ferruginea, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 521. — Madag.
Gamblei, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 445. — Sikkim.
gmelinaefolia, King, ex Hook. f. l. c. — Reg. Himal.
Hildebrandtii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 990. — Madag.
Hosei, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 449. — Penins. Mal.
Hullettii, King, ex Hook. f. l. c. 452. — Perak.
Humboldtiana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 990. — Madag.
kilimandscharica, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 238. — Afr. trop. or.
Kingii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 451. — Penins. Mal.
Lowii, King, ex Hook. f. l. c. 453. — Penins. Mal.
mollis, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 93. — Congo mer.
ovata, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 181 [an Boiv. ?]. — Madag.
perakensis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 447. — Perak.
platyphylla, Baker, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 991. — Madag.
Poggei, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 94. — Congo mer.
Porteana, Ed. André, in Rev. Hort. lx. (1888) 176 fig. 36; W. Wats. in Gard. Chrots. (1894) ii. 284 cum xyl.; Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7407. — Ins. Philipp.
Preussii, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 92. — Kamerun.
punctata, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 80. — N. Guin.
pustulata, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 445. — Reg. Himal.
quadriglandulosa, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 350. — N. Guin.
racemosa, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 520. — Madag.
riparia, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 463. — Ins. N. Hannov.
rufibarbis, Warb. l. c. xvi. (1893) 21. — N. Guin.
saccifera, Pax, l. c. xix. (1894) 93. — Congo.
Schleinitziana, K. Schum. l. c. ix. (1888) 207. — N. Guin.
Schweinfurthii, Pax, l. c. xix. (1894) 92. — Afr. trop.

MACARISIA, Thou. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 138.
emarginata, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 15. — Madag.

MACFADYENA, A. DC. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 138.
cynanchoides, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 187 (= *Dolichandra cynanchoides*, Cham. & Schlecht.). — Bras.
mollis, K. Schum. l. c. [an Seem. ?]. — Reg. Argent.
dentata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 227. — Bras.
simplicifolia, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 198. — Guatem.
undulata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 227. — Bolivia.

MACHAERINA, Vahl = **Cladium**, R. Br. (Cyperac.).
melicoides, Bory, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 656 = *Asterochaeta elongata*, Kunth.

MACHAONIA, Humb. & Bonpl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 139.
Pringlei, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 380. — Mexic.

MACHILUS, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 140.
Bournei, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 373. — China.
breviflora, Hemsl. l. c. 374 (= *Alseodaphne breviflora*, Benth.). — Ins. Hongkong.
chinensis, Hemsl. l. c. (= *A. chinensis*, Champ.). — Ins. Hongkong.
Clarkeana, King, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 137. — Reg. Himal.
edulis, King, ex Hook. f. l. c. 138. — Reg. Himal.
Faberii, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 374. — China.
Gamblei, King, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 138. — Reg. Himal.
Gammieana, King, l. c. 137. — Reg. Himal.
Henryi, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 375. — Hainan.
Kobu, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 95. — Ins. Boninsima.
Listeri, King, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 138. — Reg. Himal.
macrophylla, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 375. — China.
microcarpa, Hemsl. l. c. 374. — China.
Nanmu, Hemsl. l. c. 376. — China.
neurantha, Hemsl. l. c. — China.
Sheareri, Hemsl. l. c. 377. — China.
villosa, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 140. — Reg. Himal.

MACLEANIA, Hook. (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 140.
Poortmanni, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 74. — Ecuad.
tuberosa, Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 224 (= *Thibaudia tuberosa*, Leib. [fide cl. Niedenzu]).

MACODES, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 140.
javanica, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1889) t. 7037 (= *Argyrorchis javanica*, Blume). — Java.

MACOMARIA ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 170. **ORCHIDEAE**.
Veitchii, Rolfe, l. c. (= *Goodyera Veitchii*, Hort.). Hybr. artef.

MACPHERSONIA, Blume (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 140.
cauliflora, Radlk. in *Sitz. math.-phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 247, in obs. — Madag.
gracilis, Radlk. l. c. [an *O. Hoffm.*?]. — Ins. Nossibé.
Hildebrandtii, Radlk. l. c. [an *O. Hoffm.*?]. — Madag.
laevis, Radlk. l. c. 248. — Madag.
macrophylla, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2243. — Madag.

MACRANTHISIPHON, Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 219. **BIGNONIACEAE**
longiflorum, K. Schum. l. c. (= *Bignonia longiflora*, Cav.). — Guayaquil.

MACROCALYX, Trew. = **Ellisia**, Linn. (Hydrophyll.).
bipinnatifida, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 151 = *Phacelia micrantha*, Torr. var. *chrysanthemifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 434 = *E. chrysanthemifolia*, Benth.
membranaceus, Kuntze, l. c. = *E. membranacea*, Benth.
micrantha, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 157 = *Phacelia micrantha*, Torr.
Nyctelea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 434 = *E. Nyctelea*, Linn.

MACROCALYX, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 357 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
Holtoni, Van Tiegh. l. c. (= *Psittacanthus Holtoni*, Eichl.). — N. Granat.

MACROCARPAEA, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 94 = **Lisianthus**, Linn. (Gentian.).
glabra, Gilg, l. c. = *L. glaber*, Linn. f.
macrophylla, Gilg, l. c. = *L. macrophyllus*, H. B. & K.
obtusifolia, Gilg, l. c. = *L. obtusifolius*, Griseb.
revoluta, Gilg, l. c. = *L. revolutus*, Ruiz. & Pav.
thamnoides, Gilg, l. c. = *L. thamnoides*, Griseb.

MACROCERATIUM, Reichb. Consp. (1828) 184; Kuntze, Rev. Gen. (1891) 34 = **Andrzeiowskia**, Reichb. (Crucif.).
cornutum, Kuntze, l. c. = *A. Cardamine*, Reichb.

MACROCHORDION, De Vriese = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel).
lagenarium, Ed. Morr. ex Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1892) 372 [Macrochordium] = *Ae. lagenaria*, Mez.
Lamarchei, «Ed. Morr.» ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 237, ad calc. = *Ae. bromeliaefolia*, Baker.
Lamarckii, Hort. ex Baker, l. c. 67, sphalm. = *Ae. Lamarchei*, Ed. Morr.
Lindenii, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiii. Beibl. n. 29 (1891) 14 [Macrochordium] = *Quesnelia Lindenii*, Ed. Morr.
macracanthum, Regel, in *Act. Hort. Pétersb.* ix. (1886) 603; et in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 297, fig. 37 = *Ae. conspicuarmata*, Baker.
Van Houtteanum, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiii. Beibl. n. 29 (1891) 4 = *Quesnelia Van Houtteana*, Ed. Morr.

MACROCLINIUM, Barb. Rodr. ex Pfitz. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1889) 220; et Nachtr. III = **Ornithocephalus**, Hook. ? (Orchid.).

MACRODENDRON, Taub. in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 19. **CUNONIACEAE**.
corcovadensis, Taub. l. c. — Bras.

MACRODISCUS, Bureau = **Distictis**, Mart. (Bignon.).
gnaphalanthia, Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 36 = *Bignonia gnaphalanthia*, A. Rich.
lactiflora, Bureau, ex Baill. l. c. = *D. lactiflora*, DC.
latiflora, «Baill.» ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 215 = praec.

MACROLOBIUM, Schreb. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 144.
Limba, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 77. — Sierra Leone.
Greenei, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 73 = *Aplopappus Greenei*, A. Gray.
mollis, Greene, l. c. = *A. mollis*, A. Gray.
pygmaeum, Greene, l. c. = *A. pygmaeus*, A. Gray.
Watsoni, Greene, l. c. 74. = *A. Watsonii*, A. Gray.

MACROPANAX, Miq. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 142.
dispermum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = *oreophilum*, Miq.

MACROPETALUM, Benth. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 142.
Bentharii, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 266. — Afr. austr.

MACROPELMA, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw.* Ost-Afr. C (1895) 321; et in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 213. **ASCLEPIADEAE**.
angustifolium, K. Schum. ll. cc. — Afr. trop. or.

MACROLEPTETRUM Pfitz. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1889) 214. **ORCHIDEAE**.
sesquipedale, Pfitz. l. c. fig. 234 (= *Angraecum sesquipedale*, Thou.). — Afr. trop.

MACRORRHYNCHUS, Lem. = **Troximon**, Nutt. (Compos.).
elatus, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 324. — Chili.

MACROSCEPIS, H. B. & K. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 143.
pleistantha, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 543. — Guatem.

MACROSPHYRA, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 143.
paleacea, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 77, in obs. (= *Gardenia paleacea*, A. Rich.). — Afr. trop.

MACROTOMIA, DC. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 143.
Benthami, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 352 [Macrotamia]. (= *Echium Benthami*, Wall.). — Reg. Himal., Afghan.

MACROZAMIA, Miq. (Cycad.). — Ind. Kew. ii. 144.
cylindrica, C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) — Austral.
Fawcettii, C. Moore, l. c. 380. — Austral.
flexuosa, C. Moore, l. c. — Austral.
heteromera, C. Moore, l. c. — Austral.
Hopii, W. Hill, ex F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* i. (1886) 50. — Austral.
Moorei, F. Muell. ex C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 379. — Austral.
mountperiensis, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* i. (1886) 50. — Austral.
secunda, C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 379. — Austral.

MACROZANONIA, Cogn. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 612; Muell. & Pax, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 392 in add. **CUCURBITACEAE**.
macrocarpa, Cogn. ll. cc. (= *Zanonia macrocarpa*, Blume). — Ins. Sandvic.

MADIA, Molina, (Compos.). — Ind. Kew. ii. 144.
corymbosa, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 213 = *corymbosa*, DC.
exigua, Greene, *Erythea*, i. (1893) 99; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 193 = *filipes*, A. Gray.
hispida, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 217 (= *Madia corymbosa*, DC. var. ? *hispida*, DC.). — Calif.
madioides, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 193 = Nutt.
valida, T. S. Brandeg. in *Zoë*, iv. (1893) 206. — Calif.

MADORIUS, Rumph. *Herb. Amboin.* vi. (1750) 24, t. 14, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 421 = **Calotropis**, R. Br. (Asclep.).
Acia, Kuntze, l. c. = *C. Acia*, Buch.-Ham.
giganteus, Kuntze, l. c. = *C. gigantea*, [Dryand. in] Aiton.
procera, Kuntze, l. c. = *C. procera*, [Dryand. in] Aiton.

MAERUA, Forsk. (Capparid.). — Ind. Kew. ii. 144.
amphilahensis, Terrac. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, v. (1894) 114. — Afr. trop. or.
angustifolia, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxix. (1888) 48. — Afr. austro-occ. extratrop.
caffra, Pax, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1891) 234 = *Niebuhrria triphylla*, Wendl. f.
calophylla, Gilg, in Engl. *Pflanzenw.* Ost-Afr. C (1895) 187. — Afr. or.
caudata, Pax, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 305. — Kamerun.
Emini, Pax, l. c. 304. — Afr. trop. occ.
grandiflora, Pax, l. c. 302. — Afr. trop. or.
Guerichii, Pax, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 305 in obs; et xix. (1894) 135. — Afr. austro-occ. extratrop.

MAERUA : —

- Harmsiana, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 187. — Afr. or.
 Hoehnelii, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 227, nomen. — Afr. trop. or.
 Holstii, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 187. — Afr. or.
 insignis, Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 30; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 187. — Afr. trop. or.
 Johannis, Volkens & Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 187. — Afr. or.
 juncea, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 302. — Afr. trop. austro-or.
 linearis, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1891) 234 = Niebuhria linearis, DC.
 nuda, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 2. — Madag.
 parvifolia, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 303 in obs.; et xix. (1894) 135. — Afr. austro-occ. extra-trop.
 Schinzii, Pax, l. c. 303 et 136. — Afr. austro-occ. extra-trop.
 somalensis, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 235; et in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 304. — Reg. Somal.
 Stuhlmannii, Pax, l. c. 303. — Afr. trop. or.
 tomentosa, Pax, l. c. 305. — Afr. trop. or.

MAESA, Forsk. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 144.

- Borjacana, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 138. — Ins. S. Thom.
 Hornsheimiana, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 398. — N. Guin.
 papuana, Warb. l. c. 400. — N. Guin.
 subsessilis, Warb. l. c. 399. — N. Guin.

MAESOBOTRYA, Benth. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 145.

- Bertramiana, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 93. — Congo.

MAESOPSIS, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 255. **RHAMNEAE**.

- Eminii, Engl. l. c.; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 399. — Afr. trop. or.
 Stuhlmannii, Engl. ll. cc. — Afr. trop. or.

MAFEKINGIA, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 303;

- K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 218. **ASCLEPIADEAE**.
 Parquetiana, Baill. ll. cc. — Afr. austr.

MAGNOLIA, Linn. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 145.

- Delavayi, Franch. Pl. Delav. (1889) 33 t. 9-10. — Yunnan.
 ferruginea, Hort. ex W. Wats. in Kew Bull. (1889) 305 = grandiflora, Linn.
 foetida, Sarg. in Gard. and For. i. (1889) 615; et N. Am. Sylva, i. 3 t. 1 et 2 = grandiflora, Linn.
 Gustavi, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. iii. ii. (1891) 209 t. 61. — Assam.
 Hartwegii, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 17 = grandiflora, Linn.
 Hartwicus, Hort. l. c. = grandiflora, Linn. var.
 hybrida X, Dippel, Handb. Laubholzk. iii. (1893) 151. — Hybr. artef.
 latifolia, Aiton [Hort. Kew. ii. (1789) 251] ex Dippel, l. c. 145 = glauca, Linn.
 Lenneana X, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 146 [an M. Lennei X, Van Houtte?] — Hybr. artef.
 Maingayi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 369. — Penins. Mal.
 Norbertiana X, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. iii. (1893) 152; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 146 = hybrida, Dippel.
 Pealiana, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. iii. ii. (1891) 210 t. 59. — Assam.
 speciosa, « Cels, » ex Dippel, Handb. Laubholzk. iii. (1893) 152 = hybrida, Dippel.
 stricta, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 17 = grandiflora, Linn. var.

MAGNOLIA : —

- tripetala, Trelease, Branner & Coville, in Branner, Rep. Geol. Surv. Ark. 163 (= M. tripetala, Linn.) = M. umbrellata, Linn.
 Thurberi, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 17 = M. Kobus, DC.
 Watsoni, Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7157. — Japon.
 Wiesneri, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. lxii. (1890) 406. — Japon. ?

MAGONIA, Vell. = **Ruprechtia**, C. A. Mey. (Polygon.).

- amentacea, apetalata, brachysepala, brachystachya, coriacea, corilifolia, Cumingii, excelsa, fagifolia, glauca, Jamisonia, laxiflora, Lundii, Martei, mollis, polystachya, ramiflora, salicifolia, tenuiflora, triflora, Vivaru, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 553 = homonyma omnia Ruprechtiae.
 carpinodes, Kuntze, l. c. = R. carpinoides, Meissn.
 costata, Kuntze, l. c. = R. Cumingii, Meissn.

MAHEA, Pierre, ex L. Planch. Étud. prod. Sapot. (1888) 26; et Not. bot. Sapot. (1890) 8. **SAPO-TACEAE**.

- glauca, Pierre, l. c. (= Labourdonnaisia glauca, Boj.). —
 natalensis, Pierre, l. c.; Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 742. — Natal.

MAHERNIA, Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 146.

- auricoma, Szyszyl. Polyp. Rehmann. (1887) 51. — Natal.
 cordata, E. Mey. ex Szyszyl. l. c. = betonicaefolia, Eckl. & Zeyh.
 Macowanii, Szyszyl. l. c. 54. — Natal.
 natalensis, Szyszyl. l. c. 52. — Natal.
 Rehmannii, Szyszyl. l. c. 55. — Transvaal.

MAHOE, Hiliebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 86 = **Alec-tryon**, Gaertn. (Sapind.).**MAHONIA**, Nutt. = **Berberis**, Linn. (Berberid.).

- Fortunei, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. iii. (1893) 109 = B. Fortunei, Lindl.
 latifolia, Hort. ex Dippel, l. c. = B. Aquifolium, Pursh.
 Murrayana, Hort. ex Dippel, l. c. = B. Aquifolium, Pursh.
 nepalensis, DC. ex Dippel, l. c. 112 = B. nepalensis, Spreng.
 Sieboldii « Lavallée, » [Arboret. Segrez. (1870) 16], ex Dippel, l. c. 11 = B. nepalensis, Spreng.
 trifoliata, Hort. ex Dippel, l. c. 104 = B. Schiedeana, Schlecht.
 trifurcata, Hort. ex Dippel, l. c. 113 = B. trifurcata, Forst.
 Wagneri, Hort. ex Dippel, l. c. 107 = B. pinnata, Lag.

MAHYA, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 490. **LABIATAE**.

- stellata, Cordem. l. c. — Ins. Borbon.
MAIETA, Aubl. (Melastom.). — Ind. Kew. ii. 000.
 dentata, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 465 (= Calophysa dentata, Triana). — Peruvia.
 tococoidea, Cogn. l. c. (= Calophysa tococoidea, DC.). — Bras., Peruvia.

MAJANA, Rumph. Herb. Amboin. v. (1747) 291, 296, t. 101, f. 3, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 523 = **Coleus**, Lour. (Labiata.).

- acuminata, arabica, bicolor, Blancoi, canina, carnosa, galeata, glandulosa, grandifolia, inflata, lanuginosa, latifolia, macrophylla, macrostachya, Manni, multiflora, parviflora, puberula, secundiflora, spicata, tenuicaulis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 524 = homonyma omnia Colei.
 amboinica, Kuntze, l. c. = C. aromaticus, Benth.
 Benthamiana, Kuntze, l. c. = C. inflatus, Benth.
 Forskalii, Kuntze, l. c. = C. barbatus, Benth.
 paniculata, Kuntze, l. c. = C. Persoonii, Benth.
 pumila, Kuntze, l. c. = C. acuminatus, Benth.
 Richardiana, Kuntze, l. c. = C. tuberosus, A. Rich.

MAJANA : —

- scutellarioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 524 = Coleus scutellarioides, Benth.
 Sugunda, Kuntze, l. c. = C. aromaticus, Benth.
 tuberosa, Kuntze, l. c. = C. parviflorus, Benth.
 Zatarhendi, Kuntze, l. c. = C. spicatus, Benth.

MAJANTHEMUM, Sieg. Fl. Petrop. (1736) 70; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 981 = **Convallaria**, Linn. (Liliac.).

- majalis, Kuntze, l. c. = C. majalis, Linn.

MAKOKOA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 619; et (1887) 704 = **Octolepis**, Oliver? (Thymel.).

- congolana, Baill. ll. cc. — Congo gall.

MALABAILA, Hoffm. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 147.

- aurantiaca, Alboff. Prodr. Fl. Colch. (1895) 117. — Reg. Cauc.
 biradiata, Hausskn. ex Nym. Conspect. Fl. Eur. Suppl. ii. l. (1889) 138. — Graecia.
 Burnatiana, Heldr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 242. — Graecia.
 chrysantha, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 117. — Reg. Cauc.
 Kirungae, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 134, nomen. — Afr. trop.
 parnassica, Heldr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 243. — Graecia.
 porphyrodiscus, Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 52. — As. Min.
 Psaridiana, Heldr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxix. (1889) 243. — Graecia.

MALACANTHA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 60; Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 295. **SAPO-TACEAE**.

- alnifolia, Pierre, l. c. (1891) 61 (= Chrysophyllum alnifolium, Baker) — Afr. trop. occ.
 Heudelotiana, Pierre, l. c. — Afr. trop. occ.

MALACHE, Trew = **Pavonia**, Cav. (Malvac.).

- angustifolia, arabica, arenaria, Bojeri, cancellata, castanaefolia, ceratocarpa, clathrata, diuretica, glechomifolia, grandiflora, grisea, hastata, heterophylla, hirsuta, intermixta, Klotschyi, lanceolata, lasiopetala, latifolia, modesta, odorata, paniculata, papilionacea, pellita, propinqua, prostrata, praemorsa, racemiflora, Rosa-campetris, rosea, sagittata, Schimperiana, Schrankii, semiserrata, sepium, sessiliflora, sidifolia, speciosa, spinifex, subpandurata, wens, urticifolia, velutina, zeylanica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 70-71 homonyma omnia Pavoniae.
 achanodes, Kuntze, l. c. = P. achanoides, Griseb.
 arachnodes, Kuntze, l. c. = P. arachnoides, Presl.
 alba, Kuntze, l. c. 70 = P. paniculata, Cav.
 Burchellii, Kuntze, l. c. = P. Columella, Cav.
 cardiosepala, Kuntze, l. c. = P. varians, Moric.
 cordifolia, Kuntze, l. c. = P. Mutisii, H. B. & K.
 corymbosa, Kuntze, l. c. = P. paniculata, Cav.
 deltoides, Kuntze, l. c. = P. deltoidea, Mart.
 flava, Kuntze, l. c. = P. sepium, A. St. Hil.
 glandulosa, Kuntze, l. c. = P. glandulosa, Presl.
 glechomodes, Kuntze, l. c. = P. glechomoides, A. St. Hil.
 hirta, Kuntze, l. c. = P. glechomoides, A. St. Hil.
 hirtiflora, Kuntze, l. c. = P. glandulosa, Presl.
 involucreta, Kuntze, l. c. = P. sessiliflora, H. B. & K.
 leptocarpa, Kuntze, l. c. = P. Typhalaea, Cav.
 Luschnathiana, Kuntze, l. c. = P. microphylla, Casarr.
 macrophylla, Kuntze, l. c. = P. Kraussiana, Hochst.
 mexicana, Kuntze, l. c. = Kosteletzkyia mexicana, Garcke.
 microphylla, Kuntze, l. c. 71 = P. Dregei, Garcke.
 mollis, Kuntze, l. c. 70 = P. Mutisii, H. B. & K.
 muricata, Kuntze, l. c. 71 = P. Schrankii, Spreng.
 mutanda, Kuntze, l. c. 70 = P. cordifolia, Wright.
 Poeppigii, Kuntze, l. c. 71 = Hibiscus Poeppigii, Garcke.
 polymorpha, Kuntze, l. c. = P. speciosa, H. B. & K.

MALACHE : —

repanda, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 71 = *Urena repanda*, Roxb.
rigida, Kuntze, l. c. = *U. rigida*, Wall.
scabra, Kuntze, l. c. = *Pavonia paniculata*, Cav.
spicata, Kuntze, l. c. 70 = *P. racemosa*, Sw.
stellata, Kuntze, l. c. 71 = *P. Typhalaea*, Cav.
sulfurea, Kuntze, l. c. = *P. cancellata*, Cav.
typhalaeodes, Kuntze, l. c. = *P. Typhalaea*, Cav.
Wrightii, Kuntze, l. c. = *P. lasiopetala*, Scheele.

MALACHRA, Linn. (Malv.). — Ind. Kew, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 460. — Peruvia.

MALACOCARPUS, Salm-Dyck = **Echinocactus**, Link & Otto (Cact.).

Sellowii, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II. (1890) 238; et in Monatsschr. f. Kakteenk. iv. (1893) 160 = *Sellowianus*, Salm-Dyck.
tephracanthus, K. Schum. l. c. 243 = *E. tephracanthus*, Link & Otto.

MALACOCOAETE, Nees = **Scirpus**, Tourn. (Cyperac.).

aemulans, Arn. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 620 = *S. corymbosus*, Heyne.

MALACODENDRON ovatum, « Cav. » ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 30 = *Malachodendron ovatum*, Cav.

MALACOTHRIX, DC. (Compos.). — Ind. Kew, ii. 148.

foliosa, A. Gray, ex Lyon, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 335, nomen; et Syn. N. Am. Fl. i. II. (1886) 454. — Calif.
indecora, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. VI. (1886) 152. — Ins. S. Cruz (Calif.).
squalida, Greene, l. c. — Ins. S. Cruz (Calif.).

MALAISIA, Blanco (Urtic.). — Ind. Kew, ii. 148.
scandens, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 199 (= *M. scandens*, Planch.) = *tortuosa*, Blanco.

MALANTHOS, Stapf, in Hook Icon, pl. xxv. (1895) sub t. 2415. Genus omnino delendum [Conf. Kew Bull. (1895) 319].

MALANEA, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew, ii. 148.
grandis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 43; et iv. (1895) 208, in obs. = *Elaeagia grandis*, Rusby.

MALAPOENNA, Adans. = **Litsea**, Lam. (Laurin.).
acerina, *aciculata*, *albicans*, *amara*, *angulata*, *angustifolia*, *assamica*, *Beddomii*, *cassiaefolia*, *castanea*, *charitacea*, *chrysocoma*, *citrata*, *cordata*, *coriacea*, *Cubeba*, *dealbata*, *densifolia*, *diversifolia*, *elliptica*, *elongata*, *ferruginea*, *firma*, *fulva*, *fuscata*, *glaberrima*, *glabrata*, *glaucescens*, *gracilipes*, *grandis*, *guatemalensis*, *Helperi*, *Hookeri*, *Hookeriana*, *japonica*, *javanica*, *khassiana*, *Kingii*, *Kurzii*, *laeta*, *latifolia*, *leiantha*, *ligustrina*, *longifolia*, *longipes*, *luzonica*, *Maingayi*, *Mannii*, *Meisneri*, *membranifolia*, *mishmiensis*, *myristicifolia*, *nemoralis*, *nitida*, *Noronhae*, *nuculanacea*, *obtusata*, *Orizaba*, *ovalifolia*, *Panamonja*, *parvifolia*, *penangiana*, *petiolata*, *plumbea*, *polita*, *Pseudocutilitawan*, *resinosa*, *reticulata*, *robusta*, *rubra*, *rugosa*, *Rumphii*, *semecarpifolia*, *sericea*, *Thomsoni*, *tomentosa*, *tripplinervia*, *undulata*, *venulosa*, *villosa*.
Wightiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 571-73 = *homonymia omnia* Litseeae.

accedens, Kuntze, l. c. 572 (= *Cylicodaphne accedens*, Meissn.). — Borneo.
ambigua, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera ambigua*, Blume). — Ins. Moluce.
areolata, Kuntze, l. c. (= *T. areolata*, Blume). — N. Guin.
bancana, Kuntze, l. c. (= *T. bancana*, Miq.). — Ins. Banca.
bandongana, Kuntze, l. c. = *L. Noronhae*, Blume.
Bindoana, Kuntze, l. c. 571 = *L. Bindoniana*, F. Muell.

MALAPOENNA : —

Blumeana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 572 (= *Cylicodaphne cuneata*, Blume). — Sumatra.
borneensis, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera borneensis*, Meissn.). — Borneo.
brachystachya, Kuntze, l. c. (= *T. brachystachya*, Blume). — Java.
Brawas, Kuntze, l. c. (= *T. Brawas*, Blume). — Sumatra.
calicaris, Kuntze, l. c. 571 (= *T. Tangao*, Blume). — N. Zel.
caloneura, Kuntze, l. c. 572 (= *T. caloneura*, Miq.). — Java.
chrysophoena, Kuntze, l. c. (= *T. chrysophoena*, Blume). — Ins. Moluce.
chrysopleura, Kuntze, l. c. (= *T. chrysopleura*, Blume). — Java.
crassifolia, Kuntze, l. c. (= *T. crassifolia*, Blume). — Borneo.
Cuipala, Kuntze, l. c. 571 = *L. lanuginosa*, Nees.
cuneata, Kuntze, l. c. 572 (= *Tetranthera cuneata*, Blume). — Ins. Celebes.
cuspidata, Kuntze, l. c. (= *T. cuspidata*, Blume). — Java.
Cylicodaphne, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne pallida*, Blume). — Malaya.
discolor, Kuntze, l. c. = *L. timoriana*, Span.
Doshia, Kuntze, l. c. = *L. oblonga*, Meissn.
dubia, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne velutina*, Blume). — Java.
flexuosa, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera flexuosa*, Blume). — Ins. Moluce.
Forstenii, Kuntze, l. c. (= *T. Forstenii*, Blume). — Ins. Celebes.
fusca, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne fusca*, Blume). — Sumatra.
fuscata, Kuntze, l. c. = *L. fuscata*, Thw.
fuscescens, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne fuscescens*, Meissn.). — Malaya.
gemelliflora, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera gemelliflora*, Miq.). — Sumatra.
geniculata, Coult. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 164 = *L. geniculata*, Benth. & Hook. f.
glauca, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 572 = *L. salicifolia*, Hook. f.
glomerata, Kuntze, l. c. = *L. geniculata*, Benth. & Hook. f.
grisea, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne grisea*, Blume). — Sumatra.
hirta, Kuntze, l. c. (= *C. hirta*, Blume). — Java.
Hookeri, Kuntze, l. c. = *L. oreophila*, Hook. f.
impressa, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera impressa*, Blume). — Java.
insignis, Kuntze, l. c. (= *T. insignis*, Blume). — Sumatra.
intermedia, Kuntze, l. c. (= *T. intermedia*, Blume). — Java.
involuta, Kuntze, l. c. 571 = *L. zeylanica*, C. & T. Nees.
Iteodaphne, Kuntze, l. c. 572 = *L. ovalifolia*, Trim. ?
lancifolia, Kuntze, l. c. = *L. minuta*, Reinw.
lucida, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera lucida*, Hassk.). — Java.
lucidissima, Kuntze, l. c. = *L. lucida*, Blume.
macrantha, Kuntze, l. c. 571 = *L. Sebifera*, Pers.
macrophylla, Kuntze, l. c. 572 = *Actinodaphne macrophylla*, Nees.
magnifica, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne magnifica*, Miq.). — Sumatra.
mappacea, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera mappacea*, Blume). — Sumatra.
martabanica, Kuntze, l. c. (= *T. martabanica*, Jungh.). — Burma.
Miqueliana, Kuntze, l. c. (= *Lepidadenia mollis*, Miq.). — Java ?
Mogol, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera Mogol*, Blume). — Java.
mollis, Kuntze, l. c. (= *T. mollis*, Miq.). — Java ?
monopetala, Kuntze, l. c. 571 = *L. polyantha*, Fuss.
Neesiana, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera Neesiana*, Wall.). — Malacc.

MALAPOENNA : —

nervosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 572 = *L. Wallichii*, Hook. f.
nigricans, Kuntze, l. c. 573 (= *Tetranthera nigricans*, Meissn.). — Borneo.
nitens, Kuntze, l. c. (= *T. nitens*, Blume). — Java.
obscura, Kuntze, l. c. (= *T. obscura*, Blume). — N. Guin.
obtusata, Kuntze, l. c. (= *T. obtusata*, Nees). — Java.
oleodes, Kuntze, l. c. = *L. oleoides*, Hook. f.
Oliveriana, Kuntze, l. c. = *L. mollis*, Oliver.
pallens, Kuntze, l. c. 572 = *L. umbrosa*, Nees.
pallida, Kuntze, l. c. 573 (= *Tetranthera pallida*, Blume). — Ins. Celebes.
palmatinervia, Kuntze, l. c. 571 (= *T. palmatinervia*, Meissn.). — Ins. Fiji.
Pantjara, Kuntze, l. c. (= *T. Pantjara*, Blume). — Java, Sumatra.
penangiana, Kuntze, l. c. 573 = *L. penangiana*, Hook. f.
polynura, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne polynura*, Meissn.). — Java.
propinqua, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera propinqua*, Blume). — Sumatra.
pulchella, Kuntze, l. c. = *L. zeylanica*, C. & T. Nees.
punctata, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne punctata*, Blume). — Borneo.
rangoonensis, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera rangoonensis*, Meissn.). — Burma.
riparia, Kuntze, l. c. (= *T. riparia*, Blume). — Ins. Moluce.
rubiginosa, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne rubiginosa*, Blume). — Sumatra.
Seemannii, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera Seemannii*, Meissn.). — Ins. Fiji.
sessiliflora, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne sessiliflora*, Meissn.). — Borneo.
sessilis, Kuntze, l. c. 572 = *L. sessiliflora*, Hook. f.
siamensis, Kuntze, l. c. = *L. nuculanacea*, Hook. f.
Sieboldii, Kuntze, l. c. = *L. glauca*, Siebold.
sumatrana, Kuntze, l. c. 573 (= *Cylicodaphne sumatrana*, Miq.). — Sumatra.
tephrophylla, Kuntze, l. c. (= *Lepidadenia tephrophylla*, Miq.). — Java.
tersa, Kuntze, l. c. 571 = *L. Sebifera*, Pers.
tuberculata, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne tuberculata*, Blume). — Sumatra.
umbellata, Kuntze, l. c. = *L. hexantha*, Fuss.
undulata, Kuntze, l. c. 573 = *L. undulata*, Zipp.
unita, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne unita*, Blume). — Ins. Moluce.
utilis, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera utilis*, Meissn.). — Borneo.
varians, Kuntze, l. c. (= *T. varians*, Blume). — Sumatra.
velutina, Kuntze, l. c. (= *T. velutina*, Blume). — Ind. or.
vestita, Kuntze, l. c. = *L. tomentosa*, Blume.
villosa, Kuntze, l. c. 551 = *L. Neesiana*, Hemsl.
virens, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera virens*, Nees). — Ins. Penang.
Waitziana, Kuntze, l. c. (= *T. Waitziana*, Blume). — Java.
xanthophylla, Kuntze, l. c. (= *T. xanthophylla*, Blume). — Sumatra.

MALAXIS, Soland. ex Sw. (Orchid.). — Ind. Kew, ii. 148.

acutangula, *andicola*, *arachnifera*, *bancana*, *bawrita*, *brachystachya*, *Burbridgei*, *calophylla*, *calycina*, *caracasana*, *cardiophylla*, *carinata*, *caulescens*, *Chlorophrys*, *commelinifolia*, *cordata*, *corymbosa*, *crenulata*, *crispifolia*, *cylindrostachya*, *discolor*, *disepala*, *Ehrenbergii*, *excavata*, *fastigiata*, *floridana*, *furcata*, *Godefroyi*, *gracilis*, *hastilabia*, *Josephiana*, *khassiana*, *Lagotis*, *lancifolia*, *longisepala*, *macrostachya*, *Maingayi*, *Massonii*, *metallica*, *micrantha*, *montana*, *Moritzii*, *muscifera*, *myurus*, *oculata*, *parvula*, *polyodon*, *polyphylla*, *porphyrea*, *pubescens*, *purpurea*, *rotundata*, *rupestris*, *Scottii*, *segaarensis*, *simillima*, *stelidostachya*, *Stocksii*, *taurina*, *Ventilabrum*, *ventricosa*, *Warmingii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 673 = *homonymia omnia* Microstylidis.

MALAXIS : —

- densiflora*, Rich. & Galeotti, ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 331, in syn. = *Microstylis macrostachya*, Lindl.
platycheila, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 673 = *Micr. platycheila*, Reichenb. f.
resupinata, Kuntze, l. c. = *Micr. Rheedii*, Reichenb. f. et versicolor, Lindl.
tipulodes, Kuntze, l. c. = *Micr. tipuloides*, Lindl.

MALCOMIA, R. Br. (Crucifer.). — Ind. Kew. ii. 149.

- aurantica*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 420 [Malcolmia]. — Syria.
bassavana, Petrov. ex Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 376, in syn. [Malcolmia] = *M. Pancicii*, Adamov.
ciliaris, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 44 [Malcolmia]. — Afghan.
Cossoniana, Rouy, in Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 7, in obs. [Malcolmia] = *Sisymbrium malcomioides*, Coss. & Dur.
Doumetiana, Rouy, in Rouy & Fouc. l. c. [Malcolmia] = *S. Doumetianum*, Coss.
hybrida X, Hausskn. in Mitth. Thur. Bot. Ver. N. Folge, iii et iv. (1893) 108 [Malcolmia]. — Graecia.
micrantha, Boiss. & Reut. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 45 [Malcolmia]. — Mesopot.
nana, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 20 [Malcolmia] = *Sisymbrium nanum*, DC.
Pancicii, Adamov, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 405 [Malcolmia]. — Serbia.
zachlensis, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 420 [Malcolmia]. — Syria.

MALESHERBIA, Ruiz & Pav. (Passiflor.). — Ind. Kew. ii. 149.

- breviflora*, Phil. ex Harms, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 598, in obs. — Am. austr. occ.
densiflora, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 22. — Am. austr. occ.
Hieronymi, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 68. — Reg. Argent.
pulchra, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 22; et l. c. 599. — Am. austr. occ.

MALIORTEA, W. Wats. in Gard. Chron. (1886) i. 557, err. typ. = **Malortiea**, H. Wendl. (Palm.).**MALLINOA**, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 47. **COMPOSITAE**.
corymbosa, Coult. l. c. t. 5. — Guatem.**MALLOSTOMA**, Karst. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 150.

- Shannoni*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 203. — Guatem.

MALLOTUS, Lour. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 150.

- anamiticus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 608. — Anam.
andamanicus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 439. — Ins. Andam.
anisophyllus, Hook. f. l. c. 436. — Malacca, Borneo.
Beddomei, Hook. f. l. c. 438. — Travanc.
bracteatus, Hook. f. l. c. 436. — Perak.
brevipes, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 18. — Quid?
Buettneri, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 89. — Gabon.
Caput-Medusae, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1880) 449. — Penins. Mal.
chrysanthus, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 78. — N. Guin.
Clellandii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 435. — Pegu.
columnaris, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 349. — N. Guin.
filiformis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 435. — Tenass.
Griffithianus, Hook. f. l. c. 433. — Penins. Mal.
Hollrungianus, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 79. — N. Guin.
khasianus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 438. — Khasia.

MALLOTUS : —

- Kingii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 439. — Perak.
Kunstleri, King, ex Hook. f. l. c. 443. — Perak.
Kurzii, Hook. f. l. c. 427. — Ins. Andam.
lancifolius, Hook. f. l. c. 434. — Penang.
leptostachyus, Hook. f. l. c. 435. — Tenass.
leucodermis, Hook. f. l. c. 441. — Malacca.
Maingayi, Hook. f. l. c. 449. — Penins. Mal.
Playfairii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 441. — China.
polyneurus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 439. — Tenass.
populifolius, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 441. — China.
puberulus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 435. — Perak.
vernicosus, Hook. f. l. c. 443. — Penins. Mal.
vitifolius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 608. — Cambodia.
Walkeriae, Hook. f. l. c. 437. — Zeyl.
Wrayi, King, ex Hook. f. l. c. 433. — Perak.

MALOPE, Linn. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 151.

- intermedia*, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 110 = *malacoides*, Linn.

MALOUETIA, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 151.

- africana*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1895) 187. — Afr. trop.
Tamaquarina, K. Schum. l. c. = *M. Tamaquarina*, A. DC.

MALPERIA, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv.

- (1889) 54; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 388. **COMPOSITAE**.
tenuis, S. Wats. l. c. — Calif. austr.

MALPIGHIA, Plum. ex Linn. (Malpigheae.). — Ind. Kew. ii. 151.

- oaxacana*, Niedenzu, ex Loesen. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 544 t. 20. — Mexic.

MALUS, Tourn. ex Linn. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).

- chinensis*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 183 = *P. spectabilis*, Ait.
crataegifolia, Koehne, Die Gatt. d. Pomac. (1890) 27; et Deutsch. Dendrol. (1893) 257; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 402 = *P. crataegifolia*, Savi.
edulis, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 181 = *P. orthocarpa*, Nichols.
Halliana, Koehne, l. c. 27 et 261; Dippel, l. c. 406. — Japon.
Mengo, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 406 = *P. Siboldi*, Regel.
Niedzwetzkyana, Dieck, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 259 = *P. Malus*, Linn.
orthocarpa, Lavall, ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 181 = *P. orthocarpa*, Nichols.
Parkmanni, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1894) 261 = *Halliana*, Koehne.
Riversicarnea X, Hort. ex Koehne, l. c. 260. — Hybr. artef.
Ringo, Sieb. [Catal. rais. (1856) 5], ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 400 = *P. spectabilis*, Ait.
Siboldii, Regel, [in Gartenfl. ix. (1859) 82], ex Dippel, l. c. 406 = *P. Siboldi*, Regel.
upsalensis, Hort. ex Dippel, l. c. 394 = *P. Malus*, Linn.

MALVA, [Tourn.] Linn. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 152.

- antofagastana*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 7 = *Malvastrum antofagastanum*, E. G. Baker.
diminutiva, Phil. l. c. 8 = *Malvastrum diminutivum*, E. G. Baker.
Duriei, Hort. Kew. ex Gard. Kew, Herb. Pl. (1895) 287 (= *M. Duriei*, Spach?) = *Lavatera mauritanica*, Duch.
multicaulis, Schlecht. [in Lechl. Pl. Peruv. n. 1784] ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 153, in syn. = *Malvastrum multicaule*, Britton.

MALVA : —

- Papaver*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1890) 41 (= *M. Papaver*, Cav.) = *Callirhoe Papaver*, A. Gray.
Reichei, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 19 = *Malvastrum capitatum*, E. G. Baker.
subacaulis, Phil. l. c. 14 = *M. subacaulis*, E. G. Baker.
tarapacana, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 8. — Am. austr. occ.

MALVASTRUM, A. Gray (Malv.). — Ind. Kew. ii. 165.

- Alexandri*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 166. — Afr. austr.
alismaticum, K. Schum. ex Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 318. — Peruvia.
antofagastanum, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 167 (= *Malva antofagastana*, Phil.). — Chili.
auricomum, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 8; E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 365. — Chili.
bolivianum, E. G. Baker, l. c. 168. — Bolivia.
Burchellii, E. G. Baker, l. c. 165. — Afr. austr.
capitatum, E. G. Baker, l. c. 168 (= *Malva capitata*, Cav.). — Peruvia, Bolivia.
clandestinum, E. G. Baker, l. c. 363 (= *Sida clandestina*, Phil.). — Chili.
condensatum, E. G. Baker, l. c. — Peruvia.
Copelandii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 43. — Peruvia.
decipiens, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 000 (= *Sida decipiens*, St Hil. & Naud.). — Bras., Uruguay.
diminutivum, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 36 (= *Malva diminutiva*, Phil.). — Chili.
fasciculatum, Greene, Fl. Francisc. (1891) 108 = *M. Thurberi*, A. Gray.
Garckeanum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 267. — Bras., Urug.
interruptum, K. Schum. l. c. 272. — Argent.
jacens, O. S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 417. — Mexic.
Lobbii, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 365. — Columbia.
multicaule, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 153 (= *Malva multicaulis*, Schlecht.). — Peruvia.
multiflorum, Greene, Fl. Francisc. (1891) 109. — Calif.
nubigena, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 172 (= *Malva nubigena*, Wedd.). — Peruvia, Bolivia.
nudum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 274. — Uruguay, Argent.
obcuneatum, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 363. — Bolivia.
orbiculatum, Greene, Fl. Francisc. (1891) 109. — Calif.
Oriastrum, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 172 (= *Malva Oriastrum*, Wedd.). — Bolivia.
Pappei, E. G. Baker, l. c. 166. — Afr. austr.
Parryi, Greene, Fl. Francisc. (1891) 108. — Calif.
parviflorum, Phil. ex E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 363; et in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 9. — Chili.
Pearcei, E. G. Baker, l. c. 364. — Bolivia.
pentandrum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 273. — Reg. Argent.
Pringlei, E. G. Baker, ex Robinson, in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 175. — Mexic.
pygmaeum, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 167 (= *Malva pygmaea*, Wedd.). — Bolivia.
retusum, E. G. Baker, l. c. 166 (= *Malva retusa*, Cav.). — Afr. austr.
rugosum, Phil. l. c. 364; et in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 9. — Chili.
Rusbyi, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1888) 64. — Bolivia.
sajanense, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 318. — Peruvia, Bolivia.
Schaffneri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 143. — Calif.
stipulare, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 8. — Am. austr. occ.

MALVASTRUM : —

- Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 318. — Peruvia.
 subacaule, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 36 (= *Malva subacaulis*, Phil.). — Chili.
 tarapacana, E. G. Baker, l. c. xxix. (1891) 167 (= *Malva tarapacana*, Phil.). — Chili.
 tenuifolium, E. G. Baker, l. c. 169 (= *Malva tenuifolia*, Hook. & Arn.). — Chili.
 trilobatum, E. G. Baker, l. c. 164. — Afr. austr.
 Tweedii, E. G. Baker, l. c. 169. — Uruguay.

MALVAVISCUS, Dill. ex Adans. (Malv.). — Ind.

- Kew. ii. 155.
 cinereus, E. G. Baker, in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 176, nomen. — Mexic.
 Guerkeanus, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 320. — Columb.
 Palmeri, E. G. Baker, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 313. — Mexic.
 Pringlei, E. G. Baker, in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1 (1895) 175. — Mexic.

MALVEOPSIS, Presl = **Sphaeralcea**, A. St. Hil. (Malv.).

- acaulis, albens, americana, anthemidifolia, asperima, borussica, bryoniaefolium, calycina, capensis, Castelnacana, coccinea, compacta, dissecta, divaricata, exilis, flabellata, grossulariaefolia, humilis, leptophylla, longirostris, Mac Cleanii, macrostachya, Mandoniana, mexicana, Orbigniana, parnassiaefolia, pedicularifolia, peruviana, Phyllanthos, pichinchensis, pinnata, procumbens, racemosa, ribifolia, rotundifolia, setosa, spicata, splendida, stenopetala, stricta, subtriflora, tridactylites, ulophylla, virgata, vitifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = *homonyma omnia Malvastri*.
 angustifolia, Kuntze, l. c. = *Sphaeralcea angustifolia*, G. Don.
 arcuata, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 66. — Calif.
 aurantiaca, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = *Malvastrum Wrightii*, A. Gray.
 Copelandii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx Beibl. n. 49 (1895) 43, in obs. = *Malvastrum Copelandii*, Hieron.
 ciculata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = M. Thurbieri, A. Gray.
 coromandeliana, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 55 = M. tricuspidatum, A. Gray.
 Coulteri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = *Sphaeralcea Coulteri*, S. Wats.
 fragrans, Kuntze, l. c. = *Malvastrum capense*, Garcke.
 Fremontii, Greene, in Erythea, i. (1893) 171 = *Sphaeralcea Lindheimeri*, A. Gray.
 hispida, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = *Malvastrum angustum*, A. Gray.
 lateritia, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 55 = M. lateritum, Nichols.
 multicaulis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 9 = M. multicaule, Britton.
 Munroana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = *Sphaeralcea Munroana*, Spach.
 pedatifida, Kuntze, l. c. = S. Fendleri, A. Gray.
 rosea, Kuntze, l. c. = S. umbellata, G. Don.
 Rusbyi, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 9 = *Malvastrum Rusbyi*, Britton.

MAMMEA, Linn. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 156.
 similis, Goudot, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 499, in syn. = *macrophylla*, Planch. & Triana.**MAMMILLARIA**, Haw. (Cactee). — Ind. Kew. ii. 156.

- Besleri, « Link & Otto » ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 1024, ad calc. sphalm. = *Melocactus Besleri*, Link & Otto.
 cornimamma, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) ii. 186. — Hab.?
 Gabbii, Engelm. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 109, in syn. — Calif. inf.
 Grusoni, Runge, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 105, fig. 20. — Mexic.
 Halei, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 161, t. 6. — Calif.

MAMMILLARIA : —

- Halei, Coult. ex K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. v. (1895) 89 [an praec. ?]. — Calif.
 Neumannii, Regel, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 270 et 1023, ad calc. [Neumannii] = *lactescens*, Meinsh.
 Notesteinii, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 367 = *missouriensis*, Sweet.
 obscura, Hildm. in Monatsschr. f. Kakteenk. (1891-92) 52, cum xylogr. — Hab.?
 Pondii, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 268. — Calif.
 purpurea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 150. — Mexic.
 Purpusii, K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. iv. (1894) 165. — Am. bor.
 Radleana, K. Schum. l. c. ii. (1892) 104, cum xylogr. — Mexic.
 rigidispina, Hildm. ex Quehl. Hall. in Monatsschr. f. Kakteenk. iii. (1893) 112, cum xylogr. — Hab.?
 Roseana, T. S. Brandeg. in Zöb. ii. (1891) 19 [Mamillaria]. — Calif.
 Schumannii, Hildm. in Monatsschr. f. Kakteenk. (1891-92) 101, cum xylogr. (sphalm. 89) et 125 [Schumannii]. — Hab.?
 setispina, Engelm. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 106. — Calif. inf.
 tuberculosa, « Engelm. » ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 416, sphalm. (= M. tuberculata, Engelm.) = *strobiliformis*, Scheer.
 uberimamma, Mouw. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 374. — Hab.?
 Williamsii, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 129 (= *Anhalonium Williamsii*, Engelm.). — Am.

MANDEVILLA, Lindl. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 160.

- antennacea, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 171 = *Echites antennacea*, A. DC.
 auriculata, K. Schum. l. c. 171 = E. fluminensis, A. DC.
 Benthamii, K. Schum. l. c. = E. Benthamii, A. DC.
 brachyloba, K. Schum. l. c. = E. brachyloba, Miers.
 bracteata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 414 = E. bracteata, H. B. & K.
 canescens, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 171 = E. canescens, Willd.
 funiformis, K. Schum. l. c. = E. funiformis, Vell.
 javitensis, K. Schum. l. c. = E. javitensis, H. B. & K.
 cuyabensis, K. Schum. l. c. = E. cuyabensis, A. DC.
 leptophylla, K. Schum. l. c. = E. leptophylla, A. DC.
 macrophylla, K. Schum. l. c. = E. macrophylla, H. B. & K.
 mollissima, K. Schum. l. c. = E. mollissima, H. B. & K.
 scabra, K. Schum. l. c. = E. scabra, Hoffm. g.
 Schumanniana, Loesen. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 556. — Mexic.
 Spruceana, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 171 (= *Amblyanthera Spruceana*, Muell. Arg.). — Bras.
 tomentosa, K. Schum. l. c. = seq.
 tomentosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 416 = E. tomentosa, Vahl.
 velutina, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 171. — Costarica.

MANDRAGORA [Tourn.] Linn. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 160.

- Haussknechtii, Heldr. in Mitth. Geogr. Ges. Jena. iv. (1886) 77. — Graecia.
 hybrida X, Hausskn. & Heldr. ex Heldr. l. c.; et N. Folge, viii. (1895) 54. — Graecia.

MANETTIA, Mutis (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 161.

- asperula, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 142. — Columb.
 Beyrichiana, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 181. — Brasil.
 canescens, K. Schum. l. c. 178. — Ecuad.

MANETTIA : —

- congesta, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 177 = *albiflora*, Schott.
 flexuosa, Casar. l. c. in syn. = *albiflora*, Schott.
 diffusa, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 107. — Bolivia.
 Guilleminiana, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 181. — Bras.
 ignita, K. Schum. l. c. 170 = *cordifolia*, Mart.
 lutescens, K. Schum. l. c. 186. — Bras.
 marginata, K. Schum. l. c. 178. — Venezuela.
 meridensis, K. Schum. l. c. — Venezuela.
 microcarpa, K. Schum. l. c. 179. — Venezuela.
 mitis, K. Schum. l. c. 185 = *fimbriata*, Cham. & Schlecht.
 pedunculata, K. Schum. l. c. 173 = *pseudodiodia*, Cham. & Schlecht.
 pleiodon, K. Schum. l. c. 184. — N. Granat.
 scabra, Pohl, ex K. Schum. l. c. 175 = *luteo-rubra*, Benth.
 Tweediana, K. Schum. l. c. 169. — Uruguay.

MANGLIETIA, Blume (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 161.

- Fordiana, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1953. — Ins. Hongkong.
 Scortechini, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 370. — Ind. or.

MANIHOT, Tourn. ex Adans. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 162.

- Manihot, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 95 = *utilissima*, Pohl.
 Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 148. — Mexic.

MANILTOA, Scheff. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 162.

- Schefferi, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 101 = *grandiflora*, Scheff.

MANISURIS, Linn. = **Rottboellia**, Linn. f. (Gramin.).

- acuminata, Afzelii, Coelorhachis, compressa, corrugata, cylindrica, digitata, divergens, exaltata, formosa, glandulosa, hirsuta, impressa, latifolia, loricata, mollicoma, nigrescens, rugosa, Selloana, speciosa, striata, thyrsodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 779 = *homonyma omnia Rottboelliae*.
 exaltata, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 199 = *exaltata*, Kuntze.
 parifera, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 48. — Reg. Himal.
 rottboelliodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 779 = R. ophiuroides, Benth.

MANNIOPHYTON, Muell. Arg. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 163.

- angustifolium, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 952. — Congo gall.

MANOTES, Soland. ex Planch. (Connac.). — Ind. Kew. ii. 163.

- Aschersoniana, Gilg, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 334. — Congo.
 brevistyla, Gilg, l. c. — Congo.
 pruinosa, Gilg, l. c. 332. — Congo.
 sanguineo-arillata, Gilg, l. c. 333. — Congo.
 tomentosa, Gilg, l. c. 332. — Gabon.

MAOUTIA, Wedd. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 163.

- rugosa, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 289. — N. Guin.

MAPANIA, Aubl. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 163.

- africana, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 667, nomen. — Afr. trop. occ.
 andamanica, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 681. — Ins. Andam.
 ferruginea, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 209, fig. 5. — Ins. S. Thom.
 Kurzii, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 681. — Penins. Mal.

MAPANIA: —

- longa, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 683. — Penins. Mal., Sumatra.
macrocephala, K. Schum. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 265 = *Hypolytrum macrocephalum*, Gaudich.
 Mannii, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 667, nomen. — Afr. trop. occ.
 oblonga, C. B. Clarke, l. c. nomen. — Afr. trop. occ.
 multispicata, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 682. — Penins. Mal., Java.
pandanophyllum, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 25 = *Thoracostachyum hypolytroides*, C. B. Clarke.
 scaberrima, C. B. Clarke, ex Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 667 (= *Hypolytrum scaberrimum*, Boeck.). — Gabon
 superba, C. B. Clarke, l. c. (= *Hypolytrum macranthum*, Boeck.). — Afr. trop. occ.
 silhetensis, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 681. — Ind. or.
 tenuiscapa, C. B. Clarke, l. c. 683. — Ind. or., Sumatra.
 Wallichii, C. B. Clarke, l. c. 682. — Penins. Mal., Borneo.

MAPOURIA, Aubl. = **Psychotria**, Linn. (Rubiaceae).

- artensis*, Beauvisage, Révis. genr. pl. Néo-Caléd. (1894) 8 (= *Delpechea artensis*, Montr.). — N. Caléd.
connata, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 112 = *Psychotria connata*, Wall.
crassa, K. Schum. l. c. = *P. crassa*, Benth.
Douarrei, Beauvisage, Révis. genr. pl. Néo-Caléd. (1894) 11 (= *Douarrea alba*, Montr.). — N. Caléd.
floribunda, Beauvisage, l. c. (= *Delpechea floribunda*, Montr.). — N. Caléd.
fulva, K. Schum. l. c. = *Psychotria fulva*, Buch.-Ham.
parasitica, K. Schum. l. c. = *P. parasitica*, Sw.
parvifolia, K. Schum. l. c. 111 = *P. parvifolia*, Benth.
sarmentosa, K. Schum. l. c. = *P. sarmentosa*, Blume.
speciosa, Beauvisage, Révis. genr. pl. Néo-Caléd. (1894) 11 (= *Douarrea speciosa*, Montr.). — N. Caléd.
tristis, Muell. Arg. ex Warm. in *Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. Kjöeb.* (1889) 342 (Symb. Fl. Bras. centr. xxxiii. 912). — Bras.

MAPPA, A. Juss. = **Macaranga**, Thou. (Euphorbiae).

- Porteana*, Hort. ex Éd. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 176, in obs. = *Macar. Porteana*, Éd. André.

MAPPIA, Jacq. (Olinac.). — Ind. Kew. ii. 64.

- cambodiana*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 17 (1892) t. 267 b. — Cambodia.
mexicana, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 150. — Mexic.
pittosporoides, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1762. — China.

MAPROUNEA, Aubl. (Euphorbiae). — Ind. Kew. ii. 165.

- obtusa*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 116. — Afr. trop. or.
vaccinioides, Pax, l. c. — Congo.

MARANTA, Plum. ex Linn. (Scitameae). — Ind. Kew. ii. 165.

- albo-lineata*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 95 = *Calathea ornata*, Koern.
asymetrica, Hort. ex Petersen, l. c. 94 = *C. taeniosa*, Foriss.
atrata, Hort. ex Illustr. *Hortic.* xli. (1894) 177. — Form. hort.
Bachemiana, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 115 = *C. Bachemiana*, Éd. Morr.
bella, Hort. Bull. ex Petersen, l. c. 127 = *C. bella*, Regel.

MARANTA: —

- bracteosa*, Petersen, ex Warm. in *Vidensk. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 333 (Symb. Fl. Bras. centr. xxxiii. 903). — Bras.
concolor, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 126 = *Calathea concolor*, Eichl.
coriifolia, Hort. ex Petersen, l. c. 95 = *C. ornata*, Koern.
fascinator, L. Lindl. & Rodigas, in *Illustr. Hortic.* xli. (1894) 105 t. 7. — Bras.
fiorentina, Hort. l. c. 177. — Form. hort.
fulgens, Hort. l. c. — Form. hort.
gracilis, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 149 = *noctiflora*, Koern.
hirsuta, Mart. ex Petersen, l. c. 135 = *Ischnosiphon hirsutus*, Petersen.
iconifera, Hort. Bull. Catal. (1887) 11 = *Calathea Makoyana*, Éd. Morr.
Kegeliana, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 115 = *C. Bachemiana*, Éd. Morr.
Leopoldi, Hort. ex Gard. *Chron.* (1892) ii. 160. — Form. hort.
Lietzei, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 111 = *Calathea Lietzei*, Éd. Morr.
Lindeniana, Wallis [in *Linden. Catal. ann.* 1867], ex Petersen, l. c. 92 = *C. Lindeniana*, Éd. Morr.
Louisae, Hort. ex Gard. *Chron.* (1891) i. 594. — Bras.
majestica, L. Linden, in *Illustr. Hortic.* xli. (1894) 11, in obs. — Form. hort.
Maacellii, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 118 = *Calathea virginalis*, L. Lind.
Mariae, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 251. — Form. hort.
Massangeana, Hort. Makoy, ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1898) 151 = *leuconeura*, Éd. Morr.
metallica, Hort. ex Illustr. *Hortic.* xli. (1894) 177. — Form. hort.
Neuberti, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 111 = *Calathea Lietzei*, Éd. Morr.
Openhami, Hort. ex Rev. Hort. Belge xix. (1893) 258, sphalm. = seq.
Oppenheimiana, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 128 = *Calathea Oppenheimiana*, Éd. Morr.
pacifica, Linden [Catal.], ex Petersen, l. c. 125 = *C. pacifica*, L. Linden & André.
parvifolia, Petersen, ex Warm. in *Vidensk. Meddel. Naturh. Foren.* (1889) 328 (Symb. Fl. Bras. centr. xxxiii. 898). — Bras.
Riedeliana, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 127 = *Calathea Koernickeana*, Regel.
roseo-lineata, Hort. ex Petersen, l. c. 95 = *C. ornata*, Koern.
Sanderiana, Hort. ex L. Linden, in *Illustr. Hortic.* xli. (1894) 11, nomen. et ex Rev. Hort. (1895) 249 = *majestica*, L. Lind.
Wioti, Ch. Morr. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 130 = *Calathea Wioti*, Regel.

MARCELLIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1886) 625. **AMARANTACEAE.**

- mirabilis*, Baill. l. c. — Angola.

MAR CETIA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 166.

- heterophylla*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 297 (= *Rhexia heterophylla*, Hook. & Arn.). — Uruguay.
 Schenckii, Cogn. i. c. 291. — Bras

MARGRAVIA, Plum. ex Linn. (Ternstroem.).

- Ind. Kew. ii. 167
peduncularis, Poepp. ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 8; et iv. (1895) 205, in obs. (= *Novantia peduncularis*, Poepp.). — Bolivia.
 Sintenisii, Urban, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, iv. (1886) 245. — Ins. Puerto-Rico.

MAREZIA, Pomel = **Sisymbrium**, Tourn. (Crucif.).

- Doumetiana*, Batt. in Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 69 = *S. Doumetianum*, Coss.

MAREZIA: —

- malcolmioides*, Batt. in Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 69 = *Sisymbrium malcolmioides*, Coss. & Durieu.
nana, Batt. l. c. 68 = *S. nanum*, DC.

MARGARETTA, Oliver (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 167.

- Cornetii*, Dewèvre, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 2 1894 (1895) 103; et xxxiv. 2 (1895) 90. — Congo.
Holstii, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 133; et in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57 et 58. — Afr. trop.
distincta, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 255. — Afr. trop. austro-or.
orbicularis, N. E. Br. l. c. 256. — Afr. trop. austro-or.
Passargei, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 234 — Afr. trop.
rosea, Britten & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iv. (1894) 29. — Afr. trop. or.
Whytei, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 323 = *rosea*, Britten & Rendle.

MARGARITOPSIS, Wright (Rubiaceae). — Ind. Kew. ii. 167.

- nudiflora*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 122. — Cuba.

MARGYRICARPUS, Ruiz & Pav. (Rosaceae). — Ind. Kew. ii. 167.

- cristatus*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 25. — Bolivia.

MARICA, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 168.

- Martii*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 63. — Bras.
occidentalis, Baker, in *Gard. Chron.* (1892) ii. 150. — Peruvia.

MARILAUNIDIUM, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 434 = **Nama**, Linn. (Hydroph.).

- biflorum*, Coulteri, *demissum*, *dichotomum*, *hirsutum*, *hispidum*, *jamaicense*, *latifolium*, *Lobbii*, *origanifolium*, *Palmeri*, *Parryi*, *Rothrockii*, *rupicolum*, *sandwicense*, *Schaffneri*, *sericeum*, *stenocarpum*, *stenophyllum*, *strictum*, *subpetiolare*, *undulatum*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Namatis.
aretoides, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 161 = *Eutoca aretioides*, Hook. & Arn.
macranthum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 434 = *N. undulatum*, H. B. & K. var.
serpyllodes, Kuntze, l. c. = *M. serpyllodes*, A. Gray.

MARIPA, Aubl. (Convolvul.). — Ind. Kew. ii. 168.

- paniculata*, Barb. *Rodr. [Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 368]* *Vellosia*, 1885-88. Sec. édic. (1891) 59 t. 27 A. — Bras.

MARISCUS, Gaertn. (Cyperac.). — Ind. Kew. ii. 169.

- albomarginatus*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 584. — Afr. austro-or. et austr.
Aster, C. B. Clarke, l. c. — Madag.
avenicola, C. B. Clarke, ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 316, in obs. (= *Cyperus Blodgettii*, Britton). — Am. bor.
aximensis, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 584. — Guinea.
Bojeri, C. B. Clarke, l. c. — Madag.
Bolusii, C. B. Clarke, l. c. 585. — Afr. austro-or. et austr.
circumclusus, C. B. Clarke, l. c. — Abyss.
bulbosus, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 620. — Ind. or.
Cooperi, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 586. — Afr. austro-or. et austr.
cupreus, Hochst. ex C. B. Clarke, l. c. 586. — Abyss.
dactyliformis, C. B. Clarke, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iv. (1894) 53 (= *Cyperus dactyliformis*, Boeck.). — Afr. trop. et austr.

MARISCUS: —

- diurensis, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 586 (= *Cyperus diurens*, Boeck.). — Afr. centr. et or.
- durus, C. B. Clarke, l. c. (= *C. durus*, Kunth). — Afr. austro-occ. et austr.
- detersus, C. B. Clarke, l. c. — Madag.
- elator, C. B. Clarke, l. c. (= *C. elatior*, Boeck.). — Afr. austro-or. et austr.
- eurytachys, C. B. Clarke, l. c. 587 (= *C. eurytachys*, Ridl.). — Angola.
- ferax, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 624; et in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 587 (= *C. ferax*, Rich.). — Reg. trop. orb. tot.
- foliosus, C. B. Clarke, l. c. 588. — Afr. trop. or.
- Grantii, C. B. Clarke, l. c. — Natal.
- Gueinzii, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austro-or. et austr.
- hemisphaericus, C. B. Clarke, l. c. 589 (= *Cyperus hemisphaericus*, Boeck.). — Afr. trop.
- Hilsenbergii, C. B. Clarke, l. c. — Madag.
- Hookerianus, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 623. — Sikkim.
- humilis, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 534 = *tabularis*, C. B. Clarke.
- involutus, C. B. Clarke, l. c. 589. — Afr. austr.
- ischnos, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 623 (= *Cyperus ischnos*, Schlecht.). — Am. trop., Ind. or.
- leptophyllus, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 589 (= *C. leptophyllus*, Hochst.). — Afr. or. et austro-or.
- luridus, C. B. Clarke, l. c. — Congo.
- luteus, C. B. Clarke, l. c. 589 (= *Cyperus luteus*, Boeck.). — Madag.
- luzuliformis, C. B. Clarke, l. c. (= *C. luzuliformis*, Boeck.). — Afr. austro-or. et austr.
- macropus, C. B. Clarke, l. c. 590 (= *C. macropus*, Boeck.). — Afr. trop.
- Marlothii, C. B. Clarke, l. c. (= *C. Marlothii*, Boeck.). — Afr. austro-or. et austr.
- mollipes, C. B. Clarke, l. c. (= *Rynchospora bulbicaulis*, Boeck.). — Afr. trop.
- Myrmecias, C. B. Clarke, l. c. (= *Cyperus Myrmecias*, Ridl.). — Angola.
- Owani, C. B. Clarke, l. c. (= *C. Owani*, Boeck.). — Afr. trop.
- pilosulus, C. B. Clarke, l. c. 591. — Zanzibar.
- pseudo-brunneus, C. B. Clarke, l. c. 5. — Ins. Comor.
- pseudo-flavus, C. B. Clarke, l. c. — Afr. trop.
- purpurascens, C. B. Clarke, in Kew Bull. (1893) 283 (= *Cyperus brunneus*, Griseb. pr. p.). — Ins. Antill.
- Rehmannianus, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 591 (= *Cylindrolepis Rehmanniana*, Boeck.). — Afr. austro-or. et austr.
- remotus, C. B. Clarke, l. c. — Congo.
- Rohlfii, C. B. Clarke, l. c. 592 (= *C. Rohlfii*, Boeck.). — Abyss.
- somaliensis, C. B. Clarke, in Kew Bull. (1895) 229 — Reg. Somal.
- Soyauxii, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 593 (= *Cyperus Soyauxii*, Boeck.). — Gabon.
- squarrosus, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 623; et in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 594 (= *C. squarrosus*, Linn.). — Ind. or., Afr. trop. or.
- strigosus, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 308 (= *C. strigosus*, Linn.). — Am. bor.
- sul limis, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 594 (= *C. umbellatus*, C. B. Clarke). — Afr. trop.
- tabularis, C. B. Clarke, l. c. (= *C. tabularis*, Schrad.). — Afr. austr.
- tanyphyllus, C. B. Clarke, l. c. — Afr. trop. or.
- Taylori, C. B. Clarke, l. c. — Ins. S. Thom.
- thomensis, C. B. Clarke, l. c. — Afr. trop. occ.
- tomaiphyllus, C. B. Clarke, l. c. — Afr. aequat.-or., Madag.
- trinervis, C. B. Clarke, l. c. 595. — Congo.

MARISCUS: —

- varius, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 595. — Madag.
- vestitus, C. B. Clarke, l. c. (= *Cyperus vestitus*, Hochst.). — Afr. trop.

- MARISCUS, Hall. Enum. stirp. Helv. (1742) 251-52, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 754 = **Cladium**, P. Br. (Cyperac.).
- acutus, Kuntze, l. c. 755 = *Cl. schoenoides*, R. Br.
- affinis, Kuntze, l. c. = *Gahnia Gaudichaudii*, Steud.
- anceps, Kuntze, l. c. = *Cl. iridifolium*, Baker.
- ancistrophyllus, Kuntze, l. c. = *Gahnia ancistrophylla*, Benth.
- angustifolius, Kuntze, l. c. (= *Vincentia angustifolia*, Gaudich.). — Ins. Sandvic.
- aristatus, Kuntze, l. c. = *Gahnia aristata*, Benth.
- arthrophyllus, Kuntze, l. c. = *Cl. arthrophyllum*, F. Muell.
- articulatus, Kuntze, l. c. = *Cl. articulatum*, R. Br.
- asper, Kuntze, l. c. = *Gahnia aspera*, F. Muell.
- australis, Kunze, l. c. = *Cl. elynanthoides*, F. Muell.
- Beecheyi, Kuntze, l. c. = *Gahnia Beecheyi*, H. Mann.
- Cladium, Kuntze, l. c. = *Cl. germanicum*, Schrad.
- congestus, Kuntze, l. c. = *Gahnia globosa*, H. Mann.
- crassus, Kuntze, l. c. = *Cl. riparium*, Benth.
- decompositus, Kuntze, l. c. = *Gahnia Preissii*, Nees.
- deustus, Kuntze, l. c. = *G. deusta*, Benth.
- filifolius, Kuntze, l. c. = *Cl. filifolium*, Benth. & Hook. f.
- Filum, Kuntze, l. c. = *Gahnia trifida*, Labill.
- Gaudichaudii, Kuntze, l. c. = *G. Gaudichaudii*, Steud.
- globosus, Kuntze, l. c. = *G. globosa*, H. Mann.
- glomeratus, Kuntze, l. c. = *Cl. glomeratum*, R. Br.
- insularis, Kuntze, l. c. = *Cl. insulare*, Benth.
- iridifolius, Kuntze, l. c. = *Cl. iridifolium*, Baker.
- javanicus, Kuntze, l. c. = *Gahnia javanica*, Mor.
- juncus, Kuntze, l. c. = *Cl. juncum*, R. Br.
- laniger, Kuntze, l. c. = *Gahnia lanigera*, Benth.
- lavarum, Kuntze, l. c. = *Cl. iridifolium*, Baker.
- laxus, Kuntze, l. c. = *Cl. laxum*, Benth.
- leptostachys, Kuntze, l. c. = *Cl. germanicum*, Schrad.
- Mannii, Kuntze, l. c. = *Gahnia Mannii*, Hillebr.
- marianus, Kuntze, l. c. = *Cl. mariscoides*, F. Vill.
- mariscodes, Kuntze, l. c. = *Scleria triglomerata*, Michx.
- melanocarpus, Kuntze, l. c. = *Gahnia melanocarpa*, R. Br.
- Meyenii, Kuntze, l. c. (= *Baumea Meyenii*, Kunth). — Ins. Sandvic.
- microstachys, Kuntze, l. c. = *Gahnia microstachya*, Benth.
- mucronatus, Kuntze, l. c. = *G. globosa*, H. Mann.
- nudus, Kuntze, l. c. = *Cl. Gunnii*, Hook. f.
- polyphyllus, Kuntze, l. c. = *Gahnia polyphylla*, Benth.
- Preissii, Kuntze, l. c. = *G. Preissii*, Nees.
- procerus, Kuntze, l. c. = *G. procera*, Forst.
- psittacorum, Kuntze, l. c. = *G. psittacorum*, Labill.
- Radula, Kuntze, l. c. = *G. Radula*, Benth.
- restioides, Kuntze, l. c. (= *Schoenus restioides*, Sw.). — Ind. occ.
- riparius, Kuntze, l. c. = *Cl. riparium*, Benth.
- schoenodes, Kuntze, l. c. = *Gahnia schoenoides*, Forst.
- scirpodens, Kuntze, l. c. = *Cl. scirpoideum*, Benth. & Hook. f.
- setifolius, Kuntze, l. c. = *Gahnia setifolia*, Steud.
- teretifolius, Kuntze, l. c. = *Cl. teretifolium*, R. Br.
- tetragonocarpus, Kuntze, l. c. = *Gahnia tetragonocarpa*, Boeck.
- tetraquetrus, Kuntze, l. c. = *Cl. tetraquetrum*, Hook. f.
- trifidus, Kuntze, l. c. = *Gahnia trifida*, Labill.
- tristis, Kuntze, l. c. = *G. tristis*, Nees.
- vaginalis, Kuntze, l. c. = *Cl. vaginale*, Benth.
- Wichurae, Kuntze, l. c. = *Gahnia tristis*, Nees.
- xanthocarpus, Kuntze, l. c. = *G. xanthocarpa*, Hook. f.

MARKHAMIA, Seem. = **Dolichandrone**, Fenzl (Bignon.).

- infundibuliformis, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 242. — Afr. trop.
- lanata, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.
- lutea, K. Schum. l. c. = *D. luteum*, Seem.
- puberula, K. Schum. l. c. = *D. puberulum*, Klotzsch.
- sansibarica, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16 = *D. zanzibaricum*, Kl.
- stenocarpa, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 242 = *D. stenocarpum*, Seem.
- tomentosa, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34 et 49; et l. c. = *D. tomentosum*, Benth.
- zanzibarica, K. Schum. l. c. 242 = *sansibarica*, K. Schum.

MARLIEREA, Cambess. (Myrt.). — Ind. Kew ii. 170.

- antiscola, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 45. — Bras.
- brachymischa, Kiaersk. l. c. — Bras.
- cannifolia, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Eugeniopsis cannaefolia*, Berg). — Bras.
- choriophylla, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 47. — Bras.
- Clausseniana, Kiaersk. l. c. 51 (= *Eugeniopsis Clauseniana*, Berg). — Bras.
- edulis, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 77 (= *Rubachia glomerata*, Berg). — Bras.
- Gardneriana, Niedenzu, l. c. 76 (= *R. Gardneriana*, Berg). — Bras.
- Glazioviana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 48. — Bras.
- involuta, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 77 (= *Rubachia involuta*, Berg). — Bras.
- laevigata, Niedenzu, l. c. 76 (= *Eugeniopsis laevigata*, Berg). — Bras.
- laevigata, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 51 (= *Eugeniopsis laevigata*, Berg). — Bras.
- Neuwiediana, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 77 (= *Rubachia Neuwiediana*, Berg). — Bras.
- obumbrans, Niedenzu, l. c. 76 (= *R. obumbrans*, Berg). — Bras.
- ovata, Niedenzu, l. c. (= *Eugeniopsis ovata*, Berg). — Bras.
- racemosa, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 51 (= *Eugeniopsis cannaefolia*, Berg). — Bras.
- Richardiana, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1892) 76 (= *E. Richardiana*, Berg). — Bras.
- silvatica, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 51 (= *E. silvatica*, Berg). — Bras.
- Sintenisii, Kiaersk. in Bot. Tidskr. xvii. (1889) 252 t. 13a et fig. 2. — Ins. Puerto Rico.
- spiciflora, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 77 (= *Rubachia spiciflora*, Berg). — Bras.
- subacuminata, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 50. — Bras.
- Warmingiana, Kiaersk. l. c. 44. — Bras.

MARLIERIOPSIS, Kiaersk. in Bot. Tidskr. xvii. (1890) 281. **MYRTACEAE**. Eggersii, Kiaersk. l. c. 282 t. 11a et fig. 11 (= *Mitranthi Eggersii*, Niedenzu). — Ins. Domin.**MARLOTHIA**, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 39. **RHAMNEAE**. spartioides, Engl. l. c. — Afr. austr.**MARRUBIUM**, Tourn. ex Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 170. Aschersonii X, Magnier, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 253. — Eur. ballotaeforme, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 228. — Persia. Bornmuelleri, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 376. — As. Min.

MARRUBIUM: —

Sewerzowi, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 611 (= *Eremostachys Sewerzowi*, Herder). — As. centr.
virescens X, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 253. — Croatia.

MARSDENIA, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 171.

angolensis, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 258. — Angola.
Balansae, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 811. — N. Caled.
barbata, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 87. — Ind. or.
crinita, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1993. — Afr. trop. occ.
edulis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 60. — Mexic.
Pringlei, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 158. — Mexic.
profusa, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 258. — Reg. Nigrit.
racemosa, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 147. — Afr. trop.
Selerorum, Loesen. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 557. — Mexic.
sinensis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 113. — China.
speciosa, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 811. — N. Caled.
Taubertiana, K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 292. — Bras.
verrucosa, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 410. — N. Guin.
Vieillardii, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 812. — N. Caled.
zambesiaca, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 339. — Afr. trop. austro-or.

MARSHALLIA, Schreb. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 171.

trinervia, [Lesquereux ex] Branner, Trelease & Coville, in Branner, Rep. Geol. Surv. Ark. iv. 1888 (1891) 196 = *latifolia*, Pursh.
trinervis, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 337 = praec.

MARSIPIANTHES, Mart. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 172.

Chamaedrys, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 524 = *hypotoides*, Mart.
Chamaedrys, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 245 = praec.

MARTIA, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 459 = **VALETONIA**, Th. Dur. (Olacin.).

brasilienensis, Valetton, l. c. — Bras.

MARTIELLA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 168 = **LORANTHUS**, Linn.

Palmeri, Van Tiegh. l. c. = *L. Palmeri*, S. Wats.

MARTINELLA, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 30.

K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 216. **BIGNONIACEAE**.
Martinii, Baill. l. c. 31; et 216, in adn. (= *Bignonia Martinii*, DC.). — Am. centr. et austr.
Gollnerii, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 216. — Am. austr.

MARTIUSELLA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 64; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 296 = **CHRY-SOPHYLLUM**, Linn. (Sapot.).

bahiensis, Pierre, l. c. 66 = *Sapota bahiensis*, Mart. & Eichl.
gonocarpa, Pierre, l. c. = *S. gonocarpa*, Mart. & Eichl.
imperialis, Pierre, l. c. = *C. imperiale*, Benth. & Hook. f.

MARTYNIA, Houst. ex Linn. (Pedalin.). — Ind. Kew. ii. 172.

Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 66. — Calif. austr.

MARUMIA, Blanco (Melast.). — Ind. Kew. ii. 172.

hirsuta, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 553. — Borneo.
rhodocarpa, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. II. (1890) 532. nomen; et l. c. 550 (= *M. zeylanica*, Triana). — Java, Zeylan.
verrucosa, Cogn. in DC. l. c. vii. (1891) 549. — Malacca.
Warburgii, Cogn. ex Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 393; et l. c. 454 [non Melast. fide cl. Cogn. in DC. Monog. Phan. App. 1173]. — N. Guin.

MASCAGNIA, Bert. ex Colla = **HIRAEA**, Jacq. (Malpigh.).

divaricata, Niedenzu, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 55 = *H. divaricata*, H. B. & K.
lilacina, Niedenzu, l. c. 50 = *H. lilacina*, S. Wats.
paraguayensis, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 30 (1891) 1. — Parag.
prunifolia, Niedenzu, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 55 = *H. prunifolia*, H. B. & K.
polybotrya, Niedenzu, l. c. 55 = *H. polybotrya*, Juss.
Seleriana, Loesen, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 549. — Mexic.
septentrionalis, Niedenzu, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 55 = *H. septentrionalis*, Juss.

MASCARENHASIA, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 173.

Gerrardiana, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 504 [Mascarenhaizia]. — Madag.
Fischeri, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 318. — Afr. trop. or.
macrostemon, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 504. — Madag.
micrantha, S. Elliot, ex Baker, l. c. xxv. (1890) 335. — Madag.
rosea, Baker, l. c. — Madag.
speciosa, S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 32. — Madag.
utilis, Baker, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2390. — Madag.
variegata, Britten & Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 26. — Afr. trop.

MASDEVALLIA, Ruiz & Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 173.

acrochorodonia, Reicheb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 526. — Hab. ?
astuta, Reicheb. f. l. c. (1886) ii. 584. — Costa Rica.
biflora, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 306; et in Gartenfl. xl. (1891) 90. — Columb.
calopterocarpa, Reicheb. f. in Flora, lxix. (1886) 560. — N. Granat.
candida, Linden, in Lindenia, iv. (1888) 57 t. 171 = *tovarensis*, Reicheb. f.
Cassiope X, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 749. — Hybr. artef.
chloracra, Reicheb. f. in Flora, lxix. (1886) 560. — Hab. ?
costaricensis, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) ii. 183. — Costa Rica.
Courtauldiana X, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 200. — Hybr. artef.
Culex, Hort. l. c. (1888) i. 245, 361 et 488 = *Pleurothallis macroblepharis*, Reicheb. f.
demissa, Reicheb. f. l. c. (1887) ii. 9. — Costa Rica.
eclyptrata, Kraenzl. l. c. (1895) ii. 577. — Hab. ?
Ellisiana X, Hort. l. c. (1889) i. 809; et ii. 155. — Hybr. artef.
falcata X, O'Brien, l. c. (1891) i. 552; et ex Gartenfl. xl. (1891) 359. — Hybr. artef.
Forgetiana, Kraenzl. l. c. (1895) ii. 484. — Bras.
fulvescens, Rolfe, l. c. (1890) ii. 324 fig. 65. — N. Granat.
Geleniana X, Reicheb. f. l. c. (1887) ii. 586; et (1891) ii. 19. — Hybr. artef.
glaphyrantha X, Hort. ex Reicheb. f. l. c. (1886) ii. 648. — Hybr. artef.
guttulata, Rolfe, l. c. (1890) ii. 267; et (1895) ii. 324 = *M. Lawrencei*, Kraenzl.

MASDEVALLIA: —

haematosticta, Reicheb. f. in Flora, lxix. (1886) 559. — N. Granat.
Heathi, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 810. — Hab. ?
Henrietta X, Hort. l. c. (1893) i. 740. — Hybr. artef. heterotepala, Reicheb. f. in Flora, lxix. (1886) 561. — N. Granat.
Hincksiana, Reicheb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 214. — Hybr. artef.
Hubschii, Reicheb. f. in Lindenia, iv. (1888) 8, sphalm. = *Maxillaria Hubschii*, Reicheb. f.
Lawrencei, Kraenzl. in Gard. Chron. (1895) ii. 324. — Hab. ?
Lauchiana, Hort. Sander, ex Gartenfl. xli. (1892) 184. — Hab. ?
leontoglossa, Reicheb. f. l. c. xxxvi. (1887) 612 fig. 154. — Columb.
Lowii, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 416. — Columb.
macrochila, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 307; et in Gartenfl. xl. (1891) 170. — Columb.
Measuresiana X, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) ii. 379. — Hybr. artef.
meiracyllium, Reicheb. f. in Flora, lxix. (1886) 558. — N. Granat.
microglochis, Reicheb. f. l. c. — N. Granat.
mordax, Reicheb. f. l. c. 559. — N. Granat.
Mundyana X, Hort. ex Gard. Chron. (1891) ii. 19. — Hybr. artef.
nidifica, Reicheb. f. l. c. (1888) ii. 628. — Hab. ?
O'Brieniana, Rolfe, l. c. (1890) ii. 524; *Godefroy-Lebaef*, L'Orchidophile (1890) 353. — Hab. ?
pachyantha, Reicheb. f. in Flora, lxix. (1886) 561. — N. Granat.
platycrater, Reicheb. f. l. c. 559. — N. Granat.
platyrachis, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) ii. 178 = *Pleurothallis platyrachis*, Rolfe.
Pourbaissi X, Hort. ex Lindenia, ix. (1893) 9 t. 387. Hybr. artef.
Pulex, Hort. ex Reicheb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 488, sphalm. (= *M. Culex*, Hort.) = *Pleurothallis macroblepharis*, Reicheb. f.
punctata, Rolfe, l. c. (1888) ii. 323; Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7165 = *Scaphosepalum punctatum*, Rolfe.
pusilla, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 335. — Hab. ?
pusiola, Reicheb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 140. — Columb.
Rebecca X, Hort. l. c. (1893) i. 740. — Hybr. artef.
Rolfeana, Kraenzl. l. c. (1891) i. 488. — Hab. ?
sororcula, Reicheb. f. l. c. (1887) ii. 713. — Hab. ?
Stella X, Rolfe, l. c. (1890) ii. 325. — Hybr. artef.
striatella, Reicheb. f. l. c. (1886) ii. 103. — Hab. ?
strumifera, Reicheb. f. in Flora, lxix. (1886) 560. — N. Granat.
trinema, Reicheb. f. l. c. 558. — N. Granat.
Wendlandiana, Reicheb. f. l. c. (1887) i. 174. — N. Granat.
yauaperyensis, Barb. Rodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 121. — Bras.

MASSANGEA, Éd. Morr. = **CARAGUATA**, Lindl. (Bromel.).

Morreniana, Hort. Linden, ex Baker, in Journ. Bot. xxv. (1887) 172; et Handb. Bromel. (1889) 151 = *Schlumbergeria Morreniana*, Éd. Morr.
santoviensis, Hort. Linden, ex Baker, l. c. (1889) 149. — Bras.
vittata, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 146 = *Caraguata vittata*, Baker.

MASSIA, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 165. **GRAMINEAE**.

trisetia, Balansa, l. c. (= *Eriachne trisetia*, Nees). — Cochinch.

MASSONIA, Thunb. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 174.

laeta, Masson, ex Baker, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 336. — Afr. austr.
latebrosa, Masson, ex Baker, l. c. — Afr. austr.
parvifolia, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35 (1892) 8. — Afr. austr.
pedunculata, Baker, l. c. — Afr. austr.

MASTIXIA, Blume (Cornac.). — Ind. Kew. ii. 174.
cambodiana, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 17 (1892) t. 260b. — Cambod.

MATAYBA, Aubl. = **Ratonia**, DC. (Sapind.).
falcata, Th. Dur. ex Drake, Illustr. Fl. Ins. Maris Pacif. (1890) 143 = *Cupania falcata*, A. Gray.
stipitata, Th. Dur. ex Drake, l. c. 144; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 36. — Austral., Ins. Pacif.
stipitata, Th. Dur. ex Drake, l. c. = *Ratonia stipitata*, Benth.
Storckii, Th. Dur. l. c. = R. Storckii, Seem.

MATISIA, Humb. & Bonpl. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 175.
lasiocalyx, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 239. — Bras.
ochrocalyx, K. Schum. l. c. 238. — Bras.

MATRICARIA, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 176.
grandiflora, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 340 = *Chrysanthemum grandiflorum*, Hook.
matricarioides, Porter, ex Britton, l. c. 341 = *discoidea*, DC.
occidentalis, Pomel [ubi ?] ex O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1895) 277. — Quid ?
occidentalis, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 150; et *Man. Bot. San. Franc. Bay* (1894) 208. — Calif.
officinatum, Baill. Dict. Bot. iii. (1891) 667 = *Anacyclus officinarum*, Hayne.
pinnatifida, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 437. — Afr. austro-occ. extratrop.
Raddeana, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 122 t. 3 fig. 2. — Turkest.
spalhipappus, C. Winkl. l. c. x. (1887) 85. — Turkest.
zuurbergensis, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii (1892) t. 2230. — Afr. austr.

MATTHIOLA, R. Br. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 177.
abortiva ×, Hausskn. in Mitt. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. et iv. (1893) 105. — Graecia.
australis, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 193 [Matthiola] = *sinuata* R. Br.
Bolleana, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 88; et xiv. (1892) 231. — Ins. Canar.
circinnata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 935, sphalm. = *Malcomia circinnata*, Boiss.
exigua, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien. ii. (1886) 24. — As. occ.
hybrida ×, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. et iv. (1893) 104. — Graecia.
sabauda, Chod. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) p. cccii. — Gall.

MATTHIOLA, Plum. ex Linn. = **Guettarda**, Linn. (Rubiaceae).
Angelica, *argentea*, *Blanchetiana*, *bracteata*, *Burchelliana*, *calyptrata*, *comosa*, *conferta*, *cordata*, *crispiflora*, *dealbata*, *dependens*, *dichotoma*, *elliptica*, *grandiflora*, *Hoffmannseggii*, *longiflora*, *macrantha*, *macrocarpa*, *membranacea*, *mollis*, *ochreate*, *odorata*, *peidosa*, *paniculata*, *parviflora*, *parvifolia*, *platyphylla*, *platypoda*, *Pohlana*, *ramuliflora*, *reticulata*, *riabdocalyx*, *sericea*, *Spruceana*, *umbellata*, *undulata*, *uruguensis*, *viscosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 288 = *homonyma omnia* Guettardae.
armata, Kuntze, l. c. = *Chomelia filipes*, Benth.
aromatica, Kuntze, l. c. = *G. aromatica*, Poepp. & Endl.
frondosa, Kuntze, l. c. = *Guettarda frondosa*, Moritz.
myrtodes, Kuntze, l. c. = *G. myrtoides*, F. Muell.
putaminosa, Kuntze, l. c. = *G. putaminosa*, F. Muell.
speciosa, Kuntze, l. c. = *G. speciosa*, Linn.
tenuiflora, Kuntze, l. c. = *Antirrhoea tenuiflora*, F. Muell.
viburnodes, Kuntze, l. c. = *G. viburnoides*, Cham. & Schlecht.

MATTUSCHKAEAE, Schreb. = **Perama**, Aubl. (Rubiaceae).
glabra, Willd. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi (1888) 90, in syn. = *P. galioides*, Poir.

MAUCHIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 352 = **Bradburia**, Torr. & Gray (Compos.).
hirtella, Kuntze, l. c. = *B. hirtella*, Torr. & Gray.

MAULOUTCHIA, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Gesells. xiii. (1895) 83 = **Myristica**, Linn.
Chapelieri, Warb. l. c. = *M. Chapelieri*, Baill.

MAURANDIA, Orteg. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 178.
geniculata, Robinson & Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 120. — Mexic.

MAUROCENIA, Linn. = **Cassine**, Linn. (Celastr.).
arguta, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 149 = *Turpinia arguta*, Seem.
cochinchinensis, Kuntze, l. c. 150 = *Triceros cochinchinensis*, Lour.
heterophylla, Kuntze, l. c. = *Staphylea heterophylla*, Ruiz & Pav.
insignis, Kuntze, l. c. 149 = *Turpinia insignis*, Tul.
occidentalis, Kuntze, l. c. 150 = *T. occidentalis*, G. Don.
pinnata, Kuntze, l. c. = *T. pinnata*, Hemsl.
pomifera, Kuntze, l. c. 147, 149 = *T. pomifera*, DC.
Schinziana, Loesen, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 194. — Afr. austr.
simplicifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 149 = *Turpinia arguta*, Seem.
sphaerocarpa, Kuntze, l. c. 147, 150 = *T. sphaerocarpa*, Hassk.
Zollingeri, Kuntze, l. c. (= *Cassine Zollingeri*, Kuntze). — Java.

MAVAELIA, Trimen, Handb. Fr. Ceyl. iii. (1895) 419, in obs. = **Podostemon**, Mickx.
metzgerioides, Trimen, l. c. — Zeylan.

MAXILLARIA, Ruiz & Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 178.
Amesiana, Hort. ex Gard. Chron. (1891) i. 502. — Form. hort.
Endresii, Reichb. f. l. c. (1886) i. 680. — Costa Rica.
fucata, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 616. — Hab. ?
fuscata, « Reichb. f. » ex l. c. (1888) 576, sphalm. = *fucata*, Reichb. f.
glumacea, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 210. — Bras.
Huebschii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 136. — Hab. ?
Lindeniae, Cogn. in Journ. des Orchid. iv. (1894) 362; et in *Lindenia*, x. (1894) 671. 464. — Peruvia.
longisepala, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) ii. 94; et *Lindenia*, vi. (1890) 19 t. 248. — Venezuela.
monantha, Barb. Rodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 129. — Bras.
mirabilis, Cogn. in Journ. des Orchid. iv. (1894) 363; et in *Lindenia*, ix. (1893) 69 t. 417. — Am. trop.
molitor, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 242. — Hab. ?
Mooreana, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 36. — Guatem.
Muelleri, Regel, in Gartenfl. xxxix. (1890) 574; et in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 307. — Columb.
nervosa, Rolfe, ex Britton in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 264. — Bolivia.
parva, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 193. — Bras.
Sanderiana, Reichb. f. in Reichenbachiana, Ser. I. 1 (1887 ?), t. 25; The Garden (1887) ii. 60 t. 686; Ed. André, in Rev. Hortie. (1894) 526, cum ic. — Peruvia.
sanguinea, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 8. — Am. centr.
striata, Rolfe, in Orchid. Rev. i. (1893) 266; et in *Lindenia*, ix. (1893) 31 t. 398. — Hab. ?
xanthosia, Barb. Rods. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 130. — Bras. bor.

MAXILLARIA : —
yauaperyensis, Barb. Rodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 129. — Bras. bor.
yzabalana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xii. (1888) 286. — Guatem.

MAXIMILIANA, Mart. = **Cochlospermum**, Kunth (Bixin.).
angolensis, Fraseri, Gillivraei, Gossypium, Gregorii, heteroneura, nilotica, orinocensis, Parkeri, tinctoria, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *homonyma omnia* Cochlospermi.
Codinae, Kuntze, l. c. = *C. Cadinae*, Eichl.
hibiscoides, Kuntze, l. c. = *C. hibiscoides*, Kunth
hibiscoides, Millsp. Field Columb. Misc. Bot. Ser. I. (1895) 31. = praec.
longirostrata, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 909] Pl. nov. Jard. bot. Rio (1891) 112. — Bras. bor.
paucifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *C. parkeaeifolium*, Planch.
vitifolia, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 293 = *C. hibiscoides*, Kunth.

MAXIMOWASIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 34 = **Cryptospora**, Kar. & Kir. (Crucif.).
falcata, Kuntze, l. c. = *C. falcata*, Kar. & Kir.

MAXIMOWICZIA, Cogn. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 180.
Sonorae, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 51. — Mexic.

MAYEPEA, Aubl. = **Linociera**, Sw. (Oleac.).
arbores, *cambodiana*, *crassifolia*, *densiflora*, *elegans*, *insignis*, *intermedia*, *latifolia*, *laxiflora*, *leprocarpa*, *ligustrina*, *luzonica*, *malabarica*, *mandiocana*, *micrantha*, *minutiflora*, *montana*, *pauciflora*, *rostrata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 411-12 = *homonyma omnia* Linocierae.
acuminata, Kuntze, l. c. = *Linociera terniflora* Wall.
africana, Knobl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 529. — Angola.
axilliflora, Krug & Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 345 = *L. axilliflora*, Griseb.
bumelioides, Krug & Urban, l. c. = *L. bumelioides*, Griseb.
callophylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 411 = *Chionanthus callophylla*, Blume). — Malaya.
caribaea, Kuntze, l. c. 411 = *L. compacta*, R. Br.
cuspidata, Kuntze, l. c. (= *Chionanthus cuspidata*, Blume). — Ins. Celebes.
diversifolia, Kuntze, l. c. (= *C. diversifolia*, Miq.). Sumatra.
domingensis, Krug & Urban, in Bot. Jahrb. xv (1893) 44 = *Chionanthus domingensis*, Lam.
Dussii, Krug & Urban, l. c. 347. — Ins. Martinic.
elliptica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 411 (= *C. elliptica*, Blume). — Malaya.
Gilgiana, Volkens, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. Add. (1895) 424, nomen. — Afr. trop. or.
glomerata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 411 (= *C. glomerata*, Blume). — Sumatra.
linocierodes, Kuntze, l. c. 711 = *Linociera Wightii*, C. B. Clarke.
Mannii, Knobl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 529 = *L. Mannii*, Soland.
nilotica, Knobl. l. c. 528 = *L. nilotica*, Oliver.
odorata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 711 = *L. purpurea*, Vahl.
palembunica, Kuntze, l. c. = *L. pauciflora*, C. B. Clarke.
Pohlana, Kuntze, l. c. 411 = *L. glomerata*, Pohl.
spicata, Kuntze, l. c. (= *Chionanthus spicata*, Blume) — Malaya.
timorensis, Kuntze, l. c. (= *C. timorensis*, Blume). — Malaya.
verrucosa, Knobl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1892) 10; et in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 527 = *L. verrucosa*, Soland.
Welwitschii, Knobl. l. c. 580. — Angola.
zeylanica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 411 = *Linociera purpurea*, Vahl.

MAYNA, Aubl. = **Oncoba**, Forst. (Bixin.).

apeibaefolia, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1893) 19 = *O. apeibaefolia*, Karst. & Triana.
grandifolia, Warb. l. c. = *O. grandifolia*, Karst. & Triana.
pubescens, Warb. l. c. = *O. pubescens*, Karst. & Triana.
suaveolens, Warb. l. c. = *O. suaveolens*, Karst. & Triana.

MAYTENUS, Molina (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 181.

Eggersii, Loesen. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 39. — Ecuad.
 Jelskii, Zahlbr. in Diss. Cl. Math. Phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 222. — Peruvia.
 Glazioviana, Loesen. ex Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 9. — Bras.
 longifolia, Reiss. ex Loesen. l. c. 9. — Bras.
 Muellieri, Schwache, Addit. Fl. Bras. i. (1886) sub t. 1. — Bras.
 Radlkoferiana, Loesen. ex Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 7. — Bras.
 Sellowii, Loesen. ex Taub. l. c. 8. — Bras.
 Urbaniana, Loesen. ex Taub. l. c. 10. — Bras.

MAZUS, Lour. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 181.
gracilis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 181. — China.

japonicus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 462 = *rugosus*, Lour.
lamifolius, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 181. — China.
procumbens, Hemsl. l. c. 182. — China.
pulchellus, Hemsl. l. c. — China.

MEADIA, Catesby = **Dodecatheon**, Linn. (Primul.).

caroliniana, Clevelandii, crenata, Cusickii, Hendersonii, Jeffreii, patula, pauciflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 397 = *homonyma omnia* Dodecatheontis.

MECHOWIA, Schinz, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1a (1893) 110; et in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 186. **AMARANTACEAE**.
grandiflora, Schinz, ll. cc. — Angola.

MECONELLA, Nutt. = **Platystigma**, Benth. (Papav.).

denticulata, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 59. — Calif.

MECONOPSIS, Vig. (Papav.). — Ind. Kew. ii. 182.

bella, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiii. (1894) ii. 82. — Reg. Himal.
betonicifolia, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 42, t. 12. — Yunnan.
chelonifolia, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. v. (1891) 19. — China occ.
Henrici, Bureau & Franch. l. c. — China occ.
integrifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 289; et Pl. Delav. i. (1889) 41 (= *Cathcartia integrifolia*, Maxim.). — Yunnan.
punicea, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 34. — China.
racemosa, Maxim. l. c. 36. — China.

MECRANIUM, Hook. f. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 188.

obtusifolium, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 983. — Cuba.

MEDICA, Tourn. ex Linn. = **Medicago**, Tourn. (Legumin.).

apiculata, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 102 = *M. apiculata*, Willd.
arabica, Greene, Fl. Francisc. (1894) 102 = *M. arabica*, All.
denticulata, Greene, l. c. = *M. denticulata*, Willd.
legitima, « Clus. » Greene, l. c. 101 = *M. sativa*, Linn.
Lupulina, Lam. l. c. = *M. Lupulina*, Linn.

MEDICAGO, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 182.

MEDICAGO : —

caspia, Grunes ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 167 (= *M. caspica*, Jacq.) = *denticulata*, Willd.
cyclocarpa, Hy. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) ix. (1895) 431 = *media*, Pers.
elongata, Simonk. ex Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 4 = *minima*, Linn.
Loreti, Albert, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 13 = *denticulata*, Willd.
lilacea ×, Hy. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 432. — Gall.
mixta, Sennh. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 32; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 839. — Austria.
oligocarpa ×, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 150. — Gall. occ.
Reynieri, Albert, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893), Append. i. 14 = *lappacea*, Lam.
rhodopea, Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1892-93) 31. — Bulg.
rugulosa, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 239 = *littoralis*, Rhode.
Shepardii, Post. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 163; et in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 425. — Syria.
spuria ×, Hy. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 431. — Gall.
tornata, « Willd. » ex Ces., Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 723 = *muricata*, Willd.
Urbani, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 165, in syn. = *coronata*.

MEDINILLA, Gaudich. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 184.

amplexicaulis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 316. — Madag.
anomala, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1185. — N. Guin.
Balls-Headelyi, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. ii. (April 1887) 125; et in Bot. Centralbl. xxxii. (1887) 213. — Austral.
Beccariana, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 600. — Borneo.
cauliflora, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 135. — Ins. Salom.
Chapelieri, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 587. — Madag.
corallina, Cogn. l. c. 598. — Borneo.
decurrens, Cogn. l. c. 591. — Borneo.
divaricata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 478. — Madag.
elongata, Cogn. ex Elliot, l. c. xxix. (1891) 18; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1185. — Madag.
fasciculata, Cogn. in DC. l. c. 575. — N. Guin.
flagellata, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) sub t. 2411. — Borneo.
floribunda, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 699. — Sumatra.
Humboldtii, Cogn. l. c. 588. — Madag.
hyalantha, Naud. ex Cogn. l. c. 584. — Hab. ?
lasioclados, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 161. — Borneo
linearifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 478. — Madag.
longifolia, Cogn. in DC. Monog. Phan. (1891) 597. — N. Guin.
longipedunculata, Cogn. l. c. 577. — Borneo.
lorata, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2417. — Borneo.
Maidenii, F. Muell. in Wing South. Sci. Record, New Ser. II. (Jan. 1886); et ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 20; Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 580. — N. Guin.
montana, Cogn. in DC. l. c. vii. (1891) 592. — N. Guin.
Mortonii, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 211. — Ins. Salom.
Muelleri, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1195. — N. Guin.
nervosa, Cogn. l. c. 594. — Madag.
oblongifolia, Cogn. l. c. 589. — Madag.
pallida, Cogn. l. c. 577. — Sumatra.
quintuplinervis, Cogn. in Boerl. Handb. Fl. Ned. Indië. i. II. (1890) 534, nomen; in Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 393; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 574 et 1185. — N. Guin.
robusta, Cogn. in DC. l. c. 576. — Borneo.

MEDINILLA : —

rubiginosa, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 598. — N. Guin.
 • *sarcorrhiza*, Cogn. l. c. 587. (= *Dissochaeta sarcorrhiza*, Baill.). — Madag.
septuplinervis, Cogn. l. c. 576. — Sumatra.
serpens, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2411. — Borneo.
stephanostegia, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 160. — Borneo.
subcordata, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 589. — Ins. Nossibe.
tetragona, Cogn. l. c. 581. — Madag.
trinervis, Cogn. l. c. 596. — N. Guin.
urophylla, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 160. — Borneo.
Waterhousei, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 590. — Ins. Vite.

MEDINILLOPSIS, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 603. **MELASTOMACEAE**.
Beccariana, Cogn. l. c. — Borneo.
sessiliflora, Cogn. l. c. — Penins. Mal.

MEEHANIA, Britton, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club. iv. (1893) 147; et in Bull. Torrey Bot. Club. xxi. (1894) 32 t. 173 = **Cedronella**, Riv. (Labiata).
cordata, Britton, ll. cc. = *C. cordata*, Benth.

MEGACARPAEA, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 185.

Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 406. — China occ.

MEGAELINIUM, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 185.

Clarkei, Rolfe, in Kew Bull. (1891) 198. — Afr. trop. occ.
Imshooitium, Rolfe, l. c. (1895) 8. — Afr. trop. inaequale, Reichb. f. in Flora, lxix. (1886) 553, in syn. = *Bulbophyllum inaequale*, Reichb. f.
leucorhachis, Rolfe, in Kew Bull. (1891) 198. — Afr.
minutum, Rolfe, l. c. (1893) 5; Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7314. — Sierra Leone.
nummularia, Kraenzl. in Gard. Chron. (1894) i. 685. — Kamerun.
oxyodon, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 91. — Madag.
pusillum, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 362. — Afr. trop. or.
scaberulum, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) ii. 6. — Afr. austro-occ. extratrop.
triste, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 362. — Hab. ?
tentaculigerum, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 16 (= *Bulbophyllum tentaculigerum*, Reichb. f.). — Kamerun.

MEGADENIA, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 76. **CRUCIFERAE**.

pygmaea, Maxim. l. c. 77. — China.

MEGALOTHECA, *dianthiflora*, Welw. ex O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 184, in obs.; et in Bot. Jahrb. xv. (1893) 641 = *Erythrocephalum dianthiflorum*, O. Hoffm.

MEGAPHYLLAEA, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1708. **MELIACEAE**.
perakensis, Hemsl. l. c. — Perak.

MEGAPTERIUM, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).

canescens, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 235 = *Oe. canescens*, Torr.
Fremontii, Britton, l. c. 236 = *Oe. Fremontii*, S. Wats.

MEGARRHIZA, Torr. & Gray = **Echinocystis**, Torr. (Cucurbit.).

macrocarpa, Rattan, in Bull. Torrey Bot. Club. xiv. (1887) 158 = *E. macrocarpa*, Greene.

MELANODISCUS, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. (1888) 75, et in Sitz. math. phys. Cl. Akad. Wiss. Muench. xx. (1890) 285. *SAPINDACEAE*. africanus, Radlk. ll. cc. — Afr. trop. oblongus, Radlk. ex Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 250. — Afr. trop. or.

MELANORRHEA, Wall. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 190. *baccifera*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 308. sphalm. = *laccifera*, Pierre. Curtisi, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1513. — Penang.

MELANTHERA, Rohr. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 190. cinerea, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 434, nomen — Afr. trop. or. Marlothiana, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 277. — Afr. austro-occ. extratrop.

MELANTHIUM, Clayt. ex Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 190. *hyacinthoides*, Herb. Madr. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 348, in syn. = *Scilla indica*, Baker.

MELASMA, Berg (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 191. *asperillum*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 358 (= *Alectra asperillum*, Benth.). — Abyss. cordatum, Engl. l. c. (= *Glossostylis cordata*, Hochst.). — Afr. trop. indicum, Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 91 = *Alectra indica*, Benth. orobanchoides, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 359 (= *Alectra orobanchoides*, Benth.). — Afr. austr. pedicularioides, Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 91 (= *A. pedicularioides*, Baker). — Madag. spathaceum, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 279 [Oliver, ex im Thurn, in Timelri, v. (1886) 200]. — Guian. angl. Thomsoni, Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 91 (= *Alectra Thomsoni*, Hook. f.). — Ind. or.

MELASPHAERULA, Ker-Cawl. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 191. *ramosa*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 203 = *graminea*, Ker-Gawl.

MELASTOMA, Burm. ex Linn. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 191. Barbeyanum, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indie. i. II. (1890) 530, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 347. — Java. Beccarianum, Cogn. ll. cc. 530; et 356. — Borneo. bifaria, L. C. Rich. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1886) 192 = *Leandra solenifera*, Cogn. calyptratum, Sieb. [Fl. Martin. n. 108], ex Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 765. — Ins. Antill. Clarkeanum, Cogn. l. c. 346. — Tenass. crenata, Pavon, ex Cogn. in Mart. Pl. Bras. xiv. IV. (1886) 137 = *Leandra crenata*, Cogn. Francavilleum, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. II. (1890) 530, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 358. — Java. pauperula, L. C. Rich. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1886) 202 = *Leandra agrestis*, Raddi.

MELHANIA, Forsk. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 196. Engleriana, K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 393. — Reg. Somal. griquensis, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxii (1887) 172; K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 41. — Afr. austr. ovata, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 303. (= *Brotera ovata*, Cav.). — As. et Afr. trop. Rehmannii, [Rehmannii] Szyszyl. Polyp. Rehmann. (1887) 46. — Transvaal. transvaalensis, Szyszyl. l. c. — Transvaal.

MELIA, Linn. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 197. Volkensii, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 231. — Afr. trop. or.

MELIADELPHA, Radlk. in Sitz. math.-phys. Cl. Akad. Muench. xx. (1890) 331, in obs. *MELIA-CEAE*. conferta, Radlk. l. c. 332. — N. Caled. oceanica, Radlk. l. c. — Polyn.

MELICA, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 197. argentea, Beal, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 153 (= *Poa argentea*, Howell). — Oregon. Aschersonii, X, M. Schulze, in Mitt. Bot. Ver. Jena, vii. (1889) 38. — Germ. flavescens, Simenk. Enum. Fl. Transs. (1886) 577 = *ciliata*, Linn. inflata, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 269. — Calif. macrantha, Beal, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 153 = *Poa macrantha*, Vasey. mexicana, Link, ex Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 135 = *Buchloë dactyloides*, Engelm. parviflora, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 50; Vasey, Ill. N. Am. Grass. i. I. (1890) t. 50 = *M. Porteri*, Scribn. Smithii, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 294 (= *Avena Smithii*, Porter). — Michigan. Teneriffae, Hack. ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 153. — Teneriffa.

MELICOPE, Forst. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 198. Broadbentiana, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull. ii. (1891) 9. — Austral. Choorechillum, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellen-den-Ker (1889) 33. — Austral. parvula, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 255. — N. Zel. pubescens, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iii. (1891) 9. — Austral.

MELICYTUS, Forst. (Violar.). — Ind. Kew. ii. 199. microphyllus, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 260; xx. 1887 (1888) 189. — N. Zel.

MELIENTHA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1888) 762, et Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 264b; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 457. *OLACINEAE*. suavis, Pierre, ll. cc. — Cambodia.

MELILOTUS, Tourn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 199.

hirsuta, Lipski, in Mém. Soc. hist. nat. Kiev, xi. (1891) extr. 21; et in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 287. — Reg. Cauc. Petitpierreana, « Willd. » ex Ces. Pass. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 718 (= *M. Petitpierreana*, Willd.) = *officinalis*, Desr. Schoenheitianus, X, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, viii. (1890) 37. — Europ.

MELINIA, Decne. (Asclepiad.). — Ind. Kew. ii. 200. Eichleri, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 245 (= *Kerbera Eichleri*, Fourn.). — Mexic.

MELIOSCHINZIA, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 62; Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. II. (1890) 670. *MELIACEAE*. macrophylla, K. Schum. ll. cc. 62 et 671. — N. Guin.

MELIOSMA, Blume (Sabiace.). — Ind. Kew. ii. 200.

brasiliensis, Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Gesells. xiii. (1895) 216. — Bras. cuneifolia, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 211. — Tibet. dentata, Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Gesells. xiii. (1895) 212 (= *Lorenzanea dentata*, Liebm.). — Mexic. Fordii, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1886) 144. — China.

MELIOSMA : —

glabrata, Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) 212 (= *Lorenzanea glabrata*, Liebm.). — Costa Rica. Glaziowii, Urban, ex Warb. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 372, nomen. — Bras. grandifolium, Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) 212 (= *Lorenzanea grandifolia*, Liebm.). — Mexic. Herbertii, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 244; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2305. — Ind. occ. impressa, Krug & Urban, ex Warb. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 372, nomen. — Haiti. obtusifolia, Krug & Urban, ex Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Gesells. xiii. (1895) 216 (= *Atelandra obtusifolia*, Bolle). — Ins. Puerto Rico. Pardonii, Krug & Urban, l. c. 215. — Ins. Guadalup. patens, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1886) 145. — Ins. Hongkong. Schlimii, Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Gesells. xiii. (1895) 217 (= *Oligostemon Schlimii*, Turcz.). — N. Guin. Sellowii, Urban, l. c. 212. — Bras. sinuata, Urban, l. c. — Bras.

MELISSA, Tourn. ex Linn. (Labiace.). — Ind. Kew. ii. 200.

Baumgarteni, Simenk. in Termész. Fuzét. x. (1886) 182 = *Calamintha alpina*, Lam. bolnokensis, X, Simenk. Enum. Fl. Transsily. (1886) 445. — Transsily. hungarica, X, Simenk. in Termész. Fuzét. x. (1886) 182; et l. c. 444 = *Calamintha hungarica*, Nym. fahniana, X, Simenk. l. c. ix. (1885) 25. — Hung.

MELLERA, S. Moore (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 201.

nyassana, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 133. — Afr. trop. austro-or.

MELlichAMPIA, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 437. *ASCLEPIADEAE*. rubescens, A. Gray, l. c. — Mexic.

MELLOA, Bureau (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 201. *BIGNONIACEAE*. populifolia, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 188 = *populifolia*, Bureau.

MELOCACTUS [Tourn.] Link & Otto (Cact.). — Ind. Kew. ii. 201.

albispinus, Suringar, in Versl. en Medd. Akad. Wetensch. Amst. Ser. III. vi. (1889) 446. — Ins. Aruba. angusticostatus, Suringar, l. c. ii. (1886) 188 = *rectusculus*, Suringar var. approximatus, Suringar, l. c. 189. — Ins. Aruba. arcuatus, Suringar, l. c. vi. (1889) 450 (= *M. Non-villanus*, Suringar, olim.). — Ins. Aruba. argenteus, Suringar, l. c. 439. — Ins. Aruba. armatus, Suringar, l. c. 458. — Ins. Aruba. Baarscanus, Suringar, l. c. 448. — Ins. Aruba. capillaris, Suringar, l. c. 442. — Ins. Aruba. compactus, Suringar, l. c. 444. — Ins. Aruba. contortus, Suringar, l. c. 445. — Ins. Aruba. cornutus, Suringar, l. c. ii. (1886) 192. — Ins. Curaçao. dilatatus, Suringar, l. c. vi. (1889) 454. — Ins. Aruba. eburneus, Suringar, l. c. 447. — Ins. Aruba. elongatus, Suringar, l. c. 451. — Ins. Aruba. euryacanthus, Suringar, l. c. 447. — Ins. Aruba. extensus, Suringar, l. c. 442. — Ins. Aruba. Evertszianus, Suringar, l. c. ii. (1886) 190; et vi. (1889) 448. — Ins. Aruba. ferox, Suringar, l. c. 1885; et 446 = *ferus*, Suringar. ferus, Suringar, l. c. vi. (1889) 446 = *rubellus*, Suringar. flammeus, Suringar, l. c. 457. — Ins. Maruba. flavispinus, Suringar, l. c. 453. — Ins. Aruba. flexilis, Suringar, l. c. 453. — Ins. Aruba. flexus, Suringar, l. c. 441. — Ins. Aruba. hexacanthus, Suringar, l. c. ii. 1885 (1886) 185 = *rubellus*, Suringar, var.

MELOCACTUS : —

- humilis, *Suringar*, in *Versl. en Medd. Akad. Wetensch. Amst.* Ser. III. vi. (1889) 459. — Venezuela. incurvus, *Suringar*, l. c. 441. — Ins. Aruba. inflatus, *Suringar*, l. c. 454. — Ins. Aruba. intermedius, *Suringar*, l. c. ii. 1885 (1886) 192. — Ins. Curaçao. Koolwijckianus, *Suringar*, l. c. 184; et vi. (1889) 438. — Ins. Aruba. lasyacanthus, *Hort. ex Sprenger, in Gartenfl.* xli. (1892) 248, nomen. — [Quid?] leucacanthus, *Suringar*, in *Versl. en Medd. Akad. Wetensch. Amst.* Ser. III. vi. (1889) 454 = dilatatus *Suringar*, var. ? limis, *Suringar*, l. c. 440. — Ins. Aruba. macracanthus, *Salm-Dijck, ex Foerst-Ruempl. Handb. Cactench.* (1885 ?) 442. — Ins. Antill. martialis, *Suringar*, in *Versl. en Medd. Akad. Wetensch. Amst.* Ser. iii. vi. (1889) 443. — Ins. Aruba. nanus, *Suringar*, l. c. 441. — Ins. Aruba. obliquus, *Suringar*, l. c. 440. — Ins. Aruba. obovatus, *Suringar*, l. c. 453. — Ins. Aruba. ovatus, *Suringar*, l. c. 456. — Ins. Aruba. parvispinus, *Suringar*, l. c. ii. (1886) 185. — Ins. Bonaire. patens, *Suringar*, l. c. Ser. III. ii. 1885 (1886) 190. — Ins. Bonaire. pentacanthus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 445. — Ins. Aruba. pulvinosus, *Suringar*, l. c. 458. — Ins. Aruba. pusillus, *Suringar*, l. c. ii. 1885 (1886) 192. — Ins. Curaçao. radiatus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 446. — Ins. Aruba. rectiusculus, *Suringar*, l. c. (1889) 187. — Ins. Aruba. reticulatus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 453. — Ins. Aruba. reversus, *Suringar*, l. c. ii. 1885 (1886) 187. — Ins. Aruba. roseus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 439. — Ins. Aruba. rubellus, *Suringar*, l. c. ii. (1886) 184; et vi. (1889) 448. — Ins. Aruba. rudis, *Suringar*, l. c. 442. — Ins. Aruba. sordidus, *Suringar*, l. c. 451. — Ins. Aruba. spatanginus, *Suringar*, l. c. ii. 1885 (1886) 193. — Ins. Curaçao. stellatus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 452. — Ins. Aruba. stramineus, *Suringar*, l. c. ii. (1886) 185; et vi. 448. — Ins. Aruba. trachycephalus, *Suringar*, l. c. 455. — Ins. Aruba. trichacanthus, *Suringar*, l. c. ii. (1886) 186. — Ins. Aruba. trigonus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 456. — Ins. Aruba. uncinatus, *Suringar*, l. c. 450. — Ins. Aruba.

MELOCHIA, Dill. ex Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 202.

- Benthani, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 40. — Bras., Guian. betsiensis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 451. — Madag. bracteosa, F. Hoffm. *Beitrag. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 13. — Afr. trop. carthaginensis, Willd. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 40 = M. Benthani, K. Schum. cephalodes, K. Schum. l. c. 45. — Bras. decandra, « Willd. » ex K. Schum. l. c. 31 = illioides, K. Schum. illicioides, K. Schum. l. c. — Bras. littoralis, K. Schum. l. c. 44 (= *Riedleia littoralis*, Poepp. & Endl.). — Bras. Morongii, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 62. — Parag. paniculata, « Willd. » ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 37 = venosa, Sw. sorocadensis, K. Schum. l. c. 42. — Bras. speciosa, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 42. — Mexic. stricta, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 42. — Bras. subcordata, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 62. — Parag.

MELODINUS, Forst. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 202.

- aeneus, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 786. — N. Caled. Balansae, Baill. l. c. 785. — N. Caled. buxifolius, Baill. l. c. 787. — N. Caled. celastroides, Baill. l. c. — N. Caled. coriaceus, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvii. (1888) t. 1758. — Penang. inaequilatus, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 786. — N. Caled. Murpe, F. M. Bailey, in *Dep. Agric. Brisbane, Bot. Bull.* x. (1895) 23. — Austral. polyadenus, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 786. — N. Caled.

MELODORUM, Hook. f. & Thoms. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 202.

- kinabaluense, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 130. — Borneo. litseaefolium, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 103. — Perak. micranthum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 190. — N. Guin. Oldhami, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 27. — Ins. Formosa.

MELOSPERMUM rubro-stamineum, Seortech. ex King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1895) ii. 83, in syn. = *Walsura multijuga*, King.**MELOTHRIA**, Linn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. ii. 203.

- acutifolia, Cogn. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 419. — Transvaal. angustifolia, Cogn. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 207. — Afr. centr. or. Donnell-Smithii, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xxi. (1891) 9. — Guatem. Elliotiana, Cogn. ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 19. — Madag. heterophylla, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 243; Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië* i. ii. (1890) 596 (= *Zehneria heterophylla*, Thw.). — As. trop. et subtrop. Marlothii, Cogn. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 152; et in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 270. — Afr. austro-occ. extratrop. membranifolia, Cogn. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 420. — Natal. papuana, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 355. — N. Guin. parvifolia, Cogn. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 420. — Natal. polycarpa, Cogn. ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 20. — Madag. subpellucida, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 356. — Austral.

MEMECYLON, Linn. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 204.

- australe, C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales*, 208 = *Eugeniae* sp. Bakerianum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1154. — Madag. Beccarianum, Cogn. l. c. — Borneo. Bernierii, Cogn. l. c. 1156. — Madag. Candolleum, Cogn. l. c. 1144. — Ins. Andam. cardiophyllum, Cogn. l. c. 1171. — Madag. Clarkeum, Cogn. l. c. 1141. — Zeylan. confertiflorum, Cogn. l. c. 1151. — Borneo. dioicum, Cogn. in Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië* i. ii. (1888) 538, nomen; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1172 (= *Lijndenia dioica*, Naud.). — Java. discolor, Cogn. l. c. 1149. — Ind. or. durum, Cogn. l. c. 2152. — Borneo. Englerianum, Cogn. l. c. 1195. — Kamerun. Helferii, Cogn. l. c. 1166. — Tenass. vel Andam. lanceolatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 247 (= *Lijndenia laurina*, Zoll. & Mor.). — Java. longifolium, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1150. — N. Guin. malabaricum, Cogn. l. c. 1148. — Ind. or. molestum, Cogn. l. c. 1169. — Ind. or.

MEMECYLON : —

- nigrescens, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 338. — Kamerun. nitidulum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1132. — Guinea. oblongifolium, Cogn. l. c. 1168. — Madag. pergamentaceum, Cogn. l. c. 1151. — Borneo. pulchrum, Cogn. l. c. 1141. — Borneo. pusilliflorum, Cogn. l. c. 1164. — Ins. Celeb. rotundatum, Cogn. l. c. — Zeylan. strychnoides, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 105. — Afr. trop. occ. subcordatum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1164. — Ind. or. tetrapterum, Cogn. ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 18; et in *DC. l. c.* 1194. — Madag. Thwaitesii, Cogn. l. c. 1134. — Borneo. urceolatum, Cogn. l. c. 1156 (= *M. umbellatum*, Thw.). — Zeylan. violaceum, Cogn. l. c. 1152. — Borneo. zanzibaricum, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 296. — Afr. trop. or.

MEMORA, Miers = **Adenocalymma**, Mart. (Bignon.).

- allamandiflora, Bureau, ex K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 225 = *Bignonia allamandaeflora*, Benth. axillaris, K. Schum. l. c. — Bras. bracteosa, Bureau, ex K. Schum. l. c. 226 = *Adenocalymma bracteata*, DC. cavacasana, K. Schum. l. c. 225. — Venezuela. fulgens, Bureau, ex K. Schum. l. c. 225. — Am. austral. glaberrima, K. Schum. l. c. = *Bignoniaglaberrima*, Cham. pubescens, K. Schum. l. c. 226 = *B. fallax*, Cham. valida, K. Schum. l. c. 225. — Bras.

MENABEA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 825. **ASCLEPIADEAE**. venenata, Baill. l. c. — Madag.**MENDONCIA**, Vell. ex Vand. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 205.

- Lindavii, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 241. — Bolivia. Schwackeana, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 361. — Bras.

MENTHA, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 207.

- acimifolia, Borb. ex H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xl. (1898) 430 = *verticillata* ×, Linn. agraria, H. Braun, l. c. 470 = *arvensis*, Linn. *Albae-Caroliniae*, H. Braun, l. c. 445 = *arvensis*, Linn. albarracinensis, Pau, *Not. Bot.-Fl. Espan.* i. (1887) 14. — Hisp. albida, Desegl. & Th. Dur. ex Briq. *Lab. Alp. Marit.* i. (1891) 49. in syn. = *sylvestris*, Linn. albida, Willd. ex H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 218, in obs.; et xl. (1890) 395 = *sylvestris*, Linn. alpigena, Kern. ex H. Braun, l. c. 399 = *sylvestris*, Linn. ambigua, Wolocz. in *Spraw. Kom. fizyj. Krajow.* xxii. (1888) ii. 207. — Eur. Amblardii ×, Debeaux, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 154. — Gallia. amplissima, Strail. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxvi. (1887) 133 = *verticillata* ×, Linn. Andersoniana, H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xl. (1890) 484 = *dalmatica* ×, Tausch. angustata, Opiz, ex H. Braun, l. c. 422 = *aquatica*, Linn. angustifolia ×, Corbière, *Nouv. Fl. Norm.* (1893) 469. — Gall. occ. approximata, Strail. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxvi. (1887) 145 = *arvensis*, Linn. approximata, H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xl. (1890) 452 [an praec. ?] = *arvensis*, Linn. arduennensis, Callay, in *Bull. Soc. Dauph.* xvi. (1889) 636. — Gall. argutissima, Borb. ex H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, (1886) 228 = *dalmatica* ×, Tausch.

MENTHA: —

- aurgensis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 371 = *villosa* ×, Huds.
Austiana, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 442 = *verticillata* ×, Linn.
Baguetiana, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 151 = *arvensis*, Linn.
baldensis, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 384 = *sylvestris*, Linn.
balsamiflora, H. Braun, in Verh. naturf. Ver. Brunn, xxvi. (1888) : et l. c. xxxix. (1889) 43; et xl. (1890) 394 = *sylvestris*, Linn.
banatica, H. Braun, l. c. xl. (1890) 403 = *piperita*, Linn.
Bauhini, « Ten. » ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 74 = *rotundifolia*, Linn.
Bechevi, H. Braun, in Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 482 = *gentilis*, Linn.
belgradensis, H. Braun, l. c. 443 = *verticillata* ×, Linn.
bihariensis, Borb. in Simonk. Enum. Fl. Transsylv. (1887) 437; et H. Braun, Geogr. atq. enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 212; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wiss. Wien, xl. (1890) 487 = *dalmatica* ×, Tausch.
bolzanensis, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 375 = *villosa* ×, Huds.
Borbassiana ×, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 53 = *dalmatica* ×, Tausch.
Borbassiana, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 376, in syn. = *arvensis*, Linn.
Bornmülleri, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 381 = *sylvestris*, Linn.
brachystachya, Borb. [Arb. Ungar. Naturf. und Aerzte, xx. (1880) 312] ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 410 = *dumetorum* ×, Schult.
bracteosa, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 114 = *verticillata* ×, Linn.
Braunii, Oborny, Fl. Mahren, i. (1884) 378; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 984 = *dumetorum* ×, Schult.
brevicomosa, Topitz, ex H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 171 = *verticillata* ×, Linn.
brevidentata, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 127 = *verticillata* ×, Linn.
brevifrons, Borbas, ex Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 91 = *sylvestris*, Linn.
brevispicata, Opiz, ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 80 = *sylvestris*, Linn.
Bruttelei, Malinv. ex Strail, l. c. 129 = *verticillata* ×, Linn.
bulsanensis, H. Braun, ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. (1891) 164, sphalm. = *bolsanensis*, H. Braun.
calaminthifolia, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 425 [an praec.?] = *aquatica*, Linn.
calaminthaeifolia, Dorfler, in Sched. ad cent. xxxi. Herb. norm. (1894) 22 = *aquatica*, Linn.
calaminthaeifolia, « Host. » ex H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 422 = *calaminthoides*, H. Braun.
calaminthaeiformis, Borb. ex Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 55 = *dalmatica* ×, Tausch.
calaminthoides, H. Braun, in Verh. naturf. Ver. Brunn, xxvi. (1887) 119; et ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 430 = *verticillata* ×, Linn.
calvescens, H. Braun, l. c. 480 = *gentilis*, Linn.
campicola, H. Braun, l. c. 456 = *arvensis*, Linn.
cardiophyllos, Borb. ex H. Braun, l. c. 368 = *sylvestris*, Linn.
Carnuntiae ×, H. Braun, l. c. 406; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 985 = *dumetorum* ×, Schult.
Cephaloniae, H. Braun, l. c. 493 = *M. Pulegium*, Linn.
Chaixii, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1897) 98 = *aquatica*, Linn.
Chrysi, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 481 = *dalmatica* ×, Tausch.
cinerascens, H. Braun, l. c. 384 = *dalmatica* ×, Tausch.

MENTHA: —

- clinopodiifolia*, Hort, ex H. Braun, in Verh. Naturf. Ver. Brunn, xxvi. (1887) 121; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 434 = *verticillata* ×, Linn.
caerulescens, Opiz, ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xvi. (1887) 79 = *sylvestris*, Linn.
consimilis, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 264 = *M. Cunninghamii*, Benth.
crenatifolia, « Opiz. » ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 123 = *verticillata* ×, Linn.
crenato-dentata, Strail, l. c. 102 = *aquatica*, Linn.
cretica, Portenschl. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 390 = *sylvestris*, Linn.
cyprica, H. Braun, l. c. xxxix. (1889) 217 = *sylvestris*, Linn.
danubialis, Borb. & H. Braun, l. c. xl. (1890) 382 = *sylvestris*, Linn.
densifoliata, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 150 = *arvensis*, Linn.
denticulata, Strail, l. c. 104 = *aquatica*, Linn.
distans, H. Braun, ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brunn, xxvi. (1887) 205; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 465 = *arvensis*, Linn.
dunensis, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 102 = *aquatica*, Linn.
Durandiana, Strail, l. c. 124 = *verticillata* ×, Linn.
Durandoana, Malinv. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 669; Briq. Lab. Alp. Marit. i. (1891) 72 = *piperita*, Linn.
elongata, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 424 = *aquatica*, Linn.
Eschfelleri, H. Braun, l. c. 439 = *verticillata* ×, Linn.
exaltata, H. Braun, l. c. (1890) 417 = *piperita*, Linn.
Fenzliana, H. Braun, l. c. 484 = *dalmatica* ×, Tausch.
flagellifera, Borb. ex H. Braun, l. c. 409 = *dumetorum* ×, Schult.
flanatica, Borb. ex H. Braun, l. c. 382 = *sylvestris*, Linn.
flexuosa, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 148 = *arvensis*, Linn.
florida, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 441 = *arvensis*, Linn.
fossicola, H. Braun, l. c. 457 = *arvensis*, Linn.
foliicoma, Opiz, ex H. Braun, l. c. (1886) 228 = *arvensis*, Linn.
Frivaldskjana, Borb. in Termész. Fuzét. xiii. (1890) 78 = *dalmatica* ×, Tausch.
frondosa, Borb. (1879) ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 489 = *dalmatica* ×, Tausch.
gentiliformis, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 144 = *arvensis*, Linn.
Gintlina, « Opiz. » ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 459 [err. cal.] = *Ginsliana*, Opiz.
gnaphaliflora, Borb. & H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 376 = *arvensis*, Linn.
graciliscens, Opiz, ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 154 = *arvensis*, Linn.
grandidentata, Strail, l. c. 96 = *aquatica*, Linn.
grazensis, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 435 = *verticillata* ×, Linn.
grisella, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 93 = *sylvestris*, Linn.
Hagenbachiana, H. Braun, & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 170 = *dumetorum* ×, Schult.
haplocalyx, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) = *canadensis*, Linn.
hardeggensis, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 266 =
Haynaldiana, Borb. l. c. xli. (1891) 60 = *dalmatica* ×, Tausch.
heliogeton, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 479 = *gentilis*, Linn.
Heleonastes, H. Braun, l. c. 415 = *verticillata* ×, Linn.
Henrici, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 147, nomen. — Hung.

MENTHA: —

- Heuffelii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 404 = *dumetorum* ×, Schult.
hirtescens, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 148 = *piperita*, Linn.
hirtiflora, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 492 = *M. Pulegium*, Linn.
Hollosyana, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 146 = *sylvestris*, Linn.
hortivaga, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 146 = *villosa* ×, Huds.
Hudsoniana, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 402 = *piperita*, Linn.
humillima, H. Braun, l. c. 492 = *M. Pulegium*, Linn.
hungarica, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 318 = *dumetorum* ×, Schult.
hydrophila, Borb. l. c. 147, nomen. — Hung.
Hystrix, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 426 = *aquatica*, Linn.
illyrica, Borb. & H. Braun, l. c. 390 = *sylvestris*, Linn.
incanescens, H. Braun, l. c. 377 = *villosa* ×, Huds.
inciso-serrata, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 101 et 168 = *aquatica*, Linn.
interrupta, Opiz, ex Strail, l. c. 112 = *verticillata* ×, Linn.
iráziana, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 485 = *dalmatica* ×, Tausch.
inundata, Opiz, ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 115 = *verticillata* ×, Linn.
isophylla, Borb. ex Pacher. Nachtr. zur Fl. Karnt. (1894) 103. — Form. hort.
Jahniana, H. Braun & Topitz, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 323, nomen. — Austria.
jenensis, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 170 = *dumetorum* ×, Schult.
jurana, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 400 = *sylvestris*, Linn.
Jurányiana, Borb. in Anal. [Munkalatai] medic. et nat. scrut. Hung. xxv. (1890) 142; et in Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 52 = *dalmatica* ×, Tausch.
Kitaibeliana, H. Braun, ex Haring, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 510; et xl. (1890) 448 = *arvensis*, Linn.
Kmetiana, H. Braun, l. c. xl. 473 = *gentilis*, Linn.
Kotschyana, H. Braun, l. c. xxxix. (1889) 218 = *sylvestris*, Linn.
krapinensis, H. Braun, l. c. xl. (1890) 484 = *dalmatica* ×, Tausch.
krassoensis, H. Braun, l. c. 393 = *sylvestris*, Linn.
Krockeri, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 74 = *rotundifolia*, Linn.
Kuncii, Borb. Geogr. atq. enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 210 = *sylvestris*, Linn.
lacerata, « Opiz », ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 87 = *viridis*, Linn.
Langiana, Topitz, ex H. Braun, & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 148 = *viridis*, Linn.
late-ovata, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 101 = *aquatica*, Linn.
latifrons, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1890) 378 = *villosa* ×, Huds.
latissima, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. vxvi. (1887) 133 = *verticillata* ×, Linn.
leioneura, Oborny, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 186 = *sylvestris*, Linn.
leiotricha, Borb. l. c. xli. (1891) 147, nomen. — Hung.
leucantha, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 381 = *sylvestris*, Linn.
leucotricha, Borb. ex H. Braun, l. c. 408 = *dumetorum* ×, Schult.
levipes, Borb. Geogr. atq. enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 212 = *dalmatica* ×, Tausch.
Libertiana, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 119 = *verticillata* ×, Linn.
ligustrina, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 381 = *sylvestris*, Linn.
limicola, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 105 = *aquatica*, Linn.

MENTHA : —

- limnogenae*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 411 = *dumetorum* ×, Schult.
limnogeton, H. Braun, ex H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 170 = *dumetorum* ×, Schult.
limnophila, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 406 = *dumetorum* ×, Schult.
limosa, H. Braun, l. c. 425 = *aquatica*, Linn.
lithvanica, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 146 = *villosa* ×, Huds.
littoralis, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 104; et ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 424 = *aquatica*, Linn.
Lobelianae, H. Braun, l. c. 415 = *aquatica*, Linn.
longibracteata, H. Braun, l. c. 444 = *arvensis*, Linn.
lugosensis, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 411 = *dumetorum* ×, Schult.
macrandria, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 483 = *dalmatica* ×, Tausch.
macrocephala, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 103 = *aquatica*, Linn.
macrostemma, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 397 = *dalmatica* ×, Tausch.
Malinevaldi, Agasse, ex Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 78 = *viridis*, Linn.
Malinevaldi ×, G. Camus, in Bull. Herb. Boiss. i. Append. i. (1893) 191 [an praec. ?] = *carinthiaca* ×, Host.
Malvi, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1890) 370 = *villosa* ×, Huds.
marchica, H. Braun, l. c. 405 = *dumetorum* ×, Schult.
marisensis, Simonk. in Termész. Füzet. ix. (1885) 24 = *sylvestris*, Linn.
melliflens, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 147 = *sylvestris*, Linn.
microcephala, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 106 et 168 = *aquatica*, Linn.
microphylla, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 492 = *M. Pulegium*, Linn.
minoriflora, Borb. ex H. Braun, l. c. 421 = *aquatica*, Linn.
minutiflora, Borb. in Bot. Centralbl. xxv. (1886) 239; et in Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 55 = *sylvestris*, Linn.
mosoniensis ×, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 373; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 982 = *villosa* ×, Huds.
Morii, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1894) 169 = *dumetorum* ×, Schult.
nederheimensis, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 95 = *aquatica*, Linn.
Neilreichiana, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 393 = *sylvestris*, Linn.
nemophila, H. Braun, l. c. 404 = *dumetorum* ×, Schult.
nemorivaga, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 169 = *dumetorum* ×, Schult.
Nicholsoniana, Strail, in Bot. exch. Club. Brit. Isl. Rep. for (1890) 307 = *sylvestris*, Linn.
norica, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 398 = *sylvestris*, Linn.
nudiceps, Borb. in Termész. Füzet. xiii. (1890) 79; H. Braun, l. c. 414; et in Kern.Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 50 = *verticillata* ×, Linn.
oblongifrons, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 447 et 451 = *verticillata* ×, Linn.
oblongifolia, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 75 et 168 = *rotundifolia*, Linn.
obtusacrenatoserrata, Strail, l. c. 131 = *verticillata* ×, Linn.
orbiculata, Strail, l. c. 130 = *verticillata* ×, Linn.
pachystachya, Timb. & Marçais, in Bull. Soc. sci. phys. et nat. Toul. vii. (1888) = *rotundifolia*, Linn.
pallascens, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 391 = *sylvestris*, Linn.
Pancicii, H. Braun, l. c. 489 = *dalmatica* ×, Tausch.

MENTHA : —

- pannonica*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 425 = *dumetorum* ×, Schult.
panormitana, H. Braun, l. c. 397 = *sylvestris*, Linn.
parietariaefolia, « Beck. » ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 141; K. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvi. (1886) 226 = *arvensis*, Linn.
pauciflora ×, Figert, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 11 = *gentilis*, Linn.
Peisonis, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 406 = *dumetorum* ×, Schult.
peracuta, Borb. Geogr. atq. enum. pl. Com. Castref. (1887) 212; et ex H. Braun, l. c. 486 = *dalmatica* ×, Tausch.
perdentata, H. Braun, l. c. 472 = *gentilis*, Linn.
pergracilis, H. Braun, l. c. 473 = *gentilis*, Linn.
petiolata, Wirtgen, ex H. Braun, l. c. 311 = *sylvestris*, Linn.
phyllostachya, Borb. ex H. Braun, l. c. 488 = *dalmatica* ×, Tausch.
Piersiana, Borb. in Oest.-Bot. Zeitschr. xl. (1890) 244 = *arvensis*, Linn.
Pireana, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 105 = *aquatica*, Linn.
posoniensis, H. Braun, ex H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 146 = *villosa* ×, Huds.
Pseudopiperita, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 420 = *aquatica*, Linn.
Pseudostachya, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 113 = *verticillata* ×, Linn.
pulegiiformis, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 466 = *arvensis*, Linn.
pulverulenta, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 78 = *villosa* ×, Huds.
pycnotracha, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 486 = *dalmatica* ×, Tausch.
pyrenaica, H. Braun, l. c. 491 = *carinthiaca* ×, Host.
pyrifolia, H. Braun, l. c. 420 = *aquatica*, Linn.
pyrifolia, A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 50 = *aquatica*, Linn.
quadica, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 206 = *carinthiaca* ×, Host.
ramosissima, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 491 = *carinthiaca* ×, Host.
ramosissima, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 97 = *aquatica*, Linn.
recedens, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 453 = *arvensis*, Linn.
Reissekii, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 112, nomen. et 204 = *carinthiaca* ×, Host.
retinervis, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 382 = *sylvestris*, Linn.
Reverchonii ×, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 67. — Creta.
rhenana, Topitz, ex H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 146 = *villosa* ×, Huds.
rhomboides, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 118 = *verticillata* ×, Linn.
Richterii, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1890) 385 = *sylvestris*, Linn.
rigida, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 157 = *arvensis*, Linn.
Rigoi, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 366 = *villosa* ×, Huds.
Rocheliana, Borb. & H. Braun, l. c. 384 = *sylvestris*, Linn.
rubescens, Topitz & H. Braun, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 171 = *verticillata* ×, Linn.
rubicunda, H. Braun & Topitz, l. c. 147 = *viridis*, Linn.
sciaphila, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 432 = *verticillata* ×, Linn.
sepincola, Holuby, Pfl. Temesiner Comit. (1888) 74 = *laciniosa*, Schur.
seriata, A. Kern, ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 386 = *sylvestris*, Linn.
silvicola, H. Braun, l. c. 459 = *arvensis*, Linn.
similata, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 116 = *verticillata* ×, Linn.

MENTHA : —

- Soleana*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 100 = *aquatica*, Linn.
sparsiflora, H. Braun, in Verh. naturf. Ver. Brunn. (1887) 203; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 449 = *arvensis*, Linn.
speciosa, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 71 = *sylvestris*, Linn.
sphaerostachya, Haussm. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 407 = *sylvestris*, Linn.
sphakophylla, H. Braun, ex H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 170 = *dumetorum* ×, Schult.
Steffekiana, Borb. & Waisb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 110 = *gentilis*, Linn.
stenantha, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 385 = *sylvestris*, Linn.
stenostachya, A. Richt. in Termész. Füzet. xii. (1889) 186 t. 7 = *sylvestris*, Linn.
stenotracha, Borb. l. c. ix. (1883) 34; H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 393 = *sylvestris*, Linn.
suaviflora, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 318; et ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. (1891) 156 = seq.
suavifolia, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 486 = *dalmatica* ×, Tausch.
suavis ×, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 37; et ii. (1889) 14; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 326. — Hisp.
subarvensis ×, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 438 = *dalmatica* ×, Tausch.
subgentilis, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 472 = *gentilis*, Linn.
subincana, H. Braun, l. c. 367 = *sylvestris*, Linn.
sublanata, H. Braun, l. c. 451 = *arvensis*, Linn.
submollis, H. Braun, l. c. 466 = *carinthiaca* ×, Host.
subreversa, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 438 = *dalmatica* ×, Tausch.
subrotunda, Schur, ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 470 = *arvensis*, Linn.
subsessilis, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 20, nomen; et Geogr. atq. enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 210 = *sylvestris*, Linn.
subtomentella, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 492 = *M. Pulegium*, Linn.
subtomentosa, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 159 = *carinthiaca* ×, Host.
subundulata, Borb. [in Természettud. Közöny (1891) 500] ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 413 = *gentilis*, Linn.
subviridis, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 388 = *sylvestris*, Linn.
syrmienis, Borb. ex H. Braun, l. c. 383 = *sylvestris*, Linn.
Szenezzyana, Borb. Geogr. atq. enum. pl. Corn. Castrif. (1887) 211; et ex H. Braun, l. c. 368 = *sylvestris*, Linn.
Szilyana, Borb. in Magy. orv. termd. munk. xxv. (1891) 492 ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 182 = *sylvestris*, Linn.
Tauschii, H. Braun, in Holuby, Pfl. Trenesiner Comit. (1888) 74 = *laciniosa*, Schur.
tenuicaulis, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 150 = *arvensis*, Linn.
thayana, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 444 = *arvensis*, Linn.
triemarginata, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 159 = *carinthiaca* ×, Host.
trojana, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 426 = *aquatica*, Linn.
uliginosa, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 155 = *arvensis*, Linn.
valdepilosa, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 431 = *verticillata* ×, Linn.
Van Haesendonckii, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 154 = *arvensis*, Linn.
veneta, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 366 = *villosa* ×, Huds.
verisimilis, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 142 = *arvensis*, Linn.

MENTHA : —

vinacea, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 433 = *verticillata* X, Linn.
virgata, H. Braun, l. c. 489 = *dalmatica* X, Tausch.
viridescens, Borb. [Bekesvarm. Floraja (1881) 74] ex H. Braun, l. c. 389 = *sylvestris*, Linn.
viridior, Borb. [Fl. Comit. Temesiensis (1884) 46] ex H. Braun, l. c. 409 = *dumetorum* X, Schult.
Weinerniana, Opiz, ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 81 = *sylvestris*, Linn.
Wiesbaurii, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 481 = *dalmatica* X, Tausch.
zabichlicensis, Opiz, ex H. Braun, l. c. 435 = *verticillata* X, Linn.

MENTZELIA, Plum. ex Linn. — Ind. Kew. ii. 210.

affinis, Greene, *Pittonia*, ii. (June 1890) 103; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 141. — Calif.
arborescens, Urban & Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 110. — Mexic.
aurea, Baill. ex Urban & Gilg, l. c. 111 (= *Chrysostoma aurea*, Lilja). — Calif.
bartonioides, Urban & Gilg, l. c. 110 (= *Acrolasia bartonioides*, Presl) = *albicaulis*, Dougl.
cordobensis, Urban & Gilg, ex F. Kurtz, in *Revista Mus. La Plata*, v. (1893) 289. — Reg. Argent.
decapetala, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 229 = *ornata*, Torr. & Gray.
decapetala, Urban & Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 111 = *ornata*, Torr. & Gray.
Fendleriana, Urban & Gilg, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 34. — Bolivia.
igneae, Urban & Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 110. — Chili, Peruvia.
Nelsonii, Greene, in *Erythra*, iii. (1895) 70. — Wyoming.
nitens, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 234. — Calif.
parvifolia, Urban & Gilg, ex F. Kurtz, in *Revista Mus. La Plata*, v. (1893) 289 [Sert. Cordob. II]. — Reg. Argent.
polyantha, Urban & Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 110. — N. Granat.
reflexa, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 74; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 108 t. 9. — Calif.
Solierii, Urban & Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 110 (= *Acrolasia Solierii*, C. Gay). — Chili.

MEPHITIDIA, Reinw. = **Lasianthus**, Jack. (Rubiaceae).

Balsanae, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 238. — Tonk.
baviensis, Drake, l. c. 239. — Tonk.
hispidula, Drake, l. c. — Tonk.
langkokensis, Drake, l. c. 240. — Tonk.
tonkinensis, Drake, l. c. — Tonk.

MERANTHERA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 356 = **Loranthus**, Linn.
Collum-cycni, Van Tiegh. l. c. (= *Psittacanthus Collum-cycni*, Eichl.). — Am. trop.
corynocephala, Van Tiegh. l. c. (= *P. corynocephalus*, Eichl.). — Bras.
eucalyptifolia, Van Tiegh. l. c. = *Loranthus eucalyptifolius*, H. B. & K.

MERCURIALIS [Tourn.] Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 211.

Bichei X, Magnier, *Scrin. fl. select.* vi. 118; et in *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. (1889) 274. — Gall.
Reverchoni, Rouy, in *Le Naturaliste* (1887) 199; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 441; *Debeaux, Syn. Fl. Gibralt.* 185. — Gibralt.

MERENDERA, Ram. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 212.

atlantica, Chab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 319; in syn. = *filifolia*, Cambess.
jordanicola, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 476. — Palaest.

MERENDERA : —

kurdica, Bornm. in *Mitth. Thur. Bot. Ver. N. Folge*, vii. (1895) 7, nomen. — Oriens.
rhodopea, Velen, in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 66. — Bulg.
sobolifera, Hort. ex Baker, in *Gard. Chron.* (1890) i. 192 = *Colchicum procurrens*, Baker.

MERIANIA, Sw. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 214.

boliviensis, Cogn. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 58; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 428. — Bolivia.
Candollei, Cogn. l. c. 425. — N. Granat.
cordifolia, Cogn. l. c. (= *Schwerinia cordifolia*, Karst.). — N. Granat.
dentata, Cogn. l. c. 434. — Bras.
excelsa, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 28 (= *Davya excelsa*, Gardn.); et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 435. — Bras.
Glazioviana, Cogn. ll. cc. 30; et 434. — Bras.
Kraenzlinii, Cogn. in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 19 = *nobilis*, Triana.
Lindenii, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 427. — N. Granat.
longifolia, Cogn. l. c. 426 (= *Chastenea longifolia*, Naud.). — Am. austr. occ.
oblongifolia, Cogn. l. c. 429. — Ecuad. vel Peruvia?
pergamentea, Cogn. l. c. 432. — Bras.
robusta, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 605; et l. c. 432. — Bras.
Sipolisii, Glaziov & Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1182. — Bras.
Spruceana, Cogn. l. c. 426. — Peruvia.
subumbellata, Cogn. l. c. 430. — Venezuela.
Trianae, Cogn. in *Bot. Jahrb.* viii. (1888) 19; et l. c. 424 (= *Schwerinia Trianae*, Karst.). — N. Granat.

MERIDIANA, Hill. = **Gazania**, Gaertn. (Compos.).

canescens, *coronopifolia*, *heterochaeta*, *jurineaefolia*, *Kraussii*, *Krebsiana*, *leptophylla*, *Lichtensteini*, *lineariloba*, *longifolia*, *longiscapa*, *mucronata*, *nivea*, *Othonnites*, *oxiloba*, *Pavonia*, *pinnata*, *pygmaea*, *serrulata*, *subbipinnata*, *tenuifolia*, *uniflora*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 353 = *homonyma omnia Gazaniae*.
arctotodes, Kuntze, l. c. = *G. arctotoides*, Less.
armerioides, Kuntze, l. c. = *G. armerioides*, DC.
Echinus, Kuntze, l. c. 353 = *G. Burchellii*, DC.
linearis, Kuntze, l. c. = *G. subulata*, R. Br.
ringens, Kuntze, l. c. 352 = *G. rigens*, Moench.

MERIOLIX, Rafin. = **Oenothera**, Linn. (Onagraceae).

spinulosa, Heller, in *Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. i.* (1895) 70 [Bot. Expl. S. Tex.] = *Oe. spinulosa*, Nutt.

MERISMA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 361 = **Loranthus**, Linn.

clusiifolia, Van Tiegh. l. c. = *L. clusiifolius*, Willd.

MEROSTELA, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21

(1895) sub t. 334 = **Aglaia**, Lour. (Meliac.).
grandis, Pierre, l. c. = *A. grandis*, Korth.

MERREMIA, Dennst. = **Convolvulus**, Tourn. (Convolv.).

alatipes, Dammer, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 28; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 330. — Afr. trop. or.
ampelophylla, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 115. — Afr. trop. or.
angustifolia, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552; et xviii. (1896) 117 = *Ipomoea angustifolia*, Jacq.
atzensis, Hallier f. in *Engl. l. c.* xvi. (1893) 552 = *I. atzensis*, G. Don.
bipinnatipartita, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 115 = *I. bipinnatipartita*, Engl.
calycina, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552 = *I. calycina*, Meissn.
chrysoides, Hallier f. l. c. = *I. chrysoides*, Ker-Gawl.
cissoides, Hallier f. l. c. = *I. cissoides*, Griseb.
contorquens, Hallier f. l. c. = *I. contorquens*, Choisy.

MERREMIA : —

Davenporti, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 552 = *I. Davenporti*, F. Muell.
digitata, Hallier f. l. c. = *Gerardia digitata*, Spreng.
dissecta, Hallier f. l. c.; et xviii. (1894) 114 = *Ipomoea dissecta*, Pers.
emarginata, Hallier f. ll. cc. 552; et 118 = *I. reniformis*, Choisy.
ericoides, Hallier f. l. c. 552 = *I. ericoides*, Meissn.
gallabatensis, Hallier f. l. c. = *I. gemella*, Choisy.
glabra, Hallier f. l. c.; et xviii. (1894) 116 = *I. glabra*, Choisy.
Guerichiana, Hallier f. l. c. 115. — Afr. trop.
hastata, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552; et xviii. (1894) 117 = *Convolvulus hastatus*, Desv.
hederacea, Hallier f. l. c. 118 = *Evolvulus hederaceus*, Burm.
maypurenensis, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552. — Bras.
Medium, Hallier f. l. c.; et xviii. (1894) 118 = *Aniseia Medium*, Choisy.
multisecta, Hallier f. l. c. 115. — Angola.
palmata, Hallier f. l. c. 112. — Afr. austro-occ. extratrop.
pedata, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552; et xviii. (1894) 116 = *Ipomoea pedata*, Hochst. & Steud.
pentaphylla, Hallier f. ll. cc. 552; et 115 = *Batatas pentaphylla*, Choisy.
pinnata, Hallier f. ll. cc. 552; et 116 = *Ipomoea pinnata*, Hochst.
potentilloides, Hallier f. l. c. 552 = *I. potentilloides*, Meissn.
pterygocaulos, Hallier f. ll. cc. 552 et 113 = *I. pterygocaulos*, Choisy.
quercifolia, Hallier f. l. c. 114. — Angola.
quinquefolia, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552 = *I. quinquefolia*, Linn.
rhynchorrhiza, Hallier f. l. c. = *Ipomoea rhynchorrhiza*, Dalz.
retusa, Hallier f. ll. cc. 552 et 117 = *I. retusa*, E. Mey.
Riedeliana, Hallier f. l. c. 552 = *I. Riedeliana*, Oliver.
sibirica, Hallier f. l. c. = *I. sibirica*, Pers.
spongiosa, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 179. — Angola.
tomentosa, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 552 = *I. tomentosa*, Choisy.
tridentata, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552; et xviii. (1894) 116 = *I. tridentata*, Roth.
umbellata, Hallier f. ll. cc. 552 et 114 = *I. umbellata*, E. Mey.
vitifolia, Hallier f. l. c. 552 = *I. vitifolia*, Sweet.
xanthophylla, Hallier f. l. c. 552; et 113 = *I. xanthophylla*, Hochst.

MESEMBRYANTHEMUM, Dill. ex Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 214.

abyssinicum, Pax, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* ii. 1891 (1892) 208 [an *M. abyssinicum*, Regel?]. — Abyss.
Barklyi, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1820. — Afr. austro-occ. extratrop.
Brownii, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1888) t. 6985. — Afr. austr.
Guerichianum, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 133. — Afr. austro-occ. extratrop.
Marlothii, Pax, l. c. x. (1889) 13. — Afr. austro-occ. extratrop.
salicornioides, Pax, l. c. xix. (1894) 133. — Afr. austro-occ. extratrop.

MESOGYNE, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 117. **URTICEAE**.

Henriquesii, Engl. l. c. 148. — Ins. S. Thom.
insignis, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 44; et l. c. — Afr. trop. or.

MESONA, Blume (Labiata). — Ind. Kew. ii. 217.

procumbens, Hemsl. in *Ann. Bot.* ix. (1895) 155 t. 7. — Formosa.
prunelloides, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 267. — China.

MESONEPHELIUM, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21 (1895) sub t. 321 = **Nephelium**, Linn. (Sapind.).

cochinchinense, Pierre, l. c. in syn. — Cochinch.

MESOPHAERUM, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 516, 525-26, sphalm. = seq.

MESOPHAERUM, P. Br. = **Hyptis**, Jacq. (Labiata).

actinocephalum, *adamantium*, *adpressum*, *affine*, *albidum*, *albipes*, *alpestre*, *altheaefolium*, *altissimum*, *alutaceum*, *ammotrophum*, *angulosum*, *angustifolium*, *araripense*, *arborescens*, *aristatum*, *atrorubens*, *barbatum*, *Besckeanum*, *brachyphyllum*, *brachystachyum*, *brevipes*, *brunescens*, *caespitosum*, *calidum*, *calophyllum*, *calycinum*, *campanulatum*, *camporum*, *canescens*, *canum*, *capitatum*, *caprariaefolium*, *cardiophyllum*, *carpinifolium*, *clavelliferum*, *coccineum*, *coeruleum*, *complicatum*, *concinnum*, *confertum*, *conspersum*, *coriaceum*, *corymbosum*, *crassifolium*, *crenatum*, *crinitum*, *crispatum*, *cuneatum*, *cymulosum*, *densiflorum*, *densifolium*, *dictiocalyx*, *dilatatum*, *divaricatum*, *diversifolium*, *dubium*, *dyctioides*, *elongatum*, *Emeroyi*, *ericalyx*, *eriocephalum*, *eriophyllum*, *excelsum*, *expansum*, *ferrugineum*, *ferruginosum*, *floridum*, *foliosum*, *fragilifolium*, *fruticosum*, *glaucum*, *glutinosum*, *gonocephalum*, *goyazense*, *halimifolium*, *heteranthum*, *heterophyllum*, *Hilarii*, *hirsutum*, *hispidum*, *homalophyllum*, *humile*, *hypoleucum*, *imbricatum*, *inamoenum*, *incisum*, *interruptum*, *involucratum*, *irregulare*, *Itatiaiae*, *laciniatum*, *lacunosum*, *lacustre*, *lagenarium*, *lamiifolium*, *lanatum*, *lanceolatum*, *laniflorum*, *lappaceum*, *latifolium*, *laurifolium*, *lavandulaceum*, *laxiflorum*, *leptocladum*, *leucocephalum*, *leucophyllum*, *lilacinum*, *lobatum*, *longifolium*, *longipes*, *lophanthus*, *Lorentzianum*, *lucidum*, *Lundii*, *lutescens*, *macranthum*, *macrocephalum*, *macrostachyum*, *malacophyllum*, *marginalum*, *marifolium*, *melanostictum*, *membranaceum*, *microphyllum*, *minutiflorum*, *Mocinianum*, *molle*, *mollissimum*, *monticulium*, *multibracteatum*, *multiflorum*, *neruosum*, *nicaraguense*, *nigrescens*, *nitidulum*, *nudicaule*, *oblongifolium*, *obtectum*, *obtusatum*, *obtusiflorum*, *obvallatum*, *odoratum*, *orbiculatum*, *ovalifolium*, *ovatum*, *paludosum*, *paniculatum*, *Parkeri*, *passerinum*, *pauciflorum*, *pectinatum*, *pedalipes*, *pedunculare*, *petiolare*, *petraeum*, *pilosum*, *platanifolium*, *plumosum*, *polyanthum*, *pruinatum*, *pubescens*, *Purdiei*, *pycnoccephalum*, *racemulosum*, *radiatum*, *ramosum*, *recurvatum*, *reflexum*, *rhabdocalyx*, *rhytidum*, *rigidum*, *rotundifolium*, *rubicundum*, *rubiginosum*, *rugosum*, *salicinum*, *salviaefolium*, *saxatile*, *scabrum*, *selaginifolium*, *sericeum*, *Sideritis*, *simplex*, *spicigerum*, *spinulosum*, *spireaefolium*, *stellatum*, *strictum*, *suaveolens*, *subrotundum*, *subverticillatum*, *sylvularum*, *Tafallae*, *tephrodes*, *tetrageron*, *tomentosum*, *trichephalum*, *uliginosum*, *uncinatum*, *velutinum*, *vepretorum*, *verticillatum*, *vesiculosum*, *vestitum*, *viejense*, *villosum*, *virgatum*, *viscidulum*, *vitifolium*, *vulcanicum*, *xanthiocephalum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 516, 525-26 = *homonyma omnia Hyptidis*.

americanum, Kuntze, l. c. 525 = *H. scoparia*, Poit. *ammotrichum*, Kuntze, l. c. = *H. ammotropa*, Griseb.

amethystodes, Kuntze, l. c. 526 = *H. amethystoides*, Benth.

argutum, Kuntze, l. c. = *H. rugosa*, Benth.

aridum, Kuntze, l. c. 525 = *H. violacea*, Pohl.

asterodes, Kuntze, l. c. = *H. asteroides*, St. Hil.

Blanchetii, Kuntze, l. c. = *H. Blancheti*, Benth.

brasiliense, Kuntze, l. c. = *H. Gaudichaudii*, Benth.

Claussenii, Kuntze, l. c. = *H. Claussenii*, Benth.

cordatum, Kuntze, l. c. = *H. cordata*, Pohl.

criocaulodes, Kuntze, l. c. sphalm. = *H. eriocauloides*, A. Rich.

ditassodes, Kuntze, l. c. = *H. ditassoides*, Mart.

fasciculatum, Kuntze, l. c. 516 (= *Clinopodium verticillatum*, Vell.). — Bras.

fastigiatum, Kuntze, l. c. 526 = *Hyptis fasciculata*, Benth.

glechomodes, Kuntze, l. c. = *H. glechomoides*, Weinm.

gratiolifolium, Kuntze, l. c. = *H. gratiolaefolia*, St. Hil.

graveolens, Kuntze, l. c. = *H. umbrosa*, Salzm.

inodorum, Kuntze, l. c. 525 = *H. muricata*, Schott.

lappulaceum, Kuntze, l. c. 526 = *H. lappacea*, Benth.

latanifolium, Kuntze, l. c. 525 = *H. lantanaefolia*, Poit.

linarioides, Kuntze, l. c. 526 = *H. linarioides*, Pohl.

lippoides, Kuntze, l. c. = *H. lippoides*, Pohl.

MESOPHAERUM : —

longiflorum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 525 = *H. reticulata*, Mart.

lythrodes, Kuntze, l. c. 526 = *H. lythroides*, Pohl.

marrubiastrum, Kuntze, l. c. 525 = *H. sinuata*, Pohl.

Martinsii, Kuntze, l. c. 526 = *H. Martiusii*, Benth.

melissodes, Kuntze, l. c. = *H. melissoides*, H. B. & K.

melochiodes, Kuntze, l. c. = *H. melochioides*, St. Hil.

menthodorum, Kuntze, l. c. = *H. lophantha*, Mart.

mutabile, Kuntze, l. c. = *H. spicata*, Poit.

oppositifolium, Kuntze, l. c. 525 = *H. glomerata*, Mart.

plectranthodes, Kuntze, l. c. = *H. plectranthoides*, Benth.

pulegiodes, Kuntze, l. c. 526 = *H. pulegioides*, Pohl.

pumilum, Kuntze, l. c. 525 = *H. communis*, St. Hil.

rhombodeum, Kuntze, l. c. 527 = *H. rhomboideum*, Mart. & Gal.

salvioides, Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 9. — Peruvia.

Salzmännii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 527 = *H. Salzmännii*, Benth.

Sellowii, Kuntze, l. c. = *H. Selloi*, Benth.

turnerifolium, Kuntze, l. c. = *H. turneraefolia*, Mart.

Tweedii, Kuntze, l. c. = *H. Tweedii*, Benth.

undulatum, Kuntze, l. c. 525 = *H. fasciculata*, Benth.?

urticoides, Kuntze, l. c. 527 = *H. urticoides*, H. B. & K.

vele, Kuntze, l. c. = *H. vilis*, Kunth & Bouché.

verbenifolium, Kuntze, l. c. = *H. verbenaeifolia*, Mart.

veronicifolium, Kuntze, l. c. = *H. veronicaefolia*, Pohl.

jungasensis, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club* iv. (1895) 246. — Bolivia.

MESPILUS, [Tourn.] Linn. = **Pyrus**, Tourn. etc. (Rosac.).

Carrierei, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet, (1894) 195 = *Crataegus Carrierei*, Vaucl.

dahurica, Hort. Dieck. Neuheit. Nat. Arboret. Dieck. (1892-93) 21. — Dahuria.

fastigiata, C. Koch, ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 459 et 738, ad calc. = *Crataegus monogyna*, Jacq.

integerimus, Ham. ex Dippel, l. c. 418 = *Cotoneaster affinis*, Lindl.

Lalandi, Hort. ex Dippel, l. c. 421 = *Crataegus Pyracantha*, Medic.

stricta, C. Koch, ex Dippel, 459 et 738, in syn. = *Crataegus monogyna*, Jacq.

METAPLEXIS, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 220.

Hemsleyana, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1970. — China.

METASTACHYS, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii (1895) 164 = **Loranthus**, Linn.

corymbosa, Van Tiegh. l. c. 165 = *L. corymbosus*, Dietr.

denticulata, Van Tiegh. l. c. 166. — Columb.

grandiflorus, Van Tiegh. l. c. 165 = *L. grandiflorus*, Ruiz & Pav.

secunda, Van Tiegh. l. c. = *L. secundus*, Benth.

tholifera, Van Tiegh. l. c. — Columb.

verticillata, Van Tiegh. l. c. = *L. verticillatus*, Ruiz & Pav.

METASTELMA, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 220.

albiflorum, S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 60. [albiflora]. — Mexic.

brasiliense, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 241 (= *Amphistelma parviflorum*, Fourn.). — Bras.

chiapense, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 397, in obs. — Mexic.

filiforme, K. Schum. l. c. (= *A. filiforme*, Griseb.). — Ins. Antill.

latifolium, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 106. — Mexic.

METASTELMA : —

melananthum, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 241 (= *Vincetoxicum melananthum*, Decne.). — Bras.

multiflorum, S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 158. — Mexic.

myrianthum, Schlechter, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 451. — Bolivia.

Pringlei, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 396 et 397. — Mexic.

Schaffneri, A. Gray, l. c. 396, in obs. — Mexic.

METHARME, Phil. ex Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 86; et in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 12. **ZYGOPHYLLEAE**, lanata, Phil. ll. cc. t. 1 fig. 2. — Chili.

METRODORA, A. St. Hil. = **Esenbeckia**, Kunth. (Rutac.).

mollis, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892) 5. — Bras.

METROSIDEROS, Banks (Myrtac.). — Ind. Kew. ii. 221.

aurata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 385. — N. Zel.

Regelii, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i.* ii. (1889) 6. — N. Guin.

speciosa, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 463. — N. Zel.

tenuifolia, Colenso, l. c. xxiv. 1891 (1892) 387. — N. Zel.

METULA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 263 = **Loranthus**, Linn.

angolensis, Van Tiegh. l. c. 264 = *L. angolensis*, Engl.

MEYERAFRA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 353 = **Astephania**, Oliver (Compos.).

africana, Kuntze, l. c. = *A. africana*, Oliver.

MEZIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 573 = **Endiandra**, R. Br. (Laurin.).

crassiramea, Ita-Uba, *navallium*, *oppositifolia*, Sprucei.

Kuntze, l. c. *homonyma omnia Endiandrae*.

anacardioides, Kuntze, l. c. = *Acrodictidium anacardioides*, Spruce.

MEZIA, Schwacke, ex Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 58; Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 30 (1891) 3. **MALPIGHIACEAE**.

Aranjei, Schwacke, ll. cc. — Bras.

MEZIEREA, Gaudich. = **Begonia**, Linn.

Molleri, C. DC. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 124. — Ins. S. Thom.

MEZONEURON, Desf. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 223.

andamanicum, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 131. — Ins. Andam.

Grevei, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1886) t. 24 B et C. — Madag.

kauaiense, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 110 (= *Casalpinia kauaiensis*, Mann). — Ins. Sandvic.

sinense, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 204; et in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1960. — China.

MEZZETTIA, Becc. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 223.

Curtisii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 129. — Penang.

Herveyana, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1560. — Malacca.

MICHELIA, Linn. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 223.

compressa, Sarg. *For. Fl. Japan.* (1894) 11, t. 5 = *Magnolia compressa*, Maxim.

Mannii, King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iii. ii. (1891) 218, t. 70. — Assam.

MICHELIA, Linn. [1735. non 1737] = **Barringtonia**, Forst. (1776) (Myrtac.).

acuminata, *acutangula*, *angusta*, *calyptata*, *conodea*, *costata*, *excelsa*, *Helperi*, *Horsfieldii*, *insignis*, *intermedia*, *luzonensis*, *macrocarpa*, *macrostachya*, *neocaledonica*, *nitida*, *pterocarpa*, *Reinwardtii*, *reticulata*, *sevrata*, *spicata*, *timorensis*, *Vriesei*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 240-241 = *homonyma omnia* Barringtoniae.

apiculata, Kuntze, l. c. (= *Butonica apiculata*, Miers.). — Madag.
asiatica, Kuntze, l. c. = *Barringtonia speciosa*, Linn.

racemosa, Kuntze, l. c. = *B. racemosa*, Roxb.
rigida, Kuntze, l. c. 241 = *Symplocos rigida*, C. B. Clarke.

rosata, Kuntze, l. c. (= *Butonica rosata*, Miers.). — Ins. Philipp.

zeylanica, Kuntze, l. c. = *Barringtonia ceylanica*, Gaertn.

MICONIA, Ruiz & Pav. (Melastom.). — Ind. Kew. ii, 223.

alpestris, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 288. — Guatem.

altissima, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 837. — Bras.

amplexans, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 256; et l. c. 749 (= *Pogonorrhynchus amplexans*, Crueg.). — Ind. occ., Peruvia.

Andreana, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 952; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 880. — N. Granat.

angustifolia, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 613; et in DC. l. c. 840. — Bras.

argyrea, Cogn. in DC. l. c. 838. — Bras.
atrosanguinea, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 23; et l. c. 760. — Costa Rica.

Augusti, Cogn. in DC. l. c. 835. — Bras.

aureoides, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 260; et l. c. 762. — Peruvia.

Bangii, Cogn. ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iii. 3 (1893) 30. — Bolivia.

Barbeyana, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 872. — Venezuela

biacuta, Cogn. ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iii. 3 (1893) 31. — Bolivia.

biperulifera, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 912; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 260. — Costa Rica.

Boissieriana, Cogn. in DC. l. c. 734. — Cuba.

boliviana, Cogn. l. c. 901. — Bolivia.

Bourgaeana, Cogn. l. c. 772. — Mexic.

Brittonii, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xvii. (1890) 92; et in DC. l. c. 900. — Bolivia.

capitellata, Cogn. in DC. l. c. 892. — Ecuad.

carassana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 346; et in DC. l. c. 825. — Bras.

cardiophylla, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 960; et in DC. l. c. 891. — N. Granat.

carnea, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 28; et in DC. l. c. 912. — Costa Rica.

Carioana, Cogn. in DC. l. c. 773. — Guatem.

ceramicarpa, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 338; et l. c. 819 (= *Clidemia ceramicarpa*, DC.). — Bras., Guiana.

chlorocarpa, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 950; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 847. — N. Granat.

cinerea, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 290; et in DC. l. c. 786. — Bras.

comosa, Cogn. ll. cc. 408; et 867. — Peruvia.

conferta, Cogn. ll. cc. 416; et 908. — Bras.

confusa, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 759. — Cuba.

corymbiformis, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 964; et in DC. l. c. 929. — N. Granat.

costaricensis, Cogn. in DC. l. c. 887; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 259. — Costa Rica.

crassinervia, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 391; et in DC. l. c. 858. — Bras.

decipiens, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 948; et in DC. l. c. 822. — N. Granat.

densiflora, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 22; et in DC. l. c. 744. — Columb.

MICONIA : —

dichroa, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1192. — Bras.

dodecandra, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 243; et in DC. l. c. 740 et 1190 (= *Melastoma dodecandra*, Desv.). — Am. trop.

domingensis, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 931. — Ins. S. Doming.

Donnell-Smithii, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 287. — Guatem.

Doriana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 376; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 851. — Bras.

egensis, Cogn. ll. cc. 374; et 849. — Bras.

Eichlerii, Cogn. ll. cc. 362; et 849. — Bras.

elaeagnoides, Cogn. ll. cc. 390; et 858. — Bras.

elegans, Cogn. ll. cc. 312; et 802. — Bras.

elongata, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xvii. (1890) 91; et in DC. l. c. 874. — Bolivia.

epiphytica, Cogn. in DC. l. c. 934. — N. Granat.

eriantha, Cogn. l. c. 845. — Bras.

eriocalyx, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 342; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 823. — Bras., Peruvia.

Fendleriana, Cogn. in DC. l. c. 822. — Venezuela.

flavescens, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xvii. (1890) 93; et in DC. l. c. 930. — Bolivia.

formosa, Cogn. in DC. l. c. 842. — Bras.

foveolata, Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 281; et in DC. l. c. 928. — Ins. Porto Rico.

Francavillana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 237; et in DC. l. c. 733. — Guian., Bras.

gigantea, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 937. — Bras.

gilva, Cogn. l. c. 836. — Bras.

glabrata, Cogn. l. c. 875. — Mexic.

glandulifera, Cogn. l. c. 737. — Peruvia.

glandulosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 244. — Venezuela.

Glazioviana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 301; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 794. — Bras.

grandiflora, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 25; et in DC. l. c. 878. — Columb.

Grayana, Cogn. in DC. l. c. 896. — Ecuad. vel Peruvia?

guatemalensis, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 5; et in DC. l. c. 758. — Guatem.

guianensis, Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 280; et in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 245; et in DC. l. c. 741 (= *Tamonea guianensis*, Aubl.). — Am. austr.

hirta, Cogn. in Mem. Torrey Bot. Club. iii. 3 (1893) 31. — Bolivia.

hirtella, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 423; et in DC. l. c. 927. — Bras.

hispida, Cogn. ll. cc. 395; et 860. — Bras.

humilis, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 764. — Am. centr.

integrifolia, Cogn. l. c. 936. — Peruvia.

Kraenzlinii, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 22; et in DC. l. c. 744. — Columb.

Krugii, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 932. — Ins. S. Doming.

laeta, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 614; et in DC. l. c. 853. — Bras.

Lehmannii, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 29; et in DC. l. c. vii. (1891) 915. — Columb.

Liebmanni, Cogn. in DC. l. c. 821. — Mexic.

longicaudata, Cogn. l. c. 738. — Venezuela.

longicuspis, Cogn. l. c. 850. — Bras.

longipedunculata, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 266; et in DC. l. c. 768. — Bras.

Langsdorffii, Cogn. ll. cc. 233; et 730. — Bras.

lurida, Cogn. ll. cc. 356; et 847. — Bras.

macrotis, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 749 (= *Diplochila macrotis*, Griseb.). — Ins. Trinit., Ecuad.

majalis, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 953; et in DC. l. c. 886. — N. Granat.

Mandonii, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xvii. (1890) 93, nomen; et in DC. l. c. 911. — Bolivia.

martinicensis, Cogn. in DC. l. c. 913. — Ins. Martinic.

MICONIA : —

Maximowicziana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 355; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 833. — Bras.

Mendonçaei, Cogn. in DC. l. c. 772. — Bras.

micropetala, Cogn. l. c. 882. — Ecuad.

modesta, Cogn. l. c. 854. — Bras.

Mouraei, Cogn. l. c. 830. — Bras.

multiflora, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xvii. (1890) 60; et in DC. l. c. 825. — Bolivia.

multinervia, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 249; et in DC. l. c. 761. — Bras.

multinervulosa, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 926. — N. Granat.

multiplinervia, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 26; et in DC. l. c. 892. — Columb.

neurotricha, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 885. — N. Granat.

nitidissima, Cogn. l. c. 748. — Venezuela.

nodosa, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 962; et in DC. l. c. 911. — N. Granat.

oblongifolia, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 373; et in DC. l. c. 841. — Bras.

octoscentidium, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 871. — Venezuela.

octopetala, Cogn. l. c. 754. — Bras.

ovalifolia, Cogn. l. c. 842. — Bras.

ovata, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 281; et l. c. 782. — Bras.

pachyphylla, Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 279; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 871. — Ins. Porto Rico.

paleacea, Cogn. in DC. l. c. 757. — Costa Rica.

parviflora, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 249; et in DC. l. c. 743 (= *Diplochila parviflora*, Benth.). — Guian., Ind. occ.

parvifolia, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 905. — N. Granat.

paupercula, Cogn. l. c. 754 (= *Octomeris paupercula*, Naud.). — Am. austr. occ.

pedicellata, Cogn. l. c. 875; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxi. 1891 (1892) 258. — Am. centr. et austr.

penduliflora, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 414; et in DC. l. c. 897. — Bras.

pennipilis, Cogn. ll. cc. 287; et 785. — Bras.

pergamantacea, Cogn. in Bot. Jahrb. vii. (1887) 24; et in DC. l. c. 873. — Columb.

persicariaefolia, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xvii. (1890) 59; et in DC. l. c. 768. — Bolivia.

peruviana, Cogn. in DC. l. c. 909. — Peruvia.

Petroniana, Cogn. & Sald. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 612; et in DC. l. c. 834. — Bras.

petropolitana, Cogn. ll. cc. 613. — Bras.

Pittieri, Cogn. in DC. l. c. 1191; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 259. — Costa Rica.

Pohlana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 350; et in DC. l. c. 829. — Bras.

polygama, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xvii. (1890) 92; et in DC. l. c. vii. (1891) 901. — Bolivia.

Pseudo-aplostachya, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 263; et in DC. l. c. 767. — Bras.

Pseudo-centrophora, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 893. — Ecuad.

Pseudo-nervosa, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 337; et in DC. l. c. 819. — Bras.

Pseudo-Petroniana, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 846. — Bras.

Pseudo-Eichlerii, Cogn. l. c. 844. — Bras.

puberula, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 386; et in DC. l. c. 856. — Peruvia.

pulchra, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 795. — Bras.

quintuplinervia, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 26; et in DC. l. c. 887. — Columb.

Rabenii, Cogn. in DC. l. c. 832. — Bras.

Radula, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 957; et in DC. l. c. 889. — Ecuad.

Regelii, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 405; et in DC. l. c. 865. — Bras., Peruvia.

Regnellii, Cogn. ll. cc. 396; et 861. — Bras.

MICONIA : —

- resimoides, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 926. — Venezuela.
- rigidiuscula, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 398; *et in DC. l. c.* 862. — Bras.
- robusta, *Cogn. ll. cc.* 270 : 813. — Bras.
- robusta, *Cogn. l. c.* 611 = robustissima, *Cogn.*
- robustissima, *Cogn. l. c.* ; *et in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 774. — Bras.
- rostrata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 758 (= *Octomeris rostrata*, Naud.). — Am. austr. occ.
- Rusbyana, *Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 93; *et in DC. l. c.* 621. — Bolivia.
- Sagotiana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 299; *et in DC. l. c.* 791. — Bras., Guian.
- Saldanhaei, *Cogn. ll. cc.* 372; *et* 841. — Bras.
- sarmentosa, *Cogn. ll. cc.* 323; *et* 811. — Guian.
- scabra, *Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 956; *et in DC. l. c.* 890. — Ecuad.
- Schlechtendalii, *Cogn. in DC. l. c.* 804. — Mexic.
- Schwackei, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 342; *et in DC. l. c.* 823. — Bras.
- scrobiculata, *Cogn. ll. cc.* 334; *et* 817. — Bras.
- secundiflora, *Cogn. ll. cc.* 285; *et* 784. — Bras.
- setoso-ciliata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 843. — Bras.
- setulosa, *Cogn. l. c.* 898. — Peruvia.
- Sintenisii, *Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 281; *et l. c.* 923. — Ins. Porto Rico.
- Solmsii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 393; *et in DC. l. c.* 859. — Venezuela, Ind. occ.
- stelligera, *Cogn. ll. cc.* 276; *et* 778. — Bras., Peruvia.
- striata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 765 (= *Melastoma striatum*, Vahl). — Ind. occ.
- stricta, *Cogn. in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 27; *et in DC. l. c.* 896. — Columb.
- stylosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 257; *et in DC. l. c.* 757. — Bras.
- subcordata, *Cogn. ll. cc.* 244; *et* 741. — Bras.
- subglabra, *Cogn. ll. cc.* 412; *et* 885. — Peruvia.
- suborbicularis, *Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 958; *et in DC. l. c.* 869. — Ecuad.
- subvernica, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 374; *et in DC. l. c.* 851. — Bras.
- tetragona, *Cogn. ll. cc.* 387; *et* 849. — Bras.
- theezans, *Cogn. ll. cc.* 419; *et* 923 (= *Melastoma theezans*, Bonpl.). — Am. trop.
- tomentella, *Cogn. ll. cc.* 284; *et* 783. — Guian, bat.
- Tonduzii, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1191; *et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 257. — Costa Rica.
- tovarensis, *Cogn. in DC. l. c.* 917. — Venezuela.
- Traillii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 242; *et in DC. l. c.* 736. — Bras.
- Trianaei, *Cogn. ll. cc.* 394; *et* 860. — Bras.
- trichodes, *Cogn. ll. cc.* 327; *et* 813 (= *Clidemia trichodes*, DC.). — Guian, gall.
- tschudyioides, *Cogn. ll. cc.* 327; *et* 813 = robusta, *Cogn.*
- Tuerckheimii, *Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 5; *et in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 762. — Guatem.
- umbrosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 315; *et in DC. l. c.* 804. — Bras.
- velutina, *L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hort.* xli. (1894) 331, t. 21. — Bras.
- verrucosa, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 920. — N. Granat.
- vesicaria, *Hort. ex Ed. André, in Rev. Hort.* lxvii. (1895) 250. — Hab. ?
- violacea, *Cogn. in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 28; *et in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 913. — Columb.
- vittata, *Cogn. in DC. l. c.* 729 (= *Clidemia vittata*, Linden & André). — Peruvia.
- Warmingiana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 282; *et in DC. l. c.* 782. — Bras.

MICRAMPELIS, Rafin. = **Sicyos**, Linn. (Cucurb.).
araneosa, *Bigelowii*, *Coulteri*, *floribunda*, *gemella*,
glutinosa, *lanata*, *longispina*, *milleflora*, *minima*,
paniculata, *polycarpa*, *pubescens*, *torquata*, *Wrightii*,
Kuntze, Rev. Gen. (1891) 257 = *homonyma omnia*
Echinocystis.

MICRAMPELIS : —

- cirrhopedunculata*, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 100, in obs. = *Echinopepon cirrhopedunculatum*, N. E. Rose.
- fabacea*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 129; *et* *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 144 = *Echinocystis fabacea*, Naud.
- guadalupensis*, Greene, l. c. = *Megarrhiza guadalupensis*, S. Wats.
- leptocarpa*, Greene, l. c. (Aug. 1892) 282. — Calif.
- lobata*, Greene, l. c. ii. (Dec. 1890) 128 = *Echinocystis lobata*, Torr. & Gray.
- macrocarpa*, Greene, l. c. 129 = *E. macrocarpa*, Greene.
- macrocarpa*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 40 [Micrampela]; *et* iv. (1893) 207, in obs. (= *Echinocystis macrocarpa*, Britt.) = *M. Rusbyi*, Greene. — Am. bor.
- Marah*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 129; *et* *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 144 = *Megarrhiza Marah*, S. Wats.
- oregona*, Greene, l. c. (= *Megarrhiza oregana*, S. Wats.) = *Sicyos oregana*, Torr. & Gray.
- Rusbyi*, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 138 (= *Echinocystis macrocarpa*, Britton). — Am. bor.
- Watsoni*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 129; *et* *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 144 [Watsonii] = *Echinocystis Watsoni*, *Cogn.*

MICRANTHEMUM, Michx. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 228.

micranthemoides, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 77 = *M. Nuttallii*, A. Gray.

MICRANTHEUM, Desf. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 228.

demissum, F. Muell. in *Vict. Natural.* vii. (Sept. 1890) 67. — Austral.

hexandrum, Tate, in *Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xii. (1889) 28, nomen = *demissum*, F. Muell.

MICRANTHUS, Wendl. = **Phayloopsis**, Willd. (Acanth.).

- angolanus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 493 = *P. angolana*, S. Moore.
- Barteri*, Kuntze, l. c. = *P. Barteri*, T. Anders.
- glandulosus*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 115. — Angola.
- Hensii*, Lindau, l. c. 114. — Congo.
- imbricatus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 493 = *P. longifolia*, Sims.
- lankesterioides*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 9. — Angola.
- longifolius*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 493 = *P. longifolia*, Sims.
- microphyllus*, Kuntze, l. c. = *P. microphyllus*, T. Anders.
- obliquus*, Kuntze, l. c. = *P. obliqua*, T. Anders.
- Poggei*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 108. — Afr. trop.
- rupestris*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 403 (= *Aethelema rupestre*, Nees). — Madag.
- silvestris*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 107. — Afr. trop.
- togoensis*, Lindau, l. c. xx. (1894) 8. — Guinea.

MICROCALAMUS, Franch. in Morot, *Journ. de Bot.* iii. (1889) 282. **PALMAE**.

barbinodis, Franch. l. c. — Afr. trop.

MICROCALAMUS, Gamble, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 207. **PALMAE**.

Prainii, Gamble, l. c. t. 7. — Assam.

MICROCEPHALUM, Sch. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 90 = **Gymnolomia**, H. B. & K. (Compos.).

- Ehrenbergianum*, Sch. Bip. l. c. = *G. Ehrenbergiana*, Klatt.
- Liebmannii*, Sch. Bip. l. c. = *G. Liebmannii*, Klatt.
- sericeum*, Sch. Bip. l. c. = *G. sericea*, Klatt.

MICRODONTOCHARIS, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, II. (1894) 1134 = **Eucharis**, Planch. & Linden (Amaryll.).**MICROGLOSSA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 229.

- Hildebrandtii*, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 222. — Afr. trop. or.
- oblongifolia*, O. Hoffm. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 62; *et l. c.* — Afr. trop. or.
- parvifolia*, O. Hoffm. l. c. 223. — Zanzib.
- psiadioides*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 327. — Madag.
- pyrifolia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 353 = *volubilis*, DC.

MICROGYNOECIUM, Hook. f. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 229.

- tibeticum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 9 [Microgynaeum]; *et in Hook. Icon. pl.* xx (1891) t. 1990. [Conf. Ind. Kew. l. c.] — Reg. Himal., Tibet.

MICROKOMA, *tenuiflora*, Kuntze, ex L'ness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 268, in obs. [Quid ?]**MICROLAENA**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 229.

- ramosissima*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 105. — N. Zel.

MICROLICIA, D. Don (Melastom.). — Ind. Kew. ii. 229.

- acuminata*, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii (1891) 55. — Bras.
- bryanthoides*, Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 274 t. 39b (Oliver, ex im Thurn, in *Ti-mehri*, v. (1886) 192); *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 49. — Guian, angl.
- glandulifera*, *Cogn. in DC. l. c.* 69. — Bras.
- Glazioviana*, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 591; *et l. c.* 37. — Bras.
- Mendonçaei*, *Cogn. ll. cc.* 592; *et* 59. — Bras.
- Schreinerii*, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1174. — Bras.

MICROLOMA, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 230.

- namaquense*, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 163. — Afr. austro-occ. extratrop.
- tenuiflorum*, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin.* iv. (1886) 268 [tenuiflora] = *lineare*, R. Br.
- tenuifolium*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 222 = *lineare*, R. Br.

MICROLONCHUS, Cass. = **Centaurea**, Linn. (Compos.).

- spinulosus*, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 119. — Hisp.

MICROLUMA, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 299 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

purviflora, Baill. l. c. = *L. parviflora*, Spruce.

MICROMELES, Decne = **Pyrus** [Tourn.] Linn. (Rosac.).

- alnifolia*, Koehne, in *Wiss. Beil. Progr. Falk. Real-Gymn.* (1890) 20; *et in Gartenfl.* xli. (1892) 282, fig. 61 *et* 62; *et in Deutsche Dendrol.* (1893) 252 = *P. alnifolia*, Franch.
- japonica*, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 252 = *P. lanata*, D. Don.

MICROMERIA, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 231.

- Chamissonis*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 289 = *M. Douglasii*, Benth.
- Kernerii*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift.* xxvii. v. (1892) 53. — Herceg.
- Purtschelleri*, *Guerke, ex Engl. in Abh. Preuss. Acad. Wiss.* 1891 (1892) 365. — Afr. trop. or.
- pusilla*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 556 [err. typ. pasilla]. — Chili.
- Shepardii*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 405. — Syria.

MICROPHOLIS, Pierre, Not. Bot. Sapot. (1891) 37 = **Sideroxylon** [Dill.] Linn. (Sapot.).

angolensis, Pierre, l. c. 41. — Angola.
Burchelliana, Pierre, l. c. 40. — Bras.
calophylloides, Pierre, l. c. 40. — Guian. gall.
chrysophylloides, Pierre, l. c. 38. — Ins. Antill.
crassipedicellata, Pierre, l. c. 40 = **Sideroxylon** *crassipedicellatum*, Mart. & Eichl.
Cruegeriana, Pierre, l. c. 40. — Ins. Antill.
cylindrocarpa, Pierre, l. c. = **Sideroxylon** *cylindrocarpum*, Poepp. & Endl.
eugeniaefolia, Pierre, l. c. = Guian. gall.
garciniaefolia, Pierre, l. c. 38. — Ins. Porto Rico.
Gardneriana, Pierre, l. c. 37 = **Sideroxylon** *Gardnerianum*, A. DC.
guyanensis, Pierre, l. c. 40 = *S. guianense*, A. DC.
Imrayana, Pierre, l. c. 39. — Ins. Dominic.
linoneura, Pierre, l. c. — Bras.
Melinoniana, Pierre, l. c. 40 (= *Stephanoloma rugosa*, Baill.). — Guian. gall.
polita, Pierre, l. c. 41 = *Sapota polita*, Griseb.
portoricensis, Pierre, l. c. 38. — Ins. Porto Rico.
rugosa, Pierre, l. c. 41 = **Sideroxylon** *rugosum*, Roem. & Schult.
Spruceana, Pierre, l. c. 39 = *S. Spruceanum*, Mart. & Miq.
Urbani, Pierre, l. c. 38. — Ins. Porto-Rico.
venulosa, Pierre, l. c. 40 = *S. venulosum*, Mart. & Eichl.

MICROPLUMERIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 749; et Hist. pl. Madag. Atlas (1888) 187; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 (1895) 154. **APOCYNACEAE**.
Sprucei, Baill. ll. cc. — Bras.

MICROPORA, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1547; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 862. **LAURINEAE**.
Curtisii, Hook. f. ll. cc. (= *Hexapora Curtisii*, Hook. f.). — Penang.

MICROSACCUS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 233.
virens, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 77. — Perak, Java, Borneo.

MICROSCHOENUS, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 675. **CYPERACEAE**.
Duthiei, C. B. Clarke, l. c. — Reg. Himal.

MICROSERIS, D. Don (Compos.). — Ind. Kew. ii. 233.
anomala, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 475. — Calif.
brevipes, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 311. — Chili.
indivisa, Greene, in Erythraea, i. (1893) 7; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 222. — Calif.
intermedia, Greene, l. c. iii. (1895) 100. — Calif.
Parishii, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 46. — Calif.
scapigera, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 358 = *scapigera*, Sch. Bip.
tenella, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 222 = *tenella*, Sch. Bip.

MICROSTELMA, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 286; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 304. **ASCLEPIADEAE**.

MICROSTEPHANUS, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 249. **ASCLEPIADEAE**.
cernuus, N. E. Br. l. c. — Afr. trop. or.

MICROSTYLIS, Nutt. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 233.
acutangula, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1835; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 688. — Perak.
amplexicaulis, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull. iii. (1891) 18. — Austral.

MICROSTYLIS : —

andicola, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 330. — Ecuad.
arachnifera, Ridl. l. c. 320. — Mexic.
bancana, Ridl. l. c. 343. (= *Crepidium Rheedii*, Blume). — Banca.
bella, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 9. — Ins. Sundaic.
brachyrrhynchos, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 152. — Mexic.
Burbridgei, Reichb. f. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 336. — Labuan.
calycina, Ridl. l. c. 331 (= *Denia calycina*, Lindl.). — Mexic.
caracasana, Klotzsch, ex Ridl. l. c. 225. — Columb.
crenulata, Ridl. l. c. 346; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 691. — Ind. or.
furcata, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1827A; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 690. — Perak.
gracilis, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 321. — Guatem.
Hieronimi, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iv. (1895) 279 (= *M. rupestris*, Griseb.). — Reg. Argent.
Javesiae, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 152. — Mexic.
khasiana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 686; et in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1831. — Bengal.
labrosa, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 151. — Cuba.
linguella, Reichb. f. l. c. 153. — Mexic.
longisepala, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 327. — Mexic.
macrochila, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 6. — Malaya.
major, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 153. — Ins. Antill.
Maingayi, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1826; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 689. — Penang.
Mandonii, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 152. — Bolivia.
Massonii, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 323. — Ins. Antill.
Micholitzianus, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 482. — N. Guinea.
micrantha, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1834; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 688. — Perak.
Moritzii, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 330. — Venezuela.
muscifera, Ridl. l. c. 333; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 689 (= *Denia muscifera*, Lindl.). — Reg. Himal.
ochreatea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 454. — Mexic.
oculata, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 554. — Hab. ?
parvula, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1827 B; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 690. — Perak.
pedicellaris, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 345. — N. Guin.
polyodon, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 688; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2002. — Tenass.
polyphylla, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 339. — N. Caled.
porphyrea, Ridl. l. c. 320 (= *M. purpurea*, S. Wats.). — Arizona.
pratensis, Ridl. l. c. 344 (= *M. versicolor*, Wight). — Ind. or. austr.
Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 282. — Mexic.
prorepens, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 48. — Sierra Leone.
resupinata, Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. (1892) 305 (= *Epidendrum resupinatum*, Forst.); et Fl. Polyn. Franç. (1892) 206 = *M. Rheedii*, Lindl.
rotundata, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 322. — Ins. Guadal.
Scottii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 687, Icon. pl. xxi. (1890) t. 2000; et in Bot. Mag. (1892) t. 7268. — Pegu, Penins. Mal.
segaarensis, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 435. — N. Guin.
Stockii, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1833; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 690. — Malabar.
tenuis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 152. — Mexic.

MICROSTYLIS : —

umbelliflora, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 132 = *umbellulata*, Lindl.
unifolia, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 51 = *ophioglossoides*, Nutt.

MICROTAENA, Prain, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1872. **LABIATAE**.
cymosa, Prain, l. c. (= *Plectranthus Patchouli*, C. B. Clarke); et in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 306; et xxviii. (1890) 110. — Ind. or.
Delavayi, Prain, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 424. — Yunnan.
Griffithii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 310. — Reg. Himal.
moupinensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 426. — Tibet.
robusta, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 307. — China.
urticifolia, Hemsl. l. c. 308. — China.

MICROTIS, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 234.
papillosa, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 269. — N. Zel.

MICROTROPIS, Wall. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 234.
pallens, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) t. 305b (= *Pleurostylia pallens*, Pierre). — Cochinch.

MIDA, R. Cunn. ex A. Cunn. = **Fusanus**, R. Br. (Santal.).
acuminata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 589 = *F. acuminatus* R. Br.
cignorum, Kuntze, l. c. = *F. spicatus*, R. Br.
crassifolia, Kuntze, l. c. = *F. crassifolius*, R. Br.
persicaria, Kuntze, l. c. = *F. persicarius*, F. Muell.

MIKANIA, Willd. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 235.
araucana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1887) 330. — Araucania.
Carteri, Baker, in Kew Bull. (1895) 106. — Afr. trop. or.
chagalensis, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 47. — Ecuad.
fragrans, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 36. — Columb.
Lehmannii, Hieron. l. c. xix. (1894) 46. — Columb.
memorosa, Klatt, l. c. viii. (1887) 36. — Columb.
olivacea, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxi. 1892 (1893) 175. — Costa Rica.
punctata, Klatt, l. c. — Costa Rica.
pyramidata, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 188. — Guatem.
Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 333. — Columb.
sylvatica, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 37. — Columb.
Vellosiana, Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 276. — Bras.

MILIUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 286.
Treutleri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 780 = *Cyathopus sikkimensis*, Stapf, et Deyeuxia Treutleri, Stapf [Conf. Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) sub t. 2395 et 2396 in obs.]

MILIUSA, Leschen. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 237.
longipes, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 124. — Perak.

MILLETIA, Wight & Arn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 238.
Baptistarium, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1890) 50. — Congo.
Dorwardi, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 40. — Burma.
eurybotrya, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 187. — Tonkin.
gracillima, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 134. — Ins. Salom.

MILLETIA : —

- Hookeriana, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 271 (= *M. macrophylla*, Hook. f.). — Ins. Fernando-Po.
 ichthyochtona, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 187. — Tonkin.
 Maideniana, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane. Bot. Bull. v. (1892) 12. — Austral.
 micans, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 212. — Afr. trop. or.
 multiflora, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 41. — Burma.
 macrophylla, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 271 = auriculata, Baker.
 macrostachya, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 41. — Burma.
 pachyloba, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 187. — Tonkin.
 purpurea, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 379, t. 12. — Japon.
 scabricaulis, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 158. — Yunnan.
 Stuhlmannii, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1-95) 212. — Afr. trop. or.
 usaramensis, Taub. l. c. — Afr. trop. or.

MILNEA, Roxb. = **Aglaiia**, Lour. (Meliac.).
 cambodiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21 (1895) sub t. 334 = A. cambodiana, Pierre.
 Harmandiana, Pierre, sub t. 333 = A. Harmandiana, Pierre.
 rugosa, Pierre, l. c. t. 335 = A. rugosa, Pierre.
 verrucosa, Pierre, l. c. 335b. = A. verrucosa, Pierre.

MILTONIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 235.

- Bleuana X, Hort. ex L. Linden & Rodigas, in Lindenia, iv. (1888) 67, t. 176. — Hybr. artef.
 Bleui X, God.-Lebœuf, in L'Orchidophile (1889) 45. [an praec.] — Hybr. artef.
 Joiceyana X, O'Brien, in Gard. Chron. (1893) ii. 206. — Bras.?
 Loddigesii, Hort. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. 1890 (1898) 306 = flavescent, Reichb. f.
 Peetersiana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 326. — Hybr. spont.?
 Phalaenopsis, Nichols. Dict. Gard. ii. (1886) 367 et 369; Rolfe, in Lindenia, vii. (1891) 95, t. 334 (= Odontoglossum Phalaenopsis, Linden & Reichb. f.). — N. Granat.
 Schroederiana X, O'Brien, in Gard. Chron. (1889) ii. 210 (= Odontoglossum Schroederianum, Reichb. f.). — Hybr. artef.

MILTONIOPSIS, Bleui X, God.-Lebœuf, in L'orchidophile (1889) 145; Bleu, in Rev. Hortic. lxii. (1890) 211 = *Miltonia Bleui* X, God.-Lebœuf.

MIMELANTHE, « Greene, » ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 77, sphalm. = *Mimetanthe*, Greene (Scrophul.).

- MIMOSA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 239.
 adenophylla, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 72. — Bras.
 affinis, Robinson, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 341. — Mexic.
 Alleniana, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 98. — Parag.
 bimucronata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 198 = sepiaria, Benth.
 brachystachya, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 73. — Bras.
 delicatula, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1886) t. 24. — Madag.
 dryandroides, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 71. — Bras.
 hexandra, M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxx. (1889) n. 7, 91, t. 29. — Parag.
 minutifolia, Robinson & Greenman, in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 150. — Mexic.
 Morongii, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 97. — Parag.
 myriocephala, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 467. — Madag.

MIMOSA : —

- nossibeensis, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 23 A. — Madag.
 Palmeri, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 99. — Mexic.
 Pittieri, M. Micheli, ex Th. Duv. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 294. — Costa Rica.
 prolifica, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 452. — Mexic.
 Pringlei, S. Wats. l. c. — Mexic.
 plumosa, M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxx. (1889) n. 7, 91, t. 26. — Parag.
 Pseudo-obovata, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 74. — Bras.
 sesquijugata, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 74. — Guatem.
 Speggazzinii, Pirotta, in Ann. Ist. Bot. Roma, iii. (1887) 132. — Reg. Argent.
 spirocarpa, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 316, t. 11. — Calif.
 tequilana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 409. — Mexic.

MIMULOOPSIS, Schweinf. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 245.

- affinis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. 1887 (1888) 509. — Madag.
 bicalcarata, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 106. — Kamerun.
 Hildebrandtii, Lindau, l. c. xx. (1894) 9. — Madag.
 kilimandscharica, Lindau, l. c. 10. — Afr. aequat. or.
 runssorica, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.
 sesamoides, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 30. — Afr. trop.
 violacea, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 105. — Kamerun.

MIMULUS, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 245.

- acaulis, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 112. — Chili.
 angustatus, Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 259 (= *Eunanus angustatus*, Greene). — Calif.
 arvensis, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 37; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 277. — Calif.
 Breweri, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 171 (= *Eunanus Breweri*, Greene) = M. rubellus, A. Gray.
 caespitosus, Greene, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 8. — Calif.
 Clarkii, Kellogg, ex Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 259 = angustatus, Curran.
 Clevelandii, T. S. Brandeg. in Gard. and For. viii. (1895) 134 fig. 20; et in Gard. Chron. (1895) i. 518 (= *Diplacus Clevelandii*, Greene). — Calif.
 Congdonii, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 175. — Calif.
 deflexus, S. Wats. l. c. xxiv. (1889) 84. — Calif.
 dentilobus, Robinson & Fernald, l. c. xxx. (1895) 120. — Mexic.
 duplex, Hort. ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 72. — Form. hort.
 filicaulis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 125. — Calif.
 glareosus, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 282; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 277. — Calif.
 gracilipes, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 176. — Calif.
 hybridus X, Hort. ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 72. — Hybr. artef.
 implexus, Greene, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 8. — Calif.
 Kelloggii, Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 261 = atropurpureus, Kellogg.
 latidens, Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 278. — Calif.
 linearis, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 72 = M. Uvedaliae, Hook. f.
 marmoratus, Greene, in Erythea, iii. (1895) 73. — Calif.

MIMULUS : —

- Neubertii, Haage & Schmidt, ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 72 = cupreus, Hook. & Arn.
 pilosus, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 262; et ii. (1889) 191 (= *Herpestis pilosa*, Benth.). — Calif.
 subreniformis, Greene, in Erythea, iii. (1895) 67. — Calif.
 tener, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 70. — Chili.

MIMUSOPS, Linn. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 246.

- albescens, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 269 = Labourdonnaia albescens, Benth.
 angolensis, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 523. — Angola.
 Bakeri, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 270; et in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 942 = Butyrospermum? Kirkii, Baker.
 Boivinii, Hartog, ex Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 11 (= *Semicipium Boivinii*, Pierre). — Madag.
 Buchananii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 307. — Afr. trop. or.
 calophylloides, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 303; Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 452 (= *Labourdonnaia calophylloides*, Boj.). — Ins. Mascar.
 capitata, Baker, in Kew Bull. (1895) 149. — Afr. trop. occ.
 coriacea, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 923 = Labramia coriacea, Baill.
 cuneata, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36 et 54; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 307. — Afr. trop. or.
 densiflora, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 307. — Afr. trop.
 discolor, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 269. — Afr. austr.
 dispar, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 107. — Natal.
 fasciculata, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 401. — N. Guin.
 floridana, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 525 = M. Sieberi, A. DC.
 fragans, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 1. (1891) 152 (= *Embricaria fragrans*, Baker.). — Reg. Nigrit.
 Glaziovii, Raunkjær, ex Warm. in Vidensk. Meddel. naturh. Foren. (1889) 863 (Symb. Fl. Bras. centr. xxxi. 1). — Bras.
 longipes, Baker, in Kew Bull. (1895) 149. — Afr. trop. occ.
 marginata, N. E. Br. l. c. 107. — Afr. austr.
 oleifolia, N. E. Br. l. c. 109. — Natal.
 pachyclada, Baker, l. c. 149. — Afr. trop. occ.
 Pancheri, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 907; et Hist. des pl. xi. (1892) 273. — N. Caled.
 pauciloba, Pierre, ex Baill. l. c. 922. — Jamaic.
 Pierrei, Baill. Hist. des pl. (1892) 274 = seq.?
 Pierrei, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 919. — Ins. Maurit.
 pleeana, Pierre, ex Baill. l. c. 923. — Ind. ooc.
 revoluta, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 273 = revoluta, Hochst.?
 Riedeliana, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 922; et Hist. des pl. xi. (1892) 269. — Am. austr.
 sansibarensis, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 307. — Afr. trop. or.
 sarcophleia, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 273. — Ind. occ.
 Schweinfurthii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 943. — Afr. trop.
 Schweinfurthii, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 523. — Afr. centr.
 Sideroxylon, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 924 (= *Sapota Sideroxylon*, Griseb.). — Ind. occ.
 sulcata, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36 et 54; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 307. — Afr. trop. or.
 Welwitschii, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 524. — Angola.

MIQUELIA, Meissn. (Olin.). — Ind. Kew. ii, 247.
caudata, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 124. — Penins. Mal.

MIQUELINA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 443 = **Loranthus**, Linn.
coccinea, Van Tiegh. l. c. = *L. coccineus*, Reinw.
evenia, Van Tiegh. l. c. = *L. evenius*, Blume.
hypoglaucous, Van Tiegh. l. c. = *L. hypoglaucus*, Kurz.
Kurzii, Van Tiegh. l. c. — Pegu.

MIRABILIS, Riv. ex Linn. (Nyctagin.). — Ind. Kew. ii. 247.
angustifolius, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 216 (*Calymenia angustifolia*, Nutt.).
Bigelovii, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 413. — Arizona.
ciliata, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii (1893) 237 = *Oxybaphus ciliatus*, Phil.
exserta, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1891) 165. — Calif.
hirsuta, MacMill. *Metasp. Minn.* (1893) 217 (hirsutus) = *Oxybaphus hirsutus*, Sweet.
laevis, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1889) 198 = seq.
laevis, Curran, l. c. Ser. II. i. (1888) 235 (= *Oxybaphus laevis*, Benth.) = californica, A. Gray.
nyctagineus, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 217 = *Allionia nyctaginea*, Michx.
ovata, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 436 = *Oxybaphus ovatus*, Vahl.
Watsoniana, Heimerl, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 84. — Guatem.

MISANTECA, Cham. & Schlecht. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 248.
Juergensenii, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 102. — Mexic.
triandra, Mez, l. c. 103 = cubensis, Benth.

MISCANTHUS, Anderss. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 248.
nepalensis, Hack. in DC. *Monog. Phan.* vi. (1889) 104 (= *Eulalia nepalensis*, Trin.). — Ind. or.
nudipes, Hack. l. c. 109 (= *Erianthus nudipes*, Griseb.). — Sikkim.
sacchariflorus, Hack. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 2 (1887) 22; et l. c. 102 (= *Imperata sacchariflora*, Maxim.). — As. or.
Tanakae, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* viii. (1894) 90, nomen. — Japon.
tinctorius, Hack. in DC. *Monog. Phan.* vi. (1889) 103 (= *Erianthus tinctorius*, Sieb.). — Japon.

MISCHOCARPUS, Blume = **Ratonia**, DC. (Sapind.).
papuanus, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 248. — N. Guin.
paradoxus, Radlk. l. c. — N. Guin.

MITELLA, Tourn. ex Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 248.
diversifolia, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 32; et in *West Am. Scientist*, iii. (1887) 24. — Calif.
Hallii, Howell, in *Erythra*, iii. (1895) 33. — Am. bor. occ.
japonica, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* viii. (1894) 44, [an Miq.?]. — Japon.
longiscapa, Makino, l. c. 43; et ix. (1895) 401. — Japon.
ovalis, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 32; et in *West Am. Scientist*, iii. (1887) 25. — Calif.

MITRACARPUS, A. Rich. = **Mitracarpum**, Zucc. (Rubiace.).
anthospermoides, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. (1888) 86. — Bras.
Eichleri, K. Schum. l. c. — Bras.
frigidus, K. Schum. l. c. 81 = *Mitracarpum Hamboldianum*, Cham. & Schlecht.
microspermus, K. Schum. l. c. 83. — Am. trop.
parvulus, K. Schum. l. c. 84. — Bras.

MITRAGYNA, Korth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 249.
inermis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = africana, Kunth.

inermis, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 56, [Mitrachine] = praec. rotundifolia, Kuntze, l. c. 289. — Burma, Ins. Philipp.
stipulosa, Kuntze, l. c. = macrophylla, Hiern.
tubulosa, Kuntze, l. c. 288. — Ind. or.
tubulosa, K. Schum. l. c. = praec.

MITRANTHES, Berg = **Calyptanthus**, Sw. (Myrt.).
Eggersii, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 72 [Mitranthus] (= *Marlieroopsis Eggersii*, Kiaersk.). — Ins. Domin.

MITREPHORA, Hook. f. & Thoms. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 250.
Froggattii, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* ii. (Jan. 1887) 3; et in Bot. Centralbl. xxx. (1887) 324. — Austral.
macrophylla, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1562. — Penang.
Prainii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) II. 88. — Ins. Andam.

MITROPHORA, Neck. = **Fedia**, Gaertn. (Valer.).
Cornucopiae, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 302 = F. Cornucopiae, Gaertn.

MIXANDRA, Pierre, ex L. Planch. *Étud. prod.* Sapot. (1888) 26, et Not. Bot. Sapot. (1890) 2 = **Bassia**, Koenig (Sapot.).
butyracea, Pierre, l. c. = B. butyracea, Roxb.

MNIOPSIS, Mart. (Podost.). — Ind. Kew. ii. 250.
Glazioviana, Warm. *Fam. Podost. Afh.* 3 (1888) 481. — Bras.
Saldanhana, Warm. l. c. 458 et 481 t. 20. — Bras.

MNIOTHAMUS, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2a (1891) 136. **BRUNACEAE**.
callunioides, Niedenzu, l. c. (= *Berzelia callunioides*, Oliver). — Afr. austr.

MOCQUERYSIA, Hua, in Morot, *Journ. de Bot.* vii. (1893) 259; Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 39. **BIXACEAE**.
multiflora, Hua, l. c. 26, et 39. — Afr. trop. occ.

MODECCA, Linn. (Passifl.). — Ind. Kew. ii. 251.
cladosepala, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xzv. (1890) 317. — Madag.
hederaefolia, Baker, l. c. xxii. (1887) 479. — Madag.
membranifolia, Baker, l. c. xxv. (1890) 317. — Madag.

MODIOLA, Moench (Malv.). — Ind. Kew. ii. 251.
lateritia, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 455 (= *Malva lateritia*, Hook.). — Am. austr.

MODIOLASTRUM, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 276. **MALVACEAE**.
geranioides, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 368 (= *Modiola geranioides*, Walp.). — Chili.
Jaeggianum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 278. — Reg. Argent.
malvifolium, K. Schum. l. c. 277 (= *Modiola malvifolia*, Griseb.). — Parag. Reg. Argent.

MOEHRINGIA, Linn. = **Arenaria**, Rupp. (Caryophyll.).
frutescens, Panizzi, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxi. (1889) 475. — Ital.
sphagnoides, Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 65 = *Arenaria sphagnoides*, Froel.
tejedensis, Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 275 = A. tejedensis, Huter, Porto & Rigo.

MOENCHIA, Ehrh. = **Cerastium**, Dill. (Caryophyll.).
dolichothea, Sommer & Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 40. — Reg. Cauc.

MOERENHOUTIA, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 252.
heteromorpha, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif., Fasc. 7 (1892) 313 (= *Phayloopsis heteromorpha*, Reichb. f.). — Ins. Samoa.

MOGHANIA, Jaume St. Hil. = **Flemingia**, Roxb. (Legumin.).
Chapparr, Cumingiana, faginea, Grahamiana, guineensis, involucreta, lineata, oblongifolia, parviflora, pauciflora, stricta, tuberosa, vestita, Wallichii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 199 = homonyma omnia Flemingiae.
macrophylla, Kuntze, l. c. = F. congesta, Roxb.
Phursia, Kuntze, l. c. = F. paniculata, Wall.
rhodocarpa, Kuntze, l. c. = F. congesta, Roxb.

MOGIPHANES, Mart. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 253.
rosea, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 206. — Parag.

MOHADENIUM, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 126. **EUPHORBIACEAE**.
coccineum, Pax, l. c. 127. — Afr. trop. or.

MOHAVEA, A. Gray (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 253.
breviflora, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 168. — Calif.
viscida, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 438 = viscida, A. Gray.

MOHRIA, Britton, in Gard. and For. vi. (1893) 433-34 et 363 = **Halesia**, Linn. (Styrac.).
carolina, Britton, l. c. = H. tetraptera, Ellis.
diptera, Britton, l. c. = H. diptera, Ellis.

MOHRODENDRON, Britton, in Gard. and For. vi. (1893) 463 = **Halesia**, Linn. [non P. Br.] (Styrac.).
carolinum, Britton, l. c.; et ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 138 = H. tetraptera, Ellis.
dipterum, Britton, l. c. 463 = H. diptera, Ellis.

MOKOFUA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 63 = **MOKOF**, Adans. = **Cleyera**, Thunb. (Ternstroem.).
alnifolia, andina, brasiliensis, carnososa, clusiaefolia, congestiflora, crassifolia, cuneifolia, delicatula, dentata, elliptica, emarginata, gedehensis, japonica, laevigata, longipes, meridionalis, micrantha, obovalis, oleaefolia, patens, peduncularis, penangiana, punctata, quinquepartita, Ruiziana, Schomburghiana, Seemannii, sessiliflora, silvatica, venosa, verticillata, Kuntze, l. c. 63-64 = homonyma omnia Ternstroemiae.
Tepezapote, Kuntze, l. c. (= T. lineata, DC.) = elliptica, Sw.

MOLINAEAE, Comm. ex Juss. = **Cupania**, Plum. (Sapind.).
laevis, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 242. — Madag.

MOLINAEAE, « Schrank » St Lager, in Cariot, *Étud. des fl. éd. 8* ii. (1889) 936 = **Molinia**, Schrank. (Gramin.).

MOLINERIA, Parl. = **Aira**, Linn. (Gramin.).
involucreta, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 55. — Lusit., Hisp.

MOLINIA, Schrank. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 253.
Bertini, Hort. ex Carrière, in Rev. Hort. (1890) 348 = caerulea, Moench.

MOLLERA, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1890) 205; et in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 174. **COMPOSITAE**.
angolensis, O. Hoffm. l. c. — Angola.

MOLLIA, Mart. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 253.
boliviana, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 157. — Bolivia.

MOLLINEDIA, Ruiz & Pav. (Monimiac.). — Ind. Kew. ii. 253.
angustifolia, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* v. (1892) 23. — Austral.
Macooraia, F. M. Bailey, l. c. — Austral.
subternata, F. M. Bailey, l. c. 22. — Austral.

MOLLUGO, Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 253.
caespitosa, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 25. — Madag.
Cambessedesii, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1891) 138 = *Glinus Cambessedesii*, Fenzl.
decandra, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 24. — Madag.

MOLUCELLA, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 254.
lanata, Post, Pl. *Postianae*, ii. (1891) 19. — Syria.
otostegoides, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1891) ii. 311. — Ind. or.

MOMORDICA, [Tourn.] Linn. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 253.
cordata, Cogn. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 208. — Kamerun.
coriacea, Cogn. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 82. — N. Guin.
dissecta, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 315. — Reg. Somal.
Henriquesii, Cogn. in *Bolet. Soc. Brot.* vii. (1889) 228. — Zambesia.
heterophylla, « Cogn. » ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 318 [err. cal.] = *Melothria heterophylla*, Cogn.
martinicensis, Hook. ex Wien. *Illustr. Garten-Zeit.* (1888) 473. — Martinic.
ovata, Cogn. in Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 595. — As. trop.
punctata, [Engl.] *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 109, nomen. — Afr. trop. or.
Schinzii, Cogn. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 149. — Afr. austro-occ. extratrop.

MONACHANTHUS, Lindl. = *Catasetum*, Rich. (Orchid.)
discolor, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 568] in *Vellozia*, 1885-88. Sec. edic. (1891) 126. — Bras. bor.

MONACHOCHLAMYS, Baker (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 255.
Boivini, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 826. — Madag.
madagascariensis, Baill. l. c. = *flagellaris*, Baker.
madagascariensis, « Baill. » ex Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 291, sphalm. = *madagascariensis*, Baill.

MONACHYRON, Parl. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 255.
grandiflorum, Martelli, *Fl. Bogos.* (1886) 94 (= *Tricholaena grandiflora*, Hochst.). — Abyss.

MONADENIA, Lindl. = *Disa*, Berg (Orchid.).
bracteata, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Eur.* v. 1892 (1895) 111 = *D. bracteata*, Sw.
cernua, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *D. cernua*, Sw.
pygmaea, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *D. pygmaea*, Bolus.
reticulata, Th. Dur. & Schinz, l. c. 112 = *D. reticulata*, Bolus.
rufescens, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *D. rufescens*, Sw.

MONANTHES, Haw. (Crassul.). — Ind. Kew. ii. 256.
agriostaphys, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 162 (= *Petrophytes agriostaphys*, Webb). — Ins. Canar.
microbotrys, Bolle, l. c. xiv. (1892) 240 (= *P. microbotrys*, Webb & Berth.). — Ins. Canar.
minima, Christ, l. c. ix. (1888) 162 (= *P. minima*, Bolle). — Ins. Canar.
muralis, Christ, l. c. (= *P. muralis*, Webb). — Ins. Canar.

MONANTHES : —
pallens, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 162 (= *P. pallens*, Webb). — Teneriffa.
purpurascens, Christ, l. c. (= *P. purpurascens*, Bolle & Webb). — Ins. Canar.
tilophila, Christ, l. c. (= *P. tilophyla*, Bolle). — Ins. Canar.

MONANTHOTAXIS, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 878. *ANONACEAE*.
congoensis, Baill. l. c. 879. — Congo gall.

MONARDELLA, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 256.
discolor, Greene, *Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 24. — Am. bor. occ.

MONELYTRUM, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 140. *GRAMINEAE*.
Luederitzianum, Hack. l. c. — Afr. austro-occ. extratrop.

MONNIERIA, B. Juss. ex P. Br. = *Herpestis*, Gaertn. f. (Scrophul.).
angulata, arenaria, axillaris, Beccabunga, caespitosa, depressa, diffusa, flagellaris, floribunda, gracilis, grandiflora, Hamiltoniana, humifusa, imbricata, lanigera, madagascariensis, micromonnieria, montevidensis, obovata, pilosa, radicata, repens, reptans, Salzmannii, sessiliflora, stricta, tenella, Thonningii, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 462 63 = *homonyma omnia Herpestis*.
acuminata, Kuntze, l. c. 463 = *H. nigrescens*, Benth.
bacopodes, Kuntze, l. c. = *H. bacopoides*, Benth.
calycina, Kuntze, l. c. 462 = *H. Monnieria*, H. B. & K.
caprarioides, Kuntze, l. c. 463 = *H. caprarioides*, H. B. & K.
caroliniana, Kuntze, l. c. = *H. amplexicaulis*, Pursh.
herniarioides, Kuntze, l. c. = *H. herniarioides*, Cham.
monnierodes, Kuntze, l. c. = *H. Ranaria*, Benth.
Monnieria, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 292; et *Field Columb. Mus.*, Bot. Ser. I. (1895) 44 = *H. Monieria*, H. B. & K.
myriophylloides, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 463 = *H. myriophylloides*, Benth.
procumbens, Kuntze, l. c. = *H. chamaedryoides*, H. B. & K.
reflexa, Kuntze, l. c. = *Myriophyllum proserpinacoides*, Gill.
scabra, Kuntze, l. c. = *Herpestis laxiflora*, Benth.
semiserrata, Kuntze, l. c. = *H. gratioloides*, Benth.
serpyllodes, Kuntze, l. c. = *H. serpyllodes*, Cham. & Schlecht.
stellarioides, Kuntze, l. c. = *H. stellarioides*, Cham.
Tweedii, Kuntze, l. c. = *H. Tweedii*, Benth.

MONNIERIA, Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 257.
crenulata, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 46. — Florida.

MONNINA, Ruiz & Pav. (Polygal.). — Ind. Kew. ii. 257.
Andreana, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 134. — N. Granat.
Auraniana, Chod. l. c. 543. — Bolivia.
boliviana, Chod. l. c. — Bolivia.
boliviensis, A. W. Benn. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 20. — Bolivia.
Bridgesii, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 542. — Bolivia.
bracteata, Chod. l. c. 153. — Venezuela.
chanduyensis, Chod. l. c. ii. (1894) 166. — Am. austr. occ.
comata, Chod. l. c. 171. — N. Granat.
coriacea, Chod. l. c. 132. — Venezuela.
costaricensis, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 304. — Costa Rica.
Crepini, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. l. c. 302. — Costa Rica.

MONNINA : —
denticulata, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 135. — Peruvia.
elliptica, Chod. l. c. — N. Granat.
Lechleriana, Chod. l. c. 129. — Peruvia.
Lehmanniana, Chod. l. c. 542. — Columb.
longibracteata, Chod. l. c. 130. — Am. austr.
Lorenziana, Chod. l. c. ii. (1894) 168. — Reg. Argent.
Malmeana, Chod. l. c. iii. (1895) 540. — Bras.
Mathusiana, Chod. l. c. — Peruvia.
nitida, Chod. l. c. 130. — Peruvia.
patula, Chod. l. c. — Ecuad.
Pavoni, Chod. l. c. 132. — Peruvia.
peruviana, Chod. l. c. 133. — Peruvia.
Philippiana, Chod. l. c. ii. (1894) 159. — Chili.
piauhensis, Chod. l. c. iii. (1895) 541. — Bras.
Pittieri, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 303. — Costa Rica.
platyphylla, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 170. — N. Granat.
pulchra, Chod. l. c. iii. (1895) 133. — Ecuad.
Rusbyi, Chod. l. c. ii. (1894) 170. — Bolivia.
Spruceana, Chod. l. c. 167. — Ecuad.
stipulata, Chod. l. c. 170. — Bolivia.
sylvicola, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 303. — Costa Rica.
tenuifolia, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 131. — N. Granat.

MONOCHAETUM, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 258.
angustifolium, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1181. — Mexic.
Candollei, Cogn. l. c. 396. — Mexic.
Carazoi, Cogn. l. c. 481; et ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 246. — Costa Rica.
diffusum, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 4; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 395. — Guatem.
strigosum, Cogn. l. c. 402. — N. Granat.
vulcanicum, Cogn. l. c. 401; et ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 246. — Costa Rica.

MONOCHOSMA, Maxim. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 258.
monantha, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 203. — China.

MONOCOSMIA, Fenzl (Portul.). — Ind. Kew. ii. 258.
monandra, Baill. *Hist. des pl.* ix. (1888) 72 = *corrigioloides*, Fenzl.

MONODORA, Dunal (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 259.
borealis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 72. — Sierra Leone.

MONOLENA, Triana (Melast.). — Ind. Kew. ii. 259.
ovata, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 945; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 539. — N. Granat.

MONOLEPIS, Schrad. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 259.
Nuttalliana, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 168 = *trifida*, Schrad.

MONOTES, A. DC. (Dipteroc.). — Ind. Kew. ii. 260.
adenophylla, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 275. — Afr. trop. or.

MONOTROPA, Linn. (Monotrop.). — Ind. Kew. ii. 260.
glabra, Lange, *Haandb. Danske Fl.* ed. 4 (1886-88) 430 (= *H. glabra*, Bernh.) = *Hypopitys multiflora*, Scop.

MONSONIA, Linn. (Geran.). — Ind. Kew. ii. 260.
Drudeana, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 182. — Afr. austro-occ. extratrop.

MONSONIA : —

igneae, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 399. — Reg. Somal.
 Luederitziana, Focke & Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brandl., Abhandl.* xxix. (1888) 60. — Afr. austro-occ. extratrop.
 parvifolia, Schinz, l. c. — Afr. austro-occ. extratrop.

MONTANOA, Cerv. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 261.

dumicola, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 200. — Costa Rica.
 Moritziana, Sch. Bip. ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336. — Columb.
 patens, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 383. — Mexic.
 pauciflora, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 90. — Am. austr.
 samalensis, Coult. *Bot. Gaz.* xx. (1895) 49. — Guatem.
 subtruncata, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 424. — Mexic.

MONTIA, Mich. (Portul.). — Ind. Kew. ii. 262.

asarifolia, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 39 = Claytonia asarifolia, Bong.
 bulbifera, Howell, l. c. = C. bulbifera, A. Gray.
 Chamissoi, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 180 = C. Chamissoi, Ledeb.
 dichotoma, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 36 = C. dichotoma, Nutt.
 diffusa, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 181 = C. diffusa, Nutt.
 gypsophiloides, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 38 = C. gypsophiloides, Fisch. & Mey.
 Hallii, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 180 = C. Hallii, A. Gray.
 linearis, Greene, l. c. 181 = C. Hallii, A. Gray.
 parviflora, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 38 = C. parviflora, Dougl.
 parvifolia, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 181; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 61 = parvifolia, Moq.
 perfoliata, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 38 = C. perfoliata, Donn.
 rubra, Howell, l. c. — Am. bor. occ.
 sibirica, Howell, l. c. = C. sibirica, Linn.
 spathulata, Howell, l. c. = C. spathulata, Dougl.
 tenuifolia, Howell, l. c. = C. exigua, Torr. & Gray.

MOOREA, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 7. **ORCHIDEAE**.

irrorata, Rolfe, l. c.; et (1892) i. 489 fig. 73; Hook. f. in *Bot. Mag.* (1892) t. 7262. — Am. austr. andin.

MOQUILEA, Aubl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 262.

inaequalis, Poepp. ex Fritsch, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, v. (1890) 12. in syn. = Couepia amazonica, Fritsch.
 rufa, Barb. Rodr. *Hort. Flumin.* 1893 (1895) 165. — Bras.

MORAEA, Mill. ex Linn. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 262.

arenaria, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 52. — Afr. austr.
 Baurii, Baker, l. c. 50. — Afr. austr.
 Bolusii, Baker, l. c. 57. — Afr. austro-occ. extratrop.
 capensis, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1893 (1895) 148 = edulis, Ker-Gawl.
 Carsoni, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 391. — Afr. trop. austro-or.
 cladostachya, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 58. — Afr. austr.
 Cooperi, Baker, l. c. 54. — Afr. austr.
 Elliottii, Baker, l. c. 58; et in *Journ. Bot.* xxxix. (1891) 70. — Transvaal.
 filicaulis, Baker, l. c. 56. — Afr. austr.
 glaucopsis, Baker, l. c. 59 (= *Viesseuxia glaucopsis*, DC.). — Afr. austr.
 macrochlamys, Baker, l. c. 49. — Afr. austr.
 Martii, Baker, l. c. 63. — Bras.

MORAEA : —

Mechowii, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 151. — Angola.
 natalensis, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 56. — Natal.
 prolongata, Hort. ex Baker, l. c. 60, in obs. = iridoides, Linn.
 Rogersii, Baker, l. c. 57. — Afr. austr.
 serpentina, Baker, l. c. 52. — Afr. austro-occ. extratrop.
 sicula, Tod. *Ind. sem. hort. Panorm.* (1887) 37; et *Hort. Bot. Panorm.* t. 34. — Sicil.
 simulans, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 50. — Afr. austr.
 spathulata, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1893 (1895) 152 (= *Ixia spathulata*, Linn. f.) = spathacea, Ker-Gawl.
 spiralis, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 57. — Afr. austr.
 Thomsoni, Baker, l. c. — Afr. centr. or.
 ventricosa, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 73. — Afr. trop. centr. or.
 Welwitschii, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 51. — Angola.

MORELOSIA, Llav. & Lex. = **Bourreria**, P. Br. (Borag.).

Andrieuxii, calophylla, cassinifolia, divaricata, dominicensis, exsucca, formosa, grandiflora, havanensis, linearis, microphylla, ovata, Radula, recurva, reticulata, revoluta, spathulata, spinifex, tomentosa, virgata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 439 = homonyma omnia Bourreriae.
 Beurera, Kuntze, l. c. = B. succulenta, Jacq.
 fasciculata, Kuntze, l. c. = Ehretia fasciculata, H. B. & K.
 Guildingiana, Kuntze, l. c. (= *Crematonia Guildingiana*, Miers). — Ind. or.
 montana, Kuntze, l. c. = B. cassinifolia, Griseb.

MORETTIA, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 263.

Nakkebiana, Hochst. ex Coss. *Comp. Fl. Atlant.* ii. (1887) 128 = canescens, Boiss.
 nana, Hochst. l. c. — Afr. bor.

MORICANDIA, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 264.

cinerea, Coss. *Comp. Fl. Atlant.* ii. (1887) 154. in syn. = *Ammosperma cinereum*, Hook.
 divaricata, Coss. *Illustr. Fl. Atlant.* i. (1884?) 35, t. 25; et l. c. 158. — Algérie.
 Tournouxii, Coss. *ll. cc.* 36, t. 26; et 159. — Algérie.
 Winkleri, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 612. — Turkest.

MORINA, Tourn. ex Linn. (Dipsac.). — Ind. Kew. ii. 264.

turcica, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 409; Degen & Halácsy, ex Celak. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 396, in obs. = persica, Linn.

MORINDA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 264.

Beccariana, Baill. ex K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 138. — Borneo.
 borneensis, Baill. l. c. — Borneo.
 Deplanchei, Baill. l. c. — N. Caled.
 hypotephra, F. Muell. in *Vict. Natural.* vi. (July 1889) 55. — Austral.
 pandurifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 289. — Anam?, Cambod.?
 salomonensis, *Engl. Bot. Jahrb.* vii. (1886) 478. — Ins. Salomon.
 tribrachya, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 138 = *Tribrachya morindiformis*, Oliver.
 trimera, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 177. — Ins. Sandvic.

MORISONIA, Linn. (Capparid.). — Ind. Kew. ii. 265.

oblongifolia, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 17. — Bolivia.

MORMODES, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 265.

Cogniauxii, L. Linden, in *Journ. des Orchid.* v. (1894) 125; et in *Lindenia*, x. (1894) 27 t. 444. — Columb.

MORMODES : —

Lawrenceanum, Rolfe, in *Lindenia*, vi. (1890) 69 t. 273. — N. Granat.
 Rolfeanum, L. Linden, in *Lindenia*, vii. (1891) 5 t. 289; et in *Gard. Chron.* (1892) i. 203 fig. 30; Hook. f. in *Bot. Mag.* (1895) t. 7438. — Peruvia.
 vernixium, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 682. — Guian. angl.

MOROCARPUS, Sieb. & Zucc. = **Debregeasia**,

Gaudich. (Urtic.).
 ceylanicus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 629 = D. ceylanica, Hook. f.
 dentatus, Kuntze, l. c. = D. dentata, Hook. f.
 leucophyllus, Kuntze, l. c. = D. Wallichiana, Wedd.
 squamatus, Kuntze, l. c. = D. squamata, King & Hook. f.

MORONGIA, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*,

v. (1894) 191 = **Schranckia**, Willd. (Legumin.).
 angustata, Britton, l. c. = S. angustata, Torr. & Gray.
 Roemeriana, Heller, in *Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Explor. S. Texas]* i. (1895) 44 = S. platycarpa, A. Gray.
 uncinata, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 191 = S. uncinata, Willd.

MORONOBEEA, Aubl. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 265.

intermedia, Engl. ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 271 [Oliver. ex im Thurm, in *Timchri*, v. (1886) 189]; et in *Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1886) 466. — Guian. angl.
 Jenmani, Engl. l. c. 467. — Guian. angl.
 Macoubea, Miq. ex Vesque, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 229, in syn. = *Symphonia globulifera*, Linn.

MORUS, [Tourn.] Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 266.

Cathayana, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 456. — China.
 Colombassa, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 10 et 582 = alba, Linn.
 fastigiata, Hort. ex Dippel, l. c. = alba, Linn.
 patavia, Audib. ex Dippel, l. c. [patavina] = alba, Linn.
 virginica, Duham. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 14 = rubra, Linn.

MOSENTHINIA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 16 =

Glaucium, Tourn. (Papav.).
 Glaucium, Kuntze, l. c. = G. corniculatum, Curt.

MOSLA, Buch.-Ham. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 267.

Fordii, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 89. — China.

MOSTUEA, Didr. (Logan.). — Ind. Kew. ii. 267.

amygdalina, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 715. — Afr. austr.
 Buchholzii, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 339. — Kamerun.
 fuchsiaeifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 96. — Angola.
 grandiflora, Gilg, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 51 et 69; et *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 310. — Afr. trop. or.
 microphylla, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 310. — Afr. trop. or.
 orientalis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 96 = rubrinervis, Engl.
 rubrinervis, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 340. — Mombassa.
 Schumanniana, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 560. — Gabon.
 Walleri, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 96. — Zambesia.

MOTANDRA, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 267.

glabrata, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 760. — Angola.

MOTANDRA : —

Welwitschiana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 760. — Angola.

MOUNTNORRISIA, Szyszyl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 189 = **Annesia**, Wall. (Ternstroem.).

crassipes, Szyszyl. l. c. = *A. crassipes*, Hook.
fragrans, Szyszyl. l. c. = *A. fragrans*, Wall.

MOURERA, Aubl. (Podost.). — Ind. Kew. ii. 267. *elegans*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 260 = *Lonchostephus elegans*, Tul.

MOURIRIA, Juss. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 267. *Chamissoana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 573; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1119. — Bras.

Doriana, Sald. ex Cogn. ll. cc. 572 et 1118. — Bras. *dumetosa*, Cogn. ll. cc. 584; et 1127. — Guian. gall. *Francavillana*, Cogn. ll. cc. 576; et 1122. — Guian. gall.

Glazioviana, Cogn. ll. cc. 580; et 1124. — Bras. *Muelleri*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1118. — Mexic.

pauciflora, Spruce [Pl. Amaz. n. 3325] ex Cogn. ll. cc. 581; et 1124. — Bras.

penduliflora, Cogn. ll. cc. 578; et 1123. — Guian. gall.

Petroniana, Cogn. & Saldanha, ex Cogn. ll. cc. 588; et 1129. — Bras.

Regeliana, Cogn. ll. cc. 572; et 1118. — Bras.

MSUATA, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 388. **COMPOSITAE**. *Buettneri*, O. Hoffm. l. c. — Congo.

MUCUNA, Adans. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 268.

Andreana, M. Micheli, in Morot, Fourn. de Bot. vi. (1892) 146 t. 5 et 6. — N. Granat.

axillaris, Baker, in Fourn. Linn. Soc. xxii. (1887) 465. — Madag.

Blumei, Burck, in Annal. Jard. Buitenz. xi. (1893) 185. — Java.

ceramensis, Burck, l. c. 184. — Ins. Ceram. et Key. *cyanosperma*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 98. — Ins. Molucc., N. Guin.

erecta, Baker, in Kew Bull. (1895) 65. — Afr. centr. or.

keyensis, Burck, in Annal. Jard. Buit. xi. (1893) 189. — Ins. Key.

Kraetkei, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 329. — N. Guin.

lucidula, Burck, in Annal. Jard. Buit. xi. (1893) 190. — Sumatra.

myriaptera, Baker, in Fourn. Linn. Soc. xxv. (1890) 310. — Madag.

pallida, Corderm. Fl. Ile Réunion (1895) 394. — Ins. Borbon.

parvifolia, Burck, in Annal. Jard. Buit. xi. (1893) 188. — Ins. Key.

pauciflora, Blume, ex Burck, l. c. 188 = *pruriens*, DC.

reticulata, Burck, l. c. 184. — Ins. Celebes.

sempervirens, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Fourn. Linn. Soc. xxiii. (1887) 190. — China.

Tjerolang, Blume, ex Burck, in Annal. Jard. Buit. xi. (1893) 190 = *macrophylla* Miq.

wrentissima, Blume, ex Burck, l. c. 185 = *M. Blumei*, Burck.

Wertheimii, Burck, l. c. 188 t. 14, fig. 2. — Ins. Key.

MUEHLENBECKIA, Meissn. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 268.

hypogaea, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 98. — N. Zel.

microphylla, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 204. — N. Zel.

muricatulula, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 482. — N. Zel.

paucifolia, Colenso, l. c. xxi. 1888 (1889) 99. — N. Zel.

MUEHLENBECKIA : —

rotundata, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 493. — Chili.

Stuebelii, Lindau, ex Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 307. — Columb.

trilobata, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 100. — N. Zel.

truncata, Colenso, l. c. 101. — N. Zel.

MUEHLBERGELLA, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 615 : Schoenl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1894) 394, in add. = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campanul.).

Oweriana, Feer, l. c. (= *Edraianthus Owerianus*, Rupr.). — Reg. Cauc.

MUEHLENBERGIA, Schreb. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 268.

acuminata, Vasey, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 337; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 1 (1892) 67. — N. Mexic.

Alamosae, Vasey, ll. cc. xvi. (1891) 146; et 1 (1891) 114. — Mexic.

anomalis, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 82 = *anomala*, Fourn.

argentea, Vasey, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 443, nomen; et in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 252. — Mexic.

arizonica, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 8 t. 76, fig. a; Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 1. (1892) 70. — Arizona.

Buckleyana, Scribn. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 56; Vasey, in Illustr. N. Am. Grass. i. II (1891) t. 12 (= *M. texensis*, Buckl.). — Texas.

californica, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 53; et Illustr. N. Am. Grass. ii. (1892) t. 20. — Calif. austr.

dumosa, Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 71; et Illustr. N. Am. Grass. ii. (1892) t. 22. — Am. bor. austro-occ.

elata, Vasey, l. c. i. (1893) 282. — Mexic.

elongata, Scribn. ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 443, nomen. — Mexic.

Emersleyi, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 1 (1892) 66. — Arizona.

filiculmis, Vasey, l. c. i. (1893) 267. — Colorado.

flavida, Vasey, l. c. i. (1892) 282. — Mexic.

grandis, Vasey, l. c. 283. — Mexic.

huachucana, Vasey, l. c. iii. 69. — Arizona.

laxiflora, Scribn. in Zöf. iv. (1894) 389. — Calif.

Lemmoni, Scribn. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 70. — Arizona, Texas.

longiglumis, Vasey, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 461, nomen; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 283. — Mexic.

minutiflora, Hitchcock, in Kansas Acad. Sci. (1891) [The Grass. of Kansas] (minutiflorum) 140 (= *Dilepsum minutiflorum*, Michx.). — Am. bor.

neo-mexicana, Vasey, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 337; Illustr. N. Am. Grass. i. II. (1891) t. 13; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 70. — Mexic., Arizona.

Palmeri, Vasey, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 443; et in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 232. — Mexic.

Parishii, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 53 [err. cal. Parshii]; et Illustr. N. Am. Grass. ii. (1892) t. 23. — Calif.

parviglumis, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 1. (1892) 71 et 522. — Texas.

Pringlei, Scribn. ex Vasey, l. c. iii. 1. (1892) 71; et in Trans. N. Y. Acad. Sci. xiv. (1894) 25 = *neo-mexicana*, Vasey.

racemosa, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 67 (= *Chloris racemosa*, Kunth) = *glomerata*, Trin.

ramosissima, Vasey, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 443; et in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 232. — Mexic.

Reverchoni, Vasey & Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 1 (1892) 66. — Texas.

scoparia, Vasey, l. c. i. (1893) 283. — Mexic.

Seatonii, Scribn. ex Seaton, in Proc. Am. Acad. xviii. (1893) 122. — Mexic.

MUEHLENBERGIA : —

speciosa, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 232. — Mexic.

tenuiflora, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 67; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. (1892) 522 = *M. Willdenowii*, Trin.

MUELLERAMRA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 247 = **Pterocladon**, Hook. f. (Melastom.).

Sprucei, Kuntze, l. c. = *P. Sprucei*, Hook. f.

MUELLERINA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 25 = **Loranthus**, Linn.

celastroides, Van Tiegh, l. c. = *L. celastroides*, Sieb.

eucalyptifolia, Van Tiegh, l. c. = *L. eucalyptifolius*, Sieb.

Raoulii, Van Tiegh, l. c. = *L. Raoulii*, Van Tiegh.

MULLA, S. Wats. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 269.

coronata, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 165. — Calif.

serotina, Greene, in Erythra, i. (1893) 152. — Calif.

transmontana, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 73. — Am. bor. occ.

MULGEDIUM, Cass. = **Lactuca**, Tourn. (Compos.).

acuminatum, Conrath & Freyn, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 476. — Turkest.

longifolium, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 337. — Turkest.

MULINUM, Pers. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 270.

chillanense, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 707. — Chili.

clandestinum, Phil. l. c. 708. — Chili.

hirsutum, Phil. l. c. — Chili.

leptactanthum, Phil. l. c. 709. — Chili.

ovalleanum, Phil. l. c. — Chili.

MUNDULA, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 270.

hysterantha, Baker, in Fourn. Linn. Soc. xxv. (1890) 309. — Madag.

laxiflora, Baker, l. c. xxii. (1887) 464. — Madag.

MUNROA, Torr. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 270.

andina, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 89. — Am. austr. occ.

decumbens, Phil. l. c. 90. — Am. austr. occ.

multiflora, Phil. l. c. — Am. austr. occ.

MUNRONIA, Wight (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 270.

Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 451. — China.

unifoliolata, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1709. — China centr.

yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 463. — China occ.

MUREX, Linn. Fl. Zeyl. (1747) 205; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 481 = **Pedaliium**, Royen (Pedalin.).

Burmanni, Kuntze, l. c. = *P. Murex*, Linn.

MURRAYA, Koen. ex Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 271.

alata, Drake, in Morot, Fourn. de Bot. vi. (1892) 276. — Tonkin.

MURTUGHAS, Linn. Fl. Zeyl. (1741) 221 = **Lagerstroemia**, Linn. (Lythrar.).

anisoptera, Archeriana, calycina, calyculata, Engleriana, floribunda, hirsuta, hypoleuca, indica, lanceolata, madagascariensis, ovalifolia, parviflora, punctata, subcostata, tomentosa, turbinata, venusta, villosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 249-50 = *homonyma omnia Lagerstroemiae*.

Loudonii, Kuntze, l. c. = *L. Loudoni*, Teijsm. & Binn.

pyriformis, Kuntze, l. c. 250 = *L. piriformis*, Koen.

Roettleri, Kuntze, l. c. = *L. Roettleri*, C. B. Clarke.

speciosa, Kuntze, l. c. 249 = *L. Flos-reginae*, Retz.

MURUCOA, J. F. Gmel. = **MOUROCOA**, Aubl. = **Maripa**, Aubl. et **Lettsomia**, Roxb. (Convolv.).

axilliflora, *cayennensis*, *cordifolia*, *erecta*, *glabra*, *nica-raguensis*, *panamensis*, *scandens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 446-47 = *homonyma omnia* Maripae.
adpressa, *atropurpurea*, *barbata*, *barbigera*, *bella*, *bracteosa*, *Chalmersii*, *elliptica*, *hancorniaefolia*, *hirsutissima*, *Kurzii*, *Maingayi*, *mysorensis*, *peguensis*, *penangiana*, *rubens*, *rubicunda*, *setosa*, *sikkimensis*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Lettsomiae.
capitata, Kuntze, l. c. 446 = *Lettsomia strigosa*, Roxb.
Chalmersii, Kuntze, l. c. 447 = *L. Chalmersii*, Benth. & Hook. f.
Championii, Kuntze, l. c. = *L. Championi*, Benth. & Hook. f.
imbricata, Kuntze, l. c. 446 = *L. aggregata*, Roxb.
pomacea, Kuntze, l. c. = *Argyrea pomacea*, Choisy.
Thomsonii, Kuntze, l. c. 447 = *Lettsomia Thomsoni*, C. B. Clarke.

MUSA, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 272.
aphurica, Rumpf, ex Sagot, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 329; et ex Rev. Hort. ix. (1888) 71. — As. trop.?
aurantiaca, G. Mann, ex Baker, in Ann. Bot. vii. (1893) 222; et in Gard. Chron. (1894) i. 102. — Assam.
Buchanani, Baker, l. c. 207. — Zambesia.
Champa, Hort. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 263, in syn. = *sapientum*, Linn.
flava, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 385. — Penins. Mal.
gigantea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 691. — Sumatra.
japonica, Hort. Veitch, ex Rev. Hort. ix. (1888) 491 = *M. Basjoo*, Sieb. & Zucc.
lasiocarpa, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 329, cum ic; Baker, in Ann. Bot. vii. (1883) 208. — Yunnan.
malaccensis, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 385. — Penins. Mal.
Mannii, H. Wendl. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 263, in obs.; in Bot. Mag. (1893) t. 7311; et in Ann. Bot. vii. (1893) 222. — Assam.
Martini, Hort. ex Carrière, in Rev. Hort. lxii. (1890) 53; et lxvii. (1895) 290. — Teneriffa vel Tonk.?
proboscidea, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1777; Baker, in Ann. Bot. vii. (1893) 207. — Afr. trop. or.
rosea, Baker, l. c. 221. — Ind. or?
rubra, Firminger, ex Baker, l. c. 213 = *sapientum*, Linn.
suaveolens, G. Mann, ex Baker, l. c. 222. — Assam.
violacea, How. ex Baker, l. c. 212 = *sapientum*, Linn.
violascens, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 384. — Penins. Mal.

MUSCARI, Tourn. ex Mill. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 272.
albicaule, Post, Pl. Postianae, i. (1890) 13. — Syria.
Bouvianum, Heldr. ex Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 135, in obs. — Graecia.
calandrinianum, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 228 (= *Bellevia calandriniana*, Nym.). — Italia, Istria.
Charrelii, Heldr. ex Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 135, in obs.; Haldeszy, ex Nadj, Emp. Ottom. [Pl. de Salon.] (1892) 42. — Maced. graminifolium, Heldr. & Holzm. ex Rouy, l. c. — Graecia.
Levieri, Heldr. ex Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxiii. (1890) 267. — Italia.
Maweanum, Hort. Leichtl. ex Baker, in Gard. Chron. (1889) i. 648. — Armenia.
Motelayi, Fouc. in Bull. Soc. sci. nat. Char.-Infér. (1891) 60 cum ic. — Gall.
segusianum, Perrier & Segeon, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 436 = *comosum*, Mill.

MUSENIOPSIS, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 122; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3 (1895) 301. **UMBELLIFERAE**.

MUSENIOPSIS : —

aegopodioides, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 302 (= *Smyrnum aegopodioides*, H. B. & K. ?). — Mexic.
cordata, Coult. & J. N. Rose, l. c. 304. — Mexic.
dissecta, Coult. & J. N. Rose, l. c. — Mexic.
peucedanoides, Coult. & J. N. Rose, l. c. 303 (= *Eulophus peucedanoides*, Benth. & Hook. f.). — Mexic.
scabrella, Coult. & J. N. Rose, l. c. 304. — Mexic.
Schaffneri, Coult. & J. N. Rose, l. c. 303. — Mexic.
serrata, Coult. & J. N. Rose, l. c. 304. — Mexic.
tenuifolia, Coult. & J. N. Rose, l. c. 302. (= *Eulophus tenuifolius*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
ternata, Coult. & J. N. Rose, l. c. 303 (= *E. ternatus*, S. Wats.). — Mexic.
texana, Coult. & J. N. Rose, l. c. 123; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 146; et iii. 3 (1895) 301 (= *Eulophus texanus*, Benth. & Hook. f.). — Texas.
tuberosa, Coult. & J. N. Rose, l. c. 303. — Calif.

MUSENIUM, Nutt. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 273.
alpinum, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 260; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3 (1895) 304. — Mexic.

MUSGRAVEA, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. v. (June, 1890) 186. **PROTEACEAE**.
stenostachya, F. Muell. l. c. — Austral.

MUSSAENDA, Burm. ex Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 272.
Bevani, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. ii. (Nov. 1887) 419, t. 6. — N. Guin.
coccinea, Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 170. — Borneo.
ferruginea, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 129. — N. Guin.
Griffithii, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) sub t. 1718, in obs. (= *Acranthera Griffithii*, Hook. f.). — Reg. Himal.
hispidula, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 66. — Congo.
kintaensis, King, ex Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 172, in obs. — Perak.
Maingayi, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) sub t. 1718, in obs. (= *Acranthera Maingayi*, Hook. f.). — Perak.
mutabilis, Hemsl. l. c. t. 1718 (= *A. mutabilis*, Hemsl.). — Perak.
pilosa, Baker, in Kew Bull. (1895) 105. — Madag.
Soyauxii, Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 81. — Gabon.

MUSSATIA, Bureau, ex Baill. Hist. des pl. x. (1888) 32; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 223. **BIGNONIA-CEAE**.
Prieurei, Bureau, l. cc. (= *Bignonia Prieurei*, DC.). — Am. austr. trop.

MUTISIA, Linn. f. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 26.
alata, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 73. — Ecuad.
alba, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 823. — Chili.
brachyantha, Phil. l. c. 825. — Chili.
camptosorifolia, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 213. — Bolivia.
cochabambiensis, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 74, in obs. — Bolivia.
comptoniaefolia, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 65. — Bolivia.
consobrina, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 820. — Chili.
dentata, Phil. l. c. 819. — Chili.
elegans, Phil. l. c. 822. — Chili.
eriocephala, Phil. l. c. = 820. — Chili.
intermedia, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 72. — Ecuad.
Iserni, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1895) 823. — Bolivia.
Landbecki, Phil. l. c. 825. — Chili.
Lehmanni, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 73. — Ecuad.

MUTISIA : —

ochrocalyx, K. Schum. in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1891) 233.
popetana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 821. — Chili.
Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 367. — Columb.
versicolor, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 824. — Chili.

MYCETIA, Reinw. — **Adenosacme**, Wall. (Rubiace.).
acuminata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 289 = *A. Lawii*, Hook. f.
Balansae, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 216. — Tonkin.
holotricha, Kuntze, l. c. = *A. holotricha*, Mig.
lanceolata, Kuntze, l. c. = *A. lanceolata*, Mig.
longifolia, Kuntze, l. c. = seq.
longifolia, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 66 = *A. longifolia*, Wall.
macrostachya, Kuntze, l. c. = *A. macrostachya*, Hook. f.
obovata, Kuntze, l. c. = *A. fasciculata*, Mig.
stipulata, Kuntze, l. c. = *A. stipulata*, Hook. f.

MYGINDA, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 275.
gonoclada, Wright, [ms. in Herb. Kew.] ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 116. — Cuba.

MYONIMA, Comm. ex Juss. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 276.
parviflora, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 509 = seq.
parviflora, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 109 = *multiflora*, Rich.
velutina, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 508. — Ins. Borbon.

MYOPORUM, Banks & Soland. (Myoporin.). — Ind. Kew. ii. 276.
glabrum, F. Muell. Third Suppl. Cens. Austral. Pl. (1886) 6; et Descr. and Illustr. of Myoporin. Pl. ii. (1886) t. 70. — Austral.

MYOSOTIDIUM, Hook. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 276.
Hortensia, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 333 = *nobile*, Hook.

MYOSOTIS, [Tourn.] Dill. ex Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 276.
adpressa, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 409 = *alpestris*, Schmidt.
acnesia, Heldr. ex Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. ii. I. (1890) 226 = *pusilla*, Loisel.
aequinoctialis, Baker, in Kew Bull. (1894) 29. — Afr. trop. or.
bracteata, Rouy, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 17 = *hispidula*, Schlecht.
Cheesemannii, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 296. — N. Zel.
cognata, Schott, ex Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. ii. I. (1890) 226 = *sylvatica*, Hoffm.
Godeti, Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 268; et in Bull. Herb. Boiss. i. App. 1 (1893) 17 = *hispidula*, Schlecht.
Goyeni, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 400. — N. Zel.
gracilis, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 214 = *sylvatica*, Hoffm.
Hamiltonii, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 200. — N. Zel.
macedonica, Velen. & Charrel, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1893) xxxvii. 47. — Maced.
macrantha, Hort. Kew ex Gard. Kew. Herb. Pl. (1895) 301 (= *Exarrhena macrantha*, Hook. f.). — N. Zel.
macrocalycina, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 603. — Afr. bor.
Mathildae, Hausskn. in Mitth. Bot. Thür. Ver. N. Folge, viii. (1895) 53. — Graecia.
nemorosa, Miègev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 306 = *pyrenaica*, Pourr.

MYOSOTIS: —

- pratensis*, Miégev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl (1893) 306 = *pyrenaica*, Pourr.
rhodopea, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1892) 93 48. — Bulg.
scabra, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 408 = *palustris*, With.
semperflorens, Hort. ex Gard. Kew, Herb. Pl. (1895) 301. — Form. hort.
subvernica, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 390. — N. Zel.
virginica, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 37 = *ovina*, Nutt.

MYOSURUS, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 278.

- breviscapus*, Huth, in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 285. — Sicil. Alger., Calif.
Prenglii, Huth, l. c. — Mexic.

MYRCEUGENIA, Berg = **Myrtus**, Linn. (Myrt.).
apiculata, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 74 = *Eugenia apiculata*, DC.**MYRCIA**, DC. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 276.

- acuminatissima*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 64, in obs. (= *Aulomyrcia acuminatissima*, Berg). — Bras.
adpressopilosa, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 75. — Bras.
aloiota, Kiaersk. l. c. 70 (= *Aulomyrcia aloiota*, Berg). — Bras.
alpina, Kiaersk. l. c. 113 (= *Gomidesia Gaudichaudiana*, Berg). — Bras.
amblyophylla, Kiaersk. l. c. 76. — Bras.
amethystina, Kiaersk. l. c. 90; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia amethystina*, Berg). — Bras.
androsaeoides, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 579 (= *A. androsaeoides*, Berg). — Guian.
angustifolia, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *A. angustifolia*, Berg). — Bras.
Assumptionis, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 106. — Parag.
atramentifera, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 45] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 31, t. 1, fig. A. — Bras. bor.
atropunctata, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 68. — Bras.
Augustana, Kiaersk. l. c. 52. — Bras.
ayabambensis, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1893) 64. — Ecuad.
bicolor, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 65. — Bras.
bombycina, Kiaersk. l. c. 89; Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 75 (= *Aulomyrcia bombycina*, Berg). — Bras.
brasilienis, Kiaersk. l. c. 102 (= *Gomidesia Schaueriana*, Berg). — Bras.
caerulescens, Kiaersk. l. c. 79 (= *Aulomyrcia caerulescens*, Berg). — Bras.
calumbaensis, Kiaersk. l. c. 77 (= *A. Pohlana*, Berg). — Bras.
Candolleana, Kiaersk. l. c. 105 (= *Gomidesia Candolleana*, Berg). — Bras.
coelosepala, Kiaersk. l. c. 81. — Bras.
colpodes, Kiaersk. l. c. 80. — Bras.
crassifolia, Kiaersk. l. c. 89. — Bras.
crocea, Kiaersk. l. c. 105. — Bras.
cubensis, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 589 (= *Calycorectes cubensis*, Griseb.). — Cuba.
cuneata, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia cuneata*, Berg). — Venezuela.
cuprea, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 95. — Bras.
cymosa, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia cymosa*, Berg). — Bras.
cymoso-paniculata, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 90. — Bras.
dermatophylla, Kiaersk. l. c. 97. — Bras.

MYRCIA: —

- detergens*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 63, in obs. = *detergens*, Mig.
diaphanosticta, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 91. — Bras.
Didrichseniana, Kiaersk. l. c. 82 (= *Aulomyrcia bracteata*, Berg). — Bras.
dolicopetala, Kiaersk. l. c. 106 (= *Gomidesia Sonderriana*, Berg). — Bras.
doloresensis, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 63. — Columb.
dumosa, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 580 (= *Aulomyrcia dumosa*, Berg). — Guiana. Ind. occ.
Dussii, Krug & Urban, ex Urban, l. c. 580. — Ind. occ.
edulis, Krug & Urban, ex Urban, l. c. 581 (= *Aulomyrcia edulis*, Berg). — Guiana. Ind. occ.
emarginata, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *A. emarginata*, Berg). — Bras.
estrellensis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 107 (= *Gomidesia Riedeliana*, Berg). — Bras.
eumecophylla, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia eumecophylla*, Berg). — Bras.
fastigiata, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 92. — Bras.
Freyreissiana, Kiaersk. l. c. 102 (= *Gomidesia Freyreissiana*, Berg). — Bras.
frontinensis, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 63. — Columb.
gigantea, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia gigantea*, Berg). — Bras.
gomidesoides, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 87. — Bras.
glandulosa, Kiaersk. l. c. 83 (= *Aulomyrcia glandulosa*, Berg). — Bras.
glaucescens, Kiaersk. l. c. 83 (= *A. glaucescens*, Berg). — Bras.
Glazioviana, Kiaersk. l. c. 111. — Bras.
grandiflora, Krug & Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 587, in obs. = seq.
grandiflora, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 77 (= *Aulomyrcia grandiflora*, Berg). — Bras.
grandiglandulosa, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 83. — Bras.
Guildingiana, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 57 = *Psidium Guildingianum*, Griseb.
Gundlachii, Krug & Urban, ex Urban, l. c. 581. — Cuba.
Hartwegiana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 109 (= *Gomidesia Hartwegiana*, Berg). — Bras.
hepatica, Kiaersk. l. c. 86 (= *Aulomyrcia hepatica*, Berg). — Bras.
hexasticha, Kiaersk. l. c. 72. — Bras.
Hookeriana, Kiaersk. l. c. 107 (= *Gomidesia Hookeriana*, Berg). — Bras.
Hostmanniana, Kiaersk. l. c. 83 (= *Aulomyrcia Hostmanniana*, Berg). — Guiana.
ilheosensis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 109 (= *Gomidesia Fenzliana*, Berg). — Bras.
innovans, Kiaersk. l. c. 100. — Bras.
intermedia, Kiaersk. l. c. 90 (= *Aulomyrcia intermedia*, Berg). — Bras.
Kunthiana, Kiaersk. l. c. 112 (= *Gomidesia Kunthiana*, Berg). — Bras.
lanuginosa, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 = *lanuginosa*, Berg.
laterifolia, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 77. — Bras.
Laureola, Kiaersk. l. c. 86 (= *Aulomyrcia Laureola*, Berg). — Bras.
Lehmannii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 65. — Columb.
lenheirensis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 98 (= *Eugeniopsis angustifolia*, Berg). — Bras.
lineata, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia lineata*, Berg). — Bras.
longipes, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 70 (= *A. longipes*, Berg). — Bras.

MYRCIA: —

- longipes*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 = *prae*.
Lundiana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 78 (= *Aulomyrcia Vautheriana*, Berg). — Bras.
magnifolia, Kiaersk. l. c. 107 (= *Gomidesia magnifolia*, Berg). — Bras.
marahanensis, Kiaersk. l. c. 71 (= *Aulomyrcia micrantha*, Berg). — Bras.
marroqueimadensis, Kiaersk. l. c. 75. — Bras.
martinicensis, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 586. — Ins. Martinic.
melanosepala, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 60. — Bras.
melanosticta, Kiaersk. l. c. 54. — Bras.
membranacea, Kiaersk. l. c. 71. — Bras.
micropetala, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia micropetala*, Berg). — Bras.
microstachya, Krug & Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 361. — Jamaica.
minensis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 110 (= *Gomidesia Widgreniana*, Berg). — Bras.
mischophylla, Kiaersk. l. c. 61. — Bras.
nitida, Kiaersk. l. c. 102 (= *Gomidesia Chamissoana*, Berg). — Bras.
obovata, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 761 = *Aulomyrcia obovata*, Berg). — Bras.
obtecta, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 89 (= *A. oblecta*, Berg). — Bras.
oreioeca, Kiaersk. l. c. 94. — Bras.
orthophylla, Kiaersk. l. c. (= *Aulomyrcia orthophylla*, Berg). — Bras.
ouropretoensis, Kiaersk. l. c. 113 (= *Gomidesia Clauseniana*, Berg). — Bras.
ovalifolia, Kiaersk. l. c. 84 (= *Aulomyrcia ovalifolia*, Berg). — Bras.
oxycentophylla, Kiaersk. l. c. 57. — Bras.
paniculata, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 577 = *coriacea*, DC.
paracatuensis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 99 (= *Aulomyrcia suffruticosa*, Berg). — Bras.
paraensis, Kiaersk. l. c. 78 (= *A. paraensis*, Berg). — Bras.
parnahibensis, Kiaersk. l. c. 89 (= *A. parnahibensis*, Berg). — Bras.
Pagani, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 587. — Ins. Porto-Rico.
pauciflora, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *A. pauciflora*, Cambess.). — Bras.
pilodes, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 67. — Bras.
Picardae, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 359. — Ins. Haiti.
pilotantha, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 67. — Bras.
planipes, Kiaersk. l. c. 115 (= *Eugenia planipes*, Hook. & Arn.). — Bras.
plusiantha, Kiaersk. l. c. 66. — Bras.
Poeppigiana, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 65, in obs. (= *Aulomyrcia Poeppigiana*, Berg). — Bras.
popayanensis, Hieron. l. c. 62. — Columb.
pulchra, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 65 (= *Aulomyrcia pulchra*, Berg). — Bras.
pyrifolia, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *A. pyrifolia*, Berg). — Guian.
pyrrhopilodes, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 96. — Bras.
Rabeniana, Kiaersk. l. c. 86 (= *Aulomyrcia Sonderriana*, Berg). — Bras.
racemosa, Kiaersk. l. c. 72 (= *A. racemosa*, Berg). — Bras.
Ramageana, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 586. — Ins. S. Lucia.
retusa, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia retusa*, Berg). — Bras.
rhabdoides, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 99. — Bras.
reticulata, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 306. — Ins. S. Doming.

MYRCIA : —

- rhodeosepala, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 75 (= *Aulomyrcia lanuginosa*, Berg). — Bras.
 Richardiana, *Kiaersk. l. c.* 97 (= *A. Richardiana*, Berg). — Bras.
 rorida, *Kiaersk. l. c.* 79 (= *A. rorida*, Berg). — Bras.
 rosulans, *Kiaersk. l. c.* 72 (= *A. rosulans*, Berg). — Bras.
 rotundifolia, *Kiaersk. l. c.* 89 (= *A. rotundifolia*, Berg). — Bras.
 rugosa, *Kiaersk. l. c.* 96 (= *A. rugosa*, Berg). — Bras.
 Schenckiana, *Kiaersk. l. c.* 114. — Bras.
 sessilifolia, *Kiaersk. l. c.* 115 (= *Gomidesia Regeliana*, Berg). — Bras.
 Sintenisii, *Kiaersk. in Bot. Tidsskr.* xvii. (1890) 257; et *Enum. Myrt. Bras.* (1893) 110 (= *Gomidesia Lindeniana*, Berg). — Am. trop.
 sparadosticta, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 59. — Bras.
 spathulata, *Kiaersk. l. c.* 72; *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia spathulata*, Berg). — Bras.
 Springiana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 102 (= *Gomidesia Springiana*, Berg). — Bras.
 stenocarpa, *Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 584. — Ins. Trinit.
 stricta, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 99 (= *Aulomyrcia stricta*, Berg). — Bras.
 subobliqua, *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 76 (= *A. subobliqua*, Berg). — Guiana.
 subrugosa, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 86. — Bras.
 subverticillaris, *Kiaersk. l. c.* 88 (= *Aulomyrcia subverticillaris*, Berg). — Bras.
 taubatensis, *Kiaersk. l. c.* 79 (= *A. buxifolia*, Berg). — Bras.
 tenuivenosa, *Kiaersk. l. c.* 84. — Bras.
 ticuensis, *Kiaersk. l. c.* 107. — Bras.
 tijuensis, *Kiaersk. l. c.* 102. — Bras.
 vacciniifolia, *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia vacciniifolia*, Berg). — Bras.
 Vittoriana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 102 (= *Gomidesia Martiana*, Berg). — Bras.
 Warmingiana, *Kiaersk. l. c.* 104. — Bras.
 yungasensis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 27. — Bolivia.

MYRCIANTHES, Berg = **Myrtus**, Linn.

- Krugii*, *Kiaersk. in Bot. Tidsskr.* xvii. (1890) 276 t. 90 et fig. 9 = *Eugenia umbellulifera*, *Krug & Urban*.

MYRIACTIS, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 281.

- bellidiformis, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict.* N. S. i. II. (1889) 12. — N. Guin.
 paniculata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) 236. — Java.

MYRIALEPIS, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 480. **PALMAE**.
Scortechini, *Becc. l. c.* — Perak.**MYRIANTHUS**, Beauv. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 281.

- gracilis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 150. — Afr. trop. occ.
 Preussii, *Engl. l. c.* 149. — Afr. trop. occ.

MYRICA, Linn. (Myricac.). — Ind. Kew. ii. 281.

- dentulata, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1895) t. 308. — Madag.
 kilimandscharica, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* ii. 1891 (1892) 188. — Afr. trop. or.
 Meyeri Johannis, *Engl. l. c.* 189. — Afr. trop. or.
 peregrina, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 638 = *asplenifolia*, Linn.
 pilulifera, *Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 43. — Afr. trop.
 Roraimae, *Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* ii. (1887) 273, t. 38b [*Oliver, ex im Thurn, in Timelri*, v. (1886) 192]. — Guian. angl.

MYRICA : —

- rugulosa, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1894) t. 307. — Madag.
 spathulata, *Baill. l. c.* t. 305 et 306. — Madag.
 usambarensis, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 160. — Afr. trop. or.

MYRICARIA, Desv. (Tamarisc.). — Ind. Kew. ii. 281.

- pulcherrima, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 483. — China.

MYRIOCARPA, Benth. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 282.

- brachystachys, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 152. — Mexic.
 heterospicata, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xii. (1887) 133 = *heterostachya*, *J. D. Smith*.
 heterostachya, *J. D. Smith, l. c.* xiii. (1888) 29. — Guatem.

MYRIOCEPHALUS, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 282.

- Dittrichii*, *F. Muell. in Wing South. Sci. Record*, N. S. ii. (May 1886); et *ex Bot. Centralbl.* xxvii. (1886) 300 = *Calocephalus Dittrichii*, *F. Muell.*

MYRIONEURON, R. Br. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 282.

- borneense, *Staff, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 175. — Borneo.
 Faberii, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 380. — China.

MYRIOPHYLLUM, Ponted. (Halorag.). — Ind. Kew. ii. 282.

- alternifolium, *J. Macoun, in Canad. Record Sci.* (Nov. 1894) 148, sphalm. = *alterniflorum*, DC.
 Farwellii, *Morong, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 146. — Am. bor.
 humile, *Morong, l. c.* 242 (= *Purshia humiles*, Rafin.) = *ambiguum*, Nutt.
 intermedium, *Baill. [an DC.?] Hist. pl. Madag.* Atlas, (1895) t. 369. — Madag.
 mexicanum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 148. — Mexic.
 pinnatum, *Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal.* (1888) 19 = *scabratum*, Michx.

MYRIOPTERON, Griff. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 282.

- extensum, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 215 = *paniculatum*, Griff.

MYRIPNOIS, Bunge (Compos.). — Ind. Kew. ii. 282.

- Maximowiczii, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 12. — China.

MYRISTICA, Linn. (Myrist.). — Ind. Kew. ii. 282.

- andamanica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 103. — Ins. Andam.
 argentea, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 311. — N. Guin.
 Beddomei, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 291. — Ind. or.
 bialata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 308. — N. Guin.
 bivalvis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 107. — Penins. Mal.
 bombycina, *King, ex Hook. f. l. c.* v. (1890) 861. — Reg. Himal.
 brachiata, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 311. — Penins. Mal.
 Buchneriana, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 311. — N. Guin.
 canarica, *Bedd. ex King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 306. — Canara.
 canarioides, *King, l. c.* 304. — Penins. Mal.
 Cantleyi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 110. — Penins. Mal.

MYRISTICA : —

- cinnamomea, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 292. — Perak.
 Clarkeana, *King, l. c.* 325. — As. trop.
 Collettiana, *King, l. c.* 322. — Penins. Mal.
 conferta, *King, l. c.* 315. — Penins. Mal.
 costata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 191. — N. Guin.
 crassa, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 293. — Perak.
 Curtisii, *King, l. c.* 326. — Penins. Mal.
 Duthiei, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 861. — Reg. Himal.
 faroensis, *Hemsl. in Ann. Bot.* v. (1891) 506. — Ins. Salom.
 flocculosa, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 302. — Perak.
 Forbesii, *King, l. c.* 306. — Penins. Mal.
 fulva, *King, l. c.* 297. — Penins. Mal.
 Gamblei, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 860. — Ind. or.
 gigantea, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 288. — Perak.
 Griffithii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 109. — Ind. or.
 Hellwigii, *Warb. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 192. — N. Guin.
 heterophylla, *K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 45. — N. Guin.
 Kingii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 106. — Reg. Himal.
 Kunstleri, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 314. — Perak.
 Kurzii, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 860. — Reg. Himal.
 Lowiana, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 293. — Perak.
 Maingayi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 104. — Malacca.
 majuscula, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 310. — Penins. Mal.
 malaccensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 104. — Malacca.
 Mioku, *Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 802, nomen. — Seneg.
 Murtoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 105. — Penins. Mal.
 Niehne, *Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 342. — Seneg.
 Niehue, *Baill. ex Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1888) 42 = *praece*.
 oblongifolia, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 313. — Penins. Mal.
 paludicola, *King, l. c.* 313. — Perak.
 paradoxa, *Schwacke, Addit. Fl. Bras. Fasc. i.* (1886) sub t. 2. — Bras.
 pendulina, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 859. — Penins. Mal.
 polyspherula, *Hook. f. l. c.* v. (1886) 108. — Ind. or.
 Prainii, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 299. — Ins. Andam.
 racemosa, *King, l. c.* 328. — Penang.
 retusa, *King, l. c.* 330. — Perak.
 Ridleyana, *King, l. c.* 311. — Perak.
 rubiginosa, *King, l. c.* 302. — Penins. Mal.
 Schleinitzii, *Engl. Bot. Jahrb.* vii. (1886) 455. — Melanesia.
 Scortechinii, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 317. — Penins. Mal.; Borneo.
 Spanogheana, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* ix. (1887) 200; et in *K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 200 = *heterophylla*, *F. Villar*.
 sphaerula, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 859. — Malacca.
 suavis, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 295. — Penins. Mal.
 succosa, *King, l. c.* 301. — Penins. Mal.
 tuberculata, *K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 46. — N. Guin.
 Wrayi, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 315. — Perak.

MYRMECODIA, Jack (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 284.

- tuberosa, « Becc. » ex Treub, in *Annal. Jard. Buitenz.* vii. (1888) 192. = *tuberosa*, Jack.

MYRMECODIA : —

vivipara, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 210. — N. Guin.

MYRMEDOMA, Becc. (Rubiaceae). — Ind. Kew. ii. 284.

Naumannii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 211. — N. Guin.

MYRMEDONE, Mart. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 288.

Beccarii, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1886) t. 6883. — Austral.

lanceolata, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 468. — Bras.

MYROBALANUS, Breyne = **Terminalia**, Linn. Combret.).

actinophylla, *acuminata*, *adamantium*, *argentea*, *australis*, *bialata*, *Biscutella*, *bursarina*, *calophylla*, *Catappa*, *cicatricosa*, *circumalata*, *crenata*, *diptera*, *edulis*, *erythrocarpa*, *excelsa*, *exsculpta*, *fagifolia*, *flavicans*, *foetidissima*, *glabrata*, *glabrescens*, *glaucescens*, *gracilis*, *grandialata*, *grandiflora*, *javanica*, *latifolia*, *latipes*, *lucida*, *macroptera*, *mariana*, *melanocarpa*, *microcarpa*, *modesta*, *mollis*, *Muelleri*, *myriocarpa*, *nitidissima*, *oblonga*, *oblongata*, *pauciflora*, *petiolaris*, *phaerocarpa*, *platyphylla*, *platyptera*, *porphyrocarpa*, *procera*, *pumila*, *punctata*, *pyrifolia*, *Richii*, *Riedelii*, *rubrigemmis*, *scutifera*, *sericea*, *sericocarpa*, *subsericea*, *sulcata*, *Thozetii*, *tomentella*, *Vernix*, *volucris*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 237 = *homonyma omnia* Terminaliae.

Benzoe, Kuntze, l. c. = *T. angustifolia*, Jacq.
brasiliensis, Kuntze, l. c. = *T. januarensis*, DC.
Brownii, Kuntze, l. c. = *T. cycloptera*, R. Br.
Buceras, Kuntze, l. c. = *T. Buceras*, Wight.
Cambessedesii, Kuntze, l. c. = *T. brasiliensis*, Eichl.
Commersonii, Kuntze, l. c. = *T. Badamia*, DC.
cuneata, Kuntze, l. c. 236 = *T. Arjuna*, Wight & Arn.

discolor, Kuntze, l. c. 237 = *T. discolor*, Spreng.
Eichleriana, Kuntze, l. c. = *T. guyanensis*, Eichl.
guianensis, Kuntze, l. c. = *T. Tanibouca*, Rich.
monoptera, Kuntze, l. c. = *T. paniculata*, Roth.
obovata, Kuntze, l. c. = *T. obovata*, Steud.
Pamea, Kuntze, l. c. = *T. Pamea*, DC.
pterocarpa, Kuntze, l. c. = *T. pterocarya*, F. Muell.
salicifolia, Kuntze, l. c. = *T. salicifolia*, Schweinf.

MYRODIA, Sw. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 284.

guatemalteea, F. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 2. — Guatem.

MYROSMA, Linn. f. (Scitami.). — Ind. Kew. ii. 284.

nana, Baker, in *Gard. Chron.* (1894) i. 652. — Bras.?
unilateralis, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 130 = *unilaterale*, Benth. & Hook. f.

MYROXYLON, Forst. = **Xylosma**, Forst. f. (Bixin.).

Bentharii, *callophyllum*, *ciliatifolium*, *cinereum*, *contraversum*, *Cuningii*, *digynum*, *flexuosum*, *fragrans*, *hawaiense*, *integrifolium*, *intermedium*, *lanceolatum*, *latifolium*, *leprosipes*, *longifolium*, *nitidum*, *ovatum*, *panamense*, *prunifolium*, *racemosum*, *Salzmanni*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *homonyma omnia* Xylosmatos.

amara, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 (= *Flacourtia amara*, Span.). — Timor.

buxifolium, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 300 = *Xylosma buxifolium*, A. Gray.

celastrinum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44; Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1891) 41 (= *Flacourtia celastrina*, H. B. & K.) = *X. nitidum*, A. Gray.

Closii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *X. elegans*, Planch. & Triana.

cordatum, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 = *Flacourtia cordata*, H. B. & K.

MYROXYLON : —

coriaceum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *Xylosma nitidum*, A. Gray.

elegans, Kuntze, l. c.; Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 = *Flacourtia elegans*, Tul.

ellipticum, Kuntze, l. c. = *Xylosma ellipticum*, Hemsl.

gonicarpum, Kuntze, l. c. = *X. conicarpum*, Clos.

Grayi, Warb. l. c. 41 = *Xylosma nitidum*, A. Gray.
Hillebranthii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *X. Hillebrandi*, Wawra.

infestum, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 298 = *X. infestum*, Griseb.

lucens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *X. Benthami*, Griseb.

martinicense, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 299. — Ins. Martinic.

molle, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 = *Xylosma mollis*, Triana & Planch.

nitidum, Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. I. (1895) 32 [Pl. of Yucat.] = *X. nitidum*, A. Gray.

obovatum, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 (= *Craepaloprunnon obovatum*, Karst.). — Columb.

pachyphyllum, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 297. — Ins. Porto-Rico.

Paliurus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 (= *Hisingera Paliurus*, Clos). — Hab.?

Pringlei, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 = *Xylosma Pringlei*, Robinson.

pubescens, Warb. l. c. 41 = *X. pubescens*, Griseb.
rubicundum, Warb. l. c. (= *Craepaloprunnon rubicundum*, Karst.). — Venezuela.

schaefferioides, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 300 = *Xylosma schaefferioides*, A. Gray.

Schwanecheanum, Krug & Urban, ex Urban, l. c. 296. — Ins. Porto Rico.

Seemannii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *Xylosma Seemannii*, Triana & Planch.

senticosum, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 = *X. senticosum*, Hance.

serratum, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 295 (= *Prockia serrata*, Willd.). — Ind. occ.

spiciferum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44, sphalm.? = *Xylosma spiculiferum*, Triana & Planch.

Tweedianum, Kuntze, l. c. (= *Hisingera Tweediana*, Clos). — Bras.

velutinum, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 = *Flacourtia velutina*, Tul.

MYRRHIDENDRON, Coult. & J. N. Rose, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 465. **UMBELLIFEREAE**.

Donnellsmithii, Coult. & N. E. Rose, l. c. 466. — Costa Rica.

MYRRHIS, [Tourn.] Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 285.

ambigua, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 332 = *Glycosma ambigua*, A. Gray.

aristata, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 398 = *Osmorhiza longistylis*, DC.

brachypoda, Greene, l. c. 332 = *O. brachypoda*, Torr.

nuda, Greene, l. c. 333; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 157 = *O. nuda*, Torr.

Renjifoana, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 725. — Chili.

MYRRHODES, Moehr. = **Anthriscus**, Bernh. (Umbellif.).

africanum, *alpestre*, *Kotschy*, *lamprocarpum*, *nemorosum*, *Ruprechtii*, *tenerimum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 268 = *homonyma omnia* Anthrisci.

Anthriscus, Kuntze, l. c. = *Anthriscus vulgaris*, Bernh.

Cerefolium, Kuntze, l. c. = *A. Cerefolium*, Hoffm.

elegans, Kuntze, l. c. (= *Cryptotaenia elegans*, Webb). — Ins. Canar.

MYRRHODES : —

fumarioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 268 = *Anthriscus fumarioides*, Spreng.

silvestre, Kuntze, l. c. = *A. sylvestris*, Hoffm.

MYRSINE, Linn. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 285.

brachyclada, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 478. — N. Zel.

cryptophlebia, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 149. — Ins. Aldabra.

dasyphylla, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 199. — Borneo.

edulis, [Engl.] *Pflanzenw. Ost-Afr.* B (1895) 223, nomen. [Quid?]. — Afr. trop.

guineensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 402 = *floribunda*, R. Br.

kauaiensis, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 280. — Ins. Sandvic.

Jelskii, *Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1892) 3. — Peruvia.

kermadecensis, Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 170, nomen; et xxiv. 1891 (1892) 410. — Ins. Kermad.

lanaiensis, Hillr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 281. — Ins. Sandvic.

neo-zealandensis, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 479. — N. Zel.

neurophylla, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 45 (= *M. melanophlaeos*, Baker). — Afr. trop. or.

oligophylla, *Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1893) 2. — Peruvia.

pendula, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 94. — N. Zel.

Playfairii, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 61. — China.

rhododendroides, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47. (1894) 44. — Afr. trop. or.

runssorica, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 303. — Afr. trop. or.

Vescoi, Drake, *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 119; et *Illustr. Ins. Maris Pacif.* (1892) 227. — Ins. Societ.

MYRSTIPHYLLUM, P. Br. = **Psychotria**, Linn. (Rubiaceae).

brachiatum, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 94 = *P. brachiatum*, Sw.

corymbosum, Hitchcock, l. c. = *P. corymbosum*, Sw.

marginatum, Hitchcock, l. c. = *P. marginatum*, Sw.

pubescens, Hitchcock, l. c. = *P. pubescens*, Sw.

undatum, Hitchcock, l. c. = *P. undatum*, Sw.

MYRTILUMA, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 283 = **Sideroxylon**, Tourn. (Sapot.).**MYRTILLUS**, Gilib. = **Vaccinium**, Linn.

nigra, Lindstrom, in *Bot. Notiz.* (1893) 17 (= *M. niger*, Gilib.). = *V. Myrtillus*, Linn.

uliginosa, Lindstrom, l. c.; Kjellm. *Fanerog. Vest Eskem. Land* 38 = *V. uliginosum*, Linn.

MYRTOLEUCODENDRON, Burm. in Rumph. *Herb. Amboin.* ii. (1742) 72 t. 16 et 17 = **Mela-leuca**, Linn. (Myrtac.).

acerosum, *acuminatum*, *adnatum*, *alsophilum*, *angustifolium*, *armillare*, *basicephalum*, *Baxteri*, *blacriaefolium*, *brachystachyum*, *calycinum*, *cardiophyllum*, *ciliolum*, *concretum*, *confertum*, *cordatum*, *crassifolium*, *cucullatum*, *cuticulare*, *cymbifolium*, *decussatum*, *densum*, *depauperatum*, *diosmifolium*, *dissitiflorum*, *elachophyllum*, *eleutherostachyum*, *ellipticum*, *erianthum*, *exaratum*, *fasciculiflorum*, *filifolium*, *foliolosum*, *fulgens*, *genistifolium*, *gibbosum*, *glaberrimum*, *globiferum*, *glomeratum*, *hamulosum*, *holosericeum*, *Huegelii*, *hypericifolium*, *incanum*, *lasianthum*, *lateriflorum*, *lateritium*, *laxiflorum*, *leiocarpum*, *leiopyxe*, *leptocladum*, *linariifolium*, *linophyllum*, *longiconum*, *macronychium*, *megacephalum*, *micromerum*, *microphyllum*, *minutifolium*, *nodosum*, *Oldfieldii*, *pauciflorum*, *pauperiflorum*, *pentagonum*, *polyccephalum*, *pulchellum*, *pustulatum*, *Radula*, *scabrum*, *seriatum*, *sparsiflorum*, *spathulatum*, *squameum*, *squarrosum*, *striatum*, *subfalcatum*, *subtrigonum*, *symplocarpum*, *tamariscifolium*.

MYRTOLEUCODENDRON : —

- num, tenellum, teretifolium, thymifolium, trichophyllum, uncinatum, undulatum, urceolare, vimineum, violaceum, Wilsonii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 241-42 = *homonyma omnia* Melaleuceae.
acacioides, Kuntze, l. c. 241 = *M. acacioides* F. Muell.
aspalathodes, Kuntze, l. c. = *M. aspalathodes*, Schau.
calothamnoides, Kuntze, l. c. = *M. calothamnoides*, F. Muell.
cylindricum, Kuntze, l. c. = *M. armillaris*, Sm.
Deanii, Kuntze, l. c. = *M. Deanii*, F. Muell.
deltodeum, Kuntze, l. c. = *M. deltoideum*, Benth.
ericifolium, Kuntze, l. c. = *M. ericaefolia*, Andr.
hakeodes, Kuntze, l. c. = *M. hakeoides*, F. Muell.
nesophyllum, Kuntze, l. c. = *M. nesophila* F. Muell.
parviflorum, Kuntze, l. c. = *M. Preissiana*, Schau.
polygalodes, Kuntze, l. c. = *M. polygaloides*, Schau.
pungens, Kuntze, l. c. = *M. pungens*, Schau.
quadrifarium, Kuntze, l. c. = *M. quadrifaria*, F. Muell.
raphiophyllum, Kuntze, l. c. = *M. raphiophylla*, Schau.
seorsiflorum, Kuntze, l. c. = *M. seorsiflora*, F. Muell.
stypelioides, Kuntze, l. c. = *M. stypelioides*, Sm.
thymodes, Kuntze, l. c. = *M. thymoides*, Labill.
thyodes, Kuntze, l. c. = *M. thyoides*, Turcz.
trichostachyum, Kuntze, l. c. = *M. linariifolia*, Sm.
viridiflorum, Kuntze, l. c. 241 = *M. Leucadendron*, Linn.

MYRTUS. [Tourn.]. Linn. (Myrt.) — Ind. Kew. ii. 286.

- apiculata*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 17 (= *Blepharocalyx apiculatus*, Berg). — Bras.
Beaurepairiana, Kiaersk. l. c. 22. — Bras.
Bergiana, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 66 (= *Campomanesia suffruticosa*, Berg). — Am. austr. occ.
brunnea, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 17 (= *Blepharocalyx brunnea*, Berg). — Bras.
corynantha, Kiaersk. l. c. 18. — Bras.
emarginata, Willd., ex Krug & Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 666 = *Eugenia umbellulifera*, Krug & Urban.
epipastica, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 5, nomen. — Austral.
exaltata, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. viii. (1893) 77. — Austral.
flavida, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2290. — Borneo.
fulvescens, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 24 (= *Eugenia fulvescens*, DC.). — Bras.
Glazioviana, Kiaersk. l. c. 23. — Bras.
heteroclita, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 67 (= *Eugenia heteroclita*, Tussac). — Ins. S. Doming.
longipes, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 18 (= *Blepharocalyx longipes*, Berg). — Bras.
Metrosideros, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 27. — Austral.
monosperma, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 9; et in Bot. Centralbl. li. (1892) 89. — Austral.
neo-caledonica, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 67 (= *M. vaccinioides*, Brongn. & Gris). — N. Caled.
Reinhardtiana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 18 (= *Blepharocalyx canescens*, Berg). — Bras.
Sintensis, Kiaersk. in Bot. Tidsskr. xvii. (1890) 285 (= *Eugenia Sintensis*, Krug & Urban). — Ins. Porto Rico.
Stahlii, Kiaersk. l. c. 286 t. 7 A et fig. 12 (= *E. Stahlii*, Krug & Urban). — Ins. Porto Rico.
stictophylla, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 20. — Bras.
stenophylla, Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 273, t. 39a (Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 273). — Guian. angl.
velutina, Kiaersk. l. c. 25 (= *Pseudocaryophyllus velutinus*, Berg). — Bras.
Warmingiana, Kiaersk. l. c. 19. — Bras.
Widgreni, Kiaersk. l. c. 18 (= *Blepharocalyx Widgreni*, Berg). — Bras.

MYSTACIDIUM, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 290.

- aphyllum*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 219 = *Angraecum aphyllum*, Thou.
arachnanthus, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 51 (= *Aeranthus arachnanthus*, Reichb. f.). — Ins. Comor.
Calceolus, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 220 = *Angraecum Calceolus*, Thou.
carpophorum, Cordem. Fl. Ile Réunion, (1895) 221 = *A. carpophorum*, Thou.
comorense, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 52 (= *Aeranthus comorensis*, Reichb. f.). — Ins. Comor.
dauphinense, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 55. — Madag.
dentiens, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 52 (= *Aeranthus dentiens*, Reichb. f.). — Ins. Comor.
distichum, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1889) 216 = *Angraecum distichum*, Lindl.
dolabriforme, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 141. — Afr. trop. occ.
erythropollinium, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 52 (= *Aeranthus erythropollinius*, Reichb. f.). — Afr. trop.
exile, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Microcoelia exilis*, Lindl.). — Madag.
Gilpiniae, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *Angraecum Gilpiniae*, Reichb. f.
gladiator, Th. Dur. & Schinz, l. c. 53 (= *Aeranthus gladiator*, Reichb. f.). — Ins. Comor
globulosum, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Gussonia globulosa*, Ridl.). — Abyss.
Grandidieranum, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Aeranthus Grandidieranus*, Reichb. f.). — Ins. Comor.
longicornu, Th. Dur. & Schinz, l. c. 53 = *filicorne* Lindl.
longifolium, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 57. — Afr. trop. or.
mauritanum, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 53 = *Angraecum gladiifolium*, Thou.
Meirax, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 181 (= *Aeranthus Meirax*, Reichb. f.). — Afr. austr. or.
micranthum, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 54 = *Angraecum micranthum*, Lindl.
musciolum, Th. Dur. & Schinz, l. c. 54 (= *Aeranthus musciolum*, Reichb. f.). — Angola.
ophioplectron, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *A. ophioplectron*, Reichb. f.). — Madag.
phalaenophorum, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Aer. phalaenophorum*, Reichb. f.). — Madag.
physophorum, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *Angraecum physophorum*, Reichb. f.
productum, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 30. — Kamer.
radicosum, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 54 = *Angraecum Guyonianum*, Reichb. f.
rutulum, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Aeranthus rutulum*, Reichb. f.). — Ins. Comor.
trichoplectrum, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Aer. trifurcus*, Reichb. f.). — Ins. Comor.
viride, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 122. — Madag.
xanthopollinium, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 55 (= *Aeranthus xanthopollinius*, Reichb. f.). — Angola.

N

NACHTIGALIA, Schinz, ex Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 133, nomen = **Phaeoptilon**, Radlk. (Nyctagin.).
protectorata, Schinz, l. c. = *P. spinescens*, Radlk.

NAGEIA, Gaertn. = **Podocarpus**, L'Hérit. (Conif.).
acutifolia, *affinis*, *amara*, *andina*, *angustifolia*, *appres-*

NAGEIA : —

- sa, argotaenia, aristulata, chilina, caesia, coriacea, corrugata, costalis, Cumingii, curvifolia, discolor, elongata, eurhyncha, falcata, falciformis, ferruginea, flagelliformis, glomerata, gnidioides, Hallii, insignis, japonica, koraiana, laeta, Lambertii, leptostachya, macrophylla, macrostachya, madagascariensis, Mannii, Meyeriana, neglecta, neriifolia, nivalis, Novae-Caledoniae, nubigena, oleifolia, parvifolia, palembanica, Purdicana, salicifolia, Sellowii, spicata, Sprucei, tenuifolia, thevetiaefolia, Totara, usta, Vieillardii, vitiensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 798-800 = *homonyma omnia* Podocarpi.
chinensis, Kuntze, l. c. 800 = *P. macrophylla*, D. Don.
Endlicheriana, Kuntze, l. c. = *P. neriifolia*, D. Don.
ensifolia, Kuntze, l. c. = *P. elata*, R. Br.
excelsa, Kuntze, l. c. = *P. spinulosa*, R. Br.
insignis, Kuntze, l. c. = *P. argotaenia*, Hance.
Kirkiana, Kuntze, l. c. = *P. angustifolius*, Kirk.
latifolia, Kuntze, l. c. = *P. Thunbergii*, Hook.
montana, Kuntze, l. c. = *P. taxifolia*, H. B. & K.
Nagi, Kuntze, l. c. 798 = *P. Nageia*, R. Br.
Pancheri, Kuntze, l. c. 800. = *P. pectinata*, Panch.
polystachya, Kuntze, l. c. = *P. neriifolia*, D. Don.
taxodes, Kuntze, l. c. = *Dacrydium taxioides*, Brongn. & Gris.
tenuifolia, Kuntze, l. c. 800 = *Podocarpus tenuifolia*, Parl.
Teysmannii, Kuntze, l. c. = *P. Teysmanni*, Miq.
valdiviana, Kuntze, l. c. = *P. andina*, Poepp.
Wallichiana, Kuntze, l. c. = *P. latifolia*, Walbr.

NAJAS, Linn. (Najad.). — Ind. Kew. ii. 291.

- gracilis*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. ii. (1893) 61, [an *N. gracillima*, A. Br.?]. — Am. bor.
guadalupensis, Morong, l. c. 60 (= *Caulinia guadalupensis*, Spreng.). — Am. bor.
interrupta, K. Schum. in Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. C (1895) 94. — Afr. trop. or.
microcarpa, C. Bolle, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 153. — Ins. Canar.
microcarpa, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 727. — Bras.
microdon, Morong, in Bot. Gaz. x. (1885) 255 [an *N. microdon*, A. Br.?] = *guadalupensis*, Morong.
pectinata, Magnus, in Aschers. & Schweinf. in Mém. Inst. égypt. [Illustr. Fl. Égypt.] ii. (1887) 145 = *horrida*, A. Br.
Schweinfurthii, Magnus, in Ber. Deutsch. Bot. Gesellschaft. xii. (1894) 220. — Afr. trop. bor.

NALLOGIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 985 = **Champereia**, Griff. (Thymel.).
Gaudichaudiana, Baill. l. c. = *C. Gaudichaudiana*, Van Tiegh.

NAMA, Linn. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. ii. 292.
affinis, *caroliniana*, *corymbosa*, *elegans*, *extraaxillaris*, *floribunda*, *glabra*, *macrosepala*, *megapotamica*, *multiflora*, *nigricaulis*, *paludosa*, *spinosa*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 435 = *homonyma omnia* Hydroleae.
densa, Lemmon, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 222. — Calif.
glandulosa, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 69. [glandulosum] — Mexic.
ovata, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 272 = *Hydrolea ovata*, Nutt.
quadrivalvis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 435 = *H. caroliniana*, Michx.

NANI, Adans. Fam. des pl. ii. 88 (1763) = **NANIA**, Miq. = **Metrosideros**, Banks. (Myrtac.).

- albiflora*, *angustifolia*, *cliata*, *Colensoi*, *comosa*, *diffusa*, *florida*, *hypericifolia*, *lucida*, *macrophylla*, *nerveulosa*, *nitida*, *operculata*, *robusta*, *rubra*, *scandens*, *stipularis*, *suberosa*, *tetrapetala*, *tomentosa*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 242 = *homonyma omnia* *Metrosideros*.
buxifolia, Kuntze, l. c. = *Cloëzia buxifolia*, Brongn. & Gris.
canescens, Kuntze, l. c. = *C. canescens*, Brongn. & Gris.

NANI : —

- chrysantha*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 242 = *Xanthostemon chrysanthus*, F. Muell.
collina, Kuntze, l. c. = *Metrosideros villosa*, Sm.
Deplanchei, Kuntze, l. c. (= *Fremya Deplanchei*, Brongn. & Gris). — N. Caled.
elegans, Kuntze, l. c. (= *F. elegans*, Brongn. & Gris). — N. Caled.
flava, Kuntze, l. c. (= *F. flava*, Brongn. & Gris). — N. Caled.
floribunda, Kuntze, l. c. = *Cloëzia floribunda*, Brongn. & Gris.
glomulifera, Kuntze, l. c. = *Syncarpia laurifolia*, Tin.
Grisii, Kuntze, l. c. = *Cloëzia Deplanchei*, Brongn. & Gris.
gummifera, Kuntze, l. c. = *Spermolepis gummifera*, Brongn. & Gris.
leptoclada, Kuntze, l. c. sphalm. [leptopetala] = *Syncarpia leptopetala*, F. Muell.
ligustrina, Kuntze, l. c. = *Cloëzia ligustrina*, Brongn. & Gris.
obovata, Kuntze, l. c. = *Metrosideros villosa*, Sm.
paradoxa, Kuntze, l. c. = *Xanthostemon paradoxus*, F. Muell.
rubiginosa, Kuntze, l. c. = *Spermolepis rubiginosa*, Brongn. & Gris.
rugosa, Kuntze, l. c. = *Metrosideros villosa*, Sm.
sessilifolia, Kuntze, l. c. = *Cloëzia sessilifolia*, Brongn. & Gris.
ternifolia, Kuntze, l. c. = *Lysicarpus ternifolius*, F. Muell.
Vieillardii, Kuntze, l. c. (= *Fremya Vieillardii*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

NANODES, Lindl. = **Epidendrum**, Linn. (Orchid.).

Mathewsii, Rolfe, in Illustr. Hort. xxxix. (1892) 43, in obs. = *E. Mathewsii*, Reichb. f.

NANOSTELMA, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 247. **ASCLEPIADEAE**.

congolana, Baill. l. c. 248; K. Schum, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 1. (1893) 248 [congolana]. — Congo gall.

NAPEANTHUS, Gardn. (Gesnerac.). — Ind. Kew. ii. 292.

andina, Rusby, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 6. — Bolivia.

apodemus, J. D. Smith, l. c. — Costa Rica.

NAPOLEONA, Beauv. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 292.

Miersii, Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7199. — Afr. trop. occ.

NARCISSUS, [Tourn.] Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 293.

albulus, Levier, in Termész. Füzet. x. (1886) 45. — Eur.

anceps, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 327 = *N. Pseudo-Narcissus*, Linn.

Bachhousei X, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 12. — Hybr. artef.

Bakeri, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 245. — Lusit.

Barkei X, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 12. — Hybr. artef.

Burbridgei X, Hort. ex Baker, l. c. — Hybr. artef.

Buxtoni X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 245. — Lusit.

cyclaminus, Baker, in Bot. Mag. (1887) t. 6950 (= *Ajax cyclaminus*, Haw.). — Lusit.

Fenzlii X, Sprenger, in Gartenfl. xl. (1891) 428 fig. 84. — Hybr. artef.

Grenieri X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 245. — Gall. mer.

hedraeanthus, Colm. Enum. Pl. Penins. v. (1889) 80 = *N. Bulbocodium*, Linn.

Humei X, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 12. — Hybr. artef.

Johnstoni, Baker, l. c. 214 ad calc. = *N. Pseudo-Narcissus*, Linn.

Leda X, Hort. ex Gard. Chron. (1887) i. 832. — Hybr. artef.

NARCISSUS : —

- Margaritae* X, Sprenger, in Gartenfl. xl. (1891) 491 fig. 91. — Hybr. artef.
pallens, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 39. — Hisp.
scaberulus, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 45, cum icon.; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 296. — Lusit.
Princeps X, Hort. ex Gartenfl. xlv. (1886) 263. — Form. hort.
Stella, Hort. l. c. 264. — Form. hort.
Taiti X, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 170 t. b; Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 323. — Hisp.
Victoriae X, Sprenger, in Gartenfl. xli. (1891) 453, fig. 86. — Hybr. artef.

NARDOPHYLLUM, [Hook. & Arn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 294.

Candollei, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 432 (= *Dolichogyne Candollei*, Remy). — Reg. Argent.

paniculatum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 87. — Chili.

parvifolium, Phil. l. c. 434. — Chili.

scoparium, Phil. l. c. — Chili.

NARDOSTACHYS, DC. (Valerian.). — Ind. Kew. ii. 294.

chinensis, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 376. — China.

NARDURUS, Reichb. = **Festuca**, Tourn. (Gramin.).

cynosuroides, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 234 = *F. cynosuroides*, Desf.

NARTHECIUM, Mochr. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 295.

Reverchoni, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 154. — Cors.

NARTHEX, Falc. = **Ferula**, Tourn. (Umbell.).

Polakii, Stapf, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 70. — Persia.

NASSAUVIA, Comm. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 295.

araucana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 83. — Araucan.

argentea, Phil. l. c. 82. — Am. austr.

brevifolia, Phil. l. c. 85. — Am. austr.

glabrata, Phil. l. c. 82. — Am. austr.

humilis, Phil. l. c. 87. — Am. austr.

intermedia, Phil. l. c. 83. — Am. austr.

Lagascae, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 441 (= *Caloptilium Lagascae*, Hook. & Arn.). — Am. austr.

lanigera, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 87. — Am. austr.

latifolia, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 443 (= *Panargyrum latifolium*, Phil.). — Am. austr.

patula, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 84. — Am. austr.

rosulata, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1891) 493 (= *Acanthophyllum rosulatum*, Hook.). — Patagon.

sericea, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 86. — Chili.

spinosa, Phil. l. c. 81. — Am. austr.

NASTANTHUS, Miers = **Boopis**, Juss. (Compos.).

Miersii, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 817, in obs. = *Boopis Miersii*, Fr. Meigen.

NASTURTIIUM, Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 296.

amplexicaule, *arbuscula*, *Armoracia*, *Aucherii*, *bipinnatifidum*, *bipinnatum*, *bonariense*, *brevicaule*, *capitatum*, *Carrerasii*, *chalepense*, *Chichicara*, *chilense*, *cordatum*, *coronopifolium*, *crassifolium*, *crenatifolium*, *dictyotum*, *divaricatum*, *erinaceum*, *fastigiatum*, *flavum*, *flexuosum*, *foliosum*, *Fremontii*, *glastifolium*, *graminifolium*, *groenlandicum*, *hirtellum*, *hirtum*, *humifusum*, *integrifolium*, *lacerum*, *lanatum*, *lasiocarpum*, *latifolium*, *latipes*, *leptopetalum*, *lineare*, *linifolium*, *lyratum*, *majus*, *Menziesii*, *montanum*, *myriocarpum*, *nanum*,

NASTURTIIUM : —

- nebrodense*, *nitidum*, *obtusum*, *oleraceum*, *oxycarpum*, *pedicellosum*, *perfoliatum*, *persicum*, *phlebobotanum*, *pinnatifidum*, *propinquum*, *pubescens*, *fumilum*, *racemosum*, *Ramburei*, *rotundum*, *Serra*, *sordidum*, *spatulatum*, *spicatum*, *spinescens*, *spinosum*, *strongylophyllum*, *subulatum*, *suffuticulosum*, *trifurcum*, *Wrightii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *homonyma omnia* Lepidii.
afghanicum, Kuntze, l. c. = *L. affghanicum*, Boiss.
alyssoides, Kuntze, l. c. = *L. alyssoides*, A. Gray.
americanum, Kuntze, l. c. = *Senebiera pinnatifida*, DC.
barbareaefolium, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1888) 396. — China occ.
bracteatum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 131. — Mexic.
calicotrichum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium nebrodense*, Guss.
capillipes X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa capillipes*, Borb.). — Hung.
Coxi, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxx. (1893) 182. — Chili.
Cunninghamium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium Cunninghamium*, Fisch. & Mey.
dictyotum, Greene, Fl. Francisc. (1891) 268. — Calif.
dubium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium Humboldtii*, DC.
erythrocaule X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa erythrocaulis*, Borb.). — Hung.
eustylis, Benth. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 21 = *Cardamine eustylis*, F. Muell.
Gerardi X, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. i. (1893) 206. — Gall., Germ.
hastatum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxx. (1893) 180. — Chili.
Henryi, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1719. — China centr.
heterophyllum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium hirtum*, Sm.
hungaricum, X, Nym. Consp. Fl. Eur. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa hungarica*, Borb.). — Hung.
Hyi X, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. i. (1893) 206. — Gall.
incisum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium incisum*, Roth.
insipidum, Reverch. ex Fouc. & Rouy Fl. de Fr. i. (1893) 204 = *officinale*, R. Br.
kurdicum, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 35. — Persia.
laxum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 39. — Calif. austr.
ligerinum X, Hy. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. iv. (1894) 11. — Gall.
Maviei X, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. i. (1893) 207. — Gall.
micranthum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxx. (1893) 178 = *flaccidum*, Cham.
microstylum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium nebrodense*, Guss.
millefolium, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 444. — Madag.
monoplocodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium monoplocoides*, F. Muell.
montanum, Bruegg. Jahresb. Nat. Ges. Graubünd. xxxi. Beil. (1887-88) 10. — Helv.
Nasturtium, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 95 = *officinale*, R. Br.
neo-gradense X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa neogradensis*, Borb.). — Hung.
neozelandicum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium incisum*, Roth.
occidentale, Greene, Fl. Francisc. (1891) 268. — Calif.
owahiense, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium owahiense*, Cham. & Schlect.
oxyotum, Kuntze, l. c. = *L. humifusum*, Reg.
patens, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxx. (1893) 178. — Chili.
petrophilum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium nebrodense*, Guss. &

NASTURTIIUM : —

Philippianum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium suffruticosum*, Phil.
repens, Kuntze, l. c. = *L. Draba*, Linn.
sativum, Kuntze, l. c. = *L. sativum*, Linn.
siifolium, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 179 = officinale, R. Br.
sisymbrioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium sisymbrioides* Hook. f.
stenophyllum X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa stenophylla*, Borb.). — Hung.
stenophyllum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 177. — Chili.
stylatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium nebrodense*, Guss.?
subglobosum X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa subglobosa*, Borb.). — Hung.
tibeticum, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 54. — China.
virginicum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium virginicum*, Linn.

NATHUSIA, Hochst. = **Schrebera**, Roxb. (Oleac.).

americana, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 4. — Peruvia,
golungensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 412 = *S. golungensis*, Welw.
Holstii, Engl. & Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 68, et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 308. — Afr. trop. or.
swietenoides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 412 = *Schrebera swietenoides*, Roxb.
trichoclada, Kuntze, l. c. = *S. trichoclada*, Welw.

NATSIATUM, Buch. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 297.
sinense, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1900. — China.

NAUCLEA, Linn. (Rubiaceae). — Ind. Kew. ii. 297.
Chalmersii, F. Muell. Deser. Notes Papuan Pl. viii. (1886) 44. — N. Guin.

cuspidata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 319. — Madag.
Gordoniana, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. x. (1895) 22. — Austral.
sinensis, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1956. — China.

NAUDINIELLA, Krasser, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 195. **MELASTOMACEAE**.

fraterna, Krasser, l. c. (= *Astronia fraterna*, A. Gray). — Ins. Tahit.
glabra, Krasser, l. c. (= *A. glabra*, Triana). — Ins. Societ
samoensis, Krasser, l. c. (= *A. samoensis*, S. Moore). — Ins. Samoa.

NAUMANNIA, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 452. **ZINGIBERACEAE**.
insignis, Warb. l. c. — N. Guin.

NAVARRETTIA, Ruiz & Pav. = **Gilia**, Ruiz & Pav. (Polemon.).

achilleaefolia, aggregata, andicola, androsacea, aristella, aurea, bella, Bolanderi, Brandegei, brevicula, caespitosa, californica, campanulata, capillaris, capitata, ciliata, congesta, crassifolia, debilis, demissa, densiflora, densifolia, depressa, dichotoma, diffusa, filifolia, filiformis, floccosa, floribunda, foetida, Gayana, glutinosa, gossypifera, grandiflora, Gunnisonii, guttata, Havardii, Haydenii, iberidifolia, incisa, inconspicua, Jonesii, lacinata, lanuginosa, latiflora, latifolia, leptomeria, leptotes, linearis, liniflora, lutescens, Macombii, Matthewsii, micromeria, minutiflora, multicaulis, multiflora, nudicaulis, Nuttallii, Orcuttii, Parryae, pinnatifida, polycladon, pumila, pungens, pusilla, Rattanii, rigidula, spicata, stenothyrsa, subnuda, tenella, tenerima, tenuiflora, tenuifolia, Thurberi, tricolor, valdiviensis, virgata, Watsonii, Wrightii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *homonyma omnia* Giliae.

biflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *Phlox biflora*, Ruiz & Pav.

NAVARRETTIA : —

Breweri, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 137 = *Gilia Breweri*, A. Gray.
dianthiflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *G. dianthoides*, Endl.
divaricata, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 136 = *G. divaricata*, Torr.
diversifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *Collomia diversifolia*, Greene.
effusa, Kuntze, l. c. = *Gilia Dunnii*, Kellogg.
eritrichoides, Kuntze, l. c. = *Collomia eritrichoides*, Griseb.
erythraeoides, Kuntze, l. c. = *C. erythraeoides*, Griseb.
filicaulis, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 134 = *Gilia filicaulis*, Torr.
foliacea, Greene, l. c. 138. — Calif.
gilioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443 = *Collomia gilioides*, Benth.
gracilis, Kuntze, l. c. = *C. gracilis*, Dougl.
Gunnisonii, Kuntze, l. c. = *Gilia Gunnisoni*, Torr. & Gray.
hamata, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 138. — Am. bor.
hamata, Greene, l. c. 139 pr. p. = *leptantha*, Greene.
Harknessii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443 = *Gilia Harknessii*, Curran.
Haydenii, Kuntze, l. c. = *G. Haydeni*, A. Gray.
heterodoxa, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 134 = *G. heterodoxa*, Greene.
iberidifolia, B. B. Smyth, Check List pl. Kansas, (1892) 18 = *G. iberidifolia*, Benth.
inconspicua, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443 = *G. parviflora*, Spreng.
Lemmonii, Kuntze, l. c. = *G. Lemmoni*, A. Gray.
leptantha, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 283. — Calif.
longiflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 = *Collomia longiflora*, A. Gray.
lutea, Kuntze, l. c. 433 = *Gilia micrantha*, Steud.
Matthewsii, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 153 (= *Loeselia Matthewsii*, A. Gray). — Am. austr. occ.
mellita, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 134 = *Gilia mellita*, Greene.
millefolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *G. Nevini*, A. Gray.
mitracarpa, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 135. — Calif.
nigellaeformis, Greene, l. c. 132. — Calif.
parviflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *Gilia Bigelovii*, A. Gray.
parvula, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 134 = *G. parvula*, Greene.
peninsularis, Greene, l. c. 136. — Calif.
Philippiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 434 = *Gilia glutinosa*, Phil.
pinnata, Kuntze, l. c. = *Collomia Cavanillesii*, Hook. & Arn.
prolifera, Greene, Pittonia, i. (1887) 135. — Calif.
prostrata, Greene, l. c. 130 = *Gilia prostrata*, A. Gray.
pumila, B. B. Smyth, Check List pl. Kansas, (1892) 18 = *G. pumila*, Nutt.
rubra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *G. coronopifolia*, Pers.
setiloba, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 153. — Calif.
stenosiphon, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 434 = *Collomia stenosiphon*, Kunze.
subuligera, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 137. — Calif.
tagetina, Greene, l. c. — Calif.

NAXIANDRA, Krasser, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 197. **MELASTOMACEAE**.

coriacea, Krasser, l. c. — Borneo.

NAZIA, Adans. = **Tragus**, Hall. (Gramin.).
occidentalis, Scribn. in Zöe, iv. (1894) 386 = *T. occidentalis*, Nees.
racemosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 780; Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 332; Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 120 = *T. racemosus*, Hall.

NEAMYZA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr., xlii. (1895) 25 = **Loranthus**, Linn.
Fieldii, Van Tiegh. l. c. = *L. Fieldii*, Buchanan.

NEBELIA, Neck. (Bruniac.). — Ind. Kew. ii. 299.

angulata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 233 (= *Berardia angulata*, Sond.). — Afr. austr.
aspera, Kuntze, l. c. (= *B. aspera*, Sond.). — Afr. austr.
Dregeana, Kuntze, l. c. (= *B. Dregeana*, Sond.). — Afr. austr.
fragarioides, Kuntze, l. c. (= *B. fragarioides*, Sond.). — Afr. austr.
laevis, Kuntze, l. c. (= *B. laevis*, E. Mey.). — Afr. austr.
microphylla, Kuntze, l. c. (= *B. microphylla*, Sond.). — Afr. austr.
Sonderiana, Kuntze, l. c. — Afr. austr.
sphaerocephala, Kuntze, l. c. (= *B. sphaerocephala*, Sond.). — Afr. austr.

NECKERIA, Scop. = **Corydalis**, Vent. (Papav.).
aurea, Millsp. in Bull. West Va. Agric. Exp. Sta. ii. (1892) 327 = *C. aurea*, Willd.
flavula, Millsp. l. c. = *C. flavula*, Raf.
curvisiliqua, Rydberg, in Bot. Surv. Nebraska, iii. (1894) 24 = *C. curvisiliqua*, Engelm.
micrantha, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 255 = *C. micrantha*, S. Wats. & Coult.

NECTANDRA, Roland (Laurin.) — Ind. Kew. ii. 299.

acutifolia, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 409 = *berchemiaefolia*, Meissh.
anomala, Mez, l. c. 401. — Bras.
baccans, Mez, l. c. 414 (= *Mespilodaphne baccans*, Klotzsch & Karst.). — Columb.
Brittonii, Mez, l. c. 435. — Bolivia.
Catesbyana, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 448; et in Bull. Torrey Bot. Club, (1889) 310 = *Willdenowiana*, Nees.
caucana, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 420. — Columb.
claiophora, Barb. Rodr. [Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 646] *Vellozia*, 1885-88 Sec. edic. (1891) 64 t. 18. — Bras. bor.
debilis, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 446. — Venezuela.
dominicana, Mez, l. c. 399 (= *Oreodaphne dominicana*, Meissh.). — Ins. Dominic.
elongata, Mez, l. c. 444. — Peruvia.
Glaziovii, Mez, l. c. 412. — Bras.
globosa, Mez, l. c. 415 = *sanguinea*, Roland.
granatensis, Mez, l. c. 463. — Columb.
Heydeana, Mez & J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 262, t. 25. — Guatem.
impressa, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 439. — Bras.
Jelskii, Mez, l. c. — Peruvia.
Krugii, Mez, l. c. 422 (= *N. discolor*, Griseb.). — Ind. occ.
laevis, Mez, l. c. 451. — Peruvia.
latifolia, Mez, l. c. 454 = *polita*, Nees.
laxa, Mez, l. c. 400 (= *Synandrodaphne laxa*, Meissh.). — Columb.
lineatifolia, Mez, l. c. 424 = *amazonum*, Nees.
martinicensis, Mez, l. c. 459 (= *Laurus martinicensis* Jacq.). = *sanguinea*, Roland.?
maynensis, Mez, l. c. 428. — Peruvia.
nitida, Mez, l. c. 461. — Mexic.
panamensis, Mez, l. c. 443. — Panama.
Pearcei, Mez, l. c. 444. — Peruvia.
Pichurini, Mez, l. c. 449 = *cuspidata*, Nees.
purpurea, Mez, l. c. 443 = *polita*, Nees.
reticulata, Mez, l. c. 404 = *villosa*, Nees & Mart.
sanguinea, Hitch. Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 125 = *Willdenowiana*, Nees.
Sintenisii, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 419. — Ind. occ.
sinuata, Mez, l. c. 403. — Guatem.
surinamensis, Mez, l. c. 454. — Guian. bat.
Trianae, Mez, l. c. 439. — Columb.
truxillensis, Mez, l. c. 427. — Venezuela.
Tweediei, Mez, l. c. 446 (= *Oreodaphne Tweediei*, Meissh.). — Am. austr.

NECTANDRA : —

umbrosa, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 462 (= *Ceramocarpium umbrosum*, Nees). — Bras. velutina, Mez, l. c. 401. — Columb.

NEEA, Ruiz & Pav. (Nyctagin.). — Ind. Kew. ii. 300.

psychotrioides, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 199. — Guatem.

Wiesneri, *Heimerl.* in *Hook. Jahrb.* xi. (1890) 89. — Columb., Venezuela.

NEGUNDO, Moench (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 300.

Negundo, Karst. *Deutschl. Fl.* (1880-83) 596; Sudworth, in *Gard. and For.* iv. (1891) 166 = *Acer Negundo*, Linn.

nikoense, Nichols, ex *Gard. Kew.* i. Polypet. (1894) 93 = *A. nikoense*, Maxim.

NEILLIA, D. Don (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 300. affinis, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 304. — China occ.

gracilis, *Franch. Pl. Delav.* i. (1890) 204. — Yunnan. alternans, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iv. (1893) 43 = monogyna, *Greene*.

capitata, *Greene*, *Pittonia*, ii. (Dec. 1889) 28 = opulifolia, *Benth. & Hook. f.* var.

longiracemosa, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 304. — China occ.

malvacea, *Greene*, *Pittonia*, ii. (Dec. 1889) 30. — Am. bor. occ.

monogyna, *Greene*, l. c. 29 = *N. Torreyi*, *S. Wats.* sinensis, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1540. — China centr.

thibetica, *Bureau & Franch.* in *Morot. Journ. de Bot.* v (1891) 45. — Tibet.

NELANAREGUM, Adans. = **Naregamia**, Wight. & Arn. (Melast.).

alatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 110 = *Nar. alatum*, *Wight & Arn.*

NELSONIA, R. Br. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 301. brunellodes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 493 = campesttris, *R. Br.***NELUMBO**, [Tourn.] Adans. = **Nelumbium**, Juss. (Nymph.).

Nelumbo, Karst. *Deutschl. Fl.* (1880-83) 553 = *N. speciosum*, Willd.

NEMACLADUS, Nutt. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 301.

oppositifolius, *Robinson*, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 168. — Mexic.

NEMALUMA, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 293 = **Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.).**NEMASTYLIS**, Nutt. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 301.

bracteolata, *Baker*, *Handb. Irid.* (1892) 114 (= *Chlamydostylis bracteolata*, *Baker*). — Bolivia.

brevicaulis, *Baker*, *Handb. Irid.* (1892) 113. — Bolivia.

brunnea, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 162; *Baker*, l. c. 112. — Mexic.

Dugesii, *S. Wats.* l. c. xxiv. (1889) 86; *Baker*, l. c. — Mexic.

flava, *Robinson*, l. c. xxix. (1894) 323 = *N. Dugesii*, *S. Wats.*

grandiflora, *Benth. ex Baker*, *Handb. Irid.* (1892) 113 (= *Gelasine grandiflora*, *Herb.*). — Ecuad.

Pearcei, *Baker*, l. c. 114. — Peruvia.

Pringlei, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 85; *Baker*, l. c. 112. — Mexic.

purpurhucana, *Benth. ex Baker*, *Handb. Irid.* (1889) 114 (= *Gelasine purpurhucana*, *Herb.*). — Peruvia.

sulphurea, *Baker*, l. c. 113. — Bras.

versicolor, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 456. — Mexic.

NEMESIA, Vent. (Scrophul.). Ind. Kew. ii. 302. albiflora, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 28. — Natal.**NEMOPANTHES**, Rafin. = **Nemopanthus**, Rafin. (Ilicin.).

canadensis, *Gattinger*, *Tennessee Fl.* 31, nomen = *N. fascicularis*, *Rafin.*

ilicifolia, *Hort.* ex *Dippel*, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 503; *Koehne*, *Deutsche Dendrol.* (1893) 370 = *Ilex dipyrrena*, *Wall.*

lucida, *Hort.* ex *Koehne*, l. c. 372 = *mucronata*, *Trel.*

mucronata, *Trel.* in *Proc. Am. Acad. Sci. St-Louis* v. (1892) 349; *Baill. Hist. des pl.* xi. (1892) 220. = *Nemopanthus fascicularis*, *Rafin.*

NEMOPHILA, Nutt. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. ii. 302.

intermedia, *Bioletti*, in *Erythea*, iii. (1895) 141. — Calif.

membranacea, *Greene*, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 252. — Calif.

spatulata, *Coville*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 156. — Calif.

NEMOSERIS, *Greene*, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 192 = **Rafinesquia**, Nutt. (Compos.).

californica, *Greene*, l. c. 193; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 220 = *R. californica*, Nutt.

neo-mexicana, *Greene*, l. c. = *R. neo-mexicana*, *A. Gray*.

NINGA, H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 303. macrocarpa, *Scortechini*, ex *Becc. Malesia*, iii. (1889) 180. — Penins. Mal.**NEOBARONIA**, *Baker* = **Phylloxylon**, Baill. (Legumin.).

xiphoclada, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 313. — Madag.

xylophyllodes, *Taub.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 248. — Madag.

NEOBENTHAMIA, *Rolfe*, in *Bot. Mag.* (1892) t. 7221; et in *Gard. Chron.* (1894) ii. 272, fig. 33. ORCHIDEAE.

gracilis, *Rolfe*, l. c. — Afr. trop. or.

NEOBOLUSIA, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx., Beibl. n. 50 (1895) 5. ORCHIDEAE.

Tysoni, *Schlechter*, l. c. (= *Brachycorythis Tysoni*, *Belus*). — Afr. austr.

NEOBOUTONIA, *Muell. Arg.* (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 303.

canescens, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 91; et in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 601. — Afr. trop. or. et centr. bor.

musculiformis, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 126 = *tuberculata*, *Blume*.

NEOCOLLETTIA, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 44, t. 6; *Taub.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 384. LEGUMINOSAE.

gracilis, *Hemsl.* l. c. — Burma.

NEODRYAS, *Reichb. f.* (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 303.

Sacciana, *L. Linden & Cogn.* in *Journ. des Orchid.* iv. (1893) 73. — Bolivia.

NEODYPsis, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1894) 1172; et *Hist. des pl.* xiii. (1895) 371. PALMAE.

Lastelliana, *Baill.* l. c. — Madag.

NEOGLAZIOVIA, *Mez.* in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 426; *Baill. Hist. des pl.* xiii. (1895) 112. BROMELIACEAE.

variegata, *Mez.* l. c. 427; et 112 (= *Dyckia Glaziovii*, *Baker*). — Bras.

NEOGOEZIA, *Hemsl.* in *Kew Bull.* (1894) 354; et in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2424; *Coult.* & *J. N. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 305. UMBELLIFERAE.

gracilipes, *Hemsl.* l. c. 355 et t. 2424 (= *Orcomyrrhis gracilipes*, *Hemsl.*). — Mexic.

NEOGOEZIA : —

minor, *Hemsl.* in *Kew. Bull.* (1894) 355; et in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2425. — Mexic.

planipetala, *Hemsl.* l. c. 355 (= *O. planipetala*, *Hemsl.*). — Mexic.

NEOJOBERTIA, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 35; *K. Schum.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 227. BIGNONIACEAE.

brasiliensis, *Baill.* l. c. — Bras.

NEOLINDENIA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 851; *Lindau*, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 395. ACANTHACEAE.

mexicana, *Baill.* l. c. 851, 867; et 395 (= *Louteri-dium mexicanum*, *S. Wats.*). — Mexic.

NEOLUEDERITZIA, *Schinz.* in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 190. ZYGOPHYLLEAE.

sericocarpa, *Schinz.* l. c. 171, t. 2, fig. a, b. — Afr. austro-occ. extratrop.

NEOMACFADYA, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 26. BIGNONIACEAE.

podopogon, *Baill.* l. c. (= *Macfadyena podopogon*, *Griseb.*). — Cuba.

NEOMACFADYENA, « Baill. » ex *K. Schum.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 227 = **Neomacfadya**, Baill. (Bignon.).**NEOMUELLERA**, *Briq.* in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 180. LABIATAE.

Welwitschii, *Briq.* l. c. — Angola.

NEONELSONIA, *Coult. & J. N. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 306. UMBELLIFERAE.

ovata, *Coult. & J. N. Rose*, l. c. 307, t. 9. — Mexic.

NEOPHLOGA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1894) 1173; et *Hist. des pl.* xiii. (1895) 372. PALMAE.

Commersoniana, *Baill.* l. c. (= *Hyophorbe Commersoniana*, *Mart.*). — Madag.

NEOPHYLUM, *Van Tiegh.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 508 = **Loranthus**, Linn.

acutifolium, *Van Tiegh.* l. c. 509. — N. Caled.

Beaudouinii, *Van Tiegh.* l. c. 548. — N. Caled.

Balansae, *Van Tiegh.* l. c. 510. — N. Caled.

bicolor, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

grandifolium, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

lanceolatum, *Van Tiegh.* l. c. 509. — N. Caled.

latifolium, *Van Tiegh.* l. c. 510. — N. Caled.

luteum, *Van Tiegh.* l. c. 509. — N. Caled.

Pancheri, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

rotundifolium, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

rubrum, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

scandens, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

tenuiflorum, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

Vieillardii, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

NEOPRINGLEA, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 134. CELASTRACEAE.

integrifolia, *S. Wats.* l. c. 135. — Mexic.

NEOSPARTON, *Griseb.* (Verben.). — Ind. Kew. ii. 303.

striatum, *Phil.* in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 60. — Chil

NEOSYRIS, *Greene*, in *Erythea*, ii. (1895) 115 = **Bigelowia**, DC. (Compos.).

fuliginea, *Greene*, l. c. = *B. fuliginea*, *A. Gray*.

hypoleuca, *Greene*, l. c. = *B. hypoleuca*, *A. Gray*.

NEOTTIA, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 303.

Bigelowii, *Ehrenbergii*, *grandiflora*, *Mertensiana*, *mexicana*, *multiflora*, *odontorhiza*, *punctata*, *striata*.

Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 674 = *homonyma omnia* *Corallophoraceae*.

Corallophoraceae, *Kuntze*, l. c. = *C. innata*, *R. Br.*

crobachoides, *St Lager*, in *Morot. Journ. de Bot.* viii. (1894) 84 = *N. Nidus-Avis*, *Rich.*

NEPENTHES, Linn. (Nepenth.). — Ind. Kew. ii. 304.

Amesiana ×, Veitch, in Gard. Chron. (1893) ii. 756; et ex Kew Bull. Add. Ser. IV. (1895) 271. Hybr. artef.

Burkei ×, Hort. Veitch, ex Gard. Chron. (1889) ii. 492 et 493 fig. 69. — Hybr. artef.

Curtisii, Mast. l. c. (1887) ii. 681 et 689 fig. 139; et (1889) ii. 660 et 661 fig. 90; et in Bot. Mag. (1890) t. 7138; *Illustr. Hort.* xxv. (1888) 65 t. 59. — Borneo.

cylindrica ×, Hort. Veitch. l. c. (1887) ii. 521 fig. 103; et (1889) i. 81. — Hybr. artef.

Dicksoniana ×, Lindsay, l. c. (1888) ii. 541 et 543 fig. 78; et in Gartenfl. xxxviii. (1889) 464 fig. 73. — Hybr. artef.

Edgeworthii, Reichb. f. ex G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (May 1895) 183 = *N. Edwardsiana*, Low.

edinesis ×, Lindsay, in Gard. Chron. (1888) i. 470. — Hybr. artef.

excelsior ×, Williams, in The Garden (1885) ii. 463; G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1895) 147. — Hybr. artef.

fallax, G. Beck, l. c. (May 1895) 191. — Borneo.

Hibberdii ×, Williams, l. c. 218. — Hybr. artef.

hispida, G. Beck, l. c. (May 1895) 187. — Borneo.

Hookerae, Hort. ex G. Beck, l. c. (June 1895) 222. — Form. hort.

Hookeriana, « Hort. Low » (err. cal. *Hookeriana*) ex Becc. Malesia, iii. (1886) 3 = *N. Rafflesiana*, Jack.

longinodis, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (May 1895) 190 = *gracilis*, Korth.

mixta ×, Veitch, in Gard. Chron. (1893) i. 46 fig. 9. — Hybr. artef.

Northisii ×, Veitch, l. c. (1892) ii. 561 = *mixta*, Veitch.

O'Brieniana, L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hortic. xxxvii. (1890) 109 = *rufescens*, Veitch.

Paradisae, ×, Hort. ex G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (June 1895) 222. — Hybr. artef.

rufescens ×, Veitch, ex Gard. Chron. (1888) ii. 609, fig. 95. — Hybr. artef.

singalana, Becc. Malesia, iii. (1886) 12 t. 2 = *sanguinea*, Lindl.

Smilesii, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 116. — Siam.

Smithii, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (May 1895) 188. — Borneo.

speciosa, Hort. ex G. Beck, l. c. 226 = *distillatoria*, Linn.

spuria, G. Beck, l. c. 187. — Borneo.

stenophylla, Mast. in Gard. Chron. (1890) ii. 240 et (1892) i. 402 fig. 58. — Borneo.

Traubiana, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 318. — N. Guin.

vittata, Hort. ex G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (April 1895) 150 = *ampullacea*, W. Jack.

NEPETA, Riv. ex Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 305.

Amani, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 29 et 411. — Syria.

Bellevii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 204. — Afghan.

callichroa, Hausskn. & Briq. in Mitth. Bot. Ver. Jena, viii. (1890) 21. — Persia.

Ehlersii, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 268, nomen. — Afr. trop. or.

flexuosa, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 452 sphalm. (= *Origanum flexuosum*, Walt.). = *Pycnanthemum limifolium*, Pursh.

Fordii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 289. — China

hederacea, Britton, Stern & Pogg. Prel. m. Catal. (1888) 43; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 30; Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 294

N. Glechoma, Benth.

lanceolata, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. et l. 8 ii. (1889) 669 = *grandiflora*, Vill.

Hemslayana, Oliver, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 305. — Reg. Himal.

moldavica, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 30 = *Dorycnium moldavicum*, Linn.

pharica, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 306. — Belutchist.

NEPETA:

rigida, G. Beck, Fl. Nied. Oest. ii. ii. (1893) 1004 (= *Glechoma rigida*, A. Kern.) = *N. Glechoma*, Benth. Sewerzowii, Regel, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 96. — Turkest.

Shepardii, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 439 = *Micromeria Shepardii*, Post.

subintegra, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 90. — Mongolia.

Wettsteinii, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 226. — Persia.

NEPHELAPHYLLUM, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 307.

grandiflorum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 192. — Penins. Mal.

latilabre, Ridl. ex Staff, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 238. — Borneo.

nudum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 192. — Penins. Mal.

NEPHELIUM, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 307.

basaccense, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) sub t. 319 b. = *basaccense*, Pierre.

bassaccense, Pierre, l. c. [basaccense, in text.]. — Cochinch.

cochinchinense, Pierre, l. c. Fasc. 21 (1895) sub t. 321a (= *Xerospermum cochinchinense*, Pierre, l. c. t. 321). — Cochinch.

Lauteriana, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iv. (1891) 8. — Austral.

oppositifolium, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 379 (= *Stadmannia oppositifolia*, Poir.). — Ins. Borbon.

Thorelii, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 20 (1894) sub t. 320 A, in syn. (= *Gnemidiscus Thorelii*, Pierre). — Cochinch.

NEPHRADENIA, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 307.

fruticosa, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 196. — Guatem.

NEPHROPHYLLIDIUM, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 105. **GENTIANEA**.

Crista-galli, Gilg, l. c. fig. 47 (= *Menyanthes Crista-galli*, Griseb.). — Am. bor. occ.

NEPHTHYTIS, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 308.

picturata, N. E. Dr. in Gard. Chron. (1887) i. 476; et ex Gartenfl. xxxvii. (1888) 184 fig. 40. — Congo.

NEPTUNIA, Lour. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 308.

virgata, Trelease, ex Branner & Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888 i. (1891) 178

lutea, Benth.

NERAUDIA, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 308.

kahoolawensis, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 416. — Ins. Sandvic.

NERINE, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 308.

appendiculata, Baker, in Gard. Chron. (1894) ii. 336. — Hab.?

Elwesii, Hort. Leichtl. l. c. (1886) i. 42. — Form. hort.

insignis, Hort. Leichtl. l. c. 41. — Form hort.

laticoma, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 256 = *lucida*, Herb.

Mansellii ×, Hort. O'Brien, ex Baker, Handb. Bromel. (1888) 104. — Hybr. artef.

Moorei, Leichtl. l. c. (1886) ii. 681. — Hab.?

mutabilis ×, O'Brien, l. c. (1893) i. 130; Bois, in Rev. Hortic. lxx. (1893) 384. — Hybr. artef.

profusa, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 100 = *sarniensis*, Herç.

Stricklandii ×, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 690. — Hybr. artef.

NERTERA, Banks & Soland. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 309.

sinensis, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn Soc. xxiii. (1888) 391, t. 10. — China.

NESAEA, Comm. (Lythrar.). — Ind. Kew. ii. 308.

kilimandscharica, Koehne, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 286. — Afr. trop. or.

Luederitzii, Koehne, ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 251. — Afr. austro-occ. extra-trop.

mucronata, Koehne, ex Schinz, l. c. 248. — Afr. austro-occ. extratrop.

Schinzii, Koehne, ex Schinz, l. c. 250. — Afr. austro-occ. extratrop.

Stuhlmannii, Koehne, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 286. — Afr. trop. or.

triflora, Baill. [an H. B. & K.?] Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 359. — Madag.

Volkensii, Koehne, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 286. — Afr. trop. or.

NESLIA, Desv. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 309.

thracica, Velen. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 122 et 375. — Bulg.

NESOGORDONIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 555. **TERNSTROEMIACEAE**.

Bernieri, Baill. l. c. 535 et 563. — Madag.

NESOLUMA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 964; et Hist. des pl. xi. (1892) 279 = **Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.).

polynesiacum, Baill. ll. cc. = *C. polynesiacum*, Hillebr.

NESTLERA, Spreng. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 309.

corymbosa, Bolus, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2324. — Afr. austr.

virgata, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 25. — Natal.

NESTRONIA, Rafn. = **Buckleya**, Torr. (Santal.).

distichophylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 589 = *B. distichophylla*, Torr.

quadrata, Kuntze, l. c. = *B. lanceolata*, Mig.

umbellata, Kuntze, l. c., sphalm. = *B. umbellulata*, Rafn.). — Am. bor.

NEUMANNIA, Brongn. = **Pitcairnia**, L'Hérit. (Bromel.).

arcuata, Ed. André, in Rev. Hortic. lviii. (1886) 108 cum icon. = *P. arcuata*, Ed. André.

Lindenii, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 112, in syn. = *P. Lindenii*, Baker.

NEUMANNIA, A. Rich. = **Aphloia**, Benn. Bixin.).

deltoidea, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 43 = *Prockia deltoidea*, Lam.

madagascariensis, Warb. l. c. = *A. madagascariensis*, Clos.

minima, Warb. l. c. = *A. minima*, Baker.

NEURACHNE, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 310.

Muelleri, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 329. — Austral.

NEUROLAENA, R. Br. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 310.

Liedmannii, Sch. Bip., ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 146, in syn. = *S. Liedmannii*, Klatt.

pedicellata, Sch. Bip. l. c. = *pedicellata*, Klatt.

tenuifolia, Sch. Bip. ex Klatt, l. c. = *Jaumea tenuifolia*, Klatt.

NEUROLOBIUM, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 749; et Hist. des pl. x. (1888) 191; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 154. **APOCYNEAE**.

cymosum, Baill. ll. cc. — Bras.

NEUROPELTIS, Wall. (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 311.

Mainayi, Peter, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 500, in obs. = *Lettsomia Mainayi*, C. B. Clarke?

NEUROTHECA, Salisb. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 311.

loeselioides, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 138 (= *Ocotyleura loeselioides*, Benth.), = *loeselioides*, Oliver [Conf. Ind. Kew. ii. 311].

NEUCASTLIA, F. Muell. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 311.

Dixon, F. Muell. & Tate, in Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral. x. (1888) 81; F. Muell. in Bot. Centralbl. xxxiii. (1888) 119. — Austr.

NEUWIEDIA, Blume, (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 311.

calanthoides, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 355, t. 271. — N. Guin.

Curtisii, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 232; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 175. — As. trop. Lindleyi, Rolfe, l. c. 233; et 175; Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 763. — Penang, Borneo.

NEWTONIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 721; Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 385. **LEGUMINOSAE**. insignis, Baill. l. c. — Afr. trop. occ.

NEWTONIA, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1895) 285 et 391 = **Antunesia**, O. Hoffm. (Compos.).
angolensis, O. Hoffm. l. c. — Angola.

NHANDIROBA, Barrère = **Fevillea**, Linn. (Cucurb.).

albiflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 257 = F. *albiflora*, Cogn.
cordifolia, Kuntze, l. c. = F. *cordifolia*, Linn.
deltodea, Kuntze, l. c. = F. *deltodea*, Cogn.
Karstenii, Kuntze, l. c. = F. *Karstenii*, Cogn.
Moorei, Kuntze, l. c. = F. *Moorei*, Hook. f.
trilobata, Kuntze, l. c. = F. *trilobata*, Linn.

NICODEMIA, Ten. (Logan.). — Ind. Kew. ii. 311.

Baroniana, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2238. — Madag.
grandifolia, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 34. — Madag.
Hermanniana, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 469. Ins. Borbon.
Isleana, Cordem. l. c. 468. — Ins. Borbon.
rufescens, Solerod. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 558. — Madag.

NICOTIBA, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 56 = **Justicia**, Houtt. (Acanth.).

Betonica, Lindau, l. c. = J. *Betonica*, Linn.
fittonioides, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 329 = J. *fittonioides*, S. Moore.
lancofolata, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 38. — Afr. centr. bor.
marginata, Lindau, l. c. xxii. (1895) 119. — Kamerun.
nilgherrensis, Lindau, l. c. xviii. (1894) 56 = J. *nilgherrensis*, Wall.
trinervia, Lindau, l. c. = J. *trinervia*, Vahl.
trinervis, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 329 = praec.
versicolor, Lindau, l. c. xxii. (1895) 118. — Angola.

NICOTIANA, Linn. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 311.

brachysolen, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 62. — Am. austr.
breviloba, Jeffrey, in Kew Bull. (1894) 102. — Chili.
cardiophylla, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 772. — Chili.
caudigera, Phil. l. c. 764. — Chili.
Collae, Phil. l. c. 765 (= *Bouchetia erecta*, DC.). — Texas, Mexic.

NICOTIANA: —

colossea, Éd. André, in Rev. Hortic. (1888) 511; et (1891) 75 et 210; Godefr.-Lebœuf, in Le Jardin (1889) 274, cum ic.; Gard. Chron. (1891) i. 84, fig. 25 = *tomentosa*, Ruiz. & Pav.
copiapina, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 771 = *Berteroana*, Hort.
coquimbana, Phil. l. c. 769. — Chili.
flexuosa, Jeffrey, in Kew Bull. (1894) 101. — Uruguay.
Greeneana, J. N. Rose, ex Vasey & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 18. — Calit.
heterophylla, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 767. — Chili.
linearis, Phil. l. c. 766. — Chili.
longibracteata, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 62. — Chili.
mendocina, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 769. — Chili.
modesta, Phil. l. c. 765. — Chili.
oligantha, Phil. l. c. 767. — Chili.
parvula, Phil. l. c. 768. — Chili.
uspallabensis, Phil. l. c. 770. — Chili.

NIDORELLA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 313.

ligulata, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 28. — Madag.
pedunculata, Oliver, in F. L. James, Unkn. Horn of Afr. Append. (1888) 319. — Reg. Somal.

NIDULARIUM, Lem. = **Karatas**, Adans. (Bromel.).

agavaefolium, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 4 = K. *denticulata*, Baker.
Beuckeri, Hort. ex Rev. Hortic. Belg. xii. (1888) 110. — Form. hort.
bracteatum, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 224 = *Aechmea billbergioides*, Baker.
Chantrieri X, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hortic. lxvii. (1895) 45, cum ic. — Hybr. artef.
compactum, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 235. — Bras.
concentricum, Mez, l. c. 239 = K. *acanthocrater*, Baker.
digeneum X, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 121 t. 1. — Hybr. artef.
emergens, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 621, in obs. — Bras.
eximium, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 11 = K. *spectabilis*, Antoine.
fragrans, Hort. ex Baker, l. c. 47 = *Aechmea augusta*, Baker.
guyanense, A. Brongn. ex Baker, l. c. 91, in syn. = K. *Morreniana*, Antoine.
latifolium, Hort. ex Baker, l. c. 69 = Ae. *viridis*, Baker.
longibracteatum, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 239. — Bras.
macracanthum, Regel, in Gartenfl. xxxv. (1886) 297, fig. 34. — Bras.
Makoyanum, Regel, l. c. xxxvi. (1887) 656; et in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 368. — Am. trop.
Makoyanum, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 6 [an praec.?] = K. *neglecta*, Baker.
Marechali, Hort. ex Baker, l. c. 9 = K. *fulgens*, Antoine?
marmoratum, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 11. — Bras.?
Morrenianum, Hort. ex Baker, l. c. 9, in syn. = K. *Morreniana*, Antoine.
neglectum, Hort. ex Baker, l. c. 6 = K. *neglecta*, Baker.
pauciflorum, Lindm. in Svensk. Akad. Handl. xxiv. n. viii. 17, t. 1, fig. 8-18 = *Aechmea billbergioides*, Baker.
Paxianum, Mez, in Gartenfl. xlv. (1895) 297, t. 1415. — Bras.
porphyreum, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 219 = *Aechmea purpurea*, Baker.
pubisepalum, Mez, l. c. 246 et 621, in obs. = Ae. *Burchelli*, Baker.
pulverulentum, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 9, in syn. = K. *Morreniana*, Antoine.
rubens, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 219. — Bras.

NIDULARIUM: —

spectabile, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 10 = *Karatas princeps*, Baker.
striatum, Catal. Bull. (1888) 8; [Conf. Gard. Chron. (1888) ii. 273; et (1890) ii. 183; Rev. Hort. Belg. xvii. (1891) 204, cum xylogr.]. — Bras.
Wawreanum, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 245 = K. *amazonica*, Baker, var.

NIDUS, Riv. Icon. pl. (1760) 3 t. 7, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 674 = **Neottia**, Linn. (Orchid.).

listerodes, Kuntze, l. c. = *Neottia listeroides*, Lindl.
micranthus, Kuntze, l. c. = N. *micrantha*, Lindl.

NIEBUHRIA, DC. (Capparid.). — Ind. Kew. ii. 312.

mucronata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 38 (= *Crataeva mucronulata*, Kuntze). — Cochinch.

NIEDENZUA, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 106 = **Adenochlaena**, Baill. (Euphorb.).

cordata, Pax, l. c. 107 (= *A. leucocephala*, Baill.). — Ins. Comor.

NIGELLA. [Tourn.] Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 314.

Huthii, Brand, in Helios, xiii. (1895) 26 et 191. — Ins. Samos.
intermedia, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 122, in obs. = *hispanica*, Linn.
Tauberti, Brand, in Helios, xiii. (1895) 27 et 192. — Afr. bcr.

NIGRINA, Linn. = **Melasma**, Berg. (Scrophul.).

ovatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 463 = M. *ovatum*, E. Mey.
physalodes, Kuntze, l. c. = M. *hispidum*, Benth.
rhinanthodes, Kuntze, l. c. = M. *rhinanthoides*, Benth.

NIGRITELLA, Rich. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

Moritziana X, Bruegg. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 292. — Helv.
rubra, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 278; Wettst. ex Pacher, Nachtr. Fl. Karnt. (1894) 34. — Alp., Carpath.

NISSOLIA, Jacq. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 315.

confertiflora, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 424. — Mexic.
setosa, T. S. Brandegee, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 127. — Calif.

NOAIA, Moq. (Chenop.). — Ind. Kew. ii. 315.

mucronata, Aschers. & Schweinf. Illustr. Fl. Egypt. [Mém. Inst. égypt. ii. (1887) 131 = *spinosissima*, Moq.

NOCCAIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 354 = **NOCCAIA**, Cav. = **LAGASCEA**, Cav. (Compos.).

angustifolia, Kuntze, l. c. = L. *angustifolia*, DC.
biflora, Kuntze, l. c. = L. *biflora*, Hemsl.
decipiens, Kuntze, l. c. = L. *decipiens*, Fenzl.
heteropappus, Kuntze, l. c. = L. *heteropappus*, Hemsl.
Mociniana, Kuntze, l. c. = L. *Mociniana*, DC.

NOCCAIA, Moench (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 316.

affinis, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 90 = *alpina*, Reichb.
crassifolia, Rouy & Fouc. l. c. 91 et 92 = *Capsella procumbens*, Reichb.
diffusa, Rouy & Fouc. l. c. = C. *procumbens*, Reichb.
maritima, Rouy & Fouc. l. c. = C. *procumbens*, Reichb.
pauciflora, Rouy & Fouc. l. c. 92, in obs. = C. *pauciflora*, Koch.
Prostii, Rouy & Fouc. l. c. 92 et 93 (= *Hutchinsia Prostii*, J. Gay) = C. *pauciflora*, Koch.
Revelieri, Rouy & Fouc. l. c. 91 et 93 = C. *procumbens*, Reichb.

NOCCEAE : —

speluncarum, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 91 et 93 = *Capsella procumbens*, Reichb.
Tournefortii, Rouy & Fouc. l. c. 91 et 92 = *C. procumbens*, Reichb.

NOITTETIA, « H. B. & K. » ex Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 21, sphalm. = **Noisettia**, H. B. & K. (Violar.).

NOLANA, Linn. (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 316. *alba*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 32. — Am. austr.
Carrera, Phil. l. c. 31. — Am. austr.
debilis, Phil. l. c. 29. — Am. austr.
geminiflora, Phil. l. c. 27. — Am. austr.
leucantha, Phil. l. c. 34. — Am. austr.
linearifolia, Phil. l. c. 28. — Am. austr.
napiformis, Phil. l. c. 30. — Am. austr.
Navarri, Phil. l. c. — Am. austr.
ochrocarpa, Phil. l. c. 33. — Am. austr.
parviflora, Phil. l. c. 34. — Am. austr.
parvifolia, Phil. l. c. 35. — Am. austr.
pterosperma, Phil. l. c. 27. — Am. austr.
rupestris, Phil. l. c. 28. — Am. austr.
sessiliflora, Phil. l. c. 32. — Am. austr.
stans, Phil. l. c. 31. — Am. austr.

NOLINA, Michx. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 316. *Beldingi*, T. S. Brandeg. in Zool. i. (1890) 305. — Calif.
Bigelovii, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 208 = *N. Bigelovii*, S. Wats.
Brittoniana, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club. xxii. (1895) 158. — Florida

NOLLETIA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 316. *arenosa*, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 76; et ex Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 251. — Afr. austro-occ. extratrop.
costata, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 430. — Afr. austro-occ. extratrop.

NOMOCHARIS, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 113, Baill. Hist. des pl. xiii. (1894) 580. **LILIACEAE**.
pardanthina, Franch. l. c. — China.

NOMOPHILA, Blume (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 316. *gracillima*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 196. — Afr. austro-occ. extratrop.

NONATELIA, Aubl. = **Lasianthus**, Jacq. (Rubiace.).

acuminata, *africana*, *andamanica*, *apiocarpa*, *appressa*, *attenuata*, *Biermannii*, *Blumeana*, *capitata*, *capitulata*, *chincensis*, *chrysoneura*, *chrysophylla*, *ciliata*, *constricta*, *crinita*, *cyanocarpa*, *dichotoma*, *elliptica*, *firma*, *Gardneri*, *glabrescens*, *Griffithii*, *Helperi*, *hexandra*, *Hookeri*, *inconspicua*, *Jachiana*, *Kurzii*, *laevigata*, *lanceifolia*, *latifolia*, *longicauda*, *longifolia*, *lucida*, *Maingayi*, *micrantha*, *Moonii*, *Moralesii*, *mucronulata*, *obliqua*, *oblongifolia*, *obovata*, *obscura*, *oligantha*, *ovata*, *palembanica*, *parvifolia*, *pauciflora*, *pilosa*, *platyphylla*, *pterosperma*, *purpurea*, *reticulata*, *velosa*, *Rhinocerotis*, *rhizophylla*, *rigida*, *rufa*, *sikhimensis*, *stipularis*, *strigillosa*, *strigosa*, *subsessilis*, *tentaculata*, *Thwaitesii*, *tomentosa*, *truncata*, *tubifera*, *varians*, *venosa*, *venulosa*, *Walkeriana*, *Wightiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 290-91 = *homonyma* *omnia* *Lasianthi*.

acutata, Kuntze, l. c. 291 = *L. mucronatus*, Miq.
africana, Kuntze, l. c. = *Triainolepis africana*, Hook. f.
amazonica, Kuntze, l. c. = *Psychotria amazonica*, Muell. Arg.
borbonica, Kuntze, l. c. 290 = *Psathura borbonica*, J. F. Gmel.
cataractarum, Kuntze, l. c. 291 = *Psychotria cataractarum*, Muell. Arg.
cinnamomodes, Kuntze, l. c. = *L. reticulatus*, Blume.
densiflora, Kuntze, l. c. = *L. densifolius*, Miq.
grandifolia, Kuntze, l. c. = *Psychotria grandifolia*, Hoffmgg.

NONATELIA : —

Hildebrandtii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 291 = *Triainolepis Hildebrandtii*, Vathe.
inaequalis, Kuntze, l. c. = *Lasianthus cyanocarpus*, Jack.
macrothyrsa, Kuntze, l. c. = *Psychotria macrothyrsa*, Muell. Arg.
megalophylla, Kuntze, l. c. = *P. megalophylla*, Muell. Arg.
myrtifolia, Kuntze, l. c. 290 = *Psathura myrtifolia*, A. Rich.
nitida, Kuntze, l. c. 291 = *Lasianthus strigosus*, Wight.
sechellarum, Kuntze, l. c. 290 = *Psathura sechellarum*, Baker.
sessiliflora, Kuntze, l. c. (= *Octavia sessiliflora*, DC.). — Guian.
sylvestris, Kuntze, l. c. = *Lasianthus sylvestris*, Blume.
Sprucei, Kuntze, l. c. = *Psychotria Sprucei*, Muell. Arg.
stercatoria, Kuntze, l. c. = *L. stercorarius*, Blume.
ternifolia, Kuntze, l. c. = *Psathura ternifolia*, A. Rich.
umbellata, Kuntze, l. c. = *Lasianthus umbellatus*, Kuntze.
Wallisiana, Kuntze, l. c. 291 = *Psychotria Wallisiana*, Muell. Arg.

NONNEA, Medic. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 317. *affinis*, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 19. — Persia.
anomala, Hausskn. & Bornum, l. c. — As. Min.
commutata, Petrovic, Addit. Fl. Serb. (1885) 130. — Serbia.
vesicaria, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 164 = *violacea*, A. DC.

NOPAL silvestre, Thierry, ex Foerst. - Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 929 = *Opuntia Hernandezii*, DC.

NORMANBYA, F. Muell. = **Ptychosperma**, Labill. (Palm.).
australis, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 364 (= *Saguerus australis*, Wendl. & Drude). — Austral.

NORONHIA, Stadm. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 317.
divaricata, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 32. — Madag.

NORTHEA, Hook. f. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 317.
Hornei, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 14 = *seychellana*, Hook. f.

NORYSCA, Spach = **Hypericum**, Tourn. (Hyperic.).
Kalmiana, C. Koch, ex Dippel, Handb. Laubholz k. iii. (1893) 51 = *H. Kalmianum*, Linn.
urata, C. Koch, ex Dippel, l. c. 46 = *H. patulum*, Thimb.

NOTAPHOEBE, « Blume » ex Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1889) 116 = **NOTHAPHOEBE**, Blume = **Alseodaphne**, Nees (Laurin.).
alpigena, Pax, l. c. = *Persea alpigena*, Spreng.
borbonica, Pax, l. c. = *P. carolinensis*, Nees.
cubensis, Pax, l. c. = *P. cubensis*, Meissn.

NOTHOCALAIS, Greene, in Bull. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1886) 54 = **Microseris**, D. Don (Compos.).
cuspidata, Greene, in Bull. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1886) 55 = *Troximon cuspidatum*, Pursh.
Suksdorfii, Greene, l. c. 54. — Washingt.
troximoides, Greene, l. c. 54 = *Microseris troximoides*, A. Gray.

NOTHOCELASTRUS, Blume, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113, in syn. = **Celastrus**, Linn.
alpestre, Blume, ex Kuntze, l. c. = *C. alpestris*, Blume.

NOTHOCHILUS, Radlk. in Sitz. math.-phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xix. (1889) 216. **SCRÖPHULARINEAE**.
coccineus, Radlk. l. c. 217. — Bras.

NOTHOPANAX, Miq. = **Panax**, Linn. (Aral.).
Bastardianus, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 8 (1894) 47 = *P. Bastardianum*, Decne.
diversifolius, Harms, l. c. 48 = *Acanthopanax diversifolius*, Hemsl.
Edgerleyi, Harms, l. c. = *P. Edgerleyi*, Hook. f.
integrifolius, Harms, l. c. = *Panax integrifolium*, Colenso.
linearis, Harms, l. c. = *P. lineare*, Hook. f.
microphyllum, Harms, l. c. 47 = *P. microphyllum*, Colenso.

NOTHOSAERUA, Wight (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 318.
brachiata, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 206 = *brachiata*, Wight.

NOTICASTRUM, DC. = **Aster**, Tourn. (Compos.).
glandulosum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 409. — Am. austr.
leucophyllum, Phil. l. c. 408. — Am. austr.
Sanfurgi, Phil. l. c. 409. — Am. austr.

NOTOCERAS, R. Br. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 319.
bicornis, Caruel, ex Aschers. & Schweinf. Illustr. Fl. Egypt. [Mém. Inst. égypt. ii. (1887) 39 (= *N. bicornis*, Amo) = *carnariense*, R. Br.

NOTONIA, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 319.
vestita, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 75. — Burma.

NOTOTHIXOS, Oliver (Loranth.). — Ind. Kew. ii. 319.
malayanus, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1519. — Penang.

NOTOTHLASPI, Hook. f. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 319.
Hookeri, J. Buch, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 255, t. 13. — N. Zel.

NOTOTRICHUM, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 372. **AMARANTACEAE**.
humile, Hillebr. l. c. 373. — Ins. Sandwic.
sandwicense, Hillebr. l. c. 373 (= *Ptilotus sandwicensis*, A. Gray). — Ins. Sandwic.
viride, Hillebr. l. c. 373. — Ins. Sandwic.

NOTYLIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 319.
brevis, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 194. — Am. austr.
Bungerothii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 38. — Am. aequat.
guatemalensis, S. Wats. in T. Brigham, Guatem., Append. (1887) 429, nomen; et in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 477. — Guatem.
xiphophorus, Reichb. f. in Flora, lxi. (1886) 552. — Am. austr.

yauaperyensis, Barb. Rodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 131. — Bras. bor.

NOUELIA, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 66. **COMPOSITAE**.
insignis, Franch. l. c.; et in Rev. Hortie. lxi. (1889) 229, fig. 60. — China occ.

NUMMULARIA, Gron. = **Steironema**, Rafin. (Primul.).
ciliata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 398 = *S. ciliatum*, Rafin.
lanceolata, Kuntze, l. c. = *S. heterophyllum*, Rafin.
longifolia, Kuntze, l. c. = *S. longifolium*, Rafin.
radicans, Kuntze, l. c. = *S. radicans*, A. Gray.
thyrsiflora, Kuntze, l. c. = *Lysimachia thyrsiflora*, Linn.

NUNNEZHAROA, Ruiz & Pav. = **Chamaedorea**, Willd. (Palm.).
affinis, *alternans*, *amazonica*, *Andreana*, *Arenbergiana*,

NUNNEZHAROA: —

- atrovirens*, *aurantiaca*, *Bartlingiana*, *bifurcata*, *brachyclada*, *bracteata*, *brevifrons*, *Casperiana*, *cata-ractarum*, *concolor*, *conocarpa*, *costaricana*, *Deche-riana*, *elatior*, *elegans*, *Ernesti-Augusti*, *fenestrata*, *flavovirens*, *formosa*, *glauca*, *glaucifolia*, *graminifolia*, *humilis*, *Klotzschiana*, *lanceolata*, *lepidota*, *Linde-niana*, *linearis*, *macrospadix*, *Martiana*, *membrana-cea*, *microphylla*, *montana*, *oblongata*, *oreophila*, *Pacaya*, *paradoxa*, *pauciflora*, *pochuillensis*, *pygmaea*, *radicalis*, *resinifera*, *Sartorii*, *Schiedeana*, *Tepejilote*, *Wallisii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 730-31 = *homonyma omnia* Chamaedoreae.
- amabilis*, Kuntze, l. c. 731 — Hab. ?
- biloba*, Kuntze, l. c. = *C. Bartlingiana*, H. Wendl.?
- Chonta*, Kuntze, l. c. = *Juania australis*, Drude.
- corallina*, Kuntze, l. c. (= *Morenia corallina*, Karst.) — N. Granat.
- corallocarpa*, Kuntze, l. c. (= *M. corallocarpa*, Hort.) — N. Granat.
- Demaniana*, Kuntze, l. c. 731. — Hab. ?
- desmoncoides*, Kuntze, l. c. 730 = *C. desmoncoides*, H. Wendl.
- eburnea*, Kuntze, l. c. 731. — Hab. ?
- flexuosa*, Kuntze, l. c. = *C. Martiana*, H. Wendl.
- humilis*, Kuntze, l. c. — Hab. ?
- integrifolia*, Kuntze, l. c. 730 (= *Morenia integri-folia*, Trail.) — Bras.
- Karwinskiana*, Kuntze, l. c. = *C. elatior*, Mart.
- latifrons*, Kuntze, l. c. 731 = *C. Arenbergiana*, H. Wendl.?
- Liboniana*, Kuntze, l. c. — Hab. ?
- Liebmanni*, Kuntze, l. c. 730 = *C. Liebmanni*, Mart.
- lunata*, Kuntze, l. c. = *C. oblongata*, Mart.
- mexicana*, Kuntze, l. c. 731 = *C. Sartorii*, Liebm.
- Morenia*, Kuntze, l. c. 730 = *C. gracilis*, Willd.
- oaxacensis*, Kuntze, l. c. = *C. montana*, Liebm.
- pinnatifrons*, Kuntze, l. c. = *C. gracilis*, Willd.
- Poeppigiana*, Kuntze, l. c. (= *Morenia Poeppigiana*, Mart.) — Peruvia.
- polita*, Kuntze, l. c. 731. — Hab. ?
- pulchella*, Kuntze, l. c. = *C. pulchella*, Liebm.?
- regia*, Kuntze, l. c. = *C. desmoncoides*, H. Wendl.?
- repens*, Kuntze, l. c. = *C. desmoncoides*, H. Wendl.?
- rigida*, Kuntze, l. c. — Hab. ?
- robusta*, Kuntze, l. c. = *C. robusta*, Hort.
- simplicifrons*, Kuntze, l. c. = *C. Ernesti-Augusti*, H. Wendl.
- speciosa*, Kuntze, l. c. = *C. Schiedeana*, Mart.
- velutina*, Kuntze, l. c. = *C. lepidota*, H. Wendl.
- Verschaffeltii*, Kuntze, l. c. = *C. Verschaffeltii*, Hort.
- Warscewicziana*, Kuntze, l. c. = *C. Warscewic-zii*, H. Wendl.
- Wendlandiana*, Kuntze, l. c. 730 = *C. Wendlandi*, H. Wendl.
- Wobstiana*, Kuntze, l. c. 731 = *C. Wobstiana*, Linden.

NUPHAR, Sibth. & Sm. (Nymph.). — Ind. Kew. ii. 320.

- juratum*, Magnin, in *Bonnier, Rev. gén. de Bot.* v. (1893) 257, nomen; et in *Ann. Soc. Bot. Lyon.* xix. (1893-94) 1894 [Compt-rend. 5]. — Reg. Jurass.
- rubrodiscum*, Morong, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 167. — Am. bor.

NUXIA, Comm. ex Linn. (Logan.). — Ind. Kew. 320.

- brachyphylla*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 506. — Madag.
- brachyscypha*, Baker, l. c. xxv. (1890) 334. — Madag.
- coriacea*, Solerød, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 557. — Madag.
- gracilis*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 243. — Afr. austr.
- Holstii*, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 312. — Afr. trop. or.
- sambesina*, Gilg, l. c. — Afr. trop. or.

NUXIA: —

- sphaerocephala*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 505 = *Buddleia sphaerocephala*, Baker.
- terminalioides*, Baker, l. c. — Madag.
- usambarensis*, Gilg, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 63; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 312. — Afr. trop. or.
- Volkensii*, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 312. — Afr. trop. or.

NYMANIMA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 701 = **Freesia**, Klatt. (Irid.).

- Leichtlinii*, Kuntze, l. c. = *F. Leichtlinii*, Klatt.
- refracta*, Kuntze, l. c. = *F. refracta*, Klatt.

NYMPHAEA, [Tourn.] Linn. (Nymph.). — Ind. Kew. ii. 321

- Andreana* X, Hort. Latour-Marliac, ex Éd. André, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 570. — Hybr. artef.
- Anvora* X, Hort. Latour-Marliac, ex Éd. André, l. c. 569. — Hybr. artef.
- capensis*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1888) t. 52. — Afr. austr., Madag.
- eburnea* X, Hort. Latour-Marliac, ex Éd. André, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 259 et 571. — Hybr. artef.
- Fletcheri*, Lawson, in *Trans. Roy. Soc. Canada*, iv. (1888) 119 = *Nuphar rubrodiscum*, Morong.
- fulva* X, Hort. Latour-Marliac, ex Éd. André, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 570. — Hybr. artef.
- hewensis* X, Hort. ex W. Wats. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 366; et ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1888) t. 6988. — Hybr. artef.
- Leydekeri* X, Hort. Latour-Marliac, ex Éd. André, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 570. — Hybr. artef.
- lucida* X, Hort. Latour-Marliac, ex Éd. André, l. c. — Hybr. artef.
- Marliacca*, Hort. Latour-Marliac, ex Gard. Chron. (1888) i. 564; Éd. André, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 570 = *tuberosa*, Pyne.
- O'Marana* X, Hort. ex Gard. Tr. viii. (1895) 96. — Hybr. artef.
- polysepala*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 8. — Calif.
- Reichardiana*, F. Hoffm. *Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 7. — Afr. trop.
- rubrodisca*, Greene, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 84 = *Nuphar rubrodiscum*, Morong.
- sansibariensis*, « Caspary » ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 12 = *zanzibariensis*, Caspary.
- Seigneuxii* X, Hort. Latour-Marliac, ex Éd. André, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 258. — Hybr. artef.
- Voalefoha*, Latour-Marliac, ex Gard. Chron. (1888) ii. 236 = *stellata*, Willd.

NYMPHAEA, Ludw. = **Nuphar**, Sibth. & Sm. (Nymphaeac.).

- japonica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 12 = *Nuph. japonicum*, DC.
- polysepala*, Kuntze, l. c. = *Nuph. polysepalum*, Engelm.

NYMPHODES, Ludw. = **Limnanthemum**, S. P. Gmel. (Gentian.).

- aurantiacum*, *crenatum*, *cristatum*, *exiguum*, *exiliflorum*, *Forbesianum*, *geminatum*, *Grayanum*, *Humboldtianum*, *Hydrophyllum*, *lacunosum*, *microphyllum*, *mini-mum*, *parvifolium*, *Thunbergianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 429 = *homonyma omnia* *Limnanthemum*.
- aquaticum*, Kuntze, l. c. = *L. trachyspermum*, A. Gray.
- Eckloniana*, Kuntze, l. c. = *L. indicum*, Thw.
- hydrocharodes*, Kuntze, l. c. = *L. hydrocharoides*, F. Muell.
- indicum*, Kuntze, l. c. = *L. cristatum*, Griseb.
- orbiculatum*, Kuntze, l. c. = *L. indicum*, Thw.
- peltatum*, Kuntze, l. c. = *L. nymphoides* Hoffm. & Link et *peltatum*, S. P. Gmel.
- Thunbergianum*, Kuntze, l. c. = *L. indicum*, Thw.

NYSSA, Gronov. ex Linn. (Corn.). — Ind. Kew. ii. 322.

- aquatica*, Coult. & Evans, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 91 = *multiflora*, Wangenh.
- sinensis*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1964. — China.

O

OAXACANIA, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 151. **COMPOSITAE**.

- malvaefolia*, Robinson & Greenm. l. c. — Mexic.

OBERONIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 323.

- biaurita*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2317. — Ind. or.
- Browniana*, Thw. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 680, in syn. = *zeylanica*, Hook. f.
- ciliolata*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2317; et l. c. vi. (1890) 181. — Penins. Mal.
- Clarkei*, Hook. f. ll. cc. xviii. (1888) t. 1779; et v. (1888) 676. — Khasia.
- equitans*, Drake, Ill. *Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 305 (= *Epidendrum equitans*, Forst.). — Ins. Societat.
- equitans*, Frappier, ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 178 = *praec.*
- Falconeri*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1780; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 678. — Reg. Himal.
- ferruginea*, Parish, ex Hook. f. l. c. 679. — Tenass.
- gracilis*, Hook. f. l. c. 685. — Perak.
- Hamadryas*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 322. — N. Guin.
- Helperi*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1779; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 679. — Tenass.
- heliophila*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. *Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 305 (= *Malaxis heliophila*, Benth. & Hook. f.). — Ins. Vitiens. et Samoens.
- hexaptera*, F. Muell. *Descr. Notes Papuan Pl.* viii. (1886) 49. — N. Guin.
- insectifera*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2004; et *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 180. — Perak.
- Jenkinsiana*, Griff. ex Hook. f. l. c. v. (1888) 676 (= *Malaxis Jenkinsiana*, Reichb. f.). — Ind. or.
- maxima*, Parish, ex Hook. f. l. c. 677. — Tenass.
- Mannii*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2003; et l. c. vi. (1890) 180. — Silhet.
- orbicularis*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.
- pachyrachis*, Reichb. f. ex Hook. f. l. c. 681. — Reg. Himal.
- pusilla*, F. M. Bailey, *Rep. Bellenden-Ker Exped.* (1889) 62. — Austral.
- rosea*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2005; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 683. — Perak.
- Scortechini*, Hook. f. l. c. — Perak.
- Thwaitesii*, Hook. f. l. c. 678. — Zeylan.
- Treutleri*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1786; et l. c. 683. — Reg. Himal.
- Wallichii*, Hook. f. l. c. 681. — Silhet.
- zeylanica*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1782; et l. c. 680. — Zeylan.

OBOLARIA, Siegesb. Prim. Fl. Petr. (1736) 79, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 275 = **Linnaea**, Gronov. (Caprifol.).

- borealis*, Kuntze, l. c. = *L. borealis*, Linn.

OCHANOSTACHYS, Mast. (Olatin.). — Ind. Kew. ii. 323.

- bancana*, Valetton, *Crit. overz. Olatin.* (1886) 104 (= *Petalinia bancana*, Becc.). — Sumatra.

OCHNA, Linn. (Ochnac.). — Ind. Kew. ii. 324.

- acuminata*, *affinis*, *amplexicaulis*, *anceps*, *angulata*, *aquatica*, *axillaris*, *Blanchetiana*, *calophylla*, *caraca-*

OCHNA : —

- sana*, *cassinifolia*, *castaneaefolia*, *coccinea*, *conduplicata*, *confertifolia*, *congesta*, *crassifolia*, *cuspidata*, *dependens*, *elongata*, *Fieldingiana*, *floribunda*, *gigantophylla*, *glaberrima*, *glaucescens*, *grandiflora*, *grandifolia*, *hexasperma*, *humilis*, *ilicifolia*, *inundata*, *Juergensii*, *lanceolata*, *laurifolia*, *longifolia*, *lucens*, *lucidula*, *Magdalenae*, *Manni*, *membranacea*, *mexicana*, *microdonta*, *Miersii*, *multiflora*, *nana*, *nervosa*, *obtusifolia*, *odora*, *oleaeifolia*, *ovalis*, *parviflora*, *parvifolia*, *pendula*, *perseaefolia*, *polita*, *polyantha*, *pubescens*, *pulchella*, *pycnostachys*, *pyrifolia*, *reticulata*, *revoluta*, *rotundifolia*, *salicifolia*, *Sellowii*, *semiserrata*, *spectabilis*, *squamosa*, *stipulacea*, *suaveolens*, *subscandens*, *sumatrana*, *Vasiceae*, *Vogelii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = *homonyma omnia* Gomphiae.
- alboserata*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 75. — Afr. trop.
- alternifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = Gomphia *alternifolia*, A. Rich.
- andravinensis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 578; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 148. — Madag.
- angustifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = Gomphia *angustifolia*, Vahl.
- Aschersoniana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 61. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Bakeriana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = Gomphia *lanceolata*, Baker.
- Bernieri*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 588; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 149. — Madag.
- Boiviniana*, Baill. l. c. 589. — Madag.
- brachypoda*, Baill. l. c. 588. — Madag.
- Carvalhoi*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 273. — Afr. trop. or.
- caudata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea caudata*, Engl.). — Am. trop.
- comorensis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 589. — Ins. Comor.
- crassinervia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea crassinervia*, Engl.). — Am. trop.
- ferruginea*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 76. — Afr. trop.
- ferruginea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea ferruginea*, Engl.). — Am. trop.
- Fischeri*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 78. — Afr. trop.
- globosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea globosa*, Engl.). — Am. trop.
- glaberrima*, Kuntze, l. c. = Gomphia *glaberrima*, Beauv.
- guatemalensis*, Kuntze, l. c. (= *Ouratea guatemalensis*, Engl.). — Guatem.
- Hildebrandtii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 25; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 14 et 15 = *ciliata*, Lam. var.
- Hildebrandtii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea Hildebrandtii*, Baill.). — Madag.
- Hoffmanni* *Ottomisi*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 78. — Afr. trop.
- Holstii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 69; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 273. — Afr. trop. or.
- Humblotiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 589; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 150. — Madag.
- Humblotii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea Humblotii*, Baill.). — Madag.
- macrantha*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 457. — Madag.
- macrocarpa*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 77. — Afr. trop. or.
- macrophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = Gomphia *reticulata*, Beauv.
- micropetala*, Hochst. ex Martelli, Fl. Bogos, (1886) 13. — Abyss.
- nitida*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = Gomphia *nitida*, Sw.
- obovata*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 589. — Madag.
- opaca*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea opaca*, Engl.). — Am. trop.
- ovata*, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 19. — Afr. trop.

OCHNA : —

- parviflora*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 151. — Madag.
- parvifolia*, Baill. in Eull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 589. — Madag.
- patens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea patens*, Engl.). — Am. trop.
- Pervilleana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 589; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 147. — Madag.
- pisiformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea pisiformis*, Engl.). — Am. trop.
- polygyna*, Kuntze, l. c. (= *O. polygyna*, Engl.). — Am. trop.
- prunifolia*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 273. — Afr. trop. or.
- purpureo-costata*, Engl. c. — Afr. trop. or.
- quangensis*, Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1890) 49. — Congo.
- rapununiensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106, sphalm. = Gomphia *rapununiensis*, Klotzsch.
- Rehmannii*, Szyszyl. Pl. Rehmanns. ii. (1888) 28. — Transvaal.
- Riedeliana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea Riedeliana*, Engl.). — Am. trop.
- rigida*, Kuntze, l. c. (= *O. rigida*, Engl.). — Am. trop.
- Roraimae*, Kuntze, l. c. (= *O. Roraimae*, Engl.). — Am. trop.
- Schweinfurthiana*, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 19. — Afr. trop.
- Spruceana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea Spruceana*, Engl.). — Am. trop.
- Stuhlmannii*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 77. — Afr. trop.
- superba*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea superba*, Engl.). — Am. trop.
- tenuifolia*, Kuntze, l. c. (= *O. tenuifolia*, Engl.). — Am. trop.
- vaccinioides*, Kuntze, l. c. = Gomphia *vaccinioides*, Engl.
- verruculosa*, Kuntze, l. c. (= *Ouratea verruculosa*, Engl.). — Am. trop.
- Welwitschii*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 84 = *O. Aizelii*, R. Br.

OCHRATELLUS, Pierre, ex L. Planch. Étud. prod. Sapot. (1888) 20, sphalm. = **Ochrothallus**, Pierre (Sapot.).

OCHROCARPOS, Thou. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 324.

- angustifolius*, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 525 [Ochrocarpus] (= *Mammea angustifolia*, Planch. & Triana). — Madag.
- eugenioides*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 354 [an seq. ?]. — Madag.
- eugenioides*, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 524 (= *Mammea eugenioides*, Planch. et Triana). — Madag.
- excelsus*, Vesque, l. c. 525 (= *M. excelsa*, Planch. & Triana). — Java.
- pachyphyllus*, K. Schum. in K. Schum. & Holly. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 51. — N. Guin.
- parvifolius*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 5. — Madag.
- sessiliflorus*, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 524 [Ochrocarpus] (= *Mammea sessiliflora*, Planch. & Triana). — Madag.

OCHRONERIUM, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 774; et Hist. des pl. x. (1888) 199; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 175. **APOCYNEAE**. *Humblotii*, Baill. ll. cc. — Madag.

OCHROSIA, Juss. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 324. *commutata*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 156. — N. Guin. *compta*, K. Schum. l. c. 156. — Ins. Sandvic. *glomerata*, Valetton, in Annal. Jard. Bot. Buitenz. xiii. 2 (1895) 233. — N. Guin. *Mc Dowalliana*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. vii. (1893) 65. — Austral. *oppositifolia*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 156 = *Cerbera oppositifolia*, Lam.

OCHROSIA : —

tahitensis, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 865, nomen. — Ins. Tahit.

OCHROTHALLIUS, Pierre, in L. Planch. Thès. Sapot. (1888 ?) 26; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 298 = **Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.). *sessilifolius*, Pierre, l. c. — N. Caled.

OCHTHOCHARIS, Blume (Melast.). — Ind. Kew. ii. 324.

ovata, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. 11. (1890) 531, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 481. — Borneo. *parviflora*, Cogn. ll. cc. — Borneo.

OCIMUM, Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 324.

- calycosum*, Hochst. ex Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 161 = *comigerum*, Hochst.
- camporum*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 350. — Afr. trop. or.
- comigerum*, Hochst. ex Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 161. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Exsul*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 112. — Burma.
- fimbriatum*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 161. — Angola.
- Fischeri*, Guerke, l. c. — Afr. trop. or.
- glossophyllum*, Briq. l. c. 162. — Afr. trop. austro-occ.
- kilimandscharicum*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 349. — Afr. trop. or.
- linearifolium*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 162. — Angola.
- modestum*, Briq. l. c. — Angola.
- Poggeanum*, Briq. l. c. 163. — Angola.
- Schweinfurthii*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 160. — Afr. trop. centr.
- scoparium*, Guerke in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 350. — Afr. trop. or.
- siphonanthum*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 121. — Madag.
- staminosum*, Baker, in Kew Bull. (1895) 224. — Reg. Somal.
- Stuhlmanni*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 196. — Afr. trop. or.
- tomentosum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxi. (1886) t. 1539; et in F. L. James, Unkn. Horn of Afr., Append. (1888) 322. — Reg. Somal.
- trichodon*, Baker, ex Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 350. — Afr. trop. or.
- verticillifolium*, Baker, in Kew Bull. (1895) 224. — Reg. Somal.

OCOTEA, Aubl. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 326.

- aciphylla*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 243 (= *Oreodaphne aciphylla*, Nees). — Bras.
- acutangula*, Mez, l. c. 330 (= *Or. acutangula*, Miq.). — Bras.
- acutifolia*, Mez, l. c. 310 (= *Or. acutifolia*, Nees). — Am. austr.
- adenotrachelium*, Mez, l. c. 304 (= *Or. adenotrachelium*, Nees). — Bras.
- alnifolia*, Mez, l. c. 351 (= *Or. alnifolia*, Meissn.). — Columb.
- amazonica*, Mez, l. c. 359 (= *Or. amazonica*, Meissn.). — Bras.
- aniboides*, Mez, l. c. 367 (= *Or. Riedelii*, Meissn.). — Bras.
- Arechavaletae*, Mez, l. c. 342. — Urung.
- argentea*, Mez, l. c. 346 (= *Mespilodaphne Sprucei*, Meissn.). — Bras.
- aurantiodora*, Mez, l. c. 295 (= *M. aurantiodora*, Meissn.). — Columb. Peruvia.
- bahiensis*, Mez, l. c. 235 (= *M. bahiensis*, Meissn.). — Bras.
- balanocarpa*, Mez, l. c. 388 (= *M. balanocarpa*, Nees). — Peruvia.
- barcellensis*, Mez, l. c. 337 (= *Nectandra barcellensis*, Meissn.). — Bras.
- Benthamiana*, Mez, l. c. 263 (= *N. crassifolia*, Benth.). — Columb.
- Bernoulliana*, Mez, l. c. 275. — Guatem.
- Beyrichii*, Mez, l. c. 274 (= *Oreodaphne Beyrichii*, Nees). — Bras.

OCOTEA : —

- Blanchetii, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 355 (= *Oreodaphne Blanchetii*, Meissn.). — Bras.
 Boissieriana, Mez, l. c. 353 (= *O. Blanchetii*, Meissn.). — Bras.
 borbonica, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 303 (= *Mespidodaphne borbonica*, Meissn.). — Ins. Borbon.
 brachybotra, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 332 (= *Oreodaphne brachybotra*, Meissn.). — Bras.
 bracteosa, Mez, l. c. 356 (= *O. bracteosa*, Meissn.). — Bras.
 caesia, Mez, l. c. 287 (= *Persea cordata*, Meissn.). — Bras.
 calophylla, Mez, l. c. 298 (= *Pleurothyrium velutinum*, Meissn.). — Columb.
 canaliculata, Mez, l. c. 361 (= *Oreodaphne cayennensis*, Meissn.). — Am. austr.
 caracasana, Mez, l. c. 292 (= *O. caracasana*, Nees). — Venezuela.
 Catesbyana, Sarg. Sylv. N. Am. vii, (1895) 11 t. 303 = *Nectandra Willdenowiana*, Meissn.
 caudata, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 378 (= *Oreodaphne caudata*, Nees). — Guian. angl.
 ceanothifolia, Mez, l. c. 365 (= *Mespidodaphne ceanothifolia*, Nees). — Bras.
 celastroides, Mez, l. c. 275 (= *Oreodaphne celastroides*, Meissn.). — Venezuela.
 cernua, Mez, l. c. 277 (= *O. cernua*, Nees). — Am. centr., Ind. occ.
 cissiflora, Mez, l. c. 259. — Columb.
 citrifolia, Mez, l. c. 280. — Bras.
 citrosmioides, Mez, l. c. 349 (= *Oreodaphne citrosmioides*, Nees). — Bras.
 clavigera, Mez, l. c. 239. — Ins. Guadal.
 complicata, Mez, l. c. 247 (= *Mespidodaphne complicata*, Meissn.). — Bras.
 confertiflora, Mez, l. c. 374 (= *Oreodaphne confertiflora*, Meissn.). — Bras.
 cordata, Mez, l. c. 313 (= *Mespidodaphne cordata*, Meissn.). — Bras.
 corymbosa, Mez, l. c. 321 (= *M. corymbosa*, Meissn.). — Bras.
 costulata, Mez, l. c. 244 (= *Oreodaphne Neesiana*, Meissn.). — Guian. angl.
 crassifolia, Mez, l. c. 336 (= *O. crassifolia*, Nees). — Guian. angl.
 cuneifolia, Mez, l. c. 259. — Peruvia.
 cuprea, Mez, l. c. 299 (= *Oreodaphne cuprea*, Meissn.). — Peruvia.
 cupularis, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 303 (= *Mespidodaphne cupularis*, Meissn.). — Ins. Borbon.
 daphnifolia, Mez, l. c. 307 (= *Oreodaphne daphnifolia*, Meissn.). — Bras.
 debilis, Mez, l. c. 370 (= *Goeppertia caudata*, Meissn.). — Bras.
 declinata, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 352 (= *Oreodaphne declinata*, Meissn.). — Bras.
 Dendrodaphne, Mez, l. c. 238 (= *Dendrodaphne macrophylla*, Beurl.). — Am. centr.
 densiflora, Mez, l. c. 301 (= *Persea densiflora*, Meissn.). — Bras.
 discolor, Mez, l. c. 263 (= *Nectandra discolor*, Meissn.). — Columb.
 dispersa, Mez, l. c. 357 (= *confusa*, Meissn.).
 divaricata, Mez, l. c. 385 (= *Camphoromoea divaricata*, Nees). — Bras.
 domatiata, Mez, ex Taub. in *Bot. Fahrb.* xvii, (1893) 520. — Bras.
 effusa, Hemsl. l. c. 272 (= *Oreodaphne effusa*, Meissn.). — Mexic.
 Eggersiana, Mez, l. c. 363. — Ind. occ.
 Eichleri, Mez, l. c. 377. — Bras.
 elegans, Mez, l. c. 253. — Bras.
 endlicheriopsis, Mez, l. c. 300. — Guian. gall.
 Endresiana, Mez, l. c. 257. — Costa Rica.
 ensifolia, Taub. in *Bot. Fahrb.* xvii, (1893) 520. — Bras.
 fallax, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 310 (= *Oreodaphne fallax*, Miq.). — Guian. bat.
 fasciculata, Mez, l. c. 248 (= *Mespidodaphne fasciculata*, Meissn.). — Am. austr.
 ferruginea, Mez, l. c. 265 (= *Pleurothyrium ferrugineum*, Meissn.). — Peruvia.

OCOTEA : —

- floribunda, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 325 (= *Strychnodaphne floribunda*, Griseb.) — Ind. occ.
 florulenta, Mez, l. c. 309 (= *Oreodaphne florulenta*, Meissn.). — Bras.
 foeniculacea, Mez, l. c. 266. — Ind. occ.
 frondosa, Mez, l. c. 256 (= *Oreodaphne frondosa*, Meissn.). — Bras.
 falcata, Mez, l. c. 388. — Ins. Guadal.
 foetens, Baill. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1889) 116 = *foetens*, Benth. & Hook. f.
 Gardneri, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 338 (= *Mespidodaphne Gardneri*, Meissn.). — Bras.
 glauca, Mez, l. c. 362 (= *M. glauca*, Meissn.). — Bras.
 glaucina, Mez, l. c. 349 (= *Oreodaphne glaucina*, Meissn.). — Bras.
 globifera, Mez, l. c. 228. — Guian. gall.
 Glaziovii, Mez, l. c. 281. — Bras.
 glomerata, Mez, l. c. 294 (= *Oreodaphne glomerata*, Mez). — Am. trop.
 gracilis, Mez, l. c. 327 (= *O. gracilis*, Meissn.). — Guian. angl.
 grandifolia, Mez, l. c. 290 (= *O. grandifolia*, Nees). — Peruvia.
 grandis, Mez, l. c. 336. — Bras.
 Grisebachiana, Mez, in *Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.* (1886) 6 = *canaliculata*, Mez.
 guyanensis, Aubl. l. c. v. (1889) 296 (= *Oreodaphne guyanensis*, Nees). — Am. trop.
 Hemsleyana, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 302. — Guian. angl.
 Hilariana, Mez, l. c. 311. — Bras.
 Hookeriana, Mez, l. c. 368. — Bras.
 hypoglauca, Mez, l. c. 285 (= *Persea scrobiculata*, Meissn.). — Bras.
 Imrayana, Mez, l. c. 274. — Ind. occ.
 insignis, Mez, l. c. 265. — Bras.
 insularis, Mez, l. c. 371 (= *Phoebe insularis*, Meissn.). — Ins. Cocos.
 Jacobinae, Mez, l. c. 355 (= *Oreodaphne Jacobinae*, Meissn.). — Bras.
 Jacquinii, Mez, l. c. 242 (= *O. Jacquinii*, Meissn.). — Ins. Martinic.
 Jelskii, Mez, l. c. 261. — Peruvia.
 Karsteniana, Mez, l. c. 257 (= *Aydedendron glaucum*, Klotzsch & Karst.). — Columb.
 Kunthiana, Mez, l. c. 291 (= *A. aciphyllum*, Nees). — Guian. gall.
 lanata, Mez, l. c. 254 (= *Mespidodaphne lanata*, Meissn.). — Bras.
 lancifolia, Mez, l. c. (= *Oreodaphne lancifolia*, Nees). — Bras.
 Langsdorffii, Mez, l. c. 312 (= *O. Langsdorffii*, Meissn.). — Bras.
 laxa, Mez, l. c. 381 (= *Camphoromoea laxa*, Nees). — Bras.
 laxiflora, Mez, l. c. 371 (= *Mespidodaphne laxiflora*, Meissn.). — Bras.
 leptobotra, Mez, l. c. 376 (= *Oreodaphne leptobotra*, Nees). — Am. austr.-occ.
 Leucoxydon, Mez, l. c. 329 (= *O. Leucoxydon*, Nees). — Ind. occ.
 Lindbergii, Mez, l. c. 386 (= *Camphoromoea ovalifolia*, Meissn.). — Bras.
 litsaeifolia, Mez, l. c. 334 (= *C. litsaeifolia*, Meissn.). — Bras.
 L'Hermierii, Mez, l. c. 273. — Ind. occ.
 macrocalyx, Mez, l. c. 367 (= *Goeppertia macrocalyx*, Meissn.). — Bras.
 macrophylla, Mez, l. c. 293 (= *Oreodaphne macrophylla*, Meissn.). — Bras.
 macropoda, Mez, l. c. 348 (= *Persea macropoda*, H. B. & K.). — Am. austr.
 Mandonii, Mez, l. c. 311. — Bolivia.
 marowynensis, Mez, l. c. 380 (= *Camphoromoea surinamensis*, Meissn.). — Guian. bat.
 Martiana, Mez, l. c. 324 (= *Oreodaphne Martiana*, Meissn. pr. p.). — Bras.
 Martiniana, Mez, l. c. 345 (= *O. Martiniana*, Nees). — Guian. gall.
 martinicensis, Mez, l. c. 270. — Ind. occ.
 matensis, Mez, l. c. 373. — Bras.
 maynensis, Mez, l. c. 359. — Peruvia.

OCOTEA : —

- megaphylla, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 387 (= *Oreodaphne megaphylla*, Meissn.). — Bras.
 Meyendorffiana, Mez, l. c. 314 (= *Mespidodaphne Meyendorffiana*, Meissn.). — Bras.
 micans, Mez, l. c. 297. — Columb.
 microbotrys, Mez, l. c. 341 (= *Oreodaphne microbotrys*, Meissn.). — Bras.
 montana, Mez, l. c. 319 (= *Mespidodaphne montana*, Meissn.). — Bras.
 moschata, Mez, l. c. 269 (= *M. moschata*, Meissn.). — Ins. Porto Rico.
 Mosenii, Mez, l. c. 373. — Bras.
 multiglandulosa, Mez, l. c. 280 (= *Oreodaphne Poeppigiana*, Nees). — Peruvia.
 myriantha, Mez, l. c. 332 (= *O. myriantha*, Meissn.). — Venezuela, Bras.
 Nemodaphne, Mez, l. c. 270 (= *Nemodaphne cuneata*, Meissn.). — Ind. occ.
 nicaraguensis, Mez, l. c. 239. — Nicarag.
 nitidula, Mez, l. c. 251 (= *Mespidodaphne nitidula*, Meissn.). — Bras.
 notata, Mez, l. c. 339 (= *M. notata*, Meissn.). — Bras.
 Nummularia, Mez, l. c. 313 (= *M. Nummularia*, Meissn.). — Bras.
 nutans, Mez, l. c. 362 (= *M. nutans*, Meissn.). — Bras.
 oblonga, Mez, l. c. 367 (= *M. oblonga*, Meissn.). — Ind. occ., Guian. gall.
 obovata, Mez, l. c. 366 (= *Oreodaphne obovata*, Meissn.). — Venezuela.
 odorata, Mez, l. c. 255 (= *O. odorata*, Meissn.). — Bras.
 opaca, Mez, l. c. 246. — Bras.
 organensis, Mez, l. c. 321 (= *Mespidodaphne organensis*, Meissn.). — Bras.
 ovalifolia, Mez, l. c. 261 (= *Oreodaphne sublanuginosa*, Nees). — Peruvia.
 pallida, Mez, l. c. 282 (= *O. pallida*, Meissn.). — Bras.
 pauciflora, Mez, l. c. 370 (= *O. pauciflora*, Nees). — Bras.
 persicifolia, Mez & J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 10. — Guatem.
 Petalanthra, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 358 (= *Oreodaphne Petalanthra*, Meissn.). — Peruvia.
 phillyraeoides, Mez, l. c. 315 (= *Mespidodaphne phillyraeoides*, Meissn.). — Bras.
 pomaderrioides, Mez, l. c. 302 (= *Oreodaphne pomaderrioides*, Meissn.). — Bras.
 portoricensis, Mez, l. c. 364. — Ins. Porto Rico.
 pretiosa, Mez, l. c. 250 (= *Mespidodaphne pretiosa*, Nees). — Bras.
 prolifera, Mez, l. c. 276 (= *Mespidodaphne prolifera*, Nees). — Bras.
 pubescens, Mez, l. c. 384 (= *Oreodaphne pubescens*, Nees). — Bras.
 punctulata, Mez, l. c. 379. — Guian. angl. et gall.
 Regelian, Mez, l. c. 283 (= *O. Regelian*, Meissn.). — Bras.
 reticulata, Mez, l. c. 308. — Bras.
 rhynchophylla, Mez, l. c. 241 (= *Nectandra rhynchophylla*, Meissn.). — Guian. angl.
 Riedelii, Mez, l. c. 353 (= *Mespidodaphne Riedelii*, Meissn.). — Bras.
 rigida, Mez, l. c. 284 (= *Oreodaphne rigida*, Meissn.). — Bras.
 Rodiei, Mez, l. c. 236 (= *Nectandra Rodiei*, R. Schomb.). — Guian. angl.
 rubra, Mez, l. c. 258. — Guian. gall.
 rubriflora, Mez, l. c. 270. — Mexic.
 rubrinervis, Mez, l. c. 351. — Panama.
 rufa, Mez, l. c. 300. — Columb.
 Rusbyana, Mez, l. c. 303. — Peruvia, Bolivia.
 Salvini, Mez, l. c. 264. — Guatem.
 Sassafras, Mez, l. c. 247 (= *Mespidodaphne Sassafras*, Meissn.). — Bras.
 Schomburgkiana, Mez, l. c. 337 (= *Oreodaphne Schomburgkiana*, Nees). — Guian. bat.
 Schottii, Mez, l. c. 324 (= *O. Schottii*, Meissn.). — Bras.
 Schwackeana, Mez, l. c. 305. — Bras.
 semicompleta, Mez, l. c. 318 (= *Oreodaphne semicompleta*, Nees). — Bras.

OCOTEA : —

- spathulata, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 268. — Ind. occ.
 spectabilis, Mez, l. c. 373 (= *Oreodaphne spectabilis*, Meissn.). — Am. austr.
 Spixiana, Mez, l. c. 260 (= *O. Spixiana*, Nees). — Bras.
 splendens, Mez, l. c. 282 (= *O. splendens*, Meissn.). — Guian. gall.
 staminea, Mez, l. c. 240 (= *O. fragans*, Meissn.). — Ind. occ.
 Sprucei, Mez, l. c. 323 (= *Mespilodaphne Sprucei*, Meissn.). — Bras.
 Stuebelii, Mez, l. c. 245. — Columb.
 subalpina, Mez, l. c. 375 (= *Oreodaphne subalpina*, Meissn.). — Bras.
 subracemosa, Mez, l. c. 360. — Bras.
 subtriplineris, Mez, l. c. 333 (= *Camphoromoea subtriplineris*, Nees). — Bras.
 sylvatica, Mez, l. c. 320 (= *Oreodaphne sylvatica*, Meissn.). — Bras.
 tarapotana, Mez, l. c. 304 (= *O. tarapotana*, Meissn.). — Peruvia.
 Teleiandra, Mez, l. c. 382 (= *O. Teleiandra*, Meissn.). — Bras.
 tenuiflora, Mez, l. c. 383 (= *Camphoromoea tenuiflora*, Meissn.). — Bras.
 towarensis, Mez, l. c. 295 (= *Oreodaphne towarensis*, Klotzsch & Karst.). — Venezuela.
 trichantha, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 515. — Madag.
 undulata, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 278 (= *Oreodaphne undulata*, Meissn.). — Bras.
 Urbaniana, Mez, l. c. 262. — Bras.
 urophylla, Mez, l. c. 377 (= *Oreodaphne urophylla*, Meissn.). — Guian. angl.
 usambarensis, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 51 et 54; et *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 182. — Afr. trop. or.
 vaccinioides, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 252. — Bras.
 vaginans, Mez, l. c. 245 (= *Mespilodaphne vaginans*, Meissn.). — Venezuela.
 Velloziana, Mez, l. c. 347 (= *Oreodaphne Velloziana*, Meissn.). — Bras.
 veraguensis, Mez, l. c. 240 (= *Sassafridium vera-guense*, Meissn.). — Am. centr.
 vernicosa, Mez, l. c. 321. — Guian. gall.
 verruculosa, Mez, l. c. 308 (= *Oreodaphne verruculosa*, Meissn.). — Bras.
 viburnoides, Mez, l. c. 322 (= *Persea viburnoides*, Meissn.). — Bras.
 Wrightii, Mez, l. c. 267 (= *Acroclididium Wrightii*, Meissn.). — Ind. occ.

OCTOLEPIS, Oliver (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 327. *congolana*, Warb. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 56 (= *Makokoa congolana*, Baill.). — Congo gall.

OCTOMELES, Miq. (Datisc.). — Ind. Kew. ii. 327. *moluccana*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 386. — As. & Oceania trop.

OCTOMERIA, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 327. *alba*, Wall. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 795 = *Eria alba*, Lindl.
excavata, Wall. ex Hook. f. l. c. = *E. excavata*, Lindl.
Seegeriana, Kraenzl. in *Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6 (1892) 101 t. 257. 1 fig. 1-6. — Bras.
supra-glaucia, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1887) ii. 716. — Hab.?
xanthina, Barb. Rodr. *Vellozia*, 1885-88, Sec. édiç. (1891) 121. — Bras. bor.
Wawrae, Reichb. f. ex Wawra, *Itin. Princ. S. Coburg.* ii. (1888) 156. — Bras.
yauaperyensis, Barb. Rodr. *Vellozia*, 1885-88, Sec. édiç. (1891) 120. — Bras. bor.

OCTOTROPIS, Bedd. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 328. *terminalis*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 33 t. 17. — Furma.

OCYMASTRUM, Seguiet = **Centranthus**, DC. (Valer.).

angustifolium, Calcitrapa, junceum, longiflorum, macrosiphon, nevadense, rubrum, Sibthorpii, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 302-03 = *homonyma omnia* *Centranthi*.
trinerve, Kuntze, l. c. 303 = *C. nervosus*, Moris.

ODINA, Roxb. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 329. *alata*, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 105. — Afr. trop. or. *cinerea*, Engl. l. c. 104. — Reg. Somal.
cuneifoliolata, Engl. l. c. 105. — Reg. Somal.
fulva, Engl. l. c. 102. — Afr. trop. or.
humilis, F. Hoffm. *Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 24. — Afr. centr. or.
nigritana, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 75. — Sierra Leone.
obcordata, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 105. — Reg. Somal.
Schimperi, F. Hoffm. *Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 24. — Afr. trop. or.
Stuhlmannii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 244. — Afr. trop. or.
tomentosa, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 102. — Afr. trop. or.

ODONTADENIA, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 329.

Cururu, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 169 (= *Anisobolus Cururu*, Muell. Arg.). — Bras.
glandulosa, K. Schum. l. c. — Peruvia.
grandiflora, K. Schum. l. c. = *speciosa*, Benth.
Salzmannii, K. Schum. l. c. (= *Anisobolus Salzmannii*, A. DC.). — Bras.
Sprucei, K. Schum. l. c. (= *A. Sprucei*, Muell. Arg.). — Reg. Amaz.
Zuccariniana, K. Schum. l. c. (= *Anisobolus hebecarpus*, Muell. Arg.). — Bras.

ODONTELLA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 260 = **Loranthus**, Linn.

Deflersii, Van Tiegh. l. c. — Arabia.
kilimandscharica, Van Tiegh. l. c. = *L. kilimandscharicus*, Engl.
Schimperi, Van Tiegh. l. c. = *L. Schimperi*, Hochst.
Volkensii, Van Tiegh. l. c. = *L. Volkensii*, Engl.

ODONTITES [Riv.] Hall. = **Bartsia**, Linn. (Scrophul.).

atlantica, Coss. ex Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 657 = *discolor*, Pomel.
Djurdjurae, Coss. ex Batt. & Trab. l. c. = *violacea*, Pomel.
longifolia, Corbière, *Nouv. Fl. Norm.* (1893) 436 = *B. verna*, Reichb. f.
Odontites, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 102 = *B. Odontites*, Huds.

ODONTOCHILUS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 329.

brevistylis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 100. — Perak.
calcaratus, Hook. f. l. c. 99. — Perak.
Clarkei, Hook. f. l. c. 100. — Reg. Himal.
crispus, Hook. f. l. c. 99 (= *Anoetochilus crispus*, Lindl.). — Reg. Himal.
Elwesii, C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c. 100. — Reg. Himal.
macranthus, Hook. f. l. c. 98. — Perak.
pectinatus, Hook. f. l. c. 99. — Perak.
pumilus, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.
sandwicensis, Benth. & Hook. f. ex Drake, *Ill. Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 312 (= *Anoetochilus sandwicensis*, Lindl.). — Ins. Sandvic.

ODONTOGLOSSUM, H. B. & K. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 329.

aspidorhinum, F. C. Lehm. in *Gard. Chron.* (1895) ii. 356. — Columb.
auriculatum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 140. — Am. austr.
Bergmani ×, L. Linden, in *Lindenian*, vi. (1890) 95 t. 286. — Hybr. spont.?
Boddaertianum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 296; et (1888) ii. 328. — Venezuela.

ODONTOGLOSSUM : —

Brandtii, Kraenzl. & Wittm. in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 378. — Hab.?
chaetostoma ×, Hort. ex O'Brien, in *Gard. Chron.* (1886) i. 76 = *chaetostroma* ×, Reichb. f.
Claesianum ×, L. Linden, in *Lindenian* vi. (1890) 65, t. 271. — Venezuela.
dellense ×, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1891) i. 520. — Hybr. artef.
dieranophorum ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 330 et 360. — Hybr. spont.
Duvivierianum, Reichb. f. l. c. (1888) 352; et in *Lindenian*, v. (1889) 55, t. 218. — Hybr. spont.?
Edithiae, Warner, *Select Orch. Pl. Ser.* 3 t. 25 = *crispum*, Lindl.
elegantius, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 200. — Hybr. spont.?
Glonerianum, L. Linden, in *Lindenian*, iv. (1888) 17, t. 151 = *odoratum*, Lindl.
Godseffianum ×, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1894) ii. 728. — Hybr. artef.
guttatum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 140. — N. Granat.
Halli-xanthum ×, L. Linden, in *Lindenian* x. (1894) 73 t. 467. — Hybr. artef.
Harryanum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 486. — Hab.?
harvengtense ×, L. Linden, in *Journ. des Orchid.* v. (1894) 7; et in *Lindenian*, x. (1894) 95 t. 478. — Hybr. artef.
Harzyanum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 486; et (1887) ii. 169 fig. 41; *Reichenbachia*, Ser. l. ii. (1889) t. 49; et *ex Orchid. Alb.* viii. (1889) t. 366. — Columb.
Hennisii, Rolfe, l. c. (1894) ii. 158. — Ecuad.
Hrubyianum, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 234. — Peruvia.
Hunnellianum, Rolfe, l. c. (1889) ii. 67. — N. Granat.
Imshootianum ×, Rolfe, l. c. (1891) ii. 758. — Hybr. spont.
Josephinae, Williams, *Orchid. Alb.* iv. (1885) sub t. 174, in nota, et t. 188. — N. Granat.
Kraenzlinii, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1893) i. 442. — Columb.
latimaculatum, Hort. Linden, ex *Lindenian*, iv. (1888) 5 t. 145 = *crispum*, Lindl.
Leroyanum ×, Hort. God.-Lebœuf, ex *Rev. Hortic.* (1890) 167; et in *L'Orchidophile* (1891) 112; *Reichenbachia* Ser. 2, ii. t. 37; et in *Gard. Chron.* (1891) ii. 19 et (1892) ii. 11 = *Wilckeanum* ×, Reichb. f.
Lucianum, Reichb. f. in *Lindenian*, ii. (1886) 37 t. 65; in *Gard. Chron.* (1886) ii. 712; et in *Illustr. Hortic.* xxxiv. (1887) 23 t. 7. — Venezuela.
majale, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 550. — Am. centr.
Noezlianum, Hort. Linden, ex *Gard. Chron.* (1890) 602; et *ex Orchid. Alb.* xi. (1891) t. 509 = *Cochlioda Noezliana*, Rolfe.
Owenianum, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1891) ii. 178. — Hab.?
platycheilum, Rolfe, l. c. (1892) ii. 35. — Am. centr.
rhynchanthum ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 380. — Hab.?
Schlesingerianum ×, L. Linden, in *Lindenian*, v. (1889) 99 t. 240. — Hab.?
tenue, Cogn. in *Journ. des Orchid.* vi. (1895) 266. — Venezuela.
Thompsonianum ×, Garnier, l. c. iv. (1893) 109; L. Linden, in *Lindenian*, ix. (1893) 11 t. 388. — Hybr. artef.
Warocqueanum, J. et L. Linden, in *Lindenian*, iv. (1888) 75 t. 180 = *crispum*, Lindl.
Wattianum, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 354. — Hab.?
Wendlandianum ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 6. — N. Granat.
Youngi, Gower, in *The Garden*, xxxvii. (1890) 84; *Orchid. Alb.* ix. (1891) t. 406. — Mexic.

ODONTONEMA, Nees = **Thyrsacanthus**, Nees (Acanth.).

amplexicaule, *bracteolatum*, *callistachyum*, *cuspidatum*, *dissitiflorum*, *Flagellum*, *Hookerianum*, *interruptum*,

ODONTONEMA: —

- longifolium*, *nitidum*, *phantasmense*, *rubrum*, *rutilans*, *Schomburgkianum*, *sessile*, *strictum*, *variegatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 494 = *homonyma omnia* Thysacanthi.
barlerioides, Kuntze, l. c. = *T. barlerioides*, Nees.
foliobraceatum, Kuntze, l. c. = *T. foliaceo-bracteatum*, Oerst.
fuchsioides, Kuntze, l. c. = *T. fuchsioides*, Nees.
lilacinum, Kuntze, l. c. = *T. callistachys*, Nees.
paniculatum, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 335 = *Schaueria*, paniculata, Nees.
tubiforme, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 494 = *T. tubaeformis*, Nees.

- ODONTONEMELLA, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 56; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 336 = *Eranthemum*, Linn. et *Dianthera*, Gronov. (Acanth.).
indica, Lindau, ll. cc. = *Eranthemum indicum*, C. B. Clarke.
leptostachya, Lindau, l. c. 336 = *Dianthera Walli-chii*, Benth. & Hook. f.

ODONTOSPERMUM, Neck. (Compos.). — Ind.

- Kew. ii. 331.
maritimum, C. Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 243. — Ins. Canar.
pygmaeum, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 209. — Algeria.

ODONTOSTELMA, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 161. ASCLEPIADEAE.

- Welwitschii*, Rendle, l. c. t. 344. — Angola.

OEDEMATOPUS, Planch. & Triana = *Havetiopsis*, Planch. (Guttif.).

- polyandrus*, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 164. — Columb.

OEDINA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Fr. xlii. (1895) 249 = *Loranthus*, Linn.

- erecta*, Van Tiegh. l. c. = *L. erectus*, Engl.

OEGROE, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 32. COMPOSITAE.

- spinosa*, Phil. l. c. t. 1 fig. 5. — Chili.

OENANTHE, [Tourn.] Linn. (Umbell.). — Ind.

- Kew. ii.
Foucaudi, Tesser, in Bull. Assoc. Pyren. éch. pl. i. (1891) ex Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) bibl. 175 — Gall.
Pringlei, Coult. & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3 (1895) 307. — Mexic.
psychrophila, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 38. — Peruvia.

OENOCARPUS, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 332.

- edulis*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1887) ii. 157. — Demerara.

OENOTHERA, Linn. (Onagrar.). — Ind. Kew. ii. 332.

- angelorum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 49. — Calif. austr.
arguta, Greene, Fl. Francisc. (1891) 212. — Calif.
californica, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 290 = *leptocarpa*, Greene.
campestris, Greene, Fl. Francisc. (1891) 216; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 133 (= *Oe. dentata*, S. Wats. nec Cav.). — Calif.
coccinea, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 213. — Bolivia.
crassiuscula, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 290. — Calif.
decorticans, Greene, Fl. Francisc. (1891) 217 = *gauraeiflora*, Torr. & Gray.
depressa, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 216. — Am. bor. occ.
elongata, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 33. — Bolivia.
glabrescens, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 631. — Chili.

OENOTHERA: —

- hirsuta*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 291; et xviii. (1894) 435, 443 et 464. — Chili.
hirtella, Greene, Fl. Francisc. (1891) 215; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 133. — Calif.
Ibari, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 633. — Chili.
idahoensis, A. J. Mulford, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 117. — Idaho.
Jepsonii, Greene, Fl. Francisc. (1891) 211. — Calif.
leptocarpa, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 302 (= *Eulobus californicus*, Nutt.). — Calif.
magallanica, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 633. — Chili.
nitida, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 70. — Calif.
ovata, Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 255. — Calif.
ovata, C. H. Shinn, in West Am. Scientist. (1891) 208 [an praec. ?]. — Calif.
picensis, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 22. — Am. austr. occ.
rutila, David, in Erythea, ii. (1894) 61. — Calif.
sceptrostigma, T. S. Brandeg, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 156. — Calif.
Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 327. — Ecuad.
tenuissima, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 683. — Utah.
valdiviana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 634. — Chili.
xylocarpa, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 105, t. 8. — Calif.

OEONIA, Lindl. = *Aeonina*, Lindl. (Orchid.).

- Elliotii*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 55, t. 11. — Madag.
erostis, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 217 (= *Beclardia erostis*, Frappier). — Ins. Borbon.
oncidiiflora, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 56. — Madag.
volucris, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. y. 1892 (1895) 51 (= *Epidendrum volucris*, Thou.) = *Aeonina Auberti*, Lindl.

OFTIA, Adans. (Myopor.). — Ind. Kew. ii. 335.

- Jasminum*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 360 = *africana*, Boq.

OLAX, Linn. (Olacin.). — Ind. Kew. ii. 335.

- andronensis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 306. — Madag.
Ascheroniana, Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1890) 46. — Congo.
seminifera, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 116. — Borneo.
verruculosa, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 69. — Afr. trop.

OLDENLANDIA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 336.

- ascendens*, *acutangula*, *ampliflora*, *angustifolia*, *barbata*, *Beddomei*, *bracteosa*, *buxifolia*, *capitulata*, *capituligera*, *carnosa*, *ciliacaulis*, *cineereoviridis*, *congesta*, *consanguinea*, *cyaneascens*, *cymosa*, *effusa*, *elegans*, *evenia*, *fruticosa*, *Gardneri*, *glabra*, *Griffithii*, *Helferi*, *hirsutissima*, *inamoena*, *iodoneura*, *laevigata*, *lancea*, *latifolia*, *Lawsoniae*, *Lessertiana*, *lineata*, *macrae*, *macrostemon*, *Maingayi*, *membranacea*, *nodulosa*, *obscura*, *ovata*, *paradoxa*, *Pavryi*, *pinifolia*, *prostrata*, *pruinosa*, *quinquenervia*, *radicans*, *recurva*, *rigida*, *rugosa*, *scabra*, *scandens*, *stylosa*, *tenelliflora*, *Thomsonii*, *Thwaitesii*, *travancorica*, *Uncinella*, *Vachellii*, *verticillaris*, *viscida*, *xanthochroa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292-93 = *homonyma omnia* Hedyotis.
alpestris, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 375. — Afr. trop. or.
amatymbica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292. — Afr. austr.
arborea, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 = *Hedyotis arborea*, Roxb.
Auricularia, K. Schum. l. c. 25 = *H. Auricularia*, Linn.
brachyloba, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292. — Afr. austr.
Cephalotes, Kuntze, l. c. — Afr. austr.
chlorophylla, Kuntze, l. c. — Afr. austr.

OLDENLANDIA: —

- chlorophylla*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 (= *H. chlorophylla*, Hochst.). — Natal.
coerulea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = *Hedyotis caerulea*, Wight & Arn.
connata, Kuntze, l. c. = *H. coronata*, Wall.
connata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 25 = *H. merguensis*, Benth. & Hook. f.
delicatula, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 375. — Afr. trop. or.
echinulosa, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.
divaricata, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 269. — Afr. austro-occ. extratrop.
flicaulis, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 271. — Bras.
fruticosa, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 = *Hedyotis fruticosa*, Linn.
geminiflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292. — Afr. austr.
glabella, Kuntze, l. c. = *Hedyotis nitida*, Wight & Arn.
Grayi, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 = *H. Grayi*, Hook. f.
hirtula, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292. — Afr. austr.
Holstii, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 376. — Afr. trop. or.
Hookeri, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 25 = *Hedyotis leptopetala*, Hook. f.
Horneriana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = *H. barbata*, Korth.
hymenocapsa, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 375. — Afr. trop. or.
inconstans, Pomel, ex Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Alg. [Dicot.] (1889) 388. — Algeria.
Johnstoni, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 397 = *Hedyotis Johnstoni*, Oliver.
Lawsoniae, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 = *H. Lawsoniae*, Wight & Arn.
Leptopetalum, K. Schum. l. c. 25 = *H. leptopetala*, Hook. f.
loganioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = *Hedyotis loganioides*, Benth.
longifolia, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 376 = *virgata*, DC.
longituba, G. Beck, in Paulitschke, Harrar, App. (1888) 461, fig. 2. — Afr. trop. or.
macrodonata, Baker, in Kew Bull. (1895) 67. — Afr. centr. or.
Maingayi, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 = *Hedyotis Maingayi*, Hook. f.
monocephala, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = *Hedyotis monocephala*, R. Br.
natalensis, Kuntze, l. c. — Afr. austr.
Oliveriana, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 397. — Afr. trop. or.
pinifolia, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 25 = *Hedyotis pinifolia*, Wall.
Pringlei, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 169. — Mexic.
psychotrioides, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (July 1889) 54. — Austral.
purpurascens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = *Hedyotis purpurea*, Bedd.
pygmaea, Kuntze, l. c. = *H. caerulea*, Wight & Arn.
quadrangularis, Kuntze, l. c. = *H. tetragonalis*, Walp.
rhamnoides, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 131. — Afr. trop.
rupicola, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 293. — Afr. austr.
rotata, Baker, in Kew Bull. (1895) 216. — Reg. Somal.
rugosa, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 25 = *Hedyotis rugosa*, Korth.

OLDENLANDIA : —

- scandens*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. (1891) 26 = *Hedyotis scandens*, Roxb.
Schweinfurthii, Terrac. in Ann. Ist. Bot. Roma, v. (1894) 107. — Afr. trop. or.
serpyllifolia, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 502 = *trinervis*, Retz.
setifera, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 376 = *caffra*, Eckl. & Zeyh.
silvatica, K. Schum. l. c. — Afr. trop.
sphaerocarpa, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37. — Afr. trop. or.
stricta, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = O. Heynii, G. Don.
subdivaricata, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 211. — Tonk.
swertioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = O. swertioides, Hook. f.
tenella, Kuntze, l. c. — Afr. austr.
tenuipes, Kuntze, l. c. = *Hedyotis tenuipes*, Hemsl.
tenuis, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 273. — Bras.
thesiifolia, K. Schum. l. c. 269 = *Hedyotis thesiifolia*, A. St Hil.
thymifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292. — Afr. austr.
vaginata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 25 = H. *vaginata*, Blume.
vestita, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 211 = H. *vestita*, R. Br.

OLEA, [Tourn.] Linn. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 337.

- javanica*, Kobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1895) 134 = *maritima*, Wall.
Woodiana, Kobl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 532. — Natal.

OLEARIA, Moench (Compos.). — Ind. Kew. ii. 338.

- alpina*, J. Buchanan, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 215. — N. Zel.
chathamica, T. Kirk, l. c. xxiii. 1890 (1891) 444 (O. operina, Hook. f. Handb. N. Z. Fl. 731). — Ins. Chatham.
erubescens, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 290 = *Eurybia erubescens*, DC.
erythropappa, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 468. — N. Zel.
fasciculifolia, Colenso, l. c. xxv. 1892 (1893) 330. — N. Zel.
fragrantissima, Petrie, l. c. xxiii. 1890 (1891) 398. — N. Zel.
fulvida, Archer, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315, nomen. — N. Zel.
Hilli, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 194. — N. Zel.
Kernotii, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser. I. ii. (1889) 10, in syn. = *Aster Kernotii*, F. Muell.
monticola, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. x. (1895) 39. — N. Guin.
multiflora, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 387. — N. Zel.
odorata, Petrie, l. c. xxiii. 1890 (1891) 399. — N. Zel.
ramuliflora, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 467. — N. Zel.
rigida, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 194. — N. Zel.
rugosa, Archer, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315, nomen. — N. Zel.
suavis, Chesem. in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 409. — N. Zel.
suborbiculata, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 26. — N. Zel.
uniflora, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 469. — N. Zel.
xanthophylla, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 193. — N. Zel.

OLIGOBOTRYA, Baker, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1537. **LILIACEAE**.
Henryi, Baker, l. c. — China.**OLIGOCARPUS**, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 338.

- acanthospermus*, Bolus, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1535 (= *Xenismia acanthosperma*, DC.). — Afr. austro-occ. extratrop.

OLIGOGYNIUM, Engl. = **Nepthytis**, Schott (Aroid.).

- constrictum*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 453 = N. *constricta*, N. E. Br.
Gravenreuthii, Engl. l. c. — Kamerun.
libericum, Engl. l. c. = N. *liberica*, N. E. Br.

OLIGONEMA, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 138; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1894) 389. **COMPOSITAE**.
heterophylla, S. Wats. l. c. — Mexic.**OLINIA**, Thunb. [Thymel.]. — Ind. Kew. ii. 339.
macrantha, Engl.? Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 123 [sphalm.?] = *micrantha*, Decne.?
usambarensis, Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 63; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 277. — Afr. trop. or.
Volkensii, Gilg, ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 285. — Afr. trop. or.**OLIVERELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 259 = **Loranthus**, Linn.
campestris, Van Tiegh. l. c. = L. *campestris*, Engl.
Hildebrandtii, Van Tiegh. l. c. = L. *Hildebrandtii*, Engl.
rubro-viridis, Van Tiegh. l. c. = L. *rubro-viridis*, Oliv.
Sacleuxii, Van Tiegh. l. c. — Afr. trop. or.**OLIVERODOXA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 692 = **Riedelia**, Oliver (Scitam.).
curviflora, Kuntze, l. c. 692 = R. *curviflora*, Oliver.**OMALANTHUS**, Juss. = **Homalanthus**, A. Juss. (Euphorb.).
populneus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 699 = H. *Leschenaultianus*, A. Juss.**OMALOCLINE**, Cass. = **Crepis**, Linn. (Compos.).
granatensis, Willk. Illustr. Fl. Hisp. ii. (1886-92) 147, t. 178. — Hisp.**OMENTARIA**, Salisb. = **Tulbaghia**, Linn. (Liliac.).

- acutiloba*, *aequinoctialis*, *alliacea*, *capensis*, *Dregeana*, *hypoxidea*, *violacea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 713 = *homonyma omnia* Tulbaghia.

OMPHALANDRIA, P. Br. = **Omphalea**, Linn. (Euphorb.).

- brasiliensis*, *commutata*, *diandra*, *frondosa*, *hypoleuca*, *triandra*, *trichotoma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 609 = *homonyma omnia* Omphaleae.
oppositifolia, Kuntze, l. c. = O. *biglandulosa*, Baill.

OMPHALEA, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 340.

- Queenslandiae*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker (1889) 58. — Austral.

OMPHALOCARPUM, Beauv. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 341.

- Radikoferi*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1886) 580; L. Planch. Etud. prodr. Sapot. (1888) 60. — Afr. trop. occ.

OMPHALODES, Tourn. ex Moench (Borag.). — Ind. Kew. ii. 341.

- acuminata*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 170. — Mexic.
cordata, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 148. — China.
Kuzinskyanae, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 318. — Lusit.
Lojkae, Sommier & Levier, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 157. — Reg. Cauc.
mexicana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 158. — Mexic.

OMPHALODES : —

- moupinensis*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 64. — Tibet.

OMPHALOGONUS, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1889) 812; et Hist. des pl. x. (1889) 300; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 221. **ASCLEPIADEAE**.
calophyllus, Baill. l. c. — Zanzib.**OMPHALOPAPPUS**, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 234; et in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 176. **COMPOSITAE**.
Newtoni, O. Hoffm. l. c. — Angola.**ONAGRA**, [Tourn.] Adans. = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).

- Braunii* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 695 = Oe. *Braunii*, Doell.
muricata, G. Beck, l. c. = Oe. *muricata*, Murv.
Oakesiana, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 233 = Oe. *Oakesiana*, Robinson.

ONCELLA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 251 = **Loranthus**, Linn.
ambigua, Van Tiegh. l. c. = L. *ambiguus*, Engl.
Sacleuxii, Van Tiegh. l. c. — Zanzib.**ONCIDIUM**, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 341.

- Braunii*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 620; et in Gartenfl. xxxv. (1886) 621 t. 1235. — Hab. ?
brevilabrum, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 158. — Hab. ?
chrysops, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 104. — Hab. ?
chrysorhapis, Reichb. f. l. c. 72. — Bras.
cristatum, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 210; et in Lindenian, x. (1894) 41 t. 451. — Bras.
detortum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 392. — Hab. ?
fallens, Reichb. f. in Flora. lxxix. (1886) 549. — Hab. ?
Gravesianum, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) i. 650 fig. 94. — Bras.
Hookeri, Rolfe, l. c. (1887) ii. 520. — Bras.
inops, Cogn. & Rolfe, in Journ. des Orchid. iii. (1893) 346; et iv. (1893) 74 = *bryolophotum*, Reichb. f.
Larkinianum, Gower, in Garden. xxxvii. (1890) 325; et *Orchid. Alb.* ix. (1891) t. 405. — Bras.
Leopoldi, « Rolfe », ex God.-Lebœuf, L'Orchidophile (1890) 353 = seq.
Leopoldianum, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) ii. 556; et in Lindenian, vi. 71 t. 274. — Reg. Andina.
lepturum, Reichb. f. l. c. (1886) i. 40. — Bolivia.
Lucasianum, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 185. — Hab. ?
luteum, Rolfe, l. c. (1893) 172. — Hab. ?
Mantini X, God.-Lebœuf, in L'Orchidophile (1888) 47, cum ic.; et ex Gard. Chron. (1888) i. 335 [Hybr. spont. ?]. — Bras.
mendax, Reichb. f. in Flora. lxxix. (1886) 549. — Hab. ?
oloricollis, Reichb. f. l. c. lxxi. (1888) 151. — Hab. ?
orthostates, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 283 t. 47 [Oliver, ex in Thurn, in Timehri, v. (1886) 204]. — Guian. angl.
orthotis, Reichb. f. in Illustr. Hort. xxxv. (1888) 91 t. 69. — Hab. ?
panduratum, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 9. — Columb.
pardoglossum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 516. — Hab. ?
platybulbon, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 475. — Bras.
Pollettianum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 326 [Hybr. spont. ?]. — Hab. ?
robustissimum, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 352. — Bras.
Rolfeanum, Sander, l. c. (1892) ii. 34. — Columb.
Rusbyi, Rolfe, ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 265. — Bolivia.
Saintlegerianum, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) ii. 582, et (1893) i. 194 et 227. — Bras.
Sanderianum, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 337. — Peruvia.

ONCIDIUM : —

Schmidtianum, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 649. — Hab. ?
zonatum, Cogn. in *Journ. des Orchid.* iv. (1893) 74. — Columbia.

ONCINOTIS, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 345.

gracilis, Stapf, in *Kew Bull.* (1894) 124; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2346. — Lagos.
melanocephala, K. Schum. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 34; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 319. — Afr. trop. or.

ONCOBA, Forsk. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 345.

fissistyla, Warb. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 277. — Afr. trop. or.
laurina, Warb. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 18. — Afr. trop.
macrophylla, Warb. l. c. (= *Chlania macrophylla*, Klotzsch). — Afr. trop.
Poggei, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 163. — Congo.
Stuhlmanni, Guerke, l. c. 164. — Afr. trop. or.

ONCOCALYX, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 258 = **Loranthus**, Linn.

Welwitschii, Van Tiegh. l. c. = L. Welwitschii, Engl.

ONCOSTEMMA, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 148. **ASCLEPIADEAE**.

cuspidatum, K. Schum. l. c. — Ins. S. Thom.

ONCOSTEMUM, A. Juss. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 347.

botryoides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 502. — Madag.
flexuosum, Baker, l. c. — Madag.
microsphaerum, Baker, l. c. 501. — Madag.
nervosum, Baker, l. c. xxv. (1890) 333. — Madag.
polytrichum, Baker, l. c. xxii. (1887) 501. — Madag.
vacciniifolium, Baker, l. c. 502. — Madag.

ONCOTHECA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 931; et *Hist. des pl.* xi. (1892) 220.

ILICINEAE.
Balansae, Baill. ll. cc. — N. Caled.

ONOBRYCHIS, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 346.

Bornmuelleri, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 9; et in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 189. — As. Min.
calcareae, Vandas, ex Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 154. — Bulg.
caloptera, Aitch. & Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 58. — Turkest.
fallax, Freyn & Sint. ex Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 81. — Armen.
insignis, Freyn & Bornm. ex Freyn, l. c. — As. Min.
kurdica, Post, Pl. *Postianae*, iv. (1892) 6. — Syria.
marginata, G. Beck, ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien.* (1886) ii. 75. — As. Min.
megalobotrys, Aitch. & Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 58. — As. centr.
pentelica, Hausskn. in *Mitt. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 71. — Graecia.
pindicola, Hausskn. l. c. — Graecia.
pulvillus, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 452. — Turkest.
pseudomadritensis, Batt. in *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 292 = argentea, Boiss.
scardica, Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 236. — Graecia.
stenostachya, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 446. — As. Min.
transsilvanica, Simonk. in *Termész. Füzet.* x. (1886) 180; et *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 191 = montana, Pers.
xanthina, Freyn & Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 445 (= *Hedysarum xanthinum*, Freyn). — As. Min.

ONONIS, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 348.

austriaca, G. Beck, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 794; et *Fl. Nied.-Oest.* ii. i. (1892) 835. — Austria.
Christii, Bolle, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 237. — Ins. Canar.
cirtensis, Batt. in *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 218; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 3 8 = hirta, Desf.
Clausoniana, Batt. l. c. 218 = O. Natrix, Linn.
Thomsoni, Ball, ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1829. — Maroc.

ONOPORDON, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 349.

Boissieri, Freyn & Sint. ex Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 470. — Ins. Cypr.
Espiniae, Coss. in *Compt.-rend. Acad. Sci. Paris*, xcvi. (1884) 468; *Ill. Fl. Atlant.* ii. (1893) 71 t. 143; Rony, in *Morot, Journ. de Bot.* vii. (1893) 163. — Tunetia.
humile, Loscos, ex Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* ii. (1889) 6. — Hisp.
micropterum, Pau, l. c. 5. — Hisp.

ONOSERIS, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 350.

glandulosa, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 366. — Peruv.
lanata, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 32 t. 2 fig. 1. — Am. austr. occ.
paniculata, Klatt ex Th. Dnr. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 214 (= *Isotypus onoseroides*, H. B. & K.). — Costa Rica.
spatulata, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 31. — Am. austr.-occ.
Stuebelii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 366. — Peruvia.
Trianae, Hieron. l. c. xix. (1894) 69. — Columb.
Warszewiczii, Hieron. l. c. 70. — Ecuad.

ONOSERIS, Willd. Sp. pl. iii. (1804) 1702 pr. p. = **Lycoseris**, Cass. (Compos.).

bracteata, grandis, latifolia, squarrosa, triplinervia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 354 = *homonyma omnia* *Lycoseridis*.
altissima, Kuntze, l. c. (= *Centroclinium altissimum*, Poepp. & Endl.). — Peruvia.
trinervis, Kuntze, l. c. (= *Diazeuxis trinervis*, D. Don). — Peruvia.

ONOSMA, Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 350.

austriacum, G. Beck, ex Ber. *Deutsch. Bot. Gesells.* x. (1893) 104. — Austria.
Bornmuelleri X, Hausskn. & Bornm. in *Mitt. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 19. — As. Min.
bracteosum, Hausskn. & Bornm. l. c. — As. Min.
bulgaricum, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 54; et *Fl. Bulg.* (1891) 398. — Bulg.
burmanicum, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 94. — Burma.
echioides, St Lager, in *Cariot. Étud. des fl.* éd. 8 ii. (1889) 612 = echioides, Linn.
Mattirolii, Baldacci, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 226. — Albania.
paniculatum, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 104. — China occ.
pyramidale, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1888) t. 6987 [pyramidalis]. — Reg. Himal.
tridentinum, Wettst. in *Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* iv. (1886) 64 = echioides, Linn.
tubiflorum, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 54; et *Fl. Bulg.* (1891) 398. — Bulg.

OOSTERDYKIA, Burm. = **Cunonia**, Linn. (Saxif.).

Balansae, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 227 = C. Balansae, Brongn. & Gris.
Lenormandii, Kuntze, l. c. = C. Lenormandii, Vieill.
macrophylla, Kuntze, l. c. = C. macrophylla, Brongn. & Gris.
pulchella, Kuntze, l. c. = C. pulchella, Brongn. & Gris.
purpurea, Kuntze, l. c. = C. purpurea, Brongn. & Gris.

OOSTERDYKIA : —

simplicifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 227 = *Cunonia Balansae*, Brongn. & Gris.
Vieillardii, Kuntze, l. c. = C. Vieillardii, Brongn. & Gris.

OPERCULINA, Silva Manso = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.).

codonantha, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 550 = I. codonantha, Benth.
hetrocaulos, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 119 = I. tuberosa, Rich.
Pavoni, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 550 = I. Pavonii, Choisy.
peltata, Hallier f. xvi. (1892) 549; et xviii. (1894) 119 = I. peltata, Choisy.
populifolia, Hallier f. l. c. 550, nomen. — Cuba.
triquetra, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 120 = I. triquetra, Roem. & Schult.
Turpethum, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 32 = I. Turpethum, R. Br.
ventricosa, Peter, l. c. = I. ventricosa, G. Don.
violacea, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 645] Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 60 t. 26b. — Bras.

OPHELIA, D. Don = **Swertia**, Linn. (Gentian.).

Tashiroi, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 68. — Ins. Kiusiu.

OPHIOCARYON, Schomb. (Sabiace.). — Ind. Kew. ii. 352.

heterophyllum, Urban, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xii. (1895) 221. — Guian.
paradoxum, Urban, l. c. = paradoxum, Schomb.

OPHIOCAULON, Hook. f. (Passiflor.). — Ind. Kew. ii. 352.

lanceolatum, Engl. *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 386; et xv. (1893) 563. — Congo.
Poggei, Engl. ll. cc. 386, et 567. — Congo.
Rowlandi, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 16. — Afr. trop. occ.
Schweinfurthii, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 569. — Afr. trop.

OPHIOPOGON, Ker-Gawl. (Haemodor.). — Ind. Kew. ii. 352.

brevifolius, Royle, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 324, in syn. = *Theropogon pallidus*, Maxim.
Clarkei, Hook. f. l. c. 268. — Reg. Himal.
clavatus, C. H. Wright, ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2382; et in *Kew Bull.* (1895) 116. — China.
dracaenoides, Hook. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 268 (= *Flueggea dracaenoides*, Baker). — Reg. Himal.
jaburae, R. Schulze, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 377, sphalm. = O. Jaburan, Lodd.
Griffithii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 270. — Assam.
kansuensis, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 103. — China.
micranthus, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 269. — Assam.
reptans, Hook. f. l. c. 268. — Ind. or.

OPHIORHIZA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 353.

amplifolia, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 213. — Tonk.
baviensis, Drake, l. c. — Tonk.
glauco-rosea, Drake, l. c. 214. — Tonk.
inflata, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 488. — Ins. Ya Jama.
leptobotrya, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 214. — Tonk.
micrantha, Drake, l. c. — Tonk.
rupestris, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894) 212. — Ins. Salom.
subrubescens, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 215. — Tonk.
Tashiroi, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 489. — Ins. Ya Jama.
tristis, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 215. — Tonk.

OPHIURUS, Gaertn. f. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 354.
exaltatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 780 = *corymbosus*, Gaertn. f.

OPHRYS, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 354.
Ascheroni X, Nanteuil, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 423. — Gall.
Barlae X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 159. — Gall.
Botteroni X, Chod. [Notice sur Polyg. d'Eur. et d'Or. (1887) in nota] in Bull. Soc. Bot. Genève. v. (1889) 187. — Jurass.
cusifolia, Pav. ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 326, in syn. = *fastigiata*, Reichb. f.
Ficalhoana, Guimaraes, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 39 = *tenthredinifera*, Willd.
gibbosa X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 198. — Austria.
Migoutiana X, H. Gay, in Mém. Assoc. Franç. avanc. sci. Paris (1888) 502, cum ic. — Algérie.
Nouletii X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 158. — Gall.
Pseudo-fusca X, Albert & G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 392; et in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 158. — Gall. mer.
Reichenbachiana X, M. Schulze, in Mitth. Bot. Ver. Jena, vii. (1889) 29. — Eur.
Saratoi X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 159. — Gall.
triorchis, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 815 = *Herminium Monorchis*, Linn.

OPILIA, Roxb. (Oclac.). — Ind. Kew. ii. 355.
congolana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 872. — Congo-gall.
tomentella, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 168. — Engl.

OPLISMENUS, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 355.
Bakeri, Schinz, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 771 = *bromoides*, Baker.
Benthami, C. Cordon. Fl. Ile Réunion, (1895) 118 = *Panicum Benthami*, Benth.
Junghuhnii, Boerl. in Annal. Jard. Buitenz. viii. (1889) 63. —
simplex, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 48. — Afr. trop.

OPOPANAX, Koch (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 356.
horridum, Miq. ex Dippel. Hand. Laubholz. iii. (1893) 238 = *Fatsia horrida*, Benth. & Hook. f.
syriacum, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 271. — Syria.

OPULASTER, Medic. = **Neillia**, D. Don (Rosac.).
amurensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 949 (= *Physocarpa amurensis*, Maxim.). — As. or.
capitata, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 112 = seq.
capitata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 949 = *Neillia opulifolia*, Benth. & Hook. f.
flexuosus, Kuntze, l. c. = *Stephanandra flexuosa*, Sieb. & Zucc.
gracilis, Kuntze, l. c. = *St. gracilis*, Franch. & Savat.
Hanceanus, Kuntze, l. c. = *St. chinensis*, Hance.
malvaceus, Greene, in Erythea. ii. (1894) 194; Leiberg, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 271 = seq.
malvaceus, Kuntze, Rev. Gen. (1893) 949 = *Neillia malvacea*, Greene.
monogynus, Greene, in Erythea, ii. (1894) 194 = seq.
monogynus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 949 = *Neillia Torreyi*, S. Wats.
opulifolius, Kuntze, l. c. = *N. opulifolia*, Benth. & Hook. f.
sinensis, Kuntze, l. c. = *N. sinensis*, Oliver.
Tanakae, Kuntze, l. c. = *Stephanandra Tanakae*, Franch. & Savat.
thyrsiflorus, Kuntze, l. c. = *Neillia thyrsiflora*, D. Don.

OPUNTIA, Tourn. ex Linn. (Cact.). — Ind. Kew. ii. 356.

OPUNTIA : —

Airampo, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 492. — Chili.
Alcahes, Weber, in Bull. Mus. Hist. nat. Paris, i. (1895) 321. — Calif.
Alfayucca, « Karw. » ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885 ?) 938, sphalm. (= *O. Alfagayucca*, Karw.) = *O. Amyclea*, Ten.
bernardina, Engelm. ex Parish, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 92. — Calif.
Chella, Weber, in Bull. Mus. Hist. nat. Paris, i. (1895) 320. — Calif. infér.
Geissei, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 492. — Chili.
heteromorpha, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 28. — Am. austr. occ.
inamœna, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II. (1890) 306. — Bras.
invicta, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 163. — Calif.
leonina, Haage & Schmidt, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885 ?) 974, fig. 133. — Chili.
leucophaea, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 27. — Am. austr.-occ.
Maihuen, Gay, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885 ?) 996 = *Peirescia Poeppigii*, Salm-Dyck.
molesta, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 164. — Calif.
Piccolomini, Hort. ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 39. — Form hort.
Rahmeri, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 27. — Am. austr. occ.
rotundifolia, T. S. Brandeg. in Zöf. ii. (1891) 21. — Calif.
tarapacana, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 27. — Am. austr. occ.
tetracantha, Toumey, in Gard. and For. ix. (1893) 432. — Arizona.
tuberiformis, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 28. — Am. austr. occ.
versicolor, Engelm. ex Toumey, in Gard. and For. viii. (1895) 325, 326. —

ORANIA, Zipp. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 358.
nivea, Hort. Linden, ex W. Wats. in Gard. Chron. (1887) ii. 157. — N. Guin.

ORBIGNIA, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 358.
exelsa, Barb. Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, i. (1891) 32 t. ix, fig. b, 1-9. — Bras.
sabulosa, Barb. Rodr. l. c. 110. — Bras.
speciosa, Barb. Rodr. l. c. 32 t. 9 b, fig. 1-9. — Bras.

ORCHAENACTIS, « Coville » ex O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzentam. iv. 5 (1893) 391 sphalm. = **Orochaenactis**, Coville (Compos.).

ORCHI-ACERAS X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 107. **ORCHIDEAE**.
Bergoni X, G. Camus, l. c. (= *Orchis Bergoni*, de Nanteuil). — Gall.
spuria X, G. Camus, l. c. 108 (= *Orchis spuria*, Reichb.). — Gall.
Weddellii X, G. Camus, l. c. — Gall.

ORCHIASTRUM, Lem. = **Lachenalia**, Jacq. (Liliac.).
porrifolium, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 306 = *Spiranthes porrifolia*, Lindl.
Romanzoffianum, Greene, l. c. = *S. Romanzoffiana*, Cham. & Schlecht.

ORCHIDANTHA, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) ii. 519; Petersen, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzentam. ii. 5 (1888) 10. **MUSACEAE**.
borneensis, N. E. Br. ll. cc. (= *Lowia borneensis*, Baker). — Borneo.

ORCHI-GYMNADENIA X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 479, in obs. **ORCHIDEAE**.
Heinzliana X, G. Camus, l. c. (= *Orchis Heinzliana*, Reichb.). — Gall.

ORCHI-GYMNADENIA : —

Lebrunii X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 351; et in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 492; et Atlas, t. 38. — Gall.
Legrandiana X, G. Camus, l. c. 478 (= *Gymnadenia Legrandiana*, G. Camus). — Gall.
Regelii X, G. Camus, l. c. (= *Orchis Regelii*, G. Camus). — Gall.
souppensis X, G. Camus, l. c. 477, et Atlas, t. 25. — Gall.

ORCHIODES, Trew. in Act. Phys. Med. Caes. Leop. Nat. Cur. iii. (1736) 406 t. 6 f. 7; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 674 = **Goodyera**, R. Br. (Orchid.).
bifidum, *celebicum*, *coloratum*, *cordatum*, *foliosum*, *fumatum*, *fuscum*, *grande*, *hispidum*, *macrophyllum*, *nudum*, *parviflorum*, *procerum*, *pubescens*, *pusillum*, *recurvum*, *repens*, *reticulatum*, *rubicundum*, *Schlechtendalianum*, *secundiflorum*, *velutinum*, *viridiflorum*, *viscosum*, *vitatum*, *Waitzianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 674 = *homonyma omnia* Goodyerae.
biflorum, Kuntze, l. c. (= *Georchis biflora*, Lindl.). — Reg. Himal.
calva, Kuntze, l. c. (= *G. calva*, Lindl.). — Java.
decipiens, Kuntze, l. c. = *Goodyera Menziesii*, Lindl.
discolor, Kuntze, l. c. = *Haemaria discolor*, Lindl.
elongatum, Kuntze, l. c. = *Hetaeria elongata*, Lindl.
marginatum, Kuntze, l. c. = *Goodyera repens*, R. Br.
occultum, Kuntze, l. c. = *Platylepis goodyeroides*, A. Rich.
polygonodes, Kuntze, l. c. = *Goodyera polygonoides*, F. Muell.
quercilobum, Kuntze, l. c. = *Physurus querceticola*, Lindl.
resupinatum, Kuntze, l. c. = *Goodyera repens*, R. Br.
subregularis, Kuntze, l. c. (= *Georchis subregularis*, Reich. f.). — N. Caled.
tesselatum, Kuntze, l. c. = *Goodyera repens*, R. Br.

ORCHIPEDA, Blume = **Voacanga**, Thou. (Apo-cyn.).
papua, F. Muell. Descr. Notes Papuan Pl. vii. (1886) 30. — N. Guin.

ORCHI-PLATANATHERA X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 474. **ORCHIDEAE**.
Chevallieriana, G. Camus, l. c.; et Atlas, t. 34. — Gall.

ORCHIS, [Tourn.] Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 359.
adulterina X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 32. — Gall.
alatoïdes X, Fleury, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 163 et 187; G. Camus, in Morot, l. c. 406. — Gall.
altissima, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 137 = *O. Suzannae*, R. Br.
Arbostii X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 53; et in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 351. — Gall.
balcanica, Velen. in Sitz. Boehm. Gess. Wiss. 1889 (1890) ii. 53. — Bulg.
Barlae X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 406 (= *Scrapias Barlae*, C. Richt.). — Gall.
Bergoni X, Nanteuil, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 422 = *Orchi-Aceras Bergoni* X, G. Camus.
Bonnieriana X, G. Camus, Vade-mecum herb. paris, Suppl. (1890) et Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 416; et Atlas, t. 29 et 29 bis. — Gall.
Bornemanniae, « Aschers. » ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 27. sphalm. = *O. Bornemannii* X, Aschers.
Bornemanniana X, « Aschers. » ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1890) 292, sphalm. = *O. Bornemannii* X, Aschers.

ORCHIS : —

- bosniaca*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus.* Wien, ii. (1887) 53 t. 1 fig. 1-3; et v. (1898) 574 = *latifolia*, Linn.
- Boudieri* X, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 285; et xlii. (1895) 506; G. Camus, in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1892) 252. — Gall.
- Calvellii*, Terrac, in *Ann. Ist. Bot. Roma*, iv. 1889-90 (1891) 47. — Italia mer.
- Camusii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 272; G. Camus, in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1892) 349. — Gall.
- capitata* X, G. Camus, l. c. 33. — Gall.
- carnea* X, G. Camus, l. c. 419; et *Atlas*, t. 33. — Gall.
- Chatini* X, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 341. et in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1892) 413. — Gall.
- Chevallieriana* X, G. Camus, l. c. xxxviii. (1891) 156 = *Orchiplatanthera Chevallieriana*, G. Camus. *clavata*, Heyne, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 150, in syn. = *Habenaria marginata*, Colabr.
- complicata* X, G. Camus, in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1892) 34. — Pyren.
- cyclochila*, Maxim. in *Bull. Acad. Petersb.* xxxi. (1887) 104 (= *Habenaria cyclochila*, Franch. & Sav.). — Japon.
- Debeauxii* X, G. Camus, in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1892) 34 et 350. — Cors.
- decipiens* X, G. Camus, l. c. 412. — Gall.
- Eichenfeldtii* X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest. i.* (1890) 202. — Austria.
- Erdingeri* X, Sennholz, in *Sitz. zool.-bot. Ges.* Wien, xli. (1891) Sitzb. 41; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 381 (= *Platanthera Erdingeri*, A. Kern.). — Austria.
- erythrantha* X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest. i.* (1890) 201. — Austria.
- Franchetii* X, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 243 t. 3, et in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1892) 415. — Gall.
- Grenieri* X, G. Camus, l. c. 410. — Gall.
- guestphalica* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 273. — Germ. occ.
- Henriques* X, Guimaraes, in *Bolet. Soc. Brot. v.* (1887) 71. — Lusit.
- influenza* X, Sennholz, in *Verh. zool.-bot. Ges.* Wien, xli. (1891), Sitzb. 40; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 381. — Austria.
- integrata*, G. Camus, in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1892) 157 = *incarnata*, Linn.
- intermedia* X, Gadeceau, in *Mém. Soc. sci. nat. de l'Ouest*, ii. (1892) 4 t. 1, fig. 6a et 6b; G. Camus, l. c. 408. — Gall.
- intuta* X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest. i.* (1890) 205 (= *O. Regaliana*, C. Richt.). — Austria.
- Jeanperii* X, G. Camus & Luizet, in *Camus, Vademecum herb. paris. Suppl.* (1890), ex *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1892) 416; et *Atlas*, t. 27. — Gall.
- Kisslingii* X, G. Beck, in *Verh. zool.-bot. Ges.* Wien, xxxviii. (1888) 768; et *Fl. Nied.-Oest. i.* (1890) 203. — Austria.
- Langei* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 273. — Hisp.
- Leguei* X, G. Camus, in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1892) 420; et *Atlas*, t. 32. — Gall.
- leucantha*, Ham. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 161, in syn. = *Habenaria constricta*, Hook. f.
- Loeselii*, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 173, sphalm. = *Liparis Loeselii*, A. Rich.
- Luizetiana* X, G. Camus, in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1892) 415; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 341. — Gall.
- monticula* X, C. Richt. in *Verh. zool.-bot. Ges.* Wien, xxxviii. (1888) 220. — Austria.
- neglecta* X, G. Camus, *Vademecum herb. paris.*, Suppl. (1890) et in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1892) 419. — Gall.
- Pauliana* X, Malinv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) p. cclxvii. t. 1; et in *Morot, l. c.* 354. — Gall.

ORCHIS : —

- pentecostalis*, Wettst. & Sennholz, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 321; et in *Bot. Centralbl.* xli. (1890) 84. — Austria
- Perretii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 272; G. Camus, in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1892) 351. — Gall.
- pseudo-conopsea*, Parmentier, in *Bull. Ser. hist. nat.* Autun, vii. (1894) 343 = *conopsea*, Linn.
- purpurea* X, G. Camus, in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1892) 32. — Gall.
- Regaliana* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 205 = *intuta* X, G. Beck.
- Regelii* X, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) p. 228; et in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1890) 2; et vi. (1892) 478. — Helv., Gall.
- Roborowskii*, Maxim. in *Bull. Acad. Petersb.* xxxi. (1887) 104. — Reg. Tangut.
- Rouyana* X, G. Camus, *Vademecum herb. paris.*, Suppl. (1890), et in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1892) 416; et *Atlas*, t. 28. — Gall.
- Sauzaiana* X, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1891) 217; in *Morot, l. c.* 419; et *Atlas*, t. 32. — Gall.
- Schulzei* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 274; G. Camus, l. c. 417. — Gall., Germ.
- Schulzii* X, Hausskn. [ubi?] ex Nym. *Consp. Fl. Europ. Suppl. ii. I.* (1890) 292. — Germ.
- Skorpii*, Velen, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxii. (1886) 257; in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1887) 461; et *Fl. Bulg.* (1891) 523 = *O. Morio*, Linn.
- speciosissima*, Wettst. & Sennholz, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 319; et in *Bot. Centralbl.* xli. (1890) 84; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest. i.* (1890) 203 = *pentecostalis*, Wettst. & Sennholz.
- stylosanthes*, Ham. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 143 in syn. = *Habenaria commelinifolia*, Wall.
- Suzanneae*, Heyne, ex Hook. f. l. c. 164, in syn. = *H. galeandra*, Benth.
- Széchenyiana*, Reichb. f. & Kanitz, *Pl. exped. Szechenyi in As. centr. coll.* (1891) 58, t. 61 fig. 1-4, [Növényt. Gysylesek Erdmánya, 1891]. — As. centr.
- Timbaliana* X, G. Camus, in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1888) 349, t. 9; et vi. (1892) 352. — Gall.
- Tommasini* X, G. Camus, l. c. vi. (1892) 35. — Gall.
- Vilmisii* X, G. Camus, l. c. 355; et *Atlas*, t. 23. — Gall.
- viride-fusca*, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 229. — Reg. Cauc.
- Weddellii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 273 [an seq.]. — Gall.
- Weddellii* X, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 242 t. 3; G. Camus, in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1892) 414. — Gall.
- Wilmsii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 273. — Westphal.

- ORCHI-SERAPIAS** X, G. Camus, in *Morot, Journ. de Bot. vi.* (1894) 31. **ORCHIDEAE.**
- adulterina* X, G. Camus, l. c. 32. — Gall.
- Barlae* X, G. Camus, l. c. 33. — Alp. Marit.
- capitata* X, G. Camus, l. c. — Gall.
- complicata* X, G. Camus, l. c. 34. — Gall.
- Debeauxii* X, G. Camus, l. c. — Cors.
- Neuletii* X, G. Camus, l. c. 31 — Gall.
- purpurea* X, G. Camus, l. c. 32 (= *Serapias purpurea*, Doumenjon). — Gall.
- Tommasini* X, G. Camus, l. c. 35 (= *S. Tommasini*, Kern.). — Eur. mer.

- ORCUTTIA**, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 219 t. 60; et in *West Am. Scientist*, iii. (1886) 4, cumic.; Hack. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1887) 65. **GRAMINEAE.**
- californica*, Vasey, l. c. 219; et *Illustr. N. Am. Grass.* ii. (1892) t. 49. — Calif.
- Greenei*, Vasey, *ll. cc.* xvi. (1891) 146; et t. 50. — Guatem.

- ORELLANA**, Ludw. = **Bixa**, Linn.
- americana*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 44 = *B. Orellana*, Linn.

- OREOBOLUS**, R. Br. (Cyper.). — *Ind. Kew.* ii. 362.
- serulata*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 492 = *stricta*, Bergg.

- OREOBROMA**, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 31 = **Calandrinia**, H. B. & K. pr. p. et **Lewisia**, Pursh (Portul.).
- brachycalyx*, Howell, l. c. 31 = *Lewisia brachycalyx*, Engelm.
- columbiana*, Howell, l. c. 32 = *Calandrinia columbiana*, Howell.
- Cotyledon*, Howell, l. c. = *C. Cotyledon*, S. Wats.
- Howellii*, Howell, l. c. = *C. Howellii*, S. Wats.
- Leana*, Howell, l. c. 31 = *C. Leana*, Porter.
- nevadensis*, Howell, l. c. 33 = *C. nevadensis*, A. Gray.
- oppositifolia*, Howell, l. c. 32 = *C. oppositifolia*, S. Wats.
- pygmaea*, Howell, l. c. = *Talinum pygmaeum*, A. Gray.
- triphylla*, Howell, l. c. 33 = *Claytonia triphylla*, S. Wats.
- Tweedyi*, Howell, l. c. 32 = *Calandrinia Tweedyi*, A. Gray.

- OREOCARYA**, Greene, in *Pittonia*, i. (July 1889) 57; Guerke, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1894) 109. **BORAGINEAE.**
- fulvocanescens*, Greene, l. c. (= *Krynitzkia fulvocanescens*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- glomerata*, Greene, l. c. (= *K. glomerata*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- holoptera*, Greene, l. c. (= *K. holoptera*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- leucophaea*, Greene, l. c. (= *K. leucophaea*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- Palmeri*, Greene, l. c. (= *K. Palmeri*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- sericea*, Greene, l. c. (= *K. sericea*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- setosissima*, Greene, l. c. — Am. bor. occ.
- suffruticosa*, Greene, l. c. 57 (= *K. Jamesii*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- virigata*, Greene, l. c. 48 (= *K. virigata*, A. Gray). — Am. bor. occ.

- OREOCHARIS**, Benth. (Gesner.). — *Ind. Kew.* ii. 363.
- aurantiaca*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 716. — Yunnan.
- Delavayi*, Baill. l. c. 715. — Yunnan.
- Henryana*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) 1944. — China.

- OREOCHLOA**, Link (Gramin.). — *Ind. Kew.* ii. 363.
- seslerioides*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 78 = *pedemontana*, Boiss.

- OREODAPHNE**, Nees & Mart. = **Ocotea**, Aubl. (Laurin.).
- diospyrifolia*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 374 (= *Oreodaphne diospyrifolia*, Meissn.). — Am. austr.

- OREODOXA**, Willd. (Palm.). — *Ind. Kew.* ii. 364.
- granatensis*, Hort. Bull. [Conf. W. Wats. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 304; Nichols. *Dict. Gard.* ii. 521] — N. Granat.

- OREOGRASTIS**, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 127. **CYPERACEAE.**
- Emini*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

- OREOPANAX**, Decne. & Planch. (Aral.). — *Ind. Kew.* ii. 364.
- eriocephalus*, Harms, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) Beibl. 67 — Ecuad.
- jaliscana*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 151. — Mexic.
- Jelskii*, Zahlbr. in *Diss. Cl. Math. Phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 227. — Peruvia.
- Lehmannii*, Harms, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) Beibl. 66. — Ecuad.

OREOPANAX : —

membranaceus, *Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 42. — Bolivia.
microcephalus, *Harms*, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 68. — Columb.
oligocarpum, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 194. — Am. centr.
Rusby, *Britton*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 38. — Bolivia.
Sanderianum, *Hemsl.* in *Gard. Chron.* (1892) i. 718; et (1893) i. 442. — Am. centr.
Taubertianum, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 4. — Guatem.

OREORCHIS, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 364.

indica, *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 709. — Reg. Himal.

OREOSTYLIDIUM, Berggr. (Stylid.). — Ind. Kew. ii. 365.

affine, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 197. — N. Zel.

OREOSYCE, Hook. f. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 365.

Holstii, *Cogn.* ex *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61, nomen; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 107 = triangularis, *Cogn.*
triangularis, *Cogn.* in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 207. — Usambara.

ORESTIA, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 197; et in *Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 201. **ORCHIDEAE**.

elegans, *Ridl.* *ll. cc.* — Ins. S. Thom.

ORIASTRUM, Poepp. & Endl. = **Chaenactis**, (Compos.).

albicaule, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 20. — Chili.

dioicum, *Phil.* l. c. (= *Egara dioica*, *Remy*). — Chili.

Gayi, *Phil.* l. c. 18. — Chili.

glabriusculum, *Phil.* l. c. 16. — Chili.

gossypinum, *Phil.* l. c. 19. — Chili.

incana, *Phil.* l. c. 22. — Chili.

leucocephalum, *Phil.* l. c. 16. — Chili.

nivale, *Phil.* l. c. 21. — Chili.

pentacaenoides, *Phil.* l. c. 22. — Chili.

parviflorum, *Phil.* l. c. 18. — Chili.

polymallum, *Phil.* l. c. 17. — Chili.

uncinatum, *Phil.* l. c. 23. — Chili.

ORIGANUM, Tourn. ex Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 366.

aciculare, *aesticum*, *albicans*, *bracteatum*, *bracteosum*, *Broussonetii*, *capitatum*, *capitellatum*, *cappadocicum*, *carnosum*, *cephalotes*, *ciliatum*, *cilicicum*, *cinicinum*, *comphum*, *decussatum*, *diffusum*, *Funkii*, *granatense*, *Herba-barona*, *hirsutum*, *hirtum*, *longiflorum*, *Loscosii*, *maroccanum*, *Masticina*, *membranaceum*, *nitidum*, *Piperella*, *sabulicolum*, *Serpyllum*, *striatum*, *syriacum*, *tomentosum*, *valentinum*, *villosum*, *Webbianum*, *Wdwitschii*, *zygis*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 528 = *homonyma omnia* *Thymi*.

amanum, *Post*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 161. — Syria.

barcense, *Simonk.* in *Termész. Füzetek*, x. (1886) 182 = *vulgare*, *Linn.*

Dowii, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 528 = *Thymus Serpyllum*, *Linn.*

caespitium, *Kuntze*, l. c. = *T. Serpyllum*, *Linn.*

Dayi, *Post*, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 403. — Syria.

hiemale, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 528 = *Thymus hyemalis*, *Lange*.

integrum, *Kuntze*, l. c. = *T. Billardieri*, *Boiss.*

fanhae, *Kuntze*, l. c. = *T. Serpyllum*, *Linn.*

micromerioides, *Kuntze*, l. c. = *T. micromerioides*, *Rouy*.

Munbyanum, *Kuntze*, l. c. = *T. ciliatus*, *Benth.*

origanoides, *Kuntze*, l. c. = *T. origanoides*, *Webb. & Benth.*

Richardi, *Kuntze*, l. c. = *majoricum*, *Cambers.*

ORIGANUM : —

saturejodes, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 528 = *Thymus satureioides*, *Coss. & Bal.*

semiglaucum, *Boiss. & Reut.* ex *Briq.* *Lab. Alp. Marit.* iii. (1895) 484 = *vulgare*, *Linn.*

serpyllodes, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 528 = *Thymus serpylloides*, *Bory.*

silvestre, *Kuntze*, l. c. = *T. sylvestris*, *Hoffmugg. & Link.*

teucriodes, *Kuntze*, l. c. = *T. teucrioides*, *Boiss. & Sprunn.*

Thymus, *Kuntze*, l. c. = *T. vulgaris*, *Linn.*

ORITES, R. Br. (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 366.

fragrans, *F. M. Bailey*, *Bellenden-Ker*, (1889) 56. — Austral.

ORLAYA, Hoffm. = **Daucus**, Tourn. (Umbell.).

Daucorlaya, *Murb.* in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 119. — Herceg.

ORMOCARPUM, Beauv. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 367.

Buchholzii, *Engl. Bot. Jahrb.* vii. (1886) 336. — Kamerun.

ORLEANESIA, Barb. Rodr. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 367.

yauaperyensis, *Barb. Rodr.* *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 124. — Bras. bor.

ORMOSIA, Jacks. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 367.

Balansae, *Drake*, in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 213. — Tonk.

Fordianna, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) 2422. — China.

ORNITHIDIUM, Salisb. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 367.

fragrans, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1894) 157. — Hab.?

imbricatum, *Wall.* ex *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 846 = *Pholidota imbricata*, *Reichb. f.*

nanum, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1894) 395. — Ind. occ.

ochraceum, *Reichb. f.* in *Gard. Chron.* (1887) i. 209. — N. Granat.

ORNITHOCEPHALUS, Hook. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 366.

Pottisiae, *S. Wats.* in *T. Brighan. Guatem.* Append. (1887) 429, nomen; et in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 478. — Guatem.

stenoglossis, *Reichb. f.* in *Flora*, lxix. (1886) 551. — Hab.?

ORNITHOGALUM, [Tourn.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 363.

amboëse, *Schinz*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 220. — Afr. austro-occ. extratrop.

apertiflorum, *Baker*, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 38. — Hab.?

Aserni, *Velen*, in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1893) xxxvii. 63. — Bulg.

bosniacum, *G. Beck*, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 48 = *tenuifolium*, *Guss.*

brutium, *Terrac.* in *Ann. Ist. Bot. Roma*, iv. 1889-90 (1891) 17 t. 1. — Italia mer.

indicum, *Koenig*, ex *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 334. in syn. = *Chlorophytum arundinaceum*, *Baker*.

miniatum, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 223. — Afr. austr.

natalense, *Baker*, in *Kew Bull.* (1893) 210. — Natal.

orbelicum, *Velen*, in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 57; in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 237; et *Fl. Bulg.* (1891) 552. — Bulg.

pulchrum, *Schinz*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 221. — Afr. austro-occ. extratrop.

reflexum, *Freyn & Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 391. — As. Min.

Reverchoni, *Lange*, in *Willk. Ill. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 117 t. 158; et in *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 53. — Hisp.

Saundersiae, *Baker*, in *Gard. Chron.* (1894) ii. 452. — Afr. austr.

ORNITHOGALUM : —

Schmalhauseni, *Alboff*, in *Bull. Soc. Hort. Odessa.* (1891) extr. 15, ex *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 260, in syn. = *O. Balansae*, *Boiss.*

Schlechterianum, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 223. — Afr. austr.

Skorpili, *Velen*, in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1887) 463; et *Fl. Bulg.* 550 = *oligophyllum*, *C. B. Clarke*.

sordidum, *Baker*, in *Kew Bull.* (1895) 228. — Reg. Somal.

speciosum, *Baker*, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 72. — Afr. austro-occ. extratrop.

subcucullatum, *Rouy & Coincy*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1890) 167. — Hisp.

trichophyllum, *Baker*, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 7. — Afr. austr.

ORNITHOGLOSSUM, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 370.

platycheilum, *Weathers*, in *Gard. Chron.* (1892) i. 587 fig. et 84. — Hab.?

ORNITHOPODIUM, Linn. 1735 = **Ornithopus**, Linn. (Legumin.).

coriandrinum, *ebracteatum*, *isthmocarpum*, *micranthum*, *perpusillum*, *salivum*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 199-200 = *homonyma omnia* *Ornithopi*.

ORNITHOPUS, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 371.

Hormolotus, *Oliver*, in *Johnston, Kilimanjaro Exped.* (1886) 339 nomen. — Afr. trop. or.

minor, *Tornab.* *Fl. Sicula*, (1887) 212. — Sicil.

OROBANCHE, [Tourn.] Linn. (Orobanch.). — Ind. Kew. ii. 371.

acmula, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 102 = *aegyptiaca*, *Pers.*

angustiflora, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 96 = *O. Muteli*, *F. Schultz.*

artemisiophya, *St Lager*, in *Cariot, Étud. des fl. éd.* 8, ii. (1889) 652 = *loricata*, *Reichb.*

Borbasiana, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 173. — Croatia.

bulbosa, *G. Beck*, l. c. 83 fig. 7 = *Aphyllon tuberosum*, *A. Gray.*

centaurophya, *St Lager*, in *Cariot, Étud. des fl. éd.* 8, ii. (1889) 649 = *major*, *Linn.*

chilensis, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 82. — Chili.

Cooperi, *G. Beck*, l. c. 81 = *Aphyllon Ludovicianum*, *A. Gray.*

cyamophya, *St Lager*, in *Cariot, Étud. des fl. éd.* 8, ii. (1889) 648 = *speciosa*, *Forsk.*

echinophya, *St Lager*, l. c. 650 = *major*, *Linn.*

emarginata, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 98 = *O. Muteli*, *F. Schulz.*

eryngiophya, *St Lager*, in *Cariot, Étud. des fl. éd.* 8, ii. (1889) 651 = *amethystea*, *Thuill.*

fastigiata, *G. Beck*, l. c. 102 = *aegyptiaca*, *Pers.*

galiophya, *St Lager*, in *Cariot, Étud. des fl. éd.* 8, ii. (1889) 648 = *caryophyllacea* *Sm.*

Grayana, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 79. — Am. bor. occ.

habrocaulon, *G. Beck*, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 147 = *O. Laserpitii-sileris*, *Reut.*

Haussknechtii, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 103 = *aegyptiaca*, *Pers.*

hederifixa, *St Lager*, in *Cariot, Étud. des fl. éd.* 8, ii. (1889) 651 = *O. Hederiae*, *Duby.*

Hookeri, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 85 = *Boschniakia Hookeri*, *Walp.*

Hydrocotylei, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 41. — N. Zel.

interjecta, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 98 = *O. Muteli*, *F. Schulz.*

icterica, *Pau*, *Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 5; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 189. — Hisp.

laserophya, *St Lager*, in *Cariot, Étud. des fl. éd.* 8, ii. (1889) 650 = *O. Laserpitii-sileris*, *Reut.*

OROBANCHE : —

- latisquamosa*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 659 (= *Boulardia latisquama*, F. Schultz). — Algeria.
malloantha, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 98 = O. Muteli, F. Schultz.
medicaginifixa, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 649 = *lutea*, Baumg.
monoclonos, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 89 = *ramosa*, Linn.
oxyloba, G. Beck, l. c. 48 (= *Phelypaea oxyloba*, Reut.). — As. Min.
Pancicii, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 148, t. vi. fig. 8-11; et l. c. 223. — Serbia.
panormitana, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 97 = O. Muteli, F. Schultz.
parasitica, Fischer, ex G. Beck, l. c. 101 = aegyptiaca, Pers.
peucedanophya, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 652 = *alsatica*, Kirschl.
picridophya, St Lager, l. c. 651 = O. Picridis, F. Schultz.
polyclonos, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 88 = *ramosa*, Linn.
proboscistyla, G. Beck, l. c. 89 = *ramosa*, Linn.
Promuntarii, G. Beck, l. c. 97 = O. Muteli, F. Schultz.
pulchella, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 102 = aegyptiaca, Pers.
rectiflora, G. Beck, l. c. 108 = aegyptiaca, Pers.
Reverchoni, Lange, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hesp. (1893) 187 = *mauritanica*, G. Beck.
salsa, Kuntze, in Act. Hort. Pérop. x. (1887) 225 (= *Phelypaea salsa*, C. A. Mey.). — As. bor. et occ.
salvifixa, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 000 = O. Salviae, F. Schultz.
savrothamnophya, St Lager, l. c. 647 = *major*, Linn.
scabiosifixa, St Lager, l. c. 649 = *reticulata*, Wallr.
Schweinfurthii, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 94. — Afr. bor.
sinaica, G. Beck, l. c. 97 = O. Muteli, F. Schultz.
spissa, G. Beck, l. c. 96 = O. Muteli, F. Schultz.
stenosiphon, G. Beck, l. c. 96 = O. Muteli, F. Schultz.
tarapacana, Phil. in Anal. Mus. nat. Chile (1891) 69. — Am. austr.
teucrophya, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 648 = O. Teucii, Holand.
thymophya, St Lager, l. c. 648 = *alba*, Steph.
tricholoba, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 103 = aegyptiaca, Pers.
trifolifixa, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 650 = *minor*, Sutt.
trinacria, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 102 = aegyptiaca, Pers.

OROBUS, [Tourn.] Linn. = **Lathyrus**, Tourn. (Legumin.).

- Bauhini*, Genty, in Bull. Soc. Dauph. éch. pl. Sér. II, iii. (1892) 91 = L. Bauhini, Genty.
occidentalis, Fritsch, in Sitzb. Akad. Wiss. Wien, civ. (1895) 499 = L. ochraceus, Kittel.
Skorpili, Velen, in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 32; et Fl. Bulg. (1891) 158. — Bulg.
triflorus, G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 76. — As. Min.

OROCHAENACTIS, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 134; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 39 [sphalm. Orchaenactis]. **COMPOSITAE**.
thysanocarpha, Coville, l. c. (= *Chaenactis thysanocarpha*, A. Gray). — Calif.

OROGENIA, S. Wats. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 376.
fusiformis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 474. — Calif.

OROPHEA, Blume (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 370.
cuneiformis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 84. — Perak.
gracilis, King, l. c. 83. — Perak.
hastata, King, l. c. — Perak.

OROPHEA :

- hirsuta*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 82. — Perak.
maculata, Scortech. ex King, l. c. — Perak.
setosa, King, l. c. 80. — Perak.

ORPHIUM, E. Mey. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 376.

- fruticosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432, sphalm. = *frutescens*, E. Mey.

ORTGIESIA, Regel (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 377.

- Legrelliana*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 19 (= *Hohenbergia Legrelliana*, Baker). — Urug.

ORTHAEA, Klotzsch (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 377.

- abbreviata*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 75. — Ecuad.
cordata, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2412. — Columb.

ORTHANTHERA, Wight (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 377.

- albida*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.
Browniana, Schinz, l. c. 264. — Afr. austro-occ. extratrop.
jasminiflora, Schinz, l. c. 265, in obs. (= *Barrouia jasminiflora*, Decne.). — Afr. austr.
jasminiflora, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 266 = *praec.*

ORTHOCARPUS, Nutt. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 377.

- versicolor*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 283. — Calif.

ORTHOCERAS, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 377.

- Caput-serpentis*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 490. — N. Zel.
rubrum, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 273. — N. Zel.

ORTHORRHIZA, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 38; Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 205. **CRUCIFERAE**.

- persica*, Stapf, ll. cc. (= *Chorispora stricta*, DC.). — Persia.

ORTHOSIPHON, Benth. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 378.

- adornatus*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 176. — Afr. trop. occ.
calaminthoides, Baker, in Kew Bull. (1895) 225. — Afr.
Cameroni, Baker, l. c. 72. — Afr. trop.
cladotrichos, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 349. — Afr. trop. or.
comosum, Baker, in Kew Bull. (1895) 184. — Arabia.
debilis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 267. — China.
grandiflorum, Terrac, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 424. — Reg. Somal.
heterochrous, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 173. — Congo.
iodocalyx, Briq. l. c. 174. — Congo.
menthaefolius, Briq. l. c. 176. — Angola.
molle, Baker, in Kew Bull. (1895) 275. — Afr. trop.
Parishii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1890) ii. 295. — Tenass.
retinervis, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 175. — Congo.
roseus, Briq. l. c. 174. — Afr. trop.
scabridus, Briq. l. c. 175. — Angola.
Schinianus, Briq. l. c. 173. — Afr. austro-occ. extratrop.
sinensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 268. — China.
Stuhlmannii, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 349. — Afr. trop. or.

ORTHOSIPHON : —

- tuberosus*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 172. — Angola.
tubulascens, Briq. l. c. 174. — Angola.
usambarensis, Guerke, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 349. — Afr. trop. or.
villosus, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 177. — Angola.
violaceus, Briq. l. c. 178. — Angola.
Welwitschii, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 88. — Angola.

ORYCTINA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 168 = **Loranthus**, Linn.
scabrida, Van Tiegh. l. c. 169 (= *Oryctantus scabridus*, Eichl.). — Am. bor.

ORYZA, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 378.

- leersioides*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 1062 = *Potamophila leersioides*, Benth.
Meyeriana, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 166 (= *Padia Meyeriana*, Zoll. & Mor.). = *sativa*, Linn.
parviflora, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 1063 = *Potamophila parviflora*, R. Br.
prehensilis, Baill. l. c. = P. *prehensilis*, Benth.

ORYZOPSIS, Michx. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 379.

- caduca*, Beal, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 111 (= *Stipa caduca*, Scribn.). — Montana.
coerulescens, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 167 = *coerulescens*, Hack.
Hendersoni, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 267. — Am. bor.
juncea, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 67 = *canadensis*, Torr.
membranacea, Vasey, Grass. Southwest. i. II. (1891) t. 10; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. I. (1891) 56 (= *Stipa membranacea*, Pursh.). — Am. bor.
miliacea, Benth. & Hook. f. ex Aschers. & Schweinf. in Mém. Inst. égypt. [Ill. Fl. Egypt.] (1887) 169 (= *Piptatherum miliaceum*, Coss.). — Eur., Sibir.
miliacea, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 33; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 51; Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 167 = *praec.*
mongolica, Beal, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 111 (= *Stipa mongolica*, Turcz.). — Mongol.
obtusata, Stapf, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2393. — China.
paradoxa, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1895) 167 *paradoxa*, Nutt.
Pringlei, Beal, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 112 (= *Stipa Pringlei*, Scribn.). — Mexic.
pubiflora, Scribn. ex Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 122 (= *Urachne pubiflora*, Trin. & Rupr.). — Mexic.
purpurea, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 34 (= *U. purpurea*, Steud.). — Pyren.
Richardsonii, Beal, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 111 (= *Stipa Richardsonii*, Link.). — Am. bor.
virescens, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 51 (= *Urachne virescens*, Trin.) = *paradoxa*, Nutt. var.
Webberi, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1890) 49; et Ill. N. Am. Grass (1892) t. 18, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 55. — Calif.

OSBECKIA, Linn. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 379.

- Aizelii*, Cogn. [sphalm. Hook. f.] in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 330 et 1178 (= *Antherotoma Aizelii*, Hook. f.). — Sierra-Leone.
Brazzaei, Cogn. l. c. 335. — Congo gall.
Buettneriana, Cogn. ex Buettl. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 95; et l. c. 332. — Gabon, Congo gall.
Buracavi, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 335. — Congo gall.
cinerea, Cogn. l. c. 1177. — Tonk.
cochinchinensis, Cogn. l. c. 331. — Cochinch.
congolensis, Cogn. ex Buettl. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 95; et l. c. 314. — Congo.

OSBECKIA : —

- dionychoides, *Cogn. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix, (1891) 17; et in *DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1178. — Madag.
 Elliotii, *Cogn. II. cc.* — Madag.
 hirsuta, *Cogn. I. c.* — Angola.
 madagascariensis, *Cogn. I. c.* 328. — Madag.
 Naudini, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii, (1893) 168, in obs.
 = *O. Antherotome*, Naud.
 papuana, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indie*, i, ii, (1890) 530, nomen; et in *DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 332. — N. Guin.
 saigonensis, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 247. — Cochinch.
 sublaevia, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 321. — Ind. or.
 Welwitschii, *Cogn. I. c.* 333. — Angola.
 zambesiensis, *Cogn. in Bolet. Soc. Brot.* vii, (1889) 226; et *I. c.* 236. — Zambesia.

- OSBERTIA, Greene, in *Erythea*, iii, (1895) 14 = **Erigeron**, Linn. (Compos.).
Heleniastrum, Greene, *I. c.* = *E. Heleniastrum*, Greene.
stolonifera, Greene, *I. c.* = *Aplopappus stoloniferus*, DC.

- OSERYA, Tul. & Wedd. (Podostem.). — Ind. Kew. ii, 380.
flagelliformis, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i, (1886) 647 (= *Devillea flagelliformis*, Tul. & Wedd.). — Bras.

- OSKAMPIA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii, (1890) 859 = **Nonnea**, Medic. (Borag.).
flavescens, Baill. *I. c.* = *N. flavescens*, Fisch. & Mey.

- OSMANTHUS, Lour. (Oleac.). — Ind. Kew. ii, 380.
Delavayi, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i, (1886) 613. — Yunnan.
Fordii, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi, (1889) 89. — China.
ilicifolius, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i, (1889) 140 = *Olea aquifolia*, Sieb. & Zucc.
marginatus, Hemsl. ex Knobl. in *Bot. Centralbl.* lxi, (1895) 83, in obs. = *marginatus*, Benth. & Hook. f.
myrtifolius, Hort. Veitch. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i, (1889) 141 = *Olea aquifolia*, Sieb. & Zucc.
rotundifolius, Hort. ex Dippel, *I. c.* = *O. aquifolia*, Sieb. & Zucc.
sandwicensis, Knobl. in *Bot. Centralbl.* lxi, (1895) 82 = *sandwicensis*, Benth. & Hook. f.

- OSMARONIA, Greene, Pittonia, ii, (Sept. 1891) 189 = **Nuttalia**, Torr. & Gray. [non Alior.] (Rosac.).
cerasiformis, Greene, *I. c.* 191; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 110 = *N. cerasiformis*, Torr. & Gray.

- OSMELIA, Thw. (Samyd.). — Ind. Kew. ii, 380.
paniculata, Warb. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii, 6a (1893) 49 = *O. Gardneri*, Thw.

- OSMOHYDROPHORA, Barb. Rodr. Vellozia. 1885-88, Sec. edig. (1891) 49; K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv, 3b (1895) 252, in obs. **BIGNONIACEAE**.
nocturna, Barb. Rodr. *II. cc.* — Bras.

- OSMORHIZA, Rafin. (Umbell.). — Ind. Kew. ii, 381.
ambigua, Coult. & f. N. Rose, *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 119 (= *Glycosma ambiguum*, A. Gray). — Am. bor. occ.
Claytoni, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 21 = *brevistylis*, DC.
depauperata, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv, (1894) 926. — Chili.

- OSMOXYLON, Miq. (Aral.). — Ind. Kew. ii, 381.
Miquelii, Boerl. in *Annal. Jard. Buit.* vi, (1887) 125. — N. Guin.

- OSSAEA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii, 381.
capillaris, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv, IV, (1888) 550; et in *DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1053 (= *Chidemia capillaris*, Don). — Peruvia.
caudata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1066. — Ecuad.
ciliata, *Cogn. I. c.* 1067 (= *Octopleura ciliata*, Triana). — Ins. Trinit.
congestiflora, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv, IV, (1888) 353; et *I. c.* 1054 (= *Oxymeris congestiflora*, Triana). — Bras.
cuneata, *Cogn. II. cc.* 550; et 1053. — Bras.
diversifolia, *Cogn. I. c.* 550; in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv, (1889) 968; et in *DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1064 (= *Octopleura diversifolia*, Triana). — Columb.
diversifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 248 = *praec. fragilis*, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv, IV, (1888) 551; et in *DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1053. — Bras.
humilis, *Cogn. II. cc.* 552; et 1054. — Bras.
Krugiana, *Cogn. [in Sintenis, Pl. Portoric. n. 4642] in DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1048. — Ins. Porto Rico.
macrophylla, *Cogn. I. c.* 1064 (= *Octopleura macrophylla*, Triana). — Ins. Cocos.
quinquenervia, *Cogn. I. c.* (= *Octopleura quinquenervia*, Triana). — Ins. Tumaco, Cocos et Porto-Bello.
quinquenervia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 248 = *praec. robusta*, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1065 (= *Octopleura robusta*, *Cogn.*). — Am. austr. occ.
rubescens, *Cogn. I. c.* 1067 (= *Oct. rubescens*, Triana). — N. Granat.
sanguinea, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv, iv, (1888) 549; et *I. c.* 1052. — Bras.
tetragona, *Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx, 1891 (1892) 264. — Costa Rica.
Trianaei, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1057. — Cuba.
Warmingiana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv, IV, (1888) 544; et in *Vidensk. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 895 (*Symb. Fl. Bras. centr.* xxxii, 44); et *I. c.* 1050. — Bras.

- OSTEOCARPUS, Phil. (Solan.). — Ind. Kew. ii, 381.
brevifolius, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci, (1895) 40. — Chili.
clavatus, Phil. *I. c.* 41. — Chili.
foliolosus, Phil. *I. c.* — Chili.
lepidophyllus, Phil. *I. c.* 42. — Chili.
spathulatus, Phil. *I. c.* 41. — Chili.

- OSTEOMELES, Lindl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii, 381.
pernettoides, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii, (1890) 11 = *pernettoides*, Decne.

- OSTEOPHLOEUM, Warb. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xiii, (1895) 89. **MYRISTICACEAE**
platyspermum, Warb. *I. c.* (= *Myristica platysperma*, Spruce). — Bras.

- OSTEOSPERMUM, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii, 381.
montanum, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii, (1895) 432. — Afr. austro-occ. extratrop.
odoratum, Klatt, *I. c.* 433. — Afr. austro-occ. extratrop.
psammophilum, Klatt, *I. c.* 434. — Afr. austro-occ. extratrop.
tanaetifolium, Macowan, (*Herb. Austro-Afr.* n. 1382), ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xix, (1889) t. 1839. — Afr. austr.

- OSTERDAMIA, Neck. = **Zoysia**, Willd. (Compos.).
Matrella, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 781 = *Z. pungens*, Willd.
sinica, Kuntze, *I. c.* = *Z. sinica*, Hance.
tenuifolia, Kuntze, *I. c.* = *Z. tenuifolia*, Willd.

- OSTODES, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. ii, 382.
appendiculatus, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v, (1887) 401. — Perak.
muricata, Hook. f. *I. c.* — Perak.

- OSTREARIA, Baill. [ubi?] ex Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii, 2a (1891) 130. **HAMAMELIDEAE**.
australina, Baill. *I. c.* — Austr.

- OSTRYA, Mich. ex Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. ii, 382.
japonica, Sarg. in *Gard. and For.* v, (1893) 383; et *Forest Fl. Japan*, (1894) 66 t. 22 = *virginica*, Willd. ?
Knowltonii, Sarg. *I. c.* vii, (1894) 115. — Am. bor. occ.
Ostrya, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 187 = *virginica*, Willd. ?
virginiana, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 49 = *virginica*, Willd.

- OSYRICERAS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii, 382.
purpurascens, Fitzger. *Austral. Orchids*, v, II, (1895?) tab. (= *Bulbophyllum purpurascens*, Bailey). — Austral.

- OSYRIDOCARPOS, A. DC. (Santal.). — Ind. Kew. ii, 382.
Kirkii, *Engl. Bot. Jahrb.* xix, Beibl. n. 47 (1894) 30 [Osyridocarpos]. — Afr. trop. or.
scandens, *Engl. I. c.* 29. — Afr. trop. or.

- OSYRIS, Linn. (Santal.). — Ind. Kew. ii, 382.
rigidissima, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii, (1892) 199. — Reg. Somal.
tenuifolia, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 167. — Afr. trop. or.

- OTACANTHUS, Lindl. (Acanth.). — Ind. Kew. ii, 382.
platychilus, Taub. in *Bot. Jahrb.* xii, Beibl. n. 28 (1890) 15. — Bras.

- OTHONNA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii, 383.
glauca, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii, (1895) 439. — Afr. austro-occ. extratrop.
disticha, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 16. — Afr. austr.
graveolens, O. Hoffm. in *Bull. Herb. Boiss.* i, (1893) 88; et in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv, 5 (1893) 303. — Afr. austro-occ. extratrop.
lamulosa, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii, (1895) 439. — Afr. austro-occ. extratrop.
Lessingii, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix, (1894) 368. — Afr. austr.
rosea, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii, (1895) 424. — Afr. austro-occ. extratrop.
Whyteana, Britton, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv, (1894) 21. — Afr. trop.

- OTOCARPUM, Willk. III. *Fl. Hisp.* ii, (1886-92) 145 t. 186; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 83, sphalm. = OTOSPERMUM, Willk. = **Matricaria**, [Tourn.] Linn. (Compos.).

- OTOCHILUS, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii, 384.
fragrans, Nichols. *Dict. Gard.* ii, (1886) 534. — Reg. Himal.

- OTOLEPIS, Turcz. = **Capura**, Blanco (Sapind.).
amplifolia, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 21 (1895) sub t. 331 = *Otophora amplifolia*, Pierre.
cambodiana, Pierre, *I. c.* sub t. 330 = *O. cambodiana*, Pierre.
furcata, Pierre, *I. c.* = *O. furcata*, Pierre.
nodosa, Pierre, *I. c.* sub t. 331 = *O. nodosa*, Pierre.

OTOPAPPUS, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 384.
acuminatus, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 140. — Mexic.
alternifolius, Robinson, l. c. 165. — Mexic.
Aschenbornii, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 362 (= *Verbesina Humboldtii*, Klatt). — Mexic.
oaxacanus, Klatt, l. c. (= *V. oaxacana*, DC.). — Mexic.
olivaceus, Klatt, l. c. (= *V. olivacea*, Klatt). — Mexic.
perymenioides, Klatt, l. c. (= *V. perymenioides*, Sch. Bip. ex Klatt). — Am. austr.
Robinsonii, Klatt, l. c. = *V. alternifolia*, Robinson.

OTOPHORA, Blume (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 384.
amplifolia, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 21 (1895) t. 331. — Cochinch.
cambodiana, Pierre, l. c. t. 330. — Cochinch.
furcata, Pierre, l. c. — Cochinch.
nodosa, Pierre, l. c. t. 331 — Cochinch.
pyncostachys, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 393. — Afr. trop. or.

OTOSTEGIA, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 384.
microphylla, Aschers. & Schweinf. in *Mém. Inst. égypt.* ii. (1887) [Illustr. Fl. Égypt.] 122 = O. Schimper, Boiss.

OTTELIA, Pers. (Hydrochar.). — Ind. Kew. ii. 384.
plantaginea, Welw. ex Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 238. — Angola.
vesiculata, Ridl. l. c. 237. — Angola.

OUBANGUIA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 869. **TILIACEAE**.
africana, Baill. l. c. — Congo gall.

OURATEA, Aubl. = **Gomphia**, Schreb. (Ochnac.).
affinis, Engl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 79, in obs.; Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 143 = *G. affinis*, Hook. f.
amplexicaulis, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1896) 587; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1890) t. 144; Gilg, l. c. = *G. amplexicaulis*, O. Hoffm.
anceps, Baill. l. c. = *G. anceps*, Baker.
angulata, Baill. l. c.; Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 142 = *G. angulata*, DC.
angustifolia, Baill. ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 667; Gilg, l. c. = *G. angustifolia*, Vahl.
calophylla, Engl. *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 79, in obs. = *G. calophylla*, Hook. f.
comorensis, Engl. l. c. 81. — Ins. Comor.
congesta, Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 142 = *Gomphia congesta*, Oliver.
corymbosa, Engl. *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 80. — Afr. trop.
cuspidata, Engl. ex Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 142 = *Gomphia cuspidata*, St Hil.
deltoides, Gilg, l. c. = *G. deltoidea*, Baker.
dependens, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 587; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1890) t. 145; Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 142 = *G. dependens*, DC.
elongata, Engl. *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 80, in obs. = *G. elongata*, Oliver.
glaberrima, Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 143 = *G. glaberrima*, Beauv.
Hildebrandtii, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 587. — Madag.
Humboldtii, Baill. l. c. — Madag.
laevigata, Baill. l. c. 584; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1890) t. 144 = *Ochna laevigata*, Vahl.
lanceolata, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 587; Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 142 = *Gomphia lanceolata*, Baker.

OURATEA : —
Mannii, Engl. *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 80, in obs. = *Gomphia Mannii*, Oliver.
obtusifolia, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 142 = *G. obtusifolia*, DC.
odora, Engl. l. c. = *G. odora*, Poepp.
parviflora, Engl. l. c. = *G. parviflora*, DC.
perseaeifolia, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 587 = *G. perseaeifolia*, Baker. ?
podogyna, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1893) 2. — Guatem.
reticulata, Engl. *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 79, in obs. = *Gomphia reticulata*, Beauv.
rigida, Engl. ex Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 141. — Guian.
sumatrana, Gilg, l. c. 142 = *Gomphia sumatrana*, Jack.
Vogelii, Engl. ex Gilg, l. c. = *G. Vogelii*, Hook. f.

OURISIA, Comm. ex Juss. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 385.
calycina, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 97. — N. Zel.
montana, J. Buch, l. c. xix. 1886 (1887) 214 t. 14. — N. Zel.
prorepens, Petrie, l. c. xxv. 1892 (1893) 272. — N. Zel.

OUROUPARIA, Aubl. = **Uncaria**, Schreb. (Rubiace.).
africana, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 57 = *africana*, Baill.
Bernaysii, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 128. — N. Guin.
ferrea, K. Schum. l. c. = *Uncaria ferrea*, DC.
sclerophylla, K. Schum. l. c. 127 = *U. sclerophylla*, Roxb.

OVIDIA, Meissn. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 386.
anomala, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1894) 239 = *O. Humboldtii*, Meissn.

OVIEDA, Linn. = **Clerodendron**, Linn. (Verben.).
aculeata, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 118 = *C. aculeatum*, Griseb.

OXALIS, Linn. (Geran.). — Ind. Kew. ii. 386.
aberrans, K. Reiche, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1895) 283. — Chili.
adenocaulos, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 914. — Chili.
Agassizi, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 136. — Ins. Galapag.
albiflora, F. Muell. in *Viet. Natural.* viii. (Feb. 1892) 164, nomen (= *Biophytum albiflorum*, F. Muell.). — N. Guin.
alfalfalis, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 912. — Chili.
andina, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 159. — Bolivia.
araucana, K. Reiche, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 302. — Araucania.
areolata, Taub. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 504. — Bras.
atacamensis, K. Reiche, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 286 (= *O. trichocalyx*, Phil.). — Chili.
binervis, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 312. — Hab. ?
Bojeriana, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 597. — Madag.
boliviana, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 159. — Bolivia.
Borchersii, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 905. — Chil.
Breana, Phil. l. c. 1096. — Chili.
breviramulosa, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. iii. (1893) 13. — Bolivia.
brevis, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 906 = *tarapacana*, Phil.
Bulbocastanum, Phil. l. c. 1095. — Chili.
caripensis, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49. (1895) 32. — Columb.
catharinensis, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1887) i. 140. — Bras.

OXALIS : —
chaetocalyx, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 914. — Chili.
Chamaecrista, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 597. — Madag.
clematodes, J. D. Smith, in *Coult. Bot.* xviii. (1893) 198. — Guatem.
Commersonii, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 598; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 115. — Madag.
Cornetii, Dewevre, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 2 1894 (1895) 98, nomen. — Congo.
Darapskyi, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 1096. — Chili.
delicatula, Phil. l. c. 906. — Chili.
dimidiata, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 27. — Guatem.
Fluehmanni, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 901. — Chili.
Gilliesii, Phil. l. c. — Chili.
grandis, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 475 t. 223. — Am. bor.
Hildebrandtii, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 597; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 114. — Madag.
Hirthii, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 1103. — Chili.
hypophila, Phil. l. c. 903. — Chili.
illapelina, Phil. l. c. 1097. — Chili.
Inesitae, Phil. l. c. 1103. — Chili.
Landbeckii, Phil. l. c. 904. — Chili.
leptocaulos, Phil. l. c. 902. — Chili.
leucophylla, Phil. l. c. 911. — Chili.
madrensis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 144. — Calif.
Mariae, Szyszyl. *Pl. Rehmann.* ii. (1888) 18. — Transvaal.
microphylla, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 903 = *exigua*, Phil. [in *Linnaea*, xxxiii. 35].
Mimosella, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 597; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1895) t. 113. — Madag.
mollis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 8. — Madag.
oligotricha, Baker, in *Kew Bull.* (1890) 64. — Afr. trop.
ovalleana, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 910. — Chili.
paniculata, K. Reiche, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 287. — Chili.
papuana, F. Muell. in *Viet. Natural.* ix. (Nov. 1892) 112; et in *Bot. Centralbl.* liii. (1893) 27. — N. Guin.
Peraltae, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 909. — Chili.
pumila, Phil. l. c. 907. — Chili.
recurva, Trelease, in *Mem. Bost. Soc.* iv. (1888) 89 = *grandis*, Small.
San Romani, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 912 = *puberula*, Phil.
semiloba, [N. E. Br.] in *Monteiro, Delagoa Bay* (1891) 165. — Afr. trop.
sylvicola, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 25. — Ins. Fernando Noronha.
tarapacana, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 11. — Am. austr. occ.
thelyoxys, Focke, in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* x. (1889) 516. — Cuba.
thyrsioidea, K. Reiche, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 287. — Chili.
torcana, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 905. — Chili.
trichophylla, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 63. — Afr. trop. or.
yungasensis, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 12. — Bolivia.

OXYANTHERA, Brongn. = **Thelasia**, Blume (Orchid.).
decurva, Hook. f. *Icon. pl.* xxii. (1892) t. 2157. — Penins. Mal.
elata, Hook. f. l. c. — Penins. Mal.

OXYANTHUS, L'Hérit. (Nyctag.). — Ind. Kew. ii. 391.
Monteiroae, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1892) 125. — Afr. trop. austro-or.

OXYBAPHUS, L'Hérit. (Nyctag.). — Ind. Kew. ii. 391.Bodini, *Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i.* (1893) 287 t. 21. — Color.dichotomus, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xci.* (1895) 274. — ChiliSan-Romani, *Phil. l. c.* 275. — Chili.**OXYCOCCUS**, Tourn. ex Adans. (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 392.*Oxycoccus*, MacMill. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 15 = palustris, Pers.**OXYDECTES**, Linn. = **Croton**, Linn. (Euphorb.).

abatensis, *aberrans*, *adamantina*, *adenocalyx*, *adendon*, *adenophora*, *adenophilla*, *adipata*, *adpressa*, *adpersa*, *agoensis*, *agraria*, *agrophila*, *alagoensis*, *albella*, *albida*, *alnifolia*, *althaeafolia*, *amabilis*, *amazonica*, *andina*, *angolensis*, *angustifrons*, *anisata*, *anisodonta*, *antisiphilitica*, *argyranthemum*, *argyrata*, *argyrodaphne*, *arnhemica*, *aromatica*, *asprerima*, *astrogyna*, *Astroites*, *atrofusa*, *axillaris*, *bahiensis*, *Bailloniana*, *balsamea*, *barbata*, *Benthiana*, *betacea*, *Betulaster*, *betulina*, *bicolor*, *bidentata*, *bifurcata*, *Billbergiana*, *birmanica*, *Blanchetiana*, *Boissieri*, *Boiviniana*, *Bojeriana*, *boliviensis*, *Boutoniana*, *bracteata*, *Bridgesii*, *Burchellii*, *buxifolia*, *Cajucara*, *caldensis*, *californica*, *callicarpifolia*, *calocephala*, *colycina*, *campestris*, *caperoniaefolia*, *capitata*, *carinata*, *Caryophyllus*, *Cascarilla*, *catingana*, *caudata*, *ceanothifolia*, *cearensis*, *celtidifolia*, *cerina*, *cerinodentata*, *chaetocalyx*, *chaetophora*, *chamaedryfolia*, *Chapelieri*, *chapodensis*, *chilensis*, *chlorocalyx*, *chilroleuca*, *chrysoclada*, *Chrysodaphne*, *ciliatoglandulosa*, *cincta*, *cinerella*, *citri-folia*, *cladotricha*, *Clausseniana*, *clavuligera*, *cleori-folia*, *coelococca*, *comata*, *comosa*, *compressa*, *consanguinea*, *constricta*, *Corchoropsis*, *cordiaefolia*, *coriacea*, *corrientensis*, *Cortesia*, *corylifolia*, *costaricensis*, *costata*, *Coloneaster*, *craspedotricha*, *crenata*, *cubana*, *Cumingii*, *cuneata*, *debilis*, *decipiens*, *desertorum*, *dichotoma*, *dichroa*, *dioica*, *discolor*, *Draco*, *Drac-nopsis*, *Ehrenbergii*, *Eichleri*, *Elliotii*, *elliptica*, *Eluteria*, *eremophila*, *eriodlada*, *eriodstachya*, *erythro-chila*, *exuberans*, *fallax*, *farinosa*, *fastuosa*, *ferruginea*, *ferruginella*, *flavens*, *floribunda*, *flosculosa*, *fragilis*, *fragrans*, *Francavilleana*, *Francoana*, *Fraseri*, *Friesiana*, *Frionis*, *fruticulosa*, *fulva*, *Funchi-ana*, *fusca*, *Garciana*, *Gardneri*, *Gardneriana*, *Gaudichaudii*, *Gibsoniana*, *glabella*, *glabrescens*, *glandulosa*, *glutinosa*, *glyptosperma*, *gnidiacea*, *Gnap-halii*, *gossypifolia*, *Goudotii*, *grayensis*, *graciliscens*, *gracilipes*, *gracilis*, *gratissima*, *grewiaefolia*, *Griffithii*, *Grisebachiana*, *Guiltingii*, *Hancei*, *Hasskarliana*, *hecatondandra*, *Helichrysium*, *hemiaragrea*, *heterocalyx*, *heterocarpa*, *heterochroa*, *heterodoxa*, *heteroneura*, *heterotricha*, *Hialmarsonii*, *Hilarii*, *Hoffmannii*, *Holtonii*, *homolepida*, *Horminum*, *horridula*, *humilis*, *hypoleuca*, *incana*, *incerta*, *incisa*, *indivisa*, *insularis*, *intercedens*, *Itacolumi*, *jacobinensis*, *Jatropha*, *Jennyana*, *Josephina*, *Joufra*, *Julop-sidium*, *juncea*, *Korthalsii*, *lachnocarpa*, *lachnoclada*, *lachnostachya*, *laevifolia*, *laevigata*, *lagoensis*, *lanata*, *Langsdorffii*, *lanuginosa*, *Lapanus*, *Laseguei*, *lasi-antha*, *laurifolia*, *laxiflora*, *Lechleri*, *leiophylla*, *leptobotrys*, *leptophylla*, *Leptopus*, *leptostachya*, *leucophlebia*, *leucophylla*, *Liebmannii*, *Lindeniana*, *Lind-heimeriana*, *linearifolia*, *linearis*, *lobata*, *longifolia*, *longinervia*, *lucida*, *lurida*, *Luziana*, *luzoniensis*, *macrocalyx*, *macrodonata*, *magdalenensis*, *malabarica*, *Malambo*, *maritima*, *Martii*, *mauritanica*, *medians*, *Medusae*, *megalobotrys*, *megalocalyx*, *megapontica*, *melanoleuca*, *membranacea*, *menthodora*, *metallica*, *mexicana*, *micans*, *microcarpa*, *migrans*, *miradoren-sis*, *mollis*, *monanthogyna*, *Mongue*, *montevidensis*, *Moorei*, *morifolia*, *Mubango*, *mucronifolia*, *multico-stata*, *muricata*, *muscipapa*, *Mutisiana*, *myriantha*, *myricifolia*, *Myrsinites*, *neomexicana*, *Neuwiedii*, *nigroviridis*, *nilotica*, *nitrariaefolia*, *nivea*, *nobilis*, *Noronhae*, *Novi-Friburgii*, *nudata*, *nummularia*, *nummulariaefolia*, *oblongifolia*, *occidentalis*, *odonton-denia*, *Oerstediana*, *oligantha*, *olivacea*, *Orbignyana*, *organensis*, *organifolia*, *orinocensis*, *ovalifolia*, *oxy-petala*, *oxyphylla*, *pachysepalata*, *palanostigma*, *pallida*, *pallidula*, *paludosa*, *panamensis*, *panduriformis*, *panti-culata*, *pannosa*, *paraensis*, *pardina*, *parvifolia*,

OXYDECTES : —

parvula, *pauciflora*, *paucistaminea*, *Pauliniana*, *Paulina*, *pauperula*, *Payeriana*, *pedicellata*, *peduncu-lata*, *pellita*, *peltophora*, *penninervis*, *peraffinis*, *per-vestita*, *petraea*, *pilosa*, *pimelea*, *piptocalyx*, *polycarpa*, *Pomaderris*, *populifolia*, *Pottsii*, *praetervisa*, *procum-bens*, *Pseudo-Populus*, *pubescens*, *pulchella*, *pulchra*, *pulegiadora*, *punctata*, *puncticulata*, *pungens*, *Purdiaei*, *pycnadenia*, *pycnantha*, *pycnoccephala*, *pyrifolia*, *qua-drisetosa*, *ramiflora*, *reflexifolia*, *refracta*, *Regeliana*, *Regnelliana*, *repens*, *reticulata*, *Rheedii*, *rhexiaefolia*, *rivularis*, *robusta*, *rosmarinifolia*, *Rudolphiana*, *ru-foargentea*, *Ruiziana*, *Sagraeana*, *salutaris*, *Sampha-tik*, *santolina*, *sapiifolia*, *scaberrima*, *scabiosa*, *scabra*, *Schiedeana*, *Schimperia*, *Schultesii*, *sclero-calyx*, *Scouleri*, *Sellowii*, *seminuda*, *semivestita*, *ser-phyllifolia*, *serrata*, *serratifolia*, *siderophylla*, *sincoren-sis*, *Soliman*, *Sonderiana*, *Sonora*, *soratensis*, *sordida*, *speciosa*, *Spica*, *spiralis*, *Spruceana*, *squa-migera*, *squamulosa*, *staminosa*, *stenophylla*, *stenose-pala*, *stenotricha*, *stipulacea*, *Stoechadis*, *strigosa*, *stylosa*, *suaveolens*, *suavis*, *subacuta*, *subagvaria*, *subcomosa*, *subcompressa*, *suberosa*, *subferruginea*, *subfragilis*, *subincana*, *sublepidota*, *sublucida*, *subly-rata*, *subvillosa*, *sumatranica*, *surinamensis*, *sylvatica*, *Tamberlikii*, *tarapotensis*, *Tartouira*, *tejuensis*, *tenella*, *tenuissima*, *terminalis*, *tetradenia*, *Teucri-dium*, *texensis*, *thermarum*, *Thouarsiana*, *thurifera*, *thymelina*, *Tigilium*, *tiliaefolia*, *tomentella*, *Torrey-ana*, *triangularis*, *trichotoma*, *tricolor*, *tridentata*, *triglandulata*, *trigonocarpa*, *Tulasnei*, *Turrialva*, *umbratilis*, *Urucurana*, *uruguayensis*, *variegata*, *Vauthieriana*, *Velame*, *Velloziana*, *velutina*, *vepreto-rum*, *Verreauxii*, *vestita*, *villosa*, *viminalis*, *virens*, *virgultosa*, *Virletiana*, *vulneraria*, *Wallichii*, *War-mingii*, *Welwitschiana*, *Widgreniana*, *Wilsonii*, *xal-lapensis*, *yanamensis*, *yunguensis*, *zambesica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 610-14 = *homonyma omnia*; *Crotonis*.

abutiloides, Kuntze, l. c. 610 = *Croton abutiloides*, H. B. & H.*alnodea*, Kuntze, l. c. = *C. alnodeus*, Baill.*ambanivulensis*, Kuntze, l. c. 611 = *C. ambanivou-lensis*, Baill.*ardisioides*, Kuntze, l. c. 614 = *C. ardisioides*, Hook. f.*argyrophylloides*, Kuntze, l. c. 611 = *C. argyrophyl-loides*, Muell. Arg.*atrata*, Kuntze, l. c. = *C. versicolor*, Muell. Arg.*Berlandieri*, Kuntze, l. c. 611 = *C. humilis*, Linn.*Bernieri*, Kuntze, l. c. 610 = *C. Berniera*, Baill.*bixodes*, Kuntze, l. c. = *C. bixoides*, Vahl.*Blancoana*, Kuntze, l. c. = *C. Tigilium*, Linn.*Bocquillonii*, Kuntze, l. c. 611 = *C. Bocquillonii*, Baill.*Bonplandiana*, Kuntze, l. c. 610 = *C. Persicaria*, Baill.*brevispicata*, Kuntze, l. c. 609 = *C. brachybotrys*, Muell. Arg.*cascarilloides*, Kuntze, l. c. 610 = *C. cascarilloides*, Geisl.*cassinoides*, Kuntze, l. c. = *C. cassinioides*, Lam.*denticulata*, Kuntze, l. c. 609 = *C. rhodostachyus*, Muell. Arg.*draconodes*, Kuntze, l. c. 611 = *C. draconoides*, Muell. Arg.*dracunculoides*, Kuntze, l. c. 610 = *C. dracunculoi-des*, Baill.*echioides*, Kuntze, l. c. = *C. echioides*, Baill.*ericodes*, Kuntze, l. c. 611 = *C. ericoideus*, Baill.*eriodadodes*, Kuntze, l. c. 610 = *C. eriodadoides*, Muell. Arg.*erythroxyloides*, Kuntze, l. c. = *C. erythroxyloides*, Muell. Arg.*fothergilliaefolia*, Kuntze, l. c. 611 = *C. fothergil-laeifolia*, Baill.*Glaziovii*, Kuntze, l. c. 613 = *C. Glaziovii*, Muell. Arg.*glechomifolia*, Kuntze, l. c. 611 = *C. glechomaefo-lius*, Muell. Arg.*gnaphalioides*, Kuntze, l. c. 610 = *C. gnaphaloides*, Schrad.*grangerioides*, Kuntze, l. c. = *C. grangerioides*, Boj.**OXYDECTES** : —*grewioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 610 = *Croton grewioides*, Baill.*guyanensis*, Kuntze, l. c. = *C. guyanensis*, Aubl.*Hadrianii*, Kuntze, l. c. = *C. Hadriani*, Baill.*helicodes*, Kuntze, l. c. = *C. helicoideus*, Muell. Arg.*Heptalon*, Kuntze, l. c. = *C. Berlandiera*, Muell. Arg.*Hostmannii*, Kuntze, l. c. = *C. Hostmanni*, Mig.*inversa*, Kuntze, l. c. = *C. piahiensis*, Muell. Arg.*Isabellii*, Kuntze, l. c. 612 = *C. Isabelli*, Baill.*Isertii*, Kuntze, l. c. = *C. Iserti*, Geisl.*Jamesoni*, Kuntze, l. c. 610 = *C. Jamesoni*, Muell. Arg.*japirensis*, Kuntze, l. c. = *C. laurifolius*, Spach.*Jardinii*, Kuntze, l. c. 612 = *C. Jardini*, Muell. Arg.*jatrophiifolia*, Kuntze, l. c. 610 = *C. jatrophaefo-lius*, Muell. Arg.*Kalkmannii*, Kuntze, l. c. = *C. Kalkmanni*, Muell. Arg.*Klaensei*, Kuntze, l. c. 613 = *C. Klaenzei*, Muell. Arg.*Klotzschii*, Kuntze, l. c. 612 = *C. Klotzschianus*, Thw.*laccifera*, Kuntze, l. c. 610 = *C. aromaticus*, Mig.*macrobothrya*, Kuntze, l. c. = *C. macrobothrys*, Baill.*macrostachya*, Kuntze, l. c. = *C. macrostachys*, Hochst.*Mandonii*, Kuntze, l. c. = *C. Mandonis*, Muell. Arg.*maturensis*, Kuntze, l. c. 612 = *C. matourensis*, Aubl.*Meisneri*, Kuntze, l. c. = *C. Meisneri*, Muell. Arg.*microstachya*, Kuntze, l. c. 610 = *C. microstachys*, Baill.*Miqueliana*, Kuntze, l. c. = *C. aromaticus*, Mig.*nepetifolia*, Kuntze, l. c. = *C. nepetaefolius*, Baill.*Pavanae*, Kuntze, l. c. = *C. Tigilium*, Linn.*Pavonii*, Kuntze, l. c. = *C. Pavonis*, Muell. Arg.*persimilis*, Kuntze, l. c. 612 = *C. Joufra*, Roxb.*phebaloides*, Kuntze, l. c. = *C. phebaloides*, Muell. Arg.*plagiographa*, Kuntze, l. c. 613 = *C. plagiographis*, Muell. Arg.*Pohlana*, Kuntze, l. c. = *C. horridulus*, Baill.*polyandra*, Kuntze, l. c. 609 = *C. brasiliensis*, Muell. Arg.*pulegiodes*, Kuntze, l. c. 614 = *C. pulegioides*, Baill.*riviniifolia*, Kuntze, l. c. 610 = *C. rivinaefolius*, H. B. & K.*roettlerifolia*, Kuntze, l. c. = *C. roettleraeifolius*, Baill.*Roxburghiana*, Kuntze, l. c. = *C. dioicus*, Roxb.*salviaefolia*, Kuntze, l. c. = *C. rhamnifolius*, H. B. & K.*Schlechtendalliana*, Kuntze, l. c. = *C. fragilis*, Schlecht.*Sellowiana*, Kuntze, l. c. 609 = *C. sphaerogynus*, Baill.*sidifolia*, Kuntze, l. c. 613 = *C. sidaefolius*, Lam.*stigmatica*, Kuntze, l. c. 610 = *C. phebaloides*, Muell. Arg.*subflocosa*, Kuntze, l. c. 609 = *C. Lundianus*, Muell. Arg.*Thwaitesiana*, Kuntze, l. c. 613 = *C. Klotzschianus*, Thw.*timandroides*, Kuntze, l. c. = *C. timandroides*, Muell. Arg.*tomentosa*, Kuntze, l. c. 613 et 614 = *C. crassifo-lius*, Geisl.*urticifolia*, Kuntze, l. c. 613 = *C. urticaefolius*, Lam.*vaccinioides*, Kuntze, l. c. = *C. vaccinioides*, A. Rich.*Vaillantii*, Kuntze, l. c. = *C. Vaillanti*, Geisl.*verbenifolia*, Kuntze, l. c. = *C. verbenaeifolius*, Muell. Arg.*zeylanica*, Kuntze, l. c. = *C. reticulatus*, Thunb.*Zippiana*, Kuntze, l. c. = *C. muricatus*, Zipp.

OXYGONUM, Burch. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 392.
atriplicifolium, Martelli, *Fl. Bogos.* (1886) 69 (= *Ceratogonum atriplicifolium*, Meissn.). — Abyss.
elongatum, Dammer, *ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 41; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 170. — Afr. trop. or.
salicifolium, Dammer, *ll. cc.* 41; *et* 175. — Afr. trop. or.
Stuhlmannii, Dammer, *l. c.* 171. — Afr. trop. or.

OXYGRAPHIS, Bunge (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 392.
Andersoni, Freyn, *in Flora*, lxx. (1887) 140 (= *Ranunculus Andersoni*, A. Gray). — Am. bor. occ.
breviscapa, Prantl, *in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 263 (= *R. breviscapus*, DC.). — Peruv.
Chamissonis, Freyn, *in Flora*, lxx. (1887) 141 (= *R. Chamissonis*, Schlecht.). — Am. austr.
Cymbalaria, Prantl, *in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 263 (= *R. Cymbalaria*, Pursh). — Reg. bor. temp.
Delavayi, Franch, *in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 374. — China.
nubigena, Prantl, *in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 262 (= *Ranunculus nubigenus*, Kunth). — Peruv.
plumbaginifolia, Prantl, *l. c.* (= *R. plumbaginifolius*, Murr.). — Sibir.
tridentata, Prantl, *l. c.* (= *R. tridentatus*, Kunth). — Am. austr.
vulgaris, Freyn, *in Flora*, lxxi. (1887) 141; *et in Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1895) 92 (= *R. glacialis*, Linn.). — Reg. bor. & arct.

OXYMERIS, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 392.
dolichodons, Cham, *ex Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 177 = *Leandra dolichodons*, Cogn.

OXYMITRA, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 393.
calycina, King, *in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 99. — Penins. Mal.
macrantha, Hemsl., *in Kew Bull.* (1895) 132; *et in Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2399 *et* 2400. — Ins. Salom.

OXYPETALUM, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 393.
andinum, Phil., *in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 204. — Chili.
angustifolium, Phil., *l. c.* 202. — Chili.
Glaziovianum, Loesen, *in Flora*, lxxii. (1889) 78. — Bras.
Kuntzei, Schlechter, *in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 453. — Reg. Argent.
Moelleri, Phil., *in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 202. — Chili.
paraguayense, Schlechter, *in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 454. — Parag.
parviflorum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 420, sphalm. = *parvifolium*, Phil.
parvifolium, Phil., *in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 203. — Chili.

OXYPOLIS, Rafin. = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).
filiformis, Britton, *in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 239 = *Oenanthe filiformis*, Walt.
rigidus, Britton, *l. c.* = *Sium rigidum*, Linn.

OXYRIA, Hill (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 394
sinensis, Hemsl., *in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 317 t. 33. — China occ.

OXYS, Tourn. *ex* Adans. = **Oxalis**, Linn. (Geran.).
oregana, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 71 = *Oxalis oregana*, Nutt.

OXYSTELMA, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 394.
Gilliesii, K. Schum., *in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 229 (= *Philibertia Gilliesii*, Hook. & Arn.). — Am. austr.
Secamone, K. Schum., *l. c.* = *alpina*, Decne.
solanoides, K. Schum., *l. c.* (= *Philibertia solanoides*, H. B. & K.). — Peruvia.

OXYSTELMA : —
violacea, K. Schum., *in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 229. — Chili.

OXYTENANTHERA, Munro (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 394.
brachythyrus, K. Schum., *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 23. — N. Guin.
macrothyrus, K. Schum., *in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 117. — Afr. trop. or.

OXYTHECA, Nutt. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 394.
hirtiflora, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 153; *et* Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 48 = *Eriogonum hirtiflorum*, A. Gray.
spergulina, Greene, *l. c.* (1891) 153 = *Reddingiana*, M. E. Jones.

OXYTROPIS, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 395.
acutirostris, M. E. Jones, *in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 677 (= *Astragalus acutirostris*, S. Wats.). — Calif.
Beketowii, Krassn., *in Script. Hort. Univ. Petrop.* ii. 1. (1887-88) 15. — China.
dinarica, Murb., *in Lunds Univ. Arsskrift.* xxvii. v. (1892) 143 = *campestris*, Linn.
Foucaudi, Gillot, *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 517. — Pyren.
graeca, Hausskn., *in Mitth. Bot. Ver. Jena*, N. Folge, v. (1893) 84. — Graecia.
Halácsyana, Heldr., *ex Hausskn. l. c.* 85. — Graecia.
japonica, Maxim., *in Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 27. — Japon.
micans, Freyn & Sint., *in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 186. — Armenia.
nothoxys, M. E. Jones, *in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 677 (= *Astragalus nothoxys*, A. Gray). — Arizona.
prenja, G. Beck, *in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 122 = *O. Halleri*, Bunge.
Sintenisii, Freyn, *in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 65. — As. Min.
sylinchanensis, Franch., *in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 304. — China
Tatrae, Borb., *in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 362, nomen. — Hung.
trichophora, Franch., *in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 303. — China.
tyrolensis, Fritsch, *in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 592 = *Astragalus tyrolensis*, Sieb.
yunnanensis, Franch., *Pl. Delav. i.* (1890) 163. — Yunnan.

OYEDAIA, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 397.
boliviana, Britton, *in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 149. — Bolivia.
Pearcei, Rusby, *in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 59. — Bolivia.

P

PACHIRA, Aubl. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 397.
obtusa, Spruce, *ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 222. — Bras.

PACHITES, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 397.
Bodkini, Bolus, *Icon. Orchid. Austro-Afr.* i. 1 (1892) t. 26. — Afr. austro-occ. extratrop.

PACHYACRIS, *capensis*, Schlechter, *in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 358, *in obs.* = *Asclepias Tysoniana*, Schlechter.

PACHYANTHUS, A. Rich. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 397.
corymbiferus, Cogn., *in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 951 (= *Chalybaea corymbifera*, Naud.). — N. Granat.

PACHYCENTRIA, Blume (Melast.). — Ind. Kew. ii. 398.
macrorhiza, Becc., *Malesia*, ii. (1886) 237 t. 56 f. 1-2; *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 607. — Borneo.
Maidenii, F. Muell., *in Wing's South Sci. Record*, New Ser. II. (Jan. 1886); *et in Bot. Centralbl.* xxvi. (1886) 20, *in syn.* = *Medinilla Maidenii*, F. Muell.
microsperma, Becc., *Malesia*, ii. (1886) 238 t. 58 fig. 1-9; *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 609. — Borneo.
microstyla, Becc., *ll. cc.* 239; *et* 606. — Borneo.

PACHYCHLAMYS brachyptera, Dyer, *ex* Brandis, *in Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 77, *in syn.* = *Shorea brachyptera*, Heim.

PACHYCLADON, Hook. f. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 398.
elongatum, J. Buch., *in Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1877) 216 t. 14 [elongata]. — N. Zel.

PACHYCORNIA, Hook. f. (Chenop.). — Ind. Kew. ii. 398.
robusta, Baill., *Hist. des pl.* ix. (1888) 184 = *robusta*, Hook. f.

PACHYLOPHUS, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).
caespitosa, Raimann, *in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 215 = *O. caespitosa*, Nutt.

PACHYNOCARPUS, Hook. f. (Dipterocarp.). — Ind. Kew. ii. 398.
ruminatus, Brandis, *in Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 136 (= *Vatica ruminata*, Burck.). — Siam.
Staphianus, King, *in Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) II. 136; Brandis, *l. c.* 136. — Perak.
verrucosus, Brandis, *l. c.* = seq.
verrucosus, Heim, *Recherch. Diptéroc.* (1892) 107 (= *Vatica verrucosa*, Burck.). — Borneo.
Wallichii, King, *in Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) II. 135; Brandis, *in Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 136. — As. trop.

PACHYPODIUM, Lindl. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 399.
brevicaule, Baker, *in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 503. — Madag.
cactipes, K. Schum., *in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 178. — Madag.
densiflorum, Baker, *in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 503. — Madag.
giganteum, Engl., *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 147. — Afr. austro-occ. extratrop.
Saundersii, N. E. Br., *in Kew Bull.* (1892) 126. — Afr. austr.

PACHYRHIZUS, Rich. *ex* DC. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 399.
bulbosus, Britton, *in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1889) 324 = *bulbosus*, Kurz.

PACHYSANDRA, Michx. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 399.
axillaris, Franch., *Pl. Delav.* (1889) 135, t. 26. — Yunnan.

PACHYSTELA, Pierre = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).
brevipes, Baill., *in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 947, *in obs.* = *S. brevipes*, Baker.
Sacleuxii, Pierre, *ex* Baill., *l. c.* 946 = *S. Sacleuxii*, Baill.

PACHYSTIGMA, Hochst. = **Fadogia**, Schweinf. (Rubiace.).
ancylanthum, K. Schum., *in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 387 = *F. ancylantha*, Schweinf.
decussatum, K. Schum., *l. c.* = *Afr. trop. or.*
fuchsoides, K. Schum., *l. c.* = *F. fuchsoides*, Welw.
triphyllum, K. Schum., *l. c.* = *F. triphylla*, Baker.
Zeyheri, K. Schum., *l. c.* = *F. Zeyheri*, Sond.

PACHYSTIMA, « Rafin. » = **Pachistima**, Rafin. (Celastr.).
myrsinites, « Rafin. » ex Hamb. Garten und Blumen-Zeit. (1888) 559 = *Myginda myrtifolia*, Nutt.

PACHYSTOMA, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 399.
 Holtzei, F. Muell. in *Vict. Natural*. viii. (Mar. 1892) 180 (= *Eulophia Holtzei*, F. Muell.). — Austral.

PACHYSTYLUS, K. Schum. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 133. **RUBIACEAE**.
 Guelcherianus, K. Schum. l. c.: et in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 109. — N. Guin.
 Henningsianus, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 437. — N. Guin.

PADUS, Linn. = **Prunus**, Tourn. (Rosac.).
bracteata, Hort. Gall. ex Dippel, *Handb. Laubholz* iii. (1893) 647 = *Pr. Padus*, Linn.
monstrosa, Hort. Gall. ex Dippel. l. c. 621 = *Pr. Mahaleb*, Linn.

PAEDERIA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 400.
argentea, K. Schum. in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 125 = *Lecontea argentea*, A. Rich.
foetens, K. Schum. l. c. (= *Siphomeris foetens*, Hiern). — Afr. trop.
olens, K. Schum. l. c. = *Lygodisodea foetida*, Ruiz & Pav.

PAEONIA, [Tourn.] Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 400.
algeriensis, Chab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 18. — Algeria.
angustata, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 145 = *peregrina*, Mill.
atlantica, Kralik. ex Trab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1889) 62. — Algeria.
Delavayi, Franch. l. c. xxxiii. (1886) 382; *Huth*, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 273. — China.
leiocarpa, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 145 = *peregrina*, Mill.
lutea, Delavay, ex Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 382; *Huth*, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 272. — China.
mascula, G. Beck. Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 393 = *corallina*, Retz.
ovatifolia, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 144 = *corallina*, Retz.

PAEPALANTHUS, Mart. (Eriocaul.). — Ind. Kew. ii. 401.
Beckii, Szyszyl. ex Wawra, *Itin. Princ. Saxo-Coburg*. ii. (1888) 97. — Bras.
Roraimae, Oliver, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. ii. (1887) 286, t. 49b (Oliver, ex im Thurn, in *Timchri*, v. (1886) 208). — Guian. angl.

PAGAEA, Griseb. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 402.
memorosa, Gilg, in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 102. — Am. austr.
pumila, Gilg, l. c. (= *Brachycodon pumilus*, Progel). — Bras.

PAGEREA *Hookeri*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 283, nomen. — Cochinch.

PAHUDIA, Miq. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 403.
cochinchinensis, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 287. — Cochinch.
macrocarpa, Pierre, l. c. — Cochinch.

PAJANELIA, DC. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 402.
longifolia, K. Schum. in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 244 = *multijuga*, DC.

PALAFOXIA, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 403.
arenaria, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 178. — Calif.

PALALA, Rumph. Herb. Amboin. ii. (1741) 28 = **Myristica**, Linn.

amygdalina, *andamanica*, *ardisiaefolia*, *argentea*, *arunana*, *attenuata*, *bancana*, *bialata*, *Biculhyba*, *bivalvis*, *Buchneriana*, *calophylla*, *canariformis*, *Cantleyi*, *capitellata*, *carinata*, *castaneaefolia*, *cinerea*, *cuspidata*, *debilis*, *diversifolia*, *elliptica*, *elongata*, *eugeniaefolia*, *Farquhariana*, *fatua*, *fragrans*, *furfuracea*, *Gardneri*, *geminata*, *gibbosa*, *glabra*, *glaucescens*, *Globularia gordoniae*, *gracilis*, *grandifolia*, *Griffithii*, *guatemalensis*, *guatteriaefolia*, *heterophylla*, *Hookeriana*, *hypargyrea*, *hypoleuca*, *hyposticta*, *iners*, *insipida*, *intermedia*, *inutilis*, *Irya*, *iteophylla*, *Kingii*, *laevigata*, *lanceifolia*, *laurifolia*, *laurina*, *Lemmanniana*, *lepidota*, *litoralis*, *longifolia*, *macrocarpa*, *macrocoma*, *macrophylla*, *macrothyrsa*, *madagascariensis*, *magnifica*, *Maingayi*, *malabarica*, *malaccensis*, *Mandakaran*, *membranacea*, *mexicana*, *micrantha*, *Mococa*, *mollissima*, *Murtonii*, *myrmecophila*, *nesophila*, *Otoba*, *panamensis*, *peltata*, *pendulina*, *peruviana*, *platysperma*, *polysphaerula*, *punctata*, *Radya*, *rugulosa*, *Schleinitzii*, *scifera*, *sessilis*, *simiarum*, *sphaerula*, *spicata*, *Sprucei*, *subglobosa*, *subsessilis*, *succedanea*, *superba*, *surinamensis*, *sylvestris*, *tingens*, *tomentosa*, *tuberculata*, *tubiflora*, *naupensis*, *valida*, *venosa*, *Wallichii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 567 = *homonyma omnia* Myristicae.
calocarpa, Kuntze, l. c. = *M. elliptica*, Wall.
Commersonii, Kuntze, l. c. = *M. Commersonii*, Blume.
corticosa, Kuntze, l. c. = *M. glaucescens*, Hook. f. & Thoms.?

glomerata, Kuntze, l. c. = *M. Horsfieldia*, Blume.
Hostmannii, Kuntze, l. c. = *M. Hostmanni*, Benth.
Iryaghedi, Kuntze, l. c. = *M. Horsfieldia*, Blume.
Leucoxydon, Kuntze, l. c. = *M. leucoxylo*, Miq.
luzonica, Kuntze, l. c. = *M. bracteata*, A. DC.
morindifolia, Kuntze, l. c. = *M. fatua*, Houtt.
palembanica, Kuntze, l. c. = *M. glaucescens*, Hook. f. & Thoms.
paniculata, Kuntze, l. c. = *M. Farquhariana*, Wall.
parvifolia, Kuntze, l. c. = *M. parviflora*, Roxb.
Pavonii, Kuntze, l. c. = *M. Pavonii*, A. DC.
philippensis, Kuntze, l. c. = *M. philippensis*, Lam.
pinniformis, Kuntze, l. c. = *M. pinnaeformis*, Zipp.
subcordata, Kuntze, l. c. = *M. fatua*, Houtt.
sublanceolata, Kuntze, l. c. = *M. iners*, Blume.
sycocarpa, Kuntze, l. c. = *M. elliptica*, Wall.
Teysmannii, Kuntze, l. c. = *M. Teysmanni*, Miq.
theodora, Kuntze, l. c. = *M. theiodora*, Spruce.

PALAEQUIMUM, Blanco = **Dichopsis**, Thw. (Sapot.).
canaliculatum, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 511 = *Isonandra canaliculata*, Thw.
ellipticum, Engl. l. c. = *Bassia elliptica*, Dalz.
fulvosericum, Engl. l. c. = Borneo.
grande, Engl. l. c. = *Dichopsis grandis*, Thw.
Helferi, Engl. l. c. = *D. Helferi*, C. B. Clarke.
hexandrum, Engl. l. c. = *Isonandra hexandra*, Griff.
laevifolium, Engl. l. c. = *I. laevifolia*, Thw.
lanceolatum, Engl. l. c. = *I. lanceolata*, Thw.
luzoniense, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 176. — Ins. Philipp.
Maingayi, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 511 = *Dichopsis Maingayi*, C. B. Clarke.
Nadeaudi, Drake, Fl. Polyn. Franç. (1891) 120; et Ill. Ins. Mar. Pacif. (1892) 229 (= *Mimusops decussata*, Nadeaud), — Ins. Societ.
obovatum, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 511 = *Isonandra obovata*, Griff.
Ottelanderi, Koerd. & Valet, Boomsoort. van Java, i. (1894) 146. — Java.
pauciflorum, Engl. l. c. = *I. pauciflora*, Thw.
petiolare, Engl. l. c. = *Dichopsis petiolaris*, Thw.
polyanthum, Engl. l. c. = *Bassia polyantha*, Wall.
rubens, Engl. l. c. = *Dichopsis rubens*, C. B. Clarke.
rubiginosum, Engl. l. c. = *Isonandra rubiginosa*, Thw.
Thwaitesii, Trim. Handb. Fl. Ceyl. iii. (1895) 84. — Zeylan.

PALENIA, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 7. **COMPOSITAE**.
Delhini, Phil. l. c. — Chili.

PALICOUREA, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 403.

coriacea, K. Schum. in Engl. et Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 115 = *xanthophylla*, Muell. Arg.
discolor, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7001, in syn. = *nicotianaefolia*, Cham. et Schlecht.
insularis, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 41. — Ins. Fernando Noronha.
megalophylla, K. Schum. in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 115 = *Psychotria megalophylla*, Muell. Arg.
pentandra, K. Schum. l. c. = *Pal. Pavetta*, DC.
Spruceana, K. Schum. l. c. = *Psychotria Sprucei*, Muell. Arg.

PALISOTA, Reichb. (Commel.). — Ind. Kew. ii. 404.

congolana, Hua, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii (1894) p. lii. — Afr. trop. occ.
plagiocarpa, Hua, l. c. — Afr. trop. occ.
Tholloni, Hua, l. c. — Congo gall.

PALIURUS, Tourn. ex Linn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 404.

hirsutus, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 388. — China.
orientalis, Hemsl. l. c. 387. — China.

PALLASIA, Scop = **Crypsis**, Ait. (Gramin.).
aculeata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 781. = *C. aculeata*, Aiton.

PALMERELLA, A. Gray (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 405.

tenera, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 433. — Mexic.

PALMIJUNCUS, Rumph. Herb. Amboin. v. (1747) 95-119, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 731 = **Calamus**, Linn. (Palm.).

acanthospathus, *africanus*, *amplectens*, *andamanicus*, *arborescens*, *aruensis*, *asperimus*, *Ashyanus*, *australis*, *Blancoi*, *caesius*, *ciliaris*, *collinus*, *concinus*, *coronarius*, *deerratus*, *delicatulus*, *densus*, *depressiusculus*, *Diepenhorstii*, *diocus*, *elegans*, *epitolaris*, *equestris*, *erectus*, *exilis*, *farinosus*, *flabellatus*, *floribundus*, *gracilis*, *graminosus*, *grandis*, *Griffithianus*, *Guruba*, *Helferianus*, *heteracanthus*, *horrens*, *Huegelianus*, *hypoleucus*, *insignis*, *interruptus*, *javensis*, *kentiaeformis*, *laevigatus*, *latifolius*, *leptospathis*, *Lindenii*, *litoralis*, *longisetus*, *macropterus*, *Manan*, *manillensis*, *Margaritae*, *marginatus*, *melanacanthus*, *melanoloma*, *Meyenianus*, *micranthus*, *micranthus*, *mollis*, *Muelleri*, *Nicolai*, *nitidus*, *nivalis*, *opacus*, *ornatus*, *Oxleyanus*, *pachystemonus*, *palustris*, *papuanus*, *paradoxus*, *petraeus*, *philippensis*, *piscicarpus*, *platyspathus*, *plicatus*, *plumosus*, *polygamus*, *pulcher*, *pygmaeus*, *quingenerovius*, *radiatus*, *ramosissimus*, *reflexus*, *refractus*, *Riedelianus*, *rivalis*, *rudentum*, *Rungdung*, *schistoacanthus*, *Scipionum*, *serrulatus*, *siphonopathus*, *spectabilis*, *subangulatus*, *simphysiphus*, *tenuis*, *tetradactylus*, *thysanolepis*, *triqueter*, *unifarius*, *Veitchii*, *vestitus*, *viminalis*, *Walkeri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 733-34 = *homonyma omnia* Calami.

accedens, Kuntze, l. c. = *Daemonorops Draco*, Blume.
adpersus, Kuntze, l. c. 733 = *D. adpersus*, Blume.
amarus, Kuntze, l. c. = *Calamus tenuis*, Roxb.?
amboinensis, Kuntze, l. c. = *Daemonorops calapparius*, Blume.
aweus, Kuntze, l. c. = *Calamus ornatus*, Blume.
barbatus, Kuntze, l. c. 732 = *Daemonorops barbatus*, Mart.
borneensis, Kuntze, l. c. 733 = *Calamus javensis*, Blume.
brevifrons, Kuntze l. c. = *C. Blancoi*, Kunth.
calapparius, Kuntze, l. c. 731 = *Daemonorops calapparius*, Blume.
calocarpus, Kuntze, l. c. 733 = *D. calicarpus*, Mart.
calolepis, Kuntze, l. c. = *Calamus melanoloma*, Mart.
caryotodes, Kuntze, l. c. = *C. caryotoides*, A. Cunn.

PALMIJUNCUS: —

- cochleatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 733 = *Daemonorops cochleatus*, Teijsm. & Binn.
crinitus, Kuntze, l. c. = *D. crinitus*, Blume.
discolor, Kuntze, l. c. = *Calamus siphonospatus*, Mart.?
Draco, Kuntze, l. c. 732 = *Daemonorops Draco*, Blume.
elongatus, Kuntze, l. c. 733 = *D. elongatus*, Blume.
extensus, Kuntze, l. c. = *Calamus palustris*, Griff.
fasciculatus, Kuntze, l. c. = *C. viminalis*, Reinw.
Fernandezii, Kuntze, l. c. = *C. Oxleyanus*, Teysm. & Binn.
fissus, Kuntze, l. c. = *Daemonorops fissus*, Blume.
flagellum, Kuntze, l. c. = *Calamus polygamus*, Roxb.
Gaudichaudii, Kuntze, l. c. = *Daemonorops Gaudichaudii*, Mart.
geniculatus, Kuntze, l. c. = *D. geniculatus*, Mart.
glaucescens, Kuntze, l. c. = *Calamus caesius*, Blume.
gracilipes, Kuntze, l. c. = *Daemonorops longipes*, Miq.
grandis, Kuntze, l. c. = *D. grandis*, Mart.
Haenkeanus, Kuntze, l. c. = *Calamus mollis*, Blanco.
Heliotropium, Kuntze, l. c. = *C. tenuis*, Roxb.
heterodeus, Kuntze, l. c. = *C. Reinwardtii*, Mart.
hirsutus, Kuntze, l. c. = *Daemonorops Hystrix*, Mart.
humilis, Kuntze, l. c. = *Calamus latifolius*, Roxb.
hygrophilus, Kuntze, l. c. = *Daemonorops hygrophilus*, Mart.
Hystrix, Kuntze, l. c. = *D. Hystrix*, Mart.
inermis, Kuntze, l. c. = *Calamus latifolius*, Roxb.
intermedius, Kuntze, l. c. = *Daemonorops intermedius*, Mart.
Jenkinsianus, Kuntze, l. c. = *D. Jenkinsianus*, Mart.
Korthalsii, Kuntze, l. c. = *D. Korthalsii*, Blume.
leptopus, Kuntze, l. c. 733 = *D. leptopus*, Mart.
Lewisianus, Kuntze, l. c. = *D. Lewisianus*, Mart.
macroacanthus, Kuntze, l. c. = *Calamus latifolius*, Roxb.
macrocarpus, Kuntze, l. c. = *C. erectus*, Roxb.
malaccensis, Kuntze, l. c. = *Daemonorops malaccensis*, Mart.
manicatus, Kuntze, l. c. = *D. crinitus*, Blume.
maximus, Kuntze, l. c. = *Calamus manillensis*, H. Wendl.
melanolepis, Kuntze, l. c. = *C. Huegelianus*, Mart.
mirabilis, Kuntze, l. c. = *Daemonorops mirabilis*, Mart.
mishmeensis, Kuntze, l. c. = *Calamus floribundus*, Griff.
monoecus, Kuntze, l. c. = *C. Rotang*, Linn.
montanus, Kuntze, l. c. = *C. acanthospatus*, Griff.
monticolus, Kuntze, l. c. = *Daemonorops monticolus*, Mart.
Newmannii, Kuntze, l. c. = *Calamus Newmannii*, Hort.
niger, Kuntze, l. c. 732 = *Daemonorops niger*, Blume.
mutantiflorus, Kuntze, l. c. = *D. Jenkinsianus*, Mart.
ovodeus, Kuntze, l. c. = *Calamus ovodeus*, Thw.
palembanicus, Kuntze, l. c. = *Daemonorops palembanicus*, Blume.
pallens, Kuntze, l. c. = *Calamus Reinwardtii*, Mart.
penicellatus, Kuntze, l. c. = *C. javensis*, Blume.
pericanthus, Kuntze, l. c. = *Daemonorops pericanthus*, Miq.
petiolaris, Kuntze, l. c. = *D. petiolaris*, Mart.
platyacanthus, Kuntze, l. c. = *Calamus oblongus*, Reinw.
Pseudorotang, Kuntze, l. c. = *C. viminalis*, Willd.
radicalis, Kuntze, l. c. = *radicalis*, H. Wendl. & Drude
Rheedii, Kuntze, l. c. = *C. Rheedii*, Griff.
rhombodeus, Kuntze, l. c. = *C. rhomboideus*, Blume.
Royleanus, Kuntze, l. c. = *C. tenuis*, Roxb.
ruber, Kuntze, l. c. = *Daemonorops Draco*, Blume.

PALMIJUNCUS: —

- schizospathus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 733 = *Calamus erectus*, Roxb.
tetrastichus, Kuntze, l. c. = *C. javensis*, Blume.
tigrinus, Kuntze, l. c. = *C. longisetus*, Griff.
trichous, Kuntze, l. c. = *Daemonorops trichous*, Miq.
usitatus, Kuntze, l. c. = *D. Gaudichaudii*, Mart.
verticillatus, Kuntze, l. c. = *D. verticillatus*, Mart.
Wightii, Kuntze, l. c. = *C. Huegelianus*, Mart.
zebrinus, Kuntze, l. c. = *C. zebrinus*, Becc.

PALMIFOLIA, [UM] Trew = **Zamia**, Linn. (Cycad.).

- angustifolium*, Chigua. debile, Fischeri, furfuraceum, integrifolium, Kickxii, latifolium, Loddigesii, medium, multifoliatum, muricatum, Ottonis, Poeppigianum, Pseudoparasiticum, pumilum, pygmaeum, Skinneri, sparteum, tenue, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 803 = *homonyma omnia Zamiae*.
angustissimum, Kuntze, l. c. = *Z. angustifolia*, Jacq.
bolivianum, Kuntze, l. c. = *Z. boliviana*, DC.
floridanum, Kuntze, l. c. = *Z. angustifolia*, Jacq.
Galeottii, Kuntze, l. c. = *Centrozamia mexicana*, Brongn.
mexicanum, Kuntze, l. c. = *Zamia Loddigesii*, Miq.
strictum, Kuntze, l. c. = *Z. angustifolia*, Jacq.
Yatesii, Kuntze, l. c. = *Z. angustifolia*, Jacq.

PANARGYRUM, D. Don = **Nassauvia** Juss. (Compos.).

- acerorum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 97. — Chili.
laxum, Phil. l. c. — Chili.
pectinatum, Phil. l. c. 96. — Chili.
subspinosum, Phil. l. c. 98. — Chili.

PANAX, Linn. (Arab.). — Ind. Kew. ii. 404.

- affine*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 437. — Ins. Borbon.
compactum, Hort. ? ex Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 243. — Hab. ?
crispatum, Hort. Bull. Catal. (1888) 9; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 273. — Bras.
Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 248. — Tibet.
gomphophyllum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 480 [gomphophylla]. — Madag.
Hermannii, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 437 — Ins. Borbon.
integrifolium, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx 1887 (1888) 192 [integrifolia]. — N. Zel.
lepidum, Hort. Bull. Catal. (1888) 9; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 273. — Bras.
Macdowalli, F. Muell. in Wing South. Sci. Record, New Ser. (April 1886). extr. 4. — Austral.
nitidum, Hort. Bull. Catal. (1888) 9; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 273. — Bras.
ornatum, Hort. Bull. ii. cc. — Bras.
plumatum, Hort. ex Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 243. — Hab. ?
repandum, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 436 (= *Polyscias repanda*, Baker). — Ins. Borbon.
Victoriae, Hort. ex Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1892 (1895) 243. — Hab. ?

PANCOVIA, Willd. = **Erioglossum**, Blume (Sapind.).

- Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 461 (= *Sapindus Delavayi*, Radlk.). — China occ.
Teckeli, Claudel, in Ann. Inst. Colon. Marseille, ii. (1895) n. iii. 45. — Afr. trop. occ.

PANCRATIUM, Dill. ex Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 406.

- Saharae*, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algérie [Monoc.] (1895) 46. — Algérie.

PANDANUS, Rumph. ex Linn. (Pandanus). — Ind. Kew. ii. 407.

- Augustianus*, L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hort. xxxiii. (1886) 157, t. 612. — N. Guin.

PANDANUS: —

- Baptisti*, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenzeit (1893) 306; Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 167, fig. 35. — Hab. ?
Barterianus, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 324 (Barteriana). — Ins. Fernando-Po.
ceramensis, Hort. ex Gard. Chron. (1888) ii. 631 = *labyrinthicus*, Kurz.
ceramicus, Hort. l. c. = *praec.*
Danckelmannianus, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 17. — N. Guin.
dyckioides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 527. — Madag.
Grusonianus, L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hort. xxxiv. (1887) 35, t. 12. — Ins. Amirant.
Hombromia, F. Muell. in Vict. Natural. vii. [err. typ. viii] (Jan. 1891) 143; et ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 123 (= *Hombromia edulis*, Gaudich.). — Austral.
Kerchovei, L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hort. xxxiii. (1886) 95 t. 590. — Ins. Amirant.
Kirkii, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 326. — Zanzibar.
Krauelianus, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 18. — N. Guin.
Livingstonianus, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 336. — Zambesia.
myriocarpus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 347. — Madag.
nemosus, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 149 (= *P. sylvestris*, Bory). — Ins. Borbon.
odorifer, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 737 = *odoratissimus*, Linn. f.
rabaiensis, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 325; et in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 432, t. 34 fig. 1-6. — Afr. trop. or. [Mombassa].
sparganioides, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1890) 347. — Madag.
thomensis, Solms, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 206, t. E. — Ins. S. Thom.
Thurstoni, Wright, in Kew Bull. (1894) 348. — Ins. Fiji.
Welwitschii, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 324, v. 347. — Angola.

PANDERIA, Fisch. & Mey. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 409.

- pilosa*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 11 = *Kochia odontoptera*, Schrenk, et indica, Wight.

PANDOREA, Spach = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).

- austro-caledonica*, Bureau, ex Baill. Hist. des pl. x. (1888) 40; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 230 = *T. austro-caledonica*, Bureau.
ceramica, « Baill. » ex K. Schum. l. c. = *T. ceramensis*, Teijsm. & Binn.
jasminoides, K. Schum. l. c. = *T. jasminoides*, K. Schum.
Ricasoliana, « Baill. » ex K. Schum. l. c. = *T. Ricasoliana*, Tanf.

PANGIUM, Reinw. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 409.

- Naumannii*, Warb. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 23. — N. Guin.

PANICASTRELLA, Moench = **Echinaria**, Desf. (Cramin.).

- capitata*, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 232 = *capitata*, Moench.

PANICULARIA, Fabr. = **Glyceria**, R. Br. (Gramin.).

- acutiflora*, aquatica, australasica, canadensis, distans, dives, elongata, fluitans, Fordeana, glaucescens, latispica, magellanica, nervata, pallida, pauciflora, procumbens, ramigera, remota, syrtica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 782-83 = *homonyma omnia Glyceriae*.
Fendleriana, Kuntze, l. c. 782 (= *Atropis californica*, Munro). — Am. bor. occ.
latifolia, Kuntze, l. c. = *Catabrosa latifolia*, Phil.
Nuttalliana, Kuntze, l. c. (= *Poa tenuifolia*, Nutt.). — Am. bor. occ.
obtus, Kuntze, l. c. = *Poa obtusa*, Muhl.

PANICULARIA : —

- scabrella*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 782 = *Poa scabrella*, Benth.
tenuifolia, Kuntze, l. c. = *Catabrosa tenuifolia*, J. Presl.
Thurberiana, Kuntze, l. c. = *Poa pauciflora*, Benth.
americana, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 81 = *Glyceria aquatica*, Wahlenb. var.
angustata, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 54 = *G. angustata*, Fries.
brevifolia, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 205 = *G. acutiflora*, Torr.
laxa, Scribn. l. c. xxi. (1894) 37 = *G. laxa*, Scribn.
maritima, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 54 = *G. maritima*, Mert & Koch.

PANICUM : —

- adenophorum*, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 409.
Afr. C (1895) 103. — Afr. trop. or.
aequiglume, Hackel & Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. ii. (1894) 111. — Urug.
albovellereum, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 101. — Afr. trop. or.
amoenum, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 142. — Cochinch.
arrectum, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 741 (= *P. subquadrifarium*, Nees). — Afr. austr.
arundinifolium, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. ii. (1894) 22. — Eritrea.
atrofuscum, Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 63. — Madag.
basisetum, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun. viii. (1895) 353 (= *Setaria basiseta*, Th. Dur. & Schinz). — Afr. trop.
bambusoides, Spegazz. ex Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. ii. (1894) 128 t. 9 et 10. — Urug.
Boivinianum, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 742 (= *Hymenachne Boiviniana*, Steud.). — Ins. Nossibe.
boreale, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 421. — Am. bor.
Bergi, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. ii. (1894) 147. — Uruguay.
brachyurum, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 142. — Afr. austro occ. extratrop.
Bradyus, Bory, ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 734, in syn. = *Zoysia pungens*, Willd.
Buckleyanum, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. v. (1894) 499. — Am. bor.
cambridgeense, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 142. — Cochinch.
capillarioides, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 54; ii. (1894) 507, et iii. (1892) 33. — Texas.
chusqueoides, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 377. — Natal.
ciliatissimum, Buchl. in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 28; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 29. — Texas.
cinereum, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 500. — Ins. Sandvic.
confusum, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 118. — Ins. Borbon.
crinitum, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 744, nomen. — Afr. trop. centr.
decempepdale, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 783. — Reg. Himal.
deltoides, Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 64. — Madag.
dissitiflorum, Vasey, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 80; [an Steud.?] et ex Scribn. in Zöe, iv. (1894) 387. — Mexic.
dorsisetum, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 748, nomen. — Transvaal.
Drummondii, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 499. — Am. bor.
Echinochloa, Th. Dur. & Schinz, l. c. [an *P. Echinochloa*, Steud.?] (= *Echinochloa divaricata*, Anderss.). — Mossamb.
fili culme, Hack. ex Schinz. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 377. — Natal.

PANICUM : —

- filiferum*, « Garcke » ex Sagorski & Schneid. Fl. Centralkarp. index; (1891) p. 37, sphalm. = *filiforme*, Garcke.
filipes, Scribn. in Contrib. Herb. Frankl. i. (1895) 13. [Bot. Explor. S. Texas]. — Texas.
flexile, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 475 = *diffusum*, Pursh.
gabunense, Hack. ex Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 70. — Gabon.
glanduliferum, K. Schum. in Abh. Naturw. Ver. Brem. ix. (1889) 401. — Madag.
glomeratum, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 141. — Afr. austro-occ. extratrop.
Gussonii, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 26. — Ins. Ischia.
Hallii, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 508. — Am. bor.
Havardii, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1887) 95; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 509; et iii. (1892) 36. — Texas.
Hildebrandtii, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 750, nomen. — Ins. Nossibe.
hippoxix, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 22; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 103. — Afr. trop. or.
imbricatum, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 501. — Ins. Sandvic.
incisum, Munro, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 84 t. 33. — Ind. or.
Joorii, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 32; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 31. — Am. bor.
laevifolium, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 378. — Transvaal.
lasiocoleum, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 14, 23 et 35, nomen. — Afr. trop.
leucacanthum, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 102. — Afr. trop. or.
luridum, Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 64. — Madag.
macrostachyum, Hochst. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 763, in syn. = *sanguinale*, Linn.
Marlothii, Hack. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 398. — Afr. austr.
melanotylum, Hack. l. c. — Afr. austr.
milanjianum, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 56. — Afr. trop.
minus, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 421 = *diffusum*, Pursh.
mitopus, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 103. — Afr. trop. or.
montanum, Poit. ex Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 30 = *pallens*, Sw.
monticola, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 500. — Ins. Sandvic.
mossambicense, Hack. in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 140; et ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 755, nomen. — Mossamb.
Munroanum, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 140. — Cochinch.
najadum, Hack. & Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. ii. (1894) 123 t. 7bis et 8. — Uruguay.
Nealleyi, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 25. — Texas.
nigritanum, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 756, nomen. — Afr. trop. occ.
nitidum, Hack. & Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. ii. (1894) 131. — Uruguay.
nudicaule, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 31. — Florida.
oblongum, Hack. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 450, nomen. — Costa Rica.
ophismenoides, Hack. in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 141. — Mossamb.
oryzeturum, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 141. — Cochinch.
ononbiense, Balansa, l. c. 142. — Cochinch.
oxanthum, Steud. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 740, in syn. = *anabaptistum*, Steud.

PANICUM : —

- Palmeri*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 281. — Mexic.
paucispicatum, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 262. — Parag.
pectinatum, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 54. — Afr. trop.
pedicellatum, Vasey, in Bull. U. S. Nat. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 28; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 53, iii. (1892) 29. — Texas.
pertense, Boerl. in Ann. Jard. Buitenz. viii. (1889) 51 (= *Digitaria pertensis*, Buese). — Ins. Banca.
platynotum, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 101. — Afr. trop. or.
platyphyllum, Munro, ex Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 25; et Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 27. — Texas.
Porterianum, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 420 (= *P. latifolium*, Walt.). — Am. bor.
Prenticeanum, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 82. — Austral.
Pseudo-Ischaemum, Boerl. in Ann. Jard. Buitenz. viii. (1889) 52 (= *Digitaria Pseudo-Ischaemum*, Buese). — Java.
psilostachyum, Hochst. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 768, nomen. — Abyss.
pubivaginatum, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 102. — Afr. trop. or.
amosum, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. ii. (1894) 111 t. 7. — Uruguay.
ramosissimum, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 117. — Ins. Borbon.
Reverchoni, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 25; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 503, iii. (1892) 26. — Texas.
Richardi, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 118. — Ins. Borbon.
Ridleyi, Hack. ex Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii. (1893) 400. — Penins. Mal.
scalarum, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. II. (1894) 20. — Arab., Erithrea.
Schinzi, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 142. — Afr. austro-occ. extratrop.
Schweinfurthii, Hack. in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 764, nomen. — Afr. centr. bor.
scoparium, S. Wats. in A. Gray, Man. N. Am. Bot. ed. 6 (1890) 632 = *Scribnerianum*, Nash.
Scottii, Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 63. — Madag.
Scribnerianum, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 421. — Am. bor.
setarioides, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 116. — Ins. Borbon.
sparsiflorum, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 36; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 505, et iii. (1892) 34. — Am. bor. (pars austr.).
sphagnicolum, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 422. — Florida.
Stuhlmanni, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. (1895) 102. — Afr. trop. or.
subalbidum, Hochst. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 740, in syn. = *albidulum*, Steud.
subspicatum, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 25; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 503, et iii. (1892) 26. — Texas.
supervacuum, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 407. — Bengal.
terminale, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 117. — Ins. Borbon.
tonkinense, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 140. — Cochinch.
trachycladus, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 108, sphalm. = *trichocladum*, Hack.
trichocladum, Hack. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 119, nomen. — Afr. trop. or.
tylanthum, Hack. ex Engl. l. c. 118. — Afr. trop. or.
urochloides, Boerl. in Ann. Jard. Buitenz. viii. (1889) 62 (= *Digitaria urochloides*, Buese). — Java.
vicinum, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 82. — Austral.

PANICUM : —

Wilcoxianum, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 32; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 31. — Nebraska.
xantholeucum, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 141. — Afr. austro-occ. extratrop.

PANOPSIS, Salisb. (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 421. polystachya, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 579. — N. Granat.

PAPAPAYER, McClatchie, in Erythea, ii. (1894) 79, err. typ. = **Papaver**, Tourn.

PAPAVER, Tourn. ex Linn. (Papav.). — Ind. Kew. ii. 421.

acrochaetum, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vii. (1895) 6. — Oriens.

Anthemani X, Rouy, in Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 153. — Hybr. spont.

atlanticum, « Ball » ex Cosson, Ill. Fl. Atlant. i. (1882?) 11 t. 6; et Comp. Fl. Atlant. ii. (1883) 64 = rupifragum, Boiss.

californicum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 323. — Calif.

crassifolium, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 9. — Calif.

decipiens, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 162 = alpinum, Linn.

Godroni X, Rouy, l. c. 153, in obs. — Hybr. spont. guerlekense, Staff, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 15. — As. Min.

heterophyllum, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 168; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 9 (= Meconopsis heterophylla, Benth.). — Calif.
inexpertum X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 434. — Austria.

Lemmoni, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 168; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 9. — Calif.

Pollaki, Kern, ex Wien. Illust. Gartenzeit. (1888) 272. — Persia.

rhodopeum, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1893 (1894) n. 37, 5. — Bulg.

rhopalotheca, Staff, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 17. — As. Min.

rumelicum, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 39; et Fl. Bulg. (1891) 17. — Bulg.

Vesianii X, Rouy, in Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) — Hybr. spont. ?

Virchowii, Aschers. & Sint. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 23. — As. Min.

PAPAYA, Tourn. = **Carica**, Linn. (Passifl.).

candicans, erythrocarpa, glandulosa, gossypifolia, heterophylla, peltata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 253 = homonyma omnia Caricae.

aurantiaca, Kuntze, l. c. (= Vasconcellea aurantiaca, Regel). — N. Granat.

Bourgeauii, Kuntze, l. c. = C. Bourgeauii, Solms.

cestriflora, Kuntze, l. c. (= Vasconcellea cestriflora, A. DC.). — N. Granat.

chilensis, Kuntze, l. c. (= V. chilensis, Planch.). — Chili.

cubensis, Kuntze, l. c. = Carica cubensis, Solms.

cundinamarcensis, Kuntze, l. c. = C. candanamar-censis, Hook. f.

Goudotiana, Kuntze, l. c. (= Vasconcellea Goudotiana, Triana & Planch.). — N. Granat.

lanceolata, Kuntze, l. c. = Carica lanceolata, Benth & Hook. f.

Manihot, Kuntze, l. c. (= Vasconcellea Manihot, Triana & Planch.). — N. Granat.

paniculata, Kuntze, l. c. = C. paniculata Spruce.

parviflora, Kuntze, l. c. (= Vasconcellea parviflora, A. DC.). — Peruv.

platanifolia, Kuntze, l. c. = C. platanifolia, Solms.

pubescens, Kuntze, l. c. = C. pubescens, Lenné & C. Koch.

quercifolia, Kuntze, l. c. = C. quercifolia, Benth. & Hook. f.

Rocheffortii, Kuntze, l. c. = C. Rocheffortii, Solms.

PAPHINIA, Lindl. = **Lycaste**, Lindl. (Orchid.).

Lindeniana, Reichb. f. in Flora, lxx. (1887) 497; et in Lindenia, iii. (1887) 23 t. 106. — Venezuela.

PAPHIOPEDILUM, Pfitzer, Entwurf. Naturl.-anordn. Orchid. (1887) 95 = **Cypripedium**, Linn. (Orchid.).

barbatum, Pfitz. in Pringsh. Jahrb. Wiss. Bot. xix. (1888) 159 = C. barbatum, Lindl.

Boxallii, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 84 = C. Boxallii, Reichb. f.

caudatum, Pfitz. in Pringsh. Jahrb. Wiss. Bot. xix. (1888) 164 = Selenipedium caudatum, Reichb. f.

concolor, Pfitz. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 84 = C. concolor, Batem.

insigne, Pfitz. in Pringsh. Jahrb. Wiss. Bot. xix. (1888) 159 = C. insigne, Wall.

javanicum, Pfitz. l. c. 165 = C. javanicum, Blume.

laevigatum, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 84 = C. philippinense, Reichb. f.

Lawrenceanum, Pfitz. in Pringsh. Jahrb. Wiss. Bot. ii. 6 (1888) 164 = C. Lawrenceanum, Reichb. f.

longifolium, Pfitz. l. c. 159 = Selenipedium longifolium, Reichb. f.

Sedeni X, Pfitz. l. c. 144 = S. Sedeni x, Reichb. f.

Spicerianum, Pfitz. l. c. = C. Spicerianum, Reichb. f.

venustum, Pfitz. l. c. 165 = C. venustum, Wall.

PAPPEA, Eckl. & Zeyh. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 422.

Radlkoferi, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. bot. Genova (1893) 336. — Eritrea.

Schumanniana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 156. — Afr. austro-occ. extratrop.

PAPYRIUS, Lam. = **Broussonetia**, L'Hérit. (Urtic.).

Kaempferi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 629 = B. Kaempferi, Siebold.

Karinoki, Kuntze, l. c. = B. Kazinoki, Siebold.

papyrifera, Kuntze, l. c. = B. papyrifera, Vent.

PARABARLERIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 837; et Hist. des pl. x. (1891) 455, in obs. — **ACANTHACEAE**.

Boivini, Baill. ll. cc. — Afr. trop. or.

PARABIGNONIA, Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 229 = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).

Maximiliani, Bureau, l. c. = T. Maximiliani, Mart.

PARABOUCHETIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 662, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 34. **SOLANEAE**.

brasiliensis, Baill. ll. cc. — Bras.

PARACARYUM, Boiss. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 423.

Boissieri, Schweinf. ex Aschers. & Schweinf. in [Suppl. Illust. Fl. Egypte] Mém. Inst. égypt. ii. (1889) 768. — Egypt.

papillosum, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 105 (= Omphalodes papillosa, DC.). — Arabia.

velutinum, Post, Pl. Postianae, iv. (1892) 10, et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 26. — Syria.

PARACOLEA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 692; et Hist. des pl. x. (1887) 57, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 246. **BIGNONIACEAE**.

Boivini, Baill. l. c. 692. — Madag.

Grevei, Baill. ll. cc. 692; et 246. — Madag.

PARADISEA, Mazzuc. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 423.

minor, C. H. Wright, in Kew Bull. (1895) 118. — Yunnan.

PARAGONIA, Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 218 = **Tabebuia**, Gomez (Bignon.).

pyramidalis, Bureau, l. c. = T. pyramidalis, DC.

PARAHOPEA, Heim Rech. Diptéroc. (1892) 66 = **Shorea**, Roxb. (Diptéroc.).
Balangeran, Heim, l. c. (= Hopea Balangeran, Korth.). — Malaya.

PARALABATIA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 23; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 289 = **Pouteria**, Aubl. (Sapot.).

dictyoneura, Pierre, l. c. = P. dictyoneura, Radlk.

PARALSTONIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 750; et Hist. des pl. x. (1888) 185; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 139. **APOCYNEAE**.

clusiacea, Baill. ll. cc. — Ins. Philipp.

PARALYXIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 758; et Hist. des pl. x. (1888) 189; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 155. **APOCYNEAE**.

Schomburgkii, Baill. ll. cc. — Guian.

PARAMANSOA, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 27; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 223. **BIGNONIA-CEAE**.

Grossourdyana, Baill. ll. cc. — Venezuela.

PARAMERIA, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 423.

barbata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 162 = glandulifera, Wall.

densiflora, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1520. — Penang.

Pierrei, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 167 — Cambodia.

PARANEPHELIUM, Miq. (Sapnid.). — Ind. Kew. ii. 423.

muricatum, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21 (1895) sub t. 328 (= Delphy muricata, Pierre, l. c. t. 328 B). — Cochinch.

PARANOMUS, Salisb. & Knight = **Nivenia**, R. Br. (1810) (Proteac.).

capitatus, concavus, crithmifolius, Dregei, Lagopus, marginatus, medius, mollissimus, parvifolius, Sceptrum, spathulatus, spicatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 580 = homonyma omnia Niveniae.

candicans, Kuntze, l. c. = Serruria albicans, Roem. & Schult.

PARASCOPOLIA, Baill. Hist. des pl. ix (1888) 338; Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 38. **SOLANEAE**.

acapulcensis, Baill. ll. cc. — Mexic.

PARASHOREA, Kurz = **Shorea**, Roxb. (Diptéroc.).

plicata, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 104. — Ins. Philipp.

Warburgii, Brandis, l. c. 105. — Ins. Philipp.

PARASYSTASIA, Baill. Hist. des pl. x. (1891) 460; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 325. **ACANTHACEAE**.

somalensis, Baill. l. c. 461 (= Barleria somalensis, Franch.). — Reg. Somal.

PARATHESIS, Hook. f. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 424.

calophylla, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 205. — Guatem.

macrophylla, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 217 = Ardisia ferruginea, H. B. & K.

micranthera, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 4 et 205 [err. cal. micrantha] (= Ardisia micrantha, J. D. Smith, olim). — Guatem.

pleurobotryosa, J. D. Smith, l. c. xvi. (1891) 195. — Guatem.

sessilifolia, J. D. Smith, l. c. — Guatem.

PARATROPHIS, Blume (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 424.
anthropophagorum, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 296 (= *Trophis anthropophagorum*, Seem.). — Ins. Vitensis.
Smithii, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 148. — N. Zel.
tahitensis, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 296; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 193 (= *Uromorus tahitensis*, Bureau). — Ins. Pacif.

PARATROPIA, DC. = **Heptapleurum**, Gaertn. (Arab.).
Stelzneriana, Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 244. — Hab. ?

PARIETARIA, [Tourn.] Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 425.
macrophylla, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 165. — Mexic.
persica, *Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 4. — Persia.
thymifolia, *Stapf, l. c.* — As. occ.

PARINARI, Aubl. = **Parinarium**, Aubl. (Rosac.).
Chapelieri, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 12 = P. Chapelieri, Baill.

PARINARIUM, Aubl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 426.
Benna, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 78. — Sierra Leone.
Boivini, *Fritsch, in Annal. Natur. Hofmus. Wien*, v. (1890) 14. — Madag.
emirnense, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 469. — Madag.
gabunense, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 87. — Afr. trop.
guyanense, *Fritsch, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, v. (1890) 14. — Guian. bat.
Holstii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. Add.* (1895) 423. — Afr. trop. or.
Hostmanni, *Fritsch, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, v. (1890) 13. — Surin.
polystachyum, *Poepp. ex Fritsch, l. c.* 12, in syn. = *Couepia amazonica*, *Fritsch*.
salicifolium, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 54; et *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 191 = P. Holstii, *Engl.*

PARIS, [Ruepp.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 426.
chinensis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 97. — Tibet.
imperialis, *Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 362, in syn. = polyphylla, *Smith*.
japonica, *Franch. in Mém. Soc. Phil. Paris* (1889) 291. — Japon.
quadrifolius, *Himpel, Fl. Elsass-Lothr.* (1891) 273 = quadrifolia, *Linn.*
thibetica, *Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1887-88) 184. — Tibet.
yunnanensis, *Franch. in Mém. Soc. Phil. Paris* (1889) 290. — Yunnan.

PARITIUM, A. Juss. = **Hibiscus**, Linn. (Malvac.).
Paoui, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 668. — N. Caled.

PARKINSONIA, Plum. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 427.
florida, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 152 = florida, S. Wats.

PARNASSIA, [Tourn.] Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 427.
Bornmuelleri, *Frey, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 98. — Persia.
californica, *Greene, Pittonia*, ii. (June 1890) 102; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 123 = palustris, *Linn.*
Davidi, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 237. — China occ.

PARNASSIA: —
Faber, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1778. — China.
viridiflora, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 168. — China.

PARONYCHIA, [Tourn.] Linn. (Illecebr.). — Ind. Kew. ii. 427.
argyroloba, *Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 12. — As. Min.
caespitosa, *Stapf, l. c.* 22. — As. Min.
Hieronymi, *Pax, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 34. — Reg. Argent.
microphylla, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 26. — Am. austr. occ.
monandra, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1891) 115. — Calif.
orthoclada, *Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 103 = canariensis, *Juss.*
pusilla, *Greene, Pittonia*, i. (May 1889) 302; et *Fl. Francisc.* (1891) 131 = Herniaria cinerea, DC.
Rouyana, *Coincy, in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 65. — Hisp.
somalensis, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 226. — Reg. Somal.
subandina, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 233. — Chili.
Wilkinsoni, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 454. — Mexic.

PAROPSIA, Noronha, ex Thou. (Passifl.). — Ind. Kew. ii. 428.
Brazzaeana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 611. — Congo gall.
laevigata, *Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 27 (= *Smcathmannia laevigata*, Soland.). — Afr. trop.
pubescens, *Warb. l. c.* (= *S. pubescens*, Soland.). — Afr. trop.
reticulata, *Engl. Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 391; et xv. (1893) 586. — Angola.

PAROPSIOPSIS, *Engl. Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 391; et xv. (1893) 586; *Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 27. **PASSI-FLOREAE**.
africana, *Engl. ll. cc.* — Gabon.

PAROSELA, Cav. = **Dalea**, Linn. (Legumin.).
aurea, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 196 = Psoralea aurea, *Poir.*
Dalea, *Britton, l. c.* = Dalea alopecuroides, *Willd.*
domingensis, *Millsp. Field Columb. Mus. Bot.* Ser. I. (1895) 21 [Parosella] = Dalea domingensis, DC.
enneandra, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 196 = D. enneandra, *Nutt.*
Hallii, *Heller, in Contrib. Herb. Frankl.* i. (1895) 49 [Bot. Expl. S. Texas] = D. Hallii, A. Gray.
lanata, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 196 = D. lanata, *Spreng.*
nana, *Heller, in Contrib. Herb. Frankl.* i. (1895) 49 [Bot. Expl. S. Texas] = D. nana, Torr.
pogonathera, *Heller, l. c.* = D. pogonathera, A. Gray.

PARQUETINA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 806 [sphalm. 86]; et *Hist. des pl.* x. (1890) 295; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 218. **ASCLEPIADEAE**.
gabonica, *Baill. ll. cc.* (sphalm. D. gabonica). — Gabon.

PARRASIA, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 75 = **Greggia**, A. Gray (Crucif.).
camporum, *Greene, l. c.* = G. camporum, A. Gray.
linearifolia, *Greene, l. c.* = G. linearifolia, S. Wats.

PARRYA, R. Br. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 428.
arabidiflora, *Nichols, Dict. Gard.* iii. 25. — Sibiria.
Beketowi, *Krassn. in Script. bot. Hort. Univ. Petrop.* ii. 1 (1887-88) 12. — China.

PARRYA: —
ciliaris, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 20. — China occ.
eurycarpa, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 56. — China.
Menziesii, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 253 = Cheiranthus Menziesii, S. Wats.
nudicaulis, F. Kurtz, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 454 = Matthiola nudicaulis, *Trautv.*
prolifera, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 56. — China.
siliquosa, *Krassn. in Script. bot. Hort. Univ. Petrop.* ii. 1 (1887-88) 12. — China.
villosa, *Maxim. Fl. Tangut* (1889) 55. — China.

PARSONSIA, P. Br. = **Cuphea**, P. Br. (Lythrar.).
micropetala, *Hitchcock, in Missouri Bot. Gard.* Rep. iv. (1893) 87 = C. platycentra, *Benth.*
petiolata, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 231 = C. petiolata, *Koehne*.
radicans, *Hitchcock, in Missouri Bot. Gard.* Rep. iv. (1892) 87 = C. Parsonsia, R. Br.

PARSONSIA, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 428.
affinis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 766. — N. Caled.
angustifolia, *Baill. l. c.* — N. Caled.
Balansae, *Baill. l. c.* 765 et 767. — N. Caled.
brachycarpa, *Baill. l. c.* 766. — N. Caled.
carnea, *Panch. ex Baill. l. c.* — N. Caled.
catalpaecarpa, *Baill. l. c.* 768. — N. Caled.
curvisepala, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 215. — N. Guin.
crebriflora, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 767. — N. Caled.
esculenta, *Panch. ex Baill. l. c.* 767. — N. Caled.
flexilis, *Baill. l. c.* 766. — N. Caled.
flexuosa, *Baill. l. c.* 765. — N. Caled.
lifuaana, *Baill. l. c.* 767. — N. Caled.
linearis, *Baill. l. c.* 766. — N. Caled.
Galeottiana, *Baill. l. c.* ii. (1890) 813 = Thenardia Galeottiana, *Baill.*
javanica, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 184 = spiralis, *Wall.*
macrocarpa, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 767. — N. Caled.
populifolia, *Baill. l. c.* — N. Caled.
pubercula, *Baill. l. c.* 765. — N. Caled.
ochracea, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 480. — N. Zel.
reflexa, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 765. — N. Caled.
rigida, *Baill. l. c.* 766. — N. Caled.
Vieillardii, *Baill. l. c.* 768. — N. Caled.

PARTHENIUM, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 428.
repens, *Eggert, Catal. pl. St Louis* (1891) 16. — Am. bor.

PARTHENOCISSUS, *Planch. in DC. Monog. Phan.* v. (1887) 447 = **Vitis**, [Tourn.] Linn. (Ampelid.).
anamallayana, *Planch. l. c.* 452 = V. anamallayana, *Bedd.*
cuspidifera, *Planch. l. c.* 451 = V. cuspidifera, *Miq.*
himalayana, *Planch. l. c.* 450 = V. himalayana, *Brandis.*
neilgherriensis, *Planch. l. c.* 450 = V. neilgherriensis, *Wight.*
quinquefolia, *Planch. l. c.* 448 = V. hederacea, *Ehrh.*
semicordata, *Planch. l. c.* 451 = V. semicordata, *Wall.*
Thomsoni, *Planch. l. c.* 453 = V. Thomsoni, *M. Laws.*
tricuspidata, *Planch. l. c.* 452 = V. inconstans, *Miq.*
vitacea, A. S. Hitchcock, *Spring. Fl. Manhattan* (1894) 26. — Am. bor.

PARVATIA, Decne (Berberid.). — Ind. Kew. ii. 429.
chinensis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 281. — China.

PASACCARDOA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 354 = **Phyllactinia**, Benth. (Compos.).
Grantii, Kuntze, l. c. = *P. Grantii*, Benth.

PASANIA, Oerst. = **Quercus**, Tourn. (Cupulif.).
Beccariana, Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1 (1888) 55 = *Q. Beccariana*, Benth.

javanensis, Prantl, l. c. = *Q. javensis*, Mig.
Reinwardtii, Prantl, l. c. = *Q. Reinwardtii*, Korth.
Teysmannii, Prantl, l. c. = *Q. Teysmannii*, Blume.

PASCHIRA, G. Kuntze, in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 201 = **Pachira**, Aubl. (Malv.).

PASPALUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew, ii. 429.

anemotum, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 68. — Ins. Fernando Noronha.

Arechavaletae, Hack. ex Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 86. — Urug.

Buckleyanum, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 167; et ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 498. — Texas.

Chaffanjonii, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 159 fig. 5. — Am. austr. trop.

conjugatum, C. Cordem. ex J. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 114. — Ins. Bourbon.

culiacanum, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 281. — Mexic.

dentatosulcatum, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 88. — Urug.

Drummondii, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 18 (= *Dimorphostachys Drummondii*, Fourn.). — Florida, Texas.

Elliotii, S. Wats. in A. Gray, Man. N. Am. Bot. ed. 6 (1890) 629 = *paspaloides*, Scribn.

enode, Hack. ex Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 87. — Urug.

Galmarra, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. ix. (1894) 12. — Austral.

giganteum, Baldw. ex Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 166; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 20. — Florida.

giganteum, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 70. — Urug.

gneoarum, Arechav. l. c. 56. — Urug.

Hackelianum, Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 4, nomen. — Ecuad.

ibarrense, Sodiro, l. c. — Ecuad.

inops, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 281. — Mexic.

intermedium, Munro, ex Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 258. — Parag.

lamprocaryon, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 100. — Afr. trop. or.

Larranagai, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 68 t. 2. — Urug.

monostachys, Vasey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 498, sphalm. = seq.

monostachyum, Vasey, l. c. iii. (1892) 17, et ii. (1894) 498. — Am. bor.

paspaloides, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 29 (= *Digitaria paspaloides*, Michx) = *P. Waltherianum*, Schlecht.

paucispicatum, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 281. — Mexic.

phonoliticum, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 68 t. 4. — Ins. Fernando Noronha.

Pittieri, Hack. ex Tondus, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 464, nomen. — Costa Rica.

polystachyum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 786 = *saccharoides*, Nees.

proliferum, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 72. — Urug.

pubescens, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 69. — Galmarra.

saltense, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 59. — Urug.

simplex, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 259. — Parag.

Sodiroanum, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 3, nomen. — Ecuad.

subpinum, Sieb. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 737, in syn. = *heteropodium*, End.

PASPALUM : —

uruguayense, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 60 t. 1. — Urug.

PASSERINA, Linn. (Thymel.). — Ind. Kew, ii. 433.
segobricensis, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 25. — Hisp.

PASSIFLORA, Linn. (Passifl.). — Ind. Kew, ii. 439.

allantophylla, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 7. — Guatem.

amolocarpa, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 964] in Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 25 t. 12. — Bras. bor.

ampullacea, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 91 = *Tacsonia ampullacea*, Mast.

Barbosae, Barb. Rodr. Vellozia 1885-88, Sec. edic. (1891) 27 t. 13a; et Hort. Flumin. 1893 (1895) 184. — Bras. bor.

Barclayi, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 175 (= *Disemma Barclayi*, Seem.). — Ins. Vitiens.

Brighami, S. Wats. ex W. T. Brigham, Guatem. (1887) 428, nomen; et in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 473. — Mexic.

cabedelensis, Barb. Rodr. Vellozia 1885-88, Sec. edic. (1891) 30. — Bras. bor.

choconiana, S. Wats. ex W. T. Brigham, Guatem. (1887) 428, nomen; et in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 474. — Guatem.

cisnana, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 5. — Ecuad.

clypeophylla, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 7. — Guatem.

cumbalensis, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 13 (= *Tacsonia cumbalensis*, Karst.). — Ecuad.

cupiformis, Mast. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1768. — China.

cuspidifolia, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 72; et in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 3. — N. Granat.

Decaisneana ×, Nichols. Dict. Gard. iii. 30. — Hybr. artef.

diethophylla, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 8. — Guatem.

Eggersii, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 7. — Guatem.

Engleriana, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 72; et in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 2. — N. Granat.

esclavensis, Ramirez, in Informe Excurs. Ajusto, (1894) 35. — Mexico.

fimbristipula, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 11. — Am. trop.

gigantifolia, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 88; et in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 1. — Ecuad.

gracilens, Harms, l. c. = *Tacsonia gracilens*, A. Gray.

guatemalensis, S. Wats. ex W. T. Brigham, Guatem. (1887) 428; et in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 473. — Guatem.

hexagonocarpa, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 304] in Vellozia 1885-88, Sec. edic. (1891) 24 t. 9. — Bras. bor.

Hieronymii, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 12. — Ecuad.

Hollrungii, K. Schum. l. c. ix. (1888) 211; et xv. (1893) 81. — N. Guin.

hydrophila, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 195] in Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 26 t. 13. — Bras.

involutellata, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 6. — Ecuad.

iodocarpa, Barb. Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, i. (1891) 3 t. 2; et Hort. Flumin. 1893 (1895) 184. — Bras.

Jenmani, Mast. in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 2270. — Guian. brit.

keuensis ×, Hort. ex Le Jardin (1888) 201; et Gard. and For. (1888) 293. — Hybr. artef.

Mastersiana, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 89; et in Bot. Jahrb. xvii. Beibl. n. 46 (1894) 8. — Ecuad.

PASSIFLORA : —

muralis, Barb. Rodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 29 t. 13b. — Bras. bor.

nephrodes, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 282. — Bolivia.

ornitheura, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 8. — Guatem.

Palmeri, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 131, t. 14. — Ins. Carmen.

perpera, Mast. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) sub t. 1768. — Khasia.

picroderma, Barb. Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, i. (1891) t. 1; et Hort. Flumin. 1893 (1895) 185. — Bras.

porphyretica, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 538, t. 36. — Guatem.

praeacuta, Mast. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 220. — Columb.

Pringlei, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 151. — Mexic.

prolata, Mast. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 219. — Guatem.

retipetala, Mast. in Kew Bull. (1893) 12. — Guian. angl.

rhodantha, Harms, ex Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 324. — Ecuad.

Rusbyi, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1890) 282. — Bolivia.

salmonea, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 11. — N. Granat.

securicrata, Mast. in Kew Bull. (1893) 12. — Guian. brit.

tolimana, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 9. — Am. austr.

transversa, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 7. — Guatem.

trinifolia, Mast. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 217. — Guatem.

trisulca, Mast. l. c. 218. — Columb.

tryphostemmatoides, Harms, l. c. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 6. — Am. trop.

umbilicata, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 91 = *Tacsonia umbilicata*, Griseb.

Watsoniana, Mast. in Gard. Chron. (1886) ii. 648, fig. 127; in the Garden (1888) 195; *Rodigas*, in Illustr. Hort. xxxvi. (1889) 9, t. 524. — Bras.

PASTINACA, Linn. = **Peucedanum**, Tourn. (Umbellif.).

corsica, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 260. — Corsica.

dentata, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 103. — As. Min.

grisea, Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denksch. Akad. Wien, ii. (1886) 52. — As. Min.

Polakii, Stapf & Wettst. l. c. — As. Min.

Trysia, Stapf & Wettst. l. c. 27. — As. Min.

vaginans, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 380. — Bulg.

PATAGONIA miraflorensis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 21 = *Adesmia miraflorensis*, Remy.

PATAGONICA, Linn. = **Patagonula**, Linn. (Borag.).

americana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 439 = *P. americana*, Linn.

bahiensis, Kuntze, l. c. = *P. bahiensis*, Moric.

Glaziovii, Mez, ex Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 17. — Bras.

PATAGONIUM, Schrank = **Adesmia**, DC. (Legumin.).

Aegiceras, angustifolium, aphyllum, apricum, arachni-

pes, araucanum, arboreum, argenteum, argyrophyllum, arvense, asperum, atacamense, axillare, balsamicum, bicolor, brachycarpum, bracteatum, calocarpum, canescens, capricornum, chillanense, ciliatum, cinereum, Closii, corymbosum, cuneatum, curvifolium, Davillae, decumbens, dentatum, denticulatum, denudatum, deserticolum, dichotomum, Echinus, elatum, elegans, elongatum, emarginatum, eremophilum, erinaceum, exile, filicaule, filifolium, frigidum, Gayanum, Germainii, Gilesii, glandulosum, glaucum, glaucescens,

PATAGONIUM: —

glomerulum, *glutinosum*, *gracile*, *graveolens*, *hirsutum*, *hispidulum*, *horridum*, *humifusum*, *humile*, *Hystrix*, *incanum*, *inconspicuum*, *Kingii*, *lanatum*, *latifolium*, *laxum*, *leiocarpum*, *leptacanthum*, *longipes*, *longiscum*, *Loudonii*, *macrostachyum*, *Meyenianum*, *micranthum*, *microphyllum*, *montanum*, *mucronatum*, *multicuspis*, *muricatum*, *obcordatum*, *obovatum*, *obscurum*, *odontophyllum*, *oligophyllum*, *oresigenum*, *oxalidophyllum*, *papposum*, *parviflorum*, *parvifolium*, *parvulum*, *pauciflorum*, *Pearcei*, *pedicellatum*, *pinifolium*, *propinquum*, *prostratum*, *psilocarpum*, *pulchrum*, *pumilum*, *punctatum*, *pungens*, *quadriflorum*, *radicans*, *radicifolium*, *ramosissimum*, *retrofractum*, *retusum*, *Schneideri*, *sericeum*, *sessiliflorum*, *Simonsii*, *Smithiae*, *spinosisissimum*, *stipulaceum*, *subterraneum*, *trijugum*, *triste*, *ulicinum*, *uspallatense*, *Valdesia*, *vesicarium*, *viscosum*, *Volkmannii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 200-01 = *homonyma omnia* Adesmaeae. *boronioides*, Kuntze, l. c. = *A. boronioides*, Hook. f. *coronilloides*, Kuntze, l. c. = *A. coronilloides*, Gill. *dendroides*, Kuntze, l. c. = *A. dendroidea*, Phil. *genistoides*, Kuntze, l. c. = *A. genistoides*, Presl. *glabriusculum*, Kuntze, l. c. 200 = *A. glabriuscula*, Vog. *grandifolium*, Kuntze, l. c. = *A. grandiflora*, Gill. *Landsbeckii*, Kuntze, l. c. = *A. Landsbeckii*, Phil. *lotoides*, Kuntze, l. c. = *A. lotoides*, Hook. f. *monospermum*, Kuntze, l. c. = *A. monosperma*, Clos. *Ononidis*, Kuntze, l. c. = *A. Ononidis*, Griseb. *phyllodeum*, Kuntze, l. c. = *A. phylloidea*, Clos. *trifoliatum*, Kuntze, l. c. 201 = *A. trifoliata*, Phil. *viscidum*, Kuntze, l. c. = *A. mucronata*, Hook. & Arn.

PATERSONIA, R. Br. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 438.

borneensis Staff. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 242. t. 20 A. 1-6. — Borneo.
Lowii Staff. l. c. 241, t. 20 B, fig. 7-9. — Borneo.

PATOSIA, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 63. **FUNCEAE**.
clandestina, Buchenau, l. c. 44 (= *Rostkovia clandestina*, Phil.). — Chili.**PATRINIA**, Juss. (Valerian.). — Ind. Kew. ii. 438.

angustifolia, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 396. — China.
saniculaefolia, Hemsl. l. c. 397. — China.

PATRISIA, Rich. = **Ryania**, Vahl (Bixin.).

acuminata, *canescens*, *Mansoana*, *Riedeliana*, *Sagotiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 45 = *homonyma omnia* Ryaniae.
chocoensis, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 50 = *R. chocoensis*, Planch. & Triana.

PATTALIAS, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 60; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 255. **ASCLEPIADEAE**.

angustifolius, K. Schum. l. c. (= *Melinis angustifolia*, A. Gray). — Arizona.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 60. — Mexic.

PAULLINIA, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 438.

boliviana, Radlk. ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iv. (1895) 206. — Bolivia.
hymenobraceata, Radlk. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 282. — Guatem.
pseudota, Radlk. ex Wurm. in Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. (1890) 242 (Symb. Fl. Bras. centr. xxxvii). — Bras.
scarlatina, Radlk. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 193. — Guatem.
sonorensis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 45. — Mexic.
tortuosa, T. S. Brandeg. in Zoë, ii. (1891) 74; et in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 123 = *Cardiospermum tortuosum*, Benth.

PAULOMAGNUSIA, Kuntze. Rev. Gen. (1891) 702 = **Micranthus**, Eckl. (Irid.).

alopecuroides, Kuntze, l. c. = *M. alopecuroides*, Eckl.
spicata, Kuntze, l. c. = *Watsonia punctata*, Ker-Gawl.

PAULO-WILHELMIA, Hochst. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 440.

glabra, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 115. — Kamerun.
sclerochiton, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 105; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 30 (= *Ruellia sclerochiton*, S. Moore). — Afr. trop.
togoensis, Lindau, l. c. 105. — Afr. trop.

PAULOWNIA, Sieb. & Zucc. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 440.

Fortunei, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 180; et in Gard. Chron. (1899) i. 448. — China.
grandifolia, Hort. ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 67, in obs. = *imperialis*, Sieb. & Zucc.
tomentosa, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 434 = *imperialis*, Sieb. & Zucc.

PAURIDIA, Haw. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 440.

minuta, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 142 = *hypoxidioides*, Haw.

PAVETTA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 440.

blepharosepala, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 388. — Afr. trop. or.
borbonica, Hort. ex Cordem. Fl. Ile Réunion. (1895) 507 = *Ixora borbonica*, Cordem.
corynostylis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 388. — Afr. trop. or.
crassipes, K. Schum. l. c. 389. — Afr. trop. or.
disarticulata, Galpin, in Kew Bull. (1895) 145. — Transvaal.
Holstii, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 45; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 389. — Afr. trop. or.
humilis, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 136, nomen. — Malacca.
involutrata, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 45 et 51, nomen; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 94. — Afr. trop.
kerenensis, Becc. ex Martelli, Fl. Bogos. (1886) 43. — Abyss.
Klotzschiana, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 388. — Afr. trop. or.
limbata, Staff. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 179. — Borneo.
olivaceo-nigra, K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 51; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 388. — Afr. trop. or.
refractifolia, K. Schum. l. c. 388. — Afr. trop. or.
Schumanniana, F. Hoffm. ex K. Schum. l. c. 389. — Afr. trop. or.
sepium, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.
stenosepala, K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26; et l. c. 388. — Afr. trop. or.
teitana, K. Schum. l. c. 389. — Afr. trop. or.
trichanta, Baker, in Kew Bull. (1893) 148. — Ins. Aldabra.

PAVIA, Boerh. ex Mill. = **Aesculus**, Linn. (Sapind.).

coriacea, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 403 = *A. Pavia*, Linn.
pendula, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 85 = *A. Pavia*, Linn.
pubescens, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 403 = *A. Pavia*, Linn.
pumila, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 85 = *A. Pavia*, Linn.
rubicunda, «Lodd.» ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 398 = *A. carnea*, Hayne.

PAVIEASIA, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) sub t. 317 in text. **SAPINDACEAE**.

anamensis, Pierre, l. c. (= *Sapindus anamensis*, Pierre). — Tonk.

PAVONIA, Cass. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 441.

argentina, Guérke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 508. — Reg. Argent.
Aschersoniana, Guérke, l. c. 518. — Bras.
bahamensis, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 63. — Ins. Baham.
bahiensis, Guérke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 525. — Bras.
Balansae, Guérke, l. c. 507. — Parag.
calyculina, Frapp. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 327 = *Sida calycina*, Cav.
cordifolia, Hieron, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 45 (1895) = *Pavonia Kunthii*, Guérke.
cristata, Schinz, ex Guérke, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 407. — Reg. Somal.
Engleriana, Guérke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 497. — Bras.
erythrolema, Guérke, l. c. 523. — Bras.
fraterna, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 328. — Ins. Borbon.
Garcleana, Guérke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 496. — Bras.
Glazioviana, Guérke, l. c. 524. — Bras.
Hieronymi, Guérke, l. c. — Reg. Argent.
kilimandscharica, Guérke, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 40. — Afr. trop. or.
Kunthii, Guérke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 510. — Bras., N. Granat.
longipedunculata, Guérke, l. c. 425. — Bras.
macrostylis, Guérke, l. c. 521. — Bras.
malacophylla, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xvi. (1889) 154 (= *Lopimia malacophylla*, Nees & Mart.). — Am. austr.
melanommata, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 104. — Mexic.
Morongii, S. Moore, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 58. — Parag.
peruviana, Guérke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 487. — Peruvia.
Pohlui, Guérke, l. c. 517. — Bras.
Rehmannii, Szyszyl. Polypet. Rehmann. (1887) 37 = *clathrata*, Mast.
Riedelii, Guérke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 493. — Bras.
Schumanniana, Guérke, ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 174. — Afr. austro-occ. extra-trop.
Selloi, Guérke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 530. — Bras.
semiserrata, Guérke, l. c. 527 (= *Lebretonia semiserrata*, DC.). — Bras.
spinistipula, Guérke, l. c. 513. — Bras.
Urbaniana, Guérke, l. c. 501. — Urug.
Warmingiana, Guérke, l. c. 488. — Bras.

PAVONIA, Ruiz = **Laurelia**, Juss. (Monim.).

Novozelandiae, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 568 = *L. Novae-Zelandiae*, A. Cunn.
sempervirens, Kuntze, l. c. = *L. aromatica*, Juss.
columbiana, Kuntze, l. c. (= *Billia columbiana*, Planch. & Triana). — N. Granat.
octandra, Kuntze, l. c. = *A. Pavia*, Linn.
pallida, Kuntze, l. c. = *A. glabra*, Willd.

PAXIA, Gilg, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 320; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1891) 70. **CONNARACEAE**.

scandens, Gilg, l. c. 320; et 70. — Gabon.

PAXIODENDRON, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 182. **LAURINEAE**.

usambarense, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

PAYENA, A. DC. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 443.

Beccarii, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 508. — Borneo.
parvifolia, Engl. l. c. — Borneo.

PAYPAYROLA, Aubl. (Violar.). — Ind. Kew. ii. 443.

Glazioviana, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 2. — Bras.

PAWIA, (Pavia) Linn. = **Aesculus**, Linn. (Sapind.).

californica, *chinensis*, *dissimilis*, *glabra*, *Hippocastanum*, *indica*, *mexicana*, *octandra*, *pallida*, *Parryi*, *parviflora*, *punduana*, *rubicunda*, *turbinata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 146 = *homonyma omnia* Aesculi.

PECHUELIA, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 270 = **Selago**, Linn. (Selagin.).

alopecuroides, Kuntze, l. c. = *S. alopecuroides*, Rolfe.

PECHUEL-LOESCHKEA, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 274; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 177. **COMPOSITAE**.

Leubnitziae, O. Hoffm. ll. cc. — Afr. austro-occ. extratrop.

PECKIA, Vell. = **Cybianthus**, Mart. (Myrsin.). *angustifolia*, Boissieri, *coriacea*, *cuspidata*, *densicoma*, *densiflora*, *detergens*, *fusca*, *glabra*, *longifolia*, *macrophylla*, *meridensis*, *microbotrys*, *nitida*, *obovata*, *penduliflora*, *peruviana*, *Prieurii*, *subspicata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 402 = *homonyma omnia* Cybianthi.

cybianthodes, Kuntze, l. c. = *C. philippinensis*, Hook. f.

guyanensis, Kuntze, l. c. = *C. guyanensis*, Miq.

surinamensis, Kuntze, l. c. = *C. myrianthos*, Miq.

PECTINARIA, Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 26. **GRAMINEAE**.

PECTIS, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 443. *aquatica*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 279. — Mexic.

Bennettii, Klatt, in Leopoldina, Heft xxv. (1889) 108. — Prom. S. Lucae.

bracteata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 155. — Mexic.

caespitosa, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 46. — Columb.

graveolens, Klatt, l. c. — Columb.

Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 58. — Mexic.

stenophylla, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 393. — Mexic.

PEDDIEA, Harv. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 444.

Fischeri, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 310; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 226. — Afr. centr. or.

involuta, Baill. [an Baker?] Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 319. — Madag.

longiflora, Engl. & Gilg. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 257. — Afr. trop. occ.

longipedicellata, Gilg, l. c. 256. — Afr. trop.

Volkensii, Gilg, l. c. xix. Beibl. n. 47 (1894) 41. — Afr. trop. or.

Zenkeri, Gilg, l. c. xix. (1894) 256. — Afr. trop. occ.

PEDICELLARIA, Schrank = **Gynandropsis**, DC. (Capparid.).

Lehmannii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 20. — Columb.

triphylla, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 224 = *Cleome serrata*, Jacq.

PEDICELLIA, Lour. = **Ratonia**, DC. ? (Sapind.).

grandis, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21 (1895) t. 324a. — Cochinch.

Lourei, Pierre, l. c. t. 323a. — Cochinch.

pentopetala, Pierre, l. c. sub t. 314, in obs. = *Cupania pentapetala*, Wight & Arn.

sundaica, Pierre, l. c. t. 323b = *C. Lessertiana*, Cambess.

PEDICULARIS, [Tourn.] Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 444.

affinis X. Steininger, in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 156. — Helv.

PEDICULARIS : —

albiflora, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 273; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 156, t. 17 C. D. — Reg. Himal.

Alopecuros, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 548. — Yunnan.

anas, Maxim. l. c. 578. — China.

apodochila, Maxim. l. c. 611. — Yunnan.

atrovirens X. Naegeli, ex Steininger, in Bot. Centralbl. xxx. (1887) 26. — Helv., Tirol.

axillaris, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 555. — Yunnan.

batangensis, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 106. — China occ.

Baumgarteni, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 182; et Enum. Fl. Transsilv. (1886) 431. — Transsilv.

bidentata, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 533. — China.

binaria, Maxim. l. c. 579. — Szechuen.

birostris, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 107. — China occ.

Bohatschini X. Steininger, in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 155. — Tirol.

Borodowskii, Palibin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 134. — Mongol.

bosniaca, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 139 = *leucodon*, Griseb.

carpatica, Andrae, in Oest. Bot. Zeitschr. (1893) 109. — Reg. Carpath.

cephalanthia, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 540. — Yunnan.

chumbica, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 259; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 144, t. 22 B. — Reg. Himal.

collata, Prain, ll. cc. 266; et 177, t. 31 C. — Reg. Himal.

Collettii, Prain, l. c. 278; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 154, t. 15 A. — Burma.

comptoniaefolia, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 586; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 166, t. 15 B. — Burma, Yunnan.

confertiflora, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 258; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 142, t. 27 A-D. — Reg. Himal.

conifera, Maxim. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 206. — China.

corymbosa, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 277; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 152, t. 14 B. — Burma.

craspedotricha, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 540. — China.

crenata, Maxim. l. c. 559. — Yunnan.

cristata, Maxim. l. c. 547. — China.

Daltoni, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 270; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 121, t. 6 A. B. — Reg. Himal.

Davidi, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 67. — Tibet.

debilis, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 549. — Yunnan.

Delavayi, Franch. ex Maxim. l. c. 531. — Yunnan.

delphinata X. Steininger, in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 216. — Gall. or.

deltoidea, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 604. — Yunnan.

densispica, Franch. ex Maxim. l. c. 594. — Yunnan.

diffusa, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 7, t. 1. — Reg. Himal.

eburnata, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 114. — Mexic.

erubescens X. Steininger, in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 155. — Tirol.

fallax, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 139 = *leucodon*, Griseb.

filicifolia, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 208. — China.

Filicula, Franch. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 573. — Yunnan.

flaccida, Prain, in Kew Bull. (1893) 157; et in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 8, t. 2. — China.

fragilis, Prain, ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 582; et in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 263; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 178, t. 31 A. — Reg. Assam.

Franchetiana, Maxim. l. c. 553. — China.

PEDICULARIS : —

Gammieana, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 260; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 162, t. 22 C. — Reg. Himal.

Garckeana, Prain, ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 582; et in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 267; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 122, t. 5 A. — Reg. Himal.

gibbera, Prain, ll. cc. 262; et 174, t. 29 B. — Reg. Himal.

goniantha, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 128. — China occ.

Grisebachii, Wettst. in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xxvi. (1892) 78. — Albania.

gruina, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 536; Prain, in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 149, t. 10 A. — Yunnan.

gyrorhyncha, Franch. ex Maxim. l. c. 545. — China.

Hemsleyana, Prain, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2210. — China.

Henryi, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 560. — China.

Heydei, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 258; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 140, t. 27 E. — Reg. Himal.

hirtella, Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 209. — Yunnan.

incarnaloides X. Steininger, in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 157. — Eur.

ingens, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 565. — China.

instar, Prain, ex Maxim. l. c.; et in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 257; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 135, t. 26 D, E. — Reg. Himal.

Jankae, Steininger, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 189. — Hung.

jurana, Steininger, in Bull. Soc. sci. nat. Neuchâtel, xix. (1891) 149. — Helv.

Kingii, Prain, in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 602; et in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 264; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 179, t. 28 A. — Reg. Himal.

leiandra, Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 211. — China.

likiangensis, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 597. — Yunnan.

lineata, Franch. l. c. — Yunnan.

longicaulis, Franch. l. c. 577. — Yunnan.

longipes, Maxim. l. c. 554. — China.

longipetiolata, Franch. l. c. 541. — Yunnan.

lutescens, Franch. l. c. 605. — Yunnan.

lyrata, Prain, ex Maxim. l. c. 606; et in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 264; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 165, t. 31 B. — Reg. Himal.

macilentia, Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 212. — China.

macrosiphon, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. 1887 (1888) 66. — Tibet.

Maximowiczii, Krasn. in Script. bot. Hort. Univ. Petrop. ii. I. (1887-88) 18. — China.

melampyriflora, Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 212. — Yunnan.

melampyrifolia, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 603, sphalm. = *praec.*

microchila, Franch. l. c. 595. — Yunnan.

microphyton, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 107. — China occ.

moupinensis, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. 1889 (1888) 67. — China.

nepalensis, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 268; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 124, t. 6 E. — Reg. Himal.

nipponica, Makino, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 72. — Japon.

ochroleuca, Duthie, ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 530 = *macrantha*, Klotzsch.

odontophora, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 275; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 155, t. 10 D. — Reg. Himal.

oligantha, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 530. — Yunnan.

Oliveriana, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 257; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 135, t. 22 H. — Reg. Himal.

PEDICULARIS : —

- ophiocephala, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 530, *Prain, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 172, t. 33 A. — Reg. Himal.
- orbicella, *Frank, ex Panic. Nov. elem. Fl. Princ. Bulg.* (1886) 34. — Bulg.
- oxycarpa, *Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxiii. (1888) 530. — China.
- Pantlingii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) II. 273; *et in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 148, t. 16 B. — Reg. Himal.
- Penzigi, *Steininger, in Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 186. — Afr. centr.
- plicata, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 598. — China.
- polyphylla, *Franch. ex Maxim. l. c.* 543. — Yunnan.
- Potani, *Maxim. l. c.* 570. — China.
- Prainiana, *Maxim. l. c.* 567; *Prain, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 162, t. 11 B. — Reg. Himal.
- princeps, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 129. — China occ.
- Provoti, *Franch. l. c.* iv. (1889) 318. — China bor.
- Pseudo-asplenifolia*, *Steininger, in Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 157. — Helv.
- pygmaea, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 595. — Tibet.
- recurva, *Maxim. l. c.* 563. — China.
- Regeliana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) II. 274; *et in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 169 t. 10 C. — Reg. Himal.
- rhynchodonta, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 108; *Prain, in Hook. Icon. pl.* xxii. (1892) t. 2209. — China.
- rex, *C. B. Clarke, ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 589; *et in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 167 t. 30 A. — Himal., Yunnan.
- rigida, *Franch. ex Maxim. l. c.* 587. — Yunnan.
- rhodotricha, *Maxim. l. c.* 566. — China.
- rupicola, *Franch. l. c.* 599. — Yunnan.
- salviaeflora, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 215. — China.
- scardica, *G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien,* ii. (1887) 138 t. 3 fig. 1 = *P. Friederici-Augusti, Tomm.*
- schizocalyx, *Steininger, in Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 249 = *comosa, Linn.*
- Scullyana, *Prain, ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 529; *in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 268, *et in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 127 t. 9 A-C. — Reg. Himal.
- semitorta, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 566. — China.
- sigmoidea, *Franch. l. c.* 535. — Yunnan.
- stenantha, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,* Sér. VIII. iii. (1891) 149. — Tibet.
- strobilacea, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 216. — China.
- superba, *Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 588. — Yunnan.
- szetschuanica, *Maxim. l. c.* 601. — China.
- Tartarinowii, « *Maxim.* » ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 217, sphalm. = *P. Tartarinowii, Maxim.*
- tasiensis, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 108. — China occ.
- Tenoreana, *Huter, Porta & Rigo, ex Steininger, in Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 314, in syn. = *petiolaris, Ten.*
- tenuicaulis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) II. 259; *et in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 144, t. 18 C-E. — Reg. Himal.
- tenuisecta, *Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 538. — Yunnan.
- torta, *Maxim. l. c.* 538. — China.
- tsangchanensis, *Franch. l. c.* 71. — Yunnan.
- vagans, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 218; *et in Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1928. — China.
- verbenaeifolia, *Franch. l. c.* 549. — Yunnan.
- Viali, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 219. — China.
- villosula, *Franch. ex Hemsl. l. c.* 220. — China.
- Wolfii, *M. Besse, ex Wolf, in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. Heft ii.* (1892) 37. — Helv.
- yunnanensis, *Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 572. — Yunnan.

PEDILANTHUS, Neck. (Euphorb.) — Ind. Kew. ii. 447.

- lycioides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 516. — Madag.
- macradenioides, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 263. — Guatem.
- pectinatus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 344. — Madag.
- Pringlei, *Robinson, in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 322. — Mexic.
- tomentellus, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. I. (1895) 164. — Mexic.

PEIRESKIA, Steud. = **Pereskia**, Plum. (Cact.).

calandrinifolia, Hort. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 206 = *P. calandrinaefolia*, Hort. Ber.

cruenta, Hort. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II. (1890) 312 = *P. Bleo, DC.*

lanceolata, Hort. Berol. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 206 = *P. lanceolata*, Herb. Berol.

spathulata, Hort. Berol. l. c. = *P. spathulata*, Otto.

PELAPHOIDES rotundiflora, Banks & Soland. (Mss.). ex Cheesem. in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 237 = *Coprosma spatulata*, A. Cunn.

PELARGONIUM, L'Hérit. (Geran.) — Ind. Kew. ii. 448.

- Barklyi, *S. Elliot, in Journ. Bot.* xxix. (1891) 68. — Afr. austro-occ. extratrop.
- dispar, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 144. — Natal.
- Fischeri, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 II. (1892) 276. — Afr. trop.
- gramineum, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 158. — Afr. austr.
- leptopodium, *Bolus, l. c.* 157. — Afr. austr.
- MacOwanii, *Bolus, l. c.* — Afr. austr.
- madagascariense, *Baker, l. c.* xxii. (1887) 454. — Madag.
- mosambicense, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 225. — Afr. trop. or.
- Rehmannii, *Szyszył, Polypet. Rehmanni.* (1888) 9. — Transvaal.
- saxifragoides, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1890) II. 154. — Hab.?
- Tysonii, *Szyszył, Polypet. Rehmanni.* (1888) 8 (= *Geranium ciliatum*, Cav.). — Afr. austr.
- usambarense, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61; *et Pflanzenw. Ost. Afr.* C (1895) 225. — Afr. trop. or.

PELEA, A. Gray = **Melicope**, Forst. (Rutac.).

- barbigera*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 70 = *M. barbigera*, A. Gray.
- cinerea*, Hillebr. l. c. = *M. cinerea*, A. Gray.
- elliptica*, Hillebr. l. c. 69 = *M. elliptica*, A. Gray.
- Knudsenii*, Hillebr. l. c. 70. — Ins. Sandvic.
- Lydgatei*, Hillebr. l. c. 65. — Ins. Sandvic.
- macropus*, Hillebr. l. c. 65. — Ins. Sandvic.
- Mannii*, Hillebr. l. c. 66. — Ins. Sandvic.
- molokaiensis*, Hillebr. l. c. 65. — Ins. Sandvic.
- pallida*, Hillebr. l. c. 68. — Ins. Sandvic.
- parvifolia*, Hillebr. l. c. 65. — Ins. Sandvic.

PELECYPHORA, Ehrenb. (Cact.) — Ind. Kew. ii. 456.

- pectinata, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 195. — Mexic.

PELEXIA, [Poit.] Rich. (Orchid.) — Ind. Kew. ii. 456.

- aphylla*, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. II. (1887) 284 t. 48b (Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 205) = *Spiranthes aphylla, Cogn.*
- Glazioviana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 157 t. 34. — Bras.
- maculata*, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 7. — Hab.?
- olivacea*, Rolfe, l. c. (1890) 200. — Andes?
- saccata*, Rolfe, l. c. (1895) 195. — Guatem.
- Travassosii*, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) I. 330. — Bras.
- Wendlandiana*, Kraenzl. l. c. (1892) I. 426. — Hab.?

PELIOSANTHES, Andr. (Haemodor.) — Ind. Kew. ii. 456.

- albida, *Baker, in Bot. Mag.* (1890) t. 7110; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 267. — Penang.
- Bakeri*, *Hook. f. l. c.* — Reg. Himal.
- longiflora*, « *Steud.* » ex Hook. f. l. c. 266, in syn. [sphalm. = *longifolia* Steud.] = *neilgherriensis, Wight.*

PELIOSTOMUM, E. Mey. (Scrophul.) — Ind. Kew. ii. 456.

- calycinum, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1894) 390. — Transvaal.
- Marlothii, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 251. — Afr. austr.
- oppositifolium, *Engl. l. c.* xix. (1894) 149. — Afr. austr. occ.

PELLACALYX, Korth. (Rhizophor.) — Ind. Kew. ii. 456.

- Saccardianus, *Scortech. in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1546. —

PELLETIERA, A. St Hil. = **Asterolinon**, Hoffm. & Link (Primul.).

- trinum*, Pax, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. I. (1890) 113 = *A. trinum, Daud.*

PELLIONIA, Gaudich. (Urtic.) — Ind. Kew. ii. 456.

- acaulis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 562. — Penang.
- bulbifera, *Hook. f. l. c.* 560. — Tenass.
- burmanica, *Hook. f. l. c.* 561. — Tenass.
- Daveauanana*, Hort. ex Gard. Chron. (1895) II. 643 = *Daveauana, N. E. Br.*
- nigrescens, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 291. — N. Guin.

PELTANDRA, Rafin. (Aroid.) — Ind. Kew. ii. 456.

- sagittaeifolia*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club v. (1894) 102 = *sagittaeifolia, Rafin.*

PELTARIA, Jacq. (Crucif.) — Ind. Kew. ii. 456.

- emarginata*, Hausskn. in Mitt. Thür. Bot. Ver. N. Folge, III et IV. (1893) 111 = *Ptilotrichum emarginatum, Boiss.*
- isatoides*, Barb. in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxi. (1885) 219; *et Karpathos* (1895) 94 t. I. — Ins. Karpathos.

PELTIPHYLLUM, Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2a (1891) 61. **SAXIFRAGAEAE.**

- peltatum*, *Engl. l. c.* (= *Saxifraga peltata*, Torr.). — Calif.

PELTODON, Pohl (Labiata). — Ind. Kew. ii. 457.

- comaroides, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 110. — Parag.

PELTOPHORUM, Walp. (Legumin.) — Ind. Kew. ii. 457.

- aubium*, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 176; *Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 88 = *Vogelianum, Walp.*
- massaiense*, Taub. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 202. — Afr. or.

PELTOSTIGMA, Walp. (Rubiace.) — Ind. Kew. ii. 457.

- pentaphyllum, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) I. — Guatem.

PELUCHA, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 55; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 390. **COMPOSITAE.**

- trifida*, S. Wats. l. c. — Calif.

PENAEA, Linn. (Penaeac.) — Ind. Kew. ii. 457.

- ericifolia*, Gilg. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 520; *et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 212. — Afr. austr.

PENNISETUM, Rich. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 459.

densiflorum, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 778 (= *Eriochaeta densiflora*, Fig. & De Not.). — Kordofan.

depauperatum, Schweinf. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. App. II. (1894) 26. — Arabia.

flexispica, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 105. — Afr. trop. or.

laxum, Hochst. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* ii. 1891 (1892) 126, nomen. — Afr. trop. or.

longisetum, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 105 = *Setaria longiseta*, Beauv.

nemorum, Arechav. in *Anal. Mus. nac. Montevid.* iii. (1895) 221 = *nervosum*, Trin.

nigricans, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 781 = *nigricans*, Trin.

nigritarum, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Penicillaria nigritarum*, Schlecht.). — Seneg.

Notarisii, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Eriochaeta reversa*, Fig. & De Not.). — Nubia.

nitens, Hack. in *Bolet. Soc. Bot. vi.* (1888) 142; Th. Dur. & Schinz, l. c. 781 (= *Gymnotrix nitens*, Fig. & De Not.). — Mossamb.

nubicum, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 58; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 99 = *longisetum*, K. Schum.

Parisii, Trab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 391; Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 136 = *orientale*, Rich.

pumilum, Hack. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 II. (1892) 124. — Afr. trop. or.

reversum, Hack. ex Buett. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1889) 68. — Congo.

Rueppelianum, Hort. ez *Gartenfl.* xlv. (1895) 137 et 179 = P. Ruppellii, Steud.

secundiflorum, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 784 (= *Eriochaeta secundiflora*, Fig. & De Not.). — Nubia.

sphacelatum, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Gymnotrix sphacelata*, Nees). — Afr. austr.

spicatum, Koern. ex Aschers. & Schweinf. *Ill. Fl. Egypt.* [Mém. Inst. égypt.] (1887) 162; et ex Schinz. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 227 = *spicatum*, Roem. & Schult.

tenuifolium, Hack. ex Schinz, l. c. iii. (1895) 380. — Transvaal.

tristachyum, Arechav. in *Anal. Mus. nac. Montevid.* i. (1894) 219, t. 13 = *tristachyum*, Spreng.

uliginosum, Hack. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 123. — Afr. trop. or.

unisetum, Jacks. ex Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 786 = *unisetum*, Benth.

PENTACAENA, Bartl. (Illecebr.). — Ind. Kew. ii. 459.

andina, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 26. — Chili.

PENTACE, Hassk. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 459.

borneensis, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 10 (1888) sub t. 151. — Borneo.

Curtisii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lx. (1891) II. 103. — Penang.

eximia, King, l. c. — Perak.

floribunda, King, l. c. 102. — Perak.

Griffithii, King, l. c. 104. — Tenass.

Hookeriana, King, l. c. 101. — Perak.

Kunstleri, King, l. c. — Perak.

macrophylla, King, l. c. 104. — Perak.

perakensis, King, l. c. 101. — Perak.

Scortechini, King, l. c. 104. — Perak.

strychnoidea, King, l. c. 105. — Perak.

PENTACHAETA, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 459.

Orcutti, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 309. — Calif. inf.

PENTACME, A. DC. = *Shorea*, Roxb. (Dipteroc.).

malayana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiii. (1893) II. 107. — Malaya.

paucinervis, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 73. — Ins. Philipp.

PENTADIPLANDRA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* i. (1886) 611. *TILLACEAE*.

Brazzeana, Baill. l. c. — Congo gall.

PENTAGONIA, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 459.

spathicalyx, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 302. — Bras.

PENTAGONIA, Moehr. = *Specularia*, Heist. (Campanul.).

biflora, falcata, hybrida, leptocarpa, perfoliata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 381 = *homonyma omnia Speculariae*.

coa, Kuntze, l. c. = *S. pentagonia*, A. DC.

coloradensis, Kuntze, l. c. = *S. Lindhdimeri*, Vathe.

PENTAGONOCARPOS, Mich. = *Kosteletzkya*, Presl (Malvac.).

adoensis, altheaeifolius, cordatus, Coulteri, digitatus, Grantii, hastatus, hispidus, madagascariensis, paniculatus, pentacarpus, pentaspermus, sagittatus, velutinus, virginicus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 73 = *homonyma omnia Kosteletzkiae*.

Bakerianus, Kuntze, l. c. = *K. hispida*, Baker.

macrotrich, Kuntze, l. c. = *Pavonia macrotrich*, Baker.

PENTANISIA, Harv. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 460.

longituba, Oliver, in *F. L. James, Unkn. Horn of Afr.*, Append. (1888) 319. — Afr. or.

monogyna [Engl.] *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 42, nomen. — Afr. trop.

veronicoides, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 90 = *Holocarpa veronicoides*, Baker.

PENTAPANAX, Seem. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 460.

Willmotii, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* ii. (April (1887) 125; et *Bot. Centralbl.* xxxii. (1887) 214. — Austral.

PENTAPHALANGIUM, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 382; Engl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 240. *GUTTIFERAE*.

crassinerve, Warb. II. cc. — N. Guin.

PENTAPHRAGMA, Wall. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 460.

aurantiaca, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 188. — Borneo.

PENTAPOGON, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 461.

quadrifidum, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 280 = P. Billardieri, R. Br.

PENTARRHAPHIA, Lindl. (Gesner.). — Ind. Kew. ii. 461.

Sloanei, Hitchcock, in *Missouri, Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 114 [Pentaraphia] = P. Sloanei, Hanst.

PENTARRHAPHIS, H. B. & K. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 461.

Fournieriana, « Vasey » Hack. & Scribn. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 229. — Mexic.

geminata, Hack. & Scribn. l. c. 231 = Fournieriana, Hack. & Scribn.

paupercula, Hack. & Scribn. l. c. 233 (= *Polyschistes paupercula*, J. & C. Presl). — Ins. Luzon.

PENTARRHINUM, E. Mey. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 461.

coriaceum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 357. — Natal.

fasciculatum, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 323. — Afr. trop. or.

tylophoroides, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 244. — Afr. austr.

PENTAS, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 461.

confertifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 67. — Afr. trop.

elata, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 377. — Afr. trop. or.

glabrescens, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 215. — Reg. Somal.

hirtiflora, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii (1887) 482. — Madag.

involucrata, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 67. — Reg. Somal.

lanceolata, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 29 = *carnea*, Benth.

longiflora, Oliver, in *H. Johnst. Kilim. Exped.*, Append. (1886) 341 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii (1887) 335. — Afr. trop. or.

longituba, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 377. — Afr. trop. or.

modesta, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 290. — Afr. trop.

monbassana, Hiern, ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1887) 335. — Afr. trop.

pauciflora, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 215. — Reg. Somal.

Schimperi, Hochst. ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 92 = P. Schimperi, Vathe?

speciosa, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 67. — Afr. trop.

Warburgiana, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 29. — Afr. trop. occ.

PENTATRICHIA, Klatt, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 436. *COMPOSITAE*.

petrosa, Klatt, l. c. 437 T 10. — Afr. austro-occ.

PENTATROPIS, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 462.

officinalis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 110. — China.

PENTOPETIA, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 467.

natalensis, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 257. — Afr. austr.

PENTSTEMON, Mitch. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 452.

arenarius, Greene, *Pittonia*, i. (Mar. 1889) 282. — Nevada.

canescens, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 291. — Am. bor.

Davidsonii, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 241. — Calif.

ellipticus, Coult. & Fisher, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 302. — Idaho.

fasciculatus, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 403. — Mexic.

fruticiformis, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 170. — Calif.

fruticosus, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 239 = P. Menziesii, Hook.

guadalupensis, Heller, in *Contrib. Herb. Frankl. [Bot. Expl. S. Texas]* (1895) 92 t. 7. — Texas.

Haydeni, S. Wats. ex Coult. in *Bot. Gaz.* xvi. (1891) 311. — Am. bor.

leucanthus, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 72. — Calif.

linearifolius, Coult. & Fisher, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 302. — Idaho.

Moffatii, Eastwood, in *Zoë*, iv. (1893) 9. — Colorado.

montanus, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 240. — Am. bor.

Pentstemon, MacMill. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 15; Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1891) 201 = *pubescens*, Solander.

Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 281. — Mexic.

rotundifolius, A. Gray, l. c. xxii. (1887) 307; Dewar, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 264 fig. 31. — Mexic.

Shockleyi, S. Wats. l. c. xxiii. (1888) 265. — Nevada.

PENTSTEMON : —

- Smallii*, Heller, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 25 et 304. — Am. bor.
sonomensis, Greene, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 218; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 274. — Calif.
triflorus, Heller, in *Contrib. Herb. Frankl. [Bot. Exp. S. Texas]* i. (1895) 92 t. 8. — Texas.
Tweedyi, Canby & J. N. Rose, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 66, [Pentstemon]. — Montana.
utahensis, Eastwood, in *Zoö*, iv. (1893) 124. — Utah.

PEPEROMIA. Ruiz & Pav. (Piperac.). — Ind.

- Kew. ii. 468.
albidiflora, C. DC. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 399. — N. Granat.
Andrei, C. DC. l. c. 398. — N. Granat.
armadana, C. DC. l. c. 399. — N. Granat.
Bachmannii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 227. — Afr. austro-occe.
Bangii, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 49. — Bolivia.
brachytricha, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 342. — Madag.
barbana, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxix. 2 (1890) 70; et xxx. (1891) 233. — Costa Rica.
borucana, C. DC. l. c. 232. — Costa Rica.
Brittonii, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 254. — Bolivia.
breeana, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 227. — Kamerun.
caespitosa, C. DC. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 399. — Ecuad.
calvicaulis, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 231. — Costa Rica.
chrysocarpa, C. DC. l. c. xxix. 2 (1890) 70; et xxx. (1891) 227. — Costa Rica.
cobana, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 268. — Guatem.
confusa, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 98. — Zeylan.
Cooperi, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 226. — Costa Rica.
costaricensis, C. DC. l. c. 228. — Costa Rica.
dauleana, C. DC. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 399. — Ecuad.
Dryadum, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 229. — Madag.
Durandi, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 225. — Costa Rica.
Dusenii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 229. — Kamerun.
enervis, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Nov. 1891) 109; et in *Bot. Centralbl.* xlix. (1892) 362. — Austral.
glandulosa, C. DC. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 398. — Ecuad.
gracillima, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 448. — Mexic.
guatemalensis, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 10. — Guatem.
Heydei, C. DC. l. c. 9. — Guatem.
Hildebrandtii, Vathe, ex C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 228. — Madag.
Holstii, C. DC. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 37; et in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 226. — Afr. trop. or.
Imerinae, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 228. — Madag.
inquilina, Hemsl. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 428. — Mexic.
jaliscana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 145. — Mexic.
kamerunana, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 228. — Kamerun.
leucostachya, C. DC. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 398. — N. Granat.
ligustrina, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 426. — Ins. Sandvic.
Luxii, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 260. — Guatem.
macrophylla, C. DC. l. c. 8. — Guatem.
malaccensis, Ridl. in *Kew Bull.* (1895) 185. — Malacca.

PEPEROMIA : —

- mascarena*, C. DC. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 47, nomen. — Ins. Mascar.
metallica, L. Linden & Rodigas, in *Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 79 t. 557. — Peruvia.
Molleri, C. DC. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 154. — Ins. S. Thom.
muriculata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 393. — N. Zel.
Novae-Zelandiae, Colenso, l. c. 394. — N. Zel.
nudicaulis, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 49. — Bolivia.
palmana, C. DC. ex Th. Dur. & Schinz, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxix. 2 (1890) 71; et xxx. (1891) 233. — Costa Rica.
pandiana, C. DC. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 398. — N. Granat, Ecuad.
parvula, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 426. — Ins. Sandvic.
Pittieri, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 235. — Costa Rica.
pleistostachya, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 426. — Ins. Sandvic.
poasana, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 224. — Costa Rica.
Preussii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 226. — Kamerun.
Pseudo-pubescens, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 160. — Bolivia.
psilophylla, C. DC. l. c. 161. — Bolivia.
psilostachya, C. DC. ex M. Micheli, in *Mem. Soc. Helv. sci. nat.* xxxii. (1893) n. 2, 9 t. 54 fig. 6-9. — Parag.
pululaguana, C. DC. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 399. — Ecuad.
Rehmannii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1895) 227. — Transvaal.
Rusbyi, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 49. — Bolivia.
San-Felipensis, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 9. — Guatem.
Santa-Rosana, C. DC. l. c. 10. — Guatem.
Schmidtii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 229. — Ins. Comor.
scutellata, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 230. — Costa Rica.
silvicola, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 230. — Madag.
Siziana, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 9. — Guatem.
stenophylla, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 228. — Costa Rica.
Stuebelii, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 255. — Bolivia.
Stuhlmannii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1892) 225. — Afr. trop. or.
truncicola, C. DC. l. c. — Madag.
thomeana, C. DC. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 154. — Ins. S. Thom.
Thomsoni, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 97. — Reg. Himal., Zeylan.
Tonduzii, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxix. 2 (1890) 70, et xxx. (1891) 229. — Costa Rica.
vaccinifolia, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 226. — Kamerun.
vinasiana, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 231. — Costa Rica.
violaeifolia, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 8. — Guatem.
Zenkeri, C. DC., in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 226. — Kamerun.

PEPINIA, Brogn. = **Pitcairnia**, L'Hérit. (Bromel.).
incarnata, Éd. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 116, in syn. = *P. incarnata*, Baker.
recurvata, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 110 = *P. recurvata*, K. Koch.
subjuncta, Baker, l. c. 116. — Guian. gall.

PEPLIDIUM, Delile (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 466.

- maritimum*, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 78 = *humifusum*, Delile.

PEPONIA, Naud. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 467.
bracteata, Cogn. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 119. — Ins. S. Thom.

- kilimandscharica*, Cogn. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 406 et (1894) 34 et 64; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 210. — Afr. trop. or.
parviflora, Cogn. l. c. 209. — Afr. trop. or.
trilobata, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 399. — Afr. trop. or.
umbellata, Cogn. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 210. — Afr. trop. or.
usambarensis, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 399. — Afr. trop. or.

PERAMIUM, Salisb. = **Goodyera**, R. Br. (Orchid.).

- giganteum*, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 424 = *Epipactis Royleana*, Lindl.
Menziesii, Morong, in *Mem. Torrey Bot. Club* v. (1894) 124 = *Goodyera Menziesii*, Lindl.
pubescens, C. C. Curtiss, ex Small & Vail, l. c. iv. (1893) 155; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 189 = *G. pubescens*, R. Br.

PERAXILLA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli.

- (1894) 300; et xlii. (1895) 26 = **Loranthus** Linn.
Colensoi, Van Tiegh. l. c. 300 = *L. Colensoi*, Hook. f.
decussata, Van Tiegh. l. c. 26 = *L. decussatus*, Kirk.
Haastii, Van Tiegh. l. c. (= *Perella Haastii*, Van Tiegh.). — Austral.
punctata, Van Tiegh. l. c. (= *Perella punctata*, Van Tiegh.). — Austral.
tetracephala, Van Tiegh. l. c. 300 = *Loranthus tetracephalus*, Linn. f.
uniflora, Van Tiegh. l. c. (= *Perella uniflora*, Van Tiegh.). — Hab. ?

PERDICESEA, Provencher (ubi ?) ex Delam., Renauld & Card. *Fl. Miquelonensis* (1888) 21 = **Mitchella**, Linn. (Rubiace.).

- repens*, Provencher, l. c. = *M. repens*, Linn.

PEREBEA, Aubl. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 468.

- Markhamiana*, Benth. ex Hook. f. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1886) 211, in nota. — Darien.

PERELLA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii.

- (1895) 434 = **Loranthus**, Linn.
Haastii, Van Tiegh. l. c. — Austral.
punctata, Van Tiegh. l. c. — Austral.
tetracephala, Van Tiegh. l. c. = *Loranthus tetracephalus*, Linn. f.
uniflora, Van Tiegh. l. c. — Hab. ?

PEREZIA, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 469.

- brachylepis*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 299. — Chili.
capitata, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 156. — Mexic.
collina, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 144. — Mexic.
glomerata, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club* iv. (1895) 214. — Bolivia.
grandifolia, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 156. — Mexic.
Mandoni, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 66. — Bolivia.
michoacana, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 179. — Mexic.
montana, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 105 t. 8. — Mexic.
Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 58. — Calif. austr.
paniculata, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 393. — Mexic.
pilifera, Kurtz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1894) 112 = *pilifera*, Hook. & Arn.
spatulata, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 300. — Chili.
vernonioides, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 433. — Mexic.

PEREZIOPSIS, Coult. *Bot. Gaz.* xx. (1895) 52, **COMPOSITAE**.

- Donnell-Smithii*, Coult. l. c. 53 t. 6. — Guatem.

PERFOLIATA, Burm. = **Hermas**, Linn. (Umbell.).
capitata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 269 = *H. capitata*, Linn. f.
ciliata, Kuntze, l. c. = *H. ciliata*, Linn. f.
gigantea, Kuntze, l. c. = *H. gigantea*, Linn. f.
quinquedentata, Kuntze, l. c. = *H. quinquedentata*, Linn. f.
villosa, Kuntze, l. c. = *H. depauperata*, Linn. f.

PERGULARIA, Linn. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 469.
africana, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 259. — Afr. trop.

PERIANDRA, Mart. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 469.
mediterranea, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 359. — Bras.
parviflora, M. Micheli, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 444, t. 14. — Guatem.

PERIANTHOMEGA, Bureau, ex Baill. Hist. des pl. x. (1888) 33; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3b. (1894) 225. **BIGNONIACEAE**.
Vellozii, Bureau, in Warm. Symb. Fl. Bras. centr. xl. (1893) 1228 (= *Bignonia perianthomega*, Vell.). — Bras.

PERIANTHOPODUS, Silva Manso = **Cayaponia**, Silva Manso (Cucurb.).
globulosus, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 829. — Seneg.

PERIANTHOSTELMA, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 247; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 249. **ASCLEPIADEAE**.

PERICHLAENA, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 50; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1894) 232. **BIGNONIACEAE**.
Richardi, Baill. ll. cc. — Madag.

PERIEILEMA, Benth. & Hook. f. = **Pereilema**, Presl (Gramin.).
ciliatum, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 93 = *Pereilema ciliatum*, Fourn.
cirratum, Fourn. l. c. in syn. = *P. crinitum*, Presl.
setarioides, Fourn. l. c. = *P. setarioides*, Fourn.

PERIESTES, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1890) 833; et Hist. des pl. x. (1891) 463. Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 333. **ACANTHACEAE**.
Baroni, Baill. ll. cc. — Madag.
comorensis, Lindau, l. c. (= *Hypoestes comorensis*, Baker). — Ins. Comor.

PERIGLOSSUM, Decne = **Cordylogyne**, E. Mey. (Asclep.).
Kaessnerianum, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 40. — Afr. austr.

PERILLA, Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 470.
frutescens, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 277 = *ocimoides* Linn.

PERYMENIOPSIS, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90, in syn. = **Gymnolomia**, H. B. & K. (Compos.).
perfoliata, Sch. Bip. l. c. = *G. decurrens*, Klatt.

PERINERION, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1888) 758; et Hist. des pl. x. (1888) 210; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 174. **APOCYNACEAE**.
Welwischii, Baill. ll. cc. — Angola.

PERIOMPHALE, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1888) 731; et Hist. des pl. x. (1888) 85. **GESNERACEAE**.
Balsanae, Baill. l. c. 732. — N. Caled.
Pancheri, Baill. l. c. — N. Caled.

PERIPLOCA, Tourn. ex Linn. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 471.
latifolia, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 321 — Afr. trop. or.
Preussii, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 117. — Afr. trop.
visciformis, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 216 (= *Socotora aphylla*, Balf. f.). — Afr. trop. or.

PERISTERIA, Hook. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 471.
aspera, Rolfe, in Lindenia, vi. (1890) 57 t. 267. — Columb.
laeta, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 616. — Hab.?
Lindenii, Rolfe, in Lindenia, vii. (1891) 83 t. 328; et in Illustr. Hort. xxxix. (1892) 121. — Hab.?
Rossiana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1889) i. 8. — Hab.?

PERISTETHIUM, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 175 = **Loranthus**, Linn.
leptostachyum, Van Tiegh. l. c. = *L. leptostachys*, H. B. & K.

PERISTROPHE, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 471.
Doriae, Terrac. in Ann. Ist. Bot. Roma, v. (1894) 102. — Afr. trop. or.
keyensis, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 422. — N. Guin.

PERISTYLUS, Blume = **Habenaria**, R. Br. (Orchid.).
hispidulus, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1891) 398 [hispidula] = *Brachycorythis pubescens*, Harv.

PERITYLE, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 472.
aurea, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 84. — Calif. inf.
crassifolia, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 147. — Calif.
Brandegeana, J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 114. — Am. bor. occ.
cuneata, T. S. Brandeg. in Zoë, i. (1890) 54. — Calif.
deltoidea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 57. — Calif. austr.
effusa, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 104. — Mexic.
Greenii, J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 117. — Calif. austr.
jaliscana, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 431. — Mexic.
Lloydii, Robinson & Fernald, l. c. xxx. (1895) 118 — Mexic.
microcephala, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 391. — Mexic.
minutissima, J. N. Rose, ex T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 148, nomen. — Calif.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 57. — Mexic.
Rothrockii, J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 114. — Calif.
rotundifolia, T. S. Brandeg. in Zoë, iv. (1893) 210 = *P. Fitchii*, Torr.
socorrosensis, J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 118. — Calif.
Vaseyi, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 42, et ii. (1892) 227 t. 3. — Texas.

PERLARIUS, Rumpf, Herb. iv. (1744) 120 t. 56 (non 122 t. 57); Kuntze, Rev. Gen. (1891) 629 = **Pipturus**, Wedd. (Urtic.).
argenteus, asper, mollissimus, platyphyllus, repandus, rotundifolius, Kuntze, l. c. 629-30 = *homonyma omnia* Pipturi.
albidus, Kuntze, l. c. 630 = *Pipt. Gaudichaudianus*, Wedd.
incanus, Kuntze, l. c. 629 = *Pipt. velutinus*, Wedd.

PERNETTYA, Gaudich. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 472.
andina, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 264 et 292, et xviii. (1894) 440 et 464. — Chili.

PERNETTYA: —
brasiliensis, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1889) 191 = *Gaultheria myrtilloides*, Cham. & Schlecht.
Hookeri, Niedenzu, l. c. 190 = *G. microphylla*, Hook.
macrostigma, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 92. — N. Zel.
myrtyllifolia, « Griseb. » ex Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 197, sphalm. = *myrtilloides*, Griseb.
nana, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 389. — N. Zel.
Palenae, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 195. — Chili.
parvifolia, Phil. l. c. 194. — Chili.
promaucana, Phil. l. c. 195. — Chili.
speciosa, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 349 = *phillyreaefolia*, DC.

PEROCARPA, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 619 = **Peracarpa**, Hook. f. & Thoms. (Campanul.).
carnosa, Feer, l. c. 620 = *P. carnosa*, Hook. f. & Thoms.
circaeoides, Feer, l. c. 621 t. 7 et 8 (= *Campanula circaeoides*, F. Schmidt). — Japon.

PEROTIS, Ait. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 473.
indica, K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 22 et 29; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 99 = *latifolia*, Ait.

PERRALDERIA, Coss. = **Grantia**, Boiss. (Compos.).
purpurascens, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 430 — Algeria.

PERROTETTIA, H. B. & K. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 473.
alpestris, Loesen. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1892) 220. — Malaya.
arborescens, Loesen, l. c. — Austral.
philippinensis, Loesen, l. c. — Ins. Philipp.

PERSEA, Plum. ex Linn. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 473.
breviflora, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1889) 115 (= *Alseodaphne breviflora*, Benth.). — China.
caerulea, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berlin, v. (1889) 171 = *laevigata*, H. B. & K.
Chamissonis, Mez, l. c. 168. — Mexic.
chinensis, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1889) 115 (= *Alseodaphne chinensis*, Champ.). — Hongkong.
cordata, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 165 = *pyrifolia*, Nees.
corymbosa, Mez, l. c. 158. — Peruvia.
ferruginea, Mez, l. c. 154 (= *Laurus ferruginea*, Ruiz & Pav.). — Peruvia.
floccosa, Mez, l. c. 148. — Mexic.
glaberrima, Mez, l. c. 144. — Ind. occ.
grandis, Mez, l. c. 160. — Peruvia.
Haenkeana, Mez, l. c. 174. — Peruvia.
Humboldtii, Mez, l. c. 158 = *Persea ferruginea*, Meissn.
humilis, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 157. — Florida.
hypoleuca, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 174 = *cubensis*, Meissn.
intermedia, Phil. in Anal. Univ. Chil. xcl. (1895) 502. — Chili.
Jenmani, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 162. — Guian. angl.
Krugii, Mez, l. c. 162. — Ins. Porto Rico.
lanata, Mez, l. c. 164 = *fuliginosa*, Meissn.
lanceolata, Mez, l. c. 150 — Bras.
Liebmanni, Mez, l. c. 100. — Mexic.
nitens, Mez, l. c. 146. — Guian. angl.
Persea, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 95 = *gratissima*, Gaertn. f.
pubescens, Sarg. Sylv. N. Am. vii. (1895) 7 t. 302 = *carolinensis*, Nees.
scoparia, Mez, Arb. Bot. Gart. Breslau i. (1892) 115. — Bolivia.
stricta, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 141. — Peruvia.
Urbaniana, Mez, l. c. 143. — Ins. Jamaica.
vestita, Mez, l. c. 154. — Bolivia.

PERSICA, [Tourn.]. Mill. = **Prunus**, Linn. (Rosac.).
atropurpurea, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 131 = Pr. persica, Stokes.
Simoni, Lavall. l. c. = Pr. *Simonii*, Carr.

PERTYA, Sch. Bip. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 475.
sinensis, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2214. — China.

PERVINCA, Tourn. ex Adans. = **Vinca**, Linn. (Apocyn.).
media, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 709 = V. *media*, Hoffmgg & Link.

PERYMENIUM, Schrad. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 475.
album, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 154. — Mexic.
asperifolium, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina. Heft xxiii. (1887) 143. — Mexic.
jaliscense, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 155. — Mexic.
microcephalum, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina. Heft xxiii. (1887) 143. — Mexic.
pellitum, Klatt, l. c. — Mexic.
Sartori, Sch. Bip. ex Klatt, l. c. 144, in syn. = *Otopappus verbesinoides*, Benth.

PETAGNAEA, Caruel, Epit. Fl. Eur. ii. (1894) 257 = **Petagnia**, Guss. (Umbell.).

PETALACTELLA, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 100 : et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2352. **COMPOSITÆ**.
Woodii, N. E. Br. ll. cc. — Afr. austr.

PETALODISCUS, Baill. = **Savia**, Willd. (Euphorb.).
mimosoides, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 15 = S. *mimosoides*, Baill.
oblongifolius, Pax, l. c. = S. *oblongifolia*, Baill.
pulchella, Pax, l. c. = S. *pulchella*, Baill.

PETALOSTEMON, Michx. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 476.
compactus, Swezey, Nebr. Flow. Pl. (1891.) 6 = *macrostachyus*, Torr.
glandulosus, Coult. & Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 2:9. — Texas.
Reverchoni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 449. — Texas.
sabinalis, S. Wats. l. c. 448. — Texas.

PETASITES, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 477.
nivalis, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 18. — Am. bor. occ.

PETASTOMA, Bureau, in Warm. Symb. Fl. Bras. centr. xl. (1893) 1215. **BIGNONIACEAE**.
formosum, Bureau, l. c. — Bras.
Leucopogon, Bureau, l. c. (= *Pantherpa Leucopogon*, Miers). — Bras.

PETESIODES, Jacq. = **Wallenia**, Sw. (Myrsin.).
clusiifolium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 402 = W. *clusiifolia*, Griseb.
nemoralis, Kuntze, l. c. = W. *nemoralis*, Mart.
venosum, Kuntze, l. c. = W. *venosa*, Griseb.

PETRADOSIA, Greene, in Erythea, iii. (1895) 13 = **Solidago** (Vaill.) Linn. (Compos.).
pumila, Greene, l. c. = S. *pumila*, Torr. & Gray.

PETRAEOVITEX, Oliver (Verben.). — Ind. Kew. ii. 477.
pubescens, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 427. — N. Guin.
Riedelii, F. Muell. in Bot. Centralbl. 1. (1892) 195. [an Oliver ?] — N. Guin.

PETROCOPTIS, A. Br. = **Lychnis**, Tourn. (Caryoph.).
crassifolia, Rouy, Ill. Pl. Eur. rarior. iv. (1895) 26 t. 79. — Hisp.

PETROCOSMEA, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1716. **GESNERACEAE**.
grandiflora, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 115, et in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2410. — China.
ionantha, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1894) 1148 = *Saintpaulia ionantha*, Wendl.
sinensis, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii (1887) t. 1716. — China centr.

PETROPHILA, R. Br. (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 478.
Shirleyae, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. [ii] (1891) 17. — Austral.

PETROPHYTES, Webb & Berth. = **Monanthes**, Haw. (Crassul.).
pellens, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 115. — Ins. Canar.

PETROSELINUM, Hoffm. = **Carum**, Linn. (Umbell.).
anatolicum, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitsch. xlv. (1894) 99. — As. Min.

PETROSIMONIA, Bunge (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 479.
triandra, Reehinger, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 244 = P. *Volvox*, Bunge.

PETUNGA, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 479.
racemosa, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 80 = P. *Roxburghii*, DC.

PETUNIA, Juss. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 479.
axillaris, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888). 38 = *nyctaginiflora*, Juss.

PEUCEDANUM, [Tourn.] Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 479.
abyssinicum, Defters, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 304. — Arabia.
aculeolatum, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 42. — Afr. trop. or.
aegopodioides, Seidel, in Isis, (1888) 86 (= *Physospermum aegopodioides*, Boiss.). — Macedon.
aegopoides, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn. xxx. (1892) 81 = P. *aegopodioides*, Boiss.
aequiradium, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 36; et Fl. Bulg. (1891) 205. — Bulg.
Anethum, Baill. Trait. bot. méd. (1884) 1045; Cordem. Fl. Ile Réunion, (1895) 435 = *graveolens*, Benth.
Angelica, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 281 = *Angelica sylvestris*, Linn.
angelicaefolium, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 44, in obs. (= *Carum? angelicaefolium*, Baker). — Madag.
areysianum, Defters, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 305. — Arabia.
Austinae, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 268; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 66. — Calif.
Bojerianum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 319. — Madag.
Brandegei, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 210; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 72. — Calif.
calcareum, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 114. — Reg. Cauc.
californicum, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 143 = *parvifolium*, Torr. & Gray.
Canbyi, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 78; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 56. — Am. loc. occ.
circumdatum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 474. — Oregon.
Conrathi, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 305. — As. occ.

PEUCEDANUM : —

Cous, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 453. — Oregon.
Cusickii, S. Wats. l. c. — Oregon
decumbens, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 52 (= *Angelica decumbens*, Franch.). — Yunnan.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 143. — Yunnan
Donnellii, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 143. et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 65. — Oregon.
Eminii, Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. C (1895) 300. — Afr. trop. or.
eurycarpum, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 61. — Am. bor. occ.
evittatum, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 277. — Am. bor. occ.
fallax, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 102 = *tomentellum*, Freyn & Sint.
Grayi, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 209; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 60 (= *P. millefolium*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
Hassei, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 276. — Calif.
Hendersoni, Coult. & J. N. Rose, l. c. xiii. (1888) 210; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 56. — Oregon.
heterophyllum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. v. (1894) 141. — Yunnan.
intermedium, Simonk. Enum. Fl. Transsylv. (1886) 265 (= *Petroselinum intermedium*, Schur.). — Transsylv.
kauaiense, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 145. — Ins. Sandvic.
Kerstenii, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 43. — Afr. trop. or.
Kingii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 474 (= *P. graveolens*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
lapidosum, M. E. Jones, in Zool. ii. (1891) 246. — Utah.
Lemmoni, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 277. — Arizona.
macilentum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris. Sér. VIII. vi. (1894) 142. — Yunnan.
madrense, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 151. — Mexic.
Martindalei, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 142; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 66. — Oregon.
microcarpum, Howell, ex Coult. & J. N. Rose, l. c. 65. — Oregon.
mohavense, Coult. & J. N. Rose, l. c. 62. — Calif.
multivittatum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 52. — Japon.
oreganum, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 64. — Oregon.
Parishii, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 209; et l. c. 68. — Calif.
pimpinelloides, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 268. — As. Min.
Plummerae, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 278. — Calif.
Pringlei, Coult. & J. N. Rose, l. c. xiii. (1888) 209 = *dasycarpum*, Torr. & Gray.
runssoricum, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 44. — Afr. trop. or.
robustum, Jepson, in Erythea, i. (1893) 9; Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 156. — Calif.
salmoniflorum, Coult. & J. N. Rose, ex Holzinger. in Contrb. U. S. Nat. Herb. iii. 4 (1895) 228. — Idaho.
Sandbergii, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 79; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 65. — Am. bor. occ.
sandwicense, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 144. — Ins. Sandvic.
serbicum, Petrov. Addit. Fl. Agri Nyssani (1885) 89. — Serb.
thracicum, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 379 (= *P. vitijugum*, Velen.). — Bulg.
tomentellum, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 101. — As. Min.
Torreyi, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 277. — Calif.
Vaseyi, Coult. & J. N. Rose, l. c. 144; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 67. — Calif.

PEUCEDANUM : —

Volkensii, *Engl. Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 43. — Afr. trop. or.
 Watsoni, *Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 209; et *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 57. — Am. bor. occ.
 xantholeucum, *Frey & Sint. ex Frey, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 122. — Armen.

PEUCELUMA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 895; et *Hist. des pl.* xi. (1890) 286 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).
 pinifolia, Baill. l. c. = *L. pinifolia*, Baill.

PFIAFFIA, Mart. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 482.
 cinerea, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 544. — Hab.?
 denutata, *Kuntze, l. c.* 543. — Bras.
 eriantha, *Kuntze, l. c.* = *Hebanthe virgata*, Mart.
 helichrysoides, *Kuntze, l. c.* 544. — Bras.
 iresinoides, *Kuntze, l. c.* 543 = *Gomphrena iresinoides*, Moq.
 lanata, *Kuntze, l. c.* 544 = *tomentosa*, Mart.
 paniculata, *Kuntze, l. c.* 542, 543 = *Hebanthe paniculata*, Mart.
 pulverulenta, *Kuntze, l. c.* 543 = *H. pulverulenta*, Mart.
 reticulata, *Kuntze, l. c.* = *Gomphrena reticulata*, Seub.
 sericea, *Kuntze, l. c.* = *G. sericea*, Mart.
 spicata, *Kuntze, l. c.* = *Hebanthe spicata*, Mart.

PFEIFFERAGO, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 227 = **Codia**, Forst. (Saxifr.).
 ferruginea, *Kuntze, l. c.* = *C. ferruginea*, Brongn. & Gris.
 floribunda, *Kuntze, l. c.* = *C. floribunda*, Brongn. & Gris.
 montana, *Kuntze, l. c.* = *Callicoma Billardieri*, D. Don.
 obcordata, *Kuntze, l. c.* = *Codia obcordata*, Brongn. & Gris.
 spatulata, *Kuntze, l. c.* = *C. spatulata*, Brongn. & Gris.

PHACA, Linn. = **Astragalus**, Linn. (Legumin.).
 brachycarpa, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 200 = *A. caespitosus*, A. Gray.
 canadensis, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 325 = *A. canadensis*, Linn.
 caryocarpus, MacMill. l. c. 326 = *A. caryocarpus*, Ker-Gawl.
 compacta, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 14. — Am. austr. occ.
 cryptantha, Phil. l. c. — Am. austr. occ.
 diminutiva, Phil. l. c. — Am. austr. occ.
 gracilis, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 325 = *Astragalus gracilis*, Nutt.
 hypoglottis, MacMill. l. c. 324 = *A. hypoglottis*, Linn.
 plattensis, MacMill. l. c. 325 = *A. plattensis*, Nutt.
 viridis, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 201 = *A. kentrophyta*, A. Gray.

PHACELIA, Juss. (Hydrophyl.). — Ind. Kew. ii. 483.
 Arthuri, *Greene, Pittonia, i.* (Oct. 1888) 224; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 255. — Calif.
 cedrosensis, *J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 18. — Calif.
 Covillei, *S. Wats. in A. Gray, Man. N. Am. Bot.* ed. 6 (1890) 360. — Am. bor.
 dubia, Trelease, ex Trelease, Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkan.* for 1888, iv. (1891) 205; Small, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 303 = *parviflora*, Pursh.
 Eisenii, *T. S. Brandeg. in Zoë, ii.* (1891) 252. — Am. bor. occ.
 foliosa, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 53. — Am. austr.
 glechomaefolia, A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* ii. 1. [Suppl.] (1886) 417. — Colorado.
 heterosperma, *Parish, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 37. — Calif.
 hirtuosa, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 310. — Calif.

PHACELIA : —

idahaensis, *L. F. Henderson, in Bull. Torrey Bot. Club*, xx.i. (1895) 48. — Idaho.
 imbricata, *Greene, in Erythea, i.* (1893) 127; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 253. — Calif.
 inconspicua, *Greene, l. c.* iii. (1895) 24. — Nevada.
 leptostachya, *Greene, l. c.* ii. (1894) 190. — Calif.
 leucantha, *Lemmon, ex Greene, Pittonia, i.* (June 1888) 175. — Calif.
 linearis, *Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 242 (= *Hydrophyllum lineare*, Pursh) = *P. Menziesii*, Torr.
 magellanica, *Coville, l. c.* iv. (1893) 159 = *circinnata*, Jacq.
 nematostyla, *Robinson, in Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 181. — Mexic.
 nemoralis, *Greene, Pittonia, i.* (Nov. 1887) 141; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 253. — Calif.
 nudicaulis, *Eastwood, in Zoë, iv.* (1893) 123 et 296 = *demissa*, A. Gray.
 Palmeri, *Vasey & J. N. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xi. (1888) 532. — Calif.
 parviflora, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 226. — Chili.
 pauciflora, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 61. — Calif. austr.
 peritylodes, *Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 75; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 160, t. 15. — Calif.
 pinetorum, *M. E. Jones, in Zoë, iv.* (1893) 279. — Am. bor. occ.
 rugulosa, *Lemmon, ex Greene, Pittonia, i.* (June 1888) 175. — Calif.
 rupicola, *Robinson & Fernald, in Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 119. — Mexic.
 scabrella, *Greene, Pittonia, i.* (Mar. 1887) 35. — Calif.
 scariosa, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 185. — Calif.
 setigera, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 54. — Am. austr.
 splendens, *Eastwood, in Zoë, iv.* (1893) 9. — Colorado.
 suaveolens, *Greene, Pittonia, i.* (Oct. 1888) 223; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 255. — Calif.
 thermalis, *Greene, in Erythea, iii.* (1895) 66. — Calif.
 umbrosa, *Greene, l. c.* ii. (1894) 191. — Calif.
 verna, *Howell, l. c.* iii. (1895) 35. — Oregon.
 villosa, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 225. — Chili.

PHACELLARIA, Benth. (Santal.). — Ind. Kew. ii. 484.
 caulescens, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 122, t. 17. — Burma.
 Wattii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 236. — Ind. or.

PHAEANTHUS, Hook. f. & Thoms. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 484.
 andamanensis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 122. — Ins. Andam.
 lucidus, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1561. — Penang.

PHAEADRANASSA, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 484.
 ventricosa, *Baker, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 210 = *chloracea*, Herb.

PHAENICAULIS *Menziesii*, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 143 = *Phoenicaulis Menziesii*, Steud.

PHAEOPAPPUS, Boiss. = **Centaurea**, Linn. (Compos.).
 depressus, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 211. — Persia.
 Freyrii, *Sint. ex Frey, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 235. — Armenia.
 insignis, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 312. — As. occ.
 inuloides, Boiss. l. c. 312, in obs. = *Centaurea inuloides*, Fisch.
 longispinus, *Post, Pl. Postianae, ii.* (1891) 14. — As. occ.
 macrocephalus, *Frey & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 220. — As. Min.

PHAEOPTILUM, Radlk. (Nyctag.). — Ind. Kew. ii. 485.
 Heimerli, *Engl. Bot. Jahrb.* xix. (1894) 133 [Phaeoptilon]. — Afr. austro-occ. extratrop.

PHAGNALON, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 485.
 aegyptiacum, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 296. — Desert. Aegypt.-Arab.
 Barbeyanum, *Asch. & Schweinf. in Mém. Inst. égypt. [Illustr. Fl. Egypt.]* iii. (1887) 87. — Aegypt.
 linitolium, *Post, Pl. Postianae, i.* (1891) 12. — As. occ.
 methanaeum, *Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v.* (1887) 85, et *N. Folge*, vii. (1895) 30. — Graecia.

PHAIOCALANTHE ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 168. **ORCHIDEAE**.
 irrorata ×, Rolfe, l. c.; et in *Gard. Chron.* (1888) i. 136, in obs. (= *Phajus irroratus*, Reichb. f.). — Hybr. artef.
 Sedeniana ×, Reichb. f. l. c. (= *P. Sedenianus*, Veitch). — Hybr. artef.

PHAIUS, Lour. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 486.
 amabilis ×, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1893) i. 226 [Phajus]. — Hybr. artef.
 candidissimus, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1889) 101. — Burma.
 Cooksoni ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1890) i. 388 et 389 fig. 57; et (1891) i. 456; *Orchid Alb.* x. (1894) t. 478. — Hybr. artef.
 Humbloti, *Reichb. f. in Rev. Hort.* lxiii. (1891) 204 cum ic. [Phajus]. — Ins. Comor.
 Incarvillei, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 675 [Phajus] = *P. Wallichii*, Lindl.
 longibracteatus, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 226 [Phajus]. — Ins. Mascar.
 Marshallianus, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1889) 101. — Hab.?
 nanus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 192; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2088. — Bengal.
 Owenianus ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1894) i. 783, fig. 102. — Hybr. artef.
 philippinensis, *N. E. Br. l. c.* (1889) ii. 239. [Phajus]. — Ins. Philipp.
 Roeblingii, O'Brien, l. c. (1895) i. 358. — Reg. Himal.
 roseus, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 6. [Phajus]. — Burma.
 Sedenianus × Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 174; Veich., l. c. (1888) 136. — Hybr. artef.

PHALAEENOPSIS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 436.
 alboviolacea, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 373. — Penins. Mal.
 Amphitrita ×, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1892) i. 619. — Hybr. artef.
 Bartri, King, ex *Hook. f. Century Ind. Orchids* (1895) 38, in syn. = *Phalaenopsis tetraspis*, Reichb. f.
 Buyssonianus, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) ii. 395; et in *Bot. Mag.* (1891) t. 7196 = *P. Esmeralda*, Reichb. f.
 casta ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1890) i. 227. — Hybr. artef.
 Cynthia ×, Hort. ex Rolfe, l. c. 132 et 227. — Hybr. artef.
 denticulata, Reichb. f. in *Lindenia*, iii. (1887) 66; et l. c. (1888) i. 296. — Hab.?
 Foestermannii, Reichb. l. c. (1887) i. 244. — Hab.?
 fugax, *Kraenzl. l. c.* (1893) ii. 360. — Hab.?
 gloriosa, Reichb. f. l. c. (1888) i. 554. — Hab.?
 Harriettae ×, Rolfe, l. c. (1887) ii. 8 fig. 1. — Hybr. artef.
 Kunstleri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 30. — Perak.
 Leda ×, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 457. — Hybr. artef.
 leucorhoda ×, Hort. l. c. i. (1890) 227. — Hybr. artef.
 Lindeni, Loker, in *Journ. des Orchid.* vi. (1895) 103. — Hab.?
 Micholitzii, Hort. ex *Gartenfl.* xli. (1892) 184. — Hab.?

PHALAEOPSIS : —

- muscicola*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1893) 373. — Penins. Mal.
Regnieriana, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 746. — Siam.
Rothschildiana ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 606. — Hybr. arter.
Ruckeriana, Hort. ex *Orchid Alb.* vi. (1887) sub t. 266, in syn. = *Thrixspermum unguiculatum*, Reichb. f.

PHALANGIUM, [Tourn.] Adans. = **Anthericum**, Linn. (Liliac.).
Fraseri, « Nutt.? » cf. MacMill. *Metasp.* Minn. (1892) 151. sphalm. = *Camasia Fraseri*, Torr. *serotinum*, Engelm. ex Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 9 = *Anthericum serotinum*, Baker.

PHALANGIUM, Moehr. Hort. Priv. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 713 = **Bulbine**, Linn. (Liliac.).
annuum, *bisulcatum*, *bulbosum*, *densiflorum*, *favosum*, *filifolium*, *frutescens*, *latifolium*, *laxiflorum*, *longisepalum*, *minimum*, *narcissifolium*, *mutans*, *praemorsum*, *pugioniforme*, *postratum*, *semibarbatum*, *Zeyheri*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Bulbines.
aloodes, Kuntze, l. c. = *B. alooides*, Willd.
asphodelodes, Kuntze, l. c. = *B. asphodeloides*, Spreng.
urgineodes, Kuntze, l. c. = *B. urGINEOIDES*, Baker.

PHALARIDANTHA, St Lager, in *Cariot. Étud.* des fl. éd. 8 ii. (1889) 900 = **Phalaris**, Linn. (Gramin.).
arundinacea, St Lager, l. c. = *P. arundinacea*, Linn.
Robinsiana, St Lager, l. c. in obs. — Ins. Juan Fernandez.

PHALARIS, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 487.
hispanica, Coincy, in *Morat, Journ. de Bot.* viii. (1894) 207. — Hisp.
Lemmoni, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 42; et *Ill. N. Am. Grass.* ii. (1892) t. 5. — Calif., Arizona.

PHALERIA, Jack (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 488.
acuminata, Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 225 (= *Drimyspermum acuminatum*, Seem.). — Ins. Fiji.
lanceolata, Gilg, l. c. (= *D. lanceolatum*, A. Gray). — Ins. Fiji.
montana, Gilg, l. c. (= *D. montanum*, Seem.). — Ins. Fiji.
pubiflora, Gilg, l. c. (= *D. pubiflorum*, Seem.). — Ins. Fiji.
subcordata, Gilg, l. c. (= *D. subcordatum*, Seem.). — Ins. Fiji.

PHALODALLIS, Herb. = **Cypella**, Herb. (Irid.).
gigantea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 702 = *C. gigantea*, Klatt.
gracilis, Kuntze, l. c. = *C. gracilis*, Baker.
Herbertii, Kuntze, l. c. = *C. Herberti*, Herb.
paludosa, Kuntze, l. c. = *C. paludosa*, Klatt.
peruviana, Kuntze, l. c. = *C. peruviana*, Baker.
pusilla, Kuntze, l. c. = *C. pusilla*, Benth. & Hook. f.

PHARBITIS, Choisy = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.).
cissoïdes, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 32 = *I. cissoïdes*, Griseb.
dichroa, Hochst. ex Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 136 = *I. dichroa*, Hochst.
falkioides, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 32 = *I. falkioides*, Griseb.
jamaicensis, Peter, l. c. = *I. jamaicensis*, G. Don.
leptoloma, Peter, l. c. = *I. leptotoma*, Torr.
pinnata, Peter, l. c. = *I. pinnata*, Hochst.

PHARMACUM, Rumpf, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 248 = **Astronia**, Noronha (Melastom.).
Beccarianum, *calycinum*, *Candolleum*, *confertiflorum*, *Cumingianum*, *fraternum*, *Holtrungii*, *ovalifolium*, *papuanum*, *Pickeringii*, *pilcolatum*, *pulchrum*, *robustum*, *Rolfei*, *samoënsis*, *smilacifolium*, *Storckii*, sub-

PHARMACUM : —

- cordatum*, *tomentosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 953-54 = *homonyma omnia* Astroniae.
glabrum, Kuntze, l. c. = A. Forsteri, Naud.
intermedium, Kuntze, l. c. = A. spectabilis, Blume.
macrophyllum, Kuntze, l. c. = A. macrophylla, Blume.
papetarium, Kuntze, l. c. = A. papetaria, Blume.
parviflora, Kuntze, l. c. = A. parviflora, Triana.

PHARNACEUM, Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 489.
obovatum, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 162. — Afr. austr.

PHASEOLODES, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 201 = **Millettia**, Wight & Arn. (Legumin.).
aboënsis, *argenteum*, *atropurpureum*, *Brandisianum*, *canum*, *caudatum*, *Championii*, *cinereum*, *coeruleum*, *cognatum*, *drasticum*, *evianthum*, *extensum*, *ferrugineum*, *fruticosum*, *glaucescens*, *gracile*, *japonicum*, *leigynum*, *macrophyllum*, *Maingayi*, *Mannii*, *megaspermum*, *monticolum*, *nitidum*, *nudiflorum*, *ovalifolium*, *pachycarpum*, *pendulum*, *piscidia*, *pubinerve*, *pulchrum*, *racemosum*, *reticulatum*, *rhodanthum*, *rostratum*, *rubiginosum*, *sericeum*, *sericosum*, *splendens*, *tetrapterum*, *Thonningii*, *urophyllum*, *versicolor*, *xylocarpum*, *Zollingerianum*, Kuntze, l. c. (1891) 201-02 = *homonyma omnia* Millettiae.
brachybotrys, Kuntze, l. c. 201 = *Wistaria brachybotrys*, Sieb. & Zucc.
floribundum, Kuntze, l. c. = W. chinensis, DC.
frutescens, Kuntze, l. c. = W. speciosa, Nutt.
grande, Kuntze, l. c. 202 = *Millettia caffra*, Meissn.
Hookerianum, Kuntze, l. c. = M. macrophylla, Benth.
speciosum, Kuntze, l. c. 201 = M. speciosa, Champ.
splendissimum, Kuntze, l. c. 202 = M. splendissimum, Blume.
Sutherlandii, Kuntze, l. c. 202 = M. Sutherlandii, Harv.

PHASEOLUS, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 490.
diffusus, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 12. — Madag.
Esperanzae, Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 118. — Mexic.
massaiensis, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ast.-Afr.* C (1895) 223. — Afr. trop. or
montanus, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1891) 130. — Calif
novo-guineensis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 194. — N. Guin.
polystachyus, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 15 = *perennis*, Walt.
Schimperi, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 267. — Abyss.
umbellatus, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1889) 209. — Am. bor.

PHAYLOPSIS, Willd. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 492.
imbricata, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 496 = *parviflora*, Willd.

PHELLINE, Labill. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 493.

Balansae, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 937. — N. Caled.
brachyphylla, Baill. l. c. 938. — N. Caled.
confertifolia, Baill. l. c. 937. — N. Caled.
erubescens, Baill. l. c. 939. — N. Caled.
floribunda, Baill. l. c. 938. — N. Caled.
macrophylla, Baill. l. c. — N. Caled.
microcarpa, Baill. l. c. — N. Caled.
robusta, Baill. l. c. 939. — N. Caled.
wagapensis, Baill. l. c. 937. — N. Caled.

PHELYPAEA, Tourn. ex Linn. (Orobanch.). — Ind. Kew. ii. 493.
albiflora, Lojac. ex G. Beck, in *Luerss. Bibl. Bot.* Heft xix. (1890) 97 (Phelipaea) = *Orobancha Muteli*, F. Schultz.
fulgida, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1891) 658 = O. Muteli, F. Schultz.

PHELYPAEA : —

- libanotica*, Schweinf. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 357. [Phelipaea]. — Syria.
Melongenae, Noë, ex G. Beck, in *Luerss. Biblioth. Bot.* Heft xix. (1892) 101 [Phelipaea] = *Orobancha aegyptiaca*, Pers.
Millefolii, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 442 (= *P. Millefolii*, Nym.) = O. ramosa, Linn.
Pareyssi, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 357 (= O. Pareyssi, G. Beck) = O. purpurea, Jacq.
tenuiflora, G. Beck, in *Luerss. Biblioth. Bot.* Heft xix. (1892) 97 = O. Muteli, F. Schultz.

PHENAX, Willd. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 494.
pallida, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 259. — Bolivia.

PHEROTRICHIS, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 494.

- Balbisii*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 400 (= *Asclepias villosa*, Balbis). — Mexic.
leptogenia, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 319. — Mexic.
Schaffneri, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 400. — Mexic.
villosa, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 303 = P. Balbisii, Decne.

PHIALOCARPUS, Defflers, 'n Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 304. **CUCURBITACEAE**.
glomeruliflorus, Defflers, l. c. — Arabia.

PHIALODISCUS, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 494.

- plurijugatus*, Radlk. in *Sitz. Math.-Phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 263. — Angola.

PHILADELPHUS, [Riv.] Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 494.

- columbarius*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 342 = *Gordonianus*, Lindl.
columbiensis, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet. (1894) 280 = *grandiflorus*, Willd.
Coulteri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 472; et in *Gard. and For.* i. (1888) 232 fig. 40. — Mexic
Falconeri, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet. (1894) 225; et ex Sarg. in *Gard. and For.* viii. (1895) 494. — Hab.?
Godohokeri, Hort. Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 184, sphalm. (= *P. Godohokeri*, Hort.) = *laxus*, Schrad.
japonicus, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet. (1894) 227 = P. Satsumi, Sieb.
Kochianus, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 188. — Japon.
Lemoinei ×, Hort. ex Wien. Ill. Garten-Zeit. (1888) 124; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 341 fig. 179. — Hybr. artef.
pulchellus, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet. (1894) 227 (pulchella) = P. Satsumi, Sieb.
thyrsiflorus, Hort. l. c. = P. Lewisiai, Pursh.
umbellatus, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 181. — Hab.?
Yokohamae, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 343 = *Gordonianus*, Lindl.

PHILGAMIA hibernioides, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 265. — Madag.

PHILIBERTIA, H. B. & K. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 495.

- bicolor*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 395 = *elegans*, Hemsl.
biloba, A. Gray, l. c. = *cynanchoides*, B. Gray.
campanulata, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 96. — Peruvia.
clausa, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 229 = *viminalis*, A. Gray.
elegans, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. (1886) 87 in obs.; et in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 395. — Am. bor.
Ervendbergii, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 395. — Mexic.
Fendleri, A. Gray, l. c. Venezuela.
Gardneri, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 229 (= *Sarcostemma Gardneri*, Fourn.). — Bras.

PHILIBERTIA : —

- hypoleuca*, Schlechter, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 450. — Bolivia.
linearis, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 183 = *linearis*, A. Gray.
Palmeri, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 394. — Mexic.
refracta, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 207. — Guatem.
viridiflora, Britton, & Rusby, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* vii. (1887) 11. — Texas, Mexic.

PHILIPPIA, Klotzsch (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 495.

- adenophylla*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 332. — Madag.
benguensis, Welw. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 328, in syn. [an seq.?] = *Salaxis benguensis*, Engl.
benguensis, Welw. ex Britten, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 24. — Afr. trop.
capitata, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 499. — Madag.
cryptoclada, Baker, l. c. — Madag.
hispidia, Baker, l. c. — Madag.
Holstii, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 59; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 302. — Afr. trop. or.
intricata, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 441. — Ins. Borbon.
Johnstonii, Schweinf. ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 302. — Afr. trop. or.
leucoclada, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 332. — Madag.
milanjensis, Britten, & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 24. — Afr. trop.
minutifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 500. — Madag.
myriadenia, Baker, l. c. xxv. (1890) 332. — Madag.
pilosa, Baker, l. c. 332. — Madag.
scyplostigma, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 441. — Ins. Borbon.
senescens, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 332. — Madag.
Stuhlmannii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 302. — Afr. trop. or.
thomensis, Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 137. — Ins. S. Thom.
trichoclada, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 500. — Madag.
trimera, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 302 t. 33 fig. a-h. — Afr. trop. or.
tristis, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 187. — Afr. austr.

PHILIPPIAMRA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 58 = **Silvaea**, Phil. (Portul.).

- amarantoides*, Kuntze, l. c. = *S. amarantoides*, Phil.
celosoides, Kuntze, l. c. = *S. celosoides*, Phil.
corrigioloides, Kuntze, l. c. = *S. corrigioloides*, Phil.
pachyphylla, Kuntze, l. c. = *S. pachyphylla*, Phil.

PHILLIPSIA, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 223. **ACANTHACEAE**.

- fruticulosa*, Rolfe, l. c. — Reg. Somal.

PHILLYROPHYLLUM, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1890) 268; et ex Schinz. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 78. [Phillyrophyllum], **COMPOSITAE**.
Schinzii, O. Hoffm. *ll. cc.* — Afr. austro-occ. extratrop.

PHILODENDRON, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 495.

- Andreanum*, Devans. in *Rev. Hort.* lvi. (1886) 36 cum ic.; et *Rev. Hort.* Belge, xiii. (1887) 274 fig. 30. — N. Granat.
Corsinianum ×, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort. (1888) 211. — Hybr. artef.
Devansayanum, L. Linden, in *Illustr. Hort.* xlii. (1895) 376 t. 48. — Peruvia.
grandidens, Hort. ex *Rev. Hort.* Belge, xiii. (1887) 274 = *Andreanum*, Devans.
notabile, Hort. ex *Gard. Chron.* (1893) i. 414. — Form. hort.

PHILOMEDA, Noronha = **Gomphia**, Schreb. (Ochnac.).

- obovata*, Boivin. ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* i. (1886) 589, in syn. = *Ochna obovata*, Baill.
parvifolia, Boivin, ex Baill. l. c. = *O. parvifolia*, Baill.

PHILOPODIUM *rigidum*, Hort. ex Kew Bull. (1889) 102 = *Muehlenbeckia adpressa*, Meissn.

PHINAEA, Benth. (Gesnerac.). — Ind. Kew. ii. 497.

- rubida*, Fritsch, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 173; Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 99 (= *Niphaea crenata*, Karst.). — Am. austr.

PHLEUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 498.

- bulbosum*, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1889) 37 = *tenuis* Schrad.
Brueggeri ×, C. Richt. l. c. — Helv.
crispoides, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 269 = *Maillea Urvillei*, Parl.
sardoum, Hach. ex *Franch. l. c.* 274. — Sardinia.
subalpinum, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 195. — Helv.

PHLOGA, Noronha (Palm.). — Ind. Kew. ii. 498.

- microphoenix*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* ii. (1895) 1185. — Madag.
Scottiana, Becc. ex S. Elliot in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 61. — Madag.

PHLOGELLA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* ii. (1894) 1175; *Hist. des pl.* xiii. (1895) 372. **PALMAE**.

- Humblotiana*, Baill. l. c. — Ins. Comor.

PHLOMIS, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 498.

- albiflora*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 304. — China.
betonicifolia, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 580. — Turkest.
bucharica, Regel, l. c. 579 t. 10, fig. 2. — Buchara.
gracilis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 305. — China.
hissarica, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 594 t. 10, fig. 17. — Turkest.
javanica, Prain, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iii. 2 (1891) 231 (= *Leonurus javanicus*, Blume). — Java.
Maximowizii, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 594 t. 10, fig. 18. — Mandschuria.
oblongifolia, Prain, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iii. 2 (1891) 231. (= *Leonurus oblongifolius*, Blume). — Java.
Ostrowskiana, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 595 t. 10, fig. 19. — Turkest.
platystegia, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 407. — Syria.
setifera, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 149. — China.
tatsienensis, Bureau & Franch. l. c. — China.

PHLOX, Linn. (Polemon.). — Ind. Kew. ii. 500.

- albomarginata*, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1894) 367. — Am. bor. occ.
austromontana, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 151. — Calif.
dolichantha, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 310. — Calif.
gracilis, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 141; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 251 = *Gilia gracilis*, Dougl.
Kelseyi, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 225. — Am. loc.

PHOEBE, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 500.

- amoena*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 207 (= *Oreodaphne amoena*, Nees). — Bras., Reg. Argent.
amplexicaulis, Mez, l. c. 216 (= *Persea amplexicaulis*, Cham. & Schlecht.). — Mexic.
amplifolia, Mez & J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 261. t. 24. — Guatem.

PHOEBE : —

- Barbeyana*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 209. — Mexic.
Benthiana, Mez, l. c. 195 (= *Persea Hartwegii*, Hemsl.). — Mexic.
betazensis, Mez, l. c. 192. — Mexic.
Bourgeauviana, Mez, l. c. 194. — Mexic.
brasiliensis, Mez, l. c. 199. — Bras.
Ehrenbergii, Mez, l. c. 201. — Mexic.
erythropus, Mez, l. c. 189 = *Persea erythropus*, Nees & Mart.
estrellensis, Mez, l. c. 198 (= *Oreodaphne estrellensis*, Meissn.). — Bras.
Galeottiana, Mez, l. c. 200 = *Ocotea subtripinaria*, Hemsl.
Glaziovii, Mez, l. c. 216. — Bras.
Grisebachiana, Mez, l. c. 215 (= *P. cinnamomifolia*, Rich.). — Cuba.
Hausknechtii, Mez, l. c. 186. — Bras.
helicterifolia, Mez, l. c. 193 = *Ocotea helicterifolia*, Hemsl.
heteranthera, Mez, l. c. 185 = *Ruiziana*, Nees.
indica, Pax, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1889) 115 (= *Persea indica*, Spreng. pr. p.). — Ins. Canar.
Mathewsii, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 217. — Peruvia.
microneura, Mez, l. c. 204 = *Persea microneura*, Meissn.
mollis, Mez, l. c. 192. — Mexic.
nectandroides, Mez, l. c. 194. — Mexic.
pachypoda, Mez, l. c. 196 = *Persea pachypoda*, Nees.
pallescentia, Mez, l. c. 218. — Mexic.
patens, Mez, l. c. 204 (= *Mespilodaphne patens*, Meissn.). — Bras.
pauciflora, Mez, ex Taub. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 520. — Bras.
porosa, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 205 (= *Oreodaphne porosa*, Nees & Mart.). — Am. austr.
porphyria, Mez, l. c. 199 = *Nectandra porphyria*, Griseb.
purpurea, Mez, l. c. 196. — Guatem.
psychotrioides, Mez, l. c. 191 = *Ocotea psychotrioides*, H. B. & K.
Riedelii, Mez, l. c. 197 = *Persea Riedelii*, Meissn.
semecarpifolia, Mez, l. c. 217 (= *Oreodaphne semecarpifolia*, Meissn.). — Am. austr.
stenophylla, Mez, l. c. 190 = *Persea stenophylla*, Meissn.
subsessilis, Mez, l. c. 183 = *P. subsessilis*, Meissn.
tampicensis, Mez, l. c. 200. — Mexic.
tavoyana, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 143. — Tenass.
tetragona, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 184 (= *Oreodaphne tetragona*, Meissn.). — Bras.
tripinaria, Mez, l. c. 211 = *peruviana*, Meissn.
vesiculosa, Mez, l. c. 206 (= *Oreodaphne vesiculosa*, Nees). — Bras.

PHOENICANTHEMUM, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 502 et 544 = **Loranthus**, Linn.

- Balansae*, Van Tiegh. l. c. 503 (= *Dithecina Balansae*, Van Tiegh.). — N. Caled.
Bennettianum, Van Tiegh. l. c. 544 = *Loranthus Bennettianus*, Miq.
coccineum, Van Tiegh. l. c. 502 = *L. coccineus*, Jacq.
Hookerianum, Van Tiegh. l. c. 502 = *L. Hookeerianus*, Wight & Arn.
intermedium, Van Tiegh. l. c. = *L. intermedium*, Wight.
Kingii, Van Tiegh. l. c. 544. — Ins. Andam.
ligustrinum, Van Tiegh. l. c. 502 = *L. ligustrinus*, Wall.
obtusatum, Van Tiegh. l. c. 502 et 544 = *L. obtusatus*, Wall.

PHOENIX, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 501.

- erecta*, Hort. ex Sauvag. in *Rev. Hort.* lxvi. (1894) 495 = *canariensis*, Hort.
macrocarpa, Hort. ex Sauvag. l. c. = *canariensis*, Hort.
Marioposae ×, Hort. l. c. — Hybr. artef. ?

PHOENIX: —

- melanocarpa, *Naud. in Rev. Hort.* (1893) 563, (1894) 494 fig. 183 et 184; *et ex Gard. Chron.* (1893) ii. 299. — Hab.?
robusta, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 427. — Ind. or.
Roebelinii, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 475 et 758, fig. 68 = *humilis*, *Royle* var.

PHOLIDIA, R. Br. (Myopor.). — Ind. Kew. ii. 502.

- alternifolia*, Baill. ex Wettst. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 359 = *Eremophila alternifolia*, R. Br.
Brownii, Baill. l. c. = *E. Brownii*, F. Muell.
Drummondii, Baill. l. c. = *E. Drummondii*, F. Muell.
ericalyx, Baill. l. c. = *E. ericalyx*, F. Muell.
Forrestii, Baill. l. c. = *E. Forrestii*, F. Muell.
Fraseri, Baill. l. c. = *E. Fraseri*, F. Muell.
Gibsonii, Baill. l. c. = *E. Gibsonii*, F. Muell.
Gilesii, Baill. l. c. = *E. Gilesii*, F. Muell.
Hughesii, Baill. l. c. = *E. Hughesii*, F. Muell.
leucophylla, Baill. l. c. = *E. leucophylla*, F. Muell.
Macdonellii, Baill. l. c. = *E. Macdonellii*, F. Muell.
Mackinlayi, Baill. l. c. = *E. Mackinlayi*, F. Muell.
maculata, Baill. l. c. = *E. maculata*, F. Muell.
Mitchellii, Baill. l. c. = *E. Mitchellii*, F. Muell.
oppositifolia, Baill. l. c. = *E. oppositifolia*, R. Br.
Pantoni, Baill. l. c. = *E. Pantoni*, F. Muell.
rotundifolia, Baill. l. c. = *E. rotundifolia*, F. Muell.
Sturtii, Baill. l. c. = *E. Sturtii*, R. Br.

PHOLIDOCARPUS, Blume (Palm.). — Ind. Kew. ii. 502.

- macrocarpa, *Becc. Malesia*, iii. (1886) 92, t. 9, 1-3. — Penins. Mal.
mucronata, *Becc. l. c.* 91, t. 9, 4-5. — Sumatra?
sumatrana, *Becc. l. c.* 92, t. 10. — Sumatra.

PHOLIDOTA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 502.

- assamica, *Hort. Sand. ex Regel, in Gartenfl.* xxxix. (1890) 607, nomen. — Ind. or.
Convallariae, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1880; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 846 (= *Coelogyne Convallariae*, Reichb. f.). — Ind. or.
Griffithii, *Hook. f. ll. cc.* t. 1881; et 845. — Reg. Himal.
Lagardi, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 6. — Burma.
Laucheana, *Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6 (1892) 106, t. 259, fig. 6-13. — Hab.?
micrantha, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 847, sphalm. = *parviflora*, *Hook. f.*
obovata, *Hook. f. l. c.* 845. — Ind. or.
parviflora, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1891. — Perak.
protracta, *Hook. f. l. c.* t. 1877; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 845. — Ind. or.
repens, *Rolfe, in Kew Bull.* (1891) 199. — Ind. or.
sesquitoria, *Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6 (1893) 114, t. 266 i. fig. 1-7. — Borneo.

PHORADENDRON, Nutt. (Loranth.). — Ind. Kew. ii. 502.

- Brittonianum, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 254. — Bolivia.
Diguettianum, *Van Tiegh. in Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 31. — Calif. infer.
obovatifolium, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci.* vii (1893) 216. — Parag.
Roraimae, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. ii. (1887) 281; (*Oliver, ex im Thurn, in Timelri*, v. (1886) 201). — Guian. angl.
thaculense, *Loesen, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 536. — Mexic.

PHORMIUM, Forst. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 503.

- Hookeri, *Gunn, in Bot. Mag.* (1888) t. 6973. — N. Zel.

PHOTINIA, Lindl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 503.

- dentata, *Hort. ex Gard. Kew*, i. Polypet. (1894) 215 = *serrulata*, *Lindl.*

PHOTINIA: —

- defflexa, *Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 153. — Formosa.
elliptica, *Nichols. Dict. Gard.* iii. (1886) 108 = *Eriobotrya elliptica*, *Lindl.*
foliolosa, *Koehne, Deutsche Dendrol.* (1891) 19 = *Pyrus foliolosa*, *Wall.*
japonica, *Benth. & Hook. f. ex Aschers. & Schweinf.* in *Mém. Inst. égypt.* [Illustr. Fl. Égypt.] (1887) 73 = *Eriobotrya japonica*, *Lindl.*
variabilis, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. (1887) 263. — Japon, China.
Wrightiana, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 486. — Japon.

PHRAGMANTHERA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 261 = **Loranthus**, Linn.

- cinerea*, Van Tiegh. l. c. 262 = *L. cinereus*, *Engl.*
cistoides, Van Tiegh. l. c. = *L. cistoides*, *Welw.*
fulva, Van Tiegh. l. c. = *L. fulvus*, *Engl.*

PHRAGMITES, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 502.

- dioica, *Hook. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 2 (1887) 68. — Am. austr.
Loscosii, *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 13. — Hisp.
Phragmites, *Karst. Deutschl. Fl.* (1880-83) 378; *Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal.* (1888) 69 = *communis*, *Trin.*

PHREATIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 503.

- albiflora, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 326. — N. Guin.
formosana, *Rolfe, ex Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 156. — Formosa.
Listeri, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 358. — Ins. Christmas.
nana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 811; *et in Hook. Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2084. — Perak.
parvula, *Benth. ex Hook. f. l. c.* v. (1890) 811 (= *Octarrhena parvula*, *Thw.*). — Zeyl.
papuana, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 327. — N. Guin.

PHRODUS, Miers (Solan.). — Ind. Kew. ii. 504.

- breviflorus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 20. — Chili.
pendulus, *Phil. l. c.* 20 = seq.
pendulus, *Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 14 (= *Rhopalostigma pendulum*, *Phil.*). — Chili.
thymifolius, *Phil. l. c.* 20 = *P. Bridgesii*, *Miers.*

PHRYGANOCYDIA, Mart. = **Macfadyena**, A. DC. (Bignon.).

- Coito, *Warm. Symb. Fl. Bras. centr.* xl. (1893) 1226 = *M. Coito*, *Miers.*
corymbosa, *Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 224. — Am. austr.

PHRYGILANTHUS, Eichl. = **Loranthus**, Linn.

- aphyllus, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 228 = *aphyllus*, *Eichl.*
Berteroi, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 178 = *Loranthus Berteroi*, *Hook. & Arn.*
heterophyllus, *Van Tiegh. l. c.* = *L. heterophyllus*, *Ruiz & Pav.*
radicans, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 229; *et xviii.* (1894) 441 et 465 = *L. radicans*, *Phil.*

PHRYNIUM, Loeffl. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 504.

- Cadellianum, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Inn.* vi. (1892) 260. — Ins. Andam.
Griffithii, *Baker, in Hook. f. l. c.* — Malacca.
jucundum, *Hort. ex Rev. Hort. Belg.* xiv. (1888) 16 = *variegatum*, *Hort.*
macrocephalum, *K. Schum. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 30. — N. Guin.
plicatum, *Hort. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 94 = *Calathea flavescens*, *Lindl.*

PHRYNIUM: —

- tapiorum, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 382. — Penins. Mal.
textile, *Ridl. in Journ. Bot.* xxv. (1887) 133. — Angola.
thyrsiflorum, *Hort. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1860) 160 = *Ctenanthe setosa*, *Eichl.*
variegatum, *N. E. Br. in Illustr. Hort.* xxxiii. (1886) 125 t. 606. — Hab.?

PHTHEIROSERMUM, Bunge (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 505.

- tenuisectum, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 129; *Prain, in Hook. Icon. pl.* xxxiii. (1892) t. 2211. — Reg. Himal., Tibet.

PHTHIRUSA, Mart. = **Loranthus**, Linn.

- loranthoidea, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 70, in obs. = *L. loranthoideus*, *Van Tiegh.*

PHUCAGROSTIS, Cavolini = **Cymodocea**, Kon. (Naiad.).

- isoetifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 744 [Phycagrostis] = *C. isoetifolia*, *Aschers.*
manatorum, *Kuntze, l. c.* = *C. manatorum*, *Aschers.*
nodosa, *Kuntze, l. c.* = *C. aequorea*, *Kon.*
serrulata, *Kuntze, l. c.* = *C. serrulata*, *Aschers. & Magnus.*

PHUS glabra, Macoun, in *Erythea*, i. (1893) 144 [err. typ.] = *Rhus glabra*, *Linn.***PHYLACIUM**, Benn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 505.

- majus, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii (1890) 44 t. 7. — Burma.

PHYLICA, Linn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 505.

- leucocephala, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 414 (= *Blaeria leucocephala*, *Berg.*). — Ins. Borbon.

PHYLLACTIS, Pers. (Valerian.). — Ind. Kew. ii. 506.

- mapirensis, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 263. — Bolivia.

PHYLLAGATHIS, Blume (Melast.). — Ind. Kew. ii. 506.

- elliptica, *Stapf. in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) 2279. — Borneo.
hirsuta, *Cogn. in Illustr. Hort.* xli. (1894) 41 t. 3. — Borneo.
tonkinensis, *Stapf, in Ann. Bot.* vi. (1892) 316. — Tonkin.
uniflora, *Stapf, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2280. — Borneo.

PHYLLANTHUS, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 506.

- albizzoides, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 289. — Burma.
Boehmii, *Pax, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 525. — Afr. trop. or.
Brandegei, *Mills. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 218. — Calif.
Braunii, *Pax, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 525. — Afr. trop. occ.
brevipes, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 297. — Reg. Himal.
capillariformis, *Vatke & Pax, ex Pax, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 523. — Afr. trop. or.
capilliformis, *Pax & Vatke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 20; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 18 [an praec.?] — Afr. trop.
chacoensis, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 218. — Parag.
Chamaepeuce, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 345. — Penins. Mal.
ciliato-glandulosus, *Mills. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 219. — Calif.
Clarkei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 297. — Reg. Himal.
columnaris, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 356. — N. Guin.

PHYLLANTHUS : —

- cryptophilus*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 48 (= *Monarda cryptophila*, Juss.). — Madag.
cupuliformis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 356. — N. Guin.
Dinklagei, Pax, l. c. xix. (1894) 77. — Gabon.
elongatus, Klotzsch, ex Gard. Chron. (1894) i. 526. [an Steud.?] — Bras.
Engleri, Pax, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 236. — Afr. trop. or.
Finschii, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 205. — N. Guin.
Fischeri, Pax, l. c. xix. (1894) 77. — Afr. trop. or.
gigantifolius, Vidal, *Rev. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 236. — Ins. Philipp.
gomphocarpus, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 301. — Perak.
Hellwigii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 198. — N. Guin.
Hildebrandtii, Pax, l. c. xv. (1893) 526. — Reg. Somal.
humilis, Pax, l. c. x. (1889) 35. — Afr. austr.
Humboldtianus, Baill. *Hist. pl. Madag.* Atlas, (1892) t. 221. — Madag.
humilis, Pax, in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 34. — Afr. austr.
hypospodius, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Mar. 1892) 177; et in *Bot. Centralbl.* i. (1892) 125. — Austral.
keyensis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 355. — N. Guin.
Kunstleri, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 292. — Penang.
lalabensis, Schweinf. ex Penzig, in *Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 360, nomen. — Erithrea.
leucanthus, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 524. — Afr. trop. or.
macranthus, Pax, l. c. xix. (1894) 77. — Mossamb.
macropus, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 287. — Reg. Himal.
meruensis, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 526. — Afr. trop. or.
minutiflorus, F. Muell. & Tate, in *Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xiii. (June 1890) 98 = *rhytidospermus*, Muell. Arg.
missionis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 297. — Deccan.
nanus, Hook. f. l. c. 298. — Burma.
oblongifolius, Pax, in *Forschungs. Gazelle Bot.* [Siphon.] 48; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1890) 19. — Malaya.
paniculatus, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2372. — Ins. Salom.
pectinatus, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 290. — Ind. or.
pedunculatus, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 357. — N. Guin.
pomiferus, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 289. — Burma.
Prainianus, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 123. — Burma.
Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 147. — Mexic.
scabrifolius, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 299. — Concan.
sessilis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 357. — N. Guin.
Stuhlmanii, Pax, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* c. (1895) 236. — Afr. trop. or.
suffrutescens, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 523. — Afr. trop. or.
vergens, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1892) t. 225. — Madag.
Volkenii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 236. — Afr. trop. or.

PHYLLARTHON, DC. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 512.

- articulatum*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1895) 251 = *Noronhaeanum*, DC.
madagascariensis, K. Schum. l. c. 3b (1895) 250 (= *Arthrophyllum madagascariense*, Boj.). — Madag.

PHYLLIS, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 512. *viscosa*, Christ. in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 144. — Teneriffa.

PHYLLOBOEA, Benth. (Gesner.). — Ind. Kew. ii. 512. *sinensis*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1721. — China centr.

PHYLLOCACTUS, Link (Cact.). — Ind. Kew. ii. 512. *Campmanni*, Hook. ex *Gartenfl.* xxxvi. (1887) 39. — Form. hort.
Franzii, Hort. Germ. ex Hildm. in *Gartenfl.* xli. (1892) 225 t. 1370 fig. 1. — Hybr. artef.
Gaertneri, K. Schum. in *Ruempl. et K. Schum. Die Sukkulente.* (1892) 147 fig. 80; et in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iv. (1894) 105. — Bras.
Pommer Eschei X. Hildm. in *Gartenfl.* xli. (1892) 225 t. 1370 fig. 2. — Hybr. artef.
Russellianus, K. Schum. in *Ruempl. & K. Schum. Die Sukkulente.* (1892) 147 fig. 79. — Bras.
Thomasianus, K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* v. (1895) 6 cum ic. — Am. trop.

PHYLLOCHLAMYS, Bureau (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 513. *Wallichii*, King, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 489. — Penang.

PHYLLOCLINIUM, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 870; Warb. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 38. *BIXINEAE*. *paradoxum*, Baill. ll. cc. — Congo.
Soyauxianum, Baill. ex Warb. l. c. 38. — Afr. trop. occ.

PHYLLICTENIUM, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 692; et *Hist. des pl.* x. (1888) 57 K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 247. *BIGNONIACEAE*. *Bernieri*, Baill. ll. cc. — Madag.

PHYLLODES, Lour. = **Phrynium**. Loebl. (Scit-tam.).

- aemulum*, *affine*, *albicans*, *allonia*, *altissimum*, *amplissimum*, *applicatum*, *argyreaum*, *Baraguinii*, *Bachemianum*, *barbatum*, *bellum*, *blandum*, *brachystachyum*, *brasiliense*, *brevipes*, *chimboraense*, *chrysanthum*, *chrysoleucum*, *cinereum*, *coloratum*, *comosum*, *concolor*, *confertum*, *crocatum*, *densum*, *dicephalum*, *Eichleri*, *eximium*, *exscapum*, *fasciatum*, *grandis*, *grandiflorum*, *guianense*, *hieroglyphicum*, *inocephalum*, *insigne*, *Jagorianum*, *Kummerianum*, *lanatum*, *laterale*, *Legrellianum*, *leopardinum*, *leucostachys*, *Lietzei*, *Lindbergii*, *Lindenianum*, *longibracteatum*, *longifolium*, *macilentum*, *Mannii*, *Mansonis*, *maximum*, *mediopictum*, *metallicum*, *micans*, *microcephalum*, *mirabile*, *modestum*, *monophyllum*, *Myrosma*, *nigrocostatum*, *nitens*, *nobilis*, *oblongum*, *Oppenheimianum*, *ornatum*, *ovatum*, *pachystachyum*, *pacificum*, *peruvianum*, *picturatum*, *princeps*, *propinquum*, *pulchellum*, *pumilum*, *Rossii*, *rotundifolium*, *rufibarbum*, *Sellowii*, *smaragdinum*, *stramineum*, *strobiliferum*, *taeniosum*, *trifasciatum*, *tuberosum*, *tubispatum*, *umbrosum*, *undulatum*, *varians*, *variegatum*, *Veitchianum*, *velutinum*, *vestitum*, *villosum*, *violaceum*, *virgatum*, *virginale*, *vittatum*, *Wallisii*, *Warszewiczii*, *Wiotiana*, *zebrinum*, *zingiberinum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 692-97 = *homonyma omnia* Calatheae.
Achiro, Kuntze, l. c. 696 = *C. capitata*, Lindl.
Ackermannii, Kuntze, l. c. = *C. Ackermannii*, Koern.
adenocarpum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 442. — Afr. trop. occ.
angustifolium, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 695 = *Phrynium angustifolium*, Lodd.
Arrabidae, Kuntze, l. c. 696 = *Calathea Arrabida*, Koern.
arrectum, Kuntze, l. c. = *C. arrecta*, Lindl. & André.
baccatum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 442. — Afr. trop.

PHYLLODES :

- bisubulatum*, K. Schum. in *Bolet. Soc. Brot.* xi. (1893) 83. — Angola,
brachystachyum, K. Schum. l. c. = *Phrynium brachystachyum*, Benth.
capitatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 694 = *P. capitatum*, Willd.
cylindricum, Kuntze, l. c. 696 = *Calathea grandifolia*, Lindl.
densiflorum, Kuntze, l. c. 695 = *Phrynium densiflorum*, Blume.
fasciculatum, Kuntze, l. c. = *P. fasciculatum*, Horan.
flexuosum, Kuntze, l. c. = *P. flexuosum*, Benth.
flexuosum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 445 = *praeac.*
Glaziovii, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 696 = *Calathea Glaziovii*, Benth.
Grisebachianum, Kuntze, l. c. = *C. macrostachya*, Griseb.
Hookeri, Kuntze, l. c. = *C. colorata*, Benth. & Hook. f.
imbricatum, Kuntze, l. c. 695 = *Phrynium imbricatum*, Roxb.
latifolium, Kuntze, l. c. = *P. latifolium*, Blume.
leiogonium, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 442. — Afr. trop.
littorale, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 695 = *Calathea littoralis*, Koern.
luteum, Kuntze, l. c. = *C. discolor*, G. F. W. Mey.
Mackoyanum, Kuntze, l. c. = *C. Makoyana*, Ed. Morr.
macrophyllum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 444. — Afr. trop. occ.
macrostachyum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 695 = *Phrynium macrostachyum*, Wall.
macrostachyum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 445 = *praeac.*
Mandiocae, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 696 = *Calathea Mandiocae*, Koern.
maximum, Kuntze, l. c. 695 = *Phrynium maximum*, Blume.
molle, Kuntze, l. c. = *P. villosum*, Benth.
monophyllum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 440. — Afr. trop. occ.
monostachyum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 695 = *Phrynium macrostachyum*, Wall.
Neowiedii, Kuntze, l. c. = *Calathea Neowiedii*, Lodd.
obliquum, Kuntze, l. c. = *Phrynium obliquum*, Lodd.
oxycarpum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 443. — Afr. trop. occ.
Pavonianum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 695 = *Calathea pavonina*, C. Koch & Linden.
platyphyllum, Kuntze, l. c. 696 = *C. latifolia*, Klotzsch.
prionogonium, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 441. — Kamerun.
pubigerum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 695 = *Phrynium pubigerum*, Blume.
pubinerve, Kuntze, l. c. = *P. pubinerve*, Blume.
roseopictum, Kuntze, l. c. = *Calathea rosea-picta*, Regel.
Ruizianum, Kuntze, l. c. 696 = *C. capitata*, Lindl.
spicatum, Kuntze, l. c. 695 = *Phrynium spicatum*, Roxb.
stenophyllum, Kuntze, l. c. 696 = *Calathea augustifolia*, Koern.
sumatranum, Kuntze, l. c. 695 = *Phrynium sumatranum*, Miq.
textile, Th. Dur. & Schinz. *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 133 = *P. textile*, Ridl.
truncatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 696 = *Calathea orbiculata*, Lodd.
villosum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 445: Th. Dur. & Schinz. *Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 133 = *Phrynium villosum*, Hook. f.
virgatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 696 = *Clino-gyne virgata*, Benth. & Hook. f.
Widgrenii, Kuntze, l. c. = *Calathea Widgrenii*, Koern.

PHYLLORCHIS, Thou, in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* (1809) 314/9; ex Kuntze. *Rev. Gen.* (1891) 675 = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).
adenopetala, *affinis*, *albida*, *albicornis*, *Alopecurus*,

PHYLLORCHIS:

Andersonii, *angustifolia*, *antennifera*, *apoda*, *Argyropus*, *aristata*, *aurantiaca*, *aurata*, *aurea*, *auricoma*, *Baileyi*, *barbigera*, *Baronii*, *Beccarii*, *bicolor*, *bifaria*, *biseta*, *Blepharistes*, *Bowkettiae*, *bracteolata*, *brevipes*, *caespitosa*, *calamaria*, *candida*, *capillipes*, *capitata*, *caudata*, *cauliflora*, *cernua*, *Cheiri*, *chinensis*, *chloroptera*, *ciliata*, *cirrhatta*, *clavigera*, *cochleata*, *comata*, *comosa*, *conchifera*, *concinna*, *conferta*, *coriscensis*, *crassifolia*, *crassipes*, *crocea*, *Cunningii*, *cuprea*, *cylindraca*, *Dayana*, *Dearei*, *distans*, *elegans*, *Elisae*, *elongata*, *eublephara*, *exaltata*, *exigua*, *falcipetala*, *flavescens*, *flavida*, *fusca*, *fusco-purpurea*, *gamosepala*, *geraensis*, *gibbosa*, *gladiata*, *Globulus*, *grandiflora*, *gravidia*, *Gymnopus*, *Hildebrandtii*, *hirsuta*, *hirta*, *hymenantha*, *imbricata*, *inaequalis*, *iners*, *intertexta*, *javanica*, *Kingii*, *lasiantha*, *lasiophila*, *laxiflora*, *lemniscata*, *leopardina*, *leptantha*, *leptosepala*, *lichenastrum*, *limbata*, *Lindleyana*, *Lobbii*, *Lundiana*, *lupulina*, *macrantha*, *maculosa*, *Mannii*, *maxillaris*, *Medusae*, *megalantha*, *megalonyx*, *membranacea*, *membranifolia*, *merguncis*, *meridensis*, *micrantha*, *micropetala*, *microsepala*, *minutissima*, *mischmeensis*, *modesta*, *moniliformis*, *monticola*, *mucronata*, *mucronifolia*, *multiflora*, *mutabilis*, *Napelli*, *nasuta*, *nematopoda*, *obtus*, *occlusa*, *odorata*, *odoratissima*, *Oerstedtii*, *oligoglossa*, *oreonastes*, *ovalifolia*, *paleacea*, *parviflora*, *parvula*, *patens*, *pavimenta*, *Penicillium*, *petiolaris*, *pilata*, *Pipio*, *polyrhiza*, *Prenticei*, *protracta*, *psittacoglossa*, *Psychoon*, *Pumilio*, *punctata*, *purpurascens*, *pygmaea*, *quadriseta*, *radiata*, *recurva*, *Reinwardtii*, *repens*, *reptans*, *reticulata*, *Rhizophorae*, *rostriceps*, *rufilabra*, *rufina*, *saltatoria*, *Sceptrum*, *Schefferi*, *Schmidtiana*, *secunda*, *setigera*, *scyphellarum*, *Sicyobulbon*, *Silléniana*, *sordida*, *stenobulbon*, *striata*, *striatella*, *suavissima*, *sulcata*, *tenella*, *tenuicaulis*, *tenuiflora*, *Thompsonii*, *Thwaitesii*, *tortuosa*, *tremula*, *tridentia*, *triflora*, *tripetala*, *tristis*, *unguiculata*, *uniflora*, *vermicularis*, *violacea*, *virens*, *vittata*, *Wrayi*, *xylophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 675-78 = *homonyma omnia* Bulbophylli.

acutiflora, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum acutiflorum*, Hook. f.

biflora, Kuntze, l. c. = *Bulbophyllum bifarium*, Hook. f.

Blumei, Kuntze, l. c. 676 = *B. cuspidilingua*, Reichb. f.

bootanensis, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum bootanense*, Griff.

Bufo, Kuntze, l. c. = *Megaclinium Bufo*, Lindl.

Bulbophylli, Kuntze, l. c. 676 = *Bulbophyllum Griffithii*, Reichb. f.

caespitosa, Kuntze, l. c. 675 = *B. caespitosum*, Thou.

clavata, Kuntze, l. c. = *B. clavatum*, Thou.

Collettii, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum Collettii*, Hemsl.

Commersonii, Kuntze, l. c. 675 = *Bulbophyllum Commersonii*, Thou.

colubrina, Kuntze, l. c. 677 = *Megaclinium colubrinum*, Reichb. f.

cornuta, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum cornutum*, Lindl.

densa, Kuntze, l. c. 675 = *Bulbophyllum densum*, Thou.

Diphyes, Kuntze, l. c. 676 = *B. capitatum*, Lindl.

Elaidum, Kuntze, l. c. 677 = *B. elaidium*, Lindl.

elata, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum elatum*, Hook. f.

Elliae, Kuntze, l. c. 676 = *C. Wightii*, Thw.

erecta, Kuntze, l. c. = *Bulbophyllum erectum*, Thou.

falcata, Kuntze, l. c. 677 = *Megaclinium falcatum*, Lindl.

fimbriata, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum fimbriatum*, Lindl.

Gamblei, Kuntze, l. c. = *C. Gamblei*, Hook. f.

gracilis, Kuntze, l. c. 675 = *Bulbophyllum Thouarsii*, Steud.

guttulata, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum guttulatatum*, Hook. f.

Helinae, Kuntze, l. c. 676 = *C. cornutum*, Lindl.

Hermiinostachys, Kuntze, l. c. 677 = *Bulbophyllum herminostachys*, Reichb. f.

Hookeri, Kuntze, l. c. 676 = *Cirrhopetalum Thomsoni*, Hook. f.

PHYLLORCHIS: —

incurva, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 675 = *Bulbophyllum incurvum*, Thou.

Josephii, Kuntze, l. c. 677 = *B. aurantiacum*, Hook. f.

kaitiensis, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum neilgherense*, Wight.

longiflora, Kuntze, l. c. 675 = *C. Thouarsii*, Lindl.

longiscapa, Kuntze, l. c. 677 = *C. longiscapum*, Teijsm. & Binn.

Macraei, Kuntze, l. c. = *C. Wightii*, Thw.

maxima, Kuntze, l. c. = *Megaclinium maximum*, Lindl.

minuta, Kuntze, l. c. 675 = *Bulbophyllum minutum*, Thou.

monantha, Kuntze, l. c. 676 = *B. uniflorum*, Griff.

nilgherensis, Kuntze, l. c. 677 = *B. neilgherense*, Wight.

nutans, Kuntze, l. c. 675 = *B. nutans*, Reichb. f.

occulta, Kuntze, l. c. = *B. occultum*, Thou.

ornatissima, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum ornatissimum*, Reichb. f.

Othonis, Kuntze, l. c. 676 = *C. nutans*, Lindl.

oxyptera, Kuntze, l. c. 677 = *Megaclinium oxypteryum*, Lindl.

pachyrrhachis, Kuntze, l. c. = *Bulbophyllum pachyrrhachis*, Griseb.

pendula, Kuntze, l. c. 675 = *B. pendulum*, Thou.

picturata, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum picturatum*, Lodd.

prismatica, Kuntze, l. c. = *Bulbophyllum prismaticum*, Thou.

purpurea, Kuntze, l. c. 676 = *B. Careyanum*, Spreng.

pusilla, Kuntze, l. c. 675 = *B. pusillum*, Thou.

refracta, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum refractum*, Zoll.

Reichenbachii, Kuntze, l. c. 676 = *Bulbophyllum gracile*, Parish & Reichb. f.

retusiuscula, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum retusiusculum*, Reichb. f.

Ridleyana, Kuntze, l. c. = 676 = *C. concinnum*, Hook. f.

Rolfei, Kuntze, l. c. 677 = *C. parvulum*, Hook. f.

Roxburghii, Kuntze, l. c. = *C. Roxburghii*, Lindl.

sessilis, Kuntze, l. c. 676 = *Bulbophyllum clandestinum*, Lindl.

Shepherdii, Kuntze, l. c. 677 = *B. Shepherdii*, F. Muell.

simillima, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum simillimum*, Reichb. f.

taeniophylla, Kuntze, l. c. = *C. taeniophyllum*, Parish & Reichb. f.

Thomsonii, Kuntze, l. c. = *Bulbophyllum Thomsoni*, Ridl.

Trimenii, Kuntze, l. c. 676 = *B. purpureum*, Thw.

umbellata, Kuntze, l. c. 675 = *Cirrhopetalum Thouarsii*, Lindl.

vaginata, Kuntze, l. c. 677 = *C. vaginatum*, Lindl.

variegata, Kuntze, l. c. 675 = *Bulbophyllum variegatum*, Thou.

velutina, Kuntze, l. c. 677 = *Megaclinium velutinum*, Lindl.

viridiflora, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum viridiflorum*, Hook. f.

Wallichii, Kuntze, l. c. 676 = *C. Wallichii*, J. Grh.

Weddellii, Kuntze, l. c. 678 = *Bulbophyllum Weddellii*, Reichb. f.

Wightii, Kuntze, l. c. 676 = *Cirrhopetalum grandiflorum*, Wight.

PHYLLODESISMIS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 255 = **Loranthus**, Linn.

coriacea, Van Tiegh. l. c. 256. — Yunnan.

Delavayi, Van Tiegh. l. c. 255. — Yunnan.

paucifolia, Van Tiegh. l. c. 256. — Yunnan.

PHYLLOGONUM, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 190. **POLYGONEAE**.

luteolum, Coville, l. c. t. 21. — Calif.

PHYLLONOMA, Willd. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 513.

integerrima, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 11 = *Dulongia integerrima*, Turcz.

PHYLLONOMA: —

laticarpis, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a (1891) 88, sphalm.? = *Dulongia latifolia*, Turcz.

PHYLLOSTACHYS, Sieb. & Zucc. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 514.

heteroclada, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2288. — China.

PHYLLOSTEGIA, Benth. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 514.

ambigua, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 350. — Ins. Sandvic.

hispida, Hillebr. l. c. 353. — Ins. Sandvic.

Knudsenii, Hillebr. l. c. 354. — Ins. Sandvic.

linearifolia, Drake, l. c. (1886) 46 t. 20. — Ins. Sandvic.

PHYLLOSTEPHANUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 358 = **Loranthus**, Linn.

Andreanus, Van Tiegh. l. c. — Ecuad.

Engelsii, Van Tiegh. l. c. — Columb.

PHYLLOSTYLON, Capan. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 514.

rharnoides, Taub. in Oest. Bot. Zeitsch. xl. (1890) 409. — Bras.

PHYLLOXYLON, Baill. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 514.

ensifolium, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 44. — Madag.

PHYSALIS, Linn. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 514.

ambigua, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 287. — Am. bor.

arenicola, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 485. — Florida.

cinerascens, A. S. Hitchcock, Spring Fl. Manhattan, (1894) 32. — Am. bor.

comata, Rydberg, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 306. — Am. bor.

digitalifolia, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 288 = *hederaefolia*, A. Gray.

Francheti, Mast. in Gard. Chron. (1894) ii. 434 et 441, fig. 57; et ex Gartenfl. xlv. (1895) 458. — Japon.

Greenei, Vasey & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 18. — Calif.

macrophysa, Rydberg, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 308. — Am. bor.

microphysa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 402. — Mexic.

pedunculata, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 268 = *P. Greenei*, Vasey & J. N. Rose.

subulata, Rydberg, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 306. — Mexic.

versicolor, Rydberg, l. c. 307. — Am. bor.

viscida, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 49. — Ins. Fernando Noronha.

PHYSALODES, Boehmer, in Ludwig. Defin. (1760) 42, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 452 = **Nicandra**, Adans. (Solan.).

peruvianum, Kuntze, l. c. = *N. physaloides*, Gaertn.

Physalodes, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1892) 287 = *N. physaloides*, Gaertn.

PHYSALOIDES, Moench = **Withania**, Pauq. (Solan.).

physaloides, Britton, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 142 = *Nicandra physaloides*, Gaertn.

PHYSARIA, A. Gray (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 516.

argentea, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 263 = *Vesicaria Ludoviciana*, DC.

montana, Greene, Fl. Francisc. (1891) 249 = *Vesicaria montana*, A. Gray.

- PHYSIDIUM**, Schrad. = **Angelonia**, Humb. & Bonpl. (Scrophul.).
cornigerum, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 116 = *A. cornigera*, Hook.
Gardneri, Nichols. l. c. = *A. Gardneri*, Hook.
- PHYSOCARPUS**, Rafin. = **Neillia**, D. Don (Rosac.).
capitatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 219 = *N. opulifolia*, Benth. & Hook. f.
flexuosus, Kuntze, l. c. = *Stephanandra flexuosa*, Sieb. & Zucc.
gracilis, Kuntze, l. c. = *S. gracilis*, Franch. & Sav.
Hanceanus, Kuntze, l. c. 218 = *S. chinensis*, Hance.
malvaceus, Kuntze, l. c. 219 = *N. malvacea*, Greene.
monogynus, Kuntze, l. c. 218, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 104 = *N. Torreyi*, S. Wats.
sinensis, Kuntze, l. c. = *N. sinensis*, Hook. f.
Tanaka, Kuntze, l. c. 219 = *Stephanandra Tanaka*, Franch. & Sav.
thyrsiflorus, Kuntze, l. c. 218 = *Neillia thyrsiflora* D. Don.
opulifolius, Maxim. ex Koehne, Deutsch. Dendrol. (1893) 209 = *Spiraea opulifolia*, Linn.
- PHYOPTYCHIS**, Boiss. = **Vesicaria**, Tourn. (Crucif.).
gnaphalodes, Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 196 = *gnaphalodes*, Boiss.
Hausknechtii, Bornm., in Mitth. Thür Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 65. — Oriens.
- PHYSIPHON**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 517.
guatemalensis, Rolfe, in Kew Bull. (1891) 197. — Guatem.
Lindleyi, Rolfe, l. c. (1893) 61. — Mexic.
- PHYSOSTEGIA**, Benth. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 517.
denticulata, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 284 = *Dracocephalum denticulatum*, Ait.
- PHYSOSTELMA**, Wight (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 517.
carnosa, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 88. — Burma.
- PHYSOSTIGMA**, Balf. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 517.
mesopotamicum, Taub. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xii. (1894) 81. — Afr. or. germ.
- PHYSURUS**, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 517.
humilis, Cogn. in Mart. Fl. Bras. ii. IV. (1895) 232 t. 55, fig. 1. — Bras.
Lindleyanus, Cogn. l. c. 238 t. 55, fig. 2. — Bras.
Peterianus, Cogn. l. c. 227 t. 52, fig. 1 (= *P. roseus*, Reichb. f.). — Guin. bat.
- PHYTEUMA**, Linn. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 517.
Huteri, Murr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 47, et in Progr. Oberrealschule Innsbruck (1890-91) 56. — Tirol.
italicum, Arv.-Touv. in Bull. Soc. Dauph. xiv. (1887) 584. — Ital.
Khekii, Murr. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 224; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 98. — Tirol.
Murrianum, Borb. ex Murr. in Progr. Oberrealsch. Innsbruck (1890-91) 56; et ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) 125. — Tirol.
obtusifolium, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 56. — Bosnia.
Pseudo-orbiculare, Freyn, in Verh. zool.-bot. Ges. xxxvii. (1888) 618 = *obtusifolium*, Freyn.
rumelicum, Orph. & Janka, ex Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 520, in syn. (= *Diosphaera calcidica*, Buser). — Graecia.
trichocalycinum, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1888) 63 = *Podanthum trichocalycinum*, Boiss.
- PHYTOLACCA**, Tourn. ex Linn. (Phytol.). — Ind. Kew. ii. 519.
japonica, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 49. — Japon.
polyandra, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 99. — China.
volubilis, Heimerl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 11 (= *Ercilla volubilis*, A. Juss.). — Am. austr. occ.
- PIARANTUS**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 519.
comptus, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 892a, b. — Afr. austr.
grivanus, N. E. Br. l. c. t. 1924 a. — Afr. austr.
- PIAROPUS**, Rafin. = **Eichhornia**, Kunth (Ponted.).
crassipes, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 241 = *crassipes*, Rafin.
- PICEA**, Link (Conif.). — Ind. Kew. ii. 519.
acicularis, Maxim. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 380 (= *P. japonica*, Regel). — Japon.
acutissima, Hort. ex Beissn. l. c. 342 et 358 = *alba*, Link et excelsa, Link.
alpestris, Bruegg. ex Stein, in Gartenfl. xxxvii. (1887) 346. — Helv.
bicolor, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 380 = *polita*, Carr.
canadensis, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 71; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 23 = *alba*, Link.
commutata, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 346 = *pungens*, Engelm.
Cranstoni, Hort. ex Beissn. l. c. 360 = *excelsa*, Link.
elegantissima, Hort. ex Beissn. l. c. 367 = *excelsa*, Link.
finlandensis, Hort. ex Beissn. l. c. = *excelsa*, Link.
glauca, Hort. ex Beissn. l. c. 342 = *alba*, Link.
Gregoryana, Hort. ex Beissn. l. c. 364 = *excelsa*, Link.
hondoensis, Mayr. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 24. — Ins. Hondo.
Mariana, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 71; Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 496; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 23 = *nigra*, Link.
Mariana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 800 = *nigra*, Link.
Maxwelli, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 366 = *excelsa*, Link.
omorica, Panic. ex Stein, in Gartenfl. xxxvi. (1887) 13 fig. 4 et 5; Eichl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1 (1889) 79; Wettst. in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. xcix. (1890) 533 = *P. Omorika*, Mast.
Parsonsiana, Barron, ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 473 = *Abies concolor*, Lindl. & Gard.
Remonti, Hort. ex Beissn. l. c. 363 = *excelsa*, Link.
sitchensis, Mayr. ex Beissn. l. c. 390 = *sitchensis*, Trautv. & Mey.
tenuifolia, Hort. ex Beissn. l. c. 433 = *Abies pectinata*, DC.
Thunbergii, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 22 in obs. = *Abies Thunbergii*, Lamb.
Torano, Koehne, l. c. 22 = *polita*, Carr.
viminialis, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 360 = *excelsa*, Link.
Yezomonii, Hort. ex Beissn. l. c. 338 = *ajanensis*, Fisch.
- PICHLERIA**, Stapf & Wettst. in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 56 **UMBELLIFERAE**.
cruciata, Stapf & Wettst. l. c. 56. — As. Min.
pallidiflora, Stapf & Wettst. l. c. — As. Min.
- PICHONIA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 22. **SAPOTACEAE**.
Balansana, Pierre, l. c. (1890) 23. — N. Caled.
elliptica, Pierre, l. c. — N. Caled.
- PICRAMNIA**, Sw. (Simarub.). — Ind. Kew. ii. 520.
quaternaria, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 3. — Am. centr.
- PICRIDIIUM**, Desf. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 520.
macrophyllum, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 203 = *intermedium* Sch. Bip.
- PICRIS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 521.
Balansae, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot] (1890) 545 (= *Helminthia Balansae*, Coss. & Durieu). — Afr. bor.
racemosa, Batt. l. c. 544 (= *Deckera racema*, Pomel). — Algeria.
Saharae, Batt. l. c. 542 (= *Spitzelia Saharae*, Coss.). — Afr. bor.
- PICROCARDIA**, Radlk. in Sitz. Akad. Muench. xx. (1890) 344, in obs. **SIMARUBEAE**.
resinosa, Radlk. l. c. 345. — N. Caled.
- PICRODENDRON**, Planch. (Simarub.). — Ind. Kew. ii. 521.
baccatum, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 308 (= *Juglans baccata*, Linn.). — Ind. occ.
- PICRORHIZA**, Royle (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 522.
Lindleyana, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 84 = *Lindleyana*, Steud.
- PIERIS**, D. Don (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 522.
nana, Makino, in Tokyo Bot. Mag. viii. (1894) 213. — Japon.
Swinhoei, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 17. — China.
- PIERREA**, Hance, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 958; et Recherch. Diptéroc. (1892) 78. **DIPTEROCARPEAE**.
pachycarpa, Heim, l. c. 958. — Borneo?
penangiana, Heim, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 133, in syn. : et ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 110, in syn. = *Balanocarpus Heimii*, King.
- PIGEUM**, Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 284, sphalm. = **Pygeum**, Gaertn. (Rosac.).
- PILEA**, Lindl. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 523.
crassifolia, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 228. — Borneo.
Clarkei, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 533. — Reg. Himal.
cordifolia, Hook. f. l. c. 558. — Ind. or.
costaricensis, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 294. — Costa Rica.
fasciata, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 81. — Tibet.
fruticosa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 558. — Perak.
glabra, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 152. — Mexic.
Holstii, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 50; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 163. — Afr. trop. or.
irrorata, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 11. — Guatem.
Johniana, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 227. — Borneo.
Johnstoni, Oliver, in H. Johnston, Kilim. Exped. App. (1886) 346, nomen; et in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 349. — Afr. trop. or.
lancifolia, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 553. — Khasia.
longipes, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 163. — Afr. trop. or.
macropoda, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 524. — Madag.
minuta, C. B. Clarke, l. c. xxv. (1889) 66. — Ind. or.
obliqua, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 558. — Reg. Himal.
pansamalana, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 10. — Guatem.
pleuroneura, J. D. Smith, l. c. 12. — Guatem.
Pseudo-verticillata, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 265. — Ins. Borbon.

PILEA : —

- pteroaulis, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 227. — Borneo.
 quichensis, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 12. — Guatem.
 riparia, J. D. Smith, l. c. 11. — Guatem.
 senarifolia, J. D. Smith, l. c. 12. — Guatem.
 usambarensis, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 50; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 163. — Afr. trop. or.
 veronicifolia, Engl. l. c. 164. — Afr. trop. or.

PILOCARPUS, Vahl (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 534.

- microphyllus, Stapf, in *Kew Bull.* (1894) 5; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2331. — Bras.

PILOCEREUS, Lem. = **Cereus**, Mill. (Cact.).

- Ackermanni* ×, Hort. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 183. — Hybr. artef.
albispinus, Salm-Dyck, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 649. — Afr. austr.
auratus, Labouret, ex Foerst.-Ruempl. l. c. 650. — Peruvia.
barbatus, Reb. ex Foerst.-Ruempl. l. c. — Hab. ?
Bruennowii, Haage, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 651 fig. 86; et in *Hamb. Gart. und Blumen-Zeit.* (1888) 85, cum ic. — Bolivia.
Brunnowianus, Hort. ex Rev. Hort. lxvii. (1895) 451 = praec.
Brunnowii, « Haage » ex Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 127 = P. Bruennowii, Haage.
crenatus ×, Hort. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 183. — Hybr. artef.
crenulatus, Salm-Dyck, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 655. — Am. austr., Antill.
euphorbioides, Ruempl. in Foerst.-Ruempl. l. c. 658 = *Cereus euphorboides*, Haw.
excresc., K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 180 = *Cereus virens*, DC.
flavicomus, Salm-Dyck, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 658 (= *C. flavicomus*, Salm-Dyck). — Hab. ?
Ghiesbreghtii, Hort. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 661. — Mexic.
giganteus, Lemaire, ex Foerst.-Ruempl. l. c. 662 fig. 88 (= *Cereus giganteus*, Engelm.). — Calif.
Haagei, Poselger, ex Foerst.-Ruempl. l. c. 665. — Bolivia.
Hoppenstedtii, Roetzl, ex Foerst.-Ruempl. l. c. 667; et ex *Hamb. Gart. und Blumen-Zeit.* (1888) 8, cum ic. — Mexic.
Hoogendorpii, Ortg. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 181, nomen = P. Hoppenstedtii, Roetzl.
Kanzleri, Haage, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 671. — Hab. ?
lanuginosus, Ruempl. in Foerst.-Ruempl. l. c. 672; K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 181 = *Cereus lanuginosus*, Mill.
lateribarbatus, Pfeiffer, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 672 (= *P. Columna*, Lemaire). — Mexic.
lutescens, Salm-Dyck, ex Foerst.-Ruempl. l. c. 675. — Hab. ?
Melocactus, K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 20, cum xylogr. — Bras.
pasacanus, Weber, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 678. — Am. austr. temp.
pentaedrophorus, Cons. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 679 (= *Cereus pentaedrophorus*, Labouret). — Bras.
phyllanthoides ×, Hort. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 183 — Hybr. artef.
polyptichus, Lemaire, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 680. — Hab. ?
repandus, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 181 = *C. repandus*, Mill.
Royeni, Haworth, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 682 (= *Cereus Royeni*, Haw.). — Ind. occ.

PILOCEREUS : —

- Russelianus*, Hort. Berol. ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 682. — Venezuela.
Sargentianus, Orcutt, ex K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* v. (1893) 86. — Calif.
strictus, DC. ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 687 (= *Cereus strictus*, Willd.). — Am. austr.
Terscheckii, Parm. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 688 (= *Cereus fulvispinus*, Salm-Dyck). — Reg. Argent.
Thurberi, Engelm. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 689. — Mexic.
trichacanthus, Hort. Berol. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 675 (= *Cereus Pfeifferi*, Parm.). — Am. austr.
Verheinei, Hort. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 690. — Hab. ?
virens, Foerst.-Ruempl. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 180, in obs. = *virens*, Lem.

PILOSTIGMA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 488 et 540 = **Loranthus**, Linn.

- brevipes*, Van Tiegh. l. c. = L. *brevipes*, Van Tiegh.
Muelleri, Van Tiegh. l. c. = L. *Muelleri*, Van Tiegh.
sanguineum, Van Tiegh. l. c. 489 = L. *sanguineus*, F. Muell.

PIMELAEA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 974 =

- Pimelea**, Banks & Soland. (Myrsin.).
erecta, Kuntze, l. c. sphalm. = *Pimelandra erecta*, C. B. Clarke.

PIMELEA, Banks & Soland. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 526.

- angulata*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 265. — N. Zel.
bicolor, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 485. — N. Zel.
dichotoma, Colenso, l. c. — N. Zel.
heterophylla, Colenso, l. c. 486. — N. Zel.
Husseyana, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 81, nomen. — Austral.
lanceolata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 483. — N. Zel.
microphylla, Colenso, l. c. 484. — N. Zel.
polycephala, Colenso, l. c. 486. — N. Zel.
rugulosa, Colenso, l. c. xxi. 1888 (1889) 102. — N. Zel.
similis, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 483. — N. Zel.
stylosa, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 205. — N. Zel.
Suteri, T. Kirk, l. c. xxvi. 1893 (1894) 259. — N. Zel.
Treyvaudi, F. Muell. in *Vict. Natural.* xi. (May 1894) 2, nomen. — Austral.

PIMELEODENDRON, Hassk. (Euphorb.). —

- Ind. Kew. ii. 527.
borneense, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 199. — Borneo.
papuanum, Warb. l. c. 198. — N. Guin.

PIMENTA, Lindl. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 527.

- Pimenta*, Cockerell, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 95 = *officinalis*, Lindl.

PIMPINELLA, [Riv.] Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 527.

- andina*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 721. — Am. austr. occ.
araucana, Phil. l. c. 723. — Araucania.
Battandieri, Chabert, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 24. — Algeria.
camptotricha, Penzig, in *Atti Congr. bot. Genova* (1893) 343. — Erithrea.
cervariaefolia, Freyn & Sint. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 303. — Armenia.
cypria, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 253. — Ins. Cypr.
depauperata, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 427. — Syria.
Djurdjurae, Chabert, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 25. — Algeria.

PIMPINELLA : —

- flaccida*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 28, t. 15. — Kohima.
huillensis, Welw. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 319. — Angola.
intermedia ×, Figert, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vii. (1889) 85; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. i. (1892) 626. — Eur. centr.
kilimandscharica, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 42. — Afr. trop. or.
macrophylla, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 722. — Am. austr. occ.
mexicana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 164. — Mexic.
moabitica, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 156. — Syria.
Moelleri, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 720. — Am. austr. occ.
Navarri, Phil. l. c. 721. — Am. austr. occ.
Parishii, Coult. & J. N. Rose, in *Coult. Bot. Gaz.* xii. (1887) 157 = *Eulophus Parishii*, Coult. & J. N. Rose.
peteroana, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 723. — Am. austr. occ.
spinosa, « Gaertn. » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 551, sphalm. = *Poterium spinosum* Linn.
Vidali, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 724. — Am. austr. occ.
Volkensii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 299. — Afr. trop. or.
Welwitschii, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 319. — Angola.

PINALIA, Buch.-Ham. = **Eria**, Lindl. (Orchid.).

- abbreviata*, *acervata*, *acridostachya*, *acuminata*, *acutifolia*, *albidotomentosa*, *amica*, *andamanica*, *annulata*, *aporina*, *appendiculata*, *articulata*, *bambusifolia*, *barbata*, *bicolor*, *bicristata*, *bifalcis*, *biflora*, *bipunctata*, *braccata*, *brachystachya*, *bractescens*, *calamifolia*, *canaliculata*, *capitellata*, *carinata*, *ciliata*, *clavicaulis*, *compressa*, *concolor*, *confusa*, *crassicaulis*, *Curtisii*, *dasyphylla*, *Dasyphy*, *Dayana*, *ebulbis*, *elata*, *elongata*, *erecta*, *Eriopsidobulbon*, *excavata*, *exilis*, *extinctoria*, *ferox*, *ferruginea*, *Fitzalani*, *flavescens*, *floribunda*, *foliosa*, *fragrans*, *fusca*, *gracilis*, *graminifolia*, *hirta*, *iridifolia*, *javanensis*, *Kingii*, *lancifolia*, *latifolia*, *leptocarpa*, *Lindleyi*, *lineata*, *lobata*, *longifolia*, *Maingayi*, *marginata*, *Matthewsii*, *merguensis*, *micrantha*, *microphylla*, *monostachya*, *monticola*, *mucronata*, *multiflora*, *musculicola*, *mysorensis*, *nana*, *nutans*, *obesa*, *obliqua*, *ornata*, *pachystachya*, *paniculata*, *pannea*, *Parishii*, *pauciflora*, *pellipes*, *Pleurothallis*, *polystachya*, *polyura*, *profusa*, *pubescens*, *pulvinata*, *pumila*, *pusilla*, *pygmaea*, *recurvata*, *Reinwardtii*, *reticosa*, *retroflexa*, *retusa*, *rigida*, *ringens*, *robusta*, *rosea*, *rostriflora*, *rubiginosa*, *rufinula*, *saccifera*, *scabrilinguis*, *sclerophylla*, *Scortechinii*, *sicaria*, *sinica*, *sonharis*, *stellata*, *stricta*, *striolata*, *sulcata*, *sumatrana*, *Thwaitesii*, *tomentosa*, *tricolor*, *truncata*, *tuberosa*, *ustulata*, *valida*, *velutina*, *vestita*, *vittata*, *vulpina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 678-79 = *homonyma omnia Eriae*.
Andersonii, Kuntze, l. c. 679 = E. *Andersonii*, Hook. f.
aporodes, Kuntze, l. c. 678 = E. *aporoides*, Lindl.
biophylla, Kuntze, l. c. 679, sphalm. = *leiophylla*, Lindl.
cauligera, Kuntze, l. c. = *Phreatia cauligera*, Reichb. f.
hyacinthodes, Kuntze, l. c. 678 = E. *hyacinthoides*, Lindl.
Jerdoniana, Kuntze, l. c. 679 = E. *Lichenora*, Lindl.
laxiflora, Kuntze, l. c. 678 = *Phreatia laxiflora*, Lindl.
leiophylla, Kuntze, l. c. 679 [err. typ. *biophylla*] = E. *leiophylla*, Lindl.
leucantha, Kuntze, l. c. = E. *alba*, Lindl.
limenophyllax, Kuntze, l. c. 678 = E. *limenophyllax*, Reichb. f.
Lobbii, Kuntze, l. c. 679 = E. *elongata*, Lindl.
microchilos, Kuntze, l. c. = E. *Dalzellii*, Lindl.
myristiciformis, Kuntze, l. c. = E. *myristicaeformis*, Hook.
nilgherensis, Kuntze, l. c. = E. *pauciflora*, Wight.
obligantha, Kuntze, l. c. = E. *oligantha*, Hook. f.

PINALIA : —

oblitterata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 678 = *Eria oblitterata*, Reichb. f.
oreophyllax, Kuntze, l. c. 679 = *Phreatia oreophyllax*, Reichb. f.
perpusilla, Kuntze, l. c. = *P. perpusilla*, Reichb. f.
prorepens, Kuntze, l. c. = *P. prorepens*, Reichb. f.
pulchella, Kuntze, l. c. = *Eria Griffithii*, Reichb. f.
rigida, Kuntze, l. c. = *E. pulchella*, Lindl.
Rimannii, Kuntze, l. c. = *E. Rimanni*, Reichb. f.
rugosa, Kuntze, l. c. = *E. stellata*, Lindl.

PINANGA, Blume (Palm.). — Ind. Kew. ii. 529.
angustisecta, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 119. — Borneo.
auriculata, Becc. l. c. 134. — Borneo.
brevipes, Becc. l. c. 121. — Borneo.
calamifrons, Becc. l. c. 132. — Borneo.
canina, Becc. l. c. 135. — Borneo.
crassipes, Becc. l. c. 120. — Borneo.
curvata, Becc. l. c. 128 (= *Areca curvata*, Griff.). — Penins. Mal.
decora, L. Linden & Rodigas, *Cat. pl. Hort. Contin.* (1885) 61, n. 119 in *Illustr. Hort.* xxxiv. (1886) 171, t. 614. — Borneo.
densiflora, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 116. — Sumatra.
Duperreana, Pierre, *ex Becc. l. c.* 144. — Cambodia.
globosa, Hort. ex Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 130 = *Calyptracalyx spicatus*, Blume.
gracilis, Hook. f. *ex C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 80 (= *Areca gracilis*, Roxb.) = *gracilis*, Blume.
Griffithii, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 117. — Khasia, Assam.
Hookeriana, Becc. l. c. 141. — Khasia.
hymenopatha, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 411. — Burma.
lepida, Bull. *Catal.* (1888) 9; *et ex Gard. Chron.* (1888) ii. 273. — Ind. or.
ligulata, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 129. — Borneo.
Manii, Becc. l. c. (1889) 178. — Ins. Nicob.
mirabilis, Becc. l. c. (1886) 126. — Borneo.
pectinata, Becc. in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 410. — Perak.
perakensis, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 175. — Penins. Mal.
philippinensis, Becc. l. c. 180. — Ins. Philipp.
polymorpha, Becc. l. c. 172. — Penins. Mal.
rivularis, Becc. l. c. (1886) 130. — Burma.
robusta, Becc. in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 408. — Penins. Mal.
rubricaulis, L. Linden, *Catal. pl. Hort. Contin.* (1885) 61, n. 117; W. Wats. in *Gard. Chron.* (1893) i. 260 = *Cyrtostachys Renda*, Blume.
Sanderiana, W. Bull. [1885], *ex Becc. Malesia*, iii. (1889) 170.
Scortechini, Becc. l. c. 170. — Penins. Mal.
simplicifrons, Becc. l. c. (1883) 124 (= *Ptychosperma simplicifrons*, Miq.). — Sumatra.
Smithii, Hort. ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1894) sub t. 7345, in syn. = *Ptychosperma elegans*, Blume.
spectabilis, Bull. *Catal.* (1886); *ex Becc. Malesia*, iii. (1886) 115; W. Wats. in *Gard. Chron.* (1893) i. 260. — Hab. ?
stricta, Becc. l. c. 133. — Borneo.
stylosa, Becc. l. c. (1889) 177. — Sumatra.
subruminata, Becc. l. c. 174. — Penins. Mal.
tomentella, Becc. l. c. (1886) 126. — Borneo.
variegata, Becc. l. c. 127. — Borneo.
Von Mohli, *Hort. Linden*, (1890); [cf. W. Wats. in *Gard. Chron.* (1893) i. 260]. — Hab. ?

PINAROPAPPUS, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 529.
junceus, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 307. — Mexic.

PINEDA, Ruiz & Pav. = **Banara**, Aubl. (Samyd.).
Lehmannii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 58. — Ecuad.

PINELLIA, Tenore (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 529.
integrifolia, N. E. Br. in Hook. *Icon. pl.* xix. (1889) t. 1875. — China.

PINGUICULA, Tourn. ex Linn. (Lentibul.). — Ind. Kew. ii. 529.
Arvcti, *Genty*, in *Morot. Journ. de Bot.* v. (1891) 250 (= *P. variegata*, Arv.-Touv., non Turcz.). — Gall.
bicolor, Woloszczak, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 80. — Hung.
magellanica, Commers. ex Franch. *Miss scient. Cap Horn*, v. (Phan.) (1889) 353 = *antarctica*, Vahl.
parvifolia, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 320. — Mexic.
ramosa, Miyoschi, *ex Yatabé*, in *Tokyo Bot. Mag.* iv. (1890) n. 43 t. 11. — Japon.
Reuteri, *Genty*, in *Morot. Journ. de Bot.* v. (1891) 229, t. 3. — Reg. Jurass.

PINUS, [Tourn.] Linn. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 530.
Apacheca, Lemmon, in *Erythea*, ii. (1894) 103 t. 3. — Arizona.
attenuata, Lemmon, [in Mining and Scientif. Press. (Jan. 1892)] in *Gard. and For.* v. (1892) 65 = *tuberculata*, Gord.
Cortecana, Hort. ex Beissn. *Handb. Nadelholz.* (1891) 222 = *P. Pinaster*, Soland.
digenea X, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, iii. (1888) 77; *et Fl. Nied.-Oest.* i. 1. (1890) 4. — Austria.
digenea X, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 108 = *P. Wettsteinii*, Fritsch.
Donnell-Smithii, *Mast. ex J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 199, *et xviii.* (1893) 13, t. 2. — Guatem.
hagueensis, «Loud.» ex Beissn. *Handb. Nadelholz.* (1891) 228 = *silvestris*, Linn.
latifolia, H. Mayr. in *Gard. and For.* ii. (1889) 496, *cum xylogr.*; Beissn. *Handb. Nadelholz.* (1891) 259; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 36. — Arizona.
Lumholtzii, Robinson & Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 122. — Mexic.
Mayri, Zabel, in *Forstl. Bl.* (1891) 250, *ex Gartenfl.* xli. (1892) 40 = *parviflora*, Sieb. & Zucc.
peloponnesiaca, Hort. ex Beissn. *Handb. Nadelholz.* (1891) 441 = *Abies cephalonica*, Link.
permixta X, G. Beck, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 766; *et Fl. Nied.-Oest.* i. (1890) 6. — Austria.
Pseudopumila, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* i. (1890) 5 = *montana*, Mill.
Wettsteinii X, Fritsch, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 153; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* i. (1890) 5. — Austria.

PIPER, Linn. (Piperac.). — Ind. Kew. ii. 534.
albescens, C. DC. in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 398. — N. Granat.
Andreanum, C. DC. l. c. 397. — N. Granat.
anisotis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 86. — Reg. Himal.
Bangii, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 354. — Bolivia.
Biolleyi, C. DC. *ex Th. Dur. & Pitt.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 210. — Costa Rica.
borucanum, C. DC. l. c. 219. — Costa Rica.
calvirameum, C. DC. l. c. 200. — Costa Rica.
carrilloanum, C. DC. l. c. 209. — Costa Rica.
carizalanum, C. DC. in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 397. — Am. austr.
cascajolanum, C. DC. l. c. 398. — Ecuad.
chrysostachyum, C. DC. *ex Th. Dur. & Pitt.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 207. — Costa Rica.
cinerascens, C. DC. *ex M. Micheli*, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxii. (1893) n. 2, t. 51, fig. 1-5. — Paraguay.
coilostachyum, C. DC. *ex Th. Dur. & Pitt.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 212. — Costa Rica.
corrugatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 565. — Costa Rica.
daguanum, C. DC. in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 288. — Columb.
discophorum, C. DC. *ex Th. Dur. & Pitt.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 201. — Costa Rica.

PIPER : —

Donnell-Smithii, C. DC. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 95, nomen; *et in Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 239. — Guatem.
dryadum, C. DC. *ex Th. Dur. & Pitt.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 221. — Costa Rica.
emirnense, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 514. — Madag.
fimbriatum, C. DC. *ex Th. Dur. & Pitt.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 207. — Costa Rica.
flavidum, C. DC. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 66, nomen; *et in Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 258. — Guatem.
fulvescens, C. DC. in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxii. (1893) n. 2, t. 53. — Paraguay.
Gaudichaudianum, Kunth, *ex C. DC.* l. c. 6. — Bras., Paraguay.
gibbosum, C. DC. *ex Th. Dur. & Pitt.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 212. — Costa Rica.
Goudotii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 287. — Columb.
guayranum, C. DC. in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 397. — Venezuela.
hainanense, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 365. — China.
Hancei, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 94 (= *Chavica leptostachya*, Hance). — China.
Heydei, C. DC. *ex J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 6. — Guatem.
jaliscanum, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 145. — Mexic.
leptonema, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 91. — As. trop.
longistylousum, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club.* xxi. (1894) 161. — Bolivia.
Luxii, C. DC. *ex J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 5. — Guatem.
Maingayi, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 80. — Ind. or.
mapirense, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 47. — Bolivia.
Mestoni, F. M. Bailey, *Rep. Exped. Bellenden-Ker* (1889) 54. — Austral.
Molleri, C. DC. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 153. — Ins. S. Thom.
mollicomum, Kunth, *ex C. DC.* in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxii. (1893) n. II, t. 7. — Am. trop.
nemorense, C. DC. *ex Th. Dur. & Pitt.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 222. — Costa Rica.
neurostachyum, C. DC. l. c. 213. — Costa Rica.
novo-guineense, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 284. — N. Guin.
nudibracteatum, C. DC. l. c. x. (1888) 288. — Columb.
nudifolium, C. DC. *ex Th. Dur. & Pitt.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 205. — Costa Rica.
otophorum, C. DC. l. c. 220. — Costa Rica.
oxyphyllum, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 48. — Bolivia.
pachyphyllum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 80. — Malacca.
peltaphyllum, C. DC. *ex Th. Dur. & Pitt.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 220. — Costa Rica.
pendulum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 283. — N. Guin.
petiolatum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 84. — Reg. Himal.
pitanum, C. DC. in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 397. — N. Granat.
Pittieri, C. DC. *ex Th. Dur. & Pitt.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxix. 2 (1890) 69; *et xxx.* (1891) 204. — Costa Rica.
poasanum, C. DC. l. c. 206. — Costa Rica.
Postelsianum, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 93. — China, Ins. Liukiu.
Pseudo-sylvaticum, C. DC. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 153. — Ins. S. Thom.
psilocladum, C. DC. *ex Th. Dur. & Pitt.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 211. — Costa Rica.
psilophyllum, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 47. — Bolivia.
quinquenerium, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 284. — N. Guin.
rubronodosum, Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 148. — N. Granat.

PIPER : —

- rubro-venosum, Hort. ex Rodigas, in *Illustr. Hort.* xxxiv. (1887) 91, t. 33 : et ex *Gard. Chron.* (1888) ii. 328. — N. Guin.
- Rueckeri, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 36. — N. Guin.
- rufescens, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 218. — Costa Rica.
- Rusbyi, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 47. — Bolivia.
- rhytidocarpum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 92. — Reg. Himal.
- salinasanum, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 214. — Costa Rica.
- santa-rosanum, C. DC. in *J. D. Smith, Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 96, nomen ; et in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 258. — Guatem.
- savanense, C. DC. in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 236. — Columb.
- Schmidtii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 89. — Reg. Himal.
- sclerocladum, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 224. — Afr. trop. occ.
- sepicola, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 202. — Costa Rica.
- sublineatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 565. — Costa Rica.
- subsessilifolium, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 216. — Costa Rica.
- tablazosense, C. DC. in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 288. — Costa Rica.
- terrabanum, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 217. — Costa Rica.
- Thomsoni, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 87. — Reg. Himal.
- Tuerckheimii, C. DC. in *J. D. Smith, Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 96, nomen ; et in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 258. — Guatem.
- umbricola, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 215. — Costa Rica.
- uspantanense, C. DC. ex *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 6. — Guatem.
- vallicolum, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 222. — Costa Rica.
- variabile, C. DC. in *J. D. Smith, Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 66, nomen ; et in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 259. — Guatem.
- Volkensii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 225. — Afr. trop. or.
- yzabalanum, C. DC. ex *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 7. — Guatem.

PIPTADENIA, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew ii. 542.

- Buchanani, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 354. — Afr. trop.
- leptoclada, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 467. — Madag.
- novo-guineensis, Warb. ex Taub. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 122. — N. Guin.
- Schumanniana, Taub. in *Flora*, lxxv. (1892) 75. — Bras.
- Schweinfurthii, Vatke, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 44 ; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 82 = P. Buchanani, Baker.

PIPTANTHUS, Sweet (Legumin.). — Ind. Kew ii. 542.

- tomentosus, Franch. in *Rev. Hort.* lix. (1887) 474 ; et *Pl. Delav.* (1890) 150. — China.

PIPTOCALYX, Torr. = **Krynitzkia**, Fisch. & Mey. (Borag.).

- dichotomus, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 60 = K. dichotoma, Greene.

PIPTOCARPHA, R. Br. (Compos.). — Ind. Kew ii. 543.

- costaricensis, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 184. — Costa Rica.
- Leubnitziae, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 263. — Afr. austro-occ. extratrop.
- sexangularis, Klatt, *Beibl. zum Leopoldina* (1895) extr. 1. — Costa Rica.

PIPTOMERIS, Turcz. = **Jacksonia**, R. Br. (Légumin.).

- alata, angulata, capitata, carduacea, Clarkei, compressa, cupulifera, densiflora, floribunda, foliosa, Forrestii, furcellata, hakeoides, horrida, Lehmannii, nematoclada, odontoclada, pteroclada, racemosa, ramosissima, restioides, rhadinoclada, rhadinoclona, scoparia, sericea, spinosa, Stachhousei, Sternbergii, stricta, thesioides, umbellata, velutina, vernicosa, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 114-15 = homonyma omnia Jacksoniae.
- dilatata, Greene, l. c. 114 [sphalm. dilatata] = J. dilatata, Benth.
- purpurascens, Greene, l. c. 115 [sphalm. purpurascens] = J. purpurascens, F. Muell.

PIPTOSPATHA, N. E. Br. (Aroid.). — Ind. Kew ii. 543.

- Ridleyi, N. E. Br. ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1894) t. 7410. — Penins. Mal.

PIPTOTHRIX, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 383. **COMPOSITAE**.

- Palmeri, A. Gray, l. c. — Mexic.
- pubens, A. Gray, l. c. — Mexic.

PIPTURUS, Wedd. (Urtic.). — Ind. Kew ii. 543.

- melastomatifolius, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 37. — N. Guin.

PIQUERIA, Cav. (Compos.). — Ind. Kew ii. 544.

- laxiflora, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 107. — Mexic.
- Pringlei, Robinson & Seaton, l. c. — Mexic.

PIRARDA, Adans. = **Ethulia**, Linn. (Compos.).

- conyzodes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 355 = E. conyzoides, Linn.
- megacephala, Kuntze, l. c. = E. conyzoides, Linn.

PIRATINERA, Aubl. = **Brosimum**, Sw. (Urtic.).

- spuria, Baill. ex Laness. *Pl. util. Colon Franç.* (1886) 452 = B. spurium, Sw.

PIREA, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 494 ; Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 183. **CRUCIFERAE**.

- Olgae, Th. Dur. ex Prantl, l. c. (= *Dictyosperma Olgae*, Regel). — As. centr.

PIRIQUETA, Aubl. (Turner.). — Ind. Kew ii. 544.

- aurea, Urban. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 629.

PIRONNEAVA, Gaudich. = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).

- floribunda, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 29 (1891) 14 = A. floribunda, Mart.
- Morongii, Rolfe, ex Morong & Britton, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 115. — Parag.

PISCIDIA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew ii. 544.

- mollis, *J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 98. — Mexic.
- Piscipula, Sarg. in *Gard. and For.* iv. (1891) 436 = P. Erythrina, Linn.

PISONIA, Plum. ex Linn. (Nyctag.). — Ind. Kew ii. 544.

- areolata, Heimerl, ex Warm. in *Vidensk. Meddel. Naturh. Foren.* (1890) 159 (*Symb. Fl. Bras. centr.* xxxv. 960). — Bras.
- artensis, Montrouzier, [ubi ?] ex Heimerl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b (1889) 29. — Ins. Art.
- grandifolia, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 303. — N. Guin.
- macranthocarpa, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 293. — Guatem.
- membranacea, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fr. Kais. Wilh. Land* (1889) 43. — N. Guin.
- Muelleriana, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 204. — N. Guin.
- rostrata, Warb. l. c. — N. Guin.

PISONIA : —

- platystemon, Heimerl, ex Warm. in *Vidensk. Meddel. Naturh. Foren.* (1890) 161 (*Symb. Fl. Bras. centr.* xxxv. 962). — Bras.
- Riedeliana, Fischer, ex Wawra, *ll. cc.* (1891) 162 ; et 963. — Bras.
- sandwicensis, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 369. — Ins. Sandvic.
- Warmingii, Heimerl, ex Warm. in *Vidensk. Meddel. Naturh. Foren.* (1890) 162 (*Symb. Fl. Bras. centr.* xxxv. 963). — Bras.

PISTACIA, Linn. (Anacard.). — Ind. Kew ii. 545.

- coccinea, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 36. — Burma.
- falcata, Becc. ex Martelli. *Fl. Bogos.* (1886) 24. — Abyss.
- weimmannifolia, Poiss. ex Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 467. — Yunnan.

PITCAIRNIA, L'Hérit. (Bromel.). — Ind. Kew ii. 546.

- alborubra, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 102. — N. Granat.
- Altensteinii, X, Hort. ex Baker, l. c. 111. — Hybr. artef.
- amazonica, Baker, l. c. 117. — Bras.
- anthericoides, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 441. — Bras.
- arcuata, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 565 ; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 111. — N. Granat.
- armata, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 270 fig. 13. — Am. austr.
- brachysperma, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 564 ; et lxi. (1889) 22 t. 8 ; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 105. — Columb.
- brachystachya, Baker, l. c. 105. — Am. trop.
- Brongniartiana, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 565 ; et lxi. (1889) 23 t. 9 d. ; Baker, l. c. 110. — Columbia.
- Burchelli, Mez, in *Fl. Bras.* iii. III. (1894) 436. — Bras.
- Caldasiana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 100. — Bras.
- camptocalyx, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 564 ; et lxi. (1889) 19 t. 8 c ; Baker, l. c. 96. — Columbia.
- canaliculata, Baker, l. c. 99. — Bras.
- caracasana, Baker, l. c. 103. — Venezuela.
- carinata, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 448. — Bras.
- Carioana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 32 (1891) 4. — Guatem.
- Claussenii, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 454. — Bras.
- corallina, X, Hort. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 111. — Hybr. artef.
- Darblayana, Sallier, in *Le Jardin* (1888) 201 ; et ex *Rev. Hort.* lxii. (1890) 33 fig. 10. — Hybr. artef.
- dendroidea, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 564 ; et lxi. (1889) 26 t. 9a ; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 104. — Columb.
- Devansayana, Ed. André, *Bromel. Andean.* (1889) 25 t. 8g ; Baker, l. c. 93. — Ecuad.
- Dietrichiana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiii. Beibl. n. 29 (1891) 15. — Bras.
- dykioides, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 118. — Bolivia.
- echinotricha, Baker, ex Ed. André, *Bromel. Andean.* (1889) 33, in syn. ; Baker l. c. 119 (= *Puya echinotricha*, Ed. André). — Ecuad.
- ensifolia, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 436. — Bras.
- Glaziovii, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 92. — Bras.
- Goudotiana, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 564 ; et lxi. (1889) 27 t. 9e ; Baker, l. c. 108. — Columb.
- graminifolia, Hort. ex Baker, l. c. = integrifolia, Ker.
- Gravisiiana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xl. (1889) 56 ; Baker, l. c. 114. — Columb.
- Guaritermae, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 564 ; et lxi. (1889) 23, t. 8 f. ; Baker, l. c. 112. — Columb.
- guyanensis, Baker, l. c. 120. — Guian. angl.

PITCAIRNIA : —

- hypoleuca, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 438. — Bras.
 incarnata, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 116. — Guian. gall.
 intermedia, Hort. ex Baker, l. c. 94, in syn. = alta, Hassk.
 jaliscana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 456; et in *Gard. and For.* i. (1888) 195. — Mexic.
 Klotzschiana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 106. — Venezuela.
 Lamarchiana, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 111. — Am. trop.
 lancifolia, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 447. — Bras.
 laxissima, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 101. — Ecuad.
 leiotea, Hort. ex Baker, l. c. 96, in syn. = muscosa, Mast.
 Leprieurii, Baker, l. c. 117. — Guian. gall.
 L'Herminieri, Hort. ex Baker, l. c. 185, in syn. = fulgens, Deane.
 Lindeni, Baker, l. c. 112. — Hab. ?
 longicauda, Hornem. ex Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 445. — Bras.
 lutea, Hort. Linden, ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 104. — Hab. ?
 macranthera, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 565; et *Bromel. Andreanae* (1889) 29, t. 9 f.; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 110. — Columbia.
 macrobotrya, Éd. André, ll. cc. 564; et 24, t. 9c; Baker, l. c. 104. — Columbia.
 megastachya, Baker, l. c. 120 (= *Puya Roezli*, Éd. Morr.). — Peruvia.
 membranifolia, Baker, l. c. 109. — Costa Rica.
 nigra, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 565; et *Bromel. Andreanae* (1889) 30; Baker, l. c. 113. — Columbia, Ecuad.
 odontopoda, Baker, l. c. 93. — Peruvia.
 Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 456; et in *Gard. and For.* i. (1888) 209 et 211, fig. 38. — Mexic.
 pastoensis, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 122. — Columb.
 Pearcei, Baker, l. c. 120. — Peruvia.
 Philippii, Baker, l. c. 122 (= *Puya paniculata*, Phil.). — Chili.
 platypetala, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 438. — Bras.
 Plumieri, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 107 (= *Broccchinia Plumieri*, Griseb.). — Ins. Domin.
 Poeppigiana, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 461. — Peruvia.
 polyanthoides, Brongn. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 110 = recurvata, K. Koch.
 Poortmanni, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 564; et *Bromel. Andreanae* (1889) 26, t. 9 b; Baker, l. c. 103. — Columb.
 pruinosa, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 454. — Bras.
 puberula, Mez, & J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 264. — Guatem.
 quietamensis, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 121 (= *Puya quietamensis*, Éd. André). — N. Granat.
 reflexiflora, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 564; et *Bromel. Andreanae* (1889) 18 t. 8 b; Baker, l. c. 105. — Ecuad., Venezuela.
 Roezlii, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 564 = Devansayana, Éd. André.
 rubiginosa, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 116. — Guian. gall.
 Rusbyi, Baker, l. c. 122. — Bolivia.
 Sanctae-crucis, Baker, l. c. 120. — Bolivia.
 Schiedeana, Baker, l. c. 95. — Mexic.
 Schlimii, Baker, l. c. 100. — Venezuela.
 Selloana, Baker, l. c. — Bras.
 semijuncta, Baker, l. c. 117. — Guian. gall.
 Skinneri, Hort. ex Baker, l. c. 94, in syn. = alta, Hassk.
 speciosissima, Hort. ex Baker, l. c. 114, in syn. = undulata, Scheidw.
 sphaerocephala, Baker, l. c. 123. — Chili.
 spinosa, Gillies, ex Baker, l. c. 136, in syn. = Dyckia Gilliesii, Baker.

PITCAIRNIA : —

- stenophylla, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 564; et *Bromel. Andreanae* (1889) 21, t. 8 d; Baker, l. c. 95. — Columbia.
 stenothyrsa, Baker, l. c. 122. — Bolivia.
 stricta, Éd. André, *Bromel. Andreanae* (1889) 31; Baker, l. c. 107. — Columbia.
 sulphurea, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 565; et l. c. — Colomb.
 tarapotensis, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 102. — Peruvia.
 Trianae, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 564; et *Bromel. Andreanae* (1889) 17, t. 8 a; Baker, l. c. 108. — Columbia.
 Turckheimii, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 190 et 300 t. 24; Baker, l. c. 97. — Guatem.
 uaupensis, Baker, l. c. 93. — Bras.
 venusta, Baker, l. c. 123 (= *Puya venusta*, Phil.). — Chili.
 Weddelliana, Baker, l. c. 122. — Bolivia.

PITHECOCTENIUM, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 547.

- Carolinae, Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 152. — Hab. ?
 echinatum, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 218 = P. Aubletii, Splitg. Glaziovii, Bureau, ex K. Schum. l. c. — Bras.

PITHECOLOBIUM, Mart. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 547.

- Acle, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 121 = Mimosa Acle, Blanco.
 Balansae, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1976. — Tonkin.
 flexicaule, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1891) 101. — Texas.
 flexicaule, Coult. l. c. — Texas.
 kubaryanum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 335. — N. Guin.
 insigne, M. Micheli, ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 283. — Am. centr.
 laxiflorum, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 24. — Bolivia.
 Lovellae, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* viii. (1893) 74. — Austral.
 mexicanum, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 100. — Mexic.
 Sonorae, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 49. — Mexic.
 Stuhlmannii, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 193. — Afr. or
 texense, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 37. — Texas.

PITTIERA, Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 271; Muell. & Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1894) 393, in add. *CUCURBITACEAE*.
 longipedunculata, Cogn. ll. cc. — Costa Rica.
 trilobata, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 239. — Guatem.
PITTOSPORUM, Banks (Pittospor.). — Ind. Kew. ii. 528.

- bicurium, Th. Dur. & Schinz, in *Nouv. Mém. Acad. Belg.* liii. (1896) 65. — Congo.
 capitatum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 294. — Madag.
 Fairchildi, Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 147. — N. Zel.
 glomeratum, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 23. — Ins. Sandvic.
 Galai, K. Schum. in K. Schum. & Holll. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 71. — N. Guin.
 hawaiiense, Hillebr. l. c. 26. — Ins. Sandvic.
 heterophyllum, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 415. — China occ.
 Humblotianum, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 112. — Madag.
 insigne, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 26. — Ins. Sandvic.
 kauaiense, Hillebr. l. c. 25. — Ins. Sandvic.
 lanceolatum, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 419 (= *Senecia lanceolata*, Lam.). — Ins. Borbon.
 pachyphyllum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 444. — Madag.

PITTOSPORUM : —

- Pervillei, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 111. — Madag.
 quinquevalvatum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 320. — N. Guin.
 resiniferum, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894) 344. — Ins. Philipp.
 vernicosum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 445. — Madag.
 Wingii, F. Muell. in *South. Sci. Rec.* (March 1885), ex F. M. Bailey. *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* i. (1886) 4. — Austral.
 yunnanense, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 415. — China occ.

PITURANTHOS, Viv. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 550.

- Korolkowi, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 211 (= *Deverra Korolkowi*, Regel & Schmalh.). — Turkest.
 Rohlfianus, Schinz, l. c. 209 et 210. — Afr. bor.
 tortuosus, Benth. & Hook. f. ex Aschers. & Schweinf. in *Mém. Inst. égypt.* [Illustr. Fl. Egypt.] ii. (1887) 80 (= *Deverra tortuosa*, DC.). — Aegypt.
 triradiatus, Aschers. & Schweinf. l. c. (= *D. triradiata*, Hochst.). — Arabia.

PITYROPHYLLUM, Beer = **Tillandsia**, Linn. (Bromel.).

- Andreanum, Éd. Morr. ex Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 567, in syn. = *Tillandsia Andréana*, Éd. Morr.

PLACODISCUS, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 550.

- pseudostipularis, Radlk. in *Sitz. Akad. Muench.* xx. (1890) 242. — Afr. trop. occ.
 tristis, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 271. — N. Zel.

PLACUS, Lour = **Blumea**, DC. (Compos.).

- angustifolius, balsamifer, barbatus, Belangerianus, bifolius, chinensis, crinitus, flexuosus, gariepinus, glomeratus, hieracifolius, Jacquemontii, Kingii, lacerus, laciniatus, macrophyllus, malabaricus, membranaceus, natalensis, neilgherensis, nodiflorus, obovatus, oxyodontus, procerus, sericans, sikkimensis, subcapitatus, timorensis, vimineus, virens, Kuntze. *Rev. Gen.* (1891) 356-57 = homonyma omnia Blumeae.
 acrocephalus, Kuntze, l. c. = Conyza acrocephala, Mig.
 acutatus, Kuntze, l. c. = Blumea laciniata, DC.
 Bovei, Kuntze, l. c. = B. abyssinica, Sch. Bip.
 Clarkei, Kuntze, l. c. = B. elongata, DC.
 floresiana, Kuntze, l. c. = Conyza floresiana, Sch. Bip.
 humifusa, Kuntze, l. c. = C. humifusa, Mig.
 lanuginosus, Kuntze, l. c. = Blumea Malcolmii, Hook. f.
 Milnei, Kuntze, l. c. = B. densiflora, DC.
 mollis, Kuntze, l. c. = B. Wightiana, DC.
 obliquus, Kuntze, l. c. = B. amplexans, DC.
 subracemosa, Kuntze, l. c. = Conyza subracemosa, Mig.
 sumbavensis, Kuntze, l. c. = C. sumbavensis, Mig.
 ternatensis, Kuntze, l. c. = C. ternatensis, Mig.
 Zollingeriana, Kuntze, l. c. = C. Zollingeriana, Turcz.

PLAGIANTHUS, Forst. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 550.

- densiflorus, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 72. — Austral.
 Helmsii, F. Muell. & Tate, *Elder Exped. Diagn. New Pl.* (1893) [1]; et in *Bot. Centralbl.* lv. (1893) 316. — Austral.

PLAGIOBOTHRYS, Fisch. & Mey. (Boragin.).

- californicus, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. 7 (1887) 407 (= *Echidocarya californica*, A. Gray) = P. Cooperi, A. Gray.
 californicus, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 231 = campestris, Greene.
 campestris, Greene, l. c. ii. (Aug. 1892) 282; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 260 (= *P. californicus*, Greene, pr. p.). — Calif.

PLAGIOBOTHRYUS : —

microcarpa, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 21. — Calif.
Pringlei, *Greene, l. c.* 21 (= *Echidnocypha arizonica*, A. Gray). — Am. bor. occ.

PLAGIOCHEILUS. Arn. (Compos.). — Ind.

Kew. ii. 551.
erectus, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 212. — Bolivia.

PLAGIOSPERMUM. Oliver, in Hook. Icon. pl.

xvi. (1886) t. 1526. *CELASTRINEAE*.
sinense, *Oliver, l. c.* — China.

PLAGIOSPERMUM. Pierre, Fl. For. Cochinch.

Fasc. 17 (1892) t. 260a = **Styrax**, (Styrac.).
Benzoin, Pierre, l. c. = *S. Benzoin*, *Dryand.*

PLANCHONELLA. Pierre, Not. bot. Sapot. (1890)

35 = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).
argentea, assamica, attenuata, australis, bancana, borneensis, cambodiana, chrysophylla, costata, dongnaiensis, elengoides, ferruginea, grandifolia, Hookeri, Howean, indica, javensis, lanceolata, laurifolia, longensis, maritima, nodosa, obovata, parvifolia, Petilian, sandwicensis, spathulata, tomentosa, Pierre, l. c. 35-36 = *homonyma omnia* *Sideroxyl. dictyonura*, Pierre, l. c. 35. — N. Caled.
linguaeformis, Pierre, l. c. 36. — N. Caled.
microphylla, Pierre, l. c. — N. Caled.
obovata, Pierre, l. c. 35 = *Sersalisia obovata*, Benth.
Pancheri, Pierre, l. c. — N. Caled.
Paviana, Pierre, l. c. 36. — Laos.
viridis, Pierre, l. c. — N. Caled.
Wahere, Pierre, l. c. — N. Caled.

PLANERA, J. F. Gmel. (Urtic.). — Ind. Kew.

ii. 551.
Keakei, « C. Koch » ex Dippel, Handb. Laubholz, ii. (1892) 40 = *Zelkova acuminata*, *Planch.*
Verschaffelti, Hort. ex Dippel, l. c. 589, ad calc. = *Z. japonica*, *Dippel*

PLANTAGO, [Tourn.] Linn. (Plantag.). — Ind.

Kew. ii. 551.
albida, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 269. — Chili.
amphibola, *Phil. l. c.* 253. — Chili.
angustifolia, *Phil. l. c.* 258. — Chili.
armerifolia, *Phil. l. c.* 263. — Chili.
Aschersonii, *Bolle, in Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 251. — Ins. Canar.
atlantica, *Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 224; et in *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1890) 744. — Algeria.
Boissieri, *Hauskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 60. — Oriens.
brachyantha, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 270. — Chili.
calbucana, *Phil. l. c.* 252. — Chili.
californica, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 236. — Calif.
cantagullensis, *A. Zahlbr. ex Wawra, Itin. Princ. Sax.-Coburg*, ii. (1888) 56. — Bras.
collipubens, *Miégev. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. xxxv. — Pyren. gall.
dasyphylla, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 393. — N. Zel.
disticha, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 272. — Chili.
dolichophylla, *Phil. l. c.* 262. — Chili.
Fischeri, *Engl. Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 48. — Afr. trop. or.
Foncki, *Phil. l. c.* 259. — Chili.
glabriuscula, *Phil. l. c.* 288. — Chili.
graeca, *Halacsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 761. — Graecia.
heterophylla, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 265. — Chili.
Julietti, *Phil. l. c.* 262. — Chili.
laevigata, *Phil. l. c.* 260. — Chili.
lunarensis, *Phil. l. c.* 266. — Chili.
macrosperma, *Phil. l. c.* 269. — Chili.

PLANTAGO : —

Monnieri, *Giraudias, in Lucante, Rev. de Bot.* iv. (1885-86) 287, in *Bull. Soc. étud. sci. Angers* (1890) 114, nomen = *media*, *Lam.*
Olizanka, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 270. — Chili.
ovata, *Phil. l. c.* 251. — Chili.
pachyrhiza, *Phil. l. c.* 265. — Chili.
pachystachys, *Phil. l. c.* 248. — Chili.
picta, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 481. — N. Zel.
Pugae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 250. — Chili.
reniformis, *G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 149. t. 2, fig. 1-2. — Bosnia.
rosulata, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1890) 743 = *P. Coronopus*, *Linn.*
sphaerostachya, *A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung.* iv. (1886) 71 = *lanceolata*, *Linn. var.*
stenopetala, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 271. — Chili.
uniflora, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 71. — Am. austr. occ.
Tweedyi, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. 1. reprint. (1886) 390. — Am. bor. occ.
Vidalii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 264. — Chili.

PLASO, Adans = **Butea**, Koen. (Legumin.).
monosperma, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 202 = *B. frondosa*, *Roxb.*

PLATANThERA, Rich. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

algeriensis, *Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 75, xli. (1894) 516 t. 6; et *Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 31. — Algeria.
arachnoidea, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 179 (= *Peristylus arachnoideus*, A. Rich.). — Abyss.
Brachycorythis, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 12 = *Brachycorythis pubescens*, *Haw.*
Bulbinella, *Schlechter, l. c.* = *Schizochilus Bulbinella*, *Bolus.*
Gerrardi, *Schlechter, l. c.* = *S. Gerrardi*, *Bolus.*
hispidula, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. c.* (1895) 151 (= *Peristylus hispidulus*, *Rendle*). — Afr. trop.
interrupta, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 106. — Ins. Kiusiu.
Lefeburiana, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 179 (= *Peristylus Lefeburianus*, A. Rich.). — Abyss.
Mac Owaniana, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 12 = *Brachycorythis Mac Owaniana*, *Reichb. f.*
natalensis, *Schlechter, l. c.* xx. Beibl. n. 50 (1890) 6 = *Herminium natalense*, *Reichb. f.*
ovata, *Schlechter, l. c.* 12 = *Brachycorythis ovata*, *Lindl.*
Petitiana, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 179 (= *Peristylus Petitianus*, A. Rich.). — Abyss.
Preussii, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 63. — Kamerun.
Quartiniana, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 179 (= *P. Quartinianus*, A. Rich.). — Abyss.
satyroides, « *Reichb.* » ex *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 338, in obs. sphalm. = *satyroides*, *Reichb.*
tenuior, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 12 = *Brachycorythis tenuior*, *Reichb. f.*
tricurris, *Hochst. ex Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 194 = *Habenaria tricurris*, *Reichb. f.*
tridentata, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 179 (= *Peristylus tridentatus*, *Hook. f.*). — Kamerun.
unalaschensis, *F. Kurtz, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 408 = *Habenaria unalaschensis*, *S. Wats.*
ussurensis, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 107. — Mandshuria, Japon.
Volkensiana, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 17. — Afr. trop. or.
Zeyheri, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 12 = *Schizochilus Zeyheri*, *Sond.*

PLATANUS, [Tourn.], Linn. (Platan.). — Ind.

Kew. ii. 556.
insularis, *Kotschy, ex Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 206 = *orientalis*, *Linn.*
pyramidalis, *Bolle, ex Koehne, l. c.* = *orientalis*, *Linn.*
pyramidalis, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* iii (1893) 279 = *occidentalis*, *Linn.*
virifolia, « *Spach.* » ex *Dippel, l. c.* 276 et 741 ad calc. = *orientalis*, *Linn.*

PLATYCAPNOS, Bernh. = **Fumaria**, Linn.

(Papav.).
Echeandiae, *Pau, Not. Bot. Fl. Espan.* ii. (1889) 6 et iv. (1891) (1893) 312. — Hisp.

PLATYCLINIS, Benth. (Orchid.). — Ind. Kew.

ii. 557.
corrugata, *Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 233. — Borneo.
gracilis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 708; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1880) t. 2016. — Perak.
Kingii, *Hook. f. ll. cc.* 708 et t. 2015. — Perak.
grandiflora, *Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 233. — Borneo.
stachyodes, *Ridl. ex Stapf, l. c.* 234. — Borneo.

PLATYDESMA. H. Mann (Rutac.). — Ind.

Kew. ii. 557.
auriculaeifolia, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 72 (= *Pelea auriculaeifolia*, A. Gray). — Ins. Sandvic.
cornuta, *Hillebr. l. c.* — Ins. Sandvic.
rostrata, *Hillebr. l. c.* — Ins. Sandvic.

PLATYKELEBA, N. E. Br. in Kew Bull. Soc.

(1895) 250. *ASCLEPIADEAE*.
insignis, *N. E. Br. l. c.* — Madag.

PLATYLEPIS, A. Juss. (Orchid.). — Ind. Kew.

ii. 557.
angolensis, *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr. v.* 1892 (1895) 58 = *glandulosa*, *Reichb. f.*
occulta, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 261 = *godyeroides*, *A. Rich.*

PLATYLUMA, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 283 =

Sideroxylon, Linn. (Sapot.).
calophylloides, *Baill. l. c.* 284. — Guian.

PLATYMISCUM, Vog. (Legumin.). — Ind.

Kew. ii. 558.
cordatum, *Taub. in Flora*, lxxv. (1892) 84. — Bras.
piliferum, *Taub. l. c.* 85. — Bras.

PLATYMITIUM, Warb. in Engl. Pflanzenw.

Ost-Afr. C (1895) 279. *BIXINEAE*.
loranthifolium, *Warb. l. c.* t. 3. — Afr. trop. or.

PLATYPHOLIS, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.

xxxi. (1887) 88. *OROBANCHEAE*.
Boninsimae, *Maxim. l. c.* — Ins. Boninsima.

PLATYSTEMON, Benth. (Papav.). — Ind. Kew.

ii. 558.
crinitus, *Greene, Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 13. — Calif.
denticulatus, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 283 (= *Meconella denticulata*, *Greene*). — Calif.
linearis, *M. K. Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* i. (1888) 242; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 10 = *Platystigma linearis*, *Benth.*
oreganus, *M. K. Curran, l. c.* = *Platystigma oreganum*, *Benth. et Hook. f.*
Torreyi, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 283; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 10 = *Platystigma californicum*, *Boland.*

PLATYSTIGMA, Benth. (Papav.). — Ind. Kew.

ii. 558.
denticulatum, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 218 = *Platystemon denticulatum*, *Greene.*

PLATYSTOMA, Benth. & Hook. f. = **Platostoma**, Beauv. (Labiata).
Buettnerianum, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 166. — Congo occ.
flaccidum, Briq. l. c. 165. — Afr. trop.

PLATYSTYLIS, Lindl. = **Liparis**, Rich. (Orchid.).
alata, Blume, ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 291 = *L. decumbens*, Reichb. f.

PLECOSPERMUM, Tréc. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 559.
andamanicum, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 491. — Tenass., Ins. Andam.
laurifolium, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 294a. — Madag.

PLECTANEIA, Thou. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 559.
Hildebrandtii, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 144. — Madag.
Pervillei, K. Schum. l. c. — Madag.

PLETOCOMIA, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 559.
Griffithii, Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 478. — Malacca.
maxima, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 734 = *elongata*, Mart. & Blume.
montana, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 478, in syn. = *himalayana*, Griff.

PLETOCOMIOPSIS, Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 479. **PALMAE**.
geminiflorus, Becc. in Hook. f. l. c. (= *Calamus geminiflorus*, Griff.). — Penins. Mal.
paradoxus, Becc. in Hook. f. l. c. 488 (= *C. paradoxus*, Kurz). — Martab.
Wrayi, Becc. in Hook. f. l. c. — Perak.

PLECTRANTHUS, L'Hérit. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 559.
albidus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 341. — Madag.
albus, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 202. — Afr. trop. or.
betonicaefolius, Baker, in Kew Bull. (1895) 72. — Afr. trop.
Brandisii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 296. — Burma.
Burnatii, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 124. — Madag.
cardiaphyllus, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 269. — China.
carnosifolius, Hemsl. l. c. 270. — China.
crenatus, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 208. — Afr. trop. or.
cyaneus, Guerke, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37 et 65; et l. c. — Afr. trop. or.
densus, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 12. — Afr. trop. or.
elegans, Britten, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 36. — Afr. trop.
Emini, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 207. — Afr. trop. or.
esculentus, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 12. — Natal.
Fischeri, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 200. — Afr. trop. or.
flaccidus, Guerke, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 18; et l. c. 206 (= *Coleus flaccidus*, Vatke). — Afr. trop.
floribundus, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 12. — Natal.
Henryi, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 271. — China.
herbaceus, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 179. — Angola.
hereroensis, Engl. l. c. x. (1888) 267. — Afr. austro-occ. extratrop.
Holstii, Guerke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62; et l. c. xix. (1894) 204. — Afr. trop. or.
hoslundoides, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 44. — Madag.

PLECTRANTHUS : —
hylophilus, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 283. — Kamerun.
kamerunensis, Guerke, l. c. 202. — Kamerun.
Kurzii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. — Sikkim.
Malinvaldi, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 125. — Abyss.
melanocarpus, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 210. — Afr. trop. or.
minimus, Guerke, l. c. 205. — Afr. trop. occ.
miserabilis, Briq. l. c. 180. — Congo.
modestus, Baker, in Kew Bull. (1895) 72. — Afr. trop.
monticola, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 130, nomen. — Afr. trop.
nervosus, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 272. — China.
nudipes, Hemsl. l. c. — China.
orbicularis, Guerke, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 21; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 203. — Afr. trop. or.
parvus, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append. (1886) 345, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 347. — Afr. trop.
pharicus, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1891) ii. 297. — Reg. Himal.
pratensis, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 201. — Afr. trop. or.
primulinus, Baker, in Kew Bull. (1895) 292. — Afr. trop. austro-or.
prostratus, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 206. — Afr. trop.
quadridentatus, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 356, nomen. — Erithrea.
racemosus, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 273. — China.
rubescens, Hemsl. l. c. — China.
sanguineus, Britten, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 36. — Afr. trop.
subacaulis, Baker, in Kew Bull. (1895) 73. — Afr. trop.
sylvestris, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 205. — Afr. trop. or.
Tatei, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 274. — China.
tetragonus, Guerke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 209. — Afr. trop.
usambarensis, Guerke, ll. cc. 65: et 207. — Afr. trop. or.
violaceus, Guerke, ll. cc. 53: et 201. — Afr. trop. or.
Websteri, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 275. — China.
Zenkeri, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1891) 199. — Kamerun.

PLECTRITIS, DC. = **Valerianella**, Tourn. (Valerian.).
samolifolia, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 276, et xviii. (1894) 400 et 461 = *Betekea samolifolia*, DC.

PLECTRONIA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 560.
barbata, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 181 (= *Canthium barbatum*, Seem.). — Ins. Sandvic.
barbata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92; Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 93 (= *Chiococca barbata*, Forst.). — Ins. Pacif.
blepharoccephala, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 61, nomen. — Afr. trop.
bogosensis, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 42. — Abyss.
caudatiflora, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92 (= *Canthium caudatiflorum*, Hiern). — Afr. trop.
coprosmoides, K. Schum. l. c. (= *C. coprosmoides*, F. Muell.). — Austral.
cuspidi-stipulata, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 53, nomen. — Afr. trop.
Diplodiscus, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 385. — Afr. trop.

PLECTRONIA : —
foetida, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386 (= *Canthium foetidum*, Hiern). — Afr. trop.
glabriflora, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 129; et l. c. (= *C. glabriflorum*, Hiern). — Afr. trop. occ.
glaucal, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386 (= *C. glaucum*, Hiern). — Afr. trop. or. et austro-or.
Henriquesiana, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 128. — Ins. S. Thom.
hispida, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386 (= *Canthium hispidum*, Benth.). — Afr. trop. occ.
horrida, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92 (= *C. horridum*, Blume). — Java.
Korthalsii, K. Schum. l. c. (= *C. umbellatum*, Korth.). — Borneo.
livida, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386 (= *C. lividum*, Hiern). — Afr. trop.
micrantha, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 483. — Madag.
neglecta, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 399 (= *Canthium neglectum*, Hiern). — Abyss.
nitens, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 385 (= *C. nitens*, Hiern). — Afr. trop.
odorata, Benth. & Hook. f. ex Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 175. — Ins. Sandvic.
parvifolia, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92 (= *Canthium parvifolium*, Roxb.). — Ind. or.
setiflora, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 385 (= *C. setiflorum*, Hiern). — Afr. trop.
sordida, K. Schum. l. c. 386. — Afr. trop. or.
Soyauxii, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92. — Gabon.
subcordata, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386 (= *Canthium subcordatum*, DC.). — Afr. trop.
syringaeifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 321. — Madag.
syringodora, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386. — Afr. trop. or.
umbellata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 293 = *umbellata*, Benth. & Hook. f.
umbellata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92 (= *Canthium umbellatum*, Bartl.) = *P. Villarii*, Vidal.
Vatkeana, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 399; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 106 (= *Canthium Vatkeanum*, Hiern). — Abyss.
vulgaris, K. Schum. l. c. (1895) 386. — Afr. trop. or.
zanzibarica, Vatke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26 (= *Canthium zanzibaricum*, Klotzsch). — Zanzib.

PLEIOCARPA, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 561.
bicarpellata, Stapf, in Kew Bull. (1894) 21. — Afr. trop. occ.

PLEIOCERAS, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 759; et Hist. des pl. x. (1888) 201; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 186. **APOCYNEAE**.
Barteri, Baill. ll. cc. — Lagos.

PLEIOCHITON, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 561.
Glaziovianum, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV (1888) 426. — Bras.
micranthum, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 950. — Bras.
parvifolium, Cogn. l. c. 949. — Bras.
roseum, Cogn. l. c. 950. — Bras.
setulosum, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 426. — Bras.

PLEIONE, D. Don = **Coleogyne**, Lindl. (Orchid.).
anceps, *asperata*, *barbata*, *bilamellata*, *brachyptera*, *brevifolia*, *breviscapa*, *carnea*, *caulescens*, *corniculata*, *corrugata*, *corymbosa*, *Crockeri*, *Cumingii*, *Day-*

PLEIONI. —

ana, elata, fimbriata, flaccida, flavida, Foersterman-nii, fuliginosa, fuscescens, Gardneriana, glandulosa, Goweri, graminifolia, Griffithii, Hookeriana, Huettneriana, incrassata, lactea, lentiginosa, longibracteata, longifolia, longipes, macrobulbon, Malingayi, Massangana, micrantha, miniata, nitida, occulata, ochracea, odoratissima, pandurata, Parishii, plantaginea, prolifera, psittacina, purpurascens, Reichenbachiana, rigida, Rossiana, Rumphii, Schilleriana, simplex, Sonderiana, sparsa, speciosa, stenochila, suaveolens, testacea, Thuniana, tomentosa, Treutleri, trinervis, ustulata, uniflora, viscosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 679-81 = homonyma omnia Coelogynes. chinensis, Kuntze, l. c. 680 = C. fimbriata, Lindl. Cynochle, Kuntze, l. c. = C. Cynochle, Par. & Reichb. f. nervosa, Kuntze, l. c. = C. corrugata, Wight. Rochussenii, Kuntze, l. c. = C. Rochussenii, De Vriese. speciosissima, Kuntze, l. c. 681 = C. cristata, Lindl. sulfurca, Kuntze, l. c. = C. sulphurea, Reichb. f. triplicatula, Kuntze, l. c. = C. fuliginosa, Lodd.

PLEIOTAXIS, Steetz (Compos.). — Ind. Kew. ii. 561.

affinis, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 538. — Congo, Angola.
Antunesii, O. Hoffm. l. c. 539. — Angola.
eximia, O. Hoffm. l. c. — Angola, Congo.
linearifolia, O. Hoffm. l. c. 538. — Angola.
Newtoni, O. Hoffm. l. c. 537. — Angola.
pulcherrima, Klatt, in Annal. Naturh. Hoffmus. Wien, vii. (1892) 104 = eximia, O. Hoffm.
racemosa, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xv. (1895) 540. — Afr. trop. or.
rugosa, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Bot. x. (1892) 183; et l. c. 538. — Angola.

PLEONOTOMA, Miers = **Bignonia**, Linn. *stichadenium*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 226. — Bras.

PLERANDRA, A. Cunn. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 561.

Graeffei, « *Scem* » ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 71, sphalm. = P. Grayi, *Scem*.
Stahlian, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 203. — N. Guin.

PLETHIANDRA, Hook. f. (Melastrom.). — Ind. Kew. ii. 562.

cuneata, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) sub t. 2418. — Borneo.
Hookeri, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 163; et l. c. t. 2418. — Borneo.
rejangensis, Stapf, l. c. sub t. 2418. — Borneo.
sessilis, Stapf, l. c. — Borneo.

PLEURIPETALUM, « Becc. » ex Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1838) 493, sphalm. = **Eburopetalum** Becc. (Anonac.).

PLEUROGYNA, Eschsch. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 563.

diffusa, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 510 [Pleurogyna]. — Tibet.

PLEUROLOBUS, Jaume St Hil. = **Desmodium**, Desv. (Legumin.).

canadensis, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 319 = D. canadense, DC.
canescens, MacMill. l. c. = D. canescens, DC.
grandiflorus, MacMill. l. c. 321 = D. acuminatum, DC.
Dillenii, MacMill. l. c. = D. Dillenii, Darl.
nudiflorus, MacMill. l. c. = D. nudiflorum, DC.
paniculatus, MacMill. l. c. 320 = D. paniculatum, DC.

PLEUROPHORA, Don (Lythrar.). — Ind. Kew. ii. 563.

aspera, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 752. — Chili.
Paulseni, Fr. Phil. ex Phil. l. c. 751. — Chili.
uncinata, Phil. l. c. 752. — Chili.

PLEUROPHYLLUM, Hook. f. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 564.

Gilliesianum, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1890 (1891) 435 = P. Hookeri, f. Buch.
Hookerianum, T. Kirk, l. c. t. 39 et 40, sphalm. = P. Hookeri, f. Buch.
splendens, Mart. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 317, in syn. = Warscewiczia coccinea, Klotzsch.

PLEUOSPERMUM, Hoffm. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 564.

Davidi, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 247. — Tibet.
decurrens, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 138. — Yunnan.
foetens, Franch. l. c. 140. — Yunnan.
Franchetianum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 307; et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2244. — China occ.
nanum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 110. — China.
Pulszkyi, Kanitz, Pl. expéd. Széchenyi, in As. centr. coll. (1891) 25. — As. centr.
Szechenyi, Kanitz, l. c. — As. centr.
yunnanense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 137. — Yunnan.

PLEUOSTACHYS, Brongn. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 564.

angustifolia, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 18. — Bras.
Muelleri, Boeck. l. c. 19. — Bras.
paniculata, Boeck. l. c. 20. — Bras.
Rabonii, Boeck. l. c. 19. — Bras.
Ulei, Boeck. l. c. — Bras.

PLEUOSTELMA, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 266; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 248. **ASCLEPIADEAE**.

africanum, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) t. 351. — Afr. trop. or.
Grevei, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 266; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 218. — Madag.

PLEUROSTYLIA, Wight & Arn. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 564.

capensis, Loesen. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1892) 216 (= Cathastrum capense, Turcz.). — Afr. austr.
capensis, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2297 = praec.
cochinchinensis, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 20 (1894) sub t. 305 in text. — Cochinch.
pallens, Pierre, l. c. t. 305b in text (= Microtopis pallens, Pierre). — Cochinch.
Wightii, Pierre, l. c. t. 305b, sphalm. = cochinchinensis, Pierre.

PLEUROTHALLIS, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 564.

albiflora, Barb. Rodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 116. — Bras. bor.
astrophora, Reichb. f. ex Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 5 (1892) 85 246 ii, fig. 8-9. — Hab. ?
Autraniana, Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 359. — Hab. ?
Barbareana, O'Brien, in Gard. Chron. (1888) i. 245, in obs. sphalm. = Barberiana, Reichb. f. ?
Blaisdellii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 284. — Guatem.
Brighami, S. Wats. l. c. 285. — Guatem.
cardiophylax, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 154. — Hab. ?
choconiana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 285. — Guatem.
colossus, Kraenzl. ex de Kerch. Le livre des Orchid. (1894) 376. — Columb.
cryptoceras, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1886) 554. — Bras.
densifolia, Rolfe, ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club., iv. (1895) 260. — Bolivia.
glossopogon, Hort. ex Gard. Chron. (1887) i. 477. = insignis, Rolfe.

PLEUROTHALLIS: —

inflata, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 154. — Columb.
insignis, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) i. 577. (= P. glossopogon, Hort.). — Hab. ?
Josephensis, Barb. Rodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 117. — Bras. bor.
lonchophylla, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1886) 555. — Hab. ?
longispala, Barb. Rodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 115. — Bras. bor.
maculata, Rolfe, in Kew Bull. ii. (1888) [maculatus], et (1893) 334. — Bras.
minutiflora, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 286. — Guatem.
parva, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 33. — Bras.
pergracilis, Rolfe, l. c. (1893) 334. — Am. centr.
pernambucensis, Rolfe, l. c. (1894) 361. — Bras.
Pfavi, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1886) 555. — Am. centr.
platyrachis, Rolfe, in Journ. Bot. (1890) 135, in nota et in Bot. Mag. (1890) t. 7129. — Costa Rica.
platysmos, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1886) 555. — Am. trop.
puberula, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 169. — Hab. ?
punctulata, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) ii. 756. — N. Granat.
Regeliana, Reichb. f. in Gartenfl. vxxv. (1886) 50. — Bras.
rhombipetala, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 4; et in Gard. Chron. (1893) i. 290. — Venezuela.
rhomboglossa, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 154. — N. Granat.
rotundifolia, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 191. — Jamaica.
scabridula, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 260. — Bolivia.
scoparum, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 153. — Ecuad.
stenosepala, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 208. — Hab. ?
subulata, Rolfe, l. c. (1892) 137. — Hab. ?
Talpinaria, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1886) 554 (= Talpinaria bivalvis, Karst.). — Columb.
teretifolia, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) ii. 521. — Bras.
uncinata, W. Fawcett, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 12. — Jamaica.
unistriata, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 334. — Hab. ?
Wendlandiana, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 153. — N. Granat.
yauaperyensis, Barb. Rodr. Vellozia 1885-88, Sec. edic. (1891) 116. — Bras. bor.
yungasensis, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 259. — Bolivia.

PLEUROTHYRIUM, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 567.

panurensis, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 469 (= Nectandra panurensis, Meissn.). — Ecuad.

PLICOSEPALUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 504 et 540 = **Loranthus**, Linn.

curviflorus, Van Tiegh. l. c. = L. curviflorus, Benth.
Fauroti, Van Tiegh. l. c. = L. Fauroti, Franch.
undulatus, Van Tiegh. l. c. = L. undulatus, Meyer.

PLOGLOTTIS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 568.

porphyrophylla, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 368. — Penins. Mal.

PLOCOSPERMA, Benth. (Logan.). — Ind. Kew. ii. 568.

macrophyllum, Baill. ex Solerod. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 50. — Mexic.

PLUCHEA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 568.

conocephala, F. Muell. in Trans. Proc. Roy Soc. Vict. xxiv. (July 1888) 135 (= Eurybia conocephala F. Muell.). — Austral.
decussata, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 39. — Columb.

PLUCHEA : —

- foetida*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 28 = *bifrons*, DC.
laxa, Baker, in Kew Bull. (1895) 182. — Arabia.
mollis, Baker, l. c. Arabia.
nitens, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 226. — Afr. or.
phagnaloides, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. ii. n. 685] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 425 (= *P. phanaloides*, Sch. Bip.) = *scoparium*, Sch. Bip.
pteropoda, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 422 t. 11. — China.
sericea, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 128 (= *Tessaria borealis*, A. Gray). — Am. bor.

PLUMERIA, Tourn. ex Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 569.
Jamesoni, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 136 [Plumera]. — Ecuad.

- POA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 570.
argentea, Howell, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 11; *Vasey*, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 72. — Oregon.
arida, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 270. — Am. bor.
balearica, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 354. — Ins. Balear.
Bigelovii, Vasey & Scribn. Descr. Catal. Grass. (1885) 81; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 270. — N. Mexic.
brennia, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 85 = *violacea*, Bell.
brizaeformis, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 207 = *bulbosa*, Linn.
Buckleyana, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 465 (= *P. tenuifolia*, Buckl.). — Am. bor.
capillaris, Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 52. — Reg. Cauc.
Chapmanniana, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 38. — Am. bor.
Commersoni, Franch. Miss. scient. Cap Horn, v. [Bot. (1886) 385. — Am. austr.
confinis, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 75; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 270. — Alaska.
cucullata, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quito, 1889] 9, nomen. — Ecuad.
Cusickii, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 271. — Oregon.
dura, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 578 = *Cynosurus durus*, Linn.
dipsacea, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 271. — N. Zel.
Djurjurae, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 208 = *alpina*, Linn.
Fendleriana, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 74 (= *Eragrostis Fendleriana*, Steud.). — Am. bor. austro-occ.
festucoides, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 723. — Utah.
Figerti ×, Gerhardt, in Deutsche Bot. Monatsschr. x. (1892) 152. — Germ.
filifolia, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 271; et iii. (1895) 262. — Idaho.
gracillima, Vasey, l. c. 272. — Am. bor.
Grayana, Vasey, l. c. — Calif.
Hamiltonii, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 353. — N. Zel.
hispidula, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 272. — Am. bor.
Howellii, Vasey & Scribn. in Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 78; et l. c. 272. — Oregon, Calif.
hypophylla, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 87. — Chili.
jemtlandica, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 84. — Suecia.
Jurani, Genty, in Magnier, Scrin. fl. select. v. (1886) 103. — Jurass.
Kelloggii, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 79; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 272. — Calif.

POA : —

- leioclada*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quito, 1889] 9, nomen. — Ecuad.
Lettermani, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 273. — Colorado.
longeradiata, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 526. — Ins. Sandvic.
lucida, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 273. — Colorado.
Macounii, Vasey, in Macoun, Catal. Canad. Pl. iv. (1888) 225. — Canada.
macrantha, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1885) 11; et Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 80. — Calif., Washingt.
Maniototo, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 443. — N. Zel.
menachensis, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. II, (1894) 43. — Arabia.
montana, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 127. — Ins. Borbon.
nana, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 87. — Chili.
nervosa, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 81; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 274 (= *Festuca nervosa*, Hook.). = Am. bor. occ. occidentalis, Vasey, l. c. 274. — Am. bor.
Orcuttiana, Vasey, in West Am. Scientist, iii. (1887) 165; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 275. — Calif.
oresigena, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 87. — Chili.
Pattersoni, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 275. — Colorado
pollinensis, Terrac. in Ann. Ist. Bot. Roma, iv. 1889-90 (1891) 37, t. 2. — Ital. mer.
Pringlei, Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 275. — Am. bor. austro-occ.
polonica, Biochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 156. — Eur. centr. or.
Pseudopratensis, Beyer, in Wiss. Beil. Progr. Andreas-Realgymn. Berl. (1891), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 177 = *pratensis*, Linn.
pumila, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 87. — Chili.
quitensis, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quito, 1889] 9. — Ecuad.
reflexa, Vasey & Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 276. — Am. bor. occ.
Rehmanni, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 83 = *caesia*, Smith.
rupestris, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 94. — Am. bor.
Sandbergii, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 276; et iii. (1895) 263. — Am. bor. austro-occ.
Sheldoni, Vasey, l. c. 276. — Colorado.
Sodiroana, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuator. [Anal. Univ. Quito, 1889] 9. — Ecuad.
subaristata, Scribn. ex Macoun, Catal. Canad. Pl. iv. (1888) 227. — Canada.
texana, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1890) 60 (= *Sieglingia Wrightii*, Vasey). — Am. bor.
Thurberiana, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 84 (= *Panicularia Thurberiana*, Kuntze). — Calif.
trachyphylla, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quito, 1889] 9. — Ecuad.
Tracyi, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 49; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 276. — N. Mexic.
tuberifera, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.
unilateralis, Scribn. ex Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 85. — Calif.
ursina, Velen. Beitr. Fl. Bulg. (1886) 45; in Abb. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) i. 72, et Fl. Bulg. (1891) 624 = *alpina*, Linn.
Wolfi, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 228. — Illinois.

POACYNUM, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 757; et Hist. des pl. x. (1888) 208; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 1 (1895) 179. **APOCYNACEAE**.
pictum, Baill. ll. cc. (= *Apocynum pictum*, Schrank). — Songar.

PODANDRA, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 265; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 248. **ASCLEPIADEAE**.
boliviana, Baill. ll. cc. — Bolivia.

PODANTHES, Haw. = **Stapelia**, Linn. (Asclep.).
geminata, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 172 = *Piaranthus geminatus*, N. E. Br

PODANTHUM, Boiss. = **Phyteuma**, Linn. (Campanul.).
aurasiacum, Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 346, nomen, et p. LX cum ic.; et Atl. Fl. de l'Algér. (1895) 19, t. 12. — Algeria.
grandiflorum, Velen. Fl. Bulg. (1891) 373. — Bulg.
supinum, Wettst. in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, xcvi. 1889 (1889) 377. — As. Min.

PODISTERA, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 475. **UMBELLIFERAE**.
nevadensis, S. Wats. l. c. (= *Cymopterus nevadensis*, A. Gray). — Calif.

PODOCARPUS, Labill. = **Phyllocladus**, A. Rich. (Conif.).
hypophylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 802 = *Ph. hypophylla*, Hook. f.
trichomanodes, Kuntze, l. c. = *Ph. trichomanoides*, D. Don.

PODOCARPUS, [L'Hérit.] Pers. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 578.
Hallii, T. Kirk, in Forest Fl. N. Zeal. (1889) 13. — N. Zel.
milanjiana, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 61. — Afr. trop.
montana, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1894 (1895) 395. — N. Zel.
pectinata, Hort. ex Rev. Hortie. lxvii. (1895) 249, nomen. — Reg. Andina.
pruinosa, Eckl. & Zeyh. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 954 = *pruinosa*, E. Mey.
Sciadophytis, Hort. ex Beissn., Handb. Nadelholzsk. (1891) 181 = *Cephalotaxus pedunculata*, Sieb. & Zucc.

PODOCHILUS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 578.
acicularis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 82. — Penins. Mal.
hasianus, Hook. f. l. c. 81. — Ind. or.
longicalcaratus, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 186. — Borneo.
unciferus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 81. — As. trop.

PODOCHROSIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 750; et Hist. des pl. x. (1888) 193; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 158. **APOCYNACEAE**.
Balansae, Baill. ll. cc. — N. Caled.

PODOCOCCLUS, Mann & H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 579.
acaulis, Hua, in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 315. — Congo gall.

PODOCYTISUS, Boiss. & Heldr. = **Laburnum**, Linn. (Legumin.).
americanus, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 107 = *L. caramanicum*, Benth. & Hook. f.

PODOGYNIUM, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92, nomen. **LEGUMINOSAE**
capparidaceum, Taub. l. c. — Afr. trop. or.

PODOLUMA, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 290 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

PODOON, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 682 et (1889) 793; Heimerl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 14. **PHYTOLACCACEAE**.
Delavayi, Baill. ll. cc.; Franch. Pl. Delav. (1890) 146 t. 32-35. — Yunnan.

PODOPHYLLUM, Linn. (Berberid.). — Ind. Kew. ii. 580.
Delavayi, *Franch. in Bull. Muséum Paris*, i. (1895) 63. — Yunnan.
japonicum, T. Ito, ex Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 14; et in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 434 (= *Ranzania japonica*, T. Ito). — Japon.
pleianthum, Hance, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 298, fig. 44. — China.

PODORUNGIA, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 443; Lindau, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1895) 341. **ACANTHACEAE**.
Lantzei, Baill. *ll. cc.* — Madag.

PODOSPERMUM, DC. = **Scorzonera**, Linn. (Compos.).
pindicolum, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*. v. (1887) 86; Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 204. — Graecia.

PODOSTELMA, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 133; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 234. **ASCLEPIADEAE**.
Schimper, K. Schum. *ll. cc.* (= *Astephania Schimper*, Vatke). — Afr. trop. or.
Schimperianum, K. Schum. l. c. 155, sphalm. = praec.

PODOSTEMON, Michx. (Podostem.). — Ind. Kew. ii. 580.
distichus, Warm. *Fam. Podost. Afh.* iii. (1888) 12, t. 19, fig. 5-7 (*Lacis disticha*, Cham.) = P. Chamissois, Tul.
Galvonis, Warm. l. c. t. 17. — Bras.
metzgerioides, Trimen, *Handb. Fl. Ceyl.* iii. (1893) 419. — Zeylan.
Muelleri, Warm. *Fam. Podost. Afh.* iii. (1888) 3 t. 16 et 17. — Bras.
olivaceum, Warm. l. c. Afh. iv. (1891) 35, fig. 31-35 = olivaceum, Gardn.
Schenkii, Warm. l. c. Afh. iii. (1888) 9. — Bras.
Tholloni, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 877. — Congo gall.

POGGEA, Guerke, ex Warb. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 16; et in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 162. **BIXINEAE**.
alata, Guerke, *ll. cc.* — Congo.

POGGEOPHYTON, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 88. **EUPHORBIACEAE**.
aculeatum, Pax, l. c. (1894) 89. — Congo mer.

POGOINA, «Griff.» ex B. Grant, *Orchids of Burma*, (1895) 355, sphalm. = **Pogonia**, Griff. (Orchid.).

POGONANTHERA, Blume (Melast.). — Ind. Kew. ii. 591.
pauciflora, Becc. *Malesia*, ii. (1886) 241. — Sumatra.
robusta, Becc. l. c. 240. — Borneo.

POGONIA, Juss. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 582.
macroglossa, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 120. — Reg. Himal.
mexicana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 154. — Mexic.
microstyloides, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 547. — N. Granat.
modesta, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1893) 133 (= *Psilochilus modesta*, Barb. Rodr.). — Bras.
Rodriguesii, Cogn. l. c. 121 (= *Pogonia gracilis*, Barb. Rodr.). — Bras.
simplex, Th. Dur. & Schinz. *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 59 = simplex, Reichb. f.
striata, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 377. — Penins. Mal.
trianthophora, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 52 = pendula, Lindl.

POGONIOPSIS, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 582.
Schenkii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1893) 136. — Bras.

POGONOPUS, Klotzsch (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 582.
caracasensis, Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 175 = exsertus, Oerst.
exsertus, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 21 = exsertus, Oerst.
speciosus, K. Schum. l. c. (= *Macrocnemum speciosum*, Jacq.). — Am. austr. et centr.
tubulosus, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 266 (= *Calycophyllum tubulosum*, DC.). — Bras.

POGOSTEMON, Desf. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 583.
benghalense, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 529 = plec-trantoides, Desf.
Benthianum, Kuntze, l. c. 530 = *Dysophylla verticillata*, Benth.
cruciatum, Kuntze, l. c. = D. cruciata, Benth.
erectum, Kuntze, l. c. = D. erecta, Dalz.
janthinum, Kanitz, *Növényt. Gyűjt. Erd. Gróf Szecsenyi* (1891) 46, nomen. — China.
japonicum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 530 = *Dysophylla japonica*, Miq.
lineare, Kuntze, l. c. = D. linearis, Benth.
myosuroides, Kuntze, l. c. = D. myosuroides, Benth.
pentagonum, Kuntze, l. c. [sp. coll.]. — Ind. or.
quadrifolium, Kuntze, l. c. sphalm. = *Dysodia porophylloides*, A. Gray.
stellatum, Kuntze, l. c. 429 = D. stellata, Benth.
Wattii, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 59. — Kohima.

POIKILACANTHUS, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 57; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 342. **ACANTHACEAE**.
flexuosus, Lindau, *ll. cc.* (= *Adhatoda flexuosa*, Nees). — Bras.
Gilliesii, Lindau, *ll. cc.* (= *A. Gilliesii*, Nees). — Reg. Argent.
humilis, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 481. — Bras.
macranthus, Lindau, l. c. — Guatem.
Moritzianus, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 57; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 342 (= *Adhatoda Moritziana*, Nees). — Columb.
Tweedianus, Lindau, *ll. cc.* xviii. (1894) 40 et xix. Beibl. n. 48 (1894) 19 (= *A. Tweediana*, Nees). — Reg. Argent.

POISSONELLA, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1890) 29 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).
Baillonii, Pierre, l. c. — Hab. ?
neo-caledonica, Pierre, l. c. = L. neo-caledonica, Pierre.

POLANISIA, Rafin. = **Cleome**, Linn. (Capparid.).
bororensis, Pax, ex Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 184 = C. bororensis, Oliver.
dodecandra, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 6 = C. graveolens, Rafin.
hirta, Pax, in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 14 = C. hirta, Oliver.
Kelleriana, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 395. — Reg. Somal.
Petersiana, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 134 (= *Dianthera Petersiana*, Klotzsch). — Mossamb.
suffruticosa, Pax, l. c. — Afr. austro-occ. extratrop.

POLEMONIUM, [Tourn.] Linn. (Polemon.). — Ind. Kew. ii. 584.
Brandegei, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 126 (= *Gilia Brandegei*, A. Gray). — Am. bor. occ.
filicinum, Greene, l. c. 124. — N. Mexic.
occidentale, Greene, l. c. ii. (May 1890) 75. — Am. bor. occ.
pauciflorum, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 280. — Mexic.
Van Bruntiae, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 224, t. 131. — Am. bor.

POLIOMINTHA, A. Gray (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 000.
bicolor, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 160. — Mexic.

POLIOthyRSIS, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xix. (1889) t. 1885. **BIXINEAE**.
sinensis, Hook. f. l. c. — China.

POLLIA, Thunb. (Commelin.). — Ind. Kew. ii. 585.
cyanocarpa, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 91, nomen. — Afr. trop. or.

POLLINIA, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 585.
aurea, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 123 = aurea, Benth.
collina, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 81. — Cochinch.
debilis, Balansa, l. c. 82. — Cochinch.
fimbriata, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 164. — Ind. or.
gracillima, Hack. in *DC. l. c.* 179. = Ins. Tahit.
grata, Hack. in *DC. l. c.* 175. — As. trop.
hirtifolia, Hack. l. c. 165. — Ind. or.
mollis, Hack. l. c. 161 (= *Erianthus mollis*, Griseb.). — Reg. Himal.
monostachya, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 81. — Cochinch.
pallens, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 156. — Ind. or., Yunnan.
phaeothrix, Hack. l. c. 168 (= *Erianthus Cumingii*, F. Muell.). — Ind. or., Zeylan.
quadrinervis, Hack. l. c. 158. — Ind. or., China.
Ridleyi, Hack. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 7. — Penins. Mal.
rufispica, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 171 (= *Andropogon rufispica*, Steud.). — Java.
speciosa, Hack. l. c. 159. — China.
Thwaitesii, Hack. l. c. 163. — Zeylan.
velutina, Hack. l. c. 169. — Ind. or.

POLYACHYRUS, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 586.
foliosus, Phil. in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 72. — Chili.
calderensis, Phil. l. c. 76. — Chili.
glabratus, Phil. l. c. 73. — Chili.
nivalis, Phil. l. c. 75. — Chili.
San Romani, Phil. l. c. 76. — Chili.
tarapacanus, Phil. l. c. 74. — Chili.
tenuifolius, Phil. l. c. 77. — Chili.

POLYALTHIA, Blume (Anon.). — Ind. Kew. ii. 586.
Armitiana, F. Muell. *Sec. Cens. Austral. Pl.* (1889) 5 [Quid?].
Beccarii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 65. — Perak.
bullata, King, l. c. 64. — Penins. Mal.
clavigera, King, l. c. 60. — Malaya.
congregata, King, l. c. 61. — Perak.
dumosa, King, l. c. 52. — Perak.
glomerata, King, l. c. 61. — Malaya.
Hookeriana, King, l. c. 57. — Malacca, Perak.
hypogaea, King, l. c. 62. — Perak.
Kunstleri, King, l. c. 55. — Perak.
lateriflora, King, l. c. 58 (= *Gutteria lateriflora*, Miq.). — Malaya.
macrantha, King, l. c. 54. — Perak.
macropoda, King, l. c. 60. — Perak.
oblonga, King, l. c. 65. — Perak.
pachyphylla, King, l. c. 66. — Perak.
pauana, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 191. N. Guin.
pyncantha, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lx. (1892) ii. 68. — Malacca.
pulchra, King, l. c. 55. — Perak.
Schefferi, Stapf, in *Kew Bull.* (1892) 195. — Java.
Scortechinii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lx. (1892) ii. 56. — Perak.
sumatrana, King, l. c. 53 (= *Gutteria sumatrana*, Miq.). — Sumatra.

POLYCARDIA, Juss. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 587.
Baroniana, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2237. — Madag.
centralis, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 354. — Madag.

POLYCARENA, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 587.
discolor, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 191. — Afr. centr. austr.

POLYCARPA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 50 = **Polycarpon**, Loeffl. (Caryoph.).
arabica, *aristata*, *breviflora*, *caespitosa*, *carnosa*, *corymbosa diffusa*, *divaricata*, *fragilis*, *Gayi*, *glabrifolia*, *involuta*, *linearifolia*, *longiflora*, *prostrata*, *Smithii*, *spicata*, *spirostylis*, *stellata*, *synandra*, *violacea*, Kuntze, l. c. 51 = *homonyma omnia* Polycarpaeae.
Balfouriana, Kuntze, l. c. = Polycarpaea divaricata. *Balf.* f.
depressa, Kuntze, l. c. = Polycarpon depressum, Nutt.
filifolia, Kuntze, l. c. = Polycarpaea filifolia, Webb.
lancifolia, Kuntze, l. c. = P. lancifolia, Christ.
nivea, Kuntze, l. c. = P. microphylla, Cav.
repens, Kuntze, l. c. = Polycarpon Loefflingiae, Benth. & Hook. f.
Robbairae, Kuntze, l. c. = Polycarpaea prostrata, Decne.
succulenta, Kuntze, l. c. = Polycarpon succulentum, J. Gay.
tenuis, Kuntze, l. c. = Polycarpaea tenuis, Webb.

POLYCARPA, Linden = **Idesia**, Maxim. (Bixin.).
australis, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1892) 53. — Parag.

POLYCARPAEA, Lam. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 587.
akkensis, Pax, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 592 (= *Robbairae akkensis*, Aschers.). — Marocc.
filifolia, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 103. — Teneriffa.
lancifolia, Christ, l. c. 104. — Ins. Canar.
platyphylla, Pax, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 590. — Liberia.
Poggei, Pax, l. c. 591. — Angola.
tenuis, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 103. — Ins. Canar.

POLYCARPON, Loeffl. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 587.
colomense, Porta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 305. — Ins. Balear.
prostratum, Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b (1889) 87 (= *Robbairae prostrata*, Forsk.). — Afr. bor.; Oriens.
rupicolum, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 162 = *peplodes*, DC.

POLYCLINE, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2293. **COMPOSITAE**.
psyllioides, Oliver, l. c. — Afr. trop. or.
gracilis, Oliver, in Hook. f. Icon. pl. (1894) sub t. 2293. — Afr. trop. or.
Stuhlmannii, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 233. — Afr. trop. or.

POLYCYCNIS, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 588.
Lehmanni, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 365. — N. Granat.

POLYDRAGMA, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1701; et Fl. Brit. Ind. v. (1887) 457. **EUPHORBIACEAE**.
mallotiformis, Hook. f. ll. cc. — Penins. Mal.

POLYGALA, [Tourn.] Linn. (Polygal.). — Ind. Kew. ii. 588.
acicularis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 445. — Mexic.
acuminata, Willd. ex Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 46. — Peruvia, Chili.
aethiopica, Chod. l. c. 330. — Abyss.
africana, Chod. l. c. 168. — Angola.
albida, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxix. (1888) 53. — Afr. austr.
Albowniana, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 123. — Mexic.
Alfredi, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 172 (= *P. gracilis*, A. W. Benn.). — Bras.
Alopecurus, Chod. l. c. 227. — Bras.

POLYGALA : —

amboniensis, Guerke, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 14 et 22; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 234. — Afr. trop. or.
andensis, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 25. — Peruvia.
andicola, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 495. — Chili.
andina, A. W. Bennett, ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 19. — Bolivia.
Andreana, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 121. — Reg. Andina.
antillensis, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 38. — Ins. Martinic.
aphrodisiaca, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* B (1895) 514, et C (1895) 234. — Afr. trop. or.
apopetala, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 130 t. 3. — Calif.
argentinensis, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 271. — Reg. Argent.
Arizonae, Chod. l. c. 108. — Arizona.
Aschersoniana, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 548. — Cyrenaica.
Autranii, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 80. — Bras.
bahiensis, Chod. l. c. 49. — Bras.
Baikiesi, Chod. l. c. 334. — Reg. Nigrit.
Barbeyana, Chod. l. c. 16. — Mexic.
Bennetti, Chod. l. c. xxx, n. 8 (1889) 113, t. 32, fig. 2 et xxxi. n. 2 (1893) 7. — Parag., Bras.
Berlandieri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 416. — Mexic.
birmanica, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 126. — Burma.
Blancheti, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 88. — Bras.
Bojeri, Chod. l. c. 365. — Madag.
bosniaca, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 165 = *supina*, Schreb.
brevialata, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 234. — Venezuela
bukobensis, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 233. — Afr. trop. centr.
butyracea, Heck. in *Bull. Soc. géogr. Marseille. [Végét. util. Afr. trop.]* (1889) 4, t. 1; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2410. — Afr. trop. occ.
calicola, Chod. l. c. 336. — Reg. Somal.
carpatica, Wolosz. in *Spraw. Kōzl. fizyj. Krajow.* xxii. (1888) II. 216. — Reg. Carpat.
carphoides, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 158. — Bras.
chloroptera, Chod. l. c. 375. — Natal.
Chodatiana, A. W. Bennett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 109. — Reg. Argent.
Chuiti, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxx. n. 8 (1889) 105, t. 29, fig. 1. — Parag.
columbica, Chod. l. c. xxxi. n. 2 (1893) 29. — Venezuela.
confusa, MacOwan, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 385. — Afr. austr.
cordobensis, A. W. Bennett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 109. — Reg. Argent.
costaricensis, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 298; et in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 30. — Costa Rica.
crinita, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 156. — Mexic.
croatica, Chod. l. c. 468; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 356. — Croatia.
cubensis, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 62. — Cuba.
deflorata, Chod. l. c. 23. — Peruvia.
desertorum, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 130. — Calif.
dholarica, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 181. — Arabia.
dichotoma, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 77. — Bras.
Duparciana, Chod. l. c. 409. — Am. austr.
Durandi, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 300; et l. c. 27. — Costa Rica.
durbanensis, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2, 401. — Natal.
Ehlersii, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 36. — Afr. trop. or.

POLYGALA :

erubescens, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 398. — Afr. austr.
exasperata, Chod. l. c. 253. — Bras.
extraaxillaris, Chod. l. c. xxx. n. 8 (1889) 103; t. 28, fig. 1. — Parag.
fallax, Chod. l. c. 104. — Parag.
fallax, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 59. — China.
Fendleri, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 167. — Venezuela.
filicaulis, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 608. — Madag.
Fischeri, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 310. — Afr. trop. or.
flabellata, Shuttlew. ex Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 53. — Florida.
formosa, A. W. Bennett, ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1887) 19. — Bolivia.
Francheti, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 276. — Bras.
Funcii, Chod. l. c. 224. — Venezuela.
Gagnebiniana, Chod. l. c. 321. — Zanzib.
Galeottii, Chod. l. c. 28 [err. cal. Galeottii]. — Mexic.
Galmeri, Chod. l. c. 48. — Venezuela.
Galpini, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1895) t. 7439. — Afr. austr.
genistopsis, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 405. — Afr. austr.
gigantea, Chod. l. c. 75. — Peruvia.
glaucescens, Royle, ex Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 126 (= *Semecardium glaucescens*, Hassk.). — Ind. or.
Glaziovii, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1890) 276 [Glaziovii]. — Bras.
gracillima, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 398. — Mexic.
Graebiana, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxx. n. 2 (1889) 110, t. 30, fig. 2. — Parag.
Grandidieri, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 607; Chod. l. c. xxxi. n. 2 (1893) 364. — Madag.
grandis, Hort. ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 241 = *latifolia*, Ker-Gawl.
Greveana, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 607; Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 330. — Madag.
grisea, A. W. Bennett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 109. — Reg. Argent.
Guerichiana, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 141. — Afr. austro-occ. extratrop.
guatemalensis, A. W. Bennett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 108. — Guatem.
gymnoclada, MacOwan, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 385. — Afr. austr.
Harveyana, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 412. — Afr. austr.
heteroptera, A. W. Bennett, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 47 (= *Heterosamara birmanica*, Kuntze). — Burma.
Hieronymi, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 302. — Reg. Argent.
Hildebrandtii, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 607; Chod. l. c. 487. — Madag.
hongkongensis, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 60, t. 2, fig. 1-6; Chod. l. c. 350. — Ins. Hongkong.
houtboshiana, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 408. — Transvaal.
Huberiana, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 122. — N. Granat.
insignis, Klotzsch. ex Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 81. — Bras. mer.
insubrica, Gremli, Neue Beitr. Fl. Schw. v. (1890) 22 = *nicaensis*, Risso.
Jablottzkiana, Fisch. & Mey. ex Boiss. Fl. or. Suppl. (1888) 75; Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 476. — Persia.
jamaicensis, Chod. l. c. 11. — Jamaica.
juncoides, Chod. l. c. 210. — Bras.
juniperoides, Chod. l. c. 254. — Bras.
kalaxariensis, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxix. (1888) 52. — Afr. austr.
kaxalariensis, « Schinz » ex Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 365 = *praec.*
kilimandscharica, « Chod. » ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61 = *seq.*

POLYGALA : —

- kilimandjarica, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 320. — Afr. aequat. or.
 Klotzschii, *Chod. l. c.* xxx. n. 8 (1889) 114, in obs.; et xxxi. n. 2 (1893) 6 (= *Acanthocladus brasiliensis*, Klotzsch). — Bras.
 Krugii, *Chod. l. c.* xxxi. n. 2 (1893) 63. — Ins. Bahamas.
 Kurtzii, *A. W. Bennett, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 110. — Reg. Argent.
 Lecardi, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 222. — Sudan. gall.
 Lentiana, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895). 233. — Afr. trop. or.
 leptocaulis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 445. — Madag.
 leptolopha, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 147 (= *P. adenophylla*, A. W. Bennett). — Bras.
 leptosperma, *Chod. l. c.* 17. — Mexic.
 leucocarpa, *Chod. l. c.* 400. — Afr. austro-occ.
 Lindenii, *Chod. l. c.* 44. — Venezuela.
 liniflora, *Boj. ex Chod. l. c.* 367. — Afr. trop. or.
 Livingstoniana, *Chod. l. c.* 339. — Transvaal.
 lusitanica, *Welw. ex Chod. l. c.* 441. — Lusit.
 lycopodioides, *Chod. l. c.* 251 (= *P. bryoides*, A. W. Bennett). — Bras.
 lysimachiaefolia, *Chod. l. c.* 377. — Natal.
 Malmeana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 548. — Bras.
 Mariesii, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 61, t. 2 b, fig. 7-13. — China.
 Mathusiana, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 231. — Peruvia.
 maxima, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 233. — Afr. trop. or.
 Micheli, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxx. n. 8 (1889) 113, t. 31, fig. 2. — Parag.
 michoacana, *Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xviii.* (1893) 103. — Mexic.
 modesta, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 35. — Afr. trop. or.
 nicaraguensis, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 54. — Nicaragua.
 nilotica, *Chod. l. c.* 369. — Afr. trop.
 nitens, *Chod. l. c.* 84. — Bras.
 nubica, *Hochst. ex Chod. l. c.* 343 = *erioptera*, DC.
 obtusissima, *Hochst. ex Chod. l. c.* 322. — Abyss.
 opaca, *Chod. l. c.* 82. — Mexic.
 Ophiura, *Chod. l. c.* 376. — Afr. austro-or.
 orientalis, *Chod. l. c.* 324. — Ind. or.
 Orobis, *Chod. l. c.* 51. — Bras.
 orthocarpa, *Chod. l. c.* xxx. n. 8 (1889) 108, t. 30, fig. 1. — Parag.
 oxyantha, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 495. — Chili.
 oxyrhynchos, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 167. — Parag.
 panamensis, *Chod. l. c.* 35. — Panama.
 parietaria, *Chod. l. c.* 50. — Bras.
 parvula, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 496. — Chili.
 patagonica, *Phil. l. c.* 497. — Patag.
 Pavonii, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 14. — Mexic.
 Peplis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 608; *Chod. l. c.* 341. — Madag.
 petraea, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 346. — Ukamba.
 Philippiana, *Chod. l. c.* 300. — Reg. Argent.
 phlebotaenia, *Chod. l. c.* 4. — Cuba.
 piahiensis, *Chod. l. c.* 60. — Bras.
 Poggei, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 309. — Afr. trop.
 praetervisa, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 140. — Am. bor.
 Pringlei, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 142. — Mexic.
 producta, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 142. — Afr. austr.
 Pseudocelosioides, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 237. — Bras.
 Pseudocoriacea, *Chod. l. c.* 257. — Bras.
 Pseudochebeclada, *Chod. l. c.* 66. — Bras.
 Pseudojuncea, *Chod. l. c.* 211. — Bras.
 Pseudosericea, *Chod. l. c.* 241. — Parag.

POLYGALA : —

- Pseudovariabilis, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 181. — Bras.
 pterolopha, *Chod. l. c.* 301. —
 pulchra, *Chod. l. c.* 100. — Java.
 pygmaea, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 234. — Afr. trop. or.
 Radlkoferi, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 160. — Bras.
 recognita, *Chod. l. c.* 428. — Afr. austr.
 Regnelli, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1895) 548. — Bras.
 Rehmanni, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 362. — Transvaal.
 retusa, *Hochst. ex Chod. l. c.* 342 = *erioptera*, DC.
 rivinifolia, *Chod. l. c.* 24. — Mexic.
 rostrata, *Chod. l. c.* 244. — Bras.
 Ruiziana, *Chod. l. c.* 145. — Peruvia.
 Sadebeckiana, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 233. — Afr. trop. or.
 salicina, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 83. — Bras.
 Sanctae Luciae, *Chod. l. c.* 36. — Ins. S. Luciae.
 sansibarensis, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 233. — Afr. trop. or.
 Schimper, *Vatke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 281. nomen; *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 349. — Abyss.
 Schinziana, *Chod. l. c.* 364. — Afr. austro-occ. extratrop.
 Schweinfurthii, *Chod. l. c.* 338. — Afr. trop.
 scoparioides, *Chod. l. c.* 285. — Arizona.
 senegambica, *Chod. l. c.* 334. — Senegambia.
 Serpentaria, *Eckl. ex Chod. l. c.* Afr. austr.
 singalensis, *Chod. l. c.* 314. — Zeylan.
 somaliensis, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 211. — Reg. Somal.
 spicata, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 221. — Angola.
 Stanleyana, *Chod. l. c.* 340. — Angola.
 Steudneri, *Chod. l. c.* 390. —
 stipulata, *Chod. l. c.* 89. — Guian. Bat.
 Stuhlmannii, *Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 234. — Afr. trop. or.
 subulata, *S. Wats. in Proc. Calif. Acad. Wiss.* xxvi. (1891) 132. — Mexic.
 tenuissima, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 153. — Reg. Argent.
 Tepperi, *F. Muell. in Vict. Natural.* vii. (July 1890) 38; et in *Bot. Centralbl.* xliii. (1890) 276 = *chinensis*, Linn.
 Thurmanniana, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 346. — Arabia.
 tonkinensis, *Chod. l. c.* 97. — Tonkin.
 timoutoides, *Chod. l. c.* xxx. n. 8 (1889) 112, t. 31, fig. 2. — Parag.
 Torreyi, *Chod. l. c.* xxxi. n. 2 (1893) 194. — Am. bor.
 tovariensis, *Chod. l. c.* 32. — Venezuela.
 transvaalensis, *Chod. l. c.* 374. — Transvaal.
 tricholopha, *Chod. l. c.* 98. — Ind. or.
 tuberculata, *Chod. l. c.* 242. — Bras.
 Tweedyi, *Britton, in Mém. Torrey Bot. Club*, ii. (1891) 143. — Texas.
 ukambica, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 329. — Afr. or.
 ukirensis, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 310. — Afr. trop. or.
 Urbani, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 58. — Bras.
 usambarensis, *Guerke, in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 64; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 283. — Afr. trop. or.
 Vauthieri, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 65. — Bras.
 Villa-Rica, *Chod. l. c.* xxx. n. 8 (1889) 106, t. 29, fig. 2, et xxxi. n. 2 (1893) 286. — Parag.
 viminalis, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 234. — Afr. trop. or.
 Vogtii, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 144. — Mexic.
 Volkensii, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 234. — Afr. trop. or.
 wadibomica, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. (1893) 320. — Afr. or.
 Warburgii, *Chod. ex Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 346. — N. Guin.

POLYGALA : —

- Watsoni, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 285. — Mexic.
 Weddelliana, *Chod. l. c.* 159. — Parag.
 Weddelliana, *Chod. l. c.* 207. — Bras.
 Welwitschii, *Chod. l. c.* 340. — Angola.
 Wrightii, *Chod. l. c.* 67. — Cuba.
 xyloclada, *Chod. l. c.* 48. — Bras.
 yemenica, *Chod. l. c.* 327. — Arabia.

POLYGONATUM, [Tourn.] Adans. (Liliac.). —

- Ind. Kew. ii. 594.
 agglutinatum, *Hua, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 448. — China.
 amabile, *Yatabé, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 279, t. 7; et *Icon. Fl. Japon.* i. (1893) 233, t. 57. — Japon.
 anomalum, *Hua, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 420. — China.
 curvistylum, *Hua, l. c.* 424. — China.
 cyrtoneuma, *Hua, l. c.* 393. — China.
 Franchetii, *Hua, l. c.* 392. — China.
 nodosum, *Hua, l. c.* 394. — China.
 Delavayi, *Hua, l. c.* 422. — Yunnan.
 erythrocarpum, *Hua, l. c.* 424. — China.
 Fargesii, *Hua, l. c.* 446. — China, Reg. Himal.
 fuscum, *Hua, l. c.* 444. — China.
 kasuense, *Maxim. ex Batalin. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 493. — China.
 Kingianum, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 28 t. 21; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 322. — Burma.
 mixtum, *X. C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 233. — Helv.
 platyphyllum, *Franch. in Morot. Journ. de Bot.* iv. (1889) 318. — China bor.
 Prattii, *Baker, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2217. — China.
 pumilum, *Hua, in Morot. Journ. de Bot.* vi. (1892) 423 [pumilum]. — China.
 Skorpili, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1893) 61. — Bulg.
 Souliei, *Hua, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 427. — China.
 trinerve, *Hua, l. c.* 445. — China.

POLYGONELLA, Michx (Polygon.). —

- Ind. Kew. ii. 594.
 americana, *Small, in Mém. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 141 = *ericoides*, *Engelm. & Gray*.

POLYGONIFOLIA, Mappus = Corrigiola, Linn. (Illecebr.).

- capensis*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 535 = *C. capensis*, Willd.
deltodea, *Kuntze, l. c.* = *Monocosmia corrigioloides*, Fenzl.
latifolia, *Kuntze, l. c.* = *Corrigiola latifolia*, C. Gay.
litoralis, *Kuntze, l. c.* = *C. litoralis*, Linn.
propinqua, *Kuntze, l. c.* = *propinqua*, C. Gay.
squamosa, *Kuntze, l. c.* = *Corrigiola squamosa*, Hook. & Arn.
telephiifolia, *Kuntze, l. c.* = *C. litoralis*, Linn.

POLYGONUM, [Tourn.] Linn. (Polygon.). —

- Ind. Kew. ii. 594.
 acanthophyllum, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 12. — Reg. Argent.
 arachnoideum, *Klotzsch, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 35 = *lanigerum*, R. Br.
 araucanum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 489. — Chili.
 auriculatum, *Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 47 = *strigosum*, R. Br.
 axillare, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia axillaris*, Walp.
 Banca, *Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 36 = *minus*, Huds.
 Bettfreudianum, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 11. — Reg. Argent.
 Bisculatum, *Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 39 = *flaccidum*, Meissn.
 Bishirae, *Ham. ex Hook. f. l. c.* 37 = *stagninum*, Ham.
 boreale, *Small, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 479 = *aviculare*, Linn.

POLYGONUM : —

- Buchanani, *Dammer*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 170. — Afr. trop. or.
 Caballeri, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 491. — Chili.
 cordobense, *Lindau*, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 10. — Reg. Argent.
 cynanchoides, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 338. — China.
 Delfini, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 490. — Chili.
 dissitiflorum, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 338. — China.
 Dombeyanum, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia peruviana*, *Meissn.*
emersum, *Britton*, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* viii. (1889) 73; *Small*, *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 44 = *P. Muehlenbergii*, *S. Wats.*
ephedroides, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia ephedroides*, *Hook. f.*
erythrops, *Dammer*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 170. — Afr. trop. or.
 exsertum, *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 172; et *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 112 t. 43. — Am. bor.
 flexuosum, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia adpressa*, *Meissn.*
 florulentum, *Kuntze*, l. c. = *M. Cunninghami*, *F. Muell.*
 fluviatile, *Herb. Ham.* ex *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 37 = *barbatum*, *Linn.*
 fusiforme, *Greene*, in *Erythraea*, i. (1893) 259. — Am. bor. occ.
 galapagense, *Caruel*, in *Rendic. Acad. Lincei*, v. (1889) 624. — Ins. Galapag.
 Gilesii, *Hemsl. in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1756. — Afghan.
 glareosum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 490. — Chili.
 Goyalpara, *Herb. Ham.* ex *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 37 = *stagninum*, *Ham.*
 gracile, *Herb. Ham.* ex *Hook. f.* l. c. 38 = *P. Posumbu*, *Ham.*
 gracillimum, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia gracillima*, *Meissn.*
 gracilipes, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 340. — China.
 Griffithii, *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 54. — Reg. Himal.
 guttiferum, *Miq.* ex *Hook. f.* *Fl. Brid. Ind.* v. (1886) 42 = *alatum*, *Ham.*
 hastulatum, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia chilensis*, *Meissn.*
 herniarioides, *Herb. Strach. & Winterb.* ex *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 28 = *plebejum*, *R. Br.*
 hirsutum, *Herb. Ham.* ex *Hook. f.* l. c. 36 = *viscosum*, *Ham.*
 hypostictum, *Miq.* ex *Hook. f.* l. c. 36 = *minus*, *Huds.*
 Kelloggii, *Greene*, *Fl. Francisc.* (1891) 134. — Calif.
 leptobotrys, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia leptobotrys*, *Meissn.*
 longipes, *Haldasy & Charrel [Nadji]* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 164. — Maced.
 longistylum, *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 165; et *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 78, t. 26. — Am. bor.
 Marmoramae, *Herb. Ham.* ex *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 37 = *barbatum*, *Linn.*
 Metzianum, *Miq.* ex *Hook. f.* l. c. 42 = *alatum*, *Ham.*
 mexicanum, *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 356; et *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 60. — Mexic.
 micranthemum, *Franch.* ex *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 28 = *plebejum*, *R. Br.*
 microsperrum, *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 366; et *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 124 t. 49. — Am. bor.
 microspermum, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 70 = *P. Engelmanni*, *Greene.*
 Myosurus, *Franch.* in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 73. — China. occ.
 Newberryi, *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 170, t. 194; et *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 36, t. 5. — Am. bor.

POLYGONUM : —

- Nuttallii, *Small*, *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1889) 132, t. 53. — Am. bor. occ.
 opelousanum, *Riddell*, ex *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxix. (1892) 354; et *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 78, t. 16. — Am. bor.
 pergracile, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 344 [pergracilis]. — China.
 phytolaccaefolium, *Meissn.* ex *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 361. — Calif.
 pilosum, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 345 (= *Koenigia pilosa*, *Maxim.*). — China.
 pinetorum, *Hemsl. l. c.* — China.
 praetermissum, *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 47. — Ind. or., Tasmania.
 Pringlei, *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 257; et *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 58, t. 16. — Am. bor.
 radicans, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 347. — China.
 Rapte, *Herb. Ham.* ex *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 38 = *serrulatum*, *Lag.*
 rhyticarum, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia rhytocarya*, *F. Muell.*
 rigidulum, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 14, t. 1. — Am. bor.
 rupestre, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia rupestris*, *Wedd.*
 sagittifolium, *Kuntze*, l. c. = *M. sagittifolia*, *Meissn.*
 sawatchense, *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 213; et *Monog. N. Am. Polygon.* i. (1895) 120, t. 47. — Am. bor. occ.
 Schimperii, *Vatke*, ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 202. — Afr. trop. or.
 spergulariaeforme, *Meissn.* ex *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 366. — Am. bor. occ.
 tataricum, *Wall.* ex *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 52 = *tortuosum*, *Don.*
 tiliaefolium, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia tiliaefolia*, *Wedd.*
 Tuerckheimii, *Vatke*, ex *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 370, in syn. = *Meisnerianum*, *Cham. & Schlecht.*
 trophyllum, *Bureau & Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 150. — China occ.
 valdivianum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 488. — Chili.
 varians, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia varians*, *Meissn.*
 Watsoni, *Small*, *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 138, t. 56. — Am. bor.
 Zuccarinii, *Small*, l. c. 158, t. 66. — Am. bor.

POLYLEPIS, Ruiz & Pav. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 599.

- Besseri, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 312 (= *P. villosa*, *Rusby*). — Bolivia.
 Lehmannii, *Hieron.* l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) 29. — Columb. vel Ecuad.
 Pauta, *Hieron.* l. c. xxi. (1895) 313. — Ecuad.
 reticulata, *Hieron.* l. c. 312. — Ecuad.
 Stuebelii, *Hieron.* l. c. 313. — Ecuad.
 villosa, *Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 25 = *P. Besseri*, *Hieron.*

POLYMNIA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 600.

- Liebmanni, *Sch. Bip. ex Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 89. — Mexic.
 oaxacana, *Sch. Bip.* l. c. — Mexic.
 quichensis, *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 48. — Guatem.
 tarapacana, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 21. — Chili.

POLYOSMA, Blume (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 600.

- bracteosum, *Stapf*, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 148. — Borneo.
 Hookeri, *Stapf*, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2296. — Borneo.
 reducta, *F. Muell.* in *Vict. Natural.* ix. (June 1892) 42; et in *Bot. Centralbl.* li. (1892) 252. — Austral.

POLYOSMA : —

- rigidiuscula, *F. Muell. & F. M. Bailey*, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* i. (1890) 4. — Austral.

POLYPARA, Lour. = **Houttuynia**, Thunb. (Piperac.).

- cordata, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 565 = *H. cordata*, *Thunb.*

POLYPETALIA speciosa, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 135 = *Prunus italica*, *Borkh.***POLYPOGON**, Desf. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 600.

- canadense, *Fourn.* *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 92 = *Agrostis mexicana*, *Linn.*
 majus, *Hackel*, ex *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 153 (= *P. algeriense*, *Gandog.*). — Algeria.
 tarapacanum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 82. — Chili.

POLYPOMPHOLYX, Lehm. (Lentibul.). — Ind. Kew. ii. 601.

- Holtzei, *F. Muell.* in *Vict. Natural.* ix. (Mar. 1893) 176; et ex *Bot. Centralbl.* liv. (1893) 93, in syn. = *Utricularia Holtzei*, *F. Muell.*

POLYPORANDRA, Becc. (Icacin.). — Ind. Kew. ii. 601.

- Hansemani, *Engl. Bot. Jahrb.* xvi. Beibl. n. 39 (1893) 13. — N. Guin.

POLYPTERIS, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 601.

- latifolia, *Hemsl. in Biol. Centr.-Am.* iv. (1886) 59. — Mexic.
 sphacelata, *Trelease*, ex *Branner & Coville*, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* for 1888, i. (1891) 197 = *Hookeriana*, *A. Gray.*

POLYRRHIZA, Pfitz. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1889) 215. **ORCHIDEAE.**
 funalis, *Pfitz. l. c.* (= *Aeranthis funalis*, *Lindl.*). — Jamaica.**POLYSCIAS**, Forst. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 601.

- aculeata, *Harms*, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 45 (= *Cuphocarpus aculeatus*, *Decne.*). — Madag.
 amplifolia, *Harms*, l. c. (= *Panax amplifolium*, *Baker.*). — Madag.
 Anisum, *Harms*, l. c. (= *P. Anisum*, *DC.*). — Ins. Molucc.
 austro-caledonica, *Harms*, l. c. (= *P. austro-caledonica*, *Baill.*). — N. Caled.
 Balansae, *Harms*, l. c. (= *P. Balansae*, *Baill.*). — N. Caled.
 cissiflora, *Harms*, l. c. (= *P. cissiflorum*, *Baker.*). — Madag.
 confertifolia, *Harms*, l. c. (= *P. confertifolium*, *Baker.*). — Madag.
 Cumingii, *Harms*, l. c. (= *P. Cumingianum*, *Rolfe.*). — Ins. Philipp.
 dioica, *Harms*, l. c. (= *Cussonia dioica*, *Vieill.*). — N. Caled.
 elegans, *Harms*, l. c. (= *Panax elegans*, *C. Moore & F. Muell.*). — Austral.
 farinosa, *Harms*, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. (1894) 45 (= *Aralia farinosa*, *Del.*). — Abyss.
 fruticosa, *Harms*, l. c. 45 (= *Panax fruticosum*, *Linn.*). — As. et Ocean. trop.
 gomphophylla, *Harms*, l. c. (= *P. gomphophyllum*, *Baker.*). — Madag.
 inermis, *Harms*, l. c. (= *Cuphocarpus inermis*, *Baker.*). — Madag.
 Kissodendron, *Harms*, l. c. (= *Panax kissodendron*, *C. Moore & F. Muell.*). — Austral.
 Macgillivrayi, *Harms*, l. c. (= *P. Macgillivrayi*, *Benth.*). — Austral.
 madagascariensis, *Harms*, l. c. 44 (= *Maralia madagascariensis*, *DC.*). — Madag.
 microbotrys, *Harms*, l. c. (= *Panax microbotrys*, *Baill.*). — N. Caled.

POLYSCIAS : —

mollis, *Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii, 8 (1894) (= *P. molle*, Benth.). — Austral. multibracteata, *Harms, l. c.* (= *Panax multibracteatum*, Baker). — Madag.
 multijuga, *Harms, l. c.* (= *P. multijugum*, Benth. & Hook. f.). — Ins. Fiji.
 Murrayi, *Harms, l. c.* (= *P. Murrayi*, F. Muell.). — Austral.
 myriophylla, *Harms, l. c.* (= *P. myriophyllum*, Baill.). — N. Caled.
 obtusa, *Harms, l. c.* (= *P. obtusum*, Blume). — Java.
 ornifolia, *Harms, l. c.* (= *P. ovalifolium*, Baker). — Madag.
 Pancheri, *Harms, l. c.* (= *P. Pancheri*, Baill.). — N. Caled.
 pentamera, *Harms, l. c.* (= *P. pentamera*, Baker). — Madag.
 pulchella, *Harms, l. c.* (= *P. pulchellum*, Baill.). — N. Caled.
 Rumphiana, *Harms, l. c.* (= *P. pinnatum*, Lam.). — Archiv. Mal.
 sambucifolius, *Harms, l. c.* (= *P. sambucifolium*, Sieber). — Austral.
 samoënsis, *Harms, l. c.* (= *P. samoënsis*, A. Gray). — Ins. Samoëns.
 Stuhlmanni, *Harms, ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 130, nomen. — Afr. trop. or.
 suborbicularis, *Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii, 8 (1894) 45. — N. Caled.
 tahitensis, *Harms, l. c.* (= *Panax tahitense*, Nadeaud). — Ins. Tahit.
 tripinnata, *Harms, l. c.* 44 (= *P. tripinnatum*, Baker). — Madag.
 Weinmanniae, *Harms, l. c.* (= *P. Weinmanniae*, Baill.). — N. Caled.
 xanthoxyloides, *Harms, l. c.* (= *P. xanthoxyloides*, Baker). — Madag.

POLYSPHAERIA, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii, 601.
 neriifolia, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 383. — Afr. trop. or.

POLYSTACHYA, Hook. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii, 601.

acutifolia, *Lindl. ex Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 639 (= *Dendrochis acutifolia* Kuntze). — [Quid?] albescens, *Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v.* (1887) 199. — Ins. S. Thom.
 albo-violacea, *Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii.* (1893) 50. — Afr. trop.
 Beccarii, « Reichb. f. » ex Martelli, *Fl. Bogos.* (1886) 80 = Beccariana, *Reichb. f.*
 Buchananii, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 335. — Zambesia.
 bulbophylloides, *Rolfe, l. c.* (1891) 199. — Afr. trop. or.
 caespitica, *Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 47; in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 155; et in *Bot. Jahrb. xxii.* (1895) 21. — Afr. trop. or.
 cucullata, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1892 (1895) 34 = grandiflora, *Lindl.*
 disticha, *Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix.* (1891) 139. — Ins. S. Thome.
 Dusenii, *Kraenzl. in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 251. — Kamerun.
 Elliotii, *Rendle, in Journ. Bot. xxxiii.* (1895) 198. — Afr. trop. or.
 expansa, *Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v.* (1887) 198. — Afr. trop. occ.
 farinosa, *Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii.* (1893) 51. — Kamerun.
 glaberrima, *Schlechter, in Bot. Jahrb. xx.* Beibl. n. 50 (1895) 11. — Afr. austr.
 gracilentia, *Kraenzl. l. c.* xix. (1894) 251. — Afr. trop. or.
 imbricata, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 172. — Zambesia.
 Kirkii, *Rolfe, l. c.* (1895) 283. — Afr. trop. or.
 Laurenceana, *Kraenzl. in Gard. Chron.* (1893) ii, 150. — Zambesia.
 minima, *Rendle, in Journ. Bot. xxxi.* (1895) 198. — Afr. trop. or.

POLYSTACHYA : —

nigrescens, *Rendle, in Journ. Bot. xxxiii.* (1895) 201. — Afr. trop. or.
 polychaete, *Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii.* (1893) 50. — Kamerun.
 Preussii, *Kraenzl. l. c.* 51. — Kamerun.
 Rivae, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii.* App. II. (1894) 88. — Eritrea.
 ruwenzoriensis, *Rendle, in Journ. Bot. xxxiii.* (1895) 199. — Afr. trop. or.
 Shega, *Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57; in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 155; et in *Bot. Jahrb. xxii.* (1895) 22. — Usambara.
 simplex, *Rendle, in Journ. Bot. xxxiii.* (1895) 199. — Afr. trop. or.
 spatella, *Kraenzl. in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 251. — Afr. trop. or.
 stauroglossa, *Kraenzl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 155; et *l. c.* xxii. (1895) 22. — Afr. trop. or.
 Stuhlmannii, *Kraenzl. l. c.* — Afr. trop. or.
 Tayloriana, *Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx.* (1895) 385. — Afr. trop. or.
 tenuissima, *Kraenzl. in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 250. — Kamerun.
 transvaalensis, *Schlechter, l. c.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 28. — Transvaal.
 villosa, *Rolfe, in Kew Bull.* (1894) 393. — Zambesia.
 zambesiaca, *Rolfe, l. c.* (1895) 192. — Zambesia.

POLYTOCA, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii, 602.

Cookei, *Stapf, in Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2333. — Ind. or.

POLYTRIAS, Hack. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii, 2 (1887) 24. **GRAMINEAE.**

amaura, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 788 = praemorsa, *Hack.*
 diversiflora, *Baill. Hist. des pl.* xii. (1894) 319 = praemorsa, *Hack.*
 praemorsa, *Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii, 2 (1887) 24; et in *DC. Monog. Phan. vi.* (1889) 189 (= *Pollinia praemorsa*, Nees). — Java.

POLYXENA, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. ii, 602.

Bakeri, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1893 (1895) 366 (= *Massonia pygmaea*, Schlecht.). — Afr. austr.
 haemanthoides, *Baker, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1727. — Afr. austr.
 odorata, *Nichols. Dict. Gard. iii.* (1886) 196. — Afr. austr.

POMADERRIS, Labill. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii, 602.

amoena, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii.* 1885 (1886) 258. — N. Zel.
 mollis, *Colenso, l. c.* xxv. 1892 (1893) 327. — N. Zel.

POMATOSTOMA, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) sub t. 3420. **MELASTOMACEAE.**
 angustifolium, *Stapf, l. c.* t. 2420. — Borneo.
 inaequalis, *Stapf, l. c.* t. 2421. — Borneo.
 phyllagathoides, *Stapf, l. c.* — Borneo.
 sertuliferum, *Stapf, l. c.* t. 2420. — Borneo.

POMAZOTA, Ridl. in *Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iii. (1893) 308. **RUBIACEAE.**
 sylvestris, *Ridl. l. c.* — Penins. Mal.

POMMERESCHIA, Wittm. in *Gartenfl.* xlv. (1895) 131. **ZINGIBERACEAE.**
 Lackneri, *Wittm. l. c.*, fig. 35. — Ind. or.

PONGAMIA, Vent. (Legumin.). — Ind. Kew. ii, 604.

dehiscens, *Koerd. & Valet. Boomsoort. van Java.* ii. (1895) 96. — Java.

PONGATIUM, Juss. = **Sphenoclea**, Gaertn. (Campanul.).
 zeylanicum, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 381 = *S. zeylanica*, *Gaertn.*

PONGELION, Fl. For. Cochinch. Fasc. 19 (1893) sub t. 294, in text. = **Ailanthus**, Desf. (Simarub.).

calycinum, *Pierre, l. c.* = *A. calycinus*, *Pierre.*
 excelsum, *Pierre, l. c.* sub t. 295 A = *A. excelsum*, *Roxb.*
 Fauvelianum, *Pierre, l. c.* sub t. 295 B = *A. Fauvelianus*, *Pierre.*
 glandulosum, *Pierre, l. c.* sub t. 294 = *A. glandulosus*, *Desf.*
 imberbiflorum, *Pierre, l. c.* = *A. imberbiflorus*, *F. Muell.*
 malabaricum, *Pierre, l. c.* = *A. malabaricus*, *DC.*
 moluccanum, *Pierre, l. c.* sub t. 294 = *A. moluccanus*, *DC.*

PONGONIA, « Griff. » ex Grant, *Orchids of Burma* (1895) 351. sphalm. = **Pogonia**, Griff. (Orchid.).

PONTHIEVA, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii, 604.

dicliptera, *Reichb. f. in Flora.* lxi. (1886) 548. — N. Granat.
 grandiflora, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1888) i, 264. — Ecuad.
 phaenoleuca, *Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii.* IV. (1895) 273 (= *Calorchis phaenoleuca*, Barb. Rodr.). — Bras.
 Sprucei, *Cogn. l. c.* 274. t. 66, fig. 3. — Bras.

POORTMANNIA, Drake, in *Bull. Soc. Philom.* Paris, Sér. VIII. iv. (1892) 128. **SOLANAEAE.**
 speciosa, *Drake, l. c.* 129. — Ecuad.

POPOWIA, Endl. (Anonac.). — Ind. Kew. ii, 605.

fusca, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi.* (1892) ii, 94. — Perak.
 Hookeri, *King, l. c.* 97. — Ind. or.
 Kurzii, *King, l. c.* 96 (= *P. macrophylla*, Hook. f. & Thoms.). — As. trop.
 micrantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii.* (1887) 442. — Madag.
 nitida, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi.* (1892) ii, 92. — Ins. Andam. et Nicob.
 perakensis, *King, l. c.* 94. — Perak.
 velutina, *King, l. c.* — Perak.

POPULINA, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 443; *Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv, 3b (1895) 344. **ACANTHACEAE.**
 Richardi, *Baill. l. c.* — Madag.

POPULUS, Linn. (Salic.). — Ind. Kew. ii, 605.

ambigua X, *G. Beck. Fl. Nied.-Oest. i.* (1890) 305. — Austria.
 Arenbergiana, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 191 (= *P. Arenbergica*, *Hort.*) = alba, *Linn.*
 crispa, *Hort. ex Dippel, l. c.* 209 = laurifolia, *Ledeb.*
 Eugenii, *Simon, ex Gartenfl.* xxxvi. (1887) 674; et in *Gard. Chron.* (1887) ii, 818 (an *P. Eugeni*, *Hort. ex C. Koch*) = monilifera, *Ait.*
 grandifolia, *Hort. ex Wesm. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxvi. 1887 (1889) 375 = heterophylla, *Linn.*
 Juliana-pendula, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 192 = canescens, *Sm.*
 lasiocarpa, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1943. — China.
 microcarpa, *Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1888) 639. — Bhotan.
 monticola, *T. S. Brandeg. in Zool.* i. (1890) 274. — Calif.
 Nolestii, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 199 = nigra, *Linn.*
 ovata, *Hort. ex Dippel, l. c.* 199, sphalm. et 583 (ad calc.) (Quid?).
 Petrowskiana, *Schroed. ex Dippel, l. c.* 200: *Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 82 = canadensis, *Moench.*
 Rasumofskyana X, « *Schroed.* » ex *Koehne, l. c.* 84 = seq.
 Rasumowskiana, « *Schroed.* » ex *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 204. — Hab. ?
 serotina, *Hort. ex Dippel, l. c.* 202 = angulata, *Ait.*

POPULUS : —

- Steiniana* X, Bornm. in Gartenfl. xxxvii. (1888) 173, fig. 37 et 38; et in Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 154. — Bulg.
tristis, « Fisch. » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 204; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 82. — Hab. ?
Viadri X, Ruediger, in Abh. Naturw. Ver. Reg.-Bezirk. Frankf. viii. (1889-90), ex Gartenfl. xxxix. (1890) 447; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 84. — Germ.
Wobstii, Schroed. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 207 = *balsamifera*, Linn.

PORANA, Burm. f. (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 606.

- densiflora*, Hallier f. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26 et 34; et in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 93. — Afr. trop. or.
sinensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 167. — China.
velutina, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 538 (= *Dufourea* ? *velutina*, Mart. & Gal.). — Mexic.

PORCELIA, Ruiz & Pav. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 606.

- microcarpa*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 1. — Guatem.

PORLIERIA, Ruiz & Pav. (Zygophyll.). — Ind. Kew. ii. 606.

- Lorentzii*, Engl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 84. — Reg. Argent.

POROPHYLLUM, Vaill. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 606.

- crassifolium*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 57. — Mexic.
Pringlei, Robinson, l. c. xxvii. (1893) 178. — Mexic.

POROSPERMUM, F. Muell. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 607.

- Michieanum*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 31 (= *Delarbyrea Michieana*, F. Muell.) = *Michieanum*, F. Muell.

PORPHYROCOMA, Scheidw. = **Dianthera**, Linn. (Acanth.).

- lanceolata*, Hort. ex Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 342 = *serpens*, Lindau.
Pohlana, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 40 et 57; et l. c. (= *Orthotactus Pohlmanus*, Nees). — Bras.
serpens, Lindau, l. c. (= *Amphiscopia serpens*, Nees). — Columb.

PORPHYROSTEMMA, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 607.

- cuanzensis*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 174. — Angola.

PORTEA, C. Koch (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 607.

- Gardneri*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 21. — Bras.
Glaziovii, Baker, l. c. 22. — Bras.
Legrelliana, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 202. — Bras.
Noettigii, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 296 = *Aechmea Noettigii*, Wawra.
petropolitana, Mez, l. c. 297 = *Ae. petropolitana*, Wawra.
tillandsioides, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 302. — Bras.

PORTERANTHUS, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club. iv. (1893) 115 = **Gillenia**, Moench (Rosac.).

- stipulatus*, Britton, l. c. t. 77 = *G. stipulata*, Nutt.
trifoliatus, Britton, l. c. t. 76 = *G. trifoliata*, Moench.

PORTLANDIA, P. Br. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 607.

- pterosperma*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 53. — Mexic.

PORTULACA, Linn. (Portul.). — Ind. Kew. ii. 607.

- cyclophylla*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. v. (June 1890) 16. — Austral.
dubia; J. G. O. Tepper, in Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral. xvii. (1893) 16. — Austral.
Fischeri, Pax, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 585. — Afr. trop. or.
parvula, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 274. — Am. bor. austro-occ.

POSADAEA, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. II. xx. (1890) 476; Muell. & Pax, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1894) 393, in obs.

- CUCURBITACEAE.**
sphaerocarpa, Cogn. l. c. 477; et 393. — Columb.

POSOQUERIA, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 608.

- macrantha*, Hort. ex Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 331 = *Deherainia smaragdina*, Decne.

POTAMOGETON, [Tourn.] Linn. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 609.

- Aschersonii*, A. Bennett, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 294. — Chili.
aulacophyllus, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 696. — Reg. Argent.
australis, F. Phil. ex Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 95; et in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 525. — Chili.

- Bennettii* X, Fryer, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) I. t. 348. — Brit.

- Billupsii* X, Fryer, l. c. xxxi. (1893) 353, t. 337-338. — Brit.

- borealis*, Kihlm. ex Bot. Notiz. (1887) 84 = *gramineus*, Linn.

- capensis*, Scheele, ex A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 287, nomen. — Afr. austr.

- coriaceus*, Fryer, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 8. — Germ. Brit.

- crassifolius* X, Fryer, l. c. xxviii. (1890) 321, t. 299. — Brit.

- Curtissii*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 145. — Florida.

- Delavayi*, A. Bennett, in Journ. Bot. xxx. (1892) 228. — Yunnan.

- dubius*, Tiselius (Potam. Succ. exsicc. n. 19) in Bot. Notiser (1894) 165. — Suecia.

- falcatus*, Fryer, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 65, t. 286. — Brit.

- Faxonii*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 2 (1893) 22, t. 32. — Am. bor.

- Gayii*, A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 293. — Urug.

- huillensis*, Welw. ex A. Bennett, l. c. 292 = *javanicus*, Hassk.

- latifolius*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 2 (1893) 52, t. 59 = *pectinatus*, Linn.

- limosellifolius*, Maxim. ex Korshinsky, in Act. Hort. Pérop. xii. (1892) 393. — Sibir.

- Lundii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 13. — Suecia.

- major*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. II. (1893) 41 = *P. Friesii*, Ruprecht.

- major*, Morong, ex MacMill. Metasp. Minn. (1892) 37, in syn. = *rutilus*, Wolff.

- mexicanus*, A. Bennett, in Journ. Bot. xxv. (1887) 289. — Mexic.

- Miduhikimo*, Makino, ex A. Bennett, l. c. xxx. (1892) 229. — Japon.

- montevidensis*, A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 293. — Urug.

- monticola*, Schweinitz, ex A. Bennett, l. c. 293, in syn. = *confervoides*, Reichb.

- nipponicus*, Makino, ex A. Bennett, in Journ. Bot. xxx. (1892) 229. — Japon.

- peruvianus*, Presl, ex A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 292, in syn. = *mexicanus*, A. Bennett.

- Phialae*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 409 = *trichoides*, Linn.

- pumilum*, Nutt. ex A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 293, in syn. = *P. Robbinsii*, Oakes.

POTAMOGETON : —

- Purshianus*, Morong, & MacMill. Metasp. Minn. (1892) 39, in syn. = *pauciflorus*, Pursh.

- reflexus*, Herb. Vind. ex A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 291 = *zosterifolius*, Schum.

- revularis*, Gillet, in Magnier, Scrin. fl. select. vi. (1887) 118; et in Bull. Soc. Dauph. xiv. (1887) 584 = *lanceolatus*, Smith.

- sclerocarpus*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 688. — Bras.

- sibiricus*, A. Bennett, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 300. — Sibiria.

- spathulaeformis*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 2 (1892) 26 t. 35. — Am. bor.

- stenostachys*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 687. — Bras.

- suecicus*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 15. — Suecia.

- sulcatus*, A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 294. — Austral.

- tenuifolius*, F. Phil. ex Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) App. [95]; et in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 521 = *P. Aschersonii*, A. Bennett.

- Tepperi*, A. Bennett, in Journ. Bot. xxv. (1887) 178. — Austral.

- Thomasii*, (Auct. ?) ex A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 288 = *alpinus*, Balb.

- Tiselii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 13. — Suecia.

- tretocarpus*, Maxim. ex A. Bennett, in Journ. Bot. xxix. (1891) 154; et in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 289 = *mucronatus*, Fries.

- Ulei*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 690. — Bras.

- tricaratus*, F. Muell. & A. Bennett, ex A. Bennett, in Journ. Bot. xxx. (1892) 229. — Austral.

- varians*, Morong, ex Fryer, in Journ. Bot. xxii. (1889) 33, t. 287 et xxv. (1892) 308; Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 2 (1893) 26 = *spathulaeformis*, Morong.

- Wolfgangii*, Kihlm. Herb. Pl. Mus. Fenn. (1889) 33 et 128; et A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 292 = *gracile*, Wolff.

- Wrightii*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 158 = *lucens*, Linn.

POTAMOPITYS, Linn. = **Elatine**, Linn.

- Alsinastrum*, *ambigua*, *americana*, *brachysperma*, *californica*, *campylosperma*, *hexandra*, *Hydropiper*, *inaperta*, *macropoda*, *major*, *trianandra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 58 = *homonyma omnia* Elatine.

POTENTILLA, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 611.

- adriatica*, Murb. in Lunds Univ. Arsskrift. xxvii. v. (1892) 134. — Herceg.

- adscharica*, Sommier & Levier, ex R. Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 509. — Reg. Cauc.

- aetnea*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 226. — Sicil.

- Alberti*, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 33. — Gall. mer.

- ambigens*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 5. — Color.

- Andersonii*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 104 (= *Horkelia parviflora*, Nutt.). — Am. bor. occ.

- Andrzejowskii*, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 407. — Galicia.

- Antheris* X, Huter, ex Siegf. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. iii. (1893) 128. — Helv., Tirol.

- arizonica*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 104 = *Ivesia pinnatifida*, S. Wats.). — Am. bor. occ.

- armeniaca*, Siegf. [Exsicc. Potent. (1892) n. 648] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 36 = *collina*, Wibel.

- articulata*, Franch. Pl. Delav. (1890) 210. — Yunnan.

- Baenitzii*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 437, nomen. — Silesia.

- Baileyi*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 105 (= *Ivesia Baileyi*, S. Wats.). — Am. bor. occ.

- Battersbyi*, Siegf. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 242; et xl. (1889) 203 = *arenaria*, Borkh.

- bellowensis*, Siegf. [Exsicc. Potent. (1892) n. 710] ex Oest. Bot. Zeitschr. xliiv. (1894) 156. — As. Min.

POTENTILLA : —

- benacensis, Zimm. ex [Siegfr. Exsicc. Potent. (1894) n. 952 b] Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 150, nomen. — Ital., Tirol.
- Besseana X, Siegfr. [Exsicc. Potent. (1893) n. 937] in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. iii. (1893) 129; et in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xxi-xxii. (1894) 119. — Helv.
- biennis, Greene, Fl. Francisc. (1891) 65; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 115. — Calif.
- bohémica, Blocki, ex Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyj. Krajow. xxii. (1888) 218; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 17. — Bohem.
- Bolanderi, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 103 (= *Horkelia Bolanderi*, A. Gray). — Calif.
- bolzanensisformis, Sauter, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 114. — Tirol.
- Bornmuelleri, Borb. Enum. Pl. Comit. Castrif. (1887-88) 311 = recta, Linn.
- borussica, Uechtr. ex [Siegfr. Exsicc. Potent. (1891) n. 139] Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1890) 19. — Borussia.
- Brandisiana, Siegfr. [Exsicc. Potent. (1892) n. 910] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 36, nomen. = collina, Wibel.
- Brennia X, Huter, ex A. Kern Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 14. — Tirol.
- brevistipula, Dumas, in Rev. d'Auvergne (1891) cum ic.; et ex Rev. sci. Bourb. v. (1892) 20 = aurea, Linn.
- Buschakii, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 291, et xlii. (1892) 351. — Galicia.
- Buseri X, Siegfr. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 202. — Helv.
- calicicola, Blocki, ex [Siegfr. Exsicc. Potent. (1892) n. 328] Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 36, nomen. = inclinata, Vill.
- californica, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1888) 100; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 116 (= *Horkelia californica*, Cham. & Schlecht.). — Calif.
- Candriani X, Siegfr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. ii. (1892) 102, et v. (1895) 122. — Helv.
- capitata, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 104 (= *Horkelia capitata*, Lindl.). — Am. bor. occ.
- cardinalis, Hort. ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 39 = argyrophylla, Wall.
- Chodatiana X, Ph. Paiche, ex Siegfr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. iii. (1893) 129. — Helv.
- chulensis, Siegfr. & Keller, ex Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 504. — Reg. Cauc.
- ciliata, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 103. — Calif.
- Clevelandi, Greene, l. c. 102. — Am. bor. occ.
- confusa X, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 89. — Germ. bor.
- commixta X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 112; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 96. — Graecia.
- Cornati, « Buser » ex Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 181. sphalm. = seq.
- Cornazi X, Buser, ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 23; M. Besse, in Bull. Soc. trav. Murith. Fasc. xxi-xxii. (1894) 121 = argentea, Linn.
- crassicaulis, Blocki, ex [Siegfr. Exsicc. Potent. (1891) n. 98] Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 15. — Podolia.
- daucifolia, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 160. — Calif.
- Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II, viii. (1886) 222. — China occ.
- decipiens, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 106 (= *Ivesia pygmaea*, A. Gray). — Calif.
- Delavayi, Franch. Pl. Delav. (1890) 215. — Yunnan.
- Dichtliana, Blocki, ex [Siegfr. Exsicc. Potent. (1890) n. 97] Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 15. — Austria.
- dispersa X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 112; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 98. — Graecia.
- divina, Alboff, in Soc. Imp. Hort. (Compt.-rend. Sect. Odessa) (1891) extr. 10; et Prodr. Fl. Colch. (1895) 81, in syn. = Oweriana, Rupr.
- Doerfleri, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 39, t. 2 fig. 17, 20. — Albania.
- dolosa X, Hausskn. ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 15; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 98. — Graecia, Oriens.

POTENTILLA : —

- Donnell-Smithii, Focke, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 3. — Guatem.
- Douglasii, Greene, in Pittonia, i. (Nov. 1887) 103 (= *Horkelia fusca*, Lindl.). — Am. bor. occ.
- elata, Greene, l. c. (= *H. californica*, Cham. & Schlecht.). — Calif.
- eremica, Coville, in Proc. biol. Soc. Wash. vii. (1892) 76. — Calif.
- fallacina, Blocki, ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 38; et xlii. (1892) 351 = recta, Linn.
- Favratii, Zimm. ex Favrat, in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xiii-xv. (1887) 62; Botan. Kalender (1887) 67; et Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 10 = P. Tormentilla, Neck.
- foliosa, Somm. & Levier, ex Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 500. — Reg. Cauc.
- frondosa, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 300; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 116. — Calif.
- Gelmiana X, Siegfr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 984a] ex Keller, in Bot. Centralbl. lxi. (1895) 288. — Helv., Tirol.
- Gibelliana, Siegfr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 978] ex Keller, l. c. — Italia.
- ginsiensis, Woloszczak, in Köszeg Videken. edényes Növen. (1891) 64; Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 381, et xlii. (1892) 289. — Hung.
- Goirani, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 22. — Italia.
- Gordoni, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 106 (= *Horkelia Gordoni*, Hook.). — Am. bor. occ.
- graja, Beyer, in Wiss. Beil. Progr. Andreas Realgymn. Berl. (1891), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 177. — Germ.
- grandiceps, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 25 = argentea, Linn.
- Gremblachii X, Gandoger, ex Murr. in Deutsche Bot. Monatsschr. ix. (1891) 23. — Europ.
- Gremlii, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 10. — Helv.
- haematosticta, Goiran, in Giorn. Bot. Ital. xxi. (1889) 270; xxii. (1890) 537. — Helv. ?
- Halacsyan, Degen, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 306 et 334. — Ins. Samothr.
- Herbichii, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 291; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 14; et in Bot. Centralbl. xl. (1889) 243. — Eur. or.
- heterosepala, Fritsch, in Bot. Jahrb. xi. (1889) 314. — Am. centr.
- Hoelzli X, Blocki, in [Siegfr. Exsicc. Potent. (1892) n. 322] Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 147 (= *P. commutata*, Blocki). — Austro-Hung.
- Honoratae X, Blocki, ex [Siegfr. l. c. (1892) n. 939] Zimm. l. c. xliii. (1893) 36, nomen. — Podolia.
- Howellii, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 104. — Oregon.
- Huteri X, Siegfr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. iii. (1893) 128, et in Bull. trav. Soc. Murith., Fasc. xxi-xxii. (1894) 121. — Helv.
- intercedens X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 112; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 97. — Graecia.
- Jaeggiana X, Siegfr. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 199; et lxii. (1895) 35. — Helv.
- haeseri X, Siegfr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. ii. (1892) 102. — Helv.
- Karoi, Uechtr. ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 18 = collina, Wibel.
- Kelleri X, Siegfr. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 201. — Helv.
- Kelloggii, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 101; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 116 (= *Horkelia Kelloggii*, Greene). — Calif.
- Kingii, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 105 (= *Ivesia Kingii*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
- kionaea, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 751. — Graecia.
- Knappii, Blocki, ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 19; et in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 8. — Galicia.
- Koernickii, Uechtr. ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 19. — Eur.
- lasiothrix X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 759. — Austria.
- laxiflora, Drew, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 151. — Calif.

POTENTILLA : —

- Lemmoni, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 104 (= *Ivesia Lemmoni*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
- leopolitana, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 334; et xlii. (1892) 351; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 16 = recta, Linn.
- leucochaeta, Borb. in Termész. Fuzét. xiv. (1893) 48 = hirta, Linn.
- leucopolitanoides, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 103; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 18 = collina, Wibel.
- leucotricha, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 78; Bornm. in Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 59. — Eur. centr. et or.
- Levieri, Siegfr. & Keller, ex R. Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 511. — Reg. Cauc.
- ligurica X, Siegfr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 974a] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 38, nomen. — Italia.
- Lindleyi, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 101 = multijuga, Lehm.
- longifrons, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 404 (= *P. longifolia*, Borb.). — Hung.
- magyarica, Borb. ex H. Braun, l. c. xxxix. (1889) 310. — Hung.
- mallota, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 234. — Persia.
- Mermodi X, Siegfr. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 243 & 303; Favrat, in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xvi-xviii. (1890) 8. — Helv.
- micans X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. i. (1889) 112; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 97. — Graecia.
- Micheneri, Greene, in Erythea, i. (1893) 5; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 117. — Calif.
- mirabilis, Siegfr. & Moehrlen, ex Siegfr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 998] in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. v. (1895) 123. — Jurass.
- Muirii, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 106 (= *Ivesia Muirii*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
- monacensis, Woerlein, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 8. — Germ.
- monticola, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 31. — Helv.
- moupinensis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II, viii. 1885 (1886) 222. — China occ.
- Murithii, Besse, ex Siegfr. [Exsicc. Potent. xi. (1894) n. 960, et vii. (1895) n. 960a] in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xxi-xxii. (1894) 120; et in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. v. (1895) 124. — Helv.
- mutinensis, Siegfr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 970a] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 156. — Italia.
- Nicicii, Adamovic, l. c. xlii. (1892) 406. — Serbia.
- Nicolletii, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1891) 16 = supina, Linn. var. Nicolletii, S. Wats.
- nifdagensis, Zimm. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 23. — As. Minn.
- nubigena, Greene, in Erythea, iii. (1895) 36. — Calif.
- nyssana, Petrov, ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 15. — Serbia.
- ohensis X, Petunnikov, ex [Siegfr. Exsicc. Potent. (1894) n. 985] Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 17 t. 5; Bot. Centralbl. lxi. (1895) 288 [okaënsis]. — Ross. med.
- Paicheana X, Siegfr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. ii. (1892) 102. — Helv.
- pallidioides, M. Besse, ex Siegfr. [Exsicc. Potent. (1893) n. 947] l. c. 129; et in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xxi-xxii. (1894) 119. — Helv.
- papuana, Focke, in Abh. Naturw. Ver. Brem. xiii. (1895) 162. — N. Guin.
- Parryi, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1889) 102 (= *Horkelia Parryi*, Greene). — Am. bor. occ.
- parvula, Hook. f. ex Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2294. — Borneo.
- pedatoides X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. i. (1889) 112; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 97. — Graecia.
- Pelivarovicii, Petrov, ex Borb. Enum. Pl. Comit. Castrif. (1887-88) 311, nomen = recta, Linn.
- perincisa, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 424, nomen. — Hung.
- Peyritschii, Zimm. in Ber. Naturw. Ver. Innsbr. xix. (1891) 37; Siegfr. in Bot. Centralbl. lxii. (1895) 38. — Helv.

POTENTILLA: —

- Pickeringii*, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 105 (= *Ivesia Pickeringii*, Torr.). — Am. bor. occ.
Piersii X, Siegf. [Exsicc. Potent. (1892) n. 938] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 36. — Hung.
pindicola Hausskn. ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 15; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 95 = *canescens*, Bess. pocutica, Woloszczak, in *Spraw Kom. fizyj. Krajow.* xxviii. (1888) ii. 218. — Hung.
podolica, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 291; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 17. — Podolia.
porphyracea, Sauter, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 113; et xxxix. (1889) 211. — Tirol.
poterioides, Franch. Pl. Delav. (1890) 212. — Yunnan.
praeconioides, Sauter, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 211, nomen = *collina*, Wibel.
Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 272. — Mexic.
Pseudo-argentea, Blocki, [Siegfr. Exsicc. Potent. (1890) n. 153] in Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 23. — Galicia.
Pseudo-canescens X, Blocki, [Siegfr. Exsicc. Potent. (1890) n. 333] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 39, et xlii. (1892) 351. — Gall., Austro-Hung.
Pseudo-chrysanthia, Borb. [in Temesneg. vegyet. (1884) 76] ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 29 = *chrysanthia*, Ten.
Pseudo-Herbichii, Blocki, [Siegfr. Exsicc. Potent. (1890) n. 74] ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 14. — Galic., Podol.
Pseudo-obscura, Blocki, [Siegfr. l. c. (1891) n. 73] ex Zimm. l. c. — Galic., Podol.
Pseudo-pallens, Siegf. [Exsicc. Potent. (1892) n. 946] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 36, nomen = *recta*, Linn.
Pseudo-rubens, Siegf. [Exsicc. Potent. vi. (1894) n. 928 a et b] in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. ii. (1892) 102, et v. (1895) 123, nomen. — Helv.
Pseudo-Serpentini X, Waisb. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 357. — Hung.
puberula, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 102. — Calif.
purpurascens, Greene, l. c. 105 (= *Horkelia purpurascens*, A. Gray). — Am. bor. occ.
pyenochaeta, Borb. in Termész. Füzet. xiv. (1893) 48. — Hung.
Reineckei X, Sagorski, in Deutsche Bot. Monatschr. ix. (1891) 53. — Thuring.
Roemerii, Siegf. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 171. — Transsilv.
rubens, Zimm., ex Sagorski & Schneid. Fl. Central-karp. ii. (1891) 137 (= *Fragaria rubens*, Crantz) = *opaca*, Linn.
rubiformis, Czernean, ex R. Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 512, in syn. = *elatio*, Schlecht.
sabulosa, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 680. — Am. bor. occ.
Salpichae, « Blocki » ex Bot. Centralbl. xl. (1889) 243, sphalm. = *P. Sapichae*, Blocki.
sanguisorbifolia, Favre & Wolf, ex Wolf, in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xvi-xviii. (1890) 33. — Helv.
santolinoides, Greene, in *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 106 (= *Ivesia santolinoides*, A. Gray). — Am. bor. occ.
Sapichae, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 291; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 17. — Galic., Podol.
Sauteri, Zimm. l. c. 18. — Tirol.
saxosa, Lemmon, ex Greene, *Pittonia*, i. (June 1886) 171. — Calif.
Scholziana X, Callier, in Deutsche Bot. Monatsschr. ix. (1891) 7. — Germ. or.
Schroeteri X, Siegf. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. ii. (1892) 102; Jacc. in Nouv. Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxiv. (1895) 425. — Helv.
scopulorum, Greene, in *Erythra*, i. (1893) 4. — Colorado.
semilaciniosa, Borb. [Budapestnek es Kornyecken, Noveny. (1879) 164] [in Terms. rajzi. Füzet. 1893], ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 429 = *recta*, Linn.

POTENTILLA: —

- sericata*, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 104. (= *Horkelia sericata*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
Sibbaldia, F. Kurtz, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 375 (= *P. Sibbaldia*, Greissel) = *Sibbaldia procumbens*, Linn.
Siegfriedii, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 32. — Helv.
silesiaca, Uechtr. ex Zimm. l. c. 19. — Silesia.
Sintenisii, Siegf. & R. Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 506. — As. Min.
Skofitzii, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 291; Zimm. l. c. 32. — Galicia.
Slendzinskii, Blocki, l. c. xxxviii. (1888) 181; Zimm. l. c. 17. — Galicia.
Sommierii, Siegf. & Keller, ex R. Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 506. — Reg. Cauc.
stenoloba, Greene, in *Erythra*, iii. (1895) 36 (= *P. tenuiloba*, Greene, non Jord.). — Calif.
sterilis, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) Sitz. 97 (= *P. sterilis*, Garcke) = *P. Fragariastrum*, Ehrh.
subcanescens X, Waisb. [Kösz. ex Videkénék edényes növ. nyei (1891) 63] ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 381. — Hung.
subnivalis X, Bruegg. ex M. Besse, [Siegfr. Exsicc. Potent. (1893) n. 254 b] in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xxi-xxii. (1894) 122 (= *P. pulchella*, Bruegg. olim). — Helv.
subsericea, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 94. — Graecia.
sundaica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 219 = *Kleiniana*, Wight & Arn.
superargentea, Waisb. [Kösz. es Videkénék edényes növ. nyei (1891) 63] ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 381, et xlii. (1893) 289. — Hung.
svanetica, Siegf. & Keller, ex Keller in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 507. — Reg. Cauc.
Tabernaemontani, Aschers. in Abh. Bot. Ver. Prov. Brand. xxxii. (1891) 156 = *verna*, Linn.
tenuiloba, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 105; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 116 (= *Horkelia tenuiloba*, Greene). — Calif.
tenuirugis, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 304 = *hirta*, Linn.
thyraica, Blocki, [Siegfr. Exsicc. Potent. (1890) n. 72] ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 14. — Podolia.
Tilingi, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 105 = *tridentata*, Soland.
tirolensis, « Zimm. » ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. l. (1890) 362, sphalm. = *tirolensis*, Zimm.
tossiensis, Siegf. [Exsicc. Potent. (1894) n. 712]. — As. Min.
Tollii, Trautv. in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 507. — Sibir.
Trefferi X, Siegf. in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 102; et in Bot. Centralbl. lxii. (1895) 38; Wilczek, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. 1894 (1895) Sess. extr. p. 275. — Helv. Tirol.
tridentina, Gelmi, [Siegfr. Exsicc. Potent. (1894) n. 987]. — Tirol.
tuberculata, Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. (1891) extr. 24; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 227. — Hisp.
tuberosa, J. Wolff, [Siegfr. Exsicc. Potent. (1894) n. 914]. — Transsilv.
turicensis, « Siegf. » ex Keller, Fl. von Winterthur, i. (1891) 59, sphalm. = *turicinensis* Siegf.
Tynieckii X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 49. — Galicia.
umbrosa X, Hy, in Bull. Herb. Boiss. i. App. I. (1893) 15. — Gall.
umbrosaeformis, Siegf. & Alboff, ex Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 640. = Reg. Transcauc.
unguiculata, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 105. (= *Ivesia unguiculata*, A. Gray). — Am. bor. occ.
utahensis, Greene, *Pittonia*, i. (Feb. 1888) 162 (= *Ivesia utahensis*, S. Wats.). — Utah.
veronensis, Zimm. [Siegfr. Exsicc. Potent. (1894) n. 977]. — Italia.
villosa, G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, v. (1887) 116; Zimm. ex Sagorski & Schneid. Fl. Central-karp. ii. (1891) 138 (= *Fragaria villosa*, Crantz). — Eur. centr.

POTENTILLA: —

- vitodurensis*, « Siegf. » ex Bot. Centralbl. xl. (1889) 202 et 243 = *vitodurinusensis*, Siegf.
Waisbeckeri X, Siegf. [in Waisb. Köszeg Vidékének edényes növe nyei (1891) 63] ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 289. — Hung.
Webberi, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 105 (= *Ivesia Webberi*, A. Gray). — Am. bor. occ.
Wolffiana X, Siegf. [Exsicc. Potent. (1891) n. 334]. — Transsilv.
Wolfii X, Siegf. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. ii. (1892) 102. — Helv.
Zapateriana, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 18; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 226. — Hisp.

POTERANTHERA, Bong. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 616.

- foliosa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 121. — Bras.
gracillima, Cogn. l. c. (= *Tulasnaea gracillima*, Naud.). — Bras.

POTERIUM, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 616.

- officinale*, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. & Forb. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 247 = *officinale*, A. Gray.
rhodopeum, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1892-93) 27. — Bulg.
POTHOS, Linn. (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 617.
argenteus, Bull. Catal. (1887) 11. — Borneo.
nitens, Bull. l. c. — Malaya.
Curtisii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 554. — Penins. Mal.
Kingii, Hook. f. l. c. 553. — Perak.
Kunstleri, Hook. f. l. c. 554. — Perak.
lancifolius, Hook. f. l. c. — Perak.
latifolius, Hook. f. l. c. — Perak.
macrocephalus, Scortech. ex Hook. f. l. c. 553. — Perak.
Maingayi, Hook. f. l. c. 554. — Malacca.
Wallichii, Hook. f. l. c. 553. — Penins. Mal.

POTHUAVA, Gaudich. = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).

- pycnantha*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 44 = *Ae. pycnantha*, Baker.

POTTSIA, Hook. & Arn. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 618.

- laxiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 416 = *cantonensis*, Hook. & Arn.

POUCHETIA, A. Rich. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 618.

- Baumanniana*, Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 83. — Congo.

POUTERIA, Aubl. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 619.

- crassinervia*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 514. — Bras.
Schenckii, Engl. l. c. — Bras.
Sellowii, Engl. l. c. in obs. (= *Lucuma Sellowii*, A. DC.). — Bras.
tovarensis, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 142. — Am. austr.

POUZOLZIA, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 619.

- arabica*, Deflers, Voy. au Yémen (1889) 206. — Arabia.
frondosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 630 = *viminea*, Wedd.
fuscescens, Kuntze, l. c. — Java.
nivea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 453. — Mexic.
Palmeri, S. Wats. l. c. — Mexic.
zeylanica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 631 = *indica*, Gaudich.

POZOA, Lag. = **Azorella**, Lam. (Umbell.).

- elegans*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 386 = *A. elegans*, Colenso.
microdonta, Colenso, l. c. 387 = *A. microdonta*, Colenso.

PRADOSIA. Liais = **Lucuma**, Molina (Sapot.).
lactescens, Radlk. in Sitzb. Akad. Muench. xviii.
(1888) 407 = *L. glycyphloea*, Mart.
intescens, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan.
(1888) 501, sphalm. = *lactescens*, Radlk.

PRAINIA, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.
(1888) 546. **URTICACEAE**.
scandens, King, l. c. 547. — Perak.

PRANGOS, Lindl. (Umbell.). — Ind. Kew, ii.
620.
Bungei, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 260. — Persia.
euryangiodes, Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denkschr.
Akad. Wien (1886) ii. 56. — As. Min.

PRANTLEIA, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III.
(1891) 257. **BROMELIACEAE**.
glabra, Mez, l. c. — Bras.
leprosa, Mez, l. c. 259. — Bras.

PRASOPHYLLUM, R. Br. (Orchid.). — Ind.
Kew. ii. 620.
Baueri, Fitzger. Austr. Orchids, iii. II. (1888) cum
ic. (= *Genoplesium Baueri*, R. Br.). — Austral.
Deanianum, Fitzger. l. c. cum ic. — Austral.
Dixonii, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (June 1892)
44; et ex Bot. Centralt. li. (1892) 253. — Austral.
Fitzgeraldi, Dean, ex Tate, in Trans. Roy. Soc. S.
Austral. xix. (1895) 82, nomen. — Austral.
Frenchii, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Dec. 1889)
126; et in Bot. Centralt. xli. (1890) 122. —
Austral.
Laufferianum, Maury, in Morot, Journ. de Bot. ii.
(1888) 302, cum xylogr. — Austral.
pauciflorum, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii.
1885 (1886) 273. — N. Zel.
transversum, Fitzger. Austral. Orchids, iv. II. (1891)
cum ic. — Austral.
variegatum, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887
(1888) 208. — N. Zel.

PRATIA, Gaudich. (Campanul.). — Ind. Kew. ii.
621.
borneensis, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xvi. (1886)
t. 1532. — Borneo.
nummularia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 381 (= *P.*
nummularia, Benth.) = *begonifolia*, Lindl.
physaloides, Schoenl. in Engl. & Prantl, Natürl.
Pflanzenfam. iv. 5 (1889) 69 (= *Colensoa physaloi-*
des, Hook. f.). — N. Zel.

PREMNA, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 621.
angolensis, Guerke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 165.
— Congo, Angola.
cauliflora, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv.
(1894) 215. — Borneo.
formosana, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi.
(1887) 80. — Ins. Formos.
glabra, A. Gray, ex Maxim. l. c. — Japon.
Hildebrandtii, Guerke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894)
165. — Zanzibar.
Holstii, Guerke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.
(1894) 16; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895)
338. — Afr. trop. or.
ligustroides, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890)
256. — China.
macroscaphon, Baker, in Bolet. Soc. Brot. x.
(1892) 148. — Ins. S. Thom.
nana, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii.
(1891) 109. — Burma.
nitida, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais.
Wilh. Land (1887) 120. — N. Guin.
Schimperi, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891
(1892) 356. — Abyss.
staminea, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi.
(1887) 80. — Ins. Liukiu.
Tateana, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot.
Bull. iv. (1891) 15. — Austral.
velutina, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C
(1895) 338. — Afr. trop. or.
zanzibarensis, Vathe, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad.
Wiss. (1890) 26 et 34, nomen. — Zanzib.

PRENANTHES, Vaill. ex Linn. (Compos.). —
Ind. Kew. ii. 622.
acerifolia, Matsumma, Cat. Pl. Univ. Tokyo 113,
ex Makino, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1893) 133
(= *Nabalus acerifolius*, Maxim.). — Japon.
Faberii, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn.
Soc. xxiii. (1888) 486. — China.
macrophylla, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iv.
(1889) 307. — China bor.
ochroleuca, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888)
486 (= *Nabalus ochroleucus*, Maxim.). — China.
stricta, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 21. — Am.
bor. occ.

PRESCOTTIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew.
ii. 623.
Glazioviana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895)
261. — Bras.

PRESTOEIA, Hook. f. (Palm.). — Ind. Kew. ii.
623.
Carderi, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7108. —
N. Granat.
montana, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 216. —
Ins. Granat.
trinitensis, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) sub
t. 7108, in nota = *pubigera*, Hook. f.

PRESTONIA, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii.
623.
acutifolia, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl.
Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 188 (= *Haemadictyon*
acutifolium, Benth.). — Bras.
ecuadorensis, K. Schum. l. c. — Ecuad.
Gaudichaudii, K. Schum. l. c. (= *Haemadictyon Gau-*
dichaudii, A. DC.). — Bras.
Goudotiana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i.
(1889) 792. — N. Granat.
longituba, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl.
Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 188. — Costa Rica.
Muelleri, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895)
217. — Bolivia.
parviflora, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889)
783 (= *Haemadictyon parviflorum*, Benth.). — N.
Granat.
venosa, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 216; Rolfe, in
Kew Bull. (1893) 262 (= *Haemadictyon venosum*,
Lindl.). — Ind. occ., N. Granat.

PREVOSTEA, Choisy = **Breweria**, R. Br. (Con-
volv.).
alternifolia, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894)
92 (= *Codonanthus alternifolius*, Planch.). — Afr.
trop.
campanulata, Hallier. f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894)
92. — Gabon.
cordata, Hallier, f. l. c. 93. — Madag.

PRIEURELLA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 68
= **Ecclinusa**, Mart. (Sapot.).

PRIMULA, Linn. fide Kuntze, Rev. Gen. (1891)
398.

Aizoon, albana, altaica, arctica, Aretia, armeniaca,
caespitosa, carnea, chamaejasme, cylindrica, erecta,
filiformis, Friesii, globifera, Gmelini, hedreantha,
Heerii, hirtella, Hookeriana, imbricata, lactiflora,
lanuginosa, longifolia, macrantha, maxima, micro-
phylla, multiscapa, occidentalis, ochotensis, pyrenaica,
sarmentosa, Selago, septentrionalis, tapete, triflora,
Kuntze, Rev. Gen. (1891) 400 = *homonyma omnia*
Androsaces.
aretiodos, Kuntze, l. c. = Androsace aretioides,
Kern.
brevis, Kuntze, l. c. = A. alpina, Lam.
bryoides, Kuntze, l. c. = A. bryoides, DC.
chamaedryodes, Kuntze, l. c. = *Stimpsonia chamae-*
dryoides,
crispidens, Kuntze, l. c. (= *Lysimachiae* sp.). —
China.
curviflora, Kuntze, l. c. = *Dionysia curviflora*,
Bunge.
Decandollii, Kuntze, l. c. = Androsace ciliata,
DC.
diapensiacefolia, Kuntze, l. c. = *Dionysia diapen-*
siacefolia, Boiss.

PRIMULA: —

Douglasii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 400 = *Dou-*
glasia nivalis, Lindl.
drabifolia, Kuntze, l. c. = *Dionysia drabaefolia*,
Bunge.
Dubyana, Kuntze, l. c. = Androsace muscoidea,
Duby.
Hausmannii, Kuntze, l. c. = A. Hausmanni,
Leyb.
helvetica, Kuntze, l. c. = A. bryoides, DC.
hirtella, Kuntze, l. c. = A. alpina, Lam.
Kotschyi, Kuntze, l. c. = *Dionysia Kotschyi*,
Bunge.
Lehmannii, Kuntze, l. c. = Androsace Lehmanni,
Wall.
linearis, Kuntze, l. c. = *Douglasia arctica*, Hook.
macrosiphonia, Kuntze, l. c. = *Dionysia caespitosa*,
Boiss.
Michauxii, Kuntze, l. c. = D. Michauxii, Boiss.
montana, Kuntze, l. c. = *Douglasia montana*,
A. Gray.
nana, Kuntze, l. c. = Androsace elongata, Linn.
odora, Kuntze, l. c. = *Dionysia odora*, Fenzl.
odoratissima, Kuntze, l. c. = Androsace villosa,
Linn.
parviflora, Kuntze, l. c. = A. rotundifolia, Hardw.
patens, Kuntze, l. c. = A. saxifragaeifolia, Bunge
Paxiana, Kuntze, l. c. = A. geraniifolia, Watt.
saxifragifolia, Kuntze, l. c. = A. saxifragaeifolia,
Bunge.
sempervivodes, Kuntze, l. c. = A. sempervivodes,
Jacquem.
tapete, Kuntze, l. c. = A. tapete, Maxim.
tapetodes, Kuntze, l. c. = *Dionysia tapetodes*,
Bunge.
Wallichiana, Kuntze, l. c. = Androsace Wiedman-
ni, Boiss.
Wulfenia, Kuntze, l. c. = A. hedreantha, Griseb.

PRIMULA, Linn. (Primul.). — Ind. Kew. ii. 624.
anisiaca, X. Stapf, in Kern. Sched. Fl. Austro-
Hung. iv. (1886) 45; G. Beck. Fl. Nied.-Oest.
ii. II. (1893) 914. — Austria.
argutidens, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
(1895) 451. — China.
austriaca, Wettst. in A. Kern. in Sched. Fl. Austro-
Hung. iv. (1886) 49. — Austria.
baldensis, Goiran, ex Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii.
(1889) 641, in syn. = *spectabilis*, Tratt.
Balfouriana, Watt, ex Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889)
175, nomen. — Reg. Himal.
blattarifolmis, Franch. in Gard. Chron. (1887) .
575. — Yunnan.
bosniaca X, G. Beck, ex Fiala, in Wissensch.
Mitth. Bosn. und Hercegov. i. (1893) 554. —
Bosnia.
bosniaka, Fiala (Glasnik zemalpm. Bosn. i. Herc.
(1891) 3) ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 414,
sphalm. = *praeac*.
breviscapa, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895)
65. — Yunnan.
Broadheadae, M. E. Jones, in Zoë, iii. (1893) 306.
— Idaho.
cadinensis, Porta, in Kolb. Europ. Alpenpflanz.
(1890) 234. — Tirol, Lombard.
Caruelii X, Porta, l. c. 235. — Italia.
chartacea, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895).
64. — Yunnan.
cinerascens, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
(1895) 448. — China.
Cockburniana, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix.
(1892) 313. — China occ.
cordifolia, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1888) 216. —
Reg. Himal.
coronata, Porta, in Kolb. Europ. Alpenpflanz.
(1890) 237 = *daonensis*, Leyb.
Cortusa, Sander, ex A. Richt. in Termész. Fuzét.
xvii. (1894) 94 = *Cortusa Matthioli*, Linn.
crenata, Ces., Pass. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii.
(1886) 408 = *marginata*, Curt.
Cusickiana, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. I. [Suppl.]
(1886) 399. — Oregon.
deorum, Velen, Fl. Bulg. (1891) 479. — Bulg.
Davidi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 66; et in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II.
x. (1887) 56 t. 14 fig. a. — China occ.

PRIMULA : —

- danubialis, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 219. — Austria.
diantha, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 97. — China occ.
Dumoulini X, Stein, ex Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 232; et in Kolb, Eur. Alpenpflanz. (1890) 239. — Tirol.
exigua, Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 32 (1893) 56; et Fl. Bulg. (1891) 478 = farinosa, Linn.
Faberii, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1789. — China.
fallax X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 194. — Austria.
Fargesii, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 452. — China.
Fauriei, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 146. — Japon.
Forbesii, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 64; Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7246. — China.
gemmifera, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 491. — China.
gracilis X, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 240; et in Kolb, Eur. Alpenpfl. (1890) 343. — Form. hort.
Griffithii, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1888) 213 = obtusifolia, Royle.
hakusanensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 144. — Japon.
Henrici, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 98. — China occ.
heterodonta, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 145. — Japon.
heucherifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 65; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 55, t. 15, fig. b. — China occ.
incana, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 306. — Am. bor. occ.
incisa, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 69; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 58, t. 15, fig. a. — China occ.
Jaffreyana, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. 1886 (1887) II. 229 t. 10. — Reg. Himal.
Juriella X, Sünderm, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 156; et in Kolb, Eur. Alpenpfl. (1890) 245. — Tirol.
kialensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 458. — China.
Kolbeana X, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 240. — Eur. centr.
Lacei, Hemsl. & Watt, in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 325. — Belutch. brit.
Legueana X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1896) 174. — Gall.
leptopoda, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 97. — China occ.
Loczyi, Kanitz, Pl. expéd. Szechényii in As. centr. coll. (1891) 36. — As. centr.
longobarda, Porta, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 50; Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 643 = spectabilis, Tratt.
maglasonica, Porta, ex Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 232; et in Kolb, Eur. Alpenpfl. (1890) 247 [maglasonica] = spectabilis, Tratt.
malacoides, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 64. — China occ.
malvacea, Franch. l. c. 65. — China occ.
Matthioli, A. Richt. in Termész. Füzet. xvii. (1894) 34 = Cortusa Matthioli. Linn.
membranifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 68. — China occ.
moupinensis, Franch. l. c. 67; et in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 57, t. 14, fig. b. — Yunnan.
neurocalyx, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 449. — China.
nipponica, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. iv. (Oct. 1890) 3 t. 13-15; et Icon. Fl. Jap. i. I. (1891) 35, t. 15. — Japon.
nutantiflora, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 313. — China occ.
nutans, Delavay, ex Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 69. — Yunnan.
Obristii X, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 241 [sphalm. Obsistii]; et in Kolb, Eur. Alpenpfl. (1890) 250. — Eur. centr.

PRIMULA : —

- oreodoxa, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 66; et in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 55, t. 15, fig. b. — China occ.
ovalifolia, Franch. l. c. 67; et 57. — China occ.
pannonica X, A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 46 = inflata, A. Kern.
Pantlingii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 228. — Sikkim.
Parlatorii, Porta, ex Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 642. — Italia.
pellucida, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 428. — Yunnan.
Peyritschii X, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 241; Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 229. — Helv.
Poissoni, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 67; Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7216. — China.
polynura, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 448. — China.
Portae X, Huter, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 53. — Tirol.
Prattii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 314. — China occ.
Pseudo-acaulis X, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 610 (= P. Pseudo-acaulis, Schur?). — Italia.
pulchella, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) [P. Stuartii, Franch.]; et in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 41. — Yunnan.
pumila, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1888) 208 (= P. nivalis, Pall. var. pumila, Ledeb.). — Fret. Behring.
purpurascens, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 914 = anisiaca, Stapf.
pyncoloba, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 99. — China occ.
Reidii, Duthie, in Report Saharamp. Bot. Gard. for 1885; in Gard. Chron. (1886) i. 277, in nota, et (1886) ii. 691 fig. 131; Hook. f. in Bot. Mag. (1887) t. 6961. — Kumaon.
Sanctae Coronae X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 914. — Austria.
Sertulum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 451. — China.
similis X, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 241, et in Kolb, Eur. Alpenpfl. (1890) 255. — Austria.
sinuata, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 65. — Yunnan.
Souliei, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 450. — China.
Tanneri, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. 1886 (1887) II. 227 t. 8. — Sikkim.
tenuiloba, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1888) 204 = muscoides, Hook.
tongolensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 453. — China.
tosaensis, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. iv. (Nov. 1890) 1 t. 44; et Icon. Fl. Jap. i. I. (1891) 31 t. 12. — Japon.
variiflora X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 914. — Austria.
Viali, Delavay, ex Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. iii. (1891) 848. — Tibet.
vinciflora, Franch. in Gard. Chron. (1887) i. 575, fig. 108. — Yunnan.
vittata, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 96. — China occ.
vochinensis X, Gussm, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 107. — Carinth.
Wettsteinii X, Wiemann, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvi. (1886) 376; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 918. — Austria.

PRINSEPIA, Royle (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 627. uniflora, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 167; et ex Gartenfl. xlii. (1893) 331. — Mongolia.

PRINTZIA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 627. laxa, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 26. — Natal.

PRIONIUM, E. Mey. (Juncac.). — Ind. Kew. ii. 626. serratum, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 501 = P. Palmito, E. Mey.

PRIONOSCIADIUM, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 275. **UMBELLIFERAE**. linearifolium, Coult. & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3 (1895) 308 (= Cicuta linearifolia, S. Wats.). — Am. bor.
madrense, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 275. — Mexic.
megacarpum, Coult. & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3 (1895) 308. — Mexic.
mexicanum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 275. — Mexic.
Pringlei, S. Wats. l. c. 276. — Mexic.
Watsoni, Coult. & J. N. Rose, ex S. Wats. l. c. xxv. (1890) 150 (= Peucedanum mexicanum, S. Wats.). — Mexic.

PRISMATOCARPUS, L'Hérit. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 627. acerosus, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 217. — Afr. austr.

PRISMATOMERIS, Thw. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 628. tetrandra, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 138 = albiflora, Thw.

PRITCHARDIA, Seem. & H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 628. aurea, Hort. ex Hook. f. in Rep. Gard. Kew, 1882 (1884) 65; et ex Gard. Chron. (1893) i. 332 = borneensis, Hort.
filamentosa, Hort. ex W. Wats. in Kew Bull. iii. (1889) 296 = Washingtonia filifera, H. Wendl.
grandis, Veitch, Catal. (1885) 54; W. Wats. in Gard. Chron. (1886) i. 139 = Licuala grandis, H. Wendl.
Hillebrandii, Becc. Malesia, iii. (1890) 292. — Ins. Sandvic.
lanigera, Becc. l. c. 298. — Ins. Sandvic.
remota, Becc. l. c. 294. — Ins. Sandvic.
Pericurlarum, H. Wendl. ex Gard. Chron. (1893) i. 332, nomen. — Ins. Pcmtou.
Thurstoni, F. Muell. & Drude, in Gartenfl. xxxvi. (1887) 486, fig. 123-24; et in Gard. Chron. (1887) ii. 341; Becc. Malesia, iii. (1890) 210. — Ins. Fiji.

PRITZELAGO, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 35 = **Hutchinsia**, R. Br. (Crucif.).
affinis, Kuntze, l. c. = H. alpina. [R. Br. in] Ait. alpina, Kuntze, l. c. = A. alpina. [R. Br. in] Ait. brevicaulis, Kuntze, l. c. = H. alpina, [R. Br. in] Ait.
media, Kuntze, l. c. = H. media, Beyer, fide Kuntze.

PRIVA, Adans. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 628. armata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 160. — Mexic.
Orizabae, S. Wats. l. c. xxiii. (1888) 282. — Mexic.

PROBOSCIDEA, Schmid. = **Martynia**, Houst. (Pedalin.).
lutea, Stapf, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 369 (= Martynia montevidensis, Cham.). — Am. austr.

PROCHNYANTHES, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 457. **AMARYLLIDAE**. viridescens, S. Wats. l. c. — Mexic.

PROCKIOPSIS, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 573; Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 20. **BIXINEAE**. Hildebrandtii, Baill. l. c.; et Hist. pl. Madag. Atlas (1889) t. 110. — Madag.

PROCRIS, Comm. ex Juss. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 629. obovata, G. Beck, in Annal. Jard. Buitenz. iii. (1888) 254. — Inst. Stewart.
velutina, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 189 — N. Guin.

PROMENAEA, Lindl. = **Zygopetalum**, Hook. (Orchid.).
citrina, Hort. Bull. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 694. — Hab. ?

PROSOPIS, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 630.

africana, Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1893) 119 (= *Coulteria africana*, Guill. & Perr.) = *oblonga*, Benth.

articulata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 48. — Mexic.

Fischeri, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 196. — Afr. or.

Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 48. — Mexic.

stenoloba, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 20. — Chili.

Tamaruya, Phil. l. c. 21. — Chili.

PROSOPOSTELMA, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 247; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 227. **ASCLEPIADEAE**.

PROSTANTHERA, Labill. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 630.

chrysocalyx, Briq. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 220. — Austral.

Schultzii, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix. (1895) 82, nomen. — Austral.

serpyllifolia, Briq. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 220 (= *Cryphia serpyllifolia*, R. Br.). = *microphylla*, A. Cunn.

PROTAMOMUM, Ridl. in Straits Times (13 Nov. 1891), ex Journ. Bot. xxx. (1892) 31; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 383, t. 66. **SCITAMINEAE**.

maxillarioides, Ridl. l. c. (= *Lowia maxillarioides*, Baker). — Penins. Mal.

PROTEA, Linn. [Gen. pl. non Sp. pl.] = **Leucadendron**, R. Br. (Proteac.).

acuta, *aurantiaca*, *Buckiana*, *buxifolia*, *cartilaginea*, *Dregei*, *elata*, *eucalyptifolia*, *florida*, *glabra*, *grandiflora*, *imbricata*, *lanigera*, *nitida*, *ovalis*, *pedunculata*, *platysperma*, *pubescens*, *ramosissima*, *scabra*, *sessilis*, *spatulata*, *uliginosa*, *venosa*, *verticillata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 580 = *homonyma omnia* *Leucadendri*.

brunioides, Kuntze, l. c. = *L. brunioides*, Meissn.

PROTEA, Linn. (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 631.

Bismarckii, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 196, nomen. — Togo.

ferruginea, Engl. l. c. 197, nomen. — Congo mer.

kilimandscharica, Engl. l. c. 195. — Afr. trop. or.

madiensis, Engl. l. c. 196, in obs. — Afr. trop.

micans, Welw. l. c. — Angola.

Nyasae, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 39. — Afr. trop.

paludosa, Welw. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 196, in obs. — Angola.

petiolaris, Welw. l. c. 197. — Angola.

Poggei, Engl. l. c. — Congo mer.

rhodantha, Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7331. — Transvaal.

Welwitschii, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 196. — Angola.

PROTIUM, Burm. f. (Burser.). — Ind. Kew. ii. 634.

bolivianum, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 189. — Bolivia.

PROTOLIRION, Ridl. in Ann. Bot. ix. (1895) 56. **TRURIDEAE**?

paradoxum, Ridl. l. c. 57 (= *Petrosavia paradoxa*, Ridl.). — Penins. Mal.

PROUSTIA, Lagasca (Compos.). — Ind. Kew. ii. 634.

Olivillo, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 838 (= *P. reticulata*, Phil.). — Chil.

PRUNELLA, Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 634.

integerrima, G. Beck, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 250 = *laciniata*, Linn.

PRUNELLA : —

pienina, Ullepitsch, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 57. Hung.

spuria X, Stapf, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 250. — Tirol.

PRUNOPSIS, Éd. André = **Prunus**, [Tourn.] Linn. (Rosac.).

Mume, Éd. André, in Rev. Hort. lxviii. (1890) 209 = *Prunus Mume*, Sieb. & Zucc.

PRUNUS, [Tourn.] Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 635.

amygdaliformis, Pau, Not. bot. Fl. Espan. i. (1887) 21 = *spinosa*, Linn.

baldschuanica, Regel, in Gartenfl. xxxix. (1890) 612; et in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 314. — Buchara.

Besseyi, L. H. Bailey, in Bull. Cornell. Agr. Exp. State, lxx. (1891) 70 261; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 156. — Nebraska.

bifrons, Fritsch, in Sitzungs. Akad. Wiss. Wien, ci. (1892) 637. — Reg. Himal.

brachypoda, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1892) 166; et in Gartenfl. xlii. (1893) 330. — China.

brahuica, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 62 (= *Amygdalus brahurica*, Boiss.). — Beluchist.

Brittoniana, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 24. — Bolivia.

brutia, Terrac. in Att. Ist. Incoragg. Napol. i. n. 7, t. 1; et in Ann. Ist. bot. Roma, iv. 1889-90 (1891) 102. — Italia mer.

californica, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 312 = *acuminata*, Willd.

calycosa, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 61, t. 7. — Turkest.

caudata, Franch. Pl. Delav. (1890) 196 [caudatus]. — Yunnan.

cinerascens, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 216. — Tibet.

Cocumilio, « Ten. » ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 636 = *P. Cocumilia*, Ten.

copallina, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 141 = *P. Capollin*, Zucc.

eburnea, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 62 (= *Amygdalus eburnea*, Spach). — Persia.

eminens X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 821 (= *Cerasus intermedia*, Hort.). — Austria.

Fenzliana, Fritsch, in Sitzungs. Akad. Wiss. Wien, ci. (1892) 632, t. 2. — Reg. Cauc.

hirtipes, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 218. — China.

hortulana, L. H. Bailey, in Gard. and For. v. (1892) 90; Sarg. N. Amer. Sylva, iv. 23, t. 151. — Am. bor.

Jacquemonti, Hort. Dieck, Neuheit. Nat. Arboret. Dieck (1892-93) 23. — Am. bor. occ.

kurdica, Fritsch, in Sitzungs. Akad. Wiss. Wien, ci. (1892) 628. — Armen.

Lauchiana, Bolle, ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 646 = *P. Padus*, Linn.

mandschurica, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 317. — Mandschuria.

Mauveri X, Zabel, ex Gartenfl. xxxvii. (1888) 124; Koehne, l. c. 313. — Hybr. artef.

nana, Focke, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1891) 54 = *nana*, Stokes.

occidentalis, W. S. Lyon, in Bot. Gaz. xi. (1886) 202, 333. — Calif.

orthosepala, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 311. — Texas?

Pattoniana, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 143 = *mollis*, Walp.

planteriensis, Simon-Louis, ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 634 = *cerasifera*, Ehrh.

praecox, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. lxiv. (1892) 488, fig. 142 et 143. — Form. hort.

Salzeri, Zđarek, in Carinthia, lxvii. (1887) 199; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlii. (1892) 17 = *P. Padus*, Linn.

Serrula, Franch. Pl. Delav. (1890) 196. — Yunnan.

PRUNUS : —

setulosa, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 165; et in Gartenfl. xlii. (1893) 330. — Reg. Cauc.

szechuanaca, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 167. — China.

thibetica, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 215. — Tibet.

tortuosa, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 61 (= *Cerasus tortuosa*, Boiss.). — Reg. Afghan.

utahensis, Dieck, Catal. (1885), ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 634, fig. 259; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 315. — Utah.

velutina, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 168. — China.

Watsoni, Sarg. in Gard. and For. vii. (1893) 134, fig. 25. — Am. bor.

xerocarpa, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 152. — Ins. Formosa.

yunnanensis, Franch. Pl. Delav. (1890) 195. — Yunnan.

PRZEWALSKIA, Maxim. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 637.

Roborowskii, Prain, ex Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 380. — Tibet.

PSACALIUM, Cass. = **Senecio**, Tourn. (Compos.).

strictum, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 228 = *Prenanthes stricta*, Greene.

PSAMMISIA, Klotzsch (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 637.

Jessicae, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 237. — Venezuela.

pichinchensis, Hort. ex Nichols, l. c. = *Hookeriana*, Klotzsch

symphytemona, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 291. — Costa Rica.

PSATHURA, Comm. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 638.

angustifolia, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 515. — Ins. Borbon.

polyantha, Cordem, l. c. 513. — Ins. Borbon.

PSEPELLUS, Cass. = **Centaurea**, Linn. (Compos.).

abchasicus, Alboff, in Soc. imp. hort. (Compt. rend. Sect. Odessa) (1891) extr. 12 = *heterophyllus*, Boiss.

Barbeyi, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 247. — Reg. Cauc.

Freynii, Sint. ex Freyn, l. c. iii. (1895) 472, in syn. *Centaurea Freynii*, Sint.

PSEUDACACIA, Moench = **PSEUDOACACIA**, Tourn. = **Robinia**, Linn. (Legumin.).

vulgaris, « Tourn. » Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 88 = *R. Pseudacacia*, Linn.

PSEUDALEIA, Thou. = **Olex**, Linn. (Olin.).

imbricata, Hassk. ex Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 115, in syn. = *O. imbricata*, Roxb.

longistylis, Hassk, l. c. = *O. imbricata*, Roxb.

PSEUDERANTHEMUM, Radlk. in Th. Dur. Ind. gen. (1888) 314; Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 380 =

Eranthemum, Linn. pr. p. (Acanth.).

Andersoni, Lindau, l. c. = *E. Andersoni*, Mast.

connatum, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 40. — Ins. Comor.

dichotomum, Lindau, l. c. [dichotoma] = *Rhinacanthus communis*, Nees.

Hildebrandtii, Lindau, l. c. 39. — Afr. trop. or.

Leptanthus, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 330 = *E. Leptanthus*, C. B. Clarke.

Ludovicianum, Lindau, l. c. = *E. Ludovicianum*, Buettn.

Macgregorii, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 5. — N. Guin.

malaccense, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 330 = *E. malaccense*; C. B. Clarke.

PSEUDERANTHEMUM : —

- Muelleri-Fernandi*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 4. — N. Guin.
pacificum, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 330 = *E. pacificum*, Engl.
Parishii, Lindau, l. c. = *E. Parishii*, C. B. Clarke.
velutinum, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 5. — N. Guin.

PSEUDEVAX, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 334 = PSEUDEVAX, DC. = **Evax**, Gaertn. (Compos.).
mauritanica, Pomel, l. c. = *E. mauritanica*, Batt.

PSEUDOAMPELOPSIS, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 322, nomen = **Ampelopsis**, Planch. (Ampelid.).

PSEUDOBAECKEA, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a (1891) 136 = **Brunia**, Linn. pr. p.
capitellata, Niedenzu, l. c. = *B. staauioides*, Sond.
cordata, Niedenzu, l. c. = *B. racemosa*, Brongn.
pinifolia, Niedenzu, l. c. = *B. pinifolia*, Brongn.
squalida, Niedenzu, l. c. = *B. squalida*, Sond.
villosa, Niedenzu, l. c. = *B. villosa*, E. Mey.
virgata, Niedenzu, l. c. = *B. virgata*, Brongn.

PSEUDOBARLERIA, T. Anders. = **Petalidium**, Nees (Acanth.).
canescens, Engl. in Bot. Jahrb. x. (1888) 258. — Afr. austro-occ. extratrop.
coccinea, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 300 = *Petalidium coccineum*, S. Moore.
Currovi, Lindau, l. c. = *P. Currovi*, S. Moore.
Engleriana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 197. — Afr. austro-occ. extratrop.
glandulosa, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 299 = *Petalidium glandulosum*, S. Moore.
glutinosa, Engl. in Bot. Jahrb. x. (1888) 259. — Afr. austro-occ. extratrop.
halimoides, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 300 = *Petalidium halimoides*, S. Moore.
lanata, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 258. — Afr. austro-occ. extratrop.
latifolia, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 197. — Afr. austro-occ. extratrop.
Lepidagathis, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 300 = *Petalidium Lepidagathis*, S. Moore.
Lindavi, Dewèvre, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. 2 1894 (1895) 104. — Afr. trop. austro-or.
linifolia, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 299 = *Petalidium linifolium*, T. Anders.
loranthifolia, Lindau, l. c. 300 = *P. loranthifolium*, S. Moore.
ovata, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 198. — Afr. austro-occ. extratrop.
physaloides, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 299 = *Petalidium physaloides*, S. Moore.
rupestris, Lindau, l. c. 300 = *P. rupestre*, S. Moore.
variabilis, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 259. — Afr. austro-occ. extratrop.
Welwitschii, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 300 = *Petalidium Welwitschii*, S. Moore.

PSEUDOBLEPHARIS, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 836; et Hist. des pl. x. (1891) 457 = **Sclerochiton**, Harv. (Acanth.).
Boivini, Baill. l. c. 837. — Madag.
Dusenii, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 34. — Afr. trop. occ.
Grandidieri, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 837. — Madag.
Holstii, Lindau, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26; in Bot. Jahrb. xx. (1894) 35; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 270. — Zanzib.

PSEUDOBLEPHARIS : —

- nitida*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 319 (= *Acanthus nitidus*, S. Moore). — Angola.
Preussii, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 34. — Afr. trop. occ.

PSEUDOBROMUS, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 108. GRAMINEAE.
silvaticus, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

PSEUDOCEDRELA, Harms, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 153. MELIACEAE.
Kotschyi, Harms, l. c. 154 (= *Cedrela Kotschyi*, Schweinf.). — Afr. trop.

PSEUDOCENTRUM, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 639.
sylicolum, Reichb. f. in Flora, lxix. (1886) 548. — N. Granat.

PSEUDOCHROSIA, Blume (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 639.
glomerata, Hort. Bogor. ex Valetton, in Annal. Jard. bot. Buitenz. xiii. 2 (1895) 233, in syn. = *Ochrosia glomerata*, Valetton.

PSEUDOCLADIA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 49; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 291 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).
lateriflora, Pierre, l. c. 50 = *Lucuma lateriflora*, Benth.
Melmonii, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 291. — Hab.?

PSEUDOCONNARUS, Radlk. in Sitzb. Akad. Muench. xvi. (1886) 356. CONNARACEAE.
fecundus, Radlk. l. c. (= *Connarus fecundus*, Baker). — Bras.

PSEUDOCYOPTERUS, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 74. UMBELLIFERAE.
anisatus, Coult. & J. N. Rose, l. c. 75 (= *Cymopterus anisatus*, A. Gray). — Am. bor. occ.
bipinnatus, Coult. & J. N. Rose, l. c. (= *C. bipinnatus*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
montanus, Coult. & J. N. Rose, l. c. 74 (= *Ligusticum montanum*, Benth. & Hook. f.). — Am. bor. occ.

PSEUDODESMOS *riparia*, Spruce, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 1. (1888) 466 = *Moronobea riparia*, Planch. & Triana.

PSEUDOERNESTIA, Krasser, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 149. MELASTOMACEAE.
cordifolia, Krasser, l. c. (= *Ernestia cordifolia*, Berg). — Am. austr. bor.

PSEUDOGALTONIA, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 274; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1888) 158. LILIAEAE.
Pechuelii, Kuntze, ll. cc. (= *Hyacinthus Pechuelii*, Kuntze). — Afr. austro-occ. extratrop.

PSEUDOHYDROSME, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 455. AROIDEAE.
Buettneri, Engl. l. c. 456. — Afr. trop. occ.
gabunensis, Engl. l. c. 555. — Afr. trop. occ.

PSEUDOLMEDIA, Tréc. (Urtic.). — Ind. Kew. 639.
oxyphyllaria, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 294. — Guatem.

PSEUDOMACODES, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 127. ORCHIDEAE.
Cominsii, Rolfe, l. c. 128. — Ins. Salom.

PSEUDOMARSDENIA, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 268; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 285. ASCLEPIADEAE.
Bourgaeana, Baill. ll. cc. — Mexic.

PSEUDOPANAX, C. Koch (Araliac.). — Ind. Kew. ii. 639.
ferox, T. Kirk, in Gard. Chron. (1890) i. 432. — Hab.?
racemiferum, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 167 (= *Sciadophyllum racemiferum*, Miq.). — Am. austr.

PSEUDOPHOENIX, H. Wendl. & Drude, ex Drude, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1887) 64; H. Wendl. in Gard. and For. i. (1888) 352. PALMAE.
Sargentii, H. Wendl. ll. cc.; et in Gard. Chron. (1888) ii. 408 fig. 56. — Florida.

PSEUDOSANTALUM, Rumpf, Herb. Amb. ii. 54 t. 12, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = **Osmoxylon**, Miq. (Araliac.).
Miquelii, Kuntze, l. c. = *O. Miquelii*, Boerl.
umbelliferum, Kuntze, l. c. = *O. amboinense*, Miq.

PSEUDOSTENOSIPHONIUM, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 50; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 303 = **Strobilanthes**, Blume (Acanth.).
ceylanicum, Lindau, ll. cc. 50; et 303 = *S. zeylanicum*, T. Anders.
Gardnerianum, Lindau, l. c. 52 = *S. Gardnerianum*, T. Anders.
nigrescens, Lindau, l. c. = *S. nigrescens*, T. Anders.
rhamnifolium, Lindau, l. c. = *S. rhamnifolius*, T. Anders.
viscosum, Lindau, l. c. 40, 52 = *S. viscosa*, T. Anders.

PSEUDOSTROPHIS, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 294. URTICACEAE.
laxiflora, Warb. l. c. 295. — N. Guin.

PSEUDOTSUGA, Carr. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 634.
macrocarpa, Lemmon, Third Rep. Calif. St. Board Forest (1890) 134; H. Mayr. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 417 = *P. Douglasii*, Carr. var. *macrocarpa*, Engelm.
mucronata, Sudworth, ex Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 4 (1895) 266 = *P. Douglasii*, Carr.
taxifolia, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. viii. (1889) 74 = *P. Douglasii*, Carr.

PSEUDOVESICARIA, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 48 = **Vesicaria**, Tourn. ex Adans. (Crucif.).
digitata, Boiss. l. c. 49 = *V. digitata*, C. A. Mey.

PSEVA, Rafin. = **Chimaphila**, Pursh (Ericac.).
japonica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 390 = *C. japonica*, Miq.
maculata, Kuntze, l. c. = *C. maculata*, Pursh.
Menziesii, Kuntze, l. c. = *C. Menziesii*, Spreng.
umbellata, Kuntze, l. c. = *C. umbellata*, Nutt.

PSIADIA, Jacq. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 640.
ambigua, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 530. — Ins. Borbon.
amygdalina, Cordem. l. c. 525 (= *Conyza amygdalina*, Lam.). — Ins. Mascar.
anchusaefolia, Cordem. l. c. (= *C. anchusaefolia*, Poir.). — Ins. Mascar.
argentea, Cordem. l. c. 524 (= *C. argentea*, Lam.). — Ins. Mascar.
aspera, Cordem. l. c. (= *C. aspera*, Bory). — Ins. Mascar.
callocephala, Cordem. l. c. 523 (= *C. callocephala*, Bory). — Ins. Borbon.
cuspidifera, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 489. — Madag.
decurrens, Klatt, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 23. — Madag.
Frappieri, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 526. — Ins. Borbon.
inuloides, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 223. — Afr. aequat. or.

PSIADIA : —

insignis, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 727. — Ins. Borbon.
 laurifolia, *Cordem. l. c.* (= *Conyza laurifolia*, Lam.). — Ins. Mascar.
 lithospermifolia, *Cordem. l. c.* 524 (= *C. lithospermifolia*, Lam.). — Ins. Mascar.
 littoralis, *Cordem. l. c.* (= *Frappieria littoralis*, Cordem.). — Ins. Borbon.
 modesta, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 490. — Madag.
 montana, *Baill. Dict. encycl. sci. méd. Sér. II.* xxvii. 712, ex *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 529 (= *Frappieria montana*, Cordem.). — Ins. Borbon.
 salaziana, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 525. — Ins. Borbon.
 sericea, *Cordem. l. c.* 524 (= *Conyza sericea*, Bory). — Ins. Borbon.
 scabra, *Cordem. l. c.* 526. — Ins. Borbon.
 stenophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 490. — Madag.
 thermalis, *Cordem. Fl. Ile Réunion* 529 (= *Frappieria thermalis*, Cordem.). — Ins. Borbon.
 tortuosa, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 21 (1890) 23. — Madag.

PSIDIUM, Linn. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 640.

appendiculatum, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 32. — Bras.
 Brownianum, *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 89 = *Brownianum*, Mart.
 Eugenii, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 26. — Bras.
 eugenioides, *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 69 = *eugenioides*, Camb.
 Friedrichsthalianum, *Niedenzu, l. c.* (= *Calyptrospidium Friedrichsthalianum*, Berg). — Guatem.
 Gardnerianum, *Niedenzu, l. c.* = *Gardneriana*, Berg.
 Glaziovianum, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 33. — Bras.
 Kennedyanum, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 104. — Parag.
 lagoënsis, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 30. — Bras.
 minutifolium, *Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 569. — Cuba.
 ovalifolium, *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 69 (= *Mitranthes ovalifolia*, Berg). — Bras.
 Passeanum, *Ed. André, in Rev. Hort.* lxviii. (1890) 233, fig. 71. — Hab. ?
 pulverulentum, *Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 567. — Jamaica.
 salicifolium, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 240 (= *Myrtus salicifolia*, Willd.) = *crenatum*, Berg.
 Sartorianum, *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 69 (= *Mitranthes Sartoriana*, Berg). — Mexic.
 Schenkiana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 34. — Bras.
 Warmingianum, *Kiaersk. l. c.* 28 (= *Campomanesia suffruticosa*, Berg). — Bras.
 Wrightii, *Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 570. — Cuba.

PSILA, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 36. **COMPOSITAE**.

caespitosa, *Phil. l. c.* t. 1 fig. 4. — Am. austr. occ.

PSILACTIS, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. ii. 641.

crispa, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 169. — Calif.
 tenuis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 139. — Mexic.

PSILOCARPHUS, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 641.

chilensis, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 281 = *Bezanilla chilensis*, Remy.
 elatior, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. ii. Suppl. (1886) 448. — Am. bor. occ.

PSILOCARYA, Torr. = **Rynchospora**, Vahl (Cyper.).
nitens, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 101 = *R. nitens*, A. Gray.

PSILOPEGANUM, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 103. **RUTACEAE**.
sinense, Hemsl. l. c. t. 3. — China.

PSILOSTACHYS, Hochst. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 642.
 Boiviniana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 622. — Zanzib.
 flipes, *Baill. l. c.* — Zanzib.
 nervulosa, *Baill. l. c.* [nervulos]. — Afr. trop. or.

PSILOSTROPHE, DC. = **Riddellia**, Nutt. (Compos.).
Cooperi, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 176; Kuntze, Rev. Gen. (Nov. 1891) 358 = *R. Cooperi*, A. Gray.
tagetina, Greene, l. c.; Kuntze, l. c. = *R. tagetina*, Nutt.

PSILOTRICHUM, Blume (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 642.
 africanum, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1542; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 345. — Afr. trop. or.
 humile, *Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif.* (1892) 270 (= *Nototrichum humile*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.
 Schimper, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 207. — Abyss.
 viride, *Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif.* (1892) 270 (= *Nototrichum viride*, Hillebr.). — Ins. Sandv.

PSILURUS, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 642.
aristatus, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 908 (= *P. aristatus*, Duval-Jouve) = *nardoides*, Trin.

PSORALEA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 643.
 collina, *Rydberg, Fl. of Nebraska* (1895) 54. — Am. bor.
 Douglasii, *Greene, in Erythraea*, iii. (1895) 99. — Calif.
 monticola, *Greene, l. c.* 98. — Calif.
 pedunculata, *Vail, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1891) 114 = *melilotoides*, Michx.
 Purshii, *Vail, l. c.* 94. — Am. bor.
 Reverchoni, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 447. — Texas.
 rigida, *Parish, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 91. — Calif.
 Trianae, *Vail, l. c.* xxi. (1894) 119. — N. Granat.
 Walkingtoni, *F. Muell. in Vict. Natural.* xii. (Oct. 1895) 66; et ex *Bot. Centralbl.* lxiv. (1895) 364. — Austral.

PSOROSPERMUM, Spach (Hyperic.). — Ind. Kew. ii. 644.
 albidum, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 83. — Angola.
 campestre, *Engl. l. c.* 84. — Afr. trop. occ.
 emarginatum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 453. — Madag.
 malifolium, *Baker, l. c.* xxv. (1889) 295. — Madag.
 membranifolium, *Baker, l. c.* 296. — Madag.
 populifolium, *Baker, l. c.* xxii. (1887) 453. — Madag.
 salicifolium, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 84. — Afr. trop.
 Stuhlmannii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 274. — Afr. trop. or.
 verticillatum, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 4. — Madag.

PSYCHOLOBIUM *urens*, Blume, ex Burck, in Annal. Jard. Buitenz. xi. (1893) 185, in syn. = *Mucuna Blumei*, Burck.

PSYCHOPSIS, Nutt. ex Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 134 = **Hosackia**, Dougl. (Legumin.).

PSYCHOTRIA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 645.

albidocalyx, *K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 21 et 16; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 390. — Afr. trop. or.
 alsophila, *K. Schum. l. c.* 63; et 390. — Afr. trop.
 amboniana, *K. Schum. l. c.* 26, 28; et 390. — Afr. trop. or.
 amicomum, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif.* (1890) 197 (= *Chasalia amicomum*, A. Gray); Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 181. — Ins. Pacif.
 albicaulis, *S. Elliot, l. c.* 83. — Sierra Leone.
 apiculata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 439. — N. Guin.
 Aschersoniana, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 114, — Columb.
 aurantiaca, *K. Schum. l. c.* (= *Grumilea aurantiaca*, Miq.). — Ind. bat.
 Bangii, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 47. — Bolivia.
 Beccarii, *K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 135. — N. Guin.
 Boryana, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 511 (= *Chasalia Boryana*, DC.). — Ins. Borbon.
 brachypoda, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 109 (= *Mapouria brachypoda*, Muell. Arg.). — Bras.
 Brackenridgei, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 114 = *P. Brackenridgei*, A. Gray.
 brevicaulis, *K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 391. — Afr. trop. or.
 bukobensis, *K. Schum. l. c.* — Afr. trop. or.
 chionantha, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 109 = *P. Luschnathii*, Mart.
 chondrophylla, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. I. (1891) 139 (= *Chasalia chondrophylla*, Miq.). — Sumatra.
 chrysotricha, *Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) I. — Peruvia.
 coactanea, *K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 391. — Afr. trop. or.
 concinna, *Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 276, t. 42 b [Oliver, ex im Thurn, in *Timbri*, v. (1886) 196]. — Guian. angl.
 congesta, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 513. — Ins. Borbon.
 corallioides, *Cordem. l. c.* 510. — Ins. Borbon.
 crocea, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 110 (= *Palicourea crocea*, Schlecht.) = *subcrocea*, Muell. Arg.
 densifolia, *Stapp, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 182. — Borneo.
 discolor, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 258, in obs. — Ind. occ.
 elachistacantha, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 92, nomen. — Afr. trop.
 falcata, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 47. — Bolivia.
 fimbriicalyx, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. I. (1891) 139 (= *Grumilea fimbriicalyx*, Miq.). — Java.
 flavifolia, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 48. — Bolivia.
 Franchetiana, *Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif.* (1890) 198, t. 18 (= *Uragoga Franchetiana*, Drake). — Ins. Tahit.
 gaertneroides, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 512. — Ins. Borbon.
 Guerkeana, *K. Schum. in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 131. — Ins. S. Thom.
 guianensis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 48 = *Palicourea guianensis*, Aubl.
 gyrolosa, *Stapp, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 180. — Borneo.
 Hasseltiana, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. I. (1891) 139 (= *Chasalia Hasseltiana*, Miq.). — Java.
 Henriquesiana, *K. Schum. in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 132. — Ins. S. Thom.
 hirtella, *Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append.* (1886) 341, nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 336. — Afr. trop. or.

PSYCHOTRIA : —

- hypoleuca, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 391. — Afr. trop. or.
- Imthurniana, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 276, t. 42 a [Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 196]. — Guian. angl.
- iteophylla, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 181. — Borneo.
- keyensis, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 438. — N. Guin.
- kilimandscharica, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 400. — Afr. trop.
- laevis, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 131. — Afr. trop. occ.
- lamprophylla, K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 54; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 391. — Afr. trop. or.
- Lepiniana, Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif. (1890) 198 (= *Uragoga Lepiniana*, Baill.). — Ins. Tahit.
- Limba, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 83. — Sierra Leone.
- marchionica, Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif. (1890) 198. — Ins. Pacif.
- Milnei, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 113 (= *Calycosia Milnei*, A. Gray). — Ins. Fiji.
- Molleri, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 132. — Ins. S. Thom.
- niveo-barbata, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 110 (= *Mapouria niveo-barbata*, Muell. Arg.). — Am. austr.
- officinalis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 957, in syn. sphalm. (= *Palicourea officinalis*, Mart.) = *medica*, Muell. Arg.
- Parkeri, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 485. — Madag.
- porphyroclada, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 390. — Afr. trop. or.
- Pseudojapurensis, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 400, in obs. (= *P. japurensis*, Muell. Arg. pr. p.). — Bras.
- melanosticta, K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16 et 26, nomen. — Afr. trop.
- porphyrantha, K. Schum. l. c. 51, nomen. — Afr. trop.
- puberula, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 135. — N. Guin.
- reducta, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 484. — Madag.
- retiphebia, Baker, l. c. 485. — Madag.
- Schmielei, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 440. — N. Guin.
- Simmondsiana, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. ii. (1891) 13. — Austral.
- stipularis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 47 (= *Palicourea stipularis*, Benth.). — Ecuad.
- stricta, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1892) 134. — N. Guin.
- subhirtella, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 390. — Afr. trop. or.
- tahitensis, Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif. (1890) 199 (= *P. asiatica*, Nadeaud). — Ins. Tahit.
- Teysmanniana, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. I. (1891) 139 (= *Grumilea Teymanniana*, Miq.). — Ins. Banka.
- umbrosa, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 110. — Am. austr.
- velutipes, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 130. — Ins. S. Thom.
- Volkensii, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 390. — Afr. trop. or.
- yungasensis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 46. — Bolivia.

PTAEROXYLON, Eckl. & Zeyh. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 651.

obliquum, Radlk. in Sitz. Akad. Wiss. Muench. xx. (1890) 165. — Afr. austr.

PTARMICA, [Tourn.] Neck. = **Achillea**, Linn. (Compos.).

Barbeyana, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 166 = *Achillea Barbeyana*, Heldr. & Heimerl.

biserrata, Lange, in Bot. Tidsskr. (1895) 256, in obs. (= *P. biserrata*, DC.) = *A. biserrata*, Bieb.

PTARMICA : —

- calcareae*, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 167 = *Achillea moschata*, Wulf.
- daticea*, Nym. l. c. 166 = *A. oxyloba*, Sch. Bip.
- discoidea*, Lange, in Bot. Tidsskr. (1895) 256. — Hab. ?
- Jaborneggi* X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 167 = *Achillea Jaborneggi* X, Halácsy.
- Kernerii*, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 243 = *A. Kernerii*, Halácsy.
- Millii*, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 166 = *A. umbellata*, Sibth. & Sm.
- olympica*, Heimerl, ex Nym. l. c. 167 = *A. moschata*, Wulf. ?
- pindicola*, Hausskn. ex Nym. l. c. — Graecia.
- Reichardtiana*, Nym. l. c. = *Achillea Reichardtiana*, G. Beck.
- rupestris*, Nym. l. c. 166 = *A. rupestris*, Huter.

PTELEA, Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 651.

crenulata, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 216; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 72. — Calif.

glauca, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 354 = *trifoliata*, Linn.

PTELEOPSIS, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 25 et 34; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 293. **COMBRETACEAE**.

variifolia, Engl. ll. cc. — Afr. trop. or.

PTERALYXIA, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 151. **APOCYNEAE**.

macrocarpa, K. Schum. l. c. (= *Vallesia macrocarpa*, Hildeb.). — Ins. Sandvic.

PTERICHIS, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 652.

Widgreni, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iv. (1895) 245 (= *Acraea Widgreni*, Reichb. f.). — Bras.

PTERISANTHES, Blume (Ampelid.). — Ind. Kew. ii. 652.

Beccariana, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 418. — Borneo.

caudigera, Planch. l. c. 420 (= *Embamma caudigerum*, Griff.). — Ind. or.

Dalhousiae, Planch. l. c. 419. — Ind. or.

eripoda, Planch. l. c. 418 (= *Vitis eripoda*, Miq.). — Sumatra.

glabra, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 287. — Penins. Mal.

Miquelii, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 418 (= *Vitis araneosa*, Miq.). — Sumatra, Borneo.

polita, Planch. l. c. 416 = *polita*, M. Laws.

rufula, Planch. l. c. 417 (= *Vitis rufula*, Miq.). — Sumatra.

taeniata, Planch. l. c. 419. — Borneo.

PTERNANDRA, Jack (Melastom.). — Ind. Kew. ii. 652.

cordifolia, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1105. — Borneo.

discolor, Cogn. l. c. 1194. — Tonkin.

multiflora, Cogn. l. c. 1104. — Borneo.

Nesopanax, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 8 (1894) 29 (= *Nesopanax vitensis*, Seem.). — Ins. Viti.

PTERNOPETALUM, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 246. **UMBELLIFERAE**.

Davidi, Franch. l. c. t. 8, fig. B. — Tibet.

PTEROCARPUS, Linn. [1747, non 1763, fide cl. Kuntze] = **Derris**, Lour. pr. p. (Legumin.).

acuminatus, *amoenus*, *brachypterus*, *brevipes*, *canariensis*, *chinensis*, *Cumingii*, *cuneifolius*, *discolor*, *elegans*, *ellipticus*, *evalatus*, *ferrugineus*, *floribundus*, *glabratus*, *guianensis*, *Heyneanus*, *javanicus*, *Korthalsianus*, *laxiflorus*, *longifolius*, *lucidus*, *macrolobus*, *macrophyllus*, *Maingayanus*, *marginatus*, *micropterus*, *montanus*, *multiflorus*, *negrensis*, *nobilis*, *oblongus*, *paniculatus*, *parviflorus*, *polyphyllus*, *polystachyus*, *pubinervis*, *pubipetalus*, *pyrothyrus*, *robustus*, *scandens*, *secundus*, *Spanogheanus*, *thyrsiflorus*, *vestitus*,

PTEROCARPUS : —

- Wightii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 203-04 = *homonyma omnia* Derreos.
- dalbergioides*, Kuntze, l. c. 203 = *D. dalbergioides*, Baker.
- Forstenianus*, Kuntze, l. c. = *D. uliginosa*, Benth.
- grandifolius*, Kuntze, l. c. = *D. sinuata*, Benth.
- Hanceanus*, Kuntze, l. c. = *D. oblonga*, Hance.
- ovalifolius*, Kuntze, l. c. = *D. oblonga*, Benth.
- polyarthrus*, Kuntze, l. c. = *D. polyantha*, Miq.
- trifoliatus*, Kuntze, l. c. = *D. uliginosa*, Benth.
- Zollingeri*, Kuntze, l. c. = *D. grandifolia*.

PTEROCARPUS, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 653.

- Buchanani, Schinz, in Bull. Soc. Bot. Genève, vi. (1891) 66. — Transvaal.
- chrysothrix*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 218. — Afr. trop. or.
- Michellii*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 86. — Parag.
- papuana*, F. Muell. in Austral. Journ. Pharm. i. (1886) 123; et ex Bot. Centralbl. xxvii. (1886) 21. — N. Guin.
- Soyauxii*, Taub. in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2369. — Afr. trop. occ.

PTEROCARYA, Kunth (Jugland.). — Ind. Kew. ii. 653.

- dumosa*, Lavalée, ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 326 = *fraxinifolia*, C. Koch.
- japonica*, Hort. ex Dippel, l. c. 329, fig. 19; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 74, in obs. — Japon.
- macroptera*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 100. — China.
- Paliurus*, Batalin, l. c. 101. — China.
- pteroarpa*, « Kunth » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 326 = *fraxinifolia*, C. Koch.

PTEROCaulon, Ell. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 653.

- capitatum*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 144 = *Pluchea capitata*, Hook. & Arn.
- redolens*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. I. (1891) 240 (= *Monteales redolens*, Labill.). — Timor.
- tomentosus*, Boerl. l. c. (= *M. tomentosa*, Sch. Bip.). — Java.

PTEROCelastrus, Meissn. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 653.

- macrostylus*, Hochst. ex Szyszyl. Pl. Rehm. ii. (1888) 31 = *Apodytes dimidiata*, E. Mey.
- obtusius*, Hochst, l. c. = *A. dimidiata*, E. Mey.

PTEROCROSIA, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 194; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 158. **APOCYNEAE**.

Viellardii, Baill. l. c. — N. Caled.

PTEROCYMBIUM, R. Br. = **Sterculia**, Linn.

campanulatum, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 13 (1889) t. 195 A [*campanulata*] = *S. campanulata*, Wall.

columnare, Pierre, l. c. t. 195 b [*columnaris*]. — Cochinch.

dongnaiense, Pierre, l. c. sub t. 193-95, in text. [*dongnaiensis*] = *S. dongnaiensis*, Pierre.

tubulatum, Pierre, l. c. = *S. tubulata*, Mast.

PTERODISCUS, Hook. (Pedalin.). — Ind. Kew. ii. 654.

- angustifolius*, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 155. — Afr. trop. or.
- brasiliensis*, Aschers. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 182 = *aurantiacus*, Welw.

PTEROGLOSSASPIS, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 654.

- Engleriana*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 249. — Afr. trop. or.

PTEROLEPIS, Miq. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 654.

- Oerstedii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 597 (= *P. Arstedii*, Cogn. olim). — Am. centr.

PTEROLOBIMUM, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 654.
punctatum, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 207. — China.

PTEROLOMA, Hochst. = **Dipterygium**, Decne (Crucit.).
glaucum, Kuntze; Rev. Gen. (1891) 35 = *D. glaucum*, Decne.

PTERONIA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 654.
polygalifolia, O. Hoffm. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 73. — Afr. austro-occ. extratrop.

PTEROPETALUM, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1891) 295, cum ic.; et in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 229. **CAPPARIDEAE**.
Klingii, Pax, *ll. cc.* — Togo.

PTERORHACHIS, Harms, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 155. **MELIACEAE**.
Zenkeri, Harms. *l. c.* — Kamerun.

PTEROSPERMADENDRON, Amm. = **Pterospermum**, Schreb. (Stercul.).
acerifolium, Blumeum, *cinnamomeum*, *diversifolium*, *fuscum*, *glabrescens*, *heterophyllum*, *jackianum*, *lanceacifolium*, *obtusifolium*, *Pierrei*, *reticulatum*, *rubiginosum*, *semisagittatum*, *suberifolium*, *Thorelii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 80 = *homonyma omnia* Pterospermi.
grewiaefolium, Kuntze, *l. c.* = *P. grewiaefolium*, Pierre.
insulare, Kuntze, *l. c.* = *P. insulare*, Pierre.
involutum, Kuntze, *l. c.* = *P. obliquum*, Blanco.
saigonense, Kuntze, *l. c.* = *P. saigonense*, Pierre.
Thorelii, Kuntze, *l. c.* = *P. Thorelii*, Pierre.
xylocarpum, Kuntze, *l. c.* = *P. Heyneanum*, Wall.

PTEROSPERMUM, Schreb. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 655.
grewiaefolium, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 12 (1888) p. 181. — Cochinch.
insulare, Pierre, *l. c.* t. 180b. — Cochinch.
niveum, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 67. — Ins. Philip.
saigonense, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 292, nomen; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 12 (1888) t. 180 a. — Cochinch.
suberifolium, Pierre, *l. c.* sub t. 180, in obs. — Cochinch.
Thorelii, Pierre, *l. c.* — Cochinch.

PTEROSPOROPSIS, Kell. = **Sarcodes**, Torr. (Monotrop.).
sanguinea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 391 = *S. sanguinea*, Torr.

PTEROSTEMON, Schau. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 656.
rotundifolium, Ramirez, in *El Estudio*, iv. (1893) 453, t. 13; et in *La Naturaleza*, Ser. II. ii. (1894) 417, t. 21. — Mexic.

PTEROSTYLIS, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 656.
auriculata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 489. — N. Zel.
depauperata, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* iv. (1891) 18. — Austral.
Mackibbini, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (Oct. 1892) 93; et in *Bot. Centralbl.* xlii. (1892) 347. — Austral.
Oliveri, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 270. — N. Zel.
patens, Colenso, *l. c.* xviii. 1885 (1886) 270. — N. Zel.
polyphylla, Colenso, *l. c.* xxii. 1889 (1890) 489. — N. Zel.
rubella, Colenso, *l. c.* xviii. 1885 (1886) 271. — N. Zel.
speciosa, Colenso, *l. c.* xxii. 1889 (1890) 488. — N. Zel.

PTEROTROPIA, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 149. **ARALIACEAE**.

dipyrena, Hillebr. *l. c.* (= *Heptapleurum dipyrenum*, Mann). — Ins. Sandvic.
gymnocarpa, Hillebr. *l. c.* 151. — Ins. Sandvic.
kauaiensis, Hillebr. *l. c.* (= *Heptapleurum kauaiense*, Mann). — Ins. Sandvic.

PTERYGODIUM, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 657.

alare, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 116 = *platypetalum*, Lindl.
hastatum, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 177 fig. 14. — Afr. austr.

PTERYGOTA, Schott & Endl. = **Sterculia**, Linn.

Burcavii, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 13 (1889) sub t. 196, in obs. — Borneo.
Forbesii, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Aug. 1886) 46. — N. Guin.
papuana, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 376. — N. Guin.

PTILEPIDA, Rafin. = **Actinella**, Nutt. (Compos.).

acaulis, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 339 = *A. acaulis*, Nutt.
linearifolia, Britton, *l. c.* 340 = *A. linearifolia*, Torr. & Gray.
odorata, Britton, *l. c.* = *A. odorata*, A. Gray.
scaposa, Britton, *l. c.* = *A. scaposa*, Nutt.

PTILIMNIUM, Rafin. = **Discopleura**, DC. (Umbell.).

capillaceum, Hollick, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* xiii. (1893) 28 = *capillaceum*, Rafin.
laciniata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 269 = *D. laciniata*, Benth. & Hook. f.
Nuttallii, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 244 = *D. Nuttallii*, DC.

PTILOCALAIS, Greene, in *Bull. Calif. Akad.* ii. v. (1886) 54 = **Microseris**, D. Don (Compos.).

gracililoba, Greene, *l. c.*; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 150 = *Calais gracililoba*, Kell.
major, Greene, *l. c.* = *Microseris major*, A. Gray.
nutans, Greene, *l. c.* = *M. nutans*, A. Gray.

PTILOCHAETA, Turcz. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 657.

glabra, Niedezu, in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 30 (1891) 4. — Bras.

PTILORIA, Rafin. = **Stephanomeria**, Nutt. (Compos.).

canescens, Greene, *Pittonia*, ii (Dec. 1890) 131; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 220. — Calif.
cichoriacea, Greene, *l. c.* 133 = *Stephanomeria cichoriacea*, A. Gray.
coronaria, Greene, *l. c.* 132 = *S. coronaria*, Greene.
divaricata, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 224. — Calif.
exigua, Greene, *Pittonia*, ii. (Dec. 1890) 132 = *Stephanomeria exigua*, Nutt.
lactucina, Greene, *l. c.* = *S. lactucina*, A. Gray.
myrioclada, Greene, *l. c.* 138 = *S. myrioclada*, Eaton.
paniculata, Greene, *l. c.* 132 = *S. paniculata*, Nutt.
Parryi, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 144 = *S. Parryi*, A. Gray.
pentachaeta, Greene, *Pittonia*, ii. (Dec. 1890) 133 = *S. pentachaeta*, Eaton.
pleurocarpa, Greene, *l. c.* 131. — Calif.
Schottii, Greene, *l. c.* 133 = *Hemiptilium Schottii*, A. Gray.
Thurberi, Greene, *l. c.* = *Stephanomeria Thurberi*, A. Gray.
tomentosa, Greene, *l. c.* 121 = *S. tomentosa*, Greene.
virgata, Greene, *l. c.* 130; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 230 = *S. virgata*, Benth.
Wrightii, Greene, *l. c.* = *S. Wrightii*, A. Gray.

PTILOTRICHUM, C. A. Mey. = **Alyssum**, Tourn. (Crucif.).
Uechtritzianum, Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 18 = *Lepidotrichum Uechtritzianum*, Velen. & Bornm.

PTILOTUS, R. Br. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 657.

Carlsoni, F. Muell. in *Vict. Natural.* v. (Oct. 1888) 74. — Austral.
Macleayi, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. iii. (June 1888) 162. — Austral.

PTYCHANDRA, Scheff. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 658.

Muelleriana, Becc. in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xx. (1888) 177. — N. Guin.
obriensis, Becc. *l. c.* 178. — N. Guin.

PTYCHOSPERMA, Labill. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 658.

caryotoides, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 358. — N. Guin.
litigiosa, Ridl. *l. c.* = *P. Ridleyi*, Becc.
Ridleyi, Becc. in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xx. (1888) 179, in obs. (= *P. litigiosa*, Ridl.). — N. Guin.
Sayeri, Becc. *l. c.* 178. — N. Guin.

PTYCHOSTYLUS, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. (1895) 389 = **Loranthus**, Linn.
Deppeanus, Van Tiegh. *l. c.* 390 = *L. Deppeanus*, Cham. & Schlecht.

PUCCINELLIA, Parl. = **Glyceria**, R. Br. (Gramin.).

airoides, S. Wats. & Coult. in A. Gray, *Man. N. Am. Bot.* ed. 6 (1890) 668 = *Glyceria distans*, Wahlenb.
angustata, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 512 = *G. angustata*, Fries.

PUELIA, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 674; et in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VII. xi. (1887) 673. **GRAMINEAE**.
ciliata, Franch. *ll. cc.* — Gabon.

PUERARIA, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 658.

calycina, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 181. — Yunnan.
ново-гуинеенсис, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 325. — N. Guin.
sericans, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 99 = *phaseoloides*, Benth.
yunnanensis, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 181. — Yunnan.

PULASSARIUM, Rumpf, *Herb. Amboin.* v. (1745-47) 32, t. 20, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 416 = **Alyxia**, Banks (Apocyn.).

affine, *buxifolium*, *ceylanicum*, *coriaceum*, *disphaerocarpum*, *fasciculare*, *glaucohyllum*, *gracile*, *Halmaheirae*, *ilicifolium*, *laurinum*, *leucogyne*, *Lindii*, *madagascanense*, *obtusifolium*, *odoratum*, *filosum*, *podocarpum*, *pumilum*, *quinatum*, *ruscifolium*, *scandens*, *sinense*, *spicatum*, *Spanogheanum*, *squamulosum*, *stellatum*, *Thozetii*, *thyrsiflorum*, *Torresianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 417 = *homonyma omnia* Alyxiae.
Alyxia, Kuntze, *l. c.* = *A. lucida*, Wall.
breviflorum, Kuntze, *l. c.* (= *Gynopogon breviflorum*, Kurz). — Burma.
brevifolium, Kuntze, *l. c.* = *Alyxia breviflora*, Van Heurck & Muell. Arg.
daphnoides, Kuntze, *l. c.* = *A. daphnoides*, A. Cunn.
oliviformis, Kuntze, *l. c.* = *A. olivaeformis*, Gaudich.
sulcatum, Kuntze, *l. c.* = *A. olivaeformis*, Gaudich.

PULICARIA, Gaertn. (Compos. — Ind. Kew. ii. 659.

adenensis, Schweinf. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 358. — Arabia.
Aylmeri, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 216. — Reg. Somal.
iphionoides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 258 = *adenensis*, Schweinf.

PULICARIA : —

leucophylla, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 333. — Arabia.
 suffrutescens, Schweinf. ex Penzig, in *Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 346, nomen. — Erithrea.
 villosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 358 = *Pulicaria Boissieri*, Hook. f.

PULMONARIA. [Tourn.] Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 660.

dacica, Simonk. *Enum. Fl. Transs.* (1886) 406 = rubra, Schott & Kotschy.
 intermedia X, Palla, ex Ber. *Deutsch. Bot. Ges. v.* (1887) 131. —
 Kerner, *Wettst. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 559. t. 13 : Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 38. — Stiria.

PULSATILLA. [Tourn.] Linn. = **Anemone**. Tourn. (Ranuncul.).

hirsutissima, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vi. (1891) 217 = A. patens, Linn.
 multiceps, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 4. — Alaska.
 occidentalis, Freyn, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* viii. (1890) 78 = *Anemone occidentalis*, S. Wats.
 Petteri X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* i. (1890) 410. — Austria.
 slavica, Reuss, ex Sagorski & Schneid. *Fl. Central-karp.* ii. (1891) 37, sphalm. = slavica, Reuss.

PULTENAEA. Sw. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 661.

Baerlerenii, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. i. (Feb. 1887) 1109. — Austral.

PURDIEANTHUS. Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 99. **GENTIANEA**. pulcher, Gilg, l. c. — N. Granat., Columb.**PURPURELLA**, Naud. = **Tibouchina**, Aubl. (Melast.).

cleistoflora, Ule, in Ber. *Deutsch. Bot. Gesells.* xiii. (1895) 418, t. 32. — Bras.
 hospita, Krasser, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 148 = *Tibouchina hospita*, Cogn.
 hygrophila, Krasser, l. c. = T. hygrophila, Cogn.
 minutiflora, Krasser, l. c. = T. minutiflora, Cogn.

PUSAETHA, Linn. *Fl. Zeyl.* (1747) 236 = **Entada**, Adans. (Legumin.).

abyssinica, acaciaefolia, africana, Duparquetiana, Kirkii, polyphylla, scandens, sudanica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 204 = *homonyma omnia* Entadae.
 abyssinica, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 196 = *abyssinica*, Kuntze.
 Entada, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 204 = *Entada polystachya*, DC.
 Kirkii, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 196 = E. Kirkii, Oliver.
 Stuhlmannii, Taub. l. c. — Afr. trop. or.
 spicata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 204 = *Entada natalensis*, Benth.
 Wahlbergii, Kuntze, l. c. = E. Wahlbergii, Harv.

PUYA, Molina (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 663.

Achupalla, Hort. Lind. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 126, in syn. = *Bonplandiana*, Schult. f.
 aequatorialis, Ed. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 565 ; et *Bromel. Andreanae* (1889) 36, t. 12a ; Baker, l. c. — Ecuad.
 boliviensis, Baker, l. c. — Bolivia.
 Brittoniana, Baker, l. c. 124. — Bolivia.
 copiapina, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 613. — Chili.
 echinotricha, Ed. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 565 ; et *Bromel. Andreanae* (1889) 33, t. 11b = *Pitcairnia echinotricha*, Baker.
 eryngioides, Ed. André, l. c. 565 ; et 32, t. 10 ; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 125. — Ecuad.
 floccosa, Ed. Morr. ex Baker, l. c. in syn. = *Pitcairnia floccosa*, Regel.

PUYA : —

gigantea, Ed. André, in *Tour du Monde*, xxxviii. (1879) 332, cum xylogr. ; et *Rev. Hortic.* lx. (1888) 565 = gigas, Ed. André.
 nivalis, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 124. — Columb.
 pastensis, Ed. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 565 ; et *Bromel. Andreanae* (1889) 39, in obs. — Columb.
 quatameensis, Ed. André, l. c. 365 ; et 38, t. 11a = *Pitcairnia quatamensis*, Ed. André.
 Thomasiana, Ed. André, l. c. 565 ; et 35, t. 11d ; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 125. — Columb.
 Trianae, Baker, l. c. 124. — N. Granat.
 venusta, Phil. ex Baker, l. c. (1889) 123, in syn. ; et in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 613 = *Pitcairnia venusta*, Baker.
 vestita, Ed. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 565 ; et *Bromel. Andreanae* (1889) 37, t. 12b ; Baker, l. c. 125. — Ecuad.
 Weberiana, Godefr. Leboeuf, ex *Rev. Hortic.* lxiii. (1891) 291. — Hab. ?

PYCNANTHEMUM. Michx (Labiata). — Ind. Kew. ii. 663.

flexuosum, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 42 = *linifolium*, Pursh.
 virginianum, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* for 1888 i. (1891) 211 = *lanceolatum*, Pursh.
 virginicum, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 42 = *lanceolatum*, Pursh.

PYCNANTHUS. Warb. in Ber. *Deutsch. Bot. Ges.* xiii. (1895) 94. **MYRISTICAE**.

microcephalus, Warb. in Ber. *pharm. Ges.* (1892) 226 ; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B* (1895) 271 (= *Myristica microcephala*, Benth.). — Afr. trop.
 Schweinfurthii, Warb. ex *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B* (1895) 271 et C. (1895) 180. — Afr. trop.

PYCNARRHENA. Miers (Menisperm.). — Ind. Kew. ii. 663.

australiana, F. Muell. in *Vict. Natural.* ii. (Sept. 1886) 61 ; et ex *Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 147. — Austral.
 manillensis, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 45. — Ins. Philipp.

PYCNOBREGMA, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 288 ; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 304. **ASCLEPIADEAE**.

Funckii, Baill. l. c. — N. Granat.

PYCNOCOMA, Benth. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 663.

littoralis, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 100. — Afr. trop. or.
 macrantha, Pax, ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 44 ; et ex *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 239. — Afr. trop. or.
 rigidifolia, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1890) t. 178. — Madag.
 trewoides, Baill. l. c. 180. — Madag.

PYCNOCOMON, Hoffm. & Link = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).

montanum, Pomel, ex Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 417, in syn. = S. rutaefolia, Vahl.

PYCNOPHYLLUM, Remy (Caryophyll.). — Ind. Kew. ii. 664.

argentinum, Pax, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1893) 33. — Reg. Argent.

PYCNORHACHIS, Benth. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 664.

Benthiana, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 278. — Malacca.

PYCHNOSTACHYS « Hook. » ex Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 69, sphalm. = seq.**PYCNOSTACHYS**, Hook. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 664.

affinis, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 345. — Afr. trop. or.

PYCNOSTACHYS : —

cyanea, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 345. — Afr. trop. or.
 Emini, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 145. — Afr. trop. or.
 Goetzenii, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 135 [Pychnostachys]. — Afr. trop. or.
 Meyeri, Guerke, ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 362, et (1894) 53 et 69. — Afr. trop. or.
 micrantha, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 345. — Afr. trop. or.
 niamniensis, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 145. — Afr. trop.
 orthodonta, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 345. — Afr. trop. or.
 parvifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 72 [parvifolius]. — Afr. trop.
 pubescens, Guerke, l. c. — Afr. trop. or.
 Schweinfurthii, Briq. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 191. — Afr. trop.
 speciosa, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 345. — Afr. trop. or.
 Stuhlmannii, Guerke, l. c. — Afr. trop. or.
 verticillata, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 71 [verticillatus]. — Afr. trop.
 Volkensii, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 344. — Afr. trop. or.

PYCNOSTELMA, Bunge (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 664.

lateriflorum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 192. — China.
 paniculatum, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 243 [paniculatum] = chinensis, Bunge.

PYCREUS, Beauv. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 664.

aethiops, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 534 (= *Cyperus aethiops*, Welw.). — Afr. trop.
 atrobrunneus, C. B. Clarke, l. c. 535. — Madag.
 atronervatus, C. B. Clarke, l. c. (= *Cyperus atronervatus*, Boeck.). — Abyss.
 atropurpureus, C. B. Clarke, l. c. (= C. atropurpureus, Boj.). — Madag., Ins. Bourbon.
 betschuanus, C. B. Clarke, l. c. (= C. betschuanus, Boeck.). — Afr. austr.
 caespitosus, C. B. Clarke, l. c. (= C. caespitosus, Poir.). — Ins. Bourbon.
 capillifolius, C. B. Clarke, l. c. (= C. capillifolius, A. Rich.). — Afr. trop.
 chrysanthus, C. B. Clarke, l. c. (= C. chrysanthus, Boeck.). — Afr. austr.
 Cooperi, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austr.
 cuanzensis, C. B. Clarke, l. c. 536 (= C. cuanzensis, Ridl.). — Angola.
 divulsus, C. B. Clarke, l. c. (= C. divulsus, Ridl.). — Madag.
 elegantulus, C. B. Clarke, l. c. (= C. elegantulus, Steud.). — Afr. trop. et austr.
 ferrugineus, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 595 ; et ex *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 536 (= C. ferrugineus, Poir.). — As., Afr. et Am. trop.
 Hildebrandtii, C. B. Clarke, l. c. v. 1894 (1895) 538. — Zanzibar, Mombassa.
 lanceolatus, C. B. Clarke, l. c. (= *Cyperus lanceolatus*, Poir.). — Afr. trop., Madag.
 latespicatus, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 690 (= C. latespicatus, Boeck.). — Ind. or.
 macranthus, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 538 (= C. macranthus, Boeck.). — Afr. trop. et austr.
 melas, C. B. Clarke, l. c. (= C. melas, Ridl.). — Angola.
 monocephalus, C. B. Clarke, l. c. (= C. monocephalus, Baker.). — Madag.
 nigrescens, C. B. Clarke, in *J. Buchan. Nyassaland* (18) 20 (= C. nigrescens, Steud.). — Afr. trop.
 nigricans, C. B. Clarke, in *Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 53 ; et l. c. 539 (= C. nigricans, Steud.). — Abyss.

PYCREUS : —

- pauper, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894* (1895) 540 (= *Cyfe us pauper*, Hochst.). — Angola, Abyss.
 pelophilus, *C. B. Clarke, l. c.* (= *C. pelophilus*, Ridl.). — Angola.
 Pervillei, *C. B. Clarke, l. c.* (= *C. Pervillei*, Boeck.). — Madag.
 Rehmannianus, *C. B. Clarke, l. c.* 542 (= *C. Rehmannianus*, Boeck.). — Transvaal.
 Smithianus, *C. B. Clarke, l. c.* (= *C. Smithianus*, Ridl.). — Afr. trop.
 spissiflorus, *C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894)* 53; et *l. c.* — Afr. trop. austro-or.
 stramineus, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893)* 589 (= *C. stamineus*, Nees). — Ind. or., Zeylan.
 subtrigonus, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894* (1895) 542. — Congo.
 sulcinus, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893)* 593; et *ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894* (1895) 542 (= *Cyperus sulcinus*, *C. B. Clarke*). — Orb. vet. reg. trop.
 tremulus, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894* (1895) 542 (= *C. tremulus*, Poir.). — Afr. trop.

PYGEUM, Gaertn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 664.

- brevistilum, *K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 93. — N. Guin.
 nitidum, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886)* 284, nomen. (Pigeum). — Cochinch.
 oocarpum, *Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894)* 144. — Borneo.
 Parreavii, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886)* 284, nomen [Pigeum]. — Cochinch.
 Turnerianum, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. viii. (1893)* 74. — Austral.

PYRENACANTHA, Wight (Oclacin.). — Ind. Kew. ii. 664.

- globosa, *Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894)* 80. — Afr. trop. or.
 malvaefolia, *Engl. in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. xviii. (1893)* 268. — Afr. trop. or.
 vitifolia, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 248. — Afr. trop. or.

PYRENARIA, Blume (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 665.

- Jonquierana, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886)* 295; et *Fl. For. Cochinch. Fasc. 8* (1887) t. 120. — Cochinch.
 Kunsteri, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890)* II. 200. — Perak.
 Wrayi, *King, l. c.* 201. — Perak.

PYRETHRUM, Hill = **Chrysanthemum**, Tourn. (Compos.).

- anserinaefolium, *Hauskn. & Bornm. ex Hauskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891)* 18. — As. Min.
 Bornmuelleri, *Hauskn. & Bornm. l. c.* — As. Min.
 depauperatum, *Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895)* 158. — Syria.
 Fisheriae, *Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888)* 300 = *Tanacetum Fisheriae, Aitch. & Hemsl.*
 Griffithii, *Boiss. l. c.* 299 = *Chrysanthemum Griffithii, C. B. Clarke.*
 helichrysiflorum, *Hauskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894)* 66. — Oriens.
 Johnstoni, *Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888)* 299 = *Tanacetum Johnstoni, Hemsl.*
 leucanthemifolium, *Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. 1891* (1892) 34. — Hisp.
 Marioni, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895)* 92. — Reg. Cauc.
 ponticum, *Alboff, l. c.* ii. (1894) 454. — Reg. Cauc.
 Shepardi, *Post, l. c.* iii. (1895) 158, in obs. — Syria.
 Starkeum, *Alboff, l. c.* ii. (1894) 454. — Reg. Cauc.

PYROLA, [Tourn.] Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 667.

- atropurpurea, *Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)* 372. — China.
 convallariaefolia, *Genty, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890)* 29 [Pirola] = media, *Sw.*

PYROSTEGIA, Presl = **Bignonia**, Tourn. *cinerca*, Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b* (1894) 223. — Am. austr.**PYRROCOMA**, Hook. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

- apargioides, *Greene, in Erythea, ii. (1894)* 70 = *A. apargioides, A. Gray.*
 crocea, *Greene, l. c.* 69 = *A. crocea, A. Gray.*
 Cusickii, *Greene, l. c.* 59 = *A. carthamoides, A. Gray var.*
 elata, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 173. — Calif.
 hirta, *Greene, in Erythea, ii. (1894)* 69 = *Aplopappus hirtus, A. Gray.*
 Howellii, *Greene, l. c.* 70 = *A. Howellii, A. Gray.*
 integrifolia, *Greene, l. c.* 69 = *A. integrifolius, Porter.*
 inuloides, *Greene, l. c.* 60 = *A. inuloides, Torr.*
 lanceolata, *Greene, l. c.* 69 = *A. lanceolatus, Torr. & Gray.*
 subquarrosa, *Greene, l. c.* iii. (1895) 22. — Wyoming.
 tenuicaulis, *Greene, l. c.* ii. (1894) 69 = *A. tenuicaulis, D. C. Eaton.*
 uniflora, *Greene, l. c.* 60 = *A. uniflorus, Torr.*

PYRUS, [Tourn.] Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 668.

- Armud, *Hauskn. & Bornm. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891)* 17. — As. Min.
 cathayensis, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887)* 256 (= *Cydonia senensis, Thoms.*). — China.
 Delavayi, *Franch. Pl. Delav. (1890)* 227, t. 47 [Pirus]. — Yunnan.
 Donnell-Smithii, « Mast. » ex Coult. *Bot. Gaz. xvi. (1891)* 199 (err. cal.) = *Pinus Donnell-Smithii, Mast.*
 floribunda, *Nichols. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894)* 181 (= *Malus floribunda, Sieb.*). — Japon.
 Halleana, *Hort. l. c.* = seq.
 Halliana, *Hort. ex Gard. and For. i. (1888)* 152 (= *Malus Halliana, Koehne*) = floribunda, *Nichols.*
 ioënsis, *L. H. Bailey, in Am. Gard. xii. (1889)* 473 f. 7-8; ex *Sarg. Silva N. Am. iv. (1892)* 72 = coronaria, *Linn.*
 iowensis, *MacMill. Metasp. Minn. (1892)* 284 = praec.
 kansuensis, *Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893)* 94. — China.
 kohimensis, *Watt, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889)* 20. — Kohima.
 lobata, *Nichols. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894)* 195 (= *Crataegus lobata, Bosc.*). — Reg. Cauc. ?
 minima, *Aug. Ley, in Journ. Bot. xxxiii. (1895)* 84. — Brit.
 Miyabei, *Sarg. in Gard. and For. vi. (1893)* 213, et vii. (1894) 14; *Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893)* 381 [Pirus]. — Japon.
 Myabei, *Sarg. Forest Fl. Japan* (1894) 40, t. 13 = praec.
 nigra, *Sarg. in Gard. and For. iii. (1890)* 416; *Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893)* 385, 386 [Pirus] (= *Aronia nigra, Dippel*). — Am. bor.
 occidentalis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888)* 263. — Calif.
 orthocarpa, *Nichols. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894)* 181 (= *Malus orthocarpa, Lavall.*). — Japon.
 Parkmanni, *Hort. ex Gard. and For. i. (1888)* 152; *Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893)* 406 et 740, ad calc. [Parkmanni] = floribunda, *Nichols.*
 Polvilla, « Gmel. » ex *Dippel, l. c.* 359 = *P. Polveria, Linn.*
 Prattii, *Hemsl. in Kew Bull. (1895)* 16. — China.
 scabrifolia, *Franch. Pl. Delav. (1890)* 229. — Yunnan.

PYRUS : —

- serulata, *Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894)* 191 = *Pyrus Sorbus, Gaertn.*
 Soulardi, *L. H. Bailey, in Am. Gard. xii. (1891)* 173 (= *Malus Soulardi, Britton*); *Sarg. Sylva N. Am. iv. (1892)* 72, in obs. = coronaria, *Linn.*
 succica, *Garccke, ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894)* 187 (= *Pyrus succica, Roehl.*) = intermedia, *Ehrh.*
 Tenorei, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893)* 399; *Koehne, Deutsche Dendrol. (1893)* 260 (= *Malus spectabilis, Borkh.*). — Form. hort.
 thianschanica, *Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890)* 312; et in *Gartenfl. xl. (1891)* 8, fig. 4 = tianschanica, *Franch.*
 Thomsonii, *Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894)* 189 = vestita, *Vall.*
 transitoria, *Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893)* 95. — China.
 yunnanensis, *Franch. Pl. Delav. (1890)* 228. — Yunnan.

PYXIDARIA, Hall. = **Vandellia**, Linn. (Scrophul.).

- caespitosa, *corymbosa, crustacea, cymulosa, diffusa, elata, Ellobum, glandulifera, Hookeri, japonica, latifolia, limosa, minuta, montana, nervosa, nummularifolia, obtusa, pachypoda, pubescens, scapigera, senegalensis, soriana, sphaerocarpa, stachydifolia, subcrenolata, subulata, urticifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891)* 464-657 = homonyma omnia Vandelliae.
 alsinodes, *Kuntze, l. c.* 464 = *V. alsinoides, Benth.*
 arvidens, *Kuntze, l. c.* = *V. pedunculata, Benth.*
 cordifolia, *Kuntze, l. c.* = *V. pedunculata, Benth.*
 hirta, *Kuntze, l. c.* = *V. mollis, Benth.*
 lobelioides, *Kuntze, l. c.* = *V. lobelioides, Oliver.*
 micrantha, *Kuntze, l. c.* = *V. angustifolia, Benth.*
 molluginodes, *Kuntze, l. c.* = *V. molluginoides, Benth.*
 oblonga, *Kuntze, l. c.* 465 = *Torrenia oblonga, Steud.*
 obovata, *Kuntze, l. c.* = *Mazus rugosus, Lour.*
 pusilla, *Kuntze, l. c.* 464 = *Vandellia scabra, Benth.*
 stemodioides, *Kuntze, l. c.* = *V. stemodioides, Miq.*
 viscosa, *Kuntze, l. c.* = *V. hirsuta, Buch.-Ham.*

Q

QUAMOCLIT, Tourn. ex Moench = **Ipomoea**, Linn. (Convoly.).

- lutea, *Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893)* 557 = *Ipomoea lutea, Hemsl.*

QUAPOYA, Aubl. = **Clusia**, Linn. (Guttif.).

- acuminata, *Kuntze, Rev. Gen. (1891)* 61 = *Rengifa acuminata, Planch. & Triana.*
 colorans, *Klotzsch, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1888)* 426 = *Clusia colorans, Engl.*
 ligulata, *Klotzsch, l. c.* 420 = *C. myriandra, Planch. & Triana.*
 microphylla, *Klotzsch, ex Engl. l. c.* 427 = *C. microphylla, Engl.*
 peruviana, *Kuntze, Rev. Gen. (1891)* 61 = *Rengifa peruviana, Poepp. & Endl.*
 robusta, *Klotzsch, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1888)* 431 = *Clusia Schomburgkiana, Benth.*

QUARARIBEA, Aubl. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 671.

- floribunda, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886)* 242 = *Myrodia floribunda, St. Hil.*. — Bras.
 pendulifera, *K. Schum. l. c.* 241. — Bras.

QUEBRACHIA, Griseb. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 671.

- Laurentzii, « Griseb. » ex *Illustr. Hort. xxxviii. (1891)* 105, in obs. sphalm. = *Lorentzii, Griseb.*
 Morongii, *Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1892)* 77. — Parag.

QUEKETTIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 671.
chrysanth, *Barb. Rodr. Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 130. — Bras. bor.

QUERCUS. [Tourn.] Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. ii. 671.
abbreviata, Vukot. in Verh. zool.-Bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 199 = *Q. Robur*, Linn.
acuminata, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 93 = *Q. Prinos*, Linn.
Allardi X, Hy. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 558. — Gall.
andegavensis X, Hy. l. c. — Gall.
agrifolia, Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 825 = *Q. Ilex*, Linn.
arizonica, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 89, t. 389. — Arizona.
asiatica, Borb. in Termész. Füzet. xiii. (1890) 32. — As. occ.
asterotricha, Borb. & Csátó, in Magyar Növ. Lapok. (1886) 132. — Hung.
avellanoides, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 197 = *Q. Robur*, Linn.
bacuinensis, Vukot. l. c. 194 = *Q. Robur*, Linn.
badensis X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. l. (1890) 272. — Eur. centr.
Balanseae, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 152, t. 4, fig. 6. — Tonk.
Banga, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 603, in syn. = *lanuginosa*, Don.
baviensis, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 150, t. 3 fig. 2. — Tonk.
Bedoi, Borb. in Magyar Növényt. (1886) 54 et 108; et in Termész. Füzet. xiii. (1890) 28. — Hung.
Bedoi X, Simonk. & Fekete, in Erdész. Lapok, xxvi. (1887) 38; Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1887) 489 = *dacica*, Borb.
bellogradensis, Borb. in Termész. Füzet. xiii. (1890) 30 = *Q. Robur*, Linn.
Bossebovii Hy. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 559. — Gall.
brevifolia, Sarg. Sylv. N. Am. viii. (1895) 171, t. 431 = *cinerea* Michx.
breviloba, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 93; et Sylv. N. Am. viii. (1895) 71, t. 384 = *Q. Durandi*, Buchl.
brevipes, Borb. in Magyar Növényt. Lapok, x. (1886) 131 = *Q. Robur*, Linn.
brutia, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 376 = *Q. Robur*, Linn.
budensis X, Borb. in Bot. Centralbl. xxxvii. (1889) 129; Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. l. (1889) 278. — Hung.
Budenziana, Borb. in Termész. Füzet. xiii. (1890) 31 = *Q. brutia*, Ten.
Cantleyana, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 613; et in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 64, t. 59. — Penins. Mal.
caroliniana, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 85 = *Q. Prinos*, Linn.
castanoides, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 198 = *Q. Robur*, Linn.
Castelnarnauiana, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 264. — Ins. Philipp.
Chapmanni, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 93; et Sylv. N. Am. viii. (1895) 41, 370. — Carolina, Florida.
Clementiana, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 614; et in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 69. — Penins. Mal.
Collettii, King, l. c. 49 = *spicata*, Smith.
confragosa, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 616; et in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 77, t. 71. — Perak.
coriifolia, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 196 = *Q. Robur*, Linn.
Csátó, Borb. in Magyar Növényt. Lapok, x. (1886) 133; et in Termész. Füzet. xiii. (1890) 33 = *Q. Robur*, Linn.
Curtisii, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 612; et in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 56, 73, t. 52. — Perak.
cyrtocarpa, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 150, t. 3, fig. 3. — Tonk.

QUERCUS:

dacica, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 148 (= *Q. Bedoi*, Simonk.). — Hung.
de Baryana, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 286. — N. Guin.
devensis, Simonk. in Erdész. Lapok (1887) 415 = *tridactyla*, Borb.
digena X, Borb. in Termész. Füzet. xiii. 7 (1890) 29. — Hung.
digitata, Sudworth, in Gard. and For. v. (1892) 98; Sarg. Sylva N. Am. viii. (1895) 147, t. 420 et 421 = *falcata*, Michx.
Eichleri, Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 236; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 615. — Sumatra, Perak.
Engelmanni, Greene, West Am. Oaks (1889) 32, t. 15, fig. 2. 3 et t. 17; Sarg. Sylva N. Am. viii. (1895) 83, t. 387 = *oblongifolia*, Torr.
erythronura, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 198 = *Q. Robur*, Linn.
farinosa, Vukot. l. c. 199 = *Q. Robur*, Linn.
Feketei, Simonk. in Erdész. Lapok (1887) 31; et Enum. Fl. Transsilv. (1886) 487 = *Q. Robur*, Linn.
Fragmus, A. Longo, in Bollet. Natural. Siena, viii. (1888) extr. 8. — Italia.
grandifrons, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 610; et in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 49, t. 35b. — Perak.
grosse-serrata, Kotschy, ex Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1889) 194 = *infectoria*, Olivier.
Guerangeri X, Hy. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 557. — Gall.
Havilandii, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 231. — Borneo.
hemisphaerica, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 151, t. 3, fig. 4. — Tonk.
heterophylla, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 195 = *Q. Robur*, Linn.
Heuffeli, Simonk. in Bot. Centralbl. lxxvii. (1889) 129, et in Akad. Math. es Termész. (1890) cum ic. = *brutia*, Ten.
Hindsiana, « Benth. » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 75, sphalm. = *Q. Hindsii*, Benth.
horizontalis, Hort. ex Dippel, l. c. 62 = *Q. Robur*, Linn.
hudsonica, Hort. ex Dippel, l. c. 112 et 385 = *cuneata*, Wangeh.
hypophaeos X, « Booth », ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 131. — Hybr. artef. ?
indica, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 153 = *Castaneopsis indica*, A. DC.
intercedens X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 271. — Austria.
irazuensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 641. — Costa Rica.
Jahnii, Simonk. in Akad. Math. es Termész. (1890) cum ic., ex Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 452. — Hung.
Kanitziana, Borb. in Erdész. Lapok (1887) 732; et in Termész. Füzet. xiii. (1890) 28. — Hung.
javanica, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 153 = *Castaneopsis javanica*, A. DC.
Jenkinsiana, « Benth. » ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 617, sphalm. = *Q. Jenkinsii*, Benth.
kabylica X, Trab. in Bull. Assoc. Franç. avanc. sci., Paris (1888) 506; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1899) 822. — Algeria.
Karduchorum, « C. Koch » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 100 = *Q. carduchorum*, C. Koch.
Kunstleri, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 606; et in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 40, t. 31. — Perak, Borneo.
kurdica, Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 186. — Kurdist.
lacinifolia, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 195 = *Q. Robur*, Linn.
lanuginosa, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 270 = *Q. Robur*, Linn.
leucocarpa, Hook. f. & Thoms. ex Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 225. — Bengal.
Listeri, King, in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 89, t. 82. — Assam.

QUERCUS :—

Louetti, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 66 = *Q. Robur*, Linn.
Lowii, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 28, t. 21 b. — Borneo.
massana, G. Ehrenb. ex Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 208 = *Q. Ehrenbergii*, Kotschy.
Mierbeckii, « Durieu » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892-93) = *Q. Mierbeckii*, Durieu.
magnifica, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 122 = *tinctoria*, Bartr.
minor, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 471; et Sylv. N. Am. viii. (1895) 37, t. 369-70 = *obtusiloba*, Muhr.
monorensis, Simonk. in Akad. Math. es Termész. (1890) cum ic., ex Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 452 = *Q. Bedoi*, Borb.
monticola, King, in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 44, t. 37. — Borneo, Sumatra.
nana, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 155, t. 424 = *ilicifolia*, Wangeh.
Neo-Heuffeli, Borb. in Erdész. Lapok (1887) 350; et in Termész. Füzet. xiii. (1890) 30. — Hung.
nivea, King, in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 31, t. 24 b. — Borneo.
numidica X, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 58 et 61. — Algeria.
parvula, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 40 = *Q. Wislizeni*, A. DC.
platanoides, Sudworth, in Rep. Secr. U. S. 1892 (1893) 327; Sarg. Sylva N. Am. viii. (1895) 63, t. 380 = *bicolor*, Willd.
pubens, Kotschy, ex Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 190. — Syria.
pulchra, King, in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 85, t. 81. — Borneo.
pusilla, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 196 = *Q. Robur*, Linn.
ramosa, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 75 et 585; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 128 = *alba*, Linn.
Rechini X, Hy. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 557. — Gall. centr.
reflexa, King, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 616; et in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 78, t. 72. — Penins. Mal.
rhodopea, Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1893) xxxvii. 57. — Bulg.
rubicunda, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 63 = *Q. Robur*, Linn.
rufa, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 195 = *Q. Robur*, Linn.
rufescens, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 620, in syn. = *Castaneopsis Hystrix*, A. DC.
Scortechinii, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 608; et in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 43, t. 35 a. — Perak.
sectifolia, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 194 = *Q. Robur*, Linn.
semilanuginosa, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 198; et in Termész. Füzet. xiii. (1890) 29. — Hung.
Sieboldi, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 71; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 130 = *Q. Robur*, Linn.
slavonica, Kit. ex Borb. in Erdész. Lapok (1886) 230 = *Q. Farnetto*, Tenore.
Soleriana, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 261. — Ins. Philipp.
spatulaeifolia, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 197 = *Q. Robur*, Linn.
specimens, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 67 = *Q. Robur*, Linn.
suberispa X, Borb. in Termész. Füzet. xiii. 7 (1890) 29. — Hung.
sulcata, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 196 = *Q. Robur*, Linn.
superlata, Borb. in Deutsche Bot. Monatsschr. (1887) 164; et in Termész. Füzet. xiii. 7 (1890) 33. — Hung.
svevica, Borb. in Termész. Füzet. xiii. 7 (1890) 30; et 33 = *Q. Robur*, Linn.

QUERCUS : —

- Szechenyana* ×, Borb. in Erdész. Lapok (1886) 993, et (1887) 679; et in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 143. — Hung.
- Szowitzii, Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 188. — Reg. Transcauc.
- tabajdiana* ×, Simonk. in Erdész. Lapok (1886) 567; et in Akad. Math. es Termész. (1890) cum ic. — Bosnia.
- tephrocarpa*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 151, t. 4, fig. 5. — Tonk.
- tergestina*, Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 191. — Eur. mer.-or.
- tetracarpa*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 196 = *Q. Robur*, Linn.
- tlemcenensis* ×, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 58. nomen. — Algeria.
- Tiszae* ×, Simonk. & Fekete, in Erdész. Lapok, xxvi. (1887) 39; et in Termész. Füzet. xiii. (1890) 30; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 272. — Eur. centr.
- Toumeyii*, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 92, fig. 13 et 14; et Sylva N. Am. viii. (1895) 93, t. 391. — Am. bor. occ.
- Tozzae*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 62 et 585 [Tozzae] = *Q. Robur*, Linn.
- Trabuti* ×, Hy. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 556. — Gall.
- tridactyla* ×, Borb. in Term. Közlöny, xviii. (1886) 353; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 145 (= *Q. Kernerii* ×, Simonk.). — Hung.
- truncata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 618; et in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 84, t. 80. — Ind. or.
- tunkinensis*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 153, t. 4, fig. 8-10. — Tonk.
- turbinella*, Greene, West Am. Oaks, i. (1889) 37; et ii. 59, t. 27 pr. p. = *undulata*, Torr.
- ventricosa*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 125 = *Q. Aegilops*, Linn.
- venustula*, Greene, West Am. Oaks, ii. (1890) 69, t. 32 = *Q. Gambelii*, Nutt.
- Vukotinovići*, Borb. in Bot. Centralbl. xxxvii. (1889) 129
- Wenzigiana*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 613; et in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 65, t. 58 b. — As. trop.
- Wrayii, King, l. c. 77, t. 104. — Perak.
- xanthoclada*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 149, t. 3, fig. 1. — Tonk.
- Zan, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 93, in syn. = *lusitanica*, Lam.
- Zang, Hort. ex Dippel, l. c. = *praec.*

QUESNELIA, Gaudich. (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 678.

- arcensis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 381 = *rufa*, Gaudich.
- Bakeri*, Ed. André, in Rev. Hort. ix. (1888) 564; et *Bromel. Andreanae* (1889) 16, t. 7; *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 85. — Columbia.
- blanda*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 383 = *strobilispica*, Wawra.
- cayennensis*, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 85. — Guian. gall.
- columbiana*, *Baker, l. c.* 87 (= *Ronnbergia columbiana*, Ed. Morr.). — Columb.
- distichanta*, Lindm. in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiv. n. 8 (1891) 25, t. 4, fig. 7-10 = *Aechmea brasiliensis*, *Baker*?
- effusa*, Lindm. l. c. 26, t. 4, fig. 1-6 = *Hillbergia marmorata*, *Baker*.
- Enderi*, *Gravis & Wittm. in Gartenfl.* xxxvii. (1888) 195, fig. 41-43; *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 86 (= *Billbergia Enderi*, Regel). — Bras.
- Glaziovii*, *Baker, l. c.* 87. — Bras.
- humilis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 386. — Bras.
- indecora*, Mez, l. c. 384. — Bras.
- Lamarckii*, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 85. — Guian.?
- Selloana*, *Baker, l. c.* — Bras.
- Testudo*, Lindm. in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiv. n. 8 (1891) 24, t. 3, fig. 9-19; Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 380. — Bras.

QUESNELIA :

- tillandsioides*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 388 = *Billbergia tillandsioides*, *Baker*.
- Wittmackiana*, Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 497, t. 1281; et in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 692; *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 86. — Bras.

QUINA, Aubl. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 678.

- Glaziovii*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1888) 482. — Bras.
- peruviana*, Engl. l. c. 481. — Peruv.
- Spruceana*, Engl. l. c. — Bras.

QUINARIA, Rafin = **Vitis**, Tourn. (Ampelid.).

- quinquefolia*, Koehne, in Gartenfl. xli. (1892) 403; et Deutsche Dendrol. (1893) 399 = *V. hederacea*, Ehrh.
- radicantissima*, Koehne, l. c. 403. — Form. hort.
- tricuspidata*, Koehne, l. c.; et Deutsche Dendrol. (1893) 398 = *Vitis inconstans*, Mig.
- Veitchii*, Koehne, ll. cc. 403; et 399 = *V. inconstans*, Mig.

QUINCHAMALIUM, Molina (Santal.). — Ind.

- Kew. ii. 678.
- Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 306. — Peruv., Bolivia.
- tarapacatum*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 75. — Chile.

QUINETIA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 678.

- Macgregorii*, « F. Muell. » ex Journ. Bot. xxxi. (1893) 334, sphalm. = *Quintinia Macgregorii*, F. Muell.

QUINQUINA, Condam. = **Cinchona**, Linn. (Rubiace.).

- Calisaya*, *carabayensis*, *Humboldtiana*, *lancifolia*, *Ledgeriana*, *micrantha*, *officinalis*, *ovata*, *succubra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 294-95 = *homonyma omnia* Cinchonae.
- coccinea*, Kuntze, l. c. 295 = *C. macrocalyx*, Pav.
- heterophylla*, Kuntze, l. c. = *C. cordifolia*, Mutis.
- MacIvoriana* ×, Kuntze, l. c. — Hybr. artef.
- mixtissima* ×, Kuntze, l. c. — Hybr. artef.
- obovata*, Kuntze, l. c. = *Cinchona pubescens*, Vahl.
- Palton* ×, Kuntze, l. c. = *C. macrocalyx*, Pav.
- pubescens*, Kuntze, l. c. = *C. cordifolia*, Mutis.

QUINTINIA, A. DC. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 678.

- Macgregorii*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Feb. 1892) 164, nomen, et ix. (Nov. 1892) 112; et in Bot. Centralbl. liii. (1893) 27. — N. Guin.
- Quatrefagesii*, F. Muell. l. c. vii. (Mar. 1891) 181. — Austral.

QUIVISIA, Comm. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 679.

- grandifolia*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 10. — Madag.

QUIVISIANTHE, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 251. **MELIACEAE**.

Papinae, Baill. l. c. — Madag.

R**RACHICALLIS**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 679.

- americana*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 92 = *rupestris*, DC.

RADINOCION, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 200. **ORCHIDEAE**.

- flexuosum*, Ridl. l. c. 200, t. b, fig. a [*flexuosa*]. — Ins. S. Thom.

RADLKOFERELLA, Pierre, Not. Bot. Sapot. (1890) 21 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

- arguacoensium*, *curvifolia*, *domingensis*, *grandiflora*, *littoralis*, *marginata*, *multiflora*, *pauciflora*, *serpentaria*, *sphaerocarpa*, *calenzuelana*, *venosa*, *Warmin-gii*, Pierre, l. c. = *homonyma omnia* Lucumae.
- Dussiana*, Pierre, l. c. nomen. — Ind. occ.
- Eichleri*, Pierre, l. c. = *Vitellaria Eichleri*, Engl.
- guadelupensis*, Pierre, l. c. nomen. — Ins. Guadal.
- inseparabilis*, Pierre, l. c. nomen. — Mexic.
- martinicensis*, Pierre, l. c. nomen. — Ins. Martinic.
- nigricans*, Pierre, l. c. nomen. — Mexic.
- nitidula*, Pierre, l. c. = *Vitellaria nitidula*, Pierre.
- quadrifida*, Pierre, l. c. nomen. — Hab.?
- Urbani*, Pierre, l. c. nomen. — Hab.?

RADLKOFEROTOMA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 358 = **Carelia**, Less. (Compos.).

cistifolium, Kuntze, l. c. = *C. cistifolia*, Less.

RAFNIA, Thunb. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 686.

- capensis*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 199 (= *Spartium capense*, Linn.). — Afr. austr.
- Meyeri*, Schinz, l. c. 201 (= *Rafnia ovata*, E. Mey.). — Afr. austr.
- ovata*, Schinz, l. c. 199 (= *Spartium ovatum*, Berg.). — Afr. austr.
- Schlechteriana*, Schinz, l. c. 197 et 199. — Afr. austr.

RAGALA, Pierre, Not. Bot. Sapot. (1891) 57; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 297. **SAPOTACEAE**.

- sanguinolenta*, Pierre, ll. cc. (= *Ecclinusa sanguinolenta*, Pierre). — Guian. gall.

RAILLARDELLA, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 680

- paniculata*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 48. — Calif.

RAILLARDIA, Gaudich. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 680.

- molokaiensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 226. — Ins. Sandvic.

RAMISCHIA, Opiz = **Pyrola**, Tourn. (Ericac.).

- obtusata*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 467. — Graecia.

RAMISIA, Glaziov, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 697; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2404. **NYCTAGINEAE**.

- brasiliensis*, Glaziov, ll. cc. — Bras.

RAMIUM, Rumpf, Herb. Amboin. v. (1747) 214, t. 59, f. 1, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 631 = **Boehmeria**, Jacq. (Urtic.).

- acuminatum*, *asperum*, *australe*, *Blumei*, *brevirostre*, *bullatum*, *catophlebium*, *caudatum*, *celtidifolium*, *compactum*, *cylindricum*, *densiflorum*, *Didymogyne*, *elongatum*, *fallax*, *heterophyllum*, *hirtum*, *hispidulum*, *Jacquinianum*, *japonicum*, *Kurzii*, *Lindenianum*, *macrophyllum*, *malabaricum*, *mollicoma*, *monticolum*, *niveum*, *Pavonii*, *polystachyum*, *ramiflorum*, *repens*, *rigidum*, *rugulosum*, *Zollingerianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 632-33 = *homonyma omnia* Boehmeriae.
- ampullaceum*, Kuntze, l. c. 632 = *B. caudata*, Sw.
- denudatum*, Kuntze, l. c. = *B. excelsa*, Wedd.
- grande*, Kuntze, l. c. = *B. stipularis*, Wedd.
- grewiaeflorum*, Kuntze, l. c. 633 = *B. grewiaefolia*, Presl.
- Hamiltonianum*, Kuntze, l. c. = *B. platyphylla*, D. Don.
- Helferi*, Kuntze, l. c. = *B. Helferii*, Blume.
- rhynchophyllum*, Kuntze, l. c. = *B. rhynchophyllum*, Wedd.
- sedifolium*, Kuntze, l. c. 632 = *B. sidaefolia*, Wedd.
- tenuis*, Kuntze, l. c. 632 = *B. rugulosa*, Wedd.

RAMONA, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 235, et (Sept. 1892) 301 = **Audibertia**, Benth. (Labiata.).

humilis, Greene, in Erythea, i. (1893) 144; et in Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 291 = *A. humilis*, Benth.

polystachya, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 235 et (Sept. 1892) 302 = *A. polystachya*, Benth.

RAMONDA, Caruel, Epit. Fl. Europ. ii. (1894) 140 = **Ramondia**, Rich. (Gesner.).

RANDIA, Houst, ex Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 631.

abnormis, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 130 (= *Gynopachys abnormis*, Korth.). — Borneo.

acuminata, Boerl. l. c. 130 (= *Gyn. acuminata*, Blume). — Ind. bat.

acuminata, Boerl. l. c. 131 (= *Griffithia acuminata*, Korth.). — Borneo.

auriculata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 75 = *Anamanthodia auriculata*, Hook. f.

Barteri, K. Schum. l. c. = *Mitriostigma Barteri*, Benth. & Hook. f.

coffeoides, Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 90. — Polynes.

corymbosa, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië ii. i. (1891) 130 (= *Gynopachys corymbosa*, Blume). — Ind. bat.

densiflora, Bartl. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 343 = *formosa*, K. Schum.

depauperata, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 217. — Tonk.

Engleriana, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 75; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 380. — Afr. trop. or.

euacantha, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 131 (= *Griffithia euacantha*, Korth.). — Java, Borneo.

Fischeri, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 381. — Afr. trop. or.

formosa, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 342. — Bras.

guianensis, Sagot, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 377 = *Basanacantha spinosa*, K. Schum.

Gynopachys, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 130 (= *Gynopachys tomentosa*, Blume). — Ind. Bat.

Kuhniana, F. Hoffm. & K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 380. — Afr. trop. or.

longiloba, Hemsl. Biol. Centr.-Am. iv. (1886) 101. — Ins. Cozumel.

macrosiphon, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 28; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 381. — Afr. trop. or.

obcordata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 53. — Mexic.

oxygyna, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 131 (= *Griffithia oxygyna*, Korth.). — Sumatra.

oxydonta, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 218. — Tonk.

penduliflora, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 380. — Afr. trop. or.

Pringlei, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 379. — Mexic.

pycnantha, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 218. — Tonk.

Quintasii, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 127. — Ins. S. Thom.

speciosa, K. Schum. in K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 130. — N. Guin.

spinuligera, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (June 1892) 43; et in Bot. Centralbl. li. (1892) 252. — Austral.

stenantha, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 219. — Tonk.

Thurberi, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 53. — Mexic.

tomentosa, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 130 (= *Gardenia tomentosa*, Blume). — Java.

tomentosa, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 152 = *P. Watsoni*, Robinson.

RANDIA : —

tuberculosa, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. ii. (1891) 12. — Austral.

Watsoni, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 317. — Mexic.

Zippeliana, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 130 (= *Gynopachys Zippeliana*, Scheff.). — N. Guin.

RANDONIA, Coss. (Resed.). — Ind. Kew. ii. 682. *somalensis*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 398. — Reg. Somal.

RANUNCULUS, [Tourn.] Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 680.

abchasicus, Freyn, ex Somm. & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 525; et in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 373. — Reg. Cauc.

aberrans, Phil. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 82, nomen. — Am. austr.

abyssinicus, Schube, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 219. — Afr. trop. or.

acinacilobus, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 89 = *flabellatus*, Desf.

aconitoides X. Rouy, Ill. Pl. Eur. rarior. iv. (1895) 25, t. 76. — Helv.

acriiformis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 374. — Am. bor.

acuticulus, Durieu, ex Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 62 = *oleucos*, Lloyd.

alceus, Greene, in Erythea, iii. (1895) 69. — Calif.

alismellus, Greene, Fl. Francisc. (1892) 297 = *alismaefolius*, Geyer, var.

alleghehiensis, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 224. — Virginia, Carolina.

alliarifolius, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 48 = *cassubicus*, Linn.

amerocephylus, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II. (1889) 1. — N. Guin.

ampelophyllus, Somm. & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 523, et Sér. II. i. (1894) 9. — Reg. Cauc.

anatolicus, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 34 = *brutius*, Ten.

apiophyllus, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 12 = *sceleratus*, Linn.

areolatus, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 439. — N. Zel.

arizonicus, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 60 = *subsagittatus*, Greene.

arizonicus, Lemmon, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 370. — Arizona.

asarifolius, Diard, ex Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 59 = *hederaceus*, Linn.

astrantiaefolius, Boiss. & Balansa, in Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 11. — As. Min.

aurigeranus X. Rouy, in Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 101, in obs. — Gall.

Austinae, Greene, in Erythea, iii. (1895) 44. — Calif.

Berggreni, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 325. — N. Zel.

Biolettii, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 225. — Calif.

Boissieri, Simonk. in Termész. Füzet. xi. (1889) n. 3, 4 = *caucasicus*, Bieb.

Bolanderi, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 58. — Calif.

Bongardi, Greene, in Erythea, iii. (1895) 54 (= *R. recurvatus*, Bong. pr. p.) = *occidentalis*, Nutt.

britannicus, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 69 = *trichophyllus*, Chaix.

calandrinoides, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1828. — Marocc.

calthaeiflorus, Greene, in Erythea, iii. (1895) 45. — Am. bor. occ.

carinatus, Simonk. Enum. Fl. Transsylv. (1886) 43 = *carinatus*, Schur.

casaliodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 3. — Java.

chiclensis, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 28. — Peruvia.

cinerascens, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 89 = *flabellatus*, Desf.

Cooleyae, Vasey, & J. N. Rose, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 239; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 289, t. 22. — Alaska.

RANUNCULUS : —

Cooperi, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1502. — Afr. austr.

Cusickii, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 615. — Am. bor. occ.

dentatus, Freyn, in A. Kern. Sched. Fl. Austr.-Hung. v. (1888) 47 = *montanus*, Willd.

dissectus, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 105 = *bulbosus*, Linn.

Drummondii, Greene, in Erythea, ii. (1894) 192 (= *R. Hookeri*, Regel). — Am. bor.

dubius, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 78 = *R. Thora*, Linn.

ellipticus, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 110 (= *R. brevicaulis*, Hook.). — Am. bor. occ.

elymaiticus, Boiss. & Hausskn. in Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 6. — Persia.

eximius, Greene, in Erythea, iii. (1895) 19. — Am. bor. occ.

extensus, Schube, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 218. — Ins. Fernando-Po.

fallax, Strasser, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 50 = *auricomus*, Linn.

filiaculis, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 69 = *trichophyllus*, Chaix.

flabellifolius, Rouy & Fouc. l. c. = *fluitans*, Lam.

Forreri, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 154. — Mexic.

Freynii, A. Kern. ex Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 48. — Eur. centr. et merid.

gingkolobus, Somm. & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 524; et Sér. II. i. (1894) 8; et in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 184. — Reg. Cauc.

gobicus, Maxim. Enum. Pl. Mongol. (1889) 15. — Mongol.

Grayanus, Freyn, in Deutsche Bot. Monatsschr. viii. (1890) 179 = *aquatilis*, Linn.

Grayi, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 265 (= *R. pedatifidus*, Hook.). — Am. bor.

gymnadenus, Somm. & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 524, et Sér. II. i. (1894) 10; et in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 181. — Reg. Cauc.

Hartwegi, Greene, in Erythea, iii. (1895) 45 = *alismaefolius*, Geyer, var.

Harveyi, Greene, l. c. ii. (1894) 189; Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 159 = *abortivus*, Linn. var.

Helena, Alboff, in Soc. imp. hort. [Compt.-rend. Sect. Odessa] (1891) extr. 2; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 253. — Reg. Cauc.

hepaticaeifolius X. Bruegg. ex Freyn, in Bot. Centralbl. xli. (1890) 133. — Helv.

hesperoxys, Greene, in Erythea, ii. (1894) 189. — Calif.

involutus, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 15. — China.

juniperinus, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 615. — Am. bor. occ.

Kernerii, Freyn, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 47. — Tirol.

Kirkii, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 323. — N. Zel.

lazicus, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 11, in syn. = *R. Huetii*, Boiss.

leptorrhynchus, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 29, t. 1. — Afghan.

Lojkae, Somm. & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 525, et Sér. II. i. (1894) 10; et in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 185. — Reg. Cauc.

longipetiolatus, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892 (1893) 325. — N. Zel.

Lowii, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 2261. — Borneo.

ludovicianus, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 58. — Calif.

Luizetii X. Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 215. — Pyren.

Macounii, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xii. (1892) 2; Robinson, Syn. Fl. N. Am. i. I. (1895) 36. — Am. bor.

Marchesinii, Lojac. in Giorn. Com. agr. Pal. N. S. xviii. (1886) 79; et Fl. Sicula, i. I. (1888) 48, et App. t. 8. — Sicil.

RANUNCULUS: —

- maximus, *Greene*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiv. (1887) 118; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 3. — Calif.
- mouriensis, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 20. — Am. bor.
- mollis, *Rouy & Fouc.* Fl. de Fr. i. (1893) 90 = flabellatus, *Desf.*
- Muelleri, *J. Buch.* in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 215, t. 16 = *R. Monroi*, *Hook. f.*
- muricatus, *Colenso*, l. c. xxiii. 1890 (1891) 381. — N. Zel.
- Novae-Zelandiae, *Petrie*, l. c. xxvi. 1893 (1894) 266. — N. Zel.
- nudicaulis, *Rouy & Fouc.* Fl. de Fr. i. (1893) 73. in obs. = *R. Ficaria*, *Linn.* var.
- orbiculatus, *Blanche*, in *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 5. — Syria.
- Orphanidis, *Boiss. & Heldr.* ex *Boiss.* l. c. 13. — Maced.
- ovalifolius, *Rouy & Fouc.* Fl. de Fr. i. (1893) 89 = flabellatus, *Desf.*
- petiolaris, *E. S. Marshall*, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 289, t. 328 = *R. Flammula*, *Linn.* var.
- Pichleri, *Frey*, ex *Staff.* in *Denkschr. Akad. Wien*, (1886) ii. 23. — As. occ.
- platyphyllus, *Simons*, *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 51 = acris, *Linn.* var.
- Polii, *Franch.* ex *Forb. & Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 15. — China.
- pollinensis, *Chiavenda*, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 297 = montanus, *Willd.*
- Populago, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 19. — Am. bor. occ.
- Porteri, *Britton*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 310. — Am. bor.
- ranunculinus, *Rydberg*, in *Bot. Surv. Nebraska*, iii. (1894) 23 = *R. Nuttallii*, *A. Gray*.
- reticulatus, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 188. — N. Zel.
- rhodensis, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 7. — Ins. Rhod.
- rigidulus, *Boiss.* l. c. 11. = *R. Huetii*, *Boiss.*
- ruahenicus, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 256. — N. Zel.
- rugulosus, *Greene*, *Pittonia*, ii. (May 1890) 58. — Calif.
- Savatieri, *Franch.* *Miss. scient. Cap Horn*, v. [Phan.] (1889) 320. — Reg. Magell.
- Schweinfurthii, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 12. — Syria.
- Shaftoanus, *Boiss.* l. c. 5 = seq.
- Shaftoanus, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 366 = *Oxygraphis Shaftoana*, *Aitch. & Hemsl.*
- Sintenisii, *Frey*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 362. — Armen.
- Sommieri, *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 245; *Somm.* & *Levier*, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. i. (1894) 9. — Reg. Cauc.
- stenorhynchus, *Franch.* in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 189. — Tibet.
- subpinnatus, *Rouy & Fouc.* Fl. de Fr. i. (1893) 90 = flabellatus, *Desf.*
- subsagittatus, *Greene*, *Pittonia*, ii. (May 1890) 57. — Am. bor. occ.
- Suksdorfii, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 371. — Washington.
- synchonetala, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 324. — N. Zel.
- tenuis, *J. Buch.* l. c. xx. 1887 (1888) 255, t. 12. — N. Zel.
- Tempskyanus, *Frey* & *Sint.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 35. — Armen.
- thasius, *Halacsy*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 412. — Ins. Thasos.
- tricuspis, *Maxim.* Fl. Tangut. (1889) 12; et *Enum. pl. Mongol.* (1889) 16. — Mongol.
- triteratus, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 370. — Washington.
- Turneri, *Greene*, *Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 296. — Alaska.
- uncinatus, *Rouy & Fouc.* Fl. de Fr. i. (1893) 90 = flabellatus, *Desf.*
- vagans, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 131. — Mexic.

RANUNCULUS: —

- Vespertilio, *Lojacono*, Fl. Sicula, i. l. (1888) 33, t. 3. — Sicil.
- vitifolius, *Boiss. & Balansa*, ex *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 9. — As. Min.
- vitifolius, *Lojacono*, Fl. Sicula, i. l. (1888) 43. — Sicilia.
- Volkensii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 181. — Afr. trop. or.

RANZANIA, *T. Ito*, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 302; *Prantl*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 274. **BERBERIDEAE.**

japonica, *T. Ito*, l. c. (= *Podophyllum japonicum*, *T. Ito*) — Japon.

RAOULIA, *Hook. f.* (Compos.). — Ind. Kew. ii. 689.

albo-sericea, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 195. — N. Zel.

RAPHANISTROCARPUS, *Baill.* in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1883) 309; *Muell. & Pax*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1889) 25. **CUCURBITACEAE.**

Boivini, *Cogn. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 397 (= *Momordica Boivini*, *Baill.*). — Afr. trop. or.

RAPHANISTRUM, *Tourn.* ex *Adans.* = **Raphanus**. *Tourn.* (Crucif.).

microcarpum, *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 18 = *R. microcarpum*, *Willk.*

RAPHANOCARPUS, *Hook. f.* (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 690.

humilis, *Cogn. ex Schinz*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 149. — Afr. austro-occ. extratrop.

RAPHANUS, [Tourn.] *Linn.* (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 690.

landroides, *Rouy & Fouc.* Fl. de Fr. ii. (1895) 68 = *R. Raphanistrum*, *Linn.*

rupestris, *Porta & Rigo* [Iter. secund. *Hisp.* (1890) n. 194], ex *Porta*, in *Atti Accad. Agiati*, ix. (1891) extr. 6; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 293, in syn.; *Rouy*, in *Deyrolle, Le Naturaliste. Sér. II.* xiii. (1891) 248 (= *Hutera rupestris*, *Porta*) = *Coincya rupestris*, *Rouy*.

RAPHIA, *Beauv.* (Palm.). — Ind. Kew. ii. 690.

Kirkii, [Engl. ?] *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 10. — Afr. trop.

Monbuttorum, *Drude*, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 111, 130. — Afr. trop.

RAPHIACME, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 117; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1895) 220 = **Raphionacme**, *Harv.* (Asclep.).

globosa, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 118; et l. c. 221. — Angola.

grandiflora, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 425 = *R. grandiflora*, *N. E. Br.*

linearis, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 117; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1893) 221. — Angola.

longifolia, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 425 = *R. longifolia*, *N. E. Br.*

scandens, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 221 = *R. scandens*, *N. E. Br.*

RAPHIDOCYSTIS, *Hook. f.* (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 690.

sakalavensis, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 318. — Madag.

RAPHIONACME, *Harv.* (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 690.

angolensis, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 248. — Angola.

Brownii, *S. Elliot*, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 91. — Sierra Leone.

excisa, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 301. — Afr. trop.

RAPHIONACME: —

- Flanaganii, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 2. — Afr. austr.
- Galpinii, *Schlechter*, l. c. — Afr. austr.
- grandiflora, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 111. — Afr. centr. or.
- lanceolata, *Schinz*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 263. — Afr. austro-occ. extratrop.
- longifolia, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 110. — Zambesia.
- macrorrhiza, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 10. — Afr. austr.
- procumbens, *Schlechter*, l. c. 11. — Afr. austr.
- scandens, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 111 = *R. Flanaganii*, *Schlechter*.
- splendens, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 301. — Afr. trop.
- velutina, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 12. — Afr. austr.
- volubilis, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 302. — Afr. trop.

RAPHIOSTYLES, *Benth. & Hook. f.* = **Apodytes**, *E. Mey.* (Olacin.).

Poggei, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 73. — Kamerun.

Preussii, *Engl.* l. c. 72. — Kamerun.

Stuhlmannii, *Engl.* l. c. — Afr. trop.

RAPISTRUM, *Tourn.* ex *Medic.* (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 691.

Ceratocnemum, *Prantl*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 181 = *Ceratocnemum rapistroides*, *Coss. & Balansa*.

RAPONA, *Baill.* Hist. des pl. x. (1888) 326; *Hallier f.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 15. **CONVULVULACEAE.**

madagascariensis, *Baill.* l. c. 328 (= *Breweria tiliaefolia*, *Baker*). — Madag.

RASPALIA, *Brongn.* (Bruniac). — Ind. Kew. ii. 692.

affinis, *Nieden*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2a (1891) 135 (= *Nebelia affinis*, *Sweet*). — Afr. austr.

Dregeana, *Nieden*, l. c. (= *Berardia Dregeana*, *Sond.*). — Afr. austr.

phylicoides, *Nieden*, l. c. 125 = *phylicoides*, *Presl.*

RAUWOLFIA, *Plum.* ex *Linn.* (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 692.

cardiocalpa, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 154. — Gabon.

celastrifolia, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 335. — Madag.

chinensis, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 95 (= *Ophioxylon chinense*, *Hemsl.*). — China.

clavunculus, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1893) 154. — Madag.

dichotoma, *K. Schum.* l. c. — Ins. S. Thom.

inebrians, *K. Schum.* l. c.; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 318. — Afr. trop. or.

javanica, *Koerd. & Valet.* Boomsoort. van Java, i. (1894) 91. — Java.

macrophylla, *Staff.* in *Kew Bull.* (1894) 20. — Afr. trop. occ.

major, *Nichols.* Dict. Gard. ii. (1886) 279 [majus]. — Java.

Mannii, *Staff.* in *Kew Bull.* (1894) 21. — Afr. trop. occ.

mombasiana, *Staff.* l. c. — Afr. trop. or.

monopyrena, *K. Schum.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 27; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 318. — Afr. trop. or.

obscura, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1893) 154. — Congo mer.

obversa, *Baill.* Hist. des pl. x. (1888) 171, in nota 5 = *serpentina*, *Benth.*

ochrosioides, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1893) 154; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 318. — Afr. trop. or.

parviflora, *K. Schum.* l. c. in obs. = *Ochrosia sandwicensis*, *A. DC.*

pleiosiadica, *K. Schum.* l. c. — Ins. S. Thom.

Preussii, *K. Schum.* l. c. — Kamerun.

RAUWOLFIA : —

- reflexa*, Koerd. & Valet. Boomsoort. van Java, i. (1894) 91. — Java.
reflexa, K. Schum. l. c. 154 = *reflexa*, Teijsm. & Binn. rosea, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 317. — Afr. trop. or.
serpentina, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 170 = *serpentina*, Benth.
Stuhlmannii, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 318. — Afr. trop. or.
trichophylla, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 334. — Madag.
trifoliata, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 171 = *serpentina*, Benth.
verticillata, Baill. l. c. 170 = *chinensis*, Hemsl.

RAVENALA, Adans. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 692.

- guyanensis*, Petersen, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1888) 7 (= *Phenakospermum guyanense*, Endl.). — Am. austr. bor.

RAVENIA, Vell. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 693.

- ruellioides*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, ii. (1887) 272, t. 38 (= Oliver, ex im Thurn, in Timmerhri, v. (1886) 191 [err. cal. Revenia]. — Guian. angl.

RAVENSARA, Sonner. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 692.

- parvifolia*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 45. — Madag.

RAZOUMOFSKYA, Hoffm. = **Arceuthobium**.

- Bieb. (Loranth.).*
camptopoda, Douglasii, gracilis, minuta, occidentalis, pusilla, robusta, vaginata, verticilliflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 587 = *homonyma omnia* Arceuthobii.
americana, Kuntze, l. c. = *Arceuthobium Oxycedri*, Bieb.
cryptopoda, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 192 = *A. cryptopodum*, Engelm.
cupressodes, Kuntze, l. c. = *Dendrophthora cupressoides*, Eichl.
divaricata, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 192 = *Arceuthobium divaricatum*, Engelm.
opuntoides, Kuntze, l. c. = *Dendrophthora opuntoides*, Eichl.

REAUMURIA, Linn. (Tamarisc.). — Ind. Kew. ii. 693.

- reflexa*, Lipski, Exc. bot. au delà Mer Casp. (1889) 7. — Oriens.
soongarica, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 97; et Enum. Pl. Mongol. (1889) 106 (= *Hololachne soongorica*, Ehrenb.). — As. centr.

REBOUDIA, Coss. & Durieu = **Erucaria**, Gaertn. (Crucif.).

- microcarpa*, Coss. Comp. Fl. Atlant. ii. (1887) 213, in obs. = *microcarpa*, Boiss.

REBUTIA, K. Schum. in Monatschr. f. Kakteenk. v. (1895) 102. **CACTEAE**.

- minuscule*, K. Schum. l. c. cum xylogr. — Reg. Argent.

RECHSTEINERA, Regel = **Gesneria**, Linn. (Gesner.).

- aggregata*, aurantiaca, Blassii, bulbosa, canescens, caracasana, cardinalis, cochlearis, confertiflora, Cooperi, coruscans, dentata, discolor, Douglasii, elatior, elliptica, erubescens, faucialis, flavescens, gracilis, Hookeri, lateritia, latifolia, macrorrhiza, maculata, magnifica, Marchii, Merckii, pendulina, polyantha, reflexa, ruficula, rutila, Sceptrum, splendens, stachydifolia, stricta, trifoliata, tuberosa, Vargasii, Vauthieri, Warczewiczii, xanthophylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 474 = *homonyma omnia* Gesneriae.
atrosanguinea, Kuntze, l. c. = G. Lindleyi, Hook.
barbata, Kuntze, l. c. = *Sinningia Carolinae*, Benth. & Hook. f.
chelonoides, Kuntze, l. c. = *Gesneria chelonoides*, R. Br.
Gollmeriana, Kuntze, l. c. = G. Gollmeriana, Hanst.

RECHSTEINERA : —

- guazumifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 474 = *Gesneria guazumaefolia*, Benth.
Leopoldi, Kuntze, l. c. = G. Leopoldi, Scheidw.
sceptrodes, Kuntze, l. c. = G. sceptroides, Hanst.
Schomburgkii, Kuntze, l. c. = G. Schomburgkiana, Kunth.
Selloi, Kuntze, l. c. = G. Sellovi, Mart.
Suttonii, Kuntze, l. c. = G. Suttoni, Booth.

REDFIELDIA, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 133, t. 70; Hack. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 97. **GRAMINEAE**.

- flexuosa*, Vasey, ll. cc. — Colorado.

REGELIA, Lindm. in Oefvers. Akad. Holm. (1890) 542; et in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiv. n. 8 (1891) 15 = **Karatas**, Mill. (Bromel.).

- acanthocrater*, Lindm. ll. cc. 543; et 21 = *Karatas acanthocrater*, Baker.
ampullacea, Lindm. l. c. = K. ampullacea, Baker.
Binoti, Lindm. l. c. 543 ou 643 = *Nidularium Binoti*, Ed. Morr.
chlorosticta, Lindm. l. c. 543 = *Karatas chlorosticta*, Baker.
coriacea, Lindm. l. c. = K. coriacea, Antoine.
cruenta, Lindm. l. c. = K. cruenta, Baker.
cyanea, Lindm. l. c. 542 = K. cyanea, Baker.
denticulata, Lindm. l. c. 542 = K. denticulata, Baker.
Johannis, Lindm. l. c. 543 = K. Johannis, Baker.
Laurentii, Lindm. l. c. = K. Laurentii, Baker.
Makoyana, Lindm. l. c. = K. Makoyana, Baker.
Marechali X, Lindm. l. c. (= *Nidularium Marechali*, Hort.). — Hybr. artef.
Morreniana, Lindm. l. c. = K. Morreniana, Antoine.
princeps, Lindm. l. c. = K. princeps, Baker.
Regnellii, Lindm. l. c. = K. Regnellii, Baker.
sarmentosa, Lindm. l. c. 542 = K. sarmentosa, Baker.
spectabilis, Lindm. l. c. 543 = K. spectabilis, Antoine.
tristis, Lindm. l. c. 542 = K. tristis, Baker.

REHMANNIA, Libosch (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 694.

- angulata*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 193. — China.
Oldhami, Hemsl. l. c. 194; Baker, in Ann. Bot. ix. (1895) 154. — Ins. Formosa.
rupestris, Hemsl. l. c. 195; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7191. — China.

REICHARDIA, Roth = **Picridium**, Desf. (Compos.).

- dichotoma*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 267 = P. dichotomum, Bieb.

RELBUNUM, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 695.

- asperum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 111. — Bras.
atherodes, K. Schum. l. c. 107 = *Galium atherodes*, Spreng.
bigeminum, K. Schum. l. c. 106 = G. bigeminum, Griseb.
buxifolium, K. Schum. l. c. 110. — Bras.
chaetophorum, K. Schum. l. c. 114 = *Galium chaetophorum*, Griseb.
compactum, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 49. — Bolivia.
corymbosum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 118. — Bras.
croceum, K. Schum. l. c. 116. — Peruv.
diffusum, K. Schum. l. c. 111. — Bras.
diphyllum, K. Schum. l. c. 117. — Bras.
ericoides, K. Schum. l. c. 109 = *Galium ericoides*, Lam.
hirsutum, K. Schum. l. c. 114 = G. hirsutum, Ruiz & Pav.
hirtum, K. Schum. l. c. 107 = G. hirtum, Lam.
humile, K. Schum. l. c. 105 = G. humile, Cham. & Schlecht.
Muelleri, K. Schum. l. c. (1889) 406. — Bras.
nitidum, K. Schum. l. c. (1888) 114. — Bras.
noxium, K. Schum. l. c. 110 (= *Rubia noxia*, St Hil.). — Bras.

RELBUNUM : —

- orinocense*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 112. — Venezuela.
ovale, K. Schum. l. c. 115. — Bras.
pusillum, K. Schum. l. c. 117. — Am. austr.
Selloanum, K. Schum. l. c. 115. — Bras.
tuberculosum, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 42 (= *Rubia tuberosa*, Benth.). — Peruvia.
vallantioides, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 115. — Bras.
vile, K. Schum. l. c. 116. — Bras.

REMIJIA, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 695.

- amazonica*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 153. — Bras.
firmula, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 46 (= *Ladenbergia firmula*, Mart.). — Am. austr.
hispida, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 150. — Venezuela.
involuta, K. Schum. l. c. 150, in obs.; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 45. — N. Granat.
pedunculata, Ed. André, in Rev. Hort. lix. (1887) 417, fig. 84 (= *Cinchona pedunculata*, Karst.). — Columb.
physophora, Benth. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 151. — Bras.
Roraimae, K. Schum. l. c. 154 = *Cascarilla Roraimae*, Wedd.

REMYA, Hillebr. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 695.

- kauaiensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 194. — Ins. Sandvic.
mauiensis, Hillebr. l. c. — Ins. Sandvic.

RENANTHERA, Lour. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 695.

- angustifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 49. — Perak.
Edefeldtii, F. Muell. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 460. — N. Guin.
Imshoohtiana, Rolfe, in Kew Bull. (1891) 200. — Hab. ?
Papilio, King & Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1895) ii. 328. — Ind. or.

RENEALMIA, Houtt. = **Villarsia**, Vent. (Gentian.).

- albiflora*, calthifolia, capitata, lasiosperma, latifolia, ovata, parnassifolia, violifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 430 = *homonyma omnia* Villarsiae.
congestifolia, Kuntze, l. c. = V. congestiflora, F. Muell.
exaltata, Kuntze, l. c. = V. reniformis, R. Br.

RENEALMIA, Linn. f. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 696.

- chrysotricha*, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 42. — Bras.
circinata, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 130 (= *Ethanium circinatum*, K. Schum.). — Gabon.
gracilis, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 47. — Guian. gall.
humilis, Petersen, l. c. 47. — Guian. gall.
mexicana, Klotzsch, ex Petersen, l. c. 45. — Mexic.

RESEDA, Tourn. ex Linn. (Resed.). — Ind. Kew. ii. 696.

- dimerocarpa*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 251 = R. Luteola, Linn.
epirotica, Formánek, in Verh. Naturf. Ver. Brünn. xxxiii. (1894) 145. — Graecia.
fluminensis, Simonk. in Magyar Növen. Lapok, xii. (1888) 19. — Croatia.
oligomeroides, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 397. — Reg. Somal.
platystachya, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 242 = alba, Linn.
sphenocleoides, Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 298. — Arabia.
tymphaea, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1888) 10; et N. Folge, v. (1893) 41. — Graecia.

RESTIARIA, Rumpf = **Commersonia**, Forst. & **Rulingia** R. Br. (Stercul.).

crispa, *echinata*, *Gaudichaudii*, *melanopetala*, *microphylla*, *et pulchella*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 81 = *homonyma omnia* Commersoniae.

corylifolia, *craurophylla*, *cuneata*, *densiflora*, *grandiflora*, *hermanniaefolia*, *Kampeana*, *laxophylla*, *macrantha*, *madagascariensis*, *magniflora*, *parviflora*, *platycalyx*, *rotundifolia*, *rugosa*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Rulingiae.

cygnorum, Kuntze, l. c. = *Rulingia malvaefolia*, Steetz.

dasyphylla, Kuntze, l. c. = *R. pannosa*, R. Br.

Fraseri, Kuntze, l. c. = *R. pannosa*, R. Br.

Leichhardtii, Kuntze, l. c. = *Commersonia Leichhardtii*, Benth.

RESTREPIA, H. B. & K. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 699.

brachypus, *Reichb. f. in Flora*, lxx. (1886) 554. — N. Granat.

dentata, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1892) 208. — Reg. Andina?

ecuadorensis, *Rolfe*, l. c. 138. — Ecuad.

pandurata, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1888) i. 244; *et ex Veitch*, *Man. Orchid. Pl.* v. (1889) 13. — N. Granat.

Shuttleworthii, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1892) 138. — Reg. Andina.

striata, *Rolfe*, in *Gard. Chron.* (1891) i. 137; *et in Bot. Mag.* (1892) t. 7233. — N. Granat.

RETAMA, Rafin. = **Genista**, Tourn. (Legumin.). *recutita*, Webb, ex C. Bolle, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 236. — Ins. Canar.

RETANILLA, Brongn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 699.

Moelleri, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1893) 5. — Chili.

RETINISPORA, Sieb. & Zucc. = **Thuya**, Linn. (Conif.).

flavescens, Hort. ex Beissn. *Handb. Nadelholzk.* (1891) 58 = *T. orientalis*, Linn.

glaucescens, Hochst. ex Beissn. l. c. (1891) 35 = *T. occidentalis*, Linn.

Keteleeri, Hort. ex Beissn. l. c. 95 = *T. occidentalis*, Linn.

Nobleana, Hort. ex Beissn. l. c. 94 = *T. occidentalis*, Linn.

pygmaea, Hort. ex Beissn. l. c. 97 = *T. occidentalis*, Linn.

Troubetzkoyana, Hort. ex Gard. Chron. (1890) i. 108; *et ex Beissn.* l. c. 95 [Retinospora] = *T. occidentalis*, Linn.

RETINODENDRON, Korth. = **Vatica**, Linn. (Dipteroc.).

bancanum, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 129, in obs. = *V. bancana*, Scheff.

Kunstleri, King, l. c. 129 = *V. Kunstleri*, Brandis. *moluccanum*, Heim, *Recherch. Diptéroc.* (1892) 104 = *V. moluccana*, Burck.

pallidum, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 128; *et in Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 121 = *V. pallida*, Dyer.

Scortechinii, King, ll. cc. 128 et 121. — Perak.

RETINODENDROPSIS, Heim, in *Mém. Assoc. Franç. Pau*, 1892 (1893) 475, t. 4. **DIPTEROCARPEAE**.

aspera, Heim, l. c. 470, t. 4. — Borneo.

RHABDIA, Mart. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 700.

aquatica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 439 = *lycioides*, Mart.

REYNOSIA, Griseb. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 700.

larvigata, Sarg. in *Gard. and For.* iv. (1891) 15 = *latifolia*, Griseb.

RHABDOCHLOA, Beauv. = **Leptochloa**, Beauv. (Gramin.).

bipinnata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 788 = *L. bipinnata*, Hochst.

Burchellii, Kuntze, l. c. = *L. Burchellii*, Munro.

imbricata, Kuntze, l. c. = *Diplachne imbricata*, Scribn.

longa, Kuntze, l. c. = *Leptochloa longa*, Griseb.

polystachya, Kuntze, l. c. = *L. polystachya*, Benth.

rigida, Kuntze, l. c. = *Diplachne rigida*, Benth.

subdigitata, Kuntze, l. c. = *Leptochloa subdigitata*, Trin.

uniflora, Kuntze, l. c. = *L. uniflora*, Hochst.

RHACHICALLIS, Spach = **Rachicallis**, DC. (Rubiace.).

americana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 281, in syn. = *rupestris*, DC.

maritima, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 33 = *rupestris*, DC.

RHACHIDOSPERMUM, Vasey, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 110 = **Jouvea**, Fourn. (Gramin.).

mexicanum, Vasey, l. c. t. 12. — Mexic.

RHACOMA, Adans. = **Leuzea**, DC. (Compos.).

coniferum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 360 = *L. conifera*, DC.

longifolium, Kuntze, l. c. = *L. longifolia*, Hoffmgg. & Link.

rhaponticoides, Kuntze, l. c. = *Centaurea rhaponticoides*, Benth. & Hook. f.

salinum, Kuntze, l. c. = *C. salina*, Benth. & Hook. f.

RHACOMA, Linn. = **Myginda**, Linn. (Celastr.). *decussata*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1894) t. 284. — Madag.

RHAGADIOLUS, Tourn. ex Scop. (Compos.). Ind. Kew. ii. 701.

papposus, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 205. — Armen.; Afghan.

Rhagadiolus, Dorfler, in *Herb. norm. Sched.* ad cent. xxxi. (1894) 19 = *edulis*, Gaertn.

RHAMNELLA, Miq. = **Microrhamnus**, A. Gray (Rhamn.).

franguloides, Weberbauer, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) 406 = *japonica*, Miq.

RHAMNICAstrum, Link. = **Scolopia**, Schreb. (Bixin.).

Brownii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 45 = *Scolopia Brownii*, F. Muell.

crenatum, Kuntze, l. c. = *S. crenata*, Clos.

Ecklonii, Kuntze, l. c. (= *Phoberos Ecklonii*, Presl). — Afr. austr.

Mundtii, Kuntze, l. c. (= *P. Mundtii*, Presl). — Afr. austr.

pusillum, Kuntze, l. c. = *Scolopia Gaertneri*, Thw.

Rhinanthera, Kuntze, l. c. = *S. Rhinanthera*, Clos.

spinosum, Kuntze, l. c. = *S. Roxburghii*, Clos.

Zeyheri, Kuntze, l. c. (= *Phoberos Zeyheri* Presl). — Afr. austr.

RHAMNIDIUM, Reiss. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 701.

ferreum, Sarg. in *Gard. and For.* iv. (1891) 16; *et N. Am. Sylva*, ii. (1892) 29, t. 58 = *Condalia ferrea*, Griseb.

RHAMNOLUMA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*. ii. (1890) 894 [err. cal. Rhamo-Moluma]; *et Hist. des pl.* xi. (1892) 287 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

novo-caledonica, Baill. l. c. 288 = *L. novo-caledonica*, Engl.

RHAMNONEURON, Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 245. **THYMELAEACEAE**.

Balansae, Gilg, l. c. — Tonk.

RHAMNUS, Tourn. ex Linn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 701.

americana, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 526 = *hybrida*, L'Hérit.

baetica, *Reverch. & Willk. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 86; *et Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 125, t. 163. — Hisp.

balearica, Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 44, t. 117a; *et Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 257. — Hisp.

Billardii, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 526 = *hybrida*, L'Hérit.

boliviana, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 15. — Bolivia.

chinensis, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 393 = *chlorophora*, Decne.

chrysophyllus, Weberbauer, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 410 (= *Frangula chrysophylla*, Reiss.). — Bras.

disperma, Ehrenb. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 156. — Desert. Aegypt.-Arab.

dumosa, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 520 = *saxatilis*, Linn.

glaucochylla, Somm. in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. i. (1894) 19, 2 et 3. — Ital.

granulosa, Weberbauer, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1. (1895) 410 [granulosus] = *Ceanothus granulatus*, Ruiz & Pav.

heterophylla, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1759 [heterophyllus]. — China.

Holstii, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 69; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 255. — Afr. trop. or.

imeretia, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 525 = *alpina*, Linn.

imeretina, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 393. — Reg. Cauc.

imeretina, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 525 = *alpina*, Linn.

insularis, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. (1887) 392; *et Pittonia*, i. (1888) 201 = *crocea*, Nutt.

Jelskii, *Zahlbr. in Diss. Cl. Math. Phys. Akad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 223. — Peruvia.

leucodermis, Baker, in *Kew Bull.* 1895 (1896) 316. — Arabia.

myrtifolia, Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 45, t. 117b; *et Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 257. — Hisp.

occidentalis, Howell, ex Greene, *Pittonia*. ii. (Nov. 1889) 15. — Am. bor. occ.

orbiculata, Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 225. — Dalm. vel Serb.

Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 403. — Mexic.

polymorpha, Weberbauer, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) 410 [polymorphus] = *sectipetala*, Mart.

pubescens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 120 = *sectipetala*, Mart.

rhodopea, Velen, *Fl. Bulg.* (1891) 119; *et in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1893) xxxvii. 19. — Bulg.

rubra, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 63 et 160 = *Purshiana*, DC.

rugulosa, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 129 [rugulosus]. — China.

sphenophylla, Borb. in *Erdész. Lapok* (1885) 703. — Hung.

tortuosa, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* Ser. II. i. (1894) 26. — Reg. Cauc.

RHAMPHICARPA, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 703.

angolensis, Engl. *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 74. — Angola.

Heuglinii, Hochst. ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 361 = *Cycnium Heuglinii*, Engl.

Holstii, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 35; *et Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 74 (= *Cycnium Holstii*, Engl.). — Afr. trop.

macrocephala, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. vi. (May 1892) 473. — Austral.

Medwedewi, Alboff, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 435; *et in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 248, t. 6. — Reg. Cauc.

RHAMPHICARPA : —

Meyeri Johannis, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 382 (= *Cycnium* Meyeri Johannis, *Engl.*). — Afr. trop. or.
pratensis, *Engl. l. c.* (1894) 58, nomen. — Afr. trop.
stricta, *Engl. l. c.* 24 et 39; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 77 (= *Cycnium strictum*, *Engl.*). — Afr. trop.

RHANTERIUM, Desf. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 703.

incrassatum, Pomel, ex Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 432 = *adpressum* Coss. & Durieu.
squarrosus, Coss. & Durieu, ex Batt. & Trab. l. c. = *adpressum*, Coss. & Durieu.

RHAPHIDANTHE, Hiern, ex Guerke, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 163. **EBENACEAE**.

obliquifolia, *Hiern, l. c.* — Afr. trop. occ.

RHAPHIDOPHORA, Hassk. (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 703.

crassifolia, *Hook. f. Fl. Br. Ind.* vi. (1893) 543. — Perak.
gracilipes, *Hook. f. l. c.* 545. — Perak.
Hollrungii, *Engl. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 19. — N. Guin.
Kunstleri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 546. — Ind. or.
Maingayi, *Hook. f. l. c.* 543. — Malacca.
minor, *Hook. f. l. c.* 544. — Penins. Mal.
neo-guineensis, *Engl. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 19. — N. Guin.
Schottii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 544. — Ind. or.
Scortechinii, *Hook. f. l. c.* 545. — Perak.
tetrasperma, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 548. — Perak.
Wrayi, *Hook. f. l. c.* 544. — Perak.

RHAPHIDOPHYLLUM, Benth. = **RAPHIDOPHYLLUM**, Hochst. = **Sopubia**, Buch.-Ham. (Scrophul.).**RHAPHIDOSPORA**, Nees = **Justicia**, Houst. (Acanth.).

campylostemon, Lindau, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 329 = *J. campylostemon*, T. Anders.

RHAPHIOSTYLIS, Planch. = **RAPHIOSTYLES**, Benth & Hook. f. = **Apodytes**, E. Mey. (Olacin.).**RHAPONTICUM**, [Vaill.] Hall. = **Centaurea**, Linn. (Compos.).

integrifolium, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 425. — Buchara.

RHAPTOSTYLUM, Humb. & Bonpl. = **Heisteria**, Jacq. (Olac.).

acutum, *brasiliense*, *cauliflorum*, *citrifolium*, *coccineum*, *cyanocephalum*, *densifrons*, *flexuosum*, *guianense*, *Kappleri*, *laxiflorum*, *longifolium*, *microcarpum*, *nitidum*, *ovatum*, *pallidum*, *parvifolium*, *salicifolium*, *Spruceanum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 112 = *homonyma omnia* Heisteriae.
mayteniodes, Kuntze, l. c. = *H. maytenioides*, Spruce.
microcalyx, Kuntze, l. c. = *H. microcalyx*, Sagot.

RHEEDIA, Linn. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 705.

rostrata, *Vesque, Epharmos.* ii. (1889) 24; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 510. — Bras.
Sagotiana, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 460 = *macrophylla*, *Planch. & Triana*.
sessiliflora, *Planch. ex Vesque, in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 509. — Ins. Jamaic.

RHEEDIA : —

Spruceana, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 463. — Bras.
tenuifolia, *Engl. l. c.* — Bras.
virens, *Planch. ex Vesque, in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 511. — Guiana.

RHEUM, Linn. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 705.

Alexandrae, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 384. — China.
Bailloni, *Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1892) 1015 et 1104. — Hab.?
Delavayi, *Franch. in Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 212. — Yunnan.
hirsutum, Maxim. ex *Franch. l. c.* 213, in obs. = *Polygonum acaule*, *Hook. f. & Thom.*
kialense, *Franch. l. c.* 212. — China.
strictum, *Franch. l. c.* 213. — China.
tibeticum, Maxim. ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 56. — Reg. Himal., Tibet.

RHEXIA, Linn. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 705.

aristosa, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 14, t. 99; *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1181. — Am. bor. or.
floridana, *Nash, l. c.* xxii. (1895) 150. — Florida.

RHIGOZUM, Burch. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 708.

brevipinosum, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 270. — Afr. austro-occ. extratrop.
zambesiacum, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 32. — Zambesia

RHINACANTHUS, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 708.

nasutus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 474; Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 329; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 371 = *communis*, Nees.
ndorensis, *Schweinf., ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 394, nomen; et in *Hoehnel, zum Rudolph See* (1892) 7. — Afr. trop. or.

RHINANTHUS, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 708.

dinaricus, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1891) 69. — Herceg.
ellipticus, *Hauskn. in Tagebl. Naturf. Vers. Wien* (1894) 368. — Germ.
puberulus, *Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 747. — Austria.
rumelicus, Velen. in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1887) 455; et *Fl. Bulg.* (1891) 433 = *major*, Ehrh.
serotinus, *Oborny. Fl. von Mähren* ii. (1886) 435 = *major*, Ehrh.

RHIPSALIS, Gaertn. (Cact.). — Ind. Kew. ii. 708.

aculeata, A. Weber, in *Rev. Hort.* lxiv. (1892) 428; et in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 33. — Reg. Argent.
alata, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 288 (= *Cactus alatus*, Sw.). — Am. trop.
anceps, A. Weber, in *Rev. Hort.* lxiv. (1892) 427; et in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 24. — Bras.
brevibarbis, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 199. — Hab.?
capilliformis, A. Weber, in *Rev. Hort.* lxiv. (1892) 425; et in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 11. — Bras.
cavernosa, G. A. Lindb. in *Gartenfl.* xxxix. (1890) 153; K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 289. — Bras.
clavata, A. Weber, in *Rev. Hort.* lxiv. (1892) 429; et in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 34. — Bras.
comorensis, A. Weber, in *Ind. semin. Hort. Paris* (1899), in *Rev. Hort.* lxiv. (1892) 424; K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 8. — Ins. Comor.
dissimilis, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 286 (= *Lepismium dissimile*, G. A. Lindb.). — Bras.

RHIPSALIS : —

elliptica, G. A. Lindb. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 293. — Bras.
erythrocarpa, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Os. Afr. C* (1895) 282. — Afr. trop. or.
floribunda, Schott, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 274 = *teres*, Steud.
gibberula, A. Weber, in *Rev. Hort.* lxiv. (1892) 426; et in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 12. — Bras.
gonocarpa, A. Weber, l. c. 427; et 23. — Bras.
hadrosoma, G. A. Lindb. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 96. — Bras.
Lindbergiana, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 271. — Bras.
linearis, K. Schum. l. c. 296. — Bras.
macrofagon, K. Schum. l. c. 282 = *cavernosa*, G. A. Lindb.
madagascariensis, A. Weber, in *Ind. semin. Hort. Paris* (1889), in *Rev. Hort.* lxiv. (1892) 424; G. A. Lindb. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 83, cum ic. — Madag.
minutiflora, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 271. — Guian. bat.
Myosurus, K. Schum. l. c. 281 (= *Lepismium Myosorus*, Pfeiff.) = *R. Myosurus*, Foerst.
Neves-Armondii, K. Schum. l. c. 284. — Bras.
phyllanthus, K. Schum. l. c. 298 = *macrocarpa*, K. Schum.
pulvinigera, G. A. Lindb. in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 182, fig. 33-35; K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 273. — Bras.
puniceodiscus, G. A. Lindb. in *Gartenfl.* xlii. (1893) 233, fig. 49. — Hab.?
ramosissima, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 299. — Bras.
Regnellii, G. A. Lindb. in *Gartenfl.* xxxix. (1890) 118, fig. 31 et 32; et in *Illustr. Hort.* xxxix. (1890) 121, fig. 29, 31, 32; K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1893) 295, t. 58. — Bras.
sansibarica, A. Weber, in *Rev. Hort.* lxiv. (1892) 425. — Zanzib.
setulosa, A. Weber, l. c. 428, in syn. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 24 = *dissimilis*, K. Schum.
squamulosa, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 280 (= *Cereus squamulosus*, Salm-Dyck). — Bras.
suareziana, A. Weber, in *Rev. Hort.* lxiv. (1892) 425; et in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 11. — Madag.
Taglionis, K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iv. (1894) 74, sphalm. = *R. Saglionis*, Otto & Dietr.
tetragona, A. Weber, in *Rev. Hort.* lxiv. (1892) 429; et in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 34. — Hab.?
tucumanensis, A. Weber, l. c. 427; et 22. — Reg. Argent.
virgata, A. Weber, in *Rev. Hort.* lxiv. (1892) 425. — Bras.
Warmingiana, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 291; G. A. Lindb. in *Gartenfl.* xli. (1892) 8, fig. 5 et 6. — Bras.
zanzibarica, A. Weber, in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 11. — Zanzib.

RHIZOTAECHIA, « Radlk. » in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) 347 = **Rhizotoechia**, Radlk. (Sapind.).**RHODALSINE**, J. Gay = **Arenaria**, Rupp (Caryophyll.).

Gayana, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 103 = *A. Gayana*, Christ.
platyphylla, J. Gay, ex Christ, l. c. 102 = *A. platyphylla*, Christ.

RHODAMNIA, Jacq. (Myrtac.). — Ind. Kew. ii. 709.

glabra, *Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 129 — Ins. Philipp.

RHODIOLA, Linn. = **Sedum**, Tourn. (Crasul.).

Scopolii, A. Kern. ex Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 234. — Transsilv.

RHODOCISTUS Spach = **Cistus**. Tourn.
osbeckiaefolius, Webb, ex Christ. in Bot. Jahrb. ix.
(1888) 96 = *C. osbeckiaefolius*, Christ.

RHODOCHLAENA, Spreng. = **Rhodolaena**.
Thou. (Chlaenac.).

RHODOCOLEA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris,
i. (1887) 693; et Hist. des pl. x. (1888) 57; et in
Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b
(1895) 249. **BIGNONIACEAE**.
nobilis, Baill. ll. cc. 693; et 58. — Madag.

RHODODENDRON, Linn. (Ericac.). — Ind.
Kew. ii. 710.

adenopodium, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
(1895) 391. — China.

argyrophyllum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.
xxxiii. (1886) 231; et in Nouv. Arch. Mus. Paris,
Sér. II. x. (1887-88) 48. — China occ.

Armitii, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot.
Bull. x. (1895) 39. — N. Guin.

atrovirens, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 235. — China occ.

aucubaefolium, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi.
(1890) 19. — China.

Augustinii, Hemsl. l. c. 19. — China.

aureum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)
394. — Yunnan.

auriculatum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi.
(1889) 20. — China.

blepharocalyx, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
(1895) 396. — China.

Bonvaloti, Franch. l. c. v. (1891) 94. — China.

brachyanthum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.
xxxiii. (1886) 234. — China occ.

bullatum, Franch. l. c. xxxiv. (1887) 281. — China
occ.

Bureavi, Franch. l. c. — China occ.

calophyllum, Franch. l. c. xxxiii. (1886) 250; et in
Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 45.
— Tibet.

canadense, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal.
(1888) 32; Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889)
418; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 457 (= *Rhodora canadensis*, Linn.) = *R. Rhodora*, f. F.
Gmel.

canescens Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi.
(1889) 220 = *nudiflorum*, Torr. & Gray.

Carringtoniae, F. M. H. in Vict. Natural. iv. (Nov.
1887) 110; et in Bot. Centralbl. xxxiii. (1888) 55.
— N. Guin.

chartophyllum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
(1895) 398. — Yunnan.

ciliicalyx, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 233. — China occ.

Clivicium X, Hort. ex Ungar. Rosen-Zeit. vii. 6
(1904) 24. — Hybr. artef.

concinnum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890)
21. — China.

costulatum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
(1895) 399. — China.

crassifolium, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.
iv. (1894) 195. — Borneo.

crassum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887)
282. — China occ.

culminicolum, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict.
N. S. i. ii. (1889) 23. — N. Guin.

cuneifolium, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.
(1894) 198. — Borneo.

dahuricum, « Linn. » ex Dippel, Handb. Laub-
holz. i. (1889) 425, fig. 274 = *dauricum*,
Linn.

Davidi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)
230. — China occ.

Davisi, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893)
458 = *sinensis*, Sweet.

decorum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 230; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.
x. (1887-88) 45. — China occ.

Delavayi, Franch. l. c. 231. — China occ.

dendrocharis, Franch. l. c. 233; et in Nouv. Arch.
Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 51, t. 13, fig. a.
— China occ.

discolor, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)
391. — China.

RHODODENDRON : —

ellipticum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii.
(1888) 497. — China.

Faberii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890)
22. — China.

Fargesii, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)
390. — China.

fastigiatum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 234. — China occ.

Fauriae, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
Sér. VII. x. (1886) 145. — Japon.

flavidum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)
395. — China.

floribundum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 232; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.
x. (1887-88) 49. — China.

Fordii, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 5. — China.

formosanum, Hemsl. l. c. 183. — Formosa.

fragrans, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv.
(1887) 284 = *trichostomum*, Franch.

glanduliferum, Franch. l. c. xxxiii. (1886) 231. —
China occ.

gracilentum, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N.
S. i. ii. (1889) 22. — N. Guin.

gracilipes, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
(1895) 391. — China.

graveolens X, Bull. Catal. (1887) ii. — Hybr. artef.

haematodes, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 232. — China occ.

Hanceanum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi.
(1889) 24. — China.

Hancockii, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 107; et in
Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2381. — China.

Hansemani, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 26.
— N. Guin.

heliolipis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv.
(1887) 283. — China occ.

Hellwigii, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 5, 26. —
N. Guin.

Herzogii, Warb. l. c. 15, 25. — N. Guin.

hypoglauum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi.
(1889) 25. — China.

intricatum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
(1895) 395. — China.

irroratum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv.
(1887) 280; Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7361.
— China.

kewense X, W. Wats. ex Gard. Chron. (1888)
i. 620; The Garden, xlii. (1892) 474, t. 885. —
Hybr. artef.

kialense, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)
392. — China.

Kotschyi, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 389. —
Transsilv.

lacteam, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)
231. — China occ.

lacteam, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.
(1894) 197. — Borneo.

leptanthum, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N.
S. i. ii. (1889) 24, in obs. — N. Guin.

Lochae, F. Muell. in Vict. Natural. iii. (Mar. 1887)
157; in Gard. Chron. (1887) i. 543; et in Bot.
Centralbl. xxx. (1887) 277. — Austral.

lucidum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)
390. — China.

lutescens, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 235; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér.
II. x. (1887-88) 235. — China occ.

maculiferum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
(1895) 393. — China.

microphyton, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 235. — China occ.

moupinense, Franch. l. c. 233; et in Nouv. Arch.
Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 52, t. 12. —
China occ.

neriiflorum, Franch. l. c. 230. — China occ.

nigropunctatum, Bureau & Franch. in Morot,
Journ. de Bot. xxxiv. (1891) 95. — China occ.

occidentale, W. Wats. ex Gard. Chron. (1886) ii.
104 fig. 21 = *occidentale*, A. Gray.

oleifolium, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 235. — China occ.

oreodoxa, Franch. l. c. 230; et in Nouv. Arch. Mus.
Paris, Sér. II. x. (1887-88) 46. — China occ.

pachytrichum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 231; et l. c. 49. — China occ.

RHODODENDRON : —

pentaphyllum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi.
(1887) 64. — Japon.

phaeochiton, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N.
S. i. ii. (1889) 23. — N. Guin.

pittosporaefolium, Hemsl. in Journ. Linn. Soc.
xxvi. (1889) 29. — China.

polifolium, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
(1895) 397. — China.

polycladum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 234. — China occ.

polylepis, Franch. l. c. 232; et in Nouv. Arch. Mus.
Paris, Sér. II. x. (1887-88) 50. — China occ.

Potaniini, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891)
489. — China.

Prattii, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)
389. — China.

primulaeflorum, Bureau & Franch. in Morot, Journ.
de Bot. v. (1891) 95. — China occ.

Principis, Bureau & Franch. l. c. 92. — China
occ.

Quadrasianum, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886)
170. — Ins. Philipp.

racemosum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 235; et ex Gard. Chron. (1892) ii. 62; Hook. f.
in Bot. Mag. (1893) t. 7301. — China occ.

rigidum, Franch. l. c. 233. — China occ.

rosmarinifolium, Dippel, Handb. Laubholz. i.
(1889) 421; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893)
457 = *ledifolium*, G. Don.

rosmarinifolium, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Philip.
(1886) 172. — Ins. Philipp.

rotundifolium, Arm. David (As. Soc. North. China
Branch. (1871-92) 216), ex Franch. in Bull. Soc.
Bot. Fr. xxxiii. (1886) 230; et in Nouv. Arch. Mus.
Paris, Sér. II. x. (1887-88) 47. — Tibet.

rubiginosum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv.
(1887) 282. — China occ.

rufescens, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
(1895) 397. — China.

rufum, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890)
490. — China.

scabrifolium, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 236; Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7159.
— China.

shikokianum, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892)
53. — Japon.

Smirnowi, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886)
513; Regel, in Gartenfl. xxxv. (1886) 377, t. 1226,
fig. 2. — Armen.

sonomense, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 172; et
Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 323. — Calif.

Souliei, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)
393. — China.

spiciferum, Franch. l. c. 400. — Yunnan.

spinuliferum, Franch. l. c. 398. — Yunnan.

spondylophyllum, F. Muell. in Trans. Roy. Soc.
Vict. N. S. i. ii. (1889) 23. — N. Guin.

stamineum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 236. — China occ.

strigillosum, Franch. l. c. 232; et in Nouv. Arch.
Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 49. — China
occ.

sulfureum, Franch. l. c. xxxiv. (1887) 283. — China
occ.

sutchuenense, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
(1895) 392. — China.

taliense, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)
232. — China.

Tashiroi, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887)
64. — Ins. Kiusiu.

tatsienense, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
(1895) 394. — China.

tosaense, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 53.
— Japon.

trichocladum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 234. — China occ.

trichostomum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.
(1895) 396. — Yunnan.

Ungernii, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886)
514; Regel, in Gartenfl. xxxv. (1886) 278, fig. 1. —
Armen. ross.

verticillatum, Vidal, Rev. Fl. Vasc. Filip. (1886)
171 = *R. Vidalii*, Rolfe.

Viali, Delavay & Franch. in Morot, Journ. de Bot.
ix. (1895) 398. — Yunnan.

RHODODENDRON : —

- Vidal i, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 348, in obs. (= *R. verticillatum*, Vidal). — Ins. Philipp.
Victorianum X, Cuvelier, in Gard. Chron. (1887) i. 387. = Hybr. artef.
Westlandii, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 31. — China.
yanthinum, Bureau & Franch. in Morot, *Journ. de Bot.* v. (1891) 94. — China occ.
Yelliottii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 25. — N. Guin.
yedoense, Maxim. ex Regel, in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 565, t. 1233. — Japon.
yunnanense, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 232. — China occ.
Zoelleri, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1892) 15, 34. — N. Guin.

RHODOLAENA, Thou. (Chlaenac.). — Ind. Kew. ii. 712.

- Bakeriana*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 566, et 571; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 103 (= *Rhod. altivole*, Baker). — Madag.
Humboldtii, Baill. *ll. cc.* 566, 571; et t. 104. — Madag.

RHODOMYRTUS, Reichb. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 712.

- baladensis*, Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 70 (= *Myrtus baladensis*, Brongn. et Gris). — N. Caled.

RHODOPSIS, Ledeb. = **Rosa**, Tourn.

- berberifolia*, « Ledeb. » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1891) 601 = *R. berberifolia*, Pall.

RHODOSCIADIUM, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 151. **UMBELLIFERAE**.

- dissectum*, Coult. & J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 309. — Mexic.
glaucum, Coult. & J. N. Rose, l. c. — Mexic.
Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 151. — Mexic.

RHODOSEPALA, Baker. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 475. **MELASTOMACEAE**.

- crecta*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 339. — Madag.
pauciflora, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 471; *Cogn. l. c.* 338. — Madag.
procumbens, Cogn. l. c. 339. — Madag.

RHODOSPHAERA, Engl. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1892) 162. **ANONACEAE**.

- rhodanthema*, Engl. l. c. fig. 100 p. — Austral.

RHODOSTACHYS, Phil. (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 713.

- albo-bracteata*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 28. — Chili
argentina, Baker, l. c. 29. — Reg. Argent.
micrantha, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 618. — Chili.
Urbaniana, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1891) 182. — Reg. Argent.

RHOICISSUS, Planch. in *DC. Monog. Phan.* v. (1887) 463 = **Vitis**, [Tourn.] Linn. (Ampe-
lid).

- capensis*, Planch. l. c. = *V. capensis*, Thunb.
cuneifolia, Planch. l. c. 466 (= *Cissus cuneifolia*, Eckl. & Zeyh.). — Afr. austr.
drepanophylla, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 257. — Afr. trop. or.
erythroides, Planch. l. c. 465 = *Vitis erythroides*, Fres.
Holstii, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 257. — Afr. trop. or.
pauciflora, Baker, in *DC. Monog. Phan.* v. (1887) 468 = *Cissus pauciflora*, Burch.
Revoilii, Planch. l. c. 469. — Reg. Somal.
rhomboidea, Planch. l. c. 467 (= *Cissus rhomboidea*, E. Mey.). — Natal.

RHOICISSUS : —

- sansibarensis*, Gilg, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1895) 53; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 257. — Afr. trop. or.
sericea, Planch. l. c. 466 (= *Cissus sericea*, Eckl. & Zeyh.). — Afr. austr.
Thunbergii, Planch. l. c. 469 (= *C. Thunbergii*, Eckl. & Zeyh.). — Afr. austr.
unifoliata, Planch. l. c. 470 (= *C. unifoliata*, Harv.). — Afr. austr.
usambarensis, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 257. — Afr. trop. or.

RHOMBONEMA, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 41. **ASCLEPIADEAE**.

- luridum*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

RHUS [Tourn.] Linn. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 713.

- ambigua*, Lavallée, ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 373. — Japon.
americana, Hort. Batav. ex Dippel, l. c. 367 = *typhina*, Linn.
Blodgettii, Kearney, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 486. — Florida.
borneensis, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 142. — Borneo.
caroliniana, W. W. Ashe, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 548, t. 37. — Carolna.
coccinea, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 367 = *glabra*, Linn.
collina, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 25. — Afr. trop.
Delavayi, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 466. — China occ.
Engleriana, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 363. — N. Guin.
falcata, Penzig, in *Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 337 (= *Pistacia falcata*, Becc.). — Eritrea.
flexicaulis, Baker, in *Kew Bull.* 1895 (1896) 316. — Arabia.
Grandidieri, Baill. *Hist. pl. Madag.* Atlas, Fasc. 30 (1892) t. 221. — Madag.
hirta, Sudworth, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 81 = *typhina*, Linn.
latifolia, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas, Fasc. 30 (1892) t. 231. — Madag.
Marlothii, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1888) 37. — Afr. austro-occ. extratrop.
myriantha, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 213. — Reg. Somal.
outeniquensis, Szyszyl. *Pl. Rehmann.* ii. (1888) 52. — Afr. austr.
Palmeri, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 95. — Mexic.
Potanini, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 110. — China.
sanguinea, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 367 = *glabra*, Linn.
somalensis, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 289. — Afr. trop. or.
Telopedendron, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas, Fasc. 30 (1892) t. 232. — Madag.
velutosa, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 309. — Madag.

RHYNCHANThERA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 716.

- humilis*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 98. — Bras.
ternata, Cogn. l. c. 105. — Parag.

RHYNCHANThUS, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1886) t. 6861. **SCITAMINEAE**.

- longifolius*, Hook. f. l. c. — Borneo.

RHYNCHOCALYX, Oliver, in Hook. Icon: pl. xxiv. (1894) t. 2348. **LYTHRARIACEAE**.

- lawsonioides*, Oliver, l. c. — Natal.

RHYNCHOCARPA, Schrad. = **Kedrastis**, Me-
dic. (Cucurb.)

- Courboni*, Defflers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxii. (1885) 349 = *Phialocarpus glomeruliflorus*, Defflers.

RHYNCHOCORIS, Griseb. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 719.

- Boissieri*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 28. — Syria.
intermedia, Alboff, in *Soc. imp. hort. [Compt. rend. Sect. Odessa]* (1891) extr. p. 13; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 262 = *stricta*, C. Koch.

RHYNCHODIA, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 717.

- rhynchosperma*, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1894) 173 = *R. Walli-
chii*, Benth.

RRYNCHORYZA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1892) 1063; et *Hist. des pl.* xii. (1894) 291. **GRAMINEAE**.

- subulata*, Baill. *ll. cc.* 106 et 292 (= *Oryza subulata*, Nees). — Am. austr.

RHYNCHOSIA, Lour. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 717.

- calosperma*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 314. — N. Guin.
chrysadenia, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 222. — Afr. trop. or.
chrysantha, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 26, nomen. — Afr. trop.
cinerea, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 149. — Florida.
comosa, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 99. — Afr. trop.
Descampsii, Dewèvre, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 2. 1894 (1895) 100. — Afr. trop. austro-occ.
fagelioides, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 33; et ex *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 77, nomen. — Afr. trop.
Henryi, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 196, 489 = *Dumasia villosa*, DC.
hirsuta, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 168. — Afr. austro-occ. extratrop.
Holubii, Hemsl. in *Ann. Bot.* v. (1891) 409. — Zambesia.
longiflora, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 169. — Afr. austro-occ. extratrop.
Michauxii, Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 458. — Florida.
nigropunctata, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 408. — Mexic.
Pringlei, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 316. — Mexic.
Schenckii, Taub. in *Flora*, lxxii. (1889) 429. — Bras.
Torreyi, Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 499. — Texas.
trichocephala, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 465. — Madag.
usambarensis, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 222. — Afr. trop. or.
Woodii, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 197. — Natal.
yunnanensis, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 185. — Yunnan.

RHYTACHNE, Desv. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 719.

- congoensis*, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 277. — Congo gall.
gabonensis, Hack. l. c. 276. — Afr. trop.
princeps, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. (1895) 700 (= *Jardinea abyssinica*, Steud.). — Abyss.
trisetia, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 275. — Afr. centr. bor.

RHYTICOCOS, Becc. in *Malpighia*, i. (1886) 350, 253. **PALMAE**.

- amara*, Becc. l. c. 353 (= *Cocos amara*, Jacq.). — occ.

RHYTIDOSOLEN, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 75 = **Arthrosolen**, C. A. Mey.

- (Thymel.).
laxus, Van Tiegh. l. c. 75 = **A. laxus**, C. A. Mey.

RHYZOTOECHIA, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 718.
gracilipes, Radlk. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzengam.* iii. 5 (1895) 347 [Rhizotaechia]. — N. Guin.

RIBES, Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 720.
acerifolium, Howell, in *Erythraea*, iii. (1895) 34. — Am. bor. occ.
Ahrendsii, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 495. — Chili.
amarum, Mac Clatchie, in *Erythraea*, ii. (1894) 79. — Calif.
amictum, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 69. — Calif.
Davianum, Hort. Gall. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 294 = sanguineum, Pursh.
Davidi, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. (1886) 240, t. 7, fig. B = pachysandroides, Oliver.
Georgianum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 730. — Chili.
hesperium, Mac Clatchie, in *Erythraea*, ii. (1894) 79. — Calif.
heterophyllum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 495. — Chili.
heterotrichum, « Holle », in *Bot. Centralbl.* liii. (1893) 218. — Hab. ?
humile, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 304 = alpinum, Linn.
integrifolium, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 494. — Chili.
lacarense, Phil. l. c. 498 et 730 — Chili.
Loudoni, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 295 = Gordonianum, Lem.
longeracemosum, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 240. — Tibet.
Marshallii, Greene, in *West Am. Scient.* iii. (1887) 24; et *Pittonia*, i. (Feb. 1887) 31. — Calif.
Maximowiczii, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 487. — China.
micranthum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 497. — Chili.
moupinense, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. (1886) 240. — China occ.
nebularium, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 498. — Chili.
nubigerum Mac Clatchie, in *Erythraea*, ii. (1894) 80. — Calif.
pachysandroides, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1767. — China.
Palenae, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 497. — Chile.
Palmeri, Vasey et J. N. Rose, in *Proc. U. S. Nat. Mus.* xi. (1888) 529. — Calif.
Pentlandii, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 26. — Bolivia.
sardoum, Martelli, in *Malpighia*, viii. (1895) 384, t. 7. — Sardinia.
serotinum, « Lindb. » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 307 et 743, ad calc. = aureum, Pursh.
Stolpi, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 496. — Chili.
tripartitum, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 488. — China.
Victoris, Greene, *Pittonia*, i. (Oct. 1888) 224; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 125. — Calif.
Watsonianum, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 197. — Washingtn.
Wilsonianum, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 70. — Calif.

RIBESIODES, Linn. Fl. Zeyl. (1747), n. 403 ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 403 = **Embelia**, Burm. f. (Myrsin.).
adnatum, amentaceum, angustifolium, arboreum, canescens, clusiaceum, concinnum, coriaceum, dasythyrsium, floribundum, Gamblei, Gardnerianum, Lampani, longifolium, lucidum, madagascariense, micranthum, Myrtillus, nervosum, mummulariaceum, rutans, oblongifolium, obovatum, ovatum, pacificum, parviflorum, pergamenaceum, philippinense, racemosum, Ribes, robustum, sarmentosum, sessiliflorum, vestitum, villosum, viridiflorum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 403 = homonyma omnia Embelieae.

RIBESIODES : —

australianum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 403 (= *Samarra australiana*, F. Muell.). — Austral.
garciniaefolium, Kuntze, l. c. = E. Ribes. Burm. f. *Jussieu*, Kuntze, l. c. = E. Jussiae, A. DC.
macrophyllum, Kuntze, l. c. = E. coriacea, Wall.
Nasughia, Kuntze, l. c. = E. Nagushia, D. Don.
oblongatum, Kuntze, l. c. = E. coriacea, Wall.
scandens, Kuntze, l. c. = E. javanica, A. DC.
singalense, Kuntze, l. c. = E. singalensis, Scheff.

RICHARDELLA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 19 = **Lucuma**, Molina (Sapot.)

Campechiana, Pierre, l. c. 20 = L. Campechiana, Kunth.
nervosa, Pierre, l. c. = L. nervosa, A. DC.
Rivicoa, Pierre, l. c. 19 = L. Rivicoa, Gaertn. f.
salicifolia, Pierre, l. c. = L. salicifolia, Kunth.
Temare, Pierre, l. c. = L. Temare, Kunth.

RICHARDIA, Kunth (Aroid). — Ind. Kew. ii. 721.

aurata, Hort. ex Mottet, in *Rev. Hort.* lxxvii. (1895) 38. — Form. hort.
Elliotiana, Hort. ex Mottet, l. c. = Afr. bor. ?
Lutwichei, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1893) i. 568. — Afr. trop. austro-or.
Lutwichei, Hort. ex *Rev. Hort.* lxxiii. (1895) 249, sphalm. = praec.
Pentlandii, R. Whyte, ex W. Wats. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 123 et (1894) i. 599; et ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1895) t. 7397. — Afr. austr.
Rehmanni, N. E. Br. ex Krdage, l. c. (1893) ii. 564 et 770, fig. 94 (err. cal. Lehmanni); et in *Gartenfl.* (1894) 12, fig. 7 (= *Zantedeschia Rehmanni*, Engl.) — Transvaal.
Rehmanniana, « Engl. » ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1896) sub t. 7397 sphalm. = praec.
Rhemanni, « Engl. » ex Mottet, in *Rev. Hort.* lxxvii. (1895) 38, sphalm. = R. Rehmanni, N. E. Br.

RICHARDIA, Houst. ex Linn. = **Richardsonia**, Kunth (Rubiace.).

astroites, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 296 = R. astroites, K. Schum.
coldenioides, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 208. — Bolivia
grandiflora, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* iv. (1893) 132 = grandiflora, Cham. & Schlecht.
pedicellata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 296 = Richardsonia p. dicellata, K. Schum.

RICHARDSONIA, Kunth (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 722.

astroites, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1888) 95. — Bras.
pedicellata, K. Schum. l. c. 97. — Bras.

RICHEA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 235 = **RICHAELIA**, Thou. = **Weiheae**, Spreng. (Rhizoph.).

africana, leptoclada, microphylla, ovata, plumosa, zeylanica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 235 = homonyma omnia Weiheae.
Afzelia, Kuntze, l. c. = W. Afzelii, Oliver.
phaeotricha, Kuntze, l. c. = W. phaeotricha, Baill.

RICHEA, R. Br. (Eupacrid.). — Ind. Kew. ii. 722.

gummiflua, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1891) t. 323. — Madag.
lanceolata, Baill. l. c. t. 324. — Madag.
madagascariensis, Baill. l. c. t. 325. — Madag.
microphylla, Baill. l. c. t. 326. — Madag.

RICHETIA, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1892) 975; et *Recherch. Diptéroec.* (1892) 50 = **Balanocarpus**, Bedd. (Dipteroc.).

acuminata, Baill. l. c. 979 = B. acuminatus, Brandis.
coriacea, Heim, l. c. 975. — Borneo.
latifolia, Heim, l. c. 976 = B. latifolia, Brandis.
oblongifolia, Heim, l. c. 979. — Borneo.
penangiana, Heim, l. c. 980 = B. penangianus, King.

RICHTERAGO, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 363 = **Seris**, Less. (Compos.).

amplexifolia, Kuntze, l. c. = S. amplexifolia, Gardn.
discoidea, Kuntze, l. c. = S. discoidea, Less.

RICHTERIA, Kar. & Kir. = **Chrysanthemum**, Tourn. (Compos.).

Leontopodium, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 421. — Turkest.

RICINELLA, Muell. Arg. = **Adelia**, Linn. (Euphorb.).

Vaseyi, Coult. & Fisher, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 351 (= *Euphorbia Vaseyi*, Coult.). — Texas.

RICINOCARPUS, Burm. Thes. Zeyl. (1737) 203/5, t. 93, f. 1 (non t. 92) p. p., ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 615 = **Acalypha**, Linn. (Euphorb.).

accedens, acuminatus, adenostachyus, adenotrichus, alnifolius, amblyodontus, angatensis, angolensis, angustifolius, anisodontus, Arcianus, aristatus, arvensis, australis, Baillonianus, benguelensis, Berteroanus, bipartitus, bisetosus, Boivinianus, boliviensis, Botterianus, brachyandrus, brachycladus, brachystachyus, bracteatus, brasiliensis, brevibracteatus, brevicaulis, brevipes, bullatus, californicus, callosus, cancanus, capillipes, capitatus, carolinianus, carpinifolius, carthaginensis, Caturus, chorisanthus, ciliatus, cinctus, Clausenii, codonoclyx, consimilis, conspicuus, conterminus, crenatus, cuneatus, cuspidatus, deciduus, decumbens, denudatus, depauperatus, dictyonurus, digyneus, digynostachyus, dimorphus, distans, divaricatus, diversifolius, dumetorum, ellipticus, emirnenis, eremorum, erythrostachyus, exaltatus, fallax, fasciculatus, firmulus, Forsterianus, Fournieri, fruticosus, fruticulosus, fuscescens, glabratus, glandulosus, gracilis, grandidentatus, grandis, havanensis, hederaceus, hernandifolius, heterodontus, hispidus, indicus, infestus, insularis, integrifolius, irazuensis, laevifolius, laevigatus, lagoensis, lanceolatus, Langianus, languidus, latifolius, laxiflorus, Lepinei, leptoclada, leptopodus, leptorhachis, Lindenianus, Lindheimeri, Livingstonianus, longepicus, longestipularis, macrodontus, macrostachyus, malabaricus, Mannianus, marginatus, Martianus, melochiaefolius, membranaceus, mexicanus, microcephalus, mollis, monostachyus, multicaulis, nemorum, neocaledonicus, neogranatensis, neomexicanus, nigritianus, obscurus, oliganthus, oligodontus, ornatus, oxyodontus, padifolius, Pancherianus, parvifolius, parvulus, patens, Peckoltii, peduncularis, persimilis, peruvianus, petiolaris, pilosus, platyphyllus, plicatus, Pohlianus, Poirerii, polymorphus, polystachyus, portoricensis, prunifolius, pruriens, psilostachyus, pubiflorus, purpurascens, radians, radicans, reflexus, repandus, rhombifolius, Richardsonianus, Riedelianus, ricularis, Ruizianus, salicifolius, scabrosus, scandens, Schiedeianus, Schlumbergeri, segetalis, seminudus, senensis, senilis, setosus, sidiifolius, Sonderianus, Spachianus, spiciflorus, stipulaceus, strictus, subtomentosus, subvillosus, tarapotensis, tenuifolius, tenuiramus, tenuis, tomentosus, tricholobus, trilobus, unibracteatus, urostachyus, vagans, Vahlmanus, velameus, villicaulis, villosus, virgatus, virginicus, Welwitschianus, zambeziensis, Zeyheri, Zollingeri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 617 = homonyma omnia Acalyphae.

alopeuroidea, Kuntze, l. c. 617 = *Acalypha alopeuroidea*, Jacq.

alternifolius, Kuntze, l. c. = A. Hochstetteriana, Muell. Arg.

anemioides, Kuntze, l. c. = A. anemioides, H. B. & K.

Blancoanus, Kuntze, l. c. = A. glandulosa, Blanco.

chamaedrifolius, Kuntze, l. c. = A. reptans, Sw.

Clausenii, Kuntze, l. c. = A. Clausenii, Baill.

communis, Kuntze, l. c. = A. variabilis, Klotzsch.

costaricensis, Kuntze, l. c. 616. — Costa Rica.

Cunninghamii, Kuntze, l. c. 617 = A. Cunninghamii, Muell. Arg.

Eckloni, Kuntze, l. c. = A. Eckloni, Baill.

Grisebachianus, Kuntze, l. c. 616 = A. macrostachya, Griseb.

Jardini, Kuntze, l. c. 618 = A. Jardini, Muell. Arg.

Liebmannii, Kuntze, l. c. = A. Liebmanniana, Muell. Arg.

macrostachyoides, Kuntze, l. c. = A. macrostachyoides, Jacq.

Mandonii, Kuntze, l. c. = A. Mandoni, Muell. Arg.

ocymoides, Kuntze, l. c. = A. ocymoides, H. B. & K.

philippinensis, Kuntze, l. c. 677 = A. tomentosa, Blanco.

RICINOCARPUS : —

- phleodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 618 = *Acalypha phleoides*, Cav.
reticulatus, Kuntze, l. c. = *A. arborea*, Comm.
roettlerodes, Kuntze, l. c. = *A. roettleroides*, Baill.
samydifolius, Kuntze, l. c. = *A. samydaefolia*, Poepp. & Endl.
Schlechtendallianus, Kuntze, l. c. = *A. Schlechtendalliana*, Muell. Arg.
sidaifolius, Kuntze, l. c. = *A. sidaefolia*, A. Rich.
urticifolius, Kuntze, l. c. = *A. urticaefolia*, Poir.
Weddellianus, Kuntze, l. c. = *A. brasiliensis*, Muell. Arg.
Wilkesianus, Kuntze, l. c. = *A. tricolor*, Seem.

- RICINUS**, [Tourn.] Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 722.
camboagensis, Benary, in Gartenfl. xxxvi. (1887) 102 = *communis*, Linn.
zanzibarensis, Hort. ex Illustr. Hort. xli. (1894) 99, fig. 19 = *communis*, Linn. ?

- RIDANIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = **RIDAN**, Adans. = **Actinomeris**, Nutt. (Compos.).
alba, Kuntze, l. c. = *A. alba*, Torr. & Gray.
alternifolia, Kuntze, l. c. = *A. squarrosa*, Nutt.

- RIDDELLIA**, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 722.
graphalioides, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 628 = *arachnoides*, A. Gray.

- RIDLEYINDA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 65 = **Isoptera**, Burck (Sapct.).
borneensis, Kuntze, l. c. = *I. borneensis*, Burck.

- RIEDELIA**, Meissn. = **Satyria**, Klotzsch (Vac. cin.).
clonantha, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 334 = *S. clonantha*, Klotzsch.
Fendleriana, Kuntze, l. c. nomen. — Venezuela.
panurensis, Kuntze, l. c. = *S. panurensis*, Benth. & Hook. f.
Warszewiczii, Kuntze, l. c. = *S. Warszewiczii*, Klotzsch.

- RIEDLEIA**, Vent. = **Melochia**, Dill. (Stercul.).
argentea, Poepp. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 37 = *M. venosa*, Sw.

- RINDERA**, Pall. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 724.
Bungei, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 106 (= *Mattia Bungei*, Boiss.). — Persia.
caespitosa, Guerke, l. c. = *caespitosa*, Bunge.
lanata, Guerke, l. c. = *lanata*, Bunge.
Schlumbergeri, Guerke, l. c. (= *Mattia Schlumbergeri*, Boiss.). — Syria.

- RINOREA**, Aubl. = **Alsodeia**, Thou. (Violar.).
andina, *angustifolia*, *arborea*, *ardisiaeflora*, *Aucuparia*, *bahiensis*, *bengalensis*, *brachypetala*, *castaneaefolia*, *caudata*, *cauliflora*, *cymulosa*, *dentata*, *elliptica*, *falcata*, *flavescens*, *glabra*, *Gossypium*, *Griffithii*, *guianensis*, *haplobotrys*, *Horneri*, *Horsfieldii*, *ilicifolia*, *javanica*, *lanceolata*, *latifolia*, *Lindeniana*, *macrocarpa*, *Maingayi*, *Maximiliana*, *mollis*, *obtusata*, *paniculata*, *pauciflora*, *physiphora*, *racemosa*, *Roxburghii*, *sessilis*, *Sprucei*, *subintegrifolia*, *ulmifolia*, *Wallichiana*, *Welwitschii*, *zeylanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *homonyma omnia* Alsodeiae.
anguifera, Kuntze, l. c. = *Alsodeia echinocarpa*, Korth.
angustifolia, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 582; Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. angustifolia*, Thou.
arborea, Baill. l. c. 583; Kuntze, l. c. = *A. arborea*, Thou.
ardisiaeflora, Kuntze, l. c. = *A. ardisiiflora*, Welw.
auriculata, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 584 = *A. auriculata*, Tul.
brachypetala, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. brachypetala*, Turcz.
Brownii, Kuntze, l. c. = *A. zeylanica*, Thw.
calophylla, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 138 = *A. calophylla*, Tul.

RINOREA : —

- calycina*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 583 = *Alsodeia calycina*, Tul.
castaneoides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42; Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 36 = *A. castaneoides*, Welw.
cauliflora, Kuntze, l. c. = *A. cauliflora*, Oliver.
dentata, Kuntze, l. c. = *A. dentata*, Beauv.
elliptica, Kuntze, l. c. = *A. elliptica*, Oliver.
Goudotiana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 582; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 134 = *A. Goudotiana*, Baill.
Greveana, Baill. ll. cc. 584; et t. 140. — Madag.
ilicifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *Alsodeia ilicifolia*, Welw.
Kuenstleriana, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 329 = *A. Kuenstleriana*, King.
latifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. latifolia*, Thou.
leucoclada, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 583; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 141 = *A. leucoclada*, Tul.
longipes, Baill. ll. cc. 583; et t. 142 = *A. longipes*, Tul.
maculata, Baill. l. c. 583 = *A. maculata*, Tul.
Maingayi, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 329 = *A. Maingayi*, Hook. f.
monticola, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 583 = *A. monticola*, Tul.
mutica, Baill. l. c. = *A. mutica*, Tul.
Panura, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. guianensis*, Eichl.
pauciflora, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 583; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 137 = *A. pauciflora*, Thou.
pubescens, Baill. l. c. 583 = *A. pubescens*, Tul.
Riana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. prunifolia*, Spreng.
rubra, Baill. l. c.; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 139 = *A. rubra*, Tul.
sileatica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. sylvatica*, Seem.
spinosa, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 583; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 136 = *A. spinosa*, Boiv.
squamosa, Baill. ll. cc. 583; et t. 135 = *A. squamosa*, Boiv.
verticillata, Baill. l. c. 583 = *A. verticillata*, Boiv.
virgata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *Scyphylandra virgata*, Thw.
viridiflora, Baill. l. c. = *Alsodeia viridiflora*, Tul.
Wrayi, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 329 = *A. Wrayi*, King.

- RIOCREUXIA**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 724.

- Burchellii*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 273. — Afr. austr.
Flanaganii, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 13. — Afr. austr.
picta, Schlechter, l. c. 24. — Afr. austr.
polyantha, Schlechter, l. c. xxxiii. (1895) 273. — Afr. austr.
profusa, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 260. — Afr. trop. austro-or.

- RIVEA**, Choisy (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 724.

- abutiloides*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 158, in obs. (*Ipomoea abutiloides*, G. Don). — Ecuad.
adenioides, Hallier f., l. c. 156 (= *I. adenioides*, Schinz). — Afr. austro-occ. extratrop.
argyrophylla, Hallier f., l. c. 157 (= *I. argyrophylla*, Vatke). — Afr. trop.
Bernouilliana, Hallier f., l. c. 158, in obs. (= *I. Bernouilliana*, Peter). — Guatem.
bracteata, Hallier f., l. c. 158, in obs. (= *I. bracteata*, Wight). — Ind. or.
corymbosa, Hallier f., l. c. 157 (= *I. Burmannii*, Choisy). — Am. austr.
decora, Hallier f., l. c. 156 (= *I. Hildebrandtii*, Vatke). — Afr. trop.

RIVEA : —

- Hartmanni, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 156 (= *Ipomoea Hartmannii*, Vatke). — Afr. trop.
kituiensis, Hallier f., l. c. 156 (= *I. kituiensis*, Vatke). — Afr. trop.
Lindenii, Hallier f., l. c. 158, in obs. (= *I. Lindenii*, Mart. & Galeotti). — Mexic.
nana, Hallier f., l. c. 157. — Afr. trop. or.
oenotheroides, Hallier f., l. c. 156 (= *Convolvulus oenotheroides*, Linn. f.). — Afr. austr.
Pringsheimiana, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 334. — Afr. trop. or.
racemosa, Hallier f., l. c. 158, in obs. (= *Exogonium racemosum*, Choisy). — Ind. or.
shirensis, Hallier f., l. c. 157 (= *Ipomoea shirensis*, Oliver). — Afr. trop.
suffruticosa, Hallier f., l. c. 156 (= *I. suffruticosa*, Burch.). — Afr. austr.
Urbaniana, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 334. — Afr. trop. or.

- RIVINA**, Plum. ex Linn. (Phytol.). — Ind. Kew. ii. 724.

- roseoacnea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 557 = *Ledenbergia roseoacnea*, Lem.

- ROBOROWSKIA**, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 91. **PAPAVERACEAE**.
mira, Batalin, l. c. — Kashgaria.

- ROCHFORTIA**, Sw. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 726.

- fasciculata*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 89 (= *Diflostylis fasciculata*, Karst. & Triana). — Columb.

- ROCHELIA**, Roem. & Schult. = **Echinosperrum**, Sw. (Borag.).

- Bungei*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 462. — Turkest.

- ROCHONIA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 726.

- senecionoides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 326. — Madag.

- RODGERSIA**, A. Gray (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 727.

- aesculifolia*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 96. — China.

- pinnata*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 176, in obs. (= *Astilbe pinnata*, Franch.). — China.

- RODIGIA**, Spreng. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 727.

- bulgarica*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 362. — Bulg.
gracilis, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 259. — As. Min.

- RODRIGUEZIA**, Ruiz & Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 727.

- anomala*, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 728, fig. 145. — Bras.

- Bungerothii*, Reichb. f. in Lindenia, iii. (1887) 65, t. 127; et l. c. (1888) i. 264, et (1888) ii. 328. — Venezuela.

- Fuerstenbergii*, Kraenzl. l. c. (1890) ii. 746. — Hab. ?

- inconspicua*, Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 650 (= *Trichocentrum candidum*, Lindl.). — Am. centr.

- Lindenii*, Cogn. in Journ. des Orchid. iii. (1892) 10, fig. 1. — Bras.

- RODRIGUEZIELLA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 649 = **Theodorea**, Barb. Rodr. (Orchid.).

- RODWAYA**, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Dec. 1890) 116 = **Thismia**, Griff. (Burmman.).

- thismiacea*, F. Muell. l. c. = *T. Rodwayi*, F. Muell.

- ROEMERIA**, Medic. (Papav.). — Ind. Kew. ii. 727.

- doecandra*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, li. (1886) 295 = *orientalis*, Boiss.

ROEPERIA, Spreng. = **Ricinocarpos**, Desf. (Euphorb.).

cyaneus, glauca, *ledifolia*, *major*, *marginata*, *muri-cata*, *psiloclada*, *rosmarinifolia*, *speciosa*, *trichophora*, *tuberculata*, *velutina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 618 = *homonymia omnia* Ricinocarpos.

Bowmanii, Kuntze, l. c. = Ricinocarpos Bowmani, F. Muell.

ROEPEROCARIS, Reichb. f. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

alcicornis, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 6 (1892) 105, t. 258, iv. fig. 13-15. — Abyss. *occidentalis*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 67. — Kamerun.

Urbaniana, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 6 (1892) 104, t. 258, iii. fig. 9-12. — Abyss.

ROETTLERA, Vahl = **Chirita**, Don, et **Didymocarpus**, Wall. (Gesnerac.).

bifolia, *brevipes*, *caliginosa*, *calva*, *caerulea*, *dimidiata*, *eburnea*, *fusca*, *glabra*, *Horsfieldii*, *humilis*, *insignis*, *Juliae*, *Kurzii*, *lachenensis*, *macrosiphon*, *monophylla*, *Moonii*, *obtusata*, *primulacea*, *pumila*, *sinensis*, *speciosa*, *spectabilis*, *urticifolia*, *Waltheri*, *Zollingeri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 476-77 = *homonymia omnia* Chiritae.

acuminata, *albicalyx*, *alternifolia*, *amoena*, *Andersonii*, *angustifolia*, *aromatica*, *aurantiaca*, *bancana*, *barbinervia*, *Beccarii*, *bullata*, *cinerea*, *conicapsularis*, *corchorifolia*, *cordata*, *corniculata*, *crinita*, *detergibilis*, *demissa*, *elegans*, *floccosa*, *follicularis*, *gracilipes*, *hamosa*, *Hookeri*, *Humboldtiana*, *lanceolata*, *leptocalyx*, *longipes*, *lyrata*, *macrophylla*, *madagascariensis*, *marginata*, *Minahassae*, *missionis*, *mollis*, *nerveosa*, *oblonga*, *ovalifolia*, *paucinervia*, *pedicellata*, *petiolaris*, *platycalyx*, *platypus*, *podocarpa*, *producta*, *pulchra*, *punctata*, *pundana*, *pygmaea*, *racemosa*, *repens*, *reptans*, *reticulosa*, *rufescens*, *rufipes*, *scabrinervia*, *Schefferi*, *semitorta*, *syrrata*, *teres*, *ternata*, *villosa*, *zeylanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 476-77 = *homonymia omnia* Didymocarpi.

alata, Kuntze, l. c. 476 = Didymocarpus incana, Benth.

anachoreta, Kuntze, l. c. = Chirita anachoretica, Hance.

barbata, Kuntze, l. c. 475 = C. Horsfieldii, R. Br.

brevipes, Kuntze, l. c. 476 = C. brevipes, C. B. Clarke.

capsularis, Kuntze, l. c. = Didymocarpus Blancoi, Hassk.

communis, Kuntze, l. c. — D. zeylanica, R. Br.

grandifolia, Kuntze, l. c. = Chirita macrophylla, Wall.

Josephi, Kuntze, l. c. = C. Hookeri, C. B. Clarke.

Kompsobaea, Kuntze, l. c. = Didymocarpus Koompsobaea, Kuntze, l. c.

limans, Kuntze, l. c. = Chirita Bilabium, C. B. Clarke.

Miquelii, Kuntze, l. c. = C. mollis, Mig.

Mortonii, Kuntze, l. c. = Didymocarpus Mortoni, C. B. Clarke.

oblongifolia, Kuntze, l. c. 475 = Chirita acuminata, R. Br.

Parabaea, Kuntze, l. c. = Didymocarpus Parabaea, C. B. Clarke.

primulifolia, Kuntze, l. c. = D. aromatica, Wall.

verbeniflos, Kuntze, l. c. = D. verbenaeiflos, C. B. Clarke.

violodes, Kuntze, l. c. = D. violoides, C. B. Clarke.

ROEZILIA, regia, Hort ex Éd. André, in Rev. Hortic. lix. (1887) 353; et ex Kew Bull. (1888) 103 = Fourcroya Roetzii, Éd. André.

ROGERIA, J. Gay (Pedalin.). — Ind. Kew. ii. 728.

bigibbosa, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 256. — Afr. austro-occ. extratrop.

Gayi, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 668 (= *Pterodiscus Gayi*, Decne.) — Angola.

ROLANDRA Rottb. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 728.

fruticosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 360 (= *R. fruticosa* Rottb.) = *argentea*, Rottb.

ROLLANDIA, Gaudich. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 728.

grandifolia, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 245. — Ins. Sandvic.

racemosa, Hillebr. l. c. 246 (= *Delissea racemosa*, Mannj.) — Ins. Sandvic.

ROLLINIA, A. St. Hil. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 728.

cordifolia, Szyszyl. in Diss. math.-nat. Acad. litt. Cracov. xxvii. (1894) 140. — Am. austr.

ROMULEA, Maratti (Irid.). — Ind. Kew. ii. 729.

alpina, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 401. — Afr. trop. or.

campanuloides, Harms, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 28. — Afr. trop. or.

Celsii, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 163. — Afr. austr.

citrina, Baker, Handb. Irid. (1892) 100. — Afr. austro-occ. extratrop.

Fischeri, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 150. — Afr. trop. or.

gracillima, Baker, Handb. Irid. (1892) 103. — Afr. austro-occ. extratrop.

monadelpha, Baker, Handb. Irid. (1892) 104. — Afr. austr.

Rouyana, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 390; et Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 38 = R. Linaresii, Parl.

Schlechteriana, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 395. — Afr. austr.

umbellata, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 167 (= *Trichonema umbellatum*, Klatt). — Afr. austr.

RONDELETIA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 729.

hispidula, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 35 (= *Arachnothrix hispidula*, Griseb.). — Ind. occ.

rupicola, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 222. — Bras.

spinosa, K. Schum. ex Loesen. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 620. — Mexic.

RORIPA, Scop. = **Nasturtium**, R. Br. (Crucif.).

americana, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 169 = N. lacustre, A. Gray.

Armoracia, Hitchcock, Spring Fl. Manhattan (1894) 18 = *Cochlearia Armoracia*, Linn.

arvensis, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 194 = *Nasturtium palustre*, DC.

capillipes, X. Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 72 = N. capillipes X, Nym.

curvisiliqua, Bessey, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 169 = N. curvisiliqua, Nutt.

dictyota, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 20. — Calif.

erythrocaule X, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 22 = *Nasturtium erythrocaule* X, Nym.

Gmelini, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 195 = N. amphibium, R. Br.

hispidula, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 169 = N. hispidum, DC.

hungaricum X, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 22 = N. hungaricum X, Nym.

lyrata, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 20 (= N. lyratum, Nutt.) = N. curvisiliqua, Nutt.

microcarpa, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 198 = N. pyrenaicum, R. Br.

Morisoni, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. iii. (1892) 465 (= N. Morisonii, Tausch) = N. sylvestre, R. Br.

Nasturtium, G. Beck, l. c. 463; Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 5 = N. officinale, R. Br.

Neireichii X, G. Beck, l. c. 465. — Austria.

neogradensis X, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 22 = *Nasturtium neogradense* X, Nym.

RORIPA: —

obtusata, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 169 = *Nasturtium obtusum*, Nutt.

palustris, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 20 = N. palustre, DC.

prolifera, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 73 = N. brachycarpum, C. A. Mey.

Reichenbachii, Simonk. l. c. 72 (= N. Reichenbachii, Knaf.) = N. sylvestre, R. Br.

sessiliflora, Hitchcock, Spring Fl. Manhattan (1894) 18 = N. sessiliflorum, Nutt.

sinuata, Hitchcock, l. c. = N. sinuatum, Nutt.

sphaerocarpa, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, vi. (1894) 170 = N. sphaerocarpum, A. Gray.

stenophylla X, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 22 = N. stenophyllum X, Nym.

subglobosa X, Borb. l. c. = N. subglobosum X, Nym.

tanacetifolia, Heller, Contrib. Frankl. Coll. i. (1895) 40 [Bot. Explor. S. Texas] = N. tanacetifolium, Hook.

tenerrima, Greene, in Erythea, iii. (1895) 46. — Calif.

thracica, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. 1894 (1895) 317 = N. thracicum, Griseb.

Turczaninowii X, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 73 = N. Turczaninowii, Czern.

ROSA, Tourn. ex Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 731.

aciphyllolides, Crép. ex Cottet & Castella, Guid. Bot. Cant. Frib. (1891) 114 = canina, Linn.

acutiformis, Oborny, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 5 = canina, Linn.

adenoclada, Hy, in Bull. Herb. Boiss. iii. App. i. (1895) 9 = arvensis, Huds.

affabilis X, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 10. — Austro-Hung.

albida, Kmet, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 16; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 290 = canina, Linn.

algoiensis, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiv. (1895) 62. — Turkest.

almeriensis, Rouy, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 224 = rubiginosa, Linn.

ambigens, Ripart, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 101, nomen = *Dematracana*, Lagg. & Puget.

anachoretica X, Schmidely, in Bull. Soc. Bot. Genève, vii. (1894) 147; Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. (1894) 141. — Sabaud.

aprica, H. Braun, in Oborny, Fl. von Mähren (1886) 894; et in G. Beck & Syzszyl, Pl. Itin. Cern. & Alban. lect. = canina, Linn.

arbuscula X, « Vilmor. » ex Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. ccxxiv. (1895) 59. — Am. bor. ?

aradiensis, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 503 = canina, Linn.

areitiana X, Cornaz, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxviii. (1889) 193, 198. — Helv.

athoensis, Crép. l. c. xxxi. 2 (1892) 49, in obs. = glutinosa, Sibth. & Smith.

barcensis, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 212 = tomentosa, Smith.

Bathyranyorum, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 280 = canina, Linn.

Bernardi, Moutin, in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 547 = rubiginosa, Linn.

Bernetii X, Schmidely, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. (1894) 29, in obs. — Helv.

Beytei, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 284 = agrestis, Savi.

bibracensis X, Sagorski, in Mitth. Thur. Bot. Ver. N. Folge, iii. et iv. (1893) 55. — Eur. centr.

Blochiana, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 72 = canina, Linn.

Borhekiana, J. B. Kell. & Formanek, ex Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn, xxxii. (1894) 199 = agrestis, Savi.

bourgeoisensis, Ozan in Magnier, Scrin. Fl. select. x. (1891) 189 = canina, Linn. ?

brachypetala, Vukot. in Rad Jugos. Acad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 29 = canina, Linn. ?

ROSA: —

- Brachtii*, H. Braun, [in Doerfler, Herb. norm. Sched. ad Cent. xxxvi. 1894], ex Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 462 = *canina*, Linn.
- briacensis*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 23 = *graveolens*, Gren.
- Brueggeri* X, Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1888) 58. — Helv.
- Brunnoniana*, J. B. Keller, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 208, nomen. = *canina*, Linn.
- bulgarica*, Borb. ex H. Wagner, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 38, nomen. — Bulg.
- burmiensis*, Cornaz, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxviii. (1889) 193, 194; et xxxiv. (1895) 104 = *glaucia*, Vill.
- byzantina*, Dieck, ex Hamb. Gärt. und Blum. Zeit. (1888) 561, nomen; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 279 = *damascena*, Mill.
- campicola*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 16 = *canina*, Linn.
- carstigena*, H. Braun, ex G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 97 = *arvensis*, Huds.
- caviniensis* X, Ozan, in Magnier, Scrin. Fl. select. xi. (1892) 246. — Gall.
- cerasifera*, J. Kern, ex H. Braun, in G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 801, in syn. = *canina*, Linn.
- celica*, H. Braun, ex G. Beck, l. c. 815 = *tomentosa*, Smith.
- Christii* X, M. Schulze, in Mitth. Geogr. Ges. Jena, v. (1886) 47; Sagorski, in Deutsche Bot. Monatschr. vii. (1889) 39. — Germ.
- Ciesielskii*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 189 = *canina*, Linn.
- ciliato-sepala*, Blocki, in Bot. Centralbl. xli. (1890) 309 = *canina*, Linn.
- Collettii*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxviii. 2 (1889) 49; et in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 55, t. 9. — Burma.
- congesta*, Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 15 = R. Jundzilli, Bess.?
- Coquebertii*, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 47 = *sicula*, Tratt.?
- corrugata*, Caldesi, in Ces. Passer. & Gibelli, Conspect. Fl. Ital. (1886) 672. — Italia.
- Cramerii* X, Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1888) 59. — Helv.
- cuneata*, Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 132, nomen = *canina*, Linn.
- decalvata*, Crép. ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 112 = *canina*, Linn.
- Degeniana*, Borb. ex H. Wagner, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 38, nomen = *tomentosa*, Sm. [fide cl. Crép. in sched.].
- derelecta*, Burnat & Gremli, Obs. Roses Ital. (1886) 31; et Révis. group. Oriental. (1887) 77 = *Heckeliana*, Tratt.?
- Didieri*, F. Gerard, in Magnier, Scrin. Fl. select. v. (1886) 100 = *flexuosa*, Rau.?
- dimorphocarpa*, Borb. & H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 14 = *canina*, Linn.
- ditrichopoda*, Kmet, ex H. Braun, in A. Kern. l. c. 22 = *canina*, Linn.
- dolata*, H. Braun, in A. Kern. l. c. 9 = *canina*, Linn.
- doljensis* X, Vukot. & Borb. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. (1886) extr. ii. 9, et extr. iii. 4, ex A. Kern. l. c. 4. — Croatia.
- dorica*, H. Braun & Halácsy, ex Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 754 = *canina*, Linn.
- Dufschmidtii*, J. B. Keller & Haselb. Beitr. Rosenfl. Oberoester. (1891) 19 = R. Jundzilli, Bess.
- echinoclada*, Boullu, in Magnier, Scrin. Fl. select. xiii. (1894) 320; Pons & Coste, Herb. Rosar. Fasc. ii. (1895) 14 = *agrestis*, Savi.
- Engelmanni*, S. Wats. in Gard. and For. ii. (1889) 376, fig. 121; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1895) 586 = *acicularis*, Lindl.
- eulanceolata*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 11 = *canina*, Linn.
- fasciculiflora*, Boullu, ex St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1892) 245 = *gallica*, Linn.

ROSA: —

- faventina*, Burn. & Gremli, Obs. Roses d'Ital. (1886) 27 = *tomentilla*, Linn.
- flavidifolia*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 9; et lxxxiii. 8 (1889) 29, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 7 = *canina*, Linn.
- Floriana*, Vukot. l. c. lxxxiii. 8 (1889) 40 = *canina*, Linn.
- florigera*, Bouleill. in Mém. Assoc. Franç. avanc. sci. Paris (1889) 525, nomen = *micrantha*, Smith.
- fossicola* X, Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 9. — Eur. centr.
- fraxinoides*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 9 = *canina*, Linn.
- Friedaldskii*, H. Braun, in A. Kern. l. c. 10 = *glaucia*, Vill.
- fruticulosa* X, Borb. & Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 15. — Eur. centr.
- generalis*, Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 80 = *canina*, Linn.
- gigantea*, Collett, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvii. 2 (1888) 148. et in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 56, t. 10; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1895) 564; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 280. — Ind. or.
- Gisellae*, « Borb. » ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 287 = R. Gisellae, Borb.
- glaberrima*, Rip. ex Boullu, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. (1889) 261 = *canina*, Linn.
- globulifera*, Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 51 = *canina*, Linn.
- Godefroyae*, Carr. in Rev. Hort. lvi. (1886) 261; Cochet, Journ. des Roses, x. (1886) 104 = *moschata*, Herrm.
- gratissima*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 73 = *pisocarpa*, A. Gray.
- Gravetii*, Crép. ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brunn. xxx. (1892) 82 = *glaucia*, Vill.
- Guiccardii*, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 78 = *glutinosa*, Sibth. & Smith.
- Gussenbaueri*, J. B. Keller & Pacher, in Pacher, Nachtr. Fl. Karnt. (1894) 207 = *tomentosa*, Sm.
- gypsicola*, Blocki, in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 246 = *glaucia*, Vill.
- Hedebergae*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 384 = *tomentosa*, Smith.
- Herbichiana*, Blocki, l. c. 419 = *canina*, Linn.
- Herbichii*, H. Braun, in Spraw Kom. fizij. Krakow. xxi. (1888) 43. — Eur. centr.
- Hermannii*, Burnat & Gremli, Observ. Ros. Italie (1887) 30 = *Strobiliana*, Burn. & Gremli.
- hirta*, H. Braun, in Oborny, Fl. von Mähren, ii. (1886) 908 = *canina*, Linn.
- hispidocarpa* X, H. Braun, ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I (1892) 776 et 778. — Austria.
- humensis*, Conrath, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 52 = *pimpinellifolia*, Linn.
- Huteri*, H. Braun, ex G. Beck, Pl. Itin. Cern. et Alban. lect. (1888) 117 = *mollis*, Smith.
- impariserrata*, X, Beyer, in Wiss. Beil. Progr. Andreas Realgymn. (1891), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 177. — Austria.
- incanescens*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1888) 15 = *canina*, Linn.
- intercedens*, H. Braun, in A. Kern. l. c. v. (1888) 6 = *canina*, Linn.
- interjecta*, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 4 = *glutinosa*, Sibth. & Smith.
- Janii*, Burnat & Gremli, Obs. Roses Ital. (1886) 41; et Révis. group. Oriental. (1887) 19, 46 = *micrantha*, Smith.
- javalambrensis*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 25 = *pimpinellifolia*, Linn. var.
- juncta*, Puget, ex H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 12 = *canina*, Linn.
- Karsiana*, Borb. ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 103 = *tomentosa*, Smith.
- Kionae*, H. Braun & Halácsy, ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 752 = *glaucia*, Vill.
- Kmetiana*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 184 = *canina*, Linn.

ROSA: —

- Knappii*, Blocki, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 197 = *canina*, Linn.
- Kokelii*, J. B. Keller & Pacher, in Pacher, Fl. von Kärnten. i. III (1887) 296 = *rubiginosa*, Linn.?
- Kuncii*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Cast. (1887) 277 = *stylcea*, Desv.?
- lagenarioides* X, Ozan, in Magnier, Scrin. Fl. select. x. (1891) 188, xi. (1892) 248. — Helv.
- leopoliensis*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 113, 147, 287 et 269 = *canina*, Linn.
- lexnizensis*, J. B. Keller, in Oborny, Fl. von Mähren, ii. (1886) 929; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. II. (1892) 810 = *micrantha*, Smith.?
- Lichtensteinii*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 117 = *micrantha*, Smith.
- lioclada*, Boullu, in Bull. Soc. Dauph. Sér. II. ii. (1891) 53 = *canina*, Linn.
- littoralis*, Corbière, Nouv. Fl. Normand. (1893) 225 = *tomentosa*, Sm.
- luxemburgiana*, Crép. ex Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 78, in obs. = *canina*, Linn.
- Maasii* X, M. Schulze, in Mitth. Geogr. Ges. Jena, v. 3 (1885) 21. — Germ.
- macrostylis*, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 46 = *canina*, Linn.
- Mallardiana*, Moutin, in Bull. Soc. Dauph. xvi. (1889) 633 = *canina*, Linn.
- massicanensis*, Ozan. & Duffort, in Magnier, Scrin. Fl. select. xi. (1893) 249 = *stylosa*, Desv.
- Maureri* X, M. Schulze, in Mitth. Geogr. Ges. Jena, v. 3 (1885) 21. — Germ.
- Mayeri*, H. Braun, in Oborny, Fl. von Mähren, ii. (1886) 889; et in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1886) 5 = *glaucia*, Vill.
- mészköensis*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 210 = *canina*, Linn.
- micranthiformis*, H. Braun, in Spraw kom. fizij. Krakow. xxi. (1888) 42 = *rubiginosa*, Linn.
- microtypos*, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 9 = *Austria*.
- mirogojana*, H. Braun & Vukot. l. c. = *gallica*, Linn.
- morgana*, Borb. ex H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 311 = *canina*, Linn.
- multiflex*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 292. — Form. hort.
- Mygindi*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 18 = *canina*, Linn.
- myrtyllana*, H. Braun, in Bericht Bot. Ver. Landshut (1889) 112; et in G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I (1892) 798 = *canina*, Linn.
- nerveulosa*, Gandog. & Debeaux, in Magnier, Scrin. Fl. select. v. (1886) 115 = *canina*, Linn.
- nummulifolia* X, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. (1889) extr. 13, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 3. — Hung.
- obversa*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 357 = *agrestis*, Savi.
- oetca* X, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 48. — Graecia.
- oligantha*, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 14. — Austria.
- oligogyna*, Borb. & Vukot. l. c. 14 = *canina*, Linn.?
- oligoseta*, Borb. & Kmet, in Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Cast. (1887-88) 283 = *canina*, Linn.
- olympica*, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 80 = *glutinosa*, Sibth. & Smith.
- Oreadis*, Cottet, in Cottet & Castella, Guid. bot. Cant. Frib. (1891) 119 = *canina*, Linn.
- pallidiflora*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. (1888) 524; et in G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I (1892) 8 = *tomentosa*, Smith.
- Parnassii*, Sibth. ex Burn. & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 72 = *Heckeliana*, Tratt.
- patens*, Kmet, ex H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 16 = *canina*, Linn.
- Penchenati*, Gandog. & Debeaux, in Magnier, Scrin. Fl. select. vii. (1888) 131 = *canina*, Linn.
- percuriosa* X, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 36. — Austria.
- petrophila* X, Borb. & H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 145 = *mollis*, Smith.

ROSA: —

- placidula*, Vukot. & Borb. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 44 = *canina*, Linn.
pliniana, Cornaz, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxviii. 1. (1889) 193; Schmidely, in Bull. Soc. Bot. Genève, vii. (1894) 150 = *montana*, Chaix.
potutica, Woloszczak [Spraw. kom. fizyogr. Krakow. xxv. 1. 1890], ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 140 = *canina*, Linn.
polonica, H. Braun, in Spraw. Kom. fizyogr. Krakow. xxi. (1888) II. 45 = *tomentosa*, Sm.
pratensis, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. (1888) n. 1631; et in G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 786 = *canina*, Linn.
pratensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix (1892) 307 = *macrophylla*, Lindl.
Pseudocaryophyllacea, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 154 = *tomentosa*, Smith.
Pseudoglaberrima, J. B. Keller & Pacher, in Pacher, Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 212 = *canina*, Linn.
Pseudo-glaucina, H. Braun, ex G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 105 = *canina*, Linn.
Pseudo-graveolens, Moutin, ex Boullu, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 277 = *agrestis*, Savt.
Pseudo-rusticana, Crép. ex Rogers, in Journ. Bot. xxvii (1889) 24 = *stylosa*, Desv.
fulchra ×, Beyer, in Wiss. Beil. Progr. Andr. Realgymn. Berl. (1891), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 177. — Austria.
Reissmanni, J. B. Keller & Pacher, in Pacher & Jaborn. Fl. von Kärnten, iii. (1887) 419 = *canina*, Linn.
rhodopetala, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 59 = *canina*, Linn.
rigida, H. Braun, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 5 = *canina*, Linn.
regularis, H. Braun & Borb. in A. Kern. l. c. 13 = *canina*, Linn.
robusta, F. Gérard, in Magnier, Scrin. Fl. select. v. (1886) 100 = *canina*, Linn.
Rocheliana, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 15 = *canina*, Linn.
rorida, Cottet, in Cottet & Castella, Guid. Bot. Cant. Frib. (1891) 125 = *canina*, Linn.
rubiginella, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 24 = *graveolens*, Gren.
rugulosa, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 13 = *damascena*, Mill.
rupicarpa, H. Braun, ex Szyszl. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxvi. (1889) 120 = *canina*, Linn.
sarmatica, H. Braun, in Spraw. Kom. fizij. Krakow. xxvi. (1888) II. 39 = *canina*, Linn.
Sauteri, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 25 = *graveolens*, Gren.
Sauzeana ×, Boullu, in Bull. Soc. Bot. Lyon. (1887) 3, ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 251, et in Bull. Soc. Dauph. Sér. II. ii. (1891) 55. — Gall.
saxillatensis, Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 281 = *canina*, Linn.
schemnitzensis, Kmet, ex H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 17 = *canina*, Linn.
Schleicheri, H. Braun, in G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 773 = *hybrida*, Schleich.
Schlosseri, Vukot. & H. Braun, in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. (1886) extr. 39 = *zalana*, Wiesb.
scopolosa ×, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, vii. (1894) 97. — Gallia.
scotinophylla, Boullu, ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 270 = *canina*, Linn.
sgobricensis, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 28; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 224 = *R. Pouzini*, Tratt.
semibiscrata, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 8 = *canina*, Linn.
seminermis, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 11. — Austria.

ROSA: —

- semiscabra*, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 39 = *zalana*, Wiesb.
semisepium, Borb. & Vukot. l. c. 36 = *agrestis*, Savt.
semisimplex, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1886) 5 = *alpina*, Linn.
semproniana ×, Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1888) 59. — Helv.
Sendneri, H. Braun, ex G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 112 = *tomentosa*, Sm.
sestincensis, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 8. — Austria.
simplex, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1890) sub t. 7119, in syn. = *multiflora*, Thunb.
sonomensis, Greene, Fl. Francisc. (1891) 72; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 118 = *spithamea*, S. Wats.
Soulieana, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiv. 2 (1895) 51, nomen. — China.
stendontia, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1886) 4 = *alpina*, Linn.
Strobliana, Burnat & Greml. Révis. group. Oriental. (1887) 44. — Italia.
subalpina, H. Braun ex Sagorski, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 165; Sagorski & Schneider, Fl. Centralalp. (1891) 153 = *canina*, Linn.
subbiscrata, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castri. (1887) 282 = *canina*, Linn.
subcinnamomea, Borb. ex Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, cxiv. (1895) 62 = *canina*, Linn.
submollis ×, Rouy, in Deyrolle, Le Naturaliste Ser. II. x. (1888) 285. — Hybr. spont.
subtistis ×, Sagorski, in Deutsche Bot. Monatschr. vii. (1889) 98. — Germ.
sudetica, H. Braun, in Spraw. Kom. fizij. Krakow. xxi. (1888) 46 = *tomentosa*, Sm.
superba, Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 132, 283 = *canina*, Linn.
tenella, Boullu, in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 545; et ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 243 = *gallica*, Linn.
thyransis ×, Killias, in Jahresb. Naturh. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 59. — Helv.
Thureti, Burnat & Greml. Suppl. Ros. Alp. Marit. (1882) 12, 78; Obs. Ros. Ital. (1886) 48; et Révis. group. Oriental. (1887) 30 = *glutinosa*, Sibth. & Smith.
thyraica, Blocki, in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 311 = *canina*, Linn.
tonquinensis, Crép. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxv. 2 (1886) 192. — Tonk., China.
trigintipetala, Dieck, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 282. — Form. hort.
Trinacriae, Burnat & Greml. Obs. Ros. Ital. (1887) 30, 45 = *micrantha*, Smith.
twonicensis, Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 73; et in Mém. Acad. sci. et belles lettres Angers., Nouv. sér. i. (1890-91) 89 = *stylosa*, Desv.
Tyniecii, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 311 = *canina*, Linn.
umbellifera, Oborny, Fl. von Mähren, ii. (1886) 235 = *tomentosa*, Smith.
umbelliflora, « Swartz » ex H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v (1888) 28, sphalm. = *umbellifera*, Sw.
Unterhaueri, J. B. Keller & Pacher, in Pacher & Jaborn. Nachr. Fl. Kärnt. (1895) 189 = *canina*, Linn.
variegata, Boullu, in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 545; et ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 2. 8 (1889) 246 = *gallica*, Linn.
Vaulxiana, Moutin, in Bull. Soc. Dauph. xvi. (1889) 634 = *canina*, Linn.
vittata, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 279. — Form. hort.
Watsoniana, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvii. 2 (1888) 96; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1895) 556. — Japon.
Weeberi, J. B. Keller, & Formanek, ex J. B. Keller, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 195 [Hybr. spont.]. — Moravia.

ROSA: —

- Wiegmannii* ×, M. Schulze, ex Sagorski, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 38. — Germ.
Wirtgeni, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 20 = *tomentella*, Linn.
Wittmannii, H. Braun, in Spraw. Kom. fizij. Krakow. xxi. (1888) II. 41 = *canina*, Linn.?
Wormastyniana, Vukot. & Borb. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 12 = *gallica*, Linn.
zashensis, J. B. Keller, ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brunn, xxxii. (1894) = *glutinosa*, Sibth. & Smith.
zoisaana, Oborny & H. Braun, in Oborny, Fl. von Mähren, ii. (1886) 914 = *canina*, Linn.

- ROSCOEIA**, Sm. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 740.
longifolia, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 208. — Simla.
petiolata, Royle, ex Hook. f. l. c. 209, in syn. = *Cautleya petiolata*, Baker [cf. Cur. post.].
tibetica, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 183. — Tibet.

- ROSENBACHIA**, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 613, t. 10; Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 182, in obs. **VERBENACEAE**.
turkestanica, Regel, l. c. — Turkest.

- ROSMARINUS**, [Tourn.] Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 740.
lavandulaceus, Nob. ex Debeaux, in Mém. Assoc. Franç. avanc. sci. Oran (1888) 312. — Afr. bor.

- ROSTKOVIA**, Desv. (Juncac.). — Ind. Kew. ii. 740.
ensiformis, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 396, in syn. = *Juncus prismatocarpus*, R. Br.

- ROOTALA**, Linn. (Lythrar.). — Ind. Kew. ii. 741.
cordifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 478. — Madag.
heteropetala, Koehne, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 149. — Abyss.
Stuhlmannii, Koehne, in Engl. Pflanzenw. Ost. Afr. C (1895) 285. — Afr. trop. or.

- ROTANG**, Adans. = **Calamus**, Linn. (Palm.).
albus, *asperrimus*, *Blancoi*, *caesius*, *Cawa*, *equestris*, *graminosus*, *heteroideus*, *latispinus*, *Manan*, *melanoloma*, *micracanthus*, *ornatus*, *petraeus*, *piscicarpus*, *rhomboideus*, *Royleanus*, *rudentum*, *Scipionum*, *spectabilis*, *verus*, *viminalis*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 299-300 = *homonyma omnia* Calami.
ascendens, Baill. l. c. 300 = *Daemonorops ascendens*, Blume.
barbatus, Baill. l. c. = *D. barbatus*, Mart.
crinitus, Baill. l. c. = *D. crinitus*, Blume.
Linnaei, Baill. l. c. 299 = *Calamus Rotang*, Linn.
longipes, Baill. l. c. 300 = *Daemonorops longipes*, Mig.
maximus, Baill. l. c. = *Plectocomia elongata*, Mart. & Blume.
niger, Baill. l. c. 299 = *Daemonorops niger*, Blume.
palembanicus, Baill. l. c. 300 = *D. palembanicus*, Blume.
periacanthus, Baill. l. c. = *D. periacanthus*, Mig.
scandens, Baill. l. c. 300 = *D. scandens*, Blume.

- ROTANTHA**, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 317. **LYTHRAR(EAE)**.
combretoides, Baker, l. c. t. 41. — Madag.

- ROTHIA**, Lam. = **Hymenopappus**, L'Hérit. (Compos.).
artemisiaefolia, *corymbosa*, *filifolia*, *flavescens*, *mexicana*, *tenuifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 361 = *homonyma omnia* Hymenopappi.

- ROTTBOELLIA**, Linn f. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 741.
acuminata, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 291. — Ind. or.
Azelii, Hack. in DC l. c. 300. — Sierra Leone.

ROTTBOELLIA : —

- caespitosa, *Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii.* (1887) 533. — Madag.
 caudata, *Hack. in DC. Monog. Phan. vi.* (1889) 298. — Angola.
 Clarkei, *Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli.* (1891) 8. — Ind. or.
 divergens, *Hack. in DC. Monog. Phan. vi.* (1889) 292. — As. trop.
 geminata, *Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli.* (1891) 48; *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii.* (1893) 401. — Penins. Mal.
 glauca, *Hack. l. c.* 47. — Belutsh.
 gracillima, *Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii.* (1887) 533. — Madag.
 khasiana, *Munro, ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi.* (1889) 302, in syn. = striata, *Nees*.
 papillosa, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 699 (= *Ophiurus papillosus*, *Hochst.*). — Afr. centr. bor.
 pratensis, *Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv.* (1890) 110. — Tonkin.
 protensa, *Hack. in DC. Monog. Phan. vi.* (1889) 289 (= *Lodularia protensa*, *Nees*). — Ind. or.
 rariflora, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. viii.* (1893) 86. — Austral.
 setifolia, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost. Afr. C* (1895) 96. — Afr. trop. or.
 speciosa, *Hack. in DC. Monog. Phan. vi.* (1889) 282 (= *Ischaemum speciosum*, *Nees*). — Ind. or.
 thyrsoides, *Hack. in DC. l. c.* 284 = *R. Zea, C. B. Clarke*.
Zea, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 86, t. 35. — Ind. or.

ROTTLERA, *Roxb. = Mallotus*, *Lour.* (Euphorb.).
hamosa, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii.* (1894) 1147. — Ind. or., China.

ROTTLERA, *Vahl = Didymocarpus*, *Wall.* (Gesner.).
cortusifolia, *Fritsch, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b* (1894) 148 = *Chirita cortusifolia*, *Hance*.
Kinneari, *Fritsch, l. c.* 147 = *Didymocarpus Kinneari*, *F. Muell.*
Mannii, *Fritsch, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b* (1894) 148 = *Trachystigma Mannii*, *C. B. Clarke*.

ROUBIEVA, *Moq.* (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 743.
microcarpa, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xc.* (1895) 423. — Chili.

ROUCHERIA, *Planch.* (Lineae.). — Ind. Kew. ii. 742.
contestiana, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18* (1893) t. 281. — Cochinch.

ROULINIA, *Decne* (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 743.
racemosa, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 422, in syn.; *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2* (1895) 255 = *R. Jacquinii*, *Decne*.

ROUPALA, *Aubl.* (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 743.
arvensis, *Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 695] Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 67, t. 19 fig. B. — Bras. bor.
consimilis, *Mez, ex Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27* (1890) 11. — Bras.
impressiuscula, *Mez, ex Taub. l. c.* 12. — Bras.
mucronulata, *Mez, ex Taub. l. c.* — Bras.
tristis, *Mez, ex Taub. l. c.* 11. — Bras.
yauaperyensis, *Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 223] Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 66, t. 19 fig. a. — Bras. bor.

ROUREA, *Aubl.* (Connar.). — Ind. Kew. ii. 744.
amazonica, *Radlk. in Sitzb. Math. Phys. Akad. Muench. xvi.* (1886) 375. — Bras.
Bakerana, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi.* (1889) 192. — Bolivia.
camptoneura, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xvi.* (1886) 375. — Bras.

ROUREA : —

- fasciculata, *Gilg, in Bot. Jahrb. xiv.* (1891) 329. — Congo mer.
 gudjuana, *Gilg, l. c.* 323. — Afr. centr. bor.
 Mannii, *Gilg, l. c.* — Afr. trop. occ.
 maxima, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 192 (= *Byrsocarpus maximus*, *Baker*). — Afr. trop.
 monticola, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 92, nomen. — Afr. trop.
 obliquifoliolata, *Gilg, in Bot. Jahrb. xiv.* (1892) 328. — Congo.
 ovalifoliolata, *Gilg, in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 25; et *l. c.* 327. — Zanzib.
 ovatifolia, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 192 (= *Byrsocarpus ovatifolius*, *Baker*). — Afr. trop.
 parviflora, *Gilg, in Bot. Jahrb. xiv.* (1891) 322. — Afr. trop. or.
 patentinervis, *Radlk. in Sitzb. Phys.-Math. Akad. Muench. xvi.* (1886) 375. — Bras.
 Poggeana, *Gilg, in Bot. Jahrb. xiv.* (1891) 326. — Congo.
 pseudobaccata, *Gilg, l. c.* 327. — Afr. trop.
 pubescens, *Radlk. in Sitzb. Phys.-Math. Akad. Muench. xvi.* (1886) 375 (= *Connarus pubescens*, *DC.*) = revoluta, *Planch.*
 Soyauxii, *Gilg, in Bot. Jahrb. xiv.* (1891) 324. — Gabon.
 spadicea, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xvi.* (1886) 372. — Guian.
 splendida, *Gilg, in Bot. Jahrb. xiv.* (1891) 321. — Congo.
 subtriplinervis, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Wiss. Muench. xx.* (1890) 200. — Guian. angl.
 unifoliolata, *Gilg, in Bot. Jahrb. xiv.* (1891) 325. — Congo.
 usaramensis, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 192. — Afr. trop. or.
 viridis, *Gilg, in Bot. Jahrb. xiv.* (1891) 327. — Congo.

ROYDSIA, *Roxb.* (Capparid.). — Ind. Kew. ii. 745.
Scortechinii, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii.* (1889) II. 397. — Penins. Mal.

ROYENA, *Linn.* (Ebenac.). — Ind. Kew. ii. 745.
macrocalyx, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 305 (= *Diospyros macrocalyx*, *Klotzsch*). — Afr. trop.
usambarensis, *Guerke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 34; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 73 = *macrocalyx*, *Guerke*.
Whyteana, *Hiern, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 25. — Afr. trop.

ROYLEA, *Wall.* (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 745.
cinerea, *Baill. Hist. des pl. xi.* (1892) 26 = *elegans*, *Wall.*

RUBIA, [Tourn.] *Linn.* — Ind. Kew. ii. 745.
infundibularis, *Hemsl. & Lace, in Journ. Linn. Soc. xxviii.* (1891) 324. — Ind., Belutch., Afghan.
tetragona, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI.* (1888) 120 (= *Galium tetragonum*, *Griseb.*). — Reg. Argent.

RUBUS [Tourn.] *Linn.* (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 746.
ablutus ×, *G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I.* (1892) 727. — Austria.
acanthophyllus, *Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii.* (1892) 89, in syn. = *R. Guentheri*, *Weihe & Nees*.
acuminatus, *Lindeb. [Herb. Rubor. Scand. n. 38] ex Areschoug, in Bot. Notiser* (1886) 78 = *corylifolius*, *Sm.*
acutidens, *Boulay, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii.* (1895) 405, 415 = *vestitus*, *Weihe & Nees*.
acutifrons, *A. Ley, in Journ. Bot. xxxi.* (1893) 13. — Brit.
acutus, *Lindeb. [Herb. Rubor. Scand. n. 47] ex Areschoug, in Bot. Notiser* (1886) 79 = *corylifolius*, *Sm.*
adenodes, *Dichtl, in Deutsche Bot. Monatsschr. iv.* (1886) 132. — Austria.

RUBUS : —

- adulterinus, *Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii.* (1892) 23. — Reg. Carpat.
 aegaeus, *L. Favrat, in Barbey, Samos* (1892) 41, t. 3. — Ins. Aegea.
 aetneus, *Tornab. Fl. Sicula* (1887) 229 = *australis*, *A. Kern*.
 aetnicus, *Tineo, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I.* (1889) 107 = *tomentosus*, *Borkh.*
 affinoides ×, *Utsch, in Deutsche Bot. Monatsschr. x.* (1892) 2. — Germ.
 airensis, *Schmidely, in Cat. Soc. Helv. éch. pl.* (1885-86) 8; et in *Bull. Soc. Bot. Genève, iv.* (1888) 107 = *macrophyllus*, *Weihe & Nees*.
 albiflorus, *Boul. & Lucante, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii.* (1895) 400, 414 = *macrophyllus*, *Weihe & Nees*.
 allophyllus, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix* (1892) 304. — China occ.
 althaeifolius, *Simonk. ex Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii.* (1892) 174, in syn. = *R. Pseudo-Wahlbergii*, *Sabransky*.
 americanus, *Britton, in Mém. Torrey Bot. Club, v.* (1895) 185 = *triflorus*, *Richards*.
 americanus, *Hort. ex Gard. Chron.* (1887) ii. 99 = *villosus*, *Ait.*
 Ampelopsis ×, *Sabransky & Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii.* (1892) 54. — Reg. Carpat.
 amplus, *Fritsch, ex Huldcsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli.* (1891) 262; *G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I.* (1892) 727. — Austria.
 anglicus, *Sabransky, in Deutsche Bot. Monatsschr. x.* (1892) 74. — Brit.
 anglo-saxonicus, *Gelert, ex K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi.* (1886) 81 & Rés. franç. [16].
E. L. Krause, in Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. I. (1888) 55. — Eur.
 anaticus, *Focke, in Abh. Nat. Ver. Brem. ix.* (1886)
 anonymus ×, *G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I.* (1892) 745. — Austria.
 Antoni, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii.* (1893) 356, nomen. — Hung.
 appenninus, *Evvers, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii.* (1895) 148. — Italia
 appendiculatus, *Bowet, in Bull. Soc. étud. sci. Anger* (1889) 146. — Gall. centr.
 atrichantherus, *E. L. Krause, in Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii.* (1890) 61. — Eur. bor.
 austrolittoralis, *Borb. Enum. pl. Com. Castrif.* (1887-88) 303, in obs. — Croatia.
 Baeumleri, *Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii.* (1892) 21. — Reg. Carpat.
 Baileyanus, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 185 = *villosus*, *Aiton*.
 Bakeri, *F. A. Lees, in Bot. Record Club, Manchester. Rep. 1884-86* (1887) 120 = *nitidus*, *Weihe*.
 balcanus, *Borb. in Termész. Közlemények, xxiv.* (1890) 81. — Eur. or.
 bambusarum, *Focke, in Hook. Icon, pl. xx.* (1891) sub t. 1952. — China.
 Banningii, *Utsch, in Deutsche Bot. Monatsschr. iii.* (1885) 158 = *elegans*, *Utsch*.
 Barthianus, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii.* (1892) 289, nomen. — Hung.
 Bartramii, « *G. Braun* » ex *Oest. Bot. Zeitschr.* (1889) 376, sphalm. = *R. Bertramii*, *G. Braun*.
 Batthyanyanus, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 326. — Hung.
 Baumgartneri, *H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv.* (1895) 322. — Austria.
 Beckii, *Haldcsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli.* (1891) 248. — Austria.
 Benzonianus ×, *E. L. Krause, ex Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii.* (1890) 85. — Eur. bor.
 Berthae, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 308. — Hung.
 Bollae, *Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi.* (1886) 289. — Reg. Carpath.
 Bollei, *Focke, in Abh. naturw. Ver. Brem. ix.* (1889) 405, et xii. (1892) 338, t. 3. — Ins. Canar.
 Borbasii, *H. Braun, in Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 215; et in *Termész. Közlemények, xxiv.* (1890) 105. — Hung.

RUBUS: —

- brachyodon, *Borb.* in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 98. — Ross.
brachythyrus, *Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 362, et xliii. (1893) 361 = *caesius*, *Linn.*
brachytichus, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 412. — *Reg. Carpath.*
Braunii X, *Borb.* in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 97. — *Hung.*
bremontis, *H. L. Krause*, in *Bot. Jahrb.* xvi. Beibl. n. 37 (1893) 3 [sp. collect.]. — *Germ.*
brevipes, *Waisbecker*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 354. — *Hung.*
brevithyrus, *Boulay & Malbr.* [Assoc. Rubol. n. 246] ex *Corbiere*, *Nouv. Fl. Normand.* (1892) 210 = *rudis*, *Weihe & Nees*.
Breyanius, *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I (1892) 729 (= *R. Cafilshii*, *Halácsy*). — *Austria.*
britannicus, *W. M. Rogers*, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 48. — *Brit.*
calophyllus, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 19, t. 7. — *Jakpho* (Ind. or.).
calvatifolius, *Ph. J. Muell.* ex *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. I (1889) 108, nomen = *R. Koehleri*, *Weihe & Nees*.
calvescens, *Bouvet*, in *Bull. Soc. étud. sci. Angers* (1889) 145, 150 [sp. coll.]. — *Gall. centr.*
canariensis, *Focke*, in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* ix. (1889) 405; et xii. (1892) 338, t. 4. — *Ins. Canar.*
cancellatus X, *A. Kern.* ex *Halácsy*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 240; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 75 = *reticulatus*, *A. Kern.*
cardiophorus, *Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 32. — *Hung.*
cardiophyllus, *Borb.* *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 29 et 328 = *praec.*
carinthiacus, *Halácsy*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 354; *Pacher, Nachtr. Fl. Kärntn.* (1894) 222. — *Carinth.*
Caroli, *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I (1892) 738. — *Austria.*
carpaticus, *Borb.* ex *Sabransky*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxv. (1886) 92, et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 83. — *Austria.*
Castrifera, *Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 424, et xlii. (1892) 255. — *Hung.*
centiformis, *K. Frieder.* in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1886) 118 et Rés. franç. [26] (sp. coll.). — *Scand.*
ceticus, *Halácsy*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 244; *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 729 = *villicaulis*, *Koehl.*
chagalensis, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 28. — *Ecuad.*
chaerophyllus, *Sagorshi & W. Schultze*, ex *Sagorshi*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 1. — *Germ.*
chiliadenus, *Focke*, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) sub t. 1952. — *China.*
chinensis, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 207. — *Yunnan.*
chroosepalus, *Focke*, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1952. — *China.*
chloroclados, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 413. — *Reg. Carpath.*
Ciesielskii, *Bloch.* l. c. xxxix. (1889) 189. — *Galicia.*
ciliatus, *Lindeb.* [Herb. Rubor. Scand. n. 50] ex *Areschoug*, in *Bot. Notiser* (1886) 79; *K. Frider. & Gelert*, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1886) 123, et Rés. franç. [38] = *corylifolius*, *Sm.*
cimbricus, *Focke*, in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* ix. (1886) 334; *K. Frider. & Gelert*, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 83; et Rés. Franç. [16]. — *Slesvic.*
cinereus, *Clavaud*, in *Act. Soc. Linn. Eord.* xlii. II. (1888) p. lxi. — *Gall. occ.*
circipanicus X, *E. L. Krause*, ex *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 56. — *Eur. bor.*
cistoides, *Pau, Not. Bot. Pl. Espan.* iii. (1889) 29, nomen. — *Hisp.*
clypeatus, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 90 = *corylifolius*, *Sm.*
Cockburnianus, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 305. — *China, occ.*
coculotinus, *Evers*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1895) 148. — *Italia.*
cognatus, *N. E. Br.* in *English Bot. Suppl.* edit. 3 (1892) 101; et in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 302. — *Brit.*

RUBUS: —

- commixtus, *K. Frider. & Gelert*, in *Bot. Tidsskr.* xvii. (1889) 246, et 330. — *Dania.*
contiguus, *Gelert*, in *K. Frider. & Gelert. [Rub. exsicc. Daniae, Fasc. 1] in Meddel. Bot. Foren Kjöb.* ii. (1887) 35, et 110. — *Dania.*
contiguus, *E. L. Krause*, ex *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 55. [an praec?]. — *Slesv.-Holst.*
Corbierei, *Boulay*, ex *Corbiere*, *Nouv. Fl. Normand.* (1893) 205. — *Gall. occ.*
corylifolius, *Focke*, in *J. D. Smith. Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 19 = *poliophyllus*, *Focke*.
Coronae-Hungariae, *Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 362; et xliii. (1893) 361. — *Croat.*
crassipes, *Collett & Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 68. — *Reg. Afghan.*
crebrisetus, *Boulay & Corbiere*, ex *Corbiere*, *Nouv. Fl. Normand.* (1893) 207 = *R. Koehleri*, *Weihe & Nees*.
cryptacanthus, *Rost.* in *Ber. Deutsche Bot. Ges.* ix. (1891) 120; nomen. — *Europ.*
curvidens, *A. Ley*, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 143. — *Brit.*
cyclophyllus, *Lindeb.* [Herb. Rubor. Scand. n. 48] ex *Areschoug*, in *Bot. Notiser* (1886) 19 = *R. Walbergii*, *Arrhen.*
danicus, *Focke*, in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* ix. (1886) 321; *K. Frider. & Gelert*, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 71, et Rés. Franç. [14] = *macrophyllus*, *Weihe & Nees*.
danubialis, *Borb. & Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 289 (= *R. kodruensis*, *Sabransky*). — *Hung.*
debilis X, *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 742. — *Austria.*
Delavayi, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 205. — *Yunnan.*
Demantii X, *Utsch*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* x. (1892) 4. — *Germ.*
depressus, *Boulay & Diomède*, in *Bull. Soc. sci. Nat. Nimes*, xix. (1891) 78. — *Gall.*
devonicus, *Boulay*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 408, 416 = *obscurus*, *Kall.*
devoniensis, *Focke*, ex *W. M. Rogers*, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 205 = *macrophyllus*, *Weihe & Nees*.
diclinis, *F. Muell.* in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i.* II. (1889) 5. — *N. Guin.*
dictyophyllus, *Oliver*, in *H. Johnston, The Kilim. Exped. Append.* (1886) 340, nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1887) 332. — *Afr. trop.*
ditrichoclados, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887) 292. — *Hung.*
dobrensis X, *Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 205. — *Transsilv.*
dolomiticus X, *Holuby*, ex *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 175. — *Hung.*
domingensis, *Focke*, in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* xi. (1890) 411. — *Ins. S. Doming.*
doryades, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 53, sphalm. = *dryades*, *Sabransky*.
doubravnicensis, *Sabransky*, l. c. xxxix. (1889) 404 = *villicaulis*, *Koehl.*
Dryades, *Sabransky*, [in *Baenitz, Herb. Europ. Lief.* liii. n. 544] 3; et in *Verh. Ver. Natur.-ic. Heillk. Pressb.* 1887], cf. *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 423 = *rotatus*, *Sabransky*.
dumnoniensis, *Bab.* in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 338. — *Angl.*
durescens, *W. R. Linton*, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 70. — *Brit.*
Durotrigum, *R. P. Murray*, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 15. — *Brit.*
echinaceus, *Celak*, in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1891 (1891) i. 46 = *glandulosus*, *Ball.*
Edwardii, *Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 247. — *Bosnia.*
egeniflorus, *Prog.* in *Ber. Bot. Ver. Landshut*, xi. (1889) 136. — *Germ.*
egregiusculus, *K. Frider. & Gelert*, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 121, et Rés. franç. [26] = *centiformis*, *K. Frider. & Gelert*.
elegans X, *Utsch*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* iii. (1885) 158. — *Germ.*
eluxatus, *L. M. Neuman*, in *Bot. Notiser* (1888) 58. — *Scand.*

RUBUS: —

- eremophilus* X, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 23. — *Hung.*
erinaceus, *Schmidely*, in *Bull. Soc. Bot. Genève*, iv. (1888) 158 = *vestitus*, *Weihe & Nees*?
erioclados X, *Borb.* in *Termész. Közlemények* xxiv. (1890) 93. — *Hung.*
Ernesti Bolli, *E. L. Krause*, ex *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlsv.-Holst.* ii. (1890) 51. — *Slesv.-Holst.*
erythrandrus, *Borb. & Halácsy*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 289 (= *R. purpureus*, *Holuby*) = *thyrsoides*, *Wimm.*
erythrostachys, *Sabransky*, ex *Halácsy*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 278; *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I (1892) 743 = *R. Guentheri*, *Weihe & Nees*.
Eugeni X, *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I (1892) 746. — *Austria.*
eurythyrus, *Sabransky & H. Braun*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 82 = *vindobonensis*, *Sabransky*.
extensus, *Schube*, ex *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 212. — *Ins. Fernando Po.*
extensus, *Zahlbr.* in *Diss. Cl. Math.-Phys. Acad. lit. Cracov.* xxix (1894) 221. — *Peruvia.*
Fabryi, *A. Richt.* in *Termész. Füzet.* xii I (1889) 4, t. 1; et in *Bot. Centralbl.* xxxviii. (1889) 817; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 376. — *Hung.*
Fargesii, *Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 267. — *China occ.*
fasciatus, *Harmand*, in *Lucante, Rev. de Bot.* vi. (1887-88) 326 = *R. Radula*, *Weihe*.
Favrati, *Schmidely*, in *Bull. Soc. Bot. Genève*, iv. (1888) 145. — *Gall. or.*
Ferdinandi Muellieri, *Focke*, in *Abh. naturw. Ver. Brem.* xiii. (1895) 165. — *N. Guin.*
Fioniae, *K. Frider.* [Rub. exsicc. Daniae, n. 28] ex *Areschoug*, in *Bot. Notiser* (1886) 81; *K. Frider. & Gelert*, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 115, et Rés. franç. [26]; *E. L. Krause*, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* i. (1888) 52. — *Eur. bor.*
flandricus, *Boulay & de Lesd* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 407, 416 = *R. Koehleri*, *Weihe & Nees*.
flensburgensis, *K. Frider.* in *Lange, Handb. Danske Fl.* ed. 4 (1888) 787; *E. L. Krause*, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 76. — *Dania.*
florulentus, *Focke*, in *Abh. naturw. Ver. Brem.* xi. (1890) 411. — *Ins. Portor.*
flosculosus, *Focke*, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) sub t. 1952. — *China.*
foliolatus, *Halácsy*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 208; *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 738. — *Austria.*
foliosus, *Halácsy*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 265 = *foliolatus*, *Halácsy*.
Formanckii X, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 404. — *Moravia.*
Friderichsenii, *Lange, Haandb. Danske Fl.* ed. 4 (1886-88) 794. — *Dania.*
Friesii, *G. Jensen*, ex *K. Frider. & Gelert*, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 112, et Rés. franç. [23] = *nemorosus*, *Hayne*.
fusciculatus, *Halácsy*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 252. — *Austria.*
Gelertii, *K. Frider.* in *Bot. Tidsskr.* xv. (1886) 237 [Gelerti]; et xvi. (1888) 80 et 16; *Lange, Haandb. Danske Fl.* ed. 4 (1886-88) 775 [Gelertii]. — *Eur. bor.*
genensis, *Schmidely*, in *Bull. Soc. Bot. Genève*, iv. (1888) 76 = *thyrsoides*, *Wimm.*
Gillottii, *Boulay*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 415 = *hedycarpus*, *Focke*.
ginsiensis, *Waisbecker*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 355. — *Hung.*
Gizellae, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 327; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 147. — *Hung.*
glaber, *Cordem.* *Fl. Ile Réunion* (1895) 407. — *Ins. Borbon.*
glanduloso-setosifolius, *Sagorshi*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 2. — *Eur. centr.*
glottocalyx, *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 739. — *Austria.*
Goetzenii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A. (1895) 134. — *Afr. trop.*

RUBUS: —

- Göncyanus, Borb. in Termész. Közlemények, xxiv. (1890) 74; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 147. — Hung.
- gothicus, K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 134, et Rés. franç. [28]. — Dania.
- graniticus, Halácsy, ex Topitz, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 202. — Austria.
- graniticus, Sabransky, l. c. 20. — Hung.
- Graveli, Boulay, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 408, 416 = obscurus, Kalt.
- greinensis, Halácsy, ex Topitz, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 202. — Austria.
- Gremblighii, Halácsy, l. c. xl. (1890) 433. — Austria.
- Grossbaueri, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. (1892) 731, [Hybr. spont. ?]. — Austria.
- hallandicus, L. M. Neuman, in Bot. Notiser (1888) 52 = corylifolius, Sm.
- hamatus, Harmand, in Lucante, Rev. de Bot. vi. (1887-88) 326 [Hybr. spont. ?]. — Gall.
- Hansenii, E. L. Krause, in Prah. Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst. i. (1890) 60. — Eur. bor.
- Haynaldianus, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 298. — Hung.
- hemimacrophyllus X. E. L. Krause, ex Prah. Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst. ii. (1890) 84. — Eur. bor.
- Hemithyrsoides X, E. L. Krause, l. c. 82. — Eur. bor.
- hennebergensis, Sagorski, in Deutsche Bot. Monatschr. v. (1887) 82. — Germ.
- Henrici X, Fritsch, ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 727. — Austria.
- Henryi, Hemsl. & Kuntze, in Journ. Linn. Soc. xxxiii. (1887) 231; et in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1705. — China centr.
- herbaceus, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 29, nomen. — Hisp.
- Hirtiformis, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 297, 327 = R. Castriferrei, Borb. holerythros, Focke, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 47. — Brit.
- Holubyanus, Sabransky, ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 207 = oreogeton, Focke.
- Holubyanus, Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 207. — Moravia.
- huillensis, Welw. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A. (1895) 104, et B. 188. — Afr. trop.
- Hunfalvyanorum, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 290. — Hung.
- hupehensis, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1816. — China.
- ichangensis, Hemsl. & Kuntze, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1887) 231. — China.
- imitabilis, K. Frider. [Rub. exsicc. Daniae, Fasc. 1] ex Areschoug, in Bot. Notiser (1886) 81; et ex Meddel. Bot. Foren. Kjöb. i. (1886) 214; K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 111, et Rés. franç. [23] = R. Friesii, Jensen.
- inermis, Halácsy, ex Topitz, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 204. — Austria.
- insidiosus, Progel, ex Sabransky, in Deutsche Bot. Monatschr. viii. (1890) 9. — Germ.
- invisus, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 115; et in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 279 = villosus, Ait.
- irroratus, Progel, ex Sabransky, in Deutsche Bot. Monatschr. viii. (1890) 6. — Eur. or.
- Jelskii, Zahlbr. in Diss. Cl. Math.-Phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 220. — Peruvia.
- Joannis, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 736. — Austria.
- Juranyanus, Borb. in Termész. Közlemények, xxiv. (1890) 96. — Hung.
- Kampmannii, Schmidely, in Bull. Soc. Bot. Genève, iv. (1888) 76. = thyrsoides, Wimm.
- Karsterianus, Borb. in Bot. Centralbl. li. (1892) 236, nomen. — Croatia.
- Karstianus, Borb. in Termész. Közlemények, xxvi. (1892) 271, ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 429. — Hung.
- Kelleri, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 431; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 725. — Austria.

RUBUS: —

- Kernerii, Borb. in Termész. Közlemények, xxiv. (1890) 74; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 147. — Hung.
- Khekii, Holuby, in Deutsche bot. Monatsschr. ix. (1891) 113. — Reg. Carpath.
- kodruensis X, Simonk. in Termész. Füzet, xii. 1889 (1890) 160. — Hung.
- köfultianus, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 303, 329. — Hung.
- kuebensis, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 733. [Hybr. spont. ?]. — Austria.
- Kuntzeanus, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxxiii. (1887) 232. — China.
- Lagerbergii, Lindeb. [Herb. Rubor. Scand. n. 40], ex Areschoug, in Bot. Notiser (1886) 78; K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xv. (1886) 121 = corylifolius, Sm.
- lamproleucus X, Borb. & Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 284; G. Beck, Fl. Nied. Oest. ii. i. (1893) 1328. — Austria.
- lanceolatus, Waisbecker, Pl. vascul. de Köszeg, éd. 2 (1891) 61; Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 289. — Hung.
- lasiaxon, Borb. & Waisbecker, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1893) 361, et xlv. (1895) 145. — Hung.
- lasiostylus, Focke, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1951; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7426. — China.
- latifrons, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, xi. (1889) 135; et in Ber. Deutsch Bot. Ges. viii. (1890) [140] = irrufatus, P. J. Muell.
- Lejolisii, Corbière, Nouv. Fl. Normand. (1893) 209 = scaber, Weihe & Nees.
- Leyanus, W. M. Rogers, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 375, in obs., et xxxiii. (1895) 81. — Brit.
- Lidforssii, Gelert, in Meddel. bot. Foren. Kjöb. ii. (1891) 193; et in Bot. Notiser (1891) 175. — Scand., Dania.
- Lintoni, Focke, in Journ. Bot. xxv. (1887) 82. — Brit.
- Lippaianus, Borb. & Holuby, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 424 (= R. coriaceus, Holuby). — Hung.
- littoralis, Borb. ex Formanek, l. c. xxxvii. (1887) 206 (= R. macrogynius, Borb.) = oreogeton, Focke.
- longicuspispidatus, Boulay & Lucante, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 400, 411. — Gall.
- longiramulus, Sabransky, ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 70. — Moravia.
- longistylis, Borb. in Magy. orv. Munk. xxv. (1890) 501, ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 183 = hirtus, Waldst. & Kit.
- loppiensis X, Evers, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 148. — Italia.
- loropetalus, Franch. Pl. Delav. (1890) 203. — Yunnan.
- Lowii, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2288. — Borneo.
- lucens, F. Linton, in Journ. Bot. xxv. (1887) 82. — Brit.
- lusaticus, R. Wagner, in Wiss. Beil. z. 10 Jahresb. Realsch. Löbau f. Ostern (1886), ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. v. (1887) 94. — Germ. bor.
- lusitanicus, R. P. Murray, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 189. — Lusit.
- lutescens, Franch. Pl. Delav. (1890) 206. — Yunnan.
- Macgregorii, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 4. — N. Guin.
- macrocalyx, Borb. in Termész. Közlemények, xxiv. (1890) 93 [an seq. ?]. — Tirol.
- macrocalyx, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 433; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 737. — Austria.
- macroclados, Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 92. — Reg. Carpath.
- macrostemonides X, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 780; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. (1892) 742. — Austria.
- Malgrangianus, Harmand, in Lucante, Rev. de Bot. vi. (1887-88) 334 = rhamnifolius, Weihe & Nees.

RUBUS: —

- malacophyllus, Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 82, in syn. = R. Guentheri, Weihe & Nees.
- malifolius, Focke, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1947. — China.
- Mandersii, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxxviii. (1890) 68. — Reg. Afghan.
- Marshalli, W. M. Rogers, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 374, in obs. = R. Koehleri, Weihe & Nees.
- medioximus X, Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 379. — Hung.
- melanodermis, Focke, in Journ. Bot. xxx. (1890) 133 et xxxii. (1892) 302. — Brit.
- melanoxylon, Bab. in Journ. Bot. xxxii. (1887) 21, 22 = melanodermis, Focke.
- mercicus, E. Bagnall, in Journ. Bot. xxxii. (1892) 374. — Brit.
- microstemon, Celak. Result. d. bot. Durchforschung Böhm. im Jahre 1888 (1889) = glandulosus, Bell.
- milliformis, K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1886) 100, 103, 108 [sp. coll.]. — Eur.
- Millspaughii, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 366. — Virginia.
- minutispinosus, Rost. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. ix. (1891) 120 (= R. micracanthus, Rost.). — Germ.
- mollicellus X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 734. — Austria.
- mollissimus, W. M. Rogers, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 45. — Brit.
- monachus, G. Jensen, ex K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 88, et Rés. franç. [17] = vestitus, Weihe & Nees.
- montanus, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 15, et xxi. (1894) 120. — Am. bor.-or.
- moravicus, Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 405. — Moravia.
- Mortensenii, K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 120, 123, et Rés. franç. [26] = centiformis, K. Frider. & Gelert.
- mucronatus, Lange, Handb. Fl. Dan. ed. 4 (1888) 785 = atrichanthus, E. L. Krause.
- muricatus, Boulay & Gillot, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 406, 416 = R. Menkei, Weihe & Nees.
- Murrii, Fritsch, ex J. Murr. in Progr. Ober-Realsch. in Innsbr. (1890-91), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 280. — Tirol.
- nacophyllus X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 731. — Austria.
- nadasensis X, Simonk. in Termész. Füzet, xii. 1889 (1890) 160. — Austro-Hung.
- nanus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 162. — Ins. Adscens.
- Neumani, Focke, ex K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 79, et Rés. franç. [16]. — Slesv.
- Newbouldi, Bab. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 21. — Brit.
- nigroviridis, Sabransky, in Verh. Ver. Naturh. Pressb. N. Folge, Heft 7 (1890) 1-15; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 247; et xlii. (1892) 22. — Hung.
- nitens, Sagorski, in Deutsche Bot. Monatsschr. v. (1887) 84. — Germ.
- Obornyanus, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 260, in obs.; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. ii. (1892) 736. — Austria.
- obovatus, G. Braun, ex Areschoug, in Bot. Centralbl. xxxvii. (1889) 268. — Germ.
- obtusidens, Boulay & Diomède, ex Cabanes, in Bull. Soc. Nat. Nîmes, xix. (1891) 77, nomen. — Gall.
- ochrodermis, A. Ley, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 15. — Brit.
- orthosepalus, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 243. — Austria.
- otophorus, Franch. Pl. Delav. (1890) 205. — Yunnan.
- pachyphyllus, Borb. [Fl. Comit. Temesv. 76] Geogr. atq. Enum. Pl. Comit. Castrif. (1887-88) 305, in obs. — Austro-Hung.
- pajalensis X, Samz. in Bot. Notiser (1890) 184. — Scand.

RUBUS: —

- pallidifolius*, E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 78. — Schlesw.-Holst.
- papyracus* ×, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 376. — Reg. Carpath.
- paramethystinus*, Borb. ex *Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxii. (1894) — Maced.
- pauciflorus*, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 12 = *tectiflorus*, Halácsy.
- peracanthus*, Borb. & Waisbecker, l. c. xliii. (1893) 356. — Hung.
- perdurus*, Holuby & Borbas, ex *Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 21, in obs. (= *R. durus*, Holuby). — Hung.
- peruvianus*, Fritsch, in *Diss. Cl. Math.-Phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 220. — Peruv.
- pileatus*, Focke, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) sub t. 1952. — China.
- piliferus*, Sagorski, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* v. (1887) 81. — Germ.
- pillisiensis* ×, Borb. in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 94. — Hung.
- pinnatisepalus*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 305. — China occ.
- pinetorum*, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 285, in obs. = *pseudopsis*, Gremli.
- Playfairii*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 235. — China.
- platyacanthus*, Utsch. in *Deutsche Bot. Monatsschr.* x. (1892) 3. — Germ.
- plusiacanthus*, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 289 (= *R. polyacanthus*, Gremli). — Hung.
- podocarpus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 223. — Java.
- poliophyllus*, Focke, ex *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 202; et *Enum. Pl. Guatem.* iii. (1893) 23. — Guatem.
- polytrichus*, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 203. — Yunnan.
- polytrichus*, A. Kern. ex Borb. in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 105. — Hung.
- Pomeli*, Batt. ex Focke, in *Abh. naturw. Ver. Brem.* xi. (1892) 338, 339. — Algeria.
- populifolius*, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 56 = *brachyandrus*, Gremli.
- Porcii*, Borb. in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1891) 92. — Hung.
- porphyropetalus*, Borb. & Waisbecker, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1893) 319. — Hung.
- posoniensis*, Sabransky, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* iv. (1886) 5; et in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvi. (1886) 90. — Reg. Carpath.
- Powellii*, W. M. Rogers, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 47. — Brit.
- Prahlui* ×, K. Frider. & Gelert, ex E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 78. — Slesv.-Holst.
- Preissmanni*, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 273. — Stiria.
- prizakensis* ×, Simonk. in *Termész. Füzet.* xii. 1889 (1890) 161. — Hung.
- Progelii*, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 57. — Hung.
- propexus*, K. Frider. in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 236, et Rés. franç. [31]. — Slesvig.
- Pseudo-acer*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 53. — Japon.
- Pseudomelanoxylon* ×, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 246; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. i. (1892) 730. — Austria.
- Pseudoseriatus*, Progel, ex *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* iv. (1886) p. 188. — Bavaria.
- Pseudo-venustus*, Schmidely, in *Bull. Soc. Bot. Genève*, iv. (1888) 38, 173. — Sabaud.
- Pseudo-Wahlbergii*, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 174 (= *R. Wahlbergii*, Sabransky). — Reg. Carpath.
- pubifrons*, Sabransky, l. c. xli. (1891) 411. — Eur. or.
- Purchasianus*, W. M. Rogers, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 374, in obs. — Brit.
- pyracanthus*, Lange, ex K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 108 et Rés. franç. [22] = *milliformis*, K. Frider. & Gelert.

RUBUS: —

- quadricus*, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. i. (1892) 726 (= *R. macrophyllus* Weihe, subsp. *quadricus* Sabransky) = *macrophyllus*, Weihe.
- quartocostatus* ×, E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 88. — Slesv.-Holst.
- Radoi*, Borb. *Geogr. atq. Enum. pl. Com. Castrif.* (1887-88) 215; et in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 96. — Hung.
- reflexicalyx*, Boulay & Lefèvre, [*Assoc. Rubol.* n. 206] ex *Corbière, Nouv. Fl. Normand.* (1893) 212. — Gall. occ.
- relaius*, F. Areschoug, *Obs. Gen. Rubus* (1886) 156; et in *Bot. Notiser* (1888) 1 = *affinis*, Weihe & Nees.
- renifrons*, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 55 = *brachyandrus*, Gremli.
- repens*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 223 = *R. Dalibarda*, Linn.
- retinervis*, Borb. in *Termész. Közlemények* (1892) 271, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 362, et xliii. (1893) 361. — Hung.
- Richterii*, Halácsy, l. c. xl. (1890) 434; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 740. — Austria.
- rigidulus*, Schmidely, in *Bull. Soc. Bot. Genève*, iii. (1884) 80, 175 (= *R. rigidus*, E. Merc.). — Eur.
- Rogersii*, F. Linton, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 214. — Brit.
- rosanthus*, Lindeb. [*Herb. Rubor. Scand.* n. 41-42] ex Areschoug, in *Bot. Notiser* (1886) 78 = *corylifolius*, Sm.
- rothomagensis*, Boulay, ex *Corbière, Nouv. Fl. Normand.* (1893) 197 = *R. Sprengelii*, Weihe & Nees.
- rubicundus*, W. H. Purchas, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 130. — Brit.
- rubrisetus*, Borb. *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 329. — Hung.
- rugicus* ×, E. L. Krause, ex *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 55. — Eur. bor.
- runssorensis*, Engl. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 190. — Afr. or.
- Rusbyi*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 10. — Bolivia.
- russatus*, Schwarzer, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 423 = *glandulosus*, Bell.
- sabatinus*, Evers, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1895) 37, 149 = *ulmifolius*, Schott f.
- sabinus*, Evers, l. c. 148. — Italia.
- Sabranskyi*, Borb. ex *Sabransky, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvi. (1886) 94; et *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 295. — Hung.
- Sanioi*, Borb. in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 95. — Boruss.
- scepusiensis*, Sagorski in *Sagorski & Schneider, Fl. Centralkarp.* ii. (1891) 140 (= *R. glandulosus*, Wahlenb.). — Reg. Carpat.
- Scheutzi*, Lindeb. [*Herb. Rub. Scand.* i. n. 32] ex Areschoug, in *Bot. Notiser* (1886) 38 = *rhamnifolius*, Weihe & Nees.
- Schmidelyi*, Aug. Favrat, in *Bull. Soc. Vaud. sci. nat.* xxv. (1889) 53. — Helv.
- scotophilus*, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 260. — Austria.
- scrupus* ×, Prog. in *Ber. Bot. Ver. Landshut.* xi. (1889) 129; Sabransky, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* viii. (1890) 6. — Germ.
- sebesensis* ×, Simonk. in *Termész. Füzet.* xii. 1889 (1889) 161. — Hung.
- segobricensis*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 29, nomen. — Hisp.
- selectus*, K. Frider. ex E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* i. (1888) 52. — Eur. bor.
- Selmeri*, Lindeb. [*Herb. Rub. Scand.* i. n. 33] ex Areschoug, in *Bot. Notiser* (1886) 76 = *villicaulis*, Koehl.
- semibifrons* ×, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 175. — Reg. Carpath.
- semicaesius*, E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 88. — Eur. bor.
- semicandicans*, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 289 (= *R. Laschii*, Borb.). — Hung.

RUBUS: —

- semicimbrius* ×, E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 82. — Eur. bor.
- semicinereus*, Borb. ex *Sabransky, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvi. (1886) 96, in obs.; et *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 305 = *corylifolius*, Sm.
- semidiscolor* ×, Sabransky, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* (1888) 106; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 173. — Reg. Carpath.
- semidrejerianus*, E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 88. — Slesv.-Holst.
- semigregius* ×, E. L. Krause, l. c. 82. — Eur. bor.
- semigrabowskianus* ×, E. L. Krause, l. c. — Eur. bor.
- semifissus*, E. L. Krause, l. c. 81. — Eur. bor.
- semigratus* ×, E. L. Krause, l. c. 84. — Eur. bor.
- semipallidus* ×, E. L. Krause, l. c. 85. — Eur. bor.
- semiplicatus* ×, E. H. L. Krause, l. c. 82; et in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* xii. (1891) 156. — Eur. bor.
- semipyramidalis* ×, E. L. Krause, l. c. 85. — Eur. bor.
- semiradula* ×, E. H. L. Krause, l. c. 84; et in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* xi. (1891) 156. — Eur. bor.
- semisilvaticus* ×, E. L. Krause, l. c. — Eur. bor.
- semispengelianus* ×, E. L. Krause, l. c. 82. — Eur. bor.
- semisubrectus* ×, E. L. Krause, l. c. 81. — Eur. bor.
- semitomentosus*, Borb. [*Fl. Comit. Temesv.* 76] *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 304. — Hung.
- semivestitus* ×, E. L. Krause, ex *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 85. — Eur. bor.
- semivillicaulis*, E. L. Krause, l. c. 83. — Eur. bor.
- septimus* ×, E. L. Krause, l. c. 51. — Eur. bor.
- serpentinus*, Th. Dur. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxvi. 1887 (1889) 364 = *nemosus*, Hayne.
- serridens*, Boulay & Diomède, ex *Cabanis, in Bull. Soc. sci. nat. Nîmes*, xix. (1891) 77, nomen. — Gall.
- serrulatus*, Lindeb. [*Herb. Rub. Scand.* n. 46] ex Areschoug, in *Bot. Notiser* (1886) 79; et ex K. Frider. & Gelert, in *Bot. Notiser* (1886) 79; et ex K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1886) 126 = *corylifolius*, Sm.
- setchuenensis*, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 46. — China occ.
- sextus*, E. H. L. Krause, in *Ber. deutsch. bot. Ges.* iv. (1886) 80, 82 = *subrectus*, Anders.
- Silvae-Candidae*, Evers, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1895) 74 et 150 = *ulmifolius*, Schott f.
- similatus*, K. Frider. ex K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1883) 121, et Rés. franç. [27] = *centiformis*, K. Frider. & Gelert.
- simplex*, Focke, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1948. — China.
- Sommieri*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 245 = *Raddeanus*, Focke.
- sozostylus*, Focke, in *Hook. Icon. pl.* xx (1891) sub t. 1952. — China.
- spinipes*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 306. — China occ.
- spinulatus*, Boulay, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 406, 416, in obs. = *R. Menkei*, Weihe & Nees.
- Spitzneri*, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 436. — Moravia.
- spurius* ×, Halácsy & H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 232; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 724. — Austria.
- squarrosus*, Fritsch, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 259; et in *Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien*, xcv. (1887) 191-94, 205 = *australis*, A. Kern.
- stelliger*, Boulay, in *Bull. Soc. sci. nat. Nîmes*, xix. (1891) 77. — Gall.
- stellulatus* ×, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 727. — Austria.
- stenocarpus*, Steud. [*in Schimp. Pl. Abyss.* ii. n. 985] ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 220, in syn. = *tembensis*, Fresen.
- stenothyrsanthus*, Borb. ex *Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 105 [*stenothyrsantus*] et 383. — Bosnia.
- strictus*, Boulay & Diomède, ex *Cabanis, in Bull. Soc. sci. nat. Nîmes*, xix. (1891) 77, nomen. — Gall.

RUBUS: —

- styriacus, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1890) 432; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 729. — Austria.
- subcanus, Boulay, [Assoc. Rubol. n. 905] ex Corbière, Nouv. Fl. Normand. (1893) 208. — Gall. occ.
- sublensis, Boulay & Diomède, in Bull. Soc. sci. nat. Nîmes, xix. (18 1) 78. — Gall.
- subreticulatus, Borb. & Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 54. — Hung.
- subrudis, Harmand, in Lucante, Rev. de Bot. vi. (1887-88) 325 [Hybr. spont. ?]. — Lotharingia.
- subsenilis, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 12. sphalm. = seq.
- subsessilis, Halácsy, l. c. xli. (1891) 12 [subsenilis]; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 282; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 705. — Austria.
- subvestitus, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 328. — Austro-Hung.
- superbus, Focke, ex f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 201; et Enum. Pl. Guatem. ii. (1893) 24. — Guatem.
- Szaboi, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 288; Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 376. — Austro-Hung.
- taeniarum, Lindeb. [Herb. Rubor. Scand. n. 191] ex Areschoug, in Bot. Notiser (1886) 37 = infestus, Weihe.
- tectiflorus, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 207; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 742. — Austria.
- thibetanus, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 221. — Tibet.
- thyrsiger, Bab. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 227. — Brit.
- Topitzii, Halácsy, ex Topitz, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 203. — Austria.
- trichomorus, Borb. & Waisbecker, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 357. — Hung.
- trichopus, Boulay, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 409 et 416. — Gall.
- trichothamnus, Dichtl, in Deutsche Bot. Monatsschr. iv. (1886) 131; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 730. — Austria.
- trichothecus, Waisbecker, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 354. — Hung.
- tridentinus, X, Evers, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 148. — Eur. centr.
- trigenius, X, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 25. — Austria.
- trivialis, Bouvet, in Bull. Soc. étud. sci. Angers (1889) 147, 166 [sp. coll.]; — Gall. centr.
- uncinatus, K. Frider. ex K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 25, in syn. = R. Wahlenbergii, Arrhen.
- undulatus, G. Jensen, ex Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 4 (1886-88) 800, in syn. = corylifolius, Sm.
- valentinus, Evers, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 148. — Italia.
- valentinus, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1888) 11; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 226. — Hisp.
- valligenus, Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 90. — Reg. Carpath.
- vestitifolius, Fritsch, ex Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 252. — Austria.
- viburnifolius, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 63. — Yunnan.
- vindobonensis, Sabransky, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 131; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 741. — Austria.
- vinodorus, Sabransky, l. c. viii. (1890) 6 = R. Guentheri, Weihe & Nees.
- Volkensii, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 30. — Afr. trop. or.
- Vrabelyanus, A. Kern, ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 207 [Hybr. spont. ?]. — Hung.
- Waisbeckeri, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 304. — Hung.
- Warmingii, G. Jensen, ex Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 4 (1886-88) 800; et ex K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 122, et Rés. franç. (27) = corylifolius, Sm.

RUBUS: —

- Warnstorffii, Focke, ex Warnst. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1891) 261. — Boruss.
- Wiesbaurii, X, Sabransky, in Deutsche Bot. Monatsschr. x. (1892) 72; Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 361. — Hung.
- Wittingii, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 271; Pacher, Nachtr. Fl. Kärtn. (1894) 225. — Carinth.
- xanthocarpus, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 46; Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 477. — China.
- Wolnyanus, Borb. De orig. Xanthii spin. Append. (1894) 96 [Conf. Oest. Bot. Zeitschr. xliiv. (1894) 398]. — Hung.

RUDBECKIA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 758.

- Brittonii, Small, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 130. — Virginia.
- chrysantha, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 143. — Mexic.

RUDGEA, Salisb. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 758.

- citrifolia, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 116 = caribaea, Benth.
- coriacea, K. Schum. l. c. = eriantha, Benth.
- Lehmannii, K. Schum. l. c. — Columb.
- leiocarpa, K. Schum. l. c. = leiocarpoides, Muell. Arg.
- leucocephala, K. Schum. l. c. = macrocephala, Benth.
- tambillensis, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 2. — Peruvia.
- tomentosa, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 48. — Bolivia.

RUELLIA, Plum. ex Linn. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 759.

- affinis, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Dipteracanthus affinis*, Nees). — Bras.
- amplexicaulis, Lindau, l. c. (= *Arrhoxystylum amplexicaule*, Nees). — Bras.
- angustifolia, Lindau, l. c. (= *Cryphiacanthus angustifolius*, Nees) = Tweediana, Griseb.
- asperula, Lindau, l. c. (= *Stephanophysum asperulum*, Mart. & Nees). — Bras.
- bahiensis, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 192 (= *Dipteracanthus bahiensis*, Nees). — Bras.
- batangana, f. Braun & K. Schum. in Ber. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 157. — Afr. trop. occ.
- Blanchetiana, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Dipteracanthus Blanchetianus*, Nees). — Bras.
- brevicaulis, Lindau, l. c. 310 (= *D. brevicaulis*, Nees). — Bras.
- bulbifera, Lindau, l. c. 311 (= *D. tuberosus*, Nees). — Am. trop.
- calicosa, Lindau, l. c. (= *D. calicosus*, Nees). — Bras.
- canescens, Lindau, l. c. (= *D. canescens*, Nees) = geminiflora, H. B. & K.
- chiquitensis, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 853. — Bolivia.
- coerulea, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 193. — Parag.
- colorata, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 853. — Am. austr. occ.
- confinis, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 309 (= *Dipteracanthus confinis*, Nees). — Bras.
- Delavayana, Baill. Hist. des pl. x. (1891) 408. — China.
- diffusa, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= *Siphonacanthus diffusus*, Nees). — Bras.
- discifolia, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1511; et in F. L. James, Unkn. Horn of Afr., Append. (1888) 321, t. 2. — Reg. Somal.

RUELLIA: —

- domingensis, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 = domingensis, Spreng.
- erythropus, Lindau, l. c. 311 (= *Siphonacanthus erythropus*, Nees). — Bras.
- euantha, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 366. — Bolivia.
- filicalyx, Lindau, l. c. 362. — Bolivia.
- furcata, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= *Dipteracanthus furcatus*, Nees). — Bras.
- Garckeana, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1887) 218. — N. Guin.
- glanduloso-punctata, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= *Dipteracanthus glanduloso-punctatus*, Nees). — Bras.
- grandiflora, Lindau, l. c. (= *D. grandiflorus*, Nees) = candica, Ruiz & Pav.
- Guppyi, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 214. — Ins. Salom.
- Humboldtiana, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 366 (= *Stemonacanthus Humboldtianus*, Nees). — Am. trop.
- humistrata, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Arrhoxystylum repens*, Mart.). — Am. trop.
- hypericoides, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 16 (= *Dipteracanthus hypericoides*, Nees). — Am. austr.
- ibbensis, Lindau, l. c. xx. (1891) 15. — Afr. centr. bor.
- incomta, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Dipteracanthus incomtus*, Nees). — Bras.
- Kuntzei, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 365. — Bolivia.
- lanato-glandulosa, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= *Dipteracanthus lanato-glandulosus*, Nees). — Bras.
- lanceolata, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 193. — Parag.
- longipedunculata, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 365. — Bolivia.
- macrosiphon, Lindau, l. c. 309 = lactea, Cav.
- Marlothii, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 257. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Matagalpae, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 364. — Nicarag.
- mattogrossensis, Lindau, l. c. 362. — Bras.
- megachlamys, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 134. — Afr. trop. or.
- megasphaera, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 364. — Mexic.
- microcalyx, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= *Dipteracanthus microcalyx*, Nees). — Guian.
- microphylla, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 16 (= *Arrhoxystylum microphyllum*, Mart.). — Bras.
- Morongii, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 192 (= *Cryphiacanthus acaulis*, Nees). — Bras.
- multifolia, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= *Dipteracanthus multifolius*, Nees) = subdentata, Klotzsch.
- Neesiana, Lindau, l. c. (= *D. Neesiana*, Mart.). — Bras.
- Neovedia, Lindau, l. c. (= *D. Neowedia*, Nees). — Bras.
- panucana, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 363. — Mexic.
- patula, Oliver, in F. L. James, Unkn. Horn of Afr. Append. (1888) 321 = patula, Jacq.
- pedunculosa, Lindau, l. c. (= *Arrhoxystylum pedunculatum*, Nees). — Peruvia.
- porrigens, Lindau, l. c. (= *Dipteracanthus porrigens*, Nees) = porrigens, Mart.
- praetermissa, Schweinf. ex Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 15. — Afr. centr. bor.
- proxima, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 365. — Bolivia.
- radicans, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Stemonacanthus radicans*, Nees). — Guian.

RUELLIA : —

- rubiginosa, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Siphonacanthus rubiginosus*, Nees). — Bras.
 Ruiziana, Lindau, l. c. (= *Stephanophysum Ruizianum*, Nees). — Peruv., Chili.
 Schaueriana, Lindau, l. c. 310 = solitaria, Vell.
 Sellowiana, Lindau, l. c. 311 (= *Stemonacanthus Sellowianus*, Nees). — Bras.
 sessilifolia, Lindau, l. c. 310 (= *Dipteracanthus sessilifolius*, Nees). — Bras.
 silvicola, Lindau, l. c. 311 = formosa, Andr.
 somalensis, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 14. — Afr. trop. or.
 speciosa, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 364, in obs. (= *Ophthalmacanthus speciosus*, Nees) — Mexic.
 spectabilis, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 334. — Peruvia.
 spectabilis, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 192 = *Cryphiacanthus angustifolius*, Nees.
 splendidula, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Arrhostoxylum splendidulum*, Nees). — Bras.
 subsessilis, Lindau, l. c. (= *A. subsessile*, Nees). — Bras.
 sudanica, Lindau, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 28, 29; et in Bot. Jahrb. xx. (1894) 16, in obs. — Afr. trop.
 tetragona, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 311. — Am. austr.
 thysacanthoides, Lindau, l. c. (= *Stemonacanthus thysacanthoides*, Nees). — N. Granat.
 Treubiana, Lindau, l. c. 310 (= *Dipteracanthus vernicosus*, Nees). — Java.
 turbascensis, Lindau, l. c. 309 (= *D. turbascensis*, Nees). — N. Granat.
 Tweedii, T. Anders. ex Morong. in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 192 = *Blechnum Tweedii*, Nees.
 velascana, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 363. — Bolivia.
 vestita, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 473; et in Forschungsr. Gazelle [Siphon.] (1889) 44. — Guinea.
 villosa, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Siphonacanthus villosus*, Nees). — Afr. trop.
 Vindex, Lindau, l. c. (= *Dipteracanthus Vindex*, Nees) = vindex, Mart.
 viscidula, Lindau, l. c. = viscidula, Mart.
 viscosissima, Lindau, l. c. (= *Dipteracanthus viscosissimus*, Nees). — Bras.

RUELLIOLOA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1890) 852; et Hist. des pl. x. (1891) 427, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 307. **ACANTHACEAE**.
 Grevei, Baill. ll. cc. — Madag.

RUGENDASIA, Schiede = **Weldenia**, Schult. f. (Commelin.).
 majalis, Ehrenb. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7405 = *W. candida*, Schult. f.

RULAC, Adans. = **Acer**, Tourn. (Sapind.).
 Negundo, Hitchcock, Spring Fl. Manhattan (1894) 6 = *A. Negundo*, Linn.

RUMEX, Linn. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 764.
 albescens, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 378. — Ins. Sandvic.
 ambigua ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 61. — Europ.
 angiocarpus, Murb. in Lunds Univ. Arsskrift. xxvii. v. (1892) 46. — Herceg.
 arizonicus, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. vii. (1889) 73. — Arizona.
 biflorus, Rechinger, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 402 = *pratensis*, Mert. & Koch.
 Borbasii ×, Blocki, l. c. xxxix. (1889) 155. — Germ.
 commutatus ×, Rechinger, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlii. (1892) 19. — Tirol.

RUMEX : —

- confinis ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 77. — Europ.
 Duffii ×, Hausskn. l. c. 78. — Germ.
 dumulosus ×, Hausskn. l. c. 67. — Germ.
 erosus, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 494. — Chili.
 erubescens ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. III. (1885?) 77. — Germ.
 fallacinus ×, Hausskn. l. c. 74. — Eur. centr.
 fascicularis, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 367. — Florida.
 finitimus ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 67. — Germ.
 fueginus, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 439. — Am. austr.
 Geyeri, Trelease, in Missouri Bot. Gard. Rep. iii. (1892) 78, t. 15 = *paucifolius*, Nutt.
 Heimerlii ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 318. — Austria.
 hybridus ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 69. — Germ.
 inundatus ×, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 183. — Transsilv.
 Kernerii ×, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 365. — Galicia.
 lacustris, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 63. — Calif.
 Lorentzianus, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 8. — Reg. Argent.
 laxiflorus, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8 (1889) 709 = *palustris*, Sm.
 macrophyllus, St. Lager, l. c. 708 = *R. Hydrolapathum*, Huds.
 Mezeri ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 60. — Helv.
 Mureti ×, Hausskn. l. c. 73. — Eur. centr.
 nigricans, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 59. — Ind. or.
 pannonicus ×, Rechinger, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 401. — Austria.
 platycarpus, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1891) 774 = *bucephalophorus*, Linn.
 Ruhmeri ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 73. — Eur. centr.
 Sagorskii ×, Hausskn. l. c. 76. — Germ.
 Schmidtii ×, Hausskn. l. c. 66. — Germ.
 Schreberi ×, Hausskn. l. c. 74. — Eur. centr.
 Schulzei ×, Hausskn. l. c. 68. — Germ.
 similatus ×, Hausskn. l. c. 62. — Germ.
 Skofitzii ×, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. (1888) 340. — Galicia.
 spiralis, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 44. — Texas.
 subalpinus, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. ii. v. (1895) 720 [subalpina]. — Utah.
 subulatus, Rechinger, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 51 = *obtusifolius*, Linn.
 Weberi ×, Fischer-Benz. in Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst. ii. (1889-90) 186. — Germ. Bor.

RUMFORDIA, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 766.
 connata, T. S. Brandeg. in Zoë, iii. (1892) 241, t. 23. — Calif.

RUNGIA, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 766.
 Baumannii, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 120. — Afr. trop. occ.
 Buettneri, Lindau, l. c. xx. (1894) 46. — Afr. trop. occ.
 coerulea, Warb. l. c. xiii. (1891) 422 (= *Didielytra coerulea*, Blume) = *parviflora*, Nees.
 rosacea, Lindau, l. c. xx. (1894) 46. — Madag.

RUPPIA, Linn. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 766.
 intermedia, Theden. in Bot. Notiser (1886) 83. — Scand.
 lacustris, Macoun, Cat. Canad. Pl. v. (1890) 27 = *occidentalis*, S. Wats.
 occidentalis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 138. — Columb. brit.

RUSBYA, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 67. **VACCINIACEAE**.
 Pearcei, Britton, l. c. 68. — Bolivia.
 taxifolia, Britton, l. c. — Bolivia.

RUSBYANTHUS, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 95. **GENTIANACEAE**.
 cinchonifolius, Gilg, l. c. — Bolivia.

RUSPOLIA, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 354. **ACANTHACEAE**.
 pseudanthemoides, Lindau, l. c. — Reg. Somal.

RUSSELIA, Jacq. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 767.
 coccinea, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 63; et in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 562 — Mexic.
 racemosa, Wettst. l. c. (= *Gomera racemosa*, Ruiz & Pav.). — Peruv.
 retrorsa, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 176. — Mexic.
 subcoriacea, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 113. — Mexic.

RUSSOWIA, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 281; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 325. **COMPOSITAE**.
 crupinoides, C. Winkl. l. c. 282, t. 1 et 2. — Turkest.

RUSTIA, Klotzsch (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 768.
 angustifolia, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 262. — Bras.
 gracilis, K. Schum. l. c. 263. — Bras.
 rosea, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 18. — N. Granat.
 secundiflora, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 261. — Bras.

RUTA, [Tourn.] Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 768.
 erythraea, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 45 (= *Haplophyllum erythraeum*, Boiss.). — Afghan.
 Gilesii, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 4. — Ind. or.
 pedicellata, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 45 (= *Haplophyllum pedicellatum*, Boiss.). — Persia.
 pilosa, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 177 (= *H. pilosum*, Franch.). — Ross. or.
 rotundifolia, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 45. — Afghan.

RUTTYA, Harv. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 761.
 fruticosa, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 45. — Afr. trop. or.

RYMANDRA, Salisbury & Knight = **Knightia**, R. Br. (Proteac.).
 Deplanchei, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 580 = *K. Deplanchei*, Vieill.
 strobilina, Kuntze, l. c. = *K. strobilina*, R. Br.

RYNCHOSPORA, Vahl (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 768.
 adscendens, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 65 (= *Dichromena candida*, Ridl. pr. p.). — Madag.
 alta, Boeck. Cypr. Nov. ii. (1890) 20 [Rhynchospora]. — Bras.
 Arechavaletae, Boeck. l. c. i (1888) 24. — Uruguay; Afr. austro-occ. extratrop.
 axillaris, Britton, in Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 61; et in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 104 [Rhynchospora] (= *Schoenus axillaris*, Lam.) = *cephalantha*, A. Gray.
 Barteri, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 653. — Afr. trop. occ.
 capillifolia, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 22 [Rhynchospora]. — Bras.
 columbiensis, Boeck. l. c. i. (1888) 29. — Columb.
 corymbiformis, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 86; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 12. — Am. bor.
 corymbosa, Britton, l. c. 84. — Parag.

RYNCHOSPORA: —

- corymbosa*, Hitchcock, in Missouri, Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 141 = aurea, Vahl.
criniger, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 28 [Rhynchosp.]. — Uruguay.
Cruegeriana, Boeck. l. c. ii. (1890) 26 [Rhynchosp.]. — Ins. Trinit.
Diedrichsenii, Boeck. l. c. 25. — Bras.
Dussiana, Boeck. l. c. 40. — Ins. Martinic.
Eggersiana, Boeck. l. c. 25. — Ins. Jamaic.
elegantula, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 209, fig. 10 [Rhynchosp.]. — Am. austr. trop.
elongata, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 26 [Rhynchosp.]. — Ins. Portoric.
erinacea, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 654 (= *Schoenus crinaceus*, Ridl.). — Angola.
Fauriei, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris. Sér. VII. x. (1886) 104 [Rhynchosp.]. — Japon.
floribunda, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 27 [Rhynchosp.]. — Reg. Argent.
fuscoides, C. B. Clarke, ex Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 89; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 16. — Am. bor. or.
hemicephala, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 24 [Rhynchosp.]. — Bras.
Hieronymi, Boeck. l. c. 30. — Reg. Argent.
hyalinolepis, Boeck. l. c. ii. (1890) 23. — Reg. Argent.
infusca, Boeck. l. c. (1888) 31. — Columb.
intermedia, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 87; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 14 [Rhynchosp.]. — Florid., Texas.
leucantha, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 22 [Rhynchosp.]. — Bras.
Loefgrenii, Boeck. l. c. 21. — Bras.
macrocephala, Boeck. l. c. 21. — Bras.
maculata, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxi. (1890) n. 1, 146, t. 43a [Rhynchosp.]. — Am. austr.
malasica, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 670. — Penins. Mal.
Mendoncana, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 23 [Rhynchosp.]. — Bras.
Niederleiniana, Boeck. l. c. i. (1888) 27. — Reg. Argent.
orizabensis, C. B. Clarke, ex Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 85; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 11; et ex J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. iii. (1893) 111, nomen [Rhynchosp.]. — Mexic., Am. centr.
palustris, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 24 [Rhynchosp.]. — Bras.
panicifolia, Maury, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 422 [Rhynchosp.]. — Columb.
pauloensis, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 24 [Rhynchosp.]. — Bras.
praecincta, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxi. (1890) n. 1, 146, t. 43b [Rhynchosp.]. — Parag.
Prenteloupiana, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 26 [Rhynchosp.]. — Ins. S. Doming.
Pseudolanata, Boeck. l. c. 25. — Cuba.
quadriscipata, Boeck. l. c. 28. — Columb.
quinquespicata, Boeck. l. c. 29. — Columb.
Schenckiana, Boeck. l. c. 22. — Bras.
schoenoides, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 92; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 19 [Rhynchosp.]. = cyperoides, Mart.
setacea, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 104 [Rhynchosp.]. = capillacea, Torr.
sikkimensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 672. — Sikkim.
sphaerocephala, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 24 [Rhynchosp.]. — Bras.
spicaeformis, Hillbr. Fl. Haw. Isl. (1888) 477. — Ins. Sandvic.
Stuebelii, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 30. — Columb.
subtilis, Boeck. l. c. 26. — Bras.
surinamensis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 127 [Rhynchosp.]. = aurea, Vahl.
Tracyi, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 84; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 11 [Rhynchosp.]. (= *Ceratoschoenus capitatus*, Chapm.) = cyperoides, Mart.

RYNCHOSPORA: —

- Tuerckheimii*, C. B. Clarke, ex Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 85; et Sp. Scirp. et Rhynchosp. N. Am. (1892) 12; C. B. Clarke, in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. iii. (1893) 111, nomen [Rhynchosp.]. — Am. centr.
Urbani, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 26 [Rhynchosp.]. — Bras.
Wallichii, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 25 = Wallichiana, Kunth.
Widgrenii, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 25 [Rhynchosp.]. — Bras.

RYPAROSA, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 771.

- fasciculata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) II. 127. — Malaya.
Hullettii, King, l. c. 126. — Malaya.
Kingii, King, l. c. 125. — Malaya.
Kunstleri, King, l. c. 127. — Malaya.
Kurzii, King, l. c. 125; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 23. — Ind. or.
Scortechinii, King, l. c. 126. — Malaya.
sumatrana, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 23. — Miq.
Wrayi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) II. 126. — Malaya.

RYTICARUM, «Becc.» ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. I. (1890) 215, sphalm. = **Ryticaryum**, Becc. (Palm.).

RYTIDOCARPUS, Cors. Illustr. Fl. Atlant. i. (1888) 99. **CRUCIFERAE**.
moriciandoides, Coss. l. c. t. 64b. — Marocc.

RYTIDOPHYLLUM, Mart. = **Rhytidophyllum**, Mart. (Gesner.).
stipulare, Urban, ex Bello, Estud. Fl. Puerto Rico vi. (1888) 260. — Ins. Porto Rico.

RYTIDOSTYLIS, Hook. & Arn. = **Elaterium**, Jacq. (Cucurb.).
carthaginensis, ciliata, cordata, filiformis, glabra, longiflora, quadrifida, quinqueloba, Trianae, trilobata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 258 = *homonyma omnia* Elaterii.
hastata, Kuntze, l. c. = *Cyclanthera tamnoides*, Cogn.

S
SABADILLA, Brandt & Ratzeb. = **Schoenocaulon**, A. Gray (Liliac.).
Coulteri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 713 = Sc. Coulteri, Baker.
Drummondii, Kuntze, l. c. = Sc. Drummondii, A. Gray.
dubia, Kuntze, l. c. [dubia] = Sc. gracile, A. Gray.
intermedia, Kuntze, l. c. = Sc. intermedium, Baker.

SABAL, Adans. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 772.
Ghiesbreghtii, Hort. ex Pfister, Beitr. vergl. Anat. Sabalenbl. (1892) 41. — Hab. ?

SABAZIA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 772.
glabra, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 277. — Mexic.
michoacana, Robinson, l. c. xxvii (1893) 173. — Mexic.
subnuda, Robinson & Seaton, l. c. xxviii. (1893) 108. — Mexic.

SABBATIA, Adans. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 772.
angustifolia, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 259 = brachiata, Ellis.
calycina, Heller, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 24 = calycosa, Pursh.

SABBATIA: —

- campanulata*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 259 = gracilis, Salisb.
dichotoma, Trelease, ex Branner & Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888, i. (1891) 204 = calycosa, Pursh.
dodecandra, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 36 = chloroides, Pursh.
Palmeri, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 438. — Mexic.

SABIA, Colebr. (Sabiace.). — Ind. Kew. ii. 772.
Swinhoei, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 144. — Formosa.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 465; et Pl. Delav. (1889-90) 147. — China occ.

SABICEA, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 772.
acuminata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 320. — Madag.
arborea, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92. — Afr. trop.
Henningsiana, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 79. — Gabon.
humilis, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. IV. (1895) 369. — Bras.
ingrata, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 126. — Ins. S. Thom.
Kolbeana, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 78. — Congo.
novo-granatensis, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 303, in obs. — N. Granat.
Schumanniana, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 76. — Congo.
speciosa, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 67. — Kamerun.

SACCHARUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 778.
atrovirens, Cuzent & Pancher, ex Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 256 = officinarum, Linn.
fallax, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 80. — Cochinch.
filiforme, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 127. — Parag.
fragile, Cuzent & Pancher, ex Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 256 = officinarum, Linn.
glabrum, Cuzent & Pancher, l. c. = officinarum, Linn.
luzonicum, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 116 = officinarum, Linn.
Munroanum, Hack. l. c. 124 (= *Eriochrysis pallida*, Munro). — Transvaal.
obscurum, Cuzent & Pancher, ex Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 256 = officinarum, Linn.
porphyrocomum, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 120 (= *E. porphyrocoma*, Hance). — China.
purpuratum, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 56. — Afr. trop., austro-or.
Ridleyi, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 6. — Penins. Mal.
rubicundum, Cuzent & Pancher, ex Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 256 = officinarum, Linn.

SACCOGLOTTIS, Endl. = **Sacoglottis**, Mart. (Humir.).
Glaziovii, Urban, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 503. — Bras.

SACCOLABIUM, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 774.
acaule, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 61. — Zeylan.
acuminatum, Hook. f. l. c. 65. (= *Uncifera acuminata*, Lindl.). — Penins. Mal.
Archytas, Ridl. in Journ. Roy. As. Soc. (Straits Branch) (June 1891) 137. — Ins. Christmas.
bivittatum, Regel, in Gartenfl. xxxix. (1890) 607; et in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 301. — Ind. or.
calopterum, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 411. — N. Guin.
cephalotes, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 63. — Silhet.
cerinum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 206. — Ins. Sandvic.

SACCOLABIUM : —

- congestum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 63. (= *Acampe congesta*, Lindl.). — Malab., Zeylan. flavum, *Hook. f. l. c.* 58; *et in Hook. Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2131. — Texass.
- galeatum, *Gardn. ex Hook. f. l. c.* 71, in syn. = *Cleisostoma maculatum*, Lindl.
- geminatum « Lindl. » ex *Hook. f. l. c.* 55, sphalm. = gemmatum, Lindl.
- hainanense, *Rolfe, in Kew Bull.* (1894) 284. — China or.
- Helferi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 57; *et in Hook. Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2130. — Penins. Mal.
- inconspicuum, *Hook. f. l. c.* 56; *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* v. (1895) 69, t. 49. — Assam.
- japonicum, *Makino, Ill. Fl. Japon.* i. n. 7 (1891) 3 t. 13. — Japon.
- lanatum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 60; *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* v. (1895) 48 t. 72 (= *Cleisostoma lanatum*, Lindl.). — Tenass.
- longicalcaratum, *Rolfe, in Kew Bull.* (1894) 186. — Borneo.
- longifolium, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 62 (= *Vanda longifolia*, Lindl.). — Ind. or. (China?).
- maculatum, *Hook. f. l. c.* 64 (= *Sarcochilus maculatus*, Benth.). — Concan. Canara.
- Matsuran, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 48. — Japon.
- microphyton, *Frapp. in Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 195. — Ins. Borbon.
- minimiflorum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 59; *et in Hook. Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2135. — Perak.
- Mooreanum, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 64; *et ex Hook. f. in Bot. Mag.* (1895) t. 7428. — N. Guin.
- nilagiricum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 60. — Ind. or.
- obtusifolium, *Hook. f. l. c.* 65; *et in Hook. Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2134 (= *Uncifera obtusifolia*, Lindl.). — Reg. Himal.
- occidentale, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 57. — Kamerun.
- Pechei, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1889) i. 447; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1891) 66, in obs. — Penins. Mal.
- penangianum, *Hook. f. l. c.* vi. (1890) 57; *et in Hook. Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2129b; *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* v. (1895) 47, t. 71. — Penins. Mal.
- pepusillum, *Hook. f. l. c.* 56; *et t.* 2129a. — Penins. Mal.
- praemorsum, *Hook. f. l. c.* 62. — Ind. or.
- pseudo-distichum, *King, & Pantling, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) II. 341. — Ind. or.
- rostellatum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 59; *et in Hook. Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2132. — Sikkim.
- Sanderianum, *Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 8 (1894) 134. — As. trop.
- saxicolum, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 374. — Penins. Mal.
- Sayerianum, *F. Muell. & Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 253, xlv. (1895) 180. — N. Guin.
- Schleinitzianum, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* vii. (1886) 440; *et Forschungs. Gazelle* (1886) 21. — N. Guin.
- Smeeanum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1887) ii. 214. — Ins. Sund.?
- squamatum, *Frapp. in Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 165. — Ins. Borbon.
- tenuicaule, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 64; *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* v. (1895) 49 t. 74. — Penins. Mal.
- Wendlandianum, *Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid.* (1894) 121, t. 269, fig. 10-20 = *Cleisostoma Wendlandiorum*, *Reichb. f.*
- Wightianum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 62. — Ind. or., — Zeylan.

SACCOPETALUM, Benn. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 775.

- longipes, *Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 43. — Ins. Philipp.

SACCUS, Rumpf. *Herb. Amboin.* i. (1741) 104-05, t. 30 34, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 633 = **Artocarpus**, Forst. (Urtic.).

- anisophyllus, *biformis*, *Blumei*, *bracteatus*, *callophyllus*, *Chaplasta*, *Cumingianus*, *Dadah*, *Denisonianus*, *dimorphophyllus*, *elasticus*, *Forbesii*, *glaucescens*, *glau-cus*, *Gomerianus*, *hirsutus*, *integer*, *Kemando*, *Kertsau*, *Kuenstleri*, *laevis*, *Lakoocha*, *lanceaeifolius*, *lanceola-tus*, *Limpato*, *Lowii*, *Maingayi*, *marianensis*, *mol-lis*, *nitidus*, *nobilis*, *peduncularis*, *petiolaris*, *rigidus*, *Scortechinii*, *tephrophyllus*, *tylophyllus*, *varians*, *ve-nenosus*, *Zollingerianus*, Kuntze. *Rev. Gen.* (1891) 633 = *homonyma omnia* *Artocarpi*.
- Champeden*, Kuntze, l. c. = *A. Polyphema*, *Pers.*
- communis*, Kuntze, l. c. = *A. incisa*, *Linn. f.*
- elongatus*, Kuntze, l. c. = *Sloetia Sideroxylon*, *Teijsm. & Binn.*
- heterophyllus*, Kuntze, l. c. = *Artocarpus integri-folia*, *Linn. f.*
- Teijsmannii*, Kuntze, l. c. = *A. Teijsmanni*, *Miq.*

SACLEUXIA, Baill. *Hist. des pl. x.* (1890) 265; *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzen-fam.* iv. 2 (1895) 226. **ASCLEPIADEAE**.

salicina, Baill. *ll. cc.* — Zanzib.

SACROPTERYX stipitata, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 259, in obs., sphalm. = *Sarcopteryx stipitata*, Radlk.

SAGERAEA, Dalz. = **Bocagea**, A. St. Hil. (Anon.).

Listeri, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iv. (1893) 7, t. 35a. — Penins. Mal.

SAGERETIA, Brongn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 775.

- ferruginea*, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1710. — China centr.
- minutiflora* in *Trans. St. Louis Acad.* v. (1889) 367 = *S. Michauxii*, *Britton*.
- paucicostata*, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 101. — China.
- spinosa*, *Wettst. in Sitzungs. zool.-bot. Ges. Wien*, xcvi. 1889 (1890) 385, t. 1, fig. 13-15. — As. Min.

SAGINA, Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 775.

arctica, *Scheutz [Pl. vasc. Fenniseenses]* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxii. 10 (1888) 93. — Sibiria.

Baumgarteni, *Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 134 = *S. Linnaei*, *Presl*.

Boydii, *Buch. White, in Trans. Bot. Soc. Edinb.* xvii. (1887) 32-35; *et in Journ. Bot.* xxx. (1892) 226, t. 326b. — Scotia.

carnosula, *Norm. in Christ. Vidensk.-Selsk. Forhandl.* (1893) 000. — Norv.

donatioides, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict.* N. S. i. II. (1889) 3. — N. Guin.

hawaiensis, *Pax, in Bot. Jahrb.* xviii. (1893) 27, in obs. (= *S. subulata*, *Hillebr.*). — Ins. Sandvic.

papuana, *Warb. l. c.* xvi. (1892) 14, 21. — N. Guin.

saginoides, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 151 = *Spergula saginoides*, *Linn.*

subulata, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 38 = *ha-waiensis*, *Pax*.

truncata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 386. — N. Zel.

SAGITTA, « Plin. » *Adans.* = **Sagittaria**, Rupp. (Alism.).

aguatica, « Plin. » *St. Lager, in Cariot, Étud. des fl.* é. 1. 8, ii. (1889) 819 = *S. sagittifolia*, *Linn.*

SAGITTARIA, Rupp. ex Linn. (Alism.). — Ind. Kew. ii. 776.

- ambigua*, *J. G. Smith, in Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 48, t. 17. — Kansas.
- demersa*, *J. G. Smith, l. c.* 58, t. 15. — Mexic.
- arifolia*, *Nutt. ex J. G. Smith, l. c.* 32 = *sagitti-folia*, *Linn.*
- cuneata*, *Sheldon, in Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 283, t. 159; *J. G. Smith, l. c.* 34, t. 2. — Minnesota.

SAGITTARIA : —

- Engelmanniana*, *J. G. Smith, in Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 25; *et in Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 41 = *variabilis*, *Engelm.*
- filiformis*, *J. G. Smith, l. c.* vi. (1895) 46, t. 15. — Alabama.
- Greggii*, *J. G. Smith, l. c.* 43, t. 12. — Calif., Mexic.
- isoetiformis*, *J. G. Smith, l. c.* vi. (1895) 115, t. 53. — Florida.
- longerostis*, *J. G. Smith, in Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 26; *et l. c.* vi. (1895) 42 = *sagittifolia*, *Linn.*
- macrocarpa*, *J. G. Smith, l. c.* 53, t. 24. — Carolina.
- platyphylla*, *J. G. Smith, l. c.* 55, t. 26 (= *S. gram-minea*, *Michx.* var.). — Am. bor.
- recurva*, *Engelm. ex Patterson, Check List* (1887) 130, nomen = *platyphylla*, *J. G. Smith*.
- Sanfordii*, *Greene, Pittonia*, ii. (1890) 158; *J. G. Smith, in Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 57. — Calif.
- subulata*, *Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal.* (1888) 58 = *pusilla*, *Nutt.*
- teres*, *S. Wats. in A. Gray, Man. N. Am. Bot.* ed. 6 (1890) 555; *J. G. Smith, in Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 54 t. 24. — Am. bor. or.

SAGUASTER, Rumpf = **Ptychosperma**, La-bill. (Palm.).

- ambiguus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 735 = *Actino-phloeus ambiguus*, *Becc.*
- angustifolius*, Kuntze, l. c. = *Coleospadix oninen-sis*, *Becc.*
- appendiculatus*, Kuntze, l. c. 734 = *Drymophloeus appendiculatus*, *Miq.*
- bifidus*, Kuntze, l. c. 735 = *D. bifidus*, *Becc.*
- Capitis-Yorkis*, Kuntze, l. c. = *Ptychosperma Ca-pitis-Yorkii*, *H. Wendl. & Drude*.
- Drudei*, Kuntze, l. c. = *P. Drudei*, *H. Wendl.*
- elegans*, Kuntze, l. c. = *P. elegans*, *Blume*.
- gracilis*, Kuntze, l. c. = *P. gracilis*, *Labill.*
- leprosus*, Kuntze, l. c. = *Drymophloeus leprosus*, *Becc.*
- Macarthurii*, Kuntze, l. c. = *Ptychosperma Ma-carthurii*, *H. Wendl.*
- Normanbyi*, Kuntze, l. c. = *Areca Normanbyi*, *F. Muell.*
- oliviformis*, Kuntze, l. c. 734 = *Drymophloeus olivaeformis*, *Mart.*
- oninensis*, Kuntze, l. c. 735 = *Coleospadix oninen-sis*, *Becc.*
- pauciflora*, Kuntze, l. c. = *Ptychosperma pauci-flora*, *H. Wendl.*
- perbrevis*, Kuntze, l. c. = *Balaka perbrevis*, *Becc.*
- Pickeringii*, Kuntze, l. c. = *Ptychosperma Pick-eringii*, *H. Wendl.*
- propinquus*, Kuntze, l. c. = *Actinophloeus propin-quus*, *Becc.*
- pumiceus*, Kuntze, l. c. = *Pinanga ternatensis*, *Scheff.*
- saxatilis*, Kuntze, l. c. = *Drymophloeus saxatilis*, *Mart.*
- Seemannii*, Kuntze, l. c. = *Balaka Seemannii*, *Becc.*
- tahitensis*, Kuntze, l. c. = *Ptychosperma tahiten-sis*, *H. Wendl.*
- vitiensis*, Kuntze, l. c. = *P. vitiensis*, *H. Wendl.*

SAGUERUS, Rumpf = **Arenga**, *Mart.* (Palm.).

brevipes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 736 = *A. brevi-pes*, *Becc.*

pinnatus, Kuntze, l. c. = *A. saccharifera*, *Labill.*

undulatifolius, Kuntze, l. c. = *A. undulatifolia*, *Becc.*

SAINTPAULIA, *Wendl. in Gartenfl.* xlii. (1893) 321. **GESNERACEAE**.

ionantha, *Wendl. l. c.* fig. 66 t. 1391; *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1893) 1148; *Hook. f. in Bot. Mag.* (1895) t. 7408. — Afr. trop. or.

SALACIA, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 778.

angustifolia, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 75. — Sierra Leone.

camerunensis, *Loesen. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 240. — Afr. trop. occ.

SALACIA: —

- Chesseana*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) sub t. 312B in obs. = *Hippocratea Chesseana*, Pierre.
dinhensis, Pierre, l. c. = *H. dinhensis*, Pierre.
dongnaiensis, Pierre, l. c. Fasc. 19 (1893) t. 300B. — Cochinch.
Dusenii, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 242. — Kamerun.
erythrocarpa, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 70. — N. Guin.
gabunensis, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 242. — Afr. trop. occ.
Godefroyana, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 19 (1893) t. 300a. — Cochinch.
hamputensis, Pierre, l. c. Fasc. 20 (1894) t. 312b in text. (= *Salacia macrophylla*, Pierre, non Miq.). — Cochinch.
laurifolia, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 141. — Borneo.
macrophylla, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 20 (1894) t. 312b = *hamputensis*, Pierre.
Miqueliana, Loesen, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 230 (= *S. macrophylla*, Miq.). — Guian. bat.
Naumannii, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 464; et in Forschungsr. Gazelle (1886) 36, t. 13. — Ins. Pacif.
noronhioides, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 19 (1893) t. 297a. — Cochinch.
Olivieriana, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 240 = *S. oblongifolia*, Olivier.
pallens, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 19 (1893) t. 298d. — Cambodia.
polyanthomaniaca, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 647] *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 15. t. 8. — Bras. bor.
Preussii, Loesen, in Jahrb. Bot. xix. (1894) 239. — Kamerun.
Regeliana, f. Braun & K. Schum. in Ber. Deutsch. Schutzg. ii. (1889) 154; Loesen, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 230 (*Regeliana*). — Kamerun.
Rehmannii, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 195. — Transvaal.
rostrata, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 19 (1893) t. 299a. — Cochinch.
Siputa, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 338. — Bras.
Soyauxii, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 241. — Afr. trop. occ.
Stuhlmanniana, Loesen, l. c. — Zanzibar.
typhina, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 19 (1893) t. 297b et t. 299b. — Cochinch.

SALAXIS, Salisb. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 779. *benguensis*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 328 (= *Philippia benguensis*, Welw.). — Angola.

SALAZIA, Salisb. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 779. *Liebmannii*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90. — Mexic.

SALDANHAEA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 480 sphalm. = **Soldanhaea**, Bur. (Bignon.). — Seemanniana, Kuntze, l. c. — Ins. Trinit.

SALICORNIA, [Tourn.] Linn. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 779. *andina*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 75. — Chili.
copiapina, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 429. — Chili.
magellanica, Phil. l. c. 430. — Chili.
occidentalis, Greene, Fl. Francisc. (1891) 173; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 57 = *Haplostachys occidentalis*, S. Wats.

SALIX, [Tourn.] Linn. (Salic.). — Ind. Kew. ii. 780. *Ahlbergii*, Behm, in Bot. Notiser (1887) 176. — Scand.
algovica X, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, viii. (1895) 39. — Germ.
Angstroemiana, V. F. Holm, in Bot. Notiser (1892) 72. — Scand.

SALIX: —

- Arnelli*, Lundstr. in Bot. Notiser (1888) 26, 31; et in Bot. Centralbl. xxxv. (1888) 31. — Sibiria.
Aschersoniana X, Seemen, in Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. xxxvi. (1895) 159. — Germ.
Ausserdorferi X, Huter [in Ausserd. Catal. exsicc. Tirol. 1872] ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 75. — Tirol.
Beckiana X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 292. — Austria.
behringica, Seemen, in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 52 (1895) 6. — Am. arct.
Besseri X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austria.
bifax X, Woloszczak, l. c. xxxviii. (1888) 225. — Tirol.
Bornmuelleri, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 21. — As. Min.
Boulayi X, F. Gérard, in Rev. de Bot. viii. (1894) 214. — Lothar.
Brownii, Bebb, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 115; et xvi. (1891) 106. — Am. arct.
Buseri X, Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxv. (1889) 52; et in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xvi-xviii. (1890) 28. — Helv.
californica, Hort. ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 600, 644 = *repens*, Linn.
calyculata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 635. — Reg. Himal.
capnoides X, A. & J. Kern. ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 297. — Austria.
cernua, P. Linton, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 202. — Brit.
cinereoides, V. F. Holm, in Bot. Notiser (1892) 71. — Scand.
combinata X, Huter, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 21. — Austria.
commutata, Bebb, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 110. — Am. bor. occ.
conjuncta, Bebb, l. c. — Am. bor. occ.
cremsensis X, A. & J. Kern. [Herb. Oest. Weid. Dec. viii. (1869) n. 72]; ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 80; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 286. — Tirol.
dendroides, A. & J. Kern. l. c. 289. — Austria.
eburnea, Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 291; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 99. — Italia mer.
Eichenfeldii, Gander, ex C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 21. — Austria.
elata X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austria.
eriocaulos, Lundstr. in Schutz. Pl. vasc. Jeniss. (1886) n. 679; et in Bot. Centralbl. xxxv. (1888) 31. — Sibir.
erythroclados X, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1890) 424. — Hung.
eugenes, E. F. & W. R. Linton, in Journ. Bot. xxxii. (1890) 364. — Brit.
euryadenia X, Ausserd. ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 76. — Tirol.
friburgensis, Cottet, in Cottet & Castella, Guid. bot. Cant. Frib. (1891) 296; et in Bull. Soc. Murith. xix-xx. (1892) 8. — Helv.
gemma X, Buser, ex Jaccard, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxiv. (1895) 330. — Helv.
glaucella, Behm, in Bot. Notiser (1887) 183. — Scand.
Grenieri X, Corbière, Nouv. Fl. Normand. (1893) 529. — Gall. occ.
hirticeps, V. F. Holm, in Bot. Notiser (1892) 71. — Scand.
Hoyeriana, Dieck, ex Dippel, in Gartenfl. xl. (1891) 332; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 97. — Columb. brit.
Indebetoni X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 21. — Suecia.
intercedens X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 291. — Austria.
Jaccardi X, Buser, ex Jaccard, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxiv. (1895) 329. — Helv.
Karelini, Seemen, in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 52 (1895) 10. — Turkest.
Kernerii X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austr.-Hung.
Kotulae X, Woloszczak, l. c. xli. (1891) 234. — Galicia.

SALIX: —

- lagopina*, Ausserd. [Catal. exsicc. Tirol. 1873] ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 75. — Tirol.
longebracteata, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. ii. (1889) 36 = *incana*, Schrank.
longipes, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 634 = *S. Serpyllum*, Anderss.
ludificans X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 404; et in Journ. Bot. xxx. (1892) 360. — Scotia.
marchiaca X, Straehler, in Deutsche Bot. Monatschr. xiii. (1895) 17. — Europ.
Margaretæ X, Seemen, l. c. vii. (1889) 124. — Eur.
margarita X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 441. — Scotia.
Mariana X, Woloszczak, in Tirol (1888) n. 18; et in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 226. — Stiria.
maritima, Hart. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 264 = *decumbens*, Forb.
mexicana, Seemen, in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 52 (1895) 9. — Mexic.
microphyta, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 83. — Tibet.
missouriensis, Bebb, in Gard. and For. viii. (1895) 373. — Am. bor.
mixta X, Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 391. — As. bor. occ.
Moorei X, H. C. Wats. ex B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 438. — Scotia.
moupinensis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 82. — Tibet.
neglecta, Cottet, in Cottet & Castella, Guid. bot. cant. Frib. (1891) 297; et in Bull. trav. Soc. Murith, Fasc. xix-xx. (1892) 9. — Helv.
Nicholsonii X, Dieck, in Neuheit Offert. fur 1889-90, ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 284; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 104. — Am. bor.
oenipontana X, A. & J. Kern. [Herb. Oest. Weid. Dec. vi. (1869) 52]; ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 79; G. Beck, Nied.-Oest. i. (1890) 282. — Tirol.
oligotricha X, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1890) 424. — Austro-Hung.
opaca, Anderss. ex Herder, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 428 = *stipularis*, Sm.
oslaviensis X, Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 235. — Galicia.
Otites, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 242. = *S. Elaeagnos*, Scop.
parvifolia, V. F. Holm, in Bot. Notiser (1892) 71. — Scand.
Paxii X, Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 133. — Austro-Hung.
pectinata, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 276 = *nigricans*, Sm.
perpendens, α Ser. β ex Dippel, l. c. 221. sphalm. = *propendens*, Ser.
Piperi, Bebb, in Gard. and For. viii. (1895) 363. — Am. bor.
podolica X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Podolia.
recondita X, Ausserd. [Catal. exsicc. Tirol. 1874] ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 74. — Tirol.
Sacharowii X, Schroed. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 291; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 105. — Hybr. artef.
saskatchevana, Seemen, in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 52 (1895) 7. — Am. bor.
Schatilowii, Schroed. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 235. — Ross. centr.
saxetana X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 434; et in Journ. Bot. xxv. (1892) 361. — Scotia.
Schumanniana X, Seemen, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 36. — Germ.
scrobigeræ X, Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 74. — Austria.
semireticulata X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 444. — Scotia.
semiretusa X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 299. — Austria.

SALIX : —

- schulchialis* X, Simonk, ex Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 424. — Austro Hung.
seria X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 436. — Scotia.
shikokiana, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 49. — Japon.
sibylina X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 446. — Scotia.
simulatrix X, B. White, l. c. 439. — Scotia.
sobrina X, B. White, l. c. 440. — Scotia.
Stephania X, B. White, l. c. 424. — Scotia.
Stöderana X, Durnnb. in Jahr.-Katal. Wien. bot. Tauschver. (1894) 6. — Hab. ?
Strachleri X, Seemen, in Deutsche Bot. Monatschr. vii. (1889) 33. — Germ.
subdola X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 354. — Scotia.
superata X, B. White, l. c. 423. — Scotia.
syntriandra X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 293. — Austria.
Tatrae, Woloszczak, in G. Beck, l. c. 252. — Austria.
Theobaldiana X, Bruegg, in Jahresb.-Naturf. Ges. Graub. xxxi. (1887-88) 167. — Helv.
Trefferi X, Huter [Enum. pl. exsicc. ann. 1884] ex A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 77. — Tirol.
tricolor, V. F. Holm, in Bot. Notiser. (1892) 71. — Scand.
Urbaniana, Seemen, in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 32 (1895) 9. — Japon.
variegata, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 82. — Tibet.
Wardi, Bobb, in Gard. and For. viii. (1895) 363. — Am. bor.
Wardiana X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 403. — Brit.
zygostemon, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 636, in syn. = *oxycarpa*, Anderss.

SALMEA, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 787.

- mikanoides*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 150. — Bolivia.
nitida, Sch.-Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 145, in syn. = *scandens*, DC.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 141. — Mexic.

SALMIA, Willd. = **Carludovica**, Ruiz & Pav.

- (Cyclanth.).
Lauchiana, Hort. Sand, ex Gard. Chron. (1893) i. 442 et 481, fig. 72; et ex Gartenfl. xxxiii. (1894) 345, fig. 73. — Columb.

SALPIGLOSSIS, Ruiz & Pav. (Solan.). — Ind.

- Kew. ii. 787.
chilensis, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 36 (= *Reyesia chilensis*, J. Gay). — Chili.
linifolia, Wettst. l. c. (= *Leptoglossa linifolia*, Benth. & Hook. f.). — Reg. Argent.
schwenkioides, Wettst. l. c. (= *L. schwenkioides*, Benth. & Hook. f.). — Peruvia.
tenuis, Wettst. l. c. (= *Cyclostigma tenue*, Phil.). — Am. trop.

SALPINGIA, Raimann, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 217 = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).

- Hartwegii*, Raimann, l. c. = *Oe. Hartwegii*, Benth.

SALSOLA, Linn. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 788.

- cyclophylla*, Baker, in Kew Bull. (1894) 340. — Arabia.
hadramautica, Baker, l. c. — Arabia.
leucophylla, Baker, l. c. — Arabia.
oxyanthera, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 233. — Turkest.
Pachoi, Volkens & Aschers. [Ill. Fl. Égypt.] in Mém. Inst. égypt. ii. (1887) 130. — Aegypt.
Volkensii, Schweinf. & Aschers. l. c. — Aegypt.
zygophylla, Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. Append. ii. (1890) 15; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1892) 73. — Algeria.

SALVIA, [Tourn.] Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 790.

- abyssinica*, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. i. n. 160] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 367 = *nudicaulis*, Vahl, var.
adulterina X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. i. (1889) 248. — Graecia.
alamosana, f. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 110. — Mexic.
aliena, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 157. — Mexic.
alpestris, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 248. — Graecia.
amasiana, Freyn & Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 58. — As. Min.
ambigens, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 120. — Parag.
anisodonta, Hausskn. & Briq. ex Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 21. — Persia.
Andrzejowskii X, Blocki, in Deutsche Bot. Monatschr. x. (1892) 107. — Galicia.
approximata, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 119. — Parag.
approximata, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 7. — Hisp.
Balansae, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 117 = *S. Rouyana*, Briq.
Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 246. — Bolivia.
Besseri X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austro-Hung.
Bornmuelleri, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 21. — As. occ.
brachyodon, Vandas, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 179. — Herceg.
brevilabra, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 149. — Tibet.
californica, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Sér. II. ii. (1889) 697. — Calif.
cinerarioides, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 118. — Parag.
Clevelandi, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 236 = *Audibertia Clevelandi*, A. Gray.
compacta, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 530. — Costa Rica.
digenea X, Borb. in Termész. Füzet. xiv. (1893) 51. — Hung.
Durandiana, Briq. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 236 = *polystachya*, Ortega.
erythrophylla, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 284 = *japonica*, Thunb.
Freyniana, Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 349. — As. Min.
Hegelmaieri, Porta & Rigo, ex Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. (1891) (1892) 56; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 150. — Hisp.
Goudotii, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 137. — Madag.
Hildebrandtii, Briq. l. c. 135. — Madag.
Issanchou, Hort. ex Rev. Hort. lxii. (1890) 229 = *splendens*, Ker-Gawl.
Kernerii X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austro-Hung.
leucophylla, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 236 = *Audibertia nivea*, Benth.
lucida, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 118. — Parag.
lycioides, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 408. — Mexic.
Maximowicziana, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 285. — China.
mellifera, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 236; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 291 = *Audibertia stachyoides*, Benth.
mohavensis, Greene, l. c. 235 = *A. capitata*, A. Gray.
namaensis, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 208. — Afr. austro-occ. extratrop.
nusairiensis, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 406. — Syria.
oblongata, De Not. ex Briq. Lab. Alp. Marit. iii. (1895) 515, in obs. = *S. Verbenaca*, Linn.
Palmeri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 408. — Mexic.
Palmeri, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 236 = *Audibertia Palmeri*, A. Gray.

SALVIA : —

- Pittieri*, Briq. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 237. — Costa Rica.
podolica X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austro-Hung.
Prattii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 316. — China occ.
purpurascens, Post, l. c. xxiv. (1888) 438. — As. occ.
rhodopea, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 388. — Bulg.
Rouyana, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, iv. (1888) Add. p. iii. (= *S. Balansae*, Briq.). — Parag.
rubropunctata, Robinson & Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 121. — Mexic.
Rusbyi, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 246. — Bolivia.
sessilifolia, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 445. — Mexic.
Shannoni, f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1893) 256. — Guatem.
sonomensis, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 236 = *Audibertia humilis*, Benth.
spathacea, Greene, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 291 = *A. grandiflora*, Benth.
Steingroeveri, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 91. — Afr. austro occ. extratrop.
stenodonta, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 135. — Madag.
tanamarivensis, Briq. l. c. 136. — Madag.
tatsienensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 150. — Tibet.
Torreri, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 156. — Mexic.
tricuspis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 150. — Tibet.
utilis, A. Braun, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 367 = *nudicaulis*, Vahl.
veronicaefolia, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 444. — Mexic.
villicaulis, Borb. [A magyar. Romokpuszták növényvilága (1886) 88] ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 234. — Hung.
vulgaris, Briq. Lab. Alp. Marit. iii. (1895) 527 = *pratensis*, Linn. subsp.
yosgadensis, Freyn & Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 348. — As. Min.

SALVIACANTHUS, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 75; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 351. **ACANTHACEAE**.
Preussii, Lindau, l. c. — Kamerun.**SAMAMA**, Rumpf, Herb. Amboin. iii. (1734) 36, t. 19, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 296 = **Anthocephalus**, A. Rich. (Rubiace.).
Cadamba, Kuntze, l. c. = *A. morindaefolius*, Korth.
citrifolia, Kuntze, l. c. 297 = *A. morindaefolius*, Korth.**SAMANDURA**, Gaertn. (Simarub.). — Ind. Kew. ii. 796.

- Harmandiana*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 305 [Samandera]. — Cochinch.
Harmandii, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 261 = *praec.*
indica, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 305 = *mekongensis*, Pierre.
mekongensis, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 262. — Cochinch.

SAMAROCELTIS, Poiss. in Mém. Assoc. Franç. Toulouse, 1887 (1888) 595 = **Phyllostylon**, Capan. (Urtic.).
rhamnoides, Poiss. l. c. = *P. rhamnoides*, Taub.**SAMBUCUS**, Tourn. ex Linn. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 796.

- arborescens*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 533, in syn. = *melanocarpa*, A. Gray.
aurea, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. lxiii. (1891) 384 = *nigra*, Linn.
australasica, Fritsch, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 162 = *xanthocarpa*, F. Muell.
callicarpa, Greene, Fl. Francisc. (1891) 342; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 163 = *glauca*, Nutt.?

SAMBUCUS : —

- Fontenayi*, C. Koch, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 172 = *glauca*, Nutt.
Gautschii, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 230. — Reg. Himal.
maritima, Greene, *Pittonia*. ii. (Sept 1892) 297; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 163. — Calif.
planteriensis, Hort. Simon-Louis, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 169 = *mexicana*, Presl.
plantierensis, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 533 = *praec.*
plumosa, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. lxiii. (1891) 408 = *racemosa*, Linn.

SAMERARIA, Desv. = **Isatis**, Linn. (Crucif.).
Djurdjurae, Coss. Comp. Fl. Atlant. ii. (1887) 296, in syn. = *I. Djurdjurae*, Coss. & Durieu.
macrocarpa, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 64. — Persia.

SAMOLUS, [Tourn.] Linn (Primul.). — Ind. Kew. ii. 796.
alyssoideus, Heller, in Contr. Herb. Frankl. Coll. [Bot. Expl. S. Texas] i. (1895) 74, t. 3. — Texas.
aquaticus, St. Lager, in Cariot. Etud. de fl. éd. 8, ii. (1889) 578 = *S. Valerandi*, Linn.
bracteolus, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 51. — Chili.

SAMPACCA, Rumpf = **Michelia**, Linn. (Magnol.).
Cathcartii, excelsa, *Kisopa*, lanuginosa, *montana*, *nilagirica*, *oblonga*, *parvifolia*, *pundana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 6 = *homonyma omnia* *Micheliae*.
evonymoides, Kuntze, l. c. = *M. Champaca*, Linn.
longifolia, Kuntze, l. c. = *M. Champaca*, Linn.
suaveolens, Kuntze, l. c. = *M. Champaca*, Linn.
velutina, Kuntze, l. c. = *M. Tsiam-paca*, Linn.

SANDERELLA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 649 = **Parlatorea**, Barb. Rodr. (Orchid.).

SANDORICUM, Cav. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 797.
Harmandianum, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 310, nomen. — Cochinch.
radiatum, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) 21. — Penins. Mal.

SANGUISORBA, Rupp. ex Linn. = **Poterium**, Linn. (Rosac.).
annua, Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1889) 223. — Am. bor.
latifolia, Coville, l. c. iii. (1895) 339 = *Poterium sitchense*, S. Wats.
polygama, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 768 = *P. polygamum*, Walld. & Kit.
Sanguisorba, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 189 = *P. Sanguisorba*, Linn.

SANHILARIA, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 27; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 222. **BIGNONIACEAE**.
brasiliensis, Baill. ll. cc. — Bras.

SANICULA, [Tourn.] Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 798.
coerulescens, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris. Sér. VIII. vi. (1894) 109. — Yunnan.
divaricata, Greene, in *Erythra*, iii. (1895) 64. — Calif.
gregaria, Bicknell, in Bull. Torrey Bot. Club. xxii. (1895) 354, t. 242. — Am. bor. or.
hacquetioides, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris. Sér. VIII. vi. (1894) 110. — Yunnan.
Howellii, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 81; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 104. — Am. bor. occ.
memoralis, Greene, in *Erythra*, i. (1893) 6. — Calif.
satsumana, Maxim, in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 47. — Ins. Kiusiu.
saxatilis, Greene, in *Erythra*, i. (1893) 6; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 150. — Calif.
septentrionalis, Greene, in *Erythra*, i. (1893) 6. — Am. bor. occ.

SANICULA : —

- trifoliata*, Bicknell, in Bull. Torrey Bot. Club. xxii. (1895) 359, t. 244. — Am. bor.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris. Sér. VIII. vi. (1894) 108. — Yunnan.

SANOPODIUM *Dearei*, Hort. ex Reichb. in Flora, lxxi. (1888) 156 [sphalm. = *Sarcopodium*] = *Bulbophyllum* *Dearei*, Reichb. f.

SANSEVIERIA, Thunb. (Haemodor.). — Ind. Kew. ii. 798.
flavescens, Mawry, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 269, fig. 12. — Am. austr.
Kirkii, Baker, in Kew Bull. (1887) 3, 8, fig. 5; et in Bot. Mag. (1894) t. 7357. — Afr. trop. austro-or.
paniculata, Schinz, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 14. — Afr. austr.
subspicata, Baker, in Gard. Chron. (1889) ii. 436. — Mossamb.
Volkenzii, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 144. — Afr. trop. or.

SANTALINA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1890) 843. **SANTALACEAE**.
madagascariensis, Baill. l. c. 844, 853. — Madag.

SANTALODES, Linn. = **Rourea**, Aubl. (Connar.).
acuminata, *acutipetalum*, *caudatum*, *concolor*, *cuspidatum*, *discolor*, *diversifolium*, *Donianum*, *floridum*, *frutescens*, *fulgens*, *Gardnerianum*, *glabrum*, *humile*, *indutum*, *ligulatum*, *macrophyllum*, *Martianum*, *multiflorum*, *myrianthum*, *nilidum*, *polyphyllum*, *puberulum*, *pulchellum*, *revolutum*, *rugosum*, *simile*, *simplicifolium*, *Solanderi*, *stenopetalum*, *villosum*, *Wallichianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 155 = *homonyma omnia* *Roureae*.
Bakeri, Kuntze, l. c. = *Rourea heterophylla*, Baker.
dasyphyllum, Kuntze, l. c. = *Cnestis ramiflora*, Griff.
fraternum, Kuntze, l. c. = *Rourea induta*, Planch.
Hermannianum, Kuntze, l. c. = *Rourea santaloides*, Wight. & Arn.
heterophyllum, Kuntze, l. c. = *R. heterophylla*, Baker.
mimusoides, Kuntze, l. c. = *R. mimusoides*, Planch.
monadelphum, Kuntze, l. c. = *R. commutata*, Planch.
phyllanthoides, Kuntze, l. c. = *R. phyllanthoides*, Blume.
Roxburghii, Kuntze, l. c. = *R. Milletii*, Planch.

SANTALUM, Linn. (Santal.). — Ind. Kew. ii. 798.
Haleakalae, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 390. — Ins. Sandvic.
latifolium, Meurisse, in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1892) 1026. — Ins. Sandvic.
longifolium, Meurisse, l. c. — N. Zel.
Macgregorii, F. Muell. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 227. — N. Guin.
salicifolium, Meurisse, in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1892) 1016. — Ins. Sandvic.

SANTIRIA, Blume (Burser.). — Ind. Kew. ii. 798.
acuminata, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 64. — N. Guin.
balsamifera, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1573; Engl. Bot. Jahrb. xi. Beibl. n. 26. (1890) 6 = *Santiriopsis balsamifera*, Engl.
floribunda, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 254. — Perak.
floribunda, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 63. — N. Guin.
laxa, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 254 (= *Canarium laxum*, A. W. Benn.). — Penins. Mal.
longifolia, King, l. c. 258. — Perak.
macrocarpa, King, l. c. 256. — Perak.
Wrayi, King l. c. 259. — Perak.

SANTIRIOPSIS, Engl. Bot. Jahrb. xi. Beibl. n. 26 (1890) 6. **BURSERACEAE**.
balsamifera, Engl. l. c. (= *Santiria balsamifera*, Oliver). — Ins. S. Thome.

SANTOLINA, Tourn. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 799.
Benthamiana, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iv. (1891) 42. — Hisp.
Benthamiana, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 263 (= *S. pectinata* Benth.). — Gall. mer.

SANVITALIA, Gualt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 799.
tenuis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 277. — Mexic.

SANVITALIOPSIS, Sch. Bip. = **Zinnia**, Linn. (Compos.).
Liebmanni, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 89, in syn. = *Z. Liebmanni*, Benth. & Hook. f.

SAPINDUS, Tourn. ex Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 799.
anamensis, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) t. 317b = *Paviesia anamensis*, Pierre.
Delavayi, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1893) 315 (= *Pancovia Delavayi*, Franch.). — China.
emarginatus, Hort. Alger. ex Rev. Hort. lxvii. (1895) 303 = *utilis*, Trab.
oahuensis, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 85. — Ins. Sandvic.
utilis, Trab. in Rev. Hort. lxvii. (1895) 196. — Hab. ?

SAPIUM R. Br. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 800.
cornutum, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 114. — Angola.
glandulosum, Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 227 = *biglandulosum*, Muell. Arg.
Hildebrandtii, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 116. — Madag.
Hookeri, Hort. Calc. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 470, in syn. = *eugeniaefolium*, Ham.
Poggei, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 115. — Congo mer.
rotundifolium, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 445. — China.
sceleratum, Ridl. l. c. xxvii. (1890) 60. t. 3. — Ins. Fernando Noronha.
xylocarpum, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 115. — Congo.

SAPONARIA, Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 801.
cypria, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1388) 83. — Ins. Cypr.
illyrica, Baldacci, in Malpighia, viii. (1894) 81 = *Tunica illyrica*, Fisch. & Mey.
intricata, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 77. — As. Min.
Zapaterii, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iv. (1891) 22 = *glutinosa*, Bieb.

SAPROSMA, Blume (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 802.
dichotomum, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indie, ii. I. (1891) 142 (= *Mephitidia dichotoma*, Korth.). — Java.
foetens, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 122 = *zeylanicum*, Bedd.
molle, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indie, ii. I. (1891) 142 (= *Rutidaea mollis*, Blume). — Penang.

SARACA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 802.
camboodiensis, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 287, nomen. — Cambodia.

SARACHA, Ruiz & Pav. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 802.
grandiflora, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. I. (1895) 161. — Mexic.

SARANTHE, Eichl. = **Myrosma**, Linn. f. (Scitam.).
Eichleri, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 166. — Bras.
membranacea, Petersen, l. c. 167. — Bras.
tenuifolia, Petersen, l. c. 169. — Bras.
urceolata, Petersen, l. c. 167. — Bras.
ustulata, Petersen, l. c. 165. — Bras.

SARARANGA, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 216. **PANDANACEAE**
sinuosa, Hemsl. l. c. t. 11. — Ins. Salom.

SARCANTHIDIUM, « Baill. » ex Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 245 = **Sarcanthidion**, Baill. (Olcin.).

SARCANTHUS, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 803.

appendiculatus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 67 [= *Aerides appendiculatus*, Wall.] in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 236; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 50, t. 76. — Ind. or.

auriculatus, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 9. — Hab. Gilberti, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxxiv. (1894) 2334. — Tenass.

lorifolius, Parish, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 69; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2130. — Tenass.

praealtus, Reichb. f. Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 344. — N. Gu n.

rutilus, Parish, in Grant, Orchids of Burma (1895) 278, nomen. — Burma.

Scortechinii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 68; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2138. — Perak.

SARCOBATUS, Nees (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 803.

Baileyi, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 77; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 184, t. 20. — Calif.

retusus, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 109. — N. Guin.

SARCOCAULON, Sweet (Geran.), — Ind. Kew. ii. 803.

Marlothii, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 31. — Afr. austro-occ. extratrop.

rigidum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1889) 59. — Afr. austro-occ. extratrop.

SARCOCEPHALUS, Afzel (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 803.

gracilis, Dalla Torre, in Just, Bot. Jahresb. xviii. 1890 (1892) 526. sphalm. = macrocephalus, K. Schum.

macrocephalus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 59. — N. Guin.

sambucinus, K. Schum. l. c. = esculentus, Afzel.

SARCOCHILUS, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 803.

aphyllus, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.

aureus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 35; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 42, t. 64. — Perak.

borneensis, Rolfe, in Illustr. Hort. xxxix. (1892) 99 t. 561. — Borneo.

brachyglottis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 34; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 42, t. 63. — Perak.

brachystachys, Hook. f. l. c. vi. (1890) 41. — Penang.

caligaris, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 372. — Penins. Mal.

carinatifolius, Ridl. in Journ. Roy. As. Soc. (Straits Branch). (June 1891) 136. — Ins. Christmas.

cladostachys, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 35; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 43, t. 65. — Malaya.

cochinchinensis, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 360. — Cochinch.

complanatus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 41 (= *Limodorum complanatum*, Lindl.). — Zeylan.

crassifolius, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 396. — Hab. ?

erichilus, Filtz, in Journ. Bot. xxix. (1891) 153. — Austral.

filiformis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 39; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2124. — Perak.

Freemianii, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 361 = S. Freemianii, Reichb. f.

SARCOCHILUS : —

hirsutus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 38; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 43, t. 67. — Perak.

hirtulus, Hook. f. l. c. 39; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2121. — Penins. Mal.

leopardinus, Parish & Reichb. f. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 38. — Tenass.

luniferus, Benth. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 70 (= *Thrixperum luniferum*, Reichb. f.). — Burma.

Mannii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 36. — Ind. or.

merguensis, Hook. f. l. c. 40; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2125a. — Tenass.

microscopicus, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 487. — Sumatra.

minimifolius, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 37. — Zeylan.

muscosus, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 7. — Ins. Andam.

notabilis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 42; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2126. — Penang.

obtus, Benth. ex Hook. f. l. c. 36 (= *Camarotis obtusa*, Lindl.). — Tenass.

papuanus, Kraenzl. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 34. — N. Guin.

pardalis, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 371. — Penins. Mal.

pauciflorus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 41. — Perak.

platystachys, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. i. (1886) 56. — Austral.

psiloglottis, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 372. — Penins. Mal.

pugionifolius, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 196 [pugionifolia]; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2125b. — Zeylan.

recurvus, Hook. f. l. c. 39; et t. 2122. — Perak.

retro-spiculatus, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. n. 3 (1895) II. 340. — As. trop.

Roxburghii, Hook. f. l. c. 36 (= *Camarotis pallida*, Lindl.). — Ind. or.

Scopa, Reichb. f. ex Hook. f. l. c. 44. — Perak.

Scortechinii, Hook. f. l. c. 40. — Perak.

stenoglottis, Hook. f. l. c. 34; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1893) 41 t. 62. — Sumatra (Perak ?).

suaveolens, Hook. f. l. c. 33 (= *Aerides suaveolens*, Roxb.). — Ind. or.

tanyphyllus, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 372. — Penins. Mal.

trichoglottis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 39; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1890) t. 2123. — Penins. Mal.

Trimeni, Hook. f. l. c. 40, 196, in obs. nomen = viridiflorus, Hook. f.

viridiflorus, Hook. f. l. c. 38 (= *Aerides viridiflorus*, Thwaites). — Zeylan.

Wightii, Hook. f. l. c. 37 (= *Limodorum pusillum*, Willd.). — Ind. or., Zeylan.

SARCOCHLAENA, Spreng. = **Sarcolaena**, Thou. (Chlaenac.).

codonochlamys, « Baker », ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 175 = Sarc. codonochlamys, Baker.

SARCOGONUM, G. Don = **Muehlenbeckia**, Meissn. (Polygon.).

fruticulosum, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 251 = M. rupestris, Wedd.

vulcanicum, Rusby, l. c. 252 = M. vulcanica, Endl.

SARCOLAENA, Thou. (Chlaenac.). — Ind. Kew. ii. 804.

codonochlamys, Baker, in Kew Bull. (1893) 11. — Madag.

diospyroidea, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 565; et Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 100. — Madag.

Grandidieri, Baill. l. c. 565; et t. 99. — Madag.

pilosa, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 565 = Xerochlamys pilosa, Baker.

SARCOLOBUS, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 805.

ciliolatus, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 408. — N. Guin.

retusus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 285. — N. Guin.

SARCOPODIUM, Lindl. = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).

Godseffianum, Sander, ex Gard. Chron. (1890) ii. 800, nomen. — Hab. ?

SARCOPTERYX, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 804.

brachyphylla, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Muench. xx. (1890) 265. — N. Guin.

holconeura, Radlk. l. c. 266. — N. Guin.

SARCOSPERMA, Hook. f. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 804.

pedunculatum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi (1890) 68 [pedunculata]. — China.

SARCOSTEMMA, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 804.

acidum, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 256 (= S. acidum, Voigt) = brevistigma, Wight & Arn.

carpophylloides, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 165. — Parag.

SARCOTHECA, Blume (Lineae). — Ind. Kew. ii. 895.

paniculata, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 282. — Penins. Mal.

SARCOTHECA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 979.

sphalm. = SAROTHECA, Nees = **Justicia**, Linn. (Acanth.).

scabra, Kuntze, l. c. = Aphelandra pectinata, Willd.

SARGENTIA, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 144. **RUTACEAE**.

Greggii, S. Wats. l. c. — Calif.

Pringlei, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 134. — Mexic.

SARIBUS, Rumpf. = **Livistona**, R. Br. (Palm.).

Hasseltii, Hoogendorpii, humilis, inermis, Kingianus, papuanus, rotundifolius, speciosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 736 = homonyma omnia Livistonae.

Jenkenii, Kuntze, l. c. = Livistona Jenkinsiana, Griff.

Mariae, Kuntze, l. c. = L. humilis, R. Br. ?

SAROTHAMNUS, Wimm. = **Cytisus**, Linn. (Legumin.).

Dieckii, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 202. — Hisp.

glauca, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. S. ii. (1889) 159 = Cytisus purgans, Spach.

SARRACENIA, Linn. (Sarrac.). — Ind. Kew. ii. 806.

Athinsoniana, Hort. ex Nichols. Gard. Dict. iii. (1886) 364. — Hybr. artef.

decora, Hort. ex Gard. Chron. (1889) ii. 250. — Hybr. artef.

excellens, Hort. ex Nichols. Gard. Dict. iii. (1886) 363. — Hybr. artef.

exornata, Hort. ex Nichols. l. c. — Hybr. artef.

exsculta, Hort. ex Nichols. l. c. — Hybr. artef.

Fildesi, Hort. ex Nichols. l. c. 363 = flava, Linn.

illustrata, Hort. ex Nichols. l. c. 364; et ex Gard. Chron. (1889) ii. 81. — Hybr. artef.

Maddisoniana, Hort. ex Nichols. Gard. Dict. iii. (1886) 364; et ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 399; et ex Gard. Chron. (1889) ii. 81 [an seq.]. — Hybr. artef.

melanorhoda, Hort. ex Nichols. l. c. 365. — Hybr. artef.

Mesoniana, Hort. ex Gard. Chron. (1889) ii. 81. — Hybr. artef.

SARRACENIA : —

- Mitchelliana* X, Hort. ex Nichols. Gard. Dict. iii. (1886) 365; et ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 398 [an praec.]. — Hybr. artef.
Patersoni X, Hort. ex Nichols. l. c.; et ex Gard. Chron. (1889) ii. 81. — Hybr. artef.
Swaniana X, Hort. ex Nichols. Gard. Dict. iii. (1886) 366. — Hybr. artef.
Tolliana X, Hort. ex Nichols. l. c.; et ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 398. — Hybr. artef.
Wrigleyana X, Hort. Veitch. ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 398, et ex Gard. Chron. (1889) 495. — Hybr. artef.

SARUMA, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1895. **ARISTOLOCHIEAE**.
 Henryi, Oliver, l. c. — China.

SASSAFRAS, Linn. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 806

- Sassafras*, Karst. Pharm.-Med. Bot. (1882) 505; Sudworth, in Gard. and For. iv. (1891) 146 = officinale, Nees & Eberm.
variifolium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 574 = officinale, Nees & Eberm.

SATUREJA, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 806.

- filiformis*, Ces. Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 302. — Corsica.
garganica, Briq. Lab. Alp. Marit. iii. (1895) 421. [Satureia] = *graeca*, Linn.
olympica, Halácsy, ex Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 40, in syn. = *pisidica*, Wettst.
pisidica, Wettst. l. c.; et in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien, xcvi. 1889 (1890) 374 t. 3, fig. 13-16. — As. Min.
rumelica, Velen. Fl. Bulg. (1891) 466. — Rumel.
sphaerophylla, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 134 (= *Micromeria sphaerophylla*, Baker). — Madag.
thymoides, Ces. Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 302 = *Micromeria thymoides*, De Not.

SATYRIUM, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 807.

- chlorocorys*, Reichb. f. ex Oliver, in H. Johnston. Kilim. Exped. Append. (1886) 346; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 50, nomen. — Afr. trop.
crassicaule, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 295. — Afr. trop. occ.
debile, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1885) 67. — Afr. austr.
emarcidum, Bolus, l. c. — Afr. austr.
gigas, Ridl. l. c. xxii. (1886) 126. — Madag.
Guthriei, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. 1. (1893) t. 21; Rolfe, in Orchid. Rev. i. (1893) 269. — Afr. austr.
longibracteatum, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 238. — Angola.
Mechowianum, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 65. — Angola.
microrrhynchum, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 50 (1895) 14. — Afr. austr.
neglectum, Schlechter, l. c. 15. 39. — Afr. austr.
niloticum, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 296. — Afr. trop. or.
ocellatum, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. 1. (1893) t. 23. — Afr. austr. etaustro-or.
ochroleucum, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 66. — Afr. austr.
pallidiflorum, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 15. — Austr.
paludicola, Schlechter, l. c. 37. — Afr. austr.
Princeps, Bolus, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1729 = *membranaceum*, Sw.
Woodii, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50. (1895) 16. — Afr. austr.

SAURAUJA, Willd. (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 808.

- actinidifolia*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 135. — Borneo.
amoena, Stapf, l. c. 134. — Borneo.
bifida, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 380. — N. Guin.

SAURAUJA : —

- bullosa*, Wawra, in Mart. Fl. Bras. xii. 1. (1886) 286. — N. Granat.
conferta, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 379. — N. Guin.
Lehmannii, Hieron. l. c. Beibl. n. 49 (1895) 47. [Saurauia]. — Ecuad.
Oldhami, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 79. — Formosa.
polyantha, Gilg. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 128. [Saurauia]. — Costa-Rica.
Rusbyi, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 64. — Bolivia.

SAUROPUS, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 809.

- concinus*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 123 t. 18. — Burma.
forcipatus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 334. — Perak.
lanceolatus, Hook. f. l. c. 333. — Reg. Himal.
macrophyllus, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.
oblongifolius, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.
pubescens, Hook. f. l. c. 335. — Reg. Himal.
stipitatus, Hook. f. l. c. 333. — Reg. Himal.

SAUSSUREA, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 810.

- alatypes*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1-92) 308. — China. occ.
amblyophylla, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 244. — Tibet.
Aster, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 115. t. 5. — Tibet.
auriculata, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris. Sér. II. x. (1888) 40. — Tibet.
auriculata, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 308. — China. occ.
canescens, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 168. — Turkest.
carduiformis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 343. — China.
caudata, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 147. — China. occ.
chetchozensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 359. — China. occ.
chondrilloides, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 169. — Turkest.
ciliaris, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 357. — China.
cirsioides, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 309. — China. occ.
colorata, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 167. — Turkest.
conyzoides, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 309. — China. occ.
cordifolia, Hemsl. l. c. 312. — China. occ.
dealbata, Collett & Hemsl. l. c. xxviii. (1890) 76. — Afghan.
decurrens, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1735. — Reg. Afghan.
decurrens, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 310. — China. occ.
Delavayi, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 355. — China. occ.
dimorpha, Franch. l. c. viii. (1894) 340. — China. occ.
dzeurensis, Franch. l. c. 339. — China. occ.
edulis, Franch. l. c. ii. (1888) 337 = *Jurinea edulis*, Franch.
eriocephala, Franch. l. c. 329. — China. occ.
Famintziniana, Krassn. in Script. Univ. Petrop. ii. 1. (1887-88) 17. — China.
Fargesii, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 344. — China. occ.
flexuosa, Franch. l. c. 341. — China. occ.
Gilesii, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1736. — Reg. Afghan.
grosseserrata, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 311, 354. — China. occ.
Henryi, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 311. — China. occ.
Koslowi, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 241. — Tibet.
Kuschakewiczii, C. Winkl. l. c. ii. (1889) 170. — Turkest.

SAUSSUREA : —

- lamprocarpa*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 465. — China.
lapatifolia, G. Beck. Fl. Nied.-Oest. ii. (1893) 1252, in syn. = *discolor*, DC.
Larionowi, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 376. — Turkest.
leptophylla, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1734. — Reg. Afghan.
likiangensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 356. — China. occ.
longifolia, Franch. l. c. 354. — China.
macrota, Franch. l. c. viii. (1894) 343. — China. occ.
microcephala, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 466. — China.
minuta, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 243. — China.
mollis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 353. — China. occ.
nobilis, Franch. l. c. 354. — China. occ.
pachyneura, Franch. l. c. — China. occ.
pamirica, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 171. — Turkest.
peduncularis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 357. — China. occ.
phyllocephala, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 76. — Afghan.
populifolia, Hemsl. l. c. xxix. (1892) 311. — China. occ.
prostrata, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 518. — Turkest.
pulviniformis, C. Winkl. l. c. xi. (1891) 377. — Turkest.
pumila, C. Winkl. l. c. xiii. (1894) 244. — Tibet.
radiata, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 357. — China. occ.
romuleifolia, Franch. l. c. 339. — China. occ.
rupestris, Hemsl. & Lac. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 325. — Belutch. brit.
Russowi, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 423. — Turkest.
saligna, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 345. — China. occ.
Salemanni, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 166. — Turkest.
scabrida, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 146. — China. occ.
semilyrata, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 76. — China. occ.
Souliei, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 147. — China. occ.
spatulifolia, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 338. — China. occ.
stricta, Franch. l. c. viii. (1894) 342. — China. occ.
sutchuenensis, Franch. l. c. 353. — China. occ.
tatsienensis, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 148. — China. occ.
thibetica, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 338. — China. occ.
Thoroldi, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 115, t. 4, fig. 5-9. — Tibet.
tibetica, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 242. — Tibet.
vestita, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 358. — China. occ.
villosa, Franch. l. c. 353. — China. occ.
virgata, Franch. l. c. 340. — Yunnan.
Woodiana, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 312. — China. occ.
yesoënsis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. xii. (1888) 88. — Japon.
yunnanensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 340. — Yunnan.

SAUSSUREA, Salisb. = **Funkia**, Spreng. (Liliac.).
coerulea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 714 = *F. ovata*, Spreng.
japonica, Kuntze, l. c. = *F. ovata*, Spreng.
plantaginea, Kuntze, l. c. = *F. subcordata*, Spreng.
Sieboldiana, Kuntze, l. c. = *F. Sieboldiana*, Hook.

SAVASTANA, Schrank = **Hierochloë**, S. F. Gmel. (Gramin.).
alpina, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v (1894) 34 = *H. alpina*, Roem. & Schult.

SAVASTANA: —

odorata, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 34 = *Hierochloë borealis*, Roem. & Schult.
pauciflora, Scribn. l. c. 353 = *H. pauciflora*, R. Br.

SAVIA. Willd. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 811.

Hildebrandtii, Baill. *Hist. pl. Madag.* Atlas (1892) t. 209. — Madag.
oblongifolia, Baill. l. c. t. 208. — Madag.
revoluta, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 48. — Madag.

SAXIFRAGA, Tourn. ex Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 812.

Aliciana, Rony & Coincy, *Eclog. pl. Hisp.* (1893) 12, t. 4. — Hisp.
Allionii, Terrac. in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 185. [sp. coll.]. — Eur.
apiculata ×, Engl. in *Gard. Chron.* (1894) i. 556. fig. 68. — Hybr. artef.
apophylloides, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 238. — Yunnan.
aurantiaca, Franch. l. c. 236, t. 51b. — Yunnan.
baborensis, Batt. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 550; et *Atlas Fl. Algér.* (1895) 28, t. 20. — Algeria.
Blavii, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 93 = *adscendens*, Linn.
Boydii ×, Dewar, in *The Garden*, xxxviii. (1890) 10. — Hybr. spont?
brachyphylla, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 237. — China, occ.
Bucklandii ×, Hort. ex Stein, in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 306. — Hybr. artef.
californica, Greene, *Pittonia*, i. (Apr. 1889) 286; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 120. — Calif.
Candelabrum, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 232, t. 48. — Yunnan.
cardiophylla, Franch. in *Nowv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. (1886) 230. — China, occ.
carniolica, Huter, ex A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 52. — Austria.
carpathica, Terrac. in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 133. — Reg. Carpat., Monten.
caucasica, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 525; et in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1894) 188. — Reg. Cauc.
cernagorica, Terrac. in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 134. — Monten.
chrysantha, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 236, t. 50b. — Yunnan.
cintrana, Kuzinsky, ex Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 318. — Lusit.
colchica, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 96. — Reg. Cauc.
columnaris, Schmalh. ex Akinfiew, in *Bull. Soc. géogr. Cauc.* (1892) 186 [*Fl. Cauc. centr.* (1894) 21.], t. 17, fig. 8-18; et in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* x. (1892). — Reg. Cauc.
comosa, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 178 = *foliolosa*, R. Br.
crinalis, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 233. — Yunnan.
Davidi, Franch. in *Nowv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. (1886) 229. — Tibet.
delphinensis, Ravaud. *Guid. bot. Dauph. 6^e excurs.* p. 23; et in *Bull. Soc. Dauph.* xvi. (1889) 634 = *pubescens*, Pourr.
Dinniki, Schmalh. ex Akinfiew, in *Bull. Soc. géogr. Cauc.* (1892) 185 [*Fl. Cauc. centr.* (1894) 20]; et in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* x. (1892) 288, t. 18, fig. 6-7. — Reg. Cauc.
drabaeformis, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 235, t. 59b. — Yunnan.
Engleri ×, Hort. ex *Gartenfl.* xxxix. (1890) 649. — Hybr. spont?
flabellifolia, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 295. — China, occ.
glaucophylla, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 239, t. 53a. — Yunnan.
Grayana, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 178 = *caroliniana*, A. Gray.
Haussknechtii ×, Stein, in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 306. — Hab?

SAXIFRAGA: —

Hochstetteriana, Lange, ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 132 = *granulata*, Linn.
Howellii, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1891) 163. — Oregon.
Huguenini, Bruegg. in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 486, t. 1230b = *aspera*, Linn.
Korneri ×, G. Beck, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vii. (1889) 117. — Eur. or.
ledifolia, Greene, *Pittonia*, ii. (June 1890) 101. — Calif.
longistyla, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. iii. (1891) 144. — Tibet.
Mac Nabiana ×, Hort. ex *Gartenfl.* xxxv. (1886) 306; et in *Gard. Chron.* (1889) ii. 295. [*Macnabiana*]. — Hybr. artef.
macrostigma, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 240, t. 52a. — Yunnan.
madida, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 52. — Japon.
Marshallii, Greene, *Pittonia*, (Jan. 1888) 159. — Calif.
Michauxii, Britton, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1894) 118 (= *S. leucanthemifolia*, Michx.). — Virginia.
micranthifolia, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 17 = *erosa*, Pursh.
montavoniensis, A. Kern. ex *Gartenfl.* xxxix. (1890) 649; et ex *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* x. (1892) [26] = *S. Cotyledon*, Linn.
nidifica, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 222. — Calif.
occidentalis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 264. — Am. bor. occ.
oregana, Howell, in *Erythraea*, iii. (1895) 34. — Am. bor. occ.
Pacheriana ×, Wiesb. in *Natur. und Offenbarung*, xxxvi. (1891) 762, in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1891) 93; et ex Pacher, *Nachtr. Fl. Karnt.* (1894) 149. — Carinth.
pellens ×, Fritsch, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxiv. (1889) 587. — Austria.
parva, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 112. — Tibet.
pedata, Hort. ex *Gartenfl.* xxxv. (1886) 306. [nomen.]. — [Quid?].
peplidifolia, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 234. — Yunnan.
petrophila, Franch. l. c. 237. — Yunnan.
pontica, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 97. — As. Min.
Portae, Stein, in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 306. — Ital. mer.
prenja, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 93 = *sedoides*, Linn.
Przewalskii, Engl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2a (1891) 57. — China.
racemosa, Simonk. *Enum. Fl. Transs.* (1886) 247 = *hieracifolia*, Waldst. & Kit.
Reyeri ×, Huter (Enum. pl. exsicc. Austr. 1873) ex A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 52; Pachev, *Nachtr. Fl. Karnt.* (1894) 148. — Carinthia.
rhaetica, A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* iv. (1886) 29 = *S. Hostii*, Tausch var.
rhodopea, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 645. — Bulg.
Rigoi, Freyn, ex Porta, in *Atti Accad. Agiati*, ix. (1891-1892) extr. 26; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 209. — Hisp.
Rouyana, Magnier, *Scrin. fl. select.* xii. (1893) 286; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 329. — Hisp.
sanguinea, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 295. — China, occ.
Sartorii, Heldr. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 348. — Graecia.
scleropoda, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 526; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 186. — Reg. Cauc.
stellariaefolia, Franch. in *Nowv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. (1886) 231, t. 7 fig. a. — Tibet.
subalpina, Bruegg. in *Jahresb. Nat. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 69 = *stellaris*, Linn.
tabularis, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 269. — China.
trinervia, Franch. in *Nowv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. (1886) 232. — Tibet.

SAXIFRAGA: —

Tozetta ×, Hort. ex Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2a (1891) 58. — Hybr. artef.
tsangchanensis, Franch. *Pl. Delav.* (1878) 233, t. 51a. — Yunnan.
umbellulata, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 222. — Calif.
valentina, Willk. ex Herv. in *Rev. gén. bot.* (1892) 133, cum *icc.*; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 209. — Hisp.
Watanabei, Yatabé, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 7 et 43, t. 2; et *Icon. Fl. Japon.* i. III. (1893) 179, t. 44. — Japon.
Willkommii, Kuzinsky, ex Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 318, in syn. = *cintrana*, Kuzinsky.

SAXIFRAGELLA, Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2a (1891) 61. SAXIFRAGEAE.

bicuspidata, Engl. l. c. — Reg. Magell.

SAYERIA, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 298. ORCIDEAE.

paradoxa, Kraenzl. l. c. — N. Guin.

SCABIOSA, [Tourn.] Linn. (Dipsac.). — Ind. Kew. ii. 817.

balcanica, Velen. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1888) 159; et *Fl. Bulg.* (1891) 243. — Bulg.
Bretschneideri, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 184. — China.
brevipora, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 145. — As. min.
celtibérica, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 30. nomen. — Hisp.
Correvoniana, Somm. & Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 152. — Reg. Cauc.
Djurdjurae, Chab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 26; Debeaux, in *Rev. de Bot.* xi. (1893) 177. — Algeria.
dalmatica, Huter & Kern. ex Freyn & Brandis, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 610 = *leucophylla*, Borb.
dubia, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 243. — Bulg.
epirola, Haldacz & Baldacci, l. c. xlii. 1892 (1893) 577. — Albania.
farinosa, Coss. in *Compt.-rend. Acad. sci.* xcvi. (1884) 468; et *Ill. Fl. Atlant.* ii. (1893) 58, t. 134. — Tunetia.
incana, Freyn, ex Freyn & Brandis, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 610 = *leucophylla*, Borb.
garganica, Porta & Rigo, ex Wettst. in *Luerss. Bibl. Bot.* Heft xxvi. (1892) 67, t. 4 fig. 1 et 2. — Albania.
incanescens, Freyn, ex Conrath, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 382. — Bosnia.
leucophylla, Borb. ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 345 = *gramuntia*, Linn.?
kurdica, Post, *Pl. Postianae*, iv. (1892) 7. — As. Min.
lucidula ×, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1893) 1150. — Austria.
montana, Batt. in *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 417 (= *Pycnocomon montanum*, Pomel). — Algeria.
Olgae, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 453. — Reg. Cauc.
psilophylla ×, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1893) 1150. — Austria.
rufescens, Freyn & Sint, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 167. — Armen. turc.
silatifolia, Velen. *Beitr. Fl. Ost.-Rumel. und Bulg.* (1886) 19; et *Fl. Bulg.* (1891) 244. — Bulg.
subalpina, Bruegg. in *Jahresb. Nat. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 82 = *S. Columbaria*, Linn.
thracica, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 246. — Bulg.
turolensis, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 20; et Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 74 = *tomentosa*, Cav.
virescens, Freyn, ex Freyn & Brandis, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 610 = *leucophylla*, Borb.

SCAEVOLA, Linn. (Goodenov.). — Ind. Kew. ii. 826.

Beckii, *Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, iii. (1888) 281, t. 13 fig. 1. — N. Caled.

cylindrocarpa, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 268. — Ins. Sandvic.

novo-guineensis, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 222. — N. Guin.

procera, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 268. — Ins. Sandvic.

scandens, F. M. Bailey, *Rep. Exped. Bellenden-Ker* (1889) 47; et *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 43. — Austral.

SCALESIA, Arn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 821. Baurii, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 141. — Ins. Galap.

SCALIA, Sims = **Podolepis**, Labill. (Compos.). *aristata, canescens, gracilis, Lessonii, longipedata, microcephala, nutans, pallida, rugata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 361 = *homonyma omnia* Podolepidis. *arachnoides*, Kuntze, l. c. = *P. rytidochlamys*, F. Muell. *capillaris*, Kuntze, l. c. = *P. Siemssenia*, F. Muell.

SCALIGERIA, DC. = **Conopodium**, Koch (Umbell.). *allioides*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 255 = *C. allioides*, Regel & Schmalh. *capillifolia*, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 428; Boiss. l. c. — Syria. *Hermonis*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 399. — Syria.

SCANDIX, Tourn. ex Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 821. *eriocarpa*, Stapf & Wettst. ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 29. — As. Min.

SCAPHIUM, Schott & Endl. = **Sterculia**, Linn. *affine*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 13 (1889) sub t. 193-95, in text. = *S. affinis*, Mast. *Beccarianum*, Pierre, l. c. t. 195c = *S. Beccariana* [Beccarianum], Pierre. *linearicarpum*, Pierre, l. c. sub t. 193-95, in text. = *S. linearicarpa*, Mast. *lychnophorum*, Pierre, l. c. sub t. 193-95, in text. = *S. lychnophora*, Hance.

SCAPHOCHLAMYS, Baker, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 252. **SCITAMINEAE**. *malaccana*, Baker, l. c. — Malacca.

SCAPHOGLOTTIS, Poepp. & Endl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 822. *longicaulis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 286. — Guatem.

SCAPHOSEPALUM, Pfitz. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 7 (1888) 139. **ORCHIDEAE**.

anchoriferum, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 136 (= *Masdevallia anchorifera*, Reichb. f.); et in *Gard. Chron.* (1890) i. 709. — Costa-Rica. *antenniferum*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) i. 709. — Hab. ?

breve, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 136 (= *Masdevallia brevis*, Reichb. f.). — Guian. brit. *gibberosum*, Rolfe, l. c. (= *M. gibberosa*, Reichb. f.). — N. Granat.

macroactylon, Rolfe, l. c. (= *M. macroactyla*, Reichb. f.). — N. Granat.

microactylum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 335. — Hab. ?

ochthodes, Pfitz. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1888) 39 (= *Masdevallia ochthodes*, Reichb. f.). — N. Granat.

pulvinare, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 137 (= *M. pulvinaris*, Reichb. f.); Hook. f. in *Bot. Mag.* (1890) t. 7151. — Columb. ?

punctatum, Rolfe, l. c. (= *M. punctata*, Rolfe). — N. Granat ?

swertiaefolium, Rolfe, l. c. (= *M. swertiaefolia*, Reichb. f.). — N. Granat.

SCAPHOSEPALUM : —

verrucosum, Pfitz. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1888) 139 (= *Pleurothallis verrucosa*, Reichb. f.). — N. Granat.

SCELOCHILUS, Klotzsch (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 822.

auriculatus, Reichb. f. in *Flora*, lxxix. (1886) 551. — Am. trop. occ.

carinatus, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 284. — Am. austr. andina.

variegatus, Cogn. in *Journ. des Orchid.* vi. (1895) 268; et in *Lindenia*, xi. (1895) 26. — Columb.

SCHEDONNARDUS, Steud. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 823.

paniculatus, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 265 = seq.

paniculatus, Trelease, Branner & Coville, ex Branner, in *Rep. Geol. Surv. Ark.* iv. 1888 (1891) 236 = *texanus*, Steud.

SCHEELEA, Karst. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 823.

amylacea, Barb. *Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio*, Fasc. i. (1891) 17, t. 5, 6. — Bras.

excelsa, Barb. *Rodr. l. c.* 30, t. 9, fig. a, 1-8; et iv. (1894) 24 = *osmantha*, Barb. *Rodr.*

Leandroana, Barb. *Rodr. l. c.* 19, t. 5, 7 fig. b. — Kras.

osmantha, Barb. *Rodr. l. c.* Fasc. iv. (1894) 24 (= *S. excelsa*, Barb. *Rodr.*). — Bras.

Unguis, Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 385. — Am. trop.

SCHEFFERELLA, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1890) 4 = **Payena**, A. DC. (Sapot.).

Bawun, Pierre, l. c. = *P. Bawun*, Scheff.

SCHEFFLERA, Forst. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 823.

abyssinica, avensis, Baikiei, Barteri, biternatum, Cephalotes, Cumingii, elatum, ellipticum, emarginatum, fimbriatum, heterophyllum, hypoleucum, impressum, insularum, Junghuhnianum, Mannii, octophyllum, petiolosum, racemosum, rigidum, rostratum, tomentosum, venulosum, Wallichianum, Harms, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 36-38 = *homonyma omnia* Heptapleuri.

actinophylla, Harms, l. c. 36 (= *Brassia actinophylla*, F. Muell.). — Austral.

acuminata, Harms, l. c. (= *Sciadophyllum acuminatum*, Poir.). — Peruv.

angulata, Harms, l. c. (= *S. angulatum*, Poir.). — Peruv.

aromatica, Harms, l. c. 38 (= *Agalma aromaticum*, Seem.). — Java.

Belangeri, Harms, l. c. 37 (= *Sciadophyllum Belangeri*, El. March.). — Martinica.

capitata, Harms, l. c. 36 (= *Brassia capitata*, C. B. Clarke). — Reg. Himal., Burm.

confusa, Harms, l. c. 37 (= *Sciadophyllum confusum*, El. March.). — Reg. Amaz.

conica, Harms, l. c. 36 (= *S. conicum*, Poir.). — Peruv.

coriacea, Harms, l. c. 37 (= *Orcopanax coriaceum*, Decne & Planch.). — Guian. brit.

decaphylla, Harms, l. c. 37 (= *Sciadophyllum decaphyllum*, Seem.). — Guian. gall.

ferruginea, Harms, l. c. 36 (= *S. ferrugineum*, Decne). — Peruvia.

glaucula, Harms, l. c. 38 (= *Heptapleurum elatum*, Hiern). — Afr. trop.

Goetzenii, Harms, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 134, nomen. — Afr. trop.

Hierniana, Harms, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 38 (= *Heptapleurum scandens*, Hiern). — Kamerun.

Hookeriana, Harms, l. c. (= *Paratropia alata*, Hook. f.). — Kamerun.

Horsfieldii, Harms, l. c. (= *Agalma Horsfieldii*, Seem.). — Java.

Humblotii, Harms, l. c. — Ins. Comor.

japurensis, Harms, l. c. (= *Sciadophyllum japurensis*, Mart. & Zucc.). — Bras.

SCHEFFLERA : —

Karsteniana, Harms, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 36 (= *Sciadophyllum Karstenianum*, El. March.). — Venezuela.

Lehmannii, Harms, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 69, in obs. (= *S. Lehmannii*, Harms). — Columb.

littoralis, Harms, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 38 (= *Parapanax littoralis*, Miq.). — Sumatra.

macrostachya, Harms, l. c. 36 (= *Brassia macrostachya*, Seem.). — N. Guin.

Mathewsii, Harms, l. c. (= *Sciadophyllum Mathewsii*, Seem.). — Peruvia.

parasitica, Harms, l. c. (= *Actinomorphe humilis*, Miq.). — Java, Sumatra.

patula, Harms, l. c. 37. — Bolivia.

pedicellata, Harms, l. c. 37 (= *Sciadophyllum pedicellatum*, Poir.). — Peruvia.

pentandra, Harms, l. c. 36 (= *S. pentandrum*, Poir.). — Peruvia.

Planchoniana, Harms, l. c. (= *Sciadophyllum Planchonianum*, E. March.). — Ecuad.

polysciadia, Harms, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 297. — Afr. trop. or.

quindiensis, Harms, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 37 (= *Sciadophyllum quindiense*, DC.). — Columb.

rediviva, Harms, l. c. (= *Agalma redivivum*, Seem.). — Borneo.

rugosa, Harms, l. c. (= *Agalma rugosum*, Miq.). — Malaya.

samoensis, Harms, l. c. 39 (= *Paratropia samoensis*, A. Gray). — Ins. Samoens.

Sciadophyllum, Harms, l. c. 37. — Jamaica.

sessilis, Harms, l. c. 36 (= *Brassia sessilis*, Seem.). — Penins. Mal.

sphaerocoma, Harms, l. c. 37 (= *Sciadophyllum sphaerocoma*, Benth.). — Ins. Gorgona.

Sprucei, Harms, l. c. 36 (= *S. Sprucei*, Seem.). — Peruvia.

stellata, Harms, l. c. 39 (= *Heptapleurum stellatum*, Gaertn.). — Zeylan.

Trianae, Harms, l. c. 36 (= *Sciadophyllum Trianae*, Planch. & Linden). — N. Granat.

Volkensii, Harms, l. c. iii. 8 (1894) 36, fig. 7. — Afr. trop. or.

SCHENCKIA, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. (1889) 246; et in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 37. **RUBIACEAE**. *Blumenaviana*, K. Schum. *ll. cc.* 247; et 37. — Bras.

SCHICKENDANTZIA, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 322, 336. **AMARYLLIDAE**. *Hieronymi*, Pax, l. c. — Reg. Argent.

SCHIECKIA, Meissn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 824.

congesta, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 269, fig. 12 = *flavescens*, Maury.

flavescens, Maury, l. c. — Am. austr. trop.

SCHIEDEA, Cham. & Schlecht. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 824.

hawaiiensis, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 33. — Ins. Sandvic.

lychnoides, Hillebr. l. c. 36. — Ins. Sandvic.

Lydgatei, Hillebr. l. c. 34. — Ins. Sandvic.

pubescens, Hillebr. l. c. 31. — Ins. Sandvic.

salicaria, Hillebr. l. c. 33. — Ins. Sandvic.

SCHIMA, Reinw. (Ternstr.). — Ind. Kew. ii. 824. *brevifolia*, Baill. ex Stapf, in *Hook. Icon pl.* xxiii. (1893) t. 2264. — Borneo.

stellata, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 295; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 8 (1887) t. 122. — Cochinch.

SCHIMPERINA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 256 = **Loranthus**, Linn.

amoena, Van Tiegh. l. c. 257. = *L. amoenus*, Delile.

platyphylla, Van Tiegh. l. c. = *L. platyphyllus*, Hochst.

SCHINUS, Linn. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 824.
diversifolia, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*. iv. (1890) 206. — Bolivia.

SCHINZAFRA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 234 = **Thamnea**, Soland. (Bruniac.).
depressa, Kuntze, l. c. = *T. depressa*, Oliver.
gracilis, Kuntze, l. c. = *T. gracilis*, Oliver.
hirtella, Kuntze, l. c. = *T. hirtella*, Oliver.
uniflora, Kuntze, l. c. = *T. uniflora*, Soland.

SCHINZIELLA, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 74. **GENTIANEAE**.
tetragona, Gilg, l. c. (= *Canscora tetragona*, Vatke). — Angola.

SCHISMATOCCLADA, Baker (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 825.
tricholarynx, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 480. — Madag.

SCHISMATOGLOTTIS, Zoll. & Mor. (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 825.
brevicuspis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 537. — Perak.
brevipes, Hook. f. l. c. 358. — Perak.
Kurzii, Hook. f. l. c. 539. — Pegu.
minor, Hook. f. l. c. 538. — Perak.
mutata, Scortech. ex Hook. f. l. c. — Perak.
Scortechini, Hook. f. l. c. 537. — Perak.

SCHISTOCARPAEA, F. Muell. in *Vict. Naturalist* (Mar. 1891) 182. **RHAMNEAE**.
Johnsoni, F. Muell. l. c. 183. — Austral.

SCHISTOCARPHA, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 825.
Liebmännii, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.
paniculata, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 210 [Schistocarpa]; ei in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* ix. (1891) extr. 3. — Costa Rica.
pedicellata, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.

SCHISTOCARYUM, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 930. **BORAGINEAE**.
ciliare, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 105. — China occ.
myosotideum, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 930. — Yunnan.
ovalifolium, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 105. — China occ.

SCHIZACHYRIUM, Nees = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
tenuiberbe, Munro, ex Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 435, in syn. = *A. tenuiberbe*, Hack.

SCHIZANDRA, Michx. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 825.
marmorata, Nichols, *Dict. Gard.* iii. (1886) 383. — Borneo.

SCHIZANTHUS, Ruiz & Pav. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 826.
albiflorus, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 124. — Chili.
angustifolius, Phil. l. c. 119. — Chili.
araucanus, Phil. l. c. 121 = *S. Grahami*, Gill. ?
Diazii, Phil. l. c. 122 = *retusus*, Hook.
floribundus, Phil. l. c. 119. — Chili.
glandulifer, Phil. l. c. 120 [glandulifera] = *alpestris*, Poepp. ?
heterophyllum, Phil. l. c. 125. — Chili.
humilis, Phil. l. c. 118. — Chili.
laciniosus, Phil. l. c. 125. — Chili.
latifolius, Phil. l. c. 123. — Chili.
litoralis, Phil. l. c. 118. — Chili.
tenuifolius, Phil. l. c. 118. — Chili.
tenuis, Phil. l. c. 124. — Chili.

SCHIZOCARPUM, Schrad. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 826.
guatemalense, Cogn. ex J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* iii. (1893) 34; et in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 290. — Guatem.
Palmeri, Cogn. & J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 100. — Mexic.

SCHIZOCASIA, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 826.
Regnierii, L. Linden & Rodig. in *Illustr. Hortie.* xxxiv. (1887) 17, t. 6; et ex *Gard. Chron.* (1888) ii. 328, nomen. — Siam.

SCHIZOCHILUS, Sond. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 826.
Burchellii, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 205 (= *Brachycorythis Burchellii*, Reichb. f.). — Afr. austr.
Gerrardi, Bolus, l. c. (= *B. Gerrardi*, Reichb. f.). — Afr. austr.

SCHIZOCODON, Sieb. & Zucc. (Diapens.). — Ind. Kew. ii. 826.
rotundifolius, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 497. — Ins. Ya-Yama.

SCHIZODIUM, Lindl. = **Disa**, Berg. (Orchid.).
biflorum, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 113 = *D. biflora*, Sw.

SCHIZOGLOSSUM, E. Mey. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 826.
aemulatum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 258. — Afr. austr.
altissimum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 13. — Afr. austr.
angustissimum, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 123. — Afr. trop.
araneiferum, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51. (1895) 13. — Afr. austr.
Ascheronianum, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 48. — Afr. austr.
atrorubens, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 353. — Afr. austr.
barbatum, Britton & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 27. — Afr. trop.
barbatum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 14. — Afr. austr.
Barberae, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 27. — Afr. austr.
bilamellatum, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 15. — Afr. austr.
Bolusii, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 48. — Afr. trop.
capitatum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 15. — Afr. austr.
carinatum, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 3. — Afr. austr.
ciliatum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1895) 354. — Afr. austro-or.
connatum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 69. — Afr. centr. or.
debile, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 305. — Afr. trop. or.
elatum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 123. — Afr. trop.
elingue, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 149. — Natal.
Elliotii, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 305. — Afr. trop.
erubescens, Schlechter, l. c. 306. — Afr. trop. or.
excisum, Bolus, l. c. xxxii. (1894) 259. — Afr. austr.
fasciculare, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894); et in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 354, in obs. (= *Aspidoglossum fasciculare*, E. Mey.). — Afr. austr.
filifolium, Schlechter, l. c. 4. — Afr. austr.
filipes, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 16. — Afr. austr.
firmum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 252. — Angola.
Flanaganii, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 3. — Afr. austr.

SCHIZOGLOSSUM : —
flavum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 355. — Natal.
Galpini, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 15. — Afr. austr.
glabrescens, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 17. — Afr. austr.
glanduliferum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 259. — Afr. austr.
grandiflorum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 27. — Afr. austr.
Guthriei, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 49. — Afr. austr.
heterophyllum, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 5; et in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 16 (= *Aspidoglossum heterophyllum*, E. Mey.). — Afr. austr.
Hollandiae, Harv. ex Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 6 = *virens*, E. Mey.
interruptum, Schlechter, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 233 = *interruptum*, Benth. & Hook. f.
lamellatum, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 48. — Afr. austr.
linifolium, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 4. — Afr. austr.
longirostre, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51. (1895) 17. — Afr. austr.
lunatum, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 49. — Afr. austr.
masaicum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 252. — Afr. trop. or.
multifolium, N. E. Br. l. c. 253. — Afr. trop. austro. or.
nitidum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 18. — Afr. austr.
Nyassae, Britton & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 26 [err. cal. ? Nyassae.]. — Afr. trop.
oblongum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 260. — Austr.
orbiculare, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 19. — Afr. austr.
ovalifolium, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 5. — Afr. austr.
pachyglossum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 354. — Afr. austr.
pallidum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 19. — Afr. austr.
parvulum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 354. — Afr. austr.
pedunculatum, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 50. — Afr. austr.
periglossoides, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 20. — Afr. austr.
pilosum, Schlechter, l. c. — Afr. austr.
pulchellum, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 15. — Afr. austr.
pumilum, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 21. — Afr. austr.
pygmaeum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 355. — Afr. austr.
quadridens, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 252. — Afr. austr.
restioides, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 50. — Afr. austr.
robustum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 267. — Afr. austr.
Schinzianum, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 51. — Afr. austr.
shirense, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 253. — Zambesia.
spatulatum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 120. — Afr. trop.
stenoglossum, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 28. — Afr. austr.
striatum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 356. — Afr. austr.
strictum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 22. — Afr. austr.
tenuissimum, Schlechter, l. c. 23. — Afr. austr.
tomentosum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 261. — Afr. austr.
tricorniculatum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 121. — Afr. trop.

SCHIZOGLOSSUM : —

- tricuspidatum, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 267. — Afr. austr.
 tridentatum, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 5. — Afr. austr.
 truncatulum, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 322. — Afr. trop. or.
 truncatum, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 28. — Afr. austr.
 tubulosum, *Schlechter*, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 23. — Afr. austr.
 umbellatum *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 356. — Afr. austr.
 umbelluliferum, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 24. — Afr. austr.
 venustum, *Schlechter*, l. c. — Afr. austr.
 verticillare, *Schlechter*, l. c. 25. — Afr. austr.
 villosum, *Schlechter*, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 29. — Afr. austr.
 violaceum, *K. Schum.* l. c. xvii. (1893) 122. — Afr. trop.
 virgatum, *Schlechter*, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 6 (= *Lagarinthus virgatus* E. Mey.). — Afr. austr.
 Wallacei, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 268. — Afr. austr.
 Woodii, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 25. — Afr. austr.

SCHIZOLAENA, Thou. (Chlaenac.). — Ind. Kew. ii. 826.

- laurina, *Baill.* in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 568 et 571; et *Hist. pl. Madag.* Atlas (1889) t. 102. — Madag.

SCHIZONOTUS, Rafin. = **Spiraea**, n. (Rosae.).

- argenteus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 225
 argentea, *Linn.*
 ariaefolius, *Greene*, *Fl. Francisc.* (1891) 58 =
 ariaefolia, *Sm.*
 discolor, *Koehne*, *Deutsche Dendrol.* (1893) 265 =
 discolor, *Rafin.*
 dumosus, *Koehne*, l. c. (1893) 265. — Am. bor.

SCHIZOPEPON, Maxim. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 827.

- dioicus, *Cogn.* in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2224. — China.

SCHIZOPETALUM, DC = **Schizopetalon**, Sims (Crucif.).

- bipinnatifidum, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 192. — Chili.
 biseriatum, *Phil.* l. c. — Chili.
 San Romani, *Phil.* in *Anal. Mus. nac. Ch.* (1891) 5; et l. c. 191. — Chili.
 tenuifolium, *Phil.* in *Annal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 191. — Chili.

SCHIZOPHRAGMA, Sieb. & Zucc. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 827.

- integrifolia, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1934. — China.

SCHIZOPREMNA, Baill. *Hist. des. pl.* xi. (1892) 119; Briq. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1894) 166. **VERBENACEAE**.

- timorensis, *Baill.* ll. cc. 120; et 166. — Timor.

SCHIZOPTERA, Turcz. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 827.

- lyrata, *Klatt*, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 360. — Mexic.

SCHIZOSCYPHUS, «K. Schum.» ex Taub. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 130 = **Schizosiphon**, K. Schum. (Legum.).**SCHIZOSIPHON**, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 101; Boerl. *Fl. Ned. Indië*, i. 1. (1890) 680. **LEGUMINOSAE**.

- roseus, *K. Schum.* ll. cc. — N. Guin.

SCHIZOSTACHYUM, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 827.

- Warburgii, *Hack.* ex *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 263. — N. Guin.

SCHIZOSTEPHANUS, Hochst. ex Benth. et Hook. f. = **Vincetoxicum**, Moench (Asclep.).

- alatus, *Hochst.* ex *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 139. — Afr. trop.
 somaliensis, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 250. — Reg. Somal.

SCHIZOTHECA, Lindl. = **Atriplex**, Tourn. (Chenop.).

- hastata, *Celak.* ex *Formanek, Květena*, ii. (1892) 291 = *hastata*, *Fourn.*
 littoralis, *G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* i. (1890) 335 = *littoralis*, *Fourn.*
 oblongifolia, *Celak.* ex *Formanek, Květena*, ii. (1892) 292 = *A. patula*, *Linn.*
 patula, *Celak.* l. c. = *A. patula*, *Linn.*
 rosea, *Celak.* l. c. = *A. rosea*, *Linn.*
 tartarica, *Celak.* l. c. = *tatarica*, *Celak.*

SCHIZOZYGIA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 752; K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 146. **APOCYNACEAE**.

- coffaeoides, *Baill.* ll. cc. — Zanzib.

SCHKUHRIA, Roth (Compos.). — Ind. Kew. ii. 827.

- anthemoides, *Coult.* in *J. D. Smith, Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 93 = *Hopkirkia*, *A. Gray.*
 coquimbana, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 29. — Chili.
 glomerata, *Robinson & Seaton*, in *Proc. Am. Acad.* xxviii (1893) 109. — Mexic.
 platyphylla, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci. Ser. III.* l. (1895) 156. — Mexic.
 Pringlei, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 278. — Mexic.

SHLECHTENDALIA, Willd. = **Adenophyllum**, Pers. (Compos.).

- lata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 361 = *Dysocanellata*, *A. Gray.*
 llum, Kuntze, l. c. = *Adenophyllum Porolum*, *Hemsl.*
 „, Kuntze, l. c. = *A. Wrightii*, *A. Gray.*

SCHLEGELIA, Miq. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 827.

- cornuta, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 6. — Guatem.

SCHLEINITZIA, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 336. **LEGUMINOSAE**.

- microphylla, *Warb.* l. c. — N. Guin.

SCHLUMBERGERIA, Éd. Morr. (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 828.

- Lehmanniana, *Wittm.* in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 60 = *Caraguata Lehmanniana*, *Baker.*

SCHMALHAUSENIA, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 281. **COMPOSITAE**.

- eriophora, *C. Winkl.* l. c. — As. centr.

SCHMIDELIA, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 828.

- insulana, *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 25. — Ins. Fernando Noronha.
 lasiostemon, *G. Beck*, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, iii. (1888) 255. — Ins. Stewart.
 Rehmanniana, *Szyszył. Pl. Rehmann.* ii. (1888) 47. — Natal.

SCHOENOCAULON, A. Gray (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 330.

- tenuifolium, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci.* i. (1895) 168 (= *Asagraea tenuifolia*, *Reichb.*). — Mexic.

SCHOEDONARDUS paniculatus, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 46, sphalm. = *Lep- turus paniculatus*, *Nutt.***SCHOENOPLECTUS**, Palla, in *Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 49 = **Scirpus**, [Tourn.] *Linn.* (Cyper.).

- carinatus, *Palla*, l. c. = *S. carinatus*, *Sm.*
 lacustris, *Palla*, l. c. = *S. lacustris*, *Linn.*
 littoralis, *Palla*, l. c. = *S. littoralis*, *Schrad.*
 mucronatus, *Palla*, l. c. = *S. mucronatus*, *Linn.*
 pungens, *Palla*, l. c. = *S. pungens*, *Vahl.*
 supinus, *Palla*, l. c. = *S. supinus*, *Linn.*
 Tabernaemontani, *Palla*, l. c. = *S. Tabernaemontani*, *C. C. Gmel.*
 triquetus, *Palla*, l. c.; *A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 90 = *S. triquetus*, *Linn.*

SCHOENOXIPHUM, Nees (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 830.

- Buchanani, *C. B. Clarke*, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 676, nomen, — Natal

SCHOENUS, Linn. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 831.

- aristatus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 756 = *Tetraria aristata*, *C. B. Clarke.*
 capensis, *Linn.* ex *C. B. Clarke*, l. c. 663 = *T. thermalis*, *C. B. Clarke.*
 curvulus, *F. Muell.* in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i.* ii. (1889) 36. — N. Guin.
 deustus, *Linn.* ex *C. B. Clarke*, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 664 = *Tetraria ustulata*, *C. B. Clarke.*
 discifer, *Tale.* in *Trans. and Proc. Roy. S. Austral.* xii. (1889) 131. — Austral.
 Dregeanus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 756 = *Tetraria Dregeana*, *C. B. Clarke.*
 Hornei, *C. B. Clarke*, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 657 (= *Cyclocampe elongata*, *Benth.*). — Ins. Scycheil.
 ligulatus, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci. Ser. III.* l. (1895) 156. — Mexic.
 loreus, Kuntze, l. c. (= *Elynanthus loreus*, *Nees*) = *T. cuspidata*, *C. B. Clarke.*
 microstachyus, Kuntze, l. c. (= *E. microstachyus*, *Boeck.*) = *T. fasciata*, *C. B. Clarke.*
 natans, *Thunb.* ex *C. B. Clarke*, l. c. 633 = *Scirpus tenuissimus*, *Boeck.*
 pictus, Kuntze, l. c. = *T. picta*, *C. B. Clarke.*
 sylvaticus, Kuntze, l. c. = *T. sylvatica*, *C. B. Clarke.*
 Teneriffae, *Vent.* ex *C. B. Clarke*, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 654 = *Rynchospora micrantha*, *Vahl.*
 ustulatus, *Vahl.* ex *C. B. Clarke*, l. c. 663 = *Tetraria rottboelliioides*, *C. B. Clarke.*

SCHOEPFIA, Schreb. (Olacin.). — Ind. Kew. ii. 832.

- californica, *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 139. — Calif.
 Griffithiana, *Valetton, Crit. overz. Olacin.* (1886) 128. — Bengal.
 Miersii, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 17 (1892) t. 265b. — Cambodia.

SCHOLLERA, Schreb. = **Heteranthera**, Ruiz & Pav. (Ponted.).

- callifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 719 = *H. callifolia*, *Reichb.*
 dubia, Kuntze, l. c. = *H. graminea*, *Vahl.*
 Kotschyana, Kuntze, l. c. = *H. callaefolia*, *Reichb.*
 limosa, Kuntze, l. c. = *H. limosa*, *Willd.*
 Potamogeton, Kuntze, l. c. = *H. Potamogeton*, *Solms.*
 reniformis, Kuntze, l. c. = *H. reniformis*, *Ruiz & Pav.*
 Seubertiana, Kuntze, l. c. = *H. Seubertiana*, *Solms.*
 spicata, Kuntze, l. c. = *H. spicata*, *Presl.*
 zosterifolia, Kuntze, l. c. = *H. zosteriaefolia*, *Mart.*

SCHOLLERA, Roth = **Oxycoccus**, Tourn. (Vac- cin.).

- erythrocarpa, *Britton*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 253 (= *S. erythrocarpa*, *Steud.*) = *O. erythrocarpus*, *Pers.*
 macrocarpa, *Britton*, l. c. (= *S. macrocarpa*, *Steud.*) = *O. macrocarpus*, *Pers.*
 Oxycoccus, *Britten*, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 233, in obs. (= *S. Oxycoccus*, *Roth*) = *O. palustris*, *Pers.*

SCHOMBURGKIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 833.
chionodora, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) i. 73. — Am. centr.
lepidissima, *Reichb. f. l. c.* (1889) i. 72. — Hab. ?
Sanderiana, *Rolf. l. c.* (1891) i. 202, 614. — Hab. ?
Thomsoniana, *Reichb. f. l. c.* (1887) ii. 38, et (1891) i. 615; *Veitch, Man. Orch. Pl.* ii. (1887) 202. — Ind. occ.

SCHOUTENIA, Korth. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 833.
Buurmanni, *Koerd. & Valet. Boomsoort. van Java*, i. (1894) 215. — Java.
glomerata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* ix. (1891) ii. 216. — Johore.
hypoleuca, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* 9 (1888) t. 134. — Cambodia.
Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* ix. (1891) ii. 216. — Penang.
Mastersii, *King, l. c.* 215 (= *Chaetocalyx accrescens*, Mast.). — Malaya, Borneo.

SCHRANKIA, Willd. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 833.
Intsia, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* for 1888, i. (1889) 178 = *uncinata*, Willd.

SCHREBERA, Roxb. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 831.
Buchanani, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 95. — Zambesia.

SCHREBERA, Thunb. = **Hartogia**, Linn. f. (Celastr.).
capensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 117 = *Agathosma hispida*, Baril.

SCHREIBERSIA, Pohl = **Augusta**, Pohl (Rubiace.).
longifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 298 = *A. lanceolata*, Pohl.

SCHULTESIA, Mart. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 834.
mexicana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 144. — Mexic.
senegalensis, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 26. — Seneg.

SCHUMANNIA, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 192. **UMBELLIFERAE**.
turcomanica, Kuntze, l. c.; Lipsky, l. c. xiii. (1894) 368, sphalm. 168 (= *Ferula Karelini*, Bunge). — Turkest.

SCHUURMANSIA, Blume (Violar.). — Ind. Kew. ii. 834.
Henningssii, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* ix. (1887) 210. — N. Guin.

SCHWABEA, Endl. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 834.
Anisacanthus, *Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 346 (= *Justicia anisacanthus*, Schweinf.). — Afr. trop. or.
ecboloides, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 58. — Afr. trop. or.
revoluta, *Lindau, l. c.* 59. — Afr. trop. or.

SCHWACKAEA, Cogn. in *Th. Dur. Ind. gen. Phan.* (1888) 132; et in *A. DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 132. **MELASTOMACEAE**.
cupheoides, *Cogn. ll. cc.* 132 et 183 (= *Pterogastra cupheoides*, Seem.). — Mexic., Am. centr.

SCHWEINFURTHAFRA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 5 = **Glyphaea**, Hook. f. (Tiliac.).
lateriflora, Kuntze, l. c. = *G. grewoides*, *Hook. f. tomentosa*, Kuntze, l. c. = *G. tomentosa*, Mast.

SCHWEINFURTHIA, Al. Br. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 834.
latifolia, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 338, nomen; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2362. — Arabia.

SCHWENDENERA, K. Schum. in *Sitzb. Ges. naturf. Freund. Berl.* 1886 (1887) 157. **RUBIA-CEAE**.
tetrapyxis, *K. Schum. l. c.* — Bras.

SCIADOPHYLLUM, P. Br. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 835.
arborescens, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 91 = *S. Jacquinii*, Griseb.
coriaceum, *El. March. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii.* (1887) 275, t. 41; *Oliver, ex im Thurn, in Timbri, v.* (1886) 195. — Guian. angl.
heptaphyllum, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 91 = *Brownei*, Spreng.
Lehmannii, *Harms, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 69 (= *Schefflera Lehmannii*, Harms). — Am. centr.
leptophyllum, *Herb. Kew. ex Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 156 = *Dizygotheca leptophylla*, Hemsl.
paniculatum, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 37. — Bolivia.
patulum, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club* iii. 3 (1893) 41. — Bolivia.

SCIAPHILA, Blume (Triurid.). — Ind. Kew. ii. 835.
affinis, *Becc. Malesia*, iii. (1890) 334, t. 39, fig. 14-18. — Borneo
andensis, *Becc. l. c.* 339, t. 42, fig. 10-14. — Borneo.
arfarkiana, *Becc. l. c.* 336, t. 41, fig. 6-14. — Borneo.
caudata, *Poulsen, in Vidensk. Middel. Kjob.* 1884-86 (1886) 165; *Lucante, in Rev. de Bot.* vi. (1887-88) 197. — Bras.
corniculata, *Becc. Malesia*, iii. (1890) 336, t. 39, fig. 5-13. — Borneo.
crinita, *Becc. l. c.* 338, t. 42, fig. 1-9. — Borneo.
elata, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 659. — Bras.
major, *Becc. Malesia*, iii. (1890) 332, t. 40, fig. 1-11. — Borneo.
papua, *Becc. l. c.* 335, t. 41, fig. 1-5. — N. Guin.
papillosa, *Becc. l. c.* 334, t. 39, fig. 1-4. — N. Guin.
Richardi, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1895) 1189. — Am. trop.
Schwackeana, *Jobow, in Pringsh. Bot. Jahrb.* xx. (1889) 478. — Bras.
sumatrana, *Becc. Malesia*, iii. (1890) 333, t. 40, fig. 12-20. — Sumatra.

SCILLA, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 836.
Adlami, *Baker, in Gard. Chron.* (1891) i. 520. — Natal.
Buchanani, *Baker, l. c.* (1893) i. 568. — Afr. trop. austro-or.
Eckloni, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 7. — Afr. austr.
edulis, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1892) 475. — Afr. trop.
Engleri, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. (1893) 391 (= *S. pallidiflora*, Engk.). — Afr. trop.
Fischeri, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 142. — Afr. trop. or.
gabunensis, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. (1892) 476. — Afr. trop. occ.
gracillima, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 142. — Afr. trop. or.
Hildebrandtii, *Baker, ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii.* (1887) 551, nomen, in obs. — Madag.
Johnstoni, *Baker, ex Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Njaro Exped. Append.* (1886) 347; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii.* (1887) 351. — Afr. trop. or.
Ledieni, *Engl. in Gartenfl.* xxxviii. (1889) 153, t. 1394. — Congo.
leucophylla, *Baker, in Gard. Chron.* (1893) i. 506. — Persia.
longipes, Batt. in Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 69 = *autumnalis*, Linn.
pallidiflora, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1892) 476 = *S. Engleri*, *Th. Dur. & Schinz.*
Petersii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 142. — Afr. trop. or.
Schweinfurthii, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1892) 475. — Afr. trop.

SCILLA : —
somaliensis, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. (1892) 476. — Reg. Somal.
Tayloriana, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 426. — Afr. trop. or.
textilis, *Rendle, l. c.* 427. — Afr. trop. or.
uyuiensis, *Rendle, l. c.* 428. — Afr. trop. or.
Volkensii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 142. — Afr. trop. or.
yemensis, *Deflers, Voy. Yémen* (1889) 212. — Arabia.

SCINDAPSUS, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 838.
perakensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 542. — Perak.
Scortechinii, *Hook. f. l. c.* 541. — Perak.

SCIRPUS, [Tourn.] Linn. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 838.
afflatus, *albibracteatus*, *albovaginatus*, *albidus*, *atacamensis*, *bonariensis*, *capillatus*, *carniolicus*, *cellulosus*, *costulatus*, *Cunninghamii*, *debilis*, *Dombeyanus*, *emarginatus*, *fistulosus*, *fuegianus*, *fuscousanguineus*, *glauco-virens*, *gracilis*, *grandis*, *Hookeri*, *japonicus*, *Lechleri*, *Liebmannianus*, *liocarpus*, *litoralis*, *macranthus*, *maculosus*, *marginulatus*, *melanocarpus*, *mendocinus*, *microcarpus*, *montevideensis*, *nanus*, *ochrostachys*, *olivaceus*, *pachycarpus*, *punctatus*, *Sellowianus*, *sphacellatus*, *stolonifer*, *subarticulatus*, *subtilis*, *subviciiparus*, *tenuissimus*, *tetraquetrus*, *tricostatus*, *valdivianus*, *vicentinus*, *viviiparus*, *Widgrenii*. Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 757-58 = *homonyma omnia* Eleocharites.
aggregatus, Steud. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 644 = *Ficinia tenuifolia*, Kunth.
angolensis, C. B. Clarke, ex *Th. Dur. & Schinz, l. c.* 617. — Angola.
aphyllus, Boeck. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 275. — Reg. Argent.
appendiculatus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 757 = *Eleocharis palustris*, R. Br.
Arechavaletae, Boeck. *Cyper. Nov.* i. (1888) 18. — Uruguay.
arenicolus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 757 = *Eleocharis montana*, Roem. & Schult.
aristatus, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 138 (= *Isolepis aristata*, Presl). — Hung.
arrhenopogon, Hochst. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 625 = *littoralis*, Schrad.
atrosanguineus, Boeck. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 276. — Afr. trop. or.
aturensis, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 199, fig. 8. — Am. austr. trop.
Bachmannianus, Boeck. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 634 = *venustus*, Boeck.
Beccarii, Boeck. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 275. — Hab. ?
Boeckelerianus, Schweinf. in *Bull. Herb. Boiss.* App. ii. (1894) 50. — Eritrea.
Buettnerianus, Boeck. *Cyper. Nov.* i. (1888) 20. — Guinea.
Burchelli, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 618. — Afr. austr.
Burkei, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, l. c.* — Afr. austr. et austro-or.
californicus, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* xi. (1892) 79; et *Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am.* (1892) 6 = *riparius*, J. & C. Presl.
Clarkei, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 244. — Borneo.
concolor, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 110. — Japon.
cylindricus, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* xi. (1892) 79; et *Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am.* (1892) 6 = *leptolepis*, Chapm.
distichophyllus, Boeck. *Cyper. Nov.* i. (1888) 19. — Reg. Argent.
Dussii, Boeck. l. c. ii. (1890) 38. — Ins. Martinic.
erythropodus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 757 = *leptolepis*, Chapm.
tuberculata, Kuntze, l. c. 758 = *leptolepis*, Chapm.
fuirenoides, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 109. — Japon.

SCIRPUS : —

- fuscus*, Roxb. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 639, in syn. = *Fimbristylis compressa*, Boeck.
Gaillardii, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 197, fig. 7. — Am. austr. trop.
globiceps, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 622. — Afr. austr.
granulato-hirtellus, Boeck. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 179 = *Fimbristylis exilis*, Roem. & Schult.
griquensium, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 623. — Afr. austr.
Hallii, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. ix. (1889) 11. — Am. bor.
Hieronymi, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 18. — Reg. Argent.
karrooicus, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 624. — Afr. austr.
lagoensis, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 15. — Bras.
lanceaegulumis, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 634 = *varius*, Boeck.
leucanthus, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 46 = *supinus*, Linn.
leucocoleus, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 125. — Afr. trop.
Loefgrenii, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 16. — Bras.
loeteflorens, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 625, nomen. — Afr. austro-occ. extratrop.
longevaginatus, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 16. — Bras.
macrolepis, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 614, 616 = *Bulbostylis Kirkii* et *Zeyheri*, C. B. Clarke.
macrostachys, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 19. — Reg. Himal.
melanocephalus, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 131, nomen. — Afr. trop.
mexicanus, C. B. Clarke, ex Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 77; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 4 = *cyperoides*, Hemsl.
microstachys, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 14. — Reg. Argent.
minutissimus, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 46; et ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 630 = *sororius*, C. B. Clarke.
mucronulatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis acuta*, R. Br.
Muelleri, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 14. — Austral.
mutatus, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 627, in syn. = *Eleocharis spiralis*, R. Br.
natalensis, « Boeck. ex C. B. Clarke » in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 623 = *S. Hystrix*, Thunb.
Niederleinianus, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 16. — Reg. Argent.
Novae-Zelandiae, Colinso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 277. — N. Zel.
pallens, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 633 = *Thouarsianus*, Schoutt.
Peckii, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xi. (1892) 82; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 9. — Am. bor.
pinguiculus, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 629. — Afr. austr.
potosinus, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 82; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 9. — Mexic.
pretorianus, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 613 = *Bulbostylis cinnamomea* et *collina*, C. B. Clarke.
Pringlei, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 103 t. 30. — Mexic.
Pseudo-setaceus, Daceau, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 85. t. 1; Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 99. — Lusit., Algeria.
purpurascens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis congesta*, D. Don.
radiciflorus, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 199 fig. 9. — Am. austr. trop.

SCIRPUS : —

- Rehmannianus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 629, in syn. = *quinquefarius*, Buch.-Ham.
Schaffneri, Boeck. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 275. — Mexic.
Schaffneri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis cancellatus*, S. Wats.
Schinzianus, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 618 = *S. Burkei*, C. B. Clarke.
Schinzii, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 47; et ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, l. c. 621, in syn. = *dioecus*, Boeck.
Schwackeanus, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 15. — Bras.
Sideri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis variegata*, Presl.
sororius, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 630 (= *Isolepis sororius*, Kunth). — Afr. austr.
ternatus, Ham. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 656, in syn. = *erectus*, Poir.
thermalis, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 99 = *littoralis*, Schrad.
Thomsonii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis afflata*, Steud.
Torreyanus, Kuntze, l. c. = *E. microcarpa*, Torr.
trachyspermus, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 633 (= *Isolepis trachysperma*, Nees). — Afr. austr.
transiens, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Acad. Wiss. (1894) 38, nomen. — Afr. trop.
transvaalensis, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 163 = *Bulbostylis cinnamomea*, C. B. Clarke.
triangularis, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 99 = *pungens*, Vahl.
trispiculata, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 613 = *Bulbostylis collina*, C. B. Clarke.
validus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis geniculata*, R. Br.
varius, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 634. — Afr. trop. austro-or.
viridis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis geniculata*, R. Br.
Warmingii, Boeck. ex Warm. Lagoa Santa (1892) 240, cum xylogr. — Bras.
Welwitschii, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 141. — Lusit.
yokuhamensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis tetraquetra*, Nees.
Zollingeri, Kuntze, l. c. = *E. afflata*, Steud.

SCLERANTHUS, Linn. (Illecebr.). — Ind. Kew. ii. 844.

- fasciculatus*, Gillot & Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) p. cxxiii. — Gall. mer.
hamatus, Hausskn. & Bornm. ex Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 17. — As. Min.
imbricatus, G. Beck. in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 66 = *collinus*, Horn.
minusculus, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Sept. 1890) 66. — Austral.
pumilus, Gillot & Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) p. cxxvii = *verticillatus*, Tausch.
ruscinonensis, Gillot & Coste, l. c. p. cxxvii. — Gall.

SCLERIA, Berg. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 845.

- Balansae*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxi. (1890) n. 1, 148 i. 44b. — Parag.
Baroni, C. B. Clarke, ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 669, nomen. — Madag.
Bojeri, C. B. Clarke, l. c. nomen. — Madag.
Buchanani, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 34. — Afr. trop. or.
Buchanani, Boeck. l. c. 33. — Afr. trop. et austr.
Buettneri, Boeck. l. c. 36. — Gabon.
canescens, Boeck. l. c. 37. — Ins. Porto Rico.
catophylla, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 670. — Afr. trop. et subtrop.

SCLERIA : —

- cenchroides*, Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 669 = *bulbifera*, A. Rich.
cubensis, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 42. — Cuba.
Eggersiana, Boeck. l. c. 41. — Cuba.
flaccida, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 688. — Ind. or.
flexuosa, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 33 = *remota*, Ridl.
glabra, Boeck. l. c. 35. — Afr. trop. austro-or.
globonux, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 671. — Afr. trop.
graminifolia, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 104. — Mexic.
Hilsenbergii, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 34 = *pulchella*, Ridl.
keyensis, K. Schum. ex Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1890) 267. — N. Guin.
khasiana, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 29. — Khasia.
khasiana, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 692. — Khasia.
Krugiana, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 35. — Ins. Portorico.
Kuntzei, Boeck. l. c. 34. — Java.
multispiculata, Boeck. l. c. 36. — Afr. trop. or.
multispiculosa, Boeck. l. c. — Afr. trop.
natalensis, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 673, nomen. — Natal.
nossibensis, C. B. Clarke, l. c. nomen. — Ins. Nossibe.
pandanophylla, Kurz, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 714; in syn. = *Carex pandanophylla*, C. B. Clarke.
Pittieri, Boeck. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 7, nomen. — Costa Rica.
Pseudo-Sorghum, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 21, nomen. — Afr. trop.
psilorrhiza, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 691. — Ind. or.
puzzolanea, K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 21; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 129. — Afr. trop. or.
Rehmanni, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 674, nomen. — Transvaal.
Ridleyi, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 686. — Ind. or.
Rinkiana, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 30. — Ins. Pulo Penang.
salebrosa, C. Spreng. fide Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 673 = *pergracilis*, Kunth.
scaberrima, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 41. — Ins. S. Vincent.
scabrosa, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxi. (1890) n. 1, 148, t. 44. — Parag.
Schenskyana, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 31. — Bras.
setulosa, Boeck. l. c. i. (1888) 33 = *Dregeana*, Kunth.
spinulosa, Boeck. l. c. ii. (1890) 30. — Congo.
Tonduzii, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 464, nomen. — Costa Rica.
trigonocarpa, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 37. — Bras.
Trinitatis, Boeck. l. c. ii. (1890) 31. — Ins. Trinit.
ustulata, F. M. Bailey. Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1898) 81 (= *Exocaryasclerioides*, Benth.). — Austral.
Vogelii, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 675 (= *S. racemosa*, Benth.). — Afr. trop. occ.
Welwitschii, C. B. Clarke, l. c. (= *S. junciformis*, Welw.). — Angola.
Woodii, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austr. et trop.

SCLEROCARPUS, Jacq. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 847.

- coffeaecola*, Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 360 [coffeaecolus]. — Columb.
spatulatus, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 103. — Mexic.

SCLEROCARYA, Hochst. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 847.
Schweinfurthiana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. Abhandl. xxix. (1888) 63. — Afr. austro-occ. extratrop.
Schweinfurthii, «Schinz» ex O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1892) 152 = Schweinfurthiana, Schinz.

SCLEROCHAETIUM, Nees = **Tetraria**, Beauv. (Cyper.)
dactyloides, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894. (1895) 661 = T. involucreata, C. B. Clarke.
teres, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, l. c. 662 = T. Rottboellii, C. B. Clarke.

SCLEROCHITON, Harv. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 847.
stenostachyus, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 27 — Afr. trop. or.

SCLEROCHLOA, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 848.
filiformis, Tornab. Fl. Sicula (1887) 595. — Sicil.

SCLEROLEPIS, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 848.
uniflora, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 25; Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 311 = verticillata, Cass.

SCLEROLOBIMUM, Vog. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 848.
Glaziovii, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 80. — Bras.

SCLEROPYRUM, Arn. (Santal.). — Ind. Kew. ii. 848.
Maingayi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 235. — Penins. Mal.

SCLEROTHECA, A. DC. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 849.
Forsteri, Drake, Ill. Ins. Maris Pacif. (1886) 222 t. 8; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 114. — Ins. Societ.
Closiana, Warb. l. c. 30 (= *Eriodaphus Closianus*, Baill.). — Afr.-austr.
maritima, Warb. l. c. 29 (= *Phoberos maritima*, Miq.). — Sumatra.

SCOLIOTHECA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 724; et Hist. des pl. x. (1888) 84. **GESNERIACEAE**.
Trianae, Baill. ll. cc. — N. Granat.

SCOLOCHLOA, Mert. & Koch = **Arundo**, Tourn. (Gramin.).
arundinacea, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 79 = festucacea, Link.

SCOLOPIA, Schreb. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 849.
borbonica, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 29. — Ins. Borbon.
cuneata, Warb. l. c. 29; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 278. — Afr. trop. or.
Ecklonii, Warb. l. c. 29 = seq.
Ecklonii, Szyszyl. Pl. Rehmann. (1887) 19 (= *Phoberos Ecklonii*, Presl.). — Afr. austr.
luzonensis, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 30 = *Scolopia Dasyanthera*, F. Villar.
Mundtii, Warb. l. c. 29 (= *Phoberos Mundtii*, Harv. & Sond.). — Afr. austr.
novo-guineensis, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 384; et l. c. 30. — N. Guin.
rhinanthera, Warb. l. c. 29 = *rhinanthera*, Clos.
spinosa, Warb. l. c. = *Roxburghii*, Clos.
Zeyheri, Warb. l. c. 29 = seq.
Zeyheri, Szyszyl. Pl. Rehmann. (1887) 19 (= *Phoberos Zeyheri*, Presl.). — Afr. austr.

SCOLYMOCEPHALUS, Weinm. = **Protea**, Linn. *abyssinicus, acaulis, acerosus, acuminatus, amplexicaulis, angustatus, auriculatus, barbiger, caffer, calocephalus, canaliculatus, coccineus, compactus, cordatus, echinulatus, effusus, elongatus, formosus, fulvus, glaber,*

SCOLYMOCEPHALUS: —

hirtus, incomptus, laevis, lanceolatus, longiflorus, longifolius, loreus, macrocephalus, macrophyllus, melaleucus, mellifer, montanus, mucronifolius, nervifolius, nitidus, obtusifolius, ovatus, patens, pendulus, pulchellus, reconditus, repens, revolutus, rubiculus, scaber, scabridus, Scolopendrium, Scolymus, speciosus, tenax, tenuifolius, turbiniflorus, venosus, venulosus, villifer, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 581-82 = homonyma omnia Proteae.
coriaceus, Kuntze, l. c. 581 = *P. punctata*, Meissn.
cynarodes, Kuntze, l. c. = *P. cynaroides*, Linn.
eximius, Kuntze, l. c. = *P. latifolia*, R. Br.
humiflorus, Kuntze, l. c. = *P. humilis*, R. Br.
Lepidocarpodendron, Kuntze, l. c. = *P. Lepidocarpon*, R. Br.
marginalis, Kuntze, l. c. = *P. melaleuca*, R. Br.
nanus, Kuntze, l. c. = *P. rosacea*, Linn.
penicillatus, Kuntze, l. c. = *P. Mundi*, Klotzsch.
pyrifolius, Kuntze, l. c. = *P. Buekiana*, Meissn.
Roupelliae, Kuntze, l. c. = *P. Roupelliae*, Meissn.
spectabilis, Kuntze, l. c. = *P. latifolia*, R. Br.

SCOPARIA, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 849.
purpurea, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 51. — Ins. Fernando Noronha.

SCOPOLIA, Adans. = **Ricotia**, Linn. (Crucif.).
carnosula, cretica, Lunaria, sinuata, tenuifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 36 = homonyma omnia Ricotiae.

SCOPOLIA, Jacq. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 850.
sinensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 176. — China.

SCOPOLINA, Schult. = **Scopolia**, Jacq. (Solan.).
carniolica, japonica, sinensis, tangutica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 452 = homonyma omnia Scopoliae.
stemonifolia, Kuntze, l. c. = *Scopolia lurida*, Dunal.

SCORIA, Rafin. = **Carya**, Nutt. (Jugland.).
glabra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 6 = *C. porcina*, Nutt.
minima, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 178 = *C. minima*, Nutt.
ovata, MacMill. l. c. = *C. alba*, Nutt.

SCORTECHINIA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 366, et in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1706. **EUPHORBIACEAE**.
Kingii, Hook. f. ll. cc. 367, et t. 1706. — Ins. Nicob.

SCORZONELLA, Nutt. = **Microseris**, D. Don (Compos.).
arguta, Drew, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 152. — Calif.
Bolanderi, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 52; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 223 = *Microseris Bolanderi*, A. Gray.
borealis, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 19 = *Leontodon borealis*, DC.
Howellii, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 52 = *Microseris Howellii*, A. Gray.
maxima, Bioletti, ex Greene, in Erythea, i. (1893) 69; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 223. — Calif.
megacephala, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 50. — Am. bor. occ.
montana, Greene, l. c. 53. — Calif.
paludosa, Greene, l. c. 52 (= *Microseris sylvatica* Sch. Bip. var. *Stillmani*, A. Gray; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 223. — Calif.
pratensis, Greene, l. c. 51. — Calif.
procera, Greene, l. c. 50 = *Microseris procera*, A. Gray.
scapigera, Greene, l. c. 53 = *Scorzonera scapigera*, Forst.

SCORZONERA, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 850.
Albertoregelia, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 322. — Turkest.
amasiana, Hausskn. & Bornm. ex Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 17. — As. Min.

SCORZONERA: —

bicolor, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 266. — Armen. turc.
bracteosa, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 324. — Buchara.
cana, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1893) 365 = *Jacquiniana*, Boiss.
mongolica, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 492. — Mongolia.
capito, Maxim. l. c. 491. — Mongol.
crispatula, Boiss. ex Willk. Illustr. Fl. Hisp. ii. (1886-92) 83. t. 135. — Hisp.
glabra, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 333. — Turkest.
Hissariae, C. Winkl. l. c. xi. (1889) 172. — Buchara.
isophylla, Post, Fl. Postianae, iii. (1892) 13. — Syria.
jacquiniana, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. (1893) 1324 = *Jacquiniana*, Boiss.
kenissaea, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 321. — Syria.
leptoclada, Hausskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Bot. Ver. Jena, N. Folge, vi. (1894) 66. — Oriens.
Raddeana, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 150. t. 3 fig. 1. — Turcom.
rhodantha, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 86. — Graecia.
rubriseta, Lipsky, in Mém. Soc. Hist. nat. Kiew, x. (1891) extr. 20; et in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 315. — Reg. Cauc.
rumelica, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1892-93) 40. — Rumel.
rupicola, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 17. — As. Min.
Schweinfurthii, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 320. — Desert, Aegypt.-Arab.
Sintenisii, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 267. — Armen. turc.
troodea, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 320. — Ins. Cypr.

SCOTTELLIA, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 2265. **BIXINEAE**.
leonensis, Oliver, l. c. — Sierra Leone.

SCRIBNERIA, Hack. in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 105; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2. (1887) 78. **GRAMINEAE**.
Bolanderi, Hack. ll. cc. t. 5 (= *Lepturus Bolanderi*, Thurb.). — Calif., Oregon.

SCROFELLA, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 511. **SCROPHULARINEAE**.
chinensis, Maxim. l. c. 511. — China.

SCROPHULARIA, Tourn. ex Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 852.
alaschanica, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 380. — Mongolia.
antiochia, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 27. — Syria.
balcanica, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 55; et Fl. Bulg. (1891) 421. — Bulg.
Bornmuelleri, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 348. — As. Min.
bosniaca, G. Beck, in Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, ii. (1887) 135 t. 5 fig. 7-9 = *nodosa*, Linn.
Duriaei, Spach, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 632, nomen. — Algeria.
gileadense, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 438. — As. occ.
Henryi, Hemsl. l. c. xxvi. (1890) 178. — China.
Jankae, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 231 = *laciniata*, Linn.
kansuensis, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 381. — China.
ningpoensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1899) 178. — China.
nusairiensis, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 27. — Syria.
Peyroni, Post, l. c. 28. — Syria.
pindicola, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 88. — Graecia.
provincialis, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 264 [Scrophularia] (= *S. lucida*, Gren. & Godr.). — Gall. mer.

SCROPHULARIA : —

- Przewalskii, *Batalin*, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 382. — Tibet.
 Reuteri, *Daveau*, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 169. — Lusit.
 Saharæ, *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 634; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 296. — Algeria.
 Teucrium, *Christ*, in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 128. — Teneriffa.

SCUTELLARIA, Riv. ex Linn. (Labiata). — Ind.

- Kew. ii. 855.
andamanica, *Prain*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) II. 307 = *oblonga*. *Benth.*
aurea, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 163. — Mexic.
Brittonii, *Porter*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 177. — Am. bor.
campestris, *Britton*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 283. — Am. bor.
Footiana, *A. I. Mulford*, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 118. — Am. bor.
formosana, *N. E. Br.* in *Gard. Chron.* (1894) ii. 212. — China.
Helenæ, *Alboff*, in *Bull. Soc. Imp. Hort.* [Compt.-rend. Sect. Odessa (1891)-extr. 14, ex *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 261, in syn. = *pontica*, *C. Koch.*
hercegovinica, *Formanek*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 384: *Murb.* in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. (1892) 65 = *orientalis*. *Linn.*
hispidula, *Robinson*, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 174. — Mexic.
javalambrensis, *Pau*, *Not. Bot. Fl. Espan.* ii. (1889) 35 = *alpina*. *Linn.*
Kingiana, *Prain*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) II. 308. — Reg. Himal.
kurdica, *Post*, *Pl. Postianæ*, iv. (1892) 10. — As. Min.
Livingstonei, *Baker*, ex *Guerke*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 342. — Afr. trop. or.
lutea, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 76. — Guatem.
Nicholsoni X, *Taub.* in *Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brand.* xxvii. (1886) 25, et xxxviii. (1887) 25, t. 2. — Anglia.
nipponica, *Makino*, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 54. — Japon.
obtusifolia, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 296. — China.
orichalcea, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 29. — Guatem.
paucifolia, *Baker*, in *Kew Bull.* (1895) 292. — Afr. centr. austr.
petiolata, *Hemsl.* ex *Lace & Prain*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) II. 308; et in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) 326. — Belutchist.
Schweinfurthii, *Brig.* in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 194. — Afr. centr. bor.
sessilifolia, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 297. — China.
shikokiana, *Makino*, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 54. — Japon.
stenosiphon, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 297. — China
strigillosa, *Hemsl.* l. c. — China.
suffrutescens, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 160. — Mexic.
tosaensis, *Makino*, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 54. — Japon.

SCUTIA, Comm. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 856.
obcordata, *Baill. Hist. pl. Madag.*, Atlas (1894) t. 285. — Madag.**SCUTICARIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 856.

- Keysseriana*, *Hort.* ex *Journ. of Hort.* ii. (1894) 194, 195, fig. 26 = *S. Steelii*, *Lindl.*

SCYPHANTHUS, [D. Don in] Sweet = **Grammatocarpus**, Presl (Loaseae).

- stenocarpus*, *Urban & Gilg.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 118 = *G. volubilis*, *Presl.*

SCYPHOCEPHALIUM, Warb. in Ber. Deutsche

- Bot. Ges.* xiii. (1895) 84. **MYRISTICACEAE.**
chrysothrix, *Warb.* l. c.; et in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* (1895) 98. — Kamerun.
Kombo, *Warb.* ll. cc. (= *Myristica Kombo*, *Baill.*). — Gabon.
Mannii, *Warb.* l. c. 98 (= *M. Mannii*, *Benth.*). — Afr. trop. occ.

SCYPHOSTEGIA, Stapf, in Trans. Linn. Soc.

- Ser. II. iv. (1894) 217. **MONIMIACEAE.**
borneensis, *Stapf*, l. c. 218. — Borneo.

SCYPHOSTELMA, Baill. Hist. des pl. x. (1890)

- 252; *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 254. **ASCLEPIADEAE.**
granatensis, *Baill.* ll. cc. — N. Granat.

SEBAEA, Soland. ex R. Br. (Gentian.). — Ind.

- Kew. ii. 857.
acutiloba, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 412. — Afr. austr.
Barbeyana, *Schinz*, in *Viertelj. Naturf. Ges. Zürich*, xxxvii. (1891) 326. — Afr. austr.
Evansii, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 27; *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2377. — Afr. austr.
filiformis, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 412. — Natal.
Grisebachii, *Schinz*, in *Viertelj. Naturforsch. Ges. Zürich*, xxxvi. (1891) 322. — Afr. austr.
linearifolia, *Schinz*, l. c. 321. — Afr. austr.
longicaulis, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 219. — Afr. austr.
microphylla, *Knobl.* in *Bot. Centralbl.* lx. (1894) 324 = *khasiana*, *C. B. Clarke.*
minutiflora, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 413. — Afr. austr.
Rehmanni, *Schinz*, in *Viertelj. Naturforsch. Ges. Zürich*, xxxvi. (1891) 322. — Transvaal.
repens, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 219. — Afr. austr.
tabularis, *Echl.* ex *Schinz*, in *Viertelj. Naturforsch. Ges. Zürich*, xxxvi. (1891) 319. — Afr. austr.
tetragona, *Vatke*, ex *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 336, in obs. nomen. — Angola.
Welwitschii, *Schinz*, in *Viertelj. Naturforsch. Ges. Zürich*, xxxvi. (1891) 321. — Angola.
Zeyheri, *Schinz*, l. c. 325. — Afr. austr.

SEBASTIANIA, Spreng. (Euphorb.). — Ind.

- Kew. ii. 858.
Palmeri, *J. N. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 112. — Mexic.
Pringlei, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 149. — Mexic.
Ramirezii, *Mauzy*, in *La Natureza*, Ser. II. ii. (1894) 406. — Sonora.

SEBSCHAUERA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 494 =

- Sebastiano-Schaueria**, *Nees* (Acanth.).
oblongata, *Kuntze*, l. c. = *S. oblongata*, *Nees.*

SECAMONE, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii.

859.
acuminata, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 263 (= *Toxocarpus acuminatus*, *Benth.*). — Ind. or.
crassifolia, *K. Schum.* l. c. (= *Genianthus crassifolius*, *Hook. f.*). — Penins. Mal.
discolor, *K. Schum. & Vatke*, ex *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 140. — Madag.
Elliottii, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 141. — Madag.
erythradenia, *K. Schum.* l. c.; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 263. — Afr. trop.
Gerrardi, *Harv.* ex *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894); et in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 353. — Afr. austr.
glaberrima, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 142. — Madag.
gracilis, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 248. — Mombasa, Afr. trop. or.
Kirkii, *N. E. Br.* l. c. — Zanzibar.

SECAMONE : —

- Kleinii*, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 263 (= *Toxocarpus Kleinii*, *Wight et Arn.*). — Ind. or.
laurifolia, *K. Schum.* l. c. (= *Genianthus laurifolius*, *Hook. f.*). — Sikkim.
micrandra, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 142. — Afr. trop.
papuana, *Warb.* l. c. xviii. (1894) 206. — N. Guin.
platystigma, *K. Schum.* l. c. xvii. (1893) 143. — Angola.
retusa, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 248. — Zanzib.
sansibariensis, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 325. — Afr. trop. or.
Schweinfurthii, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 143. — Afr. trop.
stenophylla, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 325. — Afr. trop.
Stuhlmannii, *K. Schum.* l. c. — Afr. trop. or.
Wightiana, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 263 (= *Toxocarpus Wightiana*, *Hook. & Arn.*). — Ind. or.
zambesiaca, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 303. — Afr. trop. or.

SECURIDACA, Linn. (Polygal.). — Ind. Kew.

- ii. 859.
Engleriana, *Chod.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 545. — Bras.
falcata, *Chod.* l. c. 547. — Bras.
Fendleri, *Chod.* l. c. 545. — Venezuela.
Gardneri, *Chod.* l. c. 546. — Bras.
Michelliana, *Chod.* in *J. D. Smith, Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 8; et l. c. 546. — Costa Rica.
myrtifolia, *Chod.* l. c. — Mexic.
rosea, *Barb. Rodr.* [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 19] in *Vellosia*. 1885-88, Sec. edic. (1891) 6, t. 4, fig. a. — Bras. bor.
tenuifolia, *Chod.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 545. — Ins. Trinit.
Warmingiana, *Chod.* l. c. 544. — Bras.

SECURINEGA, Comm. ex Juss. (Euphorb.). — Ind.

- Kew. ii. 860.
keyensis, *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 358. — Ins. Key (N. Guin.).

SEDDERA, Hochst. = **Breweria**, R. Br. (Con-

- volv.).
humilis, *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 89. — Afr. trop. or.
latifolia, *Hort.* ex *Terrac.* in *Ann. Ist. Bot. Roma*, v. (1894) 164 = *Breweria latifolia*, *Terrac.*
mucronata, *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 88
Convolvulus mucronatus, *Engl.*
somalensis, *Hallier f.* l. c. 90 = *Breweria somalensis*, *Vatke.*
spinescens, *Peter*, ex *Hallier f.* l. c. 89. — Afr. trop. or.
suffruticosa, *Hallier f.* l. c. 88 = *Breweria suffruticosa*, *Schinz.*
Welwitschii, *Hallier f.* l. c. — Angola.

SEDUM, Tourn. ex Linn. (Crassul.). — Ind. Kew.

- ii. 860.
alamosanum, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 148. — Mexic.
Amani, *Post*, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 20, 411. — Syria.
andinum, *Ball.* in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 38. — Peruvia.
baeticum, *Rouy*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 441 = *hirsutum*. *All.*
brutium, *Terrac.* in *Ann. Ist. Bot. Roma*, iv. 1889-90 (1891) 98, t. 4. — Italia mer.
calcicola, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 150. — Mexic.
chapalense, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 411. — Mexic.
chihuahuense, *S. Wats.* l. c. xxxiii. (1888) 273. — Mexic.
Deserti-hungarici, *Simonk.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 333. — Hung.

SEDUM:

- diffusum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 148. — Mexic.
divergens, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 154. — Mexic.
erectum, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 302. — As. Min.
filiferum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 428. — Mexic.
filipes, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 284, t. 7a, fig. 1-3. — China.
flexuosum, Wettst. in Luerss. Biblioth. Bot. Heft 26 (1892) 43. — Alban.
guadalajaranum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 411 [guadalajaranana]. — Mexic.
jaliscanum, S. Wats. Bot. Mag. ix. (1890) 148. — Mexic.
jucalambrense, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iv. (1891) 38, in syn. = nevadense, Coss.
Lumholtzii, Robinson & Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 116. — Mexic.
macrolepis, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris. Sér. II. viii. 1885 (1883) 241. — Tibet.
madrense, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 273. — Mexic.
Makinoi, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 487. — Japon.
Meyeri Johannis, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. ii. 1891 (1892) 229. — Afr. trop. or.
oryzifolium, Makino, Illustr. Fl. Japon. i. 8 (1891) 2, t. 50; et in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 261. — Japon.
pallens, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 317. — Dahuria.
polonicum, Blochi, in Deutsche Bot. Monatsschr. v. (1887) 66. — Eur. centr. or.
polytrichoides, Hemsl. ex Hemsl. & Forb. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 286, t. 7b, fig. 4. — China.
Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 273 = S. Torreri, Greene.
puberulum, S. Wats. l. c. — Mexic.
rodanthum, Bornum, in Mitth. Bot. Ver. Jena, N. Folge, vi. (1894) 66. — Oriens.
Stribnyi, Velen. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 14. — Bulg.
texanum, J. D. Smith, in Missouri Bot. Gard. Rep. vi. (1895) 114, t. 50. — Texas.
Torreri, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1888) 162 (= S. divergens, Greene). — Mexic.
tosaense, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 52. — Japon.
tricarpum, Makino, Illustr. Fl. Japon. i. 7 (1891) 3, t. 12. — Japon.
vinicolor, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 428. — Mexic.
Volkenzii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 188. — Afr. or.

SEEMANNIA, Regel (Gesnerac.). — Ind. Kew. ii. 863.

- major, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 710. — Bolivia.
purpurascens, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 237. — Bolivia.
sylvatica, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 708 = ternifolia, Regel.
uniflora, Baill. l. c. 710. — Bolivia.

SEGUIERA, Loeffl. (Phytol.). — Ind. Kew. ii. 863.

- paraguayensis, Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 210. — Parag.

SEGUIERA, Manetti, Virid. Fl. (1751) 81, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 430 = **Chlora**, Ren. (Gentian.).

- imperfoliata, Kuntze, l. c. = C. imperfoliata, Linn. f. perfoliata, Kuntze, l. c. = C. perfoliata, Linn.

SEHIMA, Forsk. = **Ischaemum**, Linn. (Gramin.).

- macrostachyum, Hochst. (in Schimp. Pl. Abyss. n. 1705) ex Hack. in A. DC. Monog. Phan. vi. (1889) 245, in syn. = I. laxum, R. Br.

SEIDELIA, Baill. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 863.

- triandra, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 35 = S. Mercurialis, Baill.

SELAGO, Linn. (Selagin.). — Ind. Kew. ii. 866.

- alopecuroides, Rolfe, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 175; Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 270. — Angola.
densiflora, Rolfe, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 222. — Afr. austr.
Johnstoni, Rolfe, ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 345. — Afr. trop. or.
milaniensis, Rolfe, l. c. iv. (1894) 35. — Afr. trop.
Nachtigali, Rolfe, ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 205. — Afr. austro-occ. extratrop.
Thomsoni, Rolfe, ex Oliver, in J. Thoms. Through Masai Land, Append. (1887) 351. — Afr. trop. or.
Welwitschii, Rolfe, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 175. — Afr. trop. occ.
Whyteana, Rolfe, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 35. — Afr. trop.

SELENIPEDILUM, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 84 = **Selenipedium**, Reichb. f. (Orchid.).

- Chica, Pfitzer, l. c. = S. Chica, Reichb. f.

SELENIPEDIUM, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 865.

- Baconis, X, Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 358, et iii. (1895) 80 (= Cyripedium Baconis, X, Kraenzl.). — Hybr. artef.
Brysa, X, Hort. l. c. (= C. Brysa, X, Hort.). — Hybr. artef.
calurum, X, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 413; Rolfe, in Lindenia, vii. (1891) 35, t. 304. — Hybr. artef.
chlorops, X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 584, in syn. (= C. chlorops, Reichb. f.). — Hybr. artef.
conchiferum, X, Nichols, l. c. — Hybr. artef.
Coppinianum, X, Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 325, et iii. (1895) 81 (= Cyripedium Coppinianum, X, R. H. Meas.). — Hybr. artef.
Dalleanum, X, Hort. ex Ed. André, in Rev. Hort. lxvii. (1895) 164. — Hybr. artef.
Elsteadianum, X, Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 358; et iii. (1895) 80 (= Cyripedium Elsteadianum, X, R. L. Meas.). — Hybr. artef.
Hardyanum, X, Hort. l. c. (= C. Hardyanum, X, Hort.). — Hybr. artef.
hybridum, X, Hort. ex Gard. Chron. (1891) i. 502. — Hybr. artef.
Lemoinianum, X, Hort. ex Orchid Rev. iii. (1895) 79 (= Cyripedium Lemoinianum, X, Reichb. f.). — Hybr. artef.
leucorrhodum, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 211 — Form. hort.
Lindenii, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 413. — N. Granat.
nitidissimum, X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 6, in syn. = Cyripedium nitidissimum, Reichb. f.
Persus, X, Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 358; et iii. (1895) 80 (= C. Persus, X, Hort.). — Hybr. artef.
reticulatum, Reichb. f. in Lindenia, i. (1885) 25, t. 10. — Ecuad.
Sanderianum, X, Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 16, 31, et iii. (1895) 79 (= Cyripedium Sanderianum, X, Reichb. f.). — Hybr. artef.
Sargentianum, Rolfe, in Orchid Rev. (1893) et in Gard. Chron. (1894) i. 781, fig. 100; Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7446. — Bras.
Schomburgkianum, Desbois, Monog. Cyriped. (1888) 141 = Klotzschianum, Reichb. f.
Schroederiae, X, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 413. — Hybr. artef.
Stella, X, Hort. Sand. ex Orchid Rev. ii. (1894) 110. — Hybr. artef.
Wallisii, J. Linden. in Lindenia, iii. (1887) 73, t. 131 = Cyripedium Wallisii, Reichb. f.

SELENIPEDIUM: —

- Weidlichianum, X, Hort. Sand. ex Gard. Chron. (1890) 702. — Hybr. artef.

SELINUM, Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 865.

- agasylloides, Alboff. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 252, t. 8 = Chymysdia agasylloides, Alboff.
Bentharii, F. Kurtz, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 382 = Cnidium Bentharii, S. Wats.
Dawsoni, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 114; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 44. — Am. bor.
eryngiifolium, Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 102; et Fl. Francisc. (1892) 326. — Calif.
Gmelini, F. Kurtz, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 389 = Ligusticum Gmelini, Cham. & Schlecht.
Grayi, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 144; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 44. — Calif.
Hookeri, S. Wats. ex Coult. & J. N. Rose, Revis. N. Am. Umbell. (1888) 45. — Am. bor.
longeradiatum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 50. — Japon.

SELLIERA, Cav. (Goodenov.). — Ind. Kew. ii. 866.

- microphylla, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 473. — N. Zel.

SELLOA, Spreng. = **Gymnosperma**, Less. (Compos.).

- corymbosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 362 = G. corymbosum, DC.
eriocarpa, Kuntze, l. c. = Gutierrezia eriocarpa, A. Gray.
multiflora, Kuntze, l. c. = Gymnosperma corymbosum, DC.
scoparia, Kuntze, l. c. = G. corymbosum, DC.

SELLOCHARIS, Taub. in Flora, lxxii. (1889) 521; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1893) 226. **LEGUMINOSAE**.

- paradoxa, Taub. l. c. — Bras.

SEMECARPUS, Linn. f. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 866.

- magnifica, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. With. Land (1889) 65. — N. Guin.

SEMICIPIUM, Pierre, Not. Bot. Sapot. (1890) 10 = **Mimusops**, Linn. (Sapot.).

- Boivinii, Pierre, l. c. 11 = M. Boivinii, Hartog.

SEMPERVIVUM, Rupp. ex Linn. (Crassul.). — Ind. Kew. ii. 867.

- adenophorum, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castri. (1887-88) 238. — Hung.
agriostachys, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 229 [sphalm.?] = Monanthes agriostaphys, Christ.
Aizoon, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 162 (= Greenovia Aizoon, Bolle). — Teneriffa.
Bentejui, Christ, l. c. 160 (= Aconium Bentejui, Webb). — Ins. Canar.
Berthelotianum, Christ, l. c. 161 (= Ae. Berthelotianum, Bolle). — Teneriffa.
Bethencourtianum, Christ, l. c. (= Ae. Bethencourtianum, Webb). — Ins. Canar.
Bollei, Christ, l. c. 160 (= Aichryson Bollei, Webb). — Ins. Canar.
brachycaulon, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 231 (= Petrophytes brachycaulon, Webb & Berth.). — Ins. Canar.
Castello-Paivae, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= Aconium Castello-Paivae, Bolle). — Ins. Canar.
Christii, X, Wolf, in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xvi-xviii. (1890) 29. — Helv.
decorum, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= Aconium decorum, Webb). — Ins. Canar.
diplocyclum, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= Greenovia diplocycla, Webb). — Ins. Canar.
engadinense, X, Bruegg. [ubi?] ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 129. — Helv.
erraticum, X, Bruegg. l. c. — Helv.

SEMPERVIVUM : —

- Fontanae* X, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 67. — Helv.
ferreum, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= *Greenovia ferrea*, Webb). — Ins. Canar.
gracile, Christ, l. c. (= *G. gracilis*, Bolle). — Teneriffa.
Heerianum X, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 67. — Helv.
immaculatum, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 160 (= *Aichryson immaculatum*, Webb). — Ins. Canar.
Laggeri, Schott, ex E. Hallier, in Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 3 (1892) 944. — Helv.
leucanthum, Pance, Nov. elem. Fl. Princ. Bulg. (1886) 23. — Bulg.
macroleptum, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= *Aeonium macroleptum*, Webb). — Teneriffa.
Mauriqueorum, Christ, l. c. (= *Ae. Mauriqueorum*, Bolle). — Ins. Canar.
pachycaulon, Christ, l. c. (= *Aichryson pachycaulon*, Bolle). — Ins. Canar.
palmense, Christ, l. c. 160 (= *A. palmense*, Webb). — Ins. Canar.
palmense, Christ, l. c. 161 (= *Aeonium palmense*, Webb). — Ins. Canar.
Parlatorei, Christ, l. c. 160 (= *Aichryson Parlatorei*, Bolle). — Ins. Canar.
parciflorum, Christ, l. c. (= *A. parciflorum*, Bolle). — Ins. Canar.
polypharmicum, Christ, l. c. 161 (= *Greenovia polypharmica*, Webb). — Ins. Canar.
Porphyrogenetos, Christ, l. c. 160 (= *Aichryson porphyrogenetos*, Bolle). — Ins. Canar.
radicescens, Christ, l. c. 161 (= *Aichryson radicescens*, Webb). — Ins. Canar.
rhaeticum X, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 67 [Die Fl. d. Untereng.]. — Helv.
rupifragum, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= *Greenovia rupifraga*, Webb). — Teneriffa.
Saundersii, Christ, l. c. (= *Aeonium Saundersii*, Bolle). — Ins. Canar.
sedifolium, Christ, l. c. (= *Aichryson sedifolium*, Webb). — Teneriffa.
surculosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 229 = *Monanthes atlantica*, Ball.
Thomayeri X, Corr. in Bull. Soc. Hort. Genève (Dec. 1891) ex Gard. Chron. (1892) i. 104; et in Gartenfl. xli. (1892) 162. — Hybr. artef.
virgineum, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= *Aeonium virgineum*, Webb). — Ins. Canar.
viscatum, Christ, l. c. (= *A. viscatum*, Webb). — Ins. Canar.

SENAEA. Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 515.
GENTIANEA.
coerulea, Taub. l. c. 516. — Bras.

SENECILLIS. Gaertn. = **Senecio**. Tourn. (Compos.).
sibirica, Simonk. Enum. fl. Transs. (1886) 143 = *S. Ligularia*, Hook. f.

SENECIO, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 869.
acerifolius, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 363. — Mexic.
acerifolius, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 9. — China.
acetosaefolius, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 496. — Madag.
acloetus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 256. — Chili.
Adenotrichia, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 419 = *adenotrichus*, DC.
admirabilis, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 23. — Colorado.
agnostus, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 364. — Hab.?
Ahrendsi, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 267. — Chili.
ainsliaeflorus, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 361. — China occ.
alabugensis, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 320. — Turkest.

SENECIO : —

- albiflorus*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 43. — Chili.
albopunctatus, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 177. — Afr. austr.
alfalfalis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 270. — Chili.
alienus, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 110. — Mexic.
allariaetolius, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1888) 280. — Afr. austro-occ. extratrop.
andicola, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 22. — Chili.
angustatus, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 324 (= *Cineraria angustata*, Schur). — Transsylv.
anisophyllus, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv (1888) 124. — Mexic.
Antandroi, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 30. — Madag.
antipodus, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 440, nomen. — Ins. Antipod.
antirrhinifolius, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 34. — Chili.
aphanactis, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 220; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 212. — Calif.
apricus, Klatt, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 25. — Madag.
apricus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 261. — Chile.
arachnanthus, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 355. — Yunnan.
aracus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 291 = *denticulatus*, DC.
arctifolius, Baker, in Kew Bull. (1895) 106. — Bras.
areolatus, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 317. — N. Zel.
argyreus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 261. — Chili.
armerifolius, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 43. — Chili.
armerifolius, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 287. — China occ.
arnautorum, Velen. Fl. Bulg. (1888) 45. — Bulg.
ascotanensis, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 41. — Chili.
astephanus, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 174. — Calif.
atacamensis, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 46. — Chili.
atroviolaceus, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 303. — China occ.
auriculatissimus, Britton, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 21. — Afr. trop.
auriculatus, Steininger, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 73 = *subalpinus*, Koch.
auritus, Wawra, Itin. Princ. Coburg. ii. (1888) 47. — Bras.
Bakeri, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 30. — Madag.
Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 64. — Bolivia.
Baurii, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1572. — Caffraria.
basipinnatus, Baker, in Kew Bull. (1895) 217. — Reg. Somal.
Baxteri X, E. F. Marshall. Bot. Exch. Club Brit. Isles, Rep. for. 1892 (1893) 374. — Brit.
begoniaefolius, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 358. — China occ.
Benthamianus, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 286. — Sikkim.
bicolor, Ces. Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 517 = *bicolor*, Todaro.
bipartitus, Sch. Bip. ex Defflers, Voy. Yémen (1889) 155, nomen. — Arabia.
Blochmanae, Greene, in Erythraea, i. (1893) 7. — Calif.
boliviensis, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 127. — Bolivia.
Boninsimae, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1893) 1, t. 2. — Japon.
Borchersii, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 13. — Chili.
bosniacus, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 163 t. 5, fig. 2-6. — Bosnia.

SENECIO : —

- botryodes*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 154. — Tibet.
bracteatus, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 125. — Mexic.
bracteolatus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 12. — Chili.
breanus, Phil. l. c. 250. — Chili.
Breweri, Davy, in Erythraea, iii. (1895) 116. — Calif.
bucharicus, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 335. — Buchara.
buglossus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 276. — Chili.
calamitosus, Klatt, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 25. — Madag.
Campanae, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1888) 248. — Chili.
campanulatus, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 126. — Bolivia.
campanulatus, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 284. — China. occ.
Caroli, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 7. — China.
casalpatensis, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 47. — Peruvia.
caulanthifolius, Davy, in Erythraea, iii. (1895) 117. — Calif.
cernuus, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 44. — Chili.
celtibericus, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. ii. (1889) 14; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 87. — Hisp.
chamomillefolius, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 272. — Chili.
chanaralensis, Phil. l. c. 265. — Chili.
Chapalensis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 155. — Mexic.
chinotegensis, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 125 = *Gynoxis Oerstedii*, Benth.
chihuahuensis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 280. — Mexic.
chronotus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 26. — Chili.
chrysanthemoides, Phil. l. c. 269. — Chili.
cicatricosus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 497. — Madag.
cineurus, Velen. Beitr. Fl. Ost-Rum. und Bulg. (1886) ex Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 62 = *erucifolius*, Linn.
Clarkeanus, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 288. — Reg. Himal.
clavifolius, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 64. — Bolivia.
cleistolepis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 264. — Chili.
cobanensis, Coult. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. ii. (1891) 42; et in Bot. Gaz. xvi. (1891) 101. — Guatem.
coccineus, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1886) 48. — Columb.
Coincy, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 163; Coincy, Ecol. pl. Hisp. (1893) 16, t. 6 (= *Cineraria Coincy*, Willk.). — Hisp.
compactus, Rydberg, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 342. — Am. bor.
concolor, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 543 (= *Cacalia concolor*, Frapp.). — Ins. Borbon.
conipes, Somm. & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 88. — Reg. Cauc.
consanguineus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 27. — Chili.
copiapinus, Phil. l. c. 253. — Chili.
Cordillerae, Phil. l. c. 277. — Chili.
crassifolius, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 163 (= *Cineraria crassifolia*, Kit.) = *alpestris*, DC.
crepidoides, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 252. — Chili.
ctenophyllus, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 45. — Chili.
cuencanus, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 65. — Ecuad.
curvidens, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 127. — Peruvia.
cyaneus, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 235. — Afr. trop. or.

SENECIO : —

- cyclaminifolius, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 362. — China occ.
 cyclocladus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 496. — Madag.
 cyclotus, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 74. — China occ.
 cydoniifolius, *O. Hoffm. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 19, 20, 42, nomen. — Afr. trop.
 Davidi, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1888) 40. — Tibet.
 Davila, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 33. — Chili.
 deformis, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii.* (1888) 125. — Mexic.
 Delavayi, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 286. — China occ.
 Delavayi, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 364. — Yunnan.
 Delfini, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 275. — Chili.
 denticulatus, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 442. — Afr. trop. or.
 depilis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 291 = *denticulatus, DC.*
 dichotomus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 43. — Chili.
 dictionurus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 294. — China. occ.
 digitatus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 44. — Chili.
 dimorphocarpus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 316. — N. Zel.
 discoideus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 284. — China occ.
 distinctus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 390. — N. Zel.
 dodrans, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 152. — China.
 Domeykoanus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 29. — Chili.
 Donae-Anae, *Phil. l. c.* 6. — Chili.
 Donell-Smithii, *Coult. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 42; et in *Bot. Gaz.* xvi. (1891) 101. — Guatem.
 drepanophyllus, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27. (1890) 26. — Madag.
 duciformis, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 155. — China.
 dumosus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1888) 24. — Chili.
 Durandi, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 211. — Costa Rica.
 Dux, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 40. — Jakpho.
 ecuadorensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 68. — Ecuad.
 ecuadorensis, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* ix. (1894) 364. — Ecuad.
 Ehrenbergianus, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv.* (1888) 125. — Mexic.
 elamutensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 292. — Persa.
 Englerianus, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* x. (1888) 279. — Afr. austro-occ. extratrop.
 erechthitoides, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict.* N. S. i. II. (1889) 15. — N. Guin.
 eriocephalus, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 212. — Costa Rica.
 eriopodus, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv.* (1888) 125. — Mexic.
 erythropappus, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 73. — China occ.
 euryphyllus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 156. —
 Evansi, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 147. — Natal.
 Eversi, *X. Huter, in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 151. — Italia.
 exilis, *Blanche, ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 302. — Syria.
 Faberi, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. (1888) 452. — China.

SENECIO : —

- Fargesii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 300. — China occ.
 Fauriei, *Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VII.* xii. (1888) 87. — Japon.
 Fernandezi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 258. — Chili.
 Feuilleti, *Phil. l. c.* 264. — Chili.
 floccosus, *Britton [err. typ. ? floscosus] in Bull. Torrey Bot. Club,* xix. (1892) 264. — Bolivia.
 Francheti, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 165. — Buchara.
 franciscanus, *Greene, Pittonia,* ii. (Nov. 1889) 19. — Arizona.
 Francisci, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 12. — Chili.
 fueginus, *Phil. l. c.* 26. — Chili.
 fulgens, *Nichols. Gard. Dict.* iii. (1886) 420. — Afr. austr.
 Fussii, *G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* ii. (1887) 163 = *campestris, DC.*
 Galpini, *Hook. f. in Journ. of Hort.* (1892) 3; et in *Bot. Mag.* (1892) t. 7239. — Transvaal.
 Garnieri, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 26; et in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* vii. (1892) 299 = *erechthitoides, Baker.*
 Gibbonsii, *Greene, Pittonia,* ii. (Nov. 1889) 20. — Am. bor. occ.
 gibraltarius, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 140; in *Le Naturaliste,* Sér. II. ix. (1887) 107; *Debeaux, Syn. Fl. Gibraltar* (1887) 107. — Hisp.
 gilvus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 16. — Chili.
 Goetzenii, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 135. nomen. — Afr. trop.
 Goldsacki, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 249. — Chili.
 gomereus, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 363 = *S. Steetzii, Bolle.*
 gossypinus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 330. — Madag.
 gracilipes, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 156 (= *Erechtites polyphodioides, Greene.*) — Am. bor. occ.
 gracillimus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 5. — Mongol.
 Grenierii, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 26. — Madag.
 guadalajarensis, *Robinson, in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 166. — Mexic.
 guayacanensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 281. — Chili.
 Gunnisii, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 217. — Reg. Somal.
 gymnocaulus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 23. — Chili.
 Gynura, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 157. — China.
 Hallii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 358. — Ecuad.
 haplogynus, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict.* N. S. i. II. (1889) 14. — N. Guin.
 harazianus, *Defflers, Voy. au Yémen* (1889) 154. — Arabia.
 Harveianus, *Mac Owan, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 388. — Afr. austr.
 Heimerli, *X. Muellner, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien,* xlv. (1895) 94. — Austria.
 helianthoides, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 258. — Chili.
 Helianthus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 286. — China occ.
 heliophytoides, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 262. — Chili.
 Henryi, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. (1888) 452. — China.
 hesperius, *Greene, Pittonia,* ii. (July 1891) 166. — Oregon.
 heterophyllus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 389 [heterophylla]. — N. Zel.
 heteroideus, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv.* (1888) 125. — Mexic.

SENECIO : —

- hibernus, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 55. — Japon.
 Hildebrandtii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 488. — Madag.
 Hillebrandii, *Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1887) 148. — Ins. Canar.
 himalayensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 287. — Sikkim.
 Hirthii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 247. — Chili.
 Hoffmannii, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxv.* (1889) 106. — Costa Rica.
 homogynoides, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* ix. (1894) 364. — Bras.
 Humblotii, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* vii. (1892) 299. — Ins. Comor.
 Hyadesii, *Franch. Miss. scient. Cap Horn,* v. [Phan.] (1888) 348 t. 2. — Reg. Magell.
 hygrophilus, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 26 = *Cineraria hygrophila, Klatt.*
 Ibari, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 20. — Chili.
 iberidifolius, *Phil. l. c.* lxxxviii. (1894) 21. — Chili.
 ilicetorum, *A. Davids. in Erythea,* ii. (1894) 85. — Calif.
 Incae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 273. — Chili.
 innovans, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* ix. (1894) 365. — Bolivia.
 integrifolius, *Simonk. Enum. Fl. Transs.* (1886) 326 = *Othonna integrifolia, Linn.*
 involutus, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* ix. (1894) 365. — N. Granat.
 ionophyllus, *Greene, Pittonia,* ii. (Nov. 1889) 20. — Calif.
 irregularis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 273. — Chili.
 jaliscana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 143. — Mexic.
 Jamesii, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. (1888) 452. — China.
 Jamesonii, *Spruce, ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv.* (1888) 127. — Ecuad.
 janthophyllus, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 361. — China occ.
 Jarae, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 44. — Chili.
 Johnstonii, *Oliver, in Johnston, Kilim. Exped. App.* (1886) 342, nomen; et in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1887) 340, t. 60. — Afr. trop. or.
 Jorquerae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 20. — Chili.
 juncalensis, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 41. — Chili.
 Fussienii, *Klatt, ex Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 69 = *Gynoxys cordifolia, Cass.*
 kanaitzensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 298. — China occ.
 kansuensis, *Franch. l. c.* 287. — China occ.
 karaguensis, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 417. — Afr. trop. or.
 karelinioides, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 280. — Turkest.
 Kaschkarowi, *C. Winkl. l. c.* xiv. (1895) 152. — China.
 kenensis, *E. G. Baker, in Journ. Bot.* xxxii. (1894) 140. — Afr. trop. or.
 Kernerii, *X. Blocki, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 165. — Austria.
 koualapensis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 356. — Yunnan.
 kukulensis, *Woloszkak, in Spraw. Kom. fizij. Krakowei,* xxi. (1888) ii. 125. — Eur. centr.
 Kurtzi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 254. — Chili.
 lacarensis, *Phil. l. c.* 259. — Chili.
 lactucinus, *Greene, in Erythea,* i. (1893) 223. — Am. bor. occ.
 lactucoides, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv.* (1888) 125 = *Erechtites valerianaefolia, DC.*
 laetevirens, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 30. — Chili.
 lankongensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 301. — China occ.

SENECIO : —

- lapathifolius, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1891) 306. — China occ.
 Larranagae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 269. — Chili.
 latifolius, *Mast. in Gard. Chron.* (1894) ii. fig. 43 = laxifolius, *Buchanan.*
 latipes, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 356. — Yunnan.
 Lehmanni, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 66. — Columb.
 leptanthus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 15. — Chili.
 leptocaulis, *Phil. l. c.* 266. — Chili.
 leucocephalus, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 360. — China occ.
 leucus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 42. — Chili.
 liatroides, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 8. — China.
 Liebmannii, *Buchinger, ex Klatt, in Leopoldina, Heft* xxiv. (1888) 125. — Mexic.
 limonius, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 280. — Chili.
 limumae, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 55. — Japon.
 longipes, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 217. — Reg. Somal.
 Lorentzi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 8. — Chili.
 Lyallii, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 365. —
 lynceus, *Greene, in Eryithea*, iii. (1895) 22. — Am. bor. occ.
 Lyoni, *A. Gray, ex Lyon, in Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 335, nomen; et *Syn. Fl. N. Am.* i. II. Suppl. (1886) 454. — Calif.
 macer, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 263. — Chili.
 Madariagae, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 45. — Chili.
 magellanicus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 24. — Chili.
 Makineanus, *Yalabe, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 115, t. 3; et *Icon. Fl. Japon.* i. III. (1894) 183, t. 45. — Japon.
 Makinoi, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 6. — Japon.
 maranguiensis, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 418. — Afr. trop. or.
 margaritifolius, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 37. — Madag.
 Marlothianus, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* x. (1889) 279. — Afr. austro-occ. extratrop.
 Maximowiczii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 287. — China occ.
 melanocephalus, *Franch. l. c.* 294. — China occ.
 melastomaefolius, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 497. — Madag.
 mesogrammoides, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 417. — Afr. trop. or.
 Meyeni, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 25. — Chili.
 Meyeri-Johannis, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 444. — Afr. trop. or.
 microcephalus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 23. — Chili.
 microdontus, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 76. — China occ.
 microtis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 253. — Chili.
 minutifolius, *Phil. l. c.* 250. — Chili.
 mirus, *Klatt, in Anal. Mus. Nac. Costarica* (1893) 113, nomen; et *ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxi. 1892 (1893) 213. — Costa Rica.
 Moelleri, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 274. — Chili.
 mohavensis, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. Suppl. (1886) 454. — Calif.
 monocephalus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 498. — Madag.
 montereyanus, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 155 [Montereyana]. — Mexic.
 monticola, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 32. — Chili.
 Moritzianus, *Klatt, in Leopoldina, Heft* xxiv. (1888) 127. — Columb.

SENECIO : —

- morrensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 362. — Peruvia.
 mosoynensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 298. — China occ.
 multibracteatus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 30. — Chili.
 multicorymbosus, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 103. — Angola.
 multinervis, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 330 [multinerve]. — N. Zel.
 murinus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 247. — Chili.
 Murrayanus, *Wawra, Itin. Princ. Sax.-Coburg.* ii. (1888) 48. — Austral.
 mweroensis, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 290. — Afr. centr. austr.
 myrianthus, *Klatt, in Leopoldina, Heft* xxiv. (1888) 127. — Bolivia.
 myrtifolius, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 27. — Madag.
 nagensium, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 39. — Ind. or.
 nahuelbutanus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1890) 254. — Chili.
 namaquanus, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 176. — Afr. austr.
 napifolius, *Mac Owan, l. c.* xxv. (1890) 388. — Afr. austr.
 narynensis, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1887) 319. — Turkest.
 Navarri, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 11. — Chili.
 neapolitanus X, *Evers, ex Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 151, 390. — Italia.
 nelumbifolius, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 74. — China occ.
 nephelagetus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 285. — Reg. Himal.
 nimborum, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris. Sér. II. x.* (1888) 39. — Tibet.
 nobilis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 287. — China occ.
 novenlepis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 357. — Ecuad.
 obesus, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 366. — Reg. Argent.
 oblongatus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 286. — Sikkim.
 ochroleucus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 12. — Chili.
 oclonetus, *Phil. l. c.* 256. — Chili.
 odoratus, *Defters, Voy. au Yémen* (1889) 158 (= *Cacalia odora*, Forsk.). — Arabia.
 Oerstedtii, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 363 = *Gynoxis Oerstedii, Benth.*
 olivaceus, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 299. — Madag.
 olivaceus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 271. — Chili.
 Otaeguianus, *Phil. l. c.* 246. — Chili.
 otophorus, *Phil. l. c.* 279. — Chili.
 ovatus, *MacMill. Metasp. Minn.* (1892) 555 (= *Cacalia ovata*, Walp.) = *S. Walteri, Sch. Bip.*
 oxyodon, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 42. — Chili.
 paberensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 288. — Reg. Himal.
 Palenae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 14. — Chili.
 pallescens, *Klatt, in Leopoldina, Heft* xxv. (1888) 126. — Mexic.
 parochetus, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 27. — Madag.
 pendulus, *Defters, Voy. au Yémen* (1889) 155 (= *Cacalia pendula*, Forsk.). — Arabia.
 peninsularis, *Vasey & J. N. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xi. (1888) 531. — Calif.
 pentadactylus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 260. — Chili.
 Peraltae, *Phil. l. c.* 256. — Chili.
 pteroanus, *Phil. l. c.* 28. — Chili.
 petrophilus, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 27. — Madag.
 phaenicochaetes, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 295. — China occ.

SENECIO : —

- Phaedrus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 251. — Chili.
 phyllocomus, *Phil. l. c.* 260. — Chili.
 phyllolepis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 360. — China occ.
 pilosus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 292 = *denticulatus, DC.*
 pindilicensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 65. — Ecuad.
 pinnatifidus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 19. — Chili.
 Piptocoma, *O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 87. — Afr. austro-occ. extratrop.
 plantaginifolius, *Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII.* iii. (1891) 145. — Tibet.
 platyglossus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 293. — China occ.
 platyphylloides, *Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 153. — Reg. Cauc.
 pleurocaulis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 365 (= *S. tatsienensis*, Franch.). — China occ.
 polygaloides, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 38. — Chili.
 polypodioides, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III.* i. (1895) 156. — Mexic.
 Potamni, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 5. — China.
 primulifolius, *Somm. & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II.* ii. (1895) 89. — Reg. Cauc.
 Pringlei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 307. — Mexic.
 prionites, *Mac Owan, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 389. — Afr. austr.
 promaeanus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 283. — Chili.
 psammophilus, *Phil. l. c.* 270 ou 271. — Chili.
 pteridophyllus, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 364. — Yunnan.
 pubescens, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 268. — Chili.
 Puchi, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 46. — Chili.
 pulviniformis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 359. — Bolivia.
 pumiceus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 89. — N. Zel.
 purpurascens, *Klatt, in Leopoldina, Heft* xxv. (1888) 126 (= *Cacalia purpurascens*, Sch. Bip.). — Mexic.
 Purtschelleri, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 443. — Afr. trop. or.
 Putjatae, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 125. — China.
 Rahmeri, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 42. — Chili.
 ranconensis, *Sch. Bip. ex Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1891) 490 = *rancoënsis, Sch. Bip.* ?
 ravidus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 4. — Tibet.
 Rawsonianus, *Greene, Pittonia*, ii. (July 1891) 166. — Calif.
 Rehmanni, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 177. — Afr. austr.
 Reisackii X, *Grembl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 165. — Tirolia.
 Reissianus, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 356. — Columb.
 Remyanus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 31. — Chili.
 Renjifoanus, *Phil. l. c.* 10. — Chili.
 reniformis, *MacMill. Metasp. Minn.* (1892) 555 (= *Cacalia reniformis*, Muehl.) = *S. Muehlbergii, Sch. Bip.*
 Rhabdos, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 40, t. 19. — Ind. or.
 rhodanthus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 330. — Madag.
 rivularis, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887) 190
 Robbinsii, *Oakes, ex Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 19. — Am. bor. or.
 roseus, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 366. — Peruvia.
 Rosmarinus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 41. — Chili.

SENECIO : —

- ruficomus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 298. — China occ.
 rufipilus, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 350. — China occ.
 rumicifolius, *Klatt, in Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 126 (= *Cacalia rumicifolia*, Sch. Bip.). — Mexic.
 rubiculus, *Simonk. Enum. Fl. Transs.* (1886) 324 = *Cineraria rupicola* Schur.
 sagittatus, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix (1894) 64 (= *Cacalia sagittata*, Vahl) = *Emilia flammea*, Cass.
 Santeliciis, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 45. — Chili.
 sarawschanicus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 153. — Turkest.
 sarmentosus, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 236. — Afr. trop. or.
 Schaffneri, *Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 126. — Mexic.
 Schinzii, *O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 86. — Afr. austro-occ. extratrop.
 Schoenleinii, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 282, 292, et xviii. (1894) 443, 465. — Chili.
 Schoenemannii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 21. — Chili.
 Schulzeanus, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 282, 292; et xviii. (1894) 443, 465. — Chili.
 Schweinfurthii, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 417 (= *S. Serra*, Schweinf.). — Afr. trop. or.
 scoparius, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 282. — Chili.
 scotifolius, *Phil. l. c.* 28. — Chili.
 sedifolius, *Phil. l. c.* (1895) 28. —
Serra, Schweinf. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 446 = *S. Schweinfurthii*, *O. Hoffm.*
 setchuenensis, *Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris*, Sér. VIII. iii. (1891) 145. — Tibet.
 setulosus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 5. — Chili.
 sikkimensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 285. — Sikkim.
 silphoides, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 361. — Columb.
 Simpsoni, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 257. — Chili.
 Sinclairii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 68 = *Gynoxys Sinclairii*, Benth.
 Smallii, *Britton, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 132, et v. (1894) 343 = *aureus* Linn. var. *angustifolius*, *Britton*, *sociorum*, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xx.v. (1887) 175. — Afr. austr.
 Sotoanus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 9. — Chili.
 sotarensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 360. — Columb.
 Souliei, *Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris*, Sér. VIII. iii. (1891) 165. — Tibet.
 Sprucei, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 265. — Bolivia.
 Sprucei Klatt, *in Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128. [err. cal. ? *Sprucei*]. — Peruvia.
 stenoglossus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 305. — China occ.
 stenophyllus, *Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 325 = *lugens*, *Richards*.
 Stirthii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 247. — Chili.
 streptanthifolius, *Greene, in Erythra*, iii. (1895) 23. — Idaho.
 Stuebelii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 356, 357. — Columb.
 Stuhlmanni, *Klatt, Leopoldina* Heft xxxi. (1895) 10. — Afr. trop.
 subauritus, *Phil. in Annal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 17. — Chili.
 sublyratus, *Phil. l. c.* 365. — Chili.
 subspicatus, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 75. — China occ.
 subvestitus, *Howell, in Erythra*, iii. (1895) 35. — Oregon.
 sulphureus, *Simonk. Enum. Fl. Transs.* (1886) 325 = *campestris*, *Retz.*

SENECIO : —

- Sumarae, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 154. — Arabia.
 Sundti, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 7. — Chili.
 syringifolius, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 236. — Afr. trop. or.
 taliensis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 357. — Yunnan.
 talquinus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 35. — Chili.
 tarapacanus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 42. — Chili.
 tatsienensis, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 75, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 293 = *pleurocaulis*, *Franch.*
 tchangchanensis, *Franch. l. c.* 299. — China occ.
 Telekii, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. c.* (1895) 417 (= *Erigeron Telekii*, Schweinf.). — Afr. trop. or.
 tenuicaulis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 11. — Chili.
 tenuipes, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 298. — China occ.
 teretifolius, *Less. ex Klatt, in Annal. Naturh. Hofm.* Wien. ix. (1894) 368, in syn. = *Othonna Lessingii*, *Klatt*.
 tomentosus, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 543 = *Eupatorium tomen osum*, *Lam.*
 tongolensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 305. — China occ.
 tricuspis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 357. — Yunnan
 trifurcifolius, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 358. — Bolivia.
 turkestanicus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 279. — Turkest.
 tussilaginea, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 364 = *S. Kaempferi*, *DC.*
 Tysoni, *Mac Owan, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 389. — Afr. austr.
 ukambensis, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 235. — Afr. trop. or.
 umbraculifera, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 279. — Mexic.
 Vaingaindrani, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 29. — Madag.
 Valderramae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 15. — Chili.
 valdivianus, *Phil. l. c.* 255. — Chili.
 Valeriana, *Oliver, in H. Johnston, Kilim, Exped. Append.* (1886) 342, nomen = *Gynura Valeriana*, *Oliver*.
 variabilis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 276. — Chili.
 vellereus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 299. — China occ.
 Velenovskyi, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* (1889) 234 (= *S. cinereus*, *Velen.*). — Bulg.
 vernalis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 285. — Sikkim, China occ.
 vernicosus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 497. — Madag.
 Vespertilio, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 359. — China occ.
 Vidali, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 18. — Chili.
 villiferus, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 362. — China occ.
 virens, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 259. — Chili.
 viridis, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 43. — Chili.
 Visianianus, « Papaf. » ex *Pacher & Jabornegg*, *Fl. von Karnten* (1888) 412 = *Visianus*, *Papaf.*
 Volkensii, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 418. — Afr. trop. or.
 Webbii, *Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1887) 147 (= *Doronicum Webbii*, *C. Schultz*). — Ins. Canar.
 Weddellianus, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 356. — Columb.
 Whyteanus, *Britten, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 21. — Afr. trop.
 Williamsi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 246. — Chili.

SENECIO : —

- Wolffii, *Simonk. Enum. Fl. Transs.* (1886) 325 = *campestris*, *DC.*
 xanthopappus, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofm.* Wien. ix. (1894) 366; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 360. — Hab.?
 xanthoxylon, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 7. — Chili.
 yesoensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 306. — Japon.
 yungasensis, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 264. — Bolivia.
 yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 303; et in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 363. — Yunnan.

SEPTIMETULA, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 266 = **Loranthus**, *Linn.*
bukobensis, *dschallensis*, *emarginata*, *hirsutissima*, *Macrosolen*, *regularis*, *rufescens*, *sigensis*, *Van Tiegh. l. c.* = *homonyma omnia Loranthi*.

SEPTULINA, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 263 = **Loranthus**, *Linn.*
glauca, *Van Tiegh. l. c.* = *L. glaucus*, *Thunb.*
ovalis, *Van Tiegh. l. c.* = *L. ovalis*, *E. Mey.*

SERAPIAS, *Linn. (Orchid.)*. — *Ind. Kew.* ii. 88?
Alberti ×, *G. Camus, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 28. — Gall.
Barlae ×, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 276. — Gall. mer.
complicata, *G. Camus, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 34, in syn. = *Orchis complicata*, *G. Camus*.
Debeauxii, *G. Camus, l. c.* = *O. Debeauxii*, *G. Camus*.
digena ×, *G. Camus, l. c.* 30. — Gall.
elongata, *Todaro, Hort. bot. Panorm.* (1886-88) 25. t. 7. — Italia.
Grenieri ×, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 275. — Gall.
Laramberguei ×, *G. Camus, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 27. Atlas. t. 6. — Gall.
Lloydii ×, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 275. — Gall.
meridionalis ×, *G. Camus, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 29, Atlas. t. 9. — Gall.
Nouletii ×, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 342. — Gall.
parasitica, *Pavon. ex Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 331, in syn. = *Microstylis calycina*, *Ridl.*
Timbali ×, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 275. — Gall.

SERICOCARPUS, *Nees (Compos.)*. — *Ind. Kew.* ii. 884.

asterodes, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 364 = seq.
asteroides, *Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal.* (1888) 26 = *conyzoides*, *Nees*.
bifolius, *Porter, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 322 = *tortifolius*, *Nees*.
linifolius, *Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal.* (1888) 26 = *solidagineus*, *Nees*.
tomentellus, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1889) 283 = *Aster brickelliioides*, *Greene*.

SERICOCOMA, *Fenzl (Amarant.)*. — *Ind. Kew.* ii. 884.

Nelsii, *Schinz, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1a (1893) 107. — Afr. austro-occ. extratrop.
quadrangula, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 7. — Afr. austro-occ. extratrop.
sericea, *Schinz, l. c.* xxi. (1895) 181. — Afr. austro-occ. extratrop.
squarrosa, *Schinz, l. c.* 182. — Afr. austro-occ. extratrop.
Zeyheri, *Engl. l. c.* x. (1889) 6 (= *Trichinium Zeyheri*, *Moq.*). — Afr. austr.

SERICOCOMOPSIS, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 184. **AMARANTACEAE.**
Bainesii, *Schinz, l. c.* 185 (= *Sericocoma Bainesii*, *Hook.*). — Afr. trop.

SERICOCOMOPSIS : —

Hildebrandtii, Schinz, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 184; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 172. — Afr. trop. or.
pallida, Schinz, l. c. 185 (= *Sericocoma pallida*, S. Moore). — Afr. trop. or.

SERICOSTOMA, Stocks (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 885.

verrucosum, G. Beck, in *Paulitschka, Harvar* (1888) 457, fig. 3-6. — Arabia.

SERINIA, Rafin. = **Krigia**, Schreb. (Compos.).

gracilis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 664 = *Apogon gracilis*, DC.
oppositifolia, Kuntze, l. c. = *Krigia virginica*, Willd.
Wrightii, Kuntze, l. c. = *Apogon Wrightii*, A. Gray.

SERIOLA, Linn. = **Hypochoeris** Linn. (Compos.).

caespitosa, Porta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 310. — Ins. Balear.
Warionis, Herb. Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 536, in obs. = *Hypochoeris Claryi*, Batt. ?

SERIS, Willd = **Onoseris**, DC. (Compos.).

acerifolia, adpressa, annua, Castelnauana, corymbosa, hastata, hyssopifolia, integrifolia, odorata, reflexa, salicifolia, speciosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 364 = *homonyma omnia* Onoseridis.
conspicua, Kuntze, l. c. = O. *Isotypus*, Benth.
Cumingii, Kuntze, l. c. = O. *odorata*, Hook. & Arn ?
criocephala, Kuntze, l. c. = *Hieracium erianthum*, H. B. & K.
hieracioides, Kuntze, l. c. = *Onoseris hieracioides*, H. B. & K.
purpurea, Kuntze, l. c. 354, 364 = O. *purpurata*, Willd.
rupestris, Kuntze, l. c. 364 = O. *Isotypus*, Benth.

SERISSA, Comm. ex Juss. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 885.

japonica, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 164. (= *S. japonica*, Thunb.) = *foetida*, Comm.

SERJANIA, Plum. ex Schum. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 886.

aluligera, Radlk. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 464. — Peruvia.
areolata, Radlk. *Monog. Serj. Suppl.* (1886) 87. — Bolivia.
chaetocarpa, Radlk. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 302. — Bolivia.
cognata, Baill. *Hist. pl. Madag. Atlas* (1893) t. 248. — Madag.
depauperata, Radlk. *Monog. Serj. Suppl.* (1886) 92. — Guatem.
didymadenia, Radlk. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 467. — Bolivia.
dissecta, S. Wats. ex Engl. *Monog. Serj. Suppl.* (1886) 138, in obs. = *Cardiospermum dissectum*, Radlk.
lamelligera, Radlk. l. c. 123; et in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1893) 326. — Bras.
dateritia, Radlk. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 465. — Guatem.
Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 45. — Mexic.
pernambucensis, Radlk. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1893) 233. — Bras.
peruviana, Radlk. *Monog. Serj. Suppl.* (1886) 154. — Peruvia.
plicata, Millsp. *Field Columb. Mus. Bot. Ser. I.* (1895) 33 = *plicata*, Radlk.
psilophylla, Radlk. ex J. D. Smith. *Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 11a; et in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 191. — Guatem.
punctata, Radlk. ex J. D. Smith, l. c. xx. (1895) 281. — Am. centr.
rachiptera, Radlk. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 11a; et l. c. xvi. (1891) 192. — Guatem.
rufesepala, Radlk. l. c. — Guatem.
scatens, Millsp. *Field Columb. Mus. Bot. Ser. I.* (1893) 33 = *scatens*, Radlk.
suborbicularis, Radlk. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1893) 329. — Bras.

SERJANIA : —

subrotundifolia, Radlk. *Monog. Serj. Suppl.* (1886) 118. — Peruvia.
truncata, Radlk. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1893) 331. — Bras.
viridissima, Radlk. in *Abhandl. Akad. Muench.* xvi. (1886) 81; et l. c. 258. — Bras.

SERRASTYLIS, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 158; et in Gard. Chron. (1894) ii. 726 fig. 91. ORCHIDAE.

modesta, Rolfe, l. c. — N. Granat.

SERRATULA, Dill. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 887.

albaracinensis, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 21, et ii. (1889) 30, Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 4; et *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1888-92) 136 t. 171a. — Hisp.
chartacea, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 524. — Turkest.
decurrens, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 31, nomen. — Hisp.
kurdica, Post, *Pl. Postiana*, iv. (1892) 8. — Syria.
lycopifolia, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1893) 1254, in syn. = *heterophylla*, Desf.
lycopifolia, Wettst. in *Sitzb. Akad. Wiss. Wien*, xcvi. (1889) 581 = *heterophylla*, Desf.
microcephala, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 458. — Turkest.
Scocanei, Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 317; *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 98; et *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1888-92) 104 t. 149. — Hisp.

SERSALISIA, R. Br. = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

acuminata, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 945 (= *Sebertia acuminata*, Pierre). — N. Caled.
brevipes, Baill. l. c. 947 = *Sideroxylon brevipes*, Baker.
cinerea, Pancher, ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 905. (= *Sideroxylon* sp.). — N. Caled.

SERTULA, Linn. = **Melilotus**, Tourn. (Legumin.).

alba, *bicolor*, *brachystachys*, *Bungeana*, *dentata*, *elegans*, *indica*, *infesta*, *italica*, *messanensis*, *neapolitana*, *officinalis*, *pallida*, *polonica*, *ruthenica*, *speciosa*, *suaevolens*, *sulcata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 205 = *homonyma omnia* Meliloti.
altissima, Kuntze, l. c. = M. *officinalis*, Lam.
arvensis, Kuntze, l. c. = M. *officinalis*, Lam.
Besseriana, Kuntze, l. c. = M. *gracilis*, DC.
coerulea, Kuntze, l. c. = *Trigonella caerulea*, Ser.
macrorhiza, Kuntze, l. c. = *Melilotus officinalis*, Lam.

SERUNEUM, Rumpf, Herb. Amboin. v. (1747) 423, 426, t. 156, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 365 = **Wedelia**, Jacq. (Compos.).

abyssinicum, *acapulcense*, *acuminatum*, *affine*, *africanum*, *alagoense*, *ambiguum*, *asperrimum*, *biflorum*, *brachycarpum*, *calendulaceum*, *chrysostephanum*, *Crucianum*, *Ehrenbergii*, *elongatum*, *filipes*, *Forsterianum*, *frutescens*, *Gaudichaudii*, *goyazense*, *gracile*, *hispidum*, *Horsfieldianum*, *lanceolatum*, *latifolium*, *longifolium*, *Lundii*, *macrodonum*, *modestum*, *molle*, *mossambicense*, *natalense*, *oligocephalum*, *paludosum*, *pilosum*, *polycephalum*, *populifolium*, *puberulum*, *pulchellum*, *radiosum*, *reticulatum*, *scaberrimum*, *serratum*, *subvelutinum*, *Trichostephia*, *urticifolium*, *Vauthieri*, *villosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 365 = *homonyma omnia* Wedeliae.
bupththalmodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 361 = W. *bupththalmodes*, Guseb.
canescens, Kuntze, l. c. = W. *Chamissonis*, Less.
glabrata, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia glabrata* DC.). — Ins. Timor.
helianthodes, Kuntze, l. c. = *Zexmenia helianthodes*, Benth. & Hook. f.
Hookerianum, Kuntze, l. c. = *Wedelia frutescens*, Hook. f.
insulare, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia insularis*, DC.). — Ins. Pacif.
javanicum, Kuntze, l. c. (= W. *javana*, Turcz.). — Java.

SERUNEUM : —

moluccanum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 361 (= *Wollastonia moluccana*, DC.). — Ins. Molucc.
montanum, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia montana*, DC.). — Java.
pedunculatum, Kuntze, l. c. = W. *Schultziana*, Miq.
procumbens, Kuntze, l. c. = *Chrysogonum procumbens*, Benth. & Hook. f.
prostratum, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia prostrata*, DC.). — Bras.
scabrinusculum, Kuntze, l. c. = *Wedelia biflora*, D. C.
serrulatum, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia serrulata*, Miq.). — Sumatra.
spilanthodes, Kuntze, l. c. = *Wedelia spilanthoides*, F. Muell.
strigosum, Kuntze, l. c. = W. *Menotriche*, Oliver & Hiern.
strigulosum, Kuntze, l. c. = W. *aristata*, Less.
trilobatum, Kuntze, l. c. = W. *carnosa*, Pers.
verbesinodes, Kuntze, l. c. = W. *verbesinoides*, F. Muell.
Zollingerianum, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia Zollingeriana*, Sch. Bip.). — Ins. Sundaic.

SESAMODES, Ludw. = **Astrocarpus**, Neck. (Resed.).

canescens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 39 = A. *sesamoides*, Colm.
cochlearifolium, Kuntze, l. c. = A. *cochlearifolius*, Nym.
minus, Kuntze, l. c. = A. *minor*, Lange.
pygmaeum, Kuntze, l. c. = A. *sesamoides*, Colm.
suffruticosum, Kuntze, l. c. = A. *suffruticosus*, Lange.

SESAMUM, Linn. (Pedalin.). — Ind. Kew. ii. 890.

angustifolium, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 365. — Afr. trop. or.
antirrhinoides, Welw. ex Aschers. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 183. — Angola.
foetidum, Afzel. ex Engl. *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 156 = *occidentale*, Heer & Regel.
lamiifolium, Engl. l. c. x. (1888) 256 = *Ceratotheca lamiifolia*, Engl.
macranthum, [Engl.?] *Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 64, nomen. — Afr. trop.
Marlothii, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1888) 257. — Afr. austro-occ. extratrop.
Schenckii, Aschers. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 184. — Afr. austro-occ. extratrop.
Schinzianum, Aschers. ex Schinz, l. c. 182. — Afr. austro-occ. extratrop.
triphylum, Welw. ex Aschers. l. c. 185; et (1889) 239. — Afr. austro-occ. extratrop.

SESBANIA, Scop. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 890.

Hildebrandtii, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 42; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 80 = *speciosa*, Taub.
indica, Kuntze, Rev. Gen. (1890) 180 = *aegyptiaca*, Poir.
MacOwaniana, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 165. — Afr. austro-occ. extratrop.
oligosperma, Taub. in *Flora*, lxxii. (1889) 423. — Bras.
paulensis, Barb. Rodr. *Pl. nov. Jard. Bot. Rio*, Fasc. ii. (1893) 13, t. 2; et *Hort. Flumin.* 1893 (1895) 11. — Bras.
speciosa, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 21, 42; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 213. — Afr. trop. or.

SESELI, Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 890.

athamanthoides, G. Beck, in *Annal. Naturhist. Hofmus. Wien*, x. (1895) 205 = *athamanthoides*, C. A. Mey.
calcareum, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 108. — Reg. Cauc.
Delavayi, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vi. (1894) 130. — Yunnan.
floribundum, Somm. & Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II.* ii. (1895) 75. — Reg. Cauc.

SESELI : —

- inaequale, *Terrac. in Ann. Ist. bot. Roma*, iv. 1889-90 (1891) 93, t. 3. — Italia mer.
 penganum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 719. — Chili.
 resinosum, *Frey & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 100. — As. Min.
 rhodopeum, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) ii. 45; *Fl. Bulg.* (1891) 242; *et in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 398. — Bulg.
 rubellum, *Post. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 157. — Syria.
 virescens, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, x. (1895) 205 = *Silaus carvifolius*, C. A. Mey.
 yunnanense, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vi. (1894) 129. — Yunnan.

- SESELINIA, G. Beck, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 797; *et Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 637 = **Seseli**, Linn. (Umbell.).
 austriaca, G. Beck, ll. cc. = *Pimpinella Gouani*, Benth. & Hook. f.
 clata, G. Beck, l. c. 637 = *Seseli elatum*, Linn.

SESLERIA, Scop. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 893.

- comosa, *Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss.* vii. 1. (1886) 44 = *coerulea*, *Friv.*
 fallax, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, v. (1890) 559 = *argentea*, *Savi.*
 hercegovina, G. Beck, l. c. = *argentea*, *Savi.*
 Heuffleriana, Blocki, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 155 = *coerulea*, *Friv.*
 stenophylla, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, v. (1890) 659 = *argentea*, *Savi.*
 subcaulis, Balansa, ex Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 875 = *Ammochloa subcaulis*, Balansa.
 varia, Wettst. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 357 ou 557; A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 107 (= *Aira varia*, Jacq.) = *coerulea*, *Friv.*

SESSEA, Ruiz & Pav. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 892.

- Regnellii, *Taub. in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 18. — Bras.

SESUVIUM, Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 892.

- distylum, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 38. — Ins. Fernando Noronha.
 maritimum, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 20 = *S. Portulacastrum*, A. Gray.

SETARIA, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 892.

- acromelaena, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 772 (= *Panicum acromelaenum*, Hochst.). — Abyss.
 atrata, Hack. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 122, *et* (1894) 64. — Afr. trop. or.
 bifida, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 770. sphalm. = biflora, Hillebr.
 basiseta, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 772 (= *Panicum basisetum*, Steud.). — Guinea.
 biflora, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 503. — Ins. Sandvic.
 brachiariaeformis, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 775 (= *Panicum brachiariaeforme*, Steud.). — Afr. trop. occ.
 breviglumis, St Lager, in *Cariot. Etud. des fl.* éd. 8 ii. (1889) 891 = *glaucula*, Beauv.
 caespitosa, Hack. & Arechav. in *Anal. Mus. nac. Montev.* ii (1894) 166, t. 15. — Urug.
 chrysochaeta, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 772 (= *Panicum chrysochaetum*, Steud.). — Ins. Borbon.
 flava, *Fourn. Gram. Mexic.* 1881 (1886) 45 (= *P. flavum*, Nees). — Mexic.
 latiglumis, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 229; S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 442. — Mexic.
 megaphylla, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 773 (= *Panicum megaphyllum*, Steud.). — Guinea.

SETARIA : —

- nigrirostris, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 774 (= *Panicum nigrirostre*, Nees). — Abyss., Afr. austr.
 oligochaeta, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 105. — Afr. trop. or.
 pauciseta, Vasey, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 442, nomen; in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 930; *et in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 39. — Texas.
 perennis, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 379. — Transvaal.
 perennis, Hall, in B. B. Smyth, *Check List pl. Kansas* (1892) 26. — Kansas.
 phyllomacra, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 774 (= *Panicum phyllomacra*, Steud.). — Guinea.
 plicatilis, Hack. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 121 (= *Panicum plicatile*, Hochst.). — Abyss.
 proliseta, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 774 (= *P. prolisetum*, Steud.). — Ins. Princip.
 rudimentosa, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *P. rudimentosum*, Steud.). — Seneg.
 transiens, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 105. — Afr. trop. or.
 Vatkeana, K. Schum. in *Abh. Naturh. Ver. Brem.* ix. (1887) 402. — Madag.

SETILOBUS, Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 29.**BIGNONIACEAE.**

- bracteatus, Baill. l. c. — Bras.
 simplicifolius, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 221 = *truncatus*, Bureau.

SEYMERIA, Pursh (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 894.

- madagascariensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 457, cum cit. falsa. — Madag.

SHERARDIA, Dill. ex Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 894.

- agraria, Tornab. *Fl. Sicula*, (1887) 284. — Sicil.

SHOREA, Roxb. (Dipteroc.). — Ind. Kew. ii. 894.

- aptera, Burck, *Minjak Tangh. Batavia* (1886) 19; *et in Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 210 t. 22; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 78. — Borneo.
 altoensis, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15. (1890) t. 232b, *et* 17. (1892) t. 257a; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 85. — Cambodia.
 Baillyana, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 973 = *macroptera*, Dyer.
 Bakeriana, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 974; *et Recherch. Diptéroc.* (1892) 47; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 96. — Borneo.
 Balangeran, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 214; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 86 (= *Hopea Balangera*, Korth.). — Ind. bat.
 barbata, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 81. — Malacca.
 Beccariana, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 213; Brandis, l. c. 87. — Borneo.
 Beccarii, Dyer, ex Brandis, l. c. in syn. = *Beccariana*, Burck.
 brachyptera, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 957; *et Recherch. Diptéroc.* (1892) 46; Brandis, l. c. 77. — Borneo.
 bracteata, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 301 = *siamensis*, Miq.
 ciliata, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 118; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 82. — Penang.
 cambodiana, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15. (1890) sub t. 229; Brandis, l. c. 89. — Cambodia.
 cochinchinensis, Pierre, l. c. t. 230 (= *S. Talura*, Roxb. var. *cochinchinensis*, Pierre); Brandis, l. c. 84. — Cambodia.
 compressa, Burck, *Minjak Tangh. Batavia* (1886) 26; *et in Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 212, t. 24; Brandis, l. c. 87. — Borneo.
 coriacea, Burck, l. c. 214; Brandis, l. c. 100. — Borneo.

SHOREA : —

- costata, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 119; Brandis, l. c. 81. — Penang.
 Curtisii, Dyer, ex King, l. c. 111; Brandis, l. c. 101. — Penang.
 dryobalanoides, Dyer, l. c. 95 = *Faguetiana*, Heim.
 Dyeri, Heim, in *Bull. Linn. Soc. Paris*, ii. (1891) 957 = *cristata*, Brandis.
 elliptica, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 215; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 99. — Borneo.
 Faguetiana, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 975; *et Recherch. Diptéroc.* (1892) 49; Brandis, l. c. 95. — Borneo.
 falcifera, Dyer, ex Brandis, l. c. 85. — Borneo.
 ferruginea, Dyer, ex Brandis, l. c. 91. — Borneo.
 Forbesii, Brandis, l. c. 92. — N. Guin.
 Franchetiana, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 956; *et in Mém. Assoc. Franç. Besanç.* 1892 (1893) 459; Brandis, l. c. 87 = *Beccariana*, Burck.
 fusca, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 207; Brandis, l. c. 83. — Sumatra.
 Gala, Baill. *Bot. médic.* i. (1884) 617 [Quid?]. — Hab.?
 gibbosa, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 99. — Penins. Mal.
 glauca, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 117; Brandis, l. c. 102. — Penang.
 grandiflora, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 93. — Borneo.
 Gysbertsiana, Burck, in *Minjak Tangh. Batavia* (1886) 15; *et in Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 211 t. 23, 30 fig. 2; Brandis, l. c. — Borneo.
 Harmandii, Pierre, in *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 302; *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15 (1890) t. 231; Brandis, l. c. 85. — Cochinch.
 Havilandi, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 82. — Borneo.
 Henryana, Pierre, in *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 302; *et Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15 (1890) t. 229, *et* Fasc. 16 (1891) t. 351b; Brandis, l. c. 89. — Cochinch.
 inappendiculata, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 206; Brandis, l. c. 102. — Borneo.
 Kunstleri, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) 116; Brandis, l. c. 93. — Perak.
 macrantha, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 97. — Borneo.
 Maranti, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 217 (= *Hopea ? Maranti*, Miq.); Brandis, l. c. 101. — Ind. bat.
 maritima, Pierre, in *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) p. 302, *et Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15. (1890) sub t. 229; Brandis, l. c. 89. — Cochinch.
 Maxwelliana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 114; Brandis, l. c. 86. — Perak.
 mekongensis, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 301 = *siamensis*, Miq.
 ovata, Dyer, ex Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 91. — Borneo.
 parvistipulata, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 974; Brandis, l. c. 95. — Borneo.
 pauciflora, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 116; Brandis, l. c. 98. — Penang.
 philippinensis, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 88. — Ins. Philipp.
 Pierreana, Heim, *Recherch. Diptéroc.* (1892) 48. nomen — Cochinch.
 platycarpa, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 956; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 94. — Borneo.
 Ridleyana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 115; Brandis, l. c. 89. — Perak.
 rigida, Brandis, in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2402; *et in Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 102. — Penins. Mal.
 rugosa, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 973; Brandis, l. c. 96. — Borneo.
 scaberrima, Burck, *Minjak Tangh. Batavia* (1886) 22; *et in Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 208; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 78. — Borneo.
 scrobiculata, Burck, l. c. 207; Brandis, l. c. 83. — Borneo.
 Schumanniana, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 39. — N. Guin.

SHOREA : —

- scutulata, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 118; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 83. — Penang.
 Singkawang, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 219; Brandis, l. c. 87. — Sumatra.
 stenoptera, Burck, *Minjak Tangk. Batavia* (1886) 11; et l. c. 209, t. 21; Brandis, l. c. 78. — Borneo.
 stipulosa, Burck, l. c. 220 (= *Vatica stipulosa*, Miq. ?); Brandis, l. c. 96. — Sumatra.
 suavis, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 301 = *siamensis*, Miq.
 Teysmanniana, Dyer, ex Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 100. — Bangka.
 Thiseltoni, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) 122; Brandis, l. c. 77. — Perak.
 Thorelii, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 302; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15 (1890) t. 233; Brandis, l. c. 81. — Cochinch.
 utilis, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 119; Brandis, l. c. — Penang.
 verruculosa, Dyer, ex Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 96 = *rugosa*, Heim.
 Vidaliana, Brandis, l. c. 83. — Ins. Philipp.
 vulgaris, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 301; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15 (1890) t. 232a; Brandis, l. c. 81. — Cochinch.
 Warburgii, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 38; Brandis, l. c. 98. — Ins. Philipp.

SHORTIA, Torr. & Gray (Diapens.). — Ind. Kew. ii. 895.

- rotundifolia, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* ix. (1895) 103 (= *Schizocodon rotundifolium*, Maxim.). — Japon.

SHULTZIA, Rafin. = **Obolaria**, Linn. (Gentian.).

- virginica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 430 = *O. virginica*, Linn.

SHUTERIA, Wight & Arn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 894.

- longipes, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 179. — China occ.

SICANA, Naud. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 895.

- atropurpurea, Ed. André, in *Rev. Hort.* lxii. (1890) 516, et lxxvi. (1894) 108, cum ic. — Uruguay.
 sphaerica, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1890) t. 7109. — Jamaica.

SICKINGIA, Willd. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 895.

- Glaziovii, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 327; et in *Mart. Fl. Bras.* vi. (1889) 227. — Bras.
 japurensis, K. Schum. l. c. 229. — Bras.
 macrocrater, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 327; et l. c. 226. — Reg. Amazon.
 Oliveri, K. Schum. ll. cc. 328; et 232. — Bras.
 paraënsis, K. Schum. ll. cc. 328; et 232 (= *Chimarrhis paraënsis*, Baill.). — Bras.
 Pikia, K. Schum. ll. cc. 328; et 234. — Bras.
 pisoniiformis, K. Schum. ll. cc. 327; et 225 = *pisoniaeformis*, Baill.
 rubra, K. Schum. ll. cc. 328; et 233 (= *Arariba rubra*, Mart.). — Bras.
 tinctoria, K. Schum. ll. cc. 328; et 228 (= *Condaminea tinctoria*, DC.). — Bras.
 viridiflora, K. Schum. ll. cc. 328; et 232 (= *Pinckneya viridiflora*, Allem. & Sald.). — Bras.
 xanthostema, K. Schum. ll. cc. 328; et 229. — Bras.

SICYOCODON, Feer, in *Bot. Jahrb.* xii. (1890) 613 = **Campanula**, [Tourn.] Linn.

- macrostylus, Feer, l. c. = *C. macrostyla*, Boiss. & Heldr.

SICYOS, Linn. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 896.

- collinus, Robinson & Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 116. — Mexic.
 echinocystoides, Cogn. ex J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 319. — Mexic.
 hispidus, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 136. — Ins. Sandvic.
 laciniatus, Hillebr. l. c. 138. — Ins. Sandvic.

SICYOS : —

- longisepalus, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 11. — Guatem.
 minimus, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 274. — Mexic.
 sertuliferus, Cogn. ex Th. Dur. & Pitt, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) (1892) 277. — Costa Rica.
 trigemina, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 38. — Bolivia.

SIDA, Linn. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 896.

- alamosana, S. Wats. ex J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 93; et in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 133. — Mexic.
 argentina, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 315. — Reg. Argent.
 Bakeriana, Rusby, ex E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 38. — Bolivia.
 Barclayi, E. G. Baker, l. c. xxx. (1892) 236. — San Salvad.
 benensis, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 153. — Bolivia.
 chachapoyensis, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 324. — Peruv.
 chapadensis, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 317. — Bras.
 cinerea, E. G. Baker, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 311. — Mexic.
 dictyocarpa, Griseb. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 314. — Reg. Argent.
 discolor, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 291 [discolora]. — Timor.
 Eggersii, E. G. Baker, l. c. 139. — Ind. or.
 Glaziovii, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 322. — Bras.
 gorgonea, Lowe, ex E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 240 = *rhombifolia*, Linn. var.
 goyazensis, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 316. — Bras.
 guianensis, K. Schum. l. c. 305. — Guian. angl. et gall.
 Helleri, J. N. Rose, ex Heller, in *Contrib. Herb. Frankl. und Marsch. Coll. [Bot. Expl. S. Texas]* i. (1895) 65. — Texas.
 hermaphrodita, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 223 = *S. Napaea*, Cav.
 Hoepfneri, Guérke, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 404. — Afr. austro-occ. extratrop.
 Holtzei, F. Muell. in *Journ. Roy. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 1890 (1891) 78. — Austral.
 Jamesii, E. G. Baker, in *Journ. de Bot.* xxx. (1892) 294. — Ecuad.
 Kingii, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Feb. 1887) 138; et ex *Bot. Centralbl.* xxx. (1887) 243. — Austral.
 lapaensis, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 302. — Bras.
 leprosa, K. Schum. l. c. 341 (= *Malva leprosa*, Ort.). — Am. trop.
 lodigensis, E. G. Baker, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 311. — Mexic.
 medicarpa, Klotzsch, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 313 = *serrata*, Willd.
 montana, K. Schum. l. c. 335. — Reg. Argent.
 neo-mexicana, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 296. — Am. bor. occ.
 nummularia, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 290. — Ins. Pin. [Isle of Pines].
 oligandra, K. Schum. in *Engl. & Prantl; Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1890) 43; et in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1891) 321. — Bolivia.
 Palmeri, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 295. — Mexic.
 podopetala, F. Muell. & Tate, in *Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xiii. (1890) 107. — Austral.
 Pseudo-urens, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 294. — Peruv.
 purpurascens, Salzm. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 333. — Bras.
 Riedelii, K. Schum. l. c. 296. — Bras.
 savannarum, K. Schum. l. c. 308. — Guian. angl.
 Schweinfurthii, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 295. — Afr. trop.
 Teysmannii, E. G. Baker, l. c. 292. — Timor.
 Wilkinsoni, F. Muell. in *Vict. Natural.* x. (Feb. 1894) 166, nomen. — Austral.

SIDA : —

- Xanti, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 296. — Calif.

SIDALCEA, A. Gray (Malv.). — Ind. Kew. ii. 901.

- delphinifolia, Greene, *Fl. Franc.* (1892) 105 (= *Sida delphinifolia*, Nutt.). — Calif.
 Hendersoni, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 262. — Oreg.
 Hickmani, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 139. — Calif.
 parviflora, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 148. — Calif.
 pedata, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 288. — Calif.
 secundiflora, Greene, *Fl. Francisc.* (1892) 103; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 65. — Calif.

SIDASTRUM, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 137. **MALVACEAE**.

- quinquenervium, E. G. Baker, l. c. (= *Sida quinquenervia*, Duchass.). — Am. trop.

SIDERITIS, Tourn. ex Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 901.

- aurasiaca, Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 698 = *incana*, Linn.
 biflora, Porta & Rigo, ex Porta, in *Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 59; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 156. — Hisp.
 glandulifera, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 30, 411. — Syria.
 javalambrensis, Pan. *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 26; Willk. l. c. (1893) 155. — Hisp.
 nusairiensis, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 29. — Syria.
 pycnostachys, Pomel, ex Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1890) 699 = *Guyoniana*, Boiss. & Reut.?
 Reverchoni, Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 156. — Hisp.

SIDEROCARPUS, Pierre, ex L. Planch. *Étud.*

- prod. Sapot. (1888) 27; et *Not. bot. Sapot.* (1890) 31 = **Sideroxylon**, [Dill.] Linn. (Sapot.).
 Vrieseanum, Pierre, l. c. = *S. Vrieseanum*, Pierre.

SIDEROXYLON, [Dill.] Linn. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 902.

- amboinense, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) 312. — Ins. Molucc.
 Argan, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 887 = *Argania Sideroxylon*, Roem. & Schult.
 Aylapi, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) — Ind. Bat.
 Bakeri, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 31. — Madag.
 Balanseum, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 889. — N. Caled.
 Broumichii, Baill. l. c. 885. — N. Caled.
 burmanicum, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 82. — Burma.
 cambodianum, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1891) 36 (= *Planchonella cambodiana*, Pierre). — Cochinch.
 coriaceum, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 892. — N. Caled.
 cuneatum, Raunkiaer, ex Warm. in *Vidensk. Meddel. naturh. Foren.* 1889 (1890) [Symb. Fl. Bras. centr. xxxi.] 4. — Bras.
 dictyoneuron, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 884. — N. Caled.
 dongnaiense, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1891) 36 (= *Planchonella dongnaiensis*, Pierre). — Cochinch.
 Eerwah, F. M. Bailey, in *Proc. Roy. Soc. Queensl.* x. (1894) 52. — Austral.
 fastuosum, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 884. — N. Caled.
 Fischeri, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 306. — Afr. trop. or.
 floribundum, Cordem. *Fl. Ile Réunion*, (1895) 451. — Ins. Bourbon.
 Kaernbachianum, Engl. in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 102. — N. Guin.
 lasianthum, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 887. — N. Caled.

SIDEROXYLON : —

- lasiocladon, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 887. — N. Caled.
 lauraceum, *Baill. l. c.* 890. — N. Caled.
 laurifolium, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 517 = *S. Richardi*, *F. Muell.*
 Lecardi, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 904. — N. Caled.
 leucophyllum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 59. — Calif. austr.
 lifuanum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 890. — Ins. Lifu.
 maritimum, *Pierre, Not. bot. Sapot.* (1891) 36 (= *Planchonella maritima*, *Pierre*). — Cochinch.
 microlobum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 333. — Madag.
 microphyllum, *S. Elliot, l. c.* xxix. (1891) 31. — Madag.
 novo-guineense, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* ix. (1887) 214. — N. Guin.
 Pancheri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 885. — N. Caled.
 papuanum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 312. — N. Guin.
 parvifolium, *Raunkiaer, ex Warm. in Vidensk. Meddel. naturh. Foren.* 1889 (1890) [Symb. Fl. Bras. centr. xxxi.] (parvifolia) 4. — Bras.
 pedicellatum, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 451. — Ins. Bourbon.
 Pervillei, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 518. — Madag.
 petiolare, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 434. — Mexic.
 Petitionum, *Pierre, Not. bot. Sapot.* (1891) 36, in syn. (= *Planchonella Petitiona*, *Pierre*). — N. Galed.
 politum, *Pierre, l. c.* 41 (= *Sapota polita*, *Griseb.*). — Cuba.
 reticulatum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 891. — N. Caled.
 reticulatum, *Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 156. — Parag.
 Sacleuxii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 911, 946. — Zanzib.
 Schwackei, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 518 = parvifolium, *Raunkiaer*.
 sphaerocarpum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 891. — N. Caled.
 spatulatum, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 277 (= *Planchonella*, *sp. Pierre*). — Ins. Sandvic.
 spurium, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 450. — Ins. Bourbon.
 timorense, *Blume, ex Pierre, Not. bot. Sapot.* (1890) 35 (= *Planchonella javensis*, *Pierre*). — Ins. Timor.
 Vieillardii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 886. — N. Galed.
 Wakere, *Baill. l. c.* 882 (= *Chrysophyllum Wakere*, *Panch. & Sebert*). — N. Caled.
 Zippelianum, *Pierre, ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 312. — Ind. bat.

SIEGESBECKIA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 903.
 repens, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser.* III. i. (1895) 153. — Mexic.

SIEGLINGIA, Bernh. = **Triodia**, R. Br. (Gramin.).
 acuminata, albescens, ambigua, antarctica, avenacea, Cunninghamii, exigua, filiformis, irritans, microstachya, mutica, plumosa, procera, pulchella, pungens, Schaffneri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 737 = homonyma omnia *Triodiae*.
 brasiliensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) (= *Uralespis brasiliensis*, *Steud.*). — Bras.
 Buckleyana, Dewey ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 540. — Texas.
 Chapmani, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 365. — Am. bor.
 congesta, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 539. — Texas.
 Cunninghami, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 230 = *Triodia Cunninghami*, *Benth.*
 eragrostoides, Dewey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 539. — Texas, Florida.

SIEGLINGIA : —

- flaccida, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 739 (= *Uralespis flaccida*, *Doell.*). — Bras.
 flava, Kuntze, l. c. = *Triodia cuprea*, *Jacq.*
 latifolia, Kuntze, l. c. (= *Tricuspis latifolia*, *Gri-seb.*). — Reg. Argent.
 Lindleyana, Kuntze, l. c. = *Leptochloa Lindleyana*, *Kunth.*
 microdon, Kuntze, l. c. = *Triraphis microdon*, *Benth.*
 Mitchellii, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 230 = seq.
 Mitchellii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 789 = *T. Mitchellii*, *Benth.*
 Nealleyi, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 538 = *T. Nealleyi*, *Vasey.*
 pungens, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 230 = *T. pungens*, *R. Br.*
 purpurea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 789 = *Triplasis purpurea*, *Chapm.*
 seslerioides, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 48 = *Triodia cuprea*, *Jacq.*
 Wrightii, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 269. — Am. bor. austro-occ.

SIEVERSIA, Willd. = **Geum**, Linn. (Rosac.).
 bulgarica, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 113. — Bulg., Maced.
 pontica, Alboff, in Soc. imp. hort. [Compt. rend. Sect. Odessa] (1891) extr. 8. — Reg. Cauc.
 rhaetica, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 113. — Helv.
 speciosa, Alboff, in Trav. Soc. hort. Odessa (1891) ex Prodr. Fl. Colch. (1895) 80, et ex Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 244 = *Geum speciosum*, *Alboff.*
 Sredinskianum, Krassnoff, in Bull. Soc. Natur. Kharkoff, (1892), ex Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 244 = *G. speciosum*, *Alboff.*

SIGMATOSIPHON, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 150; Stapf, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzen-3b (1895) 262. **PEDALINEAE**.
 Guerichii, Engl. ll. cc. 151; et 262. — Afr. austro-occ. extratrop.

SILAUS, Bernh. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 904.
 foliosus, Somm. & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 78. — Reg. Cauc.
 Rochelii, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 261 = *Selinum Rochelii*, *Heuff.*
 selinoides, Halácsy, in A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 37; Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 261 = *Seseli selinoides*, *Jacq.*

SILENE, Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 904.
 Acantholimon, Wettst. in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, xcvi. 1889 (1890) 381. — As. Min.
 adenantha, Franch. Pl. Delav. ii. (1889) 84. — China occ.
 Akinfiewi, Schmalh. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) 286; Akinfiew, in Bull. Soc. géogr. Cauc. (1892) 90 [Fl. Cauc. centr. (1894) 11.]. — Reg. Cauc.
 Alexandri, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 28. — Ins. Sandvic.
 amassiensis, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 99 = filipes, *Freyn & Sint.*
 antiochica, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 78. — Syria.
 asclepiadea, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxx III. (1886) 422; et Pl. Delav. (1889) 84. — Yunnan.
 asperifolia, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 97. — As. Min.
 Astartes, Blanchet, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 102. — Syria.
 avromana, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. l. c. 105. — Persia.
 Barbeyana, Heldr. ex Boiss. l. c. 107. — Graecia.
 Berthelotiana, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 100. — Teneriffa.
 bernardina, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 82. — Calif.
 Bornmuelleri, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 363. — As. Min.
 bosniaca, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, vi. (1891) 333 = *S. Cucubalus*, *Wibel.*

SILENE :

- Bourgaei, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 100. — Ins. Canar.
 brachypoda, Rouy, Illustr. pl. Eur. rarior. iv. (1895) 26, t. 80. — Gall.
 Brotherana, Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 36. — Reg. Cauc.
 brevistipes, F. N. Williams, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 163. — Teneriffa.
 burmanica, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 23. — Burma.
 caespitosa, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 22. — China occ.
 capsiriensis, Timb.-Lagr. in Jeanb. & Timb.-Lagr. Le Capsir 1887 [Bull. Soc. sci. phys. et nat. Toul.] 53 = *S. Cucubalus*, *Wibel.*
 cardiopetala, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) p. 419; et Pl. Delav. (1889) 80, t. 21. — Yunnan.
 citrina, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 101. — Afghan.
 corinthiaca, Boiss. l. c. 96. — Graecia.
 Correvonianus, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 90. — Reg. Cauc.
 cryptoneura, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 8. — As. Min.
 cryptopetala, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 29. — Ins. Sandvic.
 debilis, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 14. — As. occ.
 Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 424; et Pl. Delav. (1889) 86. — Yunnan.
 djimilensis, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 103, in syn. = saxatilis, *Sims.*
 Engleri, Pax. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 586. — Abyss.
 eremicana, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 17. — As. occ.
 erysimifolia, Stapf, l. c. — As. occ.
 fabarioides, Hausskn. in Nym. Consp. Fl. Europ. Suppl. ii. i. (1889) 51; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 47. — Graecia.
 filipes, Freyn & Sint, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 98. — As. Min.
 Galatea, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 102. — Ins. Cypr.
 genistifolia, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 369. — Graecia.
 glabrescens, Coss. Illustr. Fl. Atlant. i. (1890) 133, t. 85. — Maroc.
 grandiflora, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 427; et Pl. Delav. (1889) 90, t. 23. — Yunnan.
 Hallii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 446. — Am. bor. occ.
 Haussknechtii, Heldr. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 55; Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1895) 51. — Graecia.
 Hermini, Welw. ex Rouy, Ill. Pl. Eur. rar. iv. (1895) 17 = foetida, *Lam.*
 hifacensis, Rouy, Excurs. bot. Espagne 1883 (1884) 10, ex Willk. Illustr. Fl. Hisp. i. (1885?) 150; et Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 282. — Hisp.
 hirticalyx, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 104. — Persia.
 Holzmanni, Heldr. ex Boiss. l. c. 89. — Graecia.
 infidelium, Post, ex Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 154. — Syria.
 intricata, Post, l. c. — Syria.
 Kernerii, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 17. — As. occ.
 kubanensis, Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1895) 37. — Reg. Cauc.
 Lacaitae, Willk. Illustr. Fl. Hisp. (1886-92) 150, t. 89, in syn. = hifacensis, *Rouy.*
 longistylis, Engelm. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 469. — Calif.
 lankongensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 421; et Pl. Delav. (1889) 83. — Yunnan.
 longitubulosa, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 76. — Afr. trop. or.
 luisana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 261. — Mexic.
 lutea, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 420. — China occ.
 macedonica, Formanek, in Verh. Bot. Ges. Brunn xxxii. 1893 (1894) 183. — Maced.

SILENE: —

- Macounii, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 124. — Columb. brit.
 macrocarpa, *Formanek*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* ix. (1891) 68. — Maced.
 macronychia, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 100. — Afghan.
 macropoda, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1886) extr. 8; Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 53 = *multicaulis*, Guss.
 Manissadjiani, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 83. — As. Min.
 maroccana, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 130, t. 83. — Maroc.
 megalocalyx, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 82. — Armen.
 mekinensis, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 144, t. 93. — Maroc.
 melanantha, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 423; et *Pl. Delav.* (1889) 86. — Yunnan.
 mogadorensis, Coss. & Balansa [in Balansa, *Pl. Maroc. exsicc.* (1867)] in *Coss. Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 126, t. 80. 81; Batt. & Trab. *Fl. de l'Alg.* [Dicot.] (1888) 133 (= *S. canariensis*, Otth.). — Maroc.
 mongolica, Maxim. *Enum. Pl. Mongol.* (1889) 88. — Mandschuria.
 monantha, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 99. — Mesopot.
 multinervia, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1898) 126. — Calif.
 Munbyana, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 148, in syn. = *velutinoides*, Pomel.
 napuligera, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 82. — Yunnan.
 nurensis, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 99. — Persia.
 oropediorum, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 132, t. 84. — Algeria.
 otodonta, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 427; et *Pl. Delav.* (1889) 89. — Yunnan.
 pachyphylla, Hausskn. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 55. — Graecia.
 pachyrhiza, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 427; et *Pl. Delav.* (1889) 89. — China occ.
 Parrowiana, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 97. — Persia.
 parvula, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 137, t. 88. — Maroc.
 phoenicodonta, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 422; et *Pl. Delav.* (1889) 84. — China occ.
 Pichleri, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 15. — As. occ.
 pindicola, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 85; Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 53. — Graecia.
 platypetala, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 22. — China occ.
 platyphylla, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 419; et *Pl. Delav.* (1889) 81. — Yunnan.
 Porteri, Post, ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 104; et in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 422. — As. occ.
 Potanini, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 66. — China.
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 269. — Mexic.
 pteropleura, Coss. ex Batt. & Trab. *Fl. de l'Alg.* [Dicot.] (1888) 134 = *colorata*, Poir.
 pterosperma, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 67. — China.
 purpurata, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1892) 229. — Alaska.
 rhadinocalyx, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 8. — As. occ.
 Rigoï, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 94, in syn. = *apetala*, Willd.
 Rouyana, Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) t. 385; Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 147, t. 95. — Algeria.
 rubicunda, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 417; et *Pl. Delav.* (1889) 79. — Yunnan.
 scaposa, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 145. — Oregon.

SILENE: —

- schizopetala, Bornm. in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, vii. (1895) 6, nomen. — As. occ.
 Schlumbergeri, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 106. — Syria.
 Schmuckeri, Wettst. in *Luerss. Biblioth. bot.* Heft xxvi. (1892) 30, t. 2, fig. 6. — Alban.
 Schwarzenbergeri, Haldázy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 472. — Graecia.
 scopulorum, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 423; et *Pl. Delav.* (1889) 85. — Yunnan.
 Shockleyi, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 127. — Calif.
 simulans, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 63. — Calif.
 Skorpili, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) i. 39. — Bulg.
 subciliata, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 327. — Texas, Louisiana.
 subuniflora, Somn. & Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 39. — Reg. Cauc.
 Suksdorfii, Robinson, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 44, t. 6, fig. 9-11. — Am. bor.
 Tanakae, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 81. — Japon.
 tenuicaulis, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 400. — As. Min.
 trachyphylla, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 417; et *Pl. Delav.* (1889) 79. — Yunnan.
 vagans, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1888) 6. — Kohima.
 virescens, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 143, t. 92. — Maroc.
 virgata, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 15. — As. occ.
 viscidula, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 421; et *Pl. Delav.* (1889) 83. — China occ.
 vittata, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 7. — As. occ.
 yunnanensis, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 425; et *Pl. Delav.* (1889) 88. — China occ.
 Watsoni, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 143. — Calif.
 xylobasis, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 100. — As. Min.
 Yanoëi, Makino, *Illustr. Fl. Japon.* i. n. ix. (1891) 1, t. 52. — Japon.
 yemensis, Defters. *Voy. au Yémen.* (1889) 112. — Arabia.

SILER, Crantz. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 912.
cordifolium, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 263. — As. Min.

SILIQAMOMUM, Baill. in *Bull. Soc. Linn.* Paris, ii. (1895) 1193. **ZINGIBERACEAE**.
tonkinense, Baill. l. c. — Tonkin.

SILICUASTRUM, Tourn. = **Cercis**, Linn. (Legumin.).
occidentale, Greene, *Man. Bot. San. Franc. Bay* (1894) 84 = *C. occidentalis*, Toir.

SILPHIUM, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 912.
brachiatum, Gattinger, *Tenness. Fl.* (1887) 54. — Am. bor.

SILVAEA, Phil. (Portub.). — Ind. Kew. ii. 912.
fastigiata, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 26. — Chili.
capitata, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 311. — Chili.

SILVIA, Allem = **Endiandra**, R. Br. (Laurin.).
anacardioides, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 108 = *Misanteca anacardioides*, Benth.
crassiramea, Mez, l. c. 104 = *M. crassiramea*, Benth.
Ita-Uba, Mez, l. c. 107 = *Endiandra Ita-Uba*, Mez.
Ita-uba, Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1889) 123 = *praec.*
oppositifolia, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 110 = *Aydendron oppositifolium*, Nees.
Sprucei, Mez, l. c. 109 = *Acroclidium Sprucei*, Meissn.

SILVIANTHUS, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 912.
radiciflorus, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 32. — Kohima.

SIMABA, Aubl. (Simarub.). — Ind. Kew. ii. 912.
macrophylla, * Oliver n ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 103, sphalm. ? = *Simaruba monophylla*, Oliver ?

SIMARUBA, Aubl. (Simarub.). — Ind. Kew. ii. 913.
Berteroana, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 306. — Ins. S. Doming.
Tulae, Urban, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, iv. (1886) 245; et in *Gartenfl.* xxxvi. (1887) 157, t. 1298. — Ins. Portoric.

SIMBULETA, Forsk. = **Anarrhinum**, Desf. (Scrophul.).
abyssinica, *bellidifolia*, *brevifolia*, *elata*, *fruticosa*, *laxiflora*, *orientalis*, *Pechuelii*, *pedata*, *pubescens*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 465 = *homonyma omnia* *Anarrhini*.
bellidifolia, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 60 = *Anarrhinum bellidifolium*, Desf.
hirsuta, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 465 = *A. Duriminium*, Pers.
laxiflora, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 60 = *A. laxiflorum*, Boiss.
orientale, Wettst. l. c. = *A. orientale*, Benth.
pubescens, Wettst. l. c. = *A. pubescens*, Fries.
veronicoides, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 465 = *Linnaria veronicoides*, A. Rich.

SIMETHIS, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 913.
planifolia, Lloyd & Fouc. *Fl. Ouest Fr.* éd. 4. (1886) 354 (= *S. planifolia*, Gren. & Godr.) = *bicolor*, Kunth.

SIMOCHEILUS, Klotzsch (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 913.
viscosus, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 240. — Afr. austr.

SIMONISIA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 980, sphalm. = **SIMONISIA**, Nees = **Beloperone**, Nees (Acanth.).

SINAPIDENDRON, Lowe = **Brassica**, Tourn. (Crusif.).
Bourgaei, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 89. — Teneriffa.

SINAPIS, Tourn. = **Brassica**, Tourn. (Crusif.).
arvernensis, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 59 = *B. Cheiranthus*, Vill.
Candollei, Rouy & Fouc. l. c. = *B. Cheiranthus*, Vill.
corbatiensis, Timb. in *Lucante, Rev. de Bot.* x. (1892) 42 = *B. Cheiranthus*, Vill.
pendula, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 59 = *B. Cheiranthus*, Vill.
pubescens, Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 28 (= *Erucastrum pubescens*, Willk.). — Hisp. Italia.
rectangularis, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 59 = *B. Cheiranthus*, Vill.

SINCLAIRIA, Hook. & Arn. = **Liabum**, Adans. (Compos.).
Liebmannii, Klatt, ex Sch. Bip. in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 146, in syn. = *Liabum Liebmannii*, Klatt.

SINDECHITES, Oliver, in Hook. *Icon pl.* xviii. (1888) t. 1772. **APOCYNACEAE**.
Henryi, Oliver, l. c. — China.

SINNINGIA, Nees (Gesner.). — Ind. Kew. ii. 914.
barbata, Nichols, *Dict. Gard.* iii. (1886) 436 = *S. Carolinae*, Benth. & Hook. f.
concinna, Nichols, l. c. — Bras.
conspicua, Nichols, l. c. — Bras.
hirsuta, Nichols, l. c. — Bras.
Menziesiana, Nichols, l. c. — Hab. ?

SINNINGIA : —

pusilla, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 772 (= *Tapina pusilla*, Mart.). — Bras.
speciosa, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 62 (= *Ligeria speciosa*, Decne) = *speciosa*, Hiern.

SIOLMATRA, Baill. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 915.
paraguayensis, Cogn. in Coult. Bot. Gaz, i. (1893) 611. — Parag.

SIPANEA, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 915.
rupicola, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 222, in syn. = *Rondeletia rupicola*, K. Schum.
veris, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 368. — Bras.

SIPARUNA, Aubl. (Monim.). — Ind. Kew. ii. 915.

Eggersii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 17. — Ecuad.
foetida, Barb. Rodr. [Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 686]; *Vellisia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 68, t. 21. — Bras.
nigra, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 252. — Bolivia.

SIPHANTHEMUM, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 361 = **Psittacanthus**, Mart. (Loranth.).
brachynema, Van Tiegh. l. c. = *P. brachynema*, Eichl.

SIPHOBEOA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 722, 733; et Hist. des pl. x. (1888) 106; Fritsch, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 159. **GESNERIACEAE**.
Commersonii, Baill. ll. cc. — Ins. Philipp.

SIPHOCAMPYLUS, Pohl (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 915.

andensis, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 373. — Bolivia.
bolivianus, « Zahlbr. » ex Britton, l. c. = *boliviensis*, Zahlbr.
boliviensis, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 443 [Syphocampylus]. — Bolivia.
cutervensis, Zahlbr. l. c. 442. — Bolivia.
gloriosus, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 373. — Bolivia.
gracilis, Britton, l. c. 374. — Bolivia.
incanus, Britton, l. c. 373. — Bolivia.
jelskii, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 440 [Syphocampylus]. — Bolivia.
membranaceus, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 372. — Bolivia.
radicans, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 381. — Costa Rica.
Rusbyanus, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 372. — Bolivia.
Spruceanus, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 443 [Syphocampylus]. — Peruvia.
tupaeformis, Zahlbr. l. c. 440; Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 372. — Bolivia.
unduavensis, Britton, l. c. 373. — Bolivia.

SIPHOCOLEA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 707-08; et Hist. des pl. x. (1888) 58; Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 249. **BIGNONIA-CEAE**.

Boivini, Baill. ll. cc. — Madag.
Hildebrandtii, Baill. ll. cc. — Madag.
rhoifolia, Baill. ll. cc. — Madag.

SIPHONERANTHEMUM, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 494 = **Eranthemum**, Linn. (Acanth.).
alatum, *atrofurpureum*, *bicolor*, *Cocperi*, *cordatum*, *crenulatum*, *cuspidatum*, *decurrens*, *detruncatum*, *Eldorado*, *exaequatum*, *fasciculatum*, *foecundum*, *heterophyllum*, *hispidulum*, *hypocrateriforme*, *lanceum*, *lapathifolium*, *leptanthum*, *leptostachyum*, *macrophyllum*, *modestum*, *Moorei*, *nigritianum*, *polyneurum*,

SIPHONERANTHEMUM : —

praeox, *reticulatum*, *Riedelianum*, *roseum*, *senense*, *sessile*, *tenellum*, *tricolor*, *tuberculatum*, *variabile*, *verbenaceum*, *versicolor*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 495-97 = *homonyma omnia* *Eranthem*.
lilacinum, Kuntze, l. c. 497 = *E. lilacinum*, S. Moore [in Herb. Kew. fide Kuntze]. — Parag.
Lindenianum, Kuntze, l. c. 495, 497 = *E. cuspidatum*, Nees.
nervosum, Kuntze, l. c. = *Daedalacanthus nervosus*, T. Anders.

SIPHONODON, Griff. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 917.

macrophyllum, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) sub t. 312b, in syn. = *Salacia hampuntensis*, Pierre.
pendulum, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iv. (1891) 8. — Austral.

SIPHONOGLOSSA, Oerst. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 917.

dipteracantha, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Explor. S. Texas.] i. (1895) 95 = *S. Pilosella*, Torr.
glabrescens, Lindau, ex Loesen, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 564. — Mexic.
sulcata, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 19 = *Jacobinia sulcata*, Nees.
tubulosa, Baill. ex Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 338. — Afr. austr.

SIPOLISIA, Glaziov, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2281, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 388. **COMPOSITAE**.

lanuginosa, Glaziov, ll. cc. — Bras.

SIPHONYCHIA, Torr. & Gray (Illecebr.). — Ind. Kew. ii. 917.

americana, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 123 = *americana*, Torr. & Gray.

SIRHOOKERA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 681 = **Josephia**, Wight (Orchid.).

lanceolata, Kuntze, l. c. = *J. lanceolata*, Wight.
latifolia, Kuntze, l. c. = *J. latifolia*, Wight.

SIRMUELLERA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 581 = **Banksia**, Linn. f. (Proteac.).

attenuata, *Baueri*, *Baxteri*, *Caley*, *Candolleana*, *coccinea*, *collina*, *dentata*, *elegans*, *Goodii*, *grandis*, *Hookeriana*, *ilicifolia*, *integrifolia*, *lucvigata*, *Lemania*, *Lindleyana*, *media*, *Menziesii*, *microstachya*, *mutans*, *occidentalis*, *ornata*, *petiolaris*, *prostrata*, *Prionotes*, *pulchella*, *quercifolia*, *repens*, *Sceptrum*, *serrata*, *serratifolia*, *Solandri*, *speciosa*, *sphaerocarpha*, *spinulosa*, *triscuspis*, *verticillata*, *Victoriae*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 582 = *homonyma omnia* *Banksiae*.
Brownii, Kuntze, l. c. = *B. Brownii*, Baxter.
dryandroides, Kuntze, l. c. = *B. dryandroides*, Baxter.
ericifolia, Kuntze, l. c. = *B. ericaefolia*, Linn. f.
littoralis, Kuntze, l. c. = *B. littoralis*, R. Br.
Meisneri, Kuntze, l. c. = *B. Meisneri*, Lehm.
praemorsa, Kuntze, l. c. = *B. marcescens*, R. Br.
Robur, Kuntze, l. c. = *B. latifolia*, R. Br.
serratifolia, Kuntze, l. c. = *B. aemula*, R. Br.

SISYMBRIUM, [Tourn.] Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 917.

balearicum, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 298. — Ins. Balear.
brachycarpum, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 4. — Chili.
Brandegianum, Vasey & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 10. [Brandegiana]. — Calif.
caespitosum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 181. — Chili.
ciliolatum, Phil. l. c. 186. — Chili.
Costei, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. ii. (1895) 325, 326. — Gall.
crenatum, T. S. Brandeg, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 111. — Calif.

SISYMBRIUM : —

depressum, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 4. — Chili.
dianthoides, Phil. l. c. 2. — Chili.
elegantissimum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 189. — Chili.
erodifolium, Phil. l. c. 190. — Chili.
exalatum, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 166. — Mexic.
floridum, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 3. — Chili.
glandulosum, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 61 (= *Arabis glandulosa*, Kar. & Kir.). — As. centr.
glaucescens, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 190. — Chili.
grandiflorum, Post, Pl. Postianae, i. (1890) 3. — Syria.
hastifolium, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien ii. (1886) 31. — As. occ.
Hochstetterianum, Buchinger, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 233, in syn. = *S. Irio*, Linn.
laciniosum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 187. — Chili.
Lapeyrouseanum, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 23 = *pinnatifidum*, DC.
Larranagae, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxx. (1893) 185. — Chili.
linifolium, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 2. — Am. austr. occ.
longesiliquosum, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 332. — Hisp.
longisiliquosum, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 51 = *S. Columnae*, Jacq.
macroloma, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 66 = *S. Columnae*, Jacq.
minutiflorum, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 3. — Chili.
mollipilum, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 62. — China.
mongolicum, Maxim. l. c. 61 (= *Malcolmia mongolica*, Maxim.). — As. centr.
monanthos, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 42. — Reg. Afghan.
multifidum, MacMill. Metasp. Miun. (1892) 258 = *canescens*, Nutt.
multiracemosum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 132. — Mexic.
niveum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 186. — Chili.
pandurifolium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 33, in syn. (= *Hesperis pandurifolia*, Kuntze). — Venezuela.
pazense, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 5 [pazensis]. — Bolivia.
pinnatum, Greene, in Bull. Calif Acad. ii. vii. (1887) 390 = *canescens*, Nutt.
polyphyllum, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 2. — Chili.
Reuteri, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 16 = *austriacum*, DC.
rubescens, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 3. — Chili.
Rusbyi, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 16. — Bolivia.
striatum, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 42. — Mesopot.
Simpsoni, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 184. — Chili.
tarapacanam, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 3. — Chili.
tenuisiliqua, Pomel, ex Batt. & Trab. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 67 = *crassifolium*, Cav.
te racmoides, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 43. — Mesopot.
umbelliferum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 188. — Chili.

SISYRANTHUS, E. Mey. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 920.

anceps, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 45. — Afr. austr.
rotatus, Schlechter, l. c. 46. — Afr. austr.
schizoglossoides, Schlechter, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 357. — Afr. austr.
trichostomus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 265 (= *S. virgatus*, E. Mey. var. *trichostomus*, Harv. — Afr. Austr.

SISYRINCHIUM, Linn. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 921.
 angustifolium, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 625. — Chili.
 balansae, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 133. — Parag.
 bifolium, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 621. — Chili.
 bracteosum, *Phil. l. c.* 631. — Chili.
 brevipes, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 130. — Peruvia.
 Burchellii, *Baker, l. c.* 123. — Bras.
 Coulterianum, *Klatt, ex Baker, l. c.* 128. — Mexic.
 demissum, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 69. — Arizona.
 Elmeri, *Greene, l. c.* 106. — Calif.
 eleutherostemon, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 622. — Chili.
 exalatum, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1 (1895) 166. — Mexic.
 humile, *Phil. l. c.* 619. — Chili.
 illapelinum, *Phil. l. c.* 625. — Chili.
 longifolium, *Phil. l. c.* — Chili.
 microspatum, *Phil. l. c.* 628. — Chili.
 Middletoni, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 122. — Patag.
 modestum, *Steud. Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. (1895) 62, in syn. = *Ixia Hochstetteriana, Rich.*
 multiflorum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 628. — Chili.
 nanum, *Phil. l. c.* 621. — Chili.
 nudicaule, *Phil. l. c.* 617. — Chili.
 oligostachium, *Phil. l. c.* 630. — Chili.
 palense, *Phil. l. c.* 618. — Chili.
 pauciflorum, *Phil. l. c.* 621. — Chili.
 pauperculum, *Phil. l. c.* 629. — Chili.
 piligerum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 623. — Chili.
 platycaule, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 132. — Parag.
 platyphyllum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvii. (1891) 155. — Mexic.
 polycladum, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1 (1895) 166. — Mexic.
 Rahmeri, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1891) 620. — Chili.
 rigidifolium, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 131. — Bolivia.
 sarmentosum, *Suksdorf, ex Greene, in Erythea* iii. (1895) 121. — Washington.
 stenopetalum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 624. — Chili.
 stenophyllum, *Phil. l. c.* — Chili.
 Thurowi, *Coult. & Fisher, in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 352; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 428. — Texas.
 valdivianum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 616. — Chili.
 Volckmanni, *Phil. l. c.* 619. — Chili.

SITILIAS, Rafin. = **Pyrrophappus**, DC. (Compos.).
 grandiflora, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 180 = *P. grandiflorus, Nutt.*
 multicaulis, *Greene, l. c.* 179 = *P. multicaulis, DC.*
 pauciflora, *Greene, l. c.* 180 = *P. pauciflorus, DC.*
 Rothrockii, *Greene, l. c.* = *P. Rothrockii, A. Gray.*
 Sessana, *Greene, l. c.* = *P. Sesseanus, DC.*

SIUM, [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 922.
 heterophyllum, *Greene, Pittonia*, ii. (June 1890) 102; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 151. — Calif.
 ovatum, *Yatabe, in Tokyo Bot. Mag.* iv. (March 1891) 73, t. 22; et *Icon. Fl. Japon.* ii. (1892) 97, t. 27. — Japon.

SKIMMIA, Thunb. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 923.
 Foremanni X. *Foremann, ex Gard. Chron.* iv. (1888) 709, 735. — Hybr. artef.
 Fortunei, *Mast. in Gard. Chron.* (1889) i. 520, 525, fig. 91, 553; *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 356 (= *S. japonica, Hook.*). — China.

SLOANEA, Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 924.
 chrysocarpha, *Poepp. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 194, in obs. = *Oncoba maynensis, Poepp. & Endl.*

SLOANEA : —

Eichleri, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 183. — Bras.
 Forbesii, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (Febr. 1892) 164, nomen, et ix. (Nov. 1892) 111; in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 323; et in *Bot. Centralbl.* liii. (1893) 27. — N. Guin.
 Garckeana, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 177. — Bras.
 lasiocoma, *K. Schum. l. c.* 184. — Bras.
 latifolia, *K. Schum. l. c.* 173 = *corymbiflora, DC.*
 Maximowicziana, *K. Schum. l. c.* 192. — Bras.
 obtusa, *K. Schum. l. c.* 181 (= *Dasynema obtusum, Splitz.*). — Guian. bat.
 obtusifolia, *K. Schum. l. c.* 188 (= *Adenobasium obtusifolium, Moric.*). — Bras.
 pentagona, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 1. — Guatem.
 Regelii, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 189, 190. — N. Granat.
 Schumannii, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 372. — N. Guin.
 Sigun, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1890) 5. — Java.

SLOETIA, Teijsm. & Binn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 924.

penangiana, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1531; et *ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 493. — Penins. Mal.
 Wallichii, *King, ex Hook. f. l. c.*; et in *Kew Bull.* (1890) 129. — Penins. Mal. [Java?]

SMELOWSKIA, C. A. Mey. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 924.
 ovalis, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 624. — Washington.

SMILACINA, Desf. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 925.
 oligophylla, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 323 (= *Tovaria oligophylla, Baker.*). — Reg. Himal.
 tubifera, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 104. — China.

SMILAX, [Tourn.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 925.

argyrea, *L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 51; t. 552, et xl. (1893) 39, t. 583, fig. 5; et xli. (1894) 12, fig. 1 [argyrea]. — Peruv.
 anamitica, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 715. — Anam.
 cynodon, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 150. — Ins. Borbon.
 ecirrhata, *S. Wats. in A. Gray, Man. Bot. North. U. S.* ed. 6 (1890) 520 = *herbacea, Linn.*
 flaccida, *Wright, in Kew Bull.* (1895) 118. — China.
 Kingii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 307. — Penins. Mal.
 longibracteolata, *Hook. f. l. c.* 305. — Khasia.
 medicinalis, *S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 496. — Bras. centr.
 megacarpa, *Morong, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 434. — Florida.
 megalantha, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1895) 118. — China.
 microphylla, *C. H. Wright, l. c.* 117. — China.
 panamensis, *Morong, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 441. — Panama.
 quadrangulata, « Muehlb. » ex *Dippel, Handb. Laubholz.* i. (1889) 4, sphalm. (= *S. quadrangularis, Muehlb.*) = *rotundifolia, Linn.*
 scobinicaulis, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1895) 117. — China.
 Smallii, *Morong, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 430. — Georgia.
 utilis, *Wright, in Kew Bull.* (1895) 138. — Ins. Salom.

SMITHIA, Ait. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 927.
 africana, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 215 = *S. Kotschy, Benth.*
 Carsoni, *Baker, in Kew Bull.* (1893) 156. — Afr. centr. austr.
 recurvifolia, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 215; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 321. — Afr. centr. or.

SMITHIA : —

rubrofarinacea, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 216. — Afr. trop. or.
 scaberrima, *Taub. l. c.* 215. — Afr. trop. or.
 uguenensis, *Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57 et 60. — Afr. trop.
 Volkensii, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 215. — Afr. trop. or.
 yunnanensis, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 170. — China occ.
 Welwitschii, *Taub. (ubi?) ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* 216, in obs. — Afr. trop.

SMITHIANTHA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 977 = **Naegelia**, Regel (Gesner.).
 cinnabarina, *Geoltiana, punctata, secunda, zebrina*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 978 = *homonyma omnia Naegeliae.*
 amabilis, *Kuntze, l. c.* = *N. multiflora, Hook.*

SOBRALIA, Ruiz & Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 928.

Lowii, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1890) ii. 378. — N. Granat.
 Lucasiana, *Hort. ex Journ. of Hort.* (1893) 74, 75, fig. 2. — Form. hort.
 pumila, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 337. — Bras.
 Veitchii, *Hort. ex Journ. of Hort.* (1894) 98, 99, fig. 5. — Form. hort.
 xantholeuca, *Hort. ex Williams, Orchid. Grow. Man.* ed. 6 (1885) 576; et *Orchid. Alb.* vi. (1886) t. 250; in *Bot. Mag.* (1894) t. 7332. — Guatem.
 Wilsoniana, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1890) ii. 378. — Am. centr.
 yauaperyensis, *Barb. Rodr. Vellosia*, 1885-88, Sec. ed. (1891) 131. — Bras. bor.

SODIROA, Éd. André (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 929.

Andreana, *Wittm. in Bot. Jahrb.* xi. (1889) 57; *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 142. — Columb.
 dissitiflora, *Ed. André, in Rev. Hort.* ix. (1888) 565; et (1889) 42, t. 13 c; *Baker, l. c.* 142. — Columb.
 Kalbreyeri, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 141. — Columb.
 Pearcei, *Baker, in Journ. Bot.* (1887) 53; et *l. c.* — Ecuad.
 Sprucei, *Ed. André, in Rev. Hort.* ix. (1888) 565; et *l. c.* (1889) 43, t. 13 d; *Baker, l. c.* 141. — Columb.

SOLANDERA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 452 = **Solandra**, Sw. (Solan.).
 brachycalyx, *Kuntze, l. c.* — Costa Rica.
 coriacea, *Kuntze, l. c.* — Columb.

SOLANDRA, Sw. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 929.
 Selerae, *Dammer, ex Loesen. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 617. — Mexic.

SOLANOA, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1890) 67; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 242 = **Schizonotus**, A. Gray (Asclep.).
 purpurascens, *Greene, l. c.* = *S. purpurascens, A. Gray.*

SOLANOANA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 421 = **Schizonotus**, A. Gray (Asclep.).
 purpurascens, *Kuntze, l. c.* = *S. purpurascens, A. Gray.*

SOLANUM, [Tourn.] Linn. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 929.

aberrans, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 15. — Chili.
 abutilifolium, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 229. — Bolivia.
 albifolium, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1894) 127. — Angola.
 albotomentosum, *C. H. Wright, l. c.* 128. — Angola.
 aldabrense, *C. H. Wright, l. c.* 149. — Ins. Aldabra.
 amatitlanense, *J. M. Coult. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 110. — Guatem.
 amethystinum, *Poit. ex Hook. f. in Bot. Mag.* (1889) t. 7062 = *pensile, Sendtn.*

SOLANUM : —

- antidotum*, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 355. — Afr. trop. or.
antiguense, J. M. Coult. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 187. — Guatem.
aridum, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 173. — Parag.
arrazolense, J. M. Coult. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 110. — Guatem.
barbulatum, Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien.* vii. (1892) 6. — Peruvia.
Binderianum, Sch. Bip. ex Engl. in *Abh. Preuss. Acad. Wiss.* 1891 (1892) 372, nomen. — Afr. trop.
Bridgesii, A. DC. in *Arch. sc. phys. et nat.* xv. (1886) extr. 16. — Chili.
Brittonianum, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 174. — Parag.
botryophorum, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 50. — Ins. Fernando Noronha.
bromoense, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 453. — Java.
campanuliflorum, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 127. — Angola.
Carvalhoi, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 355. — Afr. trop. or.
caudiculatum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 12. — Chili.
chrysotrichum, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 129. — Afr. trop. austro-or.
corumbense, S. L. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 404. — Bras.
crassipes, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 14. — Chili.
cupuliferum, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 72. — Calif.
cutervoanum, Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien.* vii. (1892) 7. — Peruvia.
Dallmannianum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 415. — N. Guin.
Dammanianum, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 311; et in *Gartenfl.* xl. (1891) 20. cum xylogr. 10. — Ecuad.
Donnell-Smithii, J. M. Coult. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 51; et in *Bot. Gaz.* xvi. (1891) 144. — Guatem.
Dunali, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 12. — Chili.
duplosinuatum, Hort. ex *Gartenfl.* xliii. (1894) 96. — Hab. ?
Englerianum, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 353. — Afr. trop. or.
Fischeri, Dammer, l. c. — Afr. trop. or.
Geissei, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 16. — Chili.
gilioides, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 228. — Bolivia.
glochidiatum, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 354. — Afr. trop. or.
grandidentatum, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 64. — Chili.
Grayi, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 108. — Mexic.
Griffithii, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 453. — Malaya.
Grisebachianum, Kuntze, l. c. — Ins. Trinit.
guatemalense, Hort. ex Gard. and For. v. (1892) 95 = *muricatum*, Ait.
Handelianum, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 175. — Parag.
impar, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 415. — N. Guin.
inconstans, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 127. — Ins. Fernando Po.
inelegans, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 229. — Bolivia.
infundibuliforme, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 65. — Chili.
Jelskii, Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien.* vii. (1892) 7. — Peruvia.
kauaiense, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 305. — Ins. Sandvic.
Kilimandschari, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 352. — Afr. trop. or.
kitivuense, Dammer, l. c. 353. — Afr. trop. or.
Kunzei, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 6. — Chili.
Lambii, Fernald, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 536. — Mexic.

SOLANUM : —

- Lucani*, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (Mar. 1893) 175; et in *Bot. Centralbl.* liv. (1893) 93. — Austral.
Maccoraii, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* viii. (1893) 80. — Austral.
Maingayi, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 453. — Malaya.
Mandonii, A. DC. in *Arch. sc. phys. et nat.* xv. (1886) extr. 14. — Bolivia.
Mannii, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 129. — Afr. trop. occ.
mazatenangense, J. M. Coult. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 110, nomen. — Guatem.
melastomoides, C. II. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 128. — Reg. Somal.
Miersii Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 16 (= *Clidocarpus Gardneri*, Miers). — Bras.
Monteiroi, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 127. — Angola.
muticum, N. E. Br. l. c. 6; et ex *Gartenfl.* xliii. (1894) 171, t. 1401. — Parag.
Naumannii, *Engl. Bot. Jahrb.* viii. (1886) 64. — Congo.
obliquum, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 354. — Afr. trop. or.
ocellatum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 14. — Chili.
olivaeforme, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 28, xv. (1890) 28, et xvi. (1891) 13, t. 2. — Guatem.
pallidum, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 228. — Bolivia.
Palmeri, Vasey & J. N. Rose, in *Proc. U. S. Nat. Mus.* xi. (1888) 532. — Calif.
pannosum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 9. — Chili.
pauperum, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 127. — Angola.
Pearcei, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 227. — Bolivia.
Pearcei, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 5. — Chili.
phytolaccoides, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 126. — Abyss.
Pierreanum, Paillex & Bois, [*Rev. des sci. appliq.* 1890] ex André, in *Rev. Hortie.* lxii. (1890) 348. — Gabon.
pilcomayense, Morong, in *Ann. Y. N. Acad. sci.* vii. (1893) 177. — Parag.
pittosporifolium, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 171. — China.
polyphyllum, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 64. — Chili.
Pringlei, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 160. — Mexic.
psilostylum, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 354. — Afr. trop. or.
Pugae, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 7. — Chili.
pulchellum, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 64. — Chili.
quichense, J. M. Coult. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 111, nomen. — Guatem.
Remyanum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 17; et in *Mus. nac. Chile* (1891) 66 (= *S. flexum*, Remy). — Chili.
Rohrii, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 128. — Abyss.
rupestre, Waisb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 143. — Hung.
Saccianum, Naud. in *Rev. Hortie.* lxiv. (1892) 58, nomen = *muricatum*, Ait.
salsum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 455. — Venezuela.
saltiense, S. L. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 404. — Bras.
Sanfuegoi, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 10. — Chili.
scalare, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 93. — Sierra Leone.
Schumannianum, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 352. — Afr. trop. or.
septemlobum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 10. — Chili.
setaceum, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 253. — Afr. trop. or.
stipitato-stellatum, Dammer, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 63; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 353. — Afr. trop. or.

SOLANUM : —

- Stuhlmannii*, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 354. — Afr. trop. or.
styracioides, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 230. — Bolivia.
subandinum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 13. — Chili.
subandinum, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 293, et xviii. (1894) 397, 461. — Chile.
tarapacanum, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 65. — Chili.
tequileense, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 441. — Mexic.
tenuicaule, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 13. — Chili.
Thruppii, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 129. — Reg. Somal.
trepidans, C. H. Wright, l. c. 128. — Zambesia.
ulugur-nse, Dammer, ex *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 130, nomen. [ulugurensis]. — Afr. trop.
Urbanianum, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 355. — Afr. trop. or.
urbanum, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 177. — Parag.
ursinum, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 227. — Bolivia.
usaramense, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 353. — Afr. trop. or.
vagans, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 128. — Zanzib.
validum, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 230. — Bolivia.
vexans, S. L. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 405. — Bras.
villaricense, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 178. — Parag.
Volkensii, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 354. — Afr. trop. or.
Weddelli, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 65. — Chili.
Welwitschii, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 126. — Afr. trop. occ.
Wendlandii, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1887) t. 6914. — Costa-Rica.
witheringoides, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 448 in nota = *Saracha Sellowiana*, Miers.

SOLARIA, Phil. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 940.
major, Reiche, in *Bot. Jahrb.* xvi. (1892) 272. — Chili.

SOLDANELLA, Linn. (Primul.). — Ind. Kew. ii. 940.

- hungarica*, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 461; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 219 = *montana*, Willd.
pindicola, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 61. — Graecia.
transilvanica X, Borb. in *Pötfüzet. Természettud. Közlönyh.* xii. (1890) 191, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 416, et xli. (1891) 31. — Transsilv.

SOLEIROLIA, Gaudich. = **Helxine**, Req. (Urtic.).
refens, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 633 = *H. Soleirolii*, Req.

SOLENANDRA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 120 = **Stenanthemum**, Reiss. (Rhamneae).

- coronata*, *humilis*, *leucophracta*, *Waterhousii*, Kuntze. *Rev. Gen.* (1891) 120 = *homonyma omnia* *Stenanthemi*.
pimelodes, Kuntze, l. c. = *S. pimeloides*, Benth.
pomaderrödes, Kuntze, l. c. = *S. pomaderrödes*, Reiss.

SOLENANTHUS, Ledeb. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 940.

- hurdicus*, Guerke, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1893) 104 = *cerinthoides*, Boiss.

SOLENOCALYX, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 260 = **Loranthus**, Linn.

- lampophyllus*, Van Tiegh. l. c. = *Psittacanthus lampophyllus*, Eichl.
Siphon, Van Tiegh. l. c. = *P. Siphon*, Eichl.

SOLENOMELES, Miers (Irid.). — Ind. Kew. ii. 941.
Lechleri, *Baker. Handb. Irid.* (1892) 139 (= *Lechlera Sisyrinchium*, Griseb.). — Chili.

SOLENOPHORA, Benth. (Gesnerac.). — Ind. Kew. ii. 941.
erubescens, *J. D. Smith. Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 56; *et in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 197. — Guatem.

SOLENORUELLIA, Baill. Hist. des pl. x. (1891) 445; Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 326. **ACANTHACEAE**.
Galeottiana, Baill. ll. cc. — Mexic.

SOLENOSTEMON, Thonn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 941.
africanus, [Engl. ?] *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 116, nomen [africanum]. — Afr. trop.
bullatus, *Brig. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 180. — Congo mer.-or.

SOLIDAGO, [Vaill.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 942.
angustifolia, G. C. Druce, Bot. Exch. Club, Brit. Isles Rep. for 1892 (1893) = *S. virga-aurea*, Linn.
araucana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 431. — Chili.
caroliniana, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 26 = *tenuifolia*, Pursh.
floribunda, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 430. — Chili.
Gattingeri, Chapm. ex Gattinger, Teness. Fl. (1887) 51 = *missouriensis*, Nutt. var.
laxiflora, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 429. — Chili.
micrantha, *Phil. l. c.* 432. — — Chili.
parvula, *Phil. l. c.* — Chili.
Parryi, Greene, in Erythea, ii. (1894) 57 = *Aplopappus* Parryi, A. Gray.
patagonica, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 433. — Chili.
Purshii, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 311. — Am. bor.
recta, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 431. — Chili.
rigidiuscula, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 319. — Am. bor.
roanensis, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club. xix. (1892) 136. — Carolina.
uniligulata, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 320 = *Bigelovia uniligulata*, DC.
valdiviana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 431. — Chili.
yadhinensis, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1890) 368 = *Boottii*, Hook.

SOLULUS, Rumpf = **Ormocarpum**, Beauv. (Legumin.).
bibracteatus, coccineus, elegans, Kirkii, Thurberi, verrucosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 205 = *homonyma omnia* Ormocarpium.
cochinchinensis, Kuntze, l. c. = *Ormocarpum senoides*, DC.
coeruleus, Kuntze, l. c. = *O. caeruleum*, Balf. f.
mimosodes, Kuntze, l. c. = *O. mimosoides*, S. Moore.

SOMALIA, Oliver, in Hook. Icon. Pl. xvi. (1886) t. 1528, et in F. L. James, Unkn. Horn. of Afr. Append. (1888) 321, t. 3. **SCROPHULARINEAE**.
Bottae, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 838. — Arabia.
diffusa, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1528; et in F. L. James, Unkn. Horn. of Afr. App. (1888) 321, t. 3. — Reg. Somal.

SOMMERA, Schlecht. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 944.
sabiceoides, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 300. — Bras.

SONCHUS, [Tourn.] Linn. — Ind. Kew. ii. 944.
Dianae, Lacaita, ex Willk. Illustr. Fl. Hisp. ii. (1886-92) 16 t. 100; et Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 116. — Hisp.

SONCHUS : —

Erythraeae, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 346. — Erithrea.
exauriculatus, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 421. — Afr. trop. or.
Fischeri, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.
Freynianus, Huter, Porta & Rigo, ex Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. 1891 (1892) 43; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 114. — Hisp.
gracilis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 325. — Chili.
grandifolius, T. Kirk, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 184; et in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 266. — Ins. Chatham.
Haussknechtii, X. Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 216. — Helv.
Loscosii, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 115. — Hisp.
Loweii, Heer, ex Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 246. — Ins. Canar.

SONERILA, Roxb. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 946.
Beccariana, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. II. (1890) 532; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 508. — Borneo.
borneensis, Cogn. ll. cc. — Borneo.
cantoniensis, Stapf, in Ann. Bot. ii. (1892) 302. — China.
Clarkei, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 501. — Deccan.
cordifolia, Cogn. l. c. 502. — Zeylan.
hirtella, Cogn. l. c. 509. — Borneo.
crassiuscula, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 156. — Borneo.
Hendersoni, Hort. ex Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. II. (1890) 531, in syn. = *margaritacea*, Lindl.
hirtella, Cogn. l. c. 532. — Borneo.
Impatiens, Becc. ex Cogn. l. c. 531, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 489. — Borneo.
integrifolia, Stapf, in Ann. Bot. vi. (1892) 312. — Perak.
kinabaluensis, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 156. — Borneo.
papuana, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. II. (1890) 532, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 511. — N. Guin.
Parishii, Stapf, in Ann. Bot. vi. (1892) 303. — Penins. Mal.
parviflora, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. II. (1890) 532. — Borneo.
peperomiaefolia, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1814. — China.
pulchella, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 157. — Borneo.
purpurascens, Becc. ex Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. II. (1890) 531, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 499. — Borneo.
rivularis, Cogn. l. c. vii. (1891) 1183. — Tonkin.
tonkinensis, Cogn. l. c. 1184. — Tonkin.
triflora, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. II. (1890) 531, nomen; et l. c. 591. — Borneo.
tuberculifera, Cogn. l. c. 532, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 511. — Sumatra.
velutina, Cogn. ll. cc. 532; et 509. — Borneo.

SONNEA, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 22; O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 109. **COMPOSITAE**.
foliacea, Greene, l. c. i. (Oct. 1888) 222. — Nevada.
glomerata, Greene, l. c. i. (Feb. 1887) 22 (= *Plagiobothrys glomerata*, A. Gray). — Calif.
harknessii, Greene, l. c. 23. — Calif.
hispida, Greene, l. c. 22 (= *Plagiobothrys hispida*, A. Gray). — Am. bor. occ.
Jonesii, Greene, l. c. 23 (= *P. Jonesii*, A. Gray). — Am. bor. occ.
Kingii, Greene, l. c. (= *P. Kingii*, A. Gray). — Am. bor. occ.

SOPHORA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 947.
chinensis, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 663, in syn. = *violacea*, Hort.
Korolkowi, Hort. ex Dippel, l. c. 662; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 323. — Mongolia.

SOPHORA : —

shikokiana, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 53. — Japon.
tomentosa, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 663, in syn. = *violacea*, Hort.
zeylanica, Trim. Handl. Fl. Ceyl. ii. (1893) 96, t. 30; et Plates illustr. Handb. Fl. Ceyl. (1894) t. 30. — Zeyl.

SOPHROCATTLEYA, X. Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 169; et in Gard. Chron. (1889) ii. 156. **ORCHIDEAE**.
Batemanniana, X. Rolfe, ll. cc. (= *Laelia Batemanniana*, Reichb. f.); Veitch, Man. Orch. Pl. ii. (1887) 92, cum xylogr. — Hybr. artef.
Calypto, X. Rolfe, l. c. (1890) ii. 588. — Hybr. artef.
eximia, X. Hort. Veitch, ex Journ. of Hort. (1894) 321, fig. 48; et ex Rev. Hort. lxvi. (1894) 491. — Hybr. artef.
laeta, X. Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 476, fig. 63 [sphalm. Batemanniana]. — Hybr. artef.

SOPHRONIA, Lindl. = **Sophronitis**, Lindl. (Orchid.).
coccinea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 681 = *Sophronitis grandiflora*, Lendl.
militaris, Kuntze, l. c. = *S. grandiflora*, Lindl.
pterocarpa, Kuntze, l. c. = *S. pterocarpa*, Lindl. & Paxt.
violacea, Kuntze, l. c. = *S. violacea*, Lindl.

SOPUBIA, Buch-Ham. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 948.
angolensis, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 67. — Angola.
Buchneri, Engl. l. c. 66. — Angola.
Candei, Terrac, in Dull. Soc. Bot. Ital. (1892) 424. — Reg. Somal.
Eminii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 359. — Afr. trop. or.
lanata, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 67. — Afr. trop.
latifolia, Engl. l. c. 66. — Congo mer.
parviflora, Engl. l. c. 65. — Afr. centr. bor.
Welwitschii, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 66. — Angola.

SORANTHE, Salisb. & Knight = **Sorocephalus**, R. Br. (Proteac.).
diversifolia, Dregei, imberbis, imbricata, lanata, scabrida, setacea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 582 = *homonyma omnia* Sorocephali.
phylicodes, Kuntze, l. c. = *S. phyllicoides*, Meissn.
salsolodes, Kuntze, l. c. = *S. salsoloides*, R. Br.

SORBARIA, A. Br. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).
alpina, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 503 = *S. Pallasii*, G. Don.
millefolium, Focke, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1888) 16; Dippel, l. c. 504, fig. 228 = *S. Millefolium*, Torr.

SORBUS, [Tourn.] Linn. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).
auricula, « Pers. » ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 371. sphalm. (= *S. auriculata*, Pers.) = *P. pinnatifida*, Ehrh.
coronaria, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 284 = *P. coronaria*, Linn.
corymbiflora, X. Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 248. — Hybr. artef.
cretica, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 376 = *P. Aria*, Ehrh.
dulcis, Hort. ex Dippel, l. c. 367 = *Pyrus aucuparia*, Ehrh.
erubescens, A. Kern, ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 378 = *P. intermedia*, Ehrh.
lanata, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 199 = *P. lanata*, D. Don.
majestica, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 374 = *P. Aria*, Ehrh.
nepalensis, Hort. ex Dippel, l. c. 375. 386 = *P. Aria*, Ehrh.
neullyensis, X. Dippel, l. c. 370. — Hybr. artef.
Neullyi, Hort. ex Dippel, l. c. = *praece*.
quercoides, Hort. ex Dippel, l. c. = *P. spuria*, DC.

SORBUS: —

occidentalis, Greene, Fl. Francisc. (1891) 54; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 247, in syn. = *Pyrus sambucifolia*, Cham. & Schlecht.
praemorsa, Strobl, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 239 = *Pyrus praemorsa*, Guss.
Sargenti X, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 373. — Hybr. artef.
saturejifolia X, Dippel, l. c. 370. — Hybr. artef.
suecica, Briq. Fl. du Mont Soudine (1893) 32; et in Bull. Soc. Bot. Genève, v. 1893 (1894) 99 = *Pyrus intermedia*, Ehrh.

SORGHUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 949.

annuum, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 128 = *halepense*, Coss.
barbatum, Hochst. & Steud. ex Th. Dur. & Schinz, Consph. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 846. — Abyss., Arabia.
laxiflorum, F. M. Bailey, Bellenden-Ker Exped. (1889) 70. — Austral.

SORGUM, Linn. = *Sorghum*, Linn. (Gramin.).

abyssinicum, *acutiusculum*, *affine*, *Alopecurus*, *amethystinum*, *amplectens*, *annulatum*, *annuum*, *appendiculatum*, *arctatum*, *arenarium*, *argutum*, *arrhenobasis*, *Barteri*, *bellariense*, *bicornis*, *bipennatum*, *bombycinum*, *brachystachyum*, *bracteatum*, *brevifolium*, *Buchneri*, *Cabanisii*, *caricosum*, *carinatum*, *chrysostachyum*, *cirratum*, *commutatum*, *condensatum*, *confine*, *consanguineum*, *contortum*, *Cornucopiae*, *cubense*, *cymbarium*, *Delavayi*, *demissum*, *dilandrum*, *distachyum*, *Elliottii*, *euceme*, *eucomum*, *exaltatum*, *exaratum*, *exile*, *exothecum*, *familiale*, *fastigiatum*, *filifolium*, *filipendulum*, *finitimum*, *flavescent*, *foveolatum*, *fulvibarbe*, *gangeticum*, *Gayanum*, *Gidarba*, *glabriusculum*, *glaucescens*, *gracilipes*, *gracile*, *grandiflorum*, *Gryllus*, *Hallii*, *heteroclitum*, *Hildebrandtii*, *hirtiflorum*, *hirtifolium*, *hirtum*, *Hookeri*, *Huegelii*, *humile*, *intermedium*, *Ischaemum*, *Iwarancusa*, *Kuntzeanum*, *lanigerum*, *laterale*, *lepidum*, *leptocladum*, *leptocomum*, *leucostachyum*, *lithophilum*, *lividum*, *longiberbe*, *longipes*, *macrolepis*, *malacostachyum*, *Mannii*, *melanocarpum*, *monatherum*, *montanum*, *monticolum*, *mucronatum*, *multiplex*, *Myosurus*, *Nardus*, *Newtonii*, *nodulibarbe*, *nodulosum*, *obliquiberbe*, *oligantum*, *oryztorum*, *papillosum*, *pertusum*, *pilosissimum*, *piptatherum*, *platyphyllum*, *plumosum*, *poecilotrichum*, *Pohlmannum*, *polyatherum*, *polyptychum*, *pratense*, *procerrum*, *provinciale*, *Pseudoischaemum*, *pterocephalus*, *pulchellum*, *pusillum*, *refractum*, *Riedelii*, *rufum*, *Ruprechtii*, *scabriflorum*, *Schimperii*, *Schinzii*, *schizense*, *Schlumbergeri*, *Schoenanthus*, *Schottii*, *Schweinfurthii*, *scoparium*, *semiberbe*, *sericeum*, *serratum*, *Smithianum*, *spathiflorum*, *subtile*, *superciliatum*, *tenerum*, *tenuiberbe*, *tenuis*, *ternatum*, *trichocladum*, *trichozygium*, *triste*, *triticum*, *tuberculatum*, *umbellatum*, *urceolatum*, *venustum*, *verticillatum*, *vestitum*, *virginicum*, *Wrightii*, *xanthoblepharis*, *yunnanense*, *Zaeae*, *Zollingeri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 790-92 = *homonyma omnia* *Andropogonis*.

aciculatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 791 = *Chrysopogon aciculatus*, Trin.

anthistirodes, Kuntze, l. c. = *Andropogon anthesis-tiroides*, Hochst.

argenteum, Kuntze, l. c. 790 = *A. argyreus*, Schult. Aucher, Kuntze, l. c. 791 = *Chrysopogon serrulatus*, Trin.

bicolor, Kuntze, l. c. 790 = *A. dichrous*, Steud.

Bourgeauii, Kuntze, l. c. 791 = *A. Bourgaei*, Hack.

campestre, Kuntze, l. c. 790 = *A. hypogynus*, Hack.

camporum, Kuntze, l. c. = *A. campestris*, Trin.

cerasiaeforme, Kuntze, l. c. 791 = *A. cerasiaeformis*, Nees.

ciliare, Kuntze, l. c. 790 = *A. Cymbachne*, Hack.

comosum, Kuntze, l. c. = *A. coleotrichus*, Steud.

erianthodes, Kuntze, l. c. = *A. erianthoides*, F. Muell.

Glaziovii, Kuntze, l. c. = *A. Glaziovii*, Hack.

glomeratum, Kuntze, l. c. 791 = *A. macrourus*, Michx.

laxum, Kuntze, l. c. 790 = *A. apricus*, Trin.

lepton, Kuntze, l. c. 792 = *A. tener*, Kunth.

Liebmannii, Kuntze, l. c. = *A. Liebmannii*, Hack.

orientale, Kuntze, l. c. 790 = *A. aristulatus*, Hochst.

SORGUM: —

papillipes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 790 = *Andropogon papillipes*, Hochst.

plumosum, Kuntze, l. c. = *Trachypogon polymorphus*, Hack.

rude, Kuntze, l. c. 792 = *Arthraxon cuspidatus*, Hochst.

saccharodes, Kuntze, l. c. = *Andropogon saccharoides*, Sw.

Salzmannii, Kuntze, l. c. 790 = *A. imberbis*, Hack.

sanguinarum, Kuntze, l. c. 792 = *A. sanguinarius*, Schreb.

sanguineum, Kuntze, l. c. 791 = *A. Pseudograya*, Steud.

serrulatum, Kuntze, l. c. 791 = *Chrysopogon serrulatus*, Trin.

villosum, Kuntze, l. c. = *Andropogon Neesi*, Kunth.

zizanolodes, Kuntze, l. c. = *A. squarrosus*, Linn. f.

SORIA, Adans = *Euclidium*, R. Br. (Crucif.).

syriaca, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 36 = *E. syriacum*, R. Br.

tenuissima, Kuntze, l. c. = *E. tataricum*, DC.

SORINDEIA, Thou. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 949.

acutifolia, Engl. Bot. Jahrb. xi. Beibl. n. 26 (1890) 6. — Ins. S. Thom.

Azelii, Engl. l. c. xv. (1892) 107. — Sierra Leone.

grandifolia, Engl. l. c. xi. Beibl. n. 26 (1890) 7. — Ins. S. Thom.

madagascariensis, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1892) t. 230a et b. — Madag.

obtusifoliolata, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 244. — Afr. trop. or.

Poggei, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1892) 197. — Congo.

usambarensis, Engl. in Abh. Preuss. Acad. Wiss. (1894) 44; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 244. — Afr. trop. or.

SOROCEA, A. St. Hil. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 949.

grandifolia, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 476. — Bras.

SOYAUXIA, Oliver (Passiflor.). — Ind. Kew. ii. 950.

glabrescens, Engl. Bot. Jahrb. xiv. (1891) 390. — Gabon.

SPACHEA, A. Juss. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 950.

sericea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 88. — Panama.

SPARATTOSPERMA, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 951.

leucanthum, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 235 [Sparattospermum] = *lithotripticum*, Mart.

SPARAXIS, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 951.

lineata, Pax, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1888) 155 = *Tritonia lineata*, Ker.

SPARGANUM, [Tourn.] Linn. — Ind. Kew. ii. 951.

androcladum, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, iv. (1888) 78; et in Macoun, Catal. Canad. Pl. iv. (1888) 70. — Canada.

flaccidum, Meinsh. in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 37. — Russia.

Glehnii, Meinsh. l. c. 34. — Sacchaline.

Greenii, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 177. — Calif.

longifolium, Don, ex Druce, in Journ. Bot. xxvi. (1888) 115, in syn. = *affine*, Schnitzl.

perpusillum, Meinsh. in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 38. — Russia.

ratis, Meinsh. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1887) 874; et in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 39. — Russia.

septentrionale, Meinsh. l. c. — Russia.

simile, Meinsh. in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 34. — As. centr.

SPARGANIUM: —

speirocephalum, Neum. in Meddel. Soc. Faun. et Fl. Fenn. xix. (1893) 143. — Fennia.

splendens, Meinsh. in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 32. — Russia.

stenophyllum, Maxim. ex Meinsh. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1889) 171; et l. c. 35. — Manchuria.

subvaginatum, Meinsh. in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 34. — Am. bor.

submuticum, Hartm. Skand. Fl. ed. (1889) 108; Wainio, in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn. viii. n. 4 (1891) 83. — Eur. bor.

SPARTOTHAMNELLA, Briq. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 161.

VERBENACEAE.

juncea, Briq. l. c. (= *Sparthothamnus juncea*, A. Cunn.). — Austral.

SPARTOCYTISUS, Webb & Berth. = *Cytisus*, Linn. (Legumin.).

supranubius, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 162 (= *Spartium supranubium*, Linn. f.) — Teneriffa.

SPATHACANTHUS, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 444; Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 327. *ACANTHACEAE*.

Donnell-Smithianus, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. 371. — Guatem.

Donnell-Smithii, Lindau, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 293 = *praec.*

Hahnianus, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 444. — Mexic.

Hoffmanni, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 370. — Costa Rica.

SPATHANTHIUM, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 952.

heterandrum, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 471 = *heterandrum*, Benth. & Hook. f.

SPATHE, P. Br. = *Spathelia*, Linn. (Simarub.).

glabrescens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 104 = *Spathelia glabrescens*, Planch.

rhoifolia, Kuntze, l. c. = *S. rhoifolia*, DC.

vernica, Kuntze, l. c. = *S. vernica*, Planch.

SPATHIONEMA, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 224. *LEGUMINOSAE*.

kilimandscharicum, Taub. l. c. 224. — Afr. trop. or.

SPATHIPHYLLUM, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 953.

pictum, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 467 = *Rhodospatha picta*, Nichols. (in App.).

SPATHODEA, Beauv. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 954.

Danckelmaniana, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 87. — Gabon.

Danckelmannii, « Buettn. » ex Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 241, sphalm. = *praec.*

SPATHOGLOTTIS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 954.

Augustorum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 9; (1886) ii. 104; et in Bot. Mag. (1888) t. 7013 = *S. Vieillardii*, Reichb. f.

Bensonii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 814; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2087. — Parag.

gracilis, Rolfe, ex Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7366. — Borneo.

Ericsonii, Hort. ex Gartenfl. xli. (1892) 184, nomen [Quid?].

Hollrungii, Kraenzl. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 33. — N. Guin.

Kimballiana, Hort. Sand. ex Gartenfl. xli. (1892) 184; ex Reichenbachia (1894) t. 88; Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7443 [Kimballiana]. — Borneo.

microchilina, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 484. — Sumatra.

parviflora, Kraenzl. ex Warb. l. c. xvi. (1892) 13, 18. — N. Guin.

SPATHOGLOTTIS : —

- plicata*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 354, in obs. = *plicata*, Blume.
Portus-Finschii, Kraenzl. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 32. — N. Guin.
Regneri, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) 174. — Cochinch.
rosea, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 467. — Ins. Philipp.
stenophylla, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 354. — N. Guin.
Soutteriana, F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. xi. i. (1895) 15. — Austral.
Wrayi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 812; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2086. — Perak.

SPATHOLOBUS, Hassk. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 954.

- parviflorus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 205 = *S. Roxburghii*, Benth.

SPATHYEMA, Rafin. = **Symplocarpus**, Salisb. (Aroid.).

- foetidum*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 508 = *foetida*, Rafin.

SPECULARIA, Heist. (Campanul.). — Ind. Kew. 955.

- Speculum-Veneris*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1888) 139 = *S. Speculum*, A. DC.

SPEIRANTHA, Baker (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 955.

- Gardeni*, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 524 = *convallarioides*, Baker.

SPEIROSTYLA, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 198. **STERCULIACEAE**.
tiliaefolia, Baker, l. c. t. 4. — Madag.**SPERANSKYA**, Baill. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 955.

- Henryi*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1577. — China centr.

SPERGULA, Linn. (Caryophyll.). — Ind. Kew. ii. 955.

- flaccida*, Aschers. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1889) p. 43. — Afr. bor., As. occ., Afghan. India.

SPERGULARIA, J. et C. Presl (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 956.

- angolensis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 771. — Chil.
aprica, Phil. l. c. 766. — Chili.
araucana, Phil. l. c. 764. — Chili.
Borchersii, Phil. l. c. 769. — Chili.
borealis, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxxix. (1894) 312 (= *Buda borealis*, S. Wats. & Coult.). — Am. bor.
Clevelandi, Robinson, l. c. 310 (= *Tissa Clevelandi*, Greene). — Calif.
coquimbensis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 764. — Chili.
depauperata, Phil. l. c. 765, in obs. (= *Arenaria depauperata*, C. Gay). — Chili.
fasciculata, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 6. — Chili.
fruticosa, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 767. — Chili.
gracilis, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 311 (= *Lepigonum gracile*, S. Wats.). — Am. bor.
hybrida ×, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 59. — Graecia.
Larranagae, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 767. — Chili.
Lebeliana, Rouy, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 223. — Gall.
longipes, Rouy, l. c. 224. — Gall.
macrotheca, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 312 (= *Lepigonum macrothecum*, Fisch. et Mey.). — Calif.
oligantha, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 770. — Chili.
polyantha, Phil. l. c. 765. — Chili.

SPERGULARIA : —

- Rengifoii*, Phil. l. c. 769. — Chili.
sperguloides, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 58 (= *Lepigonum sperguloides*, Fisch. & Mey.). — Europ.
tenella, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 766. — Chili.
tenuis, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 311 (= *Lepigonum tenue*, Greene.). — Calif.

SPERMACECE, Dill. ex Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 957.

- angustifolia*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 144 (= *Bigelovia angustifolia*, Span.). — Ins. Timor.
Baurii, Robinson & Greenm. in Am. Journ. sci. Ser. III. i. (1895) 141 (= *Borreria Baurii*, Robinson & Greenm.). — Ins. Galap.
Brownii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 208. — Boliv.
galapageia, Robinson & Greenm. in Am. Journ. sci. Ser. III. i. (1895) 141 (= *Borreria galapageia*, Robinson & Greenm.). — Ins. Galapag.
Jacobsoni, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull. iii. (1891) 13. — Austral.
megalocarpa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 381. — Mexic.
monodon, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 144. — Bras.
pacifica, Robinson, et Greenm. in Am. Journ. sci. Ser. III. i. (1895) 141 (= *Borreria pacifica*, Robinson & Greenm.). — Ins. Galapag.
Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 152. — Mexic.
pumila, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 144 (= *Bigelovia pumila*, Span.). — Ins. Timor.
setidens, Boerl. l. c. (= *B. setidens*, Miq.). — Java.
sociata, Boerl. l. c. (= *B. sociata*, Span.). — Ins. Timor.
tenuissima, Pohl, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1890) 46, in syn. (= *Borreria tenuis*, DC.). — Bras.
thymocephala, Hitchcock, Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 95 (= *B. thymocephala*, Griseb.). — verticillata, Linn.
uniseta, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull. iii. (1891) 13. — Austral.
Zollingeriana, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 144 (= *Bigelovia Zollingeriana*, Miq.). — Java.

SPERMOLEPIS, Rafin. = **Apium**, Tourn. (Umbell.).

- divaricatus*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 244 = *divaricata*, Rafin.
echinatus, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marshall Coll. i. [Bot. Expl. S. Texas] (1895) 73 = *apium echinatum*, Benth. & Hook. f.

SPHACELE, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 959.

- fragrans*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 38. — Calif.
Grisebachii, F. Kurtz, in Revista Mus. La Plata [Sert. Cordob.] 14 v. (1893) 292. — Reg. Argent.

SPHACOPHYLLUM, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 959.

- africanum*, O. Hoffm. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58; et Pflanzenzw. Ost-Afr. C (1895) 412 (= *Astephania africana*, Oliver). — Afr. trop. or.
Holstii, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.
Lastii, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.
Stuhlmannii, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.

SPHACOPSIS, Briq. Lab. Alp. Marit. i. (1891) 184 = **Salvia**, Linn. (Labiata.).

- verticillata*, Briq. l. c. = *S. verticillata*, Linn.

SPHAERALCEA, A. St. Hil. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 959.

- albiflora*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 81; E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 362. — Calif.
ambigua, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 292. — Am. bor. occ.

SPHAERALCEA : —

- arenaria*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 11. — Chili.
axillaris, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 41. — Mexic.
californica, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 66; E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 363. — Calif.
capitata, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 8. — Chili.
capituliflora, Phil. l. c. 10. — Am. austr. occ.
circinata, Phil. l. c. 7. — Am. austr. occ.
Coulteri, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. sci. Ser. II. ii. (1889) 135 = *californica*, J. N. Rose.
Coulteri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 291. — Arizona.
crispa, Hook. ex E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 363. — Patagonia.
crispifolia, E. G. Baker, l. c. 367 (= *Sida crispifolia*, Cav.). — Am. austr.
fulva, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 201. — Ins. Cedros.
grandiflora, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 5. — Chili.
Hainesii, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 136. — Calif.
malvastroides, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 366. — Afr. austr.
Mandoni, E. G. Baker, l. c. 364. — Bolivia.
Orcuttii, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 290. — Calif.
Palmeri, J. N. Rose, l. c. i. (1890) 23; E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 362. — Ins. Guadal. (Calif.).
pannosa, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 156. — Afr. austr.
pedatifida, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 291 (= *Malvastrum pedatifidum*, A. Gray). — Texas.
peteroana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 9. — Chili.
plicata, Phil. l. c. 6. — Chili.
prostrata, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 367 (= *Sphaeroma prostratum*, Harv.). — Afr. austr.
pulchella, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1893) 9. — Chili.
Rusbyi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 293. — Arizona.
valparadisea, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 12. — Chili.
Vidali, Phil. l. c. 6. — Chili.
viridis, Phil. l. c. 8. — Chili.

SPHAERANTHUS, Vaill. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 959.

- angolensis*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 228. — Angola.
angustifolius, Sch. Bip. [in Schimp. Pl. Abyss. ii. n. 525] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 422, in syn. = *S. Steetzii*, Oliver & Hiern.
cyathuloides, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 229. — Afr. trop. or.
Fischeri, O. Hoffm. l. c. 230. — Afr. trop. or.
gomphrenoides, O. Hoffm. l. c. 229. — Afr. trop. or.
Hildebrandtii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 326. — Madag.
Stuhlmannii, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 230. — Afr. trop. or.
ukambensis, Vathe & O. Hoffm. ex O. Hoffm. l. c. 228. — Afr. trop. or.

SPHAERIUM, Linn. = **Coix**, Linn. (Gramin.).

- giganteum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 793 = *C. Lacryma-Jobi*, Linn.
Lacryma, Kuntze, l. c. = *C. Lacryma-Jobi*, Linn.
tubulosum, Kuntze, l. c. 794 = *C. tubulosa*, Hack.

SPHAEROCEPHALUS, Linn. = **Echinops**, Linn. (Compos.).

- albicaulis*, alexicaulis, armatus, Aucheri, dannaticus, Bovei, Cephalotes, ceratophorus, chamaeccephalus, chantavicus, chorassanicus, commutatus, cornigerus, cyanocephalus, dasyanthus, dichrous, echinatus, Gaillardotii,

SPHAEROCEPHALUS : —

giganteus, *glaberrimus*, *Gmelinii*, *gracilis*, *Haussknechtii*, *hebelepis*, *Heldreichii*, *heteromorphus*, *hispidus*, *horridus*, *humilis*, *Hussonii*, *hypoleucus*, *ilicifolius*, *inermis*, *integrifolius*, *jaxarticus*, *jesdianus*, *karataevicus*, *hurdicus*, (Boiss. & Haussk.) *leucographus*, *longifolius*, *longisectus*, *macrochaetus*, *macrophyllus*, *maracandicus*, *microcephalus*, *nannus*, *niveus*, *ossicus*, *parviflorus*, *polygamus*, *Ritro*, *ritrodes*, *robustus*, *spinosis*, *strigosus*, *subglaber*, *Szowitsii*, *Tournefortii*, *tricholepis*, *vaginatus*, *villosissimus*, *viscosus*, *xanthacanthus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 366 = *homonyma omnia* Echinopseos.
exaltatus, Kuntze, l. c. = *E. exaltatus*, Koch.
Griffithianus, Kuntze, l. c. = *E. echinatus*, Roxb.?
latifolius, Kuntze, l. c. = *E. dahuricus*, Fisch.
multiflorus, Kuntze, l. c. = *E. sphaerocephalus*, Linn.
polyceras, Kuntze, l. c. = *E. Blancheanus*, Boiss.
jugens, Kuntze, l. c. = *E. persicus*, Stev.

SPHAEROCODON, Benth. (Asclep.). — Ind. Kew, ii. 960.

acutifolium, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 125 [acutifolius] = *longipedunculatus*, K. Schum.
caffrum, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 339 = *obtusifolium*, Benth.
longipedunculatum, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 326 [longipedunculatus] (= *Gymnema longipedunculatum*, Schweinf.). — Afr. trop. or.

SPHAEROLOBIUM, Sm. (Legumin.). — Ind. Kew, ii. 960.

parviflorum, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Tasman. (1890) 14. — Austral

SPHAEROMA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 73 = **Sphaeralcea**, A. St. Hil. (Malvac.).

Berteroana, *bonariense*, *chilense*, *choapina*, *cisplatense*, *collinum*, *coquimbaram*, *crispum*, *Dregeanum*, *elegans*, *Emoryi*, *Fendleri*, *Gayanum*, *glabratum*, *hastulatum*, *Hornschuchianum*, *Lindheimeri*, *miniaturum*, *nitans*, *obtusilobum*, *rupestre*, *sessiliflorum*, *velutinum*, *vitifolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 74 = *homonyma omnia* Sphaeralceae.
abutiloides, Kuntze, l. c. = *Sphaeralcea abutiloides*, G. Don.
ambigua, Kuntze, l. c. = *Sida ambigua*, Ten.?
divaricatum, Kuntze, l. c. (= *Malva divaricata*, E. Mey.). — Afr. austr.
filicaule, Kuntze, l. c. = *Sida diffusa*, H. B. & K.
floridanum, Kuntze, l. c. — Chili.
incanum, Kuntze, l. c. = *Sida Emoryi*, Torr.
pannosum, Kuntze, l. c. = *S. glutinosa*, Cav.
reticulare, Kuntze, l. c. = *S. acerifolia*, Nutt.
calparadiseum, Kuntze, l. c. = *S. obtusiloba*, G. Don.
Wrightii, Kuntze, l. c. = *S. Emoryi*, Torr.

SPHAEROSEPALUM, Baker (Guttif.). — Ind. Kew, ii. 960.

coriaceum, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 5. — Madag.

SPHAEROSTIGMA, Fisch. & Mey. = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).

acuminatum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 629. — Chili.

SPHAEROTHYLAX, Bisch. ex Krauss (Podost.). — Ind. Kew, ii. 961.

abyssinica, Warm. Fam. Podost. iv. (1891) 14, 39, fig. 17 (= *Anastrophoea abyssinica*, Wedd.); Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2356. — Abyss.
heteromorpha, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 876. — Congo gall.

SPHANELLOLEPIS *ciliata*, « Steud. » ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1886) 19, sphalm. (= *Sphanellopsis ciliata*, Steud.) = *Adelobotrys ciliata*, Triana.

SPHEDAMNOCARPUS, Planch. (Malpigh.). — Ind. Kew, ii. 961.

galphimiaeifolius, Szyszyl. Polypet. Rehm. (1888) 2 = *Acridocarpus galphimiaeifolius*, Fuss.
pruriens, Szyszyl. l. c. = *A. pruriens*, Fuss.
Rehmannii, Szyszyl. l. c. 3 [Rehmanni]. — Transvaal.

SPHENANDRA, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew, ii. 961.

cinerea, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 253. — Afr. austr.

SPHENODESME, Jack (Verben.). — Ind. Kew, ii. 961.

ferruginea, Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 181 (= *S. ferruginea*, Wight) = *barbata*, Schau.

SPHENOSTIGMA, Baker (Irid.). — Ind. Kew, ii. 962.

boliviensis, Baker, Handb. Irid. (1892) 107. — Bolivia.
euryandra, Baker, l. c. 106 (= *Herbertia euryandra*, Griseb.). — Turkestan.
gramineum, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 493. — Bras. centr.
polycephalum, Baker, l. c. 107 [polycephala]. — Bras.
Spruceanum, Baker, l. c. [Spruceana]. — Ecuad.

SPHINCTANTHUS, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew, ii. 962.

maculatus, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 356. — Bras.
microphyllus, K. Schum. l. c. 354. — Bras.

SPHONDYLUM, [Tourn.] Adans. = **Heracleum**, Linn. (Umbell.).

alpinum, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 255 (= *S. alpinum*, Scop.) = *H. alpinum*, Linn.
austriacum, Caruel, l. c. 254 (= *S. austriacum*, Scop.) = *H. austriacum*, Linn.
lanatum, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 157 = *H. lanatum*, Michx.

SPHYRANTHERA, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1702; et Fl. Brit. Ind. v. (1888) 477. EUPHORBIACEAE.

capitellata, Hook. f. II. cc. (= *Codiaeum lutescens*, King). — Ins. Andam.

SPIESIA, Neck. = **Oxytropis**, DC. (Legumin.).

aciphylla, *acupetala*, *ajanensis*, *albana*, *albiflora*, *algida*, *ambigua*, *ammophila*, *amputata*, *arctobia*, *argentata*, *Aucherii*, *baicalia*, *bicolor*, *brachybotrys*, *brevicaulis*, *cabulica*, *caespitosa*, *campestris*, *candicans*, *caucasica*, *caudata*, *chionobia*, *chionophylla*, *chrysocarpa*, *ciliata*, *cinerascens*, *confusa*, *cuspidata*, *cyanea*, *dasyopoda*, *deflexa*, *densa*, *dichroantha*, *didymophylla*, *dioritica*, *dubia*, *eriocarpa*, *falcata*, *filiformis*, *floribunda*, *foetida*, *frigida*, *fruticulosa*, *Gebleri*, *glabra*, *glandulosa*, *globiflora*, *gracillima*, *grandiflora*, *Griffithii*, *gymnogyna*, *Hallii*, *heratensis*, *heteropoda*, *heterotricha*, *hirsuta*, *hirta*, *hypophylla*, *Hystris*, *inaria*, *integripetala*, *intermedia*, *hansuensis*, *Kotschyana*, *Lagopus*, *Lambertii*, *lanata*, *lapponica*, *lasipoda*, *lazica*, *Lehmanni*, *leptophylla*, *leptophylla*, *leucantha*, *leucocyanea*, *leucotricha*, *longebracteata*, *longipes*, *longirostre*, *macrobotrys*, *macrocarpa*, *macrosema*, *malacophylla*, *malaleuca*, *melanocalyx*, *melanotricha*, *merkensis*, *Mertensiana*, *Meyeri*, *microphylla*, *microspiraera*, *Middendorffii*, *mixotricha*, *mollis*, *montana*, *monticola*, *mugodschavica*, *multiceps*, *muricata*, *myriophylla*, *nana*, *nigrescens*, *nitens*, *nivea*, *nutans*, *ochrolepis*, *ochrantia*, *ochrocephala*, *ochroleuca*, *oligantha*, *oreophila*, *oxyphylla*, *pagobia*, *Pallasii*, *Parryi*, *pellita*, *persica*, *physocarpa*, *pilosa*, *platonychla*, *platysema*, *podocarpa*, *podoloba*, *polyphylla*, *proboscidea*, *prostrata*, *pumila*, *Pumilio*, *pusilla*, *pyrenaica*, *racemosa*, *recognita*, *revoluta*, *rhynchophylla*, *rosea*, *rupifraga*, *samurensis*, *sawellanica*, *Schmidtii*, *Schrenkii*, *selegensis*, *Semenowii*, *setosa*, *Sewerzowii*, *songorica*, *sordida*, *splendens*, *squamulosa*, *stenophylla*, *Stracheyana*, *strobilacea*, *submutica*, *subverticillaris*, *tartarica*, *Thomsonii*,

SPIESIA : —

tianschanica, *tibetica*, *Tilingii*, *tragacanthodes*, *Trantvetteri*, *trichocalycina*, *trichophylla*, *triflora*, *triphylla*, *Tschujae*, *uralensis*, *vaginata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 206-07 = *homonyma omnia* Oxytropidis.
acutirostris, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 677, in obs. = *Oxytropis acutirostris*, S. Wats.
alpicola, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 206 = *O. uralensis*, DC.
alpina, Kuntze, l. c. = *O. uralensis*, DC.
altaica, Kuntze, l. c. = *O. brevirostra*, DC.
arctica, Kuntze, l. c. = *O. uralensis*, DC.
Belli, Britton, ex Macoun, in Canad. Record Sci. (Nov. 1894) 148. — Am. bor. occ.
bracteosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 206 = *O. oxyphylla*, DC.?
cava, Kuntze, l. c. = *O. cana*, Bunge.
chiliophylla, Kuntze, l. c. = *O. microphylla*, DC.
coerulea, Kuntze, l. c. = *O. caerulea*, DC.
Gaudinii, Kuntze, l. c. = *O. Gaudini*, Bunge.
gelida, Kuntze, l. c. = *O. albana*, Stev.
glacialis, Kuntze, l. c. = *O. lapponica*, Gaud.
Halleri, Kuntze, l. c. = *O. uralensis*, DC.
humifusa, Kuntze, l. c. = *O. albana*, Stev.
inflata, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 201 = *O. podocarpa*, A. Gray.
Kasbeki, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 206 = *O. Kasbeki*, Bunge.
kaschemiriana, Kuntze, l. c. = *O. cachemiriana*, Cambess.
mandschurica, Kuntze, l. c. = *O. manschurica*, Bunge.
Meinshausenii, Kuntze, l. c. = *O. Meinshausenii*, Schrenk.
nothoxys, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 677, in syn. = *O. nothoxys*, M. E. Jones.
Owerinii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 206 = *O. Owerinii*, Bunge.
pauciflora, Kuntze, l. c. = *O. Tschujae*, Bunge.
sulfurea, Kuntze, l. c. = *O. sulphurea*, Fisch.
sylvicola, Kuntze, l. c. = *O. sylvatica*, DC.
Szovitzii, Kuntze, l. c. = *O. Szovitzii*, Boiss.
tattarica, Kuntze, l. c. = *O. tatarica*, Cambess.
viscida, Kuntze, l. c. = *O. campestris*, DC.

SPILADOCORYS, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 322 = **Pentastachme**, Wall. (Asclep.).

angustifolia, Ridl. l. c. = *P. caudatum*, Wall.

SPILANTHES, Jacq. (Compos.). — Ind. Kew, ii. 963.

Botterii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 141. — Mexic.
disciformis, Robinson, l. c. xxvii. (1893) 176. — Mexic.
lateraliflora, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1886) 43. — Guatem.
Lehmanniana, Klatt, l. c. 43. — Columb.
leucophaea, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 144. — Mexic.
orizabaensis, Sch. Bip. l. c. — Mexic.

SPINILUMA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 943 = **Sideroxylon**, Dill. (Sapot.).

Oxyacantha, Baill. l. c. — Abyss.

SPINOVITIS, Romanet = **Vitis**, Tourn. (Ampel.).

Davidi, Carr. in Rev. Hortic. lxi. (1889) 312, lxii. (1890) 507; et lxiii. (1891) 102, fig. 24-26. — China.
Davidiana, « Carr. » ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 596, ad calc. sphalm. = praec.

SPIRAEA, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew, ii. 964.

aemula, « Zabel, » ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 219. —
alnifolia, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 26 = *chamaedryfolia*, Linn.
anomala, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 92. — China.
arbuscula, Greene, in Erythea, iii. (1895) 63 = *betulifolia*, Pall. var.

SPIRAEA: —

- arguta* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 22; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1894) 465. — Hybr. artef.
- assimilis* ×, Zabel, l. c. 74. — Hybr. artef.
- aubifolia*, Hort. ex Zabel, l. c. 26; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 484 = *chamaedryfolia*, Linn. *salicifolia*, Linn.
- Bernhardi*, Hort. Angl. ex Zabel, l. c. 67 = *S. Bumalda* ×, Hort.
- bethlemensis*, Hort. ex Wenzig, in Flora, lxxi. (1888) 281, sphalm. (= *S. bethlehemensis*, Hort.) = *salicifolia*, Linn.
- Billardieri*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 101 = *S. Menziesii*, Hook.
- blanda* ×, Zabel, l. c. 40. — Hybr. artef.
- brachystachys* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 495. — Hybr. artef.
- brevipes*, Borb. in Magyar Növény. Lapok, xiii. (1890) 75. — Hung.
- Bumalda* ×, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 66. Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 479; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 214. — Hybr. artef.
- californica*, Hort. Gall. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 490 = *fulvescens*, Dippel.
- californica*, Hort. Germ. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 489 = *macrothyrsa* ×, Dippel.
- cinerea* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 23; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 465. — Hybr. artef.
- concinna* ×, Zabel, l. c. 70. — Hybr. artef.
- conferta* ×, Zabel, l. c. 35. — Hybr. artef.
- conspicua* ×, Zabel, l. c. 90; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 219. — Hybr. artef.
- Constantiae*, « Schroed. » ex Zabel, l. c. 102; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 486; Koehne, l. c. 219. — Hybr. artef.
- crispifolia minor*, Hort. ex Dippel, l. c. 480 = *bulbata*, Maxim.
- cuneata*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 55 = *canescens*, D. Don.
- difformis* ×, Zabel, l. c. 96. — Hybr. artef.
- expansa*, Hort. ex Zabel, l. c. 86 = *rubra*, Hort.
- flagelliformis*, Hort. ex Zabel, l. c. 55; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 475 = *canescens*, D. Don.
- Fontenaysii* ×, Hort. Billard. ex Zabel, l. c. 83; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 219. — Hybr. artef.
- fontenaysiensis* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 490. — Hybr. artef.
- Foxii* ×, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 71. — Hybr. artef.
- fulvescens* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 490. — Hybr. artef.
- gemma* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1886) 23. — Hybr. artef.
- Gieseleriana* ×, Zabel, l. c. 28. — Hybr. artef.
- grata* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 491. — Hybr. artef.
- grossulariaefolia*, Hort. ex Zabel, l. c. 43 = *trilobata*, Linn.
- Henryi*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 225, t. 6. — China.
- hispanica*, « Barrelier » ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 22 = *multiflora*, Zabel.
- inebrians*, Hort. ex Zabel, l. c. 108 = *opulifolia*, Maxim.
- intermedia* ×, Hort. Lemoine, ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 88; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 493; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 220. — Hybr. artef.
- laxissima*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 217. — Japon.?
- Lemoinei* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 64. — Hybr. artef.
- lobata*, Zabel, l. 75 = *betulifolia*, Pall.
- longifolia* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 494. — Hybr. artef.
- luxurians*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 57 = *nivea*, Hort.
- lycotonifolia*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 41. — Japon.
- macrophylla*, Hook. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 217 = *japonica*, Linn.

SPIRAEA: —

- macrothyrsa* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 489; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 221. — Hybr. artef.
- magnifica* ×, Dippel, l. c. — Hybr. artef.
- Margaritae* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 71; Dippel, l. c. 480; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 83. — Hybr. artef.
- micropetala* ×, Zabel, l. c. 33. — Hybr. artef.
- microthyrsa* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 83. — Hybr. artef.
- monbetsusensis*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Ser. VII. xii. (1888) 85. — Japon.
- multiflora* ×, Zabel, l. c. 20. — Gall.
- multijuga*, Wenzig, in Flora, lxxi. (1888) 285 (= *Filipendula multijuga*, Maxim.). — Japon.
- myrtifolia*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 475 = *canescens*, D. Don.
- nipponica*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1886) 40 = *bracteata*, Zabel.
- notha* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 91; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 491. — Hybr. artef.
- nudiflora* ×, Zabel, l. c. 47. — Hybr. artef.
- oxyodon* ×, Zabel, l. c. 27. — Hybr. artef.
- pachysandra*, Hort. ex Zabel, l. c. 94; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 489 = *magnifica*, Dippel.
- pachystachys* ×, Hort. ex Zabel, l. c. 94. — Hybr. artef.
- pallidiflora*, Zabel, ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 487, in obs. — Hybr. artef.
- podolica*, Blocki, in Deutsche Bot. Monatsschr. x. (1892) 110 = *media*, F. Schmidt.?
- praecox*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 37; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 460, 474 = *pikoviensis*, Bess.
- pumila*, Hort. ex Zabel, l. c. 65; Dippel, l. c. 479, in syn. = *S. Bumalda* ×, Hort.
- pyramidata*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 221. — Washington.
- reflexa* ×, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 465 = *cinerea*, Dippel.
- revirescens* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 69; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 482; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 216. — Hybr. artef.
- rosalba* ×, Dippel, l. c. 484. — Hybr. artef.
- rubella* ×, Dippel, l. c. — Hybr. artef.
- rubra*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 270 = *lobata*, Jacq.
- rubra*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 85; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 220. — Hybr. artef.
- semperflorens* ×, Zabel, ll. cc. 86; et 492. — Hybr. artef.
- spicata* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 486. — Hybr. artef.
- stipularis*, Hort. ex Wenzig, in Flora, lxxi. (1888) 287 = *lobata*, Murr.
- subcordata* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 482. — Hybr. artef.
- superba* ×, Froeb. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 73; Dippel, l. c. 479; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 217. — Hybr. artef.
- tenuifolia*, Otto, ex Dippel, l. c. 484 = *alba*, Du Roi.
- thalictroides*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 18 = *hypericifolia*, Linn.
- thibetica*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 25. — China occ.
- tosaensis*, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1902) 6. — Japon.
- tristis*, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 62. — Hybr. artef.?
- triumphans*, Zabel, l. c. 101 = *S. Menziesii*, Hook.
- velutina*, Franch. Pl. Delav. (1890) 201. — Yunnan.
- virgata*, Franch. l. c. 199. — China occ.
- virginiana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 314. — Virginia.
- yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. (1890) 200. — Yunnan.

SPIRAEANTHEMUM, A. Gray (Saxifr.). —

- Ind. Kew. ii. 965.
- Davidsonii, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. ii. (Mar. 1887) 85; et ex Bot. Centralbl. xxx. (1887) 355. — Austral.

SPIRANTHES, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 967.

- acaulis*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 221 = *picta*, Lindl.
- Allemanii*, Cogn. l. c. 219 (= *Sarcoglottis Allemani*, Barb. Rodr.). — Bras.
- annua*, Lesq. [cf. Trelease, Branner & Coville, in Branner, Ref. Geol. Surv. Arkans. iv. 1888 (1891) 222] = *cernua*, Rich.
- aphylla*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 215 (= *Pelexia aphylla*, Ridl.). — Bras.
- atroviridis*, Cogn. l. c. 206 (= *Cyclopogon atroviride*, Barb. Rodr.). — Bras.
- Bangii*, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 265. — Bolivia.
- bifida*, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 283; [Oliver, ex im Thurn, in Timburi, v. (1886) 205]; Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 200. — Guian angl.
- biflora*, Cogn. l. c. 207 (= *Serapias biflora*, Vell.). — Bras.
- Cogniauxiana*, Barb. Rodr. ex Cogn. l. c. 214, t. 48, fig. 3. — Bras.
- colorans*, N. E. Br. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 453, nomen. = *colorata*, N. E. Br.?
- eriphora*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 165. — Mexic.
- fasciculata*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 22 (= *Serapias fasciculata*, Vell.). — Bras.
- Grisebachii*, Cogn. l. c. 207 (= *S. bicolor*, Griseb.). — Antill, Am. austr.
- guyanensis*, Cogn. l. c. 209 = *Goodyera guyanensis*, Lindl.). — Guian., Ins. Trinit.
- jaliscana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 153. — Mexic.
- leucosticta*, Reichb. f. in Gartenfl. xxxiv. (1885) 243; et in Flora, lxxix. (1886) 548. — Hab.?
- nitida*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 224 (= *Serapias nitida*, Vell.). — Bras.
- olivacea*, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 141. — Peruvia.
- orchioides*, Hemsl. l. c. (1893) 275 (= *Stenorrhynchus orchioides*, Rich.). — Am. trop.
- paludosa*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 202. — Bras.
- pedicellata*, Cogn. l. c. 210. — Bras.
- praecox*, S. Wats. in A. Gray, Man. Bot. North. U. S. ed. 6 (1890) 503; et in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 134. — Am. bor. occ.
- Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 153. — Mexic.
- Rodriguesii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 204 (= *Cyclopogon trilineata*, Barb. Rodr.). — Bras.
- rubrocalosa*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 165. — Mexic.
- sauroglossum*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 479. — Bras.
- Schwackei*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 212, t. 47 fig. 3. — Bras.
- Ulaei*, Cogn. l. c. 107, t. 47, fig. 1. — Bras.
- variegata*, Cogn. l. c. 193 (= *Cyclopogon variegata*, Barb. Rodr.). — Bras.
- velata*, Robinson & Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 122. — Mexic.
- yungasensis*, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 266. — Bolivia.

SPIROLOBIUM, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 773; et Hist. des pl. x. (1888) 215. APOCYNEAE.

- cambodianum*, Baill. ll. cc. 774; et 215. — Cambodia.
- cambodiense*, « K. Schum. » in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 174, sphalm. = *cambodianum*, Baill.

SPIROPETALUM, Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1888) 70; et in Bot. Jahrb. xiv. (1891) 335. CONNARACEAE.

- odoratum*, Gilg, ll. cc. — Gabon.
- polyanthum*, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 69. — Kamerun.

SPODIOPOGON, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 968.
cotulifer, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 187 (= *Miscanthus cotulifer*, Benth.). — Japon. Ind. or.
dubius, *Hack. l. c.* — Reg. Himal.
rivalis, Thw. ex Hack. l. c. 228, in syn. = *Ischaemum rivale*, Hack.

SPONDIAS, Linn. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 968.
mexicana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 403. — Mexic.
Radlkoferi, J. D. Smith. in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 194. — Guatem.

SPONDIOPSIS, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 243. **ANACARDIACEAE**.
trifoliata, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

SPOROBOLUS, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 968.
albens, *Balansa, in Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 164. — Tonk.
altissimus, Vasey, ex T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 212. — Calif.
annuus, Vasey, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 443. nomen; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiv. (1887) 9. — Mexic.
arizonicus, Thurber, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 9 = *interruptus*, Vasey.
auriculatus, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1. (1892) 64; II. (1894) 518. — Texas.
Bolanderi, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 337; et l. c. 63. — Oregon.
brevifolius, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 39; Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxiii. (1895) 464 (= *Agrostis brevifolia*, Nutt.). — Am. bor.
Buckleyi, Vasey, *Illustr. N. Am. Grass.* i. II. (1891) t. 17; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1. (1892) 63. — Am. bor.
capillaris, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 284. — Mexic.
confusus, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 293; et l. c. iii. 1. (1892) 64 (= *Vilfa confusa*, Fourn.). — Am. bor. occ.
deserticolus, Phil. in *Anal. Mus. nat. Chile* (1891) 82. — Chili.
expansus, Scribn. in *Zoë*, iv. (1894) 390. — Calif.
filiformis, Rydberg, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 189 = *depauperatus*, Scribn.
helvola, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 820 (= *Vilfa helvola*, Trin.). — Afr. trop., Arabia.
interruptus, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 8; in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1 (1891) 61; et *Illustr. N. Am. Grass.* i. II. (1891) t. 18 (= *Vilfa interrupta*, Vasey). — Arizona.
laetevirens, Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 251; Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 151. — Tunetia.
ligulatus, Vasey & Dewey, ex J. M. Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 268; et ii. (1894) 518. — Texas.
Marlothii, Hack. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 401. — Afr. austr.
mauritanus, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 822 (= *Vilfa mauritiana*, Steud.). — Ins. Maurit.
Melleri, « Hack. » ex Th. Dur. & Schinz, l. c. sphalm. = Mollerii, Hack.
micranthus, Th. Dur. & Schinz, l. c. 822 (= *Triachyum micranthum*, Steud.). — Abyss.
minor, Vasey, in A. Gray, *Man. Bot. North. U. S.* ed. 6 (1890) 646; in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1. (1892) 60; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxv. (1895) 464 = *vaginaeflorus*, Wood.
minutus, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 127, in obs. (= *Vilfa minutus*, Trin.); Schweinf. ex Terrac. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, v. (1894) 95 = *minutus*, Link.
Mollerii, Hack. in *Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 213, t. g. fig. b. — Ins. S. Thom.

SPOROBOLUS: —
montanus, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 127 (= *Vilfa montana*, Hook. f.). — Afr. trop. or.
natalensis, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 822 (= *Vilfa natalensis*, Steud.). — Natal.
Nealleyi, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1888) 49; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 57, et iii. 1 (1892) 61. — Texas.
nebulosus, Hack. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 402. — Afr. austr.
neglectus, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 464. — Am. bor.
paniculatus, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 823 (= *Vilfa paniculata*, Trin.). — Sierra Leone.
pilosus, Vasey, in B. B. Smyth, *Check List pl. Kansas* (1892) 26, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1888) 49; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1 (1892) 60 = *asper*, Kunth.
racemosus, Vasey, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 443. nomen; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiv. (1888) 9. — Mexic.
Rehmanni, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 383. — Transvaal.
rhizomatosus, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (18 5) 823 (= *Vilfa rhizomatosus*, Steud.). — Madag.
Sacatella, Griseb. ex Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 101, in syn. = *Vilfa sacatella*, Griseb.
setulosus, Terrac. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, v. (1894) 95 (= *Vilfa setulosa*, Trin.). — Arabia.
Shepherdii, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiv. (1887) 8. — Mexic.
subulatus, Hack. ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 65. — Madag.
tenellus, Balansa, in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 164. — Tonk.
texanus, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 57, et iii. (1892) 63. — Texas.
Tourneuxii, Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 250; Batt. et Trab. *Fl. Alger.* [Monoc] (1895) 151. — Tunetia.
Wallichii, Munro, ex Trim. in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 171. — Zeyl.

SPRAGUEA, Torr. (Portul.). — Ind. Kew. ii. 970.
multiceps, Howell, in *Erythra*, i. (1893) 39. — Oregon.
nuda, Howell, l. c. = *Calyptidium nudum*, Greene.
umbellata, Coville, *Death Vall. Exp.* (1893) 282. nomen = *C. monospermum*, Greene.

SPRUCELLA, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1890) 27 = **Sideroxylon**, [Dill.] Linn. (Sapot.).
cyrtobotrya, Pierre, l. c. = *S. cyrtobotryum*, Mart.

SPYRIDIDIUM, Fenzl (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 970.
scabridum, Tate, in *Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xii. (1889) 129. — Austral.

SQUAMELLARIA, Becc. Malesia, ii. (1886) 228. **RUBIACEAE**.
imberbis, Becc. l. c. t. 46, fig. 1-12 (= *Myrmecodia imberbis*, A. Gray). — Ins. Fiji.
Wilsoni, Becc. l. c. 229, t. 46, fig. 13-24 (= *Hydnophytum Wilsoni*, Horne).

STABEROHA, Kunth (Restiac.). — Ind. Kew. ii. 971.
caricina, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 520 (= *Thamnochortus caricinus*, Mast.). — Afr. austr.
cernua, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *T. cernuus*, Kunth). — Afr. austr.
disticha, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *T. distichus*, Mast.). — Afr. austr.
gracilis, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *T. gracilis*, Mast.). — Afr. austr.

STACHYARRHENA, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 971.
penduliflora, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 370. — Bras.

STACHYCARPUS, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 163 = **Podocarpus** [L'Hérit.] Pers. (Conif.).
andina, Van Tiegh. l. c. 173 = *P. andina*, Poepp.
ferruginea, Van Tiegh. l. c. = *P. ferruginea*, G. Benn.
spicata, Van Tiegh. l. c. = *P. spicata*, R. Br.
taxifolia, Van Tiegh. l. c. = *P. taxifolia*, H. B. & K.

STACHYPHYLLUM, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 565 = **Antidaphne**, Poepp. & Endl. (Loranth.).
Fendleri, Van Tiegh. l. c. — Venezuela.

STACHYS, [Tourn.] Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 971.
acuminata, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. VII. (1887) 410. — Ins. S. Cruz (Calif.).
adulterina, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 300. — China.
albereana, J. Neyr. & Debeaux, in *Rev. de Bot.* x. (1891) 263 = *italica*, Mill. ?
ambigua, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 288 = *hyssopifolia*, Michx. var.
andina, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 562 (= *S. elliptica*, Phil.). — Chili.
araucana, Phil. l. c. 563. — Chili.
arenariaeformis, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1890) 166. — Romania.
Baumgaertneri, X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. II. (1893) 1013. — Austria.
bizensis, Schweinf. ex Penzig, in *Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 356, nomen. — Erithrea.
brevidens, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 558. — Chili.
cinnamnatensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 531 [an hybr. spont. ?]. — Am. bor.
Closi, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 561. — Chili.
cordifolia, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) II. 310. — Burma.
costaricensis, Briq. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 240. — Costa Rica.
crenata, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 562. — Chili.
crenulata, Briq. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 192. — Afr. austro-occ. extratrop.
digenea, X, Leguë, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 213. — Gall.
dinarica, Marb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 61 = *alpina*, Linn.
elegans, Formanek, in *Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxii. 1893 (1894) 171. — Maced.
fragillima, Bornm. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, N. Folge, vii. (1895) 7, nomen. — Oriens.
Freynii, Hausskn. l. c. Ser. I. v. (1887) 70. — Graecia.
glabrata, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 559. — Chili.
glabrata, Simonk. *Enam. Fl. Transsilv.* (1886) 450 = *recta*, Linn.
glandulifera, Post, *Pl. Postianae*, iv. (1892) 11. — As. occ.
Hildebrandtii, Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 138. — Madag.
hissarica, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1889) 614. — Turkest.
Janiana, Janka, in *Magyar Növényt. Lapok*, x. (1886) 149, sphalm. = *S. Janii*, Ces., *Passer & Gibelli*.
litoralis, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 560. — Chili.
longepetiolata, X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. II. (1893) 1013. — Austria.
macrophylla, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 202. — Reg. Cauc.
madagascariensis, Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 137. — Madag.
Milani, Petrov. ex Magnier, *Scrin. fl. select.* vi. (1887) 117 = *spinulosa*, Heldr.
nemorivaga, Briq. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 192. — Angola.
obtusifolia, MacOwan, in *Kew Bull.* (1893) 13. — Afr. austr.

STACHYS:

- odontophylla, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 59. — As. Min.
 pannosa, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 564. — Chili.
 paradoxa X, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 215. — Gall.
 petiolata X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. II. (1893) 1013. — Austria.
 rupestris, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 562 (= *S. Meyeniana*, Phil.). — Chili.
 Sendtneri, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 144, t. 4, fig. 5-7 = *pubescens*, Vis.
 Steingroeveri, Briq. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 193. — Afr. austro-occ. extratrop.
 stricta, Greene, in *Erythraea*, ii. (1894) 122. — Calif.
 trichophylla, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 342. — Madag.
 trinervis, Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iii. (1886) 97. — Afghan.
 turcomanica, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 463. — Turkest.
 tubulosa, MacOwan, in *Kew Bull.* (1893) 13. — Afr. austr.
 tymphaea, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 70. — Graecia.
 velutina, Greene, in *Erythraea*, ii. (1894) 121. — Calif.
 venulosa, Greene, *Pittonia*, i. (Jan. 1888) 157. — Mexic.
 zeppensis, Formanck, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 383. — Bosn.

STACHYTARPHETA, Vahl (Verben.). — Ind. Kew. ii. 974.

- Nelsonii, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci. Ser. III* i. (1895) 162. — Mexic.

STACKHOUSIA, Sm. (Stackhous.). — Ind. Kew. ii. 974.

- uniflora, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 258. — N. Zel.

STAËLIA, Cham. & Schlecht. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 975.

- aurea, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1888) 77. — Bras.
 capitata, K. Schum. l. c. 72. — Bras.
 catechosperma, K. Schum. l. c. 74. — Bras.
 filifolia, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 209. — Bolivia.
 lanigera, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1888) 73 (= *Spermacoce lanigera*, Pohl). — Bras.
 thymbroides, K. Schum. l. c. 77 (= *Psyllocarpus thymbroides*, Mart. & Zucc.). — Bras.
 vestita, K. Schum. l. c. 78. — Bras.
 virgata, K. Schum. l. c. 76 (= *Mitracarpum virgatum*, Cham. & Schlecht.). — Bras.

STAHLIANTHUS, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 697. **SCITAMINEAE**.

- campanulatus, Kuntze, l. c. — Siam.

STANHOPEA, Frost (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 974.

- Amesiana, Hort. ex *Garden Mag.* (1893) 352, cum ic. = *S. Lowii*, Rolfe.
 grandiflora, Nichols, *Dict. Gard.* iii. (1886) 486. — Ins. Trinit.
 Lowii, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 63; et ex *Orchid. Rev.* i. (1893) 177, fig. 12. — N. Granat.
 Molliana, Rolfe, in *Lindenia*, vii. (1891) 89, t. 331. — Peruvia.
 nigripes, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 364. — Hab.?
 Randii, Rolfe, l. c. 363. — Bras.
 Spindleriana X, Kraenzl. in *Gartenfl.* xxxix. (1890) 619, t. 1335. — Hybr. artef.

STANLEYA, Nutt. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 976.

- albescens, M. E. Jones, in *Zoö*, ii. (1891) 17. — Am. bor. occ.
 collina, M. E. Jones, l. c. iii. (1893) 284. — Nevada.
 elata, M. E. Jones, l. c. 16. — Am. bor. occ.
 pinnata, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* viii. (1888) 62 = *pinnatifida*, Nutt.

STAPELIA, Linn. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 976.

- affinis, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1912. — Hab.?
 Arnoti, N. E. Br. l. c. t. 1915. — Afr. austr.
 Barklyi, N. E. Br. l. c. t. 1909. — Afr. austro-occ. extratrop.
 Desmetiana, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1880) ii. 684; et *Hook. l. c.* t. 1916. — Afr. austr.
 erectiflora, N. E. Br. l. c. t. 1921. — Afr. austr.
 fuscopurpurea, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1913. — Hab.?
 glabricaulis, N. E. Br. l. c. t. 1917. — Afr. austr.
 horizontalis, N. E. Br. l. c. t. 1907. — Hab.?
 intermedia, N. E. Br. l. c. t. 1910 A. — Afr. austr.
 longidens, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1895) ii. 324. — Reg. Mossamb.
 Macowani, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1920. — Afr. austr.
 parvipuncta, N. E. Br. l. c. t. 1923. — Afr. austr.
 parvipunctata, « N. E. Br. » ex K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 278. sphalm. = *parvipuncta*, N. E. Br.
 vaga, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.
 villosa, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1911. — Afr. austro-occ. extratrop.
 virescens, N. E. Br. l. c. t. 1910b. — Afr. austr.
 Woodii, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) i. 554. — Natal.

STAPHYLEA, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 978.

- Coulombieri, Éd. André, in *Rev. Hort.* lix. (1887) 462; *Dippel, Handb. Laubholz*, ii. (1892) 476. — Hab.?
 elegans, Zabel, ex *Gartenfl.* xxxvii. (1888) 499, fig. 113; *Dippel*, l. c. 472, fig. 225. — Oriens.
 holocarpa, Hemsl. in *Kew Bull.* (1895) 15. — China.
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 146. — Mexic.

STATHMOSTELMA, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 129; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 239. **ASCLEPIADEAE**.

- angustatum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 132, in obs. (= *Asclepiadis* sp., fide N. E. Brown.). — Abyss.
 gigantiflorum, K. Schum. l. c. 129. — Afr. trop.
 globuliflorum, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 322. — Afr. trop. or.
 incarnatum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 130. — Afr. trop.
 Laurentianum, Dewevre, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 1894 (1895) 102, nomen, et xxxiv. 2 (1895) 87. [Laurentiana]. — Congo.
 pauciflorum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 132, in obs. = *Gomphocarpus pauciflorus*, Hochst. & Steud.
 pedunculatum, K. Schum. l. c. 132, in obs.; et in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 24 et 41 (= *G. pedunculatus*, Decne.). — Afr. austr.
 reflexum, Britten & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iv. (1894) 27 = *pauciflorum*, K. Schum.
 rhacodes, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 131. — Afr. trop.
 Welwitschii, Britten & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iv. (1894) 28, in obs. — Afr. trop.

STATICE, Tourn. ex Linn. (Plumbag.). — Ind. Kew. ii. 978.

- Alberti, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 615. — Turkest.
 aragonensis, Debeaux, ex Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 226; et in *Rev. de Bot.* xii. (1894) 44. — Hisp.
 asparagoides, Coss. & Durieu, [in *Bourg. Pl. Alger. exsicc.* (1856)], ex Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1890) 727. — Algeria, Marocc.
 Corculum, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 141. — Ins. Canar.
 Friderici, Barbey, in *Karpathos* (1895) 127, t. 13. — Ins. Karpathos.

STATICE : —

- Gilesii, Hemsl. in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1737. — Gilgit.
 Heldreichii, Haldcsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, (1886) 241, in syn. — Thessal.
 Letourneuxii, Coss. ex Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1890) 118, in obs. nomen; et in Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1890) 734. — Tunet.
 leucocoleum, Stapf & Wettst. ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 42. — As. occ.
 Macphersonii, F. Muell. in *Chem. and Drug. Austral.* x. (Oct. 1895) 207; et in *Bot. Centralbl.* lxi. (1895) 364. — Austral.
 palmyrensis, Post, *Pl. Postianae*, iii. (1892) 16. — As. occ.
 teretifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 334; et in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2355. — Arabia.
 Tremolsii, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 325. — Hisp.
 tunetana, Barratte, Ill. *Fl. Tunisie* (1895) t. 15. — Reg. Tunet.
 xipholepis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 218. — Reg. Somal.

STAUROCHLAMYS, Baker, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1825. **COMPOSITAE**.

- Burchellii, Baker, l. c. — Bras.

STAUROGYNE, Wall. = **Ebermaiera**, Nees (Acanth.).

- Anigozanthus, Beddomei, concinnula, coriacea, elegans, elongata, fastigiata, glauca, glutinosa, gracilis, Griffithiana, Helferi, hirsuta, humilis, incana, lanceolata, lasiobotrys, longifolia, macrophylla, mandiocana, merguensis, minarum, obtusa, paniculata, parviflora, polybotrya, raemosa, repens, Riedeliana, setigera, Simonsii, stolonifera, veronicifolia, zeylanica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 497 = *homonyma omnia* Ebermaierae.
 comosa, Kuntze, l. c. = *Ebermaiera axillaris*, Nees.
 Maclellandii, Kuntze, l. c. = *E. Maclellandii*, T. Anders.
 Miqueliana, Kuntze, l. c. = *E. humilis*, Mig.
 thyrsodes, Kuntze, l. c. = *E. thyrsodea*, Nees.
 Vauthierana, Kuntze, l. c. = *E. Vauthieriana*, Nees.

STAUROPSIS, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 982.

- Batemanni, Nichols, *Dict. Gard.* iii. (1886) 493. — Ins. Philipp.
 undulatus, Benth. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 27 (= *Vanda undulata*, Lindl.); King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. (1895) 36, t. 35. — Reg. Himal.
 Warocqueana, Rolfe, in *Lindenia*, vii. (1891) 65, t. 319. — N. Guin.

STEARODENDRON, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 275; et in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 42. **GUTTIFERAE**.

- Stuhlmannii, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

STEGASTRUM, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 447 = **Loranthus**, Linn.

- alveolatum, Van Tiegh. l. c. — Ins. Celeb.
 Beccarii, Van Tiegh. l. c. = *Loranthus bahajensis*, Korth.

- lancifolium, Van Tiegh. l. c. — Borneo.

STEIRONEMA, Rafin. (Primul.). — Ind. Kew. ii. 983.

- intermedium, Kearney, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 264, t. 209. — Am. bor.
 quadriflorum, Hitchcock, in *Trans. St. Louis Acad.* v. (1892) 506 = *longifolium*, A. Gray.

STELECHOCARPUS, Hook. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 983.

- grandifolia, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 306. — N. Guin.
 nitida, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 5; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* iv. (1893) 4, t. 2. [nitidus]. — Perak.
 punctata, King, l. c. 4; et 4, t. 1. — Perak.

STELIS. Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 983.

- Bangii, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 260. — Bolivia.
 Brittoniana, Rolfe, l. c. 261. — Bolivia.
 plurispicata, Barb. Rodr. Vellozia, 1887-88, Sec. edic. (1891) 120. — Bras. bor.
 Rusbyi, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 261. — Bolivia.
 Toepferiana, Reichb. f. in Flora, lxxix. (1886) 556. — Dominica.
 yauaperyensis, Barb. Rodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 120. — Bras. bor.

STELLARIA, Hall. [an Linn.?] = **Callitriche**, Linn. (Halor.).

- stagnalis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 234 = C. stagnalis, Scop.
 verna, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 345 = C. verna, Linn.

STELLARIA, Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 984.

- arenaria, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 91. — China.
 axillaris, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 762. — Chili.
 chlorotica, Timb.-Lagr. in Lucante, Rev. de Bot. x. (1892) 144 = media, Vill.
 cucubaloides, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 14. — Hisp.
 Davidi, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 67 (= Krascheninikowia Davidi, Franch.); Franch. Pl. Delav. (1889) 99. — China.
 decipiens X, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. (1885) 276. — Germ.
 Delavayi, Franch. Pl. Delav. (1889) 97. — China occ.
 fontinalis, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 286 (= Sagina fontinalis, Short & Peter). — Am. bor.
 glochidisperma, Marb. in Lunds Univ. Arsskrift xxvii. v. (1892) 156 = nemorum, Linn.
 heterantha, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 435; et Pl. Delav. (1889) 101 (= Krascheninikowia heterantha, Maxim.). — China.
 heterophylla, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 68 (= K. heterophylla, Miq.); Franch. Pl. Delav. (1889) 101. — China, Japon.
 heterophylla, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 133 = praec.
 infracta, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 78. — China.
 laxa, F. Behm, in Bot. Notis. (1887) 181. — Scandin.
 Maximowicziana, Franch. Pl. Delav. (1889) 101 (= Krascheninikowia Maximowicziana, Franch. & Sav.). — China.
 Maximowicziana, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 133 = praec.
 montana, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 93. — Mexic.
 oligosperma, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 257. — N. Zel.
 pellucida, Colenso, l. c. xviii. 1894 (1895) 383. — N. Zel.
 pilosa, Franch. Pl. Delav. (1889) 99. — China occ.
 pilosula, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. xii. (1888) 84 = yezoensis, Maxim.
 ponojensis, Arrhen. in Medd. Bot. Foren.-Kjöb. (1888-91) 197. — Lapp. ross.
 raphanorrhiza, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 69; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 435; et Pl. Delav. (1889) 101. — China.
 rupestris, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. l. c. (= Krascheninikowia rupestris, Turcz.). — China.
 rupestris, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 80 = praec.
 Schimper. Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 212. — Afr. trop. or.
 silvatica, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 435; et Pl. Delav. (1889) 101 (= Krascheninikowia silvatica, Maxim.). — Reg. Amur.
 silvatica, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 133 = praec.

STELLARIA : —

- yezoensis, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 15; Yatabe, Icon. Pl. Japon. i. 3 (1894) 167 t. 41. — Japon.
 yunnanensis, Franch. Pl. Delav. (1889) 98. — Yunnan.

STELLASTER. Heister = **Gagea**, Salisb. (Liliac.).

- amblyopetalus, bulbifer, chloranthus, chrysanthus, damascenus, Granatelli, Liotardii, minimus, nebrodensis, pusillus, reticulatus, saxatilis, spathaceus, transbaicalensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 715-16 = homonyma omnia Gageae.
 arvensis, Kuntze, l. c. (1891) 715 = G. stellaris, Salisb.
 bohemicus, Kuntze, l. c. = G. pygmaea, Salisb.
 foliolosus, Kuntze, l. c. = G. foliosa, Schult.
 gageodes, Kuntze, l. c. = G. persica, Boiss.
 graecus, Kuntze, l. c. = Lloydia graeca, Endl.
 luteus, Kuntze, l. c. 716 = Gagea fascicularis, Salisb.
 polycephalus, Kuntze, l. c. = G. polyphylla, Stev. ?
 pratensis, Kuntze, l. c. 715 = G. bracteolaris, Salisb.
 rigidus, Kuntze, l. c. = G. reticularis, Salisb.
 rubroviridis, Kuntze, l. c. = Lloydia rubro-viridis, Baker.
 triflorus, Kuntze, l. c. = L. triflora, Baker.

STELLERA, J. G. Gmel. ex Linn. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 986.

- calycina, ciliata, coridifolia, elliptica, microphylla, nitida, tinctoria, velutina, villosa, virescens, virgata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 585 = homonyma omnia Thymelaeae.
 Alberti, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 616; et in Gartenfl. xxxvi. (1887) 649, t. 1262. — Turkest.
 Aucheri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 585 = Thymelaea Aucheri, Meissn.
 dioica, Kuntze, l. c. = T. dioica, All.
 hirsuta, Kuntze, l. c. = Passerina hirsuta, Linn.
 incana, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 58. — As. min.
 lanuginosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 585 = Thymelaea canescens, Endl.
 Ruizii, Kuntze, l. c. = T. calycina, Meissn.
 thesiodes, Kuntze, l. c. = T. thesiodes, Endl.
 Thymelaea, Kuntze, l. c. = T. Sanamunda, All.
 Tartonrairae, Kuntze, l. c. = T. Tartonraira, All.

STELLULARIA, Linn. = **Stellaria**, Linn. (Caryoph.).

- longipes, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 222 = Stellaria longipes, Goldie.

STELMACRYPTON, Baill. in Bull. Soc. Linn.

- Paris, ii. (1889) 812; et Hist. des pl. x. (1890) 300; E. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 221. **ASCLEPIADEAE**.
 khasianum, Baill. ll. cc. (= Pentanura khasiana, Kurz). — Khasia; Yunnan.

STELMAGONUM, Baill. Hist. des pl. x. (1890)

- 287, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 304 [Stelmagonum]. **ASCLEPIADEAE**.
 Hahnianum, Baill. ll. cc. — Mexic.

STEMMADENIA, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 986.

- obovata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 149 = pubescens, Benth.

STEMMATOPHYLLUM, Van Tiegh. in Bull. Soc.

- Bot. Fr. xli. (1894) 505 = **Loranthus**, Linn.
 acutum, Van Tiegh. l. c. 546. — Ins. Philipp.
 Beccarii, Van Tiegh. l. c. 506. — Borneo.
 Cumingii, Van Tiegh. l. c. 505. — Ins. Philipp.
 luzonense, Van Tiegh. l. c. 505 = L. luzonensis, Presl.
 nodosum, Van Tiegh. l. c. 506. — Ins. Philipp.
 irregulare, Van Tiegh. l. c. 546. — Borneo.
 sessilifolium, Van Tiegh. l. c. 506. — Ins. Philipp.

STEMODIA, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 986.

- Kingii, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. xxiii. (1886) 57. — Austral.
 Palmeri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 403. — Mexic.
 polystachya, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii (1889) 191. — Calif.
 Schottii, Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 286. — Texas.

STEMODIACRA, P. Br. = **Stemodia**, Linn. (Scrophul.).

- Berteroana, chilensis, debilis, durantifolia, Ehrenbergiana, foliosa, glabra, jorullensis, lanceolata, lythri-folia, maritima, palustris, peduncularis, pusilla, senegalensis, serrata, stricta, subhastata, suffruticosa, trifoliata, viscosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 466 = homonyma omnia Stemodiae.
 bartsiodes, Kuntze, l. c. = Stemodia bartsioides, Benth.
 coerulea, Kuntze, l. c. = Adenosma caeruleum, R. Br.
 gratioliifolia, Kuntze, l. c. = Stemodia palustris, A. St. Hil.
 hyptodes, Kuntze, l. c. = S. hyptoides, Cham. & Schlecht.
 linearifolia, Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 183. — Parag.
 tetragona, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 466 = S. lobelioides, Lehm.
 tomentosa, Kuntze, l. c. = S. lanata, Ruiz & Pav.
 verticillata, Kuntze, l. c. = S. parviflora, Ait.

STEMMODONTIA, Cass. = **Wedelia**, Jacq. (Compos.).

- brachycarpa, Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 147 = W. brachycarpa, Baker.
 elongata, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 58. — Bolivia.

STEMONA, Lour. (Roxburgh.). — Ind. Kew. ii. 987.

- Curtisii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 298; et in Bot. Mag. (1892) t. 7254. — Penang.
 erecta, C. H. Wright, in Lew. Bull. (1895) 117; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2389. — China.
 javanica, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1887) 8 (= Roxburghia javanica, Kunth). — Malaya.

STEMONOPORUS, Thw. = **Vateria**, Linn. (Dipteroc.).

- nervosus, Trim. Handb. Fl. Ceyl. i. (1893) 135 = V. nervosa, Thw.
 oblongifolius, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 258 l. — Cochinch.
 rigidus, Pierre, l. c. 258 l. — Cochinch.
 roseus, Trim. Handb. Fl. Ceyl. i. (1893) 136 = Vateria rosea, Thw.

STEMONURUS, Blume = **Gomphandra**, Wall. et **Lasianthera**, Beauv. (Olcac.).

- australiannus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 112 = Brackenridgea australiana, F. Muell.
 capitulatus, Kuntze, l. c. = Gomphandra capitulata, Becc.
 intermedius, Scortech. ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiv. (1895) II. 117, in syn. = Lasianthera umbellata, King.
 Maingayi, Valetton, Crit. overz. Olacac. (1886) 236 = L. Maingayi, Mast.
 mappiodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 112 = Gomphandra mappioides, Valetton.
 megacarpus, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 133; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2398. — Ins. Salom.
 tomentellus, Valetton, Crit. overz. Olacac. (1886) 237 [tomentella] = Lasianthera lanceolata, Mast.

STENANDRIUM, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 988.

- affine, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 426. — Bras.

STENANDRIUM : —

- Beckmannianum* X, L. Linden, in *Illustr. Hortic.* xxxix. (1892) 121. — Hybr. artef.
Boivini, Baill. [ubi?] ex *Lindau*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 321. — Madag.
Goossensianum X, L. Linden & Rodigas, l. c. xl. (1893) 11. — Hybr. artef.
Lindenii, N. E. Br. l. c. xxxviii. (1891) 91, t. 536. — Peruvia.
Neesianum, *Lindau*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 321 (= *S. trinerve*, Nees, var.). — Columb.
pictum, N. E. Br. ex *Illustr. Hortic.* xxxix. (1892) 121, in obs. (= *Eranthemum igneum*, Linden). — Peruvia.
praecox, S. L. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 426. — Bras.
spatulatum, S. L. Moore, l. c. 427. — Bras.

STENANTHIUM, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 988.

- gramineum*, Morong, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 110 (= *S. gramineum*, Kunth) = *angustifolium*, Kunth.

STENOCARPUS, R. Br (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 988.

- Grunowii*, *Zahlbr.* in *Annal. Naturhist. Hofmus. Wien*, iii. (1888) 286, t. 13, fig. 2. — N. Caled.

STENOCLINE, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 989.

- tomentosula*, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 434. — Afr. austro-occ. extratrop.
longifolia, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1891) t. 7186; W. Wats. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 563 fig. 72. — Natal.

STENOGYNE, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 989.

- bifida*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 358. — Ins. Sandvic.
cinerea, Hillebr. l. c. 361. — Ins. Sandvic.
longiflora, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1886) 265, t. 27. — Ins. Sandvic.
serpens, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 362. — Ins. Sandvic.
vagans, Hillebr. l. c. 362. — Ins. Sandvic.
viridis, Hillebr. l. c. 361. — Ins. Sandvic.

STENOLOBIUM, D. Don = **Tecoma**, Juss. (Bignon.)

- molle*, Loesen. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 619 (= *S. molle*, Seem.) = *T. mollis*, H. B. & K.

STENOMERIS, Planch. (Dioscor.). — Ind. Kew. ii. 990.

- borneensis*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2328. — Borneo.
Wallisii, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 2. — Ins. Philipp.

STENOMESSION, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 990.

- pauciflorum*, Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 498 (= *S. pauciflorum*, Sweet) = *flavum*, Herb.

STENOPHRAGMA, Celak. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 990.

- bursifolium*, Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 192 = *Sisymbrium bursifolium*, Linn.
falcatum, Prantl, ex *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 226 = *S. falcatum*, Fourn.
pinnatifidum, Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. II. (1891) 192 = *S. pinnatifidum*, DC.
salsuginosum, Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 192 = *S. salsuginosum*, Pall.

STENOPHYLLUS, Rafin = **Scirpus**, Tourn. (Cyper.).

- floridanus*, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 161. — Florida.
Funkii, Britton, l. c. xxi. (1894) 30 = *Isolepis Funkii*, Britton.

STENOPHYLLUS : —

- sphaerolepis*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 270 = *Scirpus sphaerolepis*, Boeck.
stenophyllus, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1890) 30 = *S. stenophyllus*, Ell.
Warei, Britton, l. c. (1894) 30 = *I. Warei*, Torr.

STENOPTERA, Presl (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 990.

- actinosophila*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 255, t. 60 fig. 1 (= *Stenorhynchus actinosophila*, Barb. Rodr.). — Bras.
adnata, Ridl. ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 284, t. 48a; Oliver, ex im Thurn, in *Timehri*, v. (1886) 205; Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 251. — Guian. angl.
Lorenzii, Cogn. l. c. 255. — Bras.

STENORRHYNCHUS, Reichb. = **Spiranthes**, Rich. (Orchid.).

- acianthiformis*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 178 (= *Pelexia acianthiformis*, Reichb. f. & Warm.). — Bras.
balanophorostachys, Cogn. l. c. 161, t. 48, fig. 4 = *Spiranthes balanophorostachya*, Reichb. f.
bonariensis, Cogn. l. c. 164 = *S. bonariensis*, Lindl.
cuculliger, Cogn. l. c. 175 = *S. cuculligera*, Reichb. f.
Esmeraldae, Cogn. l. c. 170 = *S. Esmeraldae*, Linden & Reichb. f.
Glaziovii, Cogn. l. c. 171. — Bras.
jaliscana, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 158 = *Spiranthes jaliscana*, S. Wats.
longifolius, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 173. — Bras.
macrantha, Cogn. l. c. 176 = *Spiranthes macrantha*, Reichb. f.
oestriifera, Cogn. l. c. 163 = *S. oestriifera*, Reichb. f.
paraguayensis, Cogn. l. c. 162 = *S. paraguayensis*, Reichb. f.
pteryganthus, Cogn. l. c. 171 = *S. pterygantha*, Reichb. f.
rupestris, Cogn. l. c. 179 = *S. rupestris*, Lindl.
saltensis, Cogn. l. c. 166 = *S. saltensis*, Griseb.
Weirii, Cogn. l. c. 174 = *S. Weirii*, Reichb. f.

STENOSIPHON, Spach. (Onagrar.). — Ind. Kew. ii. 990.

- linifolium*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 236 (= *S. linifolium*, Heynh.) = *virgatum*, Spach.

STENOSPERMATION, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 991.

- multiovulatum*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1894) i. 684 (= *S. Spruceanum*, Schott, var. *multiovulatum*, Engl.). — Columb.?

STENOSTELMA, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 6. **ASCLEPIADEAE**.

- capense*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

STENOSTEPHANUS, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 991.

- Lindenii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 855. — Am. austr. occ.

STENOTAENIA, Boiss. = **Heracleum**, Linn. (Umbell.).

- macrocarpa*, Freyn & Sint. ex Freyn, in *Oest. Bot. Ze tschr.* xlii. (1892) 165. — Armen.
Sintenisii, Freyn, l. c. xlii. (1894) 102. — As. Min.

STENOTAPHRUM, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 991.

- dimidiatum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 794 (= *S. dimidiatum*, Brongn.) = *glabrum*, Trin.

STENOTUS, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

- interior*, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 72 = *A. interior*, Coville.
lanuginosus, Greene, l. c. 73 = *A. lanuginosus*, A. Gray.
stenophyllus, Greene, l. c. 72 = *A. stenophyllus*, A. Gray.

STEPHANIA, Lour. (Menisp.). — Ind. Kew. ii. 991.

- aculeata*, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* iii. (1891) 7. — Austral.
africana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1893) 353, sphalm. = *Astephania africana*, Oliver.
cinnamans, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 44. — N. Guin.

STEPHANISCUS, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 260 = **Loranthus**, Linn.

- gabonensis*, Van Tiegh. l. c. 261 = *L. gabonensis*, Engl.
Lecomtei, Van Tiegh. l. c.; et in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 165. — Afr. trop.

STEPHANODIUM, Poepp. & Endl. (Chailletiac.). — Ind. Kew. ii. 992.

- Blanchetianum*, Baill. in *Mart. Fl. Bras.* xii. (1886) 377. — Bras.
estrellense, Baill. l. c. 378. — Bras.

STEPHANODORIA, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 12. **COMPOSITAE**.

- tomentella*, Greene, l. c. (= *Xanthocephalum tomentellum*, Robinson). — Am. bor.

STEPHANOLUMA, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 283 = **Sideroxyylon**, Linn. (Sapot.).

- rugosa*, Baill. l. c. = *S. rugosum*, A. DC.

STEPHANOMERIA, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 992.

- tomentosa*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. VI. (1886) 152. — Ins. S. Cruz (Calif.).

STEPHANOSTEGIA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 748; et *Hist. des pl.* x. (1888) 184; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 136. **APOCYNACEAE**.

- Hildebrandtii*, Baill. *ll. cc.* — Madag.

STEPHANOTIS, Thou. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 992.

- japonica*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 53. — Japon.

STERCULIA, Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 992.

- appendiculata*, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 36; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 271, t. 29. — Afr. trop. or. austro-caledonica, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1894) t. 7382. — N. Caled.
Bammleri, K. Schum. in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 53. — N. Guin.
Beccariana, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 13 (1889) sub t. 201, in obs. [*Scaphium Beccarianum*, Pierre, l. c. t. 195c]. — Borneo.
cochinchinensis, Pierre, l. c. 12 (1889) t. 186. — Cochinch.
columnaris, Pierre, l. c. Fasc. 13 (1889) sub t. 202, in obs. — Cochinch.
comorensis, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1888) t. 65. — Madag.
Conwentzii, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 208. — N. Guin.
dongnaiensis, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 13 (1889) t. 202. — Cochinch.
Edelfeltii, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Aug. 1886) 47. — N. Guin.
frondosa, Spruce, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 7 = *speciosa*, K. Schum.
gracilipes, Pierre, *Fl. For. Cochinch.*, Fasc. 12 (1888) t. 191B. — Cochinch.
Guerichii, K. Schum. ex Engl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 144. — Afr. austro-occ. extratrop.
Harmandii, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 12 (1888) t. 183b. — Cochinch.
Holtzei, F. Muell. in *Journ. Roy. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 1890 (1891) 175; et in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 30. — Austral.
lychnophora, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 13 (1889) t. 200, sphalm. = *lychnophora*, Hance.
hypochroa, Pierre, l. c. Fasc. 12 (1888) t. 185. — Cochinch.

STERCULIA : —

- keyensis, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 375. — N. Guin.
 Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* ix. (1891) ii. 65. — Penins. Mal., Sumatra.
 lissophylla, *Pierre, Fl. For. Cochinch.*, Fasc. 12 (1888) t. 188B. — Cochinch.
 Mastersii, *Pierre, l. c.* t. 183 A. — Cochinch.
 Murex, *Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 155; et in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 3278. — Transvaal.
 oliganthera, *F. Muell. in Vict. Natural.* iii. (Aug. 1886) 49. — N. Caled.
 oncinocarpa, *F. Muell. & Forb. l. c.* — N. Guin.
 Parkinsoni, *F. Schum. in Australas. Journ. Pharm.* ii. (Febr. 1887) 43; et ex *Bot. Centralbl.* xxxi. (1887) 20. — N. Brit.
 pexa, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 12 (1888) t. 182. — Cochinch.
 pruriens, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 8. — Am. austr.
 pruriens, *K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1898) 96 = *S. Ivira, Sw.*
 quinqueloba, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1892) 135 = *Cola quinqueloba, Garcke.*
 Rex, *Mart. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 12, in obs. = *Basiloxylon Rex, K. Schum.*
 Shillinglawii, *F. Muell. in Austral. Journ. Pharm.* ii. (Febr. 1887) 41; et in *Bot. Centralbl.* xxxi. (1887) 21. — N. Brit.
 speciosa, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 7. — Bras.
 stigmarota, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 12 (1888) t. 189. — Cochinch.
 subviolacea, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 2:1. — Afr. trop. or.
 Taria, *Baill. Hist. pl. Madag. Atlas* (1888) t. 64. — Madag.
 Thorelii, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 12 (1888) t. 184. — Cochinch.
 translucens, *Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 136. — Borneo.

STEREOSPERMUM, Cham. (Bignon.). — Ind.

- Kew. ii. 994.
 acuminatissimum, *K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 243. — Kamerun.
 cinereo-viride, *K. Schum. l. c.* — Angola.
 Harmsianum, *K. Schum. l. c.* — Afr. centr. bor.

STERIGMOSTEMON, Bieb. = **Sterigma**, DC. (Crucif.).

- acanthocarpum, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 36 = *Sterigma acanthocarpum, Fisch. & Mey.*
 caspicum, *Kuntze, l. c.* in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 169 = *Cheiranthus caspicus, Pall.*
 contortuplicatum, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 36 = *Sterigma contortuplicatum, Boiss.*
 longistylum, *Kuntze, l. c.* = *S. longistylum, Boiss.*
 purpurascens, *Kuntze, l. c.* = *S. purpurascens, Boiss.*

STERIPHE, Phil. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 994.

- acerosa, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 678 (= *Grindelia acerosa, Phil.*). — Chili.
 Navarri, *Phil. l. c.* 677. — Chili.

STEUDELAGO, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 298 =

- Solenandra**, *Hook. f. (Rubiaceae).*
 ixorodes, *Kuntze, l. c.* = *S. ixoroides, Hook. f.*

STAUDNERA, C. Koch (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 994.

- capitellata, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 521. — Burma.
 colocasioides, *Hook. f. l. c.* 520. — Reg. Himal.
 sesamica, *Hook. f. l. c.* 520. — Assam.

STEVIA, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 995

- baccharoides, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 283 (= *Nothites baccharoides, DC.*). — Chili.
 Bangii, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 209. — Bolivia.
 bicrenata, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1886) 32. — Guatem.

STEVIA : —

- laxa, *Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 107. — Mexic.
 madrensis, *A. Gray, l. c.* xxi. (1886) 382. — Mexic.
 neglecta, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 209. — Bolivia.
 odorata, *Hort. Dammer, ex Regel, in Gartenfl.* xl. (1891) 107, cum. xylogr. 36. — Hab. ?
 Palmeri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 382. — Mexic.
 phlebophylla, *A. Gray ex S. Wats, l. c.* xxii. (1887) 419. — Mexic.
 pinifolia, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 37. — Mexic.
 Pringlei, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 276. — Mexic.
 venosa, *A. Gray, l. c.* xxi. (1886) 382. — Mexic.

STICKMANNIA, Neck. = **Dichorisandra**, Mikan (Commelin.).

- alba, albomarginata, bigoniaefolia, foliosa, Gaudichaudiana, gracilis, hirtella, inaequalis, incurva, interrupta, leucophthalmos, mexicana, micans, mosaica, ovalifolia, oxyptetala, penduliflora, perforans, picta, puberula, pubescens, radicalis, Saundersii, tenuior, thyrsofolia, villosula, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 721 = *homonyma omnia Dichorisandrae.*
 Glaziovii, *Taub. in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34. (1892) 16 = *D. Glaziovii, Taub.*
 hexandra, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 721 = *Dichorisandra Aubletiana, Schult. f.*
 rhizophora, *Kuntze, l. c.* = *D. rhizophya, Mart.*

STICTOCARDIA, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii.

- (1894) 159. **CONVOLVULACEAE.**
 beraviensis, *Hallier f. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 159 (= *Ipomoea beraviensis, Vatke.*). — Madag.
 multiflora, *Hallier f. l. c.* 160. — Afr. austro-or.
 tiliaefolia, *Hallier f. l. c.* 159 (= *Rivea tiliaefolia, Choisy.*). — As., Afr. et Amer. trop.

STIGMAPHYLLON, A. Juss. (Malpigh.). — Ind.

- Kew. ii. 996.
 cordatum, *J. N. Rose, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 198. — Guatem.
 Lupulus, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 461. — Guatem.
 trifidum, *Niedenau, in Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 30 (1891) 4. — Bras.

STIGMATOPHYLLUM, Spach = **Stigmaphyllon**, A. Juss. (Malpigh.).

- negrescens, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 89 = *Banisteria negrescens, A. Juss.*

STILLINGIA, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 997.

- bicarpellaris, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 455. — Mexic.
 dentata, *Britton & Rusby, in Trans. N. Y. Acad. sci.* vii. (1887) 14; *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 405 = *Torreyana, S. Wats.*

STIPA, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 998.

- Aliciae, *Kanitz, Pl. exped. Szechenyi, in As. centr. coll.* (1891) 61 t. 7, ii. fig. 4. — China.
 arida, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 725. — Utah.
 avenacioides, *Nash, in Bull. Torrey Bot. Club.* xxii. (1895) 423. — Florida.
 caduca, *Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1 (1892) 54 (= *Oryzopsis caduca, Beal.*). — Montana.
 californica, *Vasey, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 80, nomen. — Calif.
 caucasica, *Lipski, in Mem. Soc. hist. nat. Kiev.* xii. (1892) extr. 28 [an seq. ?]. — Ross.
 caucasica, *Schmalh. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* x. (1892) 293; et in *Akinfijeff, Fl. Caus. centr.* (1894) 24. — Reg. Cauc.
 charruana, *Arechav. in Anal. Mus. Nac. Buenos-Aires* iv. (1895) 181, fig. 3. — Uruguay.
 columbiana, *Macoun, Catal. Canad. Pl.* iv. (1888) 191. — Canad.

STIPA : —

- dumetorum, *Sodiuro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 7, nomen. — Ecuad.
 flexuosa, *Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club.* xv. (1888) 49; et *Illustr. N. Am. Grass.* i. 1. (1890 t. 24. — Am. bor. austro-occ.
 Hackeli, *Arechav. in Anal. Mus. Nac. Buenos-Aires*, iv. (1891) 179, fig. 11. — Urug.
 Hookeri, *Staff, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 120. — Tibet.
 Hassei, *Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 267. — Calif.
 Joannis, *Celak, in Formanek, Květena*, i. (1887) 92. — Moravia.
 Lasiagrostis, *Nichols, Dict. Gard.* iii. (1886) 504. — Eur.
 latifolia, *Arechav. in Anal. Mus. Nac. Buenos-Aires* iv. (1895) 181, fig. 4. — Urug.
 latifolia, *Sodiuro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1887)* 7, nomen. — Ecuad.
 Letourneuxii, *Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 405, Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 165 = gigantea, Lag.
 Lettermani, *Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 53. — Idaho.
 longitola, *Borb. in Magyar Növen. Lapok*, x. (1886) 117. — Hung.
 Macounii, *Scribn. in Macoun, Catal. Canad. Pl.* v. (1890) 390 = *S. Richardsonii, A. Gray.*
 pinetorum, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 724. — Utah.
 Pringlei, *Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1 (1892) 54 (= *Oryzopsis Pringlei, Beal.*). — Am. bor. austro-occ.
 rupestris, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 81. — Chili.
 Scribneri, *Vasey, Illustr. N. Am. Grass.* i. II. (1891) t. 9. — N. Mexic.
 Semenowi, *Krassn. in Scripta Hort. Univ. Petrop.* ii. I. (1887-88) 22. — China.
 Sodiuroana, *Hack. & Sodiuro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 7, nomen. — Ecuad.
 venusta, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 81. — Am. austro. occ.
 Woronini, *Krassn. in Scripta Hort. Univ. Petrop.* ii. I. (1887-88) 22. — China.

STIPULICIDA, Michx (Caryophyll.). — Ind.

- Kew. ii. 1000.
 filiformis, *Nash, in Bull. Torrey Bot. Club.* xxii. (1895) 148. — Florida.

STISSERA, Linn. = **Stapelia**, Linn. (Asclep.).

- acuminata, ambigua, Asterias, atropurpurea, clypeata, comosa, compacta, concinna, conspurcata, deflexa, dejecta, divaricata, fissirostris, flavicomata, fuscata, gemmiflora, glanduliflora, glauca, grandiflora, hamata, hirsuta, hirsuta, juvenula, lanifera, lepidia, lucida, maculosa, marginata, marmorata, Marsonii, mixta, multiflora, mutabilis, normalis, obliqua, orbicularis, pallida, paniculata, patula, pedunculata, picta, planiflora, pulchella, pulvinata, quinquerivis, reflexa, retusa, revoluta, roriflua, rufa, rufescens, rugosa, spectabilis, stellaris, stricta, stygia, tigridia, variegata, verrucosa, vetula, Wendlandiana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 421-22 = *homonyma omnia Stapeliae.*
 anguina, *Kuntze, l. c.* 421 = *Stapelia picta, Donn.*
 aperta, *Kuntze, l. c.* = *Caralluma aperta, N. E. Br.*
 articulata, *Kuntze, l. c.* = *Pectinaria articulata, Haw.*
 bisulca, *Kuntze, l. c.* = *Stapelia variegata, Linn. var.*
 bufonia, *Kuntze, l. c.* = *S. variegata, Linn. var.*
 caespitosa, *Kuntze, l. c.* = *Duvalia caespitosa, Haw.*
 caudata, *Kuntze, l. c.* = *Brachystelma crispum, R. Grah.*
 ciliata, *Kuntze, l. c.* = *Diplocyatha ciliata, N. E. Br.*
 concolor, *Kuntze, l. c.* = *Duvalia sp.*
 Curtisii, *Kuntze, l. c.* = *Stapelia variegata, Linn. var.*
 decora, *Kuntze, l. c.* = *Piранthus decorus, N. E. Br.*
 depressa, *Kuntze, l. c.* = *Stapelia patula, Willd. var.*
 elegans, *Kuntze, l. c.* = *Duvalia elegans, Haw.*
 geminata, *Kuntze, l. c.* = *Piранthus serrulatus, N. E. Br.*
 glomerata, *Kuntze, l. c.* = *Duvalia glomerata, Haw.*

STISSERA : —

- hirtella*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 421 = *Duvalia hirtella*, Sweet.
hispidula, Kuntze, l. c. = *Stapelia glanduliflora*, Mass.
inodora, Kuntze, l. c. = *S. variegata*, Linn. var.
irrorata, Kuntze, l. c. = *S. variegata*, Linn. var.
Jacquiniana, Kuntze, l. c. = *Duvalia Jacquiniana*, Sweet.
laevigata, Kuntze, l. c. = *D. laevigata*, Haw.
laevis, Kuntze, l. c. = *Stapelia pedunculata*, Mass.
mammillaris, Kuntze, l. c. = *Caralluma mammillaris*, N. E. Br.
mastodes, Kuntze, l. c. 422 = *Duvalia mastodes*, Sweet.
pilifera, Kuntze, l. c. = *Trichocaulon piliferum*, N. E. Br.
pruinosa, Kuntze, l. c. = *Caralluma pruinosa*, N. E. Br.
pulchra, Kuntze, l. c. = *Stapelia roriflua*, Jacq.
radiata, Kuntze, l. c. = *Duvalia radiata*, Haw.
ramosa, Kuntze, l. c. = *Caralluma ramosa*, N. E. Br.
reclinata, Kuntze, l. c. = *Duvalia reclinata*, Haw.
replicata, Kuntze, l. c. = *D. replicata*, Sweet.
serrulata, Kuntze, l. c. = *Piarranthus serrulatus*, N. E. Br.
Simsii, Kuntze, l. c. = *Stapelia pedunculata*, Mass.
sorroria, Kuntze, l. c. = *S. sororia*, Mass.
tuberculata, Kuntze, l. c. = *Duvalia radiata*, Haw.
Woodfordiana, Kuntze, l. c. = *Stapelia picta*, Donn.

- STIXIS, Lour. = **Roydsia**, Roxb. (Capparid.).
elongata, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 655. — Laos.
flavescens, Baill. l. c. 654. — Laos.
floribunda, Baill. l. c. 655 = *Roydsia floribunda*, Planch.
Hookeri, Baill. l. c. 656. — Cochinch.
mollis, Baill. l. c. — Cochinch.
obtusifolia, Baill. l. c. 654 = *Roydsia obtusifolia*, Hook. f. & Thoms.
parviflora, Baill. l. c. 655 = *R. parviflora*, Griff.
suaveolens, Baill. l. c. 654 = *R. suaveolens*, Roxb.

- STIZOLOBIUM, P. Br. = **Mucuna**, Adans. (Legumin.).
altissimum, *atropurpureum*, *Bennettii*, *bracteatum*, *capitatum*, *Championii*, *coriaceum*, *flagellipes*, *giganteum*, *hirsutum*, *imbricatum*, *macrobotrys*, *macrocarpum*, *macrophyllum*, *melanocarpum*, *molle*, *monospermum*, *Mutisianum*, *niveum*, *novoguineense*, *platyphyllum*, *quadrialatum*, *rostratum*, *spurius*, *stans*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27-08 = *homonyma omnia Mucunae*.
cyanospermum, Kuntze, l. c. 208 = *M. cyanosperma*, K. Schum.
cylindrospermum, Kuntze, l. c. = *Physostigma cylindrospermum*, Holmes.
Holtonii, Kuntze, l. c. 207. — Costa Rica.
Jungkuhiana, Kuntze, l. c. 208. — Java.
Kraetkei, Kuntze, l. c. = *M. Kraetkei*, Warb.
Pseudostizolobium, Kuntze, l. c. = *M. Macroceratides*, DC.
sempervirens, Kuntze, l. c. = *M. sempervirens*, Hemsl.

- STOEBE, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1001.
biotoides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 494. — Madag.
cryptophylla, Baker, l. c. — Madag.
kilimandscharica, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 411. — Afr. trop. or.
passerinoides, Cordem. Fl. Ile Reunion (1895) 534 = *paniculata*, Cass.

- STOECHADOMENTHA, Linn. Fl. Zeyl. (1747) 194, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 466 = **Adenosma**, R. Br. (Scrophul.).
camphorata, *capitata*, *coerulea*, *macrophylla*, *malabarica*, *microcephala*, *Muelleri*, *subrepens*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Adenosmatis*.
javanica, Kuntze, l. c. = *A. ovatum*, Benth.

- STOKESIA, L'Hérit. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1002.
laevis, Greene, in Erythraea, i. (1893) 3 = *cyanea*, L'Hérit.

- STORMIA**, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 300. **ANONACEAE**.
brasiliensis, S. L. Moore, l. c. (= *Hexalobus brasiliensis*, A. St. Hil.). — Bras. cent.

- STRANVAESIA**, Lindl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 1002.
integrifolia, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2295. — Borneo.

- STRAUSSIA**, A. Gray (Rubiaceae). — Ind. Kew. ii. 1002.
leptocarpa, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 180. — Ins. Sandvic.
oncocarpa, Hillebr. l. c. — Ins. Sandvic.

- STREBLACANTHUS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 497; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 338. **ACANTHACEAE**.
monospermus, Kuntze, l. c. — Costa Rica.

- STREBLOCHAETA**, Hochst. = **Danthonia**, DC. (Gramin.).
Koestlini, «Hochst.» ex Th. Dur. & Schinz, Conspl. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 851, in syn. (= *S. Koestlini*, Hochst.) = *Danthonia Koestlini*, Hochst.

- STREBLOSA**, Korth. = **Psychotria**, Linn. (Rubiaceae).
urticina, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 182. — Borneo.

- STRELITZIA**, [Banks] Ait. (Scitami.). — Ind. Kew. ii. 1003.
Niveni X, Hort. ex Rev. Hort. lx. (1888) 117. — Hybr. artef.

- STREMPOLIOPSIS**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1003.
Benthani, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 182 = *strempeleioides*, Benth.

- STREPTANTHUS**, Nutt. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1003.
albidus, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 62; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 16. — Calif.
arizonicus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1895) 125. — Arizona.
barbatus, S. Wats. l. c. — Am. bor. occ.
barbiger, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 217; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 16. — Calif.
Biolettii, Greene, l. c. 225; et 17. — Calif.
californicus, Greene, Fl. Francisc. (1891) 256 = *Standfordia californica*, S. Wats.
campestris, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 125. — Calif.
Hesperidis, Jepson, in Erythraea, i. (1893) 14. — Calif.
Howellii, M. F. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 623 = *Thelypodium Howellii*, S. Wats.
inflatus, Greene, Fl. Francisc. (1891) 257 = *Caulanthus inflatus*, S. Wats.
Lemmoni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 125. — Arizona.
longirostris, S. Wats. l. c. 127, in obs. (= *Arabis longirostris*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
Mildredae, Greene, Fl. Francisc. (1891) 260; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 16. — Calif.
niger, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xii. (1886) 141; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 16. — Calif.
orbiculatus, Greene, Fl. Francisc. (1891) 258 (= *S. Breweri*, A. Gray, pr. p.). — Calif.
Parryi, Greene, l. c. 257. — Calif.
peramoenus, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 142. — Calif.
pulchellus, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 225; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 17. — Calif.
secundus, Greene, Fl. Francisc. (1891) 261; et l. c. 17. — Calif.
suffrutescens, Greene, in Erythraea, i. (1893) 147. — Calif.
versicolor, Greene, l. c. iii. (1895) 99. — Calif.

- STREPTOCALYX**, Beer (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 1004.
angustifolius, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 283. — Bras.
Blanchetii, Baker, Handb. Bromel. (1889) 32. — Bras.
floribunda, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 284 [floribundus] = *Aechmea platynema*, Baker.
laxiflora, Baker, Handb. Bromel. (1889) 31. — Bras.
longifolia, Baker, l. c. (= *Bromilia longifolia*, Rudge.). — Guian. gall.
orthopoda, Baker, in Kew Bull. (1892) 198. — Bras.
platynema, Lindman, in Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. xxiv. 8 (1891) 37 = *Aechmea platynema*, Baker.
podantha, Baker, Handb. Bromel. (1889) 32 = *Portea Glaziovii*, Baker.
Poitaei, Baker, l. c. 31. — Guian. gall.

- STREPTOCARPUS**, Lindl. (Gesnerac.). — Ind. Kew. ii. 1004.
balsaminoides, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 77. — Afr. trop. occ.
Bruanti X, Hort. ex Rev. Hort. lxi. (1889) 267. — Hybr. artef.
Dunnii, Mast. in Gard. Chron. (1886) 625; Hook f. in Bot. Mag. (1886) t. 6903. — Transvaal.
Dyeri X, W. Wats. in Gard. and For. viii. (1895) 5. — Hybr. artef.
elongatus, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 76. — Afr. trop. occ.
Galpini, Hook. f. in Journ. of Hort. (1891) 388, fig. 76; et in Bot. Mag. (1892) t. 730; W. Wats. in Gard. Chron. (1892) i. 139 fig. 24. — Transvaal.
glandulosissimus, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 78. — Afr. trop. or.
Holstii, Engl. l. c. 77. — Afr. trop. or.
hewensis X, Hort. ex Gard. Chron. (1887) ii. 246 fig. 61. — Hybr. artef.
montanus, Oliver, in H. Johnston The Kilim. Exped. Append. (1886) 343 nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 344. — Afr. trop. or.
rivularis, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 78. — Afr. trop. or.
saxorum, Engl. l. c. xix. (1894) 154. — Afr. trop. or.
Volkensii, Engl. l. c. 153. — Afr. trop. or.
Watsoni X, Hort. ex Gard. Chron. (1887) ii. 137, 215 fig. 52. — Hybr. artef.
Wendlandii, Hort. Dammann, ex Gartenfl. xli. (1892) 26; W. Wats. in Gard. Chron. (1894) i. 590; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7447. — Transvaal.

- STREPTOCHAETA**, Schrad. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1004.
Sodiroides, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito (1889) 5 nomen; et in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 111. — Ecuad.

- STREPTOGLOXINIA** X, Rodigas, in Illustr. Hort. xxxix. (1892) 124. — Gen. hybr. artef. **GESNERACEAE**.

- STREPTOLIRION**, Edgew. — Ind. Kew. ii. 1004.
cordifolium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 722 = *volubile*, Edgew.

- STREPTOPETALUM**, Hochst. (Turneras). — Ind. Kew. ii. 1004.
graminifolium, Urban, in Notizbl. bot. Gart. Berl. i. (1895) 31. — Afr. or.

- STREPTOPUS**, Michx (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1004.
paniculatus, Baker, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1932. — China.
parviflorus, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. 1887 (1888) 90. — Tibet.

- STRICKLANDIA**, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 105. **AMARYLLIDAE**.
eucrosioides, Baker, l. c. (= *Leperiza eucrosioides*, Baker). — Ecuad.

STRIGA, Lour. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1004.
asiatica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 466 = *densiflora*, Benth.
canescens, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 361.
 — Afr. trop. or.
gesnerioides, Vatke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 28, nomen. — Afr. trop.
sansibarensis, Vatke, ex Engl. l. c. (1894) 28, nomen; Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 13, 74 = *pubiflora*, Klotzsch.

STROBIDIA, Miq. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1005.
conchigera, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 698; Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 253, in syn. = *Alpinia conchifera*, Griff.
Mannii, King, ex Baker, in Hook. f. l. c. 253, in syn. = *A. Mannii*, Hook. f.
oligosperma, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 698, in syn. = *Alpinia conchifera*, Griff.

STROBILANTHES, Blume (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 1005.
anamiticus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 498. — Anam. comatus, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 104 t. 16. — Burma.
Cusia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 499 = *flaccidifolius*, Nees.
debilis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 239. — China.
Dyerianus, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1893) i. 442; et in Rev. Hortie. lxxv. (1893) 201. — Ind. or.
Galeopsis, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 215. — Borneo.
gregalis, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 104. — Burma.
Henryi, Hemsl. l. c. xxvi. (1890) 240. — China.
hispidula, Baker, l. c. xxii. (1887) 509. — Madag.
integrifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 499 = *perfoliatus*, T. Anders.
kinabaluensis, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 214. — Borneo.
latisepalus, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 241. — China.
Naumannii, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 474; et in Forschungsgr. Gazelle (1886) 44. — Melanesia.
Nockii, Trim. Handb. Fl. Ceyl. iii. (1895) 3-1 t. 70. — Zeylan.
pterygorrhachis, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 54 t. 25. — Kohima.
recurvus, C. B. Clarke, l. c. 52 t. 24. — Kohima.
reticulatus, Stapf, in Kew Bull. (1894) 347. — Ind. or.
urticifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 499 = *alatus*, Nees.

STROBOPETALUM, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 335; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 244. **ASCLEPIADEAE**.
Benti, N. E. Br. l. c. 336; et 244. — Arabia.
carnosum, N. E. Br. l. c. 390; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2387. — Arabia.

STROGYLON, Vog. (Legumin. — Ind. Kew. ii. 1007.
Graveniae, Baron & Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 74. — Madag.
siderospermum, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 322 [*siderospermum*]. — Ins. Borbon.

STROMANTHE, Sond. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1007.
angustifolia, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 266. — Bolivia.
papillosa, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 155. — Bras.
pluriflora, Petersen, ex Warm. in Vidensk. Meddel. naturh. Foren. (1889) 335 (Symb. fl. Bras. centr. xxxi. 905). — Bras.
villosa, Eichl. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 154 = *S. Tonckat*, Eichl.

STROMATOCARPUS Kotschoubeyi, Karw. ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 232 = *Anhalonium sulcatum*, Salm-Dyck.

STROMBOSIA, Blume (Olatin.). — Ind. Kew. ii. 1007.
lucida, Teysm. & Binn. Crit. overz. Olatin. (1886) 86.
 — Java.
membranacea, Valetou, l. c. 87. — Java.
multiflora, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) 102. — Penins. Mal.
pustulata, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2299. — Lagos, Sierra Leone.
rotundifolia, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) 103. — Penins. Mal.

STRONGYLOMA, DC. = **Nassauvia**, Comm. (Compos.).
struthionum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 88. — Patag.

STROPHACANTHUS, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 344. **ACANTHACEAE**.
coccinus, Lindau, l. c. = *Dianthera collina*, C. B. Clarke.
dichotomus, Lindau, l. c. = *D. dichotoma*, C. B. Clarke.
terminalis, Lindau, l. c. = *D. terminalis*, C. B. Clarke.

STROPHANTHUS, DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1007.
Aamba, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 407, 454. — N. Guin.
amboensis, Engl. & Pax, ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 376; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 289. — Afr. austro-occ. extra-trop.
arborus, Boiv. ex Franch. l. c. 252, in syn. = *Boivini*, Baill.
aurantiacus, Blondel, Stroph. comm. Paris (1888) 11, nomen. — Madag. vel Java?
Balsanae, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 262, t. 17. — Tonkin.
Barteri, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 323; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 279, t. 11a — Afr. trop. ooc.
Boivini, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 757; Franch. l. c. 252, t. 7. — Madag.
bracteatus, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 324; et l. c. 280, t. 12. — Congo gall.
congoensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 302, 324; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1895) 288, t. 13. — Congo gall.
Courmonti, Sacleux, ex Franch. l. c. 300 ou 322, et 286, t. 10. — Afr. trop. or.
ecaudatus, (err. typ. *ecandatus*) Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 85. — Angola.
Emini, Aschers. ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 366, t. 10 et 11; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 275. — Afr. trop. or.
Fischeri, Aschers. & K. Schum. ex Holmes, in Pharm. Journ. (1893) 868, nomen; et ex Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 325. — Afr. trop. or.
gracilis, K. Schum. & Pax, ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 370; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 277. — Afr. trop. occ.
gratus, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 171 (= *Roupellia grata*, Hook.). — Afr. trop.
gratus, Franch. in Journ. de Bot. vii. (1893) 321; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 256 = *praeac*.
Grevei, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 757; Franch. l. c. Sér. III. v. (1893) 254. — Madag.
intermedius, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 375; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 287. — Angola.
Ledienii, Stein, in Gartenfl. xxxvi. (1886) 145, t. 1241; Franch. l. c. 270. — Congo.
mincr, Blondel, Stroph. comm. Paris (1888) 26, nomen. — Reg. Nigrit.

STROPHANTHUS : —
minor, Christy, ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 381. — Reg. Nigrit.
niger, Blondel, Stroph. comm. Paris (1888) 11, nomen. — Hab.?
ogovensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. 1891 (1893) 324; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 284, t. 15. — Congo gall.
Paroissei, Franch. l. c. ; et 290, t. 16. — Guinea.
parviflorus, Franch. l. c. 321; et 281, t. 11b. — Angola.
parvifolius, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 182. — Angola.
Pierrei, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1151. — Cochinch.
Preussii, Engl. & Pax, ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 369; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 279. — Kamerun.
puberulus, Pax, l. c. 378; Franch. l. c. 269. — Ins. Sumbawan.
Rigali, Hort. Paris, ex Pax, l. c. 381, in obs. — Hab.?
scaber, Pax, l. c. 370 = *gracilis*, K. Schum. & Pax.
Schuchardti, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 371; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 276. — Angola.
speciosus, Reber, in Der Fortschr. iii. (1887) 299; Franch. l. c. 287 (= *Christya speciosa*, Ward & Haw.) = *capensis*, A. DC.
Tholloni, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 299; et l. c. 257, t. 8. — Afr. trop. occ.

STROPHOSTYLES, Ell. = **Phaseolus**, Tourn. (Legumin.).
pauciflorus, S. Wats. in A. Gray, Man. Bot. North. U. S. ed. 6 (1890) 145 = *P. pauciflorus*, DC.

STRUCHIUM, P. Br. = **Sparganophorus**, Vaill. (Compos.).
sparganophorum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 366 = *S. Vaillantii*, Crantz.

STRUTHANTHUS, Mart. = **Loranthus**, Linn. *Sclerorum*, Loesen, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 536. — Mexic.

STRUTHIOLA, Linn. (Thymelaeac.). — Ind. Kew. ii. 1009.
amabilis, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 284. — Afr. trop. or.
Bachmanniana, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 270; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 229. — Afr. austr.
ericina, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 270. — Afr. trop. or.
Holstii, Engl. l. c. xvii. (1893) 186, nomen = *Gnidia Holstii*, Engl.
kilimandscharica, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 284. — Afr. trop. or.
Rustiana, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 270. — Afr. austr. et austro-occ.
Stuhlmannii, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 283. — Afr. trop. or.
usambarensis, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 269. — Afr. trop. or.

STRYCHNOS, Linn. (Logan.). — Ind. Kew. ii. 1009.
aculeata, Solered. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 544; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1892) 41. — Afr. trop. occ.
Azelii, Gilg, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 572. — Sierra Leone.
alnifolia, Baker, in Kew Bull. (1895) 150. — Lagos.
angolensis, Gilg, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 571. — Angola.
Bancroftiana, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker (1889) 49; et Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 47. — Austral.
Baroni, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 504. — Madag.
Barteri, Solered. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 556; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2284. — Afr. trop. occ.

STRYCHNOS : —

- Buettneri, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 574. — Afr. trop.
- Burtoni, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 98 = *S. Quaquea, Gilg.*
- cerasifera, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 311. — Afr. trop. or.
- chrysocarpa, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 93. — Afr. trop. occ.
- cocculoides, Baker, l. c. — Angola.
- distichophylla, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 310. — Afr. trop. or.
- Engleri, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 568; et ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 25, 34, nomen. — Afr. trop.
- Fischeri, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 565. — Afr. trop. or.
- floribunda, *Gilg, l. c.* 566. — Reg. Mossamb.
- ericetina, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. Bot. Amaz. n.* 160] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 34 t. 3, fig. A. — Bras.
- gigantea, Barb. Rodr. ll. cc. t. 4, fig. a. — Bras.
- gracillima, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 573. — Afr. trop.
- Guerkeana, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 311. — Afr. trop. or.
- guianensis, Baill. *Bot. medic. [Phaner.]* (1884) 1219. — Guian.
- Henningsii, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xi i. (1893) 569. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Henriquesiana, Baker, in *Bolet. Soc. Brot.* xi. (1893) 86. — Angola.
- Henriquesiana, *Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 75. — Angola.
- Holstii, *Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 36; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 310. — Afr. trop. or.
- kauichana, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. Bot. Amaz. n.* 202] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 37. — Bras. bor.
- laxa, Solered. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 554. — Reg. Nigrit.
- lethalis, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. Bot. Amaz. n.* 713] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 39. — Bras. bor.
- loandensis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 97. — Angola.
- longicaudata, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 570. — Reg. Mossamb.
- lucens, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 97. — Angola.
- macrophylla, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. Bot. Amaz. n.* 249] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 33 t. 11a. — Bras. bor.
- manacensis, Barb. Rodr. ll. cc. [n. 257] et 37. — Bras. bot.
- mattogrossensis, S. L. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 392. — Bras.
- microcarpa, Baker, in *Kew Bull.* (1896) 97. — Angola.
- Moloneyi, Baker, l. c. — Afr. trop. occ.
- nigritana, Baker, l. c. — Afr. trop. occ.
- Miniungassamba, *Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 77. — Angola.
- occidentalis, Solered. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam* iv. 2 (1892) 40. — Afr. trop. occ.
- panganensis, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 311. — Afr. trop. or.
- papilosa, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. Bot. Amaz. n.* 680] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 36 t. 4 fig. b. — Bras.
- pungens, Solered. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 554; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1892) 40. — Afr. trop.
- Quaqua, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 567. — Reg. Mossamb.
- rivularia, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. Bot. Amaz. n.* 698] Sec. edic. (1891) *Vellozia*, 1885-88, 35 t. 2, fig. b et 4 fig. c. — Bras.
- Schweinfurthii, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 568. — Congo bor.
- sennensis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 97. — Zambes.
- splendens, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 571. — Sierra Leone.
- Stuhlmannii, *Gilg, l. c.* 570. — Afr. trop.
- suaveolens, *Gilg, l. c.* 566. — Congo bor.
- subscandens, Baker, in *Kew Bull.* (1893) 96. — Angola.

STRYCHNOS : —

- Thonningii, Solered. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam* iv. 2 (1892) 40 (= *S. micrantha*, Thw.). — Zeyl.
- tomantinensis, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. bot. Amaz. n.* 714] Sec. edic. (1891) *Vellozia*, 1885-88, 38. — Bras. bor.
- Tonga, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 575. — Reg. Mossamb.
- triclisioides, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 98. — Afr. trop. occ.
- Urbanii, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. bot. Amaz. n.* 128] Sec. edic. (1891) 38 t. 4 fig. a. — Bras.
- usambarensis, *Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 36; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 311. — Afr. trop. or.
- Vogelii, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 96. — Afr. trop. occ.
- Volkensii, *Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 25; in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 76; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 311. — Afr. trop. or.
- Wakefieldi, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 98 = Engleriana, *Gilg.*
- Welwitschii, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 573. — Angola.
- xerophila, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 98 = *S. Unguacha, A. Rich.*
- zizyphoides, Baker, l. c. 96. — Afr. trop. or.

STUEBELIA, Pax, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 89. *CAPPARIDEAE*.
nitida, Pax, l. c. — Columb.

STUHLMANNIA, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 201. *LEGUMINOSAE*.
Moavi, Taub. l. c. — Afr. or.

STYCHOPHYLLUM *bryoides*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 7, in syn. = *Pycnophyllum molle*, Remy.

STYLARTHROPUS, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 822; et *Hist. des pl.* x. (1890) 437 = *Whitfieldia*, Hook. (Acanth.).
Brazzaei, Baill. l. c. 823. — Congo gall.
Preussii, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 12. — Afr. trop. occ.
Stuhlmannii, Lindau, l. c. 11. — Afr. trop. or.
tenuiflora, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 823. — Congo gall.
Tholloni, Baill. l. c. — Congo gall.

STYLIDIUM, Sw. (Stylid.). — Ind. Kew. ii. 1011.
Merrallii, F. Muell. in *Vict. Naturalist*, v. (Oct. 1888) 76 (= *Candollea Merrallii*, F. Muell.). — Austral.
vitiense, Th. Dur. ex Drake, Ill. *Fl. Ins. Pacif.* (1886) 184 (= *Marlea vitiensis*, Benth.). — Ins. Pacif.

STYLOCHITON, Lepr. (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 1012.
angolensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1892) 465. — Angola.
maximus, *Engl. l. c.* 466. — Afr. trop. austro-or.

STYLOCLINE, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1012.
arizonica, Coville, in *Proc. biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 79. — Arizona.

STYLOCONUS, Baill. *Hist. des pl.* xiii. (1895) 75. *AMARYLLIDEAE*.
canescens, Baill. l. c. (= *Blanca canescens*, Baill.). — Austral.

STYLOCORYNE, Cav. = **Randia**, Houst. (Rubiace.).
campaniflora, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 108 = *R. campaniflora*, Hook. f.
nigrescens, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 432, in obs. (= *Tarenna nigrescens*, Warb.). — N. Guin.
Wallichii, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 108 = *R. Wallichii*, Hook. f.

STYLONCERUS, Spreng. = **Angianthus**, Wendl. (Compos.).

amplexicaulis, *brachypappus*, *Cunninghamii*, *demissus*, *Drummondii*, *eriocephalus*, *globifer*, *microcephalus*, *Milnei*, *phyllocephalus*, *platycephalus*, *plumiger*, *Preisianus*, *pusillus*, *pygmaeus*, *strictus*, *tenellus*, *tomentosus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 367 = *homonyma omnia* Angianthi.
micropodes, Kuntze, l. c. = *A. micropoides*, Benth.
myosuroides, Kuntze, l. c. = *A. myosuroides*, Benth.
phyllocalymneus, Kuntze, l. c. = *A. Pleuropappus*, Benth.

STYLONEMA, Kuntze. *Rev. Gen.* (1891) 36 = **Syrenia**, Andr. (Crucif.).
bithynicum, Kuntze, l. c. = *Erysimum cuspidatum*, DC.

quadrangulum, Kuntze, l. c. = *Syrenia sessiliflora*, Ledeb.

STYLOPHORUM, Nutt. (Papav.). — Ind. Kew. ii. 1012.
lanceolatum, Yatabe, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (Sept. 1890) 308. — Japon.

STYLOSANTHES, Sw. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1013.

Bangii, Taub. ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 206. — Boliv.
biflora, Britton, Stern. & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 13; Taub. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 25 = *elator*, Sw.
dissitiflora, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 105. — Mexic.
hamata, Taub. in *Verh. Bot. Brand.* xxxii. (1890) 22; et in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 614 = *procumbens*, Sw.
mexicanus, Taub. l. c. 21. — Mexic.
Pohlana, Taub. l. c. 29. — Bras.
sundaica, Taub. l. c. 21 (= *S. mucronata*, Miq.). — Archip. Sundaic.
sympodialis, Taub. l. c. 19. — Ecuad.

STYPA, «L.» ex St Lager, in *Cariot. Etud. des fl.* ed. 8 ii. (1889) 895 = **Stipa**, Linn. (Gramin.).

STYPHELIA, Sw. (Epacrid.). — Ind. Kew. ii. 1013.

ericifolia, F. Muell. *Sec. Cens. Austral. Pl.* (1889) 180 (= *Pentachondra ericifolia*, Hook. f.). — Tasman.
Kingiana, F. Muell. in *Vict. Natural.* x. (Sept. 1893) 78; et in *Bot. Centralbl.* lvi. (1893) 124. — Austral.
malayica, Drude, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1 (1889) 78 (= *Leucopogon malayanus*, Jack). — Austral.
Milligani, F. Muell. *Sec. Cens. Austral. Pl.* (1889) 178; in *Papers and Proc. Roy. Soc. Tasm.* (1891-92) 15; et in *Bot. Centralbl.* xlix. (1891) 29 (= *Pentachondra verticillata*, Hook. f.). — Tasman.

STYRAX, [Tourn.] Linn. (Styrac.). — Ind. Kew. ii. 1015.

ceramensis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 402, 454 — N. Guin.
dealbata, Guerke, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 178 = *S. Benzoin*, Dryand.
conterminum, F. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 5. — Guatem.
glabrata, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 482. — N. Guin.
guatemalensis, F. D. Smith; in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 27. — Guatem.
jaliscana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 144. — Mexic.
peruviana, Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1892) 4. — Peruv.
portoricensis, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 337. — Ins. Puerto-Rico.

SUAEDA, Forsk. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 1015.

brevifolia, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 432. — Chili.
cochlearifolia, Woloszczak, ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 7. — As. occ.

SUAEDA : —

Moquini, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 264; Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 366 = *Torreyana*, S. Wats.
multiflora, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 430. — Chili.
parvifolia, Phil. l. c. 431. — Chili.
tenuifolia, Phil. l. c. 432. — Chili.

SUCCISA, Neck. = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).
australis, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 187 = *S. australis*, Wulf.
Carvateana, Musit, in Bolet. Soc. Brot. viii. (1890) 147. — Lusit.
Petteri, Kern. & Murb. ex Murb. in Lunds Univ. Arsskrift, xxvii. v. (1892) 112. — Herceg.

SUCCISELLA, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1145 = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).
inflexa, G. Beck, l. c. = *S. australis*, Wulf.

SULLIVANTEA, Torr. & Gray (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 1017.
Hapemani, Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 421 = *Heuchera Hapemani*, Coult. & Fisher.
Sullivantii, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 178 = *S. Ohioensis*, Torr. & Gray.

SUNAPTEA, Griff. = **Vatica**, Linn. (Dipteroc.).
borneensis, Heim, Recherch. Diptéroc. (1892) 109 = *V. borneensis*, Burck.
Bureavi, Heim, l. c. — As. trop.
faginea, Heim, l. c. 99 = *Vatica faginea*, Dyer.
Teysmannii, Heim, l. c. 100 = *V. Teysmannii*, Burck.
Urbani, Heim, l. c. 116. — Borneo.

SUNAPTEOPSIS, Heim, Recherch. Diptéroc. (1892) 92 = **Vateria**, Linn. (Dipteroc.).
jucunda, Heim, l. c. = *V. jucunda*, Thw.

SUREGADA, [Roxb.] = **Gelonium**, Roxb. (Euphorb.).
africana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 619 = *G. africanum*, Muell. Arg.
bifaria, Kuntze, l. c. = *G. bifarium*, Roxb.
comorensis, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 978. — Ins. Comor.
lanceolata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 619 = *Gelonium lanceolatum*, Willd.
oxyphylla, Kuntze, l. c. = *G. oxyphyllum*, Miq.

SURENUS, Rumpf = **Cedrela**, P. Br. (Meliac.).
angustifolia, *bogotensis*, *fissilis*, *Glaziovii*, *guianensis*, *inodora*, *Kotschy*, *montana*, *paraguariensis*, *serrulata*, *sinensis*, *Teysmannii*, *Toona*, *Velloziana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 111 = *homonyma omnia* Cedrelae.
australis, Kuntze, l. c. = *C. Toona*, Roxb.
Brownii, Kuntze, l. c. = *C. odorata*, Linn.
febrifuga, Kuntze, l. c. = *C. Toona*, Roxb.
glabra, Kuntze, l. c. = *C. Toona*, Roxb.
mexicana, Kuntze, l. c. = *Swietenia humilis*, Zucc.
microcarpa, Kuntze, l. c. = *C. Toona*, Roxb.
serrata, Kuntze, l. c. = *C. Toona*, Roxb.
velutina, Kuntze, l. c. = *Chickrassia tabularis*, A. Juss.

SURINGARIA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 635. MYRTACEAE.
cambodiana, Pierre, l. c. 636. — Cambod.

SUTERA, Roth = **Chaenostoma**, Benth. (Scrophul.).
athiopica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 467 = *C. aethiopicum*, Benth.
affinis, Kuntze, l. c. = *C. affine*, Benth.
calycina, Kuntze, l. c. = *C. calycinum*, Benth.
campanulata, Kuntze, l. c. = *C. campanulatum*, Benth.
cephalotes, Kuntze, l. c. = *C. fastigiatum*, Benth.
cordata, Kuntze, l. c. = *C. cordatum*, Benth.
cuneata, Kuntze, l. c. = *C. cuneatum*, Benth.
denudata, Kuntze, l. c. = *C. denudatum*, Benth.
floribunda, Kuntze, l. c. = *C. floribundum*, Benth.

SUTERA : —

glabrata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 467 = *Chaenostoma glabratum*, Benth.
halimifolia, Kuntze, l. c. = *C. halimifolium*, Benth.
integrifolia, Kuntze, l. c. = *C. integrifolium*, Benth.
laxiflora, Kuntze, l. c. = *C. laxiflorum*, Benth.
linifolia, Kuntze, l. c. = *C. linifolium*, Benth.
marifolia, Kuntze, l. c. = *C. marifolium*, Benth.
natalensis, Kuntze, l. c. = *C. natalensis*, Benth.
oppositifolia, Kuntze, l. c. = *C. hispidum*, Benth.
pauciflora, Kuntze, l. c. = *C. pauciflorum*, Benth.
pedunculosa, Kuntze, l. c. = *C. pedunculatum*, Benth.
polyantha, Kuntze, l. c. = *C. polyanthum*, Benth.
procumbens, Kuntze, l. c. = *C. procumbens*, Benth.
pumila, Kuntze, l. c. = *C. pumilum*, Benth.
racemosa, Kuntze, l. c. = *C. racemosum*, Benth.
revoluta, Kuntze, l. c. = *C. revolutum*, Benth.
rotundifolia, Kuntze, l. c. = *C. rotundifolium*, Benth.
subspicata, Kuntze, l. c. = *C. subspicatum*, Benth.

SUSUM, Blume (Flagellar.). — Ind. Kew. ii. 1017.
malayanum, Planch. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 391 (= *Veratonia malayana*, Miq.). — Malaya.

SWAINSONA, Salisb. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1018.

atrococcinea, Carrière, in Rev. Hort. (1887) 275 [Swainsonia]. — Form. hort.
Beasleyana, F. Muell. in Chem. and Drug. Austral. (April 1887) 84. — Austral.
cyclocarpa, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Jan. 1892) 136 : et in Bot. Centralbl. xlix. (1892) 350. — Austral.

Forresti, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Jan. 1892) 131, nomen. — Austral.

Kingii, F. Muell. in Trans. and Proc. Roy. Soc. Vict. xliii. (April 1887) 53. — Austral.
salsula, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 281 = *Sphaerophysa salsula*, DC.

SWARTZIA, Schreb. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1018.

chrysantha, Barb. Rodr. [Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 149] *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 19 t. 7, C [non t. 9]. — Bras.

SWEERTIA, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 582 = **SWEERTIA**, Koch = **Swertia**, Linn. (Gentian.).

SWEETIA, Spreng. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1019.

fallax, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 82. — Bras.

SWERTIA, Linn. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 1019.

affinis, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 394 (= *Ophelia affinis*, Wight & Arn.). — Affinis.
bella, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 138. — China.

bifolia, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 378. — China.

brachyanthera, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 388 = *Pleurogyne brachyanthera*, C. B. Clarke.
carolinensis, Baill. ex Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 88 [Sweertia] (= *Frasera carolinensis*, Walt.). — Carolina.

Clarkei, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 338 = *Pleurogyne Thomsoni*, C. B. Clarke.

coerulescens, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 88 (= *Ophelia coerulescens*, Zoll. & Mor.). — Java.

corymbosa, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 394 = *corymbosa*, Wight.

Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 62. — Tibet.

dimorpha, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 379. — China.

Eminii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 314. — Afr. trop. or.

Haussknechtii, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 88 (= *S. coerulea*, Hausskn.) [Sweertia]. — Reg. Himal.

SWERTIA : —

kilimandscharica, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 339. — Afr. trop. or.

Lastii, Engl. l. c. 337. — Afr. trop. or.

Lubahniana, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 338, in obs. (= *Pleurogyne Lubahniana*, Vatke). — Madag.

minor, Knobl. l. c. = *Pleurogyne minor*, Benth. & Hook. f.

multicaulis, Engl. ex Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 88 [Sweertia]. — Abyss. oculata, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 140. — China.

polynectaria, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 88 = *decumbens*, Vahl.

punicea, Hemsl. l. c. — China.

purpurascens, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 347 (= *Ophelia purpurascens*, Don). — Afghan.

Richardi, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 338. — Abyss.

spathulata, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 388 = *Pleurogyne spatulata*, Kern.

striata, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 91. — Burma.

stricta, Collett & Hemsl. l. c. — Burma.

tibetica, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 174. — Tibet.

usambarensis, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 59 ; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 314. — Afr. trop. or.

Wattii, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 47 t. 21. — Jakpho [Ind. or.]

Welwitschii, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 339. — Angola.

SWIETENIA, Jacq. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 1020.

macrophylla, King, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1550. — Honduras.

SYAGRUS, Mart. = **Cocos**, Linn. (Palm.).

Chavesiana, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 267] *Pl. nov. Jard. bot. Rio*. (1891) 108 = *C. Chavesiana*, Barb. Rodr.

SYCOCARPUS, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 143. ANACARDIACEAE.

Rusbyi, Britton, l. c. (= *Guarea trichilioides*, Linn.). — Am. austr.

SYCOPHILA, Welw. ex Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 485 = **Loranthus**, Linn.

combretoides, Welw. l. c. — Angola.

Mannii, Van Tiegh. 486, 543 (1894) 543 = *L. Mannii*, Oliver.

ternata, Van Tiegh. l. c. — Ins. S. Thom.

SYCOPSIS, Oliver (Hamamel.). — Ind. Kew. ii. 1020.

sinensis, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1931. — China.

SYKESIA, Arn. = **Gaertnera**, Lam. (Logan.).

arenaria, *calycina*, *edentata*, *grisea*, *hongkongensis*, *lanceolata*, *longifolia*, *macrobotrys*, *macrostipula*, *obovata*, *oxyphylla*, *paniculata*, *pendula*, *phyllosepala*, *phyllostachya*, *rosea*, *rotundifolia*, *sphaerocarpa*, *ternifolia*, *vaginata*, *viminea*, *Zollingeriana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425-26 = *homonyma omnia* Gaertnerae.

acuminata, Kuntze, l. c. 325 = *G. Koenigii*, Wight.

crassifolia, Kuntze, l. c. = *G. crassiflora*, Boj.

cuneifolia, Kuntze, l. c. = *Chasalia divaricata*, DC.

funghukniana, Kuntze, l. c. = *Gaertnera Koenigii*, Wight.

phanerolebia, Kuntze, l. c. = *G. phanerophlebia*, Baker.

psychotriodes, Kuntze, l. c. = *G. psychotrioides*, Baker.

vaginans, Kuntze, l. c. = *G. Koenigii*, Wight.

SYMBEGONIA, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 149. BEGONIACEAE.

fulvo-villosa, Warb. l. c. — N. Guin.

SYMBOLANTHUS, G. Don = **Lisianthus**, Linn. (Gentian.).
anomalus, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 99 = *L. anomalus*, H. B. & K.
calygonus, Gilg, l. c. = *L. calygonus*, Ruiz & Pav.
daturoides, Gilg, l. c. = *L. daturoides*, Griseb.
Stuebelii, Gilg, l. c. — Am. austr.
vasculosus, Gilg, l. c. = *L. vasculosus*, Griseb.

SYMPETALEIA, A. Gray (Loas.). — Ind. Kew. ii. 1021.
rupestris, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 50 (= *Loasella rupestris*, Baill.); T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1887) 159. — Calif. austr.

SYMPHONIA, Linn. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 1021.
gabonensis, Pierre, ex Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 231, in syn. = *giobulifera*, Linn., Hildebrandtii, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 362. — Madag.
microphylla, Benth. & Hook. f. ex Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 232 (= *Chrysopia microphylla*, Cambess.). — Madag.
oligantha, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 36. — Madag.

SYMPHOREMA, Roxb. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 1021.
Cumingianum, Briq. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1895) 180. — Ins. Philipp.

SYMPHORICARPUS, Dill. ex Juss. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 1021.
acutus, Hort. ex Hamb. Gart. und Blumenz. (1888) 562 = *mollis*, Nutt.
Heyeri, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 281, fig. 187; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 358 = *occidentalis*, Hook.
pauciflorus, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 105. — Am. bor.
Symphoricarpos, MacMill. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 15 = *orbiculatus*, Moench.

SYMPHYANDRA, A. DC. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 1021.
pangaea, Heldr. & Charrel [Nadj] in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 341. — Maced.
Pangaea, Heldr. & Nadj [Charrel] Emp. Ottom. [Pl. de Salon.] (1892) 29 = *praec.*
sporadum, Haldácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 461, cum xylogr. — Ins. Sporad.
Zangezur, Lipsky, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 317. — Armen. ross.

SYMPHYOSTEMON, Miers (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1022.
acaule, Benth. ex Baker, *Handb. Irid.* 1892) 138 (= *Sisyrinchium acaule*, Klatt). — Bolivia.

SYMPHYTONEMA, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1895) 321. **ASCLEPIADEAE**.
madagascariense Schlechter, l. c. t. 312a. — Madag.

SYMPHYTUM, Tourn. ex Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 1022.
ambiguum, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 32 = *officinale*, Linn.
stenophyllum, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 132 = *officinale*, Linn.
Ullepitschii X, Wettst. in A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 87. — Hung.
Wettsteini, Sennh. in *Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 69; et in *Bot. Centralbl.* xxxv. (1888) 60; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. II. (1893) 964. — Austria.
Zahlbruckneri X, G. Beck, l. c. 964. — Austria.

SYMPLECTOCHILUS, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 45 = **Adhatoda**, Tourn. (Acanth.).
formosissimus, Lindau, l. c. = *A. formosissima*, Klotzsch.

SYMPLOCOS, Jacq. (Styrac.). — Ind. Kew. ii. 1022.

anillana, Guerke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. I. (1891) 170 = *cubensis*, Griseb.
Benthami, Guerke, l. c. 172 (= *S. ciliata*, Benth.). — Mexic.
botryantha, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1887-88) 60. — Tibet.
buxifolia, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 206. — Borneo.
Clarkei, Guerke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. I. (1891) 170 (= *S. acuminata*, Bedd.). — Ind. or.
cubensis, Guerke, l. c. = *Lindeniana*, Krug & Urb.
Curtisii, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1757. — Penang.
deflexa, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 205. — Borneo.
fasciculata, Roxb. ex Vesque, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 153, in syn. = *Eurya fasciculata*, Wall.
guadeloupensis, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 337. — Ins. Guadal.
guianensis, Guerke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. I. (1891) 172 (= *Ciponima guianensis*, Aubl.). — Am. trop.
jamaicensis, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 330. — Jamaica.
Johniana, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 206. — Borneo.
laeteviridis, Stapf, l. c. 205. — Borneo.
lanata, Krug & Urban, in *B. t. Jahrb.* xv. (1892) 335. — Ins. Puerto-Rico.
latifolia, Krug & Urban, l. c. 334. — Ins. Puerto-Rico.
Lindeniana, Krug & Urban, l. c. — Cuba
luzoniensis, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 348, in obs. — Ins. Philipp.
Mezii, Zahlbr. in *Diss. Cl. Math.-Phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 230. — Peruvia.
micrantha, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 336. — Ins. Puerto-Rico.
montana, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 179 = *luzoniensis*, Rolfe.
paucistaminea, F. Muell. & F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 46. — Austral.
polyantha, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 333. — Ins. Puerto-Rico.
Pringlei, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 168. — Mexic.
Pseudo-spicata, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 179. — Ins. Philipp.
sessilifolia, Guerke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. I. (1891) 170 = *subsessilis*, Choisy.
Spruceana, Guerke, l. c. — Peruvia.
strigillosa, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 332. — Cuba.
theaeformis, Guerke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. I. (1891) 172 = *S. Alstonia*, L'Hérit.
tubulifera, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 331. — Jamaica.
Villarii, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 178. — Ins. Philipp.
zizyphoides, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 205. — Borneo.

SYNADENIUM, Boiss. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 1024.
piscatorium, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 125. — Afr. trop. or.
umbellatum, Pax, l. c. 125. — Afr. trop.
Volkensii, Pax, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — Afr. trop. or.

SYNANDRA, Nutt. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 1024.
hispidula, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 45; Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 285 = *grandiflora*, Nutt.

SYNAPTANTHA, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 24 = **Synaptantha**, Hook. f. (Rubiace.).

SYNAPTEA, Kurz = **SUNAPTEA**, Griff. = **Vatica**, Linn. (Dipteroc.).
astritricha, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 16 (1891) sub t. 241, sphalm. = seq.
astrotricha, Pierre, l. c. *Fasc.* 15 (1890) t. 240 = *Vatica astrotricha*, Ham.
Dyeri, Pierre, l. c. t. 241 = *V. Dyeri*, Pierre.
faginea, Pierre, l. c. t. 242, 255g = *V. faginea*, Dyer.

SYNAPTOLEPIS, Oliver (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 1024.
Kirkii, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 231, fig. 81 f, j. = *Oliveriana*, Gilg.
longiflora, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 276. — Afr. trop. austro-or.
macrocarpa, Gilg, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 284. — Afr. trop. or.
Oliveriana, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 276. — Afr. trop. austro or.
pachyphylla, Gilg, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 284. — Afr. trop. or.

SYNCARPIA, Tenore (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 1024.
glomulifera, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 88 (= *S. laurifolia*, Ten.). — Austral.

SYNCEPHALANTHUS, Benth. & Hook. f. = **Syncephalanthus**, Bartl. (Compos.).
macrophyllus, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 108. — Hab. ?
sanguineus, Klatt, l. c. 106. — Guatem., Costa-Rica.

SYNCHORISTE, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 442; Lindau, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 340. **ACANTHACEAE**.
rufopila, Baill. *ll. cc.* 443; et 340. — Madag.

SYNCLISIA, Benth. (Menisp.). — Ind. Kew. ii. 1024.
delagoensis, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1892) 196. — Afr. trop. austro-or.
leonensis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 72. — Sierra Leone.
zambesiaca, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1892) 496. — Zambesia.

SYNDECHITES, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1772. **APOCYNEAE**.
Henryi, Oliver, l. c. — China.

SYNDICLIS, Hook. f. *Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1515. **LAURINEAE**.
paradoxa, Hook. f. l. c.; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 127. — Reg. Himal.

SYNEPILAENA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 725; et *Hist. des pl.* x. (1888) 81. **GESNERACEAE**.
granatensis, Baill. *ll. cc.* — N. Granat.

SYNGONIUM, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 1025.
Dennell-Smithii, Engl. in *J. D. Smith, Enum. Pl. Guatem.* ii. (1891) 77. — Guatem.

SYNNEMA, Benth. = **Cardanthera**, Buch.-Ham. (Acanthac.).
africanum, Griffithii, *pinnatifidum*, *Thwaitesii*, *triflorum*, *uliginosum*, *verticillatum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 500 = *homonyma omnia* *Cardantherae*.
barbigera, Kuntze, l. c. = *C. balsamica*, Benth.

SYNPHORANTHERA *polystachya*, Boj. ex Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 442, in syn. = *Dialypetalum floribundum*, Benth. & Hook. f.

SYNSEPALUM, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 286. **SAPOTACEAE**.
dulcificum, Baill. l. c. 287 (= *Sideroxylon dulcificum*, A. DC.). — Afr. trop. occ.

SYNTHESISMA, Walt. = **Panicum**, Linn. (Gramin.)
filiformis, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 420 = *P. filiforme*, Linn.
linearis, Nash, l. c. = *P. glabrum*, Gaud.
sanguinalis, Nash, l. c. = *P. sanguinale*, Linn.

SYRENIA, Andr. ex DC. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1026
quadringula, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 69 = *sessiliflora*, Ledeb.

SYRINGA, Linn. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 1026.
alba, Dietr. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 112 = *vulgaris*, Linn.
Bretschneideri, Hort. Lemoin. ex Wittm. in Gartenfl. xxxiv. (1895) 499 = *S. Emodi*, Wall.
correlata, Al. Braun, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 114 = *dubia*, Pers.
metensis, Hort. ex Dippel, l. c. 114 = *dubia*, Pers.
rubra, Lodd. ex Dippel, l. c. = *dubia*, Pers.
Saugeana, Hort. ex Dippel, l. c. = *dubia*, Pers.
sempervirens, Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 613. — China occ.
tomentella, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 103. — China occ.
yunnanensis, Franch. in Rev. Hort. lxiii. (1891) 308. — China occ.

SYRINGODEA, Hook. f. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1026.
Flanaganii, Baker, in Kew Bull. (1893) 158. — Afr. austr.

SYRMATIUM, Vog. = **Hosackia**, Dougl. (Legumin.).
argophyllum, *cytisoides*, *decumbens*, *distichum*, *Hermannii*, *juncum*, *micranthum*, *nudatum*, *Ornithopus*, *procumbens*, *prostratum*, *sericeum*, *Veatchii* Greene, in Bull. Acad. Calif. ii. vi. (1886) 148-49 = *homonyma omnia* Hosackiae.
dendroideum, Greene, l. c. 146. — Ins. S. Cruz. (Calif.).
distichum, Greene, l. c. 148 = *Hosackia disticha*, Greene.

SYSTEMONODAPHNE, Mez. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 78; Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 276. **LAURINEAE**.
geminiflora, Mez, l. cc. (= *Goeppertia geminiflora*, Meissn.). — Guian.

SYZYGIUM, Gaertn. = **Eugenia**, Mich. (Myrtac.).
acutangulum, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 85 = *E. acutangula*, K. Schum.
Buettnerianum, Niedenzu, l. c. = *E. Buettneriana*, K. Schum.
operculatum, Niedenzu, l. c. = *E. operculata*, Roxb.
sandwicense, Niedenzu, l. c. = *E. sandwicensis*, A. Gray.
Smithii, Niedenzu, l. c. = *E. Smithii*, Spreng.

SZECHENYIA, Kanitz, Pl. exp. Szechen. in As. centr. collect. (1891) 60. **LILIACEAE**.
lloydoides, Kanitz, l. c. 60 t. 7, i. fig. 1-3. — China.

T

TABASCINA, Baill. Hist. des pl. x. (1891) 445; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 346. **ACANTHACEAE**.
Lindenii, Baill. l. cc. — Mexic.

TABEUBIA, Gomez (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 1028.

Caraiba, Bureau, in Kongl. Vet. Sv. Acad. (1893) 112, [Symb. Fl. Bras. centr. xl.] (= *Tecoma Caraiba*, Mart.). — Bras.
chrysantha, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 1. — Venezuela.
Dönnell-Smithii, J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 418 t. 26. — Guatem.
globiflora, Ernst, in Rev. cient. Univ. Venez. (1887) 133. — Venezuela.
longipes, Baker, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1738. — Guian. brit.
nodosa, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 236 = *nodosa*, Griseb.
obtusifolia, Bureau, in Kongl. Sv. Vet. Acad. (1893) 113 [Symb. Fl. Bras. centr. xl.] = *leucoxyla*, DC.
Palmeri, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 109 t. 11. — Mexic.
Roraimae, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 286 [Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 201.]. — Guian. angl.
serratifolia, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) (= *Tecoma serratifolia*, G. Don). — Ind. occ.
serratifolia, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 267 = *praec.*
setulosa, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 236 (= *Tecoma setulosa*, Griseb.). — Cuba.
spectabilis, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) (= *T. spectabilis*, Planch. & Linden). — Ind. occ., Venezuela.
trachycarpa, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 236 (= *T. trachycarpa*, Griseb.). — Cuba.

TABERNAEMONTANA, Plum. ex Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1028.
angolensis, Stapf, in Kew Bull. (1894) 23. — Angola.
anguinea, Hemsl. l. c. (1895) 136; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2397. — Ins. Salom.
arbores, J. N. Rose, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 206. — Guatem.
brachyantha, Stapf, in Kew Bull. (1894) 22. — Ins. Fernando Po.
contorta, Stapf, l. c. 23. — Afr. trop. occ.
crispiflora, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 148. — Gabon.
dipladeniflora, Stapf, in Kew Bull. (1894) 121. — Afr. trop. occ.
Donnell-Smithii, J. N. Rose, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 206. — Guatem.
durissima, Stapf, in Kew Bull. (1894) 24. — Afr. trop. or.
eglandulosa, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.
elegans, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.
Holstii, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 317. — Afr. trop. or.
inconspicua, Stapf, in Kew Bull. (1894) 120. — Afr. trop. or.
longepedunculata, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 113. — N. Guin.
nitida, Stapf, in Kew Bull. (1895) 22. — Afr. trop. or.
pachysiphon, Stapf, l. c. 22. — Afr. trop. or.
paisavelensis, Loesen, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 553. — Mexic.
punctulata, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 406. — N. Guin.
Stapfiana, Britten, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 25. — Afr. trop.
stenosiphon, Stapf, in Kew Bull. (1895) 23. — Afr. trop.
usambarensis, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 148. — Afr. trop. or.
Volkensii, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 316. — Afr. trop. or.

TABERNANTHE, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 783, et Hist. des pl. x. (1888) 196; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 146. **ACANTHACEAE**.
Iboga, Baill. l. c.; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2337. — Afr. trop. occ.

TACAZZEA, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1030.

Barteri, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 808 [sphalm. 88]. — Afr. trop. occ.
Brazzaeana, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 242. in nota 2. — Afr. trop.
conferta, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 247 [Taccazia]. — Abyss.
Kirkii, N. E. Br. l. c. 248. — Zambesia.
laxiflora, [Engl.?] Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92. nomen. — Afr. trop. or.
Martini, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 808, [sphalm. 88]. — Nubia.
nigritana, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 248 [Taccazia]. — Reg. Nigrit.
pedicellata, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 115. — Afr. trop. or.
Tholloni, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 807, [sphalm. 87]. — Angola.
venosa, Baill. l. c. 808, sphalm. 88 (= *Periploca venosa*, Hochst.). — Abyss.
verticillata, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 114. — Afr. trop. occ.
Welwitschii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 807 [sphalm. 87]. — Angola.

TACCA, Forst. (Taccac.). — Ind. Kew. ii. 1030.
integrifolia, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 288, in syn. = *laevis*, Roxb.
leontopetalodes, Kuntze. Rev. Gen. (1891) 704 = *pinnatifida*, Forst.

TACHIA, Aubl. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 1030.
Pavonii, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 93. — Peruvia vel Mexic.?

TACHIADENUS, Griseb. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 1030.
continentalis, Baker, in Kew Bull. (1895) 70. — Afr. centr. or.
longifolius, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 34. — Madag.

TACQANTHUS, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 832; et Hist. des pl. x. (1890) 426; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 308. **ACANTHACEAE**.
Pearcei, Baill. l. cc. 833; et 427 (= *Otanthus Pearcei*, Benth.). — Bolivia.

TACSONIA, Juss. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 1030.
boliviana, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 37. — Boliv.
coactilis, Mast. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 216. — Ecuad.
coccinea, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 164], *Vellozia*, 1885-88. Sec. edic. (1891) 23, t. 11. — Bras.

TAENIOPHYLLUM, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1031.
scaberulum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 77. — Travanc.
Paife, Drake, Illustr. Fl. Ins. Pacif. (1886) 311; et Fl. Polyn. Franc. (1892) 217. — Ins. Societ.
serrula, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 77. — Perak.

TAENIOPLEHRUM, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 283. **UMBELLIFERAE**.
Howellii, Coult. & J. N. Rose, l. c. 284. — Oregon.

TAFALLAEA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 565 = **TAFALLA**, Ruiz & Pav. = **Hedyosmum**, Sw. (Chloranth.).
arborescens, *Artocarpus*, *Bonplandiana*, *brasiliensis*, *callososerrata*, *cumbalensis*, *Dombeyana*, *Goudotiana*, *Grisebachii*, *integra*, *Lechleri*, *mexicana*, *nulans*, *parvifolia*, *Pseudoandromeda*, *Sprucei*, *Weddelliana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 565 = *homonyma omnia* Hedyosmi.
Mandonii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 565 = *H. Mandoni*, Solms.
glabrata, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 252 = *H. glabratum*, H. B. & K.

TAGETES, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1030.

aristata, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 109. — Mexic.

gigantea, Carr. in *Rev. Hort.* lviii. (1889) 107. — Bolivia.

ladera, T. S. Brandeg. in *Zoë*, i. (1890) 314. — Am. bor. occ.

linifolia, Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 120. — Mexic.

Mandonii, Schult. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 109. — Boliv.

Palmeri, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1883) 392. — Mexic.

Pringlei, S. Wats. l. c. xxiii. (1888) 279. — Mexic.

TAINIA, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1032.

cordata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 193. — Reg. Himal.

cordifolia, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1861. — Ins. Formosa.

coriifolia, Hook. f. *Century Ind. Orchids* (1895) 24 t. 36, sphalm. = cordata, Hook. f.

hastata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 821; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2092 = *Eulophia hastata*, Lindl.). — Assam.

Hookeriana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 8. — Penins. Mal.

khasiana, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 821; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2090. — Bengal.

latifolia, Benth, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 820 (= *Ania latifolia*, Lindl.). — Inl. or.

latilingua, Hook. f. l. c. 827; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2093. — Perak.

macrantha, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1860. — China.

maculata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 820. — Zeyl.

Maingayi, Hook. f. l. c. 822; et in *Hook. f. Icon. pl.* xix. (1889) t. 2094. — Penang.

minor, Hook. f. l. c. 821; et t. 2091. — Reg. Himal.

penangiana, Hook. f. l. c. 820; et t. 2089. — Penang.

promensis, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1883; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 820. — Pegu.

stellata, Pfliz. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1888) 153 (= *Eria stellata*, Lindl.). — Java.

TALAUMA, Juss. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 1032.

andamanica, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 372. — Ins. Andam.

Forbesii, King, l. c. 373. — Sumatra.

Kunstleri, King, l. c. — Penins. Mal.

lilifera, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 6 = *Magnolia pumila*, Andr.

phellocarpa, King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iii. II. (1891) 205 t. 47. ter. — Assam.

spongiocarpa, King, l. c. t. 47b. — Burma.

TALIGALEA, Aubl. = **Amasonia** Linn. f. (Verben.).

angustifolia, calycina, hirta, velutina, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 509 = *homonyma omnia* Amasoniae.

TALINELLA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* i. (1886) 569, Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b (1889) 59. **PORTULACEAE.**

Boiviniana, Baill. l. c. — Madag.

dauphinensis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 4. — Madag.

TALINUM, Adans. (Portul.). — Ind. Kew. ii. 1032.

brevicaule, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 446. — Mexic.

coahuilense, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 132. — Mexic.

teitense, Pax & Vathe, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 585; *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 176, nomen. — Afr. trop.

TALISIA, Aubl. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1032.

princeps, Oliver, ex *Gard. Chron.* (1888) 806; et in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1769. — Venezuela.

TAMARIX, Linn. (Tamarisc.). — Ind. Kew. ii. 1033.

austro-africana, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 183. — Afr. austr.

casica, Hort. Gall. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 9 = chinensis, Lour.

dahurica, « Willd. » ex Dippel, l. c. 11 = davurica, Willd.

kashgarica, Hort. Lemoine, ex *Gard. Chron.* (1893) i. 414. — As. centr.

Hausknechtiana, Niedenzu, in *Ind. lect. Lyc. reg. Hos. Braunsberg.* (1894) 5. — Graecia.

japonica, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 9 = chinensis, Lour.

phaleria, Niedenzu, in *Ind. lect. Lyc. reg. Hos. Braunsberg.* (1895) 5. — Graecia.

TAMONEA, Krassn. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 142 → **Miconia**, Ruiz & Pav. (Melast.).

albicans, andina, argyrophylla, atrata, ciliata, cubensis, epiphytica, fulva, holosericea, humilis, ibaguensis, laevigata, ligustroides, longifolia, macrophylla, minutiflora, nervosa, prasina, rubiginosa, speciosa, stenostachya, theaezans, tomentosa, Krassn. l. c. = *homonyma omnia* Miconiae.

TAMUS, Linn. (Dioscor.). — Ind. Kew. ii. 1034.

baccifera, St Lager, in *Cariot, Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 765 = communis, Linn.

TANACETUM, Tourn. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1034.

affine, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 313 = *Chrysanthemum Leucanthemum*, Linn.

alpinum, Simonk. l. c. = *C. Leucanthemum*, Linn.

auriculatum, Simonk. l. c. = *C. Leucanthemum*, Linn.

coronulatum, Simonk. l. c. = *C. Leucanthemum*, Linn.

corymbosum, Simonk. l. c. 312 = *C. corymbosum*, Linn.

darwasicum, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 317. — Turkest.

Gregorjewi, Krassn. in *Script. Hort. Univ. Petrop.* ii. 1. (1887-88) 16 [sp. collect.]. — Ross.

Leucanthemum, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 313 = *Chrysanthemum Leucanthemum*, Linn.

macrophyllum, Simonk. l. c. = *C. macrophyllum*, Walst. & Kit.

macropodium, Hemsl. & Lace, in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) 324. — Belutch. brit.

myrianthum, Franch. in *Bull. Soc. Phil. Paris*, Sér. VIII. iii. (1891) 144. — Tibet.

serotinum, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 312 = *Chrysanthemum Leucanthemum*, Linn.

Newesskyanum, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 374. — Turkest.

Pseudachillea, C. Winkl. l. c. 373. — Turkest.

rotundifolium, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 313 = *Chrysanthemum rotundifolium*, Waldst. & Kit.

subalpinum, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 312 = *Chrysanthemum Leucanthemum*, Linn.

Santolina, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 375. — Turkest.

schugnanicum, C. Winkl. l. c. 318. — Turkest.

setaceum, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) sub. t. 2365, in obs. (= *Pyrethrum setaceum*, Roem. & Schult.). —

subcorymbosum, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 312 = *Chrysanthemum subcorymbosum*, Schur.

tripinnatifidum, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2306. — Cachem.

TANARIUS, Rumpf, *Herb. Amboin.* iii. (1743) 190. t. 121 ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 619 =

Macaranga, Thou. (Euphorb.).

amboinensis, angolensis, Baillonianus, bancanus, bicolor, Brandisii, Chatinianus, cissifolius, confervus, cordifolius, coriaceus, cornutus, corymbosus, Cumin-

gii, cuneifolius, cupularis, Curtisii, cuspidatus, denticulatus, depressus, Diepenhorstii, digynus, divergens, Gambley, giganteus, Grayanus, Griffithianus, Har-

veyanus, heterophyllus, Heudelotii, hexandrus, hispidus, Hosei, Hulletii, hypoleucus, indicus, involucratulus, javanicus, Kingii, longistipulatus, Lowii, macro-

phyllus, Maingayi, Mappa, mauritianus, membranaeus, minutiflorus, monandrus, Mottleyanus, myrian-

thus, oblongifolius, obovatus, occidentalis, pachyphyl-
lus, perakensis, populifolius, prinosus, pustulatus, Roxburghii, secundus, Seemannii, sinensis, spinosus, stipulosus, strictus, subfalcatus, sumatranus, taiensis, tenuifolius, trichocarpus, trilobus, Vedelianus, veluti-

nus, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Macarangae.

borneensis, Kuntze, l. c. 620 = *M. trichocarpa*, Muell. Arg.

boutonioides, Kuntze, l. c. = *M. boutonioides*, Baill.

dioecus, Kuntze, l. c. = *M. dioica*, Muell. Arg.

flexuosus, Kuntze, l. c. = *M. indica*, Wight.

glaber, Kuntze, l. c. 619 = *M. Tanarius*, Muell. Arg.

gmelinifolius, Kuntze, l. c. = *M. gmelinaefolia*, King.

Helferi, Kuntze, l. c. = *M. minutiflora*, Muell. Arg.

Kurzii, Kuntze, l. c. 620 = *M. membranacea*, Kurz.

leptostachyus, Kuntze, l. c. (Cleidronis cfr.). — N. Caled.

megalophyllus, Kuntze, l. c. = *M. megalophylla*, Muell. Arg.

paniculatus, Kuntze, l. c. = *M. denticulata*, Muell. Arg.

pellatus, Kuntze, l. c. = *M. Roxburghii*, Wight.

rhizinodes, Kuntze, l. c. = *M. rhizinoides*, Muell. Arg.

roettlerioides, Kuntze, l. c. = *M. roettlerioides*, Baill.

rugosus, Kuntze, l. c. = *M. megalophylla*, Muell. Arg.

Teysmannii, Kuntze, l. c. = *M. Teysmanni*, Muell. Arg.

tomentosus, Kuntze, l. c. = *M. Roxburghii*, Wight.

Vieillardii, Kuntze, l. c. = *M. Vieillardii*, Muell. Arg.

TANULEPIS, Balf. f. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 215. **ASCLEPIADEAE.**

stenophylla, « Balf. f. » ex K. Schum. l. c. = *sphenophylla*, Balf. f.

TAONABO, Aubl. = **Ternstroemia**, Mutis.

andina, brasiliensis, Candolleana, carnosa, cernua, clusiaefolia, congestiflora, coriacea, crassifolia, cunei-

folia, delicatula, elongata, emarginata, flavescens, japonica, longipes, meridionalis, microcarpa, oleaefo-

lia, patens, Pavoniana, Schomburgkiana, Scortechinii, silvatica, Tapezapote, ulmifolia, umbellata, Szyszyl.

in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1895) 188-89 = *homonyma omnia* Ternstroemiae.

Jelskii, Zahlbr. in *Diss. Cl. Math. Phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 224. — Peruvia.

Lehmannii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 48. — Ecuad.

Stuebelii, Hieron. l. c. xxi. (1895) 320. — Columb.

Wallichiana, Szyszyl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1895) 188 = *Ternstroemia*

penangiana, Choisy.

TAPAGOMEA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 960

sphalm. = **TAPOGOMEA**, Aubl. = **Cephaëlis**, Sw. (Rubiace.)

TAPEINANTHUS, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 1036.

dubius, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1898) 236 (= *Carregnoa dubia*, Perez Lara). — Hisp.

TAPEINIA, Juss. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1036.

pumila, Baill. *Hist. des pl.* xiii. (1895) 149 = *margellancus*, Ker.

TAPEINACHILUS, Benth. & Hook. f. = **Tapeinocheilos**, Miq. (Scitam.).

acaulis, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 27. — N. Guin.

Holtrungii, K. Schum. l. c. 26. — N. Guin.

Naumannii, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 278. — N. Guin.

piniformis, Warb. l. c. 277. — N. Guin.

pubescens, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 356. — N. Guin.

Teysmannianus, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 277. — N. Guin.

TAPEINOSTELMA, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 53; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 267. **ASCLEPIADEAE**.

cafrum, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

TAPINANTHUS, Blume = **Loranthus**, Linn. *globiferus*, Mechow, Kraussianus, namaquensis, pentagonus, Preussii, prunifolius, verrucosus, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 267 = *homonyma omnia* Loranthi.

TAPINOSTEMMA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 257 = **Loranthus**, Linn.

Acacia, arabicum, gibberulum, nummularifolium, venustum, Van Tiegh. l. c. = *homonyma omnia* Loranthi.

TAPIRIRA, Aubl. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 1037.

fasciculata, Loesen, in Flora, lxxii. (1889) 76. — Bras.

TAPISCIA, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1928; Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 262. **SAPINDACEAE**. *sinensis*, Oliver, l. c. — China.

TAPURA, Aubl. (Chailletiac.). — Ind. Kew. ii. 1037.

africana, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 235 = T. Fischeri, Engl.

cucullata, Spruce, ex Baill. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 373 = *guianensis*, Aubl.

Fischeri, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C addend. (1895) 423. — Afr. trop. or.

TARAKTOGENOS, Hassk. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 1037.

Kunstleri, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix (1890) ii. 122. — Perak.

Kurzii, King, l. c. 123. — Burma.

Scortechini, King, l. c. 122. — Malaya.

tomentosa, King, l. c. — Perak.

TARASA, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 10. **MALVACEAE**.

Rahmeri, Phil. l. c. t. 1, fig. 1. — Chili.

TARAXACUM, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1039.

depressum, Coss. & Durieu, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 552 = *inaequilaterum*, Pomel.

Gregorjewi, Krassnow, in Script. Hort. Univ. Petrop. ii. (1887-88) 16 [sp. coll.]. — China.

Gremlii, Appel, ex Naegeli & Wehrli, in Mitt. Thurgauisch. Naturforsch. Gesellsch. ix. (1890) 150 = *officinale*, Weber [in Wigg.].

Haussknechtii, Uechtr. in Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 190; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vii. (1895) 49. — Graecia.

humifusum, Heldr. ex Nym. l. c. = *gymnanthum*, DC.

hyoseridifolium, Arv.-Touv. & Marc. d'Aymerie, in Lucante, Rev. de Bot. x. (1892) 651. — Gall. mer. occ.

Ibari, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 324. — Reg. Magell.

Neyraui, Debeaux, in Lucante, Rev. de Bot. ix. (1891) 255; et in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 259 = *obovatum*, DC.

TARAXACUM : —

nivale, Lange, ex Kihlm. in Meddel. Soc. Faun. et Fl. Fenn. (1888-91) 67; et in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 41 = *phymatocarpum*, J. Vahl.

Taraxacum, Karst. Deutschl. Fl. (1880-83) 1133; MacMill. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 15 = *officinale*, Weber.

TARAXIA, Raimann, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 216 = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.)

graciliflora, Raimann, l. c. = O. *graciliflora*, Hook. & Arn.

longiflora, Raimann, l. c. = O. *longiflora*, Nutt.

TARENNA, Gaertn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1038.

asiatica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *zeylanica*, Gaertn.

nigrescens, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 431. — N. Guin.

TARIRI, Aubl. = **Picramnia**, Sw. (Simarub.). *Antidesma*, Baill. Bot. médic. [Phan.] (1884) 880 = P. *Antidesma*, Sw.

ciliata, Baill. l. c. = P. *ciliata*, Mart.

pentandra, Baill. l. c. = P. *pentandra*, Sw.

TARRIETIA, Blume (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 1038.

actinophylla, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 63. — Austral.

Carroni, C. Moore, l. c. = *argyrodendron*, Benth. *cochinchinensis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 13 (1889) t. 205. — Cochinch.

Curtisii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 77. — Penang.

Kunstleri, King, l. c. — Penang.

perakensis, King, l. c. — Perak.

TAUBERTIA, K. Schum. ex Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 3. **MENISPERMACEAE**. *peltata*, K. Schum. l. c. 4. — Bras.

TAXILLUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 256 = **Loranthus**, Linn.

bracteatus, Van Tiegh. l. c. = L. *bracteatus*, Heyne.

recurvus, Van Tiegh. l. c. = L. *recurvus*, Wall.

tomentosus, Van Tiegh. l. c. = L. *tomentosus*, Heyne.

TAXODIUM, Rich. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 1039.

pyramidatum, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 153 = *distichum*, Rich.

virens, Hort. ex Beissn. l. c. 155 = *mexicanum*, Carr.

TAXOTROPHIS, Blume (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1039.

ilicifolia, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 349. — Ins. Philip.

TAXUS, [Tourn.] Linn. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 1039.

elavstonensis, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 176 = *baccata*, Linn.

minor, Britton, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 167, et v. (1893-94) 19 = *canadensis*, Willd.

TECLEA, Delile = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).

unifoliolata, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 591. — Ins. Comor.

TECOMA, Juss. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 1039.

amazonica, Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 238. — Reg. Amazon.

bipinnata, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 102. — Burma.

dura, Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 238. — Guian.

evenia, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 8. — Guatem.

TECOMA : —

filicifolia, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 13 [filicifolium]. — Ins. Fiji.

hybrida, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 48 = *chinensis*, C. Koch.

Lapacho, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 238 (= T. *flavescens*, Griseb.). — Reg. Amazon.

obscura, Bureau & K. Schum. l. c. — Reg. Amaz.

pratensis, Bureau & K. Schum. l. c. — Reg. Amaz.

Ricasoliana, Tanfan, in Bull. Soc. Tosc.ortic. (1887) 17 t. 1-2; et in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 103 = T. *Maikenii*, S. Wats.

shirensis, Baker, in Kew Bull. (1894) 30. — Zambesia.

Smithii X, Hort. ex Gartenfl. xlv. (1895) 51. cum xylogr. — Hybr. artef.

villosa, Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 238 (= *Bignonia villosa*, Vahl). — N. Granat.

TECOMANTHE, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 41; Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 230. **BIGNONIACEAE**.

Bureavii, Baill. l. c. — N. Guin.

TECOMARIA, Spach = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).

alata, Baill. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 230 = T. *Guarume*, DC. [Conf. Baill. Hist. des pl. x. (1888) 41].

fulva, Baill. l. c. = T. *fulva*, G. Don.

Nyassae, Baill. l. c. = T. *Nyassae*, Oliver.

TEINOSOLEN, Hook. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1041.

Jamesonii, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 27. — Am. austr. occ.

TEKELIA, Adans. Fam. des pl. ii. (1763) 497, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 702 = **Libertia**, Spreng. (Irid.).

formosa, Kuntze, l. c. = L. *formosa*, R. Grh.

grandiflora, Kuntze, l. c. = L. *grandiflora*, Sweet.

ixioides, Kuntze, l. c. = L. *ixioides*, Spreng.

micrantha, Kuntze, l. c. = L. *pulchella*, Spreng.

paniculata, Kuntze, l. c. = L. *paniculata*, Spreng.

pulchella, Kuntze, l. c. = L. *pulchella*, Spreng.

sessiliflora, Kuntze, l. c. = L. *caerulescens*, Kunth.

triccoca, Kuntze, l. c. = L. *triccoca*, Lem.

TELANTHERA, R. Br. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 1041.

stellata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 436 = *Alternanthera stellata*, Uline & Bray.

Tuerckheimii, Vathe [fide J. D. Smith] ex Uline & Bray, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 161 = *Gomphrena Tuerckheimii*, Uline & Bray.

TELECTADIUM, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 801. **ASCLEPIADEAE**.

edule, Baill. l. c. — Laos.

TELIS, Linn. = **Trigonella**, Linn. (Legumin.).

aleppica, anguina, arabica, arcuata, astroites, auran-tiaca, azurea, Balansae, berythea, calliceris, capitata, caviensis, Cassia, cephalotes, corniculata, crassipes, cretica, cylindracea, elliptica, Emodi, falcata, filipes, Fischeriana, Foenumgracum, gladiata, gracilis, graeca, grandiflora, Griffithii, halophila, hamosa, isthmocarpa, laciniata, lilacina, lunata, macrorhyn-cha, maritima, monspeliaca, Noëana, occulta, persica, plicata, polycarpa, polycerata, pubescens, radiata, raphanina, retrorsa, rhytidocarpa, rigida, rostrata, Sibthorpii, smyrnea, spicata, spinosa, Spruneriana, stellata, stragulata, striata, suavissima, subracemosa, uncata, velutina, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 209 = *homonyma omnia* Trigonellae.

brachuca, Kuntze, l. c. 209 = T. *polycerata*, Linn.

cachemiriana, Kuntze, l. c. = T. *Emodi*, Benth.

coelestria, Kuntze, l. c. = T. *coelestria*, Boiss.

coerulea, Kuntze, l. c. = T. *caerulea*, Ser.

Fenzlii, Kuntze, l. c. = T. *Kotschyi*, Fenzl.

glomerata, Kuntze, l. c. = T. *brachycarpa*, Moris.

hierosolymitana, Kuntze, l. c. = T. *hierosolymitana*, Boiss.

TELIS : —

Kotschyi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 209 = *Trigonella rytidocarpa*, Boiss.
incisa, Kuntze, l. c. = *T. polycerata*, Linn.
monantha, Kuntze, l. c. = *T. polycerata*, Linn.
ornithopodioides, Kuntze, l. c. = *T. ornithopodioides*, DC.
orthoceras, Kuntze, l. c. = *T. polycerata*, Linn.
ovalis, Kuntze, l. c. = *Medicago ovalis*, Urban.
procumbens, Kuntze, l. c. = *Trigonella Besseriana*, Ser.

TELLIMA, R. Br. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii, 1042.
nudicaulis, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1891) 162. — Am. bor. occ.
racemosa, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 55 (= *Heuchera racemosa*, S. Wats.).
scabrella, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1891) 162. — Calif.
tripartita, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 106. — Calif.

TELOTIA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 754; Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 275. **MENISPERMA-CEAE**.
nodiflora, Pierre, *ll. cc.* — Cochinch.

TEMNOLEPIS, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 495. **COMPOSITAE**.
scrophulariaefolia, Baker, l. c. — Madag.

TEMPLETONIA, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1043.
Battii, F. Muell. in Melb. Chem. and Drug. New Ser. ii. (Febr. 1887) 31; et *ex Bot. Centralbl.* xxx. (1887) 180. — Austral.

TENAGOCARIS, Hochst. = **Butomopsis**, Kunth (Alismac.).
lanceolata, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 86 = *cordofanus*, Hochst.
lanceolata, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 489 = *praec.*

TENARIS, E. Mey. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1043.
chlorantha, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 44. — Afr. austr.
Volkenii, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 327 = *rostrata*, N. E. Br.

TEPHROCACTUS, Lem. = **Opuntia**, Tourn. (Cact.).
polyacanthus, Lemaire, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 915 = *Opuntia platyacantha*, Pfeiff.
retrospinosus, Lemaire, l. c. 911 [*retrospinosus*] = *O. Parmentieri*, Pfeiff.

TEPHROSIA, Pers. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1043.
affinis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 424. — Mexic.
alpestris, Taub. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58, 62; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 212. — Afr. trop. or.
angustissima, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 29. — Afr. austr.
cana, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 126. — Calif.
Commersonii, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 13 = *Galega pumila*, Lam.
constricta, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 46. — Mexic.
damarensis, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 29. — Afr. austro occ. extratrop.
dura, Baker, in Kew Bull. (1894) 331. — Arabia.
elata, Defters, Voy. au Yémen (1889) 130. — Arabia.
geminiflora, Baker, in Kew Bull. (1895) 316. — Arabia.
grandiflora, Nichols, Dict. Gard. iv. (1887) 17. — Afr. austr.
Haussknechtii, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 54. — Arabia.

TEPHROSIA : —

Holstii, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 211. — Afr. trop. or.
hypargyrea, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62. nomen. — Afr. trop.
incana, Grah. ex Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 15. 21. 53. 74 = *villosa*, Pers.
leucoclada, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix (1891) 13. — Madag.
macrantha, Robinson & Greenm. ex Pringle, in Gard. and For. vii. (1894) 153, 175. — Mexic.
Meyeri-Johannis, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 260. — Afr. trop. or.
Nyassae, E. G. Baker, in Trans. Linn. Soc. S. r. II. iv. (1894) 9. — Afr. trop.
oraria, Hance, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 17. — Ins. Hongkong.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 46. — Mexic.
Purissimae, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 149. — Calif.
Schweinfurthii, Defters, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 302. — Arabia.
talpa, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 405. — Mexic.
Whyteana, E. G. Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 9. — Afr. trop.

TEREBINTHINA, Rumph. Herb. Amboin. vi. (1750) 150, t. 67, fig. 2, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 477 = **Linnophila**, R. Br. (Scrophul.).
aquatica, Kuntze, l. c. 468 = *L. polystachya*, Benth.
aromatica, Kuntze, l. c. 467 = *L. gratissima*, Blume.
balsamea, Kuntze, l. c. 468 = *L. balsamea*, Benth.
camphorata, Kuntze, l. c. = *L. diffusa*, Benth.
cana, Kuntze, l. c. = *L. cana*, Griff.
connata, Kuntze, l. c. = *L. hypericifolia*, Benth.
erecta, Kuntze, l. c. 467 = *L. erecta*, Benth.
glabra, Kuntze, l. c. 468 = *L. Griffithii*, Hook. f.
Helferi, Kuntze, l. c. = *L. Helferi*, Hook. f.
indica, Kuntze, l. c. 467 = *L. gratioides*, R. Br.
javanica, Kuntze, l. c. = *L. javanica*, A. DC.
laxa, Kuntze, l. c. = *L. laxa*, Benth.
micrantha, Kuntze, l. c. 468 = *L. micrantha*, Benth.
polyantha, Kuntze, l. c. = *L. polyantha* Kurz.
punctata, Kuntze, l. c. = *L. conferta*, Benth.
pygmaea, Kuntze, l. c. 467 = *L. pygmaea*, Hook. f.
racemosa, Kuntze, l. c. 468 = *L. racemosa*, Benth.
rugosa, Kuntze, l. c. = *L. Roxburghii*, G. Don.
sessiliflora, Kuntze, l. c. = *L. sessiliflora*, Blume.
tillaeoides, Kuntze, l. c. = *L. tillaeoides*, Hook. f.
villifera, Kuntze, l. c. 467 = *L. villifera*, Miq.
villosa, Kuntze, l. c. = *L. villosa*, Blume.

TERMINALIA, Linn. (Combret.). — Ind. Kew. ii. 1046.
albida, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 79. — Sierra Leone.
Brandisii, Engl. ex Brandis, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 118. — Afr. trop. or.
canescens, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 520; et in Sitzb. Akad. Muench. xx. (1890) 129, in obs (= *Alectryon canescens*, DC.) = *circumalata*, F. Muell.
canescens, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 294. — Afr. trop. or.
complanata, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 83. — N. Guin.
corticiosa, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 315. — Cochinch.
Darfeuillana, Pierre, l. c. 314. — Cochinch.
elegans, Hort. ex Kew Bull. ii. (1888) 117 = *Polyscias paniculata*, Baker.
Fischeri, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 294. — Afr. trop. or.
glauca, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 314, nomen. — Cochinch.
Hildebrandtii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 294. — Afr. trop. or.
Holstii, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et l. c. — Afr. trop. or.

TERMINALIA : —

inguovenulosa, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 315. nomen. — Cochinch.
Kaernbachii, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 201. — N. Guin.
Kaiseriana, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 26. — Afr. trop.
kilimandscharica, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 294. — Afr. trop. or.
nyassensis, Engl. l. c. — Afr. trop. or.
Oliveri, Brandis, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2202. — Burma.
Petersii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 294. — Afr. trop. or.
porphyrocarpa, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 242. — Afr. austro-occ. extra trop.
Rautanenii, Schinz, l. c. 243. — Afr. austro-occ. extratrop.
rubiginosa, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 84. — N. Guin.
spinosa, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 294. — Afr. trop. or.
Stuhlmannii, Engl. l. c. — Afr. trop. or.
torulosa, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 27. — Afr. trop.
triptera, Stapf, in Kew Bull. (1895) 103. — Ins. Langkau.

TERMINALIS, Rumph. Herb. Amboin. iv. (1744) 79, t. 34; vii. (1755) 40, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 716 = **Cordyline**, Royen (Liliac.).
australis, Banksii, floribunda, indivisa, linearifolia, neocaledonica, oxyphylla, Fumilio, rigida, rubra, stricta, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 716 = *homonyma omnia* Cordylines.
dracaenodes, Kuntze, l. c. = *Cordyline dracaenoides*, Kunth.
fruticosa, Kuntze, l. c. = *C. terminalis*, Kunth.
Marchionae, Kuntze, l. c. = *C. Haageana*, C. Koch.
mauritiana, Kuntze, l. c. = *C. macrophylla*, C. Koch.
obtecta, Kuntze, l. c. = *C. Baueri*, Hook. f.

TERNATEA, Linn. = **Clitoria**, Linn. (Legum.).
amazonum, arborescens, australis, biflora, brachystegia, densiflora, flagellaris, grandiflora, guianensis, heterophylla, javitensis, lasciva, leptostachya, macrophylla, Mariana, multiflora, nana, polystachya, portobellensis, racemosa, rufescens, Selloi, simplicifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 210 = *homonyma omnia* Clitoriae.
arbores, Kuntze, l. c. = (*C. arbores*, Benth.) = *C. Hoffmannseggii*, Benth.
bracteata, Kuntze, l. c. = *C. stipularis*, Benth.
Hanceana, Kuntze, l. c. = *C. Hanceana*, Hemsl.
laurifolia, Kuntze, l. c. = *C. cajanifolia*, Benth.
pedunculata, Kuntze, l. c. = *C. pedunculata*, Boj.
rubiginosa, Kuntze, l. c. = *C. glycinoides*, DC.
Schiedeana, Kuntze, l. c. = *Centrosema pubescens*, Benth.

TERNSTROEMIA, Mutis (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 1047.
alnifolia, Wawra, in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1886) 275. — Bras.
andina, Wawra, l. c. 278. — N. Granat.
Candolleana, Wawra, l. c. 273. — Bras.
laevigata, Wawra, l. c. 281. — Guian. angl.
Lowii, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 132. — Bernaeo.
oleaefolia, Wawra, in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1886) 279. — Bras.
Scortechinii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) II. 193. — Malaya.

TESTUDINARIA, Salisb. (Dioscor.). — Ind. Kew. ii. 1048.
Cocolmea, Procop, in Bot. Centralbl. xlix. (1892) 201. — Mexic.

TETRACENTRON, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1892; Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 273. **MAGNO-LIACEAE**.
sinense, Oliver, *ll. cc.* — China.

TETRACERA, Linn. (Dilleniace.). — Ind. Kew. ii. 1049.

axillaris, *Martelli*, in *Becc. Malesia*, iii. (1886) 151. — Borneo.

Billardieri, *Martelli*, l. c. 152 (= *T. euryandra*, Labill.). — N. Caled.

Cowleyana, *F. M. Bailey*, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* v. (1892) 7. — Austral.

Empedoclea, *Gilg*, in *Engl. & Prantl, Naturl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 111 (= *Empedoclea alnifolia*, St Hil.). — Bras.

Everillii, *F. Muell. Descr. Notes Papuan Pl.* vii. (1886) 25. — N. Guin.

glaberrima, *Martelli*, in *Becc. Malesia*, iii. (1886) 150. — Borneo.

grandis, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 363. — Penins. Mal.

grandiuscula, *F. Muell. & Tate*, in *Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xiii. (1890) 108 [grandiuscula]. — Austral.

moluccana, *Martelli*, in *Becc. Malesia*, iii. (1886) 153. — Ins. Amboin.

Radula, *Martelli*, l. c. — Borneo.

Stuhlmanniana, *Gilg*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 272. — Afr. trop. or.

Teysmannii, *Martelli*, in *Becc. Malesia*, iii. (1886) 150. — Ins. Banca.

TETRACERATIUM Kuntze, Rev. Gen. (1891) 36 = **Tetraceme**, Bunge (Crucif.).

tontorium, *quadriflorum, recurvatum, secundum, Stockii*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia generis Tetracmes*.

TETRACHNE, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. li. 1049.

aristulata, *Hackel & Rendle*, ex *S. Elliot*, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 72. — Afr. austro-occ. extratrop.

TETRACHONDRA, Petrie, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2250. **BORAGINEAE**. Hamiltonii, *Petrie*, l. c. (= *Tillaea Hamiltonii*, T. Kirk). — N. Zel.

TETRACHYRON, Schlecht. = **Calea**, Linn. (Compos.).

orizabaensis, *Sch. Bip.* ex *Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 145, in syn. = *Calea orizabaensis*, *Klatt*.

TETRACRONIA, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 285a. **RUTACEAE**.

cymosa, *Pierre*, l. c. — Cochinch.

TETRACUSTELMA, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 292. **ASCLEPIADEAE**.

prostrata, *Baill.* l. c. 3 (= *Lachnostoma prostratum*, Decne). — Mexic.

Schaffneri, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Naturl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 304. — Mexic.

TETRADENIA, Briq. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 1049.

Goudotii, *Briq.* in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 132. — Madag.

Hildebrandtii, *Briq.* l. c. 134. — Madag.

TETRAENA, Maxim. Enum. pl. Mongol. (1889) 129. **ZYGOPHYLLACEAE**.

mongolica, *Maxim.* l. c. 129. — Mongol.

TETRAGASTRIS, Gaertn. = **Hedwigia**, Sw. (Bursar).

balsamifera, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 107 = *H. panamensis*, Sw.

Hostmanni, *Kuntze*, l. c. = *H. Hostmanni*, *Engl.*

panamensis, *Kuntze*, l. c. = *H. panamensis*, *Engl.*

TETRAGONANTHUS, S. G. Gmel. = **Halenia**, Borkh. (Gentian.).

alatus, *brevicornis, decumbens, deflexus, Dombeyanus, elatus, elongatus, gracilis, inaequalis, longicornis, major, multiflorus, nudicaulis, nutans, parviflorus, pauciflorus, Palmeri, Perrottetii, pinifolius, plantagineus, Purdieanus, Schiedeanus*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 431 = *homonyma omnia Haleniae*.

Centrostemma, *Kuntze*, l. c. = *H. elliptica*, *D. Don*.

corniculatus, *Kuntze*, l. c. = *H. sibirica*, *Borkh.*

TETRAGONANTHUS : —

Fischeri, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 431 = *Halenia sibirica*, *Borkh.*

gentianodes, *Kuntze*, l. c. = *H. gentianoides*, *Wedd.*

hypericoides, *Kuntze*, l. c. = *H. hypericoides*, *Griseb.*

umbellatus, *Kuntze*, l. c. = *H. Pavoniana*, *G. Don*.

TETRAGONIA, Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 1050.

dimorphantha, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 12. — Afr. austro-occ. extratrop.

horrida, *Britton*, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 122. — Parag.

macroptera, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 11. — Afr. austro-occ. extratrop.

Schenkii, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 204. — Afr. austro-occ. extratrop.

tetragonoides, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 264 = *T. expansa*, *Murr.*

trigona, *Phil.* in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 24. — Chili.

TETRAGONOLOBUS, Scop. = **Lotus**, Tourn. (Legumin.).

Bivonaeus, *Ces.*, *Passer. & Gibelli*, *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 707 = *L. Bivonaeus*, *Guss.*

TETRAGONOTHECA, Dill. ex Linn. (Compos.). Ind. Kew. ii. 1050.

guatemalensis, *Coult.* in *J. D. Smith, Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 38, nomen; et *Bot. Gaz.* xvi. 99. — Guatem.

TETRAMERIUM, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 1051.

costatum, *Müllsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. I.* (1895) 47. — Am. bor.

glutinosum, *Lindau*, ex *Loesen*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 565. — Mexic.

TETRAMICRA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1051.

minuta, *Rolfe*, in *Gard. Chron.* (1889) i. 526 (= *Lep-totes minuta*, *Rolfe*). — Hab. ?

serrulata, *Nichols. Dict. Gard.* iv. (1887) 30 = *Lep-totes serrulata*, *Eindl.*

TETRAMOLOPIUM, Nees (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1051.

arenarium, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 199 (= *Vittadinia arenaria*, *A. Gray*). — Ins. Sandvic.

Chamissonis, *Hillebr.* l. c. (= *V. Chamissonis*, *A. Gray*). — Ins. Sandvic.

consanguineum, *Hillebr.* l. c. (= *V. consanguinea*, *A. Gray*). — Ins. Sandvic.

conyzoides, *Hillebr.* l. c. 200 (= *V. conyzoides*, *A. Gray*). — Ins. Sandvic.

humile, *Hillebr.* l. c. 198 (= *V. humilis*, *A. Gray*). — Ins. Sandvic.

TETRANEMA, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1051.

evoluta, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 29. — Guatem.

TETRAPLACUS, Radlk. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1053.

Tauberti, *Mez*, ex *Taub.* in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 16 (= *Oltacanthus coerules*, *Lindl.* fide *Taub.*). — Bras.

TETRAPLASANDRA, A. Gray (Arab.). — Ind. Kew. ii. 1053.

Kaalae Harms, in *Engl. & Prantl, Naturl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 30 (= *Triplandra Kaalae*, *Hillebr.*). — Ins. Sandvic.

Lydgatei, *Harms*, l. c. (= *T. Lydgatei*, *Hillebr.*). — Ins. Sandvic.

meiandra, *Harms*, l. c. (= *T. meiandra*, *Hillebr.*). — Ins. Sandvic.

oahuensis, *Harms*, l. c. 30. — Ins. Sandvic.

TETRAPLEURA, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1053.

tetraptera, *Taub.* in *Bot. Centralbl.* xlvii. (1891) 395 = *T. Thonningii*, *Benth.*

TETRAPOGON, Desf. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1053.

spathaceus, *Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 864 (= *Chloris spathacea*, *Hochst.*). — Afr. trop. or. et austr.

TETRAPTERIS, Cav. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 1053.

rhodopteron, *Oliver*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 272 (*Oliver*, ex *im Thurn*, in *Timehri*, v. (1886) 190.). — Guian. angl.

TETRARIA, Beauv. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 1054.

aristata, *C. B. Clarke*, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 659 (= *Elynanthus aristatus*, *Boeck.*). — Afr. austr.

Bolusii, *C. B. Clarke*, l. c. 659. — Afr. austro-or. et austr.

brevicaulis, *C. B. Clarke*, l. c. — Afr. austr.

Burmanni, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Chaetospira Burmanni*, *Spreng.*). — Afr. austr.

capillacea, *C. B. Clarke*, l. c. (= *C. capillacea*, *Nees*). — Afr. austr.

circinalis, *C. B. Clarke*, l. c. (= *C. circinalis*, *Schrad.*). — Afr. austr.

compar, *C. B. Clarke*, l. c. 660 (= *Elynanthus compar*, *Nees*). — Afr. austr.

crinifolia, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Aulacorrhynchus crinifolius*, *Nees*). — Afr. austr.

cuspidata, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Elynanthus cuspidatus*, *Nees*). — Afr. austr.

Dregeana, *C. B. Clarke*, l. c. 661 (= *E. Dregeanus*, *Boeck.*). — Afr. austr.

eximia, *C. B. Clarke*, l. c. nomen. — Afr. austr.

fasciata, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Elynanthus microstachys*, *Boeck.*). — Afr. austr.

fimbriolata, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Chaetospira fimbriolata*, *Nees*). — Afr. austr.

flexuosa, *C. B. Clarke*, l. c. (= *C. flexuosa*, *Schrad.*). — Afr. austr.

involucrata, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Sclerochaetium involucratum*, *Nees*). — Afr. austr.

ligulata, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Elynanthus ligulatus*, *Boeck.*). — Afr. austr.

Mac Owani, *C. B. Clarke*, l. c. nomen. — Afr. austr.

nigrovaginata, *C. B. Clarke*, l. c. 662 (= *Cyathocoma nigrovaginata*, *Nees*). — Afr. austr.

picta, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Elynanthus pictus*, *Boeck.*). — Afr. austr.

pleosticha, *C. B. Clarke*, l. c. nomen. — Afr. austr.

punctoria, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Buekia punctoria*, *Nees*). — Afr. austr.

robusta, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Chaetospira robusta*, *Kunth*). — Afr. austr.

Rottboellii, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Lepidosperma Rottboellii*, *Schrad.*). — Afr. austr.

rottboellioides, *C. B. Clarke*, l. c. 663 (= *Sclerochaetium angustifolium*, *Hochst.*). — Afr. austr.

secans, *C. B. Clarke*, l. c. nomen. — Afr. austr.

spiralis, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Sclerochaetium spirale*, *Hochst.*). — Afr. austr.

sylvatica, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Elynanthus sylvaticus*, *Nees*). — Afr. austr.

thermalis, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Lepidosperma thermale*, *Schrad.*). — Afr. austr.

triangularis, *C. B. Clarke*, l. c. (= *L. triangulare*, *Boeck.*). — Afr. austr.

usambarensis, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 128. — Afr. trop. or.

ustulata, *C. B. Clarke*, l. c. 664 (= *Elynanthus ustulatus*, *Nees*). — Afr. austr.

Wallichiana, *C. B. Clarke*, l. c. nomen. — Afr. austr.

TETRASTIGMA, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 423 = **Vitis**, [Tourn.] Linn. (Ampelid.).

amboinense, *Planch.* in DC. Monog. Phan. v. (1887) 443 = *V. amboinensis*, *Miq.*

angustifolium, *Planch.* l. c. 439. — Sumatra.

articulatum, *Planch.* l. c. = *Vitis articulata*, *Miq.*

bracteolatum, *Planch.* l. c. 428 = *V. bracteolata*, *Wall.*

campylocarpum, *Planch.* l. c. 437 = *V. campylocarpa*, *Kurz.*

TETRASTIGMA : —

- capreolatum*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 401 = *serrulatum*, Planch.
crassipes, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 426. — Cochinch.
dichotomum, Planch. l. c. 441 = *Vitis dichotoma*, Miq.
dubium, Planch. l. c. 437 = *V. dubia*, Laws.
erubescens, Planch. l. c. 444. — Tonkin.
Gaudichaudianum, Planch. l. c. 435. — Cochinch.
glabratum, Planch. l. c. 430 (= *Cissus glabrata*, Blume). — Java.
glycosmoides, Planch. l. c. 426. — Zeylan.
Godefroyanum, Planch. l. c. 436. — Siam.
Harmandi, Planch. l. c. 425. — Cochinch.
Hookeri, Planch. l. c. 428 = *Vitis Hookeri*, Laws.
hypoglaucum, Planch. l. c. 433. — Yunnan.
lanceolarium, Planch. l. c. 433 = *Vitis lanceolaria*, Wall.
mutabile, Planch. l. c. 440 = *V. mutabilis*, Miq.
obtectum, Planch. ex Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 458; et l. c. 434; Franch. Pl. Delav. (1889) 138 = *Cissus oblecta*, Wall.). — Reg. Himal. China mer.
oliviforme, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 438. — Cochinch.
papillosum, Planch. l. c. 429 (= *Cissus papillosa*, Blume). — Java.
papuanum, Planch. l. c. 442 = *Vitis papuana*, Miq.
pedunculare, Planch. l. c. 438 = *V. peduncularis*, Wall.
pergamaceum, Planch. l. c. 431. — Ind. batav.
pisicarpum, Planch. l. c. 441 = *Vitis pisicarpa*, Miq.
quadridens, Planch. l. c. 445. — Cochinch.
Rafflesiae, Planch. l. c. 443 = *Vitis Rafflesiae*, Miq.
ramentaceum, Planch. l. c. 430 (= *Cissus glabrata*, Blume). — Java.
retinervium, Planch. l. c. 444. — Tonkin.
robustum, Planch. l. c. 443. — Cambod.
rumicispermum, Planch. l. c. 429 = *Vitis rumicis-perma*, Laws.
rustre, Planch. l. c. 435. — Tonkin.
scariosa, Planch. l. c. 441 (= *Cissus scariosa*, Blume). — Java.
serrulatum, Planch. l. c. 432 (= *C. serrulata*, Roxb.). — Ind. or.
subsuberosum, Planch. l. c. 445. — Cochinch.
tetragynum, Planch. l. c. 440 = *Vitis tetragyna*, Miq.
Thomsonianum, Planch. l. c. 439, in obs. — Silhet.

TETRASTYLIDIUM, Engl. (Oclac.). — Ind. Kew. ii. 1054.
 Engleri, Schwacke, in Bot. Jahrb. x. (1888) 291; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. I. (1889) 235. — Bras.

TETRAZYGIA, Rich. ex DC. (Melastom.). — Ind. Kew. ii. 1051.
 bicolor, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 724 (= *Miconia bicolor*, DC.). — Cuba, Baham.
 Krugii, Cogn. l. c. 719. — Ins. Puerto-Rico.
 pallens, Cogn. l. c. 724 (= *Miconia pallens*, Triana). — Ind. occ.
 Stahlil, Cogn. ex Stahl, Estud. Fl. Puerto-Rico, iv. (1886) 113; in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 279; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 719. — Ins. Puerto-Rico.
 Urbanii, Cogn. l. c. iv. (1886) 278; et vii. (1891) 719. — Ins. Portoric.
 villosa, Cogn. l. c. 721. — Ins. Domin.

TEUCRIUM, [Tourn.] Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 1055.
 ajugaceum, F. M. Bailey & F. Muell. in F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. ii. (1888) 48. — Austral.
 Albarracini, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 19 = *T. Chamaedrys*, Linn.
 albo-rubrum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 311. — China.
 ambiguum, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 196. — Hisp.
 arisitense X. Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1892) 584. — Gall.

TEUCRIUM : —

- aristatum*, Perez Lara, in Annal. Soc. Esp. Hist. Nat. xviii. (1889) 90; Florul. Gadit. iii. (1886-92) 288; Willk. Illustr. Fl. Hisp. ii. (1886-93) 96 tab. 144. — Hisp.
auranticum, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 440. — As. occ.
bidentatum, Hemsl. l. c. xxvi. (1891) 312. — China.
cebenense X. Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 582; et in Bull. Herb. Boiss. iii. App. i. (1895) 17. — Gall.
Contejani X. Giraudias, in Bull. Soc. étud. sci. Angers (1888) 16; et (1889) 52. — Pyren. gall.
corbariense X. Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 583. — Gall. mer.
Davaeanum, Coss, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 102, 105. — Cyrenaica.
expansum, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. ii. (1889) 14; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 162. — Hisp.
flavovirens, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 714 = *T. Polium*, Linn.
floccosum, Coincy, in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 66; et Eclog. alt. Pl. Hisp. (1895) 22 t. 9. — Hisp.
Franchetianum, Rouy & Coincy, in Coincy, Eclog. Fl. Hisp. (1893) 20 t. 8. — Hisp.
Freynii, Reverchon, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 159. — Hisp.
Gautieri X. Fouc. ex Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 581, in obs. — Gall.
leucanthum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 565. — Chili.
Mailhoi X. Giraudias, in Bull. Soc. étud. sci. Angers (1890) 56, et (1891) 72. — Pyren. gall.
Nashii, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 484. — Florida.
ningpoense, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 313. — China.
nummularifolium, Baker, in Kew. Bull. (1895) 185. — Arabia.
ornatum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 313. — China.
Perryi, « Franch. » ex Briq. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 213. sphalm. = *T. Pernyi*, Franch.
pilosum, Aschers. & Schweinf. Illustr. Fl. Égypte (1887) 189, in add. — Arabia.
Reverchoni, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 53; et Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 160. — Hisp.
ruthense X. Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 586. — Gall. mer.
scindicum, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 316. — Ind. or.
Townsendii, Vasey & J. N. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xii. (1890) 146. — Ins. Clarion.
Wattii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 317. — Ind. or.
Willkommii, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 315. — Ins. Balear.
Yebrudi, Pl. Postianae, ii. (1892) 15. — Syria.
yemensense, Deflers, Voy. au Yémen. (1889) 190. — Arabia.

THALESIA, Rafin. = **Aphyllon**, Mitch. (Orobanch.).
fasciculata, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 298 = *A. fasciculatum*, A. Gray.
uniflora, Britton, l. c. = *A. uniflorum*, Torr. & Gray.

THALIA, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1057.
caerulea, Ridl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 132. — Angola.
coarctata, Herb. Vindob. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 168 = *Saranthe cuiabensis*, Eichl.
densibracteata, Petersen, l. c. 144. — Bras.
Welwitschii, Ridl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 132. — Angola.

THALICTRODES, Amm. = **Cimicifuga**, Linn. (Ranuncul.).
americanum, *bitermum*, *cordifolium*, *datum*, *japonicum*, *obtusilobum*, *racemosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 4 = *homonyma omnia* Cimicifugae.
Cimicifuga, Kuntze, l. c. = *C. foetida*, Linn.
simplex, Kuntze, l. c. — *C. foetida*, Linn.

THALICTRUM, Tourn. ex Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 1057.

- arpadinum*, Borb. in Termész. Füzet. xvi. (1893) 42 = minus, Linn.
bulgaricum, Velen. Fl. Bulg. (1891) 4. — Bulg.
caesium, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1888) 286. nomen. — Austria.
caesium, Greene, Fl. Francisc. (1891) 309. — Calif.
catalaunicum, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iv. (1891) 111 = simplex, Linn.
ceraiense, Matsumura, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 276. — Japon.
clematidifolium, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 273. — China occ.
corbariense, Timb. in Lucante, Rev. de Bot. x. (1892) 20 = minus, Linn.
corymbulosum, Timb. l. c. 21. — Gall. mer.
coriaceum, Small, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 98 = dioicum, Linn. var.
crossaenum, Heldreich & Charrel [Nadji] in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 374. nomen; et Emp. Ottom. Geogr. bot. [Pl. de Saloniq.] (1892) 7. — Turc.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 367; et Pl. Delav. (1889) 10; Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7152. — China occ.
diptero carpum, Franch. l. c. 308; et 12. — China occ.
gallicum, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 29 [sp. coll.]. — Gall.
grandiflorum, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 11. — China.
grandifolium, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 267. — Mexic.
hamatum, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 16. — China.
hesperium, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 24; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 6 (= *T. platycarpum*, Greene). — Calif.
ichangense, Lecoyer, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1765. — China.
integrilobum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 477. — Japon.
iodostemon X. « Borb. » ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 5, sphalm. = *iodostemum* X. Borb.
Lecoyeri, Franch. Pl. Delav. (1888) 16. — Yunnan.
leuconotum, Franch. l. c. 15. — China occ.
Linnaeanum, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 35 = flavum, Linn.
longipes, Rouy & Fouc. l. c. 22 = minus, Linn.
lugdunense, Rouy & Fouc. l. c. 30 = gallicum, Rouy & Fouc.
macro rhynchum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 302. — China sept.
microgynum, Lecoyer, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1766. — China.
macrostylum, Small & Heller, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. (1892) 8. — Carolina.
oligandrum, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 16. — China.
pinnatum, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 267. — Mexic.
platycarpum, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 166 = hesperium, Greene.
polygynum, Somm. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxv. (1893) 46. — Sibiria.
Pringlei, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 141. — Mexic.
reticulatum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 371; et Pl. Delav. (1889) 17. — China occ.
robustum, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 18. — China.
sabaudum, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 18 = minus, Linn.
scabrifolium, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 371; et Pl. Delav. (1889) 16. — China occ.
Schlechteri, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 22 = minus, Linn.
subfalcatum, Rouy & Fouc. l. c. 26 = minus, Linn.
subphaerocarpum, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 240. — Hung.
sultanabadense, Stapf, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 550. — Persia.
tomentellum, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 103. — Mexic.

THALICTRUM : —

trichopus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 368; et *Pl. Delav.* (1889) 14. — China occ.
tripclatum, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 13. — China.
uncatum, *Maxim. l. c.* 14. — China.
venulosum, *Trelease, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxiii. (1886) 302; *Macoun, Catal. Canad. Pl. v.* (1890) 296. — Am. bor. occ.
Watanabei, *Yatabe, in Tokio Bot. Mag.* vi. (1892) 307, t. 9. — Japon.

THALYSIA, Linn. = **Zea**, Linn. (Gramin.).

Mays, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 794 = *Z. Mays*, Linn.

THAMNEA, Soland. (Bruniac.). — Ind. Kew. ii. 1060.

diosmoides, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2314. — Afr. austr.

THAMNOSMA, Torr. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 1061.

africanum, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1888) 33. — Afr. austro-occ. extratrop.
Hirschii, *Stapf, in Kew Bull.* (1895) 315. — Arabia.

THAPSIA, Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 1061.

edulis, *Nichols. Diet. Gard.* iv. (1887) 74. — Ins Mader.

THASPIUM, Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1061.

trifoliatum, *Britton, in Mem. Tnrey Bot. Club.* v. (1894) 248 = trifoliatum, *A. Gray.*

THEA, Linn. = **Camellia**, Linn. (Ternstroem.).

Dormoyana, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 296; et *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 8 (1887) t. 118. — Cochinch.
drupifera, *Pierre, l. c.* sub t. 119 = *Camellia drupifera*, *Lour.*

Edithae, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 65 = *C. Edithae*, *Hance*

fraterna, *Kuntze, l. c.* = *C. fraterna*, *Hance.*

Greysii, *Kuntze, l. c.* = *C. Grysii*, *Hance.*

hongkongensis, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* 8 (1887) t. 117 = *C. hongkongensis*, *Seem.*
lanceolata, *Pierre, l. c.* sub. t. 119 = *C. lanceolata*, *Seem.*

lutescens, *Pierre, l. c.* = *C. lutescens*, *Dyer.*

Piquetiana, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 296; et *l. c.* t. 119. — Cochinch.

Quinosaura, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* 8 (1887) sub t. 119 = *Camellia Quinosaura*, *Seem.*

reticulata, *Pierre, l. c.* = *C. reticulata*, *Lindl.*

rosiflora, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 64 = *C. rosae-flora*, *Hook.*

theiformis, *Kuntze, l. c.* = *C. euroides*, *Lindl.*

THAUMATOCARYUM, Baill. in Bull. Soc.

Linn. Paris, ii. (1890) 839; et Hist. des pl. x. (1890) 387. **BORAGINEAE**.

Hilarii, *Baill. ll. cc.* — Bras.

THECACORIS, A. Juss. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 1062.

membranacea, *Pax, in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 158. — Ins. S. Thom.

THECOPHYLLUM, Éd. André, Bromel. Andrean. (1889) 107. **BROMELIACEAE**.

Poortmanni, *Éd. André, l. c.* 103. — Ecuad.

Wittmackii, *Éd. André, l. c.* 107, t. 39b. — Columbis.

THECOSTELE, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1062.

maculosa, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 374. — Penins. Mal.

Maingayi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 20. — Malacca.

quinquefida, *Hook. f. l. c.* — Malacca.

THEILEAMEA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 821; et Hist. pl. x. (1890) 432. **ACANTHACEAE**.

rupestris, *Baill. ll. cc.* (= *Aetheilema rupestris*, *Nees*). — Madag.

THELASIS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1062.

bifolia, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 86. — Khasia.

decurva, *Hook. f. l. c.* 87. — Penins. Mal.

elata, *Hook. f. l. c.* — Perak.

khasiana, *Hook. f. l. c.* 87. — Khasia.

longifolia, *Hook. f. l. c.* — Khasia.

THELECARPUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 262 = **Loranthus**, Linn.

Batangae, *Van Tiegh. l. c.* = *L. Batangae*, *Engl. hexasepalus*, *Van Tiegh. l. c.* 263; et in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 166. — Congo gall.

Soyauxii, *Van Tiegh. ll. cc.* = *L. Soyauxii*, *Engl. Thollonii*, *Van Tiegh. in Bull. Mus. Paris, i.* (1895) 166. — Congo gall.

THELESPERMA, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1062.

trifidum, *Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci.* ix. (1890) 182 = filifolium, *A. Gray.*

THELYGONUM, Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1062.

macranthum, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1887) 71. — Tibet.

THELYMITRA, Forst. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1062.

alba, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 272. — N. Zel.

concinna, *Colenso, l. c.* xx. 1887 (1888) 207. — N. Zel.

cornuta, *Colenso, l. c.* 206. — N. Zel.

Elizabetae, *F. Muell. in Viet. Natural.* vii. (Dec. 1890) 116. — Austral.

fasciculata, *Fitzger. Austral. Orchids.* iii. II. (1888) cum ic. — Austral.

fimbriata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 490. — N. Zel.

nervosa, *Colenso, l. c.* xx. 1887 (1888) 207. — N. Zel.

urnalis, *Fitzger. Austral. Orchids.* iii. I. (1888) cum ic. — Austral.

THELYPODIUM, Endl. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1062.

aureum, *Eastwood, in Zoë.* ii. (1891) 227. — Color. elegans, *M. E. Jones, in Zoë.* iv. (1893) 265. — Am. bor. occ.

Hookeri, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 263; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 18 = *Streptanthus flavescens*, *Hook.*

Howellii, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 445. — Oregon.

lasiophyllum, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 142; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 19 (= *Turritis lasiophylla*, *Hook. & Arn.*)
Sisymbrium reflexum, *Nutt.*

Lemmoni, *Greene, in West Am. Scientist.* iii. (1887) 156. — Calif.

procerum, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 263; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 18 = *Caulanthus procerus*, *S. Wats.*

rigidum, *Greene, Pittonia.* i. (July 1887) 62; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 18. — Calif.

stenopetalum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 468. — Calif.

Vaseyi, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 30; et ii. (1891) 15, t. 1. — Texas.

THEMEDA, Forsk. = **Anthistiria**, Linn. (Gramin.).

anathera, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 669 = *A. anathera*, *Nees.*

arguens, *Hack. l. c.* 657 = *A. arguens*, *Willd.*

arundinacea, *Hack. l. c.* 674 = *A. arundinacea*, *Roxb.*

THEMEDA : —

arundinacea, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1893) 401. — Penins. Mal.

avenacea, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1887) 677 = *Anthistiria avenacea*, *F. Muell.*

brachyantha, *Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 129 = *T. Forskalii*, *Hack*

caudata, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 676 = *Anthistiria caudata*, *Nees.*

ciliata, *Hack. l. c.* 664 = *A. ciliata*, *Linn. f.*

cymbaria, *Hack. l. c.* 668 = *A. cymbaria*, *Roxb.*

effusa, *Balansa, in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 115. — Cochinch.

foliosa, *Balansa, l. c.* 116 = *bracteatus*, *Willd.*

Forskalii, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 659. — Orb. vet. reg. trop. & sub trop.

gigantea, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 670 = *Anthistiria gigantea*, *Cav.*

Helferi, *Hack. l. c.* 665. — Tenass., Ins. Andam.

intermedia, *Hack. in DC. l. c.* = *Anthistiria gigantea*, *Cav.*

quadrivalvis, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 793 = *A. ciliata*, *Linn. f.*

tremula, *Hack. l. c.* 667 = *A. tremula*, *Nees.*

villosa, *Hack. l. c.* 675 = *A. villosa*, *Poir.*

THEMISTOCLESIA, Klotzsch (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 1063.

Humboldtiana, *Niedenzu, in Bot. Jahrb.* xi. (1889) 211 = *Macleania Humboldtiana*, *Klotzsch.*

THENARDIA, H. B. & K. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1063.

Galeottiana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris.* ii. (1890) 819. — Mexic.

THEOBROMA, Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 1063.

grandiflorum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 76 = *Guazuma grandiflora*, *G. Don.*

Mariae, *K. Schum. l. c.* 71 = *Abroma Mariae*, *Mart.*

Martii, *K. Schum. l. c.* 78. — Bras.

sylvestris, *Baill. Bot. médic. [Phan.]* (1894) 795 = *Genipa Merianae*, *Rich.*

THEODORA, Médic. = **Schottia**, Jacq. (Legumin.).

Fischeri, *Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 18, 36; et in *Engl. Pflanzenw.*

Ost-Afr. C. (1895) 198. — Afr. or.

suaheliensis, *Taub. l. c.* 198. — Afr. or.

THEODOREA, Cass. = **Saussurea**, DC. (Compos.).

Alberti, *albescens*, *alpina*, *americana*, *arenaria*, *blanda*, *bracteata*, *cana*, *Candolleana*, *canescens*, *Clarkei*, *colorata*, *congesta*, *coronata*, *dawrica*, *discolor*, *elata*, *elegans*, *dilipica*, *elongata*, *Falconeri*, *filifolia*, *Frolovii*, *Geblariana*, *glacialis*, *glanduligera*, *gossypiphora*, *gracilis*, *graminifolia*, *grandiflora*, *Griffithii*, *hissarica*, *Hookeri*, *Jacea*, *japonica*, *kaschgarica*, *katachaete*, *Kuschakewiczii*, *laciniata*, *lamprocarpa*, *latifolia*, *Maximowiczii*, *Medusa*, *microcephala*, *microcephala*, *nigrescens*, *nikoensis*, *nipponica*, *obovata*, *odontolepis*, *palcata*, *pamirica*, *pectinata*, *phaeantha*, *Poljakowii*, *Przewalskii*, *pygmaea*, *Riederi*, *rigida*, *robusta*, *Roylei*, *runcinata*, *sacra*, *Salemannii*, *salicifolia*, *saissa*, *scaposa*, *Schultzii*, *Semenowii*, *serrata*, *sordida*, *stella*, *Stubendorffii*, *subulata*, *Sughoo*, *Tanaka*, *tenuis*, *triangulata*, *tridactyla*, *tripera*, *uniflora*, *ussuriensis*, *Yakla*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 367-68 = *homonyma omnia* *Saussureac.*

alata, *Kuntze, l. c.* = *S. japonica*, *DC.*

amurensis, *Kuntze, l. c.* = *S. eriolepis*, *Bunge.*

Andersoni, *Kuntze, l. c.* = *S. Andersoni*, *C. B. Clarke.*

atkinsonii, *Kuntze, l. c.* = *S. Atkinsonii*, *C. B. Clarke.*

auriculata, *Kuntze, l. c.* 367 = *S. hypoleuca*, *Spreng.*

baikalensis, *Kuntze, l. c.* 368 = *S. pycnocephala*, *Ledeb.*

brahucica, *Kuntze, l. c.* = *S. candicans*, *C. B. Clarke.*

THEODOREA : —

- caespitosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 367 = *Saussurea taraxacifolia*, Wall.
chondrilloides, Kuntze, l. c. 368 = *S. chondrilloides*, C. Winkl.
Costus, Kuntze, l. c. = *S. Lappa*, C. B. Clarke.
cynoglossifolia, Kuntze, l. c. = *S. serrata*, DC.
Davidii, Kuntze, l. c. = *S. Davidi*, Franch.
deltoides, Kuntze, l. c. = *S. deltoides*, C. B. Clarke.
denticulata, Kuntze, l. c. = *S. denticulata*, Wallr.
discolor, Kuntze, l. c. 367 = *S. piptathera*, Edgew.
epilobioides, Kuntze, l. c. 368 = *S. epilobioides*, Maxim.
foliosa, Kuntze, l. c. = *S. foliosa*, Ledeb.
fruticulosa, Kuntze, l. c. = *S. cana*, Ledeb.
gnaphalodes, Kuntze, l. c. = *S. sorocephala*, Hook. f. & Thoms.
heteromalla, Kuntze, l. c. 367 = *S. candicans*, C. B. Clarke.
integrata, Kuntze, l. c. 368 = *S. glomerata*, Poir.
intermedia, Kuntze, l. c. = *S. japonica*, DC.
involucrata, Kuntze, l. c. (= *Aplotaxis involucrata*, Kar. & Kir.) — As. temp.
iostegia, Kuntze, l. c. = *S. iostegia*, Hance.
neglecta, Kuntze, l. c. = *S. denticulata*, Ledeb.
papposa, Kuntze, l. c. = *S. crassifolia*, DC.
Poljakowii, Kuntze, l. c. = *S. Poljakowii*, Glehn.
polystichoides, Kuntze, l. c. = *S. polystichoides*, Hook. f.
serruloides, Kuntze, l. c. sphalm. = *S. serratuloides*, Turcz.
sylvatica, Kuntze, l. c. = *S. sylvatica*, Maxim.
Stoliczkaii, Kuntze, l. c. = *S. Stoliczkae*, C. B. Clarke.
Stracheyana, Kuntze, l. c. = *S. foliosa*, Hook. f.
taraxacifolia, Kuntze, l. c. 367 = *S. erlostemon*, Wall.
Thomsonii, Kuntze, l. c. = *S. Thomsoni*, C. B. Clarke.
werneroides, Kuntze, l. c. = *S. werneroides*, C. B. Clarke.

THEOPHRASTA, Linn. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 1063.

- Biborrana*, *caloneura*, *fulgens*, *grandis*, *macrocarpa*, *pendula*, *Riedeliana*, *spathulata*, *undulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 404 = *homonymia omnia* Clavijae.
Kalbreyeri, Kuntze, l. c. — N. Granat.
laurifolia, Kuntze, l. c. sphalm. = *Clavija lancifolia*, Desf.
pinnata, Hort. ex Gard. Chron. (1888) i. 806 = *Talisea princeps*, Oliver.
Ruiziana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 404 = *Clavija vinata*, D. Don.
sparsifolia, Kuntze, l. c. = *Leonia glycyarpa*, Ruiz & Pav.

THERIOPHONUM, Blume (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 1063.

- minutum*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 457 = *crenatum*, Blume.

THERMOPSIS, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1064.

- argentata*, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 18. — Calif.
gracilis, Howell, l. c. i. (1893) 109. — Am. bor. occ.
robusta, Howell, l. c. — Calif.
velutina, Greene, l. c. iii. (1895) 19. — Calif.

THEROFON, Rafin. [sphalm. THEREFON] = **Boykinia**, Nutt. (Saxifr.).

- aconitifolium*, Millsp. in Bull. West Va Agric. Exp. Sta. ii. (1892) 361 = *B. aconitifolia*, Nutt.
altum, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 121 = *B. occidentalis*, Torr. & Gray.
major, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 227 = *B. major*, A. Gray.
occidentale, Kuntze, l. c. = *B. occidentalis*, Torr. & Gray.
Richardsonii, Kuntze, l. c. = *B. Richardsonii*, A. Gray.

THEROGERON, DC. = **Minuria**, DC. (Compos.).

- Cunninghamii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 369 = *M. Cunninghamii*, Benth.
leptophyllum, Kuntze, l. c. = *M. leptophylla*, DC.
suaedifolia, Kuntze, l. c. = *M. suaedifolia*, F. Muell.

THESIUM, Linn. (Santal.). — Ind. Kew. ii. 1064.

- auriculatum*, Vandas, in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 279; et Beitr. Kenntn. Fl. Bosn. und Herzeg. (1890) 279. — Eur. or.
bulgaricum, Velen. Fl. Bulg. (1891) 498. — Bulg.
cystoseioides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 516. — Madag.
Dollinerii, Murb. ex Velen. Fl. Bulg. (1891) 498; et in Lunds Univ. Arsskrift, xxvii. v. (1892) 43. — Bulg.
hybridum X, G. Beck, in Abh. zool.-bot. Ges. Wien (1891) 640; et Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 602. — Austria.
Kernerianum, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 183 = *divaricatum*, Jan.
kilimandscharicum, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 200. — Afr. trop. or.
mauritanicum, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 393; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 785. — Algeria.
moesiacum, Velen. Fl. Bulg. (1891) 500. — Bulg.
nigricans, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 41. — Afr. trop.
refractum X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. (1886) n. 105 [Neue und crit. Pflanzenfam. n. 105]. — Helv.
Schweinfurthii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 168. — Afr. trop. or.
simplex, Velen. Fl. Bulg. (1891) 499, in obs. — Transsilv.
Stuhlmannii, Engl. l. c. — Afr. trop. or.
subaphyllum, Engl. l. c. — Afr. trop. or.
ulugurense, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 130, nomen. — Afr. trop. or.
Whyteanum, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 42. — Afr. trop.

THESPESIA, Soland. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 1066.

- Garcleana*, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 12. — Afr. trop.
Rehmannii, Szyszyl. Polypet. Rehmann. i. (1887) 44. — Natal.

THEVETIA, Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1066.

- Gaumeri*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. (1886) t. 1517; et Biol. Centr.-Am. iv. (1886) 104. — Ins. Cozumel.
nitida, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 159 = *nitida*, A. DC.
paraguayensis, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 158. — Parag.
thevetioides, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 159 = *T. Yccotli*, A. DC.

THINOBI, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 399. **COMPOSITAE**.

- araucana*, Phil. l. c. 400. — Chili.

THINOUIA, Planch. & Triana = **Thouinia**, Poit. (Sapind.).

- coriacea*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 191. — Bolivia.
paraguayensis, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 308 = *T. paraguayensis*, Britton.
repanda, Radlk. l. c. — Parag.
sepium, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 341. — Am. trop.

THISMIA, Griff. (Burmanniac.). — Ind. Kew. ii. 1067.

- chrysops*, Ridl. in Ann. Bot. ix. (1895) 323. — Malacca.
clandestina, F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm. 1890 (1891) 235; et ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 141 (= *Sarcosiphon clandestinum*, Blume). — Java.
clavigera, F. Muell. l. c. (= *Geometra clavigera*, Becc.). — Borneo.
episcopalis, F. Muell. l. c. (= *G. episcopalis*, Becc.). — Borneo.
fumida, Ridl. in Journ. Straits Branch. Roy. As. Soc. n. 22 (1890) 333. — Penins. Mal.

THISMIA : —

- Glaziovii*, Poulsen, in Kongl. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1890) 24; et ex Bonnier, Rev. gén. de Bot. i. 1889 (1890) 549. — Bras.
grandiflora, Ridl. in Ann. Bot. ix. (1895) 324. — Ind. or.
hyalina, Benth. & Hook. f. ex F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasman. 1890 (1891) 234 (= *Myostoma hyalina*, Miers). — Bras.
macahensis, Benth. & Hook. f. ex F. Muell. l. c. (= *Ophiomeris macahensis*, Miers). — Bras.
Rodwayi, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Dec. 1890) 115; et in Proc. Roy. Soc. Tasm. 1890 (1891) 232 cum ic.; et ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 63, 125, 257, et xlv. (1891) 139 et 141. — Austral.

THLADIANTHA, Bunge (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 1066.

- Davidi*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 243. — China occ.
Henryi, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 316; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2223. — China.
longifolia, Cogn. ex Oliver, l. c. xxiii. (1892) t. 2222. — China.
nudiflora, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 316 t. 7. — China.

THLASPI, [Tourn.] Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1067.

- atlanticum*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. Append. ii. (1890) 2; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 70, cum ic. — Algeria.
cenisium, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 157 = *rotundifolium*, Gaudin.
chloraeifolium, Hausskn. & Bornum, in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 15. — As. mer.
corymbosum, Gremli, Neue Beitr. Fl. Schweiz, Heft v. (1890) 7 = *rotundifolium*, Gaudin.
Gaudinianum, "Jord.", ex E. Hallier, Syn. Fl. Germ. ed. 3 (1895) 136, sphalm. = *Gaudinianum*, Jord.
heterochroum, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 58. — Eur. or.
limosellifolium, Reut. ex Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 156 = *rotundifolium*, Gaudin.
Oliveri, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 223. — Abyss.
petraeum, Ces., Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. (1886) 827 = *Hutchinsia petraea*, R. Br.
pindicum, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. iv. (1893) 115. — Graecia.
pinnatum, G. Beck, in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien (1890) 18; et Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 488 = *Hutchinsia petraea*, R. Br.
pinnatum, Fritsch, in Bot. Centralbl. xlii. (1890) 13 = *praec.*
rubellum, Cabanès, in Bull. Soc. sci. nat. Nîmes, xix. (1891) 187 = *rubellum*, Loret & Barr.
Salisii, Bruegg. ex Gremli, Neue Beitr. Fl. Schw. Heft v. (1890) 5 = *alpestre*, Linn.
stenopterum, Conrath & Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 38. — As. Min.
thessalonicum, Charrel [Nadjil] in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 375, nomen; et in Emp. Ottom. [Pl. de Saloniq.] (1892) 19. — Maced.
tymphaeum, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. iv. (1893) 115. — Graecia.
umbrosum, Waisbecker, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 318, et xlv. (1894) 74. — Austro-Hung.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1888) 407; et Pl. Delav. (1889) 67. — Yunnan.

THOLLONIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 610; Focke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1891) 61. **ROSACEAE**.

- racemosa*, Baill. l. c. — Congo gall.

THOMANDERSIA, Baill. Hist. des pl. xi. (1891) 456; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 325. **ACANTHACEAE**.

- laurifolia*, Baill. l. c. (= *Scytanthus laurifolius*, T. Anders.). — Afr. trop. occ.

THONNINGIA, Vahl (Balanophor.). — Ind. Kew. ii. 1069.

- malagassica*, Fawcett, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1886) 239. — Madag.

THORACOSPERMA, Klotzsch = **Simocheilus**, Klotzsch (Ericac.).

- barbigera*, *bicolor*, *carnea*, *depressa*, *glabella*, *glabra*, *hirsuta*, *hispidula*, *Klotzschiana*, *multiflora*, *oblonga*, *patens*, *pubescens*, *quadrifida*, *submutica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 390-91 = *homonyma omnia* Simocheili.
articulata, Kuntze, l. c. 390 (= *Syndesmanthus articulatus*, Klotzsch). — Afr. austr.
ciliata, Kuntze, l. c. (= *S. ciliatus*, Benth.). — Afr. austr.
discolor, Kuntze, l. c. (= *Anomalanthus discolor*, Klotzsch). — Afr. austr.
Ecklonia, Kuntze, l. c. = *Simocheilus Ecklonianus*, Benth.
fasciculata, Kuntze, l. c. = *S. glabellus*, Benth.
glauca, Kuntze, l. c. (= *Syndesmanthus glaucus*, Klotzsch). — Afr. Austr.
hirta, Kuntze, l. c. 391 = *Simocheilus hirsutus*, Benth.
parviflora, Kuntze, l. c. 391 (= *Codonanthemum parviflorum*, Klotzsch). — Afr. austr.
paucifolia, Kuntze, l. c. 391 (= *Syndesmanthus paucifolius*, Benth.). — Afr. austr.
puberula, Kuntze, l. c. (= *Codonanthemum puberulum*, Klotzsch). — Afr. austr.
scabra, Kuntze, l. c. 391 (= *Syndesmanthus scaber*, Klotzsch). — Afr. austr.
squarrosa, Kuntze, l. c. (= *S. squarrosus*, Benth.). — Afr. austr.
tenuis, Kuntze, l. c. 391 (= *Codonanthemum tenue*, Benth.). — Afr. austr.

THORACOSTACHYUM, Kurz (Cyper.). — Ind. Kew. ii, 1069.

- hypolyroides*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 680. — As. et Austral. trop.

THORELDORA, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) sub t. 334 = **Aglaia**, Lour. (Anona.).
cochinchinensis, Pierre, l. c. = Cochinch.

THOTTEA, Rottb. (Aristol.). — Ind. Kew. ii, 1069.
tricornis, Maingay, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 74. — Malacca.

THOUINIA, Poit. (Sapind.). — Ind. Kew. ii, 1069.
acuminata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 145. — Mexic.
paraguayensis, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1892) 75. — Parag.
portoricensis, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 311. — Ins. Puerto Rico.
Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 145. — Mexic.
stricta, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 311. — Am. trop.

THOUINIDIUM, Radlk. = **Thouinia**, Poit. (Sapind.).
hexandrum, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 314 = *T. hexandra*, H. B. & K.

THRINAX, Linn. f. (Palm.). — Ind. Kew. ii, 1070.
Morrisii, H. Wendl. in Gard. Chron. (1891) i. 700, fig. 134, et (1892) i. 104, fig. 20, 21. — Ind. occ.

THRINCIA, Roth = **Leontodon**, Linn. (Compos.).
seriolensis, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 32. Hisp.

THRIXSPERMUM, Lour. = **Sarcocochilus**, R. Br. (Orchid.).
aureum, *brachyglottis*, *brachystachyum*, *cladostachyum*, *emarginatum*, *filiforme*, *hirsutum*, *hirtulum*, *Hystrix*, *Mannii*, *merguense*, *minimifolium*, *minimum*, *notabile*, *pauciflorum*, *recurvum*, *stenoglottis*, *trichoglottis*, *viridiflorum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 682 = *homonyma omnia* Sarcocochili.
appendiculatum, Kuntze, l. c. = *Sarcocochilus pusillus*, Reichb. f.
Beccarii, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 343. — N. Guin.
elegans, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 682 (= *Grosour-dya elegans*, Reichb. f.). — Malaya.

THRIXSPERMUM : —

- indusiatum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 585. — Ins. Sandvic.
platyphyllum, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 343. — N. Guin.
Scortechinii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 682 = *Sarcocochilus Scortechinii*, Hook. f.

THRYALLIS, Linn. = **Galphimia**, Cav. (Malpigh.).
angustifolia, *glandulosa*, *glauca*, *gracilis*, *grandiflora*, *hirsuta*, *Humboldtiana*, *latifolia*, *multicaulis*, *paniculata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 89 = *homonyma omnia* Galphimiae.
linifolia, Kuntze, l. c. = *G. angustifolia*, Benth.

THRYALLIS, Mart. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii, 1071.
Laburnum, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 324. — Bras.
ovatifolia, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 30 (1891) 5. — Bras.

THRYOTHAMNUS, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 618. **VERBENACEAE**.
junciformis, Phil. l. c. — Chili.

THUNBERGIA, Retz. (Acanth.). — Ind. Kew. ii, 1071.

- Bachmanni*, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1093) 94. — Afr. austro-occ. extratrop.
bicolor, Lindau, l. c. xvii. Beibl. n. 41 (1893) 42 = *Wightiana*, T. Anders.
borbonica, Lindau, l. c. — Ins. Borbon.
brewerioides, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 387, nomen; et in Hoch-nel, Zum Rudolph Sec, Append. (1892) 6. — Afr. trop. or.
chrysoclamys, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 508. — Madag.
cordata, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 365. — Afr. trop. or.
Erythraea, Schweinf. ex Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 3. — Afr. trop. or.
fasciculata, Lindau, l. c. xvii. (1893) 97. — Afr. trop.
Fischeri, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1893) 387. — Afr. trop. or.
fuscata, T. Anders. ex Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. Beibl. n. 41 (1893) 40. — Afr. trop.
Gibsoni, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 131. — Afr. trop. or.
Gregorii, S. Moore, l. c. 139. — Afr. trop. or.
Guereana, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 366. — Afr. trop. or.
hamata, Lindau, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 64; et in Bot. Jahrb. xx. (1894) 2. — Afr. trop.
hispidula, Lindau, l. c. xvii. (1893) 93 = *Solmsiana*, Lindau.
Holstii, Lindau, l. c. 95. — Afr. trop. or.
Hookeriana, Lindau, l. c. xvii. Beibl. n. 41. (1893) 38 = *T. Kirkii*, Hook.
kamerunensis, Lindau, l. c. xvii. (1893) 97. — Afr. trop.
longifolia, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 91. — Afr. trop.
malangana, Lindau, l. c. — Afr. trop.
manganjensis, Lindau, l. c. 92. — Afr. trop.
Mechowii, Lindau, l. c. — Afr. trop.
mollis, Lindau, l. c. xvii. Beibl. n. 41 (1893) 35, nomen, et xx. (1894) 2. — Afr. trop.
parva, Roulet, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 281, 282, 316. — Hab.?
parvifolia, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 90. — Afr. trop.
Paulitschkeana, G. Beck, in Paulitschke, Harrar, App. (1888) 459, fig. 12. — Afr. trop.
Petersiana, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 89. — Afr. trop.
phytocrenoides, T. Anders. ex Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 113, in syn. = *Afromendoncia phytocrenoides*, Gilg.
pondoensis, Lindau, l. c. 93. — Afr. austro-occ. extratrop.
rufescens, Lindau, l. c. 96. — Afr. trop. occ.
sessilis, Lindau, l. c. — Afr. trop.

THUNBERGIA : —

- Solmsiana*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 368, in obs. (= *T. hispidula*, Lindau). — Madag.
Stuhlmanniana, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 91. — Afr. trop.
subalata, Lindau, l. c. xvii. Beibl. n. 41 (1893) 41, nomen, et xx. (1894) 3. — Afr. trop.
togoensis, Lindau, l. c. xxii. (1895) 112. — Afr. trop. occ.
usambarica, Lindau, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 64; et in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 89. — Afr. trop.

- THUNIA**, Reichb. f. = **Phaius**, Lour. (Orchid.).
Brymeriana, Rolfe, in Gartenfl. xli. (1892) 184; et in Kew Bull. (1894) 156. — Burma.
candidissima, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 34 = *Phaius candidissima*, N. E. Br.
Mastersiana, Kraenzl. l. c. (1894) ii. 420. — Penins. Mal.
nivalis, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 62, nomen, in obs. = *Phaius albus*, Lindl.
Veitchi ×, Hort. l. c. (1891) i. 740 [an *T. Veitchiana* ×, Reichb. f.?]. — Hybr. artef.
Winniana, Hort. ex L. Lind. in Lindenia, x. (1894) 43, t. 452. — Hab.?
Wrigleyana, Hort. ex Orchid. Alb. vi. (1888) sub t. 326, in syn.; Veitch, Man. Orch. Pl. vi. (1890) 20 = *Veitchiana* ×, Reichb. f.

THUROVIA, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 321. **COMPOSITAE**.
triflora, J. N. Rose, l. c. — Texas.

THUSPEINANTHA, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 78 (= **TAPEINANTHUS**, Boiss.). **LABIATAE**.

- THUYA**, Linn. (Conif.). — Ind. Kew. ii, 1072.
Bodmeri, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 42 = *occidentalis*, Linn.
flabellata, Hort. ex Beissn. l. c. 42 = *plicata*, Don.
globosa, Hort. ex Beissn. l. c. 43 = *occidentalis*, Linn.
lycopodioides, Hort. ex Beissn. l. c. 44 = *plicata*, D. Don.
plicatilis, Hort. ex Beissn. l. c. = *plicata*, D. Don.
recurva, Hort. ex Beissn. l. c. 42 = *occidentalis*, Linn.
recurvata, Hort. ex Beissn. l. c. = *occidentalis*, Linn.
semper aurea, Hort. ex Beissn. l. c. 60 = *orientalis*, Linn.

THYANA, Ham. = **Thouinia**, Poit. (Sapind.).
discolor, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 72 = *T. discolor*, Griseb.

THYIA, Aschers. = **Thuya**, Linn. (Conif.).
occidentalis, " Linn. " ex Aschers. & Schweinf. Illustr. fl. Egypte (1887) 179 = *T. occidentalis*, Linn.

THYMELAEAE, Tourn. ex Scop. (Thymel.). — Ind. Kew. ii, 1073.
subrepens, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 193. — Hisp.

- THYMUS**, Tourn. ex Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii, 1073.
albanus, H. Braun, ex Wertst. in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xxvi. (1892) 86. — Alban.
albiflorus, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.], (1889) 673 = *ciliatus*, Desf.
Alfredae, Post, Pl. Postianae, iii. (1892) 15. — As. occ.
Antoninae, Roy & Coincy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 165; Coincy, Eclog. Pl. Hisp. (1893) 18, t. 7; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 145. — Hisp.
arundanus, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 52. — Hisp.
auriculatus, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 142 = *T. Serpyllum*, Linn.

THYMUS : —

- badensis*, H. Braun, ex R. Walz, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 559 = *T. Serpyllum*, Linn.
- benacensis*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 297 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Boissieri, *Haldasy*, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 252. — Graecia.
- Borbasii*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 215 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Braunii* X, Borb. l. c. 214, 216; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 996. — Austria.
- calvifrons*, Borb. & H. Braun, in Borb. l. c. 216 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Celakowskyanus, M. Schulze, in Mitth. Bot. Ver. Jena, viii. (1890) 39. — Eur. centr.
- ciliolatus*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 19; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1891) 143. — Hisp.
- clavicus*, Borb. Symb. Eur. med. (1890) 76 = *T. Serpyllum*, Linn.
- dolomiticus*, Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) p. c. xxx. — Gall. mer.
- dracensis*, Batt. l. c. xxxv. (1888) 393; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Alger. [Dicot.] (1889) 671 = *T. Serpyllum*, Linn.
- ellipticus*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 187; et in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 44 = *T. Serpyllum*, Linn.
- erioclados*, Borb. Symb. Thym. Eur. med. (1890) 93 = *T. Serpyllum*, Linn.
- flagellicaulis*, A. Kern, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 297 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Gizellae*, Borb. [in Pöt. Füzet. Termész. Közl. vi. (1889) 91, nomen], ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 310 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Hausmanni*, H. Braun, l. c. xli. (1891) 297 = *T. Serpyllum*, Linn.
- heterophyllum*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Alger. [Dicot.] (1889) 671 = *T. Monardii*, Noé.
- holosericeus*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 266, in obs. — Ins. Cephal.
- humillimus*, Celak. l. c. = *hirsutus*, Bieb.
- isiriacus*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 42 = *T. Serpyllum*, Linn.
- juranyanus*, Borb. Symb. Eur. med. (1890) 96; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 149, et xliii. (1893) 70 = *T. Serpyllum*, Linn.
- kabylicus*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Alger. [Dicot.] (1889) 672 = *lanceolatus*, Desf.
- Kernerii*, Borb. Symb. Thym. Eur. med. (1890) 74; Pacher, Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 108 = *T. Serpyllum*, Linn.
- leptophyllum*, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 198. — Hisp.
- linearifolius*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 45 = *T. Serpyllum*, Linn.
- macrophyllum*, H. Braun, in A. Kern. l. c. 48 = *T. Serpyllum*, Linn.
- murcicus*, Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. (1891) 60; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 60. — Hisp.
- oblongifolius*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 297 = *T. Serpyllum*, Linn.
- oenipontanus*, H. Braun, l. c. 296, 297 = *T. Serpyllum*, Linn.
- paradoxus* X, Rouy, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 258. — Eur. mer.
- piliensis*, Borb. Symb. Thym. Eur. med. (1890) 94 = *T. Serpyllum*, Linn.
- polytrichus*, A. Kern, ex Borb. in Termész. Közl. xxiv. ii. (1890) 105; et Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 47 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Porcii*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 462, et xli. (1891) 149 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Portae*, Freyn, [in Porta & Rigo. Iter iii Hisp. (1891) n. 443] in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 547; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 147 = *T. Antoninae*, Coincy.
- pulvinatus*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 265 = *hirsutus*, Bieb.
- quinquecostatus*, Celak. l. c. xxxix. (1889) 263. — China bor.
- Radoi*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 215 = *T. Serpyllum*, Linn.

THYMUS : —

- Reuteri, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 122, in obs.; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 144; Debeaux, in Lucante. Rev. de Bot. xii. (1895) 359. — Hisp.
- Santoi*, Borb. Symb. Thym. Eur. med. (1890) 95 = *T. Serpyllum*, Linn.
- sedoides*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 266 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Sintenisii*, Celak. l. c. 268 = *T. Serpyllum*, Linn.
- sparsipilus*, Borb. Symb. Thym. Eur. med. (1890) 94 = *T. Serpyllum*, Linn.
- subhirsutus*, Borb. & H. Braun, in Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 217; et in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 45 = *T. Serpyllum*, Linn.
- sudeticus*, Borb. in Termész. Közl. xxiv. II. (1890) 103; et l. c. 48 = *T. Serpyllum*, Linn.
- thracicus*, Velen. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 16 = *T. Serpyllum*, Linn.
- valentinus* X, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 123. — Hisp.
- Vandasii*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) i. 39; et Fl. Bulg. (1891) 469. — Bulg.
- Webbianus*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 122. — Hisp.
- zygiformis*, H. Braun, ex Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 87. — Albania.

THYRSACANTHUS, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 1076.

coccineus, Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 128 = *Lemaireanus*, Nees.

geminatus, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 75. — Guatem.

THYRSODIUM, Salzm. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 1077.

africanum, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1892) 106. — Congo.

THYSANOCARPUS, Hook. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1077.

conchuliferus, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 218. — Ins. S. Cruz. [Calif.]

ramosus, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. VII. (1887) 390. — Ins. S. Cruz [Calif.].

THYRSANTHEMA, Neck. = **Chaptalia**, Vent. (Compos.).

arancosa, dentata, Ehrenbergii, exscapa, integrifolia, lyrata, nutans, oblonga, ovalis, rotundifolia, runcinata, Seemannii, sinuata, spatulata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 369 = *homonyma omnia* Chaptaliae.

chilensis, Kuntze, l. c. = *C. exscapa*, Poepp.

filoselloides, Kuntze, l. c. = *C. piloselloides*, Baker.

pumila, Kuntze, l. c. = *C. sinuata*, Baker.

semiflosculare, Kuntze, l. c. = *C. tomentosa*, Vent.

tomentosa, Kuntze, l. c. = *C. albicans*, Vent.

THYSANOLAENA, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1077.

maxima, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 794 = *T. Agrostis*, Nees.

THYSANURUS, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1889) 127; et in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 229. **COMPOSITAE**.

angolensis, O. Hoffm. ll. cc. — Angola.

TIBOUCHINA, Aubl. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 1078.

alata, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 247. — Bras.

alba, Cogn. l. c. 210. — Bras.

Andreana, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 936; et l. c. 275. — N. Granat.

arthrostemmoides, Cogn. ll. cc. 931; et 252. — N. Granat.

aspericaulis, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 209. — Bras.

bicolor, Cogn. l. c. 265 (= *Pleroma bicolor*, Triana). — Bolivia.

Bourgaeana, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 4; et l. c. 264; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 245. — Mexic., Am. centr.

TIBOUCHINA : —

- Brittoniana*, Cogn. ex Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 55; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 260. — Bolivia.
- capitata*, Cogn. ll. cc. 54; et 251 (= *Pleroma capitatum*, Triana). — Bolivia.
- Chamaecistus*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 267 (= *P. Chamaecistus*, Triana). — Ins. Martinic.
- chironioides*, Cogn. l. c. 267 (= *P. chironioides*, Triana). — Ins. Dominica.
- ciliaris*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 932; et l. c. 257 (= *P. ciliare*, Triana). — N. Granat.
- cistoides*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 266 (= *P. cistoides*, Triana). — Ins. S. Vinc.
- citrina*, Cogn. l. c. 253 (= *Micranthella citrina*, Naud.). — Bolivia.
- Cogniauxii*, Glazion, ex Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1175. — Bras.
- confertiflora*, Cogn. l. c. 253 (= *Micranthella confertiflora*, Naud.). — Bolivia.
- diffusa*, Cogn. l. c. 266 (= *Pleroma diffusum*, DC.). — Ins. Portoric.
- echinata*, Cogn. l. c. 266 (= *P. echinatum*, Triana). — Peruvia.
- erioclada*, Cogn. l. c. 251. — N. Granat.
- Ferrariana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1176. — Mexic.
- Galeottiana*, Cogn. l. c. 258 (= *Pleroma Galeottianum*, Triana). — Mexic.
- Gayana*, Cogn. l. c. 253 (= *P. Gayanum*, Triana). — Peruvia.
- Geitheriana*, Cogn. l. c. 255. — Venezuela.
- glandulosa*, Cogn. l. c. 278 (= *Pleroma glandulosum*, Triana). — Guian.
- granulosa*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) et l. c. 222. — Bolivia.
- Hieronymi*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1175. — Bras.
- hirsuta*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 601; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 237. — Bras.
- Imperatoris*, Sald. & Cogn. ex Cogn. ll. cc. 598; et 202. — Bras.
- lanceolata*, Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 551; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 262. — Bolivia.
- latifolia*, Cogn. ll. cc. 54; et 252 (= *Pleroma latifolium*, Triana). — Bolivia.
- laxa*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 933 (= *P. laxum*, DC.); et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 250. — Ecuad.
- lilacina*, Cogn. l. c. 212. — Bras.
- longifolia*, Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. I. (1895) 36 = *longifolia*, Baill.
- longipilosa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1176. — Bras.
- longisepala*, Cogn. l. c. 259. — Venezuela.
- meiodon*, Stapf, in Kew Bull. (1895) 104. — Bras.
- maurocarpa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 260 (= *Pleroma macrocarpum*, Triana). — Peruvia.
- manicata*, Cogn. l. c. 220. — Bras.
- mexicana*, Cogn. l. c. 258 (= *Pleroma mexicanum*, DC.). — Mexic.
- microphylla*, Cogn. ex Schwake, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 28 (1890) 8, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 277. — Bras.
- monticola*, Cogn. l. c. 263 (= *Pleroma monticolum*, Triana). — Mexic., Am. centr.
- Moritziana*, Cogn. l. c. 259 (= *Chaetogastra Moritziana*, Klotzsch). — Venezuela.
- Mouraei*, Cogn. l. c. 236. — Bras.
- Naudmiana*, Cogn. l. c. 264 (= *Chaetogastra Naudmiana*, Decne). — Mexic.
- octopetala*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 57; et l. c. 273. — Bolivia.
- Oerstedii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. (1885) 297; et xiv. IV. (1888) 597; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 269, sphalm. Aerstedii. — Am. centr.
- Orbignyana*, Cogn. l. c. 261 (= *Pleroma Orbignyana*, Triana). — Bolivia.
- ovata*, Cogn. l. c. 211. — Bras.
- panicularis*, Britton, ex Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 54; et l. c. 252 (= *Pleroma paniculare*, Triana). — Bolivia.

TIBOUCHINA : —

- paratropica, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 257 (= *Pleroma paratropicum*, Griseb.). — Am. austr.
 paulensis, *Cogn. l. c.* 229. — Bras.
 pendula, *Cogn. in Bot. Jahrb.* viii. (1886) 18; et *l. c.* 251. — Ecuad.
 Petroniana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 598; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 201. — Bras.
 pilosa, *Cogn. l. c.* 600; et 216. — Bras.
 purpurascens, *Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 56; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 263. — Bolivia.
 rupicola, *Cogn. l. c.* 259 (= *Pleroma rufipile*, Triana). — Mexic.
 rupestris, *Cogn. l. c.* 1176. — Bras.
 Rusbyi, *Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 54; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 249. — Bolivia.
 scabriuscula, *Cogn. l. c.* 263 (= *Chaetogastra scabriuscula*, Triana). — Mexic.
 Schenckii, *Cogn. l. c.* 207. — Bras.
 Schiedeana, *Cogn. l. c.* 261 (= *Pleroma Schiedeana*, Triana). — Mexic.
 Schumannii, *Cogn. l. c.* 256. — Venezuela.
 Schwackei, *Cogn. l. c.* 206. — Bras.
 Solmsii, *Cogn. l. c.* 250. — Peruvia.
 stenophylla, *Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 56; et in *DC. Monog. Phan.* (1891) 257. — Bolivia.
 stenopetala, *Cogn. l. c.* 262 (= *Pleroma stenopetalum*, Triana). — Peruvia.
 strigosa, *Cogn. l. c.* 266 (= *P. strigosum*, Triana). — Ind. occ., Guian angl.
 Trianaei, *Cogn. l. c.* 261. — Mexic.
 Ulaei, *Cogn. l. c.* 202. — Bras.
 Urbanii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 602, t. 129, fig. 1; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 272. — Bras.
 violacea, *Cogn. l. c.* 272. — Parag.

TIEDEMANNIA, DC. = **Peucedanum**, Tourn.

- (Umbell.).
 Fendleri, Coult. & J. N. Rose, Revis. N. Am. Umbell. (1888) 48. — Colorado. N. Mexic.
 rigida, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xii. (1887) 74; et *l. c.* 47 = *Archemora rigida*, DC.
 ternata, Coult. & J. N. Rose, *l. c.* = *A. ternata*, Nutt.

TIEGHEMELLA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 18. **SAPOTACEAE**.

- africana, Pierre, *l. c.* — Gabon.
 Jollyana, Pierre, in *Inst. bot.-géol. colon. Marseille*, i. II. (1893) 2. — Afr. trop.

TIGRIDIA, Juss. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1079.

- buccifera, S. Wats. in *Gard. and For.* ii. (1887) 412, fig. 125; *Baker, Handb. Irid.* (1892) 68. — Mexic.
 lilacea, X, Hort. ex Garden (1894) i. 263, t. 953; et ex *Gartenfl.* xliii. (1894) 639. — Hybr. artef.
 Meleagris, Nichols, *Dict. Gard.* iv. (1887) 39. — Mexic.
 Pringlei, S. Wats. in *Gard. and For.* i. (1888) 388, fig. 61; et ex *Baker, in Bot. Mag.* (1889) t. 7089. — Mexic.
 pulchella, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1892) 184. — Mexic.

TILIA, [Tourn.] Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 1079.

- aenobarba, Borb. & H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 325, et xxxix. (1889) 363. —
Blechna X, Arboret. Zoesch. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 73. — Hybr. artef.
Borbasiana, H. Braun, in *Mathem. es Termesz. Köslm.* xxii. (1888) in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 139 = *cordata*, Mill.
Braunii X, Simonk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 398. — Austria.
Carmutiac, H. Braun, *l. c.* xlv. (1895) 320 = *vulgaris*, Heyne?
 chinensis, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 83. — China.

TILIA : —

- eristylis*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castri. (1887) 384 = *vulgaris*, Heyne.
euryptera X, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 423. — Hung.
firedensis, Herm. ex Borb. *l. c.* 423 = *Haynaldiana* X, Simonk.
gigantea, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 65. 67 = *alba*, Aiton.
Gizellae, Borb. in *Termesz. Közl.* vi. (1889) 91. — Hung.
Haynaldiana X, Simonk. in *Mag. Növen. Lapok*, xi. (1887) 1; et in A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 30. — Hung.
Hazzlinskyana, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castri. (1887) 262, 325 = *rubra*, DC.
Henryana, Szyszyl. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1927. — China.
heggesensis X, Simonk. in *Mag. Növen. Lapok* (1887) 4 = *furanyana* X, Simonk.
Hosteana, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 297 = *platyphyllos*, Scop.
idriaca, H. Braun, *l. c.* xlv. (1894) 311 = *dasy-styla*, Stev.
furanyana X, Simonk. in *Erdész. Lapok*, xxv. (1886) 570; et in A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 30. — Eur. centr.
Ledebourii, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 45 = *dasy-styla*, Stev.
Ludoviciana, Bosc, ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 408, nomen = *americana*, Linn.?
morifolia X, Simonk. [Potfűzetek (1892) 141] ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 67. — Hung.
Oliveri, Szyszyl. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) sub t. 1927. — China.
paucicostata, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 82. — China.
Pseudobliqua, Simonk. in *Mathem. et Term. Közl.* xxii. (1888) 300; A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 32 = *vulgaris*, Heyne.
Richteri X, Borb. in *Bot. Centralbl.* xxxvii. (1889) 161; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 408. — Hung.
Steveniana, Borb. in *Deutsche Bot. Monatssch.* vii. (1889) 3 (= *T. rubra*, Stev.). — Eur.
subflavescens, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castri. (1887-88) 264 = *rubra*, DC.
trichoclados, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 325 = *platyphyllos*, Scop.
 Tuan, Szyszyl. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1926. — China.
 Ullipicii, Borb. [in *Baenitz, Herb. Europ.* (1892)] in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 288, nomen, 487, [ad calc. Ullepitschii]. — Hung.
virescens, Borb. *l. c.* xli. (1891) 423. [Quid?]
viridis X, G. Beck. *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 533, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 490. — Austria.

TILLAEA, Mich. (Crassul.). — Ind. Kew. ii. 1080.

- Bolanderi, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 183; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 127. — Calif.
 diffusa, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 424. — N. Zel.
 multicaulis, Petrie, *l. c.* xix. 1886 (1887) 324. — N. Zel.
 Novae-Zelandiae, Petrie, *l. c.* xxv. 1892 (1893) 270. — N. Zel.
 viridis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 272. — Mexic.

TILOCARPUS, Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl.*

- Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 247. **OLACINEAE**.
 papuanus, Engl. *l. c.* (= *Lasianthera papuana*, Becc.). — N. Guin.

TILLANDSIA, Linn. (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 1080.

- achyrostachys, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 171. — Mexic.
 adpressa, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 566; et *Bromel. Andreanae* (1889) 67 t. 23b. — Ecuad.
 Alberti X, Ed. André, *l. c.* 577. — Hybr. artef.
 alta, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 226 (= *Vriesia alta*, Ed. Morr.). — Am. centr.

TILLANDSIA : —

- amazonica, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 108; et *Handb. Bromel.* (1889) 220. — Reg. Amazon.
 amethystina, Baker, *l. c.* 106; et 218; et in *Bot. Mag.* (1890) t. 7121. — Bras.
 Andreana, Ed. Morr. ex Ed. André, in *Rev. Hort.* (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 85 t. 29b. — Columb.
 Appuniana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 213. — Guian. angl.
 Araujei, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 600. — Bras.
 Armadae, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 106. — Columb.
 arpcalix, Ed. André, *l. c.* 567; et 101 t. 38. — Ecuad.
 Aschersoniana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 68. — Costa-Rica.
 astragaloides, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 601. — Am. austr. (Terr. Mission.).
 atrichoides, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. ii.* IV. (1895) 491 = *lohiacea*, Mart.
 Bakeriana, Britton, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 170; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 165. — Bras.
 bandensis, Baker, *l. c.* 234; et 165. — Uruguay.
 Barbeyana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 66. — Ecuad.
 Barclayana, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 239; et *Handb. Bromel.* (1889) 171. — Ecuad.
 Barilleti, Baker, *l. c.* xxvi. (1888) 79; et 215 (= *Vriesia Barilleti*, Ed. Morr.). — Peruvia.
 Beleana, Ed. André, *Bromel. Andreanae* (1889) 69 t. 24b. — Columb.
 Benthiana, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 15. — Mexic.
 Billbergiae, Baker, *l. c.* 48. — Mexic.
 bivittata, Hort. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 16, in syn. = *Cryptanthus bivittatus*, Regel.
 Blanchetiana, Baker, *l. c.* 182. — Bras.
 boliviensis, Baker, in *Mém. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 267. — Bolivia.
 Botteri, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 183. — Mexic.
 Bourgaei, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 278. — Mexic.
 brachycephala, Baker, *l. c.* xxvi. (1888) 40; et *Handb. Bromel.* (1889) 201. — Peruvia.
 brachyphylla, Baker, *l. c.* 16; et 200. — Bras.
 brachypoda, Baker, *l. c.* xxv. (1887) 231. — Venezuela.
 bracteosa, Klotzsch, ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 169. — Ins. S. Doming.
 brassicoides, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 12; et *Handb. Bromel.* (1889) 189. — Bras.
 brevibracteata, Baker, *l. c.* xxv. (1887) 346; et 191. — Ins. Martinic.
 brevifolia, Baker, *l. c.* 239 = *incarnata*, H. B. & K.
 brevispicula, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 567 = *Beleana*, Ed. André.
 Brittoniana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 195. — Bolivia.
 Brunonis, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 92 t. 34. — Columb.
 Caldasiana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 199. — Bras.
 caracasana, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 44; et *Handb. Bromel.* (1889) 206. — Venezuela.
 carinata, Baker, *l. c.* 49; et 212 (= *Vriesia carinata*, Wawra). — Bras.
 Carrierei, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 93 t. 30b. — Columb.
 caulescens, Brongn. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 168. — Peruvia.
 chagresiana, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 109; et *l. c.* 222. — Panama.
 chilensis, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 166. — Chili.
 chontalensis, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 237; et *l. c.* 169. — Nicaragua.
 citrina, Baker, *l. c.* (1889) 224. — Bras.
 Clauseniana, Baker, *l. c.* 213. — Bras.
 Closoni X, Hort. ex Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1890) 203. — Hybr. artef.
 columnaris, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 208, in syn. = *cyanea*, Ed. Morr.

TILLANDSIA : —

- conantha, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 228 (= *Acanthospora conantha*, Spreng.). — Peruvia.
 condensata, Baker, l. c. 164. — Bolivia.
 confertiflora, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae*, (1889) 90 t. 26a. — Ecuad.
 corcovadensis, Britton, in *Journ. Bot.* (1888) 172; et *Handb. Bromel.* (1889) 191. — Bras.
 Cornuaulti, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 102 t. 33. — Columb.
 cornucopia, Bertero, ex Ed. André, l. c. (1889) 61, in syn. = *Catopsis nutans*, Baker.
 Cossoni, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 279; et *Handb. Bromel.* (1889) 186. — Mexic.
 crassifolia, Baker, l. c. (1889) 175. — Parag., Bolivia.
 crinita, Herb. Willd. ex Baker, l. c. 160 = *usneoides*, Linn.
 crocata, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 214; et *Handb. Bromel.* (1889) 163. — Bras.
 Crousseana X, Hort. ex Rev. Hort. lx. (1890) 203. — Hybr. artef.
 cryptantha, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 142; et *Handb. Bromel.* (1889) 229. — Mexic.
 cucaensis, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 32 (1891) 7. — Guatem.
 cylindrica, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 155. — Mexic.
 dactylifera, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 181. — Venezuela.
 dasyliriifolia, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 304; et *Handb. Bromel.* (1889) 187. — Hondur.
 decipiens, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 68 t. 24a. — Ecuad.
 decomposita, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 168. — Parag.
 decurvata, Baker, l. c. 216 (= *W. recurvata*, Baker). — Bras.
 denudata, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 96. — Columb.
 didisticha, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 16 = *Lorentziana*, Griseb.
 discolor, Hort. ex Baker, l. c. 4 = *Karatas purpurea*, Antoine.
 Dombeyi, Baker, l. c. 199. — Peruvia.
 drepanocarpa, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 41; et l. c. 202. — Bras.
 drepanoclada, Baker, l. c. 188. — Mexic.
 drepanophylla, Baker, l. c. 176. — Parag.
 Dugesii, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 278; et *Handb. Bromel.* (1889) 185. — Mexic.
 dura, Baker, l. c. (1889) 168. — Bras.
 Duvaliana, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 48; et *Handb. Bromel.* (1889) 213 (= *Vriesia Duvaliana*, Ed. Morr.). — Bras.
 Dyeriana, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 98 t. 32. — Ecuad.
 Eggersii, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 170. — Ins. S. Doming.
 Ehrenbergiana, Klotzsch, ex Baker, l. c. 169 (= *Platystachys Ehrenbergii*, Beer). — Mexic.
 elata, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 46; et *Handb. Bromel.* (1889) 209. — Am. trop.
 Engleriana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 63. — Columb.
 erectiflora, Ed. André, *Bromel. Andreanae* (1889) 86 t. 26b. — Ecuad.
 erectiflora, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 346; et *Handb. Bromel.* (1889) 191. — Bras.
 exserta, Fernald, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 537. — Mexic.
 fastuosa, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 104, t. 37. — Columb.
 firmula, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 603. — Bras.
 flabellata, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 242; et *Handb. Bromel.* (1889) 176. — Guatem.
 flagellifera, Ed. Morr. ex Baker, l. c. (1889) 185, in obs. = *violacea*, Baker.
 fluminensis, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 591. — Bras.

TILLANDSIA : —

- Fournieri, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 183. — Mexic.
 fragrans, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 83 t. 29a. — Ecuad.
 Duratii, Hort. ex *Rev. Hort.* lxiv. (1892) 436, fig. 130 et 131. — Uruguay.
 Fraseri, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 187. — Ecuad.
 Funciana, Baker, l. c. 196. — Venezuela.
 Gayi, Baker, l. c. 179. — Peruvia.
 Geissei, Phil. in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 370, t. 1302, fig. 2; et ex *Rev. Hort.* lxi. (1889) 388. — geniculata, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 190. — Mexic.
 Ghiesbreghtii, Baker, l. c. 208. — Mexic.
 glaucophylla, Baker, l. c. 183 (1887) 243. — Am. trop.
 Glaziovii, Ed. Morr. ex Baker, l. c. (1889) 229. — Bras.
 goniorachis, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 303; et *Handb. Bromel.* (1889) 187. — Bras.
 gradata, Baker, ll. cc. xxvi. (1888) 105; et 217. — Bras.
 graminifolia, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 281 = *monadelpha*, Baker.
 grisea, Baker, l. c. 245 = *latifolia*, Meyen.
 Grisebachiana, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 143 (= *T. tetrantha*, Griseb.). — Venezuela.
 Grisebachii, Baker, l. c. xxv. (1887) 305; et *Handb. Bromel.* (1889) 188. — Venezuela.
 guadelupensis, Baker, l. c. (1889) 213. — Ins. Guadelup.
 guttata, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 108; et l. c. (1889) 221 (= *Vriesia guttata*, Ed. André). — Bras.
 gymnobotrya, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 243; et (1889) 181 [*sphalm.* *gymnobotrya*]. — Mexic.
 gymnophylla, Baker, ll. cc. xxv. (1888) 41; et (1889) 201. — Venezuela.
 Hartwegiana, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 199, in syn. = *Benthamiana*, Klotzsch.
 heterandra, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 83 t. 27. — Columbia.
 heterophylla, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 202 = *virginalis*, Ed. Morr.
 heterostachys, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 106; et *Handb. Bromel.* (1889) 217. — Bras.
 hieroglyphica, Baker, ll. cc. 110; et 224 (= *Vriesia hieroglyphica*, Ed. Morr.). — Bras.
 Hilaireana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 199. — Bras.
 homostachya, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 70 t. 25a. — Ecuad.
 Houzeavii, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 188 = *valenzuelana*, A. Rich.
 Humboldtii, Baker, l. c. 203. — Mexic.?
 imperialis, Ed. Morr. ex Ed. André, *Bromel. Andreanae* (1889) 96, in syn. = *nigrescens*, Ed. André.
 inconspicua, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 74. — Ecuad.
 incurvata, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 49; et *Handb. Bromel.* (1889) 213 (= *Vriesia incurvata*, Gaudich.). — Bras.
 inflata, Baker, in *Bot. Mag.* (1886) t. 6882 = *incurvata*, Baker.
 Itatiaiae, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 110; et *Handb. Bromel.* (1889) 224. — Bras.
 Jenmani, Baker, ll. cc. 545; et 194. — Guian.
 Kalbreyeri, Baker, ll. cc. xxvi. (1888) 45; et 208. — Columb.
 Kirchhoffiana, Wittm. in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 107, fig. 22. — Mexic.
 Kitteliana X, Hort. ex *Rev. Hort.* lxii. (1890) 203. — Hybr. artef.
 Kramerii, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 197. — Bras.
 lajensis, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 88 t. 31b. — Columb.
 lancifolia, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 202. — Bras.
 Langsdorffii, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 598. — Bras.

TILLANDSIA : —

- lateritia, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 566; et *Bromel. Andreanae* (1889) 76 t. 21. — Ecuad.
 latifolia, Meyer, ex Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 277. — Peruvia.
 leioclamys, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 184. — Mexic.
 lineata, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 105. — Columb.
 longibracteata, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 81; et *Handb. Bromel.* (1889) 215. — Venezuela.
 longicaulis, Baker, ll. cc. 80; et 214. — Bras.
 longifolia, Baker, l. c. (1889) 185. — Venezuela.
 longipetala, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1888) 142; et *Handb. Bromel.* (1889) 229. — Columb.
 Lorentzii, « Griseb. » ex *Rev. Hort.* lxiii. (1891) 172 = *Lorentziana*, Griseb.
 Lubbersii, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 218 (= *Vriesia Lubbersii*, Ed. Morr.). — Bras.
 lucida, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 207. — Mexic., Guatem.
 lutea, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 198 (= *Anoplophyllum luteum*, Ed. Morr.). — Uruguay.
 macrocllamys, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 142; et l. c. 180. — Mexic.
 macropetala, Wawra, in *Wien. Ill. Gartenzeit.* (1887) 241, cum ic. = *vaginalis*, Ed. Morr.
 macropoda, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 218. — Bras.
 magna, Baker, l. c. 210. — Ins. Martinic.
 Magnusiana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 66. — Guatem.
 Makoyana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 189. — Mexic.
 Mallemontii, Glaziou, ex Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 608. — Bras.
 martinicensis, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 45; et l. c. 209. — Ins. Martinic.
 Mathewsii, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 236; et l. c. 167. — Peruvia.
 megastachya, Baker, ll. cc. xxvi. (1888) 46; et 210. — Ins. S. Vinc.
 meridionalis, Baker, ll. cc. 15; et 197. — Uruguay.
 micrantha, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 303; et 194. — Ins. Trinit.
 microxiphon, Baker, in *Bot. Mag.* (1893) t. 7320. — Uruguay.
 monadelpha, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 281; et *Handb. Bromel.* (1889) 192. — Guian.
 monadelpha, Wittm. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 4 (1888) 57 = *prae.*
 Moritziana, Klotzsch, ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 174. — Venezuela.
 Morreni, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1888) 189; et l. c. 226 (= *Vriesia Morreni*, Wawra). — Bras.
 myosura, Griseb. (in *Lorentz, Fl. Argent. exsicc.* n. 122) ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 163. — Am. austr.
 myriantha, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 242; et *Handb. Bromel.* (1889) 176. — Venezuela.
 nana, Baker, l. c. 172. — Peruvia.
 nigrescens, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 96 t. 14b. — Columb.
 oligantha, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 345; et *Handb. Bromel.* (1889) 215. — Bras.
 oranensis, Baker, l. c. (1889) 171. — Reg. Argent.
 orizabensis, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 105; et *Handb. Bromel.* (1889) 217. — Mexic.
 oxysepala, Baker, ll. cc. 141; et 228. — Peruvia.
 pachycarpa, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 238. — Ins. Trinit.
 pachycllamys, Baker, l. c. xxvi. (1888) 48. — Guian. angl.
 parabaica, Baker, ll. cc. 82; et *Handb. Bromel.* (1889) 212 (= *Vriesia parabaica*, Wawra). — Bras.
 paraensis, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 586. — Bras.
 Parkeri, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 42; et *Handb. Bromel.* (1889) 205. — Guian. angl.
 Parryi, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 277; et 184. — Mexic.
 parvispica, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 244; et 178. — Bras.

TILLANDSIA : —

- pastensis*, Éd. André, in *Rev. Hortie*, lx, (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 91 t. 39a. — Columb.
- Pastuchoffiana*, Hort. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 226, in syn. = *T. Morreni*, Baker?
- pectinata*, Éd. André, in *Rev. Hortie*, lx, (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 87 t. 30 fig. a.; Baker, l. c. 204. — Columb.
- Pereziana*, Éd. André, ll. cc. 567; et 80. t. 28. — Columb.
- Philippo-Coburgi*, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1888) 138; et *Handb. Bromel.* (1889) 225 (= *Vriesea Philippo-Coburgi*, Wawra). — Bras.
- phyllostachya*, Baker, l. c. xxv. (1888) 143; et in *Bot. Mag.* (1889) 204. — Mexic.
- picta*, Hort. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 215 = *splendens*, Brongn.
- platyptala*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 47 = *Hamaleana*, Éd. Morr.
- Platzmanni*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 104; et *Handb. Bromel.* (1889) 218. — Bras.
- plumosa*, Baker, ll. cc. 13; et 196. — Mexic.
- poenulata*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 230 (= *Vriesea poenulata*, Éd. Morr.). — Hab.?
- Pohlana*, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 517. — Bras.
- polyphylla*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 178. — Bolivia.
- Pringlei*, S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 155. — Mexic.
- prodigiosa*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 140; et *Handb. Bromel.* (1889) 186 (= *Vriesea prodigiosa*, Lem.). — Mexic.
- pulvinata*, Éd. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 190. — Mexic.
- pyramidata*, Éd. André, *Bromel. Andreanae* (1889) 86. — Columbia.
- quadriflora*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 163. — Bolivia.
- ramealis*, Klotzsch, ex Baker, l. c. 161. — Ins. S. Thom.
- rariflora*, Éd. André, in *Rev. Hortie*, lx, (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 95. — Columb.
- rectiflora*, Éd. André, l. c. 567 = *erectiflora*, Éd. André.
- recurvata*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 106 — *decurvata*, Baker.
- Regnelli*, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 592. — Bras.
- Reichenbachii*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 166. — Tucuman.
- remota*, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 32 (1891) 6. — Guatem.
- Restrepeana*, Éd. André, in *Rev. Hortie*, lx, (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 89 t. 22. — Columb.
- reticulata*, Baker, in *Gard. Chron.* (1887) i. 140; et *Handb. Bromel.* (1889) 225 (= *Vriesea reticulata*, Éd. Morr.). — Bras.
- Rex* X, Hort. ex *Rev. Hortie*, lxii. (1890) 202. — Hybr. artef.
- rhodochlamys*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 203. — Mexic.
- rhodocincta*, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 143; et *Handb. Bromel.* (1889) 168. — Guian. angl.
- rhomboides*, Éd. André, in *Rev. Hortie*, lx, (1888) 566; et *Bromel. Andreanae* (1889) 75 t. 20. — Columb.
- rigidula*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 44; et *Handb. Bromel.* (1889) 207. — Guian. angl.
- Riocreuxii*, Éd. André, in *Rev. Hortie*, lx, (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 73 t. 35. — Ecuad.
- Rodigasiana*, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 138; et *Handb. Bromel.* (1889) 225 (= *Vriesea Rodigasiana*, Éd. Morr.). — Bras.
- ropalocarpa*, Éd. André, in *Rev. Hortie*, lx, (1888) 566; et *Bromel. Andreanae* (1889) 66 t. 23a. — Columb.
- rubella*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 44; et *Handb. Bromel.* (1889) 207. — Bolivia.
- rubra*, Hort. ex Baker, l. c. (1889) 4 = *Karatas purpurea*, Antoine.

TILLANDSIA : —

- rupicola*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 13; et *Handb. Bromel.* (1889) 196. — Ecuad.
- Rusbyi*, Baker, l. c. (1889) 176. — Bolivia.
- sanguinea*, Éd. André, in *Tour du Monde*, xxxviii. 367 = *Caraguata sanguinea*, Éd. André.
- sanguinolenta*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 226 (= *Vriesea sanguinolenta*, Cogn. & Él. March.). — Columb.
- scalaris*, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 108; et *Handb. Bromel.* (1889) 221. — Bras.
- scalarifolia*, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 235; et 60. — Bolivia.
- Schenckiana*, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 63. — Columb.
- Schimperiana*, Wittm. l. c. 67. — Columb.
- Schlechtendalii*, (err. cal. *Schlechtendahl*) Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 49; et *Handb. Bromel.* (1889) 213. — Mexic.
- Selloana*, Baker, ll. cc. 104; et 219. — Bras.
- sericea*, Hort. ex Baker, l. c. (1889) 164 = *xiphoides*, Ker.
- Sintenisii*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 12; = *utriculata*, Linn.
- sorataensis*, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 235; et 166. — Bolivia.
- sparsiflora*, E. G. Baker, l. c. xxviii. (1890) 306. — Am. centr.
- sphaerocephala*, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 141; et *Handb. Bromel.* (1889) 228. — Bolivia.
- stenostachya*, Baker, ll. cc. 109; et 222. — Ins. Trinit.
- Stolpi*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 614. — Chili.
- streptocarpa*, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 241; et *Handb. Bromel.* (1889) 175. — Parag.
- strobilantha*, Baker, ll. cc. 168; et 180. — Mexic.
- strobilifera*, Éd. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 181. — Mexic.
- subalata*, Éd. André, in *Rev. Hortie*, lx, (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 70 t. 25b. — Columb.
- subimbricata*, Baker, in *Journ. Bot.* (1887) 307; et *Handb. Bromel.* (1889) 188. — Ins. Trinit.
- sublaxa*, Baker, ll. cc. 280; et 187. — Ind. occ.
- subsecunda*, Wittm. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 217. — Costa Rica.
- Swartzii*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 12; et l. c. 191. — Jamaica.
- tenuispica*, Éd. André, in *Rev. Hortie*, lx, (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 71 t. 31a. — Columb.
- Tequendamae*, Éd. André, ll. cc. 568; et 103 t. 36. — Columb.
- thyrsigera*, Éd. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 185. — Mexic.
- tortilis*, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 237 = *Ehrenbergiana*, Klotzsch.
- tricholepis*, Baker, l. c. 231 = *Bakeriana*, Britton.
- trinitensis*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 211. — Ins. Trinit.
- triticea*, Burchell, ex Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 42; et l. c. 205. — Bras.
- Turneri*, Baker, ll. cc. 143; et 173. — Columb.
- Tweediana*, Baker, ll. cc. 138; et 228. — Bras.
- umbellata*, Éd. André, in *Rev. Hortie*, lviii. (1886) 60, cum ic.; et *Bromel. Andreanae* (1889) 97. — Ecuad.
- unilateralis*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 105; et *Handb. Bromel.* (1889) 218. — Bras.
- Urbaniana*, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 65. — Costa Rica.
- valenzuelana*, Éd. André, in *Rev. Hortie*, lx, (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 80 t. 28. — Columb.
- Veitchii*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 223 (= *Vriesea Veitchii*, Éd. Morr.). — Columb.
- vernicaosa*, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 241; et l. c. 175. — Bras.
- violacea*, Baker, ll. cc. 279; et 185. — Mexic.
- viridiflora*, Hort. ex Baker, l. c. (1889) 214, in syn. = *viminalis*, Hemsl.
- viridiflora*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 81; et *Handb. Bromel.* (1889) 214. — Mexic.
- viridis*, Baker, l. c. 204 (= *Vriesea viridis*, Éd. Morr.). — Bras.
- virginalis*, Éd. Morr. ex *Gard. Chron.* (1888) i. 717 fig. 93; Wittm. in *Gartenfl.* xlv. (1895) 398, fig. 87, 88. — Mexic.

TILLANDSIA : —

- vittata*, Hort. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 16, in syn. = *Cryptanthus bivittatus*, Regel.
- Warmingii*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 104; et *Handb. Bromel.* (1889) 219. — Bras.
- Wawrana*, Baker, ll. cc. 105; et 218 [*sphalm. Wawranae*]. — Bras.?
- Weddellii*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 181. — Bolivia.
- Wilsoni*, S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 266. — Florida.
- xiphophylla*, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 204; et *Handb. Bromel.* (1889) 204. — Mexic.
- yucatanica*, Baker, ll. cc. 280; et 186. — Yucatan.

TIMONIUS, Rumpf. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1082.

- amboinicus*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 133 (= *Polyphragmon amboinicum*, Miq.). — Ins. Amboin.
- anodon*, Boerl. l. c. (= *P. anodon*, Miq.). — Ins. Amboin.
- Bammleri*, K. Schum. in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 56. — N. Guin.
- compressicaulis*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 133 (= *Polyphragmon compressicaule*, Miq.). — Sumatra.
- cuneatus*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 433. — N. Guin.
- Enderianus*, Warb. l. c. 434. — N. Guin.
- fuscus*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 133 (= *Bobea fusca*, Korth.). — Sumatra.
- hydrangiaefolius*, Baill. l. c. (= *Polyphragmon hydrangiaefolium*, Miq.). — Sumatra.
- mutabilis*, Boerl. l. c. 132 = *mutabilis*, Walp.
- novo-guineensis*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 434. — N. Guin.
- ovalis*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 132 (= *Polyphragmon ovale*, Korth.). — Borneo.
- Pseudocapitatus*, Boerl. l. c. (= *P. Pseudocapitatus*, Scheff.). — Malaya;
- splendens*, Boerl. l. c. (= *P. splendens*, Miq.). — Sumatra.
- trichocaulon*, Boerl. l. c. (= *P. trichocaulon*, Miq.). — Malaya.
- sericeus*, K. Schum. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 131; Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 433 = *T. Rumphii*, DC.

TINA, Roem. & Schult. = **Ratonia**, DC. (Sapind.).

velutina, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 462. — Madag.

TINANTIA, Schlecht. (Commelin.). — Ind. Kew. ii. 1083.

- leicalyx*, C. B. Clarke, ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 211. — Guatem.
- macrophylla*, S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 442. — Mexic.
- modesta*, T. S. Brandeg, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. iii. (1889) 175 = *fugax*, Scheidw.

TINGULONGA, Rumpf = **Protium**, Burm. f. (Burser.).

- Almacega*, altissima, Beandu, *Blanchetii*, *brasiliensis*, *Carana*, *Copal*, *crassifolia*, *divaricata*, *elegans*, *feruginea*, *gigantea*, *grandifolia*, *guianensis*, *heptaphylla*, *leicaria*, *insignis*, *laxiflora*, *macrophylla*, *madagascariensis*, *Martiana*, *multiflora*, *nitida*, *obtusifolia*, *ovata*, *paniculata*, *pilosissima*, *polybotrya*, *pubescens*, *reticulata*, *Riedeliana*, *sercata*, *Spruceana*, *subsercata*, *tenuifolia*, *trifoliata*, *venosa*, *Warminiana*, *Widgrenii*, *Zollingeri*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 107-108 = *homonyma omnia* Protii.
- Aracuchini*, Kuntze, l. c. 108 = *P. Aracuchili*, March.
- caudata*, Kuntze, l. c. 107 = *P. Sagotianum*, March.
- cneandria*, Kuntze, l. c. = *P. decandrum*, March.
- Hostmannii*, Kuntze, l. c. = *P. Hostmanni*, Engl.
- leptostachya*, Kuntze, l. c. 108 (= *leica leptostachya*). — Mexic.
- Melionis*, Kuntze, l. c. = *P. Melionis*, Engl.
- Protium*, Kuntze, l. c. = *P. javanicum*, Burm.
- simplicifolia*, Kuntze, l. c. 107 = *P. unifoliolatum*, Engl.

TINNEA, Kotschy & Peyr. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 1083.

arabica, Baker, in Kew Bull. (1894) 339. — Arabia. Fischeri, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 128. — Afr. trop. or. *gracilis*, Guerke, l. c. — Afr. trop. *platyphylla*, Brigg. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 194 [Tinnaea]. — Congo mer. *vesiculosa*, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 129; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92. — Afr. trop. or.

TINOPSIS, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 78; et in Sitzb. Akad. Muench. xx. (1890) 291. **SAPINDACEAE**. *apiculata*, Radlk. l. c. — Madag.

TINOSPORA, Miers (Menisperm.). — Ind. Kew. ii. 1083.

Hullsii, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 6 (= *Pachygone Hullsii*, F. Muell.). — Austral.

TINUS, Burm. = **Ardisia**. Sw. (Myrsin.).

affinis, *ambigua*, *amplexicaulis*, *andamanica*, *arguta*, *Barthesia*, *bhotanica*, *bipinnata*, *borneensis*, *bracteata*, *bracteosa*, *Brandisiana*, *brasiliensis*, *breviflora*, *brevipedata*, *calycosa*, *canaliculata*, *Capollina*, *caribaea*, *caudata*, *cauliflora*, *celebica*, *cestrifolia*, *chinensis*, *compressa*, *confinis*, *coriacea*, *courallensis*, *cubana*, *Cumingiana*, *cuspidata*, *cymosa*, *demissa*, *denticulata*, *depressa*, *divergens*, *dubia*, *durifolia*, *esculenta*, *eximia*, *ferruginea*, *fertilis*, *floribunda*, *foetida*, *fuliginosa*, *fusca*, *fuscopilosa*, *Gardneri*, *glanduloso-marginata*, *grandifolia*, *Griffithii*, *Helferiana*, *Henryi*, *humilis*, *Icara*, *insularis*, *irrasuensis*, *japonica*, *javanica*, *Jung-huhniana*, *khasiana*, *laevigata*, *laevis*, *Lampouga*, *lanceolata*, *laterifolia*, *laurifolia*, *lepidifolia*, *leptantha*, *Lhotzkya*, *Liebmanni*, *linearifolia*, *lineata*, *Lob-biana*, *longifolia*, *lurida*, *luzonensis*, *macrocalyx*, *macrophylla*, *maculata*, *mamillata*, *marginata*, *mem-branacea*, *micrantha*, *microphylla*, *Missionis*, *mon-tana*, *Moonii*, *nicaraguensis*, *negrescens*, *nigricans*, *nigropunctata*, *nitidula*, *nutans*, *odontophylla*, *Oliveri*, *Opegrapha*, *orinocensis*, *palembanica*, *paniculata*, *pauciflora*, *pedunculosa*, *pellucida*, *Perrottetiana*, *petocalyx*, *philippinensis*, *Pickeringia*, *plagioneura*, *polycephala*, *porosa*, *propinqua*, *Pseudojambosa*, *ptero-caulis*, *pubicalyx*, *pyramidalis*, *pyrifolia*, *quinquangu-laris*, *ramiflora*, *reclinata*, *reflexa*, *revoluta*, *rhyncho-phylla*, *rigida*, *rubiginosa*, *Schomburgkiana*, *sessilis*, *Spanoghei*, *sphenobasis*, *squamulosa*, *Storkii*, *stylosa*, *subcuneata*, *sumatrana*, *sumbarana*, *swinamensis*, *tenuiramis*, *ternatensis*, *tinifolia*, *tomentosa*, *triflora*, *turbacensis*, *undulata*, *verrucosa*, *virens*, *Wallichii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 403, 973-74 = *homonyma omnia Ardisiae*.

acuminata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 973 = *Ardisia Kurzii*, C. B. Clarke.

adenanthera, Kuntze, l. c. 974 = *Parathesis adenan-thera*, Hook. f.

anceps, Kuntze, l. c. = *Ardisia Blumei*, A. DC.

angustifolia, Kuntze, l. c. 973 = *A. semicrenata*, Mart.

ardisioides, Kuntze, l. c. = *A. decipiens*, A. DC.

attenuata, Kuntze, l. c. 405 = *A. oxyphylla*, Wall.

Bakeriana, Kuntze, l. c. 973 = *A. laurifolia*, A. DC.

Balfouriana, Kuntze, l. c. — Ins. Rodriguez.

borbonica, Kuntze, l. c. 974 (= *Badula borbonica*, A. DC.). — Ins. Borbon.

bumelioides, Kuntze, l. c. = *Ardisia bumelioides*, Griseb.

Candolleana, Kuntze, l. c. 973 = *A. angustifolia*, A. DC.

Clarkeana, Kuntze, l. c. 973 = *A. zeylanica*, C. B. Clarke.

clusioides, Kuntze, l. c. 974 = *A. clusioides*, Griseb.

complanata, Kuntze, l. c. = *A. colorata*, Roxb.

crassa, Kuntze, l. c. = *A. insularis*, Baker.

crispa, Kuntze, l. c. 405 = *A. crenata*, Roxb.

cybianthoides, Kuntze, l. c. 974 = *A. cybianthoides*, Miq.

densa, Kuntze, l. c. = *A. crenata*, Roxb.

denticulata, Kuntze, l. c. = *A. semicrenata*, Mart.

diagensis, Kuntze, l. c. 405. — Java.

TINUS : —

disticha, Kuntze, l. c. = *Pimelandra disticha*, Benth. & Hook. f.

erecta, Kuntze, l. c. = *P. erecta*, C. B. Clarke.

erythroxyloides, Kuntze, l. c. = *Ardisia erythroxy-loides*, Thou.

escallonioides, Kuntze, l. c. = *A. escallonioides*, Schlecht. & Cham.

eugeniaefolia, Kuntze, l. c. = *Pimelandra eugeniae-folia*, Benth. & Hook. f.

Faberi, Kuntze, l. c. = *Ardisia Faberii*, Hemsl.

Forsterii, Kuntze, l. c. = *A. Forsterii*, Scheff.

frangulaefolia, Kuntze, l. c. = *A. frangulaefolia*, Zipp. & Scheff.

Grisbachiana, Kuntze, l. c. 973 = *A. multiflora*, Griseb.

guadalupensis, Kuntze, l. c. 974 = *A. guadalupensis*, Duchass.

guianensis, Kuntze, l. c. 973 = *A. acuminata*, Willd.

Hostmannii, Kuntze, l. c. 974 = *A. Hostmanni*, Miq.

jacquinioides, Kuntze, l. c. = *A. jacquinioides*, Griseb.

jambosioides, Kuntze, l. c. = *A. crassa*, C. B. Clarke.

Keenani, Kuntze, l. c. = *A. Keenani*, C. B. Clarke.

Korthalsiana, Kuntze, l. c. = *Pimelandra Walli-chii*, A. DC.

Kurzeana, Kuntze, l. c. 973 = *P. Griffithii*, C. B. Clarke.

latifolia, Kuntze, l. c. = *Ardisia Sieberi*, Baker, vel *guadalupensis*, Duchass.

Maingayi, Kuntze, l. c. = *A. crassa*, C. B. Clarke.

Martiana, Kuntze, l. c. 974 = *A. latipes*, Mart.

multiflora, Kuntze, l. c. = *A. insularis*, Baker.

myristifolia, Kuntze, l. c. = *A. myristicaefolia*, Blume.

obovata, Kuntze, l. c. 973 = *A. Hamiltonii*, A. DC.

ovata, Kuntze, l. c. 974 = *A. colorata*, Roxb.

pachysandra, Kuntze, l. c. 973 = *Pimelandra Wal-lichii*, A. DC.

paludosa, Kuntze, l. c. 974 (= *Monoporus paludosus*, A. DC. — Madag.

pergamacea, Kuntze, l. c. = *Embelia pergamacea*, A. DC.

polysticta, Kuntze, l. c. = *Ardisia crenata*, Sims.

primulifolia, Kuntze, l. c. = *A. primulaefolia*, Gardn. & Champ.

punctata, Kuntze, l. c. = *A. crenata*, Sims.

racemosa, Kuntze, l. c. = *A. Pyrgus*, Roem. & Schult.

reticulata, Kuntze, l. c. 975 = *A. insularis*, Baker.

rhomboidea, Kuntze, l. c. = *A. rhomboidea*, Wight.

semicrenata, Kuntze, l. c. = *A. acuminata*, Willd.

serrata, Kuntze, l. c. = *A. Cavanillesii*, Roem. & Schult.

Sieboldii, Kuntze, l. c. = *A. Sieboldi*, Miq.

Sprengelii, Kuntze, l. c. 974 = *A. racemosa*, Spreng.

simplex, Kuntze, l. c. 405. — Java.

sublaevigata, Kuntze, l. c. 974 = *A. Martiana*, Miq.

thyrsiflora, Kuntze, l. c. 974 = *A. neriifolia*, Wall.

xylostoides, Kuntze, l. c. = *A. xylostoides*, Griseb.

zeylanica, Kuntze, l. c. 974 = *A. Moonii*, C. B. Clarke.

TIPULARIA, Nutt. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1083.

unifolia, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 51 = *discolor*, Nutt.

TIRANIA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 657; Pax, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 236. **CAPPARIDEAE**.

purpurea, Pierre, l. c. 658; et 236. — Cochinch.

TISONIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 568. **TILIACEAE**.

Bailloni, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 3. — Madag.

coriacea, S. Elliot, l. c. — Madag.

ficulnea, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 568; et Hist. pl. Madag. (1889) t. 108. — Madag.

glabrata, Baill. l. c. 572. — Madag.

velutina, Baill. l. c. t. 109; et Hist. pl. Madag. Atlas (1889) t. 109. — Madag.

TISSA, Adans. = **Spergularia**, J. & C. Presl (Caryophyll.).

campestris, Prantl, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b. (1889) 85 = *S. campestris*, Willh.

canadensis, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 152 = *S. media*, Presl.

Clevelandii, Greene, Fl. Francisc. (1891) 127; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 36. — Calif.

diandra, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 131; Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 128 = *Spergularia diandra*, Boiss.

gracilis, Britton, l. c. xvii. (1889) 128 (= *Lepigonum gracile*, S. Wats.). — Calif., Texas.

grandis, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1892) 53 = *Spergularia grandis*, Cambess.

grandis, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 235, et xviii. (1894) 236 = *praec.*

leucantha, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 301; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 36. — Calif.

macrotheca, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 131; Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 129 = *Spergularia macrotheca*, Heyne.

marina, Britton, l. c. xvi. (1889) 126 = *S. media*, Presl.

mexicana, Britton, l. c. 129 = *S. mexicana*, Hemsl.

pallida, Greene, ex Britton, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 36. — Calif.

rubra, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 131; Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 127 = *Spergularia rubra*, Presl.

rubra, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 235 = *praec.*

salina, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 127 = *Spergularia media*, Presl.

sparsiflora, Greene, in Erythea, iii. (1895) 46. — Wyoming.

Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 308. — Peruvia.

Talinum, Greene, in Erythea, i. (1893) 106. — Calif.

tenuis, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 128 (= *Lepigonum tenue*, Greene); et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 37. — Calif.

valida, Greene, in Erythea, i. (1893) 107. — Calif.

villosa, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 62, 129 = *Spergularia villosa*, Cambess.

TITHONIA, Desf. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1083.

brachypappa, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 174. — Mexic.

fruticosa, Canby & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 104 t. 5. — Mexic.

glaberrima, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 371, sphalm. = *Gymnolomia platylepis*, A. Gray.

macrophylla, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 140. — Mexic.

Palmeri, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 104. — Mexic.

speciosa, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxi. 1892 (1893) 203 = *aristata*, Benth.

TITHONIA, Linn. = **Rivina**. Plum. ex Linn. (Phytol.).

humilis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 552 = *R. humilis*, Linn.

TITHYMALODES, Ludw. Defin. (1737) 96, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 620 = **Pedilanthus**.

Neck. (Euphorb.).

angustifolium, *aphyllum*, *articulatum*, *bracteatum*, *cor-dellatum*, *Fendleri*, *Finkii*, *Giesbreghtianum*, *Houl-letii*, *involutatum*, *linearifolium*, *macrocarpum*, *padifolium*, *retusum*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* *Pedilanthi*.

myrtifolium, Kuntze, l. c. = *P. tithymaloides*, Poit.

Oerstedtii, Kuntze, l. c. = *P. Oerstedtii*, Klotzsch & Garcke.

parasiticum, Kuntze, l. c. = *P. ramosissimus*, Boiss.

Pavonii, Kuntze, l. c. = *P. Pavonis*, Boiss.

TITHYMALUS, Tourn. ex Hall. = **Euphorbia**, Linn.

Kernerii, Huter, ex Pacher, Fl. von Kärnten (1887) 234 = *E. Kernerii*, Huter.
villosus, Pacher, l. c. 233 = *E. pilosa*, Linn.

TOCOCA, Aubl. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 1086.

capitata, Trail, ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 615; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 967. — Bras.

ferruginea, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 49. — Am. austr.

imperialis, Nichols. l. c. — Peruv.

lasiostyla, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 455; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 971. — Bras.

longisepala, Cogn. ll. cc. 449; et 968. — Bras.

platyphylla, Cogn. ll. cc. 437; et 961. — Bras.
Poortmanni, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 971. — Ecuad.

Spruceana, Cogn. l. c. 964. et in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 443; et l. c. 964 — Bras.

subglabrata, Cogn. ll. cc. 438; et 961. — Bras.

symphyandra, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 963. — N. Granat.

Trailii, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 626; et l. c. 967. — Bras.

TOCOYENA, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1086.

formosa, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 347 (= *Gardenia formosa*, Cham. & Schlecht.). — Bras.

guianensis, K. Schum. l. c. 346. — Guian. gall.

longiflora, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 74 (= *Gardenia formosa*, Cham. & Schlecht.). — Bras.

lychnophora, Casaretto, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 348 = *brasiliensis*, Mart.

Selloana, K. Schum. l. c. 349 = *Gardenia Sellowiana*, Cham. & Schlecht.

TODDALIA, Juss. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 1086.

crenulata, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 228. — Afr. trop. or.

densiflora, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 303. — Madag.

Ellioti, Radlk. ex S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 9. — Madag.

eugeniaefolia, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 75 = *simplicifolia*, Engl.

Fischeri, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 228. — Afr. trop. or.

glomerata, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 18. — Afr. trop.

macrophylla, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 303. — Madag.

nitida, Baker, l. c. — Madag.

pilosa, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 228. — Afr. trop. or.

sansibarensis, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

simplicifolia, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 369; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 228. — Afr. trop. or.

trichocarpa, Engl. l. c. 228. — Afr. trop. or.

TODDAVADDI[A] Zan = **Oxalis**, Linn. (Geran.).

calophylla, casta, dormians, somnians, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 96 = *homonyma omnia* Oxalidis.

dendroides, Kuntze, l. c. = *O. dendroides*, H. B. & K.

mimosoides, Kuntze, l. c. = *O. mimosoides*, A. St Hil.

sensitiva, Kuntze, l. c. = *Biophytum sensitivum*, DC.

TOECHIMA, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1086.

hirsutum, Radlk. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 67; et in Sitzb. Akad. Muench. xx. (1890) 266. — N. Guin.

livescens, Radlk. l. c. 266. — Borneo.

subteres, Radlk. l. c. 267. — Hab.?

TOFIELDIA, Huds. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1086.

divergens, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 157. — China.

macilentia, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 95. — Tibet.

guineensis, H. Schultze, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 330. — Afr. trop.

Moritziana, H. Schultze, l. c. (= *Isidrogalea Moritziana*, Klotzsch). — Am. austr.

racemosa, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 55 = *pubens*, Willd.

Schomburgkiana, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 285 t. 49a (Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 206.). — Guian. angl.

thibetica, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 95. — China occ.

TOLUIFERA, L. = **Myroxylon**, Linn. f. (Legumin.).

peruifera, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 389 (= *T. peruifera*, Baill.) = *M. peruiferum*, Linn. f.

pubescens, Taub. l. c. (= *T. pubescens*, Baill.) = *M. pubescens*, H. B. & K.

TOLYPANTHUS, Blume = **Loranthus**, Linn.

Gardneri, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 249 = *L. Gardneri*, Thw.

lageniferus, Van Tiegh. l. c. xlii. (1893) 249 = *L. lageniferus*, Wight.

TONDUZIA, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 464, nomen = **Durandia**, Boeck. (Cyper.).

macrophylla, Boeck. l. c. = *D. macrophylla*, Boeck.

TONNINGIA, Neck. = **Cyanotis**, D. Don (Commel.).

angusta, axillaris, barbata, capitata, cristata, cucullata, djurensis, fasciculata, foecunda, geniculata, hirsuta, incerta, Kerliana, kewensis, lavata, longifolia, Mannii, nodiflora, papilionacea, parasitica, pauciflora, pilosa, tuberosa, vaga, vaginata, villosa, vivipara, Wightii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 722-23 = *homonyma omnia* Cyanotidis.

arachnoidea, Kuntze, l. c. 722 = *C. arachnoidea*, C. B. Clarke.

glaberrima, Kuntze, l. c. = *C. barbata*, D. Don.

mollucana, Kuntze, l. c. = *C. uniflora*, Hassk.

polyrhiza, Kuntze, l. c. = *C. polyrrhiza*, Hochst.

zeylanica, Kuntze, l. c. = *C. ceylanica*, C. B. Clarke.

TOPOBEA, Aubl. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 1088.

Andreana, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 974; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1085. — N. Granat.

ciliata, Cogn. l. c. 1089. — Ecuad.

Durandiana, Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 268. — Costa Rica.

Maurofernandeziana, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1193; et l. c. 267. — Costa Rica.

Pittieri, Cogn. ll. cc. 1088; et 268 — Costa Rica.

Regeliana, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1085. — Panama.

Trianaei, Cogn. l. c. 1083. — N. Granat.

Watsonii, Cogn. l. c. 1089. — Guatem.

TORDYLIUM, Tourn. ex Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1088.

pustulosum, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 268. — As. Min.

TORENIA, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1089.

setulosa, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 72. — Japon.

Thouarsii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 468 = *parviflora*, Buch-Ham.

TORICELLIA, DC. (Cornac.). — Ind. Kew. ii. 1089.

angulata, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1893. — China.

TORILIS, Adans. = **Caucalis**, Linn. (Umbell.).

aglochis, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 208; in Termész. Füzet. xii. (1890) 4; A. Kern.

Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 25. — Hung.

Eminii, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58, 62; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 301, in syn. = *gracilis*, Engl.

gracilis, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 301. — Afr. trop.

homophylla, Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 28. — As. Min.

Sintenisii, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 167 = *Caucalis Sintenisii*, Freyn.

TOUNATEA, Aubl. = **Swartzia**, Schreb. (Legumin.).

acuminata, acutifolia, alterna, apetalata, aptera, argentea, Benthamiana, bracteosa, Blanchetii, calophylla, cardiosperma, caribaea, conferta, corrugata, crocea, cuspidata, dicarpa, discolor, dodecandra, elegans, eriocarpa, Flemingii, floribunda, fugax, grandifolia, Hostmanni, latifolia, laurifolia, laxiflora, leiocalycina, leptopetala, macrocarpa, macrostachya, madagascariensis, Martii, Matthewsii, microcarpa, mollis, multijuga, myrtifolia, oblonga, panamensis, pendula, picta, pilulifera, pinnata, polyphylla, racemosa, pulchra, recurva, rosea, Schomburgkii, sericea, Sprucei, tomentosa, Trianaei, velutina, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 390-91 = *homonyma omnia* Swartziae.

arborescens, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xvi. (1889) 325 (= *Pascalia arborescens*, Aubl.) = *S. triphylla*, Willd.

Glazioviana, Taub. in Flora, lxxii. (1892) 82. — Bras.

simplex, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 391 = *S. grandiflora*, Willd.

theodora, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 81. — Bras.

TORMINARIA, M. Roem. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).

latifolia X, Dippel, Handb. Laubholz, iii. (1893) 388 = *P. rotundifolia*, Moench.

tormalis, Dippel, l. c. 387 = *P. tormalis*, Ehrh.

TORNABENEA, Parl. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1090.

insularis, E. H. L. Krause, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 409 = *insularis*, Parl.

TOULICIA, Aubl. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1090.

brachyphylla, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 232. — Venezuela.

TOURNEFORTIA, Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 1090.

aurata, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 352 (= *Heliotropium auratum*, Phil. olim). — Chili.

cordifolia, Ed. André, in Rev. Hortie. lix. (1887) 128 fig. 26, 27. — Am. austr.

TOURNESOLIA, Nissol. ex Scop. = **TOURNESOL**, Adans. = **Chrozophora**, Neck. [1790] (Euphorb.).

Brocchiana, gracilis, obliqua, plicata, senegalensis, tinctoria, verbascifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 621 = *homonyma omnia* Chrozophorae.

obliqua, Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 135 = *C. obliqua*, A. Juss.

tinctoria, Baill. Bot. médic. (1884) 932 = *C. tinctoria*, Neck.

Warionii, Kuntze, l. c. = *C. Warionis*, Coss.

TOUROULIA, Aubl. = **Quina**, Aubl. (Guttif.).

decastyla, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xix. (1889) 218. — Bras.

Jenmani, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1998. — Guian. angl.

pteridophylla, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xix. (1889) 218. — Bras.

TOVOMITA, Aubl. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 1092.

acuminata, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1888) 449. — Bras.

bahiensis, Engl. l. c. 445. — Bras.

brevistaminea, Engl. l. c. 446. — Bras.

TOVOMITA : —

- cephalostigma, *Vesque, Epharmosis*, iii. (1889) t. 96; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 207. — Guian. gall.
 Eggersii, *Vesque, Il. cc.* 19; et 203. — Ins. Trinit. elliptica, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. (1888) 453. — Bras.
 Glazioviana, *Engl. l. c.* 445. — Bras.
 Goudotiana, *Cambess. ex Vesque, in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 521. — Madag.
 Jenmani, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. (1888) 447. — Guian. angl.
 Martiana, *Engl. l. c.* 453. — Bras.
 martinicensis, *Vesque, Epharmosis*, ii. (1889) 19; et iii. (1889) t. 103-05; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 216. — Ins. Martinic.
 Melinoni, *Vesque, Il. cc.* 20, t. 100, 101; et 217. — Guian. gall.
 obovata, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. (1888) 451. — Bras.
 Riedeliana, *Engl. l. c.* 449. — Bras.

TOVOMITOPSIS, Planch. & Triana = **Chrysorchlamys**, Poepp. & Endl. (Guttif.).
 Saldanhae, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. (1888) 457. — Bras.
 Spruceana, *Engl. l. c.* 458. — Bras.

TOWNSENDIA, Hook. (Composit.). — Ind. Kew. ii. 1092.

excapa, Porter, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 321 = *sericea*, Hook.
montana, M. E. Jones, in *Zoë*, ii. (1893) 262 = *scapigera*, Eaton.

TOXICODENDRON, Linn. = **Rhus**. Tourn. (Anacard.).

abyssinicum, *acutidens*, *africanum*, *albomarginatum*, *amplum*, *Andrieuxii*, *angolense*, *angustifolium*, *Aucherii*, *Bolusii*, *Burkeanum*, *ciliatum*, *copallinum*, *coriaceum*, *Coriaria*, *crenatum*, *cuneifolium*, *dentatum*, *discolor*, *dissectum*, *divaricatum*, *Dregeanum*, *Echlonianum*, *erosum*, *excisum*, *glabrum*, *glaucum*, *glutinatum*, *gracillimum*, *grandidens*, *grandifolium*, *Griffithii*, *Guinzii*, *Hindsianum*, *horridum*, *hypoleucum*, *incanum*, *incisum*, *insigne*, *integrifolium*, *khasianum*, *Kirkii*, *Krebsianum*, *laevigatum*, *lanceum*, *laurinum*, *Lentii*, *longipes*, *longispinum*, *lucidum*, *macrocarpum*, *macrophyllum*, *microphyllum*, *molle*, *mysurense*, *natalense*, *nitidum*, *nodosum*, *obovatum*, *paniculatum*, *parviflorum*, *pentaphyllum*, *populifolium*, *puberulum*, *pumilum*, *punjabense*, *refractum*, *Rehmannianum*, *retinorrhoeum*, *rigidum*, *rosmarinifolium*, *rubifolium*, *Schiedeanum*, *scoparium*, *scotophyllum*, *semialatum*, *sempervirens*, *sinuatum*, *Sonderi*, *stenophyllum*, *succedaneum*, *tenuinerve*, *terebinthifolium*, *thyrsiflorum*, *tomentosum*, *trichocarpum*, *tridactylum*, *tridentatum*, *trilobatum*, *typhinum*, *undulatum*, *villosum*, *villosissimum*, *viminale*, *viticifolium* *Wallichii*, *Welwitschii*, *Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 153-54 = *homonyma omnia* Rhois.
Burchellii, Kuntze, l. c. 153 = *Rhus* *Burchellii*, Sond.

celastroides, Kuntze, l. c. = *R.* *celastroides*, Sond.
elongata, Kuntze, l. c. = *R.* *mucronata*, Thunb.
glaucovirens, Kuntze, l. c. 154 = *R.* *Zeyheri*, Sond.
oxyacanthum, Kuntze, l. c. = *R.* *albida*, Schousb.
potentillifolium, Kuntze, l. c. = *R.* *potentillaefolium*, Turcz.

pyroides, Kuntze, l. c. = *R.* *pyroides*, Burch.
pinnatum, « Mill. » ex Dippel, *Handb. Laubholz*, ii. (1892) 379, sphalm. = *R.* *venenata*, DC.
Quartinianum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 153 = *R.* *glaucescens*, A. Rich.

quercifolium, « Michx. », ex Dippel, *Handb. Laubholz*, ii. (1892) 376 = *R.* *Toxicodendron*, Linn.
radicans, Kuntze, l. c. = *R.* *Toxicodendron*, Linn.
retusum, Kuntze, l. c. 154 = *R.* *rufa*, Teyss. & Binn.

silvestre, Kuntze, l. c. = *R.* *silvestris*, Sieb. & Zucc.
simarubifolia, Kuntze, l. c. = *R.* *simarubaeifolia*, A. Gray.

striata, Kuntze, l. c. 153 = *R.* *juglandifolia*, Wall.
transvaalensis, Kuntze, l. c. = *R.* *transvaalensis*, Engl.

vernux, Kuntze, l. c. = *R.* *venenata*, DC.

TOXOCARPUS, Wight. & Arn. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1093.
leonensis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 92. — Sierra Leone.

TOXYLON, Rafin. = **Maclura**. Nutt. (Urtic.).
pomiferum, Sarg. in *North Am. Sylva*, vii. (1895) 89 [Toxylon, Rafin.] = *M. aurantiaca* Nutt.

TOZZIA, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1093.
carpathica, Woloszcz. in *Spraw. Kom. fizyj.* Krakow. xxvii. (1892) 216, ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 388, nomen, et xliiii. (1893) 108 = *alpina*, Linn.?

TRACHELIOPSIS, Buser, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 524 = **TRACHELIOPSIS**, Opiz = **Campanula**, Tourn.
albicans, Buser, l. c. 531 (= *Campanula petraea*, Auct. Gall.). — Gall. mér.
petraea, Buser, l. c. 528 = *C. petraea*, Linn.
Postii, Buser, l. c. 527 t. 19 = *Trachelium* *Postii*, Boiss.
tubulosa, Pierre, l. c. 525 = *T. tubulosum*, Boiss.

TRACHELIUM, Tourn. ex Linn. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 1092.
halteratum, Bianca, ex Buser, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 515. — Sicil.
Postii, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 336. — Syria.

TRACHELOSPERMUM, Lem. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1093.

Bowringii, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 99 (= *Parechites* *Bowringii*, Hance). — Ins. Hong Kong.
divaricatum, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 173 = *jasminoides*, Lem.
lucidum, K. Schum. l. c. 173 = *fragrans*, Hook. f. *speciosum*, Hort. Berol. ex Leonhard, in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 99. — Hab.?
stans, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 394. — Mexic.

TRACHYDIUM, Lindl. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1093.

daucoides, Franch. in *Nov. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* viii. 1885 (1886) 245 (= *Ligusticum daucoides*, Franch.). — Tibet.
Delavayi, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII.* vi. (1894) 110. — Yunnan.
hispidum, Franch. l. c. 113. — Yunnan.
purpurascens, Franch. l. c. 112. — Yunnan.
rubrinerve, Franch. l. c. — Yunnan.
viridiflorum, Franch. l. c. 111. — Yunnan.

TRACHYLOBIUM, Heyne (Legumin.). — Ins. Kew. ii. 1094.
verrucosum, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 457 = *verrucosum*, Oliver.

TRACHYMENE, DC. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1094.

Croniniana, F. Muell. in *Vict. Natural.* xi. (Feb. 1895) 114; et ex *Bot. Centralbl.* lxii. (1895) 29 t. 93 (= *Didiscus Croninianus*, F. Muell.). — Austr.
Eatoniae, F. Muell. l. c. ix. (Aug. 1892) 57; et li. (1894) 357. — Austral.
elachocarpa, F. Muell. l. c. xi. (Feb. 1895) 144 [elachocarpa]. — Austral.
Maxwellii, F. Muell. l. c. ix. (Aug. 1892) 56; et in *Bot. Centralbl.* li. (1892) 396 [sphalm. T. Maxwell]. — Austral.
saniculaefolia, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2308. — Borneo.

TRACHYPHYNIUM, Benth. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1094.

Danckelmannianum, J. Braun & K. Schum. in *Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 153. — Afr. trop. occ.
Poggeanum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 431. — Afr. trop. occ.
Preussianum, K. Schum. l. c. 430. — Afr. trop. occ.
violaceum, Ridl. in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 133. — Angola.

TRACHYPOGON, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1094.

secundum, ARechav. in *Anal. Mus. nac. Montevideo*, iii. (1895) 270 (= *Heteropogon secundum*, Presl). — Am. austr.
spicatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 794 = *polymorphus*, Hack.

TRADESCANTIA, Rupp. ex Linn. (Commelin.). — Ind. Kew. ii. 1095.

angustifolia, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 185. — Mexic.
brevifolia, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 323 t. 16. — Am. bor.
guatemalensis, C. B. Clarke, ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 210. — Guatem.
montana, Shutt. ex Small & Vail, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 160 = *virginica*, Linn.
Palmeri, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 113. — Mexic.
pilosa, Heyne, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 387, in syn. = *Cyanotis pilosa*, Schult. f.
pinetorum, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 247 (= *P. tuberosa*, Greene, non Roxb.). — Am. bor.
Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 157. — Mexic.
Reginae, L. Linden & Rodigas, in *Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 29, t. 547, et xli. (1894) 13, fig. 2. — Peruvia.
subscaposa, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xv (1890) 29. — Guatem.
superba, L. Linden & Rodigas, in *Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 69 t. 555. — Peruvia.?

TRAGACANTHA, Tourn. = **Astragalus**, Tourn. (Legum.).

abbreviata, *aboriginorum*, *abyssinica*, *acaulis*, *acicularis*, *acinacifera*, *acmophylla*, *acmotricha*, *acuta*, *adsurgens*, *adunciformis*, *adusta*, *aegobroma*, *ajubensis*, *alatavia*, *Alberti*, *albicans*, *albicaulis*, *aliena*, *alindana*, *alexandrina*, *algarbiensis*, *Alopecias*, *Alopecurus*, *Alpamarcae*, *alpina*, *altaica*, *amalecitana*, *amana*, *amara*, *amata*, *ambigua*, *ambiolepis*, *Amherstiana*, *Ammodendron*, *ammodytes*, *ammophila*, *ammotropha*, *amoena*, *amphilogia*, *ampullaria*, *anacamptia*, *anacardia*, *anatolica*, *ancistrocarpa*, *ancylea*, *andalanica*, *Andersonii*, *Andrachne*, *andrachnifolia*, *angarensis*, *angulosa*, *angustata*, *angustiflora*, *angustifolia*, *Antilibani*, *apollinea*, *aprica*, *Arbuscula*, *arcuata*, *arenaria*, *argaea*, *arganatica*, *argurica*, *argutensis*, *argyrostachys*, *argyrothamnus*, *arida*, *arizonica*, *armata*, *arnacantha*, *asciocalyx*, *askabadensis*, *askia*, *aspadana*, *aspera*, *atlantica*, *atrata*, *atropatana*, *atropurpurea*, *Aucherii*, *angana*, *aulacoloba*, *aurea*, *Austinae*, *australis*, *austriaca*, *bachtirica*, *bactriana*, *baghensis*, *baibutensis*, *baicalensis*, *bakaliensis*, *bakuensis*, *Balan-sae*, *barbata*, *Beckwithii*, *Benthamiana*, *berysia*, *berythea*, *bethlehemica*, *bhotanensis*, *bicolor*, *bicuspis*, *Biebersteinii*, *biflora*, *bivoluta*, *Biserrula*, *bisulcata*, *Bodeana*, *Boissieri*, *Bolanderi*, *bombicina*, *Bourgovii*, *brachybotrys*, *brachycalyx*, *brachycarpa*, *brachycentra*, *brachyceras*, *brachyclada*, *brachyloba*, *brachyodontia*, *brachyptera*, *Brachypus*, *brachystachys*, *brachytropis*, *brahuica*, *Brandegei*, *brazoensis*, *brevifolia*, *brevipes*, *Breweri*, *Bruguierei*, *Buceras*, *buchtormensis*, *Bukseana*, *Burkeana*, *cachinalensis*, *cadmica*, *caespitosa*, *calabrica*, *callichroa*, *Calliphysa*, *callistachys*, *calophylla*, *calvescens*, *calycina*, *calycosa*, *campestris*, *camptoceras*, *camptylantha*, *campylorhyncha*, *campylo-semi*, *canadensis*, *cancellata*, *candidissima*, *Candolleana*, *canescens*, *cana*, *canoatra*, *capillipes*, *Capito*, *cappadocica*, *caprina*, *Cavaganae*, *carduchorum*, *cariensis*, *caryocarpa*, *caryoloba*, *Casei*, *castellana*, *catacampta*, *cataonica*, *caudiculosa*, *cauquensis*, *Cedreti*, *cephalantha*, *cephalobea*, *cephalopoda*, *chalarantha*, *chaetodonta*, *chaetoloba*, *chaetopoda*, *chelonobea*, *chionophila*, *chlorocarpa*, *chlorodontia*, *chlorosphaera*, *chlorostachys*, *chlorostegia*, *chorassanica*, *chorinensis*, *Christiana*, *chrysanthia*, *chrysophylla*, *chrysoptera*, *chrysostachys*, *chrysotricha*, *chthonocephala*, *Cicer*, *cicerella*, *cicerifolia*, *ciliolata*, *cinerea*, *citrina*, *clavata*, *Closiana*, *cobrensis*, *coelestis*, *cognata*, *collina*, *columnaris*, *coluteocarpa*, *commixta*, *comosa*, *compacta*, *complanata*, *complicata*, *compressa*, *concinna*, *conden-*

TRAGACANTHA : —

sa'ta, *confusa*, *consanguinea*, *contortuplicata*, *cordata*, *coriacea*, *corniculata*, *Coronilla*, *corrugata*, *costata*, *Coulteri*, *Cracca*, *crassa*, *crassinervia*, *crassispina*, *crenophila*, *cretacea*, *cretica*, *crinita*, *cruciata*, *cruentiflora*, *cryptantha*, *cuscutaria*, *cuneifolia*, *curtipes*, *curviflora*, *curvirostris*, *Cuscuta*, *cyanea*, *cylindrica*, *cymbocarpa*, *cymbostegis*, *cypria*, *cyrtobasis*, *cysticalyx*, *dactylocarpa*, *daenensis*, *damascena*, *Darumbium*, *dasyantha*, *daurica*, *debilis*, *declinata*, *decumbens*, *decurvens*, *deinacantha*, *demavendica*, *densiflora*, *densifolia*, *depauperata*, *dependens*, *depressa*, *derbendica*, *dictyocarpa*, *dictyoloba*, *dictyophylla*, *didymocarpa*, *didymophylla*, *dilecta*, *diluta*, *Diopogon*, *diphtheritis*, *diphtheroloba*, *diphysa*, *dipodura*, *dipsacea*, *distans*, *distorta*, *divaricata*, *Dodii*, *dolia*, *dolichophylla*, *Doniana*, *Dorcoceras*, *Douglasii*, *drepanophora*, *Drummondii*, *drupacea*, *drusorum*, *ecbatana*, *Echidna*, *Echinops*, *Echinus*, *edulis*, *effusa*, *Ehrenbergii*, *elbrusensis*, *elegans*, *elmaliensis*, *elongata*, *elymaica*, *emarginata*, *Emodi*, *Epiglottis*, *episcopa*, *eremophila*, *Eremothamnus*, *eriacma*, *eriacna*, *ericalyx*, *ericocephala*, *erioceras*, *erionata*, *erriophylla*, *erriopoda*, *eriosphaera*, *eristyla*, *erythrolepis*, *erythrotaenia*, *eschkeensis*, *excapa*, *fabacera*, *falcata*, *falciformis*, *falcinella*, *Falconeri*, *farcta*, *fasciculifolia*, *Fendleri*, *Fenzlii*, *ferruginea*, *filamentosa*, *filicaulis*, *filifolia*, *filipes*, *finitima*, *flaccida*, *flavescens*, *flexa*, *flexuosa*, *floccosa*, *florida*, *fodinarum*, *foliolosa*, *follicularis*, *Fontanesii*, *fragifera*, *fragrans*, *Fraxinella*, *fraxinifolia*, *Fresenii*, *Frickii*, *frigida*, *fruticosa*, *gaebobotrys*, *galactites*, *galegiformis*, *Garboncillo*, *Gebleri*, *gemina*, *geminiflora*, *geniculata*, *geocyma*, *gerensis*, *Geyeri*, *ghilanica*, *Gibbsii*, *Gilliesii*, *gilva*, *glabrifolia*, *glabriuscula*, *gladiata*, *glandulifera*, *glareosa*, *glauca*, *glauca*, *glaucocephala*, *Glaux*, *globiceps*, *globiflora*, *globosa*, *glomerata*, *glumacea*, *glycyphyllus*, *Gombo*, *Gompholobium*, *gossypina*, *gracilenta*, *gracilipes*, *gracca*, *grammocalyx*, *Grantii*, *graveolens*, *Griffithii*, *grisea*, *Gryphus*, *gudrunensis*, *Guelldenstedtia*, *gummifera*, *gymnoloba*, *gymnopoda*, *gyzensis*, *Haarbachii*, *haematocarpa*, *Halicacaba*, *Hallii*, *Halodendron*, *hamosa*, *Hancockii*, *hasbeyana*, *Hausknechtii*, *Haydeniana*, *Helbreichii*, *hellenica*, *Helleri*, *Helmii*, *Hemiphysa*, *heratensis*, *hermonica*, *heterodoxa*, *Heydii*, *hilaris*, *himalayana*, *hirsuta*, *hirsutissima*, *hirta*, *hirticalyx*, *hispidula*, *Hohenackeri*, *hololeuca*, *holopila*, *holoptera*, *holosemia*, *Hookeriana*, *Hornii*, *horrida*, *hostilis*, *Huetii*, *humilis*, *humillima*, *humistrata*, *hyalolepis*, *hymenocalyx*, *hymenocystis*, *hymenostegis*, *hypogaea*, *hypoglottis*, *hypoleuca*, *hypsogeton*, *hyrcana*, *Hystrix*, *idaea*, *iliensis*, *incana*, *incurva*, *infesta*, *inflata*, *inflexa*, *intermedia*, *iodantha*, *iodotropis*, *ischredensis*, *ispahanica*, *ispirensis*, *janthina*, *Jambertiana*, *jejuata*, *jediana*, *Jessenii*, *Johannis*, *jubata*, *junceae*, *juvenalis*, *kadshorenensis*, *kahirica*, *karabaghensis*, *karakugensis*, *karputana*, *karstiana*, *kentodes*, *heratensis*, *Kessleri*, *Keyserlingii*, *khassiana*, *hirindica*, *koburensis*, *kohrudica*, *koschkukenis*, *Kotschyana*, *kuhistana*, *kuldshensis*, *kurdica*, *kurramensis*, *kurtischumensis*, *lactea*, *laeta*, *lagocephala*, *lagonyx*, *Lagowskii*, *Lagurus*, *Lamarchii*, *lanata*, *lanceolata*, *lanigera*, *lanuginosa*, *larica*, *lasioglottis*, *lasiopetala*, *lasiostylis*, *lasiostyla*, *lateritia*, *latifolia*, *leioclada*, *leioloba*, *lentiformis*, *lentiginosa*, *leontina*, *lepidantha*, *leporina*, *lepsensis*, *lepta*, *leptacantha*, *leptalea*, *leptocarpa*, *leptocaulis*, *leptocentra*, *leptophylla*, *lessertoides*, *leucacantha*, *leucocephala*, *leuoclada*, *leucozyanea*, *leucolachna*, *leucomalla*, *leucomelas*, *leucophaca*, *leucophylla*, *leucopsis*, *lilacina*, *Lindheimeri*, *lincata*, *Listoniae*, *lithophila*, *litorea*, *lobophora*, *lonchocarpa*, *longicaulis*, *longicuspis*, *longiflora*, *longifolia*, *longistyla*, *lotiflora*, *lunata*, *lupulina*, *luxurians*, *lycia*, *macrobotrys*, *macrocarpa*, *macrocephala*, *macrochlamys*, *macrodon*, *macroloba*, *macroplumata*, *macrophala*, *macroptera*, *macroptila*, *macropus*, *macrorrhiza*, *macrosepa*, *macrosemia*, *macrostachys*, *macrotropis*, *macroura*, *maculata*, *malaca*, *malacophylla*, *marcotica*, *Marshalliana*, *masenderana*, *mauritanica*, *maxima*, *media*, *megacarpa*, *megalantha*, *megalocystis*, *megalomera*, *megalotropis*, *melaleuca*, *melanoculys*, *melanocarpa*, *melanoccephala*, *melanodon*, *melanophruria*, *melanostachya*, *melina*, *melitenensis*, *membranacea*, *Mercklinii*, *meridionalis*, *mesites*, *mesogitana*, *mesoleia*, *mesoptera*, *mexicana*, *Meyeri*, *Michauxiana*, *micracme*, *micranistra*, *micranthella*,

TRAGACANTHA : —

microcephala, *microcystis*, *microloba*, *microphysa*, *microptera*, *microthamna*, *miniata*, *minima*, *minor*, *minutissima*, *misera*, *Mitchelliana*, *modesta*, *mollissima*, *monadelphica*, *monanthema*, *monsessulana*, *monticola*, *mossulensis*, *mucaida*, *mucronata*, *mucronifolia*, *multicaulis*, *multiceps*, *multijuga*, *Munroi*, *muradica*, *murina*, *Muschiana*, *myriacantha*, *nana*, *nanodes*, *narbonensis*, *nematodes*, *neurocarpa*, *nevadensis*, *nicharensis*, *nitens*, *nicialis*, *Noeana*, *nothoxys*, *nucleifera*, *nuda*, *nummularia*, *nurensis*, *obcordata*, *oblongifolia*, *obscura*, *obtusifolia*, *ochreata*, *ochrobica*, *ochroleuca*, *odorata*, *oleifolia*, *oligophylla*, *oncotricha*, *Onobrychis*, *oocarpa*, *ocephala*, *oophora*, *ophiocarpa*, *orbiculata*, *orthantha*, *orthocarpa*, *ortholoba*, *otiponensis*, *ovalis*, *ocallensis*, *oxyglottis*, *oxyodon*, *oxyphysa*, *oxyrhyncha*, *oxysenia*, *oxytropifolia*, *pachyacantha*, *pachystachys*, *Pallasii*, *pallenscens*, *Paliseri*, *Palmeri*, *pamphylica*, *pandurata*, *pannosa*, *paradoxa*, *paralipomena*, *paralutges*, *paraplesia*, *Parnassi*, *Parryi*, *parva*, *parviceps*, *pauciflora*, *paucijuga*, *pectinata*, *peduncularis*, *pelligera*, *pellita*, *pennata*, *pentaglottis*, *pergrina*, *petraea*, *petropylensis*, *physocalyx*, *physodes*, *Pickeringii*, *pictus*, *piestoloba*, *pinetorum*, *piptoccephala*, *pisidica*, *placens*, *plattensis*, *platyphylla*, *platyraphis*, *platysmata*, *platytropis*, *plebeja*, *plumosa*, *podocarpa*, *podoloba*, *podosphaera*, *poecilantha*, *polaris*, *polemia*, *polemoniaca*, *poliotes*, *polyantha*, *polybotrys*, *polyacantha*, *polyceras*, *polyphylla*, *pontica*, *porphyracma*, *porphyrobaphis*, *porrecta*, *Preussii*, *procera*, *procumbens*, *prolixa*, *prostrata*, *Przewalskii*, *pseudaustralis*, *pseudocaspia*, *psilacantha*, *psilacma*, *psilodonta*, *psilostyla*, *ptero-carpa*, *ptilodes*, *psychophylla*, *pubentissima*, *puberula*, *pubiflora*, *pugionifera*, *pulchella*, *puleinata*, *punctata*, *purpurascens*, *Purschii*, *pusilla*, *pynocephala*, *pynoloba*, *pynostachya*, *pyrrhotricha*, *quadriscutata*, *quinquefoliolata*, *racemosa*, *racemulosa*, *radiata*, *radkanensis*, *raphiodontha*, *rariflora*, *Rauwolfii*, *Reboudii*, *recognita*, *redunca*, *reflexa*, *refracta*, *Reinii*, *remotiflora*, *remotifolia*, *remotijuga*, *reptans*, *retamocarpa*, *reticulata*, *Reuteriana*, *rhizantha*, *rhodochroa*, *rigidula*, *Robbinsii*, *robusta*, *rosea*, *rostrata*, *rubriflora*, *rubrostriata*, *rugosa*, *runcinata*, *rufifraga*, *ruscifolia*, *rytidocarpa*, *sabuletorum*, *saccata*, *saccocalyx*, *sachalinensis*, *saganlugensis*, *Sahendi*, *salatavica*, *salsuginea*, *samamensis*, *sancta*, *sanguinolenta*, *scaberrima*, *scabrifolia*, *scabriseta*, *schahrudensis*, *Schanganiana*, *Schelichowii*, *Schimperii*, *schiracica*, *schistocalyx*, *schizoptera*, *Schottiana*, *Schrenkiana*, *schurabica*, *sciadophora*, *sciurea*, *sclerocarpa*, *scleroclada*, *scleropodia*, *scleroxylon*, *scoparia*, *scopolorum*, *Scorpius*, *secunda*, *seidabadensis*, *Seidlitzii*, *Semenovii*, *semibilocularis*, *semipellitus*, *sericophylla*, *sericostachya*, *serotina*, *sesamea*, *sesquiflora*, *setulosa*, *Sewertzowii*, *seytunensis*, *Shortiana*, *Sibthorpiana*, *sicula*, *Sieberi*, *Sieversiana*, *sigmodea*, *sikkimensis*, *siliquosa*, *simplificifolia*, *singarensis*, *sinica*, *siririca*, *sisyrodites*, *sitiens*, *sivasica*, *skythropa*, *sofica*, *Soyeri*, *Spachiana*, *sparsa*, *sparsiflora*, *speciosa*, *sphaerocarpa*, *sphaeracantha*, *sphaerocarpa*, *sphaerocystis*, *sphaerophylla*, *spinella*, *spinescens*, *squalida*, *squarrosa*, *Stella*, *stenocera*, *stenolepis*, *stenophylla*, *stenosemia*, *stenostegia*, *Steveniana*, *Stewartii*, *stipitata*, *stipulata*, *Stockii*, *straminea*, *striatella*, *stricta*, *strictifolia*, *strictispina*, *strigillosa*, *strigulosa*, *strobilifera*, *stromatodes*, *subalpina*, *subijuga*, *subcompressa*, *submitis*, *subsecunda*, *subulata*, *subulifera*, *succumbens*, *suffalcata*, *suidunensis*, *sulcata*, *sulfurea*, *superba*, *supina*, *susiana*, *syrtischensis*, *tabrisiana*, *talagonica*, *talyschensis*, *tanaitica*, *tarijensis*, *tartarica*, *taurica*, *tauricola*, *Tavernieri*, *tegetaria*, *teheranica*, *tenax*, *tenera*, *tenuicaulis*, *tenuifolia*, *tenuirugis*, *tenuis*, *tephrodes*, *tephroloba*, *testiculata*, *tetragonocarpa*, *thracica*, *Thurberi*, *tibetana*, *Tigridis*, *tmolea*, *tokantensis*, *tomentosa*, *tormentum*, *toruosa*, *Tournefortii*, *trachyacantha*, *trachytirica*, *transoxana*, *Trautvetteri*, *tribulifolia*, *trichocarpa*, *tricholoba*, *trichopoda*, *trichoptera*, *trichostigma*, *tricolor*, *tridactylia*, *triflora*, *trifoliata*, *trifoliolata*, *trigona*, *trigonocarpa*, *trimestris*, *triphylia*, *triradiata*, *tshuyensis*, *tuberculosa*, *turbinata*, *Turczaninowii*, *turkestana*, *tymphestea*, *uliginosa*, *umbellata*, *uniflora*, *unifoliolata*, *unifolia*, *unijuga*, *unilateralis*, *urmiensis*, *uranolimnea*, *utahensis*, *utrigera*, *vaccarum*, *vaginans*, *vaginata*, *Vanillae*, *variabilis*, *vegeta*, *veluchensis*, *venosa*,

TRAGACANTHA : —

ventorum, *venulosa*, *vera*, *verrucosa*, *versicolor*, *verticillaris*, *vesicaria*, *vesiculosa*, *vestita*, *vestillaris*, *viciaefolia*, *villosa*, *villosissima*, *virgata*, *viridis*, *Vulnerariae*, *Wagneri*, *wartocensis*, *Webberi*, *Webbiana*, *Whitneyi*, *Wiedemanniana*, *wolgensis*, *Wrightii*, *xanthotricha*, *xerophila*, *xiphocarpa*, *yuralica*, *zacharensis*, *zachlensis*, *zansharensis*, *zardana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 942-49 = *homonyma omnia Astragali*.
aciphylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 940 = *Astragalus acutifolius*, Schlecht.
acutifolia, Kuntze, l. c. = *A. Pseudostella*, Delile.
adunca, Kuntze, l. c. 942 = *A. Bungeanus*, Boiss.
aeluropus, Kuntze, l. c. = *A. aeluropus*, Bunge.
afghana, Kuntze, l. c. = *A. affghanus*, Boiss.
Agranioti, Kuntze, l. c. = *A. Agranioti*, Orph.
Aitchisonii, Kuntze, l. c. = *A. Aitchisoni*, Baker.
alicantensis, Kuntze, l. c. 940 = *A. hispanicus*, Coss.
alidaghensis, Kuntze, l. c. = *A. elatus*, Boiss. & Bal.
allepica, Kuntze, l. c. = *A. aleppicus*, Boiss.
alopeurodes, Kuntze, l. c. = *A. alopecuroides*, Linn.
alysodes, Kuntze, l. c. = *A. alyssoides*, Lam.
andina, Kuntze, l. c. (= *Phaca Bustillosii*, Phil.). — *Chili*.
angustissima, Kuntze, l. c. = *Astragalus oxypetalus*, Bunge.
ankyloides, Kuntze, l. c. = *A. ankylotus*, Fisch. & Mey.
anserinaefolia, Kuntze, l. c. = *A. anserinaefolius*, Boiss.
anthylloides, Kuntze, l. c. = *A. anthylloides*, Lam.
arkalykensis, Kuntze, l. c. = *A. arkalykensis*, Bunge.
armenica, Kuntze, l. c. = *A. armeniacus*, Boiss.
Arnoceras, Kuntze, l. c. = *A. brachyceras*, Ledeb.
Arnottiana, Kuntze, l. c. (= *Phaca Arnottiana*, Gill.). — *Chili*.
asperula, Kuntze, l. c. = *Astragalus epiglottis*, Linn.
atacamensis, Kuntze, l. c. (= *Phaca depauperata*, Phil.). — *Chili*.
baetica, Kuntze, l. c. 210 = *Astragalus baeticus*, Linn.
bayonnensis, Kuntze, l. c. = *A. bayonnensis*, Loisel.
Belangeri, Kuntze, l. c. = *A. tenellus*, Bunge.
bella, Kuntze, l. c. (= *Phaca pulchella*, Clos.). — *Chili*.
beludshistana, Kuntze, l. c. 943. — *Belutchist*.
Berteroana, Kuntze, l. c. 940 (= *Phaca canescens*, Hook. & Arn.). — *Chili*.
Berteroi, Kuntze, l. c. 943 = *Astragalus Berteri*, Colla.
Bienertii, Kuntze, l. c. = *A. Bienerti*, Bunge.
bifida, Kuntze, l. c. = *A. multicaulis*, Ledeb.
Bigelowii, Kuntze, l. c. = *A. Bigelowii*, A. Gray.
bisinflata, Kuntze, l. c. (= *Phaca inflata*, Gill.). — *Chili*.
Bourgeana, Kuntze, l. c. = *Astragalus Bourgaeanus*, Coss.
brachypodia, Kuntze, l. c. = *A. lagurus*, Willd.
Brackenridgei, Kuntze, l. c. = *A. Brackenridgei*, A. Gray.
bracteosa, Kuntze, l. c. = *A. aksuensis*, Bunge.
brevialata, Kuntze, l. c. (= *Phaca brachyptera*, Phil.). — *Chili*.
bunacantha, Kuntze, l. c. = *Astragalus bounacanthus*, Boiss.
bunophila, Kuntze, l. c. = *A. bounophilus*, Boiss. & Hohen.
Bustillosii, Kuntze, l. c. = *B. Bustillosii*, Clos.
californica, Kuntze, l. c. = *A. candidissimus*, Ledeb. ?
carinata, Kuntze, l. c. 943 (= *Phaca carinata*, Hook. & Arn.). — *Chili*.
caspia, Kuntze, l. c. = *Astragalus caspicus*, Bieb.
caucasia, Kuntze, l. c. = *A. caucasicus*, Pall.
ceratodes, Kuntze, l. c. = *A. ceratoides*, Bieb.
Chamissonii, Kuntze, l. c. (= *Phaca Chamissonis*, Vog.). — *Chili*.
Chardinii, Kuntze, l. c. = *Astragalus Chardini*, Boiss.
Chaubartii, Kuntze, l. c. = *A. Wulfeni*, Koch.
chilensis, Kuntze, l. c. (= *Phaca chilensis*, Nees). — *Chili*.

TRAGACANTHA : —

- choica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 944 = *Astragalus latifolius*, Lam.
chordorrhiza, Kuntze, l. c. = *A. chordorrhizus*, Fisch.
cilicica, Kuntze, l. c. 941 = *A. cilicius*, Boiss.
clandestina, Kuntze, l. c. (= *Phaca clandestina*, Phil.), — Chili.
conferta, Kuntze, l. c. = *Astragalus hippocrepides*, Benth.
coquimbensis, Kuntze, l. c. (= *Phaca coquimbensis*, Hook. & Arn.), — Chili.
cornuta, Kuntze, l. c. 941 = *Astragalus vimineus*, Pall.
Cossonii, Kuntze, l. c. 944 = *A. chlorocyaneus*, Boiss. & Reut.
Crotolariae, Kuntze, l. c. = *A. oocarpus*, A. Gray.
Cruikshankii, Kuntze, l. c. = *A. Cruikshankii*, Griseb.
curvicaulis, Kuntze, l. c. (= *Phaca curvicaulis*, Clos.), — Chili.
cuspidata, Kuntze, l. c. = *Astragalus schizopterus*, Boiss.
cystisoides, Kuntze, l. c. = *A. cystisoides*, Bunge.
dasyglossis, Kuntze, l. c. = *A. Hypoglottis*, Linn.
decemjuga, Kuntze, l. c. = *A. psilacanthus*, Boiss.
deluensis, Kuntze, l. c. = *A. griseus*, Boiss.
dendroides, Kuntze, l. c. = *A. dendroides*, Kar. & Kir.
denutata, Kuntze, l. c. = *A. microcephalus*, Willd.
ebenodes, Kuntze, l. c. = *A. ebenoides*, Boiss.
Edmondi, Kuntze, l. c. 941 = *A. pectinatus*, Boiss.
eriantha, Kuntze, l. c. = *A. gummifer*, Labill.
eriocarpa, Kuntze, l. c. = *A. mollis*, Bieb.
ervodes, Kuntze, l. c. 944 = *A. ervoides*, Hook. & Arn.
eubrychioides, Kuntze, l. c. = *A. eubrychioides*, Boiss.
expansa, Kuntze, l. c. = *A. Kotschyanus*, Boiss.
filaginea, Kuntze, l. c. = *A. gossypinus*, Fisch.
firma, Kuntze, l. c. 941 (= *Phaca robusta*, Phil.), — Chili.
Fischeriana, Kuntze, l. c. 945 = *Astragalus pilodes*, Benth.
flava, Kuntze, l. c. (= *Phaca flava*, Hook. & Arn.), — Chili.
flaviflora, Kuntze, l. c. 941 = *Astragalus flavus*, Nutt.
formosa, Kuntze, l. c. = *A. concinnus*, Benth.
Forskali, Kuntze, l. c. 945 = *A. Forskahl*, Boiss.
frutescens, Kuntze, l. c. = *Brongniartia robinoides*, Kunth.
Gaillardotii, Kuntze, l. c. = *Astragalus Gaillardotii*, Boiss.
Gayana, Kuntze, l. c. 941 = *A. lanuginosus*, Clos.
genistoides, Kuntze, l. c. 945 = *A. genistoides*, Boiss.
Germannii, Kuntze, l. c. = *A. Germanii*, Phil.
glycyphyllos, Kuntze, l. c. = *A. Glycyphyllos*, Linn.
granatensis, Kuntze, l. c. 941 = *A. Poterium*, Vahl.
grandis, Kuntze, l. c. (= *Phaca macrocarpa*, Phil.), — Chili.
grata, Kuntze, l. c. 945 (= *P. grata*, Clos.), — Chili.
Grayi, Kuntze, l. c. = *Astragalus Grayus*, Parry.
Hartwegii, Kuntze, l. c. 941 = *A. Hartwegi*, Benth.
Heldreichii, Kuntze, l. c. = *A. vestitus*, Boiss. & Heldr.
Hendersonii, Kuntze, l. c. 945 = *A. Hendersoni*, Baker.
Heydii, Kuntze, l. c. = *A. Heydii*, Baker.
Hoffmeisteri, Kuntze, l. c. 941 = *A. adesmiaefolius*, Benth.
hosackioides, Kuntze, l. c. 945 = *A. hosackioides*, Benth.
hymenocarpa, Kuntze, l. c. = *A. chartaceus*, Ledeb.
hymenochlaena, Kuntze, l. c. = *A. angustiflorus*, K. Koch.
iodostachys, Kuntze, l. c. = *A. jodostachys*, Boiss. & Buhse.
iranica, Kuntze, l. c. = *A. mollis*, Bieb.
Kapherriana, Kuntze, l. c. 941 = *A. persicus*, Fisch. & Mey.
karamasica, Kuntze, l. c. 945 = *A. orthodontus*, Bunge.

TRAGACANTHA : —

- kashmirensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 945 = *Astragalus caschmirensis*, Bunge.
kellensis, Kuntze, l. c. = *A. kellensis*, Boiss. & Hausskn.
lagopodes, Kuntze, l. c. = *A. lagopoides*, Lam.
laguroides, Kuntze, l. c. = *A. laguroides*, Pall.
Landbeckii, Kuntze, l. c. (= *Phaca Landbeckii*, Phil.), — Chili.
lapponica, Kuntze, l. c. 941 = *Astragalus arcticus*, Bunge.
lasiocaulis, Kuntze, l. c. = *A. pachyacanthus*, Bunge.
laxa, Kuntze, l. c. = *A. remotifolius*, Boiss. & Hausskn.
laxiflora, Kuntze, l. c. = *A. bracteosus*, Boiss. & Noë.
Laxmannii, Kuntze, l. c. 946 = *A. adsurgens*, Pall.
leocalyx, Kuntze, l. c. = *A. laetus*, Bunge.
Lemmonii, Kuntze, l. c. = *A. Lemmonii*, A. Gray.
Leontonyx, Kuntze, l. c. = *A. oleifolius*, DC.
leptothalama, Kuntze, l. c. 946 = *A. leptothamnus*, Boiss.
lessertioides, Kuntze, l. c. = *A. lessertioides*, Benth.
libanotica, Kuntze, l. c. = *A. Echinus*, DC.
longior, Kuntze, l. c. 941 (= *Phaca elongata*, Phil.), — Chili.
Lyallii, Kuntze, l. c. 946 = *Astragalus Lyalli*, A. Gray.
lycioides, Kuntze, l. c. = *A. lycioides*, Boiss.
macrophysa, Kuntze, l. c. (= *Phaca macrophysa*, Phil.), — Chili.
Maxwellii, Kuntze, l. c. = *Astragalus tibetanus*, Benth.
medicaginea, Kuntze, l. c. = *A. Kotschyanus*, Boiss.
melilotodes, Kuntze, l. c. = *A. melilotoides*, Pall.
mesochledensis, Kuntze, l. c. = *A. meschedensis*, Bunge.
Michauxii, Kuntze, l. c. 941 = *A. glaber*, Michx.
micrantha, Kuntze, l. c. = *A. Nuttallianus*, DC.
missouriensis, Kuntze, l. c. 946 = *A. missouriensis*, Nutt.
Moellendorffii, Kuntze, l. c. = *A. Moellendorffii*, Bunge.
mollis, Kuntze, l. c. 941 = *A. Humboldtii*, A. Gray.
mongolica, Kuntze, l. c. 946 = *A. mongolicus*, Bunge.
montana, Kuntze, l. c. 941 = *A. kentrophyta*, A. Gray.
Mortonii, Kuntze, l. c. 946 = *A. Mortonii*, Nutt.
Muelleri, Kuntze, l. c. 941 = *A. Onobrychis*, Linn.
mugodsharica, Kuntze, l. c. 946 = *A. mugosaricus*, Bunge.
neglecta, Kuntze, l. c. 941 = *A. Cooperi*, A. Gray.
nubigena, Kuntze, l. c. 946 (= *Phaca nubigena*, E. Mey.), — Chili.
nudata, Kuntze, l. c. = *Astragalus kurdicus*, Boiss.
nummularioides, Kuntze, l. c. = *A. nummularioides*, Desf.
Nuttallii, Kuntze, l. c. 941 = *A. Menziesii*, A. Gray.
ochrochlora, Kuntze, l. c. 946 = *A. ochrochlorus*, Boiss. & Hohen.
Olginii, Kuntze, l. c. = *A. mossulensis*, Bunge.
oligantha, Kuntze, l. c. (= *Phaca oligantha*, Phil.), — Chili.
olympica, Kuntze, l. c. = *Astragalus boibutensis*, Bunge.
Orbigniana, Kuntze, l. c. = *A. Orbignyanus*, Wedd.
oreodes, Kuntze, l. c. = *A. oreades*, C. A. Mey.
oreophila, Kuntze, l. c. 947 (= *Phaca oreophila*, Phil.), — Chili.
ornithopodioides, Kuntze, l. c. = *Astragalus ornithopodioides*, Lam.
orobodes, Kuntze, l. c. = *A. oroboides*, Hornem.
orthodonta, Kuntze, l. c. = *A. karamasicus*, Boiss. & Bal.
Owerinii, Kuntze, l. c. = *A. Owerini*, Bunge.
pallida, Kuntze, l. c. = *A. drusorum*, Boiss.
paphlagonica, Kuntze, l. c. = *A. atropurpureus*, Boiss.
parviflora, Kuntze, l. c. 941 = *A. gracilis*, Nutt.
Pattersonii, Kuntze, l. c. 947 = *A. Pattersonii*, A. Gray.
Pavillonii, Kuntze, l. c. 941 = *A. canescens*, Bunge.
penduliflora, Kuntze, l. c. = *A. alpinus*, Linn.

TRAGACANTHA : —

- persica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 941 = *Astragalus mesopotamicus*, Boiss.
Philippiana, Kuntze, l. c. (= *Phaca amocna*, Phil.), — Chili.
phlomodis, Kuntze, l. c. 947 = *Astragalus phlomodis*, Boiss.
physalodes, Kuntze, l. c. = *A. physaloides*, DC.
Pinardii, Kuntze, l. c. = *A. Pinardi*, Boiss.
Pississi, Kuntze, l. c. (= *Phaca Pississi*, Phil.), — Chili.
procerior, Kuntze, l. c. 941 = *Astragalus Chippidum*, Bunge.
prusiana, Kuntze, l. c. 947 = *A. Boissieri*, Fisch.
psiloptera, Kuntze, l. c. = *A. genistoides*, Boiss.
psilopus, Kuntze, l. c. 947 = *A. spartioides*, Kar. & Kir.
psoralodes, Kuntze, l. c. = *A. psoraloides*, Willd.
Pulciferiae, Kuntze, l. c. = *A. Pulciferi*, A. Gray.
pungens, Kuntze, l. c. = *A. angustifolius*, Lam.
purpurea, Kuntze, l. c. = *A. hypoglottis*, Linn.
pyncnorhiza, Kuntze, l. c. 947 = *A. pyncnorhizus*, Wall.
pygmaea, Kuntze, l. c. 941 = *A. Chamaeleuce*, A. Gray.
quindecimjuga, Kuntze, l. c. (= *Phaca quindecimjuga*, Phil.), — Chili.
Reedii, Kuntze, l. c. (= *P. Reedii*, Phil.), — Chili.
reflexistipula, Kuntze, l. c. 947 = *Astragalus reflexistipulus*, Miq.
resupinata, Kuntze, l. c. = *A. fragans*, Willd.
rigida, Kuntze, l. c. = *A. melanocephalus*, Boiss.
Rousseauana, Kuntze, l. c. = *A. Rousseauanus*, Boiss.
rubbarica, Kuntze, l. c. = *A. confusus*, Bunge.
rumelica, Kuntze, l. c. = *A. veluchensis*, Boiss.
rupicola, Kuntze, l. c. = *A. peregrinus*, Vahl.
Ruprechtii, Kuntze, l. c. = *A. Ruprechtii*, Bunge.
Schmalhauseni, Kuntze, l. c. = *A. Schmalhauseni*, Bunge.
scorpioides, Kuntze, l. c. = *A. scorpioides*, Pourr.
scrobiculata, Kuntze, l. c. = *A. gymnobolus*, Fisch.
Segethii, Kuntze, l. c. = *A. Segethi*, Phil.
senganaensis, Kuntze, l. c. = *A. senganaensis*, Bunge.
Serenoi, Kuntze, l. c. 941 = *A. nudus*, S. Wats.
sericea, Kuntze, l. c. 942 = *A. sericoleucus*, A. Gray.
Serobischir, Kuntze, l. c. 942 = *A. chrysanthus*, Boiss. & Hohen.
sesamodes, Kuntze, l. c. = *A. sesamoides*, Boiss.
Solanderi, Kuntze, l. c. 210 = *A. Solandri*, Lowe.
Sonora, Kuntze, l. c. 948 = *A. arizonicus*, A. Gray.
Spaldingii, Kuntze, l. c. = *A. Spaldingii*, A. Gray.
spartioides, Kuntze, l. c. = *A. spartioides*, Kar. & Kir.
Spruneriana, Kuntze, l. c. = *A. Spruneri*, Boiss.
striata, Kuntze, l. c. (= *Phaca striata*, Clos.), — Chili.
subacaulis, Kuntze, l. c. = *Astragalus incertus*, Ledeb.
subumbellata, Kuntze, l. c. = *A. hippocrepidis*, Benth.
sultanensis, Kuntze, l. c. = *A. bombycinus*, Boiss.
supervisa, Kuntze, l. c. = *A. Candolleanus*, Boiss.
Szowitsii, Kuntze, l. c. = *A. Szowitsii*, Fisch. & Mey.
talasaea, Kuntze, l. c. = *A. talasseris*, Boiss. & Bal.
tebesiensis, Kuntze, l. c. 942 = *A. cornutus*, Bunge.
tenella, Kuntze, l. c. = *A. multiflorus*, A. Gray.
tephrosioides, Kuntze, l. c. 948 = *A. tephrosioides*, Boiss.
thessala, Kuntze, l. c. = *A. Spruneri*, Boiss.
Thomsonae, Kuntze, l. c. = *A. Thompsonae*, S. Wats.
tragacanthodes, Kuntze, l. c. 942 = *A. coluteoides*, Willd.
tribulodes, Kuntze, l. c. 948 = *A. tribuloides*, Willd.
trichroa, Kuntze, l. c. 942 = *A. tricolor*, Bunge.
trigonellodes, Kuntze, l. c. 948 = *A. trigonellodes*, Boiss.
turkestanica, Kuntze, l. c. 942 = *A. Dipelta*, Bunge.
uralensis, Kuntze, l. c. = *A. macropus*, Bunge.
uspallatensis, Kuntze, l. c. 949 (= *Phaca uspallatensis*, Phil.), — Chili.
usturtensis, Kuntze, l. c. = *Astragalus usturtensis*, Bunge.
vaga, Kuntze, l. c. (= *Phaca vaga*, Phil.), — Chili.

TRAGACANTHA : —

- vicoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 949 = *Astragalus vicoides*, R. Gralh.
Volkmannii, Kuntze, l. c. = A. Volkmanni, Phil.
Watsoniana, Kuntze, l. c. 942 = A. eriocarpus, S. Wats.
Weddelliana, Kuntze, l. c. = A. modestus, Wedd.
Wulffenii, Kuntze, l. c. 949 = A. Wulfeni, Koch.
Zohrabi, Kuntze, l. c. = A. lagopoides, Lam.

TRAGIA, Plum. ex Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 1096.

- brevipes*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 103. — Afr. trop. or.
Buettneri, Pax, l. c. — Gabon.
discolor, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 65 (= *Leptobotrys discolor*, Baill.). — Am. bor.
glabrescens, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 104. — Afr. trop. or.
guatemalensis, Lottsy, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 354. — Guatem.
Klingii, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 105. — Afr. trop. occ.
parvifolia, Pax, l. c. 102. — Afr. trop. or.
Preussii, Pax, l. c. — Kamerun.
subsessilis, Pax, l. c. 101. — Afr. trop. or.
ukambensis, Pax, l. c. 103. — Afr. trop. or.
velutina, Pax, l. c. 104. — Afr. trop. or.
Volkensii, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 240. — Afr. trop. or.

TRAGOCEROS, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1097.

- Mocinianus*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 388. — Mexic.

TRAGOPOGON, [Tourn.] Linn. (Compos.) — Ind. Kew. ii. 1097.

- albinerve*, Freyn. & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 266. — Armen. turc.
Badali, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 112 = *crocifolius*, Linn.
balcanicum, Velen. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 203; et Fl. Bulg. (1891) 355 = *crocifolium*, Linn.
fibrosum, Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 475. — Armen.
glabrum, Nichols, Dict. Gard. iv. (1887) 66 [glaber]. — Europ.
macrocephalum, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 549 = *porrifolium*, Linn.
mirabile X, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) p. xviii [mirabilis]. — Gall.
neglectum X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 26 [neglectus]. — Germ.
rumelicum, Velen. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 15; et in Abh. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) n. xxxvii. 39. — Bulg.

TRAGOPOGONODES, Manetti (1751), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 370 = **Urospermum**, Scop. (Compos.).

- Dalechampii*, Kuntze, l. c. = U. Dalechampii, W. F. Schmidt.
picroides, Kuntze, l. c. = U. picroides, F. W. Schmidt.

TRAPA, Linn. (Onagrar.). — Ind. Kew. ii. 1099.

- colchica*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 237. — Reg. Cauc.
Maximowiczii, Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 336. — As. bor. or.

TRAPELLA, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1595; Stapf, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 265. **PEDALINEAE**.

- sinensis*, Oliver, ll. cc. — China.

TRAUNIA, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 22; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 287. **ASCLEPIADEAE**.

- albiflora*, K. Schum. ll. cc. 23; et 287. — Afr. trop. or.

TRAUTVETTERIA, Fisch. & Mey. (Ranuncul.).

- Ind. Kew. ii. 1099.
carolinensis, Britton, ex A. Murr. & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, ii. (1890) 42 = *palmata*, Fisch. & Mey.

TRECHONAETES, Miers (Solan.). — Ind. Kew. ii. 1099.

- bipinnatifida*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 67. — Chili.
floribunda, Phil. l. c. 66. — Chili.
lanigera, Phil. l. c. — Chili.
machucana, Phil. l. c. 67. — Chili.
parviflora, Phil. l. c. 66. — Chili.

TRECVLIA, Decne (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1099.

- Affona*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 360; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2353. — Reg. Nigrit.
madagascariensis, N. E. Br. l. c. — Madag.
obovoides, N. E. Br. l. c. 361. — Afr. trop. occ.

TREMA, Lour. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1099.

- guineensis*, Priemer, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 426, 469 (= *Celtis guineensis*, Schum.). — Afr. trop.
Hochstetteri, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 190; Priemer, l. c. 425, 470 (= *Sponia Hochstetteri*, Buchinger). — Afr. trop.
integrifolia, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1895) t. 292. — Madag.

TREMATANTHERA, F. Muell. in Vict. Natural. iii. (Oct. 1886) 71; et ex Bot. Centralbl. xxix. (1887) 148. **TERNSTROEMIEAE**.

- Dufaurii*, F. Muell. ll. cc. — N. Guin.

TREMATOCARPUS, Zahlbr. in Annal. Naturh.

- Hofmus. Wien, vi. (1891) 430; Hemsf. in Ann. Bot. vi. (1892) 154; et vii. (1893) 289; Stapf, l. c. vii. (1893) 396 = **Lobelia**, Linn. (Campanul.).
macrostachys, Zahlbr. l. c. 432 = L. macrostachys, Hook. & Arn.

TRETOCARYA, Maxim. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 1100.

- sikkimensis*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 2255. — Reg. Himal.

TREUBELLA, Pierre, Not. Bot. Sapot. (1890) 5. **SAPOTACEAE**.

- macrocarpa*, Pierre, l. c. (= *Palaquium macrocarpum*, Burck). — Sumatra.

TREUBELLA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 265 = **Loranthus**, Linn.

- amplexans*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 87 = L. amplexans, Van Tiegh.
Forsteriana, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 266 = L. Forsterianus, Schult.
glauca, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 436 = L. glaucus, Van Tiegh.
indica, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 267 = L. longiflorus, Desv.
insularum, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 435 = L. insularum, A. Gray.
Mercieri, Van Tiegh. l. c. — N. Caled.
Muelleriana, Van Tiegh. l. c. 87 = *Loranthus Muellierianus*, Van Tiegh.
signata, Van Tiegh. l. c. = L. signatus, Van Tiegh.
triflora, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 267 = L. triflorus, Span.
vitiensis, Van Tiegh. l. c. 266 = L. vitiensis, Seem.

TREUBIA, Pierre, in Boerl. Handl. Fl. Nederl. Indië, ii. (1890) 445. **SAXIFRAGEAE**.

- combretoarpa*, Pierre, l. c. — Ind. bat. (Ceram).

TREVESIA, Vis. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 1100.

- barbata*, carphophagorum, Geelwinkiana, helleborina, insidiator, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 272 = *homonyma omnia* Boerlagiodendri, Burck.
Beccarii, Boerl. in Annal. Gard. Buitenz. vi. (1887) 110; et Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 949. — Sumatra.

TREVESIA : —

- Burckii, Boerl. in Annal. Gard. Buitenz. vi. (1887) 110; et Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 649 (= *Trevesia sundaica*, Regel). — Sumatra.
cheiranthia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 272 = Trev. Burckii, Boerl.
pulcherrima, Kuntze, l. c. = *Eschweilera pulcherrima*, Boerl.
tahitensis, Drake, Fl. Polyn. Franc. (1892) 81. — Ins. Pacif.
Teysmannii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 272 = Boerlagiodendron Teysmannii, Harms.

TRIANTHEMA, Sauv. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 1101.

- Camilli*, Cordem. Fl. Ill. Réunion (1895) 291. — Ins. Borbon.
Cussackiana, F. Muell. in Chem. and Drug. Austral. x. (Oct. 1895) 207; et ex Bot. Centralbl. lxiv. (1895) 364. — Austral.
littoralis, Cordem. Fl. Ill. Réunion (1895) 290. — Ins. Borbon.

TRIANATHERA, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 55. **SCROPHULARIEAE**.

- triandra*, Wettst. l. c. (= *Calceolaria triandra*, Vahl). — Peruvia.

TRIARTHRON, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1892) 985; et Hist. des pl. xi. (1892) 475 = **Loranthus**, Linn.

- loranthoideum*, Baill. ll. cc. — Am. trop.

TRIAS, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1101.

- Stocksii*, Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 781. — Deccan.

- vitrina*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 282. — Tenass.

TRIASPIS, Burch. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 1101.

- axillaris*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 302. — Madag.
choregyna, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 269. — Madag.
diotostigma, Baill. l. c. t. 270. — Madag.
floribunda, Baill. [an O. Hoffm.?] l. c. t. 268. — Madag.
Rehmannii, Szyszyl. Polypt. Rehmann. ii. (1888) 3. — Transv.
speciosa, Niedenzu, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 232. — Afr. trop. or.

TRIATHERA, Desv. = **Bouteloua**, Lag. (Gramin.).

- gracilis*, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 141. — Mexic.

TRIBULUS, Tourn. ex Linn. (Zygophyll.). — Ind. Kew. ii. 1102.

- erectus*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 32. — Afr. austro-occ. extratrop.
inermis, Engl. l. c. 32. — Afr. austro-occ. extratrop.
leptophyllus, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iii. (1891) 8. — Austral.
Pechuelii, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 262. — Afr. austro-occ. extratrop.

TRIBRACHYA, Korth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1102.

- Beccariana*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 137 (= *Dibrachya Beccariana*, Baill.). — Borneo.

TRICALYSIA, A. Rich. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1102.

- acocantheroides*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 382. — Afr. trop. or.
cuneifolia, Baker, in Kew Bull. (1894) 148. — Ins. Aldabra.
Galpinii, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 416. — Transvaal.
Lastii, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 382. — Afr. trop. or.

TRICALYSIA : —

singularis, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 82 (= *Diplospora singularis*, Korth.). — Ind. or., Malaya.

TRICHERA, Schrad. = **Scabiosa**, Linn. (Dipsac.).

bosniaca, Conrath, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 383 = *S. arvensis*, Linn.?
budensis, A. Kern. ex Simonk. in Bot. Centralbl. lviii. (1894) 100 = *S. sylvatica*, Linn.
dinarica, Murb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 399 = *S. sylvatica*, Linn.
neglecta, Conrath, l. c. xxxvii. (1887) 383, in obs. = *S. arvensis*, Linn.?

TRICHILIA, P. Br. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 1104.

Buchananii, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 580. — Afr. trop. austro-or.
Colimana, C. DC. ex f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 40. — Mexic.
Donnell-Smithii, C. DC. ex f. D. Smith, l. c. 2. — Guatem.
emarginata, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 11. — Madag.
gracilis, Loesen, in Flora, lxxii. (1889) 75. — Bras.
Heydeana, C. DC. ex f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 3. — Guatem.
Lehmanni, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 571. — Ins. Jamaica.
levis, C. DC. l. c. 573. — Bras.
ovalis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 14, et iv. (1890) 205, in obs. — Bolivia.
Palmeri, C. DC. in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 38. — Mexic.
peltostylis, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 255. — Madag.
polyclada, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 572. — Parag.
pterophylla, C. DC. l. c. 581. — Afr. austr.
quadrivalvis, C. DC. ex Schinz, l. c. iii. (1895) 402. — Afr. trop. occ.
Volkenii, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 33. — Afr. trop. or.

TRICHINIUM, R. Br. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 1104.

Burtonii, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. ii. (1891) 14. — Austral.

TRICHLORIS, Tourn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1105.

Blanchardiana, Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 59. — Am. austro-occ.

TRICHOCAULON, N. E. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1106.

cactiformis, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) sub t. 1905 (= *Stapelia cactiformis*, Hook.). — Afr. austro-occ. extratrop.
officinale, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 264. — Afr. austr.
pedicellatum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 266. — Afr. austro-occ. extratrop.

TRICHOCENTRUM, Poepp. & Endl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1106.

albiflorum, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 336. — Mexic.
Hartii, Rolfe, l. c. (1894) 395. — Venezuela.
Leeanum, Reichb. f. in Flora, lxxix. (1886) 550. — Am. occ. aequat.?
triquetrum, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 700; et in Lindenia, vii. (1891) 49, t. 311. — Peruvia.

TRICHOCLINE, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1106.

caulescens, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 31. — Chili.
cordifolia, Baker, in Kew Bull. (1892) 197. — Bras.
nivea, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 31. — Chili.
paraguayensis, Baker, in Kew Bull. (1892) 198. — Parag.
peruviana, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 368. — Peruvia.

TRICHOCORONIS, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1106.

riparia, Greene, in Erythea, i. (1893) 42; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 169 (= *Biolettia riparia*, Greene). — Calif.

TRICHODESMA, R. Br. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 1106.

Boissieri, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 436. — Syria.
calycosum, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 92. — Burma.
grandifolium, Baker, in Kew Bull. (1894) 29. — Afr. trop. or.
Hildebrandtii, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 99; et in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 67. — Reg. Somal.
lanceolatum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 269. — Afr. austro-occ. extratrop.
Medusa, Baker, in Kew Bull. (1894) 29. — Angola.
pauciflorum, Baker, l. c. — Ins. Hamish.
stenosepalum, Baker, l. c. (1895) 221. — Reg. Somal.

TRICHODYPsis, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1894) 1165; et Hist. des pl. xiii. (1895) 370.

PALMAE.
Hildebrandtii, Baill. l. c. — Madag.

TRICHOGLOTTIS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1107.

leontoglossa, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 355. — N. Guin.

TRICHOGONIA, Gardn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1107.

scabra, Klatt, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt. ix. (1892) 125. — Bras.

TRICHOLAENA, Schrad. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).

abbreviata, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58. — Afr. trop.
ameihystea, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 356. — Congo gall.
brevipila, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 143. — Afr. austro-occ.
congoensis, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 355. — Congo gall.
Dregeana, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 769. — Natal.
filifolia, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 355. — Gabon.
microstachya, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. (1895) 77 (= *Rhynchelytrum microstachyum*, Balf. f.). — Ins. Socotra.
Monachyron, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2374. — Ins. Cap. Virid., Abyss.
nervigiumis, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 357. — Congo gall.
ruficoma, Hack. in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 142; Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 770. — Reg. Mossamb.
scabrida, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 104. — Afr. trop. or.
unigiumis, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 770. — Nubia.
villosa, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Monachyron villosum*, Parl.). — Ins. Capit. Virid.
Wightii, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 143 = *Wightii*, Nees & Arn.

TRICHOLOBUS, Blume (Connar.). — Ind. Kew. ii. 1108.

africanus, Heckel, in Ann. Fac. Sci. Marseille, Fasc. i. (1891) 16, in obs. — Afr. trop. occ.
verruculosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 155. — Cochinch.

TRICHOPILIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1108.

brevis, Rolfe, in Lindenia, vii. (1891) 91 t. 832; et ex Gard. Chron. (1895) ii. 641 fig. 105. — Peruvia.
Lehmanni, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 371. — Columb.
punctata, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 227. — Costa Rica.

TRICHOPTERYX, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1108.

arundinacea, Hack. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 129 (= *Tristachya arundinacea*, Hochst.). — Afr. trop. or.
barbata, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, l. c. 846 (= *T. barbata*, Nees). — Abyss., Arabia.
elegans, Hack. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 129 (= *Loudetia elegans*, Hochst.). — Afr. trop. or.
elegantula, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2394. — Afr. trop. occ.
grisea, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 109. — Afr. trop. or.
incompta, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 373. — Congo gall.
kagerensis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 109. — Afr. trop. or.
simplex, Hack. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 129, in obs. = simplex, Benth.
somalensis, Engl. l. c. 130 (= *Tristachya somalensis*, Franch.). — Reg. Somal.
spirathera, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 109. — Afr. trop. or.
stipoides, Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 65 (= *Arundinella stipoides*, Hack.). — Madag.

TRICHOSANTHES, Linn. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 1108.

Holtzei, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. i. (Dec. 1886) 447; et in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 275. — Austral.
Muelleri, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 346; et ex F. Muell. Cens. Austral. Pl. F. Suppl. (1889) 4. — Austral.
shikokiana, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 54. — Japon.

TRICHOSCPHA, Hook. f. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 1109.

Braunii, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1892) 111. — Afr. trop. occ.
Buettneri, Engl. l. c. 162, 113. nomen, in obs. — Afr. trop.
camerunensis, Engl. l. c. 109. — Afr. trop. occ.
ferruginea, Engl. l. c. 112. — Afr. trop. occ.
laxiflora, Engl. l. c. 110. — Afr. trop. occ.
liberica, Engl. l. c. 108. — Afr. trop. occ.
parviflora, Engl. l. c. — Afr. trop. occ.
Preussii, Engl. l. c. 110. — Afr. trop. occ.

TRICHOSMA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1110.

coronaria, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 681 = *suavis*, Lindl.

TRICHOSPORUM, D. Don = **Aeschynanthus**, Jack. (Gesner.).

acuminatum, amoenum, Andersoni, apicidens, arfakense, Beccarii, bracteatum, brevicalyx, caudatum, cryptanthum, Curtisii, elongatum, fulgens, geminatum, gracile, Griffithii, hians, Hookeri, Horsfieldii, javanicum, Kingii, lepidospermum, leptocladum, levipes, Lobbianum, longicaule, longiflorum, macracalyx, maculatum, Mannii, marmoratum, Matoniae, Motleyi, micranthum, microphyllum, microtrichum, miniatum, obconicum, obovatum, parvifolium, Perrottetii, philippinense, podocarpum, rubiginosum, siphonanthum, spectosum, superbum, tetraquetrum, Treysmannianum, tricolor, tubiflorum, verticillatum, viridiflorum, Wallichii, zeylanicum, Zollingeri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 477-78 = *homonyma omnia* Aeschynanthi.
Boschianum, Kuntze, l. c. 477 = *A. Lamponga*, Miq.
chiritoides, Kuntze, l. c. = *A. chiritoides*, C. B. Clarke.
parasitica, Kuntze, l. c. = *A. chiritoides*, C. B. Clarke.

TRICHOSTELMA, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 287; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 303. **ASCLEPIADEAE**.
ciliatum, Baill. l. c. 288; et 303. — Mexic.

TRICHOSTEMA, Gronov. ex Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 1110.
suffrutescens, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 483. — Florida.

TRICONDYLIUS, Salisb. & Knight = **Lomatia**. R. Br. (Proteac.).

chilensis, dentata, ilicifolia, obliqua, polymorpha, sinuata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 582 = *homonyma omnia* Lomatiae.

Fraseri, Kuntze, l. c. = *L. ilicifolia*, R. Br.
nigricodes, Kuntze, l. c. = *L. longifolia*, R. Br.

TRICYRTIS, Wall. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1111.

macrantha, Maxim. in Bull. Acad. Petersb. xxxii. (1888) 625. — Japon.

nana, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1893) 39 t. 3. — Japon.

TRIDAX, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1111.
Ehrenbergii, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 145. — Mexic.

erecta, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 390. — Mexic.

Galeottii, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 145. — Mexic.

lanceolata, Klatt, l. c. — Mexic.

leptophylla, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 391. — Mexic.

Liebmannii, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90, in syn. = *Salazia Liebmannii*, Sch. Bip.

Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 351. — Ecuad.

tambensis, Hieron. l. c. — Peruvia,
tenuifolia, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 319. — Mexic.

Trianae, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 350. — Columb.

verticillata, Klatt, in Leopoldina, Heft xxv. (1889) 107. — Bras.

TRIFOLIUM, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1111.

Absadami, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 425. — As. occ.

amoenum, Greene, Fl. Francisc. (1891) 27; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 96. — Calif.

amplectens, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 6 = *stenophyllum*, Nutt.

arizonicum, Greene, in Erythra, iii. (1895) 18. — Arizona.

Barbeyi, Gibelli & Belli, in Atti Accad. Torino, xxii. (1887) 610 t. 8. — Ins. Karpathos.

barbulatum, Freyn & Sint, ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 377 = *aureum*, Poll.

blesense, Dodart, ex Gibelli & Belli, Rev. crit. sp. Trifol. Ital. (1892) 14, in syn. = *subterraneum*, Linn.

brachyodon, Celak. in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 1 = *arvense*, Linn.

brevidens, Conrath & Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 177. — As. centr.

Candollei, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 425. — Syria.

capitellatum, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 9, et iv. (1891) 28; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 246. — Hisp.

Catalinae, S. Wats. ex T. S. Brandeg. in Zöc. i. (1890) 134, nomen; et in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 128. — Calif.

celtibericum, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) n. 7, et iv. (1891) 28. Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 244 = *montanum*, Linn.

chilense, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1889) 35. — Peruvia.

columbinum, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 4; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 96. — Calif.

costatum, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 252, in syn. = *bilineatum*, Fresen.

Delilii, Dalb. ex Gibelli & Belli, in Malpighia, iii. (1889) 230 = *filiforme*, Linn.

diversifolium, Greene, Fl. Francisc. (1891) 33 = *hydrophilum*, Greene.

TRIFOLIUM : —

dolopium, Heldr. & Hochst. ex Gibelli & Belli, in Malpighia, iii. (1889) 228. — Graecia.

Durandoi, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 239 = *physodes*, Stev.

exile, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 6. — Am. bor. filipes, Greene, l. c. 67 = *pauciflorum*, Nutt.

flavulum, Greene, l. c. ii. (May 1892) 223; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 99. — Calif.

franciscanum, Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 100 (= *T. stenophyllum*, Greene). — Calif.

Germanicia, Post, ex Gibelli & Belli, Rev. crit. sp. Trifol. Ital. (1890) 30, in syn. = *physodes*, Stev.

glaucescens, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 79. — Syria.

Hansenii, Greene, in Erythra, iii. (1895) 17. — Calif.

Heldreichianum, Hausskn. in Nym. Consp. Fl. Europ. Suppl. ii. i. (1889) 90; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 72. — Graecia.

Hervieri, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 245; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 543; Debeaux, in Rev. de Bot. xii. (1894) 38. — Hisp.

Howellii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 262. — Oregon.

hydrophilum, Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 100. — Calif.

Johnstoni, Oliver, in H. Johnst. Kilim. Exped. App. (1886) 339, nomen; et in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 331. — Afr. trop. or.

Juliani, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. (1887) 387; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 235. (an *T. Xatardi*, DC.?). — Algeria.

kilimandscharicum, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 254. — Afr. trop. or.

lacerum, Greene, in Erythra, ii. (1894) 182. — Am. bor. occ.

laciniatum, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 7; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 101. — Calif.

lineare, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 6 = *depau-peratum*, Desv.

Minae, Lojacq. ex Ces., Pass. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 714; et Fl. Sicula, ii. i. (1891) 91 t. 9 fig. 1 = *phleoides*, Pourr.

monoense, Greene, in Erythra, ii. (1894) 181. — Calif.

Morleyanum, Greene, l. c. iii. (1895) 47. — Calif.

olivaceum, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 4; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 96. — Calif.

orbelicum, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 33; et Fl. Bulg. (1891) 140. — Bulg.

oreganum, Howell, in Erythra, i. (1893) 110. — Am. bor. occ.

parvulum, G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) ii. 25. — As. occ.

perpusillum, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 333 = *ornithopodioides*, Sm.

pinetorum, Greene, in Erythra, ii. (1894) 182 (*T. involucreatum*, Greene). — Am. bor. occ.

ponticum, Alboff, in Soc. Imp. hort. [Comp. rend. Sect. Odessa] (1892) extr. 7. — Reg. Cauc.

productum, Greene, in Erythra, ii. (1894) 181. — Calif.

Pseudo-badium, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 33; et Fl. Bulg. (1891) 141 [*psedo-badium*] (= *T. badium*, Panc. & Velen.). — Bulg.

Pseudo-medium, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 70. — Graecia.

quercetorum, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 172 = *stenophyllum*, Nutt.

Raddeanum, Trautv. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 105. — Dagest.

roscidum, Greene, Fl. Francisc. (1891) 31; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 98. — Calif.

Rusbyi, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 5. — Am. bor. occ.

saxiculum, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 302. — Reg. Cauc.

scabrellum, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 159 = *tridentatum*, Lindl.

Sintenisii, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 404. — As. Min.

stenophyllum, Greene, Fl. Francisc. (1891) 34 = *franciscanum*, Greene.

TRIFOLIUM : —

thessalonicum, Halácsy & Charrel, ex Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 370. — Maced.

thionanthum, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 71; Gibelli & Belli, in Malpighia, iii. (1889) 207. — Graecia.

triflorum, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 5 = *oliganthum*, Steud.

turcicum, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. (1892-93) 23 = *scabrum*, Linn.

usambarense, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 59, nomen; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 208. — Afr. trop. or.

Velenowskyi, Vandas, ex Velen. Fl. Bulg. (1891) 143. — Bulg.

virescens, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 223; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 99. — Calif.

virginicum, Small, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 112 t. 75. — Virginia.

Willkommii, Chabert, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 145. — Hisp.

TRIFURCIA, Herb. = **Herbertia**, Sweet (Irid.).
pulchella, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 89 = *H. pulchella*.

TRIGLOCHIN, Riv. ex Linn. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 1116.

concinna, Davy, in Erythra, iii. (1895) 117. — Calif.

TRIGONANTHUS pendulus, Korth, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 826; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2100, in syn. = *Ceratostylis pendula*, Hook. f.

TRIGONELLA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1116.

laxiflora, Aitch. & Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 47. — Turkest.

Meyeri-Joannis, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 260. — Afr. trop. or.

Schlumbergeri, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 163. — Syria.

TRIGONOPLEURA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 399; et in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1753. **EUPHORBIACEAE**.

malayana, Hook. f. l. c. — Penins. Mal.

TRIGONOSCIADIUM, Boiss. = **Heracleum**, Linn. (Umbell.).

intermedium, Freyn, & Sint. ex Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 123. — Armen.

TRIGONOSTEMON, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 1118.

villosus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 397. — Perak.

TRIGONOTIS, Stev. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 1118.

Haackei, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 30. — N. Guin.

inoblita, F. Muell. l. c. 31. — N. Guin.

mollis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 153. — China.

TRIGYNAEA, Schlecht. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 1118.

antillana, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 235; et in Journ. Bot. xxxi. (1893) 351. — Ins. S. Vincent.

TRIGYNEIA, Reichb. = **Trigynaea**, Schlecht. (Anon.).

boliviensis, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 14. — Bolivia.

TRILEPIDEA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 28 = **Loranthus**, Linn.

Adamsii, Van Tiegh. l. c. = *L. Adamsii*, Cheeseman.

Ralphii, Van Tiegh. l. c. = *L. Ralphii*, Van Tiegh.

TRILEPIS, Nees = **Kobresia**, Willd. (Cyper.).

Oliveri, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 38 = *Eriospora Oliveri*, C. B. Clarke.

TRILEPIS: —

Rehmanniana, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 676 = *Eriospora Rehmanniana*, C. B. Clarke. *setifera*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Trilepis setifera*, Ridl. ?

TRIMENIA, Seem. (Monim.). — Ind. Kew. ii. 1119.

grandifolia, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 37 (= *Monospora grandifolia*, Hochst.). — Afr. austr.

TRIMEZA, Salisb. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1119.

spathata, Baker, Handb. Irid. (1892) 66 [Trimezia] (= *Lansbergia spathata*, Klatt). — Bras.

TRIMORPHOPETALUM, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 454. GERANIACEAE

dorstenioides, Baker, l. c. 455. — Madag.

TRINIA, Hoffm. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1119.

bosniaca, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, x. (1895) 200 = *vulgaris*, DC.

TRIODANIS, Rafin. = *Specularia*, Heist. (Campanul.).

biflora, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 230 = *S. biflora*, Fisch. & Mey.

TRIODIA, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1120.

antarctica, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 403 = *Deschampsia Chapmani*, Petrie. *australis*, Petrie, l. c. xxii. 1889 (1890) 442. — N. Zel.

Buckleyana, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 540, in syn. = *Sieglingia Buckleyana*, Dewey.

capensis, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 877 (= *Uralespis capensis*, Kunth). — Afr. austr.

ciliata, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *U. ciliata*, Steud.). — Seneg.

Eleusine, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *U. Eleusine*, Steud.). — Afr. austr.

eragrostoides, Vasey & Scribn. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 539; et *Illustr. N. Am. Grass.* i. II. (1891) t. 34 (= *Sieglingia eragrostoides*, Dewey). — Am. bor. aust.

grandiflora, Vasey, l. c. t. 35 (= *S. avenacea*, Kuntze). — Am. bor. austro-or.

livida, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 877 (= *Uralespis livida*, Steud.). — Afr. austr.

mollis, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Leptochloa mollis*, Kunth). — Seneg.

Nealleyi, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 49; et *Illustr. N. Am. Grass.* i. II. (1891) t. 36 (= *Sieglingia Nealleyi*, Vasey). — Texas.

pusilla, T. Kirk, ex Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 405, nomen. — N. Zel.

Vulpiastrum, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 113 = *Rhabdocola Vulpiastrum*; De Not.

TRIODON, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1120.

laxum, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 11 = *Borreria dichotoma*, Cham. & Schlecht.

TRIOLAENA, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 1120.

Barbeyana, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 549. [Triolaena]. — Peruvia.

paleolata, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 28; et l. c. 543. — Guatem.

TRIPETALUM, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 51; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 240. GUTTIFERAE.

cymosum, K. Schum. l. c. — N. Guin.

Stuhlmannii, Harms, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1865) 280. — Afr. trop. or.

TRIPLARIS, Loebl. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 1121.

Macombii, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1893) 257. — Guatem.

speciosa, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 14. — Bras.

TRIPLASANDRA, Seem. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 1121.

Kaala, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 154. — Ins. Sandvic.

Lydgatei, Hillebr. l. c. 153. — Ins. Sandvic.

meiandra, Hillebr. l. c. 152. — Ins. Sandvic.

TRIPLATEIA, Bartl. = *Hymenella*, Moç. & Sesse, (Caryophyll.).

moehringioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 56 = *H. moehringioides*, [Moç. & Sesse] ex DC.

TRIPLEUROSPERMUM, Sch. Bip. = *Matricaria*, Tourn. (Compos.).

heterolepis, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 349, in syn. = *C. heterolepis*, Freyn & Sint.

repens, Freyn, l. c. 350, in syn. = *C. repens*, Freyn.

tenuifolium, Freyn, ex Freyn & E. Brandis, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 613 = *C. uniglandulosum*, Vis.

TRIPLOCEPHALUM, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 231; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 389. COMPOSITAE.

Holstii, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.

TRIPODANDRA, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1886) t. 50; Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1888) 91. MENISPERMA-CEAE.

Thouarsiana, Baill. l. c. — Madag.

TRIPODANTHUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 178 = *Loranthus*, Linn.

acutifolius, Van Tiegh. l. c. 179 = *L. acutifolius*, Ruiz. & Pav.

destructor, Van Tiegh. l. c. 177 = *L. destructor*, H. B. & K.

eugenioides, Van Tiegh. l. c. = *L. eugenioides*, H. B. & K.

flagellaris, Van Tiegh. l. c. = *L. flagellaris*, Cham. & Schlecht.

ligustrinus, Van Tiegh. l. c. = *L. ligustrinus*, Willd.

suaveolens, Van Tiegh. l. c. = *L. suaveolens*, H. B. & K.

TRIPOGON, Roth (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1122.

Jacquemontii, Stapf, in Kew Bull. (1892) 85. — Ind. or.

Lisboae, Stapf, l. c. 84. — Ind. or.

TRIPOLIUM, Nees = *Aster*, Tourn. (Compos.).

humile, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 404. — Chili.

Moelleri, Phil. l. c. 403. — Chili.

oliganthum, Phil. l. c. 403. — Chili.

tenuifolium, Phil. l. c. 404. — Chili.

TRIPSACUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1122.

floridanum, Porter, ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 6; et in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 130. — Florida.

Lemmoni, Vasey, l. c. 130. — Am. bor.

TRIPTERANTHUS, Wall. = *Burmanna*, Linn.

pusillus, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 665 = *Blyxa pusilla*, Thw.

TRIPTERIS, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1122.

crassifolia, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1888) 280. — Afr. austro-occ. extratrop.

speciosa, Taub. l. c. xii. Beibl. n. 27 (1890) 14. — Bras.

Volkensii, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 419. — Afr. trop. or.

TRIPTERODENDRON, Radlk. in Sitz. Matth. Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 260-290; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 342. SAPINDACEAE.

filicifolium, Radlk. l. c. — Bras.

TRIPTILION, Ruiz & Pav. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1123.

Berteroi, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 91 [Triptilium]. — Chili.

compactum, Phil. l. c. 95. — Chili.

digitatum, Phil. l. c. — Chili.

humile, Phil. l. c. 91. — Chili.

pectinatum, Phil. l. c. 92. — Chili.

pusillum, Phil. l. c. 96. — Chili.

ramulosum, Phil. l. c. 94. — Chili.

Remyanum, Phil. l. c. 89. — Chili.

TRIRAPHIS, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1123.

abyssinica, Nees, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 132 [Trirhaphis] (= *Danthonia abyssinica*, Hochst.). — Afr. trop. or.

Elliotii, Rendle, ex S. Elliot, in Journ. Bot. xxix. (1891) 73. — Afr. austro-occ. extratrop.

nana, Hack. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 403 (= *Diplazne nana*, Nees). — Afr. austr.

purpurea, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 146. — Afr. austro-occ. extratrop.

ramosissima, Hack. ex Schinz, l. c. 237. — Afr. austro-occ. extratrop.

Rehmanni, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 388. — Afr. austr.

Schinzii, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 147. — Afr. austro-occ. extratrop.

TRisetum, Pers. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1123.

californicum, Vasey, in Illustr. N. Am. Grass. ii. 5 (1892) t. 46. — Calif.

Dozei, Franch. Miss. scient. Cap. Horn (1888) 384, t. 9. — Patag.

montanum, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 118. — Am. bor.

lasianthum, Perez Lara, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xv. (1886) 401; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 19. — Hisp.

pennsylvanicum, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 68 = *palustre*, Torr.

spicatum, Richter, Pl. Europ. i. (1890) 59 = *subspicatum*, Beauv.

TRISTACHYA, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1124.

decora, Stapf, in Kew Bull. (1895) 75. — Afr. trop.

hispida, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 109 = *leucothrix*, Trin.

inamoena, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

Rehmanni, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 384. — Transvaal.

Tholloni, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 374. — Congo gall.

TRISTANIA, R. Br. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 1125.

bilocularis, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 152. — Borneo.

Callobuxus Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 89 (= *Tristanioopsis Callobuxus*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

capitulata, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 258, nomen [sphalm.] = seq. ?

capitulata, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 89 (= *Tristanioopsis capitulata*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

elliptica, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 151. — Borneo.

glaucia, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 89 = *glaucia*, Panch.

Guillainii, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 258 (= *Tristanioopsis Guillainii*, Vieill.). — N. Caled.

longivalvis, F. Muell. in Wing, South. Sc. Record, N. S. ii. (April. 1886). — Austral.

Vieillardii, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 89 (= *Tristanioopsis Vieillardii*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

TRISTANIOPSIS, Brongn. & Gris = **Tristania**, R. Br. (Myrt.).
capitulata, « Brongn. & Gris » ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 258, sphalm. = *capitulata*, Brongn. & Gris.

TRISTELLATEIA, Thou. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 1125.
emarginata, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1894) t. 273. — Madag.
emarginata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 456. — Madag.
Greveana, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 271. — Madag.
plurisetia, Baill. l. c. t. 275. — Madag.
Richardi, Baill. l. c. t. 274. — Madag.
stenoptera, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 456. — Madag.

TRISTEMMA, Juss. (Melastom.). — Ind. Kew. ii. 1125.
leiocalyx, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1179. — Congo.

TRISTIOPSIS, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 76; in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 76; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 325. **SAPINACEAE**.
acutangula, Radlk. l. c. — Ins. Pacif.
obtusangula, Radlk. l. c. — Ins. Pacif.

TRITHECANTHERA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 597 = **Loranthus**, Linn.
xiphostachya, Van Tiegh. l. c. 599 (= *Beccarina xiphostachya*, Van Tiegh.). — Borneo.

TRITELEIA, Dougl. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).
Bridgesii, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 141 = *B. Bridgesii*, S. Wats.
candida, Greene, l. c. 139. — Calif.
crocea, Greene, l. c. 141 = *Brodiaea crocea*, S. Wats.
gracilis, Greene, l. c. = *B. gracilis*, S. Wats.
Hendersonii, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1888) 164 = *B. Hendersonii*, Howell.
Howellii, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 139 = *B. Howellii*, S. Wats.
hyacinthina, Greene, l. c. = *Milla hyacinthina*, Baker.
ixioides, Greene, l. c. = *M. ixioides*, Baker.
Leichtlinii, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 93 = *Milla Leichtlinii*, Baker.
Lemmonae, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. 141 = *Brodiaea Lemmonae*, S. Wats.
lilacina, Greene, l. c. 143. — Calif.
lugens, Greene, l. c. 142. — Calif.
Palmeri, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 292 = *Brodiaea Palmeri*, S. Wats.

TRITICUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1126.
alpestre, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 205 = *caninum*, Schreb.
barbulatum, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 594 = *Agropyron glaucum*, Roem. & Schult.
Batalini, Krassn. in Script. Hort. Univ. Petrop. ii. 1. (1887-88) 21. — China.
bifaria, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 795 = *Eragrostis coromandelina*, Trin.
biunciale, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 128 (= *Aegilops biuncialis*, Vis.). — Dalm., Graecia.
comosum, C. Richt. l. c. (= *Aeg. comosa*, Sibth. & Sm.). — Graecia.
crassum, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 127. — As. centr.
Grenieri X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 129. — Gall. mer.
Heldreichii, C. Richt. l. c. 128. — Graecia.
Loreti X, C. Richt. l. c. 129. — Gall. mer.
macrochaetum, C. Richt. l. c. 128 (= *Aegilops macrochaeta*, Shuttl. & Huet). — Gall. mer.
persicum, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 127. — Afghan., Persia.

TRITICUM : —

subulatum, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 939 (= *Aegilops subulata*, Pomel). — Algeria.
uniaristatum, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 128 (= *Aeg. uniaristata*, Vis.). — Dalm., Istria.
varnense, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. (1894) n. xxix. 28. — Bulg.

TRITOMA, Ker-Gawl. = **Kniphofia**, Moench (Liliac.).
Canari, Carrière, in Rev. Hort. xl. (1888) 295 = *K. aloides*, Moench.

TRITONIA, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1128.
bongensis, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 153; Baker, Handb. Irid. (1892) 196. — Afr. centr. bor.
cinnabarina, Pax, l. c. 152. — Angola.
Cooperi, Baker, Handb. Irid. (1892) 192. — Afr. austr.
crocosmiflora X, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 94. — Hybr. artef.
disticha, Baker, Handb. Irid. (1892) 193 (= *Tritonia disticha*, Klatt). — Afr. austr.
graminifolia, Baker, l. c. 195. — Transvaal.
Krausii, Baker, l. c. 194. — Natal.
mensensis, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. ii. (1894) 86. — Eritrea.
Nelsoni, Baker, Handb. Irid. (1892) 195. — Transvaal.
pauciflora, Baker, l. c. 193. — Afr. austro-occ. extratrop.
riparia, Cordem. Fl. Ill. Réunion (1895) 161. — Ins. Borbon.
striata, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 208 = *Gladiolus striatus*, Soland.
Templemanni, Baker, Handb. Irid. (1892) 193. — Afr. austr.
teretifolia, Baker, l. c. 194. — Natal.
tigrina, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 152. — Angola.
trinervata, Baker, Handb. Irid. (1892) 191. — Afr. austr.
unguiculata, Baker, l. c. 196. — Afr. austr.
ventricosa, Baker, l. c. 192. — Afr. austr.
watsonioides, Baker, l. c. 195. — Afr. austr.
Wilsoni, Baker, in Gard. Chron. (1886) ii. 38. — Afr. austr.

TRIUMFETTA, Plum. ex Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 1128.
abyssinica, K. Schum. ex Engl. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 126; et in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 298. — Abyss.
brachystema, K. Schum. l. c. xv. (1893) 130. — Congo mer.
Bradshawii, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Oct. 1891) 85, nomen; et in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. vi. (May 1892) 460. — Austral.
brevipes, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 400. — Mexic.
buettneriacea, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 129. — Afr. centr.
cucullata, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 532. — Mexic.
dunalis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 85. — Anam.
heliocarpa, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 131. — Congo mer.
insignis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 400. — Mexic.
iomalla, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 132. — Congo mer.
Jelskii, Zahlbr. in Diss. Cl. Math. Phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 224. — Peruvia.
lepidota, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 127. — Afr. trop.
macrophylla, K. Schum. l. c. 130. — Afr. trop. or.
Mastersii, E. G. Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 6. — Afr. trop.
micrantha, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 128. — Afr. trop.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 400. — Mexic.

TRIUMFETTA : —

Pseudorhomboidea, Szyszyl. Polyph. Rehmann. i. (1887) 59. [*Pseudorhomboidea*]. — Transvaal.
Rehmanni, Szyszyl. l. c. — Transvaal.
scandens, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 125. — Angola.
Sonderiana, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 173 (= *T. trichocarpa*, Sond.). — Afr. austr.
subpalmata, Soland. ex Hemsl. in Journ. Bot. xxviii. (1890) 2. — Austral.
Telekii, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 298, nomen; et in Hochnel, zum Rudolph See, Append. (1892) 15. — Afr. trop. or.
trachystema, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 130. — Congo mer.

TRIURIS, Miers (Triurid.). — Ind. Kew. ii. 1130.
brevistylis, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 14; K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 663. — Guatem., Bras.
major, Poulsen, in Bot. Tidsskr. xvii. (1890) 296; K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 663. — Bras.

TRIXIS, P. Br. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1130.
gigas, Wawra, Itin. Princ. Sax. Coburg. ii. (1888) 50. — Bras.
hyposericea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 157. — Mexic.

TROCHERA, Rich = **Ehrharta**, Thunb. (Gramin.).
acmula, aphylla, avenacea, barbinodis, brevifolia, Colensoi, dura, Eckloniana, festucacea, gigantea, longiflora, Microlaena, Mnemateia, ovata, panicca, paniciformis, pusilla, ramosa, rupestris, stricta, triandra, uniflora, varicosa, versicolor, villosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 975 = *homonyma omnia Ehrhartae*.
auriculata, Kuntze, l. c. = *E. calycina*, Sm.
capensis, Kuntze, l. c. = *E. Mnemateia*, Linn. f.
geniculata, Kuntze, l. c. = *E. calycina*, Sm.
laxiflora, Kuntze, l. c. = *E. calycina*, Sm.
longiseta, Kuntze, l. c. = *E. longiflora*, Sm.
melicoides, Kuntze, l. c. = *E. melicoides*, Thunb.
Ottomii, Kuntze, l. c. = *E. longifolia*, Schrad.

TROCHETIA, DC. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 1130.
granulata, Cordem. Fl. Ill. Réunion (1895) 318. — Ins. Borbon.

TROLLIUS, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 1132.
ranunculoides, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 301. — China occ.
Tatrae, Borb. ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 421 = *europaeus*, Linn.

TROPAEOLUM, Linn. (Geran.). — Ind. Kew. ii. 1132.
argentinum, Buchenau, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 221. — Reg. Argent.
bimaculatum, Klotzsch, ex Buchenau, l. c. 217. — Am. centr.
Buchenavianum, Hieron. l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) 33. — Ecuad.
canariense, Hort. ex Kew Bull. iii. (1889) 55 = *aduncum*, Sm.
capillare, Buchenau, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 219. — Reg. Argent.
Cochabambae, Buchenau, l. c. xxii. (1895) 161. — Bolivia.
Glaziovii, Buchenau, l. c. xv. (1892) 220. — Bras.
Kuntzeanum, Buchenau, l. c. xxii. (1895) 163. — Bolivia.
Leichtlinii X, Hort. Leichtl. in Rev. Hort. lxvii. (1895) 384. — Hybr. artef.
rectangulum, Buchenau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 165. — Bolivia.
Seemannii, Buchenau, l. c. xv. (1892) 226. — Peruv.

TROPHAEUM, Linn. = **Tropaeolum**, Linn. (Geran.).

atrosanguineum, *azureum*, *Benthii*, *bicolor*, *bogotense*, *brachyceras*, *brasiliense*, *Bridgesii*, *Chaixianum*, *chilense*, *chrysanthum*, *ciliatum*, *cirrhipes*, *crenatiflorum*, *crenatum*, *Decherianum*, *digitatum*, *dipetalum*, *edule*, *elegans*, *emarginatum*, *floribundum*, *Funchii*, *Haynianum*, *Hookerianum*, *incrassatum*, *Jarattii*, *Klotzschii*, *Lechleri*, *leptophyllum*, *linearifolium*, *longifolium*, *majus*, *marmoratum*, *minus*, *Moritzianum*, *mucronatum*, *nubigenum*, *oxanthum*, *parviflorum*, *pentaphyllum*, *peltophorum*, *pendulum*, *peregrinum*, *pilosum*, *pinnatum*, *polyphyllum*, *pubescens*, *quinatum*, *Reineckianum*, *rhizophorum*, *speciosum*, *tenellum*, *tenuirostre*, *trilobum*, *tuberosum*, *umbellatum*, *Wagnerianum*, *Warmianum*, *Zanderi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 97 = *homonyma omnia Tropaeoli*.
aduncum, Kuntze, l. c. = *T. peregrinum*, Linn.
aureum, Kuntze, l. c. = *T. azureum*, Miers.
denticulatum, Kuntze, l. c. = *T. denticulatum*, Ruiz & Pav. [ubi?] fide cl. Kuntze.
Popelarii, Kuntze, l. c. = *T. albiflorum*, Linn.
rhomboidum, Kuntze, l. c. = *T. rhomboideum*, Linn.
tricolor, Kuntze, l. c. = *T. tricolorum*, Sweet.

TROPIDIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1133.

formosana, Rolfe, in *Ann. Bot.* ix. (1895) 158. — Ins. Formosa.
Maingayi, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 93. — Penins. Mal.
Reichenbachiana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 442; et in *Forschungs. Gazelle* [Siphonog.] (1889) 25, t. 7, fig. 1. — Ins. Lucepara.
Thwaitesii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 93. — Zeyl.

TROPIDOCARPUM, Hook. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1133.

capparideum, Greene, *Pittonia*, i. (Oct. 1888) 217; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 27. — Calif.
dubium, Davids. in *Erythea*, ii. (1894) 179. — Calif.

TROUETTIA, Pierre, ex Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 295 = **Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.).

leptoclada, Pierre, ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 945. — N. Caled.

TROXIMON, [Nutt.] in Fras. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1133.

arizonicum, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1890) 78. — Am. bor. occ.
elatum, Greene, l. c. i. (July 1887) 71. — Calif.
Marshallii, Greene, l. c. i. (June 1888) 174. — Calif.
plebeium, Greene, l. c. ii. (May 1890) 79. — Calif.
purpureum, Greene, l. c. 76 (= *Macrorhynchus purpureus*, A. Gray) = *aurantiacum*, Hook.

TRYPHOSTEMMA, Harv. (Passifl.). — Ind. Kew. ii. 1134.

apetalum, E. G. Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 14. — Afr. trop.
heterophyllum, Engl. *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 388, in obs.; et xv. (1893) 577 (= *Basananthe heterophylla*, Schinz). — Afr. austro-occ. extratrop.
lanceolatum, Engl. *ll. cc.* — Afr. trop. or.
littorale, Engl. *ll. cc.* 389, et 561 = *Basananthe littoralis*, Peyr.
niloticum, Engl. *ll. cc.* — Afr. centr. bor. or.
nummularium, Engl. l. c. 588 (= *Basananthe Nummularia*, Welw.). — Angola.
pilosum, Harms, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 280. — Afr. trop. or.
Schinzianum, Harms, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii: 6a (1893) 72, 75 fig. 25a, 26c; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 281. — Afr. trop. or.
triflorum, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1838 [triflora]. — Afr. trop. austro-or.
trilobum, Bolus, ex Schinz, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 33 (1892) 2, in obs. [triloba]. — Afr. austr.
Volkensii, Harms, l. c. xix. Beibl. n. 47 (1894) 40. — Afr. trop. or.

TSJERACANARINAM, Adans. (melius-UM) = **Cansjera**, Juss. (Olacin.).

grossularioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *C. grossularioides*, Blanco.
Helferianum, Kuntze, l. c. = *C. Helferiana*, Valetton.
lanceolatum, Kuntze, l. c. = *C. Rheedii*, J. F. Gmel.
leptostachyum, Kuntze, l. c. = *C. leptostachya*, Benth.
parviflorum, Kuntze, l. c. = *C. parvifolia*, Kurz.
pentandrum, Kuntze, l. c. = *Antidesma Cumingii*, Muell. Arg.
Rheedii, Kuntze, l. c. = *Cansjera Rheedii*, J. F. Gmel.

TSUGA, Carr. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 1134.

ajanensis, Regel, ex Beissn. *Handb. Nadelholz* (1891) 385 = *Picea ajanensis*, Fisch.
Araragi, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 10 = *T. Sieboldii*, Carr.
dumosa, Eichl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 1 (1887) 80 = *Brunoniana*, Carr.
japonica, Shirasawa, in *Tokyo Bot. Mag.* ix. (1895) 84; et ex *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 274. — Japon.

TUBIFLORA, J. F. Gmel. = **Elytraria**, Michx (Acanth.).

acaulis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 500 = *E. crenata*, Vahl.
pachystachya, Kuntze, l. c. = *E. tridentata*, Vahl.
squamosa, Kuntze, l. c. = *E. tridentata*, Vahl.

TUCHIROA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 211 = **TOUCHIROA**, Aubl. = **Crudia**, Schreb. (Legumin.).

acuminata, *bracteata*, *oblonga*, *orientalis*, *senegalensis*, *zeylanica*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Crudiae*.
spicata, Kuntze, l. c. = *C. Schreberi*, J. F. Gmel.
tomentosa, Kuntze, l. c. = *C. Parivora*, DC.

TULBAGHIA, Heist. Descr. Brunsv. (1753) 10, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 718 = **Agapanthus**, L'Hérit. (Liliac.).

africana, Kuntze, l. c. = *A. umbellatus*, L'Hérit.
minor, Kuntze, l. c. = *A. umbellatus*, L'Hérit.
praecox, Kuntze, l. c. = *A. umbellatus*, L'Hérit.

TULBAGHIA, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1135.

Bragae, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 141. — Afr. trop. or.
natalensis, Baker, in *Gard. Chron.* (1891) i. 668. — Natal.
pauciflora, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 6. — Afr. austr.

TULIPA, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1135.

aximensis, Perr. & Song. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 435 = *T. Didieri*, Jord.?
balcanica, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1892, n. 37. (1893) 65. — Bulg.
Baldaccii, Mattei, in *Malpighia*, vii. (1893) 56. — Italia.
Batalini, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 688; et in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 506, t. 1307 fig. 2. — Buchara.
Boeltgeri, Regel, l. c. x. (1887) 366. — Buchara.
ciliatula, Baker, in *Gard. Chron.* (1890) i. 640, fig. 106. — As. Min.
concinna, Baker, l. c. (1893) i. 538. — As. occ.
Dammani, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 688; et in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 314. — Syria.
Leichtlini, Regel, *ll. cc.* x. (1887) 366; et xxxvii. (1888) 93. — As. centr.
Marjoletti, Perr. & Song. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 432. — Sabaud.
Maximowiczii, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 687; et in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 505 t. 1307 fig. 1. — Buchara.
Regeli, Krassn. in *Script. Univ. Petrop.* ii. (1887-88) 21. — As. centr.
Sintenisii, Baker, in *Gard. Chron.* (1891) i. 330; et in *Bot. Mag.* (1891) t. 7193. — Armenia.
Sprengeri, Baker, l. c. (1894) i. 716; et in *Gartenfl.* xlv. (1895) 57, t. 1411. — Armenia.

TUMION, Rafin. ex Greene, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 195 = **Torreya**, Arn. (Conif.).

californicum, Greene, l. c. = *T. californica*, Torr.
grande, Greene, l. c. 194 = *T. grandis*, Fortune.
nuciferum, Greene, l. c. = *T. nucifera*, Sieb. et Zucc.
taxifolium, Greene, l. c. = *T. taxifolia*, Arn.

TUNATEA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 211 = **TOUNATEA**, Aubl. = **Swartzia**, Schreb. (Legumin.).

acuminata, *acutifolia*, *alterna*, *apetala*, *aptera*, *argentea*, *auriculata*, *Benthiana*, *Blanchetii*, *brachystachya*, *bracteosa*, *calophylla*, *cardiosperma*, *caribaea*, *conferta*, *corrugata*, *crocea*, *cuspidata*, *dicarpa*, *discolor*, *dodecandra*, *elegans*, *eriocarpa*, *floribunda*, *fugax*, *grandifolia*, *Langsdorfii*, *latifolia*, *laurifolia*, *laxiflora*, *leucocalycina*, *leptopetala*, *longifolia*, *macrocarpa*, *macrostachya*, *Martii*, *microcarpa*, *mollis*, *myrtifolia*, *oblonga*, *panamensis*, *pendula*, *picta*, *pilulifera*, *pinnata*, *polyphylla*, *racemosa*, *recurva*, *rosea*, *Schomburgkii*, *sericea*, *Trianae*, *velutina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 211 = *homonyma omnia Swartziae*.
arborescens, Kuntze, l. c. = *S. triphylla*, Willd.
Flemingii, Kuntze, l. c. = *S. Flemingi*, Raddi.
Hostmannii, Kuntze, l. c. = *S. Hostmanni*, Benth.
Matthewsii, Kuntze, l. c. = *S. Mathewsii*, Benth.
multijuga, Kuntze, l. c. = *S. multijuga*, Vog.
Panacoco, Kuntze, l. c. = *S. tomentosa*, DC.
simplex, Kuntze, l. c. = *S. grandiflora*, Willd.
Sprucei, Kuntze, l. c. = *S. Sprucei*, Benth.

TUNICA, Hall. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 1136.

Davaena, Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 103. — Cyren.
filiformis, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 17, 411. — Syria.
gracilis, Williams, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 196. — Kurdist.
Haynaldiana, Janka, ex Nyman, *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 57; et ex Williams, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 197 (= *Gypsophila Haynaldiana*, Janka). — Reg. Banat.
macra, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 81. — Persia.
Peronini, Boiss. l. c. — As. Min.
phthiotica, Boiss. & Heldr. ex Boiss. l. c. 83. — Graecia.
rhodopea, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1894, n. xxix. (1895) 4 (= *T. ochroleuca*, Velen.). — Bulg.

TUPA, G. Don = **Lobelia**, Plum. (Campanul.).

axilliflora, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 188. — Chili.
Gayana, Phil. l. c. 190. — Chili.
glaucescens, Phil. l. c. 187. — Chili.
Kingi, Phil. l. c. 189. — Chili.
linearifolia, Phil. l. c. 190. — Chili.
serrata, Phil. l. c. 189. — Chili.

TUPISTRA, Ker-Gawl. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1137.

chinensis, Baker, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1867. — China.
chlorantha, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1893) 1115. — China.
Clarkei, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 325. — Reg. Himal.
Fargesii, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1893) 1114 (= *Campylandra Fargesii*, Baill.). — China.
tonkinensis, Baill. l. c. 1116. — Tonkin.
Wattii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 325. — Reg. Himal.

TURNERA, Plum. ex Linn. (Turnerac.). — Ind. Kew. ii. 1137.

discolor, Urban, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 506. — Bras.
madagascariensis, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 582 (= *Piriqueta madagascariensis*, Urban). — Madag.
Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 413. — Mexic.
revoluta, Urban, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 508. — Bras.
setifera, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 582. — Madag.

TURRAEA, Linn. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 1138.
ambohitsiana, Baill. *Hist. pl. Madag.* Atlas (1892) t. 253. — Madag.
Bakeriana, Baill. l. c. t. 254c. — Madag.
cuneata, Guérke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 231. — Afr. trop. or.
cuneifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 305. — Madag.
emetica, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 94, nomen. — Afr. trop.
Fischeri, Guérke, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 308. — Afr. trop. or.
Grandidieri, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1892) t. 254c. — Madag.
Holstii, Guérke, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 35. — Afr. trop. or.
kilimandscharica, Guérke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 230. — Afr. trop. or.
lanceolata, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1892) t. 252. — Madag.
lycioides, Baill. l. c. t. 254d. — Madag.
lycioides, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 212. — Reg. Somal.
malifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 305. — Madag.
obovata, Guérke, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 308. — Madag.
parvifolia, Defflers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 301. — Algeria.
Pervillei, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1892) t. 252a. — Madag.
rhannifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 305. — Madag.
rhombifolia, Baker, l. c. xxii. (1887) 458. — Madag.
Richardi, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1892) t. 254. — Madag.
robusta, Guérke, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 34. — Afr. trop. or.
scabra, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1892) t. 254b. — Madag.
subcordata, Guérke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 232. — Afr. trop. or.
usambarensis, Guérke, l. c. 231. — Afr. trop. or.
venulosa, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 458. — Madag.
Volkenii, Guérke, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 34. — Afr. trop. or.

TURRIGERA, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1139.
Lessonii, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 227. — Chili.

TURRITIS, Tourn. ex Linn. = **Arabis**, Linn. (Crucif.).
alpina Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 192 = *A. brassicaeformis*, Walbr.

TYLACHIUM, Lour. fide Gilg, in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* (1895) 63 = **Thylachium**, Lour. (Capparid.).
albo-violaceum, Gilg, l. c. 64. — Afr. trop. or.
macrophyllum, Gilg, l. c. 63. — Afr. trop.

TYLECARPUS, Engl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 247. **OLACINEAE**.
papuanus, *Engl. l. c.* — N. Guin.

TYLLOMA, D. Don = **Chaetanthera**, Ruiz & Pav. (Compos.).
albiflorum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 843. — Chili.
brachylepis, Phil. l. c. 842. — Chili.
ciliatum, Phil. l. c. 841. — Chili.
curylepis, Phil. l. c. 840. — Chili.
gnaphalioides, Phil. l. c. 843. — Chili.
minutum, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 33. — Chili.
rotundifolium, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 843. — Chili.
Stolpi, Phil. l. c. 841. — Chili.
strictum, Phil. l. c. 840. — Chili.

TYLOPHORA, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1140.

Adalinae, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 286. — Afr. trop.
apiculata, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 325. — Afr. trop. or.
biglandulosa, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 256. — Endl.
cameroonica, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 257. — Kamerun.
conspicua, N. E. Br. l. c. — Angola.
cordifolia, Benth. & Hook. f., ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 424. — China.
Flanaganii, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 11. — Afr. austr.
Hellwigii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 410. — N. Guin.
Leibiana, F. Muell. in *Journ. Roy. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 1890 (1891) 78. — Austral.
longipedunculata, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 338 = *Tylophoropsis heterophylla*, N. E. Br.
oblonga, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 257. — Sierra Leone.
oculata, N. E. Br. l. c. 112. — Ins. Fernando Po.
simiana, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 33. — Afr. austr.
stenoloba, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 257. — Afr. trop. or.
tenuipedunculata, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 144. — Afr. trop.
umbellata, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 11. — Afr. austr.
Thwaitesii, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 286. — Zeylan.
villosa, Benth. & Hook. f., ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 424 (= *Vincetoxicum Miquelianum*, Kuntze). — Ind. bat.
yemensis, Defflers, *Voy. au Yémen* (1889) 165 = *Tylophoropsis yemensis*, N. E. Br.

TYLOPHOROPSIS, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 244; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 255. **ASCLEPIADEAE**.
heterophylla, N. E. Br. l. c. 245; Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2373 (= *Tylophora heterophylla*, Rich.). — Abyss.
yemensis, N. E. Br. l. c. 244 (= *T. yemensis*, Defflers). — Arabia.

TYNANTHUS, Miers (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 1141.
guatemalensis, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 6, 209, t. 22. — Guatem.
igneus, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. bot. Amaz.* n. 662] *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 51, t. 10. — Bras.

TYNNANTHUS, «Miers» ex K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 221 = praec.

TYPHA, Linn. (Typhac.). — Ind. Kew. ii. 1141.
aethiopica, Kronfeld, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 162. — Afr. trop. or.
bracteata, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. VII. (1887) 413 = *domingensis Pers.*
elongata, Dudley, *Cayuga Fl.* (1889) 102 = *latifolia*, Linn.
Maresii, Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 389; et Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 18 = *latifolia*, Linn.
spathulifolia, Kronfeld, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvii. (1887) Sitzb. 15 = *latifolia*, Linn.

TYPHONIUM, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 1142.
brevipes, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 511. — Reg. Himal.
Millari, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* ii. (1891) 20. — Austral.

TYSONIA, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1942; Guérke, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1894) 106. **BORAGINEAE**.
africana, Bolus, l. c. — Afr. austr.

U

UAPACA, Baill. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 1142.
Mole, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 79. — Congo.
Teuscii, Pax, l. c. — Angola.

UBOCHEA, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1891) 103; Briq. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1894) 155. **VERBENACEAE**.
dichotoma, Baill. l. c. — Ins. Capit. Virid.

UCACOU, Adans. = **Synedrella**, Gaertn. (Compos.).
nodiflorum, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 100 = *S. nodiflora*, Gaertn.

UEBELINIA, Hochst. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 1142.
hispidia, Pax, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 586. — Kamerun.

UECHTRITZIA, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 240; O. Hoffm. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 391. **COMPOSITAE**.
armena, Freyn & Sint. ex Freyn, l. c. 241, 391. — Armen. turc.

ULEX, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1143.
major, St Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd. 8*, ii. (1889) 158 = *europaeus*, Linn.
minor, St Lager, l. c. = *nanus*, Linn.

ULMARIA, [Tourn.] Hill. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).
Ulmaria, Barnhart, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xxi. (1894) 491 = *S. Ulmaria*, Linn.

ULMUS, [Tourn.] Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1143.
adiantifolia, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 29 = *scabra*, Mill.
aspervima, Simonk. *Fl. von Grossward.* (1890), ex Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 424. — Hung.
castaneifolia, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 446. — China.
cucullata, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 25 = *campestris*, Linn.
Dampieri, Hort. ex Dippel, l. c. 28 = *scabra*, Mill.
fastigiata, Hort. ex Dippel, l. c. 24, 28 = *campestris*, Linn.
glandulosa, «Lindl.» ex Dippel, l. c. 26, 591 = *glabra*, Mill.
intermedia, Hort. ex Dippel, l. c. 29 = *scabra*, Mill.
monumentalis, Rinz, ex Dippel, l. c. 29, 590 = *campestris*, Linn.
pedunculata, Hook. f. et Thoms. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 480, in syn. = *Wallichiana*, Planch.
Pitteursii, Ch. Morren, ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 29 = *scabra*, Mill.
Pseudosuberosa, Blocki, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 130 = *campestris*, Linn.
pumila, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 481, in syn. = *parvifolia*, Jacq.
pyramidalis, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 28, 590 = *montana*, With.
Rosselsii, Hort. ex Dippel, l. c. 25, 590 = *campestris*, Linn.
tridens, Hort. ex Dippel, l. c. 29 = *scabra*, Mill.
triservata, Hort. ex Dippel, l. c. 29 = *scabra*, Mill.
Verschaffeltii, Hort. ex Dippel, l. c. 39. = *Zelkova japonica*, Dippel.
virens, Hort. ex Dippel, l. c. 25, 591 = *campestris*, Linn.

UMBILICUS, DC. = **Cotyledon**, Tourn. (Crassul.).
aetneus, Tornab. Fl. Sicula (1887) 249. — Sicil.
gondinamensis, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien
(1886) ii. 57. — As. occ.

UMBRACULUM, Rumpf, Herb. Amboin, iii. (1743)
124, t. 82, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 405 =
Aegiceras, Gaertn. (Myrsin.).
corniculatum, Kuntze, l. c. = *A. majus*, Gaertn.

UNCARIA, Burch. = **Harpagophytum**, DC.
(Pedal.).
Burchellii, Grandidieri, *leptocarpa*, *peltata*, Zeyheri,
Kuntze, Rev. Gen. (1891) 481 = *homonyma omnia*
Harpagophyti.

UNCARIA, Schreb. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii.
1145.
Bernaysii, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm.
(Feb. 1886) 45; et ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886)
114. — N. Guin.

UNCARINA, Stapf, in Engl. & Prantl, Natürl.
Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 261. **PEDALINEAE**.
Didieri, Stapf, l. c. (= *Harpagophytum Grandidieri*,
Baill.). — Madag.
peltata, Stapf, l. c. (= *H. peltatum*, Baker). —
Madag.

UNCINIA, Pers. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 1145
capillaris, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887
(1888) 210 = *riparia*, R. Br.
Clarkii, Petrie, l. c. 185. — N. Zel.
disticha, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 188
(1888) 210. — N. Zel.
macrotricha, Franch. Miss. scient. Cap Horn, v.
[Phan.] (1889) 379 t. 7a. — Patag.
multifolia, Boeck. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 207. —
Columb.
polynura, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886
(1887) 270. — N. Zel.
variegata, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 211. — N
Zel.

UNIFOLIUM, Hall. = **Maianthemum**, Weber
(Liliac.).
amplexicaule, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xv.
(1888) 287 = *Smilacina racemosa*, Desf.
bifolium, Greene, l. c.; Millsp. Metasp. Minn.
(1892) 152 = *Maianthemum Convallaria*, Weber.
bifolium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 718 = *praec.*
canadense, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xv.
(1888) 287 = *Maianthemum Convallaria*, Weber.
dilatatum, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay
(1894) 316 = *M. Convallaria*, Weber.
liliaceum, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 280 =
Smilacina stellata, Desf.
racemosum, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. viii.
(1889) 74 = *S. racemosa*, Desf.
sessilifolium, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv.
(1888) 287 = *S. sessilifolia*, Nutt.
stellatum, Britton, l. c. = *S. stellata*, Desf.
trifolium, Britton, l. c. = *S. trifolia*, Desf.

UNIOLA, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1146
effusa, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 122. —
Mexic.
laxa, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888)
69 = *gracilis*, Michx.
lucens, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 122. —
Mexic.
longifolia, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xxi.
(1894) 229. — Am. bor.
Muelleri, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 122. —
Mexic.
Palmeri, Vasey, in Gard. and For. ii. (1889) 401 ou
402 fig. 124; et Ill. N. Am. Grass. i. (1893) t. 70.
— Mexic.
Pittieri, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 6,
nomen. — Costa Rica.

UNJALA, Blume = **Heptapleurum**, Gaertn.
(Aral.).
bifida, Reinw. ex Boerl. in Annal. Jard. Buit. vi.
(1887) 116 = *Eschweilera palmata*, Zipp.

UNONA, Linn. f. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 1146.
Ancana, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii.
(1890) 5 (= *Ancana stenopetala*, F. Muell.). —
Austral.
bibracteata, Robinson, in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1.
(1895) 175. — Nicaragua.
evecta, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.
(1886) 283. — Cochinch.
panamensis, Robinson, in Am. Journ. Sci. Ser. III.
1. (1895) 175. — Panama.
Wrayi, Hems. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1553.
— Perak.

URAGOGA, Linn. = **Psychotria**, Linn. (Rubiace.).
acuminata, *alba*, *horizontalis*, *justicioides*, *laxiflora*,
serpens, *stipulacea*, *trichocephala*, Kuntze, Rev.
Gen. (1891) 299-301 = *homonyma omnia* *Psycho-*
triae.

abrupta, *acutiflora*, *adenophylla*, *aeneo-fusca*, *affinis*,
Afzelii, *agnata*, *ampla*, *amplectens*, *anamallayana*,
anceps, *andamanica*, *androsamifolia*, *antoclada*,
angulata, *angustata*, *anisocephala*, *anisoloba*, *Ansellii*,
apiculata, *apocynifolia*, *appendiculata*, *arboresc.*
arenosa, *argentea*, *aureola*, *bahiensis*, *bantamensis*,
barbiflora, *barcellana*, *barracensis*, *Beccarii*, *Bentham-*
iana, *Beskeana*, *Beyrichiana*, *biaristata*, *biatenuata*,
bidentata, *bifaria*, *bisulcata*, *bitermata*, *Blanchetiana*,
borjensis, *brachiata*, *brachyantha*, *brachybotrya*,
brachyceras, *brachygyne*, *brachyloba*, *Brackenridgei*,
bracteata, *bracteocardia*, *bracteolata*, *bracteosa*, *brasi-*
liensis, *Brassii*, *breviflora*, *brevipedunculata*, *brevi-*
pes, *brunnea*, *caloneura*, *calva*, *calycosa*, *calycina*,
camphyloneura, *capensis*, *capitata*, *carthagenensis*,
Carvonis, *casiquiarum*, *chaenotricha*, *chlorantha*,
chlorophylla, *chlorotica*, *comitis*, *concolor*, *conferta*,
conjungens, *connata*, *consanguinea*, *constricta*, *con-*
tracta, *cordata*, *cordifolia*, *cornifolia*, *cornigera*,
cornuta, *corymbosa*, *costaricensis*, *costivenia*, *crassa*,
crispa, *cristata*, *cujabensis*, *cuneifolia*, *cymosa*, *Dal-*
zellii, *dasyophthalma*, *debilis*, *deflexa*, *denticulata*,
dichotoma, *diplospheerica*, *divaricata*, *diversico-*
lor, *Doniana*, *aura*, *egensis*, *erratica*, *erythro-*
carpa, *erythrophylla*, *estrellana*, *euneura*, *exanulata*,
excelsa, *exserta*, *extensa*, *extratropica*, *figemma*,
filipes, *Fitzaloni*, *flavicans*, *flexuosa*, *floribunda*,
fluminensis, *Fockeana*, *foetida*, *foliosa*, *formosa*,
foveolata, *Franequevilleana*, *fraterna*, *fulgens*, *fulva*,
furcata, *gabonica*, *Gardneri*, *Gardneriana*, *glabrata*,
glabrescens, *glandulifera*, *glauca*, *glaucescens*, *globosa*,
glomerata, *gracilentia*, *gracilis*, *graciliflora*, *granaden-*
sis, *Grayana*, *grandiflora*, *grandis*, *Haenkeana*,
hancorniaefolia, *hastisepala*, *hebeclada*, *Helferiana*,
heterocephala, *hexandra*, *hirtipes*, *Hoffmannseggiana*,
hirsuta, *hirta*, *horridula*, *Horsfieldiana*, *Humbold-*
tiana, *humilis*, *hypargyrea*, *igneae*, *inaequifolia*, *in-*
fundibularis, *insidens*, *insularum*, *interjecta*, *intermedia*,
inundata, *involucellaris*, *Jackii*, *janeirensis*, *keyensis*,
Kolly, *konguensis*, *lacinata*, *laevis*, *lagoensis*, *lanata*,
Langsdorffiana, *lasiophthalma*, *lasiopus*, *lasiostylis*,
latistipula, *laxa*, *leiocarpa*, *lepidocarpa*, *leptophylla*,
leucocarpa, *ligularis*, *linearis*, *longicollis*, *longicuspis*,
longipes, *longipetiolata*, *longistipula*, *longistipulata*,
longistylis, *lophoclada*, *lucens*, *lucida*, *lupulina*, *ma-*
craantha, *macrophylla*, *magnoliaefolia*, *madrasspatana*,
Maingayi, *malayana*, *mamillaris*, *mandiocana*, *manil-*
lensis, *Mannii*, *Mansoana*, *maranhana*, *Marogravii*,
marginata, *mariana*, *Martiusii*, *medusula*, *megacoma*,
megapontica, *melanotricha*, *mesomorpha*, *mesotropa*,
membranifolia, *mexicana*, *micrantha*, *microcephala*,
minutiflora, *miradorensis*, *mollis*, *monocephala*, *mon-*
tana, *monticola*, *Moorei*, *Morae*, *mucronata*, *multico-*
lor, *multiflex*, *nematopoda*, *memorosa*, *mesophila*,
neurotricha, *nicobarica*, *nigropunctata*, *nitidella*, *nitid-*
ula, *noxia*, *nubica*, *nudiflora*, *nutans*, *obconica*,
obfusca, *obliquinervia*, *obscura*, *obscureata*, *obtegens*,
obtusifolia, *octocuspis*, *oligotricha*, *opaca*, *orinocensis*,
ovariensis, *pachyneura*, *pacimonica*, *padifolia*, *palens*,
paludosa, *paniculata*, *papantlensis*, *paradoxa*, *paraen-*
sis, *pardina*, *patens*, *patentinervia*, *Patrisii*, *parvula*,
pauciflora, *pauridiantha*, *Pecholtiana*, *pedunculata*,
penangensis, *pentaphthosa*, *pergamacea*, *persimilis*,
Pervillei, *philippensis*, *phyllacalymma*, *Pickeringii*,
pilosiuscula, *platycocca*, *platyneura*, *platyphylla*, *platy-*
poda, *pleiocephala*, *plurivenia*, *Poeppigiana*, *polio-*
stemma, *polyantha*, *polycarpa*, *polycephala*, *polynau-*
ra, *polytricha*, *psilogyne*, *puberula*, *pubescens*, *pubi-*

URAGOGA : —

gera, *humila*, *punctata*, *purpurascens*, *pyramidalis*,
pyrifolia, *quinquecuspis*, *quinqueradiata*, *racemosa*,
radians, *recurva*, *refracta*, *remota*, *repanda*, *reptans*,
reticulata, *revoluta*, *rhinocerotis*, *rhodoleuca*, *rigida*,
robusta, *rosea*, *Roxburghii*, *rubra*, *ruelliaefolia*, *rufes-*
cens, *rufipes*, *rugulosa*, *rupestris*, *salicifolia*, *sambucina*,
santaremica, *scabriuscula*, *Schlechtendalliana*, *Schmie-*
lei, *Schomburghii*, *Schottiana*, *Schweinfurthii*, *sclero-*
phylla, *segregata*, *Sellowiana*, *semifissa*, *sessiliflora*,
sessilifolia, *setacea*, *setigera*, *silhetensis*, *silvicola*,
simulans, *sordida*, *Sororia*, *Sororiella*, *Soyauxii*,
sphaerocephala, *squarrosa*, *stellaris*, *stenocalyx*, *steno-*
clada, *stictophylla*, *stipularis*, *stipulata*, *stipulosa*,
stricta, *strigosa*, *subaeneofusca*, *subacuminata*, *sub-*
crocea, *subcuspidata*, *subfusca*, *subherbacea*, *subintegra*,
subnuda, *subobliqua*, *subovata*, *subpunctata*, *subremota*,
subscandens, *subspathacea*, *subtomentosa*, *subtriflora*,
subundulata, *succulenta*, *suffruticosa*, *sulcata*, *sumba-*
vana, *Sutevella*, *sylvatica*, *symplocifolia*, *tenella*, *tene-*
rior, *tenuifolia*, *tenuinervis*, *tephrosantha*, *terminalis*,
ternifolia, *tetraphylla*, *Thwaitesii*, *tortilis*, *trachystyla*,
triantha, *trichoclada*, *tricholoba*, *trichoneura*, *tricho-*
phora, *trichostyla*, *trifida*, *triphylla*, *trispicata*, *trun-*
cata, *turbinata*, *turbinella*, *tylophora*, *uberabana*,
uginosa, *umbraticola*, *undata*, *undulata*, *urophylla*,
Vauthieri, *vellerea*, *velutipes*, *venulosa*, *verrucosa*,
verticillata, *villosa*, *virgata*, *viridis*, *Vogeliana*, *War-*
mgii, *Wawana*, *Westii*, *Wightiana*, *Wrightii*,
xanthocephala, *xantholoba*, *xanthophylla*, *zambesiana*,
Kuntze, Rev. Gen. (1891) 959-63 = *homonyma*
omnia Psychotriae.
aceraensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 953 = *Psycho-*
tria obscura, Benth.
aculeoligera, Kuntze, l. c. = *Rudgea angustifolia*,
Muell. Arg.
acutifolia, Kuntze, l. c. = *Psychotria umbellata*,
Hook. f.
aemulans, Kuntze, l. c. (= *Mapouria aemulans*,
Muell. Arg.). — Bras.
alba, Kuntze, l. c. = *Cephaelis alba*, Willd.
alpina, Kuntze, l. c. = *Palicourea alpina*, DC.
amazonica, Kuntze, l. c. = *Rudgea amazonica*,
Muell. Arg.
ambigua, Kuntze, l. c. 954 = *Psychotria Salzman-*
niana, Muell. Arg.
amethystina, Kuntze, l. c. 959 = *Palicourea amethy-*
stina, DC.
amicorum, Kuntze, l. c. = *Chasalia amicomum*, A.
Gray.
angusturensis, Kuntze, l. c. 954 = *Cephaelis disco-*
lor, Polak.
angulosa, Kuntze, l. c. 299 = *Psychotria angulata*,
Korth.
angustifolia, Kuntze, l. c. 959 = *P. angustifolia*,
Poir.
apicata, Kuntze, l. c. 300 = *Palicourea apicata*,
H. B. & K.
apocynacea, Kuntze, l. c. 959 (= *Mapouria apocynacea*,
Muell. Arg.). — Bras.
apoda, Kuntze, l. c. = *Rudgea apoda*, Muell. Arg.
arcuata, Kuntze, l. c. 299 = *Psychotria inundata*,
Benth.
articulata, Kuntze, l. c. 959 (= *Grumilea articulata*,
Hiern). — Afr. trop.
Asae, Kuntze, l. c. 954 = *Psychotria gracilis*,
A. Gray.
Aschersoniana, Kuntze, l. c. = *Rudgea longiflora*,
Benth.
australis, Kuntze, l. c. (= *Mapouria australis*, Muell.
Arg.). — Bras.
axillaris, Kuntze, l. c. = *Cephaelis axillaris*, Sw.
Bailloniana, Kuntze, l. c. (= *Mapouria Burchelliana*,
Muell. Arg.). — Bras.
Bakeriana, Kuntze, l. c. 955 = *Psychotria ferrugi-*
nea, Baker.
Balfowiana, Kuntze, l. c. = *P. lanceolata*, Balf. f.
barbata, Kuntze, l. c. = *P. barbata*, Poir.
barbinervia, Kuntze, l. c. = *Palicourea barbinervia*,
DC.
Barteri, Kuntze, l. c. (= *Grumilea micrantha*, Hiern).
— Afr. trop.
baviensis, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)
236. — Tonkin.
Berteroana, Kuntze, l. c. = *Psychotria Berteriana*,
DC.

URAGOGA: —

- Bisglaziovii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 955 = *Psychotria Glaziovii*, Muell. Arg.
Boryana, Kuntze, l. c. 959 = *Chasalia Boryana*, DC.
Blumeana, Kuntze, l. c. 955 = *Cephaëlis stipulacea*, Blume.
Bolusiana, Kuntze, l. c. = *Rudgea elliptica*, Muell. Arg.
Bonplandiana, Kuntze, l. c. = *Palicourea speciosa*, H. B. & K.
brachyandra, l. c. = *Rudgea brachyandra*, Muell. Arg.
brachypoda, Kuntze, l. c. (= *Mapouria brachypoda*, Muell. Arg.). — Bras.
brachytheca, Kuntze, l. c. = *Psychotria brevicollis*, Muell. Arg.
brevicollis, Kuntze, l. c. (= *Mapouria brevicollis*, Muell. Arg.). — Bras.
britoguanensis, Kuntze, l. c. 955 = *Psychotria nervosa*, Benth.
Britteniana, Kuntze, l. c. = *P. cordata*, A. Gray.
Brownii, Kuntze, l. c. 959 = *P. Brownei*, Spreng.
Burchelliana, Kuntze, l. c. = *Rudgea Burchelliana*, Muell. Arg.
caldasica, Kuntze, l. c. (= *Mapouria caldasica*, Muell. Arg.). — Bras.
callophylla, Kuntze, l. c. = *Palicourea calophylla*, DC.
calocarpa, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 236, in syn. = *P. calocarpa*, King.
Candalariae, Kuntze, l. c. 955 = *Palicourea lanceolata*, Benth.
capillacea, Kuntze, l. c. 959 (= *Mapouria capillacea*, Muell. Arg.). — Bras.
capitulata, Kuntze, l. c. = *Psychotria barbiflora*, DC.
capituliflora, Kuntze, l. c. (= *Mapouria capituliflora*, Muell. Arg.). — Bras.
Carapichea, Kuntze, l. c. 955 = *Cephaëlis Patrisii*, D. Dietr.
carpinterensis, Kuntze, l. c. = *Palicourea intermedia*, Oerst.
Carruthersii, Kuntze, l. c. = *Psychotria palicouroides*, Muell. Arg.
Carueliana, Kuntze, l. c. (= *Mapouria umbrosa*, Muell. Arg.). — Bras.
Casarettoana, Kuntze, l. c. 959 = *Rudgea Casarettoana*, Muell. Arg.
castellana, Kuntze, l. c. (= *Mapouria castellana*, Muell. Arg.). — Bras.
catharinensis, Kuntze, l. c. (= *M. catharinensis*, Muell. Arg.). — Bras.
celastrinea, Kuntze, l. c. = *Rudgea celastrinea*, Muell. Arg.
celastroides, Kuntze, l. c. = *Psychotria celastroides*, Griseb.
cephalantha, Kuntze, l. c. (= *Mapouria cephalantha*, Muell. Arg.). — Bras.
Chamissoi, Kuntze, l. c. 955 = *Rudgea magnoliaefolia*, Muell. Arg.
chinantlensis, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis hirsuta*, Martens & Gal.
chionantha, Kuntze, l. c. 959 = *Psychotria Lusch-nathii*, Klotzsch.
cinchonoides, Kuntze, l. c. 960 (= *Mapouria cinchonoides*, Muell. Arg.). — Bras.
circinnata, Kuntze, l. c. = *Palicourea elliptica*, H. B. & K.
citrifolia, Kuntze, l. c. 955 = *Rudgea caribaea*, Benth.
clavipes, Kuntze, l. c. 960 = *R. clavipes*, Benth.
coccinea, Kuntze, l. c. (= *Patabea coccinea*, Aubl.). — Guian.
coerulea, Kuntze, l. c. 960 = *Palicourea coerulea*, Roem. & Schult.
coffoides, Kuntze, l. c. 955 = *Chasalia divaricata*, DC.
cochoirensis, Kuntze, l. c. = *Rudgea longistipula*, Muell. Arg.
colarensis, Kuntze, l. c. 960 (= *Mapouria colarensis*, Muell. Arg.). — Bras.
collina, Kuntze, l. c. = *Psychotria Brownei*, Spreng.
colorata, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis colorata*, Hoffmugg.

URAGOGA: —

- compaginata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 960 (= *Mapouria compaginata*, Muell. Arg.). — Bras.
compressistipes, Kuntze, l. c. 955 = *Psychotria clavipes*, Muell. Arg.
confertiflora, Kuntze, l. c. 960 = *P. Korthalsiana*, Miq.
congesta, Kuntze, l. c. = *P. congesta*, Hook. f.
conocarpa, Kuntze, l. c. = *Rudgea conocarpa*, Muell. Arg.
corcovadensis, Kuntze, l. c. 955 = *R. calycina*, Benth.
Cordilleræ, Kuntze, l. c. = *Palicourea alpina*, DC.
coriacea, Kuntze, l. c. 960 = *Psychotria coriacea*, Poir.
corniculata, Kuntze, l. c. = *Rudgea corniculata*, Benth.
coronata, Kuntze, l. c. = *R. coronata*, Muell. Arg.
corymbifera, Kuntze, l. c. (= *Mapouria corymbifera*, Muell. Arg.). — Bras.
corymbulosa, Kuntze, l. c. = *Rudgea corymbulosa*, Benth.
Coulteriana, Kuntze, l. c. 955 = *R. mucronata*, Muell. Arg.
crocea, Kuntze, l. c. 299 = *Palicourea crocea*, Roem. & Schult.
cuneata, Kuntze, l. c. 955 = *Cephaëlis cuneata*, Korth.
cupularis, Kuntze, l. c. (= *Mapouria cupularis*, Muell. Arg.). — Bras.
curviflora, Kuntze, l. c. 299 = *Chasalia curviflora*, Thw.
cuspidata, Kuntze, l. c. 955 = *Psychotria cuspidata*, Bredem.
cuspidatipula, Kuntze, l. c. = *Rudgea Blanchetiana*, Muell. Arg.
cussareoides, Kuntze, l. c. 960 (= *Mapouria coussa-reoides*, Muell. Arg.). — Bras.
cyanosperma, Kuntze, l. c. = *Rudgea cyanosperma*, Muell. Arg.
cymuligera, Kuntze, l. c. (= *Mapouria cymuligera*, Muell. Arg.). — Bras.
Dallachyana, Kuntze, l. c. = *Psychotria Dallachiana*, Benth.
daphnoides, Kuntze, l. c. = *P. daphnoides*, A. Cunn.
decipiens, Kuntze, l. c. = *Rudgea decipiens*, Muell. Arg.
Delipinoana, Kuntze, l. c. 955 = *R. tenuitolia*, Muell. Arg.
densicostata, Kuntze, l. c. 960 = *Psychotria densicostata*, Muell. Arg.
densiflora, Kuntze, l. c. 955 = *Rudgea viburnoides*, Benth.
densivenosa, Kuntze, l. c. 960 = *Psychotria densivenosa*, Muell. Arg.
depauperata, Kuntze, l. c. (= *Mapouria depauperata*, Muell. Arg.). — Bras.
depressoglobosa, Kuntze, l. c. 955 = *Psychotria pendula*, Hook. f.
Detoniana, Kuntze, l. c. = *P. Riedeliana*, Muell. Arg.
diervilloides, Kuntze, l. c. = *P. diervilloides*, H. B. & K.
discolor, Kuntze, l. c. = *Rudgea discolor*, Benth.
divergens, Kuntze, l. c. 300 = *Psychotria divergens*, Blume.
domingensis, Kuntze, l. c. 960 = *Palicourea domin-gensis*, DC.
Dyeriana, Kuntze, l. c. 955 (= *Mapouria Nettoana*, Muell. Arg.). — Bras.
elata, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis elata*, Sw.
elliptica, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 237 = *Psychotria elliptica*, Ker.
elliptica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 300 = *P. commutata*, DC.
elongata, Kuntze, l. c. 960 = *P. elongata*, Benth.
Eminiana, Kuntze, l. c. 955 = *P. sulphurea*, Schweinf.
Engleriana, Kuntze, l. c. (= *Mapouria nyriantha*, Muell. Arg.). — Bras.
eriantha, Kuntze, l. c. 960 = *Palicourea eriantha*, DC.
erioloba, Kuntze, l. c. = *Rudgea erioloba*, Benth.
erythrantha, Kuntze, l. c. 955 = *Palicourea coccinea*, DC.
fastigiata, Kuntze, l. c. = *P. fastigiata*, H. B. & K.

URAGOGA: —

- ferruginea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 960 (= *Mapouria ferruginea*, Muell. Arg.). — Bras.
fimbriata, Kuntze, l. c. 955 = *Rudgea micrantha*, Muell. Arg.
fimbriata, Kuntze, l. c. 983 (= *Stremptelia guianensis*, A. Rich.). — Guian.
fimbriicalyx, Kuntze, l. c. 960 (= *Grumilea fimbriicalyx*, Miq.). — Java.
fissistipula, Kuntze, l. c. = *Rudgea fissistipula*, Muell. Arg.
flavescens, Kuntze, l. c. = *Palicourea flavescens*, H. B. & K.
Forsteriana, Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 98 = *Psychotria Forsteriana*, A. Gray.
forsteronioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 960 = *P. forsteronioides*, Muell. Arg.
fragrans, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis fragrans*, Hook. & Arn.
Francavillana, Kuntze, l. c. = *Rudgea Francavillana*, Muell. Arg.
Franchetiana, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) t. 18; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 97. — Ins. Pacif.
Franchetiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 956 = *Psychotria Burchelliana*, Muell. Arg.
fuscostipulata, Kuntze, l. c. = *P. microcephala*, Muell. Arg.
Gabrieli, Kuntze, l. c. = *P. gabrielis*, Muell. Arg.
Galeottiana, Kuntze, l. c. = *Palicourea Galeottiana*, Martens.
galloguianensis, Kuntze, l. c. 956 = *P. umbellata*, DC.
gardenioides, Kuntze, l. c. 960 = *Rudgea gardenioides*, Muell. Arg.
Gaudichaudii, Kuntze, l. c. = *R. Gaudichaudii*, Muell. Arg.
gendarussifolia, Kuntze, l. c. = *Psychotria gendarussaeifolia*, Blume.
glabra, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis glabra*, Willd.
Glaziovii, Kuntze, l. c. = *Rudgea Glaziovii*, Muell. Arg.
Gomeziana, Kuntze, l. c. = *R. Gomeziana*, Muell. Arg.
goyazensis, Kuntze, l. c. = *R. goyazensis*, Muell. Arg.
grandifolia, Kuntze, l. c. 953 = *Chasalia grandifolia*, DC.
Greeneana, Kuntze, l. c. (= *Mapouria insignis*, Muell. Arg.). — Bras.
Griffithii, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = *Cephaëlis Griffithii*, Hook. f.
Grisebachiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 956 = *Psychotria coronata*, Griseb.
Grumilia, Kuntze, l. c. (= *Grumilea macrocarpa*, Hiern). — Afr. trop.
guianensis, Kuntze, l. c. 983 = *Cephaëlis Evea*, DC.
hebecladoides, Kuntze, l. c. 956 = *Psychotria hebecladoides*, Griseb.
Hemsleyana, Kuntze, l. c. 956 = *P. tomentosa*, Hemsl.
herbacea, Kuntze, l. c. 300 = *Geophila reniformis*, Hemsl.
heteromorpha, Kuntze, l. c. = *Psychotria heteromorpha*, Korth.
Heurckii, Kuntze, l. c. = *Rudgea Heurckii*, Muell. Arg.
Hiernii, Kuntze, l. c. 956 = *Psychotria virens*, Hiern.
Hieronymi, Kuntze, l. c. = *P. goyazensis*, Muell. Arg.
Hookeri, Kuntze, l. c. = *Coprosma triflora*, Benth. & Hook. f.
Hostmanniana, Kuntze, l. c. = *Rudgea Hostmanniana*, Benth.
hyacinthiflora, Kuntze, l. c. = *Palicourea hyacinthiflora*, Roem. & Schult.
hygrophilodes, Kuntze, l. c. = *Psychotria hygrophilodes*, Benth.
hyptoides, Kuntze, l. c. = *P. hyptoides*, Benth.
ilheutica, Kuntze, l. c. = *Rudgea ilheutica*, Muell. Arg.
inhumasensis, Kuntze, l. c. 956 = *R. loniceroides*, Muell. Arg.
insignis, Kuntze, l. c. = *R. insignis*, Muell. Arg.

URAGOGA:

- interrupta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 961 = *Rudgea interrupta*, Benth.
involuta, Kuntze, l. c. 956 = *Cephaelis involuta*, Willd.
irregularis, Kuntze, l. c. = *Rudgea irregularis*, Muell. Arg.
ixorodes, Kuntze, l. c. = *Psychotria ixoroides*, Benth.
Jacobaschii, Kuntze, l. c. 956 (= *Mapouria Martiana*, Muell. Arg.). — Bras.
Jacobiniensis, Kuntze, l. c. 960 = *Rudgea jacobiniensis*, Muell. Arg.
jambosoides, Kuntze, l. c. = *Psychotria jambosoides*, Schlecht.
japurensis, Kuntze, l. c. 956 (= *Mapouria japurensis*, Muell. Arg.). — Bras.
japurensis, Kuntze, l. c. 960 = *Rudgea japurensis*, Muell. Arg.
jasminoides, Kuntze, l. c. = *R. jasminoides*, Muell. Arg.
Johnstonii, Kuntze, l. c. 961 = *Psychotria Johnstonii*, Hook. f.
Josephi, Kuntze, l. c. 956 = *P. filipes*, Hook. f.
Jungkuhiana, Kuntze, l. c. 961 = *P. sarmentosa*, Blume.
Kerneriana, Kuntze, l. c. 956 = *Rudgea breviflora*, Muell. Arg.
Kingiana, Kuntze, l. c. 956 = *Psychotria decipiens*, Muell. Arg.
Kirkii, Kuntze, l. c. 961 = *P. Kirkii*, Hiern.
Kunthiana, Kuntze, l. c. 956 = *Cephaelis salicifolia*, H. B. & K.
Kurziana, Kuntze, l. c. = *Psychotria divergens*, Kurz.
laciniata, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea laciniata*, Muell. Arg.
laevifolia, Kuntze, l. c. (= *Mapouria laevifolia*, Muell. Arg.). — Bras.
lanceaefolia, Kuntze, l. c. = *Rudgea lanceaefolia*, Salisb.
lanceolata, Kuntze, l. c. = *R. lanceolata*, Benth.
Langsdorffii, Kuntze, l. c. = *R. Langsdorffii*, Muell. Arg.
lasiorhachis, Kuntze, l. c. = *Palicourea lasiorhachis*, Oerst.
latifolia, Kuntze, l. c. = *Psychotria axillaris*, Willd.
leiocarpodes, Kuntze, l. c. = *Rudgea leiocarpoides*, Muell. Arg.
Lepiniana, Baill. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 19; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 96. — Ins. Pacif.
leucophylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 956 = *Rudgea macrophylla*, Benth.
Levyi, Kuntze, l. c. = *Psychotria parvifolia*, Benth.
Lindleyana, Kuntze, l. c. = *P. Lindleyana*, Muell. Arg.
lineata, Kuntze, l. c. 300, 956 = *Palicourea lineata*, Benth.
longiflora, Kuntze, l. c. 956 = *P. longiflora*, DC.
longifolia, Kuntze, l. c. = *P. longifolia*, H. B. & K.
longipedunculata, Kuntze, l. c. = *Psychotria longipedunculata*, Muell. Arg.
longevaginalis, Kuntze, l. c. = *P. longevaginalis*, Schweinf.
lonicerodes, Kuntze, l. c. = *P. loniceroides*, Sieber.
loxensis, Kuntze, l. c. 956 = *Palicourea calycina*, Benth.
Lundiana, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea Lundiana*, Muell. Arg.
lurida, Kuntze, l. c. (= *Mapouria lurida*, Muell. Arg.). — Bras.
macrobotrys, Kuntze, l. c. = *Palicourea macrobotrys*, Roem. & Schult.
macrocalyx, Kuntze, l. c. 956 = *Psychotria macrocalyx*, Muell. Arg.
macrocarpa, Kuntze, l. c. 961 = *Palicourea macrocarpa*, H. B. & K.
macropoda, Kuntze, l. c. = *Geophila macropoda*, DC.
Magnusiana, Kuntze, l. c. 956 (= *Mapouria panurensis*, Muell. Arg.). — Bras.
major, Kuntze, l. c. = *Rudgea major*, Muell. Arg.
malaccensis, Kuntze, l. c. 956 = *Psychotria Griffithii*, Hook. f.

URAGOGA: —

- Mannageltaii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 956 = *Psychotria vellerea*, Muell. Arg.
Mapuria, Kuntze, l. c. 300, 983 = *Psychotria nitida*, Willd.
marchionica, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 198; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 97. — Ins. Pacif.
Martensiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 956 = *Psychotria nicotianaefolia*, Martens & Gal.
Martiana, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea Martiana*, Muell. Arg.
matogrossensis, Kuntze, l. c. 956 = *R. cujabensis*, Muell. Arg.
medians, Kuntze, l. c. 961 = *R. medians*, Muell. Arg.
microcarpa, Kuntze, l. c. (= *Mapouria microcarpa*, Muell. Arg.). — Bras.
microdesmia, Kuntze, l. c. = *Psychotria microdesmia*, Oerst.
Miersiana, Kuntze, l. c. = *Rudgea Miersiana*, Benth.
minor, Kuntze, l. c. 956 = *R. Clauseniana*, Benth.
Miqueliana, Kuntze, l. c. = *Psychotria oligantha*, Miq.
mitis, Kuntze, l. c. 961 = *Palicourea mitis*, DC.
montana, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 237 = *Psychotria montana*, Blume.
Mooniae, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 961 = *Chasalia Mooniae*, Baker.
Mooreana, Kuntze, l. c. 957 = *Rudgea triflora*, Benth.
morindiflora, Kuntze, l. c. 961 = *Psychotria morindaeflora*, Wall.
morindodes, Kuntze, l. c. = *P. leucocarpa*, Blume.
Muelliana, Kuntze, l. c. 957 = *P. Martiana*, Muell. Arg.
multicostata, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea multicostata*, Muell. Arg.
muscosa, Kuntze, l. c. = *Cephaelis muscosa*, Sw.
myriantha, Kuntze, l. c. (= *Mapouria myriantha*, Muell. Arg.). — Bras.
myrsinifolia, Kuntze, l. c. = *Rudgea myrsinaefolia*, Benth.
Myrtiphyllum, Kuntze, l. c. = *Psychotria Myrtiphyllum*, Sw.
Nebrowniana, Kuntze, l. c. 957 (= *Mapouria sessiliflora*, Muell. Arg.). — Bras.
nervosa, Kuntze, l. c. = *Palicourea Pavetta*, DC.
Nettoana, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea Nettoana*, Muell. Arg.
Neuwiedii, Kuntze, l. c. = *R. Neuwiedii*, Muell. Arg.
nicaraguensis, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria alba*, Ruiz & Pav.
nicotianifolia, Kuntze, l. c. 957 = *P. tabacifolia*, Muell. Arg.
Niedenzuana, Kuntze, l. c. = *P. fissistipula*, Muell. Arg.
nigrescens, Kuntze, l. c. 961 = *Palicourea nigrescens*, Martens & Gal.
nilgherensis, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria elongata*, Hook. f.
niveobarbata, Kuntze, l. c. 961 (= *Mapouria niveobarbata*, Muell. Arg.). — Bras.
nobilis, Kuntze, l. c. = *Rudgea nobilis*, Muell. Arg.
nodosa, Kuntze, l. c. = *R. nodosa*, Benth.
novocastellana, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria castellana*, Muell. Arg.
nuda, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = *P. Gardneriana*, Muell. Arg.
Nymanniana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 957 = *Rudgea paniculata*, Benth.
oblonga, Kuntze, l. c. = *Cephaelis oblonga*, DC.
obovata, Kuntze, l. c. = *Palicourea obovata*, DC.
ochroleuca, Kuntze, l. c. = *Rudgea ochroleuca*, Muell. Arg.
Oerstediana, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria obovata*, Hemsl.
officinalis, Kuntze, l. c. = *P. medica*, Muell. Arg.
oligantha, Kuntze, l. c. 961 = *P. oligantha*, DC.
Oliveriana, Kuntze, l. c. 957 = *P. mandiocana*, Muell. Arg.
ovalifolia, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea ovalifolia*, Salisb.
ovalis, Kuntze, l. c. = *P. ovalis*, Muell. Arg.

URAGOGA: —

- oxylepis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 941 = *Chasalia oxylepis*, Miq.
pachyphylla, Kuntze, l. c. = *Rudgea pachyphylla*, Muell. Arg.
pachysantha, Kuntze, l. c. = *R. pachysantha*, Muell. Arg.
palicouroides, Kuntze, l. c. 962 [sphalm. *paleucouroides*] = *R. palicouroides*, Muell. Arg.
Palicourea, Kuntze, l. c. 300, 983 = *Palicourea guianensis*, Aubl.
panurensis, Kuntze, l. c. 962 = *Rudgea panurensis*, Muell. Arg.
pararawinensis, Kuntze, l. c. 957 = *Geophila hirta*, Korth.
parquoides, Kuntze, l. c. = *Rudgea parquoides*, Muell. Arg.
parviflora, Kuntze, l. c. = *Palicourea parviflora*, Benth.
parvifolia, Kuntze, l. c. = *Rudgea parvifolia*, Muell. Arg.
peduncularis, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = *Cephaelis peduncularis*, Salisb.
pedunculosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 962 = *Palicourea pedunculosa*, DC.
pendula, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria parasitica*, Sw.
peraffinis, Kuntze, l. c. 962 (= *Mapouria peraffinis*, Muell. Arg.). — Bras.
petiolaris, Kuntze, l. c. = *Palicourea petiolaris*, H. B. & K.
Philippiana, Kuntze, l. c. 957 = *P. Haenkeana*, DC.
phoenicea, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = *Palicourea punicea*, Ruiz & Pav.
phyllocalymmodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 962 = *P. phyllocalymmodes*, Muell. Arg.
picta, Kuntze, l. c. 957 = *P. calocarpa*, Kurz.
pilota, Kuntze, l. c. 962 [sphalm. ?] = *P. pilosa*, Ruiz & Pav.
platypoda, Kuntze, l. c. 962 = *P. platypoda*, DC.
podocephala, Kuntze, l. c. (= *Mapouria podocephala*, Muell. Arg.). — Bras.
Pohlana, Kuntze, l. c. (= *M. Pohlana*, Muell. Arg.). — Bras.
Polakowskyi, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria costaricensis*, Polak.
popayensis, Kuntze, l. c. = *Palicourea popayanensis*, Benth.
Prantliana, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria recurva*, Hiern.
prunifolia, Kuntze, l. c. 962 = *P. microcephala*, Muell. Arg.
psammophila, Kuntze, l. c. = *Rudgea psammophila*, Muell. Arg.
Pseudojapurensis, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria japurensis*, Muell. Arg.
psychotriaefolia, Kuntze, l. c. = *Cephaelis psychotriaefolia*, Seem.
psychotroides, Kuntze, l. c. (= *Grumilea psychotrioides*, DC.). — Afr. trop.
psychophylla, Kuntze, l. c. (= *Mapouria psychophylla*, Muell. Arg.). — Bras.
puberulina, Kuntze, l. c. (= *M. puberulina*, Muell. Arg.). — Bras.
pulchra, Kuntze, l. c. 300 = *Palicourea pulchra*, Griseb.
pulvinigera, Kuntze, l. c. — Costa Rica?
purpurea, Kuntze, l. c. 962 = *Cephaelis purpurea*, Willd.
quadrifolia, Kuntze, l. c. = *Palicourea quadrifolia*, DC.
quinguecornuta, Kuntze, l. c. 957 = *Rudgea microcephala*, Muell. Arg.
Rabeniana, Kuntze, l. c. 962 (= *Mapouria Rabeniana*, Muell. Arg.). — Bras.
Reevesii, Kuntze, l. c. 300 = *Psychotria elliptica*, Ker-Gawl.
Reginae, Kuntze, l. c. 962 = *P. Regina*, Muell. Arg.
Regnelli, Kuntze, l. c. = *P. Regnelli*, Muell. Arg.
retifolia, Kuntze, l. c. 957 = *Rudgea reticulata*, Benth.
Rhinocerotis, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 237, in obs. = *Psychotria Rhinocerotis*, Reinw.
rhytidocarpa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 962 = *P. rhytidocarpa*, Muell. Arg.

URAGOGA : —

- Riedeliana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 963 = *Psychotria Riedeliana*, Muell. Arg.
riparia, Kuntze, l. c. = *Palicourea crocea*, Roem. & Schult.
Rolfseana, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria microcarpa*, Muell. Arg.
rostrata, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 238, in obs. = seq.
rostrata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 300 = *Chasalia rostrata*, Miq.
rubribaccata, Kuntze, l. c. 957 = *Rudgea eriostrocarpa*, Muell. Arg.
rudgeoides, Kuntze, l. c. 962 = *Psychotria rudgeoides*, Muell. Arg.
Ruiziana, Kuntze, l. c. 957 = *Palicourea tinctoria*, Roem. & Schult.
Saccardoana, Kuntze, l. c. = *Psychotria Weddelliana*, Muell. Arg.
sarmentosa, Kuntze, l. c. [sarmentosa] = *P. sarmentosa*, Blume.
Schiedweileri, Kuntze, l. c. 957 = *Palicourea gardenioides*, Benth. & Hook. f.
Schlechtendalii, Kuntze, l. c. = *Psychotria neurothrix*, Muell. Arg.
Schomburgkiana, Kuntze, l. c. 962 = *Rudgea Schomburgkiana*, Benth.
Schumanniana, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria Rabeniana*, Muell. Arg.
Schwechiana, Kuntze, l. c. 952 = *P. Schwechiana*, Muell. Arg.
sclerocalyx, Kuntze, l. c. (= *Mapouria sclerocalyx*, Muell. Arg.). — Bras.
Selloana, Kuntze, l. c. = *Rudgea Selloana*, Muell. Arg.
sessilis, Kuntze, l. c. = *R. sessilis*, Muell. Arg.
Sieberi, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria capitata*, Ruiz & Pav.
Solmsiana, Kuntze, l. c. 958 = *P. japurensis*, (n. 1589) Muell. Arg.
soteropolitana, Kuntze, l. c. 962 = *P. soteropolitana*, Muell. Arg.
Spanogheana, Kuntze, l. c. 958 = *P. parviflora*, Spanogh.
spathulata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1598) 120. — Bras.
speciosa, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 15; et Fl. Polyn. Franc. (1892) 97 = *Psychotria speciosa*, Forst.
speciosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 962 = *Ixora vitiensis*, A. Gray.
sphaerocarpha, Kuntze, l. c. (= *Grumilea sphaerocarpha*, Hiern.). — Afr. trop.
spicata, Kuntze, l. c. = *Psychotria spicata*, Muell. Arg.
Spruceana, Kuntze, l. c. (= *Mapouria Spruceana*, Muell. Arg.). — Bras.
stachyoides, Kuntze, l. c. = *Psychotria stachyoides*, Benth.
stenantha, Kuntze, l. c. = *Rudgea stenantha*, Muell. Arg.
stenophylla, Kuntze, l. c. = *Palicourea angustifolia*, H. B. & K.
stipulacea, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = *Cephaelis stipulacea*, Blume.
suaveolens, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 392 = *Cephaelis suaveolens*, Schweinf.
subcordata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 962 = *Rudgea subcordata*, Muell. Arg.
subrubra, Kuntze, l. c. = *Palicourea subrubra*, Polak.
subrufa, Kuntze, l. c. = *Psychotria Rhinocerotis*, Reinw.
subsessilis, Kuntze, l. c. = *P. subsessilis*, Benth.
subspathulata, Kuntze, l. c. (= *Mapouria subspathulata*, Muell. Arg.). — Bras.
sulfurea, Kuntze, l. c. = *Psychotria sulphurea*, Seem.
sumatrensis, Kuntze, l. c. 958 = *P. coriacea*, Korth.
Suteriana, Kuntze, l. c. = *P. Lindleyana*, Muell. Arg.
Swartzii, Kuntze, l. c. 962 = *Cephaelis Swartzii*, DC.
symplocodes, Kuntze, l. c. 963 = *Rudgea symplocodes*, Muell. Arg.
tabernifolia, Kuntze, l. c. = *Palicourea tabernaefolia*, DC.

URAGOGA : —

- tahitensis*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 17; et Fl. Polyn. Franc. (1892) 98. — Ins. Pacif.
Taubertiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 958 = *Rudgea involucrata*, Muell. Arg.
tenuis, Kuntze, l. c. 963 (= *Mapouria tenuis*, Muell. Arg.). — Bras.
tetrandra, Kuntze, l. c. = *Cephaelis Evea*, DC.
Teymanniana, Kuntze, l. c. (= *Grumilea Teymanniana*, Miq.). — Ins. Banca.
Thomsonii, Kuntze, l. c. 963 = *Psychotria Thomsonii*, Hook. f.
Thonningii, Kuntze, l. c. 958 = *P. umbellata*, Thonn.
thyrsiflora, Kuntze, l. c. 963 = *Palicourea thyrsiflora*, DC.
tinctoria, Kuntze, l. c. 958 = *P. parviflora*, Willd.
tinguana, Kuntze, l. c. 963 = *Rudgea tinguana*, Muell. Arg.
tinifolia, Kuntze, l. c. = *Palicourea tinifolia*, DC.
tomentosa, Kuntze, l. c. 301 = *Psychotria tomentosa*, Muell. Arg.
tomentosa, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = praec.
tonsa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 958 = *Psychotria elliptica*, Ker-Gawl.
tortilis, Kuntze, l. c. 301 = *P. tortilis*, Baill.
travancorica, Kuntze, l. c. 958 = *P. macrocarpa*, Hook. f.
Trubiana, Kuntze, l. c. = *Rudgea lasiostylis*, Muell. Arg.
triadica, Kuntze, l. c. 963 (= *Mapouria triadica*, Muell. Arg.). — Bras.
trichocalyx, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) t. 16; et Fl. Polyn. Franc. (1892) 99 = *Calycosia trichocalyx*, Drake.
trichogyne, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 963 (= *Mapouria trichogyne*, Muell. Arg.). — Bras.
trichophorodes, Kuntze, l. c. = *Psychotria trichophorodes*, Muell. Arg.
trichophylla, Kuntze, l. c. = *P. triphylla*, Muell. Arg.
trichotoma, Kuntze, l. c. = *P. trichotoma*, Mart. & Gal.
tricephala, Kuntze, l. c. (= *Mapouria tricephala*, Muell. Arg.). — Bras.
triflora, Kuntze, l. c. = *Coprosma triflora*, Benth. & Hook. f.
tristis, Kuntze, l. c. (= *Mapouria tristis*, Muell. Arg.). — Bras.
tubulosa, Kuntze, l. c. 958 = *Rudgea eriantha*, Benth.
turrialvensis, Kuntze, l. c. = *Psychotria subsessilis*, Benth.
umbellata, Kuntze, l. c. = *P. Arrabidaea*, Muell. Arg.
umbellifera, Kuntze, l. c. (= *Grumilea umbellata*, Mig.). — Sumatra.
umbelluligera, Kuntze, l. c. 963 (= *Mapouria umbelluligera*, Muell. Arg.). — Bras.
umbrosa, Kuntze, l. c. = *Rudgea umbrosa*, Muell. Arg.
Urbaniana, Kuntze, l. c. 958 = *Psychotria corymbifera*, Muell. Arg.
vaginata, Kuntze, l. c. 963 = *Palicourea vaginata*, Benth.
vasivensis, Kuntze, l. c. (= *Mapouria vasivensis*, Muell. Arg.). — Bras.
Velhana, Kuntze, l. c. (= *M. Velhana*, Muell. Arg.). — Bras.
Vellozoana, Kuntze, l. c. 958 = *Psychotria herbacea*, Vell.
venosa, Kuntze, l. c. 963 (= *Grumilea venosa*, Hiern.). — Afr. trop.
vestita, Kuntze, l. c. (= *Mapouria vestita*, Muell. Arg.). — Bras.
viburnodes, Kuntze, l. c. = *Psychotria viburnoides*, H. B. & K.
violacea, Kuntze, l. c. = *Geophila violacea*, DC.
virens, Kuntze, l. c. = *Psychotria virens*, Poepp. & Endl.
vitoriensis, Kuntze, l. c. = *P. vitoriensis*, Muell. Arg.
Warburgiana, Kuntze, l. c. 958 = *P. apiculata*, Warb.
Watsoniana, Kuntze, l. c. 958 (= *Mapouria crassa*, Muell. Arg.). — Bras.

URAGOGA : —

- Weddelliana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 963 = *Rudgea Weddelliana*, Muell. Arg.
Wettsteiniana, Kuntze, l. c. 958 = *Psychotria brachyandra*, Muell. Arg.
Willdenowiana, Kuntze, l. c. = *Cephaelis violacea*, Willd.
Wittmackiana, Kuntze, l. c. (= *Mapouria Langsdorffiana*, Muell. Arg.). — Bras.
xanthina, Kuntze, l. c. 963 = *Palicourea xanthina*, DC.
xanthophylloides, Kuntze, l. c. (= *Mapouria xanthophylloides*, Muell. Arg.). — Bras.
ypanemensis, Kuntze, l. c. = *Rudgea ypanemensis*, Muell. Arg.
zangebarica, Kuntze, l. c. = *Psychotria zangebarica*, Hiern.
zeylanica, Kuntze, l. c. 958 = *P. stenophylla*, Hook. f.
Zollingeriana, Kuntze, l. c. 963 = *Geophila Zollingeriana*, Miq.
zombamontana, Kuntze, l. c. 958 (= *Grumilea Kirkii*, Hiern.). — Afr. trop.

URANDRA, Thw. = **Lasianthera**, Beauv. (Ola-

- cin.).
capitatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 (= *Stemonurus capitatus*, Becc.). — Borneo.
grandifolia, Kuntze, l. c. (= *S. grandifolius*, Becc.). — Borneo.
lanceolata, Kuntze, l. c. = *Lasianthera lanceolata*, Mast.
macrocarpa, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 248 = *L. macrocarpa*, Miq.
Maingayi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *L. Maingayi*, Mast.
scorpioides, Kuntze, l. c. (= *Stemonurus scorpioides*, Becc.). — Borneo.
secundiflora, Kuntze, l. c. 112, 113 = *Lasianthera apicalis*, Benth. & Hook. f.
tomentella, Kuntze, l. c. 113 = *Gomphandra tomentella*, Mast.
umbellata, Kuntze, l. c. (= *Stemonurus umbellatus*, Becc.). — Borneo.

URARIA, Desv. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1148.

- heteropetala*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 5 (= *Fitzalanthera heteropetala*, F. Muell.). — Austral.
paniculata, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 15 t. 4. — Kohima.
retroflexa, Drake, in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 192. — Tonkin.
sinensis, Franch. Pl. Delav. (1890) 172. — Yunnan.

URASPERMUM, Nutt. = **Osmorhiza**, Rafin.

- (Umbell.).
aristatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 270 = *O. longistylis*, DC.
Berteroi, Kuntze, l. c. = *O. Berterii*, DC.
glabratum, Kuntze, l. c. = *O. glabrata*, Phil.
nudum, Kuntze, l. c. = *O. nuda*, Torr.

URBANELLA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 25

- = **Lucuma**, Molina (Sapot.).
buchananiofolia, Pierre, l. c. = *L. buchananiaefolia*, Pierre.
cuspidata, Pierre, l. c. — Bras.
oblonga, Pierre, l. c. = *Lucuma oblonga*, Pierre.
procera, Pierre, l. c. (1890) 25 = *L. procera*, Mart.

URBANIA, Phil in Anal. Mus. nac. Chile (1891)

60. **VERBENACEAE**.
eganioides, Phil. l. c. t. 1, fig. 7a, b. — Chili.
pappigera, Phil. l. c. t. 1, fig. 7c et d. — Chili.

URBANISOL, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 370 =

- Tithonia**, Desf. (Compos.).
aristatus, *decurrens*, *heterophyllus*, *Thurberi*, *tubiformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 371 = *homonyma omnia* Tithoniae.
tagetifolia, Kuntze, l. c. 370 = *T. tagetiflora*, Desf.

URBANODENDRON, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 86; Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 276. **LAURINEAE**.
verrucosum, Mez, ll. cc. (= *Aydedron verrucosum*, Nees). — Bras.

URCEOCHARIS *Clibrari* X, Mast, in Gard. Chron. (1892) ii. 214, fig. 36; et ex Gartenfl. xli. (1892) 501. (Amaryth.). — Hybr. artef.

URECHITES, Muell. Arg. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1149.
Neriandra, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 262. — Ind. occ.

URELYTRUM, Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1889) 25. **GRAMINEAE**.
agropyroides, Hack, in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 272 (= *Rotibocella agropyroides*, Hack.). — Angola.
digitatum, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 97 [Urelythrum]. — Afr. trop. or.
squarrosus, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 272 t. 1, fig. 5. — Afr. austr.

URENA, Dill. ex Linn. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 1149.
callifera, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 7 t. 3. — Kohima.
cylindrica, Franch. Miss. scient. Cap Horn, v. [Phan.] (1889) 379 t. 7b. — Reg. Magell.
Hookeri, Guerke, in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 381. — Ind. or.

URERA, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1149.
Eggersii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 3. — Ecuad.
Hypselodendron, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 130, nomen. — Afr. trop.
tenax, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1748. — Natal.

URETIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 544 = **OURET**, Adans. = **Aerva**, Forsk. (Amarant.).
congesta, glabrata, lanata, Leubnitziae, leucura, microphylla, Monsonia, Pechuelii, persica, revoluta, sanguinolenta, Wightii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 544-545 = *homonyma omnia* Aervae.
sericea, Kuntze, l. c. = *Aerva tomentosa*, Lam.

URGINEA, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1150.
acinacifolia, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 220. — Afr. austro-occ. extratrop.
brachystachys, Baker, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 474. — Afr. trop. or.
Bragae, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 142. — Afr. trop. or.
coromandeliana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 347 (= *Scilla coromandeliana*, Roxb.). — Coromand.
Eckloni, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35 (1892) 6. — Afr. austr.
eriospermoides, Baker, in Gard. Chron. (1887) ii. 126. — Afr. austr.
macrocentra, Baker, l. c. i. (1887) 702. — Afr. austr.
modesta, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35 (1892) 6. — Afr. austro-occ. extratrop.
noctiflora, Batt. & Trab. in Compt. rend. Assoc. Franç. Besançon, 1892 (1893) 505; et Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 250. — Algeria.
Nyasae, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 50. — Afr. trop.
polyphylla, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 348 (= *Ornithogalum polyphyllum*, Heyne). — Deccan?
sanguinea, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 219. — Afr. austro-occ. extratrop.
Tayloriana, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 424. — Afr. trop. or.
Wightiana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 347. — Deccan.

UROPAPPUS, Nutt. = **Microseris**, D. Don (Compos.).
Clevelandi, Greene, in Erythea, i. (1893) 137; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 221 (= *Calais Clevelandi*, Greene). — Calif.
Kelloggii, Greene, ll. cc. (= *C Kelloggii*, Greene). — Calif.

UROPAPPUS : —
leucocarpus, Greene, in Erythea, i. (1893) 260. — Calif.
macrochaetus, Greene, l. c. 137 = *Microseris macrochaeta*, Sch. Bip.

UROPEDILUM, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 84, in obs. = **UROPEDIUM**, Lindl. = **Selenipedium**, Reichb. f. (Orchid.).

UROPHYLLUM, Wall. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1151.
chloranthum, [Engl. ?] Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92, nomen. — Afr. trop.
cyphandrum, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 176. — Borneo.
heteromerum, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 130; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 67. — N. Guin.
hexandrum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 301. — Malacca.
Holstii, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 379. — Afr. trop. or.
lineatum, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 177. — Borneo.
longidens, Stapf, l. c. 178. — Borneo.
salicifolium, Stapf, l. c. 177. — Borneo.
subanurum, Stapf, l. c. 175. — Borneo.

UROSPERMUM, Scop. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1151.
grandiflorum, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 527. = *U. Dalechampii*, Desf.

UROSTEPHANUS, Robinson & Greenm., in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 159; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 306. **ASCLEPIADEAE**.
gonoloboides, Robinson & Greenm. ll. cc. — Mexic.

URSINIA, Gaertn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1153.
anethifolia, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 670 (= *Sphenogyne anethifolia*, Less.). — Afr. austr.
anethoides, N. E. Br. l. c. (= *S. anethoides*, DC.). — Afr. austr.
brachyloba, N. E. Br. l. c. (= *S. brachyloba*, Kuntze). — Afr. austr.
brachypoda, N. E. Br. l. c. (= *S. brachypoda*, Harv.). — Afr. austr.
calendulaeflora, N. E. Br. l. c. = *calendulaeflora*, Benth. & Hook. f.
chamaemeloides, N. E. Br. l. c. = *chamaemeloides*, DC.
chamomillaefolia, N. E. Br. l. c. (= *S. chamomillaefolia*, DC.). — Afr. austr.
ciliaris, N. E. Br. l. c. (= *S. ciliaris*, DC.). — Afr. austr.
concolor, N. E. Br. l. c. (= *S. concolor*, Harv.). — Afr. austr.
coronopifolia, N. E. Br. l. c. (= *S. coronopifolia*, Less.). — Afr. austr.
discolor, N. E. Br. l. c. (= *S. discolor*, Less.). — Afr. austr.
Dregeana, N. E. Br. l. c. (= *S. Dregeana*, DC.). — Afr. austr.
Eckloniana, N. E. Br. l. c. (= *S. Eckloniana*, Sond.). — Afr. austr.
filipes, N. E. Br. l. c. (= *S. filipes*, E. Mey.). — Afr. austr.
heterodonta, N. E. Br. l. c. (= *S. heterodonta*, DC.). — Afr. austr.
hispida, N. E. Br. l. c. (= *S. hispida*, DC.). — Afr. austr.
incana, N. E. Br. l. c. (= *S. incana*, DC.). — Afr. austr.
leptoglossa, N. E. Br. l. c. (= *S. leptoglossa*, DC.). — Afr. austr.
macropoda, N. E. Br. l. c. (= *S. macropoda*, DC.). — Afr. austr.
natalensis, N. E. Br. l. c. (= *S. natalensis*, Sch. Bip.). — Afr. austr.
nudicaulis, N. E. Br. l. c. (= *S. nudicaulis*, Less.). — Afr. austr.
pauciloba, N. E. Br. l. c. (= *S. pauciloba*, DC.). — Afr. austr.
pulchra, N. E. Br. l. c.; Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 126. — Afr. austr.

URSINIA : —
punctata, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 670 (= *Sphenogyne punctata*, Less.). — Afr. austr.
pusilla, N. E. Br. l. c. (= *S. pusilla*, DC.). — Afr. austr.
quinquepartita, N. E. Br. l. c. (= *S. quinquepartita*, DC.). — Afr. austr.
rigidula, N. E. Br. l. c. (= *S. rigidula*, DC.). — Afr. austr.
saxatilis, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 355. — Transvaal.
scapiformis, N. E. Br. in Gard. Chron. (1888) i. 670 (= *S. scapiformis*, DC.). — Afr. austr.
sericea, N. E. Br. l. c. (= *S. sericea*, Less.). — Afr. austr.
subhirsuta, N. E. Br. l. c. (= *S. subhirsuta*, DC.). — Afr. austr.
tridentata, N. E. Br. l. c. = *tridentata*, Benth. & Hook. f.
trifida, N. E. Br. l. c. (= *S. trifida*, Less.). — Afr. austr.
trifurca, N. E. Br. l. c. (= *S. trifurca*, Harv.). — Afr. austr.
tripartita, N. E. Br. l. c. (= *S. tripartita*, DC.). — Afr. austr.
versicolor, N. E. Br. l. c. (= *S. versicolor*, DC.). — Afr. austr.

URTICA, [Tourn.] Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1153.
bracteata, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 585, in syn. = *Pouzolzia caudata*, Benn. californica, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 281; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 296. — Calif.
Fischeri, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 162. — Afr. trop. or.
pauciflora, Hochst. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 592, in syn. = *Droguetia diffusa*, Wedd.
sibirica, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 162. — Afr. trop. or.
xiphodon, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 3. — As. occ.

URTICASTRUM, Moehr. Hort. Priv. (1736); Heist. Syst. (1748), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 634 = **Laportea**, Gaudich. (Urtic.).
alatipes, amplissimum, bulbiferum, costatum, decumanum, Gaudichaudianum, gigas, Harveyi, laxiflorum, microstigma, Milnei, nicaraguense, oleraceum, peltatum, photiniphylla, Pterostigma, repens, stimulanus, Vrieseanum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 635 = *homonyma omnia* Laportee.
divaricatum, Kuntze, l. c. = *L. canadensis*, Gaudich.
exaltatum, Kuntze, l. c. = *L. terminalis*, Wight.
mexicanum, Kuntze, l. c. = *L. platycarpa*, Wedd.
morodes, Kuntze, l. c. = *L. morodes*, Wedd.
sinuatum, Kuntze, l. c. = *L. stimulanus*, Miq.

URUPARIA, Rafin. = **Uncaria**, Schreb. (Rubiace.).
acida, africana, attenuata, callophylla, canescens, cirrhiflora, dasyoneura, ferrea, Gambier, homomalla, jasmijniflora, levigata, lanosa, Lobbii, macrophylla, nemorosa, ovalifolia, ovata, pedicellata, pilosa, pteropoda, Roxburghiana, sessiliflorus, setiloba, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 301 = *homonyma omnia* Uncariae.

URVILLEA, H. B. & K. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1157.
dissecta, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 447. — Mexic.

UTRICULARIA, Linn. (Lentibul.). — Ind. Kew. ii. 1157.
brevicornis, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 253, et xxxvii. (1887) 117, 164, 192. — Eur. centr.
bryophila, Ridl. in Ann. Bot. ii. (1888) 305. — Ins. S. Thom.
Campbelliana, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 280, t. 44b (Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 200). — Guian. angl.
capilliflora, F. Muell. in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xxiv. 1890 (1891) 77; et ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 31. — Austral.
cleistogama, Britton, in Trans. N. Y. Acad. ix. (1889) 12. — Am. bor.

UTRICULARIA: —

- Holtzei, F. Muell. in *Vict. Natw. ix.* (Mar. 1893) 176; et in *Bot. Centralbl.* liv. (1893) 93. — Austral.
 involvens, Ridl. in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 11. — Penins. Mal.
 Jankae, Velen. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. I. (1889) 259; et *Fl. Bulg.* (1891) 473. — Bulg.
 Kamienskii, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (Mar. 1893) 175; et ex *Bot. Centralbl.* liv. (1893) 93. — Austral.
 littoralis X, Melander, in *Bot. Notis.* (1887) 175. — Scand.
 major, St Lager, in *Cariot. Étud. des. fl. éd. 8* (1880) 646 = *vulgaris*, Linn.
 Muelleri, Kamienskii, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xii. (1894) 5. — Austral.
 Oliveri, Kamienskii, l. c. 4. — Afr. trop.
 ophirensis, Ridl. in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 10. — Malacca.
 Singeriana, F. Muell. in *Journ. Roy. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 1889 (1891) 76. — Austral.
 tortilis, F. Muell. l. c. = Wallichiana, Wight.
 verapazensis, Morong, ex F. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 209. — Guatem.
 vulcanica, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 318. — N. Zel.
 Warmingii, Kamienskii, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xii. (1894) 7. — Bras.

UVA, Burm. = **Uvaria**, Linn. (Anonac.).

- acuminata, angolensis, argentea, aurita, bracteata, caffra, Chamae, chinensis, concava, connivens, cristata, cylindrica, dulcis, fusca, glabra, globosa, gracilis, Hamiltonii, heteropetala, hirsuta, Holtzei, Lobbiana, lucida, lurida, macropoda, Marcenaria, membranacea, micrantha, microcarpa, Narum, ovata, parviflora, pauciovulata, ptychocalyx, rufa, rugosa, scabrata, semecarpifolia, sphenocarpa, subrepanda, sumatrana, synsepala, timoriensis, Vogelii, Kuntze. *Rev. Gen.* (1891) 7 = homonyma omnia Uvariae brasiliensis, Kuntze, l. c. = Cymbopetalum brasiliense, Benth.
 cordata, Kuntze, l. c. = Uvaria macrophylla, Roxb.
 Goetzeana, Kuntze, l. c. = U. Goetzeana, F. Muell.
 grandiflora, Kuntze, l. c. = U. purpurea, Blume.
 Hasseltii, Kuntze, l. c. = U. Hasseltii, Blume.
 heterophylla, Kuntze, l. c. — [Quid?]
 moluccana, Kuntze, l. c. = Unona Musaria, Dunal.
 oblongifolia, Kuntze, l. c. = Uvaria trigyna, Mart.
 Schumacheri, Kuntze, l. c. = U. cordata, Schum. & Thonn.

UVARIA, Linn. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 1159.

- amfamanica, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 21. — Perak.
 bukobensis, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 178. — Afr. trop. or.
 Buchananii, Engl. l. c. 179. — Afr. trop. or.
 chinensis, Hance [ubi?] ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 8. — China.
 Curtisii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 21. — Perak.
 Eminii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 179. — Afr. trop. or.
 fruticosa, Engl. l. c. 178. — Afr. trop. or.
 heterophylla, Blume [ubi?], ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 8. — Hab.?
 Holstii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 178. — Afr. trop. or.
 leptoclada, Oliver, in H. Johnston, *The Kilim. Exped. Append.* (1886) 337, nomen. = seq.
 leptoclada, Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*, ii. (1887) 327. — Afr. trop. or.
 lutescens, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 48. — N. Guin.
 neo-guineensis, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 454. — N. Guin.
 Ridleyi, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 19. — Perak.
 Scortechini, King, l. c. 20. — Perak.
 Sofa, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 69. — Sierra Leone.
 Stuhlmannii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 178. — Afr. trop. or.

UVIFERA, Linn. Hort. Cliff. (1737) 487, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 561 = **Coccoloba**, Linn. (Polygon.).

- acuminata, alagoensis, armata, ascendens, barbadensis, Barbeyana, Billbergii, bracteolosa, brasiliensis, Candolleana, caracasana, cordata, coriacea, costata, Cruegeri, cubensis, Curtisii, cuyabensis, cylindrostachya, declinata, densifrons, Eggersiana, excelsa, excoriata, fagifolia, fallax, fastigiata, flavesces, floribunda, geniculata, gracilis, grandiflora, Grisebachiana, ilhensis, jamaicensis, jurgensii, Klotzschiana, Krugii, laevis, latifolia, laurifolia, laxiflora, leptostachya, Liebmannii, Lindeniana, longifolia, longipendula, lucidula, manzanillensis, marginata, microneura, microphylla, Mosonii, nematostachya, nigrescens, nitida, nodosa, novogranatensis, nutans, oblonga, ovata, Orizabae, ovata, padiformis, pallida, paracoccia, Spruceana, sticticaulis, striata, subcordata, Swartzii, tenuiflora, tiliacea, Trianaei, Trinitatis, Urbaniana, venosa, verruculosa, Warmingii, Wrightii, yucatanica, zebra, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 561 = homonyma omnia Coccolobae.
 acrostichoides, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 561 = C. acrostichoides, Cham.
 Blanchetiana, Kuntze, l. c. = C. ochreolata, Wedd.
 crescentifolia, Kuntze, l. c. = C. crescentiaefolia, Cham.
 Curtisii, Kuntze, l. c. = C. lacerifolia, Jacq.
 dioica, Kuntze, l. c. (= C. dioica, Steud.) = Muehlenbeckia sagittifolia,
 Glaziovii, Kuntze, l. c. = Coccoloba Glaziovii, Lindau.
 guyanensis, Kuntze, l. c. = C. guianensis, Meissn.
 Humboldtii, Kuntze, l. c. = C. Humboldtii, Meissn.
 laurifolia, Kuntze, l. c. = C. laurifolia, Jacq.
 Lehmannii, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 7, in obs. = C. Lehmannii, Lindau.
 leoganensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 561 = C. uvifera, Linn.
 leptostachyoides, Kuntze, l. c. = C. leptostichyoides, Lindau.
 longipendula, Kuntze, l. c. = C. longependula, Mart.
 mexicana, Kuntze, l. c. = C. Schiedeana, Lindau.
 obtusifolia, Kuntze, l. c. = C. microstachya, Willd.
 pubescens, Kuntze, l. c. = C. grandifolia, Jacq.
 punctata, Kuntze, l. c. = C. coronata, Jacq.
 racemulosa, Kuntze, l. c. = C. racemulosa, Meissn.

V

VACCARIA, Medic. = **Saponaria**, Linn. (Caryoph.).
 pyramidalis, Pahl, *Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 28 = S. Vaccaria, Linn.

VACCINIOPSIS, Rusby, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 433 t. 170. **VACCINIACEAE**.
 ovata, Rusby, l. c. 434. — Bolivia.

VACCINIUM, Linn. (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 1162.

- acutissimum, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 15. — N. Guin.
 africanum, Britton, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 23. — Afr. trop.
 ambyandrum, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 19. — N. Guin.
 amplifolium, F. Muell. l. c. II. — N. Guin.
 atrococtum, Heller, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 24 = corymbosum, Linn.
 barandanum, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 166. — Ins. Philipp.
 benguetense, Vidal, l. c. 168. — Ins. Philipp.
 Blumeianum, Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 200 (= V. floribundum, Blume). — Java.

VACCINIUM: —

- cordifolium, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 189. — Borneo.
 Cumingianum, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 167. — Ins. Philipp.
 Delavayi, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 367. — Yunnan.
 escallonioides, Drake, l. c. iii. (1889) 76. — Ecuad.
 Exul, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1941. — Transvaal.
 fragile, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 366. — Yunnan.
 gaultherioides, Bigel. in *New Engl. Med. Journ.* v. 335, ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 328 = uliginosum, Linn.
 Helenae, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 16. — N. Guin.
 Henryi, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 15. — China.
 indatum, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 169. — Ins. Philipp.
 lasiodiscus, Maxim. in *Bull. Acad. Petersb.* xxxi. (1887) 63. — Japon.
 luzoniense, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 168. — Ins. Philipp.
 Macbainii, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 17. — N. Guin.
 micrantherum, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 190. — Borneo.
 moupinense, Franch. in *Nouv. Archiv. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 43. — Tibet.
 nigrum, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 252 = pennsylvanicum, Lam.
 pachydermum, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 189. — Borneo.
 parvulifolium, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 20. — N. Guin.
 polyanthum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 385 = V. Teysmannii, Mig.
 pubicalyx, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 369. — Yunnan.
 puxophyllum, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 17, in obs. = Agapetes buxifolia, Nutt.
 reclinatum, Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 224 (= V. reflexum, Hook.). — Bolivia.
 sabuletrum, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 315. — Penins. Mal.
 Stanleyi, Schweinf. in *Sitzb. Ges. naturf. Freunde Berl.* (1892) 173. — Afr. trop.
 urceolatum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 16. — China.
 Villarii, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 166. — Ins. Philipp.
 yunnanense, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 368. — Yunnan.

VAGNERA, Adans. = **Smilacina**, Desf. (Liliac.).
 amplexicaulis, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 316 = S. racemosa, Desf.
 racemosa, Morong, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 480; et in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 114 = S. racemosa, Desf.
 sessilifolia, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 316 = S. sessilifolia, Nutt.
 stellata, Morong, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1 (1894) 181, et in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 114 = S. stellata, Desf.
 trifolia, Morong, l. c. 114 = S. trifolia, Desf.

VAHEA, Lam. = **Landolphia**, Beauv. (Apocyn.).
 Kirkii, Sadeb. in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* ix. I. (1891) 226 = L. Kirkii, Dyer.

VAHLIA, Thunb. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 1164.
 dichotoma, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 227 = oldenlandioides, Roxb.
 digna, Kuntze, l. c. = viscosa, Roxb.

VALENTINIA, Heist. = **Maianthemum**, [Weber] in Wigg. (Liliac.).
 bifolia, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 517 = Maianthemum Convallaria [Weber in] Wigg.

VALERANDIA, Neck. = **Orphium**, E. Mey. (Gentian.).
fruticosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 = *O. frutescens*, E. Mey.

VALERIANA, Tourn. ex Linn. (Valerian.). — Ind. Kew. ii. 1164.

aegialitis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 721. — Chili.

albonervata, Robinson, ex Seaton, in Proc. Am. Acad. xxvii (1893) 170. — Mexic.

ambigua, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1140 = *montana*, Linn.

andina, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 264. — Bolivia.

andina, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 276, 293, et xviii. (1894) 429, 462. — Chili.

apiifolia, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii (1887) 417. — Mexic.

aracana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 744. — Chili.

bijuga, Simonk. ex Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 352 = *tripteris*, Linn.

boliviana, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 263. — Bolivia.

calcareae, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 452, iii. (1895) 519. — Reg. Cauc.

caudata, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 743. — Chili.

ceratophylla, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 492 = *edulis*, Nutt.

Chodatiana, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 452. — Reg. Cauc.

columbaria, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 747. — Chili.

crassicaulis, Phil. l. c. 746. — Chili.

crenata, Phil. l. c. 744. — Chili.

Fedtschenkoi, Coincy, Ecl. alt. pl. Hisp. (1895) 15, in obs. (= *V. longiflora*, Regel & Schmalh.). — As. centr.

flagellifera, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 374. — China.

Glaziovii, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 10. — Bras.

Heyderi, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 757. — Graecia.

integrifolia, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 742. — Chili.

kilimandscharica, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 48. — Afr. trop. or.

Mandoni, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 264. — Bolivia.

Palmeri, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 417. — Mexic.

Pancini, Halácsy et Baldacci, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 408. — Montenegro.

Phu, Ces. Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 549. [Sp. collect.]. — Italia.

polemoniifolia, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 743. — Chili.

Pugae, Phil. l. c. 746. — Chili.

remota, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 42. — Peruvia.

rhomboidea, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 154. — Mexic.

Rusbyi, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 264. — Bolivia.

Sternbergii, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1140 = *montana*, Linn.

tangutica, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 375. — China.

Urbani, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 29. — Chili.

versifolia, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 98, et xxxi. Beil. (1887-88) 80 = *officinalis*, Linn.

Volkensii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 395. — Afr. trop. or.

VALERIANELLA, Tourn. ex Hall. (Valerian.). — Ind. Kew. ii. 1167.

bessarabica, Lipsky, in Soc. Natur. Kiew, xi. II. (1891) 50. — Reg. Cauc.

bulgarica, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1893 (1894) xxxvii. 33 = *pontica*, Lipsky.

VALERIANELLA : —

caucasica, Höck, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 177 (= *Betekea caucasica*, Boiss.). — Reg. Cauc.

euxina, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. 1894, (1895) n. xxix 16 (= *V. pontica*, Velen.). — Bulg.

leiocarpa, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 195 = *Dufresnia leiocarpa*, L. C. Koch

platycarpa, Trautv. l. c. ix. (1886) 455. — Turkest.

Pomeli, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]. (1889) 406. — Algeria.

pontica, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1893 (1894) xxxvii. 34 = *euxina*, Velen.

Willkommii, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 71; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 546 = *V. Martini*, Losc.

VALERIANODES, Medic. = **Stachytarpheta**, Vahl (Verben.).

acuminatum, albiflorum, bicolor, canescens, commutatum, crassifolium, glabrum, integrifolium, longispicatum, orubicum, pachystachyum, quadrangulum, reticulatum, sanguineum, scaberrimum, speciosum, villosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 510 = *homonyma omnia* *Stachytarphetae*.

cayennensis, Kuntze, l. c. = *S. cajanensis*, Vahl.

gesnerodes, Kuntze, l. c. = *S. gesnerioides*, Cham.

integrifolium, Kuntze, l. c. = *S. glauca*, Walp.

longispicatum, Kuntze, l. c. = *S. Chamissonis*, Walp.

rhomboidale, Kuntze, l. c. = *S. rhomboidalis*, Walp.

VALETONIA, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 64 (= **MARTIA**, T. Valetton). **OLACINEAE**.

VALLARIS, Burm. f. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1168.

glabra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 417 = *V. Pergulana*, Burm. f.

solanacea, Kuntze, l. c. = *V. Heynii*, Spreng.

solanacea, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 186 = *praec.*

VALLESIA, Ruiz & Pav. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1168.

laciniata, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 182. — Calif.

macrocarpa, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 297. — Ins. Sandvic.

VALLISNERIA, Mich. ex Linn. (Hydrochar.). — Ind. Kew. ii. 1168.

caulescens, F. M. Bailey & F. Muell. Syn. Queensl. Fl. Sec. Suppl. (1888) 56. — Austral.

gracilis, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellend. (1889) 62; et Syn. Queensl. Fl. Third Suppl. (1890) 70. — Austral.

VALLOTA, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 1168.

speciosa, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 258 = *purpurea*, Herb.

VANCOUVERIA, Ch. Morr. & Decne. (Borberid.). — Ind. Kew. ii. 1168.

parviflora, Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 100; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 7. — Calif.

VANDA, Jones (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1168.

Amesiana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 764 et (1889) i. 233; Williams, Orchid Alb. vii. (1888) t. 296; Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7139. — Cambodia.

Arbuthnotiana, Kraenzl. in Gard. Chron. (1892) i. 522; Williams, Orchid Grow. Man. ed. 7 (1894) 740. — Malabar.

Charlesworthii × *Rolfe*, in Orchid Rev. ii. (1894) 322. — Hybr. spont.?

Clarkei, N. E. Br. in Kew Bull. (1888) 112 = *Arachnanthe Clarkei*, Hook. f.

Drakei, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 648. — Ins. Sund.

flavobrunnea, Reichb. f. in Flora, lxix. (1886) 552. — Hab.?

Kimballiana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1889) i. 232 (1889) ii. 294, 335, fig. 50; *Lindenia*, v. (1889) 27, t. 204; Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7112. — Hab.?

VANDA : —

Lindeni, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 70; et in *Lindenia*, ii. (1886) 19, t. 56. — Ins. Pacif.

Muelleri, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 461. — N. Guin.

obliqua, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 61, in syn. = *Saccolabium obliquum*, Lindl.

pumila, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 53; et in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 45. — Reg. Himal.

Roeblingiana, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 365. — Penins. Mal.

subulifolia, Reichb. f. in Flora, lxix. (1886) 552. — Hab.?

superba, Hort. ex *Lindenia*, iii. (1887) 83, t. 136 = *V. Boxallii*, Reichb. f.

vitellina, Kraenzl. in Gard. Chron. (1892) ii. 206. — Hab.?

VANDELLIA, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1169.

cerastoides, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 100. — Burma.

VANDOPSIS, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1889) 210. **ORCHIDEAE**.

Chalmersiana, F. Muell. & Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 210. — N. Guin.

gigantea, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1889) 210 (= *Stawropsis gigantea*, Benth.). — Burma.

lissochiloides, Pfitz. l. c. (= *S. lissochiloides*, Pfitz.). — Ins. Philipp.

VANGUIERA, Juss. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1169.

acuminatissima, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 385. — Afr. trop. or.

apiculata, K. Schum. l. c. 385. — Afr. trop. or.

glabra, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

loranthifolia, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

microphylla, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

neglecta, K. Schum. l. c. 384. — Afr. trop. or.

nigrescens, S. Elliot, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2283; S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 80. — Sierra Leone.

nodulosa, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92, nomen. — Afr. trop.

Pyrostria, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 134 (= *Pyrostria spinosa*, Miq.). — Java.

tomentosa, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 385. — Afr. trop. or.

verrucosa, Sieber, ex Solereder, in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 398, in syn. = *Linociera verrucosa*, Solereder.

Volkensii, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 384. — Afr. trop. or.

VANHOUTTEA, Lem. = **Houttea**, Decne. (Gesner.).

Leptopus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 478 = *H. Gardneri*, Decne.

salviaefolia, Kuntze, l. c. = *H. salviifolia*, Hanst.

VANILLA, Plum. ex Mill. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1170.

appendiculata, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 178. — Guian. angl.

ensifolia, Rolfe, l. c. (1892) 141; S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 479, t. 33, fig. 6. — Bras.

Gardneri, Rolfe, l. c. (1895) 177. — Bras.

tolypephora, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 376. — Penins. Mal.

VANTANEA, Aubl. (Humir.). — Ind. Kew. ii. 1170.

contracta, Urb. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 3. — Bras.

VARANGEVILLEA, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 116; Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 178. **VERBENACEAE**.

hispidissima, Baill. l. cc. (= *Colea hispidissima*, Seem.). — Madag.

VARTHEMIA, Caruel, Epit. Fl. Eur. ii. (1894) 227 = *Vartheimia*, DC.

VASEYANTHUS, Cogn. in Zoë, i. (1890) 368, t. 11; Muell. & Pax in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1894) 393, in add. CUCURBITACEAE. Rosei, Cogn. II. cc. 394. — Calif.

VATERIA, Linn. (Dipteroc.). — Ind. Kew. ii. 1172. *siamensis*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. 2 (1887) 184 = *Shorea siamensis*, Miq.

VATERIOPSIS, Heim, Recherch. Diptéroc. (1892) 94; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 149 = *Vateria*, Linn. (Dipteroc.). *seychellarum*, Heim, l. c. = *V. seychellarum*, Dyer.

VATICA, Linn. (Dipteroc.). — Ind. Kew. ii. 1172. *bantamensis*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 231 t. 28 = *grandiflora*, Dyer. *Beccariana*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 955. — Borneo. *Beccarii*, Dyer, ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 133, in syn. = *V. Urbani*, Heim. *borneensis*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 230. — Borneo. *Burckii*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 956 = *Cotylelobium Burckii*, Heim. *Bureavi*, Heim, l. c. 955. — Borneo. *Caddupa*, Buchanan, ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 119, in syn. = *chinensis*, Linn. *celebensis*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 126. — Ins. Celebes. *cinerea*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 104. — Malaya. *Curtisii*, King, l. c. 105. — Penang. *Dyeri*, King, l. c. 106. — As. trop. or. *Dyeri*, Pierre, in Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 299 = *Synaptea Dyeri*, Pierre. *Forbesiana*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 228. — Sumatra? *furfuracea*, Burck, l. c. — Borneo. *Griffithii*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 121. — Burma. *Harmandiana*, Pierre, in Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 239; et Fl. For. Cochinch. Fasc. 15 (1890) t. 239; et 16 (1891) t. 254b. — Cochinch. *Harmandii*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 955 = *Cotylelobium Harmandii*, Heim. *Kunstleri*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxiii. (1895) 127. — Perak. *lamponga*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 227 t. 29, fig. 3. — Sumatra. *Lowii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 103. — Perak. *moluccana*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 226 t. 26. — Ins. Molucc. *nitens*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 104. — Penang. *obtus*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 228 = *Pachynocarpus ruminatus*, Brandis var. *papua*, K. Schum. & Hollr. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 52 = *Schumanniana*, Gilg. *pedicellata*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 125. — Borneo. *perakensis*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 103. — Perak. *Philastreana*, Pierre, in Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 298; et Fl. For. Cochinch. Fasc. 15 (1890) t. 237; et 16 (1891) t. 254c. — Cochinch. *reticulata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 106. — Perak. *Ridleyana*, Brandis, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2401. — Penins. Mal. *ruminata*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 227 t. 29, fig. 24 = *Pachynocarpus ruminatus*, Brandis. *sarawakensis*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 970; et Recherch. Diptéroc. (1892) 109. — Borneo. *Schefferi*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 128 (= *Dryobalanops Schefferi*, Hance). — Sumatra.

VATICA: —

Schumanniana, Gilg, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 38. — N. Guin. *Teysmanniana*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 230. — Ins. Bangka. *Thorelii*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 15 (1890) t. 238, et 16 (1891) t. 254b. — Cambodia. *umbonata*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 232 = *Pachynocarpus umbonatus*, Hook. f. *Urbani*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 956 — Borneo. *verrucosa*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 232 t. 29, fig. 5 = *Pachynocarpus umbonatus*, Brandis.

VAUANTHES, Haw. = *Grammanthes*, DC. (Crassul.). *dichotoma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 232 = *G. gentianoides*, DC.

VAUQUELINIA, Correa (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 1172. *californica*, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 400; et N. Am. Sylva, ii. (1892) 59, t. 164 = *V. Torreyi*, S. Wats.

VAUSAGESIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 871. VIOLARIEAE. *africana*, Baill. l. c. — Afr. trop.

VAVAEA, Benth. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 1172. *megaphylla*, Wright, in Kew Bull. (1895) 102. — Ins. Fiji.

VEATCHIA, A. Gray (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 1172. *discolor*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. ii. II. (1889) 140 (= *Schinus discolor*, Benth.). — Calif.

VELAEA, DC. = *Arracacia*, Bancr. (Umbell.). *arguta*, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 120 = *A. arguta*, Benth. & Hook. f. *glauca*, Coult. & J. N. Rose, ex J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 327 t. 14. — Oregon. *Hartwegi*, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 121 = *Arracacia Hartwegi*, S. Wats. *Howallii*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 122. — Oregon. *Kelloggii*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 121. = *Arracacia Kelloggii*, S. Wats. *Parishii*, Coult. & J. N. Rose, l. c. — Calif. *vestita*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 122 = *Arracacia vestita*, S. Wats.

VELLEIA Sm. (Goodenov.). — Ind. Kew. ii. 1173. *Salmoniana*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Dec. 1892) 127; et in Bot. Centralbl. liii. (1893) 124. [Velleja]. — Austral.

VELLOZIA, Vand. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 1173. *acuminata*, Baker, in Kew Bull. (1895) 228. — Reg. Somal. *aequatorialis*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 409. — Afr. trop. or. *arabica*, Baker, in Kew Bull. (1894) 342; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2364. — Arabia. *humilis*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 4. — Afr. trop. austro-or., Afr. austr. *Schnitzleinia*, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 82 = *Xerophyta Schnitzleinia*, Baker. *splendens*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 49. — Afr. trop. *villosa*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 3. — Transvaal.

VELLOZIELLA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, l. (1886) 715. SCROPHULARINEAE. *dracocephaloides*, Baill. l. c. (= *Digitalis dracocephaloides*, Vell.). — Bras.

VELVETIA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 354 = *Loranthus*, Linn. *cincta*, Van Tiegh. l. c. = *L. cinctus*, Mart.

VENIDIUM, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1173. *calendulaceum*, Hort. ex Kew Bull. (1888) 122 = *fugax*, Harv. *speciosum*, Hort. l. c. = *hirsutum*, Harv.

VENTILAGO, Gaertn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 1174. *cristata*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) t. 314a. — Cochinch. *elegans*, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 151. — Formosa. *fasigera*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) t. 314d. — Cochinch. *gladiata*, Pierre, l. c. t. 314c. — Cochinch. *Harmandiana*, Pierre, l. c. t. 313a. — Cochinch. *luzoniensis*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 90. — Ins. Philipp. *microcarpa*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 72. — N. Guin. *ochrocarpa*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) t. 314b. — Cochinch.

VEPRECELLA, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 1174. *acuminata*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 486. — Madag. *apiculata*, Cogn. l. c. 483. — Madag. *biformis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 477; Cogn. l. c. 488. — Madag. *bulbosa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 483. — Madag. *foliosa*, Cogn. l. c. 484. — Madag. *lanceolata*, Cogn. l. c. 488. — Madag. *microphylla*, Cogn. l. c. 485. — Madag. *oblongifolia*, Cogn. l. c. 487. — Madag. *ovalifolia*, Cogn. l. c. 484. — Madag. *pilosula*, Cogn. l. c. 482. — Madag. *riparia*, Cogn. l. c. 488. — Ins. Nossibe. *rosea*, Cogn. l. c. 484. — Madag. *tetraptera*, Cogn. l. c. 487. — Madag.

VERATRUM, [Tourn.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1174. *bosniacum*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 50 = *album*, Linn. *bracteatum*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 106. — China.

VERBASCUM, Tourn. ex Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1171. *acaule*, alpinum, aureum, Boissieri, brachysepalum, Cili-cia, coronopifolium, creticum, cylleneum, Daenzeri, floccosum, glandulosum, heterophyllum, interruptum, intricatum, lanceolatum, Lucillae, Lycia, orientale, pedunculatum, persicum, pinetorum, ponticum, pyrroliforme, ramosissimum, Suvarowianum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 468-69 = *homonyma omnia* Celsiae. *adpersum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 296. — As. Min. *aintabicum*, Post, Pl. Postianae, ii. (1889) 17. — Syria. *Aliciae*, Post, l. c. iii. (1892) 14. — Syria. *ambigen* Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia. *ambracicum* X, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 317. — Graecia. *Andrusi*, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 161. — Syria. *Antari*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 17. — Syria. *aphyllopodium*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 264. — As. Min. *atlanticum*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 626. — Algeria. *aurantiacum*, Coincy, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 332. — Hisp. *badense* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1032. — Austria. *balcanicum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 413. — Bulg. *Barbeyi*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 436. — As. occ.

VERBASCUM: —

- Barthii*, Schur, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 229 = *nigrum*, Linn.
Beckeanum X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1036. — Austria.
betonicifolium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 = *Celsia betonicaefolia*, Desf.
Bornmuelleri, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889. ii. (1890) 38; et Fl. Bulg. (1891) 415. — Bulg.
bracteatum, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 294. — As. Min.
breyinnum X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1033. — Austria.
bulgaricum, Velen. Fl. Bulg. (1891) 408. — Bulg.
carinthiacum X, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1889) Sitzb. 71; in Bot. Centralbl. xli. (1890) 82; Pacher, Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 119. — Carinth.
caudatum, Freyn & Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 346. — As. Min.
caudatum, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 160. — Syria.
cocnobotanum X, Hausskn. & Heldr. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.
coromandelicum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 468 = *Celsia coromandelina*, Vahl.
crenatum X, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 230. — Croatia.
cylindraceum, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 295. — As. Min.
Debauxii, Franch. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 627, in syn. = *kabylianum*, Debaux.
Decaisneanum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 468 = *Celsia parviflora*, Decne.
decorum, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889. ii. (1890) 50; et Fl. Bulg. (1891) 417. — Bulg.
derichorum X, Hausskn. & Heldr. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — As. occ.
divaricatum, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 265. — As. Min.
Divrikianum, Bornm. in Mitt. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 66. — Oriens.
eriocarpum, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 297 = *xanthophoeniceum*, Griseb.
eryaticum X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.
fallax, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 264. — As. Min.
flaccidum, Freyn & Bornm. l. c. xli. (1891) 57. — As. Min.
fluminense X, A. Kern. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 230. — Croatia, Istria.
Formanekii, Borb. ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxi. 1892 (1893) 122. — Bulg.
Friedrichsthalianum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 468 = *Celsia speciosa*, Fenzl.
fruticulosum, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 405. — Syria.
gadarense, Post, l. c. 403. — Syria.
gileadense, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 426. — As. occ.
glochotrichum, Hausskn. & Heldr. ex Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 87. — Graecia.
grandicalyx X, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 138. — Hung.
Grisebachianum, Borb. [ubi?] ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 229 = *nigrum*, Linn.
Halácsyanum, Sint. & Bornm. ex Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 374. — Thracia.
Haussknechtii, Heldr. ex Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 71. — Graecia.
heterophyllum, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. (1888) 21; in Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 229; et Fl. Bulg. (1891) 417. — Bulg.
ibericum, Schmalh. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) 290; & Akinfiew, Fl. Cauc. centr. (1894) 23. — Reg. Transcauc.
inaequale, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 265. — As. Min.
incanum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 = *Celsia lanceolata*, Vent.
infidum X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1037. — Austria.
insignitum X, G. Beck, l. c. 1037. — Austria.

VERBASCUM: —

- Jankae*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. VII. Folge, i. (1886) 33; et Fl. Bulg. (1891) 408. in syn. = *pannonicum*, Vis. & Panic.
Jankaeanum, Panic. Nov. elem. fl. Princ. Bulg. (1886) 32. — Bulg.
Juratzkae X, Reehinger, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 338; Pacher, Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 120. — Austria.
kabylianum, Debeaux, in Rev. de Bot. viii. (1890) 265; et ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 627. — Algeria.
Karyeteini, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 16. — Syria.
Kernerii X, Fritsch, in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 251; in Bot. Centralbl. xxxiv. (1888) 397; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1037. — Austria.
lacinatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 = *Celsia Bernadesii*, G. Don.
Letourneuxii, Aschers. [in Letourn. Pl. Aegypt. n. 325] ex Barbey, Herb. Levant. (1887) 182, nomen, et ex Aschers. & Schwein. [Ill. Fl. Egypte] in Mém. Inst. Egypt. (1887) 189. — Aegypt.
leucorion X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1034. — Austria.
leucothrix X, G. Beck, l. c. 1035. — Austria.
liburnicum X, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 230. — Eur.
Luntii, Baker, in Kew Bull. (1894) 337. — Arabia.
macrantherum, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 373. — Thracia.
macranthum, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 404. — Syria.
macrocarpum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 = *Celsia intricata*, Benth.
mardinense, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 161. — Syria.
meteoricum, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 229. — Thessal.
nitidulum, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 347. — Armen. turc.
palmyrense, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 26. — Syria.
Pancicii X, Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 267. — Bulg.
paradoxum X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.
phalerum X, Hausskn. l. c. — Graecia.
Portae, Willk. Illustr. Fl. Hisp. (1886-93) 84, t. 124. — Hisp.
Porteri, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 18. — Syria.
praesigne X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1037. — Austria.
Pseudo-sinuatum X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.
pulchrum, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. (1887) 454; et Fl. Bulg. (1891) 409. — Bulg., Rumel.
qulebicum, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 437. — As. occ.
rotundifolium, Post, Pl. Postianae, ii. (1889) 16. — Syria.
salisburgense X, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) Sitzb. 23; et in Bot. Centralbl. xxxiv. (1888) 391. — Austria.
saltense, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 27. — Syria.
Sceptrum, Schmalh. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) 291; et Fl. Cauc. centr. (1894) 23. — Reg. Transcauc.
Schmidtii X, A. Kern. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 230. — Transsilv.
semirigidum X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.
somaliense, Baker, in Kew Bull. (1895) 222. — Reg. Somal.
stachydiifolium, Freyn & Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 346. — As. Min.
styriacum, Fritsch, l. c. xxxviii. (1888) 262. — Styria.
subphlomidoides X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 71. — Graecia.
thessalum X, Hausskn. l. c. 72. — Graecia.
thracicum, Velen. Fl. Bulg. (1891) 410. — Bulg.
tomentosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 (= *Celsia tomentosa*, Zucc.) = *graecum*, Heldr. & Sart.

VERBASCUM: —

- tossiense*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 263. — As. Min.
Tourneuxii, « Aschers. » ex Aschers. & Schweinf. Ill. Fl. Egypt. [Mém. Inst. Egypt.] (1887) 114, sphalm. = *V. Letourneuxii*, Aschers.
Uechtritzi X, Fritze, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 170, nomen. — Hisp.
Warionis, Franch. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 627. — Algeria.
yemensse, Defflers, Voy. au Yémen (1889), 177. — Arabia.
VERBENA, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 1178.
adulterina X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 245. — Thessal.
aristigera, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 439. — Bras.
bella, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 58. — Chile.
canadensis, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 276 = *Buchnera canadensis*, Linn.
digitata, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 59. — Chili.
grisea, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 142. — Ins. Galapag.
Hystrix, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 610. — Chili.
illapelina, Phil. l. c. 612. — Chili.
longovina, Phil. l. c. 608. — Chili.
mendocina, Phil. l. c. 609. — Chili.
micrantha, Phil. l. c. 615. — Chili.
minutifolia, Phil. l. c. 614. — Chili.
Morongii, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 192. — Parag.
neo-mexicana X, Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 148. — N. Mexic.
Paulseni, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1890) 607. — Chili.
quadrangulata, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Expl. S. Texas] i. (1895) 84, t. 6. — Texas.
ramulosa, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 610. — Chili.
riparia, Rafin. ex Small & Heller, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. (1892) 12 = *urticifolia*, Linn.
rumelica, Velen. Fl. Bulg. (1891) 441 = *officinalis*, Linn.
subuligera, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 156. — Mexic.
thymoides, Phil. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1891) 497. — Patag., Chili.
trachea, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 609. — Chili.
tridactylia, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 59. — Chili.
triterinata, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 615. — Chili.
ulicina, Phil. l. c. 611. — Chili.
VERBESINA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1180.
alternifolia, Britton, ex Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 485 = *Actinomeris alternifolia*, DC.
aurita, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 48. — Chili.
boliviana, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 361. — Bolivia.
Bridgesii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 212. — Bolivia.
chihuahuensis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 389. — Mexic.
cymosa, A. Gray, l. c. 390. — Mexic.
Donell-Smithii, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 50. — Guatem.
erosa, T. S. Brandegee, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 146. — Calif.
hypoglaucæ, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 144. — Mexic.
leptochaeta, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 889. — Mexic.
Liebmanni, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 144. — Mexic.
myriocephala, Sch. Bip. ex Klatt, l. c. 144. — Mexic.

VERBESINA : —

- oncophora, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 109. — Mexic.
 Palmeri, S. Wats. l. c. xxiv. (1889) 86. — Calif. austr.
 perymenioides, Sch. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii (1887) 143. — Mexic.
 platyptera, Sch. Bip. ex Klatt, l. c. 144. — Mexic.
 potosina, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 175. — Mexic.
 Pringlei, Robinson, l. c. — Mexic.
 resinosa, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 144. — Mexic.
 Sartorii, Sch. Bip. ex Klatt, l. c. 143, in syn. = leprosa, Klatt.
 scandens, Klatt, l. c. Heft xxv. (1889) 106. — Ins. Porto Rico.
 scaposa, M. E. Jones, in *Zoö.* ii. (1891) 248. — Utah.
 sphaerocephala, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 428. — Mexic.
 tuberosa, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 351. — Mexic.

VERMINIARIA *denudata*, α Sm. » ex Wien. Illustr. Gartenzeit. (1888) 272, sphalm. = *Viminaria denudata*, Sm.

VERNONIA, Schreb. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1181.

- Abbotiana, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 221. — Afr. aequat.-or.
 acrocephala, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 100. — Angola.
 alboriviridis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 325. — Madag.
 alsodea, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 295. — Madag.
 alsodes, Klatt, l. c. (= *Bechium foliosum*, Klatt). — Madag.
 amplexicaulis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 216. — Reg. Somal.
 Antinoriana, Aetia, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xxi. (1889) 348; in *Annuaire. Ist. Bot. Roma*, vi. (1895) 55, t. 3, fig. 1-3. — Afr. trop. or.
 Antanossi, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 27. — Madag.
 Aplinii, Collett & Hemsl. l. c. xxviii. (1890) 69. — Ind. or.
 arborea, Welw. ex O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 172, in obs. = conifera, Benth.
 aristosquamosa, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 332. — Bolivia.
 Bailloni, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 26. — Madag.
 Bakerana, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 331. — Bolivia.
 betonicaefolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 487. — Madag.
 boliviana, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 332. — Bolivia.
 brachycalyx, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 405. — Afr. trop. or.
 Calvoana, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 415 (= *Stengelia Calvoana*, Hook. f.). — Kamerun.
 cephalophora, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1892) t. 2239. — Madag.
 cistifolia, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 404. — Afr. trop. or.
 coriifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 325. — Madag.
 cryptocephala, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 216. — Reg. Somal.
 cuanzensis, Welw. ex O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 174, in obs. = *Porphyrostemma cuanzensis*, O. Hoffm.
 cylindriceps, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 35. — Ind. or.
 Drummondii, Shuttlew. ex Werner, in *Journ. Cincin. Soc. Nat. Hist.* xvi. (1894) 171, ex Heller, Bot. Expl. S. Texas (1895) 99 = V. altissima, Nutt.
 var. grandiflora, A. Gray.
 drymaria, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 100. — Angola.
 dumeta, Klatt, in *Bot. Beibl.* 2, Leopoldina (1895) 1. — Costa-Rica.
 elaeochroma, Klatt, in *Arb. Bot. Mus. Hamb.* (1890) 1; et in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* ix. (1892) 123. — Bras.
 Eminii, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 404. — Afr. trop. or.
 erythromarula, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 295 (= *Bechium rubricaulis*, DC.). — Afr. trop.
 esculenta, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 401. — China.
 exserta, Baker, l. c. xxii. (1887) 488. — Madag.
 Faradifani, S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 27. — Madag.
 Fischeri, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 221. — Afr. trop. or.
 gigantea, Trelease, Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* for 1888, i. (1891) 189; Britton, ex Kearn, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 485 = altissima, Nutt.
 glomerata, Baker, ex Warm. in *Vidensk. Medd. Forh. Kjob.* [Symb. Fl. Bras. centr. xxxvi. 970]. — Bras.
 glauca, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 311 = glauca, Willd.
 Goetzenii, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 135, nomen. — Afr. trop.
 gomphophylla, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 216. — Reg. Somal.
 granitifolia, Trelease, Branner & Coville, ex Branner, in *Rep. Geol. Surv. Arkans.* for 1888 (1891) 189 = angustifolia, Michx.
 grisea, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 488. — Madag.
 griseola, Baker, ex Warm. in *Vidensk. Medd. Forh. Kjob.* [Symb. Fl. Bras. centr. xxxvi. 970] (1890) 185. — Bras.
 guadalupensis, Heller, in *Contr. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Explor. S. Texas]* (1895) 100, nomen. = fasciculata, Michx.
 gymnoclada, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 70. — Ind. or.
 herbacea, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 209 = obovata, Vell.
 Heydeana, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 42. — Guatem.
 Hildebrandtii, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 324. — Madag.
 Holstii, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 220. — Afr. trop. or.
 huairacajana, Hieron. l. c. xix. (1894) 43. — Ecuad.
 insularum, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Maris Pacif. (1890) 202 (= *Strobocalyx insularum*, Sch. Bip.). — Ins. Pacif.
 iodocalyx, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 403. — Afr. trop. or.
 Johannis, Volk. et O. Hoffm. l. c. 405. — Afr. trop. or.
 kentecephala, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 324. — Madag.
 lastopus, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 403. — Afr. trop. or.
 Lastii [O. Hoffm. ?] ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 55, nomen [an V. Lentii Volk. & O. Hoffm. ?]. — Afr. trop.
 Lehmanni, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 44. — Columb.
 Lentii, Volk. et O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 404. — Afr. trop. or.
 leptanthus, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 99. — Angola.
 leptolepis, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 405. — Afr. trop. or.
 Leubnitzae, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 264 = *Piptocarpha Leubnitzae*, Kuntze.
 leucoclepis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 322. — Madag.
 Luederitziana, O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 171; et ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 71. — Afr. austro-occ. extratrop.
 luxensis, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 41. — Guatem.
 malacophyta, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 323. — Madag.
 marginata, Trelease, Branner & Coville, ex Branner, in *Rep. Geol. Surv. Arkans.* iv. 1888 (1891) 189; Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 311 = V. Jamesii, Torr. & Gray.
 mecistophylla, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 322. — Madag.

VERNONIA : —

- nummulariaefolia, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 427. — Madag.
 obionifolia, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 272. — Afr. austro-occ. extratrop.
 obovata, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 235 (= *Decaneurum obovatum*, DC.). — Ins. Rawak.
 ondongensis, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 430. — Afr. austro-occ. extratrop.
 ocephala, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 68. — Afr. trop. or.
 oxyura, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 403. — Afr. trop. or.
 Palmeri, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 101. — Mexic.
 paucifolia, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 50, et iv. (1895) 209, in obs. = obovata, Linn.
 Pechuelii, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.
 Poggeana, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 221. — Congo.
 pogosperma, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 99. — Angola.
 polyantha, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 447. — N. Guin.
 potamophila, Baker, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 100. — Angola.
 pratensis, Klatt, l. c. vii. (1892) 295 (= *Cyanopsis madagascariensis*, DC.). — Madag.
 purpureo-glandulosa, Klatt, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 21; et l. c. = rhodolepis, Baker.
 rampans, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 323. — Madag.
 rhodopappa, Baker, l. c. xxii. (1887) 487. — Madag.
 rivularis, Klatt, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 21. — Madag.
 rubicunda, Klatt, l. c. 22; et in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 295 = V. Hildebrandtii, Baker.
 Schinzii, O. Hoffm. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 72. — Afr. austro-occ. extratrop.
 senecionaeifolia, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 331. — Bolivia.
 Shannoni, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 44. — Guatem.
 speiracephala, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 323. — Madag.
 spiciformis, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 296. — Madag.
 stenoclinoides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 486. — Madag.
 stenolepis, Oliver, in H. Johnston, *The Kilim. Exped. App.* (1886) 341, nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 237. — Afr. trop. or.
 Stuebelii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 327. — Peruvia.
 subaphylla, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 290. — Afr. centr. or.
 sublutea, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 26. — Madag.
 subuligera, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 403. — Afr. trop. or.
 superba, O. Hoffm. l. c. 406. — Afr. trop. or.
 syringifolia, O. Hoffm. l. c. 405. — Afr. trop. or.
 teitensis, O. Hoffm. l. c. 404. — Afr. trop. or.
 teucroides, Welw. ex O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 171. — Angola.
 Teuscii, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 424. — Angola.
 thyrsoides, Baker, ex Warm. in *Vidensk. Medd. Forh. Kjob.* [Symb. Fl. Bras. centr. xxxvi. 970] (1890) 185. — Bras.
 trichodesma, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 325. — Madag.
 usambarensis, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 220. — Afr. trop. or.
 verrucosa, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 99. — Angola.
 Wakeheldii, Oliver, in H. Johnston, *The Kilim. Exped. App.* (1886) 341, nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 336. — Afr. trop. or.
 Welwitschii, O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 170. — Angola.

VERNONIA : —

Whyteana, Britten, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 17. — Afr. trop.
yungasensis, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 332. — Bolivia.

VERONICA, [Tourn.] Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1187.

amphibola X, Hausskn. in *Mith. Thür. Bot. Ver.* N. Folge. vi. (1894) 27. — Graecia.
areolata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 392. — N. Zel.
bácsensis, Simonk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 107 = *V. Beccabunga*, Linn.
balcanica, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 431 (= *V. apennina*, Velen. et repens, Velen.). — Bulg.
Bornmuelleri, Hausskn. in *Mith. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 20. — As. occ.
Bonarota, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 22 = *Paederota Bonarota*, Linn.
byzantina, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 40 = *V. Tournefortii*, C. C. Gmel.
campestris, Schmalh. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* x. (1892) 291, t. 16, fig. 12, 14, 16 = *verna*, Linn.
capraefolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 487. — Madag.
chamaedryoides, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 358. — Afr. trop. or.
commutata, Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 82; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 182. — *Hisp.*
compacta, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 202. — N. Zel.
Cookiana, Colenso, l. c. 201 = *macroura*, Hook. f.
Curchillii X, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 24 = *Paederota Churchillii* X, Huter.
dagestanica, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 124. — Dagest.
Darwiniana, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 332. — N. Zel.
denudata, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 190. — Reg. Cauc.
Derwentia, Littley, ex C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 340. — Austral.
Espadanae, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan. i.* (1887) 13, *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 183. — *Hisp.*
Fairfieldii, [Hort. Martin.] Hook. f. in *Bot. Mag.* (1893) t. 7323. — N. Zel.
farinosa, Hausskn. in *Mith. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 20. — Persia.
filiculis, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 761. in syn. = *prostrata*, Linn.
filifolia, Lipsky, in *Mém. Soc. hist. nat. Kiev*, xi. (1891) 54; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 322. — Ross.
Fuhsii, Freyn & Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 325. — As. min.
Godefroyana, Carr. in *Rev. Hort.* lx. (1888) 455, lxii. (1890) 242. — N. Zel.
Gunae, Schweinf. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 380, nomen. — Abyss.
hirsuta, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 393. — N. Zel.
integerrima, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 137 = *serpyllifolia*, Linn.
javalambrensis, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan. i.* (1887) 22 = *V. Teucrium*, Linn.
Kovacsii, Borb. *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castri.* (1887) 227 = *V. Anagallis*, Linn.
Lendenfeldii, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict.* N. S. i. ii. (1889) 29. — N. Guin.
lepida, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 110. — Chili.
longiracemosa, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 203. — N. Zel.
longistyla, Lange, in *Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1893) 199. — *Hisp.*
lutea, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1890) 85; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 22 = *Paederota lutea*, Scop.
macrocalyx, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 391. — N. Zel.
magellanica, « Juss. » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 448 ad calc. sphalm. = *elliptica*, Forst. f.

VERONICA : —

major X, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1890) 85 = *V. Curchillii* X, Wettst.
mexicana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 282. — Mexic.
myrsinoides, Oliver, in *H. Johnston, Kilim. Exped.* App. (1886) 343, nomen; in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1509; et in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1887) 343. — Afr. trop. or.
oligantha, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 333. — N. Zel.
Pacheri X, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 23. — Carniol.
Parkinsoniana, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 97. — N. Zel.
poljensis, Murb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 364 = *anagalloides*, Guss.
pontica, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1893 (1894) xxxvii. 52. — Bulg.
pontica, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1890) 85 = *Paederota lutea*, Rupr.
prenja, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 137, t. 4, fig. 7 = *austriaca*, Linn.
Pseudo-arvensis, Tineo, ex Tornab. *Fl. Sicula* (1887) 426. — Sicil.
pubicarpa, Simonk. *Enum. Fl. Transsylv.* (1886) 422 = *prostrata*, Linn.
racemifoliata, Perez Lara, *Pl. nov. aliq. descr.* (1882) 3; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 181. — *Hisp.*
rugulosella, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 391. — N. Zel.
schizocalyx, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 324. — As. Min.
senanensis, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 515. — Japon.
szechuanica, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 383. — China.
thracica, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1893 (1894) xxxvii. 50. — Bulgaris.
vandellioides, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 514. — China.
Velenovskyi, Uechtr. ex Bornm. in *Bot. Centralbl.* xxxvi. (1888) 125; et in *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 427. — Bulg.
venustula, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 393. — N. Zel.
vulcanica, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 263. — N. Zel.

VERTICILLARIA, Ruiz & Pav. = **Rheedia**. Linn. (Guttif.).

Madruno, Tulasne, ex Vesque, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 508 = *R. acuminata*, Planch. & Triana.
rostrata, Miers, ex Engl. in *Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 464 = *R. floribunda*, Planch. & Triana.

VERTICORDIA, DC. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 1192.

Rennieana, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. South Austral.* xvi. (1895) 354. — Austral.

VESICARIA, Tourn. ex Adans. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1193.

tympaea, Hausskn. in *Mitt. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 70. — Graecia.

VESQUELLA, Heim, Recherch. Diptéroc. (1892) 90 = **Stemonoporus**, Thw. (Diptéroc.).
acuminata, Heim, Recherch. Diptéroc. (1892) 90; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 153 = *Vateria acuminata*, Thw.
oblongifolia, Heim, ll. cc. = *Stemonoporus oblongifolia*, Thw.

VIBO, Medic. = **Emex**, Nutt. (Polygon.).
australis, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 44 = *E. australis*, Steinh.
Centropodium, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 562 = *E. australis*, Steinh.

VIBURNUM, Linn. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 1194.

anglicum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 191, 199 = *nudum*, Linn.
aragonense, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan. i.* (1887) 16 = *V. Lantana*, Linn.
Awafuki, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 199 = *odoratissimum*, Ker.
Awafusci, « Lindl. » ex Dippel, l. c. = *odoratissimum*, Ker.
betulifolium, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 371. — China.
brachybotryum, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 349. — China.
canadense, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 182 = *molle*, Michx.
Carlesii, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 350. — Corea.
dahuricum, « Pall. » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 198 = *davuricum*, Pall.
Davidi, Franch. in *Nouv. Archiv. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 251. — Tibet.
ferrugineum, Small, ex Small & Vail, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 123; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 306 = *prunifolium*, Linn. var.
Fortunei, Hort. Gall. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 177 = *macrocephalum*, Fortune.
Henryi, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 353. — China.
Jelskii, Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 1. — Peruvia.
kansuense, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 372. — China.
mexicanum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 184 = *molle*, Michx.
nanum, Hort. ex Dippel, l. c. 173, 449, ad calc. = *V. Opulus*, Linn.
nepalense, Hort. ex Dippel, l. c. 176 = *Hanceanum*, Maxim.
oliganthum, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 372. — China.
propinquum, Hemsl. in *Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 355. — China.
rhytidophyllum, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. l. c. — China.
suspensum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 200 = *V. Sandankwa*, Hassk.
utile, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 356. — China.
Vetteri X, Zabel, in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 462. — Hybr. spont. ?

VICIA, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1195.

andicola, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 270. — Chili.
apiculata, Phil. l. c. 274. — Chili.
baborensis, Batt. & Trab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1881) 304, et xxxix. (1892) 71. — Algeria.
californica, Greene, *Fl. Francise.* (1891) 3. — Calif.
chinensis, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 177. — Yunnan.
ciliata, Lipsky, in *Mém. Soc. hist. nat. Kiev*, xi. (1891) extr. 24; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 293; *Alboff, Prodr. Fl. Colch.* (1895) 65. — Reg. Cauc.
commutata, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 276 (= *V. Macraei*, Clos). — Chili.
Coxi, Phil. l. c. 275. — Chili.
cruentia, Coss. ex Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 368 = *fulgens*, Batt.
dadianorum, Sommi. & Lévier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 43. — Reg. Cauc.
dalmatica, A. Kern, *Sched. Fl. Austro-Hung.* iv. (1886) 2 = *tenuifolia*, Roth var.
Darapskyana, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 276. — Chili.
dianthes, Phil. l. c. 265. — Chili.
diversifolia, Phil. l. c. 267. — Ins. Chiloe.
ecirrata, Phil. l. c. 269. — Chili.
elegantissima, Shutt. ex Rouy, *Exc. bot. Espagne en 1881-1882* (1883) 65; et in *Le Naturaliste*, Sér. II. x. (1888) 85. — Gall. mer. : *Hisp.*
Fauriae, Franch. in *Bull. Soc. Phil. Paris*, Sér. VII. x. (1886) 139. — Japon.
glabrescens, Fritsch, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 592 = *varia*, Linn.

VICIA : —

- glabrescens*, A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 1 = *villosa*, Roth.
Hassei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 129. — Calif.
heterophylla, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 268. — Chili.
heteropus, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 438 = *V. Cracca*, Linn.
leptantha, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 267. — Araucania.
linearis, Greene, Fl. Francisc. (1891) 3 = *americana*, Muhl. var.
lusitanica, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 542. — Lusit.
mauritanica, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) p. ccxx. = *erviformis*, Boiss.
mediocincta, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 425. — Mexic.
Moorei, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 270. — Chili.
ramosissima, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 305. — China occ.
Saffordii, Phil. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1892) 82, nomen; et in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1895) 266. — Am. austr.
scandens, R. P. Murray, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 9. — Teneriffa.
Schneideri, Bruegg. in Jahrb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 45 = *V. Cracca*, Linn.
semicincta, Greene, in Erythra, iii. (1895) 17. — Oregon.
Solisi, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 267. — Chili.
speciosa, Phil. l. c. 277. — Chili.
Tenorei, Ces., Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 685. — Italia.
tenuifolia, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 191. — As. Min.
Thurberi, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 129. — Am. bor. occ.
variabilis, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 82. — Armen.
Volkensii, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 219. — Afr. trop. or.

VICOA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1198.

- Albertoregelia*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 277. — Turkest.
javanica, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 241 (= ? *Pegolettia javanica*, Miq.). — Java.
Pentanema, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 75. — Persia.

VIDORICUM, Rumpf, Herb. Amboin. i. (1741) 174-75, t. 67, iii. 184-186, t. 118, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 407 = **Bassia**, Koen. (Sapot.).

- butyraceum*, caloneurum, Cocco, cuneatum, elongatum, Ersikanum, fulcum, insigne, Korthalsii, latifolium, Lobbi, longifolium, malabaricum, microphyllum, Moontii, Mottleyanum, nervifolium, pallidum, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Bassiae*.
fusum, Kuntze, l. c. (= *Illipe fusca*, Engl.). — Borneo.

VIEUSSEUXIA, D. Delar. = **Moraea**, Mill. (Irid.)

- Elliotii*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 154 = *M. Elliotii*, Baker.
tripetala, Klatt, l. c. 155 = *M. tripetala*, Ker.

VIGNA, Savi (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1199.

- abyssinica*, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 267. — Abyss.
brachycalyx, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 310. — Madag.
lebanensis, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 28. — Abyss.
incana, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 223. — Afr. trop. or.
longepedunculata, Taub. l. c. — Afr. trop. or.
monophylla, Taub. l. c. — Afr. trop. or.
polytricha, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 310. — Madag.
repens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 212 = *glabra*, Savi et retusa, Walp.
spartioides, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 269. — Abyss.

VIGNA : —

- stenocarpa*, [Taub.] in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 31, nomen. — Afr. trop.
stipulacea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 212 = *Dolichos stipulaceus*, Lam.
strobilophora, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 167, xxix. (1894) 386; et in Gard. and For. vii. (1894) 153. — Mexic.
variegata, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 132. — Arabia.
verticillata, [Taub.] in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 31, nomen. — Afr. trop.

VIGUIERIA, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1200.

- atacamensis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 48. — Chili.
calva, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 149 = *calva*, Benth. & Hook. f.
glutinosa, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 211. — Bolivia.
lanceolata, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 149. — Bolivia.
leptocaulis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 140. — Mexic.
longipes, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1810) 41 = *Zexmenia hispida*, A. Gray.
microphylla, Vasey & J. N. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi. (1888) 535. — Calif.
montana, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 103. — Mexic.
Palmeri, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 427. — Mexic.
quiqueradiata, A. Gray, l. c. — Mexic.
pazensis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 59. — Bolivia.
pedunculata, Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 119. — Mexic.
Pringlei, Robinson & Greenm. l. c. xxix. (1894) 388. — Mexic.
Purismae, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 173. — Calif.
strigosa, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxi. 1892 (1893) 204. — Costa Rica.
sylvatica, Klatt, l. c. — Costa Rica.
tenuis, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 426. — Mexic.

VILFA, Beauv. = **Sporobolus**, R. Br. (Gramin.).

- confusa*, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 101. — Mexic.
densiflora, Fourn. l. c. 98. — Mexic.
Grisbachii, Fourn. l. c. — Mexic.
hamiensis, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. App. ii. (1894) 29. — Arabia.
Liebmanni, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 100. — Mexic.
Muelleri, Fourn. l. c. 98. — Mexic.
pubescens, Fourn. l. c. 102. — Mexic.
Sacatella, Fourn. l. c. 101. — Mexic.

VILLAMILLA, Ruiz & Pav. (Phytolac.). — Ind. Kew. ii. 1202.

- racemosa*, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 251. — Boliv.

VILLANOVA, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1202.

- perpusilla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 47. — Chili.
robusta, Phil. l. c. — Chili.

VILLARESIA, Ruiz & Pav. (Olcac.). — Ind. Kew. ii. 1202.

- suaveolens*, Valetton, Crit. overz. Olac. (1886) 199 (= *Chariessa suaveolens*, Miq.). — Java.

VILLARSIA, Vent. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 1203.

- nymphoidea*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 581 = *Limnanthemum nymphoides*, Hoffmgg. & Link.

VILLEBRUNEA, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1203.

- fasciculata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 289. — N. Guin.

VILLEBRUNEA : —

- pedunculata*, Shirai, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 158 t. 4. — Japon.

VINCA, Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1203.

- Haussknechtii*, Bornm. & Sint. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 66. — Oriens.
mixta, Velen. Fl. Bulg. (1891) 646, in add. = *herbacea*, Linn.
obtusiflora, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 20 = *media*, Hoffmgg. & Link.

VINCENTELLA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 37 = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).

- densiflora*, Pierre, l. c. = *S. densiflorum*, Baker.
longistyla, Pierre, l. c. = *S. longistylum*, Baker.
revoluta, Pierre, l. c. = *S. revolutum*, Baker.

VINCENTIA, Gaudich. = **Cladium**, P. Br. (Cyper.).

- ensifolia*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 665 = *C. iridifolium*, Baker.

VINCETOXICUM, Moehr. Hort. priv. (1736) 100, fide Kuntze, Rev. Gen. (1891) 422.

- abyssinicum*, acutum, affine, alatum, aphyllum, auriculatum, boerhaviaefolium, callialata, capense, capillare, caudatum [Maxim.], congestum, Dalhousiae, crubescens, excelsum, fimbriatum, floribundum, Fordii, Heydei, insulanum, Jacquemontianum, lanceolatum, linearifolium, montevidense, myrtifolium, nummulariaefolium, pedunculatum, puberulum, Roylei, serpyllifolium, stenophyllum, verticillatum, virens, Wallichii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 422-25 = *homonyma omnia Cynanchi*.

- barbatum*, Belostemma, biglandulosum, cafferum, calcareatum, capparidifolium, chloranthum, cordifolium, crassifolium, cuspidatum, Dalzellii, nerve, erectum, exile, fasciculatum, flexuosum, globiferum, grandiflorum, Helferii, heterophyllum, himalaicum, hirsutum, hispidum, longifolium, lutescens, mollissimum, paniculatum, pauciflorum, Perrottetianum, rotundifolium, rupestre, sylvaticum, syringaeefolium, tcnervium, tenue, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Tylophorae*.

- Adalinae*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 134. — Congo gall.

- africanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 422 = *Cynanchum pilosum*, R. Br.

- angulatum*, Kuntze, l. c. 424. — Bras.

- arenosum*, Kuntze, l. c. — Bras.

- astephanoides*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 435. — Mexic.

- Baldwinianum*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 265 = *Gomphocarpus macrophyllum*, Ell.

- Benthianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Tylophora macrophylla*, Benth.

- biflorum*, Kuntze, l. c.; Heller, in Contr. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Expl. S. Texas] i. (1895) = *Gonolobus biflorus*, Nutt.

- Bojerianum*, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum Bojerianum*, Decne.). — Madag.

- capense*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 6, in syn. = *capense*, Kuntze.

- carolinense*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 265 = *Cynanchum carolinense*, Jacq.

- chiloense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 (= *Cynoctonum chiloense*, Decne.). — Chili.

- cissodes*, Kuntze, l. c. = *Tylophora cissoides*, Blume.

- Decaisnei*, Kuntze, l. c. (= *Orthosia Decaisnei*, Fourn.). — Bras.

- deltodeum*, Kuntze, l. c. = *Cynanchum deltoideum*, Hance.

- dimidiatum*, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum dimidiatum*, Hassk.). — Java.

- discolor*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 409. — N. Guin.

- Dombeyanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 (= *Cynoctonum Dombeyanum*, Decne.). — Ecuad.

- Dregeanum*, Kuntze, l. c. = *Cynanchum obtusifolium*, Linn. f.

- Eichleri*, Kuntze, l. c. (= *Orthosia Eichleri*, Fourn.). — Bras.

VINCETOXICUM : —

- eurychitoides*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 136. — Madag.
Eurychiton, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 (= *Cynoctonum eurychiton*, Decne.). — Madag.
ferrugineum, Kuntze, l. c. = *Amphistelma ferrugineum*, Fourn.
formosanum, Kuntze, l. c. (= *Cynanchi* sp.). — Ins. Formosa.
Fournieri, Kuntze, l. c. = *Amphistelma parviflorum*, Fourn.
hastatum, Kuntze, l. c. = *Cynanchum Bungei*, Decne.
hirsutum, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 266 = *Gonolobus hirsutus*, Michx.
hirtellum, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 279 [Oliver, ex im Thurn, in Timahri, v. (1886) 199]. — Guian. angl.
hirtulorum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Tylophora macrantha*, Hook. f.
Holstii, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 135. — Afr. trop.
hybanthera, Kuntze, l. c. = *T. cordifolia*, Hook. f.
irrawadense, Kuntze, l. c. = *T. purpurea*, Wall.
laeve, Kuntze, l. c. 423 = *Cynanchum ovalifolium*, Wight.
Leschenaultii, Kuntze, l. c. 424 = *Tylophora congesta*, Decne.
leucanthum, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 138. — Madag.
lycioides, Kuntze, l. c. 424 = *Tylophora lycioides*, Decne.
madagascariense, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 138. — Madag.
madagascariense, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Tylophora Bojeriana*, Decne.
Mannii, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 93. — Afr. trop. occ.
mauritanium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Tylophora laevigata*, Decne.
micranthum, Kuntze, l. c. = *T. zeylanica*, Decne.
Miquelianum, Kuntze, l. c. = *T. villosa*, Benth. & Hook. f.
mollissimum, Kuntze, l. c. = *T. mollissima*, Wall.
mucronatum, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum mucronatum*, Decne.). — Chili.
multiflorum, Kuntze, l. c. = *Tylophora lphisia*, Decne.
multiflorum, Kuntze, l. c. (= *Orthosia multiflora*, Fourn.). — Bras.
muricatum, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum muricatum*, Decne.). — Java.
nemorum, Kuntze, l. c. 425 (= *C. nemorosum*, Phil.). — Chili.
obliquum, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 266 = *Cynanchum obliquum*, Jacq.
obovatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Cynoctonum obovatum*, Decne.). — Madag.
pachylepis, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. viii. (1893) 79. — Austral.
pachyphyllum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Cynoctonum pachyphyllum*, Decne.). — Chili.
patagonicum, Kuntze, l. c. (= *C. patagonicum*, Phil.). — Patag.
pilosum, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 160. — Afr. austr.
polyanthum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Tylophora floribunda*, Miq.
polyanthum, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 136. — Afr. trop.
pubescens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 423 = *Cynanchum sinense*, R. Br.
purpureum, Kuntze, l. c. 424 = *C. roseum*, Decne.
Raddeanum, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 170. — Reg. Cauc.
repandum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Cynoctonum repandum*, Decne.). — Madag.
Riedelii, Kuntze, l. c. (= *Amphistelma Riedelii*, Fourn.). — Bras.
reticulatum, Heller, in Contr. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Expl. S. Texas] i. (1895) 79 = *Gonolobus reticulatus*, Engelm.
sarcostemmoides, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. bot. Genova (1893) 349, nomen. — Erithrea.
scandens, Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 158. — Reg. Cauc.
Selloanum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 = *Amphistelma Selloanum*, Fourn.

VINCETOXICUM : —

- Shortii*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 266 = *Gonolobus Shortii*, A. Gray
streptolobum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Amphistelma streptolobum*, Fourn.). — Bras.
Struthianthus, Kuntze, l. c. 423 = *Lorostelma Struthianthus*, Fourn.
suberosum, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 260 = *Gonolobus suberosus*, R. Br.
thesioides, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 124 — Sibiria.
tomentosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Amphistelma tomentosum*, Fourn.). — Bras.
tuberculatum, Kuntze, l. c. = *Cynoctonum tuberculatum*, Blume, fide Kuntze.
tunicatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 423 = *Cynanchum pauciflorum*, R. Br.
umbrosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Orthosia umbrosa*, Fourn.). — Bras.
undulatum, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum undulatum*, Decne.). — Chili.
urceolatum, Kuntze, l. c. (= *Orthosia urceolata*, Fourn.). — Bras.
ventricosum, Kuntze, l. c. 423 = *Tylophora Wallichii*, Hook. f.
virescens, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 137. — Madag.
virgatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Guilleminianum*, Decne.
viride, Kuntze, l. c. 425 (= *Cynoctonum viride*, Phil.). — Chili.
vomitum, Kuntze, l. c. 424 = *Tylophora asthmatica*, Wight & Arn.
Woollii, Kuntze, l. c. = *T. Woollii*, Benth.
Zollingeri, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum Zollingeri*, Miq.). — Malaya.

VIOLA Tourn. ex Linn. (Violar.). — Ind. Kew. ii. 1204.

- acanthophylla*, Leyb. ex Reiche, in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 442. — Chili.
aetnensis, Tornab. Fl. Sicula (1887) 138; et Fl. Aetnea, i. (1889) 132 = *parvula*, Tinco.
Aizoon, Reiche, in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 443. — Chili.
albiensis X, Sudre, in Lucante, Rev. de Bot. xii. (1894) 19. — Gall.
alichariensis, G. Beck, in Jahrb.-Katal. Wien. bot. Tauschver. (1894) 6. — Maced.
Amani, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 16, 411. — Syria.
anceps X, C. Richt. in Sitzb. zool.-bot. Wien, Ges. xli. (1891) 20. — Austria.
apennina, Terracc. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxi. (1889) 327; et in Ann. Ist. Bot. Roma, iv. 1889-90 (1891) 77 = *calcarata*, Linn.
arbuscula, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 491 = *V. Philippii*, Leyb.
arsenica, G. Beck, in Jahrb.-Katal. Wien. bot. Tauschver. (1894) 6. — Maced.
atrachocarpa, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 118, 167 = *collina*, Bess.
aurata, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 492. — Chili.
banatica, Simonk. Erdély edényes Fl. (1887) 112 = *dacica*, Borb.
Barceloi, Nym. Consp. Fl. Europ. Suppl. ii. I. (1889) 45. — Ins. Balear.
Bertoti, Souché, in Bull. Soc. bot. Rochel. (1892), ex Corbière. Nouv. Fl. Norm. (1893) 77 = *sylvestris*, Lam.
Bethkeana, Borb. in Oest. bot. Zeitschr. xli. (1891) 422 = *V. Leunisii*, Borb.
Bethkeana X, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 23. — Slesv.-Holst.
Bethkei X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 221. — Austria.
bilczensis, Blochi, in Spraw. Kom. fizy. Krakow. xxii. (1888) II. 213. — Eur. centr.
boliviana, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 18. — Bolivia.
Borchersi, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 494 = *frigida*, Phil. var.
bosniaca, Form. in Oest. Bot. Zeitschr. (1887) 368; G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, x. (1895) 179 = *declinata*, Waldst. & Kit.

VIOLA : —

- brachyantha*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 39. — As. Min.
Braunii X, Borb. in Hallier, Koch's, Syn. deutsch. Fl. ed. 3 (1891) 202. — Austro-Hung.
Bridgesii, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 18. — Bolivia.
Burnati X, Gremli, Fl. anal. Suisse (1886) 124; et Neue Beitr. Fl. Schweiz. v. (1890) 18. — Helv.
Caflishii, Woerlein, in Ber. Bot. Ver. Landshut, 1888-89 (1889) 171. — Bavaria.
californica, Greene, Fl. Francisc. (1891) 3. — Calif.
caninaeformis X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 221. — Austria.
carinthiaca X, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 237. — Carinth.
carpatica X, Borb. l. c. xli. (1891) 422. — Hung.
Celia, G. Beck, ex Borb. l. c. xlii. (1892) 287. nomen. = *leucecras*, Borb.
chillanensis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 347 = *vulcanica*, Gill.
cochleata, Coincey, in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 204; et Eclog. alt. Pl. Hisp. (1895) t. 2. — Hisp.
colliniformis X, Murr. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1893) 196. — Tirol.
concolor, E. L. Krause, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. (1887) 25; Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 22. — Slesv.-Holst.
cuicochensis, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 323. — Ecuad.
dacica, Borb. in Magyar. Növen. Lapok, xiii. (1890) 79; et ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 75, 183 = *declinata*, Waldst. & Kit.
dannubialis, Borb. l. c. = *elatior*, Fries.
Davidi, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 293. — Tibet.
decipiens, Reiche, in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 445. — Chili.
decora, Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxii. 1893 (1894) 179. — Maced.
Delabordii, Hort. ex Kew Bull. (1889) 56. — nomen.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 413; et Pl. Delav. (1889) 73. — China occ.
deltoidea, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 318. — Japon.
Desetangii X, G. Camus & Hariot, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 422. — Gall.
Dioszegiana X, Borb. in Magyar Növen. Lapok, xiii. (1890) 79; et in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 191. — Austro-Hung.
dravica, Murr. in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 3. — Eur. centr.
dubia X, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 191. — Austro-Hung.
Eichenfeldii X, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 181. — Dalm.
Favratii, Hausskn. ex Favrat; in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xiii-xv. (1887) 61 = *odorata*, Linn.
flavida, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 21. — China occ.
Fluehmanni, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 346. — Araucania.
funesta X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 220. — Austria.
gloggnitzensis X, C. Richt. l. c. xxxvii. (1887) 197. — Austria.
Godoyae, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 493. — Chili.
Gremlichii X, Murr. in Deutsche Bot. Monatsschr. iv. (1886) 151; Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 184. — Tirol.
Guilleanae X, Giraudias, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1895) 374. — Gall.
Hallieri X, Borb. in Magyar. Növen. Lapok, xiii. (1890) 78; et in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 183. — Hung.
heliocopia, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 17. — Ins. Sandvic.
heterocarpa X, Borb. ex C. Richt. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien. xli. (1891) 20. — Scand.

VIOLA: —

- holstetica* ×, E. L. Krause, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. (1887) 25; Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 22. — Slesv.-Holst.
- Hookeri*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1886) 5 = *tuberifera*, Franch.
- Howellii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 308. — Terr. Washing.
- hungarica* ×, Degen & Sabransky, in Deutsche Bot. Monatsschr. (1885) 8; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 512. — Hung.
- hybrida* ×, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 192 = *interjecta*, Borb.
- insignis* ×, C. Richter, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1886) 220. — Austria.
- interjecta*, Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 190; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 510. — Austria.
- intertexta*, G. Beck, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 642; et l. c. 521. — Austria.
- faborneggii* ×, Khék, ex Pacher, Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 166. — Carinth.
- kiliensis* ×, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 24. — Slesv.-Holst.
- lacmonica* ×, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 44. — Graecia.
- latiseptala*, Wettst. in Luers. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 27 = *declinata*, Waldst. & Kit.
- leucoceras*, Borb. ex J. Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 134 (= *V. neglecta* Schm.). — Tirol.
- Leunisi*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 422 = *V. Bethkeana*, Borb.). — Hung.
- Levieri*, Parl. ex Caruel, Fl. Italiana, ix. (1890) 181. — Ital.
- Macloskeyi*, F. E. Lloyd, in Erythea, iii. (1895) 74. — Oregon.
- maculata*, Giraudias, in Lucante. Rev. de Bot. (1886) = *sylvestris*, Lam.
- magna* ×, C. Richt. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 20. — Austria.
- medlingensis*, Wiesb. in Doubl. Verz. Schles. Tauschver. xxiii. (1885-86), ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 190 = *hungarica* ×, Degen & Sabransky.
- megapolitana* ×, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 24. — Slesv.-Holsat.
- Mercurii*, Orph. ex Halácsy in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 497. — Graecia.
- merkensteiniensis* ×, Wiesb. ex Murr, xl. (1890) 134; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 517. — Tirol.
- minutiflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 493. — Chili.
- mixta* ×, Sudre, in Lucante, Rev. de Bot. xii. (1894) 19. — Gall.
- mollis* ×, A. Kern, ex Wiesb. in Deutsche Bot. Monatsschr. (1885) 179; Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 181. — Austria.
- moupinensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 412; et Pl. Delav. (1889) 72. — Yunnan.
- nassauvioides*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxx. (1893) 346. — Chili.
- Neilreichiana* ×, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 117, 167, 278; et in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 185. — Austria.
- Neilreichii* ×, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 231. — Austria.
- Neumanniana* ×, Borb. l. c. xli. (1891) 20. — Austria.
- nenensis* ×, Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. (1892) 210. — Tirol.
- enipontana* ×, Murr. in Deutsch. bot. Monatsschr. iv. (1886) 151, xii. (1894) 93; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (18-2) 511; et in Oest. Bot. Zeitschr. xliiii. (1893) 176. — Austria.
- olysipponensis*, Rouy, in Magnier, Scrin. fl. select. vi. (1887) 114 = *tricolor*, Linn.
- orophila*, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 191, in obs. = *sylvestris*, Lam.
- ovalleana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 494. — Chili.
- Pacheri* ×, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 190, et xl. (1890) 134, 162; Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 185. — Tirol.
- paradoxa* ×, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 220. — Austria.

VIOLA: —

- parva*, E. Adans. Hartwell, Cot. Phaenoy. and. Crypt. Pl. Fitchburg (1885). ex Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 85. (Quid?) — Am. bor.
- perrobusta*, Borb. in Magyar Növen. Lapok, xiii. (1890) 81; et in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 245 = *tricolor*, Linn.
- Philippiana*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 14 (= *V. chrysantha*, Phil.). — Chili.
- pinetorum*, Greene, l. c. = *aurea*, Kell?
- Pirottiae*, Chiovenda, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 287 = *odorata*, Linn.
- plantaginea*, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 96. — Ins. Canar.
- Plenigeri*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxxiii. 1894 (1895) 158. — Albania.
- pluricaulis*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 422; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 514 (= *V. multicaulis* Jord.) = *odorata*, Linn.
- prenja*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 81, t. 4 fig. 1-4 = *odorata*, Linn.
- Pseudasterias*, K. Reiche, in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 435. — Chili.
- Pseudo-mirabilis*, Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) p. cxv. — Gall. mer.
- Pseudomontana*, Blocki, in Spraw. Kom. Fizy. Krakow. xxii. (1888) ii. 213 = *elator*, Fries?
- Pseudosilicatica* ×, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 221. — Austria.
- pubinervis*, Rehm. & Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xliiii. (1893) 196 = *palustris*, Linn.?
- pulvinata*, K. Reiche, in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 434. — Chili.
- radicans* ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 514. — Austria.
- reptans*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 165. — Mexic.
- Reverchoni*, Willk. ex Coincy. Eclog. pl. alt. Hisp. (1895) sub t. 2, in syn.; Debeaux, in Lucante, Rev. de Bot. xii. (1895) 345 = *cochleata*, Coincy.
- rhaetica* ×, Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1893) 186. — Austria.
- robusta*, Hillbr. Fl. Haw. Isl. (1888) 16. — Ins. Sandvic.
- Rossii* ×, Chiovenda, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 207. — Ital.
- Rossii*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 54. — China.
- roxolanica*, Blocki, in Deutsche Bot. Monatsschr. v. (1887) 147; et in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 15. — Eur. centr.-or.
- Ruprechtiana* ×, Borb. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 20. — Boruss.
- segobricensis*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. ii. (1889) 9. — Hisp.
- serbica*, Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxii. 1893 (1894) 179. — Serbia.
- Shofitziana*, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 190; et in Natur und Offenb. xxxvii. (1891) 500 = *elator*, Fries.
- slesvicensis* ×, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1898) 23. — Slesv.-Holsat.
- somalensis*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 308. — Reg. Somal.
- Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 324. — Columb.
- suaviflora* ×, Borb. & H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xi. (1890) 26; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 516. — Austria.
- subcrenata*, Phil. ex Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 258, nomen. — Chili.
- subhirta* ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 511. — Austria.
- subodorata* ×, Borb. ex Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 134; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1894) 92. — Tirol.
- subpubescens*, Borb. in Natur und Offenb. xxxvii. (1891) 500; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 347; G. Beck, Fl. Nied. Oest. ii. I. (1892) 519 = *elator*, Fries.
- Szilyana*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 253; et in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1895) 176; H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 29. — Stiria.

VIOLA: —

- Tatrae* ×, Borb. in Magyar Növen. Lapok, xiii. (1890) 81; H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 245. xlii. (1892) 287 = *tricolor*, Linn.?
- Tenorii*, Terrac. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxi. (1889) 326. — Ital.
- tenuis* ×, C. Richt. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 20. — Scand.
- thymifolia*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 18. — Bolivia.
- tirolensis* ×, Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3. (1892) 183; in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 117, xlv. (1895) 237; Pacher Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 169. — Tirol.
- tristicha* ×, Waisb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 144. — Hung.
- tuberifera*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 410; et Pl. Delav. (1889) 70. — Yunnan.
- Uechtritziana* ×, Borb. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 20; et in Oest. Bot. Zeitschr. (1891) 33; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. II. (1892) 519. — Austria.
- umbrosa*, Cesati, ex Chiovenda, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 287, in syn. = *V. Pirottiae*, Chiovenda.
- urophylla*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 413; et Pl. Delav. (1889) 74. — China occ.
- Vandasii*, Velen. Fl. Bulg. add. (1891) 641; et in Sitzb. Bohm. Ges. Wiss. 1893 (1894) xxxvii. 12. — Bulg.
- valesiaca*, Hausskn. ex Favrat, in Bull. trav. Soc. Murith, Fasc. xiii-xv. (1887) 61 = *collina*, Bess.
- vaudensis* ×, Hausskn. ex Gremli, Fl. anal. Suisse. (1886) 124. — Helv.
- velutina*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxx. 1891 (1892) 75, xxxii. 1893 (1894) 177. — Maced.
- Websteri*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 56. — China.
- Wettsteinii*, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 197 = *sylvestris*, Lam.
- Wiesbawii* ×, Sabransky, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 48. — Austria.
- VIORNA**, Reichb. = **Clematis**, Dill. (Ranuncul.).
- cylindrica*, Spach, ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 181 = *C. cylindrica*, Linn.
- VIRECTA**, Afzel. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1210.
- major*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 377. — Afr. trop. or.
- VIROLA**, Aubl. = **Myristica**, Linn. (Myrist.).
- elongata*, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) 89 = *M. elongata*, Benth.
- VISCAINOA**, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1888) 163; Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 88. **EUPHORBIACEAE**.
- geniculata*, Greene, l. c.; T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 137 (= *Staphylea geniculata*, Kell.). — Calif.
- VISCARIA**, Riv. ex Rupp. = **Lychnis**, Tourn. (Caryoph.).
- media*, Fries, ex Swanlund, in Bot. Notis. (1886) 7, in syn. = *L. Viscaria*, Linn.
- nivalis*, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 131 = *L. nivalis*, Kit.
- VISCUM**, Tourn. ex Linn. (Loranth.). — Ind. Kew. ii. 1211.
- brevifolium*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 131. — Afr. austr.
- clavatum*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 429, t. 37. — N. Zel.
- Fischeri*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 132. — Afr. trop. or.
- glomeratum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 515. — Madag.
- Hildebrandtii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 133. — Afr. trop.
- Holstii*, Engl. l. c. 132. — Afr. trop. or.
- MacOwani*, Engl. l. c. xix. (1894) 131. — Afr. austro-occ. extratrop.
- ripsaloides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 516. — Madag.

VISCUM : —

Rutenbergii, *Buchenau, in Abh. Naturw. Ver. Brem.* x. (1889) 376. — Madag.
 Schimperii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 132. — Abyss.
 Stuhlmanni, *Engl. l. c.* 133. — Afr. trop. or.
 tenue, *Engl. l. c.* 133. — Afr. trop. or.
 vacciniifolium, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 343. — Madag.

VISMIA, Vand. (Hyperic.). — Ind. Kew, ii. 1212.

calvescens, *Hieron, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 322. — Columb.
 gracilis, *Hieron, l. c.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 52. — Columb. v. Ecuad.
 Jelskii, *Zahlbr. in Diss. Cl. Math. Phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 224. — Peruvia.
 Lehmannii, *Hieron, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 52. — Columb. v. Ecuad. ?
 Mandurr, *Hieron, l. c.* 54. — Columb.

VITELLARIA, Gaertn. f. = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

campechina, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 513 = *L. campechiana, H. B. & K.*
 catocladantha, *Engl. l. c.* 514 = *L. catocladantha, Eichl.*
 Eichleri, *Engl. l. c.* 512. — Bras.
 glaucophylla, *Engl. l. c.* 513. — Bras.
 mammosa, *Loes. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 564 = *Lucuma mammosa, Radlk.*
 nitidula, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 512. — Cuba.
 salicifolia, *Engl. l. c.* 514 = *Lucuma salicifolia, H. B. & K.*
 tenuifolia, *Engl. l. c.* 513. — Cuba.
 Warmingii, *Engl. l. c.* 512 = *Lucuma Warmingii, Eichl.*

VITEX, Tourn. ex Linn. (Verben.). — Ind. Kew, ii. 1213.

amboniensis, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 340. — Afr. trop. or.
 angolensis, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 167. — Angola.
 bracteata, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 42. — Madag.
 Buchanani, *Baker, ex Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 339. — Afr. trop. or.
 Buchneri, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xviii (1894) 166. — Angola.
 camporum, *Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 35. — Angola.
 Carvalhi, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 339. — Afr. trop. or.
 cestroides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 341. — Madag.
 congesta, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2240. — Madag.
 Fischeri, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 171. — Afr. trop.
 flavescens, *Rolfe, in Bolet. Soc. Brot.* xi. (1893) 87. — Angola.
 formosana, *Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 151. — Formosa.
 gabunensis, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 167. — Gabon.
 grandifolia, *Guerke, l. c.* 169. — Gabon.
 hirsutissima, *Baker, in Kew Bull.* (1892) 108. — Madag.
 Hollrungii, *Warb. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 208. — N. Guin.
 lundensis, *Guerke, l. c.* 168. — Congo.
 Mechowii, *Guerke, l. c.* 167. — Angola.
 micrantha, *Guerke, l. c.* 170. — Afr. trop. occ.
 microcalyx, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 341. — Madag.
 milanjiensis, *Britten, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 36. — Afr. trop.
 monophylla, *K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 121. — N. Guin.
 mossambicensis, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 340. — Afr. trop. or.
 Novae-Pommeraniae, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 429, xviii. (1893) 208. — N. Guin.
 Poggei, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 168. — Afr. trop. occ.
 pyramidata, *Robinson, in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 321. — Mexic.

VITEX : —

pyramidata, *Robinson & Pringle, in Gard. and For.* vii. (1894) 153. — Mexic.
 rufescens, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 169. — Angola.
 Schweinfurthii, *Guerke, l. c.* 170. — Afr. trop.
 syringaeifolia, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 115. — Afr. trop. occ.
 tangensis, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 339. — Afr. trop. or.
 Teleravina, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 340. — Madag.
 thyrsoiflora, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 152. — Afr. trop. occ.
 tristis, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 42. — Madag.
 Volkensii, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 339. — Afr. trop. or.
 Welwitschii, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 166. — Angola.

VITIS, [Tourn.] Linn. (Ampel.). — Ind. Kew, ii. 1215.

acuminata, *Carr. in Rev. Hort.* lxii. (1890) 183. — China.
 acuminata, *Trim. Handb. Fl. Ceyl.* i. (1893) 292 (= *Cissus acuminata, Thw.*). — Zeylan.
 angulosa, *Rafin. [Am. Man. Grap. Vin.]* (1830) 16] ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 561 = *rotundifolia, Michx.*
 Apliniana, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 35. — Ind. or.
 apodophylla, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 330. — Arabia.
 artemisiaefolia, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 137, in syn. (= *Ampelocissus artemisiaefolia, Planch.*). — China occ.
 Baileyana, *Munson, ex Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 500. — Virgin.
 Balansaeana, *Planch. in DC. Monog. Phan. v.* (1887) 612. — Tonkin.
 Blancoi, *Munson, in Gard. and For.* iii. (1890) 474, nomen. — Mexic.
 Bourgaeana, *Planch. in DC. Monog. Phan. v.* (1887) 368. — Mexic.
 brevipedunculata, *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 564, fig. 267 (= *Cissus brevipedunculata, Maxim.*). — Japon.
 burmanica, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 35. — Burma.
 cardiospermoides, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 140, in syn. (= *Ampelopsis cardiospermoides, Planch.*). — China.
 Champini, *Planch. in DC. Monog. Phan. v.* (1887) 321. — Texas.
 congoensis, *Hort. ex Gard. Chron.* (1891) i. 116. — Congo.
 Davidiana, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 556, 564 = *V. Romaneti, Romanet.*
 Davidiana, *Nichols. Dict. Gard.* iv. (1887) 187 (= *Cissus Davidiana, Carr.*). — China.
 Delavayana, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 139, in syn. (= *Ampelopsis Delavayana, Planch.*). — China occ.
 digitata, *Defflers, Voy. au Yémen* (1889) 125 (= *Cissus digitatus, Lam.*). — Arabia.
 Doniana, *Munson, in Gard. and For.* iii. (1890) 473, nomen. — Arkans.
 dubia, *Becc. ex Martelli, Fl. Bogos.* (1886) 19. — Abyss.
 Foëxeana, *Planch. in DC. Monog. Phan. v.* (1887) 616. — Texas.
 Giradiana, *Munson, in Gard. and For.* iii. (1890) 473, nomen. — Calif.
 glabrescens, *Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien.* xxxix. (1889) 592. — Austria.
 glauca, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 410 = *glauca, Wight & Arn.*
 glossopetala, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 344. — Madag.
 grossedentata, *Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 44. — Gabon.
 Guerkeana, *Buettn. l. c.* xxxi. (1889) 89. — Congo, Angola.
 Henryana, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 132. — China.

VITIS : —

humilis, *N. E. Br. in Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1565. — Natal.
 hypoleuca, *Szyszl. Polypt. Rehmann.* ii. (1888) 45 (= *Cissus hypoleuca, Harv.*). — Transvaal.
 imerinensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 308. — Madag.
 lanceolata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1886) 462. — Guatem.
 leucophlea, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 12. — Madag.
 Lindeni, *Nichols. Dict. Gard.* iv. (1887) 188. — N. Granat.
 Martinelli, *Hort. Kew. ex Planch. in DC. Monog. Phan. v.* (1887) 375, in obs. (= *Ampelocissus Martini, Planch.*). — Cochinch.
 mauritiana, *A. Juss. ex Planch. l. c.* 382 (= *A. elephantina, Planch.*). — Madag. ?
 megabotrya, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 34. — Burma.
 morifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 307. — Madag.
 Munsoniana, *J. H. Simson, in Muns. Address on Am. Grap.* (1886) 5, nomen, ex *Planch. in DC. Monog. Phan. v.* (1887) 615; *Munson, in Gard. and For.* iii. (1890) 473, 474. — Florida.
 nana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 953. — Congo gall.
 natalia, *Szyszl. Polypt. Rehmann.* ii. (1888) 47. — Natal.
 novo-mexicana, *Lemmon, ex Munson, Nat. Grap. U. S.* (1885) 5; et in *Address on Am. Grap.* (1886) 5; [nuevo mexicana] fide *Planch. in DC. Monog. Phan. v.* (1887) 616. — N. Mexic.
 pachyphylla, *Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 412. — Ins. Borbon.
 pachyphylla, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 132. — China.
 pallida, *Trim. Syst. Cat. Ceyl. Pl.* (1885) 19; et *Handb. Fl. Ceyl. i.* (1893) 292 (= *V. Heyneana, Wall.*). — Zeylan.
 Planchonii, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 139, in syn. (= *Telrastigma hypoglauca, Planch.*). — Yunnan.
 Potanini, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 104. — China.
 pycnantha, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 34. — Burma.
 quadrangularis, *Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 411; *Defflers, Voy. au Yémen* (1889) 125 = *quadrangularis, Wall.*
 Regelianae, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 564 = *brevipedunculata, Dippel.*
 Retordi, *Romanet du Caill. ex Planch. in DC. Monog. Phan. v.* (1887) 613. — Tonkin.
 rhodotricha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 461. — Madag.
 rotundifolia, *Defflers, Voy. au Yémen* (1889) 125 (= *Cissus rotundifolia, Vahl.*). — Arabia.
 rutilans, *Carr. in Rev. Hort.* lxii. (1890) 444, cum ic. — China.
 sambucina, *Becc. ex Martelli, Fl. Bogos.* (1886) 20. — Abyss.
 Schumanniana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 128, 151. — Malacca.
 sicyoides, *Baker, in Kew Bull.* (1893) 243, 249 = *sicyoides, Mig.*
 Simpsoni, *Munson, in Gard. and For.* iii. (1890) 473, nomen. — Florida.
 soudanensis, *Lécard, ex Planch. in DC. Monog. Phan. vii.* (1887) 487, in syn. = *caesia, Baker, pr. p.*
 sphaerophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 460. — Madag.
 spicigera, *Kuntze, in Gartenfl.* xlii. (1893) 112 (= *Cissus spicigera, Griff.*) = *macrostachys, Mig.*
 succulenta, *Galpin, in Kew Bull.* (1895) 144. — Transvaal.
 ulmifolia, *Lafon, ex Planch. in DC. Monog. Phan. v.* (1887) 405, in obs. — Costa Rica.
 umbellata, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 137. — Ins. Formosa.
 vestita, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 139, in syn. (= *Ampelopsis tomentosa, Planch.*). — Yunnan.
 Virgiliana, *Clem. [Ensayo sobre var. Vid.]* (1879) 53, t. 12], ex *Planch. in DC. Monog. Phan. v.* (1886) 356 = *vinifera, Linn.*

VITIS : —

- virginiana*, Munson, in Gard. and For. iii. (1890) 475 = *Baileyana*, Munson.
vitiginea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 128, 129, 138 = *repanda*, Wight & Arn.
Voanonalala, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 461. — Madag.
vulgaris, Bartr. [Rep. pat. Off. Agric. (1857) 329], ex Dippel. Handb. Laubholz. ii. (1892) 545 = *V. Labrusca*, Linn.

VITTADINIA, A. Rich. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1218.

- Alinae*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II. (1889) 11. [*Vittadenia*]. — N. Guin.
macra, F. Muell. l. c. — N. Guin.

VIVIANIA, Cav. (Geran.). — Ind. Kew. ii. 1218.

- aristulata*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 249 (= *Cissarobryum aristulatum*, Phil.). — Chili.
laxa, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 738. — Chili.
ovata, Phil. l. c. 739. — Chili.

VLECKIA, Rafin. = **Lophanthus**, Benth. (Labiata.)

- anethiodora*, Greene, in Mem. Torrey Bot. Club, v (1894) 282 = *Hyssopus anethiodorus*, Nutt.
Foeniculum, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 449 = *Lophanthus anisatus*, Benth.
urticifolia, Holzinger, in Contr. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 246 (= *V. urticaefolii*, Rafin.) = *L. urticifolius*, Benth.

VOACANGA, Thou. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1218.

- africana*, Stapf, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 87. — Sierra Leone.
angustifolia, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 317. — Afr. trop. or.
Boehmii, K. Schum. l. c.; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 149. — Afr. centr. or.
bracteata, Stapf, in Kew Bull. (1894) 22. — Afr. trop. occ.
dichotoma, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 317. — Afr. trop. or.
diplochlamys, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 149. — Kamerun.
foetida, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 171; K. Schum. l. c. = *foetida*, Rolfe.
glabra, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 149 = *africana*, Stapf.
obtusata, K. Schum. l. c. — Afr. trop.
papuana, K. Schum. l. c. = *Orchipeda papuana*, F. Muell.
puberula, K. Schum. l. c. 149. — Afr. trop. occ.
Schweinfurthii, Stapf, in Kew Bull. (1894) 21. — Afr. trop.

VOCHYSIA, Juss. (Vochys.). — Ind. Kew. ii. 1218.

- boliviana*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. III. (1893) 7. — Bolivia.
guatemalensis, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xii. (1887) 131, xiii. (1888) 299, t. 23. — Guatem.
Lehmannii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 38. — Columb.
Saldanhana, Warm. in Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. (1889) 877 [Symb. Fl. Bras. centr. xxxii. 26]. — Bras.
Schwackeana, Warm. l. c. — Bras.
spathulata, Warm. l. c. 876; et 25. — Bras.

VOHEMARIA, Buchenau, in Abh. Naturw. Ver.

- Brem. x. (1889) 372. **ASCLEPIADEAE**.
Messeri, Buchenau, l. c. 372, t. 6, fig. 9-12. — Madag.

VOLKAMERIA, Linn. Syst. ed. 1 (1735) = **Sesamum**, Linn. (Pedal.)

- alata*, angolensis, calycina, laciniata, lamiifolia, macrantha, Marlothii, prostrata, Schenkii, Schinziana, triphylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 482 = *homonyma omnia* Sesami.
antirrhinodes, Kuntze, l. c. = *S. antirrhinoides*, Welw.
orientalis, Kuntze, l. c. = *S. indicum*, Linn.
pentaphylla, Kuntze, l. c. = *S. capense*, Burm. f.
samodes, Kuntze, l. c. (= *Anthadenia sesamoides*, Lem.). — Afr. trop.

VOLKENSIA, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894)

- 219; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 387, in add. **COMPOSITAE**.
argentea, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.

VOLKENSIOPHYTON, Lindau, in Bot. Jahrb.

- xx. (1894) 27. **ACANTHACEAE**.
neuracanthoides, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.

VOLVULUS, Medic. = **Calystegia**, R. Br. (Con-

- volv.).
hederaceus, Kraussianus, marginatus, roseus, silvaticus, Tuguriorum, villosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 447 = *homonyma omnia* Calystegiae.
Hantelmannii, Kuntze, l. c. = *C. Hantelmannii*, Phil.
sepium, Junger, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 133 = *C. sepium*, Linn.

VOSSIA, Wall. & Griff. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1219.

- cambogiensis*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 109. — Cochinch.
cuspidata, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 324 = *procera*, Wall.

VOUAPA, Aubl. = **Macrolobium**, Schreb. (Legu-

- min.).
canaliculata, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 393 = *M. canaliculatum*, Spruce.
coerulea, Taub. in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 31 — Afr. trop. or.
discolor, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 393 = *Macrolobium discolor*, Benth.
flexuosa, Taub. l. c. = *M. flexuosum*, Spruce.
gracilis, Taub. l. c. = *M. gracile*, Spruce.
guyanensis, Taub. l. c. 394 = *M. guyanense*, Aubl.
latifolia, Taub. l. c. = *M. latifolium*, Vogel.
Limba, Taub. in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 32, in obs. = *M. Limba*, S. Elliot.
limbata, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 393 = *M. limbatum*, Spruce.
multijuga, Taub. l. c. = *M. multijugum*, Benth.
pendula, Taub. l. c. = *M. pendulum*, Willd.
stipulacea, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1892) 142 = *M. stipulaceum*, Benth.
suaveolens, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 394 = *M. suaveolens*, Spruce.
taxifolia, Taub. l. c. = *M. taxifolium*, Spruce.
venulosa, Taub. l. c. = *M. venulosum*, Benth.

VOYRIA, Aubl. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 1220.

- platypetala*, Baker, in Kew Bull. (1894) 26. — Afr. trop. occ.
primuloides, Baker, l. c. 25. — Gabon.

VRIESEA, Beer = **Tillandsia**, Linn. (Bromel.)

- aëris-incola*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 555 = *Catopsis maculata*, Ed. Morr.
Alberti ×, Éd. André, in Rev. Hort. xli. (1889) 300, cum ic. — Hybr. artef.
albo-nitens, Nichols, Dict. Gard. iv. (1887) 187. — Bras.
alta, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 226, in syn. = *Tillandsia alta*, Baker.
amazonica, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 554 = *T. amazonica*, Baker.
atra, Mez, l. c. 543. — Bras.
botafogensis, Mez, l. c. 536. — Bras.
caespitosa, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 213 = *Tillandsia Schlechtendalii*, Baker.
Cappei ×, Hort. L. Duval, ex Rev. Hort. Belg. lxvi. (1894) 285. — Hybr. artef.
cardinalis ×, Hort. L. Duval, l. c. lxii. (1890) 358; et in Illustr. Hort. xxxviii. (1891) 39, t. 525. — Hybr. artef.
citrina, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 224, in syn. = *Tillandsia citrina*, Baker.
Clausseniana, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 545 = *T. Clausseniana*, Baker.
corcovadensis, Mez, l. c. 532 = *T. corcovadensis*, Baker.

VRIESEA : —

- Crousseana* ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 258 = *V. Warmingii*, Éd. Morr.
crassa, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 566. — Bras.
crotalophora, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 215, in syn. = *Tillandsia Barilleti*, Baker.
densiflora, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 568. — Bras.
Devansayana ×, Hort. L. Duval, ex Rev. Hort. Belg. lxvi. (1894) 285. — Hybr. artef.
Duchartrei ×, Hort. L. Duval, l. c. 285. — Hybr. artef.
fenestrata ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. lxvi. (1894) 285, sphalm. ? = *fenestralis*, Linden ?
friburgensis, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 537. — Bras.
fulgida ×, Hort. ex Rodigas, in Illustr. Hort. xxxv. (1888) 87, t. 67. — Hybr. artef.
gigantea, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 566 = *Tillandsia gigantea*, Baker.
goniorachis, Mez, l. c. 345 = *T. goniorachis*, Mez.
gradata, Mez, l. c. 523 = *T. gradata*, Baker.
Gravissiana ×, Wittm. in Gartenfl. xxxix. (1890) 494, fig. 81; Rev. Hort. Belg. xvi. (1890) 49; cum ic. — Hybr. artef.
Hillegeeriana, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 227, in syn. = *Tillandsia regina*, Vell.
imperialis, Carrière, in Rev. Hort. Belg. lx. (1888) 56 = *T. regina*, Vell.
insignis, Hort. Lugd.-Bat. ex Wittm. in Gartenfl. xl (1891) 476, t. 1362. — Hybr. artef.
Kitteliana ×, Wittm. l. c. xxxix. (1890) 326, fig. 62. — Hybr. artef.
leodiensis ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xviii. (1892) 3, cum ic. — Hybr. artef.
Leopoldi ×, Witte, in Gartenfl. xl. (1891) 476. — Hybr. artef.
longicaulis, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 542 = *Tillandsia longicaulis*, Baker.
Lubbersii ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 258. — Hybr. artef.
Luschnathii, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 555. — Bras.
macropoda, Mez, l. c. 554 = *T. macropoda*, Baker.
magnifica ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xiv. (1888) 136. — Hybr. artef.
Magnusiana ×, Kittel & Wittm. ex Wittm. in Gartenfl. xxxviii. (1889) 343. — Hybr. artef.
Mariae ×, Éd. André, in Rev. Hort. Belg. lxi. (1889) 301, fig. 74. — Hybr. artef.
Mosenii, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 558. — Bras.
Nanoti ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. lxvi. (1894) 285. — Hybr. artef.
obliqua ×, Hort. Quintus, ex Wittm. in Gartenfl. xli. (1892) 201, t. 1369. — Hybr. artef.
oligantha, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 544 = *Tillandsia oligantha*, Baker.
pardalina, Mez, l. c. 523. — Bras.
Pastuchoffiana, Glaziou, ex Mez, l. c. 524 = *Tillandsia Pastuchoffiana*, Hort. ex Baker.
Plewicii ×, Hort. L. Duval, ex Rev. Hort. Belg. lxvi. (1894) 285. — Hybr. artef.
poenulata, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 230, in syn. = *Tillandsia poenulata*, Baker.
procera, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 539 = *T. procera*, Mart.
procera, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n. 29 (1891) 21 = *praec.*
purpurascens ×, Hort. Bull. ex Gard. Chron. (1893) i. 413. — Hybr. artef.
Quintusiana ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 258. — Bras.
Regnelli, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 547. — Bras.
reticulata, Hort. ex Kew Bull. (1888) 121 = *Tillandsia reticulata*, Baker.
Rex ×, Hort. L. Duval, ex Rev. Hort. Belg. lxvi. (1894) 285; et in Rev. Hort. Belg. xx. (1894) 217. — Hybr. artef.
rosea, Éd. Morr. ex Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 553 = *Tillandsia platynema*, Griseb.
rubida, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 215, nomen = *T. oligantha*, Baker.

VRIESEA: —

- Rostrum aquilae*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 518. — Bras.
Sanctae-Crucis, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. IV. (1895) 491. — Bras.
Schenkiana, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii, Beibl. n. 29 (1891) 20. — Bras.
Schlechtendalii, Wittm. l. c. xi. (1889) 69, xiv. Beibl. n. 32 (1891) 8 = *Tillandsia Schlechtendalii*, Baker.
Selloana, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 547 = *T. Selloana*, Baker.
squamosa, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 212, in obs. = *T. carinata*, Baker.
subsecunda, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1889) 69. — Costa Rica.
thyrsoides, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 556. — Bras.
triligulata, Mez, l. c. 541. — Bras.
Truffautiana, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 213 = *Tillandsia incurvata*, Baker.
Tweediana, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 561 = *T. Tweediana*, Baker.
unilateralis, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 545 = *T. unilateralis*, Baker.
vasta, Mez, l. c. 572. — Bras.
Veitchii, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 223, in syn. = *Tillandsia Veitchii*, Baker.
Weyringiana ×, Wittm. in Gartenfl. xxxix. (1890) 7. — Hybr. artef.
Wittmackiana ×, Kittel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 287, 553, t. 1283; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 565. — Hybr. artef.

- VRYDAGZYNEA**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1220.
papuana, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 345. — N. Guin.
viridiflora, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 96 (= *Phyrsurus viridiflorus*, Lindl.). — Bengal, (Java?).

- VUACAPUA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 212 = **VUACAPOUA**, Aubl. = **Andira**, Lam. (Legum.).
amazonum, *cubensis*, *cujabensis*, *fraxinifolia*, *frondosa*, *gabonica*, *humilis*, *laurifolia*, *nitida*, *paniculata*, *parvifolia*, *Pisonis*, *vermifuga*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 212 = *homonyma omnia* Andirae.
anthelmia, Kuntze, l. c. = *A. anthelminthica*, Benth.
legalis, Kuntze, l. c. = *A. stipulacea*, Benth.
sapindodes, Kuntze, l. c. = *A. sapindoides*, Benth.
surinamensis, Kuntze, l. c. = *A. retusa*, H. B. & K.

- VUAPA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 212 = **VUOAPA**, Aubl. = **Macrolobium**, Schreb.
acaciaefolia, *canaliculata*, *discolor*, *flexuosa*, *florida*, *gracilis*, *latifolia*, *multijuga*, *pendula*, *suaveolens*, *stipulacea*, *taxifolia*, *venulosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 213 = *homonyma omnia* Macrolobii.
elliptica, Kuntze, l. c. (= *Anthonota elliptica*, Desv.). — Am. mer.
guianensis, Kuntze, l. c. = *M. Utea*, f. F. Gmel.
racemigera, Kuntze, l. c. = *M. pendulum*, Willd.
unijuga, Kuntze, l. c. = *M. limbatum*, Spruce.

- VULPIA**, C. C. Gmel. = **Festuca**, Tourn. (= Gramin.).
bromoidea, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 939 = *F. bromoides*, Linn.
ciliata, St. Lager, l. c. 938 = *F. Myuros*, Linn.
exserta, St. Lager, l. c. = *F. sciuroides*, Gmel.
vaginata, St. Lager, l. c. = *F. Myuros*, Linn.

W

- WAHLBERGELLA**, Fries = **Lychnis**, Tourn. (Caryoph.).
brachypetala, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 266 = *L. brachypetala*, Schwaegr.
tristis, Freyn, l. c. xxxix. (1889) 386 = *L. tristis*, Bunge.

- WAHLENBERGIA**, Schrad. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 1222.
baikalensis, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 46. — Dahuria.
croatica, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1888) 39 = *W. Kitaibelii*, A. DC.
ensifolia, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 498 = *Heterochaenia ensifolia*, A. DC.
kilimandscharica, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 412. — Afr. trop.
Murbeckii ×, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 293, in syn. (= *Hedraianthus Murbeckii* ×, Wettst.). — Herceg.
Oliveri, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 412, nomen. — Afr. trop.
paucidentata, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 422. — Natal.
pinifolia, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 148. — Natal.
serbica, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 298, in syn. (= *Hedraianthus serbicus*, Wettst.). — Serb.
serpyllifolia, G. Beck, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 212 = *Campanula serpyllifolia*, Vis.
spinulosa, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 271. — Afr. austro-occ. extratrop.
virgata, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 400. — Afr. trop. or.
Wettsteinii, Halácsy & Baldacci, ex Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 371, in syn. (= *Edraianthus Wettsteinii*, Halácsy & Baldacci). — Montenegro.

- WAILESIA**, Lindl. = **Dipodium**, R. Br. (Orchid.).
punctata, Nichols. Dict. Gard. iv. C (1887) 191 = *D. punctatum*, R. Br.

- WALDSTEINIA**, Willd. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 1223.
ternata, Fritsch, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 449; et in Bot. Centralbl. xl. (1889) 168 = *sibirica*, Tratt.

- WALLERIA**, T. Kirk (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1223.
paniculata, Fritsch, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, v. (1890) 493. — Madag.

- WALLROTHIA**, Spreng. = **Seseli**, Linn. (Umbell.).
alpina, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, x. (1895) 201 = *tuberosa*, Spreng.
montana, G. Beck, l. c. = *tuberosa*, Spreng.

- WALNEWA** *pulchella*, Regel, ex Gard. Chron. (1891) i. 307, sphalm. = **Waluwewa** *pulchella*, Regel.

- WALSURA**, Roxb. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 1224.
Candollei, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 84. — Ins. Andam.
multijuga, King, l. c. 83. — As. trop.

- WALTHERIA**, Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 1224.
Ackermanniana, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 61. — Bras.
aspera, K. Schum. l. c. 55. — Bras.
cinerea, A. St Hil. ex K. Schum. l. c. 56 = *cinerascens*, A. St Hil.
collina, K. Schum. l. c. 63. — Bras.
Glazioviana, K. Schum. l. c. — Bras.
mollis, Willd. ex K. Schum. l. c. 53 = *viscosissima*, A. St Hil.
petiolata, K. Schum. l. c. 61. — Bras.
Pohlana, K. Schum. l. c. 62. — Bras.
polyantha, K. Schum. l. c. 60. — Bras.
prostrata, K. Schum. l. c. 56. — Bras.
Selloana, K. Schum. l. c. 53. — Bras.

- WALUEWA**, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 309. **ORCHIDEAE**.
pulchella, Regel, l. c. — Bras.

- WARBURGIA**, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 276; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 318. **CINNAMOMEAE**.
Stuhlmannii, Engl. ll. cc. — Afr. trop. or.

- WARSCIEWICZELLA**, Reichb. f. = **Zygopetalum**, Hook. (Orchid.).
Lindeni, Hort. ex Journ. of Hort. (1892) i. 419, 461 fig. 79; et in Journ. des Orchid. vii. (1892) 143 fig. 17 = *Z. Lindeni*, Rolfe.

- WARSCIEWICZIA**, Klotzsch (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1225.
cordata, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 217. — Peruv.
longistaminea, K. Schum. l. c. 218. — Bras.
Schwackei, K. Schum. l. c. 219. — Bras.

- WASHINGTONIA**, H. Wendl. [emend.] (Palm.). — Ind. Kew. ii. 1225.
filamentosa, Gaudichaudii, lanigera, Martii, pacifica, pericularum, remota, Thurstonii, Vuylstekeana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 737 = *homonyma omnia* Pritchardiae.
Hildebrandtii, Kuntze, l. c. = *P. Hillebrandii*, Becc.
Sonora, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 79, xxv. (1890) 136. — Calif.

- WATSONAMRA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 302 = **Pentagonia** Benth. (Rubiace.).
macrophylla, *pinnatifida*, *spathicalyx*, *Tinajita*, *Wendlandii*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Pentagoniae.

- WATSONIA**, Mill. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1225.
fulgens, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 193 = *angusta*, Ker-Gawl.
juncifolia, Baker, Handb. Irid. (1892) 178 (= *Morphixia juncifolia*, Baker). — Afr. austr.
lapeyrousioides, Baker, l. c. — Afr. austr.
lineata, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 193 = *Tritonia lineata*, Ker-Gawl.
pyramidata, Klatt, l. c. 194 = *rosea*, Ker-Gawl.
spicata, Klatt, l. c. 195 = *brevifolia*, Ker-Gawl.

- WEBBIA**, DC. = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).
serratuloides, Sch. Bip. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 415, in syn. = *V. cylindrica*, Sch. Bip.

- WEBERA**, Schreb. = **Tarenna**, Gaertn. (Rubiace.).
albituba, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. I. (1891) 129 (= *Stylocoryna albituba*, Miq.). — Sumatra.
buruensis, Boerl. l. c. 130 (= *S. buruensis*, Miq.). — Borneo.
celebica, Boerl. l. c. (= *S. celebica*, Miq.). — Ins. Celeb.
coriacea, Boerl. l. c. 129 (= *S. coriacea*, Korth.). — Sumatra.
costata, Boerl. l. c. 129 (= *S. costata*, Miq.). — Sumatra.
dasyphylla, Boerl. l. c. (= *S. dasyphylla*, Miq.). — Sumatra.
Forsteriana, Boerl. l. c. 130 (= *S. Forsteriana*, Miq.). — Ins. Celeb.
hirsuta, Miq. ex Boerl. l. c. 129 (= *S. hirsuta*, Korth.). — Java.
Junghuhniana, Boerl. l. c. (= *S. Junghuhniana*, Miq.). — Java?
lateriflora, Boerl. l. c. 129 (= *S. lateriflora*, Span.). — Timor.
Miquelii, Boerl. l. c. (= *S. grandifolia*, Miq.). — Sumatra.
nigrescens, Boerl. l. c. 130 = *Tarenna nigrescens*, Warb.
orophila, Boerl. l. c. (= *Stylocoryna orophila*, Miq.). — Sumatra.
pavettoides, Boerl. l. c. 129 (= *S. pavettoides*, Miq.). — Sumatra, Banka.
polycarpa, Boerl. l. c. (= *S. polycarpa*, Miq.). — Java, Sumatra.
racemosa, Boerl. l. c. (= *S. racemosa*, Cav.). — Java.
saxatilis, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 25. — Madag.

WEBERA: —

setigera, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 129 (= *Stylocoryna setigera*, Miq.). — Sumatra.
tomentosa, Boerl. l. c. (= *S. tomentosa*, Blume). — Java.

WEBSTERIA, S. H. Wright, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 135, xv. (1888) 99 = **Dulichium**, Pers. (Cyper.).
limnophila, S. H. Wright, l. c. = *Scirpus submersus*, Wright.

WEDELIA, Jacq. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1226. *angolensis*, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 102. — Angola.

glabrata, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 242 (= *Wollastonia glabrata*, DC.). — Timor, Java.

molucaana, Boerl. l. c. (= *Woll. molucaana*, DC.). — Ins. Molucc.

prostrata, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 434. — China.

quadribacteata, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 449. — N. Guin.

scabriuscula, Engl. *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 223; Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 241 (= *Wollastonia scabriuscula*, DC.). — N. Guin, Timor.

serrulata, Boerl. l. c. 241 (= *Woll. serrulata*, Miq.). — Sumatra.

Stirlingii, F. Muell. & Tate, in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 81, nomen. — Austral.

strigulosa, Benth. & Hook. f. ex Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 207 (= *Wollastonia strigulosa*, Gaudich.). — Ins. Pacif.

strigulosa, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 223, nomen. — N. Guin.

Stuebelii, Hieron. l. c. xxi. (1895) 348. — Columb.

trilobata, Hitchc. in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 99 = *carcosa*, Pers.

Zollingeriana, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 242 (= *Wollastonia Zollingeriana*, Sch. Bip.). — Ind. bat.

WEIGELIA, Pers. = **Diervilla**, Tourn. (Caprifol.).

arborescens, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 273 = *D. floribunda*, Sieb. & Zucc.

hybrida, Hort. ex Dippel, l. c. 272, in syn. = *D. hybrida*, Dippel.

WEINGAERTNERA, Bernh. = **Corynephorus**, Beauv. (Gramin.).

articulata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 795 = *C. articulatus*, Beauv.

WEINMANNIA, Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 1227.

apetala, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* viii. (1893) 76. — Austral.

auriculifera, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 22. — Columb. v. Ecuad.

cochensis, Hieron. l. c. xxi. (1895) 310. — Columb.

Dzieduszyckii, Zahlbr. in *Diss. Cl. Math.-phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 218. — Peruvia.

Engleriana, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 24. — Columb. v. Ecuad.

Glazioviana, Taub. l. c. xii. Beibl. n. 27 (1890) 18. — Bras.

guanacasana, Hieron. l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) 25. — Columb.

Jelskii, Zahlbr. in *Diss. Cl. Math.-phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 218. — Peruvia.

Karsteniana, Szyszyl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 41. — Venezuela.

Lehmannii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 21. — Columb.

leptostachya, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 469. — Madag.

luzoniensis, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 125. — Ins. Philipp.

Mariquitae, Szyszyl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 41. — N. Granat.

nitida, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 23. — Columb.

popayanensis, Hieron. l. c. 26. — Columb.

WEINMANNIA: —

stenostachya, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 103. — Madag.

Stuebelii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 329. — Ecuad.

Vescei, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1886) 35, 164, t. 13; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 61. — Ins. Pacif.

WELDENA *longifolia*, Pohl, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 402 = *Abutilon longifolium*, K. Schum.

WELWITSCHIELLA, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 390. **COMPOSITAE.**

neriifolia, O. Hoffm. l. c. — Angola.

WENDLANDIA, Bartl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1228.

basistaminea, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Mar. 1892) 177; et *ex Bot. Centralbl.* l. (1892) 125. — Austral.

buddleacea, F. Muell. *Descr. Notes Papuan Pl.* viii. (1886) 45. — N. Guin.

Henryi, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1712. — China.

montana, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 37 = *Notoniana*, Wall.

salicifolia, Franck. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 208. — China, Tonk.

psychotrioides, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Mar. 1892) 178 (= *Oldenlandia psychotrioides*, F. Muell.). — Austral.

WERNERIA, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1238.

acerosifolia, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 363. — Peruvia.

Antinorii, Aetla, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xx. (1889) 348; et in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. (1895) 54 t. 3 fig. 4-5. — Afr. trop. or.

decumbens, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 364. — Peruvia.

glaberrima, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 40. — Chili.

glandulosa, Klatt, in *Bot. Jahrb.* viii. (1886) 50. — Ecuad.

juniperina, Hieron. l. c. xxi. (1895) 365. — Peruvia.

incisa, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 40. — Chili.

Lorentziana, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 364. — Peruvia.

poposa, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 40. — Chili.

soratisensis, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 363. — Columb.

Stuebelii, Hieron. l. c. 362. — Peruvia.

Wedellii, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 40. — Chili.

WESTONIA, Spreng. = **Rothia**, Pers. (Legumin.).

hirsuta, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 213 = *R. hirsuta*, Baker.

indica, Kuntze, l. c. = *R. trifoliata*, DC.

WIBORGIA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 213 = **VIBORQUIA**, Ort. = **Eysenhardtia**, H. B. & K. (Legumin.).

adenostylis, Kuntze, l. c. = *E. adenostylis*, Baill.

amorphodes, Kuntze, l. c. = *E. amorphodes*, H. B. & K.

spinosa, Kuntze, l. c. = *E. spinosa*, Engelm.

WIDDRINGTONIA, Endl. = **Callitris**, Vent. (Conif.).

Whytei, Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 60. — Afr. trop.

WIGANDIA, Neck. = **Disparago**, Gaertn. (Compos.).

Kraussii, *lasiocarpa*, *laxifolia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 371 = *homonyma omnia* *Disparaginis*.

ericodes, Kuntze, l. c. = *D. ericoides*, Gaertn.

seriphoides, Kuntze, l. c. = *D. seriphoides*, DC.

WIKSTROEMIA, Endl. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 1230.

albiflora, Yatabé, in *Tokyo Bot. Mag.* iv. (July 1891) 217 t. 26; et *Icon. Fl. Japon.* i. 2 (1892) 129 t. 35 = *gynopoda*, Maxim.

alternifolia, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 99 [Wickstroemia]. — China.

angustifolia, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 396. [Wickstroemia]. — China.

Balansae, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 227 [Wickstroemia]. — Tonkin.

bicornuta, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 387 [Wickstroemia]. — Ins. Sandvic.

canescens, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1886) 100. — Japon.

foetida, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 385 (= *Daphne foetida*, Forst.). — Ins. Sandvic.

Ganpi, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 99 [Wickstroemia] (= *Passerina Ganpi*, Sieb. & Zucc.). — Japon.

gracilis, Hemsl. ex Hemsl. & Forb. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1894) 397 [Wickstroemia]. — China.

gynopoda, Maxim. ex Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 52 [Wickstroemia]. — Japon.

linoides, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1894) 398. — China.

micrantha, Hemsl. l. c. 399. — China.

obovata, Hemsl. l. c. 400. — Ins. Luchu.

stenantha, Hemsl. l. c. — China.

villosa, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 386. — Ins. Sandvic.

WILBRANDIA, Silva Manso (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 1230.

Glaziovii, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 354. — Bras.

WILCKIA, Scop. = **Malcomia**, R. Br. (Crucif.).

africana, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 215 = *M. africana*, R. Br.

angulifolia, Halácsy, l. c. 176 = *M. angulifolia*, Boiss. & Orph.

bassarana, Halácsy, l. c. 174 = *M. bassarana*, Petr.

bicolor, Halácsy, l. c. 172 = *M. bicolor*, Boiss. & Heldr.

chia, Halácsy, l. c. 176 = *M. chia*, DC.

confusa, Halácsy, l. c. 215 = *M. confusa*, Boiss.

flexuosa, Halácsy, l. c. 171 = *M. flexuosa*, Sibth. & Sm.

graeca, Halácsy, l. c. 172 = *M. graeca*, Boiss. & Sprun.

illyrica, Halácsy, l. c. 175. — Dalm.

hybrida, Halácsy, l. c. 176 = *Malcomia hybrida*, Hausskn.

hydraea, Halácsy, l. c. 176 = *M. hydraea*, Heldr. & Halácsy.

maritima, Halácsy, l. c. 176 = *M. maritima*, R. Br.

maritima, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, x. (1895) 175 = *praec.*

Pancicii, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 177 = *Malcomia Pancicii*, Adamovic.

parviflora, Halácsy, l. c. 215 = *M. parviflora*, DC.

serbica, Halácsy, l. c. 177 = *M. serbica*, Panc.

WILDPRETINA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 432 = **Ixanthus**, Griseb. (Gentian.).

viscosa, Kuntze, l. c. = *I. viscosus*, Griseb.

WILKESIA, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1031.

Grayana, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 220. — Ins. Sandvic.

WILLARDIA, J. N. Rose, in *Contr. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 97; Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 275. **LEGUMINOSAE.**

mexicana, S. Wats. *Il. cc.* 98; et 275. — Mexic.

WILLDENOWIA, Thunb. (Restiac.). — Ind. Kew. ii. 1231.

Ecklonii, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 525 (= *Anthochortus Ecklonii*, Nees).

— Afr. austr.

WILLEMETIA, Neck. = **Chondrilla**, Thunb. (Compos.).
stipitata, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 108; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 370 = *C. apargioides*, Jacq.

WILLKOMMIA, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 145. **GRAMINEAE**.
annua, Hack. l. c. 146. — Afr. austro-occ. extratrop.
sarmentosa, Hack. l. c. 145. — Afr. austro-occ. extratrop.

WILLOUGHBYA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 371 = **WILLUGHBAEYA**, Neck. = **Mikania**, Willd. (Compos.).

acuminata, *amazonica*, *angularis*, *angulata*, *armigera*, *aspera*, *attenuata*, *Badiery*, *Banisteria*, *bogotensis*, *brachiata*, *bracteosa*, *Burchellii*, *callineura*, *campanulata*, *Candolleana*, *caudata*, *Charua*, *chlorolepis*, *cissampelina*, *coarctata*, *conferta*, *confertissima*, *cordifolia*, *coriacea*, *corydalifolia*, *dentata*, *discolor*, *divaricata*, *erioclada*, *eriophora*, *estrellensis*, *firmula*, *fulva*, *Gabrieli*, *glauca*, *glomerata*, *gracilis*, *Hackeana*, *hastata*, *hastifolia*, *hemisphaerica*, *hirsutissima*, *hispidula*, *Houstonia*, *Imrayana*, *itambana*, *lagoensis*, *lanuginosa*, *latifolia*, *laurifolia*, *laxa*, *leiolaena*, *lelostachya*, *leptotricha*, *ligustrifolia*, *Lindbergii*, *Lindleyana*, *linearifolia*, *longipes*, *loxensis*, *Lundiana*, *microcephala*, *microdonta*, *microlepis*, *microphylla*, *multinervia*, *myriocephala*, *neurocaula*, *nigricans*, *nitidula*, *nodosa*, *nodulosa*, *nummularia*, *obovata*, *obtusata*, *officinalis*, *ovalis*, *oxylepis*, *pachylepis*, *pannosa*, *parvifolia*, *pernambucensis*, *phaeoclados*, *pilosa*, *pinnatifida*, *Pohlana*, *populifolia*, *premnifolia*, *pteropoda*, *ramosissima*, *repanda*, *reticulata*, *retifolia*, *rotunda*, *rufa*, *rufescens*, *Ruiziana*, *salviacifolia*, *salmanniaefolia*, *sarcodes*, *scabrida*, *scandens*, *Selloi*, *sericea*, *sessilifolia*, *setigera*, *smilacina*, *speciosa*, *Sprucei*, *stipulacea*, *strobilifera*, *subverticillata*, *Swartziana*, *ternifolia*, *testudinaria*, *Tlalixcoyan*, *triangularis*, *trichophylla*, *Trinitaria*, *triphylla*, *variabilis*, *verticillata*, *vineana*, *vismiaefolia*, *vitifolia*, *Warmingii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 371-73 = *homonyma omnia* Mikaniae.
ambigua, Kuntze, l. c. 372 = *M. pentstemonoides*, DC.

argyrea, Kuntze, l. c. = *M. Argyreiae*, DC.
Andrachne, Kuntze, l. c. = *M. laevis*, DC.
argyrostigma, Kuntze, l. c. = *M. amara*, Willd.
auriculata, Kuntze, l. c. = *Senecio deltoideus*, Less.
Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 53. — Bolivia.
buddleiaefolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 372 = *Mikania buddleiaefolia*, DC.
chagalensis, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 47, in obs. = *M. chagalensis*, Hieron.
clavellata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 372 = *Ophryosporus Freyreissii*, Baker.
complanata, Kuntze, l. c. = *Mikania obovata*, DC.
corymbulosa, Kuntze, l. c. = *Kanimia corymbulosa*, Benth. & Hook. f.
diversifolia, Kuntze, l. c. = *Mikania biformis*, DC.
erithalina, Kuntze, l. c. = *Kanimia erythralina*, Benth. & Hook. f.
flavescens, Kuntze, l. c. = *Mikania nummularia*, DC.
Gardneriana, Kuntze, l. c. = *M. microcephala*, DC.
Glaziovii, Kuntze, l. c. = *M. Glaziovii*, Baker.
Guaco, Kuntze, l. c. = *M. amara*, Willd.
lasiandra, Kuntze, l. c. = *M. Lasiandrae*, DC.
Lehmannii, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 47, in obs. = *M. Lehmannii*, Hieron.
micrantha, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 211 = *M. micrantha*, H. B. & K.
Moronoa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 372 (= *Corynanthelium Moronoa*, Kunze). — Bras.
oblongifolia, Kuntze, l. c. = *Kanimia oblongifolia*, Baker.
odorata, Kuntze, l. c. = *Mikania fastuosa*, Lem.
parviflora, Kuntze, l. c. = *M. amara*, Willd.
platyphylla, Kuntze, l. c. = *M. Hookeriana*, DC.
polystachya, Kuntze, l. c. = *M. psilostachya*, DC.
resinosa, Kuntze, l. c. = *Eupatorium sordescens*, DC.
scabra, Kuntze, l. c. = *Mikania psilostachya*, DC.

WILLOUGHBYA: —

stipitata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 373 = *Mikania amara*, Willd.
strigosa, Kuntze, l. c. = *M. Lasiandrae*, DC.
Tafallana, Kuntze, l. c. = *M. amara*, Willd.
tenuiflora, Kuntze, l. c. = *Eupatorium patens*, Hook. & Arn.
ternata, Kuntze, l. c. 372 = *Mikania apiifolia*, DC.
teucrifolia, Kuntze, l. c. 373 = *Eupatorium Gaudichaudianum*, DC.
thapsodes, Kuntze, l. c. = *Kanimia thapsoides*, Benth. & Hook. f.
Vauthieriana, Kuntze, l. c. = *Mikania Vauthieriana*, Baker.
viscosa, Kuntze, l. c. = *Symphopappus viscosus*, Sch. Bip.

WILLUGHBEIA, Roxb. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1231.
dulcis, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 319. — Penins. Mal.
globosa, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 46 [Willughbaeya]. — Guatem.

WILSONIA, R. Br. (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 1231.
ovalifolia, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 532, in obs. — Austral.
sericea, Hallier f. l. c. — Austral.

WIMMERIA, Schlecht. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 1231.
cyclocarpa, Radlk. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 199. — Guatem.

WINCHIA, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1231.
glaucescens, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 125 = *calophylla*, A. DC.

WINDMANNIA, P. Br. = **Weinmannia**, Linn. (Saxifr.).

affinis, *Babbsiana*, *Biagiana*, *bifida*, *Blumei*, *Bojeriana*, *cinerea*, *comorensis*, *cordata*, *crassifolia*, *crenata*, *decora*, *dichotoma*, *discolor*, *dryadifolia*, *elliptica*, *eriocarpa*, *fraxinea*, *glomerata*, *Hackeana*, *heterophylla*, *hirtella*, *Horsfieldii*, *humilis*, *intermedia*, *lachnocarpa*, *Landsbergiana*, *latifolia*, *laurina*, *Lechleriana*, *lentiscifolia*, *macrophylla*, *microphylla*, *organensis*, *ovata*, *parviflora*, *parvifolia*, *paulliniaefolia*, *pinnata*, *pubescens*, *racemosa*, *reticulata*, *rhodoxylon*, *Richtii*, *rubifolia*, *Rutenbergii*, *samoensis*, *serrata*, *sorbifolia*, *Spruceana*, *subsessiliflora*, *sulcata*, *sundana*, *ternata*, *tinctoria*, *tomentosa*, *Trianaea*, *trichosperma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = *homonyma omnia* Weinmanniae.
auriculifera, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 22, in obs. = *Wein. auriculifera*, Hieron.
Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 26. — Bolivia.
Bentharii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = *Geissois Bentharii*, F. Muell.
Boiviniana, Kuntze, l. c. = *Weinmannia tinctoria*, Sm.
Engleriana, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 24 = *Wein. Engleriana*, Hieron.
fagarodes, Kuntze, l. c. = *Wein. fagaroides*, H. B. & K.
glabra, Kuntze, l. c. = *Wein. pinnata*, Linn.
Glazioviana, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1893) 16 = *Wein. Glazioviana*, Taub.
guanacasana, Hieron. l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) = *Wein. guanacasana*, Hieron.
guianensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = *Wein. guyanensis*, Klotzsch.
Hildebrandtii, Kuntze, l. c. = *Wein. Hildebrandtii*, Baill.
Lehmannii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 21, in obs. = *Wein. Lehmannii*, Hieron.
madagascariensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = *Wein. mauritiana*, D. Don.
nitida, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 23 = *Wein. nitida*, Hieron.
paniculosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = *Ackama Muelleri*, Benth.

WINDMANNIA: —

popayanensis, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 26, in obs. = *Weinmannia popayanensis*, Hieron.
Riviniiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = *Wein. tinctoria*, Sm.

WINKLERA, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 617; Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 206. **CRUCIFERAE**.
patrinoides, Regel, l. c. — Turkest.

WISSADULA, Medic. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 1232.
andina, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 153. — Bolivia.
Balsanae, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 69. — Parag.
decora, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 312. — Bras.
divergens, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 63 = *divergens*, Benth.
ferruginea, Garcke & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 443 (= *Sida ferruginea*, DC.). — Peruvia.
Gymnanthemum, K. Schum. l. c. 446. — Reg. Argent.
nudiflora, Garcke, in Zeitschr. Naturw. (1890) 123 = *stellata*, K. Schum.
patens, Garcke, l. c. (= *Abutilon patens*, A. St Hil.). — Bras.
Pringlei, J. N. Rose, in Contr. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 312. — Mexic.
stellata, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 446 (= *Sida stellata*, Cav.). — Peruv.

WISTARIA, Nutt. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1232.
Maideniana, F. M. Bailey, ex C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 517. — Austral.

WITHANIA, Pauq. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 1232.
Holstii, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 351. — Afr. trop. or.
melanocystis, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 171. — Mexic.

WITSENIA, Thunb. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1233.
binata, Klatt, ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 172 (= *Nivenia binata*, Klatt). — Afr. austr.

WITTMACKANTHUS, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 302 = **Pallasia**, Klotzsch (Rubiace.).
Stanleyanus, Kuntze, l. c. = *P. Stanleyana*, Klotzsch.

WITTMACKIA, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 274 = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).
lingulata, Mez, l. c. 275 = *A. lingulata*, Baker.
odora, Mez, l. c. 277 = *A. odora*, Baker.
patentissima, Mez, l. c. 278 = *A. patentissima*, Baker.

WITTROCKIA, Lindm. in Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. xxiv. 8 (1891) 20, t. 2 fig. 13-21. **BROMELIACEAE**.
superba, Lindm. l. c. — Bras.

WOODIA, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 30. **ASCLEPIADEAE**.
trifurcata, Schlechter, l. c. — Afr. austr.
trilobata, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 387. — Afr. trop. or.
verruculosa, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 31. — Afr. austr.

WORMIA, Rottb. (Dillen.). — Ind. Kew. ii. 1233.
Kunstleri, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 366. — Penins. Mal.
longepetiolata, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 378. — N. Guin.
luzoniensis, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 36. — Ins. Philipp.
Macdonaldi, F. Muell. in Vict. Natural. ii. (Mar. 1886) 146 [err. typ. 134]; et ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 114. — N. Guin.

WORMIA : —

meliosmaefolia, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) 11. 365. — Penins. Mal.

WORMSKIOLDIA, Thonn. (Turner.). — Ind. Kew. ii. 1235.

Schinzii, Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 156. — Afr. trop. austro-or.

WRIGHTIA, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1234.

Baccelliana, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Mar. 1892) 178; et in *Bot. Centralbl.* l. (1892) 126. — Austral.

Millgar. F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* vii. (1893) 65. — Austral.

parviflora, Stapf, in *Kew Bull.* (1894) 121; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2345. — Afr. trop. occ.

Stuhlmannii, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 319; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 183. — Afr. trop. or.

WULFENIA, Jacq. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1234.

alpina, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 83 = *Synthyris alpina*, A. Gray.

cordata, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 280 = *S. reniformis*, Benth. var.

Houghtoniana, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 83 = *S. Houghtoniana*, Benth.

pinnatifida, Greene, l. c. = *S. pinnatifida*, S. Wats. *plantaginea*, Greene, l. c. = *S. plantaginea*, Benth. *rotundifolia*, Greene, l. c. 82 = *S. rotundifolia*, A. Gray.

rubra, Greene, l. c. 83 = *S. rubra*, Benth.

WULFFIA, Neck. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1234.

baccata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 373 = *stenoglossa*, DC.

WULLSCHLAEGELIA, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1234.

Ulaei, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 244. — Bras.

WUNDERLICHIA, Riedel (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1234.

Crulsiana, Taub. in *Cruls, Relat. Commiss. explor. Platanalto centr. Braz.* (1894) 365. — Bras.

WURMBEA, Thunb. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1234.

spicata, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 413 = *capensis*, Thunb.

WYETHIA, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1234.

mexicana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 154. — Mexic.

X

XANTHERANTHEMUM, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 54; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 321. **ACANTHA-CEAE**.

igneum, Lindau, l. c. (= *Chamaeranthemum igneum*, Regel). — Peruvia.

XANTHIUM, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1235.

Nigri, Ces. & Passer, & Gibelli, *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 437. — Italia.

XANTHOCEPHALUM, Willd. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1235.

californicum, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 171. — Calif.

XANTHOCEPHALUM : —

lucidum, Greene, *Pittonia*, ii. (Aug. 1892) 282. — Calif.
tomentellum, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 172. — Mexic.

XANTHOCHYMUS, Roxb. = **Garcinia**, Linn. (Guttif.).

lanceolatus, Thw. ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 311, in syn. = *Garcinia spicata*, Hook. f. var.

novo-guineensis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 381. — N. Guinea.

XANTHOPAPPUS, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 10. **COMPOSITAE**.

subacaulis, C. Winkl. l. c. 11. — China.

XANTHOPHYLLUM, Roxb. (Polygal.). — Ind. Kew. ii. 1236.

andamanicum, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) 11. 135. — Ins. Andam.

bullatum, King, l. c. 142. — Malaya.

Curtisii, King, l. c. 138. — Malaya.

Hookerianum, King, l. c. 139. — Malaya.

Kunstleri, King, l. c. — Malaya.

pulchrum, King, l. c. 141. — Malaya.

Scortechinii, King, l. c. 140. — Malaya.

sulphureum, King, l. c. 143. — Malaya.

Wrayi, King, l. c. 138. — Malaya.

XANTHOPHYTUM, Reinw. ex Blume (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1236.

Villarii, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 150. — Ins. Philip.

XANTHORRHOEA, Sm. (Junc.). — Ind. Kew. ii. 1236.

Thorntoni, Tate, in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 82, nomen. — Austral.

XANTHOSOMA, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 1236.

maculatum, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 224. — Form. hort.

XANTHOSTEMON, F. Muell. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 1236.

ciliatum, Niedenzu, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 88 (= *Fremya ciliata*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

elegans, Niedenzu, l. c. 88 (= *F. elegans*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

oppositifolius, F. M. Bailey, *Cat. indig. and natur. Pl. Queensl.* Add. (1890) 109. — Austral.

ruber, Niedenzu, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 88 = *ruber*, Panch. & Sebert.

Vieillardii, Niedenzu, l. c. (= *Fremya Vieillardii*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

XANTHOXYLUM, J. F. Gmel. = **Zanthoxylum**, Linn. (Rutac.).

Fagara, Sarg. in Gard. and For. ii. (1890) 186; et in N. Am. Sylv. i. (1892) 73, t. 32 = *Z. Fagara*, Sarg.

XERAEA, Linn. Syst. ed. 1 (1735) = **Gomphrena**, Linn. (Amarant.).

acaulis, *affinis*, *agrestis*, *albiflora*, *angustiflora*, *aphylla*, *arborescens*, *argentina*, *Blanchettii*, *boliviana*, *brachystylis*, *Brownii*, *caespitosa*, *canescens*, *Clausenii*, *conferta*, *conica*, *cylindrica*, *debilis*, *decipiens*, *decumbens*, *demissa*, *desertorum*, *diffusa*, *duriuscula*, *elegans*, *eriphylla*, *fallax*, *flaccida*, *Gardneri*, *globosa*, *graminea*, *Haenkeana*, *Hilariana*, *humilis*, *hygrophila*, *incana*, *lanceifolia*, *lanigera*, *leptoclada*, *leucocephala*, *Lundii*, *macrocephala*, *macrorhiza*, *marginata*, *Martiana*, *microcephala*, *mollis*, *mucronata*, *nigricans*, *nitida*, *oligocephala*, *parviflora*, *perennis*, *pilosa*, *platandra*, *Pohlui*, *prostrata*, *pulchella*, *pumila*, *pungens*, *pusilla*, *Regeliana*, *Riedelii*, *rudis*, *scapigera*, *Sellowiana*, *sericantha*, *serrata*, *Sonora*, *tenella*, *tuberifera*, *umbellata*, *virgata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 543 = *homonyma omnia* Gomphrenae
argenteosericea, Kuntze, l. c. 543 = *Hebanthe argenteosericea*, Benth. & Hook. f.

XERAEA : —

capitata, Kunze, Rev. Gen. (1891) 545 = *Gomphrena rupestris*, Nees.

celosioides, Kuntze, l. c. = *G. celosioides*, Mart.

Clausenii, Kuntze, l. c. = *G. Clausenii*, Moq.

flaginoides, Kuntze, l. c. = *G. flaginoides*, Martens & Gal.

holosericea, Kuntze, l. c. 543 = *Hebanthe holosericea*, Mart.

Maitlandii, Kuntze, l. c. 545 = *Gomphrena Maitlandii*, F. Muell.

Moquinii, Kuntze, l. c. = *G. Moquini*, Seub.

paniculata, Kuntze, l. c. = *Hebanthe paniculata*, Benth. & Hook. f.

phagnalodes, Kuntze, l. c. = *Gomphrena phagnaloides*, Griseb.

Piercii, Kuntze, l. c. = *G. Pearcei*, Oliver.

rhodantha, Kuntze, l. c. = *G. rodantha*, Moq.

Schlechtendahlia, Kuntze, l. c. = *G. Schlechtendahlia*, Mart.

vaga, Kuntze, l. c. 543 = *Hebanthe vaga*, Benth. & Hook. f.

villosa, Kuntze, l. c. 545 = *Gomphrena perennis*, Linn.

XEROCHLAMYS, Baker (Chlaenac.). — Ind. Kew. ii. 1238.

pubescens, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 296. — Madag.

XEROCHLOA, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1238.

littoralis, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1892) 1019 (= *Kerinozoma littoralis*, Steud.). — Java.

XEROCLADIA, Harv. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1238.

viridiramis, Taub. in *Bot. Centralbl.* xlvii. (1891) 395 = *X. Zeyheri*, Harv.

XEROCOCCUS, Oerst. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1238.

Lindenii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 285. — Mexic.

XEROPHYTA, Juss. = **Vellozia**, Vand. (Amaryll.).

Bakeri, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 270 = *V. villosa*, Baker.

Hildebrandtii, Th. Dur. & Schinz, l. c. 271 = *Barbacenia Hildebrandtii*, Pax.

humilis, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *Vellozia humilis*, Baker.

mollissima, Th. Dur. & Schinz, l. c. — Transvaal.

scabrida, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *Barbacenia scabrida*, Pax.

tomentosa, Th. Dur. & Schinz, l. c. 272 = *B. tomentosa*, Pax.

XEROSPERMUM, Blume (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1238.

cochinchinense, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 21 (1895) t. 321a (= *Nephelium cochinchinense*, Pierre). — Cochinch.

glabratum, Pierre, l. c. sub t. 322 = *glabrum*, Pierre.

glabrum, Pierre, l. c. sub t. 322a. — Cochinch.

macrophyllum, Pierre, l. c. sub t. 321b. — Cochinch.

microcarpum, Pierre, l. c. Fasc. 20 (1894) t. 320b. — Cochinch.

Thorelii, Pierre, l. c. t. 320a (= *Cnemidesia Thorelii*, Pierre). — Cochinch.

XEROTIA, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2359. **CARYOPHYLLEAE**.

arabica, Oliver, l. c. — Arabia.

XIMENIA, Plum. ex Linn. (Olacin.). — Ind. Kew. ii. 1239.

gabonensis, Baill. ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 834. — Gabon.

XOLISMA, Rafin. = **Andromeda**, Linn. (Ericac.).

ferrugineum, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 153, in obs. = *Lyonia ferruginea*, Nutt.

fruticosum, Nash, l. c. — Florida.

ligustrina, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club. iv. (1894) 135 = *Lyonia paniculata*, Nutt.

XUAREZIA, Ruiz & Pav. = **Capraria**, Tourn. (Scrophul.).
frutescens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 = *C. saxifragaefolia*, Cham. & Schlecht.
hirsuta, Kuntze, l. c. = *C. biflora*, Linn.
semiserrata, Kuntze, l. c. = *C. semiserrata*, Vahl.

XYLANCHE, G. Beck, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv.3b (1893) 132. **OROBANCHEAE**.
himalaica, G. Beck, l. c. (= *Boschniakia himalaica*, Hook. f. & Thoms.). — Reg. Himal.

XYLIA, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1240.
xylocarpa, Taub. in Bot. Centralbl. xvii. (1891) 395 = *dolabriformis*, Benth.

XYLOBIMUM, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1240.
corrugatum, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 458 (= *Maxillaria corrugata*, Lindl.). — Venezuela.
discolor, Nichols, Dict. Gard. iv. (1887) 225. — Jamaica.
foveatum, Nichols, l. c. — Guiana.
leontoglossum, Benth. ex Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 458; et in Bot. Mag. (1889) t. 7085 (= *Maxillaria leontoglossa*, Reichb. f.). — N. Granat.
pallidiflorum, Nichols, Dict. Gard. iv. (1887) 225; Pfister, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 163; Rolfe, in Kew Bull. (1893) 278 (= *M. pallidiflora*, Hook.). — Am. trop.
varicosum, Rolfe, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 262 (= *M. varicosa*, Reichb. f.). — Bolivia.

XYLON, Linn. = **Eriodendron**, DC. (Malv.).
Burchellii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 75 (= *Ceiba Burchellii*, K. Schum.). — Bras.
erianthos, Kuntze, l. c. = *Eriodendron leiantherum*, DC.
hypoleucum, Kuntze, l. c. = *E. hypoleucum*, Spruce.
jasminodorum, Kuntze, l. c. = *E. jasminodorum*, St Hil.
microphyllum, Kuntze, l. c. (= *Ceiba microphylla*, K. Schum.). — Bras.
pentandrum, Kuntze, l. c. = *Eriodendron anfractuosum*, DC.
phaeosanthum, Kuntze, l. c. = *E. phaeosanthum*, Decne.
pubiflorum, Kuntze, l. c. = *E. pubiflorum*, St Hil.
Rivieri, Kuntze, l. c. = *E. Rivieri*, Decne.
Samauma, Kuntze, l. c. = *E. Samauma*, Mart.

XYLOPHYLLLOS, Rumpf, Herb. Amboin. vii. (1755) 19 t. 12; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 589 = **Exocarpus**, Labill. (Santal.).
aphyllus, Bidwillii, cupressiformis, Gaudichaudii, homalodadus, humifusus, latifolius, nanus, odoratus, Rolfianus, sparteus, strictus, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Exocarpi.
phyllanthoides, Kuntze, l. c. = *E. phyllanthoides*, Endl.

XYLOPIA, Linn. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 1240.
Curtisii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) II. 116. — Penang.
Eminii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 179. — Afr. trop. or.
olivacea, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) II. 119. — Penins. Mal.
pyrifolia, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 179. — Afr. trop. or.
Ridleyi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) II. 121. — Penins. Mal.
Scortechinii, King, l. c. 118; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iv. I. (1893) 149, t. 195. — Penang.
s'enopetala, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxi. (1887) t. 1563. — Penang.

XYLOPICRUM, P. Br. = **Xylopia**, Linn. (Anonac.).
acuminatum, acutiflorum, aethiopicum, africanum, aromaticum, barbatum, brasiliense, caudatum, Championii, dicarpum, ellipticum, emarginatum, frutescens, fuscum, grandiflorum, ligustrifolium, longifolium, magnum, Maingayi, nigricans, nitidum, ochranthum, odoratissimum, parvifolium, Pierrei, polycarpum, pustulatum, rubescens, Spruceanum, Thomsonii, Vie-

XYLOPICRUM: —
lana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 8 = *homonyma omnia* Xylopieae.
acutum, Kuntze, l. c. (= *Habzelia acuta*, Miq.). — Java.
carminativum, Kuntze, l. c. = *Xylopia sericea*, A. St Hil.
malayanum, Kuntze, l. c. = *X. ferruginea* Spruce.
neglectum, Kuntze, l. c. = *X. parviflora*, Valtot.
oxyacanthum, Kuntze, l. c. = *X. oxyantha*, Hook. f. & Thoms.
parviflorum, Kuntze, l. c. = *X. Dunaliana*, Valtot.
Richardii, Kuntze, l. c. = *X. Richardi*, Boiv.
sumatranum, Kuntze, l. c. = *X. malayana*, Hook. f. & Thoms.
truncifolium, Kuntze, l. c. = *X. trunciflora*, Cham. & Schlecht.

XYLOPLEURUM, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).
roseum, Raimann, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 214 = *O. rosea*, Ait.
speciosum, Raimann, l. c. = *O. speciosa*, Nutt.
tetrapterum, Raimann, l. c. = *O. tetraptera*, Cav.

XYLOSMA, Forst. f. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 1241.
celastrinum, H. B. & K. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44, in syn. = *Myroxylon citrinum*, Kuntze.
Pringlei, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 164; et xxvii. (1893) 166. — Mexic.
quichense, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 197. — Guatem.

XYLOSTEUM, Rupp. = **Lonicera**, Linn. (Caprifol.).
Philomelas, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 257 = *L. gracilipes*, Miq.

XYLOTHERMIA, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 188 = **Pickeringia**, Nutt. (Compos.).
montana, Greene, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 108 = *P. montana*, Nutt.

XYMALOS, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 650. **BIXINEAE**.
monospora, Baill. l. c.; Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 53 (= *Xylosma monospora*, Harv.). — Afr. austr.

XYRIS, Gronov. ex Linn. (Xyrid.). — Ind. Kew. ii. 1242.
Augusto-Coburgi, Szyszyl. ex G. Beck, Itin. Princ. Sax. Coburg. ii. (1888) 94 t. 14. — Bras.
Bakeri, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. [Ueb. Afr. Art. Gatt. Xyris] (1891) 157; et in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 30. — Madag.
congensis, Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 71. — Congo.
conifera, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 40 = *iridifolia*, Chapm.
cristata, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 56 t. 3. — Bras.
cubana, Alb. Nilsson, l. cc. 27 t. 3 fig. 4. — Cuba.
fascicularis, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 39 = *serotina*, Chapm.
filifolia, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1891) 43. — Bras.
foliolata, Alb. Nilsson, l. cc. 65. — Angola.
fusca, Alb. Nilsson, l. cc. 57 t. 3. — Bras.
glabra, Engelm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 37 = *flexuosa*, Muehl.
Glaziowii, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 61 t. 6 fig. 7. — Bras.
glandulacea, Alb. Nilsson, l. cc. 50 t. 3. — Bras.
globosa, Alb. Nilsson, l. cc. 57 t. 3. — Venezuela.
graminifolia, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 40 = *caroliniana*, Walt.
Hildebrandtii, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. [Ueb. Afr. Art. Gatt. Xyris] (1891) 155; et in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 31. — Madag.

XYRIS: —
laevigata, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. (1891) 155; et in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. xxiv. (1892) 50 t. 3. — Bras.
longiscapa, Alb. Nilsson, l. c. 59 t. 4. — Bras.
mexicana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 163. — Mexic.
montana, H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 38. — Am. bor.
natalensis, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. (1891) 157; et in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Ueb. Stud. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 28. — Afr. austr. et austro-or.
neglecta, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1891) 45. — Bras.
neglecta, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 300. — Florida.
nigricans, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] (1891) 60, t. 5. — Bras.
nilagarensis, Steud. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 265, in syn. = *scheuroides*, Mart.
nitida, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. (1891) 156; et in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. (1892) 30. — Afr. trop. oc.
obtusiuscula, Alb. Nilsson, l. cc. (1892) 47 t. 2 (= *X. asperula*, Seub.). — Bras.
partita, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 39 = *communis*, Kunth.
Regnellii, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. xxiv. n. 14 (1892) 43 t. 2. — Bras.
Rehmanni, Alb. Nilsson, l. cc. 28. — Transvaal.
rigida, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 40 = *iridifolia*, Chapm.
scirpoides, Chapm. ex H. Ries, l. c. 36 = *flabelliformis*, Chapm.
setigera, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 285 t. 50 fig. 1-8 (Oliver, ex im Thurn, in Timchri, v. (1886) 207). — Bras.; Guian. angl.
Seubertii, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1891) 51 t. 4. — Guian. angl.
simulans, Alb. Nilsson, l. cc. 47 t. 2. 6. — Bras.
Smalliana, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 159. — Florida.
stenophylla, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 42 = *Baldwiniana*, Roem. & Schult.
stenophylla, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1891) 46 t. 2 fig. 2a, 2d. — Bras.
straminea, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. [Ueb. Afr. Art. Gatt. Xyris] (1891) 153; et l. c. (1891) 40. — Afr. trop. occ.
teres, Alb. Nilsson, l. cc. xxiv. n. 14 (1891) 44 t. 1, fig. 2, 2a, b. — Bras.
triquetra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 719. — Ins. Trinit.
Umbilonis, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 30. — Natal.
ustulata, Alb. Nilsson, l. c. 28. — Austral.
witsenioides, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 285 t. 50b. Oliver, ex im Thurn, in Timchri, v. (1886) 207]. — Guian. angl.

XYSMALOBIMUM, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1243.
angolense, S. Elliot, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 365. — Angola.
bellum, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 69. — Afr. trop.
Carsoni, N. E. Br. l. c. (1895) 250. — Afr. trop.
confusum, S. Elliot, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 363. — Natal.
decipiens, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 250. — Angola.
dissolutum, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 119. — Afr. trop.
ensifolium, Burch. ex S. Elliot, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 364 = *undulatum*, R. Br.
fraternum, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 252. — Afr. trop.
fritillarioides, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 162. — Angola.

XYSMALOBIMUM : —

- Gerrardi, *S. Elliot*, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 364. — Natal.
 Holubii, *S. Elliot*, l. c. 365. — Angola.
 membraniferum, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 251. — Sierra Leone.
 padifolium, *S. Elliot*, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 363 (= *Gomphocarpus padifolius*, Baker). — Afr. austr. parviflorum, *Harv. ex S. Elliot*, l. c. — Afr. austr. et austro-or.
 prismatostigma, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 120. — Afr. trop.
 reticulatum, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 251. — Afr. trop.
 rhomboideum, *N. E. Br.* l. c. — Angola.
 spurium, *N. E. Br.* l. c. — Zambesia.
 stockenstromense, *S. Elliot*, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 364. — Afr. austr.

Y

- YATABEA**, Maxim. ex Yatabé, in *Tokyo Bot. Mag.* v. (1891) 281; et *Icon. Fl. Japon.* i. II. (1893) t. 22 = **Ranzania**, *T. Ito* (Berberid.).
japonica, Maxim. II. cc. = *R. japonica*, Maxim.
YERVAMORA, Ludw. *Defin. pl.* (1737) 126, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 545 = **Bosia**, Linn. (Amarant.).
canariensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 545 = *B. Yervamora*, Linn.

- YPSILANDRA**, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 93. **LILIACEAE**.
thibetica, Franch. l. c. 94. — Tibet.

- YUCCA**, Dill. ex Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1243. australis, *Trelease*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 436. — Mexic., Texas.
Carrierei X, *Ed. André*, in *Rev. Hort.* lxxvii. (1895) 81, fig. 21-23. — Hybr. artef.
Eleana, Hort. ex W. Wats. in *Kew Bull.* (1889) 304 = *guatemalensis*, Baker.
Hanburii, Baker, in *Kew Bull.* (1892) 8; et *ex Gard. Chron.* (1892) i. 749. — Am. bor. [Mont. Scopul.].
Mazlii, Hort. ex W. Wats. in *Kew Bull.* (1889) 304 = *guatemalensis*, Baker?
valida, *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 208 t. 11. — Calif.

Z

- ZAA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1887) 691; et *Hist. des pl.* x. (1888) 58. **BIGNONIA-CEAE**.
ilicifolia, Baill. II. cc. (= *Tabebuia ilicifolia*, DC.). — Madag.

- ZACZATEA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 806 [sphalm. 86]; et *Hist. des pl.* x. (1890) 295. **ASCLEPIADEAE**.
angolensis, Baill. II. cc. — Angola.

- ZALACCA**, Rumpf (Palm.). — Ind. Kew. ii. 1244. Beccarii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 474. — Rangoon.
borneensis, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 68. — Borneo.
dubia, Becc. l. c. — Hab.?
nitida, *Bull. Cat.* (1886) 9, ex Becc. l. c. in obs. — Afr. trop. occ.
vermicularis, Becc. l. c. 66. — Borneo.

- ZALUZANIA**, Pers. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1244. discoidea, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 388. — Mexic.
resinosa, *S. Wats.* l. c. xxv. (1890) 153. — Mexic.

- ZALUZIANSKYA**, F. W. Schmidt (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1245.
Aschersoniana, *Schinz*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 190 [Zaluzanskia]. — Afr. austro-occ. extratrop.

- ZANNICHELLIA**, Mich. ex Linn. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 1246.
cyclostigma, Clavaud, in *Act. Soc. Linn. Bord.* xlii. (1888) p. lxvii; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. I. (1893) 20 = *palustris*, Linn.
indica, « Cham. » ex *Morong*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii (1886) 159. — Ins. Luchu.
lingulata, Clavaud, in *Act. Soc. Linn. Bord.* xlii. (1888) p. lxviii; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. I. (1893) 20 = *palustris*, Linn.

- ZANTEDESCHIA**, Spreng. = **Richardia**, Kunth (Aroid.).
Lutwychei, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 477 = *R. Lutwychei*, *N. E. Br.*

- ZANTHOXYLUM**, Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 1246.
chalybeum, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 227. — Afr. trop. or.
costaricense, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 190 = *Z. Limoncello*, *Planch. & Oerst.*
dimorphophyllum, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 150. — China.
dissitum, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 106. — China.
diversifolium, *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 339. — N. Guin.
echinocarpum, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 149. — China.
Fagara, Sarg. in *Gard. and For.* iii. (1890) 186 = *Z. Pterota*, *H. B. & K.*
foliolosum, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) i. [Xanthoxylum]; et *Enum. Pl. Guatem.* iv. (1895) 17. — Guatem.
fraxinoides, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 148. — China.
glandulosum, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 74. — Ins. Sandvic.
hawaiiense, *Hillebr.* l. c. 76. — Ins. Sandvic.
laetum, *Drake*, in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 274. — Tonk.
madagascariense, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 303. — Madag.
micranthum, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 147. — China.
multijugum, Franch. *Pl. Delav.* i. (1889) 124. — China occ.
Nadeaudi, *Drake*, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 130; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 24. — Ins. Pacif.
oahuense, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 75. — Ins. Sandvic.
olitorium, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 227. — Afr. trop. or.
Piasezkii, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 93. — China.
podocarpum, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 107. — China.
Pringlei, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi (1891) 134 [Xanthoxylum]. — Mexic.
rhetsoides, *Drake*, in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 275. — Tonk.
setosum, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 107. — China.
shikokianum, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 51. — Japon.
stenophyllum, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 147. — China.
Stuhlmannii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 227. — Afr. trop. or.
undulatifolium, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 144. — China.
usitatum, *Pierre*, ex *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 304. — Cochinch.
veneficum, *F. M. Bailey*, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* i. (1886) 11. — Austral.

- ZAPATERIA**, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan. i.* (1887) 17 [conf. Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1892) 134, in obs.] = **Ballota**, Linn. (Labiata.).
hirsuta, Pau, II. cc. = *B. hirsuta*, *Benih.*

- ZAUSCHNERIA**, Presl (Onagrar.). — Ind. Kew. ii. 1248.
cana, *Greene. Pittonia*, i (Feb. 1887) 28. — Calif.
latifolia, *Greene*, l. c. 25; et *Man. Bot. San Franc.* Bay (1894) 131 = *californica*, Presl, var.
tomentella, *Greene*, l. c. 26. — Am. bor. occ.
villosa, *Greene*, l. c. 27. — Calif.

- ZEAL**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1248.
canina, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1861) 160. — Mexic.

- ZEBRINA**, Schnizl. (Commelin.). — Ind. Kew. ii. 1248.
pumila, *Greene, Pittonia*, (Jan. 1888) 157. — Mexic.

- ZELKOVA**, Spach (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1249.
carpinifolia, Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 38; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 136 = *crenata*, Spach
japonica, Dippel, l. c. 39, fig. 13. — Japon.
Keaki, Dippel, l. c. 40; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 137 = *acuminata*, Planch.

- ZENKERELLA**, Taub. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii 3 (1894) 386. **LEGUMINO-SAE**.
citrina, Taub. l. c. — Kamerun.

- ZENOBIA**, D. Don (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 1249.
cassinifolia, Pollard, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 231 = *speciosa*, D. Don.
pulverulenta, Pollard, l. c. 232 = *speciosa*, D. Don?

- ZEPHYRANTHES** Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 1249.
albicans, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 38 (= *Pyrolirion albicans*, Herb.). — Peruvia.
Andersoni, Baker, l. c. 37 (= *Habranthus Andersoni*, Herb.). — Urug.
andicola, Baker, l. c. 36 (= *H. andicola*, Herb.). — Chili.
arenicola, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 205. — Calif.
Bakeriana, *Morong*, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii (1893) 239. — Parag.
aurea, Baker, *Handb. Amaryll.* 37 (= *Pyrolirion aureum*, Herb.). — Peruvia.
boliviensis, Baker, l. c. 38. — Bolivia.
cearensis, Baker, l. c. 36. — Bras.
coerulea, Baker, l. c. 37 (= *Amaryllis coerulea*, Griseb.). — Urug.
entreriana, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 320 (= *Amaryllis entreriana*, O. Hoffm.). — Parag.
erubescens, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 162. — Mexic.
flammea, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 37 (= *Pyrolirion flammeum*, Herb.). — Peruvia.
flava, Nichols, *Dict. Gard.* iv. (1887) 239 (= *Pyrolirion flavum*, Herb.). — Peruvia.
flava, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 37 = *praec. franciscana*, Herb. ex Baker, l. c. 36. — Bras.
gracilifolia, Baker, l. c. (= *Habranthus gracilifolius*, Herb.). — Urug.
Hieronymi, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 320, 324. — Reg. Argent.
lactea, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 495. — Bras.
longistyla, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 320, 323. — Reg. Argent.
macrosiphon, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 35. — Mexic.
mendocensis, Baker, l. c. 36. — Reg. Argent.
pulchella, J. D. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1893) 114 t. 52. — Texas.
robusta, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 35 (= *Habranthus robustus*, Herb.). — Urug.
sylvatica, Baker, l. c. 35 (= *H. sylvaticus*, Herb.). — Bras.

ZEPHYRANTHES : —

versicolor, *Baker, Handb. Amayll.* (1888) 35 (= *Hybanthus versicolor*, Herb.). — Bras.
Tauberti, *Harms, in Gartenfl.* xlv. (1895) 386. — Am. Austr.
Wrightii, *Baker, Handb. Amayll.* (1888) 82. — Cuba.
xiphopetala, *Baker, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1896) 268. — Bolivia.

ZERUMBET, Wendl. = **Alpinia**, Linn. (Scitam.).
Autviani, Heckel, in *Le Naturaliste*, Sér. II. xiii. (1891) 293 fig. 10. — Congo gall.

ZEUXINE, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1250.
abbreviata, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 109; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1894) t. 2178 (= *Etaeria abbreviata*, Lindl.). — Ind. or.
affinis, *Benth. ex Hook. f. ll. cc.* 108; et t. 2277 (= *Monochilus affinis*, Lindl.). — Ind. or.
cochlearis, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 11. — Afr. austr.
elongata, *Rolfe, in Bolet. Soc. Brot.* ix. (1891) 142. — Ins. Princip.
formosana, *Rolfe, ex Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 258. — Ins. Form.
longifolia, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 109; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1894) t. 2180 (= *Hetaeria longifolia*, Benth.). — Reg. Himal.
moulmeinensis, *Hook. f. ll. cc.* 109; et t. 2179 (= *Etaeria moulmeinensis*, Parish & Reichb. f.). — Tenass.
plantaginea, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 312 (= *Monochilus plantagineus*, Reichb. f.). — Ins. Pacif.
reniformis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 107; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2183. — Perak.
stenophylla, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 312 (= *Monochilus stenophyllus*, Reichb. f.). — Ins. Pacif.
tetraptera, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 57 (= *M. tetrapterus*, Reichb. f.). — Afr. trop. occ.

ZEXMENIA, La Llave (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1258.
dulcis, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 99. — Guatem.
fruticosa, *J. N. Rose, in Contr. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 103. — Mexic.
guatemalensis, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 188. — Guatem.
phyllostegia, *Klatt, in Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 105. — Guatem.
tequilana, *A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 425. — Mexic.
virgulta, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 293. — Costa Rica.

ZILLA, Forsk. (Crucif.) — Ind. Kew. ii. 1251.
spinosa, *Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 175 = *myagroides*, Forsk.

ZIMAPANIA, Engl & Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1892) 119. **EUPHORBACEAE**.
Schiedeanum, *Engl. & Pax, l. c.* fig. 75. — Mexic.

ZINGIBER, Adans. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1251.
brevifolium, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1886) ii. 390. — Ins. Philipp.
Griffithii, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 246. — Malacca.
intermedium, *Baker, in Hook. f. l. c.* — Khasia.

ZINNIA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1251
australis, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* iii. (1891) 14. — Austral.
Liebmanni, « *Benth. & Hook. f.* » ex *Klatt, in Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 89. — Mexic.
Palmeri, *A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 423. — Mexic.
pauciflora, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 49. — Chile.

ZIZANIOPSIS, Doell & Aschers. = **Zizania**, Grönov. (Gramin.).
miliacea, Doell & Aschers. ex Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 40; Baill. Hist. pl. xii. (1893) 293 = *Z. miliacea*, Michx.

ZIZIA, Koch = **Carum**, Rupp. (Umbell.).
Bebbii, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, ii. (1890) 35, et v. (1894) 243. — Am. bor.

ZIZIFORUM, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1883) 144; et Epit. Fl. Eur. ii. (1894) 171 = **Ziziphora**, Linn. (Labiata.).

ZIZIPHORA, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 1252.
subcapitata, *Hauskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 67. — As. occ.
rigida, *H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 239 = *clinopodioides*, Bieb.

ZIZYPHUS, Tourn. ex Linn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 1252.
affinis, *Hemsl. in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1544. — Perak.
attoensis, « *Pierre* » ex Weberbauer, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 402 = *atopensis*, *Pierre*.
atopensis, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 20 (1894) t. 316a. — Cochinch.
cambodianus, *Pierre, l. c.* t. 315a. — Cochinch.
chloroxylon, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1862. — Jamaica.
Chloroxylum, *Oliver, in Kew Bull.* iii. (1889) 127, cum ic. = *praec.*
espinosus, *Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand* xxxii. (1890) 48. — Congo.
Harmandiana, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 20 (1894) t. 316b. — Cochinch.
Harmandii, « *Pierre* », ex Weberbauer, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 402, sphalm. = *praec.*
koaensis, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 20 (1894) t. 315b. — Cochinch.
oblongifolius, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 339. — Bras.
pubescens, *Oliver, in H. Johnston. Kilim. Exped. App.* (1886) 339, nomen, et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii.* (1887) 330. — Afr. trop. or.
sonorensis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1889) 44. — Mexic.

ZOEGEA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1253.
baldschuanica, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 426. — Buchara.

ZOELLERIA, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 28; *Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1895) 131. **BORAGINEAE**.
procumbens, *Warb. ll. cc.* — N. Guin.

ZOLLIKOFERIA, DC. = **Launaea**, Cass. (Compos.).
anomala, *Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 190. — Algeria.
arborescens, *Batt. l. c.* xxxv. (1888) 342, 891. — Algeria.
Bornmuelleri, *Hauskn. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 56. — As. occ.
elquiensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1895) 327. — Chili.
oligocephala, *Hauskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, v. (1894) 55. — As. occ.
secunda, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 923 (= *Microrhynchus secundus*, C. B. Clarke). — Afghan.
tapetodes, *Boiss. l. c.* 324. — Afghan.
tenuiloba, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 557 = *mucronata*, *Boiss.*

ZOLLINGERIA, Kurz (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1253.
dongnaiensis, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 634; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 21 (1895) t. 325a. — Cochinch.

ZOMBIANA, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 420; Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 360. — **MYOPORINEAE**.
africana, *Baill. ll. cc.* — Afr. trop. or.

ZOSTERA, Linn. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 1254.
latifolia, *Morong, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. ii. (1893) 63 = *pacifica*, *S. Wats.*
oregana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 131 = *marina*, *Linn.*
pacifica, *S. Wats. l. c.* — Am. bor. occ.

ZYGELLA, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 493, t. 34 fig. 1-13. **IRIDEAE**.
graminea, *S. Moore, l. c.* 494. — Bras.

ZYGOCACTUS, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. ii. (1890) 223 = **Epiphyllum**, Haw. (Cact.).
Altensteinii, *K. Schum. l. c.* 225 = *E. truncatum*, *Haw.*
truncatus, *K. Schum. l. c.* (1890) 224 = *E. truncatum*, *Haw.*

ZYGOCOLAX ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) i. 765. (Orchid.).
leopardinum ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1889) i. 809
Veitch, *Man. Orch. Pl.* ix. (1893) 66; *Will. Orch. Grow. Mun. ed.* 7 (1894) 758. — Hybr. artef.
Veitchii ×, *Rolfe, ll. cc.*; *Veitch, Man. Orch. Pl.* ix. (1895) 66 (= *Zygopetalum Veitchii* × *Veitch*). — Hybr. artef.

ZYGODIA, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1255.
kidengensis, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 318. — Afr. trop. or.
kindengensis, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 164 = *praec.*
urceolata, *Stapp, in Kew Bull.* (1894) 122. — Angola.

ZYCONA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 373. **COMPOSITAE**.
oppositifolia, *Kuntze, l. c.* — Venezuela.

ZYGONERION, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1888) 758; et Hist. des pl. x. (1888) 210; *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 174. **APOCYNACEAE**.
Welwitschii, *Baill. ll. cc.* — Angola.

ZYGOPETALUM, Hook. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1255.

Beaumontii, *Nichols. Dict. Gard.* iv. (1887) 245. — Bras.
caulescens, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1890) i. 544. — Bras.?
citrinum, *Nichols. Dict. Gard.* iv. (1887) 245; et *l. c.* (1888) 94. — Am. bor.
Crepeauxi, *Carr. in Rev. Hort.* lix. (1887) 420. — Bras.
Dormannianum, *Nichols. Dict. Gard.* iv. (1887) 245. — N. Granat.?
fimbriatum, *Nichols. l. c.* — N. Granat.
Gibeziae, *N. E. Br. in Lindenia*, iv. (1888) 79 t. 181. — Hab.?
graminifolium, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1892) ii. 179; et *l. c.* viii. (1892) 9 t. 339; *Veitch. Man. Orch. Pl.* ix. (1893) 52. — Bras.
Jorisanum, *Rolfe, in Lindenia*, v. (1889) 91 t. 237; et *l. c.* (1890) i. 704. — Venezuela.
leopardinum ×, *Hort. Veitch, ex Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) ii. 199, 712; *Nichols. Dict. Gard.* iv. (1887) 246 (= *Zygocolax leopardina* ×, *Rolfe*).
leucocylum ×, *Hort. Veitch. ll. cc.* (1892) i. 214; et 246. —
Lindeniae, *Rolfe, in Lindenia*, vi. (1890) 73 t. 275; et *ex Orchid. Rev.* ii. (1894) 270; *Will. Orchid. Grow. Man. ed.* 7 (1894) 761. — Venezuela.
Lindenii, *Rolfe, in Lindenia*, viii. (1892) 5 t. 337; *Veitch. Man. Orch. Pl.* iii. (1893) 56. — Hab.?
lucidum, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1889) i. 799 — Guian. angl.
Perrenoudi ×, *Hort. ex Rev. Hort.* (1894) 191. — Hybr. artef.
Sanderianum, *Regel, in Gartenfl.* xxxvii. (1888) 657 t. 1287; et in *Act. Hort. Petrop.* x. (1888) 695. — Columb.

ZYGOPETALUM : —

Veitchii ×, Veitch, in Gard. Chron. (1887) i. 425 = *Zygocolax Veitchii* ×, Rolfe.
venustum, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, ii. (1887) 283, t. 47. — Guian. angl.
Whitei, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 354; et in Godefr. Lebeuf, L'Orchidophile (1890) 194. — N. Granat.

ZYGOPHYLLUM, Linn. (Zygophyll.). — Ind. Kew. ii. 1258.

amblyocarpum, Baker, in Kew Bull. (1894) 330. nomen; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2358. — Arabia.
berenicense, Schweinf., Illustr. Fl. Égypte [Mém. Inst. Égypt. ii.] (1887) 56, nomen. — Aegypt.
cinereum, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 189. — Afr. austro-occ. extratrop.
densiflorum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 181. — Afr. austro-occ. extratrop.
gobicum, Maxim. Enum. Fl. Mongol. (1889) 125. — Mongol.

ZYGOPHYLLUM : —

incanum, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. (1894) 190. — Afr. austro-occ. extratrop.
Loczyi, Kanitz, Pl. Exped. Szechenyi in As. centr. lect. (1891) 13. — As. centr.
longicapsulare, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 55. — Afr. austr-occ. extratrop.
longistipulatum, Schinz, l. c. 86. — Afr. austro-occ. extratrop.
Marlothii, Engl. in Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 32 = Z. Stapfii, Schinz.
paradoxum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 155. — Afr. austro-occ. extratrop.
rigidum, Schinz, l. c. 55. — Afr. austro-occ. extratrop.
Stapfii, Schinz, l. c. 57. — Afr. austro-occ. extratrop.
suffruticosum, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 188. — Afr. austro-occ. extratrop.
xanthoxylum, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 81 (= *Sarcozygium xanthoxylum*, Bunge). — Mongolia.

ZYGOPHYLLUM : —

xanthoxylum, « Engl. » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1893) 358 = praec.

ZYGORUELLIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 820; et Hist. des pl. x. (1890) 432. **ACANTHACEAE.**

Richardi, Baill. ll. cc.; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 249. — Madag.

ZYGOSTELMA, Fourn. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1257.

Benthami, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 300. — Siam.

ZYRPHELIS, Cass. = **Mairia**, Nees (Compos.).

Burchellii, corymbosa, crenata, Ecklonis, foliosa, hirsuta, lasiocarpa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 374 = *homonyma omnia Mairiae*.
filosella, Kuntze, l. c. = *M. perezoides*, Nees.

CURAE POSTERIORES IN INDICEM KEWENSEM

VEL

ADDENDA ET EMENDANDA POST ANNUM 1895 NOTATA

A

BENJAMIN DAYDON JACKSON

ORDINATA

a. = adde. d. = dele. l. = lege. p. = pone.

A

- 1¹ a. AALIUS, Rumph. ex Lam. Encyc. i. 1 (1793)
= **Sauropus**, Blume (Euphorb.).

ABERIA

- 2¹ l. *caffra*, Hook. f. ex Harv. & Sond.

ABIES

- 3¹ a. *macrocarpa*, Vasey, in Gard. Monthly (Jan. 1876); ex Sargent, in Rep. For. N. Am. (U. S. Census, ix.) 210 = *Pseudotsuga Douglasii*.

ABUTILON

- 4³ l. *albidum*, Sweet, (l. c.).
a. *arborescens*, Noronha, ex Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. xi. (1844) 215 = *Broussonetiae* sp.?
5¹ l. *crispum*, Medic. *Malv.* 29 (*crispum*); Sweet.
5² *giganteum*, Sweet, Hort. Brit. ed. i. 53; Presl,
5³ *polyandrum*, G. Don, ... 500 = seq.
a. *polyandrum*, Wight, & Arn. Prod. ... — Ind. or.
6¹ a. *spinifex*, Scop. Introd. 288 = *Pavonia spinifer*.

ACACIA

- 6³ a. *aurea*, Noronha, ex Hoev. & De Vriese, Tijdschr. xi. (1844) 216 = *Burmanniana*.
9³ l. *leiophylla*, Benth. ... 351 = *saligna* (non *Albizzia*).
prona, Noronha, (l. c.) = *Smithia sensitiva*?

ACAENA

- 14¹ l. Huttoni, R. Br. *ter.* ... 362 = *Poterium Sanguisorba*.

ACALYPHA

- 15³ l. *grandis*, Benth.
16¹ a. *Maccafeeana*, Veitch, Cat. (1878) 25 = *Wilkesiana*.
macrostachya, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 47. — Ins. Trinit. (non *jacq.*).
16³ *rubra*, Nor. fide Hassk. in Tijdschr. Nat. Ges. xi. (1844) 216 = *densiflora*.

- 17² l. ACANTHOCARYA, Pfeiffer, Nom. i. 11 (1871) = seq.

- 17² a. ACANTHOCARYX, Endl. Gen. 1076 (1840) = ACANTHOCARYX, Arruda.

ACANTHORHIZA

- 19¹ a. *arboorea*, Drude; cf. Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 64. — Hab.?

- 19³ l. ACANTHYLLIS, Pomel.

ACER

- 20¹ l. *barbatum*, Michx.
californicum, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1283 = *Negundo californicum*, (loco Torr. & Gray).
26³ *manschuricum*, Maxim.

ACHILLEA

- 23³ a. *oxyloba*, DC. Prod. vi. 20. — Europ.
serbica, Petr. Addit. Fl. Agr. Nyss. 102 = *ageratifolia*.

- 28¹ l. ACIDOTON, P. Br. Hist. Jamaic. 335 (1756) (non Sw.) = **Securigena**, Comm. (Euphorb.).

ACIPHYLLA

- 28³ l. *Traversii*, Hook. f. Handb. Fl. N. Zed. 729. F. Muell.

ACLISIA

- 29² d. *quayaquilensis*, (est *Acnisti* sp.; cf. p. 30).

ACONITUM

- 31¹ l. *lethale*, Griff. Not. iv. 732. — Ind. or.
31² a. *salisburifolium*, Griff. in Itin. Not. 306. — Ind. or.

ACOSTA, Adans.

- 32¹ a. *spinosa*, Scop. Introd. 124 = *C. spinosa*.

ACTINIDIA

- 35¹ l. *arguta*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 15; Franch.
polygama, Miq. (l. c.); Franch.
rufa, Miq. (l. c.); Franch.
volubilis, Miq. (l. c.) 16; Franch.

- 37¹ a. **ADELAIDA**, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 74 (1783). (Quid?)
borbonica, Buc'hoz, l. c. — Maurit.

ADINA

- 43² l. *aralioides*, Benth. & Hook. f. ... 30 = *polycephala*.
l. *trichotoma*, Benth. & Hook. f. (l. c.) = *polycephala*.

- 43³ a. ADOCETON, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 438 = ADOKETON, Rafin. = **Zelanthera**, R. Br. (Illecebr.).

ADOKETON

- 44¹ a. *maritimum*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 438 = *T. frutescens*.
saxatile, Rafin. l. c. = *T. frutescens*.

ADYSETON

- 44³ a. *bidentatum*, Medic. Pflanzeng. 73. — Europ.?
l. *campestre*, Medic. (l. c.) 74; Moench,
a. *squamatum*, Medic. (l. c.). — Europ.?

AELUROPUS

- 47² l. *villosus*, Trin. ex C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 18. —

AEONIA

- 47³ l. *alata*, A. Rich. ... xv. (1841) 67 t. 11.

AEONIUM

- 47³ l. *Berthelotianum*, C. Bolle ... 239. — Ins. Canar. *Castello-Paivae*, Bolle ... = *S. Paivae*, *Manriqueorum*, C. Bolle, *tabuliforme*.

AERANTHES

- 48¹ l. *grandiflora*, Lindl. *grandiflora*, Lindl.

AERANTHUS

- 48¹ a. *Fischeri*, Reichb. in Mitth. Geogr. Geo. Hamb. 1882-83 (1885) 268, nomen. — Afr. trop.

AERIDES

- 48² l. *Borrassi*, Buch. Ham. ... = *Cymbidium aloifolium*.
49¹ l. *quinquevulnera*, Lindl. ... — Ins. Philipp. (non *Malaya*).
l. *Thibautiana*, Reichb. f. ... — Ins. Philipp. (non *Polynesia*).

AERVA

- 49³ l. *tomentosa*, Forsk. Fr. Aeg. Arab. p. 122; Lam.

AESCHYNANTHUS

- 50¹ l. *longiflora*, DC. Prod. ix. 262.
50² l. *Wallichii*, R. Br. in Benn...

AETHEILEMA

- 51³ a. *anisophyllum*, R. Br. Prod. 478 = *Phaylopsis longifolia*.

AFZELIA

- 52³ l. *splendens*, Hort. ex Sweet, Hort. Brit. ed. i. 72; Loud.

AGANOSMA

- 53² l. *Edithae* ... v. (1865) 227

AGAPANTHUS

- 53² a. *calyciflorus*, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 56 = *Fuchsia excorticata*.

AGATHOSMA

- 54³ 1. *brevifolia*, & *bruniodes*, Sweet, Hort. Brit. ed. i. 89; Loud.
a. *desciscens*, J. B. Fisher, in Bijdr. Nat. Wetensch. vii. (1832) 22 t. 2 = *bifida*.

AGAVE

- 54² 1. *tehuacanensis*, (non *thuacanensis*).

AGRIMONIA

- 60¹ 1. *Agrimonioides*, Linn.

AGROPYRON

- 61² 1. *violaceum*, Rink, Grönl. ed. 2, Add. 115; Vasey,

AGROSTIS

- 63² 1. *indica*, Norsk... p. 104 = *Sporobolus*, etc.
64³ *Royleana*, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. (1845) 371 = *Calamagrostis* *Royleana*.

AIRA

- 67¹ 1. *antarctica*, Hook... 150 = *Deschampsia* *antarctica*.
68¹ a. *lagopoides*, Scop. Introd. 74 = *Aeluropus* *laevis*.

AIROPSIS

- 69¹ a. *tenella*, Coss. & Dur. Expl. Sc. Algér. 97. — Algeria.

AITONIA

- 69¹ a. *NYMANIA*, Lindb. in Notis. Sällsk. Fann. Fl. Fenn. ix. (1866) 290 in obs.

AJAX

- 69³ a. *muticus*, J. Gay, in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 308 = *N. Pseudo-Narcissus*.

- 72² a. *ALBONIA*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 51 (1783 = *Rhus*, Tourn. (Anacard.)).
peregrina, Buc'hoz, l. c. = *R. succedanea*.

- 72² 1. *ALCAEA*, Hill... (Malvac.).

ALCHORNEA

- 73³ 1. *cordifolia*, Muell. Arg... = *cordata*, Benth.

- 76² a. *ALISMORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318; = *Alismorchis*, Thou.

ALLANBLACKIA

- 77¹ 1. *floribunda*, Oliver, in Journ. Linn. Soc.

ALLIUM

- 78² 1. *bifolium*, Willd
79³ *flavescens*, Poepp... = *Nothoscordum* *striatum*.
glaucum [Desf.]... = *A. Scorodoprasum*.
82² 1. *spurium*, G. Don,

ALNUS

- 85¹ 1. *incana*, Moench, Meth. 424; Medic. Pfl. anat.; 83.
oblongata, Willd... = *glutinosa*.

ALOE

- 86¹ 1. *Bainesii*, Dyer... 568.
Barbarae, Dyer... 568 = *Bainesii*.
Bowiea, Schult. f. (non *Bourea*).
a. *confusa*, Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1880) 36. — Hab. ?
86² a. *fulgens*, Todaro, (l. c.) 37. — Hab. ?

ALSINE

- 91¹ 1. *biflora*, Wahlenb... = *Stellaria* *biflora*.
92² a. *scandinavica*. = *Stellaria* *biflora*.
a. *sedoides*, Karst. Pharm. Med. Bot. 533 = *Stellaria* *petraea*.

ALTERNANTHERA

- 95¹ 1. *Achyranthes*... lix. (non lxix).

ALYSSUM

- 97² 1. *cheirifolium*, Berger. Phytol. iii, 125 =

- 99¹ a. *ALYTOSTYLIS*, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 409 in obs. (1874) = *Roydsia*, Roxb. (Capparid.).

AMARANTHUS

- 101¹ a. *flexuosus*, Ambrosi, Fl. Tir. Austr. ii. 187 = *viridis*.

AMELANCHIER

- 105² a. *Amelanchier*, Karst. Pharm. med. Bot. 784 = *canadensis*.

- 106¹ a. *AMERIX*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

AMMI

- 107¹ 1. *cicutarium*, Willd. ex F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaert. II. Nachr. i. 211; et...

AMORPHOPHALLUS

- 109³ 1. *campanulatus*, Deene, in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 366; Blume, Rumphia, i. 139 partim.

- 118³ a. *AMPHIBOLIS*, Schott & Kotschy, in Kotschy, Reise Taur. 379 (1858) nomen. = *Hyacinthus*, Tourn.
coelestis, Schott & Kotschy, l. c. = *H. azureus*.

AMPHICARPAEA

- 111¹ 1. *comosa*, Sweet, Hort. Brit. ed. i. 121; G. Don,

- 112¹ a. *AMPHORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 316 = *AMPHORCHIS*, Thou.

AMYGDALUS

- 112³ a. *decipiens*, *genuina*, *grandiflora*, *macrocarpa*, *mensarum*, *tenuis*, Poit. & Turp. in Poit, Pomol. Franç. iv. = *P. Amygdalus*.

AMYRIS

- 113² 1. *floridana*, Nutt... (dele « *Wave ex* »).
113³ 1. *pernambucensis*, Arruda... 500 = *Protium* *heptaphyllum*?

- 116² a. *ANAMELIS*, Garden, in Linn. Corresp. i. 340, 599 (1821) = *Fothergilla*, Murr. (Hamamel.).

ANANASSA

- 116³ a. *Ananas*, Karst. Pharm. Med. Bot. 466 = *Ananas* *sativas*.

ANARRHINUM

- 117² 1. *canadense*, Desf. Fl. Atlant. ii. 51; et

ANASSER

- 117² a. *Laniti*, Blanco, Fl. Filip. ed. 1, 112; ed. 2, 81; ed. 3, 149 = *Wrightia* *ovata*.

ANASTATICA

- 117³ d. *Hierochontis*, Medic. (quae sub *Euclidio* reperies).

- 120⁴ a. *ANDERSONIA*, Koenig, ex R. Br. Prod. 570 (1810) = *Stylidium*, Sw.

ANDIRA

- 120² a. *SKOLEMORA*, Arruda, ex Koster, Trav. 498 (1816).

ANDROPOGON

- 126¹ 1. *laniger*, Desf. . 379 (*lanigerum*).
127³ a. *squarrosus*, Linn. hb. ex R. Br. Prod. 193 = *Chamaeraphis* *spinescens*.

ANDROSACE

- 128³ a. *erecta*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 499. — China.

ANEMOPAEGMA

- 132³ 1. *clematideum*, Griseb.. 222 = *Pithecoctenium* *clematideum*.

ANGELICA

- 133³ 1. *Dieffenbachii*, Benth. & Hook. f.. (Aciphyllae sp.).

- 134 a. *ANGORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318 = *Angraecum*, Bory (Orch.).

ANGRAECUM

- 134³ a. *ANGORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318.

- 135¹ a. *brachycarpum*, Reichb. f. in Walp. Ann. iii. 573, in obs. — Afr. trop.

1. *distichum*, Lindl... 1781 = *Mystacidium* *distichum*.

- a. *eburneum*, S. Moore, in Baker, Fl. Maurit. 356 partim = *Brongniartianum*.

- eburneum*, Reichb. f. ex S. Moore, in Journ. Bot. xvi. (1878) 137 = *A. Giranae* [in Suppl.].

- 135² a. *Kotschyianum*, Reichb. f. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864) 338. — Afr. trop.

1. *Kotschyi*, Reichb. f.. 456 = *praec*.

1. *luridum*, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vi. (1826) 86 = *Eulophia* *lurida*.

1. *pectinatum*, Thou... 51 = *Mystacidium* *pectinatum*.

1. *pellucidum*, Lindl... 134 = *M. pellucidum*.

ANGUILLARIA

- 135³ 1. *bahamensis*, Gaertn. l. c. 373 = *Myrsine* *Heberdenia*.

ANISOMELES

- 137³ 1. *fureata*, Sweet, Hort. Brit. ed. 1, 315; Loud.

ANISOPHYLLEA

- 138¹ a. *flavicans*, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 175 in nota. — Ins. Penang.

ANTHEMIS

- 145² 1. *nigricans*, Hort. ex Sweet, Hort. Brit. ed. i. 243;

ANTHERICUM

- 146³ 1. *capillare*, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaert. I. Nachr. i. 254; Spreng.

- a. *croceum*, F. G. Dietr. (l. c.) 255 = *Schoenolirion* *croceum*.

1. *dendroides*, Stev. in Comm. Soc. Phys. Mosq. i. (1808) 43; et...

1. *fastigiatum*, F. G. Dietr. (l. c.) 256; Steud.

- 147² 1. *niveum*, F. G. Dietr. (l. c.); Spreng.

- 148¹ a. *virgatum*, F. G. Dietr. (l. c.) 257 = *Nolina* *georgiana*.

ANTHOLYZA

- 149² 1. *aethroides*, Burm. f.. (non *aethroides*).

- 149³ 1. *intermedia*, Baker... (1877).

ANTHOXANTHUM

- 150² 1. *amarum*, Brot... (dele « f. 1 »).

- glaucum*, Vahl, ex Poit. Encyc. Suppl. ii. 662; et Roem.

- pulchellum*, D. Dietr... i. 125 (non 625).

ANTHRISCUS

- 150³ a. *Anthriscus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 857 = *vulgaris*.

ANTHURIUM

- 151¹ 1. *candidum*, Bull. = *Spathiphyllum* *candidum*, N. E. Br.

- 153³ lin. 1. 1. **ANTHYLLIS**.

ANTIRRHINUM

- 155¹ a. *apterum*, Vaitke, in Oesterr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1875) 96. — Afr. trop.

ANTURA

- 157² a. *edulis*, Forsk. (l. c.) p. cvi. = *C. edulis*.

- 157³ **AOPLA**, Lindl. Bot. Reg. sub. t. 1701 (1835).

- 157³ 1. *reniformis*, Lindl. (Habenariae sp.) = *H. erminium* *reniforme*.

APARGIA

- 158¹ l. *danubialis*, Scop. Introd. 122; Fl. Carn.
a. *proteiformis*, Ambrosi, Fl. Tir. Austr. ii. 564
= *hastilis*.

APERULA

- 159¹ l. *pipericarpa*, Meissn. (non *pipericarpa*).

APHELANDRA

- 160¹ a. *pulcherrima*, R. Br. *Prod.* 475. — Ind. occ
scabra, R. Br. (l. c.) = *pectinata*?

- 161² l. **APIOS**, Corn. ex Medic... (1787); Moench,
tuberosa, Moench,... = *americana*.

- 163³ l. **APLOSTEMON**, Rafin. in Am. Monthly.
Mag. i. (1817) 431; et...
bracteatum, Rafin. (l. c.) = *S. bracteatus*.
triquetrum, Rafin. (l. c.) = *S. monander*.

APONOGETON

- 165² a. *Kraussianum*, Hochst. ex Krauss. in *Flora*,
xxviii. (1845) 343. — Afr. austr.

APORUM

- 165³ a. *incrassatum*, Brongn. in Duperr. Voy. Co-
quille, Phan. 204, t. 42, fig. B. (non Blume).
= *Eria aporoides*.

APPENDICULA

- 166¹ a. *manilensis*, « *Reichb. f. in Walp. Ann.* i. 791 »
in obs. — Ins. Philipp.
manillensis, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 703 =
praec.

ARABIS

- 169² l. *patens*, Sulliv. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlii.
(1841) 49. —

ARALIA

- 172¹ a. *syana*, Veitch, Cat. (1870) 17. — Ins. Pacif.

ARAUJIA

- 172² l. *sericofera* (non *sericifera*)

ARCEUTHOBIMUM

- 173² a. *pusillum*, Peck, in Ann. Rep. N. Y. State
Museum Nat. Hist. (Dec. 1875) 112. — Am.
bor.
a. *verticilliflora*, Engelm. in Bot. Calif. ii. 107.
— Mexic.

ARCHANGELICA

- 173² a. *Archangelica*, Karst. Pharm. med. Bot. 843 =
officinalis.

ARCTOPHILA

- 174¹ a. *effusa*, Lange, in Adnot. ad Fl. Dan. suppl.
126 (1874); et Consp. Fl. Groenl. i. 167
(1880). — Groenl.

ARDISIA

- 176¹ l. *excelsa*, Ait... 261 = *Myrsine Heberdenia*.
176³ a. *montana*, Sieb. ex Miq. Cat. Mus. Bot. Lugd.
Bat. 65 nomen; ex Franch. & Savat, Enum.
Pl. Jap. i. 305. — Japon.

- ARDUINA, Mill... Linn. Mant. 52 (1767) =

- 177² l. *grandiflora*, E. Mey. l. c. 191 (non 190).

ARECA

- 177² l. *Bacaba*, Arruda, ... 490 = *Oenocarpus Ba-*
caba.
177³ a. *Herbstii*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron.
(1884) ii. 426 = *Acanthophoenix crinita*.
a. *montana*, Hort. Cantab. ex R. Grah. in Bot.
Mag. sub t. 3874 = *Prestoea montana*.
178¹ *Normanbyi*, F. Muell... = *Ptychosperma*
Normanbyi.
a. *pisifera*, Lodd. ex Hook. f. Kew Rep. 1882
(1884) 54 = *Dictyosperma furfuraceum*.
a. *speciosa*, Hort. ex Lem. in Illustr. Hortic.
xiii. (1866) t. 462-3 = *Hyophorbe amari-*
caulis.

AREMONIA

- 178¹ l. *agrimonoides*, DC... *Agrimonia Agrimonoides*.

ARENARIA

- 178³ a. *Brevivina*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii.
(1872) 620.
180² l. *musciiformis*, Wall... 641 (non 6401).
l. *parvifolia*, Benth... (non *parviflora*, quae per-
peram in mss. Kew. exstat.).
l. *scandinavica*, Spreng... 402 (non 399).

ARENGA

- 181³ a. Bonnetti, Hort. Rollis. ex Hook. f. Kew Rep.
1882 (1884) 61. — Ind. or.

ARGANIA

- 182² a. **TEKELIA**, Scop. Introd. 88 (1777).

ARISAEMA

- 185³ a. *multicarinatum*, Wall. ex Royle, Ill. Bot.
Himal. 406. — Reg. Himal.

ARISTEA

- 186¹ l. *compressa*, Buching. ex Krauss. in *Flora*,
xxviii. (1845) 309 nomen; et ex Baker,

ARISTIDA

- 187¹ a. *lanuginosa*, Burch. Trav. ii. 226 = *vestita*,
Thunb.

ARISTOLOCHIA

- 188³ l. *frutescens*, Marsh... = A. Siphon (non macro-
phylla).
189¹ l. *grandiflora*, Arruda... 499; Gomez,

ARMENIACA

- 190³ a. *bataavica*, *communis*, *macrocarpa*, *mira*, *monga-*
metia, *praecox*, *tardiflora*, Poit. & Turp.
in Poit. Pomol. Franç. i. = P. *Armeniaca*.

- 193¹ l. **AROMADENDRON**, Andr. ex Steud. Nom.
ed. II. i. 134 (1840) = seq.

- 192³ a. **AROMADENDRUM**, W. Anders. ex R. Br.
Prod. 553 in Adnot. (1810) = **Eucalyp-**
tus, L'Hérit. (Myrtac.).

ARTEMISIA

- 198² l. *pallens*, Wall. ex Bess. in Nouv. Mém. Soc.
Nat. Mosc. iii. (1834) 85. — Ind. or.

ARTHRATHERUM

- 200¹ a. *lanuginosum*, Burch. Trav. ii. 617 = *Aristida*
vestita, Thunb.

ARTOCARPUS

- 201³ l. *Dadah*, Miq... (non *Dadak*).

ARUM

- 202³ a. *divaricatum*, Thw. Enum. 334 = *Theriopho-*
num crenatum.
a. *Roxburghii*, Thw. (l. c.) 432 = *Typhonium*
Roxburghii.

ARUNDINARIA

- 204¹ a. *diversifolia*, Kurz, ex Teijsm. & Binn. Cat.
Pl. Bogor. 19 nomen = *Fortunei*?
Kokantsik, Kurz (l. c.) = *Bambusa mar-*
morea.
Kumasosa, Kurz (l. c.) = *Bambusa palmata*
(in Suppl.).
pygmaea, Kurz l. c. = *B. pygmaea*?
siamensis, Kurz (l. c.). — Siam.

ARUNDINELLA

- 204² a. **PTERYGOSTACHYUM**, Nees, ex Steud. nom.
ed. II. ii. 42 (1841).
PTERYGOSTACHYUM, Nees, ex Steud. Syn. Pl.
Gram. 413 (1855).

ARUNDINELLA

- 204³ l. *setosa*, Trin... 63 (non 65).

ASCLEPIAS

- 207³ a. *ciliata*, [Pers. in] Linn. Syst. Veg. ed. XV.
271; Murr.

ASIMINA

- 210¹ a. *virginiana*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol.
Franç. ii. t. 54 = *triloba*.

- 210² a. **ASOPHILA**, Neck. Elem. ii. 162 (1790) =
Gypsophila, Linn. (Caryoph.).

ASPARAGUS

- 213² a. *punjabensis*, Stew. Punj. Pl. 233. — Ind. or.
213³ l. *sarmentosus*, Linn... Afr. austr. (non Ind. or.)
a. *Satawur*, J. A. Murr. Drugs Sind, 24 = *ad-*
scendens.

ASPERULA

- 214³ l. *Jordani*, Perr. & Song. in Bull. Soc. Hist.
Nat. Savoie, 1853 (1855) 196 = *longiflora*.

ASTELIA

- 217³ l. *albicans*, Colenso... = *spicata*.
l. *fragrans*, Colenso... = *nervosa*.

ASTER

- 219¹ a. **BRACHYASTER**, Ambrosi, Fl. Tir. austr. ii.
379 (1857).
221¹ l. *Heterochaeta*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 44. —
Reg. Himal.
221¹ a. *imbricatus*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.
iii. 77. — Afr. austr.
l. *imbricatus*, Linn... 21 = *Felicia reflexa*.
223² l. *scorpioides*, Scop. Introd. 130; Fl. Carn.

ASTRAGALUS

- 228³ l. *candidissimus*, S. Wats. Bibl. Ind. N. Am.
Bot. 191. — Calif.
233³ a. *linearis*, Edgew. ex Aitch. Cat. Pl. Punjab,
43 = *bakuensis*.
237¹ a. *ramosus*, Aitch. Cat. Pl. Punjab, 43, sphalm.
= *hamosus*, Linn.
238¹ a. *Sprunerianus*, Bunge, Astrag. ii. 251 (Index)
sphalm. = *Spruneri*.
239³ l. *wartoënsis*, Boiss... (non *urtoënsis*).

- 249¹ a. **ASTRALAGUS**, Curran, in Bull. Calif.
Acad. i. II. (1885) 152; Greene, (l. c.) 155,
sphalm. = **Astragalus**, Tourn.

ASTROCARYUM

- 240² l. *argenteum*, Hort... = A. *Malybo*.
a. *filare*, Hort. Bull. ex Hook. f. Kew. Rep. 1882
(1884) 71. — Hab?
a. *iriartoides*, Willis, ex Regel, in Gartenfl. xxix.
(1880) 230 t. 1022 f. 3 (*Martinesiae* sp?)
Hab?

ASYSTASIA

- 242¹ a. *quadrangularis*, Heyne, ex Trimen, Syst. Cat.
Pl. Ceyl. 67, nomen. — Ind. or.

- 242³ l. **ATHALMUM**, Neck.

ATHAMANTA

- 243¹ l. *chinensis*, Linn... = *Selinum canadense*.

ATHANASIA

- 243² l. *capitata*, Linn. Amoen. Acad. vi. 97. — Afr.
austr. (i. e. dele « Pl. Afr. Rar. p. 50 »).
a. *crithmifolia*, Scop. Introd. 127 = *parviflora*,
Thunb.
l. *laevigata*, Linn. (l. c.) 98 (dele « Pl. Afr. Rar.
p. 52 »).
a. *rigida*, Scop. (l. c.) = *Pteronia incana*.
l. *squarrosa*, Linn. (l. c.) (dele « Pl. Afr. Rar.
p. 52 »).

ATHRIXIA

- 244² l. *chaetopoda*, F. Muell.

ATRACYLIS

- 245¹ l. *lanatus*, Scop. Introd. 124; Fl. Carn.

- 245² l. **ATRAPHAX**, Scop. Introd. 344 (1777) =
Atraphaxis, Linn.

ATRAPHAXIS

- 245³ l. *undulata*, Scop. Introd. 344; Willd.

ATRIplex

- 246³ 1. *holocarpa*, F. Muell... = spongiosa.

ATROPIS

- 248² 1. *tenuifolia*, Thurb... = *Poa tenuifolia*, Nutt.

ATYLOSIA

- 248³ 1. *barbata*, Baker... 216 = *goënsis*.
1. *goënsis*, Dalz... 186. — Ind. or.

AUBRIETIA

- 249² *italica*, et Kotschy, in ordine alphabetico ponuntur.

- 249³ a. *ANGUSTA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 102-106 (1821) = **Gardenia**, Ellis (Rubiace.).

AURANTIUM

- 251² a. *Bigarella*, *corniculatum*, *coronatum*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. ii. = *C. Aurantium*.

AVENA

- 252¹ 1. *antarctica*, R. Br. Prod. 209; Roem. & Schult.
252² 1. *caespitosa*, Scop. Introd. 74; Kuntze... = *Deschampsia caespitosa*.
a. *canina*, Scop. (l. c.) = *Agrostis canina*.
252³ a. *Cupaniana*, Ambrosi... 238 = *Aira caryophyllaea*.
253¹ 1. *flexuosa*, Scop. (l. c.); Mert. & Koch... = *Deschampsia flexuosa*.
253² a. *Gaudiana*, Ambrosi, Tirol. Austr. i. 237 = *Trisetum Cavanillesii*.
253³ 1. *montana*, Scop. (l. c.); [Weber]... = *Aira montana*.
253³ 1. *ovata*, Scop. (l. c.); C. C. Gmel... = *Lagurus ovatus*.
254² a. *Spica-venti*, Scop. (l. c.); = *Apera Spica-venti*.
1. *subspicata*, Scop. (l. c.); [Clairv.]... *Trisetum subspicatum*.

AZALEA

- 256¹ a. *arboorea*, Bart. ex Pursh, Fl. Am. Sept. i. 153 = *R. arborescens*.
256² 1. *pontica*, Linn. = *R. flavum*, G. Don.
256³ 1. *verticillata*, Bart... = *R. arborescens*, Pursh.

AZORELLA

- 257² 1. *glabra*, Wedd... 67 = *diapensoides*.

B

- 257³ 1. **BABIANA**, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 539 (1801); et t. 576 (1802).
a. *crispa*, Ker-Gawl. (l. c.) = *Tritonia crispa*.
fragrans, Ker-Gawl. (l. c.) = *plicata*.
a. *mucronata*, Ker-Gawl. (l. c.); et in...
1. *plicata*, Ker-Gawl. (l. c.); et t. 576.
a. *plicata*, Ker-Gawl. (l. c.) partim = *Thunbergii*.
punica, Ker-Gawl. (l. c.) = *stricta*.
1. *ringens*, Ker-Gawl. (l. c.); et in...
rubrocyanea, Ker-Gawl. (l. c.) = *stricta*.
1. *sambucina*, Ker-Gawl. (l. c.); et in...
spathacea, Ker-Gawl. (l. c.); et t. 638.
stricta, Ker-Gawl. (l. c.); et t. 621, 637.
sulphurea, Ker-Gawl. (l. c.); et in...
tubata, Ker-Gawl. (l. c.); Echl.
tubiflora, Ker-Gawl. (l. c.); et t. 680.
258¹ *villosa*, Ker-Gawl. (l. c.); et t. 583.
villosa, Ker-Gawl. (l. c.); partim = *stricta*.

BACTRIS

- 261³ a. Binoti, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 70. nomen. — Hab.?
Caraja, Hort. ex Hook. f. l. c. nomen. — Hab.?

BALANITES

- 265¹ 1. *Roxburghii*, Planch... ii. (1854) 258. — Ind. or.

BAMBUSA

- 267³ 1. *Chino*, Franch. & Sav.
268² 1. *senanensis*, Franch. & Sav... 182, 606.
268² 1. *virgata*, Trin.

BANISTERIA

- 270² a. *rotundifolia*, Buc'hoz, Herb. Col. Amer. t. 28 (Quid?). — Hab.?

BARRINGTONIA

- 275¹ 1. *Butonica*, Forst... = *speciosa*.
276¹ a. *luzonensis*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 213. — Ins. Philipp.
1. *luzoniensis*, Vidal... 113 = *praec.*
1. *speciosa*, Forst... — Ins. Pacif.

- 276³ a. *BARTRAMIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 15 (1821) = **Dodecatheon**, Linn. (Primul.).

BASILAEA

- 277² 1. *punctata*, Mirb. l. c.; Lam. Illustr. ii. 381. [t. 239 f. 2].

BASSIA

- 277³ a. *Macayana*, F. Muell. in Vict. Natural. i. (1885) 168, nomen. — N. Guin.

BASSIA, Koenig.

- 273³ 1. **ILPIPE**, Gras, in Bull. Soc. Br. Fr. xi. (1864) 83.
277³ 1. *Blancoi*, A. DC... = *D. latifolia*, F. Villar.
278¹ 1. *lanceolata*, A. DC... = *Dichopsis lanceolata*, F. Villar.
oleifera, A. DC... = *D. oleifera*, F. Villar.

BATRACHIUM

- 279² 1. *Rionii*, Nym... = *R. trichophylla*.

BANERA

- 279³ a. *RAMSAIA*, W. Anders. ex R. Br. Prod. 553 in adnot. (1810).

BAUHINIA

- 279³ 1. *acuminata*, Linn... 375 (non 376).
281² a. *timorana*, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 466 = *racemosa*.
1. *timoriana*, Steud... = *praec.*
timoriensis, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 276 = *timorana*.

BEGONIA

- 284¹ a. *Chelsoni* X, Veitch, Cat. (1871) 14; Hort. intermedia X, Veitch, Cat. (1873-74); et ex.

BELLEVALIA

- 285¹ 1. *azurea*, Boiss... = *H. azureus*.

- 291³ 1. *BENZOIN*, Ludw. Def. 143 (1737); Nees,

BERBERIS

- 292¹ a. *alba*, *latifolia*, *sylvestris*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. ii. = *vulgaris*.
292² 1. *concinna* (err. typ. *cininna*).
293² *stenophylla* X, dele « = *Darwinii* ».

BERCHEMIA

- 293¹ a. *HALAEA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 378, 379 (1821).
294¹ a. *HUXHAMIA*, Garden, (l. c.) 366, 379 (1821).

BERGHAUSIA

- 294² 1. *barbulata*, Endl. ex Miq. in Verh. Nederl. Inst. III. iv. (1851) 32 (Analect. Bot. Ind. ii. 20) — China; Malaya.
clata, Arn... — Ind. or.
Emodi, Endl... — Reg. Himal.
pallens, Miq. (l. c.) 33; (21). — Ind. or.
tenella, Miq. (l. c.) 34; (22) — Ind. or.

BERINGERIA

- 294³ 1. *crispa*, Neck. Elem. i. 312; G. Don...

- 295² 1. *BERMUDIANA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).

- 295³ a. *BERNOULLIA*, Neck. Elem. ii. 97 (1790) = **Geum**, Linn. (Rosac).
hybrida, Neck. l. c. = *G. rivale*.
montana, Neck. l. c. = *G. montanum*.
reptans, Neck. l. c. = *G. reptans*.
virale, Neck. l. c. = *G. rivale*.

BETA

- 297² a. *atriplicifolia*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 246. — Hispan.

BETONICA

- 298¹ 1. *nivea*, Stev... = *Stachys discolor*.

BETULA

- 298² a. *americana*, Buc'hoz, Herb. Col. Amer. t. 36 = *nigra*?
298³ *etnensis*, Rafin. Specch. Sc. i. 17; ex Call, Life Rafin. 146. — Ital.
glandulosa X, Berl. in Ofvers. Vet. Akad. Förh. xli. (1884) ii. VII. 63. — Groenl.
299¹ 1. *papyracea*, Ait... = *seq.*
1. *papyrifera*, Marsh. Arbustum, 19. — Am. bor.
1. *populifolia*, Marsh. (l. c.); [Dryand]... — Am. bor.

- 299² a. *BEVERIA*, Collinson, in Linn. Corresp. i. 38 (1821) sphalm. = *BEURERIA*, Ehret = **Calycanthus**, Linn.

BIASOLETTIA

- 300¹ a. *cynapioides*, Karst. Pharm. Med. Bot. 857 = *Carum cylindricum*?

BIDENS

- 301¹ a. *linifolius*, Sch.-Bip. ex Klatt. in Flora, lxviii. (1885) 203. — Mexic.

- 303¹ a. *BIGELOWIA*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 442 = **Arenaria**, Rupp. (Caryophyll.)
montana, Rafin. (l. c.) = *A. montana*.

BIGNONIA

- 305³ 1. *tinctoria*, Arruda... 497 = *B. Chica*.

BINECTARIA

- 307² a. *laurifolia*, Forsk. (l. c.) p. cx. = *I. maxima*?

BISCUTELLA

- 308³ 1. *verna*, Mathieu, Fl. Belg. 49 = *laevigata*.

- 313³ 1. *BLUFFIA*, Delile...; Nees, in Delect... Gram. 61 (1836).

BOEHMERIA

- 316³ 1. *frutescens*, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 340 cum. cit. falsa =
317² 1. *scabrella*, Gaudich... 500.

- 318³ 1. *BOISSIERA*, Haenseler, ex Willk. in Bot. Zeit. iv. (1846) 313 = *Pumilio*, Stapf... 9 = *bromoides*.

BOMBAX

- 320² 1. *gossypinum*, Linn. Syst. ed. XII. 457 = *Gossypium*, Cav. Diss. v. 297 = *praec.*
1. *insigne*, Wall... 71 (non 74).
1. *mediterraneum*, Arruda... 489 = *Chorisia ventricosa*.

- 321¹ a. *BONAMYA*, Neck. Elem. i. 316 (1790 = **Stachys**, Tourn. (Labiata).)

- 321² a. *BONINIA*, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xiv. (1871) 309 in nota = **Evodia**, Forst. (Rutac.).
a. *glabra*, Planch. l. c. 310 in nota. — China.
a. *grisea*, Planch. l. c. — China.

- 325² a. *BOSSEKIA*, Neck. Elem. ii. 91 (1790) = **Rubus**, Tourn. (Rosac.).

BOURRERIA

- 327³ a. *montana*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 110 = *cassinifolia*.

- 329³ a. *BRACHYASTER*, Ambrosi, Fl. Tir. Austr. ii. 379 (1857) = **Aster**, Tourn. (Compos.).
Bellidiastrum, Ambrosi, l. c. 380 = *A. Bellidiastrum*.

BRACHYCORYTHIS

- 330² 1. *tenuior*, *Reichb. f.*... — Afr. austr. (non Afr. trop.).

BRAHEA

- 333² a. *glauca*, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 64 = *Erythea armata*.
lucida, Hort. ex Hook. f. (l. c.). — Hab.?
nobilis, Hort. Rollis. ex Hook. f. (l. c.). — Hab.?

BRASSICA

- 334³ 1. *SINAPI*, Neck. Elem. iii. 80 (1790); Dulac,
 335¹ a. *arvensis*, Scheele, in *Flora*, xxvi. (1843) 319
 = *B. Sinapistrum*.

BRAYERA

- 337¹ 1. *HAGEA*, Pfeiff. Nom. Bot. i. 1544 (1874) cum
 cit. falsa.

BREWERIA

- 337² a. *alternifolia*, Radlk. in *Abh. Nat. Ver. Bremen*,
 viii. (1883) 413, in *Adnot.* = *africana*,
Benth. & Hook. f.

BRODIAEA

- 340¹ 1. *capitata*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* i. iv.
 (1885) 227 = *insularis*.

BROMELIA

- 340³ 1. *muricata*, Arruda, ... 21 = *Ananas sativus*.
Sagenaria, Arruda, ... 14 = *Ananas sativus*.
variegata, Arruda, ... 7 [= *Neoglaziovia* *variegata*, Mez].

BROMUS

- 342² 1. *japonicus*, Thunb. *Fl. Jap.* 52 (non 51).
 a. *Lloydianus*, Nym. *Suppl. Syll.* 73 = *molli-*
formis.
 343¹ 1. *Plukenetii*, All... (non *Plukenetii*).
 a. *pseudo-velutinus*, Barnard, ex H. C. Watson,
 in *Phytol.* iii. (1850) 807 absque descr. =
interruptus, Druce.
velutinus, Auct. *Angl. fide* H. C. Watson,
Phytol. iii. (1850) 808 = *molliis*.

BROSIMUM

- 344² a. *utile*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 498 = *B. Ga-*
lactodendron.

BROWALLIA

- 345¹ a. *exaltata*, Fourn. in *Baill. Dict. Bot.* i. 501 =
elata.

BUCHANANIA, Spreng... 1800 ii. (1801)
234.

- 349² a. *LANZAN*, Spreng. (l. c.) 235, in obs.

BUCHNERA

- 350¹ 1. *divaricata*, Linn. ex Benth. in Hook. *Comp.*
Bot. i. (1835) 371 = *Z. pusilla*.
 350² 1. *palustris*, R. Br. *Prod.* 437; *Spreng.*

BULBOPHYLLUM

- 354² a. *biflorum*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 646. — Java.
 355² 1. *nutans*, Rich. in *Mém. Soc. Hist. Nat. Par.*
 iv. (1828) 55 = *variegatum*.

- 356² a. *BULGA*, Linn. *Syst. ed.* 1 (1735) = *Ajuga*,
 Linn. (*Labiata*).

BUMELIA

- 357¹ 1. *lycioides*, Gaertn. f. *Fruct.* iii. 127, t. 202
 (1805).

BUNIUM

- 358¹ a. *montanum*, Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. II. 315
 = *C. montanum*.

- 361¹ a. *BURCHARDIA*, Neck. Elem. ii. 76 (1790)
 = *Psidium*, Linn. (*Myrtac.*).

BURSERA

- 302¹ 1. *Delpechiana*, Poisson. in *C. R. Assoc. Fr.*
Blois, 1884 (1885) 308. — Mexico.

BYRSONIMA

- 364² a. *speciosa*, Peckolt, in *Zeitschr. Allg. Oesterr.*
Apoth. Ver. xxi. (1883) 200, nomen. — Bras.

C

- 369³ 1. *CADIA*, Forsk... p. cxi. 90.
 1. *Ellisiana*, Baker, ... (1883).
pedicellata, Baker, l. c. xxi. (1884).
purpurea, Ait. Hort. *Kew.* iii. 492.
varia, L'Hérit... v. (1795) 22, t. 5.

CAESALPINIA

- 371¹ 1. *mimosoides*, Lam... 462 (non 452).

CAESIA

- 371² 1. *Thunbergii*, Kunth, *Enum.* iv. p. 610.

CAKILE

- 372¹ a. *Cakile*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 663 = *mar-*
itima.

CALAMAGROSTIS

- 374² a. *Calamagrostis*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 378
 = *Stipa Calamagrostis*.

CALAMINTHA

- 375³ a. *Calamintha*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 1002 =
officinalis.
 376² a. *vulgaris*, Karst. (l. c.) = *C. Clinopodium*.

CALAMUS

- 376³ a. *cochin-chinensis*, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.*
 1882 (1884) 67. — Cochin China.
 377¹ 1. *macropterus*, Miq.
 377² a. *trinervis*, Hort. *Bull. cf. W. Wats. in Gard.*
Chron. (1884) ii. 729. — Hab.?
 277² Nicolai, Hort., Rollis. ex Hook. f. (l. c.) — Hab.?
opacus, G. Mann & H. Wendl... (= *Laccosper-*
ma opacum). — Afr. trop.
Oxbyanus, W. Wats. in *Gard. Chron.* (1884)
 ii. 729, sphalm. = *Oxleyanus*.

CALANTHE

- 379¹ 1. *angustifolia*, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 251 (non
 250).
 1. *Ceciliae*, Hort. Low. ex Reichb. f. in *Gard.*
Chron. (1883) i. 432.
cubensis, Linden & Reichb. f. in *Bonplandia*,
 iv. (1856) 322 = *mexicana*.
 1. *curculigoides*, Wall. *Cat.* (non « *Lindl. in »*).
 379² 1. *versicolor*, Lindl... 42. — Ind. or.
 1. *vestita*, Wall. *Cat.* (non « *Lindl. in »*).

CALATHEA

- 380¹ a. *guianensis*, Klotzsch, ex Benth. & Hook. f. *Gen.*
Pl. iii. 654. — Guiana.
 380² a. *Wioti*, Regel, in *Gartenfl.* xxviii. (1879) 298
 = *Wiotiana*.

CALCEOLARIA

- 381² a. *LOGIA*, Mutis, in Linn. *Corresp.* ii. 528 (1821).

CALLA

- 384³ 1. *aethiopica*, Gaertn... = *Richardia africana*.
ambigua, Salisb... = *Richardia africana*.
peritusa, R. Br. *Prod.* 327; Kunth,

CALLIANDRA

- 385³ a. *macrophylla*, Hook. *Bot. Mag.* sub t. 5181,
 sphalm. loco § *Macrophyllae*.
 a. *nitida*, Hook. (l. c.) loco § *Nitidae*.

CALLICARPA

- 386² a. *Hookeri*, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit.*
 Ind. iv. 568, in nota = *vestita*.

CALLISIA

- 387³ a. *gnaphalodes*, Linn. *Pl. Afr. Rar.* 23 = *Ley-*
sera gnaphalodes.

CALLISTEMMA

- 388² 1. *hortense*, Cass... *Suppl.* 46 (non 45).

CALLITRIS

- 389² 1. *articulata*, Link. *Handb.* ii. 473 =
 a. *articulata*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 319 =
quadrivalvis.
 389³ 1. *cupressiformis*, Endl. *Syn. Conif.* 36 in *Syn.* —
 1. *quadrivalvis*, Rich. *Conif.* 46, t. 8, f. 1. —

CALOPHANES

- 391¹ a. *hyssopifolius*, Nees, in *Linnaea*, xx. (1847) 713.
 — Mexico.

CALOSERIS

- 392³ 1. *rupestris*, Benth. l. c. = *O. Isotypus*.

- 393² a. *CALOTHERIA*, Wight. & Arn. ex Steud.
Syn. Pl. Gram. 199 (1855) = *Pappopho-*
rum, Schreb. (*Gramin.*).
elegans, Wight, & Arn. l. c. = *P. elegans*.

CALYCANTHUS

- 394² a. *BEVERIA*, Collinson, in Linn. *Corresp.* i. 38
 (1821) sphalm.
 a. *GARDENIA*, Ellis, in Linn. *Corresp.* i. 86 (1821).

CALYCOTOME

- 395³ 1. *villosa*... — Reg. *Medit.*

- 395³ lin. 28. 1. **CALYCOTOME** (loco **CALICO-**
TOME).

CALYPTROGYNE

- 397² a. *elata*, H. Wendl. ? *cf. Hook. f. Kew Rep.* 1882
 (1884) 60. — Hab.?
Swartzii, Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 61;
Nichols. Dict. Gard. 249. — Ind. occ.

CALYSTEGIA

- 398² a. *spithamea*, R. Br. *Prod.* 483 = *Convolvulus*
spithamea.

CALYTHRIX

- 398³ 1. *pubescens*, Sweet, Hort. *Brit.* ed. I. 157, nomen;
 et ex Sond.
 1. *pulchella*, Turcz... = *breviseta*.

CAMARIDIUM

- 399¹ a. *ochroleucum*, Lindl... — Guiana.
ochroleucum, Lindl. (l. c.) partim = ...

CAMELLIA

- 400¹ 1. *grandiflora*, Forsk... = *Ruellia longiflora*.

- 400² a. *CAMMARUM*, Hill, *Brit. Herb.* 47 (1756) =
Eranthis, Salisb. (*Ranunc.*).
hyemale, Hill, l. c. = *E. hyemale*.

CAMPANULA

- 403¹ a. *groenlandica*, Berl. in *Ofvers. Vet. Akad. Förh.*
 xli. (1885) n. vii. 50. — Groenl.
 1. *rhomboides*, Murr... = *Adenophora communis*.

CAMPHORA

- 407³ a. *Camphora*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 504 =
Cinnamomum Camphora.

CAMPYLOSTACHYS

- 409³ 1. *phyllicoides*, Sond... xx.

CANNA

- 412² a. *iridiflora* ×, Carr. in *Rev. Hort.* (1895) 291. —
 Hyb. artef.

CANSJERA

- 413³ 1. *Rheedii*, J. F. Gmel. *Syst.* ii. 280 (non i.).

CANTHIUM

- 414¹ 1. *Gueinzii*, Sond...
 414³ a. *subulatum*, Baill. *Adausonia*, xii. (1878) 187.
 — N. Caled.

CAPSELLA

- 418³ 1. *spinosa*, Medic. *Pflanzeng.* 85; Moench,

CARAGANA

- 419³ a. *Caragana*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 699 =
arborescens.

CARDAMINE

- 421³ 1. *longirostris*, *Źanka*, in *Közlem. Magyar Tudom. Akad.* xii. (1876) 164. — Banat.

CARDUUS

- 424³ *Carolorum* X... = *Cnicus Carolorum* X.
426³ a. *simplex*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 213 = *Jurinea mollis*.

CAREX

- 427² 1. *acicularis*, Turcz. ex Bess. in *Flora*, xvii. (1834) Beibl. 26 nomen.
427³ 1. *anthericoides*, Presl... 204 = *macrocephala*.
428¹ a. *arcuata*, C. P. Laestad. *Bidr. Känned. växtr. Torneo Lappmarks* (1860) 26, 43. — Europ. bor.
Arnotiana, Nees, ex Drejer, *Symb. Caric.* 16. — Ceylan.?
429² 1. *Cheesemanii*, Petrie... = *comans*, Bergg.
429³ *columbiana*, Dewey, in *Am. Journ. Sc.* xxx. (1836) 62, tab. 136, fig. 90. — Am. bor.
429³ 1. *corralensis*, Phil.
430³ a. *disperma*, Kunze, ex Carey, in A. Gray, *Manual*, ed. I. 542 = *rosea*.
431¹ 1. *epigejos*, Fries, in Bot. Notis. (1843) 105; et Summa...
431² 1. *flaccida*, Sw. ex Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 149 =
431³ 1. *gaimardioides*, E. Desv... = *Scirpus semisubterraneus*.
432² a. *Halleri*, Gunn. Fl. Norv. ii. 103 = *Vahl.*
432³ a. *hyalinolepis*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 235 = *riparia*, Curt.
1. *hyalinolepis*, Steud. in *Lechler, Berb. Am. austr.* 56. — Peruv.
433¹ a. *involuta*, Syme, *Engl. Bot.* ed. III. x. 169. — Europ.
433² 1. *Kochiana*, DC. Cat. Monsp. 89 (non 8).
434² a. *longibracteata*, Schleicher, *Cat. Pl. Helv.* ed. IV. (1821). — Helvet.
1. *macrocephala*, Willd. ex Spreng. *Syst.* iii. 808.
434³ a. *malvernensis*, S. Gibson, in *Phytol.* i. (1843) 715 = *leporina*.
a. *melanocephala*, Karel. & Kiril. in *Bull. Soc. Mosc.* (1841) 436. — Hab.?
melanocephala, Turcz. ex Kunth, *Enum.* ii. 437 = *Vahl.*
Mertensii, Bong. in *Mém. Acad. St Pétersb.* ii. (1833) 169; *Presl*.
435¹ 1. *Moniezi*, Lagrange, (non Timb.).
monostachya, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 512 = *parasitica*.
435² *muricata*, Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xvi. 1883 (1884) 411 = *trachycarpa* [in Suppl.].
436¹ 1. *pacifica*, Drejer, Fl. Excurs. Hafn. (1838) 292 =
1. *Parkeri*, Petrie... 332 = *lagopina*.
parviflora, C. A. Mey. Verz. Pf. Cauc. 30. — Reg. Cauc.
436³ a. *phaeostachya*, Steud. Nom. ed. II. i. sphalm. = seq.
a. *phaeostachya*, Sm. *Engl. Fl.* iv. 99. — Europ.
437¹ 1. *prolixa*, Fries, Novit. Suec. Mant. 3 (1842) 150 =
437² 1. *pubescens*, Poir... cf. 317 =
rariflora, Sm. *Engl. Bot.* t. 2516; et *Engl. Fl.* Rasulii, post «*rariflora*» ponitur.
438¹ a. *rutilus Humnicki*, Cat. Pl. Orléans, 25. — Europ.
439¹ 1. *stenolepis*, Less. Reise durch Norwegen, 301 = *ampullacea*.
439² *tenuifolius*, Poir... cf. 317 =
439³ 1. *torta*, Boott, ex Carey, in A. Gray, *Manual*, ed. I. 547, et ex Tuckerm. i...
1. *transsilvanica*, Schur... = *pallascens*.
1. *turfosa*, Fries, in Bot. Notis. (1843) 104; (1845) 117, fide Summa Veg. 228 = *vulgaris*.
440² a. *vacillans*, Drejer, in Hartm. Excurs. Fl. ed. I. iii. = *salina*.
vesicaria, W. Boott, in Bot. Calif. ii. 252 = *monile*.
xanthocarpa, Degland, in Loisel. Fl. Gall. ii. 299. — Europ.

CARICA

- 441¹ 1. *scandens*, Walp. Ann. iv. 868; sphalm. = *candicans*.

CARLINA

- 442¹ a. *subfusca*, Nym. Consp. 400 = *sulphurea*.

- 442¹ 1. CARLOTEA, Arruda... (1816) = *Hippeastrum*? Herb. (Amaryll.).

CARTHAMUS

- 444³ a. *carolinensis*, Hort. Trian. ex Buc'hoz, Herb. Col. Amer. t. 17 = *Carduncellus caeruleus*.
445¹ 1. *cyaneus*, Hill, Hort. Kew. ed. I. 57; Banks...
445¹ 1. *laevis*, Hill, Hort. Kew. 57 (1768); ed. II. 57, t. 5 (1769) = *Stokesia cyanea*.

CARUM

- 445³ a. *montanum*, Benth. & Hook. f. ex Archang. *Comp. Fl. Ital.* 274. — Europ.

CARYOTA

- 447¹ a. *Blancoi*, Hort. Veitch, ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 61. — Ins. Philipp.

- 449² a. CASSANDRA, D. Don.
CHAMAEDAPHNE, Moench, Meth. 457 (1794).

CASSIA

- 450¹ a. *babylonica*, Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit. iv. (1805) 312 = C. Absus.
450² 1. *candenatensis*, Dennst... = *Dalbergia torta*, R. Grh.
452³ *obovata*, Collad... 15 = *obtusata*.
obtusata, Roxb... 757 — Geront. trop.
453² a. *pulchra*, Rodsch. *Bemerk. Kol. Esseq.* 42. — Guiana.
454² 1. *venenifera*, Rodsch. (l. c.) 43; et...

CASTALIA, Salisb... (1805) 71.

- 455³ a. *alba* [Wood] in Rees, Cycl. vi. n. 2 = N. odorata.
1. *caerulea* [Wood] (l. c.) n. 8; Tratt.
1. *Lotus*, [Wood] (l. c.) n. 3; Tratt.
a. *odorata*, [Wood] (l. c.) n. 7 = N. odorata.
mystica, Salisb... (1805).
pubescens, [Wood] (l. c.) n. 8 = N. Lotus.
scutifolia, Salisb... (1805).
1. *stellata*, [Wood] (l. c.) n. 9; Blume,

CASTANEA

- 456¹ a. *Castanea*, Karst. Pharm. Med. Bot. 495 = *sativa*.
a. *dentata*, Borckh. Handb. Forst. Bot. i. 741 (551) = *sativa*.

- 456² 1. CASTANOPHORUM (CASANOPHORUM) Neck.

CASTILLOA

- 457² a. *Markhamiana*, Markham, Peruv. Bark (1880) 453 = *elastica*?

CATABROSA

- 458¹ a. *antarctica*, f. Buch. Indig. Grasses N. Zeal. t. 41 B (non Hook. f.). — N. Zel.

CATALPA

- 458² a. *Catalpa*, Karst. Pharm. Med. Bot. 927 = *bignonioides*.

CATAPODIUM

- 458³ 1. *fusiforme*, Benth... sphalm. = *filiforme*.
a. *unilaterale*, Ledeb. Fl. Ross. iv. 347 = F. tenuiflora.

CATASETUM

- 459¹ 1. *cristatum*, Lindl... sub t. 840; et t. 966.

CATHA

- 459³ a. *edulis*, Forsk... p. cvii.

CATTLEYA

- 461¹ a. *Devonia* X, Hort. cf. Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1863) 372 = *Laelia devoniensis*.
1. *devonientis* X, Hort. cf. Proc. Roy. Hort. Soc. iv. (1864) 178 = *Laelia devoniensis*.
461³ 1. *Pinellii*, Hort. ex Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 5, n. 9. Bras.

CAUCALIS

- 462¹ 1. *Carota*, Crantz, Umb. Class. 113; Huds.

CAUCANTHUS

- 462³ a. *edulis*, Forsk. Fl. Aeg. Arab. p. cxi. nomen = *arabicus*.

CEANOTHUS

- 464¹ 1. *bicolor*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. *Syst.* v. 300 =
1. *buxifolius*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. *Syst.* v. 300. —

CENCHRUS

- 470² a. *hordeiformis*, Pers. Syn. i. 71 = P. orientale.
1. *orientalis*, Willd. ex Trin. Gram. Panic. 69 =

CENTAUREA

- 473² a. *ephelidea* X, Franch. in Bull. Soc. Philom. Sér. VII. vi. (1882) 218. — Gallia.
474¹ a. *heteroblepharis* X, Franch. (l. c.) 217. — Gallia.
474² 1. *Jankeana*, Simk. in *Termész. Füzetek*, i. (1877).
a. *Kanitziana*, Źanka, ex Brandza, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. iv. (1884) 447, t. 2. — Dobrudscha.
474³ a. *microcentron* X, Franch. (l. c.) — Gallia.
475² 1. *Oliveriana*, DC. *Prod...* (non *Oliveriana*),
1. *omphalodes*, Coss. & Dur... nomen = *Volutarella omphalodes*.
476² 1. *Sadleriana*, Źanka, in *Közlem. Magyar Tudom. Akad.* xii. (1876) 178; et...
477² a. *xanthothrix* X, Franch. (l. c.) 219. — Gallia.

CENTROCHILUS

- 478³ 1. *gracilis*, Schau. tab. 13 (non 113) = *Habeneria tipuloides*.

CEPHAELIS

- 480² a. *acuminata*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1196. — N. Granat.

CEPHALANTHERA

- 481¹ a. *Austinae*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 619 = *oregana*.

CEPHALANTHUS

- 481¹ 1. *acuminatus*, Rafn... 25 = *occidentalis*.
chinensis, Lam... 678 = *Adina globiflora*?
obtusifolia, Rafn... 25 = *occidentalis*?
occidentalis, Lour... 67 = *occidentalis*, Linn.?
orientalis, Blume... 38 = *Nauclea* sp.
orientalis, Linn... 95 = *Nauclea orientalis*.
orientalis, Roem. & Schult... = *occidentalis*?

CERASTIUM

- 484¹ a. *Duriaei*, Cariot & St Lager, *Etude des fleurs*, ed. 8, ii. p. 129, ex Rouy & Fouc. Fl. Fr. iii. 221. — Alger.

CERASUS

- 486¹ a. *anglica*, *brevipes*, *communis*, *conglobata*, *Gondouini*, *longipes*, *nana*, *officinalis*, *peracida*, *propera*, *regalis*, *sativa*, *serotina*, *tenera*, Poit. & Turp. in Poit. *Pomol. Franç.* ii. = P. *Cerasus*.

CERATOSTIGMA

- 488³ 1. *plumbaginoides*, Bunge...

CERCIS

- 489² a. *tensis*, Sarg. in Garden & Forest, iv. (1891) 778 = *occidentalis*.

CEREUS

- 490² 1. *ctenoides*, Engelm.
491¹ a. *gummosus*, Engelm. in Zool. ii. (1891) 20. — Calif.
491³ *Martinii*, Mart. ex Lem. *Illustr. Hortie.* v. (1853) 17. — Am. austr.

CEROPEGIA

- 493¹ 1. *dichotoma*, Haw... — Ins. Canar. (non Ind. or. *errore Steudelii*).

CEROXYLON

- 494² 1. *andicola*, H. B. K... 2. t. 1.

CHADARA

- 496³ 1. *tenax*, Forsk... p. cxiv.
velutina, Forsk. (l. c.) 106.

CHAILLETIA

- 501² a. *capitulifera*, Spruce, ex Baill. in C. R. Assoc. Fr. Lyon (1874) 479 = *Tapura capitulifera*.
 501³ l. *gelonioides*, Bedd. For. Man. p. lix (1871); Hook. f. 570 = *sumatrana*.

- 502¹ a. **CHALEBUS**, Rafin. in Am. Monthly. Mag. i. (1817) 439 = **Salix**, Tourn.

CHAMAEDOREA

- 503¹ a. *corallina*, Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 58. — Venezuela; N. Granat.
crucifolia, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 59 = *glaucifolia*?
Hartwegi, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1885) i. 410 = *Sartorii*.
latifolia, Hort. ex W. Wats. (l. c.) = *Arenbergiana*.
 503² a. *stolonifera*, H. Wendl. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 59. — Hab.?
ventricosa, Hort. ex Hook. f. (l. c.) = *Gaussia Princeps*?

CHAMAERAPHIS

- 504³ *aspera*, Nees,

CHAMAEROPS

- 505¹ a. *elegans*, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 64 = *humilis*.

CHAVICA

- 508¹ a. *longa*, Karst. Pharm. Med. Bot. 478 = *Piper longum*.

CHELONE

- 511¹ a. *Scouleri*, Dougl. ex Lindl. Bot. Reg. sub t. 1277 = *Pentstemon Scouleri*.

CHENOPODIUM

- 513³ a. *virgatum*, Ambrosi, Fl. Tir. austr. ii. 179 = *capitatum*.

CHIONACHNE

- 515² l. *barbata*, Benn. in R. Br. . .

CHLORAEA

- 519¹ a. *oregana*, Nutt. ex Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 619 = *Cephalantha oregana*.

CHLORIS

- 519² a. *americana*, R. Br. Prod. 173 = *Bouteloua bromoides, juncifolia*.

- 522³ a. **CHONDROPHORA**, Rafin. New Fl. N. Am. iv. 79 (1836) = **Bigelowia**, DC. (Compos.).

CHORIZANTHE

- 524² l. *membranacea*, Benth. . . — Calif.

- 525³ l. **CHRYSALIDOCARPUS**, H. Wendl. in Bot. Zeit. (1878) 117 (non 171).

CHRYSANTHEMUM

- 526¹ l. **DENDRANTHEMA**. . . (1858) (non 1855).

- 527² a. **CHRYSASPIS**, Desv. Fl. Anjou, 338, in Syn. (1827) = **Trifolium**, Linn. (Legum.).
campestre, Desv. l. c. = *T. procumbens*.

CIMICIFUGA

- 535² a. *Cimicifuga*, Karst. Pharm. Med. Bot. 571 = *foetida*.

CINCHONA

- 535³ a. *bogotensis*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 530 = *officinalis*.
 536¹ *gironensis*, Mutis, (l. c.) 518, 521 (Al. gen. ?). — N. Granat.
 a. *Hookeriana*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1206 = *Cascarilla Hookeriana*.
 536³ a. *peruviana*, Mutis (l. c.) = *officinalis*.

CINCHONA

- 536³ a. *Purdiana*, Karst. (l. c.) 1207 = *Remija Purdiana*.

CINNAMOMUM

- 539³ a. *Cinnamomum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 503 = *zeylanicum*.
Culilaban, Karst. (l. c.) 504 = *C. Culilawan*.

CIRRHOPETALUM

- 541¹ a. *Cumingii*, Lindl. l. c. xxix. (1843).
 l. *delitescens*, Rolfe,

CIRSIIUM

- 542³ a. *Kornhuberi* X, Heimerl, in Verh. zool. bot. Wien, xxxiv. (1884) 95. — Austria.
 543² l. *pauciflorum*, Sweet. Hort. Brit. ed. I. 214; Koch,

CISSUS

- 545² l. *auriculata*, Roxb. . . 411 = *Vitis auriculata*.
 547² l. *tinctoria*, Arruda, . . . 496; Mart. . .

- 550² a. **CITROPHORUM**, Neck. Elem. ii. 401 (1790) = **Citrus**, Linn. (Rutac.).

CITRULLUS

- 550³ a. **RIGOCARPUS**, Neck. Elem. i. 238 (1790).
Citrullus, Karst. Pharm. Med. Bot. 889 = *vulgaris*.

CITRUS

- 551¹ a. **CITROPHORUM**, Neck. Elem. ii. 401 (1790).
 l. *Aurantium*, Linn. . . 782 (non 783).
 a. *Balotina, bicolor, bigena, communis*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. ii. = *C. Medica*.
 l. *decumana*, Murr. . . 580 (non 508).

CLADIUM

- 551³ *elynanthoides*, F. Muell.

- 552² l. **CLADRASTIS**, Rafin. in Cincinnati Literary Gazette, i. 60 (Feb. 21. 1824); et Neogenyt. I (1825).
fragrans, Rafin. ll. cc.

CLEMATIS

- 557¹ a. *hedysarifolia*, Lindl. Bot. Reg. t. 599 = *Meyeniana*.
 558¹ l. *soongarica*, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 331.

CLEOME

- 559¹ l. *dodecandra*, Linn. Sp. Pl. ed. I. 672; ed. II. . . — *Amphig.*
 559¹ a. *droserifolia*, Franch. in Revoil, Comali, ii. = *ovalifolia*, Defflers.
 559² l. *graveolens*, Rafin. . . = *dodecandra*.
 a. *Hamiltoniana*, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 239, in nota = *aculeata*.

- 562³ a. **CLEYERA**, Neck. Elem. iii. 402, Index (1790) = **CLEYRIA**, Neck.

CLYPEOLA

- 568³ l. *alliacea*, Berger. Phyt. iii. 155 = *Peltaria alliacea*.

CNICUS

- 570¹ a. **CEPHALANOPLIS**, Neck. Elem. i. 68 (1790).
 a. *benedictus*, Linn. Sp. Pl. 826 = *Carbenia benedicta*.
Carolorum X, Jenner. ex Hook. f. Stud. Fl. ed. II. 703. — *Scotia*.

COCCOLOBA

- 573² a. *Moritziana*, Klotzsch, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. I. 28 = *Moritzii* = *ovata*.
 573³ a. *parvifolia*, Schott, in Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 405. — Bras.
 l. *rigida*, Meissn. . . = *parvifolia Schott*.

COCCULUS

- 574² l. *flavicans*, Wall. . . = *Anisophyllea flavicans*.

COCHLEARIA

- 575² l. *longifolia*, Medic. Pflanzeng. 70; et in Usteri, l. *repanda*, Medic. (ll. cc.)

COCOS

- 576¹ a. *Blumenau*, Hort. Lind. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 72 nomen. — Hab.?
 576¹ a. *Butaei*, Hort. (l. c.). — Hab.?
 576² a. *Gaertneri*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1885) i. 439. — Hab.?
 l. *Normanbyi*, M. Hill. . . = *Ptychosperma Normanbyi*.
 a. *pernambucana*, Lodd. (l. c.). — Bras.
Sancona, Hook. f. (l. c.) — Bras.
 576² l. *ventricosa*, Arruda, . . . 485 = *Acrocomia scelerocarpa*.

COELOGLOSSUM

- 578² a. *cernuum*, Benth. Fl. Hongk. 362, sphalm. = *C. densum* = *stenostachya*.

COELOGYNE

- 578³ l. *Cumingii*, Lindl. Bot. Reg. (1840) (non 1843). Misc. . .
 579² *triplicatula*, Reichb. f. . . — Burma.

COFFEA

- 580² l. *stenophylla*, G. Don. . . — Afr. trop. (non Abyss.).

COIX

- 581¹ l. *exaltata*, Fisch. ex Jacq. Ecl. Gram. t. 40, Jacq. ex. . . 238.
 a. *gigantea*, Hort. ex Jacq. (l. c.) = *C. Lacryma-jobi*.
 l. *Ma-Yü-ên*, Romanet. . . Sér. III.

- 582¹ a. **COLDENELLA**, Ellis, in Linn. Corresp. i. 95 (1821) = **Coptis**, Salisb. (Ranunc.).

- 584¹ a. **COLLEMA**, W. Anders. ex R. Br. Prod. 553 (1810) = **Goodenia**, Sm.

COLLETIA

- 584¹ a. *iguanaea*, Scop. Introd. 207 = *Celtis aculeata*.

- 585³ a. **COLOSTEPHANUS**, Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. I. 417, in nota (1838) = **Cynanchum**, Linn.
 a. *capensis*, Harv. l. c. = *Cyn. capense*, Linn. f

COLPODIUM

- 586¹ l. *latifolium*, R. Br. . . 285 (err. typ. 186).

- 590¹ a. **COMES**, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 3 (1783) (quid?).
 a. *barcalis*, Buc'hoz, l. c. — Hab.?

COMMELINA

- 592¹ l. *nudiflora*, Linn. Sp. Pl. 41.

- 593¹ a. **COMMERCONIA**, F. Muell. Fragmenta xi. (1881) 113, in obs. = **Commersonia**, Forst. (Stercul.).

- 593¹ a. **COMMERSORCHIS**, Thou. Arch. Afr. tab. synop. i. (1822) = **Dendrobium**, Sw. (Orchid.).

COMMIPHORA

- 593² l. **BALSAMODENDRUM**, Kunth. . .
 l. *africanum*, Engl. [non Endl.].

- 594¹ l. **COMPTONIA**, L'Hérit. ex Ait. Hort. Kew. iii. 334 (1789); Banks. . .
 l. *asplenifolia*, Ait. (l. c.); Banks (l. c.).

CONNARUS

- 596² l. *Rolfe*, Vid. . . 106 = *trifoliolatus*.
 a. *trifoliolatus*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 212. — Ins. Philipp.

CONRADIA

- 599¹ l. *hispidia*, Benth. . . = *P. Sloanei*.

CONVOLVULUS

- 602² l. *gangeticus*, Linn. . . 306 = *Cocculus villosus*.
 603³ a. *macrophyllus*, Aitch. Cat. Pl. Punjab. 99, sphalm. = *microphyllus*.
 l. *mauritanicus*, Boiss. . . 122 = *elongatus*.
 l. *Mechoacan*, Vitman,

CONVOLVULUS

- 605² a. *rotundifolius*, *Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit.* iv. (1805) 307. — Hab. ?
 605³ *sinuatus*, Petagna, *Inst. Bot.* ii. 353 (1787) = *Ipomoea carnosa*.

CONYZA

- 608² 1. *halimifolia*, Scop. *Introd.* 129; Desf...
 608³ 1. *ivaefolia*, Scop. (l. c.); Less...

COPROSMA

- 611² 1. *concinna*, Colenso... = *rhamnoides*.
 1. *divaricata*, A. Cunn... *rhamnoides*.
 a. *divaricata*, Hook. f. *Fl. N. Zel.* i. 107, *partim*. — N. Zel.
 1. *lucida*, Endl. *Prod. Fl. Norfolk.* 60 = *Baueri*.
 611³ 1. *pumila*, Hook. f. = *repens*.

COPTIS

- 611⁴ a. *COLDENELLA*, Ellis, in *Linn. Corresp.* i. 95 (1821).
FIBRAUREA, J. Colden, in *Linn. Corresp.* i. 94, 98 (1821).

CORALLORRHIZA

- 612¹ a. *Corallorrhiza*, Karst. *Pharm. med. Bot.* 448 = *innata*.
 1. *Macraei*, A. Gray... = *striata* (*non stricta*).

- 612² *lin.* 1. 1. **CORALLORRHIZA** : —

CORBICHONIA

- 612² a. *decumbens*, Scop. *Introd.* 264 = *O. decumbens*.

CORCHORUS

- 612³ 1. *humilis*, Muaro, Hort. Agr. 35; et ex Stocks,

CORDIA

- 613³ a. *curassavica*, Auct. ex Fresen. in *Mart. Fl. Bras.* viii. 18 = *curassavica*, Roem. et Schult.?

CORNUS

- 619² a. *sativa*, Poit. & Turp. in *Poit. Pomol. Franç.* ii. = *sanguinea*.

CORONOPUS

- 620² a. *Coronopus*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 673 = *S. Coronopus*.

CORRAEA

- 620³ a. *Euphocarpus*, W. Anders. ex R. Br. *Prod.* 553 (1810).

CORVISARTIA

- 621¹ 1. *indica*, DC. ex Royle, *Illust. Bot. Himal.* 251, t. 60, f. 1;

CORYLUS

- 622³ a. *ardua*, Poit. et Turp. in *Poit. Pomol. Franç.* iv. t. 214 = *C. Avellana*.
 1. *Hasibani*, Sieb... = *heterophylla*.
heterophylla, Fisch... 74. — Japon.
 623¹ a. *sativa*, Poit. et Turp. (l. c.), t. 11 = *tubulosa*.
tetraphylla, Ledeb... = *heterophylla*.

CORYMBIS

- 623¹ 1. *CORYMBORCHIS*, Thou. *Orch. Afr. tab.* (1822).

- 623² a. *CORYMBORKIS*, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19* (1809) 318 = *CORYMBORCHIS*, Thou.

COSTUS

- 625² 1. *spicatus*, Scop. *Introd.* 94; Sw.

COTONEASTER

- 625³ a. *Cotoneaster*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 785 = *integerrimus*.

COTYLEDON

- 627¹ a. *DIATOSTEMON*, Salm-Dyck, in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xxii. (1854) 265.

COUEPIA

- 628² a. *PLERAGINE*, Arruda, ex Koster, *Trav.* 499 (1816).

COUROUPITA

- 629¹ a. *ELSHOLTZIA*, Neck. *Elem.* ii. 256 (1790).

COVELLIA

- 631² 1. *guttata*, Wight... = *F. guttata* (1888).

CRANTZIA, Scop.

- 633¹ a. *cristata*, Scop. *Introd.* 173 = *A. cristatus*.

CREPIS

- 641³ 1. *succisaefolia*, Tausch, in *Flora*, xi. (non ix.).

CRINUM

- 642² 1. *augustum* (*non angustum*).

CROCUS

- 644³ a. *appendiculatus*, Kern. ex Maw, in *Gard. Chron.* (1881) ii. 368, in syn. = *montenegrinus*.
 645² a. *melantherus*, Boiss. ex Maw, (l. c.) 749 = *Crewii*.
 645² 1. *montenegrinus*, Kern... (1881).
 645³ a. *serbicus*, Kern. ex Maw, (l. c.) 368 = *Tomasinianus* (*recte* *Tommasinianus*).
 646¹ a. *vernus*, Berger. *Phyton.* ii. 159 *partim* = *moesiacus*.
 a. *vernalis*, Billb. *Econ. Bot.* t. 8 = *vernus*.

CROSSANDRA

- 646² 1. *infundibuliformis*, R. Br. *Prod.* 477; Nees,

CROSSOSTYLIS

- 646³ 1. *grandiflora*, Brongn. & Gris, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* viii. (1861) 376, et ex Panch. et Sebert...
 1. *multiflora*, Brongn. et Gris, (l. c.) 378 = *Haplopetalum multiflorum*.

CROTALARIA

- 648³ 1. *latifolia* [*recte* *lotifolia*], Linn.
 650² a. *Stacyana*, Wall. in *Trans. Med. Phys. Soc. Calc.* vii. II. (1835) 228 = *occulta*.

- 651¹ a. *CROTOLARIA*, Neck. *Elem.* iii. 31 (1790) = *Crotalaria*, Dill. (*Legum.*).

CROTON

- 652² a. *ciliato-glandulosus*, Steud. *Nom. ed.* II. i. 446 = *ciliato-glanduliferus*.
 654³ a. *Luzianus*, Muell. *Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 218. — Bras.

CRUPINA

- 659¹ a. *Crupina*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 1126 = *vulgaris*.

CRYPTOPHORANTHUS

- 662¹ 1. *punctatus*,

CUBEBA

- 663¹ a. *Cubeba*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 478 = *P. Cubeba*.

CUPANIA

- 668² 1. *revoluta*, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiii. (1885) 211; Vidal,
subundulata, Rolfe, (l. c.); Vidal,

- 674² 1. *CUSPARIA*, Humb. *Tabl. Geogr. ex ej. Voy. Relat. Hist.* ii. 672 (err. typ. 172) (1819); et DC.
 674³ *febrifuga*, Humb. (ll. cc.).

- 676¹ a. *CYANORKIS*, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19* (1809) 317 = *CYANORCHIS*, Thou...

CYBIANTHUS

- 677³ a. *peruvianus*, Mig. in *Mart. Fl. Bras.* x. 298, in obs. — Peruv.

CYCLEA

- 678³ 1. *Burmanni*, Miers... 41.

CYCNOCHES

- 680³ 1. *chlorochilon*, Klotzsch, in *Allg. Gartenz.* vi. (1838) 225; Lindl.

CYDONIA

- 680³ a. *Cydonia*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 783 = *P. Cydonia*.

CYCLICODAPHNE

- 681¹ 1. *lucida*, Blume... = *L. lucida*.

CYMBIDIUM

- 682¹ 1. *IRIDORCHIS*, Thou. *Orch. Afr. tab. synop.* i. (1822); Blume,

CYNANCHUM

- 684¹ a. *africanum*, R. Br. *Prod.* 440 (*Cynoctoni* sp.). — Afr. austr.
 684² 1. *aphyllum*, Vell... (= *Amphistelma*... etc.).
 684³ a. *davuricum*, R. Br. (l. c.) = *roseum*.
 685³ a. *truncatum*, R. Br. (l. c.) = *pauciflorum*.

CYNODON

- 686² *convergens*, F. Muell.

CYNOGLOSSUM

- 687¹ a. *cyaneum*, Hort. ex Hook. f. in *Gard. Chron.* (1858) 240 = *Myosotidium nobile*.

- 688³ a. *CYNORKIS*, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19* (1809) 317 = *CYANORCHIS*, Thou.

CYPERUS

- 692² a. *elegans*, Schreb. ex Roth, in *Usteri, Ann. Bot.* x. (1794) 34.
 694¹ a. *Hochstetteri*, Krauss, in *Flora*,...
 695² a. *macrostachys*, Link, in *Schrad. Journ. Bot.* ii. (1799) 310. — Lusitan.
 695³ a. *Meyenianus*, Steud. *Syn. Pl. Cyp.* 300 (ind.) err. typ. = *Meyerianus*.

CYPHONEMA

- 701¹ a. *Buchanani*, Baker, in *Journ. Bot.* xiv. (1876) 66 = *Apodolrion Buchanani*.

CYPRIPEDIUM

- 702¹ *Sedeni* X, Veitch, *Cat.* (1874) 16; Gard. *Chron.* (1873) 1431.
selligerum X, Veitch, *Cat.* (1878) 22; [Reichb. f.]; cf. ii. p. 1279.
Wallisii, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 189 = *caudatum*.

CYRILLA

- 702¹ a. *fuscata*, Rafin. *Autik. Bot.* 8; ex Sargent, *Rep. For. N. Am.* 37 = *racemiflora*.
 a. *parvifolia*, Rafin. (l. c.), ex Sargent (l. c.) = *racemiflora*.
 a. *polystachia*, Rafin. (l. c.) ex Sargent, (l. c.) = *racemiflora*.

CYRTANTHUS

- 704¹ a. *luteus*, Baker, in *Journ. Bot.* xiv. (1876) 66 = *Anoiganthus breviflorus*.

CYRTANDRA

- 703² a. *peltata*, Wawra, in *Flora*, lv. (1872) 565 = *Wawrae*, Hilleb.

CYTISUS

- 706¹ 1. *alpinus*, Linn...
 706² a. *Atleyanus*, Hort. ex C. Koch, *Wochenschr.* (1867) 179 = *canariensis*, *decumbens*.
 707¹ *neapolitanus*, [Stuart], in *Linn. Corresp.* i. 28 (1821) = *Medicago arborea*?

D

DACTYLIS

- 708³ a. *calycina*, Scop. *Introd.* 74 = *Schismus marginatus*.

DACTYLOCTENIUM

- 709¹ a. *verticillatum*, Munro, Hort. Agr. 32 = *Eleusine verticillata*.

709² a. DACTYLORRHIZA, Neck. Elem. iii. 402, Index (1790) = DACTYLORHIZA, Neck.

DACTYLOSTEMON
709² *angustifolius*, Klotzsch... = *A. angustifolius*.
brasiliensis, Muell. Arg... = *A. Sprengelii*.
communis, Muell. Arg... = *A. Sprengelii*.
glabrescens, Klotzsch... = *A. Sprengelii*.
Hagendorffii, Klotzsch... = *A. Sprengelii*.
lasiocarpus, Klotzsch... = *A. lasiocarpus*.
obtusatus, Klotzsch... = *A. Sprengelii*.

DALBERGIA
710³ 1. *alata*, Roxb... 225 = *Derris thyrsiflora*.
711¹ *Championii*, Thw... 94 = *rostrata*, *R. Grah.*
711² *Pseudo-Sissoo*, Miq... 128 = *rostrata*, *R. Grah.*
711³ *purpurea*, Reinw... 53 = *Derris elliptica*.
purpurea, Wall. Cat. n. 5869 = *cana*, *R. Grah.*
rostrata, *R. Grah.*... 5867. — Ind. or.; Malaya.

DANTHONIA
715³ *compressa*, Peck, in *Ind. Ann. Rep. N. York State Cab.* (1869) 54; an eadem ac precedo.?
Raoulii, Steud... 246 = *rigida*, *Raoul.*
716² *rigida*, *Raoul*, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii.* (1844) 116. — *N. Zel.*
rigida, Steud... = *obtusifolia*.

DAPHNE
717² 1. *rufestris*, Facch. ex Ambrosi, *Fl. Tir. Austr.* ii. 244, 287 =

DARBYA
718² 1. *umbellulata*, A. Gray, ... 389 (non 386).

DARWINIA
718³ 1. *saturejaefolia*, Turcz... = *brevistyla*.

719³ a. DASYSpermum, Neck. Elem. i. 176 (1790) = Farrago Umbelliferarum.

DASYSTACHYS
719³ a. *Drimiopsis*, Baker, ex Benth. in Benth. & Hook. f. *Gen. Pl.* iii. p. 789. — Afr. trop.
Grantii, Benth. l. c. — Afr. trop.

720² a. DAUBENTONA, Buchhoz, *Herb. Col. Amer.* t. 20 (1783) = *Crescentia*? Linn. (*Bignon.*).

722¹ a. DAVILIA, Mutis, in Linn. *Corresp.* ii. 533 (1821) = *Croton*? Linn. (*Euphorb.*).

DEERINGIA
724² indica, *Zoll. ex Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 236. — Malaya, Ins. Philipp.

725² 1. DELPECHIA, Montr... = *Psychotria*, Linn. (*Rubiace.*).
artensis, Montr... = *Mapouria artensis*, Beauvis.
floribunda, Montr... = *M. floribunda*, Beauvis.

727¹ a. DELTONEA, Peckolt, in *Zeitschr. allg. oesterr. Apoth. Ver.* xxi. (1883) 185, nomen. = *Theobroma*, Linn. (*Stercul.*).
lactea, Peckolt, l. c. («*luctea*») = *T. grandiflorum*.

727² 1. DENDRANTHEMA, Des Moul... 1858 (non 1855).

DENDROBIUM
727² a. COMMERSORCHIS, Thou. *Orch. Afr. Tab.* Synop. i. (1822).
EPIDORKIS, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 318.
PHYLLORKIS, Thou. (l. c.) 319.
728¹ 1. *bifalce*, Lindl... 237 = *Doritis bifalcis*, Reichb. f.
brachycarpum, Rich... 282 = *Angraecum brachycarpum*.
729¹ 1. *galeatum*, Sw... = *Polystachya grandiflora*, Lindl.
729³ a. *lilacinum*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1865) 674. — Borneo.

DENDROBIUM
730¹ 1. *manilense*, Schau... 430 = *Appendicula manilensis*.

730³ 1. *pumilum*, Sw... = *P. bulbophylloides*, Rolfe.
1. *roscum*, Sw... 97 = *Polystachya elastica*, Lindl.
731³ a. *villosulum*, Lindl. in Lindl. & Paxt. *Flow. Gard.* ii. (1851) 82 = *Jerdonianum*.

DENDROCALAMUS
741³ a. *Brandisii*, Kurz, *For. Fl. Brit. Burma*, ii. 560. — Burma.

732² 1. DENDROLOBIUM, Benth.

733¹ a. DENDRORCHIS, Thou. *Orch. Afr. Tab.* Synop. (1822) = *Aërides*? Sw. (*Orchid.*).

733¹ a. DENDRORKIS, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 318 = *praec.*

DERRIS
734³ 1. *pinnata*, Lour... 432 = *Dalbergiae* sp.

DESCHAMPSIA
735¹ 1. *antarctica*, E. Desv...; Hook. f... — Ins. Antarct.

DESMODIUM
736³ 1. *dioicum*, DC... 338 = *confertum*.
floribundum, G. Don... 277 = *sambuense*.
737² *multiflorum*, DC... = *sambuense*.
sambuense, DC... 335. — Reg. Himal.

DEUTZIA
739³ 1. *staminea*, *R. Br.*... n. 3651; ... (non 365).

DIANELLA
741³ 1. *triandra*, Aiz. *Stirp. Guin. med.* 6 = *Palisota thyrsiflora*.

DICHONDRA
749² a. ESCALLONIA, Mutis, in Linn. *Corresp.* ii. 532 (1821).

DICHOPSIS
749³ 1. *Krantziana*, *Pierre*, in *Beauvis*.
a. *oblongifolia*, *Burck*, *Rapp. Guttia percha*, 17.

753² a. DICROSPERMA, W. Wats. in *Gard. Chron.* (1885) ii. 362, sphalm. = *Dictyosperma*, H. Wendl. & Drude (*Palm.*).

DIDYMOCARPUS
755¹ 1. *albicalyx*, C. B. Clarke (*non albicaulis*).
Hookeri, C. B. Clarke,
755² 1. *Lawesii*, F. Muell... 229 = *Boea Lawesii*, F. O. Forbes (1889).
polyantha, Veitch, *Cat.* (1856-57) 11 = *Streptocarpus polyanthus*.

DIDYMOSPERMA
756¹ a. *distichum*, Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 61 = *Wallichia disticha*.

DIEFFENBACHIA
756² 1. *Bowmanni*, Veitch, *Cat.* (1871) 15; *Carr.*...

DILLENIA
759¹ 1. *Andreana*, F. Muell... 175 = *Saurauja Andreana* (in *Suppl.*).

DIMERIA
760¹ d. PTERYGOSTACHYUM, Nees (nunc = *Arundinella*).

760² 1. DIMESIA, Rafin... i. (1817) 442; et (1818).
760² 1. *fragrans*, Rafin (ll. cc.).
monticola, Rafin (ll. cc.).

DIOSMA
765³ 1. *odoratissima*, Montin... 105... (non 104).

DIOSPYROS
766² *bilocularis*, Hook. Ic. t. 2336 = *Maba Main-gayi*, Hiern.
767¹ 1. *Embryopteris*, Pers... — As. trop. (non Afr.).

768³ 1. DIOTOSTEMON, Salm-Dyck, ... 265.

DIPLACUS
769³ 1. *arachnoideus*, Greene, in *Bull. Calif. Acad. i.* (1885) 210 = *longiflorus*.
770¹ 1. *longiflorus*, Greene, in *Bull. Calif. Acad. i. II.* (1885) 96 partim. — Calif.

DIPLADENIA
770¹ a. *hybrida*, Veitch, *Cat.* (1878) 26. — Hab.?

DIPLOCHONIUM
671¹ a. *Hochstetteri*, Stocks, ex Aitch. *Cal. Pl. Punjab*, 66 = *Orygia decumbens*.

773¹ a. DIPLOPIA, Rafin, in *Am. Monthly. Mag. i.* (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

DIPLOTHEMIUM
774¹ a. *glaucescens*, W. Wats. in *Gard. Chron.* (1885) ii. 394, sphalm. = *caudescens*.

DISPERIS
780¹ a. DRYORKIS, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 316.

DISSOTIS
781² 1. *rotundifolia*, Triana...

782² a. DISYNIA, Rafin, in *Am. Monthly. Mag. i.* (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

DODECATHEON
784¹ a. BARTRAMIA, Ellis, in Linn. *Corresp.* i. 16 (1821).

DOLICHOS
786¹ 1. *frutescens*, Buch.-Ham... = *Pueraria Wallichii*.
hexandra, Roxb... = *Dioclea reflexa*.
786² *sesquipedalis*, Linn...; Blanco, ... = *Vigna Catjang*

DOLIOCARPUS
787² a. SERVERIA, Neck. Elem. ii. 98 (1790).

DOMBEYA
787³ a. *arabica*, Baker, ... = *Glossostemon Bruguieri*, DC.

DOODIA
789¹ 1. *simplicifolia*, Roxb... 366 = *Urania hamosa*.

DORYANTHES
791² a. Larkini, C. Moore, in *Fourn. Proc. Roy. Soc. N. S. Wales*, xviii. (1885) 85. — Austral.

792¹ 1. DOUARREA, Montr... = *Psychotria*, Linn. (*Rubiace.*).
alba, Montr... = *Mapouria Douarrei*.
speciosa, Montr... = *M. speciosa*.

DRABA
793¹ 1. *cheirifolia*, Berger. *Phyton.* iii. 89. — Hab.?
794² *montana*, Berger. (l. c.) 105. — Hab.?
795¹ a. *spatulata*, Berger. (l. c.) 107 = *Alyssum alpestre*.

DRACAENA
796² 1. *triandra*, Schult. *Syst.* vii. 354 = *Palisota thyrsiflora*.

DRIMIA
798³ 1. *Burchellii*, Baker, *Ref. Bot.* iii. *App.*

DRIMYS
799² a. *insularis*, Baill. ex F. Muell. *Fragm.* ix. 76, nomen = *Howianum*.

DRYMOPHLOEUS
802¹ *Normanbyanus*, Benth. & Hook. f... *Ptychosperma Normanbyi*.

802² a. DRYORKIS, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 316 = *Disperis*, Sw. (*Orchid.*).

DUPONTIA

- 804² a. *Fischeri*, Nees, Brown's Verm. Schr. i. (1875) 425 = seq.
1. *Fischeri*, R. Br... 291 (err. typ. 191).

DYPSIS

- 805³ a. *Hildebrandtii*, Hort. Van Houtte, ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 58, nomen. — Madag. *madagascariensis*, Hort.; cf. W. Wats. in Gard. Chron. (1885) ii. 394 = *Areca madagasca-riensis*.

DYSOXYLUM

- 806³ 1. *malabaricum*, Bedd. ex Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 548. — Ind. or.

E

EBERMAIERA

- 807³ 1. *Anigozanthus*, Nees, ... 16 (non 17).
1. *spatulata*, Nees, in DC. Prod. xi. 74 (cum cit. falsa) =

ECHEVERIA

- 809¹ 1. *nuda*, Lindl. in Gard. Chron.

ECHINOCACTUS

- 810² a. *ctenoides*, Lem. Cact. 57 = *Cereus ctenoides*.
811³ a. *Orcuttii*, Engelm. ex Orcutt. in West Amer. Scientist, ii. (1886) 46, cum ic. — Calif.

EDWARDSIA

- 822³ a. *hydaspica*, Edgew. ex Aitch. Cat. pl. Punjab, 50, in syn. (Quid. ?). — Ind. or.

- 824¹ a. *EHRETIANA*, Collinson, in Linn. Corresp. i. 32 (1821) = *Periploca*, Tourn. (Asclep.).

EHRHARTA

- 824¹ 1. *capensis*, Thunb... 8. — Afr. austr. erecta, Lam... 347. — Afr. austr. *Mnemeiteia*, Linn. f... 209 = *capensis*.
panicca, Sm... 32 = erecta.

ELAEOCARPUS

- 826¹ 1. *oblongus*, Gaertn. Fruct. i. 202, t. 43, f. 3; Sm.

ELAPHRIUM

- 827² a. *octandrum*, Scop. Introd. 225 = *B. tomentosa*.

ELCAJA

- 829¹ 1. *emetica*, M. Roem. Syn. Hesper. 116 = *T. emetica*.

ELEOCHARIS

- 830¹ 1. *dispar*, E. Hill = *capitata*.
emarginata, Klotzsch,
gracilis, R. Br.
nigrescens, Kunth, ... — Bras.

- 831¹ 1. *ELEOGENUS*, Nees,

ELETTARIA

- 831³ a. *MATONIA*, Sm. in Rees, Cyclop. xxxix. sub *Elettaria* (1819).
832¹ 1. *pallida*, Blume,

ELEUSINE

- 832¹ *OCHTHOCLOA*, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xi. (1842) i. 26.

- 833¹ 1. *ELISARRHENA*... = *Elissarrhena*...

- 833³ a. *ELLISIA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 295 (1821) = *Frasera*, Walt. (Gentian).

- ELLISIA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 418; 433-4; (1821) = *Gelsemium*, Juss. (Logan).

- 833³ a. *ELLISIANA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 364, 378 (1821) = *Gelsemium*, Juss. (Logan).

- 834¹ a. *ELSHOLTZIA*, Neck. Elem. ii. 256 (1790) = *Couroupita*, Aubl. (Myrtac.).

ENCEPHALARTOS

- 838³ 1. *Ghellinckii*, Lem. Ill. Hort. xiv. (1867) 80. —

ENDESPERMUM

- 839³ 1. *scandens*, Blume... = *Dalbergia tamarindifolia*.

EPIDENDRUM

- 847³ a. *hypoleptum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1877) i. 810, in nota = *Pinelia hypolepta*.
850² *teretifolium*, Sw... 121 (non 120).

- 851² a. *EPIDORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318 = *Dendrobium*, Sw. (Orchid.).

EPILOBIUM

- 852¹ 1. *canescens*, Westendorp, in Bull. Acad. Sc. Brux. iii. (1836) 356-361; White,...

EPIPOGUM

- 856¹ 1. *Guilfoylia*, F. Muell... 30, ex Benth, Fl. Austral. vi. 308 = *nutans*.

ERAGROSTIS

- 857² 1. *Brownii* [Nees, in] Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 253 = *elongata*, Jacq.
857³ a. *elata*, Munro, ex *Ficalho et Hiern*, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1881) 32. — Afr. trop.
858¹ a. *Eragrostis*, Karst. Pharm. Med. Bot. 389 = *minor*.
minor, Host, Gram. iv. 15 (1809); Fl. Austr.
858² 1. *namaquensis*, Nees, Ind. Sem. Vratisl. 1835; ex Linnaea, xi. (1837), Litt. 125 = *interrupta*, Beauv.
858³ *poaeoides*, Beauv. Agrost. 162, nomen = *minor*.

ERANTHEMUM

- 860¹ a. *PSEUDERANTHEMUM*, Radlk. in Sitzb. math.-Phys. Cl. Akad. Wiss. Muench. xiii. 1883 (1884) 282.
859² a. *asperum*, Hook. f. = *bicolor*.
859³ a. *Eldorado*, Hort. Williams, ex Just, Bot. Jahresb. 1877 (1879) 935. — Hab. ?
860¹ a. *punctulatum*, Hook. f. Bot. Mag. sub t. 5711, sphalm. = *asperum*, *bicolor*.
860² 1. *Zollingerianum*, Nees, ... Java (non Ins. Philipp.).

ERANTHIS

- 860² a. *CAMMARIUM*, Hill, Brit. Herb. 47 (1756).

ERCILLA

- 860³ 1. *spicata*, Moq... 35 = *volubilis*.

ERIA

- 863¹ 1. *clavicaulis*, Lindl. (non Wall. ex).
863² 1. *erecta*, (non crecta).

ERIACHNE

- 864² 1. *triseta*, Nees, ... Ind. or. [non Afr. austr.].

ERICA

- 866¹ a. *cantabrica*, Collins. in Linn. Corresp. i. 69 (1821) = *Daboecia polifolia*.
capillaris, Bartl.
871² 1. *simplicifolia*, Donn, Hort. Cantab. ed. I. 46 = *curviflora*, *buccinaeformis*.
d. simplicifolia, Steud.
872² *Zeyheri*, Spreng. f.

- 880³ 1. *ERIOCYLAX*, Neck.

ERIOILAENA

- 882² 1. *quinquelocularis*, Wight, Ic. sub t. 882, in obs.; Bedd. Fl. Silv. Anal. t. 5.

ERIOPHORUM

- 883¹ a. *lineatum*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 1052 = *Scirpus lineatus*.

ERIOSTEMON

- 885¹ a. *Turczaninowia*, F. Muell... = *Crowea* (non (Correa)).

- 885¹ a. *ERIOSTEMON*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 320, in syn., lapsu = *ERIOSTOMUM*, Hoffmagg. & Link.

- 885² a. *ERITHRAEA*, Neck. Elem. ii. 10 (1790) = **Erythraea**, Renealm. (Gentian.).
a. *aquatica*, *aurea*, *rivalis*, *pumila*, *scilloides*, *verticillata*, Neck. l. c., nomina nuda.

ERODIUM

- 887² *chumbulense*, Munro, Hort. Agr. 35 = *Monsonia senegalensis*.
887³ 1. *malachoides*, G. Don, Gen. Syst. i. 724 = seq. *malacoides*, Willd.

- 888³ a. *ERPORKIS*, Thou, in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 317 (Orchid.) (Quid. ?).

ERYSIMUM

- 892² 1. *antarcticum*, Verl... 94 = *ochroleucum*.

- 898² *ESCALLONIA*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 532 (1821) = *Dichondra*, Forst. (Convolv.).

EUCALYPTUS

- 901¹ a. *AROMADENDRUM*, W. Anders. ex R. Br. Prod. 553 (1810).
902³ *splachnicarpa*, Benth. Fl. Austral. iii. 256, in syn. = seq.
splachnicarpon, Hook. Bot. Mag. t. 4036. —

EUCLIDIUM

- 904¹ a. *HEROCHONTIS*, Medic. Pflanzeng. 51 (1792).

EUGENIA

- 905¹ 1. *acris*, Wight & Arn... = *Pimenta acris*.
908² 1. *lucida*, Banks, ex Gaertn. Fruct. i. 167, t. 33, fig. 1. — Austral.
909¹ a. *Michellii*, Parodi, Contrib. Fl. Parag. iv. (1879) 122. — Parag.
906² 1. *myrtifolia*, Sims, Bot. Mag. t. 2230; Benth. = *paniculata*, Banks.
9. 9³ 1. *paniculata*, Banks, ex Gaertn. Fruct. i. 167. — Austral.
paniculata, Lam... — Ins. Borb.

EULOPHIA

- 913² a. *sumatrana*, Blume, Orch. Archip. Ind. 183, in nota; et Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 743. — Sumatra.

EUONYMUS

- 914² a. *Koopmannii*, Lauche, in Garten-Zeit. ii. (1883) 112, t. [3], f. 2 = *nanus*.

EUPATORIUM

- 915¹ a. *KOANOPHYLLO*, Arruda, ex Koster, Trav. 495 (1816).
917² *grandiflorum*, André, in Rev. Horticole (1882) 384, cum tab. — Hab. ?
920³ 1. *Torreyanum*, [Short, in] Transylv. Journ. med. n. 32, viii. (1836) 575; et

- 921¹ a. *EUPHOCARPUS*, Anders. ex R. Br. Prod. 553, in adnot. (1810) = *Corraea*, Sm. (Rutac.).

EUPHORBIA

- 923¹ a. *cantabrica*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 247, in syn. = *pilosa*.
Chamaecise, St Amans, Fl. Agen. 188 = *E. Chamaesyce*.
925¹ a. *grandidens*, Goebel, Pflanzensch. i. 41, lapsu = *grandicornis*.
925² a. *heptagona*, Munro, Hort. Agr. 28 nomen (quid?). — Ind. or.
927¹ a. *montana*, Rafn. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 450. — Sicil.

EVALLARIA

- 938¹ a. *bifolia*, Neck. l. c. = *Maianthemum Conval-laria*.
a. *latifolia*, Neck. l. c. = *Polygonatum latifolium*.
a. *multiflora*, Neck. l. c. = *P. multiflorum*.

EVODIA

- 939¹ a. *BONINIA*, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xiv. (1871) 309, in nota.

EVOLVULUS

- 940¹ l. *gangeticus*, Linn... 391, fide herb. = *Cocculus villosus*.

EXACUM

- 940³ a. *FLOYERA*, Neck. Elem. i. 386 (1790).

F**FAGUS**

- 946¹ *glutinosa*, Poepp. & Endl.... 194 (*Eucryphiae* sp.).
sinensis, Oliver, in Hook. Ic. t. 1936 = *F. sylvatica* var.

FALCARIA

- 946² a. *Falcaria*, Karst. Pharm. Med. Bot. 835 = vulgaris.

FEDIA

- 948³ a. *sibirica*, Scop. Introd. 137 = *Patrinia sibirica*.

FERULA

- 950³ l. *aurea*, Link... = communis.
951¹ l. *foetidissima*, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 593. — Turkestan.
991¹ a. *Jaeskeana*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 708 (non Vatke). — Reg. Himal.
1. *Linkii*, Webb et Berth... 160 = communis.
a. *Loscosii*, Willk. Ind. sem. Hort. Prag. (1882). = Hispan.

FESTUCA

- 953³ l. *glomerata*, Scop. Introd. 74; All.
954² *herguensis*, Hook. f.... = *Poa kerguelensis*.

- 957¹ a. *FIBRAUREA*, J. Colden, in Linn. Corresp. i. 94, 98 (1821) = *Coptis*, Salisb. (Ranunc.).

FICARIA

- 957¹ a. *Ficaria*, Karst. Pharm. Med. Bot. 565 = *R. Ficaria*.

FICINIA

- 957³ l. *trichodes*, [C. B. Clarke, in] Ind. Kew. —

FICUS

- 958³ a. *burdigalensis*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. iv. t. 329 = *F. Carica*.

FILAGO

- 965³ a. *Pseudo-Evax*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 233. — Hispan.

FIRENSIA

- 968² a. *flavescens*, Scop. Introd. 156 = *Cordia flavescens*.

- 971³ a. *FLOYERA*, Neck. Elem. i. 386 (1790) = *Exacum*, Linn. (Gentian.).

FOENICULUM

- 972¹ a. *Foeniculum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 837 = vulgare.

FONTANESIA

- 972² l. *phylliraeoides*, Labill. (phyllyraeoides).

- 972³ a. *FORGEROUXIA*, Neck. Elem. iii. 403, 415. Index (1790); Steud... = *FORGEROUXA*, Neck.

FOSSELINIA

- 973³ a. *Fonthlaspi*, Scop. l. c. sphalm. = seq.
l. *Fonthlaspi*, Scop. l. c.; All.

FOTHERGILLA

- 973³ *admirabilis*, Aubl. Pl. Gui. 440 (quoad exempl. nonnulla) = *mirabilis*.

FOTHERGILLA

- 973³ a. *anamelis*, Garden, in Linn. Corresp. i. 340, 599 (1821).
mirabilis, Aubl. l. c. t. 175 =

FOUQUIERA

- 973³ a. *gigantea*, Orcutt, in West Amer. Scientist, ii. (18^o6) 48. — Calif.

FRAGARIA

- 974² a. *bargea*, *campana*, *florentina*, *heterophylla*, *pistillaris*, *portentosa*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. ii. = *vesca*.
a. *bathonica*, *caroliniana*, *grandiflora*, *Suchiana*, Poit. & Turp. (l. c.) = *virginiana*.
a. *Gillmani*, *Clinton*, in Am. Natural. iii. (1869) 221. — Mexico.

FRANGULA

- 975² a. *Frangula*, Karst. Pharm. Med. Bot. 868 = *R. Frangula*.

FRASERA

- 976¹ a. *ELLISIA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 295 (1821).

FRAXINUS

- 977¹ l. *potamophila*, Herd.... — Turkestan.

FREYCINETIA

- 978² l. *radicans*, Gaudich.... — Ins. Molucc. (Raurak).

FRITILLARIA

- 980² a. *Savanna*, Stejneger, in Proc. U. S. Nat. Mus. vi. (1883) 63, nomen = *camtschatcensis*.

FUCHSIA

- 981¹ l. *coccinea*, Curt. Bot. Mag. t. 97; [Soland, in] Ait. Hort. Kew.
l. *Kirkii*, Hook. f.... i. ed. II. (1871) 92 = *procumbens*.
981² a. *pendulina* X, Veitch, Cat. (1856-57) 5.

G**GAGEA**

- 985¹ l. *BOISSIERA*, Haenseler, ex Willk. in Bot. Zeit. iv. (1846) 313.

GALEOBDOLON

- 990¹ a. *Galeobdolon*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1010 = *L. Galeobdolon*.

GALIMUM

- 991³ a. *Bailloni Brantza*, in Anal. Acad. Romane, Sér. II. ii. (1881) 588, l. — Europ. merid.
994² a. *orbibracteatum*, Chaub. in St Amans, Fl. Agen. 66, t. s.

GARDENIA

- 999² a. *AUGUSTA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 102, 106 (1821).
PORTLANDIA, Ellis l. c. 122 (1821).
WARNERIA, Ellis l. c. 100 (1821).
1000¹ l. *Manganjaj*, Hiern, in Oliver, Fl. trop. Afr. iii. 103 = *Randia Buchanani*, Oliver.

- 1000³ a. *GARDENIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 86 (1821) = *Calycanthus*, Linn.

- GARDENIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 130 (1821) = *Gelsemium*, Juss. (Logan.).

- GARDENIA*, Linn. Corresp. i. 135 (1821) = *Kleinhovia*, Linn. (Stercul.).

GARRYA

- 1001² l. *Fadyenii*, Hook. Ic. Plant. t. 333 (non *Fadyena*).

GASTRODIA

- 1002³ l. *javanica*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 384 (dele Endl. Gen. 212).

- 1003¹ a. *GASTRORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 317 (Quid?) (Orchid.).

- 1004² a. *GAUNIA*, Scop. Introd. 76 (1777) = *Gahnia*, Forst. (Cyperac.).

GELSEMIUM

- 1007² a. *ELLISIANA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 364, 378 (1821).
GARDENIA, Ellis, in Linn. Corresp. i. 130 (1821).

GENISTA

- 1010³ a. *ramosissima*, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 151 = *Cytisus canariensis*.

GENTIANA

- 1012³ l. *Campellii*, Hombr... = *cerina*.
concinna, Hook. f.... = *cerina*.
1013³ l. *Hookeri*, Armst... = *saxosa*.
1014¹ l. *Novae-Zelandiae*, Armstr.... = *montana*.
1015¹ l. *saxosa*, Forst. f. — N. Zel.

GEOFFRAEA

- 1016¹ a. *spinosa*, Arruda, ex Koster, Trav. 497 = *superba*.

GEONOMA

- 1016² a. *chiriquensis*, Hort. Lind. ; cf. Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 60. — Hab. ?
1017¹ l. *Swartzii*, Griseb. = *Calyptrogyne Swartzii* (Add.).

GERANIUM

- 1017³ a. *album*, Myers, in Am. Natural. iv. (1870) 438 = *maculatum*.
1020¹ a. *malachoides*, G. Don, Gen. Syst. i. 724, in Syn. = seq.
l. *malacoides*, Linn... = *Erodium malacoides*.

GETHYLLIS

- 1285¹ l. *polyanthera*, Soland. ex Britten,

GEUM

- 1025³ a. *BEKNOULLIA*, Neck. Elem. ii. 97 (1790).

GIGANTOCHLOA

- 1027¹ a. *aspera*, Kurz, ex Teijsm. & Binn. Cat. Pl. Bogor. 20 = *Oxytenanthera nigrociliata*.
a. *Wallichiana*, Kurz l. c. nomen (Quid?) — Burma.

- 1027² a. *GIGOTORCYA*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 62 (1783) (Quid?).

GIRTANNERIA

- 1029² a. *Frangula*, Neck. l. c. = *R. Frangula*.
Jujuba, Neck. l. c. = *Zizyphus Jujuba*.
lineata, Neck. l. c. = *Berchemia lineata*.
micrantha, Neck. l. c. = *Irama micrantha*.
Nopeca, Neck. l. c. = *Zizyphus Naepca*.
Oenopia, Neck. l. c. = *Zizyphus Oenopia*.
saxatilis, Neck. l. c. = *R. saxatilis*.
Spina-Christi, Neck. l. c. = *Zizyphus Spina-Christi*.
theezans, Neck. l. c. = *Sageretia theezans*.

GLADIOLUS

- 1031³ l. *strictus*, Jacq. (dele t. 260).
1037¹ a. *sulphureus*, De Graaf, ex Molkenb. in Tuinbouw-Flora, i. (1855) 39. — Transvaal.

GLAUCIUM

- 1032² a. *Glaucium*, Karst. Pharm. Med. Bot. 649 = *flavum*.

GLOBBA

- 1033³ l. *coccinea*, Hort. Veitch... = *atrosanguinea*.

GLOSSOGYNE

- 1035³ l. *Kennedyi*, R. Br. ter... 259 = *Calotis lappulacea*.

GLYCERIA

- 1037¹ a. *Langeana*, *Berl. in Ofvers. Vel. Akad. Förh.* xli. (1884) n. VII, 79. — Groenl.

- 1039¹ l. **GLYCOSMIS** (err. typ. **GYCOSMIS**).

GNAPHALIUM

- 1041² l. *contortum*, Buch. Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 175;
1044³ *quintuplinerve*, Buch. Ham. ex D. Don, (l. c.) 174;

GNETUM

- 1046³ l. *urens*, Blume... 162 = G. Thoa.

- 1048³ a. GOMEZIA, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 529 (1821) = GOMOZIA, Mutis = **Nertera**, Banks et Soland. (Rubiace.).

GOMPHANDRA

- 1049¹ l. *laxiflora*, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiii. (1885) 211; *Vidal*,
1049² l. *polymorpha*, Wight, *Ill.* 103; et DC.

GOMPHRENA

- 1051³ l. *Brownii*, Moq... = *lanata*.
1052² *rhodantha*, Seub. in Mart. Fl. Bras. v. I. 220 = *rodantha*.

GONGORA

- 1053¹ *saccata*, Reichb. f... — Bras.

GONGROTHAMNUS

- 1053² a. *multiflorus*, Klatt, in *Flora*, lxviii. (1885) 205. — Ins. Mascar.

GONOLOBUS

- 1054² l. *biflorus*, Nutt. ex Decne. in DC. Prod. viii. 605 (1844).

GOODENIA

- 1055³ l. COLLEMA, W. Anders. ex R. Br. Prod. 553 (1810).

GOODYERA

- 1056³ a. *celebica*, Blume, *Orch. Archip. Ind.* 43. — Ins. Celebes.
grandis, Blume, *Orch. Archip. Ind.* 43. — Java.
1. *Menziesii*, Lindl... 492 (non 402).
a. *taitensis*, Blume, l. c. — Ins. Tahiti.

GORDONIA

- 1057¹ a. HUXHAMIA, Garden, in Linn. Corresp. i. 408 (1821).
a. *praelucida*, Buch. in Herb. Col. Amér. t. 21 = ?

GORTERIA

- 1057² *rigens*, Linn. Am. Acad... = (dele « Pl. Afr. Rar. 23 »).

GOSSYPIUM

- 1058² a. *Vaupelii*, J. Graham, Cat. Pl. Bomb. 15. —

- 1060³ a. GRAPHORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318 = **Limodorum**, Sw. (Orchid.).

GREWIA

- 1065² *pilosa*, Lam. [dele « Suppl. »].

GROSOURDYA

- 1067² l. *elegans*, Reichb. f... — Ins. Sunda.
a. *Hystrix*, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 123 = S. *Hystrix*.

GROSSULARIA

- 1067² l. *diacantha*, Mill... = R. *Diacantha*.

GUAZUMA

- 1070² l. *tomentosa*, H. B. & K... 320 (non 32).

GUNNERA

- 1072³ l. *strigosa*, Colenso, ... = *monoica*.

GYMNADENIA

- 1074¹ a. *conopsea*, Pérard, in Bull. Soc. Bot. Fr. xvii. (1870) 368 = G. *conopsea*.

GYMNOCARPOS

- 1076¹ a. *deserti*, Forsk. l. c. p. lxiii.

GYMNOTRIX

- 1078² a. *flaccida*, Munro ex Aitch. Cat. Punj. Pl. 163 = P. *flaccidum*.

1. *purpurascens*, Sw. ex Trin. Gram. Panic. 64 =

- 1079¹ a. GYNICIDIA, Neck. Elem. ii. 81 (1790) = **Mesembryanthemum**, Dill. (Ficoid.).

GYPSOPHILA

- 1080³ a. ASOPHILA, Neck. Elem. ii. 162 (1790).
1081¹ *Haynaldiana*, Janka, in Közlem. Magyar. Tudom. Akad. xii. (1876) 165 =

H**HABENARIA**

- 1082² l. *albida*, R. Br. Prod. 312; et in Ait.
1082³ l. *bifolia*, R. Br. l. c.; et in Ait.

- a. *Burmanni*, R. Br. l. c. = *Bartholina pectinata*.

1. *ciliaris*, R. Br. l. c.; et in Ait.

- 1083¹ l. *cristata*, R. Br. l. c.; et in Ait.
a. *eustachya*, Reichb. f. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. iii. (1885) 274. — Ind. occ.

- 1083² l. *fimbriata*, R. Br. l. c.; et in Ait.

- 1083³ a. *hispidula*, R. Br. l. c. = *parvifolia*.

1. *hyperborea*, R. Br. l. c.; et in Ait.

1. *longecalcarata*, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. (non III) xv. (1841) 71, t. 3.

- 1084¹ a. *monorhiza*, Reichb. f. l. c. = *brachyceratitis*.

- 1084² a. *psiloceras*, Welw. ex Reichb. f. in *Flora*, l. (1867) 99. — Afr. trop.

- 1084³ l. *rhodocheila*, Hance... 1866 (non 1856).

- a. *Roxburghii*, R. Br. Prod. 312 = *platyphylla secunda*, R. Br. l. c. = *Holothrix secunda*.

- 1085¹ l. *tipuloides*, Benth. in *Journ...* 355; Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 626.

- 1085² l. *viridis*, R. Br. l. c.; et in Ait.

- 1085² a. HABENORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 317 = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

HABZELIA

- 1086¹ l. *aromatica*, A. DC. = *Xylopia aromatica*.

HAEMADICTYON

- 1086² l. *venosum*, Lindl... 70.

HAEMARIA

- 1087¹ l. DICROPHYLLA, (non DICHROPHYLLA).

HAEMATOCARPUS

- 1087¹ a. *incusus*, Miers, Contrib. iii. 327 = *Thomsoni*.

- 1087³ l. HAGEA, Pfeiff. Nom. Bot. i. 1544 (1874) cum cit. falsa = **Brayera**, Kunth (Rosac.).

- 1089¹ a. HALAEA, Garden, Linn. Corresp. i. 378, 379 (1821) = **Berchemia**, Neck. (Rhamnac.).

- 1089¹ a. HALEA, Linn. Corresp. i. 365 (1821) = **Eupatorium**, Tourn. (Compos.).

- 1089¹ a. HALEA, Linn. Corresp. i. 365 (1821) = **Schlosseria**, Garden (Gen. dub. Palm.).

HALESIA

- 1089² a. TETRAPTERIS, Garden, in Linn. Corresp. i. 406 (1821).

HALLERIA

- 1090¹ l. *elliptica*, Thunb. in Nov. Act. Upsal. vi. (1799) 39. — Afr. austr.

HAMMATOLOBIUM

- 1092³ a. *gracuum*, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 171. — Graecia.

- 1092³ l. **HANCORNIA**, Gomes, Obs... (1893); et in Mem.
a. **RIBEIRIA**, Arruda, ex Koster, Trav. 499 (1816).

HAPALOSTEPHIUM

- 1093¹ l. *paludosum*, pilosum, pyrenaicum, sibiricum, cf. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 210 (1827).

- 1099¹ a. HEDERORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 319 (Quid?) (Orchid.).

HEDYCHIUM

- 1100¹ l. *speciosum*, Wall... — Ind. or.

- 1100¹ l. HEDYOSMOS, Mitch... = **Cunila**, Linn. (Labiata) (non **Ziziphora**, Linn. (Rubiace.)).

HEDYSARUM

- 1103³ a. *ascendens*, Lindl. Bot. Reg. t. 815 = *adscendens*, Sw.

- 1104³ l. *dioicum*, Buch.-Ham... = *Desmodium confertum*.

- 1106² *parviflorum*, Spreng... = *Desmodium sambuense*.

- procumbens*, Roxb... = *Alysicarpus hamosus*, *sambuense*, D. Don... = *Desmodium sambuense*.

- 1107³ a. *virgatum*, Cerv. ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 130 = *Desmodium uncinatum*.

HELIANTHEMUM

- 1110² a. *Helianthemum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 633 = *vulgare*.

HELIANTHUS

- 1112³ a. *mollis*, Buch. in Herb. Col. Amér. t. 51 (Quid?) — Hab. ?

HELICHRYSUM

- 1114¹ a. *coralloides*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. ii. 311. — N. Zel.
a. *depressum*, Benth. & Hook. f. l. c. — N. Zel.

HELICOPHYLLUM

- 1117² l. *crassifolium*, Engl... = H. *Lehmanni*.

HELIOTROPIUM

- 1120² a. *deserti*, Vatke, in Oest. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 166 = *Verbena supina*.

HEMARTHRIA

- 1125¹ a. *laxa*, Steud. Syn. Pl. Gram. 358 = *Rottboellia compressa*.

HEMEROCALLIS

- 1125² l. *japonica*, Thunb. Fl. Jap. 142 = F. *ovata*.
a. *japonica*, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 335 = *Funkia Sieboldiana*.

- 1127¹ l. HEMIMERIS, Linn. Pl. Afr. Rar. 8 (1760) quoad spec. = **Diascia**, Link & Otto (Scroph.).
Bonae-spei, Linn. l. c. = D. *Bergiana*.

HEPATICA

- 1129² a. *Hepatica*, Karst. Pharm. Med. Bot. 559 = A. *Hepatica*.

HERACLEA

- a. *capillata*, Hill, l. c. = C. *capillata*.
phrygia, Hill, l. c. = C. *phrygia*.

HERMINIUM

- 1133² l. *alpinum*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 382; Lindl...

HERNIARIA

- 1134² d. *eustachya*, (ad *Habenariam* pertinet).
1134³ a. *nebrodensis*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 440. — Sicil.

HESPERIS

- 1136³ l. *fasciculata*, Rafin. Specch. Sc. ii. 46-47, ex Call, Life Rafin. 149;
 1137² a. *rupestris*, Rafin. (l. c.); ex Call (l. c.);

HETEROSMILAX

- 1141² l. *Gaudichaudiana*, Maxim. in Bull. Acad. St. Pétersb. xvij. (1876) 176, in obs.: A. DC...

HEVEA

- 1142³ a. *peruviana*, Lechl. ex Benth. & Hook. f. Gen. Pl.

HEXADESMIA

- 1143¹ l. *fasciculata*, Brongn. (non A. Br.).
 l. *sessilis*, Reichb. f... xli (non xlii).

HIBISCUS

- 1147³ l. *pernambucensis*, Arruda, ... 487; Bertol.

HIERACIUM

- 1151² a. *commune*, Ambrosi, Fl. Tir. austr. ii. 615 = *praealtum*.
 1154¹ l. *Heufelii*, Janka, in Neilr. Krit. Zusam. Oestr. Hierac. 22 =
 1154² a. *hypochoeroides*, Ambrosi, l. c. 609 = *Crepis montana*.
hypochoeroides, Gibson, in Phytol. i. (1843) 741. — Anglia.
 1156³ a. *Paleya*, Ambrosi, (l. c.) 739 = *Crepis albida*.
 1157² a. *pleiocephalum*, Ambrosi, l. c. 614 = *stoloniflorum*.
poeniculaceum, Ambrosi, l. c. 740 = *Andryala chondrilloides*.

HIEROCHLOE

- 1161¹ spp. plur., lege Trin... sér. VI. v (non V. vi).
 l. *pauciflora*, R. Br... 293 (err. typ. 193).

- 1161¹ l. *HIEROCHONTIS*, Medic... = *Euclidium*, R. Br. (Crucif.).
carniolica, Medic. l. c. = *E. syriacum*.

HIMERANTHUS

- l. *magellanicus*, Griseb.... = *Jaborosa magellanica*.

- 1164³ a. *HIPPORCHIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 317 (Quid?). (Orchid.).

HIRSCHFELDIA

- 1166¹ *incana*, Burnat, Fl. Alp. Mar. i. 76 = *Brassica adpressa*.

HOLCUS

- 1169¹ a. *elator*, Scop. Introd. 76 = *Arrhenatherum elatius*.
 a. *trivialis*, R. Br. Prod. 199 = *Chrysopogon ariculatus*.

HOLOTHRIX

- 1170¹ l. *aphylla*, Reichb. f... — Arab. (non Afr. austr.) = *Habenaria aphylla*.

HORMIDIUM

- 1174³ l. *pygmaeum*, Benth. et Hook. f. ex Hemsl. l. c.

HORNERA, Neck.

- 1175¹ a. *altissima*, Neck. l. c. = *M. altissima*.
lignosa, Neck. l. c. = *Dolichos Lablab*.
pruriens, Neck. l. c. = *M. pruriens*.
urens, Neck. l. c. = *M. urens*.

HORTONIA

- 1175³ l. *angustifolia*, Trim. Syst. Cat. Ceyl. (1885) 75. — Zeylan.

HOYA

- 1172² l. *albans*, J. Miller, ex Traill, in Trans. Hort. Soc. vii. (1827) 23 = *parasitica*.
 1177³ a. *Cunninghami*, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Ned. Ind. xxv. (1863) 408 (Cunninghami) = *excavata*.
 1178¹ l. *pilosa*, Seem, in Bonplandia, ix. (1861) 257; et Fl. Vit. 163, nomen = *australis*.

HUERNIA

- 1178³ a. *flava*, N. E. Br. in Kew Rep. 1876 (1879) 7, nomen = *primulina*.

HUTCHINSIA

- 1180² a. *Revelieri*, Jord. Diagn. 337, in obs. = *Capsella procumbens*.
Tournefortii, Jord. l. c. 335 in obs. = *Capsella procumbens*.

- 1180² a. **HUXHAMIA**, Garden, in Linn. Corresp. i. 366, 379 (1821) = **Trillium**, Linn. (Liliac.).

- 1180² a. **HUXHAMIA**, Garden, in Linn. Corresp. i. 378, 379 (1821) = **Berchemia**, Neck. (Rhamnac.).

- 1180³ a. **HUXHAMIA**, Garden, in Linn. Corresp. i. 408 (1821) = **Gordonia**, Ellis (Ternstroem.).

HYACINTHUS

- 1180³ a. **AMPHIBOLIS**, Schott & Kotschy, in Kotschy, Reise Taur. 379 (1858) nomen

HYDNORA

- 1182² l. *bogosensis*, Bacc.

HYDRANGEA

- 1182³ l. *Hortensia*, Sieb... 688 = *hortensis*.
hortensis, Sm... 12. — As. or.

HYGROPHILA

- 1186³ a. *ringens*, R. Br. Prod. 479 = *angustifolia*.

HYMENANTHUS

- 1187² a. *crassifolia*, Veitch, Cat. 24 (1877). — N. Zel.

HYMENODICTYON

- 1188³ a. *timorianum*, Miq. Fl. Ind. Bot. ii. 153 = *timoriense*.

HYOPHORBE

- 1189³ l. *PALMAE* loco *SOLANAPALMAE*.

HYOSPATHE

- 1190² a. *amaricaulis*, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 59 = *Hyophorbe amaricaulis*.
elata, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 68. — Ins. Celebes.

HYPERICUM

- 1193¹ a. *groenlandicum*, Berl. in Ofvers. Vet. Akad. Förh. xli. (1884) n. vii. 47 = *dovrense*.
 1193² a. *hyparcticum*, Berl. l. c. 46 = *nigrescens*.
 1194³ a. *rigorosum*, Laest. ex Berl. l. c. 49 = *prenanthoides*.

HYPOCHOERIS

- 1196² a. *alpestris*, Facch. ex Ambrosi, Fl. Tir. austr. ii. 559 = *variflora*.

HYNOLAENA

- 1197³ l. *aspera*, Nees, ex Mast.

HYPOXIS

- 1199³ l. *simenensis*, Hochst. in Flora, (1844) 32 (non *simensis*).

- 1202² a. **HYSTRINGIUM**, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 11 in syn. (184) = **Lasiachloa**, Kunth (Gramin.).
 a. *acuminatum*, Trin. ex Steud. l. c. = *L. adscendens*.

I

IARAVAEA

- 1202² a. *aquatica*, Scop. Introd. 215 = *Nepsera aquatica*.
bivalvis, Scop. l. c. = *Acisanthera brevifolia*.
scandens, Scop. l. c. = *Adelobotrys scandens*.
trivalvis, Scop. l. c. = *Acisanthera trivalvis*.
villosa, Scop. l. c. = *Demoscelis villosa*.

IBERIS

- 1202³ l. *bursifolia*, Berger. Phytol. iii. 23 = ...

ICACOREA

- 1203³ l. *bahamensis*, Lam... = *Myrsine Heberdenia*.
 1203³ a. *paniculata*, Sudworth, in Garden and Forest vi. (1893) 324 = *Ardisia Pickeringia*.

ICICA

- 1204² a. *Protium*, Karst. Pharm. Med. Bot. 803 = *P. javanicum*.

ILEX

- 1205³ a. *californica*, T. S. Brandeg. in Garden and Forest, vii. (1894) 414. — Calif.
 1206³ a. *mitis*, Radlk. in Rep. Brit. Assoc. (1885) Aberd... = *capensis*
 1207² a. *triflora*, T. S. Brandeg. l. c. 414. — Calif.
 1208² l. **ILLIPE**, Gras, in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 83 = **Bassia**, Koenig (Sapot.).
 a. *malabarorum*, Gras, l. c. = *B. longiflora*.

IMPATIENS

- 1209² l. *fasciculata*, Lam... 363 (non 359).

INDIGOFERA

- 1212³ a. *denudata*, Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit. iv. (1805) 309. — Aegypt.
 1214² l. *racemosa*, Linn. Amoen. Acad.

INGA

- 1215³ l. *Bourgoni*, Scop. Introd. 298; DC... (Burgoni).
 1216¹ l. *cylindrica*, Mart... 114 = *Entada polystachya*.
 1217³ *polystachya*, Scop. (l. c.) = *Entada polystachya*.

IONIDIUM

- 1221³ a. *Marcucii*, Bancr. Obs. Pl. Cinch. (1835) 17. — N. Granat.

- 1222² l. **IOXYLON**, Rafin. in Am. Monthly Mag. ii. (1817) 118; et iv. (1818) 195 = **Maclura**, Nutt. (Urtic.).
 a. *pomiferum*, Rafin. l. c. 118 = *M. aurantiaca*.

IPOMOEA

- 1228¹ l. *ternata*, Jacq... — Jamaica.

IREON

- 1228³ a. *parviflora*, Scop. Introd. 229 = *Lightfootia oxycoccoides*.

IRIARTEA

- 1229² l. *gigantea*, H. Wendl... 155 = *Socratea* sp. ?
Klopstockia, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1885) i. 338 = *Ceroxylon andicolum*.
nivea, Hort. ex W. Wats. l. c. ii. 750 = *Ceroxylon*, sp.

- 1229² l. **IRIDORCHIS**, Thou. Orch. Afr. tab. synop. i. (1822); Blume.

- 1229² a. **IRIDORKIS**, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 319 = *praec.*

IRIS

- 1230² a. *erratica*, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1876) ii. 583 = *Guldenstaedtia*.
foetida, Berger. Phytol. ii. 185 = *foetidissima*.
 1231³ l. *paradoxa*, Stev... (1817) (loco 1814).
 1232² a. *Wittmaniana*, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1876) ii. 583 = *Guldenstaedtia*.

ISOLEPIS

- 1237³ a. *obliganthus*, Steud. in Flora, xii. (1829) 146 = *Ficinia filiformis*.
 a. *oliganthes*, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 503 = *Ficinia filiformis*.

ISONANDRA

- 1239¹ a. *Peycha*, Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 610 (Index) = *J. Gutta*.

ITTNERA

- 1240³ 1. *major*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 150 =

IVESIA

- 1241¹ *unguiculata*, A. Gray, ... = *P. unguiculata*.

J

- 1247³ a. *JADELOTIA*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 42 (1783) Quid?

JASMINUM

- 1249³ a. *Betchei*, F. Muell. in *Vict. Chem. et Drugg.*, Sept. (1881). — Ins. Samoa.

JAUMEA

- 1252³ a. *alternifolia*, Klatt, in *Flora*, lxviii. (1885) 203. — Hab. ?

- 1253¹ a. *JESSENIA*, F. Muell. ex Sond. in *Linnaea*, xxv. (1852) 519 = **Helipterum**, DC. (Compos.).
heterocarpa, F. Muell. l. c. = *H. hyalospermum*.

- 1255³ a. *JONSONIA*, Garden, in *Linn. Corresp.* i. 364 (1821) = *JOHNSONIA*, T. Dale = **Callicarpa**, Linn. (Verbenac.).

JUNCUS

- 1257³ 1. *isolepoides*, Nees, ... 244 = *Jacquini*, Sm. Rel. Rudb. 24 = *Schoenus nigricans*.
1259³ 1. *tenuis*, ... — Am. bor. (non Austral.).

JUNIPERUS

- 1260² 1. *audina*, Nutt. ... = *occidentalis*.
1260² 1. *australis*, Endl. ... 28 (non 26).
a. *canadensis*, Burgsdorf, Anleit. 124 (1787) = *caroliniana*, Mill. ... (Caroliniana), =
1260³ 1. *flagelliformis*, Hort. ... = *Henryana*, R. Br. *Campst.* ... nomen.
a. *Hermanni*, K. Koch, Dendrol. ii. II. 141 = *occidentalis* partim.
Hermanni, Spreng. Syst. III. 908 (non Pers.).
1261² 1. *pyriformis*, [Lindl. ?] (non A. Murr.) ... = *californica*.
1. *sabinoides*, Endl. Syn. 23 (non 24).

K**KADSURA**

- 1¹ a. *Blancoi* [Azaola] ex Blanco, *Fl. Filip.* ed. II. 594. — Ins. Philipp.

KALLSTROEMIA

- 2³ 1. *maxima*, Scop. *Introd.* 212; Wight & Arn.

KENNEDYA

- 4³ 1. *splendens*, Meissn. ... = *Camptosema rubicunda*.

KENTIA

- 5¹ 1. *australis*, Hort. ... = *Howea Forsteriana*.
a. *elegans*, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 54 = *Veitchia Storckii*.
1. *robusta*, Hort. ... = *Cyphosperma Vieillardii*.

KERATOPHORUS

- 5³ a. *Leerii*, Burck, Rapp. Gutta-percha, 28. — Sumatra.

KIGGELARIA

- 7¹ 1. *integrifolia*, Jacq. ... = *Royena polyandra*.

KLEINHovia

- 7³ a. *GARDENIA*, Linn. *Corresp.* i. 135 (1821),

KNIPHOFIA

- 9¹ 1. *abyssinica*, Schweinf. ... 294 (non 249).

- 9³ 1. *KOANOPHYLLON*, Arruda, ... (1816) = **Eupatorium**, Tourn. (Compos.).
tinctoria, Arruda, l. c. = *E. laeve*.

KOCHIA

- 10² 1. *pentatropis*, Tate, ... = *decaptera*.

KUNDMANNIA

- 15² 1. *sicula*, Scop. *Introd.* 116; DC.

- 15³ 1. **KYDIA**, ... 51 (non 50).
1. *calycina*, Roxb. ... iii. 12 (non ii).

KYLLINGA

- 16² a. *multiceps*, Madden, in *Journ. As. Soc. Beng.* xviii. (1849) 630, nomen. — Reg. Himal.

L**LACISTEMA**

- 19³ 1. *alterum*, Spreng. ... 20 = *Myrica cerifera*.

LAELIA

- 21³ a. *devoniensis* ×, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1877) ii. 424.
praestans ×, Reichb. f. in *K. Koch, Allg. Gartenz.* (1857) 536 =

LAGASCEA

- 23¹ 1. *mollis*, Cav. ... 332 (non 333).

LAGGERA

- 23³ 1. *alata*, Sch. Bip. ex Oliver, ... xxix (non xxxix).

LAMOUROUXIA

- 26³ 1. *grandiflora*, Benth. ... = *multifida*.
1. *Gutierrezii*, Oerst. ... (1853). — Costa Rica, Panama (non Venezuela).
1. *spathacea*, Benth. in DC. *Prod.* x. 539 = *xalapensis*.
xalapensis, Benth. (l. c.) partim = *exserta* (1895).

LANDOLPHIA

- 28¹ a. *senegalensis*, Kotschy & Peyr. *Pl. Tinn.* 31. — Afr. trop.

LANKESTERIA

- 28² 1. *longiflora*, Lindl. ... sub t. 12.

LANTANA

- 28³ a. **CAMARA**, Plum. ex Linn. *Syst. ed. I.* (1735).
a. **LANZAN**, Spreng. in *Schrad. Journ.* 1800, II. (1801) 235, in obs. = **Buchanania**, Spreng. (Anacard.).

LAPPA

- 30³ a. *Lappa*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 1121 = *A. Lappa*.

LAPPULA

- 31¹ a. *Lappula*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 979 = *E. Lappula*.

LARIX

- 31³ a. *Larix*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 326 = *europaea*.

LASIOCHLOA

- 35¹ a. **HYSTRINGIUM**, Trin. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 11. in syn. (1840).

LASIOCORYS

- 35¹ a. *argyrophylla*, Vathe, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 96, = Afr. trop.

- 45² 1. **LEAVENWORTHIA**, Torr. ... iv.

LEDENBERGIA

- 46² 1. *rosea-aenea*, Lem. ... 590 = *Villamilla rosea-aenea*.

LEEa

- 48¹ 1. *macrophylla*, Roxb. ... 231 (non 251).
1. *robusta*, Roxb. *Hort. Beng.* 18 (non 8).

LEERSIA

- 48² a. **TURRAYA**, Wall. *Cat. sub n.* 8637 (1847).
a. *ciliaris*, Griff. *Notul.* iii. 2 = *hexandra*.
a. *ciliaris*, Griff. *Notul.* iii. 8 = *Zizania ciliata*.

- 50¹ a. **LELEBA**, Rumph. ex Teijsm. & Binn. *Cat. Pl. Bogor.* 20 (1866) = **Bambusa**, Schreb. (Gramin.).
Rumphiana, Kurz, ex Teijsm. et Binn. l. c. = *B. lineata*.

LEMNISCOA

- 50³ a. *Parishii*, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 5961, in obs. = *Bulbophyllum lemniscatum*, Par.

- 50³ a. **LENCYMMAEA**, Benth. & Hook. f. *Gen. i.* 735 (1867) = seq.

1. **LENCYMMOEa**, Presl,

LEONTODON

- 52² 1. *Heldreichianus*, Boiss. *Diag. Ser. II.* iii. 88; *Fl. Orient.*

LEONTOPODIUM

- 53² a. *Leontopodium*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 1074 = *alpinum*.

LEPIDIUM

- 56³ 1. *diantrum*, Medic. *Pflanzeng.* 84; et in *Usteri*,

LEPILAENA

- 59³ a. *biloculata*, T. Kirk, in *Rep. School Agric. Lincoln* [n. 3] (1884) 18; repr. in n. 3. *Country Journ.* ix. (1885) 373; nomen tantum.

LEPTOBAAE

- 61³ a. *pubescens*, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iv. 368 in nota = *multiflora*.

LEPTOCHLOA

- 62¹ a. *bipinnata*, Hochst. in *Flora*, xxxviii. (1855) 422 = *Eragrostis cynosuroides*.
bipinnata, Hochst. ex Schweinf. f. *Beitr. Fl. Aethiop.* 300. — Afr. bor. or.

- 63³ a. **LEPTORKIS**, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 317 = **Malaxis** ? Sw. (Orchid.).

- 66² 1. **LERCHEA**, Hall. ... 1753 (non 1743).

LEUCANTHEMUM

- 70¹ a. *tubuliflorum*, Tinney, in *Am. Natural.* i. (1867) 389 = *C. Leucanthemum*.

LEUCOCOCCUS

- 71² a. *vimineus*, Wedd. in *Arch. Mus. Par.* ix. (1856) 104, 105 = *Pouzolzia ovalis*.

- 72¹ 1. **LEUCOPHAË**, Webb & Berth.

- 74³ a. **LEUCYMMAEA**, Benth. in Hook. *Kew Journ.* iv. (1852) 287, sphalm. = **Lencymmoea**, Presl (*Gen. dub.*).

LEVISTICUM

- 75¹ a. *Levisticum*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 844 = *officinale*.

LIATRIS

- 76¹ 1. *fruticosa*, Nutt. ... — Am. bor.
oppositifolia, Nutt. ... — Am. bor.

LIBANOTIS, Riv.

- 76² a. *Libanotis*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 842 = *S. Libanotis*.

LIGULARIA

- 79¹ 1. *Hodgsoni*, Hook. ... (non Hook. f.).

LIGUSTICUM

- 79³ 1. *Dieffenbachii*, Hook. f. ... = *Angelica Dieffenbachii* (Aciphyllae sp.).

LIGUSTRUM

- 80² 1. *brachystachium*, *Decne.* (non *brachystachyum*).
80³ a. *japonicum*, *Thunb. Fl. Jap.* 17. t. 1. — Japon.

LIMODORUM

- 85¹ a. *GRAPHORKIS*, *Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 318.

LIMOSELLA

- 86² 1. *annua*, *Benth. in DC. Prod.* x. 427 (cum cit. pre-Linneana).
borealis, *Less. Reise durch Norwegen*, 299; et ex *Ledeb.*...
a. *natans*, *Spreng. ex Drège, in Linnaea*, xx. (1847) 199, nomen = *aquatica*.
palustris, *Linn. Mant.* ii. 252, in obs. = *aquatica*.

LINARIA

- 87³ a. *Linaria*, *Karst. Pharm. Med. Bot.* 947 = *vulgaris*.
88³ 1. *speciosa*, *Ten. Syst. Fl. Neap.* 304 =

LINDERA

- 89² 1. *Benzoin*, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bot.* i. 324.
a. *hypoleuca*, *Franch. et Sav. Enum. Pl. Jap.* i. 415, sphalm. = *hypoglauc.*

- 89³ 1. *LINHAREA*, *Arruda, ex Koster, Trav.* 493 (1816).

LINHARIA, *Arruda.* (l. c.) = *praec.*

LINOSYRIS

- 90³ a. *anacamphthiophylla*, *Ambrosi, Fl. Tir. Austr.* ii. 389 = *Aster Linosyris*.
tatarica, *C. A. Mey. ex Aitch. Cat. Pl. Punjab*, 72 = *Aster sibiricus*?

LIPARIS

- 93² 1. *angustifolia*, *Lindl.*... — Java.
a. *angustifolia*, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 206 = *obscura* (1889).

LIQUIDAMBAR

- 96¹ 1. *asplenifolia*, *Linn.*... = *Myrica asplenifolia*.

LITHOSPERMUM

- 99² a. *Gastoni*, *Benth. in Hook. Bot. Mag.* ii. (1840) 112; et in *DC. Prod.*...

LITSEA

- 100² a. *MALAPOENNA*, *Adans. Fam.* ii. 447 (1763).
100³ 1. *Bindoniana*, *F. Muell. Census*, 4 (1882). — Austral.
101¹ a. *reticulata*, *Benth. & Hook. f. ex F. Muell. Census*, 4 (1882). — Austral.

LITTONIA

- 101² a. *Keiti*, *Leichtl. in Garden*, xxiv. (1883) 87, in obs. = *modesta*.

LIVISTONA

- 101³ a. *occidentalis*, *Hort. ex Hook. f. Kew Rep.* 1887 (1884) 64 = *Brahea dulcis*.

LOASA

- 102¹ a. *lateritia*, *Hook. Bot. Mag.* t. 3632 = *Caio-phora lateritia*.

LOBELIA

- 105² a. *parviflora*, *Scop. Introd.* 229 (sphalm.) = *parvifolia*, *Berg.*
105³ *reniformis*, *Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. II.* iii. (1835) 48, in obs. sphalm. = *Lysipomia reniformis*.

- 108³ a. *LOGIA*, *Mutis, in Linn. Corresp.* ii. 528 (1821) = *Calceolaria*, *Linn. (Scrophul.)*.

LONICERA

- 111³ a. *parviflora*, *C. Koch, Dendrol.* ii. II. 385, sphalm. = *parvifolia*.
parvifolia, *Hayne, Dendrol. Fl. Umg. Berl.* 14 = *tatarica*.

LOPHOSPERMUM

- 113³ 1. *scandens*, *D. Don*,... = *N. scandens*.

- 120³ 1. *LOUDETIA*, *Hochst.* II. *Intell.* 30; *A. Br. in*...

LUCUMA

- 122¹ 1. *deliciosa*, *Planch. & Linden*,... 336 (non 836).

- 122³ a. *LUDOVICEA*, *Buc'hoz, Herb. Col. Amér.* t. 11 (1783) = (Quid?).
gallo-provincialis, *Buc'hoz, l. c.* (Quid?). — Gallia.

LUISIA

- 124¹ 1. *teretifolia*, *Gaudich., in Freyc. Voy. Bot.* 427 (non 426).

LUZULA

- 127³ 1. *hyperborea*, *R. Br.*... 283 (err. typ. 183).

LYCASTE

- 128³ 1. *Deppii* (non *Deppei*).

LYCOPERSICUM

- 131³ a. *Lycopersicum*, *Karst. Pharm. Med. Bot.* 966 = *esculentum*.

M**MACLURA**

- 140² a. *IOXYLON*, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* ii. (1817) 118; et iv. (1818) 195.
a. *aurantiaca*, *Rafin. Med. Fl.* ii. 268 (1830) = *Maclura aurantiaca*.

MAERUA

- 144³ 1. *oblongifolia*, *A. Rich... Abyss. t. 6* (non t. 5).
ovalifolia, *Cambess. in Jacq. Voy.* 23 (non 22).

MAGNOLIA

- 146¹ a. *palustris*, *Garden, in Linn. Corresp.* i. 512, 515 = *M. glauca*.

MAJORANA

- 147² a. *Majorana*, *Karst. Pharm. Med. Bot.* 999 = *O. Majorana*.

- 148³ a. *MALAPOENNA*, *Adans. Fam.* ii. 447 (1763) = *Litsea*, *Lam. (Laurin.)*.

MALCOMIA

- 149³ a. *castellana*, *Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III* i. (1883) 72. — Hispan.

MALUS

- 152¹ a. *aegra*, *ambigua*, *americana*, *anglica*, *anisa*, *apetala*, *apiola*, *atro-rubra*, *batavica*, *britannica*, *butigliana*, *Calvilla*, *canadensis*, *canicularis*, *Capucini*, *Caroli*, *Castanea*, *cerea*, *Colombella*, *Columbina*, *emetica*, *Gratie-portus*, *gratissima*, *guttata*, *hybrida*, *illicebrosa*, *Josephinea*, *leucophaea*, *marmorea*, *montalvetia*, *nana*, *nigra*, *normalis*, *oleosa*, *passipomia*, *prasomila*, *Princeps*, *pseudocavilla*, *pumila*, *punctata*, *pustulifera*, *Rambura*, *rhotomagensis*, *Robertiana*, *Roris*, *spumosa*, *Vesperum*, *violacea*, *vitrea*, *zonalis*, *Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç.* iv. = *P. Malus*.

- 152¹ a. *discordea*, *viridis*, *A. Savat. in C. R. Assoc. Fr. Av. Sc. xi. Rochelle*, 1882 (1883) 431 = *P. Malus*.

- 152² *livida*, *beauvaisiensis*, *A. Savat. l. c.* 430 = *P. Malus*.
microcarpa, *glabra*, *A. Savat. l. c.* 432 = *P. Malus*.
santonum, *A. Savat. l. c.* 428 = *P. Malus*.
turbinoides, *cylindracea*, *A. Savat. l. c.* 429 = *P. Malus*.

MALVASTRUM

- 155³ 1. *splendidum*, *Kell.*... = *M. Thurberi*.

MAMILLARIA

- 158² a. *mammillaris*, *Karst. Pharm. med. Bot.* 888 = *simplex*.

MANETTIA

- 161² 1. *pubescens*, *Cham. & Schlecht. l. c.* 170. — Bras.

MANGIFERA

- 161³ 1. *Parih*, *Miq. (non Parish)*.

MANIHOT

- 162² a. *Manihot*, *Karst. Pharm. med. Bot.* 588 = *utilissima*.

MAPOURIA

- 164¹ 1. *brevicollis*, *Muell. Arg.*... — Bras.
Burchelliana, *Muell. Arg.*... — Bras.
castellana, *Muell. Arg.*... — Bras.
japurensis, *Muell. Arg.*... — Bras.
Langsdorffiana, *Muell. Arg.*... — Bras.
a. *Luschnathiana*, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 387, sphalm. = *M. Luschnatii*.
1. *mandiocana*, *Muell. Arg.*... — Bras.
Martiana, *Muell. Arg.*... — Bras.
microcarpa, *Muell. Arg.*... — Bras.
myriantha, *Muell. Arg.*... — Bras.
Rabeniana, *Muell. Arg.*... — Bras.
Riedeliana, *Muell. Arg.*... — Bras.
164² *sessiliflora*, *Muell. Arg.*... — Bras.
xanthophylla, *Muell. Arg.*... — Bras.

MARANTA

- 165¹ a. *albo-lineata*, *Hort. ex Regel, Gartenfl.* xxviii. (1879) 295 = *Calathea ornata*.
Bachemiana, *Hort. ex Regel, (l. c.)* 297 = *Calathea Bachemiana*.
bella, *Hort. Bull. ex Regel, (l. c.)* = *Calathea bella*, *Regel*.
165² 1. *cinerea*, *Hort.*... (1872) [non 1892].
a. *coriifolia*, *Hort. ex Regel, Gartenfl.* xxviii. (1879) 295 = *Calathea ornata*.
165³ *Kegeliana*, *Hort. ex Regel, (l. c.)* = *Calathea Bachemiana*.
Kegeliani, *E. Morr. ex Regel, (l. c.)* = *Calathea bella*, *Regel*.
majestica, *Linden, ex Regel, (l. c.)* = *Calathea ornata*.
166¹ *orbifolia*, *Linden, Cat. n. 17* (1862) nomen; et *Koern. in Regel, Gartenfl.* xiii. (1864) 322 = *Calathea rotundifolia*.
Riedeliana, *Hort. Paulowsk. ex Regel, Gartenfl.* xxviii. (1879) 293 = *Calathea Koernickiana*.
roseo-lineata, *Hort. ex Regel, Gartenfl.* xxviii. (1879) 295 = *Calathea ornata*.
166² *Wagneri*, *Hort. Veitch, ex Regel, (l. c.)* = *Calathea roseo-picta*.

MARRUBIUM

- 170² a. *Aschersoni* ×, *P. Magnus, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* ii. (1882) 349. — Ins. Sardoia.
171¹ 1. *saxatile*, *Rafin. Specch. Sc.* ii. 134-135; ex *Call, Life; Rafin.* 150.

MASSOWIA

- 175¹ 1. *Gardneri*, *K. Köch.*... = *Spathiphyllum candidum*.

- 175³ a. *MATONIA*, *Rosc. ex Sm. Life & Corr.* ii. 375 (1832) = *Elettaria?* *Maton (Scitam.)*.

- 175³ a. *MATONIA*, *Sm. in Rees, Cyclop.* xxxix. sub *Elettaria* (1819).
Cardamomum, *Steph. & Church, Med. Bot.* ii. t. 106 = *E. Cardamomum*.

- 178¹ a. *MATTONIA*, *Endl. Gen.* 223, in syn. (1837) = *MATONIA*, *Sm.* = *Elettaria*, *Maton (Scitam.)*.

MAXILLARIA

- 179² 1. *floribunda*, *Lindl. in Benth. Pl. Hartweg.* 154. — Peruv.
180² *rufescens*, *Lindl.*... sub t. 1802; et l. c. t. 1848.

MECONOPSIS

- 182¹ a. *glabra*, Hook. Ic. Pl. sub t. 732, in syn. sphalm. = heterophylla.

MEDICAGO

- 183² a. *lenticulata*, Pourr. ex Benth. Cat. pl. Pyr. 100 = suffruticosa.
184¹ *rupestris*, Pirona, Fl. Forojul. Syll. 41 = Pironae.

- 189³ a. MELANIX, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 = **Salix**, Tourn.

MELANTHIUM

- 191² l. *punctatum*, Linn... = Androcymbium leucanthum.

MELASTOMA

- 193³ a. *integrifolia*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 71 (Quid?). — Guian.

- 196³ Raussinia, Buc'hoz, l. c. t. 27. — Hab.?

- 196³ l. MELEAGRINEX, Arruda, ... = **Sapindus**, Tourn.

pernambucana, Arruda, l. c. = S. esculentus.

MELIA

- 197¹ a. *dichotoma*, Scop. Introd. 287 = Diosma cupressina.

hirsuta, Scop. (l. c.) = Diosma oppositifolia.

- 197² *succulenta*, Scop. (l. c.) = Diosma succulenta.

MELOCACTUS

- 201³ a. *Melocactus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 888 = communis.

MELOCANNA

- 202¹ a. Blumei, Kurz, ex Teijsm. & Binn. Cat. Pl. Bogor. 20. — Java.

brachyclada, Kurz, (l. c.). — Java.
elegantissima, Kurz, (l. c.) = Beesha elegantissima.

1. *gracilis*, Kurz, (l. c.); et ex Munro,

a. *Hasskarliana*, Kurz, (l. c.). — Java.

longespiculata, Kurz, (l. c.). — Java.

serpentina, Kurz, (l. c.). — Java.

tenuispiculata, Kurz, (l. c.). — Java.

1. *Zollingerii*, Kurz, (l. c.); et ex Munro,

MESPILUS

- 218² a. *apyrena*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. iv. = P. germanica.

1. *Aucuparia*, Scop. Introd. 218; [Web.]

- 218³ *macrocarpa*, Poit. & Turp. (l. c.); DC.

- 219¹ a. *portentosa*, Poit. & Turp. (l. c.) = P. germanica.

METROSIDEROS

- 221³ a. *demonstrans*, Tison. in C. R. Ass. Fr. v. (1877) 462. — N. Caled.

METROXYLON

- 222² a. *amicarum*, Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 68. — Ins. Amicor.

- 222³ a. METZLERIA, Sond. in Harv. et Sond. Fl. Cap. iii. 532 (1864-65), sphalm. = MEZLERIA, Presl = **Lobelia**, Plum. (Campan.).

MEUM

- 222³ a. *Meum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 839 = athamanticum.

MEZLERIA

- 223¹ l. *depressa*, Presl, ... — Afr. austr.
Dregeana, Sond. ... — Afr. austr.

MICONIA

- 224¹ a. *acalyphoides*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. 1228 (Index), sphalm. = acalephoides.

MICRECHITES

- 228² l. Schrieckii, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 214; Vidal,

MICRELIIUM

- 228² l. *asteroides*, Forsk... p. lxxiv.
Tolak, Forsk... 153.

- 228³ a. MICROCHITES, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 214; et op. cit. xxiv. (1886) 59, lapsu = **Micrechites**, Miq. (Apocyn.).

MICROCHLOA

- 228³ a. *thomaea*, R. Br. Prod. 208 = Oropetium thomaeaum.

MICROULA

- 234³ l. *Benthani*, C. B. Clarke, ... = tibetica.
a. *tibetica*, Benth. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvi. (1880) 502. — Tibet.

MIKANIA

- 236¹ a. *parviflora*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1061 = amara.

MIMOSA

- 240³ a. *contorta*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 67 (Quid?). — Hab.?

- 245² l. *virginalis*, Arruda, ... 500 = Stryphnodendron Barbatimam.

MITINA

- 248³ l. *lanata*, Scop. Introd. 124; Cass.

MITRARIA

- 249³ l. *Commersonia*, J. F. Gmel... = B. speciosa.

MITRASACME

- 249³ a. *Novae-Zelandiae*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 737. — N. Zel.

MOEHRINGIA

- 251² a. *ciliata*, Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 78 = A. ciliata.

- 256¹ a. MONANTHEMUM, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 314 = **Morisia**, Gay (Crucif.).
acaulis, Scheele, l. c. = Morisia hypogaea.

MONODORA

- 259¹ l. *Myristica*, Dun... — Afr. trop.

MONOSTICHE

- 260¹ l. *Danielli*, Horan... = Thaumatooccus Danielli.

- 260³ a. MONOTHECIUM, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 74 [non 374].
glandulosum, Hochst. l. c. — Afr. trop.

- 262² a. MOOREA, Lem. in Ill. Hort. ii. (1855) Misc. 14 = **Cortaderia**, Stapf (Gramin.).
argentea, Lem. l. c. = C. argentea, Stapf.

MORENIA

- 263³ l. *pauciflora*, Drude... = pauciflora.

MORILANDIA, Neck.

- 264¹ a. *crenata*, Neck. l. c. = C. crenata.
falcata, Neck. l. c. = C. falcata.
juniperina, Neck. l. c. = C. juniperina.
obcordata, Neck. l. c. = C. obcordata.
pulchella, Neck. l. c. = C. pulchella.
sarmentosa, Neck. l. c. = sarmentosa.
ternata, Neck. l. c. = C. polygonifolia.
trifoliata, Neck. l. c. = C. polygonifolia.

- 265¹ a. MORISEA, DC. Prod. vi. 90 in adnot. (1837) = **Morisia**, Gay (Crucif.).

MORISIA

- 265¹ a. *acaulis*, J. Gay, ex Colla, in Antologia, xxxiv. (Aprile 1829) 158, nomen = hypogaea.

- 265¹ a. MORISINA, DC. Prod. vi. 90, in adnot. (1837) = **Morisia**, Gay (Crucif.).

MORUS

- 266³ a. *virginiana*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. ii. — Am. bor.

MOSCHARIA

- 266³ a. *asperidifolia*, Forsk. (l. c.) p. lxxiv.
asperifolia, Steud. Nom. ed. I. 24, in syn. = praec.

MUCUNA

- 268² l. *altissima*, Scop. Introd. 309; DC.
a. *lignosa*, Scop. (l. c.) = Dolichos Jacquini.
l. *pruriens*, Scop. (l. c.); DC.
urens, Scop. (l. c.); Medic.

MUSA

- 272¹ l. *paradisiaca*, Linn... — As. trop.

MUSCARI

- 272³ l. *azureum*, Fenzl... = Hyacinthus azureus.
272³ *lingulatum*, Baker, ... 6 = Hyacinthus azureus.

MUSENIUM

- 273² l. *tenuifolium*, Hook. in Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 237 = Peucedanum graveolens.

MYAGRUM

- 275¹ a. *foetidum*, Berger. Phyt. iii. 138 = sativum.
prostratum, Berger. (l. c.) 149 = Nasturtium sylvestre.
utriculatum, Berger. (l. c.) 35 =

MYOSOTIS

- 276³ a. *albo-sericea*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 738. — N. Zel.

MYRCIA

- 278³ l. *Australasiae*, Benth. Fl. Austral. iii. 294 = seq. *australasica*, F. Muell...

MYRICA

- 281² l. COMPTONIA, L'Hérit. ex Ait. Hort. Kew. iii. 334 (1789); Banks, etc.
altera, DC... 595 = cerifera.
d. *australasica* (err. cal., vide sub Myrcia).
a. *carolinensis*, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 231 = cerifera.
l. *carolinensis*, Mill... — Am. bor.
a. *cerifera*, Bigelow, Fl. Bost. = carolinensis.
l. *heterophylla*, Rafin... 9 = cerifera.
Laureola, Tréc... = inodora?
luzonica, Vidal, ... B. — Ins. Philipp.
pennsylvanica, Hort. Reg... = carolinensis.
sessilifolia, Rafin... 10 = carolinensis.
verrucosa, Rafin... — Ind. occ.

MYRISTICA

- 284¹ l. *uapensis*, Spruce (non uapensis).

MYRSINE

- 285² l. HEBERDENIA, Banks, ex Vent. Choix, n. 5, verso (1803).
285³ *excelsa*, Link, ... = M. Heberdenia.
286¹ Heberdenia, Roem. & Schult... 508. — Ins. Baham.

MYRTUS

- 289¹ a. *nitida*, J. F. Gmel. Syst. 792 = Eugenia lucida, Banks.
289² *paniculata*, J. F. Gmel. (l. c.) = Eugenia paniculata, Banks.
290² *vitensis*, F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm. 1875 (1876) 165. — Ins. Fiji.

MYSTACIDIUM

- 290³ a. *distichum*, Benth. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 337. — Afr. trop.
fragrantissimum, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 584. — Afr. trop.
pectinatum, Benth. (l. c.) 337. — Madag., Ins. Mascar.
pellucidum, Benth. & Hook. f. (l. c.). — Afr. trop.

N

NASTURTIIUM

- 296¹ 1. *Aschersonianum*, *Janka*, in *Közlem. Magyar Tudom. Akad.* xii. (1876) 165. — Europ.
 296³ a. *Nasturtium-aquaticum*, Karst. Pharm. med. Bot. 657 = officinale.
 1. officinale, *R. Br.*... 110 (non 111).
 297¹ 1. *sativum*, Medic. Pflanzeng. 80; Moench,...

NAUCLEA

- 297³ 1. *glaberrima*, Bartl... 344 = *Sarcocephalus glaberrimus*.
 298¹ *lanceolata*, Blume... 1009. — Java.
orientalis, Linn... 243 = *Sarcocephalus cordatus*, *Anthocephalus indicus*, etc.
 d. *orientalis*, Willd.
 1. *pallida*, Reinw. ex Miq... = *purpurascens*.
polyccephala, A. Rich... 289 = *Uncaria tomentosa*.
purpurea, Reinw. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bot. iv. 182 = *purpurascens*.
purpurea, Roxb... 51. — Ind. or. (non China).
rhynchophylla, Miq... 108 = *Uncaria rhynchophylla* (cf. Cur. post.).
 298² a. *surinamensis*, Walp. Ann. i. 378 = *Uncaria surinamensis*.
 1. *undulata*, Roxb... 508 = *Sarcocephalus undulatus*.

NEEDHAMIA

- 300² a. *littoralis*, Scop. l. c. = *T. cinerea*.

NEGUNDO

- 300³ a. *Negundo*, Karst. Pharm. med. Bot. 596 = *aceroides*.

NEILLIA

- 300³ 1. *fallax*, Blume...
 301¹ *Tanakae*, Franch. & Sav... 121 = *Stephanandra Tanakae*.

NELITRIS

- 301² 1. *vitiensis*, A. Gray... 60 = *Myrtus vitiensis*.

NELUMBO

- 301³ a. *Nelumbo*, Karst. Pharm. med. Bot. 553 = *Nelumbium speciosum*.

NEPENTHES

- 304³ 1. *Courtii* ×, Veitch, Cat. (1878) 25; Gard.
 305¹ *Sedeni* ×, Veitch, Cat. (1871) 17;...
Veitchii, Veitch, Cat. (1878) 47 = *lanata*.

NEPHELIUM

- 307² 1. *connatum*, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. iii. (1859) 26. — Austral.
 307³ a. *oleaeifolium*, F. Muell. Native Pl. Victoria, 124 = *Heterodendron oleaeifolium*.
semiglaucum, F. Muell. (l. c.) 15 = *Cupania semiglauca*.

NERTERIA

- 309¹ a. *GOMEZIA*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 529 (1821).

NICANDRA

- 311² a. *Physalodes*, Scop. Introd. 188 = *physaloides*.

NICOTIANA

- 312³ 1. *plumbaginifolia*, Willd. ex Schrank, in Hoppe, vi. (1807) 265; et Enum.
 315³ a. *NOALLIA*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 14 (1783) (Quid?)
incarnata, Buc'hoz, l. c. — Hab?

NORMANBYA

- 317³ a. *Muelleri*, Becc. in Annu. Jard. Buitenz. ii. (1885) 171 (Index). — Austral.

NORYSCA

- 317³ a. *cernua*, Munro, Host. Agr. 10; Voigt,

NOTHOSCORDUM

- 319¹ a. *inodorum*, Nichols. Dict. Gard. ii. 447 = *fragrans*.

- 320² a. *NUTTALIA*, Torr. in Ann. Lyc. N. York. ii. (1836) 200, in nota = *Mentzelia*, Plum. (Loasac.).

NYCTERINIA

- 321¹ 1. *rigida*, Benth. in DC. Prod. x. 330, sub N. pedunculari, lapsu = *Z. divaricata*.

- 320¹ a. *NYMANIA*, Lindb. in Notis. Sällsk. Faun. Fl. Fenn. ix. (1868) 290, in obs. [« Trans. Nov. Scand. »] = *Aitonina*, Thunb. (Sapind.).
capensis, Lindb. l. c. = *A. capensis*.

NYMPHAEA

- 321³ 1. *glandulifera*, Rodsch. Bemerk. Col. Esseq. 76.

O

OCHNA

- 324² 1. *squarrosa*, Linn... 731 (non 732).

- 324³ a. *OCHTHOCLOA*, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xi. (1842) l. 26 = *Eleusine*, Gaertn. (Gramin.).
dactyloides, Edgew. l. c. 27 = *E. dactylifera*.

OCOTEA

- 326² a. *SENNEBERIA*, Neck. Elem. ii. 120 (1790).

ODONTOSTYLES

- 331² 1. *triflora*, Breda, l. c. = *B. triflora*, Blume.

- 335² 1. *OISODIX*, Rafn. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

OLEA

- 337³ a. *picholina*, Poit & Turp. in Poit. Pomol. Franç. II = *europaea*.

OLEARIA

- 338¹ 1. *Hectori*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xvi. 1883 (1884) 393 = *fragrantissima* (non Hook. f.).

OLINIA

- 339² a. *TEPPEA*, Delile, in Röchet, Sec. Voy. in Choa, 340 (1846).

ONCOBA

- 345³ 1. *spinosa*, Forsk. (l. c.) p. cxiii. (non 103).

ONOBRYCHIS

- 347¹ a. *hirta*, Scop. Introd. 302 = *Lespedeza hirta*.
 347² *juncea*, Scop. (l. c.) = *Lespedeza juncea*.
 1. *lineata*, Scop. (l. c.); Desv.
 a. *Onobrychis*, Karst. Pharm. med. Bot. 681 = *sativa*.
prostrata, Scop. (l. c.) = *Indigofera enneaphylla*.
 1. *pumila*, Scop. (l. c.); Desv.

ONONIS

- 348¹ a. *brachyantha*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 81. — Hispan.

OPHRYS

- 354³ a. *Fucus*, Berger, Phytom. ii. 65 = *arachnites*.

OPLISMENUS

- 355³ 1. *africanus*, Beauv... t. 68, f. 1.
 356¹ *jacquini*, Kunth, Rév. Gram. i. 44.

- 356² a. *OPODIX*, Rafn. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

OPOPONAX

- 356² a. *Opoponax*, Karst. Pharm. med. Bot. 847 = *O. chironium*.

OPUNTIA

- 358¹ a. *Opuntia*, Karst. Pharm. med. Bot. 888 = *vulgaris*.

ORCHIS

- 359³ a. *Bornemanniae* ×, Aschers. in Barbey. Fl. Sard. Comp. 183. — Ins. Sardo.
 360¹ *conocea*, A. Gras, in Bull. Soc. Bot. Fr. ix. (1862) 334; cf. Pérard, op. cit. xvii. (1870) 368 = *Gymnadenia conopsea*.
 362² 1. *tipuloides*, Linn. f... 401 = *Habenaria tipuloides*.

OREODOXA

- 364² a. *granatensis*, Hort. Bull. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 56. — N. Granat.
ventricosa, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 59 = *Gaussia Princeps*?

ORNITHOGALUM

- 360¹ 1. *decipiens*, Goiran... Italia.
 370² *pseudotenuifolium*, Goiran... Italia.

ORNITHOPUS

- 371¹ a. *albus*, Berger. Phytom. ii. 189 = *perpusillus*.

OROBANCHE

- 373¹ a. *fragrans*, Rafn. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 440. — Sicil.
 373³ *Ilicis*, Mathieu, Fl. Belg. 383 (Quid?). — Belgium.
obtusata, Rafn. (l. c.). — Sicil.

ORONTIUM

- 376² 1. *liliifolium*... = *R. japonica*.

ORTHOPOGON

- 377³ a. *albus*, Roem. & Schult. Syst. ii. 890; Nees, *undulatus*, Link. Hort. Reg. Berol. i. 203 = *Op. undulatifolius*.

ORYGIA

- 378³ 1. *portulacifolia*, Forst.
 a. *villosa*, Forsk. (l. c.) cxiv. — Arab.

ORYZA

- 378³ a. *clandestina*, A. Br. in Verh. bot. Ver. Brand. ii. (1860) 195 =

OSTERDAMIA

- 382² a. *Matrella*, Neck. (l. c.) = *Zoysia pungens linifolia*, Linn. Pl. Afr. Rar. 25 = *Euryops linifolius*.
 1. *rigens*, Linn. (l. c.) 24 = *Gazania rigens*.

- 392² a. *OXYDECTES*, Linn. Syst. ed. I (1735) = *Croton*, Linn. (Euphorb.).

OZOTHAMNUS

- 397¹ 1. *coralloides*, Hook. f... 332 = *H. coralloides*.
 397² *depressus*, Hook. f... 134 = *H. depressus*.

P

PACHIRA

- 397³ a. *RAUSSINIA*, Neck. Elem. ii. 419 (1790).
 1. *Barrigon*, Seem... 83 = *Bombax Barrigon*.
Commersonii, Planch. Hort. Donat. 22 = *Bombax grandiflorum*.
 a. *elegans*, Planch. (l. c.) 23. — Hab.?
imperialis, Planch. (l. c.) — Hab.?
 1. *longifolia*, Hook... 4549 = *macrocarpa*.
minor, Hemsl... 124 = *Bombax carolinoides*.

PAEONIA

- 401² a. *romanica*, Brandza, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. ii. (1881) 587, t. 2 = *decora*.

PAEPALANTHUS

- 401³ 1. *compactus*, Gardn. (non *compactus*).
curvifolius, Kunth.
rigidulus, Mart.

- 403¹ 1. **PELAQUIUM**, Blanco... = **Dichopsis**.
Thw. (Sapotac.).

PALICOUREA

- 403³ 1. *chionantha*, DC... = *Psychotria Luschnathii*.
officinalis, Mart... = *Psychotria medica*,
Muell. Arg.

PALIURUS

- 404² a. *colubrina*, Scop. Introd. 208 = *Colubrina*
ferruginosa.
404³ a. *Paliurus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 870 =
aculeatus.

PALMA

- 404³ a. *Aovara*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 6 (1783)
= *P. Acoira*.

PANAX

- 406² a. *Schin-seng*, Nees, Pl. Med. Suppl. i. « fasc. 5,
t. 15 »; Comp. n. 70 = *P. Ginseng*.

PANDANUS

- 409² a. *verus*, Kurz, in Journ. Bot. v. (1867) 125 =
odoratissimus.

PANICUM

- 410² d. *araneosum*, etc. (est *Penneseti* sp. v. ii. p. 458).
411² *caesium*, Nees, in Hook. Kew Journ. ii. (1850)
97. — Ins. Philipp.
412¹ *coloratum*, Nees, Agrost. Bras. 170, in syn.
cum cit. falsa = *repens*.
1. *conglomeratum*, Linn... = *indicum*?
412² *curvatum*, Linn... 732 (non 730).
414¹ *Hamiltonii*, Kunth, Enum. i. 84, cum cit. falsa.
417¹ *paradoxum*, Roth, ex Roem. & Schult. Syst.
ii. 457 = *abludens*.
418¹ *ramosum*, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 53 =
abludens.

PAPAYER

- 422¹ 1. *Roubiaci*, Vig. (non Viq.).
rubro-aurantiacum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 15 =

PAPAYA

- a. *gracilis*, Regel, in Gartenflora, xxviii, (1879)
258, t. 986. — Colombia.
Papaya, Karst. Pharm. Med. Bot. 894 =
C. Papaya.

- 422² a. **CALOTHERIA**, Wight & Arn. ex Steud. Syn.
Pl. Gram. 199 (1855).

PARITA

- 426³ a. *panduraeformis*, Scop. Introd. 282 = *Hibiscus*
panduraeformis.
populneus, Scop. (l. c.) = *Thespesia populnea*.
tiliaceus, Scop. (l. c.) = *Hibiscus tiliaceus*.
zeylanicus, Scop. (l. c.) = *Pavonia zeylanica*.

PASPALUM

- 430² a. *dissectum*, Kniphof, Bot. Orig. Cent. xi. n. 14;
fide Kunth, Enum. Pl. i. 273 = *Eleusine*
coracana.

PASSAEA, Adans.

- 433¹ a. *ornithopoides*, Scop. Introd. 310 = *O. orni-*
thopodioides.

PASSIFLORA

- 436¹ a. *Monnieri*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 35.
— Hab.?
436² *Pinardia*, Buc'hoz, (l. c.) t. 30. — Hab.?
Polignacia, Buc'hoz, (l. c.) t. 38 = *P. Muru-*
cuia.
rubra, Buc'hoz, (l. c.) t. 12 (1783) = *P. Ves-*
pertilio?

PEDILANTHUS

- 447² 1. *cordellatus*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 335; Steud.

PENNISETUM

- 458² a. *cylindricum*, Trin. Gram. Pan. 70; et in Mém.
Acad. Petersb. Sér. VI. ii. II. (1835) 185 =
typhoideum.

PENNISETUM

- 458² 1. *cynosuroides*, Wall. Cat. n. 8653.
458³ a. *nepalense*, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 302.
— Reg. Himal.
1. *parviflorum*, Trin. Gram. Panic. 65; et

PENTAGLOSSUM

- 459³ 1. *linifolium*, Forsk. (l. c.) p. lix.

PENTSTEMON

- 463² 1. *Scouleri*, Lindl. Bot. Reg. t. 1277.

PERESKIA

- 469¹ a. *Pereskia*, Karst. Pharm. Med. Bot. 888 =
aculeata.

PERIPLOCA

- 471¹ a. **EHRETIANA**, Collinson, in Linn. Corresp. i.
32 (1821).

PERSICA

- 474² a. *accensa*, *albida*, *ambigua*, *Bauciana*, *bullata*,
cancellaria, *cerasiana*, *crispa*, *cunctabundia*,
Cursonia, *dubia*, *duplex*, *flava*, *fromentina*,
heteroclita, *ispahanensis*, *mammillata*, *mam-*
mosa, *maxima*, *Merleti*, *militensis*, *mirabilis*.
mucronata, *mucronata* [bis], *nana*, *narbonen-*
sis, *Newtonii*, *oblonga*, *praeceox*, *prisca*, *pul-*
chella, *reperta*, *sanguinea*, *serotina*, *subcursonia*,
succedanea, *tenera*, *verrucosa*, Poit. & Turp.
in Poit. Pomol. Franç. i. = *P. Persica*.

PETROSELINUM

- 479¹ a. *Petroselinum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 831
= *C. Petroselinum*.

PEUCEDANUM

- 480¹ 1. *aureum*, Spreng... = *Ferula communis*.

PHACA

- 482³ 1. *candidissima*, Benth... = *A. candidissimus*,
S. Wats.
chilensis, Nees,

PHAEDRANASSA

- 484³ 1. *chloracea*, Herb.

PHALAEENOPSIS

- 486³ 1. *Sanderiana*, Reicheb. f. in Flora, lxx. (1882) 466;

- 489² a. **PHARETRANTHUS**, Klatt, in Flora,
lxviii. (1885) 203. **COMPOSITAE**.
ferrugineus, Klatt, l. c. 204. — Ins. Philipp.

- 492³ 1. **PHEDIMUS**, Rafin. in Am. Monthly Mag.
i. (1817) 438; et... = **Sedum**, Tourn.
(Crassul.).
a. *stellatus*, Rafin. l. c. = *S. stellatus*.
uniflorus, Rafin. l. c. = *S. Cepaea*.

PHLEUM

- 498² 1. *fallax*, Janka, in Közlem. Magyar. Tudom.
Akad. xii. (1876) 168 =
a. *maximum*, Pryor, Fl. Herts, 450 = *pratense*.

PHOENIX

- 501³ 1. *senegalensis*, Van Houtte, ... (1884).

PHRAGMITES

- 503³ a. *Phragmites*, Karst. Pharm. Med. Bot. 379 =
communis.

PHRYNIUM

- 504² 1. *dichotomum*, Koern. in Nouv. Mém. Soc. Nat.
Mosc. vi. (1859) 350, 351, 360, tt. 8, 9 =
Clinogyne grandis.
504³ *macrostachyum*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl.
iii. 654. — Afr. trop.
a. *plicatum*, Hort. ex Regel, Gartenfl. xxviii.
(1879) 293 = *Calathea flavescens*.
505¹ *villosum*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 653.
— Afr. trop.

- 505³ a. **PHYLLANTHUS**, Murr. Syst. 707 (1774) =
Phyllanthus, Linn. (Euphorb.).

PHYLLANTHUS

- 510¹ a. *mamillosus*, Buek, Ind. Cand. iv. 264, sphalm.
= *ramillosus*.
511² *roseo-pictus*, Hort. ex Garden, x. (187) 261.
— Hab.?
1. *ruber*, Spreng.

- 513³ a. **PHYLLORKIS**, Thou. in Nouv. Bull. Soc.
Philom. n. 19 (1809) 319 = **Dendrobium**,
Sw. (Orchid.).

PICEA

- 519³ a. *Abies*, Karst. Pharm. Med. Bot. 325 = *excelsa*.

PICRIDIIUM

- 521¹ a. *picridoides*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1145 =
vulgare.

PICRIS

- 521¹ 1. *autumnalis*, Scop. Introd. 122; All.

PICROLEMMA

- 522¹ a. *Valdivia*, G. Planch. ex Restrepo, Étude du
Cedron, 46. — N. Granat.

PILEA

- 523² 1. *multiflora*, Wedd.

PILOGYNE

- 525¹ a. *cerasiformis*, Stocks, ex Aitch. Cal. Pl. Punjab.
65 = *Chenolepis cerasiformis*.

PIMENTA

- 527³ a. *Pimenta*, Karst. Pharm. Med. Bot. 790 =
officinalis.

- 543¹ 1. **PIPTOCALYX**, Torr. ex S. Wats. in King,
240 (1871); et in... (1874) =

PISUM

- 546¹ a. *botanocolpium*, Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit.
iv. (1805) 312. — Austral.
1. *fomardi*, Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit. iv.
(1805) 309 = *sativum*.

PLANTAGO

- 553³ a. *lacustris*, De Cresp. New Lond. Fl. 51; cf.
Journ. Bot. xv. (1877) 313 = *P. Coronopus*.

PLATANATHERA

- 556¹ 1. *aphylla*, Lindl... 290 =
556³ *tipuloides*, Lindl... 285 = *Habenaria tipuloides*.

PLATYCAPNOS

- 557¹ a. *grandiflorus*, Rouy, in Rév. Sc. Nat. Sér. III.
i. (1883) 66. — Hispan.

PLECTRONIA

- 560³ a. *Gueinzii*, [f. M. Wood, ex] Cooke, in Grevillea,
x. (1882) 124. — Natal.

- 561¹ nota **PLEGERINA**,... sphalm. = **PLERA-**
GINA, Arruda = **Couepia**, Aubl. (Rosac.).
1. *odorata*, Arruda, l. c. = *C. grandiflora*.
rufa, Arruda, l. c. = *C. Witi*.
umbrosissima, Arruda, l. c. (Quid?) — Bras.

PLEROMA

- 562² a. *monticolum*, Triana, ex Polak. in Linnaea,
xli. (1877) 555 = *Naudinianum*.

PLEUROPHYLLUM

- 564¹ 1. *Hombrovi*, Decne... = *criniferum*.

PLEUROTHALLIS

- 566¹ a. *Lansbergiana*, Regel, Gartenfl. vi. (1856) t. 193.
f. d. (err. typ. 190) = *Lansbergii*.

PLUCHEA

- 568³ 1. *Dioscoridis*, DC.

PLUMBAGO

- 569² 1. *Laripentae*, Lindl... 732 = *Ceratostigma plum-*
baginoides.

POA

- 570² a. *ambigua*, Mathieu, *Fl. Belg.* 611 (quid?). — Belgia.
 573² l. *kerguelensis*, Hook. f. *Fl. Antarct.* t. 138; Steud... — Ins. Kerguel.
 575¹ l. *quadrifidalis*, Ehrh.
 578¹ l. **PODOCARPUS**, L'Hérit. ex Labill. Pl. Nov. Holl. ii. 71, in adnot. (1806); L'Hérit. (1807)
 579¹ *valdiviana* [Nelson]... = andina.

POGONIA

- 582² a. Kotschy, *Reichb. f. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xiv. (1864) 338. — Afr. trop.
 1. *viridiflora*, Reichb. f. (*non viridiflora*).

POGOSTEMON

- 583¹ l. *Cablin*, Benth... = Heyneanus.
 Patchouly, Pellet... 7. — Ind. or.; Malaya.

POLANISIA

- 584¹ l. *bhurtorensis*, Munro, Hort. Agr. 35; et ex Wight,
graveolens, Rafin... = C. dodecandra.
viscosa, DC... = C. dodecandra.

POLLINIA

- 585³ a. *Jacquinii*, Spreng. ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 45, sub 107. — Hab. ?

POLYCEPHALOS

- 588¹ l. *suaveolens*, Forsk. (l. c.) p. lxxii.

POLYGALA

- 590¹ *corsica*, Bor. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, (1857) 87. — Corsica.

POLYGONUM

- 595¹ l. *australe*, R. Br. Prod. 421; A. Rich...

POLYPOGON

- 601¹ l. *Adscensionis*, Trin. in *Mém. Acad. St. Pétersb.* Sér. VI. vi. II. (1845) 257. —

POLYSTACHYA

- 602¹ l. *cultriformis*, Lindl. ex Spreng... iii... = cultrata.
 a. *Fischeri*, Reichb. in *Mitth. Geogr. Geo. Hamb.* 1882-83 (1885) 268, nomen. — Afr. trop.
macrantha, Lindl. ex Hook. Bot. Mag. sub t. 3707 = grandiflora.

- 602³ l. **POLYTROPIA**, Presl.

POPULUS

- 605³ l. *benzoifera*, Tausch, ... 754.
biformis, Rafin. l. c. 43 = euphratica.
 606¹ a. *longiflora*, Fisch. in Otto & Dietr., Allg. Gartenz. (1841) 403 =
salicifolia, Rafin... 43 = angustifolia.
suaveolens, Fisch. (l. c.) 404 =
 606² a. *tristis*, Fisch. (l. c.) 402 = balsamifera ?
 607³ l. **PORTLANDIA**, Ellis, in Linn. Corresp. i. 122 (1821) = **Gardenia**, Ellis (Rubiace).

POTAMOGETON

- 609² l. *angustatus*, Wallm. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. vii. 16 =
 a. *Burtoni*, Hopkins, ex Syme, Engl. Bot. ed. III. ix. 39 = decipiens.
 609³ l. *epihydrum*, Rafin... = Claytonii.
flexuosus, Wredow, Fl. Mecklenburg, l. 255 (1811) = praelongus.
 610¹ *lanceolatus*, Eichw... = rufescens.
 a. *Liljebladii*, Wallm. ex Reichb. (l. c.) = obtusifolius.
 1. *lonchites*, Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlv. (1843) 38; et
 610² *paucifolius*, Opiz, in Flora, v. (1822) 267; Natur. Tausch, n. 10 (1825) 223.
Reichenbachii, Löhr, ex Beurling, in Bot. Notis. (1853) 90 = pusillus.
 610³ *tenuissimas*, Löhr, ex Beurling. (l. c.) = pusillus.

POTENTILLA

- 612³ a. *erecta*, Karst. Pharm. Med. Bot. 764 = P. Tormentilla.
 613³ *Keilhavi*, Sommerf. in Mag. f. Naturvid. II. i. (1832) 244 = *Keilhavii*.
 616² *unguiculata*, Hook. f. in Bot. Mag. t. 6560. — Calif.
 616³ l. *Weinmannii*, Lodd. Bot. Cab. t. 706.

POUZOLZIA

- 620¹ l. *ovalis*, Mig... — As. trop.
viminea, Wedd... 228 = ovalis.

PRATIA

- 621¹ l. *linnaeoides*, Hook. f. Handb. N. Z. Fl. 172 = *Lobelia linnaeoides*, Petrie (1891).

PREMNA

- 622¹ a. Perrottetii, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 572, in nota (Quid?). — Ind. or. ?

PRESTOEIA

- 623³ a. *montana*, Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 56. — Ind. occ.

PRIMULA

- 624² l. *altaica*, Paxt. Mag. Bot. xvi. (1849) 194 = vulgaris.
 625¹ a. *Dumoulini* X, Stein, Ind. Sem. Hort. Vratisl. (1881). — Hab. ?
 625² *gracilis*, Stein, (l. c.). — Hab. ?
 626¹ *Obristii* X, Stein. (l. c.). — Hab. ?
 627¹ *Warei*, Stein, (l. c.). — Hab. ?

PRINGLEOPHYTUM

- 627¹ l. *lanceolatum*, A. Gray, ... = *Berginia virgata*.

PRITCHARDIA

- 628¹ a. *aurea*, Hort. Lind. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 65. — Hab. ?

PRUNUS

- 635³ a. *ambigua*, *apiana*, *apyrena*, *bifera*, *Calvellana*, *atalanensis*, *cerasiana*, *decora*, *deformis*, *dolabriformis*, *durandina*, *duplex*, *elliptica*, *feriarum*, *formosa*, *germanica*, *graphica*, *helvetica*, *hiemalis*, *hierochuntica*, *hispanica*, *insignis*, *lineata*, *Mauriniana*, *mirabilis*, *neustriensis*, *oleaginosa*, *pictorum*, *praedura*, *provincialis*, *pseudoclaudianae*, *riomensis*, *serotina*, *spectabilis*, *spontalis*, *versicolor*, *virginalis*, Poit. et Turp. in Poit. Pomol. Franç. i. = domestica.
angustifolia, *brevifolia*, *cerasifrutus*, *domestica*, *elegans*, *elliptica*, *floribunda*, *glabra*, *glomerata*, *inermis*, *intermedia*, *Lamottii*, *Lloydii*, *lucens*, *lutescens*, *praecox*, *rhamnifrutus*, *spiraeifolia*, *virgata*, A. Savat. in C. R. Assoc. Fr. Av. Sc. xi. Rochelle, 1882 (1883) 434 = domestica ?
calycina, *divaricata*, *ericiflora*, *longicaudata*, *recta*, *spatulata*, *subrotundifolia*, A. Savat. l. c. 435 = domestica ?
chlorocarpa, *heterocarpa*, A. Savat. l. c. 433 = domestica ?
 637² *vitrea*, K. Koch, Die Deutschen Obstgehölze, 165 = P. Cerasus.

- 638³ a. **PSEUDERANTHEMUM**, Radlk. in Sitzb. Math.-phys. Cl. Akad. Wiss. Muench. xiii. 1883 (1884) 282 = **Eranthemum**, Linn. (Acanthac.).
 a. *acuminatum*, *alatum*, *albiflorum*, *album*, *atropurpureum*, *bicolor*, *cinnabarinum*, *Cooperi*, *cordatum*, *crenulatum*, *cuspidatum*, *decurrens*, *detruncatum*, *diversifolium*, *exaequatum*, *facundum*, *Haenckeanum*, *heterophyllum*, *hispidulum*, *hypocrotiferum*, *lanceum*, *leptostachyum*, *modestum*, *Moorei*, *nigritianum*, *palatiflorum*, *paniculatum*, *racemosum*, *reticulatum*, *Richelianum*, *senense*, *succifolium*, *tenellum*, *tricolor*, *tuberculatum*, *variabile*, *verbenaceum*, *versicolor*, *Zollingerianum*, Radlk. l. c. 286-287, in nota = homonyma omnia **Eranthemi**.
asperum, Radlk. l. c. 286 = E. bicolor, Schrank.
Blumei, Radlk. l. c. = E. Andersoni, Mast.

PSEUDERANTHEMUM

- Blumei*, Radlk. in Sitzb. Math.-phys. Cl. Akad. Wiss. Muench. xiii. 1883 (1884) 286 = **Eranthemum crenulatum**, Lindl.
Eldorado, Radlk. l. c. = E. *Eldorado*, Hort. *macrophyllum*, Radlk. l. c. = **Anthacanthus microphyllum**, Nees.
roseum, Radlk. l. c. = E. *roseum*, Lind. & Fourn.
tetragonum, Radlk. l. c. = **Daedalacanthus tetragonus**, T. Anders.

- 630² a. **PSEUDO-ERANTHEMUM**, Radlk. in Sitzb. bay. Akad. xiii. (1883) 282, 286 = praec.

PSEUDOTSUGA

- 640¹ l. *jezoensis*, Bertrand, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xx. (1874) p. 89; W. R. Mc Nab, *nobilis*, Bertrand, (l. c.) 86; W. R. Mc Nab,

PSIDIUM

- 640³ a. **BURCHARDIA**, Neck. Elem. ii. 76 (1790).

PSYCHOTRIA

- 646¹ a. *capitellata*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. ii. 124 (syn. *Patatea capitellata*, Wawra.)
 647¹ l. *Gardneriana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 235 (non 379). — Bras.
 648¹ a. *ligularis*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. ii. 124.
 648³ l. *obtusifolia*, Lam.
 650³ l. *umbellata*, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. II. (1851) 245. — Sumatra.

- 651² l. **PSYLLOTHAMNUS**, Oliver = **Sphaerocoma**, T. Anders. (Caryoph.).
Beevori, Oliver, ... = S. Hookeri.

PTARMICA

- 651³ l. *oxyloba*, DC... = A. *oxyloba*, DC.

PTERANTHUS

- 652¹ a. *dichotomus*, Forsk. (l. c.) p. lxii. — Arab.

1. **PTERIGOSTACHYUM**, Nees, ... = **Arun-dinella**, Raddi (Gramin.).

PTERNIX

- 652² a. *cynarioides*, Rafin. in Am. Monthly. Mag. i. (1817) 439 = *Cnicus cynarioides*.

PTEROCARYA

- 653¹ a. *diechocarpa*, Lavall. Arb. Segnez. 67, in nota. — Japon.
japonica, Maxim. in Bull. Acad. St. Pétersb. xviii. (1873) 58, in syn. = *Juglans regia*.
 1. *sorbifolia*, Sieb. & Zucc... = *rhoifolia*.

- 655² l. **PTEROPHORA**, Linn. Pl. Afr. Rar. 17 (1760); Neck... = **Pteronia**, Linn. (Compos.).

- 657 a. **PTEROXYLON** [Hook. f. in] Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. II. 60 (1868) = **Ptaeroxylon**, Eckl. & Zeyh. (Sapind.).

1. **PTERYGOSTACHYUM**, Nees, ... = **Arun-dinella**, Raddi (Gramin.).

PTYCHOSPERMA

- 658³ l. *Normanbyi*, F. Muell...; Becc. in Ann. Jard. Duitenz. ii. (1885) 171 (Index). — Austral.
 659¹ *Normanbyanus*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 893, sphalm. = *Normanbyi*.

PTYCHOTIS

- 659² a. *saxifraga*, Loret & Barr. Fl. Montp. 283 = C. Bunius.

PULEGIUM

- 659³ a. *Pulegium*, Karst. Pharm. Med. Bot. 977 = M. *Pulegium*.

PULICARIA

- 660¹ a. *Pulicaria*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1072 = vulgaris.

PULSATILLA

- 661¹ a. *Pulsatilla*, Karst. Pharm. Med. Bot. 560 = *A. Pulsatilla*.

PUPALIA

- 662² a. *prostrata*, R. Br. Prod. 417, in obs. = *Cyathula prostrata*.

PYRUS

- 668¹ a. *albicans*, *ambrosiaca*, *amoena*, *Angeli*, *anglica*, *apyrena*, *aquosa*, *Ardenpontii*, *Avenbergii*, *Augusti*, *aurantiacum*, *Aureola*, *beuveria*, *bressensis*, *butyraea*, *calculosa*, *Caumontel*, *cardinalis*, *Castigatrix*, *Chaptalia*, *cinnabarina*, *conspersa*, *crastina*, *cucurbitaria*, *cyprica*, *deliciosa*, *depicta*, *Descampi*, *dilecta*, *dolifera*, *duplex*, *Elenchus*, *exaltata*, *exquisita*, *fasciata*, *femoriformis*, *flagellata*, *fugax*, *fuscata*, *fuscata* [bis], *Germani*, *guiennensis*, *Heryana*, *hispanica*, *inculismensis*, *Lagenaria*, *lageniformis*, *lezania*, *libralis*, *longipes*, *Ludovica*, *maculosa*, *maculosa* [bis], *magdalena*, *maliformis*, *marchionissa*, *maxima*, *montana*, *moschata*, *moschatella*, *neapolitana*, *nemorum*, *oleaginata*, *olentissima*, *oviformis*, *papulata*, *pastoralis*, *provincialis*, *quercifolia*, *regalis*, *remensis*, *reperta*, *Robiniana*, *romana*, *Ronvilla*, *rubricata*, *rufa*, *Sabina*, *Salviati*, *Samsoniana*, *sanguinolenta*, *secundaria*, *semitulata*, *splendens*, *succedanea*, *suleriensis*, *tardiflora*, *tener*, *unguentula*, *vallis*, *vinetorum*, *virgolensis*, *viridis*, *viridis* [bis], Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. iii. = communis.
- aequalis*, A. Savat. in C. R. Assoc. Fr. Av. Sc., xi. Rochelle, 1882 (1883) 425 = communis.
- 668² *cineracea*, *elongata*, *ferox*, *tomentosa*, A. Savat. l. c. 427 = communis.
- 669¹ *macrocarpa*, *subglobosa*, *rufa*, *canestens*, A. Savat. l. c. 426 = communis.
- macropoda*, A. Savat. l. c. 428 = communis.
- 669² *Pseudo-chaenomeles*, Carr. Rev. Horticol. (1882) 236 = japonica.
- 669³ *sinensis*, Mus. Par. ex Thouin, in Ann. Mus. Hist. Nat. Par. xix. (1812) 145 = cathayensis, Hemsl.
- 670¹ *transversalis*, A. Savat. in C. R. Assoc. Fr. Av. Sc. xi. Rochelle, 1882 (1883) 425 = communis.

Q

- 670² a. **QUADRIA**, Mutis, in Linn. Corresp. ii. (1821) 530 = **Vismia**, Vand. (Hyperic.).

QUALEA

- 670³ l. *macropetala*, Spruce, ex [Black, in] Lindley & Moore, *Trans. Bot.* ii. 947 (1865). — Hab. ? pulcherrima, Spruce, l. c. — Hab. ?

QUERCUS

- 672² l. *bambusaefolia*, Hance, ex Seem. Bot. Voy. Herald, 415, t. 91 ; et ex Miq.
- a. *Bellota*, Colm. & Boutel. Exam. Arb. Pen. = *Q. ilex*.
- 673¹ l. *conferta*, Kit. in Schult. Oesterr. Fl. ii. 619 (1814). — Europ. austr.
- 674¹ *Farnetto*, Tenore, Syll. Plant. Vasc. Fl. Neapol. (1831) = *conferta*.

R

- 679³ l. **RADERMACHERA**, Zoll. & Mor.

- 680¹ lin. 1. insere **RADERMACHERA** : —

RADIOLA

- 680¹ a. *Radiola*, Karst. Pharm. Med. Bot. 606 = *R. Liniodes*.

- 681² a. **RAMSAIA**, W. Anders. ex R. Br. Prod. 553, in adnot. (1810) = **Bauera**, Banks. (Saxifr.).

RANUNCULUS

- 684² l. *delphinifolius*, Torr. in Eaton, Man. ed. II. 395;
- 685¹ *glabriusculus*, Rupr. = *auricomus* ?
- 685³ *innominatus*, H. C. Wats, Lond. Cat. ed. II. 1 = *tripartitus*, DC.
- 686¹ *lacustris*, Beck & Tracy, in Eaton, Man. Bot. ed. III. 423 (1822);
- 686³ a. *Nathorstii*, Berl. in Öfvers. Vet. Akad. Förh. xli. (1884) n. VII. 20 = *acris*.

RAPHANISTRUM

- 690¹ l. *innocuum*, Medic. Pflanzeng. 40 = *Raphanus Raphanistrum*.
- a. *Raphanistrum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 673 *Raphanus Raphanistrum*.

RAPISTRUM

- 691¹ a. *bursaefolium*, DC. = seq.
- a. *bursifolium*, Berger. etc.
- l. *Cakile*, Berger. (l. c.) 163 =

- 692³ a. **RAUSSINIA**, Neck. Elem. ii. 419 (1790) = **Pachira**, Aubl. (Malvac.).

RAVENIA

- 693² a. *rosea*, Lebas, in Rev. Hort. (1880) 179. — Bras.

- 694² a. **REGINA**, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 66 (1783) [Quid ?].
- Gallorum*, Buc'hoz, l. c. (Quid ?). — Hab. ?

RENEALMIA

- 696¹ a. *Mannii*, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. xv. 25 sub t. 1430. — Afr. trop.

- RESTIARIA**, Lour. (1790) = **Uncaria**, Schreb. (Rubiace.).

- 697³ l. *cordata*, Lour. = *Uncaria pedicellata*.

RESTREPIA

- 699² l. *hypolepta*, Reichb. f. = *Pinelia hypolepta*.

RHAMPHICARPA

- 703² l. *Cameroniana*... xv. (non xiv.).

- 704² l. **RHAPHITHAMUS**, Miers,

RHEXIA

- 705³ a. *bogotensis*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 527 = *glutinosa*.

RHODODENDRON

- 710³ l. *Blandianum*, *Chamaecistus*,... = *Rhododhamnus Chamaecistus*.

- 711¹ l. *flavum*, G. Don, ... — Reg. Caucas.

- 711² l. *hirsutiforme* X, Gremb.

- 712¹ *lobbii*, Veitch, Cat. (1870) 22 ; Gard. Chron. *praecox* X, Carr. in Rev. Hort. (1868) 211, cum ic.

RHOPALOSTIGMA

- 713² l. *microphyllum*, Phil. = *P. microphyllum*.
- pendulum*, Phil. = *P. pendulum*.

RHUS

- 713³ a. **ALBONIA**, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 57 (1783).
- 714³ *Michauxii*, Sargent, ... = *pumila*, Michx.
- l. *Osbeckii*, Carr. (1867) [non 1887].

RHYNCHOSIA

- 718¹ a. *Rothii*, Benth. ex Aitch. Cat. Pl. Punjab, 50 = *sericea*.

- 719³ l. **RIBEIREA**, Arruda, ... (1816) = **Hancornia**, Gomes (Apocyn.).
- sorbilis*, Arruda, l. c. = *H. speciosa*.

RIBES

- 720¹ a. *albescens*, *albicans*, *albo-virens*, *auriculatum*, *carneum*, *racemosum*, Poit. & Turp. l. c.) = *rubrum*.

- flavescens*, *ianthinum*, *lobatum*, *moschatum*, *purpureo-majus*, *purpureo-minus*, *succineum*, *tubulosum*, *virente-rotundum*, *viridi-albescens*, *viridimajus*, *viridi-minus*, *vulgatissima*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. iii. = *R. Grossularia*.

- 721¹ *Munroi*, Dougl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 120, sphalm. = *niveum*, = *gracile*.

- 724¹ a. **RIGOCARPUS**, Neck. Elem. i. 238 (1790) = **Citrullus**, Forsk.

ROBINIA

- 725³ l. *neo-mexicana*, A. Gray, ... Mont. scopul.
- a. *pendulina*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 125 (Quid ?). — Hab. ?

RONABEA

- 729² l. *australis*, A. Rich. = *Coprosma grandifolia*.

RONDELETIA

- 729³ a. *anomala*, Veitch, Cat. (1856-57) 10. — Guatemala ?

RORIPA

- 730³ a. *Turczaninowii*, Simk. in Magy. Növ. Lap. ii. (1878) 147 = *N. anceps* ? DC.
- uliginosa*, Simk. (l. c.) nomen (Quid ?).

ROSA

- 731¹ a. *affinita*, Puget, ex H. Braun, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 96 = *pilosa*.
- almeriensis*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 230. — Hispan.

- 731² *Annoniana*, Puget, ex H. Braun, (l. c.) 95 = *pilosa*.

- 731³ l. *Biebersteinii*, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vi. (1826) 89 ; et

- 732¹ a. *bohémica*, H. Braun, (l. c.) 79. — Europ. *chlorocarpa*, Fenzl & H. Braun, (l. c.) 63. — Syria.

- 734³ l. *holikensis*, Kmet. = *Wulfenii*.

- 735¹ *Hostii*, H. Braun, (l. c.) 113 = *Wulfenii*.

- 735² *Kernerii*, H. Braun, (l. c.) 80. — Austria.

- 735³ *leucadia*, H. Braun, (l. c.) 126. — Ins. Graeciae.

- 736² *myrtilloides*, H. Braun, (l. c.) 125. — Europ.

- 736³ *nipponensis*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) = *acicularis* ?

- 738¹ *Reussii*, H. Braun, (l. c.) 104. — Hungar.

- 739¹ *subtrichostylis*, H. Braun, (l. c.) 96 = *pilosa*.

- subglabra*, H. Braun, (l. c.) 94 = *pilosa*.

- 739² *Tauschiana*, H. Braun, (l. c.) 78. — Europ.

- 740¹ *Woloszczakii*, Keller, in Halacsy & H. Braun, Nachtr. 3. Fl. Niederoesterr. 282 (1880) = *pilosa*.

ROTTBOELLIA

- 742¹ a. *dimidiata*, Linn. f. Suppl. 114 ; an seq. ?

ROYDSIA

- 745¹ a. **ALYTOSTYLIS**, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 409, in obs. (1874).

RUBUS

- 747³ a. **BOSSKIA**, Neck. Elem. ii. 91 (1790).

RUDBECKIA

- 758² l. *Neumannii*, Steud. = *Newmanni*.
- Newmanni*, Loud. 584, in syn. = *speciosa*.
- Newmanni*, Loud. = *speciosa*

- 759² a. **RUELINGIA**, F. Muell. Fragm. xi. 113, in obs. (1881) = **Rulingia**, R. Br. (Stercul.).

RUELLIA

- 761¹ a. *gangetica*, R. Br. Prod. 478 = *Asystasia coromandeliana*.

RUPRECHTIA

- 767² a. *coriacea*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 105 — Venezuela.

RUTA

- 768¹ a. *finbriata*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 (Quid?). — Sicil.

- 768³ RUTICA, dele « sphalm. »

RYNCHOSPORA

- 770³ l. *nivea*, Boeck... = *Dichromena Reverchoni*, H. Wright (in Add.).

- 771³ l. RYPARIA, Blume... (Bixin.)

RYPAROSA, Blume... (1825) *BIXINEAE*.
et dele « Gen. dub. Euphorbiacearum. »

S**SABAL**

- 772¹ a. Princeps, Hort. Versch. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 63 nomen. — Hab. ?

SABICEA

- 772³ l. *Perrotteti*, A. Rich... = *Uncaria Perrottetii*.

SACCHARUM

- 773³ a. *Glagia*, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 38 = spontaneum.

SAGINA

- 776¹ l. *maritima*, G. Don, pat. ex Sm. Engl. Bot. t. 2195.

SAGITTARIA

- 776² l. *chinensis*, Spreng. Syst. ii. 633 = *sinensis*.
776³ *sinensis*, Sims, Bot. Mag. t. 1631 = *sagittifolia*.

SAGUS

- 777³ a. *Sagu*, Karst. Pharm. Med. Bot. 412 = M. Sagu.

SALIX

- 780¹ a. AMERIX, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439.

- a. CHALEBUS, Rafin. (l. c.) (1817).

- DIPLOPIA, Rafin. (l. c.) (1817).

- DISYNIA, Rafin. (l. c.) (1817).

- MELANIX, Rafin. (l. c.) (1817).

1. OISODIX, Rafin. (l. c.) (1817).

- a. OPODIX, Rafin. (l. c.) (1817).

1. VIMEN, Rafin. (l. c.) (1817).

- 781¹ l. *calostachya*, Anderss... = S. Wallichiana, Anderss.

- 783¹ *ivigtutiana*, Lundstr. ex Berl. in Ofvers. Vet. Akad. Förh. xli. (1884) n. VII. 61, 88. — Groenl.

SALVIA

- 794² a. *praetermissa*, Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. 1800) 37. — Hab. ?

SANTOLINA

- 799¹ l. *capitata*, Linn...

SAPINDUS

- 800¹ a. *manatensis*, Schuttl. ex Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 318. — Florida.

SAPONARIA

- 801³ l. *sicula*, Rafin. Specch. Sc. ii. 7; ex Call, Life Rafin. 148.

SARCOCEPHALUS

- 803² a. *Leichhardtii*, F. Muell. Rep. Burdek. Exped. 12 = *Morinda citrifolia*.

SARCOSTEMMA

- 805¹ l. *aphyllum*, R. Br. Prod. 463; Schult.
805² *pyrotechnicum*, R. Br. (l. c.); Schult.

- 805³ l. **SARCOSTIGMA**, Wight & Arn... xiv. (1833) 299.

SASSAFRAS

- 806² a. *Sassafras*, Karst. Pharm. Med. Bot. 505 = officinale.

- 806³ a. SATORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 316; (Orchid.) (Quid?).

SATYRIUM

- 808¹ a. *cornutum*, Linn. Pl. Afr. Rar. 27 = *Orchis satyroides*.

SAURAUJA

- 809³ a. *Synarrhena*, F. Muell. Fragm. v. 175, in obs. (1866).

SAUSSUREA

- 810³ l. *Katochaete*, Maxim.
a. *lapatifolia*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1106 = alpina.

SCABIOSA

- 820¹ a. TRICHOPTERIS, Neck. Elem. i. 110 (1790).

SCAEVOLA

- 820³ l. *oppositifolia*, R. Br. Prod. 583; Roxb.

SCANDALIDA

- 821² a. *conjugata*, Scop. Introd. 308 = L. *conjugatus*.
maritima, Scop. (l. c.) = L. *siliquosus*.
1. *siliquosa*, Scop. (l. c.); Medic.
tetragonoloba, Scop. (l. c.); Medic.

SCAPHYGLOTTIS

- 822² l. *stellata*, Lodd.. (1839) [non 1889].

SCHEDONORUS

- 823³ a. *laxus*, Fries, in Bot. Notis. (1843) 130 = B. *erectus*.
sterilis, Fries, (l. c.) 131 = B. *sterilis*.
tectorum, Fries, (l. c.) = B. *tectorum*.

SCHEUCHZERIA

- 824¹ a. *calyculata*, Scop. Introd. 81, 82 = *Tofieldia calyculata*.

SCHLEICHERA

- 828¹ l. *trijuga*, Willd. Sp. Pl. iv. 1096 (non 1396).

- 828¹ a. SCHLOSSERIA, Ellis, in Linn. Corresp. i. 130, 159 (1821) = **Styrax**, Tourn.

- 828¹ a. SCHLOSSERIA, Garden, in Linn. Corresp. i. 365 (1821) = (Palm.) (Quid?).

SCHOBERA

- 829² a. *angiosperma*, Scop. Introd. 158 = *Heliotropium parviflorum*.

SCHWEINFURTHIA

- 834³ a. *apterum*, Vatke, in Oesterr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 96 = *Antirrhinum apterum* (Cur. Post.).

SCIRPUS

- 838² l. APLOSTEMON, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 441; et

- 839² a. *carniolicus*, Ambrosi, Fl. Tir. Austr. i. 447 = *Eleocharis carniolica*.

- 841² l. *lateralis*, Retz... 12 (non 11).

- 842² *obliganthus*, Steud...

- 844² a. *Zanardinii*, Ambrosi, (l. c.) 448 = *Eleocharis atropurpurea*.

SCLERIA

- 845³ a. *coriacea*, Bertol. f. in Mem. Acc. Sc. Bologn. v. (1854) 476 = *oryzoides*.

SCLEROPHYLLUM

- 848³ a. *coarctatum*, Griff. Notul. iii. 8 = *Oryza coarctata*.

SCOLOPIA

- 849³ l. *Rhinanthera*, Clos,

SCORODOSMA

- 850² a. *Assa-foetida*, Karst. Pharm. Med. Bot. 845, 846 = F. *Assa-foetida*.

SCUTELLARIA

- 855² a. *hirsuta*, Short, in Transylv. Journ. Med. viii. (1835) 582 = *pilosa*.
855³ l. *javanica*, Jungh.

SEDUM

- 860² a. PHEDIMUS, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 438; et Cat. 15 (1824).
album, Rafin. Cat. Bot. Gard. Lexington (1824) 12, nomen = *albidum*.

SEHIMA

- 863³ l. *Ischaemum*, Forsk. (l. c.) p. cxxiii.

SELENIPEDIUM

- 865² l. *Wallisii*, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 189; t. 181;

SEMPERVIVUM

- 867³ l. *barbatum*, C. Sm. ex Nees, Hor. Phys. Berol. 37, in nota. — Ins. Canar.
caespitosum, C. Sm. ex Nees, (l. c.) 38 in nota — Ins. Canar.

- 868¹ *foliosum*, C. Sm. l. c.) = *Smithii*.

- 868² a. *hirsutum*, Pollini, Fl. Veron. ii. 113 = *hirtum*.
ligulare, Haw. Rev. Pl. Succ. 64, in adnot. = *caespitosum*;

- 868³ *radicescens*, Lowe, Man. Fl. Mad. 331 in obs. — Ins. Canar.

- 869¹ a. *Smidtii*, C. Sm. (l. c.) = *Smithii*.

SENKEBERGIA

- 882¹ a. *bivalvis*, Neck. l. c. = *Besleria bivalvis*.

- 883² a. SENNEBERIA, Neck. Elem. ii. 120 (1790) = **Ocotea**, Aubl. (Laurin).

SERIDIA

- 885¹ l. *sphaerocephala*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218; Webb,

- 890¹ a. SERVERIA, Neck. Elem. ii. 98 (1790) = **Doliocarpus**, Roland. (Dillen.).

SESUVIUM

- 892³ l. *pentandrum*, Ell. 556. — Am. bor.

SETARIA

- 893¹ l. *effusa*, Fourn... = *Panicum sulcatum*, Aubl.
893³ *Weinmanni*, Roem. & Schult.

SHOREA

- 894³ a. *Gala*, Baill. Bot. Médic. ii. 817 (1884) = S. Guiso ?

SILAUS

- 904² a. *Silaus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 836 = *flavescens*.

SILENE

- 907¹ a. *flavescens*, Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit. iv. (1805) 311 — Hab ?

- 913³ l. SINAPI, Neck. Elem. iii. 80 (1790); Dulac,

SISYMBRIUM

- 917³ l. *acaule*, Sieber. ... 593 = *Morisia hypogaea*.
921¹ l. *uniflora*, Journ. ... = *Braya uniflora*.

SISYRINCHIUM

- 921² a. *arizonicum*, Rothrock, in Coult. Bot. Gaz. ii. (1877) 123. — Arizona.
822² *quadrangulatum*, Klatt, in Linnaea, xxxii. (1863) 284 — Mexic.

SIUM

- 922³ l. *Bulbocastanum*, Spreng. in Neue Schr. naturf. Ges. Halle, ii. (1813) 31; et
923¹ *ferulaefolium*, Spreng. (l. c.); et
peucedanoides, Spreng. (l. c.); et

- 923³ 1. SKOLEMORA, Arruda, ... 1816 = **Andira**, Lam. (Legum.).
pernambucensis, Arruda, l. c. = *A. anthelminthica*?

SMILAX

- 927¹ a. *Purhampuy*, Ruiz, Mem. Raiz de Purhampuy, (1821) 65 = praec.

SOBRALIA

- 928³ 1. *Elisabethae*, Rob. Schomb... = *S. Liliastrum*, Lindl.

SOJA

- 929¹ a. *Soja*, Karst. Pharm. Med. Bot. 711 = *G. Soja*.

SOLANUM

- 930³ 1. *bracteatum*, Thunb. in Act. Gorenk. (1812): ex ej. Fl. Cap. ii. 57 = *Teedia lucida*.
932² a. *digitatum*, Pecholt, in Zeitschr. allg. oesterr. apoth. Ver. xxi (1883) 186, nomen. — Bras.

SONCHUS

- 946² a. *zollikoferioides*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 237 — Hispan.

SOPHORA

- 947³ a. *heptaphylla*, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 328 — Ind. or.
1. *heptaphylla*, Linn. ... 373 (non alior.) = *Derris sinuata*, Benth.

SORBUS

- 949¹ a. *sativa*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 87 = *Pyrus domestica*.

SORGHUM

- 949² a. *Sorghum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 367 = vulgare.

SPANOGHEA

- 951¹ 1. *connata*, F. Muell. in Trans.

SPARGANIUM

- 951³ 1. *pubescens*, Poir. Voy. Barb. ii. 254 (err. typ. Poiretii) = *Fuirena pubescens*.
ramosum, Huds. Fl. Angl. ed. II. 401; *Curt. tenuifolia*, Poir. (l. c. err. Poiretii) = *Scirpus pubescens*.

SPARTIUM

- 952² a. *etnensis*, Rafin. Speech. Sc. i. 18, ex Call, Life Rafin. 146.
952³ *scoparium*, Linn. Pl. Afr. Rar. 13 = *Lebeckia sepiaria*.

SPATHIPHYLLUM

- 953³ 1. *commutatum*, Schott, ... Ins. Philipp. ; Celebes.
1. Gardneri, Schott, ... (sp. diversa); cf. Massowia Gardneri, C. Koch.

SPERGULA

- 956¹ a. *norvegica*, Less. Reise durch Norwegen, 294 = *Arenaria norvegica*.
956² *tetraquetra*, Neck. Elem. ii. 157 = *Arenaria tetraquetra*.

SPIRAEA

- 964¹ 1. *banatica*, Janka, in Közlem. Magyar Tudom. Akad. xii (1876) 166 =

SPIRANTHES

- 966² 1. *colorata*, Hassk... = *Goodyera colorata*.

SPONDIAS

- 968³ 1. *tuberosa*, Arruda, ... 496 = *venulosa*.

SPOROBOLUS

- 969³ 1. *diander*, R. Br. Prodr. 170, in obs.; Beauv.

STACHYS

- 971² a. *BONAMYA*, Neck. Elem. i. 316 (1790).
972³ 1. *lusitanica*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 320 Steud... = *germanica*.

STAPELIA

- 976³ a. *erectiflora*, N. E. Br. l. c. nomen. — Afr. austr. *glabricaulis*, N. E. Br. in Kew. Rep. 1878 (1879) 7, nomen. — Afr. austr.

- 977² 1. *tsomoensis*, N. E. Br. l. c. nomen. — Afr. austr.

- 978¹ 1. STAPHYLLAEA, Scop... (1777).

STATIC

- 979¹ 1. *caespitosa*, Ortega, in Quer. Fl. Esp. vi 334; Cav. ... = *Armeria caespitosa*.

STAUROPSIS

- 982¹ a. *violacea*, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 7 = *Phalaenopsis violacea*.

STELLARIA

- 986² 1. *umbrosa*, Opiz, ex Rupr. in Flora, xvii. (1834) 710; Opiz, Seznam, ...
a. *uniflora*, Banks et Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 27 = *Colobanthus Billardieri*.

- 986³ a. STELLORKIS, Thon. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 317 = **Arethusa**? Gronov. (Orchid.).

- 989³ lin. 1 l. STENOCLINE: — (non Stenoptera).

STERCULIA

- 993² 1. *Haynii*, Bedd.
Heynii, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 360, in syn. = praec.

- 996² a. STICHORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318 = **Malaxis**? Sw. (Orchid.).

STREPTOCARPUS

- 1004¹ a. *Dyeri* X, cf. W. Watson, in Gard. & Forest, viii. (1895) 5. — Hybr. artef.

- 1004² 1. STREPTOGYNA, Beauv.

- a. STREPTOGYNE, Poir. in Dict. Sc. Nat. li. 96 (1827) = praec.

STRIGA

- 1005¹ a. *gesnerioides*, Vatke, in Oesterr. Bot. Zeitschr. xxv. (1879) 11 = *orobanchioides*.

STROMBOSIA

- 1007³ 1. *philippinensis*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 211; Vidal,

STRYCHNOS

- 1010¹ a. *Ignatia*, Lindl. Fl. Med. 530 = *S. Ignatii*.
1010² 1. *toxifera*, Schomb. ex Lindl. (l. c.); et...

STYLIDIUM

- 1011¹ a. ANDERSONIA, Koenig, ex R. Br. Prod. 570 (1810).

STYRAX

- 1015¹ a. SCHLOSSERIA, Ellis, in Linn. Corresp. i. 130, 159 (1821).
1. *angustifolia*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 26 (Quid?). — Hab.?

SUAEDA

- 1015³ 1. *heterophylla*, Bunge,
1. *hortensis*, Forsh... 71.

SUCCISA

- 1016² a. *attenuata*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 204 = *Cephalaria attenuata*.
1016³ *Succisa*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1053 = *Scab. Succisa*.

SWERTIA

- 1019² a. *Fraseria*, Sm. in Rees, Cyclop. xxxiv. n. 3 = *Fraseria caroliniana*.

SYMPLOCOS

- 1023² 1. *oblongifolia*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 214; Vidal.
reticulata, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 582, in syn. = *Beddomei*.

- 1024² a. SYNARRHENA, F. Muell. Fragm. v. 175 in obs. (1866) = **Saurauja**, Willd. (Ternstr.).

SYRINGA

- 1026¹ a. *correlata*, R. Br. in Sitzb. Ges. Naturf. Fr. Berl. (1873) 69 = *chinesis*.
japonica, Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. II. ii. (1879) 44. — Japon.
1. *oblata*, [Lindl. in] Gard. Chron. (1859) 868; Fortune, l. c. (1860) 170. — China bor.
pekinensis, Rupr.

SYZYGIIUM

- 1027³ 1. *lucidum*, Gaertn. Fruct. i. 167 = *Eugenia lucida*, Banks.
paniculatum, Gaertn. (l. c.) = *Eugenia paniculata*, Banks.

T**TAENIOPHYLLUM**

- 1031² a. *fornicatum* Blume, Tabell. 70, absque descr. — Hab.?
1. Zollingeri, Reichb. f. Xenia Orch. i. 202; Bonplandia.

TAMONEA

- 1034² a. *guianensis*, Aubl. Pl. Gui. 440 (quoad exempl. nonnulla) =

TARAXACUM

- 1037² a. *glaucum*, Boiss. & Haussk. ex Rabenh. in Sitzb. Isis (1870) [reimp.]; et Hedwigia x. (1871) 22 = *montanum*.
1037³ *Taraxacum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1138 = *officinale*.

TARIRI

- 1038¹ a. *Antidesma*, Baill. Bot. Médic. [Phan.] (1884) = *P. Antidesma*, Sw.
ciliata, Baill. (l. c.) = *P. ciliata*, Mart.
pentandra, Baill. (l. c.) = *P. pentandra*, Sw.

TAXANTHEMA

- 1038³ a. *Armeria*, Neck. Elem. i. 115 = *Armeria maritima*.

- 1041¹ a. TEKEL, Adans. Fam. ii. 497 (1763 = seq.

TEKELIA, Scop. Introd. 88 (1777) = **Argania**, Roem. & Schult. (Sapot.).
spinosa, Scop. Introd. 88 = *A. Sideroxylon*.

TELINA

- 1041³ a. *canariensis*, C. Koch, Dendrol. i. 31 = *Cytisus canariensis*.

- 1043² 1. TEPHEA, Delile, ... = **Olinia**, Thunb.
aequipetala, Delile, ... = *O. Rochetiana*.

TERMINALIA

- 1047¹ 1. *mollis*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 212; Vidal.

TETRANTHERA

- 1051³ 1. *Bindoniana*, F. Mull... = *L. Bindoniana*.
caloneura, Miq... (non *calononeura*).
1052³ *Rumphii*, Blume, ... = *L. Rumphii*.

- 1054¹ a. TETRAPTERIS, Garden, in Linn. Corresp. i. 406 (1821) = **Halesia**, Linn. (Styrac.).

THALASSIA

- 1057² 1. *Hemprichii*, Aschers. in Sitzb. Ges. Naturf. Fr. (1870) 83; et in Neumayer,

THESPESIA

- 1066¹ 1. *Lampas*, Dalz... — As. et Afr. trop.

THLASPI

- 1068¹ 1. *Burselta*, Berger. Phytom. iii. 55 = praec.

THLASPI

- 1068¹ *coronopifolium*, Berger. (l. c.) 29 =
 1068² *Nasturtium*, Berger. (l. c.) 43 =
nudicaule, Berger. l. c. 27 = *Teesdalia nudicaulis*.
nudicaule, DC., = *T. nudicaulis*, regularis.
 1068³ *rudemale*, Berger. Phyt. iii. 45; All...

THRINAX

- 1070² a. *arbores*, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 1882
 (1884) 64 = *Acanthorhiza arborea*.
 l. *barbadensis*, Lodd. ex Mart. Palm. iii. 257.
 — Ind. occ.
 a. *elegantissima*, Hort. ex Hook. f. Kew Rep.
 1882 (1884) 66 = *radiata*.
tinica, Hort. ex Hook. f. (l. c.) 64 = *Brashea dulcis*.

THYMUS

- 1074¹ a. *Barrelieri*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III.
 i. (1883) 240. — Hispan.
 1075³ *paradoxus* X, Rouy, (l. c.) 242. — Hispan.
 1076¹ *serbicus*, Petr. Addit. Fl. Agr. Nyss. 149 =
T. Serpyllum.

TILIA

- 1079³ a. *petiolata*, Hook. f. Bot. Mag. sub t. 6737
 (1884) lapsu = *petiolaris*.

TINNEA

- 1083¹ l. *erianthera*, Vatke... 539 (*species* Holmskioldiae). — Afr. trop.

TIPULARIA

- 1083² l. *camtschatica*, Spreng... 734 = *Habenaria tipuloides*.

TITHYMALUS

- 2084² a. *canariensis*, Karst. Pharm. Med. Bot. 587 =
E. canariensis.
 1084³ *edulis*, Karst. (l. c.) = *E. edulis*.
 1085¹ *officinarium*, Karst. (l. c.) = *E. officinarum*.
paluster, Karst. (l. c.) 585 = *palustris*.
 1085² *resiniferus*, Karst. (l. c.) 587 = *C. resinifera*.

TOLUIFERA, Linn.

- 1087² a. *erythroxyla*, Karst. Pharm. Med. Bot. 681 =
Myroxylon peruiferum.
frutescens, Karst. l. c. = *Myrospermum frutescens*.

TORENIA

- 1089¹ l. *crustacea*, R. Br. Prod. 440; Cham. &
 Schlecht... = *Vandellia crustacea*.
 a. *hexandra*, R. Br. Prod. 440 = *V. crustacea*.

TORMENTILLA

- 1090¹ a. *officinarium*, Neck. Elem. ii. 95 = *Potentilla Tormentilla*.

TOURNESOLIA

- 1092¹ a. *tinctoria*, Scop. l. c. = *C. obliqua*.

TOXYLON

- 1093² a. *aurantiacum*, Rafin. Med. Fl. ii. 268 =
M. aurantiaca.
pomiferum, Rafin. Am. Monthly Mag. ii.
 (1817) 118, ex Sarg.

TRICHOLAENA

- 1107³ l. *arenaria*, Nees... (1835); ex Linnaea, xi.
 (1837) Litt. 130 =
capensis, Nees, (l. c.); et
rosea, Nees, l. c.) 129; et
tonsa, Nees, (l. c.) 128; et ... = *rosea*.

- 1109¹ a. *TRICHOPTERIS*, Neck. Elem. i. 110
 (1790) = *Scabiosa*, Tourn. (Dipsac.).

TRICHOSPIRA

- 1110¹ l. *menthoides*, H. B. K... 28 (non 23).

TRIDAX

- 1111² a. *imbricatus*, Sch.-Bip. ex Klatt, in Flora,
 lxviii. (1885) 202. — Mexic.

TRIFOLIUM

- 1111¹ a. *CHRYSASPIS*, Desv. Fl. Anjou, 338, in syn.
 (1827).
 1114² l. *multicaule*, M. E. Jones... = *monanthum*.

TRIGLOCHIN

- 1116² l. *maritimum*, Linn. Sp. Pl. p. 339 (non 105).

TRILLIUM

- 1119¹ a. *HUXHAMIA*, Garden, in Linn. Corresp. i.
 366, 379 (1821).

TRIODIA

- 1120² l. *kerguelensis*, Hook. f... 379 = *Poa kerguelensis*.

TROPHIS

- 1133¹ a. *brasiliensis*, Peckolt, in Zeitschr. Allg. Oesterr.
 Apoth. Ver. xxi. (1883) 185, nomen. — Bras.

TULIPA

- 1135² l. *Beccariana*, Bicchi... in I Giardini, viii.
 (1860) fasc. 2 (Desc.).

- 1139¹ a. *TURRAYA*, Wall. Cat. sub n. 8637 (1847)
 = *Leersia*, Soland. (Gramin.).
napalensis, Wall. l. c. = *L. hexandra*.

TYNANTHUS

- 1141² l. *Goudotiana*, (non Gond—).

TYPHA

- 1142¹ l. *minima*, Funck, in Hoppe, Bot. Taschenb.
 (1794) 418; (cf. 187); et ex Willd...

U**ULEX**

- 1143¹ l. *intermedius*, Cameron, in Gard. Chron. (1848)
 157; Le Gall, ... = *Gallii*.
 1143² a. *nanus*, Lees, Bot. Malvern Hills, 34 =
Gallii.

UNCARIA

- 1145¹ a. *RESTARIA*, Lour. Fl. Cochinch. 639 (1790).
 l. *acida*, Kew. Distr. 827/2, ex Hook. f. Fl. Br.
 Ind. iii. 31 = *dasyoneura*.
 a. *athemiata*, Treub, in Ann. Jard. Bot. Buitenz. iii. (1883) 52, sphalm. ? = *attenuata*.
 l. *brevispina*, Kew. Distr. 2756, ex Hook. f. Fl. Br. Ind. iii. 31 = *dasyoneura*.
 1145² *rhynchophylla*, Miq. ... 108. — Japon.
setiloba, Benth. ... Ins. Amboina.

UNONA

- 1147¹ l. *discolor*, Steud. Nom. ed. 11. i. 717 in syn.
 sphalm. = *concolor* = *Xylopia aromatica*.
 a. *farinosa*, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 3.
 sphalm. = *pannosa*.
 1147³ *zeylanica*, Dun. (ex Mast.) = *Xylopia aromatica* (in Cur. Post.).

UROPHYLLUM

- 1151¹ l. *memecyloides*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii.
 (1885) 213; Vidal.

UROSPERMUM

- 1151² a. *echioides*, Fraas, Syn. Pl. Fl. Class. 198;
 sphalm. = *Picris echioides*.
 l. *picrioides*, Scop. Introd. 122; F. W. Schmidt,
 ... — Europ. austr.
picrioides, F. W. Schmidt, ... 275 = *praec.*

URTICA

- 1154³ l. *frutescens*, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii.
 (1794) 330 in syn. cum cit. falsa = *Villebrunnea frutescens*.

UTRICULARIA

- 1158¹ a. *caerulea*, Linn. ex R. Br. Prod. 432 = *cyanea*

UVARIA

- 1160³ l. *Narum*, Blume, Anonac. Fl. Java, 5 (1828);
 Wall. Cat. n. 6473; et A. DC.

V**VACCINIUM**

- 1163³ a. *Whitmeei*, F. Muell. in Papers Roy. Soc.
 Tasman. (1875) 103. — Ins. Samoa.

VAHEA

- 1164¹ l. *florida*, F. Muell. in Wittstein, Org. Const.
 Pl. (1878) 258; et
Heudelotii, F. Muell. (l. c.); et
owariensis, F. Muell. (l. c.); et
senegalensis, A. DC. ... 328 = *L. senegalensis* (Cur. post.).

VAILLANTIA

- 1164² a. *crebrifoliata*, Chaub. in St. Amans, Fl. Agen.
 424.

- 1164³ l. *VALENZUELIA*, Mutis,

VALERIANA

- 1166² a. *quadridentata*, St Amans, Fl. Agen. 15.

VANCOUVERIA

- 1168³ l. *chrysantha*, Greene, ... = *hexandra*, var.

VANILLA

- 1170² l. *lutea*, C. Wright, ex Griseb. l. c. = *Wrightii*.
palmarum, Griseb. Cat. Pl. Cub. 267 =
Wrightii.

VELAGA

- 1172³ l. *xylocarpa*, Gaertn.

- 1173¹ a. *VELHEIMIA*, Scop. Introd. 85 (1777)
 sphalm. = *Veltheimia*.

- 1173³ l. *capensis*, Scop. Introd. 85; [DC.]...
 a. *guineensis*, Neck. Elem. iii. 186 = *Sansevieria guineensis*.

VENTILAGO

- 1174² l. *madraspatana*, Gaertn.

VERBESINA

- 1181¹ l. *scandens*, Roxb... = *Wedelia scandens*.

VERNONIA

- 1182¹ a. *aemulans*, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.
 xxvii. (877) 195. — Afr. trop.
 1183² l. *demulans*, Vatke... err. typ. = *aemulans*.

VERONICA

- 1184³ a. *pyrrhopappus*, Sch.-Bip. ex Klatt, in Flora,
 lxviii. (1885) 203. — Ins. Philipp.
 1190¹ l. *ligustrifolia*, R. Cunn.

- 1193³ l. *VETRIX*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i.
 (1817) 439; et...
scula, Rafin. (l. c.)...

VICIA

- 1196² a. *elegantissima*, Shuttlew. ex Rouy, in Rev. Sc.
 Nat. Sér. III. i. (1883) 229. — Hispan.

- 1198³ a. *VICQ-AZIRIA*, Buc-hoz, Herb. Col. Amér.
 t 48 (1783) (Quid).

- 1198² a. *VICTORIA*, Buc-hoz, Herb. Col. Amér.
 t. 75 (1783) (Quid?).
borbonica, Buc-hoz, l. c. — Ins. Maurit.

VILLAMILLA

- 1202² a. *roseoaeana*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 47.
 — Bras.

- 1203² l. *VIMEN*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i.
 (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

VIOLA

- 1205² 1. *begoniaefolia*, Benth... 161 = stipularis.
 1206² a. *erecta*, Myers, in Am. Natural. iv. (1870, 438 = Sellirkii.
 1207³ *Maillardii*, Souché, in C. R. Assoc. Fr. Blois, 1884 (1885) 288 = hirta?

VIREA

- 1218² 1. *hispida*, Scop. Introd. 122; S. F. Gray.

WISENIA

- 1212³ a. *tiliaefolia*, Jungh. in Hoev. & De Vriese. Tijdschr. vii. (1840) 302 = Melochia arborea.
 1. *velutina*, Jungh. (l. c.); Turcz.

VISMIA

- 1213¹ a. *QUADRIA*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 530 (1821).

VITIS

- 1215³ a. *densiflora*, A. Savat. in C. R. Assoc. Fr. Av. Sc. xi. Rochelle, 1882 (1883) 436 = vinifera.
 1216¹ a. *Guillemi*, *moschata*, *praecox*, *Promeryana*, *tinctoria*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. iii. = vinifera.
 1216² *laxiflora*, A. Savat. (l. c.) = vinifera.
mensarum, Poit. (l. c.) = vinifera.

VOYRIA

- 1220² a. *Trinitatis*, Johow, in Pringsh. Jahrb. xvi. (1885) 448 = trinitensis.

W**WARIA**

- 1224³ 1. *zeylanica*, Aubl. ... t = Xylopia aromatica (in Cur. Post.).

- 1225¹ a. *WARNERIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 100 (1821) = **Gardenia**, Ellis (Rubiaceae).

- 1225¹ a. *WARNERIA*, Mill. ex Linn. Corresp. i. 114. 121 (1821) = **Watsonia**, Mill. (Irid.).

WATSONIA

- 1225³ a. *WARNERIA*, Mill. ex Linn. Corresp. i. 114, 121 (1821).

WISTARIA

- 1232² 1. *Consequana*, Loud. in Gard. Mag. ii. (1827) 422 =
 a. *polystachya*, K. Koch, Dendrol. i. 62 = chinensis.

WITHANIA

- 1232² a. *origanifolia*, Paillieux et Bois, in Bull. Soc. Acclim. Sér. IV. i. (1884) 667 = Salpichroa rhomboidea.

X**XYLOPIA**

- 1240³ a. *aromatica*, Mart. Fl. Bras. xiii. I. 43 in nota. — Bras.

XYLOSTEON

- 1241³ a. *siculum*, Rafin. in Am. monthly Mag. i. (1817) 440. — Sicil.

XYRIS

- 1242² 1. *eriophora*, Klotzsch, in R. Schomb. Reise Guiana 3 [1848] 111 = *Isolepis lanata*, H.B.K.

Z**ZANTHOXYLUM**

- 1247¹ a. *Fagara*, Sargent, in Garden and Forest, iii. (1890) 186 = Z. Limoncello.
 1247² a. *Howeanum*, F. Muell. Fragm. ix. 77, nomen. = Blackburniana.

ZEa

- 1248³ a. *amylacea*, *amylea-saccharata*, *evecta*, *indentata*, *indurata*, *saccharata*, *tunicata*, Sturtev. ex L. H. Bailey, Survival of Unlike, 128 = Z. Mays.

ZILLA

- 1251¹ 1. *myagroides*, Forsk. ... 121.
 a. *Myagrum*, Forsk. (l. c.) p. lxix.

ZINGIBER

- 1251² a. *Zingiber*, Karst. Pharm. Med. Bot. 471 = officinale.

ZIZIPHORA

- 1252² a. *intermedia*, Lindl. Introd. Bot. ed. 2. 542, sphalm. = *media*, Link = clinopodioides, Lam.

ZIZYPHUS

- 1253¹ a. *Zizyphus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 870 = sativa.

- 1290² 1. **LILIUM** (non LILIUM).

- 1290³ 1. **LIQUIRITIA** (non QUIRITIA, err. typ.).

NEOTTIA

- 1293² 1. *colorata*, Blume... = Goodyera colorata,

- 1294 **OREOCNIDE** (loco OREOC DE, literis delapsis).

SEQUUNTUR QUAE

IN HOC SUPPLEMENTO ADDENDA ET EMENDANDA

HACTENUS OBSERVAVIMUS

a. = adde. d. = dele. l. = lege.

A

- 1¹ l. AALIUS**, Rumph... (1743) (non 1750).
- 1¹ a. AAPACA**, Metzdorff, in Just, Bot. Jahresb. 1885 (1888) 212, sphalm. = **Uapaca**, Baill. (Euphorb.).
- 1² l. ABERIA**, Hochst... (non Host).
- ABOLBODA**
- 1² a. vaginata**, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. [Stud. ueber Xyrid.] xxiv. n. 14 (1891) 63 = *brasiliensis*, Kunth.
- ABUTILON**
- 1³ a. exstipulare**, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 3-5 = *exstipulare*, G. Don.
hirtum, Cordem. l. c. 326 = *hirtum*, G. Don.
- ACACIA**
- 2¹ a. Bamboloh**, Karst. Deutsche Fl. ed. 2, ii. (1895) 278 = *arabica*, Willd.
- ACALYPHA**
- 3² a. Macafeeana**, Veitch, Catal. (1886) 35, nomen. — Hab. ?
- ACANTHOPHYLLUM**
- 3³ l. brevibracteatum...** et *latifolium*... xi. (non xii).
- ACER**
- 3² a. album**, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 87 = *dasycarpum*, Ehrh.
atheniense, Hort. l. c. 91 = *Lobellii*, Ten.
atropurpureum, Hort. l. c. 93 = *palmatum*, Thunb.
caucasicum, Hort. l. c. 89 = *hyrcanum*, Fisch. & Mey.
crispatum, Hort. l. c. 93 = *palmatum*, Thunb.
digitatum, Hort. l. c. 95 = *palmatum*, Thunb.
floridanum, Hort. l. c. 99 = *dasycarpum*, Ehrh., *rubrum*, Linn.
globosum, Hort. l. c. = *platanoides*, Linn., *rubrum*, Linn.
Griffithi, Hort. l. c. = *sikkimense*, Miq.
integrum, Hort. l. c. 93 = *palmatum*, Thunb.
leucophyllum, Hort. l. c. 99 = *rubrum*, Linn.
littorale, Hort. l. c. 91 = *monspessulanum*, Linn.
monspeliense, Hort. l. c. = *monspessulanum*, Linn.
pulchrum, Hort. l. c. 89 = *dasycarpum*, Ehrh.
rugosum, Hort. l. c. 101 = *spicatum*, Linn.
speciosum, Hort. l. c. 91 = *macrophyllum*, Pursh.
- 4¹ virginianum**, Hort. l. c. 99 = *rubrum*, Linn.
Wieri, Hort. l. c. 89 = *dasycarpum*, Ehrh.
- ACHILLEA**
- 4³ l. aromatica...**; et in Abh. Boehm. Ges. Wiss. Folge 7, i. (1886) n. viii. 20.

- ACHILLEA**
- 4³ l. Vandasii**, Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) i. 47, et 1892 (1893) 383. — Bulg.
- ACOKANTHERA**
- 8³ l. Ouabaio**, Cathelineau, L'Ouabaio, 9; et in Bull. gén. Thérap. cxviii. (1889) l. 7; Lewin...
l. Schimperii, Schweinf. in Boll. Soc. Afr. Ital. x. (1891) 12. — Afr. trop.
- ACROSTEPHANUS**
- 9¹ a. coronatus**, Van Tiegh...; et in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 166.
- ADENIA**
- 10¹ l. globosa**, Engl. Bot. Jahrb. xiv. (1891) 382, et xv...
lanceolata, Engl. l. c. 478, et xv...
panduriformis, Engl. l. c. 376, et xv...
Schweinfurthii, Engl. l. c. 377, et xv...
- ADENOCALYMNA**
- 10¹ a. brevidens**, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 420. — Bras
croceum, S. Moore, l. c. 419. — Bras.
- ADESMIA**
- 10³ l. Palenae...** 283 (non 282).
- ADINANDRA**
- 11³ a. bancana**, Miq. ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxix. (1890) ii. 132. — Penins. Mal.
- AEOLANTHUS**
- 13¹ a. Poggei**, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 148. — Congo.
- AERIDES**
- 13² a. Dominicanum**, Hort. Veitch. ex Will. l. c. 83. — Hybr. artef.
- 13² l. AERVA**, Forsk... = **AERUA**, Forsk.
- AESCULUS**
- 13³ a. heterophylla**, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 83 = *A. Hippocastanum*, Linn.
incisa, Hort. l. c. = *A. Hippocastanum*, Linn.
lucida, Hort. l. c. = *A. flava*, Ait.
sinensis, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 717, fig. 116 = *A. chinensis*, Bunge.
- AGANISIA**
- 14¹ a. alba**, in Thurn, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii (1889) 260, in obs. = *venusta*, Rolfe.
venusta, Rolfe, ex Hook. f. in Bot. Mag. (1892) sub t. 7270. — Guian.
- AGATHIS**
- 14² a. vitiensis**, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 353 (= *Dammara vitiensis*, Seem.). — Ins. Fiji.
- AGELAEA**
- 14³ a. paradoxa...** et in Bot. Jahrb. xiv. (1891) 318.
rubiginosa, Gilg, l. c. 319. — Afr. trop.
Schweinfurthii, Gilg, l. c. — Afr. trop.

- AGROSTIS**
- 15³ a. Floresii**, Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quit. 1889] 7. — Ecuad.
Hackeliana, Sodira, l. c. — Ecuad.
- AILANTHUS**
- 16¹ a. macrophylla**, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 53 = *A. glandulosa*, Desf.
mascula, Hort. l. c. = *A. glandulosa*, Desf.
purpurascens, Hort. l. c. = *A. glandulosa*, Desf.
rubra, Hort. l. c. = *A. glandulosa*, Desf.
- AIRA**
- 16¹ a. chrysophaena**, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 291 = *Deschampsia caespitosa*, Beauv. ?
- AJUGA**
- 16² l. rhodopea...** 1892 (1893) 387 [non (1892) 19], et 1893 (1894) n. xxxvii. 53 = *salicifolia*, Schreb.
- ALBIZZIA**
- 16² Lucyi**, F. Muell. Iconogr. Austral. Acac. Decad. 13 (1888) 6. — Austral.
- 17¹ l. ALCHEMILLA...** (non **ALCHIMILLA**).
a. glareosa, A. Kern. [ubi ?] ex Kolb, Alpenpflanzen. (1890) 24, nomen. — Tirol.
- ALECTOROLOPHUS**
- 17² aristatus**, Gremli, Excurs. Fl. Schweiz. ed. 6 (1889) 322 = *Rhinanthus angustifolius*, C. C. Gmel.
- ALECTRA**
- 17² a. arabica**, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 179. — Arabia.
- ALLIUM**
- 19² l. Hierosolymae**, Regel, ex Damm. Catal. xlv. (1889) 3 [an *A. hierosolymorum*, Regel ?]. — Palaest.
rhodopeum,... (1890) i. [non 1890] ii.
Rollii,... v (1889)... [non iii. (1889)].
- ALOE**
- 21² a. penduliflora**, Baker, in Gard. Chron. (1888) ii. 178. — Zanzib.
- ALSINE**
- 22¹ l. Thomasiana...** [Conf. Degen, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 438].
- ALYSSUM**
- 22³ l. ponticum...** 1893 (1894) n. xxxvii. 10 [non (1892-93) 10].
Reiseri,... [non *Reisseri*]... 1893 (1894) n. xxxvii. 9... [non (1892-93) 12].
- AMARANTHUS**
- 23¹ pycnostachys**, St Lager, in Cariot. Etud. des fl. éd. 8 (1889) 697 = *retroflexus*, Linn.
- AMARYLLIS**
- 23¹ l. Tettaui...** [non Tettani].

AMELANCHIER

- 23^a a. *lancifolia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 217 = *canadensis*, Torr. & Gray.
montana, Hort. l. c. = *alnifolia*, Nutt.
parvifolia, Hort. l. c. 217 = *alnifolia*, Nutt.
pinnata, Hort. l. c. 191 = *Pyrus spuria*, DC.
stricta, Hort. l. c. 217 = *canadensis*, Torr. & Gray.

AMOMUM

- 24¹ l. *macrodon*s... (non *macrodon*s).

AMORPHA

- 24² a. *crocea*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 117 = *fruticosa*, Linn.
dealbata, Hort. l. c. = *fruticosa*, Linn.
elator, Hort. l. c. = *fruticosa*, Linn.
ludoviciana, Hort. l. c. = *fruticosa*, Linn.
marginata, Hort. l. c. = *fruticosa*, Linn.
24² l. *AMPACUS*, Rumph... 1742 (non 1747).

AMPELOPSIS

- 25¹ a. *aconitifolia*, Hort. [an? Bunge] ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 77 = *Vitis heterophylla*, Thunb.

AMYGDALUS

- 25³ a. *atropurpurea*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 131 = *Prunus persica*, Stokes.
Simonii, Dieck, l. c. = *P. Simonii*, Carr.

ANARRHINUM

- 26¹ a. *demnatense*, Coss. Ill. Fl. Atlant. ii. 84, t. 152. — Reg. Medit.

ANASTREPHIA

- 26¹ l. *paucifloscula*... (non *pauciflosculosa*).

ANCHUSA

- 26¹ l. *moesiaca*,... 1893 (1894) n. xxxvii. 44 [non 1892-93].

ANDROPOGON

- 26³ l. *bouangensis*... (non *bonangensis*).
26³ l. *fragrans*... (non *elegans*).
27¹ a. *Viancini*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun. viii. (1895) 231. — Congo gall.

ANGELICA

- 28¹ a. *coreana*, Boiss. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. (1903) 958 = *koreana*, Maxim.

ANGRAECUM

- 28² l. *Aschersoni*... 157 (non 460).
a. *Bakeri*, Kraenzl. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 159. — Kamerun.
l. *cephalotes*... 156 (non 4).
28³ a. *Leonis*, Veitch, Man. Orch. Pl. vii. (1891) 134, cum xylogr. (= *Aeranthus Leonis*, Reichb. f.). — Ins. Comor.
Schumannii, Kraenzl. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 159. — Kamerun.
Wittmackii, Kraenzl. l. c. 158. — Kamerun.

ANGULOA

- 29¹ a. *Turneri*, Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 103. — Columb.

ANIBA

- 29¹ a. *longifolia*, Mez, in Arb. Bot. Gart. Breslau, i. (1892) 110. — Bras.

- 29² l. *ANIL* [a] Ludw. 1737 (non 1837).

ANOECTOCHILUS

- 30² a. *Boylei*, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 108. — Ind. or.
concinnum, Hort. l. c. 109. — Assam.
Eldorado, Hort. l. c. — Am. centr.
Heriotii, Hort. Will. l. c. — Ind. or.
hieroglyphicum, Hort. l. c. — Assam.
Turneri, Hort. Will. l. c. 111. — Java.
zebrinum, Hort. Bull. l. c. — Ind. or.

ANTHEMIS

- 31¹ a. *argyrophylla*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1894 (1895) n. xxix. 17 = *Achillea argyrophylla*, Halácsy & Gheorgh.
hydruntina, Groves, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii. (1886) 157. — Italia.

ANTHOCLEISTA

- 31² a. *Stuhlmanniana*... 580 (non *Stuhlmannii*... 680).

ANTHERICUM

- 31² a. *sylvestre*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 503. — Bras.

- 31² l. **ANTHOSHOREA**, Heim... (non *Pierre*).

ANTHURIUM

- 32¹ l. *excelsius*... (non *excelsior*).
Froebelii X, Hort. ex Gartenfl. xxxv. (1886) 52. — Hybr. artef.
Kellermanni X, Hort. ex Le Jardin (1893) 43, fig. 15. — Hybr. artef.
Sanderianum, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1895) i. 594. — Form. hort.

- 32² a. **ANTICHEIROSTYLIS**, Fitzg. Austral. Orch. ii. pars IV. (1891). **ORCHIDEAE**.
apostasioides, Fitzg. l. c. — Austral.
borunastylis, Fitzg. l. c. pars iii. (1888). — Austral.

APETAHIA

- 33³ a. *raiateensis*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 29 t. 9. — Ins. Raiatea.

- 33¹ l. **APHANAMIXIS**, Blume = (non *Pierre*).

APINAGIA

- 33² a. *Riedelii*, Warm. Fam. Podost. iii. (1888) 19 t. 21 fig. 11-22 et t. 22 fig. 1-11. — Bras.

APODYTES

- 34¹ a. *Curtisii*, Dyer, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 392. — Penang.

APONOGETON

- 34¹ a. *Loriae*, Martelli, in Bull. t. Soc. Bot. Ital. (1895) 57, nomen. — N. Guin.

ARABIS

- 34³ a. *Doumetii*, Coss. Ill. Fl. Atlant. i. (1882) 19 t. 13. — Algeria.
parviflora, Porcius, in Anal. Acad. Romaea, Ser. II. ii. (1883) 102, sub n. 603. — Eur. austr.

ARALIA

- 35¹ a. *ricinifolia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 21 = *Acanthopanax ricinifolium*, Seem.

ARCEUTHOBIUM

- 35² a. *capense*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 295 = *Viscum capense*, Linn. f.
taenioides, Cordem. l. c. = *V. taenioides*, Comm.

ARENARIA

- 36² a. *Halacsyi*, Baldacci, in Malpighia, v. (1891) 65. — Montenegro.
36³ a. *trachyphylla*, Lange, in Danske Kongl. Vidensk. Selsk. Forh. (1892) 199. — Hisp.

ARIA

- 37² a. *dentata*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 189 = *Pyrus vestita*, Wall.

- 37² l. **ARICURYROBA**, Barb. Rodr... (non **ARIKURIROBA**).

ARISAEMA

- 37² l. *Wallichianum*, ... = *multicarinatum*, Wall.

ARISTOLOCHIA

- 38¹ l. *moupinensis*... (non *monpinensis*).

ARMENIACA

- 38¹ a. *Petzoldii*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 133 = *Prunus triloba*, Lindl. var.
tomentosa, Hort. l. c. = *P. tomentosa*, Thunb.
triloba, Hort. l. c. = *P. triloba*, Lindl.

ARRHENATHERUM

- 81¹ a. *rumelicum*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1887 (1888) 465. — Rumel.

ARTEMISIA

- 39² a. *Roezii*, Huter [ubi?] ex Kolb, Alpenpflanzen (1890) 57. — Hisp.

ARUNDINARIA

- 40¹ a. *chrysantha*, Mitford, in Gard. Chron. (1894) i. 368. — Hab.?
khasyana, H. Bean, in Gard. Chron. (1894) i. 301 = *nitida*, Hort. Kew.
Laydekeri, Hook. f. ex Mitford, in Gard. Chron. (1894) i. 368. — Hab.?

ASCLEPIAS

- 40² a. *cornuta*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 482 = *Gomphocarpus cornutus*, Decne.

ASTER

- 43² l. *Ottomanum*... (1890) i... (non ii.).

ASTRAGALUS

- 45³ a. *Kralikianus*, Coss. Ill. Fl. Atlant. ii. (1892) 38, t. 121 = *A. Kralikii*, Coss.
46² l. *sericans*... (non *sericeus*).
46³ a. *Vandasii*,... 1893 (1894) n. xxxvii. 24, [non 1-92 (1893) 34].

AUBRIETIA

- 48² a. *Leichtlinii*, Hort. ex Wien. Ill. Gartenz. xiii. (1888) 325 = *deltoidea*, DC.

- 48³ a. **AURANTIUM**, Tourn. = **Citrus**, Linn. (Rutac.).

- 48³ a. *variegatum*, Hort. ex Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 51. — Form. hort.

- 48³ l. **AUTRANEA**... (non **AUTRANIA**).

AZALEA

- 49² a. *rosaeiflora* [Dean] in Flor. Mag. (1880) t. 418. — Japon.

B**BACCHARIS**

- 49¹ a. *patiensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 345. — Columb.

- 50³ l. **BALIOSPERMUM**... (non **BALIOSPERMEUM**).

BAMBUSA

- 50³ a. *angustifolia*, Mitford, ex Garden, xlv. (1894) 547. — Japon.
Castillonii, Hort. ex Rev. Hort. lvi. (1886) 513, fig. 121; et in Gard. Chron. (1894) i. 368 = *Phyllostachys Castillonis*, Mitford.
chrysantha, Hort. Marliac, ex Gard. Chron. (1894) i. 368 = *Arundinaria chrysantha*, Mitford.
disticha, Mitford, in Garden, xlv. (1894) 547 (= *B. nana*, Hort.). — Japon.
Henonis, Hort. ex Gard. Chron. (1894) i. 368 = *Phyllostachys Henonis*, Mitford.
Laydekeri, Hort. l. c. = *Arundinaria Laydekeri*, Hook. f.

BAMBUSA

- 50³ a. *marmorea*, *Mitford*, in *Garden*, xlv. (1894) 547 (= *Arundinaria Kokantsak*, Kurz). — Japon. Nagashima, *Hort. Marliac*, ex *Mitford*, l. c. — Japon.
pumila, *Hort. ex Gard. Chron.* (1894) i. 368. — Japon.
Weiseneri... (non *Wiesneri*).

BATRACHIUM

- 52² a. *elegans*, Chab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 15, in syn. = *Ranunculus aquatilis*, Linn.

- 51² l. **BARBEYA**, Schweinf. in *Malpighia*, v. (1891) 332 et...
oleoides, *Schweinf.*, l. c. t. 24, 25; et...

BEGONIA

- 53² a. *compta*, *Bull. Catal.* (1886) 7. — Bras. *cyclophylla*, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1887) t. 6926. — China.
 53² l. *Eliassi*... (non *Eliani*).
fulgens, *Hort. Lemaire, Catal.* (1893) n. 123. — Bolivia.
Heracleicotype X, *Veitch, Catal.* (1895) 48. — Hybr. artef.
margaritacea X, *Hort. Veitch, Catal.* (1895) 3; et in *Neub. Gart. Mag.* (1895) 321, cum fig. — Hybr. artef.

BELLEVALIA

- 54² a. *Aucheri*, « Baker », ex *Bull. Soc. Tosc.ortic.* (1894) 27 = *Hyacinthus Aucheri*, Baker.

BELLIS

- 54² a. *Vandasii*, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1888 (1889) 49; et...

BENTINCKIA

- 54³ a. *nicobarica*, *Hort. Sand. Catal.* (1895) 46. — Ins. Nicobar.

BERBERIS

- 55¹ a. *angulizans*, *Hort. ex Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 27 = *vulgaris*, Linn.
coerulescens, *Hort.* l. c. 23 = *aristata*, DC.
corallina, *Hort.* l. c. 27 = *vulgaris*, Linn.
elongata, *Hort.* l. c. = *vulgaris*, Linn.
globularis, *Hort.* l. c. = *vulgaris*, Linn.
maxima, *Hort.* l. c. = *vulgaris*, Linn.
pangharengensis, *Hort.* l. c. = *vulgaris*, Linn.
 55² l. *rectinervia*... (non *rectinervis*).

BERCHEMIA

- 55² a. *yemensis*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 123. — Arabia.

BERRYA

- 55³ l. *tahitensis*, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 125; et...

BERSAMA

- 56¹ l. *Volkensii*, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 36; et...

BETULA

- 56¹ l. *Raddeana*...; et in *Gartenfl.* xxxvii. (1887) 383, fig. 95.

BICORNELLA

- 56² a. *arabica*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 208. — Arabia.

BIDENS

- 56³ l. *orientalis*, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1888 (1889) 48; et...
 a. *Remyi*, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1888) 78, 210, t. 39 (= *Coreopsis Remyi*, Drake). — Ins. Sandvic.

BILLBERGIA

- 57¹ a. *andegavensis* X, *Hort. ex Rev. Hort.* lviii. (1886) 309. — Hybr. artef.
Gireoudiana X, *Wittm. in Gartenfl.* xxxvi. (1887) 330. — Hybr. artef.

BILLBERGIA

- 57¹ a. *Schimperiaana*... et in *Bot. Jahrb.* xiii. Beibl. n. 29 (1891) 2.

BIOPHYTUM

- 57² l. *albiflorum*, *F. Mull. in Vict. Natural.* ix. (Nov. 1892); et...

BLAERIA

- 57³ l. *flava*, ... 239 (non 289).

BLAKEA

- 57³ l. *Andreana*... 959 (non 759).

BLUMENBACHIA

- 58³ a. *acaulis*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxv. (1894) 17. — Chili.
mitis, *Phil.* l. c. 18. — Chili.
nemorosa, *Phil.* l. c. — Chili.

- 59¹ a. **BOECKELERIA**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 504 = **Decalepis**, Wight & Arn.

BOLLEA

- 59³ a. *hemixantha*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) ii. 206 = *Zygopetalum hemixanthum*, Reichb. f.

BORRERIA

- 60³ a. *Schumanniana*, Taub. ex Ule, in *Cruls, Rapp. Comm. expl. plat. centr. Brésil* (1894) 351; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 453. — Bras.

- 61² l. **BOTRYANTHUS**... (non **BOTRYANTHES**).

- 61² l. **BOTRYOPHORA**... (non **BOTRYOSPORA**).

BOUCEROSIA

- 61² a. *penicillata*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 169. — Arabia.
cicatricosa, *Deflers*, l. c. 170. — Arabia.

BOUGAINVILLAEA

- 61² a. *brachycarpa*, *Heimerl, in Bot. Jahrb.* xi. (1889) 88. — Bras.

BOUSSINGAULTIA

- 61² a. *cordata*, [*Hort.*] ex *Bull. Soc. Tosc.ortic.* (1895) 207. — Peruv.

BRACHYPODIUM

- 62² l. *ponticum*... 1893 (1894) 71 [non 1892 (1893)].

- 62³ l. **BRAMIA**, Lam... (non Lour.).
Monnierea, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 484 = *B. Monnierea*, Drake.

BRASSICA

- 63¹ a. *Tinei*, *Lojac. Fl. Sicula*, i. i. (1888) 113. — Sicilia.

BRICKELLIA

- 63³ l. *lancifolia*... Ser. III. l. (non i.).

BRIDELIA

- 63³ l. *Fischeri*, ... 531 (non 53).

BRILLANTAISIA

- 63³ l. *salviiflora*... (non *salviiflora*).

BREYNIA

- 63³ a. *turbinata*, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 348 (= *Melanthesopsis patens*, Muell. Arg.). — Ind. or., Ins. Borb.

- 64¹ l. **BROCHONEURA**... (non **BROCCHONEURA**).

BROMUS

- 64² a. *condensatus*, Hack. in *Magnier, Scrin. fl. select.* vii. (1888) 135 = *erectus*, Huds.
moesiacus, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 616. — Bulg.
splendens, *Velen. in Abhandl. Boehm. Ges. Wiss.* vii. Folge, I. (1886) n. 8, 46. — Bulg.

- 64³ l. **BROUSMICHEA**... (non **BROUSEMICHEA**).

BROWNLOWIA

- 65¹ a. *kleinhovioidea*, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lx. (1891) ii. 97. — Perak.
macrophylla, *King, l. c.* 99. — Perak.
Scortechinii, *King, l. c.* 98. — Perak.

BRUNELLA

- 65¹ a. *hybrida* X, *Giraudias. in Bull. Soc. étud. sci. Angers*, xix, 1889 (1890) 113. — Gall. mer.

BUETTNERIA

- 65³ a. *campicola*, Taub. ex Ule, in *Cruls, Rapp. Comm. expl. plat. centr. Brésil* (1894) 363; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 444. — Bras.

BULBOCASTANUM

- 66¹ a. *mediterraneum*, Albert, in *Magnier, Scrin. fl. select.* x. (1891) 190 = *Carum Bulbocastanum*, Koch.

BULBOPHYLLUM

- 66² a. *Cornu-cervi*, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 332. — Sikkim.
cylindricum, *King, l. c.* 333 = *leptanthum*, *Hook. f.*
ebulbon, *King, l. c.* — Sikkim.
 l. *Hookerianum*... = *creonastes*, Reichb. f.
 66³ a. *Leysianum*, *Burbridge, in Journ. Hort. Soc. Lond.* xvii. (1894) Proc. 134, 135, fig. 19; et ex *Orchid Rev.* ii. (1894) 294. — Borneo.
Listeri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 334. — Bhotan.
saurocephalum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 262. — Ins. Philipp.
 67¹ l. *Wrayi*, ... t. 2044 (non 2844).

BULBOSTYLIS

- 67² a. *capillaris*, *Kunth, fide C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 652. — Ind. or.
junciformis, *C. B. Clarke, ex S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 512 (= *Isolepis junciformis*, Kunth). — Am. austr.

BUPLEURUM

- 67³ a. *aricensis*, Timb. in *Rev. Soc. Franç. Bot.* x. (1892) 165 = *laricensis*, Gaut. & Timb.
 l. *orbelicum*... 47 (non 407).
 a. *variabile*, *Baldacci, in Malpighia*, v. (1891) 71. — Montenegro.

BURLINGTONIA

- 68¹ a. *Farmeri*, *Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed.* 7 (1894) 136. — Hab.?
Knowlesii, *Hort. ex Will.* l. c. — Hab.?
Leeana, *Will.* l. c. = *Rodriguezia Leeana*, Reichb. f.

BURSERA

- 68¹ l. *Aracouchii*... (non *Eraconchii*).
 68² a. **BYTTNERIA**, Loebl. = **Buettneria**, Loebl. (Stercul.).

C

- 68² a. **CABRALEA**, A. Juss. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 365.
insignis, *C. DC. in Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 1. — Guatem.

CADABA

- 70¹ l. *scandens*, *Pax*... 301 (non 361).

CALAMAGROSTIS

- 71¹ l. *aurea*... (1889) (non 1884).
 a. *Curtisii*, *Vasey, in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 269 = *Ammophila Curtisii*, *Vasey*.

CALAMUS

- 71² l. *Barteri*, *Becc.* (non *Drude*).

CALANDRINIA

- 73^a a. *acuminata*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxv. (1894) 173. — Chili.
aegialitis, *F. Phil. ex Phil. l. c.* 184. — Chili.
argentea, *Phil. l. c.* 310. — Chili.
armeriifolia, *Phil. l. c.* 176. — Chili.
Bandurriae, *Phil. l. c.* 316. — Chili.
Barneoudi, *Phil. l. c.* 174. — Chili.
bracteosa, *Phil. l. c.* 181. — Chili.
caesia, *F. Phil. ex Phil. l. c.* 187. — Chili.
callithrix, *Phil. l. c.* 317. — Chili.
canescens, *Phil. l. c.* 306. — Chili.
capituligera, *Phil. l. c.* 312. — Chili.
caulescens, *Phil. l. c.* 313. — Chili.
copiapensis, [non *capiapina*] *Phil. l. c.* 191. — Chili.
crassifolia, *Phil. l. c.* 180. — Chili.
cymosa, *Phil. l. c.* 192. — Chili.
depressa, *Phil. l. c.* 316. — Chili.
eritrichioides, *Phil. l. c.* 315. — Chili.
glandulifera, *Phil. l. c.* 188. — Chili.
hispida, *Phil. l. c.* 310. — Chili.
humilis, *Phil. l. c.* 319. — Chili.
involuta, *Phil. l. c.* 318. — Chili.
lancifolia, *Phil. l. c.* 300. — Chili.
laxiflora, *Phil. l. c.* 183. — Chili.
leucopogon, *Phil. l. c.* 313. — Chili.
nana, *Phil. l. c.* 304. — Chili.
nivalis, *Phil. l. c.* 308. — Chili.
oligantha, *Phil. l. c.* 188. — Chili.
parviflora, *Phil. l. c.* 317. — Chili.
pauciflora, *Phil. l. c.* 193. — Chili.
petiolata, *Phil. l. c.* 318. — Chili.
phalacra, *Phil. l. c.* 307. — Chili.
polia, *Phil. l. c.* 306. — Chili.
portulacifolia, *Phil. l. c.* 178. — Chili.
prolifera, *Phil. l. c.* 312. — Chili.
Rahmeri, *Phil. l. c.* 189. — Chili.
rosea, *Phil. l. c.* 315. — Chili.
Sanfurgi, *Phil. l. c.* 309. — Chili.
sanguinea, *Phil. l. c.* 190. — Chili.
subverticillata, *Phil. l. c.* 302. — Chili.
tenuifolia, *Phil. l. c.* 189. — Chili.
uspallatensis, *Phil. l. c.* 307. — Chili.
sessiliflora, *Phil. l. c.* 308. — Chili.
Solisi, *Phil. l. c.* 303. — Chili.
stricta, *Phil. l. c.* 194. — Chili.
Tweedyi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 277. — Terr. Washington.
vicina, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxv. (1894) 301. — Chili.
Vidali, *Phil. l. c.* 190. — Chili.
Villanuevae, *Phil. l. c.* 194. — Chili.
Villaroeli, *Phil. l. c.* 176. — Chili.
viridis, *Phil. l. c.* 173. — Chili.

CALANTHE

- 71^a a. *aurora* X, Veitch, *Man. Orch. Pl.* vi (1890) 73. — Hybr. artef.
 72^a a. *Stevensii*, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 141 = *Stevensiana*, *Regnier*.
 72^a a. *trulliformis*, *King & Pantling, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1895) II. 337. — Sikkim.

CALCEOLARIA

- 72^a l. *glutinosa*, *Fr. Meigen...* xvii. (1893) 292, 289, nomen; et...

CALLIGONUM

- 73^a l. *minimum*, *Lipsky, in Mém. Soc. Natural. Kiev*, xi. (1891) 19; et...

CALLIPRORA

- 73^a l. *ixioides*... (non *ixiodes*).

CALLITRICHE

- 74^a a. *lenisulca*, *Clavard, in Act. Soc. Linn. Bord.* xlv. 1890 (1891) p. 43. — Gall. occ.

CALOCHORTUS

- 65^a a. *pavonaceus*, *Fernald, in Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 335. — Am. bor.

CALOPHANES

- 74^a a. *repandus*, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 257 (= *Chaetacanthus repandus*, A. Gray). — Ins. Fiji.

CALOPHYLLUM

- 74^a a. *Soulattri*, « *Burm.* » ex F. Mull. in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 29, sphalm. = C. *Soualatti*, *Burm. f.*

CALYCOSIA, A. Gray (Rubiaceae). — Ind.

- Kew. ii. 395.
trichocalyx, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 196; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 98 (= *Uragoga trichocalyx*, Drake). — Ins. Pacif.

CALYPTRANTHES

- 75^a l. *ferruginea*... 602 (non 603).
 a. *glabrescens*, *Krug & Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 596. — Cuba.

CAMELINA

- 75^a l. *rumelica*... 1887 (1888) 448 [non xli. (1891) 123].

- 75^a l. *CAMIRIUM*, Rumph... (non *CAMERIUM*).

CAMPANULA

- 76^a a. *crucifolia*, « *Feer* » ex Barbey, *Karpathos* (1895) 118, sphalm. = *erucifolia*, *Feer*.
 l. *Dzaaku*, (non *Dzaakii*).
Mykalaea, *Barb. & Major, Lydie, Lycie, Carie.* (1890) 80, t. 5. — As. Min.
Ursaria X, Bruegg. *Mitth. Neue u. Krit. Pflanzen.* [Jahresb. Naturf. Ges. Graub.] (1886) 49. — Helv.
Velenovskyi... (non *Velenowskyi*)...; et in *Boehm. Ges. Wiss.* 1894 (1895) n. xxix. 22...
velutina... 1890 (1890) i. 53 [non 1889 (1890) ii. 54]; et *Fl. Bulg.* 365. — Bulg.

CAPETHIA, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vi. (1892) 234 = **Anemone**, Linn. (Ranunc.).*integrifolia*, Britton, l. c. = A. *integrifolia*, *Humb. & Bonpl.**Weddellii*, Britton, l. c. 235 = (A. *integrifolia*, *Humb. & Bonpl.* ?). — Peruvia.**CAPITANYA**

- 77^a l. *otostegioides*... (non *ostegioides*).
 l. *rogleoides*... [an *royleoides* ?] (non *rogieoides*).

CAPSELLA

- 78^a l. *thracica*... 1893 (1894) n. xxxvii. 11... [non 1893 (1893) 11].

CARAGANA

- vulgaris*, Hort. ex Handl. *Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 123 = *arborescens*, *Lam.*

CARDAMINE

- 79^a a. *alsophila*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 73 = *nemophila*, *Phil.*
 79^a l. *Killiasii* X, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. 1884-85 (1886) 5. — Helv.
 l. *Seedlitziana*... (non *Seidlitziana*).
Skorpili... 1889 (1890)... [non (1896)].

CARDUUS

- 80^a a. *globifer*, *Velen, Fl. Bulg.* (1891) 300. — Bulg.
 80^a a. *Zapateri*, *Reverch. & Debeaux, in Lucante, Rev. Soc. Franç. Bot.* xii. (1895) 354 = *pycnocephalus*, *Linn.*

CAREX

- 80^a l. *alascana*, *Boeck, in Bot. Jahrb.* vii. (1886) 277. — Alasca.
androgyna, *L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 101. — Mexic.
Arnelli, *Christ, in Scheutz, Pl. vasc. Jeniss.* (1888) 177. — Sibiria.
atrovirens, *Boeck, Cyp. Nov. i.* (1888) 52. — Reg. Argent.
baritiana, *Porcius, in Anal. Acad. Romanae, Ser. II. xiv.* (1892) 285 = *transsilvanica*, *Schw.*
Brenneri, *Christ, in Scheutz, Pl. vasc. Jeniss.* (1888) 178. — Sibiria.
brunescens, *Boeck, Cyp. Nov. i.* (1888) 44. — Reg. Argent.
 81^a l. *contracta*... (non *econtracta*).

CAREX

- 81^a a. *Engelmanni*, *L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 132. — Colorado.
Hallii, *L. H. Bailey, l. c.* 82. — Oregon.
Hendersoni, *L. H. Bailey, l. c.* 115. — Oregon, Calif.
 81^a a. *inandrensis*, *Kihlman, ex Hjelt, in Act. Soc. Fenn.* v. (1895) 298. — Eur.
inops, *L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 126. — Oregon.
invisa, *L. H. Bailey, l. c.* 82. — Calif.
Joosi, *L. H. Bailey, l. c.* 72. — Louisiana.
 82^a a. *mollissima*, *Christ, in Scheutz, Pl. vasc. Jeniss.* (1888) 181. — Sibiria.
 82^a a. *nova*, *L. H. Bailey, in Journ. Bot.* xxvi. (1888) 322. — Am. bor.
orbetica, *Velen, Fl. Bulg.* (1891) 575. — Bulg.
Pseudobicolor, *Boeck, Cyp. Nov. i.* (1888) 44. — Reg. Himal.
 82^a a. *scaposa*, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1887) t. 6940. — China austr.
Sismani... 1893 (1894) n. xxxvii. 67... [non 1893 (1893) 67].
 83^a l. *spissa*, *L. H. Bailey... et in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 70. — Calif.
subalpina, *Bruegg. Mitth. neue u. Krit. Pflanzenfam.* [Jahresb. Naturf. Ges. Graub.] (1886) 121 = *limosa*, *Linn.*
 83^a l. *subnivalis*, *Arv.-Tow, ex Favrat, in Bull. Soc. Bot. Genève*, v. 1888 (1889) 8; et...
tibetica, *Boeck, Cyp. Nov. i.* (1888) 46. — Tibet.
tricolor... 1890 (1890) i... [non 1889 (1890) ii.].
ultra, *L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 83. — Arizona.
 83^a l. *Warmingii*... 294 (non 244).

- 83^a a. *CARINIANA*, *Casar.* = **Couratari**, *Aubl.* (Myrt.).
Glaziovii, N. Wille, ex Warm. *Lagoa Santa* (1892) 427, nomen. — Bras.

CARLINA

- 83^a l. *olympica*, *Formanek*... (1891) 128.

CARLOWRIGHTIA

- 83^a a. *hapalcarpa*, *Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 390. — Mexic.

CARPODINUS

- 84^a d. *complicata* *K. Schum*... (nomen in loco citato deest).

CARTHAMUS

- 84^a a. *dianius*, *Coincy, Eclog. alt.* (1893) 14, t. 15. (= *Carduncellus dianius*, Webb). — Hisp.
gracilis, *Celak, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1885 (1886) 91. — Oriens.

CASEARIA

- 85^a l. *riparia*... 363 (non 364).

CASSIA

- 85^a a. *Campanae*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 439. — Chili.
Closiana, *Phil. l. c.* 440. — Chili.
confusa, *Phil. l. c.* 438. — Chili.
eremobia, *Phil. l. c.* 443. — Chili.
goyazensis, *Taub. ex Ule, in Cruls, Rapp. Comm. expl. Plat. cent. Brésil* (1894) 363; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 435. — Bras.
Huidobriana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 440. — Chili.
oreades, *Phil. l. c.* 443. — Chili.

CASTALIA

- 85^a l. *Gibertii*... (non *Gilbertii*).

CATALPA

- 86^a a. *Catalpa*, *Karst. Pharm. med. bot.* (1882) 927; *Sarg. N. Am. Sylva*, vi. (1894) 86, t. 288; *Sudworth*...

CATHCARTIA

- 86^a a. *lyrata*, *Cummings & Prain, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 325. — Silhet.
polygonoides, *Prain, l. c.* 326. — Chumbi.

CATTLEYA

- 87¹ a. *amabilis*, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 152. — Bras.
armainvillierensis X, Hort. ex Rev. Hort. lxxvii. (1895) 359. — Hybr. artef.
Ashtoniana X, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 406. — Hybr. artef.
 1. *Ballantiniiana*, Reichb. f. (non *Balantiniiana*)... Will. l. c. 153. —
 a. *Boissieri*, Hort. ex Will. l. c. 154. — N. Granat. *crocata*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 360 = *labiata*, Lindl.
Devoniana X, Hort. ex Will. l. c. 160. — Hybr. artef.
Edithiana, Warner, ex Will. l. c. 161. — Bras.
floribunda X, Hort. ex W. Wats. in Gard. and For. viii. (1895) 224. — Hybr. spont.?
Johnstoniana X, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 406. — Hybr. artef.
Lowryana... (non *Louryana*).
Malouana... (non *Maloriana*).
Nilsoni X, Hort. Sander, ex Regel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 481. — Bras.
Patrocinii, St-Leger, in Citade de Rio (May 1890), ex Orchid Rev. i. (1893) 343. — Bras.
Sedeniana X, Veitch, ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 161. — Bras.
 87² a. *venosa* X, Rolfe, in Orchid Rev. ii. (1894) 132. — Hybr. artef.
veriflora X, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1891) 192. — Hybr. artef.
Wellsiana X, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 639. — Hybr. artef.
Wendlandii X, Hort. Veitch, ex Gard. Chron. (1894) i. 447. — Hybr. artef.

- 87² a. **CAUCANTHUS**, Forsk. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 462.
 a. *squarrosus*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 30 (1891) 6, et xiv. (1891) 315 (= *Triaspis squarrosa*, Radlk.). — Reg. Somal.

- CAUTLEYA**, Baker = **CAUTLEA**, Royle.
 87³ a. *Cathcarti*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 208. — Reg. Himal.
lutea, « Royle » (vide Ind. Kew. in loc.). — Reg. Himal.
petiolata, Baker, l. c. 209. — Reg. Himal.
robusta, Baker, l. c. — Reg. Himal.
spicata, Baker, l. c. — Reg. Himal.

CAVENDISHIA

- 87³ a. *spectabilis*, Bull. Catal. (1889) 7. — Columb.
 87³ a. **CAYAPONIA**, Silva Manso (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 463.
Almeideana, Sald. & Cogn. ex Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 358. — Bras.
boliviensis, Cogn. in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 39. — Bolivia.
reticulata, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 360. — Bras.
Saldanhaei, Cogn. l. c. 361. — Bras.
Schenkii, Cogn. l. c. Sér. III. xvi. (1888) 243. — Bras.

CEANOTHUS

- 87³ a. *Andersoni*, Parry, in Proc. Davenport Acad. sci. v. (1889) 172. — Am. bor.
divergens, Parry, l. c. 173. — Am. bor.
foliosus, Parry, l. c. 172. — Am. bor.
intricatus, Parry, l. c. 168. — Am. bor.
Lemmoni, Parry, l. c. 192. — Am. bor.
 88¹ a. *radicans*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 73 = *thyrsiflorus*, Eschsch.

CECROPIA

- 88¹ l. *Bureauiana*.... — Guian. gall.

CEDRELA

- 88¹ a. *impari-pinnata*, C. DC. in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 4. — Guatem.

CELASTRUS

- 88¹ a. *vitiensis*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Fl. Polyn. Franc. (1892) 31 (= *Catha vitiensis*, A. Gray). — Ins. Fiji.

CELOSIA

- 88² l. *Schweinfurthiana*... 178 (non 17).

CELSIA

- 88² a. *Bottae*, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 178. — Arabia.

CENTAUREA

- 88³ a. *Aschersonianana* X, Vetter, in Bull. Soc. Bot. Genève, v. 1888 (1889) 11. — Helv.
Barbeyana X, Vetter, l. c. — Helv.
 1. *bovina*... (non *borina*)...; et Fl. Bulg. (1891) 329.
 a. *candida*, Velen. l. c. 315. — Bulg.
cyanocephala, Velen, in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 26; et Fl. Bulg. (1891) 312. — Bulg.
euxina... 1890 (1890) i... non ii., et Fl. Bulg. (1891) 204.
Favratii X, Vetter, in Bull. Soc. Bot. Genève, v. 1888 (1889) 11. — Helv.
gracilenta, Velen. Fl. Bulg. (1891) 312. — Bulg.
Gyspergerae X, Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxv. (1889) 54. — Helv.
 89¹ a. *kroumirensis*, Coss. in Compt.-rend. Acad. sci. Paris, xcvi. (1884) 468; et Ill. Fl. Atlant. ii. (1893) 66, t. 139. — Reg. Tunet.
inuloides, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 96. — Hisp.
Loscosii, Willk. Ill. Fl. Hisp. i. (1885 ?) t. 81; et l. c. 92. — Hisp.
Moehrléniana X, Vetter, in Bull. Soc. Bot. Genève, 1888 (1889) 11. — Helv.
Nicolai, Baldacci, in Malpighia, v. (1891) 75. — Montenegro.
orbicula, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) i. 51; et Fl. Bulg. (1891) 310. — Bulg.
Pauli, Loscos, ex Willk. Ill. Fl. Hisp. ii. 141, t. 174a; et Suppl. Prodr. Fl. Hisp. 94. — Hisp.
Pomeliana, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 389; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algév. [Dicot.] 494; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 93. — Afr. bor., Hisp.
razgradensis, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 25, et Fl. Bulg. (1891) 306. — Bulg.
Stribnyi, Velen. l. c. 325. — Bulg.
tartarea...; et Fl. Bulg. (1891) 318.
Vandasii, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1894 (1895) n. xxix. 18; et...
varnensis, Velen. Fl. Bulg. (1891) 313. — Bulg.

CENTRANTHUS

- 89² a. *aurigeranus* X, Giraudias, in Bull. Soc. étud. sci. Angers, xix. 1889 (1890) 107. — Gall. mer.
Gillotii X, Giraudias, l. c. — Gall. mer.

- 88² a. **CENTROMADIA**, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 196 = **Hemizonia**, DC. (Compos.).
Fitchii, Greene, l. c. 197 = H. *Fitchii*, A. Gray.
maritima, Greene, l. c. 196. — Calif.
Parryi, Greene, l. c. 197 = H. *Parryi*, Greene.
pungens, Greene, l. c. 196 = H. *pungens*, Torr.
rudis, Greene, l. c. 197. — Calif.

CENTRONIA

- 82² a. *tomentosa*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 943. — Ecuad.

CERASTIUM

- 90¹ a. *busambarensis*, Lojac. Fl. Sicula, i. 1. (1888) 181 = *arvense*, Linn.
Gussonei, Todaro, ex Lojac. l. c. 178. — Sicilia.
octandrum, Camus, Cat. pl. France (1888) 46 = *quaternellum*, Fenzl.
orbicum... 1890 (1890) i... (non ii.).

CERASUS

- 82² a. *fruticans*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 137 = P. *Chamaecerasus*, Jacq.
myrobalanos, Hort. l. c. 133 = P. *cerasifera*, Ehrh.

CERATANTHERA

- 90² a. *Beaumetzii*...; et in Le Naturaliste, Sér. II. xiii. (1891) 277, fig. 1....

CERATOSANTHES

- 90³ l. *parviflora*... 242 (non 232).

CEREUS

- 91¹ a. *Huascha*, A. Weber, in Monatschr. f. Kakteenk. (1893) 151. — Reg. Argent.
pasacana, d. Weber, l. c. 165. — Am. austr.
 91¹ l. *Palmeri*... (non *Plmeri*).

CEROPEGIA

- 91² a. *sepium*, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 167. — Arabia.
rupicola, Defflers, l. c. — Arabia.

CHAEROPHYLLUM

- 91³ l. *balkanicum*... 1893 (1894) n. xxxvii. 30 [non 1892 (1893) 30].
gagausorum, Velen. in Abh. Sitz. Boehm. Ges. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 17; et...

CHAMAEROPS

- 92³ a. *Kwanwortii*, Hort. ex Illustr. Hort. (1887) 39, in syn. = *flabelliformis*, L'Hérit.

CHAMAESARACHA

- 93¹ a. *crenata*, Rydberg, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 308. — Am. bor. austro-occ.
villosa, Rydberg, l. c. in obs. — Mexic.

CHELIDONIUM

- 93² a. *Dicranostigma*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 327 = *Dicranostigma lactucoides*, Hook. f.

CHENOPODIUM

- 93³ l. *laxiflorum*... (non *latifolium*).

- 94² l. **CHLAMYDACANTHUS**, Lindau, ... xvii. (1893) 107, [non xviii. (1894) 58; et in Engl. & Prantl, ...
euphorbioides, Lindau, ll. cc. 110, cum ic.; et 343 fig. 37.

- 94³ a. **CHLOROCHARIS**, Rikli, in Pringsh. Jahrb. xxvii. (1895) 564 = **Eleocharis**, R. Br. (Cyper.).
Balansaana, Rikli, l. c. = E. *Balansaiana*, Boeck.
capitata, Rikli, l. c. = E. *capitata*, R. Br.
emarginata, Rikli, l. c. = E. *emarginata*, Klotzsch.
geniculata, Rikli, l. c. = E. *geniculata*, R. Br.
palustris, Rikli, l. c. = E. *palustris*, R. Br.
subprolifera, Rikli, l. c. = E. *afflata*, Steud.
tuberculosa, Rikli, l. c. = E. *tuberculosa*, R. Br.
vivipara, Rikli, l. c. = E. *vivipara*, Link.

- 94³ a. **CHLOROCYPERUS**, Rikli, in Pringsh. Jahrb. xxvii. (1895) 563 = **Cyperus**, [Mich.], Linn.
abyssinicus, Rikli, l. c. 563 = *Pycnus flavescens*, Beauv.
aegyptiacus, Rikli, l. c. 564 = *Cyperus aegyptiacus*, Gloxin.
articulatus, Rikli, l. c. 563 = C. *articulatus*, Linn.
Barteri, Rikli, l. c. = C. *pustulatus*, Vahl.
cimicinus, Rikli, l. c. (= *Cyperus cimicinus*, Presl) = *Pycnei* sp.
confertus, Rikli, l. c. 564 = C. *confertus*, Sw.
Eragrostis, Rikli, l. c. 563 (= *Pycnei* sp.).
Geront, trop.
flavescens, Rikli, l. c. = *Pycnus flavescens*, Beauv.
grammicus, Rikli, l. c. (= *Pycnei* sp.). — Chili.
intermedius, Rikli, l. c. (= *Pycnei* sp.). — Eur.
Iria, Rikli, l. c. 564 = *Cyperus Iria*, Linn.
Jacquini, Rikli, l. c. 563 = C. *mutans*, Vahl.
junciformis, Rikli, l. c. = C. *laevigatus*, Linn.
latispicatus, Rikli, l. c. 563 = *Pycnus latispicatus*, C. B. Clarke.
megapotamicus, Rikli, l. c. 563 = P. *megapotamicus*, Nees.

- CHLOROCYPERUS** : —
melanostachyus, Rikli, in Pringsh. Jahrb. xxvii. (1895) 564 (= *Pycrei* sp.). — Am. austr.
Mundtii, [sic] Rikli, l. c. 563 = *Pycreis* *Mundtii*, Nees.
nilagiricus, Rikli, l. c. 564 = *P. globosus*, Reichb.
pannonicus, Rikli, l. c. 563 = *Cyperus pannonicus*, Jacq.
Papyrus, Rikli, l. c. = *C. Papyrus*, Linn.
patuliflorus, Rikli, l. c. = *Pycreis albo-marginatus*, Nees.
pauper, Rikli, l. c. = *P. pauper*, C. B. Clarke.
polystachyus, Rikli, l. c. = *Cyperus polystachyus*, Rottb.
revularis, Rikli, l. c. 564 (= *Pycrei* sp.). — Am. bor.
- CHRYSANTHEMUM**
95³ a. *coronopifolium*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1887) 146 = *coronopifolium*, Masf.
marginatum, N. E. Br. in Kew Bull. (1888) 99 (= *Pyrethrum marginatum*, Miq.). — Japon.
nipponicum, Franch. ex Danmann, in Wien, Ill. Gart. Zeit. xx. (1895) 11, fig. 1. — Japon.
- 97¹ a. **CHYSIS**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 533.
undulata, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 196. — Hab.?
- CICHORIUM**
97² a. *Bottae*, Defflers, Voy. au Yémen (1899) 159. — Arabia.
- CINERARIA**
97³ a. *stenophylla*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 136. — Eur.
- CIRRHOPETALUM**
98² a. *Peyerianum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 485. — Sumatra.
robustum, Rolfe, in Orchid. Rev. i. (1893) 175; et ex Gard. Chron. (1895) i. 771, fig. 116. — N. Guin.
- CIRSIIUM**
98² a. *breviscapum* X, Eichenf. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xliii. (1893) 52. — Austro-Hung.
1. *horridum*, Formanek, 28 = *validum*, (1896).
a. *Kornhuberi* X, Heimerl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxiv. (1885) 95. — Austr.
98³ a. *Norristii*, Bicknell. in Malpighia, viii. (1891) 392. — Italia.
Sennholzii X, Eichenf. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xliii. (1893) 53. — Austro-Hung.
1. *valentinum*...; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. 102.
Velenovskyi... 1890 (1890) i. 268 [non 1889 (1890) ii.].
viride, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 23;...
- 98³ a. **CISSAMPELOS**, Linn. (Menisp.). — Ind. Kew. ii. 544.
natalensis, Szyzyl. Polyph. Rehmann. i. (1887) 11. — Natal.
- 100¹ a. **CISTUS**, [Tourn.] Linn. (Cist.). — Ind. Kew. ii. 547.
apricus, *arvensis*, *elegans*, *fruticans*, *humilis*, *microphyllus*, *platyphyllus*, *rhodanensis*, *velutinus*, Timb. in Rev. Bot. Soc. Franç. x. (1892) 69-70 = *homonyma omnia LEDONIAE* = *C. salvifolius*, Linn.
- 101¹ a. **CITHAREXYLUM**, Mill. (Verben.). — Ind. Kew. i. 549.
Berlandieri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 174. — Mexic.
- 100¹ a. **CITRIOBATUS**, A. Cunn. (Pittospor.). — Ind. Kew. ii. 550.
lanceifolia, F. M. Bailey, Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull. vii. (1893) 60. — Austral.
- 100¹ a. **CITRULLUS**, Forsk. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 550.
ecirrhosus, Cogn. in Abh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1889) 151; et in Bot. Jahrb. x. (1888) 270. — Afr. austro-occ. extratrop.
- 101¹ a. **CITRUS**, Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 551.
inodora, F. M. Bailey, Syn. Quensl. Fl. Third Suppl. (1890) 12. — Austral.
- 100¹ a. **CLADIUM**, P. Br. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 550.
angustifolium, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 334 (= *Vincetia angustifolia*, Gaudich.); et Fl. Polyn. Franç. (1892) 245. — Ins. Sandvic.
Durandoi, Chab. in Bull. Soc. Bot. -Fr. xxxvi. (1889) 321. — Algeria.
flexuosum, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 665 (= *Baumea flexuosa*, Boeck.). — Ins. Mascar.
latifolium, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 334 (= *Vincetia latifolia*, Kunth.); et Fl. Polyn. Franç. (1892) 244 = *iridifolium*, Baker.
lavarum, Cordem. Fl. Ile Réunion. (1895) 133 (= *Scirpus lavarum*, Poir.). — Ins. Borbon.
Meyenii, Benth. ex Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 334 (= *Baumea Meyenii*, Kunth.). — Ins. Sandvic.
- 101¹ a. **CLADOCOLEA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 166 = **Loranthus**, Linn.
Andrieuxii, Van Tiegh. l. c. 167. — Mexic.
Grahami, Van Tiegh. l. c. 166 = *Loranthus Grahami*, Oliver.
Oerstedii, Van Tiegh. l. c. = *L. Oerstedii*, Oliver.
tehuacanensis, Van Tiegh. l. c. = *L. tehuacanensis*, Oliver.
- 100¹ a. **CLADORAPHIS**, Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 673 = **Eragrostis**, Host (Gramin.).
Duparquetii, Franch. l. c. = *E. spinosa*, Thunb.
- 100¹ a. **CLADOTHRIX**, Nutt. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 552.
cryptantha, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 125. — Calif.
- 100¹ a. **CLADRASTIS**, Rafin. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 552.
Tashiroi, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 345 t. 10. — Japon.
- 100¹ a. **CLANDESTINA**, Tourn. ex Linn. = **La-thraea**, Linn. (Orobanch.).
squamaria, Legrand, Fl. du Berry, éd. 1 (1887) 197 = *L. squamaria*, Linn.
- 100¹ a. **CLAOXYLON**, A. Juss. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 552.
atrovirens, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 85. — Afr. trop.
dolichostachyum, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 341. — Ins. Borbon.
flaccidum, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 86. — Afr. trop.
hispidum, Pax, l. c. 85. — Kamerun.
insigne, Baill. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 291. — Ins. Sandvic.
lasiococcum, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 87. — Afr. trop. or.
Molleri, Pax, l. c. 84. — Ins. S. Thom.
Schweinfurthii, Pax, l. c. 86. — Afr. trop.
- 100¹ a. **CLARIONEAE**, Lag. = **Perezia**, Lag. (Compos.).
atacamensis, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, i. (1891) 35; et in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 304. — Chili.
- CLARIONEAE**
100¹ a. *caulescens*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 301. — Chili.
comosa, Phil. l. c. 304. — Chili.
nana, Phil. l. c. 303. — Chili.
spectabilis, Phil. l. c. — Chili.
- CLEMATIS**
100³ a. *campanulata*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 7 = *campaniflora*, Brot. *Daveyana*, Hort. l. c. 9 = *heracleaefolia*, DC. *Delavayi*... (1886) [non 1885].
- 101¹ a. *latifolia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 9 = *integrifolia*, Linn. *ovalifolia*,... (non *ovatifolia*).
- CLEOMODENDRON**
101² l. *somalense*... xiv. (1892) 295 [non (1893) 224].
- CLERODENDRON**
101³ a. *fistulosum*, Bower, in Proc. Phil. Soc. Glasgow, xviii. (1887) 323, nomen. — Ceylan.
1. *micans*... 179 (non 180).
a. *Powellii*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 261 (= *Faradaya Powellii*, Seem.). — Ins. Pacif.
- 102¹ a. *tricholobum*, Guerke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 178. — Zanzib., Reg. Mossamb.
- COCCOLOBA**
104³ a. *lanceolata*, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 517. — Bras.
104³ a. *Riedelii*, Lindau, l. c. xiii. (1890) 137. — Bras.
105¹ a. *Senaei*, Lindau, l. c. xvii. (1893) 517. — Bras.
- COCCULUS**
105¹ a. *carolinianus*, Hort. in Gartenfl. xxxv. (1886) 404, sphalm. = *carolinus*, DC.
- COELOGYNE**
105³ a. *Micholitzii*, W. Wats. in Gard. and For. viii. (1895) 144. — Hab.?
- COINOCHLAMYS**
106¹ l. *Poggeana*... 559 (non 558).
- 106² a. **COLEBOTRYS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 542 = **Loranthus**, Linn.
alata, Van Tiegh. l. c. 543. — Borneo.
acuminata, Van Tiegh. l. c. 542. — Java.
crassiseptala, Van Tiegh. l. c. — Penins. Mal.
heterantha, Van Tiegh. l. c. — Ind. or.
Lobbii, Van Tiegh. l. c. — Java.
Macklottiana, Van Tiegh. l. c. — Borneo.
raphidophora, Van Tiegh. l. c. — Java.
rubra, Van Tiegh. l. c. = *Lobbii*, Van Tiegh.?
Zollingeri, Van Tiegh. l. c. — Java.
- COLOBANTHUS**
107¹ l. *Meigeni*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 322; et...
- COLUTEA**
107³ a. *aurantiaca*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) = *arborescens*, Linn.
crocea, Hort. l. c. = *arborescens*, Linn.
purpurea, Hort. l. c. = *cruenta*, Ait.
- COMBRETUM**
108² l. *Raimbaultii*...; et in Le Naturaliste, Sér. 2, xvi. (1894) 236.
- COMMELINA**
108³ a. *mensensis*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. 2 (1894) 57, 106. — Erithrea.
ussilensis, Schweinf. l. c. 58. — Arabia.
- COMMIPHORA**
108³ l. *Guerichiana*,... xix. (1894) [non 1890].
- CONVOLVULUS**
109² l. *Kilimandschari*...; et in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 109.
109³ a. *sandvicensis*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 245 (= *Jacquemontia sandwicensis*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

CONYZA

- 109² a. *erythrolaena*, Klatt, in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* x. (1893) 125. — Mexic.

- 110¹ l. COPAIBA, Mill... = **COPAIFERA** (non COPAICA... = COPACFERA).

COPROSMA

- 110² a. *Nadeaudiana*, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 201; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 101. — Ins. Pacif.

- 110² l. **COPTOSAPELTA**... (non **COPTOSPELTA**).

CORALLOCARPUS

- 110² a. *emetocatharticus*, Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 279 (= *Doyerea emetocathartica*, Grossourdy). — Am. trop.

CORDIA

- 110³ a. *Bakeri*, Britten, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 88, in nota (= *C. obovata*, Baker). — Afr. trop.
marchionica, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 240; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 129. — Ins. Pacif.
obovata, Baker... = *Bakeri*, Britten.

COREOPSIS

- 111¹ a. *cordifolia*, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 208; et...
dichotoma, Drake, l. c. 209 (= *Campylothea dichotoma*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.
hawaiensis, Drake, l. c. = *Bidens hawaiensis*, A. Gray.
Hillebrandiana, Drake, l. c. (= *Campylothea Remyi*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.
japonica, Hort. Dammann, ex Wien. *Ill. Gartenzeit.* xx. (1895) 438, fig. 41. — Japon.
Jardini, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 209; et...
molokaiensis, Drake, l. c. 210 (= *Campylothea molokaiensis*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.
petrophiloides, Robinson & Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 388. — Mexic.
polycephala, Benth. & Hook. f. ex Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 217; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 108 = *Bidens polycephala*, Sch. Bip.
Remyi, Drake, l. c. 210 = B. *Remyi*, Drake.
sandwicensis, Benth. & Hook. f. ex Drake, l. c. = B. *sandwicensis*, Less.
serrulata, Benth. & Hook. f. ex Drake, l. c. = B. *serrulata*, Sch. Bip.

CORNUS

- 111² a. *citrina*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 249 = C. *Amomum*, Mill.
erythrocarpa, St Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8 (1889) 381 = C. *Mas*, Linn.
humila, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 251 = C. *Mas*, Linn.
religiana, Hort. l. c. = *macrophylla*, Wall.
Spaethii, Hort. l. c. = *alba*, Linn.
Thaleriana, Hort. l. c. 251 = *macrophylla*, Wall.
Thelicanis, Lebas, [in Rev. Hort. (1875) fig. 64] l. c. 251 = *macrophylla*, Wall.
verrucosa, Hort. l. c. = *circinata*, L'Hérit.

CORONILLA

- 111² a. *pyrenaica*, Mailho, ex Giraudias, in *Bull. Soc. sci. Angers*, xx. 1890 (1891) 69 = *varia*, Linn.
rupestris, Miégev. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. xxxiv. = *minima*, Linn.

CORYANTHES

- 111² a. *Wolfii*, Lehmann, in *Gard. Chron.* (1891) ii. 483; et ex *Orchid Rev.* i. (1893) 264. — Ecuad.

CORYDALIS

- 112¹ a. *integra*, Barb. & Major, *Samos* (1892) 30, t. 1. — Ins. Samos.
l. *slivenensis*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1887 (1888) 445; et...

COSMOS

- 112² a. *spectabilis* X, Hort. ex Rev. Hort. lxiv. (1892) 372, fig. 114-15. — Hybr. artef.

COTONEASTER

- 112³ a. *Davidiana*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 213 = *horizontalis*, Decne.
eriocarpa, Hort. l. c. 215 = *tomentosa*, Lindl.
himalayensis, Hort. l. c. 213 = *frigida*, Wall.
Hookeriana, Hort. l. c. = *buxifolia*, Wall.
montana, Hort. l. c. 215 = *Simonsii*, Baker.
nevadensis, Hort. l. c. = *Simonsii*, Baker.
repens, Hort. l. c. 213 = *buxifolia*, Wall.
sinensis, Hort. l. c. = *lucida*, Schlecht.
villosa, Hort. l. c. = *integerrima*, Medic.
Wheeleri, Hort. l. c. = *buxifolia*, Wall.

- 113¹ a. **COUDENBERGIA**, El. March. = **Coemansia**, El. March. (Aral.).
Warmingii, El. March. ex Warm. Lagoa Santa (1892) 269, nomen = C. *Warmingiana*, El. March.

COURSETIA

- 113² a. *mollis*, Robinson & Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 384. — Mexic.

COUSINIA

- 113² l. *dichacantha*, Lipsky, in *Mém. Soc. Natural. Kiew*, xi. (1891) 12; et...

CRACCA

- 114² a. *splendens*, Monicot & Miégev. ex Miégev. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. xxxiii. — Pyren. gall.

CRATAEGUS

- 114³ a. *aemula*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 211 = *uniflora*, Moench.
apiifolia, Hort. l. c. 205 = C. *Oxyacantha*, Linn.
apiifolia, [Loud.] l. c. 211 = *viridis*, Linn.
aurea, Hort. l. c. 209 = *punctata*, Jacq.
Bruantii, Hort. l. c. 205 = C. *Oxyacantha*, Linn.
californica, Hort. l. c. 207 = *pinnatifida*, Bunge.
Destefani X, Lojac. *Fl. Sicula*, i. II. (1891) 205, 310, t. 18, fig. 2. — Sicilia.
fastigiata, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 205 = C. *Oxyacantha*, Linn.
Lambertiana, Hort. l. c. 201 = *melanocarpa*, M. Bieb.
linearifolia, Hort. l. c. 197 = C. *Crus-galli*, Linn.
Macnabiana, Hort. l. c. 199 = C. *Douglasii*, Lindl.
mespilifolia, Hort. l. c. 203 = *mollis*, Scheele.
olivaeformis, Hort. l. c. 195 = C. *Carrierei*, Vauvel.
Pinshowi, Hort. l. c. 211 = *uniflora*, Moench.
spinossissima, Hort. l. c. 205 = C. *Oxyacantha*, Linn.
splendens, Hort. l. c. 199 = C. *Crus-galli*, Linn.
stipulacea, Hort. l. c. 197 = C. *Crus-galli*, Linn.
tartarica, Hort. l. c. 207 = *pinnatifida*, Bunge.
tortuosa, Hort. l. c. 203 = C. *Oxyacantha*, Linn.
urasina, Hort. l. c. 203 = C. *Oxyacantha*, Linn.

- 115¹ a. **CREMOCARPON**, Boiv. ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1879) 192; et *Hist. des pl.* vii. (1880) 399. **RUBIACEAE**.
Boivinianum, Baill. l. c. 399. — Ins. Comor.

- 115¹ l. **CREMOCARPUS**... = **CREMOCARPON**, Boiv. (non Boiss.).
Boivinianus... = C. *Boivinianum*, Baill. (non Bull.).

CREPIS

- 115¹ l. *balcanica*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) i. 53; et...
a. *Baldaccii*, Halácsy...; et in *Malpighia*, viii. (1894) 190. — Eur. or.
115² a. *glabrata*, Porcius, in *Anal. Acad. Romana*, Ser. II. xiv. (1892) 157. — Eur. austr.
nigra, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* vii. Folge i. (1886) n. 8, 28. — Bulg.
l. *orbetica*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) i. 52; et...
racemosa, St. Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8 (1889) 499 = *praemorsa*, Tausch.
Stribrnyi, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 333. — Bulg.

CRINUM

- 115³ a. *Doriae*, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort. (1894) 19. — Abyss.
grandiflorum X, Hort. Deleuil, ex Rev. Hort. lxvi. (1894) 147. — Hybr. artef.
Kivcapi X, [E. O. Orpet], in *Gard. and For.* viii. (1895) 288. — Hybr. artef.
yemensse, Deflers, Voy. au Yémen (1889) 209. — Arabia.

CRISTARIA

- 115³ a. *australis*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 307. — Chili.
bipinnatifida, Phil. l. c. 319. — Chili.
Borchersii, Phil. l. c. 316. — Chili.
carrizalensis, Phil. l. c. 319. — Chili.
l. *cyanea*, Phil...; et l. c. 312. — Chili.
divaricata, Phil...; et l. c. 312. — Chili.
a. *flexuosa*, Phil. *Verz. Antofag. u. Tarap.* (1891) 9. — Chili.
glabrata, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 308. — Chili.
l. *grandidentata*, Phil...; et l. c. 318. — Chili.
a. *grandiflora*, Phil. l. c. 311. — Chili.
hastata, Phil. l. c. 308. — Chili.
hispidula, Phil. l. c. 307. — Chili.
humilis, Phil. l. c. 310. — Chili.
inconspicua, F. Phil. ex Phil. l. c. 309. — Chili.
Jarae, Phil. *Verz. Antofag. u. Tarap.* (1891) 9. — Chili.
Larranagae, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 320. — Chili.
oxyptera, Phil. l. c. 305. — Chili.
parvula, Phil. l. c. 317. — Chili.
patens, Phil. l. c. 316. — Chili.
pilosa, Phil. l. c. 315. — Chili.
l. *ranunculifolia*, Phil...; et l. c. 314. — Chili.
saniculifolia, Phil...; et l. c. 313. — Chili.
a. *setosa*, Phil. l. c. 317. — Chili.
Sundtii, Phil. l. c. 310. — Chili.
trifida, Phil. l. c. 321. — Chili.
Vidali, Phil. l. c. 306. — Chili.

CROTALARIA

- 116³ a. *squamigera*, Deflers, Voy. au Yémen (1889) 126. — Arabia.

CROTON

- 116³ a. *Philippisii*, Williams, *Catal.* (1886) 24. — Hab.?
picturatus X, [Hort. Chantrier], ex Éd. André, in Rev. Hort. lx. (1888) 423 = *Codiaeum variegatum*, Blume.
Russellii, [Hort. Low.] ex Gard. Chron. (1893) ii. 629; et in Journ. of Hort. xxvii. 493 fig. 71 = *Codiaeum variegatum*, Blume.
Thomsoni, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 461 = *Codiaeum variegatum*, Blume.
Wigmannii, Williams, *Catal.* (1886) 24. — Hab.?

CRYPTANTHE

- 117³ *laxiflora*... [err. cal.] = *Cryptocarya laxiflora*, Phil.

CRYPTOCARYA

- 118¹ 1. *Burckiana*... (non *Burckeana*).
a. *laxiflora*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 503. — Chili.
118² a. *Schwackeana*, *Mez, in Arb. Bot. Gart. Breslau*, i. (1892) 107. — Bras.
subcorymbosa, *Mez, l. c.* 106. — Bras.

- 118³ 1. **CRYPTOPHRAGMIUM**... (non **GRYPTOPHRAGMIUM**).

CUCUMIS

- 118³ a. *Vilmorini*, [*Hort.*] ex *Bull. Soc. Tosc.ortic.* xix. (1894) 115. — Hab. ?

CURCUMA

- 119² a. *Kunstleri*, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 214 [*Kuntsleri*]. — Pegu.
Kurzii, *King, ex Baker, l. c.* 216. — Ins. Andam.

CUSCUTA

- 119² a. *alpica*, *Bruegg. Neue u. Krit. Pflanz.* [Jahresb. Naturf. Ges. Graub.] (1886) 45. — Helv.
Sarothamni, *Bruegg. l. c.* 46 = *C. Epithymum*, DC.

- 120¹ 1. **CYATHOPUS**, *Stapf, in Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2395. **GRAMINEAE** (non **CYATHOPSIS** *Brongn. & Gris*...).

CYATHULA

- 120¹ a. *truncinella*, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 189. — Madag.

CYCAS

- 120¹ a. *Duivenbodei*, *Hort. ex Cat. Comp. Cont. d'Hortic.* (1886) 9. — Ins. Molucc.
taiwaniana, *Carruth. in Journ. Bot.* xxxi. (1893) 2, t. 331. — Ins. Formosa.
Wendlandii, *Hort. Sander. Cat.* (1895) 32. — Madag.

CYCLAMEN

- 120² 1. *Pentelici*... xviii. *Beibl. n.* 44 (1894) 1.

CYCNIMUM

- 120³ 1. *cameroonianum*, *Engl.*... = *Rhamphicarpa Cameroniana*, *Oliver* [non ex loco, sed in honorem cl. Cameron nuncupatus].

CYMBIDIUM

- 120³ a. *armainvillense* ×, *Hort. ex Journ. des Orchid.* (1894) 9. — Hybr. artef.
inconspicuum, *Wall. ex Hook. f. in Ann. Bot. Gard. Calc. v. I.* (1895) 46 = *Saccolabium inconspicuum*, *Hook. f.*
nipponicum, *Rolfe, in Orchid Rev.* iii. (1895) 38 (= *Bletia nipponica*, *Franch. & Sav.*). — Japon.
121¹ 1. *Winnianum*, *Hort. ex Veitch, Man. Orch. Pl.* ix. (1893). 24; et...

CYNOGLOSSUM

- 121³ a. *Bottae*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 173. — Arabia.
1. *paucisetum* *Borb.*... (non *punctatum*).
rotatum, *Velen.*... 1893 (1894) xxxvii. 48 [non (1892) 3].

CYPERUS

- 122³ a. *holostigma*, *C. B. Clarke, ex Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* ii. App. 2 (1894) 103. — Erithrea.

CYPHOSTIGMA

- 123³ a. *exertum*, *Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xviii. (1886) 310, t. 13. — Penins. Mal.

CYPRIPEDIUM

- 123³ a. *Adrastus* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1892) i. 343. — Hybr. artef.
Aeson ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1893) i. 80. — Hybr. artef.

CYPRIPEDIUM

- 123³ a. *albanense*, *Hort. ex Veitch, Man. Orch. Pl.* iv. (1889) 105, in syn. = *C. Sedenii* ×, *Reichb. f.*
Allaniamum ×, *Hort. ex Orchid Rev.* ii. (1894) 22. — Hybr. artef.
Aphrodite ×, [*Hort. Veitch*], *Man. Orch. Pl.* iv. (1889) 76. — Hybr. artef.
Appletonianum, *Hort. ex The Garden*, xliii. (1893) 95 = *Hookerae*, *Reichb. f.*
Arthurianum ×, *Reichb. f. ex Lindenia*, iii. (1887) 53, t. 121. — Hybr. artef.
Ashtoni ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 721. — Hybr. artef.
Ashworthiae ×, *Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7* (1894) 232. — Hybr. artef.
aurorum ×, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1887) i. 179. — Hybr. artef.
Calyso ×, *Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7* (1894) 238. — Hybr. artef.
124² a. *cereus* ×, *Hort. ex Will. l. c.* 241. — Hybr. artef.
beechense ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1894) i. 762. — Hybr. artef.
Behrensianum ×, *Hort. Sander. ex Orchid Rev.* ii. (1894) 111. — Hybr. artef.
Bolerlaerianum ×, [*Hort. Pauwels*], *ex Gard. Chron.* (1895) ii. 391. — Hybr. artef.
Bosscherianum ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1892) i. 11, sphalm. = *C. Deboscherianum* ×, *Desbois*.
Bryani ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1892) ii. 138. — Hybr. artef.
Burtonii ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 800. — Hybr. artef.
Carnusianum ×, *Hort. Veitch. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 102. — Hybr. artef.
corbeillense ×, *Ch. Maron, in Rev. Hortic.* lxxv. (1893) 250. — Hybr. artef.
Corndeanii ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 627. — Hybr. artef.
Constableanum ×, *Hort. ex The Garden*, xliii. (1893) 75. — Hybr. artef.
Creon ×, *Hort. ex Will. l. c.* 249. — Hybr. artef.
Diana ×, *Hort. ex Will. l. c.* 253. — Hybr. artef.
Daviesianum ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 82. — Hybr. artef.
Deboscherianum ×, *Desbois, in Rev. Hort. Belg.* xviii. (1892) 6. — Hybr. artef.
delicatulum ×, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1887) ii. 552. — Hybr. artef.
Donatianum ×, [*Hort. Sander.*] *ex Bull. Soc. Tosc.ortic.* xx. (1895) 79. — Hybr. artef.
Edwardi ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1893) ii. 132. — Hybr. artef.
excellens ×, *Hort. ex Orchid Rev.* ii. (1894) 275. — Hybr. artef.
festum ×, *Hort. ex The Garden*, xli. (1892) 26. — Hybr. artef.
Fordianum ×, *Hort. Sander. ex Gard. Chron.* (1895) i. 210. — Hybr. artef.
Fowlerianum ×, *Hort. Sander. ex Gard. Chron.* (1895) i. 337. — Hybr. artef.
gloriosum ×, *Hort. ex Orchid Rev.* ii. (1894) 365. — Hybr. artef.
Goweri ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 529. — Hybr. artef.
Greyanum ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1893) i. 396. — Hybr. artef.
Hurellianum ×, [*R. M. Gray*] *in Orchid Rev.* iii. (1895) 15. — Hybr. artef.
124³ 1. *Huybrechtianum*... (non *Huybrechtsianum*).
Johnsonianum ×, *Hort. Sander. ex Gard. Chron.* (1892) ii. 744; et in *Journ. Hort. Soc.* xxvi. 171, fig. 30. — Hybr. artef.
Laforcadei ×, *Hort. Bauer, ex Godefroy, L'Orchidophile* (1886) 122, 181 cum ic.; *Veitch, Man. Orch. Pl.* iv. (1889) 87. — Hybr. artef.
125¹ a. *Leeanum* ×, *Hort. ex Will. et Warn. Orchid Alb. v.* (1886) t. 223; et *ex Lindenia*, iii. (1887) t. 125. — Hybr. artef.
Macfarlanei ×, *Kraenzl. in Gard. Chron.* (1891) ii. 300; et in *Gartenfl.* xl. (1891) 534. — Hybr. artef.

CYPRIPEDIUM

- 125¹ a. *Ledouxiae* ×, *Hort. ex Orchid Rev.* i. (1893) 117. — Hybr. artef.
Leopoldianum ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 333. — Hybr. artef.
leucorrhodum ×, *Reichb. f. in Journ. of Hort.* xii. (1886) 129, fig. 121; *Orchid Rev.* i. (1893) 169, fig. 11; *Will. Orch. Grow. Man. ed. 7* (1894) 277. — Hybr. artef.
loochristianum ×, *Ch. De Bosschere, in Gard. Chron.* (1895) i. 100. — Hybr. artef.
Louisae ×, *Hort. ex Orchid Rev.* iii. (1895) 50. — Hybr. artef.
Lynchianum ×, *Hort. Sander. ex Gard. Chron.* (1893) ii. 692. — Hybr. artef.
macrochilum ×, *O'Brien, in Gard. Chron.* (1891) 343, fig. 40; *Will. Orch. Grow. Man. ed. 7* (1894) 279. — Hybr. artef.
Masonii ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 800. — Hybr. artef.
1. *Massaianum*... (non *Massainum*).
a. *Mauriceanum* ×, *Ch. De Bosschere, in Orchid Rev.* i. (1893) 118. — Hybr. artef.
Millmani ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 800. — Hybr. artef.
Moensii ×, *Hort. ex Orchid Rev.* i. (1893) 98; et ii. (1894) 335 (= *C. memoria-Moensii*, *Hort.*). — Hybr. artef.
Morganae ×, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) ii. 243; in *Illustr. Hortic.* (1887) t. 5; et in *Orchid Alb.* vii. (1888) t. 313. — Hybr. artef.
Nandi ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1894) ii. 310. — Hybr. artef.
125² a. *Orestes* ×, *Veitch, Man. Orch. Pl.* iv. (1889) 94; *Will. Orch. Grow. Man. ed. 7* (1894) 288. — Hybr. artef.
Paulii ×, *Hort. ex Orchid Rev.* i. (1893) 147. — Hybr. artef.
pendulum ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 192. — Hybr. artef.
platycolor ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 655. — Hybr. artef.
Poyntzianum ×, *O'Brien, in Gard. Chron.* (1894) i. 36; et *ex Orchid Rev.* ii. (1894) 54. — Hybr. spont. ?
refulgens ×, *Hort. Ingram. ex Gard. Chron.* (1895) i. 210, 338. — Hybr. artef.
Rossianum ×, *Hort. ex Orchid Rev.* iii. (1895) 359. — Hybr. artef.
Sallierii, *Godefroy, Les Cyripéd.* Part. I. (1888), *Will. Orch. Grow. Man. ed. 7* (1894) 297; *Gard. and For.* ii. (1893) 117 [*Sallieri*]. — Burma.
signatum ×, *Bull. Catal.* (1895) 7. — Hybr. artef.
splendens ×, *Hort. ex Lindenia*, ii. (1886) t. 69. — Hybr. artef.
suffusum ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 210. — Hybr. artef.
Thayerianum ×, *Hort. Sander. ex Gard. Chron.* (1893) ii. 192. — Hybr. artef.
Tryonianum ×, *Hort. Tate, ex Gard. Chron.* (1893) ii. 134. — Hybr. artef.
Uihleinianum ×, *Hort. ex Sander, Catal.* (1895) 10. — Hybr. artef.
Umlaufianum ×, [*Hort. Sander.*] *ex Gard. Chron.* (1893) ii. 70. — Hybr. artef.
Vannerae ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 402. — Hybr. artef.
Vigerianum ×, *Hort. Mantin, ex Rev. Hortic.* lxxvii. (1895) 359; et *ex Gard. Chron.* (1895) ii. 100. — Hybr. artef.
Van Molianum ×, *Hort. Linden, ex Gard. Chron.* (1892) i. 502. — Hybr. artef.
Wallaertianum ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 655. — Hybr. artef.
125³ a. *Wallisii*, *Will. Orch. Grow. Man. ed. 6* (1885) 261; et *ed. 7* (1894) 313; in *Lindenia*, iii. (1887) 73, t. 181; *Orchid Alb.* viii. (1889) t. 380. — Ecuad.
warnhamiense ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 248. — Hybr. artef.
Watsonianum ×, *Hort. Sander. ex Orchid Rev.* i. (1893) 244. — Hybr. artef.

CYPRIPEDIUM

- 125³ a. *Whitelyanum* X, Hort. ex Gard. Chron. (1895) ii. 307. — Hybr. artef.
Wiganianum X, Hort. ex Orchid Rev. ii. (1894) 142. — Hybr. artef.

CYRTANDRA

- 126¹ a. *glaucia*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 253. — Ins. Sandvic.
Vairiae, Drake, l. c. (1889) 87, 25; t. 44; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 146. — Ins. Tahit.
Vescoi, Drake, l. c. 85, 287, t. 43. — Ins. Tahit.
vestita, Drake, l. c. 94, 287, t. 48; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 146. — Ins. Tahit.

CYRTANTHUS

- 125¹ a. *O'Brieni*, Baker, in Gard. Chron. (1894) i. 716. — Afr. austr.

CYTISUS

- 126² a. *agnipilus*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 643. — Bulg. *Carlieri*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 107 = *Laburnum anagyroides*, Medic.
a. *caucasicus*, Hort. l. c. 113 = *biflorus*, L'Hérit.
l. *danubialis*, 1890 (1890) i. ... [non (1890) ii.] *ganipilus*... [err. cal. dele et lege: *agnipilus*] (conf. supra).
126³ *medicaginoides*, Hort. l. c. = *biflorus*, L'Hérit.
a. *quinguefolius*, Hort. l. c. 117 = *sessilifolius*, Linn.

D

- 127¹ a. *DACTYLIOPHORA* .. (non *DACTYLOPHORA*).

DALEA

- 127² l. *unifoliata*... (non *unifoliolata*).

DAPHNE

- 127³ a. *arbuscula*, Celak, in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) i. 215. — Hung.

DAPHNOPSIS

- 128¹ *Schwackeana*, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 6 (non 61); et xv. Beibl. n. 38 (1893) 18 (non 8).
Sellowiana, Taub. l. c. xii. Beibl. n. 27 (1890) 7 (non xv...).
sessiliflora, Griseb. ex Taub. l. c. 8 (non xv...).

DAUCUS

- 128¹ a. *drepanensis*, Tod. ex Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1891) 298. — Sicilia.

DELPHINIUM

- 129² l. *iliense*, Huth, ... 402 (non 462).

DENDROBIUM

- 129³ l. *Augustae-Victoriae*, Kraenzl. ... = *veratrifolium*, Lindl.
burfordiense X, Hort. Lawrence, ex Gard. Chron. (1892) ii. 744. — Hybr. artef.
cheltenhamense X, Hort. ex The Garden, xliii. (1893) 389. — Hybr. artef.
chlovostele X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 477. — Hybr. artef.
chrysodiscus, Reichb. f. l. c. (1887) i. 414; et... — Hybr. artef.
chrysolabrum... (non *chrysolabium*).
Cogniauxianum... 281 (non 280).
Donnesiae X, Hort. ex Gard. Chron. (1895) i. 402; et ex The Garden (1895) 222, t. 1032, fig. 1. — Hybr. artef.
dulce X, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 214. — Hybr. artef.
Edithae X, Hort. ex Gard. Chron. (1895) i. 337. — Hybr. artef.

DENDROBIUM

- 129³ l. *Eriae*, F. Muell. Sec. Cens. Austral. Pl. (1889) 186 (= *D. eriaeoides*, F. M. Bailey). — Austral.
130¹ l. *galliceanum*, Linden, in Lindenia, vi. (1890) 5, t. 241; Will. Orch. Crow. Man. ed. 7 (1894) 340. — Burma.
Gemma X, Hort. ex Orchid Rev. iii. (1895) 73. — Hybr. artef.
130² a. *Jofftii*... [conf. *Tofttii*].
Imperatrix, Kraenzl. in Reichenbachia, Fasc. xii. (1895) 11, t. 95. — As. trop.
a. *Juno* X, Hort. ex Journ. of Hort. xx. (1890) 85, fig. 13; Will. l. c. 344, cum xylogr. — Hybr. artef.
Lutwycheanum X, Hort. ex Orchid Rev. ii. (1894) 202. — Hybr. artef.
130² l. *Mettkeanum*... (non *Meltkeanum*).
a. *Murrayi* X, Hort. ex Orchid. Rev. iii. (1895) 166. — Hybr. artef.
palens X, Hort. Lawrence, ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 354. — Hybr. artef.
pauciflorum, King & Pantling, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) II. 332. — Sikkim.
porphyrogastrum X, Veitch, Man. Orch. Pl. iii. (1888) 90. — Hybr. artef.
130³ l. *speciosissimum*, Rolfe, in Orchid Rev. iii. lxvii. (1895) 119, 140; et ex Rev. Hortie. (1895) 415. — Borneo.
Roeblingianum X, Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 211. — Hybr. artef.
Tofttii, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Third Suppl. (1890) 71. — Austral.
Vannerianum X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 72. — Hybr. artef.
Warburgianum... 281 (non 280).
xanthocentrum X, Hort. ex Gard. Chron. (1890) i. 88; et (1895) i. 82. — Hybr. artef.

DERRIS

- 131² a. *polyphylla*, Koerd. & Valet. Boomsoort. van Java, ii. (1895) 89 = *Brachypterum polyphyllum*, Miq.

DESCHAMPSIA

- 131³ a. *rhenana*, Gremli, Excurs. Fl. Schweiz. ed. 6 (1889) 451 = *caespitosa*, Beauv.

DEUTZIA

- 132² a. *californica*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 223 = *crenata*, Sieb. & Zucc.
131² l. *discolor*, Maxim... xxxii. (1890) 487 = *hypoleuca*, Maxim.
Godohokeri, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 225 = *Philadelphus hirsutus*, Nutt.
a. *hypoleuca*, Maxim. Dec. pl. Asiat. viii. (1893) 36. — Japon.
132² a. *japonica*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 227 = *Philadelphus Satsumi*, Sieb.
pulchella, Hort. l. c. = *P. Satsumi*, Sieb.
sanguinea, Hort. l. c. 225 = *P. grandiflorus*, Willd.

DEYEUXIA

- 132² a. *Royleana*, Trim. Cat. Pl. Ceyl. (1885) 108 = *Calamagrostis pilosula*, Hook. f. (Suppl. II.).

DIANTHUS

- 132² a. *aeolicus*, Lojac. Fl. Sicula, i. I. (1888) 163. — Sicilia.
brachycarpus, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge, I. (1886) 9. — Bulg.
brivatensis X, Blanchard, in Le Jardin (1892) 174. — Hybr. artef.
hermaeensis, Coss. Ill. Fl. Atlant. i. (1890) 129, t. 76. — Reg. Tunet.
132¹ a. *microcheilus*, Williams, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 176 = *carpathicus*, Borb.
l. *Freynii*... 1890 (1890) i. ... [non 1889 (1890) ii. ...].

DIANTHUS

- 132¹ l. *Nanteuillii*, Burnat... (non *Monteuillii*)... et Malinv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) p. 248.
Pancicii, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 9. — Bulg.
quadrangulus... 1892 (1893) 372... (non 1892 (1893)).
a. *rumelicus*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) i. 41; et...

DIAPEDIUM, Koen. = **Dicliptera**, Juss. (Acanth.).

- 133² a. *acuminatum*, *assurgens*, *baphicum*, *Beddomei*, *brachiatum*, *brasiliense*, *canescens*, *capense*, *caracasianum*, *ciliare*, *clavatum*, *clinopodium*, *confine*, *congestum*, *cuneatum*, *effusum*, *erianthum*, *Forsterianum*, *glabrum*, *Haenkeanum*, *heterostegium*, *Hookerianum*, *hyalinum*, *interruptum*, *javanicum*, *Kurzii*, *laevigatum*, *Leonotis*, *maculatum*, *madagascariense*, *Moritzianum*, *mucronifolium*, *multiflorum*, *ovatum*, *pedunculare*, *peruvianum*, *pilosum*, *Pohlianum*, *procumbens*, *propinquum*, *reptans*, *resupinatum*, *scabrum*, *sericeum*, *sexangulare*, *sparsiflorum*, *speciosum*, *spicatum*, *squarrosus*, *tomentosum*, *trifurcatum*, *Tweedianum*, *unguiculatum*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 484-85 = *homonyma omnia* *Diclipterae*.
apiculatum, Kuntze, l. c. 485 = *Rungia apiculata*, Bedd.
Benthii, Kuntze, l. c. = *R. chinensis*, Benth.
Brandisii, Kuntze, l. c. 484 = *R. Brandisii*, C. B. Clarke.
Clarkii, Kuntze, l. c. 485 = *R. Beddomei*, C. B. Clarke.
coeruleum, Kuntze, l. c. 484 = *Dicliptera pubescens*, Juss.
crenatum, Kuntze, l. c. 485 = *Rungia crenata*, T. Anders.
cuspidatum, Kuntze, l. c. 484 = *Dicliptera micranthes*, Nees.
diversiforme, Kuntze, l. c. 485 = *Rungia diversiformis*, Nees.
elegans, Kuntze, l. c. = *R. elegans*, Dalz. & Gibs.
grande, Kuntze, l. c. = *R. grandis*, T. Anders.
himalayense, Kuntze, l. c. = *R. himalayensis*, C. B. Clarke.
 khasianum, Kuntze, l. c. = *R. khasiana*, T. Anders.
laetum, Kuntze, l. c. = *R. laeta*, C. B. Clarke.
latebrosus, Kuntze, l. c. 484 = *Dicliptera parvibracteata*, Nees.
latus, Kuntze, l. c. = *Rungia latior*, Nees.
linifolium, Kuntze, l. c. = *R. linifolia*, Nees.
longifolium, Kuntze, l. c. = *R. longifolia*, Nees.
Mastersii, Kuntze, l. c. = *R. Mastersii*, T. Anders.
pectinatum, Kuntze, l. c. = *R. parviflora*, Nees.
pubinervium, Kuntze, l. c. 485 = *R. pubinervia*, T. Anders.
repens, Kuntze, l. c. 485 = *R. repens*, Nees.
retortum, Kuntze, l. c. = *Dicliptera parvibracteata*, Nees.
sisparensis, Kuntze, l. c. = *Rungia sisparensis*, T. Anders.
stoloniferum, Kuntze, l. c. = *R. stolonifera*, C. B. Clarke.
thlaspioides, Kuntze, l. c. = *Dicliptera thlaspioides*, Nees.
umbellatum, Kuntze, l. c. = *D. micranthes*, Nees.
verticillare, Kuntze, l. c. = *Hypoestes verticillaris*, R. Br.
verticillatum, Kuntze, l. c. 978 = *Dicliptera micranthes*, Nees.
Wightianum, Kuntze, l. c. 485 = *Rungia Wightiana*, Nees.

DICHAELIA

- 134³ l. *elongata*... (1894) 35 (non 1884).

- 135² a. *DICHOSTYLIS*, Rikli, in Pringsh. Jahrb. xxvii (1895) 565 = *Scirpus*, Tourn. (Cyperac.).
aristata, Rikli, l. c. = *Cyperus aristatus*, Rottb.
hamulosa, Rikli, l. c. = *Scirpus hamulosus*, Stev.
 135² a. *Micheliana*, Rikli, l. c. = *S. Michelianus*, Linn.
nitens, Rikli, l. c. = *Rynchospora nitens*, A. Gray.
patens, Rikli, l. c. = *Pycnus nitens*, Nees.
pygmæa, Rikli, l. c. = *Eleocharis Chaetaria*, Roem. & Schult.

DICLIPTERA

- 135² l. *Marlothii*,... x. (1888) 266 [non (1889) 265].
 135³ *usambarica*,... 47 (non 46).

DICRAEA

- 135³ a. *hamata*, Rolfe, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. 2 (1895) 264. — Boliv.

DICRANOLEPIS

- 135³ l. *Soyauxii*,... vii. (1886) (non 1885).

DICTYOSPERMA

- 136¹ a. *fibrosum*, C. H. Wright, in Kew Bull. (1894) 358. — Madag.

- 136¹ l. *DIDYMIA*,... = *Mariscus*, Vahl (Cyper.).

DIGITARIA

- 136³ a. *vaginata*, Magnier, ex Debeaux, in Lucante, Rev. Soc. Franç. Bot. xii. (1895) 303 = *Panicum vaginatum*, Sw.

DIGLOSSOPHYLLUM

- 136³ a. *serrulatum*, Wendl. ex Bull. Soc. Tosc.ortic. xiv. (1889) 337 = *Serenoa serrulata*, Hook. f.

DILLENIA

- 136³ l. *mattanensis*,... (non *mattadensis*).
meliosmaefolia, Pierre, ex Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 123 = *meliosmaefolia*, Hook. f.?
membranifolia,... (1886) (non 1887),

DINEBRA

- 137¹ a. *guineensis*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 376. — Afr. trop. occ.

DIOSMA

- 137² a. *Wendlandi*, Carrière, in Rev. Hortie. lxiv. (1892) 155. — Afr. austr.

DIPLADENIA

- 138³ a. *carissima*, T. Moore, ex Flor. and Pomol. (1869) 169, t. 502 = *Martiana*, A. DC.

DIPLOTAXIS

- 139² a. *maritima*, Rouy, Excurs. bot. Espagne, iii. 33; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 309. — Hisp.

DISA

- 142² a. *nervosa*, Hort. Kew, ex Gard. Chron. (1894) ii. 308, fig. 41. — Natal.

DISCHISTOCALYX

- 140² a. *pubescens*, Lindau, ex Engl. in Goetzen, Durch Afrika, Append. (1895) 377, 382. — Congo or.

DISTERIGMA

- 141² l. *cuspidatum*,... xi. (1889) 210 [non (1896) 220].
dendrophilum,... l. c.
 142² l. *epacridifolium*,... l. c.

DONAX

- 142³ l. *congensis*,... xv. (1892) 439.

DODECATHEON

- 141³ a. *Lemoinei* X, Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. xiv. (1889) 199 = *D. Meadia*, Linn.

DORATOXYLUM

- 142² a. *apetalum*, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 81 = *diversifolium*, Benth. & Hook. f.

DORSTENIA

- 143¹ l. *caulescens*,... xx. (1894) 144.

DORYCNium

- 143 a. *diffusum*, Janka, in Magyar Növen. Lapok, x. (1886) 147. — Hung.

DRABA

- 143³ a. *cauquenensis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 330. — Chili.
depilis, Phil. l. c. 331. — Chili.
pectinata, A. Kern. [ubi?] ex Kolb, Alpenpflanzen (1890) 109. — Tirol.
pusilla, F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 329. — Chili.
 l. *Saffordi*,...; et in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 331.

DRACAENA

- 144³ a. *Hibberdii* X, [Hort. Will.] Flor. Mag. (1876) t. 201. — Hybr. artef.
Jamesii, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 629 = *Cordylone terminalis*.

DURIO

- 146¹ a. *Lowianus*, Scortech. ex King, in Journ. As. Soc. Beng., lx. (1891) ii. 51. — Penins. Mal.
 l. *testudinarius*,... (non *testudinarius*).
Wrayii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 52. — Perak.

DUVAUA

- 146¹ a. *patagonica*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1893) 9. — Patag.

DYSOPHYLLA

- 147¹ a. *ianthina*, Maxim. ex Kanitz, Növenyt. gyujtesek Grof. Széchenyi (1891) 46 = *Pogostemon ianthina*, Kanitz.
 l. *porophylloides*,... A. Gray (non A. Grag).

E**EARINA**

- 147¹ l. *samoensium*,... (non *samoensiana*).
 147¹ a. *filiformis*, Vasey, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 117. — Am. bor.

EBENUS

- 147¹ a. *Boissieri*, Barb. in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxi. (1885) 221; et *Lydie*, Lycie, Carie (1890) 60 t. 2. — As. Min.

ECHINARIA

- 149² a. *spicata*, Debeaux, in Rev. de Bot. viii. (1890) 266. — Sicilia.

ECHINOCACTUS

- 149² a. *Beguini*, K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. (1895) 44. — Mexic.
crassihamatus, A. Weber, in Bois, Dict. Hortie. i. (1895 ?) 468. — Mexic.
durangensis, Runge, in Hamb. Gart. und Blumenzeit. xlv. (1890) 231. — Mexic.
Gerardi, A. Weber, in Bois, Dict. Hortie. i. (1895 ?) 468 = *haematacanthus*, Monv.
haematacanthus, Monv. ex A. Weber, l. c. — Mexic.
heterochromus, A. Weber, l. c. — Mexic.
Joadii, Hook. f. in Bot. Mag. (1886) t. 6867. — Uruguay.
Mathsonii, Berge, in Monatsschr. f. Kakteenk. (1893) 45. — Mexic.
phymatothelos, Poselg. in Foerst.-Ruempl. Handb. d. Kakteenk. (1886) 602. — Hab. ?
Saussieri, A. Weber, in Bois, Dict. Hortie. i. (1895 ?) 468. — Mexic.
Schickendantzii, A. Weber, l. c. 470. — Reg. Argent.

ECHINOCACTUS

- 149² a. *subniger*, Poselg. ex Foerst.-Ruempl. Handb. d. Kakteenk. (1886) 588. — Mexic.
texensis, Hopfer, ex Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 633, t. 1286. — Texas.

ECHINOCEREUS

- a. *conglomeratus*, Mathsson, in Gartenfl. xxxix. (1890) 465. — Mexic.
dubius, Engelm. ex Ruempl. in Foerst.-Ruempl. Handb. d. Kakteenk. ed. 2 (1886) 787 = *Cereus dubius*, Engelm.
glycimorphus, Foerst. in Foerst.-Ruempl. l. c. 800. — Hab. ?
mojavensis, Engelm. ex Ruempl. l. c. 803 = *Cereus mojavensis*, Engelm. & Bigel.
papillosus, Linke, in Foerst.-Ruempl. l. c. 783. — Hab. ?
paucispinus, Engelm. ex Ruempl. l. c. 794 = *Cereus paucispinus*, Engelm. & Bigel.
Roetteri, Engelm. ex Ruempl. l. c. 829 = *C. Roetteri*, Engelm.
stramineus, Engelm. ex Ruempl. l. c. 797 = *C. stramineus*, Engelm.
tuberosus, Poselg. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 783. — Am. bor.

ECHINOPS

- 149³ a. *byzantinus*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn. xxix. 1890 (1891) 129. — Oriens.
 150¹ a. *Raddeanus*, Somm. & Levier, in Nuov. Giorn. bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 90. — Reg. Cauc.
 150¹ l. *thracius*,... Ges. Wiss. 1890 (1890) i... [non *thracicus*,... Ges. Wiss. (1890) ii.].

ECHITES

- 150² a. *Sanctae-Crucis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 396. — Bras.

- 150² a. *EELDEA*, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 543 = *Candollea*, Labill. prop. *MAGNOLIACEAE*.

EHRHARTA

- 150³ a. *Godefroyi*, C. Cordem. in J. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 123. — Ins. Borbon.
penicillata, C. Cordem. l. c. — Ins. Borbon.

EHRETIA

- 150² a. *Bakeri*, Baker, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 88, in not. — Afr. trop.
 150³ a. *microphylla*, Baker, [non Wall.], in Kew Bull. (1894) 29. — Afr. trop. or.

ELAEOCARPUS

- 151¹ a. *Hulletii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 132. — Penins. Mal.
Kunstleri, King, l. c. — Perak.
Mastersii, King, l. c. 139. — Penins. Mal.
punctatus, King, l. c. — Perak.
salicifolius, King, l. c. 125. — Penins. Mal.
Scortechinii, King, l. c. 124. — Penins. Mal.
Wrayi, King, l. c. — Perak.

ELATOSTEMA

- 151² a. *ciliatum*, Hook. f. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 67, nomen; et in Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. 574 (sp. dub.). — Ind. or.
Clarkei, Hook. f. ll. cc. 67; et 369. — Ind. or.

ELEUTHEROSPERMUM

- 151³ a. *chrysanthum*, Somm. & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1895) 43; et in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 74. — Reg. Cauc.

ELIONURUS

- 151³ a. *Brazzae*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 323. — Congo gall.

EMBELIA

- 152³ a. *demissa*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 447. — Ins. Borbon.
triquetra, Cordem. l. c. 446. — Ins. Borbon.
variabilis, Cordem. l. c. 445. — Ins. Borbon.

153¹ l. **ENDACANTHUS**.... [non **ENDECANTHUS**].
Humboldtii, . Fasc. 30 (1892) t. 244 (non 241).

153³ a. **EPHEDRANTHUS**, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 296. **ANONACEAE**.
parviflorus, S. Moore, l. c. t. 21. — Bras.

EPIDENDRUM

153³ a. Barkerioli, Veitch, Man. Orch. Pl. vi. (1890) 89 (= *Barkeria Barkerioli*, Reichb. f. — Hab. ?
Claesianum, [Hort. Lucas], ex Gard. Chron. (1893) i. 641, nomen. — Hab. ?
Forgetianum, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 752. — Hab. ?
Kienastii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 126. — Mexic.

154¹ a. Matthewsii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 458; et (1887) ii. 431. — Peruv.
Watsonianum, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1892) i. 214. — Bras.

EPILAELIA

Hardyana X, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1894) i. 605, 629, fig. 80; et ex Orchid Rev. ii. (1894) 364. — Hybr. artef.

EPIPHRONITIS

Veitchii X, Hort. ex Journ. of Hort. lxxxiii. (1890) 513, fig. 68; et ex Gard. Chron. (1890) i. 799. — Hybr. artef.

155¹ a. **EPIPREMUM**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 446, err. typ. = **Epipremnum**, Schott (Aroid.).

EPISCIA

155¹ a. maculata, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7131. — Guian. angl.

ERAGROSTIS

155¹ a. Braunii, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. 2 (1894) 41. — Arabia.
Elliottii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 140 = campestris, Trin.
humifusa, C. Cordem. ex J. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 126. — Ins. Borbon.

155² a. mabiana, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. 2 (1894) 38. — Arabia.
platystachys, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 382. — Gabon.
Tholloni, Franch. l. c. 383. — Congo gall.
Tinge-lingua, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 357. — Bras.
yemensis, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. 2 (1894) 41. — Arabia.

ERANTHEMUM

155³ a. congestum, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 428. — Bras.
velutinum, Hort. Bull. Cat. new Pl. (1886) 8. — Bras.

ERIA

156² l. choneana... (non choniana).
a. fibuliformis, King & Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 336. — Sikkim.

ERIANTHUS

156³ a. longisetosus, T. Anders. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 85, t. 34. — Ind. or.

ERICA

156³ d. flava, Bolus (est Blaeriae species, in loco proprio jam enumeratur).
157¹ l. junonia.... (non Junonis).

ERIGENIA

163³ a. Fitzgeraldi [A. H. S. Lucas] in Vict. Natural. viii. (Aug. 1891) 50, err. typ. = *Eugenia Fitzgeraldi*, F. Muell.

ERIGERON

158¹ a. elegans, Greene, Pittonia, ii. (1891) 173. — Calif.

Favratii X, Gremli, Excurs. Fl. Schweiz, ed. 6 (1889) 231. — Helv.

glabrescens X, Bruegg, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. Fasc. xxiii-xxiv. (1880) 105. — Helv.

parviflorum X, Bruegg, l. c. — Helv.

158² a. Remyi, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1888) 65, t. 31 (= *Vittadinia Remyi*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

Scribneri, Canby, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 150. — Montana.

tenerrimus, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1888) 67, t. 32 (= *Aster tenerrimus*, Less.). — Ins. Sandvic.

ERIOCARPUM

158³ a. scabrellum, Greene, in Erythea, ii. (1894) 108. — Calif.

ERIOCAULON

158³ a. decemflorum, Maxim. Dec. pl. Asiat. viii. (1893) 7. — China.

dicline, Maxim. l. c. 21. — China.

kisianum, Maxim. l. c. 22. — China.

nipponicum, Maxim. l. c. 9. — Japon.

nudicuspe, Maxim. l. c. 19. — Japon.

sikokianum, Maxim. l. c. 16. — Japon.

ERIOCOMA

159¹ a. Lehmanni, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 54. — Columb.

ERODIUM

160² a. Vetteri, Barb. & Major, Samos (1892) 36, t. 2. — Ins. Samos.

EROPHILA

160² a. corsica, Jord. ex Magnier, Scrin. fl. select. x. (1891) 13 = vulgaris, DC.

ERVUM

160³ a. Tenoreanum, Giraudias, in Bull. Soc. étud. sci. Angers, xix. 1889 (1890) 104 = *Vicia Tenoreana*, Mart. -Donos.

ERYSIMUM

161¹ a. Mureti X, Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxv. (1889) 50. — Helv.

ERYTHRAEA

161³ a. Pringleana, Witttr. in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 85. — Mexic.

Schuttleworthiana, Rouy, in Le Naturaliste, Sér. 2, xiii. (1891) 11, in obs. = *E. Centaurium*, Linn.

turcica, Velen. in Abh. böhm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 31. — Bulg.

ERYTHRINA

161³ a. microcarpa, Koerd. & Valetton, Boomsoort. van Java, ii. (1895) 61. — Java.

ERYTHROXYLUM

162² a. ampullaceum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 455. — Madag.

Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 11. — Bolivia.

durum, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 322. — Bras.

novo-granatense, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 35. — Columb.

praecox, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 321. — Bras.

sparsiflorum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 455. — Madag.

ESCALLONIA

162² a. exoniensis, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 227. — Form. hort.
Ingrami, Hort. l. c. 229, in syn. = *macrantha*, Hook. & Arn.

ESCHWEILERIA

162² a. plecosperma, Th. Dur. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 183 (= *Reynoldsia plecosperma*, A. Gray). — Ins. Samoa.
sandvicensis, Th. Dur. l. c. 182 (= *R. sandvicensis*, A. Gray). — Ins. Sandvic.
tahitensis, Th. Dur. l. c. 183 (= *R. tahitensis*, Nadeaud). — Ins. Tahit.

EUCALYPTUS

162³ l. Naudiniana, F. Muell. in Austral. Journ. Pharm. (July 1886). — N. Brit.

EUCHARIS

162³ a. Clibrani X, Hort. Clibran, ex Gard. Chron. (1892) ii. 138, 214 = *Urceocharis Clibrani* X, Mast.

163¹ a. **EUCLASTE**, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 335. **GRAMINEAE**.
glumacea, Franch. l. c. 336. — Congo gall., Venezuela.

163¹ a. **EUCYPERUS**, Rikli, in Pringsh. Jahrb. xxvii. (1895) 568 = **Cyperus** [Mich.], Linn.

alternifolius, Rikli, l. c. = *C. alternifolius*, Linn.

brunneovaginatus, Rikli, l. c. = *C. brunneo-vaginatus*, Boeckl.

diffusus, Rikli, l. c. = *C. diffusus*, Vahl.

fuscus, Rikli, l. c. = *C. fuscus*, Linn.

gracilis, Rikli, l. c. = *C. gracilis*, R. Br. (?)

longifolius, Rikli, l. c. = *C. longifolius*, Poir.

longus, Rikli, l. c. = *C. longus*, Linn.

Luzulae, Rikli, l. c. = *C. Luzulae*, Rottb.

Martianus, Rikli, l. c. = *C. Martianus*, Schrad.

pungens, Rikli, l. c. = *C. conglomeratus*, Rottb. (?)

Schaffneri, Rikli, l. c. = *C. Schaffneri*, Boeck.

textilis, Rikli, l. c. = *C. textilis*, Thunb.

EUGENIA

163² l. Argyrocalyx.... 390 (non 391).

a. depauperata, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 437. — Ins. Borbon.

Hermannii, Cordem. l. c. (1895) 426. — Ins. Borbon.

heteromorpha, Cordem. l. c. 428. — Ins. Borbon.

Holtzeana, F. Muell. Sec. Cens. Austral. Pl. (1889) 101, sphalm. = *E. Holtzei*, F. Muell.

164¹ a. mascarensis, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 429. — Ins. Borbon.

miniata, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 358. — Bras.

montana, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 432. — Ins. Borbon.

164² a. platyphylla, Cordem. l. c. — Ins. Borbon.

prolixa, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 358. — Bras.

pseudo-verticillata, S. Moore, l. c. 357. — Bras.

Richardiana, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 430. — Ins. Borbon.

Sayeri, F. Muell. in Vict. Natur. ix. (May 1892) 5, nomen. — Austral.

sparsa, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 358. — Bras.

164³ l. stirpiflora... (1895) (non 1894).

a. urceolata, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 426. — Ins. Borbon.

EULOPHIA

165¹ a. coccifera, Frapp. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 222. — Ins. Borbon.

165² a. geniculata, King & Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiv. (1895) ii. 337. — Sikkim.

l. Holtzei....; et in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 237.

165³ a. versicolor, Frapp. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 221. — Ins. Borbon.

EULOPHIA

- 165³ a. Zeyheri, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1893) t. 7330 (= *E. bicolor*, Reichb. f. & Sonder). — Afr. austr.

EUONYMUS

- 166¹ a. bulgaricus, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 116. — Bulg.
citrifolius, *Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i.* [Polypet.] (1894) 65. — Hab. ?
flavescens, Hort. l. c. = europaeus, Linn.
Lilievrii, Hort. l. c. 67 = nanus, *Bieb.*
macrocarpus, Hort. l. c. 65 = atropurpureus, *Jacq.*
purpureus, Hort. l. c. = europaeus, Linn.
robustus, Hort. l. c. = japonicus, *Thunb.*

EUPATORIUM

- 166¹ l. brickellioides....; et in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* ix. (1892) 123.
a. chapalense, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 138. — Mexic.
166² a. cujabense, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 385. — Bras.
Lasseauxii, Hort. ex *Gartenfl. xlv.* (1895) 625 = *Ageratum Lasseauxii, Carr.*
l. malacophyllum....; et in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* ix. (1892) 125.

EUPHORBIA

- 166³ a. *angustifrons* X, Borb. in [Magyar homokpusz. Növényv. (1886) 30, 96, 101] ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 400. — Hung.
167¹ a. dissimilis, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 336. — Ins. Borbon.
esuloides, *Velen. in Abh. Böhm. Ges. Wiss.* vii. Folge, i. (1886) n. 8, 39. — Bulg.
167² a. jaliscensis, *Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 392. — Mexic.
l. Normanni, *Schmalh. ex Lipski, in Mém. Soc. Natur. Kiev*, xi. (1891) 57; et...
nuda, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 506. — Bulg.
167³ a. perfoliata, *Scheutz, Pl. vasc. Jenissens.* (1888) 158. — Sibiria.
168¹ a. variegata, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 198. — Arabia.

EUPHRASIA

- 168² a. mixta, *Gremli, Excurs. Fl. Schweiz.* ed. 7 (1893) 318, in obs. = alpina, *Lam.*

EURYA

- 168³ a. vitiensis, *Hort. Dammann, ex Gartenfl.* xxxvi. (1887) 130. — Ins. Fiji.
169¹ a. EUTHAMIA, Ell. = *Solidago*, *Vaill.* (Compos.).
caroliniana, *Greene, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 321 = *S. tenuifolia, Pursh.*
leptocephala, *Greene, l. c.* = *S. leptocephala, Torr. & Gray.*

EVODIA

- 169² a. anisata, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 130 (= *Pelea acuminata*, H. Mann). — Ins. Sandvic.
Aubertia, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 367 (= *Zanthoxylum Aubertia, DC.*). — Ins. Borbon.
auriculata, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1886) 19, 130, t. 4; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 27 (= *Melicope auriculata*, *Nadeaud*). — Ins. Tahit.
barbigera, *Drake, l. c.* (= *Melicope barbigera*, A. Gray). — Ins. Sandvic.
brachiata, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 368. — Ins. Borbon.
brachiata, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 131; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 26. — Ins. Pacif.
cinerea, *Drake, l. c.* (= *Melicope cinerea*, A. Gray). — Ins. Sandvic.
clusiaefolia, *Drake, l. c.* (= *Clusia sessilis*, Hook & Arn.). — Ins. Pacif.
elliptica, *Drake, l. c.* (= *Melicope elliptica*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

EVODIA

- 169² a. emarginata, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 20, 132, t. 5; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 26. — Ins. Pacif.
kavaiensis, *Drake, l. c.* (= *Pelea kavaiensis*, H. Mann). — Ins. Sandvic.
Kundseni, *Drake, l. c.* (= *P. Kundseni*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.
Lepinei, *Baill. ex Drake, l. c.* 22, 113, t. 6 = *brachiata, Drake.*
Lydgatei, *Drake, l. c.* 132 (= *Pelea Lydgatei*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.
macropus, *Drake, l. c.* (= *P. macropus*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.
Mannii, *Drake, l. c.* (= *P. Mannii*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.
molokaiensis, *Drake, l. c.* (= *P. molokaiensis*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.
Nadeaudi, *Drake, l. c.*; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 27. — Ins. Pacif.
nodulosa, *Drake, l. c.* 17, t. 3 = *E. Nadeaudi, Drake.*
oblongifolia, *Drake, l. c.* 132 (= *Pelea oblongifolia*, A. Gray). — Ins. Sandvic.
orbicularis, *Drake, l. c.* 133 (= *P. orbicularis*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.
pallida, *Drake, l. c.* (= *P. pallida*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.
parvifolia, *Drake, l. c.* (= *P. parvifolia*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.
rotundifolia, *Drake, l. c.* (= *P. rotundifolia*, A. Gray). — Ins. Sandvic.
sandvicensis, *Drake, l. c.* (= *P. sandvicensis*, A. Gray). — Ins. Sandvic.
sapotaefolia, *Drake, l. c.* (= *P. sapotaefolia*, H. Mann). — Ins. Sandvic.
segregia, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 368. — Ins. Borbon.
sericea, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1886) 15, 132, t. 2 = *E. Nadeaudi, Drake.*
simplex, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 368. — Ins. Borbon.
volcanica, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 134 (= *Pelea volcanica*, A. Gray). — Ins. Sandvic.
Waialealae, *Drake, l. c.* [Waialealae] (= *P. Waialealae*, Wawra). — Ins. Sandvic.

EVOLVULUS

- 169² a. yemensis, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 175. — Yemen.

F**FAGUS**

- 170¹ a. *rotundifolia*, Hort. ex *Gard. Chron.* (1894) i. 762 = *sylvatica, Linn.*

FARAMEA

- 170² a. coussaroides, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 375. — Bras.

FAUJASIA

- 170² a. ambavilloides, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 545. — Ins. Borbon.
fontinalis, *Cordem. l. c.* 544. — Ins. Borbon.

FERULAGO

- 171¹ a. confusa, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 204. — Bulg.

FESTUCA

- 171¹ a. *saxifraga*, *Miégev. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. xxxviii = *duriuscula, Linn.*
singularis, *Bordère & Miégev. l. c.* p. xxxvii — *Pyren. gall.*
surculosa, *Miégev. l. c.* p. xxxvi = *violacea, Gaudin.*

FICARIA

- 172¹ l. *pumila*, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1887 (1888) 438 = *R. Ficaria, Linn.*
ranunculiflora, « Moench » ex St-Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd. 8* (1889) 13, sphalm. = *R. Ficaria, Linn.*

FICINIA

- 172² a. varia, *Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. (1888) 47. — Afr. austr.

FICUS

- 172² a. acidula, *King, in Ann. Bot. Gard. i.* (1888) 176, t. 223. — Borneo.
araneosa, *King, l. c.* 136, t. 170. — Penins. Mal.
l. ardisioides... xx. (1894) adde : 171.
a. arfakensis, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi.* (1887) II. 63; et in *Ann. Bot. Gard. Calc. i.* (1888) 104, t. 133. — N. Guin.
aruensis, *King, l. c.* 175, t. 176. — Ins. Aru.
Beccarii, *King, l. c.* 102, t. 130. — Borneo.
Beddomei, *King, l. c.* 26, t. 24. — Ind. or.
bhotanica, *King, l. c.* 75, t. 205 b. — Ind. or.
brachiata, *King,...*; et *l. c.* 106, t. 136. — Sumatra.
Clarkei, *King, l. c.* 175, t. 221. — Ind. or.
comitis, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi.* (1887) II. 63; et *l. c.* 156, t. 197. — N. Guin.
cinerea, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 272. — Ins. Borbon.
condensa, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc. i.* (1888) 113, t. 149. — Borneo
conglobata, *King, l. c.* 99, t. 123. — Ind. or.
conora, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi.* (1887) II. 62; et *l. c.* 103, t. 131. — N. Guin.
conspicabilis, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi.* (1887) II. 61; et *l. c.* 80, t. 99. — N. Guin.
l. *crassipes...*; et *Syn. Queensl. Fl. Third Suppl.* (1894) 69.
a. *cucurbitina*, *King, l. c.* 22, t. 17. — Borneo, Celebes.
cycloneura, *King, l. c.* 31, t. 32 (= *Urostigma cycloneuron*, *Miq.*). — Sumatra, Borneo.
D'Albertsii, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi.* (1887) II. 64; et *l. c.* 172, t. 216. — Sumatra, N. Guin.
172³ l. *damarensis...* x. (1888) [non (1886)].
a. *dimorpha*, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc. i.* (1888) 111, t. 145 b. — Sumatra.
dumosa, *King, l. c.* 151, t. 190. — Sumatra.
duriuscula, *King, l. c.* 155, t. 195. — N. Guin.
Elliotiana, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 472. — Bras.
excavata, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc. i.* (1888) 127, t. 115 b. — Borneo, Penins. Mal.
flavovenia, *Warb. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 158. — Afr. trop.
Forbesii, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc. i.* (1888) 109, t. 143. — Sumatra.
grandis, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi.* (1887) II. 64; et *l. c.* 170, t. 214. — N. Guin.
Hemsleyana, *King, l. c.* 112, t. 146. — Borneo.
Henrici, *King, l. c.* 174, t. 220. — Sumatra.
hypogoea, *King, l. c.* 100, t. 125. — Sumatra
juglandiformis, *King, l. c.* 28, t. 27. — Sumatra.
Kurzii, *King, l. c.* 47, t. 57. — As. trop.
Lowii, *King, l. c.* 32, t. 33. — Penins. Mal.
lucens, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 273. — Ins. Borbon.
l. *mabifolia...* (non *malifolia*).
a. *macilenta*, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc. i.* (1888) 156, t. 196. — Borneo.
Maclellandi, *King, l. c.* 52, t. 64. — Pegu.
macrocarpa, *King, l. c.* 166, t. 208 (= *Pogonotrophe macrocarpa, Miq.*). — Ind. or.
mespiloides, *King, l. c.* 83, t. 105. — N. Guin.
Miquelii, *King, l. c.* 106, t. 137. — As. trop.
Mooniana, *King, l. c.* 57, t. 69. — Zeylan.
Moseleyana, *King, l. c.* 144, t. 181. — Ins. Key.
natalensis, *Krauss, ex Engl. Bot. Jahrb.* x. (1888) 5 (= *Urostigma natalense, Miq.*). — Afr. austr.
negrescens, *King, l. c.* 78, t. 95 c. — Ind. or.
obpyramidata, *King, l. c.* 116, t. 153. — Perak.
Odoardi, *King, l. c.* 156, t. 198. — N. Guin.
oleaeifolia, *King, l. c.* 160, t. 204 b. — Sumatra.
pachyphylla, *King, l. c.* 32, t. 34. — Borneo.
pauper, *King, l. c.* 161, t. 204 a. — N. Guin.

FIGUS

- 1723 a. *Schefferiana*, King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* i. (1888) 152, t. 192. — Sumatra.
Scortechinii, King, l. c. 112, t. 147. — Perak.
singalana, King, l. c. 70, t. 91. — Sumatra.
soronensis, King, l. c. 161, t. 205 a. — N. Guin.
sororia, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 270. — Ins. Borbon.
stipata, King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* i. (1888) 109, t. 142. — Sumatra.
stolonifera, King, l. c. 104. — Borneo.
Swinhoei, King, l. c. 81, t. 101 c. — Formosa.
Talboti, King, l. c. 51, t. 63. — Canara.
travancorica, King, l. c. 28, t. 26. — Ind. or.
Treubii, King, l. c. 105, t. 134. — Borneo.
- 1731 l. *triangularis*... 174 (non 170).
 a. *vaccinioides*, Hemsl. & King, ex King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* i. (1888) 126, t. 159 a. — Formosa.

FLUCGEA

- 1742 l. *nitida*... 77 (non 7').

FOUQUIERIA

- 1753 l. a. *columnaris*, Kellogg, in *Bull. Calif. Acad.* i. (1885) 133; T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. 2*, ii. (1889) 132 (= *Idria columnaris*, Kellogg). — Am. bor.

FRITILLARIA

- 1753 l. *Stribrnyi*... 1893 (1894) n. xxxvii. 61 (non [1892-93] 61).

FUCHSIA

- 1753 l. *Glazioviana*... 10 (non 16).
 a. *magniflora*, Hort. Williams, Cat. (1885) 9. — Form. hort.
Riccartoni, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1884) 139 = *Riccartoniana*, Hort.

FUIRENA

- 1753 a. *Buchanani*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 20. — Afr. trop. or.

G**GAHNIA**

- 1762 a. *articulata*, F. Muell. Key Syst. Vict. Pl. i. (1888) 456 (= *Cladium articulatum*, R. Br.). — Austral.
filum, F. Muell. l. c. (= *C. filum*, R. Br.). — Austral.
glomerata, F. Muell. l. c. (= *C. glomeratum*, R. Br.). — Austral.
Gunnii, F. Muell. l. c. (= *C. Gunnii*, Hook. f.). — Austral.
juncea, F. Muell. l. c. (= *C. junceum*, R. Br.). — Austral.
schoenoides, F. Muell. l. c. (= *C. schoenoides*, R. Br.). — Austral.
triquetra, F. Muell. l. c. — Austral.

GALACTIA

- 1763 a. *Whitehornii*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 344. — Bras.

GALANTHUS

- 1763 a. *grandiflorus*, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 656 (= *G. maximus*, Baker). — Hab. ?
umbroicus, Hort. Dammann, Cat. (1889) 4 = *nivalis*, Linn.

GALIMUM

- 1773 a. *mesocarpon*, Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 67 = *boreale*, Linn.
praecox, Kern. l. c. 78 = *verum*, Linn.
polonicum... 188 (non 189).
rhodopeum... 1893 (1894) [non 1892-93].

GALIMUM

- 1773 a. *umbellulatum*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 37 = *anisophyllum*, Vill.
vogesiaceum, F. Gérard, in Magnier, Scrin. fl. select. xiii. (1894) 323. — Gall. or.

GASTRODIA

- 1791 a. *Dyeriana*, King & Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng. lxiv.* (1895) ii. 342. — Sikkim.

GAYLUSSACIA

- 1792 a. *cinerea*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 511. — Bras.

GENISTA

- 1801 a. *daurica*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 115 = *purgans*, Boiss.
dumetorum, Hort. l. c. 111 = *tinctoria*, Linn.
 1802 a. *Oweniana* X, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 342. — Hybr. artef.
 l. *rhodopea*... 1893 (1894) n. xxxvii. 20 (non [1892-93] 20).
rumelica...; et Fl. Bulg. (1891) 125.
 a. *thyrsiflora*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 111 = *tinctoria*, Linn.

GENTIANA

- 1803 l. *bulgarica*... 1887 (1888)... (non 1886).
cyananthiflora... (non *cynanchiflora*)
Favrati, Rittener, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxii. (1886) 95; et...
 1811 a. *lingulata*, Murb. in Act. Hort. Berg. ii. n. 3 (1892) 22. — Europ.
 l. *lutescens*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 29; et...

GEONOMA

- 1813 a. *Herbstii*, Hort. ex The Garden, xxxv. (1889) 463. — Hab. ?
intermedia, Hort. Williams, Cat. (1882) 27. — Hab. ?
tenuifolia, Hort. ex Ill. Hortie. xlii. (1895) 186. — Peruv.

GERANIUM

- 1821 a. *andinum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 727. — Chili.
caespitosum, Phil. l. c. 730. — Chili.
ciliatum, Phil. l. c. 727. — Chili.
hispidum, Phil. l. c. 732. — Chili.
Moorei, Phil. l. c. 728. — Chili.
squamosum, Phil. l. c. 733. — Chili.
umbelliforme, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 443; et...

GILIA

- 1823 l. *Johowi*... 266 et 291.
 a. *Matthewsii*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ed. 2. ii. i. suppl. (1886) 409 (= *Loeselia Matthewsii*, A. Gray). — Am. bor.

GLADIOLUS

- 1831 a. *armeniaca*, J. N. Gerard, in Gard. and For. v. (1892) 318. — Armen.
 1832 a. *Elloni*, Hort. ex Wien. Ill. Gartenzeit. xv. (1890) 36. — Afr. austr.

GLAPHYRIA

- 1833 a. *Annae*, Stein, in Gartenfl. xxxiv. (1885) 67, in obs. = *Leptospermum Annae*, Stein.

GLEDISTCHIA

- 1841 a. *macrantha*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 129 = *sinensis*, Lam.
macrosperma, Hort. l. c. = *sinensis*, Lam.

GLOBULARIA

- 1842 l. *fuixensis* X, Giraudias, in Bull. Soc. étud. sci. Angers. xviii. 1888 (1889) 53; et...
Galisteri X, Giraudias, l. c. 52; et...

GNAPHALIMUM

- 1852 a. *balcanicum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 275. — Bulg.
sarmentosum, Klatt, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt. x. (1893) 126. — Mexic.

GNIDIA

- 1853 l. *dichotoma*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 264; et...
 1861 l. *macrorrhiza*... 260 (non 264).
stenophylla... 258 (non 259).

GODETIA

- 1861 a. *Heuchti*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 743. — Chili.

GOMPHOCARPUS

- 1863 l. *aureus*... 17 (non 7).
involutus... 19 (non 8).
validus... 20 (non 23).

GOMPHRENA

- 1871 a. *Mariae*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 444. — Bras.

GONGORA

- 1871 a. *Charlesworthii*, Rolfe, in Orchid Rev. i. (1893) 198; Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 407. — Hab. ?

GOODYERA

- 1873 a. *Dominii* X, Hort. ex Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 410. — Hybr. artef.
Hemsleyana, King & Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 342. — Sikkim.
 1881 l. *Rodigasiana*... (non *Rodigasiana*).
 a. *Rollissoni*, Hort. Gower, ex Williams, Orch. Grow. Man. ed. 6 (1885) 336; ed. 7 (1894) 411. — Malaya.
Veitchii X, Hort. ex Williams, l. c. 412. — Hybr. artef.

GOSSYPIUM

- 1881 a. *Comesii*, Sprenger ex Bull. Soc. Tosc.ortic. xiv. (1883) 308 t. 10. — Hab. ?

GOTHOFREDA

- 1882 a. *gracilis*, Rusby...; Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 161.
oblongifolia, Rusby...; Morong, l. c. 160.

GRAMMATOPHYLLUM

- 1882 l. *Guillemi* II... (non *Guillemi*...).
 a. *Measuresianum*, Sander, in Gard. and For. ii. (1889) 524; et ex Journ. of Hort. xxiii. (1891) 342 fig. 69. — Ins. Philipp.
Sanderianum, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 15, sphalm. = *speciosum*, Blume.

GRAPTOPHYLLUM

- 1883 a. *picturatum*, Hort. Bull. Cat. new Pl. (1895) 7 = *hortense*, Nees.

GREWIA

- 1891 a. *antidesmaefolia*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 113. — Perak.
 l. *ambongoensis*... (non *ambongoensis*).
astropetala... t. 161 (non t. 160).
Bakeriana... 558 (non 559).
 a. *Boivini*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 559. — Madag.
 1892 l. *chalybaea*, Baill. l. c. 559; et...
comorensis... i. (1886) 558 (non i. 1885).
Richardiana... 558 (non 358).
trifolia... 557 (non 587).

GRISELINIA

- 1893 l. *scandens*, .. (1892) 391 (non [1893] 398).

GUAREA

- 1902 a. *rubricalyx*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 336. — Bras.
sylvestris, S. Moore, l. c. 325. — Bras.

GUATTERIA

- 1902 a. *sylvicola*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 298. — Bras.

GUETTARDA

- 1902 a. *hirsuta*, Sarg. N. Am. Sylv. v. (1893) 111 = *speciosa*, Linn.

GUETTARDA

- 190² a. *matogrossensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 372. — Bras.

GUIDONIA

- 190² a. *gelonioides*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 567. — Madag.
grandis, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 205. — Perak.
imbricata, King, l. c. 2 4. — Perak.
lucida, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 567 (= *Casearia lucida*, Tul.). — Madag.
multinervis, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 205. — Perak.
 1. *nigrescens*... 567 (non 561).
 a. *Scortechinii*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 204. — Perak.

GUNNERA

- 190³ a. *laxiflora*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 750. — Chili.

GYMNOSPORIA

- 191³ a. *alaternifolia*, Loesen. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 550 (= *Catha alaternifolia*, Tul.). — Ins Comor.
ambonensis, Loesen. l. c. xix. (1894) 231. — Afr. trop. or.
arbutifolia, Loesen. l. c. xvii. (1893) 547 = *Celastrus arbutifolius*, Hochst.
Atkaio, Loesen. l. c. = *Celastrus Atkaio*, Rich.
brevipetala, Loesen. l. c. 546. — Afr. trop. or.
Eminiana, Loesen. l. c. 543. — Afr. trop. or.
Engleriana, Loesen. l. c. 547. — Abyss.
evonymoides, Loesen. l. c. = *Celastrus evonymoides*, Wedw.
filamentosa, Loesen. l. c. 545. — Afr. trop.
Fischeri, Loesen. l. c. 543. — Afr. trop.
 1. *gracilipes*, Loesen. l. c. 541; et...
 a. *gracilis*, Loesen. l. c. 545. — Zanzib.
Grossularia, Loesen. l. c. 543 (= *Catha Grossulariae*, Tul.). — Madag.
huillensis, Loesen. l. c. 548 = *huillensis*, Szyszyl.
lancifolia, Loesen. l. c. = *Celastrus lancifolius*, Thoms.
laurifolia, Loesen. l. c. = *C. laurifolius*, A. Rich.
lepidota, Loesen. l. c. 549. — Afr. trop.
leptopus, Loesen. l. c. 548 (= *Catha leptopus*, Tul.). — Madag.
luteola, Loesen. l. c. = *luteola*, Szyszyl.
meruensis, Loesen. l. c. 549. — Afr. trop.
mossambicensis, Loesen. l. c. 547 = *Celastrus mossambicensis*, Klotzsch.
obscura, Loesen. l. c. 546 = *obscura*, Engl.
peduncularis, Loesen. l. c. 549 = *C. peduncularis*, Sond.
 1. *putterlickioides*, Loesen. l. c. 544; et...
 a. *senegalensis*, Loesen. l. c. 541 = *Celastrus senegalensis*, Lam.
Zeyheri, Loesen. l. c. 548 = *Zeyheri*, Szyszyl.

GYPSOPHILA

- 192² a. *chilensis*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 761. — Chili.

H**HABENARIA**

- 192³ 1. *arietina*...; et in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. I (1895) 64, t. 97.
 193¹ a. *Biermanniana*, King & Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 343. — Sikkim.
 1. *Culveri*... 14 et 32.
 a. *Cumminsiana*, King & Pantling, l. c. — Sikkim.
 193³ 1. *Helferi*...; et in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. I. (1895) 66, t. 100.

HABENARIA

- 193² 1. *latilabris*...; et l. c. 67, t. 101.
Lecardii... (non Lecardi).
Montolivaea... 176 (non 172).
transvaalensis... 6 et 32.

HAEMANTHUS

- 194³ a. *candidus*, Hort. *Bull. Cat. new Pl.* (1894) 3. — Transvaal.
Clarkei ×, W. Wats. ex *Gard. Chron.* (1894) ii 398. — Hybr. artef.
 195³ a. *HANBURYOPHYTON*, Bureau, ex Warm. Symb. fl. Bras. centr. xl. (1893) 1226 = *Petastoma*, Miers (Bignon.).
xanthinum, Bureau, l. c. — Bras.

HARPALYCE

- 196² a. *speciosa*, Taub. ex Ule, in *Cruds, Comm. expl. plat. centr. Brésil* (1894) 356; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1896) 435. — Bras.

HARPULLIA

- 196³ 1. *camptoneura*...; et in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 365.
frutescens...; et *Syn. Queensl. Fl.* Third Suppl. (1890) 17.

HEDERA

- 197² a. *coriacea*, Hort. ex Handl. *Trees Kew*, Pt i. (Polypet.) 247 = *H. Helix*, Linn.
digitata, Hort. l. c. 245 = *H. Helix*, Linn.
 197³ a. *latifolia*, Hort. l. c. 247 = *H. Helix*, Linn.
marginata, Hort. l. c. 243 = *H. Helix*, Linn.
minor, Hort. l. c. 245 = *H. Helix*, Linn.
rhomboides, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.

HEDYOTIS

- 198¹ a. *psychotrioides*, F. Muell. in *Vict. Natural.* vi. (1889) 54; F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl.* Third Suppl. (1890) 33. — Austral.

HEISTERIA

- 198² a. *rubricalyx*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 337. — Bras.

HELEOCHARIS

- 198³ a. *alta*, Boeck. *Cyper. nov.* i. (1888) 17. — Java.
Archavaletae, Boeck. l. c. — Uruguay.
aurea, Boeck. l. c. 15. — Mexic.
exilis, Boeck. l. c. 16. — Mexic.
glauco-virens, Boeck. l. c. 13. — Bras.
 1. *Kuntzei*, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 14 (non l. c. 14).
 a. *mesopotamica*, Boeck. l. c. 17. — Reg. Argent.
Niederleini, Boeck. l. c. 13. — Reg. Argent.
quingularis, Boeck. l. c. 15. — Reg. Argent.
Sintenisii, Boeck. l. c. 16. — Ins. Portorico.
Tuerkheimii, Boeck. l. c. — Guatem.
univaginata, Boeck. l. c. 14. — Chili.
viridis, Boeck. l. c. 17. — Bras.
Wrightiana, Boeck. l. c. 12. — Cuba.

HELIANTHEMUM

- 199¹ a. *Aldersonii*, Greene, in *Erythra*, i. (1893) 259. — Calif. [err. cal. sub *Helianthella indic.*].

HELIANTHUS

- 199² a. *lenticularis*, Hort. ex *Gartenfl.* liii. (1894) 104 fig. 25. — Am. bor.

HELICIA

- 199³ a. *Cameronii* F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict.* New Ser. I. ii. (1889) 7. = N. Guin.
Whelani...; et *Syn. Queensl. Fl.* Third Suppl. (1890) 61.

HELICTERES

- 200¹ a. *chapadensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 316. — Bras.
orthotheca, S. Moore, l. c. 317. — Bras.

HELLEBORUS

- 200³ 1. *siculus*, Schiffn. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 116; et ..

- 200³ 1. **HELLWIGIA**... 279 et 451.
pulchra... 279 et 451.

HELONIOPSIS

- 201¹ a. *umbellata*, Hort. ex in *Gard. Chron.* (1887) i. 711, sphalm. = *japonica*, Maxim.

HEMIGRAPHIS

- 201¹ a. *colorata*, Hort. *Bull. Cat.* (1885) 14. — Ind. or.
 201³ 1. *HENRYA*, Hemsl. = **Neohenrya**, Hemsl.

HEPATICA

- 201³ a. *Hepatica*, Britton, in *Am. N. Y. Acad. sci.* vi. (1891) 233 = *A. Hepatica*, Linn.

HERACLEUM

- 202¹ 1. *Baillietianum*... = *H. Sphondylium*, Linn.
 a. *carpaticum*, Porcius, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. xiv. (1892) 1 9. — Eur. centr.
Freynianum, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1895) 43, nomen: et in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 81. — Reg. Cauc.
isopetalum, Maxim. *Dec. pl. Asiat.* viii. (1893) 2. — Japon.
juranum, Genty, in *Magnier, Scrin. fl. select.* v. (1886) 101 (= *H. alpinum*, Auct.). — Jurass.
micranthum, Borb. *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887) 236 = *H. Sphondylium*, Linn.
Mantegazzianum, Somm. & Levier, in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 79. — Reg. Cauc.
pachyrhizum, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1895) 43; et l. c. 82. — Reg. Cauc.
 1. *ternatum*...; et *Fl. Bulg.* (1891) 202.
verticillatum, Panic. *Elem.* (1886) 25; Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 21; et...

HERITIERA

- 202¹ a. *augustata*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 13 (1889) t. 204. — Cochinch.

HERMANNIA

- 202¹ 1. *cristata*, Bolus [non Baker].

HERPESTIS

- 202³ a. *acuta*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 407. — Bras.
parvula, S. Moore, l. c. 406. — Bras.

HESPERIS

- 203¹ 1. *desertorum*... 1893 (1894) n. xxxvii. 7 (non 1892-93) 7.

- 203³ a. **HETEROCROTON**, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 461. **EUPHOR-BIACEAE.**
mentis, S. Moore, l. c. t. 29. — Bras.

HETEROPTERIS

- 204¹ 1. *amplexicaulis*... 66 (non 67).
 204² a. *nudicaulis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 325. — Bras.

HEUCHERA

- 204² a. *rosea* ×, Hort. ex Möller, *Deutsche Gartenzeit.* (1893) 2. — Hybr. artef.

HIBISCUS

- 204³ a. *cernuus*, Terrac. in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 422. — Reg. Somal.
decaspermus, Koerd. & Valet. *Boomsort. van Java*, ii. (1895) 115. — Java.
 1. *Engleri*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* x. (1880) 47 (non l. c.).
lasiocarpus, S. Wats. in *Gard. and For.* (1888) 425, fig. 68. — Am. bor.
Mesnyi...; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 11 (1888) t. 172. — Cochinch.

HIERACIUM

- 206² a. *Blochii* X, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyj. Krakow, xxi. (1888) 127. — Hung.
- 207² l. *Delpinii*, Bald, *Cenni ed. App. ecc.* 75; et ex *Malpighia*, v. (1891) 76, et vii. (1893) 279; et...
- 209³ a. *Montegazzianum*, *Somm. & Levier*, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1895) 43, nomen. — Reg. Cauc.
- Mureti, *Gremli*, *Excurs. Fl. Schweiz*, ed. 6 (1889) 290, ed. 7 (1893) 274. — Helv.
- 210¹ a. *paradoxum*, *Gremli*, l. c. ed. 7 (1893) 272. — Helv.
- pocuticum* X, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyj. Krakow, xxi. (1888) 129. — Hung.
- poecilostictum*,...; et in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 23 = *negrescens*, *Willd.*
- 210³ a. *praeteneriforme*, *Almq. ex Dahlst.* l. c. 40. — Scand.
- Pseudoalbidum*, *Celak. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1885 (1886) 8. — Eur. centr.
- Pseudocorymbosum*, *Gremli*, *Excurs. Fl. Schweiz*, ed. 6 (1889) 292, ed. 7 (1893) 282. — Helv.
- Pseudoligusticum*, *Gremli*, l. c. ed. 7 (1893) 277. — Helv.
- 211¹ a. *Pseudostygium* X, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyj. Krakow, xxi. (1888) 128. — Hung.
- Purkynei*, *Celak. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1885 (1886) 8. — Eur. centr.
- Rehmanni* X, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyj. Krakow, xxi. (1888) 128. — Hung.
- ruberulum*, *Dahlst.* in *K. Svensk. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 233 = *rigidum*, *Hartm.*
- secundum*, *Freyn*, in *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 352. — Bulg.
- Skorpili*, *Freyn*, l. c. 339. — Bulg.
- 211³ a. *splendens* X, A. Kern. [ubi?] ex *Bruegg.* in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. 1884-85 (1886) 87. — Helv.
- 212¹ a. *subsimplex*, *Somm. & Levier*, in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 94. — Reg. Cauc.
- svaneticum*, *Somm. & Levier*, l. c. 92. — Reg. Cauc.
- HIPPOCRATEA**
- 213³ l. *Rowlandii*,... 236 (non 238).
- Stuhlmanniana*,...; et in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 235.
- Volkensii*,... 237 (non 238).

HIPPOCREPIS

- 213³ l. *fruticosa*,... (non *fruticosa*).

HIPPOMARATHRUM

- 213³ a. *pungens*, *Lojac. Fl. Sicula*, i. II. (1891) 285 = *Cachrys pungens*, *Jan.*

HIPTAGE

- 213³ d. *macrocarpa*, *parvifolia* et *pulcherrima* (sp. ad **HIRAEAM**, transfer.).

HIRAEA

- 214¹ a. *nitens*, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 328. — Bras.
- parvifolia*, *Niedenau*, in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 30 (1891) 2. — Bras.
- volubilis*, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 328. — Bras.

HIRSCHFELDIA

- 214¹ l. *consobrina*,... (non *consobuna*).
- incana*, *Burnat*, *Fl. Alp. Marit.* i. (1892) 76 = *incana*, *Moench.*

HIRTELLA

- 214¹ a. *collina*, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 351. — Bras.

- 215² a. *HOMALOSTACHYS*, *Boeck. Cyp. Nov. i.* (1888) 37 = *Carex* [Dill.] *Linn. (Cyper.)*.
- sinensis*, *Boeck. l. c.* 38 = *C. moupinensis*, *Franch.*

- 214³ l. *HOOKERA*, transferetur post *HOOKE-RELLAM* in pag. 215³.

- 215² **HORMOLOTUS**, transferetur post **HORKELIAM** in pag. 216.

HORTENSIA

- 216¹ a. *nigra*, *Carr.* in *Rev. Hortic.* (1880) 180 = *H. Hortensia*, *DC.*

HOSACKIA

- 216² a. *Mearnsii*, *Britton*, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* viii. (1889) 65 = *Lotus Mearnsii*, *Britton.*

HOUSTONIA

- 216² l. *J. N. Rose* (non *N. E. Rose*, passim).

HUFELANDIA

- 216³ a. *Taubertiana*, *Schwacke & Mez*, ex *Mez*, in *Arb. Königl. Bot. Gart. Breslau*, i. (1892) 108 — Bras.

- 217² l. **HUTERA**, *Porta*,... 293 = **Coincya**, *Rouy* (*Crucif.*).
- rupestris*,... = *C. rupestris*, *Rouy.*

HYACINTHELLA

- 217² a. *leucophaea*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 553 = *Hyacinthus pallens*, *Roem. & Schult.*
- longiloba*, *Velen. l. c.* 554. — Bulg.
- rumelica*, *Velen. l. c.* — Rumel.

HYDRILLA

- 218¹ a. *verticillata*, *F. Muell. Key Syst. Vict. Pl. i.* (1888) 423. — Austral.

HYDROCOTYLE

- 218¹ a. *Candollei*, *F. Muell. Key Syst. Vict. Pl. i.* (1888) 267. — Victoria.

HYDROSME

- 218² l. *sparsiflora*,... 461 (non 462).

HYMENOCARDIA

- 218³ l. *Poggei*,... 328 (non 329).

HYPECOUM

- 219¹ l. *ponticum*,... 1893 (1894) n. xxxvii. 6.
- Pseudo-grandiflorum*, *Petrov. in Magnier, Scrin. fl. select.* v. (1886) 99. — Serbia.

HYPERICUM

- 219¹ a. *apterum*, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1887 (1888) 443; et *Fl. Bulg.* (1891) 104. — Bulg.
- balcanicum*, *Velen. l. c.* 106. — Bulg.
- Borbasi*, *Formanek*, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxix. 1890 (1891) 143. — Aetolia.
- Cuisini*, *Barbey*, in *Bull. Soc. Vaud. sci. nat.* xxi. (1885) 220; et *Karpathos* (1895) 99, t. 3. — Ins. Karpathos.
- 219¹ l. *haplophyllodes*, *Haldes & Baldacci*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, (1892) 576; et in *Malpighia*, viii. (1894) 166. — Eur. centr.
- Kellerii*, *Baldacci*, in *Malpighia*, ix. (1895) 67. — Ins. Creta.
- 219² l. *Stuebelii*,... 321 (non 320).

HYPOCHAERIS

- 219³ l. *cupressorum*,... (non *cupressarum*).
- a. *Pelivanovici*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 361. — Bulg.
- thermarum*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 323. — Chili.

HYPOESTES

- 220¹ a. *radicans*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 183. — Arabia.

HYPOLYTRUM

- 220¹ a. *Buchholzianum*, *Boeck. Cyp. Nov. i.* (1888) 22. — Kamerun.
- heterophyllum*, *Boeck. l. c.* 22. — Kamerun.
- Kuntzeanum*, *Boeck. l. c.* 23. — Panama.
- microstachyum*, *Boeck. l. c.* — Bras.

HYPTIS

- 220² a. *effusa*, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 441. — Bras.
- Seemannii*,... (non *Seemannii*).

HYPTIS

- 220² a. *penaeoides*, *Taub. ex Ule, in Cruls, Comm. Plat. centr. Brasil* (1894) 357; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1896) 450. — Bras.

I**ILEX**

- 221¹ l. *eugeniaefolia*,... t. 278 A (non t. 278 D).
- excavata*,... t. 279 B (non t. 278 A).
- mitis*, *Radlk. in Rep. Brit. Assoc.* 1885 (1886) 1081. et...
- Riedlaei*,... adde: 317.
- 221² l. *Wrightii*,... 322 (non 328).

IMPATIENS

- 221³ l. *auricomae*,... t. 7381 (non 738).
- a. *Episcopi*, *Veitch, Catal.* (1886) 12 = *I. Sultani*, *Hook. f. var.*
- Micholitzii*, *Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xvii. (1892) 342. — N. Guin.

INGA

- 222³ a. *Sanctae-Annae*, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 350. — Bras.

IONIDIUM

- 223¹ a. *lacteam*, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 307. — Bras.
- Lehmannii*,... xx. *Beibl. n.* 49 (1895) 57 (non *Beibl.* 57).

IPHIGENIA

- 223¹ l. *Oliveri*,... 467 (non 466).

IPOMOEA

- 223² l. *asperifolia*,... 128 (non 125).
- Brousoni*, *J. N. Gerard*, in *Gard. and For. v.* (1892) 345. — Cuba.
- crinicalyx*, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 202. — Bras.
- 223³ a. *gossypina*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 174. — Arabia.
- Hackeliana*,... 126 (non 12).
- Kerberii*, *Hort. ex Bull. Soc. Tosc.ortic.* xix. (1894) 116 fig. 32 (= *Quamoclit Kerberii*, *Fourn.*). — Am. austr.
- 224¹ l. *Morongii*, *Britton* [non *Britten*].
- 224² a. *uniflora*, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 244 = *martinicensis*, *G. F. W. Mey.*

IRIS

- 225² a. *Agatha* X, *Hort. ex The Garden*, xlv. (1894) 157. — Hybr. artef.
- argentea*, *Hort. ex Rev. Hortic.* lxiii. (1891) 36, cum ic. = *xiphioides*, *Ehrh.*
- Cosniae*, *Hort. ex The Garden*, xlvii. (1895) 351. — Hab. ?
- Madonna*, *Hort. Sprenger, ex Bull. Soc. Tosc.ortic.* xvii. (1892) 130. — Arabia.
- 225³ a. *Skorpili*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 535. — Bulg.
- suaveolens*, *Terrac. in Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. i. (1894) 182. — Italia.
- Suworowi*, *Regel, in Gartenfl.* xxxv. (1886) 397; et in *Bot. Mag.* (1888) t. 7029 [Suwarowi]. — As. centr.

ISACHNE

- 226¹ a. *filifolia*, *Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 340. — Congo gall.
- nervata*, *Franch. l. c.* — Gabon.

ISCHNOSIPHON

- 226² a. *argenteus*, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 485. — Bras.
- concinus*, *S. Moore, l. c.* 484. — Bras.
- memorosus*, *S. Moore, l. c.* 483. — Bras.

- 227¹ a. **ISOPHYLLUM**, *Spach* = **Ascyrum**, *Linn. (Hypericin.)*.
- pellatum*, *Franch. in Ann. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 190 t. 4. — Tibet.

IXIOLIRION

- 227² a. *Sintenisii*, *Hort. Leichtlin*, ex *Wien. Ill. Gart. Zeit.* xvii (1892) 346. — Hab. ?

ISONANDRA

- 227¹ a. *polynesiaca*, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 229 (= *Chrysophyllum polynesianum*, Hillebr.). — Ins. Pacif.

IXONANTHES

- 227² a. *cochinchinensis*, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 18 (1893) t. 284 A. — Cochinch.

IXORA

- 227³ a. *conspicua*, *Bull. Cat. new Pl.* (1886) 8. — Hab. ?
salmonae, *Bull. Cat. new Pl.* (1892) 3. — Form. hort.

J**JACARATIA**

- 228¹ l. *Solmsii*... (1892) (non 1898).

JACOBINIA

- 228² a. *stellata*, *Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxix, (1894) 390. — Mexic.

- 228³ a. **JAEGERIA**, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1247.
discoidea, *Klatt, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* x. (1893) 126. — Costa Rica.

- 228³ a. **JANSENIA**, *Rodr. Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 124. **ORCHIDEAE**.
cultrifolia, *Rodr. l. c.* — Bras. bor.

JASMINUM

- 229¹ l. *elegans*... 538 (non 534).
gratissimum, *Defflers, Voy. au Yémen* (1889) 162. — Arabia.
229² l. *parvifolium*... 537 (non 531).

JULOCROTON

- 230¹ a. *abutiloides*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 465. — Bras.
elaegnoides, *S. Moore, l. c.* 463. — Bras.
lepidus, *S. Moore, l. c.* 464. — Bras.

JUNCUS

- 230² l. *Fockei*... xii (non ii).
a. *latifolius*, *Buchenau, in Bot. Jahrb.* xii. (1890) 425. — Am. bor.
niponensis, *Buchenau, l. c.* 340. — Japon.
l. *paucicapitatus*... 367 (non 307).

JURINEA

- 230³ a. *bulgarica*, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1888 (1889) 51; *et Fl. Bulg.* (1891) 302. — Bulg.

JUSTICIA

- 231¹ a. *chapadensis*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 431. — Bras.
231² a. *laevilinguis*, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 20; *et...*
Lorentziana. 19 (non 20).
231³ a. *metallicorum*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 430. — Bras.
Oreadum, *S. Moore, l. c.* 429. — Bras.

K**KAEMPFERIA**

- 232¹ a. *macrochlamys*, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 223. — Tenass.

KARATAS

- 232³ a. *antiacantha* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1888) ii. 474. — Hybr. artef.

KIELMEYERA

- 233² a. *amplexicaulis*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 311. — Bras.

KIRENGESHOMA

- 233³ l. *palmata*... *et in Icon. fl. Japon.* i. 1. (1891) t. 2.

KNIPHOFIA

- 234¹ a. *natalensis*, *Hort. ex The Garden*, xxxvi (1889) 459; *et in Gard. Chron.* (1889) ii. 562 — Natal.
Sumarae, *Defflers, Voy. au Yémen* (1889) 210. — Arabia.
Tuckii, [*Hort. Leichtlin*] *Baker, in Gard. Chron.* (1893) i. 68. — Afr. austr.
Woodii, *A. Campbell, in The Garden*, xlviii. (1895) 292. — Natal.

KNOWLTONIA

- 234¹ a. *rotundifolia*, *Huth, in Abh. und Vortr. Gesamtgeb. Naturw.* iii. (1890) 70. — Afr. austr.

KOBRESIA

- 234¹ l. *bipartita*, *Karst. Deutsch. Fl.* ed. 2, i. (1895) 335; *Britton*...
a. *brunnescens*, *Boeck. Cyper. Nov.* i. (1888) 45. — Tibet.
hyalinolepis, *Boeck. l. c.* 39. — Tibet.
macrantha, *Boeck. l. c.* — Tibet.

KOCHIA

- 234¹ l. *spongiocarpa*...; *et in Icon. Austral. Salsol.* Decas 6 (1890) t. 51.

KOELERIA

- 234² a. *intricata*, *Genty, in Magnier, Scrin. fl. select.* viii. (1888) 153 = *cristata*, *Pers.*
nitidula, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 611. — Bulg., Armen.

KOELLIA

- 234² l. *incana et virginica*, *Baill.*... xi. [non x].

KONIGA

- 234³ a. *insignis*, *Webb, ex Coss. Illustr. Fl. Atlant.* i. (1889) 63 t. 43. — Afr. bor.

KOROLKOWIA

- 234³ a. *discolor*, *Regel, in Gartenfl.* xxxv. (1886) 349; *et in Gard. Chron.* (1888) i. 105 = *Fritillaria Sewerzowii*, *Regel*.

KYLLINGA

- 235² a. *pellucido-lucida*, *Boeck. Cyper. Nov.* i. (1888) 1. — Reg. Argent.

L**LACTUCA**

- 236¹ l. *contracta*, *Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss.* VII. Folge. i. (1886) n. 8, p. 27; *et...*
236² a. *yemensis*, *Defflers, Voy. au Yémen* (1889) 160. — Arabia.

LADENBERGIA

- 236² a. *chapadensis*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 367. — Bras.

LAELIA

- 236² a. *amoena* ×, *Hort. ex Orchid Rev.* ii. (1894) 334. — Hybr. artef.
dellensis ×, *Hort. in Gard. Chron.* (1889) i. 695. — Hybr. artef.
Gottoiana, *Hort. ex Gardener's Mag.* (1891) 379 (Hybr. spont. ?). — Bras.
236² l. *juvenalis*... (non juvenilis).
Lucasiana, *Rolfe, in Orchid Rev.* i. (1893) 265; *Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7. (1894) 440. — Hab. ?
Normanni ×, *Kraenzl. in Gard. Chron.* (1893) i. 98. — Hybr. artef.

LAELIO-CATTLEYA

- 236² a. *amoena* ×, *Hort. ex Lindenia*, viii. (1892) 65 t. 367 = *Laelia amoena* ×, *Hort.*
amplissima ×, *Hort. ex Journ. des Orchid.* (1894) 253. — Hybr. artef.
ascania ×, *Hort. Veitch, ex Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 452. — Hybr. artef.
Darwiniana ×, *Hort. ex Orchid Rev.* iii. (1895) 293. — Hybr. artef.
elsteadensis ×, *Hort. ex Orchid Rev.* iii. (1895) 293. — Hybr. artef.
eumaea ×, *Hort. Veitch, ex Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 458. — Hybr. artef.
Gottoiana ×, *Hort. Sander. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 467 = *Laelia Gottoiana*, *Hort.*
Hardyana ×, *Hort. in Gard. Chron.* (1895) i. 248. — Hybr. artef.
Harrisii ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 748. — Hybr. artef.
Hippolyta ×, *Hort. ex Journ. of Hort.* xx. (1891) 303 fig. 38; *Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 452. — Hybr. artef.
Ingramii ×, *Hort. ex Journ. of Hort.* xxv. (1892) 141 fig. 20. — Hybr. artef.
Jacobiana ×, *Hort. ex Rev. Hort.* lxvii. (1895) 359. — Hybr. artef.
Marrriottiana ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1892) i. 503. — Hybr. artef.
Normanni ×, *Hort. Veitch, ex Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 459 = *Laelia Normanni* ×, *Kraenzl.*
Phoebe ×, *O'Brien, in Gard. Chron.* (1892) i. 791 fig. 114; *Gard. Mag.* (1892) 268 cum ic. l. c.
Pisandria ×, *Veitch, ex Journ. of Hort.* xxvii. (1893) 407 fig. 60; *Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894). — Hybr. artef.
Pittiana ×, *O'Brien, ex Gard. Chron.* (1894) i. 264. — Hybr. spont. ?
Proserpini ×, *Rolfe, ex Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7. (1893) 461. — Hybr. artef.
Ridolfiana ×, *Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort.* (1893) 72 t. 3. — Hybr. artef.
Sanderæ ×, *Hort. ex Orchid Rev.* i. (1893) 363. — Hybr. artef.
236³ a. *Statteriana* ×, *Veitch, ex Gard. Chron.* (1893) ii. 631; *et in Journ. of Hort.* xxvii. (1894) 463 fig. 67. — Hybr. artef.
Wellsiae ×, *Hort. Wells, ex Gard. Chron.* (1894) ii. 378. — Hybr. artef.

LAGENOPHORA

- 237² a. *linearis*, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 271. — N. Zel.

LAGGERA

- 237² a. *arabica*, *Defflers, Voy. au Yémen* (1889) 149 = *Conyza arabica*, *Willd.*

LAMIUM

- 237³ a. *rumelicum*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 649, in add. = *amplexicaule*, *Linn.*
Spachianum, *Clem. ex Baldacci, in Malpighia*, viii. (1894) 289 = *veronicaefolium*, *Benth.*

LANDOLPHIA

- 238¹ l. *parvifolia*, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1892) 409; *et...*

LANTANA

- 238¹ a. *coimbrensis*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 435. — Bras.
scabrida, *S. Moore, l. c.* 434. — Bras.

LASERPITIUM

- 239¹ a. *platyspermum*, *Somm. & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital.* (1895) 43, nomen; *et in Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 83. — Reg. Cauc.

- 239² a. **LATACE**, *Phil. in Gartenfl.* xxxviii. (1889) 319, t. 1302, fig. 1. **LILIACEAE**.
Volkmanni, *Phil. l. c.* — Chili.

LATHYRUS

- 239³ l. *arizonicus*, *Britton*, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* viii. (1889) 65; *et...*
 240¹ a. *floribundus*, *Velen.* *Fl. Bulg.* (1891) 156 = *L. Aphaca*, *Linn.*
occidentalis, *Howell*, in *Erythea*, iii. (1895) 32.
 — Oregon.

LAVANDULA

- 240² l. *canescens*, *Deflers*, *Voy. au Yémen* (1889) 186.
 — Arabia.

LAVATERA

- 240² a. *stenopetala*, ...; *et Baker f.* in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 211.

LEAVENWORTHIA

- 242¹ a. *stylosa*, *A. Gray*, *ex Gatting*, *Tenness. Fl.* (1887) 24. —
torulosa, *A. Gray*, *ex Gatting*, l. c. 23. —
 Am. bor.

LEONOTIS

- 242³ a. *malacophylla*, *Guerke*, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 142. — Natal.
mollissima, *Guerke* l. c. 141. — Afr. trop.
Schinzii, *Guerke*, l. c. 143. — Afr. austro-occ. extratrop.

LEOPOLDINIA

- 242³ a. *Laucheana*, *Hort. Sander*, *ex Gard. Chron.* (1892) i. 731, nomen. — Hab. ?

LEPIDIUM

- 243² l. *Remyi*, *Drake*, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 106... (non *Fl. Polyn. Franç...*).

LEPISTEMON

- 243³ l. *asterostigma*... 216 (non 217).

LEPTADENIA

- 243³ a. *ephedriformis*, *Deflers*, *Voy. au Yémen* (1889) 166. — Arabia.

LEPTOCHLOA

- 243³ a. *spicata*, *Scribn.* in *Proc. Acad. sci. Phil.* (1891) 302. — Am. bor.

LEPTODERMIS

- 244¹ a. *pulchella*, ...; *et Icon. Fl. Jap.* i. i. t. 8. — Japon.

LEUCERIA

- 245² a. *fasciata*, *Klatt*, in *Bot. Jahrb.* viii. (1886) 51. — Ecuad.
 245³ l. *poebana*... (non *popelana*).

LEUCOIUM

- 245³ a. *transsilvanicum*, *Porcius*, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. xiv. (1892) 274. — Eur. austr.

- 245³ a. *LEUCOPHYSALIS*, *Rydberg*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 365 = *Physalis*, *Linn.* (*Solan.*).
grandiflora, *Rydberg*, l. c. 366 = *P. grandiflora*, *Hook.*

LEUCOSMIA

- 246¹ a. *lanceolata*, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, *Ill. Ins. Fl. Mar. Pacif.* (1892) 281 (= *Drimyspermum lanceolatum*, *A. Gray*). — Ins. Fiji.
montana, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, l. c. (= *D. montanum*, *Seem.*). — Ins. Fiji.
subcordata, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, l. c. (= *D. subcordatum*, *Seem.*). — Ins. Fiji.

LEUCOSYKE

- 246¹ a. *corymbulosa*, *Benth. & Hook. f.* [non *Wedd.*] *ex Drake*, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 303 (= *Mississya corymbulosa*, *Wedd.*). — Ins. Viti.

LICANIA

- 246² l. *gracilipes*... (non *gracilis*).
 a. *subcordata*, *Fritsch*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 18. — Bras.

LICUALA

- 246³ a. *Kirsteniana*, *Hort. ex Illustr. Hort.* xlii. (1891) 189. — Madag.

LIGEA

- 246³ a. *Glaziovii*, *Warm. Fam. Podost.* iii. (1889) 23, t. 22, fig. 11-16, et t. 23. — Bras.

LIGUSTICUM

- 247³ a. *caucasicum*, *Somm. et Levier*, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1895) 43, nomen; *et in Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. ii. II. (1895) 77. — Reg. Cauc.

LIGUSTRUM

- 247¹ l. *medium*, *Hort. ex Neuh.-Off. Arbor. Zösch.* (1891) 15. — Japon.

LILIUM

- 247¹ a. *Beerensii* ×, *Hort. ex The Garden*, xlviii. (1895) 11. — Hybr. artef.
 247² a. *Elisabethae*, *Hort. Leichilin*, *ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xvi. (1891) 198. — Japon.

LIMNANTHES

- 247² a. *Macounii*, *Trelease*, in *Mem. Bost. Soc. Nat. Hist.* iv. (1888) 85 (= *L. Douglasii*, *Macoun*). — Ins. Vancouver.

LINARIA

- 248² l. *euxina*, *Velen.* in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* VII. Folge, i. (1886) n. 8, p. 34; *et...*

LINDELOFIA

- 248³ a. *longifolia*, *Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xiii. (1888) 326 = *spectabile*, *Lehm.* ?

LIPARIS

- 250¹ a. *minutiflora*, *Rolfe*, in *Gard. Chron.* (1888) i. 75. — Hab. ?

LIPPIA

- 250² a. *appendiculata*, *Robinson & Greenm.* in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 391. — Mexic.
jangadensis, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 435. — Bras.
primulina, *S. Moore*, l. c. 436. — Bras.

LISSOCHILUS

- 250³ l. *barombensis*... 52 (non 51).
 251¹ l. *Stuhlmannii*... 249 (non 248).

LITHOSPERMUM

- 251³ l. *glandulosum*... 1893 (1894) xxxvii. 46 [non (1892-93) 46].

LITSEA

- 252¹ a. *palmatinervia*, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 278 (= *Tetranchera palmatinervia*, *Meissn.*). — Ins. Fiji.
Pickeringii, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, l. c. (= *T. Pickeringii*, *A. Gray*). — Ins. Fiji.
Seemannii, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, l. c. (= *T. Seemannii*, *Meissn.*). — Ins. Fiji.
vitiensis, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, l. c. (= *T. vitiana*, *Meissn.*). — Ins. Fiji.

LIVISTONA

- 252¹ a. *enervis*, *Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xvi. (1891) 346. — Hab. ?

LOBELIA

- 252² a. *Deckeni*, *Schweinf.* in *Hoehnel*, *zum Rudolph See*, App. (1892) 9. — Afr. trop.
Dortmanni, *Hort. Dammann*, *ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xix. (1894) 459 = *L. Erinus*, *Linn.*
 252³ a. *Gerardi* ×, *Sauvageau*, in *Rev. Hort.* lxx. (1893) 519. — Hybr. artef.
Kernerii, *Hort. ex Nagy*, in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 302. — Costa Rica.
Telekii, *Schweinf.* in *Hoehnel*, *zum Rudolph See*, App. (1892) 9; *et...*

LOGFIA

- 253¹ a. *Soyeri*, *F. Gérard*, in *Magnier*, *Scrin. fl. select.* viii. (1889) 149 = *Filago neglecta*, *DC.*

LONICERA

- 253¹ a. *carpatica*, *Porcius*, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. xiv. (1892) 110 = *nigra*, *Linn.* ?
 253² a. *helvetica* ×, *Bruegg*, in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. 1884-85 (1886) 50. — Helv.
 l. *Korolkowii*... vii. (1894) 34 [non vi. (1893) 34].
Hildebrandiana... (non *Hildebrandtiana*).
musciensis... (non *musciensis*).
 a. *propinqua* ×, *Zabel*, in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 580. — Hybr. artef.
 253³ a. *splendens*, *J. L. Budd*, in *Gard. and For.* ii. (1889) 268 = *tatarica*, *Linn.*

LORANTHUS

- 254¹ a. *arabicus*, *Deflers*, *Voy. au Yémen* (1889) 197. — Arabia.
 254² a. *Dinklagei*, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 94. — Afr. trop.
 l. *Holstii*... 126 (non 127).
 255³ a. *ugensis*... 86 (non 96).

LUCUMA

- 256² l. *novo-caledonica*... 516 (non 526).

LUFFA

- 256² a. *Forskallii*, *Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort.* xviii. (1893) 12, fig. 1. — Arabia.

LUPINUS

- 257¹ a. *Pondii*, *Greene*, in *Pittonia*, i. (April 1887) 288. — Calif.

LUVUNGA

- 257¹ l. *nitida*... t. 283 (non 288).

LUZIOLA

- 257¹ a. *pusilla*, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 507 t. 37. — Bras.

LYCASTE

- 257¹ a. *ciliata*, *Veitch*, *Man. Orch. Pl.* ix. (1893) 85 (= *Maxillaria ciliata*, *Ruiz & Pav.*). — Am. trop.
Dyeriana, *Hort. Sander*, in *Gard. Chron.* (1895) ii. 49. — Peruv.
 257² a. *Jamesiana*, *Hort. ex The Garden*, xxxv. (1889) 502 = *L. Skinneri*, *Lindl.*
Rossiana, *Rolfe*, in *Orchid Rev.* i. (1893) 239. — Hab. ?

LYCHNIS

- 257² a. *Lagrangei*, *Coss. Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 123 t. 78 (= *Viscaria Lagrangei*, *Coss.*). — Reg. Maroc.

LYCORIS

- 257³ a. *Terracianii*, *Hort. Dammann*, *Catal.* xlv. (1889) 4 = *radiata*, *Herb.*

LYONSIA

- 257³ l. *pedunculata*; *Warb.*... 407.

LYSIPOMA

- 258² a. *lycopodioides*, *Goebel*, in *Pflanzenbiolog. Schilderung*, ii. (1891) 50. — Am. trop.

LYTHRUM

- 258² a. *lineare*, *Cosini*, *ex Tornab.* *Fl. Sicula*, ii. (1891) 229 = *L. Graefferi*, *Ten.*

M**MABEA**

- 258² a. *crenulata*, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 470. — Bras.

MACFADYENA

- 258³ a. *bipinnata*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 418. — Bras.
pubescens, S. Moore, l. c. — Bras.

- 259² post **MACROLOBIUM**, Limba; insere :

- a. **MACRONEMA**, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).
Greenei, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 73 = *Aplopappus Greenei*, A. Gray.
molle, Greene, l. c. = A. *Greenei*, A. Gray.
pygmaeum, Greene, l. c. = A. *pygmaeus*, A. Gray.
Watsoni, Greene, l. c. 74 = A. *Watsoni*, A. Gray.

MADAROSPERMA

- 259³ a. *oblongum*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 400. — Bras.

MAERUA

- 260¹ l. *Hoehnelii*...; et in *Hoehnel, zum Rudolph See* (1892) 15.

MAESA

- 260¹ l. *Hernsheimiana*... (non *Hornsheimiana*).

MAGNOLIA

- 260¹ a. *spectabilis*, Hort. ex *Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 15 = *conspicua*, Salisb.
stricta, Hort. l. c. 17 = *grandiflora*, Linn.
260² a. *superba*, Hort. l. c. 15 = *conspicua*, Salisb.
triumphans, Hort. l. c. = *conspicua*, Salisb.

MAHONIA

- 260² a. *Moseriana*, Moser, ex H. Martinet, in *Le Jardin* (1895) 128 = *Berberis Aquifolium*, Pursh.

MALABAILA

- 260³ a. *vaginans*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1893) n. xxxvii. 29 (= *Pastinaca vaginans*, Velen.). — Bulg.

MALUS

- 262² a. *Medwietzkyana*, Hort. Dieck. ex *Gard. Chron.* (1891) i. 461. — Siberia.
Soulardi, Britton, fide L. H. Bailey, in *Am. Gard. xii.* (1891) 173 = *Pyrus Soulardi*, L. H. Bailey.

MALVA

- 262² a. *Duriaei*, Hort. Kew. ex *Baker f. in Journ. Bot.* xxviii. (1890) 340. — Algeria.
262² *hastata*, Hort. ex *Bull. Soc. Tosc.ortic.* xviii. (1893) 108, fig. 15. — Mexic.
262² a. *liocarpa*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 18. — Am. austr.?
subacaulis, Coss. ex *Baker f. in Journ. Bot.* xxviii. (1890) 340. — Marocc.

MALVASTRUM

- 262³ l. *sajamense*... 319 (non *sajanense*... 318).

MAMILLARIA

- 262³ l. *furfuracea*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad. iv.* (1894) 130 (= *Anhalonium furfuraceum*, Coult.). — Am. bor.
263² *Spaethiana*, Hort. *Spath. Cat.* (1894-95). — Colorado.

MANISURIS

- 263³ l. *porifera*, Hack... (non *parifera*).

MAPOURIA

- 264¹ a. *corumbensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 380. — Bras.
tomentella, S. Moore, l. c. 381. — Bras.

MARANTA

- 264² a. *Leoniae*, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1893) i. 751, nomen. — Hab.?
longiscapa, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 486. — Bras.

MARGARANTHUS

- 264³ a. *purpurascens*, Rydberg, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 317. — N. Mexic.

MARISCUS

- 265² a. *setiglumis*, C. B. Clarke, ex S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 512. — Bras.
umbilensis, C. B. Clarke, in *Gard. Chron.* (1891) ii. 190 (= *Cyperus natalensis*, Hort. Angl.). — Natal.

MARLIEREA

- 265³ a. *cubensis*, Krug & Urb. in *Bot. Jahrb.* xix. (1895) 589 (= *Calycorectes cubensis*, Griseb.). — Cuba.
Dussii, Krug & Urb. l. c. 590. — Ind. ooc.
Guildingiana, Krug & Urb. l. c. 590 (= *Psidium Guildingianum*, Griseb.). — Ins. S. Vinc.

MARRUBIUM

- 265³ l. *Aschersonii* ×, Magnus, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* ii. (1884) 349; ..., Ross, in *Malpighia*, v. (1891) 312; et...

MARSDENIA

- 266¹ a. *caulantha*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 399. — Bras.

MASCAGNIA

- 266² l. *Seleriana*... (non *Seleroriana*).

MASDEVALLIA

- 266² a. *Burbidgeana*, Rolfe, in *Orchid Rev.* i. (1893) 265. — N. Granat?
fragrans, Woodward, *Monog. Gen. Masdev.* (1893) cum icone; et *Gard. Chron.* (1893) ii. 162. — Columb.
Macvitiae ×, Hort. Thomson, ex *Gard. Chron.* (1892) ii. 744. — Hybr. artef.
Parkii ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1893) i. 636. — Hybr. artef.
266³ l. *Pourbaixi*... (non *Pourbaisi*).
a. *Rushtoni* ×, Hort. ex *Orchid Rev.* i. (1893) 210. — Hybr. artef.
Schroederiana, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1890) ii. 51; *Journ. of Hort.* (1890) ii. 557, fig. 74; Woodward, *Monog. gen. Masdev.* (1893) 143 t. 56. — Peruv.?
Shuttryana ×, Hort. Lawrence, ex *Gard. Chron.* (1892) i. 764. — Hybr. artef.

MASSONIA

- 266³ *amygdalina*, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 715. — Afr. austr.

MAVAELIA

- 267² l. *metzgerioides*... = *Podostemon metzgerioides*, Trimen.

MAYEPEA

- 267³ l. *bumelioides*... 344.
domingensis... 344 (non 44).
Welwitschii... 530 (non 580).

MAYTENUS

- 268¹ a. *Pyraster*, Reiss. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 8. — Bras.

MAXILLARIA

- 267² a. *Lawrencei*, Kraenzl, in *Gard. Chron.* (1895) ii. 324, 388 = *guttulata*, Reichb. f.

MEDICAGO

- 268³ a. *gaditana*, Perez Lava, ex Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 85. — Hisp.
l. *rhodopea*... (1893) n. xxxvii. 21 (non 31).

MEDINILLA

- 268² a. *Baroni*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 317, in obs. — Madag.
l. *divaricata*, Baker, ... 478 = M. *Baroni*, Baker.

MELAMPODIUM

- 269² l. *longipilum*... (non *longifolium*).

MELANDRYUM

- 269³ l. *hybridum* ×, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. 1884-85 (1886) 10; et...

MELANTHERA

- 270¹ l. *cinerea*...; et in *Hoehnel, zum Rudolph See* (1892) 10. —

MELIOSMA

- 270³ a. *yunnanensis*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 465. — Yunnan.

MELOCHIA

- 271¹ a. *corumbensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 317. — Bras.

MELOTHRIA

- 271² a. *abyssinica*, α Naud. » ex *Bull. Soc. Tosc.ortic.* xviii. (1893) 13 fig. 2 — Abyss.

MEMORA

- 271³ a. *fallax*, Bureau, ex Warm. in K. Danske Vidensk. Selsk. Kjoeb. (1893) 105 [Symb. Fl. Bras. centr. xl. 1220] = *Bignonia fallax*, Miers.
fulgens, Bureau, ll. cc. 1'6, et 1221; et...
magnifica, Bureau, ll. cc. = *Adenocalymna magnifica*, Miers.

MENTHA

- 272² a. *Garroutei* ×, Debeaux, in *Magnier, Scrin. fl. select.* xiii. (1894) 326; et in *Lucante, Rev. de Bot.* xii. (1895) 233. — Gall. mer.
272³ a. *intricata* ×, Debeaux, in *Lucante, Rev. de Bot.* xii. (1895) 235. — Gall. mer.
273² a. *Maupontii* ×, Gadeceau, *Matér. étud. Menth. Loire-Inf.* (1882) 13, 14; et ex *Bull. Soc. éch. Dauph.* xiii. (1886) 551. — Gall. occ.
273³ a. *sedunensis*, Ayasse, ex Jacc. in *Mém. Soc. Helv. sci. nat.* xxxiv. (1895) 437 = *sylvestris*, Linn.
varians ×, Debeaux, in *Lucante, Rev. de Bot.* xii. (1895) 235. — Gall.

MERENDERA

- 274² l. *rhodopea*... 1893 (1894) n. xxxvii. 66 [non (1892-93) 66].

MERREMIA

- 274² l. *angustifolia*... (1894) 117 [non (1896) 117].
l. *gallabatensis*... xvii. (1894) 113.

- 274³ l. **MESOGYNE**... 147 (non 117).

MESPILUS

- 275² a. *tomentosa*, Castigl. ex *Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 211 = *Crataegus tomentosa*, Linn.
tomentosa, α Mill. » l. c. 215 = *Cotoneaster tomentosa*, Lindl.

- 275³ a. **MEZILAUROS**, Kuntze, in *Bot. Centralbl.* l. (1892) 21 = **Silvia**, Fr. Allem. (Laurin.).
anacardioides, *crassiramea*, *Ita-Uba*, *navalium*, *oppositifolia*, *Sprucei*, Taub. ex Mez, in *Arb. Bot. Gart. Breslau*, i. (1892) 112 = *homonyma omnia* Silvae.
Lindaviana, Schwacke & Mez, l. c. — Bras.

- 276¹ a. **MICHELIA**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 504 = **Lophotocarpus**, Th. Dur. (Alism.).

MICONIA

- 276¹ a. *corallicarpa*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 363. — Bras.

MICRAMPELIS

- 277² a. *gilensis*, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* viii. (1889) 67 = *Echinocystis gilensis*, A. Gray.

MICROGLOSSA

- 277³ a. *glutinosa*, Klatt, in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* viii. (1891) 288. — Zanzib.

MICROSTYLIS
278² a. Maximowicziana, King & Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) II. 329. — Sikkim.

MILTONIA
279¹ a. Endresii, Nichols. Dict. Gard. ii. (1886) 368; Veitch, Man. Orch. Pl. viii. (1892) 101 = Odontoglossum Warscewiczii, Reichenb. Roetzlii, Nichols. II. cc. 369; et 104 = O. Roetzlii, Reichenb. f. Schroederiana, Veitch, l. c. 107 = Schroederiana, O'Brien.

MIMOSA
279² a. pachecensis, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 349. — Bras.

MIMUSOPS
279³ l. floridana... 524 (non 525).

MIRABILIS
280¹ a. Wrightiana, A. Gray, ex Britton & Kearn. in Trans. N. Y. Acad. sci. xiv. 1894-95 (1895) 28. — Arizona.

MOHRIA
280³ a. parviflora, Britton, l. c. = H. tetraptera, Linn.

MOHRODENDRON
280³ a. parviflorum, Britton, l. c. = H. tetraptera, Linn.

MOMORDICA
281¹ a. chinensis, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort. xviii. (1893) 14, fig. 1. — China.
enneaphylla, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xvi. (1888) 238. — Congo gall.
sinensis, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort. xviii. (1893) 14 = chinensis, Hort.
Thollonii, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xvi. (1888) 238. — Congo gall.

281¹ a. **MONADENIUM**, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 126. **EUPHORBIACEAE**.
coccineum, Pax, l. c. 127. — Afr. trop. or.

MONNIERA
281² a. Brownii, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 502. — Bras.

MONTBRETIA
282¹ a. crocosmiasflora X, Hort. Lemoine, ex Rev. Hort. liv. (1882) 124, cum ic.; et ex The Garden (1887) ii. 598 (= Tritonia crocosmiasflora, Hort.). — Hybr. artef.

MONTIA
282¹ l. Chamissonis... (non Chamissoi).

282¹ a. **MOQUERYSIA**, Hua, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 259. **BIXINEAE**.
multiflora, Hua, l. c. 260, t. 3. — Afr. trop. occ.

MORINDA
282² l. hypotephra...; et in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 237.

MORMODES
282³ a. Lawrenceanum, Rolfe, in Lindenia, iii. (1890) 69, t. 273. — Columb.
platychila, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) i. 178. — Hab.?
punctatum, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) ii. 696; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 533. — Hab.?
vernixium, Reichenb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 682. — Guian. brit.

MORRENIA
282³ a. incana, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 398. — Bras.

282³ a. **MOSENIA**, Lindm. in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiv. n. 8 (1891) 27. **BRO-MELIACEAE**.
Sicarius, Lindm. l. c. t. 5, fig. 1-11. — Bras.

MUEHLBERGELLA
284² l. Oweriniana... 616 (non Oweriana... 615).

MUSA
284¹ a. assamica, G. Mann, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 263. — Assam.
kewensis X, Baker, in Gard. Chron. (1895) ii. 516. — Hybr. artef.
1. Mannii, H. Wendl... (1892) [non 1893].

MUSCARI
284¹ a. bulgaricum, Velen. Fl. Bulg. (1891) 557. — Bulg.
crossaeum, Heldr. ex Nadj, Géogr. bot. Emp. Ottom. [Pl. de Salon.] (1892) 7. — Maced.
pyramidatum, Velen. Fl. Bulg. (1891) 556. — Bulg.
Skorpili, Velen. l. c. 557. — Bulg.
Vandasii, Velen. l. c. 555. — Bulg.

MYOSOTIS
284³ a. cintra, Hort. Conimbr. ex Bull. Soc. Tosc. Ort. xv. (1890) 134, fig. 14; et in Gartenfl. xxxix. (1890) 191, fig. 47. — Lusit.
285¹ l. rhodopea... (1893) n. xxxvi. 48 [non (1892-93) 48].

MYOSURUS
285¹ l. Pringlei... (non Pringlii).

MYRCIA
285¹ l. ayabambensis... (1895) 64 (non 1893).
chapadensis, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 355. — Bras.
collina, S. Moore, l. c. 356. — Bras.
285² a. Govinha, S. Moore, l. c. 354. — Bras.
285³ d. verruculata, S. Moore, l. c. 355. — Bras.
microstachya, Picardae et reticulata Krug & Urb. sunt Myricae species.

MYRICA
286¹ a. microstachya, Krug & Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 361. — Ins. Jamaic.
Picardae, Krug & Urb. l. c. 359. — Ins. Haiti.
reticulata, Krug & Urb. l. c. 360. — Ins. S. Doming.

MYRISTICA
286³ a. myrmecophila, Bower, in Proc. Phil. Soc. Glasgow, xviii. (1889) 323, nomen. — Zeylan.

MYRMECODIA
286³ a. Beccarii, Hook. f. in Bot. Mag. (1886) t. 6883. — Austral. trop.

MYRTUS
288¹ l. monosperma... = Eugenia.

N

NARCISSUS
289¹ a. Barri X, Hort. ex Gard. Chron. (1886) i. 648. — Hybr. artef.
intermedius X, Hort. Damman, Cat. (1893) 5. — Hybr. artef.

NARDOSMIA
289² a. Sahlbergii, Scheutz, Pl. vasc. Jeniss. (1888) 122. — Sibiria.

NAUCLEA
290¹ l. Gordoniana, F. M. Bailey, in Bot. Bull. x. (1886 ?) 23. — Austral.

NECKERIA
290³ a. glauca, Millsp. in Bull. West Va. Agric. Exp. Sta. ii. (1892) 327 = Corydalis glauca, Pursh.

NECKERIA
290³ a. sempervirens, Heller, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 6 = Corydalis glauca, Pursh.

NECTANDRA
290³ a. bombycina, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 449. — Bras.

NEEA
291¹ a. hermaphrodita, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 442. — Bras.

NEESIA
291¹ a. ambigua, Becc. Malesia, iii. (1889) 261 t. 30. — Borneo.
glabra, Becc. l. c. 263 t. 31. — Borneo.
piluliflora, Becc. l. c. 267. — Borneo.
purpurascens, Becc. l. c. 264. — Borneo.

291³ a. **NEOHENRYA**, Hemsl. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 97. **APOCYNACEAE**.
HENRYA, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 111; et in Hook. Icon. Pl. xx. (1891) t. 1971.
Augustiniana, Hemsl. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 97. — China.

NEPENTHES
292¹ a. amabilis X, Hort. Williams, Cat. (1886) 26. — Hybr. artef.
Findlayana X, Hort. Williams, Cat. (1886) 23, cum fig. — Hybr. artef.
formosa X, Hort. Veitch, Cat. (1895) 8. — Hybr. artef.

NEPHELIUM
292² l. oppositifolium... (non oppositifolium).

NERINE
292² a. Alleni X, Hort. Allen, ex Gard. Chron. (1895) ii. 526. — Hybr. artef.
angustifolia, W. Wats. in Gard. Chron. (1889) ii. 195. — Afr. austr.
pancratioides, Baker, in Gard. Chron. (1891) ii. 576. — Natal.
pumila, Leichl. in Bull. Soc. Tosc. Ort. xi. (1890) 73. — Hab.?

NESAEA
292³ a. pubescens, Koehne, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 149. — Madag.
1. Schinzii...; et l. c. 151.
Stuhlmannii...; et l. c. 150.
a. tolypobotrys, Koehne, l. c. 151. — Natal.

NICOTIANA
293² l. uspallatensis... (non espallabensis).

NIDULARIUM
293² a. procerum, Lindm. in Kongl. Svensk. Akad. Handl. xxiv. n. 8 (1891) 16 t. 1 fig. 1-7 = Aechmea purpurea, Baker.

NOLLETIA
294¹ l. arenosa... 151 (non 251).

294² a. **NOSTOLACHMA**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 182 (= LACHNOSTOMA, Korth.). **RUBIACEAE**.

NOTYLIA
294³ a. bisepala, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 478. — Bras.
lyrata, S. Moore, l. c. 477, t. 32. — Bras.

NYMPHAEA
295² a. Robinsoni X, Hort. ex The Garden, xlv. (1893) 297. — Hybr. artef.
sphaerocarpa, Hort. ex Gartenfl. xxxviii. (1889) 389 = alba, Linn.
Trickeri X, Hort. ex Gard. and For. vi. (1893) 464. — Hybr. artef.

O

OBERONIA

- 295³ a. *falcata*, King & Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii, 329. — Sikkim.
lobulata, King & Pantling, l. c. 331. — Sikkim.
longilabris, King & Pantling, l. c. 330. — Sikkim.
micrantha, King & Pantling, l. c. — Sikkim.
parvula, King & Pantling, l. c. — Bhotan.
Praiana, King & Pantling, l. c. 331. — Silhet.

OCHNA

- 296¹ a. *comorensis*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 81. — Ins. Comor.
corymbosa, Engl. l. c. 80. — Gabon.

OCHROCARPUS

- 296² a. *tinctorius*, « Benth. & Hook. f. » ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 116 (= *Calysacion tinctorium*, Seem.). — Ins. Pacif.

OCIMUM

- 296³ a. *comosum*, Hort. Dammann, ex Wien, Ill. Gart.-Zeit. xiv. (1889) 485 fig. 76. — Hab. ?
 1. *Fischeri*, Guérke... 195.

OCOTEA

- 297¹ l. *ensifolia*... 251 (non 250).

OCTOMELES

- 298¹ l. *moluccana*... 385 (non 386).

ODINA

- 298² l. *fulva*... 103 (non 102).

ODONTITES

- 298² a. *aragonensis*, Willk. ex Debeaux, in Lucante, Rev. de Bot. xii. (1895) 359. — Hisp.

ODONTADENIA

- 298² l. *grandiflora*, Miers, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 416; K. Schum...

ODONTOGLOSSUM

- 298² a. *Bleichroederianum* X, J. & L. Lind. in *Lindenia*, iv. (1888) 69. t. 177. — Hybr. spont.
Bleui X, Hort. ex L'Orchidophile, ix. (1889) 63 (= *Miltonia Bleui* X, Godef.-Lebœuf). — Hybr. artef.
 298³ a. *Cambridgeanum*, Hort. ex Journ. of Hort. xvi. (1888) 411, fig. 54; Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 543. — Hab.
Grusonianum X, Hort. ex *Lindenia*, iv. (1888) 83 = *Andersonianum* X, Reichb. f.
Cookianum, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1891) 696; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 547 [Hybr. spont. ?]. — N. Granat. ?
euastrum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 71. — Columb.
 1. *Lucianianum*... (non *Lucianum*)
 a. *Masevillianum*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 618 = *O. Sceptum*, Reichb. f.
ornatum, Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. xvi. (1891) 341. — Columb.
Ortgiesianum, Hort. Sander, ex *Gartenfl.* xl. (1891) 617, t. 1360; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 582. — Hab. ?
Petersianum X, Hort. in *Lindenia*, iv. (1888) 83, nomen. — Hybr. spont.
picturatum, Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. xvi. (1891) 341. — Hab. ?
Roebelinianum X, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1893) i. 518. — Hybr. spont. ?
rubiginosum X, L. Linden, in *Lindenia*, xi. (1895) 7, v. 517. — Hybr. artef.
Seringa, Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. (1891) 341. — Columb.
Staurastrum X, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 313. — [Hybr. spont.]. — Columb.

OENONE

- 299¹ a. *Imthurnii*, Goebel, *Pflanzenbiolog. Schilderung.* ii. (1891) 376. — Am. trop.
latifolia, Goebel, l. c. 375. — Am. trop.
leptophylla, Goebel, l. c. 377. — Am. trop.

OLDENLANDIA

- 299³ l. *psychotrioides*...; et in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 236.

OLINIA

- 300² l. *usambarensis*... 278 (non 277).

ONCIDIUM

- 300³ a. *articulatum*, Rand, ex Journ. des Orchid. iv. (1893) 95; et in *Lindenia*, v. (1889) 8.
dichroneura, Rolfe, in *Orchid. Rev.* iii. (1895) 363. — Péruv.
chrysodipterum, Veitch, Man. Orch. Pl. viii. (1894). — Am. austr.
chrysops, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 104. — Hab. ?
Enderianum, Hort. ex *Gard. Chron.* (1892) ii. 75; et in *Kew Bull. Add. Ser. IV.* 297. [Hybr. spont. ?] — Bras.
lucescens, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 799; Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 620. — Columb.
 301¹ a. *unicolor*, Rolfe, in *Orchid. Rev.* i. (1893) 266. — Hab. ?
Wheatleyanum, W. H. Gower, in *The Garden*, xlv. (1893) 227; Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 636. [Hybr. spont. ?] — Bras.

ONCOCALAMUS

- 301¹ a. *acanthocnemis*, Drude, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 133. — Afr. trop.

ONONIS

- 301² a. *Damanti*, Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1891) 41, 309. Sicilia.

ONOPORDON

- 301² a. *Gautieri*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) p. xvi. — Pyren. gall.

OPHRYS

- 302¹ a. *fulchra* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 43. — Gall.

OPUNTIA

- 302² l. *modesta*... (non *molesta*).
Cholla... (non *chella*).
 a. *lucida*, Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. xiv. (1889) 146. — Hab. ?

ORCHIS

- 303¹ l. *monticola*... (non *monticeula*).
 303¹ a. *pyrenaica*, Giraudias, in Bull. Soc. étud. sci. Angers (1890) 115 = *Gymnadenia pyrenaica*, Philippe.
 303² a. *Regeliana* X, Bruegg. ex C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 230; C. Richt...
 a. *Skorpili*... xxxvi. (1886) 267 [non xxxii. (1886) 257].
Stracheyi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 128; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1894) t. 2197. — Reg. Himal.

OREOPANAX

- 303³ l. *Lehmannii*... Beibl. n. 49 (1895) 66 [non (1895) Beibl. 66].

- 304¹ a. *ORESTIAS*, Ridl... (non *ORESTIA*). [Conf. Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) errata].

ORIASTRUM

- 304 a. *acerosum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 20. — Chili.

ORIGANUM

- 304² a. *Vetteri*, Brig. & Barbey, in Barbey, Karpathos (1895) 124, t. 13. — Ins. Karpathos.

ORNITHOGALUM

- 304² l. *Aseni*... (non *Aserni*).

ORNUS

- 304³ a. *Ornus*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 624 = F. *Ornus*, Linn.

OROBANCHE

- 304³ a. *atropurpurea*, H. Gay, in Rev. de Bot. x. (1892) 718; et xi. (1893) 280. — Cors., Afr. bor.
 305¹ a. *pruinosa*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn, xxxiii. 1894 (1895) 139 = *prosgolica*, Formanek.
prosgolica, Formanek, l. c. 158. — Epirus.
rhaetica, Bruegg in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix 1884-85 (1886) 43. — Helv.

ORTHOSIPHON

- 305² a. *depauperatum*, Terrac. in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 424. — Reg. Somal.

- 306³ a. *OTOLEPIS*, Turcz = *Otophora*, Blume [Sapind.] (fide Cl. Kuntze).
alata, cordigera, erythrocalyx, imbricata, pubescens, ramiflora, spectabilis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *homonyma omnia Otophorae*.
amoena, Kuntze, l. c. = *Melicocca amoena*, Hassk.
fruticosa, Kuntze, l. c. = *Sapindus fruticosus*, Roxb.

OURATEA

- 306¹ a. *orgyalis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 334. — Bras.
purpuripes, S. Moore, l. c. 332. — Bras.
rosipes, S. Moore, l. c. 333. — Bras.
simulans, S. Moore, l. c. 334. — Bras.

OXALIS

- 307³ a. *Suksdorfii*, Trelease, in Mem. Boston Soc. Nat. Hist. iv. (1888) 89. — Oregon.

OXYPETALUM

- 309¹ a. *clavigerum*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 397. — Bras.

OXYTROPIS

- 309² a. *pentelica*, Hausskn. in Mitt. Thür. Bot. Ver. v. (1886) 71; et N. Folge, v. (1893) 82. — Graecia.

P

PAEONIA

- 310¹ a. *Bakeri*, Lynch, in Journ. Roy. Soc. Hort. xii. (1890) 441, fig. 32. — Oriens.

PALAQUIUM

- 310² l. *Ottolanderi*... (non *Ottelanderi*).

PALICOUREA

- 310³ a. *jugosa*, Hort. Bull. Cat. new Pl. (1886) 8. — Bras.

PANAX

- 311² a. *elegans*, F. Muell. & C. Moore, in C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 215. — Austral.

PANCRACTIUM

- 311² l. *Saharae*, Coss. ex Batt. & Trab. in Bonnier, Rev. gén. Bot. ii. (1890) 5 et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 337; et...

PANDANUS

- 311³ a. *Dyeri*, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1892) i. 731. — Austral.
pacificus, Hort. Veitch, ex *Gard. Chron.* (1892) i. 664. — Ins. Pacif.
Solms-Laubachii, F. Muell. in Bot. Zeit. xlv. (1857) 218. — Austral.

PANICUM

- 312¹ a. *amethystinum*, Franch. in Mém. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 341. — Congo gall.

PANICUM

- 312¹ a. *Brazzae*, Franch. in *Mém. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 354. — Congo gall.
brazzavillense, Franch. l. c. 341. — Congo gall.
congoense, Franch. l. c. 342. — Congo gall.
furcellatum, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 5^o 5 t. 34. — Bras.
Griffonii, Franch. in *Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 342. — Congo.
mayumbense, Franch. l. c. 343. — Congo.
 1. *melanostylum*... (non *melanotylum*).
 a. *ogowense*, Franch. in *Mém. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 344. — Congo.
restioideum, Franch. l. c. 353. — Congo gall.
Tholloni, Franch. l. c. 351. — Congo.

PANICULARIA

- 312¹ a. *Thurberiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 783 = *P. Thurberiana*, Vasey.

PAPAVER

- 313¹ a. *erucifolium*, Timb. in *Lucante*, Rev. de Bot. x. (1892) 36 = *P. Rhoeas*, Linn.
glaucum, Hort. *Leichtlin*, ex *Gartenfl.* xl. (1891) 608, fig. 116-17. — Armenia.
heterotrichum, Lojac, ex *Tornab. Fl. Sicula*, i. (1888) 57 = *siculum*, Guss.
rhaeticum, *Levesche*, ex *Gremli, Excursionsfl. f. d. Schweiz*, ed. 7 (1893) 66. — Helv.
 1. *rumelicum*... 1887 (1888) 444; 1889 (1890) ii. 29 (non 39).

PAPHINIA

- 313¹ a. *Randi*, L. Linden & Rodigas, in *Lindenia*, i. (1885) 65, t. 30 (= *Lycaste Randi*, Nichols.) = *cristata*, Lindl.

PAROSELA

- 314³ a. *albiflora*, A. M. Vail, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* xiv. (1894) 34 = *Dalea albiflora*, A. Gray.
formosa, A. M. Vail, l. c. = *D. formosa*, *pogonathera*, A. M. Vail, l. c.; Heller, ... *Torr. rubescens*, A. M. Vail, l. c. = *D. rubescens*, S. Wats.
Wislizeni, A. M. Vail, l. c. = *D. Wislizeni*, A. Gray.

PARSONSIA

- 314³ a. *Wrightii*, Kearn. in *Trans. N. Y. Acad. sci.* xiv. (1894) 37 = *Cuphea Wrightii*, A. Gray.

PASSIFLORA

- 315² a. *dictyophylla*... (non *diethophylla*).
ornithoura... (non *ornitheura*).
Pfordti ×, Hort. Kew, ex *The Garden*, xxxv. (1889) 572. — Hybr. artef.
Storckii, Benth. & Hook. f. ex *Drahe, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 175 (= *Disemma Storckii*, Seem.). — Ins. Pacif.

PATAGONULA

- 316¹ a. *Glaziovii*, Mez, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1899) 17. — Bras.

PATOSIA

- 316¹ l. *clandestina*... 64 (non 44).

PAVONIA

- 316³ a. *opulifolia*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 314. — Bras.

PECTIS

- 317¹ a. *jangadensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 389. — Bras.

PEDICULARIS

- 317² a. *Canbyi*, A. Gray, Syn. *Fl. N. Am.* ii. I. Suppl. (1886) 454. — Montana.
carpatia, Simonk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 221 = *foliosa*, Linn.
 317³ a. *Jankae*, Steining, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 189. — Hung.
 318¹ l. *Provosti*... (non *Provoti*).
 a. *tchangchanensis*, Franch. ex *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 571. — China occ.

PENDULINA

- 318³ a. *crassifolia*, Lojac. *Fl. Sicula*, i. I. (1888) 118 = *Diploaxis crassifolia*, DC.

PENNISETUM

- 318¹ a. *gabonense*, Franch. in *Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 363. — Congo gall.
indicum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 787 = *typhoideum*, Rich.
nodiflorum, Franch. in *Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 363. — Congo gall.
purpurascens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 787 = *compressum*, R. Br.
yemense, Defflers, *Voy. au Yémen* (1889) 217 *typhoideum*, Rich.

PENTACLETHRA

- 319¹ a. *africana*, Benth. ex Taub. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 125 [Quid? an *P. macrophylla*, Benth.?]. — Afr. trop.
maculosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 201 = *filamentosa*, Benth.

PENTSTEMON

- 319³ a. *Barrettiae*, A. Gray, Syn. *Fl. N. Am.* ii. I. Suppl. (1886) 440. — Oregon.
dimorphus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 463. — Am. bor. occ.

PEPEROMIA

- 320¹ l. *briana*... (non *breeana*).
 a. *Lehmannii*, C. DC. in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 289. — Ecuad.
 320² a. *palmirensis*, C. DC. l. c. 290. — Columb.
pavasiana, C. DC. l. c. — Columb?
pinulana, C. DC. l. c. 289. — Guatem.
Stuhlmannii, C. DC... (1894)... (non 1892)
truncicola... (1894)... (non 1892).
vacciniifolia... (non *vaccinifolia*).

PEPONIA

- 320³ a. *dissecta*, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Ser. III.* xvi. (1888) 234. — Congo gall.

PERAXILLA

- 320³ l. *tetrapetala*... l. c. 300 = (*L. tetrapetalus*, Linn. f.) = *tetrastepala*, Van Tiegh. l. c.

PEREZIA

- 320³ a. *Pringlei*, Robinson & Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 388. — Mexic.

PERISTERIA

- 321² a. *selligera*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 272. — Guian. angl.

PEROTIS

- 321³ l. *indica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 787; K. Schum...

PETASITES

- 322¹ a. *Petasites*, Karst. *Deutsch. Fl. ed. 2*, ii. (1889) 641 = *officinalis*, Moench.

PETROSELINUM

- 479¹ a. *Petroselinum*, Karst. *Deutsch. Fl. ed. 2*, ii. (1895) 394 = *sativum*, Hoffm.

PEUCEDANUM

- 322³ a. *intermedium*, Porcius, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. xiv. (1892) 108. — Europ.
 1. *serbicum*...; et in *Magnier, Scrin. fl. select.* viii. (1889) 154.

PFAFFIA

- 323¹ a. *vana*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 443. — Bras.

PHACELIA

- 323² l. *idahoensis*... (non *idahaensis*).

PHACA

- 323¹ a. *Thurberi*, Kearn. in *Trans. N. Y. Acad. sci.* xiv. (1894) 34 = *Astragalus Thurberi*, A. Gray.

- 323² a. *PHAENOHOFFMANNIA*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 940 = *Pleiospora*, Harv. (Legum.).
cajanifolia, Kuntze, l. c. = *Pl. cajanifolia*, Harv.

PHAGNALON

- 323³ a. *harazianum*, Defflers, *Voy. au Yémen* (1889) 150. — Arabia.

PHAIOCALANTHE

- 323³ a. *Arnoldiae* ×, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1894) i. 84. — Hybr. artef.
Berryana ×, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1895) ii. 655. — Hybr. artef.

PHAIUS

- 323³ a. *Cooksonae* ×, W. Wats. in *Orchid Rev.* iii. (1895) 220; et in *Gard. and For.* viii. (1895) 274. — Hybr. artef.
Gravesii ×, Rob. M. Gray, in *Gard. and For.* vi. (1893) 169; et in *Orchid Rev.* (1893) 241, fig. 13 (*Ph. hybridus*, O'Brien, var. *Gravesii*, Hort.). — Hybr. artef.
hybridus ×, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1892) i. 619; ex *Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 654. — Hybr. artef.
Marthae ×, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1894) i. 343. — Hybr. artef.
Oweniae, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1894) i. 539 = *Wallichii*, Lindl.
Sanderii, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1892) i. 598. — Hybr. artef.

PHALAEENOPSIS

- 323³ a. *alcicornis* ×, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 799 [Hybr. spont.]. — Hab.?
 323³ l. *Amphitrite*... 618 (non *Amphitrite*... 619).
 a. *fugax*... = *Sarcophilus unguiculatus*, Lindl.
 324¹ a. *Vesta* ×, Hort. Veitch, ex *Gard. Chron.* (1894) i. 343. — Hybr. artef.

PHASEOLUS

- 324² a. *Dalzellianus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 202 (= *P. pauciflorus*, Dalz.). — Ind. or.
derasus, Hort. ex *Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xiii. (1888) 126. — Bras.
monospermus, Robinson & Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 385. — Mexic.

PHILADELPHUS

- 324³ a. *igneus*, Hort. ex *Handl. Trees Kew*, Pt. i. [Polypet.] (1894) 225 = *grandiflorus*, Wall.

- 325¹ a. *PHILIPPIMALVA*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 73 = *Tetraptera*, Phil. (Malv.).
parviflora, Kuntze, l. c. = *T. parviflora*, Phil.

PHILODENDRON

- 325¹ a. *Martineti*, Hort. *Linden, ex Illustr. Hort.* xlii. (1895) 223. — Hab.?

PHLEUM

- 325² a. *phleoides*, Porcius, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. xiv. (1892) 287 = *Boehmeri*, Wibel.

PHLOMIS

- 325² a. *coriacea*, St Lager, in *Cariot, Étud. des fleurs*, éd. 8 (1889) 680 = *P. Herba-venti*, Linn.
oblongifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 529 (= *Leonurus oblongifolius*, Blume). — Java.

PHLOX

- 325² a. *atropurpurea*, Hort. ex *Kolb, Alpenpflanzen* (1890) 209, nomen. — Hab.?

PHOLIDOTA

- 326¹ l. *Lugardi*... (non *Lagardi*).

PHORADENDRON

- 326¹ l. thacolulense... (non thacolulense).

PHORMIUM

- 326¹ a. alpinum, *Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xv. (1890) 448, nomen. — N. Caled.
flaccidum, *Hort. l. c.* nomen. — N. Caled.
Hurstonsii, *Hort. l. c.* nomen. — N. Caled.
robustum, *Hort. l. c.* nomen. — N. Caled.

PHTHIRUSA

- 326³ a. abdita, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 450. — Bras.
Bauhiniae, *S. Moore, l. c.* 451. — Bras.

PHYLLANTHUS

- 327¹ l. humilis... (1888) 34, [non (1889) 35].
327¹ a. tequilensis, *Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 392. — Mexic.

PHYLLOSTEGIA

- 328³ l. linearifolia, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1886) 47, 264 t. 20. — Ins. Pacif.

PHYSALIS

- 328³ a. ciliosa, *Rydberg, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1893) 346. — Am. bor. or.
hastata, *Rydberg, l. c.* 363. — Mexic.
hederaefolia, *Holzinger, in Contrib. U.S. Nat. Herb.* i. (1892) 212 = rotundata, *Rydberg.*
leptophylla, *Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1894) 389. — Mexic.
rotundata, *Rydberg, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1893) 352. — Am. bor. occ.
texana, *Rydberg, l. c.* 339. — Texas.

PHYSURUS

- 329¹ a. Oreadum, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 479. — Bras.

PILOGYNE

- 330² a. punctata, *Hort. Dammann, ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xiv. (1889) 459, fig. 73 = *Melothria punctata, Cogn.*

PILOSELLA

- 330² a. acutis, *Norrlin, in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* xii. n. 4 (1895) 67. — Eur. bor.
adfixa, *Norrlin, l. c.* 34. — Eur. bor.
adjuncta, *Norrlin, l. c.* 61. — Eur. bor.
adtingens, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 165. — Eur. bor.
aeruginascens, *Norrlin, l. c.* 129 = *Hieracium Auricula, Linn.*
ainolensis, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 71. — Eur. bor.
albicans, *Norrlin, l. c.* 8. — Eur. bor.
alticeps, *Norrlin, l. c.* 24. — Eur. bor.
ambusta, *Norrlin, l. c.* 15. — Eur. bor.
amplectens, *Norrlin, l. c.* ii. 4. (1884) 111 = *Hieracium auricula, Linn.*
angustella, *Norrlin, l. c.* = *H. Pilosella, Linn.*
aplotea, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 28. — Eur. bor.
aridicola, *Norrlin, l. c.* 7. — Eur. bor.
Arrhenii, *Norrlin, l. c.* 68. — Eur. bor.
asperula, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 93, 173 = *Hieracium Auricula, Linn.*
assimilata, *Norrlin, l. c.* 151. — Eur. bor.
atrobulbosa, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 62. — Eur. bor.
atroviolascens, *Norrlin, l. c.* 41. — Eur. bor.
aurulenta, *Norrlin, l. c.* 30. — Eur. bor.
austerula, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 146. — Eur. bor.
Bomanssonii, *Norrlin, l. c.* 33. — Eur. bor.
brachycephala, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 97 = *Hieracium auricula, Linn.*
calolepidea, *Norrlin, l. c.* 49. — Eur. bor.
chaerophylla, *Norrlin, l. c.* 48. — Eur. bor.
chrysocephala, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 106 = *Hieracium Auricula, Linn.*
chrysocephaloides, *Norrlin, l. c.* 104 = *H. Auricula, Linn.*

PILOSELLA

- 330² a. clinans, *Norrlin, in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* xii. n. 4 (1895) 16. — Eur. bor.
coacta, *Norrlin, l. c.* 11. — Eur. bor.
coalescens, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 80 = *Hieracium Pilosella, Linn.*
cochlearis, *Norrlin, l. c.* 100 = *H. auricula, Linn.*
colobima, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 46. — Eur. bor.
concolor, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 120 = *Hieracium Auricula, Linn.*
congregata, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 22. — Eur. bor.
conspersa, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 71 = *Hieracium Pilosella, Linn.*
conspersiformis, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 16. — Eur. bor.
convexula, *Norrlin, l. c.* 17. — Eur. bor.
coracodes, *Norrlin, l. c.* 55. — Eur. bor.
cuneolus, *Norrlin, l. c.* 18. — Eur. bor.
curvscens, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 166. — Eur. bor.
cymosa, *Norrlin, l. c.* 70. — Eur. bor.
denticulifera, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 167. — Eur. bor.
detonsa, *Norrlin, l. c.* 156 = *Hieracium glomeratum, Froel.*
dimorphoides, *Norrlin, l. c.* 133 = *H. dimorphoides, Norrlin.*
discolorata, *Norrlin, l. c.* 114 = *H. Auricula, Linn.*
distantilingua, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 19. — Eur. bor.
dodrantaliss, *Norrlin, l. c.* 23. — Eur. bor.
dubia, *Lindeb. ex Norrlin, l. c.* 65. — Eur. bor.
empeda, *Norrlin, l. c.* 56. — Eur. bor.
erythrocaulis, *Norrlin, l. c.* 39. — Eur. bor.
erythropoides, *Norrlin, l. c.* 42. — Eur. bor.
exacuta, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 65 = *Hieracium Pilosella, Linn.*
ferrea, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 53. — Eur. bor.
fimbriolosa, *Norrlin, l. c.* 24. — Eur. bor.
firmicaulis, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 168. — Eur. bor.
flammea, *Norrlin, l. c.* 140, in obs. — Eur. bor.
flavella, *Norrlin, l. c.* 17. — Eur. bor.
flexipes, *Norrlin, l. c.* 15. — Eur. bor.
florulenta, *Norrlin, l. c.* 12. — Eur. bor.
fuliginea, *Norrlin, l. c.* 66. — Eur. bor.
galactina, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 154 = *Hieracium glomeratum, Froel.*
gorkense, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 52. — Eur. bor.
grisea, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 155 = *Hieracium glomeratum, Froel.*
hadromera, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 10. — Eur. bor.
Hilmæ, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 70 = *Hieracium Pilosella, Linn.*
hirticola, *Norrlin, l. c.* 139, in obs. — Scand.
hollolensis, *Norrlin, l. c.* 85 = *Hieracium auricula, Linn.*
hypopta, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 26. — Eur. bor.
hypoptella, *Norrlin, l. c.* 26. — Eur. bor.
illudens, *Norrlin, l. c.* 66. — Eur. bor.
immigrata, *Norrlin, l. c.* 60. — Eur. bor.
impallescens, *Norrlin, l. c.* 20. — Eur. bor.
inclinans, *Norrlin, l. c.* 32. — Fennia.
incrassata, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 145. — Eur. bor.
infecta, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 20. — Eur. bor.
infidula, *Norrlin, l. c.* 59. — Eur. bor.
interrupta, *Norrlin, l. c.* 37, in syn. = *succica, Fries.*
irrubescens, *Norrlin, l. c.* 56. — Eur. bor.
jodolepis, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 82 = *Hieracium Pilosella, Linn.*
karellica, *Norrlin, l. c.* 138 = *Hieracium onegense, Norrlin.*
Kihlmani, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 50. — Russia.

PILOSELLA

- 330² a. ladogensis, *Norrlin, in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* ii. n. 4 (1884) 136 = *Hieracium onegense, Norrlin.*
lagarotis, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 47. — Eur. bor.
laticeps, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 57 = *Hieracium Pilosella, Linn.*
laxipes, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 22. — Eur. bor.
lenifolia, *Norrlin, l. c.* 78. — Eur. bor.
lividipes, *Norrlin, l. c.* 28. — Eur. bor.
lychnea, *Norrlin, l. c.* 52. — Ross. bor.
lygaea, *Norrlin, l. c.* 25. — Eur. bor.
lygodes, *Norrlin, l. c.* 58. — Eur. bor.
maura, *Norrlin, l. c.* 10. — Eur. bor.
melanophaea, *Norrlin, l. c.* 52. — Eur. bor.
mollipes, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 66 = *Hieracium Pilosella, Linn.*
neglecta, *Norrlin, l. c.* 169. — Eur. bor.
nemophila, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 46 = *nemoricola, Norrlin.*
nemoricola, *Norrlin, l. c.* 80, in add. — Eur. bor.
nigella, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 112 = *Hieracium Auricula, Linn.*
obovalis, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 13. — Eur. bor.
obscuripes, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 73 = *Hieracium Pilosella, Linn.*
oenea, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 39. — Eur. bor.
onensis, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 131 = *Hieracium onegense, Norrlin.*
papyrodes, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 45. — Eur. bor.
parvica, *Norrlin, l. c.* 34. — Eur. bor.
pericausta, *Norrlin, l. c.* 49. — Eur. bor.
phaeostigma, *Norrlin, l. c.* 41. — Eur. bor.
phileophylla, *Norrlin, l. c.* 38. — Eur. bor.
pinguiscens, *Norrlin, l. c.* 23. — Eur. bor.
pilipes, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 141 = *Hieracium pilipes, Sail.*
plebeja, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 78. — Eur. bor.
prasinata, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 78 = *Hieracium Pilosella, Linn.*
prasiniza, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 9. — Eur. bor.
pratensis, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 139 = *Hieracium pratense, Tausch.*
privigna, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 35. — Eur. bor.
progenita, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 87 = *Hieracium Pilosella, Linn.*
protuberans, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 57. — Eur. bor.
pruinosa, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 57. — Eur. bor.
Pseudo-Blyttii, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 124 = *Hieracium Auricula, Linn.*
pubescens, *Norrlin, l. c.* 169. — Eur. bor.
pulvinata, *Norrlin, l. c.* 127 = *Hieracium Auricula, Linn.*
reflexa, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 29. — Eur. bor.
remotula, *Norrlin, l. c.* 14. — Eur. bor.
retractata, *Norrlin, l. c.* 72. — Fennia.
rhyphonta, *Norrlin, l. c.* 54. — Eur. bor.
Saclani, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 121 = *Hieracium Auricula, Linn.*
salebrata, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 9 (= *P. salebrosa, Norrlin.*) — Eur. bor.
salebrosa, *Norrlin, l. c.* 9, in syn. = *salebrata, Novilin.*
septentrionalis, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 147 = *Hieracium praealtum.*
sigmoidea, *Norrlin, l. c.* 63 = *H. Pilosella, Linn.*
signifera, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 70. — Eur. bor.
sphacelata, *Novilin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 162. — Eur. bor.
squarrosula, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 32. — Eur. bor.
stemmatina, *Norrlin, l. c.* 61. — Eur. bor.
stenomera, *Norrlin, l. c.* 57 = *irrubescens, Norrlin.*

PILOSELLA

- 330² a. *straminea*, Norrlin, in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn. ii. n. 4 (1884) 61 = *Hieracium Pilosella*, Linn.
subcurvescens, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 69. — Eur. bor.
subfuscata, Norrlin, l. c. 61. — Eur. bor.
subprasinata, Norrlin, l. c. 21. — Eur. bor.
subpratensis, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 102 = *Hieracium Auricula*, Linn.
subpubens, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 43. — Eur. bor.
subswirensis, Norrlin, l. c. 45. — Eur. bor.
suburnigera, Norrlin, l. c. 19. — Eur. bor.
suivalensis, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 84 = *Hieracium Pilosella*, Linn.
suomensis, Norrlin, l. c. 163. — Eur. bor.
syrjaenorum, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 74. — Ross. bor.
tenebricans, Norrlin, l. c. 55. — Eur. bor.
tenerescens, Norrlin, l. c. 64. — Eur. bor.
tenuilingua, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 75 = *Hieracium Pilosella*, Linn.
tenuirhiza, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 3. — Eur. bor.
Thedenii, Norrlin, l. c. 31. — Suecia.
tremipes, Norrlin, l. c. 7. — Eur. bor.
trochocnemis, Norrlin, l. c. 14. — Eur. bor.
urnigera, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 76 = *Hieracium Pilosella*, Linn.
valens, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 8. — Eur. bor.
ventricosa, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 109 = *Hieracium Auricula*, Linn.
viridicans, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 11. — Eur. bor.
viridilivens, Norrlin, l. c. 27. — Eur. bor.
vitis, Norrlin, l. c. 29. — Eur. bor.
xanthostigma, Norrlin, l. c. 42. — Eur. bor.

PINGUICULA

- 331² a. *variegata*, Arv.-Touv. Monog. Pilos. et Hier. Dauph. add. (1880) 54. — Gall.

PINUS

- 331² a. *pindica*, Formanek, in Deutsche Bot. Monatsschr. viii. (1890) 68 [pindicus]. — Thessal.

PIPER

- 331² a. *borbonense*, C. DC. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 224.
daguanum, C. DC. l. c. x. (1888) 288. — Columb.

PISONIA

- 332³ a. *rostrata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 304. — N. Guin.

PITHECOLOBIUM

- 333² a. *Kubaryanum*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 335. — N. Guin.

PLAGIOBOTRYS

- 334¹ a. *Jonesii*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 1. [Suppl.] (1886) 43. — Calif.

PLANTAGO

- 334¹ l. *collopúbens*... (non *collipúbens*).

PLATANThERA

- 334² l. *natalensis*... (1895) [non 1894].
 a. *subalpina*, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 120 = *Habenaria bifolia*, R. Br.

PLATYCLINIS

- 334³ a. *uncata*, N. E. Br. ex Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 680 (= *Dendrochilum uncatum*, N. E. Br.). — Ins. Philipp.

PLECTRANTHUS

- 335¹ a. *hadiensis*, Schweinf. in Wien. Ill. Gart.-Zeit. xix. (1894) 2. — Arabia.
 l. *hylophilus*... 203 (non 283).
melanocarpus... 200 (non 310).
 335² *Schweinfurthii*, Sprenger, in Wien. Ill. Gart.-Zeit. xix. (1894) 1. — Arabia.

PLECTRONIA

- 335³ a. *flavida*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 194 (= *Canthium flavidum*, Seem.). — Ins. Fiji.
sessilifolia, Benth. & Hook. f. ex Drake, l. c. (= *C. sessilifolium*, A. Gray). — Ins. Fiji.

PLEIONE

- 336¹ a. *concolor*, Hort. ex Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 681. — Ind. or.

PLEURANDRA

- 336¹ a. *Seemanni*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 183 (= *Nesopanax vitiensis*, Seem.). — Ins. Pacif.

PLEUROTHALLIS

- 336² a. *Bangii*, Rolfe, ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. 2 (1895) 261. — Bolivia.
Brittoniana, Rolfe, l. c. 260. — Bolivia.
Kraenzlini, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1894) ii. 103. — Hab. ?
 336³ a. *picta*, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) ii. 431. — Guian. angl.
platystachys, Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 459. — Bras.
Rusbyi, Rolfe, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. 2 (1895) 260. — Bolivia.
scaberula, Rolfe, l. c. — Bolivia.

PLUMBAGO

- 337¹ a. *denticulata*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 690 = *europaea*, Linn.

PODACHAENIUM

- 337³ a. *andinum*, Ed. André, in Rev. Hort. lxiv. (1892) 414, fig. 122-26. — Columb.

- 338¹ a. *POGOCHLOA*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 509. GRAMINEAE.
brasiliensis, S. Moore, l. c. t. 37. — Bras.

POLYCYCNIS

- 339¹ l. *Lehmanni*...; et in Gard. Chron. (1895) ii. 245, cum fig.

POLYGALA

- 339³ a. *hygrophiloides*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 308. — Bras.

POLYGONATUM

- 341³ a. *hybridum* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 115. — Helv.
intermedium X, Bruegg. l. c. 116 (= *Convallaria intermedia*, Boenn.). — Eur. centr.

POLYGONUM

- 341¹ a. *convolvuloides* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 102. — Helv.

POLYMERIA

- 341² a. *occidentalis*, F. Muell. Sec. Cens. Austral. Pl. (1889) 160. — Austral.

POLYSTACHYA

- 342¹ l. *Lawrenceana*... (non *Laurenceana*).

- 342³ l. *POMMERESCHIA*... (non *POMMERESCHIA*).

PORTULACA

- 343² a. *somalica*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) ii. 134. — Reg. Somal.

POTENTILLA

- 344¹ a. *Besseri*, Blocki, in Bot. Centralbl. (1889) 202. Helv.
 345¹ a. *Pseudopilosa*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 80. — Europ.
Reverchoni, Siegf. ex Debeaux, in Lucante, Rev. de Bot. xii. (1895) 350 = *alpestris*, Hall. f.

POTENTILLA

- 345² l. *subnivalis* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 17; M. Besse...
subternata X, Bruegg. l. c. — Helv.
Tinei, Tod. ex Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1895) 197 = *parviflora*, Desf.
varnensis, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1894 (1895) n. xxix. 13. — Bulg.

POTERIUM

- 345³ l. *rhodopeum*... (1894) n. xxxvii. 27 [non (1892-93) 27].

POTHOS

- 345³ a. *nigricans*, Hort. ex Catal. Compt. contin. d'hortic. (1886) 8. — Hab. ?

POUTERIA

- 345³ a. *Weddelliana*, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 45. — Guian.

POUZOLZIA

- 345³ a. *arabica*, Desf. Voy. au Yémen (1889) 206. — Arabia.

PRASOPHYLLUM

- 346¹ a. *apostasioides*, F. Muell. Sec. Cens. Austral. Pl. (1889) 190. — Austral.

PRESTONIA

- 346² a. *Evansii*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 395. — Bras.

PRIMULA

- 346³ a. *Churchillii*, Guss. ex Kolb, Alpenpflanz (1890) 236. — Eur. centr.
Cottia, Widmer, in Flora, lxxii. (1889) 71. — Eur. alp. cott.
cricalensis, Guss. l. c. 237. — Tirol.
 347¹ a. *decipiens*, Stein [ubi?] ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 238. — Pedem.
deorum, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1890) 55; et Fl. Bulg. (1891) 479. — Bulg.
 l. *exigua*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge i. (1886) n. 8, p. 38; et...
Laeschkeana, A. Kern. [ubi?] ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 263. — Reg. Himal.
Lebliana X, Guss. ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 246. — Eur. centr.
 347² a. *penduliflora*, A. Kern. ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 252. — As. centr.
Schmidelyi X, Greml. Excurs. Fl. Schweiz. ed. 7 (1893) 344. — Helv.
Sturii X, Schott [ubi?] ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 256. — Stiria.
 l. *vochinensis*, Guss. ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 259; et...

PRIMULINA

- 347² a. *sinensis*, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7117 = *P. Tabacum*, Hance.

- 348¹ a. *PRUMNOPITYS*
elegans, Phil... (Ind. Kew. ii. 634) = *Podocarpus alpina*, R. Br.

PSIDIUM

- 350¹ a. *insulicola*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 333. — Bras.
tripartitum, S. Moore, l. c. — Bras.

PSYCHOTRIA

- 350³ a. *homoplastica*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 378, t. 26. — Bras.
Oreadum, S. Moore, l. c. 376. — Bras.
sciaphila, S. Moore, l. c. 379. — Bras.

PTEROSTYLIS

- 352¹ a. *pedaloglossa*, Fitzg. Austral. Orchids, ii. Part. 3 (1887). — Austral.

PUELIA

- 352³ l. *ciliata*... et Bull. Soc. Hist. nat. Autun, viii. (1895) 386.

PUELIA

- 352³ l. *occidentalis*, Franch. ex Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* (1895) 545, sphalm. = *ciliata*, Franch.

PULICARIA

- 352³ a. *Ehrenbergiana*, Sch. Bip. ex Defflers, *Voy. au Yémen* (1889) 152. — Arabia.

PULMONARIA

- 353¹ a. *dacica*, Porcius, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. xiv. (1892) 214. — Europ.

PULSATILLA

- 353¹ a. *balkana*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 637, in add. — Bulg.
Pulsatilla, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 95 = *Anemone Pulsatilla*, Linn.
rubra, St Lager, in Cariot, *Étud. des fl.*, éd. 8 (1889) 14 = *A. rubra*, Lam.

PYRETHRUM

- 354¹ a. *glanduliferum*, Somm. & Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 87. — Reg. Cauc.
Olivieri, Chab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 386. — Algeria.

PYRUS

- 354³ a. *tartarica*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 179 = *baccata*, Linn.

Q**QUERCUS**

- 355¹ a. *Chapmani*... (non *Chapmani*).
 355² l. *Fragnus Longo*, in *Bull. Natural. Sicil.* i. (1886) n. 6; *Borzi*, in *Malpighia*, ii. (1888-89) 267; et...
 a. *Grisebachii*, Kotschy, Mattei & Baldacci, ex *Baldacci*, in *Malpighia*, v. (1891) 80, et viii. (1894) 296. — Albania.
kabylica X, Trab. in *Assoc. Franç. avanc. sci.* Paris (1889) 506; Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. (1890) 822. — Algeria.
longigians, Debeaux, in *Lucante*, Rev. de Bot. xii. (1893) 254 (= *Q. microcarpa*, Lapeyr.) = *Q. Robur*, Linn.
 355³ a. *Schochiana* X, Dieck, *Cat. Arbor. Zoesch.* (1892) 26. — Hybr. artef.

R**RADIOLA**

- 356³ a. *Radiola*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 147 = *R. Linoides*, Roth.

RANDIA

- 357¹ l. *Harveyi*, Benth. & Hook. f. ex *Drake*, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 191 (= *Stylacoryne Harveyi*, A. Gray); et... — Ins. Fiji, *odorata*, Benth. & Hook. f. ex *Drake*, l. c. (= *Canthiopsis odorata*, Seem.). — Ins. Fiji.

RANUNCULUS

- 357³ a. *Freynianus*, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1893 (1894) n. xxxvii. 3. — Bulg.
 358¹ a. *Meyeri* X, Bruegg, in *Jahresb. Naturf. Ges.* Graub. xxix. 1884-85 (1886) 3. — Helv.
subhirsutus X, Bruegg, l. c. 2. — Helv.

RAPHANISTRUM

- 358² a. *Raphanistrum*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) = *Raphanus Raphanistrum*, Linn.

RAPHIOLEPIS

- 358² a. *integerrima*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 217 = *japonica*, Sieb. & Zucc.

RAUWOLFIA

- 358³ a. *mollis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 393. — Bras.

REAUMURIA

- 359¹ l. *reflexa*...; et in *Mém. Soc. Natur. Kiew*, xi. (1891) 7.

- 359² a. *REIMBOLEA*, Debeaux, in *Rev. de Bot.* viii. (1890) 266 = *Echinaria*, Desf. (Gramin.).
spicata, Debeaux, l. c. = *E. spicata*, Debeaux.

RENANTHERA

- 359³ a. *striata*, Rolfe, in *Journ. of Hort.* xxiv. (1892) 275, fig. 45; in *Bot. Mag.* (1892) t. 7233; *Williams, Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 696. — N. Granat.

RENEALMIA

- 359³ a. *foliosa*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 482. — Bras.
Holdenii, S. Moore, l. c. 483. — Bras.

RHAMNUS

- 360³ a. *ovalifolia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 71 = *hybrida*, L'Hérit.
pedunculata, Hort. l. c. 69 = *californica*, Esch.
sibirica, Hort. l. c. 71 = *R. Frangula*, Linn.

RHEEDIA

- 361¹ a. *Guacopary*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 319. — Bras.

RHIPSALIS

- 361² a. *cribrata*, Ruempl. in *Foerst.-Ruempl. Handb. Kakteenk.* (1885) 889 = *cribrata*, Lem.

RHODODENDRON

- 362¹ a. *albescens*, Hort. Bull. Cat. (1887) 11. — Form. hort.
 362² l. *Fauriei*... (non *Fauriae*).
 a. *Luscombei* X, W. Watson, in *Gard. Chron.* (1892) i. 780. — Hybr. artef.

RHODOSPETHA

- 363¹ a. *picta*, Nichols, *Dict. Gard.* iii. (1886) 457, in obs. — Am. austr.

RHUS

- 363² a. *Michauxii*, Sarg. in *Gard. and For.* viii. (1895) 404, fig. 55. — Am. bor.
frutescens, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 103 = *typhina*, Linn.

RHYNCHANThERA

- 363² a. *leucorrhiza*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 359 [Rhyncanthera]. — Bras.
riparia, S. Moore, l. c. 361. — Bras.

RHYNCHANThUS

- 363² l. *longiflorus*... (non *longifolius*).

RHYNCHOLACIS

- 363³ a. *applanata*, Goebel, *Pflanzenbiol. Schilderung.* ii. (1891) 377. — Bras.
macrocarpa, Tul. ex Goebel, l. c. 378. — Bras.
squamulosa, Tul. ex Goebel, l. c. 379. — Bras.

RIBES

- 364¹ a. *Bridgesii*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 237 = *villosum*, Gay.
carneum, Hort. l. c. 235 = *sanguineum*, Pursh.
Lavellei, Hort. l. c. 237 = *villosum*, Gay.
Loudonianum, Hort. l. c. 231 = *Gordonianum*, Lem.
robustum, Hort. l. c. 235. — Hab. ?
 l. *sardoum*... (1894) [non 1895].
utahense, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 231 = *aureum*, Pursh.

ROBINIA

- 365³ a. *glomerata*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 123 = *Caragana microphylla*, Lam.
myrtifolia, Hort. l. c. 119 = *R. Pseudacacia*, Linn.
sinensis, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 123 = *Caragana frutescens*, DC.

ROETTLERA

- 365¹ a. *Kinnearii*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (1887) 159. — Austral

ROLLINIA

- 366² a. *incurva*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 373. — Bras.

ROSA

- 366³ a. *affinita*, Puget, ex H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxv. 1885 (1886) 96 = *canina*, Linn.
almeriana, Rouy, *Excurs. bot. Espagne*. ii. (1882-83) 66. — Hisp.
alpiniformis, Haynald, ex Borb. in *Magyar Akad. Termész. Közlem.* xvi. (1880) 526 = *alpinoides*, Déségl.
amblyphylla, Rip. ex Déségl. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xv. (1876) 380 = *canina*, Linn.
amurensis, Crép. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xiv. (1875) 6 = *acicularis*, Lindl.
annoniana, Puget, ex H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxv. (1885) 95 = *canina*, Linn.
apennina, Borb. in *Magyar Akad. Termész. Közlem.* xvi. (1880) 317, 366 = *gallica*, Linn.
Ascheronianiana, Crép. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xv. (1876) 51, 53, in obs. = *californica*, Cham. & Schlecht.
asperifolia, Borb. in *Magyar Akad. Termész. Közlem.* xvi. (1880) 443, 462 = *glauca*, Vill. ?
assurgens, Vukot, in *Rad. Jugos. Akad. Zagreb.* lxxxiii. II. (1886) 9, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 3 = *hybrida*, Schlecht.
Baenitzii, Christ, in *Flora*, lx. (1877) 404, in syn.; ex Nym. *Consp. Fl. Eur.* ii. I. (1889) 116 = *pomifera*, Herrm.
belgradensis, Panic, Fl. Belgrad. (1865) 130; ed. 2 (1878) 231 = *rubiginosa*, Linn. ?
Bernardii, Moutin, in *Bull. Soc. éch. pl. Dauph.* xiii. (1886) 547 = *rubiginosa*, Linn.
Billotiana, Crép. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxi. I. (1882) 89 = *tomentosa*, Sm.
bohemica, H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxv. (1885) 79; et in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 20 = *canina*, Linn.
borbonica, Hort. Monac. ex *Annal. de Gand*, ii. (1846) t. 42; Dippel, *Handb. Laubholz.* i. I. (1893) 563 = *chinensis*, Jacq.
budensis, Borb. in *Magyar Akad. Termész. Közlem.* xvi. (1880) 388, 391 = *canina*, Linn.
Buziae, Borb. ex H. Braun, in *Természetvizsgalok*, xxiii. 75; ex A. Kern. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 12, in obs. = *canina*, Linn.
 368¹ a. *Camellia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 171 = *laevigata*, Michx.
camelliaefolia, Hort. l. c. = *laevigata*, Michx.
chlorocarpa, Fenzl & H. Braun, ex H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxv. (1885) 65 = *phoenicia*, Boiss.
cimelium X, Kmet, in *Oswald, Almanach* (1893) 167. — Hung.
cistiflora, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. I. [Polypet.] (1894) 175 = *spinosissima*, Linn.
conjuncta, Crép. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxi. (1882) 58 = *canina*, Linn.
Cornazi, Gremli, in *Neue Beitr. Fl. Schweiz*, iv. (1887) 97 = *elliptica*, Tausch.
cujavica, Spribille, in *Bot. Abth. Nat. Ver. Posen*, ii. (1895) 5 = *omissa*, Déségl.

ROSA

- 368¹ a. *cymelliflora*, Borb. & Vukot. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 449. — Hung.
dilucida, Déségl. & Ozanon, in Bull. Soc. éch. pl. Dauph. ix. (1882) 372 = canina, Linn.
diplacantha, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 114 = glandulosa, Bell.
Dollineriana, J. B. Keller, in Halácsy et H. Braun, Nachtr. Fl. Nied.-Oest. (1882) 267 = canina, Linn.
etrusca, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 356, 366 = gallica, Linn.
euvestita, Borb., l. c. 508, 517 = tomentosa, Sm.
fissisepala, Borb., l. c. 552 = pimpinellifolia, Linn.
Formanekiana X, J. B. Keller, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 120. — Austria.
Gabrielis, F. Gérard, in Magnier, Scrin. fl. select. iv. (1884) 85 = canina, Linn.
gapensis X, Gren. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1895) 595. — Gall.
Gizellae, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 479, 486 = canina, Linn.
grunpensis, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 325, in syn. = inclinata, Kern.
Guentheri, Wiesb. l. c. 338 = abietina, Gren.
Haussknechtii, Sagorski, Fl. von Naumburg (1885) 21 [Quid?] — Eur. centr.
Haynaldiana, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 345, 349 = arvensis, Huds. ?
367² a. *Heimerlii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 129 t. 9. — Hung.
Herculis, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 507, 512 = tomentosa, Sm.
hirtella, Rip. ex Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. viii. (1869) 239, 268; Cottet & Castella, Guid. bot. Cant. Frib. (1891) 130 = canina, Linn.
hirtifolia, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 109 = canina, Linn.
hologyna, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 346, 353 = canina, Linn. ? (fide cl. Crép.)
Hostii, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 115 = alpina, Linn.
illyrica, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 532, in syn. = spinosissima, Linn.
Ischiana, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. viii. (1869) 242, 243, 318 nom. nud.; Ces., Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 670; Burnat & Gremli, Obs. Ros. Ital. (1887) 33. — Italia.
jenensis, M. Schulze, in Mitt. geogr. Ges. Jena, iii-iv. (1885) 79 = rubiginosa, Linn.
Kernerii, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 81; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 801 = canina, Linn. ?
Kitabelii, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 507, 514 = tomentosa, Sm.
Kochiana, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 293. — Hab. ?
367³ a. *lanceolata*, Waisb. in Közseg. Vidékének edényes növényei (1889) 61 = canina, Linn.
lantoscana, Burnat & Gremli, Ros. Alp. Marit. Suppl. (1882) 12 = micrantha, Sm.
lanuginosa, Ravaut, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 285 = tomentosa, Sm.
laxifolia, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 421 = canina, Linn.
laxiphylla, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 157; et in Bot. Centralbl. (1880) 286, sphalm. = praec.
leiostylia, Rip. ex Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. viii. (1889) 238 = canina, Linn.

ROSA

- 367³ a. *leucadia*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 126. — Ins. Leucad.
litoralis X, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 346, 354 [Hybr. spont. ?]. — Croatia.
longisepala, Ravaut, Guid. botan. Dauphiné, 13^{me} excurs. (1894) 17 = pomifera, Herrm. var.
367³ l. *Maassii*... (non Massii).
mauternensis, J. B. Keller, in Halácsy et H. Braun, Nachtr. Fl. Nied.-Oest. (1882) 252 = tomentosa, Sm.
micranthoides, J. B. Keller, l. c. 239 = micrantha, Sm. ?
Mollardiana, (non Mallardiana).
Moutini, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. (1883) 149; et ex Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 280 = rubiginosa, Linn.
muscipula X, Boullu, in Bull. Soc. bot. Lyon, Sér. II, xi. (1884) 75; et in Bull. Soc. éch. pl. Dauph. xii. (1885) 506 = gallica, Linn.
myrtilloides, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 125 = canina, Linn.
Neilreichii, Wiesb. ex Halácsy et H. Braun, Nachtr. Fl. Nied.-Oest. (1882) 26 = hybrida, Schleich.
nemophila, Déségl. & Ozanon, in Bull. Soc. éch. pl. Dauph. ix. (1882) 393 = canina, Linn.
nipponensis, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xiv. (1875) 7; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 584, in obs. = acicularis, Lindl.
Obornyana, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. ii. (1882) 35 = canina, Linn.
oligacantha, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 361, 373 = gallica, Linn.
Pacheri, J. B. Keller, in Deutsche Bot. Monatsschr. (1884) 72; et ex Pacher, Fl. von Kärnten. (1886) 281 = glauca, Vill. ?
per-parva, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 490 = micrantha, Sm.
Petrovicii, Burnat & Gremli, ex Petrovic, Addit. ad fl. agri Nyss. (1885) 70. — Serbia.
368¹ a. *pisiformis*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 173 = pisocarpa, A. Gray.
pomponiana, Hort. l. c. = centifolia, Mill.
platyphylla, Hort. Japon. ex Rev. Horticult. lviii. (1886) 436 = multiflora, Thunb.
Przewalskii, Regel, [ubi?] ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 297, in obs. = macrophylla, Lindl.
Pseudo-cuspidata, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xi. (1872) 89; et xxi. (1883) 93 = tomentosa, Sm.
Pseudo-montana, R. Keller, in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 323 = glauca, Vill.
Pseudo-terebinthinacea, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 508 = tomentosa, Sm.
Pseudo-tomentella, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 127, in obs. — Eur.
pyncacantha, Borb. l. c. 450 = canina, Linn.
quadica, H. Braun, in Ber. bot. Ver. Landsh. (1889) 108; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 801 = canina, Linn.
quercicola, Déségl. & A. Kern. ex Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 387 = canina, Linn.
retinervis, Borb. l. c. 386, 393 = canina, Linn.
Reussii, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 104 = canina, Linn.
rhynchocarpa, Rip. ex Déségl. in Bull. Soc. bot. Belg. xv. (1876) 371; Cottet & Castella, Guid. bot. Cant. Frib. (1891) 129 = canina, Linn.
Rocheli, Sandor, ex Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 551 = alpina, Linn.
romana, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 167 = ferruginea, Vill.
Rosa-mundi, Hort. l. c. = damascena, Mill.

ROSA

- 368¹ a. *rougeonensis*, Ozanon, in Magnier, Scrin. fl. select. x. (1891) 189; et ex Lucante, Rev. de Bot. ix. (1891) 196 = canina, Linn.
scaniana, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. (1883) 58 = canina, Linn.
Schmidtii, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 72; Oborny, Fl. von Mährens (1886) 216 = Jundzilli, Bess. ?
368² l. *Sendtneri*... (non Sendtneri).
septicoloides, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. l. (1882) 161 = micrantha, Sm.
serbica, Burnat & Gremli, ex Petrovic, Addit. ad fl. agri Nyss. (1885) 69. — Serbia.
sylvatica, Tausch, in Flora, ii. (1819) 464; Déségl. in Bull. Soc. bot. Belg. xv. (1876) 244 = gallica, Linn.
Skofitziana, Blocki, ex H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 429 = canina, Linn.
stenomalla, Borb. [ubi?] ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) [103] = tomentosa, Smith.
stenosepala X, Christ, Die Rosen d. Schweiz, (1879) 139; Rouy, in Deyrolle, Le Naturaliste, Sér. II, xi. (1889) 10. — Helv.
subatrachostylis, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 96 = canina, Linn.
subduplicata, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 15; et in Bot. Centralbl. xxxviii. (1889) 518. — Austria.
subglabra, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 94 = canina, Linn.
subrepens, Vukot. in Rad. Jugos. Akad. Zagreb. lxix. (1884) 17 [Quid. ?]. — Hung.
subspoliata, Déségl. & Ozanon, in Bull. Soc. éch. pl. Dauph. ix. (1882) 377 = micrantha, Sm.
tardata, Gren. Rev. fl. monts Jura (1876) 61 montana, Chaux.
Tauschiana, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 78 = canina, Linn.
tenuiflora, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 116 = alpina, Linn.
tenuissima, «C. C. Gmel.» ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 595, sphalm. (pro mitissima) = pimpinellifolia, Linn.
tomentelloides, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 127, in obs. = R. Pseudo-tomentella, H. Braun.
368² l. *Unterkreuteri*... (non Unterkreuteri).
vagiana, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. (1882) 57; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xix. (1870) 513; H. Braun, l. c. xxxv. (1885) 93 = canina, Crép.
victoria-Hungarorum, Borb. in Napi Közlem. xxii. (1882) 10, nomen; et Enum. pl. Comit. Castri. (1887) 279 = canina, Linn.
Waitziana X, Tratt. Rosac. Monog. i. (1825) 57 = gallica, Linn. ?
Woloszczakii, J. B. Keller, in Halácsy & H. Braun, Nachtr. Fl. Niederoest. (1882) 282; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 91 = canina, Linn.
Zabelii, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. I. (1882) 94; et ex H. Braun, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 113 = tomentosa, Sm.
zasljensis... (non zaslensis).
zoiseana, H. Braun & Oborny, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 96, nomen. — Austria.
368³ l. **ROTANTHA**, Baker, ... t. 51 = **Lawsonia**, Linn. (Lythrar.).
combretoides, Baker, l. c. = L. alba, Linn.
RUBUS
369² a. *acanthoclados*, Borb. in Termész. (1878) 322. ex Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 204, in syn. = *Idaeus*, Linn.
acanthodes, Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 89, in syn. = R. Guentheri, Weihe et Nees.
acutifrons, Aug. Ley, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 13 = humifusus, Weihe & Nees.

RUBUS

- 369³ a. *Becheri*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 603; et xli. (1891) 248 = *villicaulis*, *Koehl.*?
- berolinensis*, E. H. L. Krause, in Abh. Bot. Ver. Prcv. Brand. xxvi. (1884) 16 = *chlorophyllus*, *Gremli.*
- 370¹ a. *Burnati*, *Schmidely*, in Bull. Soc. bot. Genève, iv. (1888) 184. — Helv.
- Clusii*, *Borb.* in *Erdész. Lapok.* (1885) 401; et *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887) 292. — Hung.
- danicus*, Focke, in Abh. Nat. Ver. Brem. ix. (1886) 322 = *macrophyllus*, *Weihe.*
- debilis* X, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 659. — Austria.
- decorus*, Halácsy, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. [ed. anni 1883] iii. (1884) 42. — Austria.
- dissimulans*, Lindeb. in Act. Soc. sci. Gothob. xx. Bih. (1884) 32; Aresch. in Bot. Notiser, xiv. (1886) 78 = *corylifolius*, *Sm.*
- empelios*, Focke, in Bot. Ver. Baden, iii. (1894) 152 = *carpinifolius*, *Weihe.*
- erythrostemon*, A. Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xvii. (1881) 530 = *obscurus*, *Kaltenb.*
- 370³ 1. *foliolosus*... (non foliosus).
- fusciculatus*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 666; et xli. (1891) 252 = *vestitus*, *Weihe.*
- gloggnitzensis* X, Halácsy, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iii. (1884) 40; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 660. — Austria.
- Griffithianus*, Rogers, in J. E. Griffith, Fl. Angles. and Carnarv. (1895) 48 = *Borreri*, *Bell Salt.*
- 371¹ a. *Gussonei*, Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1891) 172 = *canadensis*, *Weihe.*
- Halácsyi* X, *Borb.* in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 666; et xli. (1891) 251; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 732. — Austria.
- Harmandii*, F. Gérard, in Lucante, Rev. de Bot. viii. (1890) 26, 74 = *orthacanthus*, *Wimm.*?
- Heimerlii*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 668; et xli. (1891) 282 = *orthacanthus*, *Wimm.*?
- inaequalis*, Halácsy, l. c. 662; et xli. (1891) 245. — Austria.
- incertus* X, Halácsy, l. c. 658. — Austria
- Langei*, G. Jensen, ex Frederichs. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1887) 67 = *villicaulis*, *Koehl.*
- laxiflorus*, Halácsy, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. [ed. anni 1883] iii. (1884) 46. — Austria.
1. *lusitanicus*... (non lusitanicus).
- 371³ a. *melanolasius*, *Hort. Späth, Catal.* (1894-95), et in *Neub. Gart.-Mag.* (1894) 177. — Am. bor. occ.
- monticolus*, Focke, in Hallier-Wohlf.-Koch, Syn. Fl. Germ. i. (1891) 760 = *cunctator*, *Focke.*
- nepalensis*, *Hort.* ex *Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 159 = *nobilis*, *Regel.*
- obtusidens* X, Boulay & Diomède, in Bull. Soc. sci. nat. Nîmes, xix. (1891) 77. — Gall.
- oreleus*, Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1891) 174, 310 = *caesius*, *Linn.*
- orthosepalus*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 664 = *villicaulis*, *Koehl.*?
- pauciflorus*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 12. — Bohem.
- 372³ 1. *peramethystenus*... (non paramethystenus). *reconditus*, *Schmidely*, in Bull. Soc. bot. Genève, iv. (1888) 170. — Helv.
- Schmetzeri*, A. Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxi. (1881) 119 = *hirtus*, *Waldst. & Kit.*
- scotophilus*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 667 = *Koehleri*, *Weihe & Nees.*?

RUBUS

- 372² 1. *scotophyllus*, F. Gérard, in Lucante, Rev. de Bot. viii. (1890) 75, in syn. = R. Godroni, P. J. Muell.
- serridens* X, Boulay & Diomède, in Bull. Soc. sci. nat. Nîmes (1891) 77. — Gall. mer.
- strictus*, A. Favrat, ex Gremli, Fl. anal. Suisse (1886) 187; et Excurs. Fl. Schweiz, éd. 6 (1889) 149 = *vestitus*, *Weihe.*?
- subsessilis*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 282; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 12 [sphalm. subsenilis] = *memorosus*, *Hayne.*
- subaculeatus*, *Borb.* in Oest. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 151 = *Guentheri*, *Weihe & Nees.*
- 373¹ a. *tiliaefolius*, J. Harmand, in Lucante, Rev. de Bot. vi. (1887-88) 315, t. 12; et viii. (1890) 75 = *Godroni*, P. J. Muell.
- Vetteri*, A. Favrat, ex Fl. anal. Suisse (1886) 188; Cottet & Castella, Guid. bot. cant. Frib. [1891] 88 = *vestitus*, *Weihe.*
- villosulus* X, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 665. — Austria.

RUDGEEA

- 373² a. *frondosa*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 381. — Bras.

- 374¹ a. **RUEHSSIA**, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 609. **ASCLEPIADEAE.**
- estebanensis*, Karst. l. c. fig. 684. — Am. austr.

RUPELLIA

- 373³ a. *Makoyana*, *Hort. Makoy, ex Closon*, in Rev. Hort. Belg. (1895) 109, cum ic. — Bras.

RUMEX

- 374² a. *cordifolius* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 104. — Helv.
- intercedens* X, K. Reching. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 19. — Hung.
- rhaeticus* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 103. — Helv.

RUPPIA

- 374³ a. *andina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1894) 525 = *maritima*, *Linn.*

RUSBYA

- 374² a. *boliviana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 215. — Bolivia.

RYPAROSA

- 375² a. *caesia*, Kurz, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) II. 125 = *Kurzii*, *King.*

S**SACCIA**

- 375³ a. *elegans*, *Naudin*, in Rev. Hort. lxi. (1889) 35. — Columb., Boliv.

SACCOLABIUM

- 375³ a. *furcatum*, *Hort.* ex *Williams. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 700. — Ind. or., Java.
- Turneri*, *Williams*, l. c. 703. — Ind. or.

SAGINA

- 376² a. *pachyrrhiza*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 773. — Chili.

SALDANHAEA

- 377¹ a. *myriantha*, Bureau, in Vidensk. Medd. Natur. Forh. Kjöb. (1893) 104 [Symb. Fl. Bras. (Bignon.) 1219] = *Tecoma myriantha*, *DC.*

SALIX

- 377² a. *arbusculoides* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 111. — Helv.
- Boulayi* X, ... viii. (1890) 211 [non viii. (1894) 214].

SALIX

- 377² a. *dacica*, *Porcius*, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 263. — Europ.
- davosiana* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 113. — Helv.
- subcaesia* X, Bruegg. l. c. 114. — Helv.

SALVIA

- 378³ a. *Pringlei*, *Robinson & Greenm.* in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 391. — Mexic.

SARANTHE

- 379³ a. *pluriflora*, O. G. Petersen, in Vidensk. Medd. naturh. Foren. Kjöb. (1889) 335 [Symb. Fl. Bras. xxxiii. 905]. — Bras.

SARCOCHILUS

- 380¹ a. *bimaculatus*, *King & Pantling*, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) II, 340. — Sikkim.
- crepidiformis*, *King & Pantling*, l. c. — Sikkim.
- Godefroyanus*, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, Ill. Ins. Mar. Pacif. (1892) 310 (= *Thrixspermum Godefroyanum*, *Reichb. f.*). — Ins. Fiji.
- Graeffei*, *Benth. et Hook. f. ex Drake*, l. c. (= *T. Graeffei*, *Reichb. f.*). — Ins. Samoa.

SARGENTIA

- 380³ a. *aricocca*, *Wendl. ex Bull. Soc. Tosc.ortic.* xiv. (1889) 341 (= *Pseudophoenix Sargentii*, *H. Wendl.*). — Florida.

SARRACENIA

- 380³ a. *Manduiana* X, *Hort. Pitcher & Manda*, ex Gard. Chron. (1893) i. 455. — Hybr. artef.

SATUREJA

- 381¹ a. *olympica*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 40, in syn. = *pisidia*, *Wettst.*
- pisidia*, *Wettst.* in Sitzb. Akad. Wiss. Wien, xcvi. I. 1889 (1890) 374; Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 40. — Graecia.
- pisidica*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 466; et in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1894) n. xxix. 24 = *Wiedemanniana*, *Lall.*
- Wiedemanniana*, *Lall.* [ubi?] ex *Velen. l. c.* 24. — Bulg.

SAXIFRAGA

- 382¹ a. *blepharophylla*, A. Kern. [ubi?] ex *Kolb. Alpenflanzen* (1890) 289. — Sturia.
1. *Engleri*, *Huter*, ex *Kolb*, l. c. 294 (non *Hort.*).
- Guthriana* X, *Hort.* ex *Kolb*, l. c. 297 = *Guthriana* X, *Hort.*?
- 382² a. *meridionalis*, *Terrac.* in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 185 = *oppositifolia*, *Linn.*

SCABIOSA

- 382³ 1. *balkanica*...; et in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 40.
- Victoriae* X, *Hort. Dammer*, ex *Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xiii. (1888) 437. — Hybr. artef.

SCHISTOCARPHA

- 384¹ 1. *paniculata*...; et x. (1893) 127.

SCHIZANTHUS

- 384¹ a. *Romani*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 126. — Chili.

SCHIZOCARPUM

- 384² a. *parviflorum*, *Robinson & Greenm.* in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 386. — Mexic.

SCHIZOGLOSSUM

- 384³ 1. *Nyssae*, *Britten*... (non *Britton*).

SCILLA

- 386² a. *antitaurica*, J. N. Gerard, in Gard. and For. (1890) 169 = *sibirica*, *Andr.*
- laxiflora*, *Baker*, in Gard. Chron. (1891) i. 668. — Afr. austr.
- radnensis*, *Porcius*, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 276. — Europ.

SCLERANTHUS

- 387² a. *aciformis*, *caniceps*, *canocephalus* (i. e. = *conocephalus*), *divergens*, *gemmaus*, *Hohenackeri*, *modestus*, *myriacanthus*, *Schurii*, *setipes*, *spithameus*, *subclavatus*, *subsessilis*, *uncinatus*, *verecundus*, *Reichb.* ex *Schur*, in *Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiii. (1895) 200-202, nomina nuda = *annuus*, *Linn.*
approximifolius, *bigeminatus*, *chloroleucanthus*, *dodrantalis*, *elegans*, *marginatus*, *neglectus*, *Reichb.* ex *Schur*, in *Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiii. (1895) 199-200, nomina nuda = *perennis*, *Linn.*
microcarpus, *Schur*, l. c. 201 = *Hohenackeri*, *Reichb.*

SCORODONIA

- 388² a. *Scorodonia*, *Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii.* (1895) 593 = *Teucrium Scorodonia*, *Linn.*

SCORZONERA

- 388³ l. *mongolica*... [transf. post *S. leptocladam*.]
rubriseta, *Lipsky*, in *Mém. Soc. Natur. Kiev*, xi. (1891) 52...
rumelica... 1893 (1894) n. xxxvii, 40 (non (1892-93) 40).

SCUTELLARIA

- 389¹ a. *Pichleri*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 449. — *Bulg.*

SEBAEA

- 389² a. *tabularis*,... = *purpurea*, *Cham. & Schlecht.*

SEDUM

- 290¹ a. *ponticum*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 191. — *Bulg.*

SELENIPEDIUM

- 390² a. *Finetianum* ×, *Hort. Sander*, ex *Orchid Rev.* iii. (1895) 102. — *Hybr. artef.*
paulistanum, *Rolfe*, in *Orchid Rev.* i. (1893) 239, in obs. (= *Cypripedium paulistanum*, *Barb. Rodr.*) — *Bras.*
pulchellum ×, *Hort. ex Orchid Rev.* i. (1893) 166. — *Hybr. artef.*

SEMECARPUS

- 390³ a. *vitiensis*, *Th. Dur. ex Drake*, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 146 (= *Ormocarpus vitiensis*, *A. Gray*). — *Ins. Fiji.*

SENECIO

- 39² a. *Arnautorum*, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1888 (1889) 45; *et Fl. Bulg.* (1891) 254. — *Bulg.*
391³ a. *bulgaricus*, *Velen. ll. cc.* 44 et 256. — *Bulg.*
392² *Heriteri*, *W. Watson*, in *Gard. and For.* iv. (1891) 510, fig. 79 (= *Cineraria aurita*, *Hort.*). — *Ins. Canar.*
393² l. *nephelagetus*... (non *nephelagetus*).
petroeanus... (non *petersanus*).
sagittatus, *O. Hofm.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 297; *Hieron*...
394² a. *tyrolensis*, *A. Kern* [ubi ?] ex *Kolb*, *Alpenpflanzen* (1890) 325 = *abrotanifolius*, *Linn.*
Wagneri, *Degen*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 20. — *Bulg.*

SERRATULA

- 395² l. *Scoanei*... (non *Scoanei*).

SESELI

- 396¹ a. *validum*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 213. — *Bulg.*

SIDA

- 397³ a. *caudatifolia*, *Robinson & Greenm.* in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 382. — *Mexic.*

SIDEROXYLON

- 398² a. *pyruliferum*, *Benth. & Hook f. ex Drake*, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 229 (= *Sapota pyrulifera*, *A. Gray*). — *Ins. Fiji.*
sandwicense, *Benth. & Hook f. ex Drake*, l. c. 228 (= *S. sandwicensis*, *A. Gray*). — *Ins. Sandwic.*
l. *timorense*... (non *limorense*)...
vitiense, *Benth. & Hook f. ex Drake*, l. c. 229 (= *S. vitiensis*, *A. Gray*). — *Ins. Fiji.*

SILAUS

- 398² a. *Silaus*, *Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii.* (1895) 402 = *flavescens*, *Bernh.*

SILENE

- 398² a. *alba*, *Burnat*, *Fl. Alp. Marit. i.* (1892) 212, in obs. = *Lychnis dioica*, *Linn.*
Bergiana, *Lindman*, in *Act. Hort. Berg. i.* n. 6 (1891) 3. — *Hab. ?*
399¹ a. *mentagensis*, *Coss. Ill. Fl. Atlant. i.* (1890) 145, t. 94. — *Reg. Maurit.*
pindicola... 83 (non 85).
Pomeli, *Batt. in Bull. Soc. bot. Fr.* xxxviii. (1891) 219. — *Algeria.*
Porcari, *Tin. ex Lojac. Fl. Sicula*, i. I. (1888) 158. — *Sicilia.*
rubra, *Burnat*, *Fl. Alp. Marit. i.* (1892) 212, in obs. = *Lychnis sylvestris*, *Schk.*

SIPHOCAMPYLUS

- 417¹ a. *bolivensis*, *Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 443. — *Bolivia.*
cutervensis, *Zahlbr. l. c.* 442. — *Peruvia.*
Jelskii, *Zahlbr. l. c.* 441. — *Peruvia.*
meridensis, *Zahlbr. l. c.* 440 = *sessilifolius*, *Vatke.*
Spruceanus, *Zahlbr. l. c.* 443. — *Peruvia.*
tupaeformis, *Zahlbr. l. c.* 440. — *Bolivia.*

SISYRINCHIUM

- 400¹ l. *oligostachyum*... (non *oligostachium*).
Pringlei, *Robinson & Greenm.* in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 394. — *Mexic.*

SKIMMIA

- 401¹ a. *Rogersii*, *Hort. ex Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 51 = *japonica*, *Thunb.*

SOBRALIA

- 401³ a. *Amesiana* ×, *Hort. Sander*, ex *Orchid Rev.* iii. (1895) 203. — *Hybr. artef.*
Beyeriana, *Hort. Seeger*, ex *The Garden*, xlii. (1891) 324. — *Hab. ?*
Linden, *W. Watson*, in *Gard. and For.* viii. (1895) 444. — *Ecuad.*
Sanderæ, *Rolfe*, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 494; *Williams Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 714. — *Am. centr.*

SODIROA

- 401³ l. *dissitiflora*... (1888) 365; *et Bromel. Andreeanae* (1889) 42, t. 13 c.
Sprucei... (1888) 365; *et Bromel. Andreeanae* (1889) 43, t. 13 d. (non lxi.).

SOLANUM

- 402¹ a. *Duchartrei*, *Heckel*, in *Ill. Wien. Gart.-Zeit.* xv. (1890) 367. — *Afr. trop. occ.*
402² a. *Mors-elephantum*, *Hort. Dammann*, ex *Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xix. (1894) 29, fig. 7. — *Afr. trop.*

SOLENOGYNE

- 403¹ a. *Emphysopus*, *F. Muell. Key Syst. Vict. Pl. i.* (1888) 310. — *Austral.*

SOLIDAGO

- 403¹ l. *parviflora*... (non *parvula*).

SONCHUS

- 403² a. *zollukoferioides*, *Rouy. Excurs. bot. Espagne*, ii. (1882-83) 73. — *Hisp.*

SOPHORA

- 403³ l. *zeylanica*... = *heterophylla*, *Arn.*

SORBUS

- 403³ a. *argentea*, *Hort. ex Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 187 = *Pyrus Aria*, *Linn.*
discolor, *Maxim.* ex *Gard. Chron.* (1891) i. 462. — *Sibir. or.*
flabellata, *Hort. ex Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 185 = *Pyrus Aria*, *Linn.*
magnifica, *Hort.* l. c. 189 = *P. vestita*, *Wall.*

SORBUS

- 403³ a. *quercifolia*, *Hort. ex Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1884) 187 = *Pyrus intermedia*, *Ehrh.*
sulphurea, *Hort. l. c.* 186 = *P. Aria*, *Linn.*

SORGHUM

- 404² a. *Sorghum*, *Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, i.* (1895) 371 = *vulgare*, *Pers.*

SORINDEIA

- 404² a. *juglandifolia*, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1893) 108, in obs. sphalm. = *grandifolia*, *Engl.*

SPARGANIUM

- 404² a. *diversifolium*, *Aschers. in Schr. Naturf. Ges. Danzig*, ix. (1895) 335. — *Germ.*

SPERMOLEPIS

- 405² a. *tannifera*, *Heckel & Schlagd.* in *C.-R. Acad. sci. Paris*, cxiv. (1892) 1793, in adnot. = *gummifera*, *Brongn. & Gris.*

SPIRAEA

- 407¹ a. *belloides*, *Hort. ex Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 151 = *japonica*, *Thunb.*
flagellaris, *Hort. l. c.* 149 = *canescens*, *Don.*
407² a. *rhombifolia*, *Hort. l. c.* = *canescens*, *Don.*
serrata, *Hort. l. c.* = *canescens*, *Don.*
Standishii, *Hort. l. c.* = *canescens*, *Don.*
Thompsoni, *Hort. l. c.* 155 = *S. Thunbergii*, *Sieb. & Zucc.*

SPOROBOLUS

- 408¹ a. *conguensis*, *Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 369. — *Congo gall.*
effusus, *Franch. l. c.* 370. — *Congo gall.*
408² a. *mayumbensis*, *Franch. l. c.* 367. — *Congo gall.*
strictus, *Franch. l. c.* 368. — *Congo gall.*

STACHYS

- 409¹ a. *tuberifera*, *Naudin, ex Rev. Hort.* lix. (1887) 290; *et ex Gard. Chron.* (1888) i. 211, 13 fig. 1. — *China bor.*

STANHOPEA

- 409¹ a. *bellaerensis* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 100. — *Hybr. artef.*

STAPELIA

- 409² a. *albicans*, *Hort. Sprenger*, in *Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xix. (1894) 235, fig. 29 = *angulata*, *Todaro.*
Scylla, *Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xix. (1894) 234, fig. 33. — *Hab. ?*

STATICE

- 409³ *superba*, *Hort. Haage & Schmidt, ex Gartenfl.* xxxvi. (1887) 666, fig. 170. — *Hab. ?*

STENOGLOTTIS

- 411¹ a. *longifolia*, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1891) t. 7186. — *Natal.*

STEPHANIA

- 411³ l. *africana*... (dele et conf. sub *STEPHANIA*, *Kuntze*).

- 411³ a. *STEPHANIA*, *Kuntze* (non *Lour.*) *Rev. Gen.* (1891) 353, in obs. = *Astephania*, *Oliver.*
africana, *Kuntze*, l. c. = *A. africana*, *Oliver.*

STERCULIA

- 412¹ l. *Tavia*... (non *Taria*).

STEVIA

- 412¹ l. *odorata*, *Hort. Dammann, Catal.* (1890-91) 80, 83, fig. 53; *et*...

- 415³ a. *STRAILIA*, *Th. Dur. Ind. Gen. Phan.* (1888) 129 (= *CERCOPHORA*, *Miers*).
MYRTACEAE.

STREPTOCARPUS

- 413³ a. *Lichtensteinensis* ×, *Hort. ex Wien. Ill. Gart. Zeit.* xix. (1894) 361, fig. 56; — *Hybr. artef.*

STREPTOCARPUS

- 413³ a. *multiflorus* X, Hort. Laing, ex Gard. Chron. (1895) ii. 211 [multiflora]. — Hybr. artef.

- 414¹ l. **STRONGYLODON**... (non STROGYLODON.
siderospermum... 392 (non 322).

STROPHANTHUS

- 414² l. Barteri... 301 (non 323).
bracteatus... 3 2 (non 323).
414³ l. ogoensis... 319 (non 324).
Paroissei... 320 (non 324).
parviflorus... 303 (non 321).
Pierrei, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1150. — Cochinch.

STUARTIA

- 415² a. *japonica*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 41 = S. Pseudo-Camellia, Maxim.

SUCCISA

- 416¹ l. *Carvaleana*, Marez... (non *Carvalheana*, Maris).
Succisa, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2. ii. (1895) 632 = *Scabiosa Succisa*, Linn.

SUSUM

- 416¹ a. *anthelminticum*, Maury, in Rev. Hort. lxi. (1889) 76, fig. 23 = *Susum malayanum*, Planch.

SWAINSONA

- 416² *Ferrandi*, Hort. ex Rev. Hort. lxi. (1886) 562. — Form. hort.

SWERTIA

- 416² a. *Chirayta*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2. ii. (1895) 602 = *cordata*, Wall.
416³ l. *tibetica*... 174 (non 175).

SYMPHORANTHERA

- 417¹ a. *polystachia*, Boj. ex Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 444 = *Dialypetalum floribundum*, Benth. & Hook. f.

SYMPHORICARPOS

- 417¹ l. *Symphoricarpos*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2. ii. (1895) 764 = *racemosa*, Michx.

SYRINGA

- 418¹ a. *japonica*, « Decne, » ex Sarg. in Gard. Chron. (1886) i. 560, fig. 123; et in Gard. and For. ii. (1889) 295, fig. 115. — Japon.

T**TABEBUIA**

- 418² a. *aurea*, Benth. & Hook. f. ex S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 423 (= *Bignonia aurea*, Silva Manso). — Bras.
chapadensis, S. Moore, l. c. 423. — Bras.

TACHIADENUS

- 418³ a. *radiatus*, Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. xiv. (1889) 113. sphalm. = *carinatus*, Griseb.

TACSONIA

- 418³ a. *Smythiana* X, Hort. ex Gard. Chron. (1892) ii. 704, fig. 109. — Hybr. artef.

TAGETES

- 419¹ a. *scabra*, T. S. Brandeg. in Zee, i. (1890) 344. — Guatem.

TAINIA

- 419¹ l. *Hookeriana*, King & Pantling... 336 (non King... 8).

TALINUM

- 419¹ a. *roseum*, Hort. Dammann. Cat. (1892) 4. — Abyss.

TAMARIX

- 419² a. *algeriensis*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 35 = *gallica*, Linn.
aphylla, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2. ii. (1895) = *orientalis*, Forsk.

TARASA

- 420¹ a. Alberti, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 321. — Chili.

TARENNA

- 420³ a. *sambucina*, Th. Dur. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. (1890) 190; et Fl. Polyn. franç. (1892) 89 (= *Stylocoryne sambucina*, A. Gray). — Ins. Pacif.

TECOMA

- 420³ a. *valdiviana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 207. — Chili.

TELANTHERA

- 420³ a. *geniculata*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 443. — N. Guin.

TEPHROSIA

- 421² l. *ovaria*... (non *oraria*).

TEPUALIA

- 421² a. *patagonica*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. 755. — Am. austr.

TERMINALIA

- 421² a. *festinata*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 352. — Bras.

TERNSTROEMIA

- 421² a. *Britteniana*, F. Muell. in Journ. Bot. xxix. (1891) 176. — Austral.

TETRAGONIA

- 422² a. *copiapina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 169. — Chili.
ovata, Phil. l. c. 168. — Chili.
robusta, Phil. l. c. 169. — Chili.

TETRAPTERIS

- 422³ a. *pilifera*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 326. — Bras.
praecox, S. Moore, l. c. 327. — Bras.

TEUCRIUM

- 423³ a. *gracile*, Barbey & Major, Karpathos (1895) 127, t. 10. — Ins. Karpathos.
423² a. *Skorpili*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 39; et Fl. Bulg. (1891) 443. — Bulg.

THEVETIA

- 425² a. *Thevetia*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2. ii. (1895) 613 = *neriifolia*, Juss.

THYMUS

- 427¹ a. *micromeroides*, Rouy, in Bull. Soc. bot. Fr. xxxv. (1888) 122. — Hisp.
427² l. *Vandasii*... 1889 (1890) ii. 39... (non 1890 (189) i)...

TILIA

- 428¹ a. *Beaumontii*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 47 = *platyphyllos*, Scop.
laciniata, Hort. l. c. = *platyphyllos*, Scop.

TILLAEA

- 428² a. *rencana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 324. — Chili.

TILLANDSIA

- 428³ a. *chrysostachys*, Baker, in Bot. Mag. (1886) t. 6906; in Rev. Hort. lxi. (1887) 166 (= *Vriesia chrysostachys*, Ed. Morr.). — Peruv.
429³ a. *leodiensis* X, Hort. Veitch. in Gartenfl. xlii. (1893) 340; et in Gard. Chron. (1893) i. 580. — Hybr. artef.
Wioti X, Hort. ex Rev. Hort. lxi. (1890) 203. — Hybr. artef.

- 432² a. **TOLBONIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 369. **COMPOSITAE**.
anamitica, Kuntze, l. c. — Anam.

- 432³ a. **TOULICIA**, Aubl.
brachyphylla, Radlk. in Kuntze, Rev. Gen. (1891) 145. — Venezuela.

TRADESCANTIA

- 433³ a. *decora*, Hort. Bull. Cat. (1892) 3. — Bras.
elongata, Hort. Linden, ex Gard. Chron. (1893) i. 474. — Hab.?
velutina, L. Linden, l. c. 475. — Hab.?

TRAGIA

- 435¹ a. *affinis*, Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 393. — Mexic.

TRAGOPOGON

- 436¹ a. *balkanicum*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 43; et Fl. Bulg. (1891) 355. — Bulg.

TRIAS

- 436³ a. *picta*, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) i. 488 (= *Bulbophyllum pictum*, Parish & Reichb. f.). — Burma.

TRICHOSPERMUM

- 437³ a. *Kurzii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 113 (= *Bixagrewia nicobarica*, Kurz). — Ins. Nicob., Perak.

TRIFOLIUM

- 438¹ a. *amphicarum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1893) 11. — Chili.
axillare, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1893) 10. — Chili.
balkanicum, Velen...; et in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1894 (1895) n. xxix. 7, in syn. = *medium*, Linn.
438² a. *Lechleri*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1893) 10. — Chili.
radnense, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 68. — Europ.

TRIPLARIS

- 439² a. *formicosa*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 444, t. 28, fig. 5-6. — Bras.

TRITICUM

- 441¹ a. *barbulatum*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 315 (= *Agropyron barbula*, Schur). — Europ.
Pseudocaninum, Porcius, l. c. = *caninum*, Linn.

TRITOMA

- 441² a. *hybrida* X, Hort. ex Bull. Tosc. Soc. Ort. (1891) 81. — Hybr. artef.

TRIXIS

- 440³ a. *radialis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 370 = *radiale*, Lag.

TROPAEOLUM

- 442³ a. *Buchenaui*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 889. — Chili.
denticulatum, « Ruiz & Pav. », ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 97 = *dipetalum*, Ruiz & Pav.?
lepidum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 889. — Chili.

TROPIDIA

- 441¹ a. *ctenophora*, « Benth. & Hook. f. » ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 311 (= *Cnemidaria ctenophora*, Reichb. f.). — Ins. Fiji.

TULIPA

- 441² l. *Dammanni*... (non *Dammanni*).
Harmonia, Hort. Dammann, Cat. (1893) 5 = *undulatifolia*, Boiss.
Levieri, Sprenger, in Bull. Tosc. Soc. Ort. xix. (1894) 230. — Persia.
libanotica, Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 126. — Syria.

TULIPA

- 441² l. sultanabadensis, *Sprenger, in Bull. Soc. Tosc.ortic.* xix. (1894) 239. — Persia.
vitellina ×, Hort. ex The Garden, xxxvi. (1889) 531. — Hybr. artef.

TUPA

- 441³ a. axilliflora, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 188. — Chili.
 Gayana, *Phil. l. c.* 190. — Chili.
 glaucescens, *Phil. l. c.* 187. — Chili.
 Kingi, *Phil. l. c.* 189. — Chili.
 linearifolia, *Phil. l. c.* 190. — Chili.
 serrata, *Phil. l. c.* 189. — Chili.

TURNERA

- 441³ a. Bernieriana, *Baill. [an Tul.?] Hist. pl. Madag.* (1890) t. 131. — Madag.

U**UNCINIA**

- 443¹ a. cylindrica, *Franch. Miss. scient. Cap Horn.* [Phan.] v. (1889) 379, t. 7b. — Patag.

UROPETALUM

- 447¹ a. Becazzeanum, *Hort. Dammann, ex Gartenfl.* xli. (1892) 611, fig. 127. — Abyss.

UTRICULARIA

- 447³ a. elachista, *Goebel, in Ann. Jard. Buitenz.* ix. (1891) 76. — Ind. or.
 longifolia, *Hort. Sander, ex The Garden*, xli. (1892) 362; *et in Gard. Chron.* (1893) i. 713, fig. 107. — Guian. brit.
 rhyterophylla, *Hort. ex Ill. Wien. Gart.-Zeit.* (1889) 74 (= *U. longifolia*, Gardn.). — Bras.
 Warburgi, *Goebel, in Am. Jard. Buitenz.* ix. (1891) 64. — China.

UVARIA

- 448¹ a. Hookeri, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc.* iv. 1. (1893) 28, t. 22. — Ind. or.

V**VALLESIA**

- 449² a. inedita, *Guib. Trait. drog. simpl.* éd. 6, ii. (1869) 376. — Bras.

VANDA

- 449² a. Dearei, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) ii. 648. — Ins. Sund.

VANILLA

- 449³ a. cucullata, *Kraenzl. ex f. Braun & K. Schum. in Mitth. Deutsch. Schweizgeb.* ii. (1889) 161. — Kamerun.
Vanilla, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, i. (1895) 474 = aromatica, Sw.

VERBASCUM

- 450¹ l. decorum... 1889 (1890) i. 56 (non 1889) ii. (1890).

VERBESINA

- 451³ a. heterophylla, *Klatt, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* x. 1892 (1893) 127. — Mexic.

VICIA

- 454¹ l. *Scheuchzeri*, Bruegg.... xxix. 1884-85 (1886) 39; *et* xxxi. Beil. (1887-88) 45....

VIGUIERIA

- 454² a. drymonia, *Klatt, in Bot. Beibl. z. Leopoldina*, (1895) 5. — Costa Rica.

VINCETOXICUM

- 455² a. *Vincetoxicum*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 607 = officinale, Moench.

VIOLA

- 456¹ l. intersita . . (non intertexta).

VITIS

- 457² a. *argyrophylla*, Carr. ex Rev. Hort. lxiv. (1892) 222, sphalm. = *aegirophylla*, Boiss.
canescens, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 77 = cinerea, Engelm.
Doaniana, Munson, in Gard. and For. iii. (1890) 474. — Am. bor.
Roylei, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 77. = inconstans, Miq.

VRIESIA

- 458² a. *Andreana* ×, Hort. Duval, ex Illustr. Hort. xlii. (1895) 217. — Hybr. artef.
Aurora ×, Hort. Kittel, ex Rev. Hort. Belg. xx. (1894) 28. — Hybr. artef.
Closoni ×, Hort. l. c. — Hybr. artef.
 458³ a. *Elmireana* ×, Hort. Duval, ex Illustr. Hort. xlii. (1895) 217. — Hybr. artef.
gracilis ×, Hort. Kittel, ex Rev. Hort. Belg. xx. (1894) 28. — Hybr. artef.

VRIESIA

- 458³ a. *Henrici* ×, Hort. Duval, ex Illustr. Hort. xlii. (1895) 217. — Hybr. artef.
Magnisiana ×, Kittel & Wittm. in Gartenfl. xxxviii. (1889) 343, fig. 56-58. — Hybr. artef.
versaillesensis ×, Hort. Truffaut, ex Illustr. Hort. xxxvi. (1889) 73, t. 87. — Hybr. artef.
Wioti ×, Hort. Kittel, ex Rev. Hort. Belg. xx. (1894) 28. — Hybr. artef.

W**WISTARIA**

- 461³ a. *grandiflora*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 119 = multijuga, Van Houtte.

X**XYRIS**

- calostachys, *Paulsen, ex Warm. in Vidensk. Medd. Foren. Kjöb.* (1893) 118 [Symb. Fl. Bras. centr. xl. 1233]. — Bras.
trichocephala, *Paulsen, ll. cc.* 119; *et* 1234. — Bras.

Z**ZEPHYRANTHES**

- 465¹ l. *Tauberti*, Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. (1895) 81; *et*... = Taubertiana, Harms (1896).

ZINGIBER

- 465¹ a. *Darceyi*, Hort. Veitch, *Catal.* (1897) 13; *et in The Garden*, xxxviii. (1890) 43 [d'Arceyi]. — Ins. Pacif.
Zingiber, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, i. (1895) 488. = officinale, Rosc.

ZIZYPHUS

- 465² a. *Zizyphus*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1893) 438 = sativa, Gaertn.