ECLOGAE AMERICANAE

SEU

DESCRIPTIONES PLANTARUM

PRAESENTIM AMERICAЕ MERIDIONALIS

NONDUM COGNITARUM,

AUCTORE

b. MARTINO VAHL.

FASCICULUS TERTIUS & ULTIMUS.

CUM TABULIS AENEIS.

HAUNIAE,
IMPENSIS VIDUAE.

Typis E. A. H. MÖLLERI, AULAE & UNIVERSITATIS TYPOGRAPHI.
MDCCC VII.

L. B.

Editis jam *Eclogarum americanarum* M. VAHLII fasciculo primo anno 1796, secundo anno 1798 cum tabulis viginti aeneis, nec non *Decadibus* tribus *Iconum, inservientium illustrationi plantarum in Eclogis descriptarum*, fasciculus hic tertius, jam absolutus, prelo esset submittendus, cum iter in Galliam anno 1799 suscepit auctor. Redux in patriam, magno suo operi, *Enumerationi plantarum*, totus incumbens, editionem hujus fasciculi minus necessariam duxit, cum descriptiones plantarum novarum & observationes, quas continet, in *Enumerationem* locum invenirent. Quo vero opere morte Auctoris chev! praematura interrupto, scientiae consulere credidimus, publici juris faciendo, quod fasciculo tertio *Eclogarum* reliquit, cui manus extrema jam dudum accessit. Ultra indicem plantarum in toto opere descriptarum vel dilucidatarum, nil nobis addere fas erat.

Hauniae 1806.

N. Tönder Lund.

P. Thonning.

EXPLICATIO

TABULARUM.

TAB. XXI. PSYCHOTRIA MEGALOSTERMA.

XXII. CORDIA DENTATA.

XXIII. PALIURUS RETICULATUS.

XXIV. MIMOSA LUCIDA.

XXV. MIMOSA ROSEA.

XXVI. MIMOSA MACROSTACHYS.

XXVII. MIMOSA LIGUSTRINA.

ZANTHOXYLUM ALBUM.

a) Corolla mascula magnitudine naturali.

b) Stamina cum pistilli rudimento, calyce corollaque ablatis, ope lentis aucta.

c) Rudimenta pistillorum receptaculo insidentia, aucta.

d) Flos foemineus magnitudine naturali.

e) Flos foemineus lente visus.

f) Pistillum floris foeminei lente auctum.

g) Capsulae magnitudine naturali.

h) Capsula solitaria.

i) Capsulae transversim sectae.

k) Tunica interior cum semine.

l) Tunica interior absque semine.

m) Semen cum pedicello.

XXVIII. MIMOSA TRAPEZIFOLIA.

XXIX. MIMOSA NIGRICANS.

XXX. RUDOLPHIA VOLUBILIS.

SCIRPUS.

SCIRPUS SERRULATUS, culmo tereti filiformi nudo, spicis terminalibus ovatis solitariis, involucro diphylo serrulato-scabro.

Fimbristylis serrulatum. VAHL Enum. pl. 2. pag. 285.

Habitat in America meridionali. *von Rohr.*

FOLIA radicalia, inferne basin culmi vaginantia, pollicaria vel parum ultra, glabra, obtusiuscula, apice serrulato-scabra.

CULMI plures, erecti, longitudine digiti minimi, aphylli, teretes, striati, glabri.

INVOLUCRUM terminale, diphyllum: *foliolis* rigidiusculis, margine serrulato-scabris, glabris; altero semiungiculari, obtusiusculo; altero subulato parum breviori & angustiori, acuto.

SPICA terminalis, foliolis involucris parum brevior, solitaria, sessilis, ovata. *Squamae* ovatae, dorso convexae, pallidae, mucrone viridi terminatae.

STYLUS bifidus.

SCIRPUS HIRTELLUS, pilosus, culmo tereti capillari nudo, spicis geminis: altera pedunculata; involucro diphylo.

Fimbristylis hirtellum. VAHL Enum. pl. 2. pag. 286.

Habitat in America meridionali. *von Rohr.*

FOLIA radicalia, capillaria, palmaria, striata, uti culmi & foliola involucris pilosa, ope lentis punctis fuscis adpersa.

CULMI erecti, laxi, capillares, teretes, aphylli, basi vaginis foliorum tecti, striati, longitudine foliorum.

INVOLUCRUM terminale, diphyllum: *foliolis* erectis, capillaribus; altero bipollicari, altero brevissimo.

SPICAE terminales, geminae, ovatae, glabrae, magnitudine seminis Cannabis: altera sessili, foliolo involucris minori parum brevior; altera pedunculata, pedunculo semiungiculari. *Squamae* ovatae, acutae, extus convexae, pallide ferrugineae.

STYLUS bifidus.

CYPERUS.

CYPERUS DEPAUPERATUS, culmo angulato capillari nudo, spicis terminalibus solitariis, involucri vaginisque nullis.

Cyperus depauperatus. VAHL Enum. pl. 2. pag. 305.

Habitat in America meridionali. *von Rohr.*

FOLIA radicalia, structura culmi. *Vaginae* nullae.

CULMI caespitosi, bi- sive tripollicares, incurvi, capillares, tetragoni, quadrisulcati, glabri, laeves, aphylli.

INVOLUCRUM nullum.

SPICA terminalis, parva, oblonga, acuta, compressa, tri- vel quinqueflora. *Squamae* lanceolatae, acutae, dorso purpureae, margine pallidae.

STAMINA tria.

A Cypero minimo LIN. omnino distinctus;

A Cypero setaceo RETZ. culmis incurvis, basi absque vaginis.

KRAMERIA.

KRAMERIA Ixina. LIN. Spec. plant. ed. 2. pag. 177.

Krameria (Ixine). LOEFLING. it. edit. Svec. pag. 195. Versio germanica pag. 258.

In Curacao observavit *von Rohr.* †

FRUTEX. Rami sparsi, teretes, villosi, subcinerei.

FOLIA alterna, petiolata, unguicularia vel minora, crassiuscula, oblonga, superiora linearia, basi acuta, apice mucrone rigido pungente terminata, integerrima, utrinque villosa, cinerea, mollia, avenia, enervia. *Spinulae* geminae, erectiusculae, parvae, in axillis foliorum, forte rudimenta foliorum.

Petioli longitudine foliorum.

RACEMUS terminalis, erectus. *Flores* approximati: *pedicelli* breves. *Bractea* ad basin singuli *pedicelli* & duae ad basin calycis, lineares, mucronatae, cinereae.

CALYX tetraphyllus: *foliolis* oblongis, dorso sericeis, margine glabris: interioribus duobus latioribus.

COROLLA nulla.

NECTARIUM triphyllum: *foliolis* crassiusculis, rigidulis; unicum superius tripartitum: laciniis spatulatis, rectis; duobus inferioribus oblongis, concavis, truncatis, brevioribus.

STAMINA. *Filamenta* inter foliolum superius nectarii & germen, quatuor, adscendentia, clavata: duo intermedia breviora, ad medium connata: duo lateralia longiora, brevioribus basi connata; omnia terminata *Anthera* acuta, apice perforata, a filamentis vix distinguenda.

PISTILLUM. *Germen* superum, oblongum, pilis albidis hirsutum. *Stylus* glaber, ascendens. *Stigma* acutum.

FRUCTUS globosus, magnitudine pisi, pilis albis hirtus, setisque plurimis purpurascens: oculo armato retrorsum spinulosis tectus, unilocularis, monospermus.

Ad Tetrandriam amandavit LINNÆUS, LOEFLINGIUS vero, & quidem meliore jure, inter Didynamas collocavit, num ne vero rectius foret monadelphis adnumeranda, cum filamenta connata sunt?

Descriptio partium fructificationis paulo aliter traditur in Prodro-mo Florae peruvianae pag. 14.

PSYCHOTRIA.

PSYCHOTRIA MEGALOSPERMA, foliis lanceolato-ellipticis subcoriaceis nitidis, paniculae ramis dichotomis foliis longioribus, baccis oblongis.

Jacquinia venosa, foliis ovato-lanceolatis venosis submembranaceis. SWARTZ. prodr. pag. 47.

Habitat in Montserrat. *Ryan.* 5

RAMI glabri, inferne teretes, superne alternatim compressi.

FOLIA opposita, petiolata, quinquepollicaria, patentia, lanceolato-elliptica, parum acuminata, basi apiceque acuta, integerrima, subcoriacea, utrinque glabra, venosa, supra nitida, subtus pallide viridia, costa flavescens.

Petioles semipollicares. *Stipulae* parvae, ovatae, indivisae, deciduae.

PANICULA terminalis, erecta, foliis longior. *Pedunculus* communis uti pedunculi partiales & pedicelli compressi, flavescens: *partiales* oppositi, distantes, bis dichotomi.

Flos dichotomiae, uti reliqui pedicellatus. *Pedicelli* versus florem incrassati.

CALYX margo superus, integerrimus.

COROLLA glabra.

BACCAE oblongae, fere pollicares.

Differt a Psychotria glabrata SWARTZII foliis ellipticis, nec ovatis.

a — — laurifolia Ej. fructibus oblongis, nec subrotundis.

a — — citrifolia Ej. stipulis deciduis, nec persistentibus.

a — — tenuifolia Ej. stipulis indivisis, nec bifidis.

CRYPTOSTOMUM.

CRYPTOSTOMUM CORIACEUM.

Moutabea guianensis. AUBL. fl. guian. pag. 679. & 680. tab. 274.

Cryptostomum. SCHREB. gen. pag. 137.

Habitat in Guiana. von Rohr. ♀

RAMI rigidi, teretes, e fusco flavescentes, glabri.

FOLIA alterna, petiolata, tri- ad sexpollicaria, oblongo-lanceolata, inferne versus parum angustiora, basi subovata, apice subacuminata, acuta vel obtusiuscula, integerrima, coriacea, utrinque glaberrima, obsolete nervosa, avenia, subtus viridiflavescentia.

Petioles semiunguiculares, fusci, subtus convexi, supra planiusculi, parum supra basin articulo discedentes.

Stipulae nullae.

PEDUNCULI ex axillis superioribus solitarii, folio dimidio breviores. Flores sessiles, alterni.

CORDIA.

CORDIA MACROPHYLLA, foliis ovato-oblongis extrorsum remote subserratis subtus reticulatis junioribus sericeis, racemis dichotomis.

Cordia macrophylla foliis ovatis villosis sesquipedalibus. LIN. Syst. Veget. ed. 14. pag. 230.

Ex insula St. Crucis misit H'ert. ♀

RAMI subdichotomi, pilis brevissimis ferrugineis tecti.

FOLIA sparsa, petiolata, pedalia & ultra, inferne spithamam fere lata, oblonga, basi ovata, apice acuminata, supra laeviuscula: nervis ferrugineo-villosis; subtus pallidiora, venoso-reticulata, venis villosis, supra medium extrorsum versus dentibus remotis mucronatis serrata, inferne versus integerrima, interdum undique integerrima: juniora villis nitidis minutis tomentosa, mollia: nervis aureis.

Petioles semipollicares, subtus convexi, supra sulco exarati.

RACEMI e divisione ramulorum, decompositi, dichotome divisi: racemuli ante florescentiam revoluti. Flores parvi, sessiles, conferti.

CALYX campanulatus, laevis, tomentosus.

COROLLA calyce parum longior.

CORDIA RETICULATA, foliis ovato-oblongis acuminatis reticulatis nitidis subtus scabris, racemis dichotomis, calycibus tomentosis.

Habitat in Montserrat. *Ryan.* t_2

RAMI teretes, glabri, cortice subfusco, apice leviter tomentoso-ferruginei.

FOLIA petiolata, alterna, quadripollicaria, persistentia, ovato-oblonga, acumine pollicari terminata, integerrima, utrinque glabra, nitida, venoso-reticulata, supra laevia; subtus venis exstantibus, scabra.

Petioli unguiculares.

RACEMUS terminalis, erectus, ramosus: *rami* alterni, semel vel bis dichotomi, uti calyces ferrugineo-tomentosi. *Flores* quatuor vel quinque in apice pedunculorum, vix pedicellati.

CALYX tubulosus, unguicularis, laevis, tomentosus, trifidus: *lacinae* oblongae, obtusae; fructiferus campanulatus.

COROLLAE *tubus* longitudine calycis; *lacinae limbi* oblongae, obtusiusculae.

STAMINA quinque, longitudine corollae.

Stylus bis bifidus. *Stigmata* dilatata, transversa.

DRUPA obovata, glabra, piso duplo major.

CORDIA CALOPHYLLA, foliis elliptico lanceolatis acuminatis glabris subcoriaceis, supra laevibus subtus scabriusculis, corymbis axillaribus.

Habitat in Cajenna. *von Rohr.* t_2

RAMI subangulati, glabri, dichotomi, flavescentes.

FOLIA petiolata, alterna, sex-octopollicaria, integerrima, mucronata, utrinque glabra, impunclata, supra laevia, obscureque venosa; subtus scabriuscula, flavescentia.

Petioli semiunguiculares.

CORYMBI axillares, ad latera dichotomiae & apices ramorum cum folio opposito, petiolo triplo longiores.

CALYX laevis, campanulatus, quinquedentatus.

Similis omnino Cordiae flavescenti AUNL. fl. Guian. pag. 226. tab. 89. quoad folia, differt vero, quantum e descriptione & figura concludere licet, inflorescentia.

CORDIA DENTATA, foliis oblongo-subrotundis scabris extrorsum dentatis, ramis petiolisque hirtis, paniculae ramis divaricatis.

Habitat in Curacao. *von Rohr.* t_2

RAMI inferne teretes, superne angulati, uti petioli & pedunculi e pilis griseis hirti.

FOLIA petiolata, sparsa, bi-quadripollicaria, oblongo-subrotunda, raro oblonga, a medio ad apicem inaequaliter remote dentata, obscure venosa, supra e punctis minutis numerosis scabra; subtus inpunctata, laeviora, parum pallidiora, axillis nervorum villosis, coeterum glabra.

Petiolus unguicularis.

PANICULA terminalis, magna, dichotome divisa: *Pedunculi partiales* patentissimi, ramis divaricatis. *Flores* tres vel quinque in ultimis ramulis, sessiles.

CALYX campanulatus, striatus, villosiusculus, obscure denticulatus.

COROLLA campanulata, calyce quintuplo major, quinqueloba.

DRUPA globosa, nivea, magnitudine Pruni spinosi.

P A L I U R U S.

PALIURUS RETICULATUS spinis geminis rectis, foliis ovalibus subdenticulatis reticulatis subtus pubescentibus, corymbis axillaribus.

Habitat in America meridionali. *von Rohr.* 72

ARBOR. Rami flexuosi, inferne glabri, teretes; superne angulati, ferrugineo-subtomentosi. Ramuli alterni, structura ramorum, ad basin utrinque muniti spina erecto-patente, glabra, rigida, fere unguiculari.

FOLIA petiolata, alterna, bipollicaria, ovalia, obtusissima, venosa, reticulata, trinervia, supra glabra; subtus pubescentia, venis nervisque exstantibus.

Petiolus vix semipollicaris, pubescens. *Stipula* utrinque ad basin petioli, subulata, tomentosa, rigida.

CORYMBI axillares, solitarii, pedunculati, flavescenti-ferrugineo tomentosi, multiflori, folio breviores. *Bractea* linearis ad basin pedicellorum.

CALYX monophyllus, quinquepartitus: *laciniis* ovatis, acutis.

COROLLA. *Petala* quinque, inter incisuras calycis, unguiculata, spathulata, lamina intus cava, longitudine calycis.

Nectarium nullum nisi margo imperceptibilis in fundo corollae.

STAMINA. *Filamenta* quinque, petalis opposita, eorumque longitudine. *Antherae* globosae.

Stylus unicus, longitudine fere corollae. *Stigma* subtridentatum.

DRUPA globosa, magnitudine Cerasi.

T R A D E S C A N T I A.

TRADESCANTIA UMBELLATA, caule erecto simplici, umbellis terminalibus pedunculatis, floribus racemosis.

Habitat in Insula Trinitatis. *Ryan.*

CAULIS erectus, sesquipedalis, simplicissimus, striatus, crassitie pennae anserinae, glaber.

FOLIA alterna, inferiora in petiolum membranaceum attenuata, distantia, superiora semiamplexicaulia, conferta, bi- vel quinquepollicaria, elliptica, apice attenuata, acuta, integerrima, multinervia, villis rarioribus adpersa, pilis brevibus frequentioribus versus marginem ciliata.

Vaginae laxae, caule ampliores, unguiculares, ciliatae.

PEDUNCULUS communis terminalis, erectus, quadri- vel sexpollicaris, villosus: *partiales* plerumque quinque, interdum gemini, umbellati, patentes, bipollicares, e casu pedicellorum dentati, pubescentes. *Flores* racemosi, alterni, ante florescentiam nutantes; *pedicelli* unguiculares, solitarii, sub flore crassiores, approximati, uniflori.

Bractae squamula ad basin pedicellorum.

CALYX triphyllus: *foliola* lanceolata, obtusa.

COROLLA tripetala: *petala* longitudine calycis.

STAMINA tria, glabra, longitudine petalorum.

Germen oblongum, triquetrum. *Stylus* staminibus parum longior, superne incurvus. *Stigma* simplex, acutum.

CAPSULA trilocularis.

G U A R E A.

GUAREA TRICHILIOIDES, foliis pinnatis: foliolis exterioribus majoribus, racemis longissimis, floribus extus germinibusque tomentosis.

Guarea trichilioides. LIN. Syst. Veget. pag. 360.

Melia Guara, JACQU. Am. pag. 126. t. 176. f. 37. CAVANILLES Diss. VII. pag. 366. t. 210.

Habitat in insula St. Crncis & Puertorico. *von Rohr, Wst.* f.

FOLIA quinque- ad novemjuga. *Foliola* petiolata, opposita, extima quadri- ad octopollicaria, interdum ovali-oblonga, obtusissima, interdum elliptico-lanceolata, breviter acuminata: acumine obtuso.

Petioluli laeves, supra canaliculati.

RACEMI, praesertim in speciminibus e Puertorico, saepe sesquipedales. *Pedunculi partiales* sparsi, distantes, inferiores compositi, sursum sensim minus compositi.

FLORES terni, subpedicellati.

GUAREA MACROPHYLLA, foliis pinnatis: foliolis ovato-oblongis, petiolis rugosis, racemis brevibus, floribus germinibusque tomentosis.

Habitat in Montserrat. *Ryan.* 12

RAMI glabri, fusco-cinerascentes.

FOLIA duodecimpollicaria & ultra. *Foliola* petiolata, opposita, trijuga, oblonga, obtusa, basi ovata, utrinque glabra, venosa, integerrima; extrema septem- vel octopollicaria; interiora minora.

Petiolus teretiusculus, basi supra canaliculo exaratus, uti petioli partiales transversim approximate rimoso-rugosi.

RACEMI axillares & terminales, subcompositi, folio duplo breviores. *Pedunculi partiales* sparsi, triflori. *Flores* pedicellati: *pedicellis* flore parum brevioribus.

CALYX quadrifidus: *laciniis* ovato-subrotundis.

Petala linearia, obtusa, extus sericeo-tomentosa.

STAMINUM tubulus ut in *Gu. trichilioide*.

Germen villosum.

Quamvis difficile sit characterem tradere, unde lucide appareat, quomodo a praecedente dignoscatur, nihilo tamen minus eam omnino specie esse diversam credo. Ambae enim inter se collatae habitu ita differunt, ut non dubio, quin unusquisque primo intuitu eas diversas esse judicet. Praeter notas in differentia allatas differunt; primo: quoad folia, quae in hac specie basi ovata sunt, nec utrinque vel acutiora vel rotundata; secundo: quod racemi foliis duplo breviores sunt, non autem ejusdem longitudinis vel saepe sesquipedales; tertio: floribus duplo vel triplo majoribus pedicellis longitudine fere florum, nec pedicellis brevissimis ut in *Gu. trichilioide*.

GUAREA GLABRA, foliis pinnatis: foliolis exterioribus minoribus, floribus germinibusque glabris.

Habitat in Montserrat. *Ryan.* 12

FOLIA paripinnata. *Foliola* petiolata, opposita, septem- vel octopollicaria, elliptico-lanceolata, utrinque acutiuscula, acuminata, integerrima, venosa, glabra.

RACEMI

RACEMI superne, foliis multoties breviores. *Pedunculi* subangulati, glabri, e casu pedunculorum partialium dentato-cicatricati. *Pedunculi partiales* sparsi, triflori: *pedicelli* glabri, flore longiores. *Flores* similes *Guarcae* trichilioidei, nisi quod omnino glabri. CAPSULA depressa, tetragona, angulis obtusis, magnitudine juglandis, glabra, quadrilocularis; interdum semina duo vel tria abortiunt, in quo casu capsula globosa, magnitudine *Pruni spinosi* & unilocularis est.

Quartam, hujus generis forte speciem, foliis simplicibus observavit Ryan in Monserrat.

Hanc non vidi ideoque omitto, praesertim cum dubito num hujus generis revera sit species, vel potius propter folia simplicia species *Quivisiae*.

Curapa Aublaetii fl. Guian. Tom. 2. p. 32. tab. 387. similis est omnino *Guareae* flore, differt vero fructu teste *von Rohr*.

C U P A N I A.

CUPANIA DISCOLOR, foliis pinnatis: foliolis lanceolato-oblongis integerrimis utrinque glabris laevibus.

Habitat in India occidentali. *von Rohr*. ♀

ARBOR. Rami teretes, griseo elevato-punctati, glabri.

FOLIA petiolata, sparsa, spithamaea vel ultra, pinnata cum pari, rarius cum impari, quadrijugis: *foliola* petiolata, opposita, quadripollicaria, interiora minora, obtusa, apice subemarginata, basi acuta, subtilissime venosa, supra nitidiuscula, viridiglauescentia, subtus rufescentia.

Petoli communes teretes, glabri: *partiales* brevissimi.

RACEMI axillares, basi ramo uno alterove, coeterum simplicissimi, longitudine foliorum. *Pedunculus communis* e casu florum sparse denticulatus.

CAPSULA turbinata, trilocularis, glabra, stylo mucronata, triloba: lobis compressis.

Flores quidem non vidi, cum vero fructus exaeque Cupaniae est, vix dubito quin species hujus generis sit.

CUPANIA DIPHYLLA, foliis conjugatis integerrimis subtus pubescentibus, floribus decandris.

Habitat in India occidentali. *von Rohr*. ♀

RAMI teretes, cortice ferrugineo: inferne glabri, cicatricati, punctis elevatis adpersi; superne uti ramuli flavescenti-ferrugineo tomentosi, angulati.

FOLIA petiolata, alterna, conjugata: *Foliola* petiolata, oblonga, quadri- vel quinquepollicaria, altero parum minore, obtusa, emarginata, basi acuta, integerrima, venosa: supra glabra, secundum nervos transversales venasque majores lincata, in costa nervis villosis; subtus reticulata, rufescentia, nervis venisque pubescentibus.

Petiolus communis unguicularis, subtus convexus, supra planus: *partiales* parum minores, uti communis ferrugineo-tomentosi.

Pedunculus communis ferrugineo-tomentosus, angulatus. *Flores* breviter pedicellati, conferti. *Braëte* minutae.

RACEMI axillares, solitarii, longitudine foliorum.

CALYX persistens, quinquedentatus.

STAMINA decem.

Stigmata tria.

CAPSULA trigona, triloba, stylo persistente mucronata, trivalvis, ferrugineo-tomentosa.

SEMINA arillata, ut in *Cupania tomentosa*.

CASSIA.

CASSIA HISPIDULA, foliis bijugis obovatis glabris, petiolis eglandulosis, ramis subhispidis, racemis terminalibus.

Habitat in America meridionali. von Rohr. ♀

RAMI teretes, tenues, superne subtilissime striati, uti petioli et pedunculi e pilis longis subhispidi.

FOLIA petiolata, bijuga. *Foliola* superne in petiolo, breviter petiolata, opposita, unguicularia, obovata, basi acuta, utrinque glabra, avenia.

Petiolus sesquipollicaris, filiformis, eglandulosus.

RACEMI terminales. *Pedunculus* quadri- vel quinquepollicaris. *Pedicelli* circiter quindécim, sesquipollicares, remoti, filiformes. *Braëta* minuta ad basin singuli pedicelli.

Flores ante florescentiam nutantes.

CALYCIS *foliola* lanceolata, attenuata, extus rare pilosa.

STAMINA decem, fertilia.

II.

CASSIA TRIFLORA, foliis bijugis oblongis subtus villosa-subincanis, pedunculis axillaribus subtrifloris, petiolis eglandulosis.

Habitat in insula St. Crucis. von Rohr. τ_2

RAMI angulati, cicatricati, glabri, superne foliosi & floriferi.

FOLIA petiolata, alterna, approximata, bi- sive trijuga. Foliola opposita, petiolata, sesquipollicaria, interiora minora, utrinque obtusa, nervosa, subtilissime venosa, supra adpersa villis rarioribus, subtus frequentioribus, canescentia.

Petiolum fere tripollicaris, tenuis, pubescens, teres, mucronatus, eglandulosus. Stipulae semiunguiculares, subulatae.

PEDUNCULI axillares, solitarii, filiformes, pubescentes, pollicares, tri- vel quadriflori.

Pedicelli longitudine pedunculi.

CALYCIS foliola oblonga.

CASSIA HIRUTA, foliis subquadrjugis: foliolis ellipticis acutis, petiolis basi glandulosis.

Cassia hirsuta, foliis sejugis late ovatis acuminatis hirsutis. LIN. Syst. Vegetab. pag. 394.

In Surinamo legit von Rohr. τ_2

RAMI lignosi, flexuosi, angulati, uti tota planta e pilis copiosis sordide cinerei.

FOLIA petiolata, quadri- vel quinquepollicaria, pinnata, tri- vel quadrjuga. Foliola opposita, breviter petiolata, sesquipollicaria, interiora sensim minora, elliptica, apice parum attenuata, utrinque acuta, venosa.

Petioles striati, basi glandula fusca sessili. Stipulae subulatae.

PEDUNCULI axillares, brevissimi, tri- quadri- vel sexflori: pedicelli alterni, pedunculo communi triplo longiores. Bractae subulatae.

LEGUMEN compressum, lineare, curvum, utrinque ad margines linea elevata longitudinali, villis longis mollibus densis tectum, sordide griseum, obtusum, quadripollicare, multiloculare. Dissepimenta membranacea.

SEMINA copiosa, ovato-subrotunda, plerumque compressa, livido-fusca, utrinque planiuscula, in altero latere linea tenui longitudinali notata, ad latus lineae versus medium macula subrotunda, impressa.

CASSIA PALLIDA, foliis subsejugis ovalibus glabris, glandula clavata inter infima, pedunculis axillaribus subquadrifloris.

Habitat ad St. Martham. *von Rohr.* 12

CAULIS fruticosus, erectus. *Rami* teretes, glabri, cortice cinerascente.

FOLIA petiolata, alterna, quinque- vel sejuga. *Foliola* opposita, petiolata, ovalia, extorsum parum dilatata, terminalia subcuneiformia, mucronata, pallide viridia, praesertim subtus, vix pollicaria, interiora minora.

Petiolus filiformis, glandula fusca clavata inter par infimum foliolorum.

PEDUNCULI axillares, semiunguiculares, tri- vel quadriflori. *Flores* breviter pedicellati.

CALYX glaber.

LEGUMEN lineare, compressum, tripollicare, rectum.

Differt a *Cassia biflora* pedicellis unifloris, nec bifloris; foliolis obtusissimis, nec acutis.

a *Cassia sennoide* glandula clavata, nec convexa.

QUASSIA.

QUASSIA CROCEA, foliis ternatis pinnatisque oblongis acuminatis emarginatis, petiolis nudis, racemis axillaribus brevibus.

Simaba guianensis. AUBL. fl. Guian. pag. 400. tab. 153.

Habitat in Cajenna. *von Rohr.* 12

RAMI tenues, teretes, glabri, cortice fusco.

FOLIA petiolata, alterna, ternata, vel quinato-pinnata. *Foliola* subsessilia, opposita, extima saepe quinquepollicaria, interiora minora, oblonga, basi sensim angustata & acuta, apice acuminata obtusa, emarginata, integerrima, subcoriacea, utrinque glaberrima, laevia, avenia, enervia, supra secundum costam longitudinaliter sulco & transversim remote lineis obscuris marginem non attingentibus exarata.

Petiolis teretes glabri, basi subtus parum gibbosi.

RACEMI axillares, subcompositi, solitarii. *Pedunculi universales* pollicares; *partiales* inferiores triflori, omnes ope lentis villosi.

Petala quinque, linearia.

STAMINA: *Filamenta* decem, interne basi squamula lineari, ope lentis villosa, munita.

Germen oblongum, quinquelobum, villosum. *Stylus* longitudine staminum. *Stigma* obtusum.

Non

Non dubito, quin *Aubl.* Simaba eadem sit ac mea, exacte enim in omnibus convenit, nisi quod squama ad basin filamenti desit in figura *Aublattii*; sed si figura filamentum consideratur, apparet, quod inferne dilatatum sit ita, ut sese saepe sistat filamentum cum squama adpressa in specimine sicco. Plantae *Aublattii*, uti notum, secundum specimina sicca sunt delineatae, hinc facile a pictore omissam vel minus rite traditam esse squamulam filamentum conjicere licet.

Suspicio Arubam Guianensem, *Aubl. fl. Guian.* pag. 293. tab. 115, hujus generis speciem esse.

MELASTOMA.

Decandrae, trinerviae.

MELASTOMA FURFURACEA, foliis oblongis glabris integerrimis, ramis pedunculisque furfuraceo-tomentosis, racemis simplicibus: pedicellis trifloris.

Habitat in India occidentali. *h*

RAMI inferne teretes, purpurascentes, glabri, dichotome divisi, superne obscure tetragoni, uti petioli, foliorum nervi subtus, pedunculi calycesque tecti tomento ferrugineo-furfuraceo.

FOLIA petiolata, opposita, magna, saepe spithamaea, opposito multo minore, trinervia, glaberrima, laevia, subtus pallidiora, acumine brevi obtuso terminata.

RACEMUS terminalis, erectus. *Pedunculus communis* palmaris, compressus: *pedicelli* oppositi, apice dilatati, triflori, breves, inferiores semiungiculares, superiores sensim breviores. *Floris* subsessiles.

CALYX turbinatus, semiungicularis, quinquedentatus: *dentibus* minutis.

Petala quinque, oblonga, sessilia.

STAMINA decem, corolla longiora.

Stylus longitudine staminum.

MELASTOMA THYRSOIDEA, glabra, foliis oblongo-ovatis attenuatis glanduloso-denticulatis, racemis terminalibus decompositis: pedicellis trifloris.

Habitat in Montserrat. *Ryan. h*

Tota glabra.

RAMI tetragoni, oppositi: *ramuli* virides, supremi racemo altiores.

FOLIA opposita, petiolata, tri-quadripollicaria, patentissima, oblongo-ovata, utrinque attenuata, basi obtusa, denticulata: denticuli distantes, crassi, glandulosi, flavescentes; trinervia, praeter nervum supra basin e nervo laterali ortum, supra transversim simpliciter venosa, subtus pallida, subtilissime venosa.

Petioles sesquipollicares.

RACEMUS terminalis, cum ramo laterali ulterius excrescens, quinquepollicaris. *Pedunculi communes* gemini, interdum terni, compresso-tetragoni: *partiales* oppositi, sursum sensim decrescentes, *ultimi* triflori. *Flores* omnes pedicellati, minuti. *Bractea* utrinque sub ramificationibus, linearis.

CALYX globosus, truncatus.

Petala quinque, subrotunda, parva.

STAMINA decem.

MELASTOMA STRIATA, foliis ovato-oblongis attenuatis glabris dentatis, racemis terminalibus compositis: pedicellis trifloris.

Habitat in Montserrat. *Ryan*. 12

FRUTEX sex- vel septempedalis. *Rami* glabri, superne uti nervi foliorum & folia tenella leviter pulverulenti, compressi.

FOLIA petiolata, opposita, palmaria & ultra, opposito saepe triplo minore, attenuata, pollices tres ad quatuor lata, ovato-oblonga, dentata, basi acuminataeque integerrima, nervis tribus, praeter nervos marginales, parum supra basin concurrentibus, hinc subtriplinervia, tenera, utrinque glabra.

Petiolus triqueter, supra canaliculatus, subtus convexus, sesquipollicaris.

RACEMUS terminalis, compositus, erectus, palmaris. *Pedunculi partiales* oppositi, distantes: infimi *pedicellis* racemosis tripartitis; superiores bipartiti *pedicellis* trifloris. *Flores* dichotomiae sessiles, mediocres.

CALYX leviter striatus, glaber, truncatus vel subtrilobus: lobis rotundatis.

Petala quinque, cuneiformia, parva, glabra.

STAMINA: *Filamenta* decem, capillaria, glabra, longitudine petalorum. *Antherae* angustae.

An *Melastoma grossularioides* Linnaei? Convenit quoad figuram foliorum cum icone Plukenetii a Linnaeo citato, nisi quod folia in mea magis attenuata sint. Deficiente vero inflorescentia in figura Plukenetii, nec e Linnaei descriptione apparet, qualis sit, novum potius quam dubium imposui nomen. Quamvis ex numerosis speciebus hujus generis paucae Linnaeo notae fuerint, difficile tamen eruuntur illae, quae in operibus ejus inveniuntur. Synonyma enim in plurimis erronea, & descriptiones specierum minus sufficientes dedit.

MELASTOMA PILULIFERA, foliis lanceolato-ellipticis integerrimis glabris, spicis bipartitis in racemo subdecomposito.

Habitat in Martinique. *von Rohr.* †

RAMI obscure tetragoni, glabri, patentes; *ramuli* compressi, rufo-pulverulenti.

FOLIA petiolata, tri- vel quadripollicaria, attenuata, basi acuta, trinervia, praeter nervos marginales: adultiora supra glaberrima, subtus in nervis et venis subpulverulenta; juniora utrinque adspersa pulvere sordide-cinereo; omnia venoso-subrugosa.

Petioli semipollicares.

RACEMI terminales, compositi, tri- vel quadripollicares. *Pedunculi communes* compresso-tetragoni, pulverulenti, saepe terni, unico reliquis multo brevior, interdum gemini & loco tertii ramulus ulterius excrescens. *Pedunculi ultimi* apice bipartiti, floriferi. *Flores* sessiles, tres vel quatuor in singulo ramulo, unico sessili in divaricatura, parvi, secundi, alterni. *Bractea* setacea ad basin florum.

CALYX quinquedentatus, striatus.

Petala oblonga.

STAMINA decem, corolla longiora.

BACCA globosa, semine sinapis duplo majore.

Differt a *Melast. laevigata*: foliis minoribus, trinerviis, omnino integerrimis, floribus paucioribus in spicis.

MELASTOMA PICTA, foliis ovato-lanceolatis attenuatis glabris integerrimis: nervis subtus coloratis, racemis terminalibus subsimplicibus.

Melastoma cornifolia: glabra, foliis ovato-acuminatis, trinerviis, integris; calyce striato infundibuliformi; paniculis subterminalibus. LA MARCK *Encycl.* 4. pag. 51.

Habitat in Montserrat. *Ryan.* h

FRUTEX tripedalis.

Rami uti reliquae partes plantae glabri, subdichotomi, teretiusculi, apice obscure tetragoni, cortice cinerei, cicatricati, ad cicatrices subnodosi.

FOLIA superne in ramulis, opposita, petiolata, pendentia, saepe palmaria, basi subovata, lanceolata, integerrima, in acumen longum sensim attenuata, membranacea, utrinque glaberrima, trinervia absque nervo marginali, nervi & venae majores plerumque purpurascens, raro flavescens.

*Petiol*i laxi, pollicares.

RACEMUS terminalis, erectus, bi- quinquepollicaris. *Pedunculus* ope lentis subfarinosus; *partiales* oppositi, distantes, patentes; infirmi *pedicellis* subracemosis, reliqui triflori, flore intermedio sessili, semiunguiculares. *Bractae* minutae, uti pedunculus & pedicelli purpurascens.

Flores parvi, calyptrati: *calyptra* hemisphaerica, decidua; interdum ad alterum latus calycis pendens.

CALYX campanulatus, truncatus, interdum obscure bi- sive trilobus, viridi-flavescens, glaber.

Petala cuneiformia.

STAMINA decem.

MELASTOMA ELONGATA, foliis ovato-lanceolatis attenuato-elongatis glaberrimis extrorsum remote dentatis, racemis terminalibus subsimplicibus.

Melastoma acuminata: foliis ovato-lanceolatis exquisite acuminatis, undato-subdentatis, triplinerviis, floribus paniculatis terminalibus. LA MARCK Encl. 4. p. 54. fide herb. la Marck.

Habitat in Montserrat. *Ryan.* h

RAMI teretiusculi, glaberrimi, tenues: *ramuli* oppositi, basi tetragoni, superne alternatim compressi, ferrugineo-pulverulenti.

FOLIA opposita, petiolata, remota, saepe spithamacea vel parum ultra, infra medium sesquipollicem lata, opposito saepe duplo vel triplo minore, tenera, patentissima, basi obtusa, extrorsum sensim valde attenuata, apicem versus remote dentata, trinervia, absque nervo marginali, nervi laterales rarius supra basin orti vix tamen triplinervia nervi transversales remoti, tenuissime venosa, glaberrima, laevia.

*Petiol*i

Petoli supra sulco exarati, subtus convexi, glabri.

RACEMUS ex apice ramorum & ramulorum, simplex vel compositus.

Pedunculi partiales oppositi, distantes, uti communis compressi, patentissimi, oculo armato pulverulenti. *Pedicelli* triflori: flos intermedius sessilis. *Flores* glabri, majusculi, calyptrati: *Calyptra* decidua, interdum in lobos duos fissa.

CALYX truncatus, integer, obscure striatus, basi oculo armato pulverulentus, flavo-virescens margine pallidiore.

Petala quinque, cuneiformia, subrubrescentia: *unguibus* longitudine calycis.

STAMINA decem, longitudine petalorum. *Antherae* dorso purpureae.

Stylus staminibus longior. *Stigma* obtusum, flavescens.

MELASTOMA LUTESCENS, foliis ovato-lanceolatis attenuatis glabris extrorsum subdentatis, racemis terminalibus compositis: pedicellis trifloris.

Habitat in montserrat. *Ryan.* 12

RAMI glaberrimi, laeves, inferne teretes, superne obscure tetragoni.

FOLIA petiolata, opposita, subpendentia, spithamaca, inferne pollices duos lata, opposito minore, extrorsum leviter dentato-subrepanda, basin versus acumineque integerrima; tenella subtus in costa & nervis leviter pulverulenta, trinervia, absque nervo marginali, venosa: nervi venaeque subtus coloratiores.

Petoli compressiusculi, glabri, laxi.

RACEMUS terminalis, palmaris & ultra, compositus, patens. *Pedunculus communis* tetragonus: *partiales* compressi, oculo armato subpulverulenti, oppositi, sursum sensim breviores minusque compositi, demum simplices. *Pedicelli* triflori, flore intermedio sessili. *Flores* majusculi, calyptrati: *calyptra* ovata, acuta.

CALYX campanulatus, viridi flavescens, truncatus, striatus, glaber.

Petala quinque, obovata, purpurea: *ungues* longitudine calycis.

STAMINA. *Filamenta* decem, longitudine petalorum. *Antherae* curvatae, dorso purpurascens.

Stylus corolla longior, fusco-purpurascens. *Stigma* obtusum, flavescens.

Ad Mel. elongatam valde accedit, gaudet vero habitu diverso, foliis firmioribus, viridi-flavescentibus nec lacte viridibus, pendentibus nec patentibus, minus evidenter dentatis, petiolis recurvis non vero reclinis, racemis magis compositis floribusque parum majoribus. Numine vero haec omnia speciem distinctam indicent vel si aliae

adsint notae speciem distinguentes, certius determinare queunt autoptae. Cum genus *Melastomatis* detectis novissimis in tantam molem excreverit, difficile est characteres specierum tradere, dum tam multiplex sit earum convenientia, quamvis intuitu diversae videantur.

Melastoma procera SWARTZII flor. Ind. occid. pag. 764, mihi ignota, affinis quoque videtur. Quantum vero e descriptione optimi viri videre liceat, illa a mea differt caule arboreo quadraginta- vel quinquaginta-pedali, foliis junioribus subtus ferrugineis, nervis scabris, petiolis ferrugineis, floribus magnis.

MELASTOMA VIRESCENS, foliis subovato-lanceolatis denticulatis glabris laevibus, spicis terminalibus racemosis bipartitis, floribus secundis.

Habitat in insula Trinitatis. *von Rohr.* 12

RAMI teretes, virescentes, glabri, dichotomi: superne compressiusculi, pulverulento-subvillosi, crassitie fili emporetici.

FOLIA petiolata, opposita, patentissima, bi-tripollicaria, vix pollicem lata, utrinque glabra, laevia, trinervia praeter nervos marginales, simpliciter denticulata, basi integerrima: dentibus juniorum seta parva terminatis; tenella utrinque pulverulenta, adultiora tantum subtus in nervis.

RACEMI terminales, erecti, sesquipollicares: *pedunculi partiales* oppositi, patentissimi, uti pedunculus communis ferrugineo-pulverulenti, bipartiti. *Flores* unica serie secundi, sessiles.

CALYX subcampanulatus, quinquedentatus, ope lentis pulverulentus.

Petala quinque, oblonga.

STAMINA decem, corolla longiora. *Antherae* lineares, curvatae, basi latere altero auriculo brevi fusco auctae, albidae.

Stylus longitudine staminum. *Stigma* obtusum, flavescens.

BACCA globosa, magnitudine Sinapis.

Decandrae, triplinerviae.

MELASTOMA PENDULIFOLIA, foliis elliptico-lanceolatis glabris extrorsum dentato-subrepandis, racemis terminalibus subdecompositis, pedicellis trifloris.

Melastoma parviflora, foliis ovato-oblongis, glabris, denticulatis, floribus paniculatis terminatricibus, fructu parvo coeruleo. AUBL. fl. Guian. I. pag. 433. tab. 171.

Melastoma pendulifolia. Aët. soc. h. nat. paris. p. 109.

In Cajenne legit von Rohr. ♀

RAMI obtuse tetragoni, glaberrimi, laeves, viridi-flavescentes vel subpurpurascences, apice interdum cinereo-pulverulenti.

FOLIA petiolata, opposita, spithamea, opposito saepe minore, sursum sensim breviora, viridi-flavescentia, utrinque glaberrima, laevia, triplinervia, nervi subtus uti petioli pallide purpurascences non tamen villosi: transversales remoti; obsolete venosa, attenuata, extrorsum remote dentato-subrepanda.

Petioli pollicares. Rudimenta foliacea, minuta, incana, in axillis petiolorum superne.

RACEMUS terminalis, subdecompositus, erectus, sexpollicaris, patentissimus. *Pedunculus communis* inferne tetragonus. *Partiales* alternatim compressi, sensim sursum, ut in plurimis aliis speciebus generis, breviores & minus compositi. *Pedicelli* ultimi gemini, triflori, cum flore sessili in divisura. *Flores* parvi. *Bractee* minutae.

CALYX cinereus, striatus, quinquedentatus.

Petala quinque, oblonga.

STAMINA decem, corolla longiora. *Antherae* albae, dorso purpurascences.

MELASTOMA BRUNNEA, foliis ovalibus ciliatis, supra scabris, subtus incanis, floribus infrafoliaceis aggregatis subpedunculatis strigosis.

Habitat in Guiana. von Rohr. ♀

RAMI bifidi, inferne teretes, cortice cinereo; superne, uti ramuli, petioli, nervi foliorum utrinque, pedunculi, calyces & petala extus strigis rufescentibus adpersi. *Ramuli* tetragoni, longi, inferne cicatricati, superne floriferi.

FOLIA opposita, petiolata, quadri- vel quinquepollicaria, pollices tres fere lata, utrinque acuta, integerrima, setis flavescentibus brevibus remotisque ciliata, triplinervia praeter nervos duos e basi folii ortos, supra rufescente viridia, scabra e mucronibus parvis flavescentibus oculo armato videndis; subtus tomentosa: tomento incano-rufescente; uti supra adpersa mucronibus, tamen non scabra, nervi & venae exstantes, venae pilis flavescentibus minutis teclae.

Petioli vix pollicares, triquetri.

PEDUNCULI parum supra cicatriculam petioli decidui, brevissimi, aggregati, utrinque tres vel quatuor, indivisi. *Bractae* parvae, ovatae, deciduae.

CALYX oblongus, unguicularis, extus strigis rufescentibus totus tectus: *Laciniae* quinque, ovatae, obtusae.

COROLLA: *Petala* quinque, subrotunda, longitudine laciniarum calycis.

STAMINA decem, longitudine corollae. *Antherae* oblongae, acuminatae, rufescentes.

Stylus rare villosus, superne parum incrassatus. *Stigma* obtusum.

Affinis *Mel. succosae* AUBLETII.

Decandrae, quinquenerviae.

MELASTOMA SPICATA, ferrugineo-hirta, foliis ovato-lanceolatis muricatis duplicato-crenatis, spicis axillaribus terminalibusque simplicibus.

Melastoma spicata, foliis ovato-oblongis, acuminatis, pilosis, floribus carnis, spicatis. AUBL. flor. Guian. 1. pag. 423. tab. 165.

Cajennae legit von Rohr. h

Tota planta e pilis longis frequentissimis ferrugineis hirta.

RAMI teretiusculi, subdichotomi, apice compressiusculi.

FOLIA petiolata, opposita, attenuata, acuta, ciliata, tripollicaria vel minora: supra inter nervos transversales adspersa tuberculis copiosis, quibus insident pili in disco flavescens versus marginem inque junioribus rufo-ferruginei; subtus punctis impressis; adultiora quinquenervia (praeter nervos marginales); juniora trinervia.

Petioli subpollicares.

SPICAE axillares, solitariae, absque spica in axilla opposita, simplicissimae, raro basi utrinque ramulo. *Flores* inferiores breviter pedicellati: *pedicellis* interdum bi- vel trifloris; superiores sessiles; terminales plerumque terni. *Bractea* ad basin singuli floris, lanceolata, patens, brevis.

CALYX subgloboso-oblongus, magnitudine seminis Coriandri: *Laciniae* quinque, parvae, ovatae, attenuatae.

Petala quinque, oblonga, obtusa, calyce parum majora.

STAMINA decem, longitudine corollae. *Antherae* subulatae, basi integrae, albescentes, dorso purpureae.

Stigma obtusum.

MELASTOMA CRENATA. Eclogae Amer. fascic. primi pag. 41.

Melastoma pauciflora: pilosa, foliis ovatis, subacuminatis, trenulatis, quinquenerviis, racemulis axillaribus terminalibusque paucifloris. LA MARCK. Dict. Enc. Vol. 4. pag. 39. fide herb. La Marckii.

Specimina perfectiora hujus Speciei in Insula St. Christophori legit RYAN mecumque communicavit, unde video, folia superiora trinervia, inferiora autem quinquenervia esse, hinc rectius inter Melast. foliis quinquenerviis collocanda erit. Sic quoque in descriptione corrigendum est: Baccae maturae ovatae, Piperi nigro duplo majores.

Caulis herbaceus, bi-tripedalis. Corolla alba. Fructus coeruleus. Habitat quoque in paludosis Puertorico. LE DRU comes itineris Baudini ad ins. Caribaeas, qui plantas quam plurimas observationesque varias mecum amicissime communicavit.

MELASTOMA EXPANSA, foliis oblongo-ovatis attenuatis setaceo-denticulatis glabris, racemo composito pulverulento, pedicellis dichotomis.

Habitat in Montserrat. *Ryan.* 12

RAMI teretiusculi, inferne glabri, superne, uti petioli, nervi foliorum subtus & racemus pulvere ferrugineo leviter tomentosi.

FOLIA petiolata, opposita, quadri-quinquepollicaria, oblongo-ovata, attenuata, acuta, basi obtusa, denticulata: dentibus lente visis seta terminatis; basi integerrima, quinquenervia, supra obscure venosa, subtus venis tenuissimis exstantibus.

Petiolus vix pollicaris.

RACEMUS terminalis, erectus, quinquepollicaris: *Pedunculi partiales* oppositi, patentissimi, duo inferiores insequentibus triplo- vel quadruplo longiores magisque compositi:

Pedicellis ultimis inferioribus bis bifidis, exterioribus bifidis, cum flore sessili in dichotomia.

CALYX campanulatus, obscure striatus, quinquedentatus.

Petala quinque, lineari-oblonga, obtusa.

STAMINA. *Filamenta* decem, corolla longiora. *Antherae* pallide flavae, dorso fuscae.

Stigma obtusum.

A Melastomate striato differt: foliis angustioribus quinquenerviis, floribus minoribus, pedicellis inferioribus in pedunculis partialibus bis bifidis nec omnibus semel bifidis.

An Mel. pyramidalis. La Marck. Encycl. 4. pag. 53.

MELASTOMA ALATA, foliis elliptico-lanceolatis sessilibus integerrimis subtus incanis, ramis alatis, panícula terminali brachiata.

Melastoma alata, floribus racemosis, foliis ovato-oblongis, subtus tomentosis, incanis, subsessilibus. AUBL. fl. Guian. 1. p. 410. tab. 158.

In Cajenna legit von Rohr. ♀

RAMI tetragoni, e membrana decurrente ferruginea quadri-alati, cinereo-tomentosi.

FOLIA tri- ad octopollicaria, opposito minore, sessilia, attenuata, basi revoluta, quinquenervia: nervi quatuor supra basin orti, duo superiores; venosa, rugosa; supra glabriora, oculo armato villis rarioribus adspersa, margine uti juniora villosiora, costa cinerea; subtus villosa-canescens, nervis griseo-purpurascens; *tenella* tomentoso-ferruginea.

PANICULA terminalis, brachiata, palmaris. *Pedunculus communis* inferne & inter infimos ramos tetragono-alatus. *Rami* oppositi, tetragoni, remoti, adscendentes, sensim breviores: *ramuli* trichotomi, ultimi triflori, flore intermedio sessili. *Bractæ* ad ramificationes paniculae, lineares, parvae. *Flores* parvi, copiosi.

CALYX quinquedentatus, uti pedunculi, pedicelli bractæaeque sordide cinereus.

COROLLA. *Petala* quinque, oblonga, unicum reliquis parum latius.

STAMINA. *Filamenta* decem, corolla dimidio longiora. *Antherae* albae, dorso linea purpurea.

Stylus capillaris, longitudine staminum.

Rhexiae speciei secundum Richard.

MELASTOMA IMPETIOLARIS, foliis oblongis acuminatis denticulatis subsessilibus, subtus racemisque axillaribus subdecompositis ferrugineo pulverulentis.

Grossularia plantaginis folio amplissimo. Plum. Catal. pl. Amer. pag. 18. fide herb. Suriani.

Melastoma impetiolaris, foliis denticulatis subsessilibus oblongis acuminatis coriaceis subtus tomentoso-ferrugineis, paniculis terminalibus axillaribusque erectis. Sw. prodr. pag. 70.

Melastoma macrophylla: foliis elliptico acutis, sessilibus, triplinerviis, subintegerrimis, postice ferrugineis; paniculis terminalibus. LA MARCK. Dict. Enc. Vol. 4. pag. 44. fide herb. La Marck.

Habitat in Montserrat. Ryan. ♀

RAMI tetragoni, superne crassitie pennae scriptoriae: juniores compressi, altero latere convexiores, altero planiores, uti pedunculi & calyces pulvere denso ferrugineo-tomentosi, scabriusculi.

FOLIA sessilia, remota, pedalia, sex vel octo pollices lata, basi cordata, inferne versus parum angustata, apice acuminata, denticulata, quinquenervia praeter nervos marginales: nervi supra ad basin saepe tomentosi; supra aetate nitida, glabra, exsiccatione nigra; juniora utrinque tomentosa.

Pedunculi axillares, spithamaci, alternatim compressi, erecti: *Partiales* oppositi, patentissimi, distantes, infimi iterum ramosi, superiores sensim breviores & minus divisi. *Braëtae* sub ramificationibus, subulatae. *Flores* parvi, sessiles, copiosi, per intervalla glomerato-subverticillati.

CALYX globosus: ore coarctato, truncato.

Petala parva, oblonga.

BACCA magnitudine Piperis nigri, sulcata.

MELASTOMA COMPRESSA, foliis oblongis integerrimis subtus incanis nervis ramis petiolisque ferrugineis, racemis verticillatis pedicellis umbellatis.

Melastoma dodecandra: foliis ovalis quinquenerviis integerrimis, subtus tomentosis; paniculae ramis lateralibus subfasciculatis. LA MARCK Dict. Encyclop. Tom. 4. p. 46. fide herb. La Marck.

Habitat in Caribaeis; incolis bois quarré dicta. von Rohr. f.

RAMI ferrugineo tomentosi, superne compressi.

FOLIA petiolata, opposita, quinque- vel sexpollicaria, oblonga, utrinque acuta, quinquenervia, supra glaberrima, subtus incana, nervis venisque ferrugineo pulverulentis.

Petiolus angulatus, ferrugineus, saepe supra pilis ferrugineis hirtus.

PEDUNCULI terminales, gemini cum ramo ulterius excrescente pedunculisque multoties longiore, compressi, griseo tomentosi: *Partiales* quinque in singulo pedunculo, umbellati, apice dilatati, structura & colore pedunculi communis, triflori. *Flores* omnes pedicellati, ante explicationem obovati, inclusi *braëta* diphylla, oblonga, ad basin calycis inserta, decidua, cinereo-pulverulenta.

CALYX ovalis, flavescens, glaber: Limbo plano, subintegro.

Petala quinque, lanceolata.

STAMINA decem, raro duodecim.

Stylus longitudine staminum. *Stigma* peltatum.

BACCA magnitudine pisi, flavescent, glabra.

In specimine a Rohrio misso inflorescentiam inveni, uti eam supra descripsi & in aere incudi curavi. Ad manus vero dein pervenit exemplar aliud, in omnibus conveniens nisi quoad modum florendi, in hoc enim:

RACEMUS terminalis, solitarius, erectus: *Pedunculi* verticillati: in verticillis duobus inferioribus quatuor, quorum duo tenuiores, breviores, triflori, duo longiores robustiores, apice pedunculis quinis, trifloris; in tribus superioribus quatuor, singulis trifloris.

Cum hoc specimen perfectius credo, differentiam specificam inde desumsi.

Accedit ad Melast. Tamoneam Swartzii, differt vero, quod specimen a viro amicissimo missum docet, ramis rufo-ferrugineis, foliis subtus albidioribus, pedunculis partialibus verticillatis, calycibus glabris, petiolis non furfuraceis; folia quoque in mea multoties latiora sunt quam in Fothergilla mirabili, quae secundum citationem eadem est ac Tamonea Aubletii.

MELASTOMA BRACHIATA, foliis ellipticis attenuatis denticulatis glabris nervis subtus pulverulentis, spicis bipartitis racemosis secundis.

Habitat in Montserrat. *Ryan.* h

FRUTEX sex- vel septem pedalis. *Rami* laeves, inferne teretes, glabri, superne leviter pulverulenti. *Ramulus* ad basin pedunculorum simplex; ulterius excreescens compressus, apice uti folia tenella ferrugineo pulverulentus, racemo longior.

FOLIA petiolata, opposita, sex vel octo pollicaria, opposito ut in variis speciebus generis minore, oblongo-ovata, interdum elliptico-lanceolata, denticulata, basin versus subintegerrima, attenuata, quinquenervia praeter nervos marginales, supra glaberrima: nervi & venae majores subtus leviter ferrugineo-pulverulenti; venosa, subreticulata.

Petoli triquetri, supra canaliculati, ferruginei.

RACEMI primum terminales, at ramo laterali demum excreescente axillares. *Pedunculi universales* ut plurimum gemini, interdum unicus robustior, quinquepollicaris, inferne tetragonus, erectus; reliqui quadruplo breviores, compressi, tripartiti, apice in singulo ramo spica bipartita; omnes uti pedunculi partiales, pedicelli & calyces pulverulenti.

verulenti. *Pedunculi partiales* compressi, patentes, distantes, inferiores oppositi: infimi bi-tripollicares, primum trifidi, apice bipartiti; reliqui semipollicares, apice tantum bipartiti. *Flores* in ramis ultimis pedunculorum sessiles in spicam bipartitam divaricatas, secundi, quinque in singulo ramulo cum flore sessili in dichotomia, parvi. *Bractee* oppositae, setaceae.

CALYX superne striatus: *fructiferus* globosus, sulcatus, magnitudine *Piperis nigri*.

Petala obovata, parva.

STAMINA decem.

Octandrae, trinerviae.

MELASTOMA ANGUSTIFOLIA, foliis lineari-lanceolatis integerrimis subtus incanis, ramis virgatis, paniculis terminalibus, floribus erectis. Sw. prodr. pag. 71.

In Montserrat legit *Ryan*. $\bar{h}$

RAMI inferne teretes, cortice fusco-cinerascente, glabri, punctis rarioribus elevatis adspersi, apicem versus alternatim compressi, pulverulento-cinereo-tomentosi.

FOLIA petiolata, opposita, inferne remotiora superne magis approximata, bi- sive tripollicaria, attenuata, acuta, basi obtusa, integerrima, supra glabra, laevia, longitudinaliter trilineata, secundum nervos transversos obsolete lineata: nervi transversi subtus frequentes, parum exstantes.

Petoli vix unguiculares, cinerascentes.

PANICULA terminalis, erecta. *Pedunculi* compressi, tomentoti: *partiales* inferiores bis- vel ter dichotomi; superiores minus compositi. *Flores* parvi, omnes pedicellati.

Petala obovata, flava.

STAMINA corolla parum longiora.

BACCA magnitudine seminis *Coriandri*, globosa, margine calycis persistente quadrilobo coronata.

MELASTOMA CORYMBOSA, foliis ovatis acuminatis integerrimis ramisque glabris, paniculis terminalibus trichotomis.

Habitat in Martinica. *von Rohr*. $\bar{h}$

RAMI uti reliquae partes glabri, cortice pallido, articulati, superne obscure tetragoni.

FOLIA petiolata, opposita, ovata vel elliptico-ovata, quadri-quinquepollicaria, acuminata; acuminis sesquipollicari, trinervia praeter nervos marginales, utrinque glaberrima: subtus pallide viridia, nervis venisque exstantibus.

Petioli pollicares & ultra, subtus carinati.

PEDUNCULI terminales, terni: intermedius robustior & sub prima ramificatione utrinque folium lineare, pollicare: *rami* di-trichotomi, fastigiati, compressiusculi, apice dilatati.

CALYX subglobosus, magnitudine fere *Piperis nigri*, margine persistente, quadrilobo: *lobis* rotundatis.

Petala quatuor, oblonga, obtusa, vix unguicularia.

STAMINA octo, longitudine corollae. *Antherae* lineares.

Stylus corolla parum brevior. *Stigma* obtusum.

A *Melast. coccinea*, cui affinis, differt: tota glabra, praesertim autem pedunculis pedicellisque aequalibus nec nodosis.

MELASTOMA NIGRICANS, foliis elliptico-ovatis integerrimis glabris, ramis triquetris incanis, paniculae terminalis pedunculis trichotomis.

Melastoma trichotoma: laeviuscula foliis lato-ovalibus, acuminatis, triplinerviis, integerrimis; paniculis trichotomis amplis, terminalibus. LA MARCK. Dict. Encycl. Tom. 4. p. 53. fide herb. La Marck.

Habitat in Martinica. von Rohr. 7

RAMI superne compresso-triquetri, e pulvere subtilissimo griseo-rufescente tomentosi.

FOLIA petiolata, opposita, lato-oblonga, acuminata, integerrima, laevia, utrinque glaberrima, supra exsiccatione nigra, subtus pallida, trinervia praeter nervos marginales: in adultioribus nervi transversa remoti; spithamea, uti in quam plurimis speciebus generis opposito duplo minore.

Petioli pollicares & ultra, supra canaliculati, subtus convexi, rufescente-tomentosi.

PANICULA terminalis, spithamea; *pedunculus* uti *pedicelli* e pulvere subtilissimo denso rufescente-tomentosi, alternatim compressi. *Pedunculi* partiales remoti, oppositi, patentissimi, sursum sensim breviores, inferiores quater circiter trichotomi, superiores sensim minus compositi, ultimi triflori; floribus lateralibus sessilibus, intermedio pedicellato. *Bractae* minutae sub floribus. *Flores* minutae.

CALYX turbinatus, obsolete quadrilobus.

COROLLA: *Petala* quatuor, oblonga.

STAMINA: *Filamenta* octo, corolla longiora. *Antherae* fuscae, apice albidæ.

Octandrae, triplinerviae.

MELASTOMA ELAEAGNOIDES, foliis lanceolatis subtus albido-tomentosis integerrimis, pedunculis terminalibus ternis trifloris.

Melastoma elaeagnoides, foliis triplinerviis integris lato-lanceolatis subtus albido-tomentosis, pedunculis terminalibus trichotomis, floribus solitariis. Sw. prodr. pag. 72.

Ex insula St. Crucis, Montserrat & St. Johan. *Ryan.* 1.

RAMI sparsi, saepe oppositi, inferne teretes, rufescentes, punctis cinereis adpersi, superne albido-pulverulento-tomentosi, apicem versus rufescente-tomentosi, compressi.

FOLIA petiolata, bipollicaria, acuta, supra nuda, longitudinaliter trilineata, transversim secundum nervos obsolete lineata, subtus albida, nervis transversis exstantibus.

PEDUNCULI terminales, terni: intermedius interdum utrinque superne pedunculo auctus; singuli triflori. *Flores* breviter pedicellati: *pedicellus* intermedius reliquis parum longior.

CALYX oblongus, medio coarctatus, superne dilatatus margine submembranaceo, integerrimo.

Antherae petalis parum altiores, flavae, dorso fuscae.

Stylus staminibus longior.

BACCA globosa, magnitudine pisi, coronata, lincis quinque insculptis subquinceloba, glabra.

Octandrae, quinquenerviae.

MELASTOMA UMBROSA, foliis ovato-cordatis acuminatis denticulatis subtus hispidis, ramulis floriferis, racemis dichotomis patentibus.

Melastoma umbrosa: foliis quinquenerviis denticulatis lato-ovatis acuminatis utrinque hirtis; ramulis floriferis, racemis dichotomis patentibus; ramis petiolisque hirsutis. Sw. prodr. pag. 72.

Melastoma latifolia: pilosa foliis lato-ovalis, acuminatis, ciliatis, paniculis axillaribus subgem-
natis folio brevioribus. LA MARCK Encycl. Vol. 4. p. 31.

Habitat in Montserrat. *Ryan.* f₂

RAMI uti petioli & pedunculi hispidi, superne acque ac petioli pallide ferrugineo-to-
mentos.

FOLIA maxima, saepe bipedalia, sesquipedem lata, subtilissime dentata, ciliata, parum
attenuata, quinquenervia praeter nervos marginales, superiora juniora trinervia:
supra pilis brevibus adspersa, nervis griseo-villosis; subtus hispida.

RACEMI axillares, solitarii, oppositi. *Pedunculi* ultimi triflori. *Flores* omnes pedicellati.

Braëta parva utrinque ad basin pedunculorum partialium & pedicellorum, spathulata.

BACCA magnitudine seminis Coriandri, hispida.

MELASTOMA CRINITA, foliis ovalibus oblongisve denticulatis utrinque hispidis;
pedunculis infrafoliaceis trifidis: pedicellis trifloris.

Habitat in montibus insulae Martinicae. f₂

RAMI teretes, remote cicatricati, inferne glabri aphylli, superne pilis albidis hispidi.

FOLIA ad apices ramorum, conferta, breviter petiolata, tripollicaria, pollices duos lata,
rigida, quinquenervia: adultiora e pilis albidis utrinque hispida, juniora pilis flave-
scentibus tota tecta; bullata, subtus venis exstantibus reticulata, denticulata.

Petioli supra plani.

PEDUNCULI infrafoliacei, solitarii, pollicares & parum ultra, filiformes, fusco-purpura-
scentes, e pilis purpureis inferne hispidi, subangulati. *Pedicelli* plerumque terminales,
terni, duo interdum inferiores oppositi, singuli triflori. *Flores* pedicellati. *Braëtae*
oppositae ad basin pedunculorum partialium subspathulatae, mucrone aristatae; sub
flore lineares, in aristam desinentes.

CALYX: *tubus* brevis, tetragonus, angulis acutiusculis basi gibbis: *lacinae* quatuor, lato-
ovatae, infra apicem aristatae.

COROLLA: *petala* quatuor, subrotunda, sessilia, calyce triplo longiora.

STAMINA: *filamenta* octo, longitudine corollae.

Stylus longitudine staminum. *Stigma* obtusum.

S T Y R A X.

STYRAX GLABRUM, foliis elliptico-ovatis utrinque glabris, racemis axillaribus, floribus secundis nutantibus.

Styrax glabrum, foliis oblongis subserratis utrinque glabris, pedunculis axillaribus simplicibus confertis multifloris, floribus nutantibus. SWARTZ. prodrom. pag. 74.

In Montserrat legit *Ryan*. $\frac{1}{2}$

RAMI glabri, cinerascetes, subangulati, apice compressi, inferne cicatricati.

FOLIA petiolata, sparsa, quadri- vel quinquepollicaria, elliptico-ovata vel oblonga, acuminata, interdum obtusissima, utrinque glabra, subtus subargentea, integerrima, interdum versus apicem obscure repanda.

Petioli pollicares, supra canaliculati.

RACEMI axillares, patentissimi, simplicissimi, solitarii, tri- ad octoflori, saepe bipollicares, interdum brevissimi, ut flores vel congesti in pedunculo brevi appareant, vel pedunculi plures uniflori aggregati in axillis foliorum. *Pedunculus communis*, uti pedicelli angulati, subargentei: *pedicelli* unguiculares, apicemversus crassiores. *Bractea* parva, linearis, ad basin singuli pedicelli, interdum alia in ipso pedicello supra basin. *Flores* fere pollicares, extus uti calyces argentei.

CALYX truncatus, obscure quinquedentatus, persistens.

COROLLA quinquepartita: *laciniae* lineari-lanceolatae, superne patentes.

STAMINA: *Filamenta* deceni, basi pilosa, alterna breviora. *Antherae* erectae, lineares.

PISTILLUM: *Germen* hemisphaericum. *Stylus* longitudine staminum. *Stigma* obtusum, subquadrilobum.

DRUPA basi calyce persistente vestita, oblonga, mucronata, glabra, magnitudine Pruni spinosae, exsucca. *Putamen* osseum, fragile, uniloculare.

SEMEN unicum, oblongum.

ALBUMEN semini conforme, carnosum, album.

EMBRYO compressus, inversus, niveus. *Cotyledones* ovatae, foliaceae. *Radicula* cylindrica, supera.

PSIDIUM.

PSIDIUM AROMATICUM, foliis lanceolato-oblongis acuminatis glabris, pedunculis infrafoliaceis unifloris, baccis quadrilocularibus.

Psidium aromaticum: foliis ovatis, acuminatis, fructu dulci, cerasiforme. AUBL. fl. Gu. 1. p. 485. tab. 191.

In Cajenna & insula Trinitatis legit von Rohr. $\S$

RAMI cortice cinereo, glabri, cicatricati, inferne teretes, superne compressi, ad articulos dilatati: *ramuli* oppositi, foliosi, purpurascens.

FOLIA petiolata, opposita, subtripollicaria, parum attenuata, acuta, basi obtusa, integerrima, utrinque glabra, tenera, venosa, subreticulata, supra secundum nervos & venas lineata, subtus pallidiora.

PEDUNCULI floriferi ad cicatrices ramorum, utrinque gemini vel tres, cum rudimento ramuli, post florescentiam ulterius excrecentes, basi utrinque squamula minuta, uniflori, filiformes, semipollicares: *fructiferi* ad ramulorum basin infrafoliacei, oppositi, solitarii, floriferis triplo longiores, basin versus utrinque foliolum lanceolatum, unguiculare. *Bracteae* duae, versus summitatem pedunculi floriferi, lineares, deciduae.

CALYX extus oculo armato villosus: *lacinae* quinque persistentes, intus tomentosae, incanae.

COROLLA parum minor quam Crat. Oxyacanthae.

BACCA globosa, glabra, magnitudine fructus Oxyacanthae.

MIMOSA.

Foliis simpliciter pinnatis. Inermes.

MIMOSA UMBELLIFERA, foliolis bijugis lanceolatis, glandula inter singula, petiolis marginatis, umbellis axillaribus pedunculatis.

Habitat in America meridionali. von Rohr. $\S$

RAMI teretes, glabri, fusco-cinerascentes.

FOLIA pinnata: *pinnae* bijugae, brevissime petiolatae, utrinque glabrae, venosae, supra nitidiusculae, attenuatae, extimae subtripollicares, intimae minores.

PETIOLUS marginatus, articulatus. *Glandula* cava, orbiculata, sessilis, inter pinnulas. *Stipulae* subulatae.

PEDUN-

PEDUNCULI axillares, solitarii, pollicares. *Bractea* minuta, superne & ad singulum pedicellum. *Pedicelli* circiter viginti quatuor, filiformes, unguiculares.

CALYX brevissimus, quinquedentatus.

COROLLA, uti Calyx glabra, unguicularis, quinquedentata.

STAMINA plura, monadelphica.

MIMOSA LUCIDA, foliolis bijugis lanceolato-ellipticis nitidis, petiolis marginatis glandulosis, spicis axillaribus oblongis.

Habitat in Cajenna. *von Rohr.* 12

Inermis.

RAMI teretes, glabri, cortice fusco cinereo punctato.

FOLIA petiolata, pinnata. *Foliola* bijuga, subpetiolata, opposita, extima quadri- vel sexpollicaria, interiora bi- sive tripollicaria, lanceolato-elliptica, basi obtusa, altero margine vix breviora, apice acuminata, acuta, mucronata, integerrima; adultiora utrinque glabra, nitida; juniora supra & ad marginem pilis raris adspersa, versus basin copiosioribus; omnia subtus viridi-flavescentia.

Petiolus subtus convexus, pilis rarioribus utrinque, praesertim basi adspersus, marginatus, biarticulatus: *articulis* cuneiformibus: exterior interiori triplo longior; interior basin versus aequalis, crassus, fuscus. *Petioli partiales* brevissimi, fusci, crassiusculi.

Stipula utrinque, lineari-lanceolata, vix unguicularis, extus villosa, substriata.

PEDUNCULI axillares, solitarii, longitudine petioli, striati, angulati, villis rarissimis subpilosi. *Flores* in spicam oblongam conferti, patentiusculi, circiter viginti quatuor, semipollicares. *Bractea* setacea, calyce dimidio brevior, ad basin singuli floris.

CALYX tubulosus, corolla dimidio brevior, striatus, glabriusculus, tri- vel quadridentatus: *dentibus* ovatis acutis.

COROLLA extus aureo-villosa, intus glabra: *lacinae* quinque, ovatae, acutae.

STAMINA corolla triplo longiora.

MIMOSA ALBA, foliolis trijugis oblongis acuminatis inaequalibus, petiolis subaequalibus glandulosis, spicis axillaribus geminis oblongis.

Mimosa alba; inermis foliis pinnatis trijugis, pinnis aequalibus ovatis acuminatis, petiolo submarginato. SWARTZ. prodr. pag. 85.

Habitat in Cajenna. von Rohr. 1

Inermis.

RAMI inferne teretes, glabri, cortice fusco cinereo punctato, superne angulati, apice uti ramuli ferrugineo-tomentosi. Ramuli axillares, pollicares vel ultra, inferiores floriferi.

FOLIA petiolata, quadri- vel quinquepollicaria, pinnata. Foliola trijuga, subpetiolata, extima tripollicaria, interiora sensim minora, elliptico-ovata vel oblonga, parum acuminata, basi acuta, integerrima, utrinque glabra, nitidiuscula, venosa, subtus pallidiora.

Petoli subtus convexi, sursum versus ad singulum par foliolorum parum latiores, non tamen alati, leviter tomentosi. Glandula sessilis, cava, inter singulum par foliolorum, Stipulae caducae.

Pedunculi axillares, plerumque gemini, rarissime terni, unguiculares, pubescentes.

SPICAE oblongae, longitudine pedunculi. Flores circiter viginti, conferti.

CALYX subtommentosus, quinque-dentatus: dentibus obtusis.

COROLLA glabra, semiunguicularis: tubus striato-subangulatus.

STAMINA numerosa, monadelphica: columna staminum corolla duplo longior, purpurea.

Foliola interiora certe sensim minora evadunt & petiolus tam parum marginatus, ut potius aequalis dici mereatur, attamen specie a Mimosa alba Swartzii non differre persuasus sum.

MIMOSA VIRGULTOSA, foliis subquadrijugis: foliolis lanceolatis glabris, petiolis marginatis, umbellis axillaribus pedunculatis.

Habitat in Cajenna. von Rohr. 1

FRUTICULUS inermis. Rami teretes, tenues, fusi, subpunctati, inferne glabri, apice ferrugineo-subtommentosi.

FOLIA petiolata, frequentia, sesquipollicaria, inferiora minora, pinnata, quadri- sive quinquejuga. Foliola sessilia, unguicularia, interiora sensim minora, facie fere Myrti boetici, lanceolata, obtusa, mucronata, utrinque glabra, nitidiuscula, latere interiori baseos subobliqua & parum angustiora.

Petoli subtus convexi, e margine tenui decurrente subalati, articulati, canaliculati, villosi. Glandula minuta, cava, inter singulum par pinnarum.

Stipulae setaceae, deciduae.

PEDUNCULI axillares, vix unguiculares, filiformes, pubescentes. *Pedicelli* umbellati, circiter duodecim, capillares, pedunculo communi duplo longiores, uniflori.

CALYX minutus, glaber, quinquedentatus.

COROLLA semiunguicularis, tubulosa, sursum versus sensim ampliata, glabra, striata, quinquedentata.

STAMINA. *Filamenta* quatuordecim vel sedecim, monadelpha: columna staminum corolla longior.

Foliis bigeminis.

MIMOSA ROSEA, foliolis lanceolatis, capitulis racemosis, pedicellis geminatis, spinis stipularibus geminis.

β. subinermis, foliolis oblongis.

Habitat in Cajenna. von Rohr. ♀

FRUTEX. *Rami* inferne teretes, superne angulati, glabri, e punctis numerosissimis cinereo fuscoque striati.

FOLIA petiolata, bigemina. *Foliola* breviter petiolata, bipollicaria, altero parum brevior & angustior, lanceolata, obtusiuscula, mucrone minuto terminata, latere interiore angustiora & basi parum breviora, utrinque glabra, venosa, lacte viridia.

Petioles communes pollicares: *secundarii* semiunguiculares; omnes filiformes, glabri, subtus convexi, supra canaliculati, mucrone rigido terminati: *partiales* brevissimi. *Glandula* sessilis, parva, cava, in apice petiolorum communium & secundariorum.

Spina utrinque ad latus petioli communis, semiunguicularis, erecto patens, fusca.

RACEMI axillares & terminales, quinque vel sexpollicares, erecto-patentes. *Pedunculi* striato-angulati, flavescentes, apice vix villosi: *pedicelli* plerumque gemini, raro inferne terni, filiformes, sesquipollicares, sursum versus sensim minores, vix villosi. *Bractea* subulata, semiunguicularis, incurva, ad basin pedicellorum. *Flores* septem vel novem, spicato-capitati, unguiculares, oculo armato tenuissime tomentosi.

CALYX brevis.

STAMINA numerosa, monadelpha: columna staminum corolla duplo longior.

Convenit β. modo crescendi, inflorescentia & floribus; differt vero foliis obtusioribus. longioribus & triplo maioribus, subtus oculo armato villosis, spinis brevissimis, pedunculis apice villosioribus, hinc primo intuitu specie differre videtur. VON ROHR autem, qui eas in loco natali observavit, contendit quod modo varietates sint.

MIMOSA MACROSTACHYS, foliolis lanceolato-oblongis, spicis axillaribus elongatis solitariis, spinis stipularibus geminis.

Habitat in Cajenna. von Kehr. ♀

RAMI teretes, substriati, glabri, cortice fusco, punctis minutis albidis numerosis adpressi.

FOLIA petiolata, bigemina. *Foliola* subpetiolata, bi-sive tripollicaria, oblongo-lanceolata, latere interiore angustiora, obtusa cum mucrone brevi, basi acuta, utrinque venosa, glabra.

Petioles communes & secundarii vix pollicares, subtus convexi, supra canaliculati, basi fusci & parum crassiores; *universalis* mucrone, subulato, rigidiusculo terminatus; *partiales* brevissimi, fusci. *Glandula* sessilis, cava, ad apices petiolorum communium & secundariorum.

Spina utrinque ad latus petioli communis, brevis, recta.

PEDONCULI subpithunaci, axillares, solitarii, patentissimi, glabri, striati, angulati, post casum florum denticulati. *Flores* spicati copiosi, unguiculares, sparsi, distincti.

Bractea minuta, rigida, ad basin singuli floris.

CALYX parvus, quinquedentatus, uti corolla extus tenuiter tomentosus, canescens, intus glaber.

COROLLAE lacinae ovatae.

STAMINA numerosa, monadelphia.

Foliis conjugatis. Inermis.

MIMOSA LIGUSTRINA, foliolis bijugis: pinnulis lanceolatis interioribus minoribus, petiolis linearibus glandulosis.

Habitat ad St. Martham. von Rohr. ♀

Inermis.

RAMI glabri, teretes, cortice cinereo punctato subrimoso.

FOLIA petiolata, conjugata. *Foliola* bijuga: *pinnulae* sessiles, lanceolatae, attenuatae, obtusiusculae, venosae, laeves, supra nitidae, utrinque glaberrimae: intimae pollicares, aequilateres; extimae bipollicares, latere interiori angustiores.

Petioles subtus convexi, supra canaliculati: *communis* unguicularis; *partiales* sesquipollicares. *Glandula* cava, sessilis, in apice petioli communis & inter singulum par pinnularum.

Stipulae caducae.

SPICAE

SPICAE in ramis aphyllis, oppositae, utrinque geminae, pollicares. *Pedunculi* filiformes, purpurascentes, glabri, post casum florum e bracteis minutis patentibus dentati.

CALYX tubulosus, glaber, quinquedentatus.

COROLLA vix semiunguicularis, quinquedentata.

Accedit ad Mimosam Bourgoni Aubletii, differt foliis conjugatis nec simpliciter pinnatis.

Foliis conjugatis. Spinosae.

MIMOSA SALINARUM, foliolis pinnatis: pinnis multijugis, spinis stipularibus solitariis, spicis elongatis.

Habitat ad salinas Jamaicae. *von Rohr.* ‡

RAMI teretes, glabri, cortice griseo-fusco, rigidi, a gemma ad gemmam subflexuosi.

GEMMAE plerumque solitariae, interdum geminae, aetate semiunguiculares, stipulis minutis acicularibus rigidiusculis innocuis imbricatae, post casum foliorum inter stipulas cicatricatae.

FOLIA ex apice gemmae, duo quatuor vel quinque, petiolata, conjugata. *Filula* divaricata, pinnata: *pinnulae* novemdecim vel vigintijugae, lineares, obtusae, glabrae, aveniae, subunguiculares, interiores & exteriores minores.

Petiolus universalis pollicaris, teres: *partialis* subtripollicaris, filiformis, triqueter, uti universalis mucrone terminatus. *Glandula* cava, sessilis, parva, in apice petioli universalis & ad singulum par pinnarum ad alterum latus petioli nec in ipso sulco.

Spina unica, rarissime duae ad latera axillae gemmaceae, patens, recta, rigida, semiunguicularis.

SPICAE ex eadem gemma ac folia, solitariae, bipollicares, pedunculatae. *Flores* conferti, parvi.

CALYX brevis, glaber.

COROLLA quinquepartita: *lacinae* lineari-lanceolatae, extus glabrae, intus apice villosae.

STAMINA decem.

Germen hirsutum, cinereum.

Foliis bipinnatis. Inermes.

MIMOSA CAUDATA, foliis bi-trijugis: pinnulis sex vel octojugis extimis nequibus, petiolis eglandulosis, spicis racemosis gemmatis.

Mimosa LOEFLING. it. pag. 223. β . ex mente Rohrii.

Habitat in Cajenna. von Rohr. $\hbar$

Inermis.

RAMI teretes, glabri, cinerascens, flexuosi.

FOLIA petiolata, bipinnata. *Foliola* bi-sive trijuga: *pinnulae* foliolorum interiorum sexjugae, extimorum septem- vel octojugae, sessiles, lineari-oblongae, obtusissimae, subemarginatae, utrinque glaberrimae, venosae, supra nitidae, subtus parum pallidiores, latere interiori angustiores & basi obliquae, latere exteriori basi rotundatae; extimae sesquipollicares, interiores sensim minores, rarissime par ultimum vel penultimum magnitudine intimorum.

Petiole supra canaliculati, subtus convexi, glabri: *communes* subspithamaci: *partiales* extimi palmares, intimi breviores. *Glandulae* nullae.

Stipulae caducae.

RACEMUS terminalis, compositus e spicis copiosis, spithamacus. *Spicae* geminatae, approximatae, quadripollicares, erecto-patentes: *tuberculum* parvum, muticum ad basin pedunculorum partialium. *Flores* numerosissimi, parvi, glaberrimi.

CALYX brevis, obscure quinque-entatus.

COROLLA: *Petala* quinque, linearia, obtusa, cava, patentia.

STAMINA decem.

MIMOSA TRAPEZIFOLIA, foliolis subbijugis: pinnulis subquadrijugis glabris obovato-trapeziis, floribus racemoso-capitatis.

Habitat in insula Trinitatis. Ryan. $\hbar$

Inermis.

ARBOR grandis. *Rami* alterni, teretes, extrorsum angulati, cortice griseo, apice villis flavescentibus subtomentosi.

FOLIA petiolata, bipinnata. *Foliola* bijuga, rarius trijuga; extima tripollicaria; intima breviora: *pinnulae* foliolorum extimorum quadri- vel quinquejugae, intimorum bi-sive trijugae, subsessiles, ultimae obovatae, pollicares, extus gibbae, interiores sensim minores, trapeziformes, latere interiori rectae sursum angustiores & inferne latiores obliquae, latere exteriori interne angustiores & sursum gibbae latiores, obtusae, basi acutae, glabrae: juniores subtus e villis minutis sericeae, tenellae aureo-tomentosae.

Petiole

Petoli glabri, supra canaliculati: *partiales* exteriores petiolo universali longiores, interiores breviores. *Glandula* sessilis, cava, inter par foliolorum interius, uti & inter duo vel tria extima pinnularum paria foliolorum exteriorum & inter omnes pinnulas foliolorum interiorum, ad latus petiolorum nec in eorum sulco.

Stipulae caducae.

PEDUNCULI axillares, plerumque gemini, erecti, tripollicares, folio breviores, sulcati, aureo subtomentosi. *Flores* conferti in capitulum oblongum, unguiculares, subpedicellati, circiter viginti, parvi.

CALYX campanulatus, quinquefidus: *laciniis* ovatis, acutis, uti corolla extus leviter aureo-tomentosis.

COROLLA campanulata, calyce duplo longior, quinquefida: *laciniis* lanceolatis, acutis.

STAMINA. *Filamenta* circiter triginta, monadelpha, corolla sextuplo longiora.

PISTILLUM. *Germen* lineare. *Stylus* capillaris, longitudine staminum.

LEGUMEN compressum, quadripollicare, latitudine unguis, spiraliter involutum, glabrum, margine exteriori repandum, dodecaspermum.

MIMOSA NIGRICANS, foliolis quadrijugis: pinnulis decemjugis, glandula inter foliola, spicis axillaribus solitariis longitudine foliorum.

Habitat in America meridionali, incolis amouret-wood. *von Rohr.* f₂

Inermis.

ARBOR vigintipedalis. *Rami* teretes, flexuosi, rigidi, inferne glabri, fusci, superne tenuissime flavido tomentosi.

FOLIA petiolata, bipinnata. *Foliola* quadrijuga opposita: *pinnulae* decem vel undecimjugae, oppositae, semiunguiculares: par intimum & extimum minora; subtrapeziformes, utrinque rotundatae, altero latere angustiores, aveniae, enerviae, utrinque glabrae, excepta costa villosa-flavescente: tenella aureo-tomentosa.

Petoli supra subcanaliculati, subtus convexi, bipollicares, flavescenti-subtomentosi.

Glandula orbicularis, sessilis, inter singulum par foliolorum.

Stipulae caducae, minutae.

SPICAE pedunculatae, solitariae. *Flores* copiosi, sparsi.

Exsiccatione nigra evadit.

MIMOSA CHRYSANTHA, foliolis octojugis: pinnulis multijugis, petiolis eglandulosis, capitulis oblongis pedunculatis quaternis.

Habitat in Cajenna. von Rohr. h

Inermis.

RAMI fusco-purpurascens, flexuosi, glabri, inferne teretes, superne impunctati, striato-subangulati.

FOLIA petiolata, distantia, patentia, sex vel septempollicaria, bipinnata. Foliola opposita, tripollicaria, octojuga: pinnulae viginti vel vigintitrijugae, semiunguiculares, foliolorum interiorum pauciores & breviores, lineari-oblongae, obtusae, glaberrimae, subtus pallidae.

Petiolis eglandulosi, fusco-purpurascens, supra subcanaliculati, subtus convexi, apicem versus compressi, mucrone subulato terminati: partiales filiformes, basi fusi.

Stipulae lineares, vix unguiculares, deciduae.

PEDUNCULI axillares, plerumque quatuor, superne interdum tres, unguiculares, filiformes.

Flores in capitulo oblongo, circiter viginti, breviter pedicellati, conferti, parvi, glabri.

STAMINA numerosa, aurea.

MIMOSA GLANDULOSA, foliolis suboctojugis: pinnulis septemdecimjugis glabris, glandula inter singula paria, spicis axillaribus solitariis elongatis.

Habitat in Cajenna. von Rohr. h

Inermis.

RAMI teretiusculi, cortice cinereo.

FOLIA petiolata, gemina vel terna saepe ex eodem puncto, tri- vel quadripollicaria, bipinnata. Foliola quinque vel octojuga, opposita, interiora breviora, pinnulis paucioribus: pinnulae septemdecimjugae, oppositae, lineares, sessiles, semiunguiculares, acutae, latere altero angustissimae, glabrae.

Petiolis subtus convexi, supra plani: partiales plani, mucrone terminati. Glandula sessilis, cava, inter singulum par foliolorum.

Stipulae deciduae.

SPICAE axillares, solitariae, folio longiores, erectae. Pedunculi angulati glabri. Flores copiosi, distincti, sparsi, parvi, glabri.

CALYCES campanulati, quinqueidentati.

COROLLA calyce dimidio longior, profunde quinquefida: *laciniae* lineari-lanceolatae.

STAMINA numerosa, inonadelpha.

MIMOSA GUIANENSIS, foliolis pinnulisque subnovemjugis subtrapeziformibus, petiolis basi glandulosis, spicis axillaribus geminis teretibus.

Mimosa guianensis: arborescens, inermis, floribus spicatis albis, legumine compresso. AUBL. flora Guianens. pag. 938. tab. 357.

Habitat in Guiana. von Rohr. ♀

Inermis.

RAMI teretes, glabri, fusci, punctis pallidis rarioribus adpersi.

FOLIA petiolata, pedalia. *Foliola* septem ad decemjuga, plerumque opposita, interdum alterna, palmaria, interiora breviora. *Pinnulae* novem vel decemjugae, foliolorum interiorum pauciores, petiolatae, alternae, unguiculares, oblongo-trapezoideae, basi subtransversae, latere interiore inferne latiores & superne angustiores, latere exteriori inferne angustiores & superne latiores, apice rotundatae: terminales obovatae; omnes utrinque glabrae, supra nitidae, obscure venosae, subtus pallidae, in specimine exsiccato supra nigrae, subtus subferrugineae.

Petioli communes validi, inferne teretes, glabri, extrorsum angulati, villosiusculi, sordide cinerascens: *partiales* compressi. *Glandula* baseos petioli communis, oblonga, marginata, coeterum nullae nec inter foliola vel inter pinnulas.

Stipulae deciduae.

SPICAE axillares, geminae, palmares, teretes, pedunculatae. *Pedunculi* pollicares, vix villosi, inter flores tomentosi, sordide canescentes. *Flores* copiosissimi, conferti, parvi.

STAMINA decem, corolla longiora.

Foliis bipinnatis. Aculeatae.

MIMOSA PANICULATA, foliolis octojugis: pinnulis numerosissimis linearibus, paniculis glabris petiolisque subtus aculeatis.

Mimosa paniculata. WEST Beskriv. over St. Croix pag. 312.

Habitat in insula St. Crucis. West. ♀

RAMI teretes, glabri, cortice cinereo, uti petioli & pedunculi aculeati: *aculei* sparsi, recurvi, purpurascentes.

FOLIA petiolata, bipinnata, palmaria vel ultra, glabra. *Foliola* octojuga, opposita, bipollicaria, intus versus sensim minora: *pinnulae* foliolorum exteriorum viginti septemjugae; interiorum quindecim- vel sedecimjugae, lineares, acutae, altero latere angustiores, intus basi rotundatae, vix semiungiculares.

Petioli universales purpurascentes, apice in setam desinentes, basi incrassati, supra canaliculati; subtus aculeis paucis, sparsis, remotis. *Glandula* orbicularis, sessilis, versus basin petioli & inter duo paria extrema foliolorum; nulla in petiolis partialibus.

PANICULA terminalis & ex axillis ultimis, diffusa. *Rami* flexuosi, inferne aculeati, superne uti ramuli inermes, glabri, linea longitudinali exarati, subangulati; *foliolum* bipinnatum, pollicare, ad basin ramorum inferiorum paniculae cum stipula lineari membranacea decidua. *Pedicelli* duo, quatuor vel quinque ex eodem puncto, unguiculares, inaequales, simplices, interdum ramosi, pubescentes.

CAPITULA globosa, magnitudine capitulorum mimosae farnesianae.

Diversa a *Mimosa pennata* Linnaei ramis, petiolis paniculisque glabris, nec tomentosis; pinnulis foliolorum majoribus; petiolis subtus aculeatis; glandulis petiolorum; ramis paniculae ramosis, nec subsimplicibus. Facile crederem hanc esse Linnaei *Mimosam tenuifoliam* Spec. plant. edit. 1. pag. 523. ob maximam similitudinem cum *Mimosa pennata*, quare forte a Linnaeo in secunda editione specierum cum illa, uti varietas, conjungitur, nec quoque abludit differentia specifica & brevis descriptio *Mimosae tenuifoliae* Linnaci loco citato specierum plantarum editionis primae; specie autem esse diversam non dubito.

MIMOSA TAMARINDIFOLIA, ramis tetragonis, stipulis cordatis, spicis oblongis pedunculatis: axillaribus geminis: terminalibus subpaniculatis.

Acacia aculeata, flore albo, foliis tamarindi. PLUM. spec. 17. Ic. tab. 7.

Mimosa tamarindifolia: aculeata, foliis bipinnatis quinquejugis, partialibus subdecemjugis, petiolis communibus inermibus. LIN. Syst. Veget.

In Cajenna legit von Rohr. 5

RAMI tetragoni: angulis obtusiusculis; purpurei, glabri, aculeati: *aculei* sparsi, recti, flavescentes, glabri.

FOLIA petiolata, bipinnata. *Foliola* opposita, tripollicaria, intus versus sensim minora, quinque- vel sejuga: *pinnulae* oppositae, sedecim- vel octodecimjugae, brevissime petiolatae, vix unguiculares, interiores minores, lineari-oblongae, obtusae, altero latere angustiores, utrinque glabrae.

Petiolus communis inermis, teretiusculus: *secundarii* filiformes. *Glandula* sessilis, in foliis inferioribus versus basin petioli, in superioribus inter par infimum foliolorum, oblonga. *Setae* duae, foliaceae, oppositae, in petiolis secundariis infra pinnulas.

Stipula utrinque, cordata, unguicularis, lata, membranacea, acuta, glabra.

PEDUNCULI axillares, gemini, folio dimidio breviores, bipollicares: superiores subpaniculati. *Braëtea* cordata, acuta, membranacea, in medio pedunculi, decidua. *Flores* plures in spica oblonga, unguiculari, glabra, obtusa: *braëteola* ovata, parva, caduca, ad singulum florem.

RUDOLPHIA.

RUDOLPHIA VOLUBILIS. Willden. Sp. Plant. Tom. 3. pag. 918.

Habitat in Puerto-Rico. *West.* 1.

CAULIS fruticosus, teres, volubilis, ramosus, cortice fusco-cinerascente, adspersus punctis numerosis elevatis. *Rami* structura caulis, alterni, remotissimi: *tenelli* laeves, retrorsum pilosi.

FOLIA petiolata, remota, simplicia, cordata, integerrima, acuminata: acumine brevi obtuso, rigida, venosa, secundum venas supra lineata, utrinque glabra, tri- vel quadripollicaria.

Petioli teretes, glabri, striati, longitudine foliorum, basi apiceque articulati: articulis parum crassioribus, fuscis, villosis, setae duae ad basin articuli superioris.

Stipula utrinque, setacea, vix semiunguicularis, decidua.

RACEMI axillares, solitarii, saepe duo tres vel quatuor, *tenelli* e braëteis setaceis inbriati: *adulti* elongati, spithamaci. *Pedunculi* teretes, rigidi, a basi ad apicem alterne frequenter tuberculati. *Pedicelli* duo vel tres in singulo tuberculo, unguiculares. *Braëtea* ovata, acuminata, rubra, sub singulo tuberculo & duae ad basin singuli floris, parvae, deciduae.

CALYX tubulosus, inferne subcarnosus, superne compressus, pollicaris, coloratus, junior villosus, aetate glaber, bilabiatus: *labium superius* compressum, subbifidum, in-

feriore tri- vel quadruplo latius: *laciniis* rotundatis; *inferius* trifidum: *laciniis* laterali-
bus lanceolatis, labio superiore brevioribus, intermedia conduplicata, labio superiore
longiore, apice incurva, acuta.

COROLLA pentapetala, papilionacea. *Vexillum* calyce dimidio longius, conduplicatum,
emarginatum, striatum, unguiculatum: *unguis* calyce duplo brevior. *Alae* lineares,
subfalcatae, inferne angustatae, superne tortae, ungue vexilli vix longiores. *Carina*
diphylla, structura & longitudine alarum.

STAMINA. *Filamenta* decem, recta, longitudine vexilli, novem in unum corpus con-
nata, superne distincta: decimum liberum. *Antherae* oblongae.

PISTILLUM. *Germen* conicum. *Stylus* subulatus, longitudine staminum.

Recedit sic a genere *Erythrinae*: calyce bilabiato, inferne abique poro mellifero; alis ca-
lyce & vexillo multo brevioribus; filamentis novem fere ungue ad connatam con-
natis, decimo omnino libero; germine sessili.

A *Piscidia*: calyce; brevitate alarum carinaeque; filamentis decimo libero.

SIPARUNA.

CHARACTER ESSENTIALIS. FLORES masculi & foeminei in eadem umbella.

MAS. CALYX quadrifidus. COROLLA nulla. STAMINA quatuor ad decem.

FOEMINA. CALYX inaequaliter quadrifidus: *laciniis* connatis. COROLLA
nulla. *Germen* superum. *Stylus* brevis. *Stigmata* octo.

SIPARUNA GUIANENSIS. AUBLET. flor. Guian. pag. 864. tab. 333.

Habitat in Guiana. von Rohr. $\frac{1}{2}$

RAMI teretes, glabri; superne compressiusculi, pubescentes, sordide subcinereascentes.

FOLIA opposita, petiolata, patentissima, quadripollicaria, elliptica, acuminata, in-
gerrima, *tenella* utrinque sordide cinereo-tomentosa, *juniora* supra pilis raris stellatis
oculo armato videndis adspersa, *adultae* glabra, nervosa, subtus obscure venosa.

Petiolus semiungicularis.

PEDUNCULI axillares, utrinque gemini, reflexi, uti calyces & pilis stellatis sordide cinereo-
tomentosi, longitudine petioli.

FLORES masculi circiter quinque vel sex, in apice pedunculi, subsessiles.

Foeminei in eadem umbella, solitarii, parum longius pedicellati. *Stylus* calyce longior.

FRUCTUS mihi ignotus.

Ex observatione Rohrii floribus foemineis est:

CALYX monophyllus, obovatus, inaequaliter quadrifidus: *laciniis conniventibus*.

COROLLA nulla.

STAMINA nulla.

PISTILLUM. *Germen* superum. *Stylus* cylindraceus, brevis. *Stigmata* octo, acuta, reflexa, marcescentia.

PERICARPIUM calyce connivente involutum.

PLUKENETIA.

PLUKENETIA VOLUBILIS, foliis cordatis serratis, racemis elongatis.

Plukenetia scandens, *hederæ foliis serratis*, *fructu tetragono*. PLUM. gener. pag. 47. Ic. 226.

Plukenetia volubilis. LIN. spec. plant. ed. 1762. pag. 1423.

PLUKENETIA INTEGRIFOLIA, foliis cordato-oblongis integerrimis, racemis brevissimis.

In Demerari legit *von Rohr*.

CAULIS volubilis. *Rami* alterni, teretes, striati, glabri: *ramuli* laeves, pubescentes.

FOLIA petiolata, alterna, inferiora septempollicaria, superiora sensim minora, cordato-oblonga, acuminata: acumine acuto; juniora obscure remote denticulata, adultiora integerrima, membranacea, venosa, tri- vel quinquenervia, utrinque glabra.

Petioles teretes, pubescentes, pollicares, superiores breviores.

RACEMI ex axillis superioribus vel supraaxillares, solitarii, petiolis parum longiores.

FLORES foeminei ad basin pedunculi, solitarii, longius pedicellati: *marculi* copiosi, brevissime pedicellati, conferti, minutissimi.

PISTILLUM ut in *Plukenetia volubili*.

CAPSULA depressa, quadrangularis: angulis obtusis, bituberculatis; quadrilocularis: *loculis* monospermis.

DALECHAMPIA.

DALECHAMPIA HETEROPHYLLA, foliis subtus villosa-subtomentosis denticulatis cordatis indivisis trifidisque, stipulis subulatis, involucris subtridentatis.

In Cajenna legit *von Rohr*.

CAULIS volubilis, teres, striatus, e villis minutis sordide cinereo-subtomentosus. *Ramuli* axillares, folio parum breviores.

FOLIA petiolata, alterna, remota, bi- tri- vel quadripollicaria, cordata, indivisa vel profunde trifida: *lobi* laterales semicordati, intermedio oblongo basin versus parum angustato; omnia denticulata, acuta, quinquenervia, venosa, minime rugosa, supra glabriuscula venis cinereo-villosis, subtus villosiora, mollia.

Petioles folio dimidio breviores, teretes, sordide cinerascens. *Stipulae* parvae, subulatae, deciduae ad singulum latus petioli: duae spuriae setaceae superne in apice petioli.

PEDUNCULI ex apice ramulorum, solitarii, breves, extrorsum parum crassiores, teretes, flavescenti-griseo tomentosi, apice nutantes.

INVOLUCRUM *exteriorius* tetraphyllum: *foliolis* subsetaceis, brevissimis; *interius* diphyllum, maximum: *foliolis* ovato-cordatis, sesquipollicaribus, utrinque flavescenti-griseo tomentosis, septem- vel novemnerviis, apice tridentatis, coeterum integerrimis.

DALECHAMPIA MOLLI, foliis trifidis denticulatis subtus villosis, involucris oblongis subtrifidis coloratis villosis, stipulis subulatis.

Habitat ad St. Martham. *von Rohr*.

CAULIS volubilis. *Rami* cinereo subtomentosi: *ramuli* axillares, folio parum breviores.

FOLIA petiolata, basi cordata, tripollicaria, quinquenervia, venosa, minime rugosa, profunde trifida, praesertim adultiora: *lobi* oblongi, obtusi, obsolete denticulati, aetate supra fere nudi, subtus molliter villosa-subtomentosi, intermedio parum longiore.

Petioles griseo-tomentosi, pollicares. *Stipulae* subulatae, parvae, deciduae, duae spuriae baseos folii ad insertionem petioli.

Pedunculi terminales ramulorum, solitarii, sub flore parum crassiores, tomentosi.

INVOLUCRUM *exteriorius* tetraphyllum: *foliolis* subsetaceis, brevissimis; *interius* maximum: *foliolis* lato-oblongis, pollicaribus, coloratis, utrinque villosa-subtomentosis, septemnerviis, subtrifidis: *laciniis* ovatis, intermedia parum majore, coeterum integerrimis.

FLORES

FLORES foeminei terni, intra idem involucrum commune. *Involucella* triphylla, oblonga, apice subtriloba, glabra, ciliata, purpurascens.

Stylus & *Stigma* ut in *Dalechampia* scandente.

CAPSULA pilis albis copiosissimis tecta.

DALECHAMPIA SCANDENS, foliis trifidis serratis, involucris cordatis trifidis hirtis, stipulis semicordatis.

Dalechampia scandens: foliis trifidis serratis. LIN. Syst. Veget. pag. 862.

ZANTHOXYLUM.

ZANTHOXYLUM SIMPLICIFOLIUM, foliis simplicibus.

Curtisia. SCHREB. Gen. pag. 199. num. 508.

Habitat in Monserrat, incolis yellow Wood dictum. *Ryan*. f.

ARBOR saepe trigintapedalis. *Rami* inermes, cortice fusco, cinereo punctati, teretes, glabri.

FOLIA superne in ramis & ramulis, petiolata, alterna, bi- sive tripollicaria, ovata, vel oblongo-ovata, interdum parum acuminata, utrinque glabra, membranacea, venoso-subreticulata, perforata; supra lucida.

Petioles pollicares, purpureo-fusci, glabri, impunctati, supra canaliculati e margine tenui decurrente.

M.S.

RACEMUS supradecompositus, terminalis, palmaris. *Pedunculi partiales* alterni. *Petioles inferiores* sparsi, ultimi umbellati. *Flores* parvi. *Bractea* minuta ad basin pedicellorum.

CALYX minutus, quinquefidus.

COROLLA: *Petalum* quinque, calyce triplo longiora, ovato-lanceolata.

STAMINA. *Filamenta* quinque, corolla parum longiora. *Antherae* subrotundae.

PISTILLUM: rudimenta germinis duo vel tria, conica, superne attenuata, divergentia. *Stigma* nullum.

FOEMINA.

RACEMUS compositus, terminalis ramorum & ramulorum.

CALYX ut in male.

COROLLA: *Petala* parum coloratiora, linearia.

STAMINA nulla.

Germe obovatum. *Stylus* nullus. *Stigma* sessile, planiusculum.

ZANTHOXYLUM TERNATUM, foliis ternatis pinnatisque: foliolis oblongis nitidis crenulatis emarginatis, floribus triandris.

Zanthoxylum ternatum, inermis, foliis ternatis, foliolis obovatis subemarginatis, nitidis, subtus punctatis. SWARTZ. Flor. ind. occid. Tom. I. pag. 570.

Habitat in Montserrat; *Ryan*. In insula St. Crucis; *West*. ♂

FRUTEX septem- vel octopedalis.

JUNIOR: TRUNCUS armatus aculeis frequentibus, sparsis, acicularibus, rectis, vix unguicularibus, flavescentibus, nitidis.

FOLIA omnia pinnata cum impari, plerumque sexjuga: foliola exteriora pollicaria, interiora minora, oblonga, opposita, parum acuminata, crenata, subus punctata.

Petiolus purpurascens, supra canaliculatus, margine utrinque ad singulum par foliolorum aculeo recto.

ADULTIOR: RAMI teretes, inermes, glabri, alterni, cortice cinereo fuscescente.

FOLIA petiolata, sparsa, plerumque ternata, saepe quinato-pinnata, rarius bijuga absque impari, rarissime geminata in eodem ramo, interdum in diversis. *Folia* petiolata, opposita, pollicaria vel bipollicaria, oblonga vel subelliptica, basi acuta: lateralibus saepe altero latere baseos parum breviora & obliqua: apice obtusa cum acumine minuto flavescente, saepe emarginata, crenulata, utrinque glaberrima, subtilissime venosa, supra nitida impunctata, subtus parum pallidiora, adpersa punctis minutis fuscis, luci obversa perforata.

Petiolus communis inermis, pollicaris, glaber: *partiales* breves, uti communis supra canaliculati.

PEDUNCULI axillares, brevissimi, quinque vel septemflori.

MAS.

CALYX minimus, trifidus.

COROLLA tetrapetala: *petala* ovata, acuta, erectiuscula.

STAMINA: *filamenta* tria, corolla longiora.

PISTIL.

PISTILLUM: rudimentum *germinis* absque *stylo* & *stigmatē*.

FOEMINA.

CALYX & COROLLA ut in *mare*.

STAMINA nulla.

PISTILLUM. *Germen* receptaculo parum elevato insidens, didymum. *Stylus* corollae parum longior, utrinque linea exaratus. *Stigma* obtusum.

CAPSULAE duae, rugosae, nigrae, semiglobosae, magnitudine seminis *Celandri*, altero latere linea elevata parum carinatae: *tunica interior* membranacea bivalvis. **SEMEN** globosum, nigrum.

Sequentia ex observatione *Ryanii* addo:

Maxima certe *Eugazem* inter & *Zanthoxylum* affinitas est.

Sed **FLORES** dioici, **STYLI** duo, **CAPSULAE** binae ex uno eodemque germine, ad *Zanthoxylum* potius hanc speciem amandandam esse suadent.

Fruticantem & arborescentem inveni. *Stolones* multi e radicibus enascuntur, spinosis-
simi, & quod singulare foliis pinnatis, ut & sunt plantae juniores.

ZANTHOXYLUM ALBUM, ramis petiolisque aculeatis, foliis subintegerrimis glabris ovalibus obtusis altero latere obliquis.

Habitat in *Montserrat*, incolis *white prickly Wood* dictum. *Ryan.* 12

ARBOR dioica, *matres* albae. *Rami* cortice cinereo, glabri, apice flavescente-tomentosi, crenati, adpersi aculeis paucis, rectis.

FOLIA ad apices ramorum, petiolata, approximata, pinnata sine impari, quinque vel sexjuga: *Foliola* exteriora bipollicaria, interiora minora, sessilia, membranacea, interdum versus apicem obscure crenata, basi obtusa, altero latere bascos angustiora & obliqua, venosa, utrinque glabra: in arbore masculina alterna, duo ultima tantum opposita, obtusa; in foeminea opposita, acuminē brevi terminata.

Petiolus saepe spithameus, supra sulco exaratus, villosus, in arbore masculina subtus aculeis sparsis flavescentibus paucis armatus, in foeminea inermis.

RACEMI compositi, parum infra folia & terminales, approximati, tri- vel quadripollicares, erecti, multiflori. *Pedunculi* pulverulenti. *Flores* parvi, subsessiles vel breviter pedicellati, per intervalla conferti.

MAS.

CALYX minimus, quinquepartitus: *laciniis* ovatis, acutis.

COROLLA: *petala* quinque, ovata, subvillosa.

STAMINA. *Filamenta* quinque, corolla longiora, infra receptaculum germinis inserta.

Antherae oblongae.

PISTILLUM. Rudimenta quinque germinum, pyramidata, acuta, receptaculo hemisphaerico insidentia. *Stylus* nullus. *Stigma* nullum.

FOEMINA.

CALYX & COROLLA ut in mare.

STAMINA nulla.

PISTILLUM. *Germen* globosum, decemsulcatum, receptaculo hemisphaerico insidens.

Stylus fere nullus. *Stigma* orbiculato-cavum.

CAPSULAE quinque, ovatae, extus linea elevata carinatae: ~~lobis~~ *interioribus* membranacea, bivalvis. *Semen* unicum, nigrum, nitidum, pedicello brevi insidens.

ZANTHOXYLUM FLAVUM, foliis pinnatis inermibus: foliolis crenatis glabris subemarginatis, racemis terminalibus compositis.

HABITAT in Montserrat, incolis yellow Sanders dictum; lignum anglis satin Wood dictum praebet haec Arbor. *Ryan*. Martinique legit *West.* h.

ARBOR viginti ad triginta pedes alta. *Rami* teretes, cortice cinereo, cicatricati, glabri, in specimine sicco longitudinaliter rugosi.

FOLIA ad apices ramorum, petiolata, approximata, pinnata cum impari, quadri- vel quinquejuga. *Foliola* opposita, subsessilia, bipollicaria, interiora minora, crenata, basin versus integerrima, punctis fulvis perforata, venosa, supra nitidiuscula, juniora utrinque villis stellatis adpersa, aetate glabra.

Petioles triquetri, villosi, supra plani, subtus convexi.

RACEMI ex apice ramorum, plures, compositi, pedunculi pedicellique cinereo-villosi.

Pedunculi folio breviores, superne angulati: *partiales* sparsi, angulati, tri- sive quadriflori, unguiculares: *pedicelli* brevissimi conferti. *Flores* parvi.

MAS.

CALYX quinquepartitus, minimus: *laciniis* ovatis.

COROLLA: *petala* quinque, calyce duplo longiora, extus uti calyx pubescentia.

STAMINA quinque.

FOEMINA.

CAPSULA magnitudine Piperis nigri. *Tunica interior* bivalvis, membranacea.

Senen nigrum, nitidum, laeve, corpusculo nigro in altera valvula tunicae interioris ad suturam internam insidens.

DRYPETES.

CHARACTER ESSENTIALIS. MAS. CALYX tetraphyllus. COROLLA nulla.
NECTARIUM discus planus.

FOEM. CALYX ut in mare. COROLLA nulla. STYLUS nullus. STIGMA sessile.
DRUPA nuce uniloculari.

DRYPETES GLAUCA.

Habitat in Montserrat. *Ryan.* 6

ARBOR dioica. *Rami* teretes, superne angulati, cinerei, apice flavido tomentosi.

FOLIA petiolata, alterna, distantia, tri- vel quadripollicaria, elliptica, parum acuminata, integerrima, vel remote obsolete crenata, membranacea, glaberrima, tenuissime venosa, glaucescentia, subtus pallidiora.

Petioles pollicares. *Stipulae* nullae.

PEDUNCULI axillares, aggregati, semiungiculares, uniflori.

MAS.

CALYX tetraphyllus: *foliis* ovatis, acutis, concavis.

COROLLA nulla.

NECTARIUM discus planus.

STAMINA: *filamenta* octo, longitudine calycis, sub nectario inserta. *Antherae* oblongae.

PISTILLUM nullum.

FOEMINA in distincta arbore.

CALYX ut in mare.

COROLLA nulla.

PISTILLUM: *germen* superum, ovatum, incanum. *Stylus* nullus. *Stigma* sessile.

PERICARPIMUM *Drupa*: *Nux* unilocularis, monosperma.

POLYPODIUM.

a. *Fronde indivisa.*

POLYPODIUM LINGUA, frondibus subsessilibus aggregatis lanceolato-oblongis obtusissimis, fructificationibus sparsis.

Habitat in Montserrat. *Ryan.*

RADIX fibrosa.

STIPITES nulli.

FRONDES plures ex apice radicis, digitales, sessiles, lanceolato-oblongae, obtusissimae, basi attenuatae, integerrimae, glabrae, nitidiusculae, venoso subreticulatae, maculis reticuli subrotundis, linea tenui apice punctata ad medium divisae.

Squamulae fructificationis nullae.

Affine Polyp. marginello Swartzii, diversum foliis multo latioribus in stipitem non decedentibus, fructificationibus sparsis.

Quod membrana fructificationem tegens vel involucri species in speciebus quibusdam desit & capsulae ex ipsa substantia frondis prodeant, notam aequè essentialem pro genere distinguendo ab iis ubi adest, ac nota illa decumta a modo quo aperitur involucrium, praebere videtur.

POLYPODIUM LATIFOLIUM, frondibus elliptico-lanceolatis, stipitibus costisque frondium paleaceis, fructificationibus sparsis.

Lingua cervina latifolia, pediculis squamosis. PLUM. filic. pag. 112. tab. 128.

Habitat in Montserrat. *Ryan.*

RADIX fibrosa; fibris subtonientosis.

STIPES quinquepollicaris, convexus, altero latere sulcatus, uti costa & nervi subtus, paleis nigricantibus copiosis adpersus.

FRONS elliptica, spithamaea vel parum ultra, pollices tres lata, acuminata, basi acuta, integerrima, supra glabra, transversim remote alternatim fusco-nervosa, luci obversa venoso-reticulata, venae obliquae inter nervos flexuosae.

PUNCTA FRUCTIFICANTIA duplici serie inter nervos disposita. *Squamulae* nullae.

Punctum fuscum villosum post casum capsularum.

POLYPODIUM ARTICULATUM, frondibus lanceolatis lucidis, fructificationibus sparsis, surculis repentibus hispidis, stipitibus articulatis.

Lingua cervina lucida, pedicellis articulatis. PLUM. filic. pag. 118. tab. 136.

Habitat in Montserrat. *Ryan.*

SURCULI repentes, crassitie pennae columbinae, undique tecti setis subulatis, copiosissimis, rufescentibus, patentibus.

STIPITES crecti, remoti, quinque- vel sexpollicares, glabri, substriati; inferne versus uniarticulati, geniculo nodoso.

FRONS pedalis, pollicem vel parum ultra lata, lanceolata, apice obtusa vel acuta, basi attenuata, per stipitem parum decurrens, marginata: margine tenui, parum inaequali, dilutius colorato; utrinque glabra, nitida, transversim subtilissime confertim nervoso-striata, nervi simplicissimi, raro bifidi.

PUNCTA FRUCTIFICANTIA parva, numerosa, sparsa. *Squamula* fructificationem tegente orbiculata, incisura laterali lineari.

b. *Fronde pinnata.*

POLYPODIUM SALICIFOLIUM, pinnis alternis subpetiolatis lanceolatis utrinque acutis integerrimis, fructificationibus serialibus.

Filix major in pinnas tantum divisa, oblongas angustasque, non crenatas. SLOAN. hist. jam. 1. pag. 84. tab. 40.

Habitat in Montserrat. *Ryan.*

Rachis angulata, glabra.

FRONS pedalis, pinnata. *Pinnae* duodecimjugae, inferiores petiolatae, superiores sessiles, omnes distinctae, quadripollicares, unguem latae, inferiores parum minores, terminalis parum longior & latior, apice attenuatae, basi acutae, integerrimae, utrinque glabrae, subtus pallidiores, subtilissime nervoso-striatae, venosae: venae fere ut in *Polypodio reticulato*.

FRUCTIFICATIONES seriales, parvae. *Squamula*, ut videtur, nulla.

POLYPODIUM REVULARE, pinnis falcato-lanceolatis extrorsum serratis: basi superiore gibbis, fructificationibus solitariis, stipite villosa.

Lonchitis glabra minor. PLUM. filic. pag. 48. tab. 63. Amer. pag. 19. tab. 28.

Habitat in Montserrat. *Rydb.*

STIPES cum fronde saepe tripedalis, subtetragonus, crassitie culmi secalis, altero latere convergentibus, altero sulco exaratus, ferrugineo-villosus.

FRONS pinnata: *pinnae* octoginta trijugae, sessiles, alternae, sequipollicares, superiores & inferiores sensim minores unguem latae; infimae ovatae vel oblongae, obtusiusculae; reliquae falcato-lanceolatae, acutiusculae; omnes apicem versus serratae, latere inferiore parum angustiores, basi rotundatae, superiore inferne lobulo auctae, basi truncatae, glabrae, subtus obscure nervoso-striatae; nervi oppositi, bifidi: ramulo altero fructificante, altero sterili.

FRUCTIFICATIONES utrinque versus marginem, serie simplici longitudinaliter dispositae, distinctae. *Synanala* fructificationes tegens orbiculata.

Stipites Londitii aliorum &c. tab. 31. diversum Polypodium cum a Planchonii hinc aliter & ad Polypod. exaratum Lin. perijuncti differt Pol. exaratum: pinnis trijugis inaequalibus, fructificationibus ad eamdem apicem nec solitariis versus marginem.

Polypodium semicordatum Swartzii distinguitur fructificationibus quadrangulis.

POLYPODIUM PUNCTULATUM, pinnis subpetiolatis lanceolatis serratis basi obliquis margine punctatis, fructificationibus solitariis.

Linnaea cervina dentata, punctalis nigris notata. PLUM. filic. pag. 98. tab. 112.

Habitat in Montserrat. *Rydb.*

STIPES cum fronde quadri- vel quinquepedalis, semiteres, supra sulco exaratus, subvillosus.

FRONS pinnata: *pinnae* quinquaginta duo jugae, omnes distinctae, per paria remotae, subpetiolatae, intermediae quadri- vel quinquepollicares, superiores & inferiores sensim minores, supremae triangulares, reliquae lanceolatae, attenuatae, serrulatae, basi sursum obliquae, deorsum rotundatae, tenuissime nervoso-striatae; nervi alterni bifidi, singulo ramulo puncto nigricante terminato; alterni simplices, parum breviores, macula fructificante terminati; costa subtus villosa.

FRUCTIFICATIONES in simplici serie longitudinaliter versus marginem digestae. *Synanala* fructificationem tegens orbiculata, margine altero incisura lineari.

Cum figura citata e Planchonio optime convenit, nisi quod serraturae in Planchonii profundiores & majores.

A Polypodio semicordato Swartzii dignoscitur fructificationibus solitariis punctisque nigricantibus versus marginem, stipite glabro.

A Polypodio simili & dissimili pinnis subpetiolatis nec decurrentibus, aliisque notis.

POLYPODIUM REPANDUM pinnis lanceolatis elongatis subrepandis; extimis tribus confluentibus distinctisve, fructificationibus sparsis.

Hemionitis maxima linguae cervinae affinis. PLUM. filic. pag. 124. tab. 145.

Habitat in Montserrat. *Ryan.*

STIPES cum fronde tri- vel quadripedalis, purpurascens, glaber, nitidus, laevis, altero latere sulco lato striato.

FRONS pinnata: *pinnae* tri- quadri- vel sexjugae, duae, quatuor vel sex inferiores; prouti numerus pinuarum, subpetiolatae, superiores per stipitem parum decurrentes, tres ultimae saepe confluentes raro distinctae: omnes fere pedales vel ultra, pollices duos latae, lanceolatae, subrepandae, valde attenuatae, glabrae, nervosae, nervi alterni, venoso-reticulatae: infimae duae basi utrinque, vel tantum latere inferiore auctae lacinia lanceolata acuta, vel breviori obtusa: terminalis reliquis duplo latior, basi subincisa, incisuris utrinque quatuor vel quinque.

PUNCTA FRUCTIFICANTIA magna, in serie utrinque prope nervum posita. *Squamula* fructificationes tegens orbiculata, cum incisura lineari ad alterum latus.

c. *Fronde subbipinnata.*

POLYPODIUM OPPOSITUM, pinnis suboppositis lanceolatis inferioribus remotis brevibus: lobulis oblongis integerrimis, stipite pubescente.

Habitat in Montserrat. *Ryan.*

STIPES cum fronde bipedalis, inferne glaber, superne pubescens, altero latere sulcatus.

FRONS subbipinnata. *Foliola* circiter quadraginta-juga, sessilia, plerumque opposita, interdum superne alterna, distantia, intermedia quadripollicaria; superiora & inferiora sensim minora; infima remota, unguicularia vel minora, basi incisa; reliqua lanceolata, glabra, attenuata, pinnatifida: *lobuli* oblongi, latere inferiore arcuati, superiore recti, obtusi, integerrimi, versus apicem evanescentes, par intinium reliquis parum longius, nervis simpliciter ramosis.

PUNCTUM FRUCTIFICANS in apice singuli rami nervorum, distinctum. *Squamula* fructificationem tegens oblonga, incisura laterali lineari.

Lonchitidi pinnulis rotundis non dentatis Plum. fil. pag. 36. tab. 47. valde affine est, differt modo quod foliola inferiora in nostro non satis convenient cum illis in Plumierii.

Ad *Polypodium patens Swartzii* accedit, at, uti video ex specimine a viro amicissimo mecum communicato, illud gaudet foliis subtns pilosis, infimis longioribus nec brevissimis.

POLYPODIUM MUSCOSUM, frondibus inferne tri- superne subbipinnatifidis: pin-
nulis lanceolatis serratis acutis ciliatis, stipite piloso.

*Filix bermudensis elegans ramosa, pinnis rarioribus profunde dentatis spelunca rupium innascens,
cauliculis muscosa.* PLUKEN, alm. 155. tab. 244. fig. 2.

Habitat in Montserrat. *Ryan.*

STIPITES plures, infra frondem pedales & ultra, crassitie fili emporetici, altero latere
striati, pilosi, basi & inter foliola e pilis longioribus mollibus patentissimis hirsuti.

FRONDES saepe pedales. *Foliola* tredecim- vel quatuordecinjuga, petiolata, suprema
uti pinnae exteriores foliolorum decurrentia; infima duo opposita, pinnis quatuor in-
finis pinnatifidis, sequentia alterna, pinnata, suprema serrato-incisa: *pinnae* lanceo-
latae, utrinque acutae, serratae, serraturis inferioribus latere superiori profundioribus,
omnibus integerrimis, pollicares, extrorsum sensim minores, alternae, tenerae, rare
ciliatae, subtus in nervis adpersae pilis longis, solitariis, remotis; nervi simpliciter ra-
mosi, ramuli alterni.

PUNCTA FRUCTIFICANTIA duplici serie in singula pinnula, distantia. *Squamulae* nullae.

*Polypodium speluncae Indiae orientalis multum distat a descripto, synonymum Pluknetii
huc potius pertinere credo quam ad illud.*

I n d e x

plantarum, quas b. VAHLIUS in fasciculis tribus *Eclogarum americanarum*, & in
Decadibus tribus *Iconum ad Eclogas* descripsit, adumbravit & aere
excudi curavit.

	Fasc.	pag.	Ecl. tab.		Fasc.	pag.	Ecl. tab.
<i>Acacia aculeata, flore albo, foliis</i>				<i>CESTRUM latifolium</i>	-	I.	25. 10.
<i>zamarindi.</i> Plum.	-	III.	40.	<i>scandens</i>	-	I.	24.
<i>AEGIPHILA arborescens</i>	-	I.	15. 10.	<i>Chrysophyllum cainito.</i> Aubl.	-	I.	28.
<i>martinicensis</i>	-	I.	14.	<i>macrophyllum.</i> La Marck	-	I.	28.
<i>villosa</i>	-	I.	16.	<i>Cissus microcarpon</i>	-	I.	16.
<i>AMASONIA erecta</i>	-	II.	51.	<i>rhombifolius</i>	-	II.	10.
<i>punicea</i>	-	II.	51. 20.	<i>Con-ghiyro.</i> Marcgr. & Piso	-	I.	44.
<i>Arbor racemosa brasiliiana, foliis</i>				<i>COMMELINA serrulata</i>	-	II.	4.
<i>malabathri.</i> Breyn.	-	I.	42.	<i>hexandra.</i> Aubl.	-	I.	34.
<i>ARISTIDA capillacea</i>	-	II.	10.	<i>CONVOLVULUS acetosaeifolius</i>	-	I.	19.
<i>Aruba guianensis.</i> Aubl.	-	III.	13.	<i>albiflorus.</i> West.	-	II.	14.
<i>ASCIUM violaceum</i>	-	II.	41. 20.	<i>ciliatus</i>	-	II.	13.
<i>Basourinha v. Tapeicava.</i> Piso	-	II.	48.	<i>cissoides</i>	-	II.	15.
<i>BIGNONIA corymbifera</i>	-	II.	45. 17.	<i>ferrugineus</i>	-	I.	17.
<i>elongata</i>	-	II.	45. 16.	<i>incarnatus</i>	-	II.	12.
<i>laurifolia</i>	-	II.	44.	<i>marinus, catharticus &c.</i>			
			Ic. tab.	Plum. am. tab. 105.	-	I.	18.
<i>mollis</i>	-	II.	46. 10.	<i>nodiflorus</i>	-	II.	14.
<i>serratifolia</i>	-	II.	46.	<i>nummularius</i>	-	II.	13.
<i>tenuisiliqua</i>	-	II.	43.	<i>ovalifolius</i>	-	II.	16.
<i>tomentosa.</i> Aët. s. h. n. Paris.	-	II.	46.	<i>ovalifolius.</i> West	-	II.	14.
<i>villosa</i>	-	II.	44.	<i>pentaphyllos, folio glabro</i>			
			Ecl. tab.	<i>dentato, vaticulis hir-</i>			
<i>BILLARDIERIA paniculata</i>	-	I.	13. 10.	<i>sutis.</i> Plum.	-	II.	16.
<i>cf. praefationem.</i>				<i>proliferus</i>	-	I.	18.
<i>BONNETIA palustris</i>	-	II.	42.	<i>quinquefolius</i>	-	II.	15.
<i>BUCIDA Buceras</i>	-	I.	50.	<i>quinquefolius, glaber ame-</i>			
<i>capitata</i>	-	I.	50. 8.	<i>ricanus.</i> Pluck	-	II.	15.
<i>varietas?</i>	-	I.	51. 8.	<i>quinquepartitus</i>	-	II.	14.
<i>BUMELIA nervosa</i>	-	I.	28.	<i>ruber</i>	-	II.	12.
<i>Caecopunga I.</i> Piso	-	I.	32.	<i>CORDIA calophylla</i>	-	III.	5.
<i>Cameraria Tamaquarina.</i> Aubl.	-	II.	22.	<i>dentata</i>	-	III.	5. 22.
<i>CAPRARIA lanceolata</i>	-	II.	47.	<i>macrophylla</i>	-	III.	4.
<i>CASEARIA macrophylla</i>	-	II.	32.	<i>reticulata</i>	-	III.	5.
<i>CASSIA hirsuta</i>	-	III.	11.	<i>CROTALARIA lotifolia</i>	-	II.	54.
<i>hispidula</i>	-	III.	10.	<i>latifolia.</i> Linn.	-	II.	54.
<i>pallida</i>	-	III.	12.	<i>pubera</i>	-	II.	55.
<i>triflora</i>	-	III.	11.	<i>trifolia fruticosa &c.</i> Slo.			
<i>CATESBAEA parviflora</i>	-	I.	12. 10.	<i>ane tab. 176.</i>	-	II.	54.
<i>parviflora.</i> La Marck	-	I.	11.	<i>CRYPTOSTOMUM coriaceum</i>	-	III.	4.
<i>CEPHAELIS punicea</i>	-	I.	19.	<i>CUPANIA diphylla</i>	-	III.	9.
<i>tomentosa</i>	-	I.	19.	<i>discolor</i>	-	III.	9.

	Fasc.	pag.	lc. tab.	Ecl. tab.
<i>Curapa</i> , Aubl. - - -	III.	9.		
<i>Curtisia</i> , Schreber - - -	III.	45.		
<i>CYNANCHUM altissimum</i> - - -	II.	23.		
<i>denticulatum</i> - - -	II.	23.	8.	
<i>hirsutum</i> - - -	II.	24.		
<i>picatum</i> - - -	II.	24.		
<i>rostratum</i> , Symb. bot. III.				
P. 45 - - -	-	-	7.	
<i>CYTERUS aphyllus</i> - - -	II.	6.		
<i>depauperatus</i> - - -	III.	2.		
<i>elegans</i> - - -	II.	7.		
<i>elegans</i> , Rottböll - - -	II.	6.		
<i>panicula sparsa ferruginea</i>				
<i>compressa elegantissima</i> ,				
Sloane - - -	II.	7.		
<i>scopellatus</i> - - -	II.	7.	12.	
<i>viscosus</i> - - -	II.	6.		
<i>DALECHAMPIA heterophylla</i> - - -	III.	44.		
<i>mollis</i> - - -	III.	44.		
<i>scandens</i> - - -	III.	45.		
<i>DRYPETES glauca</i> - - -	III.	49.		
			Ecl. tab.	
<i>ECHITES nitida</i> - - -	II.	19.	13.	
			lc. tab.	
<i>paludosa</i> - - -	II.	19.	5.	
<i>subspicata</i> - - -	II.	18.		
<i>tomentosa</i> , Symb. bot. III.				
P. 44 - - -	-	-	4.	
<i>Elechi</i> , Loesling - - -	II.	26.		
<i>ERYTHROXYLON macrocephalum</i>	II.	33.		
<i>rufum</i> - - -	II.	33.		
<i>EUGENIA Patrisii</i> - - -	II.	35.		
<i>tomentosa</i> - - -	II.	37.		
<i>trinervia</i> - - -	II.	36.	19.	
<i>undulata</i> - - -	II.	36.		
<i>Enonymus latifolius</i> , <i>racemosus</i> ,				
<i>fructu pentagono ascepurpu-</i>				
<i>reo</i> , Plum. - - -	I.	29.		
<i>Felix major</i> &c. Sloane t. 40. III.			51.	
<i>hermudiensis elegans ramosa</i>				
&c. Pluken. Alm. t. 244.				
f. 2. - - -	III.	54.		
<i>Fimbristylis hirtellum</i> , Vahl - - -	III.	1.		
<i>serrulatum</i> , Vahl - - -	III.	1.		
<i>FROELICHIA paniculata</i> - - -	I.	13.		
<i>vide praefationem</i> ,				
<i>Frutex</i> , Marcgr. hist. p. 78 - - -	I.	17.		
<i>Fuchsia involucrata</i> , Swartz - - -	I.	35.		
<i>FUIRENA obtusiflora</i> - - -	II.	8.		
<i>paniculata</i> , La Marek - - -	II.	9.		
<i>simplex</i> - - -	II.	8.		
<i>umbellata</i> - - -	II.	9.		
<i>GOMPHRENA vermicularis</i> - - -	I.	32.		
<i>Gramen cyperoides majus</i> &c.				
Sloan. t. 76. f. 2 - - -	I.	7.		
<i>Grossularia plantaginifolia</i> ampl.				
Plum. - - -	III.	22.		
<i>GUAREA glabra</i> - - -	III.	8.		
<i>macrophylla</i> - - -	III.	8.		
<i>trichosoides</i> - - -	III.	7.		
<i>GUETTARDA coccinea</i> , Aubl. II.		27.		
<i>crispiflora</i> - - -	I.	36.	6.	
<i>parviflora</i> - - -	II.	26.		
<i>Hemionitis maxima</i> , <i>linguae cer-</i>				
<i>uinac affinis</i> , Plum. - - -	III.	53.		
<i>HYMENAEA Courbaril</i> - - -	II.	30.		
<i>venosa</i> - - -	II.	31.		
<i>Jacaranda arbor</i> , <i>polyphylla</i> ,				
<i>maxime procera</i> , Barter. - - -	I.	33.		
<i>JACQUINIA arborea</i> - - -	I.	26.		
<i>armillaris</i> - - -	I.	26.		
<i>venosa</i> , Swartz, - - -	III.	3.		
<i>ISERTIA coccinea</i> - - -	II.	27.		
<i>parviflora</i> - - -	II.	28.	15.	
<i>JUSSTIA hirta</i> - - -	II.	31.		
<i>linifolia</i> - - -	II.	32.		
<i>JUSTICIA armata</i> , Swartz. - - -	II.	1.		
			lc. tab.	
<i>imbricata</i> - - -	I.	1.	1.	
<i>microphylla</i> - - -	II.	1.		
<i>pauciflora</i> - - -	I.	2.		
<i>rubra</i> - - -	II.	1.		
<i>Ryani</i> - - -	I.	1.		
<i>KRAMERIA Indica</i> - - -	III.	2.		
<i>LAUGERIA coriacea</i> - - -	I.	26.		
			Ecl. tab.	
<i>resinosa</i> - - -	I.	27.	10.	
<i>Lingua cervina</i> , <i>dentata</i> , <i>punctulif</i>				
<i>nigris mucata</i> , Plum. - - -	III.	52.		
<i>latifolia</i> , <i>pediculis squamosis</i> ,				
Plum. - - -	III.	50.		
<i>lucida</i> , <i>pediculis articulatis</i> ,				
Plum. - - -	III.	51.		
<i>Lonchitis glabra minor</i> , Plum. III.		51.		
<i>altissima</i> &c. Sloane t. 31 III.		52.		
<i>MABEA Taguari</i> - - -	II.	56.		
<i>Mahurea palustris</i> , Aubl. - - -	II.	42.		
<i>MAMMEA americana</i> - - -	II.	40.		
<i>humilis</i> - - -	II.	40.	20.	
<i>Manabes arborescens</i> , Aubl. - - -	I.	15.		
<i>villosa</i> , Aubl. - - -	I.	16.		
<i>MARCGRATIA coriacea</i> - - -	II.	39.		
<i>umbellata</i> - - -	II.	39.		
<i>scandens</i> , <i>fructu radiatim</i>				
<i>posito</i> , Plum. - - -	II.	39.		
<i>Musourea pragensis</i> , Aubl. - - -	II.	48.		
<i>MELASTOMA acuminata</i> - - -	I.	47.	7.	
<i>acuminata</i> , La Mark III.		16.		
<i>alata</i> - - -	III.	22.		
			lc. tab.	
<i>angustifolia</i> - - -	III.	25.	26.	

Ic. tab.				Ecl. tab.			
aromatica	-	I.	41.	ligustrina	-	III.	34. 27.
bivalvis, Aubl.	-	I.	38.	laeflingii, p. 223. f.	-	III.	36.
brachiata	-	III.	24.	lucida	-	III.	31. 24.
brunnea	-	III.	19. 23.	macrostachys	-	III.	34. 26.
calyptrata	-	I.	42.	nigricans	-	III.	37. 29.
capitata	-	I.	45.	paniculata	-	III.	39.
ciliata, Aët. s. h. n. Par.	-	I.	42.	rosea	-	III.	33. 25.
coccinea	-	I.	48. 16.	salinarum	-	III.	35.
compressa	-	III.	23. 17.	tamarindifolia	-	III.	40.
cornifolia, La Marck	-	III.	15.	tenuifolia, Linn.	-	III.	40.
corymbosa	-	III.	25.	trapezifolia	-	III.	36. 28.
crenata	-	{ I. 41. III. 21.	24.	umbellifera	-	III.	30.
crinita	-	III.	28.	virgulosa	-	III.	32. 20.
decussata	-	I.	42.	Moutabea guianensis, Aubl.	-	III.	4.
dodecandra, La Marck	-	III.	23.	Mucra, Macgr.	-	I.	42.
elaeagnoides	-	III.	27. 28.	Niamdu, Macgr.	-	I.	3.
elegans	-	I.	44.	Niandi, Pio	-	I.	3.
elongata	-	III.	16.	Novanrea guianensis, Aubl.	-	II.	42.
expansa	-	III.	21.	OENOTHERA hirta, Linn.	-	II.	31.
fasciculata, Swartz	-	I.	47.	linifolia	-	II.	32.
fragilis	-	I.	44.	Onagra frutescens & hirsuta nerei-			
furfuracea	-	III.	13. 22.	folia, Plum.	-	II.	31.
holosericea	-	I.	42.				Ecl. tab.
holosericea, Swartz	-	I.	43.	PALIURUS reticulatus	-	III.	6. 23.
imperialis	-	III.	22. 25.	PANAX chrysophyllum	-	I.	33. 10.
latifolia, La Marck	-	III.	28.	morosoni, Aubl.	-	I.	33.
lateriflora	-	I.	48.	PASSIFLORA glandulosa	-	II.	52.
lutescens	-	III.	17.	Peganea, Aubl.	-	I.	28.
macrophylla, La Marck	-	III.	22.	Perexil, Macgr.	-	I.	32.
nigricans	-	III.	26. 27.	PILOCARPUS racemosus	-	I.	29. 10.
ornata, Swartz	-	I.	37.	PIPER aequale	-	I.	4. 3.
parviflora, Aubl.	-	III.	19.	caudatum	-	I.	3.
paniculata, La Marck	-	III.	21.	grande	-	II.	3. 11.
pendulifolia	-	III.	18.	microstachyum	-	II.	3.
phlogophora	-	I.	45.	obovatum	-	I.	5.
picta	-	III.	15.	ovatum	-	I.	3. 1.
pilulifera	-	III.	15.	praemorsum	-	I.	4.
pyramidalis, La Marck	-	III.	21.	rugosum	-	I.	4. 2.
racemosa, Aubl.	-	I.	42.	Pitumba guianensis, Aubl.	-	II.	32.
sessiliflora	-	I.	49. 18.	PLUKENETIA integrifolia	-	III.	43.
spicata	-	III.	20.	volubilis	-	III.	43.
striata	-	III.	14.	scandens, hederæ foliis ser-			
thyrsoides	-	III.	13.	ratis, fr. serragono,			
trichosoma, La Marck	-	III.	26.	Plum.	-	III.	43.
triflora	-	I.	46.	PLUMIERIA articulata	-	II.	20.
trivalvis, Aubl.	-	I.	39.	POA racemosa	-	I.	7.
umbrosa	-	III.	27. 29.	POLYPODIUM articulatum	-	III.	51.
verticillata	-	I.	47.	latifolium	-	III.	50.
virescens	-	III.	18.	lingua	-	III.	50.
Melia Guara, Jacqu. Cav.	-	III.	7.	mucosum	-	III.	54.
MIMOSA alba	-	III.	31.	oppositum	-	III.	53.
caudata	-	III.	35.	punctulatum	-	III.	52.
chrysantha	-	III.	38.	repandum	-	III.	53.
glandulosa	-	III.	38.	rivulare	-	III.	51.
guianensis	-	III.	39.	salicifolium	-	III.	51.

Ecl. tab.				I. tab.			
PRINOS dioicus	-	II.	25. 14.	polyacanthus	-	I.	24.
nitidus	-	II.	26.	Radula	-	II.	16.
PSIDIUM aromaticum	-	III.	30.	retrofractum	-	I.	21.
PSYCHOTRIA magalosperma	-	III.	3. 21.	rubiginosum	-	II.	17. 13.
QVAESIA crocea	-	III.	12.	scaberrimum	-	I.	22.
<i>Rhamnus, foliis buxeis minimis &c.</i>				SPERMATOCOPHYTES	-	I.	10.
Sloane tab. 207. f. 1.	-	I.	12.	coeruleus	-	I.	9.
<i>Rheedia</i> , Linn.	-	II.	41.	linifolia	-	I.	8.
RHEXTA bivalvis	-	I.	38.	longifolia	-	I.	8.
inconflans	-	I.	37.	STYRAX glabrum	-	III.	29.
			Ic. tab.	<i>Smirnia</i> , Schreber	-	II.	39.
longifolia	-	I.	39. 15.	TABERNAMONTANA heterophylla	II.	22.	14.
trivalvis	-	I.	39.	neritoides	-	II.	21.
			Ecl. tab.	odorata	-	II.	22.
RICHERIA grandis	-	I.	30. 4.	undulata	-	II.	20. 6.
			Ic. tab.	<i>Talgalea</i> , Aubl.	-	II.	52.
RITTERA grandiflora	-	II.	37. 9.	TALIA guianensis, Aubl.	-	II.	30.
			Ecl. tab.	hexaphylla	-	II.	29.
pinnata	-	II.	38. 20.	rosea	-	II.	30.
RONDELETIA buxifolia	-	II.	11. 12.	cf. Addenda fasc. secundi.			
RUDOLPHIA velutibis	-	III.	41. 30.	<i>Tipogones mucronatus</i> , Aubl.	-	I.	19.
RUELLIA alpecuroidea	-	II.	49.	<i>Toumarel</i> , Hornind.	-	I.	44.
RYANIA speciosa	-	I.	51. 9.	<i>Tibouchina aspera</i> , Aubl.	-	I.	41.
			Ic. tab.	<i>Tiroia guianensis</i> , Aubl.	-	I.	45.
SCHOENUS barbatus	-	II.	4. 2.	TOURNEFORTIA sericea	-	I.	17.
hirsutus	-	I.	6.	TRADESCANTIA divaricata	-	I.	34.
<i>holoschoenoides</i> , Aët. s.				umbellata	-	III.	7.
h. n. Par.	-	II.	4.				Ecl. tab.
polyphyllus	-	II.	5.	TRAGIA verniculata	-	II.	55. 19.
rugosus	-	II.	5.	TRIGONIA larvis	-	II.	53.
triceps	-	II.	4. 3.	villosa	-	II.	53.
			Ecl. tab.				I. tab.
SCHRADERA capitata	-	I.	35. 5.	TRICHETTES grandiflora	-	II.	34. 30.
SCIRPUS hirtellus	-	III.	1.	macrophylla	-	II.	34.
serrulatus	-	III.	1.	<i>Tipocoma</i> , Linn.	-	II.	48.
spadiceus	-	I.	7.	VARDELLUS diffusa	-	II.	47.
SCOLOSANTHUS versicolor	-	I.	11. 10.	platensis	-	II.	48.
SIDERODENDRUM triflorum	-	I.	10.	VERBENA tristata	-	II.	2. 11.
<i>Sideroxylodes ferreum</i> , Jacqu.	I.	10.		vaubra	-	II.	2.
<i>Simaba guianensis</i> , Aubl.	-	III.	12.	VIOLEA linearifolia	-	II.	18.
<i>Sipanea pratenensis</i> , Aubl.	-	II.	11.	VIRECTA baltica	-	II.	11.
SIPARUNA guianensis	-	III.	41.	pratenensis	-	II.	11.
SOLANUM asperum	-	II.	17.				Ecl. tab.
flexuosum	-	I.	22.	VITEX capitata	-	II.	50. 18.
<i>frutescens &c.</i> Plum. t.				triflora	-	II.	49.
224. f. 1.	-	I.	24.	<i>Vitis trifida</i> , uva corymbosa &c.			
geminatum	-	I.	21.	Plum.	-	I.	16.
			Ic. tab.	XIPHIUM coeruleum, Aubl.	I.	5.	
hirtum, Symb. bot. II.				floribundum	-	I.	5.
pag. 40.	-	-	21.	Loefling. it. p. 179	-	I.	5.
igneum β. parvifolium	I.	23.		ZANTHOXYLUM album	-	III.	47. 27.
longiflorum	-	I.	20.	flavum	-	III.	48.
pauciflorum	-	I.	20.	simplicifolium	-	III.	45.
				ternatum	-	III.	46.