Not in Souleby.

KORTBEGRIJP
VAN HET ZAMENSTEL DER
NATUUR,

VAN DEN HEER

C. LINNAEUS,

MET ZEER VEELE ZOORTEN
VERMEERDERT DOOR

P. BODDAERT,

*Med. Doct., Oudraad der Stad VLISSINGEN,
Lid van den Keizerlyke Academie der Natuuron-
derzoekeren, van de HOLLANDSCHE
Maatschappy der Wetenschappen te HAAR-
LEM, en van het ZEEUWSCHE Ge-
noodschap der Wetenschappen te
VLISSINGEN.*

E E R S T E D E E L.

E E R S T E S T U K.

T e U T R E C H T,

By J. VAN SCHOONHOVEN, EN COMP.

M D C C L X X I I.

OFFICE OF THE

SECRETARY OF THE

NAVY

WASHINGTON

DECEMBER 10, 1907

TO THE SECRETARY OF THE

NAVY

FROM THE SECRETARY OF THE

NAVY

WASHINGTON

DECEMBER 10, 1907

QH
43
89913
1772
SCHNHR

O P D R A C H T,

Aan den Wel Edelen zeer Geleerden Heer
den Heer

NICOLAAS LAURENTIUS BUR-
MANNUS, M. D.

*Hoogleeraar in de Kruidkunde in het Doorlugtig
School te Amsterdam, Lid van de Academie
der Wetenschappen te Halle, en van het
Zeeuwfche Genoodfchap der Wetenschappen
te Vliffingen:*

Den Wel Edelen Heere

WILLEM VAN DER MEULEN,

*Capitein der Burgery te Amsterdam, Lid van het
Genoodfchap der Wetenschappen in den Opper
Laufitz, Directeur van het Zeeuwfch Ge-
noodfchap der Wetenschappen te Vliffingen:*

Den Wel Edelen Heere

PIETER CRAMER,

*Koopman te Amsterdam, Directeur van het Zeeuw-
fche Genoodfchap der Wetenschappen te Vliffingen.*

W e l E d e l e n H e e r e n !

Indien eene opregte Vriendfchap, en gulhartige
verkeering, indien aanmoediging en hulp in de
Wetenschappen, aan een gemoed dat van zynen
pligt bewustis, de blyken van dankbaare erkentenis afvor-
derdt, reken ik my dezelve aan U Edl. verschuldigt,

OPDRACHT.

de vrye toegang tot U Ed. ryke Natuurschatten, die zelv van vreemdelingen bezocht en bewonderd worden, en uit welke U Ed. my veele zeldzaame Stukken hebt gelieven te vereeren, (nooit immers scheidde ik van U Ed. wooningen, zonder vermeerdering van kennis en bezitting), eischen een openbaar bewys van erkentenis.

Ontfang dan Myn Heeren, dit werk, op U Ed. raad aangevangen, door U Ed. verzamelingen vermeerdert boven het oorsprongelyke en met Uwe hulp zamen gesteld; U Ed. kundigheeden zoo bekend, en geacht, als U Ed. verzamelingen, zullen het zelve een aanzien byzetten, die het zonder U Ed. naamen op het Voorhoofd te draagen zoude moeten misfen. Ik beveel het derhalven U Edl. bescherming aan. En eindige met bede, dat het den bron van alle kennis en wetenschap behaage, U Ed. perfoonen en huisgezinnen noch lange met zyne Zegeningen te bekroonen, tot bevordering van alle nuttige Kuudigheden, tot bloey van Amstels Koophandel, en dat die twee Pylers van ons Vaderland, noch door U Ed. kennis en zorg, het Gemeenebest doen bloeyen, en onze Nabuuren tot verwondering strekken moogen; my verder in U Ed. zoo dikwyls ondervonden Vriendschap aanbevelende, noeme ik my met agting:

Wel Edele Heeren!

U E. D. W. Dienaar;

P. BODDAERT.

VOOR-

VOORREDE.

DAT de kennis der geschapen
Wezens eene van de uit-
gebreidste is, welke zich
aan het menschelyk ver-
nuft opdoen, toonen alle de voorwer-
pen, welke zich rondsom bevinden,
en tot welke alle wy eenige betrek-
king hebben; zommige znn ons van
een wezentlyk nut, als door de voor-
zienigheid geschikt, om ons voedzel
en dekzel te verzorgen, ons behulp-
zaam te zyn in onze bezigheden, en
door zekere byzondere eigenschappen
ons te vermaaken, of tot heilzaame
geneesmiddelen te dienen. Dus zien
wy, dat alle de geschapen wezens tot
nut van den Mensch moeten dienen,
het zy om zyne kundigheden te ver-

IV V O O R R E E D E.

meerderen, of zyne behoefte te hulpe te komen.

HET is derhalven onze verpligting om deze te kennen. Maar hier opend zich zulk een uitgebreid veld van geschapen wezens, zulk een talryk heir, dat 'er om met den Heer BUFFON te spreken een zekere moed nodig is, om de Natuur in het aangezicht te durven zien; en inderdaad de menigte der voorwerpen verward in den eersten opslag de verbeelding en het geheugen: maar wanneer men Dieren, Planten, en Delfstoffen van elkander afscheid, en yder dezer in hunne benden, rangen en geslagten verdeeld, verkrygt men wel geschikte tafereelen, en de Natuur vertoond zich eenvoudig en in haar eigen gedaante. Hier door
vor-

vordert men niet flegts in de kennis van yder geflacht of bende op zich zelve, maar men ziet het verband, dat zy onderling met elkander hebben. Want het getal, de hoedanigheid en gedaante der deelen, is altoos gefchikt naar het oogmerk dat de *Schepper* in dezelve heeft; en dewyl de volmaaktheid der deelen van een Dier fteeds afneemt, in evenredigheid van het meer of min dierlyk leven, volgt noodzakelyk dat er van den Mensch tot de Plantdieren, en van daar tot de Planten en Delfftoffen een zeker verband moet plaats hebben. Welk verband dien fchakel uitmaakt, met welk alle de gefchapen wezens aan elkander verbonden zyn; en dit heeft niet alleen plaats in de uiterlyke gedaante, maar ook, en wel voornaamentlyk in het

VIII V O O R R E E D E.

werktuigelyk zaamenstel; hier ziet men die trappen, by welke de natuur afdaalt, ten duidelyksten. En de levenswyze, voeding, voortteeling en groei-
jing kunnen alleen door hunne overeenkomst of verschil dien grooten schakel aanwyzen. Onder deze beschouwingen is de Dierkunde de voornaamste, de nuttigste en de uitgebreidste. De Dieren, zegt de Heer BUFFON, (1) vereenigen alle de magten der Natuur, en de vermogens die hen bezielen zyn hun eigen en byzonder, zy willen, zy werken, zy bepaalen zich, door hunne zintuigen vereenigen zy zich met de afgelegenste voorwerpen, yder Dier is een middelpunt, alwaar alles

(1) BUFFON *Hist. Nat.* tom. II. pag. 3. (*edit. Amsterd.*)

les zamen loopt, en de geheele wae-
 reld als in weder gekeatst word; en
 met de Planten hebben zy 't vermogen
 van groeijen, ontzwagtelen, voorttee-
 len, en vermenigvuldigen gemeen,
 niet alleen, maar zy hebben zelf een
 groeibaar leven, en veel overeenkomst
 met de Planten en Delfstoffen; want
 de Aarde, die wy betreeden, dient om
 het Dierlyk ligchaam door middel van
 de Planten te voeden, en dit keerd
 weder tot Aarde niet alleen, maar de
 deelen der Dieren van hun zout, wa-
 ter, olie, en vluggen geeft afgeschei-
 den, laten een aardagtig overblyfzel
 na; dit was alles wat *Augustus* van
 den Grooten *Alexander* zag.

EDOCH de Dieren hebben met de
 Planten eene nauwer vereeniging.

x V O O R R E E D E

Laaten wy , zegt een der grootste
Natuurkenners (2) van onzen tyd ,
„ de Dieren beschouwen , die als
„ noch niet ontrolde Planten zyn , en
„ die de werktuigen , welke in de
„ Planten naar buiten uitgespreid zyn ,
„ in zich besluiten. De Dieren be-
„ staan uit een vaatachtig zamenstel ,
„ dat zeer takkig is , en de Levens-
„ boom kan genoemd worden , dat
„ met het geheel adergestel in ee-
„ nen veelvormigen verlaatbak ge-
„ worteld is , en het voedzel doorzyn
„ eigen opening krygt , en door het
„ slagaderlyk einde , (overeenko-
„ mende met in de Lucht zwaaijende
„ takken) in oneindig veele werk-
„ tuigen geschikt word , en alom door
„ een

(2) PALLAS *Lyst van Plantd.* bl. 9. 10.

„ een vleesachtig gestel ondersteund
 „ en zamen geweeven, in de opper-
 „ vlakke van het Ligchaam eindigt,
 „ gelyk een boom in zyn bladen.
 „ De Lucht word ingeademdt door
 „ zeer getakte werkbuizen, en, ge-
 „ lyk in de Planten door buizen, door
 „ het geheele Ligchaam geleidt.
 „ Daar word in het Lichaam van het
 „ Dier een Ey gemaakt, dat gelyk is
 „ aan het zaad der Planten”.

DE Ridder LINNAEUS heeft ook
 deze overeenkomst, tusschen een Dier
 en een plant aangetoond (3). En op
 een andere plaats toond de Heer PAL-
 LAS dat 'er Dieren zyn, welke geen
 bloeds omloop hebben, maar alwaar
 de

(3) LINN. Syst. XII. tom. I, pag. 15.

XII V O O R R E E D E.

de vochten even als in de Planten opklimmen (4).

BEHALVEN dat zyn'er in de Dieren verscheiden deelen, die als Planten groeyen, gelyk men voornaamentlyk in de Zeeſterren, Kreeften en ſtaarten der Haagdiſchen ziet. Is de voortteeling der Plantluizen, welke tot in het zesde geſlagt, zonder vermeniging, vermenigvuldigen, niet gelyk aan die der Planten door zaaden gelyk de geleerde BONNET bewezen heeft (5)? Ziet men niet, dat de Polypen doortakſchietingen, doorsnydingen, en door eyeren vermenigvuldigen

(4) PALLAS *Miſcell. zool.* pag. 89.

(5) BONNET *Inſectol.* tom. II. Zie ook mynen brief over de Coraalgewaſen.

gen, even als de Planten door botten, zaaden (6), en ſtekken. Eindelyk toonen de Plantdieren, de overeenkomst tuffchen de Dieren, en Planten ten klaarſten (7).

De deelen welke het dierlyk Ligchaam uitmaaken zyn veel meer in getal, veel verſcheidener in zoort, en veel verſchillender in werkingen dan die van de Planten, of Mineraalen.

Indien wy het zamenſtel der Planten beſchouwen, zien wy dat het vaatagtig zamenſtel uit *Houtvezelen*, *waterblaasjes*, *lugtbuizen* en *eigen vaat-*
ten,

(6) TREMBLEY *Hift. des Polyp.* overal: en PALLAS *Lyſt. van Plantd.* bl. 33—35.

(7) PALLAS *ubi ſupra* in de inleyding.

XIV V O O R R E E D E.

ten, welke een gecoleurd fap voeren, beftaat.

DEZE vier zoorten van Vaaten door alle de deelen van de Plant loopende, maaken drie voornaame bekleedzelen, de *Schorfch*, het *Hout*, en het *Merg*.

DE *Schorfch*, of het buitenfte bekleedzel der Planten, is, of glad en effen, of hobbelig en ruw; en zamengefteld uit breede, niet zeer digt aan een gevoegde Vezelen.

ONDER de *Schorfch* is het *Hout*, dat uit nauwere, digtere, en nader by elkander fttaande Vezelen beftaat, met minder tuffchenwydtens, minder Watervaaten en alleen Lugtvaaten hebbende.

HET

HET *Spint*, in het hart der Plant geplaatst, bestaat byna alleen uit Wattervaaten, die grooter en opgeblazener zyn, dan die van het hout of de schorsch; en welke verminderen, opdroogen en verdwynen met den ouderdom van de Plant.

LAATEN wy de Planten *Physiologisch* beschouwen, dan zien wy, dat eene met zout en oliedeelen bezwangerde stoffe, door de uiterste mondjes der Wortelvezelen opgenoomen, in de Houtvezelen klimt, en in de waterblaasjes over gaat, en van daar, na dat het daar gekleinst is en bereyd, in een meer of min dik gecoleurd Vocht, misschien overeenkomstig met de Chyl der Dieren, overgaat in de zoogenaamde *Vasa propria*

xvi V O O R R E E D E.

pria of eigen Vaaten. Hier word het door meer of min fyne buizen gekleinfst, en naar alle de deelen heen-gevoerd; de uiterste fynheid van de buizen van het voedend Sap, die hen gelyk aan hair buisjes maakt, de werking van de Lucht op de veeragtige plaatjes der Luchtbuizen, en de weder werking van deze, op de Houtvezelen, welke zy omvatten, of van welke zy omvat worden, de warmte die het voedend sap uitzet, en voor al die, welke op de oppervlakte der bladeren werkt, maakt de uitwaassening, en doet teffens het sap in de buizen klimmen. Hier is derhalven geen omloop van vochten, gelyk in Dieren; by dag wanneer de warmte op de bladeren werkt, scheiden de kleinsvaaten (*Vasa excretoria*), welke de
Heer

Heer GUETTARD het eerst in aanmerking genoomen heeft, en die zich aan de ribben van het Blad als bolletjes, pyramides, blaadjes &c. vertoonen, de wateragtige en grove-re deelen van het Sap, dat de wortel opneemt. De Lucht in de Luchtbuizen zich meer en meer uitzettende drukt de houtvezelen, en dringt dus het *Serum* of groeizap naar boven. De warmte van den Dag afneemende met den avond, openen zich de mondjes der bladeren, en florpen gretig alle de uitwaasfemingen op, die in den Dampkring dryven. De Lugt, in de Lugtbuizen door geen warmte meer uitgezet, krimpt in, hier door zetten zich de houtvezelen uit, en neemen het sap in, dat hen door de bladeren gezonden wordt, deze zappen vereeni-

I. Deel I. Stuk.

**

gen

XVIII V O O R R E E D E.

gen zich met het overschot van het geen by dag opgeklommen was, en loopen zamen naar den wortel.

DE Schorsch zend vezelen naar zyn uiterste einde; het voedende zap der schorsch niet verder konnende klimmen, of voortgaan, zet zich, door de aan drang van de straks te noemen deelen genoopt, naar alle kanten uit, en maakt een taay bekleedfel of bloemkelk, terwyl het hout zyne fynere vezelen, veeltyds en meest al evenwydig aan de schorsch dezelve groeiing geeft. Doch de eigen vaaten (*vasa propria*) met een gecoleurd sap bezwangerd, behouden hunne dikte, terwyl die der schorsch allengskens dunner en doorzigtiger worden. Deze in eene of meer bondels verzameld spreiden zich uit en

maa-

maaken eene een- of veel- bladige bloem. De Lugtvaaten, zich verlengende en in verscheiden rolronde buizen zamen loopende, maaken de helmstyltjes (*Stamina*) terwyl het merg der Plant het stampertje voorbrengt.

DIT is kortelyk de ontleedkundige Natuurkunde der Planten, welke ik by de beschouwing van het zamenstel van het groeibaar Ryk nader zal inzien.

DE Dieren, uit meer zamengestelde deelen bestaande, hebben een geheel ander werktuig ter voeding.

DE *Oeconomia Animalis*, of dierlyke huishouding, bestaat wel, gelyk in

de Planten, uit vloeijbaare en vaste deelen. Edoch deze zyn van een geheel byzonder maakzel, zamenstel, en gebruik.

IN de Planten, zagen wy dit voedend sap opklimmen en uitwaassenen, en weder daalen, of langs den zelve weg naar den wortel keeren.

LAATEN wy nu dit in de Dieren beschouwen.

DEZE ontfangen hun voedsel door den mond, welke aan den *Slokdarm* vastgehegt is, die weder zich in de maag inplant en met dezelve een ligchaam maakt, terwyl de andere opening der maag zich in de Darmen ontlast.

DE

V O O R R E E D E. XXI

DE *Slok darm* ontfangt de gekauwde spyzen, brengt dezelve in de maag, alwaar zy door het maagsap bereid worden, en, door den spieragtigen rok gedrongen, naar de ingewaanden overgaan: hier worden zy door het sap van het Alvleesch (*Succus Pancreaticus*) het ingewandsap (*Succus Entericus*) en de gal bereid, een gedeelte derzelve word afgekleinst, en tot een vloeibaare stoffe gebragt, die in de Chylbak overgaat, en door de Chylbuis in het Bloed gebragt word. Dit Bloed loopt in sterke vliefigebuizen, welke beiden uit het hart haaren oorsprong hebben, en waar door de omloop geschiedt. Het gewigt van deze zaak, zoo door haare natuur, als door haare duuring en den toefstel van werktuigen, vereifcht onzen diepften aan-

XXII V O O R R E E D E.

dacht, en inderdaad in deze beweging is zulke grootsche vertooning, en die zoo zeer het oog van een wysgeer moet treffen, dat hy in de diepste verwondering moet zeggen met den Koninglyken Dichter, dat hy op eene vreesfelyke wyze gemaakt is; en zich over de onbegrypelyke Almacht en wysheid van zynen grooten **MAKER** verwonderen.

IN het midden van de Borst, tuschen twee vaatachtige klompen (*Massa's* der Longen) legt het Hart, met zyne twee Ooren. Ieder Oor loopt in het Hart, en maakt daar twee holigheden. Dit Hart bestaat uit twee laaggen vleeschagtige vezelen, waarvan de eene schuin sch van het breedste eind naar de punt loopen, en de andere
loopen

loopen dwars: dus veroorzaaken zy twederley beweegingen, die van het hart korter en wyder te maaken, en die van het zelve te vernaauwen, en te verlengen. Het Hart fchynt deze twee beweegingen te verrigten, door als eene fchroef op haare fpil te draayen.

TWEE groote vaten hegten zich aan beide ooren, een slagader en eene ader. De *slagader* van het regter oor brengt het bloed in de *Longen*. De regter Ader is de groote ftam van het *adergestel*, en brengt het bloed uit alle de deelen van het ligchaam weder naar het Hart. De *slagader* van het linker oor is de groote ftam van het *slagaderlyk gestel*, en brengt het bloed door het geheele ligchaam. De *Ader*

van het linker oor brengt het Bloed weder na het zelve. Deze Aders en *slagaders* verdeelen zich in verscheiden takken, welke weder takken naar alle de deelen van het Lichaam zenden; en in de uiterste deelen worden aders en slagaders in elkander door inmonding gevat, en het bloed keerd weder naar het hart.

MAAR deze omloop zoude ongenoegzaam zyn, indien niet het bloed telkens door toevoer van versche Lugt verfrischt, en gezuiverd wierd. Dit nu geschied in verschillende Dieren op verschillende wyze, gelyk ik elders in het breede heb aengetoond (8). In het algemeen ademen de vier voetige Die-

(8) *Verhandel. der Holl. Maatschappij* XIV.D.

Dieren door middel van de Longen. Wat. voor en ter zyden den flokdarm legt in viervoetige Dieren en vogelen een Lugtbuis, die van vooren uit kraakbeenige ringen, en van agter uit een spieragtig vlies bestaat, doch in de meeste vogelen zyn dezelve geheel (9) gelyk ook in de Haagdischen. Deze Luchtbuis verdeelt zich in twee takken, welke zich weder in veele alengskens kleiner wordende takjes verdeelen, welker einde in blaasjes en kliertjes eindigt. Uit de Longslagader, nu komen kleine takjes, welke langs de takjes van de Luchtbuis heenen loopen; en dezelve voedsel verschaffen. Dit Longengestel verschilt egter na de woonplaatzen en aard der Dieren.

DE

(9) HALLER *Elem. Physiol.* tom. III.

XXVI V O O R R E E D E.

DE Visschen ademen door kieuwen, de Insecten door Lugtgaten aan de zyden van het Lichaam geplaatst.

GEEN mindër verscheidenheid vind men in de deelen der zintuigen van de Dieren. De Visschen, in een dikkere Middelftof levende, hadden een ander Cristallyn nodig dan de viervoetige; de oogen van der *Chamaeleon*, die van de *Hoogkyker* Visch (10) zyn de eenige van die verwonderlyke soort in hunne benden, de oogen van de Insecten, Kreeften, Spinnen, Krabben, Slakken, Watervloijen verschillen alle van elkander. De gerimpelde hoorens van de Harten, de Hartebokken de dubbele ooren der Vledermuizen, het

(10) SEBA *Schatk. III.* pag. 108. tab. 34. fig. 7.

V O O R R E E D E. xxvii

het gehoortuig der Vogelen, zelfs van de tweeslagtige, dat der Visschen, door den geleerden CAMPER betoogt en afgebeeld; de reuktuigen naakt in de viervoetigen, gedekt in den Olyphant, zoo aanmerkelyk in de dikkop Vledermuis, (II) in het *Ethiopisch* Varken, dubbeld in veele visschen. De tong der viervoetigen, zoo verschillende naar hunne verschillende levens wyze, dubbeld in veele twee slagtigen en vogelen, als een geboogen of gekrulde snuit in de Insecten.

SLAAN wy de voortteeling der Dieren gade dan vinden wy dat het innerlyk gestel verschild. De eenvoudigste

(II) DIRRK. MENGELW. I. D. II. Stuk tab. III. en IV.

XXVIII   V O O R R E E D E.

digfte voortteeling is die van het *Klootdiertje* en van den *Proteus*, welke laatste als uit elkander vallende, uit yder deel een jong geeft (12).

HIER na volgen de Plantdieren welke door takfschieting en eyeren voortteelen. De derde rang, is zulke die zonder blykbaare vermenging eyeren leggen, gelyk de zeekwallen, en alle de zagtschalige.

DE vierde rang bestaat uit zulke welke mannelyke en vrouwlyke teeldeelen in het zelve ligchaam hebben, gelyk de Schelpviſſchen, de *Aplyſia* of zeehaas.

IN den vyfden rang komen zulke, welke de Mannelyke en Vrouwelyke teel-

(12) ROES. *Inſect. tel.* tom. II. tab. 101.

teeldeelen byzonder hebben, en voorts aan elkander gelyk zyn. In andere verschild het mannetje van het wyfje op eene aanmerkelyke wyze, gelyk in de glimwormen, *Cochenilles* beesjes, het winteruiltje, enz.

HIER uit blykt teffens, hoe groot het verschil in het innerlyk gestel der voortteeling zyn moet, welk stuk ik elders in het breede zal aantoonen.

EVEN zoo veel verschil vind men in de groeiing der Dieren, welke altoos in de viervoetigen evenredig is aan hunne voorteelingskragt en grootte, gelyk de Heer BUFFON beweezen heeft. Zommige groeijen tot een verbaazende, grootte gelyk de Olyphant en *Rhinoceros*, de andere ontslippen de beste ver-

ver grootglaazen, enz. 270000000 kleiner dan eene zandkorrel, en in evenredigheid tot een bije, als eene bije tot eene Paard, volgens het gevoelen van *Leenwenhoek*, en de *Malezieux*. In alle landen vind men zulk een verschil van grootte, welke trapsgewyze afneemt van den Olyphant tot het *Siberische* muisje. Men stelt dat een Olyphant vyftig maal zwaarder is dan een mensch (13), en het *Siberische* muisje weegt 1½ drachma (14), en van de Struisvogel die 80 pont weegt (15) tot het vlieg-vogeltje, dat 40 greinen zwaar is, (16) als

(13) BUFF. *Hist. Nat. de l'Elephant*.

(14) PALLAS *Reisen durch verschiedene Provinz. des Russischen Reichs* I. pag. 454.

(15) BUFF. *Hist. des oiseaux*. tom. II. p. 13. edit. Magna.

(16) SLOANE *Voyages*.

als ook in de tweeflagtige in verfchillende zoorten, welk een onderscheid tuffchen den grooten afgod der *Fida* negers *Jacapara* slang, &c. en tuffchen, het kleine eijereetertje *Ovivorus*, dat nauwlyks een fpan lang is. Het zelve onderscheid ziet men in de viſſchen, van den Walviſch tot den kleinen kringbuik; in de Inſecten ziet men zulks byna in yder geſlacht, en in de ſchulpen byna in yder zoort.

Dus het dierlyk leven, de voorteling en groeij der Dieren beſchouwende, ziet men uit deze lugtige ſchets hoe uitgebreid het verheven deel der Dierkunde is. Ik zoude dit breeder verhandeld hebben, waare het niet, dat dit te breedvoerig voor deze inleyding zyn zoude, en ik voorneemens
was,

was, dit gewigtig stuk, in byzondere verhandelingen, de Hollandsche Maatschappy van tyd tot tyd aantebieden.

LAATEN wy nu het groeibaar Ryk nagaan, door de Plantdieren zoo naauw aan het Dierenryk verbonden, welke derhalven zulk een duidelyk bewys geeven van dien grooten schakel der Natuur. De *Planten* derhalven zyn wezens welke een groeiend leven hebben, nooit van plaats veranderen, en hun voedsel door den wortel opflorpen.

HIER voor zagen wy hun vaatagtig zamenstel en eenvoudige groeiing. Wat aangaat hunne voortteeling, de nieuwe ontdekkingen hebben hun mannelyke en vrouwelyke deelen toe-
ge-

gekend, welke of in dezelve plant plaats hebben, en alleen in getal verschillen, of welke in byzondere bloemen van dezelve plant of in verschillende geplaatst zyn, of eindelyk welke alleen voor een gewapend oog zichtbaar zyn. De stampertjes, ontfangen de zaadstof der helmtjes, die door die buis als door de scheeden in den grond der bloem (*receptaculum*), valt, daar gekoesterd word, zwelt, en een of meer vrugtjes maakt, na de verscheiden aart en zoorten der Planten, die eindelyk tot rypheid gekoomen, het zaad in zich bevatten, en de hoop van het volgende geslacht voortbrengen. Dit is egter de eenige weg niet waar door de Planten vernieuwvuldigen, debotten, stekken, en in-

I. Deel. I. Stuk.   ***   en-

XXIV V O O R R E E D E.

eningen vermeederen dezelve insgelyks.

DEZE groeibaare wezens, schoon van zenuwstel ontbloot, en dus geene zintuigen hebbende, toonen niet te min een werktuigelyk vermogen, dat door ligchaamen buiten hun in beweging gebragt word. De *Oxalis sensitiva* *Mimosa pudica* die zich op het aanraken van haare blaaderen sluit, en haar takken buigt. De *Dionea* die de gekorvenen welke op het zap van haare kliertjes aast insluit en dood; de *Euphorbia*, de *Lathyrus*, het *Cunil*, de *Curaçaosche Asclepias*, de *Americaansche Nagtschade* laten in den Herfst zoo hunne bladeren om de steel vallen, dat zy dezelve geheel be-

bedekken, en wel zoo, dat het buitenste van het blad tegen den steng aanlegt. En om hier een aanmerkelijk voorbeeld van by te brengen; de Heer LINNÆUS den *Lotus ornithopodioides* van den Heer SAUVAGES ontvangende, zag dat dezelve twee bloemen had, en was voornemens om dezelve aan den Tuinier wel aan te beveelen, edoch door andere bezigheden afgetrokken, riep hy den Tuinier des avonds, doch men vond geen bloemen, des anderendaags vertoonde zich dezelve weder; doch waren des avonds niet te vinden. De derde dag zich weder vertoonende en des avonds als verdwynende, vond men eindelyk na langzoekens, dezelve onder drie bladen als onder een dak verschoolen.

XXXVI V O O R R E E D E.

DUS flaat de *Atriplex*, de *Asclepias* de *Alfine* de bladen naar boven, en dekt dus de bloem.

DE *Seda abutilon* flaat zyne twee bladen naar boven, zoo dat de bovenfte zyde loodlynig na buiten flaat, en het onderfte voegt 'er zich tegen aan, zoo dat de bloem der nachts tusfchen twee bladen inlegt.

DE *Peruviaanfche Maluwe*, flaat des nachts den halm naar beneden, en het blad naar boven, dat den halm als met de hand omvat. De *Iva* flaat des nachts alle haare bladen naar boven, die de bloem dus als omtuynen. De *Datura* draayt haare bloem fchroefsge- wyze in elkander en flaat 'er de blaë- deren om.

DE

VOORREDE. xxxvii

DE *Hibiscus Sabdariffa* laat haare bladen loodlynig vallen rontfom de fteng, (17). Dit is het geen de flaaap der platen genoemd wort.

EN gelyk men in het Dierenryk veel al gewaer word dat de fchoonfte verwen van de huid dikwerf een wreed-aardig en roofzugtig gemoed verbergen, ziet men in de planten insgelyks, dat hunne verw hunne eigenschap te kennen geeft. Dus zyn de geele bloemen meest al bitter gelyk de *Gentiana*, de *Aloe*, het *Chelidonium*, de *Curcuma*. De roode zyn zuuragtig, gelyk de *berberis*, de *doornbes*, de *moerbes*, de *aalbes* de *aardbey*, de *zuure appel*, de *morel*, de *rooze knoppen*, de *opuntia*

(17) Zie *Amoenit. Acad.* tom. I.

XXXVIII. VOORREDE.

tia. De groene vertoond onrype vruchten.

DE bleeke verw geeft geen smaak, gelyk in de *Latuw*, *Chicorey*, *asperges*, &c.

DE blaauwe verw is veelyds hartsterkende planten eigen, als in de *Bor-rage*, het *Echium*, de *Malva*, &c.

DE witte verw geeft eene zoete smaak, gelykin de *witte aalbessen*, *witte pruimen*, &c.

HET zwart toont meest, vergift gelyk in de *bessen* van de *Atropa A-tæa*, het *Solanum*, *Empetrum*, *Padus* &c.

DE-

DEZE kragten worden ook door de reuk gekend.

ZULKE die eene *Amber* of *Muscus* of *Zibeth* reuk hebben, hebben ook een hartsterkende, maag versterkende en opstygingen dempende kragt, gelyk de *Asperula*, het *Abel mosch*, het *Geranium moschatum*, het *Milium*, de *Aera*, de *Malva moschata*.

DIE een aangenaame reuk hebben, gelyk de *Crocus*, de *Chaeranthus*, de *Jasmin*, de *Violier*, de *Polianthes*, de *Oranje bloesfem*, zyn versterkende. De *Aromatike* Planten koomen in reuk en smaak overeen, gelyk de *Kaneel*, de *Laurier*, de *Sassafras*, de *Campher*, de *Foelie* &c.

XL. V O O R R E E D E.

DE stinkende hebben of een look-reuk gelyk *Look*, *Ajuin*, *Prey*, de *Alharia*, het *Scordium*, de *Petiveria*, de *Asfa foetida*; of eene bokken reuk, gelyk de *Orchis*, de *Vulvaria*, het *Hieracium foetidum*.

NOCH stinkender reuk en teffens na-deeliger kragten hebben de *Sachys foetida*, de *Cotula foetida*, de *Tagetes*, het *Opium*, de *Cannabis*, de *Ebulus*, de *Anagyris*.

DE walgende Planten gelyk de *Hel-leborus*, het *Veratrum*, de *Tabak*, de *Convallaria*, het *Asarum*, de *Coloquint*, hebben een walgende reuk.

ALLE de grasplanten (*gramina*) strekken ter spyze voor Dieren en men-

menſchen, gelyk de *Ryſt*, de *Rogge*, de *Haver*, de *Gerst*, de *Wyth*, de *Mays* &c.

ALLE de planten aan welke bladeren ſtersgewyze (*Stellata*) ſtaan zyn piſdryvende, gelyk de *Meekrap*, de *Asperula*, de *Asperine*, het *Galium*. De ruigbladige (*Asperifolia*) zyn flymerig en lymagtig, gelyk de *Anchufa*, *Borrago*, de wortel van de *Consolida major* &c.

HET *Solanum*, de *Hyoscyamus*, de *Tabak*, de *Atropa*, de *Mandragora*, het *Capsicum* en alle die dezelve in verw gelyken en in gedaante, zyn ſcherpe, of verdoovende, en dolmaakende planten.

XLII V O O R R E E D E.

DE kransbloemen (*Umbellatæ*) zyn op het Land groeiende heilzaamē *Aromatike*, verwarmende, afdryvende Planten, maar de water kransbloemen hebben vergiftige wortels en zaaden.

DIE zes helmstyltjes hebben en een wortel zonder reuk, zyn eetbaar; maar indien de wortel een vergiftige reuk heeft, gelyk de *Gloriosa*, de *Scilla*, *Hyacinth*, *Anthericum*, *Leucojum*, *Narcissus*, *Kroonimperiaal* zyn vergift.

ALLE de tweehoornige (*Bicornes*) zyn zamen trekkende, en de *besfen* zyn zuur, gelyk de *Erica*, *Pyrola Vaccinium*, *Uva Ursi*, *Guajacana*, &c.

DIE meer dan twintig helmstyltjes heb-

V O O R R E E D E. XLIII

ben zyn vergiftig of fchadelyk, gelyk het *Aconitum*, de *Anthora*, de *Aquilegia*, de *Staphisagria*, *Delphinium*, *Elleborus*, *Clematis*, *Pulsatilla*, *Paeonia*, *Actæa*, *Melidonium*, *Euphorbia*, *Cambogia*, *Peganum*.

DE *Wervelbloemen* (*Verticillatæ*) hebben eene aangenaame verfterkende reuk, zyn goed voor de zenuwen, ontbinden verftoppingen, &c. gelyk het *Marum*, de *Dictamnus Satureja*, *Thym orego*, *Majorana*, *Kunil*, *Pulegium*, *Mentha*, *Melissa*, *Lavendel*, *Salie*, *Rosmaryn*, &c.

DE Peuldragende (*Siliquosæ*) zyn waterachtig fcherp, afveegende, pisdryvende.

DE

XLIV V O O R R E E D E.

DE Pylaartjes dragende (*Columnifera*) zyn flymagtig, fmeerende, verftompende, en rypmaakende, dus heilzaam in borftziektens, koudepis, fteen, colyk, &c.

DE *Vlinderbloemen*, (*Papilionaceæ*) gelyk de boonen, erwten, lenzen, cicers, zyn meelagtig en opblaazende.

DE zamengeftelde bloemen (*Compositi flores*,) zyn meest bitter.

DE *Orchideæ*, of die welker wortel een balzak afbeeld, en eene bokkenreuk hebben, zyn zaad verwekkende, gelyk de *Orchis*, het *Satyrion*, de *Vulvaria*, en voor al de *Vanille*.

DE *Conifera*, of welker vrugt een
ke-

kegel gelykt , geeven een harft , en zyn pisdryvende , gelyk de *Sabina*, *Olibanum*, *Pynboom*, *Denneboom*, *Cypres*.

DE Planten , welke een byhangzel hebben , dat van de bloembladen onderscheiden is , zyn gemeenlyk vergiftig , gelyk het *Aconitum*, de *Helleborus*, de *Aquilegia*, *Nigella*, *Parnassia*, *Epimedium*, *Clusia*, *Kiggelaria*, *Stapelia*, *Nerium*, *Zygophyllum*, gelyk ook alle planten , welke gekwetst zynde een melkagtig wit of geel vocht geeven , gelyk de *Rauwolfia*, de *Thevetia*, *Cerbera*, *Plumieria*, *Taberna Montana*, *Ceropegia*, &c.

ALLE deze verwonderenswaardige eigenschappen der Planten , leiden ons derhalven op tot het scheikundig
on-

onderzoek van derzelver vloeibaare deelen. Hier opent zich voor het oog van een wysgeerig natuur onderzoeker een uitgebreid veld van beschouwing. In de verschillende vlugge geesten, olien, zouten, wateren, aftrekzelen en overblyfzelen der Planten.

DIT talryk heir uit byna 1300. geslagten zamengesteld, gaat door de Steenplanten of Coraalen tot het Delfbaar Ryk over.

DE *Coraalen* immers groeijen als planten, doch misfen alle, behalven de *Corallina opuntia*, dat vaatagtig zamensfel der Planten. Ik heb ten dezen einde, de *Corallina officinalis*, *terrestris*, *rubens*, *rigens*, en *opuntia* onderzocht, en heb in de laatste alleen een vezel

ag-

V O O R R E E D E. XLVII

agtig zamenftel, dat met een kalkkorft overdekt was, gezien. Of de Turksche Veder van ELLIS (*corall. tab. 33. fig. c.* en de *Corallina Tubulosa* van PALLAS (*Elench. Zoophyt. pag. 430. n. 12.* SLOANE *Voyag. I. tab. 20. fig. 10*) tot de *Coraalen* behooren twyffel ik zeer, en deze hebben een vaatagtig zamenftel, doch geen fteenagtige korft.

DE *Delfftoffen* zyn levenlooze onbewerktuigde lichaamen, die de vaste deelen van onzen aardbol uitmaaken.

HET eerfte dat ons hier voorkomt, is *Aarde*, uit welke de mergel, de kley, het kryt, de oker, gebooren worden, hier van daan de tayheid en fmerigheid verharing en 't beftand zyn tegen het vuur.

HET

HET *Zand*, zoo verschillende in soort als de *Aarde*, is het eerste beginzel der steenen. De *Kalk*, volgens het nieuwste gevoelen, een dierlyke aarde, komt door alle haare eigenschappen noch nader aan de bende der steenen, want zy bruischt op met zuure schei-vochten, en word marmer, gyps, kryt, keyspath, na de verscheiden omstandigheden, waar in het zich bevind.

DE steenen groeijen dus uit aarde, kunnen ontbonden worden, en weder groeijen, dus word kley talk, die weder in steenmergel verandert, en als asbest weder te voorschyn komt. Het zand word tot dryffsteen, die weder tot grover zand overgaat, en in grove steen (*Saxum*) herboren word. De *Aarde* word *Schist*, en die ontbon
den

en die ontbindt zich in oker, waar uit de tuffteen ontstaat.

DE kalk wordt tot marmer, dat in kryt ontbonden word, en dit kryt word weder tot gypssteen.

DE gesteentens, die doorzigtig zyn, worden uit eenen vloeibaaren oorsprong, en die ondoorzigtig zyn uit eene vast beginzel gebooren.

DE *Mica* is dus een zamengroeiing van kley of mergel, en dus ondoorzigtig, buigbaar, glanzig en bestand tegens het vuur.

DE *Quartz* is eene Crystalwording van water, en dus, doorschynende

I. Deel. I. Stuk.

****

hard

L V O O R R E E D E.

hard, en met vitriool dikwerf door-
drongen.

DE *Spath* is eene Cryſtalwording van kalkagtig water, en dus broos, ten zy het met yzer gemengd zy. De Cryſtallen komen uit zout, bevatten zout, of 'er word zout uit gebooren. Van de eerſte zoort, zyn de edelgeſteentens, de tweede de zwavelkies *Pyrites*, de derde zyn de metaal Cryſtallen, gelyk die van yzer, koper, tin, &c.

ZOUTE, zwavelige, of *bitumeneſe* deelen, en metaaldeelen zamen gevoegt, maaken zouten, zwavel, Jodenlymen, *Ertzen* en metaalen, het zy door doorzypeling, of door bezwan-
ge-

V O O R R E E D E. LI

gering, doch altoos door drukking der Lucht en aantrekking der gelykende deelen, zulke die alleen uit zouten bestaan kunnen in water ontbonden worden, gelyk het *Natrum*, de *Selenites*, het *Zeezout*, de *Salpeter*, de *Aluin*, de *Vitriool*. Die uit zout en zwavel bestaan, kunnen door vuur ontbonden worden, en hun rook geeft een reuk als de Barnsteen, de Amber, de *Pyrites*, het *Arsenicum*. De Mineraalen uit zout, zwavel en kwik bestaande geeven in het vuur een ondoorzichtige blinkende gecoleurde *Regulus*, gelyk het *Antimonium*, de *Zinc*, de *Bismuth*, Yzer, Tin, Koper, Goud.

ALLE de Delfstoffen kunnen ontbonden worden, door bekwaame scheivochten. Het kryt, keyen &c.

LII V O O R R E E D E.

worden door zuuren ontbonden en met opbruifching. De Zwavels door vuur, de zouten door water, de metaalen en ertzen door fcheyvogten en vuur. Deze ontbindingen, de gronden van de Scheykunde, Bergwerk-kunde, en Metaalscheidingen, brengen de Delfftoffen tot geheel andere gedaantens, welke egter in veele Metaalen tot haaren eerften oorsprong, in voorige gedaantens konden herfchapen worden. Dus, om hier een voorbeeld van by te brengen, Ge-granuleerd Zilver in fterkwater ontbonden fchynt geheel verdweenen, en even als zout in water gefmolten, een koperen ftaaf in dit met zilver bezwangerd Schey-vocht geplaatst, doet het zilver als een poeder op de grond vallen, dit poeder gedroogd, en in een

V O O R R E E D E. LIII

een ander glas geworpen, en met kookend water overgooten, word melkwit, en Maanmelk (*Lac Lunæ*) genaamd, door zyne zwaarte zakt het poeder, nu wit geworden, naar beneden, en word *Magisterium Lunæ* genoemd: dit *Magisterium* word gedroogd, en in fterk water, of geest van zout geworpen, en eenigen tyd zagties op warm zand gewarmd, en daar na met fchoon water gekookt, tot dat het zynen fmaak verlooren hebbe, hier uit word de *Luna Cornea* of het Hoorn-Zilver gebooren, dit geeft weder door bereiding de *Lapis Infernalis*, en deze op het vuur gelegd, geeft het zilver weder zuiver, op dergelyke wyzen worden de overige metaalen in verfcheiden vafte en vloeibaare ge-

****

XLIV V O O R R E E D E.

daantens verandert, en weder tot hunne vorige gedaante gebragt.

WANNEER men dus de *Ontleedkunde* en *Scheikunde* in de naspooring der geschaapen wezens te hulp neemt, ontdekt men een noch uitgebreider veld, en uit dit verheven gedeelte der Natuurlyke Historie ziet men, dat een enkel voorwerp zelv, een onderzoeker zyn geheel leven door kan bezig houden; en deze beschouwing der Natuur leid ons op tot den Grooten Schepper; hoe meer, hoe nader wy deszelvs werken inzien, hoe meer wy overtuigd worden moeten van het bestaan van een Wys, Almagtig, en goed Opperwezen, dat onze verwondering, onzen eerbied, aanbidding en dank-

V O O R R E E D E. Lv

dankbaarheid vordert, het geen wy weeten, en het geen wy niet weeten, maar ten deele giffen, het geen de ondervinding, ondersteund door alle de pogingen van ons vernuft, ons leert, geeft ons het verhevenste en heerlykste denkbeeld van een Almagtig en en Alwys Schepper. Nooit waaren *Newton*, *Cassini*, *Reaumur*, of *Linnaeus*, *Godloचनाars*, *Mirabeau*, *la Mettrie*, en *Bolainvilliers*, zagen dezelve slechts oppervlakkig, en kenden geen God.

EDOCH om tot deze kennis van het verhevene deel der Natuurlyke Historie te koomen, is het voor afnodig, dat men de voorwerpen kenne in hunne uiterlyke gedaante, en in hun verband met elkander, waar door men

****

dezelve leert onderscheiden. Dit is de grond der zamenstellen. Wel is waar, dat 'er onder alle de geschapen wezens eene zekere order en zamenhang plaats hebben, waar doorzy alle elkander geregeld volgen; indien wy dezen schakel volkomen hadden, dan waaren de zamenstellen onnodig; maar dewyl wy alle de voorwerpen by lange na niet kennen, en van de huishouding, levenswyze, en inwendig zamenstel van die geene die ons bekend zyn weinig weeten, konnen wy dezen keten niet ten einde brengen. Hierom hebben de wysgierige Natuuronderzoekeren ons maar stukken kunnen geeven van de order der Natuur, en de geheele Natuur uit een ander oogpunt beschouwd, door voornamentlyk uit de overeenkomst der

der deelen , of hun verschilrang schikkingen op te maaken , welke zy weder in Benden , de Benden in Orders , de Orders , in Geslagten , de Geslagten in Zoorten , de Zoorten in Byzoorten of Verscheidenheid van zoorten verdeelen.

LAATEN wy nu deze rangschikkingen , zoo van de Natuurlyke order als van de zamenstellen beschouwen.

ALLE de voorwerpen der Natuur worden in drie ryken verdeeld ; het ryk der Dieren , der Planten , en der Delfstoffen. Wy zagen hier voor , dat de Dieren door de Plantdieren aan 't groeijbaare ryk verbonden zyn , en dat de Coraalgewassen de planten aan

LVIII V O O R R E E D E.

de Delfstoffen verbinden. Dit leert de Natuur, dit is door de grootste Natuurkenners van deze Eeuw geftaafd.

DE *Viervoetige Dieren*, die de eerste Bende uitmaaken, hegten zich door den *Struisvogel* aan de *Vogelen*, terwyl de *Vliegende draak* de *Vogelen* aan de tweeflagtigen verbind, die door de *Vifch Haagdifch* aan de *Viffchen* verbonden worden. De *Viffchen* gaan door het *Draakje* over tot de gevleugelde gekorvenen, deze hegten zich door den *Scorpioen* aan de *Hardschaligen*, welke door de *Zandkokers* aan de *Plantdieren* verbonden worden. De *Plantdieren* hegten het *Dierenryk* aan het groeibaare door hunne *Polypi*, welke als levende en zich bewegen-

gende bloemen van het Plantaardig gewas kunnen aangemerkt worden (17).

DE Heeren van ROYEN (18), LINNÆUS (19), en CRANTZ (20), hebben getragt de order der Natuur in de schikking der Planten te volgen. De Heer van ROYEN verdeelt dezelve in *Palmen, Lelien, Grasplanten, Kransbloemen, Zaamengestelde Bloemen, Driezadige, Onvolmaakte planten, Planten die haar vrugt uit de bloem geeven, Planten,*

(17) Zie *Lyft der Plantd.* inleiding, en mynen *Brief over de Bedenkingen der Dierlykheid der Co-raalgew.*

(18) In zyne *Prodromus Flor. Leyd.*

(19) LINNÆUS *Philos. Bot.* §. 77. *Gener.* ed. VI. pag. .

(20) H. I. N. CRANTZ *Instit. rei Herb.*

LX V O O R R E E D E.

ten, welker kelk een vrugt wordt, Gaapende bloemen, Hauwtjes draagende, Pyl-aartjes draagende, Peuldraagende, die zoo veel helmstyltjes als bloembladen hebben, die tweemaal zoo veel helmstyltjes als bloembladen hebben, die 'er meer hebben, die 'er geen hebben.

DE Heer LINNÆUS telt 58. Natuurlyke Orders. 1. Palmboomen. 2. Planten die eene bytende scherpe smaak hebben. 3. Die dunne styve stengen hebben. 4. Grasplanten. 5. Met drie bloembladen. 6. Met zwaardgewyze bladeren. 7. Die na het Stengelkruid gelyken. 8. Die een aangenaame reuk hebben. 9. Die eene bloemkoker hebben. 10. Kroonplanten. 11. Rankdragende. 12. Moeskruiden. 13. Sappige Planten. 14. Wier zaadhuisjes langgebekt zyn. 15. Wa-
ter-

terplanten. 16. *Wier* kelk een vrucht word. 17. *Wier* Bloem een vrucht word. 18. *Welker* helmtjes als hoorntjes gespleeten zyn. 19. *Hesperische*. 20. *Raderbloemen*. 21. *Vroeg* bloeiende. 22. *Die* naar *Angelieren* gelyken. 23. *Die* drie *Zaad*plekjes hebben. 24. *Welke* een byhangzel agter de bloembladen hebben? 25. *Welke* *Zaad*buisjes doppen zyn. 26. *Die* veel peultjes dragen. 27. *Heulplanten*. 28. *Schadelyke* planten. 29. *Klokjesbloemen*. 30. *Gedraaide* planten. 31. *Fyn* gedoornde. 32. *Vlinderbloemen*. 33. *Die* groote *Peulen* met een of meer *bokjes* hebben. 34. *Kauwoerde* planten. 35. *Doornige* planten. 36. *Appelplanten*, die kernen van binnen hebben. 37. *Pylaartjes* draagende planten. 38. *Drie*zadige. 39. *Hauw*dragende. 40. *Gapende* of *getronyde* planten. 41. *Wier* bla-

LXII V O O R R E E D E.

bladen ſcherp zyn. 42. *Wervelbloemen*. 43. *Struiken*. 44. *Hegplanten*. 45. *Kransbloemen*. 46. *Veil of Klimopplanten*. 47. *Met gesternde of Stersgewyzebladen*. 48. *By elkander ſtaande bloemen*. 49. *Zamengeſtelde bloemen*. 50. *Katjes*. 51. *Kegelvrugten*. 52. *Vereenigde*. 53. *Ruwe planten*. 54. *Gemengde*. 55. *Vaaren*. 56. *Mosfen*. 57. *Wier*. 58. *Campernoeljes*.

DE Heer CRANTZ in zyne *Institutiones rei herbariæ juxta nutum naturæ digestæ* te Weenen 1766. in II. Deelen in 8vo uitgegeven, ſtelt de navolgende natuurlyke Orders. 1. *Verborgенbloemen*. 2. *Onvolmaakte*. 3. *Zamengeſtelde*. 4. *Grasplanten*. 5. *Palmboomen*. 6. *Lelyplanten*. 7. *Gaapende*. 8. *Vlinderbloemen*. 9. *Kruisbloe-*

bloemen. 10. *Kransbloemen.* 11. *Py-
laartjesdragendebloemen.* 12. *Uit de
Kelk vrugtdragendebloemen.* 13. *Wel-
ker bloemen vrucht draagen.* 14. *Die wei-
nig helmstyltjes hebben.* 15. *Die veel
helmstyltjes hebben.*

DE HEER GUETTARD in zyne *Ob-
servations sur les plantes*, 8vo Paris 1747.
heeft eenige Natuurlyke orders uitge-
dacht van welke verscheiden met boven-
gemelde overeenkomen, hy leid dezel-
ve af van zekere hairtjes en draadjes,
die men op de agterzyde van het bladt
vindt. Zie hier zyne rangschikkingen.
1. *Kampernoeljes.* 2. *Wier.* 3. *Vaa-
ren.* 4. *Mosfen.* 5. *Waterplanten zon-
der draadjes.* 6. *Zulke die het Stengel-
kruid gelyken.* 7. *Lelieplanten.* 8. *Riet-
planten.* 9. *Grasplanten.* 10. *Cuscu-
ta's*

LXIV V O O R R E E D E.

ta's. 11. *Die kliertjes als gersten koornjes hebben.* 12. *Kattestaarten.* 13. *Die puntig uitlopende byhangzelen hebben.* 14. *Vlinderbloemen.* 15. *Met rolronde draadjes.* 16. *Die naar Anemones gelyken.* 17. *Die naar Rozen gelyken.* 18. *Appeldragende.* 19. *die naar zurig gelyken.* 20. *Met enkele kegelagtige draadjes* 21. *Met korte draadjes, en verheven kliertjes.* 22. *Gesternde planten, die naar het kleefkruid gelyken.* 23. *Kransbloemen.* 24. *Radbloemen.* 25. *Sappige planten.* 26. *Met blaasachtige kliertjes.* 27. *Die naar de Tipha gelyken.* 28. *Pylaartjesdragende.* 29. *Kruisbloemen.* 30. *Die na de Malva gelyken.* 31. *Met blaasagtige klierjes, zonder draatjes, en met zwarte tepeltjes.* 32. *Heyplanten.* 33. *Getroonide.* 34. *Kauwoerde planten.* 35. *Met geknoop-*
te

te draadjes. 36. Planten, die naar Angelieren gelyken. 37. Trechtersgewyze planten. 38. Planten die naar Distelbloemen gelyken. 39. Planten met Fleurons. 40. Getongde planten. 41. Ge-
straalde..

UIT deze vier Schetzen der Natuurlyke rangen ziet men, dat'er verscheiden zyn, welke algemeen aangenoomen worden, en hunne kentee-
kens zigbaar met zich draagen, gelyk de *Katjes*, de *Lelie* planten, de *Peuldraagende*, de *Kruisbloemen*, &c.

IN het ryk der Delfstoffen toonen zich de Natuurlyke rangen noch duidelyker, de *Aardens*, de *Steenen*, de *Zouten*, de *Zwavelstoffen*, de *Ertzen*, de *Verfteeninge*n, de *zamen-*

*****

ge-

gegroeide ſteenen toonen hun verband of onderling onderscheid.

INDIEN wy eindelyk onzen Aardbol beſchouwen, als een vaſt ligchaam uit verſcheiden deelen zaamen geſteld, zien wy uit de getuigenis der Heilige Schrift (21), en de Schriften der oude (22), en latere Wysgeeren (23), dat de aarde uit water geboren is, en deze herſchepping van eene vloeibaare ſtoffe tot eene vaſte gaat noch voort, en zal tot in het einde der Eeuwen duuren.

Ik

(21) GEN. I.

(22) THALES ARISTOL. zie *Stanl.* . .

(23) BUFFON *Hift. Nat.* Tom. I. .

(24) LINN. *de increm. tellur.* . RASPE *de globo terraque* p. 23.

V O O R R E E D E. LXVII

IK zal by de Inleiding van het Ryk der Delfstoffen nader onderzoeken, welke de eerste Aarde (*terra primigenia*) zy, en deszelvs veranderingen nagaan. Ik zal hier dierhalven alleen de verscheiden zamenstellen nagaan, in welke het Delfbaare Ryk verdeelt wordt. Zommige onder de Ouden, en Lateren verdeelen dezelve in twee Benden, en gelyk onder de Ouden, ARISTOTELES *Meteorol.* (gestelt zynde, dat dit zyn werk is,) LIBAVIUS *Comment. Metall.* lib. I. EMANUEL MENDEZ DE COSTA *Hist. Nat. of fossils.* Lond. 1757. WALCHIUS *Steinreich* 4to. 1762. LESSER *Litholog.* 1732.

ANDEREN verdeelen dezelve in drie benden, gelyk LACHMUND, *Oryctol.* 1669. LINNÆUS, *Syst. Nat. edit.*

LXVIII V O O R R E E D E.

XII. tom. III. 1768. ARGENSVILLE, *Oryctologie* 1755. Andere met CARDANUS *de Subtilit.* 1664. CAESALPINUS. BECHERUS, *Physic. subterr.* BROWALL, *Catal. rer. cur.* 1698. WALLERIUS, *Mineralogia*, 1747. CRONSTADT, *Versuch einer mineralogie*, 1772. SCOPOLI, *Princip. miner. syst.* 1772. verdeelen dezelve in 4. Benden. Andere in 5. Benden, gelyk AGRICOLA, *de Ortu subterr.* 1657. ENCELIUS, *de Re metallica*, 1551. CALCEOLARIUS, *Mus.* 1622. SCHWENKFELD, *Cat. Plant. & foss. Siles.* 1600. &c. Andere in zes, gelyk IMPERATI, *Hist. Nat.* 1672. BROMEL, *Inleiding*, 1730. HENKEL, *Mineral.* WOLTERS DORF, *Mineral. System.* 1755. JUSTI, *Grundris des Mineral. Reichs.* 1757. VOGEL, *Practisch Mineral. Syst.* 1762. Andere

V O O R R E E D E. LXIX

dere in 7. gelyk de Heer HIERNE, J. J. SCHEUCHZER, *Metereol. & oryctol. Helv.* WOODWARD, *Fossils of all kinds digest.* 1728. J. F. CARTHEUSER, *Elem. Mineral. System.* BAUMER, *Geschichte des Mineral. reichs* 1763.

DE Heer PATRICK BROWNE, in zyne *Natural Hist. of Jamaica*, verdeelt dezelve in agt Benden.

DE Heer VALMONT DE BOMARE, *Mineralogie*, in tien Benden. By de Inleiding van het Delfbaar Ryk, zullen wy deze verdeelingen nader beschouwen.

HET water door de Lucht met Aarde en Zoutdeelen bezwangert, brengt uit deze twee beginzelen de

*****

LXX V O O R R E E D E.

zenden voort, welke een veelhoekige gedaante hebben, doorschynend zyn, een smaak hebben, en weder in water ontbonden worden. Dus heeft men eerst de *Salpeter*, welke aan het zand den oorsprong geeft, het Zeezand, dat een voornaam beginzel der *Kley* is. Het *Natrum*, dat door stolling de Kalk maakt, en het *Aluyn*, dat de Aarddeelen verbindt. --- Uit deze, op verscheiden wyzen zamengesteld, worden, de steenen gebooren.

DE *Aarddeelen* door crystalschieting, bezinking, zuurwording, en verrotting voortgebracht, geeven met Zee-water kley, met regenwater zand.

DE verrottende gewassen geeven Aarde, en verrottende Dieren kalk.

DE

V O O R R E E D E. LXXI

DE *Kley* geeft *Kalk*, die weder in *Asbest* ontbonden, en in *Mica* herbooren wordt.

HET Zand eener Aarde die uit regenwater bezonken, en met *Salpeter* bezwangerd is, komt het naafte aan de *Crystallen*, en maakt de flyp- en molenfteenen, en wordt door ontbinding en weder aangroeiing *Quartz*.

DE *Aarde* der Planten vol *Salpeter*-deelen, word door drukking *Schift*, en wanneer 'er Jodenlym bykomt, *Steenkool*, de *Schift* word in *Oker* ontbonden, uit welke de *Tuffsteen* herfchapen word.

DE *Kalk* is een dierlyke Aarde die uit een Loogzout beftaat, en met

*****

LXXII V O O R R E E D E .

aard- en kleydeelen gemengd *Marmer* maakt; dit door het vuur van zyne verbindende deelen beroofd, wordt het *Kryt*; dit *Kryt* groeit weder zaamen tot een *Key*; deze ontbonden zynde, en gecryftallizeerd, word in *Spath* herſchapen.

WANNEER de Cryſtallen met een Metaalvocht verharden, worden zy edelgeſteentens van verſchillende verwen.

DE *Aluin*, met metaal-deelen gemengd, geeft *Vitriool*; Zwavel by de *Vitriool* komende word *kies*. Deze in poeder ontbonden word metaaloker.

DE *Metaalen* worden uit *Zout*, *Aarde*
de

V O O R R E E D E. LXXIII

de en *Zwavel*, gelyk wy by de Delfstoffen zien zullen, voortgebragt.

ZAND, *Quartz*, *Spath*, Aarde, by elkander komende maaken de gemengde steenen.

Dus hebben wy kortelyk het zamenstel van Dieren, Planten en Delfstoffen beschouwd. En gelyk de Plant-Dieren, de planten aan het Dierenryk verbinden, zoo worden de Delfstoffen door de Steenplanten aan het groeibaar ryk gehegt, en alle de geschappen wezens maaken dus een geheel. Maar dewyl wy alle de schakels noch niet kennen, welke alles onderling zaamen verbinden, is men verplicht eenen anderen weg in te slaan. De Heeren KLEIN, en BRISSON, maak-

LXXIV V O O R R E E D E.

ten derhalven uit de voornaamfte deelen der Dieren kanmerken, welke wy ftraks befchouwen zullen.

NIEMAND egter kwam hier verder in dan de groote LINNÆUS, wiens naam in agting zal blyven, zoo lang men de blyken van Wysheid en Almacht in het gefchapene zal zoeken nategaan; en die *hun bestaan niet hebben in de hersenen van dien Profefor te Upsal, die de geheele Natuur ziet in een klein Steedje van Zweeden*, gelyk zeker Schryver voor een aardigheid opgeeft (25).

DIT

(25) DIT zyn de woorden van een Schryver die zich noemt *Advocaat der Vaderlandsche Kerk*, II. Stuk bl. 86. een Werk met een oproerigen geeft, in een winderigen ftyl zamengeftelt, om de

VOORREDE. LXXV

DE Heer KLEIN, *Secretaris te Dantzig*, heeft in de Voorrede van
zyne

de gemoederen van wederzyden te verbitteren, het *Odium Theologicum* aan te blaazen, en zig, gelyk *Hierostratus*, te vereeuwigen, door het verbranden van den Tempel. Ondertuffchen gelieve die waanwyze Schryver te weten, voor eerst, dat 'er zulke nagtmenschen zyn als *Lineus* opgeeft, de *Chacralas*, namentlyk of witte Mooren; dat MAUPERTUISEN VOLTAIRE dezelve gezien hebben en, ik 'er een dergelyke in 1747. in Zeeland zag.

— Het tweede Deel van zyn *Bon Mot*, is even zoo onwaar, want LINNAEUS, heeft de Natuur niet *Upsal* in gezien, maar geheel Europa door; hy heeft dezelve gezien uit de berigten van elf van zyn Leerlingen, uit daagelyksche berigten van alle Geleerden, en heeft nooit zyne stellingen, waare of valsche in de nieuws papieren als egt laten uitventen; maar noch LINNAEUS, noch BURMANNUS, zullen hunne achting verliezen, by zulke die hunne verdiensten kennen en waardeeren, en zich aan geen aardigheden, ten hunnen koste verzonnen, stooren. *Sapientes eruditos autem se maligno dente rodere, equidem,*

non

LXXVI V O O R R E E D E.

zynen *Historie avium prodromus*, welke te *Lubek*, 1759. in 4to het ligt zag, de Viervoetigen in drie rangen verdeelt, namelyk in *Hairige gehoefde*, in *Hairige gevingerde*, en in zulke die de *Huid kaal hebben*, de eerste rang is in vyf gezinnen verdeelt.

I. MET eene enkele hoef aan den poot.

II. Met twee hoeven.

III.

non invideo, sed miror magis: zegt LINNAEUS *Syst.* XII. tom. III. in de Voorrede. Omtrent den Heer BURMAN, heeft de *Advokaat* ook verscheidene aardigheden van zyne vinding. Uitmuntende belezendheid, zonder oordeel, door een krakeel zugtigen, en onbezonnen geest aangevoerd, is het beste middel, om Theologische twisten levendig te houden; en dat doet de *Advocaat* meesterlyk. *Hic niger est, hunc tu Batave cave-
te.*

V O O R R E E D E. LXXVII

III. MET drie hoeven.

IV. MET vier hoeven.

V. MET vyf hoeven.

II. Hairige en gevingerde.

I. MET twee Vingeren.

II. MET drie Vingeren.

III. MET vier Vingeren.

IV. MET vyf Vingeren.

V. MET vyf Vingeren, die door
een vlies zaamen verbonden
zyn.

III. Kaal van Huid.

I. Schildraagende.

II. Geharnafte naakte.

III. Naakte.

DE

LXXVIII V O O R R E E D E.

DE Heer BRISSON, voorheen op-
zigter van het Cabinet, den den Heer
de REAUMUR, gaf in het jaar 1756.
zyn *Regnum Animale* uit, en verdeelt
zelve in XVIII. rangen.

I. VIERVOETIGE Dieren zonder tan-
den.

II. _____, die alleen
kiestanden
hebben.

III. _____, die kies
en honds
tan den
hebben.

IV. _____, die geen
voortanden
in

in de boven
kaak heb-
ben, en in
de onder-
kaak zes.

V. VIERVUETIGE DIEREN, die geen
tanden in
de boven
kaak heb-
ben, en *acht*
in de onder
kaak.

VI. —————, die in bei-
de Kaak-
beenderen
fnyttanden
hebben, en
geheele
hoeven.

VII.

VII. VIervoetige Dieren, die in beide kaakbeenderen snytanden hebben, en gespleeten hoeven.

VIII. —————, die in de beide kaakbeenderen snytanden hebben, en drie hoeven.

IX. —————, die in beide kaakbeenderen twee snytanden

tanden
hebben, en
vier hoe-
ven, aan de
voor- en
drie aan de
agter- voe-
ten.

X. VIERSVOETIGE DIEREN, die in bei-
de Kaak-
beenderen
tien voor-
tanden heb-
ben, en vier
hoeven aan
de voor- en
drie aan de
agtervoe-
ten.

I. Deel. I. Stuk. *****

XI.

LXXXII V O O R R E E D E.

XI. **VIERVOETIGE DIEREN**, die voortanden hebben aan beide kaakbeenderen en vierhoeven.

XII. _____, die twee voortanden hebben, en de voeten met nagels.

XIII. _____, die vier voortanden hebben aan yder kaakbeen, en de voeten met nagels.

XIV.

V O O R R E E D E. LXXXIII

XIV. VIERVOETIGE DIEREN, die vier
voortan-
den hebben
aan de bo-
ven- en
zes aan de
onderkaak,
de voeten
genageld.

XV. —————, die zes
voortan-
den van
boven en
vier van on-
der hebben,
de pooten
genageld.

XVI. —————, die zes
voortan-
den van
boven en
vier van on-
der hebben,
de pooten
genageld.

LXXXIV V O O R R E E D E.

voortanden
aan yder
kaakbeen
hebben, en
de voeten
genageld.

XVII. —————, die zes
voortanden
van boven
en acht van
onder heb-
ben, de
voeten ge-
nageld.

XVIII. —————, die tien
voortan-
den van
boven
en

en acht
van on-
der heb-
ben, de
voeten
gena-
geld.

DE Heer DE BUFFON in zyne be-
kende *Histoire Naturelle, Generale en
particuliere*, maakt eene andere rang-
schikking: Hy verdeelt de Viervoeti-
gen, in zulke, die aan de oude
Waereld behooren, die alleen in
America gevonden worden, en die
tot beide behooren.

TOT de Oude Waereld behooren.

I. DE *Gehoefde*, het *Paard*, de
Zebra, de *Ezel*.

* * * * *

3

II.

LXXXVI V O O R R E E D E.

II. DIE *Gespleeten hoeven en holle Hoornen* hebben, de *Os*, de *Buffel*.

III. HET groote gezin der kleine gespleeten hoeven met holle hoornen, de *Schapen*, *Bokken*, en *Hartebokken*, &c.

IV. MET gevulde hoornen, die afvallen; de *Eland*, het *Hart*, de *Rhee*, de *Rheebok*, het *Bengaalsch Hart*.

V. MET halfgekloofde hoeven, het *Varken* met alle zyne soorten.

VI. HET groote gezin der verscheurende Dieren, met nagelen, die zy kunnen intrekken. De *Panther*, *Luypaard*.

VII.

VII. VERSCHEURENDE Dieren met vaste nagelen, de *Wolf*, de *Vos*, de *Jakbals*, de *Hond*.

VIII. _____ met vaste nagelen, en een zak by den Aars de *Ngama*, *Civetkat*, *Genette*, *Das*.

IX. _____ met een verlengd lichaam, vyf nagelen aan yder voet, de duim afgezonderd, het *Fret*, de *Marter*, de *Wezel*.

X. HET groote gezin van genagelde, die twee snytanden aan yder kaak hebben, en geen stekels op het ligchaam, *Haazen*, *Konynen*, *Eekboornen*, *Ratten*, &c.

LXXXVIII V O O R R E E D E.

XI. GENAGELDE met stekels, de *Stekel-*, en *Tzervarkens*.

XII. ————— met schubben, de *Schubbaagdisch*.

XIII. —————, die in 't water, en op het Land leeven, de *Otter*, de *Be-ver*, de *Zeehond*, de *Walrus*.

XIV. DE vierhandige *Aapen*, *Ba-viaanen*, *Meerkatten*, *Spookdieren*.

XV. DE vliegende genagelde, de *Vledermuis*.

BEHALVEN deze stelt de Heer de BUFFON negen geslachten die alleen staan: De *Olyphant*, de *Rhinoceros*,
het

V O O R R E E D E. LXXXIX

het *Rivierpaard*, de *Kameel*, de *Leeuw*,
de *Tyger*, de *Beer*, de *Mol*.

TOT de nieuwe Waereld behooren.

I. DE kleine *Aapjes*, *Sapajous*.

II. DE kleine *Aapjes* met grypstaarten, *Sagouins*. Deze behooren tot den veertienden rang.

III. DE *Philander* en *Langschenkel*. Deze behooren tot den negenden rang.

IV. DE *Bergkat*, *Couguar*, *Bizamkat*. Deze behooren tot den Zesden rang.

V. DE *Coati's*, deze behooren tot den Zevenden rang.

***** 5

VI.

VI. DE *Wezels*, deze behooren tot den Negende rang.

VII. DE *Agouti*, *Paca*, enz. deze behooren tot den Tienden rang.

VIII. DE *Schildvarkens*. Deze behooren tot den Twaalfden Rang.

IX. DE *Miereeters*, deze behooren tot den Agtsten rang.

X. DE *Luyaards*.

DE groote LINNÆUS gaf in 1767. zyn *Systema Naturæ*, ten twaalfden maale uit, en verdeeld in het zelve de viervoetige in zes Benden.

I. DE *Primates* of Dieren, die vrug
ten

ten kaauwen, en de borsten aan de borst hebben.

II. DE *Bruta* of Dieren zonder voortanden; en die de spys met het verhemelte drukken.

III. DE Verfcheurende Dieren, *Feræ*.

IV. DE Knaagende Dieren, *Glires*.

V. DE Herkaauwende Dieren, *Pecora*, met gespleeten hoeven.

VI. De Gehoefde.

By deze voegt de Heer LINNÆUS, de *Walviffchen*, om dat zy in innerlyk zamenftel, voortteeling en
voe-

xcii V O O R R E E D E.

voeding der jongen, met de viervoetigen overeenkomen.

DIT zamenstel van den Heer LINNÆUS, byna door het geheele geleerd *Europa* aangenomen, wierd het onderwerp, en als het waare den inslag van een groot werk, dat de Heer HOUTTUYN in het jaar 1757. begon uit te geven; en thans het geheele Dieren Ryk bevat; in 16. Deelen in groot 8vo. Een Werk zekerlyk van eenen grooten arbeid, maar voor eerst, volgt de Heer HOUTTUYN alleen LINNÆUS, zonder 'er veele andere soorten by te voegen; die hy echter in BUFFON, en andere Schryvers hadde kunnen vinden, als ook in de *Amsterdamsche* Cabinetten der Liefhebberen. Daar by liet de uitgestrektheid van

van zyn Werk hem niet toe, om overal dat oordeel te gebruiken dat 'er nodig is, in zulke eene onderneeming. Verscheide stukken spreken elkander vlak tegen. Ik zoude meer aanmerkingen op dit Werk kunnen maaken; maar dewyl zulks zoude schynen voor te koomen uit een geest van wraakzucht, over de onheusche behandeling, my in zyn XIV. Deel. op meer dan eene plaats aangedaan, (in welke ik egter met de Heeren LINNÆUS, PALLAS, VAN PHELSUM, MARTINET, BASTER, in verscheide andere deele), stap ik hier lieft van af.

DOCH het Werk van den Heer HOUTTUYN te lang zynde om agter een geleezen te worden, nam ik voor om enkel de Geslagten, en korte beschry-

schryvingen der soorten in het licht te geven, en 'er alle die by te voegen, welke in het zamenstel van den Heer LINNÆUS niet gevonden worden, ook heb ik 'er alle de bynaamen (*Synonyma*) van alle andere Schryvers afgelaaten. Ik heb geene Schryvers ontrent de viervoetige Dieren aangehaalt, dan de Heeren BUFFON, en EDWARDS, als by welke de beste afbeeldingen te vinden zyn. Door het beloop van het geheele Werk heb ik zulke den voorrang gegeven, die goede, en gecoleurde afbeeldingen geeven, van welke men de Naamlyst voor yder Bende vinden zal.

Ik heb de Geslagtmerken by zommigen vermeerderd.

IN de Behandeling der Vogelen heb ik my aan de Heeren D'AUBENTON, en BUFFON, EDWARDS, CATESBY, VOSMAER, BRISSON, en ALBIN, daar hy goed is, gehouden.

IN de Insecten heb ik REAUMUR, DE GEER, VOET, DRURY, SEPP, SCHAEFFER, ROESEL, en *Jussr.* MERIAN gevolgt.

ALLE de nieuwe soorten heb ik van PALLAS, en BUFFON, en anderen ontleend, of uit de Cabinetten van de Heeren BURMANNUS, Vader en Zoon, van de Heeren VANDER MEULEN, P. CRAMER te Amsterdam, en J. JULIANES, kundig Apotheker, en kenner der Natuurlyke Historie alhier; en voor de Insecten, de schoone ver-
za-

zameling van den Hooggeleerden Heer P. LUCHTMANS Hoogleraar in de *Ontleed en Heelkunde* op dit *Hoogeschool*, en de schoone Verzameling van Plantdieren van den Hooggeleerden Heer J. D. HAHN, *Hoogleeraar in de Natuur-schei- en Kruidkunde* alhier. Aan de geachte vriendschap van deze begunstigers myner oeffeningen is dit Werk zynen oorsprong verschuldigt.

DE by LINNÆUS niet beschreeven soorten heb ik met A. B. &c. onderscheiden. Onder de geslagten heb ik, op het voetspoor van den Heer PALLAS, het schoone geslacht de *Hartebokken* ingevoegt; en gaarne had ik de *Cavia's* van de Muizen afgescheiden, en tot een byzonder geslacht gemaakt,
door

door PALLAS, volgens de Natuur de-
 zer Dieren aangezet, maar dus voort-
 gaande, zoude ik onder de Vogelen,
 Tweeſlagtige en Viſſchen, geheele ge-
 ſlachten hebben moeten ſcheuren, en
 dus zoude het een geheel nieuw Werk
 geworden zyn, het geen myn oog-
 merk niet was, als alleen bedoelende
 een kort begrip van het zamenſtel der
 Natuur van LINNÆUS te geeven.

EGTER heb ik het gewaagd eene
 nieuwe rangſchikking van *Slangen* en
Haagdviſchen voor te ſtellen, om daar
 door de zoo laſtige als onſtandvaſtige
 telling der ſchubben voor te komen,
 welke men voor de optelling der zoor-
 ten dezer Dieren vinden zal; en wel-
 ke ik aan het oordeel der kenners on-
 derwerpe; verre van dat ik onverſchil-
 I. Deel. I. Stuk.   * * * * *   lig

XCVIII V O O R R E E D E.

lig zoude zyn, aan het oordeel van kundige vernuften, onderwerp ik gaarne myne werken aan hunne geleerde aanmerkingen; welke ik, met kundigheid en bescheidenheid voorgesteld, in dank zal aanneemen; doch op bitze en scherpe verwytingen, heb ik reeds getoond niet te zullen antwoorden.

ALLE de nieuwe soorten, welke ik by die van den Heer LINNÆUS gevoegd heb, heb ik met A. B. geteekend. By veele geslachten heb ik breeder kenmerken gevoegd.

OMTRENT de Planten heb ik het zelve in agt genoomen, en alleen by yder soort, een Schryver, en zoo veel my mogelyk was een gecoleurde af-

afbeelding aangehaald; en hier ontrent moet ik wederom de gulle vriendschap van de Heeren BURMANNUS, en den Heer HAHN erkennen, als die my niet alleen den vrijen toegang tot de Amsterdamsche en Utrechtsche Kruidtuyn gulhartig verleenen, maar ook met hunne uitgebreide kennissen te hulp koomen.

Ik heb liever verkooren dit Werkje stuksgewyze uittegeeven, wyl ik dus gelegendheid heb, om de my naderhand, noch ter hand koomende zoorten, gevoeglyker agter yder Benden te kunnen plaatsén. Ik heb vooral zorg gedraagen, om in de aanhalingen getrouw te zyn en 'er geen aangehaald, die ik niet zelve heb nagezien. En de Dieren welke ik of levend, of

c V O O R R E E D E.

in de Verzamelingen gezien heb, met een * geteekend. De aanhalingen van den Heer BUFFON zyn alle volgens den Amsterdamschen Druk door den Heer SCHNEIDER vervaardigt.

INDIEN dit Werk het geluk heeft van de goedkeuring van kundige liefhebbers weg te draagen, tot vermeer- ring van de kennis der Natuurlyke His- torie te dienen, en voor al den groo- ten maker in zyne onnaspeurlyke wys- heid, almacht en goedheid te doen kennen, zal ik dezen arbeid, genoeg- zaam beloond agten.

P. BODDAERT.

UTRECHT
den 19. September
1772.

ZOO-

Z O O G E N D E
D I E R E N.

MET VOORTANDEN EN SNY-
TANDEN, DE VIER BOVEN-
STE EVENWYDIG, TWEE
MAMMEN AAN DE BORST.

I. MENSCH

- (a) MET een breed plat aangezicht, op-
gewipte platte neus, groote mond,
verheven kaakbeenderen, dikke lip-
pen, zwart hair en bruin vel, klein

I. MENSCH

van postuur; de *Laplanders*, *Muscoviten*, inwoonders van *Nova Zembla*, *Borandianen*, *Samojeden*, *Noordsche Tartaren*, *Groenlanders*, *Esquimaux*.

(b) Groote welgemaakte menschen met blaauwe of bruine oogen, lang, blond of castanje bruin hair dat kruld. De *Finnen*, *Gottchen*, *Deenen*, *Zweeden*, *Futen*, *Russen*; de wilden van *Canada*.

(c) Mensch met een breed gerimpeld voorhoofd, korte neus, plat aangezicht, kleine ingezonken oogen, een lange smalle vooruitstekende kin, zwart hair, de *Asiatische Tartaren* van *Rusland* tot aan *Kamschatka*, langs de *Wolga*, langs de grenzen *China*, *Boutan*, *Ava*, de *Calmukken*, de *Krim*.

(d) Mensch, die wel gemaakt, dik is, met een breedrondaangezicht, kleine oogen, groote wenkbraauwen, eene kleine platte neus, yle baard, bruin van vel. De *Chineezzen*, *Japen-*

DSI

I. MENSCH

ponneezen, Siammers, Peguanen, Aracaners.

(e) Mensch die blank en blond is, zwak van gezicht, met een roode oogappel, en die by dag slaapt en 'snachts leeft (*).

(f) Mensch die bruin zwart is, met zwart neerhangend hair, groote oogen, en breede wenkbraauwen. *Javaanen, Maleyers, enz.*

(g) Mensch die taankleurig is, welgemaakt, het hoofd klein, het aangezicht eirond, het voorhoofd plat, roode lippen, zwarte tanden, woond in de *Philippynsche Eilanden*.

(h) Mensch die zeer groot is, met een dikke neus, groote oogen, lang
zwart

(*) Dit is een Nacht-mensch van LINNÆUS, welke op het Eiland *Java* woond, en van alle andere bekende Volkeren onderscheiden is, en wiens bestaan door den *Advocaat der Vaderlandsche Kerk* gelochend word. Zie myne Aanmerking in de Voorrede.

I. MENSCH

zwart hair, een lang aangezicht,
een woest gezicht; woond in de *Ladrones*.

(i) Mensch die geheel zwart is, met een
mager onaangenaam gezicht, de
Vrouwen hangende borsten; woond
in de *Papous Eilanden*.

(k) Mensch die zwart is, met een rond
hoofd, platte neus en gekroeft hair;
woond in *Guinea*.

(l) Mensch die olyfcoleurig is met een
kort lyf en lange dyen en beenen.
De *Mongollers*.

(m) Mensch, die zwartachtig is, met
groote breede ooren, zwart regt
hangend hair, woond in *Ceylon*.

(n) Mensch, die afch coleurig is, met
zwart hair, woond in *Guzuratte*,
Combaya, *Goa*.

De verdere zoorten van Menschen als *Persianen*;
Ara

biers, Turken, Europeërs, uit vermenging van verscheiden Volkeren gebooren, kunnen tot geene vaste soorten gebragt worden. Zie over deze alle breeder BUFF. *Hist. Nat. Tom. III. pag. 146*
— 203.

II. DE AAP (SIMIA.) Vier digt by elkander ftaan-
de Voortanden.

De Snytanden alleen staan-
de, lang, viernaar agter.
De Kiezen stomp.
De Voeten als Handen,
de Nagels rond of krom.

a *Geen Staart. Aapen.*

Bosmensch. (1) AAP zonder Staart roestverwig,
(*Satyrus*) met het hair der Armen naar
boven gekeerdt *, *Pongo*
BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIV.
tab. I.

β. The man of woods EDW. *Glean.*
I. p. 6. tab. 215.

γ. Singe sans queue BUFF. *Hist.*
Nat. tom. XIV. tab. 2.

Sylvanus. (2) AAP zonder Staart met naakte billen, en een rondagtige kop.

b Pitheque BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIV. p. 38.

Woond in Klein Afien, Arabien, Hoog Egypten, en in het geheele Noordelyke deel van Africa.

Langarm (A) AAP, zonder staart met naakte billen, een baard en zeer

(*Lar*) lange armen. *Gibbon* BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIV. pag. 41. tab. 2. 3.

Woond in Malacca, Madagafcar. de Moluccos.

Spook (3) AAP zonder staart met naakte billen, en langwerpige kop *.

(*Inuus*) *Magot.* BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIV. pag. 150. tab. 7. 8.

b *Eene korte staart.*

Baviaanen.

Verkens (4) AAP, die halfgestaard en gryns is, met eene kleine baard, bruine oogkringen, en naakte billen.

Staartje (*Nemestrina*)

The Pigtailed Monkie Edw. *Glean.* tab.

tab. 14. *Maimon. BUFF. Hist. Nat.* tom. XIV. pag. 84. tab. 19.
Woond in Sumatra.

Apedia. 5. AAP, die half gestaart is, met den
duim digt aan de vingeren,
lange nagels, die van den
duim rond, en hairige billen.
Woond in Indien.

Baviaan. 6 AAP, die half gestaart is met scher-
(*Sphinx*) pe nagels, en naakte billen*.
Babouin *BUFF. Hist. Nat.*
tom. XIV. pag. 64. tab. 13, 14.
Woond aan de Caap.
c *Met een lange staart.*
Meerkatten.

Maimon. 7. AAP, met een lange staart, een
baard, blaauwe gestreepte
kaaken*.
Mandrill *BUFF. Hist. Nat.*
tom. XIV. pag. 713, tab. 16. 17.
Woond aan de Goudkust en
verder in Zuid Africa.

Boschduivel. 8. AAP, die grys is met hairigen oo-
ren,

(Hamadryas)

ren, fcherpe nagelen, en
billen.*Macaque* BUFF. *Hift. Nat.*
tom. XIV. pag. 91. tab. 20.Oudmannet. 9. Aap, met een lange ftaart, wit met
je. eenen zwaarten baard *.

(Veter)

Lowando BUFF. *Hift. Nat.* tom.
XIV. pag. 81.
Woond in Ceilon.

Silenus

10. Aap, die zwart is, met eene lan-
ge witte baard *.*Ouanderou* BUFF. *Hift. Nat.*
tom. XIV. pag. 81.

Woond in Ceylon.

NB. Deze is eene verfcheiden-
heid der voorige.

Fanus

11. GESTAARTE gebaarde Aap, met
een kwasje aan den ftaart.*Malbrouk* BUFF. *Hift. Nat.*
tom. XIV. pag. 108. tab. 29.

Woond in Guzarate.

Belzebul.

18. ————— gebaarde Aap, met
eene grypftaart, en bruine
voeten *.*Oua.*

Ouarine, BUFF. *Hift. Nat.*
tom. XIV. p. 156.
Woond in Brafil.

Patas

(B) GESTAARTE Aap, met eene platte kruin, en een witte band boven de oogen.

Patas; BUFF. *Hift. Nat.* tom. p. 100. tab. 25.

β. ——— met een zwarte band boven de Oogen. ID. IBID. tab. 26.

Woond aan de Senegal.

Gryfaard

13. ———, gebaarde Aap, die ros is met een grypstaart.

Alouatte, BUFF. *Hift. Nat.* tom. XIV. p. 156.

Woond in Brafil en Curaçao.

Slingeraap.

14. ——— ongebaarde Aap, die zwart is, met een grypstaart, de handen zonder duimen*.

(*Paniscus*)

Coaita, BUFF. *Hift. Nat.* tom. XIV. pag. 161. tab. 42.

Slin-

Slingeraap of Boschduivel.
Vosm. *Beschryv.*

Woond in Zuid America.

Cynomolgos. 15. Aap zonder baard, met breede
Neusgaten, een kromme
staart en naakte billen.
Woond in Africa.

Hondenkop 16. Aap met een lange staart, geel-
(*Cynocephalus*) agtig, met een uitsteekende
bek, een regte staart, naak-
te billen.
Woond in Africa.

DIANA 17. GEBAAARDE, gestaarte Aap, met
een getopte baard en voor-
hoofd.
Exquima, BUFF. *Hist. Nat.*
tom. XIV. 161.
Woond in Guinea.

Schoonhairi- 11. Aap, met een lange staart, zon-
ge der baard, geelagtig van
(*Sabaea*) lyf, met lange witte hai-
re aan de kaaken.
Aapje van St. Jago EDW.
Glean. 1. tab. 215.

Ca-

Callitriche, BUFF. *Hist. Nat.*
tom. XIV. p. 133. tab. 37.

Aap van Ma- 19. AAP, met een lange staart en ge-
dagascar baarde kaaken, een geelag-
(*Ciphus*) tige kruin, zwartepooten
en de staart aan 't eind roest
coleurig.

Mangabey à collier blanc BUFF.
Hist. Nat. tom. XIV. pag.
119. tab. 32. 33.

Woond in Madagascar.

Huppelaar 20. AAP, met een lange staart, op-
(*Tripida*) staand hoofdhaar, blaauwe
pooten, en eene ruyge
grypstaart.

Woond in Suriname.

Aigret Aap 21. AAP, met eene lange staart byna
(*Aigula*) geen baard, een in de
lengte loopende opstaande
Hairbosch op het Hoofd.

Aigrette, BUFF. *Hist. Nat.*
tom. XIV. p. 19. tab. 21.

Woond in Oost-Indien.

Sifac (C) GESTAARTE ongebaarde Aap met
(*Nimacus*) hairige kaaken, en een witte staart.

LINN. *Mantiff. alt.* p. 521.

Douc, BUFF. *Hift. Nat.*

Tom. XIV. tab. 41.

Woond. . . .

Kroonaapje (D) ——— ongebaarde Aap, met
(*Senica*) het hair van de kruin
straalsgewyze plat leggende.

LINN. *Mantiff. alt.* 521.

Bonnet Chinois. BUFF. *Hift.*

Nat. tom. XIV. pag. tab. 30.

Woond in de Ooft-Indien,

Roodbek (E) ——— ongebaarde witagtige
(*Argentata.*) Aap, met een rood aangezicht, en caftanie bruine
staart.

Mico, BUFF. *Hift. Nat.*

tom. XIV. tab. 28.

Saki 22. ——— ongebaarde Aap, die
(*Pithecia*) zwart is met witte puntjes
op de haitjes, met eene
zwarte

zwarte zeer ruige staart *.

Saki, BUFF. *Hist. Nat.* XIV,

pag. 198. tab. 53.

Woond in America.

Knikkebol
(*Nictitans*.)

23. GESTAARTE ongebaarde Aap die
zwart hair heeft met bleeke
puntjes, een witten eus, een
zeer korte duim, en hairige
billen.

Woond in Guinea.

Witneus

(F) ——— gebaarde Aap, uit o-
lyfgroen en zwart gemen-
geld, met een bruine bek,
en witte eus.

Blancnez, ALLAMAND by

BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIV.

pag. 141. tab. 59.

Woond in Guinea.

Witlip

(G) ——— kort gebaarde Aap,
met hairige ooren, en een
sneuwitte bovenlip.

Mouftac, BUFF. *Hist. Nat.*

tom. XIV. pag. 139. tab. 39.

Woond in Guinea.

Sagouintje 24. GESTAARTE Aap, met ruige wyd
(*Jacokus.*) openstaande ooren, een zeer
ruige staart, elsgewyze na-
gelen, die van den duim
rond *.

Ouistiti, BUFF. *Hist. Nat.*
tom. XIV. pag. 202. tab. 55.
Cogui EDW. *Glean.* I. tab. 218.
Woond in America.

a *Musius* Aapje, met brui-
ne banden. BRISS. 202.
Saimin, BUFF. *Hist. Nat.*
tom. XIV. pag. 189.
tab. 51.

Woond in America.

Leuwen 25. ——— gebaarde Aap, met
aapje afhangend hair, een roode
(*Oedipus.*) staart, en elsgewyze nagelen*.

The little 'Lion, Monkey.
EDW. *Birds* IV. tab. 195.
Pinche, BUFF. *Hist. Nat.*
tom. XIV. pag. 111. tab. 58.
Woond in America.

Ruighals. 26. ——— ongebaarde Aap, met
(*Rosalia.*) een haarig hoofd, de om-
trek

trek van het aangezicht donkerrood.

Marikina, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIV. pag. 209. tab. 57.
Woond in America.

Geelpoot 27. GESTAARTE ongebaarde Aap, met
(*Midas.*) de bovenste lip gespleeten,
naakte vierkante ooren, en
elsgewyze nagelen *.

Tamarin, BUFF. *Hist. Nat.* Tom. XIV. p. 200 tab. 54.
The little black Monkie, EDW. *Glean.* tab. 196.
Woond in America.

Roloway (H) ——— gebaarde Aap, die
zwart is, van onder wit, met
twee hairige afhangende
vellen aan den hals, als de
tippen van een halsdoek *.

Palatine, ALLAMAND by
BUFF. *Hist. Nat.* tom. XV.
pag. 77. tab. 13.
Woond in Guinea.

Gekje 28. ——— ongebaarde Aap, met
(*Fatuellus.*) een grypsaart, twee hair-
B 2 boschjes,

bofchjes, als hoorntjes op
het hoofd.

Woond in Brafil.

Deze is eene verfcheidenheid van n. 30.

Sim
(*Apella.*)

29. GESTAARTE ongebaarde Aap, met
byna een grypftaart, een
bruin ligchaam, zwarte poo-
ten, en hairige billen.

Sajou brun, BUFF. *Hift. Nat.*
tom. XIV. p. 173. tab. 45.

Woond in Fernambuco.

Capucyn
(*Capucina.*)

30. ————— ongebaarde Aap, die
bruin is met een ruige gryp-
ftaart, de kruin en leden
zwart.

Sajou, BUFF. *Hift. Nat.* tom.
XIV. pag. 179. tab. 48. EDW.

Glean. tab. 222. *Fluiter* VOSM.

Befchryv. tab. 7.

Woond in Brafil.

Chineefchje 1. ————— gebaarde Aap, uit
geelgroen, en zwart gemeen-
geld, de kaaken hairig, de
ooren

ooren en voetzoolen zwart.
Talapoin, BUFF. *Hist. Nat.*
 Tom. XIV. pag. 143. tab. 60.
 Woond in America.

Samine

31. GESTAARTE ongebaarde Aap, met
 een uitsteekend agterhoofd,
 billen, en vier elsgewyze
 nagels *.

Saimiri, BUFF. *Hist. Nat.*
 tom. XIV. p. 188. tab. 51.
 Woond in Guajana.

III. SPOOKDIER (LEMUR.) IV. *Boven voortanden*,
 de middelste ver-
 wydert.

VI. *Onder voortanden*,
 die lang, plat,
 evenwydig, en
 dicht by elkander
 staan.

DE *bondstanden* dicht
 by elkander, van
 de voortanden en
 kiezen verwydert.

B 3

Veel

Veel kiezen die
als gekwabd zyn,
de voorfte langen
puntig.
De kop rond, de
bek langagtig.

Traagloper 1. SPOOKDIER zonder ftaart *. SEBA
van Ceilon. I. tab. 35. fig. 1. 2.
(*Tardigradus*.) *Loris*, BUFF. tom. XIII. pag.
III. tab. 31.
Woond in Ceilon.

Mongoz 2. ——— dat grys is met een ko-
leurige ftaart.
Mongous, BUFF. *Hift. Nat.*
tom. XIII. pag. 92. tab. 27.
a *Mongous*, EDW. *Glean.* I.
p. 12. tab. 216.
b *Pitiv. gazoph.* tab. 17. fig. 5.
c *Brisf. Quadr.* 221.

Maki 3. ——— met eenzwarte ftaart,
(*Macaco*.) de hals met lange hairen. *The*
black Maucanas EDW. *Glean.*
fig.

fig. 13. tab. 217. *Vari*, BUFFON, *Hist. Nat.* tom. XIII. tab. 28.

Woond in Oost-Indien.

Catta
(Inkboorn-
aapje.)

4. SPOOKDIER met een staart, die wit en zwart geringd is *. *Moco-co*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIII. tab. 23.

Woond in Oost-Indien.

Vliegend

5. ——— met een staart, door een vlies rontsom het lyf, vliegende.

Vliegende Kat van Ternate
Tab. I. pag. 93. tab. 58.

IV. VLEDERMUIS, Een groot hoofd, wyde bek, de voorvoeten gepalmd, een vlies om het ligchaam.

Vliegende
hond van

1. VLEDERMUIS zonder staart, met een eenvoudige neus, het

B 4

vlies

Ternate.
(*Vampyrus*.)

vlies tuffchen de dyen gescheiden *.

Rousfette, BUFF. *Hift. Nat.*
tom. X. pag. 25. tab. 14.
Woond in de Moluccos.

Vliegende
hond van
Nieuw Span-
je.
(*Spectrum*.)

2. VLEDERMUIS zonder ftaart, treg-
ters gewyze neus, met een
blaadje *.

Vampyre, BUFF. *Hift. Nat.*
tom. X. p. 25.
Woond in America.

Gebrilde
(*Perspicilla-*
tus.)

3. ——— zonder ftaart, de neus
met een plat fcherp blaadje *.
Edw. *Birds*. 201.
Woond in America.

Spook
(*Spasma*.)

3. ——— zonder ftaart, met
een neus met een hantsge-
wys blaadje.

Piekdrager (A) ——— zonder ftaart, met
een klaverblad op de neus *.
Fer de Lance, BUFF. *Hift.*
Nat.

Woond in America.

Ge-

Vliegende (B) GESTAARTE Vledermuis, met hangende wangen en ooren *.
 Dog
 (*Moloffius.*) Woond in Indien.

Grootkop (C) ————— Vledermuis, met een ronde kop, slangtrekkende tregtersgewyze neusgaaften *. *Dierk Mengel.* I. Deel 2de Stuk.
 Woond in de Moluccos.

Kirwonba (D) ——— Vledermuis, met een klein neusje, puntige ooren, en een gestreept vlies *.
 PALL. *Specil. Zool.* fasc. 3. p. 7.
 Woond in Ceilon.

Vliegende (E) ——— Vledermuis, met een Spitsmuis lange uitsteekende bek, een blaadje op de neus, en een uithangende tong *. *Dierkundig Mengelw.* I Deel. 1ste stuk.

Vliegende (F) ——— Vledermuis, met een Marmot verlengd hoofd, een breede dikke bek, en nauwlyks zichtbaare staart.

Woond in Indien.

Vliegende (G) GESTAARTE Vledermuis, met een
 Muis   zeer dikke bek, lange lip-
                               pen, ronde ooren, die elkan-
                               der van agter raaken.
                               BUFF. *Hist. Nat.* tom. X. p.
                               39. tab. 20. *Mulot volant Mem.*
                               de l'Acad. des Sciences 1759.

Groefneus. (H) GESTAARTE Vledermuis, met een
                               voorhoofd, de neus door een
                               groef gescheiden. BUFF. *ibid.*
                               fig. 2.

Het Uiltje (I) VLEDERMUIS die ros is, met zeer
                               breede ooren.
                               Noctule, BUFF. *Hist. Nat.* tom.
                               VIII. tab. 18.
                               Woond in Frankryk.

Avondvlie. (K) VLEDERMUIS met korte ooren,
 ger   en een zwart vlies. *ibidem.*
                               Woond in Frankryk.

Diklip. (L) ——— met de boven lip
                               gezwollen, en een ruig voor-
                               hoofd. *Pipistrilla*. BUFF. *Hist.*
                               Nat. tom. VIII. tab. 19.
                               Woond in Frankryk.

VLE-

Trompet- (M) VLEDERMUIS met opgeblazen
ter. .. wangen, een korte bek, de
oogen na by de ooren. *Bar-*
bastella, Buff. *Hift. Nat.* tom.
VIII. tab. 19.
Woond in Frankryk.

Hoefzyer (N) VLEDERMUIS, met eene half
maansgewyze rand om bek
en lippen, en een gekrulde
neus. *Fer à cheval*, Buff.
Hift. Nat. tom. VIII. tab. 20.

Geoorde 5. GESTAARTE Vledermuis, met een
(*Auritus.*) eenvoudige neus en bek,
dubbele ooren, die grooter
dan het hoofd zyn *. Buff.
Hift. Nat. tom. VIII. tab. 16.
Woond in Europa.

Gemeene 6. ———— Vledermuis, met een
(*Murinus.*) eenvoudige neus, en kleine
ooren.
Woond in Europa.

II. ZONDER VOORTANDEN.

V. OLYPHANT, Geen voortanden.

De bovenste snytanden lang,
krom, en kegelagtig.

Een lange *Snuif*, waar mede hy
grypt.

[Groote hangende Ooren.

Dikke pooten, het Lyf byna
naakt.]

I. Olyphant. * BUFF. *Hift. Nat.* tom. XI. p. 1. tab. 1.

Woond in Asia en Africa.

5. ZEEROB (*Trichecus*) Geen voortanden.

De boven hondstanden al-
leen staande.

De kiezen zyn een rimpelig
been.

De lippen dubbeld.

De pooten als een vin aan
een gegroeidt.

Walrus   I. MET uitsteekende (naar om laag
(*Rosmarus*.)   staande) hondstanden *.

Mar-

Morfe, BUFF. *Hift. Nat.*
tom. XIII. pag. 169. tab. 55.
Woond in zee by N. America.

Zeekoe 2. MET ingeslooten hondftanden *.
(*Manati.*) *Lamatin*, BUFF. *Hift. Nat.*
tom. XIII. pag. 169. tab. 58.
Woond aan den mond der ri-
vieren in Asia en America.

VI. LUYAARD. Geen voortanden.

(BRADYPUS.) De fnyttanden ftomp, langer
dan de kiezen, alleen ftaande.
V. Kiezen, die ftomp zyn.
Het ligchaam zeer hairig.

Drievingeri- 1. LUYAARDT, met drie vingeren, en
ge een korte ftaart *.
(*Tridactylus.*) *Ai*, BUFF. *Hift. Nat.* tom.
XIII. pag. 27. tab. 6. 7.
Woond in Z. America.

Tweevinge- 2. LUYAARDT met twee vingeren, en
rige geen ftaart. *Zinau*, BUFF.
Hift. Nat. tom. XIII. p. 27.
tab. 2.
Woond in Brazil,

zon-

Vyfvingeri- A. LUYAARDT zonder staart, de pooten
ge met vingeren.

Bengaalfche *Luyaartzoort*

VOSM. *Beschryv.*

Woond in Bengalen.

VII. MIERENEETER. Geen *tanden*. Eene spil-
(MYRMECOPHAGA.) ronde Tong, die hy
kan uitsteeken, de mond
tot eene snuit uitgerek.
Het ligchaam zeer hai-
rig.

Twée vingc- 1. MIERENEETER, met twee vingerige
rige voorpooten, en vier vinge-
(*Didactyla*.) rige * agterpooten. *Fourmil-*
lier, BUFF. *Hift. Nat.* tom.
X. pag. 67 tab. 30. *The lit-*
tle anteater, EDW. *Glean.* I.
pag. 20.
Woond in America.

Drievingc- 2. MIERENEETER, met drie vingeren
rige aan de voor, en vyf aan de
(*Tridactyla*.) agter-vingeren *.
Woond in America.

Ruigstaart 3. MIERENEETER, met vier voorvin-
ge.

(*Fubata.*)

geren, en vyf agter vingeren, en een lang gebaarde ſtaart *. *Tamanoir*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. X. pag. 67. tab. 29.
Woond in America.

Kaalſtaart. 4. MIERENEETER, met vier en vyf agter-vingeren, de ſtaart kaal *. *Tamandua*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. X. pag. 67.

Aardvarken (A) MIERENEETER, met hangende ooren, en eenen dikken ſnoet *. PALL. *Miſcell. Zool.* pag. 64.
Woond aan de Caap.

VIII. SCHUBHAAAGD. Geen tanden.

(*Manis.*)

Een Spilronde tong, die hy kan uitſteeken.
Het ligchaam met ſchubben dekt.

Vyfvingerig. 1. SCHUBHAAAGDISCH, met vyf vingeren *. *Pangolin*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. X. tab. 15. p. 89.
Woond in Ooft-Indien.

met

Viervinge- 2. SCHUBHAAGDISCH, met vier vingere
 ren, [de pooten van onder
 hairig*.] *Pbatagin*, BUFF.
Nat. tom. X. pag. 83. tab.
 36.
 Woond in Zuid America.

IX. SCHILDVERK. Veele kiezen, geen voortanden of hondstanden. Het lichaam, met een beenig schild geharnast, dat met tanden onderscheiden is.

Cirquençon 1. SCHILDVARKEN, met een in drieën
 (Unicinētus.) verdeeldt schild en vyfvingerige voeten. *Cirquençon*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. X. pag. 100.
 Woond in America

Apar 2. SCHILDVARKEN*, met drie banden,
 (Tricinētus.) en vyfvingeren, SEB. *Schatk.* I. tab. 38. f. 23. BUFF. *Hist.* tom. X. pag. 95.
 Woond in America.

Vierband 3. SCHILDVARKEN, met vier banden.
 [NB.

(*Quadricin-*
ctus.)

[NB. Dit is alleen uit een aan-
eengelymde schaal, die *Fa-*
bius Columna gezien heeft,
en daar noch stukken aan
ontbreeken, opgemaakt, en
is dus waarschynlyk niet in
wezen.]

Encoubert 4. SCHILDVARKEN, met zes banden,
(*Saxcinctus.*) en vyf vingeren *.

BUFF. *Hist. Nat.* tom. X. tab. 42.

Woond in America.

Tatuëta 5. , met zeven banden,
en vier vingeren *.

(*Septemcin-*
ctus.) BUFF. *Hist. Nat.* tom. X.
pag. 97.

Woond in America.

[NB. Deze heeft agt banden.]

Cachicame 6. , met negenbanden,
(*Novemcin-*
ctus.) viervingerige voor - en vyf-

vingerige agtervoeten. BUFF.
Hist. Nat. tom. X. tab. 37.
pag. 98.

Kabassou (A) , met twaalf banden,
C en

(*Duodecim
cinctus*)

en vyfvingeren. BUFFON
Hist. Nat. tom. X. tab.

40. 41,

Woond in America.

III. WILDE DIEREN.

*De voortanden kegelagtig. De hondstanden
lang. De kiezen puntige kegels. De
Pooten met scherpe kromme nagels.
(De mond met knevel-hairen.)*

X. DE ZEEHOND. Zes boven voortanden, die
(PHOCA.) evenwydig staan.

IV. Onder voortanden, die
evenwydig, en wat stomp
zyn.

Een Hondstand van boven
van de voortanden, van
onder van de kiezen af-
staande.

Vyf of zes drie hoekige
kiezen.

[De

[De voorvoeten zonder
dye of fcheen.

De agter voeten verbreed,
en als in eene vin zaa-
men loopende.

Het Ligchaam lang.]

De Zeehond 1. ZEEHOND met ooren. *Phoque*, BUFF.

(*Ursina*.)

Hift. Nat. tom. XIII. tab. 53.

Woond in de Noordzee.

Zeeleeuw 2. ———, met een van vooren ge-

(*Leonina*.)

kuifde kop. BUFF. *Hift.*

Nat. tom. XIII.

Woond aan de straat Magel-
lanes.

Zeekalf 3. ———, met een glad hoofd zon-

(*Vitulina*.)

der ooren.

Woond in de Europifche Zee.

XI. HOND. De boven voortanden zes, de zyling-

(CANIS.)

fche langer, van elkander afstaande.

De ander voortanden, zydelingge-
kwabd.

De hondftanden krom; en alleen
ftaande, zes kiezen of zeven.

Huishond. 1. HOND, met een staart linksom gekruld *.
(*Familiaris.*)

a Huishond, met opstaande ooren. BUFF. *Hist. Nat.* tom. IV. tab. 28.

b Hond met hangende ooren, een basterd nagel, aan de agterpooten.

Braque de Bengale, BUFF. *ibid.* tab. 34.

c Bloedhond met hangende koo-
nen, en een dik ligchaam. *Dogue de forte race*. BUFF. *ibid.* tab. 45.

d Waterhond, met gekroeft
hair als een Schaap.

Barbet, BUFF. *ibid.* tab. 37. 38.

e Schoothond, als een Eekhoorn.

Bichon, BUFF. *Hist. Nat. ibid.* tab. 44.

f. Dashond, met een lang lig-
chaam, kromme pooten, en
hangende ooren. *Basfet*, BUFF.
Hist. Nat. ibid. 35.

g Spoorhond, met een geknot-
te staart. *Chien Courant*, BUFF.
ibid. tab. 32.

Turk-

h Turksche Hond, naakt zonder hair.

Wolf (Lupus.) 2. HOND, met een na de regterzyde gekromde staart *. *Loup*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. 7. tab. I. Woond in de Boffchen van Europa.

a Zwarte Wolf. BUFF. *Hist. Nat.* tom. IX.

Woond in Kanada.

b Wolf van Mexico. BUFF. *Hist. Nat.* tom. XV.

Woond in Nieuw Spanje.

Hyaena. —, met een regte staart, die geringd is, met opstaande hairen aan den hals, naakte ooren, en vier vingeren aan de voorvoeten *. BUFF. *Hist. Nat.* tom. IX. tab. 51. Woond in Africa.

Vos (Vulpes.) 4. —, met een regte staart, met een witte punt *. *Renard*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VII. tab. 4.

Veldvos 5. HOND, met een regte staart met
(*Alopex.*) een zwarte punt.

NB. Eene verscheidenheid van den
Wolf.

Ifatis 6. —, met een regte staart, de punt
van een couleur. Buff. *Hist.*
Nat. tom. XIII. p. 142.

Jakhals 7. —, gezegd goud-Wolf. *Chacal*,
Buff. *Hist. Nat.* tom. XIII.
pag. 135.
b Advie, Buff. *ibid.*
Woond in het Oosten.

Bergkat 8. —, met een kromme gladde
(*Mexicanus.*) staart, een asch graauw lig-
chaam, met bruine banden,
en roffe vlekken.
Seba, Schatk. I. Deel, tab.
42. Buff. *Hist. Nat.* tom. XV.
Woond in Nieuw Spanje.

Thous 9. —, met een neer geboogen
staart, het ligchaam grys,
de buik wit.
Woond in Suriname.

HOND;

Wolf hond 10. HOND, met een roffe staart, aan
 (Corfac.) het begin en het einde
 zwart. VOSMAER, *Beschryv.*
 Woond in Siberien en Indien.

XII. KAT. De voortanden gelyk.
 (FELIS.) Drie kiezen.
 De tong fcherp.
 De nagels kunnen zy intrekken.
 [Het Hoofd rond, het Ligchaam
 gevlakt.]

Leeuw. 1. KAT, met een verlengde, aan het
 (Leo.) eind kwaftige staart, het lig-
 chaam rosbruin *. *Lion*,
BUFF. Hift. Nat. tom. IX. p.
 1. tab. 1. 2.
 Woond in Africa.
 b *Puma*, *BUFF. Hift. Nat.*
 tom. IX. p. 19.
 Woond in America.

Tyger 2. —, met een lange staart, alle de
 vlakken van het Ligchaam
 streep gewyze. *Tigre*, *BUFF.*
 C 4 *Hift.*

Hift. Nat. tom. IX. pag. 57.
tab. IX.

Woond in Africa.

Panther 3. KAT, met een lange staart, de bo-
(*Pardus.*) venvlakken van onder ge-
streept *. *Panthere*, BUFF.
Hift. Nat. tom. IX. tab.
11. 12.

Woond in Afrika.

[NB. Van onder gestreept zegt LINN.
ten onregte, dit Dier is ge-
lyk alle Tygers gevlacht.]

Jaguar 4. —, met een middelmatige staart,
(*Onca.*) het ligchaam geelachtig, met
rondagtige hoekige vlakken.
BUFF. *Hift. Nat.* tom. IX.
pag. 90. tab. 18.
Woond in America.

Kat Pardel 5. —, met een lange staart, de bo-
(*Pardalis.*) ven vlakken gestreept, de
ondersterond. *Ocelot*, BUFF.
Hift. Nat. tom. XIII. tab.
36. 37.

KAT;

Kleine Pant-(A) KAT, met een lange staart, een hertje grys ligchaam, met ronde zwarte kringen *.

Once, BUFF. *Hift. Nat.* tom. IX. pag. 68. tab. 13.

Woond in Perſien.

Luypaard (B) —, met een lange staart, een rosgeel ligchaam, en ringsgewyze hoekige vlakken *.

Leopard, BUFF. *Hift. Nat.* tom. IX. pag. 68. tab. 14.

Woond in Guinea.

Margay (C) —, met een lange staart, een dofgeel ligchaam, dat gestreept, gebandeerd en gevlokt is. BUFF. *Hift. Nat.* tom. XIII. pag. 131. tab. 38.

Bifamkat (D) —, met een lange staart, met een grysachtig geel ligchaam, met bruine vlakken. *Bifamkat*, VOSMAAR, *Befchryv.* tab. VIII. van de viervoetige Dieren.

Woond aan de Kaap.

Wolf Ty. (E) KAT, met een lang staart, een bleek
ger. geel ros ligchaam, met klei-
ne zwarte digt by elkander
staande vlakken.

Guepard, BUFF. *Hift. Nat.* tom.
XIII. pag. 131.

Woond aan de Kaap.

Kat. 6. —, met een lange staart, die met
(*Catus.*) bruin gemengd is, het lig-
chaam met zwartagtige ban-
den, die in de lengte loo-
pen, de drie zylyngsche, als
een slangentrek.

Chat, BUFF. *Hift. Nat.* tom.
V. p. 137.

b Kat van Angora.

Los 7. —, met een korte staart, die aan
(*Lynx.*) de punt zwart is, de ooren
met zwarte hairtjes. *Lynx*,
BUFF. *Hift. Nat.* tom. IX.
tab. 21. pag. 108.

Serval (F) —, met een korte staart, het
ligchaam geel ros, met zwart
gevlakt.

Ser-

Serval, BUFF. *Hift. Nat.*
tom. XIII. p. 122
Woond in Indien.

Caracal (G) KAT, met een korte staart, het
ligchaam bruin ros, de ooren met pinceeltjes eindigende. *Caracal*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. IX. p. 119. tab. 24.
Woond in Arabien.

Cugua. (H) —, met een lange staart, het
ligchaam geel ros, van onder wit *. *Couguar*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. IX. p. 97.
tab. 19.

XIII. WEZEL. De voortanden zes, de middelste kleiner.
(VIVERRA.)

De kiezen meer dan drie.

De tong meest met naar agter leggende stekels.

De nagels langs uitstekend.

Ichneumon. I. WEZEL, de staart aan 't begin dik,
allengskens verdunnende, de
dui-

duimen wataffstaande*. *Mongousta*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIII- tab. 19.

Woond in Indien en Barbaryen.

Coati 2. WEZEL, die ros is, de staart met
(*Nasua*) witte banden. *Coati*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VIII. pag. 163.

Woond in America.

Nanca 3. ———, die bruinagtig is, met een
bruine staart.

Woond in America.

Skunk 4. ———, die bruin is, met vier witte
(*Putorius*) banden op de rug*. CATESBY *Carol. II.* tab. 62.
Conepate, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIII. pag. 151. tab. 41.
Woond in America.

Quasje (A) ———, die bruin is, met een
dunne bek, zwarte nagels,
een eenvoudige staart. SEBA, I. tab. 42. fig. 1.

Coa-

Coase, BUFF. *Hift. Nat.* tom.
XIII. pag. 154. tab. 39.
Woond in America.

Chunck. (B) WEZEL, met een bultige rug, een
wit ligchaam met drie zwarte
banden, en een zeer breede
staart. *Cinche*, BUFF.
Hift. Nat. tom. XIII. pag.
pag. 149. tab. 40.
Woond in Zuid-America.

Mapurita. (C) —, met een losse hairige
staart, het ligchaam wit, en
zwart gevlakt. *Zorille*, BUFF.
ibid. pag. 42.

Zibetha. 5. —, met een geringde staart,
een asgrauwe rug met zwart
golfsgewyze gevlakt *. *Ci-
vette*, BUFF. *Hift. Nat.* tom.
IX. pag. 129. tab. 31.
Woond in Oost-Indien, en
America.

b *Zibeth*, BUFF. *Hist. Nat.*
tom. IX. p. 131. tab. 34.

WE-

Genetta. 6. WEZEL, met een geringde staart,
 een geelros ligchaam, dat na
 het zwart held. *Genette*,
 BUFF. *Hist. Nat.* tom. IX.
 tab. 36.

Fosfana. (D) ———, uit grys, zwart en ros
 gemengeld, met vier zwart-
 te banden aan de voorzyde.
 BUFF. tom. XIII. pag. 87.
 tab. 21.

XIV. FRET. VI. Boven voortanden, die recht
 op staan, fcherp zyn, en van
 elkander afstaan.

VI. Onder voortanden die ftomp
 zyn, digt by elkander, en
 twee naar binnen. De *Tong*
 glad.

[De bek kort en ftomp.

De pooten kort, de ooren
 rond.

Amerikaanfche 1. FRET, met gepalmde voorpooten,
 Otter die hairig zyn, de staart $\frac{1}{2}$
 (*Lutris.*) van het Ligchaam lang. *Loutre*
 de

de Canada, BUFF. *Hift. Nat.*
tom. XIII. p. 165. tab. 45.
Woond in Noord America.

Otter 2. FRET, met gepalmde voorvoeten,
(*Lutria*) die naaktzyn, de staart half
zoo lang als het Ligchaam.
Loutre, BUFF. *Hift. Nat.* tom.
VII. p. 63. tab. 11.
Woond in Europa.

Klein Ot- 3. —, met gepalmde voorpooten,
tertje. die ruig zyn, en een witte
bek.
Woond in Finland.

Galera. 4. —, met gespleeten pooten,
zwart van onder, aan den
hals een driehoekige vlak.
Galera, BROWNE, *Jam.* pag.
485. tab. 49. fig. 1. *Tayra*,
BUFF. *Hift. Nat.* tom. XV. n. 5.
Woond in Jamaica en Brasil.

Veelvraat. 5. —, met gespleeten pooten, een
(*Gulo*.) ros lyf, het midden van de
rug zwart. EDW. *Hift. of*
Brids,

Birds, pag. 103. tab. 103.

Glouton, BUFF. *Hist. Nat.*

tom. XIII. p. 145.

Woond in Siberien.

Marter
(*Martes.*)

6. FRET, met gespleeten voeten, het
ligchaam zwartagtig ros, en
een bleeke keel *. *Fouine*,
BUFF. *Hist. Nat.* tom. VII.
p. 76. tab. 18.

Woond in Europa.

b *Marte*, BUFF. *Hist. Nat.*
tom. XIII. p. 90. tab. 20.

Bonzem
(*Putorius.*)

7. —, met gespleeten voeten, het
ligchaam geelagtig zwart,
met witte ooren en bek *.
Putois, BUFF. *Hist. Nat.*
tom. VII. p. 95. tab. 23.
Woond in Europa.

Fret
(*Furo.*)

8. —, die geelagtig wit is, met roo-
de oogen *. *Furet*, BUFF.
Hist. Nat. tom. VII. pag.
101. tab. 24.

Woond in Africa [en Spanje.]

FRET,

Zabeldier 9. FRET, met gespleeten voeten, het
(*Zibellina*). ligchaam castanje bruin; het
voorhoofd witagtig, de keel
asch grauw *. *Zibelline*, BUFF.
Hist. Nat. tom. XIII. p. 160.
Woond in Asien, Tartarien,
Siberien.

Hermelyn- 10. FRET, met gespleeten pooten, en
tje een zwart puntje aan de
(*Erminea*.) staart *. *Hermine*, BUFF.
Hist. Nat. tom. VII. pag.
116. tab. 31.
Woond in Noord Europa,
en Asia.

Potto (A) FRET, met witte zamen gedruk-
te witte nagelen, het ligchaam
geelachtig grys. *Potto Wezel*.
Vosm. *Beschryv.* tab. IX. der
viervoetige.
Woond in America

NB. Dit geslagt is zoo na vermaagd-
schapt aan het voorige, dat zy
beter een geslagt te zaamen zou-
den uitmaaken. Edoch de Heer
LINNAEUS het geslagt der *Viver-*

ræ, van dat der *Mustelæ* afscheidende, heb ik voor yder een byzonderen geslachts-naam moeten nemen.

- XV. BEER. Zes Voortanden van binnen uitgehold, en overshands staande.
 (URSUS.) Zes onder voortanden, de twee zylings langer en gekwabd.
 De hondstanden kegelagtig.
 Vyf of zes kiezen, de eerste na by de hondstanden.
 De tong glad.
 De neus uitsteekend.
 Het oog met een knipvlies.
 De schoft met een krom been.

Beer 1. BEER, met een korte staart *. *Ours*,
 (*Ursus*.) BUFF. *Hist. Nat.* tom. VIII.
 p. 122. tab. 31, 32.

Das 2. —, met de staart eencoleurig,
 (*Meles*.) het ligchaam van boven as-
 grauw, van onder zwart,
 een zwarte band door oogen en ooren *. *Blaireau*,
 BUFF.

BUFF. *Hift. Nat.* tom. VI.
pag. 49. tab. 7. *Uitgez. ver-*
hand. VIII. p. 362. tab. 56.
Woond in Europa.

Racoon 3. BEER, met een geringde staart, en
(*Lotor.*) een zwarte band door de oo-
gen *. BUFF. *Hift. Nat.*
tom. VIII. pag. 167. tab.
42. f. 1.
Woond in America.

Beer van 4. —, met een lange staart, roest-
Hudsons baay couleurig ligchaam, bruine
(*Luscus.*) bek, voorhoofd en zyvlak.
EDW. *Hift. of Bird.* 103. tab.
103.
Woond aan Hudsonsbaay.

XVI. BUIDELRAT. Tien boven voortanden.
(DIDELPHIS.) Zeven onder voortanden,
de twee middelste korter.
De hondstanden lang.
De kiezen gekarteld.
De tong hairig.
Een zak aan den buik.
D 2 But-

Buidelrat. 1. BUIDELRAT, met agt tepels in de
(*Marsupialis.*) zak *. *Sarigua*, BUFF. *Hift.*
Nat. tom. X. pag. 128. tab. 45.
Woond in America.

Philander. 2. BUIDELRAT, met de ftaart aan het
begin hairig, hangende ooren,
en oortepels *.
NB. Dit is het mannetje van de voorige.
Woond in America.

Zakrot 3. ———, met een halve hairi-
(*Opoffum.*) ge ftaart, twee borften, bo-
ven de wenkbraauwen een
bleeke band *. SEBA, I. tab.
36. f. 1, 2.
NB. Deze is dezelve zegt BUFF. als
No. 1.

Bofchrat 4. ———, met een half hairige
(*Murina.*) ftaart, en zes tepels *. *Marmose*, BUFF. *Hift. Nat.* tom.
X. pag. 131. tab. 52, 53.
Woond in America.
NB. [Deze heeft geen zak.]

Rugdrager 5. BUIDELRAT, de staart aan het be-
 (Dorsifera,) gin hairig, langer dan het
 ligchaam, stompe vingeren*.
 SEBA, *Schatk.* I. pag. 49.
 tab. 31. fig. 45. MERIAN,
Surin. 66.

Cajopolin (A) ———, met dunne door-
 zigtige ooren, een stompe
 bek, een witte buik *. BUFF.
Hist. Nat. tom. X. pag. 159.
 tab. 55.
 Woond in America.

Ooft-Indi- (B) ———, met de staart aan
 fche het begin hairig, het ligchaam
 geelachtig, wit in het man-
 netje, haazen Colour, met
 een zwarte streep over den
 rug, in het wyfje *. *Pbalan-*
ger, BUFF. *Hist. Nat.* tom.
 XIII. pag. 53. tab. 11, 12.
Dierk. Mengelw. I. D. 5. stuk
 bl. 26.
 Woond in Amboina.

XVIII. MOL. Zes boven voortanden.

(TALPA.) Zeven onder voortanden.

Een hondstand, die groot is, en zes kleine.

[De voorpooten breed als handen.]

Gestaarte 1. MOL, met een staart, en vyf vingeren *. *Taupe*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VIII. pag. 41. tab. 12. SEBA, *Schatk.* I. D. tab. 41. fig. 1—4.

b Witte Mol *.

Woond in Europa.

Afiatische 2. —, zonder staart, met drie vingeren *. Veelcoleurige *Siberische* Mol. SEBA, *Schatk.* I. D. pag. 5. tab. 32. fig. 4, 5. BUFF. *Hist. Nat.* tom. VIII. pag. 44.

Woond in Afiën, en Siberien.

Purpere (A) —, die donker purper is, SEBA, *Schatk.* I. p. 5.

Woond in Virginien.

MOL,

- Roode (B) MOL, die rood is. SEBA, *ibid.*
Woond in America.
- Gevlakte. (C) MOL, die zwart gevlaakt is. SEBA, 51.
Woond in Oost-Friesland.

XVIII. SPITSMUIS. Twee gespleeten boven
(SOREX.) voortanden.

Zes van onder, de twee
middellste korter.

Verscheiden hondstanden.

[Het opperkaakbeen langer,
dan het onderste

[Het ligchaam kort en dik.]

- Gekuifde 1. SPITSMUIS, met gekwabde neusgaa-
(*Cristatus.*) ten *, en een korte staart*.

Woond in Pensylvanien.

[Deze zeer zeldzaame soort maakt
den overgang van de Mol tot den Spits-
muis, zy gelykt eer een Mol dan
een Spitsmuis, ik heb dezelve in het
beroemde Cabinet van den Heer *Van
der Meulen* te Amsterdam gezien.]

- Kleine 2. —————, met een zeer lange
(*Minuta.*) bek, en geen staart.

Woond in Siberien.

Virginiaan- 3. SPITSMUIS, met gepalmdede witte
sche pooten, en een korte staart,
(*Aquaticus*.) die wit is. *Zwarte Mol van*
Virginien. SEBA, *Schatk. D.*
I. pag. 51. tab. 32. fig. 3.
Woond in Virginien.

Javaanfche 4. ———, met een middelmatige
(*Murinus*.) staart, bruin ligchaam, de
pooten en staart afchgrauw.
Woond in Java.

Gemeene 5. ———, met een middelmatige
(*Araneus*.) staart, het ligchaam van on-
der witagtig. *Musferaigne*,
BUFF. *Hift. Nat.* tom. VIII.
pag. 29. tab. 10.
Woond in Europa.

Waterspits (A) ———, die zwart is, en van
muis. onder geelachtig afchgrauw.
BUFF. *Hift. Nat.* tom. VIII.
pag. 31. tab. 11.
Woond in Frankryk.

Brasiliaan- (B) ———, met een korte staart,
sche bruin ligchaam, met drie
zwarte

zwarte banden. BUFF. *Hift.*
Nat. tom. XV. p. 43. n. 19.
 Woond in Brafil.

XIX. STEKELVARKEN. Twee van elkander af-
 (ERINACEUS.) staande voortanden.
 Twee nader by een
 staande onder voor-
 tanden.
 Twee agterleggende
 hondstanden.
 [Het ligchaam met
 fcherpe pennen.

Egel 1. STEKELVARKEN, met ronde ooren
 (*Europeus.*) en een gekuifde neus *. *He-*
riffon, BUFF. *Hift- Nat.* tom.
 VIII. pag. 15. tab. 6.
 Woond in Europa.

Amerikaan- 2. —————, zonder ooren,
 fche witte Egel. SEBA, *Schatk.* I.
 (*Inauris.*) Deel p. 78. tab. 49. fig. 3.
Tanrec, BUFF. *Hift Nat.* tom.
 XII. p. 215. tab. 13.
 Woond in Madagescar.

van Malacca 3. STEKELVARKEN, met hangende ooren. SEBA, I. Deel pag. 81.
 (Malaccensis.) tab. 51. fig. 1.
 Woond in Afien.

IV. KNAGENDE DIEREN.

Twee boven voortanden, geen hondstanden.

XX. YZERVARKEN. Twee boven voortanden,
 (HYSTRIX.) die schuinſch geknot
 zyn.
 Agt Kiezen.
 Het ligchaam met lange
 pennen.

Gekuifde 1. YZERVARKEN, met vier voor en vyf
 (Cristata.) agtervingers, het hoofd
 gekuifd, de ſtaart kort *.
Porc-epic, BUFF. *Hiſt. Nat.*
 tom. XII. p. 189. tab. 54, 55.
 Woond in de warme deelen
 van Europa en Aſia.

YZER-

Grypstaart 2. YZERVARKEN, met vier vingerige
(*Prehensilis.*) voeten, een lange naakte gryp-
staart *. *Couendou*, BUFF.
Hist. Nat. tom. XII. p. 196.
tab. 57.
Woond in Indien.

Scherprug 3. —————, met vier voor, en
(*Dorsata.*) vyf agter vingeren, de rug
alleen met stekels *. EDW.
Birds, 52. tab. 52. *Urson*,
BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII.
pag. 199. tab. 58.
Woond in Canada.

Langstaart 4. —————, met vyf vingerige
(*Macroura.*) voeten, een zeer lange staart,
ingeknotte pennen. SEBA,
Schatk. I. D. p. 84. tab. 52.
fig. 1.
Woond in Afia.

NB. Deze is dezelve met de voorige
zoort.

XXI. HAAS. Twee voortanden, de bovenste ver-
(*Lepus.*) dubbeld, de binnenste kleiner.

[Eene

[Eene ronde kop, en lange ooren;
ruige pooten.]

- Haas 1. HAAS, met een korte staart, de ooren aan de punt zwart *.
(*Timidus.*) *Lievre*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VI. p. 87. tab. 30.
b Witte Haas.
Woond in Europa.
- Konyn. 2. —, met een korte staart, en
(*Cuniculus.*) naakten ooren *. *Lapin*,
BUFF. *Hist. Nat.* tom. VI.
pag. 114. tab. 42.
b Konyn van *Angora*, tab.
45, 46.
c Gestreept afchgrauw Konyn, tab. 44.
d Tam Konyn, tab. 43.
Woond in Europa. b in Syrien.
- Kaapfch 3. —, met een staart, zoo lang
(*Capensis.*) als het hoofd, en roode pooten *.
Woond aan de Kaap.
- Brefilifch. 4. —, zonder staart. *Tapeti*, BUFF.
Hist.

- (*Brasiliensis.*)   *Hist. Nat.* tom. XV. p. 44.
n. 21.
Woond in Brazil.

XXII. BEVER. De bovenste voortanden ge-
(*CASTOR.*) knot, en met een dwarsse
hoek uitgehold.
De staart plat.

- Bever.   1. BEVER, met een eyronde platte
(*Fiber.*)   staart *. *Castor*, BUFF. *Hist.*
Nat. tom. VIII. pag. 138.
tab. 36.
Woond in Europa, Asia,
America.

- Desman   2. —, met een lange staart, die
(*Moschatus.*)   plagtigtig lancetsgewyze is,
de voeten gepalmd. *Onda-*
tra, BUFF. *Hist. Nat.* tom.
X. pag. 1. tab. 2.
Woond in Rusland.

- Ondatra   3. —, met een lange zaamen ge-
(*Zibethicus.*)   drukte staart, en gespleeten
voe-

voeten. BUFF. *Hist. Nat.*
tom. X. p. 1. tab. 1.

XXIII. MUYS. De onderſte tanden elsgewyze.

Guineefch 1. Muis, zondert ſtaart, met vier-
biggetje vingerige voorvoeten, en
(*Porcellus.*) drie vingerige agtervoeten*.
Cochon d'Inde, BUFF. *Hist. Nat.*
tom. VIII. pag. 1. tab. 1.
EDW. *Glean.* tab. 294. tab. 2.
Woond in Brazil.

Kaapſch (A) —, zondert ſtaart, met drie
Mor-meldier voorvingers, en twee en
(*Cavia Capen-* een halve agtervinger; en
ſis.) ronde ooren*. *Cavia Capen-*
ſis, PALLAS, *Miſcellan Zool.* pag.
36. tab. 3. *Kaapſch Mor-*
meldier, VOSM. *Befchryv.*
Woond aan de Kaap.

Aperea (B) —, zonder ſtaart, met ronde
ooren. BUFF. *Hist. Nat.* tom.
XV. pag. 43. n. 20.
Woond in Brazil.

MUIS,

- Aouti 2. *Muis*, met een korte staart, vier voor, en vyf agtervoeten, en een geele buik.
BUFF. Hist. Nat. tom. VIII. tab. 50.
 Woond in Brasíl, Guajane, Suriname.
- Javaansche 3. —, met een korte staart, vier
 (*Leporinus*.) vingerige voor, endrie vingerige agtervoeten, een witte buik, *Javaansche Haas*,
CATESB. Carol III. tab. 18.
 Woond in Java, Sumatra.
- Zifel 4. —, met een korte staart, een
 (*Citellus*.) ligchaam zonder ooren. *Zifel*, *BUFF. Hist. Nat.* tom. XV. pag. 35.
 Woond in Oostenryk, Boheemen, Bolen.
- Leming 5. —, met een korte staart, vyf-
 (*Lemmus*.) vingere voeten, en een zwart en ros gevlakte ligchaam,
BUFF. Hist. Nat. tom. XIII. pag. 162.
 Woond in Lapland.
- Muis*,

- Cabiai (C) Muis, zonder staart, met drie voor en drie agter vingeren, korte ronde ooren, en een dikke kop. BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII. pag. 179. tab. 52. Woond in America.
- Paca. 6. —, met een korte staart, vyf vingerige voeten, de zyden geel gestreept *. *Paca*, BUFF. *Hist. Nat.* X. p. 122. tab. 43. Woond in Brasilië.
- Marmotta 7. —, met een lange dikhairige staart, ronde ooren, en bul-tige kaaken. *Marmotte*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VIII, pag. 109. tab. 28.
- Americaan- 8. —, met een lange matig hairi-
sch mormel- ge staart, een aschgrauw
dier ligchaam, ronde ooren, vier
(*Monox.*) vingerige agter voeten. EDW. *Birds.* 104. tab. 104.
Woond in America.
- Bobak. (D) Muis, met vyf voor en vier ag-
ter

ter vingeren, en een hairigē
korte staart. *Bobac*, BUFF.
Hist. Nat. tom. XIII. pag.
74. tab. 19.
Woond in Poolen.

Hamster 9. Muis, met een middelmatige staart,
(*Cricetus.*) ronde ooren, het ligchaam
van onder zwart, de zyden
met drie witte vlakken *.
Hamster, BUFF. *Hist. Nat.*
tom. XIII. pag. 69. tab. 15.
Woond in Duitſchland.

Aardmuis 10. —, met een matige staart,
(*Terreſtris.*) die wat hairig is, vier voor
en vyf agtervingeren, de
ooren kort *. *Campagnol*,
BUFF. *Hist. Nat.* tom. VII.
pag. 186. tab. 47.
Woond in Europa.

Waterrot 11. —, met een lange hairige
(*Aquaticus.*) staart, en gepalmde agter-
voeten. *Rat d'eau*, BUFF.
E *Hist.*

Hist. Nat. tom. VII. pag.
169. tab. 43.
Woond in Europa.

Rat 12. MUIS, met een lange byna naak-
(*Rattus.*) te staart, vier voorvingeren
en een nageltje, vyf agter
vingeren *. *Rat*, BUFF.
Hist. Nat. tom. VII. pag.
135. tab. 36.
Woond in Europa.

Muisje 13. —, met een verlengde naakte
(*Musculus.*) staart, vier voor, en vyf ag-
tervingeren, en een stompe
duim *. *Souris*, BUFF. *Hist. Nat.*
tom. VII. pag. 150. tab. 39.
Woond in Europa.

Hazelmuis 14. —, met een hairige staart, een
(*Avellanari-*
us.) ros ligchaam, een witagti-
ge keel, de agterste duimen
stomp *. *Edw. Glean.* tab. 266.
Muscardin, BUFF. *Hist. Nat.*
tom. VIII. pag. 95. tab. 26.
Woond in Newjork.

MUIS,

Eikelmuis 15. *Muis*, met een lang hairige staart,
(*Quercinus*.) een zwarte vlak onder de oogen. *Lerôt*, *Buff. Hist. Nat.* tom. VIII. p. 89. tab. 25:
Woond in Duitschland.

Grauwe 16. —, wiens staart driemaal korter is dan het ligchaam, en het ligchaam wat hairig grys, de buik en pooten wit.
(*Gregarius*.) Woond in Duitschland, Zweeden.

Boschmuis 17. —, met een middelmatige staart, vier voor en vyf agtervingeren, een grys ligchaam met zwarte haren, een witte buik. *Mulot*, *Buff. Hist. Nat.* tom. VII. pag. 158. tab. 41.
Woond in de Tuinen, en Boschen in Europa.

Striatus 18. —, met een middelmatige, byna naakte staart., met vier voorvingeren, en vyf agtervingeren, met gestipte strepen

pen op het ligchaam. SEBA;
Schatk. II. p. 22. tab. 21.
 fig. 2.

Woond in Indien.

Akkermuis (E) —, met een staart, half zoo
 lang als het ligchaam, dat geel
 is, de buik en pooten grys,
 een zwarte streep van het
 hoofd tot de staart. PALL.
Reiz. I. pag. 454.
 Woond in Siberien.

Kleine (F) —, met een langhairige ge-
 ringde staart, het ligchaam
 geelgrys, van onder ligt grys
 PALL. *ibid.*
 Woond in Siberien.

Langpoot 19. —, met een lange hairige
 (Longipes.) staart, vier voor, en vyfag-
 tervingerige, zeer lange dy-
 en. *Daman Israel*, BUFF.
Hift. Nat. tom. XIII. pag.
 79.
 Woond in Syrien, Phenici-
 en, Arabien.

Muis,

Springer 20. MUIS, met een langestaart met een kwast, zeer lange agter en zeer korte voorpooten*. EDW. *Birds*, 219. ALLAMAND. by BUFF. tom. XV. tab. 7.

b Springend Konyn *Comment Petropol.* 1760. Alagtage.

c *Tarfier*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIII, pag. 51. tab. 10. Woond in Indien.

Vliegende 21. —, met een lange staart, vier voor, en vyf agtervoeten, het vel ter zyden uitgespreid. EDW. *Birds*, 191. tab. 191. Woond in Virginien, Mexico.

XXIV. EEKHOORN. Twee voortanden, de bovenste wigsgewyze. (SCIURUS.) De onderste plat. [De staart breed uitgespreid en lang.]

Gemeene 1. EEKHOORN, met ooren, die aan de
 (*Vulgaris.*) tippen losse haitjes hebben, vier voor en vyf agter vingeren *. *Ecureuil*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. VII. pag. 123. tab. 32.
 Woond in Europa.

Zwarte 2. EEKHOORN, die geheel zwart is *.
 CATESBY. *Carol. II.* p. 73.
 Woond in America.
 NB. Deze zegt de Heer BUFF. *Hift. Nat.* tom. X. p. 54. is een ver-
 scheidenheid der voorige.

Graauw 3. ———, uit Virginien die a-
 le schgraauw is *. *Petitgris*,
 (*Cinereus.*) BUFF. *Hift. Nat.* tom. X.
 p. 52. tab. 25.
 Woond in Noord America.

Geele 4. ———, met ronde ooren, een
 (*Flavus.*) geel ligchaam, en vyfvin-
 genige voeten.
 Woond in America.

Geteekende. 5. ———, die grys is, met drie
 ge-

(*Palmarum.*)

geelagtige streepen, de staart met witte, en zwarte banden. *Palmiste*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. X. p. 58. tab. 26. Woond in Asia, Africa en America.

Gebandeer- 6. EKHORN, die bruin is, met vier witte in de lengte loopende

(*Getulus.*)

banden*. *Barbaresque*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. X. pag. 58. tab. 27.

Woond in Africa en America.

Gestreepte 7. ———, die geel is, met vyf bruine banden. EDW. 181.

(*Striatus.*)

CATESB. *Carol II.* p. 75. tab. 75. *Suisse*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. X. p. 58.

Woond in Noord-America.

Breedstaarti-8. ———, die grys is, van onder wit.

ge Rat.

(*Glis*)

Woond in Zuid Europa.

Geelbuik 9. ———, die grysis, van onder geelagtig.

(*Aestuans.*)

Woond in Suriname.

Vliegende 10. EEKHOORN, met uitgespreide zy-
 (Volans.) den vliegende, met een ronde
 staart *. *Polatouche*, BUFF. *Hist.*
Nat. tom. X. pag. 43. tab. 21--23.
 Woond in America.

Springer 11. ———, met uitgespreide zy-
 (Sagitta.) den vliegende, plat lancetge-
 wyze. PALL. *Miscell. Zool.* pag.
 54. tab. VI. fig. 1. 2. Oostin-
 dische *Eekhoorn*. VOSM. *Be-*
schryv.
 Woond in Java.

XXVI. NAGTVLIEGER. Twee voortanden, de
 (NOCTILIS.) bovenste fcherp,
 de onderste twee-
 kwabbig.

De neusgaten wat
 voor uitsteekende,
 rolrond, en dicht
 by elkander.

Vliegende 1. NAGTVLIEGER, met de onderste
 Haas, lip wrattig.
 (Americanus.) Woond in America.

Deze

[NB. Deze is een waare Vleermuis, nergens in van de andere voorgemelde verschillende.]

V. HERKAAUWENDE DIEREN.

*Geen boven voortanden, van onder zes, of
agt, zeer ver van de kiezen geplaatst,
De pooten gespleeten en hoeven. De
Borsten in de Lieschen.*

XXVI. KEMEL. Geen Hoornen.

(CAMELUS. Zes spathelsgewyze beneden voortanden.

De hondstanden 'er van afstaande, drie van boven, twee van onder.

De bovenlip gespleeten.

[De hals lang, het ligchaam wollig.]

Dromedaris I. KEMEL, met een bult op den rug*.

E 5

Dro.

(*Dromedarius*.)

Dromedaire. BUFF. *Hist. Nat.*
tom. XI. pag. 85. tab. 9.
Woond in Africa.

Kemel
(*Bactrianus*.)

2. KEMEL, met twee bulten op den
rug *. *Chameau*, BUFFON,
Hist. Nat. tom. XI. pag. 85.
tab. 22.
Woond in Afrika.

Glama.

3. ———, met een effen rug, en
een bult op de borst. *Lama*,
BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIII.
p. 20.
Woond in America.

Peruviaansch
Schaap
(*Pacos*.)

4. ———, met een wollig [bloed
rood] Ligchaam, zonder bul-
ten. *Paco*, BUFF. *Hist. Nat.*
tom. XIII. p. 20.
Woond in Peru.

XXVII. MUSKUS DIER.
(*Moschus*.)

Geen Hoornen. De
slagtanden van bo-
ven uitsteekende.

Mys.

Muskus Dier 1. MUSKUSDIER, met een zak aan den
(*Moschiferus.*) navel. *Musc. BUFF. Hist.*
Nat. tom. XII. p. 169.
Woond in Tartarien.

Jufferbokje. 2. ———, met een bultagtige ver-
(*Grimmia.*) hevenheid op het hoofd*.
Antilope Grimmia. PALL.
Miscell. Zool, p. 1. tab. 1.
Spicil. Zool, p. 38. tab. 3.
Jufferbokje, *VOSM. Beschryv.*
Grimme, BUFF. Hist. Nat.
tom. XII. p. 144.
Woond in Africa.

NB. Deze is een Hartebok, zie ge-
slagt.

Guineesch 5. ———, met pootjes dunner
Rheetje dan een vinger*. *Chevrotain*,
(*Pygmaeus.*) *BUFF. Hist. Nat.* tom. XII.
pag. 145. tab. 44.
Woond in Africa,

XXVIII. HART. Vaste tanden, jaarlykſch afvallende
(*Cervus.*) met een dun vel gedekte hoorens.
Ze-

Zeven onder voortanden, geen
hondstanden.

[Lange Hals en pooten, korte
staart.

Giraffa 1. HART, met zeer eenvoudige Hoor-
(*Camelopardalis*) nen, de voorpooten zeer
lang. *Giraffe*, BUFF. *Hist.*
tom. XIII. pag. 11. tab. 1,
Woond aan de Kaap.

Eland 2. —, met gepalmdde hoornen, en
(*Alce.*) een krop aan de keel. *Elan.*
BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII.
pag. 47. tab. 27.
Woond in Europa, Asia,
America.

Hart 3. —, met takkige hoorens, die ge-
(*Elaphus.*) heel schilrond zyn, en krom
BUFF. *Hist. Nat.* tom. VI.
tab 5. 12. *Cerf.*

Rendier 4. —, met kromme getakte hoorens
(*Tarandus.*) die spilrond zyn, en aan de
toppen gepalmd. *Renne*,
BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII.

p. 45. tab. II. tom. XV.

p. 52. tab. 4.

Woond in Lapland.

Damhart 5. HART, met kromme getakte plaat-
(*Dama.*) te hoornen, de toppen ge-
palmd, BUFF. *Hift. Nat.* tom.
VI. pag. 49. tab, 19.
Woond in Europa.

Rhee 6. —, met recht opstaande kleine
(*Capreolus.*) takkige hoorns, de toppen
gevorkt *. BUFF. *Hift. Nat.*
tom. VI. pag. 64. tab. 24. 25.
Woond in Europa, Asia.

Hart van 7. —, dat grys is, van onder zwart-
Guinea agtig.
(*Guineensis*) Woond in Guinea.

XXIX. HARTEBOK. Regt opstaande, beenige
(ANTILOPE.) ongetakte, spilronde hoor-
nen, die niet afvallen,
en in een scheede besloo-
ten zyn.

De

De hoeven knobbelig, de
staart kort.

1. Blaauwe 1. HARTEBOK, met wat naar vooren
Bok.

geboogen hoornen. Het lig-
chaam asgrauw, de rug zwart,
een witte vlak aan het oog,
de buik, en pooten wit.
PALL. *Dierk. Mengelw. I. D.*
pag. 4. n. 1. 1. ft.

Woond aan de Kaap.

2. Gemse 2, ———, met regte opstaande hoor-
nen, die van boven krom
zyn, een asgrauw vlak ag-
ter de hoornen, vol lokken
aan de knien, het ligchaam
bruin. *Bouquetin*, BUFF.
Hist. Nat. om. XII. pag. 67.
tab. 15. *Gemse Dierk. Men-*
gelw. I. D. I. ft. p. 5. n. 2.
Woond in Europa.

- Dama. 3. ———, die bruin rood is, met
met naar vooren omgekrom-
de hoornen. DAMA, *Dierk.*
Mengelw. I. D. I. ft. pag. 5. n. 3.
Nari-

Nanguer, BUFF. *Hift. Nat.*
tom. XII pag. 101.
Woond in Afrika.

Kromhoorn.4. HARTEBOK, met byna gladde, naar
(*Redunca*.) vooren gekromde hoornen,
het ligchaam bleekros, *Na-*
gar, BUFF. *Hift. Nat.* tom.
XII. p. 151. tab. 48. *Dierk.*
Mengelw., I.D. 1. ft. pag. 6.
n. 7. Woond in Senegal.

Kemel Bok 5. ———, met een bult voor op
(*Trago Came-* de rug, een langehals, en
lus.) staart. *Tragocamelus*, PARS,
Philosoph. transact., vol. 43.
p.465. *Dirk. Mengelw.*, I.D. 1.
stuk. p. 7. n. 5.
Woond in Indien.

Tartarifche 6. ———, met geringde geele
(*Scytica*.) doorzigtige hoornen, het lig-
chaam bruin ros, de buik
wit. BUFF. *Hift. Nat.* tom.
XII. pag. 96. tab. 24.
fig. 2. *Dierk. Mengelw.*,
Tar-

Tartierifche Bok, LINN. *Syst.*
XII. pag. 97. n. 11.

Woond in Tartaryen, Mosco-
vien.

Witgatje 7. HARTEBOK, met eenigzins platte ,
(*Pygargus*.) liersgewyze , gerimpelde
hoornen, roestcoleurig zwart,
de billen van agteren, de buik
en een streep over het voor-
hoofd, wit. *Tzeiran*, BUFF.
Hift. Nat. tom. XII. pag.
99. pl. 23. fig. 6. (de hoo-
ren), *Dierk Mengelw.*, I. D.
I. stuk. pag. 8.
Woond in Arabien.

Dorcas 8. ———, met hoornen, die heel
(*Gazelle*.) en half geringd, en in de
lengte gestreept zyn, een
witte buik en billen. Hair
bosjes aan de knien. *Gazelle*,
BUFF. *Hift. Nat.* tom. XII.
pag. 97. tab. 25. *Dorcas*,
Dierk Mengelw., I. D. I. ft.
pag. 9. tab. 9.
Woond in Syrien.

HAR.

Kevela 9. HARTEBOK, met geringde hoornen,
die aan de zyden plat zyn,
het ligchaam rosbruin, een
zwarte staart, en een zwarte
streep aan de zyden, *Kevel*,
BUFF. *Hift. Nat.* tom. XII.
pag. 98. tab. 38. *Dierk. Men-*
gelw. I. D. I. stuk. p. 10. n. 9.
Woond in Senegal.

Os van Bar- 10. ———, met dikke geslingerde
baryen hoornen, het ligchaam grys-
(*Bubalis.*) achtig ros, de hals roestver-
wig. *Bubale*, BUFF. *Hift.*
Nat. tom. XII. pag. 138. tab.
37, 38. *Dierk. Mengelw.* I.
D. I. stuk. pag. 10.
Woond in Barbaryen.

Pezoarbok 11. ———, met regte tot boven
(*Besoartica.*) de helft gerimpelde hoor-
nen, die boven de rimpels
geknobbeld, en na den top
glad zyn. *Pasan*, BUFF. *Hift.*
Nat. tom. XII. pag. 101.
fig. 3. de hoornen, *Dierk.*
F *Men-*

Mengelw. I. ft. D. I. pag. 12.
Woond in de Levant.

Jufferbokje. 12. HARTBOK, met regt opstaande
(*Grimmia.*) hoornen, een hairig bultje
dezelve*. *La Grimme*, BUFF.
Hist. Nat. tom. XII. p. 144.
PALL. *Miscell. Zool.* pag. 1.
tab. 1. *Specil. Zool.* pag. 28.
tab. 3. *Jufferbokje*, VOSM.
Beschryv. Moschius Grimmia,
(LINN.)

Woond in Indien.

[NB. Deze is dezelve welke pag. 71.
gemeldt wordt.]

Geteekende 13. ———, met agteroverleggen-
(*Scripta.*) de platte gezwenkte, eenigzins
gekielde hoornen. Het lig-
chaam bruin ros, met witte
elkander kruizende streepen.
Guib, BUFF. *Hist Nat.* tom.
XII. pag. 143. tab. 42. en
43. f. 3. hoorn. *Dierk. Men-
gelw. I. D. I. ft. p. 13.*
Woond in Senegal.

HAR-

Kaapſche E. 14. HARTEBOK, met regt opſtaande
land
(*Oryx.*) dikke hoornen, die ſlangen
trekkig gekield zyn*. *Con-*
dou, BUFF. *Hift. Nat.* tom.
pag. 167. tab. 49. f. 3. [de
hoornen.

Woond aan de Kaap.

Koedoe 15. ———, met ronde gedraaide
(*Strepsiceros.*) hoornen, die gekield zyn,
een witte plek aan de oogen
die voor den kop zaamen
loopt *. *Condoma*, BUFF.
Hift. Nat. tom. XII. p. 131.
tab. 41. de hoornen.

Hartebok 16. ———, met groote naakte
(*Rupicapra.*) van elkander wykende gerim-
pelde hoornen, het ligchaam,
bruin, de hals zwart*. *Anti-*
lope, BUFF. *Hift. Nat.* tom.
XII. p. 102. tab. 37. [tge-
raamte] tab. 38. [de hoor-
nen] tom. XV. p. 57. tab. 5.
[de afbeelding is ſlegt. *Dierk.*
Mengelw. I. D. I. ſtuk. pag.

16. tab. 1, 2. met een zeer
flegte afbeelding.

Woond in Bengale.

XXX. BOK. De hoornen hol, [plat gekield ge-
(CAPRA.) zwenkt] recht opstaande ruw.

Agt onder voortanden.

Geen hondstanden.

[Een baard onder de keel.]

Bok
(*Hircus.*)

1. Bok, met geboogen gekielde hoor-
nen, en een gebaarde keel*.

Bouc, BUFF. *Hist. Nat.* tom.

V. pag. 27. tab. 8, 9.

b Bok van Angora.

c Bok van Juda.

Wilde Bok 2. —, die een baard heeft met hoor-
(*Ibex.*)

nen, die van boven knob-
belagtig zyn, en na de rug
hellen. *Boucquetain*, BUFF.
Hist. Nat. tom. XII. pag. 67.
tab.

Woond in Europa.

BOK,

Syrische Bok 3. Bok , met leggende hoornen, hangende ooren, de keel gebaad. *Mambrine* , BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII. pag. 72.
Woond in Syrien.

Gemse 4. — , met recht opstaande hoornen, die van boven krom zyn.
(*Rupicapra.*)
(NB. Deze is een Hartebok [zie pag. 74, n. 2.)
Woond in Zwitserland.

Plathoorn 5. — , met platte kromme hoornen, die zeer klein zyn, en op 't hoofd leggen, de keel met een baard. BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII. tab. 20.
Woond in America.

Kromhoorn 6. — , met regt opstaande hoornen, die van boven krom zyn, deze schynt een *Mazame* van SEBA, te zyn.
Woond in America.

Gazelle 7. Bok, met spilronde hoornen, die
zeer langen regt zyn, en van
onder geringd.

NB. Deze is de kaapsche Eland of 13.
Hartebok.

Woond aan de Kaap.

Koedoe 8. —, met spilronde hoornen, die
(*Cervicapra.*) half geringd zyn, gezwenkt,
en gedraaid.

NB. Deze is de Koedoe, of 14de
Hartebok.

Woond in Indien.

Bezoar Bok 9. Bok, met spilronde hoornen, die
(*Bezoartica.*) geheel geringd zyn, de keel
gebaard.

NB. Deze is de 10de Hartebok.

Rheebok 10. Bok, met spilronde hoornen,
(*Dorcas.*) die volkomen geringd zyn,
krom en gedraaid.

NB. Deze is de 8ste Hartebok.

Woond in Africa.

Tartarische 11. —, met spilronde, byna regte
hoornen, die volkomen ge-
ringd

ringd, en aan de punt door-
zichtig zyn, zonder baard.

NB. Deze is de 6de Hartebok.

Woond in Asia.

Ammon. 12. Bok, met kromme half maansge-
wyze, van onder platte hoor-
nen, een losse kofsem,
geen baard. *Mouflon*, BUFF.
Hift. Nat. XI. pag. 149. tab.
29.

NB. Dit is een Ram en geen Bok.

Woond in Siberien.

XXX. SCHAAP. De hoornen hol naar agter ge-
(Ovis.) keerd, gezwenkt, ruig.
Zeven onder voortanden.
Geen snytanden.

Ram 1. SCHAAP, met platte maansgewyze
(Aries.) hoornen *. *Belier*, BUFF.
Hift. Nat. tom. V. pag. 1.
tab. 1.

a gemeen Schaap.

b Engelsch Schaap met

F 4

een

een tot de knien toe hangende balzak.

c Veelhoornig Schaap.

d Afrikaansch gehaird Schaap.

e Breedstaartig Schaap.

(a) Woond in Europa, (b) in Engeland, (c) in Gothland, (d) in Africa, (e) in Arabien.

Van Guinea 2. SCHAAP, met hangende ooren, een (*Guineensis.*)

voor uitsteekend agterhoofd, en losse hairige kofsem, *Bellier des Indes*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XI. tab. 35.

Woond in Guinea.

Koedoe 3. —, met regte opstaande hoornen (*Strepficeros.*) die gekield en gezwenkt zyn.

[Deze is de Koedoe of 14de Hartebok.]

Woond aan de Kaap.

XXXII. OS. Holle naar vooren geboogen hoornen, die maansgewyze, en glad zyn. Van

Van onder Zeven voortanden.
Geen snytanden.

- Stier 1. Os, met spilronde hoornen, naar
(*Taurus.*) buiten omgekromd, en hangende kosssem *. *Taureau*,
BUFF. *Hist. Nat.* tom. IV.
pag. 169. tab. 14.
Woond in Europa.
b *Urus*, BUFF. *Hist. Nat.*
tom. XI. pag. 130.

- Bonafus 2. —, met naar elkander geboogen
hoorens, en zeer lange maanen *. *Bonafus*, BUFF. *Hist.*
Nat. tom. XI. pag. 129.
Woond in Afrika, Asia.

- Bifon 3. Os, met van elkander wykende
hoorens, zeer langemaanen,
en een bultige rug. *Bifon*
BUFFON *ibid.*

Deze is dezelve met de voorige.

- Ruige Koe. 4. Os, met Spilronde naar vooren
gekroomde hoornen, een
F 5 han-

hangend vel, de staart los-
hairig.

Woond in Noord Afie.

Os van
Barbaryen
(*Bubalis.*)

5. Os, met agter overleggende krom-
me van vooren platte hoor-
nen. *Buffle*, BUFF. *Hift.*
Nat. tom. XI. pag. 122.
tab. 25.

Woond in Afien en Italien.
b Buffel van Africa. [De-
ze is de 9de Harteboek,
die egter niet, of niet al-
leen in Africa, maar ook
in Afien woondt.]

Indiaansche 6. Os, met hoornen, die kleiner
(*Indicus.*) zyn, dan de ooren, een
bult op den rug geen maa-
nen. ZEBBA BUFF. *Hift.* *Nat.*
tom. XI. tab. 42.
Woond in Indien.

V I. G E H O E F D E.

De Voortanden stomp, de Pooten geboeft.

- XXXIII. PAARD. Zes boven voortanden, die
(EQUUS.) regt, en even wydig staan.
Zes onder voortanden, die
meer uitsteeken.
De hondstanden alleen staande.
De pooten met een hoef.

Paard 1. PAARD, met een geheele hairige
(*Caballus.*) staart *. *Cheval*, BUFF. *Hist.*
Nat. tom. IV. p. 66. tab. I.
Woond in Europa.

Ezel 2. —, met het eind der staart hairig,
(*Asinus.*) met een zwart kruis op de
schouders *. *Ane*, BUFF.
Hist. Nat. tom. IV. p. 145.
tab. XI.
Woond in Europa.

PAART,

Zebra.

3. PAARD, dat wit is, met Bruine banden *. *Zebra*, EDW. *Birds*. tab. 222. *Zebra*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII. pag. 8. tab. 1.

Woond in Zuid Africa.

XXXIV. RIVIERPAARD. De voortanden van (HIPPOPOTAMUS.) boven zes, by paaren van onder vier voor uitsteekende de middelste langer

De hondstanden schuinsch geknot.

De pooten, aan den rand genageld.

(*Amphibius*.) I. RIVIERPAARD, met vierhoevige pooten*. *Hippopotame*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII. p. 17. tab. 3, 4.

Woond in Africa.

XXXV. VARKEN. Vier boven voortanden, die (SUS.) naar elkander toestaan, zes on-

onder voortanden , die
voor uitsteeken.

Twee korte boven snytan-
den.

Een van onder die uitsteekt.

Een platte beweegbaare uit-
steekende snuyt.

Varken.
(*Scrofa*)

1. VARKEN, met de rug van vooren
borstelig, de staart hairig *.

Cochon , BUFF. *Hist. Nat.*
tom. V. pag. 45. tab. 14.

b WildVarken, *ibid.* tab. 15.

c Chineesche Varken, *i-*
bid. pag. 52.

Woond in Europa.

Æthiopisch (A) ———, met een zeer groote,
breede platte snuit , een klei-
ne bek, zeer kleine digt by
elkander staande oogen, met
een traangroef, en twee
kwabben onder dezelve *.
PALL. *Miscell. Zool.* pag. 16.
tab. 3. *Spicil Zool*, I. D. I.
stuk. tab. 1. VOSM. *Beschryv.*
ALLAMAND, by BUFF. *Hist.*
Nat.

Nat. tom XV. p. 48. tab. 1.
Woond aan de Kaap.

Guineefch 2. VARKEN, met de rug van agter,
(*Porcus.*) de staartzoo lang als de pooten,
BUFF. *Hift. Nat.* tom. XV. pag. 38. n. 11.
Woond in Guinea.

Tajacu. 3. ———, zonder staart, met een
muscus bevattende holte op de rug *. *Pecari*, BUFF.
Hift. Nat. tom. X. pag. 9. tab. 34.
Woond in Mexico, Panama, Brazil.

Watervar- 4. ———, zonder staart, met drie
ken voorvingeren. Deze is een
(*Hydrochaeris.*) soort van *Cavia*, of Muis,
zie pag. 60. *Cabiai c. &c.*
Woond in Suriname.

Babirouffa. 5. ———, de twee hondftanden zeer
groot, naar het hoofd omgekromd *. *Babirouffa*, BUFF.
Hift.

Hift. Nat. tom. XII. pag.
177. tab. 51.
Woond in Borneo.

XXXVI. RHINOCEROS. Twee voortanden aan
weder zyden, dieftomp
zyn, en zeer ver van
elkander afstaan.
Een ronde kegelagtige
hoorn op de neus.

Rhinoceros 1. RHINOCEROS, met een hoorn op
de neus *. *EDW. Birds.* tab.
221. fig. 2. *BUFF. Hift.*
Nat. vol. XI. pag. 70. tab.
7. *ALBIN.* tab. *Musc.* IV.
V. VI.

b Met twee hoorens *.
Woond in Africa.

VII. WALVISSCHEN.

*Lugtgaaten boven op het hoofd. De borst
en staart vinnen Horizontaal.*

XXXVII. EENHOORVISCH. Twee zeos lange
(MONODON.) regte gedraaide
tanden, in de
bovenkaak.
Een water buis
op het hoofd.

Zee Een- * [EENHOORN, met een lange gedraaide
hoorn. hoorn aan de opperkaak.
Woond in Europa.

XXXVIII. WALVISCH. Hoornige bladen in ste-
(BALAENA.) de van tanden.

Groenland- I. WALVISCH, met bochtige blaasgaa-
sche ten op het midden van den
kop

(*Mysticetus*.) kop de rug zonder vinnen *.
GRONOV. *Zooph.* 139.
b Noordkaper.
Woond in de Noordzee.

Vinvisch 2. WALVISCH, met twee blaasgaaten,
(*Physeter*.) op het hoofd, een vetvin op
den rug. MARTEN SPITZS.
Woond in de Noordzee.

Koeienoog 3. ———, met twee blaasgaaten;
(*Bœops*.) het agterste der rug met een
hoornig uitsteekzel.
Woond in de Noordzee.

Breedsmoel 4. ———, met twee blaasgaaten,
(*Misculus*.) het onderste kaakbeen veel
breeder *.
Woond in de zee by Schot-
land.

Vinvisch (A) ———, met twee blaasgaaten,
en een knobbel op den rug.
Woond by Nieuw Engeland.

Knobbel- (B) WALVISCH, met twee blaasgaaten
visch en zes knobbels op den rug.

XXXIX. CACHELOT. Tanden in het onder-
(PHYSETER.)   kaak been.

Een blaasgat op het
hoofd.

Catadon.   1. CACHELOT, zonder vin op den rug,
                 met een buis in den snoet.
                 Woond in de Noordzee.

Potvifsch   2. ———, zonder vin op den rug,
(*Macrocephalus.*)   met een buis in den nek.
                 Woond in de Noordzee.

Kleinoog   3. ———, met een lange graat op
                 den rug, de bovenkaak lan-
                 ger.
                 Woond in de Noordzee.

Maftvifsch   4. ———, met een zeer hooge uit-
(*Tursio.*)   steekende vin op den rug,
                 de tanden van boven plat.

XL. DOLPHYN. Tanden in beide kaakbeende-
(DELPHINUS.)   ren, een buis op het hoofd.

Bruinvifch   1. DOLPHYN, met het lyf kegelrond,
                 een

(*Phocaena.*) een breede rug, en stompe bek.

Woond in de Noordſche en Balthiſche zee.

Dolphyn 2. DOLPHYN, met een langwerpig rol-
(*Delphis.*) rond lichaam, de ſnuit ſpits.
Woond in de Noordzee.

Botskop. 3. ———, met een opgewipte
(*Orca.*) ſnoet, de tanden breed, en
zwaardsgewyze.
Woond in de Noordzee.

Einde van het I. Deel's, Iſte Stuk.

D R U K F O U T E N, aldus te verbeteren.

Opdragt.
bladz.

II regel. 20 kuudigheden *lees* kundigheden.

Voorrede
bladz.

III — 9 znn. — zyn

X — 13 veelvormingen *lees* veelvormigen

XXXIV — 10 *oxalis ſenſitiva mimosa* *lees* *oxalis ſenſitiva*.

XXVII laaſte reg. infect. tel *lees* infect. bel. (*mimosa*.)

XXXIII reg. 10 ſcheeden *lees* ſcheede.

XL — 4 *Stachys* *lees* *Stachys*

XLI — 8 *asperine* *lees* *aparine*

ib. — 9 *aſſeri folia* *lees* *asperifolia*

XLVII — 19 verharing *lees* verharding

XLVIII (laaſte) reg. doe uit de woorden: en die ontbonden.

LVII reg. I verſchil rang *lees* verſchil, rang ſchikkingen

LXVII — 12 meterol *lees* *metereol* *.

LXXIV laaſte reg. winderigen *lees* windcrigen.

D R U K F O U T E N.

Bladz.

- LXXV — 10 Lineus lees *Linnaeus*.
 ib. — 16 niet Upsal in lees niet in Upsal.
 LXXVII — 14 Schilddraagende lees schild-draagende.
 LXXXVII — 7 Ngama doe uit
 XCV — 17 JULIANES, lees JULIAANS
 8 reg. 18 *Fanus* lees *Faunus*
 10 reg. 5 Cynomolgos lees Cynamolgos.
 ib. reg. 14 DIANA lees *Diana*.
 11 reg. 6 *Ciphus* lees *Cephus*
 ib. reg. 13 *tripida* lees *trepida*.
 12 reg. 3 *Nimacus* lees *Nimacus*.
 ib. reg. 10 Senica lees *Sinica*
 14 reg. 3 Jacokus lees *Jacchus*.
 14 reg. 11 Musius Aapje lees *Muscus* Aapje.
 16 reg. 21 chineeschje lees Cheneesche I.
 17 reg. Samine lees *Saimira*
 18 laatste reg. Maucauns lees *Maucaucas*
 20 reg. 18 hantsgewyz lees hantsgewys
 21 reg. 11 Kirwonba lees Kiriwoula
 25 reg. *Lamatin* lees *Lamantin*.
 27 reg. 16 SCHUBHAAGD. lees SCHUBMAAGDISCH.
 28 reg. 1 SCHILVERK lees SCHILDVARKEN.
 34 reg. 12 Advie lees Adivie
 35 reg. 4 VOSMAER beschr. voeg by, noch niet uitgegeven.
 41 reg. 5 Chunk lees Chink
 43 reg. 11 onder klein Ottertje te voegen (*Lutreola*)
 46 reg. 16 schoft lees schaft
 50 reg. 21 Bolen lees Polen
 60 reg. 21 *Monax* lees *Monax*
 61 reg. 24 vingerige lees vingeren
 67 reg. 17 *fuisse* lees *ecureuil* *fuisse*
 71 reg. 16 geslagt, agter te voegen XXIX.
 72 reg. 18 schilrond lees spilrond
 73 reg. 5 plaatte lees platte
 76 reg. 2 Tartierische lees Tartarische
 78 reg. 6 een hairig bultje lees tusschen dezelve
 ——— 12 *Moschius* lees *Moschus*.
 79 reg. 4 Condou lees Coudou.
 80 reg. 6 gekield gezwenkt lees gekieldt, gezwenkt,
 ib. reg. 7 recht opstaande lees recht op staande,
 ib. reg. 20 reg. agter tab. te voegen XV.
 85 laatste reg. gekroomde lees gekromde
 86 reg. 10 ZEBE lees Zebu
 99 reg. 5 de rug van agter, lees de rug van agter hairig
 92 reg. 6 Twee zeas lees twee zeer.
 ib. reg. 12 [Een hoorn, het haakje [weg te doen.

KORTBEGRIP
VAN HET ZAMENSTEL DER
NATUUR,

VAN DEN HEER

C. LINNAEUS,

MET ZEER VEELE ZOORTEN
VERMEERDERT DOOR

P. BODDAERT,

*Med. Doct., Oudraad der Stad VLISSINGEN,
Lid van den Keizerlyke Academie der Natuuron-
derzoekeren, van de HOLLANDSCHE
Maatschappij der Wetenschappen te HAAR-
LEM, en van het ZEEUWSCHE Ge-
nootschap der Wetenschappen te
VLISSINGEN.*

E E R S T E D E E L.

T W E E D E S T U K.

T e U T R E C H T,

By J. VAN SCHOONHOVEN, EN COMP.

M D C C L X X I I I.

VOORREDE.

Beschouwden wy in het voorige Stuk, de Dieren, die met ons op aarde leeven, zagen wy hunne wonderbaare verscheidenheid in het uiterlyk samenstel; zoo toonde ons hunne gedaante, dat het innerlyk werktuigelyk gestel nader by dat van den Mensch kwam, dan dat van eenige andere Dieren; schoon sommige hunner zig van de aarde verheffen, en in de lugt zweeven, laat dit gestel niet toe, dat zy zich hoog in de lugt begeeven; of van het eene Land naar het ander vliegen; de Vledermuizen, Vliegen, de Eekhoornen &c. vliegen slegts tot eene geringe hoogte (a), of vanden eenen boom tot den anderen. De Vogelen in tegendeel vliegen hooger dan de Wolken, want zy verdwynen uit ons gezicht, en de gezichtkunde leerd, dat een voorwerp, dat door het daglicht verlicht word, eerst op den afstand van 3436 maalen zyn middellyn voor ons gezicht verdwynt, indien men nade vliegt van een Arend op vyf voeten stelt, verdwynt hy eerst voor ons oog op den afstandt van 17080 voeten, of 5726 roeden (b).

Zy vliegen met een verbaazende snelheid, een Rendier, een Eland kunnen veertig mylen op eendag afleggen, en een Engelschman TORNER genaamt, heeft in elf uuren twee en dertig minuten, twee en zeventig mylen afgelegd, en in dien tyd 21 maal van Paard, verandert; zoo dat de beste Paarden maar vier mylen in een uur kunnen afleggen, en dus maar dertig mylen op een dag; maar een Vogel, een Arend by voorbeeld, of Kuikendief welke vier voeten vlugts heeft, legt

1500

(a) Zie *Dierk. Mengelw.* 2. Stuk.

(b) BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tom. I. pag. 13.

1500 voeten af in een minuut, en dus twintig mylen in een uur; en kan dus in tien uren vlugts 200 mylen afleggen, onze Zwaluwen, en andere trekvogels kunnen dus in minder dan 7 of 8 dagen van hier, tot onder de linie vliegen, en ADANSON heeft Zwaluwen aan de kust van Senegal gezien, op den 9 October, dus 8 daagen naar hun vertrek (c). Alles loopt tot deze snelheid in den Vogel zaamen. De pluimen zyn zeer ligt, en hebben een groote oppervlakte, de gedaante der vleugelen, die van boven bol en van onder hol zyn, hunne vastheid, groote uitgestrektheid, en de kracht der spieren die hen doet beweegen, eindelyk de ligtheid van het ligchaam, waar van zelv de vaste deelen ligter zyn, dan die der viervoetigen, en de vlakke beenderen zyn dunner, het geraamte van een Pelicaan schoon zeer groot woeg, maar drie en twintig oncen.

Het tweede dat de Vogelen van de viervoetigen onderscheid, is de stem, geen viervoetig Dier is 'er bekendt, dat eenige woorden of gezang leeren kan; de meeste viervoetigen zyn zeer stil, en hun stem die zy niet dikwyls laten hooren, is onaangenaam. De Vogelen integendeel hebben zagtheid, aangenaamheid en melodie in hunne stem, 'er zyn zommige, welker stem onverdragelyk is, maar deze zyn weinige, en de stem der Vogelen is, zoo veel te sterker naar maate hun ligchaam kleiner is, een Paauw. welke het honderste gedeelte niet uitmaakt van Os, laat zich op grooter afstand hooren; de stem van een Nagtegaal, loopt zoo veel ruimte door, als van een mensch. De stem der viervoetigen kan geen kwartier ver gehoord worden, en word noch door het dikste, en dus het bekwaamste deel van den dampkring gemaakt, daar wy die der Vogelen van hoog in de Lucht
hoor-

(c) ADANSON. *Poyage au Senegal.*

V O O R R E E D E.

hooren, schoon zy zelve 3436 maalen hun eigen middel-lyl van ons af zyn.

Wat de zagtheid en aangenaamheid van de stem der vogelen betreft, die is hen natuurlyk. En het is aanmerkelyk, dat in alle bevolkte en beschaafde Landen, de meeste vogelen eene aangenaame stem hebben, daar in de uitgestrekte woestynen van Afrika en America, alwaar slegts wilden woonen, de Vogels alleen schreeuwen en 'er weinige een aangenaame zang hebben. Moet men dit aan de Lugtstreek toeschryven? De Lugtstreek verandert, beken ik het uiterlyk aanzien der Vogelen; en teekend met harde en sterke merken. De viervoetige Dieren, welker vacht met afsteekende verwen, ronde vlakken of lange banden verciert is, behooren alle in warmer gewesten te huis; en alle de Vogelen hebben gloeiende verwen, edoch alle hebben zy eene onaangename stem.

Onder de Vogelen zingen de mannetjes het meest, en wel tegens den broeytyd, het is dus eene aangenaame uitdrukking van hunne begeertens. De Nagtegaal zingt het best, wanneer het wyfje het nestje maakt, endeze zang die jaarlyks ophoud, en vernieuwd word, en maar twee of drie maanden duurt, toont eene werktuigelyke overeenkomst tusschen de werktuigen der voorteeeling en de stem, ziet men in den mensch niet, dat de stem voller word in de mannelyke jaaren? in de viervoetigen word zy dan schrikbaarend.

En dewyl de Voorteeeling in de Vogelen; maar alleen op zommige tyden van het jaar plaats heeft, zoo volgt dat in de andere tyden dit overtollige vocht, de vaste deelen meer stevigheid byzet, in den mensch en in de viervoetige Dieren is de levensdoring evenredig aan de groeiing, gelyk de Heer BUFFON beweezen heeft en zy zyn slegts ter voorteeeling bekwaam, nadat zy het grootste deel van hunne groeiing door zyn. In d. Vo-

V O O R R E E D E.

gels geschiedt dit schieliker, een pas uit het ey gekomen Vogel kan staan, en loopen, en binnen eene maand of zes weken, na zyne uitkipping vliegen. Een Haan van vier maanden kan treden, schoon hy binnen 't jaar eerst zynen vollen wasdom heeft, en het leeven van een mensch of vier voetig dier is, zes of zeven maalen zynen tyd van groeiing, doch by de Vogelen is dit veel langer, ik heb zelv een Cacatoe gezien die vyftig jaaren oud was, en een Papegaay van zeventig: Dit is waarschynlyk aan het zamenstel der beenderen toe te schryven, want hoe harder en vaster de beenderen worden, hoe nader het leven ten einde loopt.

Een ander onderscheid noch tusschen de Vogelen, en de vier voetige Dieren is, die zucht van veelen om hun geboorteplaats voor een zekeren eyd, en op eenen bepaalden tyd te verlaten, gelyk men in de Trekvogelen ziet: De viervoetigen integendeel, blyven altoos aan hunne geboorteplaats verbonden, en indien de noodzakebeid vereischt dezelve te verwoeren, kwynen zy. Niemand heeft oir een Laplandsch Rendier, in de gematigde Luchtstreek kunnen in het leeven houden, nooit heeft men het Guineesch Reetje, in onze gewesten kunnen opkweeken; De Europische Honden in warmer gewesten overgebracht, worden kaal en stom, De Lecuwen en Tygersteelen in onze Landen niet voort, het geer een zonderlinge blyk der Godlyke voorzienigheid is. De Struisvogel, Casoaris, enz. Schoon hier niet voortteelende, leeven in kouder gewesten, dan hunne woonplaatsen, egter zeer gezond; sommige, en veele zelv teelen hier voort, gelyk de Paauwen, Faifanten, Poulipintades, Canaries, enz., welke als inboorlingen van Europa kunnen gerekend worden.

Het voornaamste onderscheid tusschen de Vogelen en viervoetigen, dat der voortecling; namentlyk, zal ik hier niet aanraeren als reeds menigmaalen behandelt zynde, Schoon

V O O R R E E D E.

Schoon dus de Vogelen en viervoetige Dieren zoo aanmerkelyk onderscheiden zyn, wilde echter de Goddelyke wysheid, dat het groote tafreel der Natuur eene eenstemmigheid hebben zoude, en alle deszelvs Groepen zoude verbonden zyn, door natuurlyke, zoo wel als zedelyke overeenkomsten; dus zien wy dat 'er onder de viervoetigen en de Vogelen vleescheetende geslagten zyn, en andere die van vrugten leeven. De vleescheetende Vogelen hebben gelyk de verscheurende Dieren korte ingewanden, en de blinde darm is zeer klein, in de graaneetende is de krop overeenkomstig met de pens der herkaauwende, en hebben twee blinde Darmen. En dewyl de aard en zeden veel van de levenswyze afhangen, kan men ook in dezen de Vogelen met de viervoetige Dieren vergelyken. De Arend edelmoedig en trotsch is de Leeuw, de onverzadelyke, wreede Gier is de Tyger, de buizert Raav en Kuikendief is de Wolf, de Hyaena de Chacal, de Valken, Havikken, en andere Jagtvogels zyn de Honden, Vossen, Oncas, en Lossen; de Uilen, die niet dan des nagts jacht maken, zyn de Katten, de Reigers, Vischvangers enz. zyn de Bevers en Otters, de Spechten, de Miereneeters; de Paauwen, Hoenders, Kalkoenen, zyn de herkaauwende Dieren. De Vogels schynen eene byzondere voorraad van voedsel te hebben, zy eeten het geen de viervoetigen verwerpen, gekorven, tweeslachtigen, kruipende, vrugten, graanen, kruiden, zaaden, wortelen, zyn hun voedsel. Zy hebben byna geen smaak, of ten minsten een veel minder dan de viervoetigen.

En even als men vliegende viervoetigen ziet, zyn'er Vogelen, die niet vliegen kunnen, gelyk de Casoaris, Struisvogel, Walgvogel, Thoujou, en gelyk de Zeehond, Zeekoe enz. zwemmende viervoetigen zyn, vind men zwemmende Vogelen, gelyk de zee Papega-

V O O R R E E D E.

yen, de Eenden, en de geheele bende der Watervogelen.

Dus de overeenkomst, en het verschil der Vogelen kortelyk beschouwd hebbende, ga ik tot de Vogelen zelv over.

Het ligchaam word verdeelt in het Hoofd, het ligchaam, in de leeden.

Het hoofd verdeelt men in het voorhoofd, de kruin en het agterhoofd; het voorhoofd is zomtyds gekuifd gelyk in de gekuifde Vliegenvanger, of de kruin is met een kuif voorzien, gelyk in de Hop, de Platgekuifde Vliegenvanger [Tyran], de Rotschaan de Kroonvogel, de Duif van Banda, of er bangt een kuif van het agterhoofd, gelyk in de Cacatoe, zommige Reigers, de Savacou, zommige hebben een hoorn in de plaats van een kuif, gelyk de Poulepintade, de Casoar, de Steenpaauwies. Van vooren eindigt dit hoofd in een harde hoornagtige bek, die krom is in de roofvogels, na boven geboogen, in de Sneppen, Kluit kegelagtig in de graaneetende, en aan de punt breeder in de Lepelaars.

Deze bek bestaat uit twee kaakbeenderen, dezemaaken de gaaping van den bek, welke in de Zwaluwen en Geitenmelkers zoo aanmerkelyk is.

De bals is in alle Vogelen spilrond, zeer lang in den Struisvogel, Kraanen, Reigers, zeer kort in de Baardvogel; het ligchaam is in allen eirond, met een lange wat platagtige rug, de buik ronder, welke in een stuit eindigt.

De Leden zyn de vleugels en pooten. De vleugels zyn platte drieboekige ligchaamen, en bestaan uit beenderen, spieren, dekvederen en roeipennen, zommige hebben maar het begin van vleugels gelyk de Pengoins, zommige Papegaayduikers, zommige in tegendeel zyn

zeer

zeer lang, gelyk in de Zwaluwen, Fregatvogel, A-
renden, Gieren enz. Andere hebben wel vleugelen;
doch de kortheid der staart en de zwaarte van het lig-
chaam belet hen te vliegen gelyk de Struisvogel, Casoa-
ris, Walgvogel; Deze vleugels zetten de vogelen als
wajers uit, wanneer zy zich in de lucht heffen; Hier
was het de plaats om dat verwonderlyk toefiel van de
vlugt der vogelen te onderzoeken, maar de ingewikkeld-
heid der stoffe, welke niet zonder berekening, en af-
beeldingen kan voortgesteldt worden; verbiedt my
zulks.

De eerste stuurvederen, zyn 10 in getal waar van
1—4 de vingeren, en 5—10 de agterleeden, de
tweede rei zyn 10—20 of 28. De pooten bestaan
uit de Dy, de scheen de vingeren en de nagels.

De Dyen zyn bloot in de Steltloopers, in de mee-
ste Vogelen, staan zy in het evenwigt van het ligchaam;
doch in sommige watervogelen staan zy zoo vernaar ag-
ter, dat het ligchaam byna loodrecht staat, in de Pen-
goins de zee Cacatoc, en andere; sommige hebben
gelyk de Fuit gecoleurde kniebanden. De scheenen zyn
in de meeste naakt, doch in de meeste Roofvogelen ge-
vedert.

De Vingeren zyn gemeenlyk vier, in de meeste drie
voor en een agtervinger, in sommige twee voor en twee
agtervingers, in sommige Zwaluwen staan alle de vier
vingeren naar vooren, de Struisvogel heeft maar twee
vingers, sommige Vogelen gelyk de Korhoenders, drie,
zonder agtervinger. Deze vingers zyn in meeste Vo-
gelen van elkander gescheiden; doch in de watervogelen,
door een vlies verbonden, andere hebben dezelve wel los,
dog met een vlies omzoomdt, deze noemt men gelobde
pooten; sommige hebben kromme scherpe nagels, ge-
lyk de Roofvogels, in de Lecuwrikken is de agter-
ste nagel langer dan de vinger.

V O O R R E E D E.

Behalven deze Vingeren hebben sommige spooren gelyk in de Haanen, Faifanten, Chineefche Paauwen.

De ftaart beftaat uit XII. ftuurvederen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5. 4. 3. 2. 1. in de Hoenders zyn 18. en de Spechten 10, deze ftuurvederen zyner zeer lang in de Coliou en sommige Scharlaars, Weftindifche Raven, het Weeuwte van Angola enz. en maaken den ftaart of gelyk, of gevorkt; in sommige zyn zy zeer kort, als in de Struisvogel, Walgvogel, Cafoaris, in de Haanen ftaan zy regt op, en hangen vlak neer in de Poelepeintades.

Behalven deze deelen, welke aan alle Vogelen gemeen zyn, hebben sommige ook wapenen, de meefte hebben den bek en pooten om zich te verdedigen, gelyk in de Roofvogelen, de behoornde Poelepeintade verweert zich met den boornagtigen uitwas, welke zy op het hoofd heeft. De Phaifanten, Paauwen en Berkhoenderen, met hunne spooren; de Struisvogelen, bruine Chirurgyns, gedoornde Plevieren hebben fcherpe doornen aan de vleugelen.

De meefte Vogelen houden zich by een Wyfje, doch sommige, gelyk de Hoenders, Eenden, Muffchen hebben 'er verſcheiden. De neften welke zy ter uitbroeding van de jongen maaken, zyn van verſchillende Aart en ſtoffe. Sommige hangen aan takken van boomen, gelyk die der Bananasvogel, Geelvogel, sommige neſten dryven, gelyk die van sommige Ysvogelen, sommige beſtaan uit takken, andere uit Kley enz. In deze broeyen zy hunne eyeren, welke verſchillen in grootte, gedaante, couleur en getal, die van de Struisvogels zyn groot, eyrond, geelachtig, en maar een te gelyk, de Uilen leggen bolronde eyeren twee of drie te gelyk, de Zeepapegayen twee, de Meeuw drie, de Zwaluw van vyf tot agt, doch de Eenden, en Hoenders meer.

Het

V O O R R E E D E.

Het zoude hier de plaats zyn om van de broeding het maakzel van het Ei, en de vorming van het kuiken te spreken; maar dewyl dit my te ver heenen zoude leiden: wyze ik den lezer na die schoone *Verhandeling van den Heer HALLER over de Vorming van het Kuiken in het Ey*, door die geleerden ontleedkundigen in het *Fransch* beschreeven.

Zommige Vogels blyven in hunne geboorteplaats, andere vertrekken jaarlyks naar andere gewesten. Dus ziet men dat alle de dunbekkige Vogelen van het musschen zoort, zoodra de gekorvenen, die hen tot spyze dienen ophouden, naar warmer gewesten vertrekken, en de Steltloopers insgelyks, door dien het ys hen verbiedt de Kikvorfchen Haagdischen enz. uit het water te haalen.

— Onder deze Trekvogelen bevinden zich de Zwaluwen, de Heer ADANSON, zag gelyk ik te vooren meldde, de Zwaluwen den 9 October in Senegal aankomen; de Heer KLEIN, en andere Natuurkenners, zeggen, dat zy gezien hebben, dat de Zwaluwen zich des winters onder water onthouden, en in een warm kagchel vertrek gebracht, allengskens weder beginnen te herleeven. Dit schynen twee getuigenissen, die vlak tegen elkander stryden; doch de Heer de BUFFON lost dit op, door te stellen; doch onze huis Zwaluwen Trekvogelen zyn, en dat de Zwaluwen, welk de Heer KLEIN en andere, in het water by kluwens aan elkander hangende vonden, eene andere soort is (d).

De spyzen der Vogelen zyn ook zeer verschillende zommige eeten vleesch gelyk de Arenden, Valken, Gieren, Uilen zommigen visch, gelyk de Eenden, en Ysvogelen en zommige Steltloopers, andere gekorven gelyk de dunbekkige Musschen, Vinken, andere rupzen, gelyk de Spechten, zommige Vlinders gelyk

(d) BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* pag. XVI. der Voorrede ed. in groot 4to.

V O O R R E E D E.

lyk de Koekkoek andere Horzels, gelyk de Offenpikers, de Strandlooper eet schulpdieren, de Krabbeneeter heeft Krabben tot zyne spys.

Andere voeden zich uit de gewassen, gelyk de graan eetende Vogelen.

Deze benden die zeer talryk is, is door verscheiden rangschikkers op verschillende wyze verdeelt. De voornaamste dezer zyn de Heeren KLEIN, MOHRING, BRISSON, LINNAEUS, en BRUNNICHE.

De Heer KLEIN gaf in het jaar 1750 zyne Prodrum avium in het licht, welk te Lubeck in 4to met acht koperen platen gedrukt wierd, en verdeelt dezelve in VIII. rangen.

De I. Rang, behelst de Vogelen met twee vingeren, zonder agtervinger, de Struisvogel.

De II. Rang behelst Vogelen met drie Vingeren, zonder agtervinger. Deze hebben den bek hoog en dun (b) of gekield, met eene kromme punt, of (c) regt, of (d) eene groote kop en korte bals, of (e) een lange regte bek, van binnen gegroefd, of (f) een bek, die aan haar agterend tanden heeft. Dus zes geslagten.

De III. Rang. met vier vingeren, twee voor en twee agtervingeren, en deze hebben, of (a) een dikke haaksgewyze bek, of (b) eene rechte, boekige, wigsgewyze, of (c) een elsgewyze of (d) onregelmaatige voeten, of (e) eene zeer korte bek en sterk gepluimde kop, (f) een zeer dunne bolle bek.

De IV. Rang, met drie voor en een agtervinger, de bek (a) hoeksgewyze, (b) mesgewyze krom, en aan haar begin hairig (c) de staart lang en de vlergels kort, (d) een platte bek (e). De bek stompachtig, het onderkaakbeen regt, het
boven.

V O O R R E E D E.

bovenste langer en krom, (f) de bek dun, de agter nagel zeer lang (g), de bek als vooren, doch de nagels alle even groot, (h) de bek kort, aan haar begin breed, en zamengedrukt, (i) een korte boekige snydende bek (k). Een kegelagtige bek (l), een regte rolronddelange bek (m). Een kegelagtige smalle bek (n) een sterke zaamengedrukte bek (o), een regte bek de kaakbeenderen gelyk (p); een zeisfengewyze bek (q) een korte sterke kromme bek (r) een bek als vooren, doch de pooten kort en de vleugelen lang (s), een korte bek, de middelste vinger niet gekarteld (t), een regte bek (u). een verlengde elsgewyze bek.

De V. Rang, vier vingerige pooten, de agterste vinger enkel, de drie voorste door een vlies verbonden, (a) een breede bek (b) de bek kegelagtig, fcherp of ftomp

De VI. Rang, vier vingeren alles met een vlies verbonden (a) het opperkaakbeen breed en plat, het onderfte naar boven verwulfdt.

De VII. Rang, drie gevleesde vingeren, geen agtervinger, (a) het ligchaam eirond.

De VIII. Rang, vier gewebde vingeren (a) de bek recht.

De Heer MOEHRING, gaf in het jaar 1752 zyn werk *Avium Genera* genaemdt in het ligt, het geente Breemen in 8vo gedrukt is, en naderhand door den Heer NOZEMAN, eender geleerdste Vogelkenmers van ons Vaderland vertaaldt, en door den kundigen Heer VOSMAER met aanmerkingen verrrykt is; de Heer MOEHRING onderscheidt de Vogelen in.

I. Vlies-

V O O R R E E D E.

- I. Vliespooten, deze hebben in den eersten rang de Exters in de tweede de Musschen.
- II. Velpooten, deze bevattende Roofvogelen en Hoenderen.
- III. Kortvlerken.
- IV. De Watervogelen; deze bevat vyf rangen, de tandbekken, de platbekken, de Engbekken, de Duikers en Snippen.

In het jaar 1760 en vervolgends gaf de Heer BRISSON zyn groot Vogel werk uit, bestaande in VI. Deelen in 4to met 261 Afbeeldingen, in welke vyf hondert en zestig Vogelen afgebeeldt zyn, in welke er vier hondert gevonden worden, welke nooit te vooren afgebeeldt waaren.

De Heer BRISSON verdeelt de Vogelen in twee benden, I. met gespleeten, II. met gevliesde Vingeren.
 — Deze twee benden bevatten zes en twing rangen.

- I. Die drie voor, en een agtervinger hebben, het bet bovenkaakbeen aan den punt dik, en wat krom, de neusgaaten half met een vlies gedekt, de Duiven.
- II. De bek kegelachtig krom.
- III. De bek kort en krom.
- IV. De bek eene verlengdde kegel (a), met de vederen van den kop naar voor, de Raav enz. (b) met die vederen naar agter, de Geelvogel Paradysvogel.
- V. De bek recht, aan wederzyden uitgerandt, de Klauwier.
- VI. De bek recht, de kaakbeenderen niet uitgerand, de Offenpikker, en Spreeuw.

VII.

V O O R R E E D E.

VII. De bek dun, wat geboogen, de Hop.

VIII. De bek zeer klein, aan haar begin plat, aan de punt krom, de guaping zeer groot, de Zwaluw, Geitenmelker.

IX. De bek een verlengdde kegel (a), beide kaakbeenderen recht, de Mosschen, Knueiën (b), het hovenkaak krom, de Roodborstjes (c), beide elkander kruissende, de Kruisvink.

X. De bek elsgewyze (a) met bloote neusgaaten, de Leeuwrik, Vygeneeter, enz. (b) de neusgaaten gedekt. De Meezen.

XI. De bek wigsgewyze, de Graauwspecht.

XII. De bek draadsgewyze (a) krom, in de Boomkruipertjes, (b) regt in de Bloemzuigers.

XIII. Twee voor en twee agter vingeren, (a) de bek lang en regt; met eene lange tong de Draayhals, Specht, (b) de bek matig boogsgewyze en aan de zyden zaamengedrukt, de Koekkoek en Baerdvogel. (d) De bek lang, zoo breed als het hoofd, en gekarteld. De Toucan.

XVI. Drie voor en eene agtervinger, (a) eene korte aan de punt zaamengedrukte bek, de Rotsbaen, Manakin, (b) een kegelachtige gekartelde bek, de Momot, (c) de bek lang en recht, in de Ysvogel, (d) de bek krom en scherp, in de Byeneeter, (e) de bek dik en zeissen gewyze.

XV. Kleine vleugels, waar mede zy niet vliegen kunnen, (a) met twee vingeren, de Struisvogel, (b) drie en geen agtervinger de Casoar, Thoudou, (c) vier vingers drie voor en een agtervinger.

XVI. Geen agter vinger en groote vleugels. (a) De bek als een kromme kegel, in de Trapgans.
(b)

V O O R R E E D E.

(b) *Een zeer regte lange bek, die aan de punt dikker is, de Krabbeneeter.* (c) *De bek korter, regt, en aan de punt dikker, de Plevier.*

XVII. *Drie voor- en eene agtervinger, de vleugeks bekwaam tot vliegen.* (a) *Met een regte bek aan de punt dikker, de Kievit.* (b) *De bek byna recht, wat naar boven geboogen, de Strandruiter.* (c) *Van boven rond aan de punt zamengedrukt, het Waterhoentje,* (d) *bek zamengedrukt, als ook het ligchaam; de Ral* (e) *de bek dun, het Kempphaantje, de Snep,* (f) *de bek naar beneden geboogen; de Ibis,* (g) *de bek regt plat en van vooren breed; de Lepelaer,* (h) *de bek dik en lang, de Reigers,* (i) *de bek dik en kort lepelsgewyze; (l) de bek kort en regt, de Kroonvogel; (m) de bek kegelachtig krom, de Kamchy* (n) *zylings zamengedrukt, het voorhoofd kaal, de Porphyrio.*

XVIII. *Drie voor- en een agter vinger, alle gewebd, of met een vlies omgeeven.* (a) *Met enkele vliezen de Waterhoenderen.* (b) *Met uitgesneden vliezen, de Koeten.*

XIX. *De vingers half gevlied, de pooten buiten het evenwigt, de Duikers.*

XX. *De pooten geheel gevlied, zonder achtervinger buiten het evenwicht, (a) de bek recht en scherp, de Zaagbek, (b) dwarsch gestreept, de Groenlandsche Papegaay, en Zee Papegay.*

XXI. *Drie gevliedde voorvingers en een agter vinger (a) de bek regt, met eene kromme punt. De Pengoin.*

XXII.

V O O R R E E D E.

XXII. Drie voorvingeren met geheele vliezen verbonden, geen agtervinger, de pooten in het evenwicht, en korter dan het ligchaam, gelyk de Albatros.

XXIII. Vier vingers, waar van de drie eerste gevlied met geheele vliezen, de agterste los, de pooten in het evenwigt, korter dan ligchaam, de bek niet gekarteld (a) de punt baaksgewyze, de Onweersvogel, Meeuw, (b) de bekrecht, aan de zyden plat de Stern en Watersnyder.

XXIV. Viervingeren, de drie voorste met geheele vliezen, de agterste los, de pooten in het evenwigt, korter dan het lichaam, de bek getand, (a) bek rolrondachtig de punt van het opperkaakbeen baaksgewyze, gelyk de Duiker (b) de bek van boven verheven van onder platachtig, de Eend, Gans.

XXV. Viervingeren, met geheele vliezen verbonden, de pooten in het evengewicht, korter dan het ligchaam (a) met een scherpe bek den langstaart (b), de punt van den bek krom, enz.

XXVI. Viervingeren, de drie voorste met geheele vliezen, de agterste los, de beenen in evenwicht, langer dan het ligchaam (a), de bek getand, de Flamingo (b) de bek zonder tanden, de Kluit.

De Heer LINNAEUS verdeeld in zyne laatste uitgave van het zamenstel der Natuur de vogelen in zes benden, welke ik hier niet zal aanhalen, als het onderwerp van dit stukje uitnakende.

De Heer BRUNNICHE in zyn Elementa Zoologica behoud dezelve benden als de Ridder LINNAEUS; doch verschilt zeer veel in de schikking der geslagten.

Edoch dewyl de beschryvingen, nooit zulke volmaakte denkbeelden der zaken geven kunnen, dan uitvoerige afbeeldingen hebben, de Natuurkenners zich toegelegd, om naauwkeurige afbeeldingen van de Vogelen te geven.

Iste. Deel II. Stuk.

**

On-

V O O R R E E D E.

Onder deeze munten die van de Heeren EDWARDS, CATESBY, BRISSON, D'AUBERTON, FRISCH en PENNANT uit.

Het werk van den Heer ELEAZAR ALBIN, zag eerst in het jaar 1740 het licht, in drie deelen in 4to, maar de onnatuueelyke coloreering derzelver doet het in de oogen der Natuurkenneren minder agten.

De Heer EDWARDS begon in het jaar 1740 zyne History Natural of birds uittegeven, met schoone naar het leven gecoleurde afbeeldingen. Dit werk in vier deelen in 4to bestaande, werd eenige jaaren daarna van zyne gleanings of natural History gevolgt, in drie deelen, welke te zamen behalven de viervoetigen, en insecten 315 soorten van vogelen vertoonen.

De Heer BRISSON gaf naderhand zyne Ornithologia, of vogelkunde, met verscheide nooit te vooren uitgegeven afbeeldingen van vogelen; doch zonder coleuren; eindelyk de Heeren BUFFON en D'AUBERTON dat schoone werk de algemeene en byzondere natuurlyke Historie, schryvende, gaf de jonge Heer D'AUBERTON, onder het opzicht van den Heer BUFFON de afbeeldingen der vogelen, met coleuren uit en kleinfolio, om tot de natuurlyke historie der vogelen van den laatste genoemden Heer te dienen, waarvan reeds twee deelen in het licht zyn, deze verzameling bevat reeds zes honderd bladen, waarin meer dan acht honderd vogelen afgebeeld zyn, de Heer CATESBY had reeds de Americaansche Vogelen, in zyne natural history of Carolina uitgegeven met schoone afbeeldingen; dit werk zoo ver de Vogelen aangaat, is naderhand met dat van den Heer EDWARDS, in de Neurenburgsche verzameling gebragt en door de Heer SELIGMAN in V. deelen infolio uitgegeven in het Hoogduitsch, en word thans in het Hollandsch vertaald, door den Heer Sepp, boekverkoper te Amsterdam onzen landgenooten medegedeeld; alle deze werken heeft de Heer LINNAEUS zyn zamenstel van Vogelkunde opgemaakt; doch het werk van den Heer

D'Au-

V O O R R E E D E.

D'AUBENTON *ſcheen zyn Ed. doe noch niet gezien te hebben*

Ik heb in dit kort begrip, niet alleen alle de vogelen, welke in de gemelde verzameling zyn, 'er by gevoegd, als ook die welke de kundige Heer VOSMAER in zyne beſchryving van vreemde Dieren gegeven heeft, endie ik in de verzamelingen der liefhebberen hebbe gevonden; en dus twee honderd vogelen meer dan de Heer LINNAEUS aangetekend; maar ik heb ook alle de aanbalingen van dezelfde Heer met de ſchryvers zelfs vergeleken, hier door zullen myne omſchryvingen dikwerf eenigzints met de Latynſche uitgaaf verſchillen, het geen ik nodig acht den lezer vooraf te berichten; ondertuſſchen is het verre van myn oogmerk, het werk van den Heer Houttuyn te willen onderkruipen, ik geef dit werk ſlechts als een handboek voor yder bende van Dieren, om het in het maken van verzamelingente kunnen gebruiken, al het overige van het gezegde van den Heer Houttuyn zoude ik kunnen wederleggen; maar zal allcen kortelyk ter myner verdediging aanmerken, vooreerſt, dat ik het werk zelf niet gecorrigeerd heb, als onder het drukken niet in de ſtad geweest zynde.

Ten tweeden op het berigt van zyn ontfangen briefje, wyze ik zyn Ed. na de Philosophia botanica van LINN. p. 278 n. 336 genere convenientes eaſdem poſſident vires.

Laurus cinnamomum, malabathrum, Caſſia, Camphora, Saſſafras.

En pag. 285 zegt LINNAEUS Aromaticæ odore & guſtus fere conveniunt.

Cinnamomum; Laurus, Saſſafras, Camphora, macis Cardamomum Caryophyllus &c.

En pag. 282 Lactefcentes plantæ communiter venenatæ, minus autem ſemifloſcuſæ.

En pag. 283 Lactefcentes vix venenatæ ſunt ut prenanthes Chondrilla . . . . . Lactuca. Het zy men hier de Lactuca voor Endivie of Latuw neeme.

Om rent zyn Ed: mineralogiſche Aanmerkingen zal

V O O R R E E D E.

ik alleen zeggen, dat de Heer Houttuin een greote dienst aan alle de liefhebbers der Scheikunde, en Mineralogie zal doen, met te bepaalen, wat eigentlyk de kalk is, en of zy tot het Dieren, of Delfbaar ryk behoort, dat is of zy eene Dierlyke of Delfstof zy?

Ik heb dit alleen ter myner verdediging willen stellen; al het verdere in *Ed. Voorrede* laat ik aan zyn plaats, en zal het zelve met stilzwygen voorbygaan; en om alle onvriendelykheid van myne zyde te myden, gelieve de lezer, bl. 284 de woorden van by gebrek van na te zien, uit te doen.

Onder de door my vermeerderde vogels, zyn er waar-schynelyk, verscheidenheden van kunne, of plumaadje voor byzondere zoorten te boek gesteld, maar dit zal ligtelyk verschooning vinden, wanneer men nagaat, vooreerst hoe veel het mannetje van het wyfje in veelen verschild, hoe zeer de vogelen veranderen in het ruyen, en hoe weinig wy weten van de huishouding der uitlandsche vogelen.

De volgende bende der dieren van beiderley leven by de liefhebbers der Dierkunde; in grooter getal gevonden wordende, zullen hun *Ed. my* verpligten indien zy my eenige nieuwe zoorten konnen aan de hand geven; de verzamelingen van de Heeren Burmannus, van der Meulen, en de Heer Juliaans alhier, nevens myne eigen, hebben my reeds een goeden voorraad verschaft, van welke ik een dankbaar gebruik hoop te maken.

Verder laat ik dit werk ter beoordeeling van ieder kundig liefhebber der natuurlyke historie; overtuigd, dat dwalen menschelyk is; en het toneel der geschaapen wezens zoo uitgebreid, dat het de palen van het menschelyk begrip en kennis verder te boven gaat, vinden myne geringe pogingen indezen eenige goedkeurig, zal ik met lust, dit werk, in myne ledige uren voortzetten; en geen moeite aan het zelve sparen.

P. BODDAERT.

II. BEN.

I I. B E N D E.

VOGELN.

I. ROOFVOGELN,

DE BEK KROM AAN WEDERZYDEN
MET EEN HOEK UITSTEEKENDE.

XLI. GIER. De *bek* recht, met eene omgekromde punt.

Het *Hoofd* kaal, van vooren met eene naakte huid.

De *tong* gespleeten.

Condoor
(*Gryphus.*)

I. **G**IER, met een knobel op den kruin, zoo lang als het hoofd, de keel naakt. *Condor*, BUFF. *Hist.*

Iste. Deel. IIde. Stuk. H

Nat.

Nat. des Ois. tom. I. pag. 143.

Woond in Chili, Peru, Vrankryk, (BUFFON.)

Harpey 2. GIER, met een gedekt hoofd, dat
(*Harpyja.*) met lange vederen gekuifd is.

NB. Deze behoord tot de Arenden.

Woond in Mexico, Brasíl.

Koning van 3. GIER, met kwabbige neusgaten,
de wouwen. naakte kruin en hals *. EDW.

(*Papa.*)

Hist. of Birds. II. tab. 4.

BRISS. *Ornith.* I. p. 470. tab.

36. BUFF. *Hist. Nat. des*

Ois. I. (tab. 428. *color.*) tab. 6.

Woond in America.

Zwarte 4. GIER, met een bultig hoofd, en
(*Monachus.*) zwart ligchaam. EDW. 290.

Woond in Arabien.

Menschen- 5. GIER, die boven gryns is, met zwarte
eeter te slagpennen, en eenen witten bek.

(*Aura*)

CATESB. *Carol.* I.

tab. 6. BUFF. *Ois.* p. 137.

tab. col. 187.

Woond in America.

Baard

Baard Gier 6. GIER, die witagtig is, met eenen
(*Barbatus.*) bruinen rug, eene gebaardde
keel, rooden bek, en eene
zwarte streep op het hoofd.
EDW. *Birds.* 106.
Woond in Africa.

Percnopte- 7. GIER, met zwarte flagpennen, die
rus aan den buiten rand grys zyn,
(*Arendgier.*) behalven de buitenste. BUFF.
Hist. Nat. tab. 426.
Woond in Zuid Europa.

Zwarte GierA. GIER, die bruin is, met eenen wit-
ten halsband, en geele poo-
ten. BUFF. *Ois.* tab. 425.

Witstaart 8. GIER, met een geelwas, en gee-
(*Albicilla.*) le pooten, witte hairvede-
ren, met zwarte puntjes.
Woond in Europa.

XLII. V A L K. Een kromme bek, aan het hoofd
(FALCO.) met was voorzien.

Het *Hoofd* dicht gepluimd.

De *Tong* gespleeten.

a. met geel was.

H 2

V A L K,

Gekroonde 1. VALK, met roestcoleurig was,
 (*Coronatus.*) gepluimde pooten, die wit
 en zwart gestipt zyn, de zy-
 den met zwart gestreept.
Gekroonde Arend. E D W.
Birds. III. p. 31. tab. 224.

Zwarte 2. VALK, met geel was, half ge-
 Arend pluimde voeten, zwartagtig
 (*Melanætus.*) roestcouleurig ligchaam, met
 geele streepen *. *Aigle Com-*
mun. BUFF. *Hist. Nat.* tom.
 I. pag. 68. tab. 409.
 Woond in Europa.

Witkop 3. VALK, met geel was, half ge-
 (*Leucocephalus.*) pluimde voeten, een bruin
 ligchaam, met een wit hoofd
 en staart. *Pygargue*, BUFF.
Ois. I. p. 78. tab. 411.
 Woond in America in Eu-
 ropa.

Zee Arend 4. VALK, met geel was, half ge-
 (*Osfifraga.*) pluimde voeten, roestco-
 leurig ligchaam, de staart
 vederen van binnen wit *.
 Or-

Orfraye, BUFF. *Oif.* tom.
I. p. 88. tab. 112. 415.
Woond in in Europa.

Groote 5. VALK, met geel was, roefstagtig
Arend. geele pooten, roeft coleurig
(*Chrysaetos.*) bruin ligchaam, eenen zwart-
ten ftaart, die aan haar begin
gegolfd is *. *Grand Aigle*,
BUFF. *Hift. Nat. Ois.* I. tab,
410.
Woond in Europa.

Gemeene 6. VALK, met geel was, gepluim-
Arend de roeftbruine pooten, een
(*Fulvus.*) bruinen rug, een witten band
over den ftaart. *Edw. Birds*
I. tab. 1. *Aigle Commun.*
BUFF. *Hift Nat.* tab. 419.
Woond in Europa.

Boeren 7. VALK, met geel was, en poo-
Arend ten, asgraauw ligchaam, met
(*Rusticolus.*) wit gegolfd, en eenen witten
halsband.
Woond in Zweeden.

Tunetaan- 8. VALK, met geel was en poo-
 sche ten, een blaauwagtig lig-
 (*Barbarus.*) chaam, dat met bruyng evlakt
 is, een effen borst en geban-
 deerden staart.
 Woond in Barbaryen.

Blaauwagti- 9. VALK, met geel was, winkbraau-
 ge wen, pooten en buik, de
 (*Coerulefcens.*) wangen in eenen witten om-
 trek. EDW. *Birds.* 108. tab.
 108.
 Woond in Afien.

St. Martins' 10. VALK, met wit was, rosfe
 Vogel pooten, grys blaauw lig-
 (*Cyaneus.*) chaam, een boog over de
 winkbraauwen, die na de
 keel loopt. *The blue Hawke.*
 EDW. *Glean.* 1. pag. 33. tab.
 215. *Oifeau Sint Martin.*
 BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 1. p.
 165. tab. 459.

Steenvalk 11. VALK, met geel was en poo-
 (*Pygargus.*) ten, een afchgrauw lig-
 chaam, de buik bleek, met
 rosfe

rosse in de lengte loopende
streepen, de oogkring wit.
Rochier, BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. I. pag. 227. tab. 447.
Woond in Europa,

NB. De door LINNAEUS aangehaalde
plaats van EDWARDS, komt hier
in het geheel niet te pas.

Wouw 12. VALK, met geel was, een ge-
(*Milvus*.) spleeten staart, roest coleu-
rig ligchaam, en witte kop*.
Milan, BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
I. p. 154. tab. 422.
[b. zwarte wouw met een
geelen staart. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. I. p. 139. tab.
472.
Woond in Europa.

Valk 13. VALK, met geel was en poo-
(*Gentilis*.) ten, het ligchaam aschgrauw
met bruine vlakken, de staart
met vier zwartagtige ban-
den*. *Faucon*, *Hist. Nat.*
tom. I. p. 197. tab. 470. 421.
Woond in Europa.

Boomvalk 14. VALK, met geel was en pooten, een bruinen rug, witten hals, bleeken buik, met lange bruine streepen *. *Soubuse*, BUFFON. *Hist. des Ois.* I. tab. 443.
Woond in Europa.

Buiferd. 13. VALK, met geel was, bruin lichaam, bleeken buik, met bruine vlakken. *Buse*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. I. pag. 161. tab. 419.
Woond in Europa.

Steenfmet. 16. VALK, met geel was, een rood
zer geelen rug, met zwart gestipt,
(*Tinunculus.*) de borst met bruine streepen,
de staart rond. *Cresserelle*,
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. p. 224. tab. 401. 471.
Woond in Europa.

Blaaskop 17. VALK, met geel was en pooten, een bruinagtig wit lichaam,

chaam, en beenagtige oogdekken.

Woond in Suriname.

Spotter 18. VALK, met geel was en pootten, witte wenkbrauwen, bruin ligchaam, dat met wit gevlakt is, eene zwartering om den witten kruyn.
(*Cachinnans.*)
Woond in Zuid America.

Van Hud- 19. VALK, met geel was en pootten, een bruinen rug, witte fons baay winkbrauwen, een blauwen
(*Hudsonis.*) band op de vleugels. EDW. *Birds.* tom. 3. tab. 107. pag. 107.
Woond in Hudsons baay,

Americaan- 20. VALK, met geel was, een bruin sche Sper- rooden kop, en buik, blaauwagtige vleugels. CA-
wer TESB. *Carol.* I. tab. 5. *Ae-*
(*Sparverius.*) *salon*, BRISS. *Ornith.* I. p. 386. tab. 32. fig. 1.

Duiven ee- 21. VALK, met geel was en pootten,
H 5

ter
(*Columbarius.*)

ten, een bruin lichaam, dat van onder bleek is, een bruy-nen staart, met vier witte banden. CATESB. I. pag. 3. tab. 3.
Woond in America.

Gestreepte
(*Supercilio-*
sus.)

22. VALK, met geel was, pooten en winkbraauwen, een bruy-n ligchaam met bleek gewolkt, de flagpennen roest coleurig met zwart gebandeerd.
Woond in Suriname.

Kobez
(*Vespertinus.*)

23. VALK, met geel was, pooten en winkbraauwen, de stuyt en dyen roestcoleurig, [het ligchaam bruy-n blaauw, de buik witagtig blaauw.]
Woond in Ingrien.

Zwemmer
(*Lanarius.*)

24. VALK, met geel was, de pooten en bek blaauw, het ligchaam van onder met lange zwarte vlakken. *Lanier*, BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. p. 192.
Woond in Europa.

VALK,

Vorkſtaart. 25. VALK, met donker was, en gee-
 (Furcatus.) le pooten, het ligchaam van
 boven bruyn, van onder wit-
 agtig, eenen zeer langen ge-
 vorkten ſtaart. BUFF. *Hift.*
Nat. Ois. I. p. 174. CATESB.
Carol. I. tab. 1.
 Woond in America.

Viſcharend 26. VALK, met blaauw was, en poo-
 (Haliaetus.) ten, het ligchaam van bo-
 ven bruin, van onder wit,
 de kop witagtig. *Balbufard.*
 BUFF. *Hift. Nat. Ois.* tom,
 I. pag. 81. tab. 414.
 Woond in Europa.

Giervalk 27. VALK, met blaauw was, een
 (Gyrfalco.) bruyn (gevlakt) ligchaam
 van onder met aſchgrauwe
 ſtreepen, de zyden der ſtaart
 wit. *Gerfaut.* BUFF. *Hift.*
Nat. Ois. I. tab. 210. 462,
 446.
 Woond in Europa.

Wespen bui. 28. VALK, met zwart was, half ge-
 pluim-

zerd
(*Apivoras.*)

pluimde geele pooten, eenen
afschgrauwen kop, en band
op den staart, die aan de
punt wit is. *Bondrée*, *Buff.*
Hist. Nat. Ois. I. pag. 163,
tab. 420

Woond in Europa.

Elzen Bui-
zerd
(*Aeruginos-*
us)

29. VALK, met groen was, het lig-
chaam roestverwig, de kruin,
de keel, en de schouders
bleek *. *Busard*, *Buff. Hist.*
Nat. Ois. I. tom. I. p. 172.
tab. 424.

Woond in Europa.

Havik
(*Palumbus*.)

30. VALK, met zwart was, en gee-
le pooten, het ligchaam
bruyn, de stuurvederen met
bleeke banden, de wenk-
braauwen wit. *Autour*, *Buff.*
Hist. Nat. Ois. tom. I. p.
182. tab. 461. 418.

Woond in Europa.

Sperwer.
(*Nifus.*)

31. VALK, met groen was, en gee-
le pooten, een witten met
grys

grys gegolfden buik, den
staart met zwarte banden.
Epervier, BUFF. *Hist. Nat.*
Ois I. pag. 178. tab. 466.
467. 412.
Woond in Europa.

Kleine 32. VALK, met bruin was, en gee-
le pooten, het ligchaam van
onder wit, de ftuurpennen
bruin met zwart gebandeerd;
Emerillon. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. I. pag. 228. tab. 462.
Briff. Ornith. I. pag. 315.
tab. 30. fig. 1.
Woond in Europa.

XLIII. U I L. De *bek* krom zonder wafch.
(STRIX.) De *neusgaten* met nederleggen-
de vederen gedekt.
Het *Hoofd* groot, met groote
ooren, en oogen.
a. gehoornde Uilen.

Schuifuit 1. U I L, met een ros ligchaam*. *Grand*
(*Bubo*.) *Duc*, BUFF. *Hist. Nat. Ois*;
I,

I. tom. I. pag. 435.

b. E D W. *Glean.* I. tab.

227.

Woond in Europa.

Noordsche 2. UIL, met hoorens, en een witagtig ligchaam.
(*Scandica*);

Woond in Lapland.

Americaan- 3. UIL, met hoorens, het ligchaam
sche van boven roestverwig van
onder aschgrauw, de vleu-
gels met vyf witte stippen.

C A T E S B. *Carol.* I. pag. 7.
tab. 7.

Woond in America.

KleineSchui- 4. UIL, met zes oorvederen*. Mo-
fuit *yen Duc*, B U F F O N, *Hist.*
(*Otus.*) *Nat. Ois.* I. pag. 272. tab.

29.

Woond in Europa.

Tartarische (A) UIL, met ooren, een aschgrauw
ligchaam, dat met bruin ge-
golfd is, van onder witagtig,
de schouders zwart. P A L L.

Reiz.

Reiz. tom. I. pag. 456.
Woond aan de Wolga en Sa-
mara.

Rans Uil 6. UIL, met ooren van eene veder.
(*Scops.*) *Petit Duc*, BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. tom. I. pag. 281. tab.
436.
b Zonder hoorens.

Witte 6, UIL, met eenen gladden kop, wit-
(*Nyctea.*) agtig ligchaam, met van el-
kander staande maansgewy-
se bruine vlakken. EDW.
Birds II. tab. 61. *Harfang*,
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. pag.
308. tab. 458.
Woond in Noorwegen.

GrooteNagt 7. UIL, met een ongehoornd hoofd,
Uil roest coleurig lichaam, zwar-
(*Aluco.*) te oogkringen, de voorste
voorpennen gekarteld. *Hu-*
lotte, BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
I. pag. 285. tab. 441.
Woond in Europa.

UIL,

Kerk Uil   8. UIL, zonder hoornen, met geele
(*Flammea*.)   oogen, een geel ligchaam,
met witte stipjes, van onder
witagtig, met zwarte stip-
jes *. *Effraye*, BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. tom. I. pag. 291.
tab. 440.

Woond in Europa.

Kras Uil, 9. UIL, zonder hoornen, met blau-
(*Stridula*.)   we oogen, een roest coleu-
rig ligchaam, de derde stuur-
pen langer *. *Chatuant*,
BUFF. *Hist. Nat. des Ois.* I.
pag. 281. tab. 437.

Woond in Europa.

Steen Uil, 10. UIL, zonder hoornen, het lig-
(*Ulula*.)   chaam van boven bruin, met
wit gevlaakt, de staart met
witte banden. *Chouette* BUFF.
Hist. Nat. des Ois. tom. I.
pag. 296. tab. 438.

Woond in Europa.

Caparochi (B) UIL, zonder hoornen, die van boven
bruin is, met witte stippen,
den,

de buik wit met bruine banden, de wangen wit met zwart geboord. *Sparrow Hawk*. EDW. *Birds*. II. tab. 62. BUFF. *Hist. Nat. des Ois*. I. p. 306.
Woond in Europa.

Rosse van Cayenne (C)UIL, zonder hoornen, met een rosgeele bek, het geheele lichaam geelagtig ros, met zwarte golfjes, *Chatuant de Cayenne*. BUFF. *Hist. Nat. Ois*. I. pag. 311. tab. 442.
Woond in Cayenne.

Lyk Uil 11. UIL, zonder hoornen, met een bruin ligchaam, en geele oogen. BUFF. *Hist. Nat. des Ois*. I. pag. 296. BRISS. *Ornith*. I. pag. 518. tab. 37. f. 2.
Woond in Europa en America.

Havik Uil (D)UIL, zonder hoornen, eene kleine zwarte vlak agter de oogen, een geelagtig ligchaam,

dat van onder bleeker is.

PALL. *Reiz.* I. pag 455.

Woondaan de Kaspische Zee.

Langstaart (E)UIL, zonder hoornen, met zwarte oogkringen, roeft coleurig ligchaam, van onder wit met zwarte streepjes, een zeer lange staart. PALL. *Reiz.* I. p. 455.

b. bruine met witte vlakken, en een zeer lange staart, en geele oogkringen. BUFFON, *Hist.*

Nat. Ois. I. tab. 463.

Woond in Siberien.

Van St. Do-(F)UIL, zonder hoornen, met eene mingo groote bek roeft coleurige vlakt ligchaam, de borst weinig, en de buik niet gevlakt. *Chouette de St. Domingue.* BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* I. tom. I. pag. 313.

Woond in St. Domingo.

Kat Uiltje 12. UIL, zonder, hoornen de slagpen-
nen

(*Pasferina.*)   nen met vyf reyen witte vlak-
ken. *The little owl.* EDW.
Glean. I. tab. 228. *Cheveche.*
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. p.
300. tab. 439.
Woond in Europa, doch is
zeer zeldzaam.

XLIV. KLAUWIER. De *Bek* regt van boven
(*Lanius.*)   verheven rond, van on-
der zoo dik als hoog,
het opperkaakbeen aan
de punt uitgerand, de
punt krom.

Vorkstaart. 1. KLAUWIER, met eene gevorkte
(*Forficatus.*)   staart, eene opstaande kuif,
het ligchaam groenagtig
zwart. *Gobemouche Hupé.*
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tab.
189. BRIS S. *Ornith.* tom.
II. pag. 388. tab. 37.
fig. 4.

NB. Deze is een vliegevangster.
Woond in Madagascar.

Fingah. 2. KLAUWIER, met een gevorkte
 (*Cærulescens.*) staart, het ligchaam blaauw
 agtig zwart, en de buik wit.
 BUFF. *Hist. Nat. des Ois.* I.
 pag. 244. EDW. *Birds.* II.
 pag. 56. tab. 56.
 Woond in Bengalen.

Gekuifde 3. KLAUWIER, met een wigsgewyze
 (*Cristatus.*) staart, het hoofd gekuifd,
 het ligchaam rosachtig van
 onder geelros, met bruinge-
 golfd. EDW. *Birds.* II. 54.
 pag. 54.
 Woond in Bengale.

Van Canada 4. KLAUWIER, met eene wigsgewyze
 (*Canadensis.*) staart een gekuifd hoofd, een
 ros ligchaam, dat van onder
 wit is. BUFF. *Hist. Nat. des*
Ois. I. pag. 250. tab. 475. f. 2.

Langstaart. 5. KLAUWIER, met een wigsgewyze
 staart, die zeer lang en
 blaauwagtig is, de kop ge-
 gekuifd.

Woond in Senegal.

KLAU-

Louizaan- 6. KLAUWIER, met een wigsgewyze
sche staart, afchgrauw ligchaam,
(*Ludovicianus.*) zwarte roeyvederen, die
aan hun begin, en ftuurve-
deren die aan hunnen tip
zwart zyn. BUFF. *Ornith.*
II. pag. 162. tab. 15. f. 2.
Woond in Louizanien.

(*Nengeta.*) 7. KLAUWIER, met een wigsgewyze
staart, met eene witte punt,
een afchgrauw ligchaam, dat
van onder witagtig is. EDW.
Glean. II. tab. 318.
Woond in Brasil.

Krombek 8. KLAUWIER, met een wigsgewyze
(*Curviro-* staart, een wit ligchaam,
stris.) zwarten rug, vyfflag pennen,
met eene witte vlak. *Vanga*
BUFFON. *Hift. Nat.* tom. I.
pag. 247. tab. 228. BRISS.
Ornith. II. pag. 191. tab. 19.
f. 1.
Woond in Madagascar.

Rouwdrager 5. KLAUWIER, met eene wigsgewyze
I 3 staart,

(Collaris.)

staart, een zwart ligchaam,
van onder wit, de slagpen-
pen aan 't begin wit. BUFF.
Hist. Nat. Ois. I. pag. 237.
tab. 477.

Woond aan de Kaap.

Witte

(A) KLAUWIER, die geheel wit is,
met zwarte slagpennen *.
Woond in West Indien.

Luconſche 10. KLAUWIER, met eene wigsgewyze
(*Luconensis.*)

staart, eene zwarte vlak aan
de ooren, roſſe slagpennen
die aan den tip wit zyn.
BRISS. *Ornith.* II. pag. 166.
tab. 18. fig. V.

Woond in het Eiland Luçon.

Wagter

(Excubitor.)

11. KLAUWIER, met een wigsgewy-
ze ſtaart, die aan de zyden
wit is, een graauwen rug,
zwarte vlerken met een witte
vlak *. *Piegrieche griſe.*

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. tom.
I. pag. 134. tab. 445.

Woond in Europa.

KLAU-

Schat Exter 12. KLAUWIER, met eenen byna wigs-
(*Collurio.*)

gewyze staart, gryzen rug,
de middelste roeipennen een
kleurig, de bek lood coleurig.

NB. Deze is een byzoort der voorige.
Woond in Europa.

Zwartoor (B) KLAUWIER, met een gryzen rug,
een lange zwarte vlak agter
de oogen. *Piegrieche rouffe.*
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. p.
139. tab. f. 1.

b. Met een roode borst.

BUFF. *ibid.* tab. 32. 1.

Woond in Europa.

Tyran 13. KLAUWIER, die aschgrauw is,
(*Tyrannus.*) van onder wit, met een zwarte
kruin, en een lang roffe
streep. CATESB. *Carol.* I.
tab. 55.

Woond in America.

Schach. 14. KLAUWIER, die geelagtig is, met
een zwart voorhoofd, en
vleugels.

Woond in China.

Tyran van 15. KLAUWIER, die zwart is, van onder geel, de kruin met eene

Brasil.
(*Pitangua.*)

geelee streep, een witte band aan de oogen. *Tyran de Brasil.* BUFF. *Hist Nat.* tab. 212. Woond in Brasil.

NB. Deze is een Vliegevangen.

Gestreepte 16. KLAUWIER, met eene ronde staart.
(*Doliatus.*)

een wit ligchaam met zwart gegolfd. EDW. *Glean.* I. p. 35. tab. 226. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. pag. 238. tab. 297. fig. 2. het wyfje. BRISS. *Ornith.* II. pag. 187. tab 29. fig. 3.

Woond in Cayenne.

Zwart Kop 17. KLAUWIER, die ros is, van onder wit, met een zwartagtig

(*Rufus.*)

groen hoofd. *Schetbé.* BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tom. I. pag. 248. n. 7. tab. 298. 1. BRISS. *Ornith.* II. pag. 185. tab. 17. fig. 2.

Woond in Senegal.

KLAU-

Geelkruin 18. KLAUWIER, die zwart is, van onder rood, met eene geele kruin en Dyen. *Gonolec*, BUFFON. *Hist. Nat. des Ois*, I. pag. 249. tab. 56.
Woond in Senegal.

Geelbuik 19. KLAUWIER, die is bruin met eene
(*Sulphuratus*.) zwarte kop, en eene witte band om dezelve. *Becarde a Ventre Jaune*. BUFF. *Hist. Nat. Ois*. I. pag. 247. tab. 296. BRISS. *Ornith*. II. tab. 14. fig. 1. 2.
Woond in Cayenne.

Afchgrauwe 20. KLAUWIER, die graauw is, van onder witagtig, de kruin, en
(*Senegallus*.) band om de oogen zwart; zwarte stuurvederen, die aan de punt witzyn. BRISS. *Orn*. II. pag. 167. tab. 17. fig. 1.
Woond in Senegal.

Van Madagafcar 21. KLAUWIER, die afchgrauw is, van onder witagtig, met zwarte oogstreepen, en roffe stuur

*censis.)*vederen. BRISSON. *Ornith.* II.

pag. 264. tab. 16. fig. 1. 2.

NB. Dezelve met den hals van voren

zwart. BUFFON. *Hist. Nat. des**Ois.* tab. 299. fig. 1. 2.

Woond in Madagascar.

Bruine van 23. KLAUWIER, die gryns is, van onder wit, met roode koonen, en stuit. EDW. *Birds.* IV.

*(Emeria.)*tab. 190. *Rougequeue.* BUFF.*Ois.* pag. 243.

Woond in Bengale.

Spotter

(Focosus.)

24. KLAUWIER, met eene ronde staart,

een gryns ligchaam, het onderste ooglid puper, de aars bloed rood.

Woond in China.

Schraaper.

(Infaustus.)

25. KLAUWIER, die de rug gryns heeft,

de stuurvederen ros, de twee middelste aschgrauw, met een zwarte band, de staart rond.

Woond in de Boffchen.

KLAU-

Witstreep 26. KLAUWIER, die grys is, van onder
(*Faustus.*) roestcoleurig, met een wit
streepje agter de oogen.
Woond in China.

Zwartkap (C) KLAUWIER, dse staalblauw is, met
een zwart hoofd, en stuur-
vederen, de roeipennen
zwart, doch de buitenste wit.
BUFF. *Hist. Nat. des Ois.*
I. pag. 246. tab. 377.

NB. Dezelve dog zonder witte roei-
pen. *idem.* tab. 404.
Woond in Cayenne.

Groene (D) KLAUWIER, die groen is, met een
witte hals, kop, borst en buik,
de zylingfche stuurvederen
zwart. *Thcha- Chert- bé.*
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. p.
248. tab. 374.

Blaauwe (E) KLAUWIER, die van boven blaauw
is, en van onder wit. BUFF.
Hist. Nat. Ois. I. pag. 237.
tab. 298. fig. 1.
Woond in Indien.

KLAU-

Wit Buik (F) KLAUWIER, die zwart is, met de
 buik wit. BUFF. *Hist. Nat.
 des Ois.* I. pag. 437. tab. 9.
 fig. 1. *Angraien.*
 Woond in Madagascar.

Cha-bert (G) KLAUWIER, die donker blaauw is,
 van onder wit. BUFF. *Hist.
 Nat. des Ois.* I. tab. 38. f.
 2. *Cha-bert.*
 Woond in de Manilles.

II. D U N B E K K E N.

De Bek zamengedrukt van boven gekield*.

XLV. PAPEGAY De *Bek* krom en uitgerand,
 (PSITTACUS) de onderkaak naar boven
 ge-

* IK heb deze benaaming (schoon ook oneigen) beter ge-
 agt, dan die van *Exterbenden* (PICAE), welken de Heer LIN-
 NAEUS gebruikt, wyl de meeste weinig naar *Exters* gelyken,
 en zy alle den bek zaamen gedrukt hebben.

geboogen, de *Neusgaaten*
aan den grond van den bek.
De *tong* vleesagtig rond.
Twee voor en twee agter
vingers.
a. Langstaartige.

West Indi- 1. PAPEGAY, met eene lange staart,
sche Rave die rood is, de roeipennen
(*Macao.*) van boven blaauw, van on-
der ros, de koonen naakt,
en rimpelig. EDW. *Birds.*
IV. p. 158. BUFF. *Hist. Nat.*
tab. 12.
Woond in Zuid America.

GroeneW.I.2. Langstaartige PAPEGAY, die groen
Rave is, met blaauwe vlerken,
(*Militaris.*) naakte koonen, met gepluim-
de streepen.
Woond in . . . . .

Blaauwe Ara 3. Langstaartige PAPEGAY, die van bo-
(*Ararauna.*) ven blaauw, en van onder
geel is, met naakte koonen,
met gepluimde streepen *.
EDW. *Birds.* IV. 159. BUFF.
Hist.

Hist. Nat. tab. 36.

Woond in Zuid America.

Mafcarin 5. *Langstaartige* PAPEGAY, die bruin
(*Obscurus.*) is, met roode naakte wan-
gen, het hoofd graauw, en
zwart, de staart graauw.
BUFF. *Hist. Nat. des Ois.*
tab. 35.
Woond in Africa.

Edele 6 *Langstaartige* PAPEGAY, met naakte
(*Nobilis.*) koonen, en roode schouders.
Woond in Asia.

Groene van 7. *Langstaartige groene* PAPEGAY, met
Basil naakte koonen, blaauw en
(*Severus.*) groenen stuorpennen, die van
onder purper zyn. EDW.
Glean. tab. 229. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. I. tab. 383.

Roodborst (A) *Langstaartige* PAPEGAY, die groen
(*Hæmatodes.*) is met eene rode borst, en
blauwe kaaken. LINN. *mant.*
alt. p. 524. EDW. *Glean.* I.
tab. 232.

Lang-

(b.) Langstaartige Parkietten.

Woond in Oostindien.

Van Gingi 8. *Langstaartige* PAPEGAY, die groen
(*Eupatria*.) is, met roode schouders.
BRISS. *Ornith.* IV. pag. 343.
BUFFON. *Hist. Nat. Ois.*
tab. 239.
Woond in Grugo.

Japanfche 9. *Langstaartige* PAPEGAY, die groen
(*Japonicus*.) is, van onder en aan de zylingfche ftuurpennen rood,
de roeipennen blaauw.
Woond in Japan.

Ambonfche 10. *Langstaartige roode* PAPEGAY, met
(*Amboinensis*.) eene blaauwe rug, de vleugels met eene groene vlak.
BUFF. *Hist. Nat. des Ois.* I.
tab. 240. BRISS. *Ornith.* IV.
pag. 378. tab. 28. fig. 2.
Woond in Amboine.

Blaauwkop 11. *Langstaartige groene* PAPEGAY, met
blaauw.

(*Cyanocephalos.*)

blauwe kop en keel. BUFF.
Hist. Nat. des. Ois. . . . tab.
 192 BRISS. *Ornith.* tom. IV.
 p. 359. tab. 19. fig. 4.
 Woond in Oostindien.

Van Borneo 12. *Langstaartige roode* PAPEGAY, met
 (*Borneus.*)

groene tippen aan de stuur
 en roeipennen, een blauwe
 vlak op de vleugels, en brui-
 ne oogkringen. EDW. *Birds.*
 IV. tab. 173.
 Woond in Borneo.

Geele Parkiet 13. *Langstaartige geele* PAPEGAY, met
 van Angola
 (*Solstitialis.*)

groene dekvederen, roode
 oogkringen, de buitenste
 slagpennen blauw.
 Woond in Guinea en Ango-
 la.

Van Carolina 14. *Langstaartige groene* PAPEGAY, met
 (*Carolinensis.*)

eene geele kop, hals en koo-
 nen. CATESB. *Carol.* I. tab. 4.
 Woond in Carolina en Vir-
 ginia.

Lang-

Alexanders 14. *Langstaartige PAPEGAY*, die groen
Papegay is, met eene roode halsband,
(*Alexandri.*) en borst, Ring Parkiet. EDW.
Glean. III. tab. 292. fig. 1.
BUFFON. *Ois. Hist. Nat.* pag.
215.
Woond in China, Bengale.

Geelwang 15. *Langstaartige groene PAPEGAY*, met
Parkiet roffe wangen, de stuur en
(*Pertinax.*) roeipennen grys. EDW. *Glean.*
I. tab. 234. *Yellow Faced*
Parkiet. BUFFON. *Hist. Nat.*
Ois. 528.
Woond in America.

Roode 16. *Langstaartige groene PAPEGAY*, met
blauwkop een rood voorhoofd, blauw
Parkiet agterhoofd, en roeipennen.
(*Canicularis.*) EDW. *Brids.* IV. tab. 176.
Woond in America.

Bruinwang 17. *Langstaartige groene PAPEGAY*, met
Parkiet eene blauwe kruin en stuur-
(*Aeruginosus*) vederen. EDW. *Birds* IV.
tab. 177.
Woond in America.

Iste. Deel. IIde Stuk. K *Lang.*

RosbekPar- 18. *Langstaartige groene PAPEGAY*, met
kiet roode bek, en pooten, de
(*Rufirostris.*) stuurvederen aan de tippen
blauw, de oogkringen vleesch
couleur. EDW. *Birds*. IV. p.
175.
Woond in America.

Bonte Par- 19. *Langstaartige geelen groene PAPEGAY*,
kiet het agterhoofd, keel en borst
(*Ornatus.*) rood, de kruin en ooren
blauw, de oogkringen graauw
EDW. *Birds* IV. pag. 174.
tab. 174.
b. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
tab. 61.
Woond in Asia.

Parkiet van 20. *Half Langstaartige groene PAPEGAY*,
Cayenne de dekvederen der blaauwe
(*Agilis.*) slagpennen oranje, de staart
van onder rood, de oogkrin-
gen graauw. EDW. *Birds* IV.
168.
Woond in America.

Gevlakte (B) *Langstaartige geele PAPEGAY* *, met
groene

Parkiet groene vlakken op den rug en vleugels, de dekvederen groen, de slagpennen violet, de staart groen, de buitenste vederen violet. BUFF. *Hist. Nat.* tab. 525.
Woond in Cayenne.

Roodkop (C) *Langstaartige groene* PAPEGAY, die
Parkiet van onder geel is, de kop paarsch, het voorhoofd en de wangen rood, de keel zwart, eene vlak op de vlerken. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tab. 264.
Woond in Gingi.

Geelkop (D) *Langstaartige groene* PAPEGAY, met
Parkiet eene geele kop, rood voorhoofd en wangen, de rand der vleugelen geel. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tab. 499.
Woond in Carolina.

Witkop (E) *Langstaartige* PAPEGAY, die groen
Parkiet. is, van onder rozen rood, de kop wit met een zwarten

band over het voorhoofd,
twee zwarte vlakken aan de
keel, een geele band over de
vleugels. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. I. 517.

Woond in Pondichery.

Bruinftaart (F) *Langftaartige* PAPEGAY, die groen
Parkiet is met een roestwervige buik
en ftart. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. 85.

Woond aan de ftart Magel-
lanes.

WitoogPar- (G) *Langftaartige groene* PAPEGAY, met
kiet witte oogkringen, de fchou-
ders carmyn rood. BUFFON.
Ois. Hist. Nat. p. 407.

Woond in Gujana.

Blaauwftaart(H) *Langftaartige groene* PAPEGAY, die
Parkiet de ftart blaauw heeft, de bin-
nenfte ftuurvederen geel,
de middelste wit, ende bui-
tenste blaauw BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 359.

Woond in Cayenne.

Lang-

Geteekende (I) *Langstaartige groene PAPEGAY*, die
 Parkiet de vleugels van onder geel
 heeft, de hals met roode
 vlakken. BUFFON. *Hist. Nat.*
Ois. p. 187.
 Woond in Gujana.

Geschilder. (K) *Langstaartige groene PAPEGAY*, de
 de Parkiet hals bruin, de randen der hals
 vederen oranje, een oranje
 vlak onder de oogen, het
 voorhoofd, en de wangen
 donker violet, de stuurve-
 deren blaauw, de buik en
 staart rood bruin. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 144.
 Woond in Cayenne.

Arlequin (L) *Langstaartige roode PAPEGAY*, het
 agterhoofd, het bovenste
 der rug, een band onder de
 oogen naar den rug, het on-
 derlyf en de stuurpennen
 blaauw, de roeipennen geel.
 BUFF. *Hist. Nat.* tab. 143.
 Woond in Oost Indien.

c. Kort staarten met een
gelyke staart.

* *Cacatous*.

Gekroonde 21. *Kortstaartige* PAPEGAY, met een roo-
(*Coronatus*.) de kuif met blaauwe tippen,
Woond in Surinamen.

GeelkuifCa-22. *Kortstaartige* PAPEGAY, die wit is
catoe met een geele kuif *. EDW.
(*Cristatus*.) *Birds*. IV. 160. BUFF. *Hist*.
Nat. Ois. 14.
Woond in China.

Witkuif (M) *Kortstaartige* PAPEGAY, die wit is
met eene witte kuif. BUFFON.
Hist. Nat. Ois. 163.
Woond in de Moluccos.

Roodkuif (N) *Kortstaartige* PAPEGAY, die wit is,
de kuif van onder rood *,
BUFF. *Ois.* 498.
Woond . . . . .

Roodbek (O) *Kortstaartige* PAPEGAY, die wit is,
de bek en stuit rood. BUFF.
Hist. Nat. Ois. tom. 491.
Woond

Woond in de Philippynsche
Eilanden.

b. Kleine BRISS. *Ornith.*

IV. p. 212.

Roodvlerk 23. *Kortstaartige* PAPEGAY, die vuil wit
(*Erythroleucus.*) is, de stuit vleugels en staart

rood. BRISS. *Ornith.* IV.

p. 214.

Woond . . . . .

Blaauwe 24. *Kortstaartige* PAPEGAY, die gryis is
(*Eritbacus.*) met witte oogkringen, en

roode staart. BUFF. *Ois.* tab.

311.

Woond in Jamaica.

** *Loeries.*

Snapper 25. *Kortstaartige* PAPEGAY, die rood is,
(*Garrulus.*) met graauwe oogkringen,

de kaaken en vleugels groen,

de stuurvederen aan de be-

nedenstn helft blaauw. EDW.

Birds. IV. tab. 172.

b. roode met groene, en

zwarte vleugels, de

K 4

stuur-

stuurvederen geel, de
onderste half groen.

- c. roode met groene vleu-
gels, en zwarte roey-
vederen, de staart, groen
van onder geel, eene
geele vlak op de rug.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.*

215.

Woond in de Moluccos.

Juffertje 26. Kortstaartige PAPEGAY, die rood
(*Domicella.*)

is, de kruin violet, de vleu-
gels groen, de schouders en
knieën blaauw. EDW. *Birds.*

IV. 171. *Hist. Nat. Ois.*
119.

Woond in Oostindien.

- d. De kruin zwart het ag-
terhoofd blaauw, de ag-
terste dekvederen rood,
met groene randen.

BUFF. *Hist. Nat. tab.*

84.

Lorre 27. Kortstaartige PAPEGAY, die purper
(*Lory.*)

is, met eene violette kruin,
de

de borst staart en knieën
blauw*. *Edw. Bids. IV. 170.*
Woond in Oostindien.

Bewaasfem- (P) *Kortstaartige* PAPEGAY, die rood is,
de de schouders, en roeipennen
blauw, de rug en buik, als
met eene blauwe waasssem
gedekt.

VOSM, *Beschryv.*

Fraaye (Q) *Langstaartige* roode PAPEGAY, de
schouders, buik, en roeipen-
nen blauw. *Buff. Hist. Nat.*
tab. 518.

Woond in Amboine.

NB. Deze komt zoo na aan de bewaas-
femde, dat zy misschien slechts
eene byzoort is.

Blaauwstuit (R) *Langstaartige* PAPEGAY, die rood
is, met een blauwe stuit,
en vlak boven de vleugels,
de stuurvederen zwart. *Buff.*
Hist. Nat. Ois. 519.

Woond in China.

*** *Papegayen.*

Blaauwkop 28. *Kortstaartige* PAPEGAY, die blaauw
(*Coerueo Cephala*.) is, met een groene buik,
stuit en staart, de kruingeel,
de stuuren roeipennen rood.
BRISS. *Ornith.* IV. p. 317.
Woond in Gujana.

Zwarte 29. *Langstaartige* PAPEGAY, die zwart
(*Niger*) is, met een blaauwagtig
zwart ligchaam, de bek en
oogkringen witagtig EDW.
Birds. I. tab. 5. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. tab. 502.
Woond in Madagascar.

Witkop 30. *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is,
(*Leucocephalus*.) met blauwe slagvederen, een
wit voorhoofd. EDW. *Birds.*
IV. 166.
(b.) BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
tab. 335.
Woond in Martinique. b en
in Senegal.

Veelverwige 31. *Kortstaardige* PAPEGAY, die groen
(*Lucionensis*.) is, met een blaauw agter-
hoofd en stuit, de vleugels
met

met zwart, blaauw, en rood
getekend. BRISSON. *Ornith.*
IV. pag. 295. tab. 22. f. 2.
Woond op het eiland Luçon.

Bonte   31. *Kortstaartige* PAPEGAY, die groenis,
Amazoon   met geel gevlaakt, een blaauw
(*Aestivus.*)   voorhoofd, bloedroode
                     schouders, en roode oog-
                     kringen. EDW. *Birds.* IV.
                     162. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
                     tab. 120.
                     Woond in de West Indien.

Amazoon   33. *Kortstaardige* PAPEGAY, die groen-
(*Amazonius.*)   achtig is, met een geel voor-
                     hoofd, en oranje koonen*.
                     BRISSON. *Ornith.* IV. p. 257.
                     Woond in Surinamen.

Paradys   34. *Kortstaardige* PAPEGAY, de keel,
Papegay   buik, en stuurvederen rood.
(*Paradisi.*)   BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 336.
                     Woond op het eiland Cuba.

Aurora   (S) *Kortstaartige* PAPEGAY, de schoft
                     en randen der vleugelen
                     rood.

rood. LINN. *Mantiff. alt.* pag.
524. BUFF. *Hift. Nat. Ois.*
tab. 13.

Woond in America.

Gerande (T) *Langstaartige groene PAPEGAY*, met
eene blaauwe kruin, en vleu-
gels, welkers veeren geel
gerand zyn. BUFF. *Hift. Nat.*
Ois. 287.

Woond op het Eiland Lu-
çon,

Aardige 35. *Kortstaartige groene PAPEGAY*, met
(*Festivus.*) een purper voorhoofd, de
wenkbraauwen en keel
blaauw, de rug bloedrood.
Woond in Indien.

Brasiliaan- 36. *Kortstaartige groene PAPEGAY*, met
sche een rood aangezicht de, slag-
(*Trafchen-* pennen blaauw, de oogkrin-
sis.) gen afchgrauw. EDW. *Birds*
161. tab. 161.
Woond in Brasilien.

Roodvlak- 37. *Kortstaartige groene PAPEGAY*, met
rood

kige
(*Autumnalis*) een rood voorhoofd, en eene
roode vlak op de vleugels,
de kruin en voorste roeipen-
pen blaauw. EDW. *Brids* IV.
tab. 164.
Woond in Amerika.

Havik Pape- 38. *Kortstaartige groene* PAPEGAY, met
gay
(*Accipitri-*
nus) eene graauwe kop, de borst
en hals met violet gevlaakt,
de stuur en roeiveeren aan
de tippen blaauw. EDW. *Brids*
IV. tab. 165. BUFF. *Ois.* tab.
526.
Woond in Cayenne.

Roodgatje 39. *Kortstaartige groene* PAPEGAY, met
(*Menstruus.*) een blaauwagtig hoofd, en
het onderste der rug rood.
EDW. *Glean.* III. tab. 314.
BUFF. *Ois.* tab. 384.
Woond in Suriname.

Vuyle 40. *Kortstaartige bruinagtige* PAPEGAY,
(*Sordidus.*) met een blaauwe keel, de
staart, en vleugels groen,
de bek en onderrug rood.
ED.

EDWARD. *Birds*. IV. 167.
Woond in Mexico.

Bruine (U) *Kortstaartige* PAPEGAY, die bruin is, van onder violet, de stuorpennen, en slagpennen blaauw, de stuit scharlakken rood. EDW. *Glean*. III. tab. 315. BUFF. *Ois*. tab. 408.
Woond in Cayenne.

Zwartkop 41. *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is, van onder geel met een zwarte kruin, witte borst, en vleeschroode oogkringen. EDW. *Birds* IV. tab. 167. BUFF. *Ois*. 526.
Woond in Cayenne.

Geelstuit (V) *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is, het aangezicht blaauw, de roeivederen blaauw, de middelste met een roode vlak, de borst bleek rood, met groen gewolkt, de staart geel.

geel. BUFFON. *Ois.* 360.

Woond in de Havana.

Bloedvlak (W) *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is, het bovenste der vleugels rood, de slagpennen aan het uiterste geel in, 't midden rood daarna blaauw, de punten groen. BUFFON. *Hist. Nat.* p. 212.

Woond in Cayenne.

Chineefche (X) *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is, met blaauwe en roode vlakken op de borst, de randen der vleugelen blaauw, de stuur en roeipennen van onder zwart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 514.

Woond in China.

Roodkeel (X)* *Kortstaartige groene* PAPEGAY, met een wit voorhoofd, roode keel blaauwe stuurvederen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 549.

Woond in Martinique.

Kort-

Roodbuik (X)** *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is, het hoofd en wangen blaauw, de buik rood, de roeivederen blaauw, de stuurvederen rood, van onder geel. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 548.

Woond in Martinique.

**** Parkieten.

Geelkeel 42 *Kortstaartige* groene PAPEGAY, met een roode keel.

Woond in Indien.

Bonte (Y) *Kortstaartige* PAPEGAY, uit rood en zwart gemengeld. EDW. *Brids* IV. 163.

Woond . . . . .

Vuilkleurige (Z) *Langstaartige* PARKIET, met een blaauw voorhoofd, rood achterhoofd, en borst, eene blaauwe vlak agter de oogen, het lyf groen en geel. EDW. *Birds* 174.

Blaauwkaak (Aa) *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is,

is, het voorhoofd, de keelen
wangen blaauw, de slagve-
deren blaauw, de drie bin-
nenste van boven rood, de
hals van vooren oranje. EDW.
Glean. I. pag. 43. tab. 230.
Woond . . . . .

Oranje Bek (Ba) *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is,
de slagpennen en randen der
vleugelen blaauw, de zyden
rood, het bovenkaak been
oranje. EDWARD. *Glean.* I.
pag. 44. tab. 231.
Woond in . . . . .

Parkiet van 43. *Kortstaartige* PAPEGAY, die
Senegal
(*Senegallens.*)
van onder geel is, met een
aschgrauw hoofd. BUFFON.
Hist. Nat. Ois. 288.
Woond in Senegal.

Geelkeel. (Ca) *Kortstaartige* groene PAPEGAY, met
een geele keel. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 190. 1.
Woond in America.

Goudvlerk 44. *Kortstaartige groene PAPEGAY*, de vleugels met eene oranje en blaauwe vlak, de oogkringen wit. EDW. *Glean.* II. tab. 293.

Woond in Indien.

Roodborst 45. *Kortstaartige PAPEGAY*, die groen is, met een roode borst en (Galgulus.) sluit, de kruin blaauw, [de bovenrug met eene geele band.] BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 190 2.

Woond in Peru.

Guineefche 46. *Kortstaartige PAPEGAY*, die groen is, met een rood voorhoofd, Mos de staart oranje, met eene (Pullarius.) zwarte band, de oogkringen graauw. EDW. *Glean.* I. tab. 237. fig. 1.

Woond in Guinea.

Brasiliaan- 47. *Kortstaartige PAPEGAY*, die geelag- fche Mos tig groen is, met eene blaau- (Paserinus.) we vlek op de vleugels, die van onder blaauw zyn. ED-

WARDS

WARDS *glean.* II. pag. 51. tab.

235.

Woond in America.

Blaauwrand (Da) *Kortstaartige groene* PAPEGAY, met
blauwe slagpennen, de bui-
tenste groen. BUFFON. *Hist.*
Nat. Ois. 455.

Woond aan de Kaap.

Blaauwe (Ea) *Langstaartige* PAPEGAY, die schoon
blauw is van onder wit. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 455. 2.

Woond in Peru.

Graauwrand (Fa) *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen
is, met een rood voorhoofd
en stuit, een blauwe vlak on-
der de oogen, de buitenste
slagpennen graauw. BUFFON.
Hist. Nat. Ois. 520. 1 (het
mannetje) 2 (het wyfje.)

Woond in de Philipynsche
Eilanden.

St. Thomas (Ga) *Kortstaartige groene* PAPEGAY, met
Parkiet eene geele kruin. BUFFON:

L 2

Hist.

Hist. Nat. des Ois. 456. 1.
Woond op het Eiland St.
Thomas.

Wit oog (Ha) *Kortstaartige groene PAPEGAY*, met
eene geele stuit, en vlak op
de vleugels. *Buff. Hist. Nat.*
Ois. 456. 2.
Woond in Cayenne.

Groen Par- (Ja) *Kortstaartige groene PAPEGAY**, met
kietje eene roode kop en wangen,
de benedenrug zeegroen.
Buff. Hist. Nat. Ois. 60.
Woond in Guinea.

XLVI. TOUCAN. De *Bek* zeer groot, ledig van
binnen verheven, zaagsge-
wyze uitgesneden.
Aan de punt krom.
De Neusgaaten agter den grond
van den bek.
De tong vederig.

Groene 1. TOUCAN, die groen is, met eene
(*Viridis.*) geele buik, en roode stuit*.
EDW.

EDW. *glean.* III. tab. 329.

BRISS. *Ornith.* IV. p. 423.
tab. 33.

Woond in Cayenne.

Pepereeter 2. TOUCAN, die groen is, vanvooren
(*Piperivorus.*) zwart, de dekvederen der
stuurpennen, en de dyen
rood *. EDWARDS *glean.* III.
tab. 330.
Woond in Cayenne.

Aracari 3. TOUCAN, die groen is, met eene
(*Aracari.*) roode band om den buik,
de dekvederen der staart en
stuit rood, de buik geel.
BRISS. *Ornith.* IV. p. 426.
tab. 33. fig. 2.
Woond in Zuid America,

Vischeeter 4. TOUCAN, die zwartagtig is, met
(*Piscivorus.*) eene roode band om den buik,
de dekvederen der staart
wit. EDW. *Birds.* I. pag. 64.
tab. 64.
Woond in Zuid America.

Toucan 5. TOUCAN, die zwartagtig is, met
(*Tucanus.*) eene geele band, fluit en
dekvederen der staart. EDW.
glean. I. tab. 238.
Woond in Zuid America.

Zwarte 6. TOUCAN, die zwartagtig is, met
(*Picatus.*) eene geele borst, de dekve-
deren der staart, endeszelfs
punten rood, de fluit zwart.
BRISS. *Ornith.* IV. 408.
Woond in Zuid America.

Geelborst. 7. TOUCAN, die zwartagtig is, de
(*Dicolorus.*) buik, staart, dekvederen
rood, de keel geel. EDW.
glean. III. 329. *.
Woond in Cayenne.

Toco (A) TOUCAN, die zwart is, met een
blauwe kring om de oogen,
de oogplaats rood, de keel
geelachtig wit, de dekvede-
ren der staart wit. BUFFON.
Hist. Nat. Ois. 81.

Zwarthals (B) TOUCAN, die groen is, het hoofd,
hals

hals en keel zwart, de buik
geel, met eene roode band,
de dekvederen der staart
rood. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
166.

Woond in Brasiliën.

Withals (C) TOUCAN, die zwart is, met eene
driehoekige vlak om de oog-
gen, de hals wit, met een
roode band, de stuit rood,
de staarts dekvederen geel.
BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 262.
Woond in Cayenne.

Geelhals (D) TOUCAN, die zwart is, de vleu-
gels groen, de keel geel, de
borst rood, als ook de staart,
de dekvederen der staart
geel. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 307.
Woond in Braziliën.

Roodbuik (E) TOUCAN, die zwart is, van onder
groen, met eenen rooden hals-
band, eene geele keel, met
roode vlakken en zwarte ban-

den, de buik rood. BRISS.
Ornith. IV. p. 421.
 Woond in Mexico.

Schoone (F) TOUCAN, die groen is, met rood
 en blaauw geschakeerd. BRISS.
Ornith. IV. pag. 423.
 Woond in America.

Geele (G) TOUCAN, die geel is, met eene
 zwarte band, aan weery-
 den van den bek, tot aan de
 borst, de staartvederen zwart
 en wit gemengeldt. BRISS.
Ornith. IV. pag. 432.
 Woond in America.

Blaauwe (H) TOUCAN, die uit blaauw en asch-
 graauw gemengeld is, het
 bovenkaakbeen geel, het on-
 derste purper zwart. BRISS.
Ornith. IV. pag. 433.
 Woond in Mexico.

Momot 8. TOUCAN, met drie vingeren aan de
 (*Monota.*) pooten, de twee middelste
 stuurvederen zonder vederen
 aan

aan het midden. Edw. *Glean.*

III. tab. 328.

Woond in Brasiliën.

XLVII. JAGERVOGEL. De *Bek* verheven rond,

(BUCEROS) van boven gekield,
krom, groot, zaagsge-
wyzegetand. Het voor-
hoofd naakt en been-
agtig gebult.

De *Neusgaaten* agter
den grond der bek.

De tong scherp en kort.

Drie vingers aan de voe-
ten.

Calao

(*Bicornis.*)

1. JAGERVOGEL, met een beenig plat
voorhoofd, dat van vooren
twee hoorns heeft *. Edw.
Glean. II. tab. 281. D.

Woond in China en Straat-
Sunda.

Indiaansche 2. JAGERVOGEL, met eene beenige
water-raaf plaat, die van vooren zon-

(*Hydrocorax.*)

der punt is, de buik geel.

L 5

ros.

ros. BUFFON. *Hist. Nat.*
Ois. 283.

Woond in de Moluccos.

Neushoorn 3. JAGERVOGEL, met een hoorn van
(*Rhinoceros.*)

het kaakbeen na vooren om-
kromd *. EDW. *Glean.* II.

281 B. ALLAMAND. *oscon.*

Woond in Indien.

Langbek 4. JAGERVOGEL, met een glad voor-
(*Nasutus.*)

hoofd, de stuurvederen aan
het boven en onder eind wit.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 260.

Woond in Senegal.

XLVIII. OSSENPIKKER. De *Bek* regt, byna
(BUPHAGA.) vierhoekig.

De kaakbeenderen ge-
bult, en na vooren
noch bultiger. Het
bovenste kaakebeen
aan wederzyden hoe-
kig.

De *Neusgaten* door-
loopende.

Os.

Africaansche 1. OSSENPIKKER, met een bruin lig-
 (Africanus.) haam van onder geel. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 293.
 Woond in Senegal.

XLIX. TEEKEETER. De *Bek* zamen gedrukt,
 (CROTOPHAGA.) half eirond geboogen,
 van boven gekieldt, het
 boven kaakbeen aan we-
 derzyden hoekig.

Viervinge- 1. TEEKEETER, zwart, derandender
 rige vleugelen groen, de oogkrin-
 (Ani.) gen karmynrood *. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 102. 1. *Bout*
de Petun.
 Woond in Africa en America.

Drievinge- 2. TEEKEETER, die zwart is, met ee-
 rige ne groene weerschyn. BUFF.
 (Ambulato- *Hist. Nat. Ois.* 102. 2. *Bout*
 ria.) *de Petun.*
 Woond in America.

L. RAAF. Den *Bek* verheven rond, en gekield.
(CORVUS.) De *Neusgaaten* met neerleggende hairtjes bedekt.

De *Tong* kraakbeenig gespleeten.

Kaapsche 1. RAAVE, die zwart is, met eene
Kaauw groene weerschyn, een effen
(*Hottintotus.*) staart, en zeer lange knevelbaarden. BUFF. *Hist Nat.* Ois. 226.

Woond aan de Caap.

Raave 2. RAAVE die zwart is, de rug met
(*Corax.*) eene blaauwe weerschyn, de staart byna rood *. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 495.

Woond in Europa.

Kraay 3. RAAVE, die blaauwagtig zwart is,
(*Corone.*) de staart rond, de stuurvederen gescheiden *. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 483.

Woond in Europa.

Roek 4. RAAVE, die zwart is, met een grys
(*Frugilegus.*) voorhoofd, de staart rond-

ach.

achtig. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
484. *Le Freux.*
Woond in Europa.

Bontekraay 5. RAAVE, die aschgrauw is, met een
(*Cornix.*) ne zwarte kop, vleugels en
staart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
76. *Corneille Mantelée.*
Woond in Europa.

Kaauw 6. RAAVE, die bruin is, met een grys
(*Monedula.*) agterhoofd, het voorhoofd,
de vleugels, en staart zwart*.
Albin Ois. I. tab. 14.
Woond in Europa.

Meerkol 7. RAAVE, met de dekvederen der slag-
(*Glandarius.*) pennen blaauw, met witte
en zwarte dwarsstreepjes, het
ligchaam roestkoleurig ge-
mengeld*. BUFFON. *Hist. Nat.*
Ois. 481. SEPP. Inlandsf. Ve-
gel. I.
Woond in Europa.

Kuifkaay 8. RAAVE, die blaauw is met zwaarte
(*Cristatus.*) streepjes op de dekvederen,
en

en eene zwarte halsband.

EDWARDS. *glean.* I. tab. 239.

BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 529.

Woond in Noord Amerika.

Zwartkeel 9. RAAVE die violet is, van onder wit,
(*Cyanus.*)

de keel en het voorhoofd
zwart, de staart aan de punt
wit. BRISS. *Ornith.* II. pag.
52. tab. 4. fig. 1.

Woond in Cayenne.

Nootekraa- 10. RAAVE, die bruin is, met witte
ker
(*Cargata-*
etes.)

stippen, eene zwarte staart
en vleugels, de staartvederen
aan de punt wit, de mid-
delfte als afgesleeten *. EDW.
glean. I. 240. BUFF. *Hift.*
Nat. Ois. 50.

Woond in Europa.

Balecasser 11. RAAVE, die groenachtig zwart is,
(*Balicaßius.*)

met eene gevorkte staart.
BRISS. *Ornith.* II. pag. 31.
tak. 2. fig. 1.

Woond in de Philipynsche
Eilanden.

RAAVE,

Africaansche 12. RAAVE, die violet zwart is, met
(*Afer.*) eene wigvormige staart.

BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 5.

22. BRISS. *Ornith.* II. pag.

40. tab. 3. fig. 2.

Woond in Africa, Senegal.

Exter 13. RAAVE, die wit en zwart is, met
(*Pica.*) eene wiggewyze staart *.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 488.

Woond in Europa.

Senegalsche 13. RAAVE, die violet zwart is, met
(*Senegallensis.*) eene wigsgewyze staart, en
zwarte pooten. BRISS. *Or-*

nith. II. pag. 40. tab. 3. f. 2.

Woond in Senegal.

Kortstaart 14. RAAVE, die groen is, de vleuge-
(*Brachyurus.*) len met eene witte vlak, en
van onder en de streepen van

het hoofd geel. EDW. *glean.*

III. tab. 324. BUFF. *Hist.*

Nat. des Ois. 258. *Merle de*

Bengale.

Woond in Ceylon, Benga-

len enz.

Deze

NB. Deze behoort tot de *Maerlaers*.

Canadische 13. RAAVE, die bruin is, met een
(*Canadensis*.) geelagtig voorhoofd, van onder en aan de tippen der stuurpennen wit. *BRISS. Ornith.* II. pag. 54. tab. 4. f. 2.
Woond in Canada.

(b) RAAVE die blaauw is, met eene zwarte kop, en stuurvederen, die aan de tippen wit zyn, de hals van agter, borst en buik wit. *BUFF. Hist. Nat. Ois.* 373.

Woond in Cayenne.

Withals (A) RAAVE, die zwart is, met een witte hals en borst. *BUFF. Hist. Nat. der Ois.* 327.
Woond in Senegal.

Cierlyke (B) RAAVE, die bruin is, met eene
Gaay witte keel van onder, ende kruin van het hoofd geel de wenkbraauwen streep wit.
BUFF. Hist. Nat. Ois. 249.
Woond in Cayenne.

RAAVE,

Pruinvlerk (B*) RAAVE, die zwart is, met rood
 coleurige ftuur-en roeipen-
 nen. BUFFON. *Hift. Nat.*
Ois. 538.
 Woond in Senegal.

Driecoleu- (C) RAAVE, die groen is, van onder
 rige vuil oranje, de roeipennen
 en ftuurvederen zwart, het
 voorhoofd grys, met zwarte
 hairtjes. BUFF. *Hift. Nat.*
Ois. 521.
 Woond in Cayenne.

Grolle (D) RAAVE, die donker afchgrauw is,
 met een purpere kop en vleu-
 gels, de ftuurvederen purper
 en groen. BUFF. *Hift. Nat.*
Ois. 523.
 Woond . . . . .

Bergraav 14. RAAVE, die zwartagtig is, met ee-
 (Pynocorax.) ne geele bek, en zwarte
 pooten. BRISS. *Ornith.* III.
 tab. 1. fig. 2.
 Woond op de Zwitferfche
 bergen.

Iste. Deel. IIde Stuk. M RAA-

Berg Kaauw 15. RAAVE, die violet zwart is, met
(*Graculus.*) geele bek en pooten. AL-

BIN. *Ois.* I. tab. 24.

Woond op de Zwitfersche
Bergen.

Eenzaame 16. RAAVE, die groenagtig is, met
(*Heremita.*) een geelagtig hoofd, roode

bek en pooten. ALBIN. *Ois.*

III. tab. 16. pag. 16.

Woond op de Zwitserfche
Bergen.

LI. SCHARLAER. De *Bek* zonder haitjes, met
(*CORACIAS.*) eene kromme punt.

De tong kraakbeenig, ge-
spleeten.

Duitsche 1. SCHARLAER, die blaauw is, met ee-
Papegaay ne roode rug en zwarte roei-
(*Garrulus.*) pennen *. EDW. *Birds.* III.

109. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*

486.

Woond in Europa.

Indiaansche 2. SCHARLAER, die blaauw is, van
voo-

(*Indicus.*)   vooren bleek ros, met eene
groene kruin. EDW. *glean.*
III. 326.
Woond in Indien.

Caffer   3. SCHARLAER, die blaauw is met de
(*Cassra.*)   buitenste rand der slagpen-
nen geel. J. BURMAN. *Afbeeld.*
van Kaapsche Dieren.
Woond in Ethiopien.

Oosterfche   4. SCHARLAER, die groen is, met ee-
(*Orientalis.*)   ne blaauwe gestreepte keel,
deftuurvederen zwart aan de
tippen. BRISS. *Ornith.* 2. p.
75. tab. 7. fig. 2.
Woond in Ooft Indien.

Bengaalfche.   SCHARLAER, die rosagtig is, van
(*Bengalen-*
sis.)   onder blaauwagtig, de hals
van onder met bleek violet
gestreept, deftaart geheel.
BUFF. *Hift. Nat. des Ois.* 285.

Gestaarte   6. SCHARLAER, die rosagtig is, van
(*Caudatus.*)   onder aanden hals, met bleek
violet gestreept, de uiterfte

stuurvederen zeer lang. BUFF.

Hist. Nat. Ois. 88.

Woond in Angola.

Witkop (A) SCHARLAER, die ros van onder
blauw, het voorhoofd, wan-
gen en keel wit, de middel-
ste stuurvederen groen, de
buitenste zwart en zeer lang,
de pooten geel met witte
vlakken. BUFF. *Hist. Nat.*
des Ois. 326.
Woond in Senegal.

Blaauwstaart (B) SCHARLAER, die rood is, de staart
blauw, aan de tippen pur-
per en zwart. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 501.
Woond in Madagascar.

LII. GEELVOGEL. De *Bek* kegelagtig, recht,
(ORIOLOS.) en zeer scherp, het boven-
ste kaakbeen wat langer.
De tong puntig en dubbeld.
De vingers 3. 1.

Wielewaal 1. GEELVOGEL, die geelis, met zwarte

(*Galbula.*) te bek, streepen en leden,
de buitenste stuurvederen
van agter geel*. EDW. Ois.
26. *Loriot.*
Woond in Europa, en in
Oost-Indien.

Chineefche 2. GEELVOGEL, die geel is, met zwarte
(*Chinensis.*) te vleugels die aan de tippen
geel zyn, een zwarte band
op het agter hoofd*. BRISS.
Ornith. II. pag. 326. tab.
33 fig. 1. *Loriot.* BUFF.
Hist. Nat. Ois. 579. *Cou-*
liavan.
Woond in China.

Zwartkop 3. GEELVOGEL, met een zwart hoofd,
(*Melanoccephalus.*) slagpennen, en de tippen
der middelste stuurvederen
zwart. EDW. *Birds* II. 77.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 79. *Loriot.*
Woond in Bengale.

Americaan- 4. GEELVOGEL, die hoog geel is, het
sche Specht . hoofd, de keel, de rug, de
M 3 roei

(*Icterus.*)

roei en ftuurpennen zwart,
met eene witte vlak op de
vleugels. BRISS. *Ornitb.* II,
pag. 86. tab. 8. fig. 1. CA-
TESB. *Carol.* III. tab. 5.
BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 532.
Woond in America.

Roodvlek 5. Zwarte GEELVOGEL, met de dek-
(*Phoeniceus.*) vederen der vleugelen rood,

BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 402.
Woond in Louifania.

Roodgatje 6. Zwarte GEELVOGEL, met eene roo-
(*Haemor- de ftaart. BUFFON. Hift. Nat,*
rboxs.) *des Ois.* 482.

Woond in Brafil,

Jupajuba 7. Zwarte GEELVOGEL, het agterfte der
(*Persicus.*) rug, de vlak der vleugelen,

en het agterfte der ftuurve-
deren geel. EDW. *glean.* III,
pag. 234. tab. 319. BUFF,
Hift. Nat. Ois. tab. 184.

Mexicaan- 8. Zwarte GEELVOGEL, van onder,
fche benevens het hoofd geel.

BRISS.

(*Mexicanus.*)   BRISS. *Ornith.* II. pag. 105.
Woond in Mexico.

Roodbuik 9. *Zwarte* GEELVOGEL, met gryze ban-
(*Guianensis.*)   den aan de vederen, de borst
en hals van onder rood.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 236.
fig. 2.
Woond in Guiana.

Baltimore 10. GEELVOGEL, die zwart is, van on-
(*Baltimore.*)   der ende de band over de vleu-
gelen geel. CATESB. *Carol.*
I. pag. 48. tab. 48. BUFF.
Hist. Nat. Ois. tab. 5. fig. 2.
Carouge de St. Domingue.
Woond in Noord America.

Bastaard 11. *Zwarte* GEELVOGEL, van onder
Geelvogel   geel, met een witte band
(*Spurius.*)   over de vleugels. CATESB.
Carolin. I. tab. 49. BUFFON.
Hist. Nat. Ois. 506. fig. 1.
Woond in Canada.

Driekleu- (A) *Bruine* GEELVOGEL, met een gee-
rige   le borst en buik, het hoofd
M 4   met

met geel gestippeld, een witte band over de vleugels. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 506. 2. Woond in Canada.

Bonana 12. *Goudgeele* GEELVOGEL, het hoofd
(*Bonana.*) en borst castanie bruin, de rug, staar- en roeipennen zwart. BRISS. *Ornith.* II, pag. 115. tab. 12. fig. 2. Woond in Zuid America.

Kleine van 13. *Goudgeele* GEELVOGEL, met de keel,
Peru staart en vleugels zwart. EDW, *glean.* II. tab. 243. Woond in Mexico, Jamaica, Peru.

Van St. Do- 14. *Zwarte* GEELVOGEL, met het ag-
mingo terlyf, de dekvederen, en
(*Dominica-* de vlak der vleugels geel.
nus.) BRISS. *Ornith.* II. pag. 121, tab. 12. fig. 3. Woond in St. Domingo,

Van Cayen- 15. *Zwarte* GEELVOGEL, met eene gee-
ne le vlak op de vleugels. ED-
WARDS,

(*Cogunenſis.*)

WARDS. *glean.* II. tab. 322.
Woond in Cayenne.

Geelkop
(*Icterocephalus.*)

16. GEELVOGEL, die zwart is, met
een geele kop en hals. EDW.
Glean. I. 323. BUFF. *Hift.*
Nat. Ois. 343.
Woond in Cayenne.

Gespikkelde
(*Melancholicus.*)

17. Gryze GEELVOGEL, met zwartge-
spikkeld, en eene band aan
de oogen. EDW. *Birds.* II.
85. *Schomburger.*
Woond in Mexico.

Kaapſche
(*Capenſis.*)

18. *Bruine Olyſſe* GEELVOGEL,
die van onder geel is, een
geeie vlak op de vleugels.]
BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 236. 1.
Woond aan de Kaap.

Goudvogel
(*Aureus.*)

19. GEELVOGEL, die goudgeel is,
met een zwarte keel, dek-
vederen en ſtaart. EDW.
Birds. III. tab. 112.
Woond in Ooſt-Indien.

Goudkop 20. Zwarte GEELVOGEL, met de dek-
(*Chrysocephalus*.) vederen van vleugels en
staart en de kruin geel.

BRISS. *Ornith. append.* pag.
38. tab. 2. fig. 2.

Woond in America.

Gekapte (B) GEELVOGEL, met een zwart voor-
hoofd, kruin en hals van
vooren, het agterhoofd ca-
staniebruin, de dekvederen
zwart met geelgerand. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 375.
Woond in Senegal.

Groene (C) GEELVOGEL, die groen is, van
onder rosbruin, de stuurve-
deren van onder geel, de
bekrood. BUFFON. *Hist. Nat.*
Ois. 328.
Woond in Cayenne.

Citroenvo- (D) GEELVOGEL, met een kleine af-
gel hangendekuij, het ligchaam
zwart, de beneden rug ca-
neel couleur, de staart geel,
de twee middelste stuurve-
deren

deren zwart. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 344. PALLAS. *Spécil. fasc.* VI. pag. 1. tab. 1. Woond in Cayenne.

LIII. MINO *. De *Bek* mesgewyze, verheven
(GRACULA.) rond, aan het grondstuk byna
naakt.

De *Tong* vleeschagtig, geheel,
puntig.

Drie voor-en een agtervinger.

Mino 1. MINO, die violet zwart is, met ee-
(*Religiosa.*) ne vlak op de vleugels, eene
geeie band op het agter-
hoofd*: EDWARDS. *Birds.* I-
17. tab. 17. BUFF. *Hist Nat.*
Ois. 268. *Mainate.*
Woond in Asien.

MI-

* DIT geslacht, by LINNAEUS, *Gracula* genoemd, noemt Doctor HOUTTUYN *Kaauwtjes*, doch de *Kauw* een soort van *Raaf* zynde, (zie bl. 15. n. 6.) heb ik dezelve liever den nieuwen naam van *Mino* gegeven, het bevat meest *Schaerlaers*.

Kaale 2. MINO, die aschgrauw is, met het
(*Calva.*) hoofd aan wederzyden naakt.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 200,
Merle Chauve.
Woond in de Philippynsche
Eilanden.

Stinkende 3. MINO, die zwart is, de buitenste
(*Foetida.*) roeipennen blaauw, eene
naakte band om den hals.
Woond in America.

Barita 4. MINO, die grysachtig is, met blaau-
(*Banita.*) we schouders, de buitenste
roeipennen. BRISS. *Ornith.*
II. pag. 103. tab. 10. f. 1.
Woond in America.

Kuif Meerelg. 5. MINO, die zwart is, de voorste
(*Cristatella.*) roeipennen aan hun begin,
en de stuurvederen aan hun
eind wit, de bek geel. EDW.
Birds. 19. tab. 19.
Woond in China.

Kleine Exter 6. MINO, die zwart blaauw is, de
van Bengale buik, een vlak op de vleu-
gels,

(*Sularis.*) gels, en de zydelingsche
 stuurpennen wit. EDWARDS.
Birds. III. 181. tab. 181.

Purpere 7. MINO, die violet zwart is, met ee-
 Maerlaer ne ronde staart. CAT. *Carol.*
 (*Quiscal.*) I. pag. 12. tab. 12.
 Woond in America.

Egyptische 8. MINO, die zee groen is, de buik
 Raaf roestcoleurig, de pooten
 (*Atthis.*) bloedrood. *Haspelq. Reiz.* II.
 deel. bl. 39.
 Woond in Egypten.

LIV. PARADYSVOGEL, De *Bek* gedekt door
 (PARADISEA.) de dikke veertjes van
 het hoofd.

De *zypennen* zeer lang.
 De twee bovenste
 stuurvederen naakt,
 en van een byzonder
 maakzel.

Gemeene 1. PARADYSVOGEL, met de roepennen
 (*Apoda.*) langer dan het ligchaam, de
 mid-

middelste stuurvederen borstelhairig *. *EDW. Birds*, III. 160. *Hist. Nat. Ois.* 254. Woond in Moluccos.

Koninglyke 2. PARADYSVOGEL, met de twee middelste stuurvederen als draaden, aan het eind maansgewyze gevedert. *EDW. Birds*, III. *BUFF. Hist. Nat. Ois.* 496. Woond in Amboine.

Donkere 3. PARADYSVOGEL, met eene naakte driehoekige vlak, de kop en hals bruin. *BUFFON Hist. Nat. Ois.* 219. Woond in de Philippynsche Eilanden.

NB. Deze is een Maerlaer, en heeft niets van een Paradysvogel.

LV. COUROUCOU. De *Bek* korter dan het hoofd, (TROGON) mesgewyze krom, de kaakbeenderen getand.

Cor.

Twee voor en twee agter-
vingeren.

Gestreepte 1. COUROUCOU, die aschgrauw is, de
(*Strigilatus.*) vleugels met witte streepen.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 452.
Woond in Cayenne.

Curucui 2. COUROUCOU, die goud groen is,
(*Curucui.*) van onder geel, de keel
zwart, [de borst blaauw.]
EDW. *Glean.* III. tab. 331.
Woond in Mexico, Brazil,
Peru.

Groene 3. COUROUCOU, die goudgroen is, van
(*Viridis.*) onder geel, de keel zwart.
BUFF. *Hist. Nat Ois.* 195.
Woond in Cayenne.

LVI. BAARDVOGEL. De *Bek* als de rug van
(*Bucco.*) een Mes zylingfch zaa-
mengedrukt, aan de
punt, die krom is, uit-
gerandt.

De

De gaping tot onder de
oogen loopende.

De *Neusgaaten* met twee
hairtjes gedekt.

Twee *voor-* en twee *ag-*
ter vingeren.

Kaapſche 1. BAARDVOGEL, die ros is, met ee-
(*Capensis.*) ne geele hals - en eene zwarte
borſt band. BUFF. *Hift.*
Nat. Ois. 395.

Woond in Ooſt en Weſt In-
dien.

Cierlyke (A) BAARDVOGEL, die groenis, met een
rood hoofd en keel, blaau-
we wangen, en hals band,
goudgeelee hals, rozen roode
borſt, oranje buik, de zyden
wit groen en bruin gevlakt,
de bek blaauw, met geel
gerand. BUFF. *Hift. Nat.*
Ois. 330.

Woond in Maynas.

Roodhoofd (B) BAARDVOGEL, die groen is, het
hoofd rood, de wangengeel,
als

als ook de keel, een rozen
coleure halsband, de buik
grauw met zwart gevlaakt.

Buff. *Hist. Nat Ois.* 331.

Woond in de Philippynsche
Eilanden.

Zwarte (C) BAARDVOGEL, die zwart is, de
kruyn en keel rood, de borst
geelwit, de dekvederen der
roeypennen gevlaakt. Buff.
Hist. Nat. des Ois. 206. 1.

Bruine (D) BAARDVOGEL, die de kruin en
keel rood heeft, het lighaam
bruin, de borst geel, met
zwart gevlaakt. Buff. *Hist.*
Nat. Ois. 206. fig. 2.

LVII. KOEKKOEK. De *Bek* spilronidagtig, krom,
(CUCULUS.) [eenigzins mesgewyze.]
De *Neusgaaten*, met uitstee-
kende randen.
De *tong* plat, pylsgewyze,
geheel.

Iste Deel IId. Stuk.

N

Twee

Twee voor- en twee agter-
vingers.

Zingende 1. KOEKKOEK, met eene ronde staart,
(*Canorus.*) die zwartagtig is, met wit
gestippeld *.
Woond in Europa.

Ooft-Indi- 2. KOEKKOEK, met eene ronde staart,
sche het ligchaam zwartagtig
(*Orientalis.*) groen; de bek bruyn. BUFF.
Hist. Nat. des Ois. 274. 1.
Woond in Ooft-Indien.

Gevlakte 3. KOEKKOEK, met eene ronde staart,
(*Mindanensis.*) het ligchaam goudgroen,
met bruyn en wit gevlakt,
van onder wit en zwart ge-
golfd. BUFF. *Ois.* 277.
Woond in Mindanao.

Langbek 4. KOEKKOEK, met eene wigsgewyze
(*Vetula.*) staart, het ligchaam bruyn-
agtig, van onder tegelrood,
hairtjes aan de oogen.
BRISS. *Ornith.* IV. pag. 116.
tab. 17. fig. 2.
Woond in Jamaica.

Spaan-

Spaansche 5. KOEKKOEK, met eene wigsgewyze
(*Glandarius*;) staart, het hoofd met eene
kleine kuif, en eene zwarte
band aan de oogen. EDW. II.
tab. 57.
Woond in Afrika.

Senegalsche 6. KOEKKOEK, met eene wigsgewyze
(*Senegallensis*;) staart, een grys ligchaam,
van onder wit, de kruin en
stuurvederen zwart. BRISS.
Ornith. IV. pag. 120. tab.
8. fig. 1.
Woond in Senegal.

Bonte 7. KOEKKOEK, met eene wigsgewyze
(*Honoratus*;) staart, het ligchaam zwart-
achtig, met wit gevlaakt,
van onder wit en aschgrauw
gegolfd. BUFFON. *Hist. Nat.*
Ois. 294.
Woond in Malabar.

Gestippelde 8. KOEKKOEK, met eene wigvormige
(*Punctatus*;) staart, een zwartagtig lig-
chaam, ros gestippeldt, van
onder ros met zwarte stree-
pen,
N 2

pen, de stuurvederen ros gebandeert. *BRISS. Ornith. IV. p. 134. tab. 10. fig. 2.*
Woond in Oost-Indien.

Gestreepte 9. KOEKKOEK, met eene wigvormige
(*Naevius.*) staart, het ligchaam bruyn en roestverwig gestreept: de keel van onder met bruynestreepen, de stuurvederen, met roffe tippen. *BRISS. Ornith. IV. p. 128. tab. 9. f. 1.*
Woond in Cayenne.

West-Indische 10. KOEKKOEK, met eene wigvormige
(*Americanus.*) staart, het ligchaam van boven aschgrauw, van onder wit, het onderste kaakbeen geel. *CAT. Carol. I. 9. tab. 9.*
Woond in Carolina.

Snepkoek- 11. KOEKKOEK, met een wigvormige
koek staart, het ligchaam grys en
(*Scolopaceus.*) bruin gewolkt. *EDW. Birds. II. pag. 59. tab. 59.*
Woond in Bengale.

Zwar.

Zwarte 12. KOEKKOEK, met eene wigsgewy-
(Niger.) ze staart, het ligchaam glanzig zwart, de bek geel. EDW. *Birds*. II. tab. 58.
Woond in Bengale.

Van St. Domingo 13. KOEKKOEK, met eene wigsgewy-
(Dominica- ze staart, het ligchaam grys
nus.) bruyn, van onder witagtig,
de drie zylyngsche ftuurveren met witte tippen. BRISS. *Ornith*. IV. pag. 110. tab. 9. fig. 26.
Woond in St. Domingo.

Van Cayenne 14. KOEKKOEK, met eene wigvormi-
(Cayanus.) ge staart, het ligchaam purper Caftanje bruyn, alle de ftuurvederen aan de punt wit. BRISS. *Ornith*. IV. p. 122. tab. 8. fig. 2. BUFFON. *Hift. Nat. Ois*. 211.
b. dito kleine. BRISS. *Ornith*. IV. pag. 124. tab. 16. fig. 2.
Woond in Cayenne.

Kaapſche (A) KOEKKOEK, die oranje kleurig roſ is, de rug olyfcoleur, de buik wit, de roeipennen donker bruyn, de ſtuurvederen aan de punt wit. BUFF, *Hift. Nat. des Ois.* 390.
Woond aan de Caap.

Zwarte (B) KOEKKOEK, die zwart is, van onder graauw, de ſchouders en randen der dekvederen wit, de bek rood. BUFFON, *Hift. Nat. des Ois.* 512.
Woond in Cayenne.

Toulou. (C) KOEKKOEK, die roſ is, de borſt bleek rood, de buik en ſtuurvederen zwart. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 265. 1.
Woond in Madagaſcar.

Blaauwe 15. KOEKKOEK, met eene ronde ſtaart, (Caeruleus.) en blaauw ligchaam. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 295. 1.
Woond in Madagaſcar.

Chineefche 16. KOEKKOEK, met eene wigvormige

- (*Chinensis.*) ge korte staart, het ligchaam blaauw van onder wit, de punten met een witte vlak. BRISS. *Ornith.* IV. pag. 157. tab. fig. 2.
Woond in China.
- Touraco 17. KOEKKOEK, met eene gelyke staart,
(*Perfa.*) het hoofd gekuifd, het ligchaam groen, de roeipennen bloedrood. EDWARDS. *Birds.* I. pag. 7. tab. 7.
Woond in Guinea.
- Brasiliaan- 18. KOEKKOEK, met eene gelyke staart,
sche een gekuifd hoofd, een rood
(*Brasilensis.*) ligchaam, en geele ftuurver-
deren. SEBA *Schatk.* I. tab. 66. fig. 2.
Woond in Brasil.
- Gekuifde 19. KOEKKOEK, met eene ronde staart,
(*Cristatus.*) een gekuifd hoofd, het ligchaam blinkende afchgrauw groen. BRISS. *Ornith.* IV. pag. 149. tab. 12. fig. 2.
Woond in Madagascar.

- VanCoro- 20. KOEKKOEK, met eene wigvormi-
 mandel ge staart, het ligchaam *zwar-*
 (Coroman- agtig groen, [de vleugels ros]
 dus.) van onder wit, eene witte
 halsband [en een witte vlak
 onder de oogen.] BUFFON,
Hist. Nat. Ois. 274.
 Woond in Coromandel.

- Gehoornde 21. KOEKKOEK, met eene wigvormige
 (Cornutus.) staart, eene dubbele kuif,
 en roestcoleurig ligchaam.
 WILLUGBHY. *Ornith.* tab. 38.
 Woond in Brasil.

- Siamsche 22. KOEKKOEK, met twee zeer lange
 (Paradisea.) stuurvederen, die aande punt
 verbreedten, het hoofd ge-
 kuifd, het ligchaam groen.
 BRISS. *Ornith.* IV. p. 151.
 tab. 14. fig. 1.
 Woond in Siam.

LVII DRAAYHALS. De *Bek* spilrond en
 (YUNX.) puntig,

De

De *Neusgaaten* hol, en
naakt.

De *Tong* spilrond, worms-
gewyze zeer lang, en
puntig uitloopende.

Twee *Voor-* en twee *ag-*
ter-vingers.

Draayhals 1. DRAAYHALS, die bruyn gryns is,
(*Torquilla*.) met wit en zwart gevlaakt,
de *stuurvederen* met zwarte
gegolfde banden. BRISS.
Ornith. IV. pag. 2. tab. 1.
fig 1.
Woond in Europa.

LIX. SPECHT. De *Bek* heel hoekig regt met ee-
(*Picus*.) ne wigsgewyze punt.
De *Neusgaaten* met borstel hai-
ren gedekt.
De *Tong* rolrond, wormsgewy-
ze zeer lang puntig, aan de
punt met agter overleggende
haairtjes.
Twee *voor-* en twee *agter-vin-*
geren.

[De fluurpennen puntig uitloopende.]

[De kruyn of het agterhoofd rood.]

Zwarte 1. SPECHT, die zwart is, met eene
(*Martius.*) roode kruyn *. ALBIN. *Ois.*
II. pag. 26. tab. 27.
Woond in Europa.

Witbek 2. SPECHT, die zwart is, met eene
(*Principalis.*) roode kuif, aan wederzyden
eene witte hals streep, de
twee rei roeipennen wit *.
CATESB. *Carol.* I. 1. p. 16.
tab. 16.
Woond in Noord- America.

Gedekte 3. SPECHT, die zwart is, met eene
(*Pileatus .*) roode kuif, de zyden van
het hoofd ende vleugels met
wit gevlaakt. CATESB. *Carol.*
I. p. 17. tab. 17.
Woond in Virginien.

Gebandeer- 4. SPECHT, die zwart is, met eene
roode

de

(*Lineatus.*)

roode kuif, eene witte band
aan weerzyden van den hals
tot het midden vanden rug.

BRISS. *Ornith.* IV. p. 31. tab.
1. fig. 2.

Woond in Cayenne.

Zwaluw

specht

(*Hirundina-*
ceus.)

5. SPECHT, die zwart is, met een
rood agterhoofd, de schou-
ders wit gestipt. ALBIN. *Ois.*
III. tab. 23.

Woond in Noord America.

Muschspecht
(*Pasferinus.*)

6. SPECHT, die olyf groenachtig geel
is, van onder met bruin en
wit gestreept, de kruin rood.
BRISS. *Ornith.* IV. pag. 72.
tab. 4. fig. 2.

Woond in St. Domingo.

Roodkop
(*Erythroceph-*
lus.)

7. SPECHT, die het hoofd-geheel rood
heeft, de staart en vleugels
zwart, de binnenste roei-
pennen wit. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. 117. CATESB. *Carol.* I.
tab. 20.

Woond in Noord America.

SPECHT,

Oranje 8. SPECHT, die van boven oranje is,
 Specht de nek, stuit en stuurpennen
 (*Aurantius*.) zwart. BRISS. *Ornith.* IV.
 78. tab. 6. fig. 1.
 Woond aan de Caap.

Goudspecht 9. SPECHT, die grysen zwart gestreept
 (*Auratus*.) is, de borst en keel zwart,
 de bek rood, de stuit wit.
 CATESB. *Carol.* I. pag. 18.
 tab. 18.
 Woond in Canada.

Van Caroli- 10. SPECHT, met eene roode kruyn
 na en nek, de rug met zwarte
 (*Carolinus*.) banden, de middelste stuurve-
 deren wit, met zwart gestipt,

Gegolfde 11. *Geel roode* SPECHT, met zwart ge-
 golfd, en bloedroode wan-
 gen. EDW. *Glean.* IV. tab.
 331.
 Woond in Suriname.

Groene 12. SPECHT, die groen is, met eene
 (*Viridis*.) roode kruin, [geele hals en
 stuit.]

stuit.] BUFFON: *Hist. Nat.*
Ois. 371.

Bengaalsche 13. SPECHT, die groen is, met eene
(*Bengalen-* roode kuif, eene zwarte nek
sis.) van vooren en van onder
wit met zwart gevlaakt. EDW.
Birds. IV. 182.

Woond in Bengale.

Halfbek 14. SPECHT, met de boven kaak kor-
(*Semiro-* ter.
stris.) Woond in Indien.

Ruige 15. SPECHT, met de rug overlangs ruig,
(*Pubescens.*) de buitenste stuurvederen
zwart, met vier witte vlak-
ken. CATESB. *Carol.* I. p.
21. tab. 21.
Woond in Virginien.

Hairige 16. SPECHT, met de rug overlangs
(*Villosus.*) hairig, de buitenste stuurve-
deren wit. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. 345. 1.
Woond in Canada.

SPECHT,

Groote 17. SPECHT, die wit en zwart bont is,
(*Major.*) de stuit, en het agterhoofd
rood. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 196.
Woond in Europa.

Middelbaa- 18. SPECHT, die wit en zwart bont is,
ne de kruyn en beneden rug
(*Medius.*) rood. PENNANT. *Zool. Britt.*
tab. E.
Woond in Europa.

Kleine 19. SPECHT, die wit en zwart bont
(*Minor.*) is, met eene roode kruyn,
de beneden rug bruinrood.
ALBIN. *Ois.* I. pag. 25.
tab. 20.
Woond in Europa.

Bonte 20. SPECHT, die wit en zwart bont
(*Varius.*) is, met eene roode kruyn,
de benedenrug wit, met
bruyn gestreept. CAT. *Carol.*
I. pag. 21. tab. 21.
Woond in de Bahama Eilan-
den.

Drievinge- 21. SPECHT, die een geele of roode
kruyn

rige
(*Tridactylus*.) kruyn heeft, wit en zwart
bont is, met drie vingeren.
EDW. *Birds* III. tab. 114.
Woond in Europa en Ame-
rica.

Geelrug (A) SPECHT, met eene roode kruyn
en hals, geele rug, en roei-
pennen, de vleugels groen
met geel gestipt, de buik
wit met zwart gegolfd, de
stuurpennen zwart, de wan-
gen, en het voorhoofd bruyn.
BUFFON. *Hist. Nat. des Ois.*
345.
Woond in Senegal.

Goertan (B) SPECHT, die olyfgroen is, met
een roode kruyn, en beneden
rug van onder wit. BUFF.
Hist. Nat. des Ois. 320.
Woond in Senegal.

Gestreepte (C) SPECHT, die zwart is, met geel-
agtig groen gestreept, de
kruin en beneden rug bloed-
rood,

rood, de buik geel. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 281.
 Woond in St. Domingo.

Geele (D) SPECHT, die geelis, gekuifd, met
 eene roode streep, aan den
 bek, de dekvederen der roei-
 pennen zwart, de roeipen-
 nen bruyn, de stuurpennen
 zwart. BUFF. *Hist. Nat. des*
Ois. 509.
 Woond in Cayenne.

Fraaye (E) SPECHT, die bruyn rood is, met
 eene geele kuif en beneden
 rug, de rug en vleugels met
 witte maantjes, de wangen
 rood, de stuurvederen zwart.
 BUFFON. *Hist. Nat Ois.* 524.
 Woond in Cayenne.

LX. GRAAUWSPECHT. De *Bek* elsgewyze spil
 (SITRA.) rond recht, verlengd,
 en zeer geheel.
 Het bovendeele wat lan-
 ger;

ger : met een zaamgedrukte punt.

De *Tong* uitgerand, en ingescheurd.

De *Neusgaaten* met hairtjes gedekt.

De *Pooten* met drie voor en eene agter vinger.

Europische 1. GRAAUWSPECHT, met zwarte stuurvederen, de vier zydeling-sche aan de punt wit. BRISS. *Ornith.* III. pag. 588. tab. 29. fig. 3. *Torchepot.*

b. GRAAUWSPECHT, met een zwart hoofd. CATESB. *Carol.* I. tab. 22. Woond in Europa en America.

Van Canada 2. GRAAUWSPECHT, met witte wenkbraauwen, [*het ligthaam af-sch-graaw, en van onder ros.*] BRISS. *Ornith.* III. pag. 593. tab. 29. fig. 4.

Woond in Canada.

1ste. Deels. IIde Stuk. O

GRAAUW:

Van Jamaica 3. GRAAUWSPECHT, met eene zwarte
 (*Jamaicensis*.) kruyn. SLOANE *Voyag.* II.
 pag. 300. tab. 259. fig. 1.
 Woond in Jamaica.

LXI. TOMTIT. (*) De *Bek* elsgewyze wat plat,
 (TODUS.) stomp, recht, aan het
 grondstuk met hairtjes.
 De *pooten* met drie voor en
 eene agter vinger.

Groene 1. TOMTIT, die groen is, met eene
 (*Viridis*.) roode borst. EDWARDS *Birds*.
 III. 121. tab. 121. fig. 2.
 Woond in America.

Afchgrauwe 2. TOMTIT, die afchgrauw is, en
 (*Cinereus*.) van onder geel. EDW. *gleans*.
 II. tab. 262. fig. 1.
 Woond in Suriname.

YS.

(*) GEEN Hollandfche Naam voor dit geflagt (dat zeer
 na aan de *Vliegevangens* grenst, vindende, heb ik de Ame-
 ricaanfche Landnaam behouden). De Heer BRISSON noemt
 het in Fransch *Todier*.

LXII. YSVOGEL. De *bek* driehoekig, lang,
(ALCEDO.) recht, en dik.

De *tong* vleeschig, zeer kort,
plat en fcherp.

De *pooten* met drie voor- en
een agtervinger in de
meeste.

Gekuifde 1. YSVOGEL, met eene korte staart,
(*Cristata.*) gekuifd hoofd, blaauw lig-
chaam, roffe buik, de kuif
met zwart gegolfd. BUFF.
Hift. Nat. Ois. 77. Martin-
pecheur.

Indiaanfche 2. YSVOGEL, met eene korte staart,
(*Inda.*) van bovengroen, van onder
ros, met eene gewolkte hals-
band [*de vleugels met witte*
stippen, en een roffe band om
de oogen.] EDW. *glean. III.*
335.
Woond in West-Indien.

Inlandfche 3. YSVOGEL, met eene korte staart,
(*Ispida.*) van boven blaauw, van on-
O 2 der

der geel ros, met een roffe
bekstreep *. EDW. *Birds*. I.
tab. 11.

Woond in Europa.

Purperhoofd 4. YsVOGEL, met eene korte staart,
(*Erethaca*.) eene blaauwe rug, geele
buik, het hoofd en stuit pur-
per, de keel en hals wit. AL-
BIN. *Ois*. III. p. 28. tab. 29.

[b. YsVOGEL, met eene
korte staart die blaauw is,
van onder geel, het hoofd
en stuit purperagtig castanie
bruin. LINN. *mant. alt.* pag.
524. VOSMAER, *beschryv.* IV.
van de Vogels.

Woond in Oost-Indien.

Van Mada- 5. YsVOGEL, met eene wat korte staart,
gasfar. het lichaam ros, de keel
(*Madaga-* geel, de roeipennen zwartag-
scarceus.) tig. BRISS. *Ornith.* IV. pag.
508. tab. 38. fig. 1.

Woond in Madagascar.

Groene (Supercilio-
sa.) 6. YsVOGEL, met eene wat korte staart,
van onder wit, met eene
groene band en geele wink-
braauwen. Edw. *Glean.* III.
tab. 245.
Woond in America.

Roode (A) YsVOGEL, met eene korte staart,
het ligchaam rood, van onder
geel bruyn, de kop en slag-
pennen groen, de keel wit *.
Vosm. *beschryv.* tab. III.
Woond in America.

NB. Deze heeft twee voor en twee
agtervingers.

Groenkuif (B) YsVOGEL, met eene korte staart,
blaauw ligchaam, groene
kruyn, oranje buik, witte
keel, en zwarte slagpennen.
Buff. *Hist. Nat. Ois.* 356.
Woond in Senegal.

Alcyon (Alcyon.) 7. Langstaartige YsVOGEL, met eene
kuif, het ligchaam blaauwag-
tig, de borst roestcoleurig, ee-
ne witte vlak agter en voor de
O 3 oogen

oogen *. CATESB. *Carol.* I.
tab. 69.

(b) gekuifde van St. Domin-
go. EDW. *birds.* III. tab.
115.

Woond in America.

Gekraagde 8. YsVOGEL, met eene lange staart,
(*Torquata.*) grys blaauw, met eene wit-
te halsband, de staart en
vleugels met wit gevlaakt,
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 284.
Woond in Mexico.

Kaapfche 9. YsVOGEL, met eene lange staart,
(*Capensis.*) afchgrauw blaauw, van on-
der geelros, de borst bleek
rood, de bek rood. BRISS.
Ornith. IV. pag. 488. tab.
36 fig. 3.
Woond aan de Kaap.

Senegalfche 10. YsVOGEL, met eene lange staart,
(*Senegallensis.*) het ligchaam blaauw, van on-
der wit, het hoofd grys, de
dekvederen der vleugelen
zwart,

zwart. BUFFON. *Hist. Nat.*
Ois. 334.
 Woond in Senegal.

Witkop. (C) YsVOGEL, met eene lange staart,
 het hoofd met eene blaauwe
 weerschyn, de buik oranje,
 het ligchaam donker blaauw,
 de dekvederen zwart. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 356.
 Woond in Senegal.

Turkſche 11. YsVOGEL, met eene lange staart,
 (*Smyrnenſis.*) die benevens de rug, en
 vleugels groen is. EDW.
Birds. I. p. 8. tab. 8.
 Woond in Aſia en Africa.

Bonte Viſ- 12. YsVOGEL, met eene lange staart,
 ſcher die wit en zwart is. BUFF.
 (*Rudis.*) *Hist. Nat. des Ois.* 62. EDW.
 9. tab. 9.

Van de Ber- (D) *Langſtaartige* YsVOGEL, die de
 biçes kop goudgroen, de kin zwart,
 de keel wit, de borſt en buik
 okerverwig, het lyf vermil-
 O 4 joen,

joen, met eene goudglans,
de vleugels goudgroen, de
eerste slagpen zwart, en de
stuurvederen groen rood,
blauw en zwart heeft *.

Vosm. *beschryv.*

Woond in de Berbices.

Godinnetje 13. YsVOGEL, met twee zeer lange
(*Dea.*)

stuurvederen, die in het mid-
den dun zyn, het ligchaam
zwart blauw, de vleugels
groen *. BUFF. *Hist. Nat. des*
Ois. 116.

Woond in Suriname.

Fraaye 14. YsVOGEL, met twee zeer lange
(*Paradisea.*)

stuurvederen, het ligchaam
goudgroen, twee voor en
twee agtervingeren. EDW.
Birds. I. pag. 10. tab. 10. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 271. *Jaca-*
mor.

Woond in Cayenne en Su-
riname.

Jacamare 15. YsVOGEL, met eene wigvormige
staart

(*Galbula.*)

staart, het ligchaam goud-
groen, van onder ros, de
pooten met twee voor- en
twee agtervingeren. EDW.
glean. II. tab. 334. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 238.

Woond in Brasfil en Cayenne.

LXIII. BYENEETER. De *bek* krom, plat, ge-

(MEROPS.) kield, [en puntig.]

De *tong* aan den punt ge-
spleeten.

De vingers 3. — 1.

Byeneete, 1. BYENEETER, met eene roestcoleuri-
(*Apiaster.*) ge rug, de buik en staart zee-
groen, de keel geel, de twee

stuurvederen zeer lang *.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 314.

Woond in het Oosten [en
in Senegal.]

Groene 2. BYENEETER, die groen is, met ee-
(*Virens.*) ne zwarte borstband, de

staart en keel blaauw, en

O 5 twee

twee lange stuurvederen.

EDW. *Birds*. IV. 183.

Blaauwbuik (A) BYENEETER, die bruyn is, de
 buik blaauw, de vleugelszee
 groen, met twee lange stuur-
 vederen. BUFF. *Hist. Nat.*
des Ois. 252.

Woond in Isle de France.

Geelkop 3. BYENEETER, die geelachtig is, met
 (Congener.) eene groene stuit, de roeipen-
 nen aan de punt rood, ende
 stuurvederen aan hun begin
 geel. WILLUGBH. *Ornith*. 103.
 Woond in Zuid Europa.

Van Mada- 4. BYENEETER, die groen is, met ee-
 gascar ne witte streep, boven en
 (Supercilio- onder de oogen, de keel geel-
 fus.) agtig en twee lange stuurve-
 deren. BUFFON. *Hist. Nat.*
Ois. 259.

Woond in Madagascar.

Philippyn- 5. BYENEETER, die groen is, van on-
 sche der geelagtig, de stuit rood,
 de

(Philippinus.)

de staart gelyk. [een zwarte vlak aan de oogen.] BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 57.
Woond in de Philippynsche Eilanden,

Afchgrauwe
(Cinereus.)

6. BYENEETER, die rood en geel bont is, van onder geelagtig rood, de twee staarvederen zeer lang, en rood. SEBA, *Schatk.* I. pag. 50. tab. 31. f. 10.
Woond in America.

Kaffer
(Cafer.)

7 BYENEETER, die grys is, met een geele benedenrug, en zeer lange staart*. BURMAN. *Kaap-sche Vogelen.*

Kleine

(B) BYENEETER, die groen is, met eene geele keel, ligt bruine buik, de roei en slagpennen rood, met zwarte tippen.
BUFF, *Hist. Nat. Ois.* 318.
Woond in Senegal,

Groote

(C) BYENEETER, die ligt olyf groen is, met cenige roode staar roei-

roeipennen. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. 454.

Woond in Cayenne,

LXIV. HOP. De *bek* krom, verheven, wat plat,
(UPUPA.) en niet fcherp.

De *Tong* ftomp, geheel, driehoe-
en kort.

De vingers. 3—1.

Hop 1. HOP, met eene gevlaakte kuif *,
(EPOPS.) BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 52.

Woond in Europa en in
Ooft-Indien.

Ongekuifde 2. HOP, met zes ftuurvederen, de
(PROMEROPS.) middelste de langfte [van bo-
ven bruyn, van onder wit.]

BRISS. *Ornith.* II. pag. 461.
tab. 43. fig. 2.

Woond aan de Caap.

GekuifdePa-3. HOP. met twee zeer lange ftuurve-
radysvogel deren. SEBA *Schatk.* I. pag.

(PARADISEA.) 40. tab. 30. fig. 5.

Woond in Aflen.

BOOM-

LXV. BOOMKRUIPERTJE. De *bek* dun, krom,
(CERTHIA.) fcherp, wat drie-
hoekig.

De *tong* fcherp.

De Vingers 3 — 1.

Gemeene 1. BOOMKRUIPERTJE, dat grysis, van
(*Familiaris.*) onder wit, met twee bruine
roeipennen, met witte vlak-
ken, tien ftuurvederen. AL-
BIN. Ois. III. tab. 25.
Woond in Europa.

Muurkruiper 2. BOOMKRUIPERTJE, dat afchgrauw
(*Muraria.*) is, met eenē roode vlak op
de vleugels. BUFF. *Hift. Nat.*
Ois. 372.
Woond in Zuid Europa.

Klein 3. BOOMKRUIPERTJE, dat grysis, van
(*Puffilla*) onder wit, met witte wenk-
braauwen, de ftuurvederen
bruyn, aan de tippen wit.
EDW. *Birds.* I. tab. 26.
Woond in Ooft-Indien.

(*Capensis.*) 4. BOOMKRUIPERTJE, dat grysis, met
zwart-

zwartagtige ftuurvederen,
de buitenfte naar buiten,
met wit gezoomd. BRISS.
Ornith. III. pag. 618. tab. 31.
fig. 1.

Olyfcoleu- 5. BOOMKRUIPERTJE, dat olyfcoleurig
rige is, van onder grys, met wit-
(*Olivacca.*) achtige oogkringen. BRISS.
Ornith. III. pag. 625. tab.
33. fig. 1. BUFF. *Hift. Nat.*
Ois. 575. 1.
Woond in Madagafcar.

Gryze 6. BOOMKRUIPERTJE, dat olyfcoleurig
(*Curucaria.*) is, van onder geel, de ftuur-
vederen alle even groot.
BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 576. 1.
Woond in de Philippynfche
Eilanden en Ceilon.

Twyffelag- (A) BOOMKRUIPERTJE, dat olyfco-
tige leurig is, van onder wit, de
borft met zwarte vlakken,
de ftuurvederen puntig uit-
loopende *.
Woond in Europa.

Dit

NB. Dit zeldzaam soort had de borst gevlacht, als een Lyfter, de fluurvederen puntig als de Spechten, de bek en houding als de Boomkruipers.

Purperkeel 7. BOOMKRUIPERTJE, dat grys is, van
(*fugularis.*) onder geel, de keel violet,
de twee buitenste fluurvederen aan de punt geel. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 776. 3.
Woond in de Philippynsche Eilanden.

Blaauwe 8. BOOMKRUIPERTJE, dat blaauw is,
(*Coerulea.*) met een zwarte oogband,
keel, roey, en fluurvederen*.
EDW. *Birds.* I. tab. 21.
Woond in Indien.

Van Cayenne 9. BOOMKRUIPERTJE, dat glanzig groen
ne is, van onder wit gestreept,
(*Cayana.*) de fluurvederen groen, de
binnenste van boven zwart.
BRISS. *Ornith.* III. pag. 636.
tab. 23. fig. 2.
Woond in Cayenne.

BOOM-

- Staalband 10. BOOMKRUIPERTJE, dat glanzig groen
(*Chalybea*.) is, met eene roode borst,
een staalkleurige band van
vooren. EDW. *Glean*. II. 265.
fig. 1. BUFF. *Hist. Nat. Ois*:
246. fig. 3.
Woond in Indien:
- Afrikaan- 11. BOOMKRUIPERTJE, dat groen is;
sche met eene witte buik, roode
(*Africana*) borst en blaauwe stuit. EDW:
glean. III. tab. 347. fig. 1.
Woond aan de Kaap.
- Spiza 12. BOOMKRUIPERTJE, dat groen is;
(*Spiza*.) met een zwart hoofd, en
slagpennen. EDW. *Birds*.
I. tab. 25. f. 1. 2.
Woond in Braziliën en Suri-
namen enz.
- NB. Dit is geen Boomkruiper, maar
een vliegevangster.
- Purpere 12. BOOMKRUIPERTJE, dat van boven
(*Purpurea*.) purper, van onder vermili-
oen is, het hoofd, de keel,
en stuit violet. BRISS. *Ornith*.
III.

III. pag. 655. tab. 31. f. 2. 3.

Senegalsche 14. BOOMKRUIPERTJE, dat zwartagtig
(*Senegallensis*.) violet is, de kruin en keel
goudgroen, de borst carmyn-
rood. BRISS. *Orinth.* III. p.
660. tab. 34. f. 2.
Woond in Senegal.

Groenkeel 15. BOOMKRUIPERTJE, dat zwartagtig
(*Gutturalis*.) is, met eene glanzig groene
en purpere borst. BRISS. *Or-
nith.* III. pag. 658. tab. 33.
fig. 3.
Woond in Brasil.

Blaauwkeel (B) BOOMKRUIPERTJE, dat groen is,
de keel glanzig blaauw en
purper, de borst carmyn-
rood, de buik geel, de stuur-
vederen ligt bruyn. BUFF.
Hist. Nat. 246. I.
Woond in de Philippynsche
Eilanden.

Americaan- 16. BOOMKRUIPERTJE, dat geel is,
sche van boven olyfgroen, de
Iste. Deel. IIde Stuk. P vleu-

(Pinus.)

vleugels met twee witte banden. EDWARDS. *glean.* II. tab. 277. fig. 2.

Woond in Noord America.

NB. Dit is geen Boomkruiper.

Afchgrauw- (C) BOOMKRUIPERTJE, dat van boven
we

afchgrauw is, van onder geel, de keel violet, de dekvederen blaauwagtig, de slagpennen bruyn. BUFFON. *Hist. Nat. des Ois.* 576. 2.

Woond in de Philippynsche Eilanden.

Driekleuri- (D) BOOMKRUIPERTJE, dat groen is,
ge

van onder geel, de borsten keel violet. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 576. 4.

Woond in de Philippynsche Eilanden.

Roode 17. BOOMKRUIPERTJE, dat zwartagtig
(*Bruentata.*)

blaauw is, met eene roode kruin, hals, rug en stuit. EDW. *Birds.* II. tab. 81.

Woond in Bengale.

BOOM.

Geele 18. BOOMKRUIPERTJE, dat zwart is,
(*Flaveola.*) van onder geel, witagtige
wenkbraauwen, de buitenste
stuurvederen aan de punt
wit heeft. EDW. *Birds.* III.
Woond in America.

Fraaye 19. BOOMKRUIPERTJE, dat de twee
(*Pulchella.*) middelste stuurvederen, het
ligchaam groen, en de borst
rood. SEBA *Schatk.* II. tab.
7. fig. 2.
Woond in Senegal.

Beroemde 20. BOOMKRUIPERTJE, dat de twee
(*Famofa.*) middelste stuurvederen zeer
lang heeft, het ligchaam
glanzig groen, de oxels geel,
en eene zwarte oogstreep.
BUFF. *Hift. Nat. Ois.* tab. 83.
fig. 1.
Woond aan de Caap.

Philippynsch 21. BOOMKRUIPERTJE, met twee zeer
(*Philippina.*) lange middel stuurvederen,
het ligchaam grys groen, van
onder witagtig geel BRISS. *Orn.*

III. pag. 613. tab. 30. fig. 2.
Woond in de Philippynsche
Eilanden.

Violette 22. BOOMKRUIPERTJE, met twee lan-
(*Violacea.*) ge fluurvederen, het lig-
chaam blinkend violet, borst
en buik geel. BRISS. *Ornith.*
III. pag. 623. tab. 33. f. 6.
Woond in Ceylon.

Blaauwe 23. BOOMKRUIPERTJE, dat blaauw is,
(*Cyanea.*) met eene fwarte oogstreep,
fchouders, vleugels, en ftaart.
EDW. *glean.* III. pag. 114.
tab. 264. f. 1. BUFF.
Woond in Brafil, Cayenne.
de Caap.

Ceylonfche 24. BOOMKRUIPERTJE, met een groen
(*Zeilonica.*) hoofd, roestcolcurigen rug,
geele buik, blaauwe keel,
en ftuit. BRISS. *Ornith.* III.
pag. 623. tab. 34. f. 4.
Woond in Ceilon.

Koperborst. 25. BOOMKRUIPERTJE, dat blaauw is,
met

je . met eene goudroode band,
 (Lotenia.) en zwarte oogstreep. BRISS.
Ornith. III. pag. 641. tab.
 33. f. 45.
 Woond in Ceylon.

Violetvlak (E) BOOMKRUIPERTJE , dat glanzig
 groen is, met eene violette
 vlak op de vleugelsen borst ,
 de buik zwart in het man-
 netje, witin het wyfje. BUFF.
Hist. Nat. des Ois. tab. 575.
 f. 2. 3.
 Woond in Madagascar.

LXVI. BLOEMZUIGERTJE. De bek elsgewyze
 van voren pypag-
 tig langer dan het
 hoofd. Het boven
 kaakbeen het on-
 derste insluitende.
 De tongdraadagtig
 met twee zamen-
 loopende draaden,
 [De pooten zeer
 P 3 kort]

kort] 3. voor en
1 agtervinger.

Van Mexico 1. BLOEMZUIGERTJE, met eene krom-
(*Paradisus*.) me bek, dat rood is, met
blaauwe vleugelen, het hoofd
gekuifd, de middelste stuur-
vederen zeer lang. SEBA
Schatk. I. pag. 97. tab. 61.
f. 4.
Woond in Mexico.

Roode Lang-2. BLOEMZUIGERTJE, met eene krom-
staart me bek, dat rood is, met
(*Pella*.) een bruin hoofd, een gou-
den keel en groene stuit, de
middelste stuurvederen zeer
lang. EDW. *Birds.* I. tab,
32. f. 2.
Woond in Zuid America,

Bruin 3. BLOEMZUIGERTJE, met eene krom-
(*Supercilio-* me bek, dat glanzig bruin is,
sus) met zeer lange stuurvederen,
de buik roodagtig, de wink-
braauwen wit. BRISS. *Ornith.*
III. tab. 35. f. 5.
BLOEM-

Honingdief-4. BLOEMZUIGERTJE, met eene krom-
 je me bek, dat groenachtig is,
 (*Polytmus.*) met lange stuurvederen, de
 kruyn en stuurvederen bruin.
 EDW. *Birds.* I. tab. 34.
 Woond in America.

Schaerstaert 5. BLOEMZUIGERTJE, dat groen is,
 (*Fortifica-* de zylingfche zeer lang, de
tus.) kruyn en stuurvederen
 blaauw. EDW. *Birds.* I. tab.
 33. fig. 33.
 Woond in Jamaica.

Witstaart 6. BLOEMZUIGERTJE, met een krom-
 (*Leucurus.*) me bek, dat goudgroen is,
 met gelyke stuurvederen, die
 wit zyn, eene roode hals-
 band. EDW. *Glean.* II. tab.
 256. fig. 1.
 Woond in Suriname.

Bloedkeel 7. BLOEMZUIGERTJE, met een krom-
 (*Fugularis.*) me bek, dat blaauwagtig is,
 de hals van onder bloedrood*.
 EDW. *Glean.* II. tab. 266.
 fig. 1.

Verwonder-8. BLOEMZUIGERTJE, dat glanzig groen
lyk is, de stuurvederen met wit
(*Thauman-* gezoond, de buitenste van
tias.) buiten wit *. SEBA *Schatka-*
mer I. tab. 59. fig. 5.
Woond in Zuid America.

Van St. Do-9. BLOEMZUIGERTJE, dat glanzig groen
mingo is, van onder aschgrauw,
(*Dominicus.*) de stuurvederen in het mid-
den roestverwig, aan de punt
wit. BRISS. *Ornith.* III. pag.
672. tab. 35. fig. 4.
Woond in St. Domingo.

Fluweelach-10. BLOEMZUIGERTJE, met een krom-
tig me bek, de stuurvederen van
(*Holoseri-* boven zwart, een groen lig-
ceus.) chaam blaauwe, borstband,
en zwarte buik. EDW. *Birds.*
I. 36. tab. 36.
Woond in Mexico.

Colibri 11. BLOEMZUIGERTJE, met eene regte
(*Colubris.*) bek, zwarte stuurvederen, de
drie uiterste roestcoleurig,
met witte tippen, de keel
vuur

vuur couleur. Edw. *Birds*. I.

38.

Woond in America.

Ourisia

(*Ourisia*.)

12. BLOEMZUIGERTJE, met eenen reg-

ten bek, goudgroen, byna
gelyke ftuurvederen, die
bruynagtig goud zyn, zwart-
te flagpennen, en eene blaau-
we buik.

Woond in Indien.

Blaauwhals (A) BLOEMZUIGERTJE, met eenen reg-

ten bek, groen ligchaam,
blaauwe hals en buik, de vleu-
gels en ftart bruyn*. Buff.
Hift. Nat. Ois. tab. 227. f. 3.
Woond in Cayenne.

Bloemzuiger 13. BLOEMZUIGERTJE, met eenen reg-

(*Mellisugus*.)

ten bek, goudgroen ligchaam,
blaauwe ftuurvederen, zwart
blaauwe flagpennen, geveder-
de Dyen. Edw. *glean.* III.
360. fig. 1.

Woond in . . . . .

- Pegasus 14. BLOEMZUIGERTJE, met eenen reg-
 (*Pegasus*.) ten bek, goudgroenagtig lig-
 chaam, van onder grys, de
 pooten gevederd *. BRISS.
Ornith. III. tab. 36. fig. 4.
 Woond in Cayenne.
- Zwarte 15. BLOEMZUIGERTJE, met eenen reg-
 (*Niger*.) ten bek, een zwart ligchaam,
 van onder goud couleur, wit-
 te dekvederen der staart, ge-
 vederde pooten. BRISS. *Or-*
nith. III. tab. 36. fig. 8.
- Gekuijde 16. BLOEMZUIGERTJE, met eenen reg-
 (*Cristatus*.) ten bek, bruyne vleugels,
 eene graauwbruyne buik, ee-
 ne blaauwagtige kuif, [de keel
 en borst violet.] EDW. *Birds*.
 I. tab. 37. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. 227. f. 1.
 Woond in America.
- Roodkuif 17. BLOEMZUIGERTJE, dat groenagtig
 (*Latus*.) goud is, met roestcoleurige
 stuurvederen, die aan de tip-
 pen zwart zyn, met eene roo-
 de

de afhangende kuif. EDW.
glean. III. tab. 344.
 Woond in Oost-Indien.

Witbuikje 18. BLOEMZUIGERTJE, met eenen reg-
 (Mellivorus.) ten bek, zwarte stuurvede-
 ren, de zylingfche wit, het
 hoofd blaauw, de rug groen,
 de buik wit. EDW. *Birds.* I.
 tab. 35. f. 1.
 Woond in Indien.

Rood 19. BLOEMZUIGERTJE, met eenen reg-
 ten bek, de zylingfche stuur-
 vederen violet, een bleek
 rood ligchaam met bruyn ge-
 vlakt. EDW. *Birds.* 32. f. 1.
 Woond in Suriname.

Vliegvogelt-20. BLOEMZUIGERTJE, met eenen reg-
 je ten bek, de zylingfche stuur-
 vederen van buiten wit, het
 ligchaam glanzig groen, van
 onder witagtig. EDW. *Birds.*
 III. tab. 105.
 Woond in America.

WA.

III. WATERVOGELN.

[A N S E R E S.]

De bek stomp met 'een vlies bekleedt, onder het grondstuk bultig, met een puntie aan het einde, de keel getand. De Tong vleeschig.

De pooten gevleesde Zwempooten. [Een lange hals, eneyrondagtig ligchaam.]

LXVII. EEND. De bek plaatagtig getand ver-
(ANAS.) heven, stomp.

De Tong hairig stomp.

a De bek aan het grondstuk
bultig.

Zwaan 1. EEND, met een halfronde zwarte bek,
(Cygnus.) geelwafchen wit ligchaam *.
EDW. Birds. III. 150.

(b) Tamme Zwaan met
zwartknobbelig wafsch.

EEND,

WildeZwaan 2. EEND, met eene halfrolronde bek,
(*Cygnoides.*) bultig wafch en gezwollen
oogleden. ALBIN. *Ois.* I.
pag. 89. tab. 91.
Woond in Spanje.

Gewapende 3. EEND, met eene half rolronde bek,
(*Gambensis.*) bultig wafch en gedoornde
fchouders. WILLUGBHY *Or-*
nith. pag. 275. tab. 61.
Woond in Gambia.

Brand-gans 4. EEND, met een ingedrukte bek,
(*Sadorna.*) een plat voorhoofd, een
zwarte groene kop, het lig-
chaam uit [ros] zwart en wit
gemengeld*. BUFF. *Hift. Nat.*
Ois. 53.
Woond in Europa.

Aanziene- 5. EEND, met een bultige bek, die
lyke zamengedrukt is, de keel
(*Spectabilis.*) vederachtig zwart, het hoofd
grys. EDW. *birds.* III. 154.
Woond in Canada.

EEND,

Zwartbruyn 6. EEND, dat zwartagtig is, met het
 (*Fusca.*) onder ooglid en de vleugel.
 streep wit. BRISS. *Ornith.*
 VI. pag. 423.
 Woond in Europa.

Zwarte 7. EEND, met het grondstuk van den
 (*Nigra.*) bek bultig, het geheele lig-
 chaam zwart. BRISS. *Ornith.*
 VI. pag. 420. tab. 38. f. 2.
 Woond in Europa.
 (b) *De bek aan het grond-
 stuk effen.*

Witvlak 8. EEND, dat zwart is, de schouders
 (*Marila.*) afchgrauw gewolkt, een
 witte vlak op de vlerken.
 Woond in Noordwegen.

Gans 9. EEND, met eene halve rolronde
 (*Anser.*) bek, het ligchaam van boven
 afchgrauw, van onder bleek,
 de hals gestreept *.
 (b) De gans die bruin is,
 van Canada. EDW. 153.
 Woond in Canada.

EEND,

Egyptifche 10. EEND, met eene half rolronde
(*Egyptiaca.*) bek, een gegolfd ligchaam,
de kruyn wit, en de vlak
der vleugelen wit, met een
zwarte band. *Burr. Hist. Nat.*
des Ois. 379.
Woond in Egypte.

Noordfche (A) EEND, dat wit is, met een geel
Gans voorhoofd, de roeipennen
halverweg zwart. *PALL. Spec-*
il. Zool fasc. VI. p. 32.
Woond in Rusland.

Blaauwach- 11. EEND, dat gryns is, met een wit
tig voorhoofd, de dekvederen,
(*Coeruleus.*) en beneden rug blaauw.
Edw. Birds. III. 152.
Woond in Canada.

NB. Deze zyn Ganzen.

Rotgans 12. EEND, dat bruyn is, de hals en
(*Bernicla.*) borst zwart, met een witte
halsband.
Woond in Europa.

Roodhals 13. EEND, met een zwarte kop, don-
ker

ker roffe hals, de borst wit,
en zwart gevlaakt, de rug en
vleugels zwart, de ftuurvede-
ren gryf. PALL. *Spicil Zool.*
VI. p. 22. tab. 4.

Woond in Noord Barbary-
en.

Gans van 14. EEND, dat afchgrauw is, het
Canada hoofd en ha's zwart, de koo-
nen, en keel wit. BUFFON:
Hift. Nat. Ois. 346.

Eydervogel 15. EEND, met eene rolronde bek,
(*Moliffima.*) het wafch van agter gefchei-
den en ruw. EDW. *Birds.*
II. 98. BUFF. *Hift. Nat. Ois.*
208, 209.

Woond in Noord Europa.

MufcusEend 16. EEND, met naakte tepelachtige
(*Mofchata.*) wangen. MARSIGL. *Danub.*
V. pag. 116. tab. 56. 57.

Eend van Ba- 17. EEND, dat gryf is, met eene
hama. loodcoleurigen bek, met eene
(*Bahamensis.*) roffe vlak ter zyden, de vleu-
gelen

gelengeel engroen. CATESB.

Carol. I. tab. 63.

Woond in Indien.

Wittertje 18. EEND, dat wit is, met eene zwarte rug en stuurvederen, het hoofd blaauw, het agterhoofd wit *. *Edw. Birds.* tab. 100.
(*Albeola.*)
Woond in America.

Breedbek 19. EEND, met den bek aan het eind verbreed en rond, met een krom haakje. CATESB. *Carol.* tab. 96. *BRIS.* *Ornith.* IV. tab. 32. fig. 1.
(*Clypeata.*)
Woond in Europa en America.

Quakertje 20. EEND, met de vlak der vleugelen zwart, wit en ros *.
(*Strepera.*)
Woond in Europa.

Wintertaling 21. EEND, dat witagtig is, met zwarte rug en stuurvederen, de kop van boven en van onder gezwollen, en glanzig (*pur-*
(*Hyberna.*)
per

per of groen.) CAT. Carol. I.
tab. 95.

Woond in America.

Van St. Do-22. EEND, met een van vooren roest-
mingo
(*Dominica.*) verwig hoofd, een sneeuw
witte vlak op de vleugels,
de schaften der stuurvederen
zeer zwart. BRISS. *Ornith.*
VI. tab. 41. fig. 2.

Woond in Zuid America.

Roeper 23. EEND, dat wit en zwart bont is,
(*Clangula.*) met eene violet coleurige
dikke kop, en eenenzwar-
te vlek by de gaping. AL-
BIN. *Ois.* I. pag. 92. tab. 96.
Woond in Europa.

Graauwe 24. EEND, dat bruin graauw is, met
taling
(*Rustica.*) eene witte vlak aan de ooren
en vleugels. CATESB. *Carol.*
I. pag. 98. tab. 98.
Woond in America.

Bril Eend. 25. EEND, dat zwart is, met eene
witte

(*Perspicillata*.) witte kruyn en nek, en een
ne zwarte vlak agter de neus-
gaaten. EDW. *birds*. III. p.
155. tab. 155.
Woond in Canada.

Bruinetje 26. EEND, met een zwartagtig lig-
(*Glaucion*.) chaam, eene gewolkte borst,
en een witte streep, op de
vleugels. BRISS. *Ornith*. VI.
pag. 406. tab. 36. fig. 1. 2.
Woond in Europa.

Fluiter 27. EEND, dat de staart wat puntig
(*Penelope*.) heeft, de stuit zwart, het
hoofd bruyn, het voorhoofd
wit, de rug aschgrauw ge-
golfd. WILLUGBH. *Ornith*.
tab. 72.
Woond in Europa.

Langstaart 28. EEND, met eene lange puntige
(*Acuta*.) staart, van onder zwart.
BRISS. *Ornith*. VI. p. 369.
tab. 34. fig. 1. 2.
Woond in Europa.

Yslandsch 29. EEND, met een wigsgewyze staart,
 Eend de middelste stuurpennen zeer
 (*Hyemalis.*) lang, de slaap en borst, rug
 en vleugels zwart. EDW.
Birds. III. 156. tab. 156.
 Woond in Europa en Noord
 America.

Van Terra 30. EEND, met een lange puntige
 Nova staart, een zwart ligchaam,
 (*Glacialis.*) dat van onder wit is. EDW.
glean. II. 280.

Wild Eend 31. EEND, dat aschgrauw gegolfd is,
 (*Ferina.*) met eene bruine kop, eene
 zwarte band, stuit, en staart-
 vederen. *BRISS. Ornith.* VI.
 pag. 384. tab. 35. 1. *Milo-*
uin Male.
 Woond in Europa.

Karnel 32. EEND, met eene groene vlak op
 (*Querque-* de vleugels, eene witte streep
dula.) boven de oogen. *BRISS. Or-*
nith. VI. pag. 427. tab. 39.
 fig. 12.
 Woond in Europa.

EEND,

Van Kam- (C) EEND, dat wit is, met een bleek
fchatka groene vlak aan den nek, de
vleugels witen zwart. PALL.
Specil. Zool. VI. pag. 35.
tab. 5.
Woond in Kamschatka.

Kraak Eend 33. EEND, met eene groene vlak op
(*Crecca.*) de vleugels, en eene witte
streep onder en boven de
oogen. ALBIN. *Ois.* I. pag.
95. tab. 100. II. p. 91. tab.
102.
Woond in Europa.

Circia 34. EEND, met eene veelverwige vlak,
streep boven de oogen, de
bek en pooten afchgrauw,
ALB. II. p. 92. tab. 103, 104.

Arlequin 35. EEND, dat bruynis, met wit en
(*Histrionica.*) blaauw, de ooren, en flaa-
pen met een dubbelde streep,
de hals en borst wit. EDW.
Birds. IV. tab. 99.
Woond in America en Ysland.

VanHudsons36. EEND, dat grys is, met witte ooren, de eerste roeipennen zwartachtig. EDWARDS *Birds*. 157. tab. 157.
 Baay
 (*Minuta.*)
 Woond in Hudsons baay en Ysland.

ZwartCalot 37. EEND, met blaauwe dekvederen, en groene stuurpennen, met een witte band op het voorhoofd. CATESB. *Carol*. I. pag. 100. tab. 100.
 (*Discors.*)
 (b) Bruine dito. CATESB. *Carol*. I. p. 99. tab. 99.
 BUFFON. *Hist. Nat. Ois*. 403.

Gekapte 38. EEND, dat bruyn is, het hoofd van vooren wit, en van achter zwart.
 (*Viduata.*)
 Woond in Carthagena.

Herfsttaaling 39. EEND, dat grys met zwarte staart en stuurvederen, de vlak der vleugelen ros, en wit.
 (*Autumnalis.*)
 Edw. *Birds*. IV. 194.
 Woond in America.

(c) *Met eenige kromme stuur-
vederen.*

Gemeene 40. EEND, met de stuurvederen, [van
Eend het mannetje] krom en de
(*Boschas.*) bek recht *.
Woond in Europa.

Krombek 41. EEND, met de middelste stuurve-
(*Adunca.*) deren krom, en eene krom-
me bek *.
Woond in Holland.

(d) Gekuifd dito.

Kuif Eend 42. EEND, met eene afhangende [roo-
(*Galericula-* de en groene] kuif, de rug,
ta.) van agter wederzyds met een
platte verheven, kromme veer
[de hals en borst rood, de
buik wit.] *Edw. Birds. II. tab.*
102.
Woond in China.

(e) *Gekuifde.*

Bruidje 43. EEND, met een afhangende dub-
(*Sponsa.*) bele groene kuif, met wit
en blaauw gemengeld. *CAT.*

Q 4

Carol.

Carol. I. pag. 97. tab. 97.
Woond in Noord America.

Boom Eend 44. EEND, dat grys is, met een kort
(*Arborea.*) gekuifd hoofd, de buik wit
enzwart gevlakt. *Edw. birds.*
IV. 193.
Woond in America.

Witvlak 45. EEND, met een afhangende kuif,
(*Fuligula.*) een zwart ligchaam, de
buik, en de vlak der vlerken
wit. *ALBIN. Ois. I. pag. 91.*
tab. 95.
Woond in Europa.

LXVIII. ZAAGBEK. De *bek* zaagsgewyze ge-
(MERGUS.) tandt en rolrondagtig.
De bovenkaak aan de
punt krom.
[De binnenste vinger met
een vliesje, aan de bin-
nenste zyde bezet.
Het onderste gedeelte van
de Dyen zonder vede-
ren.]

ZAAG-

Gekapte 1. ZAAGBEK, met eene bolronde kuif
(*Cucullatus.*) aan wederzyden wit, het
ligchaam van boven bruyn,
en van onder wit. [De vlak
der vleugelen wit met zwart
geboord. CATESB. *Carol.* pag.
94. tab. 94. EDW. *glean.*
III. tab. 360. fig. 3.
Woond in America,

Nonnetje 2. ZAAGBEK, met eene in de lengte
(*Merganser.*) staande kuif [in het mannet-
je] de borst ongevlakt, wit-
agtig, de stuurvederen afch-
grauw met eene witte
scharf*. BUFF. *Ois.* 449. 450.
Woond in Europa.

Langbek 3. ZAAGBEK, met eene afhangende
(*Serrator.*) kuif, de borst ros gevlakt,
eene witte halsband, de stuur-
vederen bruyn met afch-
grauw gevlakt, [het hoofd
zwartagtig blaauw, bek en
pooten rood.] EDW. *Birds.*
II. 95. BRISS. *Ornith.* VI.
tab. 23.

Q 5

ZAAG-

Visfcher 4. ZAAGBEK, met een gekuifd afch-
 (Castor.) graauw hoofd, van onder
 roestcoleurig, de keel wit,
 bek en pooten zwart*. BRISS.
Ornith. VI. pag. 225. tab. 25.
 Woond in Europa.

Witte Non 5. ZAAGBEK, met een afhangende kuif,
 (Albellus.) het agterhoofd zwart, het
 ligchaam wit, de rug en slaa-
 pen zwart, de vleugels ge-
 vlakt. BRISS. *Ornith.* VI. pag.
 243. tab. 24.
 Woond in Europa.

Pyltaart 6. ZAAGBEK, met eene ongekuifde
 (Minutus.) gryze kop, een zwarte band
 aan de oogen, en eene wit-
 te vlak onder de oogen. ALB.
Ois. I. p. 77. tab. 88.
 Woond in Europa.

XLXIX. PAPEGAAYDUIKER. De bek kort, on-
 (ALCA.) getand, plat,
 verheven rond,
 meest

meest dwarsch
gegroeft.

Het onderkaak
van onder bul-
tig.

De *Neusgaaten*
agter den bek.

De pooten
meest al drie-
vingerig.

Aek
(*Torda.*)

1. PAPEGAAYDUIKER, met vier groe-
ven aan den bek, en eene
witte streep van de bek naar
de oogen aan wederzyden *.
EDW. *Glean.* III. 358. tab.
358. fig. 2.
Woond in Europa.

Zeeduiker
(*Pica.*)

2. PAPEGAAYDUIKER, met eene gladde
platte bek, het ligchaam
[zwart] van onder ende pun-
ten der ftuurvederen wit, de
pooten rood. BRISS. *Ornith.*
VI. pag. 92. tab. 8. fig. 2.
Woond aan de Noordpool.

PA-

Pingoin   3. PAPEGAAYDUIKER, met eene platte
(*Impennis.*)   gegroefde bek, eene eyronde
[witte] vlak aan de oogen,
[van boven zwart, en van onder wit.]   EDW. *Birds.* III.
147. tab. 147.
Woond in het Noorden.

Groenland. 4. PAPEGAAYDUIKER, met eene zamen-
fche   gedrukte bek met vier groe-
(*Arctica.*)   ven, de oogkringen en wan-
gen wit, de bovenste wenk-
braauw gedoornd. EDW. *glean.*
III. 358. fig 1. BUFF. *Ois.* 275.

Rottetetje 5. PAPEGAAYDUIKER, met eene kegel-
(*Alle.*)   agtige gladde bek, de buik
en de agterste roeipennen
wit; de pooten zwart. EDW.
Birds. II. tab. 91.
Woond in het Noorden van
Europa en van America.

Gekuifde   (A) PAPEGAAYDUIKER, die zwart is,
met de zyden van het hoofd
wit, met twee geelachtige af-
hangende aigretten. DIERK.
Men.

Mengelw. I. VI. stuk bl. 22.
fig. 2.

Woond in Kamtschatka.

Zeeparkiet (B) PAPEGAAYDUIKER, die zwart is,
met eene witte streep aan
de oogen, de bek bloedrood,
platagtig eirond, het onder
kaakbeen opgewipt, de neus-
gaaten pypagtig. PALL.
Specil. fasc. V. p. 15. tab. II.
Woond tusschen Kamtschatka
en America.

Zee Cacatoe (C) PAPEGAAYDUIKER, die zwart is,
de rug met donker roestver-
wige vlakken, het voorhoofd
met eene opstaande kuif, de
bek rood, uitgerand, kegel-
agtig, aan de punt wit, de
neusgaaten pypagtig. PALL.
Specil. V. pag. 20. tab. III.
Woond in de Eylanden by
Japan.

Vierkleuri- (D) PAPEGAAYDUIKER, die van boven
gezwart is, met roestcoleurige
vlak-

vlakken, van onder bruyn
afchgrauw, een witte vlak
aan het oog, de bek bruyn
geel. PALL. *Specil.* V. pag.
24. tab. 4.

Woond in Kamschatka.

LXX. ONWEERSVOGEL. De *bek* zonder tan-
(PROCELLARIA.)

den, wat zamenge-
drukt, de kaak-
beenderen even
groot, de bovensten
met eene kromme
punt, de punt der
ondersten zaamen-
gedrukt, inge-
groefdt.

De *Neusgaaten* rol-
rond.

De voeten gevlied,
de agterste nagel
zonder vinger.

Rotje

(*Pelagica.*)

I. ONWEERSVOGEL, die zwart is, met
eene witte stuit. EDW. *birds.*

II. p. 90. tab. 90. f. 1.

Woond

Woond in de Noordzee.

Kleine Pete-2. ONWEERSVOGEL, die zwart is, van
rel onder wit*.

(*Fregata*.) Woond in de Noordzee.

Malle mukke 3. ONWEERSVOGEL, die witagtig is,
(*Glacialis*.) met eene gryze rug. BUFF.

Ois. 59.

Woond aan de Noordpool.

Groote Pete-4. ONWEERSVOGEL, bruyn met een
rel. geele bek, en bruynepooten.

(*Aequinoctia*-
lis.) EDW. *Birds*. 89. tab. 1.

Woond aan de Kaap.

Kaapfche 5. ONWEERSVOGEL, die wit en zwart
(*Capensis*.) bont is. EDW. *birds*. II. 90.
tab. 90. f. 2.

Woond aan de Kaap.

Puffin 6. ONWEERSVOGEL, die het ligchaam
(*Puffinus*.) van boven zwart, van on-
der wit heeft. EDW. *Glean*.
III. tab. 359.

LXXI. ALBATROS. De *bek* regt, het opper-
 (DIOMEDEA.) kaakbeen aan de punt
 krom, 't onderfte geknot.
 De *Neusgaaten* eirond, o-
 penstaande vooruitstee-
 kende en zylingfch ge-
 plaatft.

Albatros 1. ALBATROS, met gevederde vleu-
 (*Exulans.*) gelen, de pooten drie vin-
 gerig in evenwigt fttaande.
 EDW. *birds.* II. tab. 88.
 Woond tuffchen de keerkrin-
 gen.

Magellaan- 2. ALBATROS, met ongevederde vleu-
 fche Gans gelen, vier vingerige buiten
 (*Demerfa.*) het evenwicht fttaande poo-
 ten, alle de vingeren aan el-
 kander gehecht*. EDW. *birds.*
 IV. tab. 94. BUFF. *Hift.*
Nat. Ois. 384.
 Woond in de ftraat van Ma-
 gellanes.

LXXII. PELEKAAN. De *bek* zonder tanden, recht,
(PELECANUS.) met een krom haakje ge-
nageld. [plat]

De *neusgaaten* met eene spleet
welke weinig zichtbaar is.

Het *aangezicht* byna naakt.

De *pooten* [korter dan
het ligchaam,] en in des-
zelvs evenwigt geplaatst.
[Een vliezige zak aan de
keel.]

Pelecaan 1. PELECAAN, [die wit is,] met eene
(*Onocratus*) [geele] zak aan de keel *.
Buff. Hist. Nat Ois. 87.

b. Bruine Pelecaan. EDW.

Birds. II. 93. tab. 93.

Woond in Africa, Asia.

b. in America.

Fregatvogel 2. PELECAAN, met eene schaarsgewy-
(*Aquilus*.) ze staart, een zwart lig-
chaam, roode bek en zwarte
oogkringen. EDW. *glean*
II. 309.

Woond in Zee.

Kormoran 3. PELECAAN, met eene ronde staart,
 (Carbo.) een bek zonder tanden, de
 kop eenigzints gekuifd.
 BRISS. *Ornith.* VI. p. 511.
 tab. 45. *Cormoran.*
 Woond in Europa.

b. *Met getandde kaakbeenderen.*

Kleine Cor-4. PELECAAN, met eene ronde staart,
 moran een zwart ligchaam, dat van
 (Graculus.) onder bruin is, met twaalf
 ftuurvederen, de bek onge-
 tand.
 Woond in de Europifche zee.

Jan van Gent 5. PELECAAN, die wit is, met eene
 (Basfanus.) wigvormige staart, een
 zaagswyze groenagtige bek,
 de eerfte roeipennen zwart,
 het aangezigt blaauw, [de
 keel en de rand der oogen
 zwart.] BUFF. *Hift. Nat. Ois.*
 278. *Fou de Bosfan.*
 Woond in de Noordzee.

Vifcher 6. PELECAAN, met eene wigvormige
 (Pifcator.) staart, zaagswyze bek, wit
 ligchaam, alle de roeipen-
 nen

nen en het aangezicht zwart.
Woond in Indien en Europa.

Gek 7. PELECAAN, met een witagtig lig-
(*Sula*.) chaam, wigvormige staart,
en zaagswyze bek, de eerste
roeipennen aan de punt zwart,
het aangezicht rood. CATESB.
Carol. 87.
Woond in de Indische zee.

Bruine Gek 8. PELECAAN, met eene wigvormige
(*Fiber*.) staart, zaagswyze bek, bruin
ligchaam, alle de roeipennen
zwart, het aangezicht rood,
BRISS. *Ornith.* VI. p. 499.
tab. 43. fig. 1.
Woond in de Africaanſche,
en Americaanſche zee.

LXXIII. VISCHVANGER. De bek recht, puntig
(PLOTUS.) en getand, het aan-
gezicht gevedert.
De pooten alle ge-
palmd.

R 2

Vis-

Anhinga 1. VISCHVANGER, die bruin is, de
(*Plotus*) vleugels en hals ros gestreept *. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. 107. *Anhinga*.
Woond in [Senegal, Bengale] America.

LXXIV. KEERKRINGVOGEL. De *bek* mesgewys-
(PHAETON.) regt, scherp,
de opening verder dan de kaakbeenderen gapende.
De *Neusgaaten* langwerpig.
De agterste *vinger* na vooren gekeerd.

Langveer 1. KEERKRINGVOGEL, met twee zeer
(*Æthereus*) lange stuurvederen, een zaagswyze bek, de pooten in het evenwigt, de agterste vinger gevliëdt. EDWARDS.
Birds. III. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. 369.

Woond

Woond tuffchen de Keer-
kringen in de Zee.

Gorfou 2. KEERKRINGVOGEL, met ongeveder-
(*Demersus.*) de vleugels, de pooten ver-
buiten 't evenwigt naar ag-
ter, de agterfte vinger los.
EDW. *Birds.* I. 49.
Woond aan de Zuiderkeer-
kring.

LXXV. DUIKER. De *bek* zonder tanden, els-
(*COLYMBUS.*) wyze, regt, puntig.
De *keel* getand.
De *Neusgaaten* als ftreepjes
aan het agterfte van den bek.
De pooten buiten het even-
wigt.

Uria 1. DUIKER, met drievingerige ge-
(*Grylle.*) palmde pooten, een zwartlig-
chaam, en witte dekvederen.
EDW. *Birds.* I. tab. 50.
Woond aan den Poolkring.

(*Troile.*) 2. DUIKER, met gepalmde drievin-
R 3 gerige

gerige de pooten, een zwart ligchaam, de borst en buik wit, de tweede rei roeipennen aan de pant wit *Guillimot. Edw. glean. III. 359.*

Woond aan den Noordpool,

Noordsche 3. DUKER, met viervingerige gepalmde pooten, de hals van onder met een roestcoleurige vlak. *Edw. Birds. II. 97.*
(*Septentrio-*
nalis.)

Buff. Hist. Nat. Ois. 308.

Plongeon à gorge rouge.

Woond in Noord Europa,

Zwartkeel 4. DUKER, met viervingerige gepalmde pooten, een gryze kop, de hals van onder violet zwart met een witte band.

Woond in Europa.

Groote van 5. DUKER, met viervingerige gepalmde pooten, een violet zwarten kop en hals, en een witte afgebrooke band om de keel en hals. *Edw. Birds. III. 146.*
Ferroe
(*Glacialis.*)

Woond in de Noordzee,

DUI-

Immer 6. DUKER, met viervingerige gepalmde pooten, het ligchaam van boven zwart, met wit gewolkt, van onder geheel wit. Woond in de Yssee.

Gekuifde 7. DUKER, met gewebde pooten, een
(*Cristatus.*) ros hoofd, een zwarte halsband, de tweede rei fluurvederen wit. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 404. 1.
Woond in Europa.

Geoorde 8. DUKER, met gewebde pooten, gekuifde roestcoleurige ooren,
(*Auritus.*) [de hals en buik wit, de rug zwartagtig, de pooten blaauw, de middelste nagel lepelsgewyze stomp*.] BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 400.
Woond in Europa, America.

Duikelaar 9. DUKER, met gewebde pooten, een
(*Urinator.*) gladde kop, eene witte vlak op de vleugels. EDW. *glean.* III. tab. 360 fig. 2.
Woond in Zuid Europa.

Van St. Domingo 10. DUKER, met gewebde pooten,
 mingo gladde kop, het ligchaam onder
 (*Dominicus.*) der gevlaakt. *BRISS. Ornith. VI.*
 pag. 64. tab. 5. fig. 2.
 Woond aan St. Domingo.

Aarsvoet 11. DUKER, met gewebde pooten, een
 (*Podiceps.*) bruin ligchaam, de bek met
 anderhalve band. *CAT. Carol.*
 I. pag. 91. tab. 91.
 Woond in Noord America.

Dubbel (A) DUKER, met eene dubbelde kuif
 Gekuijde van boven bruin en van onder
 wit, de hals van onder
 met castanje bruine vlakken.
BRISS. Ornith. VI. pag. 42,
 tab. 3. fig. 2.
 Woond in America.

Zwartborst (B) DUKER, die bruin is, van onder
 wit, met gryze vlakken, een
 witte vlak tusschen den
 bek en de oogen, een zwarte
 vlak op de borst. *BRISS. Ornith. VI. p. 58.*
 Woond aan 't Eiland St. Thomas.

MEEUW.

LXXVI. MEEUW. De *bek* zonder tanden, regt,
(LARUS.) lepelsgewys, aan de punt
krom: het onder *kaakbeen* van
onder hoekig.

De *Neusgaaten* midden op den
bek, na vooren breeder.

[De *pooten* in het evenwigt,
korter dan het ligchaam.]

Rissa
(*Rissa*.)

1. MEEUW, die wit is, met eene graau-
we rug, de *stuurvederen* wit,
drie vingeren aan yder poot*.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 253.
Goiland cendré.
Woond in Ysland.

Drievinge-
rige
(*Tridactylus*.)

2. MEEUW, die witagtig is, met eene
grysachtige rug, de punten
der *stuurvederen* (behalven
de buitenste,) zwart, de poo-
ten met drie vingeren. BRISS.
Ornith. VI. pag. 189. *Mou-
ette d'byver.*

Gryze
(*Canus*.)

3. MEEUW, die wit is, met eene graau-
we rug, [de bek geel, de
pooten geelrood.] BRISS. *Or-
nith.*

nith. VI. p. 175. tab. 16. f.

1. *Mouëtte Cendrée.*

Woond in Europa.

NB. Deze is eene verscheidentheid
van de *Rissa*.

Afchkleuri- 4. MEEUW, die wit is, met eene afch-
ge couleurige rug, eene bruine
(*Cinerarius.*) vlak aan de oogen. BRISS.
Ornith. VI. p. 178. tab. 17.
f. 1. *Petite Mouëtte Cendrée.*

Witte 5. MEEUW, die wit is, met eene afch-
(*Naeivius.*) graauwe rug, de ftuurvede-
ren aan de punt zwart. BRISS.
Ornith. VI. p. 185. tab. 17.
fig. 2.
Woond in Europa.

Mantel- 6. MEEUW, die wit is, met eene zwar-
Meeuw te rug*. PENNANT. *Zool. Britt.*
(*Marinus.*) tab. I. 1.
Woond in Europa.

Bruine 7. MEEUW, die wit is, met eene brui-
Meeuw ne rug. MARSIGL. *Danub.* V,
(*Fuscus.*) pag. 84. tab. 40.
Woond in Europa.

MEEUW,

Spotter 8. MEEUW, die wit is, met een zwar-
 (*Atricilla*.) agtig hoofd, roode bek, en
 zwarte pooten. BRISS. *Or-
 nith.* VI. pag. 192. tab. 18.
 fig. 1. CATESB. *Carol.* I. p.
 89. tab. 89.
 Woond in America en Europa.

Kok Meeuw 9. MEEUW, die witagtig is, met eene
 (*Ridibundus*.) zwartagtige kop, roode bek
 en pooten.
 Woond in Europa.

Gevlakte (A) MEEUW, die wit is, met bruine
 hoekige vlakken. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 387.
 Woond in Europa.

Strontjager 10. MEEUW, die bruin is, met eene
 (*Parasiticus*.) zwarte kruin, een witagtige
 buik, en lange middelste
 stuurvederen. EDW. *Birds.*
 III. tab. 148.
 Woond tusschen de Keerkrin-
 gen.

Noordsche 11. MEEUW, die [geel en bruin ge-
 vlakt

Vogel
(*Catarractes.*)

vlakt is, met eene witte vlak
op de vleugels, de buik
bleekgeel,] de roeipennen en
stuurvederen by het ligchaam
wit, de staart byna gelyk.
Edw. *Birds.* III. tab. 149.
Woond aan de Noordpool.

LXXVII. STERN. De bek zonder tanden, elsgewyze,
(STERNA) scherp, en wat samen gedrukt.

De *Neusgaaten* aan het agterste van den bek.

Zotte
(*Stolida*)

1. STERN, met eene wigvormige staart,
een zwart ligchaam, en een
witagtig voorhoofd met
zwarte wenkbraauwen. CAT,
Carol. I. p. 88. tab. 88.
Woond in America.

Zeezwaluw
(*Hirundo.*)

2. STERN, met eene schaarsgewyze
staart, de twee buitenste
stuurvederen half wit en
zwart. BRISS. *Ornith.* VI. p.
203. tab. 19. f. 1,
Woond in Europa.

STERN,

Zwarte 3. STERN, met een byna schaarsgewyze
(*Nigra.*) staart, een grysg ligchaam, de
kop en bek zwart, de poo-
ten rood. BUFFON. Ois. 133.
Woond in Europa.

Kleine 4. STERN, met eene schaarsgewyze
(*Minuta.*) staart, wit Ligchaam, gryze
rug, wit voorhoofd, en wit-
te wenkbraauwen.
Woond in Zuid Europa.

Gevlakte 5. STERN, met eene uitgerandde staart,
(*Naevia.*) een gevlaakt ligchaam, eene
zwarte vlak aan de ooren.
BRISS. *Ornith.* VI. pag. 216.
tab. 20. fig. 2.
Woond in Zuid Europa.

Zwartagtige 6. STERN, met eene uitgerandde
(*Fuscata.*) staart, een zwartagtig onge-
vlakt ligchaam, de pooten
rood, en de bek bruin.
BRISS. *Ornith.* VI. pag. 220.
tab. 21. fig. 1.
Woond in Zuid Europa.

Met gesplee 7. STERN, met eene uitgerandde staart,
ten pooten zwart ligchaam, aschgrauwe
rug

(Fisfipes.)

rug, witte buik, en roodagtige pooten. BRISS. *Ornith.* 17. p. 211. tab. 20. f. 1.
Woond in Zuid Europa.

LXXVIII. WATERSNYDER. De bek regt: het

(Rynchops.)

opperkaakbeen
veel korter dan
het onder
kaakbeen, dat
aan de punt geknot is.

Zwarte
(Nigra.)

1. WATERSNYDER, die zwartagtig is, van onder wit, de bek van agter rood. BRISS. *Ornith.* VI. pag. 223. tab. 21. fig. 2.
BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 357.
Woond in America.

Rosse
(Fulva.)

2. WATERSNYDER, die ros is, met eene zwarte bek.
Woond in America.

STELT.

I V. STELTLOOPERS.

[G R A L L Æ.]

De Bek rolrondagtig, en wat stomp.

De Tong geheel en vleesachtig.

De Dyen naakt.

LXXIX. FLAMINGO. Eene naakte geknakte
(PHOENICOPTERUS.) geboogen, getandde
bek.

*De Neusgaaten streéps-
gewyze.*

*De pooten gepalmd en
viervingerig.*

Rode
(*Ruber.*)

I. FLAMINGO, die rood is, met zwarte
stuurvederen *. CATESB.
Carol. I. pag. 73. tab. 73.
Woond in Africa en America.

LE-

LXXX. LEPELAAR. De *Bek* platagtig, met
(PLATALEA.) een verbreed, rond,
vlak uiterfte.

Witte 1. LEPELAAR, die wit is, met eene
(*Leucorodia.*) zwarte keel, het agterhoofd
eenigzins gekuifd *. BUFF.
Hift. Nat. Ois. 405.
Woond in Europa.

Roode 2. LEPELAAR, met een [bleek] rood
(*Ajaja.*) ligchaam *. BUFF. *Hift. Nat.*
Ois. 165.
Woond in Zuid America.
(b) Donker roode.

Kleene 3. LEPELAAR, die van boven bruin,
(*Pygmaea.*) en van onder wit is.
Woond in Suriname.

LXXXI. KAMECHY. De *Bek* kegelrond, het
(PALAMEDEA.) bovenfte *kaakbeen*
krom.
De *pooten* viervingerig,
gespleeten.

Anhima 1. KAMECHY, met dubbel gedoornde
vleu-

(*Cornuta.*) vleugelen, het voorhoofd
met eene lange hoorn. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 451.
Woond in Brasil en Guaja-
nia.

Gekuifde 2. KAMICHY, die ongewapend is, met
(*Cristata.*) eengekuifd voorhoofd. WIL-
LUGB. *Ornith.* tab. 51.
Woond in Brasil.

LXXXII. SCURVOGEL. De *bek* fcherp, wat
(MYCTERIA.) opklimmende. De
boven kaak drie-
hoekig, en zeer
recht.
Het onder kaakbeen
driehoekig fcherp,
en wat naar boven
opgewept.
Het voorhoofd kaal.
De *Neusgaaten* streeps
gewyze.
Geen Tong.
De *pooten* viervingerig.

Brasiliaan- 1. SCURVOGEL, die wit is, met pur-
Iste Deel IIde Stuk. S pe-

fche
(*Americana.*)

pere roei- en ftuurvederen.
Piso *Bras.* p. 87.
Woond in Brafil.

LXXXIII. KRABBENEETER. De *bek* [dik, kort
(*CANCROMA.* en] bultig.

De *boven kaak*
lepelsgewys
met een haak-
je aan het ein-
de.

Lepelbek 1. KRABBENEETER, die van boven
(*Cochlearis.*) afchgraauw wit is, van onder
ros.

Woond in Guajana.

Tamatia 2. KRABBENEETER, [die bruin is,]
(*Cancropha-* met eenen witten buik.
ga.) *MARCGR. Bras.* 208.

Woond in Brafil.

LXXXIV. REIGER. De *bek* lang, regt, fcherp
(*ARDEA.*) [en dik] wat zamenge-
drukt, een groef van de
neus-

neusgaaten na de punt
loopende.

De *Neusgaaten* streepsge-
wyze.

De *pooten* viervingerig.

(a) *Gekuijde*, den bek
naauwlyks langer als
het hoofd.

Balearische 1. REIGER, met eene opstaande bor-
Kraan stelige kuif, de slaapen en
(*Pavonina*.) kwabben ongevedert. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 265. EDW.
Birds. IV. 192.
Woond in Africa.

Numidisch 2. REIGER, [die aschgrauw is, van
Juffertje onder wit,] met witte
(*Virgo*.) wenkbraauwen, die naar ag-
ter als afhangende kuiven
uitloopen *. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. 241. EDW. *birds.* III. 134.
Woond in het Oosten.

(b) *Kraanen*, de kop on-
gevedert.

Van Canada 3. REIGER, met het voorhoofd naakt

(Canadensis.)

en tepelachtig, het ligchaam
afschig raauw, de vleugels uit-
wendig bleekrood. EDW.
Birds. III.

Woond in Noord America.

Kraanvogel 4. REIGER, met het agterhoofd naakt,
(*Grus*.)

tepelachtig, de kruin- en roei-
pennen zwart, het ligchaam
afschig raauw. EDW. *Birds* III.
132.

Woond in Europa en Afri-
ca.

Americaan 5. REIGER, met den nek en slaapen
sche
(*Americana*.)

naakt en gepeteld, het voor-
hoofd, de nek en eerste stuur-
vederen zwartagtig, het lig-
chaam wit. EDW. *Birds*. III.
132. CATESB. *Carol*. I. 75.

Woond in Noord America.

Antigone 6. REIGER, met een naakte kop en hals-
band, die tepelachtig en rood
zyn, het ligchaam afschig raauw,
de eerste stuurvederen zwart
EDW. *Birds*. I. 45.

Woond in Afien.

REI-

Mexicaan- (A) REIGER, die aschgrauw is, met
fche de kop van boven rood, de
stuurvederen zwart.
Woond in Mexico.

Japanische (B) REIGER, die wit is, met het bo-
venste van de kop rood,
de hals en roeipennenzwart,
de stuurvederen wit.
Woond in Japan.

Trompetter(C) REIGER, die zwart is, hals en
Vogel borst goudblauw, de rug
vuilwit, de stuurvederen
zwart *. *BUFF. Hist. Nat.*
169. VOSM. beschryv. PALL.
Spicil. Zool. p. fasc. tab. IV.
Woond in America.

(c) Oyevaarders, met naak-
te oogkringen.

Oyevaar 7. REIGER, die wit is, met naakte
(*Ciconia.*) oogkringen, zwarte stuur-
vederen, en roode bek, huid
en pooten *.
Woond in Europa, Asia, A-
frica.

Zwarte 8. REIGER, die zwart is, met naakte
(*Nigra*) oogkringen, de buik en borst
wit.

Groenstaart (D) REIGER, die bruin is, de hals met
wit gestipt, de borst bruin,
met wit gegolfd, de roei-
vederen violet, de stuurve-
deren groen, de bek zeer
groen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
399. *Cicogne brune*.
Woond in . . . .

(d) *Reigers*, de middelste
vinger naar binnenge-
karteld.

Kwak 9. REIGER, met de kuif van het ag-
(*Nycticorax*) terhoofd drievederig wit en
regt uitsteekende, de rug
zwart, de buik geelagtig *.
BRISS. *Ornith.* V. pag. 493,
tab. 39. *Bihorcau*.
Woond in Zuid Europa.

Purpere 10. REIGER, met een zwart agter-
(*Purpurea*) hoofd, een afhangende kuif
met twee lange vederen, 't lyf
olyf-

olyfcoleurig, van onder purper. BRISS. *Ornith.* V. pag. 424. tab. 36. f. 2.

Woond in het Oosten.

Afchgrauwe
(*Cinerea.*) 11. REIGER, met een glad zwart agterhoofd, met eene blaauwagtige rug, van onder witagtig, de borst met lange zwarte vlakken. BRISS. *Ornith.* V. pag. 392. tab. 34.
Woond in Europa.

Groote
(*Major.*) 12. REIGER, met een zwarte afhange kuif aan het agterhoofd, afchgrauw Lighaam, de hals met eene zwarte streep, en de borst met een zwarte band. BRISS. *Ornith.* V. pag. 396. tab. 35*.
Woond in Europa.

Kleine (E) REIGER, die afchgrauw is, de hals en borst wit met zwarte vlakken.
Woond in Italien.

Cocoi 13. REIGER, met eene afhange afchgrauwe kuif, en rug, de
S 4 hals

hals met zwart gevlaakt, de
zyden van de kop zwart.

ALBIN. *Hist. Nat. Ois.* III.
pag. 32. tab. 79.

Woond in Cayenne.

Witte
(*Garzetta.*)

14. REIGER, met een gekuifd agter-
hoofd, een wit ligchaam, ee-
ne zwarte bek, de pooten en
de streep tusschen den bek
en de oogen groenagtig.
MARSIGL. *Danub.* V. pag. 14.
tab. 5.

Woond in het Oosten.

Groote Kuif 15. REIGER, met een gekuifd agter-
Reiger
(*Herodias.*)

hoofd, eene bruine rug, ros-
se dyen, de borst met lan-
ge zwarte vlakken. CATESB.
Carol. III. pag. 10. tab. 10.
Woond in America.

Violette
(*Violacea.*)

16. REIGER, met een geel agterhoofd,
en eene witte kuif, het lig-
chaam zwart en wit gestreept,
van onder blaauwagtig, met
geele pooten. CATESB. *Ca-
rol.*

rol. I. p. 79. tab. 79.

Woond in America.

Tweecoleu- (F) REIGER, met een gekuifd agter-
rige hoofd, een roffe hals en

blaauw ligchaam. BUFF. *Hist.*

Nat. Ois. 349.

Woond in America.

Blaauwe 17. REIGER, met een gekuifd agter-
(*Coerulea.*) hoofd, en blaauw ligchaam.

CATESB. *Carol.* I. p. 76. tab.

76.

Woond in Noord America.

Driecoleuri- (G) REIGER, die zwartagtig blaauw
ge is, van onder wit, met blaau-

we dekvederen der staart.

BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 350.

Woond in America.

Van Hud- 18. REIGER, met eene zwarte gekuif-
fons Baay de kruin, het ligchaam bruin-

agtig, van onder witagtig, de

hals van onder zwart, en ros

gevlakt. EDW. *Birds.* III. tab.

135.

Woond aan Hudfonsbaay.

Gestreepte 19. REIGER, met een wat gekuifd agter-
 (*Striata.*) hoofd, de rug grys gestreept,
 de hals van onder roestcoleu-
 rig, de tweede rei stuurvede-
 ren aan de punten wit.
 Woond in Suriname.

Groene 20. REIGER, met een wat gekuifd ag-
 (*Virescens.*) terhoofd, de rug glanzig
 groen, de borst ros, de toom-
 streep geel, de stuurvederen
 goudgroen. CATESB. *Carol.* I,
 pag. 80. tab. 80.
 Woond in America.

Roerdomp 21. REIGER, met eene bynag gladde kop,
 (*Stellaris.*) van boven ros, met dwarffe
 bruine vlakken, van onder
 bleeker, met langwerpige
 vlakken *. BRISS. *Ornith.*
 V. p. 444. 37. fig. 1.
 Woond in Europa.

Gryze 22. REIGER, met eene glad bruine
 (*Grisea.*) kop, een bruinagtig lig-
 chaam, van onder wit, de
 voorste roeipennen met ee-
 ne witte vlak aan de punt.
 BRISS.

BRISS. *Ornith.* V. pag. 412.
tab. fig. 1.

Woond in het Oosten.

Soco 23. REIGER, met eenegladde kop, een
(*Brasiliensis.*) zwartagtig met geel gestipt
ligchaam, de roei en stuur-
vederen, de bek en pooten
zwartagtig. WILL. *Ornith.*
209. tab. 51.
Woond in Zuid America.

Witte 24. REIGER, met eenegladde kop, een
(*Alba.*) wit ligchaam, rosse bek en
zwarte pooten *. MARSIGL.
Danub. V. p. 12. tab. 4.
Woond in Europa.

Van Caroli- 25. REIGER, met een gladde kop, wit
na ligchaam, de twee stuurve-
(*Aequinoctia-* deren aan den rand bruin.
lis.) CAT. *Carol.* I. tab. 77.
Woond in America.

Woud-Aap- 26. REIGER, met eene gladde kop,
je een bruin ligchaam, dat van
(*Minuta.*) onder rosis, de stuurvederen
zwartagtig groen, de toom-
ftree-

streepen geelagtig. EDW.
Glean. II. tab. 275.

Woond in Barbaryen.

(b) *Blongios.* BUFF. *Hist.*
Nat. des Ois. 323.

(c) Kleine Butoor van Senegal. ID. *ibid.* 315.

(b) Woond in Zwitserland en in Senegal.

LXXXV. COURLY. De bek lang spilrondagtig,
 (TANTALUS.) wat krom.

Een naakt *aangezigt* tot
 agter de oogen.

Eene korte, breede *tong*.

Een naakte zak aan de
 keel.

Eironde *Neusgaaten*.

De *pooten* viervingerig,
 naar agter gepalmd.

Americaan- 1. COURLY, met een blaauwachtig
 fche Peli-

caan

(*Loculator.*)

aangezicht, eene roodagtige
 bek, roei en stuurvederen

zwart, het ligchaam wit. CAT-
 TESB. *Carol.* I. pag. 81. tab. 81.

Woond in America.

Cou-

Gevlakte 2. COURLY, met een zwart aange-
 (Falcinellus.) zicht, blaauwe pooten, een
 castanie bruin [met wit en
 bruin gevlakt] ligchaam, de
 vleugels en staart violet.
 BRISS. *Ornith.* V. tab. 27.
 fig. 2.

Woond in Italien, Oostenryk.

Kleine 3. COURLY, met een groen aangezicht,
 (Minutus.) bek en pooten, het ligchaam
 roest verwig, van onder wit.
 EDW. *Glean.* III. tab. 356.
 Woond in . . . . .

Ibis 4. COURLY, met roode wangen, een
 geele bek, gryze pooten,
 zwarte stuurvederen, het
 ligchaam witagtig ros. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 389.
 Woond in Egypten.

RoodeWulp 5. COURLY, met roode wangen, bek
 (Ruber.) en pooten, het lichaam bloed-
 rood, de punten der vleu-
 gelen zwart *. BUFF. *Hist.*
Nat. des Ois. 81.
 Woond in America.

Cou.

Witte 6. COURLY, met roode wangen, bek
(*Albus.*) en pooten, het ligchaam wit,
de punten der vleugelen
groen. CAT. *Carol.* I. tab.
82.
Woond in Brazil.

Bruine 7. COURLY, met roode wangen, bek,
(*Fuscus.*) en pooten, een bruin lig-
chaam, dat van onder wit
is. CATESB. *Carol.* I. tab. 83.
Woond in America.

vanMadaga- (A) COURLY, die bruin is, van on-
fcar der wit, de borst en zyden
ros, met groote zwarte vlak-
ken. BRISS. *Ornith.* V. pag.
321. tab. 28.
Woond in Madagafcar.

Castanje (B) COURLY, die glanzig castanje
bruine bruin is, met eene groene
borst, de fluurvederen ca-
stanje bruin. MARSIGL. *Da-*
nub. V. p. 40. tab. 18.
Woond aan den Donauw.

SNIP.

LXXXVI. SNIP. De *bek* spilrond stomp, lan-
 (SCOLOPAX.) ger dan de kop.
 De *Neusgaaten* als streepjes.
 Het *aangezicht* gedekt.
 De *pooten* viervingerig; de
 laatste met veele leedjes.

Gaurauna 1. SNIP, met eene kromme bek, die
 geelagtig is, bruine pooten,
 het lichaam bruin, met wit
 gestreept. BRISS. *Ornith.* V.
 p. 330.
 Woond in Zuid America.

Uit Madaga-2. SNIP, met eene kromme bek, roffe
 fchar pooten, en ruitagrige vlak-
 ken op den rug. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 198. *Courly.*
 Woond in Madagascar.

NB. Deze is een *Courly*, zie het voor-
 gaande geslagt lett. B.

Witvlak 3. SNIP, met eene kromme bek,
 (*Arquata.*) blaauwagtige pooten, zwart-
 te vleugels, met witte vlak-
 ken. ALBIN. *Ois.* I. tab. 79.
 Woond in Europa.

SNIP,

Blaauwpoot 4. SNIP, met eene kromme bek,
 (*Phæopus.*) blaauwagtige pooten, en
 bruine ruitagtige vlakken
 op den rug. Edw. *glean.* II.
 307.
 Woond in Europa.

Bruine 5. SNIP, met de bek aan de punt geboo-
 (*Fusca.*) gen, het ligchaam wit, en
 zwart gewolkt, de stuit en
 vleugelen van onder wit.
 BRISS. *Ornith.* V. pag. 276.
 tab. 23. fig. 2. *Barge.*
 Woond in Europa

Houtsnip 6. SNIP, met een regte bek die aan
 (*Rusticola.*) het grondstuk ros is, de poo-
 ten afchgrauw, de dyen be-
 dekt, eene zwarte band om de
 kop. BORLACE *Cornub.* p.
 245. tab. 24. fig. 12.
 Woond in Engeland.

Snipje 7. SNIP, met eene regte geknobbeld-
 (*Gallinago.*) debek, bruine pooten, vier
 bruine voorhoofds streepen,
 de

stuit violet bont. MARSIGL.
Danub. V. tab. 15.
 Woond in Europa.

Poelsnip 8. SNIP, met een regte geknobbelde
 (*Gallinula.*) bek, groenagtige pooten,
 bruine toomstreepen, de stuit
 violet bont *. *BRISS. Ornith.*
V. pag. 304. tab. 26. fig. 2.
 Woond in Europa.

Tjerk 9. SNIP, met een regte geelagtige bek,
 (*Fedoa.*) bruine pooten, de tweede rei
 stuurvederen ros, met zwart
 gestipt. *EDW. birds.* III. 137.
 Woond in Noord America.

Glut 10. SNIP, met een regte bek, van on-
 (*Glottis.*) der aan het grondstuk rood,
 het ligchaam van onder wit,
 de pooten groenagtig. *BRISS.*
Ornith. V. pag. 272. tab. 24.
 fig. 2.
 Woond in Europa.

Ruiter 11. SNIP, met een roode regte bek,
 (*Calidris.*) roode pooten, de tweede rei
Iste. Deel. IIde Stuk. T stuur-

stuurvederen wit. *BRISS. Ornith. V. p. 188. tab. 17.*
Woond in Europa.

Totanus 12. SNIP, met een byna regte bek,
bruine pooten, witte wenk-
braauwen, borst, buik, en
stuit. *BRISS. Ornith. V. pag.*
267. tab. 23. f. 1.
Woond aan stranden in Eu-
ropa.

Barge 13. SNIP, met een wat gekromde bek,
(*Limosa.*) die aan het grondstuk rood
is, de pooten bruin, de stuur-
vederen meteene witte vlak,
behalven de vier eerste. *MAR-*
SIGL. Danub. V. p. 30. tab.
13, 14.
Woond in Europa.

Kaapsche 14. SNIP, met een regte rosagtige bek,
(*Capensis.*) en rosagtige kruinstreep, ee-
ne zwarte borstband, [het
ligchaam blaauw] en een wit-
te streep aan yder zyde. *BUFF.*
Hist. Nat. Ois. 270.
Woond aan de Kaap.

SNIP,

Saffraan- 15. SNIP, met een geelagtige wat ge-
borst kromde bek, [bruin ligchaam]
(*Lasponica*.) van onder roestcoleurig ros
de pooten zwart. Edw. *birds*.
III. 138.
Woond in Lapland en Noord
America.

Roodhals 16. SNIP, met een regte bek, groen-
(*Ægocephala*.) agtige pooten, rosagtige kop
en hals, de drie roeivederen
zwart, aan hun begin wit.
MARSIGL. *Danub*. V. p. 36.
tab. 16.
Woond in Zuid Europa.

Witte 17. SNIP, met eene oranje coleurige
(*Alba*.) na bovengekromde bek, een
wit ligchaam met geelagtige
stuur en roeipennen, bruine
pooten. Edw. *birds*. III. 139.
[de agterste figuur.]
Woond in Noord America.

Witte ruit 18. SNIP, met eene regte bek, oran-
(*Candida*.) je pooten, een witagtig lig-
chaam, de roeipennen grys

met wit gebandeerd. ED-
WARD, *birds*. III. 139. [de
voorst.]

Woond in Noord Ameri-
ca.

LXXXVII. STRANDLOOPER. De *bek* spilrond-
(TRINGA.)

agtig, zoo lang
als de kop, [aan
de punt stomp
en glad.]

De *Neusgaaten*
streepsgewyze.

De *pooten* vier-
vingerig, de ag-
terste met een
leedje, en den
grond niet raa-
kende.

Kemphaant- I. STRANDLOOPER, met een roode bek
je
(*Pugnax*.)

en pooten, de drie zylingfche
stuurvederen zonder vlak-
ken, het aangezicht met ge-
korrelde vleeschige tepelt-
jes '*.

Paon de Mer. BUFF.
Hift.

Hift. Nat. Ois. 305, 306.
Woond in Europa.

Kievit 2. STRANDLOOPER, met roode pooten,
(*Vanellus.*) eene afhangende kuif, en een
zwarte borst. *BUFF. Hift.*
Nat. des Ois. 242. *Vanneau.*
Woond in Europa, Africa.

Van Senegal (A) STRANDLOOPER, met zeer lange
geele pooten en bek, het
voorhoofd met een afhan-
gnd geel vlies, het ligchaam
grauw, de dekvederen wit,
de roeipennen zwart, de
ftuurpennen wit, met eene
breede zwarte band; de
fchouders met eene doorn
gewapend. *BUFF. Hift. Nat.*
Ois. 362.
Woond in Senegal.

Roode Rui- 3. STRANDLOOPER, met eene roode bek
ter en pooten, het ligchaam geel
(*Gambetta.*) en afchgrauw gemengeld,
van onder wit. *ALBIN. Ois.*
II. tab. 68.
Woond in Europa.

Tolk 4. STRANDLOOPER, met roode poe'en,
 (Interpres.) het ligchaam wit, zwart en
 roeft coleurig gemengd, de
 borst en buik wit. *Coulon chaud*,
Buff. Hist. Nat. Ois. 340.
 Woond in Europa en Noord
 America.

[(b) Strandlooper, die ros
 is met zwarte vlak-
 ken, de kop en hals
 witen zwart, de roei-
 pennen bruin. *Edw.*
birds. III. 141.

Woond in Hudsons baay.]

NB. Deze door HR. LINNAEUS tot de Tolk
 betrokken, en fchynt zoogeenan-
 der zoort, ten minften eene aan-
 merkelyke verfcheidentheid.

Gefcrepte 5. STRANDLOOPER, met den grond van
 Ruiter den bek en de pooten geel,
 (Striata.) de ftuurvederen wit, met
 bruin gebandeerd, en de
 meeste roeipennen wit. *Che-*
valier rayé. *BRISS. Ornith.* V.
 p. 196. tab. 18. f. 1.
 Woondt in Europa.

STRAND-

Morinel 6. STRANDLOOPER, met roode pooten, zwartagtige stuurvederen, die aan hunnen grond wit zyn, het ligchaam grys, de borst zwart. *Coulon Chaud.* BRISS. *Ornith.* V. p. 137. tab. 11. f. 2. CAT. *Carol.* I. 72. tab. 72.
Woond in America.

Zee Lyfter 7. STRANDLOOPER, met den grond van den bek en de pooten vleeschcoleurig, het ligchaam gevlakt, de wenkbraauwen, en de twee banden op de vleugelen wit. EDW. *Glean.* II. tab. 277. fig. 2.
Woond in Europa en Noord America.

Gryze 8. STRANDLOOPER, met eene elsgewyze, aan de punt gekromde bek, de pooten gewebd, de borst met wit gegolfd. EDW. III. 308.
Woond in Engeland en Lapland.

Noordſche 9. STRANDLOOPER, met eene elſge-
(*Hyperbo-* wyze aan de punt gekrom-
rea.) de bek, de voeten gewed,
de borſt afſchkleurig, de zy-
den vanden hals roeſtverwig.

EDW. *birds.* IV. 143.

Woond in Hudſons baay,
en Lapland.

Bruine 10. STRANDLOOPER, met gewebde poo-
(*Fulicaria.*) ten, eene regte geele bek,
het ligchaam grys, van onder
ros. EDW. *birds.* IV. 142.
Woond in America.

Alpiſche 11. STRANDLOOPER, die rood bruin is,
(*Alpina.*) met eene zwartagtige borſt,
de ſtuurvederen ligt afſch-
graauw, de pooten bruinag-
tig. BRISS. *Ornith.* V. p.
216. tab. 19. f. 2. *Alouette*
de Mer.
Woond in Lapland.

Zwitſerſche 12. STRANDLOOPER, met eene zwar-
(*Helvetica.*) te bek en pooten van onder
zwart, de buik wit, de ſtuur-
vede;

vederen wit, met zwart gebandeerd. BRISS. *Ornith.* V. p. 106. tab. 10. fig. 1.
Woond in Zwitserland.

Roodbeen 13. STRANDLOOPER, met de punt van den bek gestipt, de pooten groenagtig, de rug bruin en groen, de buik en buitenste stuurvederen wit. BRISS. *Ornith.* V. tab. 16. f. 1.
Woond in Europa.

(b) Strandlooper met een gladde bek, groene pooten, een bruin ligchaam met wit gestipt, een witte borst.

Woond in Europa.

Hairsnep 14. STRANDLOOPER, met een gladde bek, blaauwagtige pooten, het ligchaam afchgrauw met zwarte vlakken: van onder wit, *Puegnette*. BRISS. *Ornith.* V. 183. tab. XVI. f. 2.
Woond in Europa.

Knot 15. STRANDLOOPER, met eene gladde
 (*Canutus.*) bek, afchgrauwe pooten,
 de voorfte roeipennen gekar-
 teld, de voorfte fluurveer
 wit en ongevlakt. EDW.
Glean. II. tab. 278.
 Woond in Europa.

Sanderling 16. STRANDLOOPER, met zwarte bek
 (*Arenaria.*) en pooten, een grysligchaam,
 dat van onder wit is met ee-
 ne gryze toomstreep. BRISS.
Ornith. V. tab. 20. f. 2.
 Woond in Europa.

Strandruiter 17. STRANDLOOPER, met een gladde
 (*Littorea.*) bek, afchgrauwe pooten,
 bruine roeivederen, de fchaft
 der eerfte sneeuw wit. BRISS.
Ornith. V. pag. 203. tab. 17.
 fig. 2.
 Woond in Europa.

Bruine (B) STRANDLOOPER, die van boven
 bruin is, de vederen zwart
 met bruin gerand, de roei-
 pennen zwart, met witte
 ran-

randen. BUFFON. *Hist. Nat.*
Ois. 300.
 Woond in Europa

Strandloo- 18. STRANDLOOPER, met eene zwarte
 per bek en pooten, wittetoom-
 (*Cinclus.*) streep, het ligchaam en stuit
 grys en bruin. BRISS. *Ornith.*
V. p. 211. tab. 19. f. 1.
 Woond in Europa.

Woondnip 19. STRANDLOOPER, met eene zwart-
 (*Calidris.*) agtige bekenpooten, het lig-
 chaam van onder olyfcoleu-
 rig, de stuit gestippeld. BRISS.
Ornith. *V.* p. 226. tab. 20.
 fig. 1. *Maubeche.*
 Woond in Europa.

Kleine 20. STRANDLOOPER, met eene bruine
 (*Puffilla*) bek en pooten, het ligchaam
 van onder rosagtig, de bui-
 tenste stuurvederen met een
 witte schaft, de stuit bont.
 BRISS. *Ornith.* *V.* pag. 222.
 tab. 25. f. 2.
 Woond in St. Domingo.

STRAND-

Bonte 21. STRANDLOOPER, met eene zwarte
 (*Varia.*) bek en pooten, het ligchaam
 bruin met wit gemengeld,
 de buik wit, de ftuurvederen
 wit, met bruin gebandeert.
 BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 366.
 Woond in Europa.

Bruine 22. STRANDLOOPER, met bruine bek
 (*Fusca.*) en pooten en een bruin onge-
 vlakt ligchaam. BRISS. *Ornith.*
 V. p. 148.
 Woond in Senegal.

Braakvogel 23. STRANDLOOPER, met een zwarte
 (*Squaterola.*) bek, en groenagtige pooten,
 het ligchaam grys, van onder
 witachtig. BRISS. *Ornith.* V.
 p. 100. tab. 9. f. 1.
 Woond in Europa.

LXXXVII. PLEVIER. De *Bek* fpilrondagtig-
 (CHARADRIUS.) ftomp, [aan het eind
 dikker.]
 De *Neusgaaten* als
 ftreepjes.

Drie

Drie voorvingeren zonder agtervinger.

Pieper 1. PLEVIER, met eene zwarte borst,
(*Hiaticula.*) een zwartagtig voorhoofd,
met een wit bandje, de kruin
bruin, de pooten geel. BRISS.
Ornith. V. p. 63. tab. 5. f. 2.
Woond in Europa en Ame-
rica.

Alexandryn-2. PLEVIER, die bruin is, met het
fche voorhoofd, de hals en rug-
(*Alexandrinus.*) ge streep en buik wit, de zy-
lingsche ftuurvederen wit,
de pooten bruin blaauw. HAS-
SELQ. *Reiz.* II. d. n. 30.
Woond in Alexandrien.

Schreeuwer 3. PLEVIER, met de banden der borst,
(*Vociferus.*) hals, voorhoofd, en koonen
zwart, de ftart geel, met
eene zwarte band, de poo-
ten geel. [de bek zwart.]
CATESB. *Carol.* I. p. 71. tab. 71.
Woond in Virginien.

Egyptifche 4. PLEVIER, met eene zwarte borst:
band,

(Egyptius.)

band, witte wenkbraauwen,
de stuurvederen aan de punt
wit, met eene zwarte band,
blaauwe pooten. HASSELQ.
reiz. N. 31.

Woond in Egypten.

Dottrel

(Marinellus.)

5. PLEVIER, met eene roestverwige
borst, de band der borst en
wenkbraauwen wit, de pooten
zwart. BRISS. *Ornith.* V.
54. tab. 4. f. 2.

Woond in Europa.

Van Hud-
fonsbaay

(Apricarius.)

6. PLEVIER, met eene zwarte buik,
een bruin ligchaam, dat wit
en geel gestipt is, de pooten
afschgrauw. EDW. *Birds.*
III. tab. 140. *the spotted Plover.*

Woond in Zweeden en Canada.

GoudPlevier

(Pluvialis.)

7. PLEVIER, met een zwart en groen-
gevlakt ligchaam, van onder
witagtig, de pooten afsch-
grauw. BRISS. *Ornith.* V.
pag. 43. tab. 4. fig. 1.

Woond in Europa.

PLE-

Kleine goud-(A) PLEVIER, die van boven zwart-
 Plevier agtig is, met geele vlakken,
 van onder wit, de stuurve-
 deren zwartagtig, met wit
 engeel aan den rand gevlaakt.
 BRISS. *Ornith.* V. p. 47.

Gekraagde 8. PLEVIER, met eene zwart gevlaak-
 (*Terquatus.*) te borst, een wit voorhoofd,
 de kruin en de halsband
 zwart, de pooten en bek
 blaauwagtig. BRISS. *Ornith.*
 V. p. 70. tab. 6. f. 2.
 Woond in St. Domingo.

Grysborst (B) PLEVIER, die van boven zwart-
 agtig is, met geelagtige vlak-
 ken, de hals en borst grys,
 de randen der vleugelen geel-
 agtig, de stuurvederen bruin
 met witagtige vlakken. BRISS.
Ornith. V. p. 48. tab. 6. f. 1.
 Woond in St. Domingo.

Engelsche (C) PLEVIER, die van boven grysbrein
 is, de randen der vederen
 geel, van onder rosagtig wit,
 do

de kop wit, geel en grysgelakt, een witte band boven de oogen. *BRISS. Ornith. V. p. 58.*

Woond in Engeland.

Gekraagde (D) PLEVIER, die van boven donker bruin is, van onder wit; de borst met zwarte vlakken, een witte halsband, de stuurvederen witagtig, met rosenzwart gemengeld. *BROWN. Nat. Hist. of Jam. p. 477.*
Woond in Jamaica.

Bosch Plevier 9. PLEVIER, met eene zwarte bek en pooten, de toomstreep en stuit grysgelakt, het ligchaam van [boven grysgelakt,] onder wit, ongevlakt, [de kop van voren wit.] *BRISS. Ornith. V. p. 230. tab. 20. fig. 1. Mau-beche grise.*

NB. Dit is eene Snip, geen Plevier.

SnepPlevier (E) PLEVIER, die bruin is, met violet vlakken, eene zwarte toom-

toomstreep, en een witte vlak onder de oogen. BUFF. *Hist. Nat. des Ois.* 365.
Woond in . . . . .

Griel 10. PLEVIER, die gryns is, de twee
(*Oedicna-* voorste roeipennen zwart, in
mus.) 't midden wit, de bek scherp,
de pooten aschgrauw. PEN-
NANT. *Zool. Britt.* tab. D. I.
Woond in Engeland en in het
Oosten.

Mathoen 11. PLEVIER, die wit is, met eene
(*Himanto-* zwarterug, eene zwarte bek,
pus.) die langer is dan de kop, en
zeer lange roode pooten.
BRISS. *Ornith.* V. p. 33. tab.
3. f. 1. *Echasse.*
Woond in Zuid Europa.

Mexicaan- (F) PLEVIER, die wit is, de vleugels
sche zwart en wit bont, de kop
van boven zwart. BRISS.
Ornith. V. p. 36. *Echasse*
de Mexique.
Woond in Mexico.

Bengaalfche (G) PLEVIER, die van boven glanzig bruin is, met zwart gevlaakt, de kop, de keel en hals zwart, de koonen bleek castanje bruin. BRISS. *Ornith.* V. p. 82. EDW. *Glean.* I. p. 87. tab. 250.
Woond in Bengale.

Gedoornde 12. PLEVIER, met een zwarte borst, (Spinosus.) pooten en stuurvederen, het agterhoofd gekuifd, de stuurvederen ter helfte wit, de vleugels gedoornd. BRISS. *Ornith.* V. p. 86. tab. 7. f. 2.
(b) Indische Plevier met een zwarte borst EDW. *Birds.* I. 4 7. *Glean.* II. tab. 280.
Woond in Egypte.

LLXXIX. KLUIT. De *bek* plat, zamengedrukt elsgewyze, naar boven omgekromt puntig, de punt buigzaam.
De *pooten* drievingerig, gepalmt.

KLUIT

Kluit 1. KLUIT * die wit en zwart bont is*.
 (Avocetta.) BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 353.
 Woond in Europa.

XC. SCHOLEXTER. Eene zaamengedrukte *bek*,
 (HAEMATOPUS.) aan de punt wigsgewyze.
 De *neusgaaten* streepsge-
 wyze.
 De *pooten* drie vingerig en
 gespleeten.

Scholexter 1. SCHOLEXTER, [die van boven zwart
 (Orstalegus.) is, en van onder wit, de kop
 en de hals zwart, een wit
 vlakje onder de oogen.] CA-
 TESB. *Carol. I.* tab. 85.
 Woond in America.

XCI. WATERHOEN. De *bek* verheven, het op-
 (FULICA.) perkaak met zynen rand
 over het onderste stui-
 tende, het ander kaak
 been agter de punt bul-
 tig.

V 2

Da

De *neusgaaten* langwerpig.

Het *voorhoofd* kaal.

De *pooten* viervingerigen en wat geveesdt.

Bruin
(*Fusca.*)

1. WATERHOEN, met een geelagtig voorhoofd, geelagtige dybanden, de pooten ongevliedst, het ligchaam bruinagtig. BRISS. *Ornith.* VI. p. 6. Woond in Europa.

Koet
(*Afra.*)

2. WATERHOEN, met een rood voorhoofd, geele dybanden, gevliedde pooten, het ligchaam zwartagtig. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 393. Woond in Europa.

Zeeduivel
(*Aterrima.*)

3. WATERHOEN, met een wit voorhoofd, roode Dybanden, het ligchaam zwartagtig. BRISS. *Ornith.* VI. p. 28. tab. 2. fig. 2. Woond in Europa.

Water-

4. WATERHOEN, met een oranje voorhoofd,

hoentje (<i>Chloropus.</i>)	hoofd, roode dybanden, de pooten ongevliesd, het lig- chaam zwartagtig. BRISS. <i>Or- nith.</i> VI. p. 3. tab. 1. f. 1. 2. Woond in Europa en Ame- rica.

Poula Sul- tane (<i>Porphyrio.</i>)	5. WATERHOEN, met een rood voor- hoofd, veele dybanden, on- gevliesde pooten, groen lig- chaam, dat van onder violet is. BRISS. <i>Ornith.</i> V. p. 22. p. 512 tab. 42. f. 1. Woond in Indien.

NB. De Heer BRISSON betreft tot de-
 ze soort het purper Waterhoent-
 je van EDWARDS, *Birds.* II. tab.
 87. het geen eene andere soort
 is, en geheel donker blaauw, en
 de Heer EDWARDS zegt zelve, dat
 hy alom blaauw is: *there is a great
 likeness of colour al over the body of
 this bird, so that it needs on ly to be
 said that it is of a fine blue. —*
*in some light it seems to have a lit-
 tle glos of green on the back:* UL.
 ALDROVANDUS. *Ornith.* Lib. XX.

buik en ftuurvederen, de pooten ongevliesd. *BUFF. Hift. Nat. Ois.* tab. 352.
Woond in Cayenne.

Carthageen 6. WATERHOEN, met een blaauw voor-
fche   hoofd, het ligchaam ros, on-
(*Carthagena.*)   gevliesde pooten.
Woond in Carthagena.

Bruine   7. WATERHOEN met een blaauw voor-
Blaauwe   hoofd, ongevliesde pooten,
(*Martinica.*)   het ligchaam bruin blaauw.
Woond in Martinica.

XCII. CHIRURGYN. De *bek* wat fpilrond en
(*PARRA.*)   ftomp.
De *Neusgaaten* eyrond, in
het midden van den
bek.
Het *voorhoofd* geknobbeld
met gekwabde knob-
bels.
De *vleugels* gedoorndt.

Van St. DC. 1. CHIRURGYN, [met een rosligchaam
V 4   van

mingo
(*Dominica.*)

van onder roozen couleur,]
matige nagels en geele pooten, [de kwab van het voorhoofd geel.] BRISS. *Ornith.* V. p. 118.

Woond in St. Domingo.

Van Senegal 2. CHIRURGYN, met matige nagels en
(*Senegallæ.*) roode pooten.

NB. Deze is de Strandlooper van Senegal (zie bl. 267. gesl. 87. A.

Jacana
(*Jacana.*)

3. CHIRURGYN, met [zeer lange vingers,] de agternagels zeer lang, de pooten graauw [het ligchaam castanje bruin, de hals zwart, de roeivederen groen *.] EDW. *Glean.* III. tab 357.

Woond in Zuid America,

Bonte Chi-
rurgyn
(*Variabilis.*)

4. CHIRURGYN, met verlengde agternagels, blaauwagtige pooten, [groene roeipennen, het ligchaam gemengeldt, uitros wit en zwart, eene zwarte band over de oogen.] EDW.

Birds,

Birds. I. 48. 1.

Woond in Zuid America.

Savacou 5. CHIRURGYN, met verlengde vin-
(*Chavaria.*) geren, roffe pooten; een ge-
kuifd agterhoofd*. BUFF.
Hift. Nat. Oif. 38.

Woond in Cayenne en aan
de rivier Cinu.

NB. Deze zeer zeldzaame vogel, wel-
ke ik in geene Cabinetten ge-
zien heb, dan by den Heer JU-
LIAANS, maakt miſſchien een ge-
ſlagt op zich zelve, de wonder-
lyke, zeer breede, in het midden
gekielde, aan de punt uitgerand-
de bek, de neusgaaten na by het
voorhoofd, de twee vleefchige
banden, welke het opperkaak-
been als het waare aan het hoofd
houden, het voorhoofd zonder
kwab, de zeer korte nagels, ſchei-
den hun van dit geſlagt zeker af.

XCIH. RALL. De bek van agter dikker zamen-
(RALLUS.) gedrukt, aan de rug na de punt

toe dunner en fcherp.

De *neusgaaten* eyrond.

De *pooten* viervingerig, en gefpleeten.

Het *Ligchaam* zaamen gedrukt.

Schriek
(*Crex*)

1. RALL, met roeftverwige vleugelen, [de vederen zwart met roffe randen, de hals en borft afchgrauw, de bek en pooten grys.] BRISS. *Ornith.* V. p. 159. tab. 13. f. 2. *Roi des Cailles.*

Woond in Europa.

Fluweel
hoentje
(*Aquaticus.*)

2. RALL, met gryze vleugelen, die met bruin gevlaktzyn, dezyden met wit gevlakt, de bek van onder ros *. BRISS. *Ornith.* V. pag. 151. tab. 12. fig. 2.

Woond in Europa aan de moeraffen.

Pernel
(*Porzana.*)

3. RALL, met de twee binnenfte ftuurvederen, met wit gezoomd, de bek en pooten olyfcoleur.

BRISS.

BRISS. *Ornith.* V. p. 155.
tab. 13. fig. 1. *Marouette*.
Woond in Europa.

Bruine 4. RALL, die bruin is, met witte
(*Fuscus.*) staartvederen, die gegolfd
zyn, de pooten geel. BRISS.
Ornith. V. p. 173. tab. 15.
fig. 2.
Woond in de Philippynsche
Eilanden.

Groene (A) RALL, die groen is, van onder
geel, met eene staalcoleuri-
ge vlak aan het oog. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 368.
Woond in Cayenne.

Gestreepte 5. RALL, die zwartagtig is, van on-
(*Striatus.*) der met wit gegolft, eene
rosse keel. BRISS. *Ornith.* V.
167. tab. 14. fig. 2.
Woond in de Philippynsche
Eilanden.

Gekraagde 6. RALL, die bruin is, van onder met
(*Torquatus.*) wit gegolfd, eene witte streep
bo-

bovende oogen. *Briss. Ornith.*
 V. pag. 170. tab. 15. f. 1.
 Woond in de Philippynsche
 Eilanden.

Philippyn- 7. RALL, die bruin is, van onder met
 sche grys getandeert, witte wenk-
 (*Philippin-* braauwen, de hals van onder
sis.) rosagtig. *Briss. Ornith.* V.
 p. 163. tab. 14. f. 1.
 Woond in de Philippynsche
 Eilanden.

VanBengale 8. RALL, die wit is, met eene zwar-
 (*Bengalensis.*) te kop en hals, de rug en
 vleugels groen, de grootste
 slagpennen met rood gevlaakt.
Chevalier de Bengale. Briss.
Ornith. V. p. 209.
 Woond in Asia.

VanCarolina 9. RALL, die grys is, met een zwar-
 (*Carolinus.*) te kop, de borst loodcolour,
 de bek geel, de pooten groen-
 agtig. *Edw. Birds.* p. 144.
 Woond in Noord America.

RALL,

Virginische 10. RALL, die bruin is, ongevlakt;
 (*Virginia-* met bruine bek en pooten,
nus.) CATESB. *Carol.* I. pag. 70.
 tab. 70.

XCIV. TROMPETTERVO. De *bek* kegelagtig
 GEL. rolrond verhee-
 (PSOPHIA.) ven, wat fcherp,
 het *opperkaakbeen*
 langer.
 De *Neusgaaten* ei-
 rond en wyd.
 De *pooten* viervin-
 gerig, en ge-
 spleeten.

Poephoen 1. TROMPETTERVOGEL, die zwart is,
 (*Crepitans.*) met eene blaauwe en goud
 groene borst.
 Woond in America.

NB. Deze behoort tot de kraanen,
 zie bladz. 251. gl. 84. C.

XCVI. TRAPGANS. De *bek* aan het *opperkaakbeen*
 (OTIS.) verwulfd.

De

De *Neusgaten* eirond.

De *tong* gespleeten.

De *pooten* drievingerig.

Trapgans
(*Tarda.*)

1. TRAPGANS, die van boven roestco-
leurig, en van onder wit is.
EDW. *Birds.* II. tab. 73, 74.
BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* tom.
II. p. 86. tab. 245. het man-
netje.

Woond in Polen en in het
Oosten.

NB. De Heer LINNAEUS geeft deze
den bynaam van *Tarda* in navol-
ging van *Aldrovandus*, en *Gesne-
rus*; welke meenden dat PLINIUS
door *Avis Tarda*, den trapgans
begreep; zie hier over de voor-
rede voor dit stuk.

Arabische
(*Arabs.*)

2. TRAPGANS, met opstaande gekuif-
de ooren, [die zwart zyn,
het ligchaam bruin, de buik
wit, de hals graauw.] EDW.
Birds. I. tab. 12. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. II. p. 127.

Woond in Arabien.

TRAP-

Kleine Trap-3. TRAPGANS, die [bruin is met zwart
gans gevlaakt engewolkt, [de hals
(*Tetrax*.) zwart met twee witte banden
in het mannetje.] BUFF. *Hist.*
Nat. des Ois. II. p. 118.
tab. 10. 25. EDW. *Glean.* III.
pag. 89. tab. 251.
Woond in Europa.

Ethiopifche 4. TRAPGANS, die zwart is, met een
(*Cafræ*.) afch coleurige rug, en wit-
te ooren. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. tom. II. p. 128.
Woond in Ethiopien.

NB. Deze welke de Heer LINNAEUS,
uit de verzameling der Kaapfche
Dieren van den Heer J. BURMAN-
NUS aanhaalt, zegt de Heer BUF-
FON dezelve te zyn, als die ADAN-
SON *Voyage de Seneg.* p. 164. on-
der den naam van vliegende
Struisvogel befchryft, doch de
befchryving van ADANSAN met de
afbeelding van die, by den Hoog-
gel. Heer BURMANNUS vergely-
kende, vind ik een aanmerkelyk
onderscheid in gedaante, verw,
en pooten. STRUIS-

XCVI. STRUISVOGEL. De *bek* kegelagrig.

(STRUTHIO.) De *Neusgaaten* eirond.

De *vleugels* niet be-
kwaam tot vliegen.

De *pooten* twee, of drie
vingerig.

Struisvogel 1. STRUISVOGEL, met twee vingerige
(*Camelus.*) pooten. (*) *BUFF. Hist. Nat.*

Ois. II. pag. 1. tab. 457.

Woond in Syrien, Arabien,
Lybien, Africa.

Casuar 2. STRUISVOGEL, met drie vingerige
(*Casuarus.*) pooten, eene naakte kam,
en lellen *. *BUFF. Hist. Nat.*

Ois. tom. II. pag. 57. tab. 313.

Woond in Aſien, Sumatra,
Moluccos, Banda, en in
Africa.

Thoujou 3. STRUISVOGEL, met drie vingerige
(*Rhea.*) pooten, de agterſte vinger
ſtomp en rond.

Woond in America.

(*) Ik zoude hier de *Solitaire* van den Heer *BUFFON* byge-
bragt hebben, maar geen kenteekenen der zoort vindende,
heb ik denzelven liefſt agtergelaten.

HOEN.

V. HOENDERBENDE.

*De Bek verheven, het opperkaakbeen verwulft,
en met den rand boven het onderste uitsteeken-
de. De Neusgaten met een verheven kraak-
beenig vlies halfgedekt. Meer dan XII.
Stuurvederen. De Pooten gespleeten;
doch met het laatste lid samen gegroeid.*

XCVII. WALGVOGEL. De bek in het midden
(*Didus.*) met twee dwarsche
rimpels vernaauwd,
beide kaakbeenderen
aan de punt krom.
Het aangezicht tot bo-
ven de oogen naakt.

Dodaers   WALGVOGEL, [met een verheeven
(*Ineptus.*)   borst, het ligchaam zwartag-
tig, de slagpennen, stuurve-
deren en pooten geel.] Edw.
Glean. II. p. 179. tab. 294.
Woond op Banda.

Iste. Deels. IIde Stuk.   X   PAAUW,

XCVIII. PAAUW. De *Kop* met omgekrulde vederen bedekt.

De *Stuurvederen* zeer lang, met glanzige oogen.

Paauw 1. PAAUW, met een platte kuif op de
(*Cristatus*.) kop, en enkele spooren*.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tom.

II. p. 320. tab. 333, 334.

Woond in Indien Ceilon, en thans in Europa.

Spiegeldra- 2. PAAUW, die de kop wat gekuifd en
ger twee spooren heeft, [het lichaam
(*Bicalcaratus*.) ros, van boven bruin, de rug en vleugels met azuur-
blauwe, en de staart met

schoone groene ronde vlakken, met geele randen.]

Eperronier. BUFF. *Hist. Nat.*

Ois. Tom. II. p. 388. tab.

492, 493. EDW. *Birds.* II. tab. 67. 69.

Woond in China.

NB. Deze Vogel is noch Paauw noch Faifant, maar een middelgeslacht tusschen beiden.

PAAUW,

Japanſche 3. PAAUW , met eene puntige kuif,
(*Muticus.*) geen ſpooren [de borſt en
rug met goud blaauw en
goudgroengeſchubd, de ſlag-
pennen groen met zwarte
punten , de ſtaart met zeer
groote oogen.] *Spiciere.*
BUFFON. Hiſt. Nat. Ois. tom.
II. pag. 386.
Woond in Japan.

NB. Deze is ook noch Paauw noch
Faifant, en behoort tot de voorige.

Chinquis (A) PAAUW , die grys is , met zwarte
ſtreepen en witte ſtippen,
de rug met groote ſchitte-
rende ronde blaauwe vlak-
ken. *BUFF. Hiſt. Nat. Ois.*
tom. II. p. 385. *Chinquis.*
Woond in China.

XCIX. KALKHOEN. De *kop* met ſpongieuſe
(*MELEAGRIS.*) knobbeltjes of kwabben.
De *keel* met een afhangen-
de vlieſagtige kwab.

Kalkhoen 1. KALKHOEN, met de kop gekwabd
(*Gallopavo.*) aan het voorhoofd en de keel,
de borst van het mannetje
gebandeerd. *BUFF. Hist. Nat.*
Ois. tom. II. p. 190. tab. 97.
Woond in Noord America.

Gekuifde 2. KALKHOEN, met opstaande vederen
(*Cristata.*) op de kop, de slaapen vio-
let; [het ligchaam rood, de
dekvederen groen, de eerste
stuurvederen zwart, de klei-
nere rozenrood, de hals ge-
vlakt, de staart lang.] *EDW.*
Birds. I. tab. 13. *Guan.*
Woond in Zuid America.

NB. Deze is geen Kalkhoen, maar
een middelslag tusschen de hoen-
deren en Paauwwiezen.

Gehoornde 3. KALKHOEN, met twee hoornen op
(*Satyra*) de kop, het ligchaam rood,
met witte oogjes. *EDW.*
Birds III. tab. 116.
Woond in Bengalen.

C. PAAUWIES. De *bek* aan den wortel in beide
kaak-

(C R A X.)   *kaakbeenderen* met wafch be-
dekt.

De *Vederen* op de kop omgekruld.

Van Guajanai, PAAUWIES, met 'geel wafch, een
(*Aleſtor.*) zwart ligchaam, en witte
buik *. BUFF. *Hiſt. Nat.*
Ois. tom. II. p. 392. tab. 86.
Woond in America.

Roode   2. PAAUWIES, die rood is, met een
(*Rubra.*)   blaauwagtige kop. BUFFON.
                 Hist. Nat. Ois. tom. II, pag.
                 392. tab. 125.]
                 Woond in Peru.

Mitu   3. PAAUWIES, met rood wafch, zwart
(*Mitu.*)   ligchaam, en bruine buik.
Woond in Brazil, Guajane.

VanCuraçao⁴. PAAUWIES, met geel wasch, de bult
(*Globicera*.) op de neus rood, het ligchaam
blauwagtig zwart. EDW.
Glean. II. tab. 295.
Woond in Brazil, Curaçao.

SteenPaau- 5. PAAUWIES, met blaauw wasch, de
X 3 bult

wies
(*Pauxi.*)

bult der neus blaauw [niet]
gekuifd , het ligchaam zwart-
agtig, de buik en de staart-
punten wit *. *Edw. Glean.*
II. tab. 295. f. 1. *BUFF.*
Hift. Nat. Ois. II. pag. 400.
tab. 78.

Woond in in Mexico.

CI. FAISANT.
(*PHASIANUS.*)

De *koonen* met een glad naakt
vel, [de *bek* een kromme kegel.
De *pooten* in de meeste naakt.
De *staart* lang met puntig uit-
lopende *stuurvederen*.]

(a) *Hoenders* de kop met een
kuif, de keel met twee
lellen.

Haan
(*Gallus.*)

I. FAISANT, met een zamengedrukte
kwab op de kruin en twee
aan de keel, naakte ooren,
de staart zamen gedrukt, en
regt opstaande. *BUFF. Hift.*
Nat. Ois. II. p. 136. tab. 1.

Ge-

- (b) Gekuifde. BUFF. *Hist. Nat.*
des Ois. II. p. 178. tab. 49.
- (c) Wilde van Afien *ibid.* pag.
179.
- (d) Acoho. *ibid.*
- (e) Krielhoentje van Java *ibid.*
- (f) Hoentje met een kraag
van pluimen om de pooten.
Uit de Landengte van Da-
rien *ibid.* p. 180.
- (g) Krielhoentje van Cambo-
gia, *ibid.*
- (h) Ruigpoot van Bantam *ib.*
- (i) Faifanthoentje uit Indien,
ibid. p. 181.
- (k) Engelsche Haan, *ibid.*
- (l) Turksche.
- (m) Hamburgfche, *ibid.* pag.
182. ALBIN Ois. III. t. 13.
- (n) Met omgekeerde vede-
ren, *ibid.*
- (o) Donschoen van Japan, *ibid.*
tab. 98.
- (p) Zwarte, met eene kam
van Java, St. Jago *ib.* p. 83.
- (q) Zonder fuit uit Perfien, *ib.*
- (r) Met vyf vingeren, *ibid.*
X 4 p. 184.

p. 184.

(s) Van Sansevere *ibid.* p. 185.

(t) Van Caux, *ibid.*

(u) *Faisanten*, zonder lellen.

Karacas 2. FAISANT, die bruin is, van onder
(*Motmot.*) ros, met eene wigswyze
staart, de zylynes stuurvede-
ren ros *. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. II. pag. 382. tab. 146.
Woond in America.

Faisant 3. FAISANT, die ros is, met een blaau-
(*Colcbicus.*) we kop, de staart wigsgewy-
ze, de koonen getepeldt.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* II. p.
353. tab. 121.
Woond in Asia, Africa.

Luen 4. FAISANT, die geel is, met zwart
(*Argus.*) [gestipt, hetaangezicht rood,
de nek [en agter overleg-
gende kuif] blaauw. BUFF.
Hist. Nat. Ois. II. pag. 381.
Philosoph. transact. tom. LV.
88. tab. 3.

Gehoornde (A) FAISANT, die rood is, met witte
vlak-

vlakken. EDW. *Birds*. III. 116.

Woond in Bengale.

NB. Deze is een Faifant, en geen kalk-
hoen, gelyk de Heeren LINNAEUS
en EDWARDS meenden.

Goudlaken- 5. FAISANT, met eene geele kuif,
fche roode borft, blaauwe fluur-
(*Pictus*.) vederen, en wigsgewyze
ftaart *. EDW. *Birds*. II. tab.
68. 69. f. 2. BUFF. *Hift.*
Nat. Ois. II. p. 376. tab.
217. *Tricolor buppe*.
Woond in China.

Zilverlaken-6. FAISANT, die wit is, met zwarte
fche ftreepjes, de kuif en buik
(*Nyctbemer-* donker violet *. EDW. *birds*.
rus.) II. tab. 66. BUFF. *Hift. Nat.*
Ois. tom. II. p. 379. tab.
123, 124.
Woond in China.

Hoazin (B) FAISANT, met een ros geele kuif,
[die uit dunne van elkander
ftaande vederen bestaat,]
borft en buik, het ligchaam
X 5 don-

donker olyfcoleur met wit gebandeerd, de ſtaart zwart, aan het eind geel. *Buff. Hiſt. Nat. Ois.* p. 402. tab. 337. Woond in America.

Marail (C) FAISANT, zonder kuif, het ligchaam groen, de keel rood, de ſtuit ros. *Buff. Hiſt. Nat. Ois.* II. p. 405. tab. 338. Woond in Cayenne.

Caracara (D) FAISANT, met een ſchoone blaauwe hals en borſt, de rug gryſ bruin, de vleugels en ſtaart zwart. *BUFFON, Hiſt. Nat.* tom. II. pag. 407. Woond in de Antilles.

Chacamel (E) FAISANT, die van boven bruin is, van onder wit, de bek en pooten blaauw. *Buff. Hiſt. Nat. Ois.* II. p. 409. Woond in Mexico.

CH. POULEPEINTADE. De kop gehoornd met een

(NUMIDA.) een zamengedrukte
gecoleurde hoornige
kwab.

De *lellen* vleeschig en
gekwabd.

De *bek* met wasch, in
het welke de *Neus-*
gaten loopen.

Gehoornde I. POULEPEINTADE, [met een zwart
(*Meleagris*.) blaauw ligchaam met witte
vlakken en een celtatige
kruin *.] BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. tom. II. p. 216. tab. 108.
(a) Met een ligt paarel colour
ligchaam met blaauwe
vlakken *.
(c) Witte *.
(d) Bonte *.
Woond in Africa.

Gekuifde (A) POULEPEINTADE, zonder lellen,
wiens kop gekuifd is met
eene zwarte kuif. PALL. *Dierk.*
Mengelw. VI. p. 9. f. 1.
Woond in Oost-Indien.

Gemyterde (B) POULEPEINTADE, met een kegel-
agti-

agtige myter op de kop, de keel met eeneplooy, de pooten zwart. *PALL. Dierk. Mengelw. bl. 11.*

Woond in Africa.

CIII. BERKHOEN. Eene naakte getepelde vlak
(TETRAO.) aan de oogen.

(a) met ruige pooten.

Ourhaan 1. BERKHOEN, met ruige pooten, een
(*Urogallus.*) gerande staart, en witte oxelen.

BUFF. Hist. Nat. Ois. II. pag. 239. tab. 73, 74. coq de bruyere.

(b) *Bergfaifant. Edw. Birds. III. 117.*

Woond in Europa, en America.

Vorkstaart 2. BERKHOEN, met ruige pooten, een
(*Tetrix.*) gevorkte staart, de tweede rei slagpennen aan den wortel wit.

BUFF. Hist. Nat. des Ois. tom. II. pag. 255. tab. 173, 174.

Woond in Europa

BERK-

van Canada 3. BERKHOEN, met ruige pooten, de
(*Canadensis.*) stuurvederen zwart, aan de
punt ros, met twee witte
vlakken aan de oogen. BUFF.
Hist. Nat. Ois. tom. II p.
513. tab. 131, 132. EDW.
Birds. III. 118. 71.
Woond in Canada.

Sneeuw- 4. BERKHOEN, met gepluimde poo-
hoen ten, witte slagvederen, de
(*Lagopus.*) stuurvederen zwart, aan
de punt wit, de middel-
ste wit. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. II. pag. 301. tab. 129.
494.
Woond in Europa.

Gekuisde 5. BERKHOEN, met ruige pooten, en
Veldhoen kleine wiekjes aan den hals.
(*Cupido.*) CAT. *Carol.* I. tab. 1. BUFF.
Hist. Nat. II. p. 314. tab. 104.
Woond in Virginien.

Schilddrager 6. BERKHOEN, met ruige pooten, de
(*Umbellus.*) halsvederen uitstaande. EDW.
Glean. I. tab. 248.
Woond in Pensilvanien.

BERK-

Canace 7. BERKHOEN, met ruige pooten, een
 (Canace.) geheele staart, een witte vlak
 agter de neusgaten en ooren.
 BRISS. *Ornith.* p. 203. tab.
 20. f. 1, 2.
 Woond in Canada.

Getabberde 8. BERKHOEN, met ruige pooten, de
 (Togatus.) oxelvederen lang, zwart en
 blaauw. BRISS. *Ornith.* I. p.
 207. tab. 21. f. 1.
 Woond in Canada.

Hazelhoen 9. BERKHOEN, met ruige pooten,
 (Bonasia) afchgraauwe stuurvederen,
 met zwarte stippen, en een
 zwarte band, behalven op de
 twee middelste [het ligchaam
 ros en zwart gegolfdt.] Het
 mannetje met eene zwarte
 keel en een kuif. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois II. p. 274. tab.
 274, 475. *Gelinotte*.
 Woond in Europa.

(b) Met naakte pooten.

Francolin 10. BERKHOEN, met naakte gespood-
 de

(*Francolinus.*)

de pooten, de buik en keel
zwart, de staart wigsgewyze.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tom.
II. p. 445. tab. 147, 148.
Woond in Europa.

Pyreneische 11. BERKHOEN, met wat ruige, onge-
(*Alchata.*)

spoorde pooten, de mid-
delste stuurvederen tweemaal
langer elsgewyze. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. tom. II. pag. 183. tab.
105, 106. Ganga. EDWARD.
Glean. I. tab. 249.

Woond te Montpelliërs, op
't Pyreneesche gebergte,
en in Syrien, Arabien.

van Senegal (A) BERKHOEN, dat bleek ros is, met
eene geele keel, blaauw aan
de oogen. BUFF. *Ois.* tom.
II. 130.
Woond in Senegal.

Rosse
(*Rufus.*)

12. BERKHOEN, met naakte gespoor-
de pooten, die gelyk de bek
rood zyn, de keel wit met
een zwarte band, met wit ge-
stipt.

stipt. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
tom. II. pag. 431. tab. 231.
Bartavelle.

Woond in Zuid Europa.

(b) Roode Patrys. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. II. p. 439. tab. 150.
Woond in Europa.

Patrys
(*Perdix.*)

13. BERKHOEN, met naakte gespoor-
de pooten, een naakte roode
vlak onder de oogen, de staart
roestcoleurig, de borst bruin*.
BUFF. *Hist. Nat. Nat. Ois.*
p. 415. tab. 27. [het wyfje.]
Woond in Europa.

Berg Patrys (B) BERKHOEN, dat ros is, met een
bleeke kop en hals, de stuur-
vederen bruin. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. II. p. 430. tab. 136.
Woond in Europa.

van Senegal
(*Bicalcara-*
tus.)

14. BERKHOEN, met een bruin lig
chaam, dat met zwart ge-
vlakt is, een witte en eene
bruine streep aan de oogen;
de pooten dubbel gespoordt.
BUFF.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* II. p.
450. tab. 137. *Bisergot.*
Woond in Senegal.

Africaan- (C) BERKHOEN, dat zwart bruin is, met
sche eene roode keel, en pooten,
die dubbel gespoord zyn.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* II. p. 450.
tab. 180.
Woond in Africa.

Mexicaan- 15. BERKHOEN, met ongespoorde
sche naakte pooten, die benevens
(*Mexicanus.*) de bek rood zyn, en een
streep boven de wenkbraau-
wen.
Woond in Mexico, Louisanien.

Gepaerelde (D) BERKHOEN, dat donker bruin is,
de borst en zyden met ron-
de vlakken, en vier banden
onder de oogen. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. II. p. 452. n. 3.
Woond in China.

Virginische 16. BERKHOEN, met naakte pooten,
(*Virginia-* een zwarte band onder en
nus.) boven de oogen, een rosse
Iste. Deel. IIde Stuk. Y steep

streep op de kruin. CATESB.
Carol. III. p. 12. tab. 12.
 Woond in America.

Van Nieuw 17. BERKHOEN, met naakte pooten,
 Engeland witte wenkbrauwen, de hals
 (*Marilandicus.*) wit en zwart gestipt. ALBIN.
Ois. I. p. 26. tab. 28.
 Woond in Maryland.

Gekuisde 18. BERKHOEN, met naakte onge-
 (*Cristatus.*) spoorde pooten, eene afhan-
 gende roffe kuif, en roffe
 keel. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
 II. p. 483. tab. 126. 1. Zo-
né-Colin.
 Woond in Mexico, Guajania.

Colin (E) BERKHOEN, dat ros is, de kop
 wit en zwart gemengeld, de
 bek en pooten zwart. BUFF.
Hist. Nat. Ois. II. p. 484.
 Woond in America.

Coyoleos (F) BERKHOEN, dat van boven witen
 ros is, van onder ros, met
 twee witte en zwarte banden
 langs

langs den hals. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* II. p. 485.
Woond in Mexico.

Colenicui (G) BERKHOEN, dat ros is, van onder wit met zwart gegolfd, een witte zwarte vlak aan de oogen. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* II. p. 486. tab. 149.
Woond in Louisanien.

Chineefche 1). BERKHOEN, met naakte onge-
(*Chinensis.*) spoorde pooten, een grys gevlakt ligchaam, met een zwarte keel met een witte boog. EDWARDS *Glean.* I. pag. 77. tab. 247. BUFF. *Hift. Nat.* II. pag. 477. tab. 126.
Woond in China, de Philip-
pynfche Eilanden.

Wachtel 20. BERKHOEN, met naakte pooten,
(*Coturnix.*) een grys gevlakt ligchaam, witte wenkbraauwen, de ftuurvederen met een roest-
coleurige rand en maantjes.
Y 2 BUFF.

Buff. *Hist. Nat. Ois.* II. p.
454. tab. 170.

(b) Poolfche.

(c) Van de Maloiunfche Eilanden. Buff. *Hist. Nat.*
Ois. tab. 222.

(d) Van Madagafcar. Buff.
Hist. Nat. tom. II. p. 478.
tab. 171.

(e) Van Java.

V I. M U S S C H E N.

*De bek kegelachtig, fcherp gepunt. De
Nensgaaten eirond, naakt, wyd.*

CIV. DUIV. Eene regte *bek* aan de punt wat
(COLUMBA.) krom.

De *Neusgaten* langwerpig, met
een zagt gezwollen vlies half
gedekt.

De *Tong* geheel.

(a) Met eene gelyke *ftaart*.

DUIV,

Hout Duiv 1. Duiv, die blaauwagtig is, met een
(*Oenas.*) glanzig groenen hals, het ag-
terste van de rug wit, de
band der vleugelen en punt
der staart zwartagtig *. BUFF.
Hist. Nat. Ois. tab. 466.
Woond in Europa

Spaansche 2. Duiv, met een wit semelagtig
(*Hispanica.*) wasch. [de bek regt *.] BUFF.
Hist. Nat. Ois. tom. IV. p.
329. edit. 12.
Woond in Europa.

Ruigpoot (3) Duiv, met gevederde pooten *.
(*Dasytus.*) Woond in Europa.

Kropper 4. Duiv, met een opgezette borst.
(*Gutturosa.*) (a) Bleek roode wyn coleuri-
ge [*Soup en vin*] BUFF.
(b) Witte.
(c) Witte met gevederde poo-
ten, en lange vleugels *.
(d) Gryze en gryze gevlak-
te *.
(e) Staalgrauwe *.
(f) Blaauw en witte.

- (g) Vuurcoleurige.
 (h) Nooteboomverwige.
 (k) Castanje bruine met witte
 vleugels.
 (k) Fluweel zwarte.

Kapper 5. Duiv, met de vederen van het ag-
 (Cucullata.) terhoofd regt opgekruld *.
 Woond in Europa.

Ruige 6. Duiv, met kleine opstaande veert-
 (Hispidula.) jes, hier en daar op de rug
 en vleugelen.
 Woond in Indien.

Meeuw 7. Duiv, met de borstvederen ge-
 (Turbita.) kruld *. Buff. Hist. Nat. Ois.
 tom. IV p. 321. tab. XIV. e.
 dit. 12°.
 Woond in Europa.

Paauwe 8. Duiv, met eene opstaande breede
 staart
 (Laticauda.) veelvederige staart. Buff.
 ibid. tab. XIII.
 Woond in Europa.

Tuimelaar 9. Duiv, die onder het vliegen zig
 (Gyratrix.) omwenteld *.
 Woond in Europa.

Duiv,

Nonnetje 10. Duiv, met het hoofd, de roeien
(*Galeata.*) stuurpennen van een ander
colour dan het ligchaam.
Woond in Europa.

Turksche 11. Duiv, met een rood tepelagtig
(*Turcica.*) wasch. BUFF. *Hist. Nat. des*
Ois. tab. 110.
Woond in Europa..

Postduiv 12. Duiv, met rood geknobbeld wit-
(*Tabellaria.*) agtig wasch, en naakte oog-
leden.
Woond in Europa.

Bergduiv 13. Duiv, met naakte roode oog-
(*Montana.*) kringen, een ros lighaam,
dat van onder geel is. EDW.
Birds. III. 119.
Woond in Jamaica.

Witkop 14. Duiv, met witte oogkringen en
(*Leucocephala.*) kruin, het ligchaam blaauw-
agtig. CATESB. *Carol.* I. tab. 25.
Woond in Noord America.

Witvleugel 15. Duiv, met naakte blaauwe oog-
(*Leucoptera.*) kringen, aschgrauwe stuur-
Y 4 vede-

vederen, die aan de punt wit
zyn, de middelste bruin, [het
ligchaam bruin, de rug en buik
blauw.] Edw. *Birds*. II. 76.
Woond in Indien.

Guineefche 16. Duiv, met naakte roode oogkrin-
(*Guinea.*) gen, de vleugels met witte
driehoekige vlakken, de ftuur-
vederen aan de punt zwart,
[het ligchaam rood, de hals
blauw.] Edw. *Birds*. II. 75.
Woond in Africa.

NB. Deze is eene Tortelduiv.

Kroonvogel 17. Duiv, met zwarte oogkringen,
(*Coronata.*) eene opftaande kuif, blauw-
agtig lichaam, en roode
fchouders *. Edw. *Glean*. II.
tab. 338. Buff. *Ois*. 118.
Woond in Banda.

Geftreepte 18. Duiv, met witte oogkringen en
(*Striata.*) toomftreep, het lichaam afch-
grauw en zwart geftreept,
van onder ros. Edw. *Birds*,
I. p. 16. tab. 16.
Woond in Ooft-Indien.

Duiv,

Ringduiv 19. Duiv, met de stuurvederen van
(*Palumbus*.) agter zwart, de eerste roei-
pennen aan den buiten rand
wit, de hals aan wederzy-
den wit [het ligchaam blaauw,
deborst bleek rood.] BUFF.
Hist. Nat. Ois. 316.
Woond in Europa en Asia.

Blaauwkop 20. Duiv, met een blaauwe kop, en
(*Cyanocepha-*
la.) eene witte band onder de oo-
gen. [Het ligchaam rood, de
buik geel, de hals van voo-
ren blaauw, met een witte
rand.] BUFF. *Ois.* tab. 174.
Woond in Jamaica.

NB. Dit is een Tortelduiv.

van Madaga-21. Duiv, met gepluimde pooten,
fcar een violette staart, het lig-
(*Madagasca-*
riensis.) chaam zwartagtig blaauw.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tab. 11.
Woond in Madagafcar.

Phillippyn. (A) Duiv, die groen is, met een pur-
sche pere borst, en geele buik.
BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* tab.
138.

Woond in de Philippynsche
Eilanden.

Kopercoleu-22. Duiv, met gepalmde pooten, de
rige bek en pooten groen, het
(*Aenea.*) het ligchaam kopercoleurig.
BRISS. *Ornith.* I. p. 148. tab.
13. f. 2.

Geelfluit (B) Duiv, met gepluimde pooten, die
groen is, met violette schou-
ders, de stuurvederen graauw
van onder rood, met eene
geele rand, de stuit geel, de
roeipennen zwart met geele
randen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
tab. 111.
Woond in Madagascar.

Groene 23. Duiv, die groen kopercoleurig is,
(*Viridis.*) het ligchaam van onder vio-
let. BRISS. *Ornith.* I. pag.
152. tab. 15. fig. 2.
Woond in Amboine.

Schoone (C) Duiv, die groen is, met zwarte
vleugels, de dekvederen en
ran-

randen der roeipennen geel.

Buff. Ois. 163.

Woond in Amboina.

Van Marti- 24. Duiv, die violetagtig is, met een
nique

(*Martinica*.)

rosagtige buik, de roeipen-
nen van binnen ros. BRISS.

Ornith. I. pag. 129. tab. 12.

fig. 1.

Woond in Martinica.

Van Jamaica 25. Duiv, met blaauwe stuurpennen,

(*Jamaica*-

sis.)

aan het eind met eene witte

streep, [de buik wit.]

Woond in Jamaica.

Van Senegal 26. Duiv, die de drie buitenste stuur-

(*Senegallen*-

sis.)

vederen aan de onderste

helft wit heeft, de hals van

onder met 'zwart gevlaakt.

BRISS. *Ornith.* I. p. 125. tab.

8. fig. 3.

Woond in Senegal.

van Nicom- 27. Duiv, met een lange witte staart,

bar

(*Nicobarica*.)

het ligchaam zwart, blaauwe

stuurvederen, groene rug, de

hals vederen verlengd, [groen

goud

goud paarsch *.] BUFFON.
Hist. Nat. des Ois. 491.
 Woond in Nicombar.

Goudgroene(D) Duiv, die blaauw is, met eene
 goudgroene rug, vleugels en
 staart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
 tab. 164.
 Woond in de Molucces.

Chineefche 28. Duiv, die bruin is, met zwart ge-
 (Sinica.) bandeerd, de buik wat bloed-
 coleurig, de vleugelen geel, de
 roeipennen, en de bek zwart.
 Woond in China.

Indifche 29. Duiv, met een purper ligchaam,
 (Indica.) groene schouders, eene
 blaauwagtige kruin. EDW.
Birds. I. tab. 14.
 Woond in Oost-Indien.

(b) Tortel Duiven.

van Canada 30. Duiv, met de voorste roeipennen
 (Canadensis.) aan den punt geelagtig, de
 ftuurvederen byna asgrauw:
 de buitenste wit. BRISS. *Or-
 nith.* I. p. 118.
 Woond in Canada.

Duiv,

van Batavia (E) Duiv, die groen is, een blaauwe kop, geele keel en stuit, de buitenste stuurvederen rood. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tab. 214.
Woond in Batavia.

Africaan- 31. Duiv, die de buitenste stuurve-
sche deren aan den grond wit
(*Afra.*) heeft, eene witte vlak aan de
punt, de vlakken der dek-
vederen azuurblauw. BRISS.
Ornith. I. pag. 122. tab. 10.
fig. 1.
Woond in Senegal.

Tortel Duiv 32. Duiv, met de stuurvederen aan
(*Turtur.*) de punt wit, met een gryze
rug, de zylingfche vlak aan
den hals zwart, met witte
streepjes, de borst incar-
naat *. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
394.
Woond in Indien.

Lach-Duiv 33. Duiv, van boven geelagtig, met
(*Risoria.*) een zwart maantje aan den
hals *, [de roei en stuurve-
ve-

deren blaauw *. *Buff. Hist. Nat. Ois.* 244.
Woond in Indien.

Roodbuik (E) Duiv, die van boven misvaal is, van onder tegelrood, een maansgewyze vlak aan den hals. *Buff. Hist. Nat. Ois.* 161.
Woond in Senegal.
(b) Met drie azuure vlakjes op de vleugels, zwarte roeien stuurpennen, *ibid.* 160.
Woond in Senegal.

Groenrug (F) Duiv, die het hoofd, hals en borst kopercoleurig heeft, de rug en vleugelen groen, de roeien stuurpennen bruin. *Buff. Hist. Nat. Ois.* 177.
Woond in Java.

Roodhals (G) Duiv, die groen is, met een blaauw voorhoofd, roode keel en hals, van vooren de dekvederen wit gerandt. *Buff. Hist. nat. Ois.* 142.
Woond in Amboine.
Duiv,

Musch-Duiv 34. Duiv, met donker-coleurige stuur-
(*Passerina*.)

vederen en roeipennen, pur-
peragtig ligchaam, geele bek
en pooten. CATESB. *Carol. I.*
tab. 26.

Woond in America, tus-
schen de Keerkringen.

Kleine
(*Minuta*.)

35. Duiv, die bruin is, met vyf staal
blauwe vlakjes, de stuur-
vederen aan het eind wit*.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 243.
Woond in St. Domingo en
Martinique.

(c) Langstaartige.

Trekduiv
(*Migrato-
rius*.)

36. Duiv, met eene wigsgewyze staart,
bloedroode naakte oogkrin-
gen, een roffe borst. CAT.
Carol. I. 23.
Woond in Noord America.

van Canada (H) Duiv, die bruin is, de kop, de
agterrug, de twee rei stuur-
vederen azuurblauw, de hals
tegelrood, de buik wit.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 176.
Woond in Canada.

Duiv,

van Carolina 37. Duiv, met een lange wigsgewy-
 (Carolinensis.) ze staart, blaauwe oogkrin-
 gen, van onder rosagtig.
 CATESB. Carol. I. tab. 24.
 Woond in America.

Bruine (I) Duiv, die bruin is, van onder
 geel, de stuur en roeipennen
 staalblaauw. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. tab. 175.
 Woond in Carolina.

van Amboina 38. Duiv, met een lange wigsgewy-
 na ze staart, een ros ligchaam,
 (Amboinensis.) de halszwart gegolfd. BRISS.
Ornith. I. p. 127. tab. 9. f. 3.
 Woond in Amboine.

Langstaart (K) Duiv, die boven ros is, van on-
 der bruin geel, de stuurve-
 ren aan de punt en rand wit.
 BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 329.
 Woond in Senegal.

Kaapsche 39. Duiv, met een wigsgewyze staart,
 (Capensis.) de eerste roeipennen aan de
 binnenzyde ros. BRISS. *Ornith.*
I. p. 120. tab. f. 2.
 Woond

Woond aan de Kaap de goede Hoop.

Gerande 40. DuiV, met een lange wigsgewyze
(*Marginata.*) staart, een roode borst, de
slagpennen aan de punt zwart
met wit gerandt, [het lig-
chaam grys met zwarte vlak-
ken, de hals en het voor-
hoofd zwart;] Edw. *Birds.*
I. 15. tab. 15.
b BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 487.
Woond in America.

Witbuik (L) DuiV, die bruin is, de hals van
agter blaauw, als ook de be-
neden rug en de randen der
eerste stuurvederen, de buik
wit, de bek en pooten rood.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 176.
Woond in Canada.

Zwarthals (M) DuiV, die graauw is, de hals
van vooren zwart, als ook
de slagpennen, de vleugels
blaauwagtig, de agterste slag-
pennen vermillioen rood, de
middelfte stuurpennen zeer

Iste Deel IIde Stuk.

Z

lang

lang. BUFFON *Hist. Nat. Ois.*
140.

Woond aan de Caap.

CV. LEEUWRIK. De *bek* elsgewyze rolrond regt
(ALAUDA.) uitgestregt, de *kaakbeenderen*
gelyk, van agter nederwaards
gaapende.

De *tong* gespleeten.

De *nagel* der agterste vinger
zeer lang.

Akkerleeuw-1 LEEUWRIK, met de twee buitenste
rik
(*Arvensis.*) stuurvederen aan de buiten
zyde wit, de middelste aan
binnenzyde roest coleurig*.
Woond in Europa.

Veldleeuw-2 LEEUWRIK, die de twee buitenste
rik
(*Pratensis.*) stuurvederen van buiten wit
heeft, de streep der wenk-
braauwen wit*.
Woond in Europa.

Boomleeuw-3 LEEUWRIK, met een ronde witte band
rik om de kop. BRISS. *Ornith.*

III.

(*Arborea.*) III. p. 340. tab. 20. f. 1.
Woond in Europa.

Zoodjes 4 LEEUWRIK, met bruine ſtuurvede-
Leeuwrik ren; aan de onderſte helft
(*Canpeſtris.*) wit, behalven de twee mid-
delfte, de borſt en keel geel-
agtig.
Woond in Europa.

Picker 5 LEEUWRIK, met bruine ſtuurvede-
(*Trivialis.*) ren, de buitenſte half wit,
de tweede aan de punt wigs-
wyze wit, en een dubbele
witte ſtreep op de vleugels.
Woond in het Noorden van
Europa.

Gekuifde 6 LEEUWRIK, met zwarte ſtuurvede-
(*Criſtata.*) ren, de twee buitenſte aan
den rand wit, de kop ge-
kuifd *.
Woond in Europa.

Rosvleugel (A) LEEUWRIK, die graauw is, met
een bleeke kuif, met een
bruine ſtreep, het bovenſte
der vleugelen bleek rood,

de keel wit, met eene zwarte streep, de bovenste slagpennen wit. BUFF. *Hist.*

Nat. Ois. 503. R. *Cochevis.*

Woond in Europa.

Witbuik (B) LEEUWRIK, die graauw is, met een bruine kuif, met zwart gestipt, de buik wit. BUFF. *ibid.* f. 2.

Woond in Europa.

Spinolet 7 LEEUWRIK, met bruine stuurvederen: de twee buitenste schuins, (Spinoletta.) ter helfte wit.

Woond in Italien.

Kaapsche 8 LEEUWRIK, met de drie zylingfche (Capensis.) stuurvederen aan de punt wit, de keel geel, met zwart gerand, de wenkbraauwen, [en stuit] geel. BUFF. *Hist.* *Nat. Ois.* 504. 2.

Woond aan de Caap.

van Senegal (C) LEEUWRIK, die bruin is, met een witte buik, en afhangende kuif, de buitenste stuurvederen

deren wit , de middelste
zwart, de overige bruin.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 504. 1.
Woond in Senegal.

Calander 9 LEEUWRIK, met de buitenste stuur-
(*Calandra.*) vederen geheel wit, de twee-
de en derde aan de punt wit,
een bruine band op de borst.
BRISS. *Ornith.* III. pag. 352.
tab. 20. f. 2.
Woond aan de Alpische ber-
gen.

Gekraagde (D) LEEUWRIK, met alle de stuurvede-
ren bruin, de wenkbrauwen
wit, een zwarte band om den
hals. EDW. *Glean.* II. tab. 268.
Woond in . . . . .

Bruinborst (E) LEEUWRIK, die bruin is, van on-
der bleeker, de borst met
een bruine vlak. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 363. *Calandre.*
Woond in Europa.

Americaan- 10 LEEUWRIK, met de stuurvederen
sche ter helfte wit, de keel geel,
(*Alpestris.*) een zwarte band onder de
Z 3 oogen

oogen en om de borst. CAT.

Carol. I. p. 32. tab. 32.

Woond in Noord America.

Groote
(*Magna.*)

II LEEUWRIK, die van onder geel is,
met een zwarte kromme borst
band; de drie zylingsche
stuurvederen wit. CAT. *Ca-*
rol. I. p. 33. tab. 33.

Woond in Africa, America.

Lyfter
Leeuwrik

(F) LEEUWRIK, die bruin is, van on-
der wit, de borst en keel
geel met half maansgewyze
vlakken, de stuurvederen
met de punt der schacht uit-
steekende. *BUFF. Hist. Nat.*
Ois. 490. *Calandrotte.*

Woond . . . . .

CVI. SPREEUW.
(*STURNUS.*)

De bek elsgewyze, hoekig,
wat stomp, het *opperkaak-*
been zeer geheel, de randen
wat gaapende.

De *Neusgaaten* van boven met
een randje.

De *tong* puntig uitgerand.

SPREEUW,

Gemeene 1 SPREEUW, met eenen geelagtigen
(*Vulgaris.*) bek, het ligchaam zwart met
witte puntjes *.

Woond in Zuid Europa.

Caapfche 2 SPREEUW, die zwartagtig is, met
(*Capensis*) de zyden van de kop, en
onder wit, [alfook de bene-
den rug, en den band der
vleugelen, bek en pooten
geel.] BUFFON. *Hift. Nat.*
Ois. 280.

Woond aan de Kaap.

Louifaan- 3 SPREEUW, die gryns en bruin gevlakt
fche is, de koplyns en wenkbraau-
(*Ludoviciana.*) wen, wit de keel zwart.
nus.) BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 256.

Woond in Louifanien.

Bengaalfche 4 SPREEUW, die bruin is, de oogvlak,
(*Contra.*) de band der vleugelen, en
buik wit, [de kop zwart met
eene groene glans, de breed-
fte band der middelste ftuur-
vederen wit.] EDW. *Birds.*
IV. tab. 187.

Z 4

SPREEUW,

Watermeerl5 SPREEUW, die zwart is, met een
(*Cinclus.*) witte borst.

Woond in Europa.

Roodborst (A) SPREEUW, die van boven bruin
is, de hals van voren, de borst,
de oogkringen, en de vlak
voor de oogen, de schouders
schoonrood, de streep onder
de oogen, de zyden, buik en
stuurvederen zwart. BUFF,
Hist. Nat. Ois. 113. LINN.
Mant. alt.

Woond aan de Magellanes,

CVII. LYSTER. De *bek* spilrond, van boven mes
(TURDUS.) gewyze, het *opperkaakbeen* aan
de punt krom, en uitgerand.
De *neusgaaten* naakt, van bo-
ven ter helfte met een vlies-
je gedekt.
De *keel* met hairtjes,
De *tong* gescheurd en uitge-
rand.

Gemeene I LYSTER, met een bruine rug, de
hals

(*Viscivorus.*) hals met witte vlakken *.
Woond in Europa.

Kramsvogel 2 Lyster, met zwarte stuurvederen,
(*Pilaris.*) de buitenste aan de punt van
den binnensten rand wit, de
kop en stuit grysk. Alb. Ois.
I. tab. 36.
Woond in Europa.

Koperwiek 3. Lyster, met de vleugels van on-
(*Iliacus.*) der roestverwig, en witag-
tige wenkbrauwen. Briss.
Ornith. II. pag. 208. tab.
20. f. 1.
Woond in Europa.

Zinglyster 4 Lyster, met de slagvederen van
(*Muscus.*) binnen aan hun begin roest-
verwig.
Woond in Europa.

Olyfcoleu- 5 Lyster, die bruinagtig is, van on-
rige der ros geel. Buff. *Hist. Nat.*
Ois. 221. Merle.
Woond aan de Caap.

Treklyster 6 Lyster, die grysk is, met een ros
Z 5 se

(*Migrato-
rius.*)

fe buik, witte wenkbraauwen, de buitenste stuurvederen aan de binnenste hoeken wit. CAT. *Carol.* I. 29.
Woond in America.

Geele
(*Trichas.*)

7 Lyster, die olyfcoleurig is, met een geele buik, een zwarte band aan de oogen. EDWARDS *Glean.* I. p. 56. tabl 237 f. 2.
Woond in Noord America.

NB. Dit is een Vliegvinger.

Chineesche
(*Canorus.*)

8 Lyster, die grysg is, van onder roestcolurig, een witte streep aan de zyden van de kop, de staart gerand. EDW. *Birds.* IV. 184.
Woond in Bengale, China.

Rosse
(*Rufus.*)

9 Lyster, die roestverwig is, van onder bleeker gevlakt, de slagpennen eencoleurig, de staart gerand, de stuurvederen ros. CAT. *Carol.* I. p. 28. tab. 28.
Woond in America.

Praater

10 Lyster, die donker aschgrauw is,
van

(*Polyglottus.*)

van onder bleek, de buienste roeivederen aan den buitenste helft wit. *CAT. Carol.* I. p. 27. tab. 27.

Woond in Virginia Carolina Jamaica.

Zanger

(*Orpheus.*)

11 LYSTER, met een bruine rug, de borst en fluurvederen witagtig, en witte wenkbraauwen. *Edw. Birds.* II. 78. Woond in America.

Loodcoleu-
rige

(*Plumbeus.*)

12 LYSTER, die blaauwagtig is, de keel wit met zwart gestipt, de staart wigsgewyze [zwart met witte punten, de slagpennen zwart met wit gerand, bek en pooten rood.] *BUFF. Hist. Nat. Ois.* 560. 1. *Merle.*

Woond in America.

Rotsmeerl

(*Saxatilis.*)

13 LYSTER, met een blaauwe kop, en roestcoleurige staart, [de schoft en vleugels zwart, de rug wit, de buik oranje met witte vlakken, en zwarte stip-

stippen *.] BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 562.

Woond in Zwitserland,
Pruiffen, Oostenryk.

Glanzige 14 LYSTER, die groen is, de dekve-
(*Nitens.*) deren der vleugelen violet
glanzig. BRISS. *Ornith.* II.
311. tab. 30. fig. 2.
Woond in Angola.

Fraaye (A) LYSTER, die vanboven goudgroen
is, van onder oranje. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 358. *Merle.*
Woond in Senegal.

Witvlak (B) LYSTER, die donker olyfcoleurig
is, eene witte vlak op de
vleugels, van onder wit, de
staart zeer lang. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 558. 1. *Merle.*
Woond in St. Domingo.

Roosmeerl 15. LYSTER, die bleek rood is, de kop
(*Roseus.*) vleugels en staart zwart, het
agterhoofd gekuifd. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 251.
Woond in Bourgogne, Lap-
land, en Zwitserland.

LYS.

Groenagtige(C) Lyster, die van boven groenagtig bruin, en van onder geelagtig wit is. *Buff. Hist. Nat. Ois.* 558. 2. *Merle.*
Woond in Cayenne.

Zwart Calot (D) Lyster, die donker graauw is, de stuit wit, het hoofd van boven zwart. *Buff. Hist. Nat. Ois.* 557. 2 *Merle.*
Woond in Madagascar.

Goudvlerk (E) Lyster, die bruin is, de borst ros, de buik wit, de slagvederen violet, met een goud glans. *Buff. Hist. Nat. Ois.* 557. 1.
Woond in Madagascar.

Kaffer 16 Lyster, die zwartagtig is, wat
(*Cafer.*) gekuifd, de stuit en buik wit.
BRISSON. Ornith. II. p. 257.
tab. 20. f. 2.
Woond aan de Caap.

Kaapsche 17. Lyster, die zwartagtig is, met
(*Capensis.*) een geelagtige buik, en een
geele stuit. *BRISS. Ornith.*
II.

II. p. 259. tab. 27. f. 3.

Woond aan de Caap.

Zwartkop 18 Lyster, die zwartagtig is, met
(*Atricapilla*) een zwarte kop, buik en
sluit ros, een witte vlak op
de vleugels. BRISS. *Ornith.*
Append. 47. tab. 3. fig. 2.
Woond aan de Kaap.

Palm Meerl 19 Lyster, die olyfgroen is, van on-
(*Palmarum.*) der aschgrauw, de kop
zwart, met drie witte vlak-
ken aan wederzyden. BRISS.
Ornith. II. p. 301. tab. 29.
fig. 1. 2.
Woond in Cayenne.

van Carolina (F) Lyster, die castanie bruin is, de
hals van agter zwart, de
vleugels purperagtig zwart.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 556.
2. *Merle.*
Woond in Corolina.

Oranje buik (G) Lyster, die bruin is, met een
oranje buik met witte maant-
jes, de keel wit met zwarte
vlak.

vlakken. BUFF. *ibid.* fig. 1.

Grive.

Woond in Canada.

Graauwe (H) Lyster, die donker graauw is, van onder wit, de randen der vederen wit, der slagpennen bruin, de tippen zwart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 515. *Grive.*

Woond in Cayenne.

Chineefche 20 Lyster, die rosagtig is, met een bruin gestreepte kop, witte wenkbraauwen, bruine stuurvederen met donkere streepen, geele pooten. BRISS. *Ornith.* II. p. 221. tab. 23. fig. 1.

Woond in China.

van St. Domingo 21 Lyster, die bruinagtig is, van onder wit, de eerste slagpennen aan hun begin, en de drie zylingfche stuurvederen wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 558. 1.

Woond

Woond in St. Domingo.

Maarl 22 LYSTER, die zwart is, met eene
(*Merula.*) geele bek, en geele oogleden *.

Woond in Europa.

Gekraagde 23 LYSTER, die zwartachtig is, met
(*Torquatus.*) eene witte halsband, en geelagtige bek *.

Woond in Europa.

Blaauw 24 LYSTER, die de randen der vederen
Maerl blaauwagtig afchgrauw heeft, de bek en wenkbrauwen
(*Cyanus.*) geel EDW. *Birds.* I. tab. 18. (het Mannetje). BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 250. (het Wyfje).

Woond in Italien.

Riet Maerl 25 LYSTER, die roeft bruinis, van onder witagtig tegelrood, met banden, die aan de punt ros zyn. BRISS. *Ornith.* II. pag. 219 tab. 22. fig. 1.

Woond in Europa.

LYS.

Moor 26 **LYSTER**, die glanzig zwart is, de
(*Morio.*) voorste slagpennen ros, met
zwarte tippen. *BUFF. Hist.*
Nat. Ois. 199.
Woond aan de Kaap.

Surinaam- 27 **LYSTER**, die glanzig zwart is, de
sche kruin, de stuit en de borst
(*Surinamus.*) aan de zyden geel.
Woond in Suriname.

Ceylonfche 28 **LYSTER**, die groen is, van onder
(*Zeilanus.*) geel, de oogstreep na de
borst loopende, die zwart
is, [de stuurvederen zwart
met geele tippen.] *EDW.*
Glean. III. 321.
Woond in Ceylon.

vanCayenne(I) **LYSTER**, die donker graauw is,
de randen der vederen
blauwagtig wit, van onder
vuilwit, de stuit wit, de roei-
pennen zwartagtig met bruin
gerand. *BUFF. Hist. Nat. Ois.*
515.
Woond in Cayenne

Oranjekop (K) **LYSTER**, die groen is, van on-
Iste. Deels. IIde Stuk. Aa der

der wit, met zwarte vlakken,
de kruin en nek oranje. BUFF.
Ois. 398. 2.

(b) *Lyfter*, die groen is van
onder wit met zwarte vlak-
ken.

Woond in St. Domingo, (b)
in Gujana.

Mauvis (L) *LYSTER*, die bruin is, van onder
vuilwit, de borst zwart, en
de buik en zyde oranje ge-
vlakt, de streep boven de
oogen wit. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. 51.
Woond in Europa.

Zwartbek (M) *LYSTER*, die bruin is, de toom-
streep, bek, keel en borst
zwart met een oranje band, de
buik groengeel, met zwarte
vlakken, de roeivederen don-
ker bruin, de tweede en derde
stuurvederen zwart. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 559. *Merle.*
Woond in St. Domingo.

Rosse (N) *LYSTER*, die ros is, de hals van
voo-

vooren en ter zyden, en de borst zwart met eene witte rand, de dekvederender vleu-
zwart, met witte vlakken en
twee geele banden. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 560. *Merle a Cravate.*

Woond in Cayenne.

Prachtige (O) LYSTER, die groen is, de keel
schitterend zee groen, de buik
violet, de dekvederen der
staart en de oogvlak glanzig
blauw. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
561. *Merle.*

Woond in Angola.

Geschulpte (P) LYSTER, die bruin is, de randen
der vederen wit, de kop en
kuif bruin rood, de stuit ro-
ze rood, de buik wit. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 563. 1.

Woond aan de Kaap.

Graauwe (Q) LYSTER, die bruingraauw is, met
eene witte buik. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 563. 2. *Merle.*

Woond in Senegal.

Ooftindi- (R) Lyster, die groen is, van onder
 iche bleeker. BUFFON. *Hist. Nat.*
Ois. 564. 1.
 Woond in Oostindien.

Glanzige (S) Lyster, die bruin is, met eene
 groene weerschyn, de buik
 roeftcoleurig met bruine
 vlakken. BUFFON. *Hist. Nat.*
Ois. 564. 2. *Merle Solitaire.*
 Woond in de Manillese.

Violette (T) Lyster, die purper violet is, de
 rug en vleugels groen, de staart
 blaauw. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
 540.
 Woond in het Koningryk
 Juda.

Palmist (U) Lyster, die geel bruin is, de kop
 en nek zwart, het voorhoofd,
 de hals, de borst en buik wit.
 BUFFON. *Hist. Nat. Ois.*
 539. 1.
 Woond in Cayenne.

Gerande (V) Lyster, die donker bruin is, de
 randen der vederen geel, de
 keel

keel zwart. BUFF. *Hift. Nat.*

Ois. 539. 2.

Woond in Madagafcar.

Graauwe (W) Lyster, die graauw is, met de dekvederen en flagpennen wit gerand. BUFFON. *Hift. Nat. Ois.* 182.

Woond in Europa.

Vuilkleurige(X) Lyster, die groen is, kop en hals zwart, de buik en stuit rood, de fchouders en dekvederen der ftaart blaauw, de drie eerfte roeipennen geel, de ftaart zwart. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 89.

Woond in de Philippynfche Eilanden.

Langftaart (Y) Lyster, die donker blaauw is, met een gouden weerfchyn, de ftaart zeer lang. BUFFON *Hift. Nat. Ois.* 220.

Woond in Senegal.

Blaauwvlerk(Z) Lyster, die groen is, met een bruin hoofd, caftanje bruine
Aa 3 borft,

borst, blaauwe dekvederen,
de drie eerste roeipennen
wit, de stuurvederen zwart,
de drie middelste blaauw ge-
rand. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
257. *Merle.*

Woond in de Moluccos.

Gekroonde (Aa) Lyster, die groen is, de buik
oranjekleur, de kop en hals
zwart, de kop met een
oranje band, de dekvederen
blaauw, de stuurvederen
zwart, met groen gerand.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 258.
Woond in Bengale.

Geelkeel (Ba) Lyster, die groen is, de keel
en buik geel, de oog streep
en borst zwart, de wenk-
braauwen geel. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 272.
Woond in Bengale.

Bonte (Ca) Lyster, die van boven zwart
en wit bont is, van onder wit,
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 273. I.
Woond in St. Domingo.

Lys.

Bruinbek (D) Lyster, die groenis, van onder graauwagtig. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 273. 1.
Woond in Oost-Indien.

Donkere (Ea) Lyster, die bruin is, de kop en keel, zwart de stuit geel. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 317.
Woond in Senegal.

Groenkop (Fa) Lyster, die bruinis, met een witte keel van onder bleekbruin, de kop groen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 339. *Merle. Solitaire.*
Woond in de Philippynsche Eilanden.

Podobé (Ga) Lyster, die zwart is, met roffe vleugels, de staart donker bruin, sommige stuurvederen ter helfte wit. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 354. *Merle.*
Woond in Senegal.

Blaauwkop (Ha) Lyster, die ligt bruin is, met eene donker blaauwe kop, staart en stuurvederen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 392.
Woond aan de Kaap.

Blaauwborst (Ia) Lyster, die de rug ros bruin heeft, de kruin en nek zwart, een breede geele band over de oogen tot aan den hals, de band onder de oogen tot aan de vleugels zwart, de keel bleek geel, de borst en staart blaauw, de buik geel met zwart gestreept, de slagvederen zwart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 355.

Woond in Gujana.

Rousferolle (Ka) Lyster, die geel bruin is, van onder bleeker. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 513.

Woond . . . . .

CVIII. COTINGA. De bek regt, verheven rond,
(AMPELIS) het *opperkaak* langer, wat krom, aan weerzyden uitrand.

De *tong* gespleeten, spits en kraakbeenig.

Boheemer 1 COTINGA, met een gekuifd agter-
(Garrulus.) hoofd, de tweede roeipen-
nen

nen met een rood gecoleurd
vliesje aan de punten*. BUFF.

Hist. Nat. Ois. 261.

Woond in Europa en America.

NB. Deze word by ons in de Provin-
cie Groningen, dog zeldzaam, ge-
vonden.

Purpervogel² COTINGA, die purper rood is, de
(*Pompadora*.) dekvederen der vleugelen
die naaft aan de flagpennen
zyn zwaardsgewyze, lang,
styf en gekield. EDW. *Glean.*
III. tab. 341. BUFFON. *Hist.*
Nat. Ois. 279.

Woond in Suriname.

Bloedroode³ COTINGA, die rood is, met een
(*Carnifex*.) zwarte band boven de oo-
gen, de stuurvederen, en
flagpennen aan hunne tippen
zwart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
378. EDW. *Birds.* I. 39.

Woond in Cayenne.

Zwartstaart⁴ COTINGA, die zeer glanzig is van
(*Cotinga*.) onder purper violet, de slag
en stuurpennen zwart. BUFF.

Aa 5

Hist.

Hist. Nat. Ois. 186. EDW.
Glean. 241.

Woond in Brasil.

Gevlakte (A) COTINGA, die blaauw is, van onder
 purper, met vyf oranje vlak-
 ken, en een blaauwe borst
 band, de buik blaauw, de
 staart en roeipennen zwart*.
 BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 188.
 EDW. *Glean.* III. 341.
 Woond in Brasil.

Violetkeel 5 COTINGA, die glanzig blaauw is,
 (*Maynana.*) met een purpere keel. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 229.
 Woond in Mayana.

Quereiva 6 COTINGA, die glanzig blaauw is, de
 (*Cayana*) keel violet, [de hals met
 zwarte streepjes, het lig-
 chaam hier en daar zwartag-
 tig *.] VOSM. *Beschr.* tab.
 V. der *Vogelen.*
 Woond in Cayenne.

Fraaye 7 COTINGA, die glanzig blaauw is, met
 (*Terfa.*) eene zwarte rug, de buik
 witagtig geel.
 Woond . . . . .

KERN-

CIX. KERNBYTER. De *bek* een bultige [verkorte] kegel, aan de kop rond, het *onderkaakbeen* zylingſch ingeboogen. De *neusgaaten* aan het begin van den *bek*. De *tong* geheel.

Kruisvink 1 KERNBYTER, met eene ſchaarsge-
(*Curviro-* wyze bek *. EDW. *Glean.* III.
stra.) 303. BUFFON. *Hift. Nat. Ois.*
218.
Woond in Europa.

Dikbek 2 KERNBYTER, met een witte ſtreep
(*Coccothrau-* over de vleugels, de middel-
stes.) ſte roeivederen aan de punt
ruitagtig, de ſtuurvederen
aan het begin zwart *. EDW.
Birds. III. 188. BUFF. *Hift.*
Nat. Ois. 99. 100. *Grosbec.*
Woond in Duiſchland.

Schillebyter 3. KERNBYTER, met een dubbele wit-
(*Enucleator.*) te ſtreep over de vleugels, de
ſtuurvederen geheel zwart.
EDW. *Birds.* III. 123.
Woond in het Noorden.

KERN-

Goudvink 4 KERNBYTER, met zwarte leden, de
 (*Pyrrhula.*) dekvederen der staart en
 roeipennen wit, de borst
 van het mannetje rood, de
 kruin en keel zwart*. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 145.
 Woond in Europa.

Kardinaal 5 KERNBYTER, die rood is, met een
 (*Cardinalis.*) kuif, een zwarte halster, bek
 en pooten bloedrood*. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 37.
 Woond in Virginien.

uit Madaga- 6 KERNBYTER, die rood is, met een
 fcar zwarte band boven de oo-
 (*Madagascaren-* gen, de rug zwart gevlaakt.
rensis.) BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 134.
 2. *Moineau.*
 Woond in Madagascar.

Mexicaan- 7 KERNBYTER, die rood is, met zwar-
 fche te vleugels en staart. BUFF.
 (*Mexicanus.*) *Hist. Nat. Ois.* 135. 1.
 Woond in Mexico, [Cana-
 da.]

van St. Do- 8 KERNBYTER, die zwart is, met een
 mingo fcharlaken kop en keel, de
 borst

(*Dominica.*) borst en buik, en de randen der roeipennen wit. EDW. *Birds.* III. 127.
Woond in Brasil.

Gekuifde (A) KERNBYTER, die zwart is, met eene vuurroode opstaande kuif, de kop, keelenborst van onder wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 103.
Woond in Louifanien.

Cacatoevink⁹ KERNBYTER, die witagtig is, het voorhoofd gekuifd, de stuit en pooten rood, de middelste stuurvederen zeer lang. J. BURMANNUS, *Afbeeld. van Kaapsche Dier.*
Woond in Æthiopien.

Roodkop 10 KERNBYTER, die aschgrauw is, met een purper agterhoofd, de borst wit gevlaakt. EDW. *Birds.* III. 180. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 309.
Woond in Brasil.

Witkop 11 KERNBYTER, die bruin is, met een witte kop. EDW. *Glean.* II. tab.

tab. 306. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 119. 1.

Woond in Oost-Indien.

Coliou

(*Colius.*)

12 KERNBYTER, met een zeer lange wigsgewyze staart, de buitenste stuurvederen van buiten wit, het ligchaam aschgrauw, van onder wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 282. 1.

Woond in Senegal.

Kuif Coliou (B) KERNBYTER, die blaauwagtig is, met een blaauwe kuif, en bruine dekvederen, de staart driemaal zoo lang als het ligchaam. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 282. 2.

Woond aan de Kaap.

NB. De kromme punt van den bek, en dat het kaakbeen van onder niet bultig is, brengen deze en de voorgaande tot een byzonder geslacht, gelyk de Heeren BRISS. *Ornith.* III. pag. 304. en BRUNETHE. *Zool. fundam.* pag. 90. te recht gedaan hebben.

KERN-

Geelagtige 10 KERNBYTER, die geel is, met een
(*Flavicans.*) groenagtige rug en een oran-
je geele kop. BUFFON. *Hist.*
Nat. Ois. 201. 1.
Woond in Cayenne.

Ryftvogeltje 14 KERNBYTER, die graauw is, met
(*Oryzivora.*) witte slaapen, en een roode
bek *. EDW. *Birds.* I. 41.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 152. 1.
Woond in Asia, en Ethio-
pien.

Tarwvogel 15 KERNBYTER, die zwart is, met
(*Panicivora.*) witte vleugeldekken en een
roode bek. EDWARDS. *Birds.*
I. 42.
Woond in Asia en Ethiopien.
NB. Deze is het Wyfje van de voo-
rige. EDW.

Blaauwbek 16 KERNBYTER, die roestcoleurig is,
(*Malacca.*) met een zwart hoofd en buik,
de bek blaauw. EDW. *Glean.*
III. 355.
Woond in China, Java,
Malacca.

BERN-

Gestippelde 17 KERNBYTER, die roestcoleurig is,
 (*Punctulata.*) de buik wit en zwart ge-
 vlakt. EDW. *Birds.* I. 40.
 Woond in Java.

Gegolfde 18 KERNBYTER, die bruinagtig is, de
 (*Molucca.*) kop de keel en staart zwart,
 de buik wit en zwart ge-
 golfd. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
 139. *Domino.*
 Woond in Java, in de Mo-
 luccos.

Havervink 19 KERNBYTER, die geelros is, met
 (*Hordeacea.*) witte slaapen, borst en staart
 zwart.
 Woond in Indien.

Bloedbek 20 KERNBYTER, die grysis, van on-
 (*Sanguinifris.*) der wit, de bek en pooten
 rood. EDW. *Glean.* II. 271.
 fig. 2.
 Woond in Afien.

Astrild 21 KERNBYTER, die grysis, met bruin
 (*Astrild*) gegolfd, de bek, borst en
 oogkringen rood *. EDW.
Birds. IV. 179. *Glean.* III. 354.
 Woond

Woond in Ooft en West-Indien.

Blaauwe 22 KERNBYTER, die blaauw is, met
(*Cyanea.*) zwarte roei en ftuurvederen.
Edw. *Birds.* III. 125.
Woond in Angola.

Groene 23 KERNBYTER, die groen is, met
(*Virens.*) blaauwe fchouders.
Woond in Suriname.

Angoofsche 24 KERNBYTER, die blaauwagtig zwart
(*Angolensis.*) is, met een roeftcoleurige
buik, en een witte vlak op
de vleugels. Edw. *Glean.*
352. 2.
Woond in Angola.

Streepkruin 25 KERNBYTER, die zwart is, met
(*Lineola.*) een witte ftreep op het voor-
hoofd, en witte flaapen.
Woond in Afien.

Mexicaan- 26 KERNBYTER, die grys is, de keel,
fche ftuit, wenkbraauwen, en
(*Mexicana.*) voorhoofd geel. Edw. *Birds.*
I. 44.
Woond in Mexico.

Iste. Deel. IIde Stuk. Bb KERN-

Groenling 27 KERNBYTER, die geelagtig is, de eerste roeipennen van voren geel, de vier zylingſche ſtuurpenen aan hun begin geel; [de dekvederen, de roeipennen aan hun einde, en de ſtuurvederen geheel zwart.] BUFFON. *Hift. Nat. Ois.* 267. 2. *Verdier.*
Woond in Europa.

Botervink 27 KERNBYTER, die groenagtig is, het voorhoofd, de wenkbraauwen, borst en buik geel, de ſtaart aan de punt wit. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 114. 2. *Tangara.*
Woond in Braſil.

NB. Deze is een *Tangara*.

van Canada 29 KERNBYTER, die olyf groen is, van onder geelagtig olyf-groen met een zwarte halſter. (Canadenſis.) BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 152. 2.
Woond in Canada.

Zwavelgeele 30 KERNBYTER, die bruin olyfgroen is, met een geele keel en (Sulphurata.) en

en wenkbraauwen. BRISS.
Ornith. III. p. 225. tab. II.
 fig. 1.

Woond aan de Kaap.

Gekraagde 31 KERNBYTER, die bleek geel is, de
 (*Collaria.*) borst en halsband geel, de
 slaapen zwart.
 Woond in Indien.

Bengaalsche 32 KERNBYTER, die gryis is, met een
 (*Benghalen-* geele kruin, witagtige slaap-
sis.) pen, de buik witagtig met
 bruin gevlaakt. EDW. *Birds.*
 IV. 189.
 Woond in Bengale.

Malabaar- 33 KERNBYTER, die aschgrauw is,
 sche met een zwarte staart en
 (*Malabari-* vleugels, en witte keel, en
ca.) dekvederen der staart.
 Woond in Indien.

Zwartkop 34. KERNBYTER, die geel is, met een
 (*Melanoce-* zwarte kop.
phala.) Woond in Guinea.

Gryze 35 KERNBYTER, die gryis is, met zwart-
 (*Cana.*) te roei stuurpennen, de pooten
 Bb 2 ten

ten rood. EDW. *Birds*. IV.
179. 1. BUFF. *Hist. Nat. Ois*.
393. 1.

Woond in Asia, [en Virgini-
nien.]

Philippyn- 36 KERNBYTER, die bruin is, van on-
fche der geelagtig wit, de kruin
(*Philippina*.) en borst geel, de keel bruin.
BRISS. *Ornith*. III. p. 232.
tab. 12. f. 1.

Woond in de Philippynsche
Eilanden.

Gestreepte 37 KERNBYTER, die bruin is, met
(*Striata*.) roestcoleurige streepen van
onder wit, de keel zwart.
BRISS. *Ornith*. III. pag. 243.
tab. 13. fig. 4.

Woond in 't Eiland Bourbon.

van St. Louis 38 KERNBYTER, die zwart is, de borst,
(*Ludovician*.) buik en band der roeiveders
na.) wit. BRISS. *Ornith*. III. pag.
247. tab. 12. fig. 2.

Woon in 't Eiland St. Louis.

Kaapsche 39 KERNBYTER, die zwart is, met een
(*Capensis*.) geele stuit en dekvederen.

BRISS.

BRISS. *Ornith.* III. p. 171.
tab. 16. fig. 1.

Woond aan de Kaap.

Zwarte 40 KERNBYTER, die zwart is, met een
(*Nigra.*) witte vlak aan de schouder
en het begin der twee bui-
tenste roecipennen. CATESB.
Carol. I. p. 39. tab. 39.
Woond in America..

Van Carolina 41 KERNBYTER, die blaauw is met
(*Coerulea.*) bruine vleugelen en een pur-
pere band. CAT. *Carol.* I.
tab. 39.
Woond in America.

Witbuik 42 KERNBYTER, die blaauw is, van on-
(*Madagascari- rina.*) der wit met een zwarte hal-
fter. BRISS. *Ornith.* II. pag.
197. tab. 16. f. 3.
Woond in Madagascar.

Violette 43 KERNBYTER, die violet is met roo-
(*Violacea.*) de wenkbraauwen, keel en
stuit. CATESB. *Carol.* I. 40.
Woond in America.

Dikke 44 KERNBYTER, die blaauwagtig gry
Bb 3 is,

(Grosfa.)

is, met een zwarte keel, en
 stuurvederen, de bek rood,
 de kin van onder wit. Buff.
Hist. Nat. Ois. 154.

Kleine
 (Minima.)

45 KERNBYTER, die bruin is, van on-
 der bleek rood, de eerste
 stuurvederen aan hun begin
 en de andere van agter wit.
 Woond in Suriname.

Bruine
 (Fusca.)

46 KERNBYTER, die bruin is, van on-
 der witagtig, de stuurvede-
 ren, van de derde tot de ne-
 gende, aan hun begin wit.
BRISS. Ornith. III. pag. 319.
 tab. 17. f. 1.
 Woond in Africa, Bengale.

Gryze
 (Minuta.)

47 KERNBYTER, die grys is, de stuit
 en buik roestcoleurig, de
 vierde, vyfde, en zesde stuur-
 vederen aan weerzyden wit,
 de staart geheel.
 Woond in Suriname.

Tweecoleu. 48 KERNBYTER, die bruin is, van on-
 der

rige der rood. *Edw. Birds. II.*
 (Bicolor.) 88. f. 1.
 Woond in Indien.

Zwartbuik (C) KERNBYTER, die rood is, met een
 zwarte buik, hoofd en bek,
 de roei en stuurvederen
 bruin. *BUFF. Hist. Nat. Ois.*
 309.
 Woond in Cayenne.

Bleekbek (D) KERNBYTER, die bruin is, de bek
 bleekrood, de buik wit.
BUFF. Hist. Nat. Ois. 109.
Maia.
 Woond in Cuba.

Witstuit (E) KERNBYTER, die rood is, de vleu-
 gels en staart zwart, de stuit
 wit. *BUFF. Hist. Nat. Ois.*
 135. 1.
 Woond in Canada.

Gevlakte (F) KERNBYTER, die geel is, met een
 zwarte keel en vlakken, de
 vleugels bruin met wit ge-
 randt, de staart bruin met
 geel gerand. *BUFF. Hist. Nat.*
Ois. 135. 2.
 Bb 4. Woond

Woond in de Philippynsche
Eilanden.

Zwartkruin (G) KERNBYTER, die rood is, de kruin,
koonen en vleugels zwart,
de roeipennen met roode
randen. BUFFON. *Hist. Nat.*
Ois. 134. 1 *Moineau*.
Woond aan de Kaap.

Van Coro- (H) KERNBYTER, die zwart is, met een
mandel geele rug en schouders. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 101. 1.
Woond in Coromandel.

Jacobin (I) KERNBYTER, die bruin is, de hals
en buik zwart, de borst wit.
BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 139.
2 *Jacobin*.
Woond in Java.

Gewolkte (K) KERNBYTER, die bruin is, de buik
wit, met zwart gewolkt.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 139. 1.
Woond in Moluccos.

Breedstaart (L) KERNBYTER, die bruin rosis, met
een witte buik, de staart
waye-

wayeragtig. Buff. *Hist. Nat.*

Ois. 330.

Woond in Virginien.

Roodhals (M) KERNBYTER, die zwart is, de
streep der dekwederen wit,
de stuurpennen van onder ter
helft wit, als ook de buik, de
hals van vooren rood. Buff.
Hist. Nat. Ois. 153. 2.
Woond in Louifanien.

Nonnetje (N) KERNBYTER, die van boven
blauwagtig is, de hals, koo-
nen, buik en borst wit, met
een dubbele zwarte band om
de borst, de vleugels wit,
zwart en bleek bruin. Buff.
393. 3 *Nonette.*
Woond . . . . .

Goudkop (O) KERNBYTER, die bruin is, de kruin
goudgeel, de koonen wit, de
buik wit, met bleeke vlak-
ken. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.*
393. 2.
Woond in Indien.

Paus (P) KERNBYTER, die groen is, de kop
en de hals van agter blaauw,
van onder rood, de rug en
staart bruin. *Buff. Hist. Nat.*
Ois. 159.
Woond in Louifanien.

Gekapte (Q) KERNBYTER, die bruin is, het
voorhoofd, koonen en keel
zwart, de kop borst en buik
oranje. *Buffon. Hist. Nat.*
Ois. 223. 1.
Woond in Senegal.

Rouwdrager(R) KERNBYTER, die geheel zwart is.
Buff. Hist. Nat. Ois. 224. 3.
Woond in Cayenne.

Witband (S) KERNBYTER, die zwart is, met een
band om de borst. *Buff. Hist.*
Nat. Ois. 224. 2.
Woond in Java.

Geelrand (T) KERNBYTER, die zwart is, de roei-
en ftuurvederen met geele
randen. *Buffon. Hist. Nat.*
Ois. 224. 1.

Zwartftaart (V) KERNBYTER, die rood is, de kop
zwart,

zwart, met een kromme band,
om de oogen, zyde en keel
loopende, van onder wit, de
staart zwart. *Buff. Hist. Nat.*
Ois. 230. 1.
Woond aan de kaap.

Roodoog (W) KERNBYTER, die de kop van ag-
ter blaauw, de rug en vleu-
gels bruin heeft, van onder
blaauw en roodagtig wit, de
vlak aan de oogen bloedrood.
Buff. Hist. Nat. Ois. 230. 2.

Roodveer (X) KERNBYTER, die bruin is, van on-
der bleeker, de dekvederen
der staart rood. *Buff. Hist.*
Nat. Ois. 230. 3.

Rouwdrager (Y) KERNBYTER, die zwart is, van on-
der en aan de oogen geel.
Buffon. Hist. Nat. Ois. 341. 1.
Verdier.
Woond aan de Kaap.

Streepborst (Z) KERNBYTER, die groen is, met
wenkbraauwen, de borst
roestcoleurig, met zwarte
streepjes, de buik en stuit
wit.

wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
341. 2.

Woond in St. Domingo.

Bourbon- (Aa) KERNBYTER, die ros is, met een
fche zwarte kop en vleugels, de
buik wit.

(b) Geheel roffe, met een
zwarte kruin, vleugels en
staart. BUFFON. *Hist. Nat.*
Ois. 1, 2. *Bouvreuil.*

Woond in Bourbon. (b) aan
de Kaap.

Schulpvlek (Ba) KERNBYTER, die ros is, de rug,
kop en vleugels zwartag-
tig, de schulpen der vederen
met wit gerand. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 319. 2. *Bouvreuil.*
Woond in Cayenne.

Gekrulde (Ca) KERNBYTER, die zwart is, van
onder en ter zyde de keel
wit, de vederen der buik
lang en gekruldt. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 319. 1.
Woond in Brasil.

GEEL.

EX. (GEELGORS.) De *bek* kegelagtig [verlengd.]
 (EMBERIZA.) De *Kaakbeenderen* van agter
 van elkander wykende; en
 de randen naar binnen inge-
 drukt.

Sneeuwvo. 1 GEELGORS, met witte roeipennen,
 gel de eerste van buiten zwart,
 (Nivalis.) de fluurvederen zwart, de
 drie zylingfche wit. BUFF.
Hift. Nat. Ois. 497. EDW.
Birds. III. 126.
 Woond in Lapland en Spits-
 bergen.

Wintervo. 2. GEELGORS, die zwart is, met een
 gel. witte buik. CAT. *Carol.* I.
Hyemalis. tab. 36.
 Woond in Noord America.

Gevlakte 3. GEELGORS, die grys is, van onder
 (Miliaria.) met zwart gevlakt, en roffe
 oogkringen. ALBIN. *Ois.* II.
 p. 46. tab. 50.
 Woond in Europa.

Ortolan 4 GEELGORS, met zwarte roeipennen;
 (Hortulana.) de drie eerste aan den rand
 wit.

witagtig, de stuurvederen
zwart, twee zylingfche van
buiten zwart, [het ligchaam
ros met zwarte vlakken, de
keel graauwagtig, de wenk-
brâauwen wit.] *BUFF. Hist.*
Nat. Ois. 511. 1.

Woond in Europa.

Witbuik (A) GEELGORS, die bruinis, met zwart
gevlakt, van onder wit, de
drie eerste roeipennen zwart
met een witte rand, de vier
volgende wit. *BUFF. Hist.*
Nat. Ois. 511. 2.

Woond . . . . .

(b) De rug ros met zwart ge-
stipt, van onder wit met
rosse stippen. *BUFF. Hist.*
Nat. Ois. 497. 2.

Woond . . . . .

Groeninger 5. GEELGORS, met zwartagtige stuur-
(*Citrinella*.) vederen, de twee buitenste
aan de binnen zyde met een
puntige vlak *.

Woond in Europa.

GEEL-

Olyfcoleu. 6 GEELGORS, die olyfcoleurig is, van
 rige onder bleeker, de keel o-
 (Olivacea.) ranje, een zwartagtige band
 om de borst. BRISS. *Ornith.*
 III. p. 30. tab. 13. fig. 5.
 Woond in St. Domingo.

Gryze 7. GEELGORS, die grys, met een zwart
 (Orix.) voorhoofd en buik, de hals
 en stuit ros, de bek zwart.
 EDW. *Birds.* IV. 178.
 Woond in Africa.

Roodbek 8 GEELGORS, die grys is, met een
 (Quelea.) zwart voorhoofd, en roode
 bek. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
 183. 2. *Moineau.*
 Woond in Senegal.

Kaapsche 9 GEELGORS, die grys is, met eene
 (Capensis.) witagtige keel, eene zwart-
 agtige band aan de oogen en
 kaakbeenderen. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 158. 2. *Ortolan.*

uitLouisiane 10 GEELGORS, die grys is, van onder
 (Ludoviciana.) bleek, de borst ros, de kop
 van boven met eene zwarte
 boog.

- boog. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
158. 1. *Ortolan.*
Woond in Louifiane.
- Veldgors. 11 GEELGORS, die rosagtig is, de kop
(*Cia.*) met zwartagtige streepjes,
en witte wenkbraauwen.
Woond in Zuid Europa.
- Heggevlie- 12 GEELGORS, die grys is, met eene
ger gevlake borst, geele wenk-
(*Cirlus.*) braauwen en de twee buiten-
ste stuurvederen, met een
wigswyze witte vlak.
Woond in Zuid Europa.
- Gemeen- 13 GEELGORS, die grys gevlaakt is, de
zaame de punten der stuurvederen
(*Familiaris.*) wit, de rug van agter geel.
Woond in Afien.
- Geele 14 GEELGORS, die grysis, de kop van
(*Flaveola.*) vooren geel.
Woond in de warme Ge-
westen.
- Surinaam- 15 GEELGORS, die bruin is, met ee-
sche ne goudgeele kruin, en wit-
te

(*Amazona.*) te dekvederen der staart *.
Woond in Suriname.

Ryftediefje 16 GEELGORS, die bruin is, met eenen
(*Oryzivora.*) roffen hals een zwarte buik,
puntige ftuurvederen. EDW.
Birds. III. 291. BUFF. *Hift.*
Nat. Ois. 388.
Woond in Cuba, Carolina,
Louisiana.

Rietortolan 17 GEELGORS, die een zwarte kop
(*Schoenichlus.*) heeft, een grys en zwart lig-
chaam, de buitenfte ftuur-
vederen, met een witte wig-
vormige vlak. BUFF. *Hift.*
Nat. Ois. t. 497. 2.
Woond in Europa.

Goudvleu- 18 GEELGORS, die afchgraauw bruin
gel is, met geel roffe vleugels,
(*Psittacca.*) en twee zeer lange ftuurve-
deren. SEB. *Schatk.* I. tab.
66. f. 5.
Woond in Brafil.

Weeuwte 19 GEELGORS, die bruin is, met een
(*Paradiſea.*) roode borft [en hals] de vier
middelfte ftuurvederen zeer
Iſte. Deels. IIde Stuk. C c lang

lang en puntig uitlopende,
de bek zwart. BUFFON. *Hist.*

Nat. Ois. 194. [*Veuve.*]

Woond in Angola.

Rouwdrager²⁰ GEELGORS, met een roode kruin
(*Serena.*)

en een zwarte band om de zelve, eene wigvormige staart;
de twee middelste stuurvederen zeer lang, [de dekvederen der vleugelen wit, de bek rood.] BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 82. *Petite Veuve.*

Woond . . . . .

Langstaart ²¹ GEELGORS, die zwartagtig is, van
onder witagtig, de vier middelste stuurvederen lang
en puntig uitlopende, twee zeer lang, de bek rood.

BRISS. *Ornith.* III. p. 127.
tab. 8. f. 2.

Woond in Indien.

Schoone ²² GEELGORS, die gevlakt is, de borst
(*Principalis.*)

ros, de vier middelste stuurvederen zeer lang; de beken pooten rood. EDW. *Glean.*

II.

II. p. 126. tab. 270. *Long-tailed Sparrow.*

Woond in Angola.

Koning- 23 GEELGORS, met de vier middelste
lyke
(*Regia.*)
stuurvederen zeer lang van
dezelve grootte, en alleen
aan den punt gevedert, de
bek rood *. *Buff. Hist. Nat.*
Ois. tab. 8. fig. 1.

Chineefche 24 GEELGORS, met een blaauw hoofd,
(*Ciris.*)
een oranje buik, een groene
rug, de slagpennen groen
bruin. *Edw. Birds.* II. tab.
130.
Woond in Noord America.

Geelband (B) GEELGORS, die zwart is, met een
geele band over de rug en
vleugels. *Buff. Hist. Nat.*
Ois. 123. *Moineau.*
Woond in Juda.

CXI. TANGARA. De *Bek* kegelagtig, puntig,
(TANAGRA.)
uitgerand, aan het grond-
stuk wat driehoekig, de punt
naar beneden hellende.

Jacapa   I TANGARA, die zwart is, met de keel,
(*Jacapa*.)   borst en voorhoofd lakrood.
Edw. Glean. II. pag. 120.
tab. 267.

Woond in Zuid America.

NB. Tot welk geslacht deze vogel behoore, is zeer twyffelagtig. Zy is by LINN. een *Tangara*, by BRISSON een vliegevangcr, en by de Heer PALLAS een klaauwier.

Brasiliaan. 2 TANGARA, die lakrood is, met een
 fche zwarte staart en vleugels.
 (*Brasilia*.) BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 156. 1.
 Woond in Brasil, Canada,
 en in Oost-Indien.

Roode 3 TANGARA, die rood is, met zwarte
(*Rubra.*) vleugelen en staart, de stuur-
vederen aan de punt wit.
BRISS. *Ornith.* III. p. 48. tab.
2. f. 5.
Woond in Canada.

Jacarina 4 TANGARA, die violet zwart is, de
(*Jacarine.*) de vleugels van onder witagtig, de staart dubbel gewerkt.
EDW.

EDW. *Glean.* III. tab. 306. f. 2.
Woond in Brasil.

Teitei 5 TANGARA, die violet is, van onder
(*Violacea.*) hoog geel. EDW. *Glean.* II.
p. 112. 263. fig. 1. *the golden Titmouse.*
Woond in Brasil en Cayenne.

Blaauwe 6 TANGARA, die koornblauw is met
(*Cyanea.*) bruine ftuurvederen *. CAT.
Carol. I. tab. 45.
Woond in Carolina.

Gyrola. 7 TANGARA, die groen is, met een
(*Gyrola.*) roode kop, een geele hals-
band, en blaauwe borft.
EDW. *Birds.* I. tab. 23. BUFF.
Hift. Nat. Ois. 133. 2.
Woond in Peru en Suriname.

van Cayenne 8. TANGARA, die geelros is, met een
(*Cayana.*) groene rug, een roffe kruin,
en zwarte koonen. BRISSON.
Ornith. III p. 21. tab. 4. f. 3.
Woond in Cayenne.

Zwarte 9 TANGARA, die glimmend zwart is*.
(*Atrata.*) Woond in Ooft-Indien.

van Mexico 10 TANGARA, die zwart is, van onder geelagtig, de borst en

(*Mexicana*.)

fluit blaauw. EDW. *Birds*. III. tab. 350.

Woond in Mexico, Cayenne.

Paradys

Mees

(*Tatao*.)

11 TANGARA, die violet is, met een

zwarte rug, en geele fluit, groene kop, violette borst en vleugels, [de buik zee-groen.] EDW. *Glean*. III. tab. 349. p. 289. BUFFON. *Hist. Nat. Ois*. 127. 2.

Woond in Brasíl, Cayenne.

Witbek

(*Albirostris*.)

12 TANGARA, die zwart is, met een

geeie vlak op de vleugels en staart, de buik wit,

Woond in America.

Bloedkeel

(*Gularis*.)

13 TANGARA, die zwartagtig, van is

onder wit, de kop zwart, de keel purper. BRISS. *Supl. Ornith.* p. 67. tab. 4. f. 4.

Woond in America.

Geelborst

14 TANGARA, die blinkend zwart is,

de

(*Nigra.*) de borst aan wederzyden, en de vleugels van onder geel. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 114. 3. Woond in Cayenne, Mexico, Brasil.

Zwartborst 15 TANGARA, die zwart is, van onder wit, de keel en stuit blaauwagtig, de borst en kop van vooren zwart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 155. 1. Woond in Brasil in Cayenne.

Gevlakte 16 TANGARA, die zwart gevlacht is, van boven bruin, van onder witagtig. BRISS. *Ornith.* III. p. 37. tab. 2. fig. 4. Woond in St. Domingo.

Bruine Car-17 TANGARA, die bruin is, met een dinaal roode borst, keel en schouders. EDW. *Birds.* II. 82. Woond in America.

Witvlak 18 TANGARA, die zwart is, met een witte bek, en witte vlak op de vleugels en aan het begin van

van de staart. BUFF. *Hist.*

Nat. Ois. 197. 2.

Woond in America.

Bisschop 19 TANGARA, die aschgrauw is, met
(*Episcopus.*) de staart en vleugels van bui-
ten blaauw.

Woond in Brasil.

Sajacu 20 TANGARA, die grys is, met blaauw-
(*Sayaca.*) agtige vleugels *. EDW.
Glean. III. tab. 350. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 178. 1. Eve-
que.

Woond in Brasil en Cayenne.

Gestipte 21 TANGARA, die groen is, met zwar-
(*Punctata.*) te stippen, van onder geelag-
tig wit. EDWARDS. *Glean.* II,
262. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
133. 1.

Woond in Oost Indien,

Groene 22 TANGARA, die groen is, van on-
(*Virens.*) der geelagtig, met eenzwar-
te toomstreep, keel en koo-
nen.

Woond in Mexico, Peru
Cayenne.

TAN-

Geel zwarte²³ TANGARA, die glanzig zwart is,
(*Chlorotica*.) met een geele borst, buik
en voorhoofd, de buitenste
stuurveer van binnen met
eene zwarte vlak. BUFF. *Hist.*
Hist. Nat. Ois. 114. 2.
Woond in Cayenne.

Gekuifde 24 TANGARA, die zwart is, met een
(*Cristata*.) oranje kuif, de keelen stuit
ros, [de rand der vleugels
wit.] BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
72.
Woond in Cayenne.

Driecoleuri-(A) TANGARA, die groen is, de rug
ge en vleugels, de roeien stuur-
vederen zwart, met blaauwe
banden. BUFFON. *Hist. Nat.*
Ois. 301. 1.
Woond in Cayenne.

Groenkop (B) TANGARA, die zwart is, de kop
en schouders groen, de rug
rood, de stuit geel, de stuur-
vederen groen, de vier bui-
tenste rozenrood met blaau-
we randen, de keel en vlak
Cc 5 der

der vleugelen blaauw , de
borst en buik zeegroen. BUFF.

Hist. Nat. Ois. 7. 1.

Woond in . . . . .

Geelfluit (C) TANGARA, die groen is, de kop
zeegroen , de rug , de keel ,
en de stuit geel, de vleugels
blaauw, de stuur- en roeipen-
nen groen, de buitenste
roeipennen blaauw. BUFF.
Hist. Nat. 33. 1.

Woond in Cayenne.

Blaauwkop (D) TANGARA, die groen is, de kop
blaauw, de keel en de hals van
van agter rood , de rug zwart.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 33. 2.
Woond in Cayenne.

Donkere (E) TANGARA, die zwart is, de kop,
hals, en buik blaauw. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 179. 1.
Woond in America.

Groote (F) TANGARA , die bruin is, van on-
der ros , de keel wit, van
onder oranje , met eene
zwarte streep ter zyden.
BUFF.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 205.
Woond in Cayenne.

Gekroonde (G) TANGARA, die ligt groen is, de
buik rosgeel, de kruin oran-
je. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
290. 1.
Woond in Cayenne.

Pompadour-(H) TANGARA, die donker purper is.*
Vogel BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 128. 1.
Woond in Cayenne.

Bruine (I) TANGARA, die bruin is, van onder
wit, de kop en keel rood.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 155. 2.
Woond in America.

Fraye (K) TANGARA, die zwart is, de buik
en kruin geel. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 114. 1.
Woond in Cayenne.

Bruinrug (L) TANGARA, die vaalgroen is, de
rug bruin, de vlak dervleu-
gels zwavel couleur, de roei
en stuurpennen zwart.

NB. Deze

NB. Deze is , zegt BUFFON , het Wyfje van de Sajacu. p. 20.

Woond in Cayenne en Brafil.

CXII. VINK. De *bek* kegelachtig recht, en
(FRINGILLA.) puntig.

Laplandfche 1 VINK, met eene zwarte kop, een
(*Lapponica.*) grys en zwart gemengeld ligchaam, witte wenkbraauwen, de buitenfte ftuurvederen met een witte driehoekige vlak.

Woond in Europa.

Surinaam- 2 VINK, die grys is, de roeivederen
fche aan wederzyden wit, de zy-
(*Surinama.*) lingsche ftuurvederen van onder wit.

Woond in Suriname.

Vink 3 VINK, met zwarte leden, de roei-
(*Coelebs.*) vederen wederzyds wit, de drie eerfte ongevlakt, de twee ftuurvederen fchuinfch wit. ALBIN. *Ois.* I. tab. 63.

Woond in Europa.

VINK,

Bergvink 4 VINK, met het grondstuk der vleugelen van onder zeer geel.
(*Montifringilla*.) Woond in de Boffchen.

Zweedsche 5 VINK, die bruin is, de borst en fchouders ros, de vleugelen zwart, met eene roffe vlak.
(*Fulensis*.) Woond in Zweeden.

van Carolina 6 VINK, die zwart is, met eenen rooden weersfchyn, de buik ro-agtig en eene witte vlak op de vleugelen. CATESB. *Carol.*
(*Erythropthalma*.) I. p. 34. tab. 34.
Woond in America.

Distelvink 7 VINK, met de flagpennen aan de voorzyde geel, de buitenfte ongevlakt, de twee buitenfte ftuurvederen in het midden, en de andere aan de punt met eene witte vlak. BUFF.
(*Carduelis*.) *Hift. Nat. Ois.* 54. I.
Woond in Europa.

Chineefche 8 VINK, die groen is, met eenen rooden kop en ftart, de buik wit en zwart gegolfd. EDW.
(*Melba*.) *Birds*,

Birds. III. 128. *the green gold finch.*

Woond in China.

Caapliche 9 VINK, met een bruine kop en borst,
Musch
(*Alario.*) een castanje bruin ligchaam,
dat van onder wit is, de vier
zylingsche stuurvederen met
een zwart streepje. *BRISS.*
Ornith. III. p. 106. tab. 5.
fig. 2.

Woond aan de Caap.

Gestippelde 10 VINK, die bruin is, en rosagtig,
Bengali met wit gestipt *. *EDW.*
(*Amanda-* *Glean.* III. 355. 1. *BUFF.*
va.) *Hist. Nat. Ois.* 115. 3.
Woond in Oost-Indien.

Granadier 11 VINK, met eene wigswyze staart,
(*Granatina.*) een rosagtig ligchaam, roo-
de bek, de slaapen, stuit en
nek donkerblauw. *EDW.*
Birds. IV. 191. *BUFF. Hist.*
Nat. Ois 1093.
Woond in Brasil.

Americaan- 14 VINK, die geel is, met een zwart
sche voorhoofd, en bruine vleu-
gelen.

(*Tristis.*) gelen. CATESB. *Carol.* I. tab. 43. EDW. *Glean.* III. 274. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 202. 2. Woond in Noord America.

van Bahama 13 VINK, die zwart is, van onder
(*Zena.*) wit, eene witte streep onder en boven de oogen, een goud-geele borst. CAT. I. fig. 42. Woond in Noord America.

Aartige 14 VINK, die bruinagtig groen is,
(*Lepida.*) met een roffe keel, en streep onder en boven de oogen, zwarte borst. Woond in de Havana.

Herfstvink 15 VINK, die groenagtig is, met ee-
(*Autumna-* ne roffe kop, en bleek roode
lis.) stuit. Woond in Suriname.

Citroentje 16 VINK, die groenachtig is, de rug
(*Citrinella.*) bruin gevlaakt, de pooten vleesch couleur. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 321. 1. *Bruant de Bresil.* Woond in Zuid Europa [en America.]

VINK

- Serin 17 VINK, die na den groenen trekt,
(*Serinus*.) het onderkaakbeen wit, de rug en zyden met bruin gevlaakt, de vlak der vleugelen geel.
Woond in Zuid Europa.
- Senegali 18 VINK, die roeft bruin is, met de
(*Senegala*.) kruin en buik ros, de bek zwart en rood gestreept.
BRISS. *Ornith.* III. p. 208. tab. 10. fig. 2.
Woond in Senegal.
- Nachtvink 19 VINK, die zwart is, met eene ros-
(*Noctis*.) se keel en toomstreep, en eene zwarte bek. BRISS. *Ornith.* III. p. 118. tab. 7. fig. 1.
- Chineefche 20 VINK, die olyfgroen is, van on-
(*Sinica*.) der tegelrood, de stuur- en roei-pennen zwart, aan hun begin geel. BRISS. *Ornith.* III. p. 175. tab. 7. fig. 2.
Woond in China.
- Witbuik 21 VINK, die zwart is, van onder
(*Nivalis*.) sneeuw wit, de tweede reiflag-

stuurvederen, en de dekvederen wit. *BRISS. Ornith. III. p. 162. tab. 15. f. 1.*
Woond in America.

Geele Vink 22 VINK, die groen is, met een geele borst, buik en wenkbrauwen, de eerste slagpennen aan den buitenrand wit. *EDW. Birds. II. 84.*
Woond in Madera.

Canaryvogel 23 VINK, met een wit geelagtig lichaam, en bek, de stuur- en roeipennen groenagtig, de bek witagtig *. *BUFF. Hist. Nat. Ois. 202. 1. Serin.*
Woond in de Canarische Eilanden.

Geeltje 24 VINK, die geel is, met een goudgeel voorhoofd, de vleugels en staart zwart, met geel gerand.
Woond . . . . .

Sysje 25 VINK, die de slagpennen in het midden geel heeft, de vier eerste ongevlakt, de stuur-
Iste Deel IIde Stuk. Dd vede-

vederen aan hun begin geel
en aan de punt zwart*.
Woond in Europa.

Kuifvink 26 VINK die bruin is, met een vuur-
(*Flammea.*) couleurige kuif.
Woond in Europa.

Geelbek 27 VINK, die bruin is, met een geel-
(*Flaviro-* agtige bek.
stris.) Woond in Europa.

Rietvink 28 VINK, die de voorste slagpennen
(*Cannabina.*) en de stuurpennen zwart
heeft, aan weerzyden wit
gerandt. FRISCH *Av.* II. tab.
9. fig. 1, 2.
Woond in Europa.

Vlasvink, 29 VINK, met bruine slag en stuurve-
(*Linaria.*) deren, met bleeke randen,
de vlak der vleugelen witag-
tig, [het ligchaam ros.]
ALBIN. *Ois.* III. p. 70. tab. 75.
Woond in Europa.

Kraagmusch 30 VINK, die graauw is, met witte
(*Petronia.*) wenkbraauwen, en een gee-
le keel.
Woond in Europa.

VINK,

Vink van 31 VINK, met een bruine rug, de buik
Angola en staart blaauw. EDW. *Birds*.
(*Angolensis.*) III. 131.

Woond in Angola en Bengale.

Bengali 32 VINK, die bleek blaauw is, met
(*Bengalus.*) een graauwe kop en rug, de
zyden van de kop purper.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 115. 1.

Woond in Bengale.

Van Jamaica 33 VINK, die grys is, met een blaauw
(*Jamaica.*) groene borst, zwarte vleu-
gels en staart.

Woond in Jamaica.

Driekleuri- 34 VINK, die zwart is, de kop en stuit
ge geel, de schouders groen, de
(*Tricolor.*) buik geelagtig.

Woond in Suriname.

Maja 35 VINK, die purperagtig is, met een
(*Maja.*) donkerer borstband. BRISS.
Ornith. III. p. 214. tab. 7.
fig. 4.

Woond in Oost en West-Indien.

Musch 36 VINK, met bruine roei- en stuur-
Dd 2 pen-

(Domestica.)

pennen, een gryns en zwart
ligchaam, een enkele witte
vlak op de vleugels. Buff.
Hist. Nat. Ois. 6. 1. [het
mannetje.] *Moineau franc.*
Woond in Europa.

Bergmosch
(Montana.)

37 VINK, met bruine roei- en stuur-
pennen, een gryns en zwart
ligchaam, met een dubbele
witte vlak op de vleugels.
Edw. Glean. II. 269.
Woond in Europa.

Tweecoleu-
rige
(Bicolor.)

38 VINK, met een zwarte kop en
borst, de rug, vleugels, en
staart donker groen. *Catesb.*
Carol. I. tab. 37.
Woond in America.

Krul-Vink
(Crispa.)

39 VINK, die olyfcoleurig is, van on-
der geel, de kop zwart, de
meeste vederen omgekruld.
Edw. Glean. II. 271.
Woond in Angola.

van Mozam.
bique

(A) VINK, die groen is, van onder
geel, de randen der roei- en
stuur-

stuurpennen geel. BUFFON.
Hist. Nat. Ois. 364.
 Woond in Mofambique.

Donkere (B) VINK, die bruin is, met zwarte
 stuurvederen, de twee bui-
 tenste aan wederzyden wit,
 de buik zwavel geel. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 151. 1.
 Woond in Europa.

Wyngaard (C) VINK, die bruin is, met zwarte
 Vink stuur en slagpennen, de borst
 rood, de keel en buik geel.
 BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 151. 2.
 Woond in Vrankryk.

Scharlaken (D) VINK, die scharlaken rood is, met
 Musch een zwarte buik, borst, zy-
 den en vleugels, de dekve-
 deren bruin, en de slagpen-
 nen wit gerand. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 16. 2. *Cardinal du*
Cap. de b. Esp.
 Woond aan de Kaap.

Nieuwjork- (E) VINK, die groen is, het voor-
 sche hoofd en de kruin zwart, het
 agterhoofd, de keel en hals
 Dd 3 geel,

geel, de buik en stuit wit,
de vleugels en staart zwart,
met sneeuw witte randen.

BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 292.

Tarin de la Nouv. York.

Woond in Nieuw York.

Gemengelde (F) VINK, die bruin is, met zwarte
vlakken, de randen der dek-
vederen en roei en slagpen-
pen wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
233. *Proyer.*

Woond in Europa.

Bruinrug (G) VINK, die lakrood is, de rug,
staart en vleugels bruin, de
bek wit. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. 157. 1. *Senegali.*

Woond in Senegal.

BoschMusch (H) VINK, die bruin is, van onder
wit, de kop met een bleek
roode en zwarte band boven
de oogen. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. 225.

Woond in Europa.

Roodpoot (I) VINK, die geel is, de rug, en
vleugels groenagtig, met
don-

donkere vlakken, de pooten rood. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 321. 1. *Bruant.*
Woond in Brasíl.

Bourbon- (K) VINK, die rood is, de vleugels
sche en staart bruin, met bleeke
randen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 321. 2. *Bruant.*
Woond op het eiland Bour-
bon.

Kaapsche (L) VINK, die ros bruin is, met een
Vink zwarte kop, een witte streep
over de oogen, de buik wit,
de stuurvederen van onder
blauw. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 386. 2. *Bruant.*
Woond aan de Kaap.

Mexicaan- (M) VINK, die bruin is, de kop en
sche keel geel, de buik bleek met
bleeke zwarte vlakken. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 386. 1. *Bruant.*
Woond in Mexico.

Roodborstje (N) VINK, die bruin is, de borst rood,
de slag en stuurpennen zwart.
D d 4 *Hist.*

Hist. Nat. Ois. 485. 1 *Linotte*,
Woond in Europa.

Roodkopje (O) VINK, die bruin is, het voor-
hoofd rood, de borst bleek
rood, de buik wit. BUFFON.
Hist. Nat. Ois. 485. 2. *Ca-*
baret.
Woond in Europa.

Geelborst (P) VINK, die groen is, met de hals
van vooren, de keel en borst
geel, een geel band over de
vleugelen; de buik wit. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 435. 3.
Woond in Europa.

Staalkleurige (Q) VINK, die donker staalcoleurig
blauw is, de bek en pooten
bleekrood. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. 291.
Woond in Brasil.

Dominicaan (R) VINK, die zwart en wit bont is,
met een scharlaaken roode
kop en keel. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. 55. 2. *Cardinal Domini-*
quain.
Woond in St. Domingo.
VINK,

Gekapte (S) VINK, die van boven bruin, van onder fcharlaaken rood is, de ftuit, bek en leggende kuif carmyn rood, de twee buitenfte ftuurvederen zwart. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 181. 1. Woond in Cayenne.

Roodhals (T) VINK, die bruin is, met een zwarte kop en ftuurvederen, de hals en ftuit rood, de borft geel met eene zwarten band. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 182. 2. Woond in Carolina.

Gefchulpte (U) VINK, die groen is, de kop en hals van agter graauw, van vooren gloeyendrood, de borft met een geele band, de buik en zyden zwartagtig groen, met witte vlakken, de ftuurvederen rood. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 203. 1. Woond aan de Kusten van Africa.

Blaauwe (V) VINK, die geheel fchoon hemelfch blaauw is, de roei en ftuur-
D d 5 pen-

pennen donker, met ligter randen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 203. 2.

Woond in Cayenne.

CXIII. VLEIGENVANGER. De *bek* byna drie-

(MUSCICAPA.) hoekig, aan wederzyden uitgerandt, de punt krom, de *Knevel* *hairtjes* naar de keel gestrekt.

De *Neusgasten*
[langwerpig]
rondagtig.

Schoone 1 VLEIGENVANGER, met een zwarte
(*Paradisi.*) blaauwe gekuifde kop, een wit ligchaam, de staart wigswyze, de twee middelste stuurvederen zeer lang. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 284. 2.

(a) Het ligchaam van boven rood. fig. 2.

Woond aan de Kaap, en op Ceylon.

Langstaart 2 VLEIGENVANGER, die gekuifd is,
van

(*Mutata.*) van boven zwartagtig groen,
van onder wit, de twee mid-
delste ftuurvederen zeer lang,
wit, met een zwarte fchaft,
de zylingfche zwart. BUFF.
Hift. Nat. Ois. 248. 2.
Woond in Madagafcar.

Vierkleurige(A) Vliegenvanger, met een don-
ker groene kuif, het ligchaam
rood, de drie eerfte flagpen-
nen zwart, de overige wit,
de middelste ftuurvederen
zeer lang. BUFF. *Hift. Nat.*
Ois. 248. 1.
Woond in Madagafcar.

Van Marti- 3 Vliegenvanger, met eengekuifde
nique
(*Martinica.*) kop, van boven bruin, van
onder afchgrauw, de bui-
tenfte randen der flagpennen
witagtig. BUFF. *Hift. Nat.*
Ois. 568. 1.
Woond in Martinique.

Tyran 4 Vliegenvanger, met een zeer lan-
(*Tyrannus.*) ge [zwarte] gevorkte ftart,
de buitenfte ftuurvederen
aan

aan de binnen zyde wit, het ligchaam zwart, van onder wit, [de vleugels bruin, de kruin groen.] *Buff. Hist. Nat. Ois.* 571. 2.

Woond in Canada en Suriname.

Surinaam- 5 **V**LIEGENVANGER, met eenen geronden
fche staart, die aan de punt
(*Surinama.*) wit is, het ligchaam zwart,
van onder wit.
Woond in Suriname.

Gekroonde (B) **V**LIEGENVANGER, met een oranje
roode kuif, die plat is en op-
staat, de punten der vederen
blauw, het ligchaam bruin
groen, de vleugels bruin, de
buik en stuit geel, de staart-
vederen oranje coleurig.
Buff. Hist. Nat. Ois. 289.
Woond in Cayenne.

Gehairde 6 **V**LIEGENVANGER, met een blauwag-
(*Crinita.*) tige gekuifde kop, en hals,
de buik geelagtig, de stuur-
en

en slagpennen ros. CAT. *Carol.* I. p. 52.

Woond in Noord America.

Bengaalsche 7 Vliegenvanger, die een grys kuif-
(*Emeria*.) je heeft, van onder wit is,

de slaapen en stuit rood. EDW.

Birds. IV. 190.

Woond in Bengale.

Roode 8 Vliegenvanger, die rood is, de bek
(*Rubra*.) geelagrig. EDW. *Glean.* I.

tah. 239. fig. 2.

Woond in Noord America.

(b) Van onder wit, de punten der slagpennen zwart.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 453. 1.

Woond in Noord America.

Groenrug (C) Vliegenvanger, die groenekuif,
hals en rug heeft, de vleugels, en staart caneelcoleurig,
de borst en keel graauw,
de buik gloeiend geel. BUFF.

Hist. Nat. Ois. 569. 1.

Woond in Virginien.

Geelbuik (D) Vliegenvanger, die bruin is, de
kruin

kruin zwart en geel gevlaakt,
 een witte kop, band en keel,
 de borst en buik geel. BUFF.

Hist. Nat. Ois. 569. 2.

Woond in Cayenne.

Zwartkop 9 Vliegenvanger, die zwart is, de
 (*Atricapilla*.)

vlak op het voorhoofd en de
 vleugelen, de buik, borst en
 zylingfche ftuurvederen van
 buiten, wit. BUFF. *Hist. Nat.*

Ois. 566. 3.

Woond in Europa.

Roodftaart 10 Vliegenvanger, die zwart is, de
 (*Ruticilla*.)

borst, vlak der vleugelen en
 ftuurpennen roodagtig geel.

EDWARDS. *Birds.* II. 80. BUFF.

Hist. Nat. Ois. 566. 1. 2.

Woond in America.

Groenagtige 11 Vliegenvanger, die bruinagtig
 (*Virens*.)

groen is, van onder geel,
 de wenkbraauwen wit.

Woond in Carolina.

vanCayenne 12 Vliegenvanger, die bruin is, van
 (*Cayanensis*.)

onder geel, de wenkbraauwen

wen wit, de kruin oranje-
agtig. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
212.

Woond in Cayenne en Bra-
fil.

Gevlakte (E) Vliegenvanger, die bruin is,
de staart gevlaakt, de kruin
geel, het voorhoofd en de
keel wit, de buik en borst
geel met zwarte vlakken.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 453. 2.

Woond in Cayenne,

van Canada 13 Vliegenvanger, die aschgrauw
(*Canadensis.*) is, van onder geel, met gee-
le toomstreepen, de kruin
zwart gevlaakt. BRISS. *Ornith.*
II. p. 406. tab. 39. fig. 4.

Olyfgroene 14 Vliegenvanger, die olyfcoleurig
(*Olivacea.*) is, van onder bleeker, de
wenkbraauwen wit, de oo-
gen rood. EDW. *Glean.* II.
252.

Woond in Jamaica.

van Senegal 15 Vliegenvanger, die bont is, met
witte

(*Senegallenses.*)

witte wenkbraauwen, de buitenste stuurvederen ter helfte wit. BRISS. *Ornith.* II. p. 374. tab. 37. 2.

(b) Dezelve met eene bruine borst. *idem ibid.* p. 376. tab. 37. 3.

Woond in Senegal.

Kaapſche
(*Capensis.*)

16 Vliegenvanger, die bruin is, van onder wit, met een zwarte borst, de band op de vleugels ros, de stuurvederen aan de punt wit. BRISSON. *Ornith.* II. p. 372. tab. 36. 3. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 572 1. Woond aan de Caap.

Gekraagde
(*Terquata.*)

17 Vliegenvanger, die zwart is, van onder wit, de borst ros, de binnenste stuurvederen aan de punt wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 572. 2. Woond aan de Caap.

Zwarte

(F) Vliegenvanger, die geheel zwart is, de stuit geel. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 572. 3.

Woond

Woond op het Eiland Bourbon.

van Carolina 18. Vliegenvanger, die bruin is, van
(*Carolinensis*.) onder aschgrauw, de kop
zwart, de stuit van boven
rood. CAT. *Carol.* I. tab. 66.
Woond in Carolina.

Gevlakte 19 Vliegenvanger, die bruin is, van
(*Petechia*.) onder aschgrauw met roos
gevlakt, de keel en stuit van
boven roos. BRISS. *Ornith.*
II. p. 364.
Woond in Martinique.

Grifola 20 Vliegenvanger, die bruinagtig is,
(*Grifola*.) van onder witagtig, de hals
in de lengte gevlakt, de bo-
ven stuit rosagtig. BRISS.
Ornith. II. p. 357. tab. 35. f. 3.
Woond in Europa.

Bonte 21 Vliegenvanger, die bruin is, het
(*Variegata*.) voorhoofd en ligchaam van
onder, en de stuit, wit.
Woond in Indien.

Gerande (G) Vliegenvanger, die bruin is,
Iste. Deels IIde Stuk. Ee de

de randen der dekvederen
 wit, de keel en hals graauw,
 de buik geel, de drie mid-
 delste slagpennen, ende mid-
 delste stuurveêr rood. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 571. 1. *Petit*
Tyran.

Woond in Cayenne.

Purperkeel (H) Vliegenvanger, die zwart is,
 met een purpere keel, BUFF.
Hist. Nat. Ois. 381.

Woond in Cayenne.

Bruine (I) Vliegenvanger, die bruin is, van
 onder bleeker. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 568. 2.

Woond in Martinique.

Zwartkaak (K) Vliegenvanger, die de rug bleek
 zwart heeft, de stuurvederen
 zwart, als ook de vleugels,
 doch met een witte band, de
 kruin caneel coleurig, met
 een witte rand, de borst bruin,
 de keel en buik wit. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 567. 1.

Woond in Senegal.

VLEI-

Fraaye (L) Vliegenvanger, die zwart is,
met een witte band om de
kop, en op de vleugelen, de
borsten buik wit. *Buff. Hist.*
Nat. Ois. 567. 2.
Woond in Senegal.

Blaauwrug (M) Vliegenvanger, die van boven
blauw is, de keel bruin met
een zwarte rand, de vleu-
gels zwart, met een witte
band, de stuurvederen zwart;
doch de twee buitenste wit,
de buik wit. *Buff. Hist. Nat.*
Ois 567. 3.
Woond in Senegal.

Bruine (N) Vliegenvanger, die bruin is,
van onder wit, met een wit-
te vlak op de vleugels. *Buff.*
Hist. Nat. Ois. 565. 2. 3.
Woond in Europa.

Blaauwbuike (O) Vliegenvanger, die aschgrauw
is, de kop zwart, de buik
blauw.
Woond in Madagascar.

Groenkeel (P) Vliegenvanger, die ros bruin is,
E e 2 met

met eenen zeer langen staart,
de kuif, keel, krop en borst
groen; de buik aschgrauw.

BUFF. *Hist. Nat.* 573. 2.

Woond in Senegal.

Groenkuif (Q) Vliegenvanger, die ros bruin is,
met een groene kuif en keel,
de borst aschgrauw.

BUFF. *Hist. Nat.* 573. 2.

Woond op 't Eiland Bourbon.

Oranjeborst (R) Vliegenvanger, die donker
bruin is, de borst oranje
bruin, de buik aschgrauw.

BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 574. 1.

Woond in Cayenne.

Oranje kuif (S) Vliegenvanger, die bruin is, met
een oranje kuif, en twee oker-
geele banden op de vleugelen.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 574. 3.

Woond in Cayenne.

Groene (T) Vliegenvanger, die groen is, met
Zwartkruin een zwarte kruin, bruine
borst en geele buik. BUFF.

Hist. Nat. Ois. 574. 2.

Woond in Cayenne.

KWIK.

CXIV. KWIKSTAERT. De *bek* elsgewyze recht,
(*MOTACILLA.*) met even groote *kaak*-
beenderen.

De *Neusgaaten* eirond.

De *tong* gescheurd en
uitgerand.

Nagtegaal 1 KWIKSTAERT, die rosagtig afch-
(*Luscinia.*) graauw is, met afchgraauwe
kniebanden *.
Woond in Europa.

Hangneft 2 KWIKSTAERT, van boven groenag-
(*Caledris.*) tig bruin van onder rosgeel,
met een zwarte ftreep onder
en boven de oogen. EDW.
Birds. III. 121. fig. 2.
Woond in Jamaica.

Zanger 3 KWIKSTAERT, die van boven grys
(*Modularis.*) bruin is, de dekvederen der
vleugelen aan de punten wit,
de borst blaauwagtig afch-
graauw.
Woond in Europa.

Bies Nagte- 4 KWIKSTAERT, die roodagtig bruin
Ee 3 is,

gaal
(*Schoenoba-*
nus.

is, van onder bleekrood, de
kop gevlaakt.

Woond in Europa.

Veld Nagte-5 KWIKSTAERT, die grys is, met een
gaal
(*Campestris.*)

groene afchgrauwe kop, de
stuurvederen alle van eene
couleur, de buik witagtig.

EDWARDS *Birds*. III. 122. fig 2.

Woond in Jamaica.

Bastardnag- 6 KWIKSTAERT, die van boven bruin
tegaal
(*Curruca.*)

is, van onder wigtagtig, met
bruine stuurvederen, d bui-
tenste met een dun witrandje.

Woond in Europa.

(*Hippolais.*) 7 KWIKSTAERT, die groenagtig afch-
grauw is, van onder geel-
agtig, de leeden bruin, de
wenkbraauwen witagtig.

Woond in Europa.

Riet Nagte-8 KWIKSTAERT, die afchgrauw is,
gaal
(*Salicaria.*)

van onder wit, met witte
wenkbraauwen. ALBIN. *Ois.*

III. 26.

Woond in Europa.

KWIK.

Sylvia 9 KWIKSTAERT, die van boven asch-
(*Sylvia.*) graauw is, van onder wit,
de eerste stuurveer in de
lengte half wit, de tweede
wit aan de punt. BRISS. *Or-*
nith. III. p. 376. tab. 21. f. 1.
Woond in Europa.

Vygeneeter 10 KWIKSTAERT, die wat bruin is,
(*Ficedula.*) van onder wit, de borst asch-
grauw gevlaakt.
Woond in Europa.

Witte 11 KWIKSTAERT, met een zwarte borst,
(*Alba.*) de twee zylingfche stuurve-
deren ter helfte in de schuinte
wit. ALBIN. *Ois.* I. 49.
Woond in Europa.

Geele 12 KWIKSTAERT, [die groenagtig is]
(*Flava.*) de borsten buikgeel, de twee
zylingfche stuurvederen ter
helfte, in de schuinte, wit.
BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 28. 1.
Woond in Europa.

Gryze (A) KWIKSTAERT, die grys is, de keel
zwart, de borst en buikgeel,
Ee 4 de

de vleugels bruin, de buitenste stuurvederen wit. EDW. *Glean.* I. tab. 259. *the grey water wagtail.*

Woond in America.

Bengaalsche 13 KWIKSTAERT, die groen is, van
Vygeneter onder geelagtig, de vleugels
(*Tiphia.*) zwart met witte banden.

EDW. *Birds.* II. tab. 79.

Woond in Bengale.

Bruine 14 KWIKSTAERT, die roestcoleurig is;
(*Stapazina.*) de vleugels, staart en plaats
der oogen bruin, de buitenste stuurvederen ter zyden
wit. EDW. *Birds.* I. tab. 31.

Woond in Italien, Spanje.

Witgatje 15 KWIKSTAERT, met een graauwe
(*Oenanthe.*) rug, een wit voorhoofd, een
zwarte band om de oogen.

(b) *Kwikstaert*, die van onder bleek is, de stuurvederen aan de binnenzijde wit; de rug gegolfd.

BRISS. *Ornith.* III. p. 452.
tab. 21. fig. 2.

Woond in Europa.

KWK-

Noordsche 16 KWIKSTAERT, die zwartagtig is,
(*Rubetra.*) met witte wenkbraauwen,
en een witte vlak op de
vleugelen, de borst en keel
geelagtig BRISSON. *Ornith.*
III. pag. 432. tab. 24. 1.
Woond in Europa.

Rosbuik 17 KWIKSTAERT, die grys is, van on-
(*Rubicola.*) der rosagtig, de keel met een
witte band, en zwarte toom-
streepen.
Woond in de heggen in Eu-
ropa.

Zwartkap 18 KWIKSTAERT, die bleekrood is, van
(*Atricapilla.*) onder aschgrauw, met een
zwartagtige kruin.
Woond in Europa.

Penfylvani- 19. KWIKSTAERT, met een geelagtige
sche kruin, en bloedroode zyden,
(*Penfylvani-* [de keel en eerste stuurvede-
ca) ren van binnen wit.] EDW.
Glean. II. 301.
Woond in Penfylvanien.

Goudvlerk 20 KWIKSTAERT, die bruin is, van on-
(*Chrysopte-* der wit, de kruin en vlak op
Ee 5 de

ra.)

de vleugelen geel, de keel
zwart. Edw. *Glean.* II. 299.
Woond in Pensylvanien.

Gekroonde 21 KWIKSTAERT, die zwart gevlaakt
(*Coronata.*) is, de kruin, zyden en stuit
geel. Edw. *Glean.* II. 298.
Woond in Pensylvanien.

Van Senegal 22 KWIKSTAERT, die bruin is, de roei-
(*Senegalen-* pennen van binnen ros, de
sis.) stuurvederen zwart, met wit-
te punten.
Woond in Senegal.

Gemengelde 23 KWIKSTAERT, die wit en zwart
(*Varia.*) bont is, met twee witte ban-
den op de vleugelen, de staert
gespleeten. Brisson. *Ornith.*
III. p. 529. tab. 27. f. 5.
Woond in Jamaica, St. Do-
mingo.

Kaapsche 24 KWIKSTAERT, die bruin is, van on-
(*Capensis.*) der witagtig, met een bruine
borstband, witte wenkbrau-
wen, de zylingfche stuurve-
deren schuin sch wit. Burr.
Hist. Nat. Ois. 28. 2.
Woond aan de Kaap.

KWIK-

Geelkop 25 KWIKSTAERT, die grys is, van onder witagtig, de kruin geel, de oogband zwart, en twee geele banden op de vleugels. BRISS. *Ornith.* III. p. 517. tab. 27. f. 2.
Woond in Canada.

van St. Domingo 26 KWIKSTAERT, die aschgrauw is, van onder wit, een geele vlak voor, een witte agter, en een zwarte onder de oogen. BRISS. *Ornith.* III. pag. 520. tab. 27. f. 3.
Woond in Jamaica, St. Domingo.

van Canada 27 KWIKSTAERT, die aschgrauwagtig is, van onder wit, de kruin en band om den buik geel, de borst bruin gevlakt. BRISS. *Ornith.* p. 524. tab. 27. f. 1.
Woond in Canada.

van Madagafcar 28 KWIKSTAERT, die groenagtig is, van onder witagtig, de keelen aers geel, de oogleden wit.
Woond in Madagafcar.

KWIK-

Goudkop 29 KWIKSTAERT, die olyfgroenis, van
 (*Aurocapil-* onder wit, de kruin goud-
la.) geel, de wenkbraauwen
 zwart, de borst met zwart
 gevlaakt. EDW. *Glean.* I. 252.
 Woond in Pensylvanien.

Gemazelde 30 KWIKSTAERT, die olyfcoleurig is,
 (*Petechia.*) van onder geel, met rood
 gestipt, de kruin rood. EDW.
Glean. II. tab. 206. 2.
 Woond in Noord America.

Witborst 31 KWIKSTAERT, die aschgrauw bruin
 (*Dumeto-* is, met een blaauwagtige
rum.) kop, de keel en borst wit.
 Woond in Europa.

Kanneelee- 32 KWIKSTAERT, die gryis is, van on-
 ter der rood, de keel zwart, de
 (*Cinnamo-* vier eerste roeipennen aan't
mea.) begin rood,
 Woond in Ceylon.

Zwarte 33 KWIKSTAERT, die zwart is, de stuit
 (*Caprata.*) en dekvederen der staart en
 der vleugelen wit. BUFFON.
Hist. Nat. Ois. 235. 1. *Tra-*
quet.

Woond

Woond in het Eiland Luçon.

Muurnagte- 34 KWIKSTAERT, met eene zwarte keel,
gaal de buik en staart ros, de kop
(*Phoenicurus*. Buffon. *Hist.*
Nat. Ois. 351. 1.) en rug grys.

(b) *Kwikstaart* met zwartagtige slagpennen, het middelste paar zwart, van buiten ros.

NB. Volgens de afbeelding van BUFFON is het wyfje van boven groenagtig bruin, van onder zwavel geel, de fluurpennen ros.

Woond in Europa.

Roodstaart 35 KWIKSTAERT, met eengraauwe rug
(*Eritacus*) en slagvederen, de buik en
fluurvederen ros, de twee
buitenste afchgrauw.

Woond in Europa.

Guira 36 KWIKSTAERT, die groen is, van
(*Guira*.) onder geel, de koonen en
keel zwart, met een geele
rand. Edw. *Glean.* III. 352.
fig. 2.

Woond in Brazil.

KWIK-

Blaauwborst 37 KWIKSTAERT, met een roestverwi-
 (Succica.) ge borst met een blaauwe
 band, de stuurvederen bruin,
 aan hun begin roestverwig.
 EDW. *Birds* I. 28.
 Woond in Europa.

Blaauwbrug 38 KWIKSTAERT, die van boven blaauw
 (Sialis.) is, van onder geheel rood;
 de buik wit. EDW. *Birds*. I.
 24. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 396.
 Woond in de Bermudische
 Eilanden.

Philippyn- 39 KWIKSTAERT, die zwartagtig vio-
 sche let is, met castanje bruine
 (Fulicata.) dekvederen der staart, de
 vlak der dekvederen op de
 vleugelen wit. BRISS. *Or-
 nith.* III. p. 444. t. 23. f. 2.
 Woond in de Philippynsche
 Eilanden.

van Cayenne 40 KWIKSTAERT, die blaauw is, de
 (Cayana.) halster, schouders, vleuge-
 len en staart zwart. BRISS.
Ornith. III. p. 534. t. 28. f. 1.
 Woond in Mexico.

KWIK-

- Surinaam- 41 KWIKSTAERT, die blaauw is, de
fche buik en stuit oranje. Edw.
(*Velia.*) *Birds.* I. 22.
Woond in Suriname.
- Van Canada 42 KWIKSTAERT, die van boven blaauw
(*Canadensis.*) is, van onder wit, de keel,
vleugels en staart zwart. Edw.
Glean. I. 252. 1.
Woond in Canada.
- Blaauwe 43 KWIKSTAERT, die van boven blaauw
(*Coerulea.*) is, van onder wit, met een
zwarte staart en vleugels.
Edw. *Glean.* I. tab. 252. 1.
Woond in America.
- Zingende 44 KWIKSTAERT, die zwartagtig is,
(*Sibilis.*) van onder wit, de borstros,
een witte vlak op de vleugels.
BRISS. *Ornith.* III. pag. 439.
tab. 24. f. 4.
Woond in Madagascar.
- Roodborstje 45 KWIKSTAERT, die grys is, met
(*Rubecula.*) een roestcoleurige keel en
borst.
Woond in Europa.
- Gegolfde 46 KWIKSTAERT, die grys is, de vleu-
gels

(*Troglodytes.*)

gels uit zwart en aschgrauw gegolfd. ALBIN. Ois. I. tab. 53. B.

Woond in Europa.

Groen-geele 47 KWIKSTAERT, die aschgrauw groen
(*Calendula.*)

is, met een gloeyend geel streep op de kruin, de buik en vleugels van onder geelagtig. EDW. Glean. II. 254. 2.
Woond in Pensylvanien.

Winterko- 48 KWIKSTAERT, die de tweede rey
ningje
(*Regulus.*)

slagveeren aan den buiten rand geel heeft, en in het midden wit; de kruin geel. CATESB. Carol. III. tab. 3.
Woond in Europa [en America.]

Kleine 49 KWIKSTAERT, die aschgrauw groen
(*Trochilus.*)

is, de vleugels van onder en aan de dekvederen geelagtig, de wenkbraauwen geel.
Woond in Europa, Asia, en America.

(B) KWIKSTAERT, die van boven bruin
de

de kruin en oogkringen geel,
de borst rood, de buik geel,
en een witte vlak op de vleu-
gelen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
58. 3.

Woond . . . . .

Driecoleuri-(C) KWIKSTAERT, die van boven
ge zwart, van onder wit is, de
zyden en het begin der stuur-
pennen geel, en vyf geele
vlakken op de vleugels.
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 391. 2.
Woond in Cayenne.

Bontkuif (D) KWIKSTAERT, die groen is, van
onder geel, de kuif uit wit
en bruin gemengeld. BUFF.
Hist. Nat. Ois. 391. 1.
Woond in Cayenne.

CXV. MANAKIN. De *bek* korter dan de kop,
(PIPR.) aan zyn begin wat drie-
hoekig, zeer geheel, wat
krom aan de punt.

Drie voor en een agter *Vinger*.

Iste. Deel IIde Stuk. Ff MA-

Rotshaan 1 MANAKIN, met een [zamengedruk-
 (*Rupicola.*) te] regt opstaande oranje
 kuif met een purpere rand,
 het lichaam oranje geel, de
 dekvederen der slagpennen
 geknot *. EDW. *Glean.* II.
 tab. 264. fig. 2. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 39. VOSM. *Beschr.*
 Woond in America.

Tye 2 MANAKIN, met een bloedroode
 (*Pareola.*) kuif, een zwart ligchaam en
 blaauwe rug. EDW. *Glean.* I.
 tab. 261. 1.
 Woond in Brasil en Cayen-
 ne.

Gekuifde 5 MANAKIN, met eene geele kuif,
 (*Cristata.*) en purper ligchaam.
 Woond in Brasil.

Geelkuif 4 MANAKIN, met een geele kuif, en
 (*Rubetra.*) een bleekrood lichaam; met
 blaauwe roei-en stuurvede-
 ren.
 Woond in America.

Witkol 5 MANAKIN, met een witte kuif, een
 (*Albifrons.*) bleek roodligchaam, en een
 zwarte

zwarte rug. EDWARDS. *Glean.*
tab. 344.
Woond . . . . .

Roodkop 6 MANAKIN, die zwart is, met geele
(*Erythroce-* kniebanden en kop. BUFF.
phala.) *Hist. Nat. Ois.* 34. 1.
(b) Roodkop PALL. *Spicil.*
Zool.
Woond in Brasil.

Roode 7 MANAKIN, die zwart is, met een
(*Aureola*) roode kop en borst, de stuur-
vederen van vooren met een
witte vlak. EDW. *Glean.* II.
tab. 261.
(b) Zwart en oranje. EDW.
Birds. II. 83.
Woond in Zuid America.

Witkop 8 MANAKIN, die zwart is, met een
(*Leucocephala.*) witte kop*. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. 34. 2.
Woond in Suriname.

Witkruin 9 MANAKIN, die zwart is, met eene
(*Leucocilla.*) witte kruin. BRISS. *Ornith.*
IV. p. 446. tab. 35. fig. 2.
Ff 2 Woond

Woond in Brasíl, Suriname.

Witkeel 10 MANAKIN, die zwart is, meteene
(*Gutturalis.*) witte keel. BUFF. *Hist. Nat.*
Ois. 324. 1.
Woond in America.

Fraaye 11 MANAKIN, die zwart is, met een
(*Serena.*) blaauwe stuit en oranje
buik *. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
324. 2.
Woond in Cayenne en Suriname.

Withals 12 MANAKIN, die zwart is, van on-
(*Manacus.*) der wit, de vlak op de nek
en op de vleugels wit *. EDW.
Glean. II. 260. BUFFON. *Hist.*
Nat. Ois. 302. 1.
Woond in America.

Kleine 13 MANAKIN, die grys is, de kop wit
(*Minuta.*) en zwart gestippeld *.
Woond in Indien.

Roode (A) MANAKIN, die zwart is, de kop,
borst en buik rood, de keel
en

en schouders geel. BUFF.
Hist Nat. Ois. 34. 3.
 Woond in America.

Zwartkop (B) MANAKIN, die wit is, de kop,
 rug, vleugels en staart zwart.
 BUFF. *Hist. Nat Ois.* 303. 1.
 Woond in America.

Gekuifde (C) MANAKIN, die groen is, met ee-
 ne afhangende bloedroode
 kuif. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.*
 303. 2.
 Woond in America.

CXVI. MEES. De *bek* zeer geheel, [klein elsge-
 (PARUS.) wyze] aan het begin met bor-
 stels gedekt.

De *Tong* geknot, en met bar-
 stels eindigende.

[De *Neusgaaten*, door de vederen
 van den grond der bek be-
 dekt.]

Twecoleu- i MEES, met een gekuifde kop, die
 rige van vooren zwart is, een
 Ff 3 afch-

(Bicolor.)

afchgrauw ligchaam , van
 onder rosagtig wit. CAT.
Carol. I. tab. 57.

Woond in Noord America.

Gekuifde

2 MEES, met een [zwart en wit] ge-
 kuifde kop, een zwarte hals-
 band, en witte buik [het
 ligchaam groenagtig]

(Cristatus.)

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 502. 2.
 Woond in Europa.

Plakker

3 MEES, met een zwarte kop, witte
 flaapen en eene geele nek.

(Major.)

ALBIN. *Ois.* I. p. 44. tab. 46.
 Woond in Europa, des zo-
 mers veel in Spanje.

Blaauwkuif (A) MEES, met een blaauwe kuif, wit-
 te flaapen, zwarte keel, groen
 ligchaam, klaauwe vleugels,
 en geele buik. BUFF. *Hist.*
Nat. Ois. 3. f. 2.

Woond in Europa.

Americaan 4 MEES, die blaauwagtig is, met
 fche geele flaapen, buik en rug,
 de

- (*Americanus.*) de zyden purperagtig. CAT. I. tab. 64.
Woond in Noord America.
- Blaauwe 5 MEES, met blaauwagtige ftuurvederen, de eerſte aan de buitenrand wit, het voorhoofd wit, de kruin blaauw. ALBIN. *Ois.* I. tab. 47.
(*Coeruleus.*) Woond in Europa.
- Zwartkop 6 MEES, met eene zwarte kruin en keel, een afchgrauw lichaam, dat van onder wit is. BRISS. *Ornith.* III. pag. 553. tab. 29. f. 1.
(*Atricapillus.*) Woond in Canada.
- Koolmees 7 MEES, met een zwarte kop, en afchgrauwe rug, het agterhoofd en borſt wit. BUFFON. *Hift. Nat. Ois.* 3. 1.
(*Ater.*) Woond in Europa.
- Riet Mees 8 MEES, met een zwarte kop, een afchgrauwe rug, en witte
(*Palustris.*) Ff 4 flaa-

flaapen. BUFFON. *Hist. Nat.*

Ois. 3. 3. *Nonette.*

Woond in Europa.

NB. In de afbeeldingen van deze
plaat is eene feil, zynde N, 3.
voor No. 1. gesteld en No. 1.
voor No. 3.

Virginiaan- 9 MEES, met een geele stuit en asch-
fche graauw ligchaam. CATESB.

(*Virginianus.*)

Carol. tab. 58.

Woond in Noord Ameri-
ca.

Vreemde 10 MEES, met een roode stuit, en
(*Peregrinus.*) een aschgrauw ligchaam, dat
van onder wit is.

Woond in . . . . .

Staertmees 11 MEES, met een witte kruin, [een
(*Caudatus.*) zwarte band over de oogen,

en langs den hals, het lig-
chaam okergeel,] de staart
langer dan het ligchaam, [de
drie eerste stuurvederen

wit.]

wit.] BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
502. 3.
Woond in Europa.

Baardman- 12 MEES, met eenegraauwekruin, de
netje staart langer dan het lig-
(*Biarmicus.*) chaam, de kop gebaard.
EDW. *Birds.* II. 55.
Woond in Europa.
NB. Dit is een Klaauwier.

Remiz 13 MEES, met een wat roestcoleu-
(*Pendulinus.*) rige kop, een zwarte oog-
band, bruine vleugels en
staart, beide met roestco-
leurige randen. ALBIN. *Ois.*
III. p. 53. tab. 59.

Witbek 14 MEES, die zwart is, met een wit-
(*Cela.*) te bek, de vlak op de vleugels
en het begin der staart geel.
Woond in Indien.

CXVII. ZWALUW. De *bek* zeer klein, krom,
(HIRUNDO) elsgewyze, aan het be-
gin plat.

De *gaping* grooter dan de kop.

- Boerezwa- 1 ZWALUW, met een witte vlak op
luw de ftuurvederen , behalven
(*Rufica.*) op de twee middelste. AL-
BIN. *Ois.* I. p. 43. tab. 45.
Woond in Europa.
- Capus 2 ZWALUW, met een witte vlak op
(*Esculenta.*) alle de ftuurvederen. BRISS.
Ornith. II. pag. 510. tab. 46.
fig. 2.
Woond in Europa.
- Stadszwa- 3 ZWALUW, met ongevlakte ftuurve-
luw deren, de rug zwartagtig
(*Urbica.*) blaauw, van onder geheel
wit. ALBIN. *Ois.* II. tab.
56. fig. A.
Woond in Europa.
- Strand-Zwa-4 ZWALUW, die afchgraauw is, met
luw eene witte keel en buik.
(*Riparia.*) BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 543. 2.
Woond in Europa.
- Langvleugel5 ZWALUW, die zwartagtig is, met
eene

(*Apus.*) eene witte keel, alle vier de vingers naar vooren. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 542. 1. *Martinet.*

Woond in Europa.

Purpere 6 ZWALUW, die geheel violet is, met
(*Purpurea.*) een gespleeten staart. CAT. *Carol.* I. I. tab. 51.

Woond in Noord America.

Blaauwe van 7 ZWALUW, die zwartagtig blaauw is,
Canada de bek en het onderlyf asch-
(*Subis.*) graauw wit. EDW. *Birds.* III. 120. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 545. 2.

Woond aan Hudsons Baay.

Van Senegal 8 ZWALUW, die glanzig zwart is,
(*Senegalen-* van onder ros. BUFFON. *Hift.*
sis.) *Nat. Ois.* 310.

Woond in Senegal.

Tapera. 9 ZWALUW, met gelyke stuurvederen,
(*Tapera.*) een zwartagtig ligchaam, onder wit. BRISS. *Ornith.* II. p. 502. tab. 45 f. 3.

Woond in America.

ZWA-

Puntstaart 10 ZWALUW, met gelyke stuurvederen, met naakte elsgewyze punten, [het ligchaam zwart-agtig van onder ros. BUFF. *Hist. Nat Ois.* 544. 1.
Woond in Martinica.

Bruine 11 ZWALUW, die bruin is, met een witte keel en buik. EDW. *Birds.* I. 27.
Woond te Cadix.

Zee Zwaluw 12 ZWALUW, met halv naakte dyen. (*Praticola.*) BRISS. *Ornith.* V. pag. 141. tab. 12. fig. 1.
Woond in het Zuidlyke van Europa aan de Stranden.

Americaan- (A) ZWALUW, die van boven blaauw fche is, van onder vuil wit, de kop, keel en borst bruin. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 545. 1.
Woond in America.

Blaauwrug (B) ZWALUW, die de kop en halve rug blaauw heeft, de vleugels en staart zwart, van onder wit, de vingers alle vier

vier naar vooren. BUFFON.
Hist. Nat. Ois. 542. 2. *Martinet.*

Woond . . . . .

Roskeel (C) ZWALUW, die blaauw is, met
 een roffe keel, bruine borst,
 en witte buik *. BUFFON.
Hist. Nat. Ois. 543. 1.
 Woond in Europa.

Donkere (D) ZWALUW, die roodagtig zwart
 is, van onder ligter, met
 zwarte langwerpige vlak-
 ken. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
 544. 2.
 Woond op het Eiland Bour-
 bon.

Gevlakte (E) ZWALUW, die zwart is, van on-
 der wit, met zwarte vlak-
 ken. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*
 546. 1.
 Woond in Cayenne.

Bonte (F) ZWALUW, die blaauw is, met
 witte dekvederen, en zwar-
 te roeipennen van onder
 wit.

wit. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.*

546. 2.

Woond . . . . .

CXVIII. GEITENMELKER. De *bek* maatig krom,
(CAPRIMULGUS.)   zeer klein, elsge-

wyze, en aan zyn
begin plat.

De *Knevelharen* op
eene rei, als oog
haren.

De *gaping* zeer
wyd.

De *Tong* puntig en
zeer geheel.

Europifche GEITENMELKER, die bruin is, met
(*Europaeus.*)   ros wit en zwart gevlakt,

een witte vlak op de *fluur-*
vederen; de kop zwartag-
tig. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.*

193.

Woond in Europa en Ame-
rica.

Americaan- 2 GEITENMELKER, die ligt geel is,
met.

fche
(*America-*
nus.)

met roffe, roode, en brui-
ne vlakken, de oogkringen
geel, de ftaart met zwavel
coleure banden, van onder
wit. BUFFON. *Hift. Nat. Ois.*
325.

Woond in America.

Einde van het I. Deel's, IIde Stuk.

DRUK-

DRUKFOUTEN aldus te verbeteren.

bladz.

- 99 reg. 17 voor haar vederen *lees* *stuurvederen* wier
middelste
- 100 — 4 agter gestipt zyn ; *l.* de borst ros.
— — 10 roefte *l.* roeft.
- laatste van binnen *l.* aan de binnen kant
- 101 — 5 agter was te *voegen* gepluimde.
- 102 — 9 — buik *l.* de rug blaauwachtig zwart.
— — 22 *voeg by*, Woond in Europa Africa.
- 104 — 9 13 *l.* 15
— — 23 *Tinunculus l. Tinnunculus.*
- 109 — 8 onder kleine te *voegen*, minutus
— — 13 met een ros lichaam *l.* met hoorens
- 100 — 8 onder Americaanfche *voeg Afio*
- 116 — 21 onder langstaart *l. Macrourus*
- 117 — laatste 5 *l.* 9.
- 120 — laatste Senegal *l. Madagascar.*
- 122 — puper *l.* purper
- 126 — groenen *l.* roey en
- 132 — 9 roestwervige *l.* roestverwige
- 132 — 12 staart *l.* straat.
- 134 — 4 *lees* kortstaartige Papegaay die groen
is.
- 139 — 18 *lees* kortstaartige Papegaay die gèel is.
- 146 — 2 onder goudvlek *l. Crysopterus*
- 148 — 15 onder Toucan *l. Ramphastos,*
- 154 — 8 *oscon l. icon.*
- 156 — 14 rood *l.* rond
- 159 — 12 13 *l.* 14
- ibid. — 17 14 *l.* 15
- 160 — 3 15 *l.* 16
- 161 — 20 14 *l.* 17
- ibid. — 21 *pyrocorax l. pyrrhocorax*
- 162 — 13 *lees* de bek mesvormig
- 166 — 14 staart *l.* stuit,

bladz.

D R U K F O U T E N.

bladz.

- 171r eg. 13 eene vlak l. wittevlak
173 — 15 stuur l. roeypenen
171 — 17 te plaatzen Woond in Carolina
181 — 3 met drie vingeren, l. de pooten met
drie vingeren
189 — 21 voor dezelve in te voegen: Woond in
Perfien in
Egypten.
210 — 7 gevleesde l. gevliesde.
ibid. — 18 naregel 18te voegen Woond Europa
en Noord Ame-
rica.
211 — 13 *Sadonna l. Tadoran*
233 — agter de Noordsche gans, by te voe-
gen, Roodpoot, Eend dat aschgrauw
is, met een wit voorhoofd,
Woond in Europa, noord America.
120 — 9 voor groene stuurpenen, l. de twee-
de royvede-
ren groen.
225 — 22 voor stuurvederen lees roeivederen.
232 — 23 *fou, de Boffan l. fou de Bassan.*
138 — 3 lichaam onder l. van onder
247 — 18 opgewept l. opgewipt.
250 — 15 gepeteld l. getepeld.
251 — 16 *Zool. p. fasc. l. Zool. fasc. 2.*
261 — 21 letter B l. letter A
265 — 4 *Laeponiea l. Lapponica.*
293 — 24 ADANSAN l. ADANSON.
304 — 12 gerandde l. gerondde.
314 — 12 Malocnasche l. Maloinsche
320 — 4 gepalmde l. gepluimde
340 — 22 Corolina l. Carolina.
348 — 25 273 1 l. 2
356 — 25 BRUNETHE l. BRUNNICHE
1ste Deel IIde Stuk. G g

RECEIVED

1871
1872
1873
1874
1875