271

La concordance avec le Codex de Linneé a été faite par A. De Vos, botaniste à Liège
Inscrite à l'Index de Pritzel.

Avril 1873

A. De Vos

L. A. K. n. 1. C. 172.

JOANNES BURMANNUS Med: Doct:
Botan: Profess: Amstelæd: anno aetatis trigesimo.

Non haec effigies BURMANNI sculpta sed ipsum
Arte Promethea vivere in aere vides.
Talis Paeoniis meditatur pellere morbos
Viribus, aut laetas Chloridos auget opes.
His oculis proavi, genitorque hac fronte reident.
Nil non egregiae pignora gentis habet.
Gaudeat Amstelidum longos Hygiea perannos
Huic tabulae carum composuisse caput.

JAC. PHIL. D'ORVILLE

THE SAURUS
ZEYLANICUS,

exhibens

PLANTAS IN INSULA ZEYLANA NASCENTES,

Inter quas

Plurimae novae species, & genera inveniuntur.

Omnia Iconibus illustrata, ac descripta

C U R A & S T U D I O

JOANNIS BURMANNI,

Med. Doct. & Botanices Professoris in Horto Medico Amstelaelamensi.

A M S T E L A E D A M I,

Apud { JANSONIO-WAESBERGIOS,

&

{ SALOMONEM SCHOUTEN.

M D C C X X X V I I.

Mo. Bot. Garden,
1893

ILLUSTRISSIMIS & AMPLISSIMIS

INCLYTAE REIP.

AMSTELAEDAMENSIS

CUM MAXIME

CONSULIBUS

JOANNI VAN DE POLL,

JOANNI SIX,

LIEVE GEELVI NK,

GUILIELMO MUNTER,

ET CONSULARIBUS

NICOLAO SAUTYN,

ÆGIDIO VAN DEN BEMPDEN,

MATTHEO LESTEVENON,

GERARDO CORVER,

BALTHAZARI SCOTT,

DIDERICO TRIP,

PATRIAE PATRIBUS,

CIVIUM DELICIIIS,

BONARUM ARTIUM PATRONIS,

HORTI MEDICI CURATORIBUS,

S. P. D.

JOANNES BURMANNUS.

Sollicitus diu, dubiusque animi haesi, an nominibus vestris tam splendidis, quam magnificis, & honoratis Opusculum hoc quaecunque auderem inscribere; Animo autem mecum reputans, VIRI AMPLISSIMI & NOBILISSIMI, vos non tantum bonarum artium fautores, & vindices esse, sed & instauratores, curatoresque Horti nostri publici, qui tam copiose & ornate instructus est, ut parem sibi vix ullum agnoscat, nulli alii dignius hoc quaecunque scriptum offerri posse, aut inscribi, quam VESTRIS NOMINIBUS persuasum mihi habeo, ut qui maxime: Unde & publice obstrictissimum me vobis profiteri pro tot tantisque in me collatis beneficiis, quibus me tanto favore, & honore prosequi dignati fuistis, hac occasione debui & volui, ut & porro certi esse possitis, provinciam hanc, quam mihi credidistis, non ingrato, nec indigno prorsus, ut spero, demandatam fuisse. Omnia vero, quae tum temporis in hisce profeceram, publice id enim profiteri

D E D I C A T I O.

non erubescō , unice me Batavo illi Apollini ,
Hermanno nempe Boerhavio, cujus testimonio & impul-
 su me , vix tyrocinio studiorum in Academia depo-
 sito , ad hunc gradum evexistis , acceptum referre
 fateor , & grato id semper animo agnoscam. Ut
 interim vobis appareat , mihi , ex quo huic Spartae
 admotus fui , non desidi in otio , aut ignavo tor-
 pore tempus effluxisse , VIRI NOBILISSIMI & AM-
 PLISSIMI , hae paginae vos certiores facere , ut puto ,
 valebunt , quod si vobis approbavero , erit , quod
 mihi calcar addet ad majora etiam tentanda , ut &
 famam illam , quam per decessores meos doctissi-
 mos & celeberrimos Hortus vester Medicus in toto
 terrarum orbe obtinuit , non tantum conservare ,
 sed & eam ulterius propagare possim. Interim scrip-
 tum hoc tanquam obsequiosi ; ac grati erga vos ani-
 mi pignus ac monumentum habete , & suscipite.

Valete , VIRI ILLUSTRES & AMPLISSIMI ,
 Patriae Patres , ac Literarum egregii custodes , ac
 vindices : & in publicae rei decus & columen diu
 felices , ac superstites agite , nostrisque his labori-
 bus favere , universaeque bonarum artium saluti
 porro consulere velitis , etiam atque etiam oro.

Æquis

Aquis, & Rei Herbariae studiosis Lectoribus

S. D.

JOANNES BURMANNUS.

xhibeo vobis, L. B. elegantissimam rariorum plantarum in insula Zeylana nascentium Syllogen, quae ex plurimis auctoribus, qui has plantas commemorarunt, vel de iis ex professo egerunt, nec non ex Herbariis vivis collecta est. Vulgares, & plures aliae vilioris pretii sine dubio supersunt, sed quae non magni erunt momenti, earum vero praecipuas pro specimine, quae Operi ipsi non ita apte interponi poterant, ex optimo illo scriptore *Grimmio*, hic ut loco maxime idoneo inseram: Qui postquam distincte variarum plantarum virtutes, praeparationes ex iis, & usus Medicos in *Laboratorio suo Ceylanico* descripserat, haec sub finem pag. 113. addit.

„ Superest nobis adhuc magna quantitas Herbarum, tam in hortis, quam in sylvis. &c. Ego vero nomina earundem subjiciam; sunt autem, quae sequuntur: Asclepias, Auricula Muris, Acetosa, Acetofella, Arthemisia, Asparagus sylvestris, Bardana minor, Basilicon, Caryophyllus hortensis, Cistus, Conyza, Cichoreum, Colocasia, Curcuma, Dracunculus minor, Dracontium, Endivia, Filix cum maxima parte generum ab isto dependentium, Foeniculum, Faba, cujus innumerae sunt variae species, Gentianella, Glycyrrhiza, Hedera terrestris, Kali, Lactuca, Lingua Cervina, Lonchitis, Arbor ex qua Lacca provenit, Laser, e qua Assa Foetida, Malva, Matricaria, Myrtus Indica, Nepeta, Nasturtium, Petroselinum, „ Por-

„ Portulaca , Pimpinella , Persicaria , Ros Solis , Rosmarinus ,
 „ Ruta , Scabiosa , Scilla , Selinum , Semper Vivum , Triorchis ,
 „ Trifolia , Verbena *Bontii* , Veronica *Bontii* , Urticae varia ge-
 „ nera &c. Quibus porro addit : „ hac in re praestantissimus est
 „ Dominus Doctor noster *Paulus Herman* , non secus ac in
 „ cognitione aliorum naturalium , nec dubito , quin suo tempore
 „ nobis praebeat occasionem , aliquid extraordinarium ab eo re-
 „ cuperandi.

Sed dolendum est , quod vir ille in hisce versatissimus , & Aca-
 demiae Lugd. Batavae summum postea Lumen , propositum suum
 exsequi haud potuerit ; Ille enim aliquot per annos insulae Zeyla-
 nae Medicus oportunam ibi nactus est occasionem omnia , quae
 ad forum hoc spectant , detegendi , indagandi , & perscrutandi ,
 horumque observatorum experimenta annotandi , ut sedulus etiam ,
 & accuratissimus harum rerum investigator fuit , quod non tantum
Hortus Lugd. Batavus ab eo conscriptus , & *Paradisus Batavus*
 post fata ejus in lucem publicam emissus docent , sed maximus
 insuper plantarum numerus ad amicos , dum adhuc in insula Zey-
 lana versabatur , transmissus liquido ostendit : harum autem om-
 nium , si vitam ejus produxisset summum Numen , accuratam de-
 scriptionem , earumque historiam , nec non usum Medicum in
Musaeo suo Zeylanico explanasset , quod post ejus mortem imper-
 fectum adeo , & nullo modo elaboratum , sed veluti Chaos con-
 fusum est ed tum : ita ut tam pauca ex diuturno illo labore , quem
 summus ille vir inter tot incommoda , ac pericula indefesso studio ,
 & magno animo susceperat , nobis supersint. *Hermannus* enim
 unicuique ille est , cui notitiam plantarum Zeylanensium , quae ad
 nos pervenit , acceptam referre debemus ; omnes enim plantas
 Zeylanenses , quas ab auctoribus memoratas , vel descriptas inve-
 nimus , paucissimis quibusdam exceptis , ab *Hermann* reliqui ha-
 buere , vel ab amicis , quibuscum eas communicaverat , accepe-
 runt ;

runt; has tamen omnes in nostro Opere videbitis collectas, in ordinem Alphabeticum digestas, ad certa sua genera revocatas, & plurimas descriptionibus & figuris tanquam ad vivum expressis, a nobis illustratas; inter quas multae etiam occurrunt a nullis aliis adhuc observatae, quarum quaedam novi plane sunt generis, quas ex vero *herbario* ipsius *Hermanni* maxima ex parte Lectoribus hic offero; Herbarium illum quondam, cum in Zeylana morabatur, ad Nobiliss. *Joannem Commelinum* elegantissime & nitidissime exsiccatum, ac diligentissime conservatum transmisit, quem postea Celeberrimus *Casparus Commelinus* decessor meus honoratissimus possedit, post cujus obitum filius illius, ejusdem nominis, ac virtutis haeres, me Operis illius participem fecit, ac possessorem. Qui thesaurus, quum satis diu jam, ut puto, delituisse, longius eum inter privatos Lares celare, ac publico invidere nefas duxi; praesertim cum & altera talis gaza, qua priorem locupletare poteram, apud me superesset. Est autem illa collectio satis magna plantarum itidem Zeylonensium, quas sedulus ille *Joannes Hartog*, quum in Zeylonam fuit missus, observavit, & quas ad *Cornelium Vossium* hortulanum nuper horti nostri Amstelaedamensis laudatissimum quondam transmiserat, qui mihi collectionem illam ante suum obitum commisit ac credidit, in qua varias reperi plantas in *Herbario Hermanni* non occurrentes, sed quae saepissime pessimis nominibus, unde *Hertog* in hisce non adeo versatus mihi visus est, fuere denominatae, ita ut plurima illarum nomina mutare, aliaque magis convenientia, & apposita inponere coactus fuerim: *Hermanni* autem, quantum potui, si accuratiora non requirebantur, retinui. Haec prima fuere fundamenta Operis nostri, quod in initio non adeo amplum in lucem publicam edere destinaveram: quum vero in examine illarum plantarum viderem, dignum fore, quod majori cura elaboretur, opus, praesertim quum *Musaeum* illud *Zeylanicum* adeo confuse sit divulgatum, ut saepius ter qua-

terve una eademque planta diversis proponatur nominibus, in ordinem illud redigere incepti, privato prius commodo & usui, nunc autem publico, ut arbitror: Quibus porro aliorum auctorum synonyma, quae cum hisce plantis Zeylonensibus congruere, ac consentire videbantur, adjunxi. Varias insuper plantas aeri infigendas, quae in opere nostro exhibentur, communicavit nobiscum generosissimus simul, & peritissimus Botanicus *Job. Freder. Gronovius*, nec non Botanicorum Maecenas *D. Georgius Cliffortius*, qui plurimas exoticas, & eas quidem rarissimas in praedio suo sane regio summa industria excolit plantas, quarum syllogen, ac descriptionem jam fere absolvit doctissimus ille Suecus, *Carolus Linnaeus*, operibus suis variis Botanicis nuper editis clarum nomen adeptus.

Ita ut hic in unum corpus, ni fallor, plurima, quae de plantis Zeylonensibus scimus & habemus, inveniatis collecta, digesta, & quantum tempus mihi praxi Clinica quotidie ita occupato & distracto, ut aliis exercitationibus, ac meditationibus horas subcesivas inpendere vix concedatur, permittit, quantumque pro rerum mearum ratione, & modulo meo id fieri potuerit, illustrata, &, ut puto, satis accurate descripta.

Hunc autem laborem si alicujus utilitatis fuisse quibusdam harum elegantiarum peritis cognovero, erit, quod me incitabit, ut curam & meditationem deinceps conferam ad simile opus plantarum Africanarum elaborandum, quarum mihi magna & rarissima ad manus est copia, praesertim cum rei huic optima sese offerat etiam occasio; praeterquam enim quod centenas aliquot Africanarum in herbario meo, quod jam quinquaginta continet volumina, servem plantas, non sine magno sumptu, multoque labore ex variis terrarum plagis, & aliorum herbariis mihi comparatas, non ita pridem quoque in publica auctione *D. Wilhel. Adr. van der Stell*, Gubernatoris quondam ad Caput Bonae Spei, mihi vindicavi

cavi rarissimas illas plantas eo in loco naturalibus coloribus, & magnitudine tam nitide, tam eleganter ad vivum depictas, ut nihil nisi vita iis desit; quarum licet magna copia a *Pluknetio*, aliisque jam fuerit aere expressa, plurimas tamen, & eas quidem rarissimas, quas apud nullum ad hunc usque diem offendi, in illa collectione inveni optime depictas & conservatas, in qua praesertim etiam excellunt *Lepidocarpodendra*, *Conocarpodendra*, & *Hypophyllocarpodendra* justae magnitudinis coloribus vivis elegantissime depicta, quae adeo accurate & fideliter expressa inveniuntur in doctissimo illo *Indice Horti Lugd. Batavi*, cujus auctor est celeberrimus ille *Hermannus Boerhavius*, aevi nostri summa gloria & prodigium, ita ut nihil de hisce *Lepidocarpodendris* &c. amplius, nisi vivus color, desideretur; unde & operi Weinmanniano inferenda illa concessi: & licet scriptor quidam in Centuriis suis indigne saepius tantum Apollinem traducat, nos ejus generosum animum, & ingenuam illarum plantarum communicationem instar *Corollarii* ad utilissimum illum Indicem, ut qui optimos plantarum continet characteres, admiramur & suspicimus. Ad opus porro plantarum Africanarum augendum mihi etiam prolixa admodum humanitate sese obtulit Nobilissimus & simul doctissimus *Nicol. Witsenius* urbis nostrae Judex, qui ingentem plantarum Africanarum tam exsiccatarum, quam ad vivum depictarum servat numerum, quas olim Amplissimus & Nobilissimus vir Consularis *Nicolaus Witsen* magna pecuniae vi, & improbo labore sibi ex Africa, aliisque locis comparavit, qui codex a Clariss. *Hermannno Boerhavio* non sine ratione tam magnifice praedicatur, & in Indice suo saepe etiam ad partes vocatur. Ut interim instar *Prodromi* subsequenter operis Botanicae rei periti, ac studiosi aliquid habeant, subjunxi hic duas plantarum Africanarum catalogos, quorum prior est plantarum, quas celeberr. *Paulus Hermannus* ad Caput Bonae Spei observavit, quem mecum ingenue ad-

modum communicavit *Job. Freder. Gronovius*, quique etiam jam saepius a *Boerhavio* laudatus est. Alter autem est plantarum ab *Hertog & Oldenlando* in Capite Bonae Spei diligenter indagatarum, qui in descriptione Promontorii Bonae Spei a *Petro Colbe* belgice exarata invenitur, & minus apte ibi locatur, cujus licet aliquae a *Tournefortio* jam fuerint memoratae, multae tamen ab eo omissae in hoc catalogo inveniuntur plantae; ex quibus duobus catalogis Lectores videre poterunt, quantus adhuc plantarum numerus in illis inveniatur terris, quae minus nobis cognitae, & quarum plurimae penitus ignotae, & nondum descriptae occurrunt.

Quum autem duo illi auctores, *Hermannus* nempe & *Hertog*, praecipui harum fuerint observatores, haud injucundum fore duxi, si hic subjungantur illi catalogi, quum plantarum Zeylanensium iidem illi viri primi & praecipui fuerint indagatores.

Praeter hasce plantas, quae ibi denominatae inveniuntur, & alias plures servo, quae plane novae, & ab aliis nondum observatae fuerunt; ita ut, si Deus mihi vitam viresque concesserit, opus etiam illud, si elaboratum fuerit, alicujus utilitatis fore mihi audeam promittere. Antequam autem illud aggrediar, animus est publicae luci exponere tamdiu etiam nunc desideratum, & omnibus numeris absolutum opus Botanicum, HERBARIUM nempe AMBONICUM *Georgii Everhardi Rumphii*, quod ultra millia fere plantarum Indicarum continet, sexque ingentia volumina in folio complectitur; Plantae hae ab auctore illo tam accurate, tam ample, & nitide cum earum virtutibus, usu & cultura sunt descriptae, ut certe palmam *Horto Malabarico*, quantumvis & illud eximium, & regium sane sit opus, praeripiat; plurimarum insuper descriptionibus Figurae elegantissimae, & ad vivum in locis natalibus per *Rumphii* indefessam curam, & prodigiosos sumptus depictae additae sunt, quae maximas, & incredibiles licet requirant impensas, ac labores ad tale opus nitide imprimendum, inpedimento

mento tamen non erunt, quo minus in gratiam Botanophilorum tantum inchoetur, ac elaboretur opus, quod Belgico licet idiomate conscriptum, ne & exteris ejus invideatur usus, Latina nihilominus civitate etiam donari curabimus: Liber hic superiore jam saeculo ab auctore illo fuit conscriptus, qui totam fere vitae partem, dum in illis degebat terris, ad summam usque senectutem, & licet postea oculorum usum amitteret, in plantis illis observandis, examinandis, describendis, ac depingendis inpendit, ac consumsit, quo opere *Hortus Malabaricus* plurimis in locis haud parum illustrabitur, ut ex *Thesauro hoc Zeylanico*, in quo toties laudatus, & cum *Herbario Rumphiano*, quem obiter tantum percurrere licuit, ad partes vocatus est, facile constat, ita ut non tantum praestantia sua *Malabaricum Hortum* adaequet, sed & eo insuper elaboratior plurimis in locis habendus sit: ceterum operi huic subnectam observationes, illustrationesque meas cum aliorum auctorum synonymis, ac descriptionibus.

Per generosam autem, & non satis laudabilem Rectorum & Praefectorum Societatis Indiae Orientalis munificentiam concessa mihi est istius libri impressio, & editio, quum per semiseculare fere spatium in domo societatis Indiae Orientalis tam splendidus, & adeo cuique exoptatus thesaurus delituisse, jam communi bono ab Illustrissimis & Nobilissimis illis viris in publicum prodire, & cuique inservire dabitur. Quibus solis hoc donum acceptum referre, & eo sibi gratulari universa debet Botanicorum cohors, & cuncti hujus delectabilis studii amatores tranquilli. Interim hisce meis laboribus fruimini, & si, quod humanum est, vitia quaedam in opere hoc nostro fuerint commissa, quod & summis in hac arte contigit, aequo animo L. B. aberranti ignoscite, & conatibus nostris favete.

*Dabam Amstelredami ex Museo,
ultimo Novembris, Anni
MDCCXXXVI.*

C O M P E N D I A

LAUDATORUM AUCTORUM

E X P L I C A T A.

- Acost. edit. Ital.* Trattato di Christof. Acostae della historia , natura & virtu delle droghe Medicin: *Venet.* in 4^{to}.
- Acost. hist. arom.* Christof. Acostae Historia aromatum a Clusio interpret. in 8^{vo}.
- Acost. apud Clus.* Christof. Acostae Historia aromatum apud Clusium in exoticis in folio.
- Act. Phil. Lond.* Acta Philosophica Londinensia in 4^{to}. auctoribus *Petiver. Garcin. &c.*
- Act. Reg. Paris.* Acta Regia Parisina. in 8^{vo}. auctoribus *Vaillant. & aliis.*
- Alp. de pl. Ægypt.* De Plantis Ægypti Prosper Alpinus in 4^{to}.
- Ambros. Phyt.* Hyacinthi Ambrosini Phytologia in folio.
- Amm. Char. pl.* Ammanni Character Plantarum. in 12^o.
- Amm. H. Bosian.* Hortus Bosianus conscriptus a Paulo Ammanno. in 4^{to}.
- Baldei Philip. Histor. Ceylon.* Philippus Baldeus beschryving van Ceylon. in folio.
- Banist. Cat. Stirp. Virgin.* Joannis Banisteri Catalogus plantarum in Virginia observatarum. apud *Ray.* tom. 3. in folio.
- Bobart. Hist. Oxon.* Jacobi Bobarti Historia Oxoniensis; est tomus tertius Morisonis post mortem ab eo editus in folio.
- Boccon. Mus.* Museo di Phisica , di Piante &c. di Paulo Boccone. in 4^{to}.
- Boerb. Ind. H. L.B.* Hermannii Boerhave Index alter Horti Lugduno Batavi. 2 tomi in 4^{to}.
- Boerb. Ind. in Oët.* Ejusdem index primus in 8^{vo}.
- Bont. Hist. nat.* Jacobi Bontii historia naturalis & Medic. Indiae Orient. in folio.
- Bont. Mantiss. Arom.* Bontii Mantissa Aromatica. ibidem.
- Breyn. Cent.* Jacobi Breynii Centuria prima exoticarum in folio.
- Breyn. Prodr. 1 & 2.* Jacobi Breynii Prodromus primus & secundus in 4^{to}.
- Breyn. Filii dissert.* Joannis Philip. Breynii dissertatio de Acmella. in 4^{to}.
- C. B. Pin.* Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici in 4^{to}.
- C. B. Prodr.* Ejusdem Prodromus Theat. Botanici in 4^{to}.
- Clus. exot.* Caroli Clusii libri X. de exoticis in folio.
- Clus. Cur. post.* Clusii Curae posteriores in 4^{to}. & folio.
- Clus. rar. pl. hist.* Clusii historia rariorum plantarum in folio.
- Clus. in Monard.* Nicol. Monard. Historia simplicium , Clusio interprete in 8^{vo}.
- Colum. observ.* Fabii Columnae observationes post Ecphrasin inpressae in 4^{to}.
- Commel. Cat. Hort. Med. Amst.* Joan. Commel. catalogus Horti Medici Amstelaed. in 8^{vo}.
- Commel. in not.* Joannis Commelini in notis ad Hortum Malabaricum.
- Commel. prael. Botan.* Casp. Commelini Praeludia Botanica. in 4^{to}.
- Commel. Fl. Malab.* Caspari Commelini Flora Malabarica in folio.
- Dale Pharmac.* Samuel Dale Pharmacologia in 8^{vo}.
- Dale. Supplem.* Ejusdem supplementum ibidem.
- Dalechamp.* Historia generalis Plantarum a Dalechampio elaborata in folio.
- Dillen. H. Elth.* Johannis Jacobi Dillenii Hortus Elthamensis tomi 2. in folio.
- Dillen. nov. pl. gen.* Joh. Jacob. Dillenii nova plantarum genera , post Catalogum plantarum circa Gissam nascentium inpressa in 8^{vo}.

- Dioscorid.* Dioscoridis opera in folio.
- Dodart. Mem.* Memoires pour dresser l'Histoire des Plantes in 8^{vo}.
- Dod. Pempt.* Romberti Dodonaei Pemptades in folio.
- Ephemer. German.* Ephemerides Germanicae Naturae Curiosorum auctoribus *Breynio*, *Rumphio* & aliis in 4^{to}.
- Ferrar. Fl. Cult.* Joannis Baptistae Ferrarii florum cultura. in 4^{to}.
- Flacourt. Hist. Madag.* Flacourt Historia insulae Madagascar.
- Freyer. itin. per Ind. Orient.* Joannis Freyers reyse door Oostindien &c. in 4^{to}.
- Garcin act. Phil. Lond.* Garcin in Actis Philosophicis Londinensibus in 4^{to}.
- Garz. lib. arom.* Garzias ab Horto Historia aromatum per Clusium in 8^{vo}.
- Grimm. Labor. Ceyl.* Nicolai Grimmii Insulae Zeyloniae Thesaurus Medicus, vel Laboratorium Ceylonicum a Barthol. Pielat latinitate donatum in 12^o.
- Hart. Catal. semin.* Est Catalogus plantarum & seminum ab Hartog ex Zeylana quondam ad Hortum Amstelaedamensem missus.
- Heist. Cat. pl. H. Acad. Jul.* Laurentii Heisteri catalogus plantarum, quibus Hortum Academicum Julianum auxit annis 1731, 1732 & 1733. in 8^{vo}.
- Hernand. Hist. Mexic.* Francisci Hernandes Historia Plantarum Mexicanarum in folio.
- H. A. tom. 1 & 2.* Horti Medici Amstelaedamensis rariorum plantarum historia, cujus Tomus primus a Joan Commelino, Tomus alter a Casp. Commelino est editus in fol.
- H. Beaum.* Horti Beaumontani Catalogus plantarum exoticarum in 8^{vo}.
- H. Bosian.* Horti Bosiani Catalogus per Amman. in 4^{to}.
- H. Eyst.* Hortum Eystettensem denotat a Beslero in magno folio editum.
- H. L. Bat.* Hortus Lugduno-Batavus a Paulo Hermanno editus in 8^{vo}.
- H. L. App.* Ejusdem horti appendix.
- H. Malab.* Hortus Malabaricus est constans duodecim voluminibus in folio.
- H. Pisan.* Hortus Pisanus est auctore Michaeli Anglo Tillio in folio.
- H. Mauroc.* Hortus Maurocenus est, cujus catalogum dedit Antonius Tita in 8^{vo}.
- H. R. Par.* Est Hortus Regius Parisinus in folio.
- Herb. Ambon.* Herbarium Ambonicum MStum, ab Everhardo Rumphio Belgice conscriptum, sex voluminibus in folio constans.
- Herbar. Garcin. D.* Garcin ex Herbario suo plures mecum communicavit plantas exoticas.
- Herbar. Gronov.* Johan. Fredericus Gronovius Zeylanens. plantas ex herb. suo concessit.
- Herb. Hart. & Hert.* Hartog seu Hertog herbarium est, quod servo, quodque ex plurimis elegantissimis plantis Zeylanensibus constat, quondam ab eo ex Zeylana ad Cornelium Vossium hortulanum missum.
- Herb. Herm.* Est idem Herbarium, quod Clariss. Paulus Hermannus olim ex Zeylana ad Nobiliss. Joannem Commelinum miserat, ex quo praesertim rarissimas, & nunquam antea visas plantas publici jam juris fecimus.
- Herm. Fl. Lugd. Bat.* Pauli Hermanni Flora Lugduno Batava. in 8^{vo}.
- J. B.* Joannis Bauhini Historia plantarum universalis, 3 constans voluminibus in fol.
- Jonst. Dendr.* Joannis Jonstoni Dendrologia in folio.
- Kaemph. Amoenit. exot.* Engelberti Kaempheri Amoenitates exoticae in 4^{to}.
- Knox Hist. Ceyl.* Rombert Knox Beschryving van Ceylon in 4^{to}.
- Linnaeus char. pl. gen.* Caroli Linnaei characteres plantarum generici in 8^{vo}. qui liber jam jam inpressus erit, unde & omnibus locis, ubi debuerat, laudari vix potuit, aureus sane cacteroquin Botanicis habendus, ut qui nova & facili methodo naturales plantarum characteres accuratissime definit.
- Linn. tract. de Mus. Cliffort.* Car. Linnaei Musa Cliffortiana florens Hartecampi in 4^{to}.

Linschot. Ind. Orient. Johannes Hugo Linschotens Reyse door Oostindien in folio.
Marcgr. Georgii Marcgravii Historia rerum natural. Brasiliae in folio.
Merian. insect. Surin. Mariae Sibyllae Merian Historia insectorum Surinam. in folio
 ingenti, quod opus elegantissimas complectitur quarundam plantarum figuras.
Morif. Hist. pl. Roberti Morison Historia plantarum universalis. 3 vol. in fol.
Munt. Phytogr. Abrahami Muntingii Phytographia curiosa in folio.
Mus. Zeyl. Pauli Hermannii Musaeum Zeylanicum in 8vo.
Par. Bat. Pauli Hermannii Paradisus Batavus in 4to.
Par. Bat. App. Ejusdem libri appendix ibidem.
Par. Bat. Pr. Paradisi Batavi Prodrumus in 120.
Parkins Theat. Johannis Parkinsoni Theatrum Botanicum Anglice cum fig. in fol.
Petiv. Mus. Jacobi Petiver Musaeum, seu Centuriae in 8vo.
Petiv. Gazoph. nat. & art. Jacobi Petiver Gazophylacium naturae & artis in folio.
Petiv. Hort. sicc. Petiver Hortus siccus apud Ray in tom. 3. appendice in fol.
Petiv. Act. Phil. Lond. Petiver in Actis Philosophicis Angliae in 4to.
Pison. Hist. Gulielmi Pisonis Historia naturalis Brasiliae. in fol.
Pison. Mantiss. Aromat. Ejusdem Mantissa aromatica. ibidem.
Plukn. Almag. Leonardi Pluknetii Almagestum Botanicum in 4to.
Plukn. Amalth. Ejusdem Amaltheum Botanicum in 4to.
Plukn. Mantiss. Ejusdem Mantissa Almagesti Botanici in 4to.
Plukn. Phyt. Ejusdem Phytographia. Figurae.
Plum. pl. Amer. Caroli Plumier Descriptio Plantarum American. in folio.
Plum. nov. pl. gen. Caroli Plumier nova plantarum Americanarum genera in 4to.
Plum. Cat. pl. Amer. Caroli Plumier Catalogus plantarum American. ibidem.
Ray. hist. pl. Joannis Raji Historia plantarum tomi tres in folio. cujus tertius cum
 Dendrologia, & aliis adjectis post ejus mortem ab aliis est editus.
Ray. meth. pl. auct. & emend. Joan Raji Methodus plantarum aucta & emendata in 8vo.
Rivin. ord. pl. irreg. Fl. Monop. Quirini Rivini ordo plantarum floribus irregularibus
 monopetalis &c. in fol. cum elegantissimis figuris.
Rumph. Herb. Ambon. Everhardi Rumphii Herbarium Ambonicum, constans sex magnis
 voluminibus in fol. MStum. Quod opus sane regium est; & propediem a nobis
 edendum, de quo vide Praefationem hic praefixam.
Scheuchz. Agrast. Scheuchzeri Agrastographia, sive graminum historia in 4to.
Sch. Botan. Schola Botanica Parisina. in 8vo.
Sebae rer. nat. thes. part. 1. Alberti Sebae rerum naturalium thesaurus. Pars prima in fol.
Seyen in not. Arnoldus Syen in notis ad Hortum Malabaricum.
Sloan. Cat. pl. Jam. Hans Sloane Catalogus Plantarum Insulae Jamaicae in 8vo.
Sloan. Hist. Jam. Hans Sloane Historia Jamaica Anglice duobus volum. in fol. cum
 elegantissimis & splendissimis figuris.
Sutherl. H. Edinb. Jacobi Sutherland Hortus Medicus Edinburgensis in 8vo.
Theophr. Eresii Theophrasti opera in folio.
Tournef. inst. Josephi Pitton Tournefortii institutiones rei Herbariae in 4to. 3 vol.
Vaill. act. Reg. Paris. Sebastiaan Vaillant in actis Regiis Parisinis in 8vo.
Vaill. struct. Fl. Sebastiaan Vaillant de florum structura in 4to.
Vest. in Alpin. Johannis Vesslingii observationes in Alpinum de plantis Aegypt. in 4to.
Weinm. Phytant. Weinmanni Phytanthozoiconographia in folio: vivis coloribus plan-
 tas inpressas complectitur hoc Opus novum, quod quatuor constabit tomis.
Zanon. Historia Botanica di Giacomo Zanoni. Italice in folio.
Zeyl. Zeylonenses.

THESAURUS ZEYLANICUS.

ABUTILON Avicennae *H. Eyst. Æst. Ord. 6. Fol. 10. Fig.*

1. ubi elegans figura & varii citantur auctores videndi. *Alcea Indica Abutilon* dicta major, pericarpio membranaceo, orbiculari, compresso, vertice corniculis extus coronato, intus in decem aut duodecim loculamenta diviso.

Plukn: Almag. pag. 17. Abutilon Indicum flore luteo, Breyn. Prodr. 1. pag. 1. Althaea Theophr. flore luteo. CB. ANODA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 52.* ubi additur in arboris altitudinem saepius extollitur trunco crasso, satis lignoso, levi. nota ejus characteristica invenitur apud *Amman in Charact. plant. pag. 243.* & usus medicus apud *Samuel Dale. Pharmacol. supplem. pag. 145.*

ABUTILON Indicum, flore luteo, minore. *Breyn. Prodr. 2. pag. 1. Althaea Abutilon* dicta, Indica, flore luteo minore. *H. L. B. Par. Bat. Pr. pag. 309. Althaea Theophrasti* flore luteo minore. *H. L. B. pag. 24. Mus. Zeyl. pag. 52.* *Alcea populi folio, villosa, leviter serrata. Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 98.* *Alceae* adfinis, Indica, *Abutilon* dicta, flore flavo, foliis mollibus profunde venosis, filiculis lanuginosis. *Plukn. Phyt. Tab. 126. Fig. 5. vide & Almag. pag. 17.* **ANODA** haec etiam Zeylonice dicitur, quod nomen genericum

Abutili videtur, plures enim ejusdem familiae plantae uno saepius apud Zeylonenses indigitantur vocabulo, quod nomen genericum est, ut in sequentibus pluries occurret, uti videre est in *Filicum*, *Hedyfari*, *Astragali*, *Sinapistri*, aliisque plantarum generibus.

ABUTILON Indicum foliis profunde crenatis. *Nobis*. *Althaea* Theophrasti foliis profunde crenatis *Mus. Zeyl.* pag. 52. *Althaea Abutilon* dicta, folio lobato. *Par. Bat. Pr.* pag. 309. *Alcea Abutilon* dicta, foliis lobatis minima Indiae Orientalis. *Plukn. Almag.* pag. 17.

ABUTILON *Periplocae* angustioris folio, fructu stellato. *Dillen. H. Elth.* pag. 4. *Tab.* 3. *Althaea Zeylanica*, folio sagittato, flore albo, capsula cristata. *Commelini ibidem* *Althaea Scammonii* folio, flosculis albis, *Zeylanica*. *Par. Bat. Pr.* pag. 309. *Mus. Zeyl.* pag. 68. hujus icon etiam exhibetur, sed floribus viduus apud *Plukn.* in *Phyt. Tab.* 74. *Fig.* 7. & in *Almag.* pag. 17. vocatur *Alcea Orientalis Scammoniae* folio major, floribus albis. **WISSADULI & NILAVONANGHU** Zeylonice dicitur.

ACACIA aculeata, multiflora, foliis pennas avium referentibus. *Nobis Tab.* 1. *Acacia Zeylanica* elegans *Mimosae* folio, flore albo. *Herb. Hart.* *Acacia Zeylanica*, floribus rotundis, albis, papposis, in summitate ramulorum racematim dispositis. *Mus. Zeyl.* pag. 29. ubi **HINGHURUWAE**L, & **TSLAWAE**L Zeylonice audit.

Adfurgit elegans hic & speciosus frutex caule firmo, lignoso, leviter fulcato & anguloso, spinis undique obfesso, fuscis, instar hami recurvis, in apice nigricantibus, parvis quidem, sed robustis, nec facile fragilibus, quae infiguntur cortici fusco, scabro, quo obducitur lignum albicans, medulla fusca repletum; ramos undique spargens, ad quorum exortum folia emergunt pinnata, longo & firmo, spinosoque rachi innixa, tenuissima, mollia, ad contactum se instar *Mimosae* contrahentia, plumosa, seu pennas avium referentia; pinnae haec sunt communes, aequales, oppositae foliolis linealibus fere contiguis, vel potius imbricatis numero infinito constantes; Flores in summitate ramorum gerit racemosos, qui clausi racemum uvarum nondum expansum rotundum referunt, aperti vero stellam radios emittentem repraesentant per pappum, qui stamina sunt numerosissima, in apice florum undique dispersum; singuli autem flosculi suo instructi calice, suo

ACACIA aculeata, multiflora, foliis
pennas arum referentibus. Nobis.

ACACIA spinosa ex alis spicata,
foliis pennas avium referentibus. Nobis.

1689 Mimosa cinerea L.

fuo nituntur pedunculo, qui in medio ad centrum idem concurrunt, & instar radiorum emissorum aequales sibi invicem circulum quasi formant, de filiqua mihi non constat, quum ea destituar.

ACACIA Zeylanica, flosculis globosis luteis, foliis pinnatis, tenuissime incisilis spinis minoribus. *Mus. Zeyl. pag. 30.* ubi additur, folia sunt fere capillacea. Forte Acacia spinosa foliolis perexiguus & veluti crispatis, Maderaspatana. *Pl. Phyt. Tab. 73. Fig. 3.*

ACACIA Zeylanica sarmentosa, flore luteo globoso. *Mus. Zeyl. pag. 34.* similis huic species flosculis candidis occurrit in *H. Malab. part. 6. Tab. 4.* quae *Insja* ibi vocatur, & in notis Acacia Mala barica, flore globoso, filiquis latis.

ACACIA spinosa ex alis spicata, foliis pennas avium referentibus. *Nobis. Tab. 2.* Acacia Zeylanica, flosculis spicatis, plumosis, inferiore spicae parte rubellis, superiore vero luteis, filiqua articulata contorta. *Herb. Hart.* Acacia Zeylanica flore spicato, papposo, colore ex albo, luteo & rubicundo eleganter variegato. *Mus. Zeyl. pag. 24.* ubi **AN-DARA & KUKULUGHAS** Zeylonice vocatur.

Ex cortice albo ad exortum pedunculi foliorum exsurgunt spinae solitariae, ad basin latae, in mucronem tenuissimum, acutissimum recte abeuntes, albicantes itidem, ad quarum medium aliquando etiam erigitur pedunculus foliorum, qui rachin dat ab utraque parte gerentem foliola pinnata sibi invicem opposita, ad tactum sese non contrahentia, glabra, viridia, obtusa. Flores vero inter foliorum pedunculum & spinam ortum habent, spicati instar *Tamarisci Narbonensem*, plumosi, varii coloris, in inferiore enim parte rubelli, superiore vero lutei, & intermixti albi elegantem dant varietatem & adspectum. Flosculis hisce plumosis deciduis filiqua subsequitur articulata contorta, ut indicat hujus plantae denominatio ab *Hertogh* in loco natali ad vivum inposita.

ACACIA major, tinctoria, Zeylanica, *Pansapan* dicta. *Mus. Zeyl. pag. 42.* Erythroxylum, seu lignum rubrum Indicum, spinosissimum, Coluteae foliis, floribus luteis, filiquis maximis. *Par. Bat. Pr. pag. 332. Amm. Char. plant. pag. 552.* Acacia gloriosa Zeylanica, tinctoria, amplioribus foliis spinosa. *Plukn. Almag. pag. 5.* *Tsjampangam. H. Malab.*

Malab. part. 6. Tab. 2. Crista Pavonis Coronillae foliis secunda, five Tinctoria Indica, flore luteo, racemoso minore, filiqua latissima glabra, lignum rubrum, *Sappan* dictum ferens. *Breyn Prodr. 2. pag. 37.* Lignum *Sappan*. Caju *Sappan Rumph. Herb. Ambon. lib. 6. cap. 26.* de hujus ligno vide *Ray tom. 3. in dendrol. pag. 109.* & *Samuel Dale, Pharmac. pag. 469.* ad lignum *sapan* officin. PATAGHI & PATANGHI Zeylanice audit. alteram hujus speciem non spinosam invenies in *H. Amstel. part. 1. Tab. 103.* ad Senas accedit, quas Cristas Pavonis Breynius vocavit.

ACACIA Zeylanica minor, tinctoria, flosculis luteis, racematim dispositis, filiquis auriculatis, ventricosis, nigris, ossiculis globosis durissimis. *Mus. Zeyl. pag. 53.* KALUWATHUWA Zeylanensibus.

ACACIA, qui lobus echinatus Clusii, oculus Cati Lusitanis. *Mus. Zeyl. pag. 57.* Arbor exotica spinosa, foliis Lentisci C. B. Bonduch Indorum Ponae *Mus. Zeyl. pag. 35.* Acacia gloriosa Lentisci folio spinosa, flore luteo spicato, filiqua magna muricata. *Plukn. Phyt. Tab. 2. Fig. 2.* & in ejus *Almagest. pag. 4.* plurima vide synonyma, ut & apud *Sloan. Catal. pl. Jamaic. pag. 144.* & *Hist. Jam. vol. 2. pag. 41.* vide & *Samuel Dale. Pharmac. Supplem. pag. 308.* ad Bonduch offic. Carretti haec in *H. Malab part. 2. Tab. 22.* vocatur, ubi consule notas, & *Amm. Char. pl. pag. 317 & 318.* quae est Crista Pavonis Glycyrrhizae folio minor, repens, spinosissima, flore luteo spicato minimo, filiqua latissima echinata, semine rotundo cinereo, lineis circularibus cincto, majore. *Breyn Prodr. 2. pag. 38.* Lobus echinatus fructu caesio, foliis longioribus. *Par. Bat. Pr. pag. 348.* KUBURUWAE L Zeylanensibus. Globuli majores Gondo dicti, *Rumph. Herb. Ambon. lib. 7. cap. 50.*

ACACIA, qui lobus echinatus Clasii fructu albo. *Mus. Zeyl. pag. 12.* ubi dicitur, fructus ex lobis suis eruti, Elephantorum fiunt pabulum. ad Senas hae proxime accedunt, sed staminibus brevioribus differunt.

ACACIA gloriosa Coluteae folio Chinesis, rachi medio tam ad genicula, quam ad internodia spinis curtis duplicatis, deorsum inflexis munito, an WAWOULAETHYA Cinghalensibus dicta. *Plukn. Almag. pag. 5.* vide & ejus *Mantissam pag. 1. planta penult.* ut & *Ray tom. 3. pag. 418.* Arbor Indica spinosa, cujus fructus vespertilionum instar a ramis

ramis dependent. *Mus. Zeyl. pag. 41.* Crista Pavonis monospermos secunda, sive arbor vespertilionis Indica, Lentisci folio, spinosissima, flore racemoso luteo, parvo, odorato, filiqua & semine glabro. *Breyn Prodr. 2. pag. 39.* Arbor filiquosa Indica spinosa, flore papilionaceo, decapetalo, filiquis latis monospermos. *Ray hist. pl. pag. 1745.* Cacu-Mullu. *H. Malab. part. 6. Tab. 19.* vide & notas ad *H. Malab. part. 1. pag. 70.* Waga Madrasp, spinosa Mimosae foliis, floribus parvis spicatis. *Mus. Petiv. no. 700. & Act. Philos. Lond. vol. 22. no. 271. pl. 115.* WAWULAETHYA Zeylanensibus dicitur a *Wawoula*, id est vespertilione, quod arboris hujus spinæ similes sunt unguiculis Vespertilionum, quibus se arborum ramis affigere solent. arbor caeterum est sarmentosa, spinosa, ad sepes struendas idonea, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 41.* ad Senas accedit haec, neutiquam ad Acacias.

ACACIA Zeylanica minus spinosa, pinnularum costis & caule rufescente hirsutie villosa. *Plukn. Phyt. Tab. 122. Fig. 3. & Almag. pag. 4. ut & Ray tom. 3. pag. 477.*

ACACIA Malabarica filiquis ac feminibus compressis, semilunatis. *Mus. Zeyl. pag. 58.* an Acacia foliis amplioribus filiquis compressis, flore coccineo? *Plum. Cat. Pl. Amer. pag. 17.*

ACACIA Malabarica, flosculis spicatis, filiquis compressis, latissimis. *Mus. Zeyl. pag. 59.* Acacia non spinosa, filiquis latis compressis, flore albo. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 17.* an Wagha. *H. Malab. part. 6. Tab. 5?* quæ est Waga Madrasp. Senæ foliis, filiqua lata compressa, ubi feminibus inflata. *Petiv. Mus. no. 697.*

ACACIA Zeylanica floribus luteis, racematim ad foliorum (exortum) extremitates dispositis. *Mus. Zeyl. pag. 68.* huc spectat Nilacamaram *H. Malab. part. 1. Tab. 38.* ubi vide notas subiectas. qui est Mirobalanus Embilicus, Boa Malacca Nilikay. *Rumph. Herb. Ambon. auctuar. cap 2.* KATHUKARAMBA Zeylonensibus, hoc est Acetosa spinosa, a *Karamba* quod acidum seu acetosum dicitur; folia enim acidum grate sapiunt & *Kathu* spina est.

ACACIA Zeylanica nova. *Breyn. Prodr. 1. pag. 1.*

ACACIA Zeylanica Tamarindi foliis, flore albo umbellato. *Hertog. in Catal. feminum* ab ipso quondam ex Zeylona transmissorum reperitur. *Acacia aculeata* flore albo, foliis Tamarindi. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 17.*

ACACIA Zeylanica, spinis maximis albis, flore globoso. *Hertog. ibidem.* *Acacia* forte *Maderasp.* foliolis parvis, aculeis è regione binis prae-grandibus horrida, cortice cinereo. *Plukn. Phyt. Tab. 121. Fig. 4.* Notatu dignum censeo, quod in examine harum plantarum inveni-
rim, quod plurimae plantae *Maderaspatanae*, quae apud *Pluknetium* occurrunt, cum nostris plantis *Zeylonensibus* maxime quadrent & convenient, ut ex plurimis illarum synonymis in sequentibus magis elucescet.

ACORUS Asiaticus radice tenuiore. *H. L. B. pag. 9.* ubi ejus descriptio. *Calamus aromaticus Garziae* ab *Horto. lib. Aromat. 1. Cap. 32. & Edit. Ital. in quarto pag. 289.* ubi Figura. *Mus. Zeyl. pag. 56.* *Acorus Asiaticus* radice tenuiore. *HERMANNI Moris Hist. Oxon. Tom. 3. pag. 246.* ubi brevis ejus descriptio, & ad *Typhas* reducitur. *Calamus aromaticus Orientalis* folio & radice tenuiore. *Act. Pilos. Lond. no. 274. pag. 943.* *Acorus* verus *Asiaticus* radice tenuiore, vel *Calamus aromaticus Garciae.* *Plukn. Almag. Botan. pag. 8.* *Deryngo Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 23.* Characterem invenies apud *Linnaeum in Char. gen. pl. pag. 104.* *Vaembu H. Malab. part. 11. Tab. 40.* *Calamus aromaticus.* *Grimm. Laborat. Ceyl. pag. 123.* ubi haec habet. apud nos pariter inplantatur: Firmior atque perennior radix est, quam ea, quae aliunde nobis transmitti solet; usus ipsius sat est notus. *VAZABU & VAZUMBO* *Zeylonensibus.*

ADHATODA Zeylonensium *H. L. App. pag. 642.* ubi Figura & *Plukn. Phyt. Tab. 173. Fig. 3.* *Arbor Indica*, cujus cortex foetum extra-
hit. *Mus. Zeyl. pag. 23.* *Dictamno* forte adfinis, *Indica*, arborescens, *Lauri Americanae* foliis, seu *Ecbolium Zeylanicum*, foliis *Laurinis.* *Breyn Prodr. 2. pag. 41.* ubi vide descriptionem & apud *Ray tom. 3. pag. 650.* *Ecbolium Rivini ord. plant. fl. irregul. monopet.* ubi elegans Figura. hujus character describitur ab *Amm. in Char. plant. pag. 247.* & *Linnaeo in char. gener. plant. pag. 4.* ad *Justiciam* *Houst. Malab.* dicitur *WANAEPALA. ADHATODA. SINGHADHAE, & SINGHIKA. Mus. Zeyl. pag. 23.*

ADHA-

119. Justicia repens L.

107 Justicia Adhatoda L.

Fig. 2.

AMARANTUS humilis,
foliis oppositis. &c.

1084 *Ellecebrum sessile*
venti

Fig. 1.

ADHATODA spica longissima, *flore reflexo. Nobis.*

108. *Justicia Tobolium L.*

ADHATODA, flore solitario ex singula folii ala proveniente. *Nobis. Tab. 3.*

Fig. 1. Adhatoda Zeylanica, folio Salicis, flore albo parvo. *Herbar. Hartog.* Adhatoda Zeylanica folio rigido oblongo. *Hart. Catal. semin. transmissorum.* Differt ab Adhatoda Indica folio saligno, flore albo. *Boerhavii in Indice H. L. B.* foliis majoribus, latioribusque, floribus triplo fere minoribus: qui flores inter alas foliorum eriguntur gemini, ex singula scilicet unicus, sunt autem albicantes, calice oblongo dissecto contenti, monopetali, personati, labio superiore adunco, reflexo, barba vero pendula trifida, stamina bina recondentes. Folia vero brevi pediculo emergunt bina sibi invicem opposita, glabra, tenuia, acuta, in superiore parte viridia, in inferiore pallida, sensim minora, in summo minima. Fructus est silicula oblonga, bivalvis, bilocularis, in singulo loculo duo condens semina, rotunda, spadicea; uti in Tabula nostra ejus icon exhibet.

ADHATODA spicata, flosculos ex foliolis membranaceis producens. *Nobis. Tab. 3. Fig. 2.*

Adhatoda Zeylanica minima flore albo. *Herb. Hart.* Adhatoda Maderaspatana, spica longa foliacea, marginibus albis. *Mus. Petiv. no. 338.* Adhatoda Canariensis oleae folio viridi, huic proxime convenit, quae reperitur descripta in *Ray. tom 3. pag. 81. Dendrol.* Lignosus hic fruticulus ramosissimus est, ramos undique spargens ad terram inclinantes, folia Hyslopum referentia gerens, bina sibi mutuo opposita, scabra, duriuscula, viridia: flores habens in summo caulium collectos, spicatos, albicantes, inter foliola subrotunda Thymum aemulancia, fimbriâ albicante tenuissimâ cincta, absconditos, si clausi, aperti vero sese inter illa extollentes, suo contenti calice; qui flosculi anomali personati sunt, labio superiore acutiore constantes, barba autem pendula, reflexa trifida.

ADHATODA spica longissima, flore reflexo. *Nobis Tab. 4. Fig. 1.*

Adhatoda floris labio superiore angustissimo & ad posteriora reclinato. *Tournef. instit. pag. 175.* Kokeria Zeylanica, folio conjugato, flore albo. *Herb. Hart.* hujus varietas est, quae Arbor Zeylanica, floribus coeruleis in spica dispositis dicitur in *Mus. Zeyl. pag. 33.* quae est Carim-Curini *H. Malab. part. 2. Tab. 20.* & Curini forte prima species. *Plukn. Phyt. Tab. 171. Fig. 4.*

Caulis hujus fruticis lignosus est & glaber. folia opposita, ovato-lan-

ceolata, glaberrima, utrinque viridia. Caulem terminat spica longissima, flores gerens inter foliola provenientes, inferius florere incipiens, & ad summitatem denuo desinens. sub singulo flore subjicitur foliolum oblongum utrinque acuminatum, quod cum ipsis floribus simul decidit, nisi fructus excrescat. reliqua in *H. Malab.* accurate describuntur.

ADHATODA ad alas spinosa & florifera. *Nobis.* Adhatoda Malabarica, tetracantha. *Petiv. Act. Phil. Lond. vol. 20. num. 244. &c.*

Eryngium Zeylanicum luteum febrifugum. *Mus. Zeyl. pag. 43.* Planta Indica spinosa, amara, antifebrilis *ibidem. pag. 62.* Coletta-Veetla *H. Malab. part. 9. Tab. 41.*

Melampyro cognata Maderaspatana, spinis horrida, an Coletta Veetla? *H. Malab. Plukn. Phyt. Tab. 119. Fig. 5.* Lycium Indicum spinis quaternis ad foliorum singulorum ortum. *Par. Bat. Pr. pag. 349. H. Beaum. pag. 28. & Alb. Sebae rerum natur. thes. part. 1. Tab. 13. Fig. 1. pag. 21.* **KATHUKAROHITI** Zeylanensibus *Tsje-Mulli & Semul.* Malabaris.

ADIANTHUM caule reflexo, pinnulis alternis, striatis, in summo crenatis & frugiferis. *Nobis. Tab. 5. Fig. 1.* Adiantum Zeylanicum Filicis facie. *Mus. Zeyl. pag. 37.* Adiantum Zeylanicum Filiceum Hermanni. *Herbar. Gronov.* Filicula Maderaspatana, foliolis furcatis, ex apice prolifera. *Petiv. Mus. no. 767.*

Communicavit mecum elegantem hanc plantam doctissimus Botanicus Joh. Freder. Gronovius, qui illam per D. Scherard ex herbario Hermanni possidet.

Caulis hujus plantae est simplex, filiformis, purpureus, longus, incurvatus; pinnae ab utroque latere pinnatim exeunt situ fere alterno, maxime sibi adjacentes, versus summitatem sensim breviores, & in ipso caulis apice minimae, citra ordinem sparsae, valde rarae. Apex caulis videtur terram petere & radices agere. Pinna singula est folium simplex sine notabili petiolo, margine inferiore recto, vel fere falcato, superiori convexo magis ferrato, & interdum profundius fecto, margine versus apicem rotundo, diviso. Foliu balis est transversim angulo inferiori caulis adnata.

Fructificatio fit infra marginem superiorem, ut in Adiantho.

ADIANTHUM Indicum repens foliis Coriandri. *Mus. Zeyl. pag. 51.* an *Adiantum nigrum majus, ramosum, Coriandi folio?* *Sloan. Catal. pl. Jam. pag. 23.* **BOBU** Zeylonensibus.

ALCANNAE species Zeylanica, **MANITHONDI** Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 6.*

ALCEA Indica flosculis parvis, albis. *Mus. Zeyl. pag. 65.* an *Althaea peregrina* longiore *Betonicae* folio, floribus albis perexiguis, capitulis arcte conglomeratis. *Plukn. Almag. pag. 25?* quae in *Phytogr.* inscribitur *Malva Orientalis*, elatior, longiori folio, flore albo minimo, capsulis conglomeratis. *Tab. 44. Fig. 5.* *Malvindae* habenda species.

ALCEA Indica floribus roseis parvis, fructibus parvis, quinquepartitis, hispidis, lappaceis. *Mus. Zeyl. pag. 8.* *Alcea rosea Zeylanica ibidem pag. 10.* *Althaea Zeylanica* fructu hispido, lappaceo. *Amm. H. Bosiani pag. 2.* *Uren. H. Malab. part. 10. Tab. 2.* quae *Alcea Malabarica* folio *Vitis*, flore minore, rosaceo colore, fructu lappaceo, semine rostrato. *Commelini in notis ibidem.* *Malva, vel Alcea fruticosa Ribesii* foliis, seminibus asperis. *Sloan. Cat. Pl. Jam. pag. 96.* ubi vide reliqua. & *Hist. Jam. vol. 1. pag. 37. Tab. 11. Fig. 2.* **AEPALA** Zeylonensibus. annua est haec planta, toto anno florens & virens. ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 8.* sine dubio haec *Urenae* species est, cujus notas vide descriptas apud Doctissimum & accuratissimum *Dillenium in H. Eltham. pag. 430. & 431.* qui hanc habet pro *Alcea Indica* frutescente, foliis ad marginem exasperatis, *Bryoniae albae* divisuris. *Plukn. Phyt. Tab. 5. Fig. 3.*

ALCEA Zeylanica, oblongo, anguloso folio, flore parvo luteo, fructu orbiculato, semine anguloso. *Hert. Catal. semin.*

ALCEA Indica minor, semine leviter crispato. *Mus. Zeyl. pag. 42.* quae *Dillenio* eadem videtur cum *Alcea Indica molli & hirsuto, seu lanuginoso folio, seminibus duplici & nonnunquam triplici rostro donatis.* *Mus. Zeyl. pag. 2.* Vide *H. Eltham. pag. 213.* & infra *Malvindam.*

ALCEAE species singularis. *Mus. Zeyl. pag. 42.* **SINIIHIDDA, SIHINELLA, & SIHINIDDA.** Zeylonensibus.

ALCEA Indica, Bellidis spinosae folio, flosculis parvis. *Mus. Zeyl. pag. 44.*
KOTHIHAMBABILA & KOTHIHAMBABEWILA Zeylonensibus.

ALCEA Indica, flosculis luteis parvis, triangulo folio. **KAEJARABAEWILA** Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 54.*

ALCEA Zeylanica, Carpini folio, flosculis fasciculatim congestis. *H. L. Bat. pag. 13.* ubi brevis descriptio. Sine dubio hae sunt Malvindae species; quas juxta *Hermannum* hic posuimus, cujus plures infra ad Malvindam commemorantur.

ALCHIMILLAE congener planta Indica. *Mus. Zeyl. pag. 57.* **MAHANCAKUNUWAENNA** Zeylonensibus. *Makuna* Aranea est, utcunque enim plantae folia araneorum telis circumdata observantur. *ibidem.*

ALCHIMILLAE vel *Perchepier* affinis, Zeylanica, procumbens, Chamaecissi foliis & facie, flosculis purpureis. *Breyn. Prodr. 2. pag. 11.*

ALKEKENGi somniferum Cydoniae folio, flore & fructu rubris. *Nobis.* Solanum Antiquorum Alpini *Mus. Zeyl. pag. 58.* Solanum somniferum antiquorum *Alpin. exot. cap. 33. pag. 70.* Figura & 71. ejus descriptio. Solanum somniferum, verticillatum *C. B. P. pag. 166.* Solanum verticillatum. *J. B. tom. 3. lib. 34. pag. 610.* Alkekengi Mexiocanum. *COLUM. ad Hernand. pag. 296.* Solanum somniferum antiquorum verum. *Parkin. Theat. pag. 347.* *Peevetti H. Malab. part. 4. Tab. 55.* ubi vide notas, & *Plukn. in Almag. pag. 352.* qui hanc a Solano Alpini separat. de ejus viribus & usu vide *Samuel. Dale. Pharmacol. supplement. pag. 139.* ad Solanum somniferum Offic.

ALKEKENGi Indicum, glabrum, Capsici folio. *H. Elth. pag. 12 & 13. Tab. 11.* qui omnino videndus. Solanum vesicarium, Indicum, maximum. *Mus. Zeyl. pag. 2.* Solanum vesicarium Zeylanicum, baccis folliculisque herbaceis. *ibidem. pag. 30.* ubi dicitur; Convenit cum Cammaru *Marcgravii*, & Solano Vesicario *Camerarii*, & Halicacabo *Bontii*, quod recte refutatur a *Dillenio* in *H. Elth.* loco citato, quum tres diversae sint plantae. **NALALBATHU** haec incolis audit; a *Nalal* fronte,

Fig. 1.

ALSINE hirta minor, foliis alternis. &c.

Fig. 2.

ALSINE lutea, ramossissima, pentaphylla, polyanthos. Nobis.

748. *Mollux pentaphylla* L. ?

fronte, & *Bathu* fonitu, has enim vesiculas pueri jocantes fronti allidunt ad sonitum excitandum, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 2.*

ALKEKENGi Zeylanicum, fructu parvo, rotundo, rubro. *Nobis.* an *Halicacabus*, Indicus, minor **DAUNCAPO-CAPO.** *Rumph. Herb. Ambon. lib. 10. cap. 44.* quod est *Solanum Indicum Grim. in Laborat. Ceyl. pag. 125.* ubi sic describitur: planta est mediocriter alta, fructus profert parvos, rotundos, rubros, sicut *Alkekengi* conclusos; apud incolas maximo in pretio habetur, atque ipsi vires easdem, quas nos *Alkekengi* adscribunt.

ALKEKENGi Indicum, minimum, fructu virescente. *Tournef. Inst. pag. 151.* *Solanum vesicarium Zeylanicum, minus, fructu folliculoque herbaceo. Mus. Zeyl. pag. 62.* *Solanum vesicarium Indicum minimum. H. L. B. pag. 569.* ubi *Figura & descriptio. Moris. part. 3. pag. 527. Plukn. Almag. pag. 352.* ubi & huic jungitur *Halicacabum Alkekengi Arabibus dictum Bontii pag. 149.* & inquiritur an sit *Pee-Inota-Inodien. H. Malab. part. 10. Fig. 71.* *Solanum vesicarium Ceylanicum, minimum Bontii. Amm. H. Bosian. pag. 33.* ubi adest descriptio. *Alkekengi* character optime invenitur apud *Linnaeum in char. pl. gener. pag. 51.* qui novum nomen **PHYSALIS** huic generi tribuit.

ALLAKERALYA. *Mus. Zeyl. pag. 67.* *Alla* denotat radices majores edules.

ALOE Zeylanica pumila foliis variegatis. *Par. Bat. Pr. pag. 306. H. Amst. tom. 2. Fig. 21. pag. 41.* *Aloë pumila Zeylanica serpentaria. Breyn Prodr. 2. pag. 12. Plukn. Phyt. Tab. 256. Fig. 5.* Separantur hae plantae in *Ray. tom. 3. ut apparet. pag. 568. & pag. 572.* *Aloë Zeylanica, folio ex viridi & nigro vario. Heist. Cat. pl. Acad. Juliae ann. 1732. pag. 2.* *Aloes* character habetur apud *Linnaeum in char. gen. pl. pag. 99.*

ALSINE hirta minor, foliis alternis, floribus solitariis. *Nobis. Tab. 6. Fig. 1.* *Alsine Zeylanica, humirepens, foliis Auriculae muris, flosculis caeruleis, siliquis pusillis turgidis. Herb. Herm. Alsine Zeylanica repens, Auriculae muris folio, floribus caeruleis, liliaceis (siliquis) parvis turgidis. Mus. Zeyl. pag. 11.* *Alsine Zeylanica, rotundifolia,*
B 2 hirsuta,

hirsuta, flosculis coeruleis *ibidem* pag. 37. Alsine folio Pilosellae, exiguis capitulis Lini. *ibidem* pag. 56. Myosotis foliis subrotundis, herba Indiae Orientalis. *Plukn. Phyt. Tab. 205. Fig. 7.* WISNUGARANDI incolis vocatur, a *Wisnu*, quod nomen alicujus Dei est apud Malabaros, quem in templis suis adorant. *Garandi* notat Dysenteriam, cui plurimum confert haec planta; ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 11 & 56.*

Puella licet haec planta sit, non tamen inelegans est, quae ex radice fibrosa repente oritur, multis ramulis praedita, tota quanta hirsuta, caules enim, ut & folia, immo ipsi foliorum & florum pedunculi hirsutiae sua ruffa, quasi lanugine undique obducti sunt. Folia gerit alterna, subrotunda ab utraque parte pilosa, cauliculis brevi annexa pedunculo, ex quorum alis flores solitarii egrediuntur longo pediculo, & calice quinquefido suffulti; flosculi autem sunt liliacei, pentapetaloides, coloris coerulei, pro plantae ratione satis magni, quibus deciduis vascula feminalia apparent rotunda, turgida membranacea, pericarpio magno in quinque partes dissecto contenta, in quibus vasculis plurima reperiuntur semina, minima, subrotunda, nigricantia.

Dubito, an non sit Anagallidis inferius descriptae & depictae species, si non eadem; quum autem diversis nominibus ab *Hermanno* & *Hertog* fuerint collectae & ad vivum denominatae, in exsiccatis mutationem facere & eas conjungere arduum mihi videbatur, praeterquam quod ante collationem jam aeri essent insculptae, si quis vero pro iisdem habeat, non multum forte hallucinabitur.

ALSINE lutea, ramosissima, pentaphylla, polyanthos. *Nobis. Tab. 6. Fig. 2.* Alsine Zeylanica, humirepens, floribus luteis, capitulis Lini, Spergulae facie. *Herb. Herm.* Alsine folio viridi, subrotundo, ramosa, capitulis parvis rotundis, *Mus. Zeyl. pag. 33.* Alsine Spergulae facie, Maderaspatensis, foliis latioribus, semine minutissimo nigro. *Plukn. Phyt. Tab. 118. Fig. 1.*

Major & elatior multo quam praecedens progerminat haec planta, ramosa itidem & repens, sed ramis laxis, longissimis sese diffundens, caules habens rotundos, glabros, virides, ad quorum divaricationem folia subrotunda, glabra, oriuntur, numero utcunque quina, tria ut plurimum majora, bina minima, & in exsiccata aliquando vix conspicua, unde in *Pluknetii Figura* in plantae nempe parte superiore forte sunt omissa. Ad foliorum ortum pedunculi longissimi, ramosi admodum
flores

ALSINE erecta pentaphylla, flore albo. Nobis.

981 *Oldenlandia biflora* L.

flores in supremo sustinentes proveniunt. Flosculi sunt parvi, pentapetali, lutei, qui clausi & per exsiccationem compressi vascula feminalia in nostra Figura referunt. Vasculum vero ipsum est turgidulum, rotundum, tenue, membranaceum, feminibus nigricantibus transparentibus repletum. Scatet enim feminibus plurimis, minutissimis, nigerrimis.

ALSINE Veronicae facie, pediculis uncialibus, & sesquiuncialibus. *Mus. Zeyl. pag. 17.* Alsine forte Veronicae affinis, Trissaginis folio & facie, Maderaspatana. *Plukn. Phyt. Tab. 125. Fig. 4.* **HIRAMANA** Zeylonensibus, quod dicitur a rota ferrata, qua Cinghali nucleum ex Nuce cocco exprimunt. ob foliorum forte similitudinem.

ALSINE Zeylanica, folio capillaceo. *Mus. Zeyl. pag. 32.* an Alsine Indica, polyanthos, tenuifolia. *Plukn. Phyt. Tab. 125. Fig. 5?*

ALSINE Glaucis marinae folio. *Mus. Zeyl. pag. 33.* Alsine Indica, Glaucis maritimae folio, flosculis ex alis longo pedunculo innixis. *Plukn. Phyt. Tab. 130. Fig. 1.*

ALSINE Zeylanica, buxifolia. *Mus. Zeyl. pag. 67.* forte convenit cum Alsine Acadiensi, Buxi folio, perenni *Boerb. Ind. pl. part 1. pag. 209.*

ALSINE erecta, pentaphylla, flore albo. *Nobis. Tab. 7.* Alsine Zeylanica, sylvestris, erecta, flore albo. *Herb. Hertog.*

Sylvestris haec Alfine species ortum suum ducit ex radice tenui, albicante, vix fibrosa, quae quamprimum e terra progerminat, est ramosa, ternos quaternos simul attollens ramulos, qui foliis cincti sunt oblongis, glabris, amoene viridibus, quinis numero, tribus utcunque majoribus, duobus minoribus, tanquam appendicibus additis; ex quorum alis flosculi solitarii, gemini saepius, longis innixi pediculis, albicantes egrediuntur pentapetali, simili contenti calice, qui vasculum seminale dant oblongum, sulcatum, punctis protuberantibus verruculis quasi oblitum, per maturitatem facile dehiscens, & quatuor efformans apices, semina emittit rotunda, minima, fusca.

ALSINE ramosa, procumbens, quadrifolia, ad radicem polyphylla. *Nobis. Tab. 8. Fig. 1.* Alsine Zeylanica, sylvestris, repens, floribus albis. *Herb. Hert.* Alsine Zeylanica, repens, sylvestris, conjugato folio, flore albo. *Hert. Catal. semin.*

Altera haec sylvestris Alfine species itidem radice albicante, sed magis fibrosa & crassiore oritur, statim ramos e terra producens, per quam quasi repens sese diffundit, circa quorum ortum plurima ad radicem erumpunt folia oblonga, ad basin angustiora, in summo obtusa, & latiora; ad ramificationes vero quatuor foliola angustiora, triplo fere minora progerminant, e quorum alis pedunculi longissimi oriuntur, in summo flores tanquam in umbella collectos gerentes: flosculi itidem sunt albi, pentapetali, vasculum feminale dantes tenuissimum, glabrum, membranaceum, semina continens minima; nigricantia.

ALSINE foliis ad radicem positis. *Nobis. Tab. 8. Fig. 2.* Alfine Zeylanica, latifolia, seu platyphyllos, Capitulis oblongis turgidis. *Herb. Herm.* Alfine Zeylanica, repens, folio succulento, flore albo. *Hert. Catal. semin.* Alfini affinis, foliis Bellidis minoris, caule nudo. *Sloan. Hist. Jam. part. 1. pag. 203. Tab. 129. Fig. 2. & Cat. Pl. Jam. pag. 87.*

Humilis haec planta instar Bellidis e terra propullulat, folia ad radicem arcte collecta gerens, glabra, viridia, tenuia, formam Bellidis perfecte referentia. Non ramosa est haec planta, sed pedunculos ad foliorum concursum, aut centrum emittit longissimos rectos, in summo instar Umbellae explicatos, quibus flores insident tetrapetali, quantum in siccata apparet, fulvi coloris seu Ochroleuci, qui clausi, tumidi sunt & oblongi, sese aperientes crateriformes, aperti vero stellati, vascula feminalia dantes subrotunda, membranacea, feminibus nigerrimis, rotundis, minimis repleta. Alfine characterem habet *Linnaeus in char. gener. pl. pag. 133.*

ALTHAEA Zeylanica, aquatica DYAAEPALA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 65.* convenit forte cum Alcea fruticosa aquatica, folio cordato, scabro, flore pallide luteo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 97.*

ALTHAEA Zeylanica incana, flore luteo parvo Abutili, foliis Ibisci; seu Althaea Indica minor, feminibus furcatis. *Mus. Zeyl. pag. 44.* an Althaea Indica, Abutili subrotundo folio, flore luteo spicato? *Plukn. Phyt. Tab. 74. Fig. 6.* Malva Americana, folio Abutili, flore luteo spicato, foliis incanis. *Par. Bat. Pr. pag. 349.* Althaea flore luteo. *Sloan. Cat. Pl. Jam. pag. 96.* KAESURUBAEWILA. Zeylonensibus a *Kaesuru*, quod leonem, & *Baewila*, quod collum significat.

748 *Mollugo pentapetala* L.

ALSINE ramosa, procumbens, quadrifolia, ad radicem polyphylla. Nobis.

Tab. 8.

Pag. 14.

ALSINE foliis ad radicem positis. Nobis.

748. *Mollugo pentapetala* L. var.

ALTHAEA Indica, minor, semine furcato. *Mus. Zeyl. pag. 40.* Althaea Zeylanica, rotundifolia, flosculis luteis parvis, folio Bellidis. *Mus. Zeyl. pag. 30.* an Althaea frutescens, orbiculari fere folio, flore luteo, Indiae Orientalis semine rostrato? *Plukn. Phyt. Tab. 132. Fig. 2.* HINANODA Zeylonensibus.

ALTHAEA Zeylanica, minor, feminibus bifurcatis altera. *Mus. Zeyl. pag. 59.* forte Malva minor, supina, Betonicae folio, flore coccineo, feminibus asperis. *Sloan. Cat. pl. Fam. pag. 96.*

ALTHAEA Indica, minima, BAEWILA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 17.* ubi habetur pro Alcea Pernambuccana, semine rostro simplici donato, quae descripta reperitur apud *Moris. in hist. pl. Tom. 2. pag. 528.* & in *Mus. Zeyl.* additur, quod folia gerat subrotunda, subtus glauca, flores vero hora meridiana aperiantur, matutina vero sole oriente claudantur. Huc pertinet Malva erecta, minor, Carpini folio, flore luteo, feminibus singulis simplici aculeo longiore donatis. *Sloan. Cat. pl. Fam. pag. 96.* ubi vide reliqua.

ALTHAEA Indica, foliis oblongis, mollibus Betonicae forma, flosculis exiguis, racematim dispositis. *Mus. Zeyl. pag. 30.* Althaea spicata, Betonicae folio villoso, spica brevior & latior. *Sloan. Cat. pl. Fam. pag. 97.* Althaea Indica, flosculis parvis, folliculatim (forte fasciculatim) ramulis adfixis *Breyn. Prodr. 1. pag. 2.* Malva Americana, Carpini folio, floribus aureis parvis, fasciculatis. *Par. Bat. Pr. pag. 350. Plukn. Phyt. Tab. 9. Fig. 5.*

Althaeae hae minores *Hermanni* ad plantas hodie Malvindas dictas pertinent, quo a Systematicis ablegari poterunt, quum ipsis autem destituor plantis, nova illis imponere nomina arduum videbatur.

ALUPADHAWAEL. *Mus. Zeyl. pag. 50 & 60.* ab *Alu* cinere, totus enim frutex, ut & fructus cinerei est coloris. *ibidem.*

AMARANTHOIDES Lychnidis folio, capitulis purpureis. *Tournef. inst. pag. 654.* Amaranthoides Indicum monospermum foliis Ocymastri, capitulis purpureis. *Par. Bat. Pr. pag. 309. & Par. Bat. pag. 14.* Amarantho affinis, sive Amaranthoides major, Indica, Ocymoidis folio & facie, flore globoso purpureo. *Breyn. Prodr. 2. pag. 13. & Commel. Fl. Malab. pag. 4.* Amarantho affinis Indiae Orientalis, floribus conglomeratis,

meratis, Ocymoidis folio. *Breyn. Cent. pag. 109.* ubi elegans icon & descript. nec non in *H. Amst. tom. 1. pag. 85.* Caraxeron Ocymastri-folium, capitulis majoribus purpureis. *Vaill. act. reg. Paris. 1722. pag. 263.* Amarantho affinis, Africanus, perennis. *H. Mauroc. pag. 12.* Gnaphalio affinis, Ocymastri folio, flore ex purpureo violaceo. *H. L. B. pag. 294.* Ptarmica Indica, hortensis, capitulis globosis, rigidis, interne purpureis. *Mus. Zeyl. pag. 8.* Ptarmica Indica, hortensis, incana, capitulis rigidis saturate coccineis, Amaranthinis. *Amaranthus globosus vulgo. Mus. Zeyl. pag. 27, 59 & 62.* Flos globosus BONGA KNOP *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 72.* ubi purpureus & albus describitur. Wadapu. *H. Malab. part. 10. Tab. 37.* WADAMBU Zeylonensibus, id est, flos non marcescens. *Fula Bouton Malabar.*

AMARANTHOIDES Indicum, nodiflorum, capitulis ex albo viridescentibus.

Nobis. Tab. 5. Fig. 2. Amaranthus Indicus, flore globofo herbaceo. *Mus. Zeyl. pag. 33.* Amaranthoides Indicum, globosum, ad caulium nodos floridum, foliis solitariis summo apice barbatis. *Plukn. Phyt. Tab. 133. Fig. 2.* Serratula Zeylanica, erecta, folio oblongo. *Herb. Hert. KATHUTAMPALA Zeylonensibus.*

Pusilla haec planta caule erigitur viridi, rotundo, cui folia alternatim adcrescunt satis remota, solitaria, glabra, oblonga, in acutum apicem desinentia, utrinque viridia. Flosculi caulibus ad foliorum ortum arctissime adfixi, seu sessiles collocantur, in caput rotundum, seu sphaericum collecti, paleacei, coloris straminei, splendentis. Amaranthoidis character exhibetur a *Linnaeo, in char. pl. gen. pag. 69.* qui generi huic novum indidit nomen **GOMPHRENA.**

AMARANTUS spicatus, Zeylanicus, foliis obtusis, Amaranto Siculo

Boccone similis. *Nobis. Tab. 5. Fig. 3.* Verbena Indica, spicata, foliis obtusis, flore coerulescente. *Herb. Hert. Verbena Indica, spicata foliis obtusis. Mus. Zeyl. pag. 1.* Verbena Indica, obtusis foliis, spica comosa. *ibidem pag. 20.* ubi pro Verbena Indica Bontii, (quae apud eum *pag. 150.* exprimitur,) & Amaranto spicato Boccone habetur. Stachyarpagophora Bliti foliis rotundioribus. *Vaill. act. reg. Paris. ann. 1722. pag. 279.* qui & alteram habet Bliti foliis pubescentibus, subtus argenteis. Cadelari Sicula, Parietariae folio. *Petiv. act. Phil. Lond. ann. 1713. pag. 181.* Cadelari *H. Malab. part. 10. Tab. 78.* qui est Amarantus spicatus, Coromandel. Bliti majoris crispato folio, radice perenni.

Plukn.

Plukn. Mantiss. vide & ejus *Phyt. Tab.* 10. *Fig.* 4. & *Tab.* 260. *Fig.* 2. & *Almag. pag.* 26. KARALHÆBO Zeylonensibus dicitur; de quo notatur in *Mus. Zeyl. pag.* 20. quod ejus succus cum Olei Sefami parte anatica sumptus curet Dysenteriam, quo cum Cadelari *H. Malab.* convenit. Puto autem hanc nostram ab Amarantho Siculo Boccone differre, ut Cadelari & Scheru-Cadelari *H. Malab.* & hanc nostram Cadelari, illam autem Boccone convenire cum Scheru-Cadelari; nostrae enim folia sunt subrotunda, & in majoribus ramis fere orbiculata, quum Amaranthi Boccone folia sint acutissima, multoque minora, ut folium solitarium *Tab.* nostrae quintae insculptum ostendit, & duas revera esse diversas species, ex Pluknetio & Vaillant. patet. Caeterum flores utriusque plantae in acutissimam spicam collecti sunt, & in reliquis conveniunt, ut ulterius ex descriptione *H. Malab.* constat.

AMARANTUS humilis, foliis oppositis, flosculis in alis conglomeratis. *Nobis. Tab.* 4. *Fig.* 2. An Amaranthoides Maderasp. foliis angustis ex adverso binis, floribus ad nodos verticillatis. *Plukn. Phyt. Tab.* 132. *Fig.* 6? Polygonum Indicum minus, flosculis glomeratis albis. *Mus. Zeyl. pag.* 14. Knauwel Zeylanica folio conjugato Linariae, flosculis in capitulum collectis. *Herb. Hert.* MUGHUNUWAENNA Zeylonensibus, a *Mughuni* quod oculos piscium denotat, quibus similes sunt hujus flores. *Waenna* notat illud, quod humi jacet, ac serpit, planta enim est humi repens, quae virtutis est refrigerantis, & ejus folia a Cinghalensibus comeduntur loco Bliti, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag.* 14. *Ponnakani* Malabaris audit.

E radice fibrosa albicante provenit caulis brevis ad radicem ramosus, quadrangularis, tenuis; cui folia adcrescunt opposita, oblonga, angusta, integra, utrinque viridia. Flores in capitulum sunt congesti, saepius oblongum, in alis foliorum sessiles, albicantes, nitidi. Calix florum minimus est, quinquesidus; stamina quinque, pistillum unicum, capsula seminalis fere orbiculata, emarginata, unilocularis, condens semen unicum subrotundum nitidum, splendens, unde verus est Amaranthus.

AMARANTUS Indicus minor, folio subrotundo. *Mus. Zeyl. pag.* 1. An Amaranthus verticillatus minor, Bengalenlis, Serpilli foliis incanis. *Plukn. Phyt. Tab.* 10. *Fig.* 3? vel potius Amaranthi genus pusillum subrotundis foliis Indianum. *Plukn. Almag. pag.* 12.

AMARANTUS Zeylanicus, maximus, humilis KUMATHYA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 1.*

AMARANTI species, foliis Halimi maritimi nostratis. *Mus. Zeyl. pag. 8.*

AMARANTUS Zeylanicus, spicatus, Salicis folio, flore carneo. *Hert. Catal. semin.* Amarantus Zeylanicus, Salicis folio, flore carneo. *Heister. Ind. plant. Hort. Acad. Juliae anni 1730. pag. 3.*

AMARANTUS spicatus, aureus, Zeylanicus. *Mus. Zeyl. pag. 30.* Amarantus spicatus, aureus & igneus. *Boerb. Ind. H. L. B. part. 2. pag. 98.* Amaranthus aurea spica, & ignis versicolore. *H. R. Par.* Amaranthus luteus, spicatus. *Weinman. Phytanthoz. no. 84. litt. b.*

AMARANTUS Indicus, angustifolius, spica rigida alba. *Mus. Zeyl. pag. 66.* Amarantus spicatus, argenteus, Americanus. *Boerb. Ind. H. L. B. part. 2. pag. 98.* Amaranthus Linariae folio, spica argentea. *Weinmann. Phytanthoz: n. 96. litt. c.* Amarantus forte minor Indicus, folio Tripolii, flore ex aeneo & argenteo colore variegatus. *Amm. Char. pl. pag. 155.* *Breyn Prodr. 1. pag. 3.* KIRIHAENDA Zeylonensibus, a Kiri quod lac notat & Haenda, quod cochlear.

AMARANTUS Indicus, spinosus, spica herbacea. *H. L. B. pag. 31.* ubi descriptio & *pag. 33.* ejus Figura. Amaranthus Indicus spinosus, spica herbacea monospermos, cauliculis viridantibus. *Par. Bat. Pr. pag. 309.* ubi & idem cauliculis rubentibus & spica purpurascente citatur, nec non a *Tournef. inst. pag. 236.* Amarantus major, Ceylanicus, spinosus, flore viridi. *Amm. Char. pl. pag. 105.* Atriplex paniculata, Indica, spinosa. *Mus. Zeyl. pag. 62.* Blitum spinosum, Bajang Baduri. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 43.* Blitum monospermum Indicum aculeatum, capsula rotunda, seu Amaranthus major, spinosus, Zeylanicus, flore viridi. *Breyn Prodr. 1. pag. 18.* ubi & *pag. 19.* Atriplex spinosa Zeylanica *D. Hermans* vocatur. Blitum Americanum spinosum. *Ray hist. pl. pag. 199.* *Sutherl. Catal. pl. Edinb. pag. 51.* *Sloan. Cat. pl. Jam. p. 49.* KATHUTAMPALA Zeylonensibus, id est Amaranthus spinosus, a Kathu, quod spinam notat, & Pala, quo omne genus Bliti & Amaranthi edulis a Cinghalensibus significatur.

AMYG-

ANAGALLIS hirsuta, foliis solitariis alternis, floribus coeruleis. &c.

3177 *Dracopis alsinoides* L.

AMYGDALUS amara Indorum, putamine fungoso. amicta, flore umbellato, nucibus ad unum florem plurimis SAMANDARA Bengalenfibus & COEMBURA Zeylanenfibus dicta. *Plukn. Mantiff. pag. 12.* Amygdalus amara fructu aggregato, cujus officulum materia crassa & fungosa cum nucleo occultatur. *Plukn. Almag. pag. 250.* ubi pro Nagam *H. Malab. part. 6. Tab. 21.* habetur.

ANACARDIUM Occidentale. *Cajous* dictum, officulo reni leporis figura. *H. L. B. pag. 30.* Pomifera, seu potius Prunifera Indica, nuce reniformi, summo pomo innascente, *Cajous* dicta. *Ray. hist. pl. pag. 1649.* *Sloan. Cat. pl. Fam. pag. 187.* qui plurima habet synonyma; ut & in *Hist. Fam. part. 2. pag. 136.* ubi *Acaju* arbor pomifera, fructu delectabili, rubro, nuce reflexa propendente, *Anacardii* ritu, *Surian* vocatur. Eleganter satis exprimitur etiam apud *Merian. insect. Surinam. Tab. 16.* *Cajous* *Clus lib. 1. Aromat. cap. 30.* *Cassuvium* *Cadju* *Rumph. Herb. Ambon. lib. 1. cap. 59. app. Acajou* *Pisonis pag. 58.* & ejus *Mantiff. aromat. pag. 193.* *Cajus* *Acostae* edit *Venet. pag. 246.* ubi Figura. *Anacardus* *Zeylanica*, folio *Nucis Juglandis* *Cajous* vulgo. *Mus. Zeyl. pag. 55.* *Acajous*, five *Anacardii* altera species *Herb. Hert.* quae quum in omnibus conveniat cum *Kapa-Mava*. *H. Malab. part. 3. Tab. 54.* ubi bene descripta & expressa est, Figuram nec descriptionem damus. Reliqua ejus synonyma & usum fructus vide apud *Samuel. Dale. Pharmac. pag. 406.* Characterem vero apud *Linnaeum Char. pl. gen. pag. 129.* *KAGHU* Zeylonice audit.

ANAGALLIS Zeylanica, minor, procumbens, *D. Hermans.* MUGUMIWENNA Zeylonenfibus. apud *Ray. tom. 3. pag. 496.*

ANAGALLIS Zeylanica, aquatica, foliis longis & angustis. *Mus. Zeyl. pag. 36.*

ANAGALLIS hirsuta, foliis solitariis alternis, floribus coeruleis, petiolo articulato infidentibus. *Nobis. Tab. 9.* *Anagallis* *Zeylanica* major, flore coeruleo. *Herb. Hert.* Simili nomine invenio *Anagallidis* speciem citatam apud *Ray. tom. 3. pag. 496.* quae inscripta est. *Anagallis* flore coeruleo major, *Lusitanica* *Grislei.* *D. Hermans.* quae cum nostra eadem videtur. Nostrae plantae Figura, sed imperfecta, occurrit apud *Plukn. in Phyt. Tab. 9. Fig. 1.* quae etiam non recte inscribitur; vocatur

tur enim *Alfines* facie *Myosotis Bisnagarica* frutescens, flosculis pallide flavescentibus. primo flosculi ibi expressi nihil minus, quam *Alfinis* aut *Myosotidis* speciem referunt, *Convolvuli* enim sunt: secundo planta est humillima, vix spithamum alta, nec caulescens, unde ergo denominatio frutescentis? Tertio additur flosculi quidem ut *Anagallidis* (quod in Figura minime conspicitur) non tamen coerulei; an ergo si essent coerulei, color characterem *Anagallidis* daret? Ita ut nihil certi de iis possimus concludere. Veram itaque & meliorem hujus plantae hic dabimus figuram & descriptionem. Quae radice oritur firma, longa, crassiuscula, cinerea, multas fibras emittente, quae paulo supra terram varios dat ramos cauliculis & foliolis hirsutissimis instructos: folia autem alterne locantur, pedunculis brevissimis caulibus adfixa, sessilia fere, subrotunda, ab utraque parte valde pilosa, superiore viridia, inferiore cinerea, per ejus dorsum nervo, qui pedunculi brevissimi continuatio est, ad summum excurrente: Ex alis vero foliorum proveniunt flores longissimis, sed tenuissimis pedunculis insidentes; pedunculus autem in medio duo foliola, caliculum haud male referencia habet, ubi facile frangitur, & ex quorum foliolorum juncturis alter quasi pediculus per articulationem oritur. Flores sunt quadrifidi, in quatuor segmenta divisi, in quorum medio quatuor stamina apices flavos oblongos habentia eriguntur, calice longo, hirsuto, quadrifariam profunde dissecto, contenti, coerulei, ut *Anagallidis Monelli*, Vasculum feminale est sphaericum, membranaceum, semina nigricantia, triangula continens plurima.

ANANAS sylvestris, arborescens *Acoftae*. *Mus. Zeyl. pag. 55.* *Ananas bravo Acoftae edit. Ital. in quart. pag. 265.* ubi Figura & apud *Clus cap. 45.* *Ananas sylvestris folio Aloes, fructu cupressino. J. B. tom. 3. pag. 96.* *Commel. Fl. Malab. pag. 5.* *Plukn. Amalth. pag. 13.* ubi plura synonyma, & in *Almag. pag. 277.* *Palmae* affinis arbor conifera *Mascatensis*, longissimo folio tribus ordinibus spinarum munito, vocatur. Frutex Indicus fructu aggregato conoide **KAIDA** dictus. *Ray Hist. pl. pag. 1442.* *Kaida Taddi. H. Malab. part. 2. Tab. 1.* *Nana Brava Marcgrav. pag. 33.* *Pandanus verus, Pandang. Rumph. Herb. Ambon. lib. 6. cap. 80.* qui plurimas hujus habet species. **WAETHAKEIYA** Zeylonensibus, hujus generis character optime exprimitur a *Linnaeo* in *Char. gen. pl. pag. 99.* ad **BROMELIAM**.

ANGUINA Zeylanica, minor, fructu parvo, subrotundo, acuminato. *D. Tilly.* quo nomine a doctissimo illo Botanico praeterito anno transmissum fuit semen, quod vix e terra ortum nescio quo casu interierit.

ANONA sylvestris *Mus. Zeyl. pag. 59.* Anona *H. Amst. tom. 1. pag. 133.* novem Anonae species descriptas vide apud *Ray tom. 3. pag. 76, 77. & sequent. in dendrol.* an Anona Manoa *Rumph. Herb. Ambon. lib. 1. cap. 39?* ALUGHAS haec nostra Zeylonensibus dicitur, cujus radice utuntur tinctores ad rubellum colorem conficiendum.

ANONA fructu virescente. *Mus. Zeyl. pag. 62.* Anona Indica, pomo viridi. *Par. Bat. Pr. pag. 312. & Comm. Fl. Malab. p. 5.* Anona Indica, fructu conoide, viridi, squamis veluti aculeato. *Plukn. Phyt. Tab. 135. Fig. 2. & Almag. pag. 32.* ubi variae proponuntur species, nec non apud *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 203.* ubi Anona maxima, foliis latis, splendentibus, fructu maximo, viridi, conoide, tuberculis seu spinulis innocuis aspero, cum hac maxime convenit. quae in *Hist. Jam. part. 2. pag. 166. Tab. 225.* exhibetur. Anona tuberosa, Manoa Pannatis *Rumph. Herb. Ambon. lib. 1. cap. 4.* cujus fructus est viridis, squamosus. ANON incolis dicitur.

ANONA fructu rubicundissimo. *Mus. Zeyl. pag. 68.* Anona forte foliis subtus ferrugineis, fructu rotundo, majore, laevi, purpureo, semine nigro, partim rugoso, partim glabro. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 206. & Hist. Jam. part. 2. pag. 170. Tab. 229.* Cainito folio subtus aureo, fructu maliformi. *Plum. nov. pl. gener. pag. 10.* Guanabanus fructu purpureo. *Plum. Cat. pl. Amer. p. 43.* Chrysodendros Americana *Plukn. Almag. p. 42. &c.* Anonae character describitur a *Linnaeo in Char. pl. gen. pag. 158.*

ANONIS Asiatica, frutescens, floribus luteis, amplis. *Tournef. inst. pag. 409. & Herb. Hert.* Crotalaria Asiatica, frutescens, floribus luteis, amplis, trifolia. *H. L. B. pag. 197.* ubi icon & descriptio. Laburnum Zeylanicum, floribus ex luteo & rubro variegatis, filiquis bullatis, *Breyn. Prodr. 1. pag. 40.* Ononis natrix dicta, frutescens, Zeylanica, Laburni folio, flore luteo, spicato, amplo. *Ejusdem Prodr. 2. pag. 78.* Crotalariae trifoliatae species. *Mus. Zeyl. pag. 24.*

Cytifus Zeylanicus, folio Laburni, Ammanni apud *Ray. tom. 2. pag. 1893.* Nella-Tandale-Cotti: *H. Malab. part. 9. Tab. 27.* ubi in notis Genista trifolia, Malabarica, floribus luteis amplis, filiquis bullatis. *pag. 49.* vocatur. Vide & *Fl. Malab. pag. 33.* JACBFRYA Zeylonice audit. reliquas hujus species ad *Crotalarias* infra vide descriptas.

ANTIDESMA spicis geminis. *Nobis. Tab. 10.* Berberi dumetorum baccas fimiles ferens arbor. *Herb. Herm.* Berberis fructu arbor baccifera, racemosa, foliis integris, acuminatis, fructu rotundo, monopyreno. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 170.* Cum hac convenit, ut & Nulitoli. *H. Malab. part. 4. Tab. 56.* quae Berberis Indica, Aurantii folio ibidem vocatur.

Arboris nostrae lignum est firmum, & solidum, cortice cinereo obdutum, ex trunco multos emittens ramos, quibus folia adcrefcunt folitaria, alterna, subrotunda, acuminata, integra, glabra, obscure viridia & splendentia, mire & eleganter cancellata: Flores gerit in summitate ramorum spicatos, ex duabus inprimis spicis tenuibus, communi pedunculo provenientihus cōalitos, qui spicae arcte adcrefcunt, & exigui admodum sunt, quorum calix quinquefolius, minimus est, stamina habentes tria, calice longiora, apicibus ex duobus veluti globulis compositis, post quos baccae fequuntur Berberi dumetorum fimiles, cylindricae, a quo floribus maxime differt, unde fingulare genus conftituimus Antidesmae, ab ἀντί contra & δίσμα venenum, quia contra morfus serpentis venenatiffimi Colubrade Capello dicti, specificum est. Berberidis autem character occurrit apud *Linnaeum in Char. pl. gen. pag. 94.*

ANTIRRHINUM humile, angustifolium, flosculo gemello, ex alis foliorum producto. *Nobis. Tab. 11.* Antirrhinum Zeylanicum, sylvestre, flosculo rubello, eleganti. *Herb. Hert.* Antirrhinum minus. *Mus. Zeyl. pag. 4.* Antirrhinum Indicum, purpureum, pusillum. *Mus. Zeyl. pag. 47.*

Pusilla licet haec & sylvestris, elegans tamen Antirrhini est species, quae ramosa admodum est, ex radice cinerea, fibrosa, longa, proveniens, variis ramificationibus sese dispergens, folia gerit caulibus ad nodos quasi collecta, semiuncialia, bina opposita, seu instar Perforatorum folia caulem arctissime ambiunt, & quasi ex eo prorumpunt, sessilia penitus, ad quorum connexum flosculi bini ut plurimum, in initio

*ANTIDESMA spicis
geminis. Nobis.*

ANTIRRHINUM humile, angustifolium
flosculo gemello, ex alis foliorum
producto. Nobis.

Fig. 1.

Fig. 2.

APOCYNUM flosculis fasciculatis. Nobis.
1766 *Apocynum frutescens* L.

APOCYNUM arborescens, Verr. flore. minus. Nobis.
1715 6. *Herium zeylanicum* L.

initio communi pedunculo, dein gemino suffulti progrediuntur, in opposita autem parte plerumque ramulus florifer oritur, quatuor, sex, prout major, vel minor est, foliis constans, in cujus summo flosculi parvi, personati, monopetali, bilabiati, labio superiore bifido, inferiore trifido locantur, coloris rubelli, calice caduco aut facile marcescente contenti, in fructibus enim nullum hujus vestigium relictum est: Fructus autem est oblongus, angulosus, in summo quatuor cornicula gerens, in duos loculos perpendiculariter fissus, unde bilocularis est, & repletus seminibus minutissimis, rotundulis, nigerrimis.

APOCYNUM flosculis fasciculatis. *Nobis. Tab. 12. Fig. 1.* Apocynum Zeylanicum, fruticosum, mite, *Mus. Zeyl. pag. 71. & Herb. Hert.* Apocyni facie fruticescens, Zeylanica. *Ray. tom. 3. pag. 538.* huc spectat Apocynum fruticosum, folio oblongo, acuminato, floribus racemosis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 89. & hist. Jam. tom. 1. pag. 18. Tab. 4. Fig. 2.* **KIRIWAEL** Zeylonensibus dicitur a *Kiri* quod lac notat, tota enim planta lactescit, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 71.* unde & Pseudo-Apocynum arborescens, erectum, non lanigerum, lacte dulci praegnans, obtusis integris foliis, Zeylanicum, **KIRINDI-WALL Hermannii** vocatur apud *Moris. tom. 3. pag. 612.* **KIRIDI-WAEL** autem in *Mus. Zeyl. pag. 10.* ubi additur. Arbor est foliis conjugatis, splendentibus, floribus parvis spicatis; pronuntiatur *Kirindiwael.* De hac vide notas ad. *H. Malab. part. 1. pag. 84.* Mangle Zeylanica, folio lucido venoso, in acumen producto, **KIRINDI-WAEL** Zeylonensibus *D. Herman* apud *Ray tom. 3. dendrol. pag. 116.* Mangle Zeylanica foliis acuminatis, pulchre venosis. *Petiv. hort. sicc. apud Ray. tom. 3. append. pag. 246.*

Variis hisce nominibus proposita haec arbuscula caules gerit lignosos, glabros, fuscis, quibus folia adcrescunt, brevi innixa pediculo, bina sibi invicem opposita, oblonga, acuta, lata, glabra, venosa, parte superiore saturate viridia, inferiore pallescentia, emittens ex foliorum alis longissimos pedunculos; quibus flores brevioribus pediculis fasciculatim adcrescunt, in parvis quasi fasciculis collectos, vario modo per illos dispersos, flosculi autem sunt oblongi, tubulati, quinquefidi, calicibus suis oblongis, quinquefidis contenti, coloris purpurei. Fructum non vidimus.

APOCYNUM arborescens, Nerii flore, minus. *Nobis. Tab. 12. Fig. 2.*
Apocy-

Apocynum Zeylanicum arborescens, Caryophylli, seu Armenii flore minus. *Herb. Herm.* Nerium lactescens, Myrti Laureae folio rugoso. *Breyn. Prodr.* 2. pag. 76. Apocynum Zeylanicum Jasmini flore Hermannii. *ibidem.* Apocynum minus vocatur respectu aliorum hujus generis, quae infra ad *Neria* proposita inveniuntur, hoc autem juxta *Hermannum* hic descripsimus, licet *Nerii* vera habenda sit species. Reliquis tenerius & multo minus est, folia enim hujus sunt triplo fere minora, quam in aliis, quae sunt oblonga, acuminata, Myrthi aemula, viridia utrinque. Flores gerit in summitate ramulorum tubulosos, pentapetaloides, decem staminibus gaudentes, calice rotato, quinquefarium diviso, contentos, post quos filiquae solitariae, angustae, erectae, minimae videntur oriri, ut in figura nostra, in qua post lapsum florem filiquae rudimentum apparet, exprimitur. Caules hujus fruticis sunt rotundi, nigricantes, seu obscure purpurei, glabri, erecti, ad genicula, e quibus folia proveniunt, protuberantes. in reliquis caeterum cum infra expressis *Neriis* haec convenit.

APOCYNUM Indicum, Asclepiadis facie, esculentum. *Mus. Zeyl. pag. 17.* KIRIAGHUNA Zeylonensibus, a *Kiri* lac, & *Ghuna* species. quasi diceret, species certa lactis. Herba lactescit, & in defectu lactis vacchini aut alterius substituitur hoc lac; folia quoque concoquuntur cum cibis, in quibus lacte opus est, ut annotatur in *Mus. Zeyl.* unde suspicor, quod vera sit *Asclepiadis* aut *Vincetoxici* species, si enim in aliis Apocyni speciebus, lac suum praebentibus, hoc institui vellet, pessimum certe fortiretur eventum, quum omnes sint venenatissimae, ut odore ipso viroso facile detegitur.

APOCYNUM Indicum, repens, folio ad basin auriculato. *Mus. Zeyl. pag. 44.* WAELKAPPU & KIRIANGHURA Zeylonensibus.

APOCYNUM Indicum, maximum, floribus amplis, Janthinis, obsoletis, Beidelossar Alpini, Erici *H. Malab. Mus. Zeyl. pag. 34.* Apocynum Beidelossar. *ibidem. pag. 27.* Apocynum erectum, incanum, latifolium, Malabaricum, floribus ex albo suave purpurascens. *Par. Bat. pag. 28.* Apocynum latifolium, Aegyptium, incanum, erectum, floribus magnis, pallide violaceis. *Par. Bat. Pr. pag. 313.* Apocynum erectum, latifolium, incanum, Zeylanicum, maximum, floribus maximis, purpurascens. *Hert. Catal. semin.* Apocynum erectum, majus,

majus, latifolium, Indicum, flore concavo amplo, carneo-suave-
purpurascente. *Breyn. Prodr.* 2. pag. 14. *Commel. Fl. Malab.* p. 5.
Plukn. Almag. pag. 35. & *Moris. tom.* 3. pag. 609. *Ericu H. Malab.*
part. 2. *Tab.* 31. *Plukn. Phyt. Tab.* 175. *Fig.* 3. *Petiv. act. Philosoph.*
Lond. vol. 22. *no.* 271. *pl.* 150. Eleganter etiam haec exprimitur in
Sebae rerum natur. thes. *part.* 1. *Tab.* 26. *Fig.* 1. *Ericu Americana*
ibidem dicta. WARA & WARAGHAHA Zeylonensibus.

APOCYNUM Indicum, sylvestre, inodorum, filiquosum, feminibus pap-
posis, floribus albis, amplis. *Mus. Zeyl.* pag. 47. *Apocynum erectum,*
incanum, latifolium, Malabaricum, floribus omnino albis. *Par. Bat.*
pag. 29. *Apocynum majus, Syriacum, caule viridi, flore ex albido.*
Pr. Par. pag. 139. *Commel. Fl. Malab.* p. 6. *Belericu H. Malab. part.* 2.
pag. 56. vide & *Ray. tom.* 3. pag. 532. IDDA Zeylonensibus.

APOCYNUM Indicum, minus Nummulariae folio. *Breyn. Ephem. Germ. ann.*
4 & 5. *obser.* 138. & apud *Ray. tom.* 3. pag. 533. de quo vide *Par.*
Bat. pag. 38. *Apocynum scandens, Africanum, Convolvuli minoris*
folio, & caule hirsutis. *Plukn. Almag.* pag. 37. & *Phyt. Tab.* 137.
Fig. 4. *Breynii* autem *Figura* melior est.

ARBOR JURIGHAS dicta. *Mus. Zeyl.* pag. 5. ubi additur, hujus ma-
teries fortis ac dura, apta est ad aedes exstruendas.

ARBOR Indica, amara, nucleis Amygdali facie, *Katappas* Lusitanis,
SAMANDARA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl.* pag. 5.

ARBOR BIMMILILA Zeylonensibus. *Pau de Milile* Lusitanis. *Mus.*
Zeyl. pag. 5. Optimum ligni genus est ad fabricandum. dicitur a *Bim*
quod humum notat, & *Milila* quod arborem praegrandem.

ARBOR NAGHAS seu Ferrea dicta. *Mus. Zeyl.* pag. 7. NAGHAHA
etiam vocatur, hoc est arbor ferrea; Ferrea enim duritie est hujus ar-
boris materies, unde a Belgis YSERHOUT, a Lusitanis *Pao Ferreo*
nuncupatur. Floribus est rosaceis, candidis, odore moschato, grato;
qui flores odoris gratia inter alios odoratos collo gestantur a Mysticis.
Folia sunt bina, opposita, longa, octo vel duodecim digitos lata, sub-
tus argentea; flores proveniunt ex alis foliorum cum squammoso glo-
bulo, pediculo brevi. *Mus. Zeyl.*

ARBOR farmentosa, fabifera, KALAWAEL & WALLOURODU incolis dicta. *Mus. Zeyl. pag. 8. 21 & 24.* ubi dicitur, folia habet conjugata, terna, quina, flores papilionaceos; ramis loco funium commodissime utuntur; hujus succus epotus inebriat, aquae infusus pisces itidem ebrios reddit, illosque allicit, ut manibus capiantur, interdum ipsos etiam enecat: quod idem de Coculi fructibus verum est, & expertus sum. in *Mus. Zeyl. pag. 24.* vocatur & *Pike de Buschio.*

ARBOR BOBU dicta, *Mus. Zeyl. pag. 9.* Bombu arbor Zeylanica, cujus folia tinctoribus inserviunt, *Petiv. Mus. 39.* Foliis est ferratis, floribus spicis parvis ad exortum foliorum provenientibus. Pronunciatur *Bombu & Bohum.*

ARBOR Malabarica **ILLA** dicta, cujus cortice vescuntur Indi, defectu foliorum Beteles. *Mus. Zeyl. pag. 11.*

ARBOR stercoraria, Zeylanica, glandifera, MAELLAHOLA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 13.* ubi additur, foliis utuntur Cinghalenses in acetariis, quemadmodum Europaei Lactucâ.

ARBOR GHAEDUBA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 14.* ubi dicitur, ex hujus arboris ligno fiunt carbones, ex quibus conficitur pulvis pyrius. **GHAEDUMBA** pronunciatur, & dicitur a glutine, quod corticis succus sit viscosus ac glutinosus. Mulierculae praegnantibus utuntur hoc succo ad sanandos nodos mammarum, earumque dolores. *ibidem.*

ARBOR Zeylanica, foliis subrotundis, crenatis **WAELMINDI** dicta. *Mus. Zeyl. pag. 18 & 33.* ubi notatur, quod sit arbor foliis Zinyphi alternis, sed rotundioribus & latioribus, ex alis foliorum producens baccas instar Uvae, seminibus intus magnis. *Mindi* denotat uvas. Puto autem hanc Sambuci sylvestris speciem esse, quum inter sambucos infra propositos quaedam species etiam sit, quae **MINDI** vocatur. *Wael* sylvestre notat & farmentosum.

ARBOR WAELMENDYA & MAENDYA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 3, 5, 13 & 27.* sic dicitur, quia ad arcus conficiendos commodam praebet materiam. a Lusitanis vocatur *Jacka de Mato.* fructus enim hujus edulis est. **MENDYAE** variae sunt species & denominationes, ut patet ex *Mus. Zeyl. pag. 13, 17 & 19.* Prioris haec forte species, ni eadem.

ARBOR

ARBOR Zeylanica, Cuminum redolens, ANKAENDA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 23.* ubi additur. Baccae arboris Cuminum redolent, fundentes Oleum Cumini spirituosum. *An* denotat corium vaccinum. KAENDA filum ferreum. Materies hujus arboris apud Cinghalenses familiarissima est ad conficienda scamna, aliaque.

ARBOR Zeylanica, floribus odoratis, faciem humanam quodammodo referentibus. *Mus. Zeyl. pag. 39.* Arbor Zeylanica, floribus odoratis, humana facie. *ibidem. pag. 23.* MUNAMAL & MUNCHUNAMAL Zeylonensibus. a *Muna* quod faciem humanam notat, quam quodammodo referunt. Flores gratiosum spirant odorem, & a mulierculis coronae in modum collo ac capite gestantur, ut notatur in *Mus. Zeyl. MANUMAL* Cinghalensium in *act. Phil. Lond. vol. 22. no. 271. pl. 125.* jungitur cum Elengi *H. Malab. part. 1. Tab. 20.* sed cujus flores nihil minus quam faciem humanam repraesentant.

AN ARBOR Gummi guttam fundens, GAETHAGHORAKA Zeylonensibus dicta. *Mus. Zeyl. pag. 23.*

ARBOR Indica *Gummi Guttam* fundens, fructu dulci, rotundo, Cerasi magnitudine, CARCAPULI Acoftae. *Mus. Zeyl. pag. 26.* ubi dicitur Carcapuli Acoftae, & Linschoti differunt flore & fructu, reliquis conveniunt, ex utraque enim fluit Gummi Gambe &c. De his vide *Ray. tom. 2. pag. 1661.* & notas ad *H. Malab. part. 1. pag. 42.* & *Amm. Char. pl. pag. 393.* CARCAPULI figura prostat *pag. 274.* apud *Acoft. edit. Venet. in quarto,* & in editione a Clusio interpretata secunda *pag. 296 & 297.* in 8vo. describitur. ut & apud *Clus. cap. 46.* cum qua convenit Arbor Cambodiensis Guttam Gambi fundens ex dictariis Cl. Hermanni apud *Plukn. Almag. pag. 41.* & Carcapuli forte Linschotani fructu dulci, rotundo, Cerasi magnitudine KANNA-GHORAKA, id est Ghoraka dulcis Cinghalensibus dicta. in *Mantiss. pag. 20.* ubi additur, quod *Caspar. Bauh. in Pinac.:* cum Carcapuli Acoftae, fructu Mali aureae aemulo perperam confuderit; ut patet ex notis ad *H. Malab. part. 1. pag. 42.* de qua vide *Samuel. Dale Pharmac. pag. 438.* ad CAMBOGIUM *officin.* & notas ad *Merian. insect. Surin. pag. 20.* ut & *Commel. Fl. Malab. pag. 6.* ubi Arbor Indica, quae Gummi Guttam fundit, fructu acido fulcato, aureo, mali magnitudine vocatur. vide & ad CAMBOGIUM. *p. 17* Gummi Gutta, quae ab incolis

KANNAKURKA vocatur. *Grimm. laborat. Ceyl. pag. 105.* ubi sic describitur. Arbor ista crescit in Territorio civitatis *Columbo.* jucundissima est, mediocriter alta. Folia habet rotunda, viridia, atque pingua; Fructum profert, qui non multum distat a Morella quoad magnitudinem, atque continet in se quatuor tenuia semina in quodam dulci succo, qui cum luteis venulis intermixtus est, qui edules sunt &c. Dum cortex hujus arboris percutitur, luteus ille succus copiose defluit, seque ipsum pedetentim condensat, & maturitatem suam a sole & aëre consequitur, & tunc lubricus, atque gummosus apparet; & non secus ac alia vulgaria operatur, &c. Unde vomitoria & purgantia in Hydropicis summi usus a *Grimmio* composita, ibi porro proponuntur. Variis gaudet haec arbor apud incolas nominibus, ut patet ex *Mus. Zeyl. pag. 26.* ubi KANNAWAKORAKA. KAEPNAYKORAKA. GHOKATHU, GHORAKA & KANNAKORAKA vocatur.

ARBOR KAEKURIAGHAHA odorata, ex qua fluit *Gumm. Elemi. Mus. Zeyl. pag. 52.* huc pertinet *Paeru H. Malab. part. 4. Tab. 15.* ubi *pag. 35.* vide notas. Prunifera, forte Fago similis arbor, *Gummi Elemi* fundens, figura & magnitudine olivae ex insula Barbadenfi. *Plukn. Phyt. Tab. 217. Fig. 4.* Arbor, quae nobis *Gummi Elemi* exhibet, KAKUNA-GHAHA incolis dicta. *GRIMM. labor. Ceyl. pag. 108.* ubi haec habet: Tantum *Gummi* nobis praebet haec arbor, quantum necessitas nostra postulat. Maximi usus est in Chirurgia, quoad Emplastra, Unguenta, & Linimenta. Cortex istius arboris multum pinguedinis habet, & valde terebinthinus est quoad odorem. Decoctus autem in oleo communi optimum praebet Balsamum ad ulcera carnosae & ad Linimenta. Conditur etiam, ut Emplastris immisceatur ad contusiones, fracturas, dislocationes & plures alias infirmitates. *Grimm.*

ARBOR Zeylanica ITTA dicta, resinam *Terebinthinae* similem fundens. *Mus. Zeyl. pag. 50.* vocatur etiam ITTAWAEL. *ibidem.*

ARBOR baccifera, aromatica, Zeylanica PEROMALLA dicta. *Mus. Petiv. no. 36.*

ARBOR Zeylanica, sylvestris, odore *Rorismarini* KARAPIDSCHA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 50 & 61.*

ARBOR

ARBOR MINDAELA & SAMMATRAPALAM incolis dicta. *Mus. Zeyl. pag. 24.* Folia habet maxima, fructus dependent pedales, fert glandes. *ibidem.*

ARBOR foliis Androsaemi latioribus, plurimas baccas in summitate ramulorum ferens. *Mus. Zeyl. pag. 24.*

ARBOR foliis crassis, subrotundis, capsula Euonymi. *Mus. Zeyl. pag. 25.*

ARBOR foliis latis, subrotundis, venosis, subtus glaucis, spicis longis. *Mus. Zeyl. pag. 27.*

ARBOR foliis rotundis, subtus incanis, trinerviis, flosculis parvis ad foliorum exortum. *Mus. Zeyl. pag. 31.*

ARBOR Zeylanica, spinosa, foliis tribus nervis notatis. *Mus. Zeyl. pag. 36.*

ARBOR Zeylanica, folio Caryophylli barbati. *Mus. Zeyl. pag. 35.* Flores sunt in summitatibus Origani Virginiani instar, aut Valerianae Indicae.

ARBOR Zeylanica MANIGLIA dicta, latifolia. *Mus. Zeyl. pag. 35.*

ARBOR Zeylanica MANIGLIA dicta, angustifolia. *ibidem.*

ARBOR procera, cujus fructus edules ab incolis KATILIPPU vocantur. *Mus. Zeyl. pag. 39.*

ARBOR KODALIMURISCHA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 39.* ubi additur, arboris hujus materies tanta est duritie, ut vix ferrum admittat, quod & ejus nomen notat, id est ferrum frangens.

ARBOR Zeylanica, religiosa, foliis perpetuo mobilibus. Arbor Daemonum Belgis. *Mus. Zeyl. pag. 42.* BOGHAS, BUDUGHAA & BUDUGHAS incolis dicitur. *Buddu* nomen est illius Prophetæ, qui primus sub hujus arboris grata umbra docuit Cinghalos, unde & hodie hanc arborem venerantur celebrando sua sacrificia in altari sub hac arbore exstructo. *Mus. Zeyl.*

ARBOR exitiosa, marina, lactescens, Indica, TAKKADA vocata, fructu cerasi magnitudine, incarnato, striato, Bellamodagam. *H. Malab.*

lab. Mus. Zeyl. pag. 45. Takkada frutex Zeylonensium, forte Bellamodagam *H. Malab. part. 4. Tab. 59.* apud *Plukn. Almag. pag. 361.* Prunifera Indica, fructu umbilicato, sulcato, Grossulariae simili. *Ray. hist. pl. pag. 1481.* vide & *Amm. Char. plant. pag. 290.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 56.*

ARBOR Indica, Anagyridis effigie, antifebrilis, ÆHAELA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 48.*

ARBOR Zeylanica, fructu acidulo GODHAPARA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 49.* ubi additur; Cinghali loco saponis utuntur ejus succo.

ARBOR DANGHA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 50.* ubi notatur, quod hujus fructus, dum adhuc tenelli sunt, comedantur loco foliorum Beteles.

ARBOR TALANGHAHA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 49.* ubi haec sequuntur. Ex hoc ligno fiunt trabes convexae, seu rates, cum quibus flumina & mare transcurrere conantur Cinghali. TALANGHAHA hoc est arbor TALAN. *Talana* notat trabem.

ARBOR MAKULU & MAKULUGHHAHA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 50.* ubi notatur, quod fructus comesti ebrietatem inducant, & avide devorentur a piscibus *Lellu* & *Pethijo* dictis, alias satis delicatus. Eo vero tempore, quo fructus *Makuli* maturescunt, tales pisces nequaquam comeduntur ob vomitus, aliaque symptomata, quae ab esu horum piscium causantur. *Makulu* notat cinerem, quo fructus maturi sunt adsperfi; alias nomine *Makuli* venit Tabaxir in arundine spinosa, Indica, arborecente, KUA dicta. *Mus. Zeyl.*

ARBOR Fraxini folio, flore albo, WALKOHOMBA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 55.*

ARBOR Malabarica, flosculis Jasmini odore & forma, FOGLIO BORDOS vocatis. *Mus. Zeyl. pag. 55.*

ARBOR ex Malabara, fructu, Caryophylli effigie, inodoro. *Mus. Zeyl. pag. 57.*

ARBOR Zeylanica, fructibus niveis, dulcibus, ovis formicarum similibus. *Mus. Zeyl. pag. 64.*

ARBOR

ARBOR procera **HAPUGHAA** dicta, floribus oblongis, luteis, odoratis. *Champacca* Malabaris, *Pau Fule* Lusitanis. *Mus. Zeyl. pag. 64.* *Tsjampacca* Indorum, five arbor Uvifera Indica, foliis *Lauri Americanae*. *Breyn. Prodr. 2. pag. 101.* Uvifera arbor Orientalis folio oblongo. *Par. Bat. Pr. pag. 385.* *Commel. Fl. Malab. pag. 70.* Flos Indicus **CHAMPACEA** dictus. *Bontii. lib. 6. cap. 45. pag. 190.* *Commel. Fl. Malab. p. 29.* *Sampacca*, *Tsjampacca*, *Bonga Sjangpacca*. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 3. cap. 21.* ubi sylvestris, montana, & alba describuntur. *Champacca* Philippens. flore ac fructu stellato. *Petiv. Gazoph. Tab. 24. Fig. 1.* *Champacae* descriptio prostat in *Ray tom. 3. append.* Inter plantas a Camello observatas *pag. 83. no. 2.* vide & *Amm. H. Bosian. pag. 38.* qui eam pro *Champaca H. Malab. part. 1. Tab. 19.* habet. Ex floribus hujus arboris aqua destillatur odorata, Lignum inservit vaginis conficiendis. *Mus. Zeyl. pag. 64.*

ARBOR **HINKINDAMAL** dicta. *Mus. Zeyl. pag. 64.* dicunt arborem hanc emori, si homines vilioris fortis flores ejus decerpant.

ARBOR trifoliata **WALUNDUGHAA** dicta. *Mus. Zeyl. pag. 67.*

ARBOR Solis, Indica, foliis orbiculatis **BATHAENDA** dicta. *Mus. Zeyl. pag. 68.* *Bat* *Oryzam* denotat. *Haenda* cochlear, folia enim *Cinghalensibus* inserviunt pro orbe seu cochleari, ex quo *Oryzam* coctam comedunt. *Mus. Zeyl.*

ARBOR Zeylanica, Cotini foliis subtus lanugine villosis, floribus albis, Cuculi modo laciniatis. *Plukn. Phyt. Tab. 241. Fig. 4.* ejus descriptio habetur apud *Ray tom. 3. pag. 124.* *Dendrol.*

ARBOR **BOLANGA** dicta. *Grimm. labor. Ceyl. pag. 85.* ubi sic describitur: Ingens arbor est, rotundos fructus ferens cum duro putamine; intus continet acidulum liquorem, vel pulpam feminibus plenam. &c. Unde Rob fit in fluxibus ventris optimum. Quippe quod refrigerat, & optime viscera laxata corroborat. Folia hujus arboris sunt balsamica, & convenientissima pro infusionibus & Clysteribus ad ventris fluxus. Nascitur adhuc ex hac arbore gummi, quod easdem virtutes habet ac Gummi Arabicum. Vide infra *Cydonia.*

ARBOR tristis. *Grimm. labor. Ceyl. pag. 116.* ubi haec habet: Ipsius flores aquam nobis praebent valde odoriferam, quae Cordialis, & refrigerans est, atque oculorum inflammationibus optime prodest. *Arboro Tristo Acoftae in edit. Italic. pag. 168.* Figura exhibetur cum descriptione, quae a *Pluknetio in Almag. pag. 46.* cum Arbore tristi Myrto simili *C. B. P. pag. 469.* jungitur & convenit cum Manjapumeram *H. Malab. part. 1. Fig. 21.* ubi vide notas & *Fl. Malab. pag. 8.* & *Clus. lib. 2. cap. 10.* De arbore tristi. & *Acoft. apud Clus. cap. 37.*

ARBUSCULA folio pyri, fructibus oblongis, lapideis, **MALIKIRA** dicta. *Mus. Zeyl. pag. 9.* ubi additur; Silvīs Colombensibus est familiarissima: & hanc habeo ex Jamaica foliis instar Pyri, fructibus quatuor, in eodem pericarpio, ni fallor, aperto.

ARBUSCULA Zeylanica, flosculis niveis, ovalibus; *Mus. Zeyl. pag. 58.*

ARBUSCULA Zeylanica, tricapsularis, & tricoccos, **KEEMBYA** dicta. *Mus. Zeyl. pag. 69.* an Frutex baccifer, Indicus, spinosus, trifolius, floribus spicatis, fructu plano, rotundo, tricocco. *Ray. hist. pl. pag. 1612. Plukn. Phyt. Tab. 95. Fig. 5.* quae est Kaka-Toddaly *H. Malab. part. 5. Tab. 41.* & convenit cum *Chamaelaea* infra descripta & depicta.

ARBUSCULA Zeylanica, Aceris folio baccifera, foliis e directo magis angulosis. *Plukn. Phyt. Tab. 14. Fig. 3.* Arbuscula Zeylanica, Aceris folio baccifera, Hermannī apud *Ray. hist. pl. pag. 1801. & tom. 3. dendr. pag. 93.*

ARECA Puwak, seu Arekeri Puwakwalla dicta. *Mus. Zeyl. pag. 70.*

ARISTOLOCHIA longa, Indica, aromatica, odorata, *Mus. Zeyl. pag. 9.* Aristolochia Clematitis Indica, odorata. *Parad. Bat. Pr. append. Commel. Fl. Malab. pag. 9.* Carelu-Vagon. *H. Malab. part. 8. Tab. 25.* Aristolochia Clematitis Indica, flore albicante, fructu majore *ibidem in notis.* Interrogatur a *Pluknetio*, an Aristolochia Clematitis Gangetica, foliis in aculeum abeuntibus, radice odoratissima, huic sit eadem *in Almag. pag. 49.* quod ex ejus figura comparata cum illa *H. Malab.* non constat, quum multum differant: ab ipso autem exhibetur in *Phytogr. Tab. 69. Fig. 5.* ubi inscribitur Volubilis Gangetica, sapore
acri

ARO-ORCHIS tuberosa,
platyphyllos. Nobis.

ASPARAGUS foliis falcatis, ex uno puncto numerosis. Nobis. 14 haemipheria galanga L.
2462. Asparagus falcatus L.

acri & aromatico. SASCANDA Zeylonensibus dicitur a Luna *Sanda* vocata, quia plantae hujus radix plenilunio plurimis pollet viridibus, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 9.* Aristolochia longa SACKSANDA dicta. *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 121.* ubi sic describitur: Est planta sursum se attollens. Radix est intus lignosa, sed cortex est valde aromaticus & magnam virtutem in se continet, tam pro Medicina, quam pro Chirurgia. *Cinghalenses* eam plurimi aestimant, eamque cum Theriaca sua commiscunt, quae contra morbos venenatos assumitur. Semen cum radice destillatum, praestantissimum praebet oleum, quod valde aromaticum est, viresque suas specialiter demonstrat in morbis Matricis ex obstructione provenientibus. Ex hinc Sal volatile oleosum componitur, cujus efficacia tanta est, ut artis amatoribus commendari mereatur.

ARISTOLOCHIA Zeylanica, flore atro-purpureo. *Hert. in Catalogo seminum quondam transmissorum. An Aristolochia scandens, odoratissima, floris labello purpureo, &c? Sloan. Catal. Pl. Jam. pag. 60. & Hist. Jam. pag. 162. Tab. 104. Fig. 1.*

ARISTOLOCHIA Zeylanica, Bistortae folio breviori. D. SCHERARD. apud *Ray. tom. 3. pag. 393.* ubi additur, e lata basi folium in mucronem acutum exit.

ARO-ORCHIS tuberosa, platyphyllos. *Nobis. Tab. 13. Fig. 1.* Arum Zeylanicum, radiculis Carlinam sapientibus, loco pistilli, florem in involucro gerens flavum. *Herb. Herm. Colchicum Indicum, platyphyllum, radice tuberosa, Carlinae odore & sapore, flore albo, & idem flore incarnato. Mus. Zeyl. pag. 54.* quae convenit cum *Wanhom Kaemph. Amoenit. exot. pag. 901.* ubi ample describitur, & ejus icon exstat. quae est Katsjula Kelengu. *H. Malab. part. 13. Tab. 41.* & Calceolus Philippenfis, pumila, Plantaginis folio, radice Alexipharmaca. *Petiv. Gazophyl. natur. & artis. Tab. 19. Fig. 7.* HINGU-NIPYALI Zeylonensibus audit.

Posteriores tres citatae plantae, licet folia habeant in Figuris suis rotundiora quam nostrae, eadem tamen cum nostra planta sunt, cujus folium hic exhibetur, quod florem ipsum complectitur & est oblongum, sensim attenuatum, planum, in longum mucronem terminatum. Basis autem ejus magis contracta, ubi florem ambire videtur, ad unciale

fere spatium, glabrum, latum, laete virens, paulo flavescens. Flos autem, qui in aliis Figuris ruditer, hic exactissime delineatus est, habet petala quinque obtuse ovata; Nectarium ad unum latus interhiatum petalorum ab altero latere spatium vacuum replet: Constat labio superiore galeato petalis brevior; lateralia autem sunt emarginata, quae lacinae sunt floris. Labium inferius lambdoideum ungue angusto petalis longius est. Unde ad Orchides proxime pertinet; quum autem flos à folio, ut videtur, amplectatur, & illud folium Ari folio reliquum florem ambienti maxime conveniat; ARO-ORCHIS planta haec convenienter vocatur.

ARUM Zeylanicum, maximum, spinosum, radice longa, repente. *Mus. Zeyl. pag. 56 & 64.* Arum Zeylanicum, spinosum, Sagittae foliis. *Par. Bat. pag. 75.* ubi descriptio. KOHI WILA Zeylonensibus. de Aro Grimm. in *Laborat. Ceyl. pag. 125.* haec habet: apud nos extraordinarie magnum est; Conficiunt ex eo farinam incolae, quae plurimum eos juvat, hinc habemus etiam nostrum Faecul Aronis.

ARUM Zeylanicum, minus, Sagittariae folio. *Par. Bat. Pr. pag. 315.* *Commel. Fl. Malab. pag. 9.* Arum minus, Sagittariae folio ex insula Barbados. *Plukn. Phyt. Tab. 149. Fig. 2.* Vide & *Sloan. Catal. pl. Jam. pag. 63.* Nelenfchena major. *H. Malab. part. 11. Tab. 20.* Dracunculus forte Ambonicus Anappur. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 88.*

ARUM humile, Ceylanicum, latifolium, pistillo coccineo. *H. Amst. part. 1. Fig. 51. pag. 97.* Arum humile, Arisarum dictum, latifolium, Ceylonicum, pistillo longissimo, miniato colore. *H. Med. Amst. Catal. pag. 36.* ubi cum Nelenfchena *H. Malab. part. 13.* nondum edit. jungitur. vide & *Fl. Malab. pag. 9.* ubi Arisarum Indicum petraeum, humile, pistillo rubro adhaerente, granulis purpurascens *Commelini in notis ad H. Malab. part. 11. pag. 33.* vocatur. An Arisarum esculentum Daun-Cassise? *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 87.*

ARUM maximum, Zeylanicum, macrorhizon. *Par. Bat. pag. 73.* ubi Figura & descriptio. Arum Zeylanicum, maximum; flore odorato. *Mus. Zeyl. pag. 63.* Arum maximum, Zeylanicum, flore Moschum redolente. *Amm. Char. pl. pag. 345.* Arum maximum, Zeylanicum, foliis

foliis nervosis. *Par. Bat. Pr. pag. 314. & Mus. Zeyl. pag. 71.* HABARA & HABARALA. Zeylonensibus. Ari Indici fativi, & sylvestris descriptio est apud *Rumph. in Herb. Ambon. lib. 8. cap. 81 & 82.*

ARUNDO farmentosa, Indica, baccifera, foliis in extremo capreolatis. *Mus. Zeyl. pag. 6.* Frutex Indicus, scandens, foliis Mendoni instar in capreolum delinentibus, fructu parvo coronato. *Plukn. Amalth. pag. 101.* Panambol-Valli *H. Malab. part. 7. Tab. 53.* GHOIGIWAELE Zeylonensibus, quod pronunciatur GHOIWAELE. *Ghoigi pali* notat commodum lignum. *Wael* vimen.

ARUNDO Zeylanica, farcta, odore & sapore Calami Aromatici. PENGRI MAN Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 26.* an Arundo farcta, Tubu Sala? *Rumph. Herb. Ambon. lib. 6. cap. 10.* Arundo Indica, odorata. *Grimm. Laborat. Ceyl. pag. 120.* ubi haec habet: a parte inferiori est arundinacea, & a superiori veluti Gramen. Radix satis est dura, dum scinditur, instar ligni finditur, valde odorifera est, convenit aliquibus modis cum Calamo. in membra pariter divisa est, nodosa, & satis abundanter circa civitatem nostram Columbo crescit. Calefaciens est, incidens, aperiens, & dissipans. Per destillationem pulchrum oleum exhibet, quod in parva dosi totius plantae virtutes continet, stomachum confortat, concoctionem adjuvat, quae ex frigidis, viscosis & putridis humoribus impeditur. Optimum est ad menstruorum obstructions, eaque expulsat: Parem habet aqua virtutem. aptissima haec planta est ad Balnea & Thermas in Beriberi & in morbis supra dictis.

ARUNDO Indica, arborea, maxima, cortice spinoso, Tabaxir fundens. *Mus. Zeyl. pag. 46.* Arundo arbor. *C. B. P. pag. 18.* Mambu Pisonis *Mantiss. aromat. cap. 10. pag. 186.* Bambu Belgis *Mus. Zeyl. pag. 96.* Ily *H. Malab. part. 1. Tab. 16.* Arundo Indica, arborea, maxima, cortice spinoso. *Hermannii ibidem in notis*, quas porro vide *pag. 26.* & *Fl. Malab. Commel. pag. 10.* Arundo Tabaxifera *Offic. Samuel. Dale. Pharmac. supplem. pag. 251.* De Tabaxir humore vide *Clus. aromat. hist. lib. 1. cap. 12. & Acoft. arom. lib. cap. 6.* Canna ingens Mambu vel Bambu dicta *Parkin. Theat. pag. 1630.* Arundo arborea Mambu, vel Bambu dicta. *Plukn. Almag. pag. 53.* ubi vide reliqua & *Ray tom. 2. pag. 1315.* UNAGHAS Zeylonensibus dicitur, id est arbor febrilis.

Cinghali enim asserunt illos febris corripere, qui se in aquis lavant, in quas arboris flores decidere. Crescunt ut plurimum ad fluminum ripas, florent Martio, & Majo. *Mus. Zeyl.*

ARUNDO *Rotang* Zeylanica, spinosissima, major, fructibus rotundis, scabris, acidis. *Mus. Zeyl. pag. 59.* Arundo nucifera, *Rotang* dicta, fructu spadicei coloris, striis purpureis venuste tessulato. *Plukn. Almag. pag. 53.* ubi reliqua vide synonyma, descriptionem vero apud *Ray hist. pl. pag. 1316.* & *Pisonem in Mantiss. aromat. cap. 11. pag. 188.* hujus variae apud *Rumph. in Herbar. Ambon.* occurrunt species in *lib. 7. a cap. 56. ad 61.* ut *Palmyuncus albus ROTTANG* Puti, & verus latifolius *ROTTANG Tumi Daun*, & *ROTTANG Tumi* &c.

ASCLEPIAS Zeylanica, Vincetoxici radice praestantiore. *Mus. Zeyl. pag. 52.* Apocynum Zeylanicum, scandens, foliis Laurinis. *Par. Bat. Pr. pag. 413.* Apocynum Zeylanicum, scandens, radice Asclepiadis. *Par. Bat. pag. 55.* ubi descriptio, ut & apud *Ray tom. 3. pag. 539.* **MANUGHAWAEL** Zeylonensibus. Phthificis has radices multum prodesse a Cinghalis edocti sumus, unde Syrupis, & Decoctis expectorantibus adhibetur. *Mus. Zeyl.*

ASCLEPIAS hirsuta, Scammonii folio. *Nobis.* Apocynum scandens Zeylanicum, Scammonii folio hirsutum. *Par. Bat. pag. 56.* ubi descriptio, & ex hac apud *Ray tom. 3. pag. 539.* Apocynum hirsutum scandens Americanum, flore amplo purpureo. *Plukn. Phyt. Tab. 76. Fig. 5.* Characterem genericum vide apud *Linnaeum in char. plant. pag. 64.*

ASCLEPIAS Zeylanica, inodora, **WALANGHUNA** Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 53.* Asclepias Zeylanica, flore oblongo, tubuloso. *Hert. in Catal. semin.*

ASPARAGUS foliis falcatis, ex uno puncto numerosis. *Nobis. Tab. 13. Fig. 2.* Asparagus foliis falcatis, Zeylanicus. *D. Scherard.* Corruca Guinensis, foliis aduncis. *Mus. Petiv. no. 169.* apud *Ray tom. 3. pag. 359.* Asparagus Africanus tenuifolius, viminalibus virgis, foliis Laricis instar ex uno puncto numerosis, stellatim dispositis. *Herb. Hert. & Plukn. Amalth. pag. 40.* Hujus autem folia sunt multo angustiora, crebriora, & tenuissima.

Caulis

*ASTRAGALUS spicatus, siliquis pendulis
hirsutis, foliis sericeis. Nobis. //*

5553. *Indigofera hirsuta* L.

Caulis nostrae plantae est bipedalis, filiformis, laevis, cinereus, ad latera alternatim emittens ramulos fere spithamales obtusos, quorum apici folia insident linearis latitudinis, longitudinis biuncialis, integra, obtusa, interdum leniter falcata, glabra: folia haec etiam ex caule & ramulis plurima simul emergunt; ad ramulos hosce prorumpunt etiam tenuissimi Corymbi capillacei, flores sustinentes campaniformes. Ad exortum autem ramulorum sub basi excresecunt aculei minutissimi rigidi, acuti: hujus generis character invenitur apud *Linnaeum in char. gen. pl. p. 93.*

ASPARAGUS aculeatus, Zeylanicus, maximus, farmentofus, *H. L. B. pag. 62.* ubi descriptio & icon plantae, & in *append. pag. 650.* ejus radices exprimuntur, vide & *Ray tom. 2. pag. 1877.* pro Schada-Velikelangu *H. Malab. part. 10. Tab. 10.* a *Commelino* habetur, quod in *Ray tom. 3. pag. 359.* contradicatur. Corruca Zeylanica, Paeoniae radiculis Tanne-Mutanea Tunga Malabaris. *Petiv. act. phil. Lond. vol. 22. no. 267. pl. 87.* **HATANARYA** Zeylonensibus dicitur, a quibus radicae hujus plantae muria conditae avidè comeduntur, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 2 & 27.*

ASPHODELUS Zeylanicus, foliis rotundis, Cepaceis, floribus luteis. *D. Tilly. H. Pisan. pag. 17.*

ASTER Zeylanicus, flore coeruleo, Tithymali foliis angustis, pubescentibus, disco luteo, petalis reflexis. *D. Tilly. H. Pisan. pag. 18.*

ASTRAGALUS spicatus, filiquis pendulis hirsutis, foliis sericeis. *Nobis. Tab. 14.* Astragalus Indicus, spicatus, filiquis copiosis, deorsum spectantibus, non falcatis, seu Polylobos. *Herb. Herm.* quo nomine ab ipso *Hermanno* quondam etiam ex Zeylona ad *Joannem Commelinum* fuit transmissa, ut patet ex ejus notis ad *H. Malab. part. 9. pag. 55.* ubi eadem denominatio occurrit, quae *Hermanni* manu ad nostram plantam est adscripta, juxta quam Figuram hic exhibemus, quae in multis tamen differt a Katu Tagera *H. Malab. part. 9. Tab. 30.* easdem tamen esse certus sum, sed in *H. Malab.* plantam haud fideliter esse exsculptam ex descriptione facile constat, ubi inter alia dicitur, quod undique pilis sit obsessa, caulis, folia, calix & filiquae, quum planta tota glabra sit exsculpta, exceptis filiquis, quarum spicae etiam

ad dimidium sunt mutilatae, ita ut Figura illa sit manca & descriptioni neutiquam conveniens; hic vero damus plantam exactissime delineatam & exsculptam, quae ab aliis etiam denominata est. & a *Pluknetio* vocatur *Astragalus Indicus spicatus*, polylobos *D. Hermans. in Almag. pag. 60.* & *Colutea Orientalis*, plerumque heptaphyllos, hirsuta, floribus spicatis, saturate purpureis, filiquis plurimis quadratis, valde pilosis, summo furculorum dependentibus. *ibidem pag. 113.* *Colutea lanuginosa*, floribus parvis, filiquis pilosis, deorsum tendentibus. *Mus. Petiv. no. 45. Transact. Angl. vol. 19. num. 232. Pl. 19.* *Orobus Zeylanicus*, incanus, filiquis pendentibus, torosis. *Breyn. Prodr. 2. pag. 80.* Vide & *Ray tom. 3. pag. 455.* *PILAEGHAS Zeylonensibus*, quod in *Mus. Zeyl.* variis denominationibus additur. occurrit enim cum hoc *Astragalus Zeylanicus purpureus spicatus*, elegans. *Mus. Zeyl. pag. 33.* *Astragalus Zeylanicus sericans*, filiquis oblongis, floribus purpureis aut carneis, *ibidem. pag. 34.* *Astragalus Indicus filiquis fuscis. pag. 43.* & *Astragalus Indicus hirsutus*, filiquis (non) falcatis sericeis, villosis, major, polylobos. *pag. 44.* quae cum hac nostra conveniunt planta, quae frutescens videtur, caules enim ejus sunt lignosi, validi, duri, rufescentes, pilis undique obfessi ad summum longissimis, ubi e caule adsurgit rachis foliorum alternus, septem habens folia, bina sibi mutuo opposita, tria paria, claudente uno impari. Folia autem sunt mollia, superiore viridia, inferiore parte incana & sericea, ab utraque vero tota lanuginosa, subrotunda. E caule ubi foliorum rachis provenit, erigitur spica longissima spithamalis fere, floribus numerosissimis papilionaceis, separatis, binis utcumque oppositis onusta, qui calice longissimo & hirsutissimo continentur, post quos sequuntur filiquae quadratae valde pilosae, pendulae, in apicem acutissimum desinentes, repletæ feminibus parvis oblongis, albicantibus. Siliquae hujus plantae videntur mihi unicapculares, tenues, unde potius ad *Galegam* pertineret, quum *Astragali* siliqua sit bicapsularis.

ASTRAGALUS Indicus, hirsutus, filiquis falcatis, *Viciae* facie. *Mus. Zeyl. pag. 6.* *Astragalus Zeylanicus*, filiquis falcatis villosis. *ibidem pag. 31.* *Astragalus Indicus filiquis falcatis sericeis*, foliis *Viciae* facie. *pag. 64.* *Orobus sylvaticus Zeylanicus filiquis erectis*, foliis sericeis candicantibus, *PILAE Zeylonensibus. D. Hermans, apud Ray tom. 3. pag. 450.* quae eadem videtur cum *Colutea filiquosa enneaphylla Indiae Orientalis*,

talis, filiquis & foliis averfa parte pubescentibus. *Plukn. Phyt. Tab. 166. Fig. 3.* PILAEGHAS & PILAEHARAL Zeylon. id est *Pilae* arborefcens.

ASTRAGALUS minimus, repens, triphyllus, filiquis falcatis. *Mus. Zeyl. pag. 33.* An Colutea filiquofa, glabra, ternis, quinisve foliis, Made-rasp. femine rubello? *Plukn. Phyt. Tab. 166. Fig. 1.*

ASTRAGALUS Zeylanicus, tenellus, Viciae foliis subrotundis, *Mus. Zeyl. pag. 34.* Viciae arborefcantis species. *Mus. Zeyl. pag. 12 & 13.* PILAE & PILAEGHAS Zeyl. quod harum specierum nomen genericum est.

ASTRAGALUS Zeylanicus Asparagum olens, HAMPILLA Zeylonenfibus. *Mus. Zeyl. pag. 68.*

AURANTIUM quae malus Aurantia, regia, dulcis, Zeylanica. *Mus. Zeyl. pag. 68.* Aurantia in Indiae infula Zeilan, cortice fuavi, & dulci. *Scalig. & Lugd. C. B. P. pag. 437.* Malus Aurantia Sinenfis. *Jonst. Dendr. Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 211.* Aurantium Sinense, Sinefe ap-pels, Lemon manis Tsjina. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 2. cap. 42.*

AURANTIUM, quae malus Aurantia Zeylanica, foliis longis angustis, ap-pendicula longiffima donatis. *Breyn. Fascic. apud Ray tom. 3. pag. 80. Dendrol.*

AURANTIUM, quae malus Aurantia Indica, fructu omnium maximo *Pum-pelmus* dicto, medulla pallefcente. *H. L. Bat. pag. 405.* eadem quoque est medulla ruffefcente. *ibidem.* de qua vide notas ad *Merian. infect. Su-rin. pag. 29.* ubi etiam elegans hujus arboris ramus cum fructu expri-mitur. Malus Aurantia utriusque Indiae, fructu omnium maximo & fuaviffimo &c. *Pluknet. Almag. pag. 239.* ubi de hoc fructu varii ci-tantur auctores, & in ejus *Mantiffa* pro Arbore fcientiae, cujus fru-ctus erat Malum, in Paradiso terrestri primis parentibus interdictum proponitur, *pag. 125.* & pro pomo Adami *Casp. & Joh. Bauh. in ejus Amalth. pag. 141.* habetur, ubi vide reliqua, a *Joh. Bauh.* ejus icon datur in *hif. pl. part. 1. pag. 99.* Malus Aurantia fructu rotundo maxi-mo pallefcente, humanum caput excedente. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 212. & Hif. Jam. vol. 1. pag. 41. Tab. 112. Fig. 2 & 3. & Ray. tom. 3. pag. 80. Dendr.* Limio decumanus, Pompelmoes, Lemon Cas-fomba. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 2. cap. 34.*

AZE-

AZEDARACH fructu polypyreno, *Mangoseros* sylvestris. *Mus. Zeyl.* pag. 3. Azedarach Indica foliis non deciduis, ossiculo polypyreno. *Par. Bat. Pr.* pag. 316. Azedarach floribus albis semper virens. *H. L. App.* pag. 652. Azadarichta Indica, foliis ramosis minoribus, flore albo, subcoeruleo, purpurascente majore *Breyn Prodr.* 2. pag. 21. & *H. Amst.* tom. 1. Fig. 76. Olea Malabarica Nimbo dicta, fructu racemoso oblongo. *Ray. tom.* 2. pag. 1545. Olea Malabarica fraxineo folio e Maderaspantan. *Plukn. Phyt. Tab.* 257. Fig. 1. Arbor Indica, Fraxino similis, oleae fructu *C. B. P.* pag. 416. reliqua vide in *Commel. Flor. Malab.* pag. 11. qui cum Aria Bepou. *H. Malab.* & Azadirachta Indica foliis Fraxini non ramosis hanc jungit. **PANUKOHUMBA** Zeylonice a *Panu*, quod vermiculum seu insectum denotat, nam arboris lignum a vermibus arroditur. *Mus. Zeyl.* pag. 3.

AZEDARACH. *Dod. Pempt.* pag. 848. Arbor Fraxini foliis, flore coeruleo. *C. B. P. Mus. Zeyl.* pag. 67. Arbor Azadarichta Syriaca, foliis ramosis, flore coeruleo & albo majore, *Breyn Prodr.* 1. pag. 3. & Azadarichta foliis ramosis majoribus, Syriaca, sive vulgaris flore coeruleo majore. *Breyn. Prodr.* 2. pag. 21. Vide & *Amm. Char. pl.* pag. 282. Pseudo-Scyomorus. *H. Eyst. Aestiv. arbor & Frut. Fol.* 2. Fig. 1. &c. **KIRIKOHOMBA** Zeylonensibus.

AZEDARACH foliis falcato ferratis. *Nobis. Tab.* 15. Azedarach altera foliis semilunatis. *Mus. Zeyl.* pag. 48. Azedarach Zeylanica, semper-virens & florens, floribus albis. *Herb. Hert.* Arbor Azadarichta Indica foliis non ramosis, flore minore. *Breyn. Prodr.* 1. pag. 3. & Azadarichta Indica foliis Fraxini, sive non ramosis majoribus, flore minore albo. *Breyn. Prodr.* 2. pag. 21. qui eam recte pro Aria-Bepou *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 52. habet. ita ut alii errent, qui primam citatam Azedarachtam fructu polypyreno cum Aria Bepou conjungant, quod sola *H. Malab.* tabulae inspectione, & cum *H. Amst. Fig.* 76. comparatione facile constat, quae certe inter se nullam habent convenientiam, ut foliatura statim demonstrat, si vero nostra Figura cum illa *H. Malab.* comparetur, convenientia ipsa & similitudo patet, quod insuper descriptio in *H. Malab.* cum nostra comparata evincit, quae in omnibus nostrae tam bene convenit, ut ne ovum ovo magis, unde alteram descriptionem hic subungere supervacuum est. Unum autem illud notatum volo, quod semilunaris & irregularis illa dimidii foliorum
figura

AZEDARACH foliis falcato serratis. Nobis.

3032 *Nolana Azadirachta* L.

*BALSAMINA latifolia floris
calcarei longissimo. Nobis.*

*BALSAMINA angustifolia, floribus ternis communi. &c.
6797 Impatiens triflora L.*

6795 *Impatiens cornuta L.*

figura in *nostra Tabula* felicius sit expressa, & observata, quam in *illa Horti Malabarici*, & quod ramorum extremum in nostra planta non impar claudat, ut in *Breyn. Prodr.* 1. exhibetur. hujus generis characterem dat *Linnaeus in char. pl. gen. pag.* 127. ubi novo nomine MELIA vocatur.

BADHAAMU, Leguminis species. *Mus. Zeyl. pag.* 55. ubi additur, fructus hujus plantae decocti & cum *Oryza comesti* ebrietatem pariunt.

BALSAMINA latifolia floris calcari longissimo. *Nobis. Tab.* 16. *Fig.* 1. Balsamina, seu Noli me tangere Zeylanicum, flore rubente, fructu Hirundinis facie. *Herb. Herm.* Balsamina Zeylanica, latifolia, flosculis incarnatis, fructu Hirundinis facie. *Mus. Zeyl. pag.* 30. KUDAEUKOLA Zeylonensibus. a *Kudaelu* quod significat hirundinem, cui similia sunt vascula feminalia hujus plantae. *Kola* folium notat. Foliatura cum nostris Europaeis Balsaminae speciebus convenit, quae unicuique notae sunt. Floribus vero ab iis differt. Primo quod multo sint minores, dein quod calcaria gerant quintuplo fere longiora, tertio quod pedunculis longissimis infideant. Fructus in nostra planta tam parvus est, nec adeo excrevit, ut dijudicare possim, an hirundinem referat. Fides sit penes illustrem illum *Hermannum*, qui vivis & in loco natali vegetis plantis, naturae earum conveniens nomen indidit. Errorem autem commisit sculptor, quod flores infra foliorum ortum produxerit, quum ex eorum alis proveniant, quem postea corrigere sine figurae detrimento haud facile potuit. Hoc genus Lacca herba, seu Lacca Kitsyl a *Rumph. in Herbar. Ambon. lib.* 8. *cap.* 52. vocatur. ubi Lacca coccinea, purpurea & alba describitur, & coccinea depingitur nostrae conveniens, excepto floris calcare.

BALSAMINA angustifolia, floribus ternis communi pedunculo ortis. *Nobis. Tab.* 16. *Fig.* 2. Balsamina foemina Zeylanica, Salicis folio angusto, ferrato, flore magno, eleganti, rubro. *Herb. Herm.* an Noli me tangere folio angustissimo. *Mus. Zeyl. pag.* 19? quae KUDHUMAETHI, KUBULUBOLHIDA, & KURUBUBOLKINDA incolis vocatur. a *Kudhu* quod notat pulverem, & *Maethi* quod terram. Nascitur enim haec planta in siccis arenosisque locis, & humo pulvere plena. Folia gerit haec elegans species longissima, angustissima, acutissima, dentata, glabra, superiore eorum parte laete viridia,

dia, inferiore cinerea, per dorsum costa validissima albicante decurrente. Folia autem ex caule alternatim proveniunt ortu tenuissimo, ex quorum alis flores non solitarii, sed terni simul ex communi pediculo proveniunt, qui postea in tres dividitur pedunculos, quorum quisque suum sustinet florem magnum, amplum, elegantissimum, calcar longissimo praeditum, calice suo contentum.

BALSAMINA foemina angustifolia Zeylanica **KUDALUKOLA** dicta. *Mus. Zeyl. pag. 35.* praecedentis videtur varietas.

BALSAMINAE angustifoliae forte species **KIDHAMAHEHI** dicta. *Mus. Zeyl. pag. 25.* ubi additur, nascitur in palustribus: folia habet alterna, forma Epiphyllispermi, majora tamen, flos est instar Noli me tangere.

BALSAMINA erecta, seu foemina Persicae angusto folio, Zeylanica. *Par. Bat. pag. 105.* ubi icon & descriptio. *Lyfimachia* Zeylanica, foemina, Hydropica, floribus incarnatis. *Mus. Zeyl. pag. 64.* Balsamina foemina angustifolia Zeylanica. *Par. Bat. Pr. pag. 317.* Balsamina Indica angustifolia, flore minore rubello, elegantissimo. *Tournef. inst. pag. 419.* **DYAKUDALU** Zeylonensibus, id est **KUDALU** seu Hirundinaria aquatica.

BALSAMINA foemina angustis & eleganter crenatis foliis, flore albo minore. *Plukn. Almag. pag. 62.* Balsamina Indica flore albo. *Breyn. Prodr. 2. pag. 22.* Tilo-Onapu seu Notenga. *H. Malab. part. 9. Tab. 52.* Posteriores hae Balsaminae magis sunt varietates quam quidem diversae species, ut etiam notatur in *Parad. Batav. pag. 105.* sicut & plures Onapu varietates in *H. Malab. part. 9.* etiam occurrunt. quae a *Commel. in Fl. Malab. pag. 14.* notantur.

BALUWANOSSA. *Mus. Zeyl. pag. 25.*

BANDURA Zeylanica in extremo foliorum, folliculum peniformem expansum habens. *Herb. Herm. & Mus. Zeyl. pag. 16.* a nobis *Tab. 17.* exhibetur. Bandura Cinghalensium, planta mirabilis Zeylanica in foliorum extremo folliculum peniformem expansum habens. *D. Hermans. apud Breyn. Prodr. 1. pag. 18.* Planta Zeylanica, cujus foliorum extremus folliculus peniformis se expandit. *Mus. Zeyl. pag. 37.* Priapus vegetabilis Monorchis, **BANDURA** Cinghalensium. *Amm. Char. pl. pag.*

*BANDURA Zeylanica in
folliculum peniformem
extremo foliorum,
expansum habens.*

6913. *Nepenthes distillatoria* L.

pag. 529. Bandura Cinghal. Gentianae Indicae species. *ibidem pag. 287.* ubi vide notas. ut & *Miscell. curios. ann. prim. decur. 2. pag. 58.* Nepenthes Zeylanicum flore minore *Breyn. Prodr. 2. pag. 75.* ubi vide hujus notas characteristicas, & alias varietates. Planta mirabilis destillatoria *Grimm. in Miscell. curios. ann. prim. decur. 2. observ. 146. pag. 363.* Cantharifera, Kannekens-kruyd, Daun Giridi *Rumph. Herb. Amb. lib. 7. cap. 61.* Sed ubi folliculus peniformis instar Canthari operculo tecti depingitur, & flores ac fructus quodammodo differunt. Utricularia vegetabilis Zeylanensis, BANDURA Cinghalensibus dicta. *Plukn. Phyt. Tab. 237. Fig. 3.* in qua folliculus peniformis mire & irregulariter exprimitur, quem nos, ut in variis speciminibus invenimus, accurate delineatum curavimus, qui denominationi & rei ipsi magis convenit. Peculiarem hujus plantae proprietatem ex *Grimm.* vide descriptam apud *Ray tom. 1. pag. 721.* de qua insuper notatur in *Mus. Zeyl.* quod tota sit Alexipharmaca, praesertim ad morsus *Colubris* appellati. Nomen ejus est Cinghalense, quod Latinis notat membrum virile, quod illis vocatur *Baka.* Crescit abunde circa Columbum in humidis & umbrosis locis.

Adfurgit elegans haec planta caule fungoso crasso, rotundo, cui folia sessilia alterno ordine ad crescunt, lata, oblonga, glabra, per eorum medium nervo validissimo decurrente, qui terminatur in claviculam longam, saepius circinnatam, cui appendet folliculus vasculosus, membranaceus, glaber, concavus, facillime sese per liquorem advectum expandens, qui a radicibus hujus plantae humida loca amantibus e terra adtrahitur, atque per caulem fungosum adducitur ad folia, ubi per nervum in claviculam, per eam ad folliculi cavitatem, ubi claviculae hujus continuatio est, deducitur, expansus tunc hic folliculus perfecte penem virilem glande suo instructum refert, qui tanquam operculum amphorae in Pluknetii Figura conspicitur, in variis autem, quae servo speciminibus, nequiquam mihi ita obvenit, sed eo, quo exsculptum est, modo. Flores per caulis summum gerit longis pediculis insidentes tetrapetalos, perpetuos seu stabiles, fructui calicis loco inservientes, quorum pistillum prope apicem cingitur anthera annulari octo crenis notata, & ut videtur, ex quatuor apicibus bifidis constructa. Fructus est siliqua quadricapsularis, in summo quatuor apicibus ornata, in qua semina tenuia, longa vermiculataque, paleacea continentur.

BANGHALA. *Mus. Zeyl. pag. 51.* ubi additur hujus radix, transfertur ex Malacca in Zeylonam.

BASELLA. *H. Malab. part. 7. Tab. 24.* ubi vide notas. Solanum scandens Malabaricum folio Betae. *Cat. H. Amst. in 8vo. pag. 330.* Blium Bacciferum Ceylanicum. Solanum tinctorium Ceylanicum, Hermannii *C. H. Beaum. M. S. & Fl. Malab. pag. 16.* Solanum peregrinum Betae folio. *Ray hist. p. 1876.* Beta baccifera, aizoides, rotundifolia, Zeylanica, *Breyn. Prodr. 2. pag. 23.* an Halicacabus baccifer *Anty. Rumph. Herb. Ambon. lib. 10. cap. 45.* Solanum tinctorium Zeylanicum minus Basella Malabarorum. *Par. Bat. Append. p. 12. & Commel. Fl. Malab. pag. 63.* Mirabili Peruviana affinis tinctoria Betae folio scandens, Cochinchensis, floribus puniceis muscolis, ex sinu foliorum spicatis, fructu intus cochleato. *Plukn. Phyt. Tab. 63. Fig. 1.* vide & *Almag. pag. 252 & 253.* BINTAL Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 68.* Primus omnium characterem ejus naturalem invenit *Carolus Linnaeus*, Botanicus oculatissimus & simul peritissimus, qui illam Cuscutae veram esse speciem, quum in Horto Medico plantam vegetam florentem examinarem, mihi asseruit: unde & in *Char. pl. gener.* Basellam Cuscutae Tournefortii tribuit, cujus characterem exacte descripsit *pag. ibidem 32.*

BATATTAS vide infra *Rizophoram.* & *Samuel. Dale. Pharmacol. supplem. pag. 150.* qui Convolvulis annumerat. quorum *Batattae* etiam sunt species, ut indicant *Figurae*, quae apud *Merian. insect. Surinam. pag. 41.* inveniuntur, & apud *Rumph. in Herb. Ambon. lib. 9. cap. 17.* ubi *Batatta*, *Batattas*, & *Ubi-Castela* vocatur, qui verus est Convolvulus repens, ad singulum nodum Rhizophorus & tuberosus, folio foliario, flore parvo. *Merian* autem *Figura* exprimit Convolvulum tuberosum foliis inferioribus in quinque, superioribus in tres lacinias divisis, flore magno coeruleo. ubi in descriptione dicitur quod etiam repat & ad ramos radices agat &c. cujus Synonyma latius in notis subjunctis & in *Commel. Fl. Malab.* explicantur ad Convolvulum Indicum radice tuberosa eduli, cortice rubro, *Batattas* dictum. *pag. 22.* vide & *Fenille hist. des plant. Medicin. tom. 3. pag. 16. pl. 11.*

BAUHINIA foliis subrotundis, flore flavescente striato. *Nobis. Tab. 18*.*
Senna

BAUHINIA foliis subrotundis . flore flavescente striato. Nobis .

2953 *Bauhinia tomentosa* L.

Senna Zeylanica, folio singulari, cordato, flore lutescente magno. *Herb. Hert.* Canschena-Pou. *H. Malab. part. 1. Tab. 35.* quae in notis vocatur. Arbor filiquosa, Malabar: foliis bifidis minoribus, flore albo, flavescente, striato. a D. Syen autem in notis pag. 58. ad primam *H. Malab.* speciem annotatur, & dicit, prioris ficcatum ramulum ex insula Zeilan. transmisit Dom. Hermans sequenti inscriptione: Arbor Sancti Thomae. In floribus apparent sanguineae striae, ab effuso sanguine D. Thomae enatae. Docuisse enim creditur D. Thomas in Malab. & Zeilan. Similis huic figura, sed floribus destituta reperitur in *Plukn. Phyt. Tab. 44. Fig. 6.* ubi vocatur Mandaru Maderasp. foliis firmioribus parvis bifidulis, glabritie splendentibus, ad furculum densius stipatis. Flos divi Thomae vulgo. *Commel. Hort. Amst. Cat. pag. 34. & Fl. Malab. pag. 8.*

Rami nostrae arbusculae sunt lignosi, glabri, punctis scabriusculi, nitidi. Folia alternatim petiolis uncialibus insidentia circumscriptione fere orbiculari, a superiore parte ad medium circiter bifida, lobo scilicet singulo semiovato, superne viridia, inferne albicantia.

In media autem folii fissura apparet spinula, quae nervi recti majoris productio est & ejus continuatio. quae in *H. Malab. & Plukn.* Figura omissa est.

Flores solitarii per ramulos oriuntur, petiolis insidentes, duobus foliolis linealibus instructis. Flores hi sunt maximi ad unum latum inclinentes, ut in Senae speciebus, decem staminibus instructi, pistillum unicum staminibus dimidio fere longius habentes.

Siliquae sunt longae, planae, rectae, compressae, superficie externa lanuginosae & lenes admodum, dum tenerae adhuc sunt. Fabae, quas includunt siliquae, longitudinaliter locantur, septis distinctae, oblongo-rotundae.

BAUHINIA foliis oblongo-acutis, nervosis, flore albo. *Nobis.* Arboris divi Thomae species, foliis longioribus, MAYLA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 8.* Senae spuriae, aut Asphalto affinis, arbor filiquosa, foliis bifidis, flore pentapetalo, vario, *Sloan. Cat. Pl. Jam. pag. 150. & Hist. Jam. part. 2. pag. 51.* Thomaea arbor, filiquosa, foliis bifidis, minor, flore candido. *Par. Bat. Pr. pag. 380.* Velutta Mandaru. *H. Malab. part. 1. Tab. 34.* ubi in notis Arbor filiquosa Malabarica, foliis bifidis, flore candido, striato vocatur a D. Syen. Vide porro *Ray hist. part. 2. pag. 1571. Amman. Char. pl. pag. 366.* ubi Daudan Indo-

rum, est flos D. Thomae. Vide & eundem pag. 610. ad Velutta Mandaru & ejus H. Bosian. pag. 37. Breynius in Prodr. 2. pag. 19. breviter ejus characterem exhibet. qui accuratissime a Linn. in Char. pl. gen. pag. 126. describitur sequenti modo.

Cal. PERIANTHIUM oblongum, longitudinaliter dehiscens, ad latus repulsum, deciduum.

Cor. PETALA quinque, subrotundo-oblonga, versus alterum latus inclinata, calici opposita, inaequalia.

Stam. FILAMENTA decem, inaequalis longitudinis, declinata. ANTHERAE reflexae, assurgentes.

Pist. GERMEN Cylindraceo-oblongum, STYLUS inflexus, STIGMA capitatum, emarginatum.

Per. LEGUMEN longum, subteres, uniloculare.

Sem. Multa, subrotunda, compressa, secundum longitudinem leguminis posita.

Observ. Flores specierum in H. Malab. examinavimus, a quibus immente differunt icones Plumierii. hinc sunt diversi generis vel pessime a Plumierio depictae. Linnaeus.

Bauhiniae nomen primus Plumierius in nov. pl. gen. pag. 23. Tab. 13. huic generi tribuit, quod maluimus hic retinere in memoriam tantorum Botanicorum Casp. & Joh. Bauhinorum. licet HYMENAEA alias convenienter vocari posset, metaphorice dicta, & desumpta a foliorum figura, quae in huius speciebus duo quasi corda conjuncta repraesentant. quae licet solitaria, in summo sunt ita fissa, ut bina coälita folia referant, quae noctu se complicant & conjungunt. HYMEN autem Deus conjugii veteribus habebatur.

BETELES species folio lato, Siriboa Bontii. Mus. Zeyl. pag. 32. Siriboa Bontii lib. 6. pag. 91. exprimitur, quae Saururi habenda est species.

BETELE Tambul seu Betre C. B. P. Mus. Zeyl. pag. 34. Betre apud C. B. P. in Pinac. occurrit pag. 410. ubi dicitur Betre Malaccensium volubilis modo arbores scandens, fructu lacertae caudam aemulante. Tambul Avicennae, Betre Garzias. Mus. Zeyl. pag. 36 & 66. Betre seu Betelle J. B. tom. 1. lib. 4. pag. 437. Betele Acoft. arom. cap. 10. Betre Figuram & descript. vide apud Clus. Aromat. lib. 1. cap. 18. Betla-Codi. H. Malab. part. 7. Tab. 15. ubi pag. 29. vide notas & Amman. Char. pl. pag. 293. reliqua inveniuntur apud Plukn. Almag. Botan. pag. 67.

*BLITUM scandens fructu
lappaceo. Nobis.*
1655 *Achyrocline lappacea* L.
Fig. 1.

Fig. 2.

BLITUM annuum angustifolium spica graminea foliosa. Nobis.

67. & *Commel. Fl. Malab. pag. 15.* BULATWAELE Zeylonensibus, folia habet septinervia, estque Saururi species, ut *Samuel Dale* eum etiam post *Piper longum* ponit in *Pharmacol. pag. 364.* a *Pluknetio* haec cum *Siriboa Bontii* conjungitur, quod neque ex descriptione, nec ex figura constat, quum *Siriboa* habet folia vel profunde secta, vel tria tenuia ex uno puncto orta; hujus autem folia sunt lata, subrotundo-acuta, Convolvulacea, & haec Saururus volubilis Convolvuli majoris folio *Betele* dictavocari posset.

BETONICA frutescens *Bontii*, Hormini fativi coma, Amaranthi foliis. *Mus. Zeyl. pag. 29.* Betonica frutescens apud *Bontium* occurrit *cap. 51. pag. 146.*

BETULAE species, conis oblongis, villosis, foliis oblongis ferratis. *Mus. Zeyl. pag. 33.*

BIDENS Zeylanica latifolia flore luteo, quasi flaccido. *Hert. Catal. semin. quae ACMELLA* videtur ad *Ceratocephalum* infra exhibita.

BLATTARIA Ceylanica, flore amplo coccineo. *H. Amst. part. 1. pag. 11.* Blattaria Zeylanica, flore coccineo. *Par. Bat. Pr. pag. 318.* Blattaria Zeylanica, flore amplo miniato. *Cat. Hort. Amst. pag. 53.* & *H. L. B. pag. 90.* in *Pluknet. Mantiss. pag. 32.* Alceis accensendam esse hanc putatur, unde a *Breynio* vocatur Alcea Indica lucido hastato folio, flore Blattariae phoeniceo. de hac vide *Ray tom. 3. pag. 523.*

BLITUM scandens fructu lappaceo. *Nobis. Tab. 18. Fig. 1.* Verbena Indica, farmentosa, scandens, spica comosa, fructibus lappaceis. *Mus. Zeyl. pag. 47.* Verbena Indica scandens, farmentosa, spicis comosis, feminibus lappaceis. *Herb. Herm. Wellia Codiveli. H. Malab. part. 10. Tab. 59.* ubi Betae folio Malabarica semine lappaceo vocatur. Blitum album majus scandens. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 49?* Centaurium Ciliare minus Circaeae foliis firmioribus, spicatis floribus e *Madrasp. Plukn. Phyt. Tab. 82. Fig. 2.* huic maxime convenit. WAELKARALHAEBO Zeylonensibus. a *Wael* quod farmentum denotat KARALHAEBO est Amaranthus spicatus, seu Verbena Indica *Bontii* supra descripta.

Caulis hujus plantae est bipedalis, tenuis, simplex, ad radicem folia opposita, oblonga, acuminata, laevia, integra, sessilia, per tres oppositio-

sitiones, aut tria paria opposita gerens, & e sinu foliorum superiorum producens ramulos, quorum caulis summus instruitur flosculis sparsis, qui calicem habent quinque foliis oblongis, lanceolatis intus glabris, extus setis rigidis armatis constantem. Petala floris sunt nulla, stamina vero quinque capillaria, longitudine calicis, pistillum est unicum summitate capitatum, semen unicum nudum, unde vera Bliti species. Toti fructus hujus sunt echinati & aculeati, sive lappacei, sub singulo autem fructu ponitur squammula paleacea, acuminata.

BLITUM annuum angustifolium spica graminea foliosa. *Nobis. Tab. 18.*

Fig. 2. Verbena Indica angustifolia, spica graminea foliosa. *Herb. Herm.* an Parietaria foliis ex adverso nascentibus Urticae racemiferae flore? *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 50.* **HULLUMAYAKOLA** Zeylonensibus. Radice fibrosa & filamentosa annua enascitur haec planta, cujus caulis saepe est pedalis, nunc rectus, saepius curvus, folia spargens, nunc opposita, nunc solitaria, ex foliorum alis rami nascuntur ejusdem cum caule formae, ad radicem stolones emittit haec planta procumbentes, tenues, plures, folia sunt lanceolata, integerrima, glabra, utrinque viridia, brevibus innixa pediculis. Floris spica deest.

BLITUM Persicum, maximum, paniculis mollibus, pendulis, sericeis. *Mus. Zeyl. pag. 64.* Bliti character invenitur apud *Linnaeum in char. plant. pag. 20.*

BOHU & BOHUMBU. *Mus. Zeyl. pag. 60.* quod pronunciatur *Bombu* h. e. exoticum.

BORRAGINOIDES angustifolia flore pallescente. *Hert. Catal. semin.*

BORRAGO Zeylanica maxima, floribus ex coeruleo albicantibus. *Hert. Cat. semin.*

BRYONIA folio anguloso, acuto, glabro. *Nobis. Tab. 19. Fig. 1.* Bryonia laevis baccis rubentibus. *Herb. Herin.* Bryonia Indica alba, baccis rotundis rubentibus. *Mus. Zeyl. pag. 23 & 57.* **TELANKAEKIRI** Zeylonensibus. An Petola sylvestris, seu Petola Utan. *Rumph. Herb. Amb. lib. 9. cap. 45?*

Tenera haec planta caules laeves stramineos, ut & claviculas emittit, quae ortum suum habent ex alis foliorum, & sunt mire circinnatae.

Folia

Fig. 1.

Fig. 2.

BRYONIA folio anguloso, acuto, glabro. Nobis.

BRYONIA foliis subrotundis, angulosis, Momordicae facie. Nobis.

7339 *Cucumis mederaspatanus* L.

7342 *Bryonia grandis* L.

Folia autem gerit glaberrima, tenuia, angulosa, acuta, in ambitu apicibus spinulas haud male referentibus cincta, ex quorum opposita parte flores proveniunt longis innixi pediculis, calice quinquefido, profunde secto contenti; Flores autem sunt monopetali, in quinque segmenta divisi, venosi, albicantes; post quos baccae rubentes subsequuntur, ut *Hermanni* denominatio docet.

BRYONIA foliis subrotundis, angulosis, Momordicae facie. *Nobis. Tab.*

19. *Fig. 2.* *Bryonia laevis* fructu rubente tereti, oblongo. *Herb. Herm.* Folia hujus plantae multo sunt ampliora, sicut & tota planta validior, quam praecedens; angulosa sunt itidem, sed forma rotunda, non acuta, ut in priore specie, glabra quoque & laete virentia. Flores & Claviculae eodem, ut in antecedente progerminant, & constitutae sunt modo. Fructus autem, quo destituor, non videtur bacca, sed de pomiferorum tribu, unde Momordicis forte accensenda. Quum autem *Clariss. Hermannus* hanc Bryoniis junxerit, arduum foret hanc a praecedente sejungere, praesertim quum summus ille Botanicus in loco natali, ubi vixit, & perfecta fuit haec planta, hanc sedulus examinando denominationem talem ipsi dederit.

BRYONIA Zeylanica flore luteo, fructu rubro. *Par. Bat. pag. 107.* ubi ejus Figura.

BRYONIA Zeylanica, folio quinquepartito. *Mus. Zeyl. pag. 25 & 62.* **HONDALA** Zeylonensibus. Quae in *Mus. Zeyl. pag. 41.* variis nominibus proponitur, vocatur enim ibi Clematis Indica folliculo aureo rotundo triangulo. Clematis Indica, purpurea, foliis profunde incis, radice ampla tuberosa. Convolvulus Indicus capreolatus, radice tuberosa, foliis profunde incis, seu quinquepartitis. *Bryonia Zeylanica* folio quinquepartito. **HONDALA & ALLAHONDA** Zeylonensibus, *Honda* significat Proboscidem Elephantis, cui adaequat caulis hujus plantae a parte inferiore prope radicem. *Mus. Zeyl. apud Grimm. in Labor. Ceyl. pag. 125.* Vocatur Balsamina Momordica, a nonnullis Halicacabus peregrina, & a Cinghalensibus **HUNDULE** vocata. ubi haec addit: Exhinc cum Oleo vulgari Balsamum quoddam elicitur, quod in Chirurgia magni est usus, tam ad vulnera & contusiones, quam ad alia accidentia. Dubito autem, an omnia haec synonyma uni competant huic plantae. Quaedam enim pro *Bryonia*, quaedam

dam pro Momordica, & alia pro Alkekengi forte possent haberi: in re hac incerta certissimum secuti sumus auctorem, Clariss. nempe *Hermannum*, qui in tribus locis Bryoniae nomine hanc denominavit.

BRYONIA Zeylanica, foliis profunde laciniatis, *H. L. Bat. pag. 95.* ubi icon & descriptio. Balsamina scandens, seu Momordica Indica, Bryonioides, fructu laevi minori, rubro, albis lineis variegato. *Par. Bat. pag. 103.* Momordica minor, Indiae Orientalis, Bryoniae facie, fructu glabro, molli, Uvae crispae magnitudine & effigie, suave purpurascente, lineis niveis striato. *Breyn. Prodr. 2. pag. 74.* Bryonia Zeylanica, foliis in profundas lacinias divisis, fructu minore. *Tournef. inst. pag. 102.* Balsamina cucumerina, Malabarica, fructu minore, oblongo, rotundo, glabro. *Commel. Cat. H. Amst. p. 47. & Fl. Malab. pag. 14.* Nehoemeka *H. Malab. part. 8. Tab. 19.* ubi vide notas subjectas, & *Plukn. Phyt. Tab. 25. Fig. 3.* **BASNAGILLI** Zeylonensibus.

BRYONIA Zeylanica, foetida, flore luteo majore, fructu rubro oblongo, **KOPALAM** Zeylonensibus. *Par. Bat. Pr. pag. 318.* Balsamina scandens, seu Momordica Indica foetida Bryonioides fructu laevi majore rubro, *Par. Bat. pag. 103.* ubi descriptio. Bryonia Zeylanica foliis in profundas lacinias divisis, fructu majore. *Tournef. inst. pag. 102.* **KOPALAM** Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 69.*

De Bryonia Zeyl. in genere haec habet *Grimm. in Labor. Ceyl. pag. 126.* Praebet nobis Faecul Bryonia, cujus praestantia specialis est ad morbos Matricis & ad Hydropem.

BUPILOE. *Mus. Zeyl. pag. 14.* a *Bu* quod notat capillos; folia enim parum hirsuta sunt. *ibidem.*

BURMANNIA spica gemina *Linnaei*: quae exprimitur in *nostra Tab. 20. Fig. 1.* Ephemerum Zeylanicum, foliis gramineis, flore coeruleo. *Herb. Hert.* Hyacinthus Zeylanicus, paludosus, flosculis trigonis, coeruleis, oblongis, tribus in summo lutescentibus foliolis stellatim coronatis. *Herb. Herm.* **JAWAEL** floribus oblongis, coeruleis, triangulis, tribus in summo lutescentibus foliolis stellatim coronatis. *Mus. Zeyl. pag. 7.* Planta Zeylanica, aquatica, lato & brevi gramineo folio, floribus coeruleis minimis, capsulis ventricosus, an Sisyrrinchii species? *Ray tom. 3. pag. 559.*

Planta

COMMELINA paludosa, latifolia.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

BURMANNIA spica gemina Linnaei.
2282 Burmannia disticha L.

GALEOPSIS Zeyl. folio oblongo, flore albo.
840 Spermacoce hispida L.

Planta est Spithami magnitudine, radiculis fibrosis, foliis gramineis, flosculis ex atro coeruleis, trigonis, oblongis, tribus in summo lutescentibus foliolis stellatim coronatis, incolens prata uliginosa & aquosa. Brevis haec descriptio desumpta est ex *Mus. Zeyl. pag. 52.* Cui ex *Ray* citato loco addimus, quod summus caulis in duo velut cornua dividatur florifera & seminifera, quae ad se invicem incurvantur, fructus seu siliquae ad interiorern cornu partem vergunt simplici ordine, ut etiam distincte in nostra Figura conspicitur. JAWUL & DYAJAWUL id est *Jawul aquaticum* Zeylonice audit.

Nos sequenti modo eam describimus: Radix fibrosa est, tota capillacea, ratione magnitudinis plantae minima, e qua exeunt folia sex, octo, vel novem biuncialia, lanceolata, culmiferorum similia, integerrima, radicalia omnia. Caulis in planta adulta est spithamalis vel sesquispithamalis, rectus, simplex, folia sex, septemve alterno situ caulem investiant, inferius vaginantia, superius libera, uncialia, vix a caule remota, fere amplectentia. Caulem terminant spicae duae e recto patentes, floribus novem paucioribus vel pluribus ornatae, in singula spica homomale posita sursum vergente insident flores coerulei, non decidui, elegantissimi, quorum Calix est tubulatus, trialatus, apice trifido, tribus luteis laciniis in dissepimentis instructus, stamina sunt sex brevissima, pistillum unicum; fructus siliqua oblonga triangularis, seminibus plurimis minutissimis repleta. accuratissimum hujus characterem dedit *Carol. Linnaeus in Char. pl. gen. pag. 100.* sequenti modo.

CAL: *Perianthium* longum, monophyllum, cylindraceum, coloratum, alâ membranacea, triplici, longitudinali instructum, ore trifido parvo.

COR: minima. *Petala* tria, ovata, oblonga, in ore calycis posita, minutissima.

STAM: *Filamenta* sex, vix notabilia. *Antherae* totidem, in ore calycis, brevissimae, binae ubique simul, mucrone reflexo distinctae.

PIST: *Germen* cylindraceum, calyce dimidio brevius. *Stylus* filiformis, longitudine corollae. *Stigmata* tria, obtusa, concava.

PER: *Capsula* involuta, cylindraceo-trigona, trilocularis, trivalvis, angulis dehiscens.

SEM: numerosa, minima.

Duae hujus generis species auctori notae sunt, nostra, quam vocat, spica gemina, seu duplici, & altera est scapo biflore, quae ex apice

caulis duos tantummodo profert flores, quae in India Orientali occurrit, estque planta minima, itidem graminifolia, quam in Herbario suo servat *Job. Fred. Gronovius*.

CACALIA foliis auriculatis, ferratis, supra nigricantibus, infra lanugine alba obductis. *Nobis. Tab. 21.* *Cacalia Indica odorata. Mus. Zeyl. pag. 5.* *Cacalia Zeylanica odorata, quae Baccharidis forte species. Herb. Herm.* *Conyza Zeylanica odorata, foliis subtus lanuginosis. Mus. Zeyl. pag. 35.* *Conyza Zeylanica odorata. ibidem pag. 51.* *Eupatorium Zeylanicum, foliis dentatis ad pediculos breves auriculatis. Moris. Hist. pl. Tom. 3. pag. 99.* quem vide, & ibi etiam citatur nomine *Jacobaeae Senecionis flore Zeylanicae, odoratae PUPULA Zeylonensibus dictae HERMANNI*, & ex hoc apud *Ray tom. 3. pag. 188.* *PUPULA* dicitur a *Pupulathi* quod loca praerupta & inculta notat, quibus nasci gaudet planta. Quae caule adfurgit lignoso rotundo, purpureo, villis albicantibus obfesso, folia gerens solitaria, firmis & brevissimis pediculis innixa, auriculata, oblonga, profunde dentata, superiore parte nigricantia, inferiore alba, & tomentosa. Flores in summo caulium gerit collectos, in parvis quasi umbellis dispositos, qui flosculi calice oblongo dentato sustentur, semina plumosa, longa, tenuia, nigricantia dantes.

CALAMINTHA Zeylanica *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 128.* ubi haec habet: Copiosissime crescit apud nos; utilissimi usus est in Medicina & Chirurgia pro Clysteribus, Decoctis, Catapl. Fomentis & pluribus aliis. Oleum largissime praebet, cujus virtutes admiratione dignae sunt pro stomacho, capite & morbis Matricis. Aqua ipsius eosdem habet usus ad hujusmodi morbos. Praeterea conficimus exinde Syrupum, sicut & Salem ex cineribus.

CALTHA flore solitario, ex alis foliorum longissimo pedunculo prodeunte. *Nobis. Tab. 22. Fig. 1.* *Eupatoriophalacron foliis angustis, rarius dentatis, flore radiato. Vaill. act. reg. Paris. ann. 1720. pag. 920.* *Chrysanthemum Zeylanicum foliis angustis, rarius dentatis, asperis, KIRINDYA Zeylanensium. D. SCHERARD apud Ray Hist. pl. tom. 3. pag. 212.* *Chrysanthemum feminibus in capitulum congestis recurvis. Mus. Zeyl. pag. 38.* *Chrysanthemum Indicum longissimis pediculis, folio Bellidis. Herb. Herm.* *KIRINDYA Zeylonensibus.*

Vera

CACALIA foliis auriculatis, serratis, supra nigricantibus, infra lanugine alba obductis. Nobis.

6055 *Eupatorium zeylanicum* L.

Vera haec Calthae species est, quod non solum ex floris radiis dentatis; sed insuper ex *Hermanni* denominatione constat, ubi ipsi tribuit femina recurva in capitulum congesta, ita ut a Chrysanthemo differat; nec ad Bidentem, cujus flores parum radiati, plerumque vero nudi sunt, cum *Scherardo* referri possit. Unde & *Vaill.* novum inde composuit genus. Singulari itaque modo florem suum gerit haec planta longissimo pediculo ex foliorum alis productum, qui solitarius provenit radiatus, coloris aurei, calice scabro squammoso contentus, & ut videtur, tubuloso. Folia gerit oblonga, scabra & hirta, brevissimis pediculis infidentia, integra, opposita, forma Bellidis; Caulis est hirsutus, subrotundus, ad foliorum ortum protuberans: tota denique planta est scabra & hirsuta admodum.

CAMPANULA Ceilanica, Senecionis folio, flore purpureo. *Alb. Sebae rerum natur. thes. part. 1. Tab. 22. Fig. 12.*

CANNACORUS latifolius vulgaris. *Tournef. inst. pag. 367.* Cannacorus Daun-Tassibek. *Rumph. Herbar. Ambon. lib. 8. cap. 22.* Canna Indica, seu Arundo latifolia maxima. *Mus. Zeyl. pag. 66.* Canna Indica *Rivini p. 20.* & *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 121.* ubi plurima habet synonyma. Hujus characterem vide accuratissime datum a *Linnaeo Charact. plant. pag. 1.* ad CANNAM Katu-Bala. *H. Malab. part. 11. Tab. 43.* PUKSARNA PUSSARNA & PUKSARANA Zeylonensibus.

CAPPARIS spinosa, foliis oblongis. *Mus. Zeyl. pag. 7.* Capparis Indica, spinosa, angustiore Salicis folio. *Plukn. Mantiss. pag. 36.* Capparis Zeylanica, duplicatis spinis, folio acuto. *Mus. Petiv. no. 625.* huc spectat Cara-Schulli. *H. Malab. part. 2. Tab. 47.*

CAPSICUM Indicum. *Mus. Zeyl. pag. 61.* Capsicum Indicum. Tschili *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 50.* ubi majus rubrum, minus rubrum, & minus flavum depingitur, & describitur. Piper Indicum, vulgatissimum *C. B. P. pag. 132.* Solanum mordens, fructu propendente oblongo, crasso & obtuso. *Plukn. Almag. pag. 353.* ubi plurimae hujus enumerantur species, ut & apud *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 111.* & *sequent. & Hist. Jam. part. 1. pag. 290.* Vallia-Capo-Molago. *H. Malab. part. 9. Tab. 35.* RATHAMIRIS Zeylonensibus. ejus usum vide apud *Samuel. Dale. Pharmacol. p. 245.* & characterem apud *Linnaeum in Char. pl. pag. 51.*

CARDAMOMUM Zeylanicum, fructu rotundo nigro, in caulium summitate. *Par. Bat. Pr. pag. 320. & H. Beaum. pag. 12.* Grana Paradisi Zeylanica. *Mus. Zeyl. pag. 40.* Cardamomum fructu nigro rotundo Zeylanicum. *Par. Bat. Pr. App.* Cardamomum rotundum, Cardamom. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 12.* an Cardamomum maximum *Ger. emac. pag. 1542?* Cardamomum maximum, & Grana Paradisi. *Park. Theat. pag. 1576.* Grana Paradisi officinarum, cujus folia sub Mellegueta in Prodro-mo descripsimus. *C. B. P. pag. 413.* Characterem & usum vide apud *Samuel. Dale Pharmacol. pag. 324. & sequent.* **ALUGHAS** Zeylonensibus.

CARDAMOMUM Zeylanicum, sylvestre, aquaticum, acre, sapore Calami aromatici. *Mus. Zeyl. pag. 96.* Cardamomum Zeylanicum sylvestre aquaticum, *ibidem. pag. 48.* Cardamomum sylvestre, quod ab incolis **ALAGHAKU** dicitur. *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 117.* ubi haec habet: Fertiler crescit haec planta extra civitatem aulicam *Columbo.* Planta est, quae ad visum *Galangam magnam* repraesentat. Flores habet jucundos ac odoriferos, ex quibus Conserva conficitur, quae valde cordialis est, atque stomachum & caput corroborans &c. Fructus & semen magnam Olei abundantiam emittunt ad varios usus in Medicina, eandemque virtutem obtinent, ac Oleum *Cardam* **ALUGHAAHAS**, **ALUGHAAHA** & **ALU** Zeylonice dicitur, id est Arbor Cineris, quia fructus videntur saepe cinere quasi adsperfi. Semina sapiunt Cardamomum cum pauxillo piperis conjunctum, crescit copiose in paludosis locis, ut **ELATTERI** *H. Malab.* quae eleganter exhibetur *Part. 11. Tab. 4, 5, & 6.* & sequenti convenit.

CARDAMOMUM ENSAL dictum. *Mus. Zeyl. pag. 66.* quod Cardamomum minus & vulgare; de quo vide *Clus. lib. 1. Aromat. cap. 24. & Bont. pag. 126.* ut & *Commel. Fl. Malab. pag. 18* &c.

CARPINUS Zeylanica, filiculosa, seu arbuscula Zeylanica filiculosa Carpino similis. *Mus. Zeyl. pag. 53.* Aceri vel Paliuro forte affinis arbor, caudice non ramoso, foliis Sorbi Sylvestris, floribus pentapetalis, racemosis, purpureis &c. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 138.* **HAMPINNA** Zeylonensibus.

CAR-

*CARPINUS viscosa, Salicis folio
integro, oblongo. Nobis.*

2696. *Dodonea viscosa* L.

CARPINUS forte viscosa, Salicis folio integro, oblongo, *Nobis. Tab. 23.*
 Carpino seu Ostryae adfinis, angusto folio non ferrato Zeylanica.
Par. Bat. Pr. pag. 360. Arbuscula Zeylanica, pannosa, Salicis folio
 viscoso, seu Chamaerodendri capsulis instar Ulmi foliaceis. *Mus. Zeyl.*
pag. 32. Arbuscula pannosa Zeylanica, viscoso Salicis folio. *Herb. Herm.*
 Acer minus fructu orbiculari, Salicis folio Zeylanicum, sive foliis &
 fructibus minoribus. *Breyn Prodr. 2. pag. 8.* Arbuscula pannosa, Zey-
 lanica HERMANNI *ibidem.* Male huic pro synonymo additur Fagi
 foliis alterno positu alatis arbuscula Bisnagarica a *Plukn. in Almag. pag.*
143. Cujus Figura exhibetur in *Phytogr. Tab. 89. Fig. 10.* quae Car-
 pino antecedenti magis similis est; sed *Fig. 1. Tab. 141.* huic nostrae
 quadrat, quae inscribitur Arbuscula viscosa Elaeagni foliis laete viren-
 tibus tricoccos, Americana, alias Ricini fructu Arbuscula Bermudien-
 sis, foliis longioribus viscosis &c. An Saponaria tricoccos, minor Ame-
 ricana, in *Almag. pag. 43.* Aceri vel Paliuro adfinis angusto, oblongo
 Ligustri folio, flore tetrapetalo herbaceo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 138.*
 ubi vide reliqua: & *Hist. Jam. vol. 2. pag. 27. pl. 20. Tab. 162. Fig. 3.*
 ubi jungitur arbusculae, quae a *Pluknetio* vocatur Triopteris Indiae
 Orientalis, seu Arbuscula Amygdalae nanae folio, dispermos, filiqua
 Thlaspeos Dioscoridis, ternis amplioribus extantibus alis donata,
 WAENELLA Zeylonensibus dicta in *Almag. pag. 377.* Triopteris
 Jamaicensis angusto Salicis folio, fructu minore fusco. *ibidem.* &c. Mi-
 nor quod in *Ray tom. 3. pag. 93. Dendr.* male huic jungatur. Acer mi-
 nus fructu orbiculari, Salicis folio Brasilianum, seu foliis & fructibus
 majoribus BREYNI, quum a *Breynio* ipso Acer minus fructu minore
 (ut ex prioribus patet) arbusculae nostrae Zeylanicae jungatur in suo
Prodr. 2. dein in *Ray tom. 3. pag. 6. Dendr.* haec eadem iterum jun-
 gitur Fagi foliis, alterno positu alatis, arbuscula &c. *Pluknetii.* quod
 saepius in illo tomo occurrit, quod scilicet una eademque planta bis ci-
 tetur, & diversis jungatur synonymis.
 Quum itaque haec arbuscula tantis in hac scientia viris non bene cogni-
 ta vel perspecta fuerit, malui hanc, licet floribus & fructu viduam,
 juxta *Hermani* exemplar ex suo ipsius Herbario depromptum propo-
 nere; quae WAERELLAGHAS Zeylonensibus audit, & caules vi-
 mineos laeves habet, quibus folia oblonga, integra, glabra, splendentia,
 visco quasi seu glutine obducta, alternatim proveniunt, Salicis formam
 aemulantia: Facies alias hujus arbusculae cum Chamaelea haud male
 convenit, quod per *Pluknetii* denominationem, ubi hanc vocat tri-
 coccam,

coccam, magis adstruitur, sed quum flores nec fructus viderim, nihil certi concludere haecenus audeo, quum aliorum auctorum nomina cum hac opinione non ita consentiant.

CASSIA Fistula, Zeylanica. *Mus. Zeyl. pag. 21, 28, & 32.* quae est Cassia nigra, seu fistulosa prima, sive Cassia fistula, Alexandrina *C. B. P. pag. 403.* & *Fl. Malab. pag. 19.* & *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 145.* qui innumera fere habet hujus synonyma. & *Hist. part. 2. pag. 42.* Cassia Fistula. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 2. cap. 30.* Cassia fistula vulgaris flore luteo. *Breyn. Prodr. 2. pag.* Conna. *H. Malab. part. 1. Tab. 22.* ubi vide notas subjectas. & *Samuel. Dale Pharmac. pag. 458.* & *Clus. aromat. lib. 1. cap. 29.* De Arbore Cassia Zeyl. *Grimm. in Labor. Ceyl. pag. 119.* haec habet: Ex floribus ipsius Conservam extrahimus, quae ab obstructionibus renum & Uretherum liberat, & in ipsa Gonorrhoea optimum producit effectum. **AEHAELAGHAS, AETTAELAGHAS & AEHALA** Zeylonensibus.

CASSIA filiqua quadrangulari. *H. Elth. pag. 72. Tab. 63.* quae est Senna Orientalis hexaphylla. **TALA** Zeylonensibus *H. L. Bat. pag. 557.* ubi descriptio & *Mus. Zeyl. pag. 58 & 69.* Senna Orientalis hexaphylla filiquis longis, incurvis, *Tora* Indorum vulgo & *Tachara* Malabarorum. *Plukn. Almag. pag. 342.* & *Mantiss. pag. 170.* Galega Indica hexaphyllos, quae Senna herbacea Ceylanica minor hexaphylla. *Amman. H. Bosian. pag. 15.* & *Char. plant. pag. 402.* an Senna minor herbacea plerumque hexaphylla folio obtuso? *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 148.* & *Hist. Jam. vol. 2. pag. 47. pl. 21. Tab. 180. Fig. 5. &c.* *Taheara* Malabarorum *Paiomirioba* hexaphylla, *Glycyrrhizae* foliis. *Petiv. act. Phil. Lond. vol. 22. no. 271. pl. 94.* **TALA & TALAGHAS** Zeylonensium. & *Amm. H. Bosian. pag. 35.* ubi ad Galegam Indicam majorem demandatur. ita ut hujus duae sint varietates, seu, ut alii volunt, species, major nempe & minor, quod patet ex *Amm. Char. Plant. pag. 136.* ubi Senna Ceylanica hexaphyllos major & minor occurrit. &c. hujus generis characterem exhibet *Linnaeus in char. gener. pl. pag. 129.* Cui ex florum consensu, Cassia, Senna, Chamaecrista, & Poinciana idem genus est.

CAUCALIS Zeylanica, repens, flosculis suaverubentibus, *Mus. Zeyl. pag. 58.* cum qua forte eadem est *Caucalis*, **PITTAGHUDDU** Zeylonice dicta. *Mus. Zeyl. pag. 67.*

CENTAURIUM minus, Zeylanicum, flore luteo. *Mus. Zeyl. pag. 36.*
an Centaurium minus, aureum, flosculis numerosis, Æthiopicum. *Plukn.*
Almag. p. 94. Phyt. Tab. 275. Fig. 3?

CERASUS Zeylanica, sarmentosa, amara, capreolata, seu cornigera, cortice odore Costi, seu violaceo. *Mus. Zeyl. pag. 9.* Cerasi fructu arbor Zeylanica, aegoceratos, cortice Costum olente **HERMANNI** apud *Ray tom. 3. Dendr. pag. 45.* **BUGAETHYAWAEL** Zeylonensibus. Cortex recens Violae Martiae, aut Iridis Florentinae spirat odorem, & Costi Indici loco usurpatur. *Mus. Zeyl.* Ab aliis facile distinguitur, quod infra furculos floriferos duo habeat cornicula tenuia, deorsum reflexa, & revoluta instar cornuum arietinorum. *Ray l. cit.*

CERASUS humilis, umbellata, flosculis incarnatis, fructu **MORTINGHOS** dicto. *Mus. Zeyl. pag. 3.* Cerasus humilis, umbellata, flosculis floccosis, incarnatis, fructu nigro **MORTINGHOS** dicto. *Mus. Zeyl. pag. 14.* Cerasus Zeylanica, fructu **MORTINGHOS** dicto maximo, *ibidem. pag. 53.* **DAM & DANIGHAS** Zeylonensibus. hujus fructus comeduntur.

CERASUS Zeylanica, sylvestris, fructu nigro **MORTINGHOS** dicto major. **MAHAMADAN** Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 65.*

CERASUS Zeylanica, sylvestris, fructu nigro **MORTINGHOS** dicto minor. **DANGHEDDI** Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 65.* an Tinûs infra propositae species hae?

CERATOCEPHALOIDES subrotundo folio. *Vaill. act. reg. Paris. ann. 1720. pag. 425.* quae est Bidens Indica, Hieracii folio, caule alato. *Tournef. inst. rei herb. pag. 462.* Bellis Zeylanica, aphyllus, foliis crenatis assurgens. *Mus. Zeyl. pag. 18.* an Chrysanthemum caule alato, flore aurantio *ibidem?* & *Parad. Bat. pag. 125.* & in *H. Amst. tom. 1. pag. 5.* ubi icones & descriptiones. Vide & *Plukn. Phyt. Tab. 84. Fig. 3.* & *Sloan. Cat. Pl. Jam. pag. 126.* ad Chrysanthemum Cannabinum, Americ. alatum, flore aphylo globoso, Baccharidis folio. *Breyn Prodr. 2. pag. 32.* &c. **MUDHAMANA** Zeylonensibus. de cujus significatione vide *Mus. Zeyl. pag. 18.*

CERATOCEPHALUS Ballotes foliis, **ACMELLA** dictus. *Vaill. act. reg. Paris. ann. 1720. pag. 422.* **ACMELLA & AHAMELLA.** *Mus. Zeyl. pag. 17.* Chrysanthemum bidens Zeylanicum, flore luteo, Lamii folio. *Breyn. Filii in dissert. de hac planta. Bidens Urticae folio, Lithontriptica, Zeylanica D. Petr. Hotton Act. Phil. Lond. n. 268. pag. 760. & apud Ray tom. 3. pag. 226.* ubi ejus descriptio, & usus ad Calculum & Nephritidem egregius indicatur. Bidens Ceilanica, flore luteo, Melissae folio, **ACMELLA** dicta. *Alb. Sebae rerum nat. thes. part. 1. Tab. 10. & Tab. 11.* alteram ejus vide speciem. Senecio Indiae Orientalis Ocymi majoris folio profunde crenato. *Plukn. Phyt. Tab. 315. Fig. 2. Almag. pag. 343.* Chrysanthemum Orientale bidens, seu bicornis, Ocymi majoris folio profunde crenato, floribus parvis bullatis aureis. *Plukn. Amalth. pag. 57.* ubi vide reliqua. **AKMELLA** Zeylonensibus vocatur ab *Aka*, quo significatur illud, quod in extremo positum est, & *Mella* quod morti vicinum est. Hujus enim flores & semina semper quasi semimortua, flaccida, & emarcida apparent, ut explicatur in *Mus. Zeyl. pag. 17.*

CEREUS scandens, arboreus, trigonus, spinis inermibus. *Nobis.* Tithymalus Orientalis arboreescens, triquetrus spinosus **ESULA INDICA BONTII.** *Mus. Zeyl. pag. 56.* Esula Indica apud *Bontium* occurrit descripta & expressa *lib. 6. cap. 57. pag. 153.* an Ficoides triangulare articulatum, amplexicaule spinis brevibus obsitum. *Plukn. Almag. pag. 148?* qui Cereus Peruvianus amplexicaulis articulatus, fructu rotundo maximo, coccineo. *Par. Bat. Pr. pag. 322.* **TALUKGHAHA** Zeylonensibus. Cerei charact. invenitur apud *Linnaeum in char. pl. gen. p. 139.* ad **CACTUM.**

CHAMAELAEA trifolia, aculeata, floribus spicatis. *Nobis. Tab. 24.* Chamaelaea Zeylanica, trifolia, spinosa, fructu parvo, tripartito, croceo, sapore dulci & acri *Herb. Hert.* Arbuscula Zeylanica, trifolia, spinosa, fructu tripartito, parvo croceo, sapore dulci & acri. *Mus. Zeyl. pag. 22 & 36.* Chamaelaea trifolia, spinosa, & Piper sylvestre *ibidem pag. 22.* Chamaelaea trifolia, spinosa, Malabarica. *Mus. Petiv. Centur. pag. 8. Plukn. Tab. 95. Fig. 5.* Kaka-Toddaly *H. Malab. part. 5. Tab. 41.* cujus folia in ambitu sunt crenata, unde nostrae quodammodo varietas est. Frutex baccifer, Indicus, spinosus, trifolius, floribus spicatis, fructu plano, rotundo, tricocco. *Ray hist. plant. pag. 1612.*
Plukn.

*CHAMAELAEA trifolia, aculeata,
floribus spicatis. Nobis.*

CHAMAELEA foliis linearibus, flosculis spicatis, echinato fructu Nobis.

7106. *Brugia Chamaelea* L.

Plukn. Almag. pag. 202. Commel. Fl. Malab. pag. 30. KUDHUMIRIS Zeylonice dicitur, a *Kudhu* spina & *Miris* quod Piper denotat, fructus enim Piperis habet acrimoniam, qui vermes enecat & expellit. *Mus. Zeyl.*

Habet haec arbuscula caulem viridem, rotundum, aculeis undique obfessum, lata basi albicante provenientibus, & in apicem acutissimum reflexum nigrum desinentibus, e quo folia alternatim eriguntur, longo & valido pediculo, quandoque etiam aculeato innixa, tria numero, bina inferiora sibi opposita, claudente impari summum; quae sunt ovalia, lanceolata, integra, glabra, superiore laete viridia, inferiore parte pallidiora & fere cinerea. Flores longissimis & validissimis pediculis, aculeatis quoque proveniunt spicati, pentapetali, staminosi, rosacei, qui fructum dant communiter tricoccum, singulo cocco continente semen unicum oblongum reniforme. Ludit autem in hisce aliquando natura, transversim dissectis fructibus; inveni quadricapsularem, immo & pentacoccum, ut in *Tabula* etiam *nostra* notatur. Fructus autem coloris est crocei, maculis nigris interpositis; saporis acerrimi cum quadam dulcedine juncti. Semen colorem habet griseum, vel cinereum.

CHAMAELAEA foliis linearibus, flosculis spicatis, echinato fructu. *Nobis. Tab. 25.* Chamaelaea Zeylanica Esulae folio angusto, flore parvo, fructu tripartito. *Herb. Hert.* Tithymalus tenellus, Indicus foliis, Linariae raris. *Mus. Zeyl. pag. 32.* Ricinoides forte frutescens, Linariae foliis obtusis. *Plumier Catal. pl. Amer. pag. 20.* Cadi-Avanacu. *H. Malab. part. 2. Tab. 34.*

Oritur haec planta radice tenuissima, fibrosa, nigricante, caulem emitte-
tente rotundum, obscure viridem, cui folia adcrescunt alterna, foli-
taria, ex tenui & brevi pedunculo orta, glabra, longa, obtusa, linea-
ria perfecte, superiore parte viridia, inferiore pallentia, in ambitu
levissimis & tenuissimis dentibus seu crenulis ferrata, quae in *H. Ma-
lab.* majores exprimuntur. Flosculi ex foliorum alis, interdum ex
ipso ramo, in ortu proveniunt, spicati, minimi, examen in ficcata
fugientes planta, arctissime cohaerentes. Post hos sequitur fructus
rotundo-triangularis, & tricoccos, echinatus, seu spinulis undique ob-
fessus inermibus, continens, tria semina oblonga, cinerea, in singulo
loculo unicum.

CHENOPODIUM incanum, racemosum, folio majore, minori opposito.

Nobis. Tab. 26. Fig. 1. Atriplex Indica, tomentosa, incana, Majoranae Venetae foliis. *Mus. Zeyl. pag. 2.* Atriplex Indica, tomentosa, racemosa, Vulvariae folio. *ibidem pag. 33.* Atriplex Indica, tomentosa, Majoranae Venetae folio. *Herb. Hert.* an Amaranthus Indiae Orientalis minimus, supinus, Portulacae folio, floribus in capitulum collectis. *Tournef. inst. pag. 236.* Amaranthus Alopecuroides Indicus herbaceus Atriplicis folio. *Breyn Prodr. 2. pag. 13.* Scheru-Bula. *H. Malab. part. 10. Tab. 29.* ubi pro Herniariae specie habetur. **POLKUDUPALA** Zeylonensibus; a *Polkudu* quo trita medulla, seu nucleus Nucis Indicae *Coccos* dictae designatur, cui flores nonnihil similes sunt. *Pala* Blitum seu Amaranthum significat.

Cespitosa haec planta ramos undique per terram dispergit semipedales, flexuosos, tenaces, nec facile fragiles, ad singula folia floribus suis ubique ornatos. Folia autem alternatim e caulibus egrediuntur brevissimo innixa pediculo, fere sessilia, oblonga, integra, acuminata, superne viridia & glabra, inferne incana & valde lanuginosa, quibus in inferiore ramulorum parte foliolum ut plurimum est oppositum, quod in superiore ramorum parte definit & quasi evanescit; Ex ortu foliorum proveniunt flosculi plurimi in racemum oblongum duplicem, aut geminum utcunque collecti, albissimi, molles & tomento seu lanugine levissima obducti, tam arcte sibi juncti, ut unum capitulum videantur, qui minimi sunt, apetalii, caliculis mollibus contenti, pistillum simplex habentes, qui semen dant unicum, orbiculatum, depressum, nigrum, splendens, tenuissima membranula involutum, unde ad Chenopodium proxime pertinet.

CHENOPODIUM viride, vulgare, Alsines folio. *Nobis. Tab. 26. Fig. 2.*

Parietaria Zeylanica; vulgaris, Alsines folio. *Herb. Hert.* Parietaria Zeylanica. *Mus. Zeyl. pag. 30.* Blitum forte polygonoides, viride, polyanthos. *Sloan. Cat. pl. Jam. p. 99. & Hist. Jam. part. 1. p. 144. Tab. 92. Fig. 2.* vel Blitum vulgare, minus, surrectum. *ibidem Tab. 3. Fig. 2.* Caulis hujus plantae est latus, simplex, succulentus, cui folia variae magnitudinis sine ordine adcrescunt, subrotunda, integra, viridia utrinque, subtus venosa; plurima autem minora circa caulem ponuntur, majus impar claudit reliqua. Flores ex alis foliorum proveniunt spicatim, spicis brevissimis, confertim nascentibus, horum flosculorum

Fig. 1.

Fig. 2.

CHENOPODIUM incarnum, racemosum,
folio majore, minori opposito. Nobis.
 1672 *Illecebrum lanatum* L.

CHENOPODIUM viride,
vulgare, Alsines folio Nobis
 7179 *Amarantus polygonoides* L.

rum calix est quinquefidus, stamina quinque, pistillum simplex, semen dantes unicum globosum, depressum, nitidum, nigrum. unde & haec ad *Chenopodia* pertinet. Quorum character invenitur ap. *Linnaeum in char. pl. pag. 67.*

CHONDRILLA Zeylanica, minor, marina, folio Sinapios. *Mus. Zeyl. pag. 22.* **KADHUPARA** Zeylonensibus. a *Kadu* quod ensen seu gladium notat, cui folia sunt similia, & *Para* quod verbera, alias viam publicam notat. *ibidem.*

CHRISTOPHORIANA Zeylanica, racemosa, baccis lutescentibus. *Hart. in Catal. semin.*

CHRYSANTHEMOIDES hirsutum, foliis scabris, oblongis, acutis. *Nobis. Tab. 22. Fig. 2.* Chrysanthemoides Osteospermon, Zeylanicum, folio rigido, flore luteo. *Herb. Hert.* Monilifera hoc genus a *Vaill.* vocatur in *act. reg. Paris. 1720. pag. 373.* ubi notas ejus vide characteristicas. Elegans hic frutex e trunco suo firmo, scabro, emittit caules rotundos, leviter fulcatos, scabros & villosos, quibus folia adcrescunt brevi ex pedunculo, scabra, oblonga, acuminata, bina sibi invicem opposita, superiore parte obscura, inferiore glauca, nervosa; flores in summitate ramorum gerit elegantes, luteos radiatos, disco sulphureo, calice squammoso, dissecto, contentos, post quos sequuntur semina oblonga, lapidea; reliqua vide apud *Vaill.* loco citato. cum hac forte convenit

CHRYSANTHEMI seu Bellidis species folio integro, oblongo. *Mus. Zeyl. pag. 12.* quae **RANWANKIKIRINDI** Zeylonice audit a *Ran* quod aurum, *Wan* simile notat. Flores enim aurei sunt coloris.

CHRYSANTHEMUM, quae planta humilis, ramosa, foliis angustis, leviter serratis, capitulis aphyllis, capitatis. *Mus. Zeyl. pag. 26.* an Chrysanthemum parvum, ramosissimum, membranaceo caule *Maderaspatanum Plukn. Phyt. Tab. 160. Fig. 5.* **MUDHAMANA** Zeylonensibus.

CHRYSANTHEMUM Indicum minus, *Mus. Zeyl. pag. 32.* Chrysanthemum species **RANWAELLA** dicta. *ibidem. pag. 26.* *Waissunae* Malabaribus.

CHRYSANTHEMUM Zeylanicum, foliis guttatis, incis. *Petiv. hort. sicc.* apud *Ray tom. 3. append. pag. 243.* Chrysanthemum Americanum, frutescens, Balsaminae luteae foliis, nigris maculis punctatis. *Plukn. Phyt. Tab. 161. Fig. 1.* Chrysanthemum Curassavicum, frutescens, Hyperici foliis, nigris punctis notatis. *Par. Bat. Pr. pag. 323.*

CINNAMOMUM foliis latis, ovatis, frugiferum, *Nobis. Tab. 27.* Cinnamomum, seu Canella Zeylanica *C. B. P. pag. 408. & Herb. Herm.* Laurus Zeylanica, glandifera, folio trinervio, optimum & legitimum Cinnamomum ferens. *Mus. Zeyl. pag. 12.* Canella Zeylanica cum fructibus nondum maturis. *ibidem pag. 37.* Pianta della Canella *Acoftae edit. Ital. pag. 2.* Cuurudo *Pisonis Mantiff. aromat. pag. 165.* Cassia Cinnanomea *H. L. Bat. pag. 129. & in append. pag. 655.* ejus Figura. Arbor Canellifera Zeylanica, cortice acerrimo seu praestantissimo, qui Cinnamomum officinarum *Breyn Prodr. 2. pag. 17.* Canella seu Cinnamomum vulgare. *J. B. part. 1. lib. 4. pag. 440.* vide porro notas ad *H. Malab. part. 1. pag. 110. & Ray hist. pl. tom. 2. pag. 1559 & 1561. Samuel Dale Pharmacol. pag. 385 & seq.* Canella a *Garzia* vocatur *lib. 1. aromat. cap. 15. pag. 55 & seq.* ubi folii icon pessime exhibetur. &c. **KURUDU** quod Zeylonice pronunciatur **KURUNDU** *Mus. Zeyl.* ubi dicitur: Ex radicis cortice destillatur Camphora, ejusque Oleum; Ex trunci cortice, Oleum Cinnamomi, ex foliis, Oleum Caryophyllorum; Ex fructibus Oleum Junipero simile. Quum Cinnamomi descriptio in *H. Malab.* tam accurata & egregia exhibeatur, & apud alios citatos auctores ejus usus, & modus colligendi abunde inveniatur, de iis, ne nimis exspatier, hic nihil dico, contentus primo exactissimam Zeylonensis dedisse Figuram; notatum autem illud volo, quod haec nostra a Malabarica illa tantum loco natali differat, & multo praestantior sit, ut notat etiam *Clus. in lib. 1. Aromat. cap. 15.* ad Canellam & *Acoft. arom. lib. cap. 8.* hujus varietates certe multae in India occurrunt, ut etiam notat *Clar. Hermannus* in *H. L. B.* ita ut licet haec nostra *H. Malab.* figurae non respondeat, ipsam tamen & legitimum sit Cinnamomum. *Novem Cinnamomi diversitates* ex sola Zeylona transmissas servo, quae foliatura maxime differunt, quas non exhibeo, quia jam delineatae & descriptae sunt in *appendice ad acta Physico-Medica Acad. Caesar. Leopold. natur. curios. volum. 1. ann. 1727. pag. in append. quarta, & sequentibus.* Sequenti modo ibi distinguuntur & denominantur.

Prima

CINNAMOMUM foliis latis, cratis frugiferum. Nobis.
2910 Laurus Cinnamomum L.

CINNAMOMUM perpetuo florens, folio tenuiore, acuto. Nobis.
 2910 *Laurus Cinnamomum* L.

Prima species vocatur *Rasse Coronde* ab indigenis, quasi dicas, acre, suave ac dulce Cinnamomum, quod verum & praestantissimum habetur Cinnamomum a *Nobis. Tab. 27.* expressum. *Alter*a species Cinghalensibus dicitur *Cabette Coronde*, five amarum & adstringens Cinnamomum, quod numero secundo in *actis Medicis* delineatum est.

Tertiae speciei Ceilanenses nomen imponunt *Cappare Coronde*; quod Caphuratum Cinnamomum notat, quia Caphurae saporem, odoremque potentissimum reddit.

Quarta species incolis audit *Welle Coronde*, five Cinnamomum arenosum, quia in eo demorso & manso quaedam veluti arenulae percipiuntur, etiamsi revera harum penitus sit expers.

Quintam speciem vocant *Sewel Coronde*. SEWEL autem Ceilanica lingua idem valet, ac si diceres mucilaginosum aut glutinosum Cinnamomum.

Sextae speciei Ceilanenses nomen indunt *Nieke Coronde*, quia haec arbor illi, quam *Niekegas* vocant, similis est.

Septimae speciei cognomen est *Dawel Coronde*, five Tympani Cinnamomum, Belg. *Trommel-Caneel*. lignum enim hujus arboris leve, atque tenax ad vasa & tympana, quae *Dawel* vocant, conficienda adhibetur.

Octava species insignitur nomine *Catte Coronde*, CATTE vero Zeylanensibus idem significat quod SPINA Latinis; truncus enim hujus arboris multis spinis horret, unde CINNAMOMUM SPINOSUM dictum.

Nonam speciem appellant *Mael Coronde*, five floridum Cinnamomum; quia haec arbor perpetua florum amoenitate viget, & haec proxime accedit illi primae, optimaeque speciei *Rasse Coronde* dictae, sed nulli hujus fructus proveniunt, contra atque in laudata prima specie fieri solet; cujus ramus florifer sequenti *nostrae Tabulae 28.* exhibetur. Commemoratarum autem specierum folia in dictis *actis Medicis* proponuntur, cum brevi earum descriptione. *Cinnamomi* character apud *Linnaeum in char. pl. gener. p. 120.* occurrit. ubi LAURUM, CINNAMOMUM & CAMPHORAM ad idem genus reducit ex florum consensu.

CINNAMOMUM perpetuo florens, folio tenuiore, acuto. *Nobis. Tab. 28.*

Canella Zeylanica sylvestris odore & sapore Myrrhae, flosculis verticillatis. *Mus. Zeyl. pag. 26.* seu Laurus Zeylanica glandifera, folio trinervio, pallido, Canellae simili, odore & sapore Myrrhae *ibidem*. Cassia Cinnamomea, Myrrhae odore, folio trinervi subtus caesio, NICA-

DUWALA

DUWALA Cinghalensibus dicta. *Plukn. Almag. pag. 89.* Arbor Cannellifera, sylvestris, Zeylanica, odore & sapore Lauri vel Myrrhae *Breyn Prodr. 2. pag. 18.* Canella sylvestris, Malabarica. *Ray H. p. 1562. & Fl. Malab. pag. 17.* Canella sive Cinnamomum vulgare, crassiore cortice. *J. B. tom. 1. lib. 4. pag. 451 &c.* Katou Karua *H. Malab. part. 5. Tab. 53.* quae loco natali tantum a nostra differt, DAWALKURUNDU & NIKADAWALU Zeylonensibus. Quum in *Hermanni Herbario* nulla distinctio inter hanc & primam quoad nomen occurrebat, anceps haesi, quodnam legitimum esset Cinnamomum. Auctorum vero denominationes & descriptiones, ut & Figuras *H. L. Bat. & Malab.* accurate perpendens, prius Cinnamomum legitimum & optimum, hoc vilius & sylvestre esse puto. quod autem huic in *Mus. Zeyl.* flosculi verticillati adscribantur, non communi sensu Botanico est accipiendum, scilicet quod flores circa caules in verticillos collectos gerat, sed verticillatos id est in summo caulium vel vertice positos, ad differentiam primi, quod flores per caules inter folia dispersos etiam habeat. An bene an male ominatus fuerim, an vero sit mas & foemina, sive florifera & frugifera, ut in Lauris quarum hae sunt proprie species, obtinet, peritioribus, & qui vivas eas in loco natali aliquando examinabunt, judicandum relinquo. Quidquid sit; hoc etiam legitimum est Cinnamomum, (licet forte non ita praestans ac primum,) ut odor ejus aromaticus, gratus, in foliis contritis testatur. A Primo hoc differt, quod folia gerat multo minora, angustiora, magis acuta, subtus caesia, bina fere semper opposita. Flores deinde non per caules sparsos, sed in summo plurimos collectos, qui sequenti modo proveniunt. E calice tubuloso, oblongo, unifolio, lapaceo, ore quinquefido oritur petalum unicum, infundibiliforme, quinquefidum, cum staminibus quinque longitudine petali, & pistillo unico capitato; Fructus dein infra calicem provenit umbilicatus, bacca monosperma, subrotunda. hujus character etiam invenitur apud *Amman. char. pl. pag. 320.*

Praeter memoratas jam species, aliae insuper Cinnamomi diversitates in Zeylona observantur, ut patet ex *Mus. Zeyl. pag. 12.* ubi KURUDU-PAELA occurrit, quod parvum Cinnamomum notat, & KURUDU-AETHA quod Cinnamomum frugiferum significat, forte quod hujus sint mares & foeminae. Sic a *Grimm. in Laborat. Ceyl. pag. 84.* etiam memoratur Arbor Cinnamomi sylvestris a Cinghalensibus WALKURUNDU vocata, a Portugallis *Canell de Matte.* cujus radicis cortex prae-

praestantissimum est Alexipharmacum, attenuans, discutiens, putrefactioni resistens, fermentum febrile (ut loquitur) praecipitans, & virtutem sudoriferam possidens. Cortex hic praebet Sal quoddam volatile Oleosum, quod Myrrhae saporem & odorem habet, & potentius adhuc est in supra dictis affectibus. &c. In genere autem de Cinnamomo haec habet: *in Labor. Ceyl. pag. 56.* Arbor Cinnamomi jure merito Regina omnium arborum vocari meretur &c. Ex floribus enim Aqua, Oleum, Spiritus & Conserva penetrantissima & summi usus in arte Medica, producuntur. Folia nihil fere quoad figuram a Laurinis foliis differunt, ex quibus Pulvis Carminativus in Colicae passionibus, Tympanitide, ad tormina intestinorum &c. Ex illis etiam aqua, Oleum stillat. Syrupus, Ol. coct. ad externos usus optimum praeparatur. Vires dosis, & usus ad innumeros morbos ibi latius explicantur. Fructus etiam dant aquam & Oleum fortiss. destil. & coctum, unde Emplastra, & linimenta penetrantissima. Spiritus autem harum partium tanquam Balsamum vitae verissimum ab eo agnoscitur, qui morbis capitis, stomachi & matricis inprimis inservit, &c. De cortice hujus arboris nil dico, quum apud plures alios auctores, & ipsum vulgum de ejus incomparabilibus virtutibus satis constet. Sed praeter haec omnia radix inprimis hujus arboris plurimas offert medicinas, cujus cortex excellentissimum est Alexipharmacum, & sudoriferum in morbis venenatis, & malignis efficacissimum, quae per destillationem, & praeparationem exhibet aquam, & Oleum Camphorae, immo veram Camphoram. Unde Syrupus Camphor. Sp. Vini Camphor. Balf. sulph. compl. Tinct. Sulphur. Camphor. & Extractum ex radice optimum in fluxu ventris, & similibus affectibus proficuum; cujus & Electuarium aliis nempe additis instar Diascordii agit, & Diascordium spagyricum ab auctore vocatur. Tot tantaeque variae res, & Medicamina ex una hac arbore procedunt, ut justa sit occasio demirandi, qui fit, ut una haec arbor omnigenas nobis medicinas exhibeat. Quaelibet enim pars suam profert, & talis est omnium inter eas differentia, ut qui earum ignarus fuerit, juramentum praestare facile velit, eas scilicet ex unica hac arbore provenire non posse, ut loquitur egregius ille auctor *pag. 56.* ubi ejus praeparationes incipiunt & desinunt hujus arboris cum *pag. 84.* Vide & *Philip. Baldeum Histor. Ceylon. cap. 49.*

Ignoscite Lectores *B.* quod a scopo Botanico parum declinaverim, sed eximia nimis, & magis admiranda videbantur, quam ut sicco ita pede haec transirem. praesertim cum laudatus hic auctor, & aureus li-

bellus non multis forte notus, & in paucorum manibus versetur. hujus verus est auctor *Grimm*. Suecus, qui diu in Zeylona fuit, licet *Barth. Pielat*. qui latinitate eum, (ut loquitur,) donavit, ejus nomen reticuerit. de quo vide *Act. Lipsiens. ann. 1682. pag. 39.*

CLEMATIS Zeylanica HERMANNI. *Breyn. Prodr. 2. pag. 46.* Flam-
mula, sive Atragene Zeylanica, sylvestris, latifoliae similis. *Breynii ibi-
dem. & Sloan. Catal. pl. Jam. pag. 222.* ubi inquiritur, an sit Clematis
latifolia, sylvestris, sive prima C. B. P. &c. quae apud *Sloan. in Hist.
Jam. part. 1. pag. 199. Tab. 128. Fig. 1.* & cum reliquis suis synony-
mis proponitur *pag. 84. Cat. pl. Jam.* ubi ad finem dicitur, in sylvis
vicinas arbores scandens, & operiens reperitur. Numero foliorum so-
lum ab Europaea differt, quae in Jamaica semper terna observavi, ideo-
que, si pro distincta planta habeatur, per me licebit, quamvis tota facies
plantae eadem cum superiori videatur.

CLEMATIS Zeylanica, floribus obsoletis parvis. *Mus. Zeyl. pag. 35.* Forte
est Ligustrum foliis ad internodia ternis, infra descriptum & expressum.

CLEMATITIS species radice ampla bulbosa, URULA Zeylonensibus.
Mus. Zeyl. pag. 57.

CLERODENDRON folio lato & acuminato. *Nobis. Tab. 29.* Viburnum
Zeylanicum, maximum, conjugato oblongo folio, flore albo. *Herb.
Hert. Arbor Zeylanica, fortunata* quibusdam dicta. *Mus. Petiv. no. 870.*
Planta fortunata PINNA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 59.* ubi &
alia species proponitur, quae planta infelix, infortunata, seu PINNA-
KOLA Zeylonensibus dicitur. *Mus. Zeyl. pag. 25 & 59.* quam in
Herb. Herman. sub nomine PINNAKOLA seu *infortunata* etiam in-
veni, sed ut verum fatear, quae a priori nil nisi folii rotundiore &
magis cordata figura differt, caeterum in omnibus eadem. Quaeque
foliatura, sed majore, ut & toto habitu maxime convenit cum *Pluknetii
Tab. 211. Fig. 4.* ubi vocatur Periclymeni similis, Myrtifolia arbor Ma-
deraspatana. huc & forte spectat Arbor Baccifera, flore luteo, mono-
petalo, difformi, fructu sphaerico, nigricante, monopyreno. *Sloan. Cat.
pl. Jam. pag. 170.* huc pertinet Peragu *H. Malab. part. 2. Tab. 25.* Qui
est frutex baccifer, Malabaricus, floribus pentapetalis, binis, una bacca
nigra in calice stelliformiter expanso. *Ray. hist. pag. 1571. & Commel.
Fl. Malab. pag. 31.*

Nostrae

CLERODENDRON folio lato & acuminato. Nobis.

4633/3 *Clerodendrum infortunatum* L.

Nostreae plantae rami sunt obtusi, tetragoni, scabri, folia opposita, petiolis longis insidentia, cordata, venosa, scabra, per marginem integra, inferiora lata, leviter acuminata, superiora prope caulem fliferum angustiora, & acutiora.

Florum racemus caulem terminat, qui constat ramulo recto cum lateralibus per Dycotomiam divisis, quibus insident flores, quorum calix est patens, ampliatus, erectus, semiquinquefidus, laciniis acuminatis, perpetuus, ad maturitatem fructus excreescens. Petalum floris est unicum, tubo longissimo tereti erecto, limbis bilabiatis, galea bifida, reflexa, barba trifida, pendula, stamina sunt quatuor petalo longiora, capillacea, reflexa, & pendula apicibus lateralibus.

Pistillum floris est unicum petalo longius, etiam pendulum & reflexum. Fructus fit bacca, nucleum continens solitarium. Flos hujus plantae cum personatis *Tournefortii*, & monopetalis irregularibus *Rivini* convenit, sed ab omnibus aliis mihi hactenus cognitis plantis differt, unde novum vocabulum graeca denominatione desumptum, quod latinis *Arborem fortunatam* notat, ipsi indimus, & re vera novum est genus. Cujus characterem *Linnaeus in Char. pl. gen. pag. 186.* sequenti modo definit.

CAL: *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, laciniis ovato-acutis, tubo corollae latioribus, persistentibus.

COR: Monopetala ringens. *Tubus* tenuis, longus, labium superius concavum, erectum, bifidum, obtusum. Labium inferius ejusdem longitudinis, tripartitum, reflexum, obtusum, laciniis omnibus aequalibus.

STAM: *Filamenta* quatuor filiformia, corolla multo longiora, quorum duo breviora; *Antherae* simplices.

PIST: *Germen* subrotundum. *Stylus* figura, longitudine & situ staminum. *Stigma* simplex.

PER. *Drupa* subrotunda, calici magno inposita.

SEM: unicum, subrotundum.

COLCHICUM Zeylanicum, flore Violae odore & colore ephemero.

Par. Bat. Pr. pag. 324. Colchicum Zeylanicum HERMANNI Breyn.

Prodr. 2. pag. 35. Colchicum Zeylanicum, flore ephemero, violaceo, odorato. *Amm H. Bosian pag. 9.* Zedoaria radice rotunda *H. Beaum.*

pag. 14. Zedoaria radice rotunda officin. *Breynii* apud *Ray tom. 3. pag.*

648. ubi pro Malan-Kua *H. Malab. part. 11. Tab. 9.* habetur. quae

apud *Plukn. Almag. pag. 397.* cum Zedoaria rotunda *C. B. P. pag. 36.* jungitur. quae est Zedoaria, tuberosa, nigricans *ejusdem ibidem.* de qua *Samuel Dale in Pharmac. pag. 328.* dicit: Zedoaria longa & rotunda non aliter inter sese differre nobis videntur, quam quod ejusdem radicis partes sint diversae. & apud *Ray tom. 3. pag. 561.* ex Boccone observatione legitur, Colchici radicem seu bulbum recentem collo alligatam, ita ut supra pectus dependeret, & carnem nudam tangeret, efficax, & salutare remedium fuisse adversus pestem anno 1680. in Germania saevientem &c. MAHA-KALUWA Zeylonensibus. BLOK-ZEDOAR Belgis.

COLOCASIAE seu Fabae Ægyptiae, veterum flos *C. B. P. Mus. Zeyl. pag. 37.* quae est Colocasia, seu Faba Ægyptia veterum, *Dioscor. C. B. Pin. pag. 196. &c.*

COLOCASIA, quod Arum Indicum COLOCASIA dictum, pediculis atris. *Mus Zeyl. pag. 56.* Arum Zeylanicum, minus, Colocasiae facie, pediculis puniceis. *Par. Bat. Pr. pag. 314. & Par. Bat. pag. 77.* Arum Ceylonicum, minus, cauliculis nigricantibus, foliis Colocasiae similibus. *Cat. Hort. Med. Amst. pag. 37.* GHAHALA Zeylonensibus.

COLOCASIA, quod Arum Zeylanicum, minus, cauliculis viridantibus. *Par. Bat. pag. 77.* Arum Ceylonicum, minus, cauliculis viridantibus, foliis Colocasiae similibus. *J. Commel. Cat. Hort. Med. Amst. pag. 37.* Arum minus, Nymphaeae foliis esculentum. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 62. & Tournef. inst. pag. 159.*

COLOCASIA, quod Arum maximum, Ceylonicum, radice crassa, longa, rotunda, geniculata Colocasiae folio, Wela-lla. *H. Malab. part. 13. nondum edit. in Catal. Hort. Med. Amst. pag. 37. & Fl. Malab. pag. 9.* ubi Arum palustre, Malabaricum, folio Nymphaeae, radice arundinacea, vocatur, & in notis ad *H. Malab. part. 11. pag. 43.*

COLOCASIA strongylorrhiza, Zeylanica, pediculis & foliorum limbis atro puniceis. *Par. Bat. pag. 85.* Arum maximum, Ceylonicum, cauliculis nigricantibus. *J. Commel. Cat. Hort. Med. Amst. pag. 37.* Arum maximum, Ægyptiacum, quod vulgo Colocasia, cauliculis nigricantibus Zeylanicum. *H. L. B. pag. 60.*

COLOCASIA WALGHAHALA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 66.* an Arum maximum, Ægyptiacum, quod vulgo Colocasía *C. B. P. pag. 195?* cujus in *Sloan. Catal. pl. Jam. pag. 61.* plurima enumerantur synonyma, & quae a prima citata Colocasía separatur a *C. B. P. in pag. 195.* Arum Ægyptiacum, Caladium fativum, Kelady. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 84.*

COLUTEA Indica, humilis, ex qua Indigo folio viridi, *Mus. Zeyl. pag. 32. & Par. Bat. Pr. pag. 325.* Colutea Indica, herbacea, ex qua Indigo. *H. L. Bat. pag. 168. & Commel. Fl. Malab. pag. 21.* ubi plura synonyma. Polygala Indica, ex qua Indigo minor HIN-AWARU Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 93. Ameri H. Malab. part. 1. Tab. 54.* ubi vide notas subjectas. Anil sive Indigo Indica. *Moris hist. part. 2. pag. 202.* Anil sive Nil Indorum color. *J. B. tom. 2. lib. 22. pag. 945.* Coachera prima *Pisonis lib. 4. pag. 198.* Indicum Tawon Anyl. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 29.* Sesban Aniliferum, Indicum, Coronillae foliis vel Indigo Indica *Breyn. Prodr. 2. pag. 91.* ubi notas vide hujus characteristics. Coronilla Indica, ex qua Indigo. *Flor. Norimb. p. 124. vide & Ray hist. pl. part. 1. pag. 926. & Aët. Phil. Lond. vol. 22. no. 267. pl. 57.* Ornithopodium Indicum, herbaceum, Coronillae foliis ex qua Indigo. *Hert. Catal. seminum.* Coluteae affinis fruticosa, floribus spicatis, purpurascens, filiquis incurvis, e cujus tinctura Indigo conficitur. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 141.* qui & alia habet synonyma. AVARU & AWARU Zeylonensibus, & minor species HIN-AWARU dicitur, quae saepius pro diverso coelo, & solo differunt, licet revera eadem sint plantae.

COLUTEA Zeylanica, maxima, filiquosa, tota incana, grano rotundo, globoso, *Mus. Zeyl. pag. 54.* Colutea Zeylanica, marina, foliis argenteis, floribus luteis, filiquis teretibus, articulatis, seminibus globosis, spadiceis, *Amm. H. Bosian. pag. 9.* vide infra ad CORONILLAM.

COMMELINA paludosa, latifolia. *Nobis. Tab. 20. Fig. 2.* Gramen Zeylanicum, latifolium, flore coeruleo, stellato. *Herb. Herm.* Gramen paludosum, flore coeruleo. *Mus. Zeyl. pag. 16. & Gramen flore coeruleo. ibidem pag. 25.* hujus etiam mentio fit in *H. L. Bat. pag. 232.* a *Plumier* in *novis plantar. gener. pag. 48.* novo proponitur nomine in memoriam Clarissimor. **COMMELINORUM COMMELINA** hoc ge-

nus. ubi inter notas characteristicas dicit, quod flores gerat dipetalos, quum tripetali observentur, ut a Clariss. *Dillenio* etiam bene notatur in *H. Elth. pag. 91.* ubi tres *Commelinae* species eleganter delineatae, & depictae habentur. **DIAMENERYA** haec nostra Zeylonice dicitur, & a Medicis inter aquea, & refrigerantia numeratur, & ejus succus cum lacte vaccino datus movet urinam, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 16.*

Uliginosa amat haec planta loca, caule innitens fungoso, glabro, herbaceo, ubi folia emittit, nodoso, seu potius, ubi folia erumpunt, folliculus membranaceus ei circumcrescit, qui folio pro pediculo inservit, ex quo illud continuatur, & erigitur, quod scabrum est, latum & acutum, alternatim proveniens.

Flores in summitate proveniunt ex folio lato, concavo, tanquam in concha primo occlusi, aperti dein tenui pediculo ex illo eriguntur coerulei, stellati, tripetali, calice tripetalo insidentes, e cujus medio surgit pistillum, quod deinde abit in fructum membranaceum, trilocularem, singulo loculo semen subrotundum continentem.

COMMELINA repens, folio subrotundo, obtuso. *Nobis.* an *Commelina procumbens*, annua, Saponariae folio. *Dillen. H. Elth. pag. 93. Tab. 78. Fig. 89?* *Ephemerum Indicum*, bipetalum, procumbens, obtuso folio, pediculo alato. *Par. Bat. pag. 150. & Ray tom. 3. pag. 566.* *Ephemerum Benghalense*, serpens, folio subrotundo, brevi, phalangoides. *Plukn. Phyt. Tab. 27. Fig. 3.* *Arundinella*, Savor Bubu *Rumph. Herb. Ambon. lib. 10. cap. 17.* Hujus generis character exacte exhibetur a *Linnaeo in Char. gener. plant. pag. 11.*

CONVOLVULUS Zeylanicus, hirsutus, foliis *Pedis Tigridis* in modum, seu quinque profundas lacinias divisis. *Mus. Zeyl. pag. 12.* *Convolvulus Indicus*, *Pes Tigrinus* dictus, minor, & hirsutus. *Par. Bat Pr. pag. 326.* *Convolvulus Zeylanicus*, villosus, pentaphyllus, & heptaphyllus, minor, *Pes Tigrinus* dictus. *H. L. Bat. pag. 184.* ubi ejus descriptio, & pag. 187. ejus Figura. quae etiam prostat in *Ephemer. curios. anni 4 & 5ti pag. 136.* *Convolvulus heptaphyllus*, *Indicus*, villosus. *Breyn. Prodr. 1. pag. 33. & Commel. Fl. Malab. pag. 22.* *Convolvulus pentaphyllus*, hirsutus. *Plumier. Catal. pl. Amer. pag. 1.* *Volubilis Zeylanica*, *Pes Tigrinus* dicta *H. Elth. pag. 429. Tab. 318. Fig. 411.* *Pulli-Schovadi. H. Malab. part. 11. Tab. 59.* **DUVIPAHURU**
&

& DUVIPASSURI Zeylonensibus, a *Duvi*, quod Tigrim, & *Pail*, quod pedem notat. Folia enim Tigridis pedem referunt.

CONVOLVULUS Indicus, Pes Tigrinus dictus, major, & glaber. *Par. Bat. Pr. pag. 327.* an Convolvulus quinquefolius, glaber, Americanus *Plukn. Phyt. Tab. 167. Fig. 6?* qui est Convolvulus, pentaphyllus, folio glabro, dentato, viticulis hirsutis. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 1.* varias Convolvuli species habet *Rumph. in Herb. Ambon. lib. 9. cap. 55. ad 60.*

CONVOLVULUS Zeylanicus, alatus, maximus, foliis Ibisco non nihil similibus, angulosis. *H. L. Bat. pag. 177. & seq.* ubi descriptio, & elegans Figura. Turbith Arabum legitimum, & officinarum, *Mus. Zeyl. pag. 26.* Turpethum repens folio Althaeae, vel Indicum *C. B. P. pag. 109.* Turbith Officinarum & Garciae atque Acoftae apud *Breyn Prodr. 2. pag. 101.* Turpetum verum, seu album Cleyeri *ibidem* & apud *Plukn. Mantiss. pag. 53.* ubi inquiritur, an veteribus Graecis notum & variae de hujus radice opiniones proponuntur. Convolvulus Indicus, amplissimo subrotundo folio, caule alato, Turbith seu Tiguar Garciae quibusdam putatus. *Ray tom. 3. pag. 373.* vide & *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 56.* ad Convolvulum Althaeae folio Clusii &c. Turbith TIRASTAWALU *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 122.* ubi haec habet: Colligitur etiam extra Columbo, crescit non secus ac CONVULVULUS. Folia ipsius Malvae sunt similia, subtusque contacta lenia sentiuntur. Semen etiam veluti arbor Belgice WINDE, Gallice *Liset* dicta, continet, est rotundum atque nigrum, instar grani Piperis in certis quibusdam loculis inclusum jacens. Radix mediocriter est longa, contorta, & resinosa, de cujus virtutibus vide *Samuel Dale Pharmacol. pag. 257. & Clus. exot. cap. 36. lib. 1. pag. 206.* TIRASTAWALU Zeylonice audit.

CONVOLVULUS lactescens, KIRIMANDI dictus. *Mus. Zeyl. pag. 45.*

CONVOLVULUS maritimus, Zeylanicus, folio crasso, cordiformi. *H. L. Bat. pag. 174* ubi icon & descriptio. *Commel. Fl. Malab. pag. 22. & Par. Bat. Pr. pag. 325.* Convolvulus maritimus, Zeylanicus, folio crasso, cordiformi, flore roseo. *Mus. Zeyl. pag. 55.* Convolvulus maritimus, Zeylanicus, folio crasso, bifido, seu cordato. *Herm. Flor. Lugd. Bat. pag. 75.* Convolvulus, marinus, catharticus, folio rotundo, *Plum. Sloan. Cat.*

Cat. pl. Jam. pag. 57. & Hist. Jam. part. 1. pag. 155. Plumier. Catal. pl. Amer. pag. 1. Soldanella Malabarica, cordato folio. Petiv. Mus. no. 98. Schovanna-Adamboe. H. Malab. part. 11. Tab. 57. vide porro Ray tom. 2. pag. 188. & tom. 3. pag. 371. ut & Plukn. Phyt. Tab. 24. Fig. 4. BINTAMBURU Zeylonensibus.

CONVOLVULUS marinus, Indicus, repens, macrorizos, folio bifido, crasso, flore roseo, amplo, BINTAMBURUWÆL Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 39.* Convolvulus Zeylanicus, terrestris, flore amplo, radice Salsaeparillae simili, gummosa. *Mus. Zeyl. pag. 61.* varietas haec est Convolvuli maritimi folio crasso cordiformi &c. ut patet, si hujus descriptio in *H. L. Bat.* facta, cum illa comparetur.

CONVOLVULUS Zeylanicus, gracilis, tenuifolius APAS & APATHUAE-THA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 39.*

CONVOLVULUS Indicus, Cantabricae folio latiori, floribus albis. *Mus. Zeyl. pag. 43.* Phaseolus sylvaticus, paludosus. *ibidem.* APAHU Zeylonice.

CONVOLVULI latifolii species PATIPALAE dicti *Mus. Zeyl. pag. 44 & 60.*

CONVOLVULUS Zeylanicus, medius, semine hirsuto GHIRITILLA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 52.* Convolvulus fructu carnosio GHIRITILLA dictus. *ibidem pag. 53.*

CONVOLVULUS Zeylanicus, idem, major, semine glabro. *Mus. Zeyl. pag. 52.*

CONVOLVULUS Zeyl. idem, maximus, semine hirsuto. *ibidem.*

CONVOLVULUS Zeyl. maximus, semine hirsuto, alato. *ibidem.*

CONVOLVULUS Zeyl. idem, minimus, semine hirsuto. *ibidem.*

CONVOLVULUS Zeyl. idem, major, semine hirsuto. *ibidem pag. 53.*

CONVOLVULUS Zeyl. idem, medius, hirsutissimus. *ibidem.*

CONVOLVULUS Indicus, maximus, capreolatus, tuberosus, foliis profunde incisus seu tripartitis. *Mus. Zeyl. pag. 63. Modecca. H. Malab. part. 8. Tab. 20.* Flos passionis spurius, Malabaricus, quinquesido folio primus,

mus, five spinosus, fructu rotundo. *Breyn. Prodr.* 2. pag. 48. ubi vide notas características. & *Commel. Fl. Malab.* pag. 29. Modecca fructu majore, flore ex albo flavescente. *Par. Bat. Pr.* pag. 354.

CONVOLVULUS Indicus, capreolis donatus, foliis Bryoniae albae divisuris, Sandaracae colorem referentibus, floribus striatis, per limbum flavis, & in collo ex viridi albicantibus, Kindici-Valli. *Fl. Malab. part.* 8. *Tab.* 27. **TODWALLEWEL** Zeylonensibus dictus. *Plukn. Mantiss.* pag. 55.

CONVOLVULUS Zeylanicus, folio sagittato. *Mus. Zeyl.* pag. 64. Convolvulus Sagittariae folio, flore purpureo. *Plukn. Phyt. Tab.* 85. *Fig.* 3. **Tala-Neli** *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 55. ubi in notis, Convolvulus Malabaricus, angusto folio, flore variegato, vocatur. vide & *Fl. Malab. pag.* 22. an Convolvulus minimus, angusto, auriculato folio. *Boccon. Mus. Tab.* 33? qui est Convolvulus Graecus, Sagittae foliis, flore albo *Tournef. Cor.* pag. 1.

CONVOLVULUS Zeylanicus, hirsutus, folio Hepaticae trilobatae, floribus pluribus in capitulo junctis. *Par. Bat. Pr.* pag. 327. Convolvulus Zeylanicus, hirsutus, folio Hepaticae nobilis. *Mus. Zeyl.* pag. 65. & *Par. Bat. App.* pag. 6. Convolvulus Indicus, villosus, Hederae folio tripartito, flore coeruleo. *H. L. Bat. pag.* 182. ubi ejus descriptio. Convolvulus folio hederaceo, anguloso, lanuginoso, flore magno, coeruleo, patulo. *Sloan. Catal. pl. Jam.* pag. 56. ubi plurima habet synonyma.

CONVOLVULUS folio piloso, **BOMI** Zeylonensibus dictus. *Mus. Zeyl.* pag. 26. an Convolvulus Jamaicensis, trilobatus, foliis tomentosa lanugine densiori & levissima utrinque obductis, flore peramoene purpureo? *Pluknet. Phyt. Tab.* 167. *Fig.* 4. qui est Convolvulus folio lanato, in tres lacinias diviso, flore oblongo purpureo. *Sloan. Cat. pl. Jam.* pag. 55.

CONVOLVULUS Zeylanicus, major, folio subrotundo, cauliculis spinulis inermibus obsessis. *Nobis.* ex seminibus Ceylon: nobis ante duos annos progerminavit. Folia sunt instar Convolvuli vulgaris majoris, caules spinulis albicantibus hinc inde obsiti, flores non dedit. a *Pluknetio* in omnibus huic conveniens, & ut puto, idem exprimitur in *Phyt. Tab.* 276. *Fig.* 3. qui est Convolvulus Americanus, subrotundis foliis,

viticulis spinosis in *Almag. pag. 115.* ubi reliqua ejus inveniuntur synonyma & singularis virtus ad Luem Veneream. in *Mantiss. vero* vocatur *Convolvulus maximus*, caule spinulis obtusis obsito, flore albo, folio hederaceo, anguloso. *pag. 54.*

CONVOLVULUS flore minore, lacteo, fundo atro rubente. *Dillen. H. Elth. pag. 98. Tab. 83.* Convolvulus Zeylanicus, folio Afari, flore albo, macula purpurea notato. *ibidem.* Convolvulus Scammonii folio, subrotundo, flore albo, umbone nigro, Curassavicus. *Par. Bat. App. pag. 6.*

CONVOLVULUS Zeylanicus, folio ferrato, flore parvo, albo, macula purpurea notato. *Hert. Catal. semin.* Convolvuli characterem vide apud *Linnaeum in Char. gen. pl. pag. 47.*

AN CONVOLVULI species alia? *Mus. Zeyl. pag. 27.* quae est planta scandens, folio Convolvuli obtuso, umbilicato. *ibidem. pag. 21.* KAHIPIS-SAN Zeylonensibus. *Kabi* tussim notat, *Pissan* fatuum. succus enim foliorum aquae instillatus facit eam quasi molliter concreescere ad formam *Ficus Indicae Pissan* vocatae. *Mus. Zeyl. pag. 21.* quod optimum sine dubio ad tussim est remedium, unde & dubito, an non haec sit illa *Smilacis* species, cujus radix *Hermann*o per excellentiam *Asthmatica* vocatur, quam vide infra ad *SMILACEM.*

CONYZA arbor Zeylonensis, subrotundo folio, maxime tomentoso. *Plukn. Amalth. pag. 64.* an *Conyza* arbor, *Helenoides*, sive *Insulae St. Helenae*, *Salviae crenatis foliis*, prona parte alba lanugine incanis, *Balsamifera*? *Plukn. Mantiss. pag. 56.*

CONYZA Indica, villosa, mollis, odorata, acris, flore purpureo papposo, DADHAKAEHAEL Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 41.*

CORALLODENDRON triphyllum, Americanum, spinosum, flore ruberrimo. *Tournef. inst. pag. 661.* Siliqua sylvestris, spinosa, Arbor Indica, CORALL dicta, fructu rubicundo. *Mus. Zeyl. pag. 49. & C. B. P. pag. 402.* CORAL arbor spinosa, Orientalis, fructu obscure rubente. *Par. Bat. Pr. pag. 327. Commel. Fl. Malab. pag. 23.* Arbor CORALL *H. Amst. part. 1. pag. 211.* quem vide, ut & notas ad *H. Malab. part. 6. Tab. 7.* ubi *Mouricu* vocatur. Arbor fabifera, *Boa Tincking* dicta

dicta *Bontii* pag. 134. & *H. Beaum.* pag. 14. *Gelala littorea*, *Gelala-pantey.* *Rumph. Herb. Ambon. lib. 3. cap. 33.* Phaseolis accedens *Corall* arbor, spinosa, Orientalis, fructu obscure rubente. *Plukn. Almag. pag. 293.* ubi vide reliqua ejus synonyma; nec non apud *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 142.* ad *Corall* arbor *Clusii hist. rar. pl. append. pag. 253.* ERABUDU & ERABUDUGHAHA Zeylonensibus. Haec species est spinis ex albo virentibus, & seminibus rubentibus. quae *Corallina Ceylanica*, & *Javanica* vocatur ab *Amman. in Hort. Bosian. pag. 9.* ubi haec addit. Sunt arbores peregrinae, spinosae, femina in siliquis oblongo-rotunda ferentes, quae habent colorem quodammodo *Corallorum*, quem *Clusius pag. 253.* cum *Ferrario in cultur. pag. 380.* ob denegatam autopsiam floribus perperam tribuit. Caeterum *Figura Clusii* cum arbore nostra *Ceylanica* exacte convenit. *Amm.*

CORALLODENDRON triphyllum, Americanum, minus, spinis, & seminibus nigricantibus. *Tournef. inst. pag. 661.* **CORALL** arbor spinosa, seminibus & spinis nigricantibus. *Par. Bat. Pr. pag. 327.* **CORALL** arbor, filiquosa, minor, spinis, & seminibus nigricantibus. *H. L. Bat. pag. 189.* *Gelala Itam Rumph. Herb. Ambon. lib. 3. cap. 35.* Phaseolis accedens utriusque Indiae, *Corall* angustifolia, spinosissima, fructu tenuiore, atro-nitente. *Plukn. Almag. pag. 293.* ubi vide reliqua ut & *Ray. hist. pag. 1736.* JACERABUDU haec Zeylonensibus dicitur.

CORCHORUS, quod *Erysimum latifolium*, Sefami siliquis. *Mus. Zeyl. pag. 31.*

CORCHORUS folio auriculato, rotundiore, Zeylanicus. *Breyn. Prodr. 2. pag. 36.* *Alceae cibariae* affinis, Orientalis, brevioribus foliis, flore flavo, fructu caryophylloide, longiori. *Plukn. Almag. pag. 18.*

COR INDUM, sive *Halicacabum peregrinum*, minus. *H. L. Bat. pag. 190.* *Corindum* folio & fructu minore. *Tournef. inst. pag. 431.* *Pisum vesicarium*, fructu nigro macula alba notato, *Indicum.* *Mus. Zeyl. pag. 5.* & *Herb. Herm. Pisum Cordatum. H. Eyst. Aest. ord. 13. Fol. 11. Fig. 1.* *Halicacabus peregrinus* *Utta Malu. Rumph. Herb. Ambon. lib. 10. cap. 44.* *Halicacabum Indicum*, tricoccon, fructu nigro, minore, Lunula alba signato. *Plukn. Almag. pag. 120.* *Pisum decimum*, sive *vesicarium* fructu nigro, alba macula notato. *C. B. P. pag. 343.* & *Sloan. Cat. pl. Jam.*

pag. 110. ubi plurima hujus occurrunt synonyma. vide & *Hist. Jam.* part. 1. pag. 238 PENALA Zeylonensibus. Ex hujus foliis incolae lavamen conficiunt, quo capitis dolorem, ac ardorem sedare contendunt. *Mus. Zeyl. pag. 5.*

COR INDUM, ampliore folio, fructu majore. *Tournef. inst. pag. 431. & Fl. Malib. pag. 23.* Cor Indum, five Halicacabum, peregrinum, fructu majore. *Plukn. Almag. pag. 120.* Pisum vesicarium, fructu nigro, macula alba notato, majus. *Mus. Zeyl. pag. 42.* Ulinja *H. Malab. part. 8. Tab. 28.* MAHAPENALA Zeylonensibus *Maha* majus notat. Characterem hujus generis vide apud *Amm. Ch. pl. pag. 518 & 519. Tournef. pag. 43.* & *Linnaeum in char. gen. pl. pag. 117.* ubi *Cardiospermum* optime vocatur.

CORNUS Zeylanica, KIRIWALLA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 65.*

CORNUS sylvestris, foliis croceum colorem tingentibus, flosculis ad foliorum alas globosis. *Nobis. Tab. 30.* Rhamnus Zeylanicus, baccifer, foliis conjugatis, floribus coeruleis, WALIKAHA Cinghalensibus. *Herb. Hert.* Crocus Zeylanicus, sylvaticus, seu arbor WALIKAHU *Mus. Zeyl. pag. 7.* Arbuscula Zeylanica, baccifera, cujus folia Croci vires supplent. *ibidem. pag. 4.* WALIKAHA Zeylonice dicitur a *Wali*, quod arenam notat, & *Kaha* quod Crocum, quasi Crocus arenosus. Crescunt autem hae arbusculae locis arenosis, quarum folia siccata ex viridi in croceum transmutantur colorem, vicemque Croci incolis supplent. *Mus. Zeyl. pag. 4.*

Caulis hujus arbusculae est teres, angustus, secundum annos genicula gerens, flexilis, albicans, folia dans opposita, ovata, integerrima, utrinque glabra, petiolis bilinealibus affixa; in singula ala prodit petiolus semiuncialis, flores plurimos sustentans, quorum calix est minutissimus, semiquadrifidus, obtusus, patulus; petala florum quatuor minima; stamina itidem quatuor, & pistillum unicum. Fructus, qui bacca est, deest nostrae plantae.

CORNUS Zeylanica, sylvestris, altera KORAKAHA dicta. *Nobis. Tab. 31.* Crocus Zeylanica, arbor sylvestris, KORAKAHA dicta. *Herb. Herm.* Crocus Zeylanicus, alter, sylvaticus, seu arbor KORRAKAHU. *Mus. Zeyl. pag. 40.*

Ex trunco hujus arboris rami provenientes cortice cinereo in validioribus,

CORNUS sylvestris, foliis croceum colorem tingentibus flosculis ad foliorum alas globosis. Nobis.

2699 *Moemecylon capitellatum* L.

CORNUS Zeylanica, sylvestris,
altera KORAKAHA dicta. Nobis.

966 Samara laetia L.

CORONILLA Zeylanica, herbacea, flore purpurascente.

5565 Galega purpurea L.

ribus, in tenerioribus albicante teguntur, qui in infima parte, ubi nulla locantur folia, flores suos gerunt collectos, in umbellas parvas quasi dispositos, ex uno centro singula umbellula proveniente.

Flores tenuissimis oriuntur pediculis, calicibus quadrifoliis contenti, dum clausi, sphaerica forma, aperti vero stellati, ex quatuor foliolis cum quatuor longissimis staminibus, in summo apices flavos habentibus, constant, quid porro de fructibus sit, qui desunt, nihil determino.

Ad medium circiter ramorum, ubi hi flosculi desinunt, ramificationes duae foliosae proveniunt, e quibus folia proveniunt bina semper opposita, ovalia, glabra, viridia, brevibus, nigricantibus pediculis innixa, quae an croceum etiam tingant colorem, & ejus loco usurpentur, ut in antecedenti specie, dubito, quum nulla hujus fiat mentio, & aquae ferventi infusa colorem suum retinent, nec aquam tingunt. Crocus tamen sylvestris arbor ab *Hermanno* vocatur, ob similitudinem forte, quam cum altera habet specie, hujus generis characterem vide apud *Linnaeum in charact. gener. plant. pag. 29.*

CORONILLA Zeylanica, argentea, tota. *Boerb. Ind. H. L. B. tom.*

2. pag. 50. Colutea Zeylanica, argentea, tota. H. L. Bat. pag. 169.

ubi icon & descriptio. *Colutea Zeylanica, argentea, latifolia. Par.*

Bat. Pr. pag. 325. Mus. Zeyl. pag. 11 & 31. Amm. Char. pl. pag. 137.

Ervum, sive Orobus arborescens, incanus, Glycyrrhizae folio, flore luteo, spicato. *Breyn. Prodr. 2. pag. 43. MUNDAMURUNGHOS, quae Co-*

lutea Indica, marina, tota argentea, filiquis teretibus, articulatis, feminibus globosis. Amm. Char. plant. pag. 480. MUNDUMURUN-

GHU Zeylonensibus. a Mundu quod notat mare. Murungbu est alia arbor, ut notatur in Mus. Zeyl. pag. 11.

CORONILLA Zeylanica, herbacea, flore purpurascente. *Herb. Hert. Tab.*

32. cum qua convenire videtur Coronilla Cretica, herbacea, flore parvo, purpurascente. Tournef. Corolar. pag. 44.

Ramosa haec admodum est planta, caules gerens rotundos, virides, lignosos, glabros, quibus folia brevibus innixa pediculis ad crescunt, glabra, oblonga, integra, viridia, eleganter cancellata, bina opposita, in impar desinentia: Flores ex adverso, ubi foliorum rachis provenit, oriuntur spicati, longissimo pedunculo adunati, ex brevi autem dependentes, bini utcunque ex uno puncto provenientes, qui parvi sunt, purpurei, papilionacei, calice sat magno, quinquefido con-

tenti, post quos filiquae propullulant glabrae, tenues, teretes, in apices acutissimos desinentes, semina parva, reniformia, oblonga, fusca, continentes.

CORONILLA Zeylanica, filiquis fuscis, hirsutis, pilosis, flore albo. *Herb. Hert. Tab. 33.* Colutea Indica, platycarpus, flore albo, amplo. *Mus. Zeyl. pag. 54.* **PETAN** Zeylonensibus.

Singularis haec Coronillae species, itidem ramosa est, caules emit- tens rotundos, lignosos, virides, & hirsutos, quibus foliorum raches vario modo & ordine adcrescunt, quae folia gerunt bina sibi opposita, inpare claudente, sessilia fere, glabra, oblonga, obtusa, superiore parte viridia, inferiore pallida, striata, per dorsum costa validissima decurrente. Ramorum summum terminant flores, qui hinc inde in longissima spica, interposito aliquando folioso rachi, proveniunt, in summo autem collecti frequentiores progerminant; sunt autem satis ampli & plani, albicantes, calicibus magnis, profunde dissectis, hirsutissimis contenti, qui totum fere florem ambiunt, seu complectuntur, unde ejus figura non ita clare in tabula conspici potest. Post flores sequuntur filiquae planae, latae, incurvae, seu carinatae, & articu- latae, fuscae, sericeae, pilosissimae, in singula distincta sua thecula, seu in singulo loculo semen oblongum, glabrum continentes.

CORONILLA Zeylanica, filiquis fuscis, hirsutis, pilosis, flore purpura- scente. *Nobis.* seu Colutea Zeylanica, flore purpurascente, filiqua hir- suta. *Herb. Herm.* Prioris haec varietas videtur.

COSTUS Indicus, Violae Martiae odore. *Mus. Zeyl. pag. 58.* qui est Costus *Linnaei* in tractatu de *Musa Cliffort. pag. 14.* & est Tsjana- Kua *H. Malab part. 11. Tab. 8.* cujus character a Linnaeo loco cit. exacte recensetur. De Costo autem vide *Clusii lib. 1. aromat. cap. 35.* & *Samuel Dale in Pharmacol. pag. 329.* haec habet, ubi tres enume- rat species. **ARABICUM**, **AMARUM** & **DULCEM**, sed juxta *Bontium* monet, unam eandemque esse radicem, solummodo loco, aetate, aut corruptione differentem, recentem scilicet & incorrup- tam esse dulcem, & candidam; corruptam vero amaram, & nigrican- tem &c. Synonyma itaque Costi facit, Costus Arabicus Dioscoridis *C. B. P. pag. 36.* & Costus Iridem redolens *ejusdem.* Costus amarus Officinarum, seu Helenium, & Comagenium Dioscoridis *C. B. P. pag. 37.*
Costus

CORONILLA Zeylanica, siliquis fuscis, hirsutis, pilosis, flore albo.

3563 *Galega villosa* L. var. β .

Costus dulcis officinar. Centaurio magno cognatus ejusdem. in Theat. Botan. p. 670. Costus Helenii facie officinarum. J. B. tom. 1. lib. 19. pag. 751. Costus dulcis officinarum ejusdem. Costus Indicus, odoratus. Ger. & Costus Indicus Clusii Park. Theat. pag. 1582. Tsjanakua H. Malab. &c. ubi porro radicis descriptionem & usum addit. Vide & Commel. Fl. Malab. pag. 23.

CRISTA PAVONIS flore elegantissimo, variegato. *Nobis.* Frutex Pavoninus, five Crista Pavonis, *Breynii Cent. pag. 61.* ubi descriptio, & elegans Figura. vide & ejus *Prodr. 1. pag. 35.* Crista Pavonis, Bonga Merak, *Rumph. Herb. Ambon. lib. 6. cap. 25.* Crista Pavonis, Coronillae folio, prima, five floribus spicatis, amplissimis, ex aureo & coccineo variegatis, siliqua Pisi. *Breyn. Prodr. 2. pag. 37.* hujus elegans Figura exhibetur a *Merian. insect. Surin. Tab. 45.* Quae est Crista Pavonis, flore albo ex Surinama *Amm. H. Bosian. pag. 9.* ubi male dicitur, quod ob floris similitudinem caudae, (sed cristae) pavoninae, a Ceylonensibus MONARAKUDHUMBYA vocetur. Poinciana flore pulcherrimo. *Tournef. inst. pag. 619.* Sena spuria, arborea, spinosa, foliis alatis, ramosis, seu decompositis, flore ex luteo & rubro, specioso. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 149. & Hist. Jam. part. 2. pag. 49.* Colutea Indica, platycarpus, flore pavonino, seu flos Indicus, pavoninus. *Mus. Zeyl. pag. 39.* Planta tricapsularis, floribus cristatis. MONARAPAHUA, & MONARAHUDHIBBYA Zeylonensibus. *ibidem. pag. 12.* Acacia Orientalis, gloriosa, Coluteae foliis, rachi medio ad genicula solummodo spinis gemellis aculeata. *Plukn. Almag. pag. 5.* Erythroxyllum Indicum, minus spinosum, Coluteae foliis, siliquis angustioribus, flore ex luteo & rubro eleganter variegato. *Par. Bat. Pr. pag. 333.* Tsjetti Mandaru *H. Malab. part. 6. Tab. 1.* Sed quae spinis, (incuria forte omissis,) vidua est. MONARAMAL Zeylonensibus, quod dicitur a *Monara* quod Pavonem, & *Mal* quod florem notat. MONARAKUDHUMBYA etiam vocatur, a *Monara* Pavone, & *Kudhumbya* quod cristam, quam in capite gerunt, denotat, quia florum stamina hanc repraesentant, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 39.* Foula de Pavan. seu flos pavoninus Lusitanis audit. Hujus in *Herbario Hermannii* elegans servo specimen, quod insculpi non curavi, quum saepius jam bene expressum sit, & a *Breynio* optime etiam descriptum.

CRISTA PAVONIS arbor, foliis subrotundis, alternis, flore spicato, pentape-

tapetalo, flavo, lobis longis, fructu orbiculato, coccineo. *Nobis*. *Crista Pavonis Glycyrrhizae folio*, maxima, Indica, flore subluteo, minimo, spicato, filiquis angustis, longissimis, ubi semina occultantur, protuberantibus, semine orbiculato, compresso, sanguineo, *Breyn. Prodr.* 2. pag. 38. & *Commel. Fl. Malab. pag. 24.* Phaseolus alatus arboreus, fructu orbiculato, compresso, coccineo. *H. L. Bat. pag. 495.* MANDATHYA Cinghalensium, qui Phaseolus arboreus, alatus, fructu prorsus coccineo, orbiculato, compresso. *Amm. H. Bosian. pag. 21.* Arbor filiquosa, Indica, flore spicato, pentapetalo, filiquis longis, nodosis, fabis coccineis. *Ray. hist. p. 1752.* Arbor Indica, pisa rotunda, compressa, coccinea, in lobis fuscis, parvis, articulatis, gerens. *Mus. Zeyl. pag. 21.* Phaseolus alatus, arbor Indica, fructu coccineo fere orbiculari, medio utrinque tumido. *Plukn. Almag. pag. 294.* Mandsjadi *H. Malab. part. 6. Tab. 14.* ubi vide notas. MANDATHYA seu MARA ut & MANGILI Zeylonensibus, quod vulgo *Madathya*, quo certa ponderis species, *Mangili* vocata, denotatur, quod arboris hujus fructus suppleant: hinc aurifices his utuntur loco ponderum, semina quoque tota comeduntur, ut Castaneae in Europa. *Mus. Zeyl. pag. 21.* *Breynius* recte hanc ex Phaseolis exclusit, cum flores, folia, immo tota plantae forma ab illis differant, notas autem character. quas huic generi *Cristae Pavonis* tribuit, vide in ejus *Prodr. 2. pag. 38.* Licet hae arbores juxta *Breynium Cristae Pavonis* dictae, non ita accurate in omnibus sibi conveniant, ad unum tamen genus, & ultimum quod *Hermannus Phaseolum alatum* vocavit, hic retinuimus; quum alios Phaseolos infra ad *Lentes* locatos ab his *Cristae Pavonis* speciebus *Breynii* separavimus: quae vero a summis Botanicis, *Hermanno*, *Boerhavio*, *Pluknetio* & aliis ad ACACIAS relatae fuerint, quorum vestigia premens, & illas ad ACACIAS supra memoravi: licet juxta *Tournefort.* ad POINCIANAM, vel hic melius locatae fuissent, quum hujus videantur species.

CROTALARIA Asiatica, floribus luteis, folio singulari, cordiformi. *H. L. Bat. pag. 200.* ubi icon & descriptio *Plukn. Almag. pag. 122.* Crotalaria major, prima species, Kering Keringam. *Rumph. Herb. Ambon lib. 8. cap. 65.* Genista Indica, folio simplici, glabro, cordato, filiquis glabris, flore luteo. *Mus. Zeyl. pag. 20.* Genistella Indica, major, Salicis folio, glabro, obtuso, cordiformi, flore luteo, minore. *Breyn. Prodr. 2. pag. 50.* Tandale-Cotti. *H. Malab. part. 9. Tab.*

CROTALARIA foliis solitariis, ovato-acutis, caule sulcato. Nobis.

5256 *Crotalaria verrucosa* L.

Tab. 25. Genista Malabarica, folio singulari, floribus luteis, filiquis bullatis. *Commel. ibid. in notis pag. 46.* & *Fl. Malab. p. 33.* JACBERYA & ANDANAHIYA Zeylonensibus. *Jacca* Diaboli nomen est. *Berya* sonitum edere aut sibilum. Herba Daemonica est, cujus filiquarum ope Cinghalenses credunt diabolum ad interrogata respondere: Nam hae per maturitatem ficcatae, & induratae levissimo etiam vento commoventur, ac ob semina levissima petiolis quasi in bilance dependentia, filiquarum parietes ferientia, crepant, ac sonitum edunt, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 20.*

CROTALARIA Asiatica, folio singulari, verrucoso, floribus coeruleis. *H. L. Bat. pag. 198.* ubi icon & descriptio. & *Herb. Herm.* cujus figuram daremus, si non optime & accuratissime in *H. Malab.* esset expressa, illa autem *H. L. Bat.* minime valet, folia enim sunt nimis acuta, & auriculae foliorum etiam vitiose exprimuntur; sed illa *H. Malab.* in omnibus plantae nostrae exacte convenit, insculpta autem est *Tab. 29. part. 9.* vocata Pee-Tandale-Cotti. & a *Commel* in notis; Genista Indica, Alni folio, floribus coeruleis, filiquis bullatis. *ibidem. pag. 53.* & *Fl. Malab. pag. 32.* Genistella major, Indica, Alni folio, flore coeruleo, spicato, *Breyn. Prodr. 2. pag. 50.* &c.

CROTALARIA foliis solitariis, ovato-acutis, caule sulcato. *Nobis. Tab. 34.* Crotalaria Asiatica, folio singulari, floribus coeruleis. *Herb. Hert.* Genista Indica, rotundifolia, spicata, coerulea, filiquis hirsutis, bullatis, JAKWANOSSA Zeylonensibus. *Herb. Herm.* Genista Indica, folio simplici, crispo, floribus coeruleis, filiquis bullatis. *Mus. Zeyl. pag. 65.* ubi JACBERYA Zeylonice vocatur, quod nomen genericum *Crotalariae* est. Ab illa *H. L. Bat. & Malab.* haec planta multum differt, folia gerens acutiora, minora, ut & flores multo minores, ut & tota forma minor, & tenerior; ut ambae, quas servo, plantae inter se comparatae liquido ostendunt. Caule haec itidem sulcato provenit, quadrangulari, leviter hirsuto, viridi, e quo folia solitaria, dilute viridia, oblonga, acuta, tenui sustentata pediculo, alternatim proveniunt, ad quorum ortum foliola auriculata utcunque ponuntur, non ita constanter, nec tanta, ut in antecedente specie. Flores in spica magna, & firma eleganter eriguntur, alternatim, solitarii provenientes, papilionacei, coerulei, lati, qui calice magno, quinquefido, & petiolo subhirsuto, cum spinula paleacea, sustinentur,

qui filiquas dant latas, breves, tumidas, hirsutas, seu pilosas, seminibus reniformibus repletas.

CROTALARIA Asiatica, folio singulari, floribus luteis. *Hert. Catal. semin.* Katou-Tandale-Cotti, *H. Malab. part. 9. Tab. 26.* quae in notis, **Crotalaria** Malabarica, sylvestris, foliis singularibus, majoribus, floribus luteis, vocatur. ut & **Genista** Malabarica, folio singulari, oblongo, flore flavo, dilutiore, filiquis bullatis. *Commel. & Fl. Malab. pag. 33.* quae est **Crotalaria** Bengalensis, foliis **Genistae** subhirsutis, Katou-Tandale-Cotti. *H. Malab. Plukn. Phyt. Tab. 169. Fig. 5.*

CROTALARIA Zeylanica, frutescens, argentea, flore luteo parvo. *Hert. Catal. semin.* an **Crotalaria** Asiatica, folio argenteo, villoso, flore luteo, filiquis pendulis in spica *Boerb. Ind. pl. part. 2. pag. 25?*

CROTALARIA Zeylanica, repens, folio hirsuto &c. *Hert. ibidem.* **Crotalaria** forte hirsuta, major, Americana herbacea, caule ad summum sagittato. *H. L. Bat. Plukn. Phyt. Tab. 169. Fig. 6. &c.*

CROTALARIA arborescens, trifoliata, glabra, & viridis. *Nobis. Tab. 35.* **Cytisus** glaber, arborescens, filiquis bullatis. *Herb. Herm.* **Anonis** Zeylanica, arborescens, flore luteo, filiquis bullatis, **Cytisi** habitu. *Hert. Catal. semin.* **Cytisus** Zeylanicus, arborescens, glaber, flore luteo, filiquis bullatis. *Mus. Zeyl. pag. 40.* **Cytisus** Zeylanicus, filiquis bullatis, pediculis longissimis. *ibidem. pag. 49.* **Cytisus** pediculis longissimis, filiquis pendentibus. *ibidem. pag. 59.* **JAKBERYA** Zeylonensibus. Quoad faciem externam, quam diu flores nec filiquas perfecit haec arbuscula, **Cytisum** perfecte imitatur, inprimis **Alpinum** illum latifolium. Folia autem gerit terna, glabra, utrinque laete viridia, longissimis sustentata pediculis, qui ex cortice flavo, glabro, lignum albicans tegente, oriuntur. Flores in longissimis, validissimisque spicis eriguntur multiplices, magni, elegantes, coloris ex luteo purpurei, papilionacei, brevi sulphureo vexillo, alis minimis constantes, carina existente lata, longissima, reflexa, intense purpurea.

Siliquae inflatae & tumidae sunt, ut in prioribus etiam speciebus. quo a **Genista** & **Cytiso** differunt, hoc tamen convenit cum **Anonide**, ut & foliatura trifoliata, unde & ad **Anonidem** ablegari posset, ut eo *Tournefortius* alteram hujus speciem, quam ad **Anonidem** ideo recensui, revo-

CROTALARIA arborescens, trifoliata, glabra, & viridis. Nobis.

5260 *Crotalaria laburnifolia* L.

revocavit. cum qua haec nostra in multis etiam convenit, quaeque facile inter se confundi possunt, unde & hujus exactissimam dedi figuram. ab *Anonide* autem illa *Tournefortii* in eo differt, quod illa *Tournef.* folia habeat acutiora, in parte superiore obscure virentia, in inferiore vero incana, & hirsuta, quum nostrae folia sint glaberrima, utrinque viridia, rotundiora: caules itidem sunt glaberrimi, pallidiores, nec ita lignosi, quum in altera sint hirsuti, purpurascens & penitus lignosi. Flores nostrae plantae in quadruplo fere longioribus spicis, nec foliaceis proveniunt copiosiores, forma tamen proximè inter sese convenientes. Ex utrisque, quas servo, plantis differentiam hanc notare necesse duxi, quum externa figura quam maxime similes sint, & si quis hanc nostram ad *Anonidem* ablegare velit, ad distinctionem alterius haec, *Anonis trifolia*, glabra, viridis, arborescens, *Zeylanica* vocari posset. *Crotalariae* characterem vide apud *Amm. Char. pl. pag. 356.*

CURCUMA radice longa. *H. L. Bat. pag. 208.* ubi ejus icon, & descriptio. *Commel. Fl. Malab. pag. 25.* *Curcumae* flos. *Mus. Zeyl. pag. 30.* *Crocus Indicus*, Arabibus *Curcum*, officinis nostris radix *Curcumae* dicta. *J. Bontii Hist. nat. lib. 6. cap. 30. pag. 116.* Sed ubi loco *Curcumae*, *Canna Indica* delineata est. qui error certe, ut videtur, *Tournefortio* imposuit, qui inde hanc ad *Cannacori* species redegit, quum alius certe generis sit planta *Curcuma*, vocatur ab ipso *Cannacorus*, radice crocea, sive *Curcuma* *Officinarum instit. pag. 367.* *Curcuma* sive *Crocus Indicus*, subterrestris, Lusitanis *Saffranda Tierra* dictus. *Amman. H. Bosian. pag. 10.* *Saffrano Dell' Indie Acost. edit. Ital. pag. 193.* *Maniyella-Koua. H. Malab. part. 11. Tab. 11.* ubi notas vide subjectas. *Curcuma* foliis longioribus & angustioribus. *Breyn. Prodr. 2. pag. 40.* vide & *Morif. hist. tom. 3. pag. 253.* & *Ray. tom. 3. pag. 649.* *Cyperus Indicus Dioscoridis Matth. pag. 27.* *Zinziberis* facie radix longa, intus flava, Malaice *Kunhet Linschot. part. 3. Ind. Orient. cap. 14.* apud *Plukn. Almag. pag. 397.* notas hujus characteristicas ut & usum Medicum invenies apud *Samuel. Dale Pharmacol. pag. 324.* **KAHA** Zeylonensibus dicitur, quod *Crocum* notat. & apud Indos hujus radix *Borri*, *Borri* vulgo dicitur. *Curcumae* Figuram & descriptionem exactissimam habet *Rumph. in Herb. Amb. lib. 8. cap. 16.* ubi *Curcuma* major, *Cuning* vel *Cunyet* vocatur.

CURCUMA radice rotunda. *Par. Bat. Pr. pag. 330.* Curcuma foliis latioribus & rotundioribus. *Breyn. Prodr. 2. pag. 40.* Manya-Kua. *H. Malab. part. 11. Tab. 10.* quae est Curcuma *Linnaeo in tractat. de Musa Cliffort. pag. 15.* ubi exactissime nota hujus characteristica explicatur. Zinziberis facie radix intus flava, rotunda *Plukn. Almag. pag. 397.* qui est Crocus Indicus, seu *Curcuma* radice rotunda. *ibidem.* Curcumae characterem habet etiam *Amm. in Char. plant. pag. 360.*

CUSCUTA Indica, floribus albis, stellatis. *Mus. Zeyl. pag. 67.* an Acatsja-Valli *H. Malab. part. 7. Tab. 44?* quae Cuscutae species supra arbores & plantas nascens. *Commel. in notis & Fl. Malab. pag. 25.*

CUSCUTA Zeylanica, flosculis incarnatis. *Mus. Zeyl. pag. 42.* an Cussutha Rambut, Putri *Rumph. Herb. Ambon. lib. 9. cap. 91?*

CYCLAMINIS species, URULU Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 57.* dicitur ab *Uru*, quod porcum notat.

CYDONIA arbor BALANGHAS dicta Nobis. Balanghas ad Cydoniam referenda quae convenit cum Cavalam *H. Malab. part. 1. pag. 89.* vel cum Marmelos Garciae ab Horto. juxta *Amm. Hort. Bosian. pag. 6.* ubi dicitur: sed BALANGHAS fructum fert majorem, pulpamque acidiorum. Describitur etiam haec arbor BOLANGA a *Grimm. in Labor. Ceyl. pag. 85.* cujus descriptio supra *pag. 31.* ad arborem BOLANGA invenitur.

CYDONIA exotica, quae MARMELOS arbor. *Mus. Zeyl. pag. 60.* Cydonia malus Indica, spinosa, trifolia, putamine osseo durissimo, pulpa Mespili *Par. Bat. Pr. pag. 330.* quae & Mespilus Indica, spinosa, trifolia, putamine osseo duro *ibidem* vocatur. Mespilus Indica, trifolia, spinosa, odore roseo, fructu Mali magnitudine, cortice duro, obtecto, *Marmelos* vocata. *Mus. Zeyl. pag. 46.* Bilacus Madja, Bilac Tyloor. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 1. cap. 68.* ubi cum Malo Cydonio Indico *Bontii lib. 6. c. 8.* jungitur & *Clus.* vocantur Cydonia exotica. *lib. 2. c. 14.* Covalam seu Cydonia exotica. *C. B. Pin. pag. 435.* *H. Malab. part. 3. Tab. 37.* Ville Vittre Malab. *Petiv. act. Phil. Lond. vol. 22. no. 271. pl. 108.* Cucurbitifera trifolia, spinosa, Indica, fructus pulpa Cydonii aemula. *Plukn. Phyt. Tab. 170. Fig. 5.* & in *Almag. pag. 125.* reliqua vide Synonyma & adlegatos auctores, ut & *Commel. Fl. Malab. pag. 25.* BELI & BELIGHAS Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 46.* ubi dicitur, quod

CYTICYSTUS, foliis inferioribus confertis,
superioribus oppositis. Nobis.

quod *Garcias ab Horto* huic arbori male tribuat folia Urticae, & quod ex flosculis hujus aqua destilletur odore aquam Rosarum aemulans. Arbor haec MARMELLE vocatur a *Grimm. in Labor. Ceyl. pag. 88.* & sequenti modo describitur: Haec arbor similiter est altissima, fructus oblongos producit cum duro putamine. *Clusius* eos vocat *Cydonia Bengalica.* easdem aequae ac Cydonia vires possident, & ex eorum pulpis res omnes confici possunt, ad quas Cydonia sunt in usu. Flores, qui jucundissime olent, per Balneum Mariae destillati, aquam exhibent odoriferam valde, quae cor & spiritus vivificat; Componuntur ex pulpa horum fructuum praeter ea omnia, quae ex Cydoniis vulgaribus in Europa fiunt, variae adhuc Marmeladae, quae excellentissimae sunt pro Magnatibus & Nobilibus, & quae ad remotas regiones transferri possunt. Sic ex hisce fiunt Marmelada Cordialis, Cephalica, Stomachica, Pectoralis, Hepatica, Splenetica, Nephritica, Laxativa, Hydropica cum Gummi Gotti, quarum formulae descriptae sunt in *Labor. illo Ceylon. a pag. 88. ad 95.*

CYTICYSTUS, foliis inferioribus confertis, superioribus oppositis. *Nobis. Tab. 36.* Cytisus floribus luteis, minimis, filiqua glabra, brevi. *Herb. Hert.* Cytisus Zeylanicus, fruticosus, humilis, filiquis angustis, Ericaefolio. *Mus. Zeyl. pag. 34.* RATHOHOMBA & RATHIHOBA Zeylonensibus.

Elegans hic fruticulus cortice scabro, antequam ramos producit, gaudet, caules dein emittens molles, albicantes, laevissima lanugine tectos, quos folia verticillatim ambiunt inferius plurima simul collecta, incana, Lavendulae folia perfecte referentia, superius ad caulis flori-feri ortum bina tantum opposita collocantur.

Flores in eorum summitate eriguntur spicati, minimi, tribus ex petalis communiter constantes, magnum calicem, qui vesicam haud male repraesentat, referentibus, qui trifariam divisus, pilis tenuissimis, albicantibus obducitur, petala autem haec floris calicis dein vicem gerunt; ex fundo autem ejus stamina novem, minima, proveniunt, & ejus pistillum abit in fructum unicapsularem, in tres valvas dehiscen-tem, seminibus foetum plurimis, angulosis.

Ita ut peculiaris sit structurae haec planta & novi plane generis, quum vero florem fructumque gerat tanquam in cista aut vesica absconditos, ut in *Tabula nostra* apparet, & Cytisi nomen ab inventoribus ipsi fuerit, nescio qua ratione, inpositum, Cyticystum per contractionem pro Cytiso-Cystum ipsam vocavimus.

CYTISUS folio molli, incano, filiquis Orobi contortis, & acutis. *Nobis. Tab. 37.* Cytifus Zeylanicus, folio molli, incano, flore ex luteo purpurascante. *Herb. Hert.* Phaseolus arbor, Indica, incana, filiquis torosis *Kayan* dicta. *H. L. Bat. App. pag. 694.* & *Mus. Zeyl. pag. 4.* Arbor Indica, trifoliata, leguminosa, fructu eduli, *Kayan* dicto. *ibidem. pag. 34.* Anagyris Indica, leguminosa, filiquis torosis. *Par. Bat. Pr. pag. 311.* Phaseolus erectus, incanus, filiquis torosis, *Kayan* dictus. *Plukn. Phyt. Tab. 213. Fig. 3.* Thora-Paeru *H. Malab. part. 6. Tab. 13.* ubi vide notas. *Cajan* arbor, Indica, foliis Trifolii Bituminosi, filiquis Orobi. *Breyn. Prodr. 1. pag. 20.* Laburnum humilius, filiqua inter grana & grana juncta, semine esculento. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 139.* & *Histor. vol. 2. pag. 31.* Arbor trifolia, Indica. *J. B. tom. 2. lib. 17. pag. 386.* & *Ray tom. 3. pag. 102.* reliqua porro vide in *Plukn. Almag. pag. 293.* &c.

RATHATORA & WITTRAWINANSA Zeylonensibus.

Instar plurimarum Cytisi specierum gerit haec arbuscula folia terna, communi primo, dein trifariam diviso pediculo insidentia, quae sunt mollia, averfa parte maxime incana & tomentosa, plurimis nervis donata, & alternatim ad caules albicantes, tomentosos proveniunt: in summa ramorum parte ad foliorum exortum pediculi longissimi eriguntur, in quorum fastigio flores sustinentur plurimi, simul collecti, papilionacei, coloris obscure lutei, seu purpurascantis, calicibus oblongis, rotundis, in quinque partes dissectis, contenti.

Siliquae subsequentes sunt longae, acutae, torosae, articulatae, & divisae, in singulo nempe loculo suo suum continentes semen; quod est subrotundum, glabrum, striatum, spadiceum, in inferiore parte, ubi siliquae jungitur, protuberans, & griseum.

Seminibus hisce Columbae vescuntur in Indiis utrisque, & homines saepius in navibus. Quae hoc anno nomine **WANDOE & WANDOUW** ex India Occidentali etiam accepi.

DAWATHA. *Mus. Zeyl. pag. 70.*

DENTILLARIA Zeylanica, flore minimo, Antirrhini folio, **WISSADULI** Zeylonensibus. *D. Herman apud Ray. tom. 3. pag. 246.* **WISSADULI** maximum, ex arboribus proceris, putredine infectis, collectum. *Mus. Zeyl. pag. 42.* an *Dentillaria* scandens, sylvatica, Lych-

CYTISUS folio molli, incano, filiquis Orobi contortis, & acutis. Nobis.

5440 *Cytisus Cajan* L.

Lychnoides flore albo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 91. & Hist. part. 1. pag. 211. Tab. 133. Fig. 1?*

DIGITALIS Zeylanica, flore albo, variegato. *Herb. Hert.* quae convenit cum *Valli-Upu-Dali H. Malab. part. 9. Tab. 45.* sed in eo differt, quod hujus folia sint bina opposita, nostrae autem folia alterna, majora, duobus minoribus ad eundem exortum provenientiibus. Glaberrima sunt, viridia, instar *Ocymastri*, seu *Plumbaginis Ceylonensis*, cum qua totus plantae habitus externe etiam convenit. Flore fructuque quum mutila sit, quam fervo, planta, de iis nihil certi dicere possum.

DIGITALIS Orientalis **SESAMUM** dicta. *Tournef. instit. pag. 165. Sesamum veterum C. B. P. p. 27. Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 59. & Hist. vol. 1. pag. 161. Sesamum Rivini ord. pl. irreg monop. qui elegantem habet Figuram, & in H. Malab. part. 9. Tab. 54. Schit-Elu vocatur. Sesamum semine fusco. H. L. B. pag. 559. Sesamum Indicum, Widyn Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 33. Semplen Pr. Alp. de plant. Egypt. pag. 37. reliqua vide apud Ray. in hist. pl. pag. 1327. Plukn. Almag. pag. 344. & Phyt. Tab. 109. Fig. 4. TALA Zeylonensibus dicitur. Quum auctorum Figurae adeo variant, & huic plantae in inferiore parte Trifoliatura etiam tribuatur, nostrae quam fervo, plantae folium ex infima parte desumptum etiam depingendum curavimus, quod unicum tantum semper inveni alteri oppositum, caeterae partes nostrae plantae cum aliis exhibitis figuris sunt convenientes. Insculptum autem est nostrae Folium. *Tab. 38. Fig. 1.* quod ad distinctionem subsequenter Digitalis etiam additum est. Tota autem planta, ut & folium est scabrum, integrum, superius viride, inferius pallidum, oblongum, angustatum, acutum &c. Apud adlegatos auctores uberior hujus descriptio inveniri potest, & aliorum auctorum synonyma. *Grimm. in Laborat. suo Ceylan. pag. 131. ad caput de SESAMO* haec habet: Oleum exhibet per decoctionem, quod commodissimi usus est in Chirurgia, peculiariter in ardentibus, atque calidis capitis doloribus. Emolliens est, dolores mitigans, & aliquatenus resolvens. Usus familiarissimum habet apud Cinghalenses, a quibus Oleum illud *Schinschilli* nomen obtinet. vide & *Samuel Dale Pharmac. pag. 345.* qui pro charact. filiquas habet breves, erectas, quadrangulares. &c.*

DIGITALIS Zeylanica, hirsuta, foliis Sefami angustioribus. *Nobis. Tab. 38. Fig. 2.* Sideritis Zeylanica, angustifolia, hirsuta. *Herb. Hert.* Sideritis Zeylanica, aspera, major, ASWAENNA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 46.* & Sideritis Echioïdes, Indica, foliis oblongis. *ibidem. pag. 59 & 62.* Sefamum forte Zeylanicum, folio singulari, oblongo, flore luteo. *Hert. Catal. semin.* Florem gerit haec planta tubulosum, calici infedentem, qui quinque foliis, angustissimis, erectis, scabris, & acutis constat, post quem fructus subsequitur, qui est capsula membranacea, ex ovali oblonga, compressa, bilocularis, bivalvis, semina ovata mire excavata condens. Planta vero ipsa caulem habet simplicem, quadrangulum, hirsutum, ad foliorum exortum protuberantem, aut quasi geniculatum, ex quo folia progerminant oblonga, sessilia, integerrima, bina opposita, unciali spatio remota. Ex singula autem ala flores proveniunt calice sustentati tenuissimo, hirsuto, jam descripto. Tota porro planta scabra, & hirsuta est. Digitalis characterem habet. *Linnaeus Char. pl. gen. p. 179.*

DIGITALIS forte aspera, repens, rotundifolia. *Nobis.* Sideritis Zeylanica, aspera, repens, rotundifolia, minor, flosculis minimis, pallide coeruleis. *Mus. Zeyl. pag. 3.* Sideritis Echioïdes, Indica, minor. *ibidem. pag. 57.* ASWANNA Zeylonensibus haec etiam dicitur, ab *As* quod equum significat. *Wanna* Caudam; Caudam enim equinam videtur exprimere radix multis nigris capillata fibrillis. Vocatur a Malabaribus *Kuddurawalli*, id est Cauda equina eandem ob rationem. an forte haec planta ad Gymnotetraspermas asperifolias, ad *Asperuginem* nempe *Tournefortii*, *Heliotropium*, *Lithospermum* vel simile genus pertinet? Suadet sic *Hermanni* denominatio in *Mus. Zeyl. pag. 3.* Quum vero iisdem in *Mus. Zeyl.* gaudet denominationibus ac planta antecedens, ab ea separare non ausus fui, licet *Breynius* in *Ephemer. German.* talem ad Buglossum retulisse videatur. ut supra ad Buglossum notavimus. nos vero in planta nostra semina non nuda, sed capsula inclusa, ut juxta accuratissimum examen in antecedente planta descripsimus, invenimus, unde & ad Digitalem, cum qua penitus convenit illa planta, eam reduximus: Floris vero compressi forma non ita certam conclusionem exhibet, quam integra capsula feminalis.

DIGITALI similis, planta bicapsularis, flore tubuloso, galea trifida, & labio integro, obtuso constante. *Nobis.* Euphrasiae affinis, Indica, Echioï-

DIGITALIS
SESAMUM

Orientalis
dicta Tournet.

Fig. 1.

Fig. 2.

DIGITALIS Zeylanica, hirsuta, foliis Sesami angustioribus. Nobis.

Echioïdes. *H. L. Append. pag. 668.* ubi icon & descriptio. & *Commel. Fl. Malab. pag. 28.* Gratiolae affinis, Echioïdes, Zeylanica, major. *Breyn. Prodr. 2. pag. 54. Petiv. Act. Phil. Lond. num. 244. pl. 36.* Buglossum Echioïdes, Zeylanicum, foliis Convolvuli Indici minoris, coerulei. *Breyn. Ephemer. German. ann. 4 & 5. observ. 159. & Ray. tom. 1. pag. 498.* Buglossum forte Zeylanicum, angustifolium, majus, flore ex coeruleo albido. *Hart. Catal. semin. Pee-Tumba H. Malab. part. 9. Tab. 46.* KAWATUWA & KAWATUMBA. *Mus. Zeyl. pag. 13.*

DIWUL, & GIWUL. *Mus. Zeyl. pag. 13 & 17.* BOLANGOS Lusitanis. *ibidem.* ubi additur, *Diwul* notat adstrictionem gutturis, quae saepe caussatur a fructibus in maturis. Hujus autem arboris fructus adstringunt, unde in Dysenteria valde commendatur. Folia habet Foeni Graeci, majora tamen, spica longa ad foliorum alam internam donata. vide supra ad *Cydonia pag. 84.* & ad arborem BOLANGA, cum qua haec forte eadem.

DODHAMPANA. *Mus. Zeyl. pag. 67.* a *Pana.* quod pectinem significat.

DORYCNIUM Zeylanicum, folio minutissimo. *Hertog in Catal. semin.* an Dorycnium Indicum, floribus singularibus, rubris, in pedicillis oblongis, siliquis perexiguis. *Ray. tom. 3. pag. 471. & Manelli H. Malab. part. 9. Tab. 37.*

DRACUNCULUS Indicus, folio trifido. *Tournef. inst. pag. 161.* Dracontium Indicum, folio tripartito. *Mus. Zeyl. pag. 33.* Arum trilobato folio, humilior, & minus, Zeylanicum. *Par. Bat. pag. 78.* ubi icon & descriptio. Arum Zeylanicum tuberosum, folio tripartito. *Mus. Zeyl. pag. 63.* Serpentaria Zeylanica, triphylla. *Breyn Prodr. 2. pag. 90.* Arisarum Ambonicum, Bora Kitsyl. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 86.* PANUWALA Zeylonensibus, a *Panurwa* quod vermiculos notat quoscunque ulceribus inhabitantes, quos hujus radicis succus enecat. *Ala radix est. Mus. Zeyl.*

DRACUNCULUS non spinosus, esculentus. *Nobis.* Dracontium Zeylanicum, non spinosum, esculentum. *Mus. Zeyl. pag. 21.* Ari species, an Arum quinquefolium, Indicum *Clusii Mus. Zeyl. pag. 58?* an Arum

amplis foliis, virentibus, esculentum. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 4.*
KIDARAM Zeylonensibus.

DRACUNCULUS Zeylanicus, polyphyllus, maximus, caule trifido. *Tournef. inst. pag. 161.* Dracontium Zeylanicum, ramoso folio, maximum. *Par. Bat. pag. 89.* ubi vide descriptionem. Dracontium Indicum, multifidum. *Mus. Zeyl. pag. 33.*

DRACUNCULUS Zeylanicus, polyphyllus, caule aspero, ex flavo & viridi variegato. *Tournef. instit. pag. 160.* Dracontium Zeylanicum, ramoso folio, caule ex viridi & flavo variegato, aspero, KIDARAN Zeylonensibus. *Par. Bat. pag. 89.* Serpentaria polyphylla, Indica, caule maculato, aspero. *Breyn. Prodr. 2. pag. 90.* Serpentariae species. *Mus. Zeyl. pag. 33.* Arum polyphyllum, *Dracontium & Serpentaria* dictum, folio ramoso, Poenoniae instar, caule aspero, Zeylanicum. *Par. Bat. Pr. pag. 315.* KIDARAM Zeylonensibus.

DRACUNCULUS Zeylanicus, polyphyllus, caule aspero, virescente, maculis albicantibus notato. *Tournef. instit. pag. 160.* Arum polyphyllum, Ceylanicum, caule scabro, viridi diluto, maculis albicantibus notato. *H. Amst. part. 1. pag. 99.* ubi elegans Figura, & descriptio.

DRACUNCULUS Zeylanicus, polyphyllus, caule aspero, maculis viridifuscis, viridi-dilutis, & albicantibus pulchre notato. *Tournef. instit. pag. 160.* Arum Ceylanicum, polyphyllum, caule aspero, maculis viridi-fuscis, viridi-dilutis, & albicantibus pulchre notato. *H. Amst. part. 1. pag. 101.* ubi icon & descriptio. Arum polyphyllum, *Dracunculus & Serpentaria* dictum, Ceylanicum, caule aspero cum maculis viridi-fuscis, & viridi-dilutis, albicantibus pulchre notatum, majus, & elatius. *Commel. Cat. Hort. Med. Amst. pag. 38.* & *Fl. Malab. pag. 9.* Serpentaria polyphylla, Indica, caule maculato, aspero. *Breyn. Prodr. 2. pag. 90.* Mullu-Schena *H. Malab. part. 11. Tab. 19.*

DRACUNCULUS Zeylanicus, polyphyllus, caule laevi, ex viridi & albo variegato. *Tournef. instit. pag. 161.* Dracontium Zeylanicum, ramoso folio, caule ex viridi & albo variegato, laevi. *Par. Bat. pag. 90.* Serpentaria polyphylla, Indica, caule maculato, laevi. *Breyn. Prodr. 2. pag. 90.* Arum polyphyllum, *Dracontium & Serpentaria* dictum, folio ramoso, Poenoniae instar, caule laevi. *Par. Bat. Pr. pag. 315.*
Arum.

Arum polyphyllum *Dracunculus & Serpentaria* dictum, Ceylonicum, caule glabro, viridi diluto, maculis albicantibus notato, majus & elatius. *Commel. Cat. Hort. Med. Amst. pag. 38. & Fl. Malab. pag. 49. Schena H. Malab. part. 11. Tab. 18.* *Serpentaria major*, seu *Dracunculus major*, polyphyllus, *Markgrav. pag. 27. edit. 1648.* huc spectat **Arum polyphyllum**, *Dracunculus & Serpentaria* dictum, Surinamense, caule atro rubente, glabro, & eleganter variegato. *H. Beaum. Plukn. Phyt. Tab. 149. Fig. 1.*

DRACUNCULUS Zeylanicus, spinosus, Polypodii foliis, radice repente. *Tournef. instit. pag. 161.* *Dracontium Zeylanicum*, spinosum, foliis profunde incis, Filicis in modum, radice longa, repente. *Mus. Zeyl. pag. 64.* *Dracontium Zeylanicum*, spinosum, Polypodii foliis, radice repente. *Par. Bat. pag. 94.* ubi ejus descriptio.

DRYPIS Theophrasti. *Mus. Zeyl. pag. 62.* **RAWANAKOFFA** Zeylonensibus. **RAWANA** olim Cinghalorum rex fuit decem capitibus & viginti manibus, (ut fabulantur) ex cujus sanguine nata haec planta creditur. *Koffa* denotat scopulam, qua quaevis res purgatur. &c. *Mus. Zeyl.*

DYALABU. *Mus. Zeyl. pag. 70.*

EBENUS arbor Indiae Orientalis, Fagi amplioribus foliis, Anonae dulcis fructu, magno, coronato, eduli. **TUMBAMARUM & CARPAMARAM** Malabar. *Plukn. Mantiss. pag. 66.* Ebenum vel Hebenus. *Caju Arang. Rumph. Herb. Ambon. lib. 4. cap. 1.* Lignum Ebenum. *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 98.* ubi de eo dicitur. Tantum abest, ut lignum istud nobis deficiat in Ceylona, ut ipsius rami decedentes nobis sufficiant. Quis autem negare potest, Lignum istud eandem habere virtutem, quam *Lignum Guajacum* &c. Ego quidem ausim munus hoc suscipere, me scilicet paraturum ex isto, quidquid ex alio potest fieri. Caeterum praeterquam quod omnis generis concoctiones (decocta) ingredi possit, praebet etiam spiritum, qui praestantissimum est Medicamentum, sudorem promovens, contra quasvis impuritates, Lues, Scabies. &c. ubi porro hujus spiritus praeparatio, usus, dosis, & alia, quae ex hoc ligno parari possunt, indicantur. de Ligno porro Ebena vide *Samuel Dale Pharmacol. supplem. pag. 259 & 295.* ubi Ebenum sive Lignum

Indicum Camelli vocatur, Cujus descriptionem etiam habet: *Histor. Lugd. pag. 1751.*

ELAEACHNUS foliis oblongis, acuminatis, maculatis. *Nobis. Tab. 39. Fig. 1.* Olea Zeylanica, sylvestris, folio oblongo, subtus incano. *Herb. Hert.* an Olea sylvestris, seu Zizyphus Cheusanensis, non spinosa, folio subtus argenteo, molli, fructu rotundo, rubente, punctulis notato? *Plukn. Amalth. pag. 160.* ubi brevis ejus descriptio cum nostra maxime conveniens, quae caulem habet laeviter scabrum, qui folia ad gemmas alternatim emittit, adfixa petiolis semiuncialibus, teretibus, superius sulcatis; Folia autem ipsa sunt oblonga, superius laevia, maculis purpurascensibus adspersa, inferius argentea. Flores ad gemmas sessiles fere progerminant, qui constant calice colorato, tubulato, ore quadrifido, insistente Embryoni suo oblongo, scabro & argenteo, ut ipsi flores; Ergo quum fructus infra calicem gerat, non ad Oleas sed ad *Elaeachnos* juxta *Tournefortium* pertinet. *Elaeachni* autem character apud mox citatum auctorem, & *Linnaeum* latius explicatur in *char. plant. gener. pag. 31.*

ELAEACHNUS foliis rotundis, maculatis. *Nobis. Tab. 39. Fig. 2.* Zizyphus Indica, argentea tota, Caryophylli aromatici flore. *Herb. Herm.* Zizyphus Zeylanica, argentea, spinis carens. *Par. Bat. Pr. pag. 386. Amm. Char. pl. pag. 618.* Zizyphus Indica, & Zeylanica, argentea tota. *Par. Bat. Pr. Mus. Zeyl. pag. 8 & 37.* Zizyphus alba, argentea, Zeylanica *Hermanni. Breyn. Prodr. 2. pag. 105.* Zizyphus Zeylanica, argentea, Mali Cotoneae folio, **WAELEMBILLA** indigenis *Hermanni. Ray. tom. 3. Dendr. pag. 44.* Olea sylvestris, argenteo folio. *Plukn. Almag. pag. 269. & Ray. tom. 3. Dendr. pag. 47.* **WAELEMBILLA** Zeylonensibus, id est *Embilla* sarmentosa, *Wael* enim sarmentum est. *Mus. Zeyl. pag. 8.* ubi porro dicitur, flos est argenteus, tubulosus, plures simul ad foliorum exortus. & in *Ray. citato loco* dicitur. Flores cum fructibus, quibus insident, e foliorum alis exeunt in pediculis mediae longitudinis, argenteo exterius colore, dum adhuc in gemma sunt. Fructus oblongus, sulcatus, argenteus, nucleum includens, subruffum, molliculum; pellicula nucleum involvens, viscoso humore paucio madet. *D. Scherard.* Foliis tantum rotundis a priori differt, in omnibus caeterum idem. De **WAELEMBILLA** in notis ad *H. Malab. part. 4. Tab. 41. pag. 86.* legitur, quod Perim Toddali eadem

999. *Elaeagnus latifolia* L.
var. β .

999 *Elaeagnus latifolia* L.

*ELAIOCARPOS folio Lauri serrato,
floribus spicatis. Nobis.*

3874. *Elaiocarpus serrata* L.

EMERUS siliquis geminatis longissimis Nobis .

5491. *Acrobrynomene* Sieber & L.

eadem sit planta, cum qua tamen minime haec nostra convenit, ut ex collatis figuris & descriptione facile patet; & potius ad *Jujubas* pertinet juxta *Breyn. Prodr. 2. pag. 60.* cum qua a *Commel. in Fl. Malab. pag. 38.* illa jungitur, ubi vide reliqua, & infra ad *Jujubam*.

ELAIOCARPOS folio Lauri ferrato, floribus spicatis. *Nobis. Tab. 40.* *Laurus Indica*, ferratifolia, inodora, fructu Olivae magnitudine, & forma, nucleis crispis, lapideis, Lauro-Ceraso Clusii congener. *Mus. Zeyl. pag. 9.* *Laurus Indica*, ferratifolia, inodora, fructibus Olivae magnitudine & forma, nucleis lapideis, crispis. *Herb. Herm. Perunkara H. Malab. part. 4. Tab. 24.* an Arbor Laurifolia, Indica, fructu ad caulem racemoso, Oleae magnitudine, & forma, villosa, seminibus Anonae nucleorum aemulis referto? *Plukn. Mantiss. pag. 21.* huc spectat Baccifera arbor, calyculata, foliis Laurinis, fructu racemoso, esculento, subrotundo, monopyreno, pallide luteo. *Sloan. Hist. Jam. vol. 2. Tab. 198. Fig. 2.* **WERALU** Zeylonensibus. Gerit haec elegans arbor folia sua ad ramorum summitatem plurima, alternata, ovato-oblonga, per marginem obtuse ferrata, petiolis brevibus infidentia, glabra, quae ex suis alis dant scapum semipedalem, plures continentem flores, minutissimis petiolis infidentes, secundum scapi longitudinem sparsos, deorsum nutantes, quorum calix est quadrifolius, interdum quinquefolius, petala totidem laciniata. Stamina sedecim, si quatuor, viginti, si quinque, erecta. pistillum vero unicum. Fructus est bacca ovalis, nucleum crispum, lapideum continens. Fructus hi immaturi condiuntur muria ab incolis, addito pauxillo Oleo Olivarum ad conciliandum saporem Olivis proximum. ut notatur in *Mus. Zeyl.* in Tabula nostra florem a dorso conspiciendum exhibuimus, ut calix quadrifidus appareat, & petala quatuor ipsius floris eleganter fimbriata ad litt. a. litt. b. est petalum. c. stamen. d. pistillum.

EMERUS filiquis geminatis, longissimis. *Nobis. Tab. 41.* Emerus filiquis longissimis, & angustissimis. *Plumier. Cat. pl. Amer. pag. 19.* Senna Zeylanica, arborescens, filiqua longissima. *Herb. Hart. Kedangu. H. Malab. part. 6. Tab. 27.* quae Colutea filiquosa, Malabarensis. *ibidem.* Colutea Sesban Aegyptiacae foliis accedens, Maderasp. *Plukn. Tab. 165. Fig. 2.* Forte & Colutea exotica, angustifolia, floribus luteis, averla parte eleganter punctatis. *Plukn. Phyt. Tab. 169. Fig. 5.* huc & spectat Turia Turi. *Rumph. Herb. Ambon. 1. cap. 64.* quae cum

Kedangu *H. Malab.* jungitur, sed quae tres gerit filiquas, & flores ac folia habet majora, loco tantum natali caeterum differens.

Rami nostri fruticis sunt lignosi, simplices, teretes, striati, folia alterna, solitaria, pinnata, longissima, sine impari. Pinna singula opposita inserta, oblonga, obtusa, glabra, integerrima, ex alis foliorum petioli egrediuntur communes, tenuissimi, sparsi, flores sustinentes papilionaceos, luteos: Post flores filiquae communiter duae in singulo petiolo ad maturitatem proveniunt, longissimae, tenues, bivalves, unicapulares, isthmo interceptae, semina condentes nigra, reniformia, laevia, parva, secundum longitudinem digesta. vide infra ad *Galegam*, cum qua videtur haecce nostra convenire.

EPHEMERUM Zeylanicum, procumbens, cristatum. *Par. Bat. pag. 148.* ubi descriptio. & *Ray. tom. 3. pag. 566.* Gramen Zeylanicum, putridarum arborum, spica piscium pulmones aemulante. *Mus. Zeyl. pag. 53.* potius Phalangium est. *ibidem.* Gramen distacophoron, spica turgida, cristata. *Mus. Zeyl. pag. 25.* ubi dicitur, Ramulorum summus profert capitellum oblongum, multis semilunatis, herbaceis foliolis, imbricatim sibi invicem inpositis exornatum. Frequens occurrit in arborum senio confectarum truncis, lignis putridis, aliisque udosis, & opacis locis insulae Zeylonae, a cujus incolis BOLHIDA vocatur, quod pronunciant BOLHINDA.

EPHEMERUM Zeylanicum, procumbens, Alsinæ mediae folio. *Par. Bat. Pr. pag. 332.* mutilata ejus Figura conspicitur apud *Pluknet. in Phyt. Tab. 174. Fig. 2.* Graminis dactyli proprie habenda species, ut notatur in *Par. Bat. pag. 154.*

ERYNGIUM Indicum, aquaticum, Ilicis aculeatae folio, floribus coeruleis. *Mus. Zeyl. pag. 66.* Eryngii species *Bontii ibidem*, quae apud *Bontium* descripta & delineata est *pag. 151.* MAHALKIRI Zeylonensibus.

ERYSIMUM Zeylanicum, filiqua recta, hexagona, nigricante, alata. *Mus. Zeyl. pag. 59.*

ESULA Indica, DALUK Zeylonice dicta. *Mus. Zeyl. pag. 67.* Esula, cujus praeter legitimam multae aliae sunt species. *Grimm. Labor. Ceyl.*

EUPATORIOPHALACRON Scrophulariaceae aquaticae foliis oppositis. Nobis.

6522. *Verbesina Lavenia* L.

Ceyl. pag. 123. ubi dicit: Conficitur ex ea correctum quoddam extractum, quod certissimum habet usum iis in affectibus, ad quos commendari solet *Esula*.

ESULAE species in insula Lio, foliis angustioribus. **PITTAGHAEDIGHAS** Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 22.*

EUONYMUS Zeylanica, fructu quadrangulo, miniato. **WAE LA-WAEL** Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 67.*

EUPATORIO affinis, planta Zeylanica, foliis Ulmi. *Breyn. Cent. pag. 142. & Moris. Tab. 27. sect. 7. Fig. 29. ut & Ray. hist. tom. 1. pag. 294.*

EUPATORIOPHALACRON Scrophulariae aquaticae foliis oppositis. *Nobis. Tab. 42.* Eupatoriophalacron Scrophulariae folio trinervi. *Vaill. act. Reg. Paris. ann. 1720. pag. 421.* Conyza Zeylanica, latifolia, dentata, flore albo. *Herb. Hart.* Chrysanthemum Zeylanicum, Scrophulariae aquaticae folio, **LAVENIA** dictum. *D. Scherard. apud Ray. tom. 3. pag. 217.*

Habet haec elegans planta caulem viridem, rotundum, cui folia lata adcrescunt bina opposita, sessilia, longo & tenuissimo principio ortum ducentia, ad tertiam fere partem integra, seu non dentata, dein incisiones seu dentes profundos habentia, obtusos: Folia autem sunt glabra, tenuia, superiore parte viridia, inferiore glauca, venis magnis albicantibus, & costa per medium validissima donata. Flores in summo caulis, ubi divaricatus est, gerit, longis in pediculis gemellos, qui communi pedunculo, dein diviso, solitarius suo sustinetur pediculo. Flores hi juxta *Hertog* sunt albicantes, quorum anatomiam, characteremque exactissime dederunt *Vaillant in act. Paris loc. citat. & Dillen. in H. Elth. pag. 138.*

EUPHORBIO-TITHYMALUS spinosus, caule rotundo, & anguloso, foliis Nerii latioribus, & angustioribus. *Nobis.* Tithymalus Zeylanicus, spinosus, arborescens. *Par. Bat. Pr. pag. 381. Plukn. Phyt. Tab. 230. Fig. 4.* Tithymalus Indicus, arborescens, spinosus, Nerii folio. *Ela Calli. H. Amst. part. 1. Fig. 13. pag. 25.* Tithymalus arborescens, spinosus, Zeylanicus, foliis Laurinis. *Ela Calli. Par. Bat. App. pag. 13.* Tithymalus arbor, Indica, spinosa, foliis latis, Linguae Caninae facie. *Mus. Zeyl. pag. 54.* Euphorbio & Tithymalo media affinis,
aizoi-

aizoides, Indica, arborescens, spinosa, Nerii folio. *Breyn. Prodr.* 2. pag. 45. *Ela Calli H. Malab. part. 2. Tab. 43.* quod Euphorbium secundum, haecenus ignotum *Commel. in notis. & Fl. Malab. pag. 28.* Tithymalus Africanus, arborescens, spinosus, & foliosus, lactescens, & Euphorbium fundens; seu Euphorbium Africanum, arborescens, foliosum & spinosum. *H. Beaum. pag. 39.* Varietas est Euphorbii angulosi, foliis Nerii latioribus. *Boerb. Ind. H. L. B. part. 1. pag. 259.* qui est Tithymalus aizoides, arborescens, spinosus, caudice rotundo, Nerii folio. *Commel. praelud. Botan. pag. 22.* & Tithymalus aizoides, arborescens, spinosus, caule angulari, Nerii folio. *Commel. praelud. Botan. pag. 56.* quae tantum differunt una caule rotundiori; altera magis anguloso, & folio latiori, & angustiori; unde & in *act. reg. Paris. ann. 1720. pag. 501.* distinguitur in Euphorbium spinosum, amplo Nerii folio, & Euphorbium spinosum, angusto Salicis folio. Quas tantum varietates habeo, si vero quis distinctas velit species, per me licet. vide & *Act. Philos. Lond. vol. 22. num. 287. pl. 24.* ubi a *Petiv.* Ricinus Malabaricus, spinosus, Phyllitidis folio vocatur.

EUPHORBIIUM trigonum, spinosum, rotundifolium. *Act. Reg. Paris. ann. 1720. pag. 500.* Euphorbium verum antiquorum Scadida-Calli. *H. Amstel. part. 1. pag. 23.* Euphorbium Indicum, Opuntiae facie, caule geniculato, triangulari. *Breyn. Prodr. 2. pag. 44. Moris. Hist. pl. tom. 3. pag. 345. Commel. Fl. Malab. pag. 27.* Tithymalus Indicus, spinosus, & angulosus, lacte turgens acri. *H. Beaum. pag. 41.* Scadida-Calli. *H. Malab. part. 2. Tab. 42.* Tithymalus aizoides, triangularis, nodosus, & spinosus, lacte turgens acri. *Plukn. Almag. pag. 370.* Euphorbium verum antiquorum *Ray. Hist. pl. pag. 873. Boerb. Ind. H. L. B. tom. 1. pag. 269.* Euphorbii characterem vide apud *Linnaeum in char. pl. gen. pag. 152.* vires vero & usum apud *Samuel Dale Pharmac. pag. 279.*

EUPHORBIIUM trigonum, & tetragonum, spinosum, ramis compressis. *Act. Reg. Paris. ann. 1720. pag. 500.* Euphorbio similis, *Sadricalli* Indorum, quae forte Euphorbium triangulari caule, ramis planis, compressis, Opuntiae facie, appellari potest. *Breyn. Prodr. 2. pag. 44.* Rangiferi cornua referens, planta Zeylanica, *Sandricalli* Zeylonensibus. *Par. Bat. Pr. pag. 368.* Tithymalus aizoides, triangularis, & quadrangularis, nodosus, & spinosus, ramis compressis. *Commel.*
Prae-

FILIX non ramosa Zeylanica, foliis Adianthi in modum serratis.

7950 *Trichomanes adiantoides* L.

Praelud. Botan. pag. 21. & Tithymalus aizoïdes, triangularis, & quadrangularis, articulofus & spinofus, feu spinis geminis aduncis ex eadem fede ortis armatus, succo lacteo acerrimo turgidus. *H. Beaum. pag. 41.* vide & *Plukn. Phyt. Tab. 320. Fig. 2.* & *Almag. pag. 370.*

FAGARAS Avicennae, *Clus. ad Garc. Hist. arom. lib. 1. cap. 23.* Cubebis affinis, Fagara major, *C. B. P. pag. 412.* Fagara major, Imperato. *ibidem.* GUEGELA-ETTA Zeylonenſibus dicta. *Plukn. Almag. Botan. 143.* ubi cum Fagara Abenſinae, vel Avicennae conjungitur.

FILIX non ramofa, Zeylanica, foliis Adianthi in modum ferratis. *Herb. Herm. Tab. 43.* Filix Zeylanica, foliis Adianthi in modum ferratis. *Muf. Zeyl. pag. 36.* Adiantum Africanum, Rutae Murariae aemulum, ſegmentis longioribus, acutis. *Plukn. Phyt. Tab. 132. Fig. 6.* Alta haec, & erecta Filicis ſpecies caule adſurgit ſimplici, firmo, glabro, purpureſcente, e quo pinnae foliorum egrediuntur virides, glaberrimae, ſenſim attenuatae, longiſſimae, verſus baſin laciniatae, laciniis paulo longioribus & acutioribus, lacinia ſingula ſecundum marginem ferrato-dentata eſt, ſatis profunda, crenulâ bifidâ, quandoque trifidâ. Apex autem pinnarum, qui acutiſſimus, & tenuiſſimus eſt, integer exiſtit per ſpatium unciale. Peculiare eſt in hac planta, quod pinnae, quo magis ad radicem ſint poſitae, eo propius ſibi accedant, & in infima plantae parte fere oppoſitae, quae alias alternatim proveniunt, in caulis medio maxime remotae, ad ſummum iterum arctius unitae, quod ob plantae altitudinem in Figura noſtra, ſi juſta & naturalis foliorum magnitudo, quae in omnibus noſtris Tabulis, quantum fieri potuit, ſervata eſt, in infima ejus parte exprimi haud potuit, ſumma enim & dimidia fere totius caulis pars exſculpta eſt.

FILIX, foliis alternis, denticulatis, indiviſis, uncialibus *Muf. Zeyl. pag. 7.* Trichomanis cubitalis ſpecies. *ibidem. pag. 9.* RILLA Zeylonenſibus.

FILIX, ſimilis ramofae Alpini, anguſtioribus vero foliis, & tantum ſemel ad baſin diviſis. RILLA Zeylon. *Muf. Zeyl. pag. 11.*

FILIX ramofa, Zeylanica (foeminae ſpecies) diviſuris integris, noſtra anguſtioribus, ſemel aut bis diſſectis. *Muf. Zeyl. pag. 32.*

FILICIS humilis species, segmentis longis, & angustis. *Mus. Zeyl. pag. 25.*

FILIX Zeylanica, foliis integris, in margine leviter ferratis. *Mus. Zeyl. pag. 35.* Filix exotica, praelongis & angustis ramulis, denticulata. *Plukn. Phyt. Tab. 181. Fig. 5.*

FILIX Zeylanica, foliis auriculatis, brevibus obtusis. *Mus. Zeyl. pag. 35.* an Filix palustris, mas, non ramosa, pinnulis obtusioribus, ex insula Bermudienfi. *Plukn. Phyt. Tab. 242. Fig. 6?*

FILIX Zeylanica, ramosa, denticulata. *Mus. Zeyl. pag. 35.* Filix Bermudienfis, elegans, ramosa, pinnis rarioribus, profunde dentatis, &c. *Plukn. Phyt. Tab. 244. Fig. 2.*

FILIX Zeylanica, denticulata, non ramosa. *Mus. Zeyl. pag. 36. Tab. 44. Fig. 1.* Filix Zeylanica, dentata. *ibidem.* Filix Zeylanica, denticulata, GHODHAMI-WANA Zeylonensibus. *Herbar. Gronov.* Filix pyramidalis, Maderaspatana, elegans, pinnulis ferratis. *Mus. Petiv. no. 55. Tab. 1. icon.* Filix Bermudienfis, non ramosa, petraea, pinnis acutioribus, planis, hirsute pubescentibus. *Plukn. Phyt. Tab. 244. Fig. 1.* Filix non ramosa, major, furculis raris, brevioribus, pinnulis crebris, latis, brevibus, non aculeatis. *Sloan. Catal. pl. Jam. pag. 20. & Hist. Jam. part. 1. pag. 90. Tab. 48. Fig. 2.* quae est Filix Indica, major, alis longis, rotundis, crenatis, binis macularum ordinibus ad oras notatis, Arana-Panna *H. Malab. part. 12. Tab. 31. Bobart. hist. Oxon. pag. 575.* quoad descriptionem:

Caulis hujus plantae est tenuis, rectus, longus, supra sulcatus, simplex, purpureus, e quo brevissimis pediculis proveniunt pinnae plurimum alternae, rarius oppositae, longae, tenues, per marginem profunde ferratae: Unaquaeque ferratura, si venarum situm spectemus, est fere ovata, superius glabra, & laete viridis, inferius fere fusca; Fructus averfa pinnae parte secundum marginem denticulorum natus, instar pulveris adpersi apparet.

Ex communicatione *Joh. Freder. Gronovii*, Botanici egregii, hanc cum duabus subsequenter delineandam curavimus.

FILIX Zeylanica, Lonchitidis facie. *Breyn. Cent. pag. 189. Tab. 44. Fig. 2.* Filicifolia, Lonchitis aspera, maxima Indorum. *Plukn. Phyt. Tab. 30. Fig. 4. & Almag. pag. 152.* Lonchitis aspera, Zeylanica, alis

Fig. 2.

FILIX Zeylanica,
Lonchitidis facie.
Breyn.
7881. *Polypo-*
dium auricu-
latum L.

Fig. 1.

FILIX Zeylanica, denticulata, non ramosa. Mus. Zeyl.

7878 *Polypodium unitum* L.

*FILIX Zeylanica, arborescens, pinnis
alternis, longis, integris, in apice bifidis,
caule membranis aucto. Nobis.*

alis falcatis, laevissime denticulatis, & superiore latere auriculatis. *Bobart. Hist. Oxon. part. 3. pag. 566.* Quum in *Pluknetii Figura* superior plantae pars deficiat, illam hac tabula supplemus. Peculiaris vero structurae est haec planta, caulis enim in inferiore plantae parte hirsutissimus est, (qui male glaber a *Pluknetio* depictus est) spinulis, seu squamulis undique obsessus, quae sensim ad superiora evanescen-tes, caulem in summo glaberrimum constituunt: Caeterum caulis te-nuis est, sulcatus, flexuosus, simplex, inferius villosus, superius glaber. Pinnae communiter in parte inferiore oppositae, in superiore alternae, simplices. Singula pinna habet fere faciem digiti, ad basin transversim angulo inferiore cauli annexa, superiore autem magis producta, appendiculam constituens; margo vix notabiliter ferratus est, quaelibet ferratura tenuissimo aculeo vel setula terminatur. Fru-ctus punctatim dispersus est in pinnis supremis.

FILIX Zeylanica, arborescens, pinnis alternis, longis, integris, in apice bifidis, caule membranis aucto. *Nobis. Tab. 45.* Filix arbore-scens, ex sylvis Cotenlibus HERMANNI *Herbar. Gronov.* Filix ad alas foliosa. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 11.* An Filix arborea, ramosa, caudice non diviso, pinnulis angustis, raris, obtusis, integris. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 22?* Ad exemplar *Gronovii* manu *Hermanni* adscrip-tum erat, foliorum decoctum habilitat uterum ad concipiendum. Elegans certe & rarissima Filicis species est, quae tota quanta, gla-berrima, nigricans, & splendens sese offert: Cujus caulis reclus est, ad latera utrinque membranulis auctus; membranulae hae e tenuissima basi incipiunt, & latere cauli adnectuntur, sensim latiores factae, tandemque in obtusum desinunt, longitudine unciali, latitudine sum-ma bilineali, adeoque tales membranulae sensim sese excipiunt, tan-quam gradus in scala, & quae a latere oppositae sunt, alternatim cum hisce variant. Folia seu potius pinnae sunt oblongo-lanceolatae, in-tegerrimae, usque ad summum (ubi fissum est unumquodque folium) venosae, sessiles, singula in singulo sinu membranae per gradus cau-lis proveniente, adeoque folium hocce compositum pinnatum est ex pinnis alternis.

FILIX non ramosa, foliis integris, non ferratis, maxima, Indiae Orien-talis. *Breyn. Cent. pag. 189.* Phyllitis *Bontii lib. 6. cap. 34.* Filix palu-stris, aurea, foliis Linguae Cervinae *Plum. pag. 5. Fig. 7.* Filix sim-
N 2
pliciter

pliciter pinnatis foliis, seu Phyllitis ramosa, Jamaicensis, maxima, averfa parte, ferruginea lanugine circumquaque obducta, a *Pluknetio* in *Almag. pag. 154.* huic jungitur, quae delineatur in *Phytogr. Tab. 288. Fig. 1.* *Lonchitis palustris, maxima. Sloan. Catal. pl. Jam. pag. 15.* Vide & notas ad *H. Malab. part. 12. Tab. 12. pag. 25.*

FILIX non ramosa, Zeylanica, foliis integris, Filici vulgari similis, *Breyn. Cent. pag. 188. Ray. hist. pl. tom. 1. pag. 143.* an Filix mas, vulgari similis, pinnulis amplioribus, non crenatis, Virginiana. *Plukn. Phyt. Tab. 179. Fig. 2?*

FILIX non ramosa, foliis integris, non ferratis, Zeylanica, minor, *Breyn. Cent. pag. 188.* Filix major in pinnas tantum divisa oblongas, angustasque non crenatas. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 18. & Hist. Jam. pag. 48. part. 1. Tab. 40.* Filix non ramosa alis longis, Salicinis, alternis, non crenatis. *Bobart. Hist. Oxon. part. 3. pag. 572.*

FILIX non ramosa, altissima, palustris, pinnis integris, alternis, ferratis, acutis. *Nobis. Tab. 46.* Filix Zeylanica, palustris, non ramosa, altitudine humana superior. *Herb. Herm.* Filix Zeylanica, glabra, latifolia, maxima. *Mus. Zeyl. pag. 38.* Filix non ramosa, foliis integris, ferratis, Zeylanica. *Breyn. Cent. pag. 188. Ray. hist. pl. tom. 1. pag. 141.* quae a *Breynio* Haemionitidi, alteri *Dalechampii* perquam similis dicitur, quae depicta etiam reperitur in *Hist. Lugd. pag. 1218.* sed quae ferraturas habet profundiores, & minor ac humilior est. De nostra in *Mus. Zeyl.* dicitur: foliis est longis, sesquiunciam latis, venosis; Plurimi exiles nervi, recte a medio nervo ad margines excurrunt: quibus addo, quod margines sint laeviter ferrati, ferraturis angustis, nervus vero medius est crassus, ab utraque folii parte protuberans & conspicuus, coloris straminei, cujus etiam est caulis. Folia sunt pinnata, glaberrima, nervosa, laete viridia, ex caule provenientia.

FILIX Zeylanica, scandens, foliis crassis, & angustis. *Mus. Zeyl. pag. 39.* Filix scandens, perpulchra, Indica. *Breyn. Prodr. 2. pag. 46.*

FLOS CLITORII flore coeruleo. *Nobis.* flos Clitorius. *Breyn. Cent. pag. 76.* ubi icon & descriptio *Petiv. Act. Phil. Lond. vol. 20. no. 244. pl. 19.*

*FILIX non ramosa, altissima, palustris, pinnis
integris, alternis, serratis, acutis. Nobis.*

pl. 19. Clitorius Zeylanicus, flore coeruleo. *Hart. Catal. semin.* Flos coeruleus, Bonga Biru. *Rumph. Herb. Ambon. lib 7. cap. 30.* Phaseolus Indicus, Glycyrrhizae foliis, flore amplo coeruleo. *H. Amst. tom. 1. pag. 47.* Phaseolus Indicus, purgans, seu Galega Phaseoloides Zeylanica, flore coeruleo. *Mus. Zeyl. pag. 10 & 31.* Phaseolo adfinis, Glycyrrhizae Germanicae foliis, Orientalis, flore amplo coeruleo. *Par. Bat. Pr. pag. 364.* Phaseolus Indicus, Glycyrrhizae foliis, flore coeruleo amplo, sive Flos Clitoridis. *Breyn. Prodr. 1. pag. 43.* Flos Clitoridis Ternatenfium *Amm. Char. pl. pag. 62 & 394.* Phaseolus Indicus, coeruleus, Glycyrrhizae foliis alatis, flore amplo Clitorio. *Plukn. Almag. pag. 294.* Faba purgatrix CATHARODU Zeylonensibus. *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 124.* vocatur & KATARODUWAEL in *Mus. Zeyl.* ubi additur: Ex fructu destillatur aqua Ophthalmica. Farina Fructuum in juscule ad drachmas duas data, & assumpta, alvum leniter solvit. in *Labor. Ceyl.* notatur, quod fabae exsiccentur, & ex iis pulvis conficiatur, qui cum Lacte *Cocos* assumptus, aut juscule, lenissime purgat, & dolorem mitigat in Colica, Stomachum etiam, & viscera juvat. dosis est, drachma una ad tres.

FLOS CLITORIUS, flore albo. *Nobis.* Phaseolus Zeylanicus, purgans, floribus albis. *Mus. Zeyl. pag. 61.* Galega Phaseoloides Zeylanica, flore albo. *ibidem. pag. 32.* Clitorius flos albus *H. L. Bat. pag. 162.* Phaseolo affinis, Glycyrrhizae Germanicae foliis, Orientalis, flore albo. *Par. Bat. Pr. p. 365.* & *Fl. Malab. p. 54.* Schanga-Cuspi. *H. Malab. part. 8. Tab. 38.* KATARODU haec quoque Zeylonensibus audit, estque prioris varietas.

FRUCTUS Indicus, farmentosus, foliis hispidis, rigidis, ad quamvis materiam laevigandam commodissimus. *Mus. Zeyl. pag. 19.* KOROSWAEL & KOROSSAWAEL Zeylonensibus. Nomen tulit a *Korossa* laevigare; folia enim plantae, cum admodum densa & scabra sint, usurpantur ab incolis ad poliendam, & laevigandam quamcunque rem.

FRUTEX trifolius, spicatus, producus baccas nigras, *Mus. Zeyl. pag. 24.* Rhois trifoliatae frutex Salawaccensis, floribus juliformibus *Mus. Petiv. no. 678.* & *Ray. tom. 3. pag. 58.* *Dendrol.* KOBBAE Zeylonensibus.

FRUTEX Zeylanicus, spinosus, Jasmini flore, folio subrotundo, filiquis falcatis. *Mus. Zeyl. pag. 33.*

FRUTEX Zeylanicus, spinosus, KATHUPILA dictus. *Mus. Zeyl. pag. 39.*

FRUTEX spinosus, baccas sanguineas, oblongas proferens. *Mus. Zeyl. pag. 56.*

FRUTEX Zeylanicus, spinosus, farmentosus, fructibus rubicundis, carnosus, rotundis. *Mus. Zeyl. pag. 59.*

FRUTEX farmentosus, ligno croceo, levi, longe lateque spargens. *Mus. Zeyl. pag. 47.* ubi additur, saepe ultra duo, aut tria millia passuum in circumferentia prorepat. BANWAL Zeylonensibus dicitur a *Bana* quod funiculum significat ad alligandum boves, talia enim conficiunt ex tenuioribus hujus farmentis.

GAEDHUMBA *Mus. Zeyl. pag. 60.* sic dicitur a glutine, quia corticis succus viscosus est, ac glutinosus.

GALANGA minor, *Mus. Zeyl. pag. 51. Clus. Aromat. hist. lib. 1. cap. 40. pag. 211. Acost. apud Clus. cap. 31. pag. 275.* Galanga & Galanga minor Officinarum. *C. B. Pin. pag. 35.* vide & *Ray. tom. 2. pag. 1337. &c.* Galanga major & minor, Lanquas & Lampujang apud *Rumph. in Herb. Ambon. lib. 8. cap. 9 & 10.* eleganter describuntur. MAHUKALUWA haec quoque Zeylonensibus dicitur, quod nomen *Zedoariae rotundae* etiam tribuitur; ut patet supra ad *Colchicum pag. 68.*

GALANGA ignobilior. *Mus. Zeyl. pag. 51.* Galanga major *C. B. Pin. pag. 35.* qui utriusque plura habet synonyma, apud *Acost. in edit. Venet. pag. 45.* hujus habetur figura. Vide apud *Clus. lib. 1. aromat. cap. 40. & Acost. cap. 31.* Galangae majoris & minoris descriptionem ac usum habet etiam *Samuel Dale in Pharmac. pag. 330. Grimm.* autem in *Labor. Ceyl. pag. 122.* de Galanga majore haec habet: Nos ipsi hanc, prout necessitas postulavit, saepissime usui adhibuimus, & apud nos abundanter plantari potest, nam parvae est altitudinis; albos flores emittit, sicut & fructum non absimilem ipsi Cardamomo &c. Propter quam rationem inter ejus species libenter fructum illum annumerarem. Istius radicis vires sufficienter sunt notae. E floribus conservam
com-

compono, quae radice jucundior est ad tenerarum personarum usum.
KUDAKALUWA Zeylonensibus.

GALEGA quadrifolia, TELAMANDUKOLA Zeylonice dicta. *Mus. Zeyl. pag. 15.* nomen habet a *Tela* quod notat illud, quod sine butyro coctum saporosum est: Coquitur autem haec herba loco Bliti.

GALEGA Indica, filiquis articulatis, foliis latioribus, ramulis ad exortum alatis. *Mus. Zeyl. pag. 24 & 55.* Sesban Alpini folio latiori DYAHYABALA Zeylonensibus. *ibidem.*

GALEGA Indica, minor, hexaphylla. *Mus. Zeyl. pag. 42.* TORA & TORAKOLA Zeylonensibus. vide supra ad CASSIAM *pag. 56.*

GALEGA Indica, frutescens, spinulosa, filiquis angustis, longissimis, folio Mimosae. *Mus. Zeyl. pag. 64.* & Galega Aegyptiaca, filiquis articulatis. *ibidem. C. B. Pin. pag. 352.* Sesban Alpini Pl. *Aegypt. pag. 81 & 82. Amm. H. Bosian. pag. 33.* & Sesban aculeatum *Veslingii pag. 27.* Vide hanc cum ejus caractere descriptam in *Ponted. Anthol. pag. 284. & seq.* an eadem cum *Emero* superius descripto?

GALEOPSIS Zeylanica, folio oblongo, flore albo. *Herb. Herm. Tab. 20. Fig. 3.* supra expressa est.

Caulem gerit haec planta quadrangularem, hirsutum, viridem; folia bina opposita, scabra, superiore parte viridia, inferiore pallidiora, oblonga, & obtusa. Flores ad alas foliorum locantur verticillati, parvi, albicantes, longis in calicibus, hirsutis, dissectis contenti, qui femina post se relinquunt oblongo-rotunda, nigra, quae pericarpio magno, in summo corniculis quatuor instructo, occluduntur.

GALLIUM Zeylanicum, minimum, odoratum. *Mus. Zeyl. pag. 51.*

GALLIUM Zeylanicum, sylvestre, Lini folio, flore albido. *Hert. Catal. semin.* Convenit forte cum Gallio albo Linifolio. *Barl. Observ. 99.*

GAMBU Moluccanum, odore roseo. *Mus. Zeyl. pag. 48.* GABBU Zeylonensibus. Fructus hujus arboris parvi sunt, Mespili magnitudine, lutei, odore roseo. Alia hujus species Pyri magnitudine ac forma est.
Jam-

Jambos Acoftae. arbores has ex Europa in Zeylonam effe tranflatas credunt. vide infra ad *Jambos*.

GENISTA articulata, repens, foliis craffiusculis, planis, acutis. *Nobis. Tab. 47. Fig. 1.* Genifta Zeylanica, fylveftris, repens, flore coeruleo. *Herb. Hert.* Hedyfarum monophyllum, repens, filiculis glabris, non crenatis. *Muf. Zeyl. pag. 33.* UDUPYALI alia fpecies, folio fingulari, oblongo. *Muf. Zeyl. pag. 5.*

In fylvis magna copia haec planta per terram repens, & fefe diffundens reperitur, caules multos, rotundos, virides emittens, ubi folia erumpunt, nodofos feu articulatos, paleaceos, ex fingulo nodo unicum producens folium, quod fatis longo, & firmo fufinetur pediculo, glaberrimum, laete virens, aequale, craffum, oblongum, acuminatum. Flosculi in longis fpicis fufinentur, plures alternatim in fpica, quae ex alis foliorum erigitur, provenientes, tenuibus, fed magnis, acutis, quadrifariam diflectis, paleaceis calicibus contenti, & fere occlufi; funt minimi, coerulei, papilionacei. Siliquae binae in fpica fimul producuntur communi primo, dein proprio pediculo infedentes, copiofae admodum hae in fpicae faftigio apparent, quae funt virides, planae, glaberrimae, nullis articulis vel interftitiis diftinctae, feminibus reniformibus repletæ. Unde ad *Geniftam* & non ad *Hedyfarum* pertinet. Cumque hac convenire videtur denominatio *C. B. in Pin. pag. 395.* quae Genifta ramofa, Hyperici folio ab eo vocatur; noftrae enim folia Hyperico fimillima funt, & planta ipfa ramofa admodum eft. Difert autem ab Hedyfaro Indico, folio fingulari, subrotundo. *Tournef. instit. pag. 401.* uti ex *Plukn. Phyt. Tab. 59. Fig. 3.* patet.

GENISTELLA Zeylanica, fpinofa. *Muf. Zeyl. pag. 58.* an Geniftella fpinofa, Africana, Laricis folio, *Breyn. Cent. pag. 68?*

GENTIANA Indica, flore patulo, coeruleo, Calthae paluftris facie, radice tenui, fibrofa. *Muf. Zeyl. pag. 33.* Gentiana Indica, aquatica, caule quadrato, floribus coeruleis, amplis, radice fibrofa. *ibidem. pag. 53.* **GHIROTILLA** Zeylonenfibus.

GERANIUM maximum, Zeylanicum, Tuffilaginis folio, flore purpureo. *Alb. Sebae rer. nat. thef. part. 1. Tab. 26. Fig. 2. pag. 42.* Characterem hujus generis expofuit *Linnaeus in char. gen. pl. pag. 204.*

GHAE-

Fig. 1.

*GENISTA articulata, repens, foliis
crassiusculis planis, acutis. Nobis.*

Fig. 2.

*HEDYSARUM monophyllum, latifolium,
siliculis plurimis spica longa digestis. Nobis.*

- GHAERIETHAGAS**, seu arbor bovina. *Mus. Zeyl. pag. 23 & 33.* nomen significat ossa vaccarum, quia lignum ossa refert.
- GHALBERYA** *Mus. Zeyl. pag. 22.* a *Ghal* quod lapidem, & *Berya* quod cribrare significat; purgat enim haec planta fordes pedum.
- GHANDAPANA.** *Mus. Zeyl. pag. 60.* *Ghanda* notat foetorem, folia enim foetent. *Pana* alia species est, nec foetens, nec olens.
- GHODHAMELUM** *Mus. Zeyl. pag. 16.* Flos est Antirrhini. Planta est refrigerans, bilem maxime educit, sanat Icterus, praesertim cum lacte vaccino data. ut notatur in *Mus. Zeyl. Orletambari* Malabaris.
- GHODHAPARAGHAHA.** *Mus. Zeyl. pag. 70.* sic dicitur, quod crescat solo duro, *Ghodha* vocato. *Para* additur, quod & alia ejus species est, *PARA* vocata.
- GHONAPITTAN** *Mus. Zeyl. pag. 68.* *Ghona* Cervum, *Pittan* dorsum notat, folia quodammodo Cervi dorsum repraesentant. ut dicitur in *Mus. Zeyl.*
- GRAMEN** Alopecuroides. *Mus. Zeyl. pag. 5.* Gramen Alopecuras, Zeylanicum, *ibidem. pag. 45.* Gramen forte Alopecuroides Indicum, majus, vel minus &c. *Plukn. Phyt. Tab. 92. Fig. 4 & 5.* **KAWULA** Zeylonensibus.
- GRAMEN** amoris, minus. *Mus. Zeyl. pag. 25.* Gramen forte amoris alterum, paniculis strigosioribus magisque sparsis. *Ray. Catal. pl. exter. apud Plukn. Phyt. Tab. 92. Fig. 2.* Gramini tremulo affine, panniculatum, elegans, minimum *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 34.* an *Tsjama-Pullu H. Malak. part. 12. Tab. 41?* an *Amourettes Maderaspas.* panicula minus sparsa locustis perexiguus. *S. Broux. lib. 7. no. 293.* apud *Scheuchz. Agrast. pag. 197?*
- GRAMEN** arundinaceum, Lithospermi femine, minus. *Mus. Zeyl. pag. 45.* an Gramen Cyperoides sylvaticum, maximum, geniculatum, asperius, femine Milii Solis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 36. & Hist. part. 1. p. 118. Tab. 77. Fig. 1?* **WELHIRI** Zeylonensibus.

GRAMEN arundinaceum, tibicinum, Zeylanicum, NALAGHAS. Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 45.*

GRAMEN cruciatum Zeylanicum, an Gramen Miliaceum latifolium? *Mus. Zeyl. pag. 6.* an Gramen ischaemon Malabaricum, speciosius, longioribus & mucronatis foliis. *Plukn. Phyt. Tab. 300. Fig. 8?* Gramen dactylon, Ægyptiacum *C. B. P. pag. 7. & Fl. Botan. pag. 110. & Commel. Fl. Malab. pag. 34.* Gramen dactylon spicis brevibus crassis, plerumque quatuor cruciformiter dispositis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 33.* ubi vide plurima synonyma, & *Hist. Jam. pag. 110. vol. 1.* Gramen vaccinum, Rompot Carbou *Rumph. Herb. Ambon. lib. 10. cap. 5.* Cavara-Pullu *H. Malab. part. 12. Tab. 69.* ITANA & IDADHU Zeylonensibus. *Idadhu* significat cuspidem arcuum ferream, Cinghalensium, cujus cuspidis formam referunt hujus plantae folia. *Tana* est particula adjectiva, herbarum nominibus admodum familiaris.

GRAMEN cruciatum, supinum, Zeylanicum, humi repens. *Mus. Zeyl. pag. 45.* Gramen dactylon procumbens, crassum & viridius, cum lo reclinato. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 33. & Hist. Jam. vol. 1. pag. 111.* Gramen dactylon cruciatum, Americanum &c. *Plukn. Phyt. Tab. 189. Fig. 7.* ITANA Zeylonensibus.

GRAMEN Dactyloides spicis deorsum aristatis. *Nobis. Tab. 47. Fig. 1.* Gramen spica divisa Zeylanicum, ex una parte aristis donatum. *Mus. Zeyl. pag. 36.* Gramen dactylon, elatius spicis plurimis tomentosis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 33. & Hist. Jam. tom. 1. pag. 111. Tab. 65. Fig. 2.* Gramen Dactylon, Indicum, spicis villosis, subrubescens. *Bobart. Hist. Oxon. part. 3. pag. 185.* Gramen Zeylanicum, spica in quinque vel sex partes divisa. *Heist. Cat. pl. Acad. Jul. ann. 1733. pag. 8.* Florum spicae e summitate caulis veluti ex eodem puncto oriuntur, quinque, sex, vel septem simul, una vel altera interdum brevi spatio remota e caule exit. Omnes sunt spicae oblongae, digitales, rectae, vel laeviter incurvatae, heteromalae versus latus inferius, constant omnes glumis alternatim positae, muticis, duae vel tres in communicali calice mutico exceptae sunt. Caulis est sesquispithamalis, laevis, striatus, glaber. Folia attingunt saepe longitudinem caulis, ad margines scabra, latitudine per totam longitudinem aequalia, striata, laevia.

GRA-

581 *Poa tenella* L.

GRAMEN panniculatum,
locustis tenuissimis subrotundis.
Nobis ..

Fig. 3.

Fig. 1.

GRAMEN Dactyloides spicis
deorsum aristatis. Nobis.
Cynodorus indicus L.

418. *Scirpus capillaris* L.
GRAMEN pusillum Junci capitulis
minimis, ad basin foliolis binis auctis.
Nobis ..

Fig. 2.

GRAMEN Dactylon, Zeylanicum, radice tuberosa, aromatica, dulci, odorata. *Mus. Zeyl. pag. 66.* Gramen dactylon, aromaticum, multiplici pannicula, spicis brevibus, tomento candicantibus. &c. *Plukn. Phyt. Tab. 190. Fig. 1.* KALANDURU Zeylonensibus.

GRAMEN Dictacophoron, spica turgida, cristata. *Mus. Zeyl. pag. 25.* Gramen dactylon, bicorni, tomentosum, minus. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 33. & Hist. Jam. part. 1. pag. 110. Tab. 68. Fig. 2.* an Gramen Dactylon, Siculum, multiplici pannicula, spicis ex eodem exortu geminis? *Ray. hist. pl. pag. 1271. Plukn. Phyt. Tab. 92. Fig. 1.*

GRAMEN Dactylon, Zeylanicum, minus. *Heist. Cat. pl. Acad. Jul. ann. 1732. pag. 11.* an Gramen dactylon bicorni, spicis purpurascentibus, minus. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 34. & Hist. vol. 1. pag. 112. Tab. 68. Fig. 1.*

GRAMEN Cyperinum, Zeylanicum, vulgare, minus, KALANDURA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 2 & 4.* an Gramen Cyperoides, minus, spicis compactis, subrotundis, flavicantibus, *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 36. & Hist. vol. 1. pag. 119. Tab. 79. Fig. 1?*

GRAMEN Cyperinum, Zeylanicum, radice tuberosa, *Hin* Zeylonensibus dictum. *Mus. Zeyl. pag. 4.* an Gramen Cyperoides, minimum, spica simplici, compacta, radice tuberosa, odorata. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 36. & Hist. vol. 1. pag. 120. Tab. 79. Fig. 2?*

GRAMEN Cyperinum, Zeylanicum, porcinum, capitulis conglobatis, rotundis. *Mus. Zeyl. pag. 7.* Gramen Cyperoides latiore folio, pannicula in summitate caulis conglomerata. *Plukn. Phyt. Tab. 190. Fig. 8.* vel potius Gramen Cyperoides, minus, spica compacta, subrotunda, viridi radice odorata. *Sloan. Cat. pl. Jam. p. 36. & Hist. vol. 1. pag. 119. Tab. 78. Fig. 2.* URUKIRI Zeylonensibus. ab *Uru* quod porcum notat, a porcis enim hoc gramen appetitur.

GRAMEN parvum, spica triunciali, ramosa, instar Cyperi Miliacei. *Mus. Zeyl. pag. 26.* Gramen Cyperoides pumilum, elegans *Maderas*. *Plukn. Phyt. Tab. 191. Fig. 8.*

GRAMEN Cyperinum, junceum, longissimum, HASPAN vocatum. *Mus. Zeyl. pag. 23.* an Gramen Cyperoides, Maderasp. pannicula magis sparfa, & speciosa. *Plukn. Phyt. Tab. 192. Fig. 2?*

GRAMEN Cyperinum, Indicum, minimum, capillaceum, feu barbatum. *Mus. Zeyl. pag. 57.* an Gramen Cyperoides, minimum, spicis pluribus compactis & oblongo-rotundis. *Sloan. Cat. pl. Jam. p. 36. & Hist. vol. 1. pag. 120. Tab. 79. Fig. 3?* Seu Gramen junceum perpusillum, capillaceis foliis, Æthiopicum *Plukn. Almag. pag. 179. & Phyt. Tab. 300. Fig. 5?* MANGHARUDAELI Zeylon. *Mangharu* pisciculi barbati nomen est. *Daeli* barbam notat.

GRAMEN Cyperinum, Zeylanicum, majus, alterum. *Mus. Zeyl. pag. 58.* an Gramen Cyperoides, Indicae Orientalis elatius, pannicula sparfa, pallescente. *Plukn. Phyt. Tab. 191. Fig. 7?*

GRAMEN Cyperinum, KARABUHIRI dictum. *Mus. Zeyl. pag. 45.*

GRAMEN Cyperinum, maximum, MAHAKIRI dictum. *Mus. Zeyl. pag. 45.* an Gramen Cyperoides, majus, spicis ex oblongo rotundis, compactis, ferrugineis. *Sloan. Cat. pl. Jam. p. 36. & Hist. vol. 1. pag. 118. Tab. 77. Fig. 2?*

GRAMEN Cyperinum, minimum, HINKIRI dictum. *Mus. Zeyl. pag. 45.*

GRAMEN Cyperinum, medium, inauguralale, ÆLHIN dictum. *Mus. Zeyl. pag. 45.* *Æ!* Oryzam nondum mundatam, feu decorticatam notat. *Hiri* Oryza est. Inter Oryzam autem hoc gramen crescere solet. *Inaugurale* vocatur, quia Cinghali ex hujus graminis luxuria inaugurantur agrorum fertilitatem, nec spes bonae frugis illos facile fallit, si Oryzâ conferunt agros, quos gramine hoc luxuriantes observarunt: ut notatur in *Mus. Zeyl.*

GRAMEN Junceum, Chamaemeli capitulis, aphyllis, albis, *Mus. Zeyl. pag. 7.* Gramen Indicum, capitulis tomentosis *ibidem. pag. 57.* Gramen junceum, Indiae Orientalis, minus, capitulo rotundo, ex paleaceis spiculis in cacumine caulis glomerato. *Plukn. Mantiss. pag. 98.* KOK-MOTHA Zeylonensibus. *Motha* significat sagittam sine cuspe ferreo, sed lignoso, in globuli formam facto. *Koka* aviculam parvam, can-

candidam, longo collo, capite albicante, quod gramen hoc repraesentat. Pedem circiter altum est, foliis latioribus dordiano, ut describitur in *Mus. Zeyl.*

GRAMEN junceum, foliis capillaceis sericeis, capitulis minimis, rotundis. *Mus. Zeyl. pag. 8.* PÉNDÁ Zeylonensibus, quod caudam aviura notat.

GRAMEN junceum, Chamaemeli capitulis albis, aphyllis, minus. *Mus. Zeyl. pag. 8.* KOKMATHA minor *ibidem. pag. 20.* ubi additur: Haec est illa species, quam habet *D. Doody.* Gramen junceum, minus e Maderasp. seu Juncus pumilus, capitulis in summitate aphyllis. *Plukn. Phyt. Tab. 192. Fig. 7.*

GRAMEN Indicum, capitulis oblongis, floridis, aureis, squammatis. *Jupicai Bontii. Mus. Zeyl. pag. 41.* Erva d'Empige Lusitanis *ibidem.* & *Pisonis pag. 238.* Gramen florens capitulo squamoso. *Ray. hist. p. 1318.* & *Commel. Fl. Malab. p. 34.* Kotsjiletti-Pullu *H. Malab. part. 9. Tab. 71.* ubi vide notas. RANMOTHA Zeylonensibus. *Ran* denotat aurum. *Motha* quodcunque corpus tenerum; hujus enim plantae capitula oblongo-rotunda, aurei coloris sunt.

GRAMEN floridum, luteum, capitulis squammatis, majus. *Mus. Zeyl. pag. 50.* MOTHTHU Zeylonensibus, quod notat capitellum, quod gladiatorum manubriis inponitur.

GRAMEN Junceum, Zeylanicum, odoratum. *Mus. Zeyl. pag. 57.* Radix Indica odore Cyperi. *ibidem. pag. 51.* SAEWAENDARA Zeylonensibus, quod notat odorem. *Lambutschi veru*, id est radix odorata. Substituunt has radículas odoratas pro Cypero ac Iride. Comestae reddunt urinam odoratam, eamque promovent. *Mus. Zeyl. pag. 52.*

GRAMEN paludosum, Junci capitulis ad basin foliosis. *Mus. Zeyl. pag. 45.* an Gramen junceum, aquaticum, capitulis cum foliis capillaribus simul ortis proliferum. *Plukn. Phyt. Tab. 32 Fig. 3? &c.* BINTANA Zeylonensibus.

GRAMEN pusillum, Junci capitulis minimis, ad basin foliolis bicus auctis. *Nobis. Tab. 47. Fig. 2.* Gramen glareosum, Junci capitulis ad basin

foliosis. *Mus. Zeyl. pag. 45.* Gramen Junceum parvum, seu Holosteum, strictissimis & hirsutis foliis. *Plukn. Phyt. Tab. 299. Fig. 3.* Juncus foliatus, minimus. *J. B. tom. 2. lib. 18. pag. 523.* Huc spectat Mottapullu *H. Malab. part. 12. Tab. 38.* HADUTANA Zeylonensibus.

Graminis nostri radices sunt capillares, plures, simplices, serpentinae, albicantes, quae ex capitulo eodem protrudunt folia plurima capillaria, longitudine circiter digiti, interstincta dein brevibus, acuminatis, acutis, sulcatis squamis. Folia haec majuscula versus apicem, vel ab eo dimidio uncialis spatium protrudunt flosculum unicum, vel alterum e latere inferius foliolo tenuissimo suffultum. Flos hic constat squamis sex, calicinis, in orbem positis, oblongo-acuminatis, includens sex stamina, & unicum pistillum, absque ullis petalis, tandem proferens fructum membranaceum trilocularem. Parvitate certat cum Scirpo omnium minimo, capitulo breviori, *Tournef.*

GRAMEN panniculatum, locustis tenuissimis, subrotundis. *Nobis. Tab. 47. Fig. 3.* Gramen panniculatum, ex oris Malabaricis, pannicula delicatiore. *Plukn. Phyt. Tab. 300. Fig. 2.* Gramen Miliaceum, folio hirsuto. *Mus. Zeyl. pag. 24.* Gramen Furni, Rompot Assap. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 10. cap. 6.* MENERITANA Zeylonensibus. a *Meneri* quod Milium notat.

Caulis terminatur pannicula delicatula, contracta, vel angusta, continens locustas compositas ex quatuor vel quinque glumis muticis, minimis, exceptas a calice biglumi, mutico.

Omnes haec squamae distinctae, & imbricatim collocantur in formam ovatam. Caulis, qui tenuis est, tegitur fere vaginis foliorum, quae angusta, striata, acuminata, ad exortum e caule hirsuta sunt.

GRAMEN Zeylanicum, Miliaceum. *Mus. Zeyl. pag. 58.* Gramen Dactylon, Orientale, majus, Frumentaceum semine Napi. *Plukn. Phyt. Tab. 91. Fig. 2.* vide & *Almag. pag. 174.* Caracam Cinghalensibus *Knox Itiner. pag. 11.* vide & *Moris tom. 3. pag. 185.* ut & *Ray. tom. 3. pag. 606.* KURAKKAN Zeylonensibus.

GRAMINIS species, cujus semina comeduntur loco Oryzae. *Mus. Zeyl. pag. 61.* Gramen dactylon, Indicum, esculentum, spica articulata. *Ambros. Phytol. pag. 546.* Figura ejus invenitur apud *Plukn. Phyt. Tab. 190. Fig. 2.* BADHAMU Zeylonensibus.

GROSSULARIA spinosa vidua, baccis in racemo congestis spadiceis, foliis crenatis ovato-acuminatis Nob.
1585. Ceanothus asiaticus L.

GRAMEN Zeylanicum, folio eleganter maculato. *Par. Bat. Pr. pag. 338.*
Gramen paniceum, minimum, humi stratum, spica divisa mutica, foliis variegatis. *Sloan. Cat. pl. Jam. p. 30. & Hist. Jam. vol. 1. p. 107. Tab. 64. Fig. 3. Ray. tom. 3. pag. 600.* Gramen serpentarium, Zeylanicum, *Breyn. Cent. Prodr. 2. pag. 54.* ubi pro Graminis Daëtyli, aut Panicei specie habetur.

GRAMEN pratense, Zeylanicum, paniculis hirsutis, plumosis. *Mus. Zeyl. pag. 58.* an Gramen pratense, tomentosum, panicula sparsa. *C. B. P. pag. 4?*

GRAMEN tremulum, minus, ITANA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 56.*
Gramen tremulum, minus, panicula sparsa, *C. B. P. pag. 2. Plukn. Almag. pag. 176. &c.*

GRAMEN Typhoides, album, *Mus. Zeyl. pag. 32.* Gramen forte, Indicum, Alopecuroides, holosericum, majus, spica longa pappescente. *Plukn. Almag. pag. 177. & Phyt. Tab. 92. Fig. 5.* an Gramen Alopecuroides Curass. spica longissima, & fericea candida. *Par. Bat. Pr.*

GRANATA MALUS Zeylanica, spinosa. *Par. Bat. Pr. pag. 338. & Commel. Fl. Malab. p. 34.* Granata Malus Zeylanica, spinosa, flore luteo. *Par. Bat. Append. pag. 9.* Malus Punica Zeylonensium, spinosa. *Plukn. Almag. pag. 240.* Malus Granata Zeylonensis, aculeata. *Phyt. Tab. 98. Fig. 6.* Katunaregam *H. Malab. part. 4. Tab. 13.* *Ray. tom. 3. pag. 19. Dendr.* Granatum Malum, Delima, *Rumph. Herb. Ambon. lib. 2. cap. 33.* Arbor Granata. *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 116.* ubi haec habet: Offert nobis Syrupum Granatorum, Conservas flor. Granat. Flores & folia optimum suum habent usum in Chirurgia ad Gargarismos, Clysteres, & alia medicamenta, quae simul attrahendi, repellendi, atque abstergendi virtutem habere debent. &c. a *Commel. in Fl. Malab. pag. 42.* huic jungitur Malus Limonia, Malabarica, fructu umbilicato. *Ray. Hist. p. 1463.*

GROSSULARIA spinis vidua, baccis in racemo congestis, spadiceis, foliis crenatis, ovato-acuminatis. *Nobis. Tab. 48.* Grossulariae adfinis arbor, baccis in racemo congestis, spadiceis, ex acido dulcescentibus, *Herb. Herm.* Grossulariae forte fructu, non spinosa, Malabathri foliis oblongis, floribus herbaceis racemosis, fructu nigro. *Sloan. Cat. pl. Jam.*

Jam. pag. 165. Grossularia Zeylanica, baccis majoribus nigris. *Mus. Zeyl. pag. 11 & 26.* Grossularia Zeylanica, magno flore, EMBILLE Zeylonensibus. D. Herman. apud *Ray. tom. 3. pag. 27.* *Dendr. an Anavinga H. Malab. part. 4. Tab. 49.* ÆMBILLA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl.* ubi additur, baccas fert forma & sapore Ribes aemulantes.

Gerit haec arbuscula caules firmos, crassos, rotundos, glabros, obscure virides, e quibus folia alternatim proveniunt solitaria, subrotunda, acuminata, in ambitu crenata, glabra, obscure virentia. Flores ex foliorum alis proveniunt, in parvis racemis congesti, tetra aut pentapetaloides parvi, staminibus plurimis & calice suo contenti, qui baccas dant ex acido dulcescentes, spadiceas, *Ribesii* forma, unde & forte, quum etiam spinis destituatur, eo propius accedit.

GROSSULARIA Zeylanica, major, GHAESAEMBILLA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 36.* Grossularia baccis albis, pediculis floriferis in summo ramo, & ex alis foliorum exeuntibus. *Ray. tom. 3. Dendr. pag. 27.*

GROSSULARIA Zeylanica, baccis minoribus, albis, acidiusculis. *Mus. Zeyl. pag. 11.* Grossularia Zeylanica, fructu albo. D. Hermans. *Ray. tom. 3. pag. 27. Dendr.* Baccifera Maderasp. Ribes more, floribus muscosis, Juli instar. *Petr. Mus. no. 621.* GHAESAEMBILLA haec etiam Zeylonice audit, priorisque varietas est. Grossulariae character invenitur apud *Linn. char. pl. gen. pag. 68.* ad RIBES.

GUAJAVOS fructu pallido, dulci *Mus. Zeyl. pag. 3.* Guajava alba, dulcis. *Par. Bat. Pr. pag. 33.* *H. Amst. tom. 1. pag. 121.* Guajava Indica, fructu Mali facie, pulpa interiore alba *J. B. tom. 1. lib. 1. cap. 41.* Guajava alba, dulcis, fructu longo. *Herm. Cat. H. L. B. pag. 305. & Commel. Fl. Malab. pag. 34.* Guajava pomifera, Indica, pulpa candida. *C. B. P. pag. 437.* Guajavus domestica, Guajavus *Rumph. Herb. Amboin. lib. 1. cap. 41.* qui & *cap. 42.* sylvestrem habet fructu viridi. Guajavae dulcis icon etiam exprimitur apud *Merian. insect. Surin. hist. Tab. 19.* & apud *Piscenem* Guajava vocatur *pag. 153.* Pela *H. Malab. part. 3. Tab. 34 pag. 31.* vide & *Ray hist. pag. 1455.* Malo punicae affinis pomifera, flore pentapetalo, albo, fructu nullis dissepimentis interfecto, ex toto esculento, majore, albo. *Sloan. Cat. pl. Jam pag. 199.* qui plurima habet synonyma & alias etiam species, vide & *Hist. Jam. part. 2 pag. 163.* PERA Zeylonensibus *Mus. Zeyl.* ubi dicitur: Lusitani hanc arborem in Zeylonam transtulerunt. HAM-

HAMDAMANIAS, *Mus. Zeyl. pag. 3.* *Hamma*, seu *Hambda* pellem, vel corium notat.

HAMPINNA *Mus. Zeyl. pag. 70.* *Ham* pelliculam denotat.

HANSAPE *Mus. Zeyl. pag. 13.* *Hansa* anserem, *Pe* pedem notat. Radix enim, & folia pedem anserinum referunt.

HEDYSARUM monophyllum, latifolium, filiculis plurimis spica longa digestis. *Nobis. Tab. 49. Fig. 2.* Hedyfarum Indicum, folio singulari acuminato. *Tournef. inst. pag. 401.* Onobrychis Zeylanica, folio singulari, oblongo-rotundo D. *Hermanni* apud *Ray. tom. 3. pag. 453.* huc spectat Onobrychis Gangetica, monophyllos, filiculis singularibus, laevibus, falcatis per internodia discriminatis. *Plukn. Phyt. Tab. 50. Fig. 3.* & Onobrychis Indiae Orientalis, Fagi foliis alternis, filiculis spica longa dispositis. *Mus. Petiv. no. 788.*

Planta haec alternatim sua gerit folia, in inferiore caulis parte maxima, subrotunda, lata, instar *Persicariae Orientalis*; superiore parte viridia & glabra, inferiore autem villosa, pediculis uncialibus villosis itidem insidentia, villi hi per totum caulem, ipsamque florum spicam sese dispergunt. Caulis autem est angulosus, purpurascens, hirsutus, in summo flores suos utcunque producens, seu in spicam floriferam & frugiferam sese dividens, & diffundens. Spicae hae sunt longissimae, rectae, tenues, villosae, numero ut plurimum ternae, quae in inferiore sua parte ad dimidium fere flores, filiculasque suas dimittunt, in superiore autem dimidii parte copiose eas ad maturitatem producentes. Flosculi hi sunt purpurascens, papilionacei, tenuissimis pediculis insidentes, calicibus sat magnis contenti, singuli autem, ut videtur, filiculam dant geminam, communi ex origine productam, glabram, compressam, articulata, in sex, septem, pluresve articulos distinctam, singulo articulo semen unicum subrotundum, reniforme, splendens, glabrum, flavum continente.

HEDYSARUM monophyllum, repens, folio Nummulariae rotundo, filiculis hispidis, parvis. *Mus. Zeyl. pag. 31.* Onobrychis Maderasp. Nummulariae folio, Ornithopodii filiquis. *Petiv. Gazoph. Tab. 26. Fig. 4.* *Ray. hist. pl. tom. 3. app. pag. 247.*

HEDYSARUM monophyllum, Zeylanicum, pediculatum. *Mus. Zeyl. pag. 35.* Hedyfarum humile, Capparis folio. *Dillen. H. Elth. pag. 170. Tab. 141.* ubi vide elegantem Figuram, ac descriptionem, natamque hanc plantam dicit auctor ex semine a *J. Ph. Breynio* misso, cum inscriptione Hedyfari Zeylanici, folio singulari, fere circinnato, maculato. &c.

HEDYSARUM bifolium, filiquis articulatis, echinatis. *Mus. Zeyl. pag. 59.* Undupyali, seu Hedyfari species, foliis binis tantum. *Mus. Zeyl. pag. 18.* Mallam Tsjulli *H. Malab. part. 9. Tab. 83.* an Onobrychis Maderasp. diphyllus, minor, filiculis hirsutis *Plukn. Phyt. Tab. 246. Fig. 6?* **MAHASWAENNA** Zeylonensibus dicitur a pede equi, cui folia sunt similia. *Mus. Zeyl. pag. 18.*

HEDYSARUM bifolium, foliolis ovatis, filiculis asperis, geminis, inarticulatis. *Nobis. Tab. 50. Fig. 1.* Hedyfarum Indicum, bifolium, repens, flosculis luteis, filiquis asperis, villosis. *Herb. Hert.* Planta bifolia, humirepa, Trifolii flosculis aureis, filiquis asperis, villosis, articulatis. *Herb. Herm.* Plantula repens Indica, binis in ramulorum extremitate foliolis, flosculis luteis, Trifolii seminibus latis. *Mus. Zeyl. pag. 58.* Planta bifolia, humirepa, Indica, floribus in propriis surculis dipetalis, globulis feminalibus monospermis. *Ray. tom. 3. pag. 404.* Hedyfarum minus, diphyllum, flore luteo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 73.* Nelam-Muri. *H. Malab. part. 9. Tab. 82.* ubi in notis. Planta bifolia humirepa, Ari folio, flosculis aureis, villosis, articulatis. *Commel. & Fl. Malab. pag. 54.* Descriptio *Horti Malab. pag. 161.* in omnibus nostrae plantae ita convenit, ut alteram hic subungere, superfluum foret. *Tabula* vero 83. melius nostri Schemati & Figurae respondere videtur. huc spectat Onobrychis Maderasp. diphyllus, filiculis asperis. *Plukn. Phyt. Tab. 102. Fig. 1.* cujus folia sessilia penitus depicta sunt, quum nostrae plantae folia longis pediculis sustinentur, quo differunt.

HEDYSARUM trifoliatum, viscosum, filiquis articulatis, peltatis. *Nobis.* Trifolium Indicum, spicatum, viscosum, minus, filiquis articulatis, peltatis. *Mus. Zeyl. pag. 43.*

HEDYSARUM trifoliatum, filiculis glabris, peltatis, geminis inarticulatis. *Nobis. Tab. 50. Fig. 2.* Trifolium, Indicum spicatum, non viscosum, fili-

HEDYSARUM trifoliatum, arborescens, floribus
ex alis foliorum, siliquis copiosis, glabris. Nobis.

5510. *Hedysarum umbellatum* L.

filiquis articulatis, peltatis. *Herb. Herm.* Hedyfarum Zeylanicum, angustifolium, triphyllum, filiculis compressis, articulatis. *Mus. Zeyl. pag. 31.* Hedyfarum triphyllum, minus, flore coerulescente. *Herb. Hert.* Onobrychis Zeylanica, trifolia, minor, perennis. *D. Hermans apud Ray. tom. 3. pag. 457.*

a Priori differt caule rotundo, purpureo, glabro, quum altera viscosum & hirsutum gerat caulem. Folia vero eodem modo proveniunt terna, glabra, oblonga, pallida, in inferiore parte incana, majora, minora, prout in majore, minoreve plantae ramo proveniant. Rami vero lignosi penitus sunt, flexiles tamen. Flores in ramulorum summitate utcunque proveniunt spicati, parvi, tenues, papilionacei, coloris coerulescentis, calicibus longis, magnis, contenti, qui per articulationem quasi sibi mutuo injunguntur, quod & etiam ad foliorum ortum obtinet, maxime ubi rami disperguntur. Post flores sequuntur filiculae planae, compressae, glabrae, subrotundae, acutum apicem in summo gerentes, binae sibi mutuo utcunque inarticulatae, ubi solitariae occurrunt, Thlaspidii filiculis similes sunt. Singula vero filicula continet semen unicum, subrotundum, planum, reniforme, splendens, nigricans.

HEDYSARUM trifoliatum, arborescens, floribus spicatis, foliis subrotundis, subtus lanuginosis. *Nobis.* Onobrychis spicata, Zeylanica, trifolia, frutescens *Hermanni* apud *Ray. tom. 3. pag. 457.* Undupyali species arborescens, foliis ternis, fere rotundis, subtus lanuginosis. *Mus. Zeyl. pag. 22.* **ÆTUNDUPYALI** Zeylonensibus.

HEDYSARUM trifoliatum, arborescens, floribus ex alis foliorum, filiquis copiosis, glabris. *Nobis. Tab. 51.* Trifolium Zeylanicum, arborescens, filiquis compressis, articulatis, floribus albis. *Mus. Zeyl. pag. 21.* Hedyfarum Zeylanicum, trifolium, arborescens, floribus albis. *Herb. Hert.* Folium Crocodili, Daun Boaya. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 6. cap. 58.* **WALDAMINI & MAHAPILAE** Zeylonensibus.

Gerit haec species caulem subrotundum, lignosum, penitus purpurascens, e quo folia alternatim proveniunt, firmo sustentata pediculo, tria simul, magna, subrotunda, glabra, integra, venosa, superiore parte viridia, inferiore incana, itidem glabra. Ex ortu vero foliorum proveniunt plurimi, communi primo pedunculo, dein proprio suffulti flores papilionacei, albicantes, calice quadrifariam dissecto

contenti, singuli filiquam glabram, compressam, subrotundam, articulata[m] producentes, singulo articulo includente semen subrotundum, glabrum, nigrum, reniforme.

HEDYSARUM trifoliatum, frutescens, flore ac fructu inter duo foliola rotunda absconditis. *Nobis. Tab. 52.* Onobrychis Indica, triphyllos, foliis amplis, mucronatis, filiquis parvis in spicam longam ex alis inter bina foliola circinnata arcte convenientia reconditis. Maddy-Mal maddy Malabarorum. *Plukn. Amalth. pag. 161. pl. 5. & Phyt. Tab. 433. Fig. 7.* Arbuscula Zeylanica, trifolia, filiculis Carpino similibus, folliculis inclusis. *Mus. Zeyl. pag. 58.* Arbuscula trifolia, filiculis binis rotundifoliis folliculis inclusis. *Mus. Zeyl. pag. 36.* **PA-LAEGHAS** Zeylonensibus, ex foliorum ala erigitur spica longa, foliis rotundis ad summum usque stipata. *Mus. Zeyl.*

Tota haec arbuscula scabra est, & laeviter hirsuta, inprimis caulis, qui obscure purpureus est, & villis tenuissimis obsitus, folia gerens terna, brevibus innixa pediculis, quorum supremum quintuplo fere majus est, & oblongum, duo alia sibi mutuo opposita subrotunda sunt, itidem scabra, nigricantia in superiore parte, in inferiore pallida & hirsuta, seu incana, ex foliorum autem alis eriguntur spicae longissimae, foliaceae, ubique foliolis rotundis, venosis, undulatis, scabris, superiore parte nigricantibus, inferiore pallidioribus tectae, horum duo semper foliola ex communi pedunculo oriuntur, quae arctissime sibi invicem juncta, & Concharum instar clausa sunt, inter quae flosculi toti occluduntur parvi, purpurei, papilionacei, gemini in singula tali concha, quae dehiscit, justam si hi acqulivere magnitudinem, & sese aperiunt; post quos filiquae geminae, planae, articulatae, in longum & acutum apicem desinentes progerminant, continentes in singulo articulo semen subrotundum, planum, reniforme, nigrum. in *Pluknetii Figura* saepius tres quatuorve filiculae apparent, in nostra duas tantum semper & constanter invenimus, conchae foliaceae ruditer etiam ibi depictae sunt, multumque a nostrarum situ ac forma differunt, numero etiam multo inferiores, unde dubito, si eaedem, quod tamen videtur, an quidem multum possimus fidere isti *Figurae*, quum nostra quam exactissime ad plantam integram sit delineata, & fideliter etiam expressa.

HEDYSARUM trifoliatum, repens, filiculis compressis, glabris, crenatis. *Mus.*

HEDYSARUM trifoliatum frutescens. flore ac fructu inter duo foliola rotunda absconditis. Nobis.

5507. Hedysarum pulegiellum L.

Fig. 2.

Fig. 1.

HEDYSARUM trifoliatum, spicatum, foliis oblongis, glabris, siliquis asperis, articulatis. Nob.

HEDYSARUM trifoliatum, siliculis inferioribus solitariis, superioribus articulatis. Nobis.

5512. *Hedysarum heterocarpon* L.

Mus. Zeyl. pag. 38. Hedyfarum procumbens, Trifolii Fragiferi folio.
Dillen. H. Elth. pag. 172. Tab. 142. ubi vide reliqua.

HEDYSARUM trifoliatum, Salviae folio. *Nobis.* Trifolium Salviae folio.
Mus. Zeyl. pag. 25. Trifolium amplexicaule, filiculofum, Salviae folio.
Mus. Zeyl. pag. 60. TELAMANDU & BUDAMANI Zeylonensibus.

HEDYSARUM trifoliatum repens, incanum, Salviae foliis, filiqua parva, articulata. *Nobis.* Trifolium Indicum, repens, incanum, foliis Salviae, filiquis parvis, articulatis. *Mus. Zeyl. pag. 48.* WALUNDUWÆL Zeylonensibus, hoc est *Unda* sylvestre, sarmentosum.

HEDYSARUM trifoliatum, filiculis inferioribus solitariis, superioribus articulatis. *Nobis. Tab. 53. Fig. 1.* Hedyfarum triphyllum, Zeylanicum, rotundifolium. *Mus. Zeyl. pag. 35.* Trifolium spicatum Indicum, majus, filiquis compressis, articulatis: & idem viscosum. *Mus. Zeyl. pag. 53.* Trifolium Indicum, spicatum, viscosum, majus, filiquis articulatis, crenatis. *ibidem. pag. 42.* Trifolium Indicum, spicatum, filiquis compressis, crenatis, villosis, majus. *Herb. Herm.* Hedyfarum Zeylanicum, triphyllum, majus, flore coerulescente. *Herb. Hart.* Onobrychis Maderaspi. triphylla, filiculis clypeatis, villosis, geniculis singulis, binisve. *Petiv. Mus. no. 789.* GHASUNDUPYALI Zeylonensibus, id est Hedyfarum arborescens.

Frutescens haec Hedyfari species caulem habet rotundum, villis tenuissimis scabrum, & saepe viscosum, purpureum: unde folia alternatim emergunt, villosis, longis, & firmis innixa pediculis, quae tria communi insident pediculo, inferiora bina opposita, superiore impari existente, triplo fere majore, sunt autem glabra, subrotunda, venosa, superiore parte viridia, inferiore incana. Flores gerit in longis spicis collectos, ex alis foliorum & in summitate caulium provenientes, qui parvis calicibus contenti, papilionacei sunt & coloris dilute purpurei seu coerulescentis. Peculiare autem est huic speciei, quod in infima spicae parte post flores sequantur filiculae, planae, compressae, subrotundae, apicem acutum habentes, scabrae, solitariae. Reliqua autem spica producit filiquas longas, planas, articulatas, sex septemve articulis constantes, hirsutas, a parte inferiore aequales, superiore vero isthmo interceptas, quae nunc solitariae, nunc geminae

simul ex uno centro proveniunt, gerentes in singulo articulo semen solitarium, planum, subrotundum, glabrum, reniforme.

HEDYSARUM trifoliatum, spicatum, foliis oblongis, glabris, filiquis asperis, articulatis. *Nobis. Tab. 53. Fig. 2.* Hedyfarum Zeylanicum, triphyllum, flore coerulecente, foliis oblongis. *Herb. Hart.* Trifolium Indicum, medium, spicatum, filiquis depresso, articulatis. *Mus. Zeyl. pag. 47.* Hedyfarum trifoliatum Maderas. filiquis membranaceis, asperis. *Petiv. Mus. no. 649.* Hedyfarum triphyllum, fruticosum, flore purpureo, filiqua varie distorta. *Sloan. Cat. pl. Fam. pag. 73. & Hist. Fam. vol. 1. pag. 184. Tab. 116. Fig. 2.*

Ab altero frutescente Hedyfaro haud multum abludit haec planta, & foliis oblongis differt, ut & caule virescente, qui itidem villosus est, eodemque modo folia gerit terna, viridia, glaberrima, superiore obscura, inferiore parte incana, integra, majora, & longiora.

Flores in longissimis spicis eriguntur ex foliorum alis, & in summo caulium, alternatim provenientes, tenuissimis infidentes pediculis, papilionacei, longissima tuba instructi, quae abit in filiquam longam compressam, articulatam, hirsutam, quae geminae saepius proveniunt & copiosae admodum in hac specie observantur; continent vero, ut in aliis congeneribus, in singulo loculo, seu articulo semen subrotundum, reniforme. &c.

HEDYSARUM trifoliatum, repens, folio ovali, glabro, caule hirsuto, filiqua plana, articulata. *Nobis. Tab. 54. Fig. 1.* Trifolium Indicum, majus, cordatum, filiquis depresso, articulatis. *Mus. Zeyl. pag. 56.* Onobrychis Indica, major, foliis Acetosellae, quod **UNDUPYALI** majus. *Mus. Zeyl. pag. 5. & UNDUPYALI* alia species, folio longiore. *ibidem.* Repens haec admodum est planta, fibrillas albicantes, quae radículas formant, ubique ad foliorum & caulium ortum emittens, folia gerens glabra, terna, ovalia, laete viridia, in inferiore parte pallidiora, quae communi pediculo, ex caule tenui, hirsuto, anguloso, viridi, proveniunt. Flores nunc solitarii, nunc gemini ex foliorum alis eriguntur, longissimis & tenuissimis pediculis primo communibus, dein propriis suffulti, calicibus profundissime sectis, hirsutissimis, contenti, parvi, purpurei, papilionacei, qui filiquam dant planam, glabram, varie articulatam, in quatuor, quinque, sexve articulos distinctam, singulo articulo suum continente semen reniforme &c.

HEDY-

Fig. 1.

Fig. 2.

HEDYSARUM trifolium repens, Acetosellae folio glabro, caule hirsuto, siliqua plana, articulata. Nobis.
 5526 *Hedysarum triflorum* L.

HEDYSARUM trifolium repens, folio ovali glabro, caule hirsuto, siliqua plana, articulata. Nobis.

5526 *Hedysarum triflorum* L. var. β .

HEDYSARUM trifoliatum, repens, Acetofellae folio glabro, caule hirsuto, filiqua plana, articulata. *Nobis. Tab. 54. Fig. 2.* Onobrychis Indica, minor, Acetofellae foliis. *Mus. Zeyl. pag. 2 & 4.* Trifolium Indicum, minus, cordatum, filiquis depressis, articulatis. *Mus. Zeyl. pag. 56.* Hedysarum trifoliatum, Maderaspatanum, Lujulae folio, Ferri Equini filiquis. *Petiv. Mus. no. 649.* Foenum Graecum Zeylanicum, repens, flore purpurascens. *Herb. Hart.* UNDUPYALI Zeylonensibus.

Antecedente multo minor est haec planta, nec ita se per fibrillas radicales dispergens, repens tamen & caulem itidem hirsutum habens, folia itidem tria glabra, cordata, inferius pallida, Oxidem seu Acetofellam perfecte aemulans, gerens, caeterum eodem modo producens flores & filiquas, ut in priori dictum est specie. Proxime haec accedit ad Hedysarum procumbens, Trifolii Fragiferi folio *Dillenii*, uti in *H. Elth. pag. 173.* ab auctore etiam animadvertitur.

HEDYSARUM annuum, majus, Zeylanicum, Mimosae foliis *Tournef. inst. pag. 402.* Hedysarum caule hirsuto, Mimosae foliis alatis, pinnis acutis, minimis, gramineis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 74. & Hist. Jam. part. 1. pag. 186. Tab. 118. Fig. 3?* Mimosa non spinosa, major, Zeylanica Domino *Hermans*, Excellentissimi Domini *Syen. Breyn. Cent. pag. 52.* ubi elegans Figura & descriptio, cujus vero caulis glaber est. Vide & *Petiv. Act. Phil. Lond. vol. 22. no. 267. pl. 91.* Securidaca clypeata, flore luteo, Lentis folio, Zeylanica. *Breyn. Prodr. 1. pag. 46.* Onobrychis annua, Zeylanica, Mimosae foliis, filiquis articulatis, asperis, major. *H. L. Bat. pag. 458. Amm. H. Bosian. pag. 25.* an Onobrychis Bisnagarica, Mimosae foliis, filiquis ad unum solummodo latus dentatis, ex alis polyceratos. *Plukn. Almag. pag. 270. Phyt. Tab. 49. Fig. 5?* Mimosa herba Zeylanica, aquatica, filiquis compressis, articulatis, hispidis, atris, an Anonymos Garciae? an Aeschynomene Apollodori? *Mus. Zeyl. pag. 18.* & Herba Mimosa major MAHADYAHYAMBALA dicta, quae Aeschynomene Theophrasti. &c. *ibidem. pag. 41.* Mimosa non spinosa, major, Zeylanica *Breynii.* DYAHIBALA Cinghalensibus. D. *Hermans* apud *Ray. hist. pl. pag. 982.* ubi ejus descriptio. Figuram non damus, quum optime a *Breynio* in *Centur.* sua sit expressa. DYAHYBALA & DYAHYAMBALA Zeylonensibus, id est Tamarindus aquatica. *Dya* enim aquam notat, in qua nasci amat planta, HIEMBALA Tamarindum, cui folia sunt similia. vide intra ad MIMOSAM.

HEDY-

HEDYSARUM annuum, minus, Zeylanicum, Mimosae foliis. *Tournef. inst. pag. 56.* Onobrychis annua, Zeylanica, minor, filiquis articulatis, asperis. *H. L. B. pag. 458.* Mimosa herba Zeylanica, filiquis compressis, hispidis, articulatis minor, **HINDYAHYABALA** dicta. *Mus. Zeyl. pag. 40.* Niti-Todda-Vaddi *H. Malab. part. 9. Tab. 20.* ubi vide notas. *Fl. Malab pag. 2.* & infra ad **MIMOSAM**.

HEDYSARUM Zeylanicum, Aurantii folio. *Nobis.* Onobrychis Zeylanica, Aurantii folio. *Petiv. Hort. sicc. in Ray. tom. 3. append. pag. 247. no. 16.*

HEDYSARUM Viciae foliis, filiquis spicatis, deorsum pendentibus, hirsutis. *Nobis.* Vicia Zeylanica, filiquis spicatis collectis, ac deorsum spectantibus, nigris, hirsutis, pilosis. *Mus. Zeyl. pag. 10.* **GHASUNDUPYALI** Zeylonensibus, id est *Undupyali*, sive Hedyfarum arborescens.

HEDYSARUM Indicum, magnum, laciniatum, Pastinacae odore. *Mus. Zeyl. pag. 58.*

HEDYSARUM trifoliatum, filiquis angustissimis, oblongis. *Nobis.* Trifolium marinum, filiquis angustissimis, oblongis. *Mus. Zeyl pag. 56.*

HELIOTROPIUM Indicum, Hormini foliis latioribus. *H. Beaum. pag. 24.* Heliotropium Indicum, majus. *Mus. Zeyl. pag. 3.* Heliotropium Americanum, coeruleum, foliis Hormini. *Dodart. Mem. p. 83. Plukn. Phyt. 245. Fig. 4. Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 94.* Heliotropium latifolium, annuum *H. L. Bat. pag. 307.* Heliotropium Indicum, Hormini folio. *Ray. hist. pl. pag. 307.* **ÆTSAETHYA** Zeylonensibus. *Ætse* Elephantem, *Æthya* similem notat; spica enim floris similis est Proboscidi Elephantis. Vocatur etiam *Doelkodduhu*. *Doel* Scorpionem, & *Kodduhu* caudam seu spicam significat. Nominatur etiam *Kadschavandi*. *Kadscha* Elephas est. *Vandi* flexus facere. *Mus. Zeyl. pag. 3.* hujus & altera est floribus albis, & vocatur.

HELIOTROPIUM Zeylanicum, majus, Hormini folio, flore albo, **ÆTSAETHYA** Zeylonensibus. *Hert. Catal. semin. Aguaraquinha Pison pag. 229.* Bena-Patsja *H. Malab. part. 10. Tab. 48. & pag. 96.* vide notas. ubi a *Commel.* vocatur Heliotropium Indicum, latiore & rotundiore folio; vide & *Fl. Malab. pag. 35.*

HELIO-

Fig. 1.

Fig. 2.

HOTTONIA flore solitario ex
foliorum alis proveniente. Nobis.
1166 *Hottonia indica* L.

JACOBÆA perfoliata, folio longo, acuto, auriculato. Nobis.

6379. *Inula indica* L.

HELIOTROPIMUM Indicum, foliis Hormini, minus *Par. Bat. Pr. Mus. Zeyl. pag. 43.* Heliotropium angustifolium, annuum, minus, Jacua Acanga. Fedagozo *Markgr. & Pisonis Par. Bat. Pr. pag. 340.* Heliotropium coeruleum Americ: foliis Hormini angustioribus. *H. L. Bat. pag. 307.* Heliotropium Curassavicum, Hormini foliis angustioribus. *H. Beaum. pag. 24. & Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 94.* Jacua Acanga Brasilianis, Fedagofo Lusitanis. *Pison. pag. 229. Markgr. p. 6.* **ÆTSAETHYA** Zeylonensibus, quod Heliotropii nomen genericum est.

HEMIONITIS multifida, Zeylanica, costa sagittata; sive Filix foliis integris, Zeylanica, pediculo alato. *Breyn. Prodr. 2. pag. 55.* Filix seu Hemionitis dicta, Indiae Orientalis, Phagi seu Esculi folio aliquatenus accedens. *Plukn. Phyt. Tab. 36. Fig. 5. de qua vide Ray. hist. pl. pag. 54.*

HEMIONITIS Zeylanica, repens, scandensve, foliis minimis. *Ray. hist. pl. pag. 56.* ubi ejus descriptio.

HIBBUTHU & HINHIBBUTHU, sive majus & minus. *Mus. Zeyl. pag. 40.* **SERGIANDSKLOOT** Belgis. *ibidem.*

HIGHULHAENDA folio Myrti. *Mus. Zeyl. pag. 21.*

HINZODALAWAEL, *Mus. Zeyl. pag. 25.*

HONDAPARA, *Mus. Zeyl. pag. 10.* ab *Honda* quod genus notat.

HOTTONIA flore solitario ex foliorum alis proveniente. *Nobis. Tab. 55. Fig. 1.* Sarafraga Zeylanica, Millefolii folio, flore albo. *Herb. Hart.* an Alline saxifraga, Indiae Orientalis, foliolis circa caulem radiatis, flore herbido & muscoso. *Plukn. Mantiss. pag. 9.* Tsjudan. Tsjera. *H. Malab. part. 12. Tab. 36.*

Caulis nostrae plantae est tenuis, articulatus, simplex, e quo folia stellatim erumpunt, quinque, sex, vel plura, tenuia, brevia, pennatim divisa, ad singulum articulum provenientia, ubi & petiolus tenuis exurgit, foliis longior, apice gerens florem calice quinquefido, parvo, petalo unico quinquefido (quod in *H. Malab.* quadrifidum describitur & depingitur) constantem, qui stamina habet quinque & pistillum unicum cum capitulo. Fructus est capsula subrotunda, uni-

ocularis, femina condens plurima. Primus nomen HOTTONIAE dedit celeberr. *Herm. Boerhave* Millefolio aquatico, ad confusionem cum Millefolio terrestri vitandam, in piam memoriam decessoris sui *Petri Hotton*, Professoris quondam in *Acad. Lugd. Bat.* cujus generis characterem in indice suo *H. L. Bat.* exactius & nitidius descripsit *part. 1. pag. 206 & 207.* cum quo nostra plantula in omnibus ita convenit, ut nisi vim naturae inferre velimus, ab eo genere separari nequeat. Vide porro *Linnaeum in char. pl. gen. pag. 43.*

HYACINTHUS Indicus, tuberosus, noctu olens. *Mus. Zeyl. pag. 35.* Hyacinthus Indicus, tuberosus, flore Narcissi *C. B. Pin. pag. 47.* Hyacinthus major, Indicus, tuberosa radice non descriptus. *Swertii Floril. Tab. 14.* SANDALMALAM Zeylonensibus.

HYDROCOTYLE Zeylanica, Afari folio. *Tournef. inst. pag. 328.* Valerianella Zeylanica, palustris, repens, Hederae terrestris folio, ad radicem florida. *Par. Bat. pag. 238.* ubi icon & descriptio. *Amm. Char. pl. pag. 247.* Afarina Zeylanica minor. *Par. Bat. Pr. pag. 315.* (quia cum Afaro foliatura convenit.) *Petiv. act. Phil. Lond. vol. 22. no. 287. pl. 4.* Ranunculo adfinis, umbelliferis accedens, Chelidonii minoris folio, Zeylanica minor. *Plukn. Phyt. Tab. 106. Fig. 5.* Ranunculus aquaticus, Afari foliis, ad nodos umbelliferus *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 7.* Codagam *H. Malab. part. 10. Tab. 46. Fig. 91.* Pesequinus, Pancaga *Rumph. Herb. Ambon. lib. 9. cap. 69.*

HYOSCYAMUS maritimus, fructu Tribuli aculeato, monospermos. *Mus. Zeyl. pag. 42.* PATIRAJA Zeylonensibus, ut & *Patiraja Katbu* quod notat murices, seu machinulas illas ferreas, aculeatas, tricuspides, Germanice *Pusanghen* dictas. Hujus enim plantae fructu Cinghali loco muricum utuntur. *Mus. Zeyl.*

HYOSCYAMUS maritimus, fructu Tribuli aculeato, dispermos. *Mus. Zeyl. pag. 42.*

HYSSOPUS Zeylanicus, tenellus, pratensis, WILA Zeylonensibus; *Mus. Zeyl. pag. 51.* Hyssopus aquaticus, repens, foliis crenatis, floribus longis, amplis. *Mus. Zeyl. pag. 20.*

JABOTAPITA Cinnamomi folio, floribus spicatis. Nobis.

3865. *Ocena squarrosa* L.

Hyssopus palustris, repens, foliis crenatis, odore Thymi. **WELAKOLA** Zeylonensibus, *Mus. Zeyl. pag. 51.* Hyssopus Zeylanicus, elegans, odore ac sapore Thymi. *ibidem. pag. 47.* Hyssopus **WELAKOLA** *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 129.* ubi haec habet: Virtutem eandem, atque nostra continet. Praebet etiam oleum & aquam per destillationem: Possumus pariter exinde Syrupum conficere ad morbos pectoris excellentissimum.

JABOTAPITA Cinnamomi folio, floribus spicatis. *Nobis. Tab. 56.*
BOKAERAE Zeylonensibus. *Herb. Herm.*

Caulis hujus plantae est lignosus, perennis, ramosus, ramis minus divisis, folia ramulis superioribus alternatim insident, oblonga, venis transversalibus eleganter striata, perennia, glaberrima instar Cinnamomi; Apices ramorum terminat Corymbus florum, qui petiolis biuncialibus insident, quorum calix unifolius, quinquefidus, planus, rotatus; petala non apparent. Receptaculum in medio floris gibbum est cum pistillo acuminato, ad latus receptaculi interdum apparet corpusculum subrotundum, durum, flavum, quod an bacca, an nidus insecti? Videtur satis convenire cum **JABOTAPITA** *Plumier. in nov. pl. gen. pag. 41. Tab. 32.* quae etiam ad latus receptaculi anomalum gerit fructum. Unde & eo reduximus: quum autem nostrae petala desiderantur, num eo reducenda sit, pro certo asseverare non audemus.

JACBERIKOLE *Mus. Zeyl. pag. 60.* **PANEKILIPKIPPE** Malabaris.

JACEAE & SERRATULAE adfinis, capitulis Baccharidis, foliis Trachelii, Zeylanica, *Breyn. Prodr. 1. pag. 39. & Commel. Fl. Malab. pag. 36. H. L. Bat. pag. 339. & in append. pag. 677.* ejus Figura. Serratula Indica, major, latifolia, mollis *Breyn. Prodr. 2. pag. 90. Commel. Fl. Malab. pag. 61.* Eupatoria Conyzoides integro Jacobaeae folio, molli & incano. Indiae Orientalis *Plukn. Phyt. Tab. 177. Fig. 1.* Scabiosa Indica, arborea *Ray. hist. pl. pag. 1443.* Conjungitur vulgo cum Scabiosa Zeylanica, capitulis foliosis &c. quae est Cattu-Schiragam. *H. Malab.* sed cujus forma ab hac multum differt, quod ut appareat, Scabiosae illius accuratissimam insculpi curavimus figuram, quae infra exhibetur, ut cum *H. L. Bat. & Pluknet.* Figuris conferri possit.

JACOBAEA perfoliata, folio longo, acuto, auriculato. *Nobis. Tab. 55. Fig. 2.* Jacobaea Zeylanica, folio rigido. *Herb. Hert.* Proxime huic convenit Figura, quae in *Plukn. Phyt. Tab. 149. Fig. 3.* exprimitur, sed mire inscribitur: vocatur enim ibi Asperulae forte congener planta peregrina. Accedit & nostrae plantae *Fig. 2. Tab. 378. Phyt.* quae in *Mantiss. pag. 55.* vocatur Conyza minor, Indiae Orientalis, Nelapu Malabarorum.

Plantae nostrae rami sunt longi, tenues, rotundi, filiformes, purpurei, glabri; quibus folia sparsim alternatim adcrescunt sessilia, caulem ipsum quasi perforantia instar Perfoliatorum, seu tam arcte eum ambientia, ut ni ad basin dehiscerent, vel auriculata essent folia, caulis per eorum medium perrumpere videretur. Folia haec sunt scabra, ad latera hirsuta, superne viridia, inferne incana, forma oblonga, acuta, sensim angustiore, quae quo magis ad ramorum summum tendunt, eo plus decrescunt, & tandem minima evadunt; Flores in ramorum fastigio proveniunt solitarii, lateralibus ramulis frequentiores, in omnibus cum Jacobaeaeum floribus convenientes, coloris lutei dilutioris, seu flavi.

JACOBAEA Zeylanica, flore luteo, folio Cardui sylvestris. *Alb. Sebae rerum nat. thes. part. 1. Tab. 22. Fig. 5. pag. 34.*

JALAPPA parvo flore. *Tournef. inst. pag. 130.* Jalappa minor, purpurea. *Munt. Phytogr. Fig. 67.* Mirabilis Peruviana, parvo flore *H. L. B. pag. 428.* Solanum Mexiocanum, flore variegato minore, semine rugoso. *Sch. Botan. pag. 144.* Solanum Mexiocanum, flore parvo, luteo. *C. B. P. pag. 168.* *Mus. Zeyl. pag. 67.* Solanum Mexiocanum, Jasminum Indicum, flore minore. *C. B. Prodr. pag. 91.* ubi describitur. Mirabilis, Marvelje, Bonga Wactu, Kitsyl. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 51.* Admirabilis Peruviana, rubro flore. *Clus. rar. pl. hist. lib. 5. pag. 89.* & *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 91.* ubi & alia hujus sunt synonyma. SENDRIKKAN Zeylonensibus.

JAMBOS Malaccensis, fructu aureo, rosam spirante. *C. B. Mus. Zeyl. pag. 19.* quae Perfici ossiculo fructus Malaccensis, ex candido rubescens, vocatur a *C. B. Pin. pag. 441.* Malacca-Schambu *H. Malab. part. 1. Tab. 17.* ubi vide notas. Arbor Indica, flore tetrapetalo, staminibus longis referto, fructu majore umbilicato, *Plukn. Almag. pag. 237.*
Prunus

JASMINUM flore tetrapetalo, *IXORA* Linnæi, SCHETTI H. Malab. Nobis.

Prunus Malabarica, fructu umbilicato, Pyriformi, *Jambos* dicta, minor. *Ray. Hist. part. 2. pag. 1478.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 56.* Jambo. *Clus. lib. 2. cap. 13.* Jambi *Acoftae edit. Ital. pag. 203.* & apud *Clus. cap. 48.* Jambosa domestica. Jambu. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 1. cap. 33.* RATAGAMBU & RATAGALBU Zeylonensibus. a *Rata*, quod luteum notat, *Gambu* hujus nomen genericum est. Flores plurimis staminibus constant. Fructus hujus sunt aurei coloris, forma ac magnitudine Pyri, unde ad differentiam subsequantium haec, JAMBOS fructu aureo Pyriformi, odorato, vocari posset.

JAMBOS fructu luteo, Mespili forma, odorato, GAMBU dicta. *Nobis.* Gambu Moluccanum, odore roseo. *Mus. Zeyl. pag. 48.* ubi dicitur: Fructus hujus arboris parvi sunt, Mespili magnitudine, lutei, odore roseo, &c. vide supra ad GAMBU.

JAMBOS sylvestris, fructu rotundo, Cerasi magnitudine. *Mus. Zeyl. pag. 67.* Prunus Malabarica, fructu umbilicato, Pyriformi, *Jambos* dicta, major. *Ray. hist. part. 2. pag. 1478.* *Commel. Fl. Malab. pag. 56.* Jambos prior *Acoftae ibidem.* Nati Schambu *H. Malab. part. 1. Tab. 18.* quae Jambos sylvatica, fructu Cerasi magnitudine, WALGAMBU Cinghalensium *Hermann. ibidem* in notis *pag. 30.* & *Plukn. Almag. pag. 252.* Jambosa nigra, seu Jambu utan vel sylvestris. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 1. cap. 33.* ubi usque ad caput 36 alias plures describit species. WALGAMBU Zeylonensibus.

JAMBOS sylvestris & montana, fructu Cerasi magnitudine. *Nobis.* Jambu sylvestris, fructu Cerasi magnitudine *Mus. Zeyl. pag. 68.* Catu Tsjambu. *H. Malab. part. 4. Tab. 8.* quae Jambos sylvestris montana. *Ray. Hist. part. 2. pag. 1480.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 36.* Jambosa sylvestris parvifolia, Caju Mera. *Rumph. Herb. Ambon. auctuar. cap. 6.* MAHARATAMBOLA Zeylonensibus.

JASMINUM flore tetrapetalo, IXORA *Linnaei*, SCHETTI *H. Malab. Nobis. Tab 57.* Jasminum Indicum, Lauri folio, inodorum, umbellatum, floribus coccineis. *Par. Bat. Pr. pag. 342.* *Plukn. Almag. pag. 196.* Jasminum arborescens, Indicum, flore tetrapetalo, umbellato, phoeniceo, foliis Laurinis latioribus. *Breyn. Prodr. 2. pag. 58.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 36.* Cerasus Zeylanica, humilis, sylvestris,

floribus holosericis, intense rubris, umbellatim congestis, fructibus nigris. *Mus. Zeyl. pag. 15.* Cerasus sylvestris, Zeylanica, pavonina, umbellata, latifolia, floribus coccineis, holosericis, *ibidem. pag. 36.* Cerasus Zeylanica, humilis, pavonina, flore holoserico, umbilicato. *ibidem. pag. 60.* Cerasus Zeylanica, humilis, sylvestris, Pavonina, floribus holosericis, intense rubris, umbellatim congestis. *Herb. Herm.* Flamma sylvarum peregrina. *Rumph. Herb. Ambon. auctuar. cap. 41.* quae habetur pro Schetti *H. Malab. part. 2. Tab. 13.* ut a *Plukn. in Phyt. Tab. 59. Fig. 2. Breyn. loc. cit. Ray. Dendr. part. 3. pag. 50.* quae *Hist. part. 2. pag. 1573.* vocatur Frutex baccifer, Malabaricus, fructu calyculato, rotundo, rubro, polypyreno. Si vero meam plantam ab *Hermanno* ipso in Zeylona quondam collectam, & ad *Breynium* etiam ab ipso transmissam, examinem, & cum *H. Malab.* Figura & descriptione conferam, in quibusdam differre videtur. Nostrae enim folia sunt multo longiora, angustiora, acutiora; frequentiora etiam multo ad furculos proveniunt, interpositis plurimis minoribus foliolis, quae accuratissime omnia in tabula nostra insculpi curavi. Flores *Schetti H. Malab.* dicuntur incarnati, posteaque dilutiores, flavescentes, quum nostrae plantae sunt intentissime holoserici, rubri, caeterum descriptio cum nostra satis convenit. Ejusdem certe sunt generis; an vero diversae species, an varietas illa loco tantum natali diverso sit adscribenda, non determino; pro iisdem plantis tamdiu cum reliquis habebo auctoribus, quamdiu nota magis realis observata illas non separat. RATABALA nostra Zeylonice audit, quod pronunciatum RATAMBALA, a *Rata* quod rubrum denotat, & additur ad differentiam alterius, quae est floribus holosericis, flavis. Utraque fert fructus nigros, carnosos, rotundos, Cerasorum nigrorum magnitudine & forma, Lusitanis *fructus Pavoninos* vocatos, iis enim pavones vesci creduntur, *Mus. Zeyl. pag. 15.* unde & Cerasus Pavonina saepius haec arbuscula vocata fuit ab *Hermanno*.

JASMINUM flore tetrapetalo, flavo, Bem-Schetti *H. Malab. Nobis.* Jasminum arborescens, Indicum, flore tetrapetalo, umbellato, foliis Laurinis longioribus & angustioribus. *Breyn. Prodr. 2. pag. 58.* Jasminum Zeylanicum, flore pavonino luteo *Hermanni ibidem.* Schetti album, seu Jasminum Indicum, Lauri folio, inodorum, umbellatum, floribus albicantibus. *Plukn. Phyt. Tab. 109. Fig. 2. & Almag. pag. 196.* Bem

*JASMINUM Limonii folio conjugato,
flore odorato, pleno, vario. Nobis.
39. Hyetanthus sambac L.*

Fig. 1.

Fig. 2.

*JASMINUM sylvestre triphyllum,
floribus rubellis umbellatis. Nobis.*

45. Jasminum azoricum L.

Bem Schetti. *H. Malab. part. 2. Fig. 14.* Flamma sylvarum, Diarong. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 6. cap. 53.* Jasminum forte arbo-
reum, foliis Laurinis ex adverso nascentibus, oblongis, acuminatis,
flore albo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 169. & Hist. Jam. vol. 2. Tab. 205.*
Fig. 1. Has species *Linnaeus* secundum ejus systema a Jasminis sepa-
ravit, a quibus Florum petalis & staminibus numero diversis differunt,
nomenque iis inposuit IXORAE in *Char. pl. gen. pag. 27.* cujus cha-
racterem sequenti modo ibi definit:

CAL *Perianthium* quadripartitum, minimum, erectum, persistens.

COR: *Petalum* unicum. *Tubus* cylindraceus, longissimus, tenuis.
Limbus quadripartitus, planus. *Laciniis* ovatis.

STAM. *Filamenta* quatuor, in divisuris corollae, brevissima, incurva.
Antherae oblongae.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stig-
ma* bifidum.

PER. *Bacca* subrotunda, unilocularis.

SEM. quatuor, hinc convexa; inde angulata.

JASMINUM glandiferum, foetidum, Zeylanicum, GHURAENDA Zey-
lonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 23.* vocatur a *Ghu* quod stercus humanum
notat, & *Rhaenda* quod foetorem stercoreis. est instar Clematis daph-
noidis, floribus oblongis, tubulosis, Jasmini. Hujus & alia species est
arborescens. *Mus. Zeyl.* quod an Jasminum littoreum Gamber Lant.
Rumph. Herb. Ambon. lib. 7. cap. 47?

JASMINUM Indicum, spinosum, bacciferum, lactescens, umbellatum.
Mus. Zeyl. pag. 25 & 70. Plukn. Phyt. Tab. 305. Fig. 4. KOHOMBA,
KATHUKARANDA & KATHUKARADA Zeylonensibus. a *Ka-
thu* quod spinas notat.

JASMINUM sylvestre, triphyllum, floribus rubellis, umbellatis. *Nobis. Tab.*
58. Fig. 1. Jasminum Zeylanicum, odoratum, sylvestre, bacciferum.
Mus. Zeyl. pag. 44. & Herb. Herm. Jasminum Myrsinites, triphyl-
lum, Malabarense, floribus oblongis rubellis. *Plukn. Phyt. Tab. 303.*
Fig. 2. WALPIDSCHA Zeylonensibus, quo nomine in *Ray. Dendr.*
part. 3. pag. 63. citatur Jasminum Zeylanicum, inodorum, petalis ad
umbilicum usque incis, seu bifidis, WALPITSA Zeylonensibus. *Dr.*
Hermans. S. Brouwen lib. 4. pag. 161. Sed quod subsequens magis
con-

convenire videtur. Quum haec nostra planta florum petala habeat integra, & odorata sit, cum aliis sylvestribus caeterum conveniens, caulem habens glabrum, rotundum, viridem, e quo folia opposita, tria simul communi pediculo orta, proveniunt, quae sunt oblonga, acuta, glabra, superne viridia, inferne pallidiora. Flores in ramorum summo utcunque collocantur plures simul umbellati quasi, longo prius & communi, dein suo proprio, breviori pediculo insidentes, pentapetaloides, tubulosi, odorati, rubicundi, baccas utcunque geminas post se relinquentes, ut in aliis hujus generibus.

JASMINUM Indicum, sylvestre, bacciferum, inodorum. *Mus. Zeyl. pag. 60.* an Jasminum luteum, vulgo dictum bacciferum. *C. B. Pin. pag. 398.* & *Plukn. Almag. pag. 195?* Jasminum luteum seu trifolium fruticans, aliis Polemonium *Parkins Theat. pag. 1466.* Katu-Mulla *H. Malab. part. 6. Tab. 56.* quod floribus albis differt, ÆTHAKIRINDI Zeylonensibus.

JASMINUM Zeylanicum inodorum, maximum. MAHARATAMBALA Zeylonensibus. *D. Hermans. apud Ray. Dendr. part. 3. pag. 63.* Nalla-Mulla *H. Malab. part. 6. Tab. 50. &c.*

JASMINUM Limonii folio conjugato, flore odorato, pleno, vario. *Nobis. Tab. 58. Fig. 2.* Jasminum Arabicum, folio Aurantii flore pleno. *Mus. Zeyl. pag. 32.* Jasminum Arabicum, flore roseo pleno. *Herb. Herm.* Jasminum Indicum, Mali Aurantiae folio, flore albo, pleno, minore. *Breyn. Prodr. 2. pag. 58.* Jasminum Indicum, Mali Aurantii foliis, flore albo, duplici. *H. Beaum. pag. 25.* Jasminum Arabicum, foliis Limonii conjugatis, flore albo pleno, odoratissimo *Boerb. Ind. H. L. B. part. 2. pag. 217.* Syringa Arabica, flore duplici. *Parkin. Theat. pag. 1467.* Syringa Arabica, foliis Mali Aurantii. *Par. Bat. Pr. pag. 379.* variat flore simplici & pleno, & foliis solitariis, oppositis, & etiam ternis, ut Cudda-Mulla *H. Malab. part. 6. Tab. 51.* quae ternis gaudet foliis. Nandi Ervatam minor *H. Malab. part. 2. Tab. 55.* quae flore simplici odoratissimo gaudet; & in notis Jasminum Malabaricum, foliis Mali Aurantii, flore niveo odoratissimo vocatur. ut & apud *Amm. Char. pl. pag. 483.* IDDA nostra Zeylonensibus vocatur per excellentiam, quod florem notat, quodque nomen *Nerio* infra descripto etiam inditum est, & aliis etiam plantis additur

JASMINUM Zeylanicum, folio oblongo, flore albo, pleno, odoratissimo.

Fig. Gardenia florida L.

tur saepius *Idda*, qui egregiis constant floribus. Arbuscula nostra truncum habet scabrum, cortice albo obductum, e quo caules emittuntur, unius anni cortice viridi, subhirsuto constantes, qui in hac specie folia gerunt utcunque opposita, magna, subrotunda, venosa, scabra, utrinque viridia, brevibus, sed firmis innixa pediculis. Flores in ramorum summo colliguntur plurimi, calicibus tenuissimis, profunde sectis contenti. Flos pluribus petalis, octo, novem, decem constat, varii coloris, nunc enim roseum, nunc penitus album habet colorem, prout viget, vel incipit marcescere; odor ipsi inest jucundus, & Jasmini singularis, Balsamicus, & refocillans, qui per hybernacula primo vere sese grate diffundit, unde & in Botanophilorum hortis maxime aestimatur & appetitur haec arbuscula, quum & per plurimam anni partem elegantes suos producat flores, & amoenum spargat odorem, cuius & participem me fecit Dom. Georg. Clifortius. Botanices cultor eximius. hujus generis & aliae elegantes observantur species, uti in *Catal. Horti Pisani a Dom. Tillio* duae proponuntur pag. 87. quarum una *Tab. 30.* nitide insculpta est, vocaturque Jasminum Indicum, Mali Aurantiae foliis, flore albo, pleno, amplissimo; juxta *Breyn. Prodr. 2. pag. 59.* quod cum Cudda Mulla *H. Malab. part. 6. Tab. 51.* convenit. altera *Tab. 31.* conspicitur, folio acuminato, flore stellato, majore, odoratissimo, quae species a *Tito in H. Mauroc. pag. 96.* denominata est. nos & aliam adhuc subjungemus, quae ab *Hertog* in Zeylona observata fuit, vocaturque

JASMINUM Zeylanicum, folio oblongo, flore albo, pleno, odoratissimo. *Herb. Hert. Tab. 59.* Nandi Ervatam major. *H. Malab. part. 2. Tab. 54.* quae pag. 106. in notis vocatur Syringa Malabarica, lactescens, flore pleno, niveo, odoratissimo. & *Amm. Char. pl. pag. 483.* Mougri Indorum, seu Jasminum Arabicum, folio Mali Aurantiae, flore pleno, maximo, Nandi Ervatam. *H. Malab. Amm. Char. pl. pag. 479.* an Jasminum arborescens, Lauri folio, flore albo, odoratissimo. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 17?*

Haec arbuscula lignum suum tegit cortice albicante, scabro in trunco, unde rami, qui si teneriores, virides, alias cinerei prorumpunt; folia gerentes incerto ordine, utcunque tamen bina opposita, ex nodulis simul proveniunt glabra, oblonga, acuta, superiore parte viridia, inferiore pallidiora, tenuia. Flores ex foliorum alis, ut & in summo caulium proveniunt longis in pediculis, primo communibus, dein pro-

priis infidentes, calicibus parvis, quinquefidis contenti, qui clausi, oblongi, tubulati sunt, aperti vero instar Rosae sese expandunt, coloris nivei, & odoris fragrantissimi, jucundi. In *H. Malab.* de hac notatur quod lactescat, & sub tempus, quo florum exortus instat, folia omnia decidant, novaque simul cum floribus erumpant.

JASMINUM Zeylanicum, amplissimo Coryli folio, non dentato, floribus albis, odoratis *Plukn. Amalth. pag. 122.* forte ad Jasminum Limonii folio a nobis exhibitum pertinet, vel ejus varietas est.

JASMINUM Indicum, flore coeruleo Syringhae. *Nochile* Malabaridis, *Lagondi* Malaice *Mus. Zeyl. pag. 64.* forte Jasminum, folio integro, obtuso, flore coeruleo, racemoso, fructu flavo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 169.*

JASMINUM Millefolii folio, **ÆTPAMBA** Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 60.* videtur a Quamoclit foliis tenuiter divisis diversum, quum aliud nomen Zeylonicum gerat; & illud alio loco, ac modo ab *Hermanno* citetur, & denominetur. quod infra proponitur. Jasmini characterem habet *Linnaeus* in *Char. pl. gen. pag. 3.*

IEONPALA, *Mus. Zeyl. pag. 4.* ubi dicitur; hujus duae sunt species; una a mulierculis comeditur in acetariis, loco Bliti.

INOPHYLLUM flore quadrifido. *Nobis. Tab. 60.* Kina minor. *Mus. Zeyl. pag. 46.* Tsjeru-Punna *H. Malab. part. 4. Tab. 39.* Kalophyllo-dendron Indicum, folio & fructu minore. *Vaill. act. reg. Paris. ann. 1722. pag. 283.* Calaba folio citri splendente. *Plum. nov. pl. gen. pag. 39. Tab. 18.* Cornus Malabarica, foliis Nymphaeae. *Ray. hist. pl. pag. 1537.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 23.* **HINKINA** Zeylonensibus. Inophyllum hanc vocavimus, quia folia ita sunt striata, acsi essent fibrae musculi longitudinaliter dissecti; singularis enim structurae sunt; quum a nervo longitudinali ipsius folii utrinque excurrant fibrae parallelae, vel potius striae a costa ad marginem excavatae, rectae, veluti summi artificis studio elaboratae: Folia glaberrima sunt, ovata, opposita, petalis quadragonis, ramis quadragonis infidentia, videntur esse perennia, quum satis dura & crassa sint. Petioli ex alis foliorum oriuntur communiter solitarii, trifidi, & iterum trifidi, apicibus flores sustinentes, qui sine calice sunt, tetrapetali, regulares, rosacei, staminibus numerosis cum parvis apicibus instructi, quorum pistillum simplex est & capitatum. Fructus

INOPHYLLUM flore quadrifido. Nobis.

3869. *Calophyllum Calaba* L.

*JUJUBA aculeata, nervosis foliis,
infra sericeis, flavis. Nobis.*

1571. *Rhamnus Oenopolia* L.

Fructus bacca est globosa, magna, unico ossiculo rotundo-acuminato foeta. hujus & character describitur a *Vaillant.* & *Plumier* locis citatis.

INOPHYLLUM flore octifido. *Nobis.* *Kina Mus. Zeyl. pag. 11 & 29.* *Nux Zeylanica*, oleosa, major. *Mus. Zeyl. pag. 57.* *Punna H. Malab. part. 4. Tab. 38.* *Kalophyllodendron Indicum*, folio subrotundo. *Vaill. act. reg. Paris. ann. 1722. pag. 283.* *Fooraha Flacourt Hist. Madag. p. 139. n. 115.* *Prunifera*, seu *Nucifera*, *Malabarica*, foliis *Nymphaeae*, fructu rotundo, cortice pulvinato. *Ray. hist. pl. pag. 1525.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 56.* *Arbor Indica*, *Mali Medicae* amplioribus foliis, *Maderasp.* forte *Punna H. Malab. Plukn. Phyt. Tab. 147. Fig. 3.* *Bintangor* maritima, *Bintangor Lant*, vel *Caju Maria.* *Rumph. Herb. Ambon. lib. 3. cap. 26.* ubi fructus pruniformis depictus est. **KINE** major & **KOUGHURU** *Zeylonensibus.* de quo dicitur in *Mus. Zeyl. pag. 11.* *Arbor* est inter *Canelliferas* frequens, cujus radix gummi fundit albicans, pellucidum, inodorum. Flores sunt nivei, odorati. Fructus rotundi, edules, magnitudine *Nucis Juglandis*, nucleo valde oleoso. Folia rotunda, nervis plurimis a nervo medio ad margines. *Amman.* autem in *Char. pl. pag. 533.* De *Punna* haec habet: Est *Mali* species resinosa, vix dissimilis ei, quae fundit *Gummi Gottae*, ut habet *Zanon*; sed dissimilitudo est in feminibus, quae velim conferas. Caeterum *Punna* est arbor prunifera, floribus octo petalis, racematim cohaerentibus, & fructu rotundo, sub carnosio cortice, & lignoso putamine nucleum amarum includente, succum flavum ac resinosum fundens.

JUJUBA aculeata, nervosis foliis, infra sericeis, flavis. *Nobis. Tab. 61.* *Jujuba Indica*, rotundifolia, spinosa, foliis majoribus, subtus lanuginosis & incanis. *Breyn. Prodr. 2. pag. 60.* *Paliurus Zeylanicus*, folio molli, incano. *Herb. Hert. Zizyphus Indicus*, nemorosus, foliis nervosis, subtus sericeis. *D. Garzin.* qui varias hujus mihi ostendit species, in *India Orientali* a se ipso collectas. Cum *Jujuba Indica C. B. Pin. pag. 446.* haec a *Breynio* & *Plukn. Almag. pag. 199.* jungitur. ubi plura sunt synonyma. *Perin-Toddali H. Malab. part. 4. Tab. 41.* cujus descriptio nostrae plantae satis convenit, neutiquam Figura; quae etiam non exacte est observata, nec descriptioni multum respondet. Pro **WAE LAMBILLA** *Cinghalensium* haec ab auctoribus habetur,

tur, quo nomine ELAEACHNUS supra exhibita apud *Hermannum* occurrit.

Caulis nostri fruticis est teres, erectus, hirsutus, aculeatus, e quo alternatim prodeunt folia ovato-acuminata, integerrima, supra & infra nervosa, superius tamen glabra, inferius flava, & molli hirsutie, quasi sericea tecta, ita tamen ut nervi distincte conspiciantur. Infra foliorum ortum enascitur ubique aculeus quidam brevis, reflexus, validus, acutissimus. Rami alternatim progerminant e caule ad alas foliorum, & similibus instruuntur, sed minoribus foliis, eodem modo enatis. Hic tamen in sinu foliorum enascuntur flores plurimi, minimi, in minutissimum fasciculum congesti, qui cum fructibus in *H. Malab.* bene exhibentur & describuntur.

JUJUBA Indica, spinosa, folio & fructu longiori. *Plukn. Almag. pag. 199. Ray. tom. 3. Dendr. pag. 44. Prunus Zeylanica, spinosa, folio longiore. Par. Bat. Pr. pag. 367. Prunus Zeylanica, spinosa, longiori folio, viridi, fructus ossiculo orbiculari, scrobiculis referto. Plukn. Phyt. Tab. 216. Fig. 6. an fructus peregrinus, quartus, Clusii Exot. lib. 2. cap. 30?*

JUJUBA Indica, spinosa, folio & fructu rotundo. *Plukn. Almag. pag. 199. Ray. tom. 3. Dendr. pag. 44. Prunus Zeylanica, spinosa, foliis & fructibus rotundis. H. L. App. pag. 694. Prunus Zeylanica, spinosa, folio rotundo, majore. Par. Bat. Pr. pag. 367. Prunus Indica, spinosa, sylvestris, foliis rotundis nervosis, fructu parvo, molli, Mossan. Lusitanis. Mus. Zeyl. pag. 12. ILANDA Zeylonensibus.*

JUJUBA, seu Zizyphus, Zeylanica, rotundifolia, crenata, minor, foliis subtus lanuginosis. *Plukn. Almag. pag. 199. Phyt. Tab. 197. Fig. 2. Prunus Zeylanica, spinosa, folio rotundiori minori. H. Beaum. pag. 35. Par. Bat. Pr. pag. 367. Jujuba Indica, rotundifolia, spinosa, foliis minoribus, magis viridibus; sive Oenoplia, seu Napeca Indica, foliis minoribus, magis viridibus. Breyn. Prodr. 2. pag. 60. Prunus Zeylanica HERMANNI. ibidem.*

KABALLAEJADIWA, *Mus. Zeyl. pag. 48. Lingua Diaboli Zeylonice dicitur, quia folia referunt Linguam Lacerti peregrini, squamosi, Lusitanis animal verecundum vocati, a Cinghalis autem Kaballaeja dicti. Diwa notat linguam.* KAGI-

KAGILAWAEL. *Mus. Zeyl. pag. 69.*

KALUHABURUNGHOS. *Mus. Zeyl. pag. 21.*

KALUHAMBURU. *Mus. Zeyl. pag. 67.* *Kalu* notat nigrum colorem.

KATUPAVE. *Mus. Zeyl. pag. 67.*

KAUKEN Indorum. *Breyn. Cent. 1. pag. 20. cap. 8. Mus. Zeyl. pag. 33.* Arbor Indica, Pyri folio denfiore, floribus odoratissimis. Elengi *H. Malab. Plukn. Almag. pag. 203.* Elengi invenitur in *H. Malab. part. 1. Tab. 20. quod pag. 34.* in notis vocatur Oleae adfinis Malabarica, Pyri folio, flore odorifero, stellato. pro quo etiam agnoscitur in *Ray. tom. 3. pag. 665.* & ejus descriptionem ex *Breynio.* vide in *Ray. tom. 2. pag. 1781.* MURUMAL Zeylonensibus.

KAEBABELLA. *Mus. Zeyl. pag. 70.*

KAERAEROKU. *Mus. Zeyl. pag. 6.* *Kaeku* & *Koku* notat annulum illum, quem plantae quaedam tenellae & juniores in cacumine conficiunt, ut omnes *Filicum* species faciunt.

KETMIA Sinensis, fructu subrotundo, flore pleno. *Tournef. inst. pag. 100.* Malva Indica, frutescens, flore pleno, roseo, rubro. *Mus. Zeyl. pag. 29.* Alcea Indica, hortensis, flore pleno atro-rubente, Rosae simillimo, *ibidem. pag. 61.* Alcea arborescens, Indica, hortensis, flore atro-purpureo. *Herb. Herm. Althaea arborea, rosea, Sinensis, multiplex & simplex, Moris. Hist. tom. 2. pag. 530 Tab. 18. sect. 5.* Rosa Batavica, Indica, inodora. *Bontii Hist. nat. lib. 6. cap. 46. pag. 141.* ubi mira Figura. Rosa Sinensis. *Ferr. Fl. Cult. pag. 479.* ubi melior icon & *Amm. H. Bosian. pag. 31.* de hac porro vide notas ad *Merian. insect. Surin. pag. 31.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 2.* ad Alceam arborecentem Japonicam, pampineis foliis subasperis, flore mutabili, sive colorem mutante. *Breyn. Pr. 2. pag. 10.* ubi plura invenies synonyma. Flos festalis, Bonga Raja. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 6. cap. 12.* Ain-Pariti *H. Malab. part. 6. Tab. 43.* ubi flore simplici, & Schem-Pariti *H. Malab. part. 2. Tab. 17.* ubi flore pleno exprimitur. WADDAGHAS Zeylonensibus. *Fulo de Sapatta & Foglie Sapatte* Lusitanis, hoc est flos Calceoli, quod succo florum coria tingantur. Descriptionem

nem nec Figuram addimus, quum a tot jam auctoribus sit exhibita & descripta, & ob facilem ejus propagationem, & culturam unicuique fere in hortis praesens.

KETMIA arborea, orbiculatis foliis, floribus Ephemeris, fructu pentagono. *Nobis.* Alcea arborea, Indica, foliis orbiculatis, Ketmiae floribus Ephemeris, fructu in quinque partes hiantes. *Mus. Zeyl. pag. 40.* Flos Horarius, Bonga Balitsjaja. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 6. cap. 17.* **BELIPATHAEGHAS.** Zeylonensibus.

KETMIA Ægyptia, semine moschato. *Tournef. inst. pag. 100.* quae a *Merian.* eleganter exprimitur ad *pag. 42.* Alcea Indica, magno flore, villosa, moschata, filiqua pentagona: seu Alcea moschata *Pisonis.* *Mus. Zeyl. pag. 40.* Alcea Indica, moschata, villosa, filiquis pentagonis *ibidem. pag. 48.* Althaea Indica, magno flore, semine moschato *ibidem. pag. 59.* Abel Mosch. Ægyptiacum, sive Althaea Ægyptiaca moschata. *Morif. hist. Oxon. part. 2. pag. 533.* Abel Mosch Indicum, vel Alcea Indica, magno flore, villosa, moschato semine, filiqua pentagona; *Amman. H. Bosian. pag. 1. & Char. pl. pag. 241.* qui Abel Mosch Ægyptiacum, & Abel Mosch Indicum duas facit plantas. *Catta-Gasturi H. Malab. part. 2. Tab. 38.* reliqua synonyma occurrunt apud *Tournef. pag. 100.* *Plukn. Almag. pag. 14 & 15.* *Commel. Fl. Malab. pag. 2.* & plurima apud *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 98.* ejus usum vide apud *Samuel. Dale Pharmac. pag. 306.* Granum moschatum, Gendapura *Rumph. Herb. Ambon. lib. 6. cap. 18.* **KAPUKANAESSA.** Zeylonensibus.

KETMIA Indica, flore amplo, flavo, pendulo, fructu pentagono, alato. *Nobis.* Alcea Indica, non spinosa, flore amplo, flavo, pendulo, fructu quinquangulo, alato. *Mus. Zeyl. pag. 43.* **TELAEPALA** Zeylonensibus.

KETMIA Indica, flore amplo, flavo, pendulo, unguibus holosericis, pericarpis quinque angulis. *Nobis.* Alcea Indica, non spinosa, flore amplo, flavo, pendulo, unguibus holosericis, pericarpis quinque angulis. *Mus. Zeyl. pag. 59.* Alcea Indica, non spinosa, fructu lappaceo, altera. *ibidem. pag. 66.* an Alcea arborea, Indica, villosa, quinque foliorum lobis, flore magno, sulphureo? *Plukn. Almag. pag. 14. & Phyt. Tab. 255. Fig. 2.* **KAPUAEPALA** Zeylonensibus.

KET.

KETMIA Indica, folio angustiore, acuto, flore amplo, flavo, pendulo, unguibus holosericeis. *Nobis.* Alcea Indica, non spinosa, folio angustiore, & magis mucronato, flore amplo, flavo, pendulo, unguibus holosericeis. *Mus. Zeyl. pag. 63.* eadem & *ibidem* est folio latiore, flore flavo, nitente. quae conveniunt cum Malva arborea, folio oblongo-acuminato, veluti dentato, & laeviter sinuato, flore ex rubro flavescente. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 95. & Hist. Jam. part. 1. pag. 216. Tab. 133. Fig. 1.*

KETMIA Indica, spinulosa, profunde laciniata, Acetosae sapore. *Nobis.* Alcea Acetosa, spinosa, Indica, sarmentosa, floribus amplis, pendulis, unguibus Holosericeis: Acetosa Indica *Bontii. Mus. Zeyl. pag. 65.* Acetosa Indica apud *Bontium* occurrit *lib. 6. cap. 27. pag. 114.* Alcea Acetosa, spinosa, Indiae Orientalis heptaphylla, five Acetosa Indica *Bontii. Breyn. Prodr. 1. pag. 1.* Alcea Acetosa Indica, spinosa, foliis profunde laciniatis, flore subluteo, amplo. *Breyn. Prodr. 12. pag. 9.* Althaea Indica, spinosa, Acetosae sapore, flore flavo, pendente. *Par. Bat. Pr. pag. 308.* Alcea spinosa, Maderasp. saporis acidı, foliis profunde laciniatis Cannabis in modum, pentaphylla. *Plukn. Almag. pag. 15.* quae in *Phyt. Tab. 5. Fig. 4.* exhibetur. vide & *H. L. Bat. pag. 27. & Commel. Fl. Malab. 3.* ubi cum Narinam Pulli *H. Malab.* jungitur, sed quae potius ad sequentem pertinet. NAPIRITTA Zeylonensibus.

KETMIA Indica, Gossypii folio, Acetosae sapore. *Tournef. inst. pag. 100.* Ketmia Gossypii folio, Acetosae sapore. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 2.* Althaea Indica, Gossypii folio, Acetosae sapore. *H. L. Bat. pag. 25.* Althaea Indica, Acetosae sapore. *Amm. hort. Bosian. pag. 2.* Alcea Acetosa Indica, mitis, foliis superioribus Gossypii in modum tripartito divisıs. *Plukn. Phyt. Tab. 6. Fig. 2.* Alcea Acetosa trifido folio, Indiae Orientalis. *Breyn. Prodr. 1. pag. 1. & Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 99. & Hist. Jam. part. 1. pag. 224.* ubi vide reliqua. Narinam Pulli. *H. Malab. part. 6. Tab. 44.* quae in notis Alcea Indica, spinosa, magno flore, ex albido flavescente vocatur.

KETMIA Indica, Cannabinis foliis, *Bangue* dicta. *Nobis.* Althaea Indica, Cannabinis foliis, *Bangue* dicta *Garciae ab Horto. H. L. B. pag. 26.* *Bangue* apud *Garciam* occurrit *pag. 276.* Figura, & *pag. 277. descr. Edit. Ital. in quarto. & apud Clus. cap. 54. pag. 290. & apud Acoft. p. 290.* Can-

Cannabi similis exotica *C. B. Pin. pag. 330. & Commel. Fl. Malab. pag. 17.* Bangué Cannabi simile *J. Baub. tom. 3. pag. 440. lib. 30.* Bangué *Parkin. Theat. pag. 1624.* Alcea Indica, Cannabino folio, Acetofae sapore quibusdam. *Sam. Dale Pharm. pag. 306.* qui Cannabis speciem veram esse ex *Robinson* asserit, & a quo pro Calengi-Cansjava *H. Malab. part. 10. pag. 119.* habetur. vide & *Commel. Fl. Malab. pag. 3.*

KETMIA folio quinquefido, subtus candicante, flore flavescente, semine tomentoso. *Nobis.* Althaea arbor, folio quinquepartito, subtus candicante, religiosa. *Mus. Zeyl. pag. 32.* Cudi-Pariti. *H. Malab. part. 1. Tab. 31.* quae in notis Alcea Malabarensis, pentaphylla, flore minore, ex albo flavescente, semine tomentoso, vocatur. an Novella rubra, Daun Baru Mera *Rumph. Herb. Ambon. lib. 3. cap. 30?* ubi Pariti *H. Malab. part. 1. Tab. 30.* jungitur.

KETMIA Zeylanica, Populi folio incano, flore simplici, albo. *Hart. Catal. semin.*

KETMIA Zeylanica, sempervirens, & florens, Tiliae folio, flore luteo. *Hert. ibidem.* Arbor Solis, Indica, major; seu Alcea Indica arborea, major, Tiliae folio, floribus Ketmiae ephemeris, fructibus orbiculatis, fulcatis, succum Guttae Gambae similem fundentibus. *Mus. Zeyl. pag. 45.* Althaea arbor, rotundifolia, flore roseo incarnato. *ibidem. pag. 37.* Ketmia Indica, Tiliae folio. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 2.* Ketmia Indica, Populi folio, fructu orbiculato, compresso. *Tournef. inst. pag. 100.* Arbor Solis THYRYAGHAS *Mus. Zeyl. pag. 61.* Althaea arborea, Indica, Populi folio, flore ephemero. *H. L. Bat. pag. 22.* Alcea arborea, Indica, maxima, Populi folio, flore majore, flavescente. *Breyn. Prodr. 2. pag. 10. & Commel. Fl. Malab. pag. 2. Plukn. Almag. pag. 16.* Alcea Indica, arborescens, folio Populi, vel cordiformi, flore Ephemero, ex albo flavescente. *Amm. H. Bosian. pag. 6. & Char. pl. 300.* Novella Daun Baru *Rumph. Herb. Ambon. lib. 3. cap. 28.* SURIGHAS Zeylonensibus, a *Suria* quod solem, & *Ghas* seu *Ghaha* quod arborem notat. *Poveressa* Lusitanis dicitur, de quo notatur in *Mus. Zeyl. pag. 61.* quod flores hujus arboris Solis ortu lutescant, & expandantur, occasu vero ejus rubescant, & decidant.

KETMIA Indica, Vitis folio, flore amplo, flavo. *Nobis*. Althaea Indica, Vitis folio, flore amplo, flavo, pendente. *H. L. Bat. pag. 26.* ubi icon & descriptio, & *Commel. Fl. Malab. pag. 3.* Alcea Indica, Vitis folio, flore amplo, flavescente, quinque ad singulos flores thecis, Katan-Bel-loveren. *H. Malab. part. 6. Tab. 46. Plukn. Almag. pag. 15.* Alcea Indica, non spinosa, flore amplo, pendulo, flavo. *D. Hermans. Breyn. Prodr. 1. pag. 2.* Abutilon Indicum, fronde Pampinea, fructu quinquecapsulari. *Tournef. inst. pag. 99.* Abutilon Indicum, quinque ad singulos flores thecis. *Ray. hist. part. 2. pag. 1818. &c.*

KETMIA Indica, foliis Laurinis, flore violaceo, spicato. *Nobis*. Althaea arborea, Indica, flore violaceo, purpureo, spicato. *Par. Bat. Pr. pag. 307. Mus. Zeyl. pag. 61.* Alcea Indica, arborea, pericarpio carnofo, in plura loculamenta partito. *Ray. hist. pl. part. 2. pag. 1902. & Com-mel. Fl. Malab. pag. 2.* Alcea Indica, arborescens, Lauri folio prima, seu Alcea Indica, arborescens, foliis Laurinis, subasperis, polyanthos, minor, flore purpureo, hexapetalo, petalis rotundioribus & latiori-bus, fructu minore, caudato. *Breyn. Prodr. 2. pag. 11.* Adamboe vel Althaea arborescens, Indica, flore purpureo, spicato. *Amm. H. Bosian. pag. 1. & Char. pl. pag. 247.* forte Abutilon arboreum, spicatum, flore purpureo minore, Betonicae folio incano. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 97.* Adamboe *H. Malab. part. 4. Tab. 20 & 21.* **MUR TUGHAS** Zeylonensibus.

KETMIA Zeylanica, Fici folio, perianthio oblongo, integro. *Dillen. H. Elth. pag. 190. Tab. 157.* Ketmia Indica, humilis, folio dissecto, aspe-ro, flore parvo, candido, instar Jasmini Hispanici explicato, purpu-rascente. *J. Ph. Breynii ibidem &c.*

KETMIA Zeylanica, virens, pilosa, annua, flore sulphureo, umbone atro-purpureo. *Alb. Sebae rer. nat. thes. part. 1. Tab. 18. Fig. 3. & pag. 27.* ejus descriptio. Hujus generis characterem dedit *Linnaeus in char. gen. pl. pag. 207.*

KORRACA congener. *Mus. Zeyl. pag. 70.*

LACHRYMA JOBI. *H. Eyst. Aestiv. ord. 13. Fig. 1. pag. 6. Clus. Hist. CCXVI.* Lachryma Jobi Indica, Salee. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 28.* Miliun Solis, seu Lithospermum Indicum Bontii, &
S
Litho-

Lithospermum arundinaceum, forte Dioscorid. & Plinii *Mus. Zeyl. pag. 29.* & *C. B. P. pag. 258.* Milium Solis *Bontii pag. 152.* Lachryma Jobi multis, five Milium arundinaceum *J. Bom. tom. 2. lib. 18. pag. 449.* Milium arundinaceum, femine Lithospermi facie, maximo, durissimo. *H. L. Bat. pag. 426.* &c. KARAEBU Zeylonensibus.

LACHRYMA Jobi gramineis foliis, in capreolos desinentibus. *Nobis.* Lithospermum Indicum, arundinaceum, foliis gramineis in capreolos desinentibus. *Mus. Zeyl. pag. 30.*

LACHRYMA Jobi Zeylanica, omnium maxima, *Nobis.* Lithospermum maximum arundinaceum, Zeylanicum. *Mus. Zeyl. pag. 40.* Catri-Conda *H. Malab. part. 12. Tab. 70.* Lachryma Jobi altissima, Arundinis folio & facie. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 11.* quae a *Merian. Insect. Surin.* exprimitur ad *pag. 54.*

LACHRYMA Jobi paludosa, minor, *Nobis.* Lithospermum Indicum, arundinaceum, paludosum, minus. *Mus. Zeyl. pag. 65.* Lithospermum Cyperoides, arundinaceum, minus paludosum. *ibidem. pag. 71.* Lithospermum Ambonicum, Salecutan *Rumph. Herb. Ambon. lib. 10. cap. 16.* KARABU Zeylonensibus.

LAMIUM angustifolium, glabrum, Zeylanicum, flore albo. *Mus. Zeyl. pag. 1.* Videtur esse Leonurus annuus, angustifolius, flore albo. *ibidem.* TUMBAKOLA & WALKARALHAEBO ad differentiam illius, quod in hortis nascitur, Zeylonensibus vocatur. *Wal* enim sylvestre notat.

LAMII rubri similis Malabarica, radice glandulosa, eduli, Kurka *H. Malab.* INSALA Zeylonensibus dicta. *Plukn. Amalth. pag. 129.* Kurka *H. Malab. part. 11. Tab. 25.* exprimitur.

LATHYRUS Zeylanicus, odorato flore, amoenè ex albo & rubro vario. *Nobis.* Lathyrus Zeylanicus, hirsutus, flore variegato, odorato. *Herb. Hart.* floris tantum varietate haec planta a Lathyro odorato *Cupani* differt, quem, quia in *H. Amst. part. 2. pag. 159. Fig. 80.* bene descriptus & expressus est, hic non ulterius exhibemus, quum & omnibus insuper notae sunt hae plantae, eo quod frequentissime in nostris occurrant hortis.

LATHY-

*LAURUS ferrata, floribus spicatis, ex
foliorum alis proventibus. Herb. Herm.*

LATHYRUS Zeylanicus, flore rubro, pulchro, filiquis Pisi. *Breyn. Prodr.* 1. apud *Ray. hist. pl. pag. 1891.*

LAURUS ferrata, floribus spicatis, ex foliorum alis provenientes. *Herb. Herm.* quae exprimitur *Tab. 62.* *Laurus Zeylanica*, foliis serratis, floribus in spicis parvis ad exortum foliorum provenientes. *Herb. Hart.* **MENDYA** Zeylonensibus.

Arbor haec est Cerasi effigie, ramos superiores rubros spargens, e quibus folia alterna, satis remota exeunt ovato-lanceolata, ferrata, laevia, venosa, venis conveniens cum Ceraso sylvestri; Petioli similiter eodem modo exeunt, flores sustinentes in racemum collectos plurimos, parvos. Unusquisque petiolus, qui communiter solitarius ex singula folii ala exit, est sesquiuncialis, erectus, flores albos gerens, quorum calix est unifolius, quinquedentatus, petala quinque subrotunda, stamina viginti, vel plura, pistillum unicum, capitatum. Fructus est bacca coronata a calice, unde ad Myrtum accedit, quum habeat fructum infra calicem umbilicatum. Ex hac arbore resina odorata colligitur, quae utilissima ad Paralyfin. &c.

LENS PHASEOLOIDES foliis subrotundis, oppositis, flore spicato, pentapetalo, lobis latissimis, fructu orbiculato, fusco. *Nobis.* *Lens Phaseoloides*, maxima, Indica, Cassiae foliis, semine maximo, cordiformi. *Breyn. Prodr. 2. pag. 63.* *Phaseolus alatus*, Indicus, fructu fusco, orbiculato, maximo, lobis latissimis & longissimis. *H. L. Bat. pag. 494. Par. Bat. Pr. pag. 365.* *Phaseolus maximus*, perennis, folio decomposito, lobo maximo, contorto, *Perim-Kaku-Valli H. Malab. Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 68.* *Phaseolus Zeylanicus*, maximus, folio Lentisci. *Mus. Zeyl. pag. 44.* *Phaseolus lobis amplis, longis, geniculatis, fructu maximo, orbiculari, fusco, splendente, an Pararar Clusii ibidem?* *Phaseolus utriusque Indiae, arboreus, alatis foliis, fructu magno, cordiformi, lobis longissimis, nodosis, plerumque intortis. Plukn. Almag. pag. 295.* ubi reliqua vide & *Perim-Kaku-Valli H. Malab. part. 8. Tab. 32, 33 & 34.* ubi consule notas. **PUSAETHA** & **PUSWAEL** Zeylonensibus.

LENS PHASEOLOIDES bifolia, fructu orbiculato, fusco, lobis minoribus. *Nobis.* *Phaseolus Indicus, alatus, fructu fusco, orbiculato, maximo, lobis minoribus. Mus. Zeyl. pag. 69. Par. Bat. Pr. pag. 365.* *Phaseo-*

lus major, Fabae purgatricis nomine missus, Cor Divi Thomae quibusdam. *Clusii Comment. ad Monard. pag. 365.* Faba purgatrix, latissima, ex insula D. Thomae. *C. B. Pin. pag. 338.* item arbor filiquosa, Juglandis folio, Brasiliana, lobo longissimo, Acaciae filiquae instar distincto. *C. B. P. pag. 404.* Phaseolus novi orbis, seu Faba purgatrix, latissima, Cordis Figura. *J. B. tom. 1. lib. 12. pag. 438.* *Plukn. Almag. pag. 295. Phyt. Tab. 211. Fig. 6.* HINPUS Zeylonensibus.

LENTIBULARIA Zeylanica. *Nobis.* est Millefolium galericulatum. *Ray. Mus. Zeyl. pag. 9.* Millefolium palustre, galericulatum. *Ray. Meth. pl. auct. & emend. pag. 92. & Hist. pl. pag. 1322.* Millefolium aquaticum, flore luteo, galericulato. *Parkins. Theat. Botan. pag. 1258. J. B. tom. 3. lib. 38.* Lentibularia Rivini ord. pl. irreg. monop. ubi elegans Figura. hujus nota characteristica juxta *Rayum* est, Flos in duo segmenta divisus, quorum superius galeae, inferius labelli lati figuram obtinet. Capsula feminalis est subrotunda, unum intus semen continens; reliqua vide apud *Dillen. in novis plant. gener. pag. 115.* & *Linnaeum in char. plant. gen. pag. 5.* ad UTRICULARIAM. hujus minorem speciem habet *Plukn. in Phyt. Tab. 99. Fig. 6.* vocans Millefolium palustre, galericulatum, minus.

LEUCAS foliis rotundis, ferratis, flore albo. *Nobis. Tab. 63. Fig. 1.* Lamium rotundifolium, album, Zeylanicum, odoratum. *Herb. Herm.* Lamium Indicum, foliis oblongis, flore albo, graveolens. *Mus. Zeyl. pag. 65.* GHAETHATUMBA Zeylonensibus.
a Lamio hanc separavimus, quum hujus calix sit tubulatus, ore decedentato, adeoque quoad calicem cum Marrubio convenit, sed labio superiore cochleato a Marrubio differt, quod integrum est, inferius vero labium oblongum, ad latera sinuatum, aut emarginatum, quatuor habens stamina cum apicibus, pistillum unicum, bifidum. Caulem caeterum gerit haec planta quadrifidum, scabrum, viridem; folia ad caulem bina opposita, ad decussim provenientia, pediculis semiuncialibus insidentia, ubi autem rami e caule progerminant, uncialis est longitudinis pediculus; Folia haec sunt glabra, viridia, venosa, subrotunda, in ambitu ferrata; Flores ex eorum alis proveniunt utcunque gemini; calice longo, tubuloso contenti; qui cum floribus jam supra descriptus est.

LIGU-

Fig. 1.

*LEUCAS foliis rotundis,
serratis, flore albo. Nobis.*

Fig. 2.

*LYSIMACHIA erecta, caule
ter tripartito. Nobis.*

LIGUSTRUM foliis ad singula internodia ternis, Lignum Colubrinum officinis creditum. Nobis.

7631. *Ophioxylon serpentinum* L.

LIGUSTRUM foliis ad singula internodia ternis, *Lignum Colubrinum* officinis creditum. *Nobis. Tab. 64.* Clematis Indica, Persicae foliis, fructu Periclymeni. *C. B. Pin. pag. 304. Mus. Zeyl. pag. 4.* Lignum Colubrinum primum, & laudatissimum, *Garziae ab Horto Hist. aromat. pag. 163. & Herb. Herm.* ubi dicitur, quod perperam *Garzias* asserat vocari *Rametul* ab incolis, quum vocetur **ACA WERYA** & **EKA WERYA** a Zeylonensibus. De Ligno Colubrino vide *Clus. lib. 1. Aromat. cap. 44.* a *Rumphio in Herbar. Ambon. lib. 2. cap. 46.* breviter hoc lignum juxta *Hermannum* describitur, dicitque quod *Hermannus* **EKA WERYA** vocet, & pro Clematitide Indica, Persicae folio, Caprifolii fructu habeat, huic porro pro Synonymo jungens primam speciem *Garziae lib. 1. cap. 44. & Acoft. cap. 33. & Philipp. Baldei lib. 2. cap. 49. Histor. Ceylon.* *Rumphius* porro in illo capite aliud *Lignum Colubrinum*, a nostro penitus diversum, depingit & describit, quod fructus rotundos gerit, vocaturque ab ipso *Lignum Colubrinum*. **CAJU ULAR** cap. 46. Radix serpentum **EKA WERYA** dicta. *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 116.* ubi haec sequuntur: Vocatur a Cinghalensibus *Rametul*. Pulcherrima planta est, in altum exsurgit cum ramis tenuibus, & cum foliis longis, & acuminatis, cum parvis raris, fructibus, qui sunt racemi simul conjuncti. Radix discurrit in modum serpentum cum nodis sub terra, valde lignosa est, alba, fusca, cum cortice coloris cinerei & saporis amari. Haec est prima species, quam *Garzias ab Horto* inter Ligna serpentum describit. Vires ejus non minores sunt, quam eae, quas magna Serpentum arbor possidet. Incolae plurimum eam extollunt contra omnia Venena, & venenosos morbos. Contritam eam exhibent usque ad Semi drachmam, & amplius.

Inquiritur a *Samuel Dale in Pharmacol. pag. 440.* an hoc sit Lignum Colubrinum verum officinarum, & idem, quae Nux Vomica minor; quod est Solanum arborescens, Indicum, foliis Napecae minoribus, fructu rotundo, duro &c. *Breynii.* quas ego diversas puto species, licet earum lignum pro *Ligno Colubrino* habeatur, & utraque in Zeylona insula crescant. Prioris synonyma data sunt, & est lignum Colubrinum primum *Garziae*, posterioris synonyma ad *Nucem Vomicam* exhibebuntur infra, cujus lignum, pro tertio Ligno Colubrino *Garziae* & *Acoftae* habetur, ita ut diversae sint plantae.

Hujus nostrae caulis est trigonus, articulatus, striatus; folia ad singulum

gulum articulum tria, oblongo-acuminata, integra, nec ferrata, quo a Perficæ foliis differunt, cum qua alias figura satis conveniunt, petiolis parvis innixa. In apice caulis oriuntur flosculi plurimi, veluti ac in umbella congesti; qui sunt in fundibiliformes, pentapetaloides, calicibus parvis, quinquefidis instructi, duo habentes stamina cum unico pistillo; quod deinde abit in fructum subrotundum, semibifidum, bilocularem, continentem in singulo loculo semen unicum subrotundum: unde ambigit inter **LIGUSTRUM** & **LILAC** *Tournefortii*.

LIGUSTRUM Indicum, seu *Alcanna* *Mus. Zeyl. pag. 65.* an *Poutaletsje* *H. Malab. part. 4. Tab. 572.* quæ *Ligustri* species. *Commelin. in notis ibidem.* & *Baccifera Indica*, baccis oblongis, in umbellæ formam dispositis. *Ray. hist. pag. 1634.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 12. &c.* **MANITHONDI** Zeylonensibus.

LILIO-NARCISSUS Zeylanicus, latifolius, flore niveo, linea purpurea striato. *H. Amst. part. 1. pag. 73.* *Lilio-Narcissus* *Zeyl. latifolius*, flore niveo, externe linea purpurea striato. *Amm. Char. pl. pag. 485.*

LILIO-NARCISSUS Indicus, flore albo, hexagono. *Plukn. Almag. pag. 220.* *Narcissus hexagonus*, Zeylanicus, flore odorato, albo. *Par. Bat. App. Narcissus Zeylanicus*, flore albo, hexagono, odorato. *H. Amst. part. 1. pag. 75.* & *H. L. Bat. App. pag. 691 & 693.* ubi icones & descript. *Narcissus Zeylanicus*, flore albo, hexagono, odorato, **LUNULA** indigenis dictus. *Amm. Char. pl. pag. 484.* *Ray. hist. pl. pag. 1904.* *Commel. Fl. Malab. pag. 46.* hujus major & minor species est, & bulbo rotundo, & oblongo; uti videre est in *Mus. Zeyl. pag. 61.* *Lilium Indicum*, *Casse Zelan. Rumph. Herb. Ambon. lib. 11. cap. 47.* *Pancratii* nomine indigitavit hanc familiam *Clariss. Dillen. in H. Elth. pag. 299.* ubi notas vide characteristicas, *Catulli-Pola. H. Malab. part. 11. Tab. 40.* **WALLUNU**, **LUNALA** & **LUNA** Zeylonensibus vocatur.

LILIO-NARCISSUS maximus, Zeylanicus, floribus albis, umbellatis, *Plukn. Almag. pag. 219.* *Lilium Zeylanicum*, umbellatum, bulbiferum, minus. *Mus. Zeyl. pag. 55.* *Lilium Zeylanicum*, bulbiferum & umbelliferum. *H. L. Bat. App. pag. 683.* ubi *Figura* & descriptio, & *Ray. hist.*

*PARONYCHIA foliis ad
genicula confertis, acutis,
floribus umbellatis. Nobis.
1658. Achyranthes corymbosa L.*

*LIMONES pumili, Zeylanici, sylvestres, DEHIGHAHA Zeylonensibus. Mus. Zeyl.
3052. Limonia monophylla L.*

hist. pl. pag. 1905. Belutta-Pola-Taly: *H. Malab. part. 11. Tab. 38.* quae Lili Zeylanici umbelliferi & bulbiferi conspecies. *Commel. in not. & Fl. Malab. pag. 41.* TANGHEKOLLI TOLABO minor, & WALTOLABO Zeylonensibus. Unde & hujus major, & minor habetur species.

LIMONES pumili, Zeylanici, sylvestres, DEHIGHAHA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 40. & Herb. Herm. exprimitur Tab. 65. Fig. 1.* Arboris hujus caulis est teres, laevis, lignosus; folia sunt acuta, crassa, venosa, integerrima, alterna, petiolis brevissimis insidentia; infra foliorum exortum spina enascitur acutissima, & fasciculus florum parvorum, decem aut duodecim simul, quibus succedunt fructus: Differt haec a subsequenti, foliis solitariis, alternis, quum illa habeat folia conjugata, nec flores ita in fasciculum collectos; nomine Zeylonico etiam penitus distincta.

LIMONIA Malus, sylvestris, Zeylanica, fructu pumilo; an Limones sylvestres, non majores ovo Columbino circa Cairum Bellonii? *Mus. Zeyl. pag. 63.* Malus Limonia, Zeylanica, fructu pumilo, *ibidem. pag. 68.* Limonellus, Limon Nipis. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 2. cap. 39.* Malus Limonia, Lentisci folio, Zeylanica, fructu minimo, Uvarum magnitudine aemulo. *Plukn. Almag. pag. 239. & Mantiss. pag. 57.* Limones sua specie pusilli in Indiae insula Zeylan. *Hist. Lugdun pag. 1838. & apud Plukn. Mantiss. pag. 125.* Malus Limonia, Indica, fructu pusillo. *Ray. hist. pag. 1658. & Commel. Fl. Malab. pag. 42.* Malus Aurantia, fructu Limonis pusillo, acidissimo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 211.* ubi plura habet synonyma, & *Hist. Jam. part. 2 pag. 182.* Catu-Tsjeru-Naregam. *H. Malab. part. 4. Tab. 12.* ubi in notis. Malus Limonia, pumila, sylvestris, Zeylanica D. HERMANNI, quod a *Plukn. in Mantiss. pag. 57.* jungitur cum Coru Indorum, Mali aureae foliis, floribus albis; Parencoruttee Malabarorum. vide & *Petiv. act. Londin. vol. 22. no. 271. pl. 107.* ubi Coutree Malabaris dicitur &c. WALHEDI & JAKUAWA Zeylonensibus.

LINARIA minima, Zeylanica. *Mus. Zeyl. pag. 31.*

LOTUS Zeylanica, rubra, filiqua rotundiore, habitu Ericae. *Hert. Catal. semin.*

LOTUS

LOTUS Zeylanica, minutissimis foliis, floribus minimis, purpureis. *Hert. ibidem.*

LYCHNIS Indica, sylvestris, viscosa, floribus tenellis, rubris. *Hert. ibidem.*

LYCHNIS Indica, sylvestris, flosculis tenellis, albis. *Mus. Zeyl. pag. 11.* an *Lychnis sylvestris*, minima, angustifolia, procumbens, flore ex albido virescente? *Plukn. Almag. pag. 230.* ubi vide reliqua. **WISADULI** Zeylonensibus, a *Wissa*, quod dolorem denotat, & inflammationem, quam *Colubris* morfu causavit. *Duli* notat pulverem subtilissimum, aut rem aliquam levem, a quolibet levi vento mobilem: accepit forte hoc nomen, quod hujus pulvis loco dolenti, & a morfu *Colubris* inflammato inspersus, inflammationem tollat, partemque affectam curet.

LYCHNIS articulata, repens, folio Vincae Pervincae. *Mus. Zeyl. pag. 61.* *Lychnidifolia. ibidem. pag. 13.* **MAHANAYKOLA**, aliis **PURUCWAEL** & **PURUKUWAE**L. a *Puruku* quod notat articulum, seu geniculum plantae; cauliculi enim articulati sunt.

LYCOPODIUM Zeylanicum, erectum, ramosissimum. *Nobis. Tab. 66.* Muscus terrestris, Zeylanicus, erectus, seu *Lycopodium Zeylanicum*, *Mus. Zeyl. pag. 36.* Muscus erectus, ramosus, terrestris, Zeylanicus, sempervirens. *Herb. Herm.* non multum abludit a Musco maximo, Coridis folio, viticulis valde ramosis. *Plumier Tab. 165. lett. A.* Quum autem spicae florum in nostra planta desiderantur, nec adeo ea excreverit; incertum est determinare, ad quamnam proprie speciem pertineat: Caeterum caulis ejus est bipedalis, foliolis sparsis, acerosis fere tectus, quae inbricatim incumbunt, sed quoad insertionem satis remota sunt: e caule hoc descripto prodeunt sparsim rami plurimi, qui iterum in ramos dividuntur tenuiores; quorum folia ab ipsius caulis non differunt magnitudine, sed tantum, quod confertiora sint; uno verbo est medium inter *Lycopodium Sabinae* facie; & repens, vulgatissimum Officinarum.

LYCOPODIUM denticulatum, minus, Zeylanicum. *Nobis.* Muscus denticulatus, Zeylanicus, minor. *Mus. Zeyl. pag. 29.* Muscus denticulatus minor,

LYCOPodium Zeylanicum, erectum, ramosissimum. Nobis.

7971. *Lycopodium cernuum* L.

*LYSIMACHIA folio sinuato, acuminato, trinervio, flore
coeruleo, amplo, calice carinato, alato. Nobis.*

1513. *Chironia trinervia* L.

minor, Guianensis, seu Planta muscosa, & plumosa, Guianensis, perelegans, minor. *Breyn. Cent. pag. 194. Plukn. Almag. pag. 247.*

LYCOPodium Zeylanicum, erectum, foliis crassioribus, & magis compressis. *Nobis.* Muscus Zeylanicus, arboreus, clavatus, foliis crassis, rotundis, Lycopodii fructu compresso. *Mus. Zeyl. pag. 38.* Muscus Zeylanicus, erectus, perpetuo virens, in arboris proceritatem excrecens. *Plukn. Tab. 47. Fig. 9.* Planta muscosa, & plumosa, Guianensis, major. *Breyn. Cent. pag. 194.* Muscus Zeylanicus, terrestris, clavatus, erectus, **BADALWANASSA** *Hermanni*: an Belam Patsja. *H. Malab. part. 12. Tab. 39?* apud *Moris hist. pl. part. 3. pag. 624. Sect. 15. Tab. 5. Fig. 6.* & *Ray. hist. tom. 3. pag. 33.* a *Dodart* sequenti modo describitur: Pedale & erectum est exemplar a *Cl. Hermanno* nobiscum communicatum, in varios ramusculos divaricatum, qui rursus in alios dividuntur; ad quorum singulam terminationem clava parva, sublutea, quadrantem unciae longitudine non superans, adnata est. Ita ut primi nostri tantum sit varietas, ac foliis crassioribus, magisque congestis ab illo differat; ut ex allegatis Figuris facile constat.

LYSIMACHIA folio sinuato, acuminato, trinervio, flore coeruleo, amplo, calice carinato, alato. *Nobis. Tab. 67.* Cistus Zeylanicus, folio conjugato, flore coeruleo, in umbellam posito. *Herb. Hart.* huc spectat Cistus Chamaerhodendros, Mariana, Laurifolia, floribus expansis, summo ramulo in umbellam plurimis. *Plukn. Mantiss. pag. 49.* & Cistus folio oblongo, integro, glabro, subtus albido, vasculis trigonis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 86.* & *Hist. Jam. part. pag. 18. Tab. 4. Fig. 1.* quod est Hypericum, seu Androsaemum magnum, Canariense, ramosum, copiosis floribus, fruticosum. *Plukn.-Phyt. Tab. 302. Fig. 1.* Nostra planta caulem habet laevem, fungosum, cinereum, medulla albicante repletum, sulcatum, quadrangularem, in quatuor, vel plura internodia distinctum. Folia huic sunt opposita ad articulos, ovato-acuminata, glabra, sinuata, utrinque integerrima, sessilia, trinervia. Flores in summo ramorum gerit elegantes, coeruleos, expansos, utcunque sex; petiolis erectis, simplicibus, raro ramosis insidentes, qui calicem habent quinquefolium, foliis lanceolatis, cum carina in singulo folio alata; cujus petalum est unicum, rotatum, tubo, longitudine calicis, limbo quinquefido, amplo, laciniis, ovatis, patentibus.

T

Stamina

Stamina sunt quinque, erecta, petalo breviora; Pistillum unicum, embryo ovato, stylo longitudine staminum; stigmate capitato, incurvo. Fructus capsula est ovata, unilocularis, apice dehiscens; hinc non est *Cistus*, cui florum petala quinque, caduca, & stamina multa; calix quidem quinquefolius, sed in illo duae lacinae minores adfunt.

LYSIMACHIA erecta, caule ter tripartito. *Nobis. Tab. 63. Fig. 2.* *Lychnis Indica*, *Gentianae foliis*, febrifuga, **GIRITILLA** Zeylonensibus. *Petiv. Mus. no. 657. & Act. Phil. Lond. vol. 22. num. 264. pl. 21.* *Lyfimachia Indica*, glabra, dentata, angustifolia, *Mus. Zeyl. pag. 57.* *Gentiana fugax*, Zeylanica, radice fibrosa. *Amm. Char. pl. pag. 404.* *Lychnis Gentianae foliis*, Zeylanica, florum petalis mucronatis, capsula pyramidali. *ibidem.*

Humilis haec est planta, ex radice brevi, fibrosa, albicante proveniens, caule spithamali, erecto, tetragono, albido; in medio autem dividitur caulis in tres partes, singula pars iterum tripartitur, & adhuc tertia. Flores terminant caules, & ad eorum ortum, ut & ad divaricationem caulis oriuntur folia opposita, lanceolata, integra.

Flos hujus plantae componitur ex calice quinquefido, parvo, petalo quinquefido rotato, staminibus quinque erectis; pistillo unico, simplici, quod abit in capsulam pyramidalem, unilocularem, semina plurima continentem. Ex communicatione *Joh. Fred. Gronovii* hanc plantam exhibemus.

LYSIMACHIA Zeylanica, caule quinquangulo, floribus incarnatis. *Mus. Zeyl. pag. 65.*

LYSIMACHIA Zeylanica, pratensis, flore galericulato, incarnato, radice crocea. *Mus. Zeyl. pag. 65. an Cassida?*

LYSIMACHIA Indica, aquatica, glabra, flore flavo, siliqua angulosa, stellata, **DYANILLA** Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 66.* *Chamaenerii*, ut videtur, haec species est.

LYSIMACHIA Zeylanica, spinosa, flore luteo, magno. *Hert. Catal. semin.*

LYSIMACHIAE species, fructu Caryophylloideo, **KIKIRINDIA** Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 17.* *Lyfimachia Indica*, non papposa, repens, flore pentapetalo, fructu Caryophylloide. *Ray. hist. pag. 1510.*
&

& *Commel. Fl. Malab. pag. 41.* Nircarambu. *H. Malab. part. 2. pag. 99.* huc spectat *Lyfimachia lutea*, non papposa, erecta, minor, flore luteo, pentapetalo, fructu *Caryophylloide*. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 85.* & *Hist. Jam. vol. 1. Tab. 128. Fig. 2 & 3.* Herba Vitiliginum Sajorum. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 10. cap. 35.* KIKIRINDIA Zeylonensibus vocatur, id est succo ex viridi atrescente donata. Vocatur quoque BRUNGA, MARKAKO ANGHARACO. HAEMARAGHO & KARARANGHINA in *Mus. Zeyl. pag. 17.* ubi additur: Planta est humilis, ramosa, fructu *Caryophyllum* aemulante. Frigida est herba in tertio gradu, inprimis oculorum medicina.

MALUS Indica, fructu pentagono, BLIMBI dicta. *Ray. hist. pl. pag. 1449.* *Commel. Fl. Malab. pag. 42.* Mala acida. *Mus. Zeyl. pag. 19.* Mala Malabarica, acida, oblonga, *Billinbing Bontii. ibidem. pag. 54.* ubi notatur. Icon *Bontii lib. 6. cap. 42.* non quadrat, nec fructus, quos iconi apposuit, ideoque merito explodenda est figura. Prunum stellatum BLIMBING. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 1. cap. 30.* ubi cap. 31. *Blimbingium* teres etiam depingit & describit. ut & *Blimbingium sylvestre*, *Blimbing Utan.* in *lib. 6. cap. 79.* *Blimbi H. Malab. part. 3. Tab. 45 & 46.* Caranbola parva Indiae Orientalis. *Plukn. Mantiss. pag. 36.* *Blimbi Amman. H. Bosian. pag. 6. & Char. plant. pag. 294.* ubi haec habet: Est *Malus Indica*, fructu penta- vel hexagono, floribus pentapetalis, racematim caudici vel ramis lignosis adhaerentibus, foliis pinnatis. BILLINGHAS & BLIN Zeylonensibus in *Mus. Zeyl.* ubi dicitur, quod fructus gerat teretes, oblongos, carnosos, virides, substantia Cucumeribus non dissimiles, sapore grato, acido. Semina continet plana, rotunda, depressa, ut fere *Cucumeris*. haec quoque est Arbor BILLINGHBINGH dicta. *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 110.* ubi sequenti modo describitur. Pulcherrima est arbor; Fructus habet virides, angulatos & oblongos, qui succum acidum continent. Crescit ab infima parte stirpis usque ad apicem per omnes nodos & ramos modo mirabili, & jucundissimo. Succus istorum pulchrum nobis praebet Syrupum in morbis calidis, in febribus, in Hepatis, aut aliarum partium inflammationibus. Variis modis convenit in morbis biliosis, ex quo & per Baln. Mariae aqua valde refrigerans potest destillari. Flores, qui rubicundi, aut violacei sunt coloris, contra morbos supra dictos, immo adversus alios plurimos affectus pulcherrimam suppeditant Conservam.

MALUS Indica, fructu parvo, rotundo, acido, striato. *Nobis.* Mala Zeylanica, parva, rotunda, acida, striata. *Mus. Zeyl. pag. 55.* Neli Pouli. *H. Malab. part. 3. Tab. 47 & 48.* ubi in notis Bilimbi altera minor vocatur. & *Commel. Fl. Malab. pag. 16.* NELLI & NELLIKA. Zeylonensibus. *Tschirimelle* Lusitanis.

MALUS Indica, foliis Sennae Occidentalis, fructu acido, flavo, pentagono, sulcato, floribus rubris. *Herb. Hert.* Malus Indica, fructu acido, flavo, pentagono, sulcato. *Mus. Zeyl. pag. 19.* Malus Indica, pomo anguloso, *Carambolas* dicta. *Ray. hist. pag. 1449.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 42.* Mala Goensin, fructu octangulari, pomi vulgaris magnitudine. *C. B. Pin. pag. 433.* sed errat *Casp. Bauhinus*, quum sint pentagoni fructus, ut recte jam monuit *Commel.* in notis ad *H. Malab. part. 3. Tab. 43 & 44.* ubi Tamara-Tonga vocatur. vide & *Plukn. Almag. pag. 238.* & in *Mantiss. pag. 36.* vocatur Carambola Malabarorum, Tamaratonga *H. Malab.* Carambolas *Acoftae* apud *Clus. cap. 47. pag. 286.* & *Garziam ab Horto lib. 2. cap. 15.* & *Acoft. cap. 47. in edit. Ital. pag. 191.* ejus figura exstat. & *Parkins Theat. pag. 1637.* & *Bontium lib. 6. cap. 11.* *Amman. Char. pl. pag. 581.* & *H. Bosian. pag. 7.* KAMARANGA Zeylonensibus, a *Ka* quod notat quodvis edule; & *Maranga* pessundare; creditur enim ab incolis hujus lignum secum gestatum, aut in cubiculo fervatum, valere ad omnis generis venena, quae a veneficis struuntur: hinc & ex hac materia conficiunt vaginas, in quibus gladios & cultros, quos secum gestant semper, custodiunt. *Mus. Zeyl. pag. 19.* Arbor CARAMBOLOS dicta a *Grimm. in Labor. Ceyl. pag. 111.* vocatur. ubi sic describitur: Jucundissima est arbor; fructus ejus paulo majores sunt, quam illi, quos *Billinghbingh* nobis profert: oblongam habent formam, & angulosam, ut plurimum quinque angulorum, habent etiam in se liquorem subacidum, non tamen adeo jucundum, ut ipsa *Billinghbingh*, cum quo convenit viribus, & flores nobis etiam Conservam praebent &c.

Hujus figuram, nec ulteriorem descriptionem addimus, quum a variis jam bene descripta, & in *H. Malab.* ejus egregia insculpta est Figura, in omnibus nostrae plantae penitus conveniens; cujus descriptioni addo; quod hujus flores sint quinquefidi; calix quinquefolius, stamina decem, & pistilla tria.

MALVINDA Ulmifolia, flosculis pusillis, mucosis confertis. Nobis.

4913. *Walteria indica* L.

MALVINDA bicornis, Ballotes folio. *Dillen. H. Elth. pag. 211. Tab. 171. Fig. 209.* Alcea Zeylanica, foliis Althaeae, flore lutescente, femine duplici arista donato. *Herb. Hert.* Alcea Indica, molli, & hirsuto, seu lanuginoso folio, feminibus duplici, & nonnunquam triplici arista donatis. *Mus. Zeyl. pag. 2.* Althaea Indica, Carpini foliis, flore luteo, feminibus duplici rostro donatis. *ibidem. pag. 69.* Althaea Maderasp. subrotundo folio, molli & hirsuto, multipilis, sive feminibus ad apicem crinitis. *Plukn. Phyt. Tab. 131. Fig. 2.* Katu-Uren *H. Malab. part. 10. Tab. 54.* quae est Malva minor, erecta, Betonicae folio, flore luteo, femine duplici rostro, seu aculeo praedito. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 96.*

KAPUAEPALA & KAESURUBAEWILA Zeylonensibus. Planta, quam ex *Herb. Hart.* servo, multo rotundiora habet folia, quam illa *H. Elth.* quae optime & accuratissime juxta vivam depicta est, & differunt forte per locum natalem varium. *Pluknetii* vero, quae ad siccam est insculpta, cum nostra, quae in Zeylona crevit, maxime convenit, unde & ejus Figuram non damus, nec etiam descriptionem, quum in *H. Malab.* accurate satis sit descripta. *Tournefortius* has ad *Malvas* retinuit, vocaturque ab eo Malva Ulmifolia, femine cum gemino rostro. *in Inst. pag. 69.* quam jungit cum Alcea Virginiana, Carpini folio, flosculis minimis luteis, femine duplici rostro, seu aculeo praedito. *Morif. Hist. Oxon. part. 2. pag. 518.*

MALVINDA Ulmifolia, flosculis pusillis, muscosis, constipatis. *Nobis. Tab. 68.* Malva Ulmifolia, femine cum gemino rostro, floribus racemosis. *Tournef. inst. pag. 96.* Alcea Zeylanica, Carpini folio, flosculis fasciculatim congestis. *H. L. Bat. pag. 13.* quam vide supra ad *Alceam pag. 10.* Althaea folio viridi, flosculis parvis, muscosis, racematim dense stipatis. *Mus. Zeyl. pag. 31.* Anoda Zeylanica, Althaeae similis, flore luteo. *Herb. Hertog.* juxta cujus exemplar Figuram exhibuimus. huc & pertinet Abutilon fruticosum, foliis subrotundis, ferratis, floribus albis, pentapetalis, ad alas foliorum conglomeratis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 97.*

Caule adfurgit haec planta lignoso, villoso, villis hisce abrasis, purpurascente; folia gerens mollia, subhirsuta, viridia, oblonga, in ambitu crenata, alterna, pediculis firmis, itidem lignosis, lanuginosisque innixa, ad quorum alas erigitur caulis tenuis, simplex, longus,

qui flores gerit in medio & ad summum collectos, arcte quasi constipatos; ad florum autem nodos oritur semper folium, in medio caulis majus, in summo minimum, maxime villosum. Nodus talis florifer constat ex plurimis flosculis sibi mutuo arcte junctis, propriis tamen caliculis & pediculis infidentibus, inter quos villi albicantes instar Musci sunt dispersi; flosculi autem sunt monopetali, pentapetaloides, patentes, calice simplici, quinquefido instructi, fulvi aut lutei coloris. Ulteriore hujus generis characterem vide apud *Linnaeum char. pl. gen. pag. 205.* ad SIDAM; qui novum hocce nomen huic generi imposuit.

MALVINDA stellata, Alnifolia. *Dillen. H. Elth. pag. 215. Tab. 172. Fig. 211.* ubi elegantem vide Figuram, & varia synonyma summo cum judicio collecta. Malva Indica, folio cordiformi. *Tournef. inst. pag. 96.* Alcea Zeylanica, folio latiore cordiformi. *H. L. Bat. pag. 12. & Ray. hist. pl. pag. 1873.* Malva Indica, frutescens, folio cordato. *Par. Bat. Pr. pag. 350.* Althaea Indica, latiore folio, cordiformi, ad summum sinuato. *Plukn. Phyt. Tab. 9. Fig. 2. &c.*

MALVINDA altissima, Betonicae folio, floribus ad genicula gemellis. *Nobis. Tab. 69. Fig. 1.* Alcea Indica, alta, ramosa, foliis floribusque minimis. *Mus. Zeyl. pag. 40.* Althaea Indica, alta, ramosa, foliis floribusque pusillis. *Herb. Herm.* huc pertinet Althaea spicata, Betonicae folio villoso, spica brevior & laxa. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 97. & Hist. Jam. vol. 1. pag. 44. Tab. 14. Fig. 3.*

Alta haec admodum & ramosa est planta, caules habens obscure purpurascentes, glabros, rotundos, quibus folia ad crescunt alterna, hirsuta, subrotunda, ferrata, latiore basi in acutum apicem desinentia, Betonicae forma, e quorum alis, cum appendicibus binis foliaceis eriguntur bini, longi, pediculi hirsuti, quorum superior duobus tribusve foliolis ut plurimum ornatur, ad quorum summum sustinetur flosculus, calice magno, profunde dissecto contentus, pentapetalus, coloris lutei, tubo longo, & multis staminibus instructus, flosculo deciduo, vascula feminalia in calice reconduntur membranacea, continentia quinque semina convexa, angulosa, nigricantia.

MALVINDA foliis inferioribus multifidis, superioribus incis, flore solitario. *Nobis. Tab. 69. Fig. 2.* Alcea floribus roseis, parvis, fructu lapaceo,

Fig. 2.

Fig. 1.

MALVINDA foliis inferioribus
multifidis, superioribus incis.
flore solitario. Nobis.

5071. *Urena sinuata* L.

MALVINDA altissima, *Betonicae* folio,
floribus ad genicula gemellis. Nobis.

4923. *Melochia pyramidata* L.

Fig. 1.

Fig. 2.

MANGHAS lactescens, foliis Nerii crassis, venosis, Jasmini flore, fructu Persicae simili venenato. Nobis.

MENTHA Zeylanica, pusilla, angustissimo folio dentato. Nobis.

1707. *Cerbera manghas* L.

4339 *Ocimum tenuiflorum* L.

paceo, quinquepartito, foliis profunde laciniatis. *Mus. Zeyl. pag. 63.* Althaea Zeylanica, erecta, foliis undulatis, flore purpureo, feminum capsula spinis horrida. *Herb. Hert.* Alcea Indica, frutescens, foliis in lacinias varie dissectis. *Plukn. Phyt. Tab. 74. Fig. 1.* KADHUPARA Zeylonensibus.

Adfurgit elegans haec planta caule lignoso, rotundo, viridi, villis laeviter obfesso, folia gerens alterna, mollia, lanuginosa, superiore parte viridia, inferiore incana, varie dissecta, Quercus folia in divisione aemulantes: quo magis ad inferiora tendunt, eo latiora, & ibi maxime laciniata, ad superiora sensim angustiora & laevibus laciniis tantum intusculpta, in suprema vero plantae parte sunt minima. Ex alis autem foliorum erigitur pediculus brevis, cui infidet flos solitarius, calice multifido, & varie dissecto (qui in *Pluknetii Figura* sine flore expressus conspicitur) contentus, monopetalus, pentapetaloides, profunde, & ad unguem usque dissectus, e cujus medio erigitur stylus crassus, in medio circiter suo staminibus plurimis testiculos seu apices habentibus ornatus, qui stylus seu tubus est placenta, cui in orbem accrescunt filiculae quinae, triangulares, spinulis obsessae, & horridae, intus vero glaberrimae, quae singulae continent semen albicans, triangulare, lata basi in conum acutum assurgens. ad URAENAM *Dillenii* haec proxime accedit & pertinet, cujus & aliam speciem vide supra citatam ad ALCEAM *pag. 9.* huic proxime convenientem. Character autem hujus generis apud mox citatum auctorem invenitur in *Hort. Elth. pag. 430.* & *Linnaeum in char. gen. pl. pag. 204.*

MALWAETHAKEGYA *Mus. Zeyl. pag. 69.* dicitur a *Mal* quod fructus notat & *Waetba* quod cujuscunque generis lignum notat, ad sepes conficiendas idoneum: additur autem vox *Mal* quod & alia hujus arboris species inveniatur, nullos producat fructus, ut notatur in *Mus. Zeyl. loco citato.*

MANGHAS lactescens, foliis Nerii crassis, venosis, Jasmini flore, fructu Persicae simili, venenato. *Nobis. Tab. 70. Fig. 1.* Manghas sylvestris, lactescens, fructu venenato. *Mus. Zeyl. pag. 49.* Arbor ex-tiosa, lactescens, fructu Aurantii colore, bipartito, flore Jasmini albo, *Manghas* sylvestris. *Mus. Zeyl. pag. 32.* Manghas sylvestris, pudendis vaccarum similis. *ibidem. pag. 68.* Manghas sylvestris, lactescens, venenata, Jasmini flore & odore. *Par. Bat. Pr. pag. 351. Plukn. Almag.*

mag. pag. 241. & Commel. Fl. Malab. pag. 43. Manghas bravas Lufitanis & Acostae pag. 241. Manghas fructu venenato C. B. P. pag. 440. Mangha fructu venenato, osliculo cordiformi; nucleo gemino. Ray. hist. pag. 1552. quae est arbor lactaria, Manga Brava. Rumph. Herb. Ambon. lib. 3. cap. 38. sed ubi fructus duo sibi invicem oppositi Olivae-formes depicti sunt; unde & forte diversae sunt species.

Nostra porro convenit cum Odallam *H. Malab. part. 1. Tab. 39. quae in notis pag. 72. vocatur Perlicae similis, angustifolia, osse cordis humani figura, binos nucleos continente. Tavaracare Malab. flore albo, folio Nerii latiore. Petiv. Gazoph. nat. & art. Tab. 16. Fig. 4. quae & est Mangoe arbor Joh. Freyeri itin. per Indiam Orient. edit. Belg. pag. 180. ubi & ejus Figurae inveniuntur. GHONKADURU Zeylonensibus. hoc est boum venenum. Ghona enim vacca. Kaduru venenum est: Fructus quoque referunt quodammodo pudenda vaccarum, ut notatur in Mus. Zeyl. pag. 49.*

Arbor haec in varios ramos divisa, folia gerit Nerii lanceolata, utrinque obtusa, margine integro, crassa, costa in latere inferiore erecta, elevata cum venulis simplicibus, pinnatim ad angulum rectum exeuntibus. Folia supra sunt laevia, & transversaliter secundum venas sulcata. Ex divisuris caulis prodit laevis racemus, continens flores erectos, quorum calix est quinquefidus, petalum unicum, infundibuliforme, exacte Jasmini quinquefidum, stamina quinque: deciduo flore succedit fructus magnus, rotundus, a latere sulcatus, continens semina duo, ossea, ovata: adeoque maxime cum *Jasmino* convenit, exceptis staminibus. Lacte turgens est tota planta & caustica, quo cum *Apocynis*, ut & cum flore quadrat; si autem illud lac legitime sit praeparatum, purgat *ἀνω* & *κάτω*, unde in Hydropicis saepe summi usus potest esse. Per communicationem *Joh. Fred. Gronovii* hanc plantam insculpendam curavimus. •

MANGHAS marina, sylvestris, fructu venenato MUDUKADHURU Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 59 & 66. an Mangha sylvestris, Indiae Orientalis. Plukn. Phyt. Tab. 203. Fig. 7? & Almag. pag. 241. &c. MUDUKADHURU vocatur. a Mudu quod mare, & Kadhuru quod venenum denotat.*

MANGIFERA arbor. *Mus. Zeyl. pag. 59 & 66. Arbor Mangifera Bon-tij lib. 6. cap. 5. pag. 95. Mao seu Mau, vel Manghas. H. Malab. part.*

Fig. 2.

MOLLUGO Zeylanica,
angustifolia, flore albo. *sylvestris,*
Herb. Hart.

Fig. 1.

MARRUBIUM odoratissimum,
Betonicae folio. Nobis.

part. 4. Tab. 1 & 2. Manga Indica, fructu magno reniformi. Ray. hist. pl. pag. 1550. ubi reliqua vide synonyma & in Commel. Fl. Malab. pag. 43. & infra ad Persicam. Mangas ab Acoſta quoque describitur. edit Ital. pag. 240. & apud Cluſ. cap. 43. & a Cluſ. in exot. lib. 2. cap. 9. Rumphius in herbar. Ambon. lib. 1. cap. 21. habet Mangam domesticam, ubi & quinque alias describit & depingit ſpecies, & cap. 38. delineat Mangastomam. noſtra AMWAGHAHA Zeylonenſibus dicitur.

MARRUBIUM odoratiſſimum, Betonicae folio. *Nobis. Tab. 71. Fig. 1. Marrubium Zeylanicum, odoratum, Nepethae facie, folio Lamii Pannonici. Muſ. Zeyl. pag. 30. Planta ſpicata, hirsuta, Menthae tuberoſae facie. ibidem. pag. 25. Marrubium Zeylanicum, odoratum. Herb. Herm. Stachys Zeylanica, major, Betonicae folio, flore purpureſcente. Herb. Hart. Stachys Indica, procerior, Betonicae folio, noſtras. Plukn. Almag. pag. 357. & Ray. hiſt. pag. 1872. ubi vide reliqua. Marrubium JACKWANASSA Zeylonenſibus. Grimm. Labor. Ceyl. pag. 129. ubi haec habet: Odore atque ſapore caetera nobis cognita ſuperat. Oleum ſubtile, ſimul & aquam nobis exhibet, quae praeſtantiſſima ſunt in morbis matricis ex obſtructionibus contingentibus. Ex eodem Syrupum extrahimus ad eosdem affectus, & ad morbos ſtomachicos. in Muſ. Zeyl. pag. 30. De origine vocis JAKWANASSA dicitur, quod derivetur a *Jak* quod daemonem ſignificat; Cinghali enim hujus plantae fumo daemonem poſſe expelli ſuperſtitioſe contendunt. *Wanassa* fumum ſeu ſuffimigium notat. Caulis hujus plantae eſt rectus, altus, quadragonus; folia oppoſita, petiolis biuncialibus, vel longioribus inſidentia, cordato-oblonga, per marginem profunde crenata, inferiora majora, ſuperiora parva, & fere ſeſſilia, mollia, inferne maxime incana. Verſus ſummitatem caulis flores plurimi caulem amplectuntur, verticillos parum remotos conſtituunt, ſingulo verticillo ad baſin foliorum pari ſeſſili inſtructo: ex aliſ inferiorum foliorum prodeunt ſecundum aetatem ramuli, ramo ſimplici primo ſimiles, ſed minores, tota planta pubeſcit. Florum calix eſt tubulatus, oblongus, ſemiquinquefidus, rigidus, perſiſtens, ſemina condens quatuor, parva, glabra, reniformia, depreſſa, nitida.*

MATRICARIA flore pleno, magno. *Muſ. Zeyl. pag. 33. Matricaria Zeylanica, hortenſis, flore pleno, D. SCHERARD apud Ray. tom. 3. pag.*

pag. 224. Matricaria Maderasp. flore pleno, flavescente. *Petiv. Mus. no. 786.* Matricaria Indica, latiore folio, flore pleno. *Bobart. hist. Oxon. tom. 3. pag. 33.* Tsjetti-Pu *H. Malab. part. 10. Tab. 44.* Matricaria Sinensis, Serrine. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 53.* ubi cum Tsjetti-Pu. *H. Malab.* jungitur. quae a *Commel. in not.* Matricaria Indica, latiore folio, flore pleno vocatur. Vide & ejus *Fl. Malab. pag. 44.*

MEDICAGO Zeylanica, trifolia, arborescens, flore albo. *Herb. Hart.* quae convenit cum *Hedysaro* superius *Tab. 51.* a nobis exhibitio.

MELASTOMA scabra, trinervia. *Nobis. Tab. 72.* Cistus Indicus, trinervius, angustifolius, flore roseo, feminibus pulpa nigra inclusis. *Mus. Zeyl. pag. 36.* Cistus Zeylanicus, Laurinis foliis, flore purpureo. *Herb. Hart.*

Caulis hujus fruticis est durus & scaber, tetragonus, cinereus, similes minores, binos oppositos emittens ramulos, ad quorum ortum bina folia oblonga, majora, quam in minoribus ramis, proveniunt, quae sunt dura, scabra, trinervia, superius obscure virentia, inferius pallidiora, brevibus innixa pediculis. In summo ramorum flores sustinentur, qui in medio caulis solitarius erigitur, in lateralibus quatuor, quinque vel plures proveniunt. Flores hi sunt ampli, rosei, pentapetali, purpurei, staminibus decem, magnis, nigricantibus, recurvis, & pistillo tenui, erecto constantes, calice magno, scabro & hirsuto, semiquinquefido contenti. Post quos fructus sequuntur rotundi, glabri, in quinque loculamenta divisi, pulpa nigra referti, in qua semina plurima, minima, subrotunda collocantur. Generis hujus novi character exacte recensetur a *Linnaeo in char. pl. gen. pag. 127.*

MELASTOMA quinquenervia, minor, capitulis villosis. *Nobis.* Cistus Indicus, quinquenervius, capitulis villosis, pulpa nigra refertis, minor. *Mus. Zeyl. pag. 14.* Cistus Indicus, quinquenervius, folio scabro, & hirsuto, flore rubro, capitulis sericeis, villosis, pulpa nigra refertis, minor, Katou-Kadel *H. Malab. Amm. Char. pl. pag. 439.* Katou-Kadali *H. Malab. part. 4. Tab. 43.* Baccifera Indica, fructu umbilicato, quinque-capsulari, polyspermo, floribus minoribus, fructus cortice aspero. *Ray. hist. pl. pag. 1493.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 12.* qui cum Cisto Indico majore, MAHABOTHYA dicto, hanc conjungit. ubi vide reliqua. huc spectat Grossulariae fructu, non spinosa Malabathri

MELASTOMA *scabra* *trinervia* Nobis.

3078. Melastoma octandra L.

MELASTOMA quinquenervia, hirta, major capitulis sericeis, villosis Nobis.

3075. Melastoma Malabathrica L.

thri foliis, subtus niveis, fructu racemoso in Umbellae modum disposito. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 165. & Hist. vol. 2. Tab. 198. Fig. 1.* ubi & alias habet species. HINBOTHYA Zeylonensibus nostra vocatur. id est *Bowithya* parvum. *Bowithya* autem dicitur illud, quod apertum est, fructus enim maturi dehiscunt, quorum pulpa usurpatur ad Linguae vitia, quando scilicet dehiscit, inflammatur, & quasi decorticatur; ut notatur in *Mus. Zeyl.*

MELASTOMA quinquenervia, hirta, major, capitulis sericeis, villosis. *Nobis. Tab. 73.* Cistus Indicus, quinquenervius, capitulis sericeis, pulpa nigra refertis, major. *Mus. Zeyl. pag. 10.* Cistus Indicus, quinquenervius, folio hirta, ac scabro, floribus roseis amplis, capitulis sericeis, villosis, pulpa nigra refertis, major. *Herb. Herm. & Commel. Fl. Malab. pag. 20.* ut & in notis ad *H. Malab. part. 4. pag. 91.* ubi pro Katou-Kadali *Tab. 43.* expressa habetur; sed quanquam nostra planta eadem sit illi, quae ibi in notis juxta *Herb. Hermannii* citetur, cum Kadali tamen *H. Malab. part. 4. Tab. 42.* magis convenit, ut plantarum comparatio cum Figuris abunde docet, pro quo etiam a *Petit.* habetur, & vocatur Kadali Madraspatana, pentaneuros, foliis eleganter hirtis, in *Herbar. suo*, cujus exemplar servo ab ipso collectum, & hoc nomine ejus manu adscriptum, quod in omnibus plantae *Herbar. Hermannii* convenit. quae porro vocatur Cistus Indicus, quinquenervius, folio scabro, flore rubro, capitulis sericeis, pulpa nigra refertis, latifolius, sive major, Kadali *H. Malab. Amm. Char. pl. pag. 437.* & Baccifera Indica, fructu umbilicato, quinque-capsulari, polyspermo. *Ray. hist. pag. 1493. & Commel. Fl. Malab. pag. 12.* Cistus Chamaerhodendros, seu Ledum Orientale pentaneuros, foliis brevioribus, ferruginea & molli lanugine villosis &c. *Plukn. Almag. pag. 106.* & in *Mantiss. pag. 49.* vocatur Cistus pulpifer Indicus *Hermannii*. quae in *Phytogr. Tab. 161. Fig. 2.* exprimitur, ubi heptaneuros &c. dicitur. & est Datura Indica, foliis Malabathri. *Breyn. Cent. pag. 119.* ac Stramonium, seu Datura Cistoides, frutescens, hirsuta, major, Indica. *Breyn. Prodr. 2. pag. 97.* cum qua convenit Grossulariae fructu non spinosa, Malabathri foliis, longa & rufa lanugine hirsutis, fructu majore coeruleo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 165. & Hist. Jam. vol. 2. Tab. 107. Fig. 2.* BOTHYA, & MAHABOTHYA, seu majus Zeylonensibus dicitur; & Bocca preto Lusitanis, hoc est os nigrum, quia

pueri comedendo hujus pulpam os denigrant. unde & nomen huic generi indimus MELASTOMA, id est μέλας nigrum & στόμα os. quum peculiaris, & novi sint generis hae plantae.

Frutex hic gerit caules quadrangulares rufescentes, tuberculis ruffis undique obfessos, ut in Ficoide caule glaciato, licet hic splendeat, fere obtinet. E caule hoc rami varii proveniunt majoribus ramis simillimi, bini semper oppositi, sensim ad summum minores, qui folia gerunt semper bina opposita, oblonga, tribus majoribus nervis in medio, binis minoribus in ambitu donata, qui saepe per scabritiem, & hirsutiem elegantissimam in suprema folii parte non apparent, ubi illud etiam obscure viret, & setis seu pilis recurvis certo & eleganti quasi ordine dispositis hirsutum est; ab inferiore ejus parte pallide viret & scabrum est, setis caeterum destitutum, unde & quinque illi nervi pulchre ibi conspici possunt. Flores porro in summitate ramorum proveniunt elegantes rosacei, ampli, pentapetali, purpurei, calicibus magnis, hirtis & scabris semiquinquefidis contenti, stamina habentes decem, magna, recurva, nigricantia, & pistillum unicum, erectum; post quos capitula sericea, villosa, qui fructus sunt rotundi, quinquefidi, pulpa nigra & seminibus plurimis referti, sequuntur. Ulteriore accuratam descriptionem vide in *H. Malab. part. 4. pag. 87.* quae accuratior est & plantae nostrae magis convenit, quam Figura ibi expressa, quae glaberrima ibi depicta est, quum tota sit scabra, & hirsuta, quod vitium saepius in *H. Malab.* observavi.

AN MELO seu PEPO Zeylanicus, KEKIRYA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 69?* qui forte Melo Indicus *Clusii lib. 2. exot. cap. 20.*

MELOCHIA Corchori folio. *Dilln. H. Elth. pag. 221. Tab. 176. Fig. 217.* Ketmia lucida, Melochiae folio. *Joh. Phil. Breyn. ibidem.* & Alcea Zeylanica, flore rubello. *ibidem.* Alcea Indica, minor, flosculis luteis, parvis, fasciculatis, Melochiae folio, HINGHALKURA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 43. &c.*

MELOCHIA Indica, major, flosculis luteis, parvis, fasciculatis. *Nobis.* Althaea Indica, major, Melochiae folio, flosculis luteis, parvis, fasciculatis. MAHAGHALKURA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 42.* Althaea forte Maderasp. Melochiae foliis, floribus ex alis foliorum, pediculo curto. *Plukn. Phyt. Tab. 240. Fig. 5.* GHALKURA & MAHA-

HAGHALKURA dicitur a *Maha* quod majorem & *Ghal* quod petram notat. hujus generis characterem habet *Linnaeus in char. pl. gen. pag. 203.*

MELILOTUS Indica, hortensis, fativa, floribus odoratis, albis. *Mus. Zeyl. pag. 64.* Melilotus Indica, humilis erecta, floribus exiguis, odoratis, albis, pericarpis majoribus, spicatum densius stipatis. *Plukn. Phyt. Tab. 45. Fig. 5.* Melilotus Indiae Orientalis *Parkins.* apud *Ray. hist. pl. pag. 953.* Swendadi-Pullu *H. Malab. part. 9. Tab. 40.* ubi a *Commel. in notis.* Meliloto vulgari flore albo accedens, si non eadem, vocatur. vide & *Fl. Malab. pag. 44.*

MELONGENA fructu oblongo. *Tournef. inst. pag. 151.* Solanum pomiferum, fructu oblongo. *C. B. P. pag. 167.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 63.* *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 108.* & *Hist. vol. 1. pag. 237.* Solani species Fockii Fockii dicta. *Bontii lib. 6. cap. 35. pag. 123.* & *Mus. Zeyl. pag. 37.* Mala insana haec a *Dodon in pempt. pag. 458.* vocantur. & Melanzana in *H. Eyst. aut. Ord. 1. Fig. 1. Fol. 3.* Nila Barudena *H. Malab. part. 10. Tab. 74.* ubi vide notas & *Trongum hortense. Trong. Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 46.*

MENTHA Zeylanica, camphorata, hirsuta; rectius forsan Polium Zeyl. hirsutum, quadrifolium, camphoratum. *Mus. Zeyl. pag. 1.* Mentha Zeylanica, camphorata, triphylla, & tetraphylla, GHONACOLLA Zeylonensibus *D. Herman* apud *Ray. hist. pl. part. 3. pag. 284.* Mentha Zeylanica, camphorata, fere trifoliata *Petiv. hort. sicc.* apud *Ray. lib. 3. append. pag. 246. no. 22.* Mentha Zeylanica, aquatica, hirsuta, ramosa, odore gravi. *Mus. Zeyl. pag. 57.* Mentha GHONAKOLLA dicta. *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 129.* qui dicit: Subtilem atque Camphoreum possidet odorem, pariterque clarissimum est medicamentum pro Stomacho, Capite, Matrice. Subtile & jucundum nobis praebet Oleum per destill. immo & aquam iisdem usibus infervientem. GHONAKOLA autem dicitur a *Ghona* quod cervum, & *Kola* quod folium notat. his enim cervi dicuntur vesci: ut notatur in *Mus. Zeyl.* Sequenti modo apud *Ray.* describitur: Caule exsurgit firmo, quadrato, ramoso, foliis ad intervalla binis, non raro etiam ternis vel quaternis cincto; angustis, oblongis, acutis circa marginem argute denticulatis. Flores spicatum coagmentati in summis caulibus & ramulis, spicis Dipfasi aut *Betonicae* capitibus figura similibus,

fed multo minoribus; unde proxime nostrae expressae plantae convenit, quae apud *Ray.* angustissimo dentato folio denominatur.

MENTHA Zeylanica, Conyzoides, odorata. *Mus. Zeyl. pag. 51.* an *Mentha crispa*, Cheriro Sulassi Kitsyl, *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 58?*

MENTHA Indica, repens, hortensis, crassa, acris, odore ac sapore fragrantissimo. KAPARAWALLI Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 62.*

MENTHA Zeylanica, aquatica, inodora, latifolia; *Mus. Zeyl. pag. 35.* Planta Zeylanica Menthae aquaticae in insula Zeylon nascentis, ut videtur, species. *Ray. tom. 3. Dendr. pag. 134.* ubi additur: In surditate singulare & specificum remedium esse perhibetur, multis experimentis comprobatum.

MENTHA Zeylanica, spicata, pusilla, angustissimo folio, dentato. *Nobis. Tab. 70. Fig. 2.* *Mentha Zeylanica*, angustissimo folio, dentato. *D. Hermans* apud *Ray. tom. 3. pag. 284.* *Veronica Zeylanica*, minima, flore rubello. *Herb. Hart.*

Vera haec Menthae est species; Cujus calix est minimus, subrotundus, ore quinquedentato, duobus dentibus latioribus: Flores ac semina ut reliquae menthae, perficiens. E radice tenui, lignosa, brevissima oritur caulis brevis, qui ramos laterales se ipso longiores undique spargit, triunciales, singulus caulis terminatur spica verticillatim divisa, constans floribus minutissimis, rubellis, folia ad caules sunt opposita, oblonga, hirsuta, ferrata, seu denticulata, quae nunc bina, nunc quatuor simul ex eodem centro proveniunt.

Generis hujus character invenitur apud *Linnaeum in char. plant. gen. pag. 172.*

METHONICA gloriosa, foliis capreolatis, floribus fimbriatis, reflexis. *Nobis.* *Methonica Malabarorum.* *H. L. B. App. pag. 688.* ubi icon & descr. *Lilium superbum Methonica Malabar.* *Mus. Zeyl. pag. 28.* *Ray. hist. pl. pag. 1915.* *Lilium Zeylanicum superbum* *H. Amst. part. 1. pag. 69.* *Plukn. Phyt. Tab. 116. Fig. 3.* *Lilium Zeylanicum superbum*, radice tuberosa, florum petalis coccineis, fimbriatim reflexis. NYAGHALA Zingalensibus. *Amm. H. Bos. pag. 19.* vide & *Amm. Char. pl. pag. 521.* ad *Paeoniam.* *Paeonia Zeylanica*, superba, florum petalis

MICROCOCOS foliis alternis, oblongis, acuminatis. Nobis.

6981. *Grewia Microcos* L.

talibus fimbriatis, fulgenti cocco splendentibus, foliis capreolatis. *Mus. Zeyl. pag. 34.* Paeonia Zeylanica, capreolata, superba, floribus fulgenti cocco splendentibus, fimbriatis. *Herb. Herm.* ubi additur: Lusitani inter Lilia volunt referri, sed perperam, semina enim cum Paeonia conveniunt tum forma, tum & virtute. Mendoni *H. Malab. part. 7. Tab. 57.* Methonica Malabarorum, Nienghala Zeylonensium, Liliolum Zeylanicum superbum vulgo Hermannii. *Ray. hist. pl. pag. 1915. Plukn. Almag. pag. 249. Petiv. act. Phil. Lond. vol. 22. no. 271. pl. 155.* Liliolum Zeylanicum, feminibus ad Paeoniam accedentibus. *Plukn. Mantiss. pag. 130.* ubi dicitur: Male ad Paeonias refertur, nam non est multifiliqua, sed tricapsularis, hexapetalos; & quod apud Malab. radix pro antidoto habeatur: quum ab aliis pro summo, atrocissimo veneno habeatur. NAJAJALA, NYAGHALA & NIENGHALA Zeylonensibus. Notam hujus character. dederunt *Dillen. in nov. pl. gen. pag. 158. & Linnaeus in char. pl. gen. pag. 93.* ad GLORIOSAM.

MICROCOS foliis alternis, oblongis, acuminatis. *Nobis. Tab. 74.* KOKUKIRILLA *Herb. Herman. & Mus. Zeyl. pag. 10.* communiter dicitur *Kocurille de Kleine Cocos* Belgis *ibidem.* Confer cum hac Figuram *Pluknet. Tab. 262. Fig. 3.* quae huic eadem videtur. An Catutekka hujus species, quae invenitur in *H. Malab. part. 4. Tab. 28.* Sed quae foliis est oppositis, fructu minimo.

Gaudet haec arbuscula foliis oblongis, acuminatis, in acutum apicem desinentibus, glabris, venosis, obscure virentibus, alternatim cauli brevissimis pediculis adfixis, ad quorum insertionem squamma una, alterave instar gemmae apparet; caulis scaber est rotundus, nigricans, in summo flores producit plurimos in thyrsum collectos, qui constant calice communi, septifolio, duos vel tres continente flores, quorum petala sunt quinque, oblonga, decidua, stamina plurima, capillacea, apicibus subrotundis. Pistillum unicum, simplex habentes, quod abit in fructum subrotundum, COCUM *Hermannio* vocatum, qui in exemplari nostro desideratur.

MILIUM Indicum semine fusco, juba larga. *Mus. Zeyl. pag. 44.* Milium Indicum, arundinaceo caule, semine fusco, glumis splendentibus, atris. *Plukn. Almag. pag. 250.* Milium Indicum, arundinaceo caule, granis flavescentibus. *H. L. Bat. pag. 425. & Sloan. Cat. pl. Jam.*

Jam. pag. 25. ubi plurima vide synonyma, & *Hist. Jam. vol. 1. pag. 104.* KAURINGHU Zeylonensibus.

MILIUM Zeylanicum, fuscum, parvum, MUNAMU Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 45.*

MILIUM Zeylanicum, minimum, GHAETANA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 45.*

MILIUM gramineum, minimum, BADHAMU Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 45.*

MILIUM Zeylanicum minus, MENERI Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 66.* hujus generis characterem vide apud *Linnaeum in Char. pl. gen. pag. 17.*

MIMOSA herba Zeylanica, aquatica, filiquis compressis, articulatis, hispidis, atris, an Anonymos *Garziae* & *Æschynomene Apollodori*? *Mus. Zeyl. pag. 18.* Herba mimosa, Zeylanica, filiquis compressis, hispidis, articulatis, major, *Æschynomene Theophrasti. ibidem. pag. 41.* *Æschynomenes* apud *Theophr.* occurrit *lib. 4. cap. 3.* vide & *Clus. in exot. pag. 293.* ad ANONYMUM. MAHADYAHYAMBALA, & MAHA-PINAWAKA Zeylonensibus, id est magna *Pinawaka.* vide supra ad *Hedysarum pag. 119.*

MIMOSA herba, Zeylanica, filiquis compressis, hispidis, articulatis, minor. *Mus. Zeyl. pag. 40.* *Æschynomene mitis, fecunda, vel potius herba casta, Zeylanica, filiquis latis, compressis, minoribus. Breyn. Cent. pag. 47. Ray. hist. pag. 981. & Commel. Fl. Malab. pag. 2.* Mimosa Orientalis, non spinosa, rarioribus ramis, floribus spicatis? *Plukn. Phyt. Tab. 307. Fig. 4.* Niti-Todda-Vaddi. *H. Malab. Part. 9. Tab. 20.* HINDYAHYABALA Zeylonensibus, quod pronunciat^r *Hidyahaembala.*

MIMOSA herba, Zeylanica, foliis & filiquis angustis, glabris. *Mus. Zeyl. pag. 18.* Herba viva Zeylanica, filiquis longis, angustis, glabris; quae DYAHYABALAE species *ibidem. pag. 48.*

MIMOSA herba Zeylanica, filiquis angustis, glabris media. *Mus. Zeyl. pag. 66.* huc spectat Mimosa Americana, pigra, filiquis longis angustis,

sti , Allium olentibus. *Plukn. Almag. pag. 252. & Phyt. Tab. 307. Fig. 3.* an potius *Hedysari* habendae sunt species?

MIMOSA Zeylanica, filiculis articulatis, tenerrimis, glabris, semine minimo. *Boerb. ind. H. L. B. part. 2. pag. 55.*

MIMOSA humilis, quadripennis, glabra, procumbens, guttis sanguineis maculata, ex insula Zeylon. *Plukn. Mantiss. pag. 131.*

MIMOSA pumila, Zeylonensis, erecta, multifolia, pinnulis singulis macula purpurea utrinque notatis. *Plukn. ibidem.*

MOLLUGO Zeylanica, sylvestris, angustifolia, flore albo. *Herb. Hart. quae exprimitur Tab. nostra 71. Fig. 2.*

Planta est pedalis altitudinis, e radice albicante, fibrosa adsurgens caule brevi, glabro, viridi, qui statim in minores majori similes dividitur; ad ramorum autem divisiones, folia majora sex numero in orbem, seu stellam posita collocantur; quae sunt viridia, glabra, longa, acuta, Mollugini vulgari similia, ex alis illorum foliorum ramuli minores, ad caulem quatuor gerentes folia, proveniunt, qui in eorum summo sustinent flores albicantes, tenuissimis & longissimis petiolis insidentes, forma *Molluginis* vulgaris.

MOMORDICA Zeylanica, pampinea fronde, fructu longiore. *Tournef. inst. pag. 103.* Momordica Zeylanica, major. *Par. Bat. App. pag. 10.* Cucumis Indicus, puniceus, major. *Par. Bat. Pr. pag. 329. Mus. Zeyl. pag. 67. Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 103.* Cucumis puniceus, Zeylanicus, *Margosa* Lusitanis. *H. L. Bat. pag. 204.* Pandi-Pavel. *H. Malab. part. 8. Tab. 9.* ubi in notis vocatur Cucumis puniceus Indicus, fructu majore, ex flavo rubente. Balsamina Cucumerina, Indica, fructu majore flavescente. *H. Amst. part. 1. Fig. 54. & Fl. Malab. pag. 13.* Momordica, sive Charantia Indiae Orientalis, fructu aurantio, majore, oblongo, seminibus albis. *Breyn. Prodr. 2. pag. 73.* qui Cucumis Zeylanicus, major, seminibus albis *H. L. Bat. App. pag. 663.* Momordica Zeylanica, fructu pyriformi, majore, ex flavo rubente, seminibus albis. *H. Beaum. pag. 30. & Amm. Char. pl. pag. 469.* Amara Indica, Papari *Rumph. Herb. Ambon. lib. 9. cap. 46.* TUBUKARU-WILA Zeylonensibus. Licet fructus hujus plantae saepe varient colore

lore flavo & rubente, pro eadem tamen habenda est specie, cum qua & convenit

MOMORDICA Indica, amara, fructu tuberoso, pyriformi, rubente, *Maragosa* Lusitanis, KARABILA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 39.*

MOMORDICA Indica, amara, fructu tuberoso, rubente, pyriformi, folio Vitis KATUKARAWILA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 44.*

MOMORDICA fructu rubente, pyriformi, TUBAKWILA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 67.*

Proxime hae species inter sese conveniunt, ni forte eadem; quum vero *Hermannus* eas separavit, omnesque singulari seu proprio nomine Zeylanico occurrunt, conjungere illas non audebam, praesertim quum in *H. Malab.* undecim hujus generis proponantur species, cum quibus quaedam harum conveniunt, & pro iisdem habendae sunt: si quis vero illas velit conjungere, & tanquam varietates tantum habere, per me licet.

MOMORDICA Zeylanica, pampinea, fronde, fructu brevior, minore. *Tournef. inst. pag. 103.* Cucumis puniceus, Indicus, minor. *Par. Bat. Pr. pag. 329.* Cucumis Zeylanicus, minor, feminibus nigris. *H. L. Bat. App. pag. 664.* quae a *Commel. in Fl. Malab. pag. 14.* jungitur cum Balsamina cucumerina, punicea, Zeylanica majore. *Commel. Cat. H. Amst. pag. 47.* & est Pavel *H. Malab. part. 8. Tab. 10.* ubi in notis vocatur Cucumis Malabaricus, fructu ex flavo rubente.

MOMORDICA DAMELLA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 52.* forte est *Momordica vulgaris Tournefortii.*

MOMORDICA flore fistuloso, radiato, albo, Hederae folio, Malabarica. *Breyn. Prodr. 2. pag. 74.* quae est planta Zeylanica scandens, Hederae foliis, *Breyn. in Ephemer. Curios. ann 4ti & 5ti pag. 136.* ubi elegans figura & ejus descriptio. huc spectat Balsamina Cucumerina, fructu viridi, striis albis, *Commel. in notis ad H. Malab part. 8. Fig. 33.* quae Tota-Piri *ibidem* vocatur, & *Tab. 17.* eleganter exprimitur.

MORINGA Zeylanica, foliorum pinnis pinnatis, flore majore, fructu angu-

MORINGA Zeylanica, foliorum pinnis pinnatis, flore majore, fructu anguloso. Nobis.

3005 Guilandina Moringa L.

anguloso. *Nobis. Tab. 75.* Moringa Lentisci folio, fructu magno, anguloso. *Herb. Hart.* quo nomine & a *Joh. Baubino part. 1. lib. 12. pag. 435.* vocatur, sed cujus figura a nostra multum differt. quae Moringa ab *Acosta* vocatur *edit. Ital. pag. 262.* & apud *Clus. pag. 218.* & *lib. aromat. cap. 35.* *Mus. Zeyl. pag. 37.* & *Dalechamp pag. 168.* & *Ferrar. Fl. Cult. lib. 3. cap. 21. pag. 385.* quae convenit cum Murungu *H. Malab. part. 6. Tab. 11.* ubi vide notas Balanus Myrepica, filiqua triangulari, semine minore alato. *Breyn. Prodr. 2. pag. 22.* qui notas ejus habet characteristics. MORINGEROS *Chr. Acoftae*, quae arbor filiquosa, floribus papilionaceis, (pro decapetalis) albis, amplis, filiquis angustis, longis, triangulis, feminibus itidem trigonis, figura, magnitudine, & forma, quodammodo etiam colore proxime ad Balanum Myrepf. accedentibus, inclusis, pulpa albicante fungosa. *Amm. H. Bosian. pag. 21.* & *Char. pl. pag. 478 & 490.* Nux Been Zeylanica, filiqua triangula, feminibus alatis, *Moringeros* Lusitanis, & KATUMURUNGHA Zeylonensium. *H. L. Bat. App. pag. 692.* & *Par. Bat. Pr. pag. 357.* Moringho floribus amplis, magnis. *Mus. Zeyl. pag. 62.* hujus reliqua synonyma inveniuntur apud *Plukn. in Almag. pag. 253.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 13.* Morunga foemina, Kella Parampolam a *Rumph. in Herb. Ambon. lib. 1. cap. 63.* vocatur, quae huic penitus convenit, cujus flores polypetali cum multis staminibus sunt depicti, & foliorum rachis communiter ex septem vel pluribus constat foliis. KATU-MURUNGHA & WATTU MURUNGU, id est *Murungu* hortense Zeylonensibus haec dicitur; ut constat ex *H. L. Bat. pag. 170.* Quum hujus flores nec foliorum forma in datis jam figuris clare & distincte exprimantur, accuratiorem iconem insculpi curavimus juxta nostrum, quod servamus, exemplar. Cujus calix mihi apparuit quinquefolius, coloratus, deciduus, foliis constans oblongis, obtusis, aequalibus. Petala floris quinque, magnitudine, & forma calicis inferius & ad unum latus magis dehiscencia, alias aequalia; unde ab auctoribus hujus flos decapetalus habetur.

Stamina sunt decem, quorum quinque inferiora longiora, sursum incurva. Pistillum unicum, inferius Embryonem oblongum habens: Pericarpium vero est capsula filiquosa, teres, longissima, trivalvis; femina sunt trigona, membranâ alatâ donata, plurima juxta longitudinem filiquae disposita. Flores in racemis ex caule egressis sparsim proveniunt. Folia hujus plantae sunt pinnata, rachis longa; Pinnae folio-

rum elliptice oppositae, secundum longitudinem petiolis parvis adfixae. Petioli hi saepe etiam in inferiore parte tres simul emittunt pinnae, unde inferius trifoliatae, superius solitariae pinnae apparent.

MORINGA Zeylanica, pinnis rarioribus, flore minore. *Nobis*. Moringha floribus parvis. *Mus. Zeyl. pag. 63.* Moringhos floribus parvis. *ibidem. pag. 21.* Moringa Mas. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 1. cap. 63.* ubi flos depictus est pentapetalus, cum quinque staminibus, & folia ad rachim tantum quinque vel tria, quae cum figura *H. Amst. part. 1. Fig. 112.* convenit.

De Morunga *Grimm. in Labor. Ceyl. pag. 111.* in genere dicit: Radix ipsius excellentissimam nobis exhibet medicinam, quae convenit cum nostra piperis radice, quoad odorem & saporem, quamobrem pro cibis etiam usui adhibetur &c.

Sal ejus est exquisitissimum in Hydrope, Morbo regio, Cachexia, Obstructione Hepatis, Lienis, & in Calculo &c. Fructus optimum ibi locum habent. Flores in jusculis pro morbis calidis conveniunt.

MOTHUKOLA *Mus. Zeyl. pag. 68.* ubi additur, folia hujus comeduntur in obsoniis.

MURUWAWAEL *Mus. Zeyl. pag. 55.* ubi notatur, Caulem habet ductilem, & subtili lino infarctum, quo utuntur piscatores.

MUSA Seraphionis. Ficus Indica. *Mus. Zeyl. pag. 70.* Ficoides, seu Ficus Indica, longissimo, latissimoque folio, fructu longissimo, *Musa Seraphionis* dicta. *Herm. H. L. Bat. pag. 256.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 28.* *Merian. insect. Surin. pag. 12.* hujus habet Figuram, nec non optima invenitur apud *Linnaeum in tractat. de MUSA CLIFFORT.* quae *pag. 14.* cum ejus synonymis & nota characteristica exactissime describitur. Palma humilis, longis latisque foliis. *C. B. Mus. Zeyl. pag. 61.* Ficus Indica, racemosa, foliis & fructu amplissimis, *Musa Arabibus* dicta. *Plukn. Almag. pag. 145.* ubi multa hujus inveniuntur synonyma, & plurima ejus apud *Sloan. in Catal. pl. Jam. pag. 189.* ubi *Musa* caudice viridi, fructu longiore falcato, anguloso vocatur. vide & *Hist. Jam. part. 2. pag. 141.* & *Clus. lib. 2 cap. 8.* & *Acost* apud *Clus. lib. aromat. cap. 42.* ut & *Dale Pharmac. supplem. pag. 265.* *Bala H. Malab. part. 1. Tab. 12, 13, & 14.* ubi *pag. 20.* sexdecim enumerantur.

MUSSAENDA Zeylanica, flore rubro, fructu oblongo, poly-
spermo folio ex florum thyrso prodeunte albo. Herb. Hart.

1395. Mussaenda frondosa L.

merantur species, quae apud *Rumph. in Herb. Ambon. lib. 8. cap. 1.* etiam occurrunt, quarum quaedam etiam depictae sunt, atque haec ab eo vocatur Musa arbor, vel arbor Musae Pissang, Figo de India. KEHELGHAA Zeylonensibus haec arbor, seu planta in genere dicitur; ejus fructus vero *Watukaena*. Fructuum fasciculus *Watukaenawirya*. Flos *Watumurwa*. Folia *Khel-Kolla*. Liquor, qui ex hujus flo-
sculis sponte exstillat *Kehelperu*. *Peru* notat mel; dulcis enim & vino-
sus est liquor. Cortex arboris membranofus est, ex quo caudex com-
ponitur *Kehelpatum* dictus, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 70.* ubi etiam
dicitur, quod varias hujus arboris species Cinghali enumerent, qua-
rum plurimae ibi etiam nominibus Barbaris denominantur.

MUSSAENDA Zeylanica, flore rubro, fructu oblongo, polyspermo, folio
ex florum thyrsis prodeunte albo. *Herb. Hart. Quae Tab. 76.* expressa
reperitur. Mussaenda. *Mus. Zeyl. pag. 36.* Belilla *H. Malab. part. 2.*
Tab. 18. ibidem. qui frutex Indicus, baccifer, fructu oblongo, poly-
spermo. *Ray. hist. pag. 1493. & Commel. Fl. Malab. pag. 31.* Mussaen-
da, arbor Indica, floribus in summis ramulis veluti in fasciculos dispo-
sitis, e quorum medio emergit folium latum, singulare, flavicans.
Ray. tom. 3. Dendr. pag. 126. ubi sequenti modo breviter describitur:
Folia in ramulis ex adverso bina, triuncias longa, duas lata, Ellipticae
fere figurae, nisi quod in mucronem exeant. &c. Flores parvi ex oblon-
go tubo in quinque segmenta brevia expanduntur. & in *Mus. Zeyl.*
dicitur; Folium, quod ex florum thyrsi prodit, differt a caeteris, est-
que coloris luteo virescentis.

a *Rumphio in Herbar. Ambon. lib. 6. cap. 57.* similis huic planta, ni
eadem describitur, quam etiam cum Belilla *H. Malab.* conjungit, &
ab eo vocatur Folium Principissae, Daun Putry. depingitur autem
illa planta penitus glabra & viridis, quum nostra sit hirsuta & obscure
virens. Flores dependent ibi lutei vel flavi, calice oblongo, vix dissecto
contenti, inter quos folia subrotunda minora, quam in nostra, &
alba erumpunt. Fructus autem est ibi oblongus viridis, punctatus, ut
videtur, quadrangularis, quatuor apicibus coronatus, in quatuor locu-
lamenta divisus, polyspermos.

Nobis autem accurato examine instituto apparuit, quod nostra *Mus-
saenda* calice constet unifolio, hirsuto, in quinque radios angustos,
longitudine floris producto. Floris petalum autem est unicum, infun-
liforme,

lifforme, limbo quinquefido, totum hirsutum, coriaceum. Stamina floris sunt quinque e tubo petali nata, apicibus quinque oblongis instructa; pistillum unicum, tenue, summo bifidum gerens. Fructus in fundo calicis reconditur pyriformis, carnosus, in duo loculamenta divisus, seminibus plurimis, minutissimis nidulantibus, ut eleganter in *Figura H. Malab.* etiam apparet: sed notandum est, quod ibi calix brevis & quinquedentatus tantum exhibeatur, quum in nostra planta sit tenuis, longus, hirsutus, ut etiam in nostra icone conspicitur.

Tota denique planta glabra ibi depicta est, quum nostra tota quanta sit hirsuta, & illa cum *Rumphii Figura* penitus convenit. errorem tamen illum saepius in *H. Malab.* iconibus commissum esse observavimus, forte per incuriam sculptorum. Folia porro in nostra planta sunt ovato-acuminata, acuta, villosa, petiolis parvis insidentia, integra, bina sibi opposita, obscure virentia. Flores in summis ramulis proveniunt racemosi, jam descripti, inter hos folia occurrunt solitaria, cum caulis quoad figuram similia, sed color in his albus, vel flavescens utrinque, & multo sunt tenuiora, laeviter etiam villosa.

MUWAKIRIW AEL. *Mus. Zeyl. pag. 70.* Muwa cervum. Kiri lac notat.

MYROBALANUS Zeylanica, ex qua Gummi Elemi, fructu odore ac sapore praestans, KAEKUNA Zeylonensibus. WILDE AMANDELS Belgis. *Mus. Zeyl. pag. 48.*

MYRTUS Indica, odore Citri: an Myrtus Indica, odorata Theophrasti? *Mus. Zeyl. pag. 9.* HINCUBUSE & NARANDA Zeylonensibus. forte est Vitis Idaea infra proposita, ubi vide. Myrti characterem habet *Linnaeus in char. pl. gen. pag. 142.*

NATASURI. *Mus. Zeyl. pag. 59.*

NELUGHAS. *Mus. Zeyl. pag. 3.*

NERIUM angustifolium, flore rubente, odorato, roseo. *Mus. Zeyl. pag. 33.* Nerium angustifolium, Indicum, flore rubro, odorato, simplici. *Foula Mistica Lusitanis. ibidem. pag. 34.* Nerion Indicum, angustifolium, floribus odoratis, simplicibus. *H. L. Bat. pag. 447.* ubi icon & descriptio, & *Commel. Fl. Malab. pag. 47.* & *Ray. hist. pl. pag. 1768.*

*NERIUM Indicum. siliquis angustis,
erectis, longis, geminis. Nobis.*

1717. *Nerium antipyreticum* L.

1768. Nerium Indicum, angustifolium, flore incarnato, odorato, simplici, *Par. Bat. Pr. pag. 356.* Belutta-Aveli, *H. Malab. part. 9. Tab. 2. &c.*

NERIUM Zeylanicum, floribus roseis, amplis, plenis. *Mus. Zeyl. pag. 46.* Nerion Indicum, latifolium, floribus odoratis, plenis. *H. L. Bat. pag. 447.* ubi icon & descriptio. Nerium Indicum, latifolium, flore rubro, & aliquando variegato, odorato, pleno. *Par. Bat. Pr. pag. 356. & H. Beaum. pag. 31.* Nerium latifolium, Indicum, flore variegato, odorato, pleno. *H. Amst. tom. 1. pag. 45. Fig. 23.* Nerium Indicum, flore rubescente pleno. *Breyn. Prodr. 2. pag. 46.* Oleander Sinicus, Bodilo Tsjena. *H. Malab. Rumph. Herb. Ambon. auctuar. cap. 33.* Tsjovanna-Areli *H. Malab. part. 9. Tab. 1.* Flos Mysticarum vulgo. *Mus. Zeyl. pag. 46.* illis enim Mysticae ornant caput, collum, & brachia; ut ibi notatur.

NERIUM Indicum, filiquis angustis, erectis, longis, geminis. *Nobis. Tab. 77.* Apocynum Zeylanicum, arborescens, Armenii flore albo, filiquis angustis, erectis, longis, geminis. *Herb. Herm.* Apocynum erectum Malabaricum, frutescens, Jasmini flore candido. *Par. Bat. pag. 44.* ubi pro Codaga-Pala *H. Malab. part. 1. Tab. 47.* habetur, & frequens in insula Zeylana dicitur. Apocynum frutescens, Zeylanicum, Jasmini flore & odore, WALIDDA Zeylonensibus. *D. Herman apud Ray. tom. 3. pag. 538.* Apocynum Indicum, erectum, arborescens, floribus albis, amplis, filiqua gemella, WALIDDA dicta *Amm. Char. pl. pag. 618.*

Elegans haec arbuscula caulibus firmis, & lignosis, rotundis, ex suo trunco varios dat ramos, cortice nigricante, lignum albicans tegente, cinctos; folia gerentes bina sibi mutuo opposita, oblongo-lanceolata, acuta, glabra, nervosa, variae magnitudinis, ab utraque parte laete viridia. In summo caulium varii egrediuntur flores, tubulosi, in quinque segmenta divisi, monopetali, staminibus multis in conum acutum collectis ornati, albiissimi, jucundi odoris & aspectus. Calix flores sustinens, est stellatus, in quinque lacinias divisus, qui satis longo & tenui, ac varie multiplicato innititur petiolo, & perpetuus est; floribus enim emarcidis ex uno tali calice duae simul eriguntur filiquae angustae, erectae, naturaliter triplo fere longiores, quam in data Figura potuit exprimi; miro modo in summo per apicem acutissimum circum-

circumvolutum sibi junctae, & connexae; quae filiquae lanugine albissima sunt repletae, in qua semina collocantur plurima, longa, angusta, striata, pappo, qui lanuginem illam constituit, ornata, cinerea.

NERIUM Indicum, folio subrotundo, undulato, crasso, flore dilute rubente. *Nobis. Tab. 78. Fig. 1.* Apocynum Zeylanicum, subrotundo folio, Nerii flore rubro. *Herb. Hart.* Apocynum arboreum Indiae Orientalis, Laurinis foliis, rostrato Borriginis flore, praegrandi filiqua, seminibus longis gracilibus, sericeis pappis involutis. *Plukn. Mantiss. pag. 16.* Apocynum Malabaricum, arboreescens Limonii folio, flore ex flavo rubescente, filiquis maximis. *Commel. in notis ad H. Malab. part. 9. pag. 5.* ubi Nelam-Pala vocatur. huc pertinet quoque Nerium arboreum, folio latiore, obtuso, flore luteo minore. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 154. & Hist. vol. 2. pag. 62. Tab. 186. Fig. 2.* huc & spectat Arbor Indica, Lauri amplioribus foliis, obtusis, e regione binis, floribus Jasmini, summo ramulorum umbellatim positus, ex insula Johanna. *Plukn. Mantiss. pag. 20.* ubi dicit Tsjovanna-Amelpodi *H. Malab. part. 6. Tab. 47.* huic proxime accedere.

A prioribus differt haec arbuscula foliis rotundioribus, crassioribus, nervosissimis, per quorum dorsum nervus flavus, validissimus ad summum usque decurrit: Flores caeterum sunt etiam oblongi, tubulati, in limbo quinquefidi & instar Borriginis ibi rotati, sed profundius secti. Flores hi & in summitate ramorum, & ex alis foliorum proveniunt multi simul collecti, post quos filiquae latae, longae, simplices, glabrae subsequuntur, seminibus longis, striatis, papposis coloris flavi repletae: Semina haec eleganter inter pappum vario ordine locantur, ut in data figura pulchre conspicitur.

NERIUM Indicum scandens, flore albo, filiquis geminis. *Nobis. Tab. 78. Fig. 2.* Apocynum Zeylanicum, Indicum, frutescens Nerii flore candidissimo. *Par. Bat. pag. 40. & Herb. Hart.* Nerium Indicum, folio non nihil mucronato. *Par. Bat. Pr. pag. 357.* Apocynum Zeylanicum, arboreescens. *Mus. Zeyl. pag. 2.* Apocynum arboreescens, flore albo, Caryophylli sylvestris facie, filiquis angustis, erectis, geminis. *Mus. Zeyl. pag. 42.* Pal-Valli *H. Malab. part. 9. Tab. 12.* quod Apocynum Malabaricum scandens, latifolium, flore rubescente, filiquis angustissimis, & longissimis. *Commel. in notis & Fl. Malab. pag. 6.* vocatur, & folia habet rotundiora, floresque minores. Jasminum (potius

*NERIUM Indicum scandens, flore
albo, siliquis geminis. Nobis.*

NERIUM Indicum, folio subrotundo, undulato, crasso, flore dilute rubente. Nobis.

tius Apocynum) Indicum, sylvestre, inodorum, filiquosum, seminibus papposis, floribus albis, amplis, IDDA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 47.* huc forte spectat, quod supra *pag. 25.* citatum est. Apocynum scandens, flore Nerii albo. *Plum. pl. Amer. pag. 82. Tab. 96.* an Arbor Indica, Nerii foliis splendentibus Belgarum. *Plukn. Almag. pag. 263?* IDDAGHAS Zeylonensibus dicitur per excellentiam ab *Idda*, quod florem notat ob floris structurae, & immaculati candoris pulchritudinem eximiam. *Ghas* arbor est, ut notatur in *Mus. Zeyl.*

Folia gerit haec arbuscula oblonga, glabra, splendentia, tenuia, viridia, venosa, brevi innixa pediculo, bina sibi invicem opposita, ut in aliis congeneribus, caulibus lignosis, flexilibus, cortice purpureo maculato ornatis, adfixa; flores tam in summitate ramorum, quam inter folia per caules sunt dispersi, pluresque simul collecti, candidi, tubulati, in quinque lacinias dissecti, post quos filiquae angustae erectae, geminae, in *Parad. Batav.* (ubi reliquam vide descriptionem) dicuntur subsequi, unde magnam adfinitatem habet cum illa *Tab. 77.* a nobis exhibita, diversae tamen sunt, ut etiam ex *Parad. Batav.* patet, plantae, & a Zeylonensibus diversis etiam indigitatae nominibus, atque haec species scandens ab *Hermanno* describitur, quum altera erecta dicatur, foliatura floribusque etiam differens. Hujus generis character invenitur apud *Linnaeum char. pl. gen. pag. 63.*

NICOTIANA. *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 126.* ubi dicit: Praebet nobis aquam, Oleum stillat. Ol. per infusionem, Conservam, ex qua varia vomitoria, quae certiora sunt, quam infusiones Croci metallorum, aut Vitri Antimonii. Participes vos reddo meliorum hoc in subiecto descriptionum. Ubi varias porro proponit formulas. &c.

NIWITIWAEL. *Mus. Zeyl. pag. 70.*

NUX Zeylanica, folio multifido, digitato, flore Merdam olente. *Par. Bat. Pr. pag. 357. Mus. Zeyl. pag. 61. Plukn. Phyt. Tab. 208 Fig. 3.* Nux Juglans Zeylanica, magna, bifida, flore puniceo, stercus humanum redolente, nucleis ovalibus, triplici cortice vestitis, oleosis. *Mus. Zeyl. pag. 5.* Lignum Americanum, foetidum, Merdam olens, Polefaulatio Lusitanis. *Par. Bat. Pr. pag. 346. in Plukn Mantiss. pag. 137.* huic Telabo congener esse videtur, qui prius in *Almag. pag. 266.* diversus putabatur. vide & *Ray. hist. pl. pag. 1754.* ubi quaeritur, an
Y
Telabo

Telabo fit Covalam *H. Malab. part. 1. Fig. 49.* sed propius accedit Karil *H. Malab. part. 4. Tab. 36.* vide & notas ad *H. Malab. part. 1. pag. 90.* Merda Papaveris, seu Lignum Stercoris *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 98.* ubi breviter haec habet: Haec arbor ita vocatur, quoniam fortiter olet, plus tamen ad stercus vaccinum, quam humanum accedit. Propter odorem incolae non ipsam cufant, sed utuntur ejus ligno cum ligno Santali contuso, & illud cum aqua sorbetur ad febres, morbos calidos, & puerorum aphtas curandas, dosis est drachma dimidia ad drach. unam. TELABO Zeylonensibus dicitur.

Nux Juglans, Moluccana, bifida, RATHAKAEKUNA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 6 & 24.* id est *Kaekuna* exoticum. Nuces fert Juglande majores, putamine, cortice duro, & nucleo constantes, ex quo oleum paratur copiosissimum: folia habet lata, acuminata, pediculis longis, flores gerit copiosissimos in summo ramulorum, ut describitur in *Mus. Zeyl.*

Nux Juglans, Zeylanica, minor, bifida, flore puniceo, NAWAGHAS Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 23.* ubi dicitur folia habet lata, & obtusa. Flores in summitate ramulorum.

Nux Zeylanica, Juglandis folio, AEMBARAELLA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 50. Par. Bat. Pr. pag. 357.* Domba-Gedy Zeylonensium, seu Nux Zeyl. Juglandis folio. *Par. Bat. Pr.* quae arbor Nucifera, fructu oblongo, rotundo, sub membranaceo, ligneoque putamine unicum nucleum oleosum, & odoratum includente. *Amm. char. pl. pag. 371.* in *H. Amst. tom. 1. Fig. 61.* exprimitur & dicitur, quod DOMBA-GEDY Zeylonensibus vocetur, in *Mus.* autem Zeyl. AEMBARAELLA, ubi & additur, quod haec arbor fructus proferat similes *Manghas*, quos Cinghali Muria condiunt, sicut Europaei Cucumeres.

Nux Moluccana, foliis instar Ricini, semine nigro. *Mus. Zeyl. pag. 34.*

Nux Zeylanica, rotunda, exitiosa, folio rigido, glabro, splendente, an eadem cum *Domba Vol. 2. Fol. 5. Mus. Zeyl. pag. 66.* & DOMBA *ibidem. pag. 15?* Nux oleosa DHUMBA Zeylonensibus dicta; quae est Nux Bengalensis Juglandifolia, fructu orbiculari. *Plukn. Almag. pag. 265.* DOMBA quae Nux Indica, foliis subrotundis, laevibus, splendenti.

dentibus, resinosa. *Amm. Char. pl. pag. 371.* Nucifera arbor, semper virens, Indiana, praelongis foliis, venuste venosis, cujus lignum REDWOOD, id est Erythroxylum Barbadosibus, Nux vero *Dhumba* Zeylonensibus dicta. *Plukn. Mantiss. pag. 136.* Mali persicae, Mameyae dictae, folio longiori; arbor maxima, cortice sulcato, cinereo, amaro. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 180. & Hist. part. 2. pag. 124.* De DOMBA in *Mus. Zeyl. pag. 15.* dicitur: Folia habet lata, subrotunda, nervis plurimis, directe a medio nervo ad margines tendentibus, floribusque quinquepetalis. *Domba* notat rotundum; fructus enim rotundi sunt ut globuli; ex fructibus exprimitur Oleum ad varios usus, ac praecipue ad Lampadas.

Nux Zeylanica, umbilicatis foliis. *H. Beaum. pag. 31.* Althaea arbor Indica, folio umbilicato, pallente. *Par. Bat. Pr. pag. 307.* Nux vesicaria, oleosa, foliis umbilicatis, ex insula Barbadosi. *Plukn. Phyt. Tab. 208. Fig. 1.* Arbuscula exotica, foliis umbilicatis, nuculam Nuculae Indicae sonoriae *J. B.* similem ferens. *Breyn. Prodr. 2. pag. 20.* a quo pro Pada-Kelangu *H. Malab. part. 7. Tab. 49.* habetur. quae multum sane differt & plane diversa est a *Pluknetii* Figura; reliqua porro synonyma vide apud *Plukn. in Almag. pag. 266.*

Nux Vomica Officinarum. *Mus. Zeyl. pag. 41.* Malus Indica, venenata, amara, nucleis argenteis, compressis, orbiculatis. *ibidem.* Nux vomica major, & Officinarum. *Par. Bat. Pr. pag. 357.* Colubriini ligni tertium genus in Malabar. vastae arboris magnitudine Acoetae. *G. B. Pin. pag. 301.* Solanum arboreum, Indicum, maximum, foliis Oenopliae, sive Napecae majoribus, fructu rotundo, duro, rubro, semine orbiculari, compresso, maximo, *Nuces Vomicae & Lignum Colubrinum* Officinarum ferens. *Breyn. Prodr. 2. pag. 92. & Fl. Malab. pag. 63.* ubi vide plura. *Caniram H. Malab. part. 1. Tab. 37. & Modira-Caniram part. 8. Tab. 24.* ubi omnino vide notas subjectas *pag. 47. & Samuel Dale Pharmacol. pag. 439.* Arbor Serpentina, seu Lignum Colubrinum & Nuces Vomicae. *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 95.* ubi haec habet: Arbor vocatur a Cinghalensibus GODHAKADURU. Magna est, atque ramos suos simul valde inter se commixtos, non secus ac serpentis, emittit. Ipsius folia potius rotundae, quam longae figurae cernuntur; Fructus, quos progignit, sunt notae illae *Nuces Vomicae Officinarum*, quae numero quodam in rotundissimo cortice conclusae

reperiuntur. Canes ab isto fructu rabiosi fiunt, & moriuntur. Homi-
nibus autem inferviunt ad venena. &c. Lignum mediocriter durum
est cum venis albis transcurrentibus. Optimum est Alexipharmacum
ad omnes venenosos affectus, adversus morsus venenosarum bestia-
rum, serpentum, &c. Adversus febres, scabiem &c. ut apud lau-
datum auctorem & alios latius explicatur. in *Mus. Zeyl.* dicitur,
quod GHODHAKADURA vocetur a *Ghodha* solo duro, quo nasci
amat, & *Duru* venenum; arboris enim fructus habentur venenati.
Lignum circumfertur per Europam nomine *Ligni Colubriini*. & in
Ray. hist. pl. pag. 1661. & tom. 3. pag. 117. Dendr. dicitur, quod
Ghad-Hokadura, quae Nux Vomica officinarum, folia habeat Canellae
Zeylanicae foliorum figura similia, itidem trinervia, sed breviora,
latiora, ac crassiora.

Hujus character a *Linnaeo* sequenti modo definitur. Calix regularis,
quinquefidus, parvus, petalum infundibiliforme, ad maximam partem
quinquefidum; stamina quinque, pistillum unicum petalo longius.
Pericarpium globosum, cortice fragili, unicapulari, pulpa repletum.
Semina quindecim in tribus phalangibus disposita, orbiculata, depressa.
Hujus & notas characteristics accurate satis descripsit *Amm. in char.*
pl. pag. 310 & 477. ubi vide.

Nux Zeylanica, Moschatae rotundae similis, inodora, minor. *Mus.*
Zeyl. pag. 49. Nucifera, seu Nux Indiae Orientalis, fructu minore
fusco. *Plukn. Almag. pag. 265.* IRYA & IRYAGHAS Zeylonensibus.

Nux Zeylanica, Moschatae rotundae similis, oblonga. *Mus. Zeyl. pag. 49.*
an Nux Myristica, sylvestris, Indiae Orientalis, fructu oblongo,
Plukn. Almag. pag. 265? & Noce Moschata *Acost. edit. Ital. pag. 78.*

Nux Myristica, oblonga, Malabarica, *Mus. Zeyl. pag. 59.* Nux Myri-
stica, major, spuria Malabarica. *Ray. hist. pl. pag. 1524. & Fl. Malab.*
pag. 48. Nux Indica, oblonga, intrinsecus similis Nuci Moschatae
J. B. tom. 1. pag. 399. Nux Myristica spuria, seu Panan Palka *H.*
Malab. part. 4. Tab. 5. ubi vide notas. & Plukn. Almag. pag. 265.
Avellanae Indicae genus oblongum. *Clus. in Garz. pag. 189.* Nux
Myristica, mas, Palala prima. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 2. cap. 8.*
ubi cum Panan Palka *H. Malab.* jungitur. & huic Nux Myristica mas
Clus. exot. lib. 1. cap. 16. eadem habetur.

NUX

NUX Moschata, spuria, sylvestris,
Caryophylli arboris foliis, oppositis. Nobis.

NUX Moschata, spuria, sylvestris, Caryophylli arboris foliis, oppositis. *Nobis. Tab. 79.* Pseudo-Nux Moschata, sylvestris, Zeylanica. *Herb. Herm.* Nux Moschata, spuria, quae Pseudo-Nux Moschata, Zeylanica, **IRYAGHEDHI** Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 58.*

Arboris hujus rami sunt recti, duri, caulem gerentes scabrum, purpureum, rotundum, e quo folia opposita, petiolis firmis, lignosisque infidentia erumpunt, triuncialia, ovato-acuta, glaberrima, & splendentia, inferius caesia. De flore, fructuque nihil dicere possum, quum nostrae deficient plantae, nec ullibi bene haecenus descriptos invenerim; tubercula enim, seu coni in summo ramorum apparentes, potius gemmae, quam quidem fructus sunt in *Rumphii herbario Ambo-nico*, ubi plures Nucis Moschatae occurrunt species, forte descripti erunt accurate flores & fructus, quod opus, quum hic per quadraginta annos jam delituerit in domo Societatis Indiae Orientalis, a gubernatoribus illius societatis impetrata venia, in lucem edere est animus, ni sumptus, qui ad tale opus cum Figuris imprimendum requiruntur, exorbitantes illud impediant.

NYADA. *Mus. Zeyl. pag. 56.* quod pronunciatur *Niaenda*. Incolae hujus plantae folia diducunt, ex quibus chordae conficiuntur, ut notatur in *Mus. Zeyl.*

NYMPHAEA Indica, tuberosa, foliis per marginem crenatis; flore incarnato: seu Lotus Ægyptia Theophr. *Mus. Zeyl. pag. 19.* Lotus Ægyptia apud Theophr. occurrit *pag. 449 & 450.* Nymphaea, seu Nufar *Veslingii cap. 34. pag. 42.* Nymphaea Ægyptiaca, alba, folio crenato, radice tuberosa. *Bobart. hist. Oxon. tom. 3. pag. 513.* Nymphaea alba, major, Ægyptia; *Amm. char. pl. pag. 461.* Ambel *H. Malab. part. 11. Tab. 26.* quae Nymphaea Indica, flore albo, folio in ambitu ferrato a *Commel.* in *notis* vocatur. vide & *Ray. tom. 3. pag. 630.* *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 120. & Hist. part. 1. pag. 252.* **OLU-ALLA** Zeylonensibus, ab *Olu* quod caput in genere notat. *Alla* radix est.

NYMPHAEA alba, Indica, maxima, flore albo, fabifera. *Mus. Zeyl. pag. 66.* Nymphaea Indica, Faba Ægyptia dicta, flore incarnato. *Par. Bat. pag. 205.* ubi elegans Figura & descriptio. Nymphaea Indica, maxima, Faba Ægyptia *Stapel in Theophr. Par. Bat. Pr. pag. 358.* quae apud Theophr. *lib. 4. cap. 10. pag. 446. & Dioscorid. lib. 2. cap. 99.* invenitur

nitur descripta & depicta. Nelumbo Zeylonensium. *Tournef. inst. pag. 261.* Nymphaea Indica, Faba Ægyptia dicta, flore incarnato. *Ray. tom. 3. pag. 632.* ubi pro Tamara *H. Malab. part. 11. Tab. 30.* habetur, quae a *Commel.* in notis Nymphaeae affinis, Malabarica, flore amplo, rosaceo, albicante vocatur. vide & *Fl. Malab. pag. 48.* Nymphaeae adfinis glandifera, Malabarica, umbilicato folio ampliore, flore pleno, candido. *Bobart. Hist. Oxon. tom. 3. pag. 514.* ubi pro Beru Tamara *H. Malab. part. 11. Tab. 31.* habetur, quae variationes sunt floribus differentes. vide & *Plukn. Almag. pag. 267.* & *Amalib. pag. 156.* Nymphaea Indica, fiore incarnato, NELUMBO Zeylonensium, & Tamara *H. Malab. Amm. Char. pl. pag. 490.* Nymphaea Indica major, Taratti. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 11. cap. 50.* NELUMBO Zeylonensibus vocatur. hujus virtutes medicas cum synonymis habet etiam *Dale in Pharmacol. supplem. pag. 218.* ad Fabam Ægyptiam Officinarum, & Characteristicam notam *Linnaeus in char. pl. gen. pag. 149.* *Grimm. in Labor. Ceyl. pag. 131.* ad caput de Nymphaea haec habet: Exinde proveniunt nobis Aqua, Syrupus, Conservae, Ol. coctum: quae omnia maxime sunt usitata tum in Medicina, tum in Chirurgia. Aq. Syrup. & Conserv. fluxus ardentes, calidas febres, & Cephalalgias curandi virtutem habent. item sanguinis vomitum, Haemorrhagiam, & fluxus mulierum. Oleum inservit & Inflammationibus, Ulceribus & Combustionibus. in Clysteribus ingrediuntur, ut emolliant & tormina mitigent acrium excretionum.

OCYMUM Zeylanicum perenne, odoratissimum, latifolium. *Nobis. Tab. 80. Fig. 1.* Ocymum Zeylanicum perenne, frutescens, folio Calaminthae non nihil simili. *Par. Bat. Pr. pag. 358.* Ocymum Zeylanicum, frutescens, folio Calaminthae *Hermannii* apud *Ray. tom. 3. pag. 290.* Basilicum Zeylanicum, latifolium, odoratissimum. *Mus. Zeyl. pag. 35.* Cottam *H. Malab. tom. 10. Tab. 77.* quae in notis Nepetae, seu Menthae Catariae affinis, Indica, flore candido. vide & *Commel. Fl. Malab. pag. 47.*

Caulis nostrae plantae est simplex, bipedalis, quadragonus, hirsutus; folia ad radicem subrotunda, utrinque acuminata, crenata, villosa, petiolis tenuibus insidentia, folia caulis oblonga, angustiora & breviora, petiolis uncialibus cauli adfixa, quem terminat spica triplex, laxa, flores reflexos, pendulos gerens, qui cum seminibus eodem modo,

OCYMUM Zeylanicum, annuum, inodorum. Herb. Hart.

OCYMUM Zeylanicum perenne, odoratissimum, latifolium. Nobis.

4538. *Ocimum gratissimum* L.
6?

do, ut in reliquis Ocymi speciebus, sese habent. Communicavit nobiscum hanc Botanices & Botanicorum Mecaenas D. Georg. Cliffordius.

OCYUM Zeylanicum, perenne, odoratissimum, angustifolium. *Nobis.* Ocymum Zeyl. perenne, odoratissimum. D. *Hermans* apud *Ray.* tom. 3. pag. 290. Ocymum Maderasp frutescens, gratissimi odoris, flore parvo, cauliculis villosis. *Plukn. Phyt. Tab. 208. Fig. 4.* an Ocymum frutescens, perenne, flore parvo. *Breyn. Prodr. 2. ibidem?* quod apud *Ray. loco cit.* a priori distinguitur, & sequenti modo breviter describitur: Folia parva sunt, Calaminthae minora, longiora, acutiora, per margines serrata, pediculis satis longis innixa. Flores in summo caule in spicam longam, angustam digesti, nullis foliis intermixti sunt.

OCYUM Zeylanicum perenne, foliis angustioribus. *Herm.* apud *Ray.* tom. 3. pag. 290. an Ocymum pratense, Indicum, odore Calaminthae. *Mus. Zeyl. pag. 51?* apud *Ray.* a prioribus & haec distinguitur, atque sequentem in modum describitur. Folia huic, quam praecedenti sunt longiora paulo, longioribus pediculis haerentia. Flores majores, spicae autem non tantum in summo caule, sed etiam in ramulis è foliorum alis exeuntibus proveniunt. Floris galea est bifida, subviridis, labium album, angustum, parvum.

OCYUM Zeylanicum, annuum, inodorum. *Herb. Hart. Tab. 80. Fig. 2.* Ocymum forte Zeylanicum, vulgare. RATHATALA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 41.*

Tota haec planta hirsuta est, folia gerens ovata, crenata, subrotunda, laevissime hirsuta, petiolo unciali infidentia: Caulis quadragonus, hispidus, hirsutus, viridis. Calices & flores Ocymi; sed qui ad alterum latus magis sunt flexi, quam in aliis speciebus.

OCYUM Zeylanicum, *Karnitholeschi* Malabarorum, KOLLAN-KOLLA Zeylonensium. *Mus. Zeyl. pag. 52.* ubi additur; specificum est in Cephalalgia, Cinghali facculo indunt, & capiti imponunt.

OCYUM Indicum, odoratissimum, *Mangiriquam Clusii* TALA-KOLA Zeylonensium. *Mus. Zeyl. pag. 61 & 67.* Mangiriquam apud *Clusium* occurrit in *exot. pag. 239.* ad caput de *Anil.*

ONOBRYCHIS Zeylanica, monophyllos, caule triangulo, petiolis foliorum alatis. *Nobis. Tab. 81.* Onobrychis Zeylanica, Aurantii folio. *Petiv. Hort. sicc. in Ray. tom. 3. append. pag. 247. no. 16.* Hedyfarum Zeylanicum, Aurantii folio. *Nobis supra pag. 120.* Hedyfarum Monophyllum, flore coerulescente. *Hart. Catal. semin.* Huc usque fere inpressio hujus operis jam erat absoluta, quum Hortum Medicum perambulanti, & plantas exoticas in Hypocaustis examinanti forte fortuna sese obferebat elegans haec, & nunquam antea mihi visa planta, quam ex seminibus quondam ex Zeylona ab *Hartog* transmissis hoc anno protulit Hortus Medicus, quae licet nondum perfecta sit, nec flores fructusque in hunc usque diem dederit, hac occasione, quum a nullo Botanicorum hucusque descriptam, vel expressam invenerim, & publico offerre, ejusque figuram cum brevi descriptione huic operi inferere debui, & volui.

Quae ex radice fibrosa plurimos simul attollit ramos, majores minoribus interpositos, qui in spithamalem longitudinem hoc anno excrevere, quorum caules sunt scabriusculi, subhirsuti, purpurascens, triangulares, & fulcati, folia alterna emittentes, quae ex eorum alis squammulas duas foliaceas oblongas, acutas, strigosas producant: folia haec petiolis insident sesquiuncialibus, viridibus, foliaceis, membranula scilicet tres circiter lineas lata totum petiolum undique ambiente, unde alatus penitus est, ad cujus supremum producitur folium latum, subrotundum, acutum, Aurantii forma proxime conveniens, quod superius viride & scabrum, inferius pallidum, & laeviter hirsutum observavi, & licet haec planta flores fructusque nondum examinandos praebuerit, certus tamen sum ex toto ejus habitu ad *Hedyfarum* ablegandum esse, ut annus forte subsequens, quum floreat haec planta, determinabit, cujus in posterum data occasione flores fructusque describam & exhibebo, sin examinare illos licuerit; interim qualis sit, hac rara contenti sitis, Botanophili, planta.

ORCHIS caule ad summum folioso. *Nobis.* Orchidis species, caule ad summum folioso. *Mus. Zeyl. pag. 22.*

ORCHIS caule cubitali; spica parva, longa, rara. *Nobis.* Orchidis species, caule cubitali, spica parva, longa, rara. *Mus. Zeyl. pag. 23.*

ORCHIS

ONOBRYCHIS Zeylanica. monophyllos, caule triangulo, petiolis foliorum alatis. Nobis.
5504 Hedysarum triquetrum L.

*ORNITHOPODIUM Zeylanicum, arborescens,
Lavandulae foliis, flosculis rubellis. Nobis.*

ORCHIS Zeylanica, facie Gladioli, bulbo pyramidali, compresso, viridi, succoso. NARIALA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 63.*

ORNITHOGALUM Zeylanicum, macrorizon. DYABAERALYA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 55 & 56.*

ORNITHOPODIUM Zeylanicum, arborescens, Lavandulae foliis, flosculis rubellis. *Nobis. Tab. 82.* Spartium Zeylanicum, arborescens, flore parvo, rubello. *Herb. Hart.* Orobus Zeylanicus, glaber, flore rubro. *Par. Bat. Pr. pag. 359. & Plukn. Almag. pag. 273.*

Planta est frutescens, caule glabro, laevissime hirsuto, rotundo, cinereo; ramos hinc inde spargens plurimos, in minores absque ordine divisos. Folia ad gemmas erumpunt plurima, in quibusdam solitaria, forma & colore foliorum *Lavandulae* oblonga, pediculis brevibus adfixa, integerrima, nervo longitudinali proveniente subtus firmata, undique villo albicante vestita: in summis ramulorum prodeunt flosculi in spicam brevem, densam congesti, qui calicibus quinquedentatis, minimis insident; flores sunt minimi, rubelli, quibus succedunt filiquae plurimae, teretes, articulatae, in quinque articulos distinctae, dissepimentis parvis, laeviter compressis, ad semina protuberantibus: Siliquae ipsae sunt laeviter incurvatae, subhirsutae, plurimae in capitulum collectae, semina recondentes subrotunda, glabra, splendentia, nigra.

OROBUS Indicus, ABRUS *Alpini* dictus, fructu coccineo, macula nigra notato. *Nobis.* Orobus Americanus, fructu coccineo, macula nigra notato. *Tournef. inst. pag. 393.* Vicia Zeylanica, tota parte dulcescens, fructu coccineo, rotundo, hilo nigro notato. *Herb. Hart.* Glyzyrrhiza Indica, fructu coccineo, rotundo, hilo nigro notato. *Mus. Zeyl. pag. 16.* Glyzyrrhiza Indica, filiquis & seminibus Pisi coccineis, hilo nigro notatis. *Par. Bat. Pr. pag. 337. & Commel. Fl. Malab. pag. 33.* Cicer Indicum, fructu rubro, macula nigra notato, vel ABRUS. *Amm. Char. pl. pag. 338.* ABRUS *Alpini*, qui partim Phaseolus, partim Cicer, fructu rubro, macula nigra notato. *H. Oxon. pag. 71. Amm. Char. pl. pag. 241.* Abrus frutex, Zaga. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 7. cap. 31. & Vicia Africana Clus. exot. lib. 4. pag. 15.* Pisum Indicum, coccineum, hilo nigro notatum, ABRUS *Alpini.* *Amm. H. Bosian. pag. 28.* Phaseolus alatus, sive Abrus minor, fructu

coccineo, macula nigra notato. *Moris. hist. pl. part. 2. pag. 67 & 71. Amm. Char. pl. pag. 514.* Pisum Indicum, minus, coccineum. *C. B. Pin. pag. 343.* Abrus *Alpini de plant. Egypt. cap. 21. pag. 32.* Phaseolus Indicus *Bontii pag. 136.* Pisum Americanum, coccineum, aliis Abrus *J. B. tom. 2. lib. 17. pag. 263.* Konni *H. Malab. part. 8. Tab. 39.* qui Phaseolus alatus, major, fructu coccineo, macula nigra notato. *Commel. in notis. & Fl. Malab. pag. 53.* Abrus Officinarum. *Samuel Dale Pharmac. supplem. pag. 182.* qui hujus duas facit species, ut & etiam *Pluknetius*; quae tamen ab *Hermanno* pro una habetur. Primo ABRUS vulgaris, a plurimis jam denominatus, a *Pluknet.* vocatur Phaseolus arborescens, alatus, & volubilis major, Orientalis, fructu coccineo, hilo nigro notato in *Phyt. Tab. 214. Fig. 5. & Almag. pag. 294.* dein Phaseolus alatus, minor, Americ. Glycyrrhizae sapore, & filiquis Orobi, feminibus nigris, hilo coccineo notatis. *ibidem. & Phyt. Tab. 210. Fig. 6.* ubi filiquarum Figurae exhibentur, & Viciae folia ipsi adscribit. sed Glycyrrhizae sapor priori ab *Hermanno* & aliis etiam adtribuitur, ut patet ex *Mus. Zeyl. pag. 16.* ubi dicitur: tota planta dulcissimo est sapore, maxime radix, ex qua succum Glycyrrhizae vix cedentem decoxi. &c. *Sloan. in Catal. pl. Jam. pag. 70.* has etiam conjungit; ubi vocatur Phaseolus Glycyrrhizites, folio alato, piso coccineo, atra macula notato, ubi *pag. 70, 71 & 221.* plurima hujus vide synonyma multo labore congesta, & optimam ejus etiam Figuram in *Hist. Jam. part. 1. pag. 180. Tab. 112. Fig. 4, 5, 6.* OLINDA & OLIDA Zeylonensibus dicitur.

OXYS Indica, Tamarindi foliis, floribus umbellatis. *Nobis.* Oxalis lutea, flosculis & feminibus; quae herba sentiens *Bontii*; & Herba viva *Acoftae. Mus. Zeyl. pag. 5 & 37.* apud *Bontium* occurrit *pag. 120.* & Herba viva *Acoftae* apud *Clus. in exot. pag. 290.* descript. apud *Acoft. edit. Ital. pag. 181.* & apud *Clus. cap. 55.* Herba viva, angustifolia, Zeylanica. *Breyn. Prodr. 22. pag. 55.* Herba sentiens, Daun-Tacot-Manusia. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 79.* ubi icon & descriptio cum aliis Mimosae speciebus. Herba viva foliis Polypodii. *C. B. Pin. pag. 360. & Fl. Malab. pag. 35.* Herba viva foliis & floribus, longis pediculis uni thyrsi insidentibus, Ambonica. *Rumph. Eph. Germ. anni 11. observ. 32.* Oxoides Malabarica, sensitiva, caule viridi, glabro, flore luteo, majore. *Garcin. Act. Angl. ann. 1730. pag. 377. Tab. 2.* & Oxys Indica, non acida, Tamarindi foliis sentientibus, umbellatis, floribus

bus in summo pediculo luteis, umbellatis. *Herbar. Garcin.* qui hac inscriptione mecum illam communicavit: Acetofella herba, Mimosae foliis, sentiens. *Herb. Herm.* Pentaphylloides Zeylanicum, erectum, Mimosae foliis, flore luteo. *Herb. Hart.* Mimosa humilis Indiae Orientalis, simpliciter pinnatis Tamarindi foliis, floribus coronariis, flavis, lituris rubris eleganter striatis. *Plukn. Almag. pag. 252. & Mantiss. pag. 131.* ubi varia insuper hujus synonyma inveniuntur. *Todda-Vaddi. H. Malab. part. 9. Tab. 19.* ubi vide notas & *Totta-Vari Zanon: Tab. 61. pag. 199.* NIDIKUDDA Zeylonensibus, quod pronuntiatur NIDIKUMBA; a *Nidi* dormire & *Cumba* somnum, nam plantulae folia tacta, quasi dormientia placide decumbunt ac flaccescunt, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 5.* Generis hujus characterem habet *Linnaeus in Char. gener. pl. pag. 134.* ubi OXALIS vocatur. Descriptioni *H. Malab.* pauca subjungam, Figuram non addens; quum a variis jam bene exhibita sit, & in *Rumphii Herbar. Ambon.* satis ample descripta in posterum inveniri poterit. Radix itaque nostrae plantae est tenuis, fibras undique capillares spargens, e qua caulis oritur semipedalis, simplex, nudus, laevis, in summitate caulis ex unico veluti centro crassiusculo progerminant petioli, quibus folia plurima, decem vel plura pinnarum paria, adfiguntur sine impari, inter foliorum ortum plures pedunculi tri- vel quadriunciales proveniunt, longitudine fere foliorum, apice gerentes capitulum squammosum; inter singulam squammam prodit alius pedunculus brevissimus, unicum sustinens florem. Flores & filiculae in *H. Malab.* accurate satis descriptae sunt; sed notandum, quod si fructus ad justam maturitatem pervenerit, cum impetu, & satis magna vi semina sua explodat, ut in loco natali saepius *Dnus Garcin* sese observasse mihi asseruit, ita ut vera haec *Oxidis* sit species, quae in omnibus fere Indiae locis invenitur, & occurrit, atque egregiis etiam pollet viribus; radix enim decocta calculosis summo opere prodest, ac semina ad apostemata externe, interne ad Gonorrhaeam conducunt.

Oxys flore luteo, vulgaris, minor, Zeylanica. *Breyn. Prodr. 2. pag. 80.* Oxys lutea, Indica, Daun Assan, Kitsyl. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 64.* ubi cum illa *Clus. lib. 6. rar. pl. pag. 59.* eadem habetur. Trifolium acetosum, Zeylanicum, corniculatum, flore luteo, AEM-BULLAEBILYA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 60.* Trifolium filiquosum, rotundifolium, glabrum, floribus luteis è Maderaspata.

Plukn. Phyt. Tab. 231. Fig. 4. Trifolium acetosum, corniculatum, luteum, minus repens, & etiam procumbens. *Moris. hist. pl. pag. 180.* & *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 90.* ubi plurima hujus exhibentur synonyma.

PABA foliis incisfis *Mus. Zeyl. pag. 6.* ubi dicitur, pronunciatur *Paniba.* & infervit ad sepes struendas.

PABA foliis non incisfis. *Mus. Zeyl. ibidem.*

PADHULWANASSA. *Mus. Zeyl. pag. 6.* a *Padbul* quod aurificem, & *Wanassa* quod inpotentiam denotat, & est quasi dictum *aurifex non potest.* quia aurifices omnium rerum imagines praeter hujus plantae possunt exprimere; ut notatur in *Mus. Zeyl.*

PAELAE. *Mus. Zeyl. pag. 24.*

PALMA Indica, vinifera, fructibus urentibus, folio Adianthi saccharum praebens. *Mus. Zeyl. pag. 44.* an Palma vinifera, fructu ex arboris trunco spinoso. *C. B. P. pag. 307?* Palma humilis ex insula Macassar, Indiae Orientalis, nucleo plerumque gemello, Nucis Moschatæ instar versicolore, KITTIEL Zeylonensibus dicta. *Plukn. Almag. pag. 277.* an Palma foliorum pediculis spinosis, fructu pruniformi, luteo, oleoso? *Sloan. Cat. pl. Jam pag. 175.* ubi recensetur pro Palma, ex cujus fructibus Oleum, vinum, acetum &c. extrahuntur: huc spectat Schunda-Pana *H. Malab. part. 1. Tab. 11.* quae est Palma Indica, folio bicomposito, fructu racemoso. *Ray. hist. pl. pag. 1365.* & *Fl. Malab. pag. 50.* & Palma dactylifera, fructu acerrimo. *Plum nov. pl. gen. pag. 3.* cum qua proxime convenit Saguaster major, Nibum Besoar. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 1. cap. 14.* Caryota hoc genus a *Linnaeo in tractat. de Musa Clifford. pag. 12.* vocatur, ubi accuratissime ejus notae characteristicae recensentur. primusque est, qui Palmarum species in varias classes seu genera distinxit, intricatasque illarum notas in eleganti illo tractatu explicavit, & in ordinem redegit. & *Kettule Robert. Knox hist. Ceyl. edit. Belg. pag. 21.* ubi ita describitur: Recto adsurgit haec arbor trunco, sed non tam alta, nec ita crassa est, ac *Cocigera* arbor, lignum non ultra tres digitos crassum, durum, solidum, & grave: intus nihil aliud reperitur, nisi medulla alba, ut in arbore *Tailipot.* Succum dat, qui vocatur *Tellegie*, dulcissimus hic est, & jucundi

jucundi saporis, maximeque proficiuus corpori humano, verum non aqua fortior, nec inebrians est hic succus, bis de die petunt ex hac arbore illum, & si optima sit arbor, ter de die; vulgaris arbor duodecim, quaedam sexdecim praebebat amphoras, immo aliae plures uno de die, hunc succum coquunt, & conficiunt inde saccharum rubrum *Jaggory* illis dictum, quod etiam arte quadam albissimum reddi potest. Arbor haec KITULAETHA & KITUL Zeylonensibus dicta est. *Kitulraena* ejus fructus, & *Kitulmala* ejus flores vocantur. ut notatur in *Mus. Zeyl.*

PALMA Indica TAL & TALGHALA dicta, fructu carnosio, dulci & eduli putamine incluso. *Mus. Zeyl. pag. 49.* Pro Carim Pana haec a Dom. Syen. habetur in *notis ad H. Malab. part. 1. pag. 12.* ubi vocatur Palma coccifera, complicato folio, fructu minore. & *Commel. Fl. Malab. pag. 49.* quae est Palma coccifera, folio plicatili, flabelliformi, foemina, Carimpana *H. Malab.* Palmera Brava foemina Lusitanis. *Ray. in hist. pl. pag. 1366.* sed ab hac arbore TAL seu TALGHAHA diversam esse dicit. Carimpana haec a *Plumier. in nov. pl. gen. pag. 2.* vocatur Palma coccifera, complicato folio, fructu minore, *Pauli Hermans. & Linnaeo in tractat. de Musa Cliffort. pag. 13.* est Borussus foemina, ubi nota ejus characteristica exhibetur. cujus mas est Ampana *H. Malab. part. 1. Tab. 10.* quae *Plumierio* est Palma Malabarica, flosculis stellatis, fructu longo, squamato. Hujus fructus cum carne exteriori *Talghaedi* Zeylonensibus vocantur. & *Talaetha* ossiculum fructus carni seu putamini inclusum, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 49.*

PALMA Zeylanica, folio longissimo & latissimo, TALA & TALAGHAS dicta. *Mus. Zeyl. pag. 54.* Palma montana, folio plicatili, flabelliformi, maximo, semel tantum frugifera, *Ray. hist. pl. pag. 1367. Plukn. Almag. pag. 277.* Codda-Panna, seu Palma montana, Malabarica. *H. Malab. part. 3. a Tab. 1. ad 13.* ubi in notis Palma montana, Malabarica, folio magno, complicato, acuto, flore albo, racemoso, fructu rotundo *ibidem & Commel. Fl. Malab. pag. 50.* ut & *Plumier. nov. pl. gen. pag. 3.* & in notis *pag. 6.* a *Joh. Commel.* huic jungitur Arbor foliis sex brachiorum longis, cujus folio extenso tres quatuorve viri in itinere operiuntur, ut pluvias non metuant *Casp. Bauh. in Pinac.* *Corvpha* haec a *Linnaeo in tract. de Musa Cliffort. pag. 11.* vocatur. Talli-

pot a *Knox* vocatur in *descript. insul. Ceyl. pag. 20.* cujus descriptionem Latine versam tradit *Ray. in hist. pl. pag. 136.* TALAGHAS h. e. arbor TALA & TALAGAYA Zeylonensibus dicitur.

PALMA Indica, Coccifera, angulosa, *C. B. P. pag. 508. Par. Bat. Pr. pag. 361. Mus. Zeyl. pag. 50. Plukn. Almag. pag. 275. Ray. hist. pl. pag. 1356. Sloan. Cat. pl. Jamaic. pag. 132. Hist. Jam. vol. 2. pag. 8. Commel. Fl. Malab. pag. 50.* apud quos plurima invenies synonyma. Palma major Coccifera, Tenga *H. Malab. H. Beaum. pag. 33. Plum. nov. pl. gen. pag. 2.* Palma nucifera, Indica, major. *Fonst. dendr. pag. 145.* Palma, sive Nux Indica, vulgaris Cocos ferens. *Parkins Theat. pag. 1596. Inaia Guacuiba, vulgo Cocos. Pison. pag. 130. Coccus Clus. lib. 1. aromat. cap. 26. pag. 191. & Linnaei in tract. de Musa Cliffort. pag. 11. Coccus Officinarum. Dale Pharm. supplem. pag. 258.* ubi vide reliqua. Arboris hujus elegantes occurrunt Figurae in *H. Malab. part. 1. Tab. 1, 2, 3, 4.* nomine Tengae, ubi consule notas, & *Joh. Freyer in itiner. per Indiam.* hujus etiam bonam habet Figuram & *descript. pag. 9 & 10.* nec non *Rumph. in Herbar. Ambon. lib. 1. cap. 1.* ubi Palma Indica major, Coccifera, Cocos & Calappa vocatur, qui amplam hujus arboris habet descriptionem & optimas etiam Figuras. Cocos sive arbor Crepitaculorum a *Grimm. in Labor. Ceyl. pag. 101.* vocatur. ubi haec habet: Praeter suam satis agnitam utilitatem suppeditat nobis in gratiam Medicinae, Chirurgiae & Alchimiae pulcherrimum quoddam acetum destillatum, quod in quibusvis casibus melius est quam Acetum Vini. &c. Oleum recens e putaminibus ejus expressum optime commendatur, etiam pro Chirurgia, praesertim in adustionibus, etenim valde refrigerans est & dolorem mitigans, ubi porro bonum unguentum ad adustiones praescribit: Cocos haec nobis inservit loco lactis, Amygdalarum, pro fluoribus alvi, refrigerat & moderatur acrimonias lutosarum materiarum in visceribus. Optimum etiam est in Gonorrhoea, Urinae ardoribus, quos cito pacificat. & Oleum recens expressum aequè bonos effectus operatur, quam Oleum Amygdalarum. POLGHAHA haec arbor Zeylonensibus dicitur.

PALMA Indica, minor, fructu *Areca* dicto, vulgaris. *Mus. Zeyl. pag. 51.* Palma Arecifera, nucleo versicolore, Nuci Moschatae similis. *Par. Bat. Pr. pag. 361. Fl. Malab. pag. 50.* ubi varia adsunt synonyma. a *Plukn. in Almag. pag. 257. & in Phyt. Tab. 309. Fig. 4.* exprimitur, quae cum
Caunga

Caunga *H. Malab. part. 1. Tab. 5, 6, 7, 8.* vix quadrat. Palma, cujus fructus sessilis *Faufel* dicitur *C. B. P. pag. 510. Plum. nov. pl. gen. pag. 2.* Palma *Faufilifera. Jonst. dendr. pag. 151.* Palma, cujus succus inspissatus, *Terra Japonica* seu *Catechu* *Officinarum Dale Pharm. pag. 386.* ubi varias auctorum opiniones de ea tradit, quas collegit *Wedelius in Ephemer. German ann. 2. obs. 128.* *Faufel*, seu *Areca*, *Palmae* foliis. *J. B. tom. 1. pag. 389.* *Nux Faufel*, seu *Pinangh Bont. pag. 90.* *Areca*, seu *Faufel*, sive *Avellana Indiana*, versicolor *Park. Theat. pag. 1642.* *Ray. hist. pl. pag. 1363.* *Pinanga Areca*, seu *Nux Faufel*, *Pinangh. Rumph. Herb. Ambon. lib. 1. cap. 5.* ubi elegans Figura cum ampla descriptione, & aliis hujus speciebus inveniuntur. &c. **PUWAK-GHAHA** Zeylonensibus dicitur.

PALMA Indica, minor, regia, fructu *Areca* dicto, rubente. *Mus. Zeyl. pag. 66.* Palma, cujus fructus oblongus, faufel similis *C. B. Pin. pag. 510.* Secunda haec species *Pinangae sylvestris*, globosae a *Rumph. in Herb. Ambon. lib. 1. cap. 7.* descripta, ut si editum fuerit hoc opus, melius constabit. **LENATAESI** haec proprie dicitur Zeylonensibus.

PALMA Dactylifera, major, & *Dactylus* vulgo. *Par. Bat. Pr. pag. 360.* Palma major *C. B. Pin. pag. 506. Mus. Zeyl. pag. 69. Plum. nov. pl. gen. pag. 2.* Palma *Dactylifera. Linschot. part. 4. Ind. Orient. Fig. 14.* Palma *J. B. tom. 1. pag. 351. & Ray. hist. pl. pag. 1352.* Palma vulgaris. *Park. Theat. pag. 1545.* Palma *Dactylifera*, major, vulgaris. *Jonst. Dendr. lib. 2. pag. 138.* ubi reliquos adlegatos vide auctores, nec non apud *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 174.* qui innumera fere habet synonyma. & *Hist. part. 2. pag. 111.* Haec est *Phoenix* veterum apud *Kaemph. in amoenit. exot. pag. 669.* qui quam amplissime & accuratissime hujus, & etiam aliarum specierum, historiam & figuram dedit. hujus character exactissime definitur a *Linnaeo in tract. de Musa Clifort. pag. 12.* ad **PHOENIX** *Kaemph. INDI & MAHAINDI* Zeylonensibus.

PALMA Dactylifera, minor, humilis, sylvestris, fructu minore. *Par. Bat. Pr. pag. 361. Mus. Zeyl. pag. 69. Plukn. Almag pag. 277.* Palma *Dactylifera*, minor, Zeylanica, humilis. *Mus. Zeyl. pag. 66* de hac vide *Kaemph. in amoenit. exot. pag. 667. & H. Malab. part. 3 Tab. 22, 23, 24 & 25.* ubi *Katou-Indel* vocatur, & in notis Palma sylvestris, Mala-

Malabarica, folio acuto, fructu Pruni facie. vide & *Fl. Malab. pag. 50.*
HININDI Zeylonensibus dicitur.

PANAGHAS. *Mus. Zeyl. pag. 5.*

PAPAYA, foemina. *Nobis. Papaya. Mus. Zeyl. pag. 66.* Papaya Melo-
peponis effigie. *Plum. pag. 659.* Pepo arborefcens, feu Papaya Orien-
talis, foemina five fertilis. *Col. in Rech. pag. 870. Par. Bat. Pr. pag. 362.*
& *Fl. Malab. pag. 51.* Arbor Melonifera. *Mus. Zeyl. pag. 58. & Bontii*
pag. 159. Papaya Peruviana. *J. B. tom. 1. pag. 147. Mus. Zeyl. pag. 60.*
Papayamaram *H. Malab. part. 1. Fig. 15. ubi pag. 24. vide notas, &*
Merian. infect. Surin. pag. 40. Papaya major, flore & fructu majoribus,
pediculis curtis infidentibus. *Sloan Cat. pl. Jam. pag. 202. qui plurima*
habet synonyma. vide & Hist. Jam. vol. 2. pag. 164. Mamaera Foe-
mina *Park. Theat. pag. 1649. Ray. hist. pl. pag. 1370.* PAEPOL & PA-
POLGHAHA Zeylonensibus.

PAPAYA mas. *Boerb. Ind. Hort. Lug. Bat. part. 2. pag. 170.* Mamaera
mas. *Parkins. Th. pag. 1649. Clus. cur. poster. pag. 80.* Pepo arbore-
fcens mas feu sterilis. *Par. Bat. Pr. pag. 362. Fl. Malab. pag. 52.*
Amba Paya *H. Malab. part. 1. Tab. 15. ubi in notis Papaya Orien-*
talis mas feu sterilis a Commel. vocatur. Pinoguacu mas. *Pison pag. 159.*
Quum auctores has separavere, & nos eos fecuti fuimus, est autem
proprie una eademque arbor, ut Cannabis mas & foemina est una ea-
demque planta. Unde & alii melius has combinarunt, ut fecit *Plukn.*
in Almag. Botan. pag. 145. ubi vocatur Ficus arbor utriusque Indiae
Platani foliis, μονοτελεχης, fructu Mali Cydonii aut Melonis magni-
tudine, & utriusque Figuras exhibet in Phyt. Tab. 278. Rumphius in
Herbar. Ambon. lib. 1. cap. 44. utrasque conjungens describit, & simul
etiam exhibet earum figuras, nomine Papajae Maris & Foeminae.

PARONYCHIA foliis ad genicula confertis, acutis, floribus umbella-
tis. *Nobis. Tab. 65. Fig. 2.* Limonium Zeylanicum, folio minutissi-
mo, habitu toto quasi argenteo. *Herb. Hart.* Gramen pratense, Gal-
lii folio, umbella alba, florida, Amaranthoide. *Mus. Zeyl. pag. 42.*
Gramen Zeyl. pratense, Gallii foliis, umbella alba, sparsa, Amaran-
thoide. *Herb. Herm.* Gramen Zeylanicum, album, parvum, umbel-
latum. *Mus. Zeyl. pag. 64.* Amarantus Zeylanicus, umbellatus, folio
Lari-

Laricis, umbella fere candida. *Mus. Zeyl. pag. 29.* Amarantus folio tenuissimo, incano, Molluginem aemulante, umbellatis floribus, incarnatis, rigidis, Zeylanica. *Boccone. Mus. pag. 44. Tab. 39.* Elichryso affinis herba Indica, Polygonoides, ramosior, foliolis caulium nodos radiatim ambientibus, coma paleacea, flore albo, lituris aureis striato. *Plukn. Phyt. Tab. 86. Fig. 6.* Polygonum sericeum, ramosius, Indicum, foliolis Gallii instar caulem cingentibus &c. *Mantiss. pag. 154.*
KIRIHAENDA Zeylonensibus.

Ex radice cinerea, fibrillosa, satis firma pro Plantae magnitudine, oritur caulis teres, articulatus, pubescens, cui folia ad articulos plura adnascuntur, decem, plura, vel pauciora, Linariae aut Molluginis forma, acuminata, squammis albicantibus ejusdem formae mixta: Rami ad articulos interdum emittuntur solitarii, quo magis versus summitatem, eo frequentiores; ad summum autem caulis nulla fere folia conspiciuntur, sed caulis dichotome dividitur, & flores confertos, tanquam in umbella continet. Horum florum calix est quinquefolius, oblongo-acutus, albus, nitidus, inmarcescens, petala quinque omnium minima, vix visibilia, subrotunda, stamina florum itidem quinque, minima, semen unicum apparet fere triquetrum, breve, unde proxime ad Paronychias, licet cum Polygono in plurimis etiam conveniat. Exilitas autem florum examen vix permittentium effecit, ut tot ac tam variis insignita sit haec planta nominibus, nec haecenus bene expressa fuerit.

PATSJOTTI Zeylanica, Lauro-Cerasi folio laeviter ferrato. *D. Petiv. Act. Phil. Lond. vol. 22. no. 271. pl. 98.* & apud *Ray. tom. 3. dendr. pag. 49.* Katou-Patsjotti. *H. Malab. part. 5. Tab. 7.* qui est Frutex baccifer, Malabaricus, fructu, calice excepto, sulcato, tripyreno. *Ray. hist. pl. pag. 1572.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 30.* huc spectat Arbor Africana, subrotundo folio, margine denticulis acutis asperato, floribus pentapetalis, atro-purpureis. *Plukn. Phyt. Tab. 263. Fig. 1 & 2.* seu Baccifera Indica, fructu umbilicato, racemoso, monopyreno. *Ray. hist. pl. pag. 1498.* & *Patsjotti Malab. Commel. Fl. Malab. pag. 12 & 51.*

PEPO Indicus, reticulatus, seminibus albis, major. *H. L. Bat. pag. 482.* Cucurbita Zeylanica, reticulata, major, seminibus albis, *Luffa Arabum Vestling. Mus. Zeyl. pag. 62.* Cucumis Ægyptius, reticulatus,

five Luffa Arabum. *Veslin. in Alpin. pag. 48.* ubi ejus Figura cum descript. *Moris. Hist. pl. tom. 2. pag. 35.* Cucumis, rectius Pepo Ægyptius, reticulatus, seu Luffa Arabum. *Vesling. Ray. hist. pl. pag. 640.* WAETHAKOLU Zeylonensibus.

PEPO Indicus, reticulatus, seminibus albis, minor, TITTAWAETHA Zeylonensibus. *H. L. Bat. pag. 482. Ray. hist. pl. pag. 1874.* Cucurbita Zeylanica, reticulata, minor, seminibus albis. *Mus. Zeyl. pag. 63.* ubi WATTAKOLA Zeylonice dicitur.

PEPO Indicus, reticulatus, seminibus nigris, minor. *H. L. Bat. pag. 482. Plukn. Almag. pag. 286.* Pepo Zeylanicus, reticulatus, & sulcatus, femine nigro, *Par. Bat. App. pag. 11. Ray. hist. pl. tom. 3. pag. 332.* ubi ejus descriptio. Luffa Zeylanica, fructu oblongo, femine nigro. *D. Tilly.* quo nomine ab egregio illo Botanico missa fuere hujus plantae semina.

PERICLYMENUM Indicum, foliis maculatis, latioribus, Laurinis. *Nobis.* Periclymenum Zeylanicum, herbaceum, foliis variegatis, diversicoloribus maculis ornatis. *Par. Bat. Pr. pag. 363. Mus. Zeyl. pag. 37. Plukn. Phyt. Tab. 212. Fig. 6. Tsjude-Maram H. Malab. part. 6. Tab. 60.* Periclymenum Sirense, variegatum, flore sanguineo, amplo, quod Lignum Colubrinum optimum, Zeylanicum, Hermannii *Breyn. Prodr. 2. pag. 82. Commel. Fl. Malab. pag. 52.* qui Frutex Indicus, flore papilionaceo, sanguineo, foliis pinnatis, fructu viduus. *Ray. hist. pl. pag. 1733.* Clematis Indica, foliis Lentiscinis, candidis maculis adspersis. *C. B. Pin. pag. 301.* Ligni Colubrini tertium genus. *Garziae ab Horto pag. 164* a plurimis auctoribus huic Periclymeno pro synonymo juncta fuit Clematis Indica, foliis Persicae, fructu Periclymeni. *C. B. P. & Lignum Colubrinum primum & laudatissimum Garziae.* quod plane ab hoc diversum est, quippe quod nec habeat folia variegata, nec flores magnos sanguineos in spica collectos; sed folia glabra, viridia, & flosculos parvos, pentapetaloides perfecte ut *Ligustri.* unde & illam ad *Ligustrum* reduximus, ubi supra ejus descriptio & Figura juxta plantam *Herbar. Herman.* in ipsa Zeylona ab illo viro collectam consuli potest, quae multum ab hac planta differt, & puto huic convenire tertium Ligni Colubrini genus *Garziae*, nec non Clematis

Fig. 1.

Fig. 2.

PIPER, qui *Saururus* foliis septi-
nerviis, oblongo-acuminatis. Nobis.
231. *Piper Nobile* L.

PERIPLOCA foliis angustis, acutis, glabris. Nobis.
1751. *Periploca indica* L.

matris Indica, foliis Lentiscinis variegatis *C. B. P.* quod si *Garziae* descriptio perfectior, & absoluta esset, pro certo determinari melius posset.

PERICLYMENUM Indicum, foliis maculatis, angustioribus, Salicinis. *Nobis.* Periclymeni species, foliis maculatis ex monte Adami, quae Colubrina Zeylanica. *Mus. Zeyl. pag. 55.* an Periclymeno Sinenfi variegato similis frutex, longo, angusto folio, variegato, Sinicus. *Breyn. Prodr. 2. pag. 82.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 52?* quod est Tsjere-Maram *H. Malab. part. 6. Tab. 61.* NAGHAWAELI Zeylonensibus, a *Nagha* Colubro appellato, cujus ictus hujus plantae folia mirifice & specificè sanant.

PERIPLOCA foliis angustis, acutis, glabris. *Nobis. Tab. 83. Fig. 1.* Periploca Zeylanica perfoliata, Salicis folio. *Herb. Hart.* Sarmentosa haec planta caulem habet rotundum, cinereum, scabrum, tuberculis minimis plurimis obductum, ex cujus geniculis folia fere sessilia, bina sibi opposita proveniunt glabra, superne laete viridia, inferne pallida & cinerea, oblonga, acuta, integra, venosa, ad horum alas apparent flosculi arcte cohaerentes, plurimi, calicibus minutissimis contenti pentapetaloides, stamina minima, quinque coalita, cum gemino pistillo minimo habentes, quibus succedunt filiquae, ut in aliis hujus speciebus.

PERSICA Indica, fructu villoso *Manghas* vocato. *Mus. Zeyl. pag. 54.* Persicae similis putamine villoso, AMBA Zeylonensibus. *ibidem.* & *C. B. Pin. pag. 440.* reliqua vide supra ad *Mangiferam* arborem. *pag. 152.*

PHASEOLUS viscosus, spicato flore, ac fructu villoso. *Nobis. Tab. 84. Fig. 1.* Hedyfarum Zeylanicum, triphyllum, rotundiori folio, flore coeruleo. *Herb. Hart.* Hedyfarum Zeylanicum, trifoliatum, viscosum, Phaseoli folio subrotundo, filiculis compressis, hirsutis. *Mus. Zeyl. pag. 36.*

Gerit haec Phaseoli species caules villosos, e purpureo nigrantes, villis undique tenuissimis tanquam lanugine quadam obductos, rotundos, viscosos; folia ex illis erumpunt unciali, firmo, similique cum caule suffulta pediculo, terna, subrotunda, bina inferiora opposita, & minora, tertium superius & majus in acutiorem apicem desinit.

finis. Folia haec parte superiore sunt glaberrima, venosa, obscure virentia, inferiore vero incana & lanuginosa. Caulis summum terminant flores in longissimis spicis porrecti, parvi, papilionacei, coerulescentes, gemini oppositi, sat magnis calicibus contenti, & pediculis fere semiuncialibus suffulti, quibus succedunt filiculae tenues, incanae, hirsutissimae, & undique quasi molli lanugine obductae, in acutissimum mucronem desinentes, quae quum justam in nostra planta nondum acquisiverunt maturitatem, de earum magnitudine, feminibusque nihil dicimus: in omnibus tamen cum reliquis Phaseoli speciebus convenit haec planta.

PHASEOLUS Zeylanicus, tomentosus, Salviae foliis, lobis parvis, oblique articulatis, alter. *Mus. Zeyl. pag. 7.* Phaseolus Zeylanicus, Salviae foliis subrotundis, mollibus & hirsutis. *Par. Bat. Pr. pag. 364.* Orobus Phaseoloides Zeylanicus, foliis Salviae, rotundis, incanis, subhirsutis. *ibidem. pag. 359.* Phaseolus minor, Bisnagaricus, foliis argenteo-villosis, filiquis torosis, brevibus, spadicea hirsutiae pubescentibus, fructu parvo, Scaraboide, nigro. *Plukn. Phyt. Tab. 52. Fig. 3.* an Nir-Pullari *H. Malab. part. 9. Tab. 36?* WAELUNDU & WAELUNDUWAE Zeylonensibus.

PHASEOLUS exiguus, glaber, Trifolii foliis, filiqua plana, compressa, *Nobis. Tab. 84. Fig. 2.* Phaseolus Zeylanicus, minimus, flore rubello, filiqua minima. *Herb. Hart.*

Caules hujus plantae sunt filiformes, tenuissimi, longissimi, laeves; folia unciali spatio remota nascuntur terna, Trifolii figura ac forma, subrotunda, magis tamen obtusa & fere deltoidea, petiolis tenuissimis insidentia; ex foliorum autem ala enascitur petiolus communis, triuncialis, flores continens secundum longitudinem positos, parvos, rubellos, papilionaceos, qui tandem abeunt in filiquas parvas, obtusas, planas, glabras, nigras, dispermas, rarius trispermas, quae semina continent subrotunda, reniformia, glabra, nigra, splendentia.

PHASEOLI villosi species, BUMUM & BUNCAE Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 22.* forte Phaseolus Maderasp. cauliculis pilosis, scandens, Passiflorae modo trilobatus &c. *Plukn. Almag. pag. 292. pl. 5. & Phyt. Tab. 120. Fig. 7.* BUNUM dicitur a *Bu*, quod notat capillos teneros, seu villos; hujus & alia datur species laevis, sine villis, ut notatur in *Mus.*

Fig. 1.

Fig. 2.

PHASEOLUS viscosus, spicato flore,
ac fructu villosa. Nobis.

PHASEOLUS exiguus, glaber, trifolii
foliis, siliqua plana, compressa. Nobis.

5339. *Dolichos minimus* L.

D. medicaginis, Lam. 2. 297

5513. *Hedysarum viscidum* L.

Mus. Zeyl. qui est forte Phaseolus Maderasp. foliis glabris, trilobatus, floribus exiguis, longis petiolis ex eodem puncto gemellis. *Plukn. Phyt. Tab. 214. Fig. 3.*

PHASEOLUS Indicus, AVARAPALU dictus. *Mus. Zeyl. pag. 49.* Phaseolus Indicus, lobis bullatis, dorso trifido alato. *ibidem. & pag. 53.* Phaseolus Zeylanicus, sylvestris minor, lobis hirsutis, torosis *D. Hermans* apud *Ray. tom. 3. pag. 438.* ubi additur, Folia huic satis lata sunt, apicibus subrotundis. Flores e foliorum, alis exeunt plures simul in pediculis communibus, brevibus, minimis, foliolis suppositis. Huc spectat Phaseolus erectus, minor, siliqua tereti, ventricosa, pallide flavescente, semine albo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 72. & Hist. Jam. part. 1. pag. 183.*

PHASEOLUS sylvaticus, siliquis angustis. *Mus. Zeyl. pag. 43.* Phaseolus Zeylanicus, tenellus, siliquis angustis. *ibidem. pag. 44.* an Paeru *H. Malab. part. 8. Tab. 41?* qui Phaseolus Indicus, trifoliatus minor, flore coeruleo, fructu minore, in notis vocatur *pag. 81. & Fl. Malab. pag. 54.* Phaseolus Indicus, trifoliatus, minor, flore coeruleo, siliqua longa, angustissima, fabis membranis transversis disseptis, apud *Ray. tom. 3. pag. 444.* WALLUNAE Zeylonensibus. *Lunae* notat speciem Phaseolorum longissimorum.

PHASEOLUS sylvaticus, lobis angustis, longissimis. *Mus. Zeyl. pag. 43.* quae prioris varietas habenda, vel forte eadem.

PHASEOLUS Zeylanicus, sylvestris, maximus, *Mus. Zeyl. pag. 44.* an Bara-Mareka *H. Malab. part. 8. Tab. 44?* qui Phaseolus Indicus, trifolius, siliqua longa, grandi, fabis esculentis. *Ray. tom. 3. pag. 445.* ut & Phaseolus maximus, siliqua ensiformi, nervis insignita, & semine albo, membranula incluso. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 68.* ubi plura habet synonyma. MAHAUWARUPALU Zeylonensibus.

PHASEOLUS Zeylanicus, marinus, folio pingui, & crasso. *Mus. Zeyl. pag. 43.* Phaseolus Zeylanicus, marinus. *ibidem. pag. 44.* Phaseolus Zeyl. marinus, crassus, an Flos Thomeus? *ibidem. pag. 54.* Phaseolus Indicus, maritimus, perennis, foliis crassis, subrotundis, minor *Par. Bat. Pr. pag. 364. & Fl. Malab. pag. 53.* Catu Bara. Mareca *H. Malab. part. 8. Tab. 45.* qui Phaseolus trifolius, Indicus, siliqua grandi,
Aa 3 recurva,

recurva, fabis crassis, ovalibus, noxiis. *Ray. tom. 3. pag. 446.* huc spectat Phaseolus maritimus, rotundifolius, flore purpureo, filiqua brevi, cristata, semine fusco, striato. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 69 &c.* *Strantrottang* Vulgo. MUNDUMAE Zeylonensibus.

PHASEOLUS marinus, floribus flavis, folio molli, albo, eduli, Zeylanicus. *Mus. Zeyl. pag. 68.* Phaseolus maritimus, folio molliori. *ibidem. pag. 27.* ÆTHAKOLA Zeylonensibus.

PHASEOLUS erectus, caule & folio rigidis, flore pallide luteo, filiqua crassa & ampla. *Boerb. Ind. in Octavo pag. 152.* qui semine est variegato, & idem semine albo, in ejus *Ind. H. L. B. part. 2. pag. 28.* Phaseolus orthocaulis *Fabii Colum.* an fructus niger Coriandro similis *C. B. Mus. Zeyl. pag. 48?* Phaseolus Persicus, orthocaulis, filiquis hirsutis, Lupino minoribus *ibidem. pag. 63.* hujus videtur varietas. Phaseolus orthocaulis, Mungo Persarum, Turcarum Masc, Hispanorum Max, *Fab. Col. in Recch. pag. 887.* ubi icon & descript. & *Amm. Char. pl. pag. 480.* Phaseolus erectus, hirsutus, caule quinquangulati, auriculato, flore viridi, lutescente, filiqua in rostrum incurvum desinente. *Plukn. Almag. pag. 290.* Mungo *Clus. lib. 2. cap. 21.* MUN & MUNG Zeylonensibus.

PHASEOLUS Zeylanicus, leguminosus, lobis longis, angustissimis, MAE-MUNG, Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 67.* Phaseolus hirsutus, flexicaulis, Mungo affinis, caule tereti &c. *Plukn. Almag. pag. 290.* MAE-MUNG hoc est Mung volubilis. Mung enim denotat Phaseolum orthocaulum, ut dicitur in *Mus. Zeyl. pag. 67.*

PHASEOLUS Zeylanicus, lactescens, fructu fusco, splendente, figura renum KIRIPUSWÆL Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 49.* an Phaseolus minor, lactescens, flore purpureo? *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 71 & Hist. Jam. part. 1. Tab. 114. Fig. 4.* vide & *Ray. hist. pl. pag. 442.* ubi ejus descriptio. KIRIPUSWÆL, id est Puswael lactescens, ut explicatur in *Mus. Zeyl. loco citato.*

PHASEOLUS Zeylanicus, MEKARAL dictus. *Mus. Zeyl. pag. 59.*

PHASEOLUS Zeylanicus, minor, fructu parvo, albo. *Heist. Cat. pl. H. Acad. Jul. ann. 1731. pag. 17.*

PHASEOLUS Indicus, fructu ex albo, & nigro variegato. *Mus. Zeyl. pag. 59.* an Phaseolus peregrinus, octavus, seu angustifolius alter, fructu ex albo & nigro vario. *C. B. P. Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 67. & Hist. Jam. part. 1. pag. 176?*

PHASEOLUS Indicus, hortensis, aëreo fructu, spadiceo hilo, oblongo, albo prominente. *Mus. Zeyl. pag. 60.* Lablab spadiceum *ibidem.* Phaseolus Zeylanicus semine duro, fusco, lituris spadiceis variegato. *Plukn. Almag. pag. 291.* Phaseolus Guinensis, fructu fusco, spadiceo. *C. B. Pin. pag. 341.* HINDAMINI Zeylonensibus,

PHASEOLUS Indicus, lobis utraque extremitate fimbriatis. IRIWYA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 63.*

PHASEOLUS Indicus, lobis villosis, pruritus excitantibus. *Mus. Zeyl. pag. 60.* Phaseolus Indiae Orientalis, filiquis plurimis, hirsutiae pungentibus, faba magna Ostream referente. forte Kaku-Valli *H. Malab. part. 8. Tab. 36.* apud *Plukn. Almag. pag. 292?* Kaku-Valli *H. Malab. a Commel.* in notis vocatur Phaseolus Indicus, filiqua majore pungente & in *Fl. Malab. pag. 53.* apud quos reliqua vide synonyma, & *Ray. hist. pl. tom. 3. pag. 444* ut & *Sloan. Catal. pl. Jam. pag. 68.* planta quarta, quae est Phaseolus Brasiliensis, frutescens, lobis villosis, pungentibus, maximis. *Par. Bat. Pr. pag. 363.* &c. MANGULKARANDU Zeylonensibus.

PHASEOLUS Zeylanicus, lobis undique pilosis, fructu lucido, nigro. *Mus. Zeyl. pag. 67.* Phaseolus Orientalis, pruritus excitans hirsutiae filiquarum, fructu nigro, splendente. *Plukn. Almag. pag. 292.* Phaseolus utriusque Indiae, lobis villosis, pungentibus, minor. *Par. Bat. Pr. pag. 364.* *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 69.* Phaseolus Zurattensis, villosus, filiqua hirsuta, pungente. *Parkin Moris. hist. Oxon. pag. 69.* *Amm. H. Bosian. pag. 27.* & *Char. pl. pag. 467.* Phaseolus Zurattensis, filiqua hirsuta *Coubage* dicta. *Ray. hist. pl. pag. 887. & tom. 3. pag. 444.* & *Fl. Malab. pag. 53.* Phaseolus filiqua hirsuta *Parkins Theat. pag. 1056.* ADSARYAPALA Zeylonensibus, ab *Adsari*, quod fabrum ferrarium notat, forte quod semina sint nigri coloris.

PHASEOLUS Indicus, herbaceus, lobis villosis pungentibus, minor. *Mus.*

Mus. Zeyl. pag. 69. Phaseolus Americ. foliis molli lanugine obfritis, filiquis plurimis hirsutie pungentibus, semine fusco, punctato, *Plukn. Phyt. Tab. 214. Fig. 1.* Phaseolus hirsutus, virgatus, pruriginus. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 8.* Phaseolus Indicus, filiquis angustis, hirsutis, fabis spadiceo fuscis, membranis intercedentibus sejunctis, *Ray. tom. 3. pag. 444.* Putsja-Peru *H. Malab. part. 8. Tab. 37.* qui est Phaseolus Indicus, hirsutus, flore luteo, filiqua angusta, parva, hispida. *Breyn. Prodr. 2. pag. 82. & Commel. Fl. Malab. pag. 53.* Phaseolus sylvestris, minor, flore minimo, filiquis longis, teretibus, alba lanugine hirsutis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 71.* Cacara, pruritus. Cacara Gattal, Maagde-kruyt. *Rumph. Herbar. Ambon. lib. 9. cap. 34.* ubi a capite 20 plurimas describit & depingit Phaseolorum species. WANDURUMAE Zeylonensibus.

PHASEOLUS arboreus, tetraphyllus, Zeylanicus, Horti Regii aulae Hampton. *Plukn. Phyt. Tab. 211. Fig. 5. & Ray. tom. 3. pag. 438.*

PHASEOLUS Zeylanicus, folio longo, filiqua tenui, semine parvo, pallido. *Boerb. Ind. H. L. Bat. part. 2. pag. 29.*

PHASEOLUS Zeylanicus, folio longo, filiqua tenui, semine violaceo, pallido. *Boerb. ibidem.* Phaseolus Zeylanicus, semine parvo, violaceo. *Heist. Catal. pl. H. Acad. Jul. ann. 1732. pag. 17.* ubi & Phaseolastrum, flore ex coeruleo, & albo vario, filiqua tenui, tereti, semine parvo, violaceo, vocatur.

PHASEOLUS Zeylanicus, filiquis radiatim digestis. *Dillen. H. Elth. pag. 315. Tab. 235. Fig. 304. &c.*

PHYLLITIS repens, scandensve, foliis longis, angustis. *D. Scherard.* apud *Ray. tom. 3. pag. 52.* ubi ejus descriptio. Lingua Cervina forte scandens, angustis & undulatis foliis. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 15.* Phyllitis forte minor, scandens, foliis angustis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 17. & Hist. Jam. part. 1. pag. 73. & Plukn. Phyt. Tab. 290. Fig. 3. & Almag. pag. 156. &c.*

PHYLLITIS minor, scandens, Salicinis foliis, acuminatis, viridibus *D. Scherard* apud *Ray. tom. 3. pag. 53. & Bobart. Hist. Oxon. tom. 3. pag. 558.* Phyllitidi scandenti affinis minor, graminifolia, folio oblongo,

go, acuminato, foliorum pediculis alis extantibus auctis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 15. & Hist. vol. 1. pag. 75. Tab. 27. Fig. 2.* huc spectat *Lingua Cervina scandens, & ramosa, Citrii foliis minor. Plum. Cat. pl. Amer. pag. 15.*

PIHAEMBURU adnascens arboribus putridis. *Mus. Zeyl. pag. 2.*

PIPER, qui *Saururus* foliis septinerviis, oblongo-acuminatis. *Nobis. Tab. 83. Fig. 2.* Piper Indicum, sylvaticum. *Mus. Zeyl. pag. 20 & 24.* Piper Zeylanicum, sylvestre. *Herbar. Gronov.* qui nobiscum hanc plantam a *D. Scherardo* quondam acceptam communicavit. Piper longum arboreum, altius, folio nervoso, minore, spica graciliore & brevior. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 44. & Hist. Jam. vol. 1. pag. 134. Tab. 87. Fig. 1. Plukn. Mantiss. pag. 151.* Piper longum, sylvestre. *Ray. tom. 3. pag. 641.* ubi elegantem Piperis longi in genere ex historia naturali *Sloane* vide descriptionem. *Amolago H. Malab. part. 7. Tab. 16.* quod Piper longum, angustissimum, ex Florida. *C. B. Pin. pag. 412. & Commel. Fl. Malab. pag. 54.* ubi & alia vide synonyma. an Piper spica longa, gracili. *Plukn. Phyt. Tab. 215. Fig. 2?* cujus in *Almag. pag. 297.* vide synonyma. an Planta Julifera, aromatica, in uliginosis crescens locis *D. Banist.?* huc & pertinet Sirium Decumanum, Siri Tallang. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 7. cap. 24. vel Siriboa ejusdem lib. 9. cap. 3.* WALLANKRADHU & WALMIRIS Zeylonensibus. De hoc annotatur in *Mus. Zeyl. pag. 20.* quod folia inponantur vulneribus sordidis, & quod sint instar foliorum *Beteles* tribus nervis donata. qui plures & quidem septem numero distincti in nostra apparent planta. Cujus folia sunt scabra, lata, acuto-oblonga, solitaria, alternatim provenientia, pediculis brevibus cauli adhaerentia; qui caulis sarmentosus est, scaber, angulosus, nigricans, geniculatus, ubi flores e directo folio opponuntur, ab altera nempe caulis parte, ubi folia erumpunt, provenientes, qui duplo longioribus spicis insident spicati, minimi, arctissime collecti, minima semina dantes in unam quasi caudam aggregata, perfecte instar Ranunculi illius, qui Cauda Muris vulgo dicitur.

PIPER rotundum ex Malabara, foliis latis, quinquenerviis, albicantibus. *Mus. Zeyl. pag. 32.* quod forte Piper Benghalense. *ibidem. pag. 64.* Molago-Codi *H. Malab. part. 7. Tab. 12.* quod Piper rotundum, nigrum

grum, & album. *C. B. Pin. pag. 411. Commel. Fl. Malab. pag. 54. Parkins Theat. Botan. pag. 1603. Piper nigrum Clus. aromat. lib. 1. cap. 22. pag. 183. Peponero Acoft. pag. 15. Lada, aliis Molanga, five Piper mas & foemina. Pison. Mantiff. arom. pag. 180. qui docet album & nigrum ejusdem plantae esse fructus, album fcilicet ante infolationem decorticari; quod confirmatur ex *H. Malab.* ubi dicitur, *cortice nigro ablato, fit Piper album. &c.**

PLANTA folia habens oblongo-rotunda, forfan *Telelu* seu Cochleariae species, KERATYA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 19.*

PLANTA foliis geminatis, ex oppposito longis pediculis inter bina folia capreolo donatis. *Mus. Zeyl. pag. 26.* An Clematis Myrsinites, amplioribus foliis, Americana, forte Tety-Pote-iba Brasiliensibus, seu Vitis arbutina *Pisonis pag. 250. apud Plukn. Phyt. Tab. 163. Fig. 2?* NARAWAL & OKUWAEZ Zeylonensibus.

PLANTA parva, foliis Hyacinthi, floribus in umbella parvis. *Mus. Zeyl. pag. 27.*

PLANTA pluribus foliis triquetris, instar Graminis Cyperini summitate foliorum in plurima folia biuncialia divisis. *Mus. Zeyl. pag. 27.*

PLANTA scandens, foliis latis, subrotundis, in acumen desinentibus; subtus lanuginosis, quatuor nervis donatis. *Mus. Zeyl. pag. 27.*

PLANTA semine Althaeae. *Mus. Zeyl. pag. 31.*

PLANTA spicata, floribus coeruleis HULUNAYKOLA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 32. & pag. 2 & 4.* Sic vocatur, quod folia ejus referant formam alicujus Colubri capellati minoris, *Hulunay* dicti. *pag. vero 21.* alia hujus species memoratur, quae longe humilior est, ac spica semunciali.

PLANTA scandens, Hederaceis foliis, Zeylanica. *Breyn. Eph. Germ. ann. 4 & 5. observ. 137. & Ray. hist. pl. pag. 1914.*

PLANTAGINELLAE aureae Alopecuroidi Brasilianae similis, Zeylanica. *Breyn. Prodr. 2. pag. 84. Plukn. Mantiff. pag. 152.* Plantaginella vero aurea Alopecuroides, Brasiliana, foliis gramineis ab eo exhibetur in *Cent. pag. 108.* ubi ejus iconem vide ac descriptionem.

PLA-

POLYGALA frutescens Lavandulae folio viridi, flore coeruleo. Nobis.

6785. *Viola enneaspermia* L.

PLATANUS Zeylanica, pilulis fetaceis, miniatis, Cerasi magnitudine in spica dispositis. GAEDAWAKKA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 25.*

PLUMBAGO Zeylanensis, folio splendente Ocymastri, flore lacteo. *Boerb. Ind. H. L. Bat. part. 1. pag. 77.* Lychnis Indica, spicata, Ocymastri foliis, fructibus oblongis, lappaceis, radice urente. *H. Amst. tom. 2. pag. 169.* Lychnis Indica, spicata, Ocymastri folio, fructibus hispidis, flosculis albis, radice urente. *Mus. Zeyl. pag. 10 & 51.* Lepidium dentillaria dictum, flore albo parvo. *ibidem pag. 32.* ELA-RATHNETHUL Zeylonensibus. *Cuddi-Veru* Malabaris *Ela* denotat album, *Rathnethul* vero aliam speciem huic similem, radice autem & floribus diversam. ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 10.* Quae est

PLUMBAGO Zeylanica, folio splendente Ocymastri, flore rubro. *Herb. Hart.* RATHNETHUL *Mus. Zeyl. pag. 51.* ubi dicitur: radix recens dulcescit, acris est, & corrodens, unde vesiculis excitandis frequens est. Cinghali eam contusam inponunt vulneribus a Colubris, aliisque venenatis inflictis. Generis hujus Characterem habet *Linnaeus in Char. pl. gen. pag. 44.*

POLYGALA frutescens Lavandulae folio viridi, flore coeruleo. *Nobis. Tab. 85.* Polygala Zeylanica, Rorismarini folio, flore coeruleo. *Herb. Hart.* Peculiare huic frutici est, quod ubi inferior crassiorque ramorum pars e trunco exit, ibi penitus sit albicans & splendens, usque ad exortum foliorum, ubi enim illa progerminant, rami omnes viridi teguntur cortice, qui plurimi diffusi, & vario modo sparsi, tenues emittuntur, foliolis sparsis nunc solitariis, nunc oppositis instructi: Folia autem sunt integra, oblonga, viridia, glabra, majora, ad quorum insertionem saepe etiam minora propullulant; flores ex alis foliorum solitarii provenientes, petiolis insident tenuissimis, qui sunt papilionacei, coloris coerulei, admodum caduci. reliqua ut *Polygalae.*

POLYPODIUM exoticum, folio Quercus C. B. *Pin. pag. 359. Mus. Zeyl. pag. 7 & 71. Breyn. Prodr. 2. pag. 85.* Polypodium Indicum. *Clus. exot. lib. 4. cap. 17.* Panna-Kelengo-Maravara. *H. Malab. part. 12. Tab. 11.* quod Polypodium Indicum, foliis latissimis. *Commel. in notis. & Fl. Malab. pag. 55.* Polypodium Indicum, Simbar. *Rumph. Herb.*

Herb. Ambon. lib. 10. cap. 55. BEDURU & BENDURU Zeylonensibus *Mus. Zeyl. pag. 7.* ubi dicitur: Folia inferiora Quercus faciem habent, superiora Polypodii nostratis. *Grimm. in Labor. Ceyl. pag. 124.* ad caput de Polypodio Indico haec habet: ad usum Europaeorum transportatur, syrupum nobis exhibet, qui multum confert in morbo Gallico, Scabie, Ulceribus corrosivis, Morbis Melancholicis, Cachexia, Ictero & similibus, vel solus vel cum aliis Medicamentis commixtus.

POLYPODIUM vario modo divisum; acutum, & obtusum. *Nobis. Tab. 86.* Polypodium ex locis opacis gloreosis. *Herb. Herman.* huc spectat Filix Hemionitis trifida, & quinquefida, bullatis foliis, ex Insula Johanna. An forte de genere Polypodiorum? *Plukn. Mantiss. pag. 82:* quae in *Amalth. pag. 94.* vocatur Filix Hemionitis, Phymatodes, id est, cum exanthematis pulverulenta, foliis trifidis & quinquefidis, segmentis angustioribus in acutissimum & valde prolixum mucronem abeuntibus, ex Insula Joanna. cujus Figura exhibetur in ejus *Phytogr. Tab. 404. Fig. 5.* quae eadem cum *Fig. 1. illius Tabulae* videtur. Nostrae plantae folia ex radicibus petiolo tenui adsurgunt ensiformia, nunc obtusiora, nunc acutiora, integerrima; Prope basin duae, interdum unica lacinia eadem cum folii forma ad latera progerminat: Nervus folii crassus per totam ejus longitudinem, & lacinias extenditur. Radix autem in tenuissima filamenta expanditur.

POLYPODIUM caule simplici, foliis simplicibus, variis, longis, ferratis. *Nobis. Tab. 87.* Polypodium Zeylanicum, folio inferiori tripartito, superiore singulari, longo, ad finem ferrato, intermedio vero folio dupliciter diviso. *Herb. Hart.* Filix Zeylanica, Polypodii facie. *Mus. Zeyl. pag. 35.* Filicula Cheusanica, seu Hemionitis multifido folio, tenuissime ferrato, ad margines seminifera. *Plukn. Amalth. pag. 94. Phyt. Tab. 407. Fig. 2.* BENDURU Zeylonensibus. Variat haec admodum planta, prout rami sunt adultiores & frugiferi, vel non: in prioribus folia sunt longissima, tenuia, contracta, & ad finem tantum eorum ferraturae apparent; in junioribus & nondum frugiferis folia sunt lata, expansa, ubique ferrata. Caulis caeterum est spithamalis vel longior, folia pinnatim exeunt e caule, superius simplicia, inferius communiter gemina, rarius terna, inferiori scilicet breviori. Pinnae secundum longitudinem ferratae sunt, magis tamen
versus

POLYPODIUM vario modo divisum;
acutum, & obtusum. Nobis.

POLYPODIUM caule simplici. foliis simplicibus, variis, longis, serratis. Nobis.

versus apicem: ad margines laterum prodeunt flosculi, ac semina pulverulenta, ibique retrahitur folium, adeoque ferraturam excludit.

PORTULACA minima aizoides, HINGHEDA dicta. *Mus. Zeyl. pag. 62.* forte Brami *H. Malab. part. 10. Tab. 14.* quae Glauz Indica, Portulacae folio, flore majore dilute coeruleo, albicante colore. *Commel. in notis & Fl. Malab. pag. 33.*

PORTULACA marina, major, baccifera. *Mus. Zeyl. pag. 67.* an Basella *H. Malab. supra proposita? pag. 44.*

POTHA. *Mus. Zeyl. pag. 6.* quae Elephantum esca *ibidem. pag. 24.* de qua dicitur: firmissime adnascitur arboribus, & maceris, uti Hedera, fructus fert rotundos, rubros, edules, instar Fragariae, ut notatur *pag. 6.*

PRUNUS Indica, sylvestris, fructu flavo, pyriformi, DEMATHA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 3.* Tani *H. Malab. part. 4. Tab. 10.* ubi vide notas, & quae Prunus Indica, racemosa, fructu pyriformi. *Ray. hist. pl. pag. 1547.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 57.* Fructuum putaminibus utuntur Cinghali loco Beteles, ut notatur in *Mus. Zeyl.*

PRUNUS Indica, fructu nigro, Olivae magnitudine, Jambolons *Acoftae*, MADAN Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 8.* Jambolons descripta breviter reperitur apud *Acoft. lib. aromat. pag. 299. in octavo.* huc spectat Prunifera vel Nucifera, seu Nuci-Prunifera arbor Americ. praecelsa, angustis Lauri foliis, laete virentibus, *Mastichen* odoratam fundens. *Plukn. Almag. pag. 307. Phyt. Tab. 217. Fig. 5. Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 180. & Ray. tom. 3. Dendr. pag. 42.* ubi descriptio.

PRUNUS Zeylanica, Lauri folio, VERALU Cinghalensibus. *D. Hermans* apud *Ray. tom. 3. Dendr. pag. 42.* Prunus racemosa Celastri folio. *Mus. Petiv. no. 672.* Sequenti modo breviter apud *Ray.* describitur. Flores veluti spicati, plures simul in communi pediculo è ramis undique exeunt nullo ordine. Folia Pruni, sed breviora, rotundiora & circa margines ferrata.

QUAMOCLIT foliis tenuiter incis, & pinnatis. *Tournef. inst. pag. 116.* *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 3.* Convolvulus elegans, tenuifolius, sive

Indicus pennatus, *Munting Phyt. pag. 505.* Quamoclit, vel Convolvulus pennatus, foliis Myriophylli aquatici, exoticus, *Fabii Columnae. Amm. H. Bosian. pag. 29.* ubi descriptio. & *Char. pl. pag. 535.* Convolvulus pennatus exoticus, rarior. Quamoclit apud *Fab. Column.* occurrit in *obs. pag. 72.* Jasminum Millefolii folio *C. B. Pin. pag. 398.* *Mus. Zeyl. pag. 47.* Quamoclit, five Jasminum Americanum *Clus. Cur. post. pag. 9.* Quamoclit, five Convolvulus tenuifolius. *J. B. tom. 2. lib. 15. pag. 177.* Convolvulus tenuifolius, five pennatus Americanus. *Parkins Theat. pag. 170.* Convolvulus exoticus, annuus, foliis Myriophylli, seu Millefolii aquatici, flore sanguineo. *Moris hist. tom. 2. pag. 20.* *Commel. Fl. Malab. pag. 21.* *Sloan. Cat. pl. Fam. pag. 58.* Tsjuria-Caranti *H. Malab. part. 11. Tab. 60.* Flos Cardinalis, Bonga Tali. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 9. cap. 52.* RATHABABA Zeylonensibus, quod pronunciatur *Ratabamba* h. e. *Bamba* exotica; dicitur enim ex peregrinis locis missam esse in Zeylonam, ubi sponte crescit Alia *Bambae* species non florens, Adianthi foliis, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 47.* hujus generis characterem vide apud *Linnaeum in char. pl. gen. pag. 47.* qui novo nomine IPOMOEA hoc genus vocavit.

RADIX AMORIS Lusitanis; IRAMUSU Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 51.* ubi additur; temperata est radix, moderate adstringit, confortat, & spiritus refocillat, usus quoque in affectibus arthriticis & doloribus abdominis. Radix amoris a Portugalensibus *Res de amour* vocata. *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 128.* ubi haec habet: Planta est graminosa, quae longe repit super terra, vel si quid ipsi adjacet, cum eo convolvitur, & ascendit. Radix est aromatica, maxime cum Caryophyllata nostra conveniens quoad saporem & odorem.

RHAMNUS Zeylanicus, folio subrotundo, glabro, caulibus hirsutis, spinis exiguis, ad ramorum & foliorum ortum exasperatus, flosculo spadiceo, bacca nigra. *Nobis. Tab. 88.* Acaciae forte cognatus e *Maderasp.* frutex, Vitis Ideae Bengalensis nostrae foliis, & ramulis alternis ad foliorum ortum spinis exiguis exasperatus. *Plukn. Phyt. Tab. 122. Fig. 4.* huc & spectat Lycium foliis subrotundis, integris, spinis & foliis ex adverso sitis. *Sloan. Cat. pl. Fam. pag. 171.* *Pluknetii* Figura cum nostra planta in plurimis convenit, sed quum flore fructuque destituatur, incertum an eadem: nostram ex *Herbario Clariss. Hermannii* publici juris facimus, plantae vero nullum, quae sola fuit,

RHAMNUS Zeylanicus, folio subrotundo, glabro, caulibus hirsutis, spinis exiguis, ad
ramorum & foliorum ortum exasperatus, flosculo spadiceo, bacca nigra. Nobis.

1564 *Rhamnus lineatus* L.

RHUS Zeylanicus trifoliatus. Phaceliæ facie, floribus copiosis, spicatis. Nobis.
1930. *Connarus monocarpus* L.

fuit, quam sine nomine repperi, adscriptum erat nomen, instituto autem examine inveni veram esse *Rhamni* speciem, quae ramos habet tenues, flexiles, subhirsutos, ramulos minores alternatim emittens, qui ramuli simplices sunt, ac foliis alternatis, glabris undique instruuntur, quorum singulum exacte ovatum, semiuncialis longitudinis, integerrimum, venis oppositis constans, petiolis linealibus infidet: ad singulum folii egressum squammula quaedam rigida, aculeata, folium firmat, in folii autem ala fructificatio fit. Petiolo enim lineali solitarii infidet flosculus spadiceus tetrapetalus, quem subsequitur bacca nigra, cujus diameter tres lineas continet.

RHUS Zeylanicus trifoliatus, Phaseoli facie, floribus copiosis, spicatis. *Nobis. Tab. 89.* Phaseolus Indicus, arborescens, monospermos, in lobo rubente, unicam proferens fabam. *Herb. Herm.* Phaseolus Indicus, arborescens, monospermos. *Mus. Zeyl. pag. 39.* Phaseolus arborescens, Indicus, monospermos, in siliqua rubente unicam tantum fabam proferens. *ibidem. pag. 54.* Phaseolus trifoliatus, frutescens, monococcus, fructu adiposa mucagine. *Mus. Zeyl. pag. 16.* Arbor trifoliata, filiquosa, sarmentosa, unicam continens fabam. *ibidem. pag. 30.* Phaseolus arborescens, Zeylanicus, monocarpus *Hermanni*, **RADALISAWAEL** Zeylonensibus apud *Ray. tom. 3. pag. 438.* ubi breviter sic describitur: Planta est erecta, lignosa, trifolia, flores in summis ramulis gestans, in virgis erectis, ramosis, numerosissimos, qui quales fuerint in sicca a Dom. *Scherardo* communicata discernere non potui, ad Phaseolum tamen, me iudice, minus apte refertur. in *Mus. Zeyl. pag. 16.* **RADALYA** vocatur, quod pronunciatur *Radelie* a *Radah* quod lavatorem significat, ubi & fructus dicitur monococcus adiposa mucagine, unde dubito, an haec non sit varietas alterius, & de succo illius plantae dicitur, quod membrorum fracturas sanet. Nostra autem planta est arborescens, ligno constans duro, rigido, cortice nigricante vestito, folia gerens sparsa, triplicata, singulo petiolo communi infidentia, ovata, integra, crassa, & ut videtur, perennia: in apice caulis racemus florum inaequalis & divisus progerminat, flores gerens parvos, subhirsutos, plurimos, ut in reliquis *Rhois* speciebus, quorum characterem exactissime designatum vide apud *Linnaeum in Char. pl. gen. pag. 84.*

RICINOIDES Indica, folio lucido, fructu glabro, *Grana TIGLIA* Officinis dicto. *Herb. Hart. Tab. 90.* Ricinus arbor, fructu glabro, *Grana Tiglia* officinis dicto. *Par. Bat. Pr. pag. 370. & Commel. Fl. Malab. pag. 58.* Ricinus arbor, Indica, caustica, purgans. *Mus. Zeyl. pag. 15.* Lignum Moluccense, seu Pavana *Garziae ibidem. pag. 30.* Granum Moluccanum, Bori. *Rumph. Herbar. Amboin. lib. 6. cap. 49.* Pignoli di Maluco *Acost. edit. Ital. pag. 237.* Quauhayohuatli tertia, seu femine arboris cucurbitinae, nuclei Pinus forma, purgante. *Hernand. Hist. Mexioc. pag. 87.* Ricinus arbor, fructu glabro, *Grana Tiglia* Officinis dicto, cujus *Lignum Moluccense* & incolis *Pavana* vocatur. *Cadel-Avanacu H. Malab. Amm. Char. pl. pag. 305 & 410.* Ricinus Indicus, foliis subrotundis, mucronatis, glabris, pediculis longis insidentibus, fructu oblongo, glabro. *Bobart. tom. 3. Hist. Oxon. pag. 349.* Pinus Indica, nucleo purgante. *C. B. Pin. pag. 492.* Pinei nuclei Moluccani, & Lignum Pavana, *Acost. hist. arom. pag. 278. & apud Clus. cap. 57.* Ricinus Americanus *Clusii* in *Monard. pag. 320.* ubi fructus depicti. Lignum Moluccense *Pavana* dictum, fructu *Avellanae*. *J. B. tom. 1. pag. 342.* Lignum Moluccense. *Acost. lib. arom. cap. 34.* apud *Clus.* Ricinus Orientalis, cujus fructus sunt *Pinei Nuclei Moluccani* a nobis putati, & *Grana Tilli* Officinarum. *Cadel Avanacu H. Malab. part. 2. Tab. 33. Plukn. Almag. pag. 320.* Variis sub nominibus plantam hanc vide propositam, & descriptam apud *Ray. hist. pl. pag. 1803, 1830, 1855. & tom. 3. pag. 112 & 666.* de hujus ligno, & fructu vide *Samuel Dale Pharmac. pag. 128.* *Japalu* Malabaribus dicitur. **GAJAPALA, NEPALAM & WAYAPALI** Zeylonensibus. a *Wayya*, qui illis morbus frigidus est, nervos & artus occupans, atque contrahens; cui hujus fructus medentur. *Gaya* victorem significat. *Pala* regem, qui olim his usus fuit. Fructus purgant violentissime, reliqua vide in *Mus. Zeyl. pag. 15.* & apud caeteros adlegatos auctores, quorum nullus hujus famosae plantae bonam dedit figuram, in *H.* enim *Malab.* nulli flores, & soli tantum fructus exhibentur, unde meliorem hic cum brevi ejus descriptione proponimus figuram. Frutex hic caules gerit simplices, qui nascuntur sine ramis lateralibus, apice flores in spicam longam collectos gerentes. Folia nonnulla caulem exeunt ovato-oblonga, acuta, integra, laevia, pediculis uncilibus adnexa; ad radicem spicae duo rami egrediuntur ejusdem staturae cum caulibus, & sic continuatur secundum aetates. Inferioris
spicae

*RICINOIDES Indica, folio lucido, fructu glabro,
Grana TIGELLA Officinis dicto. Herb. Hart.*

7276 Croton Tiglium L.

RICINOIDES aromatica, arbor, Circaeae foliis hirsutis, floribus spicatis, major. Nobis.

7278 *Croton lacciferum* L.

spicae flores plures sunt foeminini, superioris vero masculini, qui calicem nullum habent, petala octo, stamina sedecim. Pistillum, & fructus nullos. Flores foeminini in inferiore spicae parte calicem habent multifidum, Embryonem subrotundum, triangularem, trisulcatum, pistilla tria, quae tandem in fructum desinunt, qui est capsula rotunda, trifurcata, trilocularis, in singulo loculo unicum semen oblongum, glabrum, splendens, striatum continens. *Grimm. in Labor. Ceyl. pag. 103.* vocat Grana Molucca, Grana Tiglia Officinarum, ab incolis GAJAPALA dicta, ubi haec habet: Arbores istae non longe ab aulica nostra civitate *Columbo* crescunt. Fructus ejus calidam & acriter fassam oleositatem habent, quae optimum praebet phlegmagogum, praesertim in magnis corporibus Hydropicis, sed prudenter praescribi debet pro macris, siccis, & calidis corporibus. In duris constipationibus, quae Colicam comitantur, & in quibus ordinaria remedia nihil praestant, ista nunquam nobis defecerunt. &c. Fructus isti velus exiguum intus habent, quod eximendum est, ceterum si simul assumatur, hic vel illic in corpore, adhaerescit, unde incommodae proveniunt operationes.

RICINOIDES aromatica, arbor, *Circaeae* foliis hirsutis, floribus spicatis, major. *Nobis. Tab. 91.* Ricinus, arbor Indica, aromatica, subhirsuta, Laccam in granis fundens, fructibus subhirsutis, minimis, **KAEPPEETHYA** *Hermanni. Bobart. hist. Oxon. tom. 3. pag. 349.* Ricinus aromaticus, spicatus, Indiae Orientalis, folio *Circaeae*, spinis ad imum duplicatis armato, Laccam in granis fundens, **CAPPATHYA** *Cinghalensibus. Plukn. Almag. pag. 320.* Ricinus Indicus, aromaticus, fructu rotundo, parvo, cum petiolo instar *Cubebae*, coloris ochroleuci. *Amm. H. Bosian. pag. 31.* Ricinus, arbor aromatica, fructu glabro, media, **KAEPPEETHYA** *Hermanni* apud *Ray. tom. 3. pag. 113.* Arbuscula Zeylanica, acris, gummi Laccae fundens, **KAEPPEETHYA** *Zeylonensibus. Herb. Herm.* Arbor Zeylanica, aromatica, acris, Laccam fundens, major. *Mus. Zeyl. pag. 46.* ubi dicitur, hujus radicis cortex aromaticus est, & purgativus, datur autem cum lacte. Non raro Laccam perpulchram ex ramulorum sinibus ad foliorum ortum collegi.

Arbor haec ramis angulatis, scabris gaudet: Folia per ramum sparsa proveniunt; Ex alis foliorum majorum oriuntur ramuli minora folia gerentes ovata, villosa, venosa, ferrata, petiolis uncialibus adnexa, solitaria.

Flores summos ramulos terminant spicati, qui constant ex calice quinquefolio, petalis quinque, staminibus viginti Pistilla in aliis floribus inter squammulas sparsa inveniuntur. Fructus deficiunt; sed juxta descriptionem, quae apud *Ray tom. 3. pag. 113.* occurrit, sunt fructus parvi, rotundi, exterius villosi, & Ricinorum ritu in tres partes per maturitatem se aperiunt, & tria femina inclusa Cannabinis aequalia demonstrant, ubi haec jungitur subsequenti; quae vix differt, quum tantum sint varietates, nam major, vel minor non multum mutat plantam, quum vero *Hermannus* tanquam diversas habuerit, & illas ita notare hic convenit.

RICINOIDES, arbor aromatica, Circaeae foliis media, **WALKAPPE-THYA** Zeylonensibus dicta. *Nobis.* Ricinus Indicus, frutescens, Laccam fundens. **WALKAPPETHYA** Zeylonensibus *Hermannii.* *Ray. tom. 3. pag. 113.* Arbor Zeylanica, aromatica, acris, Laccam fundens, media, **WALKAPPETHYA** dicta. *Mus. Zeyl. pag. 46.* Arbor Zeylanica, acris, odorata, Laccam fundens, media, **WALKAPPETHYA**, id est *Kaappethya* sarmentosum; *ibidem. pag. 11.* ubi additur: Laccam rubram & pellucidam, sed perpauca ex inciso hujus cortice non raro collegi.

RICINOIDES, arbor aromatica, Circaeae foliis, minima, **HINKAEP-PEETHYA** dicta. *Nobis.* Arbor Zeylanica, aromatica, acris, Laccam fundens, minor. **HINKAEPPEETHYA** Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 40 & 46.* Generis hujus characterem exactissime definitum vide apud *Linnaeum in Char. pl. gen. pag. 288.* ad **CROTON**.

RICINOKARPOS Zeylanica, hirsuta, foliis lanceolatis, ferratis. *Nobis Tab. 92.* Urtica Zeylanica, Hieracii folio, flore lutescente, fructu tripartito. *Herb. Hart.* Urtica Indica major, tricoccus, vehementer urens. *Mus. Zeyl. pag. 18.* Urtica Indica, tricoccus, Zeylanica, **KAHABILYA** Zeylonensibus, Schorigenam *H Malab. Mus. Zeyl. pag. 31.* Urtica frutescens, Malabarica, *Schorigenam* dicta, *Ray. hist. pl. pag. 160. & Commel. Fl. Malab. pag. 69.* Ricini spicati species, foliis hirsutis. *Mus. Zeyl. pag. 25?* an vero ad priores Ricinoides haec proprie spectat? Ricinus Althaeae folio molli, & incano, longiore & acutiore, Maderasp. *Plukn Phyt. Tab. 120. Fig. 5.* apud *Moris. tom. 3. pag. 349.* describitur, sed ibi caulis glaber dicitur, quum in nostra planta & illa

H.

RICINOKARPOS Zeylanica, *hirsuta*, *foliis lanceolatis*, *serratis*. *Nobis*.

Flor. *Crugia involucreta* L.

H. Malab. fit hirsuta admodum & urens. *D. Petiver. in act. Phil. Lond. vol. 22. no. 244. pag. 318.* hanc plantam eandem esse cum Schorigenam *H. Malab.* asserit, quod & confirmatur in *Ray. tom. 3. pag. 112* hanc *D. Sloane* etiam habet, a quo vocatur *Urtica racemosa*, urens, fruticosa, angustifolia, fructu tricocco. in *Catal. pl. Jam. pag. 38. & Hist. vol. 1. pag. 43. Tab. 16. Fig. 1.* Schorigenam in *H. Malab.* exhibetur *part. 2. Tab. 39.* quae a nostra foliis latioribus differt, & duntaxat proprie hujus plantae videntur esse differentiae, una scilicet latifolia, altera angustifolia, ut patet ex *Mus. Zeyl. pag. 18.* ubi *Urtica Zeylanica*, tricoccos, angustifolia, altera, *KAHABILYA* dicta, occurrit. Atque haec cum nostra proprie conveniret planta, cujus caulis est rectus, lignosus, rarius ramosus, villo flavescente undique tectus, striatus; Folia alternatim prodeunt lanceolata, serrata, serraturis distinctis, acutis, quae versus foliorum apicem desinunt: Folia caeterum villis flavescens, strigosis aspera sunt. Ex alis foliorum oritur petiolus, qui sustinet plures flosculos, quorum inferior est foemina, reliqui superiores sunt mares; ulteriorem descriptionem in *H. Malab. loc. cit.* vide accuratissimam, quae in omnibus nostrae penitus convenit plantae, licet illa *H. Malab.* habenda esset latifolia, nostra vero angustifolia; quum vero in *Mus. Zeyl.* eadem nomina *Zeylanica* utrique sint data & juncta, non video rationem, cur hic separarem; si quis autem duas velit facere plantas, & eas sejungere per me licet. *KAHABILYA* & *WALKAHABILYA* vocantur, quod pronunciat *Kahambelya*. a *Kala* quod prurire significat; haec enim tacta cutis pruriginem excitat, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 18.*

RICINOKARPOS Indica, glabra, fructus in acetabulis gerens. *Nobis.* Mercurialis *Zeylanica*, tricoccos, cum acetabulis. *H. L. Bat. App. pag. 686.* ubi icon & descriptio *Mus. Zeyl. pag. 2. Cat. Hort. Amst. pag. 231. Ray. hist. pl. pag. 1854. & tom. 3. pag. 108. Petiv. act. Phil. Lond. vol. 22. no. 287. pl. 18.* Mercurialis *Maderasp.* acetabulata, folio rotundo minore. *ibidem vol. 19. no. 198.* quae eadem censetur cum Mercuriali Hermaphrodita dicocco, seu Julifera & fructum ferente. *Banist. Cat. Stirp. Virgin.* apud *Ray. hist. vol. 3. append. Cupameni II. Malab. part. 10. Tab. 81.* quae *Urticae* folio, planta, flore albicante, spicato, cui passim thecula bicornis insidet, foliis in summitate caulem ambiens. vocatur a *Commel. in notis pag. 161. & Fl. Malab. pag. 70 & 44.* *Urtica Malabarica*, tricoccos. *Ray. tom. 3. pag. 107. KUPA-MENYA*
Cc 2 Zey-

Zeylonensibus dicitur, a *Kuppa* quod fumetum notat, ubi copiose crescit, & *Menya* cor, quasi amans fumetum. Duae hujus proprie sunt species, prior habet folia rotunda, mucronata, posterior oblonga, mucronata, paululum hirsuta; ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 2*. Quaeque est

RICINOKARPOS Indica, hirsuta, foliis Urticae vulgaris, fructus in parvis acetabulis gerens. *Nobis*. Cynocrambe Indica, tricoccus, major, hirsuta. *Herb. Herm.* Mercurialis tricoccus, Hermaphroditica, seu ad foliorum juncturas ex foliolis cristatis julifera simul, & fructum gerens. *D. Banister. apud Pluknet. Phyt. Tab. 99. Fig. 4?*

Caulis nostrae plantae, quae laeviter hirsuta, est simplex, longus, inaequalis, ad folia enim extrorsum vergit; folia per gradus, vel alternatim semiunciali spatio remota e caule exeunt, pediculis biuncialibus insidentia, ovato-acuminata, crenata, ad apicem caulis conferta, ex singula foliorum ala petioli communes oriuntur, fere digitales, solitarii, vel plures simul, ad latera undique flosculis stipati, inferius foemininis, superius masculinis, sub foemininis foliola subrotunda, amplexicaulia, ferrata, parvum acetabulum constituentia subjiciuntur; peracta florescentia flores masculini decidunt, foeminini autem excrescunt in fructum trilocularem, tricoccum, adeoque omnia, ut in *Ricinokarpo Boerhavii*, cujus notas vide definitas in ejus *Ind. H. L. Bat. part. 1. pag. 254*. Hybridae enim seu spuriae sunt hae plantae, mediae inter Urticam, Mercurialem, & Ricinum, quum singularum harum plantarum multa habeant adtributa.

RICINOKARPOS Indica, hirsuta, foliis Urticae vulgaris, rotundioribus & minoribus. *Nobis*. Cynocrambe Indica, tricoccus, **KUPPAMENYA** *Herb. Herm. & Mus. Zeyl. pag. 28 & 29*. Welia-Cupameni *H. Malab. part. 10. Tab. 83*. Urticae folia spicata, Indica, spicis longis, erectis, flosculis & feminibus crebrioribus. *Ray. tom. 3. pag. 107*. Urtica mortua Daun Guttæ Matti *Rumph. Herb. Ambon. lib. 10. cap. 39*. Urtica minor, iners, spicata, folio subrotundo, ferrata, fructu tricocco. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 38. & Hist. vol. 1. pag. 125. Tab. 82. Fig. 3*.

RICINOKARPOS Indica, Betonicae folio. *Nobis*. Urtica Zeylanica, tricoccus, Betonicae folio **ÆTHAHAMBILYA** Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 68*. huc & spectat Urtica racemosa, humilior, iners, *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 38. & Hist. vol. 1. pag. 124. Tab. 82. Fig. 2*.

Vide-

Fig. 1.

Fig. 2.

RICINOKARPOS Zeylanica, urens, . Mercurialis folio, floribus ex alis spicatis. Nobis.

URINARIA Indica, erecta, vulgaris. Par. Bat.

M. Phyllanthus Niruri L.

Videtur mihi haec eadem cum priori planta, licet ab *Hermanno* diversis nominibus fuerint collectae, utrasque ficcatas seruo, ut verum fatear, nullam differentiam externe observare possum, forte una planta erit mas, altera foemina, seu una spicata, testiculata altera.

RICINOKARPOS Indica, glabra, Mercurialis folio, *Nobis*. Mercurialis Indica, tricoccus *Herb. Herm.* Urtica Zeylanica, sylvestris, Mercurialis facie. *Herb. Hert.* quae est Pee-Cupameni *H. Malab. part. 10. Tab. 82.* quae Urticae folio, flore tetrapetalo racemoso, capsula triquetra *ibidem* vocatur, & in *Fl. Malab. pag. 62.* vide & *Ray. tom. 3. pag. 107.* Mercurialis Maderaspi. tricoccus, acetabulis destituta, forte Pee-Cupameni *H. Malab. Plukn. Phyt. Tab. 205. Fig. 4.*

Tres Cupameni species ex *H. Malab.* adductae & nostris plantis pro synonymis junctae adeo cum iis conveniunt, ut persuasissimus sim, easdem re vera esse plantas, uti ficcatarum, quas seruo, plantarum cum *H. Malab.* iconibus comparatio, quum earum descriptio admodum manca sit, me & alios, qui has plantas videre, docuit, unde & omnium icones hic addere supervacuum duxi, praesertim quum partes floriferae & frugiferae in his plantis adeo minutae sint, ut in exficcata exprimi bene haud facile possint, & in *H. Malab.* satis bene & accurate insculptae sint.

RICINOKARPOS Zeylanica, urens, Mercurialis folio, floribus ex alis spicatis. *Nobis. Tab. 93. Fig. 1.* Urtica Zeylanica urens, Mercurialis flore & habitu *Herb. Herm.* huc spectat Urtica racemosa, scandens, angustifolia, fructu tricocco. *Sloan. Hist. Jam. pag. 123. Tab. 82. Fig. 1.* qui Ricinus parvus, urens, Urticae folio *Banist. Cat. stirp. Virgin.*

Quum hanc plantam apud nullos invenerim auctores, quae solummodo ex foliorum alis flores fructusque profert, ejus iconem cum brevi descriptione exhibemus. Cujus caulis est simplex, erectus, laevis, folia ad caulem sparsa, alterna, lata, oblonga, profunde & obtuse serrata, tenuia, laevia, urentia, pediculis biuncialibus infidentia. Petioli ex folicum alis tenues, inferius foemineos sustinentes, superius flosculos masculinos deciduos gerunt, uti in aliis hujus speciebus.

RICINUS Zeylanicus, femine minimo. *Heist. Cat. pl. H. Acad. Jul. ann. 1731. pag. 18.*

RICINUS Americanus, Nhambu-Guacu *Pisonis* HAERANDA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 53.* Nhambu Guazu sive Ricinus Americanus apud *Pisonem* occurrit *pag. 180.* qui est Ricinus Americanus, fructu racemoso, hispido: *Jonst. Dendr. p. 217 & Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 38.* ubi plurima invenies synonyma. Palma Cristi vulgo vocatur; cum qua convenit Avanacu & Pandi-Avanacu *H. Malab. part. 2 Tab. 32 & pag. 60.* ubi vide notas, & *Fl. Malab. p. 58.* ubi Ricinus Africanus, maximus, caule geniculato rutilante. *H. Reg. Paris. p. 127.* cum eo jungitur: vide & *Plukn. Almag. pag. 319.*

RICINUS arbor Zeylanica, dulcis, MAHAPATIGHAHA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 65.* an Ricinus dulcis arborefcens, Americanus, Populnea fronde argentea, seu foliis Populi nigrae argenteis *Breynii Plukn. Phyt. Tab. 220. Fig. 5. Almag. pag. 320.* Ricinus fructu arbor, Curassavica, foliis Zizyphi argenteae Zeylanicae *Par. Bat. Pr. pag. 370.* Ne mirum videatur Lectoribus, plantas Americanas hic inter Zeylonenses enumerari, in utrisque enim terrae plagis saepius eadem occurrunt, quod ab aliis etiam jam observatum est, sic & *Pluknetius* rariorum ille summus plantarum exoticarum indagator loquitur in *Almag. pag. 111.* ubi scribit: Experientia nos docuit, quamplurimas Indiae Orientalis plantas in America etiam reperiri, quod & idem testatur se observasse Clariss. *Commelinus* in loco quodam ad *H. Malab.* quem memini quondam me legisse.

RIZOPHORA Indica, sive Inhame rubra, caule alato, Scammonii foliis nervosis, conjugatis, *Par. Bat. Pr. pag. 370. Plukn. Almag. pag. 321.* Rizophora foliis nervosis, in acumen desinentibus & prima *Par. Bat. Pr. Mus. Zeyl. pag. 20.* Katsyl Kelengu *H. Malab. part. 7. Tab. 38.* ubi *Commelinus* in notis addit, species est Batatti sylvestris ex Ceylona transmissa, ubi radices a porcis, aliisque animalibus comeduntur. Battata sylvestris, Indica, foliis Smilacis, laevibus, caulibus alatis, flore vidua, pro fructu glandes tuberosas ad exortum foliorum emittens. *Ray. tom. 3. pag. 134.* Volubilis niara, radice alba aut purpurea, maxima, tuberosa, esculenta, farinacea, caule membranulis extantibus alato, folio cordato, nervoso. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 46.* ubi plurima invenies synonyma, ut & in *Hist. Jam. vol. 1. pag. 139.* Ubum pomiferum, Aluno. *Rumph. Herb. Amboin. lib. 9. cap. 11* qui varias hujus habet species, WELALA Zeylonensibus haec dicitur; variat

Fig. 1.

ROS SOLIS ramosus,
caule folioso. Nobis.

2232 *Drosera indica* L.

Fig. 3.

SPHAERANTHOS purpurea, alata, serrata. Nobis.

Fig. 2.

2227 *Drosera rotundifolia* L.
ROS SOLIS foliis circa radicem
in orbem dispositis. Nobis.

6716 *Sphaeranthus indicus* L.

variat radice alba & rubra, ut notatur in *Parad. Batav.* & a *Pluknet.* rubrum habet *Samuel Dale in Pharm. supplement. pag. 150.* Rizophoram Zeylanicam sequenti modo describit *Amm. in Char. pl. pag. 211.* Est tuberifera, scandens, caulibus sarmentosis, quibus ad genicula e regione foliorum instar Scammonii nervosorum, & acuminatorum, tubera subrotunda, in radices abeuntia, cohaerent.

RIZOPHORA Zeylanica, Scammonii folio singulari, radice rotunda, tuberofa. *Par. Bat. pag. 217.* ubi icon & descriptio. Katu-Katsyl *H. Malab. part. 7. Tab. 36.* Battata sylvestris, foliis Smilacis nervosis, flore vidua, fructu triangulari compresso, dispermo. *Ray. tom. 3. pag. 133.* Rizophora Indica, Bryoniae nigrae similis, ad foliorum ortum verrucosa. *Plukn. Phyt. Tab. 220. Fig. 6.* KATHUWALA Zeylonensibus; hujus quoque radix comeditur, & ejus decoctum cum pulvere radicum Chinae ulcera mundificat & sanat.

ROSSAKINDA an Ibatii Pisonis? *Mus. Zeyl. pag. 27.* Ibatii Brasiliensium a *Pluknet.* idem habetur, ac Apocynum amplexicaule, frutescens, Brasilianum cortice, albo, fungoso. *Par. Bat. Pr. pag. 313.* ut constat ex ejus *Almag. pag. 37. &c.*

ROS SOLIS ramosus, caule folioso. *Nobis. Tab. 94. Fig. 1.* Ros Solis Zeylanicus, ramosus, foliolis roridis, pennatis. *Mus. Zeyl. pag. 63.* Saxifraga Zeylanica, muscosa, minutissimo folio, flore albo. *Herb. Hart. Acara-Puda H. Malab. part. 10. Tab. 20.* quae Alfine Myriophylli folio, flore carneo *ibidem in notis.* KANDULAESSA Zeylonensibus, a *Kandula* h. e. lachryma, quia foliola rore humida guttulas tanquam lachrymas repraesentant.

Radix hujus plantulae est tenuis, articulata, fibrosa, emittens caulem semipedalem, tenuissimum, ramosum, e quo folia alternatim egrediuntur tenuissima, & superius ad dimidiam circiter partem villosis crinibus tecta. Ex foliorum alis emergunt petioli longitudine foliorum, interdum longiores, qui flores tres vel plures, aliquando vero solitarios in minutioribus petiolis continent. Folia superius reflectuntur, caetera inveni, ut in reliquis *Ros Solis* speciebus.

ROS SOLIS foliis circa radicem in orbem dispositis. *Nobis. Tab. 94. Fig. 2.*
Ros Solis Zeylanicus, foliis rotundis in orbem expansis, villosis.
Herb.

Herb. Herm. Ros Solis Indicus, folio rotundo. WATHAESSA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 18.* ubi additur: hujus plantae usus, ut in Europa, sic in Zeylona decantatus est, Sal hujus plantae specificum est in obstructionibus Hepatis, Lienis, ac Mesenterii. Characterem hujus generis habet *Linnaeus in Char. pl. gen. pag. 89.* alio vocabulo hoc genus nominans DROSERAM.

Folia hujus plantae ad radicem plurima in orbem supra strata sunt sita, a basi tenuissima sensim dilatata, obtusissima, hirsutissima. Caulis simplex est, digiti aut majoris longitudinis, versus apicem floribus quinque ad decem instructus: E radice interdum alter recens caulis prodit, priori difflorato.

RUBEOLA Zeylanica ELARATHMUL dicta. *Mus. Zeyl. pag. 1.* Rubeola maritima, Indica, Molluginis folio, radice rubente *ibidem. pag. 22.* ELARATHMUL dicitur ab *Ela* album, *Rat* rubrum, & *Mul* quod radicem denotat. *Tsjada* & *Tseya* Malabaribus & Lusitanis vocatur. Linthea hujus radice rubro tinguntur colore, ut notatur in *Mus. Zeyl.*

RUBEOLA Zeylanica, foliis latioribus RATMUL dicta. *Mus. Zeyl. pag. 8.*

RUBIA Zeylanica, sylvestris, quadrifolia, major. *Hert. Catal. semin.*

RUDHUMETI & RANAHAENDYA, flore coeruleo, Calcitrapae facie. *Mus. Zeyl. pag. 18.* prima denominatio desumpta est a *Rudu* quod *Oryzae* palea est, & *Meti* terra, seu humus, in qua nascitur, fordido enim crescit loco. Altera RANAHAENDYA h. e. flos Cochleari similis. *Haenda* enim cochlear significat.

SAGITTARIA Zeylanica, floribus ex medio caulis prodeuntibus. *Mus. Zeyl. pag. 71.* Sagittariae species, flores ex medio caulis ferens. *ibidem. pag. 24.* Sagittariae quodammodo similis planta Maderasp., floribus medio caule quasi ex utriculo prorumpentibus. *Plukn Phyt. Tab. 220. Fig. 8.* SABARA & DYAHABARALA Zeylonensibus.

SALSAPARILLA. *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 126.* ubi dicit: duo sunt ipsius genera, quae usui adhibentur, tantumque eorundem habemus, quantum nobis est necessè, & Europaeis commode carere possumus. *Similacis* infra propositae forte species sunt.

SAMBUCUS humilis, Zeylanica, **PAWATHA** Zeylonensibus. *Par. Bat. Pr. pag. 373.* Sambucus antidysenterica, Zeylanica, humilis, *Mus. Zeyl. pag. 3.* Pavate *Acoftae ibidem.* quae apud eum reperitur descripta *pag. 256. in octavo.* Sambucus forte Barbadosibus dicta, foliis subincanis &c. *Plukn. Phyt. Tab. 221. Fig. 6.* quae est Grossulariae fructu, non spinosa Malabathri foliis, subtus niveis, fructu racemoso in Umbellae modum disposito. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 165. & Hist. vol. 1. pag. 40.*

SAMBUCUS Zeylanica, odorata, aromatica. *Mus. Zeyl. pag. 14.* an Arbor Baccifera laurifolia, aromatica, fructu viridi, calyculato, racemoso? *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 165.* Sambucus Indica, **MINAI** vocata. *Grimm. Labor. Ceyl. pag. 109.* ubi haec habet: Radix istius arboris corticem nobis exhibet, qui valde aromaticus est; succus aut pulvis ejus optimum est remedium adversus fluxus ventris, deprimit bilem acrem, & effervescentiam, dolores demulcet, stomachum & viscera confortat. Fructus per coctionem dant oleum, cui eadem virtus inest. Cortex per destill. dat Ol. & Aq. in quibus eadem vis continetur, praeterquam quod adhuc virtutem specialem obtinent in Gonorrhoea & renum affectibus. in *Mus. Zeyl. pag. 14.* vocatur **MINDI** & **MIDI.** ubi & notatur, quod ex ejus radice destilletur Oleum aromaticum.

SAMBUCUS Zeylanica, inodora, frugiperda, **GURULLA** Zeylonensibus, *Mus. Zeyl. pag. 40.* cum qua eadem videtur Sambucus Zeylanica, inodora, **PURULAE** Zeylonensibus, *ibidem. pag. 60.*

SAPONARIA arbor, Zeylanica, trifolia, semine Lupini. *Par. Bat. Pr. pag. 373. Mus. Zeyl. pag. 69.* Saponaria arbor, trifoliata, Zeylanica. *H. Beaum. pag. 37.* Saponaria arbor, Indica. *Amm. H. Bosian. pag. 32.* Saponaria arbor trifolia, Indica, *H. L. Bat. pag. 536. & Commel. Fl. Malab. pag. 60.* ubi jungitur cum Prunifera, fructu racemoso, parvo, nucleo saponario. *Ray. hist. pl. pag. 1548.* huc spectat Purinsji *H. Malab. part. 4. Tab. 19. ubi pag. 44. in notis* vide varios fructus, quibus Indi saponis loco utuntur. an Arbor Prunifera, sphaerulas saponarias ferens, tetraphylla, ex India Orientali. *Plukn. Phyt. Tab. 14. Fig. 6? & Almag. pag. 47.* **CONGHAS** nostra Zeylonensibus dicitur.

SCABIOSA Conyzoides, foliis latis, dentatis, semine amaro, lumbricos enecante. *Nobis. Tab. 95.* Scabiosa Zeylanica, capitulis foliosis, semine Sementinae, seu Zedoariae, lumbricos enecante. *Herb. Herm.* Scabiosa Zeylanica, capitulis foliosis, semine amaro, lumbricos enecante. *Mus. Zeyl. pag. 66.* Serratula Indica, major, capitulo folioso. *Bobart. Hist. pl. tom. 3. pag. 134.* Jaceae & Serratulae adfinis, capitulis Baccharidis, foliis Trachelii, Zeylanica. *Breyn. Prodr. 1. pag. 39. & Commel. Fl. Malab. pag. 36.* Serratula Indica, major, latifolia, mollis. *Breyn. Prodr. 2. pag. 90. Ray. tom. 3. Dendr. pag. 17. Commel. Fl. Malab. pag. 61.* Eupatoria Conyzoides, odorata, folio crenato, molli, subincano. *Plukn. Phyt. Tab. 87. Fig. 2.* Synonymia haec vulgo huic junguntur plantae, ut supra ad *Jaceam* pag. 123. monuimus. Cum qua & convenit Scabiosa Indica, capitulis foliaceis, major. *Mus. Zeyl. pag. 34.* Scabiosa Conyzoides Americ. latifolia, capitulis & floribus albidis, parvis. *Par. Bat. Pr. pag. 374.* Cattu-Schiragam *H. Malab. part. 2. Tab. 24.* quae Scabiosa Indica, arborea. *Ray. hist. pl. pag. 1443. Amm. Char. pl. pag. 322, 428 & 557.* huc spectat Chrysanthemum Maderasp. latifolium, Scabiosae capitulis parvis. *Plukn. Phyt. Tab. 159. Fig. 4.* & Carduo-Cirsium minus, angustifolium, capitulis plurimis, amplioribus, sparsis e Maderasp. *Plukn. Phyt. Tab. 154. Fig. 4.* quae foliis est integris, quo a nostra planta solummodo differt. Caulis nostrae plantae est striatus, scaber, lignosus, straminei coloris, folia alternatim inordinato situ exeuntia, ovalia, utrinque acuminata, per marginem dentato-ferrata, superiora angustiora, acutiora, media latiora, inferiora obtusiora. Rami nonnulli versus summitatem floribus solitariis instruuntur, ramis geminatis vel ternis. Florum calix est squammosus, oblongus, angustus, obtusus, semina papposa sunt, striata, coronula setacea, brevissima & tenuissima instructa.

SCABIOSA Indica, capitulis foliosis, minor. *Mus. Zeyl. pag. 34.* Scabiosa ramosa, capitulis parvis *ibidem* pag. 43. Scabiosa Conyzoides, angustifolia, capitulis, & floribus parvis. *Par. Bat. Pr. pag. 374. Plukn. Phyt. Tab. 109. Fig. 1.*

SCORZONERA Zeylanica, bulbosa. *D. Scherard.* apud *Ray. tom. 3. pag. 108.* ubi describitur sequenti modo; Flores in hac specie longis pediculis nudis non insident, sed caulis ad ipsum usque florem foliis crebris vestitur, ut folia florem veluti ambient; a *Vaill. in act. Reg. Paris.*

SCABIOSA Conyzoides, foliis latis, dentatis, semine amaro, lumbricos enecante. Nobis.

6230. - Conyza anthelmintica L.

Fig. 1.

Fig. 2.

SENECIO Zeylanica, foliis oblongis, integris, oppositis. Nobis

SENECIO Indica, foliis ternis, crenatis. Nobis.

Paris. ann. 1721. pag. 271. etiam citatur; Convenit forte cum Scorzonera bulbosa, Bistortae minimae foliis, Virginiana, *Plukn. Phyt. Tab. 59. Fig. 4.* hujus generis characterem habet *Linnaeus in Char. pl. gen. pag. 241.*

SEDUM Zeylanicum, spicatum, luteum, majus. *Mus. Zeyl. pag. 43.* Sedum spicatum, maximum, Indicum. *ibidem pag. 58.* Sedum Zeylanicum, flore luteo. *ibidem pag. 63.*

SELAGO Indiae Orientalis, five Plegmaria admirabilis, Zeylanica. *Breyn. Cent. pag. 180.* ubi ejus descriptio, & elegantissima Figura. *Ray. hist. pl. pag. 1852.* Selago Indiae Orientalis, granulis orbicularibus. *Breyn. Cent. pag. 183.* ubi dicit natam hanc plantam in insula Zeylan, e caudice vetustae cujusdam arboris *Jacae.*

SELAGO Indiae Orientalis, granulis trigonis. *Breyn. Cent. pag. 182.* Equisetum arboreum, squammatum, Ruttu Ruttu-Caju *Rumph. Herb. Ambon. lib. 10. cap. 63.* ubi tres hujus describuntur species. Tama-Poulpaalsja-Maravana *H. Malab. part. 12. Tab. 14.* ubi proluxa & elegans hujus plantae, ejusque virtutum exstat descriptio. *Lycopodii* haec videntur species, quo forsan ablegandae.

SENECIO Indica, foliis ternis, crenatis. *Nobis. Tab. 96. Fig. 1.* Senecio Zeylanica, inodora, minor, flore purpureo, papposo. *Herb. Hart.* Senecio Zeylanica, foliis subrotundis, crenatis, floribus ex purpura coeruleis. *Mus. Zeyl. pag. 31.* Conyza Indica, inodora, minor, flore purpureo, papposo. *Herb. Herm. & Mus. Zeyl. pag. 2.* ubi male cum Crista Pavonis *Breynii* jungitur. Senecio Indicus, Atriplicis folio. *Morris. Tab. 17. sect. 7. Fig. 7.* ubi foliis solitariis exprimitur. **MONARAKUDHUMBYA** in *Mus. Zeyl. pag. 2, & 31.* haec, ut videtur, vitiose vocatur, quum Cristae pavonis *Breynii* hoc nomen proprie convenit, ut patet supra *pag. 79.* quod a *Monara*, quod Pavonem & *Kudhumbya*, quod cristam denotat, derivatur, cui flos Cristae pavonis similis est. unde & delendum hoc nomen erit.

Caulis hujus plantae est sesquipedalis, teres; folia secundum caulem sparsa, terna utcunque simul numero, duo inferiora quadruplo minora, ejusdem tamen formae, sunt scilicet fere ovata, obtuse ferrata, vel crenata, glabra, petiolis longissimis vario ordine insidentia: Cau-

lis terminatur in racemum florum sparsum, cui flosculi insident tenuissimis, & longissimis petiolis suffulti, in tres quatuorve communes pediculos communiter divisi; flosculi autem sunt compositi, papposi, disciflori, ut in aliis hujus speciebus.

SENECIO Zeylanica, foliis oblongis, integris, oppositis. *Nobis. Tab. 96.*

Fig. 2. Senecio Zeylanica, minor, foliis oblongis, glabris, non crenatis, flosculo albo, papposo. *Herb. Hart.* Conyza Indica, inodora, minor, flosculis albis, papposis. *Herb. Herm.*

Ex radice tenui, fibrillosa, coadunata, albicante, oritur caulis semipedalis, glaber, tenuis, simplex, e quo rami alternatim simplices itidem proveniunt, qui binis foliis oppositis, oblongis, glabris, viridibus, integerrimis, ex quatuor foliorum paribus constructi gaudent, folia autem brevissimis pediculis adfiguntur, ita ut in minoribus ramis sessilia fere appareant. Flosculi, qui in nostro specimine defunt, sine dubio, ut in priori planta, eodem modo proveniunt, colore forte differentes, caeterum ambae hae plantae videntur annuae, ut plurimae Senecionis species.

SENECIO Indiae Orientalis, amplissimis Lampsanae foliis. *Plukn. Almag. pag. 343.* Senecio Zeylanica, flore purpureo, habitu Sonchi. *Hart. Catal. semin.* Erigeron Zeylanicum, Lampsanae foliis. *Breyn. Cent. pag. 140. & Moris. Tab. 10. Sect. 7. Fig. 5. Ray. hist. pl. pag. 294.* hujus generis characterem dedit *Linnaeus in Char. pl. gen. pag. 251.*

SENNA quadrifolia, siliqua plana, hirsuta, flore aureo, sanguineo. *Nobis. Tab. 97.* Senna Zeylanica, perelegans, flore rubello, caule & siliqua hirsutis. *Hart. Catal. semin.* Senna Orientalis, tetraphylla, *Absus* dicta. *H. L. Bat. pag. 558.* Senna spuria, tetraphylla, siliqua lata, compressa. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 149.* Loto adfinis Aegyptia, semine atro splendente, seu Abrus Alpini, flore aureo, lineolis sanguineis perfuso. *Mus. Zeyl. pag. 41. & Herb. Herm.* Loto adfinis Aegyptia. *C. B. Pin. pag. 332.* Absus Trifolii floribus, foliis Orobi glabris. *J. B. tom. 2. lib. 17. pag. 361.* Absus Alpin. de pl. Aegypt. cap. 31. pag. 97. Senna exigua, Maderasp. seu tetraphylla, filiquifera, glabra, florum pediculis ad foliorum exortum prodeuntibus. *Plukn. Phyt. Tab. 60. Fig. 1. & in Almag. pag. 341.* reliqua vide synonyma. ut & apud *Ray. tom. 3. pag. 451.* GHASDAMINI Zeylonensibus dicitur.

In.

SENNA quadrifolia, siliqua plana, hirsuta, flore aureo, sanguineo. Nobis.

2958. Cassia Abous S.
 Cassia Abous ?

SENNA vigintifolia. filiquis teretibus. Nobis.

2979 Cassia Sophora L.

Cassia

Sophora

In *Pluknet*. *Figura* caeterum optima, flores hujus plantae deficiunt, & filiquae deformes admodum etiam insculptae; glaberrimae enim & brevissimae exhibentur, quum sint subhirsutae, planae, bivalves, variis interstitiis semina occludentibus distinctae; flores autem ex alis foliorum proveniunt parvi, plures simul, purpurascens, lineolis rubris distincti, pentapetali, decem staminibus quinque minoribus, & quinque majoribus instructi. Planta autem ipsa est humilis, caulem brevem, ramosum, hirsutum gerens, cui folia vario modo petiolis uncialibus insistentia pinnata adnectuntur; pinnae autem e duplici pari constant sine impari, quae sunt ovatae, tenues, integerrimae, glabrae, venosae.

SENNA vigintifolia, filiquis teretibus. *Nobis*. *Tab.* 98. *Senna Orientalis*, fruticosa, *Sophera* dicta *H. L. Bat.* pag. 557. *Plukn. Almag.* pag. 342. *Galegae* adfinis, *Sophera* dicta. *C. B. Pin.* pag. 352. & *Herb. Herm.* *Galega Indica*, heccedecaphyllos, quae *Senna Zeylanica*, major, *Amm. H. Bosian.* pag. 15. & *Sophera Lentisci foliis*. *Honor. Bell. & Prosp. Alpin.* *Amm. H. Bosian* pag. 34. *Sophera Lentisci foliis* *Amm. Char. pl.* pag. 575. *Sopherae* congener planta, filiquis compressis, hirsutis, seminibus atris, lucidis, floribus aureis. *Mus. Zeyl.* pag. 56. *Sophera Indiae Orientalis*. *Breyn. Prodr.* 1. pag. 51. *Ponnam-Tagera* *H. Malab. part. 2. Tab.* 52. vide & notas ad *H. Malab. part. 1. pag.* 96. habetur haec vulgo pro *Sophera Alpini*, quae *Securidaca Aegyptiaca* a *Parkins. Theat.* pag. 1089. vocatur, qui & totam *Alpini* figuram in suum coniecit opus, unde *Plukn in Almag.* pag. 342. & *Moris tom. 2. pag.* 78. illam cum hac nostra conjungunt, quantum autem *Sophera Alpini*, a *Senna Orientali* fruticosa, differat, sola comparatio nostrae, & *H. Malab.* cum *Alpini Figura*, quae apud eum in *plant. Aegypt.* pag. 84. cap. 25. exhibetur, statim docebit, unde & hae etiam distinguendae sunt, vide & *Ray. tom. 3. Dendr.* pag. 109. huc spectat *Flos Flavus*, *Cambang Curung*. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 6. cap.* 28. quae ab eo cum *Ponnam Tagera* *H. Malab.* jungitur, ut & *Gallinaria* species prima, *Utta Maru*. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap.* 68. quae pro *Tagera* *H. Malab. part. 2. Tab.* 53. ab eo habetur. huc & pertinet *Senna Occidentalis*, odore *Opii viroso*, *Orobi Pannonici foliis mucronatis*, glabris. *Sloan. Cat. pl. Jam.* pag. 148. & *hist. vol. 2. pag.* 48. pl. 22. qui hanc cum *Sophera Alpini* conjungit. **MAHATORA** Zeylonensibus.

Rami nostrae plantae sunt lignosi, laeves, teretes, in floriferas divaricationes superius desinentes, e quibus per uncialia spatia folia alternatim exeunt composita juxta rachim fere pedalem ex decem paribus sine impari, singula autem foliorum pinna opposita est, fessilis fere, oblongo-acuta, integerrima, glabra, & acuminata; ex sinu foliorum compositorum proveniunt pedunculi flores paucos proferentes, e quibus unica communiter perficitur filiqua triuncialis teres, cum parvo acumine, racemus autem florum terminat singulum ramum, qui constat pedunculis alternatim egressis, semiuncialibus, in alios minores pedunculos & proprios desinentes, quibus singulis flos unicus infidet aureus, calice quadrifolio, oblongo, patente, deciduo contentus, gerens petala quinque, oblonga, concava, cum decem staminibus crocei coloris, quorum quinque longiores sunt, & stylo simplici, deorsum inflexo gaudens.

SENNA Zeylanica, foliis obtusis, semine longiore. *Hart. Catal. semin.*

SENNA Zeylanica, flore umbellifero, luteo, magno, semine plano. *Hart. ibidem.*

SENNA Zeylanica, spicata, flore luteo, maximo, fructu quadrangulati. *Hart. ibidem. & Heist. Catal. pl. Acad. Jul. ann. 1731. pag. 26.*

SENNA Zeylanica, flore luteo, magno, semine plano. *Hart. Catal. semin.*

SESBAN ex insula Zeylan. *Breyn. Prodr. 1. pag. 47.* quae est Galega Aegyptiaca, filiquis propendentibus longissimis & angustissimis. *H. L. Bat. pag. 267.* Sesban Aegyptiacum, sive Securidaca Aegyptiaca articulata. *Parkins. Moris. hist. pl. part. 2. pag. 79.* reliqua vide supra ad *Galegam pag. 103.*

SHERARDIA repens, nodiflora. *Vaill. de struct. Fl. pag. 49.* ubi vide, quae est Verbena nodiflora, foliis minoribus, viridibus. *Moris tom. 3. pag. 419.* Verbena nodiflora. *C. B. Prodr. pag. 125.* ubi icon & descriptio & *Pin. pag. 269.* *Mus. Zeyl. pag. 66.* *J. B. tom. 3. pag. 444.* Verbena repens, nodiflora. *Parkins. Theat. pag. 675.* Foelie de Raala Lusitanis dicitur. HIRIMANADAETTA Zeylonensibus, id est orbiculus dentatus, folia enim orbiculata & dentata sunt instar orbiculi illius ferrei, dentati, quo Indi medullam Nucis Indicae extorquent ad prae-

paran-

SINAPISTRUM Zeylanicum, pentap hyllum, viscosum, flore flavo. Herb. Hart.

4897. *Cleome icosaandra* L.

parandum lac Coccineum ex nuce Cocco. Lusitani hunc orbiculum vocant *Raala*, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 56.*

SINAPISTRUM Zeylanicum, pentaphyllum, viscosum, flore flavo. *Herb. Hart. Tab. 99.* Erysimum Indicum, pentaphyllum, flore flavo. *Herb. Herm.* **RANMANISSA** Zeylonensibus vocatur.

Caulis hujus plantae est rotundus, crassus, altus, villosus & viscosus, varios emittens ramos, quibus folia composita, digitata quinque simul in uno centro insident petiolis viscosis, uncialibus, alternis, singula autem pinna est oblonga, lata, glabra, integerrima. Ex alis vero foliorum petiolus uncialis oritur sustinens florem quadripetalum, qui abit in filiquam bivalvem, unicapsularem sine septo intermedio, duplici vero feminum serie constantem, qua est triuncialis, oblique extrorsum striata, teres, acuta, hirsuta & viscosa, ut tota etiam planta laeviter hirsuta est, & admodum viscosa.

SINAPISTRUM Zeylanicum, triphyllum, & pentaphyllum, viscosum, flore flavo. *Boerhav. apud Martin. Cent. 1. Dec. 3. pag. 25.* quae non nisi foliorum varietate a praecedenti differt, & vocatur Papaver corniculatum, acre, triphyllum, Indicum, floribus luteis, viscosum, **RANMANISSA** Cochinesibus dictum a *Plukn. in Almag. pag. 280.* Erysimum, seu Sinapistrum Indicum, triphyllum, viscosum, flore flavo. *Mus. Zeyl. pag. 13.* Erysimum Indicum, triphyllum *ibidem pag. 29.* Anci-Veela *H. Malab. part. 9. Tab. 23.* Sinapistrum Indicum, triphyllum, flore carneo, non spinosum. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 80. & Hist. Jam. vol. 1. pag. 194. Tab. 124. Fig. 1.* Trifolium spicatum, Mexiocanum *Hernand. apud Recch. pag. 284.* & Memeya de Teponthan *ibidem. pag. 384.*

SINAPISTRUM Indicum, spinosum, foliis quinque, sex, septemve numero incertis. *Nobis.* Sinapistrum Indicum, quinquefolium, floribus incarnatis. *Mus. Zeyl. pag. 1.* Erysimum Indicum, pentaphyllum, sylvestre, flore pallide incarnato, *ibidem. pag. 30.* Sinapistrum Indicum, majus, quinquefolium, asperum, & quasi spinosum, flore carneo. *Scherard. apud Ray. tom. 3. pag. 419.* Tareriaya. *Markgr. lib. 1. cap. 16. pag. 34.* Sinapistrum Aegyptium, heptaphyllum, flore carneo, majus, spinosum. *H. L. Bat. pag. 564. Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 80.* Papaver corniculatum, acre, quinquefolium, Americanum, flore carneo,

carneo, majus, spinosum. *Plukn. Almag. pag. 280.* Pentaphyllum peregrinum, filiquosum, bivalve, majus. *Moris. hist. pl. part. 2. pag. 288.* Lagonfa alba, five esculenta, Bredomamma. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 66.* WELAKOLA Zeylonensibus dicitur, quod loca inculta notat, ubi plurimum crescit.

SINAPISTRUM Indicum, pentaphyllum, flore carneo, minus, non spinosum. *H. L. Bat. pag. 564. Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 80.* Sinapistrum pentaphyllum, flore albo. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 6.* Pentaphyllum peregrinum, filiquosum, bivalve, minus. *Moris. Hist. pl. part. 2. pag. 288.* Papaver corniculatum, acre, quinquefolium, Ægyptiacum, minus, flore carneo, non spinosum. *Plukn. Almag. pag. 280.* Pentaphyllum filiquosum, Arabicum, albidum. *Parkins. Theat. pag. 397.* Lupinus Ægyptius, sylvestris. *Vesling. observ. in Alpin. pag. 69.* qui idem est cum Quinquefolio filiquoso *Alpini de plant. exot. pag. 322.* ut Figurarum comparatio docet. vide & *Amm. Char. pl. pag. 536.* Caara-Veela *H. Malab. part. 9. Tab. 24.* quod Pentaphyllum filiquosum, Malabaricum in notis vocatur. & a *Commel. Fl. Malab. pag. 51.* Lupino Arabico Ocome direi, Pentafillo peregrino, *Ponae Ital. pag. 102.* Pentaphyllum filiquosum, Syriacum. *Munting. pl. Cult. pag. 558.* Laganfa rubra. *Rumph. Herbar. Ambon. lib. 8. cap. 67.*

SINAPISTRUM triphyllum, pumilum, glabrum, flosculo purpureo, filiqua membranacea. *Nobis. Tab. 100. Fig. 1.* Erysimum minimum, triphyllum, flore purpureo, fistuloso. *Herb. Herm.*
Ex radice tenuissima, longa, raras fibrillas emittente, cinerea, oritur caulis sesquipedalis, nunc reclus & solitarius, vel ut in alia, quam fervo, planta, procumbens, & paulo supra terram in varios sese ramulos dividens, subhirsutos, tenues, quibus vario ordine folia adcrefcunt lata, glabra, integerrima, venosa, tria in uno centro concurrentia, & communi petiolo semiunciali suffulta, e quorum communiter alis flosculi parvi, solitarii, fistulosi, magno calice quadrifido & perpetuo contenti oriuntur, coloris purpurei, qui filiquas dant longas, planas, glabras, instar membranae translucens, bivalves, plurima semina vario modo & ordine sita continentes, quae sunt subrotunda, convexa parte gibba, concava vero excavata, & fere reniformia, sed rotundiora, minutissima, glabra, splendentia, fusca.

Fig. 2.

Fig. 1.

SINAPISTRUM Zeylanicum, viscosum, folio solitario, flore flavo, filiqua tenui. Nobis.

SINAPISTRUM triphyllum, pumilum, glabrum, flosculo purpureo, siliqua membranacea. Nobis.

4907. *Cleome monophylla* L.

4899. *Cleome dodecandra* L.

SINAPISTRUM Zeylanicum, viscosum, folio folitario, flore flavo, filiqua tenui. *Nobis. Tab. 100. Fig. 2.* Erysimum Indicum, filiquosum, folio simplici, flore flavo. *Herb. Herm.* Sinapistrum Indicum, Acetosae vulgaris folio, filiquis longis. *Mus. Zeyl. pag. 10.* Erysimum Zeylanicum, monophyllum, sylvestre, quod Sinapi species. *ibidem. pag. 29.* Papaver corniculatum, acre, singulari folio, Malabaricum, Tsjeru-Veela. *H. Malab. part. 9. Tab. 34. Plukn. Almag. pag. 280.* **RANMANISSA** Zeylonensibus. *Ravara* aurum significat, flores enim hujus sunt crocei. ut notatur in *Mus. Zeyl. pag. 10.* Caulis hujus plantae est pedalis, teres, hirsutus, striatus, versus apicem duos magnos emittens ramos; folia gerens alterna, sparsa, oblonga, acuminata, integra, hirsuta & viscosa, similibus petiolis semiuncialibus insidentia. Ex alis superiorum foliorum flores enascuntur ut plurimum solitarii, quadripetali, calice quadrifolio, & tenui pedunculo suffulti, quibus deciduis fructus seu filiqua enascitur teres, longa, bivalvis: facie sua externa, ut & filiqua tenui ad Erysimum proxime accedit haec planta.

SISYNRICHUM Zeylanicum, flore coeruleo, parvo, gramineis foliis. *Par. Bat. Pr. pag. 376. & Plukn. Almag. pag. 347. & Phyt. Tab. 224. Fig. 6.* Sisynrichium Zeylanicum, flore pallide coeruleo, foliis gramineis, carinatis, longis, *D. Hermans apud Ray. tom. 3. pag. 558.* Sisynrichii species. *Mus. Zeyl. pag. 27.*

SMILAX Indica, spinosa, folio Cinnamomi, Pseudo-China quibusdam *Mus. Zeyl. pag. 22.* Smilax Zeylanica, spinosa, Lauri folio *Hart. Catal. semin.* Planta Cinnamomi folio, trinervia, Convolvulacea, flosculis parvis, muscosis, racematim in julis, seu nucamentis dispositis. *Mus. Zeyl. pag. 31.* China spuria, nodosa. *C. B. P. pag. 247.* Smilax Virginiana, spinis innocuis armata, latis Canellae foliis, radice arundinacea crassa & carnosae. *Plukn. Phyt. Tab. 110. Fig. 5.* huc spectat Legno della China. *Acost. edit. Ital. pag. 60.* & Smilax aspera, fructu nigro, radice nodosa, magna, laevi, farinacea, *China dicta. Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 105.* ubi quamplurima vide synonyma. & *Hist. Jam. vol. 1. pag. 231. Tab. 143. Fig. 1.* **KABOLOSSA** & **RIRIBUNNAWAE** Zeylonensibus dicitur. *Riri* sanguis est. *Bonaiva* bibere. Spinulae enim horum sarmentorum quasi bibunt sanguinem tangentium. Fert haec planta radicem, a radiculis suis tenuibus sarmentis

tofis purgatam, *Chinae* forma & virtute proximam, ut notatur in *Mus. Zeyl.*

SMILAX foliis peltatis, cordato-oblongis, floribus minutissimis & copiosissimis. *Nobis. Tab. 101.* Mechoacannae similis, radix Zeylanica, Asthmatica. *Herb. Herm.* Planta scandens, folio Convolvuli obtuso, umbilicato, **KAHIPISSAN** Zeylonensibus, *ibidem. pag. 21.* quae est Convolvuli species alia. *Mus. Zeyl. pag. 27.* quam vide supra ad Convolvulum *pag. 74.* huc spectat Kattu-Kelengu *H. Malab. part. 7. Tab. 37.* & Pseudo-China Ambonica, Caju-Tsjura-Utan. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 9. cap. 61.* ubi alba & nigra describitur. **KAHIPISSAN** Zeylonice audit, cujus significationem vide *supra pag. 74.*

Caulis nostrae plantae volubilis est, tenuis, lignosus, folia sparsa, remota, solitaria, petiolo biunciali insidentia, cordato-oblonga, basi laevissime sinuata, nitida, integerrima; petiolus non ad basin folii adnectitur, sed semiunciali spatio a basi remoto inseritur, & folium umbilicatum seu peltatum constituit: Petioli autem florum pedales, vel longiores ramis pluribus lateralibus, omnibus tenuissimis, constructi sunt, quibus flores minutissimi undique adfiguntur, & squammulae nonnullae multifidae, fere capillaceae, ad divaricationem ramulorum cum petiolis enascuntur. Flosculi autem sunt minutissimi, sextifidi, pistillum unicum, stamina nulla dantes in nonnullis, sed in aliis similibus, ubi pistillum deest, stamina observantur.

SOLANUM Indicum, spinosum, frutescens, maximum, villosum totum, fructibus croceis. *Mus. Zeyl. pag. 25.* Solanum Indicum, spinosum, maximum, ac villosum totum. *ibidem. pag. 31.* Solanum pomiferum, spinosum, foliis maximis, angulosis, lanuginosum valde, **MALA-BATTOD** Zeylonensibus. *Ray. tom. 3. pag. 353.* ubi sic describitur: Tota planta lanugine sordide flavicante, densa, obducta est: Caulis spinulis brevibus, crebris obsitus; spinulae etiam costae foliorum mediae, & nervis lateralibus innascuntur rariores. Folia angulosa sunt, non tamen admodum profunde dissecta. Flores caulibus brevibus pediculis adnascuntur, perianthiis villosissimis excepti: **MALABATHU** in *Mus. Zeyl.* vocatur.

SOLANUM Zeylanicum, spinosum, folio amplo, incano, ad pediculum strictiori. *Plukn. Phyt. Tab. 226. Fig. 6.* Solanum forte spinosum, pomi.

SMILAX foliis peltatis, cordato-oblongis. floribus minutissimis & copiosissimis. Nobis.

1461. Menispermum peltatum Willd. &c.

pomiferum, Indicum, album, seu foliis Hyoschyami albi majoris. *Breyn. Prodr.* 1. pag. 49. Solanum spinosum, incanum, foliis sinuatis, flore Borriginis, fructu luteo, ovuli Gallinacei forma & magnitudine. *Triumf. apud Boerb. Ind. H. L. B. part. 2. pag. 68.* Solanum pomiferum, Indicum, spinosum, Borriginis flore, fructu croceo, candicans, maxime tomentosum. *H. L. Bat. pag. 573. Commel. Fl. Malab. pag. 63.* Juripeha Foemina *Pisonis pag. 181.* Ana-Schunda. *H. Malab. part. 2. Tab. 35.* Trongum agreste, Trong-Pra. *Rumph. Herb. Ambon. lib. 8. cap. 48.* huc spectat Solanum bacciferum, caule & foliis tomento incanis, spinosis, flore luteo, fructu croceo minore. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 107.* ubi & alia occurrunt synonyma, & *Hist. Jam. vol. 1. pag. 236. Tab. 144. Fig. 3.* Solanum tomentosum, Verbasci folio, parvo fructu, flavescente. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 4.*

SOLANUM Indicum, Pomum de Hiericho dictum, Borriginis flore, foliis profunde laciniatis. *Mus. Zeyl. pag. 34.* Solanum pomiferum, frutescens, Africanum, spinosum, nigricans, Borriginis flore, foliis profunde laciniatis. *H. L. Bat. pag. 573.* ubi ejus icon & descriptio. *Amm. H. Bosian. pag. 34. & Plukn. Phyt. Tab. 226. Fig. 5.* cujus in *Almag. pag. 351.* reliqua vide synonyma. huc spectat Solanum spinosum, pomiferum, Indicum, fructu echinato, foliis Cardui, sive Acanthi spinosi. *Breyn. Prodr. 1. pag. 50.* & Solanum Africanum, spinosum, arborescens, nigricans, pomiferum, venenatum, perenne, foliis profunde laciniatis. *Amm. H. Bosian. pag. 8. & Char. pl. pag. 338.* a quo pro Chunda *H. Malab. part. 2. Tab. 37.* habetur. **TIBBUTHU** Zeylonensibus vocatur.

SOLANUM Indicum, spinosum, flore Borriginis, fructu croceo, rotundo, Perlicae magnitudine, Pomum de Hiericho dictum. *Mus. Zeyl. pag. 43.* Solanum pomiferum, Indicum, spinosum, Borriginis flore, fructu croceo. *H. L. Bat. pag. 573. & Fl. Malab. pag. 63.* Solanum forte spinosum, Indicum, nigrum. *Breyn. Prodr. 1. pag. 50.* quod cum Cheru Schunda *H. Malab. part. 2. Tab. 36.* ab eo jungitur. Pomum de Hiericho, Melongenens congener, *J. B. tom. 3. lib. 34. pag. 619.* Solanum spinosum, fructu rotundo. *C. B. P. pag. 167. Plukn. Almag. pag. 350.* Schunda. *H. Malab. part. 2. Tab. 37.* **ELABATHU** Zeylonensibus. Variat haec species spinis violaceis, ex albo virentibus, & aureis, ut notatur a *Pluknet.* & in *H. L. Bat.*

SOLANUM frutescens, villosum, foliis undulatis, mollibus, subtus incanis, spinis flavescentibus, armatum. *Nobis. Tab. 102.* Solanum Indicum, frutescens, spinosum, Borriginis flore, fructu croceo, rotundo, minimo. *Mus. Zeyl. pag. 65. & Herb. Herm.* Solanum Indicum, Borriginis flore, folio molli, lanuginoso, longis aculeis flavescentibus armato. *Schol. Botan. pag. 143.* Solanum spinosum, Indicum, Borriginis flore, fructu croceo, rotundo, minutissimo. Cheru-Schunda *H. Malab. Amm. H. Bosian. pag. 8.* Cheru-Schunda *H. Malab. part. 2. Tab. 36.* quod est Solanum fruticosum, Indicum, fructu rubro. *Tournef. inst pag. 149.* & Solanum Indicum, spinosum, fructu minimo miniato, glabro. *Ray. hist. pl. pag. 1876. & Commel. Fl. Malab. pag. 63.* **TUBUTHU** Zeylonensibus dicitur. Frutex hic lignosus est, corticem habens purpureum, villis brevibus, ex albo flavescentibus undique ita obsitum, ut flavescentia penitus appareat, ex hoc rami vix numerosi, longiores, saepius simplices, teretes, villosi proveniunt, qui folia gerunt interdum opposita, interdum solitaria, mollia, venosa admodum, superius obscure virentia, inferius candida, villosissima, ad nervum maximum, per mediam folii partem decurrentem spinis acutissimis ab utroque latere instructa, petiolis uncialibus innixa, ex ovato acuminata, sinuosa, margine repando: Aculei autem sunt compressi, ossei, acuminati, flavi, per totam plantam sparsi, maxime in caule & petiolis, rarius in venis majoribus foliorum, ubi acutiores & tenuiores. Petioli flores sustinentes e caule hic & illic exeunt, flores quatuor, quinque, vel plures aliis minoribus petiolis gerentes. Flores sunt Solani vulgaris, cujus & bacca est magnitudinis, coloris sulphurei, vel crocei.

SPHAERANTHOS purpurea, alata, ferrata. *Nobis. Tab. 94. Fig. 3:* Sphaeranthos folio oblongo, major. *Vaill. Act. Reg. Paris. ann. 1719. pag. 382.* Jacea Zeylanica, folio oblongo, ferrato, flore purpureo. *Herb. Hart.* Scabiosa Indica, major, caule & pediculis foliosis. *Plukn. Phyt. Tab. 312. Fig. 6.* Scabiosa Indica major, crispatis foliis, alato caule, Malabarensis. *Plukn. Almag. pag. 335.* & Scabiosa minor, alato caule Maderaspatensis. *ibidem.* quae est Scabiosae capitulo, Chrysanthemi *Myconi* foliis, alato caule Maderaspatensis. *Plukn. Phyt. Tab. 108. Fig. 7.* Omnes has *Pluknetii* Scabiosas unam eandemque plantam esse, nec aliter quam aetate differre adfirmat *D. Petiv. in act. Phil. Lond. no. 244. pag. 332.* Quum tertia junioris plantae sit speci-

SOLANUM frutescens, villosum, foliis undulatis, mollibus, subtus incanis. spinis flavescentibus, armatum. Nobis.

specimen, secunda & prima adultioris, uti videre est apud *Ray. tom. 3. pag. 235.* ubi & tertia vocatur *Conyza Orientalis*, alato caule, flore globofo. *Bobart. Adaca-Manjeu H. Malab. part. 10. Tab. 43.* quae in notis planta Indica, alato caule, folio crenato, piloso, & viscoso, flore glomerato, purpureo vocatur. & *Fl. Malab. p. 55.* & *Corymbiferis affinis*, caule alato, floribus in spicis, seu capitulis, squamosis feminibus infidentibus. *Ray. tom. 3. pag. 241.*

Quum haec planta adeo variet tam ratione aetatis, quam variatione loci & coeli, nostram quoque Insulae Zeylanae indigenam, & ibi excretam proponimus, quae in plurimis Indiae locis provenit & invenitur, atque ob singulare ejus caput sphaericum, quo a *Jaceae* aliisque hujus congeneribus differt, *Sphaeranthos* a *Vaill.* vocatur, cujus notam Characterist. vide in *act. Reg. Paris. loc. cit.*

Caulis nostrae plantae est fere pedalis, simplex, crassiusculus, foliis instructus alternatis, obtusis, oblongis, ferratis, versus basin attenuatis, marginibus dentatis, a basi per caulis dorsum percurrentibus, unde alatus apparet caulis, & crispus. Ex alis foliorum enascuntur ramuli valde rari, tenues, unicus vel alter, quibus flos petiolo unciali infidet compositus, ovatus, calice squammoso communi instructus, qui deorsum petiolum marginibus percurrit, & eum crispum reddit. Reliqua hujus descriptio ex *H. Malab.* suppleri potest, quae huic nostrae plantae maxime convenit, & de qua virtutes Medicae egregiae ibi praedicantur.

STRAMONIUM Zeylanicum. *Mus. Zeyl. pag. 69.* *Datura Zeylanica*, violacea, *ibidem pag. 41.* *Stramonium* seu *datura*, pomo spinoso rotundo, longo flore. *H. L. Bat. pag. 583.* & *Fl. Malab. pag. 64.* ubi alia synonyma, & species; cujus tres diversae in *H. Malab.* nomine *Humatu* proponuntur *part. 2. Tab. 28, 29 & 30.* quae *Daturae Malabaricae Humatu* dictae prima, secunda, & tertia species apud *Ray. hist. pl. pag. 749.* denominantur, & describuntur. uti & *Rumph. in Herb. Ambon. lib. 8. cap. 49.* *Stramoniam Indicam*, seu *Dutram albam*, *nigram*, & *rubram* depingit & describit. *Datura* quoque occurrit apud *Clus. lib. 2. cap. 24. Acoft. cap. 53. & in edit. Ital. pag. 66.* *Tlapath* ab *Hernand. in Hist. Mexic. pag. 278.* vocatur, & nostra **ANTENNA** a Zeylonensibus. Characterem hujus generis habet *Linnaeus in Char. pl. gen. pag. 48.* ad **DATURAM.**

STRATIOTES DYAPARADHAEL Zeylonensibus dicta. *Mus. Zeyl. pag. 68.* *Paradhael* vocantur folia decidua & sicca, seu in terram, seu in aquam decidant: an vero haec planta sit Stratiotes terrestris, an palustris, me latet, unde & ipsi nulla jungo synonyma; acris caeterum est, & calidissima, ut dicitur in *Mus. Zeyl.*

TAMARINDUS. *Mus. Zeyl. pag. 27 & 60. & Parkins Theat. pag. 237. Bontii lib. 6. cap. 4. pag. 94. J. B. tom. 1. pag. 422. Ray. hist. pl. pag. 1748. Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 147. & Hist. Jam. vol. 2. pag. 45. Tamarindo Acoftae edit. Ital. pag. 50. & apud Clus. cap. 21. & ejus Aromat. lib. 1. cap. 28. Siliqua Arabica, quae Tamarindus. C. B. P. pag. 403. Tamarindus Derelside vocata Alpin. de pl. Egypt. cap. 10. pag. 37. ubi ejus icon. & Vessl. in Alp. pag. 13. Breyn. Prodr. 1. pag. 51. Balam-Pulli, seu Maderam-Pulli H. Malab. part. 1. Tab. 23. ubi vide notas &c. Tamarindus, Assam Java Rumph. Herb. Ambon. lib. 2. cap. 32. qui varias hujus habet icones diversis in locis, seu terris ad plantas depictas. Tamarindus arbor. Grimm. Labor. Ceyl. pag. 113. ubi dicitur, praeter pulpam, quae tam ad purgationes, quam ad Clysteres nobis infervit, possumus e floribus pulcherrimam Conservam desumere pro Stomachi, Hepatis, atque Lienis affectibus. &c. HYABILA & HIAEMBALA Zeylonensibus. Hujus characterem habet Linnaeus in char. pl. gen. pag. 9.*

TELKAPALA. *Mus. Zeyl. pag. 58.* *Tel* Butyrum notat, *Ka* lucidum, & *Pala* Blitum seu Betam significat; folia enim lucida sunt & glabra instar Butyri.

TELU. *Mus. Zeyl. pag. 70.* ubi dicitur; hujus caulis calefacti succus expressus auribus obstructis instillatur bono successu.

THALICTRUM Zeylanicum, aquaticum. *Mus. Zeyl. pag. 36.*

THLASPI Alfinoides, Indicum, trifoliatum, *Mus. Zeyl. pag. 57.*

TINUS humilis, Zeylanica, foliis crassis, venosis. *Nobis. Tab. 103.* Cerasus Zeylanica, humilis, crassis, latisque foliis, flore fructuque umbellato, rubro. *Mus. Zeyl. pag. 43.* Cerasus Zeylanica, umbellata, rubra, foliis latis & crassis *Hermanni. Herbar. Gronov.* ubi adscriptum erat, refrigerat & humectat, ex fructibus Rob conficitur in ardentibus

*TENUS humilis Zeylanica, foliis
crassis, venosis. Nobis.*

TITHYMALUS Botryoides, Zeylanicus,
cauliculis villosis. Herb. Herm.

3510. *Euphorbia hirta* L.

bus febribus proficuum. BADULAM Zeylonensibus. *Tsahinagapalam* Malabaribus vocatur. huc & spectat Ceraso affinis arbor, baccifera, racemosa, flore albo, pentapetalo, fructu flavo, monopyreno, eduli, dulci. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 169.* Folia hujus arboris sunt crassa, ovalia, versus basin magis attenuata, integra, semper virentia, nitida, & glaberrima, venosa, ex caule alternatim brevissimis pediculis orta, fere sessilia; Flores in summitate ramorum colliguntur plurimi, racemosi, umbellatim fere dispositi, monopetali, rotati, quinquefidi, quinque staminibus cum tuba longa instructi, calicibus minimis, quinquefidis contenti, coloris rubicundi, cujus & fructus sunt, qui edules, refrigerantes, & humectantes habentur. ex quibus & Rob conficitur, ut supra jam ex *Herbar. Gronov.* monuimus, qui elegantem hanc plantam inculpendam generose nobis concessit.

TITHYMALUS ramosissimus, frutescens, pene aphyllus. *Par. Bat. Pr. pag. 381. Bobart. hist. tom. 3. pag. 337.* Tithymalus arborecens, caule aphylo. *Plukn. Almag. pag. 368. & Phyt. Tab. 319. Fig. 6. Tiru-Calli H. Malab. part. 2. Tab. 44.* Tithymalus Indicus, frutescens. *Ray. hist. pl. pag. 1710. & Commel. Fl. Malab. pag. 66. & H. Amst. tom. 1. Fig. 14.* Ossifraga lactea, Patta Tulang. *Rumph. Herb. Ambon. auctuar. cap. 80.*

TITHYMALUS Orientalis, articulatus, junceus, aphyllus. *Mus. Zeyl. pag. 50.* Tithymalus Orientalis, foliolis junceis *ibidem pag. 54.* Tithymalus Orientalis, articulatus, junceus, aphyllus, an piper longum, angustissimum ex Florida C. B. Felfel Taval *Alpini Mus. Zeyl. pag. 63.* Piper longum angustissimum apud C. B. P. *pag. 412.* occurrit, & Felfel Taval apud *Alpin. de pl. Egypt. cap. 30. pag. 96.* huc spectat Tithymalus Indicus, vimineus, penitus aphyllus. *Boerb. Ind. H. L. Bat. part. 1. pag. 257.* quae prioris diversitas, ut & forte haec, quae MUNAKIRYA Zeylonensibus dicitur.

TITHYMALUS Botryoides, Zeylanicus, cauliculis villosis, *Herb. Herm.* qui inculptus est *Tab. 104.* Tithymalus Botryoides, Zeylanicus, hirsutus. *Mus. Zeyl. pag. 31.* Tithymalus Botryoides, Zeylanicus, repens, cauliculis villosis. *Commel. Cat. hort. Med. Amst. in oct. pag. 351.* Tithymalus Botryoides, major, Zeylanicus, procumbens, foliis & cauliculis villosis. *Plukn. Almag. pag. 373. & Ray. tom. 3. pag. 428.*
Tithy.

Tithymalus Indicus, annuus, dulcis Botryoides, geniculatus, *Par. Bat. Pr. pag. 382.* *Tithymalus dulcis*, Parietariae foliis hirsutis, floribus ad caulium nodos conglomeratis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 82. & Hist. Jam. vol. 1. pag. 197. Ray. tom. 3. pag. 430.* apud quos reliqua vide synonyma. *Chamaecyfe Indiae* utriusque, major, hirsuta. *Mus. Petiv. no. 758.* *Tithymalus Americanus*, humifusus, ferratus, floribus in capitulum alis adhaerens congestis. *Plum. apud Tournef. inst. rei herb. pag. 88.* Caulis hujus plantae ad radicem in plures cauliculos procumbentes dividitur, quorum quisque quadragonus, villis strigosis hirsutus, flavescens, quibus folia sunt opposita, ovato-oblonga, obtuse in summo ferrata, scabra, petiolis fere nullis innixa: Flores alternatim ad genicula exeunt, brevi communi petiolo insidentes & in capitula plurimi congesti, formae & structurae *Tithymali vulgaris.* &c.

TITHYMALUS Botryoides, erectus, florum capitulis conjugatis, & longiori pediculo insidentibus. *Nobis. Tab. 105. Fig. 1.* *Tithymalus Zeylanicus*, exiguus, hirsutus, folio conjugato, florum capite globoso. *Herb. Hart.* *Tithymalus Botryoides*, minor, *Americanus*, foliis hirsutis. *Plukn. Almag. pag. 373.* *Tithymalus erectus*, ferratus, floribus in capitulum longo pediculo insidens congestis. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 2.* *Tithymalus Indicus*, annuus, dulcis, floribus albis, cauliculis rubentibus & viridantibus. *Par. Bat. Pr. pag. 381. Plukn. Phyt. Tab. 113. Fig. 2.* *Tithymalus erectus*, acris, Parietariae foliis glabris, floribus ad caulium nodos conglomeratis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 82. & Hist. Jam. vol. 1. pag. 197. Tab. 126.* huc spectat *Chamaecyfe Americ. major*, floribus glomeratis, *Cynocrambes folio glabra.* *Breyn. Prodr. 2. pag. 31.*

A priori differt haec planta, multoque tenerior ac minor, annua quoque est, cujus caulis est simplex, teres, villosus, villis rufescentibus, semipedalis; Folia sunt opposita, oblonga, obtuse & vix ferrata, ex foliorum alis petioli unciales alterne provenientes continent flosculos plurimos, in capitulum geminum utcunque oppositum aggregatos, forma & structura prioris.

TITHYMALUS erectus, floribus rarioribus, foliis oblongis, glabris, integris. *Nobis. Tab. 105. Fig. 2.* *Tithymalus Zeylanicus*, annuus, erectus, folio oblongo, conjugato. *Herb. Hart.* *Tithymalus tenellus*, *Indicus*, *Chamaecyfes foliis*, flosculis incarnatis. *Herb. Herm. & Mus. Zeyl. pag.*

TITHYMALUS erectus, floribus
rarioribus, foliis
integris. Nobis.

3514. *Euphorbia parviflora* L.

TITHYMALUS Botryoides,
erectus, florum
gatis, & longiori
dentibus. Nobis.

3511. *Euphorbia pilulifera* L.

TITHYMALUS humilis, ramosissimus;
hirsutus, foliis *Thymi serratis*. Nobis.

3513. *Euphorbia thymifolia* L. var. β

47. huc spectat *Tithymalus Botryoides*, *Maderasp.* *Hyperici foliis non crenatis, floribus ex alis uno versu provenientiibus. Plukn. Phyt. Tab. 43. Fig. 7.* & *Tithymalus arbor foliis Amygdali obtusis Plum. Cat. pl. Americ. pag. 1.* & *Coacica Brasiliensibus, Peplis major, flosculis albis. Markgr. lib. 1. cap. 9. pag. 15.* KIRIWAENNA nostra Zeylonensibus dicitur, quae caulem habet erectum, teretem, in quinque vel plura genicula divisum, glabrum, viridem, varie ramosum, ramis saepius bifidis, qui folia gerunt opposita, ovalia, integra, in aliis laeviter & obtuse ferrata, utrinque glabra, viridia: ex alis foliorum prodit petiolus communis, uncialis, continens pauciores flosculos in fasciculum dispositos, parvos, petioli hi floriferi alternatim exeunt ex alis, scilicet ex alterutra ala, nunquam ex utraque, quo a *Pluknetii* planta differt.

TITHYMALUS humilis, ramosissimus, hirsutus, foliis Thymi ferratis. *Nobis. Tab. 105. Fig. 3.* *Tithymalus Zeylanicus, exiguus, ruber, folio Nummulariae. Herb. Hart.* *Tithymalus minimus, ruber, rotundifolius, procumbens. Bobart. Hist. Oxon. tom. 3. pag. 340.* *Tithymalus procumbens, Chamaecyfe villosa, major, caulibus viridibus. Plukn. Almag. pag. 372.* *Tithymalus exiguus, procumbens, Chamaecyfe dictus. H. L. Bat. pag. 602.* quae *Chamaecyfe J. B. tom. 3. pag. 667.* dicitur, cui nostra maxime convenit, ut & *Peplis Mariland. minima, ramosissima, angustifolia. Ray. tom. 3. pag. 431.* & *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 83* *Chamaecyfe Americana, minor, Paronychia Hispanicae Clusii facie, foliis Serpilli ferratis. Breyn. Prodr. 2. pag. 31.* qui forte *Tithymalus humifusus, floribus in capitulum alis adhaerens congestis. Plum. Cat. pl. Amer. pag. 2.*

E radice fibrosa, firma, crassiuscula, nigra, intus albicante oritur caulis tenuis, flexilis, subhirsutus, qui paulo supra terram erumpens plurimos dat ramos tenuissimos, semipedales, alternatim exeuntes, & semiunciali spatio fere remotos, qui etiam alternatim parvos ramulos simili modo emittunt. Folia ad articulos & divisiones caulis conjugata sunt, minima, Thymo vel Serpillo fere aemula, sessilia, ovata, laevissime ferrata; e quorum alis flosculi prodeunt minutissimi, in parva capitula collecti. Facies caeterum plantae est Thymo, Serpillo, vel Acino proxima.

TITHYMALUS tenuifolius, aquaticus, foliis raris. DYANELLI Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 54.*

TITTAGAEDI & TITTUWAEI. *Mus. Zeyl. pag. 67.* a *Titta* quod amarum notat, plantula enim grate amaricat.

TOTHYA fructum Cymbae similem ferens. *Mus. Zeyl. pag. 48.* a *Tothu* Cymba. dicitur & TOTHILA.

TRIBULUS terrestris, Zeylanicus, cauliculis villosis, fructu acuminato. *Nobis. Tab. 106. Fig. 1.* Tribulus Zeylanicus, terrestris, flore luteo, fructu spinosissimo. *Herb. Hart.* Tribulus terrestris, folio Ciceris, fructu aculeato, Zeylanicus. *Mus. Zeyl. pag. 44.* Tribulus terrestris, medius, Zeylanicus, *Commelini Breyn. Prodr. 2. pag. 100.* Tribulus terrestris, Indiae Orientalis, foliis Viciae subrotundis, & villosis. *Tournef. inst. pag. 266.* Tribulus terrestris incanus, Indicus, lanuginosus, paucioribus in foliis pinnulis, fructu pediculo longiori insidente. *Ray. hist. pl. tom. 3. pag. 650.* Tribulus terrestris, fructu turbinato, foliis lanuginosis. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 7.* Hujus generis characterem habent *Linnaeus in Char. pl. gen. pag. 128.* *Breyn. loc. cit. & Amm. Char. pl. pag. 599.*

Caulis nostrae plantae est longus, pedalis, & ultra, hirsutus, coloris straminei. Folia e caule exeunt pinnata, sine impari, quinque utcumque paribus composita, in vulgari autem Tribulo pinnae crebriores ut plurimum sunt. Pinnae hae sunt oblongae, obtusae, integerrimae, subhirsutae, virides. Ex singula foliorum ala ramulus prodit ejusdem cum caule figurae, sed brevior, multo minor, & alternatim saepius pinnae suas producit; Ex eadem ala in adultioribus ramis saepius flos unicus unciali petiolo insidens provenit, dimidio circiter major, quam in vulgari Tribulo, qui & fructum producit in inferiori parte brevibus spinulis obsessum, in superiori tribus, quatuorve longioribus aculeis armatum, tenuis porro hic fructus est, oblongus, multumque a vulgaris fructu differens.

TRIFOLIUM procumbens, Zeylanicum, hirsutum, Loti facie. *Nobis. Tab. 106. Fig. 2.* Trifolium vesicarium, repens; Phaseoli foliis hirsutis. *Mus. Zeyl. pag. 42.* Lotus Zeylanica, sylvestris, repens, flore luteo. *Herb. Hart.* cum qua & convenit Lotus parva, Cretica, procumbens, incana, quaternis filiquis cruciatim dispositis. *Plukn. Phyt. Tab. 43. Fig. 3.* Nostrae vero plantae filiculae haud ita propullularunt, ut pro certo concludere possimus, an sint cruciatae. huc & spectat Loto pen-

Fig. 2.

Fig. 1.

TRIFOLIUM procumbens, Zeylanicum,
hirsutum, Loti facie. Nobis.

5525 *Hedyosarum boninatum* L.

TRIBULUS terrestris, Zeylanicus, cauli-
culis villosis, fructu acuminato. Nobis.

3048 *Tribulus lanuginosus* L. -

VALERIANELLA foliis nervosis, acutis, flosculis in caulum summo quasi umbellatis. Nob.

833 Hedysotis fruticosa L.

pentaphyllo, filiquoso similis, Anonis non spinosa, foliis instar Cisti glutinosi & odoratis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 74. & Hist. Jam. vol. 1. pag. 186. Tab. 119. Fig. 1.* Characterem hujus generis habet *Linnaeus in char. pl. gen. pag. 229.* Caules nostrae plantae sunt tenues, plures ad radicem simul exeuntes, filiformes, rarius subdivisi; summis ramulis insident flores in capitula solitaria squammulis instructa collecti, coloris lutei, Folia sunt Myrti, variae magnitudinis, oblonga, terna, alterna, vel opposita, ad basin petioli caulem vaginantia, hirsuta, & viscosa, ut tota denique planta.

TRIOPTERIS Indiae Orientalis, seu Arbuscula Amygdalae nanae folio, dispermos, filiqua Thlaspeos Dioscoridis, ternis amplioribus extantibus alis donata, **WAENELLA** Zeylonensibus dicta. *Plukn. Almag. pag. 377.* quam vide *supra pag. 55.* ad Carpinum forte viscosam &c.

VALERIANELLA foliis nervosis, acutis, flosculis in caulium summo quasi umbellatis. *Nobis. Tab. 107.* **WAERANYA** Zeylonensibus. *Herb. Herm. & Mus. Zeyl. pag. 4.*

Palustris haec planta videtur, caulis enim ejus crassus, fungosus, glaber, sulcatus, & quadragonus est, folia emittens unciali, aut sesquiunciali spatio remota, pediculis brevibus suffulta, bina sibi semper opposita, ad quorum ortum vagina quaedam membranacea e caulium nodis erumpit, quae foliorum petiolos includit, aut e qua proveniunt petioli folia sustinentes lata, glabra, venosa, integerrima, acuminata; caulis summum terminant pediculi floriferi, communes, ex superiorum foliorum alis provenientes, nunc longiores, nunc triplo fere breviores, qui in summo in proprios iterum pedunculos, ex alis minorum foliorum ortos dividuntur, & flosculos umbellatim quasi dispositos sustinent, quorum calix est erectus, semiquadrifidus, angustus, acutus, perpetuus, petalum floris unicum, tubulatum, erectum, calice paulo longius, acutum, semiquadrifidum, stamina quatuor longitudine petalorum, pistillum simplex, germen dans intra florem, uti in Tabula nostra apparet; ubi lett. A. calicem exhibet, B. petalum quadrifidum cum quatuor staminibus, C. pistillum cum Embryone.

VALERIANELLA palustris, foliis nervosis, oblongis, flosculis ad caulium nodos, inter foliorum sinus collectis. *Nobis. Tab. 108. Fig. 1.* *Pulegium latifolium, Zeylanicum, aquaticum, inodorum, caudiculis atro-*

purpureis. *Herb. Herm.* an Veroniceae affinis, Indiae Orientalis, Pulegii facie, calicibus tomentosis. *Plukn. Phyt. Tab. 232. Fig. 7?* Cujus autem folia sunt rotundiora. Caulis nostrae plantae est simplex, pedalis, quadragonus, purpurascens, ad quem folia sunt opposita, oblonga, sessilia, integra, nervosa; in sinu foliorum oriuntur flosculi conglomerati, plurimi, inter quae ramulus enascitur secundum gradus aetatis. Singulus autem flosculus calicem habet quadridentatum, petalum erectum, quadrifidum, pistillum unicum, bifidum, qui fructum dat subrotundum, bilocularem Valerianellae in omnibus similem.

VERBENA Indica, rotundifolia, spicis comosis. *Mus. Zeyl. pag. 58.* an Eliti superius descripti species? an vero Verbena nodiflora, major, Indica, flore niveo. *Hermannii apud Moris tom. 3. pag. 419?*

VERONICA hirsuta, latifolia, Zeylanica, aquatica. *Mus. Zeyl. pag. 29.* Veronica Indica, Teucree folio, Nanschera-Canschabu Malabaridis dicta. *Commel. in not. ad H. Malab. part. 10. Tab. 50. Plukn. Almag. pag. 384.*

VERONICA Zeylanica, folio conjugato Rorismarini, flore albescente. *Herb. Hart.* quae est Parpadagam *H. Malab. part. 10. Tab. 35.* & Spargula Indica, major, flore candido. *in notis ibidem.* quae a nostra planta non differt, nisi quod flores saepius gemini communi petiolo in nostra proveniant planta, in hac autem semper solitarii.

VICIA foliis glabris, venosis, oblongis, floribus gemellis, planis. *Nobis. Tab. 108. Fig. 2* Viciae elegans genus, PILAE Zeylonensibus. *Herb. Herm.* Vicia Zeylanica, elegans. *Mus. Zeyl. pag. 37.* an Vicia peregrina, angustissimis foliis, siliqua lata, glabra. *Plukn. Phyt. Tab. 233. Fig. 6?*

Caulis nostrae plantae est teres, flexilis, purpureus, ad genicula ramosus, folia pinnata, novem vel decem paribus pinnarum constans; Pinnae omnes sunt oblongae, obtusae, in summo apice acutissimo seu aculeo, qui nervi medii productio est, ornatae, glabrae, utrinque virides, venosae; Ex alis foliorum dependent flores gemini vexillo plano & lato constantes. Siliqua deest.

VICIA Indica, verminosa, foliis cordatis, flosculis suaverubentibus. *Mus. Zeyl. pag. 53.* Vicia Indica, elegans, foliis oblongis, cordatis, floribus rubicundis, siliquis angustis. *ibidem. pag. 56.* PANUPILAE
Zey-

Fig. 1.

VALERIANELLA palustris, foliis nervosis, oblongis, flosculis ad caulium nodos, inter foliorum sinus collectis. Nobis.

Fig. 2.

VICIA foliis glabris, venosis, oblongis, floribus gemellis, planis. Nobis.
5564 *Galega maxima* L.

834 *Hedysotis Curicularia* L.

VITEX trifolia, floribus per ramos sparsis. Nobis.

Zeylonensibus, a *Panuiwa* quod vermiculos, seu quaevis infecta denotat, *Pilae* autem generale nomen est pro omni genere *Viciae*. *ibidem*. hujus species est

VICIA Indica, verminosa, minor. HINPANUPILAE dicta. *Mus. Zeyl. pag. 43.*

VISCUS fructibus oblongis, rubicundis, floribus oblongis, tubulosis. *Mus. Zeyl. pag. 20.* Viscum forte Caryophylloides, minus, foliis prunae instar candicantibus, flore tripetalo, purpureo, semine filamentofo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 77.* PILILA & UDHAWAEDHYA Zeylonensibus.

VITEX trifolia, Indica, odora, hortensis, floribus coeruleis, racemosis. *Mus. Zeyl. pag. 48.* Jasminum Indicum, cyneum, odore gravi, Syringae coeruleae facie. *ibidem*. Vitex trifolia, minor, Indica, *Breyn. Prodr. 2. pag. 104.* *Plukn. Almag. pag. 390.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 69.* Negundo foemina. *Acost. edit. Ital. pag. 211.* Negundo arbor foemina. *J. B. part. 2. lib. 15. pag. 189.* & *Herb. Hart.* quae apud *Plukn. in Phyt. Tab. 206. Fig. 5.* exprimitur, ut & in *H. Malab. part. 2. Fig. 11.* Cara-Nosi dicta. & est Piperi similis fructus striatus foemina, *C. B. P. pag. 412.* & Frutex Indicus, baccifer, fructu calyculato, monoppyreno *Negundo* dicta. *Ray. hist. pl. pag. 1575.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 31.* NIKA Zeylonensibus vocatur. *Nochile Lagondi* Malaic.

VITEX trifolia, odorata, sylvestris, Indica, *Mus. Zeyl. pag. 47.* Vitex trifolia, major. *Rauwolf. C. B. ibidem.* Negundo prior, seu Mas *Acostae in octav. pag. 286.* & apud *Clus. cap. 38.* Negundo Maschio *Acost. edit. Ital. pag. 210.* Negundo arbor, mas. *J. B. part. 2. lib. 15. pag. 189.* Vitex trifolia, minor, Indica, ferrata. *Breyn. Prodr. 2. pag. 104.* *Plukn. Almag. pag. 390.* Negundo mas variorum. *Commel. Fl. Malab. pag. 69.* Bem-Nosi. *H. Malab. part. 2. Tab. 12.* WALNIKA Zeylonensibus, id est Nika, seu Vitex sylvestris. hujus generis character invenitur apud *Linnaeum in char. pl. gen. pag. 186.*

VITEX trifolia, floribus per ramos sparsis. *Nobis. Tab. 109.* Vitex Zeylanica, inodora, flosculis spadiceis, tenellis. *Herb. Herm.*

Frutex hic caulem gerit lignosum, rectum, scabrum, cinereo-fuscum,

qui variis locis ramulos floriferos emittit ejusdem cum caule formae, rigidos nempe & fuscis, in florum corymbos itidem terminantes: Folia per ramos sunt sparsa, quae petiolo unciali insident tria, foliolo scilicet unoquoque itidem petiolato. Figura foliorum est oblongo-acuminata, margine integro, viridia utrimque, glabra, flosculi spadiceum habent colorem; reliqua Viticis.

VITIS folio Cucurbitae, seu non sinuato. *Mus. Zeyl. pag. 7.* an Schembra-Valli. *H. Malab. part. 7. Tab. 6?* quae Vitis sylvestris species. *Commel. in notis. & Fl. Malab. pag. 69.* MALALABU Zeylonensibus. *Labu* Lusitanis notat *Poveram*, id est Cucurbitam lagenae formam referentem.

VITIS IDAEA Zeylanica, odoratissima. *Tournef. inst. pag. 608.* Myrtus Zeylanica, fructu niveo, molli, aromatico, dulci, odore Citri. *Mus. Zeyl. pag. 65.* Myrtus Zeylanica, odoratissima, baccis niveis, monococcis. *H. L. Bat. pag. 434.* ubi icon, & descriptio. Ligustrum Zeylanicum, arborescens, Myrti Laureae foliis. *Breyn. Prodr. 2. pag. 75.* Myrtus Zeylanica. *Boerb. Ind. H. L. Bat. part. 2. pag. 255.* Myrtus forte arborea, foliis Laurinis, aromatica. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 161. & Hist. vol. 2. Tab. 191. Fig. 1.* MARANDA & MARADA Zeylonensibus.

ULMI foliis non nihil similis Zeylanica, capreolata. *D. Hermans. apud Ray. tom. 3. dendr. pag. 128.* ubi additur: Folia ramis conjugata adnascuntur, contra quam in Ulmo. Capreoli ex apice pediculorum, qui folium sustinent, egrediuntur.

URALA. *Mus. Zeyl. pag. 50.* id est *Ala* porcinum; *Ura* denotat porcum.

URINARIA Indica, erecta, vulgaris. *Herb. Hart. Tab. 93. Fig. 2. & Mus. Zeyl. pag. 11.* ubi & Tithymalus non lactescens vocatur. Urinaria Zeylanica, erecta, JATHA-ÆMBULA Zeylonensibus. *Par. Bat. Pr. pag. 385.* Kirganeli *H. Malab. part. 10. Tab. 15.* quae Vitis Idaeae affinis, flore hexapetalo ex albicante. *Commel. in notis. & Fl. Malab. pag. 69.* Fruticulus capsularis, hexapetalus, foliis brevioribus, subrotundis, & densius stipatis. *Plukn. Phyt. Tab. 183. Fig. 5.*

E radice tenui, fibrosa, albicante oritur haec planta caule recto, viridi, tenui, lignoso, rarius ramoso, pinnae foliorum alternatim producente, quae pinnae etiam alternatim brevibus pediculis oriuntur,
ad

Fig. 2.

Fig. 1.

*URTICA fatua, spicata, foliis
floribusque petiolis longis
donatis. Nobis.*

*URTICA pilulifera, foliis majoribus
longissimis pediculis, minoribus bre-
vibus pediculis donatis. Nobis.*

143. *Urtica interrupta* L.

143. *Urtica interrupta* L.

ad quarum alas flosculi solitarii, herbacei, hexapetali proveniunt tenuissimis insidentes pediculis, quae vascula in tres communiter cancellos distincta relinquunt, continentia minutissima totidem semina triangula, unde ad *Tithymalum*, ni hujus generis sit, proxime accedit: *Hermanni* autem nomen huic plantae inpositum retinuimus ob singularem vim Medicam, qua Urinam pellere valet, Urinariae dictae.

URINARIA Indica, supina, cauliculis rubentibus. *Mus. Zeyl.* 4 & 16. Urinaria Zeylanica, repens, cauliculis rubentibus. *ibidem.* pag. 37. Tsjeru-Kirganeli *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 16. quod in notis Vitis Idaeae affinis, flore hexapetalo, rubescente. *Commel. & Fl. Malab. pag.* 69. an Fruticulus capsularis, hexapetalus, brevioribus foliis & angustis *Plukn. Phyt. Tab.* 183. *Fig.* 6? **PITHAWAKKA & BINKOHUMBA** Zeylonice dicitur. de qua in *Mus. Zeyl.* notatur, quod sit planta humi jacens, foliis ac fructu vulgari paulo major, ac virtutibus validior. Flosculi sunt pentapetali & herbacei, capsula in tres partes dehiscit, continens semina minutissima, ex luteo albicantia: Febrifuga est, & diuretica, decoctum ejus vehementer pellit Urinam, unde ei nomen. **BINKOHUMBA** vocatur a *Binko*, quod humum notat, cui strata jacet.

ULHAENDA. *Mus. Zeyl. pag.* 25.

UVA Zeylanica, sylvestris, Mali Armeniacae sapore, Uves de Mato Lusitanis. *Mus. Zeyl. pag.* 8 & 31. ubi pro Narum-Panel *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 10. habetur. qui est Frutex baccifer, fructu ad singulos flores multiplici. *Ray. hist. pl. pag.* 1636. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 30. in *Mus. Zeyl. pag.* 8. describitur, quod sit Frutex sarmentosus, foliis glabris, flosculis puniceis, stellatis, sex septemve uvas in racemo proferens, subhirsutas, molles, cinereas, parvas, teretes, semiunciales, sapore vinoso Mala Armeniaca aemulante. **PALUKAENA** Zeylonensibus dicitur. *Baala-Paletti. Colo-apocaro. Uves de Mato* Lusitanis. ut constat ex *Mus. Zeyl. pag.* 31.

URTICA pilulifera, foliis majoribus longissimis pediculis, minoribus brevibus pediculis donatis. *Nobis. Tab.* 110. *Fig.* 1. Urtica Zeylanica, minor, pilulas ferens, vulgaris facie. *Herb. Hart.* Urtica racemosa, pilulifera tricoccus. *Mus. Zeyl. pag.* 60. Urtica Zeylanica foliorum
pedi-

pediculis tenuissimis & longissimis, funiculis floriferis pariter tenuissimis, praelongis, raris flosculis donatis. *Ray. hist. pl. part. 3. pag. 106.* Lupulo vulgari similis Indiae Orientalis, floribus in spicam, ex origine foliorum prodeuntem, dispositis. *Plukn. Phyt. Tab. 201. Fig. 5.* an Urticae genus Indiarum minime pungens, forte Batti-Schorigenam *H. Malab. part. 2. Tab. 40.* quae plantae nostrae penitus convenit, & est Urtica, Brasiliensis *Pino* indigenis dicta *Ray. hist. pl. pag. 159.* & *Commel. Fl. Malab. pag. 69.* *Pino Markgr. pag. 8.* KATSCHAMBALI nostra Zeylonensibus dicitur, cujus caules sunt tenues, bipedales, fulcati, subhirsuti, virides, folia per caulem dispersa, majora petiolis longissimis insidentia, minora autem brevissimis adfixa pediculis, sunt autem cordata, in ambitu profundis, obtusisque crenis insculpta, superne viridia, inferne incana, scabra; ex alis foliorum exeunt pediculi tenuissimi, longissimi, tres quatuorve uncias longi, ad medium circiter flosculos producentes congregatos, & per petiolum sparsos, in summo crebriores, Urticae vulgari similes, &c.

URTICA fatua, spicata, foliis floribusque petiolis longissimis donatis. *Nobis. Tab. 110. Fig. 2.* Urtica fatua, aculeata, Cannabis Erraticae foeminae flore verticillato. *Herb. Herm.* Urtica forte major, racemosa, humilior, pungens, sed non urens. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 38.* & *Hist. Jam. vol. 1. pag. 12.* & Urtica racemosa, amplo Coryli folio. *Plum. Cat. pl. Amer. pag. 11.*

Nostrae plantae caulis est modice crassus, viridis, sulcatus, glaber, aculeis brevissimis, inermibus, ad latera instructus, foliis plurimis, praesertim ad genicula, binis sibi oppositis minoribus foliolis provenienti-
bus gaudens, majora autem folia solitaria, alternatim ex caule exeunt, longissimis, quadriuncialibus petiolis insidentia, quae formam fere habent cordatam, secundum marginem crenis incisa, in acutissimum apicem desinentia, superius sunt rigida, crinibus armata, laete tamen virentia, duas uncias lata, tres circiter longa, venosa, versus caulis summitatem parva, & simul plura folia minora ad genicula proveniunt ex alis quasi majorum foliorum, ubi & petioli longissimi quinque vel sex uncias longi, floriferi oriuntur, qui flosculos gerunt plurimos, per interstitia, & in fasciculum quasi collectos, in petioli medio incipientes, & ibi unciali fere spatio remoti sunt, & quo magis versus summum vergunt, eo fasciculi floriferi magis accedunt, & in summo fere
sibi

sibi invicem accumbunt, flosculi autem sunt luteoli, semina relinquentes fere cordata, compressa, & ad latera punctata.

URTICA Zeylanica, hortensis, urens, foliis Cannabinis. *Mus. Zeyl. pag. 47.* quae & sylvestris etiam est, ac Urtica Zeylanica, floribus ac feminibus Cannabinis, seu Cannabina Indica, sylvestris, Urticae foliis urentibus vocatur in *Mus. Zeyl. pag. 29.* WATUHAHAMBILYA Zeylonensibus vocatur, id est Urtica hortensis, ut explicatur *ibidem. pag. 47.* hujus generis characterem habet *Linnaeus in char. pl. gen. pag. 283.*

WANATITTAWAEL. *Mus. Zeyl. pag. 61.* a *Wani* quod ulcera denotat. *Titta* amarum. *Wael* vimen. Radix est amara, & lactescens. Flosculi sunt lutei.

WELAGHA. *Mus. Zeyl. pag. 3.* quod pronunciatur *Welengha.*

XANTIUM seu Lappa, URUKOSSA Zeylonensibus dicta. *Mus. Zeyl. pag. 59.*

ZEDOARIA Zeylanica, Camphoram redolens, HARANKAHA dicta. *H. L. Bat. pag. 636. Mus. Zeyl. pag. 50. Par. Bat. Pr. pag. 386. Plukn. Almag. pag. 397. Ray. hist. pl. tom. 3. pag. 648.* Zedoaria Zeylanica, HARANKAHA Indis vocata. *Amm. H. Bosian. pag. 38.* de hac in *Mus. Zeyl.* dicitur; Radix recenter effossa Camphorae spirat odorem, postmodum Zedoariae; Radicem hanc inter sacra reponunt Cinghali, ad quam solam in morbis desperatis confugiunt. & *Grimm. in Labor. Ceyl. pag. 118.* de hac dicit: Maximi est pretii apud Cinghalenses, in morbis suis periculosissimis ea vel sola, vel cum aliis medicamentis commixta, quae venenum impugnare debent, utuntur. Radix optime sudores, & urinas movet. Sal quoddam volatile, & Oleum per destillationem emittit, quod in minima dosi vires totius plantae possidet. &c. Dum haec radix est condita, non alium saporem habet, quam *Enula Campana.*

ZEDOARIA rotunda & officinarum; de hac vide *supra pag. 67.* ad *Colchicum.*

ZINGIBER latifolium, sylvestre. *H. L. Bat. pag. 636.* ubi icon & descriptio. *Mus. Zeyl. pag. 51. Moris Tab. 14. Sect. 8. Fig. 2.* Zerumbet Officinarum *Petiv. Gazoph. nat. & art. Tab. 22. Fig. 3.* quae in *Mus. Zeyl.* male pro Zedoaria Garziae, in *H. L. Bat.* bene pro Zerumbet Garz. *ab hort. lib. 1. cap. 43. pag. 158.* habetur. & est Zerumbet Garziae ab horto, vel Zingiber sylvaticum, *Kua Malabar* dicta, vel WALINGHURU Zeylonensium *Amm. H. Bosian. pag. 38. Gengioro Acoft. edit. Ital. pag. 196. Zerumbet Clus. lib. 1. aromat. cap. 43. Dale Pharmac. pag. 328. & Commel. Fl. Malab. pag. 71.* quae est *Kua. H. Malab. part. 11. Tab. 7.* ubi vide notas. & apud *Plukn. in Almag. pag. 397.* reliqua synonyma ad Zedoariam longam *C. B. Pin. pag. 35. Zerumbet Tommon a Rumph. in Herb. Ambon. lib. 8. cap. 17.* vocatur. cujus Figura proxime cum Curcuma convenit. WALINGHURU Zeylonensibus dicitur, id est Zinziber sylvestre.

ZINGIBER sylvestre, flavum, KALUWAALA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag. 51.* an Zingiber Zeylanicum. *H. Beaum. pag. 42?* quod forte Kattu-Inschi *H. Malab. part. 11. Tab. 13.* quod a *Petiv. in Gazop. nat. & art. Tab. 23. Fig. 1.* pro Zedoaria officin. depingitur, in notis vero ad *H. Malab.* pro Zingib. qui mas a *Pison. in Mantiss. arom. pag. 189. cap. 12.* habetur, ut & a *Pluknet. in Almag. pag. 397.* ad Zingiber *C. B. P. pag. 35. Zingiber Acoft. lib. aromat. cap. 32.* apud *Clusium* etiam describitur, ut & a *Rumph. Herbar. Ambon. lib. 8. cap. 14.* & Zingiber hoc sylvestre ab incolis KALUWAALA dictum a *Grimm. in Labor. Ceyl. pag. 119.* sequenti modo describitur. Pulcherrima est planta, quae mediocris est altitudinis, florem profert rubicundum, qui non absimilis est a Pini pomo, fert etiam nigrum semen, sicut nigrum *Cuminum*, quod valde calidum est, jacet in quibusdam globulis inter folia florum inclusum. Flos iste continet in se magnam quantitatem liquoris, qui rorem fortissime attrahit, eum ego mane expressi, & in Balneo Mariae per alembicum destillavi, eumque praestantissimum vehiculum existimo. Tota haec planta cum radice destillata pulchrum Crystallinum Sal Volatile, oleosum emittit, quod certissime praestantissimum est medicamentum vires totius plantae continens adversus gravissimos morbos, dosis solum est a tribus ad quatuor grana: Eandem virtutem aqua continet, pro vehiculo assumpta.

ZINGIBER angustiori folio , foemina , utriusque Indiae alumna. *Plukn. Almag. pag. 397. Zinziber C. B. P. Chilli Hernand. Mus. Zeyl. pag. 69. Par. Bat. Pr. pag. 386. Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 60. Hist. Jam. vol. 1. pag. 163. Chilli Indiae Orientalis Hernand. Hist. Mexioc. pag. 169. Zinziber Moris hist. pl. Tab. 14. Sect. 8. Fig. 1. pag. 251. Zinziber foemina Pisonis Mantiss. arom. pag. 190. Inschi, vel Inschi-Kua. H. Malab. part. 11. Tab. 12. cujus notas characteristicas optime explicatas vide a Linnaeo in tract. de Musa Clifford. pag. 15. ad Amomum. vires vero & usum apud Samuel Dale Pharm. pag. 327. INGHURU Zeylonensibus haec vocatur.*

F I N I S.

W

ADDENDA, & CORRIGENDA.

- Pag. 7. ad ADHATODAM spica longissima. addatur Frutex Indicus, spicatus, floribus galeatis, vasculo bivalvi, dicocco. Ray. *hist. pl.* pag. 1709. & Commel. *Fl. Malab.* pag. 32.
10. ad ALKEKENGII somniferum add. Alkekengi fructu parvo, verticillato. Tournef. *inst.* pag. 151. &c.
19. ad AMYGDALUM, quae Nagam H. Malab. add. quae est filiquosa flore umbellato, pentapetalo, filiquis digitalibus, spadiceis. monospermis, ad unum florem pluribus. Ray. *hist. pl.* pag. 1753. & Commel. *Fl. Malab.* pag. 62.
21. ad ANONAM fructu virescente add. Atamaram & Janiljaca H. Malab. part. 3. pag. 21. quae est Pomifera Indica, fructu conoide, squamoso, viridi. Ray. *hist. pl.* pag. 1650. & Ate vel Ahate de Panucho Hernand. *Hist. Mexioc.* pag. 348 & 454.
22. Pro ANTIDESMA lege ANTIDESMA.
27. ad Elengi H. Malab. add. quae est Prunus Malabarica, fructu calyculato. Ray. *hist. pl.* pag. 1564. & Commel. *Fl. Malab.* p. 57. & Oleae adfinis pyrifolio Malabarica, flore odorifero, stellato, Syen in notis ad H. Malab.
33. Linea 2. pro viridibus lege viribus.
- & ad Katsjula Kelengu H. Malab. pro part. 13. lege 11. ubi addatur, quae in notis est Planta bifolia, radice tuberosa, flore tripetalo, difformi, Malabarensis. & Commel. *Fl. Malab.* pag. 55.
42. ad BALSAMINAM quae Tilo-Onapu H. Malab. add. Quae in notis Persicaria filiquosa, Indica, flore rosaceo colore, fructu piloso. & Commel. *Fl. Malab.* pag. 52.
53. ad CARA-SCHULLI H. Malab. add. qui est Frutex spinosus, Capparis forma, filiqua bivalvi, brevi. Ray. *hist. pl.* pag. 1755. & Commel. *Fl. Malab.* pag. 32.
61. ad CHRYSANTHEMOIDES addatur: hujus generis Character etiam describitur a Linnaeo in *char. pl. gen.* p. 264.
75. ad CORALLODENDRON add. hujus generis characterem dedit Linnaeus in *Char. pl. gen.* pag. 216.
84. ad CAVALAM H. Malab. add. quae in notis a Syen vocatur Nux Malabarica, sulcata, mucilaginoso, fabacea, & Arbor filiquosa Malab. pluribus ad singulos flores lobis. Ray. *hist. pl.* pag. 1754. & Commel. *Fl. Malab.* p. 8.
93. ad ELAIOCARPOS quod Perun-Kara H. Malab. add. Olea Malabarica, sylvestris, fructu dulci. Ray. *hist. pl.* pag. 1546. & Commel. *Fl. Malab.* pag. 48.
95. ad EUPATORIOPHALACRON add. Linnaeus hujus characterem etiam dedit in *char. pl. gen.* pag. 219.
101. ad FLOS-CLITORIUM add. char. hujus vide apud Linn. in *char. pl. gen.* pag. 216. ad CLITORIAM.
104. ad GENISTAM pro Tab. 47 lege 49.
121. ad HOTTONIAM pro Sarafraga lege Saxifraga.
126. Linea 4. pro umbilicato lege umbellato.
136. ad KETMIAM Tiliae folio. add. Bupariti H. Malab. part. 1. pag. 51.
142. ad LIGUSTRUM pro Tab. 172. lege 72.
145. ad LYCOPodium pro Dodart. lege Bobart.
159. Pro MICROCOS lege MICROCOCOS.
165. in fine, pro infundiforme, lege infundibiliforme.
191. ad PHASEOLUM lobis undiquaque pilosis adde Nou-Corona H. Malab. part. 8. pag. 61. &c.
209. in fine add:
SAURURUS folio lato, BETELES dicta, Siriboa BONTII. NOBIS. Quam vide supra ad Beteles pag. 46.
SAURURUS volubilis, Convolvuli majoris folio, Betele Tambul. C. B. P. NOBIS. quam itidem exhibitam vide pag. 46.
218. Linea 15. pro remoto, lege remotus.

Reliqua pro arbitrio L. B. addat, corrigat, mutet.

LOCA & NOMINA HORTI MALABARICI

ILLUSTRATA,

*Et juxta Thesaurum Zeylanicum certis plantarum
generibus tributa.*

<i>Horti Malabarici nomen.</i>	<i>Pars.</i>	<i>Tabula.</i>	<i>Thesauri Zeylanici</i>	<i>Pagina.</i>
Acara-Puda.	Part. 10	20.	Ros Solis.	207
Acatsja-Valli.	7	44.	Cuscuta.	84
Adaca-Manjeu.	10	43.	Sphaeranthos.	221
Adamboe & Cadelipoea.	4	20 & 21.	Ketmia.	137
Ain Pariti.	6	43.	Ketmia.	133
Amba-Paja.	1	15.	Papaja mas	184
Ambel.	11	26.	Nymphaea.	173
Ameri.	1	54.	Colutea, quae Indigo.	69
Amolago.	7	16.	Piper, qui Saururus.	193
Ampana.	1	10.	Palma.	181
Ana-Schunda.	2	35.	Solanum.	219
Anavinga.	4	49.	Grossularia.	112
Anci-Veela.	9	23.	Sinapistrum.	215
Arana-Panna.	12	31.	Filix.	98
Aria-Bepou.	4	52.	Azedarach.	40
Atamaram.	3	29.	Anona.	21
{ Avanacu.				
&				
{ Pandi-Avanacu.	2	32.	Ricinus.	206
Bala.	1	12, 13, 14.	Musa.	164
{ Balam Pulli.	1			
&				
{ Maderam Pulli.		23.	Tamarindus.	222
Bara-Mareca.	8	44.	Phaseolus.	189
Bafella.	7	24.	Cuscuta.	44
Batti-Scorigenam.	2	40.	Urtica.	232
Bel-Ericu.	2	56.	Apocynum.	25
Belilla.	2	18.	Mussaenda.	165
Bella-Modagam.	4	59.	Arbor TAKKADA.	30
Bellam-Patsja.	12	39.	Lycopodium.	145
Belutta.	9	2.	Nerium.	167
		G g 3		Horti

<i>Horti Malabarici nomen.</i>	<i>Pars.</i>	<i>Tabula.</i>	<i>Thesauri Zeylanici</i>	<i>Pag.</i>
Belutta-Pola-Taly.	11	38.	Lilio-Narcissus.	143
Bem-Nofi.	2	12.	Vitex.	229
Bem-Schetti.	2	14.	Jasminum.	127
Bena-Patsja.	10	48.	Heliotropium.	120
Beru-Tamara.	11	31.	Nymphaea.	174
Betla-Codi.	7	15.	Betele, qui Saururus.	46 & 47
Blimbi.	3	45 & 46.	Malus Indica.	147
Brami.	10	14.	Portulaca.	197
Bupariti.	1	29.	Ketmia.	136
Caara-Veela.	9	24.	Sinapistrum.	216
Cacu-Mullu.	6	19.	Acacia.	5
Cadelari.	10	78.	Amarantus.	16
Cadel-Avanacu.	2	33.	Ricinoides.	200
Cadi-Avanacu.	2	34.	Chamaelaea.	59
Calengi-Cansjava.	10	60.	Cannabis.	136
Caniram.	1	37.	Nux Vomica.	171
Canschena-Pou.	1	35.	Bauhinia.	45
Cara-Schulli.	2	47.	Capparis.	53
Cara-Nofi.	2	11.	Vitex.	229
Carelu-Vagon.	8	25.	Aristolochia.	32
Caretti.	2	22.	Acacia.	4
Carim Curini.	2	20.	Adhatoda.	7
Carim-Pana.	1	9.	Palma.	181
Catri-Conda.	12	70.	Lachryma-Jobi.	138
Catta-Gasturi.	2	28.	Ketmia.	134
Cattu-Schiragam.	2	24.	Scabiosa.	210
Catu-Baramareca.	8	45.	Phaseolus.	189
Catu-Tsjeru-Naregam.	4	12.	Limonia Malus.	143
Catu-Tekka.	4	28.	Micrococos.	159
Catulli-Pola.	11	40.	Lilio-Narcissus.	142
Cavalam.	1	49.	Cydonia.	84
Cavara-Pullu.	12	69.	Gramen.	106
Caunga.	1	5, 6, 7, 8.	Palma.	183
Champacam.	1	19.	Arbor HAPUGHANA.	31
Cheru-Schunda.	2	36.	Solanum.	219 & 220
Chunda.	2	37.	Solanum.	219
Codaga-Pala.	1	47.	Nerium.	167
Codagan.	10	46.	Hydrocotyle.	122
Codda-Panna.	3	1 ad 13.	Palma.	181
Coddam-Pulli.	1	24.	Arbor Gummi Guttam fundens.	27
Coletta-Veetla.	9	41.	Adhatoda.	8
Conna.	1	22.	Cassia fistula.	56
Cottam.	10	77.	Ocymum.	174
Covalam.	3	37.	Cydonia.	84
Cudda-Mulla.	6	51.	Jasminum.	128

<i>Horti Malabarici nomen.</i>	<i>Pars.</i>	<i>Tabula.</i>	<i>Thesauri Zeylanici.</i>	<i>Pag.</i>
Cupameni.	10	81.	Ricinokarpus.	203
Ela-Calli.	2	43.	Euphorbio-Tithymalus.	95
Elengi.	1	20.	Arbor, & Kauken.	27 & 133
Elatteri.	11	4,5 & 6.	Cardamomum.	54
Ericu.	2	31.	Apocynum.	25
Hummatu.	2	28,29,30.	Stramonium.	221
Ily.	1	16.	Arundo.	35
Inschi.	11	12.	Zingiber.	255
Intfia.	6	4.	Acacia.	3
Kadali.	4	42.	Melastoma.	155
Kaida-Taddi.	2	1.	Ananas.	20
Kaka-Toddaly.	5	41.	Arbuscula & Chamaelea.	32 & 50
Kaku Valli.	8	36.	Phaseolus.	191
Kapa-Mava.	3	54.	Anacardium.	19
Kariil.	4	36.	Nux.	170
Katu-Bellovera.	6	46.	Ketmia.	137
Katou-Indel.	3	22 ad 26.	Palma Dactylifera.	183
Katou-Inschi.	11	13.	Zingiber.	234
Katou Kadali.	4	43.	Melastoma.	154
Katou-Karua.	5	53.	Cinnamomum.	64
Katou-Naregam.	4	13.	Granata Malus.	111
Katou-Patsjotti.	5	7.	Patsjotti.	185
Katou-Tandale.	9	26.	Crotalaria.	82
Katsji Kelengu.	7	38.	Rizophora.	206
Katsula-Kelengu.	11	41.	Aro-Orchis.	33
Kattu-Kelengu.	7	37.	Smilax.	218
Katu-Tagera.	9	30.	Astragalus.	37
Katu-Bala.	11	43.	Cannacorus.	53
Katu-Katfiil.	7	36.	Rizophora.	207
Katu-Mulla.	6	56.	Jasminum.	128
Katu-Uren.	10	54.	Malvinda.	149
Kedangu.	6	27.	Emerus.	93
Kindici-Valli.	8	27.	Convolvulus.	73
Kirganeli.	10	15.	Urinaria.	230
Konni.	8	39.	Orobis.	178
Kotsjiletti-Pullu.	9	71.	Gramen.	109
Kua.	11	7.	Zingiber.	234
Maderam-Pulli.	1	23.	Tamarindus.	222
Malacca-Schambu.	1	17.	Jambos.	124
Malan-Kua.	11	9.	{ Colchicum seu Zedoaria. }	67
Mallam-Tsjulli.	9	83.	Hedysarum.	114
Mandsjadi.	6	14.	Crista-Pavonis.	80
Manelli.	9	37.	Dorycnium.	89

Horti Malabarici nomen.

<i>Horti Malabarici nomen.</i>	<i>Pars.</i>	<i>Tabula.</i>	<i>Thesauri Zeylanici</i>	<i>Pag.</i>
Manja-Pumeram.	I	21.	<i>Arbor tristis.</i>	32
Manja-Kua.	II	10.	<i>Curcuma rotunda.</i>	84
Manjella-Kua.	II	11.	<i>Curcuma longa.</i>	83
Mao.	4	I & 2.	<i>Mangifera arbor.</i>	152
Mendoni.	7	57.	<i>Methonica.</i>	159
Modecca.	8	20.	<i>Convolvulus.</i>	72
Modira-Caniram.	8	24.	<i>Nux Vomica.</i>	171
Molago-Codi.	7	12.	<i>Piper rotundum.</i>	193
Motta Pullu.	12	38.	<i>Gramen.</i>	110
Mouricou.	6	7.	<i>Corallodendron.</i>	74
Mulu-Schena.	II	19.	<i>Dracunculus.</i>	90
Muringu.	6	11.	<i>Moringa.</i>	163
Nagam.	6	21.	<i>Amygdalus.</i>	19
Nai-Corana.	8	35.	<i>Phaseolus.</i>	191
Nalla-Mulla.	6	50.	<i>Jasminum.</i>	128
Nandi Ervatam major & minor.	2	54 & 55.	<i>Jasminum.</i>	129
Nanschera-Canschabu.	10	50.	<i>Veronica.</i>	228
Narinan-Pulli.	6	44.	<i>Ketmia.</i>	135
Narum-Panel.	2	10.	<i>Uva.</i>	231
Nehoemeka.	8	19.	<i>Bryonia.</i>	50
Nelam-Muri.	9	82.	<i>Hedysarum.</i>	114
Nelenschena.	11	20.	<i>Arum.</i>	34
Neli-Pouli.	3	47 & 48.	<i>Malus.</i>	148
Nelia-Tandale-Cotti.	9	27.	<i>Crotalaria.</i>	22
Nila-Barudena.	10	74.	<i>Melongena.</i>	157
Nilacamaram.	I	38.	<i>Acacia.</i>	5
Nir-Carambu.	2	51.	<i>Lysimachia.</i>	147
Nir-Pullari.	9	36.	<i>Phaseolus.</i>	188
Niti-Todda-Vaddi.	9	20.	<i>Hedysarum, vel Mimosa.</i>	120 & 160
Nuli-Tali.	4	56.	<i>Antidesma.</i>	22
Odalam.	I	39.	<i>Manghas.</i>	152
Onapu.	9	47.	<i>Balsamina.</i>	42
Pada-Kelangu.	7	49.	<i>Nux.</i>	171
Paeru.	4	15.	<i>Arbor Gummi Elemi fundens.</i>	28
Paeru.	8	41.	<i>Phaseolus.</i>	189
Pal-Valli.	9	12.	<i>Nerium.</i>	168
Panam-Palka.	4	5.	<i>Nux Myristica.</i>	172
Panambu-Valli.	7	53.	<i>Arundo.</i>	35
Pandi-Avanacu.	2	pag. 60.	<i>Ricinus.</i>	206
Pandi-Pavel.	8	9.	<i>Momordica.</i>	161
Panna Kelengu-Maravara.	12	11.	<i>Polypodium.</i>	195
Papaja-Maram.	I	15.	<i>Papaja foemina.</i>	184
Pariti.	I	30.	<i>Ketmia.</i>	136
Parpadagam.	10	35.	<i>Veronica.</i>	228
Pavel.	8	10.	<i>Momordica.</i>	162

<i>Horti Malabarici nomen.</i>	<i>Pars.</i>	<i>Tabula.</i>	<i>Thesauri Zeylanici</i>	<i>Pag.</i>
Pee-Cupameni.	10	82.	<i>Ricinokarpos.</i>	205
Pee-Tandale-Cotti.	9	29.	<i>Crotalaria.</i>	81
Pee-Tumba.	9	46.	<i>Digitali affinis.</i>	89
Peevetti.	4	55.	<i>Alkekengi.</i>	10
Pela.	3	34.	<i>Guajavos.</i>	112
Peragu.	2	25.	<i>Clerodendron.</i>	66
Perim-Kaku-Valli.	8	32,33,34.	<i>Lens Phaseoloides.</i>	139
Perim-Toddali.	4	41.	<i>Fujuba.</i>	131
Peru-Kara.	4	24.	<i>Elaiocarpos.</i>	93
Ponnam-Tagera.	2	52.	<i>Senna.</i>	213
Poulpaalsja-Maravana.	12	14.	<i>Selago, vel Lycopodium.</i>	211
Poutaletsje.	4	72.	<i>Ligustrum.</i>	142
Pulli-Schovadi.	11	59.	<i>Convolvulus.</i>	70
Punna.	4	38.	<i>Inophyllum.</i>	131
Purinsja.	4	19.	<i>Saponaria.</i>	209
Putsja-Paeru.	8	37.	<i>Phaseolus.</i>	192
Schada-Veli-Kelangu.	10	10.	<i>Asparagus.</i>	37
Schadida-Calli.	2	42.	<i>Euphorbium.</i>	96
Schanga-Cuspi.	8	38.	<i>Flos Clitorius.</i>	191
Schem-Pariti.	2	17.	<i>Ketmia.</i>	133
Schembra-Valli.	7	6.	<i>Vitis.</i>	232
Schena.	11	18.	<i>Dracunculus.</i>	90
Scheru-Bula.	10	29.	<i>Chenopodium.</i>	60
Schetti.	2	13.	<i>Jasminum.</i>	126
Schit-Elu.	9	54.	<i>Digitalis.</i>	87
Schorigenam.	2	39.	<i>Ricinokarpos.</i>	202
Schovanna-Adamboe.	11	57.	<i>Convolvulus.</i>	72
Schunda-Panna.	1	11.	<i>Palma.</i>	180
Swendadi-Pullu.	9	4.	<i>Melilotus.</i>	157
Tagera.	2	53.	<i>Senna.</i>	213
Tala-Neli.	11	55.	<i>Convolvulus.</i>	73
Tamara.	11	31.	<i>Nymphaea.</i>	174
Tamara-Tonga.	3	43& 44.	<i>Malus.</i>	148
Tandale-Cotti.	9	25.	<i>Crotalaria.</i>	80
Tani.	4	10.	<i>Prunus.</i>	197
Tenga.	1	1,2,3,4.	<i>Palma Coccifera.</i>	182
Thora-Paerou.	6	13.	<i>Cytisus.</i>	86
Tilo-Onapu.	9	52.	<i>Balsamina.</i>	42
Tiru-Calli.	2	44.	<i>Tithymalus.</i>	223
Todda-Vaddi.	9	19.	<i>Oxys.</i>	179
Tota-Piri.	8	17.	<i>Momordica.</i>	162
Tsjania-Pullu.	12	41.	<i>Gramen.</i>	105
Tsjana-Kua.	11	8.	<i>Costus Indicus.</i>	78
Tsjam-Pangam.	6	2.	<i>Acacia.</i>	4
Tsjere-Maram.	6	61.	<i>Periclymenum.</i>	187
		II h		<i>Horti</i>

<i>Horti Malabarici nomen.</i>	<i>Pars.</i>	<i>Tabula.</i>	<i>Thesauri Zeylanici</i>	<i>Pag.</i>
Tsjeru-Punna.	4	39.	<i>Inophyllum.</i>	130
Tsjeru-Kirganeli.	10	16.	<i>Urinaria.</i>	231
Tjeru-Vela.	9	34.	<i>Sinapistrum.</i>	217
Tsjetti-Mandaru.	6	1.	<i>Crista-Pavonis.</i>	79
Tsjetti-Pu.	10	44.	<i>Matricaria.</i>	154
Tsjovanna-Amelpodi.	6	47.	<i>Nerium.</i>	168
Tsjovanna-Areli.	9	1.	<i>Nerium.</i>	167
Tsjudan-Tsjerae.	12	36.	<i>Hottonia.</i>	121
Tsjude-Maram.	6	60.	<i>Petriclymenum.</i>	185
Tsjuria-Cranti.	11	60.	<i>Quamoclit.</i>	198
Vaembu.	11	40.	<i>Acorus.</i>	6
Valli-Upu-Dali.	9	45.	<i>Digitalis.</i>	87
Vallia-Capo-Molago.	9	35.	<i>Capsicum.</i>	53
Velutta-Mandaru.	1	34.	<i>Bauhinia.</i>	45
Ulinja.	8	28.	<i>Cor Indum.</i>	76
Uren.	10	2.	<i>Alcea.</i>	9
Wadapu.	10	37.	<i>Amaranthoides.</i>	16
Weli-Ila.	11	22.	<i>Colocasia.</i>	68
Wellia-Codiveli.	10	59.	<i>Blitum.</i>	47
Wellia-Cupameni.	10	83.	<i>Ricinokarpus.</i>	204

F I N I S.

I N D E X

N O M I N U M

Z E Y L A N E N S I U M.

Acawerya & Ekawerya. <i>Ligustrum</i> , quod Lignum Colubrinum. Pag. 141	Areca. Puwak. } feu } Pag. 32
Acmella & Ahamella. <i>Ceratocephalus</i> . 58	Arececi. Puwakwala. }
Adhatoda. 6	Aswaenna. <i>Digitalis</i> . 88
Adsaryapala. <i>Phaseolus</i> . 191	Avarapalu. <i>Phaseolus</i> . 189
Aehaela. <i>Arbor antifebrilis</i> . 30	Avaru & Awaru. <i>Colutea</i> . 69
Aehaelaghas & Aettaelaghas. <i>Cassia</i> . 56	Badalwanassa. <i>Lycopodium</i> . 145
Aelhin. <i>Gramen Cuperinum</i> . 108	Badharum. <i>Milium</i> . 160
Aembarella. <i>Nux</i> . 170	Badhaarum. 41. & <i>Gramen</i> . 110
Aembilla. <i>Grossularia</i> . 112	Badulam. <i>Tinus</i> . 223
Aembullalbilya. <i>Oxys</i> . 179	Baewila. <i>Althaea</i> . 15
Aepala. <i>Alcea</i> . 9	Balanghas. <i>Cydonia</i> . 84
Aethahambilya. <i>Ricinokarpus</i> . 204	Baluwanossa. 42
Aethakirindi. <i>Jasminum</i> . 128	Banduru. 42
Aethakola. <i>Phaseolus</i> . 190	Banghala. 44
Aetpamba. <i>Jasminum</i> . 130	Banwael. <i>Frutex</i> . 102
Aetfaethya. <i>Heliotropium</i> . 120	Basnagilli. <i>Bryonia</i> . 50
Aetundupyali. <i>Hedysarum</i> . 115	Bathaenda. <i>Arbor</i> . 31
Allahonda. <i>Bryonia</i> . 49	Beduru & Benduru. <i>Polypodium</i> . 196
Allakeralya. 11	Beli & Belighas. <i>Cydonia</i> . 84
Alu, Alughaha, & Alughas. <i>Carda-</i> <i>momum</i> . 54	Belipathegas. <i>Ketmia</i> . 134
Alupadhawael. 15	Betre seu Betele. <i>Saururus</i> . 46
Amba. <i>Persica</i> . 187	Bimmilila. <i>Arbor</i> . 25
Amwaghaha. <i>Mangifera arbor</i> . 153	Binkohumba. <i>Urinaria</i> . 231
Andara. <i>Acacia</i> . 3	Bintal. <i>Bafella</i> . 44
Andanahirya. <i>Crotalaria</i> . 81	Bintamburu. <i>Convolvulus</i> . 71
Angharaka. <i>Lyfimachia</i> . 147	Bintamburuwael. <i>Convolvulus</i> . 72
Ankaenda. <i>Arbor</i> . 27	Bintana. <i>Gramen</i> . 109
Anoda. <i>Abutilon</i> . 1	{ Blimbi, Blimbing, } { Billinghas & Bilim, } <i>Malus Indica</i> . 147 { ut & Billinghbingh. }
Anon. <i>Anona</i> . 21	Bobu. <i>Adiantum</i> . 9
Antenna. <i>Stramonium</i> . 221	Bohu & Bohumbu. 48
Apahu. <i>Convolvulus</i> . 72	Bokaerae. <i>Jabotapita</i> . 123
Apas & Apahuaetha. <i>Convolvulus</i> . 72	H h 2 Bo-

Bolangha. { <i>Arbor</i> , & <i>Cydonia</i> .	Pag. 31	Dyabaeralya. <i>Ornithogalum</i> .	Pag. 177
Bolhinda & Bolhyda. <i>Ephemerum</i> .	84	Dyahabarala. <i>Sagittaria</i> .	208
Bomi. <i>Convolvulus</i> .	94	- <i>Galega</i> .	103
Bothya. <i>Melastoma</i> .	73	Dyahyabala. { & <i>Mimosa</i> .	160
Brunga. <i>Lyfimachia</i> .	155	Dyahyambala. <i>Hedysarum</i> .	119
Budamini. <i>Hedysarum</i> .	147	Dyajawul. <i>Burmanna</i> .	51
Budughas, { Budughaa, } <i>Arbor</i> .	117	Dyakudalu. <i>Balsamina</i> .	42
& Boghas.	29	Dyalabu.	91
Bugaethyawael. <i>Cerasus</i> .	57	Dyanelli. <i>Tithymalus</i> .	225
Bulatwaela. <i>Betele</i> .	46	Dyanilla. <i>Lyfimachia</i> .	146
Bumum & Buncae. <i>Phaseolus</i> .	188	Dyaparadhael. <i>Stratiotes</i> .	222
Bupulae.	50	Elabathu. <i>Solanum</i> .	219
{ Cahette-Coronde, Cappare-Coronde, } <i>Cinnamomum</i> .	63	Elarathmul. <i>Rubeola</i> .	208
& Catte Coronde.		Elarathnethul. <i>Plumbago</i> .	195
Cappathya. <i>Ricinoides</i> .	201	Enfal. <i>Cardamomum</i> .	54
Caracam. <i>Gramen</i> .	110	Erabudu, & Erabudughaha. } <i>Corallo dendron</i> .	74
Champacca. <i>Arbor</i> .	31	Foglio Burdos. <i>Arbor</i> .	30
Coembura. <i>Amygdalus</i> .	19	Gabbu-Gambu. 103. <i>Jambos</i> .	125
Conghas. <i>Saponaria</i> .	209	Gaedawakka. <i>Platanus</i> .	195
Dadhakaehael. <i>Conyza</i> .	74	Gaedhumba.	102
Daluk. <i>Efula</i> .	94	Gajapala. <i>Ricinoides</i> .	200
Dam & Damighas. <i>Cerasus</i> .	57	Ghaeriethagas. <i>Arbor bovina</i> .	105
Damelia. <i>Momordica</i> .	162	Ghahala. <i>Colocasia</i> .	68
Dangha. <i>Arbor</i> .	30	Ghalberya.	105
Dangheddi. <i>Cerasus</i> .	57	Ghalkura. <i>Melochia</i> .	156
Damatha.	86	Ghandapana.	105
Dawel-Coronde. <i>Cinnamomum</i> .	63	Ghaedula. <i>Arbor</i> .	26
Dawulkurundu. <i>Cinnamomum</i> .	64	Ghaesaembilla. <i>Grossularia</i> .	112
Delughaha. <i>Limones</i> .	143	Ghaetana. <i>Milium</i> .	160
Dematha. <i>Prunus</i> .	197	Ghaethagoraka. <i>Arbor</i> .	27
Diamenerya. <i>Commelina</i> .	70	Ghaethatumba. <i>Leucas</i> .	140
Diwipahuru, & Duvipassuru. } <i>Convolvulus</i> .	70	Ghasdammi. <i>Senna</i> .	212
Diwul & Giwul.	89	Ghiritilla. <i>Convolvulus</i> .	72
Dodhampana.	89	Ghirotilla. <i>Gentiana</i> .	104
Doelkodduku. <i>Heliotropium</i> .	120	Ghodhamelum.	105
Domba & Dhumba. ut & Dombagedy. } <i>Nux</i> .	170	Ghodhami-Wana. <i>Filix</i> .	98
Dyaaepala. <i>Althaea</i> .	14	Ghodhaparaghaha.	105
		Ghoigiwael & Ghoiwael. <i>Arundo</i> .	35
		Ghonakolla. <i>Mentha</i> .	157
		Ghonopittam.	105
		Ghoraka, & Ghokatu. } <i>Arbor Gummi Guttam fun-</i> <i>dens</i> .	28

Ghonkuduru. <i>Manghas.</i>	Pag. 152	Hinpanupilae. <i>Vicia.</i>	Pag. 229
Ghuraenda. <i>Fasminum.</i>	127	Hinpus. <i>Lens Phaseoloides.</i>	140
Giritilla. <i>Lyfimachia.</i>	146	Hinzodalawael.	121
Godhakaduru. <i>Nux Vomica.</i>	171	Hiramana. <i>Alfine.</i>	13
Godhapara. <i>Arbor.</i>	30	Hirimanadaetta. <i>Sherardia.</i>	214
Guegla-Etta. <i>Fagaras Avicennae.</i>	97	Hondala. <i>Bryonia.</i>	49
Gurilla. <i>Sambucus.</i>	209	Hondapara.	121
Habara & Habarala. <i>Arum.</i>	35	Hullumayakola. <i>Blitum.</i>	48
Hadutana. <i>Gramen junceum.</i>	110	Hulunaykola. <i>Planta.</i>	194
Haemaragho. <i>Lyfimachia.</i>	147	Hyabila. <i>Tamarindus.</i>	222
Haeranda. <i>Ricinus.</i>	206	Jacberikole.	123
Hamdamanias.	113	Jacberya. <i>Anonis.</i>	22
Hampilla. <i>Astragalus.</i>	39	Jacerabudu. <i>Corallodendron.</i>	75
Hampinna. <i>Carpinus.</i>	54 & 113	Jackwanassa. <i>Marrubium.</i>	153
Hancakunuwaenna. <i>Alchimillae congener.</i>	10	Jacwanossa, } <i>Crotalaria.</i>	81 & 82
Hanfape.	113	Jacberya. }	
Hapughaha. <i>Arbor.</i>	31	Jakuawa. <i>Limonia.</i>	143
Harankaha. <i>Zedoaria.</i>	233	Jatha-Aembula. <i>Urinaria.</i>	230
Haspan. <i>Gramen.</i>	108	Jawael. <i>Burmannia.</i>	50
Hatanarya. <i>Asparagus.</i>	37	Idadhu. <i>Gramen.</i>	106
Hiaembala, }		Ida. } <i>Apocynum.</i>	25
& }	222	Idda. }	
Hyabila. }		Iddaghas. <i>Nerium.</i>	128
Hibbuthu, }		Ieonpala.	167
& }	121	Ilanda. <i>Fujuba.</i>	130
Hinhibbuthu. }		Illa. <i>Arbor.</i>	132
Highulhaenda.	121	Indi & Mahaindi. <i>Palma.</i>	26
Hin. <i>Gramen cyperinum.</i>	108	Inghuru. <i>Zingiber.</i>	183
Hinanoda. <i>Althaea.</i>	15	Infala. <i>Lamium.</i>	235
Hinawaru. <i>Colutea.</i>	69	Iramufu. <i>Radix amoris.</i>	138
Hinbothya. <i>Melaestoma.</i>	155	Iriwya. <i>Phaseolus.</i>	98
Hincubuse. <i>Myrtus.</i>	106	Irya & Iryaghas. <i>Nux.</i>	191
Hindamini. <i>Phaseolus.</i>	191	Iryaghaedhi. <i>Nux.</i>	172
Hindyahyabala. }	120	Itana. <i>Gramen.</i>	173
& }		Itta & Ittawael. <i>Arbor.</i>	106 & 111
Hinghaeda. <i>Portulaca.</i>	160	Jurighas. <i>Arbor.</i>	28
Hinindi. <i>Palma.</i>	167	Kaballaejadiwa.	25
Hinghalkura. <i>Melochia.</i>	184	Kabolossa. <i>Smilax.</i>	132
Hingunipyali. <i>Aro-Orchis.</i>	156	Kadhupara. }	217
Hinguruwael. <i>Acacia.</i>	33	& }	61
Hinkaeppeethya. <i>Ricinoides.</i>	2	Malvinda.	
Hinkina. <i>Inophyllum.</i>	202	Kadschavandi. <i>Heliotropium.</i>	151
Hinkindamal. <i>Arbor.</i>	130	Kaebaella.	120
Hinkiri. <i>Gramen.</i>	31	Kaejarabaewila. <i>Alcea.</i>	133
	108	Hh }	10
			Kae.

Kaekuna. <i>Myrobolanus.</i>	Pag. 166	Katschaembali. <i>Urtica.</i>	Pag. 232
Kaekurighaha. { <i>Arbor Gummi.</i>		Katukarawila. <i>Momordica.</i>	162
	28	Katupane.	133
Kaembya. <i>Arbuscula.</i>	32	Kauringhu. <i>Milium.</i>	160
Kaepna. <i>Arbor Gummi. Guttam fundens.</i>	28	Kawathuwa, & { <i>Digitali affinis.</i>	88
Kaeppehya. <i>Ricinoides aromatica Lac-</i>			
<i>cam praebens.</i>	201	Kawatumba. }	
Kaeraekoku.	133	Kawudhukaku. <i>Cucumis.</i>	
Kaefurubaewila. <i>Althaea.</i>	14	Kawula <i>Gramen Alopecuroides.</i>	105
Kaghu. <i>Anacardium.</i>	19	Kehelghaha. <i>Musa.</i>	165
Kagilawael.	133	Kekirya. <i>Melo.</i>	156
Kaha. <i>Curcuma.</i>	83	Kerathya. <i>Planta.</i>	194
Kahabilja. <i>Ricinokarpus.</i>	202	Kidarum. <i>Dracunculus.</i>	90
	74	Kidhamaehi. <i>Balsamina.</i>	42
Kahipissan. { <i>Convolvulus.</i>		Kine. <i>Inophyllum.</i>	131
	218	Kiriaghuna. <i>Apocynum.</i>	24
Kalanduru. <i>Gramen Cyperinum.</i>	107		18
Kalawael. <i>Arbor.</i>	26	Kirihaenda. { <i>Amaranthus.</i>	
Kalukaburunghos.	133		
Kaluwala. <i>Zingiber.</i>	234		184
Kaluwathuwa. <i>Acacia.</i>	4	Kirikohumba. <i>Azedarach.</i>	40
Kamarangha. <i>Malus.</i>	148	Kirimandi. <i>Convolvulus.</i>	71
Kaparawalli. <i>Mentha.</i>	158	Kirindi-Wael. <i>Apocynum.</i>	23 & 24
Kandulaessa. <i>Ros Solis.</i>	207	Kirindya, & { <i>Caltha.</i>	52
Kannawakoraka. <i>Arbor Gummi Guttam</i>			
<i>fundens.</i>	28	Kikirindya. }	
Kapuaepala. <i>Ketmia.</i>	134	Kiripuswael. <i>Phaseolus.</i>	190
Kapukawassa. <i>Ketmia.</i>	134	Kiriwaenna. <i>Tithymalus.</i>	225
Karabila. <i>Momordica.</i>	162	Kiriwalla. <i>Cornus.</i>	76
Karabuhiri. <i>Gramen Cyperinum.</i>	108	Kittiel, Kitul & { <i>Palma.</i>	180 & 181
Karaebu. <i>Lachryma Jobi.</i>	138		
Karalhaebo. <i>Amarantus.</i>	17	Kitulaetha. }	
Karapidsha. <i>Arbor.</i>	28	Kobbae. <i>Frutex.</i>	101
Kararanchina. <i>Lyfimachia.</i>	147	Kodalimurisha. <i>Arbor.</i>	29
Karma-Ghoraka, & { <i>Arbor.</i>	27	Kohomba, }	
		Kathukaranda }	
Karma-Kurka. }			
Katarodu, & { <i>Flos Clitorius.</i>	101	Kathukarada. }	
		Kollan-Kolla. <i>Ocymum.</i>	175
Kataroduwael. }		Koki-Wila. <i>Arum.</i>	34
Kathukaramba. <i>Acacia.</i>	5	Kokmotha. <i>Gramen.</i>	108
Kathukarohiti. <i>Adhatoda.</i>	8	Kokukirilla. <i>Micrococos.</i>	159
Kathupila. <i>Frutex spinosus.</i>	102	Kopalam. <i>Bryonia.</i>	50
Kathutampala. <i>Amaranthoides.</i>	16	Koracaha. <i>Cornus.</i>	76
Kathuwala. <i>Rizophora.</i>	207	Koroswael, & { <i>Fructus Indicus.</i>	101
Katilippu. <i>Arbor.</i>	29		
		Korossawael. }	
			Kor-

Korraca.	Pag. 137	Mahathora. <i>Senna</i> .	Pag. 213
Kothihambaebila, } <i>Alcea</i> .	10	Mahauwarupala. <i>Phaseolus</i> .	189
&		Mahukaluwa. <i>Galanga minor</i> .	102
Kothihambaewila. }		Makulu, }	
Koughuru. <i>Inophyllum</i> .	131	& }	30
Kuburuwael. <i>Acacia</i> .	4	Makulughaha. }	
Kudaelukola. <i>Balsamina</i> .	41 & 42	Malabathu. <i>Solanum</i> .	218
Kudakaluwa. <i>Galanga major</i> .	103	Malalabu. <i>Vitis</i> .	230
Kudhumaethu, }		Malikira. <i>Arbuscula</i> .	32
Kubulubolhida, }	41	Malwaethakegya.	151
&		Mandathya, }	
Kurububolkinda. }		Mara, }	
Kudhumiris. <i>Chamaelaea</i> .	58	& }	80
Kukulunghas. <i>Acacia</i> .	3	Mangili.	
Kumathya. <i>Amarantus</i> .	18	Mangharudaeli. <i>Gramen</i> .	108
Kupa-Menya. <i>Ricinokarpos</i> .	203 & 204	Manghulkarandu. <i>Phaseolus</i> .	191
Kurakkan. <i>Gramen esculentum</i> .	110	Manithondi. <i>Alcanna</i> .	9
Kurudupaela, }		Manighawael. <i>Asclepias</i> .	31
&	64	Maniglia. <i>Arbor</i> .	29
Kuruduaetha. }		Manithondi. <i>Ligustrum</i> .	142
Kurundu. <i>Cinnamomum</i> .	62	Maranda, }	
Lagondi. <i>Fasminum</i> .	130	& }	230
Lavenia. <i>Eupatoriophalacron</i> .	95	Marada.	
Lenatesi. <i>Palma</i> .	183	Mayla. <i>Bauhinia</i> .	45
Lunula & Luna. <i>Lilio-Narcissus</i> .	142	Mekarae. <i>Phaseolus</i> .	190
Madan. <i>Prunus</i> .	197	Mendya. <i>Laurus</i> .	139
Mael-Coronde. <i>Cinnamomum</i> .	63	Meneri. <i>Milium</i> .	160
Maellahola. <i>Arbor</i> .	26	Meneritana. <i>Gramen</i> .	110
Maemungh. <i>Phaseolus</i> .	190	Mindaela. <i>Arbor</i> .	29
Maendya. <i>Arbor</i> .	26	Mindi, }	
Mahabothya. <i>Melastoma</i> .	154	Midi, }	
Mahadyahyambala. <i>Hedysarum</i> .	119	& }	209
Mahaghalkura. <i>Melocbia</i> .	157	Minai.	
Maha-Kaluwa. <i>Colchicum</i> .	68	Monaramal. <i>Crista Pavonis</i> .	79
Mahakiri. <i>Gramen Cyperinum</i> .	108	Monarakudhumbya. <i>Senecio</i> .	211
Mahalkiri. <i>Eryngium</i> .	92	Mothukola.	164
Mahamadan. <i>Cerasus</i> .	57	Moththu. <i>Gramen</i> .	109
Mahanaykola. <i>Lychnis</i> .	144		
Mahancakunuwaenna. <i>Alchimilla</i> .	10	Mudhamana. }	57
Mahapaenala. <i>Cor Indum</i> .	76	& }	
Mahapatighaha. <i>Ricinus</i> .	206	<i>Chrysanthemum</i> .	61
Mahapile. <i>Hedysarum</i> .	115	Mudukadhuru. <i>Manghas</i> .	151
Mahapinawaka. <i>Mimosa</i> .	160	Mugumiwaenna. <i>Anagallis</i> .	19
Maharatambala. <i>Fasminum</i> .	128	Muguru-Waenna. <i>Amarantus</i> .	17
Maharatombala. <i>Fambos</i> .	125	Mun, }	
Mahaswaenna. <i>Hedysarum</i> .	114	& }	190
		Mung. }	

Muwanu. <i>Milium</i> .	Pag. 160	Padhulwanaſſa.	Pag. 180
Muwakirya. <i>Tithymalus</i> .	223	Paelae.	180
Munamal, & } <i>Arbor</i> .	27	Paepol, & } <i>Papaya</i> .	184
Munchunamal. }		Papolghaha. }	
Mundumal. <i>Phaseolus</i> .	190	Palaeghas. <i>Hedysarum</i> .	116
Mundumurunghu. <i>Coronilla</i> .	77	Palukaena. <i>Vitis</i> .	231
Murtinghas. <i>Ketmia</i> .	137	Panaghas.	184
Muruwawael.	164	Panekilipkippe.	123
Muwakiriwael.	166	Panukohumba. <i>Azedarach</i> .	40
Naghas, & } <i>Arbor</i> .	25	Panupilae. <i>Vicia</i> .	228
Naghaha. }		Panuwala. <i>Dracunculus</i> .	89
Naghawaeli. <i>Periclymenum</i> .	167	Pataghi, & } <i>Acacia</i> .	4
Nalaghas. <i>Gramen</i> .	106	Patanghi. }	
Nalalbathu. <i>Alkekengi</i> .	10	Patipalae. <i>Convolvulus</i> .	72
Napiritta. <i>Ketmia</i> .	135	Patiraja. <i>Hyoscyamus</i> .	122
Naranda. <i>Myrtus</i> .	166	Pawatha. <i>Sambucus</i> .	209
Nariala. <i>Orchis</i> .	177	Penala. <i>Cor Indum</i> .	76
Natafuri.	166	Penda. <i>Gramen</i> .	109
Nawaghas. <i>Nux</i> .	170	Pengriman. <i>Arundo</i> .	35
Nelli, & } <i>Malus</i> .	148	Pera. <i>Guajavos</i> .	112
Nellika. }		Peromalla. <i>Arbor</i> .	28
Nelinghas.	166	Petan. <i>Coronilla</i> .	78
Nelumbo. <i>Nymphaea</i> .	174	Pihaemburu.	193
Nepalam. <i>Ricinoides</i> .	200	Pilae, & } <i>Astragalus</i> .	38
Nicaduwala, & } <i>Cinnamomum</i> .	63 & 64	Pilaeghas. }	
Nikadawalu. }		Pilaeharal. <i>Astragalus</i> .	39
Nidikudda. <i>Oxys</i> .	179	Pilae. <i>Vicia</i> .	228
Nikka. <i>Vitex</i> .	229	Pilila. <i>Viscus</i> .	229
Nilavonanchu. <i>Abutilon</i> .	2	Pinna, & } <i>Clerodendron</i> .	66
Niwitiwael.	169	Pinnakola. }	
Nochile. <i>Jasminum</i> .	130	Pittaghaedighas. <i>Esula</i> .	95
Nyada.	173	Pitthawakka. <i>Urinaria</i> .	231
Nyaghala, & } <i>Methonica</i> .	159	Polghaha. <i>Palma</i> .	182
Nienghala, }		Polkudupala. <i>Chenopodium</i> .	60
Nayapala.		Potha.	197
Okuwael. <i>Planta</i> .	194	Pottaghuddu. <i>Caucalis</i> .	56
Olinda, & } <i>Orebus</i> .	178	Pukfarna, & } <i>Cannacorus</i> .	53
Olida. }		Puffarna. }	
Olu-Alla. <i>Nymphaea</i> .	173	Pupilae. <i>Cacalia</i> .	52
Paba.	180	Purulae. <i>Sambucus</i> .	209

Puru-

Puruwael, & Purukuwael. } <i>Lychnis.</i>	Pag. 144	Sinihidda, Sihinella, & Sihinidda. } <i>Alcea.</i>	Pag. 9
Pufaetha, & Puswael. } <i>Lens Phaseoloides.</i>	139	Surighahas. <i>Ketmia.</i>	136
Puwakghaha. <i>Palma.</i>	183	Tachora, Tala, & Tora. } <i>Cassia.</i>	56
Radelisawael, & Radalya. } <i>Rhus.</i>	199	Takkada. <i>Arbor venenata.</i>	29
Ranahaendya.	208	Tala, Talaghas, Tal & Talghala. } <i>Palma.</i>	181
Ranawaella. <i>Chrysanthemum.</i>	61	Tala. <i>Digitalis.</i>	87
Ranmanissa. <i>Sinapistrum.</i>	215 & 217	Talakola. <i>Ocymum.</i>	175
Ranmotha. <i>Gramen.</i>	109	Talanghaha. <i>Arbor.</i>	30
Ranwakikirindu. <i>Chrysanthemum.</i>	61	Talukghaha. <i>Cereus.</i>	58
Rasse-Coronde. <i>Cinnamomum.</i>	63	Tanghekolli. <i>Lilio-Narcissus.</i>	143
Ratababa. <i>Fasminum.</i>	26	Telabo. <i>Nux.</i>	170
Ratagambu, & Ratagalbu. } <i>Jambos.</i>	125	Telaepala. <i>Ketmia.</i>	134
Rathababa. <i>Quamoclit.</i>	198	Telamandu. <i>Hedysarum.</i>	117
Rathakaekuna. <i>Nux.</i>	170	Telamandukola. <i>Galega.</i>	103
Rathamiris. <i>Capsicum.</i>	53	Telankaekiri. <i>Bryonia.</i>	48
Rathatala. <i>Ocymum.</i>	175	Telkapala.	222
Rathatora. <i>Cytisus.</i>	86	Telu.	222
Rathohomba, & Rathihoba. } <i>Cyticystus.</i>	85	Thyryaghas. <i>Ketmia.</i>	136
Rathnethul. <i>Plumbago.</i>	195	Tibbuthu. <i>Solanum.</i>	219
Ratmul. <i>Rubeola.</i>	208	Tiraftuwalu. <i>Convolvulus.</i>	11
Rawanakoffa. <i>Drypis</i> THEOPHR.	91	Tittagaedi.	226
Rilla. <i>Filicum species.</i>	97	Tittakelankaekiri.	
Riribunnawael. <i>Smilax.</i>	217	Tittawaetha. <i>Pepo.</i>	186
Rossakinda.	207	Todwallewel. <i>Convolvulus.</i>	73
Rudhumeti.	208	Tolabo. <i>Lilio-Narcissus.</i>	143
Sabara. <i>Sagittaria.</i>	208	Tora, & Torakola. } <i>Galega.</i>	103
Samandara. <i>Arbor.</i>	25	Tothila & Tothya.	226
Saewaendara. <i>Gramen junceum.</i>	109	Tsjampacca. <i>Arbor.</i>	31
Samnatrapalam. <i>Arbor.</i>	29	Tsjawael. <i>Acacia.</i>	3
Sandalmalam. <i>Hyacinthus.</i>	122	Tubukaruwila. <i>Momordica.</i>	161
Sandricalli. <i>Euphorbium.</i>	96	Tubuthu. <i>Solanum.</i>	220
Sascanda. <i>Aristolochia.</i>	33	Tumbakola. <i>Lamium.</i>	138
Sendrikkan. <i>Falappa.</i>	124	Udhawaedhya. <i>Viscus.</i>	229
Sewel-Coronde. <i>Cinnamomum.</i>	63	Udupyali. <i>Genista.</i>	104
Singhadae, & Singhika. } <i>Adhatoda.</i>	6	Ulhaenda.	231
		Unaghas. <i>Arundo.</i>	35
		Undupyali. <i>Hedysarum.</i>	218 & 219
		Ii	Urala

Urala.	Pag. 230	Walkohomba. <i>Arbor.</i>	Pag. 30
Urukiri. <i>Gramen.</i>	107	Walkurundu. <i>Cinnamomum.</i>	64
Urukossa. <i>Xanthium.</i>	233	Wallaurodu. <i>Arbor.</i>	26
Urula. <i>Clematis.</i>	66	Wallunae. <i>Phaseolus.</i>	189
Urulu. <i>Cyclamen.</i>	84	Wallunu. <i>Lilio-Narcissus.</i>	142
Vazabu, & } <i>Acorus.</i>	6	Walmiris. <i>Piper.</i>	193
Vazumbo. }		Walnika. <i>Vitex.</i>	229
Veralu. <i>Prunus.</i>	197	Waltolabo. <i>Lilio-Narcissus.</i>	143
Wadambu. <i>Amaranthoides.</i>	16	Walundughaha. <i>Arbor.</i>	31
Waddaghas. <i>Ketmia.</i>	133	Walunduwael. <i>Hedysarum.</i>	117
Walanghura. <i>Asclepias.</i>	36	Wanaepala. <i>Adbatoda.</i>	6
Waelawael. <i>Euonymus.</i>	95	Wanatittawael.	233
Waelembilla. { <i>Elaeagnus</i>	92	Wandurumae. <i>Phaseolus.</i>	192
& } <i>Fujuba.</i>		Wara, & } <i>Apocynum.</i>	25
Waelkahabilya. <i>Ricinokarpos.</i>	131	Waraghaha. }	
Waelkappu. <i>Apocynum.</i>	203	Wathaessa. <i>Ros Solis.</i>	208
Waelkeppethya. <i>Ricinoides.</i>	24	Wattokola. <i>Pepo.</i>	186
Waelmaendya, & } <i>Arbor.</i>	202	Wattu-Murunghu. <i>Moringha.</i>	163
Waelmindi. }		Watuhambilya. <i>Urtica.</i>	233
Waelundu, & } <i>Phaseolus.</i>	26	Wawulaethya. <i>Acacia.</i>	4
Waelunduwael. }		Wayapali. <i>Ricinoides.</i>	200
Waeranya. <i>Valerianella.</i>	188	Welagha.	233
Waerellaghas. <i>Carpinus.</i>	227	Welakola. { <i>Hyssopus.</i>	123
Waethakeja. <i>Ananas.</i>	55	& } <i>Sinapistrum.</i>	215
Walanghura. <i>Asclepias.</i>	20	Welala. <i>Rizophora.</i>	206
Waldamini. <i>Hedysarum.</i>	36	Welkiri. <i>Gramen.</i>	105
Walgambu. <i>Fambos.</i>	115	Welle-Coronde. <i>Cinnamomum.</i>	63
Walghahala. <i>Colocasia.</i>	125	Weralu. <i>Elaiocarpos.</i>	93
Walhedi. <i>Limonia Malus.</i>	69	Wila. <i>Hyssopus.</i>	122
Walidda. <i>Nerium.</i>	143	Wisaduli. <i>Lychnis.</i>	144
Walikaha. <i>Cornus.</i>	167	Wisnugarandi. <i>Alfina.</i>	12
Walinghura. <i>Zingiber.</i>	76	Wissaduli. { <i>Abutilon.</i>	2
Walkaralhaebo. { <i>Blitum.</i>	234	& } <i>Dentillaria.</i>	86
& } <i>Lamium.</i>	47	Wittrawinansa. <i>Cytisus.</i>	68
	138	Ykoraka. <i>Arbor Gummi Guttam fundens.</i>	28

C A T A L O G U S PLANTARUM AFRICANARUM,

Quas *Paulus Hermannus* Botanices Professor, ad Caput
Bonae Spei olim observavit.

ABROTANOIDES Africana, vermiculato folio, crassiori, magis incano.

————— vermiculato folio, tenuiori, minus incano.

————— folio brevi, capitulis globosis. Frutex cineraceus muscosus
Capitis Bonae Spei *Breyn.*

————— Erica foliis incanis, capitulis majoribus, villosis.

————— Erica folio. Cupresso-pinulus *Breyn.*

————— Erica foliis tenuissimis. Frutex corymbiferus Africanus,
Chrysanthemuli Ericoidis facie, flore globulariae. *Breyn. fasc.*

————— Erica foliis tomentosis, acutis.

————— foliis tenuissimis, tomentosis, capitulis bombaciferis.

————— foliis angustissimis, incanis, floribus luteis, capitulis ar-
genteis.

ABSINTHIUM Africanum, Absinthii Pontici folio. Absinthio Seriphio similis. Capi-
tis Bonae Spei. *Breyn. fasc.*

————— tenuifolium, odoratissimum, Monomotapense. *Breyn. Cent. 1.*

————— Ponticum, tenuifolium, incanum. *C. B.*

————— Idem odoratum.

————— maritimum, Lavendulae folio. *C. B.*

ACACIA Africana, latifolia, spinis majoribus.

————— angustifolia, spinis majoribus, flore odoratissimo. Acacia Africana,
spinis candicantibus horrida. *Plukn.*

————— angustifolia, spinis minoribus.

ACONTIPHORA Africana, belgice *Affagai-boom*, ex qua Hottentotti tela *Affagai* dicta
conficiunt.

ADIANTHUM Africanum, Capilli Veneris facie.

AGERATUM Africanum, Elichrysoides, umbellatum, Abrotani folio.

————— Idem foliis tenuioribus. *In Hort. Beaumont.*

————— foliis Tithymali Paralii angustioribus.

AIZOIDES folio triangulo, lato, glauco.

————— viridi, spinoso.

————— Erica folio.

————— mamillaris, viridis, summitate foliorum spinis coronata.

————— folio triangulari, glauco, brevi.

————— erectus, foliis brevibus, triangulis, flore albo.

————— Idem flore luteo. Mesembrianthemum, sive flos meridianus, Africanus, triar-
gulari folio, frutescens, maximus, procumbens, fructu turbinato, eduli. *Breyn. pr. 2.*

————— Idem flore purpureo. *Breyn. pr. 2.*

AIZOIDES Idem flore albo. *Breyn. pr. 2.*

———— Idem minus, flore luteo, minore. *Breyn. pr. 2.*

———— five Mesembrianthemum Africanum, procumbens, triangulari, glauco folio minimo veluti tuberculis exasperato, flore suave purpurascens, seu carneo minore. *Breyn. prodr. 2.*

———— Idem folio triangulo, longissimo, fructu multicapsulari, flore luteo majori *H. L. B.*

———— Idem minus.

———— teretifolium, majus, Africanum, flore luteo majore. *Breyn. prodr. 2.*

———— teretifolium, majus, flore luteo, majore, tuberculis raris donatum.

———— Idem foliis magis rigidis, magisque splendentibus *H. A.*

———— erectum, frutescens, folio tereti glaciali, caulibus hirtis. *H. A.*

———— Idem folio plano, glaciali, latissimo Plantaginis, flore albo.

———— Idem folio plano Polygoni crasso, floribus copiosis albis. *H. A.*

———— Idem folio sinuato, flore tubo longo donato. Ficus Indica, folio ad marginem sinuato, Nopalxochcuez Alticquisi *Hernand. pag. 392 & pag. 457.*

ALCEA vesicaria. Capitis Bonae Spei *Moris.* Alcea Vesicaria, Africana, flore amplo, patulo *Cat. Hort. Blef.*

ALCHIMILLA Africana, multicaulis, villosa & spinosa, flore ex coeruleo rubescens.

ALGA maritima, Africana.

ALNI materie, seu ligno, arbor Africana, floribus spicatis albis, foliis Fraxini. *Essen- bout* vulgò. an arbuscula Arbuti alatis foliis, forte Jamboloius?

ALOE Africana, foetida, folio triangulari, longissimo & angustissimo, radice lutea *H. L. B.* Iris Uvaria Promontorii Bonae Spei. *Stapel.*

———— foliis brevioribus, obtusis, spinis rarioribus albis, brevioribus in superficie utraque foliorum. *H. A.*

———— foliis brevioribus, acutis, fere rotundis, superficie prona maculis seu tuberculis adpersa. *H. A.*

———— minima, undique tuberculis, seu verrucis albis adpersa.

———— Eadem foliis obscure virentibus. *H. A.*

———— Africana, foliis in aculeum desinentibus, non spinosa. *H. A.*

———— folio brevissimo, crassissimo, triangulari, in spinulam tenuissimam desinentibus nervis albis, flore coeruleo.

———— minima, spinosa, facie aloes Americanae. *H. A.*

———— humilis, foliis brevibus, caesiis, flore coeruleo instar Hyacinthi, *inter depictas Dominae de Flines.*

———— folio Pini strobulum referente, floribus ramosis.

———— five Lili species Africana, foliis crassis, longis, obtusis, squammatim erumpentibus. *H. A.*

ALSINE Africana, Laricis folio.

———— procumbens, Gallii facie. *H. L. B.*

———— muscosa, folio capillaceo.

———— seu Spergula Africana, folio tenuissimo.

———— Myosotis dicta, hirsuta, perennis, Africana.

ALSINES seu Spergulae dictae species Africana.

———— Africanae species, folio subrotundo, floribus copiosis in summitate ramulorum.

AL-

ALSINE Africana, frutescens, angustifolia, flosculis ad singulos nodos binis ternisve.

Alfina Indica, polyanthos, tenuifolia ex Maderaspatam *Plukn.*

ALTHAEA Africana arborescens, folio rotundo, crenato.

————— arborescens, folio longiori, minus aut nihil crenato.

————— vesicaria, frutescens, flore albo.

————— folio Ranunculi Illyrici.

————— frutescens, Uvae crispae folio aspero.

————— vesicaria, Ibis minoris folio. Althaea (an Alcea) vesicaria frutescens, flore luteo, convoluto, folio molli Ibis. *Vander Stell.*

————— Eadem minor.

————— folio Pfyllii, seu Spergulae, seu Spergula ipsa.

————— Africana, Alni folio. an Malva incana, frutescens folio Alni. *Par. Bat. pr.*

————— arborescens, purpurea, Grossulariae, vel Ribes folio.

AMYGDALUS Africana, sive Aethiopica, fructu holoserico. *Breyn. Cent. 1.*

ANAGALLIS Africana, flore phoeniceo.

ANCHUSA Africana, arborescens. an Buglossum Africanum, Echii folio. *Breyn. fasc.*
vel Cynoglossum Africanum, Myrtifolium. *Breyn. fasc.*

————— frutescens ferrato Trachelii folio, flore albo.

ANEMONOSPERMOS Africana, Taraxici foliis subincanis, flore Calendulae Africanae latifolia. Jacobaea Africana Staebes facie, flore Calendulae Africanae latifolia.

Par. Bat. pr.

————— Eadem foliis angustis. *Par. Bat. pr.* Chrysanthemum Africanum, foliis angustioribus. *Breyn. pr. 1.*

————— Africana, foliis angustis, flore Aurantio, folio Coronopi.

————— Africana, foliis angustis, frutescens, folio Tussilaginis non crenato.

————— Africana, foliis angustis, flore Cichorei. an Hieracium Huislaardyanum?

————— Africana, foliis angustis, Taraxici.

————— Africana, foliis angustis, dentatis.

————— Africana, foliis angustis Asplenii, flore magno, humilis.

ANETHIFOLIUS frutex Africanus, flore sericeo.

————— frutex Africanus, major, flore non sericeo.

————— frutex Africanus, minor, capite tomentoso.

ANTHYLLIS Africana, angustissimo & brevissimo folio.

————— Africana foliis angustis, acutis.

————— Africana Rubiae angustissimae folio.

APOCYNUM Africanum, erectum, villosa fructu, Salicis folio lato, glabro. Apocynum erectum, elatius, Salicis angusto folio, emaculatis flosculis in umbellam folliculis pilosis. *Plukn.* Apocynum Hyficanense erectum, Salicis foliis latioribus. *Cat. Hort. Beaumont.*

————— erectum, fructu villosa, angustifolium, glabrum. Apocynum Africanum erectum, tuberosum, angustifolium, flore ex luteo virescente, folliculis pubescentibus. *Plukn.*

————— foliis subrotundis, crassis, floribus umbellatis albis.

————— erectum, Salicis folio, hirsutum.

humile aizoides, filiquis erectis. *H. L. B.* *Fritillaria crassa*, Capitis Bonae Spei *Stapel.*

scandens, hirsutum, foliis rotundioribus. *Par. Bat. pr.*

scandens, hirsutum, foliis acutioribus fuscis, intus albis.

— — — scandens, foliis Laurinis glabris. *Par. Bat. pr.*

— — — scandens, Asphodeli radice, folio Arbuti.

— — — scandens, Vincae Pervincae foliis subrotundis.

— — — scandens, Coronopi folio, flosculis pentapetalis.

— — — Gentianae folio.

ARBOR Africana lucida, folio Halimi nostratis.

— spinis ad fingula folia brevibus aduncis, Belgis *Haageboom*.

— — — spinosa, foliis conjugatis, fructu nigro.

— — — procera.

— — — foliis alternis, subrotundis, crassis, splendentibus.

— — — — spicata, foliis digitatis, quorum nonnulla auriculata instar foliorum Aurantiorum.

— — — spinosa, foliis crassiss, cordatis & conjugatis, spinis crassiss bigeminis.

— — — foliis conjugatis subrotundis, subtus tomentosis.

ARBUSCULA Africana, foliis ternis, rigidis, rotundis.

ARISTOLOCHIAE species Africana, foliis cordiformibus, an Floris passionis species?

ARTEMISIA latifolia Africana.

ARUM Africanum, minus, triphyllum. *Par. Bat.*

— flore albo odorato. *Par. Bat.* Arum Ægyptiacum, flore albo, Moschum olente. *H. L. B.*

ASPARAGUS *Africanus* foliis falcatis.

— — — — scandens foliis brevissimis.

aculeatus. *H. L. B.*

— — — — — seu *Corruda Africana*, virgulis lignosis, rubris, permanentibus.

ASPHODELUS Africanus, hispidis, longis, rigidisque foliis. *Par. Bat.*

latis, hispidisque foliis, floribus ramosis, albis.

— — — — — flore minore, luteo, foliis angustissimis.

— — — — — flore *Lancastriae* simili, foliis angustioribus.

ASPENIUM, five *Ceterach* folio splendente, subtus ferrugineo, planta capitata Africana.

ASTER Africanus, purpureus, lato, rigido folio.

— — — — — aizoides, frutescens, flore albo.

coeruleo.

luteus, Rorismarini folio, calice rigido.

purpureus, foliis brevibus, rigidis, recurvis.

~~fruticosa~~ frutescens, foliis angustissimis, viridibus, argute ferratis.

luteus, foliis longis, angustis, serratis.

— *Aethiopicus*, *Staechadis foliis*, flore aureo. *H. L. B. an Conyza Africana*, foliis *Staechadis citrinae Gallicae*. *Breyn. fasc.*

— Africanus, frutescens, coeruleus, floribus parvis.

ASTER Africanus, frutescens, luteus, Ericae folio.

————— humilis, coeruleus, folio Anchusae luteae minoris.

————— angustifolius.

BARBA Jovis Africana, sive Genista Capensis, spinosa, Ligustri folio pentaphyllos, flore spicato, rubro. *Plukn.*

BELLIS Africana, capitulo aphylo, luteo, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus. *H. L. B.*

———— Eadem, foliis & cauliculis junceis erectis. *H. L. B.*

———— frutescens, Camphorata, foliis angustis crassis, acutis.

BETULAE facie arbor, Africana, major.

———— Eadem minor.

BISTORTA Africana, frutescens, floribus rubris, foliis Polygoni rotundis.

BLITUM Africanum, Calthae palustris folio, caule nudo, cubitali, spicam pedalem & amplius sustinente. *Plukn. Tab. 18.* Petasites Africanus, folio Calthae Palustris. *H. L. B.*

————— Hyssopi folio.

BRANCA Ursina Africana.

BRYONIA Africana, glabra, folio profunde secto, radice rapacea, flosculis herbaceis.

———— folio minus profunde secto, segmentis rotundioribus.

———— folio dissecto, minimo, segmentis rotundis.

BUPLEURI facie Africana, Gladioli foliis angustis, nervosis, longissimis seminibus pappo convolutis.

———— Eadem, foliis brevioribus.

———— foliis junceis, carinatis, longioribus, seminibus pappo convolutis.

———— majoribus & brevioribus, seminibus pappo convolutis.

———— gramineis, rigidis, seminibus triquetris, calice perfoliato, angusto. Perfoliato angustifolio, montano, Columnae similis planta umbellifera nova, fructu triplici membranacea. *Breyn. fascic.*

———— folio angustissimo.

CALENDULA Africana.

———— erecta, flore minore.

———— procumbens, flore minore.

———— foliis gramineis, rarius dentatis, aureis.

———— Scabiosae argenteae viridibus.

CAMPANULA Erini facie Africana, flore violaceo, caulibus erectis.

———— procumbentibus. *H. L. B.*

———— Africana Ericae folio, flore coeruleo, patulo.

———— galericulato flore, foliis Violae minoribus.

CAPPARIS Africana, humilis, triphyllus, & tetraphyllos.

CAPPARIDIS leguminosae folio frutex Africanus, flore luteo, fructu membranaceo.

Idein foliis glaucis, fructu biunciali in acumen desinente, flore albescente intus carneo.

CARDIACA Africana, folio Sideritidis, floribus longissimis, phoeniceis villosis. *H. L. B.*
Leonurus Capitis Bonae Spei *Breyn. C. 1.* Sideritis flore aureo, oblongo. *Act. Hafn.*

An. 73.

———— Americana, annua, minor, Nepetae folio. *H. L. B.*

CARDUUS Africanus, luteus, Atractylidis facie, extremo foliorum aculeo adunco.

CASSIA poëtica, Africana, folio Sanamundae primae Clusii.

CENTAURIUM minus, Nummulariae folio.

———— Caryophylloides, Africanum, semper virens. *Par. Bat. pr.* Rapuntio affinis, Lini facie Capitis Bonae Spei. *Breyn. Cent. 1.*

———— Africanum, minus, Lychnidis flore rubro, foliis Centaurii vulgaris majoribus.

———— foliis angustissimis, viridibus.
———— luteum, flore amplo, capsula quatuor alis membranaceis donata.

———— humile, multiflorum.

Idem floribus paucioribus, & majoribus.

Centaureum Africanum minus, angustifolium, flore luteo minimo.

———— luteum, floribus majoribus.

———— floribus minoribus.

———— ramosum, foliis angustissimis, brevibus.

CERASUS Africana, foliis conjugatis, crassis, subrotundis.

———— rigidis, crassis, oblongis.

———— sylvestris fructu non eduli, foliis latioribus, Belgice *Tferhout.*

CERASI folio arbor Africana.

CHAMÆLÆA Africana, Rorismarini foliis majoribus, lanuginosis.

———— rarioribus, floribus ex foliorum alis erumpentibus.

———— folio angustissimo, capite globofo, alopecuroide.

———— floribus herbaceis.

———— foliis Laurinis ferratis. Alaternus Hyficanensis, sive Africana, Lauri ferratae, odoratae Stapelianae foliis. *Cat. Hort. Beaum.*

———— acutioribus.

———— frutescens, flore rubescente, ex plumoso capite, foliis Rorismarini minoribus.

———— foliis subrotundis.

CHAMÆMELUM Æthiopicum, lanuginosum. *Breyn.*

———— tenuissimo folio, glabro. *Par. Bat. pr.*

———— Africanum, pumilum, Ericae folio.

———— frutescens, folio Millefolii odorati.

———— foliis longis, angustissimis, capitulis parvis.

———— capite nudo.

CHRISTOPHORIANA Africana, Ranunculi flore, foliis rigidis Libanotidis. Sphondilii, sive Panacis rigido, hirtoque folio, planta Africana caustica. *Par. Bat. pr.*

———— Eadem, minor.

PLANTARUM AFRICANARUM.

7

CHRYSANTHEMUM Africanum, foliis angustis, dentatis.

———— Cotulae folio, minus, flore luteo.

———— pumilum, Oxyridis folio.

———— frutescens, facie Cichorei spinosi, vel bacciferum, odoratum, spinosum, flore luteo.

———— folio Erucae Canadensis Cornuti, sive ramosum, floribus parvis.

———— foliis Lini crassioribus, caule folioso.

———— femine triquetra, glabro.

———— frutescens, floribus umbellatis, foliis dense stipatis, angustissimis, viridibus.

———— Æthiopicum, arborescens, folio Populi albae Breyn. Cent. 1. vel Bacciferum, flore luteo.

———— Conyzoides, capitulo aphylo, folio Majoranae. Breyn. Cent. 1.

———— Africanum, Ericoides, coronatum, Capitis Bonae Spei. Breyn.

———— foliis scabris Coronopi.

CICER Africanum, phaseoloides, bituminosum, flore luteo. Flor. Bat. Phaseolus Africanus, bituminosus. H. L. B.

CISTUS humilis, Africana, aizoides. H. L. B. Sedum petraeum, tereti folio, Virginiana. Plukn.

———— foliis Alni minoribus.

———— Rorismarini angustis.

———— glabris, dentatis, floribus luteis, pendulis.

———— tenuissime dissectis. Varietas prioris.

COLUTEA Æthiopica, flore phoeniceo, Barbae Jovis folio. Breyn. Cent.

———— Africana, Barbae Jovis foliis, & floribus minoribus.

———— minor, purpurea, vesiculis depressis.

———— minor, purpurea, foliis brevioribus, cordatis, filiquis minus depressis, & quasi lunatis.

———— Lentisci folio, floribus & nucleo ruberrimo.

———— frutescens, foliis latis, hirsutis, flore flavo.

CONVOLVULUS Indicus, Orientalis; Inhame sive Batattas, Sifarum Peruvianorum. Seu Batattas Hispanorum.

———— Africanus, foliis oblongis, rugosis, & hirsutis Salviae instar, flore coeruleo. Van der Stell.

CONYZA Africana, flore nudo, folio Conyzae mediae.

———— frutescens, folio majore, subrotundo.

———— caule alato, foliis minoribus, subrotundis, subtus lanuginosis, flore coeruleo.

———— Eadem, foliis minoribus, & angustioribus.

CORALLINA Africana.

CORIDIS folio & spica Africanus frutex, alopecuroides, flore albo, Linconii nomine missus.

CORRUDA Africana, foliis tenuissimis, spica brevi, deorsum spectante, ad ramulorum exortum.

— frutescens, ad singulos aculeos emittens ramulos plurimos falcatos.

CRATEOGONUM Africanum, foliis brevissimis, obtusis, floribus magnis hirsutis.

CROTALARIA Africana, arborescens, Styracis folio. Genista folio Styracis. Genista Africana, quae folia habet Mali Cydonii. *Inter omissa Aët. Hafn.*

CUCUMIS Africanus, fructu echinato. Histrix vegetabilis, vulgo Hysiquanensis.

— major.

CUPRESSUS Africana, Lini folio. Larix Conifera *Plukn.*

CYTISUS Africanus *Rivini.*

— folio angusto, subtus argenteo, siliqua Securidacae luteae.

— argenteus, spicatus.

— hirsutus, & incanus, flore atro puniceo.

— angustifolius, flore luteo, globoso.

— alopecuroides, foliis Buxeis.

— capitulis globosis, foliis minoribus.

— spicatus, luteus, foliis minoribus, angustis.

— humilis, spicatus, incanus.

CYTISO-GENISTA Africana, Ericae foliis, fructibus in globum lanuginosum congestis.

— foliis minimis, siliquis Loti brevibus, rotundis.

DAUCELLUS Africanus, humilis, vel Caucalidis Species, flore rubro; *an ipsissima Daucus nostra silvestris?*

ECHIUM Lycopsis facie, Africanum, erectum, perenne. *H. L. B.* Anchusa maxima, Buglossi minoris facie, Cap. Bon. Spei. *Breyn.*

— Africanum, minus, foliis oblongis, glabris, floribus coeruleis.

EPHEMERUM Africanum, annuum, flore bipetalo *H. L. B.*

ERICA Africana, Taxifolia, floribus Cerinthes, miniatis, in umbellam congestis.

Erica Coris folio, hispido, Cerinthoides, Africana. *Breyn. Cent. 1.* Erica Africana, umbellata, flore purpureo. *Aët. Hafn.*

— frutescens, floribus purpureis, longis, staminibus longissimis donatis.

— tubulosis, longis, coccineis, staminibus longissimis donatis.

— brevioribus, longis filamentis donatis, foliisque brevioribus.

— flore longo, tubuloso, incarnato, folio Juniperi.

— erecta, paludosa, longissimis floribus, tubulosis, per caulium seriem dense dispositis.

— glabra, floribus vesicariis, Juniperi folio.

— longo filamentis dispositis, foliis brevissimis.

— hirsuta, floribus atropurpureis, ex capitalis lanuginosis.

— Coridis folio, Unedonis flore albo.

— glabra, foliis tenuibus, floribus dilute purpureis, in summitate ramulorum conglobatis.

PLANTARUM AFRICANARUM.

9

ERICA Africana, Eadem floribus albidis.

————— glabra, foliis tenuissimis, floribus minoribus, eleganter purpureis, conglobatis.

————— Eadem floribus albis.

————— tenuifolia, glabra, floribus albis.

————— Sanamundae facie.

————— Corrudae foliis, hirsutis.

————— minima, foliis Thymi minoribus.

————— Coridis foliis, floribus magnis, rarioribus.

————— Juniperi foliis brevioribus, floribus parvis, oblongis, rubris.

————— Sanamundae foliis, floribus copiosis.

————— foliis minimis, hirsutis, floribus minoribus, hirsutis, incarnatis, majoribus per seriem caulium rarius dispositis.

————— foliis minimis, floribus minoribus, hirsutis, dilute purpurascentibus per seriem ramulorum dispositis.

————— foliis brevibus, Ericae scopariae facie.

————— foliis tenuissimis, ac quasi capillaceis.

————— foliis minimis, floribusque hirsutis, minoribus.

EUONYMUS Africana, folio vario.

————— foliis Phillyreae ferratae majoribus.

EUONYMO affinis, Aethiopica, semper virens, fructu globofo, scabro, foliis Salicis rigidis, ferratis. *H. L. B.* Lauro ferratae odoratae Stapelianae similis, inodora, Capitis Bonae Spei. *Breyn.*

EUPATORIUM Africanum, frutescens, Senecionis floribus albis, umbellatis, folio singulari. Eupatorium Indicum, flore albo. *Alt. Hafn.*

————— humile, Senecionis facie, foliis Lamii. *Par. Bat. pr. Senecio Africanus, Lamii folio. Acad. Paris.*

EUPHRASIA Africana, foliis tenuiter dissectis.

FAGUS Africana.

FERRUM EQUINUM Africanum, siliquis falcatis, marginibus integris.

FERULA GALBANIFERA. Ferula fruticosa, semper virens, foliis Anisi, Galbanifera ex qua Galbanum Officinarum. *Par. Bat. pr. Oreoselinum Anizoides, arborescens, Ligustici foliis & facie, flore luteo, Capitis Bonae Spei. Breyn. pr. 2.*

————— Africana, minor.

————— foliis rigidis, latis.

————— foliis rigidis, angustis.

FILICULA Africana, humilis, pinnulis multifidis.

FILIX Africana, arborescens, ramosa, pinnulis Filicis Maris minoribus.

————— non ramosa, Polypodii facie.

————— Eadem, colore rubente.

————— mas, pinnulis integris, angustis, longis.

————— rotundis.

————— Floridae similis, in ambitu foliorum argute denticulata.

————— ramosa, lucida, pinnis Apii in morem laciniatis.

FILIX Africana, pinnarum laciniis in acumen desinentibus. Filix Africana, humilis, spinosa, pinnulis latioribus, minus patula. *Plukn.*

— ramosa, pediculo innitente.

— ramosa, ferrata.

— non ramosa, foliis integris, ferratis, Capitis Bonae Spei. *Breyn.*

Cent. 1.

— maxima, Polypodii facie. *Par. Bat. pr.*

— Polypodii facie, segmentis latioribus, alternis.

— auriculata, Lonchitidis facie, folio in cuspidem longum producto.

— ramosa, Lonchitidis facie, pinnis circa extrema ferratis.

— minor, Lonchitidis facie. *Par. Bat. pr.*

FLOS Passionis, fructu rubicundissimo, folio Vitis non inciso.

FRUTEX Africanus, monococcus, Buxi majoribus foliis, floribus albis.

— folio Cisti, odore Korismarini.

— Ambram spirans. *Plukn.*

— Ambram spirans, spicis florum densis.

— Laricis folio, capsula oblonga, rotunda, ruffa, semen unicum includente.

— foliis angustis, alternis, forte Atriplicis species.

— foliis conjugatis, Salviae angustis, floribus spicatis, tubulosis, hirsutis.

— foliis minimis, rotundis, dense stipatis.

FUCUS angustifolius, Africanus.

— Africanus, Sargasso dictus.

— latissimus, coriaceus, rugosus.

FUMARIA Africana, vesicaria. Fumaria amplexicaulis vesicaria. *Act. Hafn.*

GALEATA verticillata, Africana planta, Thymi foliis angustis. *Galehout Africana,*

Salicis foliis, Dominae de Flines. *Breyn.*

GALLIUM Africanum, foliis angustis.

GENISTA Africana, sphaerica, Rusci folio.

— Rusci folio, ramulis tomento obductis.

— Rusci foliis, dense stipatis.

— Rusci foliis, angustioribus, flore luteo.

— Lauri Alexandrinae folio, breviori, nervoso. Planta leguminosa,

Æthiopica, folio Rusci. *Breyn.*

— folio lato, orbiculato, arborefcens.

— folio lato, subrotundo, lucido. Myrto Genista, Capitis Bonae

Spei. *Breyn. Cent. 1.*

— argentea, rotundifolia, flore luteo, calyce holoserico, ferrugineo.

— purpurea, odorata.

— purpurea, foliis in spinam abeuntibus.

— foliis rigidis, spinosis, dense stipatis, imbricatim positis, floribus rubris.

— folio Salicis Pumilae argenteae minor.

GENISTA

GENISTA Africana, argentea, minor, folio acuto, & siliquis argenteis.

— — — argentea, purpurea, foliis Sanamundae.

— — — argentea, foliis minimis, alopecuroides.

— — — lutea, floribus in capsula villosa conglobatis, foliis villosis.

— — — lutea, foliis subhirsutis, in capsula lanuginosa conglobatis, foliis

Corruda aculeatis, subhirsutis. Chenopoda Monomotapensis. *Breyn. Cent. 1.*

— — — floribus luteis, subhirsutis, foliis Corruda aculeatis, glabris.

— — — lutea, Juniperi folio.

— — — lutea, foliis Ledi Selesiaci minoribus.

— — — lutea, foliis Laricis, aizoides. Genistella spinosa, Laricis folio.

Breyn. Cent. 1.

— — — lutea, non spinosa, folio Laricis, flore parvo, purpureo, variegato.

— — — lutea, Laricis foliis, incanis.

— — — lutea, foliis Asparagi, seu Corruda.

— — — spicata, Laricis foliis tenuissimis, flore minimo.

— — — Laricis folio brevi, spica lutea, lanuginosa.

— — — Eadem, spica lutea, viridi, foliis majoribus.

— — — viridis, floribus majoribus.

— — — foliis juniperi, humilis, floribus parvis purpureis, variegatis.

— — — foliis Ericae brevissimis, raris, flore minimo, singulari, siliquis brevibus, acutis.

— — — humilis, spicata, Camphoratae foliis hirsutis, floribus parvis.

— — — foliis Genistae Hispanicae, superioribus longissimis, junceis.

— — — foliis Genistae Tinctoriae majoribus.

— — — Linariae folio.

— — — humilis, Thymi foliis.

GENISTAE affinis Arbor Africana, monospermos, flore coeruleo, foliis pinnatis. *H. L. B.*

GERANIUM Africanum, arborescens, Ibis folio rotundo, Carlinae odore. *H. L. B.*

— — — Bismalvae folio, rotundo, undulato, minori.

— — — frutescens, Malvae folio, laciniato, odorato. *H. L. B.*

— — — foliis hirsutis, longis, tenuissime dissectis, flore albo, punctis purpureis, radice tuberosa.

— — — folio anguloso, circulo purpureo notato.

— — — floribus parvis, rubellis, foliis subrotundis, procumbens.

Van der Stell.

— — — foliis Thapsiae latifoliae *Dominae de Flines.*

— — — Coriandri foliis, flore incarnato, majori. *H. L. B.* Geranium

Æthiopicum, Myrrhidis folio, flore magno, striato. *Breyn. Cent. 1.*

— — — Idem, minus.

— — — Betonicae laciniatis foliis, & maculatis, floribus incarnatis. *H. L. B.*

— — — Alchimillae foliis hirsutis, flore ochroleuco. *H. L. B.*

— — — tuberosa radice, Anemones folio.

GERANIUM Africanum, idem, flore suaverubente. *Breyn. pr. 2.*

— — — — foliis Adianthi. *Par. Bat. pr.*

— — — — humile, tuberosa radice, floribus amplissimis incarnatis, latifolium. *Par. Bat. pr. app.*

— — — — Idem, angustifolium.

— — — — tuberosum, minus, Ferulaceis foliis.

— — — — Abrotani folio, flore amplissimo, semine duro, spinoso.

— — — — Cicutae folio, acu longiori.

— — — — noctu olens, radice tuberosa, foliis Pastinacae. Geranium

Æthiopicum, noctu olens, radice tuberosa, foliis Myrrhidis latioribus. *Breyn. Cent. 1.*

Idem foliis angustioribus. *Breyn. Cent. 1.*

GERANIUM Africanum, noctu olens, radice tuberosa, foliis Myrrhidis angustissimis, vel potius Scandicis villosissimis. *Breyn.*

— — — — noctu olens, tuberosum, & nodosum, foliis Aquilegiae.

H. L. B.

— — — — Myrrhidis folio aspero, radice lignosa, tuberosa, umbone purpureo.

— — — — folio integro, radice lignosa, tuberosa.

— — — — Æthiopicum, flore galeato, carneo, medio, foliis Pulsatillae, seu D. n. silvestris. *Breyn. pr. 2.*

— — — — flore galeato, parvo, foliis segmentis latioribus, seu Coriandri. *Breyn. pr. 2.*

GLADIOLUS Africanus, maximus, coccineus *Par. Bat. p. 1.* Gladiolus Africanus, maximus. *Alt. Hafn.*

— — — — idem albus. *Par. Bat. Pr.*

— — — — maximus, purpureus, floribus amplis.

— — — — Aethiopicus, flore coccineo *Cornuti.*

— — — — Africanus, pumilus, folio angustissimo. *Par. Bat.*

— — — — Aethiopicus, ramosus, caeruleus, maximus.

— — — — Africanus, ramosus, floribus parvis, luteis.

— — — — floribus tubulosis, instar Hyacinthi tuberosi.

— — — — flore incarnato, nervis foliorum albescentibus *Par. Bat. Pr.*

— — — — idem, flore nivo.

— — — — ramosus, carneo flore.

— — — — non ramosus, floribus purpureis.

— — — — foliis junceis, convolutis, floribus minoribus tubulosis.

— — — — foliis junceis, floribus minoribus, saturate purpurascens.

— — — — Aethiopicus, minor, flore violaceo *Breyn. Cent. 1.*

GNAPHALIUM Africanum, foliis latis, tomentosis, floribus luteis, umbellatis, calicis foliolis recurvis.

— — — — idem, floribus purpureis.

— — — — facie Gnaphalii Anglici, foliis angustissimis.

— — — — frutescens, Ericae folio, seu Coridis, alopecuroides.

— — — — foliis tomentosis, subrotundis, ramosis, floribus copiosis, spicatis. GRA-

GRAMEN Africanum, junceum, elatius, maritimo simile.

— — — — paniceum, spica longissima. Gramen Alopecuroides, spica maxima, Indiae Orientalis. *Plukn.*

— — — — paniceum, folio latiore.

— — — — latifolium, panícula juncea.

— — — — Triglochin, bulbosum, Monomotapense. *Breyn. fasc.*

HAEMANTHOS Africana. *H. L. B.* Tulipa Capensis, seu Capitis Bonae Spei. *Stapel.*

Narcissus Indicus, puniceus, gemino latiori folio. *Ferrar. in flor. cult.*

HELICHRYSUM Africanum, latifolium, foetidum, petalis argenteis. Conyza Africana, graveolens, capitulis argenteis. *Plukn.*

— — — — idem, petalis aureis.

— — — — luteum, latifolium, Meliloti odore, seu odoratum, caule alato.

— — — — foliis undulatis, rigidis, quinquenerveis.

— — — — album, Staechados latifolij folio.

— — — — floribus ferrugineis, folio tomentoso, angusto, oblongo, five Chrysocome Africana, flore phoeniceo, angustifolia. *Breyn. fascic.*

— — — — folio angusto, tomentoso, floribus umbellatis, facie Pedis Cati.

— — — — folio angustissimo.

— — — — folio tomentoso, angustissimo, squamis acutis, ferrugineis, deorsum reflexis.

— — — — Serpilli foliis, incanis, odoratis.

— — — — idem, foliis subtus tantum incanis.

— — — — sulphureum, foliis tomentosis, subrobundis, brevibus.

— — — — luteum, Polii montani lutei foliis.

— — — — Gnaphalii acuti foliis, capitulis parvis.

— — — — luteum, foliis minimis, angustis, brevibusque.

— — — — luteum, angusto, brevique folio, floribus globosis.

— — — — album, longis, acutis, tomentosisque foliis.

— — — — Lavendulae folio breviori, floribus umbellatis, albis.

— — — — Ericae folio, floribus longis, majoribus.

— — — — umbellatum, album, Coridis folio, flosculis longis, parvis.

— — — — umbellatum, purpureum, Coridis foliis, globosis.

— — — — Ericae foliis, tomento ferrugineo obductis.

— — — — Satureae folio.

— — — — folio, & flore Abrotani viridis.

HELICHRYSI species, folio angustissimo, argenteo.

— — — — Camphoratae folio, floribus minimis, umbellatis.

HELLEBORINE Africana, ramosa, lutea, foliis Gladioli.

HERBA TERRIBILIS Africana, foliis Tithymali Paralii.

HERNIARIA Africana, procumbens, foliis stellatis, minimis.

— — — — fruticosa, foliis Ericae.

— — — — cauliculis longioribus, pratensis.

HIERACIUM Africanum, folio angustissimo.

— — — — — purpureum, Jacobaeae folio.

— — — — — villosum, foliis & floribus Hieracii Pannonici primi. *Clusii.*

HORMINUM Africanum, frutescens, Chamaedryos folio subincano. *Salvia minor,*

Æthiopica, foliis Chamaeleagni asperis. *Breyn. Cent. 1.*

— — — — — floribus maximis, ex albo & purpureo variegatis,
foliis incanis, subrotundis.

— — — — — foliis *Salviae minoribus.*

— — — — — foliis inferioribus, alatis.

HYACINTHI species, Africana, floribus parvis.

HYACINTHUS Africanus, Orchidem aemulans.

— — — — — bifolius, floribus parvis, erectis.

— — — — — Orchioïdes, major, bifolius, maculatus, flore sulphureo.

Breyn.

— — — — — oblongo flore, ruberrimo, majori.

— — — — — oblongo flore, ruberrimo, minori.

HYACINTHO affinis, Africana, tuberosa radice, umbella coerulea, inodora. *H. L. B.*

JACEA Africana, frutescens, ciliaris, Rorismarini folio.

— — — — — folio *Laricis*, flore luteo.

— — — — — *Lavendulae multifidae*, flore luteo.

— — — — — foliis *Thymi capitati* ferratis, purpurea.

JACOBAEA Africana, folio capillaceo, viridi.

— — — — — dentato, obtuso.

— — — — — lutea, folio *Rapi*, vel *Lampsanæ*.

— — — — — *Hedypnoides*, *Monspeffulanae* facie.

— — — — — purpurea, foliis *Senecionis* pinguis. *Senecio viscosus*, *Æthio-*
picus, flore purpureo. *Breyn. Cent. 1.*

— — — — — foliis inferioribus *Iberidis*, vel *Nasturtii hortensis*.

— — — — — *Jacobaeae vulgaris*, minoribus.

— — — — — frutescens, folio *Saniculae guttatae*.

— — — — — *Abrotani*, seu *Crithmi*. *Par. Bat. pr.*

— — — — — minoribus. *Par. Bat. pr.*

— — — — — *Æthiopica*, *Lavendulae* folio. *Breyn. Cent. 1.*

— — — — — *Africana*, foliis *Stachados Citrinae*, brevioribus, tomentosis.

— — — — — radice tuberosa. *H. L. B. app.*

— — — — — maxima, *Hormini* foliis, frutescens, floribus parvis.

— — — — — lutea, folio obtuso, dentato.

— — — — — foliis *Veronicae*, hirsutis, ternis.

JUJUBE, seu ZIZYPHUS Africana, Ulmi minoribus foliis, flore violaceo, non spinosa.

Ulmi facie arbuscula *Æthiopica*, ramulis alatis, floribus purpurascens. *Cat.*

Hort. Beaumont.

— — — — — *Africana*, longissimis, & acutissimis spinis horrida, *Loti arboris* folio,
fructu subrotundo, parvo, dulci. *Cat. Hort. Beaumont.*

JUNCCELLUS Africanus.

JUNCELLUS Africanus, spica compressa, disticha, brevi.

JUNCUS Africanus, laevis, panicula glomerata, prope summitatem caulis.

———— capitulis Equiseti, paniculatis.

———— squammatis, pendulis.

———— capite pectinato.

JUNIPERI foliis frutex Africanus. *Par. Bat. pr.*

LACRYMA Jobi Africana, maxima.

LAPATHUM Africanum, facie Acetosae lanceolatae.

LAURUS Alexandrina, Africana.

———— Africana, ferrata, odorata. *Stapel.*

———— latifolia. Laurus Africana, ferratis foliis. *Act. Hafn.*

———— angustifolia.

———— foliis Ilicis subrotundis, parvis, racemifera.

LARIX Africana, Linariae acutis foliis, singularibus.

LEUCOS Africana, foliis villosis admodum, instar Marrubii albi, *Caspar. Baub.*, floribus parvis, tubulosis.

LEUCOXYLUM Africanum, seu arbor baccifera, foliis alternis, Laurinis.

———— baccis onusta. ————— plurimis,

———— foliis ex opposito subrotundis, bacca polypyrena, acidula.

———— Idem, foliis acuminatis.

LEUCOJUM Africanum, album, angustifolium.

———— coeruleum, folio angustissimo, glabro.

———— hirsutum, foliis Coronopi latis, flore coeruleo.

———— angustis, flore coeruleo, amplo.

———— minus.

LEUCOJUM BULBOSUM, Africanum, foliis angustissimis.

LILIUM Africanum, umbellatum, purpureum, ad Solem micis aureis adspersum.

———— humile, monanthos.

———— Narcissinis foliis, Polyanthos, elatius, saturo colore purpurascens. *H. L. B.* Narcissus Indicus, Liliaceus, saturo colore purpurascens. *Ferr. Fl. cult.*

———— Idem, colore diluto purpurascens. Narcissus Indicus, Liliaceus, diluto colore purpurascens. *Ferr. Fl. cult.*

———— humilius, longissimis foliis, polyanthos, saturo colore purpurascens. *H. L. B.*

———— Idem, diluto colore purpurascens. *H. L. B.*

———— sphaericum, floribus phoeniceis, majoribus, bulbo rotundo. *H. L. B.*

———— minoribus, obsolete purpureis, foliis guttatis, ad margines ciliis instar pilosis, bulbo oblongo. *H. L. B.*

LILIO ASPHODELUS Africanus, flore ex albo, coeruleo, & carneo variegatus. *Inter depictas Dominae de Flines.*

LIMONIUM Africanum, Oleae folio.

LIMONIUM Africanum, minimum.

LINUM Africanum, luteum.

LOTUS Africanus, capitulis alopecuroidibus, pediculis longis insidentibus.

LYCHNIS Africana, minima, folio angustissimo, viridi, flore purpureo, capsulis turgidis, striatis.

————— Pseudomelanthio similis, glabra, angustifolia. *H. L. B.* Lychnis segetum, Nigellastrum, minus, glabrum, dictum, flore eleganter rubello. *Mar. Hist.*

————— Lychnidis silvestris rubrae folio, flore pulchro, rubello, capsulis vesiculatis.

————— Eadem, angustioribus foliis, capsulis longissimis.

LYCIUM Africanum, rotundifolium, incanum, majus. *Belgis Lepelhout.*

————— minus.

————— longioribus foliis.

————— foliis Cerasi.

————— non spinosum, crassis & incanis foliis. *Par. Bat. pr.*

————— rotundo, crenato folio, fructu Cerasi rubro. Cerasus Hottentottorum. *Cat. Hort. Beaumont.*

————— spinosum, Beberidis foliis.

————— spinis longissimis.

————— Pyracanthæ foliis.

————— Betulae foliis. *Par. Bat. pr.*

————— Rhamni Cathartici foliis, spinosum.

LYCIO forte affinis Africana, floribus in Corymbis Moschum olentibus, foliis Paliuri.

MAJORANA Africana, frutescens, foliis tomentosis.

MARRUBIUM Africanum, Pseudodictamni foliis, floribus rubris.

MELAMPYRUM Africanum, spicatum, foliis angustissimis, dentatis.

MELIANTHUS Africanus. *H. L. B.*

————— foetidus, minor.

————— humilis, foliis minoribus.

MERCURIALIS Africana, minor, lucida.

MYRTO-BUXUS Africana, foliis rotundioribus. Buxus Africana, rotundifolia, serrata. *Par. Bat. pr.*

————— longioribus, fructu duro, monococco.

MYRTUS Africana, latifolia.

————— humilis, foliis rotundioribus.

————— foliis Myrtilli crenatis, cauliculis nigricantibus. *H. L. B.*

Frutex Æthiopicus, baccifer, foliis Myrtilli. *Breyn. Cent. 1.*

————— Eadem, foliis minoribus, angustioribus, & oblongioribus. *Breyn. Cent. 1.*

NASTURTIUM Africanum, floribus spicatis, foliis ternis, Christophoriana facie. *Par. Bat. pr.*

NASTURTIOLUM Africanum, cauliculis procumbentibus, foliis Hyoseridis, flore purpureo.

————— Idem, capitulis turgidis, majus.

- OLEA Africana, silvestris, fructu Olivae, minori.
 ————— folio longiore, acuto.
 ————— humilis, lucida. *Par. Bat. pr.*
 ————— silvestris, folio Phyllireae primae Clusii. *Belgis Pylbous.*
 OLEAE FOLIO arbor Africana, spicata, papposa.
 ————— frutex Africanus.
 ORCHIS Africana, latifolia, altissima, flore luteo. Orchis maximus, flore luteo. *Breyn.*
 ————— foliis junceis, floribus luteis, fundo purpureo.
 ————— angustissimis.
 ————— abortiva, foliis angustis, caulem amplectentibus, spica longa, densa.
 OROBANCHE Africana, ramosa.
 OROBUS Africanus, foliis minoribus, floribus globosis.
 ————— purpureus, foliis & siliquis glabris, floribus spicatis.
 ————— glaber, foliis angustis.
 ORNITHOGALUM Africanum, spicatum, luteum.
 ————— luteum, odoratum, foliis Cepaceis, radice tuberosa,
 five Cyclaminis. *H. L. B.*
 ————— flore viridi, alterno, alteri innato. *an Ornithogalum,*
 flore luteo, virescente, Indicum? *Cornuti.*
 ————— spicatum, album. *H. L. B.*
 OXYS Africana, folio & flore parvo, albente, radice Asphodeli. *Par. Bat. pr. Tri-*
 folium bulbosum, flore albo, Promont. Bonae Spei. *Stapel.*
 ————— flore albente, ad foliorum exortus bulbifera.
 ————— alba, foliis, & floribus minimis.
 ————— alba, foliis hirsutis, flore amplo, albo.
 ————— flore purpureo, magno, radice bulbosa. *H. L. B.*
 ————— bulbifera, foliis cordatis, floribus luteis, umbellatis.
 ————— foliis cordatis, hirsutis, floribus luteis, umbellatis, amplis.
 ————— flore magno, foliis pedem Caprinum referentibus, in summitate
 caulis.
 ————— foliis angustis, incanis, radice magna, bulbosa. *Acetosa bulbosa,*
Stapel.
 ————— angustissimis, dentatis foliis.
 ————— ramosa, foliis angustis, incanis, flore purpureo.
 ————— heptaphylla, flore magno.
 PERICLYMENUM Africanum, foliis lucidis, acuminatis, leviter serratis.
 PERSICA MALUS Africana, nana, flore incarnato, simplici.
 ————— eadem, flore incarnato, pleno. *H. L. B.*
 PHALANGIUM ramosum, Africanum, floribus albis, fuscis lineis insignitis. *Par. Bat. pr.*
 PHASEOLUS Africanus, luteus, annuus, minor.
 ————— siliquis brevibus, depressis.
 ————— annuus, minor, floribus rubellis, seu ex rubro eleganter
 variegatis.
 ————— flore singulari, siliqua brevi, tumida, semen unicum includente.

PHASEOLUS Africanus, floribus spicatis, rubris.

————— humilis, acaulos.

PHELLANDRIUM Africanum, humile, foliis crispis.

PHILLYREA Africana, Oleae folio, floribus albis, racemosis. *Slangenhout.*

————— eadem, folio & fructu majoribus.

PHYLLITIS Africana, ramosa.

————— altera, ramosior.

PINI FOLIIS Planta Africana, Cyperi capitulis.

PISTACHIA Africana, trifolia, foliis longis, angustis, ferratis.

PIPERITIS Africana, frutescens. *Peperboom.*

PLANTA Africana, anomala, foliis binis, in summitate instar Cornuum Cervi divisis, floribus staminosis, ad exortum divaricationis.

————— folio longo, instar Plantaginis aquaticae.

POLYGALA Africana, frutescens, latifolia, & major. *Par. Bat. pr.* Polygala Africana, frutescens, Myrtifolia, flore purpurascens. *Breyn. prodr. 2.*

————— foliis latioribus, hirsutis.

————— eadem, glabra.

————— foliis angustissimis, floribus minoribus.

————— Thymi foliis.

POLYGONOIDES Africana, foliis capillaceis.

POLYGONUM Africanum, foliis angustissimis.

POLYPODIUM Africanum, minimum, facie Ceterach. *Par. Bat. pr. app.*

PORTULACA Africana, procumbens, Polyanthos, lutea.

PULSATILLA Africana, Apii folio rigido, flore magno.

RANUNCULUS Africanus, pratensi hirsuto similis.

————— aquaticus, folio capillaceo.

RAPUNCULUS Africanus, galericulatus, annuus, minor, foliolis dentatis. *Par. Bat. pr.*

————— folio Thymbrae, flore galeato. Thymbra Africana, flore purpureo. *Act. Hafn.*

————— foliis Violae Martiae minoribus, flore galeato, coerules.

————— altissimus, floribus in summitate, foliis crenatis.

————— spicatus, foliis latis, crenatis.

————— humi fusus, flagellis longissimis, Thymi vel Polygoni foliis, angustis.

————— hirsutus, foliis dentatis, capsula turgida.

————— ramosus, foliis dentatis, floribus Gladioli, lacustris.

————— ramosus, flore albo, Drabae minoris folio.

RAPUNTIIUM Æthiopicum, flore violaceo, galeato, folio Pinastris.

————— coerules, galeato, foliis Coronopi.

————— foliolis dentatis. *Breyn. Cent. 1.*

RHAMNUS Africana, Cerasi fructu; Cerasa Hottentottorum. *Par. Bat. pr.*

————— angustifolius, spinosus, cortice albo.

RHUS Africanum, trifoliatum, majus, folio rotundo, glabro. Lentiscus Africana, trifolia, humilis. *Par. Bat. pr.*

RHUS

Rhus Africanum, idem minus. Rhus trifoliatum, Africanum, glabrum, folio splendente, subrotundo, integro. *Plukn.*

—— trifoliatum, foliis oblongis, integris.

—— majus, lato, angusto, nonnunquam crenato folio.

Rhus trifoliatum Africanum, majus, foliis subtus argenteis, & margine incis. *Plukn.*

—— lato, anguloso, folio subtus incano.

—— angustissimo folio, altera parte incano, seu Agni casti folio.

—— foliis crenatis, & hirsutis. Rhus Africanum, trifoliatum, majus, foliis obtusis, & incis, hirsutis. *Plukn.*

—— trifoliatum, foliis rotundis, hirsutis. Rhus Africanum, trifoliatum, majus, folio subrotundo, integro, molli, & incano. *Plukn.*

RORISMARINI FOLIIS ternis, angustis, frutescens planta, Africana, floribus spicatis, pentapetalis, minimis.

—— Eadem minor.

Ros SOLIS Africanus, minimus, foliis oblongo-rotundis.

—— folio lato, & longo.

—— foliis longis, angustioribus.

—— Cistoides, foliis oblongis per caulem dispositis.

RUBIA Africana, foliis Rorismarini angustis.

RUBIAE Cruciatæ Columnæ similis, planta Africana, erecta, foliis brevibus, succulentis.

SABINA Africana, conifera.

SALVIA Africana, arborescens, major, folio Verbasci. *Breyn. Cent. 1.* Salvia Indica, arborescens *Bontii.*

SCABIOSA Africana, frutescens, maxima, foliis rugosis, & crenatis, integris, capite rotundo. *Par. Bat.*

—— Eadem minor. *Par. Bat.*

—— frutescens, dissectis foliis, subhirsutis, flore purpureo. *Par. Lat.*

—— Eadem, flore coeruleo. *Par. Bat.*

—— per totam aetatem florens.

—— Æthiopica, frutescens, foliis lanuginosis, flore coeruleo, purpurascente.

Breyn.

—— Eadem flore coeruleo.

—— Eadem foliis profunde laciniatis. *Breyn.*

—— Africana, perennis, foliis dissectis, lucidis, glabris. *Par. Bat. pr.*

—— Eadem foliis glabris, & candicantibus, flore pallide coeruleo.

Par. Bat. pr. app.

SCILLA Africana, flore viridi, parvo, bulbo amplissimo, lanuginoso. *H. L. B.*

SCOLYMOCEPHALOS Africana, lato, rotundo, glabro folio, cono maximo, sericeo, candido.

—— foliis subrotundis, glabris, minor.

—— foliis longis, glabris, cono sericeo, squamis rubiginea villosa crista ornatis.

—— cono variegato, resinifero.

—— foliis oblongis, glabris, humilis, & procumbens.

SCOLYMOCEPHALOS Africana, foliis oblongis, glabris, crassis, latioribus.

— — — — foliis longis, acutioribus, hirsutis, cono mellifero.

— — — — foliis sericeis, argenteis, longis, acutis. *Silverboom.*

Leucodendros Africana, arbor tota argentea, sericea, foliis integris. *Plukn.*

— — — — latifolia, lanuginosa, foliis in summitate crenatis.

Kreupelboom. Salix conophoros, Africana, lato, obtuso, crenato, folio lanuginoso.

Par. Bat. pr. Leucodendro affinis arbor Africana, argentea, foliorum summis crenaturis florida. *Plukn.*

— — — — latifolia, lanuginosa, foliis in summitate crenatis, cono sericeo.

— — — — latifolia, lanuginosa, foliis in summitate crenatis, cono filamentis longis recurvis ornato, facie Rapunculi corniculati.

— — — — latifolia, foliis Meserei Germanici, dense stipatis, capitulis rarioribus, pluribus filamentis donatis.

— — — — foliis brevioribus, in tubercula desinentibus.

— — — — foliis longis, angustis, Crithmi, in summitate dentatis.

— — — — foliis angustis, brevioribus, tribus in summitate denticulis, capitulis foliolis interceptis.

— — — — humilis, floribus dilute purpureis, carinula albida, foliis in summitate dentatis.

— — — — argenteus, foliis brevioribus, Myrtiformibus, capitulis rarioribus.

— — — — foliis longis, glabris, angustis.

— — — — humilis, foliis Thymelaeae. Frutex Æthiopicus, conifer, foliis Cneori, Salici aemulus. *Breyn. Cent. 1.*

— — — — foliis Doricnii Plateau.

— — — — folio angustissimo, sericeo, viridante.

— — — — foliis longis, angustis, asperis.

— — — — foliis Rorismarini, acutis.

SEDUM Africanum, minimum, Ficoides, & Centaurioides.

— — — — — flore muscoso.

— — — — frutescens, incanum, orbiculatis foliis. *H. L. B.*

— — — — viride, orbiculatis foliis, minoribus, floribus Hemerocallidis pendulis, rubris.

— — — — foliis longioribus, floribus Hemerocallidis. *H. A.*

— — — — humilius, folio Ficoidis, glauco, brevi, floribus umbellatis.

— — — — Idem folio glauco, crassiori.

— — — — foliis Ficoidis, longioribus, acutis, floribus minimis, in capitula conglobatis.

— — — — elatius, Ficoidis folio glauco, floribus umbellatis.

— — — — album, umbellatum. *H. L. B.*

— — — — annuum, Centaurii minoris facie, flore aureo. *H. L. B.*

— — — — Centaurioridis, luteum, foliis acutis.

SENECIO Africanus, foetidus, annuus, foliis confertim nascentibus. *Breyn. Conyza*
Africana, Senecionis flore, foliis retusis *H. L. B.* SIDE.

SIDERITIS Africana, Teucris, vel Veronicæ folio, flore rubro.

SIDERITIDIS FACIE Planta Africana.

SIDEROXYLUM Africanum, seu Lignum ferrea duritie, folio oblongo. Lignum ferreum
Par. Bat. pr.

— — — — Idem, folio subrotundo.

— — — — Idem foliis Laurinis, lucidis.

— — — — Idem foliis oblongis, utrimque glaucis.

SISYNRIGHIUM Africanum, flore Phalangii albo, bulbiferum.

— — — — Idem luteum.

— — — — Idem rubrum.

— — — — Idem floribus Liliaceis, coeruleis, foliis nervosis, hirsutis.

— — — — Idem floribus minoribus, & ramosius.

— — — — Idem floribus minoribus, non ramosum.

— — — — Phalangii flore magno, ex coeruleo & albo variegato.

— — — — minimum, floribus longissimo tubo donatis, foliis gramineis, hirsutis.

— — — — ramosum, foliis nervosis, floribus longis, tubo donatis.

— — — — foliis Colchici, floribus Fritillariæ instar undulatis, floribus longissimis, tubo donatis.

— — — — ramosum, floribus undulatis.

— — — — flore coeruleo, Iridis seu Sisynrichii Clusii.

— — — — ramosum, umbellatum, floribus coeruleis.

— — — — Idem floribus albis.

— — — — foliis binis, longis, Helleborini montani.

— — — — Æthiopicum, flore ex Phoeniceo, suave rubente. *Breyn. Cent. I.*

— — — — Idem, flore albo. *H. L. B.*

— — — — Idem, flore intus albo, foris purpureo, violaceo. *Par. Bat. pr.*

— — — — flore aureo. *Par. Bat. pr.*

— — — — floribus parvis, flavescentibus. *Par. Bat. pr.*

— — — — flore pentapetalo, albo. *Par. Bat. pr.*

— — — — Idem, flore obsoleto. *Par. Bat. pr.*

— — — — petalis tribus externis majoribus, & tribus internis minoribus, & bifidis. *Par. Bat. pr.*

— — — — pumilum, spicatum. *Par. Bat. pr.*

— — — — flore pallescente, foliis Gladioli parvis. *H. L. B.*

— — — — ramosum, foliis plicatis, nervosis, & incanis, radice tuberosa, phoenicea. *Breyn. Cent. I.*

— — — — Africanum, floribus luteis, dodecapetalis. *Inter depictas Dominae de Flines.*

— — — — latifolium, foliis Iridem referentibus. *Inter depictas Dominae de Flines.*

— — — — Croco-Colchicum dictum. *an Sisynrichium Indicum Cornuti?*

SISYNRICHII Africanum, enneapetalon, album, foliis ad basin punctatis, tribus majoribus externis, tribus internis minoribus, bifidis, fuscis, & tribus longioribus, bifidis, albis.

SPIR.

SPIRAEA Africana, Cisti folio.

SPARTIUM Africanum, foliis junceis, sesquiuncialibus, floribus parvis, siliqua splendente, acuminata.

— — — flore purpureo. Genista-Spartium coeruleum, Capitis Bonae Spei. *Breyn. Cent. 1.*

— — — luteum, spicatum, foliis Linariae angustissimis.

SOLANUM Africanum, arborescens, pomiferum.

— — — — latifolium, floribus pendulis, baccis coeruleo-purpurascentibus.

— — — Idem floribus albis.

— — — scandens, foliis Bryoniae. Bryonia Africana, foliis Lupuli scabris. *Plukn.*

— — — frutescens, foliis Lauri Tini. *an* Frutex anonymos foliis Lauri Tini minoris? *Breyn. fasc.*

— — — pomiferum, spinosum, nigricans, Borriginis flore, foliis profunde laciniatis. *H. L. B.*

— — — bacciferum, vulgari simile, foliis frequentius, & profundius crenatis. *Par. Bat. pr.*

— — — incanum, pomiferum, spinosum, fructu sulcato, rubro. *Par. Bat. pr.*

— — — spinosum, Rhamni facie, foliis angustissimis, flore oblongo, tubuloso, fusco.

— — — Idem, foliis latioribus, instar Rhamni, flore coeruleo, bacca rubra.

— — — Idem, foliis Rhamno Monspeffulano Joann. Bauhini adhuc latioribus.

STAPHYLODENDRON Africanum, folio lucido, singulari. *Par. Bat. pr. Swarte bastboom.*

Arbor quaedam rarissima, lucens, fructu Iallicacabi. *Breyn.*

THYMELAEA Africana, Sanamundae facie, Erica foliis angustissimis. *Par. Bat. pr. an* Sanamunda Africana, foliis angustissimis, candicantibus. *Breyn.*

— — — Linifoliae similis, floribus pallidis, odoratissimis. *Par. Bat. pr.*

— — — foliis Polygalae glabris, brevioribus. *an* Sanamunda Africana quarta, sive foliis glabris, acutis. *Breyn. Fasc. ?*

— — — foliis Sanamundae primae Clusii.

— — — foliis Plegmariae squammatim dispositis, ramulis spicatis.

— — — — latioribus, viridibus, capitulis lanuginosis.

— — — — longioribus, ramulis spicatis.

— — — folio Ledi Selesiaci angustioribus, floribus umbellatis.

— — — folio Abietis, floribus umbellatis, carneis.

— — — foliis Lini angustissimis, floribus umbellatis, albis.

— — — foliis Satureae argute denticulatis, floribus in capitula congestis.

— — — foliis angustis, raris.

— — — Eadem foliis raris, brevioribus, minor.

— — — foliis Jumperi, floribus luteis.

- THYMELAEA Africana, foliis Rorismarini minoribus, floribus Jasmini.
 — — — foliis brevissimis, floribus conglobatis.
 — — — Æthiopica, Passerinae foliis. *Breyn. Cent. 1.*
 — — — Africana, foliis Abietis, capitulis villosis.
 — — — Linifoliae similis, Africana, foliis lucidis, latioribus, & obtusis. *Par. Bat. pr.*
 TITHYMALUS Africanus, frutescens.
 — — — angustifolius.
 — — — Amygdaloides.
 — — — foliis Lini angustioribus.
 — — — flore herbaceo, folio Genistae.
 — — — dendroides.
 — — — humilis, radice tuberosa, foliis oblongis, in summo cordatis, pediculis insidentibus biuncialibus.
 TRIFOLIUM Africanum, foliis minimis, cordatis, floribus Trifolii Vesicarii.
 TUSSILAGO Africana, Petasitoides, caule foliorum alato, hirsuto.
 — — — humilis, flore majore, fere aphyllus.
 VERBENA Africana, foliis Verbenae nodiflorae lanuginosis. Verbena Indica, lanuginosa *Stapel.* Verbena Africana, lanuginosa, flore rubente. *Act. Hafn.*
 — — — Eadem foliis viridibus. Verbena Indica minor, flore luteo. *Act. Hafn.*
 — — — foliis latioribus, ferratis, hirsutis.
 — — — frutescens, spicata, foliis angustioribus, ferratis.
 — — — spicata, foliis Ericae.
 — — — umbellata, foliis angustissimis, ferratis.
 VERONICA Africana, floribus luteis, tubo longo donatis.
 — — — floribus ad genicula pediculis biuncialibus insidentibus.
 VITI IDEAE similis frutex Africanus. *Par. Bat. pr. an Viti Ideae secundae Clusii similis, Breyn.*
 XERANTHEMUM Africanum, frutescens, lanuginosum, floribus argenteis, amplissimis, umbone fusco.
 — — — foliis tomentosis, longis, capitulis argenteis, minoribus.
 — — — frutescens, caulibus Genistae, foliis juncis, capitulis copiosis, argenteis.
 — — — lanuginosum, capite sulphureo, amplo.
 — — — Idem, capitulis sulphureis, minoribus.
 — — — minus, capitulis brevissimis, argenteis, foliis caulem amplectentibus.
 — — — frutescens, Thymi foliis incanis.
 — — — Majoranae foliis minoribus.
 XERANTHEMI species, foliis candidis.
 ZIZYPHUS Africana, spinis validissimis armata.

CATALOGUS ALTER PLANTARUM AFRICANARUM,

Quas *Henricus Bernardus Oldenlandus*, & *Joannes Hartog*,
Botanici egregii, in Capite Bonae Spei quondam
invenerunt, ac denominaverunt.

ABUTILON Africanum, foliis rugosis, & filiculis lanuginosis. *Simon Pauli in quadr. Botan. pag. 186.*

ABSINTHIUM Africanum, frutescens, foliis latioribus.

ALATERNOIDES Africana, Ericae foliis, floribus albicantibus, & muscosis.

————— Telephii legitimi Imperati folio, flore viridi.

————— Lauri ferratae foliis.

————— Chamaemespili folio, rigidior & minore, floribus albicantibus.

————— Rorismarini latiori & pilosiori folio, flore coeruleo.

ALLIUM Africanum, flore purpurascens.

ALOE Africana, arborecens, montana, non spinosa, folio longissimo, plicatili, flore rubro.

————— arborecens, floribus albicantibus, fragrantissimis.

————— caulescens, foliis spinosis, maculis ab utraque parte albicantibus notatis.

————— brevissimo, crassissimoque folio, flore subviridi.

————— folio glabro, rigidissimo, flore subviridi.

————— flore rubro, folio maculis ab utraque parte albicantibus notato.

————— flore rubro, folio triangulari, & verrucis ab utraque parte albicantibus notato.

————— folio in summitate triangulari, margaritifera, flore subviridi.

————— margaritifera, minor.

————— foliis glaucis, margine & dorsi parte superiore spinosis, flore rubro.

————— foliis glaucis, margine dorsi integro, spinosis.

————— caulescens, foliis glaucis, caulem amplectentibus.

————— folio triangulo, & longissimo, floribus luteis, & foetidis.

————— caulescens, foliis magis glaucis, caulem amplectentibus, & in mucronem obtusorem desinentibus.

————— caulescens, foliis minus glaucis, caulem amplectentibus, dorsi parte superiore spinosa.

- ALOE** Africana, caulescens, foliis glaucis, caulem amplectentibus, latioribus, & undiquaque spinosis.
- foliis glaucis, caulem amplectentibus, dorso integro spinoso.
- foliis glaucis, brevioribus, amplectentibus, foliorum parte interna & externa non nihil spinosa.
- foliis glaucis, brevissimis, foliorum summitate interna, & externa non nihil spinosa.
- perfoliata, glauca, & non spinosa.
- glabro folio, minutissimis cavitatibus donato.
- humilis, spinis inermibus, & verrucis obsita.
- Arachnoidaea.
- foliis ex albo & viridi variegatis.
- folio non nihil reflexo, floribus ex albo & rubro variegatis.
- folio in summitate triangulari, & rigidissimo, marginibus albicantibus.
- erecta, triangularis, & triangulari folio, viscoso.
- rotunda, folio parvo, & in acumen rigidissimum exeunte.
- ALTHAEA** Africana, vesicaria.
- AMYGDALUS** Africana, nana, flore incarnato, roseo, simplici, folio Mali Persicae angustiore.
- nana, flore incarnato, roseo, pleno, folio Mali Persicae angustiore.
- ANEMONOSPERMOS** Africana, foliis Cardui Benedicti, florum radiis intus sulphureis.
- foliis Plantaginis, flore sulphureo.
- folio Jacobaeae maritimae, flore sulphureo.
- APOCYNUM** Africanum, erectum, villoso fructu, Salicis folio, lato, glabro.
- subhirsuto.
- glabro, angusto.
- subhirsutum, foliis undulatis.
- humile, aizoides, siliquis erectis.
- scandens Africanum, Vincae Pervincae foliis, subincanum.
- Africanum, Asphodeli radice, angustissimo folio.
- Lapathi folio.
- ARGYRODENDROS** foliis sericeis, & argenteis.
- ARUM** Æthiopicum florigerum, & fructum ferens, radice magna, orbiculari.
- maximum Ægyptiacum, quod vulgo Colocasia audit.
- Africanum, flore albo, odorato.
- ASCLEPIAS** Africana, aizoides.
- longioribus foliis, minus dentatis.
- flore pulchro, fimbriato.
- ASPARAGUS** sylvestris, Africanus, aculeatus.
- ASPHODELUS** Africanus, angustifolius, luteus, minor.
- ASPLENIUM** Africanum, ramosum, maximum, caulibus splendentibus.

ASTER Africanus, Jacobaeae foliis, flore aureo.

— — — Stoechadis foliis, flore aureo.

— — ramosus, Hyslopi foliis, floribus coeruleis.

albis.

— — Helichrifi folio, flore rubro.

frutescens, foliis angustis, & plerumque conjunctis.

pendentibus, parvis, & reflexis foliis.

— — — Lavendulae foliis, flore purpureo.

— — annuus, Senecionis foliis.

frutescens, foliis Senecionis crassioribus.

ASTEROPLATU-CARPOS *Africana*, frutescens, Crithmi marini foliis.

ASTRAGALUS Africanus, odoratus, filiqua triangulari, flore luteo.

BELLIS Africana, florum pediculis pene aphyllis, foliis incis.

foliosis, foliis angustis, & integris.

capitulo aphylo, luteo, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus.

ceis, erectis. foliis, & cauliculis jun-

BRYONIA Africana, glabra, foliis in profundas lacinias divisis, fructu minore.

— — — laciniata, tuberosa radice, floribus herbaceis.

CALENDULA, five *Caltha Africana humilis*, floré intus albo, foris v

CAMPANULA Africana, annua, hirsuta, latis ferratisque foliis, flore magno, violaceo.

— — — — glabra, ferrato folio, flore pallido.

— — — hirsuta, parvo angustoque folio, flore pall.

— — — annua, angustifolia, flore purpurascente, major.

mine

— — — frutescens, aculeosa, flore violaceo.

— — — minor, Erini facie, flore violaceo, c

procu

CAMPBORATA Africana, umbellata, frutescens.

CARDAMINE, seu Nasturtium Africanum, foliis

CENTAURIUM MAJUS Africanum, laciniatum, flore aureo, odorato.

— — MINUS Africanum, Lini foliis, & facie, flore amplo, suave rube

— — — arborescens, latifolium, flore rube

angustifolium, —

— — — — tulipiferum.

CHEIRANTHOS Africană, flore luteo.

CHRYSANTHEMUM Africanum, Stoebes foliis angustioribus.

repens, flore aphylo, Coronopi folio.

CHRYSANthemoides osteospermon, Africanum, odoratum

Cistus humilis, *aizoides*, *maritimus*, *Africanus*, flore rubello.

COLUTEA Africana, annua, foliis parvis mucronatis, vesiculis compressis.

— — — cordatis, & vesiculis minus cor

COLUTEA

COLUTEA Africana, Sennae foliis, flore sanguineo.

— — — — — humilis, flore sanguineo, Crotolariae siliquis.

COMA AUREA Africana, fruticans, foliis Linariae angustis, major.

— — — — — angustioribus, minor.

— — — — — glaucis, & lanuginosis.

— — — — — omnium maxima, foliis tomentosis, & incanis.

— — — — — Erica folio.

— — — — — foliis glaucis, & in extremitate trifidis.

— — — — — Crithmi marini.

— — — — — inferioribus incis, superioribus dentatis.

CONYZA Africana, arborescens, incana, floribus purpureo-violaceis, foliis Salviae, odore Salviae & Rorismarini.

— — — — — humilis, foliis angustioribus, nervosis, floribus umbellatis.

— — — — — frutescens, foliis Salviae, odore Camphorae.

— — — — — Erucae hamatis, & incanis.

— — — — — Rorismarini.

— — — — — Senecionis flore.

COTULA Africana, calice eleganti, caesio.

COTYLEDON Africanum, frutescens, foliis orbiculatis, limbo purpureo cinctis.

— — — — — tereti folio, flore pulcherrimo.

— — — — — foliis oblongis, floribus umbellatis, fibrosa radice.

— — — — — frutescens, folio longo, angusto, flore flavescente.

— — — — — flore umbellato, coccineo.

CYTISUS Africanus, argenteus, flore atro-purpureo.

— — — — — hirsutus, angustifolius.

— — — — — herbaceus, floribus rubris.

ECHIUM Africanum, frutescens, foliis pilosis.

— — — — — perenne, Lycopsis facie.

ELICHRYSUM Africanum, lanuginosum, latifolium, calice floris argenteo, & amplissimo.

— — — — — lanuginosum, angustissimo folio, calice floris argenteo, & amplissimo.

— — — — — tomentosum, frutescens, calice argenteo.

— — — — — floris calice aureo.

— — — — — frutescens, Coridis folio.

— — — — — incanum, tomentosum, foliis subrotundis.

— — — — — umbellatum, odoratum, luteum.

— — — — — frutescens, angustis, & longioribus foliis, incanis.

— — — — — latifolium, foetidum, capitulo argenteo; & aureo.

— — — — — luteum, Polii folio.

— — — — — tomentosum, incanum, angustifolium, floribus rubris.

— — — — — frutescens, foliis Chrithmi marini.

— — — — — arboreum, Rorismarini folio.

— — — — — Plantaginis folio.

ELICHRYSUM Africanum, foetidissimum, amplissimo folio.

— inodorum, glabrum, Coronopi folio.

EPHEMERUM Africanum, annuum, flore bipetalo.

ERICA Africana, viridis, angustissimis foliis, flosculis in capitulum congestis.

— flosculis subhirsutis, secundum ramulos dispositis.

— incana, foliis angustissimis.

— capillaceo, brevique folio, flore rotundiore, purpureo.

— folio minimo, flore rotundiori, albido.

— Coris folio, flore oblongo, spicato.

— purpureo, è foliorum alis prodeunte.

— breviori, purpureo,

— floribus vesicariis.

— Juniperi folio, flore oblongo, spicato.

— umbellato.

EUONYMUS Africanus, folio lucido, ferrato.

FABAGO Africana, arborescens, flore sulphureo, fructu rotundo.

FERULA Africana, galbanifera, frutescens, Myrrhidis foliis.

FICOIDES Africana, folio Plantaginis undulato, micis argenteis adperso.

— acaulos, latissimis, crassis, & lucidis foliis conjugatis, flore aureo, amplissimo.

— erecta, Ocymastri folio, micis argenteis adperso, flore roseo, magno.

— ramosa, Tripolii folio, flore aureo, magno.

— seu Ficus aizoides, Africana, folio angustiori.

— minor, multicaulis, flore intus rubente, extus incarnato.

— Africana, folio ensiformi, dilute virenti, flore aureo, brevi pediculo insidente.

— obscure virenti, flore longo pediculo insidente.

— varie inciso, aureo flore pediculo insidente.

— seu Ficus aizoides, Africana, procumbens, folio triangulari, ensiformi.

— triangulari folio, longissimo, fructu multicap-
fulari, flore luteo, major, & altera minor.

— folio triangulari, longissimo, flore aureo.

— flore purpureo.

— flore carneo.

— seu Ficus aizoides, Africana, major, procumbens, triangulari folio, fructu maximo, eduli.

— Africana, folio longo, triangulari, incurvo, purpureo caule.

— triangulari, recurvo, floribus umbellatis, obsoleti coloris, externe purpureis.

— flore flavescente.

— lanceato.

— incurvo, & dentato.

— obtuso, in geminos aculeos abeunte, flore aureo.

FICOR.

FICOIDES Africana, folio longo, triangulari, apice rubro, caule purpurascente.
 — seu Ficus aizoides, Africana, minor, erecta, triangulari folio, viridi, flore
 intus aureo, foris purpureo.

— — — — — glauco, flore
 luteo.

— Africana, frutescens, perfoliata, folio triangulari, glauco, punctato, cor-
 tice lignoso, tenui, candido.

— — — erecta, folio triangulari, glauco, punctis obscurioribus notato.

— — — humilis, folio triangulari, glauco, bullato, flore luteo.

— — — — — dorso aculeato, flore luteo.

— — — erecta, folio triangulari, glauco, & brevi, flore carneo.

— — — humifusa, folio triangulari, longiori, glauco, flore flavescente.

— — seu Ficus aizoides, Africana, folio tereti, procumbens, flore purpureo.

— — — — — coccineo.

— — Africana, folio tereti, in villos radiatos abeunte.

— — — aculeis longissimis, & foliatis, nascentibus ex foliorum alis.

— — — repens, & laete virens, flore purpureo.

FILICULA Africana, maxima, ramosa, pinnulis tenuius dissectis.

— — — in acutas divisa lacinias.

FILIX Africana, maxima, ramosa, pinnulis crenatis.

— — — dentata, Lonchitidis facie.

— — — ramosa, pinnulis Lonchitidis.

FOENICULUM Africanum, foliis in summitate atro-rubentibus, seminibus angustis,
 & longioribus.

FRUTEX Africanus, aromaticus, flore spicato, exiguo.

— — — Aethiopicus, Portulacae folio, flore ex albido virescente.

GALEGA Africana, floribus majoribus, & siliquis crassioribus.

GENISTA Africana, frutescens, Rusci nervosis foliis.

— — — — — angustis foliis.

— — — Lavendulae folio.

— — — juncea, floribus coeruleis, foliis minimis.

— — — minima, foliis Myrthi, in exquisitum mucronem desinentibus.

— — — Rorismarini foliis, flore aureo.

— — — arborescens, argentea, lanugine pubescens.

— — — frutescens, spicata, purpurea, foliis angustissimis.

— — — — — foliis Torton-Raire, flore purpureo.

— — — Laricis foliis longioribus, & lanuginosis.

— — — — — crassioribus, & hirsutis.

— — — frutescens, spicata, Laricis foliis.

— — — — — capitata, —

— — — lutea, spicata, Laricis foliis.

— — — frutescens, capitulis lanuginosis, Laricis brevissimo folio.

— — — — — Laricis incanis foliis.

— — — Camphoratae foliis, floribus luteis, minimis.

- JACOBAEA Aricana, frutescens, Coronopi foliis.
 ——— ——— ——— Lavendulae folio latiore.
 ——— ——— ——— folio longo, & glauco.
 ——— ——— ——— Hederae terrestri folio, repens.
 ——— ——— ——— frutescens, crassis, succulentis foliis.
 ——— ——— ——— foliis rigidis, & hirsutis.
 JASMINUM Africanum, foliis solitariis, floribus vulgatori similibus.
 ——— ——— ——— Ilicis folio, flore solitario ex foliorum alis proveniente, albo.
 KETMIA Africana, Populi folio.
 ——— ——— ——— subtus incano, & caule virescente.
 ——— ——— ——— vesicaria, folio tripartito, flore purpureo.
 ——— ——— ——— fruticans, & erecta, Alni foliis latioribus, & majoribus, flore spirali, sulphureo.
 ——— ——— ——— frutescens, foliis mollibus, & incanis, flore spirali, sulphureo.
 ——— ——— ——— vesicaria, Uvae crispae foliis, flore spirali, sulphureo.
 LAURUS Africana, minor, Querci folio.
 ——— ——— ——— inodora, fructu globoso, Lauro ferratae odoratae Stapelianae similis.
 LAURIFOLIA Africana. *Swarte bastboom*.
 LEONURUS perennis, Africanus, Sideritidis folio, flore phoeniceo, majore, villosus.
 LEUCOYUM Africanum, coeruleo flore, latifolium, hirsutum.
 ——— ——— ——— ——— ——— ——— angusto Coronopi folio, majus.
 ——— ——— ——— ——— ——— ——— minus.
 LILIO-NARCISSUS Africanus, humilis, longissimis foliis, Polyanthos, saturato colore purpurascens.
 ——— ——— ——— ——— ——— ——— platycaulis, flore purpurascente, odorato.
 LOTUS Africana, annua, hirsuta, floribus luteis.
 ——— ——— ——— ——— ——— ——— frutescens, flore spicato, rubicundo.
 LYCHNIS Pseudo-Melanthio similis, Africana, glabra, angustifolia, flore eleganter rubello.
 LYCIUM Aethiopicum, Pyracanthae folio.
 MALVA Africana, frutescens, flore rubro.
 MELIANTHUS Africanus.
 ——— ——— ——— ——— ——— ——— minor, humi fusus, foliis Pimpinellae crispae.
 ——— ——— ——— ——— ——— ——— foetidus.
 MYRTUS Africana, humilis, foliis Myrtilli crenatis, cauliculis nigricantibus.
 NARCISSUS Africanus, Polyanthos.
 OLEA Africana, humilis, sylvestris, folio duro, subtus incano.
 OREOSELINUM Anizoides, arborescens, Ligustici foliis & facie, flore luteo.
 ORNITHOGALUM Africanum, luteum, odoratum, foliis Cepaceis, radice tuberosa.
 ——— ——— ——— ——— ——— ——— Plantaginis roseae folio, radice tuberosa.
 OXYS bulbosa, Africana, rotundifolia, caulibus & floribus purpureis, amplis.
 ——— ——— ——— ——— ——— ——— Aethiopica, vel Africana, minor, folio cordato, flore ex albido, purpurascente.

- PETASITES Africana, Calthae palustris folio, radice flavescente, crassa.
 PHALANGIUM Africanum, ramosum, floribus albis, petalis reflexis.
 PHASEOLUS Africanus, hirsutus, bituminosus, siliquis bullatis, flore flavo.
 ———— parvo fructu, nonnihil albicante.
 ———— perennis, minor, flore suaverubente.
 PLANTA lactaria, Africana.
 PIMPINELLA Africana, Saxifraga, maxima.
 POLYGALA Africana, frutescens, angustissimo folio, minor.
 ———— Lini folio, flore magno.
 ———— frutescens, Buxi folio, maximo flore.
 ———— arborea, Myrthifolia, floribus albis, intus purpureis.
 POLYPODIUM Africanum, maximum, acutissime divisum.
 PORTULACA Africana, sempervirens, flore rubicundo.
 PSEUDO-DICTAMNUS Africanus, Hederæ terrestris folio.
 ———— foliis subrotundis, subtus incanis.
 RANUNCULUS Africanus, seu Æthiopicus, foliis rigidis, floribus ex luteo virescentibus.
 RAPUNTIUM Africanum, minus, angustifolium, flore violaceo.
 RICINUS Africanus, maximus, caule geniculato, rutilante.
 SALIX Africana, angustis, & longissimis foliis, subtus incanis.
 SALVIA Africana, frutescens, Scorodoniae foliis, flore violaceo.
 ———— folio subrotundo, glauco, flore magno, aureo.
 SCABIOSA Africana, arborescens, maxima, foliis rugosis, & crenatis, integris.
 ———— frutescens, foliis rigidis, splendentibus, & serratis, flore albicante.
 ———— capitulo oblongo, flore albo.
 SCILLA Africana, flore viridi, parvo, bulbo amplissimo.
 SCLAREA Africana, praecox, annua.
 ———— frutescens, Helianthemis folio.
 SEDUM Africanum, fruticosum, Ericæ folio.
 ———— arborescens, incanum, foliis orbiculatis.
 ———— majus, arborescens, foliis rotundioribus, glaucis, limbo purpureo auctis.
 ———— umbellatum, album, folio viridi, angusto, mucronato, flore albo.
 ———— annuum, Centaurii minoris facie, flore aureo.
 SENECIO Africanus, arborescens, Ficoidis folio, & facie.
 SIDEROXYLUM Africanum, Cerasi folio.
 SISYNRICHIUM Æthiopicum, seu Africanum, majus, angustifolium, floribus albis.
 ———— latifolium, floribus albis, hexapetalis, lineis purpureis, striatis.
 ———— minus, latifolium, flore hexapetalo, albo.
 ———— Africanum, flore ex phoeniceo, suave rubente.
 ———— foliis Gladioli parvis, & longis, pallescente flore.
 ———— ramosum, Æthiopicum, seu Africanum, foliis plicatis, nervosis, & incanis, radice tuberosa, phoenicea.
 ———— majus, flore luteo, macula notato.

- SISYNRICHIVM Africanum, minus, angustifolium, flore majore, variegato.
 SOLANUM pomiferum, frutescens, Africanum, spinosum, nigricans, Borriginis
 flore, foliis profunde laciniatis.
 ——— lignosum, Africanum, sempervirens, Laurinis foliis.
 SPARTIVM Africanum, frutescens, Ericae folio.
 ——— ——— ——— Rusci folio, caulem amplectente.
 SPIRAEA Africana, foliis cruciatim positis.
 ——— ——— odorata, floribus plane rubentibus.
 ——— ——— foliis pilosis.
 STAPHYLODENDRON Africanum, sempervirens, foliis splendentibus.
 TANACETUM Africanum, fruticans, multiflorum, foliis Tanaceti vulgaris, decuplo
 minoribus.
 ——— ——— arborecens, foliis Lavendulae multifidae folio.
 TETRAGONOCARPOS Africanus, radice magna, tuberosa, & carnosae.
 ——— ——— ——— fruticans, foliis longis, & angustis.
 THYMELAEA Africana, Laurifoliae similis, floribus pallidis, odoratissimis.
 ——— ——— ——— foliis lucidis, latioribus, & obtusis.
 ——— ——— foliis Lini, floribus in capitulum congestis.
 ——— ——— Rorismarini folio, angustissimo, breviori.
 ——— ——— ——— ——— ——— longiori.
 ——— ——— ——— ——— ——— floribus longioribus.
 ——— ——— ——— Sanamundae facie, Ericae foliis angustissimis.
 ——— ——— ——— Tortan Raire similis, floribus in capitulum congestis.
 ——— ——— ——— foliis Rusci.
 ——— ——— ——— angustifolia, Jasmini flore.
 TITHYMALUS aizoides, Africanus, simplici, squammato, caule.
 ——— ——— ——— ——— ——— ——— Chamaenerii folio.
 ——— ——— ——— arboreus, Africanus.
 ——— ——— ——— Aethiopicus, vel Africanus, Mezerei Germanici folio, flore
 pallido.
 ——— ——— ——— aizoides, Africanus, validissimis spinis ex tuberculorum internodiis
 provenientibus.
 TRIFOLIUM Africanum, fruticans, flore purpurascens.
 ——— ——— ——— ——— ——— folio angustiore, flore rubicante.
 ——— ——— ——— ——— ——— foliis incanis, flore luteo.
 TULIPIFERA arbor Africana.
 VALERIANA Africana, fruticans, foliis longis, & angustissimis.
 ——— ——— ——— ——— foliis angustis, flore macula rubicante notato.
 ——— ——— ——— ——— fruticans foliis Ericae.
 VITIS IDAEA Aethiopica, seu Africana, Myrti Tarantini folio, flore atro-purpureo.
 ——— ——— ——— ——— ——— ——— Buxi minoris folio, floribus albidis.

PLANTAE EXOTICAE IN CAPITE BONAE SPEI

AEQUE LAETE GERMINANTES, AC IN EARUM PATRIA.

Abies. Acacia Americana, foliis Coluteae Scorpioidis leguminosae, filiquis echinatis. Acetosa hortensis. Allium sativum, & hortense. Alnus rotundifolia, glutinosa, & viridis. Aloe Americ. sobolifera. Althaea Indica, seu Rosa Sinensis. Ananas, seu Carduus Brasilianus, foliis Aloes. Apium hortense, Petroselinum vulgo. Arundo saccharifera. Asparagus sativa, seu hortensis. Beta rubra, & alba, radice Rapae. Batatas. Convolvulus. Brassica alba, & rubra, capitata, & non capitata, item florifera. Camphoraria, seu arbor Camphorifera, ex qua Camphora officinarum. Cannabis sativa, & erratica. Carduus Benedictus. Caryophyllus hortensis. Cassia Cinnamomaea, h. e. Cinnamomum, sive Canella Ceylonica. Castanea sylvestris. Cepa vulgaris. Cerasus varii generis. Chaerophyllum sativum. Cicer sativum. Cinara hortensis, foliis non aculeatis. Clematis hederacea, Indica, foliis subrotundis, flore rubente. Corylus sativa. Crista Pavonis. Cucumis vulgaris. Cucumis flos passionis dictus. Cucurbita lagenaria, & rotunda. Cupressus ramis expansis. Cyanus segetum, & hortensis flore albo, coeruleo &c. Cytisus arvensis. Datura, seu Stramonium Indica, major, foetida, pomo spinoso, oblongo. Faba leguminosa. Foeniculum vulgare, Germanicum. Fragaria ferens fraga rubra. Frumentum Indicum Saracenicum. FULLI MAGRI, qui frutex est instar Grossulariae crescens, folia ferens, Cerasi majora, flore albo, saepius pleno, odoratissimo, instar Jasmini, unde apud Italos Jasmin delmin vocatur, inde & Oleum conficiunt, quod usurpatur instar Olei Jasmini. FULLI ENWANNE est etiam Frutex ex Batavia delatus, folia ferens instar Guajavae, sed minora, & angustiora. Flores gerens fragrantissimos, luteos, instar Stellae expansos, rosaceos forte, ad altitudinem 12 pedum excrescit hic frutex. FULLI AROS BRANCHO, Malabarica dicta PELET SETTANGAN, frutex est ad hominis altitudinem excrescens, flores gerens albos & luteos instar Rosae Sinensis, folia Mali vulgaris. Flores tam amoenum spirant odorem, instar Narcissi Chonquillae dicti, in horto Societatis Indico tantum occurrunt & a foeminis ob elegantissimum, & fragrantissimum odorem maxime ibi appetuntur. Gramen vulgare, item bulbosum, & Spartium Hollandicum. Grossularia multiplici acino, sive non spinosa, hortensis, rubra & alba. Guajaca alba, dulcis, sive Guajabo, pomifera, Indica. Hordeum vernum, & hybernum. Hyacinthus albus. &c. Intibus sativa, latifolia, & crispa. Juniperus vulgaris, baccis purpureis, parvis. KAEZSCHEBYRING, Japonensibus KUTSCHINES, arbor ex insula Madagascar delata, convenit cum FULLI AROS BRANCHO, flores gerens forma, Narcissi lutei, ejusdemque odoris, qui a foeminis ob odorem maxime amatur, semen dat luteum, quo Japonenses tincturam faciunt, qua indusia tingunt. KAEYIUMAS, seu flos aureus Indorum, quae transportata est ob folia elegantia aurea, quae forma sunt Lyfimachiae foliorum, sed eleganter picta sunt ex luteo & rubro, quae aureo-lutea videntur. Flores pusilli sunt viridescentes, inodori; ob elegantissima folia in hortis colitur, quibus etiam omnes alias excellit arbores, crescit ad hominis altitudinem.